[scan 449]

$$(137)\quad \begin{cases} ST_\rho = \operatorname{Ker}\delta_\rho, \quad S'T_\rho = \operatorname{Ker}\delta_\rho^2 \\ T_\sigma = \operatorname{Ker}\varepsilon_\sigma, \quad SN'_\sigma = \operatorname{Ker}\delta'_\sigma, \quad ST_\sigma = SN'_\sigma \cap T_\sigma = \operatorname{Ker}\delta_\sigma \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad (\delta_\sigma = \delta'_\sigma | T_\sigma) \\ \mu_2 \to ST_\rho \subset S'T_\rho \qquad \text{comme composé} \qquad \mu_2 \subset G_m \xrightarrow{i_\rho} T_\sigma \\ \mu_2 \to ST_\sigma \subset SN'_\sigma \qquad \text{——————} \qquad \mu_2 \subset G_m \xrightarrow{i_\sigma} T_\sigma \end{cases},$$

$$(138)\quad \begin{cases} \Theta_G j_G : \qquad SG \hookrightarrow G, \quad \text{inclusion can} \quad (136) \\ \Theta_G j_\rho : \qquad S'T_\rho \hookrightarrow T_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} G_m \xhookrightarrow{j} G \\ \Theta_G j_\rho,\ \Theta_G j_\sigma \qquad \text{triviaux} \\ \Theta_G j_\mu : \qquad G_m \longrightarrow G_m \quad \text{incl. can.} \end{cases}$$

[scan 449]

$$(137)\quad \begin{cases} ST_\rho = \operatorname{Ker}\delta_\rho, \quad S'T_\rho = \operatorname{Ker}\delta_\rho^2 \\ T_\sigma = \operatorname{Ker}\varepsilon_\sigma, \quad SN'_\sigma = \operatorname{Ker}\delta'_\sigma, \quad ST_\sigma = SN'_\sigma \cap T_\sigma = \operatorname{Ker}\delta_\sigma \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad (\delta_\sigma = \delta'_\sigma | T_\sigma) \\ \mu_2 \to ST_\rho \subset S'T_\rho \qquad \text{comme composé} \qquad \mu_2 \subset G_m \xrightarrow{i_\rho} T_\sigma \\ \mu_2 \to ST_\sigma \subset SN'_\sigma \qquad \text{———————} \qquad \mu_2 \subset G_m \xrightarrow{i_\sigma} T_\sigma \end{cases},$$

$$(138)\quad \begin{cases} \Theta_G j_G : \qquad SG \hookrightarrow G, \quad \text{inclusion can} \quad (136) \\ \Theta_G j_\rho,\ \Theta_G j_\sigma \qquad \text{triviaux} \\ \Theta_G j_\mu : \qquad G_m \longrightarrow G_m \quad \text{incl. can.} \end{cases}$$

Apparat du scan

`140-3-s449-D001` *suppression. Manuscrit:* $\Theta_G j_\rho :\quad S'T_\rho \hookrightarrow T_\rho \xrightarrow{\delta_\rho} G_m \xhookrightarrow{j} G$

Texte: omis Motif: Passage biffé dans le manuscrit : la suppression suit l'état final de l'auteur; les doutes de lecture restent signalés.

$$(137)\quad \begin{cases} ST_\rho = \operatorname{Ker}\delta_\rho, \quad S'T_\rho = \operatorname{Ker}\delta_\rho^2 \\ T_\sigma = \operatorname{Ker}\varepsilon_\sigma, \quad SN'_\sigma = \operatorname{Ker}\delta'_\sigma, \quad ST_\sigma = SN'_\sigma \cap T_\sigma = \operatorname{Ker}\delta_\sigma \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad (\delta_\sigma = \delta'_\sigma | T_\sigma) \\ \mu_2 \to ST_\rho \subset S'T_\rho \qquad \text{comme composé} \qquad \mu_2 \subset G_m \xrightarrow{i_\rho} T_\sigma \\ \mu_2 \to ST_\sigma \subset SN'_\sigma \qquad \text{———————} \qquad \mu_2 \subset G_m \xrightarrow{i_\sigma} T_\sigma \end{cases},$$

$$(138)\quad \begin{cases} \Theta_G j_G : \qquad SG \hookrightarrow G, \quad \text{inclusion can} \quad (136) \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad \dagger \\ \qquad\qquad\quad \Theta_G j_\rho,\ \Theta_G j_\sigma \qquad \text{triviaux} \\ \Theta_G j_\mu : \qquad G_m \longrightarrow G_m \quad \text{incl. can.} \end{cases}$$

Doutes conservés dans les passages biffés.

140-3-s449-D001 $\Theta_G j_\rho \quad S'T_\rho \quad T_\rho \quad j$