BEFORE constrained-foot probe.

[scan 506]
m1

Marginal note. [m1] i.e. homomorphism of exact sequences

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & \mathcal{C}_{\rho,\sigma} L_0 & \to & B_{\rho,\sigma} & \to & \Gamma|\gamma_{\rho,\sigma} & - & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{C} & \longrightarrow & G_{\rho,\sigma} & \to & \Gamma|\gamma_{\rho,\sigma} & - & 1 \\ & & \| & & & & & & \\ & & SG_{\rho,\sigma} & & & & & & \end{array}$$

(20bis)

AFTER constrained-foot probe.

[scan 506]
m2

Marginal note. [m2] i.e. homomorphism of exact sequences

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & \mathcal{C}_{\rho,\sigma} L_0 & \to & B_{\rho,\sigma} & \to & \Gamma|\gamma_{\rho,\sigma} & - & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 1 & \longrightarrow & \mathcal{C} & \longrightarrow & G_{\rho,\sigma} & \to & \Gamma|\gamma_{\rho,\sigma} & - & 1 \\ & & \| & & & & & & \\ & & SG_{\rho,\sigma} & & & & & & \end{array}$$

(20bis)