Preceding body text.

[scan 519]

(79) If $x \in MM'^{\sim}_{0,3}$, $U = \psi_G(x)$, we have commutativity in

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \\ {\scriptstyle \mathrm{int}(x)|\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{int}(U)|\mathcal{G}} \\ \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \end{array} \tag{80}$$

Preceding body text.

[scan 519]

(79) If $x \in M'^{\sim}_{0,3}$, $U = \psi_G(x)$, we have commutativity in

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \\ {\scriptstyle \mathrm{int}(x)|\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{int}(U)|\mathcal{G}} \\ \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \end{array} \tag{80}$$

Preceding body text.

(79) If $x \in \dagger M'^{\sim}_{0,3}$, $U = \psi_G(x)$, we have commutativity in [scan 519]

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \\ {\scriptstyle \mathrm{int}(x)|\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{int}(U)|\mathcal{G}} \\ \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \end{array} \tag{80}$$