Preceding body text.

[scan 519]

(79) Si $x \in MM'^{\sim}_{0,3}$, $U = \psi_G(x)$, on a commutativité dans

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \\ {\scriptstyle \mathrm{int}(x)|\mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{int}(U)|\mathcal{G}} \\ \mathcal{G}_{0,3}^{+\wedge} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \end{array} \qquad (80)$$

Preceding body text.

[scan 519]

(79) Si $x \in M'^{\sim}_{0,3}$, $U = \psi_G(x)$, on a commutativité dans

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \\ {\scriptstyle \mathrm{int}(x)|\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{int}(U)|\mathcal{G}} \\ \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \end{array} \qquad (80)$$

Preceding body text.

(79) Si $x \in \dagger M'^{\sim}_{0,3}$, $U = \psi_G(x)$, on a commutativité dans [scan 519]

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \\ {\scriptstyle \mathrm{int}(x)|\mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{int}(U)|\mathcal{G}} \\ \mathcal{G}^{+\wedge}_{0,3} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{G} \end{array} \qquad (80)$$