Fixture fr-0-90.

[scan 495]

[p. 550] m2 49. Homomorphismes de $M_{0,3}$, les groupes $M_{\rho,\sigma}$ généraux.

Où on se met dans le bain…

Note marginale. m2 Toute cette section I semble entièrement inutile pour la suite, c'est un tâtonnement préliminaire pour déboucher sur la section II p.553.

I) Considérons un sous-groupe fermé G de $M_{0,3}$, contenant $\mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge}$, donc image inverse d'un sous-groupe fermé de $\tilde{\Gamma}_{0,3}$. On suppose que celui-ci est "suffisamment gros" — disons qu'il contienne un sous-groupe d'indice fini de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \tilde{\Gamma}_{0,3}$. Pour le moment, on suppose pour simplifier que $G \subset \operatorname{Ker} \varepsilon_3$. En résumé

$$(1) \qquad \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} \subset G \subset \widetilde{M}_{0,3}, \qquad u \in G \Longrightarrow \mu(u) \equiv 1 \ (3).$$

End of opening definition.

Fixture fr-0-170.

[scan 495]

[p. 550] 49. Homomorphismes de $M_{0,3}$, les groupes $M_{\rho,\sigma}$ généraux.
m4

Où on se met dans le bain…

Note marginale. m4 Toute cette section I semble entièrement inutile pour la suite, c'est un tâtonnement préliminaire pour déboucher sur la section II p.553.

I) Considérons un sous-groupe fermé G de $M_{0,3}$, contenant $\mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge}$, donc image inverse d'un sous-groupe fermé de $\tilde{\Gamma}_{0,3}$. On suppose que celui-ci est "suffisamment gros" — disons qu'il contienne un sous-groupe d'indice fini de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \tilde{\Gamma}_{0,3}$. Pour le moment, on suppose pour simplifier que $G \subset \operatorname{Ker} \varepsilon_3$. En résumé

$$(1) \qquad \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} \subset G \subset \widetilde{M}_{0,3}, \qquad u \in G \Longrightarrow \mu(u) \equiv 1 \ (3).$$

End of opening definition.

Fixture fr-0-260.

[scan 495]

[p. 550] m6 49. Homomorphismes de $M_{0,3}$, les groupes $M_{\rho,\sigma}$ généraux.

Où on se met dans le bain…

Note marginale. [m6] Toute cette section I semble entièrement inutile pour la suite, c'est un tâtonnement préliminaire pour déboucher sur la section II p.553.

I) Considérons un sous-groupe fermé G de $M_{0,3}$, contenant $\mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge}$, donc image inverse d'un sous-groupe fermé de $\tilde{\Gamma}_{0,3}$. On suppose que celui-ci est "suffisamment gros" — disons qu'il contienne un sous-groupe d'indice fini de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \tilde{\Gamma}_{0,3}$. Pour le moment, on suppose pour simplifier que $G \subset \operatorname{Ker} \varepsilon_3$. En résumé

$$(1) \qquad \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} \subset G \subset \widetilde{M}_{0,3}, \qquad u \in G \Longrightarrow \mu(u) \equiv 1 \ (3).$$

End of opening definition.

Fixture fr-1-90.

[scan 495]

[p. 550] m8 49. Homomorphismes de $M_{0,3}$, les groupes $M_{\rho,\sigma}$ généraux.

Où on se met dans le bain…

Note marginale. m8 Toute cette section I[i1] semble entièrement inutile pour la suite, c'est un tâtonnement préliminaire pour déboucher sur la section II p.553.

I) Considérons un sous-groupe fermé[i2] G de $M_{0,3}$, contenant $\mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge}$, donc image inverse d'un sous-groupe fermé de $\tilde{\Gamma}_{0,3}$. On suppose que celui-ci est "suffisamment gros" — disons qu'il contienne un sous-groupe d'indice fini de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \tilde{\Gamma}_{0,3}$. Pour le moment, on suppose pour simplifier que $G \subset \operatorname{Ker} \varepsilon_3$. En résumé

$$(1) \qquad \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} \subset G \subset \widetilde{M}_{0,3}, \qquad u \in G \Longrightarrow \mu(u) \equiv 1 \ (3).$$

End of opening definition.

Fixture fr-1-170.

[scan 495]

[p. 550] m10 49. Homomorphismes de $M_{0,3}$, les groupes $M_{\rho,\sigma}$ généraux.

Où on se met dans le bain…

Note marginale. m10 Toute cette section I[i1] semble entièrement inutile pour la suite, c'est un tâtonnement préliminaire pour déboucher sur la section II p.553.

I) Considérons un sous-groupe fermé[i2] G de $M_{0,3}$, contenant $\mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$, donc image inverse d'un sous-groupe fermé de $\tilde{\Gamma}_{0,3}$. On suppose que celui-ci est "suffisamment gros" — disons qu'il contienne un sous-groupe d'indice fini de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \tilde{\Gamma}_{0,3}$. Pour le moment, on suppose pour simplifier que $G \subset \operatorname{Ker} \varepsilon_3$. En résumé

$$(1) \qquad \mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3} \subset G \subset \widetilde{M}_{0,3}, \qquad u \in G \Longrightarrow \mu(u) \equiv 1 \ (3).$$

End of opening definition.

Fixture fr-1-260.

[scan 495]

[p. 550] m12 49. Homomorphismes de $M_{0,3}$, les groupes $M_{\rho,\sigma}$ généraux.

Où on se met dans le bain…

Note marginale. m12 Toute cette section I[i1] semble entièrement inutile pour la suite, c'est un tâtonnement préliminaire pour déboucher sur la section II p.553.

I) Considérons un sous-groupe fermé[i2] G de $M_{0,3}$, contenant $\mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge}$, donc image inverse d'un sous-groupe fermé de $\tilde{\Gamma}_{0,3}$. On suppose que celui-ci est "suffisamment gros" — disons qu'il contienne un sous-groupe d'indice fini de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \tilde{\Gamma}_{0,3}$. Pour le moment, on suppose pour simplifier que $G \subset \operatorname{Ker} \varepsilon_3$. En résumé

$$(1) \qquad \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} \subset G \subset \widetilde{M}_{0,3}, \qquad u \in G \Longrightarrow \mu(u) \equiv 1 \ (3).$$

End of opening definition.

Fixture fr-2-90.

49. Homomorphismes de $M_{0,3}$, les groupes $M_{\rho,\sigma}$ généraux. [scan 495] [p. 550]
m14

Où on se met dans le bain…

Note marginale. m14 Toute cette section I semble entièrement inutile pour la suite, c'est un tâtonnement préliminaire pour déboucher sur la section II p.553.

I) Considérons un sous-groupe fermé G de $M_{0,3}$, contenant $\mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$, donc image inverse d'un

sous-groupe fermé de $\tilde{\Gamma}_{0,3}$. On suppose que celui-ci est "suffisamment gros" — disons qu'il contienne un sous-groupe d'indice fini de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \tilde{\Gamma}_{0,3}$. Pour le moment, on suppose pour simplifier que $G \subset \operatorname{Ker} \varepsilon_3$. En résumé

$$(1) \qquad \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} \subset G \subset \widetilde{M}_{0,3}, \qquad u \in G \Longrightarrow \mu(u) \equiv 1 \ (3).$$

End of opening definition.

Fixture fr-2-170.

49. Homomorphismes de $M_{0,3}$, les groupes $M_{\rho,\sigma}$ généraux. [scan 495] [p. 550]
m16

Où on se met dans le bain…

Note marginale. m16 Toute cette section I semble entièrement inutile pour la suite, c'est un tâtonnement préliminaire pour déboucher sur la section II p.553.

I) Considérons un sous-groupe fermé G de $M_{0,3}$, contenant $\mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge}$, donc image inverse d'un sous-groupe fermé de $\tilde{\Gamma}_{0,3}$. On suppose que celui-ci est "suffisamment gros" — disons qu'il contienne un sous-groupe d'indice fini de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \tilde{\Gamma}_{0,3}$. Pour le moment, on suppose pour simplifier que $G \subset \operatorname{Ker} \varepsilon_3$. En résumé

$$(1) \qquad \mathcal{C}_{0,3}^{+\wedge} \subset G \subset \widetilde{M}_{0,3}, \qquad u \in G \Longrightarrow \mu(u) \equiv 1 \ (3).$$

End of opening definition.

Fixture fr-2-260.

49. Homomorphismes de $M_{0,3}$, les groupes $M_{\rho,\sigma}$ généraux.
m18

[scan 495]
[p. 550]
Où on se met dans le bain…

Note marginale. [m18] Toute cette section I semble entièrement inutile pour la suite, c'est un tâtonnement préliminaire pour déboucher sur la section II p.553.

I) Considérons un sous-groupe fermé G de $M_{0,3}$, contenant $\mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3}$, donc image inverse d'un sous-groupe fermé de $\tilde{\Gamma}_{0,3}$. On suppose que celui-ci est "suffisamment gros" — disons qu'il contienne un sous-groupe d'indice fini de $\Gamma_{\mathbb{Q}} \subset \tilde{\Gamma}_{0,3}$. Pour le moment, on suppose pour simplifier que $G \subset \operatorname{Ker} \varepsilon_3$. En résumé

$$(1) \qquad \mathcal{C}^{+\wedge}_{0,3} \subset G \subset \widetilde{M}_{0,3}, \qquad u \in G \Longrightarrow \mu(u) \equiv 1 \ (3).$$

End of opening definition.