Fixture fr-0-60.

6°) L'ensemble $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
On pose

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$(68) \qquad \left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \overset{\|}{\mathcal{G}^+}\text{-conjugué à } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \quad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ où } \nu=\frac{\mu-1}{2}} \end{array} \text{(avec} \right\}$$

End of opening definition.

Fixture fr-0-130.

6°) L'ensemble $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
On pose

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\| \tag{68}$$

$$\left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \quad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ où } \nu=\frac{\mu-1}{2}} \quad \text{(avec} \end{array} \right\}$$

End of opening definition.

Fixture fr-0-190.

6°) L'ensemble $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
On pose

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$(68) \qquad \left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \overset{\mathcal{G}^+}{\parallel}\text{-conjugué à } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \quad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ où } \nu=\frac{\mu-1}{2}} \end{array} \text{(avec} \right\}$$

End of opening definition.

Fixture fr-1-60.

6°) L'ensemble $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
On pose

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\| \qquad \| \qquad \| \qquad \| \qquad \|$$

$$\left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \quad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ où } \nu = \frac{\mu-1}{2}} \end{array} \right\} \tag{68}$$

End of opening definition.

Fixture fr-1-130.

6°) L'ensemble $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
On pose

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\| \tag{68}$$

$$\left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \quad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ où } \nu = \frac{\mu-1}{2}} \end{array} \right\}$$

End of opening definition.

Fixture fr-1-190.

6°) L'ensemble $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
On pose

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\| \tag{68}$$

$$\left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \quad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ où } \nu = \frac{\mu-1}{2}} \end{array} \right\}$$

End of opening definition.

Fixture fr-2-60.

6°) L'ensemble $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
On pose

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\| \qquad \| \qquad \| \qquad \| \qquad \|$$

$$(68) \qquad \left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \quad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ où } \nu = \frac{\mu-1}{2}} \quad \dagger \end{array} \right\}$$

End of opening definition.

Fixture fr-2-130.

6°) L'ensemble $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
On pose

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\| \qquad \| \qquad \| \qquad \| \qquad \|$$

$$(68) \qquad \left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \quad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ où } \nu = \frac{\mu-1}{2}} \qquad \dagger \end{array} \right\}$$

End of opening definition.

Fixture fr-2-190.

6°) L'ensemble $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
On pose

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\| \quad \| \quad \| \quad \| \quad \|$$

$$\left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugué à } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \quad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ où } \nu = \frac{\mu-1}{2}} \quad \dagger \end{array} \right\} \tag{68}$$

End of opening definition.