Preceding material.

II Détermination calculatoire des éléments de $\widetilde{N}^!_{0,3}$.

1) Détermination par h, g, f.

La donnée de $u \in \widetilde{M}^!_{0,3} | \widetilde{N}^!_{0,3}$

Rappelons que

(21) $\widetilde{N}^!_{0,3} | \widetilde{M}^!_{0,3}$ = autom. de $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge\prime} | \widehat{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})}'$ qui stabilisent $\widehat{\Pi}_{0,3}$, induisent l'identité sur $\mathfrak{S}_3 | \mathcal{G}_3 = \widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3} / \widehat{\Pi}_{0,3}$, et respectent la structure à lacets (définie par la classe de ε_0)

End of opening paragraph.

Preceding material.

II Détermination calculatoire des éléments de $\widetilde{N}^!_{0,3}$.

1) Détermination par h, g, f.

d1

Rappelons que

(21) $\widetilde{N}^!_{0,3}|\widetilde{M}^!_{0,3} =$ autom. de $\widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge\prime}|\widehat{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})}^{\prime}$ qui stabilisent $\widehat{\Pi}_{0,3}$, induisent l'identité sur $\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 = \widehat{\mathcal{G}}^+_{0,3}/\widehat{\Pi}_{0,3}$, et respectent la structure à lacets (définie par la classe de ε_0)

End of opening paragraph.

Preceding material.

II Détermination calculatoire des éléments de $\widetilde{N}^{!}_{0,3}$.

1) Détermination par h, g, f.

†

Rappelons que

(21) $\widetilde{N}^{!}_{0,3}|\widetilde{M}^{!}_{0,3} = $ autom. de $\widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3} \simeq \mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})^{\wedge\prime}|\widehat{\mathrm{Sl}(2,\mathbb{Z})}^{\prime}$ qui stabilisent $\widehat{\Pi}_{0,3}$, induisent l'identité sur $\mathfrak{S}_3|\mathcal{G}_3 = \widehat{\mathcal{G}}^{+}_{0,3}/\widehat{\Pi}_{0,3}$, et respectent la structure à lacets (définie par la classe de ε_0)

End of opening paragraph.