

35. 關於整數係數函數構成的極大整環。

艾米·諾特 (哥廷根) 撰。

Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), S. 65–72

以下研究與相對整函數的希爾伯特問題¹⁾ 密切相關；其緣起是 E. Hecke 偶然提出的一個問題，他曾通過直接計算解決了一個自己用作輔助引理的特殊情形²⁾。

問題如下：給定整環 $\mathfrak{Z}$ 內，由 $x_1, \dots, x_n$ 的整數係數函數——多項式、冪級數或它們的商——構成的一個極大整環，是指不能再通過加入整數分母而擴大的整環；也就是說，只要 $a \cdot g(x)$ 屬於它——其中 $g(x)$ 在 $\mathfrak{Z}$ 中——就總能推出 $g(x)$ 也屬於它。這裡 a 指非零有理整數。 $\mathfrak{Z}$ 中的每個整環 $\mathfrak{J}$ 都唯一生成一個極大整環 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ ；它由 $\mathfrak{Z}$ 中所有滿足下述條件的函數 $g(x)$ 構成：至少存在一個 $a \neq 0$ ，使得 $a \cdot g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ 。

所要問的是：當原來的整環 $\mathfrak{J}$ 是有限生成的——即它由 $\mathfrak{Z}$ 中有限多個函數 $f_1(x), \dots, f_r(x)$ 的所有整數係數多項式構成——時，關於這個極大整環 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 的分母 a 能說些什麼。這裡取 $\mathfrak{Z}$ 為 $x_1, \dots, x_n$ 的所有整數係數多項式或冪級數，或者為這樣的商：除 $f(x)$ 中出現的分母及其冪以外，不含其他分母。

我證明——在冪級數或其商的情形，還須附加假設各 $f(x)$ 之間只有代數依賴關係——總可以選取這些 a ，使其中只出現有限多個不同的素數，不過一般而言這些素數的任意次冪都可能出現。

後一點是立即清楚的：如果 $a \cdot g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ ，但對任何指數 ϱ ， $a^{\varrho-1}g(x)^{\varrho}$ 都不屬於 $\mathfrak{J}$ ，那麼所有冪 a^{ϱ} 都會出現（例如 $\mathfrak{J} = [2x]$ ； $x^{\varrho} = (2x)^{\varrho}/2^{\varrho}$ ）。

有界性問題只能表述如下：能否給出 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 的一個一般為無限的生成元系，使相應分母中各素數的指數保持有界？由於所涉及的素數只有有限多個，這個問題根據已知論證³⁾，與 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 的有限性問題相同，因而也就是整數係數表述下相對整函數的希爾伯特問題——這個問題我無法用這裡所採用的方法判定⁴⁾。

為了證明分母 a 中只出現有限多個不同的素數 p ，所依據的是：對於每個這樣的 p ，生成 $\mathfrak{J}$ 的各 $f(x)$ 之間至少存在一個模 p 關係，而這個關係取整數係數時並不作為 x 的恆等式成立。換言之，令 $\mathfrak{o}$ 表示以未定元 $u_1, \dots, u_r$ 構成的整數係數多項式環，則在對應 $u_i \rightarrow f_i(x)$ 下， $\mathfrak{J}$ 是 $\mathfrak{o}$ 的同態像；這一同態由 $\mathfrak{o}$ 中的一個素理想 $\mathfrak{a}$ 給出（即 $\mathfrak{J}$ 與剩餘類環 $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ 同構）。相應地， $\mathfrak{J}_p$ 是 $\mathfrak{o}_p$ 的同態像——下標表示轉到模 p 的剩餘類；除 $\mathfrak{J}$ 的分母中出現的有限多個素數外，這一轉化均可進行。——這個同態同樣由 $\mathfrak{o}_p$ 中的一個素理想 $\mathfrak{c}_p$ 給出，並且它包含 $\mathfrak{a}_p$ 。當且僅當 $\mathfrak{c}_p$ 成為 $\mathfrak{a}_p$ 的真上理想（理想意義下的真因子）時， p 才會出現在 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 的分母中。這只有在下列兩種情形之一才可能發生： $\mathfrak{J}_p$ 相對於 $\mathfrak{J}$ 的超越次數降低，或者 $\mathfrak{a}_p$ 喪失其素理想性質⁵⁾。這只會對有限多個 p 發生，原因是模 p 的代數依賴關係同樣會導致雅可比行列式消失 (§1)，而且 $\mathfrak{a}$ 還可證明是絕對素理想，因此它只會模有限多個 p 喪失其素理想性質⁶⁾。

還應指出，如果用某個（有限）代數數域的整數及其素理想代替有理整數，那麼上述全部論證經少量修改仍然成立 (§4)。

§1. 特徵為 p 的係數域上的雅可比行列式。

1. 設 $f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_t(x_1, \dots, x_n)$ 是有理函數，或者更一般地，是形式定義的冪級數或它們的商，其係數取自特徵為 p 的域 P 。導數 $\partial f_i / \partial x_k$ 也按形式定義，並且通常的一切運算法則都保持成立。以 Ω 表示 P 的一個代數閉擴域。

於是，與特徵為零的情形一樣，有：

定理。 如果各 $f(x)$ 之間存在一個係數取自 Ω 的代數依賴關係，那麼雅可比矩陣 $(\partial f_i / \partial x_k)$ ($i = 1, \dots, t$; $k = 1, \dots, n$) 的秩小於 t ⁷⁾。

證明。在多項式環 $\Omega[u_1, \dots, u_t]$ 中，以 $\mathfrak{m}$ 表示所有滿足 $G(f) = 0$ 關於 x 恆等成立的多項式 $G(u)$ 所構成的素理想。根據假設， $\mathfrak{m}$ 不同於零理想；從 $\mathfrak{m}$ 中取一個次數最低的多項式 $G(u) \neq 0$ （從

而 $\neq \text{const.}$)。由此特別可知 $G(u)$ 不可約。於是像通常那樣得到：

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial G}{\partial u_1} \right)_f \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \cdots + \left(\frac{\partial G}{\partial u_t} \right)_f \frac{\partial f_t}{\partial x_1} &= 0, \\ &\vdots \\ \left(\frac{\partial G}{\partial u_1} \right)_f \frac{\partial f_1}{\partial x_n} + \cdots + \left(\frac{\partial G}{\partial u_t} \right)_f \frac{\partial f_t}{\partial x_n} &= 0, \end{aligned}$$

由此可知，要麼雅可比矩陣的秩小於 t ，要麼所有 $(\partial G / \partial u_i)_f$ 都消失。但由於已假定 $G(u)$ 是次數最低的多項式，因而可以推出所有 $\partial G / \partial u_i$ 都消失。

於是得到： $G(u) = H(u_1^p, \dots, u_t^p)$ ；又因為已假定係數域 Ω 是代數閉域，從而是完美域，所以進一步有： $G(u) = H(u_i^p) = (T(u))^p$ ；這與 $G(u)$ 的選取相矛盾。——這一證明自然也適用於特徵為零的情形，此時不需要最後一步推論。

2. 推論。

設 $F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_t(x_1, \dots, x_n)$ 是整數係數函數（多項式、冪級數或它們的商），其雅可比矩陣的秩恰為 t 。選取素數 p ，使它既不出現在 $F(x)$ 的分母中，也不同時整除雅可比矩陣的所有 t 階行列式。

那麼 $F_1(x), \dots, F_t(x)$ 模 p 後仍然代數無關。

證明。以 P 表示模 p 的剩餘類域，並以 $f_1(x), \dots, f_t(x)$ 表示 P 中的函數，它們由 $F_1(x), \dots, F_t(x)$ 把整數係數替換為其模 p 剩餘類而得到。由於 p 不出現在 $F_i(x)$ 的分母中， $f_i(x)$ 是有定義的；其雅可比矩陣 $(\partial f_i / \partial x_k)$ 同樣由 $(\partial F_i / \partial x_k)$ 把整數係數替換為其模 p 剩餘類而得到——在 $(\partial F_i / \partial x_k)$ 中不會出現 $F(x)$ 所沒有的其他分母。——根據 p 的選取， $(\partial f_i / \partial x_k)$ 的秩仍為 t ；因此各 $f(x)$ 在 Ω 中代數無關，從而更在 P 中代數無關。

§ 2. 定理的表述。

1. 如引言中那樣，以 $\mathfrak{J}$ 表示由 $x_1, \dots, x_n$ 的整數係數函數構成的一個整環（無零因子環）——即整數係數的多項式或冪級數，或者它們的商。對於冪級數，可以是形式定義的冪級數，也可以是某一區域內收斂的冪級數；這裡只用到所出現的函數構成一個整環這一點。

以 Ω 表示 $\mathfrak{J}$ 的分式域； $\mathfrak{Z}$ 表示介於 $\mathfrak{J}$ 與 Ω 之間的一個整環。如引言所述，如果由 $a \cdot g(x)$ 屬於 $\mathfrak{Z}$ 中的 $\mathfrak{M}$ ——其中 a 是整數且 $\neq 0$ ， $g(x)$ 在 $\mathfrak{Z}$ 中——總能推出 $g(x)$ 屬於它，就稱 $\mathfrak{M}$ 在 $\mathfrak{Z}$ 中是極大的。對於 $\mathfrak{J}$ ，存在唯一一個由 $\mathfrak{J}$ 在 $\mathfrak{Z}$ 中生成的極大整環 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ ；它是 $\mathfrak{Z}$ 中所有包含 $\mathfrak{J}$ 的極大整環之交——因為 $\mathfrak{Z}$ 本身就是這樣的極大整環，而且任意多個極大整環的交仍然極大並包含 $\mathfrak{J}$ 。 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 由 $\mathfrak{Z}$ 中所有滿足下述條件的函數 $g(x)$ 構成：至少存在一個 $a \neq 0$ ，使 $a \cdot g(x)$ 位於 $\mathfrak{J}$ 中。

事實上，這些 $g(x)$ 構成 $\mathfrak{Z}$ 中一個包含 $\mathfrak{J}$ 的極大整環 $\mathfrak{N}$ ，因為若 $b \cdot h(x)$ 位於 $\mathfrak{J}$ 中，且 $b \neq 0$ ， $h(x)$ 在 $\mathfrak{Z}$ 中，就可推出 $ab \cdot h(x)$ 位於 $\mathfrak{J}$ 中且 $ab \neq 0$ ，因而 $h(x)$ 位於 $\mathfrak{N}$ 中。另一方面， $\mathfrak{Z}$ 中每個包含 $\mathfrak{J}$ 的極大整環 M 都包含 $\mathfrak{N}$ ；因為若 $a \cdot g(x)$ 位於 $\mathfrak{J}$ 中，則由於 $\mathfrak{J}$ 位於 $\mathfrak{M}$ 中， $a \cdot g(x)$ 也位於 $\mathfrak{M}$ 中；所以 $g(x)$ 位於 $\mathfrak{M}$ 中。

2. 現在假定 $\mathfrak{J}$ 是帶單位元的有限生成整環，以 $f_1(x), \dots, f_r(x)$ 為整性基（即有限代數生成組）；換言之， $\mathfrak{J}$ 由各 $f_i(x)$ 的所有整數係數多項式構成。再令 $\mathfrak{Z}$ 由 x 的所有整數係數多項式或冪級數構成，或者由這樣的商構成：除有限多個 $f_i(x)$ 中出現的分母外，不含其他分母；這些分母當然可以取任意次冪。

再假定至少有一個 $f_i(x)$ ——一般而言所有 $f_i(x)$ ——中確實出現 x ，否則 $\mathfrak{J}$ 與 $\mathfrak{Z}$ 就只由分數 $1/c$ 的所有整數係數多項式構成，並無任何事情需要證明。

若所考慮的是多項式或有理函數，那麼分式域 Ω 相對於有理數域 K 的超越次數為 t ，其中 $1 \leq t \leq r$ ；如果例如 $f_1(x), \dots, f_t(x)$ 構成一個代數無關系統（原文稱“不可約系統”；見注⁵⁾），則 Ω 是純超越域 $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ 的有限代數擴張。同時， $f_1(x), \dots, f_r(x)$ 的雅可比矩陣以及 $f_1(x), \dots, f_t(x)$ 的雅可比矩陣，其秩都恰為 t ⁸⁾。

為了使 Ω 的這一結構在冪級數或其商的情形仍然保持，必須附加一個假設：若 t 是各 $f_i(x)$ 的雅可比矩陣的秩，並且例如它同時也是 $f_1(x), \dots, f_t(x)$ 的雅可比矩陣的秩——從而這些函數按 §1.1. 構成一個代數無關系統——那麼仍要求 Ω 是純超越域 $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ 的有限代數擴張；即 $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ 應當相對於 $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ 是代數的⁹⁾。這裡仍有 $t \geq 1$ ，因為——特徵為零！——並非所有 $\partial f_i / \partial x_k$ 都消失。

同時，這個條件對於整性基中任意 t 個函數所組成的系統也成立，只要其雅可比矩陣的秩恰為 t ；因為它們構成一個代數無關系統，其餘函數因而代數依賴於它們。**3.** 現令 $\mathfrak{o}$ 表示不定元 $u_1, \dots, u_r$ 上的整係數多項式環，那麼由對應 $u_i \rightarrow f_i(x)$ 立即可知， $\mathfrak{J}$ 是 $\mathfrak{o}$ 的環同態像。因此 $\mathfrak{J}$ 與 $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ 環同構，其中 $\mathfrak{a}$ 是素理想，因為 $\mathfrak{J}$ 是無零因子環； $\mathfrak{a}$ 由所有使 $G(f)$ 關於 x 恆等為零的多項式 $G(u)$ 構成。

正如引言中已經提到的，這裡所涉及的是以下定理：

定理。 在第2點的附加假設下，令 $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{J}_p$ 分別表示由 $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{J}$ 通過把整係數替換為它們模 p 的剩餘類而得到的對象。那麼，即使在此情形下，除至多有限多個素數外——為使 $\mathfrak{J}_p$ 有定義， $f(x)$ 的分母中出現的素數也在這些例外之列——從 $\mathfrak{o}_p$ 到 $\mathfrak{J}_p$ 的同態也由 $\mathfrak{a}_p$ 誘導，因而 $\mathfrak{J}_p$ 與 $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ 環同構，從而也與 $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ 環同構。

藉助下述推論，由該定理可知， $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 的分母 a 中只出現有限多個素數：

推論。 若 p 的選取使 $\mathfrak{J}_p$ 與 $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ 同構，那麼只要 $p \cdot g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ 且 $g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ ，便總有 $g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ 。

換言之， $\mathfrak{J}$ 在 $\mathfrak{J}$ 中相對於所有不同於這有限多個例外素數的素數是極大的。

$\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ 與 $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ 同構。事實上，按照定義， $\mathfrak{o}_p$ 等於剩餘類環 $\mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$ ，相應地， $\mathfrak{a}_p$ 等於 $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$ 。因此——由第一同構定理——， $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ ，並且根據假設 $\mathfrak{J}_p$ ，都與 $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ 同構。

這意味着：

$$H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p} \text{ 在 } \mathfrak{J} \text{ 中} \implies H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})} \text{ 在 } \mathfrak{o} \text{ 中}.$$

這可以改寫為：由 $H(f_i(x)) = p \cdot g(x)$ [$H(f_i(x))$ 屬於 $\mathfrak{J}$ ； $g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$] 可得 $H(u_i) - pF(u_i) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ ，因而還有 $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$ ，進而 $g(x) = F(f_i(x))$ ；所以 $g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ 。

有限次反覆應用即可得到：若 a 不被任何例外素數整除，那麼只要 $a \cdot g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ 且 $g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ ，便總可推出 $g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ ，推論由此得證。

§ 3. 定理的證明。

1. 輔助定理：決定 $\mathfrak{J}$ 與 $\mathfrak{o}$ 之間同態的素理想 $\mathfrak{a}$ (§2, 3.) 是絕對素理想。

令 $\mathfrak{o}^*$ 表示不定元 $u_1, \dots, u_r$ 上以任意代數數——也包括非整代數數——為係數的多項式環， $\mathfrak{a}^*$ 表示 $\mathfrak{o}^*$ 中由 $\mathfrak{a}$ 生成的理想；因此， $\mathfrak{a}^*$ 由所有線性組合 $a_1 G_1(u) + \dots + a_s G_s(u)$ 構成，其中 a_i 是任意代數數， $G_i(u)$ 是 $\mathfrak{a}$ 中的多項式。要證明 $\mathfrak{a}^*$ 是素理想。

只需證明從 $\mathfrak{o}^*$ 到 $\mathfrak{J}^*$ 的同態由 $\mathfrak{a}^*$ 誘導——此處 $\mathfrak{J}^*$ 表示由 $f_i(x)$ 的所有以任意代數數為係數的多項式組成的整環——，即當 $H(f_i(x))$ 為零時， $H(u)$ 屬於 $\mathfrak{a}^*$ ($H(u)$ 屬於 $\mathfrak{o}^*$)。

令 $\omega_1, \dots, \omega_s$ 是由 $H(u)$ 的有限多個係數生成的有限數域的一組線性無關基。於是

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \dots + \omega_s H_s(u),$$

其中 $H_i(u)$ 屬於 $\mathfrak{o}$ ，而 $a \neq 0$ 是一個有理整數。由 $H(f) = 0$ 可得 $\omega_1 H_1(f) + \dots + \omega_s H_s(f) = 0$ ，從而 $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$ 。因此 $H_1(u), \dots, H_s(u)$ 屬於 $\mathfrak{a}$ ，進而 $H(u)$ 屬於 $\mathfrak{a}^*$ 。

2. 現在可以按如下方式完成定理的證明：

若 p 的選取滿足

I. $\mathfrak{J}_p$ 有定義，

II. $\mathfrak{a}_p$ 仍為素理想 (並且是絕對素理想) .

III. $\mathfrak{J}_p$ 的超越次數與 $\mathfrak{J}$ 的超越次數相比沒有減少 .

那麼從 $\mathfrak{o}_p$ 到 $\mathfrak{J}_p$ 的同態由 $\mathfrak{a}_p$ 誘導 . 除至多有限多個例外素數外 , 所有素數都滿足這些條件 .

根據前文 , 關於條件 I、II、III 的例外素數只有有限多個 , 這是直接可得的 .

I 是顯然的 : 例外素數只可能是 $f_i(x)$ 的分母中出現的有限多個素數 ; II 源於輔助定理所表明的 $\mathfrak{a}$ 是絕對素理想 , 因而此性質在模除至多有限多個素數之外的所有素數時仍得以保持 (參見注⁶⁾) . 最後 , III 已在推論 § 1, 2. 中證明 , 因為根據 § 2, 2. , $f_1(x), \dots, f_t(x)$ 的雅可比矩陣的秩恰好為 t .

現在選取一個不同於這些例外素數的 p . 從 $\mathfrak{o}_p$ 到 $\mathfrak{J}_p$ 的同態由一個理想 $\mathfrak{c}_p$ 誘導 ; 由於 $\mathfrak{J}_p$ 也是無零因子環 , $\mathfrak{c}_p$ 是素理想 , 並且它的超越次數由 $\mathfrak{J}_p$ 的超越次數給出 , 因而至少為 t . 事實上 , 由於 $\mathfrak{J}_p$ 與 $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$ 同構 , $\mathfrak{c}_p$ 的剩餘類域便與 $\mathfrak{J}_p$ 的分式域同構 .

由於 $\mathfrak{a}_p$ 也是素理想 , 並且包含於 $\mathfrak{c}_p$ (即 $\mathfrak{a}_p$ 是 $\mathfrak{c}_p$ 的子理想) , 所以 $\mathfrak{a}_p$ 與 $\mathfrak{c}_p$ 當且僅當二者的超越次數相同時才相同¹⁰⁾ . $\mathfrak{a}_p$ 作為 $\mathfrak{c}_p$ 的子理想 , 其超越次數同樣至少為 t ; 事實上 , $u_1, \dots, u_t$ 模 $\mathfrak{a}_p$ 的類構成一個代數無關系統 . 需要證明這個超越次數恰好等於 t , 這樣一切就都得證了 .

這裡 , 在冪級數或其商的情形下 , 要用到關於 $\mathfrak{J}$ 的分式域 Ω 之結構的附加假設 (§ 2, 2.) . 據此 , 素理想 $\mathfrak{a}$ 在每一種情形下的超越次數都是 t ; 並且編號的選取方式使得 $u_1, \dots, u_t$ 模 $\mathfrak{a}$ 的類構成一個代數無關系統 , 而 $u_{t+1}, \dots, u_r$ 的類代數地依賴於該系統 . 因此 , $\mathfrak{a}$ 中包含 — 整係數且本原的 — 多項式

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t) \quad (1)$$

它們在 $\mathfrak{a}_p$ 中變為 — 由於本原性而不消失的 — 多項式

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \dots, u_t) \quad (2)$$

這裡 , 在每個 G_λ^* 中 , $u_{t+\lambda}$ 必須實際出現 , 否則 $u_1, \dots, u_t$ 模 $\mathfrak{a}_p$ 的類之間就會存在代數關係 , 這與 p 的選取相矛盾 . 由此即證明了 $\mathfrak{a}_p$ 的超越次數為 t , 所以它與 $\mathfrak{c}_p$ 相同 , 並誘導上述同態 , 一切由此得證 .

§ 4. 推廣到代數整數係數 .

正如引言末尾已經指出的那樣 , 如果以一個 (有限) 代數數域 K 的代數整數代替有理整數 , 並以該數域的素理想 $\mathfrak{p}$ 代替素數 p , 那麼所有論證經少量修改後仍然成立 . 其中 , § 1 完全不變 , 導出 § 2 中定理表述的論證也同樣不變 ; 在證明 (§ 3, 2.) 以及 § 2, 3. 的推論中 , 則需要作若干補充 .

1. 在 § 3, 2. 中 , 還須把整除多項式 $G_1(u), \dots, G_{r-t}(u)$ 的有限多個素理想列為例外素理想 (見 § 3, 2. 的式 (1)) , 因為此時不能再假定這些多項式是本原的 . 這樣便保證了多項式 $G_1^*(u), \dots, G_{r-t}^*(u)$ (§ 3, 2., (2)) 不消失 ; 這構成了條件 III 的加強 . 條件 II 保持不變 , 因為關於絕對不可約性的定理沒有改變 ; 條件 I 自然也同樣保持不變 .

2. 作為最終結果的 § 2, 3. 的推論 , 應按照該處的最終表述寫成 :

推論 . 若 K 中的代數整數 α 不被有限多個例外素理想中的任何一個整除 , 則只要 $\alpha \cdot g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ 且 $g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$, 總可推出 $g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$.

若從 K 中選取代數整數 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 使每個 λ_i 均被一個例外素理想整除 , 但不被該素理想的平方整除 , 也不被其餘例外素理想整除 , 那麼這些 λ 的冪乘積足以充當分母 α .

證明 . 設 $(\alpha) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{e_g}$ 是 α 的素理想分解 , 並且 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ 不同於例外素理想 , 因而對每個 $\mathfrak{p}_i$, $\mathfrak{J}_{\mathfrak{p}_i}$ 都同構於 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$. 從 K 的全體代數整數所成的環出發 , 通過在分母中加入所有且僅加入與 (α) 互素的代數整數 , 也就是不被素理想 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ 中任何一個整除的代數整數 , 過渡到由 (α) 所定義的分式環 $\mathfrak{R}$. 在 $\mathfrak{R}$ 中 , 素理想 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ 仍是素理想 , 但變為主理想 ; 其餘所有素理想都變為單位理想 ; (α) 的分解保持不變¹¹⁾ . 因此 , 當過渡到以 $\mathfrak{R}$ 為係數環時 , 該推論及其證明仍完全保持 § 2, 3. 中的形式 .

這就是說：若 $\alpha \cdot g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ ，則 $g(x) = F(f_i(x))$ ，其中多項式 $F(u)$ 的係數屬於 $\mathfrak{R}$ 。若 δ 是這些係數的一個公分母——即 δ 與 α 互素——，則也可表述為：當 $\alpha \cdot g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ 時， $\delta \cdot g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ ，其中 δ 與 α 互素。因此 (δ, α) 等於單位理想，從而得到：若 $\alpha \cdot g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ ，則 $g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ 。這就證明了上述推論的第一個斷言。

為證明第二個斷言，令 $\mathfrak{R}^*$ 為 K 中由有限多個例外素理想定義的分式環，並令 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 為這些素理想在 $\mathfrak{R}^*$ 中的生成元；可以假定它們是代數整數。在 $\mathfrak{R}^*$ 中，除去 $\mathfrak{R}^*$ 的一個單位因子後， α 是這些 λ 的冪乘積。因此，退回到代數整數便得到 $\gamma\alpha = \beta\lambda_1^{e_1} \cdots \lambda_s^{e_s}$ ，其中 γ 和 β 都不被任何例外素理想整除。由 $\alpha \cdot g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ ，於是可推出 $\beta \cdot \lambda_1^{e_1} \cdots \lambda_s^{e_s} g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ ，繼而根據推論的第一個斷言，還可推出 $\lambda_1^{e_1} \cdots \lambda_s^{e_s} g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ 。

註釋。

¹⁾ D. Hilbert，〈數學問題〉(Gött. Nachr. 1900，第 253–297 頁)，問題 14。

²⁾ E. Hecke，〈用二元模函數構造相對阿貝爾數域〉(Math. Ann. 74 (1913)，第 465–510 頁)，§ 2。在 Hecke 的工作中，有限整環 $\mathfrak{J}$ 由兩個變量的冪級數的三個商生成，它們之間存在一個代數關係。

³⁾ 參見 Hilbert 上引文獻，或 E. Noether 的更詳細論述《二元形式的整數不變量系統的有限性》(Gött. Nachr. 1919，第 138–156 頁)，§ 1, IV。

⁴⁾ 因此，例如在一個基本形式系統的整數（射影）不變量的情形，已經證明它們可以用通常意義下的一個完全不變量系統來表示，而分母中只出現有限多個不同的素數——這一結果不能由通常的 Ω -過程方法推出——；但這並沒有對整數情形本身的有限性作出任何斷言，後者迄今只在二元基本形式的情形中為人所知。（參見注³⁾所引札記。）

⁵⁾ 眾所周知，一個系統的“超越次數”是指這樣一組代數無關函數的數目：該系統代數地依賴於它們；原文把由代數無關函數組成的系統稱為“不可約系統”，本文譯作“代數無關系統”。一個素理想的超越次數（維數）是指其剩餘類域的超越次數。一個素理想不存在與它具有相同超越次數的真素因子（例如參見 B.L.v.d. Waerden，〈論多項式理想的零點理論〉，Math. Ann. 96 (1926)，第 183–208 頁）。

⁶⁾ E. Noether，〈消去理論與一般理想理論〉，Math. Ann. 90 (1923)，第 229–261 頁，§ 7。藉助消去理論^{*)}，該定理可由下述較簡單的定理推出：一個絕對不可約多項式只有模有限多個素數時才會失去這一性質（A. Ostrowski，〈代數量的算術理論〉，Gött. Nachr. 1919，第 279–298 頁，其中第 296 頁。較簡單的證明見 E. Noether，〈絕對不可約性的一個代數判據〉，Math. Ann. 85 (1922)，第 26–33 頁，№ 7）。如果 $\mathfrak{J}$ 有一個整性基，其所含函數的個數恰好多於其超越次數一個——例如 Hecke（注 2）所考察的情形——，從而 α 成為主理想，那麼只需利用這個較簡單的定理，而無須藉助消去理論。各處的素數都可以由一個（有限）代數數域的素理想代替。當 α 是零理想時，該定理顯然也成立。

⁷⁾ 在原來的表述中，我曾假定係數域 P 是完美域；從 P 過渡到 Ω ，把結果推廣到任意域（包括非完美域），應歸功於 B.L.v.d. Waerden。例子 $f = x^p$ ， $df/dx = 0$ 表明，在特徵為 p 時，即使 P 是完美域，逆命題也不成立。

^{*)} 更確切地說，由於 α 具有特徵為零的係數，這一結論與該文的輔助定理 V 無關。事實上，該輔助定理的證明並不正確（在所給出的代換下，一切都可能恆等消失；正確的證明直到 B.L.v.d. Waerden 的《Bézout 定理的一種推廣》，Math. Ann. 99 (1928)，第 497–541 頁，才得以給出。參見該文注 37）。

該文第 257 頁還需要作一個容易看出的修正（定理 XIV 在 § 7 中同樣沒有用到）。原文說， $(\mathfrak{R})$ 中的所有元素都是通過把 (x_i) 中的 $t_{\mu,\nu}$ 特殊化而得到 $(\mathfrak{R}')$ 中的元素；實際上，它們是由一個更一般的線性形式

$$\sum s_{\lambda_1 \dots \lambda_n} (y_1)^{\lambda_1} \cdots (y_n)^{\lambda_n},$$

經特殊化得到的，而該線性形式的指數與 (x_i) 的指數相同。

⁸⁾ 關於這個雅可比行列式定理的純代數證明——這裡討論的是特徵為零的情形——，參見 B.L.v.d. Waerden，〈微分的代數理論〉，Nieuw Archief v. Wiskunde (2) 15 (1926)，第 111–120 頁。

⁹⁾ 當所討論的是解析函數時——如 Hecke 所考察的情形（注 2）——，並且 $f_1(x), \dots, f_t(x)$ 解析無關，而 $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$ 代數地依賴於前者時，這一附加假設得到滿足。不過，這一假設被有意表述為形式性的——雅可比矩陣的秩——，從而使它在形式定義的冪級數情形中也具有明確含義。由此可以使所有論證都保持在純粹的形式代數範圍內，而關於解析函數的定理只在特殊情形中為證明該假設得到滿足時才是必要的。

¹⁰⁾ 例如參見 B.L.v.d. Waerden ·《論多項式理想的零點理論》· Math. Ann. 96 (1926) · 第 183–208 頁 · § 3。

¹¹⁾ 例如參見 H. Grell ·《代數數域和函數域中序的理論》· Math. Ann. 97 (1927) · 第 524–558 頁 · § 2, 1。

論整數函數的極大整環。

埃米·諾特 (哥廷根)。

(摘要。)

每一個沒有“零因子”的環 (整環) $\mathfrak{J}$ 都確定一個同類型的極大整環 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ ，它由所有滿足下述條件的函數 $g(x)$ 組成：至少存在一個 $a \neq 0$ ，使得 $a \cdot g(x)$ 屬於 $\mathfrak{J}$ 。

本文在整環 $\mathfrak{J}$ 為有限生成的假設下，考察該極大整環 $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ 的“分母” a 。文中證明，總可以選擇這些 a ，使得在其全體中只有有限多個素數作為因子出現。與此同時，當 $g(x)$ 是冪級數或這類級數的商時，假定定義整環 $\mathfrak{J}$ 的函數 $f'_1(x), \dots, f'_r(x)$ 彼此之間只能由代數關係聯繫。

證明的基礎是把該問題歸結為一般理想理論中的若干問題。這一歸結通過如下方式實現：把因子 p 在分母 a 中的出現視為函數 f_i 之間的模 p 關係。

(Rec. Math. XXXVI:1; 1929).