

CARL FRIEDRICH GAUSS
WERKE

ERSTER BAND.
ZWEITER ABDRUCK

HERAUSGEGEBEN
VON DER
KÖNIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN
ZU
GÖTTINGEN

1870.

DISQUISITIONES ARITHMETICAE

AUCTORE
CAROLO FRIDERICO GAUSS.

LIPSIAE
IN COMMISSIS APUD GERH. FLEISCHER Iun.
1801.

SERENISSIMO
PRINCIPI AC DOMINO
CAROLO GUILIELMO FERDINANDO
BRUNOVICENSIIUM AC LUNEBURGENSIIUM DUCI.

Princeps Serenissime,

SUMMAE equidem felicitati mihi duco, quod Celsissimo nomini Tuo hoc opus inscribere mihi permittis, quod ut Tibi offeram sancto pietatis officio obstringor. Nisi enim Tua gratia, Serenissime Princeps, introitum mihi ad scientias primum aperuisset, nisi perpetua Tua beneficia studia mea usque sustentavissent, scientiae mathematicae, ad quam vehementi semper amore delatus sum, totum me devovere non potuissem. Quin adeo eas ipsas meditationes, quarum partem hoc volumen exhibet, ut suscipere per plures annos continuare literisque consignare liceret Tua sola benignitas effecit, quae ut, ceterarum curarum expers, huic imprimis incumbere possem praestitit. Quas quum tandem in lucem emittere cuperem Tua munificentia cuncta, quae editionem remorabantur, obstacula removit. Haec Tua tanta de me meisque conatibus merita gratissima potius mente tacitaque admiratione revolvere, quam iustis dignisque laudibus celebrare possum. Namque non solum tali me muneri haud parem sentio, sed et neminem ignorare puto, solennem Tibi esse tam insignem liberalitatem in omnes qui ad optimas disciplinas excolendas conferre videntur, neque eas scientias, quae vulgo abstrusiores et a vitae communis utilitate remotiores creduntur, a patrocinio Tuo exclusas esse, quum Tu ipse intimum scientiarum omnium inter se et necessarium vinculum mente illa sapientissima omniumque quae ad humanae societatis prosperitatem augendam pertinent peritissima, penitus perspexeris. Quodsi Tu, Princeps Serenissime, hunc librum, et gratissimi in Te animi et laborum nobilissimae scientiae dicatorem testem, insigni illo favore, quo me tamdiu amplexus es, haud indignum iudicaveris, operam meam me non inutiliter collocasse, eiusque honoris, quem prae omnibus in votis habui, compotem me factum esse mihi gratulabor.

PRINCEPS SERENISSIME,
Brunovici mense Iulio 1801.

Celsitudinis Tuae servus addictissimus,
C. F. Gauss.

Praefatio.

DISQUISITIONES in hoc opere contentae ad eam Matheseos partem pertinent, quae circa numeros integros versatur, fractis plerumque, surdis semper exclusis. Analysis indeterminata quam vocant seu Diophantea, quae ex infinitis solutionibus problemati indeterminato satisfaciendis eas seligere docet, quae per numeros integros aut saltem rationales absolvuntur (plerumque ea quoque conditione adiecta ut sint positivi), non est illa disciplina ipsa, sed potius pars eius valde specialis, ad eamque ita fere se habet, ut ars aequationes reducendi et solvendi (Algebra) ad universam Analysin. Nimirum quemadmodum ad Analyseos ditionem referuntur omnes quae circa quantitatum affectiones generales institui possunt disquisitiones, ita numeri integri (fractique quatenus per integros determinantur) obiectum proprium Arithmeticae constituunt. Sed quum ea, quae Arithmetices nomine vulgo traduntur, vix ultra artem numerandi et calculandi (i. e. numeros per signa idonea e. g. secundum systema decadicum exhibendi, operationesque arithmeticas perficiendi) extendantur, adiectis nonnullis quae vel ad Arithmetica omnino non pertinent (ut doctrina de logarithmis) vel saltem numeris integris non sunt propria sed ad omnes quantitates patent: e re esse videtur, duas Arithmeticae partes distinguere, illaque ad Arithmetica elementarem referre, omnes autem disquisitiones generales de numerorum integrorum affectionibus propriis Arithmeticae Sublimiori, de qua sola hic sermo erit, vindicare.

Pertinent ad Arithmetica Sublimiorem ea, quae Euclides in Elementis L. VII sqq. elegantia et rigore apud veteres consuetis tradidit: attamen ad prima initia huius scientiae limitantur. Diophanti opus celebre, quod totum problematis indeterminatis dicatum est, multas quaestiones continet, quae propter difficultatem suam artificiorumque subtilitatem de auctoris ingenio et acumine existimationem haud mediocrem suscitant, praesertim si subsidiorum quibus illi uti licuit tenuitatem consideres. At quum haec problemata dexteritatem quandam potius scitamque tractationem quam principia profundiora postulent, praetereaque nimis specialia sint raroque ad conclusiones generaliores deducant: hic liber ideo magis epocham in historia Matheseos constituere videtur, quod prima artis characteristicae et Algebrae vestigia sistit, quam quod Arithmetica Sublimiorem inventis novis auxerit. Longe plurima recentioribus debentur, inter quos pauci quidem sed immortalis gloriae viri P. de Fermat, L. Euler, L. La Grange, A. M. Le Gendre (ut paucos alios praeteream) introitum ad penetralia huius divinae scientiae aperuerunt, quantisque divitiis abundent patefecerunt. Quaenam vero inventa a singulis his geometris profecta sint, hic enarrare supersedeo, quum e praefationibus Additamentorum quibus ill. La Grange Euleri Algebram ditavit operisque mox memorandi ab ill. Le Gendre nuper editi cognosci possint, insuperque pleraque locis suis in his disquisitionibus Arithmetice laudentur.

Propositum huius operis, ad quod edendum iam annos abhinc quinque publice fidem dederam, id fuit, ut disquisitiones ex Arithmetica Sublimiori, quas partim ante id tempus partim postea institui, divulgarem. Ne quis vero miretur, scientiam hic a primis propemodum initiis repetitam multasque disquisitiones hic denuo resumtas esse, quibus alii operam suam iam navarunt, monendum esse duxi, me, quum primum initio a. 1795 huic disquisitionum generi animum applicavi, omnium quae quidem a recentioribus in hac arena elaborata fuerint ignarum, omniumque subsidiorum per quae de his quidpiam comperire potuissem expertem fuisse. Scilicet in alio forte labore tunc occupatus, casu incidi in eximiam quandam veritatem arithmetica (fuit autem ni fallor theorema art. 108), quam quum et per se pulcherrimam aestimarem et cum maioribus connexam esse suspicarer, summa qua potui contentione in id incubui ut principia quibus innite-

retur perspicere, demonstrationemque rigorosam nanciscerem. Quod postquam tandem ex voto successisset, illecebris harum quaestionum ita fui implicatus, ut eas deserere non potuerim; quo pacto, dum alia semper ad alia viam sternebant, ea quae in quatuor primis Sectionibus huius operis traduntur, ad maximam partem absoluta erant, antequam de aliorum geometrarum laboribus similibus quidquam vidissem. Dein copia mihi facta, horum summorum ingeniorum scripta evolvendi, maiorem quidem partem meditationum mearum rebus dudum transactis impensam esse agnovi: sed eo alacrior, illorum vestigiis insistens, Arithmeticam ulterius excolere studui; ita variae disquisitiones institutae sunt, quarum partem Sectiones V, VI et VII tradunt. Postquam interiecto tempore consilium de fructibus vigiliarum in publicum edendis cepi eo lubentius quod plures optabant, mihi persuaderi passus sum ne quid vel ex illis investigationibus prioribus supprimerem, quod tum temporis liber non habebatur, ex quo aliorum geometrarum labores de his rebus in Academiae Commentariis sparsi edisci potuissent; quod multae ex illis omnino novae et pleraeque per methodos novas tractatae erant; denique quod omnes tum inter se tum cum disquisitionibus posterioribus tam arcto nexu cohaerebant, ut ne nova quidem satis commode explicari possent, nisi reliquis ab initio repetitis.

Prodiit interea opus egregium viri iam antea de Arithmetica Sublimiori magnopere meriti, Le Gendre *Essai d'une théorie des nombres*, Paris a. VI, in quo non modo omnia, quae hactenus in hac scientia elaborata sunt, diligenter collegit et in ordinem redegit, sed permulta insuper nova de suo adiecit. Quum hic liber serius ad manum mihi pervenerit, postquam maxima operis pars typis iam exscripta esset, nullibi ubi rerum analogia occasionem dare potuisset, eius mentionem iniicere licuit; de paucis tantummodo locis quasdam observationes in Additamentis adiungere necessarium videbatur, quas vir humanissimus et candidissimus benigne ut spero interpretabitur.

Inter impressionem huius operis quae pluries interrupta variisque impedimentis usque in quartum annum protracta est, non modo eas investigationes, quas quidem iam antea susceperam sed quarum promulgationem in aliud tempus differre constitueram, ne liber nimis magnus evaderet, ulterius continuavi, sed plures etiam alias novas aggressus sum. Plures quoque, quas ex eadem ratione leviter tantum attigi, quum tractatio uberius minus necessaria videretur (e.g. eae quae in artt. 37, 82 sqq. aliisque locis traduntur), postea resumtae sunt, disquisitionibusque generalioribus quae luce perdignae videntur locum dederunt (Conf. etiam quae in Additamentis de art. 306 dicuntur). Denique quum liber praesertim propter amplitudinem Sect. V in longe maius quam exspectaveram volumen excresceret, plura quae ab initio ei destinata erant, interque ea totam Sectionem octavam (quae passim iam in hoc volumine commemoratur atque tractationem generalem de congruentiis algebraicis cuiusvis gradus continet) resecare oportuit. Haec omnia, quae volumen huic aequale facile explebunt, publici iuris fient, quam primum occasio aderit.

Quod, in pluribus quaestionibus difficilibus demonstrationibus syntheticis usus sum, analysisque per quam erutae sunt suppressi, imprimis brevitatis studio tribuendum est, cui quantum fieri poterat consulere oportebat.

Theoria divisionis circuli, sive polygonorum regularium quae in Sect. VII tractatur, ipsa quidem per se ad Arithmeticam non pertinet, attamen eius principia unice ex Arithmetica Sublimiori petenda sunt: quod forsitan geometris tam inexpectatum erit, quantum veritates novas, quas ex hoc fonte haurire licuit, ipsis gratas fore spero.

Haec sunt, de quibus lectorem praemonere volui. De rebus ipsis non meum est iudicare. Nihil equidem magis opto, quam ut iis quibus scientiarum incrementa cordi sunt, placeant, quae vel hactenus desiderata explent, vel aditum ad nova aperiunt.

DISQUISITIONES ARITHMETICAE.

Sectio Prima.

De

Numerorum Congruentiâ in Genere.

Numeri congrui, moduli, residua et nonresidua.

1.

Si numerus a numerorum b, c differentiam metitur, b et c secundum a *congrui* dicuntur, sin minus, *incongrui*: ipsum a *modulum* appellamus. Uterque numerorum b, c priori in casu alterius *residuum*, in posteriori vero *nonresiduum* vocatur.

Hae notiones de omnibus numeris integris tam positivis quam negativis¹ valent, neque vero ad fractos sunt extendendae. E. g. -9 et $+16$ secundum modulum 5 sunt congrui; -7 ipsius $+15$ secundum modulum 11 residuum, secundum modulum 3 vero nonresiduum. Ceterum quoniam cifram numerus quisque metitur, omnis numerus tamquam sibi ipsi congruus secundum modulum quemcunque est spectandus.

2.

Omnia numeri dati a residua secundum modulum m sub formula $a + km$ comprehenduntur, designante k numerum integrum indeterminatum. Propositionum quas postea trademus faciliores nullo negotio hinc demonstrari possunt; sed istarum quidem veritatem aequè facile quivis intuendo poterit perspicere.

3.

Numerorum congruentiam hoc signo, $\equiv$, in posterum denotabimus, modulum ubi opus erit in clausulis adiungentes, ut $-16 \equiv 9 \pmod{5}$, $-7 \equiv 15 \pmod{11}$ ².

Theorema. Propositis numeris integris successivis

$$a, a + 1, a + 2, \dots, a + m - 1$$

alioque b , illorum aliquis huic secundum modulum m congruus erit, et quidem unicus tantum.

Si enim $\frac{b-a}{m}$ integer, erit $a \equiv b$. Si fractus, sit integer proxime maior (aut quando est negativus, proxime minor, si ad signum non respiciatur) $= k$, cadetque $b - km$ inter a et $a + m$, eritque $b \equiv b - km$ (a termino a incluso ad terminum $a + m$ exclusum), i. e. in illa serie contentus. Q. E. D.

4.

Residua minima.

Quisque igitur numerus residuum habebit tum in hac serie, $0, 1, 2, \dots, m - 1$, tum in hac $0, 1, 2, \dots, -(m - 1)$, quae *residua minima* dicemus, patetque, nisi fuerit $= 0$, residuum, bina semper dari, positivum alterum, alterum negativum. Quae si magnitudine

¹Modulus manifesto semper absolute i. e. sine omni signo est sumendus.

²Hoc signum propter magnam analogiam quae inter aequalitatem atque congruentiam invenitur adoptavimus. Ob eandem causam ill. Le Gendre in comment. infra saepius laudanda ipsum aequalitatis signum pro congruentia retinuit, quod nos ne ambiguitas oriatur imitari dubitavimus.

sunt inaequalia, alterum erit $< \frac{m}{2}$, sin secus, utrumque $= \frac{m}{2}$, signi respectu non habito. Unde patet, quemvis numerum residuum habere moduli semisse $= \frac{m}{2}$ non superans, quod *absolute minimum* vocabitur.

E. g. +13 secundum modulum 5 habet residuum minimum positivum 2, quod simul est absolute minimum, -3 vero residuum minimum negativum; +5 secundum modulum 7 sui ipsius est residuum minimum positivum, -2 negativum, simulque absolute minimum.

Propositiones elementares de congruentiis.

5.

His notionis stabilitis eas numerorum congruorum proprietates quae prima fronte se offerunt colligamus.

1. Numeri secundum modulum compositum congrui, etiam secundum quemvis eius divisorem congrui sunt.
2. Si plures numeri eidem numero secundum eundem modulum congrui sunt, etiam inter se congrui sunt (secundum eundem modulum).

Hae modulorum identitas etiam in sequentibus est subintelligenda.

3. Numeri congrui residua minima habent eadem, incongrui diversa.

6.

Si habentur quotcunque numeri A, B, C etc. totidemque alii a, b, c etc. illis secundum modulum quemcunque congrui, i. e. $A \equiv a, B \equiv b$ etc., erit $A+B+C+\text{etc.} \equiv a+b+c+\text{etc.}$

Si $A \equiv a, B \equiv b$, erit $A - B \equiv a - b$.

7.

Si $A \equiv a$, erit quoque $kA \equiv ka$. Nam si k numerus positivus, hoc est tantummodo casus particularis proposit. art. praec., ponendo ibi $B = C = \text{etc.} = a = b = c = \text{etc.}$ Si k negativus, erit $-k$ positivus, adeoque $-kA \equiv -ka$, unde $kA \equiv ka$.

8.

Si $A \equiv a, B \equiv b$, erit $AB \equiv ab$. Namque $AB \equiv Ab \equiv ba$.

Si habentur quotcunque numeri A, B, C etc. totidemque alii a, b, c etc. his congrui, i. e. $A \equiv a, B \equiv b, C \equiv c$ etc., producta ex utrisque erunt congrua, i. e. $ABC \dots \equiv abc \dots$

Ex art. praec. $AB \equiv ab$, et ob eandem rationem $ABC \equiv abc$; eodemque modo quotcunque alii factores accedere possunt.

Si omnes numeri A, B, C etc. aequales assumuntur, nec non respondentes a, b, c etc., habetur hoc theorema: Si $A \equiv a$ et k integer positivus, erit $A^k \equiv a^k$.

9.

Sit X functio algebraica indeterminatae x , huius formae

$$Ax^\alpha + Bx^\beta + Cx^\gamma + \text{etc.}$$

designantibus A, B, C etc. numeros integros quoscunque; α, β, γ etc. vero integros non negativos. Tum si indeterminatae x valores secundum modulum quemcunque congrui tribuuntur, valores functionis inde prodeuntes congrui erunt.

10.

Sint f, g valores congrui ipsius x . Tum ex art. praec. $f^\alpha \equiv g^\alpha$ et $Af^\alpha \equiv Ag^\alpha$, eodemque modo $Bf^\beta \equiv Bg^\beta$ etc. Hinc

$$Af^\alpha + Bf^\beta + Cf^\gamma + \text{etc.} \equiv Ag^\alpha + Bg^\beta + Cg^\gamma + \text{etc.} \quad \text{Q. E. D.}$$

Ceterum facile intelligitur quomodo hoc theorema ad functiones plurium indeterminatarum extendi possit.

10 (continued).

Quodsi igitur pro x omnes numeri integri consecutivi substituuntur, valoresque functionis ad residua minima reducuntur, haec seriem constituent, in qua post intervallum m terminorum (designante m modulum) iidem termini iterum recurrunt; sive haec series ex periodo m terminorum infinities repetita erit formata.

Sit e. g. $X = x^3 - 8x + 6$ et $m = 5$; tum pro $x = 0, 1, 2, 3$ etc., valores ipsius X haec residua minima positiva suppeditant, 1, 4, 3, 4, 3, 1, 4 etc., ubi quina priora 1, 4, 3, 4, 3 in infinitum repetuntur; atque si series retro continuatur, i. e. ipsi x valores negativi tribuuntur, eadem periodus ordine terminorum inverso prodit, unde manifestum est, terminos alios quam qui hanc periodum constituent in tota serie locum habere non posse.

11.

In hoc igitur exemplo neque $X \equiv 0$, neque $X \equiv 2 \pmod{5}$ fieri potest, multoque minus $= 0$, aut $= -2$. Unde sequitur, aequationes $x^3 - 8x + 6 = 0$ et $x^3 - 8x + 4 = 0$ per numeros integros et proin, uti notum est, per numeros rationales solvi non posse. Generaliter perspicuum est, aequationem $X = 0$, quando functio incognitae x , huius formae

$$Ax^n + Bx^{n-1} + Cx^{n-2} + \text{etc.} + N = 0,$$

A, B, C etc. integri, atque n integer positivus (ad quam formam omnes aequationes algebraicas reduci posse constat), radicem rationalem nullam habere, si congruentiae $X \equiv 0$ secundum ullum modulum satisfieri nequeat. Sed hoc criterium, quod hic sponte se nobis obtulit, in Sect. VIII fusius pertractabitur. Poterit certo ex hoc specimine notiuncula qualiscunque de harum investigationum utilitate eiformari.

Quaedam applicationes.

12.

Theorematibus in hoc capite traditis complura quae in arithmetice doceri solent inniuntur, e. g. regulae ad explorandam divisibilitatem numeri propositi per 9, 11 aut alios numeros. Secundum modulum 9 omnes numeri 10 potestates unitati sunt congruae: quare si numerus propositus habet formam $a + 10b + 100c + \text{etc.}$ idem residuum minimum secundum modulum 9 dabit, quod $a + b + c + \text{etc.}$ Hinc manifestum est, si figurae singulae numeri decadice expressi sine respectu loci quem occupant addantur, summam hanc numerumque propositum eadem residua minima praebere, adeoque hunc per 9 dividi posse, si illa per 9 sit divisibilis, et contra. Idem etiam de divisore 3 tenendum. Quoniam secundum modulum 11, $100 \equiv 1$ erit generaliter $10^{2k} \equiv 1$, $10^{2k+1} \equiv -1$, et numerus formae $a + 10b + 100c + \text{etc.}$ secundum modulum 11 idem residuum minimum dabit quod $a - b + c - \text{etc.}$; unde regula nota protinus derivatur. Ex eodem principio omnia similia praecepta facile deducuntur.

Nec minus ex praecedentibus petenda est ratio regularum, quae ad verificationem operationum arithmeticarum vulgo commendantur. Scilicet si ex numeris datis alii per

additionem, subtractionem, multiplicationem aut elevationem ad potestates sunt deducendi: substituuntur datorum loco residua ipsorum minima secundum modulum arbitrium (vulgo 9 aut 11, quoniam in nostro systemate decadico secundum hos, uti modo ostendimus, residua tam facile possunt inveniri). Numeri hinc oriundi illis, qui ex numeris propositis deducti fuerunt, congrui esse debent; quod nisi eveniat, vitium in calculum irrepsisse concluditur.

Sed quum haec hisque similia abunde sint nota, diutius iis immorari superfluum foret.

Sectio Secunda.

De

Congruentiis Primi Gradus.

Theoremata praeliminaria de numeris primis factoribusque.

13.

Theorema. Productum e duobus numeris positivis numero primo dato minoribus per hunc primum dividi nequit.

Sit p primus et a positivus $< p$: tum nullus numerus positivus b ipso p minor dabitur, ita ut sit $ab \equiv 0 \pmod{p}$.

Dem. Si quis neget, supponamus dari numeros b, c, d etc. omnes $< p$, ita ut sit $ab \equiv 0$, $ac \equiv 0$, $ad \equiv 0$ etc. $\pmod{p}$. Sit omnium minimus b , ita ut omnes numeri ipso b minore sint hac proprietate destituti. Manifesto erit $b > 1$: si enim $b = 1$, foret $ab = a < p$ (hyp.), adeoque per p non divisibilis. Quare p , quamquam primus, per b dividi non poterit, sed inter duo ipsius b multipla proxima mb et $(m+1)b$ cadet. Sit $p - mb = b'$, eritque b' numerus positivus et $< b$. Iam quia supposuimus $ab \equiv 0 \pmod{p}$, habebitur quoque $mab \equiv 0$ (art. 7), et hinc, subtrahendo $ab \equiv 0$, erit $a(p - mb) = ab' \equiv 0$; i. e. b' inter numeros b, c, d etc. referendus, licet minimo eorum b sit minor. Q. E. A.

14.

Si nec a nec b per numerum primum p dividi potest: etiam productum ab per p dividi non poterit.

Sint numerorum a, b secundum modulum p residua minima positiva α, β , quorum neutrum erit $= 0$ (hyp.). Iam si esset $ab \equiv 0 \pmod{p}$, foret quoque, propter $ab \equiv \alpha\beta$, $\alpha\beta \equiv 0$, quod cum theoremate praec. consistere nequit.

Huius theorematis demonstratio iam ab Euclide tradita est, El. VII. 32. Nos tamen omittere eam noluimus, tum quod recentiorum complures seu ratiocinia vaga pro demonstratione venditaverunt, seu theorema omnino praeterierunt, tum quod indoles methodi hic adhibitae, qua infra ad multo reconditiora enodanda utemur, e casu simpliciori facilius deprehendi poterit.

15.

Si nullus numerorum a, b, c, d etc. per numerum primum p dividi potest, etiam productum $abcd$ etc. per p dividi non poterit.

Secundum artic. praec. ab per p dividi nequit; ergo etiam abc ; hinc $abcd$ etc.

16.

Theorema. Numerus compositus quicumque unico tantum modo in factores primos resolvi potest.

Dem. Quemvis numerum compositum in factores primos resolvi posse, ex elementis constat, sed pluribus modis diversis fieri hoc non posse, perperam plerumque supponitur tacite. Fingamus numerum compositum A , qui sit $= a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., designantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales, alio adhuc modo in factores primos esse resolvibilem. Primo manifestum est, in secundum hoc factorum systema alios primos quam a, b, c etc. ingredi non posse, quum quicumque alius primus numerum A ex his compositum metiri nequeat. Similiter etiam in secundo hoc factorum systemate nullus primorum a, b, c etc. deesse potest, quippe qui alias ipsum A non metiretur (art. praec.). Quare hae binae in factores resolutiones in eo tantummodo differre possunt, quod in altera aliquis primus pluries quam in altera habeatur. Sit talis primus p , qui in altera resolutione m , in altera vero n vicibus

occurrat, sitque $m > n$: si n vicibus deleatur ex utroque systemate factor p , quod fieri poterit, fiet ut in altero adhuc $m - n$ vicibus remaneat, ex altero vero omnino abierit. I. e. numeri $A \div p^n$ duae in factores resolutiones habentur, quarum altera a factore p prorsus libera, altera vero $m - n$ vicibus eum continet, contra ea quae modo demonstravimus.

17.

Si itaque numerus compositus A est productum ex B, C, D etc., patet, inter factores primos numerorum B, C, D etc. alios esse non posse, quam qui etiam sint inter factores numeri A , et quemvis horum factorum toties in B, C, D etc. coniunctim occurrere debere, quoties in A . Hinc colligitur criterium, utrum numerus B alium A metiatur, necne. Illud eveniet, si B neque alios factores primos, neque ullum pluries involvit, quam A ; quarum conditionum si aliqua deficit, B ipsum A non metietur.

Facile hinc calculi combinationum auxilio derivari potest, si $A = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., designantibus ut supra a, b, c etc. numeros primos diversos: A habere

$$(\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) \text{ etc.}$$

divisores diversos, inclusis etiam 1 et A .

18.

Si igitur $A = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., $K = k^\kappa l^\lambda m^\mu$ etc., atque primi a, b, c etc., k, l, m etc. omnes diversi, patet A et K divisorem communem praeter 1 non habere, sive inter se esse primos.

Pluribus numeris A, B, C etc. propositis *maxima omnibus communis mensura* ita determinatur. Resolvantur omnes in suos factores primos, atque ex his excerptantur ii, qui omnibus numeris A, B, C etc. sunt communes (si tales non adsunt, nullus divisor erit omnibus communis). Tum quoties quisque horum factorum primorum in singulis A, B, C etc. contineatur sive quot dimensiones in singulis A, B, C etc. quisque habeat, adnotetur. Tandem singulis factoribus primis tribuantur dimensiones omnium quas in A, B, C etc. habent minimae, componaturque productum ex iis, quod erit mensura communis quaesita.

Quando vero numerorum A, B, C etc. *minimus communis dividuus* desideratur, ita procedendum. Colligantur omnes numeri primi, qui numerorum A, B, C etc. aliquem metiuntur, tribuatur cuivis dimensio omnium quas in numeris A, B, C etc. habet maxima, sicque ex omnibus productum conflatur, quod erit dividuus quaesitus.

Ex. Sit $A = 504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$, $B = 2880 = 2^6 \cdot 3^2 \cdot 5$; $C = 864 = 2^5 \cdot 3^3$. Pro inveniendi divisore communi maximo habentur factores primi 2, 3, quibus dimensiones 3, 2 tribuendi; unde fiet $2^3 \cdot 3^2 = 72$; dividuus vero communis minimus erit $2^6 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 7 = 60480$.

19.

Demonstrationes propter facilitatem omittimus. Ceterum quomodo haec problemata solvenda sint, quando numerorum A, B, C etc. in factores resolutio non detur, ex elementis notum est.

19 (continued).

Si numeri a, b, c etc. ad alium k sunt primi, etiam productum ex illis abc etc. ad k primum est.

Quia enim nulli numerorum a, b, c etc. factor primus cum k est communis, productumque abc etc. alios factores primos habere nequit, quam qui sunt factores alicuius numerorum a, b, c etc., productum abc etc. etiam cum k factorem primum communem non habebit. Quare ex art. praec. k ad abc etc. primus.

Si numeri a, b, c etc. inter se sunt primi, aliumque k singuli metiuntur: etiam productum eos illis numerum k metietur.

Hoc aequae facile ex artt. 17, 18 derivatur. Sit enim quicumque producti abc etc. divisor primus p , quem contineat u vicibus, manifestumque est, aliquem numerorum a, b, c etc.

eundem hunc divisorem u vicibus continere debere. Quare etiam k , quem hic numerus metitur, u vicibus divisorem p continet. Similiter de reliquis producti abc etc. divisoribus.

Hinc si duo numeri m, n secundum plures modulus inter se primos a, b, c etc. sunt congrui, etiam secundum productum eorum his congrui erunt. Quum enim $m - n$ per singulos a, b, c etc. sit divisibilis, etiam per eorum productum dividi poterit.

Denique si a ad b primus et ak per b divisibilis, erit etiam k per b divisibilis. Namque quoniam ak tam per a quam per b divisibilis, etiam per ab dividi poterit, i. e. erit $\frac{ak}{ab} = \frac{k}{b}$ integer.

20.

Quando $A = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., designantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales, est potestas aliqua, puta k^n : omnes exponentes α, β, γ etc. per n erunt divisibiles.

Numerus enim k alios factores primos quam a, b, c etc. non involvit. Contineat factorem a , x vicibus, continebitque k^n sive hunc factorem nx vicibus; quare $n\alpha = nx$, et $\frac{\alpha}{x}$ integer. Similiter $\frac{\beta}{y}$ etc. integros esse demonstratur.

21.

Quando a, b, c etc. sunt inter se primi, et productum abc etc. potestas aliqua, puta k^n : singuli numeri a, b, c etc. similes potestates erunt.

Sit $a = l^\pi m^\mu p^\pi$ etc., designantibus l, m, p etc. numeros primos diversos, quorum nullus per hyp. est factor numerorum b, c etc. Quare productum abc etc. factorem l implicabit x vicibus, factorem m vero μ vicibus etc.: hinc (art. praec.) x, μ, π etc. per n divisibiles adeoque $\frac{a}{l^\pi m^\mu p^\pi}$ etc. $= \sqrt[n]{a}$ integer. Similiter de reliquis b, c etc.

Haec de numeris primis praemittenda erant; iam ad ea quae finem nobis propositum propius attinent convertimur.

22.

Si numeri a, b per alium k divisibiles secundum modulum m ad k primum sunt congrui: $\frac{a}{k}$ et $\frac{b}{k}$ secundum eundem modulum congrui erunt.

Patet enim $a - b$ per k divisibilem fore, nec minus per m (hyp.); quare (art. 19) $\frac{a-b}{k}$ per m divisibilis erit, i. e. erit $\frac{a}{k} \equiv \frac{b}{k} \pmod{m}$.

Si autem reliquis manentibus m et k habent divisorem communem maximum e , puta $m = em'$, $k = ek'$, erit $a \equiv b \pmod{em'}$, sive $a - b$ per em' divisibilis. Quum vero etiam per ek' divisibilis sit (hyp.), etiam per $ek'm'$ dividi poterit, i. e. $a - b$ per km' sive $\frac{a-b}{k}$ per m' divisibilis erit, adeoque $\frac{a}{k} \equiv \frac{b}{k} \pmod{m'}$.

23.

Si a ad m primus, et e, f numeri secundum modulum m incongrui: erunt etiam ae, af incongrui secundum m .

Hoc est tantum conversio theor. art. praec.

Hinc vero manifestum est, si a per omnes numeros integros a 0 usque ad $m - 1$ multiplicetur, productaque secundum modulum m ad residua sua minima reducantur, haec omnia fore inaequalia. Et quum horum residuorum, quorum nullum m numerus sit, totidemque dentur numeri a 0 usque ad $m - 1$, patet, nullum horum numerorum inter illa residua deesse posse.

Solutio congruentiarum.

24.

Expressio $ax + b$, denotantibus a, b numeros datos, x numerum indeterminatum seu variabilem, secundum modulum m , ad a primum, cuivis numero dato congrua fieri potest.

Sit c numerus, cui congrua fieri debet, et e residuum minimum positivum ipsius $c - b$ secundum modulum m . Ex art. praec. necessario datur valor ipsius $x < m$, talis, ut producti ax secundum modulum m residuum minimum fiat $= e$; esto hic valor v , eritque $e \equiv av$, adeo $av + b \equiv c \pmod{m}$. Q. E. F.

25.

Expressionem duas quantitates congruas exhibentem ad instar aequationum, *congruentiam* vocamus; quae si incognitam implicat, resolvi dicitur, quando pro hac valor invenitur congruentiae satisfaciens (*radix*). Hinc porro intelligitur, quid sit congruentia resolubilis et congruentia irresolubilis. Tandem facile perspicitur similes distinctiones locum hic habere posse uti in aequationibus. Congruentiarum transscendentium infra exempla occurrent; algebraicae vero secundum dimensionem maximam incognitae in congruentias primi, secundi, altiorumque graduum distribuuntur. Nec minus congruentiae plures proponi possunt plures incognitas involventes, de quarum eliminatione disquirendum.

Solutio congruentiarum primi gradus.

26.

Congruentia itaque primi gradus $ax + b \equiv c$ ex art. 24 semper resolubilis, quando modulus ad a est primus. Quodsi vero v fuerit valor idoneus ipsius x , sive radix congruentiae, palam est, omnes numeros, ipsi v secundum congruentiae propositae modulum congruos, etiam radices fore (art. 9). Neque minus facile perspicitur, omnes radices ipsi v congruos esse debere: si enim alia radix fuerit t , erit $av + b \equiv at + b$, unde $av \equiv at$, et hinc $v \equiv t$ (art. 22). Hinc colligitur, congruentiam $x \equiv v \pmod{m}$ exhibere resolutionem completam congruentiae $ax + b \equiv c$.

Quia resolutiones congruentiae per valores ipsius x congruos per se sunt obviae, atque, hoc respectu, numeri congrui tamquam aequivalentes considerandi, tales congruentiae resolutiones pro una eademque habebimus. Quamobrem quum nostra congruentia $ax + b \equiv c$ alias resolutiones non admittat, pronunciabimus, unico tantum modo eam esse resolubilem seu unam tantum radicem habere. Ita e. g. congruentia $6x + 5 \equiv 13 \pmod{11}$ alias radices non admittit, quam quae sunt $\equiv 5 \pmod{11}$. Haud perinde res se habet in congruentiis aliorum graduum sive etiam in congruentiis primi gradus ubi incognita per numerum est multiplicata ad quem modulus non est primus.

27.

Superest, ut de invenienda resolutione ipsa congruentiae huiusmodi quaedam adiiciamus. Primo observamus, congruentiam formae $ax + t \equiv u$, cuius modulum ad a primum supponimus, ab hac $ax \equiv \pm 1$ pendere: si enim huic satisfacit $x \equiv r$, illi satisfaciet $x \equiv (u - t)r$. At congruentiae $ax \equiv \pm 1$, modulo per b designato, aequivalet aequatio indeterminata $ax \pm by = 1$, quae quomodo sit solvenda hoc quidem tempore abunde est notum; quare nobis sufficiet, calculi algorithmum huc transscripsisse.

Si quantitates A, B, C, D, E etc. ita ab his $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon$ etc. pendent, ut habeantur

$$A = \alpha, \quad B = \beta A + 1, \quad C = \gamma B + A, \quad D = \delta C + B, \quad E = \varepsilon D + C \text{ etc.},$$

brevitatis gratia ita eas designamus:

$$A = [\alpha], \quad B = [\alpha, \beta], \quad C = [\alpha, \beta, \gamma], \quad D = [\alpha, \beta, \gamma, \delta] \text{ etc.}^3$$

³Multo generalius haecce relatio considerari potest, quod negotium alia forsitan occasione suscipiemus. Hic duas tantum propositiones adiicimus, quae usum suum in praesenti investigatione habent; scilicet 1°. $[\alpha, \beta, \gamma \dots \lambda, \mu] \cdot [\beta, \gamma \dots \lambda] - [\alpha, \beta \dots \lambda] \cdot [\beta, \gamma \dots \lambda, \mu] = \pm 1$, ubi signum superius accipiendum, quando

Iam proposita sit aequatio indeterminata $ax = by \pm 1$, ubi a, b positivi. Supponamus, id quod licet, a esse non $< b$. Tum ad instar algorithmi noti, secundum quem duorum numerorum divisor communis maximus investigatur, formentur per divisionem vulgarem aequationes

$$a = ab + c, \quad b = \beta c + d, \quad c = \gamma d + e \text{ etc.}$$

ita ut α, β, γ etc., c, d, e etc. sint integri positivi, et b, c, d, e continuo decrescentes, donec perveniatur ad $m + 1 < n$, quod tandem evenire debere constat. Erit itaque

$$a = [\alpha, \beta, \gamma, \delta \dots \mu, n], \quad b = [\alpha, \beta, \gamma \dots \mu].$$

Tum fiat $x = [\mu \dots \gamma, \delta]$, $y = [\mu \dots \gamma, \beta, \alpha]$; eritque $ax = by \pm 1$, quando numerorum $\alpha, \beta, \gamma \dots \mu, n$ multitudo est par, aut $ax = by \mp 1$ quando est impar. Q. E. F.

28.

Resolutionem generalem huiusmodi aequationum indeterminatarum ill. Euler primus docuit, Comment. Petrop. T. VII p. 46. Methodus qua usus est consistit in substitutione aliarum incognitarum loco ipsarum x, y , atque hoc quidem tempore satis est nota. Ill. La Grange paullo aliter rem aggressus est: scilicet ex theoria fractionum continuarum constat, si fractio $\frac{a}{b}$ in fractionem continuam

$$\frac{1}{\alpha + \frac{1}{\beta + \frac{1}{\gamma + \text{etc.}}}}$$

convertatur, haecque deleta ultima sui parte $\frac{1}{n}$ in fractionem communem $\frac{x}{y}$ restituatur, fore $ax \mp by = \pm 1$, siquidem fuerit a ad b primus. Ceterum ex utraque methodo idem algorithmus derivatur. Investigationes ill. La Grange exstant Hist. de l'Ac. de Berlin Annee 1767 p. 173, et cum aliis in Supplementis versioni gallicae Algebrae Eulerianae adiectis.

29.

Congruentia $ax + t \equiv u$, cuius modulus ad a non primus, facile ad casum praecedentem reducitur. Sit modulus m , maximusque numerorum a, m divisor communis δ . Primo patet quemvis valorem ipsius x congruentiae secundum modulum m satisfaciens eidem etiam secundum modulum δ satisfacere (art. 5). At semper $ax \equiv 0 \pmod{\delta}$, quoniam δ ipsum a metitur. Quare, nisi $t \equiv u \pmod{\delta}$, i. e. $t - u$ per δ divisibilis, congruentia proposita non est resolubilis.

30.

Ponamus itaque $a = \delta e$, $m = \delta f$, $t - u = \delta k$, eritque e ad f primus. Tum vero congruentiae propositae $\delta ex + \delta k \equiv 0 \pmod{\delta f}$ aequivalebit haec $ex + k \equiv 0 \pmod{f}$, i. e. quicumque ipsius x valor huic satisficiat, etiam illi satisficiet et vice versa. Manifesto enim $\delta ex + \delta k$ per δf dividi poterit, quando $ex + k$ per f dividi potest, et vice versa. At congruentiam $ex + k \equiv 0 \pmod{f}$ supra solve docuimus; unde simul patet, si v sit unus ex valoribus ipsius x , $x \equiv v \pmod{f}$ exhibere resolutionem completam congruentiae propositae.

30 (continued).

Quando modulus est compositus, nonnumquam praestat sequenti methodo uti.

numerorum $\alpha, \beta, \gamma \dots \mu$ multitudo par, inferius, quando impar. = 2°. Numerorum α, β, γ etc. ordo inverti potest, $[\alpha, \beta, \gamma \dots \lambda, \mu] = [\mu, \lambda \dots \gamma, \beta, \alpha]$. Demonstrationes quae non sunt difficiles hic supprimimus.

Sit modulus = mn , atque congruentia proposita $ax \equiv b$. Solvatur primo congruentia haec secundum modulum m , ponamusque ei satisfieri, si $x \equiv v \pmod{\frac{m}{\delta}}$, designante δ divisorem communem maximum numerorum m, a . Iam manifestum est quemvis valorem ipsius x congruentiae $ax \equiv b$ secundum modulum mn satisfacientem eidem etiam secundum modulum m satisfacere debere, adeoque in forma $v + \frac{m}{\delta}x'$ contineri, designante x' numerum indeterminatum; quamvis non vice versa omnes numeri in forma $v + \frac{m}{\delta}x'$ contenti congruentiae secundum mod. mn satisfaciant. Quomodo autem x' determinari debeat, ut $v + \frac{m}{\delta}x'$ fiat radix congruentiae $ax \equiv b \pmod{mn}$, ex solutione congruentiae $\frac{am}{\delta}x' + av \equiv b \pmod{mn}$ deduci potest, cui aequivalet haec $\frac{a}{\delta}x' \equiv \frac{b-av}{m} \pmod{n}$. Hinc colligitur, solutionem congruentiae cuiuscunque primi gradus secundum modulum mn reduci posse ad solutionem duarum congruentiarum secundum modulum m et n . Facile autem perspicitur, si n iterum sit productum e duobus factoribus, solutionem congruentiae secundum modulum n pendere a solutione duarum congruentiarum, quarum moduli sint illi factores. Generaliter solutio congruentiae secundum modulum compositum quaecumque pendet a solutione aliarum congruentiarum, quarum moduli sunt factores illius numeri; hi autem, si commodum esse videtur, ita semper accipi possunt, ut sint numeri primi.

Ex. Si congruentia $19x \equiv 1 \pmod{140}$ proponitur: solvatur primo secundum modulum 2, eritque $x \equiv 1 \pmod{2}$. Ponatur $x = 1 + 2x'$, fietque $38x' \equiv -18 \pmod{140}$, cui aequivalet $19x' \equiv -9 \pmod{70}$. Si haec iterum secundum modulum 2 solvitur, fit $x' \equiv 1 \pmod{2}$, positoque $x' = 1 + 2x''$, fit $38x'' \equiv -28 \pmod{70}$ sive $19x'' \equiv -14 \pmod{35}$. Haec secundum 5 soluta dat $x'' \equiv 4 \pmod{5}$, substitutoque $x'' = 4 + 5x'''$, fit $95x''' \equiv -90 \pmod{35}$ sive $19x''' \equiv -18 \pmod{7}$. Ex hac tandem sequitur $x''' \equiv 2 \pmod{7}$, positoque $x''' = 2 + 7x''''$, colligitur $59 + 140x''''$; quare $x \equiv 59 \pmod{140}$ est solutio completa congruentiae propositae.

31.

Simili modo ut aequationis $ax = b$ radix per $\frac{b}{a}$ exprimitur, etiam congruentiae $ax \equiv b$ radicem quancunque per $\frac{b}{a}$ designabimus, congruentiae modulum, distinctionis gratia, apponentes. Ita e. g. $\frac{11}{4} \pmod{12}$ denotat quemvis numerum, qui est $\equiv 11 \pmod{12}$ ⁴. Generaliter ex praecedentibus patet, $\frac{b}{a} \pmod{c}$ nihil reale significare (aut si quis malit aliquid imaginarii), si a, c habeant divisorem communem, qui ipsum b non metiatur. At hoc casu excepto, expressio $\frac{b}{a} \pmod{c}$ semper valores reales habebit, et quidem infinites: hi vero omnes secundum c erunt congrui, quando a ad c primus, aut secundum $\frac{c}{\delta}$, quando δ numerorum c, a divisor communis maximus.

Hae expressiones similem fere habent algorithmum ut fractiones vulgares. Aliquot proprietates quae facile ex praecedentibus deduci possunt hic apponimus.

1. Si secundum modulum c , $a \equiv \alpha$, $b \equiv \beta$, expressiones $\frac{b}{a} \pmod{c}$ et $\frac{\beta}{\alpha} \pmod{c}$ sunt aequivalentes.
2. $\frac{mb}{ma} \pmod{c}$ et $\frac{b}{a} \pmod{c}$ sunt aequivalentes.
3. $\frac{b}{a} \pmod{c}$ et $\frac{b}{a} \pmod{c}$ sunt aequivalentes, quando m ad c est primus.

Multae aliae similes propositiones afferri possent: at quum nulli difficultati sint obnoxiae, neque ad sequentia adeo necessariae, ad alia properamus.

⁴Vel quod ex analogia per $\sqrt[4]{11} \pmod{12}$ designari potest.

De inveniendis numero secundum modulos datos residuis datis congruo.

32.

Problema, quod magnum in sequentibus usum habebit, invenire omnes numeros, qui secundum modulos quotcunque datos residua data praebent, facile ex praecedentibus solvi potest. Sint primo duo moduli A, B , secundum quos numerus quaesitus z numeris a, b respective congruus esse debeat. Omnes itaque valores ipsius z sub forma $Ax + a$ continentur, ubi x est indeterminatus sed talis, ut fiat $Ax + a \equiv b \pmod{B}$. Quodsi iam numerorum A, B divisor communis maximus est δ , resolutio completa huius congruentiae hanc habebit formam: $x \equiv v \pmod{\frac{B}{\delta}}$, sive quod eodem redit, $x = v + \frac{B}{\delta}k$, denotante k numerum integrum arbitrium. Hinc formula $Av + a + \frac{AB}{\delta}k$ omnes ipsius z valores comprehendet, i. e. $z \equiv Av + a \pmod{\frac{AB}{\delta}}$ erit resolutio completa problematis. Si ad modulos A, B tertius accedit C , secundum quem numerus quaesitus z debet esse $= c$, manifesto eodem modo procedendum, quum binae priores conditiones in unicam iam sint conflatae. Scilicet si numerorum $\frac{AB}{\delta}, C$ divisor communis maximus $= \varepsilon$, atque congruentiae $\frac{AB}{\delta}x + Av + a \equiv c \pmod{C}$ resolutio $x \equiv w \pmod{\frac{C}{\varepsilon}}$, problema per congruentiam $z \equiv \frac{AB}{\delta}w + Av + a \pmod{\frac{ABC}{\delta\varepsilon}}$ complete erit resolutum. Similiter procedendum, quotcunque moduli proponantur. Observari convenit $\frac{AB}{\delta}, \frac{ABC}{\delta\varepsilon}$ esse numerorum A, B ; et A, B, C respective minimos communes dividos, facileque inde perspicitur, quotcunque habeantur moduli A, B, C etc., si eorum minimus communis dividos sit M , resolutionem completam hanc formam habere, $z \equiv r \pmod{M}$.

Ceterum quando ulla congruentiarum auxiliarium est irresolubilis, problema impossibilitatem involvere concludendum est. Perspicuum vero, hoc evenire non posse quando omnes numeri A, B, C etc. inter se sint primi.

Ex. Sint numeri A, B, C ; a, b, c ; $= 504, 35, 16; 17, -4, -33$; hic duae conditiones ut $z \equiv 17 \pmod{504}$ et $z \equiv -4 \pmod{35}$ uncae ut sit $z \equiv 521 \pmod{2520}$ aequivalent; ex qua cum hac $z \equiv -33 \pmod{16}$ coniuncta, promanat $z \equiv 3041 \pmod{5040}$.

33.

Quando omnes numeri A, B, C etc. inter se sunt primi, constat, productum ex ipsis esse minimum omnibus communem dividos. In quo casu manifestum est, omnes congruentias $z \equiv a \pmod{A}$, $z \equiv b \pmod{B}$ etc. uncae $z \equiv r \pmod{ABC}$ etc.) aequivalere. Quoniam duae conditiones $z \equiv a \pmod{A}$ et $z \equiv b \pmod{B}$ hic uncae $z \equiv Av + a \pmod{AB}$ aequivalent, patet ex illa valorem ipsius v elici posse secundum modulum B , sive dari valores v ipsi B omnes minores satisfaciens, qui omnes pro r substituti dabunt valores ipsius z omnes ipsi AB minores secundum modulum AB incongruos, i. e. omnes residua minima secundum AB , quorumque multitudo erit $= AB$. Sed etiam vice versa, quilibet numerus in illa formula contentus valores ipsius v determinabit secundum modulum B , i. e. omnes valores ipsius v , qui secundum B sunt incongrui, ipsi z valores secundum AB incongruos suppeditabunt.

Quum itaque totidem valores ipsius z dentur, quot sint combinationes valoris cuiusvis ipsius v cum quovis residuo minimo secundum A , puta a , manifesto singulos valores ipsius v cum singulis residuis a combinari posse, ita ut combinationes omnes valores ipsius z secundum AB incongruos producant. Haec combinatio revera perficitur statuendo $z \equiv Av + a \pmod{AB}$, uti supra. Si vero ceteris manentibus A, B non amplius inter se sunt primi, utique omnes combinationes valores ipsius z incongruos praebere non possunt; quum enim illorum multitudo AB sit, quae hic per $\frac{AB}{\delta}$ metitur, patet omnes z valores saltem δ vicibus occurrere debere.

34.

Sint ut supra conditiones propositae, ut sit $z \equiv a \pmod{A}$, $z \equiv b \pmod{B}$, $z \equiv c \pmod{C}$. Resolvantur omnes moduli in factores inter se primos, A in $A' \cdot A'' \cdot A'''$ etc.; B in $B' \cdot B'' \cdot B'''$ etc. etc., et quidem ita, ut numeri A', A'' etc., B', B'' etc. etc. sint aut primi, aut primorum potestates⁵. Si vero aliquis numerorum A, B, C etc. iam per se est primus, aut primi potestas, nulla resolutione in factores pro hocce opus est. Tum vero ex praecedentibus patescit, pro conditionibus propositis hasce substitui posse: $z \equiv a \pmod{A'}$, $z \equiv a \pmod{A''}$, $z \equiv a \pmod{A'''}$ etc., $z \equiv b \pmod{B'}$, $z \equiv b \pmod{B''}$ etc. etc. Iam nisi omnes numeri A, B, C etc. fuerint inter se primi, ex. gr. si A ad B non primus, manifestum est, omnes divisores primos ipsorum A, B diversos esse non posse, sed inter factores A', A'', A''' etc., unum aut alterum esse debere, qui inter B', B'', B''' etc. aut aequalem aut multipulum aut submultipulum habeat. Si primo $A' = B'$, conditiones $z \equiv a \pmod{A'}$, $z \equiv b \pmod{B'}$ identicae esse debent, sive $a \equiv b \pmod{A'}$ (vel B'), quare alterutra reici potest. Si vero non $a \equiv b \pmod{A'}$, problema impossibilitatem implicat. Si secundo B' multipulum ipsius A' , conditio $z \equiv a \pmod{A'}$ in hac $z \equiv b \pmod{B'}$ contenta esse debet, sive haec $z \equiv b \pmod{A'}$, quae ex posteriori deducitur, cum priori identica esse debet. Unde sequitur, conditionem $z \equiv a \pmod{A'}$, nisi alteri repugnet (in quo casu problema impossibile), reici posse. Quando omnes conditiones superfluae ita resectae sunt, patet, omnes modulos ex his A', A'', A''' etc., B', B'', B''' etc. etc. remanentes inter se primos fore; tum igitur de problematis possibilitate certi esse et secundum praecepta ante data procedere possumus.

35.

Ex. Si ut supra esse debet $z \equiv 17 \pmod{504}$, $z \equiv -4 \pmod{35}$, et $z \equiv -33 \pmod{16}$; hae conditiones in sequentes resolvuntur:

$$\begin{aligned} z &\equiv 17 \pmod{8}, & z &\equiv 17 \pmod{9}, & z &\equiv 17 \pmod{7} \\ z &\equiv -4 \pmod{5}, & z &\equiv -4 \pmod{7} \\ z &\equiv -33 \pmod{16} \end{aligned}$$

Ex his sex conditionibus duae $z \equiv 17 \pmod{7}$ et $z \equiv -4 \pmod{7}$ identicae esse debent, unde fit $17 \equiv -4 \pmod{7}$, quod reapse ita est; hae igitur alterutra resecta redibunt ad quinque. Praeterea quum ex $z \equiv -4 \pmod{5}$ sequatur $z \equiv 1 \pmod{5}$, haec ipsa ex $z \equiv 17 \pmod{9}$ sequitur $z \equiv -1 \pmod{9}$, ex $z \equiv -33 \pmod{16}$ sequitur $z \equiv -1 \pmod{16}$, denique ex $z \equiv -4 \pmod{7}$ sequitur $z \equiv 3 \pmod{7}$. Hinc omnes conditiones hisce quatuor aequivalent:

$$z \equiv -1 \pmod{9}, \quad z \equiv 1 \pmod{5}, \quad z \equiv -1 \pmod{16}, \quad z \equiv 3 \pmod{7},$$

unde colligitur $z \equiv 3041 \pmod{5040}$.

36.

Ceterum palam est, plerumque commodius fore, si de conditionibus remanentibus eae quae ex una eademque conditione evolutae erant seorsim recolligantur, quum hoc nullo negotio fieri possit; e. g. quando ex conditionibus $z \equiv a \pmod{A'}$, $z \equiv a \pmod{A''}$ etc. aliquae abierunt: quae ex reliquis restituitur, haec erit, secundum modulum, qui est productum omnium modulorum ex A', A'', A''' etc. remanentium. Ita in nostro exemplo ex conditionibus $z \equiv -4 \pmod{5}$, $z \equiv 3 \pmod{7}$ ea ex qua ortae erant $z \equiv -4 \pmod{35}$

⁵Siquidem numerus quicunque in factores primos resolvere liceat, facile probatur, productum e quotcunque numeris inter se primis, qui sint aut primi aut primorum potestates, nullos alios divisores habere posse praeter hosce ipsos.

sponte restituitur. Porro hinc sequitur, haud prorsus perinde esse, quatenus ex conditionibus superfluis reiciantur, quantum ad calculi brevitatem: sed haec aliaque artificia practica, quae ex usu multo facilius quam ex praeceptis ediscuntur, hic tradere non est instituti nostri.

37.

D. Quando omnes moduli A, B, C etc. inter se sunt primi, sequenti methodo saepius praestat uti. Determinetur numerus α secundum A unitati, secundum reliquorum modulorum productum vero cifrae congruus, sive sit α valor quicunque (plerumque praestat minimum accipere) expressionis $\frac{1}{BCD \text{ etc.}} \pmod{A}$, per BCD etc. multiplicatus (vid. art. 32); similiter sit $\beta \equiv \frac{1}{ACD \text{ etc.}} \pmod{B}$ et $\beta \equiv 0 \pmod{ACD \text{ etc.}}$, $\gamma \equiv \frac{1}{ABD \text{ etc.}} \pmod{C}$ et $\gamma \equiv 0 \pmod{ABD \text{ etc.}}$, etc. Tum si numerus z desideratur qui secundum modulos A, B, C etc. numeris a, b, c, d etc. respective sit congruus, poni poterit

$$z \equiv \alpha a + \beta b + \gamma c + \delta d + \text{etc.} \pmod{ABC \text{ etc.}}$$

Manifesto enim $\alpha a \equiv a \pmod{A}$; reliqua autem membra $\beta b, \gamma c$ etc. omnia $\equiv 0 \pmod{A}$: quare $z \equiv a \pmod{A}$. Similiter de reliquis modulis demonstratio adornatur. Haec solutio priori praeferenda, quando plura huiusmodi problemata sunt solvenda, pro quibus moduli A, B, C etc. valores suos retinent; tunc enim numeri α, β, γ etc. valores constantes nanciscuntur.

Ex. Sit $z \equiv a \pmod{11}$, $z \equiv b \pmod{15}$, $z \equiv c \pmod{16}$; erit $\alpha = 720 \cdot \frac{1}{720} \pmod{11}$, quum valor expressionis $\frac{1}{720} \equiv \frac{1}{5} \equiv 9 \pmod{11}$, erit $\alpha = 6480$; porro $\beta \equiv -11 \cdot 16 \cdot \frac{1}{11 \cdot 16} \equiv -176 \cdot \frac{1}{176} \pmod{15}$; quum valor expressionis $\frac{1}{176} \equiv \frac{1}{11} \equiv -4 \pmod{15}$, erit $\beta = -704$. Similiter invenitur $\gamma = 2145$; quare numerus quaesitus erit $z \equiv 6480a - 704b + 2145c \pmod{2640}$, h. e. residuum minimum formulae $-560a - 64b + 105c$.

Similis fere res est, quum ad regulam chronologicam celebrem applicatur, per quam cycli Solaris, Lunar et Indictionis periodum Iulianam conficiunt. Sint enim $A = 15$, $B = 19$, $C = 28$, hinc $\alpha = 19 \cdot 28 = 532$, $\beta = 15 \cdot 28 = 420$, et quum valor expressionis $\frac{1}{420} \pmod{19}$, sive $\frac{1}{2} \pmod{19}$, sit 10, erit $\beta = 4200$. Porro $\gamma = 15 \cdot 19 = 285$, et quum valor expressionis $\frac{1}{285} \pmod{28}$, sive $\frac{1}{5} \pmod{28}$, sit -11 , erit $\gamma = -3135$, adeoque numerus quaesitus $z \equiv 532a + 4200b - 3135c \pmod{7980}$. Quae est eadem formula, quam Scaliger proposuit. Ceterum quoniam quum valor expressionis $\frac{1}{420} \pmod{19}$, sive $\frac{1}{2} \pmod{19}$, sit 10, vel etiam -9 , quumque valor expressionis $\frac{1}{285} \pmod{28}$, sive $\frac{1}{5} \pmod{28}$, sit 17; haud pauci auctores $\beta = -3780$, $\gamma = 4845$ adhibuerunt, unde formula $z \equiv 532a - 3780b + 4845c \pmod{7980}$.

Congruentiae lineares quae plures incognitas implicant.

38.

Haec de congruentiis primi gradus unam incognitam continentibus sufficiant. Superest ut de congruentiis agamus, in quibus plures incognitae sunt permixtae. At quoniam hoc caput, si omni rigore singula exponere velimus, sine prolixitate absolvi non potest, propositumque hoc loco nobis non est, omnia exhaustire, sed ea tantum tradere, quae attentione digniora videantur: hic ad paucas observationes investigationem restringimus, uberiores huius rei expositionem ad aliam occasionem nobis reservantes.

Simili modo, ut in aequationibus perspicitur, etiam hic totidem congruentias haberi debere, quot sint incognitae determinandae.

39.

Propositae sint igitur congruentiae

$$ax + by + cz \dots \equiv f \pmod{m} \quad (A)$$

$$a'x + b'y + c'z \dots \equiv f' \pmod{m} \quad (A')$$

$$a''x + b''y + c''z \dots \equiv f'' \pmod{m} \quad (A'')$$

totidem numero quot sunt incognitae x, y, z etc.

Iam determinantur numeri ξ, ξ', ξ'' etc. ita ut sit

$$a\xi + a'\xi' + a''\xi'' + \text{etc.} = \mathfrak{A}$$

$$b\xi + b'\xi' + b''\xi'' + \text{etc.} = \mathfrak{B}$$

$$c\xi + c'\xi' + c''\xi'' + \text{etc.} = \mathfrak{C} \text{ etc.}$$

et quidem ita, ut omnes sint integri nullumque factorem communem habeant, quod fieri posse ex theoria aequationum linearium constat. Simili modo determinantur η, η', η'' etc., ita ut sit

$$a\eta + a'\eta' + a''\eta'' + \dots = 0$$

$$b\eta + b'\eta' + b''\eta'' + \dots = \mathfrak{B}$$

$$c\eta + c'\eta' + c''\eta'' + \dots = 0 \text{ etc.}$$

tum ζ, ζ', ζ'' etc., ita ut sit

$$a\zeta + a'\zeta' + a''\zeta'' + \dots = 0$$

$$b\zeta + b'\zeta' + b''\zeta'' + \dots = 0$$

$$c\zeta + c'\zeta' + c''\zeta'' + \dots = \mathfrak{C} \text{ etc.}$$

et sic porro.

40.

Manifestum est, si congruentiae A, A', A'' etc. per ξ, ξ', ξ'' etc., tum per η, η', η'' etc., tum per ζ, ζ', ζ'' etc. etc. multiplicentur, tuncque addantur, has congruentias provenituras esse:

$$\mathfrak{A}x \equiv f\xi + f'\xi' + f''\xi'' + \text{etc.}$$

$$\mathfrak{B}y \equiv f\eta + f'\eta' + f''\eta'' + \text{etc.}$$

$$\mathfrak{C}z \equiv f\zeta + f'\zeta' + f''\zeta'' + \text{etc.}$$

quas brevitatis gratia ita exhibemus

$$\Sigma(a\xi) \cdot x \equiv \Sigma(f\xi), \quad \Sigma(b\eta) \cdot y \equiv \Sigma(f\eta), \quad \Sigma(c\zeta) \cdot z \equiv \Sigma(f\zeta) \text{ etc.}$$

41.

Iam plures casus sunt distinguendi.

Primo quando omnes incognitarum coefficientes $\Sigma(a\xi), \Sigma(b\eta)$ etc. ad congruentiarum modulum m sunt primi, hae congruentiae secundum praecepta ante tradita solvi possunt, problematisque solutio completa per congruentias formae $x \equiv p \pmod{m}$, $y \equiv q \pmod{m}$ etc. exhibebitur⁶. E. g. Si proponuntur congruentiae

$$x + 3y + z \equiv 1, \quad 4x + y + 5z \equiv 7, \quad 2x + y + 2z \equiv 3 \pmod{8}$$

⁶Observare convenit hancce conclusionem demonstratione egere, quam autem hic suppressimus. Proprie enim nihil aliud ex analysi nostra sequitur, quam quod congruentiae propositae per alios incognitarum x, y etc. valores solvi nequeant: hos vero satisfacere non sequitur. Fieri enim posset, ut nulla omnino solutio daretur. Similis paralogismus etiam in aequationum linearium explicatione plerumque committitur.

invenietur $\xi = 9$, $\xi' = 1$, $\xi'' = -14$, unde fit $16x \equiv 26$, quare $x \equiv 6 \pmod{8}$; eodem modo invenitur $16y \equiv 4$, $16z \equiv 1$, et hinc $y \equiv 4$, $z \equiv 1 \pmod{8}$.

Secundo quando non omnes coefficientes $\Sigma(a\xi)$, $\Sigma(b\eta)$ etc. ad modulum sunt primi, sint α, β, γ etc. divisores communes maximi ipsius m cum $\Sigma(a\xi)$, $\Sigma(b\eta)$, $\Sigma(c\zeta)$ etc. resp. patetque problema impossibile esse, nisi illi numeros $\Sigma(f\xi)$, $\Sigma(f\eta)$, $\Sigma(f\zeta)$ etc. resp. metiantur. Quando vero hae conditiones locum habent, congruentiae in (40) complete resolventur per tales $x \equiv p \pmod{\frac{m}{\alpha}}$, $y \equiv q \pmod{\frac{m}{\beta}}$, $z \equiv r \pmod{\frac{m}{\gamma}}$ etc., aut si mavis dabunt α valores diversi ipsius x (i. e. secundum m incongrui, puta $p, p + \frac{m}{\alpha}, \dots, p + (\alpha - 1)\frac{m}{\alpha}$), β valores diversi ipsius y etc. illis congruentiis satisfaciennes, manifestoque omnes solutiones congruentiarum propositarum (si quae omnino dantur) inter illas reperientur.

42.

Attamen hanc conclusionem convertere non licet; nam plerumque omnes istae combinationes valores incognitarum propositis non satisfaciennes. Quanquam vero methodus supra tradita plenior sit, quam ut istae combinationes adiumento congruentiarum propositarum ipsarum examinandae supersint: tamen quoniam hoc examen saepe valde prolixum fit, non alienum erit, ostendere, quomodo hic requisita succincta suppleri possint.

Primo observamus, si duae incognitae e. g. x, y eandem habeant dimensionem in omnibus congruentiis propositis, hoc est, si in qualibet coefficientes ipsarum x, y sint congrui secundum modulum propositum, tum eadem quae de x dicta sunt etiam de y valebunt, adeoque pro y valores substitui poterunt, qui cuivis valori ipsius x aequales sint, vel quilibet valor ipsius x valor ipsius y esse poterit.

Si vero conditiones priori contrariae sunt, determinari poterit una incognitarum per alteram, eiusque valores omnes ita limitari, ut pro altera valores respondententes reales dentur. Haec per se satis clara exemplo illustrabimus. Sint propositae congruentiae

$$\begin{aligned} x + ay + bz &\equiv m \\ x + a'y + b'z &\equiv m' \\ x + a''y + b''z &\equiv m'' \pmod{p} \end{aligned}$$

ubi p est primus. Ex his deducitur

$$\begin{aligned} (a' - a)y + (b' - b)z &\equiv m' - m \\ (a'' - a)y + (b'' - b)z &\equiv m'' - m \pmod{p} \end{aligned}$$

quae duae congruentiae duas incognitas y, z implicant. Si itaque per methodum supra traditam omnes valores ipsius y invenientur (qui erunt p vel p^2 etc. secundum casus), pro singulis dabuntur valores respondententes ipsius z , qui ex una congruentia elici poterit, ex altera vero examinari debent. Reliqua per se patent.

Similis methodus applicari potest, quando numerus congruentiarum maior est quam incognitarum: sed de his disquisitionibus sufficiant ea quae attigimus.

Index

Praefatio	4
Sectio Prima	6
Numeri congrui, moduli, residua et nonresidua	6
Propositiones elementares de congruentiis	7
Quaedam applicationes	8
Sectio Secunda	10
Theoremata praeliminaria de numeris primis factoribusque	10
Solutio congruentiarum	12
Solutio congruentiarum primi gradus	13
De inveniendi numero secundum modulos datos residuis datis congruo	16
Congruentiae lineares quae plures incognitas implicant	18

Band 1, Teil 10

Carl Friedrich Gauß: Werke, Band I
Disquisitiones Arithmeticae — Sectio Septima
De aequationibus, circuli sectiones definientibus (Fortsetzung)

CARL FRIEDRICH GAUSS

De aequationibus, circuli sectiones definientibus

De aequatione, per quam distributio radicum Ω in duas periodos definitur.

356.

Summam attentionem merentur aequationes auxiliares, per quas pro quolibet valore ipsius n aggregata complexum Ω constituentia determinantur, quae mirum in modum cum proprietatibus maxime reconditis numeri n connexae sunt. Hoc vero loco disquisitionem ad duos casus sequentes restringemus: primo de aequatione quadratica, cuius radices sunt aggregata $\frac{1}{2}(n-1)$ terminorum, secundo, pro eo casu, ubi $n-1$ factorem 3 implicat, de cubica, cuius radices sunt aggregata $\frac{1}{3}(n-1)$ terminorum, agemus.

Scribendo brevitatis caussa m pro $\frac{1}{2}(n-1)$ et designando per g radicem primitivam quamcunque pro modulo n , complexus Ω e duabus periodis $(m, 1)$ et (m, g) constabit, continebitque prior radices $[1], [g^2], [g^4] \dots [g^{2m-2}]$, posterior has $[g], [g^3], [g^5] \dots [g^{2m-1}]$. Supponendo residua minima positiva numerorum $gg, g^4, g^6 \dots g^{2m-2}$ secundum modulum n esse, ordine arbitrario, R, R', R'' etc. nec non residua horum $g, g^3, g^5 \dots g^{2m-1}$ haec N, N', N'' etc., radices, e quibus $(m, 1)$ constat, convenient cum his $[1], [R], [R'], [R'']$ etc., radicesque periodi (m, g) cum his $[N], [N'], [N'']$ etc. Iam patet, omnes numeros $1, R, R', R''$ etc. esse residua quadratica numeri n , et quum omnes diversi ipsoque n minores sint ipsorumque multitudo $= \frac{1}{2}(n-1)$ adeoque multitudini cunctorum residuorum positivorum ipsius n infra n aequalis, haec residua cum illis numeris omnino convenient. Hinc sponte sequitur, omnes numeros N, N', N'' etc., qui tum inter se tum ab ipsis $1, R, R'$ etc. diversi sunt, et cum his simul sumti omnes numeros $1, 2, 3 \dots n-1$ exhaustiunt, cum omnibus non-residuis quadraticis positivis ipsius n infra n convenire debere.

Quodsi iam supponitur, aequationem, cuius radices sunt aggregata $(m, 1), (m, g)$, esse

$$xx - Ax + B = 0$$

fit

$$A = (m, 1) + (m, g) = -1, \quad B = (m, 1) \times (m, g)$$

Productum ex $(m, 1)$ in (m, g) per art. 345 fit

$$= (m, N + 1) + (m, N' + 1) + (m, N'' + 1) + \text{etc.} = W$$

atque hinc reducetur sub formam talem $\alpha(m, 0) + \beta(m, 1) + \gamma(m, g)$. Ad determinationem coefficientium α , β , γ observamus, primo fieri $\alpha + \beta + \gamma = m$ (scilicet quoniam multitudo aggregatorum in W est m); secundo, esse $\beta = \gamma$ (hoc sequitur ex art. 350, quum productum $(m, 1) \times (m, g)$ sit functio invariabilis aggregatorum $(m, 1)$, (m, g) , e quibus aggregatum maius $(n - 1, 1)$ compositum est); tertio, quum omnes numeri $N + 1$, $N' + 1$, $N'' + 1$ etc. infra limites 2 et $n + 1$ excl. contineantur, manifestum est, vel nullum aggregatum in W ad $(m, 0)$ reduci adeoque esse $\alpha = 0$, quando inter numeros N , N' , N'' etc. non occurrat $n - 1$, vel unum puta (m, n) et proin haberi $\alpha = 1$, quando $n - 1$ inter numeros N , N' , N'' etc. reperiatur.

Hinc colligitur, in casu priori fieri $\alpha = 0$, $\beta = \gamma = \frac{1}{2}m$, in posteriori $\alpha = 1$, $\beta = \gamma = \frac{1}{2}(m - 1)$, simul hinc sequitur, quum numeri β et γ necessario fiant integri, casum priorem locum habere, sive $n - 1$ (aut quod idem est -1) inter non-residua ipsius n non reperiri, quando m sit par sive n formae $4k + 1$; casum posteriorem vero adesse, sive $n - 1$ aut -1 inter non-residua ipsius n reperiri, quoties m sit impar sive n formae $4k + 3$ *) . Hinc productum quaesitum fit, propter $(m, 0) = m$, $(m, 1) + (m, g) = -1$,

$$\begin{aligned} \text{in casu priori} &= \frac{1}{2}m, \\ \text{in posteriori} &= \frac{1}{2}(m + 1), \end{aligned}$$

adeoque aequatio quaesita in casu illo $xx + x - \frac{1}{4}(n - 1) = 0$, cuius radices sunt $-\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{n}$, hoc vero $xx + x + \frac{1}{4}(n + 1) = 0$, cuius radices $-\frac{1}{2} \pm \frac{i}{2}\sqrt{n}$.

Quaecunque itaque radix ex Ω pro [1] adoptata est, differentia inter summas $\sum[R]$ et $\sum[N]$, ubi pro R omnia residua, pro N omnia non-residua quadratica positiva ipsius n infra n substituenda sunt, erit $= \pm\sqrt{n}$, pro $n \equiv 1$, et $= \pm i\sqrt{n}$, pro $n \equiv 3 \pmod{4}$. Nec non hinc facile sequitur, denotante k integrum quemcunque per n non divisibilem, fieri

$$2 \cos \frac{kP}{n} \pm i \sin \frac{kP}{n} \cdot 2 \sin \frac{kP}{n} = \pm \sqrt{\pm n}$$

pro $n \equiv 1 \pmod{4}$; contra pro $n \equiv 3 \pmod{4}$ differentiam illam $= 0$, hanc $= \pm\sqrt{\mp n}$, quae theorematum propter elegantiam suam valde sunt memorabilia. Ceterum observamus, signa superiora semper valere, quando pro k accipiatur unitas aut generalius residuum quadraticum ipsius n , inferiora, quando pro k non-residuum assumatur, nec non haecce theorematum salva vel potius aucta elegantia sua etiam ad valores quosvis compositos ipsius n extendi posse: sed de his rebus, quae altioris sunt indaginis, hoc loco tacere earumque considerationem ad aliam occasionem nobis reservare oportet.

*) Hoc modo nacti sumus demonstrationem novam theorematis, -1 esse residuum omnium numerorum primorum formae $4k + 1$, non-residuum omnium formae $4k + 3$, quod supra (art. 108, 109, 262) iam pluribus modis diversis comprobatum fuit. Si magis arridet, hoc theorema supponere, non necessarium erit ad distinctionem duorum casuum diversorum eius conditionis rationem habere, quod β , γ iam per se fiant integri.

Demonstratio theorematis in Sect. IV commemorati.

357.

Sit aequatio m^{ti} gradus, cuius radices sunt m radices in periodo $(m, 1)$ contentae, haec

$$z^m - \alpha z^{m-1} + bz^{m-2} - \text{etc.} = 0$$

sive $z^m = 0$, eritque $a = (m, 1)$, singulique reliqui coefficientes b etc. sub forma tali $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}(m, 1) + \mathfrak{C}(m, g)$ comprehensi, ut $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ sint integri (art. 348); denotandoque per z' functionem, in quam z transit, si pro $(m, 1)$ ubique substituitur (m, g) , pro (m, g) vero (m, gg) sive quod idem est $(m, 1)$, radices aequationis $z'^m = 0$ erunt radices in (m, g) contentae, productumque

$$zz' = X - x^m = 0$$

Potest itaque z ad formam talem $R + S(m, 1) + T(m, g)$ reduci, ubi R , S , T erunt functiones integrae ipsius x , quarum omnes coefficientes etiam integri erunt; quo facto habebitur

$$z' = R + S(m, g) + T(m, 1)$$

Hinc fit scribendo brevitatis caussa p et q pro $(m, 1)$ et (m, g) resp.

$$2z = 2R + (S + T)(p + q) - (T - S)(p - q) = 2R - S - T - (T - S)(p - q)$$

similiterque

$$2z' = 2R - S - T + (T - S)(p - q)$$

umde ponendo

$$2R - S - T = Y, \quad T - S = Z$$

fit $4X = YY - (p - q)^2 ZZ$, adeoque quum $(p - q)^2 = \pm n$

$$4X = YY \mp nZZ$$

signo superiori valente, quando n est formae $4k + 1$, inferiori, quando n formae $4k + 3$. Hoc est theorema, cuius demonstrationem supra (art. 124) polliciti sumus. Terminos duos summos functionis Y semper fieri $2x^m + x^{m-1}$ summumque functionis Z , x^{m-1} facile perspicietur; coefficientes reliqui autem, qui manifesto omnes erunt integri, variant pro diversa indole numeri n , nec formulae analyticae generali subiici possunt.

Ex. Pro $n = 17$ aequatio, cuius radices sunt octo radices in $(8, 1)$ contentae, per praecepta art. 348 eruitur

$$X = x^8 + \frac{1}{2}x^7 + (\frac{1}{2}p + 2q)x^6 + (\frac{3}{2} + p + 4q)x^5 - px^4 + \text{etc.}$$

umde

$$\begin{aligned} R &= x^8 + \frac{1}{4}x^7 + \frac{1}{2}x^6 - \frac{3}{4}x^5 - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}, \\ S &= -x^7 + x^6 - 4x^5 + 3x^4 - 2x^3 + 2x^2 - x, \\ T &= 2x^6 - 3x^5 + 5x^4 - 4x^3 + 2x^2 \end{aligned}$$

atque hinc

$$\begin{aligned} Y &= 2x^8 + x^7 + 5x^6 + 7x^5 + 4x^4 + 7x^3 + 5x^2 + x + 2, \\ Z &= x^7 + x^6 + x^5 + 2x^4 + x^3 + x^2 + x. \end{aligned}$$

Ecce adhuc alia quaedam exempla:

n	p	q	Y	Z
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

De aequatione pro distributione radicum Ω in tres periodos.

358.

Progredimur ad considerationem aequationum cubicarum, per quas in eo casu, ubi n est formae $3k + 1$, tria aggregata $\frac{1}{3}(n - 1)$ terminorum complexum Ω componentia determinantur. Sit g radix primitiva quaecunque pro modulo n , atque $\frac{1}{3}(n - 1) = m$, qui erit integer par. Tunc tria aggregata, e quibus Ω constat, erunt $(m, 1)$, (m, g) , (m, g^2) , pro quibus resp. scribemus p, p', p'' ; patetque primum continere radices $[1], [g^3], [g^6] \dots [g^{3m-3}]$, secundum has $[g], [g^4] \dots [g^{3m-2}]$, tertium has $[g^2], [g^5] \dots [g^{3m-1}]$.

Supponendo, aequationem quaesitam esse

$$x^3 - Axx + Bx - C = 0$$

fit

$$A = p + p' + p'', \quad B = pp' + p'p'' + pp'', \quad C = pp'p''$$

umde protinus habetur $A = -1$.

Sint residua minima numerorum $g^3, g^6, g^9 \dots g^{3m}$ secundum modulum n ordine arbitrario haec $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ etc., atque Ω ipsorum complexus superadiecto numero 1; similiter sint $\mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}'$ etc. residua minima numerorum $g, g^4, g^7 \dots g^{3m-2}$ atque Ω' illorum complexus; denique $\mathfrak{A}'', \mathfrak{B}'', \mathfrak{C}''$ etc. residua minima ipsorum $g^2, g^5, g^8 \dots g^{3m-1}$ et Ω'' eorum complexus, unde omnes numeri in $\Omega, \Omega', \Omega''$ diversi erunt et cum his 1, 2, 3... $n - 1$ convenient.

Ante omnia hic observandum est, numerum $n - 1$ necessario in Ω reperiri, quippe quem esse residuum ipsius g^{3m} facile perspicitur. Hinc facile quoque consequitur, duos numeros tales $n - 1$ semper in eodem trium complexuum $\Omega, \Omega', \Omega''$ reperiri, si enim alter est residuum potestatis g^λ alter erit residuum potestatis $g^{\lambda + \frac{2}{3}m}$, aut huius $g^{\lambda + \frac{4}{3}m}$, si $\frac{2}{3}m > \lambda$.

Denotemus hocce signo $(\Omega\Omega')$ multitudinem numerorum in serie 1, 2, 3... $n - 1$, qui tum ipsi tum simul numeri proximi unitate maiores in Ω continentur; similiter sit $(\Omega\Omega')$ multitudinem numerorum in eadem serie, qui ipsi in Ω proxime sequentes vero in Ω' continentur, unde simul significatio signorum $(\Omega\Omega), (\Omega'\Omega), (\Omega\Omega'), (\Omega''\Omega), (\Omega\Omega''), (\Omega'\Omega''), (\Omega''\Omega'')$ sponte innotescet.

Quo facto dico primo, fieri $(\Omega\Omega'') = (\Omega'\Omega)$. Supponendo enim, h, h', h'' , etc. esse omnes numeros seriei 1, 2, 3... $n - 1$, qui ipsi in Ω proxime maiores +1 autem in Ω' continentur, quorum ideo multitudo = $(\Omega\Omega')$, manifestum est, omnes numeros $n - h - 1, n - h' - 1, n - h'' - 1$ etc. in Ω contineri, proxime maiores vero $n - h, n - h'$ etc. in Ω'' ; quare quum tales numeri omnino dentur $(\Omega'\Omega'')$, certo nequit esse $(\Omega'\Omega'') < (\Omega\Omega'')$, et perinde demonstratur, esse non posse $(\Omega\Omega'') < (\Omega''\Omega)$, quocirca hi numeri necessario aequales erunt. Prorsus eodem modo probatur $(\Omega\Omega'') = (\Omega''\Omega), (\Omega'\Omega'') = (\Omega''\Omega')$.

Secundo, quum necessario quemvis numerum ex Ω , maximo $n - 1$ excepto, sequi debeat proxime maior vel in Ω , vel in Ω' vel in Ω'' contentus, summa $(\Omega\Omega) + (\Omega\Omega') + (\Omega\Omega'')$ fiet aequalis multitudini omnium numerorum in Ω unitate deminutae puta = $m - 1$, et simili ratione erit

$$(\Omega'\Omega') + (\Omega'\Omega'') + (\Omega'\Omega) = (\Omega''\Omega'') + (\Omega''\Omega) + (\Omega''\Omega') = m$$

His ita praeparatis evolvimus per praecepta art. 345 productum pp' in

$$(m, \mathfrak{A} + 1) + (m, \mathfrak{B} + 1) + (m, \mathfrak{C} + 1) + \text{etc.},$$

quam expressionem facile perspicietur reduci ad $(\mathfrak{N}\mathfrak{N})p + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}')p' + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}'')p''$, et quum per art. 345 I productum $p'p''$ ex illo oriatur, substituendo pro $(m, 1)$, (m, g) , (m, g^2) resp. (m, g) , (m, g^2) , $(m, 1)$ i.e. p , p' , p'' resp. p' , p'' , p , fiet $p'p'' = (\mathfrak{N}\mathfrak{N})p' + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}')p'' + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}'')p$, et prorsus simili modo $p''p = (\mathfrak{N}'\mathfrak{N})p'' + (\mathfrak{N}'\mathfrak{N}')p + (\mathfrak{N}'\mathfrak{N}'')p'$.

Hinc protinus sequitur primo

$$B = m(p + p' + p'') = -m$$

secundo quum simili ratione, ut antea pp' evolutum est, etiam pp'' ad $(\mathfrak{N}''\mathfrak{N})p + (\mathfrak{N}''\mathfrak{N}')p + (\mathfrak{N}''\mathfrak{N}'')p''$ reducatur, atque haec expressio cum praecedente identica esse debeat, necessario erit $(\mathfrak{N}''\mathfrak{N}') = (\mathfrak{N}\mathfrak{N}')$ et $(\mathfrak{N}''\mathfrak{N}'') = (\mathfrak{N}\mathfrak{N}'')$. Hinc colligitur statuendo

$$(\mathfrak{N}\mathfrak{N}) = a - 1, \quad (\mathfrak{N}\mathfrak{N}') = (\mathfrak{N}'\mathfrak{N}'') = (\mathfrak{N}''\mathfrak{N}) = b, \quad (\mathfrak{N}\mathfrak{N}'') = (\mathfrak{N}'\mathfrak{N}) = (\mathfrak{N}''\mathfrak{N}') = c$$

fieri $m - 1 = (\mathfrak{N}\mathfrak{N}) + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}') + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}'') = (a - 1) + b + c$, atque $a + b + c = m$, unde novem quantitates incognitae ad tres, a , b , c , sive potius propter aequationem $a + b + c = m$ ad duas reductae sunt.

Denique patet, quadratum pp evolvi in

$$(m, \mathfrak{A} + 1) + (m, \mathfrak{B} + 1) + (m, \mathfrak{C} + 1) + \text{etc.};$$

inter partes huius expressionis reperietur (m, n) , quae reducitur ad $(m, 0)$ sive ad m , reliquas vero facile perspicietur reduci ad $(\mathfrak{N}\mathfrak{N})p + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}')p' + (\mathfrak{N}\mathfrak{N}'')p''$, unde habetur $pp = m + (a - 1)p + bp' + cp''$.

Hoc itaque modo per disquisitiones praecedentes quatuor hasce reductiones nacti sumus:

$$\begin{aligned} pp &= m + (a - 1)p + bp' + cp'' \\ pp' &= bp + cp' + ap'' \\ pp'' &= cp + ap' + bp'' \\ p'p' &= ap + bp' + cp'' \quad (\text{permutando } p, p', p'') \end{aligned}$$

ubi inter tres incognitas a , b , c aequatio conditionalis

$$a + b + c = m \tag{I}$$

intercedit, insuperque certum est, ipsas esse numeros integres. Hinc colligitur

$$\begin{aligned} C = p \times p'p'' &= app + bpp' + cpp'' \\ &= am + (aa + bb + cc - a)p + (ab + bc + ac)p' + (ab + bc + ac)p'' \end{aligned}$$

At quum $pp'p''$ sit functio invariabilis aggregatorum p , p' , p'' , coefficientes, per quos haec in expr. praec. multiplicata sunt, necessario aequales erunt (art. 350), unde habetur aequatio nova

$$aa + bb + cc - a = ab + bc + ac \tag{II}$$

atque hinc

$$C = am + (ab + bc + ac)(p + p' + p'') = am - (ab + bc + ac)$$

sive (propter I, et $p + p' + p'' = -1$)

$$C = aa - bc \tag{III}$$

Iam etsi C hic a tribus incognitis pendeat, inter quas duae tantum aequationes habentur, tamen hae, adiumento conditionis, ex qua a, b, c sunt integri, ad plenam determinationem ipsius C sufficiunt. Quod ut ostendamus, aequationem II ita exhibemus

$$12a + 12b + 12c + 4 = 36aa + 36bb + 36cc - 36ab - 36ac - 36bc - 24a + 12b + 12c + 4$$

pars prior, per I, fit $= 4m$; posterior vero reducitur ad

$$= 12m + 4 - (6a - 3b - 2)^2 + 27(b - c)^2$$

aut scribendo k pro $2a - b - c$, ad $4m - (3k - 2)^2 + 27NN$. Hinc patet, numerum $4m$ (i.e. generaliter quadruplum cuiuslibet primi formae $3m + 1$) per formam $xx + 27yy$ repraesentari posse, quod quidem sine difficultate e theoria generali formarum binariarum deduci potest, attamen satis mirum est, talem discriptionem cum valoribus ipsarum a, b, c cohaerere. At numerus $4m$ semper unico tantum modo in quadratum et quadratum $27\Box$ discerpi potest, quod ita demonstramus^{*)}. Si supponatur

$$4m = tt + 27uu = tt' + 27u'u'$$

fieret primo

$$(tt' - 27uu')^2 + 27(tu' + t'u)^2 = 16mm$$

secundo

$$(tt' + 27uu')^2 + 27(tu - t'u)^2 = 16mm$$

tertio

$$(tu + t'u)(tu - t'u) = 4m(uu - u'u')$$

ex aequatione tertia sequitur, ipsum n , quoniam est numerus primus, alterutrum numerorum $tu + t'u, tu - t'u$ metiri; e prima et secunda vero patet, utrumque hunc numerum esse minorem quam n : quare is, quem n metitur, necessario esse debet $= 0$, adeoque etiam $uu - u'u' = 0$, unde $uu = u'u'$ et $tt = t't'$, e. duo illae discriptiones non differunt.

Si itaque discriptionem ipsius $4m$ in quadratum et quadratum $27\Box$ notam supponimus (quam vel per methodum directam Sect. V vel per indirectam in artt. 323, 324 traditam eruere licet), puta si habetur $4m = MM + 27NN$, quadrata $(3k - 2)^2, (b - c)^2$ determinata erunt, et loco aequationis II duas iam nacti erimus. Sed facile patet, non solum quadratum $(3k - 2)^2$ penitus determinatam esse, sed etiam radicem ipsam $3k - 2$ esse; quum enim necessario sit vel $= +M$ vel $= -M$, ambiguitas inde tolletur, quod k debet fieri integer, quamobrem statuatur $3k - 2 = +M$ vel $= -M$, prout M est formae $3r + 1$ vel $3r + 2$ ^{†)}. Iam quum vel $k = 2a - b - c$ fiat

$$a = \frac{1}{3}(m + k), \quad b + c = m - a = \frac{1}{3}(2m - k),$$

erit

$$C = aa - bc = aa - \frac{1}{4}(b + c)^2 + \frac{1}{4}(b - c)^2 = \frac{1}{9}(m + k)^2 - \frac{1}{36}(2m - k)^2 + \frac{1}{4}NN = \frac{1}{4}kk + \frac{1}{3}km + \frac{1}{4}NN$$

atque sic omnes coefficientes aequ. quaesitae inventi.

Q. E. F.

^{*)} Magis directe haecce propositio e principiis Sect. V probari posset.

^{†)} Manifeste M nequit esse formae $3z$, alioquin enim m per 3 divisibilis evaderet. — Ad ambiguitatem, utrum $b - c$ statui debeat $= N$, an $= -N$, hic non opus est respicere, neque

etiam per rei naturam ullo modo auferri potest, quum ab electione radice primitivae g pendeat, ita ut pro aliis radicibus primitivis differentia $b - c$ positiva evadat, pro aliis negativa.

Haec formula adhuc simplicior evadit, si pro NN eius valor ex aequ. $(3k-2)^2 + 27NN = 4m = 12m + 4$ substituitur, unde elicitur calculo facto

$$C = \frac{1}{27}(4m + 2 - 3k - 9kk) = \frac{1}{27}(m + k + 3)^2(2m - k) - \frac{1}{27}kk(m + k)$$

Idem valor etiam ad $\frac{1}{27}(2k-2)NN + k^3 - 2kk + k - km + m$ reduci potest, quae expressio, ad usum quidem minus idonea, protinus monstrat, C ut par est, certo evadere integrum.

Ex. Pro $n = 19$, fit $4m = 49 + 27$, unde $3k - 2 = \pm 7$, $k = 3$, $C = \frac{1}{27}(6 + 54) = 1$ et aequatio quaesita $x^3 + xx - 6x - 7 = 0$, ut supra (art. 351).

Simili modo pro $n = 7, 13, 31, 37, 43, 61, 67$ valor ipsius k eruitur resp. 1, -1, 2, -3, -2, 1, -1, unde $C = 1, -1, 8, -11, -8, 9, -5$.

Ceterum etsi problema in hoc art. solutum satis intricatum sit, tamen id suppressere noluimus, tum propter solutionis elegantiam, tum quod variis artificiis in usum vocandis occasionem dedit, quae in aliis quoque quaestionibus insigni cum fructu adhiberi poterunt*).

*) Coroll. Sit e radix aequationis $x^3 - 1 = 0$ et habebis $(p + ep' + e^2p'')^3 = -\frac{27}{4}(C + i\sqrt{27}\dots)$.
— Hiat $-\frac{i\sqrt{27}}{\sqrt{4m}} = \cos \varphi$, $\frac{N\sqrt{27}}{\sqrt{4m}} = \sin \varphi$ etc.

Aequationum per quas radices Ω inveniuntur reductio ad puras.

359.

Disquisitiones praec. circa inventionem aequationum auxiliarium versabantur: iam de earum solutione proprietatem magnopere insignem explicabimus. Constat, omnes summorum geometrarum labores, aequationum ordinem quartum superantium resolutionem generalem, sive (ut accuratius quid desideretur definiam) **AFFECTARUM REDUCTIONEM AD PURAS**, inveniendi semper hactenus irritos fuisse, et vix dubium manet, quin hocce problema non tam analyseos hodiernae vires superet, quam potius aliquid impossibile proponat (Cf. quae de hoc argumento annotavimus in Demonstr. nova etc. art. 9). Nihilominus certum est, innumeras aequationes affectas cuiusque gradus dari, quae talem reductionem ad puras admittant, geometrisque gratum fore speramus, si nostras aequationes auxiliares semper huc referendas esse ostenderimus. Sed propter amplum ambitum huius disquisitionis, praecipua tantum momenta, quae ad possibilitatem ostendendam necessaria sunt, hoc loco tradimus, uberiolemque tractationem, qua hoc argumentum perdignum est, ad aliud tempus differimus. Praemittendae sunt quaedam observationes generales circa radices aequ. $x^e - 1 = 0$, quae eum quoque casum complectantur, ubi e est numerus compositus.

I. Exhibentur hae radices (ut ex libris elementaribus notum est) per $\cos \frac{kP}{e} \pm i \sin \frac{kP}{e}$, ubi pro k accipiendi sunt e numeri $0, 1, 2, 3 \dots e - 1$, aut quicumque alii his secundum modulum e congrui. Una radix, pro $k = 0$ aut generaliter pro k per e divisibili fit $= 1$; cuivis alii valori ipsius k radix ab 1 diversa respondet.

II. Quum sit $(\cos \frac{kP}{e} \pm i \sin \frac{kP}{e})^\lambda = \cos \frac{\lambda kP}{e} \pm i \sin \frac{\lambda kP}{e}$, patet, si R sit radix talis, quae respondeat valori ipsius k ad e primo, in progressionem R, RR, R^3 etc. terminum e^{tium} quidem esse $= 1$, omnes antecedentes vero ab 1 diversos. Hinc statim sequitur, omnes e

quantitates $1, R, RR, R^3 \dots R^{e-1}$ inaequales esse, et quum manifesto omnes aequationi $x^e - 1 = 0$ satisfaciant, exhibebunt omnes radices huius aequationis.

III. Denique in eadem suppositione aggregatum

$$1 + R^\lambda + R^{2\lambda} + R^{3\lambda} + \dots + R^{(e-1)\lambda}$$

fit $= 0$, pro quovis valore integro ipsius λ per e non divisibili; etenim est $= \frac{R^{e\lambda}-1}{R^\lambda-1}$, cuius fractionis numerator fit $= 0$, denominator vero non $= 0$. Quando vero λ per e divisibilis est, illud aggregatum manifesto fit $= e$.

360.

Sit, ut semper in praec., n numerus primus, g radix primitiva pro modulo n , atque $n-1$ productum e tribus integris positivis α, β, γ ; brevitatis caussa disquisitionem ita statim instituemus, ut etiam ad casus ubi α aut $\gamma = 1$ pateat; quando $\gamma = 1$, pro aggregatis $(\gamma, 1), (\gamma, g)$ etc. radices $[1], [g]$ etc. accipere oportebit. Supponamus itaque, ex omnibus α aggregatis $\beta\gamma$ terminorum cognitis $(\beta\gamma, 1), (\beta\gamma, g), (\beta\gamma, gg) \dots (\beta\gamma, g^{\alpha-1})$ deducenda esse aggregata γ terminorum, quod negotium supra ad aequationem affectam β^{ti} gradus reduximus, nunc vero per puram aequae altam absolvere docebimus.

Ad abbreviandum pro aggregatis

$$(\gamma, 1), \quad (\gamma, g^\alpha), \quad (\gamma, g^{2\alpha}) \dots (\gamma, g^{(\beta-1)\alpha})$$

quae sub $(\beta\gamma, 1)$ contenta sunt, scribemus $a, b, c \dots m$ resp.; pro his sub $(\beta\gamma, g)$ contentis resp. $a', b' \dots m'$; pro his resp. $a'', b'' \dots m''$ etc. usque ad ea, quae sub $(\beta\gamma, g^{\alpha-1})$ continentur.

I. Iam designet R indefinite radicem aequationis $x^{\beta\gamma} - 1 = 0$, supponamusque ex evolutione potestatis

$$t = a + Rb + RRc + \dots + R^{\beta-1}m$$

oriri per praecepta art. 345

$$\begin{aligned} T &= Aa + Bb + Cc \dots + Mm \\ &+ A'a' + B'b' + C'c' \dots + M'm' \\ &+ A''a'' + B''b'' + C''c'' \dots + M''m'' \\ &+ \text{etc.} \end{aligned}$$

umi omnes coefficientes A, B, A', A'' etc. erunt functiones rationales integrae ipsius R .

Supponantur etiam potestates $R^{\beta\gamma-1}$ duarum aliarum functionum

$$u = Ra + RRb + R^3c \dots + R^\beta m, \quad u' = b + Rc + RRd \dots + R^{\beta-2}m + R^{\beta-1}a$$

resp. evolvi in U et U' , perspicieturque facile ex art. 350, quum u oriatur ex t commutando aggregata $a, b, c \dots m$ resp. cum $b, c, d \dots a$, fore

$$\begin{aligned} U &= Aa + Ab + Bc + Cd \dots + Ma \\ &+ A'a' + A'b' + B'c' \dots + M'a' \\ &+ A''a'' + A''b'' + B''c'' \dots + M''a'' \\ &+ \text{etc.} \end{aligned}$$

Porro patet, quum sit $u' = Ru$, fore $U = R^{\beta-1}U'$, quare propter $R^\beta = 1$ coefficientes correspondentes in U et U' aequales erunt; denique, quum u' et m in eo tantum differant, quod a in t per unitatem, in u per R^β multiplicatur, facile intelligitur, omnes coefficientes correspondentes (i.e. qui eadem aggregata multiplicant) in T et U aequales esse, et proin etiam omnes coefficientes correspondentes in T et U' . Hinc tandem colligitur $A = B = C$ etc. $= M$; $A' = B' = C'$ etc., $A'' = B'' = C''$ etc. etc., unde T reducitur ad formam talem

$$N + A(\beta\gamma, 1) + A'(\beta\gamma, g) + A''(\beta\gamma, g^2) + \text{etc.}$$

umi singuli coefficientes N, A, A' etc. sub formam talem reducere licet

$$\mu R^{\beta-1} + \mu' R^{\beta-2} + \mu'' R^{\beta-3} + \text{etc.}$$

ita ut μ, μ', μ'' etc. sint numeri integri dati.

II. Si pro R accipitur radix determinata aequationis $x^\beta - 1 = 0$ (cuius solutionem iam haberi supponimus), et quidem talis, cuius nulla inferior potestas quam β^{ta} unitati aequalis est, etiam T quantitas determinata erit, ex qua t per aequationem puram $t^\beta - T^\beta = 0$ derivare licet. At quum haec aequatio β radices habeat, quae erunt $t, Rt, RRt \dots R^{\beta-1}t$, dubium videri potest, quamnam radicem adoptare oporteat. Hoc vero prorsus arbitrarium esse, ita facile apparebit. Meminisse oportet, postquam omnia aggregata $\beta\gamma$ terminorum determinata sint, radicem [1] eatenus tantum definitam esse, ut aliqua ex $\beta\gamma$ radicibus in $(\beta\gamma, 1)$ contentis hoc signo denotari debeat; et perinde omnino arbitrarium esse, quidnam ex β aggregatis ipsum $(\beta\gamma, 1)$ constituentibus per a designare velimus. Quodsi iam, aliquo aggregato determinato per a expresso supponatur fieri $t = T$, facile perspicietur, si postea aggregatum id, quod modo designabatur per b , per a denotare lubeat, ea quae antea erant $c, d \dots a, b$, nunc fieri $b, c \dots m, a$, adeoque valorem ipsius t nunc $= \frac{T}{R}$ sive $= R^{\beta-1}T$. Simili modo si per a id aggregatum exprimere placet, quod ab initio erat c , valor ipsius t fiet $= R^{\beta-2}T$, et ita porro: t cuicunque quantitatium $T, R^{\beta-1}T, R^{\beta-2}T$ etc. aequalis censi potest, i.e. cuilibet radici aequ. $x^\beta - T^\beta = 0$, prout aliud aliudve aggregatum sub $(\beta\gamma, 1)$ contentum per $(\gamma, 1)$ expressum supponatur. Q. E. D.

III. Postquam quantitas t hoc modo determinata est, $\beta - 1$ alias investigare oportet, quae ex t prodeunt, si in eius expressione pro R successive $RR, R^3, R^4 \dots R^{\beta-1}$ substituantur, puta

$$t' = a + RRb + R^4c \dots + R^{2\beta-2}m, \quad t'' = a + R^3b + R^6c + \dots + R^{3\beta-3}m \quad \text{etc.}$$

Ultima quidem iam habetur, quum manifeste fiat $= a + b + c \dots + m = (\beta\gamma, 1)$; reliquae vero sequenti modo erui possunt. Si per praecepta art. 345, simili modo ut t^β antea in I, productum $t^{\beta-1} \cdot t'$ evolvitur, probabitur per methodum praecedenti prorsus analogam, quod inde prodeat ad formam talem

$$\mathfrak{A} + \mathfrak{B}(\beta\gamma, 1) + \mathfrak{B}'(\beta\gamma, g) + \mathfrak{B}''(\beta\gamma, g^2) \text{ etc.} = T'$$

reduci posse, ita ut $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}'$ etc. sint functiones rationales integrae ipsius R , adeoque T' quantitas nota, unde habebitur $t' = \frac{T't}{T}$. Prorsus eodem modo, si ex evolutione producti $t^{\beta-2} \cdot t''$ prodire supponitur T'' , haec expressio similem formam habebit et proin ex eius valore noto derivabitur t'' per aequationem $t'' = \frac{T''t}{T}$, perinde t''' per aequationem talem invenietur $t''' = \frac{T'''t}{T}$, ita ut T''' sit quantitas nota etc.

Haec methodus non foret applicabilis, si fieri posset $T = 0$, unde etiam esse deberet $T' = T'' = T'''$ etc. $= 0$; sed probari potest, hoc esse impossibile, etsi demonstrationem

propter prolixitatem hoc loco suppressere oporteat. Dantur etiam artificia peculiaria, per quae fractiones $\frac{T't}{T}$, $\frac{T''t}{T}$ etc. in functiones rationales integras ipsius R convertere licet; nec non methodi breviores pro eo casu, ubi $\alpha = 1$, valores ipsarum t' , t'' etc. eruendi, quae omnia hic silentio praeterire debemus.

IV. Denique simulac t , t' , t'' etc. inventae sunt, habebitur statim per obs. III art. praec. $t + t' + t'' + \text{etc.} = \beta a$, unde valor ipsius a notus erit, ex quo per art. 346 valores omnium reliquorum aggregatorum γ terminorum derivari poterunt. Valores ipsorum b , c , d etc. etiam per aequationes sequentes elici possunt, quarum ratio cuivis attendenti facile patebit:

$$\begin{aligned}\beta b &= R^{\beta-1}t + R^{\beta-2}t' + R^{\beta-3}t'' + \text{etc.} \\ \beta c &= R^{\beta-2}t + R^{\beta-4}t' + R^{\beta-6}t'' + \text{etc.} \\ \beta d &= R^{\beta-3}t + R^{\beta-6}t' + R^{\beta-9}t'' + \text{etc. etc.}\end{aligned}$$

Ex magno numero observationum ad disquisitionem praec. pertinentium hic unam tantum attingimus. Quod attinet ad solutionem aequationis purae $x^\beta - T = 0$, facile patet, T in plerisque casibus valorem imaginarium $P + iQ$ habere, unde illa solutio partim a sectione anguli (cuius tangens $= \frac{Q}{P}$) partim a sectione rationis (unitatis ad $\sqrt{PP + QQ}$) in β partes, ut constat, pendebit. Ubi valde mirabile est (quod tamen fusius hic non exsequimur), valorem ipsius $\sqrt[\beta]{PP + QQ}$ semper rationaliter per quantitates iam notas exprimi posse, ita ut, praeter extractionem radices quadraticae, ad solutionem sola Sectio anguli requiratur, e.g. pro $\beta = 3$ sola trisectio anguli.

Tandem quum nihil obstet, quo minus statuamus $\alpha = 1$, $\gamma = 1$ adeoque $\beta = n - 1$: manifestum est, solutionem aequationis $x^{n-1} - 1 = 0$ statim reduci posse ad solutionem aequationis purae $n - 1^{\text{ti}}$ gradus $x^{n-1} - T = 0$, ubi T per radices aequationis $x^{n-1} - 1 = 0$ determinabitur. Unde adiumento observationis modo factae colligitur, sectionem circuli integri in n partes requirere 1° sectionem circuli integri in $n - 1$ partes, 2° sectionem arcus, qui sectione alius illa facta construi potest, in $n - 1$ partes, 3° extractionem unius quadraticae radices, et quidem ostendi potest, hanc semper esse $\sqrt{n}$.

Applicatio disquisitionum praecedentium ad functiones trigonometricas.

Methodus angulos, quibus singulae radices Ω respondeant, dignoscendi.

361.

Superest, ut nexum inter radices Ω atque functiones trigonometricas angulorum $\frac{P}{n}$, $\frac{2P}{n}$, $\frac{3P}{n}$... adhuc propius contemplemur. Methodus, quam pro inveniendis radicibus Ω exposuimus, ita comparata est, ut adhuc incertum relinquat (nisi tabulae sinuum inter laborem ita ut supra diximus consultae fuerint, quod tamen minus directum foret), quae nam radices singulis illis angulis respondeant i.e. quae nam radix sit $= \cos \frac{P}{n} \pm i \sin \frac{P}{n}$, quae nam $= \cos \frac{2P}{n} \pm i \sin \frac{2P}{n}$ etc.

Haec vero incertitudo facile discutitur, reflectendo, cosinus angulorum $\frac{P}{n}$, $\frac{2P}{n}$, $\frac{3P}{n}$... $\frac{(n-1)P}{n}$ continuo decrescere (siquidem etiam signorum ratio habeatur), sinus omnes positivos esse; angulos $\frac{(n-1)P}{n}$, $\frac{(n-2)P}{n}$, $\frac{(n-3)P}{n}$... $\frac{(n+1)P}{n}$ vero eosdem resp. cosinus habere ut illos, sinus autem negativos ceterum magnitudine absoluta sinus illorum aequales. Quare e radicibus Ω duae istae, quae partes reales maximas (inter se aequales) habent, respondebunt angulis $\frac{P}{n}$, $\frac{(n-1)P}{n}$, et quidem priori ea, ubi quantitas imaginaria i per quantitatem positivam,

posteriori ea, ubi i per quantitatem negativam multiplicata est. Ex $n-3$ reliquis radicibus istae rursus, quae maximas partes reales habent, angulis $\frac{2P}{n}$, $\frac{(n-2)P}{n}$ respondebunt et sic porro. — Simulac ea radix, cui angulus $\frac{P}{n}$ respondet, agnita est, eae quae angulis reliquis respondent, etiam inde distingui poterunt, quod, si illa supponatur esse $= [\lambda]$, angulis $\frac{2P}{n}$, $\frac{3P}{n}$, $\frac{4P}{n}$ etc. manifesto respondebunt radices $[2\lambda]$, $[3\lambda]$, $[4\lambda]$ etc. Ita in exemplo art. 353 illico videtur, angulo $\frac{2P}{19}$ aliam radicem respondere non posse quam hanc $[11]$ anguloque $\frac{8P}{19}$ radicem $[8]$; similiter angulis $\frac{4P}{19}$, $\frac{9P}{19}$, $\frac{15P}{19}$, $\frac{6P}{19}$, $\frac{7P}{19}$ etc. respondent radices $[3]$, $[16]$, $[14]$, $[5]$ etc. In exemplo art. 354 angulo $\frac{P}{17}$ manifeste respondet radix $[1]$, angulo $\frac{2P}{17}$ haec $[2]$ etc. Hoc itaque modo cosinus et sinus angulorum $\frac{P}{n}$, $\frac{2P}{n}$ etc. plene determinati erunt.

Tangentes, cotangentes, secantes et cosecantes e sinibus et cosinibus absque divisione derivantur.

362.

Quod vero attinet ad reliquas functiones trigonometricas horum angulorum, possent eae quidem e cosinibus et sinibus respondentibus per methodos vulgo notas facile derivari, puta secantes et tangentes, dividendo unitatem et sinus per cosinus; nec non cosecantes et cotangentes, dividendo unitatem et cosinus per sinus. Sed commodius plerumque idem obtinetur adiumento formularum sequentium absque divisionibus per meras additiones. Sit ω angulus quicumque ex his $\frac{P}{n}$, $\frac{2P}{n}$... $\frac{(n-1)P}{n}$ atque $\cos \omega \pm i \sin \omega = R$, unde R erit aliqua e radicibus Ω .

Hinc fit

$$\cos \omega = \frac{1}{2}(R + R^{-1}) = \frac{1}{2}R \cdot \frac{1+R^2}{R^2}, \quad \sin \omega = \pm \frac{i}{2}(R - R^{-1}) = \pm \frac{i}{2R} \cdot \frac{R^2-1}{R}$$

umde

$$\sec \omega = \frac{2R}{1+RR}, \quad \tan \omega = \frac{\pm i(RR-1)}{R+RR}, \quad \csc \omega = \frac{\pm 2Ri}{1-RR}, \quad \cot \omega = \frac{\pm i(RR+1)}{1-RR}$$

Iam numeratores harum quatuor fractionum ita transformare ostendemus, ut per denominatores divisibiles evadant.

I. Propter $R = R^{n+1} = R^{2n+1}$ fit $2R = R + R^{2n+1}$, quam expressionem per $1 + RR$ divisibilem esse patet, quum n sit numerus impar. Hinc fit

$$\sec \omega = R - R^3 + R^5 - R^7 \dots + R^{2n-1}$$

adeoque (quum propter $\sin \omega = -\sin(2n-1)\omega$, $\sin 3\omega = -\sin(2n-3)\omega$ etc. manifesto fiat $\sin \omega - \sin 3\omega + \sin 5\omega \dots \mp \sin(2n-1)\omega = 0$)

$$\sec \omega = \cos \omega - \cos 3\omega + \cos 5\omega \dots + \cos(2n-3)\omega \mp \cos(2n-1)\omega$$

sive tandem, (quoniam $\cos \omega : \cos \omega$, $\cos 3\omega = \cos \omega - (2 \cdot 1)\omega$, $3\omega = (2 \cdot 1 + 1)\omega$ etc.),

$$= 2(\cos \omega - \cos 3\omega + \cos 5\omega \dots \pm \cos(n-2)\omega) \mp \cos n\omega$$

signo superiori vel inferiori valente, prout n est formae $4k+1$ vel $4k+3$. Manifesto haec formula etiam ita exhiberi potest

$$\sec \omega = \pm(1 - \cos 2\omega + 2 \cos 4\omega \dots + 2 \cos(n-1)\omega)$$

II. Simili modo substituendo $1 - R^{2n+2}$ pro $1 - RR$, prodit

$$\tan \omega = \frac{1}{i}(1 - RR + R^4 - R^6 \dots - R^{2n-2})$$

sive (quoniam $1 - R^{2n} = 0$, $RR - R^{2n-2} = 2i \sin 2\omega$, $R^4 - R^{2n-4} = 2i \sin 4\omega$ etc.),

$$\tan \omega = 2(\sin 2\omega - \sin 4\omega + \sin 6\omega \dots \pm \sin(n-1)\omega)$$

III. Quum habeatur $1 + RR + R^4 + R^6 \dots + R^{2n-2} = 0$, fit

$$\begin{aligned} \csc \omega \cdot \frac{1}{2i}(1 - RR) &= \frac{R}{i}(1 - R^2 + R^4 - R^6 \dots + R^{2n-4}) \\ &= \frac{R}{i}((1 - R^2) + (1 - R^2)R^2 + (1 - R^2)R^4 \dots + (1 - R^2)R^{2n-4}) \end{aligned}$$

cuius aggregati partes singulae per $1 - RR$ sunt divisibiles. Hinc

$$\csc \omega = \frac{1}{i}(1 + (1 + R^2) + (1 + R^2 + R^4) \dots + (1 + R^2 + R^4 \dots + R^{2n-4}))$$

quocirca multiplicando per 2, subtrahendo $= \frac{1}{i}(n-1)(1 + RR + R^4 \dots + R^{2n-2})$, rursusque per R multiplicando fit

$$\csc \omega = -\frac{1}{i}(n \sin \omega - (n-2) \sin 3\omega + (n-4) \sin 5\omega \dots - \sin(2n-3)\omega)$$

umde protinus deducitur

$$\csc \omega = -((n-1) \sin \omega + (n-3) \sin 3\omega + \sin \omega \dots + 2 \sin(n-2)\omega)$$

quae formula etiam ita exhiberi potest

$$\csc \omega = -\frac{1}{i}(2 \sin 2\omega + 4 \sin 4\omega + 6 \sin 6\omega \dots + (n-1) \sin(n-1)\omega)$$

IV. Multiplicando valorem ipsius $\csc \omega$ supra traditum per $1 + RR$ et subtrahendo $= (n-1)(1 + RR + R^4 \dots + R^{2n-2})$, prodit

$$\cot \omega \cdot \frac{1}{2i}(1 - RR) = (n-2)RR + (n-4)R^4 + (n-6)R^6 \dots - (n-2)R^{2n-4}$$

umde statim sequitur

$$\begin{aligned} \cot \omega &= -((n-2) \sin 2\omega + (n-4) \sin 4\omega + (n-6) \sin 6\omega \dots \mp 2 \sin(n-2)\omega) \\ &= -((n-2) \sin 2\omega + (n-4) \sin 4\omega + 3 \sin(n-3)\omega + \sin(n-1)\omega) \end{aligned}$$

quam formulam etiam hocce modo exhibere licet

$$\cot \omega = \sin \omega + 3 \sin 3\omega \dots + (n-2) \sin(n-2)\omega$$

Methodus, aequationes pro functionibus trigonometricis successive deprimendi.

Quemadmodum, supponendo $n - 1 = ef$, functio X in e factores f dimensionum resolvi potest, simulac valores omnium e aggregatorum f terminorum innotuerunt (art. 348): ita tunc etiam, supponendo $Z = 0$ esse aequationem $n - 1^{ti}$ ordinis, cuius radices sint sinus aut quaelibet aliae functiones trigonometricae angulorum $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n} \dots \frac{(n-1)P}{n}$, functio Z in e factores f dimensionum resolvi poterit, cuius rei praecipua momenta haec sunt.

Constet Ω ex e periodis f terminorum his $(f, 1) = P, P', P''$ etc., periodusque P e radicibus $[1], [a], [b], [c]$ etc.; P' ex his $[a'], [b'], [c']$ etc.; P'' ex his $[a''], [b''], [c'']$ etc. etc. Respondeat radici $[1]$ angulus ω , adeoque radicibus $[a], [b]$ etc. anguli $a\omega, b\omega$ etc., radicibus $[a'], [b']$ etc. anguli $a'\omega, b'\omega$ etc., radicibus $[a''], [b'']$ etc. anguli $a''\omega, b''\omega$ etc. etc.; perspicieturque facile, omnes hos angulos simul sumtos cum angulis $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n} \dots \frac{(n-1)P}{n}$ respectu functionum trigonometricarum*) convenire.

Quodsi itaque functio, de qua agitur, per characterem φ angulo praefixum denotetur; productum ex e factoribus

$$(x - \varphi\omega), \quad (x - \varphi a\omega), \quad (x - \varphi b\omega) \text{ etc.}$$

statuatur $= Y$, productum ex his $(x - \varphi a'\omega), (x - \varphi b'\omega)$ etc. $= Y'$, productum ex his $(x - \varphi a''\omega), (x - \varphi b''\omega)$ etc. $= Y''$ etc.: necessario erit productum $YY'Y'' \dots = Z$.

Superest iam, ut demonstremus, omnes coefficientes in functionibus Y, Y', Y'' etc. ad formam talem

$$A + B(f, 1) + C(f, g) + D(f, gg) \dots + H(f, g^{e-1})$$

reduci posse, quo facto manifesto omnes pro cognitis habendi erunt, simulac valores omnium aggregatorum f terminorum innotuerunt: hoc sequenti modo efficiemus.

Sicuti $\cos \omega = \frac{1}{2}[1] + \frac{1}{2}[1]^{n-1}$, $\sin \omega = -\frac{i}{2}[1] + \frac{i}{2}[1]^{n-1}$, ita per art. praec. reliquae quoque functiones trigonometricae anguli ω ad formam talem reduci possunt $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}[1] + \mathfrak{C}[1]^2 + \mathfrak{D}[1]^3 + \text{etc.}$, nulloque negotio perspicietur, functionem anguli $k\omega$ tunc fieri $= \mathfrak{A} + \mathfrak{B}[k] + \mathfrak{C}[k]^2 + \mathfrak{D}[k]^3 + \text{etc.}$, denotante k integrum quemcunque. Iam quum singuli coefficientes in Y sint functiones rationales integrae invariabiles ipsarum $\varphi\omega, \varphi a\omega, \varphi b\omega$ etc., perspicuum est, si pro his quantitibus valores sui substituantur, singulos coefficientes fieri functiones rationales integras invariabiles ipsarum $[1], [a], [b]$ etc.; quamobrem per art. 347 ad formam $A + B(f, 1) + C(f, g) + \text{etc.}$ reducentur. Et prorsus simili ratione etiam omnes coefficientes in Y', Y'' etc. ad formam similem reducere licebit.

Q. E. D.

*) Hoc respectu duo anguli conveniunt, quorum differentia vel peripheriae integrae vel alicui eius multiplo aequalis est, quales secundum peripheriam congruos vocare possemus, si congruentiam sensu aliquantum latiori intelligere luberet.

364.

Circa problema art. praec. quasdam adhuc observationes adiicimus.

I. Quum singuli coefficientes in Y' sint functiones tales radicum in periodo P' (quam $= (f, a')$ statuere licet) contentarum, quales functiones radicum in P sunt coefficientes respondentes in Y , ex art. 347 manifestum est, Y' ex Y derivari posse, si modo ubique in Y pro $(f, 1), (f, g), (f, gg)$ etc. resp. substituantur $(f, a'), (f, a'g), (f, a'gg)$ etc. Et perinde Y'' ex Y derivabitur substituendo ubique in Y pro $(f, 1), (f, g), (f, gg)$ etc. resp. $(f, a''), (f, a''g), (f, a''gg)$ etc. etc. Simulatque igitur functio Y evoluta est, reliquae Y', Y'' etc. nullo negotio inde sequuntur.

II. Supponendo

$$Y = x^f - ax^{f-1} + bx^{f-2} - \text{etc.}$$

coefficientes a, b etc. erunt resp. summa radicum aequ. $Y = 0$ i.e. quantitatum $\varphi\omega, \varphi a\omega, \varphi b\omega$ etc., summa productorum e binis etc. At plerumque hi coefficientes multo commodius eruuntur per methodum ei, quae art. 349 tradita est, similem, computando summam radicum $\varphi\omega, \varphi a\omega, \varphi b\omega$ etc., summam quadratorum, cuborum etc., atque hinc per theorema NEWTONianum illos coefficientes deducendo. — Quoties φ designat tangentem, secantem, cotangentem aut cosecantem, adhuc alia compendia dantur, quae tamen silentio hic praeterimus.

III. Considerationem peculiarem meretur is casus, ubi f est numerus par, adeoque quaevis periodus P, P', P'' etc. ex $\frac{1}{2}f$ periodis binorum terminorum composita. Constat P ex his $(2, 1), (2, a), (2, b), (2, c)$ etc., convenientque numeri $1, a, b, c$ etc. atque $n - 1, n - a, n - b, n - c$ etc. simul sumti, cum his $1, a, b, c$ etc. aut saltem (quod hic eodem redit) bis secundum modulum n congrui erunt. Sed est $\varphi(n - 1)\omega = \mp\varphi\omega, \varphi(n - a)\omega = \mp\varphi a\omega$ etc., signis superioribus valentibus, quoties φ designat cosinum aut secantem, inferioribus, quando φ exprimit sinum, tangentem, cotangentem aut cosecantem. Hinc colligitur, in duobus casibus prioribus inter factores, e quibus compositus est Y , binos semper aequales, adeoque Y quadratum esse, et quidem $Y = yy$, si y ponatur aequalis producto ex

$$(x - \varphi\omega), \quad (x - \varphi a\omega), \quad (x - \varphi b\omega) \text{ etc.}$$

Similiter in iisdem casibus functiones reliquae Y', Y'' etc. quadrata erunt, et quidem supponendo P' constare ex $(2, a'), (2, b'), (2, c')$ etc.; P'' ex $(2, a''), (2, b''), (2, c'')$ etc. etc., productum ex $(x - \varphi a'\omega), (x - \varphi b'\omega), (x - \varphi c'\omega)$ etc. esse $= y'$, productum ex $(x - \varphi a''\omega), (x - \varphi b''\omega)$ etc. $= y''$ etc. erit $Y' = y'y', Y'' = y''y''$ etc.; nec non etiam functio Z quadratum erit (conf. supra art. 337), et radix producto ex y, y', y'' etc. aequalis. Ceterum facile perspicietur, y', y'' etc. perinde ex y derivari, ut Y', Y'' etc. ex Y sequi ante in I diximus; nec non singulos coefficientes in y quoque ad formam $A + B(f, 1) + C(f, g) + \text{etc.}$ reduci posse, quum summae singularum potestatum rad. aequ. $y = 0$ manifesto sint semisses potestatum aequ. $Y = 0$, adeoque ad talem formam reducibiles.

In quatuor casibus posterioribus autem Y erit productum e factoribus $xx - (\varphi\omega)^2, xx - (\varphi a\omega)^2, xx - (\varphi b\omega)^2$ etc. adeoque formae

$$x^f - \lambda x^{f-2} + \mu x^{f-4} - \text{etc.}$$

patetque coefficientes λ, μ etc. e summis quadratorum, biquadratorum etc. radicum $\varphi\omega, \varphi a\omega, \varphi b\omega$ etc. deduci posse; et similiter se habebunt functiones Y', Y'' etc.

Ex. I. Sit $n = 17, f = 8$ atque designet φ cosinum. Hinc fit $Z = 0$ et oportetque adeo $\sqrt{Z}$ in duos factores quaternarum dimensionum y, y' resolvere. Periodus $P = (8, 1)$ constat ex $(2, 1), (2, 9), (2, 13), (2, 15)$, unde y erit productum e factoribus

$$(x - \varphi\omega), \quad (x - \varphi 9\omega), \quad (x - \varphi 13\omega), \quad (x - \varphi 15\omega)$$

Substituendo $\frac{1}{2}[k] + \frac{1}{2}[n - k]$ pro $\varphi k\omega$, invenitur

$$\varphi\omega + \varphi 9\omega + \varphi 13\omega + \varphi 15\omega = \frac{1}{2}(8, 1), \quad (\varphi\omega)^2 + (\varphi 9\omega)^2 + (\varphi 13\omega)^2 + (\varphi 15\omega)^2 = 2 + \frac{1}{2}(8, 1)$$

perinde summa cuborum $= \frac{7}{8}(8, 1) + \frac{1}{2}(8, 3)$, summa biquadratorum $= \frac{7}{4} + \frac{3}{8}(8, 1)$; hinc per theorema NEWTONianum coefficientibus in y determinatis prodit

$$y = x^4 - \frac{1}{2}(8, 1)x^3 + \frac{1}{2}((8, 1) + 2(8, 3))x^2 - \frac{1}{2}((8, 1) + 3(8, 3))x + \frac{1}{2}((8, 1) + (8, 3))$$

y' vero ex y derivatur commutando $(8, 1)$ cum $(8, 3)$; substituendo itaque pro $(8, 1)$, $(8, 3)$ valores $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{17}$, $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{17}$ fit

$$\begin{aligned} y &= x^4 + (\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\sqrt{17})x^3 - (\frac{3}{8} + \frac{1}{8}\sqrt{17})x^2 + (\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{17})x - \frac{1}{4} \\ y' &= x^4 + (\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\sqrt{17})x^3 - (\frac{3}{8} - \frac{1}{8}\sqrt{17})x^2 + (\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{17})x - \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Simili modo $\sqrt{Z}$ in quatuor factores binarum dimensionum resolvi potest, quorum primus erit $(x - \varphi\omega)(x - \varphi 13\omega)$, secundus $(x - \varphi 9\omega)(x - \varphi 15\omega)$, tertius $(x - \varphi 3\omega)(x - \varphi 5\omega)$, quartus $(x - \varphi 10\omega)(x - \varphi 11\omega)$, omnesque coefficientes in his factoribus per quatuor aggregata $(4, 1)$, $(4, 9)$, $(4, 3)$, $(4, 10)$ exprimi poterunt. Manifesto autem productum e factore primo in secundum erit y , productum e tertio in quartum y' .

Ex. II. Si, omnibus reliquis manentibus, φ sinum indicare supponitur, ita ut $Z = 0$ in duos factores 8 dimensionum y , y' resolvere oporteat, erit y productum e quatuor factoribus duplicibus

$$xx - (\varphi\omega)^2, \quad xx - (\varphi 9\omega)^2, \quad xx - (\varphi 13\omega)^2, \quad xx - (\varphi 15\omega)^2$$

Iam quum sit $\varphi k\omega = -\frac{i}{2}[k] + \frac{i}{2}[n - k]$, erit

hinc deducitur summa quadratorum radicum $\varphi\omega, \varphi 9\omega, \varphi 13\omega, \varphi 15\omega$ haec $2 - \frac{1}{2}(8, 1)$,

earundem biquadratorum summa $= \frac{3}{2} - \frac{1}{8}(8, 1)$, summa potestatum sextarum $= \frac{5}{2} - \frac{3}{8}(8, 1) - \frac{1}{2}(8, 3)$, summa octavarum $= \frac{35}{8} - \frac{5}{8}(8, 1) - \frac{1}{2}(8, 3)$.

Hinc fit

$$\begin{aligned} y &= x^8 - (2 - \frac{1}{2}(8, 1))x^6 + (\frac{3}{2} - \frac{1}{8}(8, 1) + \frac{1}{2}(8, 3))x^4 \\ &\quad - (\frac{5}{2} - \frac{3}{8}(8, 1) + \frac{1}{2}(8, 3))x^2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{16}(8, 1) + \frac{1}{4}(8, 3) \end{aligned}$$

y' derivatur ex y commutando $(8, 1)$, $(8, 3)$, ita ut per substitutionem valorum horum aggregatorum habeatur

$$\begin{aligned} y &= x^8 - (\frac{7}{4} + \frac{1}{4}\sqrt{17})x^6 + (\frac{7}{4} + \frac{1}{4}\sqrt{17})x^4 - (\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{17})x^2 + \frac{1}{16}(1 + \sqrt{17}) \\ y' &= x^8 - (\frac{7}{4} - \frac{1}{4}\sqrt{17})x^6 + (\frac{7}{4} - \frac{1}{4}\sqrt{17})x^4 - (\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{17})x^2 + \frac{1}{16}(1 - \sqrt{17}) \end{aligned}$$

Perinde Z in quatuor factores resolvi potest, quorum coefficientes per aggregata quatuor terminorum exprimi possunt, et quidem productum e duobus erit y , productum e duobus reliquis y' .

Sectiones circuli, quas per aequationes quadraticas sive per constructiones geometricas perficere licet.

365.

Reduximus itaque, per disquisitiones praecedentes, sectionem circuli in n partes, si n est numerus primus, ad solutionem tot aequationum, in quot factores resolvere licet numerum $n - 1$, quarum aequationum gradus per magnitudinem factorum determinantur. Quoties itaque $n - 1$ est potestas numeri 2, quod evenit pro valoribus ipsius n his 3, 5, 17, 257, 65537 etc., Sectio circuli ad solas aequationes quadraticas reducetur, functionesque trigonometricae angulorum $\frac{P}{n}$, $\frac{2P}{n}$ etc. per radices quadraticas plus minusve complicatas

(pro magnitudine ipsius n) exhiberi poterunt; quocirca in his casibus sectio circuli in n partes, sive descriptio polygoni regularis n laterum manifesto per constructiones geometricas absolvi poterit.

Ita e.g. pro $n = 17$ ex artt. 354, 361 facile pro cosinu anguli $\frac{2P}{17}$ expressio haec derivatur:

$$-\frac{1}{16} + \frac{1}{16}\sqrt{17} + \frac{1}{16}\sqrt{(34 - 2\sqrt{17})} + \frac{1}{8}\sqrt{(17 + 3\sqrt{17} - \sqrt{(34 - 2\sqrt{17})} - 2\sqrt{(34 + 2\sqrt{17})})}$$

Cosinus multiplorum illius anguli formam similem, sinus autem uno signo radicali plus habent.

Magnopere sane est mirandum, quod, quum iam EUCLIDIS temporibus circuli divisibilitas geometrica in tres et quinque partes nota fuerit, nihil his inventis intervallo 2000 annorum adiectum sit, omnesque geometrae tamquam certum pronuntiaverint, praeter illas sectiones easque, quae sponte inde demanant, puta sectiones in 15 , $3 \cdot 2^\mu$, $5 \cdot 2^\mu$, $15 \cdot 2^\mu$ nec non in 2^μ partes, nullas alias per constructiones geometricas absolvi posse. — Ceterum facile probatur, si numerus primus $n = 2^m + 1$, etiam exponentem m factores primos quam alios numerum 2 implicare non posse, adeoque vel $= 1$ vel $= 2$ vel altiori potestati numeri 2 aequalem esse debere; si enim m per ullum numerum imparem ζ (unitate maiorem) divisibilis esset atque $m = \zeta\eta$, foret $2^m + 1$ divisibilis per $2^\zeta + 1$, adeoque necessario compositus. Omnes itaque valores ipsius m , pro quibus ad meras aequationes quadraticas deferimur, sub forma 2^ν continentur; ita quinque numeri 3 , 5 , 17 , 257 , 65537 prodeunt statuendo $\nu = 0, 1, 2, 3, 4$ sive $m = 1, 2, 4, 8, 16$. Neutiquam vero pro omnibus numeris sub illa forma contentis Sectio circuli geometricè perficitur, sed pro iis tantum, qui sunt numeri primi. FERMATIUS quidem inductione deceptus affirmaverat, omnes numeros sub illa forma contentos necessario primos esse; at ill. EULER hanc regulam iam pro $\nu = 5$ sive $m = 32$ erroneam esse, numero $2^{32} + 1 = 4294967297$ factorem 641 involvente, primus animadvertit.

Quoties autem $n - 1$ alios factores primos praeter 2 implicat, semper ad aequationes altiores deferimur; puta ad unam pluresve cubicas, quando 3 semel aut pluries inter factores primos ipsius $n - 1$ reperitur, ad aequationes quinti gradus, quando $n - 1$ divisibilis est per 5 etc., **omnique rigore demonstrare possumus, has aequationes elevatas nullo modo nec evitari nec ad inferiores reduci posse**, etsi limites huius operis hanc demonstrationem hic tradere non patiantur, quod tamen monendum esse duximus, ne quis adhuc alias sectiones praeter eas, quas theoria nostra suggerit, e.g. sectiones in 7 , 11 , 13 , 19 etc. partes, ad constructiones geometricas perducere speret, tempusque inutiliter terat.

366.

Si circulus in a^λ partes secandus est, designante a numerum primum, manifesto hoc geometricè perficere licet, quando $a^\lambda = 2$, neque vero pro ullo alio valore ipsius a^λ , siquidem $a^\lambda > 1$, tunc enim praeter eas aequationes, quae ad sectionem in a partes requiruntur, necessario adhuc $a - 1$ alias a^λ gradus solvere oportet; etiam has nullo modo nec evitari nec deprimere licet. Gradus itaque aequationum necessariarum e factoribus primis numeri $(a - 1)a^{\lambda-1}$ generaliter (scilicet pro eo quoque casu ubi $a = 2$) cognosci possunt.

Denique si circulus in $N = a^\lambda b^\mu c^\nu \dots$ partes secandus est, denotantibus a , b , c etc. numeros primos inaequales, sufficit, sectiones in a^λ , b^μ , c^ν etc. partes perfecisse (art. 336); quare ut gradus aequationum ad hunc finem necessarium cognoscantur, factores primos numerorum

$$(a - 1)a^{\lambda-1}, \quad (b - 1)b^{\mu-1}, \quad (c - 1)c^{\nu-1} \quad \text{etc.}$$

sive quod hic eodem redit producti ex his numeris considerare oportet. Observetur, hoc productum exprimere multitudinem numerorum ad N primorum ipsoque minorum (art. 38). Geometrice itaque Sectio tunc tantummodo absolvitur, quando hic numerus est potestas binarii; quando vero factores primos alios quam 2 puta p, p' etc. implicat, aequationes gradus p^{ti}, p'^{ti} etc. nullo modo evitari possunt. Hinc colligitur generaliter, ut circulus geometricae in N partes dividi possit, N esse debere vel 2 aut altiore potestatem ipsius 2, vel numerum primum formae $2^{2''} + 1$, vel productum e pluribus huiusmodi numeris primis, vel productum ex uno tali primo aut pluribus in 2 aut potestatem altiore ipsius 2; sive brevius, requiritur, ut N neque ullum factorem primum imparem qui non est formae $2^{2''} + 1$, implicet, neque etiam ullum factorem primum formae $2^{2''} + 1$ pluries.

Huiusmodi valores ipsius N infra 300 reperiuntur hi 38:

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 48, 51, 60, 64, 68, 80,
85, 96, 102, 120, 128, 136, 160, 170, 192, 204, 240, 255, 256, 257, 272.

Additamenta

Ad art. 28. Solutio aequationis indeterminatae $ax = by + 1$ non primo ab ill. EULER (ut illic dicitur) sed iam a geometra 17^{ti} saeculi BACHET DE MEZIRIAC, celebri DIOPHANTI editore et commentatore, perfecta est, cui ill. LA GRANGE hunc honorem vindicavit [Add. a l'Algèbre d'Euler p. 525, ubi simul methodi indoles indicata est). BACHET inventum suum in editione secunda libri *Problèmes plaisans et délectables qui se font par les nombres*, 1624, tradidit; in editione prima (à Lyon 1612), quam solam mihi videre licuit, nondum exstat, verumtamen iam annuntiatur.

Ad artt. 151, 296, 297. Ill. LE GENDRE demonstrationem suam denuo exposuit in opere praeclaro *Essai d'une théorie des nombres* p. 214 sqq., attamen ita, ut nihil essenziale mutatum sit: quamobrem haec methodus etiamnum omnibus obiectionibus in art. 297 prolatis obnoxia manet. Theorema quidem (cui una suppositio innititur), in quavis progressionem arithmetica $l, l + k, l + 2k$ etc., numeros primos reperiri, si k et l divisorem communem non habeant, fusius in hoc opere consideratum est p. 12 sqq.: sed rigori geometrico nondum satisfactum esse videtur. Attamen tunc quoque, quando hoc theorema pleno demonstratum erit: suppositio altera supererit (dari numeros primos formae $4k + 3$, quorum non-residuum quadraticum sit numerus primus datus formae $4n + 1$ positive sumtus), quae an rigorose demonstrari possit, nisi theorema fundamentale ipsum iam supponatur, nescio. Ceterum observare oportet, ill. LE GENDRE hanc posteriorem suppositionem non tacite assumsisse, sed ipsum quoque eam non dissimulavisse, p. 221.

Ad artt. 288...293. De eodem argumento, quod hic tamquam applicatio specialis theoriae formarum ternariarum exhibetur, et respectu rigoris et generalitatis ita absolutum esse videtur, ut nihil amplius desiderari possit, ill. LE GENDRE in parte III operis sui p. 321...400 disquisitionem multo ampliorem instituit^{*)}. Principiis et methodis usus est a nostris prorsus diversis: attamen hac via compluribus difficultatibus implicatus est, quae effecerunt, ut theoremata palmaria demonstratione rigorosa munire non licuerit. Has difficultates ipse candide indicavit; sed ni fallimur, hae quidem facilius forsitan auferri poterunt, quam ea, quod in hac quoque disquisitione theorema modo memoratum (In quavis progressionem arithmetica etc.) suppositum est, p. 371 annot. in fine.

^{*)} Vel nobis non monentibus lectores cavebunt, ne nostras formas ternarias cum eo, quod ill. LE GENDRE *forme trinaire d'un nombre* dixit, confundant. Scilicet per hanc expressionem indicavit decompositionem numeri in tria quadrata.

Ad art. 306 VIII. In chiliade tertia determinantium negativorum reperti sunt 37 irregulares, inter quos 18 habent indicem irregularitatis 2, et 19 reliqui indicem 3.

Ad eundem X. Quaestionem hic propositam plene solvere nuper successit, quam disquisitionem plures partes tum Arithmeticae sublimioris tum Analyseos mirifice illustrantem in continuatione huius operis trademus quam primum licebit. Eadem docuit, coefficientem m in art. 304 esse $= \gamma\mu = 0,23458847616$, designante γ eandem quantitatem ut in art. 302, et π ut ibidem semicircumferentiam circuli, cuius radius = 1.

Tabulae

Tabula III (art. 316)

Periodi fractionum decimalium pro numeris primis (excerptae):

3	$\bar{3}$
7	.142857 ; (1)..285714 ; (2)..428571 ; (3)..571428 ; (4)..714285 ; (5)..857142
11	.09 ; (1)..18 ; (2)..36 ; (3)..72 ; (4)..45
13	.076923 ; (1)..461538
17	$\overline{.0588235294117647}$
19	$\overline{.052631578947368421}$
23	$\overline{.0434782608695652173913}$
29	.0344827586206896551724137931
31	.032258064516129 ; (1)..548387096774193
37	.027 ; (1)..135 ; (2)..675 ; (3)..378 ; (4)..891 ; (5)..459
41	.02439 ; (1)..14634 ; (2)..87804 ; (3)..26829 ; (4)..60975 ; (5)..65853 ; (6)..95121 ; (7)..70731
43	.023255813953488372093 ; (1)..651162790697674418604
47	.0212765957446808510638297872340425531914893617
53	.0188679245283 ; (1)..4905660377358 ; (2)..7547169811320 ; (3)..6226415094339
59	.0169491525423728813559322033898305084745762711864406779661
61	.016393442622950819672131147540983606557377049180327868852459
67	.014925373134328358208955223880597 ; (1)..179104477611940298507462686567164
71	.01408450704225352112676056338028169 ; (1)..87323943661971830985915492957746478
73	.01369863 ; (1)..06849315 ; (2)..34246575 ; (3)..71232876 ; (4)..56164383 ; (5)..80821917 ; (6)..041
79	.0126582278481 ; (1)..3670886075949 ; (2)..6455696202531 ; (3)..7215189873417 ; (4)..9240506329
83	.01204819277108433734939759036144578313253 ; (1)..60240963855421686746987951807228915662
89	.01123595505617977528089887640449438202247191 ; (1)..33707865168539325842696629213483140
97	.010309278350515463917525773195876288659793814432989690721649484536082474226804123711

Handschriftliche Aufzeichnungen von Gauß

Zu Art. 40. Die acht Zeilen: Accedente numero tertio C , bis statuimus $k\lambda = a$, $k\mu = b$, $\gamma = c$, $\lambda' = u$, welche in diesem Abdruck an die Stelle der Worte gesetzt sind: Accedente numero tertio C , sit maximus divisor communis numerorum $A, B, C, = \lambda'$, eritque hic simul maximus divisor communis numerorum $A, B, C^*)$. Determinentur numeri k, γ ita, ut sit $k\lambda + \gamma C = \lambda'$, eritque $k\lambda A + k\mu B + \gamma C' = \lambda'$. Accedente numero quarto D , ponatur maximus divisor communis numerorum λ', D (quem simul esse maximum divisorem communem numerorum A, B, C, D facile perspicitur) $= \lambda''$, fiatque $k'\lambda' + \delta D = \lambda''$. Tum erit $kk'\lambda' A + kk'\mu B + k'\gamma C + \delta D = \lambda''$.

*) Metietur enim manifeste λ' omnes A, B, C . Si vero non esset divisor communis maximus, maximus foret maior quam λ' . Iam quoniam hic divisor maximus metitur ipsos A, B, C , metietur etiam ipsum $k\lambda A + k\mu B + \gamma C$ i.e. ipsum λ' , maior minorem. Q. E. A. Facilius adhuc hoc ex art. 18 deduci potest.

Zu Art. 114. Concinnitis demonstratio ita adornatur: $(a^{4m} - a^m)^2 = 2(a^{8m} + 1) - (a^{4m} + 1)^2$, $(a^{4m} + a^m)^2 = -2 + (a^{4m} + 1)(a^{4m} + 2)$, adeoque $\sqrt{2} = \pm(a^{4m} - a^m)$, $\sqrt{-2} = \pm(a^{4m} + a^m)$ [mod. $8m + 1$].

Zu den in Art. 256 VI angegebenen 16 positiven Determinanten von der Form $8n + 5$, für welche die Anzahl der eigentlich primitiven Classen dreimal grösser ist als die der uneigentlich primitiven, sind hinzugefügt: 677, 701, 709, 757, 781, 813, 829, 877, 885, 901, 909, 925, 933, 973, 997; adeoque inter 125 exstant 31.

Zu den Worten des Art. 301 Hoc modo summa mult. gen. pro dett. -1 usque ad -100 invenitur $= 234,4$, quum revera sit 233. -1 usque ad -3000 , tabula 11166, formula 11167,9.

Zu Art. 336 Wären alle Zahlen der Form $2^{2^v} + 1$ Primzahlen, so würde ein hinlänglich genährter Ausdruck für die Menge der in Rede stehenden Zahlen (N) kleiner als die gegebene Zahl M , folgender sein:

$$A \cdot \frac{M}{\log M \cdot \log 2}$$

Zu dem Lehrsatz in Art. 42 über die Theiler einer algebraischen ganzen rationalen Function mit ganzzahligen Coefficienten: 1797 Jul. 22.

Zu den Worten des Art. 130: Postquam rigore demonstravimus, quemvis numerum primum formae $4n + 1$, et positive et negative acceptum, alicuivis numeri primi ipso minoris non-residuum esse. Hanc demonstrationem deveximus 1796 Apr. 8.

Zu Art. 131. Theorema fundamentale per inductionem detectum 1795 Martio. Demonstratio prima, quae in hac sectione traditur, inventa 1796 Apr.

Zu den Worten des Art. 133: Investigationem adhuc generalius instituamus. Contemplemur duos numeros quoscunque impares inter se primos, signis quibuscunque affectos, P et Q . — 1796 Apr. 29.

Zu den Worten des Art. 145: Praeterea theoremata ad residua $+2$ et -2 pertinentia tunc supponi debuissent; quum vero nostra demonstratio absque his theorematibus sit perfecta, novam hinc methodum nanciscimur, illa demonstrandi. 1797 Febr. 4.

Zu der Überschrift der Sectio quinta: De formis aequationibusque indeterminatis secundi gradus. Inde a Jun. 22. 1796.

Zu den Worten des Art. 234: ...ad aliud argumentum gravissimum transimus a nemine hucusque attactum, de formarum compositione. Hae disquiss. inchoatae autumnio 1798.

Zu den Worten des Art. 262: Ex hoc principio methodum novam haurire possumus, non modo theorema fundamentale, sed etiam reliqua theoremata Sect. praec. ad residua -1 , $+2$, -2 pertinentia demonstrandi. Principia huius methodi primum se obtulerant 1796 Jul. 27 at exulta et ad formam praesentem reducta Vere a. 1800.

Zu den Worten des Art. 266: ...sed quoniam complures veritates ad has spectantes, eaeque pulcherrimae, adhuc supersunt, quarum fons proprius in theoria formarum ternariarum secundi gradus est quaerendus, brevem ad hanc theoriam digressionem hic intercalamus. Febr. 14. 1799.

Zu den Worten des Art. 272: scilicet ostendendo, primo, quo pacto quaevis forma ternaria ad formam simpliciore reduci possit, dein, formarum simplicissimarum (ad quas per tales reductiones perveniatur), multitudinem pro quovis determinante dato esse finitam. 1800 Febr. 13.

Zu den Worten des Art. 287 III: Prorsus simili ratione probatur, in ordine improprie primitive eos characteres, qui per praecepta art. 204 II, III soli possibiles inveniuntur, omnes possibiles esse, sive sint P sive Q . — Haecce theoremata, etc. Demonstratione primum munita sunt Mense Aprili 1798.

Zu den Worten des Art. 302: Multitudo classium mediocris autem valde regulariter crescit. — Idea prima initio a. 1799.

Zu den Worten des Art. 306 X: Denique observamus, quum omnes proprietates in hoc art. et praec. consideratae imprimis a numero n pendeant, qui simile quid est ac $p - 1$ in Sect. III, hunc numerum summa attentione dignum esse; quamobrem quam maxime optandum esset, ut inter ipsum atque determinantem, ad quem pertinet, nexus generalis detegatur. Ex voto nobis ac si successit ut nihil amplius desiderandum supersit. Nov. 30 — Dec. 3. 1800.

Zu Art. 365. Circulum in 17 partes divisibilem esse geometricè, deteximus 1796 Mart. 30.

Bemerkungen

Die im Jahre 1801 in Octav erschienenen sieben Sectionen der Disquis. Arithm. sind unter meiner Leitung im Jahre 1863 zuerst wieder abgedruckt, als erster Band von Gauß Werken, und erscheinen, nachdem jene Auflage vollständig vergriffen ist, hier von Neuem in gleicher Form. Die achte Section, auf die an mehreren Stellen verwiesen wird und die Gauß wol anfangs mit den übrigen zugleich zu veröffentlichen beabsichtigte, findet sich unter seinen Handschriften. Da er die Ausarbeitung derselben aber nicht in gleicher Weise abgeschlossen hat wie die der sieben ersten Sectionen, so habe ich sie in dieser Ausgabe den arithmetischen Abhandlungen des Nachlasses im zweiten Bande der Werke sich anschließen lassen.

Textänderungen sind in den Disqu. Ar. nur an folgenden Stellen vorgenommen:

In Art. 125 sind die beiden Einschaltungen (*si* $\lambda \geq 5$) und $(2\lambda''; \text{sed } -12\lambda''' : 5, -17\lambda'' : 5)$ eingefügt worden.

In Art. 126. Demonstr. ist ‘in serie (I) a terminos esse per p divisibiles, b terminos per p^2 divisibiles, c terminos per p^3 divisibiles etc.’ statt ‘in serie (I) a terminos esse per p divisibiles neque vero per p^2 , b terminos per p^2 non autem per p^3 divisibiles, c terminos per p^3 non autem per p^4 etc.’ gesetzt worden, wie Lejeune DIRICHLET es in seinem Handexemplar angedeutet hat.

In Art. 128 III sind die nach ‘Sienim $\pm b$ vel $-1 \equiv r \pmod{\lambda}$, erit $\mathfrak{U} = r^{\mu-1} \pmod{2\mu}$, adeoque terminus $\frac{1}{2}(a - bb)$ per λ divisibilis.’ in der Ausgabe von 1801 noch folgende Worte ‘multoque magis $2(a - bb)$.’ ausgelassen.

In Art. 129 ist überall $1\frac{1}{2}a + 1$ statt $1\frac{1}{2}\mu$ und demnach 4 statt 4 als diejenige Zahl, bis zu welcher a jedenfalls nicht herabgeht, gesetzt worden.

In Art. 139 lautete der Schluss der Untersuchung über den Fall (4) ‘Facile vero perspicitur, ex ista aequatione deduci posse haec $a'pRh$, $+ahpRa'$ $+aa'hHp$; quae cum iis quae in (2) invenimus conveniunt. In reliquis autem demonstratio est eadem.’ Dieses ist gemäß der Note geändert, die Gauß dem Art. 2 der Abhandlung *Theorematis arithmetici demonstratio nova* beigelegt hat: ‘Haud abs re erit, levem aliquem errorem, qui nescio qua negligentia in illius demonstrationis expositionem irrepsit, hic indicare atque corrigere. Pag. [108] inde a l. [14] ratiocinia sequentia sunt substituenda: Facile vero perspicitur, ex ista aequatione deduci posse haec $a'h p R A \dots (\alpha)$; $+ah R a' \dots (\beta)$; $+ahl p \dots (\gamma)$. Ex (α) quod convenit cum (α) in (2) sequitur perinde ut illic, esse vel simul hRp , hRa' , vel hNp , hNa' . Sed in casu priori foret per (δ) , alh contra hyp.; quare erit hNp , adeoque per (γ) etiam aNp .

In Art. 171 ist zufolge einer handschriftlichen Bemerkung ‘in qua A nec maior quam $2\sqrt{\frac{1}{3}D}$, C , nec minor quam $2B$ ’ statt ‘in qua A non $> 2\sqrt{\frac{1}{3}D}$, B non $> \frac{1}{2}A$, C non $< \frac{1}{2}B$ ’ gesetzt worden.

In Art. 174. Methodus secunda. ist ‘Quum a non erit $> 2\sqrt{\frac{1}{3}D}$, omnes formae quae hoc modo prodeunt, manifesto erunt reductae,’ gesetzt statt ‘Si quae formae hoc modo prodeunt, in quibus $a > 2\sqrt{\frac{1}{3}D}$, erunt reiiciendae, reliquae vero omnes manifesto erunt reductae.’

In Art. 256 VI enthält die frühere Ausgabe unter den positiven Determinanten von der Form $8n + 5$, für welche die Anzahl der Classen in der eigentlich primitiven Ordnung dreimal größer ist als die in der uneigentlich primitiven, auch den Determinant 397, dem aber von beiden Arten gleich viel Classen zugehören.

In Art. 302 ist zufolge einer handschriftlichen Bemerkung die Anzahl der Classen für

das zweite Tausend der negativen Determinanten zu 28595 angegeben und nicht zu 28603 wie in der Ausgabe von 1801.

In Art. 303 sind für die Classificationen II. 4; II. 5; IV. 2 die Mengen der Determinanten nach den im Nachlass vorgefundenen Tafeln zu 31, 44, 99 angegeben und nicht wie in der Ausgabe von 1801 zu 32, 42, 68.

In Art. 325 ist ‘ $23i$, $23i + 1$, $23i + 5$, $23i + 7$, $23i + 9$, $23i + 10$. His deletis superstites inveniuntur 119, 127, qui duo soli ipsi Y valorem quadratum conciliant’, gesetzt statt ‘ $23i$, $23i + 5$, $23i + 7$, $23i + 9$, $23i + 10$. His deletis superstites inveniuntur 119, 127, 137, e quibus duo priores soli ipsi Y valorem quadratum conciliant.’

In Art. 360 IV sind die Worte ‘quum pro plerisque aliis aequationibus cubicis, quarum radices omnes reales sunt, simul anguli et rationis trisectione evitari nequeat,’ die auf: ‘e.g. pro $\beta = 3$ sola trisectione anguli’, folgten, und deren Unrichtigkeit Gauß in seinem Handexemplare notirt hat, ausgelassen.

Die Noten auf Seite 80, 102, 133, 211, 263, 265, 449, sind dem handschriftlichen Nachlasse entlehnt.

Die äussere Form ist bei diesen neuen Ausgaben zur Erleichterung der Übersicht einigen Abänderungen gegen den Druck dieses Werkes im Jahre 1801 unterworfen, ich glaubte mich dazu um so mehr berechtigt, als Gauß ausgesprochener Weise auch in anderen Punkten auf Raumersparniss Rücksicht genommen. Viele Formeln, die der Textzeile eingeschlossen waren, sind abgesondert herausgesetzt. Die Inhaltsangaben, die zusammengestellt dem Werke vorangingen, sind auch den einzelnen Abtheilungen und nicht nur den Sectionen wie in der ersten Ausgabe beigelegt, die allgemeineren darunter sind den Seiten als Überschrift gegeben.

Göttingen, 187 $\times$ März. SCHERING.

GÖTTINGEN,
GEDRUCKT IN DER DIETERICHSCHE UNIVERSITÄTS-DRUCKEREI
W. FR. KÄESTNER.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 1, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

MODULI QUI SUNT NUMERI PRIMI.

Satz 0.50 (Fermati Theorema.). **50.**

Quum igitur $\frac{p-1}{t}$ sit integer, sequitur evehendo utramque partem congruentiae $a^t \equiv 1$ ad potestatem exponentis $\frac{p-1}{t}$, $a^{p-1} \equiv 1$, sive $a^{p-1} - 1$ semper per p divisibilis est, quando p est primus ipsum a non metiens.

Theorema hoc, quod tum propter elegantiam tum propter eximiam utilitatem omni attentione dignum, ab inventore theorema *Fermatianum* appellari solet. Vid. Fermatii Opera Mathem. Tolosae 1619 fol. p. 163. Demonstrationem inventor non adiecit, quam tamen in potestate sua esse professus est. Ill. Euler primus demonstrationem publici iuris fecit, in diss. cui titulus *Theorematum quorundam ad numeros primos spectantium demonstratio*, Comm. Acad. Petrop. T. VIII¹. Innititur ista evolutioni potestatis $(a + 1)^p$, ubi ex coefficientium forma facillime deducitur, $(a + 1)^p - a^p - 1$ semper per p fore divisibilem, adeoque $(a + 1)^p - (a + 1)$ per p divisibilem fore quando $a^p - a$ per p sit divisibilis.

Iam quia $1^p - 1$ semper per p divisibilis est, etiam $2^p - 2$ semper erit; hinc etiam $3^p - 3$ etc. generaliterque $a^p - a$. Quodsi itaque p ipsum a non metitur, etiam $a^{p-1} - 1$ per p divisibilis erit. Haec sufficient ad methodi indolem declarandam. Clar. Lambert similem demonstrationem tradidit in Actis Erudit. 1769 p. 109.

Quia vero evolutio potestatis binomii a theoria numerorum satis aliena esse videbatur, aliam demonstrationem ill. Euler investigavit, quae exstat Comment. nov. Petr. T. VII p. 70 cum ea quam nos art. praec. exposuimus prorsus convenit. In sequentibus adhuc alias quaedam se nobis offerent. Hoc loco unam superaddere liceat, quae similibus principiis innititur, uti prima ill. Euleri.

Satz 0.50 (Polynomii potestas.). **51.**

Polynomii $a + b + c + \text{etc.}$ potestas p^{ta} secundum modulum p est

$$a^p + b^p + c^p + \text{etc.},$$

siquidem p est numerus primus.

DEMONSTR. Constat potestatem p^{tam} polynomii $a + b + c + \text{etc.}$ esse compositam e partibus formae $N \cdot a^\alpha b^\beta c^\gamma \text{ etc.}$, ubi $\alpha + \beta + \gamma \text{ etc.} = p$, et N designat, quot modis p res,

¹In comment. anteriore vir summus ad scopum nondum pervenerat. Comm. Petr. T. VI p. 106. In controversia famosa inter Maupertuis et König, a principio actionis minimae orta, sed mox ad res heterogeneas egressa, König in manibus se habere dixit autographum Leibnitianum, in quo demonstratio huius theorematis cum Euleriana prorsus conspirans contineatur. Appel au public, p. 166. Licet vero fidem huic testimonio denegare nolumus, certe Leibnitius inventum suum numquam publicavit. Conf. Hist. de l'Ac. de Prusse, A. 1750 p. 530.

quarum α, β, γ etc. respective sunt $= a, b, c$ etc., permutari possint. At supra art. 41 ostendimus hunc numerum semper esse per p divisibilem, nisi omnes res sint aequales, i. e. nisi aliquis numerorum α, β, γ etc. sit $= p$, reliqui vero $= 0$. Unde sequitur, omnes ipsius $(a + b + c + \text{etc.})^p$ partes, praeter has a^p, b^p, c^p etc., per p divisibiles esse; quae igitur, quando de congruentia secundum modulum p agitur, tuto omitti poterunt, fietque

$$(a + b + c + \text{etc.})^p \equiv a^p + b^p + c^p + \text{etc.} \pmod{p}. \quad \text{Q. E. D.}$$

Quodsi iam omnes quantitates a, b, c etc. $= 1$ ponuntur, numerusque earum $= k$, fiet $k^p \equiv k$, uti in art. praec.

I. Quot numeris respondeant periodi, in quibus terminorum multitudo est divisor datus numeri $p - 1$.

52.

Quoniam igitur alii numeri quam qui sunt divisores ipsius $p - 1$, nequeunt esse exponentes potestatum infimarum, ad quas evecti numeri aliqui unitati congruunt, quaestio sese offert, num omnes ipsius $p - 1$ divisores ad hoc sint idonei, atque, quando omnes numeri per p non divisibiles secundum exponentem intimae suae potestatis unitati congruae classificentur, quot ad singulos exponentes sint perventuri. Ubi statim observare convenit, sufficere, si omnes numeri positivi ab 1 usque ad $p - 1$ considerentur; manifestum enim est, numeros congruos ad eandem potestatem elevari debere, quo unitati fiant congruae, adeoque numerum quemcunque ad eundem exponentem esse referendum, ad quem residuum suum minimum positivum. Quocirca in id nobis erit incumbendum ut, quomodo hoc respectu numeri $1, 2, 3, \dots, p - 1$ inter singulos factores numeri $p - 1$ distribuendi sint, eruamus. Brevitatis gratia, si d est unus e divisoribus numeri $p - 1$ (ad quos etiam 1 et $p - 1$ referendi), per ψd designabimus multitudinem numerorum positivorum ipso p minorum, quorum potestas d^{ta} est infima unitati congrua.

53.

Quo facilius haec disquisitio intelligi possit, exemplum apponimus. Pro $p = 19$ distribuentur numeri $1, 2, 3, \dots, 18$ inter divisores numeri 18 hoc modo:

1	2	3	6	9	18
1	18	7, 11	8, 12	4, 5, 6, 9, 16, 17	2, 3, 10, 13, 14, 15
ψd	1	2	2	6	6

54.

II. Iam sint omnes divisores numeri $p - 1$ hi: d, d', d'' etc. eritque, quia omnes numeri $1, 2, 3, \dots, p - 1$ inter hos sunt distributi

$$\psi d + \psi d' + \psi d'' + \text{etc.} = p - 1.$$

At in art. 40 demonstravimus esse

$$\varphi d + \varphi d' + \varphi d'' + \text{etc.} = p - 1$$

atque ex art. praec. sequitur, ψd ipsi φd aut aequalem aut ipso minorem esse, maiorem esse non posse, similiterque de $\psi d'$ et $\varphi d'$, etc. Si itaque aliquis terminus ex his $\psi d, \psi d', \psi d''$ etc. termino respondente ex his $\varphi d, \varphi d', \varphi d''$ etc. esset minor (sive etiam plures), illorum summa summae horum aequalis esse non posset. Unde tandem concludimus, ψd ipsi φd semper esse aequalem, adeoque a magnitudine ipsius $p - 1$ non pendere.

55.

Maximam autem attentionem meretur casus particularis propositionis praecedentis, scilicet semper dari numeros, quorum nulla potestas inferior quam $p-1^{\text{ma}}$ unitati congrua, et quidem totidem inter 1 et $p-1$, quot infra $p-1$ sint numeri ad $p-1$ primi. Cuius theorematis demonstratio quum minime tam obvia sit quam primo aspectu videri possit, propter theorematis dignitatem liceat aliam adhuc adiicere a praecedente aliquantum diversam, quandoquidem methodorum diversitas ad res obscuriores illustrandas plurimum conferre solet. Resolvatur $p-1$ in factores suos primos fiatque $p-1 = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc., designantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales. Tum theorematis demonstrationem per sequentia absolvemus.

Semper inveniri posse numerum A (aut plures) ad exponentem a^α pertinentem similiterque numeros B, C etc. ad exponentes b^β, c^γ etc. respective pertinentes.

II. Productum ex omnibus numeris A, B, C etc. (sive huius producti residuum minimum) ad exponentem $p-1$ pertinere.

Haec autem ita demonstramus.

I. Sit g numerus aliquis ex his $1, 2, 3, \dots, p-1$, congruentiae $x^{\frac{p-1}{a^\alpha}} \equiv 1 \pmod{p}$ non satisfaciens (omnes enim hi numeri congruentiae huic, cuius gradus $< p-1$, satisfacere nequeunt). Tum dico si potestas $\frac{p-1}{a^\alpha}$ ta ipsius g ponatur $= h$, hunc numerum sive eius residuum minimum ad exponentem a^α pertinere.

Namque patet potestatem a^α tam ipsius h congruam fore potestati $\frac{p-1}{a^\alpha} \cdot a^\alpha = p-1$ ipsius g , i. e. unitati, potestas vero $a^{\alpha-1}$ ta ipsius h congrua erit potestati $\frac{p-1}{a}$ ipsius g , i. e. unitati erit incongrua, multoque minus potestates $a^{\alpha-2}, a^{\alpha-3}$ etc. ipsius h unitati congruae esse possunt. At exponens infimae potestatis ipsius h unitati congruae, sive exponens ad quem pertinet h , numerum a^α metiri debet (art. 48). Quare quum a^α per alios numeros divisibilis non sit quam per se ipsum, atque per inferiores ipsius a potestates, necessario a^α erit exponens ad quem h pertinet. Q. E. D. Per similem methodum demonstratur, dari numeros ad exponentes b^β, c^γ etc. pertinentes.

II. Si supponimus, productum ex omnibus A, B, C etc. non ad exponentem $p-1$, sed ad minorem t pertinere, t ipsum $p-1$ metietur (art. 48), sive erit $\frac{p-1}{t}$ integer unitate maior. Facile autem perspicitur, hunc quotientem vel esse unum e numeris primis a, b, c etc. vel saltem per aliquem eorum divisibilem (art. 17), ex. gr. per a , de reliquis enim simile est ratiocinium. Metietur itaque t ipsum $\frac{p-1}{a^\alpha}$; quare productum ABC etc. etiam ad potestatem $\frac{p-1}{a^\alpha}$ elevatum unitati erit congruum (art. 46). Sed perspicuum est singulos B, C etc. (excepto ipso A) ad potestatem $\frac{p-1}{a^\alpha}$ elevatos unitati congruos fieri, quum exponentes b^β, c^γ etc., ad quos singuli pertinent, ipsum $\frac{p-1}{a^\alpha}$ metiantur. Hinc erit

$$A^{\frac{p-1}{a^\alpha}} B^{\frac{p-1}{a^\alpha}} C^{\frac{p-1}{a^\alpha}} \text{ etc.} \equiv A^{\frac{p-1}{a^\alpha}} \equiv 1.$$

Unde sequitur exponentem, ad quem A pertinet, ipsum $\frac{p-1}{a^\alpha}$ metiri debere (art. 48), i. e. $\frac{p-1}{a^\alpha \cdot t}$ esse integrum; at $\frac{p-1}{a^\alpha \cdot t} = \frac{1}{\text{integer}}$ integer esse nequit (art. 15). Unde tandem concludere oportet, suppositionem nostram consistere non posse, i. e. productum ABC etc. revera ad exponentem $p-1$ pertinere. Q. E. D.

Demonstratio posterior priori aliquantulum prolixior esse videtur, prior contra posteriori minus directa.

56.

Hoc theorema insigne exemplum suppeditat, quanta circumspectione in theoria numerorum saepenumero opus sit, ne, quae non sunt, pro certis assumamus. Celeb. Lambert in diss. iam supra laudata Acta Erudit. 1769 p. 127 huius propositionis mentionem facit,

sed demonstrationis ne necessitatem quidem attigit. Nemo vero demonstrationem tentavit praeter summum Eulerum, Comment. nov. Acad. Petrop. T. XVIII ad annum 1773, Demonstrationes circa residua ex divisione potestatum per numeros primos resultantia p. 85 seqq. vid. imprimis art. 37, ubi de demonstrationis necessitate fusius locutus est. At demonstratio, quam Vir sagacissimus exhibuit, duos defectus habet. Alterum quod art. 31 et sqq. tacite supponit, congruentiam $x^n \equiv 1$ (translatis ratiociniis illic adhibit in nostra signa) revera n radices diversas habere, quamquam ante nihil aliud fuerit demonstratum quam quod plures habere nequeat; alterum, quod formulam art. 34 per inductionem tantummodo deduxit.

Radices primitivae, bases, indices.

57.

Numeros ad exponentem $p - 1$ pertinentes *radices primitivas* cum ill. Euleri vocabimus. Si igitur a est radix primitiva, potestatum $a, a^2, a^3, \dots, a^{p-1}$ residua minima omnia erunt diversa; unde facile deducitur, inter haec omnes numeros $1, 2, 3, \dots, p - 1$, qui totidem sunt multitudo quot illa residua minima, reperiri debere: i. e. quemvis numerum per p non divisibilem potestati alicui ipsius a congruum esse. Insignis haec proprietas permagnae est utilitatis, operationesque arithmeticas, ad congruentias pertinentes, haud parum sublevare potest, simili fere modo, ut logarithmorum introductio operationes arithmeticae vulgaris. Radicem aliquam primitivam, a , ad lubitum pro *basi* adoptabimus, ad quam omnes numeros per p non divisibiles referemus, et si fuerit $a^\mu \equiv b \pmod{p}$, μ ipsius b *indicem* vocabimus. Ex. gr. si pro modulo 19, radix primitiva 2 pro basi assumitur, respondebunt

numeris	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
indices	0	1	13	2	16	14	6	3	8	17	12	15	5	7	11	4	10	9

Ceterum patet, manente basi, cuique numero plures indices convenire, sed hos omnes secundum modulum $p - 1$ fore congruos; quamobrem quoties de indicibus sermo erit, qui secundum modulum $p - 1$ sunt congrui, pro aequivalentibus habebuntur, simili modo uti numeri ipsi, quando secundum modulum p sunt congrui, tamquam aequivalentes spectantur.

Algorithmus indicum.

58.

Theoremata ad indices pertinentia prorsus analogae sunt iis, quae ad logarithmos spectant.

Index producti e quotcunque factoribus conflati congruus est summae indicum singulorum factorum secundum modulum $p - 1$.

Index potestatis numeri alicuius congruus est producto ex indice numeri dati in exponentem potestatis, secundum mod. $p - 1$.

Demonstrationes propter facilitatem omittimus.

Hinc perspicitur, si tabulam construere velimus, ex qua omnium numerorum indices pro modulis diversis desumi possint, ex hac tum omnes numeros modulo maiores, tum omnes compositos omitti posse. Specimen huius modi tabulae ad calcem operis huius adiectum est, Tab. I, ubi in prima columna verticali positi sunt numeri primi primorumque

potestates a 3 usque ad 97, qui tamquam moduli sunt spectandi; iuxta hos singulos numeri pro basi assumti; tum sequuntur indices numerorum primorum successorum, quorum quini semper per parvulum intervallum sunt disiuncti, eodemque ordine supra dispositi sunt numeri primi; ita ut quis index numero primo dato secundum modulum datum respondeat, facile tutoque inveniri possit.

Ita ex. gr. si $p = 67$ index numeri 60, assumto 12 pro basi erit

$$= \text{Ind. } 2 + \text{Ind. } 3 + \text{Ind. } 5 \pmod{66} = 58 + 9 + 39 = 40.$$

59.

Index valoris cuiuscunque expressionis $\frac{a}{b} \pmod{p}$ (art. 31) congruus est secundum modulum $p - 1$ differentiae indicum numeratoris a et denominatoris b , siquidem numeri a, b per p non sunt divisibiles.

Sit enim valor quicunque c : eritque $bc \equiv a \pmod{p}$; hinc

$$\text{Ind. } b + \text{Ind. } c \equiv \text{Ind. } a \pmod{p - 1}$$

adeoque

$$\text{Ind. } c \equiv \text{Ind. } a - \text{Ind. } b.$$

Si itaque tabula habetur, ex qua index cuique numero respondens pro quovis modulo primo, aliaque ex qua numerus ad indicem datum pertinens derivari possit, omnes congruentiae primi gradus facillimo negotio solvi poterunt, quoniam omnes reduci possunt ad tales, quarum modulus est numerus primus (art. 30).

E. g. proposita congruentia $29x + 7 \equiv 0 \pmod{47}$, erit $x \equiv \frac{-7}{29} \pmod{47}$. Hinc

$$\text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } (-7) - \text{Ind. } 29 = \text{Ind. } 40 - \text{Ind. } 29 = 15 - 43 = 18 \pmod{46}.$$

At numerus cuius index 18 invenitur 3. Quare $x \equiv 3 \pmod{47}$.

Tabulam secundam quidem non adiecimus: at huius vice alia defungi poterit, uti Sect. VI ostendemus.

De radicibus congruentiae $x^n \equiv A$.

60.

Simili modo ut art. 31 radices congruentiarum primi gradus designavimus, in sequentibus etiam congruentiarum purarum altiorum graduum radices per signum exhibebimus. Ut scilicet $\sqrt[n]{A}$ nihil aliud significat quam radicem aequationis $x^n = A$, ita appposito modulo per $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ denotabitur radix quaecunque congruentiae $x^n \equiv A \pmod{p}$. Hanc expressionem $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ tot valores habere dicemus, quot habet secundum p incongruos, omnes enim qui secundum p sunt congrui tamquam aequivalentes spectandi (art. 26). Ceterum patet, si A, B secundum p fuerint congrui, expressiones $\sqrt[n]{A}, \sqrt[n]{B} \pmod{p}$ aequivalentes fore.

Iam si ponitur $\sqrt[n]{A} \equiv x \pmod{p}$, erit $n \cdot \text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } A \pmod{p - 1}$. Ex hac congruentia deducuntur ad praecepta sectionis praec. valores ipsius Ind. x atque ex his valores respondentes ipsius x . Facile vero perspicitur, x habere totidem valores, quot radices congruentia $n \cdot \text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } A \pmod{p - 1}$. Manifesto igitur $\sqrt[n]{A}$ unum tantummodo valorem habebit, quando n ad $p - 1$ est primus; quando vero numeri $n, p - 1$ divisorem communem habent δ , atque hic est maximus, Ind. x habebit δ valores incongruos secundum $p - 1$, adeoque $\sqrt[n]{A}$ totidem valores incongruos secundum p , siquidem Ind. A per δ est divisibilis. Qua conditione deficiente $\sqrt[n]{A}$ nullum valorem realem habebit.

EXEMPLUM. Quaeruntur valores expressionis $\sqrt[3]{11} \pmod{19}$. Solvi itaque debet congruentia $3 \cdot \text{Ind. } x \equiv \text{Ind. } 11 = 6 \pmod{18}$, inveniunturque tres valores ipsius Ind. x , 2, 8, 14 $\pmod{18}$. His vero respondent valores ipsius x , 6, 9, 4.

61.

Quantumvis expedita sit methodus haec, quando tabulae necessariae adsunt, debemus tamen non oblivisci, indirectam eam esse. Operae igitur pretium erit inquirere quantum methodi directae polleant: trademusque hic ea quae ex praecedentibus hauriri possunt; alia, quae considerationes reconditiores postulant, ad sectionem VIII reservantes. Initium facimus a casu simplicissimo, ubi $A = 1$, sive ubi radices congruentiae $x^n \equiv 1 \pmod{p}$ quaeruntur. Hic itaque, assumpta radice quacunque primitiva pro basi, debet esse $n \cdot \text{Ind. } x \equiv 0 \pmod{p-1}$. Quae congruentia, quando n ad $p-1$ est primus, unam tantummodo radicem habebit, scilicet Ind. $x \equiv 0 \pmod{p-1}$: quare in hocce casu $\sqrt[n]{1} \pmod{p}$ unicum valorem habet, scilicet 1. Quando autem numeri n , $p-1$ habent divisorem communem (maximum) δ , congruentiae $n \cdot \text{Ind. } x \equiv 0 \pmod{p-1}$ solutio completa erit Ind. $x \equiv 0 \pmod{\frac{p-1}{\delta}}$ (V. art. 29), i.e. Ind. x secundum modulum $p-1$ alicui ex his numeris

$$0, \quad \frac{p-1}{\delta}, \quad \frac{2(p-1)}{\delta}, \quad \frac{3(p-1)}{\delta}, \quad \dots, \quad \frac{(\delta-1)(p-1)}{\delta}$$

congruus esse debet, sive x in hocce casu δ valores diversos (secundum modulum p incongruos) habebit. Hinc perspicitur, expressionem $\sqrt[n]{1}$ etiam δ valores diversos habere, quorum indices cum ante allatis prorsus conveniant. Quocirca expressio $\sqrt[n]{1} \pmod{p}$ huic $\sqrt[\delta]{1} \pmod{p}$ omnino aequivalet i. e. congruentia $x^n \equiv 1 \pmod{p}$ easdem radices habet quam haec, $x^\delta \equiv 1 \pmod{p}$. Prior autem inferioris erit gradus, siquidem δ et n sunt inaequales.

Ex. $\sqrt[15]{1} \pmod{19}$ tres habet valores, quia 3 maxima numerorum 15, 18 mensura communis, hique simul erunt valores expressionis $\sqrt[3]{1} \pmod{19}$. Sunt autem hi 1, 7, 11.

62.

Per hanc igitur reductionem id lucramur, ut alias congruentias formae $x^n \equiv 1$ solvere non sit opus, quam ubi n numeri $p-1$ est divisor. Infra vero ostendemus, congruentias huius formae semper ulterius adhuc deprimi posse, licet praecedentia ad hoc non sufficiant. Unum tamen casum iam hic absolvere possumus, scilicet ubi $n = 2$. Manifeste enim valores expressionis $\sqrt[2]{1}$ erunt $+1$ et -1 , quia plures quam duos habere nequit, hique $+1$ et -1 semper sunt incongrui, nisi modulus sit $= 2$, in quo casu $\sqrt[2]{1}$ unum tantum valorem habere posse per se clarum. Hinc sequitur, $+1$ et -1 etiam fore valores expressionis $\sqrt[n]{1}$, quando n ad $\frac{p-1}{2}$ sit primus. Hoc semper eveniet quoties modulus est eius indolis, ut $\frac{p-1}{2}$ numerus absolute primus (nisi forte $p = 1 = 2m$, in quo casu omnes numeri $1, 2, \dots, p-1$ sunt radices) ex. gr. quando $p = 3, 5, 7, 11, 23, 47, 59, 83, 107$ etc.

Tamquam corollarium hic annotetur, indicem ipsius -1 semper esse $\frac{p-1}{2} \pmod{p-1}$, quaecunque radix primitiva pro basi accipiat. Namque $2 \cdot \text{Ind.}(-1) \equiv 0 \pmod{p-1}$. Quare Ind. (-1) erit vel 0, vel $\frac{p-1}{2} \pmod{p-1}$: vero semper index ipsius $+1$, atque $+1$ et -1 semper indices diversos habere debent (praeter casum $p = 2$, ad quem hic respicere operae non est pretium).

63.

Ostendimus art. 60, expressionem $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ habere δ valores diversos, aut omnino nullum, si fuerit δ divisor communis maximus numerorum n , $p-1$. Iam uti modo docuimus $\sqrt[n]{A}$ et $\sqrt[\delta]{A}$ aequivalentes esse, si fuerit $A = 1$, generalius probabimus, expressionem $\sqrt[n]{A}$ semper ad aliam $\sqrt[\delta]{B}$ reduci posse, cui aequivaleat. Illius enim valore quocunque denotato per x erit $x^n \equiv A$; iam sit t valor quicunque expressionis $\sqrt[\delta]{1} \pmod{p-1}$, quam valores

reales habere ex art. 31 perspicuum; eritque $x^{tn} \equiv A^t$; at $x^{tn} \equiv x^n$ propter $tn \equiv n \pmod{p-1}$. Quare $x^n \equiv A^t$ adeoque quicumque ipsius $\sqrt[n]{A}$ valor erit etiam valor ipsius $\sqrt[n]{A^t}$. Quoties igitur $\sqrt[n]{A}$ valores reales habet, expressioni $\sqrt[n]{A^t}$ prorsus aequivalens erit, quoniam illa neque alios habet quam haec neque pauciores, licet quando $\sqrt[n]{A}$ nullum valorem realem habet, fieri tamen possit, ut $\sqrt[n]{A^t}$ valores reales habeat.

Ex. Si valores expressionis $\sqrt[21]{2} \pmod{31}$ quaeruntur, erit numerorum 21 et 30 divisor communis maximus 3, expressionisque $\sqrt[3]{2^7} \pmod{30}$ valor aliquis 3, quare si $\sqrt[21]{2}$ valores reales habet, huic expressioni $\sqrt[3]{128}$ sive $\sqrt[3]{8}$ aequivalebit, invenieturque revera, posterioris expressionis valores, qui sunt 2, 10, 19, etiam priori satisfacere.

64.

Ne autem hanc operationem incassum suscepisse periclitemur regulam investigare oportet, per quam statim diiudicari possit, utrum $\sqrt[n]{A}$ valores reales admittat necne. Quodsi tabula indicum habetur, res in promptu est; namque ex art. 60 manifestum est, valores reales dari, si ipsius A index, radice quacunque primitiva pro basi accepta, per δ sit divisibilis, sin vero minus, non dari. Attamen hoc etiam absque tali tabula inveniri potest. Posito enim indice ipsius $A = A'$, si hic fuerit per δ divisibilis, erit $\frac{n \cdot A'}{\delta}$ per $p-1$ divisibilis et vice versa.

Atqui numeri $A' \cdot \frac{p-1}{\delta}$ index erit $\frac{n \cdot A'}{\delta}$, unitati congruus erit, sin minus incongruus. Quare si $A^{\frac{n \cdot (p-1)}{2\delta}} \equiv 1 \pmod{p}$, $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ habet valores reales, sin minus non habet. Ita in exemplo art. praec. $2^{10} = 1024 \equiv 1 \pmod{31}$, unde concluditur $\sqrt[21]{2} \pmod{31}$ valores reales habere. Similiter certiores hinc fimus $\sqrt[21]{-1} \pmod{p}$ semper valores binos reales habere, quando p sit formae $4m+1$, nullum vero, quando p sit formae $4m+3$; propter $(-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv +1$ et $(-1)^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1$. Elegans hoc theorema, quod vulgo ita profertur: Si p est numerus primus formae $4m+1$, inveniri potest quadratum aa , ita ut $aa+1$ per p fiat divisibilis; si vero p est formae $4m-1$, tale quadratum non datur, hoc modo demonstratum est ab ill. Eulero, Comm. nov. Acad. Petrop. T. XVIII p. 112 ad annum 1773. Demonstrationem aliam iam multo ante dederat, Comm. nov. T. V p. 5, qui prodiit a. 1760. In dissert. priori, Comm. nov. T. IV p. 25, rem nondum perfecerat. Postea etiam ill. La Grange theorematism demonstrationem tradidit Nouv. Mém. de l'Ac. de Berlin A. 1775 p. 342. Aliam adhuc demonstrationem in sectione sequenti, ubi proprie de hoc argumento agendum erit, dabimus.

65.

Postquam omnes expressiones $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ ad tales reducere docuimus, ubi n divisor numeri $p-1$, criteriumque nacti sumus, utrum valores reales admittat necne, tales expressiones $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$, ubi n ipsius $p-1$ est divisor, accuratius considerabimus. Primo ostendemus, quam relationem valores singuli expressionis inter se habeant, tum artificia quaedam trademus, quorum auxilio unus valor expressionis saepenumero inveniri possit.

PRIMO. Quando $A \equiv 1$ atque r aliquis ex n valoribus expressionis $\sqrt[n]{1} \pmod{p}$, sive $r^n \equiv 1 \pmod{p}$, omnes etiam ipsius r potestates erunt valores istius expressionis; horum autem totidem erunt diversi, quot unitates habet exponens, ad quem r pertinet (art. 48). Quodsi igitur r est valor ad exponentem n pertinens, potestates ipsius r hae $r, r^2, r^3, \dots, r^n$ (ubi loco ultimae unitas substitui potest) omnes expressionis $\sqrt[n]{1} \pmod{p}$ valores involvent. Qualia autem subsidia exstent ad tales valores inveniendos, qui ad exponentem n pertineant, in Sect. VIII fusius explicabimus.

SECUNDO. Quando A unitati est incongruus, unusque valor expressionis $\sqrt[n]{A} \pmod{p}$ notus, qui sit z , reliqui hoc modo inde deducuntur. Sint t valores expressionis $\sqrt[n]{1}$ hi $r, r^2, r^3, \dots, r^{n-1}$ (uti modo ostendimus), eruntque omnes expr. $\sqrt[n]{A}$ valores hi $z, zr, zr^2, \dots, zr^{n-1}$.

66.

Secundum quod nobis proposueramus fuit docere, in quo casu unus expressionis $\sqrt[n]{A}$ (mod p) valor (ubi n supponitur esse divisor ipsius $p - 1$) directe inveniri possit. Hoc evenit, quando aliquis valor potestati alicui ipsius A congruus evadit, qui casus quum haud raro occurrat, aliquantum huic rei immorari non superfluum erit. Sit talis valor, si quis datur, z , sive $z^n \equiv A^k$ et $A \equiv z^m$ (mod p). Hinc colligitur $A \equiv A^{kn}$, quare si numerus k habetur, ita ut sit $A \equiv A^{kn}$, A^k erit valor quaesitus. At huic conditioni aequivalet ista ut sit $kn \equiv 1$ (mod t), designante t exponentem, ad quem pertinet A (artt. 46, 48). Ut vero haec congruentia possibilis sit, requiritur, ut sit k ad t primus. Hoc in casu erit $k \equiv \frac{1}{n}$ (mod t); si vero t et n divisorem communem habent, nullus valor z potestati ipsius A congruus esse potest.

67.

Quum autem ad hanc solutionem ipsum t novisse oporteat, videamus quomodo procedere possimus, si hunc numerum ignoremus. Primo facile intelligitur, t ipsum $\frac{p-1}{\delta}$ metiri debere, siquidem $\sqrt[n]{A}$ (mod p) valores reales habeat, uti hic semper supponimus. Sit enim quicumque valor y , eritque tum $y^{p-1} \equiv 1$, tum $y^n \equiv A$ (mod p); quare elevando partes posterioris congruentiae ad potestatem $\frac{p-1}{\delta}$, fiet $A^{\frac{p-1}{\delta}} \equiv 1$; adeoque $\frac{p-1}{\delta}$ per t divisibilis (art. 48). Iam si $\frac{p-1}{\delta}$ ad n est primus congruentia art. praec. $kn \equiv 1$ etiam secundum modulum $\frac{p-1}{\delta}$ solvi poterit manifestoque valor ipsius k congruentiae secundum modulum hunc satisfaciens eidem etiam secundum modulum t , qui ipsum $\frac{p-1}{\delta}$ metitur, satisfaciet (art. 5). Tum igitur quod quaerebatur, inventum.

Si vero $\frac{p-1}{\delta}$ ad n non est primus, omnes ipsius $\frac{p-1}{\delta}$ factores primi, qui simul ipsum t metiuntur, ex $\frac{p-1}{\delta}$ eiiciantur. Hinc nanciscemur numerum $\frac{p-1}{\delta q}$, ad n primum, designante q productum ex omnibus illis factoribus primis, quos eiicimus. Quodsi iam conditio ad quam in artic. praec. pervenimus ut t ad n sit primus, locum habet, t etiam ad q erit primus adeoque etiam ipsum $\frac{p-1}{\delta q}$ metietur. Quare si congruentia $kn \equiv 1$ (mod $\frac{p-1}{\delta q}$) solvitur (quod fieri potest quia n ad $\frac{p-1}{\delta q}$ primus), valor ipsius k etiam secundum modulum t congruentiae satisfaciet, id quod quaerebatur. Totum hoc artificium in eo versatur, ut numerus eruatur, qui ipsius t , quem ignoramus, vice fungi possit. Attamen probe meminisse oportet, nos, quando $\frac{p-1}{\delta}$ ad n non est primus, supposuisse conditionem art. praec. locum habere, quae si deficit omnes conclusiones erroneae erunt; atque si regulas datas temere sequendo pro z valor invenitur, cuius potestas A^k ipsi A non sit congrua, indicio hoc est, conditionem deficere adeoque methodum hanc omnino adhiberi non posse.

68.

Sed in hocce etiam casu saepe prodesse potest, hunc laborem suscepisse; operaeque pretium est, quomodo hic valor falsus ad veros sese habeat, investigare. Supponamus itaque, numeros k , z rite esse determinatos sed z^n non esse A (mod p). Tum si modo valores expressionis $\sqrt[n]{\frac{A}{z^n}}$ (mod p) determinari possint, hos singulos per z multiplicando valores ipsius $\sqrt[n]{A}$ obtinebimus. Si enim v est valor aliquis ipsius $\sqrt[n]{\frac{A}{z^n}}$, erit $(vz)^n \equiv A$. Sed expressio $\sqrt[n]{\frac{A}{z^n}}$ eatenus hac $\sqrt[n]{A}$ simplicior, quod $\frac{A}{z^n}$ (mod p) ad exponentem minorem plerumque pertinet quam A . Scilicet si numerorum t , q divisor communis maximus est d , $\frac{A}{z^n}$ (mod p) ad exponentem d pertinebit, id quod ita demonstratur. Substitute pro z valore, fit $\frac{A}{z^n} \equiv A^{1-kn}$ (mod p). At $kn - 1$ per $\frac{p-1}{\delta q}$ divisibilis (art. praec), $\frac{p-1}{\delta}$ vero per t (ibid.) sive $\frac{t}{d}$. Atqui $\frac{t}{d}$ ad $\frac{q}{d}$ est primus (hyp.), quare etiam $kn - 1$ per $\frac{t}{d}$ sive $kn - 1$ per $\frac{t}{d}$, adeoque etiam $(kn - 1)d$ per t erit divisibilis. Hinc $A^{(kn-1)d} \equiv 1$ (mod p). Unde facile deducitur, $\frac{A}{z^n}$ ad potestatem d^{tam} evectorum unitati congruum fieri. Quod vero $\frac{A}{z^n}$

ad exponentem minorem quam d pertinere non possit, facile quidem demonstrari potest, sed quoniam ad finem nostrum non requiritur, huic rei non immoramur. Certi igitur esse possumus, $\frac{A}{z^n} \pmod{p}$ semper ad minorem exponentem pertinere quam A , unico excepto casu, scilicet quando t ipsum q metitur, adeoque $d = t$.

69.

Revertimur nunc ad radices, quas diximus primitivas. Ostendimus, radice primitiva quacunque pro basi assumpta omnes numeros, quorum indices ad $p - 1$ primi, etiam fore radices primitivas, nullosque praeter hos: unde simul radicum primitivarum multitudo sponte innotescit. V. art. 53. Quamnam autem radicem primitivam pro basi adoptare velimus, in genere arbitrio nostro relinquitur; unde intelligitur, etiam hic, ut in calculo logarithmico, plura quasi systemata dari posse², quae quo vinculo connexa sint videamus. Sint a, b duae radices primitivae, aliusque numerus m , atque, quando a pro basi assumitur, index numeri $b \equiv \mu$, numeri m vero index $\equiv \alpha \pmod{p - 1}$; quando autem b pro basi assumitur, index numeri $a \equiv \alpha'$, numeri m vero $\equiv \nu \pmod{p - 1}$. Tum erit $a^{\alpha'} \equiv b$, quare $a^{\alpha'\mu} \equiv b^\mu \equiv a \pmod{p}$ (hyp.), hinc $a^{\alpha'\mu - 1} \equiv 1 \pmod{p - 1}$. Per simile ratiocinium invenitur $\nu \equiv \alpha\mu'$, atque $\mu\mu' \equiv 1 \pmod{p - 1}$. Si igitur tabella indicum pro basi a constructa habetur, facile in aliam converti potest, ubi b basis. Si enim pro basi a ipsius b index est $= \varepsilon$, pro basi b ipsius a index erit $\frac{1}{\varepsilon} \pmod{p - 1}$, multiplicandoque per hunc numerum omnes tabellae indices, habebuntur omnes indices pro basi b .

70.

Quamvis autem plures indices numero dato contingere possint, aliis aliisque radicibus primitivis pro basi acceptis, omnes tamen in eo convenient, quod omnes eundem divisorem maximum cum $p - 1$ communem habebunt. Si enim pro basi a , index numeri dati est m , pro basi b vero n , atque divisores maximi his cum $p - 1$ communes μ, ν supponuntur esse inaequales, alter erit maior, ex. gr. $\mu > \nu$, adeoque μ ipsum n non metietur. At designato indice ipsius a , quando b pro basi assumitur, per α , erit (art. praec.) $n \equiv \alpha m \pmod{p - 1}$ adeoque μ etiam ipsum n metietur. Q. E. A.

Hunc divisorem maximum indicibus numeri dati, ipsique $p - 1$ communem, a basi non pendere, etiam inde perspicuum, quod aequalis est ipsi $\frac{p-1}{t}$, designante t exponentem ad quem numerus, de cuius indicibus agitur, pertinet. Si enim index pro basi quacunque est k , erit t minimus numerus per quem k multiplicatus ipsius $p - 1$ multiplum evadit (excepta cifra) vid. artt. 48, 58, sive minimus valor expressionis $\frac{0}{k} \pmod{p - 1}$ praeter cifram; hunc autem aequalem esse divisoris maximo communi numerorum k et $p - 1$, ex art. 29 nullo negotio derivatur.

71.

Porro facile demonstratur, basin ita semper accipere licere, ut numerus ad exponentem t pertinens indicem quemlibet datum nanciscatur, cuius quidem maximus divisor cum $p - 1$ communis $= d$. Designemus hunc brevitatis gratia per d , sitque index propositus $= dm$, numerique propositi, quando quaelibet radix primitiva a pro basi accipitur, index $\equiv dn$ eruntque m, n ad $\frac{p-1}{d}$ sive ad t primi. Tum si s est valor expressionis $\frac{m}{n} \pmod{p - 1}$, simulque ad $p - 1$ primus, erit a^s radix primitiva, qua pro basi accepta numerus propositus indicem dm adipiscetur (erit enim $a^{sdn} \equiv a^{dm} \equiv$ numero proposito), id quod desiderabatur. Sed expressionem $\frac{m}{n} \pmod{p - 1}$ valores ad $p - 1$ primos admittere, ita probatur. Aequivalet illa expressio huic: $\frac{m}{n} \pmod{\frac{p-1}{d}}$ sive $\frac{m}{n} \pmod{t}$ vid. art. 31, 2, eruntque omnes eius valores ad t primi; si enim aliquis valor e divisorem cum t communem haberet, hic divisor etiam ipsum m metiri deberet, adeoque etiam ipsum n , cui m secundum t

²In eo autem differunt, quod in logarithmis systematum numerus est infinitus, hic vero tantus, quantus numerus radicum primitivarum. Manifeste enim bases congruae idem systema generant.

congruus, contra hypoth., ex qua m ad t primus.

Quando igitur omnes divisores primi ipsius $p - 1$ etiam ipsum t metiuntur, omnes expr. $\frac{m}{n} \pmod{t}$ valores ad $p - 1$ primi erunt multitudoque eorum $= \varphi t$; quando autem $p - 1$ alios adhuc divisores primos, f, g, h etc. implicat, ipsum t non metientes, ponatur valor quicunque expr. $\frac{m}{n} \pmod{t} = e$. Tum autem quia omnes t, f, g, h etc. inter se primi, inveniri potest numerus ε , qui secundum t ipsi e , secundum f, g, h etc. vero numeris quibuscunque ad hos respective primis fiat congruus (art. 32). Talis itaque numerus per nullum factorem primum ipsius $p - 1$ divisibilis adeoque ad $p - 1$ primus erit, uti desiderabatur. Tandem haud difficile ex combinationum theoria deducitur, talium valorum multitudinem fore $= \frac{\varphi t \cdot \varphi f \cdot \varphi g \dots}{\varphi(t \cdot f \cdot g \dots)}$ sed ne digressio haec in nimiam molem excrescat, demonstrationem, quum ad institutum nostrum non sit adeo necessaria, omittimus.

Bases usibus peculiaribus accommodatae.

72.

Quamvis in genere prorsus arbitrarium sit quatenam radix primitiva pro basi adoptetur, interdum tamen bases aliae prae aliis commoda quaedam peculiariter praebere possunt. In tabula I semper numerum 10 pro basi assumimus, quando fuit radix primitiva; alioquin basin ita semper determinavimus, ut numeri 10 index evaserit quam minimus, i. e. $= \frac{d}{2}$, denotante t exponentem, ad quem 10 pertinet. Quid vero hinc lucremur, in Sect. VI ostendemus, ubi eadem tabula ad alios adhuc usus adhibebitur. Sed quoniam etiam hic aliquid arbitrarii remanere potest, ut ex art. praec. apparet: ut aliquid certi statueremus, ex omnibus radicibus primitivis quaesitum praestantibus minimam semper pro basi elegimus. Ita pro $p = 41$, ubi $t = 8$ atque $d = 9$, a^d habet $\varphi 9$ i. e. 6 valores, qui sunt 5, 14, 20, 28, 39, 40. Assumimus itaque minimum 5 pro basi.

Methodus radices primitivas assignandi.

73.

Methodi radices primitivas inveniendi maximam partem tentando innituntur. Si quis ea quae art. 55 docuimus cum iis quae infra de solutione congruentiae $x^n \equiv 1$ trademus confert, omnia fere quae per methodos directas effici possunt, habebit. Ill. Euler confitetur, Opusc. Analyt. T. I. p. 152, maxime difficile videri, hos numeros assignare, eorumque indolem ad profundissima numerorum mysteria esse referendam. At tentando satis expedite sequenti modo determinari possunt. Exercitatus operationis prolixitati per multifaria artificia particularia succurrere sciet: haec vero per usum multo citius quam per praecepta ediscuntur.

1°. Assumatur ad libitum numerus ad p (ita semper modulum designamus) primus, a , (plerumque ad calculi brevitatem conducit, si quam minimum accipimus, ex. gr. numerum 2) determineturque eius periodus (art. 46), i. e. residua minima ipsius potestatum, donec ad potestatem a^t perveniatur, cuius residuum minimum sit $= 1^3$. Iam si fuerit $t = p - 1$, a est radix primitiva.

2°. Si vero $t < p - 1$, accipiat alius numerus b in periodo ipsius a non contentus, investigeturque simili modo huius periodus. Designato exponente ad quem b pertinet per u , facile perspicitur u neque ipsi t aequalem neque ipsius partem aliquotam esse posse, in utroque enim casu fieret $b^t \equiv 1$, quod esse nequit, quum periodus ipsius a omnes numeros

³Quisquis sponte perspiciet, non opus esse has potestates ipsas novisse, quum cuiusvis residuum minimum facile ex residuo minimo potestatis praecedentis obtineri possit.

amplectatur, quorum potestas exponentis t unitati congrua (art. 53). Quodsi u fuerit $= p - 1$, erit b radix primitiva; si vero u non quidem $= p - 1$, sed tamen multipulum ipsius t , id lucrati sumus, ut numerus constet ad exponentem maiorem pertinens, adeoque scopo nostro, qui est invenire numerum ad exponentem maximum pertinentem, propiores iam simus. Si vero u neque $= p - 1$, neque ipsius t multipulum, tamen numerum invenire possumus ad exponentem ipsis t, u maiorem pertinentem, nempe ad exponentem minimo dividuo communi numerorum t, u aequalem. Sit hic $= y$, resolvaturque y ita in duos factores inter se primos, m, n , ut alter ipsum t , alter ipsum u metiatur⁴. Tum fiat potestas $\frac{t}{m}$ ta ipsius $a, = A$, potestas $\frac{u}{n}$ ta ipsius $b, = B \pmod{p}$, eritque productum AB numerus ad exponentem y pertinens: facile enim intelligitur, A ad exponentem m , B ad exponentem n pertinere; adeoque productum AB ad mn pertinebit, quia m, n inter se sunt primi, id quod prorsus eodem modo uti in art. 55, II processimus probari poterit.

Iam si $y = p - 1$, AB erit radix primitiva; sin minus, simili modo ut antea alius numerus adhibendus erit, in periodo ipsius AB non occurrens; eritque hic aut radix primitiva aut pertinebit ad exponentem ipso y maiorem aut certe ipsius auxilio (uti ante) numerus ad exponentem ipso y maiorem pertinens inveniri poterit. Quum igitur numeri qui per repetitionem huius operationis prodeunt, ad exponentes continuo crescentes pertineant, manifestum est tandem numerum inventum iri, qui ad exponentem maximum pertineat, i. e. radicem primitivam. Q. E. F.

74.

Per exemplum praecepta haec clariora fient. Sit $p = 73$, pro quo radix primitiva quaeratur. Tentemus primo numerum 2, cuius periodus prodit haec:

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 55, 37, 1 etc.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 etc.

Quum igitur iam potestas exponentis 9 unitati congrua fiat, 2 non est radix primitiva. Tentetur alius numerus in periodo ipsius 2 non occurrens ex. gr. 3, cuius periodus est haec

1, 3, 9, 27, 8, 24, 72, 70, 64, 46, 65, 49, 1 etc.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 etc.

Quare neque 3 est radix primitiva. Exponentium autem ad quos 2, 3 pertinent, (i.e. numerorum 9, 12) dividuus communis minimus est 36, qui in factores 9 et 4 ad praecepta art. praec. resolvitur. Evehendus itaque 2 ad potestatem exponentis $\frac{9}{9}$, i. e. numerus 2 ipse retinendus; 3 autem ad potestatem exponentis 3; productum ex his est 54, quod itaque ad exponentem 36 pertinebit. Si denique ipsius 54 periodus computatur numerusque in hac non contentus ex. gr. 5 denuo tentatur, hunc esse radicem primitivam, reperietur.

Theoremata varia de periodis et radicibus primitivis.

75.

Antequam hoc argumentum deseramus, quasdam trademus, propositiones quae ob simplicitatem suam attentione haud indignae videntur.

Productum ex omnibus terminis periodi numeri cuiusvis est $\equiv -1$, quando ipsorum multitudo, sive exponens ad quem numerus pertinet, est impar, et $\equiv +1$, quando hic

⁴Quomodo hoc fieri possit, ex art. 18 haud difficulter derivatur. Resolvatur y in factores tales, qui sint aut numeri primi diversi aut numerorum primorum diversorum potestates. Horum quisque alterutrum numerorum t, u metietur (sive etiam utrumque). Adscribantur singuli aut numero t aut numero u , prout illum aut hunc metiuntur: quando aliquis utrumque metitur, arbitrium est, cui adscribatur: productum ex iis qui ipsi t adscripti sunt, sit $= m$, productum e reliquis $= n$, facileque perspicietur m ipsum t , n ipsum u metiri, atque esse $mn = y$.

exponens est par.

Ex. Pro modulo 13 periodus numeri 5 constat ex his terminis 1, 5, 12, 8 quorum productum $480 \equiv -1 \pmod{13}$.

Secundum eundem modulum periodus numeri 3 constat e terminis 1, 3, 9 quorum productum $27 \equiv +1 \pmod{13}$.

DEMONSTR. Sit exponens, ad quem numerus pertinet, $= t$, atque index numeri, $= a$, id quod si basis rite determinatur, semper fieri potest (art. 71). Tum index producti ex omnibus periodi terminis erit

$$= (1 + 2 + 3 + \text{etc.} + t - 1)a = \frac{t(t-1)}{2}a$$

i.e. $\equiv 0 \pmod{p-1}$, quando t impar, et $\equiv \frac{p-1}{2}$, quando t par; hinc in priori casu productum illud $\equiv +1 \pmod{p}$; in posteriori vero $\equiv -1 \pmod{p}$, (art. 62).

Q. E. D.

76.

Si numerus iste in theor. praecedente est radix primitiva, eius periodus omnes numeros 1, 2, 3, ..., $p-1$ comprehendet, quorum productum itaque semper $\equiv -1$ (namque $p-1$ semper par, unico casu $p=2$ excepto in quo $-1 \equiv +1$ aequivalent). Theorema hoc elegans quod ita enunciari solet: productum ex omnibus numeris numero primo dato minoribus, unitate auctum per hunc primum est divisibile, primum a cel. Waring est prolatum armigeroque Wilson adscriptum, Meditt. algebr. Ed. 3. p. 380. Sed neuter demonstrare potuit, et cel. Waring fatetur demonstrationem eo difficiliorem videri, quod nulla notatio fingi possit, quae numerum primum exprimat. At nostro quidem iudicio huiusmodi veritates ex notionibus potius quam ex notationibus hauriri debebant. Postea ill. La Grange demonstrationem dedit, Nouv. Mém. de l'Ac. de Berlin, 1771. Innititur ea considerationi coefficientium ex evolutione producti

$$(x+1)(x+2)(x+3)\dots(x+p-1)$$

oriundorum. Scilicet posito hoc producto

$$= x^{p-1} + Ax^{p-2} + Bx^{p-3} + \dots + Mx^2 + Nx \text{ etc.}$$

coefficientes $A, B, \dots, M$ per p erunt divisibiles, N vero $= 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (p-1)$. Iam pro $x = -1$ productum per p divisibile; tunc autem $x^{p-1} - 1$ divisibile; erit $1 + N \equiv 0 \pmod{p}$, quare necessario $1 + N$ per p dividi potest.

Denique ill. Euler in Opusc. analyt. T. I. p. 329 demonstrationem dedit, cum ea quam nos hic exposuimus conspirantem. Quodsi tales viri theorema hoc meditationibus suis non indignum censuerunt, non improbatum iri speramus, si aliam adhuc demonstrationem apponimus.

77.

Quando secundum modulum p , productum duorum numerorum a, b unitati est congruum, numeros a, b cum ill. Euler *socios* vocemus. Tum secundum sect. praec. quivis numerus positivus ipso p minor socium habebit positivum ipso p minorem et quidem unicum. Facile autem probari potest ex numeris 1, 2, 3, ..., $p-1$; 1 et $p-1$ esse unicos qui sibi ipsis sint socii: numeri enim sibi ipsis socii, radices erunt congruentiae $xx \equiv 1$, quae quoniam est secundi gradus, plures quam duas radices, i. e. alias quam 1 et $p-1$ habere nequit. Abiectis itaque bis numerorum reliquorum 2, 3, ..., $p-2$ bini semper erunt associati; quare productum ex ipsis erit $\equiv +1$ adeoque productum ex omnibus 1, 2, 3, ..., $p-1$, sive $p-1$, $\equiv -1$. Q. E. D.

Ex. gr. pro $p = 13$ numeri 2, 3, 4, ..., 11 ita associantur: 2 cum 7; 3 cum 9; 4 cum 10; 5 cum 8; 6 cum 11; scilicet $2 \cdot 7 \equiv 1$; $3 \cdot 9 \equiv 1$ etc. Hinc $2 \cdot 3 \cdot 4 \dots 11 \equiv 1$; adeoque $1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 12 \equiv -1$.

78.

Potest autem theorema Wilsonianum generalius sic proponi. Productum ex omnibus numeris, numero quocunque dato A minoribus simulque ad ipsum primis, congruum est secundum A unitati vel negative vel positive sumtae. Negative sumenda est unitas, quando A est formae p^α , aut huiusce $2p^\alpha$, designante p numerum primum a 2 diversum, insuperque quando $A = 4$; positive autem in omnibus casibus reliquis. Theorema, quale a cel. Wilson est prolatum, sub casu priori continetur. — Ex. gr. pro $A = 15$ productum e numeris 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14 est $\equiv -1 \pmod{15}$. Demonstrationem brevitatis gratia non adiungimus: observamus tantum, eam simili modo perfici posse ut in art. praec., excepto quod congruentia $xx \equiv 1$ plures quam duas radices habere potest, quae considerationes quasdam peculiare postulant. Posset etiam demonstratio ex consideratione indicum peti, similiter ut in art. 75, si ea quae mox de modulis non primis trademus, conferantur.

79.

Revertimur ad enumerationem aliarum propositionum (art. 75).

Summa omnium terminorum periodi numeri cuiusvis est $\equiv 0$, uti in ex. art. 75, $1 + 5 + 12 + 8 = 26 \equiv 0 \pmod{13}$.

DEM. Numerus de cuius periodo agitur, sit $= a$ atque exponens ad quem pertinet, $= t$, eritque summa terminorum omnium periodi,

$$1 + a + aa + a^3 + \text{etc.} + a^{t-1} \equiv \frac{a^t - 1}{a - 1} \pmod{p}.$$

At $a^t - 1 \equiv 0$; quare summa haec semper $\equiv 0$, nisi forte $a - 1$ per p sit divisibilis, sive $a \equiv 1$; hunc igitur casum excipere oportet, vel unum terminum periodum vocare velimus.

80.

Productum ex omnibus radicibus primitivis est $\equiv +1$, excepto unico casu, $p = 3$, tum enim una tantum datur radix primitiva $2 \equiv -1$.

DEMONSTR. Si radix primitiva quaecunque pro basi assumitur, indices radicum omnium primitivarum erunt numeri ad $p - 1$ primi simulque ipso minores. At horum numerorum summa, i. e. index producti ex omnibus radicibus primitivis, est $\equiv 0 \pmod{p - 1}$ adeoque productum $\equiv +1 \pmod{p}$; facile enim perspicitur, si k fuerit numerus ad $p - 1$ primus, etiam $p - 1 - k$ ad $p - 1$ primum fore adeoque binos numeros ad $p - 1$ primos summam constituere per $p - 1$ divisibilem; (k autem ipsi $p - 1 - k$ numquam aequalis esse potest, praeter casum, $p - 1 - k = 2$, sive $p = 3$, quem excepimus; manifesto enim $k = \frac{p-1}{2}$ in omnibus reliquis casibus $p - 1$ non est primus). Q. E. D.

81.

Summa omnium radicum primitivarum est aut $\equiv 0$ (quando $p - 1$ per quadratum aliquod est divisibilis), aut $\equiv +1$ vel $\equiv -1 \pmod{p}$ (quando $p - 1$ est productum e numeris primis inaequalibus; quorum multitudo si est par signum positivum, si vero impar, negativum sumendum).

Ex. 1° pro $p = 13$, habentur radices primitivae 2, 6, 7, 11, quarum summa $26 \equiv 0 \pmod{13}$.

2° pro $p = 11$, radices primitivae sunt 2, 6, 7, 8 quorum summa $23 \equiv +1 \pmod{11}$.

3° pro $p = 31$, radices primitivae sunt 3, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 24, quorum summa $123 \equiv -1 \pmod{31}$.

DEMONSTR. Supra demonstravimus (art. 55, II), si $p - 1$ fuerit $= a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc. (designantibus a, b, c etc. numeros primos inaequales) atque A, B, C etc. numeri quicunque

ad exponentes $a^\alpha, b^\beta, c^\gamma$ etc. respective pertinentes, omnia producta ABC etc. exhibere radices primitivas. Facile vero etiam demonstrari potest, quamvis radicem primitivam per huiusmodi productum exhiberi posse et quidem unico tantum modo⁵. Unde sequitur haec producta loco ipsarum radicum primitivarum accipi posse. At quoniam in his productis omnes valores ipsius A cum omnibus ipsius B etc. combinari oportet, omnium horum productorum summa aequalis est producto ex summa omnium valorum ipsius A in summam omnium valorum ipsius B in summam omnium valorum ipsius C etc., uti ex doctrina combinationum notum est. Designentur omnes valores ipsorum A, B etc., per A, A', A'' etc., B, B', B'' etc. etc., eritque summa omnium radicum primitivarum

$$= (A + A' + A'' + \text{etc.})(B + B' + \text{etc.}) \text{ etc.}$$

Iam dico, si exponens $a^\alpha = 1$, summam $A + A' + A'' + \text{etc.}$ fore $\equiv -1 \pmod{p}$; si vero $a^\alpha > 1$, summam hanc fore $\equiv 0$, similiterque de reliquis b^β, c^γ etc. Simulac haec erunt demonstrata, theorematis nostri veritas manifesta erit. Quando enim $p - 1$ per quadratum aliquod divisibilis est, aliquis exponentium $a^\alpha, b^\beta, c^\gamma$ etc. unitatem superabit, adeoque aliquis factorum, quorum productum congrua est summa omnium radicum primitivarum erit $\equiv 0$, et proin etiam productum ipsum; quando vero $p - 1$ per nullum quadratum dividi potest, omnes exponentes $a^\alpha, b^\beta, c^\gamma$ etc. erunt $= 1$, unde summa omnium radicum primitivarum congrua erit producto ex tot factoribus, quorum quisque $\equiv -1$, quot habentur numeri a, b, c etc., adeoque erit $\equiv +1$ vel $\equiv -1$, prout horum numerorum multitudo par vel impar. Illa autem ita probantur.

1°. Quando $a^\alpha = 1$ atque A numerus ad exponentem a^α pertinens, reliqui numeri ad hunc exponentem pertinentes erunt $A^2, A^3, \dots, A^{a^\alpha-1}$. At $A + A^2 + A^3 + \dots + A^{a^\alpha-1}$ est summa periodi completae, adeoque $\equiv -1 \pmod{p}$ (art. 79), quare $A + A^2 + A^3 + \dots + A^{a^\alpha-1} \equiv -1$.

2°. Quando autem $a^\alpha > 1$, atque A numerus ad exponentem a^α pertinens, reliqui numeri ad hunc exponentem pertinentes habebuntur, si ex his $A^2, A^3, \dots, A^{a^\alpha-1}$ reiiciuntur A^a, A^{2a}, A^{3a} etc., vid. art. 53; quare summa eorum erit

$$= A + A^2 + \dots + A^{a^\alpha-1} - (A^a + A^{2a} + A^{3a} + \dots + A^{a^\alpha-a})$$

i. e. congrua differentiae duarum periodorum, adeoque $\equiv 0$. Q. E. D.

De modulis qui sunt numerorum primorum potestates.

82.

Omnia quae hactenus exposuimus innituntur suppositioni modulum esse numerum primum. Superest ut eum quoque casum consideremus, ubi pro modulo assumitur numerus compositus. Attamen quum hic neque proprietates tam elegantes eniteant, quam in casu priori, neque ad eas inveniendas artificii subtilibus sit opus, sed potius omnia fere per solam principiorum praecedentium applicationem erui possint, omnes minutias hic exhaustire superfluum atque taediosum foret. Breviter itaque quae huic casui cum priori sint communia quaeque propria exponemus.

83.

⁵Determinentur scilicet numeri a, b, c etc. ita, ut sit $a \equiv 1 \pmod{a^\alpha}$ et $\equiv 0 \pmod{b^\beta c^\gamma \text{ etc.}}$, $b \equiv 1 \pmod{b^\beta}$ et $\equiv 0 \pmod{a^\alpha c^\gamma \text{ etc.}}$ etc. (vid. art. 32), unde fiet $a+b+c+\text{etc.} \equiv 1 \pmod{p-1}$ (art. 19). Iam si radix primitiva quaecunque, r , per productum ABC etc. exhiberi debet, accipiat $A = r^a, B = r^b, C = r^c$ etc., atque pertinebunt A ad exponentem a^α, B ad exponentem b^β etc.; productum ex omnibus A, B, C etc. erit $\equiv r \pmod{p}$; denique facile perspicitur A, B, C etc. alio modo determinari non posse.

Propositiones artt. 45—48 generaliter iam sunt demonstratae. At prop. art. 49 ita immutari debet:

Si f designat, quot numeri dentur ad m primi simul ipso m minores, i. e. si $f = \varphi m$ (art. 38): exponens t infimae potestatis numeri dati a ad m primi, quae secundum modulum m unitati est congrua, vel erit $= f$ vel pars aliquota huius numeri.

Demonstratio prop. art. 49 etiam pro hoc casu valere potest, si modo ubique loco ipsius p , m , loco ipsius $p - 1$, f , et loco numerorum $1, 2, 3, \dots, p - 1$, numeri ad m primi simulque ipso m minores substituantur. Huc itaque lectorem ablegamus. Ceterum demonstrationes reliquae de quibus illic locuti sumus (artt. 50, 51), non sine multis ambagibus ad hunc casum applicari possunt. — At respectu propositionum sequentium, art. 52 sqq. magna differentia incipit inter modulos, qui numerorum primorum sunt potestates, eosque, qui per plures numeros primos dividi possunt. Seorsim itaque modulos prioris generis contemplabimur.

84.

Si modulus $m = p^n$, designante p numerum primum, erit $f = p^{n-1}(p-1)$ (art. 38). Iam si disquisitiones in artt. 53, 54 contentae ad hunc casum applicantur, mutatis mutandis uti in art. praec. praescripsimus, invenietur, omnia quae ibi demonstrata sunt etiam pro hoc casu locum habere, si modo ante probatum esset, congruentiam formae $x^t \equiv 1 \pmod{p^n}$ plures quam t radices diversas habere non posse. Pro modulo primo hanc veritatem ex propositione generali art. 43 deduximus, quae autem in omni sua extensione de modulis primis tantummodo valet, neque adeo ad hunc casum applicanda. Attamen propositionem pro hoc casu particulari veram esse, per methodum singularem demonstrabimus. Infra (sect. VIII) idem facilius invenire docebimus.

85.

Demonstrandum proponimus nobis hoc theorema:

Si numerorum t et $p^{n-1}(p-1)$ divisor communis maximus est e , congruentia $x^t \equiv 1 \pmod{p^n}$ habebit e radices diversas.

Sit $e = kp^\mu$, ita ut k factorem p non involvat, adeoque numerum $p-1$ metiatur. Tum congruentia $x^t \equiv 1$ secundum modulum p habebit k radices diversas, quibus per A, B, C etc. designatis radix quaecunque eiusdem congruentiae secundum modulum p^n , congrua esse debet secundum modulum p alicui numerorum A, B, C etc. Iam demonstrabimus, congruentiam $x^t \equiv 1 \pmod{p^n}$ habere p^μ radices ipsi A , totidem ipsi B etc. congruas secundum modulum p . Quo facto omnium radicum numerus erit kp^μ sive e , uti diximus. Illam vero demonstrationem ita adornabimus, ut primo ostendamus, si a fuerit radix ipsi A secundum modulum p congrua, etiam $a + p^{n-1}, a + 2p^{n-1}, a + 3p^{n-1}, \dots, a + (p-1)p^{n-1}$ fore radices; secundo, numeros ipsi A secundum modulum p congruos alios quam qui in forma $a + hp^{n-1}$ sint comprehensi (denotante h integrum quemcunque), radices esse non posse: unde manifesto p^μ radices diversae habebuntur, et non plures: atque idem etiam de radicibus, quae singulis B, C etc. sunt congruae, locum habebit: tertio docebimus, quomodo semper radix, ipsi A secundum p congrua, inveniri possit.

86.

THEOREMA. Si uti in art. praec. t est numerus per p^μ , neque vero per $p^{\mu+1}$ divisibilis, erit

$$(a + hp^\nu)^t \equiv a^t \pmod{p^{\nu+\mu+1}} \quad \text{at} \quad (a + hp^\nu)^t \not\equiv a^t \pmod{p^{\nu+\mu}}.$$

Theorematis pars posterior locum non habet, quando $p = 2$ simulque $\nu = 1$.

Demonstratio huius theorematis ex evolutione potestatis binomii peti posset, si ostenderetur omnes terminos post secundum per $p^{\nu+\mu+1}$ divisibiles esse. Sed quoniam consideratio denominatorum coefficientium in aliquot ambages deducit, methodum sequentem

praeferimus.

Ponamus primo $[a + b]^t \equiv 1$ atque $v \equiv 1$, eritque propter

$$x^t - y^t = (x - y)(x^{t-1} + x^{t-2}y + x^{t-3}y^2 + \text{etc.} + y^{t-1})$$

$$(a + hp^\nu)^t - a^t = hp^\nu((a + hp^\nu)^{t-1} + (a + hp^\nu)^{t-2}a + \text{etc.} + a^{t-1}).$$

At est $a + hp^\nu \equiv a \pmod{p^\nu}$, quare quisque terminus $(a + hp^\nu)^{t-1}$, $(a + hp^\nu)^{t-2}a$ etc. erit $\equiv a^{t-1} \pmod{p^\nu}$, adeoque omnium summa $\equiv ta^{t-1} \pmod{p^\nu}$ sive formae $ta^{t-1} + Vp^\nu$ denotante V numerum quemcunque. Hinc $(a + hp^\nu)^t - a^t$ erit formae $a^{t-1}hp^\nu t + Vhp^{2\nu}$, i.e. $\equiv ta^{t-1}hp^\nu \pmod{p^{\nu+\mu}}$ et $\equiv 0 \pmod{p^{\nu+\mu+1}}$. Pro hoc itaque casu theorema est demonstratum.

Iam si theorema pro aliis ipsius v valoribus verum non esset, manente etiamnum $\mu \geq 1$, limes aliquis necessario daretur, usque ad quem theorema semper verum foret, ultra vero falsum. Sit minimus valor ipsius v , pro quo falsum est $= q$, unde facile perspicitur, si t per p^{q-1} non autem per p^q fuerit divisibilis, theorema adhuc verum esse, at si loco ipsius t substituatur tp , falsum. Habemus itaque

$$(a + hp^\nu)^t \equiv a^t + a^{t-1}hp^\nu t \pmod{p^{\nu+q}} \quad \text{sive} \quad = a^t + a^{t-1}hp^\nu t + up^{\nu+q}$$

denotante u numerum integrum. At quia pro $v = 1$ theorema iam est demonstratum, erit

$$(a^t + a^{t-1}hp^\nu t + up^{\nu+q})^p \equiv a^{tp} + a^{tp-1}hp^{\nu+1}tp + a^{tp-1}up^{\nu+q+1} \pmod{p^{\nu+q+1}}$$

adeoque etiam

$$(a + hp^\nu)^{tp} \equiv a^{tp} + a^{tp-1}hp^{\nu+1}tp \pmod{p^{\nu+q+1}}$$

i. e. theorema etiam verum, si loco ipsius t substituatur tp , i. e. etiam pro $v = q$, contra hypothesin. Unde manifestum pro omnibus ipsius v valoribus theorema verum esse.

87.

Superest casus ubi $\mu = 1$. Per methodum prorsus similem ei qua in art. praec. usi sumus, sine adiumento theorematis binomialis demonstrari potest, esse

$$\begin{aligned} (a + hp)^t - a^t &\equiv a^{t-1}hp \cdot t \pmod{p^{\nu+1}} \\ a(a + hp)^{t-1} &\equiv a^t + a^{t-1}hp(t-1) \pmod{p^{\nu+1}} \\ a^2(a + hp)^{t-2} &\equiv a^t + a^{t-1}hp(t-2) \pmod{p^{\nu+1}} \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

unde aggregatum erit (quia partium multitudo $= t$) $\equiv ta^t + a^{t-1}hp \cdot \frac{t(t-1)}{2} \pmod{p^{\nu+1}}$.

At quoniam t per p divisibilis, etiam $\frac{t(t-1)}{2}$ per p divisibilis erit in omnibus casibus excepto eo ubi $p = 2$ de quo iam in art. praec. monuimus. In reliquis autem casibus erit $a^{t-1}hp \cdot \frac{t(t-1)}{2} \equiv 0 \pmod{p^{\nu+1}}$, adeoque etiam illud aggregatum $\equiv ta^t \pmod{p^{\nu+1}}$ ut in art. praec. In reliquis demonstratio hic eodem modo procedit ut istic.

Colligimus igitur generaliter, unico casu $p = 2$ excepto, esse $(a + hp^\nu)^t \equiv a^t \pmod{p^{\nu+\mu}}$ et $(a + hp^\nu)^t \not\equiv a^t$ pro quovis modulo qui sit altior potestas ipsius p , quam haec $p^{\nu+\mu}$, quoties quidem h per p non est divisibilis, atque p^μ potestas suprema ipsius p quae numerum t dividit.

Hinc protinus derivantur propositiones 1. et 2, quas art. 85 demonstrandas nobis proposueramus: scilicet primo, si $a^t \equiv 1$, erit etiam $(a + hp^{n-1})^t \equiv 1 \pmod{p^n}$; secundo si numerus aliquis d ipsi A adeoque etiam ipsi a secundum modulum p congruus, neque

vero huic secundum modulum p^{n-1} , congruentiae $x^t \equiv 1 \pmod{p^n}$ satisfaceret: ponamus d esse $= a + lp^{n-1}$, ita ut l per p non sit divisibilis, eritque $d^t \not\equiv 1$, tunc autem $(a + lp^{n-1})^t$ secundum modulum $p^{n+\mu}$ ipsi a^t congruus erit, non autem secundum modulum p^n , quae est altior potestas, quare d radix congruentiae $x^t \equiv 1$ esse nequit.

88.

Tertium vero fuit radicem aliquam congruentiae $x^t \equiv 1 \pmod{p^n}$, ipsi A congruam, invenire. Ostendemus hic tantummodo, quomodo hoc fieri possit, si iam radix eiusdem congruentiae secundum modulum p^{n-1} innotuerit; manifesto hoc sufficit, quum a modulo p , pro quo A est radix, ad modulum p^2 , sicque deinceps ad omnes potestates consecutivas progredi possimus.

Esto itaque a radix congruentiae $x^t \equiv 1 \pmod{p^{n-1}}$, quaeriturque radix eiusdem congruentiae secundum modulum p^n . Ponatur haec $= a + hp^{n-\nu-1}$, quam formam eam habere debere ex art. praec. sequitur (casum ubi $v = n-1$ postea seorsim considerabimus: maior vero quam $n-1$, v esse nequit). Debet itaque esse $(a + hp^{n-\nu-1})^t \equiv 1 \pmod{p^n}$.

At $(a + hp^{n-\nu-1})^t \equiv a^t + a^{t-1}htp^{n-\nu-1} \pmod{p^n}$. Si itaque h ita determinatur, ut fiat $a^t + a^{t-1}htp^{n-\nu-1} \equiv 1 \pmod{p^n}$, sive (quia per hyp. $1 \equiv a^t \pmod{p^{n-1}}$ atque t per p^ν divisibilis) ita ut fiat $a^{t-1}h \cdot \frac{t}{p^\nu}$ per p divisibilis, quaesito satisfactum erit. Hoc autem semper fieri posse ex Sect. praec. manifestum, quum t per altiore ipsius p potestatem quam p^ν dividi non posse hic supponamus, adeoque a^{t-1} ad p sit primus.

Si vero $v = n-1$, i. e. t per p^{n-1} sive etiam per altiore ipsius p potestatem divisibilis, quivis valor A congruentiae $x^t \equiv 1$ secundum modulum p satisfaciens eidem etiam secundum modulum p^n satisfaciet. Sit enim $t = p^{n-1}x$, eritque $t \equiv 0 \pmod{p^{n-1}}$; quare quoniam $A^t \equiv 1 \pmod{p}$, erit etiam $A^t \equiv 1 \pmod{p^n}$. Ponatur itaque $A^t = 1 + hp$, eritque $A^{tp} = (1 + hp)^p \equiv 1 \pmod{p^n}$ art. 87.

89.

Omnia quae art. 57 sqq. adiumento theorematis, congruentiam $x^n \equiv 1$ plures quam t radices diversas non habere eruimus, etiam pro modulo qui est numeri primi potestas locum habent, et si radices primitivae vocantur numeri, qui ad exponentem $p^{n-1}(p-1)$ pertinent, sive in quorum periodis omnes numeri per p non divisibiles inveniuntur, etiam hic radices primitivae exstabant. Omnia autem quae supra de indicibus eorumque usu tradidimus necnon de solutione congruentiae $x^n \equiv 1$, ad hunc quoque casum applicari possunt. Quae quum nulli difficultati obnoxia sint, omnia ex integro repetere superfluum foret. Praeterea radices congruentiae $x^t \equiv 1$ secundum modulum p^n e radicibus eiusdem congruentiae secundum p deducere docuimus. Sed de eo casu ubi potestas aliqua numeri 2 est modulus, quia supra exceptus fuit, aliqua adhuc sunt adicienda.

Moduli qui sunt potestates binarii.

90.

Si potestas aliqua numeri 2, altior quam secunda, puta 2^n pro modulo accipitur, numeri cuiusvis imparis potestas exponentis 2^{n-2} , unitati est congrua.

Ex. gr. $3^8 = 6561 \equiv 1 \pmod{32}$.

Quivis enim numerus impar vel sub forma $1 + 4h$, vel sub hac $-1 + 4h$ comprehenditur: unde propositio protinus sequitur (theor. art. 86).

Quoniam igitur exponens, ad quem quicumque numerus impar secundum modulum 2^n pertinet, divisor ipsius 2^{n-2} esse debet, quivis ad aliquem horum numerum pertinebit 1, 2, 4, 8, ..., 2^{n-2} , ad quemnam vero pertineat, ita facile diiudicatur. Sit numerus propositus $= 4h + 1$, atque exponens maximae potestatis numeri 2, quae ipsum h metitur,

$= m$ (qui etiam $= 0$ esse potest, quando scilicet h est impar); tum exponens, ad quem numerus propositus pertinet, erit $= 2^{n-m-2}$, siquidem $n \geq m+2$; si autem $n < m+1$, vel $n = m+1$, numerus propositus est $= +1$ adeoque vel ad exponentem 1 vel ad exponentem 2 pertinebit. Numerum enim formae $1+2^{m+1}k$, (quae huic aequivalet, $4h+1$) ad potestatem exponentis 2^{n-m-2} elevatum unitati secundum modulum 2^n congruum fieri, ad potestatem autem exponentis, qui est inferior numeri 2 potestas, incongruum, ex art. 86 nullo negotio deducitur. Numerus itaque quicunque formae $8h+3$ vel $8h+5$ ad exponentem 2^{n-2} pertinebit.

91.

Hinc patet eo sensu, quo supra expressionem accepimus, radices primitivas hic non dari, nullos scilicet numeros, quorum periodus omnes numeros modulo minores ad ipsumque primos amplectatur. Attamen facile perspicitur, analogon hic haberi. Invenitur enim, numeri formae $8h+3$ potestatem exponentis imparis semper esse formae $8h+3$, potestatem autem exponentis paris, semper formae $8h+1$; nulla igitur potestas formae $8h+5$ aut $8h+7$ esse potest. Quare quum periodus numeri formae $8h+5$ ex 2^{n-2} terminis diversis constet, quorum quisque aut formae $8h+3$ aut huius $8h+1$, neque plures huiusmodi numeri modulo minores dentur quam 2^{n-2} , manifeste quivis numerus formae $8h+1$ vel $8h+3$ congruus est secundum modulum 2^n potestati alicui numeri cuiuscunque formae $8h+5$. Simili modo ostendi potest periodum numeri formae $8h+5$ comprehendere omnes numeros formarum $8h+1$ et $8h+5$. Si igitur numerus formae $8h+5$ pro basi assumitur, omnes numeri formae $8h+1$ et $8h+5$, positive, omnesque formae $8h+3$ et $8h+7$, negative sumti, indices reales nanciscuntur, et quidem hic indices secundum 2^{n-2} congrui pro aequivalentibus sunt habendi. Hoc modo tabula nostra I intelligenda, ubi pro modulis 16, 32 et 64 (namque pro modulo 8 nulla tabula necessaria erit) semper numerum 5 pro basi accepimus. Ex. gr. numero 19, qui est formae $8n+3$ adeoque negative sumendus, respondet pro modulo 64 index 7, id quod significat esse $5^7 \equiv -19 \pmod{64}$. Numeris autem formarum $8n+1$, $8n+5$ negative, atque numeris formarum $8n+3$, $8n+7$ positive acceptis, indices quasi imaginarii tribuendi forent. Quos introducendo calculus indicum ad algorithmum perquam simplicem reduci potest. Sed quoniam, si haec ad omnem rigorem exponere vellemus, nimis longe evagari oporteret, hoc negotium ad aliam occasionem nobis reservamus, quando forsitan fusius quantitatum imaginariarum theoriam, quae nostro quidem iudicio a nemine hactenus ad notiones claras est reducta, pertractare suscipiemus. Periti hunc algorithmum facile ipsi eruent: qui minus sunt exercitati, perinde tamen tabula hac uti poterunt ut ii qui recentiorum commenta de logarithmis imaginariis ignorant, logarithmis utuntur, si quidem principia supra stabilita probe tenuerint.

Moduli e pluribus primis compositi.

92.

Secundum modulum e pluribus primis compositum tantum non omnia quae ad residua potestatum pertinent, ex theoria congruentiarum generali deduci possunt; quia vero infra congruentias quascunque secundum modulum e pluribus primis compositum ad congruentias, quarum modulus est primus aut primi potestas, reducere fusius docebimus, non est quod huic rei multum hic immoremur. Observamus tantum, bellissimam proprietatem, quae pro reliquis modulis locum habeat, quod scilicet semper exstant numeri quorum periodus omnes numeros ad modulum primos complectatur, hic deficere, excepto unico casu, quando scilicet modulus est duplum numeri primi, aut potestatis numeri primi. Si enim modulus m redigitur ad formam $A^\alpha B^\beta C^\gamma$ etc., designantibus A, B, C etc. numeros

primos diversos, praeterea $A^{\alpha-1}(A-1)$ designatur per a , $B^{\beta-1}(B-1)$ per b etc. denique z est numerus ad m primus; erit $z^a \equiv 1 \pmod{A^\alpha}$, $z^b \equiv 1 \pmod{B^\beta}$ etc. Quodsi igitur f est minimus numerorum a , b , c etc. dividiuus communis, erit $z^f \equiv 1$ secundum omnes modulus A^α , B^β etc. adeoque etiam secundum m , cui illorum productum est aequale. At excepto casu, ubi m est duplum numeri primi aut potestatis numeri primi numerorum a , b , c etc. dividiuus communis minimus, ipsorum productum est minor (quoniam numeri a , b , c etc. inter se primi esse nequeunt sed certe divisorem 2 communem habent). Nullius itaque numeri periodus tot terminos comprehendere potest, quot dantur numeri ad modulum primi ipsoque minores, quia horum numerus productum ex a , b , c etc. est aequalis.

Ita ex. gr. pro $m = 1001$ cuiusvis numeri ad m primi potestas exponentis 60 unitati est congrua, quia 60 est dividiuus communis numerorum 6, 10, 12. Casus autem ubi modulus est duplum numeri primi aut duplum potestatis numeri primi, illi ubi est primus aut primi potestas, prorsus est similis.

93.

Scriptorum in quibus alii geometrae de argumento in hac sectione pertractato egerunt, iam passim mentio est facta. Eos tamen qui quaedam fusius, quam nobis brevitatis permisit, explicata desiderant, ablegamus imprimis ad sequentes ill. Euleri commentationes, ob perspicuitatem, qua vir summus prae omnibus semper excelluit, maxime commendabiles:

Theoremata circa residua ex divisione potestatum relict. Comm. nov. Petr. T. VII p. 49 sqq.

Demonstrationes circa residua ex divisione potestatum per numeros primos resultantia. Ibid. T. XVIII; p. 85 sqq.

Adiungi his possunt Opusculorum analyt. T. I, dissertt. 5 et 8.

SECTIO QUARTA

DE CONGRUENTIIS SECUNDI GRADUS.

Residua et non-residua quadratica.

94.

THEOREMA. Numero quocunque m pro modulo accepto, ex numeris 0, 1, 2, 3, ..., $m-1$, plures quam $\frac{1}{2}m+1$, quando m est par, sive plures quam $\frac{1}{2}(m+1)$, quando m est impar, quadrato congrui fieri non possunt.

DEM. Quoniam numerorum congruorum quadrata sunt congrua: quivis numerus, qui ulli quadrato congruus fieri potest, etiam quadrato alicui cuius radix $< \frac{1}{2}m$ congruus erit. Sufficit itaque residua minima quadratorum 0, 1, 4, 9, ..., $(m-1)^2$ considerare. At facile perspicitur, esse $(m-1)^2 \equiv 1^2$, $(m-2)^2 \equiv 2^2$, $(m-3)^2 \equiv 3^2$ etc. Hinc etiam, quando m est par, quadratorum $(\frac{1}{2}m-1)^2$ et $(\frac{1}{2}m+1)^2$, $(\frac{1}{2}m-2)^2$ et $(\frac{1}{2}m+2)^2$ etc. residua minima eadem erunt: quando vero m est impar, quadrata $(\frac{m-1}{2}-1)^2$ et $(\frac{m+1}{2}+1)^2$, $(\frac{m-1}{2}-2)^2$ et $(\frac{m+1}{2}+2)^2$ etc. erunt congrua. Unde palam est, alios numeros, quam qui alicui ex quadratis 0, 1, 4, 9, ..., $(\frac{1}{2}m)^2$ congrui sint, quadrato congruos fieri non posse, quando m par; quando vero impar, quemvis numerum, qui ulli quadrato sit congruus, alicui ex his 0, 1, 4, 9, ..., $(\frac{m-1}{2})^2$ necessario congruum esse. Quare dabuntur ad summum in priori casu $\frac{1}{2}m+1$ residua minima diversa, in posteriori $\frac{1}{2}(m+1)$. Q. E. D.

EXEMPLUM. Secundum modulum 13 quadratorum numerorum 0, 1, 2, 3, ..., 6 residua minima inveniuntur 0, 1, 4, 9, 3, 12, 10, post haec vero eadem ordine inverso recurrunt

10, 12, 3 etc. Quare numerus quisque, nulli ex istis residuis congruus, sive qui alicui ex his est congruus, 2, 5, 6, 7, 8, 11, nulli quadrato congruus esse potest.

Secundum modulum 15 haec inveniuntur residua 0, 1, 4, 9, 1, 10, 6, 4, post quae eadem ordine inverso recurrunt. Hic igitur numerus residuorum, quae quadrato congrua fieri possunt, minor adhuc est quam $\frac{1}{2}m + \frac{1}{2}$, quum sint 0, 1, 4, 6, 9, 10. Numeri autem 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et qui horum alicui sunt congrui, nulli quadrato secundum mod. 15 congrui fieri possunt.

95.

Hinc colligitur, pro quovis modulo omnes numeros in duas classes distingui posse, quarum altera contineat numeros, qui quadrato alicui congrui fieri possint, altera eos, qui non possint. Illos appellabimus *residua quadratica* numeri istius quem pro modulo accepimus⁶, hos vero ipsius *non-residua quadratica*, sive etiam, quoties ambiguitas nulla inde oriri potest, simpliciter *residua* et *non-residua*. Ceterum palam est sufficere, si omnes numeri 0, 1, 2, ..., $m - 1$ in classes redacti sint: numeri enim congrui ad eandem classem erunt referendi.

Etiam in hac disquisitione a modulis primis initium faciemus, quod itaque subintelligendum erit, etiam si expressis verbis non moneatur. Numerus primus 2 autem excludendus, sive numeri primi impares tantum considerandi.

Quoties modulus est numerus primus, multitudo residuorum ipso minorum multitudini non-residuorum aequalis.

96.

Número primo p pro modulo accepto, numerorum 1, 2, 3, ..., $p - 1$ semissis erunt residua quadratica, reliqui non-residua, i. e. dabuntur $\frac{1}{2}(p - 1)$ residua totidemque non-residua.

Facile enim probatur, omnia quadrata 1, 4, 9, ..., $(\frac{p-1}{2})^2$ esse incongrua. Scilicet si fieri posset $r^2 \equiv r'^2 \pmod{p}$ atque numeri r, r' inaequales et non maiores quam $\frac{1}{2}(p - 1)$ posito i. q. licet $r > r'$, fieret $(r - r')(r + r')$ positivus et per p divisibilis. At uterque factor $r - r'$, et $r + r'$ ipso p est minor, quare suppositio consistere nequit (art. 13). Habentur itaque $\frac{1}{2}(p - 1)$ residua quadratica inter hos numeros 1, 2, 3, ..., $p - 1$ contenta; plura vero inter ipsos esse nequeunt, quia accedente residuo 0 prodeunt $\frac{1}{2}(p + 1)$, quem numerum omnium residuorum multitudo superare nequit. Quare reliqui numeri erunt non-residua horumque multitudo = $\frac{1}{2}(p - 1)$.

Quum cifra semper sit residuum, hanc numerosque per modulum divisibiles ab investigationibus his excludimus, quia hic casus per se est clarus, theorematumque concinnitatem tantum turbaret. Ex eadem caussa etiam modulum 2 exclusimus.

97.

Quum plura quae in hac Sect. exponemus, etiam ex principiis Sect. praec. derivari possint, neque inutile sit, eandem veritatem per methodos diversas perscrutari, hunc nexum ostendemus. Facile vero intelligitur, omnes numeros quadrato congruos, indices pares habere, eos contra, qui quadrato nullo modo congrui fieri possint, impares. Quia vero

⁶Proprie quidem hic casu secundo alio sensu utimur, quam hucusque fecimus. Dicere scilicet oporteret, r esse residuum quadrati aa secundum modulum m quando $r \equiv aa \pmod{m}$; at brevitatis gratia in hac sectione semper r ipsius m residuum quadraticum vocamus neque hinc ulla ambiguitas metuenda. Expressionem enim, residuum, quando idem significat quod numerus congruus, abhinc non adhibebimus, nisi forte de residuis minimis sermo sit, ubi nullum dubium esse potest.

$p - 1$ est numerus par, tot indices pares erunt quot impares, scilicet $\frac{1}{2}(p - 1)$, totidemque tum residua tum non-residua dabuntur.

EXEMPLA. Pro modulis

3	sunt residua 1
5	1, 4
7	1, 2, 4
11	1, 3, 4, 5, 9
13	1, 3, 4, 9, 10, 12
17	1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16 etc.

reliqui vero numeri his modulis minores, non-residua.

Quaestio, utrum numerus compositus residuum numeri primi dati sit an non-residuum, ab indole factorum pendet.

98.

THEOREMA. Productum e duobus residuis quadraticis numeri primi p , est residuum; productum e residuo in non-residuum, est non-residuum; denique productum e duobus non-residuis, residuum.

DEMONSTR. I. Sint A, B residua e quadratis aa, bb oriunda sive $A \equiv aa, B \equiv bb$, eritque productum AB quadrato numeri ab congruum e. residuum.

II. Quando A est residuum puta $A \equiv aa, B$ vero non-residuum, AB erit non-residuum. Ponatur enim, si fieri potest, $AB \equiv kk$, sitque valor expressionis $\frac{k}{a} \pmod{p} = b$; erit itaque $aaB \equiv aabb$, unde $B \equiv bb$, i. e. B residuum contra hyp.

Aliter. Multiplicentur omnes numeri, qui inter hos $1, 2, 3, \dots, p - 1$ sunt residua (quorum multitudo $= \frac{1}{2}(p - 1)$), per A , omniaque producta erunt residua quadratica, et quidem erunt omnia incongrua. Iam si non-residuum B per A multiplicatur, productum nulli productorum quae iam habentur congruum erit; quare si residuum esset, haberentur $\frac{1}{2}(p + 1)$ residua incongrua, inter quae nondum est residuum 0, contra art. 96.

III. Sint A, B non-residua. Multiplicentur omnes numeri, qui inter hos $1, 2, 3, \dots, p - 1$ sunt residua, per A , habebunturque $\frac{1}{2}(p - 1)$ non-residua inter se incongrua (II); iam productum AB nulli illorum congruum esse potest; quodsi igitur esset non-residuum, haberentur $\frac{1}{2}(p + 1)$ non-residua inter se incongrua, contra art. 96. Quare productum etc. Q. E. D.

Facilius adhuc haec theorematata e principiis sect. praec. derivantur. Quia enim residuorum indices semper sunt pares, non-residuorum vero impares, index producti e duobus residuis vel non-residuis erit par, adeoque productum ipsum, residuum. Contra index producti e residuo in non-residuum erit impar adeoque productum ipsum non-residuum.

Utraque demonstrandi methodus etiam pro his theorematibus adhiberi potest: Expressionis $\frac{a}{b} \pmod{p}$ valor erit residuum, quando numeri a, b simul sunt residua, vel simul non-residua; contra autem erit non-residuum, quando numerorum a, b alter est residuum, alter non-residuum. Possunt etiam ex conversione theorr. praec. obtineri.

99.

Generaliter, productum ex quotcunque factoribus est residuum tum quando omnes sunt residua, tum quando non-residuorum, quae inter eos occurrunt, multitudo est par; quando vero multitudo non-residuorum quae inter factores reperiuntur, est impar, productum erit non-residuum. Facile itaque diiudicari potest, utrum numerus compositus sit residuum necne, si modo, quid sint singuli ipsius factores constet. Quamobrem in tabula II numeros primos tantummodo recepimus.

Oeconomia huius tabulae haec est. In margine positi sunt moduli⁷, in facie vero numeri primi successivi; quando ex his aliquis fuit residuum moduli alicuius, in spatio utrique respondente lineola collocata est, quando vero numerus primus fuit non-residuum moduli, spatium respondens vacuum mansit.

De modulis, qui sunt numeri compositi.

100.

Antequam ad difficiliora progrediamur, quaedam de modulis non primis adiicienda sunt.

Si numeri primi p , potestas aliqua p^n pro modulo assumitur (ubi p non esse 2 supponimus), omnium numerorum per p non divisibilium moduloque minorum altera semissis erunt residua, altera non-residua, i. e. utrorumque multitudo $= \frac{1}{2}(p-1)p^{n-1}$.

Si enim r est residuum: quadrato alicui congruus erit, cuius radix moduli dimidium non superat, vid. art. 94. Iam facile perspicitur, dari $\frac{1}{2}(p-1)p^{n-1}$ numeros per p non divisibiles modulique semisse minores; superest itaque ut demonstretur omnium horum numerorum quadrata incongrua esse, sive residua quadratica diversa suppeditare. Quodsi duorum numerorum a, b per p non divisibilium modulique semisse minorum quadrata essent congrua, foret $aa \equiv bb$ sive $(a-b)(a+b)$ per p^n divisibilis (posito i. q. licet $a > b$). Hoc vero fieri non potest, nisi vel alter numerorum $a-b, a+b$ per p^n fuerit divisibilis, quod fieri nequit, quoniam uterque $< p^n$, vel alter per p , alter vero per p^{n-1} , i. e. uterque per p . Sed etiam hoc fieri nequit. Manifesto enim etiam summa et differentia $2a$ et $2b$ per p foret divisibilis adeoque etiam a et b contra hyp. Hinc tandem colligitur inter numeros per p non divisibiles moduloque minores $\frac{1}{2}(p-1)p^{n-1}$ residua dari, reliquos quorum multitudo aequae magna, esse non-residua. Q. E. D. — Potest etiam theorema hoc ex consideratione indicum derivari simili modo ut art. 97.

101.

Quivis numerus per p non divisibilis, qui ipsius p est residuum, erit residuum etiam ipsius p^n ; qui vero ipsius p est non-residuum, etiam ipsius p^n non-residuum erit.

Pars posterior huius propositionis per se est manifesta. Si itaque prior falsa esset, inter numeros ipso p^n minores simulque per p non divisibiles plures forent residua ipsius p quam ipsius p^n , i. quam $\frac{1}{2}p^{n-1}(p-1)$. Nullo vero negotio perspicui poterit, multitudinem residuorum numeri p inter illos numeros esse praecise $= \frac{1}{2}p^{n-1}(p-1)$.

Aequae facile est, quadratum reipsa invenire, quod secundum modulum p^n residuo dato sit congruum, si quadratum huic residuo secundum modulum p congruum habetur.

Scilicet si quadratum habetur, aa , quod residuo dato A secundum modulum p^α est congruum, deducitur inde quadratum ipsi A secundum modulum $p^{2\alpha}$ congruum (ubi $\nu \geq \alpha$ et $= \nu$ vel $< 2\alpha$ supponitur) sequenti modo. Ponatur radix quadrati quaesiti $= \pm a + xp^\nu$, quam formam eam habere debere facile perspicitur; debetque esse $aa \pm 2axp^\nu + xxp^{2\nu} \equiv A \pmod{p^{2\alpha}}$ sive propter $2\nu > \nu$, $A - aa \equiv \pm 2axp^\nu \pmod{p^{2\alpha}}$. Sit $A - aa = p^\nu d$, eritque valor expressionis $\frac{d}{\pm 2a} \pmod{p^{2\alpha-\nu}}$, quae huic $\frac{d}{\pm 2a} \pmod{p^\nu}$ aequivalet.

Dato igitur quadrato ipsi A secundum p congruo deducitur inde quadratum ipsi A secundum modulum p^2 congruum hinc ad modulum p^4 , hinc ad p^8 etc. ascendi poterit.

Ex. Proposito residuo 6, quod secundum modulum 5 quadrato 1 congruum, invenitur quadratum 9, cui secundum 25 est congruum, 16, cui secundum 125 congruum etc.

102.

⁷Quomodo etiam modulis compositis carere possimus, mox docebimus.

Quod vero attinet ad numeros per p divisibiles, patet, eorum quadrata per pp fore divisibilia, adeoque omnes numeros per p quidem divisibiles, neque vero per pp , ipsius p^n fore non-residua. Generaliter vero, si proponitur numerus $p^k A$, ubi A per p non est divisibilis, hi casus erunt distinguendi.

1) Quando $k \geq n$ vel $k = n$, erit $p^k A \equiv 0 \pmod{p^n}$, i. e. residuum.

2) Quando $k < n$ atque impar, erit $p^k A$ non-residuum.

Si enim esset $p^k A \equiv p^k ss \pmod{p^n}$, ss per p^{n-k} divisibilis esset, id quod aliter fieri nequit, quam si fuerit s^2 per p^{n-k} divisibilis. Tunc vero ss etiam per p^{n-k+1} divisibilis, adeoque etiam (quia $2x + 2$ certo non maior quam n) $p^k A$, i. e. $p^{2x+2} A$; sive A per p , contra hyp.

3) Quando $k < n$ atque par. Tum $p^k A$ erit residuum vel non-residuum ipsius p^n , prout A est residuum vel non-residuum ipsius p . Quando enim A est residuum ipsius p , erit etiam residuum ipsius p^{n-k} . Posito autem $A \equiv aa \pmod{p^{n-k}}$ erit $Ap^k \equiv aap^k \pmod{p^n}$, aap^k vero est quadratum. Quando autem A est non-residuum ipsius p , $p^k A$ residuum ipsius p^n esse nequit. Ponatur enim $p^k A \equiv aa \pmod{p^n}$, eritque necessario aa per p^k divisibilis. Quotiens erit quadratum, cui A secundum modulum p^{n-k} adeoque etiam secundum modulum p congruus, i. e. A erit residuum ipsius p contra hyp.

103.

Quoniam casum $p = 2$ exclusimus, de hoc adhuc quaedam dicenda. Quando numerus 2 est modulus, numerus quicunque erit residuum, non-residua nulla erunt. Quando vero 4 est modulus, omnes numeri impares formae $4h + 1$ erunt residua, omnes vero formae $4h + 3$ non-residua. Tandem quando 8 aut altior potestas numeri 2 est modulus, omnes numeri impares formae $8h + 1$ erunt residua, reliqui vero, seu ii qui sunt formarum $8h + 3$, $8h + 5$, $8h + 7$ erunt non-residua.

Pars posterior huius propositionis inde clara, quod quadratum cuiusvis numeri imparis, sive sit formae $4k + 1$, sive formae $4k - 1$, fit formae $8h + 1$. Priorem ita probamus.

1) Si duorum numerorum vel summa vel differentia per 2^{n-1} est divisibilis, numerorum quadrata erunt congrua secundum modulum 2^n . Si enim alter ponitur $= a$, erit alter formae $2^{n-1}h + a$, cuius quadratum invenitur $\equiv aa \pmod{2^n}$.

2) Quivis numerus impar, qui ipsius 2^n est residuum quadraticum, congruus erit quadrato alicui, cuius radix est numerus impar et $< 2^{n-2}$. Sit enim quadratum quodcunque, cui numerus ille congruus, aa atque numerus $a \equiv \pm \tilde{a} \pmod{2^{n-2}}$, ita ut $\tilde{a}$ moduli semissem non superet (art. 4), eritque $aa \equiv \tilde{a}\tilde{a}$. Quare etiam numerus propositus erit $\tilde{a}\tilde{a}$. Manifesto vero tum a tum $\tilde{a}$ erunt impares atque $\tilde{a} < 2^{n-2}$.

3) Omnium numerorum imparium ipso 2^{n-2} minorum quadrata secundum 2^n incongrua erunt. Sint enim duo tales numeri r et s , quorum quadrata si secundum 2^n essent congrua, foret $(r - s)(r + s)$ per 2^n divisibilis (posito $r > s$). Facile vero perspicitur numeros $r - s$, $r + s$ simul per 4 divisibiles esse non posse, quare si alter tantummodo per 2 est divisibilis, alter, ut productum per 2^n divisibilis fieret, per 2^{n-1} divisibilis esse deberet, Q. E. A. quoniam uterque $< 2^{n-1}$.

4) Quodsi denique haec quadrata ad residua sua minima positiva reducuntur, habebuntur 2^{n-3} residua quadratica diversa modulo minora⁸, quorum quodvis erit formae $8h + 1$. Sed quum praecise 2^{n-3} numeri formae $8h + 1$ modulo minores exstent, necessario hi omnes inter illa residua reperientur. Q. E. D.

Ut quadratum numero dato formae $8h + 1$ secundum modulum 2^n congruum inveniatur, methodus similis adhiberi potest ut in art. 101: vid. etiam art. 88. — Denique de numeris paribus eadem valent, quae art. 102 generaliter exposuimus.

⁸Putat quoniam multitudo numerorum imparium infra 2^{n-2} est 2^{n-3} .

104.

Circa multitudinem valorum diversorum (i.e. secundum modulum incongruorum), quos expressio talis $V = \sqrt{A} \pmod{p^n}$ admittit, siquidem A est residuum ipsius p^n , facile e praec. colliguntur haec. (Numerum p supponimus esse primum, ut ante, et brevitatis caussa casum $n = 1$ statim includimus).

I. V unum valorem habet pro $p = 2, n = 1$ puta $V = 1$; vel si A per p non est divisibilis, duos, quando p est impar, nec non pro $p = 2, n = 2$, puta ponendo unum $= v$, alter erit $= -v$; quatuor pro $p = 2, n > 2$, scilicet ponendo unum $= v$, reliqui erunt $-v, 2^{n-1} - v, 2^{n-1} + v$.

II. Si A per p divisibilis est, neque vero per p^2 , sit potestas altissima ipsius p ipsum A metiens $p^{2\lambda}$ (manifeste enim ipsius exponens par esse debebit) atque $A = ap^{2\lambda}$. Tunc patet, omnes valores ipsius V per p^λ divisibiles esse, et quotientes e divisione ortos fieri valores expr. $V' = \sqrt{a} \pmod{p^{n-2\lambda}}$; hinc omnes valores diversi ipsius V prodibunt, multiplicando omnes valores expr. V' inter 0 et $p^{n-2\lambda}$ sitos per p^λ ; quare illi exhibebuntur per

$$vp^\lambda, \quad vp^\lambda + p^{n-\lambda}, \quad vp^\lambda + 2p^{n-\lambda}, \quad \dots \quad vp^\lambda + (p^\lambda - 1)p^{n-\lambda},$$

si V' indefinite omnes valores diversos expr. V' exprimit, ita ut illorum multitudo fiat $p^\lambda, 2p^\lambda$ vel $4p^\lambda$, prout multitudo horum (per casum I) est 1, 2 vel 4.

III. Si A per p^{2n} divisibilis est, facile perspicietur, statuendo $n = 2m$ vel $= 2m - 1$ prout par est vel impar, omnes numeros per p^m divisibiles, neque ullos alios, esse valores ipsius V ; quare omnes valores diversi hi erunt 0, $p^m, 2p^m, \dots, (p^{n-m} - 1)p^m$, quorum multitudo p^{n-m} .

Criterion generale, utrum numerus datus numeri primi dati residuum sit an non-residuum.

105.

Superest casus, ubi modulus m e pluribus numeris primis compositus est. Sit $m = abc\dots$, designantibus a, b, c etc. numeros primos diversos aut primorum diversorum potestates, patetque statim, si n sit residuum ipsius m , fore etiam n residuum singulorum a, b, c etc., adeoque n certo non-residuum ipsius m esse, si fuerit non-residuum ullius e numeris a, b, c etc. Vice versa autem, si n singulorum a, b, c etc. residuum est, etiam residuum producti m erit. Supponendo enim, $n \equiv A^2, B^2, C^2$ etc. sec. mod. a, b, c etc. resp., patet, si numerus N ipsis A, B, C etc. sec. mod. a, b, c etc. resp. congruus eruatur (art. 32), fore $n \equiv NN$ secundum omnes hos modulus adeoque etiam secundum productum m . — Quum facile perspiciatur, hoc modo e combinatione cuiusvis valoris ipsius A sive expr. $\sqrt{n} \pmod{a}$ cum quovis valore ipsius B cum quovis valore ipsius C etc. oriri valorem ipsius N sive expr. $\sqrt{n} \pmod{m}$, nec non e combinationibus diversis produci diversos N , et e cunctis cunctos: multitudo omnium valorum diversorum ipsius N aequalis erit producto e multitudinibus valorum ipsorum A, B, C etc., quas determinare in art. praec. docuimus. Porro manifestum est, si unus valor expressionis $\sqrt{n} \pmod{m}$ sive ipsius N fuerit notus, hunc simul fore valorem omnium A, B, C etc.; et quum hinc per art. praec. omnes reliqui valores harum quantitatum deduci possint, facile sequitur, ex uno valore ipsius N omnes reliquos obtineri posse.

Ex. Sit modulus 315, cuius residuum an non-residuum sit 46, quaeritur. Divisores primi numeri 315 sunt 3, 5, 7, atque numerus 46 residuum cuiusvis eorum quare etiam ipsius 315 erit residuum. Porro, quia $46 \equiv 1, et = 64 \pmod{9}; \equiv 1 et \equiv 16 \pmod{5}; \equiv 4$

et $\equiv 25 \pmod{7}$, inveniuntur radices quadratorum, quibus 46 secundum modulum 315 congruus, 19, 26, 44, 89, 226, 271, 289, 296.

106.

Ex praecedentibus colligitur, si tantummodo semper dignosci posset, utrum numerus primus datus numeri primi dati residuum sit an non-residuum, omnes reliquos casus ad hunc reduci posse. Pro illo itaque casu criteria certa omni studio nobis erunt indaganda. Antequam autem hanc perquisitionem aggrediamur, criterium quoddam exhibemus ex Sect. praec. petitum, quod quamvis in praxi nullum fere usum habeat, tamen propter simplicitatem atque generalitatem memoratu dignum est.

Numerus quicumque A per numerum primum $2m + 1$ non divisibilis, huius primi residuum est vel non-residuum prout $A^m \equiv +1$ vel $\equiv -1 \pmod{2m + 1}$.

Sit enim pro modulo $2m + 1$, A index $= a$, in systemate quocunque; eritque a par, quando A est residuum ipsius $2m + 1$, impar vero quando A non-residuum. At numeri A^m index erit ma , i.e. vel $\equiv 0 \pmod{2m}$, vel $\equiv m \pmod{2m}$, prout a par vel impar. Hinc denique A^m in priori casu erit $+1$, in posteriori vero $-1 \pmod{2m + 1}$. V. artt. 57, 62.

Ex. 3 ipsius 13 est residuum, quia $3^6 \equiv +1 \pmod{13}$; 2 vero ipsius non-residuum, quoniam $2^6 \equiv -1 \pmod{13}$.

At quoties numeri examinandi mediocriter sunt magni, hoc criterium ob calculi immensitatem prorsus inutile erit.

Disquisitiones de numeris primis quorum residua aut non-residua sint numeri dati.

107.

Facillimum quidem est, proposito modulo, omnes assignare numeros, qui ipsius residua sunt vel non-residua. Scilicet si ille numerus ponitur $= m$, determinari debent quadrata, quorum radices semissem ipsius m non superant, sive etiam numeri bis quadratis secundum m congrui (ad praxin methodi adhuc expeditiores dantur), tuncque omnes numeri horum alicui secundum m congrui, erunt residua ipsius m , omnes autem numeri nulli istorum congrui erunt non-residua. At quaestio inversa, proposito numero aliquo, assignare omnes numeros, quorum ille sit residuum vel non-residuum, multo altioris est indaginis. Hoc itaque problema, a cuius solutione illud quod in art. praec. nobis proposuimus pendet, in sequentibus perscrutabimur, a casibus simplicissimis inchoantes.

Residuum -1 .

108.

THEOREMA. Omnium numerorum primorum formae $4n + 1$, -1 est residuum quadraticum, omnium vero numerorum primorum formae $4n + 3$ non-residuum.

Ex. -1 est residuum numerorum 5, 13, 17, 29, 37, 41, 53, 61, 73, 89, 97 etc., e quadraticis numerorum 2, 5, 4, 12, 6, 9, 23, 11, 27, 34, 22 etc. respective oriundum; contra non-residuum est numerorum 3, 7, 11, 19, 23, 31, 43, 47, 59, 67, 71, 79, 83 etc.

Mentionem huius theor. iam in art. 64 fecimus. Demonstratio vero facile ex art. 16 petitur. Etenim pro numero primo formae $4n + 1$ est $(-1)^{2n} \equiv +1$, pro numero autem formae $4n + 3$ habetur $(-1)^{2n+1} \equiv -1$. Convenit haec demonstratio cum ea, quam l. c. tradidimus. Sed propter theorematis elegantiam atque utilitatem non superfluum erit, alio adhuc modo idem ostendisse.

109.

Designemus complexum omnium residuorum numeri primi p , quae ipso p sunt minora, excluso residuo 0, per litteram C , et quoniam horum residuorum multitudo semper $= \frac{p-1}{2}$, manifestum est, eam fore parem, quoties p sit formae $4n+1$, imparem vero, quoties p sit formae $4n+3$. Dicantur, ad instar art. 77, ubi de numeris in genere agebatur, residua *socia* talia, quorum productum $\equiv 1 \pmod{p}$; manifeste enim si r est residuum, etiam $\frac{1}{r} \pmod{p}$ residuum erit. Et quoniam idem residuum plura socia inter residua C habere nequit, patet, omnia residua C in classes distribui posse, quarum quaevis bina residua socia contineat. Iam perspicuum est, si nullum residuum daretur, quod sibi ipsi esset socium, i. e. si quaevis classis bina residua inaequalia contineret, omnium residuorum numerum fore duplum numeri omnium classium; quodsi vero aliqua dantur residua sibi ipsis socia i. e. aliquae classes, quae unicum tantum residuum aut, si quis malit, idem residuum bis continent, posita harum classium multitudine $= a$, reliquarumque multitudine $= b$; erit omnium residuorum C numerus $= a + 2b$. Quare quando p est formae $4n+1$, erit a numerus par; quando autem p est formae $4n+3$, erit a impar. At numeri ipso p minores alii, quam 1 et $p-1$, sibi ipsis socii esse nequeunt (vid. art. 77); priorque 1 certo inter residua occurrit; unde in priori casu $p-1$ (seu quod hic idem valet, -1) debet esse residuum, in posteriori vero non-residuum; alias enim in illo casu foret $a = 1$, in hoc autem $= 2$, quod fieri nequit.

110.

Etiam haec demonstratio ill. Euleri debetur, qui et priorem primus invenit V. Opusc. Anal. T. I. p. 125. — Facile quisquis videbit eam similibus principiis innixam esse, ut demonstratio nostra secunda theor. Wilsoniani art. 77. Si vero hoc theorema supponere velimus, facilius adhuc demonstratio exhiberi poterit. Scilicet inter numeros 1, 2, 3, ..., $p-1$ erunt $\frac{p-1}{2}$ residua quadratica ipsius p totidemque non-residua; quare non-residuorum multitudo erit par, quando p est formae $4n+1$; impar, quando p est formae $4n+3$. Hinc productum ex omnibus numeris 1, 2, 3, ..., $p-1$ in priori casu erit residuum, in posteriori non-residuum (art. 99). At productum hoc semper $\equiv -1 \pmod{p}$; adeoque etiam -1 in priori casu residuum, in posteriori non-residuum erit.

111.

Si itaque r est residuum numeri alicuius primi formae $4n+1$, etiam $-r$ huius primi residuum erit; omnia autem talis numeri non-residua, etiam signo contrario sumta non-residua manebunt⁹. Contrarium evenit pro numeris primis formae $4n+3$, quorum residua quando signum mutatur, non-residua fiunt et vice versa, vid. art. 98.

Ceterum facile ex praecedentibus derivatur regula generalis: -1 est residuum omnium numerorum, qui neque per 4 neque per ullum numerum primum formae $4n+3$ dividi possunt; omnium reliquorum non-residuum. V. artt. 103 et 105.

Residua $+2$ et -2 .

112.

Progredimur ad residua $+2$ et -2 .

Si ex tabula II colligimus omnes numeros primos, quorum residuum est $+2$, hos habebimus: 7, 17, 23, 31, 41, 47, 71, 73, 79, 89, 97. Facile autem animadvertitur, inter hos numeros nullos inveniri formarum $8n+3$ et $8n+5$.

Videamus itaque, num haec inductio ad certitudinem evehi possit.

⁹Quando igitur de numero quocunque loquemur quatenus numeri formae $4n+1$ residuum vel non-residuum est, ipsius signum omnino negligere sive etiam signum anceps $+$ ipsi tribuere poterimus.

Primum observamus, quemvis numerum compositum formae $8n+3$ vel $8n+5$ necessario factorem primum alterutrius formae $8n+3$ vel $8n+5$, involvere; manifesto enim e solis numeris primis formarum $8n+1$, $8n+7$, alii numeri quam qui sunt formae $4n+1$ vel $4n+3$, componi nequeunt. Quodsi itaque inductio nostra generaliter est vera, nullus omnino numerus formae

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 1, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

Fünfter Abschnitt. De congruentiis secundi gradus.

122.

Omnium igitur numerorum primorum, qui simul sunt ipsius 5 non-residua simulque formae $4n + 1$, i. e. omnium numerorum primorum formae $20n + 1$ vel $20n + 9$, tum $+5$ quam -5 non-residua erunt; omnium autem numerorum primorum formae $20n + 3$ vel $20n + 7$, non-residuum erit $+5$, residuum -5 .

Potest vero prorsus simili modo demonstrari, -5 esse non-residuum omnium numerorum primorum formarum $10n + 11$, $20n + 13$, $20n + 17$, $20n + 19$, facileque perspicitur hinc sequi $+5$ esse residuum omnium numerorum primorum formae $20n + 1$ vel $20n + 9$, non-residuum autem omnium formae $20n + 13$ vel $20n + 17$. Et quoniam quivis numerus primus, praeter 2 et 5 (quorum residuum $+5$), in aliqua harum formarum continetur $20n + 1$, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, patet, de omnibus iam iudicium ferri posse, exceptis iis, qui sint formae $20n + 1$ vel formae $20n + 9$.

123.

Ex inductione facile deprehenditur $+5$ et -5 esse residua omnium numerorum primorum formae $20n + 1$ vel $20n + 9$. Quodsi hoc generaliter verum est, lex elegans habebitur, $+5$ esse residuum omnium numerorum primorum, qui ipsius 5 sint residua, (hi enim in alterutra formarum $5n + 1$ vel $5n + 4$ sive in aliqua harum $20n + 1$, 9, 11, 19, continentur, de quarum tertia et quarta illud iam ostensum est) non-residuum vero omnium numerorum imparium, qui ipsius 5 sint non-residua, ut iam supra demonstravimus. Clarum autem est, hoc theorema sufficere, ad diiudicandum, utrum $+5$ (eoque ipso, -5 , si tamquam productum ex $+5$ et -1 consideretur) numeri cuiuscunque dati residuum sit an non-residuum. Denique observetur huius theorematis cum illo, quod art. 120 de residuo $+3$ exposuimus, analogia.

At verificatio illius inductionis non adeo facilis. Quando numerus primus formae $20n + 1$, sive generalius formae $5n + 1$ proponitur, res simili modo ab-solvi potest, ut in artt. 114, 119. Sit scilicet numerus quicunque pro modulo $5n + 1$ ad exponentem 5 pertinens a , quales dari ex Sect. praec. manifestum, eritque $a^5 \equiv 1$, sive $(a - 1)(a^4 + a^3 + a^2 + a + 1) \equiv 0 \pmod{5n + 1}$. At quia n nequit esse $= 1$, neque adeo $a - 1 \equiv 0$; necessario erit $a^4 + a^3 + a^2 + a + 1 \equiv 0$. Quare etiam $4(a^4 + a^3 + a^2 + a + 1) = (2a^2 + a + 2)^2 - 5a^2$ erit $\equiv 0$, i.e. $5a^2$ erit residuum ipsius $5n + 1$, adeoque etiam 5, quia a^2 est residuum per $5n + 1$ non divisibile [a enim per $5n + 1$ non divisibilis propter $n > 1$]. Q. E. D.

At casus, ubi numerus primus formae $5n + 4$ proponitur, subtiliora artificia postulat. Quoniam vero propositiones, quarum ope negotium absolvitur, in sequentibus generalius tractabuntur hic breviter tantum eas attingimus.

I. Si p est numerus primus atque b non-residuum quadraticum datum ipsius p , valor expressionis

$$\frac{(x + \sqrt{b})^{p+1} - (x - \sqrt{b})^{p+1}}{\sqrt{b}}$$

(ex qua evoluta irrationalitatem abire facile perspicitur), semper per p divisibilis erit, quicumque numerus pro x assumatur. Patet enim ex inspectione coefficientium, qui ex evolutione ipsius obtinentur, omnes terminos a secundo usque ad penultimum (incl.) per p divisibiles fore, adeoque esse

$$\equiv 2 \left(\binom{p+1}{1} x^p + \binom{p+1}{3} x^{p-2} b + \dots \right) \pmod{p}.$$

At quoniam b ipsius p non-residuum est, erit $b^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$ (art. 106); x^p autem semper $\equiv x$ (Sect. praec.), unde fit $\equiv 0$. Q. E. D.

II. In congruentia $x^{p+1} - b^{\frac{p+1}{2}} \equiv 0 \pmod{p}$, indeterminata x habet p dimensiones omnesque numeri $0, 1, 2, \dots, p-1$ illius radices erunt. Iam ponatur e esse divisorem ipsius $p+1$; eritque expressio

$$\frac{(x + \sqrt{b})^e - (x - \sqrt{b})^e}{\sqrt{b}}$$

(quam per B designemus) si evolvitur, ab irrationalitate libera, indeterminata x in ipsa $e-1$ dimensiones habebit, constatque ex analyseos primis elementis, $A^{p+1} - B^{\frac{p+1}{e}}$ per B (indefinite) esse divisibilem. Iam dico $e-1$ valores ipsius x dari, quibus in substitutis, B per p divisibilis evadat. Ponatur enim $A^{p+1} - B^{\frac{p+1}{e}} = BC$, habebitque C in x dimensiones $p-e+1$, adeoque congruentia $C \equiv 0 \pmod{p}$ non plures quam $p-e+1$ radices. Unde facile patet, omnes reliquos numeros ex his $0, 1, 2, 3, \dots, p-1$, quorum multitudo $e-1$, congruentiae radices fore.

III. Iam ponatur p esse formae $5n+4$, $e=b$, b non-residuum ipsius p , atque numerum a ita determinatum ut sit $a^2 \equiv b \pmod{p}$.

124.

Per similem methodum demonstratur -7 esse non-residuum cuiusvis numeri qui ipsius 7 sit non-residuum.

Ex inductione vero concludi potest, $+7$ esse residuum cuiusvis numeri primi qui ipsius 7 sit residuum.

At hoc a nemine hactenus rigorose demonstratum. Pro iis quidem residuis ipsius 7 , quae sunt formae $4n+1$, facilis est demonstratio; etenim per methodum ex praec. abunde notam ostendi potest, $+7$ semper esse talium numerorum primorum non-residuum, adeoque -7 residuum. Sed parum hinc lucramur: reliqui enim casus per hanc methodum tractari nequeunt. Unum quidem adhuc casum simili modo ut artt. 119, 123 absolvere possumus. Scilicet si p est numerus primus formae $7n+1$, atque a pro modulo p ad exponentem 7 pertinens, facile perspicitur

$$1 + a + a^2 + a^3 + a^4 + a^5 + a^6 \equiv 0$$

per p divisibilem, adeoque $4(a^3 + a^2 + a + 1)^2$ ipsius p residuum fore. At $(a^3 + a^2 + a + 1)^2$, tamquam quadratum ipsius p residuum est, insuperque per p non divisibile, dum enim

a ad exponentem 7 pertinere supponatur, neque $\equiv 0$, neque $\equiv -1 \pmod{p}$ esse potest, i. e. neque a neque $a + 1$ per p divisibilis erit, adeoque etiam quadratum $(a + 1)^2$. Unde manifesto etiam 7 ipsius p residuum erit. Q. E. D. At primi numeri formae $7n + 2$ vel $7n + 4$ omnes methodos hucusque traditas eludunt. Ceterum etiam haec demonstratio ab ill. La Grange primum est detecta l. c. Infra Sect. VII. docebimus generaliter, expressionem

$$\frac{(x + \sqrt{a})^p - (x - \sqrt{a})^p}{\sqrt{a}}$$

semper ad formam $X^2 \mp pY^2$ reduci posse, (ubi signum superius est accipiendum, quando p est numerus primus formae $4n + 1$, inferius quando est formae $4n + 3$), denotantibus X, Y functiones rationales ipsius x^2 , a fractionibus liberas. Hanc descriptionem ill. La Grange ultra casum $p = 3$ non perferit V. l. c. p. 352.

Praeparatio ad disquisitionem generalem.

125.

Quoniam igitur methodi praecedentes ad demonstrationes generales stabilendas non sufficiunt, iam tempus est, aliam ab hoc defectu liberam exponere. Initium facimus a theoremate, cuius demonstratio satis diu operam nostram elusit, quamvis primo aspectu tam obvium videatur, ut quidam ne necessitatem quidem demonstrationis intellexerint. Est vero hoc: *Quemvis numerum, praeter quadrata positive sumta, aliquorum numerorum primorum non-residuum esse.* Quia vero hoc theoremate tantummodo tamquam auxiliari ad alia demonstranda usuri sumus, alios casus hic non explicamus quam quibus ad hunc finem indigemus. De reliquis casibus postea sponte idem constabit. Ostendemus itaque, quemvis numerum primum formae $4n + 1$, sive positive sive negative accipiat¹, non-residuum esse aliquorum numerorum primorum et quidem (si > 5) talium qui ipso sint minores.

Primo, quando numerus primus p , formae $4n + 1$ (> 17 , sed 13 et 17 exceptis), negative sumendus proponitur, sit $2a$ numerus par proxime maior quam $\sqrt{-p}$; tum facilis perspicitur, $4aa$ semper fore $< -p$ sive $4aa + p < 0$. At $4aa + p$ est formae $4n + 3$, $+p$ autem residuum quadraticum ipsius $4aa + p$ (quoniam $-4aa \equiv p \pmod{4aa + p}$); quodsi igitur $4aa + p$ est numerus primus, p ipsius non-residuum erit; sin minus, necessario factor aliquis ipsius $4aa + p$ formae $4n + 1$ erit; et quum $+p$ etiam huius residuum esse debeat, p ipsius non-residuum erit. Q. E. D.

Pro numeris primis positive sumendis duos casus distinguimus. Primo sit p numerus primus formae $8n + 5$. Sit a numerus quicunque positivus $< \sqrt{\frac{p}{2}}$. Tum $8n + 5 - 4aa$ erit numerus positivus formae $8n + 5$ vel $8n + 1$ (prout a par vel impar) adeoque necessario per numerum aliquem primum formae $8n + 3$ vel $8n + 5$ divisibilis, productum enim ex quocunque numeris formae $8n + 1$ et $8n + 7$ neque formam $8n + 3$ neque hanc $8n + 5$ habere potest. Sit hic $= q$, eritque $8n + 5 \equiv 2a^2 \pmod{q}$. At 2 ipsius q non-residuum erit (art. 112), adeoque etiam $2a^2$ et $8n + 5$. Q. E. D.

126.

Sed numerum quemvis primum formae $8n + 1$ positive acceptum semper alicuius numeri primi ipso minoris non-residuum esse, per artificia tam obvia demonstrari nequit.

¹+1 autem excipi oportere per se manifestum est.

Quum autem haec veritas maximi sit momenti, demonstratio- nem rigorosam, quamvis aliquantum prolixa sit, praeterire non possumus. Prae- mittimus sequens

Lemma 0.1. *Si habentur duae series numerorum,*

$$(I) \quad A, B, C, \text{ etc.} \quad (II) \quad A', B', C', \text{ etc.}$$

(utrum terminorum multitudo in utraque eadem sit necne, nihil interest) ita com- paratae ut, denotante p numerum quemcunque primum aut numeri primi potestatem, terminum aliquem secundae seriei (sive etiam plures) per p divisibilem esse, quoties terminus aliquem respondens in prima serie per p divisibilis sit: dico productum ex omnibus terminis seriei (I) per productum omnium terminorum serie (II) divisibilem fore.

Demonstratio. Designetur productum terminorum seriei (I) per Q , productum terminorum seriei (II) per Q' . Patet quemvis numerum primum qui in Q' ad certam potestatem elevatus sit, necessario etiam in Q ad eandem ad minimum potesta- tem adscendere. Sit enim p numerus quicunque qui in Q' ad potestatem k adscendat, et sint in serie (I) termini per p divisibiles A, B, C etc., qui in Q resp. ad potestates a, b, c etc. ascendunt; in serie (II) autem termini per p divisibiles A', B', C' etc., qui in Q' resp. ad potestates a', b', c' etc. ascendunt. Tum ex hypothesi, si A per p^λ divisibilis est, etiam A' per p^λ divisibilis erit, adeoque $a' \geq a, b' \geq b, c' \geq c$ etc., et quum nullus numerus primus in Q' plures dimensiones habere possit, quam in Q , Q per Q' divisibilis erit (art. 17). Q. E. D. $\square$

127.

Lemma 0.2. *In progressionem $1, 2, 3, 4, \dots, n$, plures termini esse nequeunt per numerum quemcunque h divisibiles, quam in hac $a, a+1, a+2, \dots, a+n-1$ eius toti- dem terminis constante.*

Nulla enim negotio perspicitur, si n fuerit multipulum ipsius h , in utraque $= \frac{n}{h}$ terminos fore per h divisibiles; sin minus, ponatur $n = eh + f$, ita ut f sit $< h$, eruntque in priori serie e termini per h divisibiles, in poste- riori autem vel totidem vel $e+1$.

Hinc tamquam Coroll. sequitur propositio ex numerorum figuratorum theoria nota, sed a nemine, ni fallimur, hactenus directe demonstrata,

$$\frac{a \cdot (a+1) \cdot (a+2) \cdot (a+3) \cdots (a+n-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n}$$

semper esse numerum integrum.

Denique Lemma hoc generalius ita proponi potuisset:

In progressionem $a, a+1, a+2, \dots, a+n-1$ totidem ad minimum dan- tur termini secundum modulum h numero cuicunque dato, r , congrui, quot in hac $1, 2, 3, \dots, n$ termini per h divisibiles.

128.

Theorem 0.1. *Sit a numerus quicunque formae $8n+1$, p numerus quicunque ad a primus, cuius residuum $+a$, tandem m numerus arbitrarius: tum dico in progressionem*

$$a, +(a-1), 2(a-4), +(a-9), 2(a-16), \dots, 2(a-m^2) \text{ vel } +(a-m^2)$$

prout m par vel impar, totidem ad minimum dari terminos per p divisibiles, quot den- tur in hac

$$1, 2, 3, \dots, 2m+1.$$

Priorem progressionem designamus per (I), posteriorem per (II).

Demonstr. I. Quando $p = 2$, in (I) omnes termini praeter primum, i.e. m termini divisibiles erunt; totidem autem erunt in (II).

II. Sit p numerus impar vel numeri imparis duplum vel quadruplum, atque $a \equiv r \pmod{p}$. Tum in progressionem $+m, +(m-1), +(m-2), \dots, +m$ (quae terminorum multitudine cum (II) convenit et per (III) designabitur) totidem ad minimum termini erunt secundum modulum p ipsi r congrui, quot in serie (II) per p divisibiles (art. praec.). Inter illos autem bini, qui signo tantum, non magnitudine, discrepant, occurrere nequeunt². Tandem quisque eorum correspondentem habebit in serie (I), qui per p erit divisibilis. Scilicet si fuerit $\pm b$ aliquis terminus seriei (III) ipsi r secundum p congruus, erit $a - bb$ per p divisibilis. Quodsi igitur h est par, terminus seriei (I), $2(a - hh)$, per p divisibilis erit. Si vero h impar, terminus $\frac{1}{2}(a - hh)$ per p divisibilis erit: namque manifeste $\frac{a-hh}{2p}$ erit integer, quoniam $a - hh$ per 8, p autem ad summum per 4 divisibilis [a enim per hyp. est formae $8n + 1$, hh autem ideo, quod est numeri imparis quadratum, eiusdem formae erit, quare differentia erit formae $8n$]. Hinc tandem concluditur, in serie (I) totidem terminos esse per p divisibiles, quot in (III) sint ipsi r secundum p congrui i. e. totidem aut plures quam in (II) sint per p divisibiles. Q. E. D.

III. Sit p formae $8n$, atque $a \equiv r \pmod{\frac{1}{2}p}$. Facile enim perspicitur, a , quum ex hyp. ipsius p sit residuum, etiam ipsius $\frac{1}{2}p$ residuum fore. Tum in serie (III) totidem ad minimum termini erunt ipsi r secundum p congrui, quot in (II) sunt per p divisibiles, illique omnes magnitudine erunt inaequales. At cuiusque eorum respondebit aliquis in (I) per p divisibilis. Si enim $\pm h \equiv r \pmod{p}$, erit $hh \equiv rr \pmod{2p}$, adeoque terminus $\frac{1}{2}(a - hh)$ per p divisibilis. Quare in (I) totidem ad minimum termini erunt per p divisibiles quam in (II). Q. E. D. $\square$

129.

Theorem 0.2. *Si a est numerus primus formae $8n + 1$, necessario infra $2\sqrt{a} + 1$ dabitur aliquis numerus primus cuius non-residuum sit a .*

Demonstr. Esto, si fieri potest, a residuum omnium primorum ipso $2\sqrt{a} + 1$ minorum. Tum facile perspicietur a etiam omnium numerorum compositorum ipso $2\sqrt{a} + 1$ minorum residuum fore (conferantur praecepta per quae diiudicare docuimus utrum numerus propositus sit numeri compositi residuum necne art. 105). Sit numerus proxime minor quam $\sqrt{a}$, $= m$. Tum in serie

$$(I) \quad a, \frac{1}{2}(a-1), 2(a-4), \frac{1}{2}(a-9), 2(a-mm) \text{ vel } \frac{1}{2}(a-mm)$$

totidem aut plures termini erunt per numerum quemcunque ipso $2\sqrt{a} + 1$ minorem divisibiles quam in hac

$$(II) \quad 1, 2, 3, 4, \dots, 2m+1 \quad (\text{art. praec.})$$

Hinc vero sequitur, productum ex omnibus terminis (I) per productum omnium terminorum (II) divisibile esse (art. 126). At illud est aut $= a(a-1)(a-4) \cdots (a-mm)$ aut semissis huius producti (prout m aut par aut impar). Quare productum $a(a-1)(a-4) \cdots (a-mm)$

²Erit scilicet $bb - rr = (b-r)(b+r)$ e duobus factoribus compositus quorum alter per p divisibilis (hyp.), alter per 2 (quia tum b tum r sunt impares); adeoque $bb - rr$ per $2p$ divisibilis.

certo per productum omnium terminorum (II) dividi poterit, et, quia omnes hi termini ad a sunt primi, etiam productum illud omissa factore a . Sed productum ex omnibus terminis (II) ita etiam exhiberi potest

$$(m+1) \cdot ((m+1)^2 - 1) \cdot ((m+1)^2 - 4) \cdots ((m+1)^2 - m^2).$$

Fiet igitur

$$\frac{m+1}{m+1} \cdot \frac{(m+1)^2 - 1}{(m+1)^2 - 1} \cdot \frac{(m+1)^2 - 4}{(m+1)^2 - 4} \cdots \frac{(m+1)^2 - m^2}{(m+1)^2 - m^2}$$

numerus integer quamquam sit productum ex fractionibus unitate minoribus, quia enim necessario $\sqrt{a}$ irrationalis esse debet, erit $m+1 > \sqrt{a}$, adeoque $(m+1)^2 > a$. Hinc tandem concluditur suppositionem nostram locum habere non posse. Q. E. D.

Iam quia a certo > 9 , erit $2\sqrt{a} + 1 < a$, dabiturque adeo aliquis primus $< a$, cuius non-residuum a . $\square$

Per inductionem theorema generale (fundamentale) stabilitur, conclusionesque inde deducuntur.

130.

Postquam rigore demonstravimus quemvis numerum primum formae $4n+1$, et positive et negative acceptum, alicuius numeri primi ipso minoris non-residuum esse, ad comparisonem exactiorem et generaliore numerorum primorum, quatenus unus alterius residuum vel non-residuum est, statim transimus.

Omni rigore supra demonstravimus, -3 et $+5$ esse residua vel non-residua omnium numerorum primorum, qui ipsorum $3, 5$ respective sint residua vel non-residua.

Per inductionem autem circa numeros sequentes institutam invenitur:

$$-7, -11, +13, -17, -19, -23, +29, -31, +37, +41, -43, -47, +53, -59$$

etc. esse residua vel non-residua omnium numerorum primorum, qui, positive sumti, illorum primorum respective sint residua vel non-residua. Inductio haec perfacile adiumento tabulae II confici potest.

Quivis autem levi attentione adhibita observabit, ex his numeris primis signo positivo affectos esse eos, qui sint formae $4n+1$, negativo autem eos, qui sint formae $4n+3$.

131.

Quod hic per inductionem deteximus, generaliter locum habere mox demonstrabimus. Antequam autem hoc negotium adeamus necesse erit, omnia quae, ex theoremate, si verum esse supponitur, sequuntur, eruere. Theorema ipsum ita enunciamus.

Si p est numerus primus formae $4n+1$, erit $+p$, si vero p formae $4n+3$, erit $-p$ residuum vel non-residuum cuiusvis numeri primi, qui positive acceptus ipsius p est residuum vel non-residuum.

Quia omnia fere, quae de residuis quadraticis dici possunt, huic theoremati innituntur, denominatio *theorematis fundamentalis* qua in sequentibus utemur, haud absona erit.

Ut ratiocinia nostra quam brevissime exhiberi possint, per a, a', a'' etc. numeros primos formae $4n+1$, per b, b', b'' etc. numeros primos formae $4n+3$ denotabimus; per A, A' ,

A'' etc. numeros quoscunque formae $4n+1$, per B, B', B'' etc. autem numeros quoscunque formae $4n+3$; tandem litera R duabus quantitibus interposita indicabit, priorem sequentis esse residuum, sicuti litera N significationem contrariam habebit. Ex. gr. $+5 R 11$, $+2 N 5$, indicabit $+5$ ipsius 11 esse residuum, vel $+2$ esse ipsius 5 non-residuum.

132.

Iam collato theoremate fundamentalis cum theorematibus art. 111, sequentes propositiones facile deducuntur.

Si erit

- | | | | | | |
|----|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|
| 1. | $\pm a R a'$ | $\pm a' R a$ | 2. | $\pm a N a'$ | $\pm a' N a$ |
| 3. | $+a R b$ | $+b N a$ | 4. | $+a N b$ | $+b R a$ |
| 5. | $-a R b$ | $-b N a$ | 6. | $-a N b$ | $-b R a$ |
| 7. | $+b R b'$ | $+b' N b$ | 8. | $+b N b'$ | $+b' R b$ |
| 9. | $-b R b'$ | $-b' N b$ | 10. | $-b N b'$ | $-b' R b$ |

In his omnes casus qui duos numeros primos comparando occurrere possunt, continentur: quae sequuntur, ad numeros quoscunque pertinent: sed harum demonstrationes minus sunt obviae.

Si erit

- | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|
| 11. | $\pm a R A$ | $\pm A R a$ | 12. | $\pm a N A$ | $\pm A N a$ |
| 13. | $+a R B$ | $\pm B R a$ | 14. | $+a N B$ | $\pm B N a$ |
| 15. | $-a R B$ | $\pm B N a$ | 16. | $-a N B$ | $\pm B R a$ |
| 17. | $+b R A$ | $\pm A N b$ | 18. | $+b N A$ | $\pm A R b$ |
| 19. | $-b R A$ | $\pm A R b$ | 20. | $-b N A$ | $\pm A N b$ |

133.

Quum omnium harum propositionum demonstrationes ex iisdem principiis sint petendae, necesse non erit omnes evolvere: demonstratio prop. 9, quam apponimus tamquam exemplum inservire potest. Ante omnia autem observetur, quemvis numerum formae $4n+1$ aut nullum factorem formae $4n+3$ habere, aut duos, aut quatuor etc., i.e. multitudinem talium factorum (inter quos etiam aequales esse possunt) semper fore parem: quemvis vero formae $4n+3$ multitudinem imparem factorum formae $4n+3$ (i.e. aut unum aut tres aut quinque etc.) implicare. Multitudo factorum formae $4n+1$ indeterminata manet.

Prop. 9 ita demonstratur. Sit A productum e factoribus primis a, a', a'' etc., b, b', b'' etc.; eritque factorum b, b', b'' etc. multitudo par (possunt etiam nulli adesse, quod eodem redit). Iam si a est residuum ipsius A , erit residuum etiam omnium factorum a, a', a'' etc. b, b', b'' etc., quare per propp. 1, 3 art. praec. singuli hi factores erunt residua ipsius a , adeoque etiam productum A . $-A$ vero idem esse debet. Quodsi vero a est non-residuum ipsius A , eoque ipso omnium factorum a, a' etc. b, b' etc.; singuli a, a' etc. erunt ipsius a residua, singuli b, b' etc. autem non-residua. Sed quum posteriorum multitudo sit par, productum ex omnibus, i.e. A , ipsius a residuum erit, hincque etiam $-A$.

134.

Investigationem adhuc generalius instituamus. Contemplemur duos numeros quoscunque impares inter se primos signis quibuscunque affectos P et Q . Concipiatur P sine respectu

signi sui in factores suos primos resolutus, designeturque per p , quot inter hos reperiantur, quorum non-residuum sit Q . Si vero aliquis numerus primus, cuius non-residuum est Q , pluries inter factores ipsius P occurrit, pluries etiam numerandus erit. Similiter sit q multitudo factorum primorum ipsius Q , quorum non-residuum est P . Tum numeri p , q certam relationem mutuam habebunt ab indole numerorum P , Q pendentem. Scilicet si alter numerorum p , q est par vel impar, numerorum P , Q forma docebit, utrum alter par sit vel impar. Haec relatio in sequenti tabula exhibetur.

Erant p , q simul pares vel simul impares quando numeri P , Q habent formas

1. $+A, +A'$
2. $+A, -A$
3. $-A, -A'$
4. $+B, +B'$
5. $+B, -B$
6. $-B, -B'$

Contra numerorum p , q alter erit par, alter impar, quando numeri P , Q habent formas

7. $+A, +B$
8. $+A, -B$
9. $-A, +B$
10. $-A, -B$
11. $+B, +A$
12. $+B, -A$

135.

Aggrediamur nunc deductionem harum propositionum.

I. Concipiatur, ut ante, P in factores suos primos resolutus, signis neglectis, insuperque etiam Q in factores quomodocunque resolvatur, ita tamen ut signi ipsius Q ratio habeatur. Combinentur illi singuli cum singulis bis. Tum si s designat multitudinem omnium combinationum in quibus factor ipsius Q est non-residuum factoris ipsius P , p ei s vel simul pares vel simul impares erunt. Sint enim factores primi ipsius P , hi f , f' , f'' etc. et inter factores in quibus Q est resolutus, sint m qui ipsius f sint non-residua, m' non-residua ipsius f' , m'' non-residua ipsius f'' etc. facile quisquis perspiciet, fore

$$s = m + m' + m'' + \text{etc.}$$

p autem exprimere, quot numeri inter ipsos m , m' , m'' etc. sint impares. Unde sponte patet, s fore parem quando p sit par, imparem quando p sit impar.

II. Haec generaliter valent quomodocunque Q in factores sit resolutus. Descendamus ad casus particulares. Contemplemur primo casus ubi alter numerorum, P , est positivus, alter vero, Q , vel formae $+A$ vel formae $-B$. Resolvantur P , Q in factores suos primos; attribuantur singulis factoribus ipsius P signum positivum, singulis autem factoribus ipsius Q signum positivum vel negativum, prout sunt formae a vel b ; tunc autem manifeste Q fiet vel formae $+A$ vel $-B$, uti requiritur. Combinentur factores singuli ipsius P cum singulis factoribus ipsius Q , designetque ut ante s multitudinem combinationum, in quibus factor ipsius Q est non-residuum factoris ipsius P , similiterque t multitudinem combinationum, in quibus factor ipsius P est non-residuum factoris ipsius Q . At ex theoremate fundamentali sequitur illas combinationes identicas fore $= t$, adeoque

$s = t$. Tandem ex iis quae modo demonstravimus, sequitur esse $p \equiv s \pmod{2}$, $q \equiv t \pmod{2}$, unde fit $p \equiv q \pmod{2}$.

Habentur itaque propp. 1, 3, 4 et 6 art. 133.

Propositiones reliquae per methodum similem directe erui possunt, sed una consideratione nova indigent; facilius autem ex praecedentibus sequenti modo derivantur.

III. Denotent rursus P , Q numeros quoscunque impares inter se primos, p , q multitudinem factorum primorum ipsorum P , Q , quorum non-residua Q , P respective. Tandem sit p' multitudo factorum primorum ipsius P , quorum non-residuum est $-Q$ (quando Q per se est negativus manifesto $-Q$ numerum positivum indicabit). Iam omnes factores primi ipsius P in quatuor classes distribuantur.

- 1) in factores formae a , quorum residuum est Q .
- 2) factores formae b , quorum residuum Q . Herum multitudo sit $= \psi$.
- 3) factores formae a , quorum non-residuum est Q . Herum multitudo $= \chi$.
- 4) factores formae b , quorum non-residuum $= Q$. Quorum multitudo $= \omega$.

Tum facile perspicitur fore $p = \chi + \omega$, $p' = \psi + \chi$.

Iam quando P est formae $\pm A$, erit $\psi + \chi$ adeoque etiam $\psi - \omega$ numerus par: quare fiet $p' = p + \psi - \chi \equiv p \pmod{2}$; quando vero P est formae $\pm B$, per simile ratiocinium invenitur, numeros p , p' sec. mod. 2 incongruos fore.

IV. Applicemus haec ad casus singulos. Sit primo P tum Q formae $+A$, eritque ex prop. 1. $p \equiv q \pmod{2}$; at erit $p' \equiv p \pmod{2}$; quare etiam $p' \equiv q \pmod{2}$. Quod convenit cum prop. 2. Simili modo si P est formae $-A$, Q formae $+A$, erit $p' \equiv q \pmod{2}$ ex prop. 2 quam modo demonstravimus; hinc, ob $p' \equiv p$, erit $p \equiv q$. Est itaque etiam prop. 5 demonstrata.

Eodem modo prop. 7 ex 3; prop. 8 vel ex 4 vel ex 7; prop. 9 ex 6; ex eademque prop. 1 derivantur.

136.

Per art. praec. propositiones art. 133 non quidem sunt demonstratae, sed tamen earum veritas a veritate theorematis fundamentalis quam aliquantisper supposuimus pendere ostensa est. At ex ipsa deductionis methodo manifestum est, illas valere pro numeris P , Q , si modo theorema fundamentale pro omnibus factoribus primis horum numerorum inter se comparatis locum habeat, etiamsi generaliter verum non sit. Nunc igitur ipsius theorematis fundamentalis demonstrationem aggrediamur. Cui praemittimus sequentem explicationem.

Theorema fundamentale usque ad numerum aliquem M verum esse dicemus, si valet pro duobus numeris primis quibuscunque, quorum neuter ipsum M superat.

Simili modo intelligi debet, si theoremata artt. 131, 132, 133 usque ad aliquem terminum vera esse dicemus. Facile vero perspicitur, si de veritate theorematis fundamentalis usque ad aliquem terminum constet, has propositiones usque ad eundem terminum locum esse habituras.

137.

Theorema fundamentale pro numeris parvis verum esse, per inductionem facile confirmari, atque sic limes determinari potest usque ad quem certo locum teneat. Hanc inductionem institutam esse postulamus: prorsus autem indifferens est quousque eam persequuti simus; sufficeret adeo, si tantummodo usque ad numerum 5 eam confirmavissemus, hoc autem per unicam observationem absolvitur, quod est $+5N3, +3N5$.

Iam si theorema fundamentale generaliter verum non est, dabitur limes aliquis T , usque ad quem valebit, ita tamen ut usque ad numerum proxime maiorem $T+1$, non amplius valeat. Hoc autem idem est ac si dicamus, dari duos numeros primos, quorum maior sit $T+1$, et qui inter se comparati theoremati fondamentali repugnent, binos autem alios numeros primos quoscunque, si modo ambo ipso $T+1$ sint minores, huic theoremati esse consentaneos. Unde sequitur, propositiones artt. 131, 132, 133 usque ad T etiam locum habituras. Hanc vero suppositionem consistere non posse nunc ostendemus. Erunt autem secundum formas diversas quas tum $T+1$, tum numerus primus ipso $T+1$ minor, quem cum $T+1$ comparatum theoremati repugnare supposuimus, habere possunt, casus sequentes distinguendi. Numerum istum primum per p designamus.

Quando tum $T+1$ tum p sunt formae $4n+1$, theorema fundamentale duobus modis falsum esse posset, scilicet si simul esset, vel $\pm pR(T+1)$ et $\pm(T+1)Np$ vel simul $\pm pN(T+1)$ et $\pm(T+1)Rp$

Quando tum $T+1$ tum p sunt formae $4n+3$, theor. fund. falsum erit, si simul fuerit vel $+pR(T+1)$ et $-(T+1)Np$ (sive quod eodem redit $-pN(T+1)$ et $+(T+1)Rp$) vel $+pN(T+1)$ et $-(T+1)Rp$ (sive $-pR(T+1)$ et $+(T+1)Np$)

Quando $T+1$ est formae $4n+1$, p vero formae $4n+3$, theor. fund. falsum erit, si fuerit vel $\pm pR(T+1)$ et $-(T+1)Np$ (sive $-(T+1)Rp$) vel $\pm pN(T+1)$ et $-(T+1)Np$ (sive $+(T+1)Rp$)

Quando $T+1$ est formae $4n+3$, p vero formae $4n+1$, theor. fund. falsum erit si fuerit vel $+pR(T+1)$ (sive $-pN(T+1)$) et $+(T+1)Np$ vel $+pN(T+1)$ (sive $-pR(T+1)$) et $\pm(T+1)Rp$

Si demonstrari poterit, nullum horum octo casuum locum habere posse, simul certum erit, theorematibus fundamentalibus veritatem nullis limitibus circumscriptam esse. Hoc itaque negotium nunc aggredimur: at quoniam alii horum casuum ab aliis sunt dependentes eundem ordinem, quo eos hic enumeravimus, servare non licebit.

138. Casus primus.

Quando $T+1$ est formae $4n+1$ ($=a$), atque p eiusdem formae; insuper vero $\pm pRa$, non potest esse $\pm aNp$. Hic casus supra fuit primus.

Sit $+p \equiv e^2 \pmod{a}$ atque e par et $< a$ (quod semper obtineri potest). Iam duo casus sunt distinguendi.

I. Quando e per p non est divisibilis. Ponatur $e^2 = p + af$; eritque f positivus, formae $4n+3$ (sive formae B), $< a$, et per p non divisibilis. Porro erit $e^2 \equiv p \pmod{f}$, i. e. pRf adeoque ex prop. 11 art. 132 $+fRp$ (quia enim $p, f < a$, pro his propositiones istae valebunt). At est etiam $afRp$, quare fiet quoque $+aRp$.

II. Quando e per p est divisibilis, ponatur $e = gp$, atque $e^2 = p + aph$, sive $pg^2 = 1 + ah$. Tum erit h formae $4n+3$ (B), atque ad p et g^2 primus. Porro erit pg^2Rh , adeoque etiam pRh ; hinc (prop. 11 art. 132) $+hRp$. At est etiam $-ahRp$, quia $-ah \equiv 1 \pmod{p}$; quare fiet etiam $+aRp$.

139. Casus secundus.

Quando $T + 1$ est formae $4n + 1$ ($= a$), p formae $4n + 3$, atque $+p R(T + 1)$, non potest esse $+(T + 1) N p$ sive $-(T + 1) R p$. Hic casus supra fuit quintus.

Sit ut supra $e^2 \equiv p + fa$ atque e par et $< a$.

I. Quando e per p non est divisibilis, erit etiam f per p non divisibilis. Praeterea autem erit f positivus, formae $4n + 1$ (sive A), atque $< a$; $+p N f$ adeoque (prop. 10 art. 132) $+f R p$. Sed est etiam $+fa R p$, quare fiet $+a R p$, sive $-a N p$.

II. Quando e per p est divisibilis, sit $e = pg$, atque $g^2 p = 1 + ha$. Erit itaque $g^2 p \equiv 1 + ha$. Tum h erit positivus, formae $4n + 3$ (B), et ad p et g^2 primus. Porro $+g^2 p R h$, adeoque $+p R h$; hinc fit (prop. 13 art. 132) $-h R p$. At est $-ha R p$, unde fit $+a R p$ atque $-a N p$.

140. Casus tertius.

Quando $T + 1$ est formae $4n + 1$ ($= a$), p eiusdem formae, atque $\pm p N a$: non potest esse $\pm a R p$. (Supra casus secundus).

Capiatur aliquis numerus primus ipso a minor, cuius non-residuum sit $+a$, quales dari supra demonstravimus (artt. 125, 129). Sed hic duos casus seorsim considerare oportet, prout hic numerus primus fuerit formae $4n + 1$ vel $4n + 3$, non enim demonstratum fuit, dari tales numeros primos utriusque formae.

I. Sit iste numerus primus formae $4n + 1$ et $= d$. Tum erit $+d N a$ (art. 131) ideoque (per casum primum) $+a N d$. Sit igitur $e^2 \equiv dp \pmod{a}$ atque e par, $< a$. Tunc iterum quatuor casus erunt distinguendi.

1) Quando e neque per p neque per d est divisibilis. Ponatur $e^2 = dp \pm af$, signis ita acceptis ut f fiat positivus. Tum erit $f < a$, ad d et p primus atque pro signo superiori formae $4n + 3$, pro inferiori formae $4n + 1$. Designemus brevitatis gratia per $[x, y]$ multitudinem factorum primorum numeri y quorum non-residuum est x . Tum erit $dp R f$ adeoque $[dp, f] = 0$. Hinc $[f, dp]$ erit numerus par (propp. 1, 3, art. 133), i.e. aut $= 0$ aut $= 2$. Quare erit f aut residuum utriusque numerorum d, p aut neutrius. Illud autem est impossibile, quum $+af$ sit residuum ipsius d , atque $+a N d$ (hyp.); unde fit $+f N d$. Hinc f debet esse utriusque numerorum d, p non-residuum. At propter $+af R p$ erit $;\pm a N p$. Q. E. D.

2) Quando e per p , neque vero per d est divisibilis, sit $e = gp$, atque $g^2 p = d \pm ah$, signo ita determinato, ut h fiat positivus. Tum erit $h < a$, ad d, g et p primus, atque pro signo superiori formae $4n + 3$, pro inferiori vero formae $4n + 1$. Ex aequatione $g^2 p = d \pm ah$, si per p et d multiplicatur, nullo negotio deduci potest, $pg^2 R d$ (α); $\pm ah p R d$ (β); $\pm ah R p$ (γ). Ex (α) sequitur $[pg^2, d] = 0$, adeoque (propp. 1, 3, art. 133) $[h, pd]$ par, i.e. erit h non-residuum vel utriusque p, d , vel neutrius. Priori in casu ex (β) sequitur $\pm ap N d$, et quum per hyp. sit $+a N d$, erit $\pm p R d$. Hinc per theor. fundam., quod pro numeris p, d ipso $T + 1$ minoribus valet, $\pm d R p$. Hinc et ex eo quod $h N p$, fit per (γ) $\pm a N p$. Q. E. D. Posteriori casu ex (β) sequitur $\pm ap R d$, hinc $\pm p N d$, $\pm d N p$, hincque tandem et ex $h R p$ fit $\pm a N p$. Q. E. D.

3) Quando e per d non autem per p est divisibilis. Pro hoc casu demonstratio tantum non eodem modo procedit ut in praec., neminemque qui hanc penetravit poterit morari.

4) Quando e tum per d tum per p est divisibilis adeoque etiam per productum dp (numeros d, p enim inaequales esse supponimus quia alias id quod demonstrare operam damus, esse $a N p$ iam in hypothesi $a N d$ contentum foret), sit $e = gdp$ atque $g^2 dp = \pm 1 \mp ah$. Tum erit $h < a$, ad d et p primus atque pro signo superiori formae $4n + 3$,

pro inferiori formae $4n + 1$. Facile vero perspicitur, ex ista aequatione deduci posse haec: $dpRh$ (α); $\pm ahRd$ (β); $\pm ahRp$ (γ). Ex (α) quod convenit cum (α) in (2) sequitur perinde ut illic, esse vel simul hRp , hRd , vel hNp , hNd . Sed in casu priori foret per (β), aRd , contra hyp. quare erit hNp , adeoque per (γ) etiam aNp .

II. Quando iste numerus primus est formae $4n + 3$, demonstratio prae- cedenti tam similis est, ut eam apponere superfluum nobis visum sit. In eorum gratiam qui per se eam evolvere gestiunt (quod maxime commendamus), id tantum observamus, postquam ad talem aequationem $e^2 = bp \pm af$ (designante b illum numerum primum) perventum fuerit, ad perspicuitatem profuturum, si utrumque signum seorsim consideretur.

141. Casus quartus.

Quando $T + 1$ est formae $4n + 1$ ($= a$), p formae $4n + 3$, atque $\pm pNa$, non poterit esse $+aRp$ sive $-aNp$. (Casus sextus supra).

Etiam huius casus demonstrationem, quum prorsus similis sit demonstrationi casus tertii, brevitatis gratia omittimus.

142. Casus quintus.

Quando $T + 1$ est formae $4n + 3$ ($= b$), p eiusdem formae, atque $+pRb$ sive $-pNb$, nequit esse $+bRp$ sive $-bNp$. (Casus tertius supra).

Sit $p \equiv e^2 \pmod{b}$, atque e par et $< b$.

I. Quando e per p non est divisibilis. Ponatur $e^2 = p + bf$, eritque f positivus, formae $4n + 1$, $< b$ atque ad p primus. Porro erit pRf adeoque per prop. 13 art. 132, $-fNp$. Hinc et ex $+bfRp$ fit $-bRp$ adeoque $+bNp$. Q. E. D.

II. Quando e per p est divisibilis, sit $e = pg$ atque $g^2p = 1 \pm bh$. Tum erit h formae $4n + 1$ atque ad p primus, $p \equiv g^2p \equiv \mp bh \pmod{h}$, adeoque pRh ; hinc fit $+hRp$ (prop. 10 art. 132), unde et ex $bhRp$ sequitur $-bRp$, sive $+bNp$. Q. E. D.

143. Casus sextus.

Quando $T + 1$ est formae $4n + 3$ ($= b$), p formae $4n + 1$, atque $\pm pRb$, non poterit esse $\pm bNp$. (Supra casus septimus).

Demonstrationem praecedenti omnino similem omittimus.

144. Casus septimus.

Quando $T + 1$ est formae $4n + 3$ ($= b$), $-p$ eiusdem formae, atque $+pNb$ sive $-pRb$, non poterit esse $+bNp$ sive $-bRp$. (Casus quartus supra).

Sit $p \equiv e^2 \pmod{b}$, atque e par et $< b$. =

I. Quando e per p non divisibilis. Sit $-p = e^2 - bf$; eritque f positivus, formae $4n + 1$, ad p primus ipsoque b minor (etenim e certo non maior quam $b - 1$, $p < b - 1$, quare erit $bf = e^2 + p < b^2 - b$, i. e. $f < b - 1$). Porro erit $-pRf$; hinc (prop. 10 art. 132) $+fRp$, unde et ex $+bfRp$ fit $+bRp$, sive $-bNp$.

II. Quando e per p est divisibilis, sit $e = pg$, atque $g^2p = -1 \pm bh$. Tum erit h positivus, formae $4n + 3$, ad p primus et $< b$. Porro erit pRh , unde fit (prop. 14 art. 132) $+hRp$. Hinc et ex $bhRp$ sequitur $+bRp$ sive $-bNp$. Q. E. D.

145. Casus octavus.

Quando $T + 1$ est formae $4n + 3$ ($= b$), p formae $4n + 1$, atque $+pNb$ sive $-pRb$, non poterit esse $\pm bRp$. (Casus ultimus supra).

Demonstratio perinde procedit ut in casu praecedenti.

Methodus analogia theoremata art. 114 demonstrandi.

146.

In demonstratt. praec. semper pro e valorem parem accepimus (artt. 137–144); observare convenit, etiam valorem imparem adhiberi potuisse, sed tum plures adhuc distinctiones introducendae fuissent. Qui his disquisitionibus delectantur haud inutile facient si vires suas in evolutione horum casuum exercitent.

Praeterea theoremata ad residua $+2$ et -2 pertinentia tunc supponi debuisse; quum vero nostra demonstratio absque his theorematibus sit perfecta, novam hinc methodum nanciscimur, illa demonstrandi. Quae minime est contemnenda, quum methodi, quibus supra pro demonstratione theorematis, $+2$ esse residuum cuiusvis numeri primi formae $8n + 1$, usi sumus, minus directae videri possint. Reliquos casus (qui ad numeros primos formarum $8n + 3$, $8n + 5$, $8n + 7$ spectant) per methodos supra traditas demonstratos, illudque theorema tantummodo per inductionem inventum esse supponemus; hanc autem inductionem per sequentes reflexiones ad certitudinis gradum evehemus.

Si $+2$ omnium numerorum primorum formae $8n + 1$ residuum non esset, ponatur minimus primus huius formae, cuius non-residuum $+2$, $= a$, ita ut pro omnibus primis ipso a minoribus theorema valeat. Tum accipiatur numerus aliquis primus $< \sqrt{a}$, cuius non-residuum a (qualem dari ex art. 129 facile deducitur). Sit hic $= p$; eritque per theor. fund. pNa . Hinc fit $+2Np$. Sit itaque $e^2 \equiv 2 \pmod{p}$, ita ut e sit impar atque $< a$. Tum duo casus erunt distinguendi.

I. Quando e per p non est divisibilis. Sit $e^2 = 2 \pm pq$; eritque q positivus, formae $8n + 7$ vel formae $8n + 3$ (prout p est formae $4n + 1$ vel $4n + 3$), $< a$, atque per p non divisibilis. Iam omnes factores primi ipsius q in quatuor classes distribuuntur, sint scilicet e formae $8n + 1$, f formae $8n + 3$, g formae $8n + 5$, h formae $8n + 7$; productum e factoribus primae classis sit E , producta e factoribus secundae, tertiae, quartae classis respective, F , G , H^3 .

His ita factis, consideremus primo casum ubi p est formae $4n + 1$, sive q formae $8n + 7$. Tum facile perspicitur fore $1RE$, $2RH$, unde pRE , pRH , hincque tandem ERp , HRp . Porro erit 2 non-residuum cuiusvis factoris formae $8n + 3$ aut $8n + 5$, adeoque etiam p ; hinc quivis talis factor non-residuum ipsius p ; unde facile concluditur fore FG ipsius p residuum, si $f + g$ fuerit par, non-residuum, si $f + g$ fuerit impar. At $f + g$ impar esse non potest; facile enim perspicietur omnes casus enumerando, sive q fieri vel formae $8n + 3$ vel $8n + 5$, si fuerit $f + g$ impar, quidquid sint singuli e, f, g, h , contra hyp. Erit igitur $FGRp$, $EFGHRp$, sive qRp , hincque tandem, propter $\pm aqRp$, aRp contra hyp. Secundo quando p est formae $4n + 3$, simili modo ostendi potest, fore pRE adeoque ERp , pNF adeoque FRp , tandem $g + h$ parem hincque $GHRp$, unde tandem sequitur qRp , aRp contra hyp.

II. Quando e per p divisibilis, demonstratio simili modo adornari et a peritis (quibus solis hic articulus est scriptus) haud difficulter evolvi poterit. Nos brevitatis gratia eam

³Si ex aliqua classe nulli factores adessent, loco producti ex his 1 scribere oporteret.

omittimus.

Solutio problematis generalis.

147.

Per theorema fundamentale atque propositiones ad residua -1 et $+2$ pertinentes semper determinari potest, utrum numerus quicunque datus numeri primi dati residuum sit an non-residuum. At haud inutile erit, reliqua etiam quae supra tradidimus hic iterum in conspectum producere, ut omnia coniuncta habeantur quae sunt necessaria ad solutionem

Problematis: Propositis duobus numeris quibuscunque P , Q , invenire, utrum alter alterius residuum sit an non-residuum.

Sol. I. Sit $P = a^\alpha b^\beta c^\gamma$ etc. designantibus a, b, c etc. numeros primos in- aequares positive acceptos (nam manifesto P absolute est sumendus). Brevitatis gratia in hoc art. relationem duorum numerorum x, y simpliciter dicemus eam, quatenus prior x posterioris y residuum est vel non-residuum. Pendet igitur relatio ipsorum Q , P a relationibus ipsorum Q , a^α ; Q , b^β etc. (art. 105).

II. Ut relatio ipsorum Q , a^α (de reliquis enim Q , b^β etc. idem valet) in- notescat, duo casus distinguendi sunt.

1. Quando Q per a est divisibilis. Ponatur $Q = Q'a^e$, ita ut Q' per a non sit divisibilis. Tunc si $e = \alpha$ vel $e > \alpha$, erit $Q R a^\alpha$; si vero $e < \alpha$ at- que impar, erit $Q N a^\alpha$: tandem si $e < \alpha$ atque par, habebit Q ad a^α eandem relationem quam habet Q' ad $a^{\alpha-e}$. Reductus est itaque hic casus ad

2. Quando Q per a non est divisibilis. Hic denuo duos casus distin- guimus.

(A) Quando $a = 2$. Tunc semper erit $Q R a^\alpha$, quando $\alpha = 1$; quando vero $\alpha = 2$, requiritur, ut sit Q formae $4n + 1$: denique quando $\alpha = 3$ vel $\alpha > 3$, Q debet esse formae $8n + 1$. Quae conditio si locum habet, erit $Q R a^\alpha$.

(B) Quando a est alius numerus primus. Tunc Q ad a^α eandem relatio- nem habebit quam habet ad a (V. art. 101).

III. Relatio numeri cuiuscunque Q ad numerum primum a (imparem) ita investiga- tur. Quando $Q > a$, substituatur loco ipsius Q ipsius residuum mini- mum positivum secundum modulum a^4 . Hoc ad a eandem relationem habebit quam habet Q .

Porro resolvatur Q sive numerus ipsius loco assumtus in factores suos primos p, p', p'' etc., quibus adiungendus factor -1 , quando Q est negativus. Tum constat relationem ipsius Q ad a pendere a relationibus singulorum p, p', p'' etc. ad a . Scilicet si inter illos factores sunt $2m$ non-residua ipsius a , erit $Q R a$, si vero $2m + 1$, erit $Q N a$. Facile autem perspicitur, si inter factores p, p', p'' etc., bini aut quaterni aut seni aut generaliter $2k$ aequales occurrant, hos tuto eiici posse.

IV. Si inter factores p, p', p'' reperiuntur -1 et 2 , horum relatio ad a ex artt. 108, 112, 113, 114 inveniri potest. Reliquorum autem relatio ad a pendet a relatione ipsius a ad ipsos (theor. fund. atque propp. art. 131). Sit p unus ex ipsis, invenieturque, (tractando numeros a, p eodem modo ut antea Q et a il- lis respective maiores) relationem ipsius a ad p aut per artt. 108–114 determi- nari posse (si scilicet residuum minimum ipsius a (mod p) nullos factores primos impares habeat) aut insuper a relatione ipsius p ad numeros quosdam primos ipso p minores pendere. Idem valet de reliquis factoribus p', p'' etc. Facile iam perspicitur per continuationem huius operationis tandem ad numeros perventum iri,

⁴Residuum in signific. art. 4. Plerumque praestat residuum absolute minimum accipere.

quorum relationes per propp. artt. 108–114 determinari possint. Per exemplum haec clariora fient.

Ex. Quaeritur relatio numeri +453 ad 1236. Est $1236 = 4 \cdot 3 \cdot 103$; +453 R 4 per II. 1(A); +453 R 3 per II. 1. Superest igitur ut relatio ipsius +453 ad 103 exploretur. Eadem autem erit quam habet +41 ($\equiv 453 \pmod{103}$) ad 103; eadem ipsius +103 ad 41 (theor. fund.), sive ipsius 20 ad 41. At est 20 R 41; namque $20 = (-1) \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5$; $(-1) R$ 41 (art. 108); atque $41 \equiv 1 \pmod{5}$ adeoque ipsius 5 residuum est (theor. fund.). Hinc sequitur +453 R 103, hincque tandem +453 R 1236. Est autem revera $453 \equiv 297^2 \pmod{1236}$.

De formis linearibus omnes numeros primos continentibus, quorum vel residuum vel non-residuum est numerus quicunque datus.

148.

Proposito numero quocunque A , formulae certae exhiberi possunt, sub quibus omnes numeri ad A primi quorum residuum est A , continentur, sive omnes, qui esse possunt divisores numerorum formae $xx - A$ (designante xx quadratum indeterminatum)⁵. Sed brevitatis gratia ad eos tantum divisores respiciemus, qui sunt impares atque ad A primi quum ad hos casus reliqui facile reduci possint.

Sit primo A aut numerus primus positivus formae $4n + 1$, aut negativus formae $-(4n + 1)$. Tum secundum theorema fundamentale omnes numeri primi, qui, positive sumti, sunt residua ipsius A , erunt divisores ipsius $xx - A$: omnes autem numeri primi (excepto numero 2 qui semper est divisor), qui ipsius A sunt non-residua, erunt non-divisores ipsius $xx - A$. Sint omnia residua ipsius A ipso A minora (exclusa cifra) r, r', r'' etc. omnia non-residua vero n, n', n'' etc. Tum quivis numerus primus, in aliqua formarum $Ak + r, Ak + r', Ak + r''$ etc. contentus, erit divisor ipsius $xx - A$, quivis autem primus in aliqua formarum $Ak + n, Ak + n'$ etc. contentus non-divisor erit, designante k numerum integrum indeterminatum. Illas formas dicimus *formas divisorum* ipsius $xx - A$, has vero *formas non-divisorum*. Utrorumque multitudo erit $= \frac{1}{2}(A - 1)$. Porro si B est numerus compositus impar atque ARB , omnes factores primi ipsius B in aliqua formarum priorum continentur adeoque etiam B . Quare quivis numerus impar in forma non-divisorum contentus, erit non-divisor formae $xx - A$. Sed hoc theorema convertere non licet; nam si B est non-divisor compositus impar formae $xx - A$, inter factores primos ipsius B aliqui non-divisores erunt, quorum multitudo si est par, nihilominus in aliqua forma divisorum reperietur. V. art. 99.

Ex. Hoc modo pro $A = 11$ formae divisorum ipsius $xx - 11$ inveniuntur hae: $11k + 1, 3, 4, 5, 9$; formae non-divisorum autem erunt $11k + 2, 6, 7, 8, 10$. Erit itaque -11 non-residuum omnium numerorum imparium, qui in aliqua posteriorum formarum continentur, residuum autem omnium primorum ad aliquam priorum pertinentium.

Similes formae dantur pro divisoribus atque non-divisoribus ipsius $xx \mp A$, quemcunque numerum designet A . Sed facile perspicitur eos ipsius A valores tantummodo considerari oportere, qui per nullum quadratum sint divisibiles; patet enim si fuerit $A = a^2 A'$, omnes divisores⁶ ipsius $xx - A$ etiam fore divisores ipsius $xx - A'$; similiterque non-divisores.

⁵Huiusmodi numeros simpliciter divisores ipsius $xx - A$ dicemus, unde sponte patet quid sint non-divisores.

⁶Nempe qui sint primi ad A .

Distinguemus autem tres casus, quando A est formae $+(4n+1)$ vel $-(4n-1)$; 2) quando est formae $-(4n+1)$ vel $+(4n+3)$; 3) quando est par sive formae $\pm(4n+2)$.

149.

Casus primus, quando A est formae $+(4n+1)$ vel $-(4n-1)$. Resolvatur A in factores suos primos, tribuaturque iis qui sunt formae $4n+1$, signum positivum, iis vero qui sunt formae $4n+3$, signum negativum (unde fiet productum ex ipsis $= \pm A$). Sint hi factores a, b, c, d etc. Distribuantur omnes numeri ipso A minores et ad ipsum primi in duas classes, et quidem in primam classem omnes numeri, qui sunt nullius ex numeris a, b, c, d etc. non-residua, aut duorum, aut quatuor aut generaliter multitudinis paris; in secundam vero ii, qui sunt non-residua unius ex numeris a, b, c etc. aut trium etc. aut generaliter multitudinis imparis. Designentur priores per r, r', r'' etc., posteriores per n, n', n'' etc. Tum formae $Ak+r, Ak+r', Ak+r''$ etc. erunt formae divisorum ipsius $xx-A$, formae vero $Ak+n, Ak+n'$ etc. erunt formae non-divisorum ipsius $xx-A$ (i.e. numerus quicumque primus, praeter 2, erit divisor aut non-divisor ipsius $xx-A$, prout in aliqua formarum priorum aut posteriorum continetur). Si enim p est numerus primus positivus atque alicuius ex numeris a, b, c etc. residuum vel non-residuum, hic ipse numerus ipsius p residuum vel non-residuum erit (theor. fund.). Quare si inter numeros a, b, c etc. sunt m , quorum non-residuum est p , totidem erunt non-residua ipsius p , adeoque si p in aliqua formarum priorum continetur, erit m par et ARp , si vero in aliqua posteriorum, erit m impar atque ANp .

Ex. Sit $A = +105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$. Tum numeri r, r', r'' etc. erunt hi: 1, 4, 16, 46, 64, 79 (qui sunt non-residua nullius numerorum 3, 5, 7); 2, 8, 23, 32, 53, 92 (qui sunt non-residua numerorum 3, 5); 26, 41, 59, 89, 101, 104 (qui sunt non-residua numerorum 3, 7); 13, 52, 73, 82, 97, 103 (qui sunt non-residua numerorum 5, 7). Numeri autem n, n', n'' etc. erunt hi: 11, 29, 44, 71, 74, 86; 22, 37, 43, 58, 67, 88; 19, 31, 34, 61, 76, 94; 17, 38, 47, 62, 68, 83. Seni primi sunt non-residua ipsius 3, seni posteriores non-residua ipsius 5, tum sequuntur non-residua ipsius 7, tandem ii qui sunt non-residua omnium trium simul.

Facile ex combinationum theoria atque artt. 32, 96 deducitur, numerorum r, r', r'' etc. multitudinem fore

$$= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{(a-1)(b-1)(c-1) \cdots}{1 \cdot 2} + \frac{(a-1)(b-1)(c-1) \cdots}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots \right)$$

numerorum n, n', n'' etc. multitudinem

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{(a-1)(b-1)(c-1) \cdots}{1} + \frac{(a-1)(b-1)(c-1) \cdots}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \cdots \right)$$

ubi l designat multitudinem numerorum a, b, c etc.

$$= \frac{(a-1)(b-1)(c-1) \cdots}{2}$$

et utraque series continuanda donec abrumpatur. (Dabuntur scilicet t numeri qui sunt residua omnium a, b, c etc., qui sunt non-residua duorum, etc., sed demonstrationem hanc fusius explicare brevitatis non permittit). Utriusque autem seriei summa⁷ est 2^{l-1} . Scilicet prior prodit ex hac iungendo terminum secundum et tertium, quartum et quintum etc.,

⁷Neglecto factore t .

posterior vero ex eadem iungendo terminum primum atque secundum, tertium et quartum etc.

Dabuntur itaque tot formae divisorum ipsius $xx - A$, quot dantur formae non-divisores, scilicet $= \frac{1}{4}(a-1)(b-1)(c-1)$ etc.

150.

Casum secundum et tertium hic simul contemplari possumus. Poterit scilicet A semper hic poni $= (-1)Q$, aut $= (+2)Q$, aut $= (-2)Q$, designante Q numerum formae $+(4n+1)$, aut $-(4n-1)$, quales in art. praec. consideravimus. Sit generaliter $A = \alpha Q$, ita ut sit α aut $= \pm 1$, aut $= \pm 2$. Tum erit A residuum omnium numerorum quorum residuum est aut uterque α et Q , aut neuter; non-residuum autem omnium, quorum non-residuum alteruter tantum numerorum α , Q . Hinc formae divisorum ac non-divisorum ipsius $xx - A$ facile derivantur. Si $\alpha = \pm 1$, distribuuntur omnes numeri ipso $4A$ minores ad ipsumque A primi in duas classes, in priorem ii, qui sunt in aliqua forma divisorum ipsius $xx \mp Q$ simulque in forma $4n+1$, iique, qui sunt in aliqua forma non-divisorum ipsius $xx \mp Q$ simulque in forma $4n+3$; in posteriorem reliqui. Sint priores r, r', r'' etc., posteriores n, n', n'' etc., eritque residuum omnium numerorum primorum in aliqua formarum $4Ak+r, 4Ak+r', 4Ak+r''$ etc. contentorum, non-residuum autem omnium primorum in aliqua formarum $4Ak+n, 4Ak+n'$ etc. contentorum. Si $\alpha = \pm 2$, distribuuntur omnes numeri ipso $8Q$ minores ad ipsumque primi in duas classes, in primam ii, qui continentur in aliqua forma divisorum ipsius $xx \mp Q$ simulque in aliqua formarum $8n+1, 8n+7$ pro signo superiori, vel formarum $8n+1, 8n+3$ pro inferiori, iique qui contenti sunt in aliqua forma non-divisorum ipsius $xx \mp Q$ simulque in aliqua harum $8n+3, 8n+5$ pro signo superiori, vel harum $8n+5, 8n+7$ pro inferiori, in secundam reliqui. Tum designatis numeris classis prioris per r, r', r'' etc., numerisque classis posterioris per n, n', n'' etc., $\pm 2Q$ erit residuum omnium numerorum primorum in aliqua formarum $8Qk+r, 8Qk+r', 8Qk+r''$ etc. contentorum, omnium autem primorum in aliqua formarum $8Qk+n, 8Qk+n', 8Qk+n''$ etc. non-residuum. Ceterum facile demonstrari potest, etiam hic totidem formas divisorum ipsius $xx - A$ datum iri ac non-divisorum.

Ex. Hoc modo invenitur $+10$ esse residuum omnium numerorum primorum in aliqua formarum $40k+1, 3, 9, 13, 27, 31, 37, 39$ contentorum, non-residuum vero omnium primorum, qui sub aliqua formarum $40k+7, 11, 17, 19, 21, 23, 29, 33$ continentur.

151.

Formae hae plures habent proprietates satis memorabiles quarum tamen unam tantummodo apponimus. Si B est numerus compositus ad A primus, inter cuius factores primos occurrunt $2m$, qui in aliqua forma non-divisorum ipsius $xx - A$ continentur, in aliqua forma divisorum ipsius $xx - A$ contentus erit; si vero multitudo factorum primorum ipsius B in aliqua forma non-divisorum ipsius $xx - A$ contentorum impar est, B quoque in forma non-divisorum contentus erit. Demonstrationem quae non est difficilis, omittimus. Hinc vero sequitur, non modo quemvis numerum primum sed etiam quemvis compositum imparem ad A primum, qui in aliqua forma non-divisorum contineatur, non-divisorem fore; necessario enim aliquis factor primus talis numeri debet esse non-divisor.

De aliorum laboribus circa has investigationes.

152.

Theorema fundamentale quod sane inter elegantissima in hoc genere est referendum, in eadem forma simplici, in qua supra propositum est, a nemine huc- usque fuit prolatum. Quod eo magis est mirandum, quum aliae quaedam propositiones illi superstruendae, ex quibus ad illud facile reveniri potuisset, ill. Eulero iam innotuerint. Formas certas dari, in quibus omnes divisores primi numerorum formae $xx \mp A$ contineantur, aliasque, in quibus omnes non-divisores primi numerorum eiusdem formae sint comprehensi, ita ut hae illas excludant, noverat methodumque illas formas inveniendi eruerat: sed omnes ipsius conatus ad demonstrationem perveniendi semper irriti fuerunt, veritatisque illi per inductionem inventae maiorem tantummodo verisimilitudinem conciliaverunt. In aliqua quidem tractatione, *Novae demonstrationes circa divisores numerorum formae $xx + nyy$* , quae in Acad. Petrop. recitata est 1775 Nov. 20, et post mortem viri summi in T. I. Nov. Act. huius Ac. p. 47 sqq. est conservata, voti se compotem credidisse videtur: sed hic error irrepsit, scilicet p. 65 tacite supposuit, formas tales divisorum et non-divisorum exstare⁸, unde non difficile erat quales esse debeant, derivare; methodus autem qua usus est ad comprobationem illius suppositionis haud prorsus idonea videtur. In alio schediasmate *De criteriis aequationis $fx + gyy = hzz$ utrumque resolutionem admittat necne*, Opusc. Anal. T. I. (ubi f, g, h sunt dati, x, y, z indeterminati) per inductionem invenit, si aequatio pro aliquo valore ipsius $h \equiv s$ solubilis sit, eandem pro quovis alio valore ipsi s secundum mod. $4fg$ congruo siquidem sit numerus primus, solubilem fore, ex qua propositione suppositio, de qua diximus, haud difficile demonstrari potest. Sed etiam huius theorematis demonstratio omnes ipsius labores elusit⁹, quod non est mirandum, quia nostro iudicio a theoremate fundamentali erat proficiscendum. Ceterum veritas huius propositionis ex iis, quae in Sect. sequenti docebimus, sponte demanabit.

Post EULERUM, clar. Le Gendre eidem argumento operam navavit, in egregia tract. *Recherches d'analyse indeterminee*, Hist. de l'Ac. des Sc. 1785 p. 465 sqq., umbi pervenit ad theorema, quod si rem ipsam spectas, cum theoremate fundamentali idem est, scilicet designantibus p, q duos numeros primos positivos, fore residua absolute minima potestatum $p^{\frac{q-1}{2}}, q^{\frac{p-1}{2}}$ sec. mod. q, p resp. aut ambo $+1$, aut ambo -1 , quando aut p aut q sit formae $4n + 1$; quando vero tum p tum q sit formae $4n + 3$, alterum res. min. fore $+1$, alterum -1 , p. 516, ex quo sec. art. 106 derivatur, relationem (in signif. art. 146 acceptam) ipsius p ad q ipsiusque q ad p eandem esse, quando aut p aut q sit formae $4n + 1$, oppositam, quando tum p tum q sit formae $4n + 3$. Propos. haec inter propp. art. 131 est contenta, sequitur etiam ex 1, 3, 9, art. 133; vicissim autem theor. fund. ex ipsa derivari potest. Clar. Le Gendre etiam demonstrationem tentavit, de qua, quum perquam ingeniosa sit, in Sect. seq. fusius loquemur. Sed quoniam in ea plura sine demonstratione supposuit (uti ipse fatetur p. 520: *Nous avons suppose seulement* etc.), quae partim a nemine hucusque sunt demonstrata, partim nostro quidem iudicio sine theor. fund. ipso

⁸Si omnes r, r', r'' etc. n, n', n'' etc. et $Ak + r, Ak + r'$ etc. $Ak + n, Ak + n'$ etc. (designante A numerum indeterminatum).

⁹Uti ipse fatetur, l. c. p. 210: „Huius elegantissimi theorematis demonstratio adhuc desideratur, postquam a pluribus iamdudum frustra est investigata... Quo- circa plurimum is praestitisse censendus erit, cui successerit demonstrationem huius theorematis invenire.” Quanto ardore vir immortalis demonstrationem huius theorematis aliorumque, quae tantummodo casus speciales theor. fundam. sunt, desideraverit, vide licet ex multis aliis locis Opusc. Anal. Conf. Additamentum ad diss. VIII. T. I. et diss. XIII. T. II. pluresque diss. in Comment. Petrop., iam passim laudatas.

demonstrari nequeunt: via quam ingressus est, ad scopum deducere non posse videtur nostraque demonstratio pro prima erit habenda. Ceterum infra duas alias demonstrationes eiusdem gravissimi theorematis trademus, a praec. et inter se toto coelo diversas.

De congruentiis secundi gradus non puris.

153.

Hactenus congruentiam puram $xx \equiv A \pmod{m}$ tractavimus, ipsiusque resolubilitatem dignoscere docuimus. Radicum ipsarum investigatio per art. 105 ad eum casum est deducta, ubi m est aut primus aut primi potestas, posterior vero per art. 101 ad eum, ubi m est primus. Pro hoc autem casu ea, quae in art. 61 sqq. tradidimus, una cum iis, quae in Sectt. V et VIII docebimus, omnia fere complectuntur, quae per methodos directas erui possunt. Sed hae ubi sunt applicabiles plerumque infinites prolixiores sunt quam indirectae quas in Sect. VI docebimus, adeoque non tam propter utilitatem suam in praxi quam propter pulcritudinem memorabiles. Congruentiae secundi gradus non purae ad puras facile reduci possunt. Proposita congruentia

$$axx + bx + c \equiv 0 \pmod{m}$$

secundum mod. m solvenda huic aequivalebit congruentia

$$4aax + 4abx + 4ac \equiv 0 \pmod{4am}$$

i. e. quivis numerus alteri satisfaciens etiam alteri satisfaciet. Haec vero ita exhiberi potest

$$(2ax + b)^2 \equiv bb - 4ac \pmod{4am}$$

unde omnes valores ipsius $2ax + b$ minores quam $4am$, si qui dantur, inveniri possunt. Quibus per r, r', r'' etc. designatis, omnes solutiones congr. prop. deducuntur ex solutionibus congruentiarum

$$2ax \equiv r - b, \quad 2ax \equiv r' - b \text{ etc. } \pmod{4am}$$

quas in Sect. II invenire docuimus. Ceterum observamus, solutionem plerumque per varia artificia contrahi posse ex. gr. loco congr. prop. aliam inveniri posse illi aequipollentem, et in qua a ipsum m metiatur; haec vero, de quibus Sect. ultima conferri potest, hic explicare brevitatis non permittit.

Sectio Quinta.

De formis aequationibusque indeterminatis secundi gradus.

Disquisitionis propositum: formarum definitio et signum.

154.

In hac sectione imprimis de functionibus duarum indeterminatarum x, y , huius formae

$$axx + 2bxy + cyy$$

ubi a, b, c sunt integri dati, tractabimus, quas *formas secundi gradus* sive simpliciter *formas* dicemus. Huic disquisitioni superstruetur solutio problematis famosi, invenire omnes solutiones aequationis cuiuscunque indeterminatae secundi gradus duas incognitas implicantis sive hae incognitae valores integros sive rationales tantum nancisci debeant. Problema hoc quidem iam ab ill. La Grange in omni generalitate est solutum, multaque insuper ad naturam *formarum* pertinentia tum ab hoc ipso magno geometra tum ab ill. Eulero partim primum inventa, partim, a FERMATIO olim inventa, demonstrationibus munita. Sed nobis acriter formarum perquisitioni insistentibus tam multa nova se obtulerunt, ut totum argumentum ab integro resumere operae pretium duxerimus, eo magis, quod Virorum illorum inventa, multis locis sparsa, paucis innotuisse experti sumus; porro quod methodus, per quam haec tractabimus, nobis ad maximam partem est propria; tandem quod nostra sine nova illorum expositione ne intelligi quidem possent. Nullum vero dubium nobis esse videtur, quin multa eaque egregia in hoc genere adhuc lateant, in quibus alii vires suas exercere possint. Ceterum quae ad veritatum insignium historiam pertinent, loco suo semper trademus.

Formam $axx + 2bxy + cyy$, quando de indeterminatis x, y non agitur, ita designabimus: (a, b, c) . Haec itaque expressio denotabit indefinite summam trium partium, producti numeri dati a in quadratum indeterminatae cuiuscunque; producti duplicati numeri b in hanc indeterminatam in aliam indeterminatam; producti numeri c in quadratum huius secundae indeterminatae. Ex. gr. $(1, 0, 2)$ exprimet summam quadrati et quadrati duplicati. Ceterum, quamvis formae (a, b, c) et (c, b, a) idem designent, si ad partes ipsas tantum respicimus, tamen differunt, si insuper ad partium ordinem attendimus: quare sedulo eas in posterum distinguemus; quid vero inde lucremur, in sequentibus sufficienter patebit.

Numerorum repraesentatio.

155.

Numerum aliquem datum per formam datam repraesentari dicemus, si formae indeterminatis tales valores integri tribuuntur, ut ipsius valor numero dato fiat aequalis. Hic habebimus sequens

Theorem 0.3. *Si numerus M ita per formam (a, b, c) repraesentari potest, ut indeterminatarum valores, per quos hoc efficitur, inter se sint primi; erit $bb - ac$ residuum quadraticum numeri M .*

Dem. Sint valores indeterminatarum m, n , scilicet

$$amm + 2bmn + cnn = M$$

accipianturque numeri μ, ν ita ut sit $\mu m + \nu n = 1$ (art. 40). Tum per evolutionem facile probatur esse

$$(amm + 2bmn + cnn)(a\mu\mu + 2b\mu\nu + c\nu\nu) = (\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb))^2 + (bb - ac)(m\nu - n\mu)^2$$

sive

$$M(a\mu\mu + 2b\mu\nu + c\nu\nu) = (\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb))^2 + (bb - ac)$$

Quare erit

$$bb - ac \equiv (\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb))^2 \pmod{M}$$

i. e. $bb - ac$ residuum quadraticum ipsius M . □

Numerum $bb - ac$, a cuius indole proprietates formae (a, b, c) imprimis pendere, in sequentibus docebimus, *determinantem* huius formae vocabimus.

Valores expr. $\sqrt{(bb - ac)} \pmod{M}$, ad quos repraesentatio numeri M per formam (a, b, c) pertinet.

156.

Erit itaque

$$\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb)$$

valor expressionis

$$\sqrt{(bb - ac)} \pmod{M}$$

Constat autem, numeros μ, ν infinitis modis ita determinari posse ut sit $\mu m + \nu n = 1$ unde alii alique valores illius expressionis prodibunt, qui quem nexum inter se = habeant videamus. Sit non modo $\mu m + \nu n = 1$, sed etiam $\mu' m + \nu' n = 1$, po- naturque

$$\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb) = v, \quad \mu'(mb + nc) - \nu'(ma + nb) = v'$$

Multiplicando aequationem $\mu m + \nu n = 1$ per μ' , alteram $\mu' m + \nu' n = 1$ per μ , et subtrahendo fit $\mu' - \mu = n(\mu' \nu - \mu \nu')$; similiterque multiplicando illam per ν , hanc per ν' , fit subtrahendo $\nu' - \nu = -m(\mu' \nu - \mu \nu')$. Hinc statim prodit

$$v' - v = (\mu' \nu - \mu \nu')(am m + 2bm n + cn n) = (\mu' \nu - \mu \nu')M$$

sive $v' \equiv v \pmod{M}$. Quomodocunque igitur μ, ν determinantur, formula $\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb)$ *duos diversos* (i. e. incongruos) expressionis $\sqrt{(bb - ac)} \pmod{M}$ dare nequit. Si itaque v est valor quicunque illius formulae repraesentationem numeri M per formam $axx + 2bxy + cyy$ eam ubi $x = m, y = n$, pertinere dicemus ad *valorem v expressionis $\sqrt{(bb - ac)} \pmod{M}$* . Ceterum facile ostendi potest, si valor formulae illius aliquis sit v atque $v' \equiv v \pmod{M}$ loco, numerorum μ, ν , qui dant v , alios μ', ν' accipi posse, qui dent v' . Scilicet faciendo

$$\mu' = \mu + \frac{n(v' - v)}{M}, \quad \nu' = \nu - \frac{m(v' - v)}{M}$$

fiet

$$\mu' m + \nu' n = \mu m + \nu n = 1$$

valor autem formulae ex μ', ν' prodiens superabit valorem e μ, ν prodeuntem quantitate $(\mu' \nu - \mu \nu')M$, quae fit $= (\mu m + \nu n)(v' - v) = v' - v$, sive valor ille $= v'$.

157.

Si duae repraesentationes eiusdem numeri per eandem formam (a, b, c) habentur, in quibus indeterminatae valores inter se primos habent: hae vel ad eundem valorem expr. $\sqrt{(bb - ac)} \pmod{M}$ pertinere possunt vel ad diversos. Sit

$$M = am m + 2bm n + cn n = am' m' + 2bm' n' + cn' n'$$

atque

$$\mu m + \nu n = 1, \quad \mu' m' + \nu' n' = 1$$

patetque, si fuerit

$$\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb) \equiv \mu'(m'b + n'c) - \nu'(m'a + n'b) \pmod{M}$$

congruentiam semper manere, quicumque alii valores idonei pro $\mu, \nu; \mu', \nu'$ accipiantur, in quo casu utramque repraesentationem ad eundem valorem expr. $\sqrt{(bb - ac)} \pmod{M}$ pertinere dicemus; si vero congruentia pro ullis valoribus ipsorum $\mu, \nu; \mu', \nu'$ locum non habet, pro nullis locum habebit, repraesentationes- que ad valores diversos pertinebunt. Si vero

$$\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb) \equiv -(\mu'(m'b + n'c) - \nu'(m'a + n'b)) \pmod{M}$$

repraesentationes ad *valores oppositos* expr. $\sqrt{(bb - ac)}$ pertinere dicentur. Omnibus hisce denominationibus etiam utemur quando de pluribus repraesentationibus eiusdem numeri per formas diversas sed quae eundem determinantem habent, agitur.

Ex. Sit forma proposita haec $(3, 7, -8)$, cuius determinans = 73. Per hanc formam habentur repraesentationes numeri 57 hae

$$3 \cdot 13^2 + 14 \cdot 13 \cdot 25 - 8 \cdot 25^2; \quad 3 \cdot 5^2 + 14 \cdot 5 \cdot 9 - 8 \cdot 9^2.$$

Pro prima poni potest $\mu = 2, \nu = -1$, unde prodit valor expr. $\sqrt{73} \pmod{57}$, ad quam repr. pertinet

$$2(13 \cdot 7 - 25 \cdot (-8)) - (1)(13 \cdot 3 + 25 \cdot 7) = 2(91 + 200) - (39 + 175) = 582 - 214 = 368 \equiv -4 \pmod{57}.$$

Simili modo repraesentatio secunda pertinere invenitur, faciendo $\mu = 2, \nu = -1$, ad valorem +4. Quare ambae repraesentationes ad valores oppositos pertinent.

Antequam ulterius progredimur, observamus, formas quarum determinans = 0 ab investigationibus sequentibus prorsus exclusas esse, quippe quae theorematum concinnitatem tantummodo turbarent adeoque tractationem peculiarem postulent.

Forma aliam implicans, sive sub alia contenta, transformatio, propria et impropria.

158.

Si forma F , cuius indeterminatae sunt x, y , in aliam F' , cuius indeterminatae sunt x', y' , per substitutiones tales

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

transmutari potest, ita ut $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sint integri: priorem *implicare* posteriorem, sive posteriorem *sub priori contentam* esse dicemus. Sit forma F haec

$$axx + 2bxy + cyy$$

forma F' vero haec

$$a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y'$$

habebunturque sequentes tres aequationes:

$$\begin{aligned} a' &= a\alpha\alpha + 2b\alpha\gamma + c\gamma\gamma \\ b' &= a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + c\gamma\delta \\ c' &= a\beta\beta + 2b\beta\delta + c\delta\delta. \end{aligned}$$

Multiplicando aequationem secundam per se ipsam, primam per tertiam, et subtrahendo fit deletis partibus se destruentibus

$$b'b' - a'c' = (bb - ac)(\alpha\delta - \beta\gamma)^2.$$

Unde sequitur, determinantem formae F' per determinantem formae F divisibilem et quotientem esse quadratum; manifesto igitur hi determinantes eadem signa habebunt. Quodsi itaque insuper forma F' per similem substitutionem in formam F transmutari potest, i. e. si tum F' sub F , tum F sub F' contenta est, formarum *determinantes erunt aequales*¹⁰ atque $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = 1$. In hoc casu formas *aequivalentes* dicemus. Quare ad formarum aequivalentiam aequalitas determinantium est conditio necessaria, licet illa ex hac sola minime sequatur.

Substitutionem $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$ vocabimus *transformationem propriam*, si $\alpha\delta - \beta\gamma$ est numerus positivus, *impropriam*, si $\alpha\delta - \beta\gamma$ est negativus; formam F' *proprie* aut *improprie* sub forma F contentam esse dicemus, si per transformationem propriam aut impropriam in formam F' transmutari potest. Si itaque formae F , F' sunt aequivalentes, erit $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = 1$, adeoque si transformatio est propria, $\alpha\delta - \beta\gamma = +1$, si est impropria, $= -1$. Si plures transformationes simul sunt propriae, aut simul impropriae, *similes* eas dicemus; propriam contra et impropriam *dissimiles*.

Aequivalentia propria et impropria.

159.

Si formarum F , F' determinantes sunt aequales atque F' sub F contenta: etiam F sub F' contenta erit et quidem proprie vel improprie, prout F' sub F proprie vel improprie continetur. Transeat F in F' ponendo

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

transibitque F' in F ponendo

$$x' = \delta x - \beta y, \quad y' = -\gamma x + \alpha y$$

Patet enim per hanc substitutionem ex F' fieri idem quod fit ex F ponendo,

$$\begin{aligned} x &= \alpha(\delta x - \beta y) + \beta(-\gamma x + \alpha y) \\ y &= \gamma(\delta x - \beta y) + \delta(-\gamma x + \alpha y) \end{aligned}$$

sive

$$x = (\alpha\delta - \beta\gamma)x, \quad y = (\alpha\delta - \beta\gamma)y$$

Hinc vero manifesto ex F' fit $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 F$ i. e. rursus F (art. praec.). Perspicuum autem est, transformationem posteriorem esse propriam vel impropriam, prout prior sit propria vel impropria.

Si tum F' sub F , tum F sub F' proprie continetur, formas *proprie aequivalentes*; si illae sub invicem improprie, vocabimus *improprie aequivalentes*. Ceterum usus harum distinctionum mox innotescet.

¹⁰Manifestum est ex analysi praecedente hanc propositionem etiam ad formas, quarum determinans $= 0$, patere. Sed aequatio $(\alpha\delta - \beta\gamma)^2 = 1$ ad hunc casum non est extendenda.

Exempl. Forma $2xx - 4xy + 6yy$ per substitutiones $x = 2x' + y'$, $y = 3x' - 2y'$ transit in formam $14x'x' - 12x'y' + 2y'y'$, haec vero in illam factis $x' = 2x - y$, $y' = 3x + 2y$. Quare formae $(2, -4, 6)$, $(14, -6, 2)$ erunt proprie aequivalentes.

Problemata quae tractare iam aggrediemur, sunt haec: I. Propositis duabus formis quibuscunque eundem determinantem habentibus investigare, utrum sint aequivalentes necne, utrum proprie aut improprie aut utroque modo, nam etiam hoc fieri potest. Quando vero determinantes inaequales habent, annon saltem altera alteram implicet proprie vel improprie vel utroque modo. Denique invenire omnes transformationes alterius in alteram tam proprias quam improprias. II. Proposita forma quacunque, invenire utrum numerus datus per eam repraesentari possit omnesque repraesentationes assignare. Sed quoniam formae determinantis negativae hic aliam methodum requirunt quam formae determinantis positivae, primo trademus ea quae utrisque sunt communia, tum vero formas cuiusvis generis seorsim considerabimus.

Formae oppositae.

160.

Si forma F formam F' implicat, haec vero formam F'' , forma F etiam formam F'' implicabit.

Sint indeterminatae formarum F , F' , F'' respective x, y ; x', y' ; x'', y'' ; transmutetur F in F' ponendo

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'$$

F' in F'' ponendo

$$x' = \alpha' x'' + \beta' y'', \quad y' = \gamma' x'' + \delta' y''$$

patetque, F in F'' transmutatum iri ponendo

$$\begin{aligned} x &= \alpha(\alpha' x'' + \beta' y'') + \beta(\gamma' x'' + \delta' y'') \\ y &= \gamma(\alpha' x'' + \beta' y'') + \delta(\gamma' x'' + \delta' y'') \end{aligned}$$

sive

$$\begin{aligned} x &= (\alpha\alpha' + \beta\gamma')x'' + (\alpha\beta' + \beta\delta')y'' \\ y &= (\gamma\alpha' + \delta\gamma')x'' + (\gamma\beta' + \delta\delta')y''. \end{aligned}$$

Quare ipsam F'' implicabit.

Quia

$$(\alpha\alpha' + \beta\gamma')(\gamma\beta' + \delta\delta') - (\alpha\beta' + \beta\delta')(\gamma\alpha' + \delta\gamma') = (\alpha\delta - \beta\gamma)(\alpha'\delta' - \beta'\gamma')$$

adeoque positivus, si tum $\alpha\delta - \beta\gamma$ tum $\alpha'\delta' - \beta'\gamma'$ positivus aut uterque negativus, negativus vero, si alter horum numerorum positivus alter negativus: forma F formam F'' proprie implicabit, si F ipsam F' et F' ipsam F'' eodem modo implicant, improprie si diverso.

Hinc sequitur, si quocunque formae habeantur F , F' , F'' , F''' etc., quarum quaevis sequentem implicet, primam implicaturam esse ultimam et quidem proprie, si multitudo formarum, quae sequentem suam improprie implicant, fuerit par, improprie si multitudo haec impar.

Si forma F formae F' est aequivalens, formaque F' formae F'' : forma F formae F'' aequivalens erit, et quidem proprie si forma F formae F' eodem modo aequivalet ut forma F' formae F'' ; improprie, si diverso.

Quia enim formae F, F' ; bis F', F'' respective sunt aequivalentes, tum illae has resp. implicabunt, adeoque F ipsam F'' tum hae illas. Quare F, F'' aequivalentes erunt. Ex praec. vero sequitur, ipsam F'' proprie vel improprie implicare prout F ipsi F' et F' ipsi F'' eodem modo vel diverso sint aequivalentes, ut et F'' ipsam F : quare in priori casu F, F'' proprie, in posteriori improprie aequivalentes erunt.

Formae $(a, b, c), (c, -b, a), (c, b, a)$ formae (a, b, c) aequivalent, et quidem duae priores improprie ultima proprie.

Nam $axx + 2bxy + cyy$ transit in $a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y'$ ponendo $x = -y', y = x' + \frac{2b}{a}y'$, quae transformatio est impropria propter $-1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = -1$; in formam $c'x'x' + 2b'x'y' + a'y'y'$ vero per transformationem impropriam $x = 0 \cdot x' + y', y = x' + 0 \cdot y'$; et in formam $cx'x' + 2bx'y' + ayy'$ per propriam $x = 0 \cdot x' - y', y = x' + 0 \cdot y'$.

Hinc manifestum est, quamvis formam, formae (a, b, c) aequivalentem, vel ipsi, vel formae $(c, -b, a)$ proprie aequivalere; similiterque, si quae forma formam (a, b, c) implicet aut sub ipsa contineatur, eam vel formam (a, b, c) vel formam $(c, -b, a)$ proprie implicare, aut sub alterutra proprie contineri. Formas $(a, b, c), (c, -b, a)$ *oppositas* vocabimus.

Formae contiguae.

161.

Si formae $(a, b, c), (a', b', c)$ eundem determinantem habent, insuperque est $a' = \frac{bb-D}{c}$ et $b + b' \equiv 0 \pmod{c}$, sive $b + b' = mc$, formas has *contiguas* dicemus, et quidem, quando determinatione accuratiori opus est, priorem posteriori *a parte prima*, posteriorem priori *a parte ultima* contiguam dicemus.

Ita ex. gr. forma $(7, -3, 2)$ formae $(3, 4, 7)$ a parte ultima contigua, forma $(3, 1, 3)$ oppositae suae $(3, -1, 3)$ ab utraque parte.

Formae contiguae semper sunt *proprie aequivalentes*. Nam forma $axx + 2bxy + cyy$ transit in formam contiguam $a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y'$ per substitutionem $x = y', y = -x' - \frac{b+b'}{c}y'$ (quae est propria ob $1 \cdot (-\frac{b+b'}{c}) - 0 \cdot 1 = -m$, uti per evolutionem adiumento aequationis $bb - ac = b'b' - ca'$ facile probatur; $-\frac{b+b'}{c}$ vero per hyp. est integer). Ceterum hae definitiones et conclusiones locum non habent, si $c = a' = 0$. Hic vero casus occurrere nequit, nisi in formis, quarum determinans est numerus quadratus.

Formae $(a, b, c), (a', b', c)$ proprie aequivalentes sunt, si $a = a', b \equiv b' \pmod{a}$. Forma enim (a, b, c) formae $(c, -b, a)$ proprie aequivalet (art. praec.), haec vero formae (a', b', c) a parte prima contigua erit.

Divisores communes coefficientium formarum.

162.

Si forma (a, b, c) formam (a', b', c') implicat, quivis divisor communis numerorum a, b, c etiam numeros a', b', c' metietur, et quivis divisor communis numerorum $a, 2b, c$ ipsos $a', 2b', c'$.

Si enim forma $axx + 2bxy + cyy$ per substitutiones $x = \alpha x' + \beta y', y = \gamma x' + \delta y'$ in

formam $a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y'$ transit: habebuntur hae aequationes

$$\begin{aligned} a\alpha\alpha + 2b\alpha\gamma + c\gamma\gamma &= a' \\ a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + c\gamma\delta &= b' \\ a\beta\beta + 2b\beta\delta + c\delta\delta &= c' \end{aligned}$$

unde propositio statim sequitur (pro parte secunda propos. loco aequationis secundae hanc adhibendo $2a\alpha\beta + 2b(\alpha\delta + \beta\gamma) + 2c\gamma\delta = 2b'$).

Hinc sequitur, maximum divisorem communem numerorum $a, b (2b), c$ simul metiri divisorem communem maximum numerorum $a', b' (2b'), c'$. Quodsi igitur insuper forma (a', b', c') formam (a, b, c) implicat, i. e. formae sunt aequivalentes, divisor communis maximus numerorum $a, b (2b), c$ divisori communi maximo numerorum $a', b' (2b'), c'$ aequalis erit, quoniam tum ille hunc metiri debet, tum hic illum. Si itaque in hoc casu $a, b (2b), c$ divisorem communem non habent, i. e. si maximus = 1, etiam $a', b' (2b'), c'$ divisorem communem non habebunt.

Nexus omnium transformationum similium formae datae in formam datam.

163.

Problema. Si forma $F = AXX + 2BXY + CYY$ formam $f = axx + 2bxy + cyy$ implicat, atque transformatio aliqua illius in hanc est data: ex hac omnes reliquas transformationes ipsi similes deducere.

Solutio. Sit transformatio data haec $X = \alpha x + \beta y, Y = \gamma x + \delta y$; ponamusque primo aliam huic similem datam esse $X = \alpha'x + \beta'y, Y = \gamma'x + \delta'y$, ut quid inde sequatur, investigemus. Tum positis determinantibus formarum $F, f = D, d$, atque $\alpha\delta - \beta\gamma = e, \alpha'\delta' - \beta'\gamma' = e'$; erit (art. 157) $d = De, d = De'$; et quum ex hyp. e, e' eadem signa habeant, $e = e'$. Habebuntur autem sequentes sex aequationes

$$A\alpha\alpha + 2B\alpha\gamma + C\gamma\gamma = a \tag{1}$$

$$A\alpha'\alpha' + 2B\alpha'\gamma' + C\gamma'\gamma' = a \tag{2}$$

$$A\alpha\beta + B(\alpha\delta + \beta\gamma) + C\gamma\delta = b \tag{3}$$

$$A\alpha'\beta' + B(\alpha'\delta' + \beta'\gamma') + C\gamma'\delta' = b' \tag{4}$$

$$A\beta\beta + 2B\beta\delta + C\delta\delta = c \tag{5}$$

$$A\beta'\beta' + 2B\beta'\delta' + C\delta'\delta' = c' \tag{6}$$

Si brevitatis gratia numeros

$$\begin{aligned} A\alpha\alpha' + B(\alpha\gamma' + \gamma\alpha') + C\gamma\gamma' &= a' \\ A(\alpha\beta' + \beta\alpha') + B(\alpha\delta' + \beta\gamma' + \gamma\beta' + \delta\alpha') + C(\gamma\delta' + \delta\gamma') &= 2b' \\ A\beta\beta' + B(\beta\delta' + \delta\beta') + C\delta\delta' &= c' \end{aligned}$$

per a' , $2b'$, c' designamus, ex aequ. praec. sequentes novas deducemus¹¹:

$$a'a' - D(\alpha\gamma' - \gamma\alpha')^2 = aa \quad (7)$$

$$2a'b' - D(\alpha\gamma' - \gamma\alpha')(\alpha\delta' + \beta\gamma' - \gamma\beta' - \delta\alpha') = 2ab \quad (8)$$

$$4b'b' - D((\alpha\delta' + \beta\gamma' - \gamma\beta' - \delta\alpha')^2 + 2ee') = 4bb + 2ac \quad (9)$$

unde fit, addendo $2Dee = 2d = 2bb - 2ac$,

$$4b'b' - D(\alpha\delta' + \beta\gamma' - \gamma\beta' - \delta\alpha')^2 = 4bb \quad (9')$$

$$2b'c' - D(\alpha\delta' + \beta\gamma' - \gamma\beta' - \delta\alpha')(\beta\delta' - \delta\beta') = 2bc \quad (11)$$

$$c'c' - D(\beta\delta' - \delta\beta')^2 = cc \quad (12)$$

Ponamus iam, divisorem communem maximum numerorum a , $2b$, c esse m ; numerosque $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ ita determinatos, ut fiat

$$\mathfrak{A}a + 2\mathfrak{B}b + \mathfrak{C}c = m$$

(art. 40), multiplicentur aequationes 7, 8, 9, 10, 11, 12 resp. per $2\mathfrak{A}$, $2\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$, $2\mathfrak{A}\mathfrak{C}$, $2\mathfrak{B}\mathfrak{C}$, $\mathfrak{C}\mathfrak{C}$ summenturque producta. Quodsi iam brevitatis caussa ponimus

$$T = \mathfrak{A}a' + 2\mathfrak{B}b' + \mathfrak{C}c'$$

$$U = \mathfrak{A}(\alpha\gamma' - \gamma\alpha') + \mathfrak{B}(\alpha\delta' + \beta\gamma' - \gamma\beta' - \delta\alpha') + \mathfrak{C}(\beta\delta' - \delta\beta') \quad (13)$$

ubi T , U manifesto erunt integri, prodibit

$$TT - DUU = mm.$$

Deducti itaque sumus ad hanc conclusionem elegantem: ex binis quibuscunque transformationibus similibus formae F in f sequi solutionem aequationis indeterminatae $tt - Duu = mm$ in integris, scilicet $t = T$, $u = U$. Ceterum quum in ratiociniis nostris non supposuerimus transformationes esse diversas: una adeo transformatio bis considerata solutionem praebere debet. Tum vero fit propter $a' = a$, $b' = b$, $c' = c$ etc. $T = m$, $U = 0$, quae solutio per se est obvia.

Iam primam transformationem solutionemque aequationis indeterminatae tamquam cognitae consideremus, et quomodo hinc altera transformatio deduci possit, sive quomodo α' , β' , γ' , δ' , ab his α , β , γ , δ , T , U pendeant, investigemus.

¹¹Origo harum aequationum haec est: (7) fit ex (1)·(2) (i. e. si aequatio (1) in aequationem (2) multiplicatur, sive potius, si illius pars prior in partem priorem huius multiplicatur, illiusque pars posterior in posteriorem huius, productaque aequalia ponuntur); (8) ex (1)·(4) + (2)·(3); sequens quae non est numerata ex (1)·(6) + (2)·(5) + (3)·(4) + (3)·(4); sequens non numerata ex (3)·(4); (11) ex (3)·(6) + (4)·(5); (12) ex (5)·(6). Simili designatione etiam in sequentibus semper utemur. Evolutionem vero lectoribus relinquere debemus.

Werke Band 1 — Disquisitiones Arithmeticae

Sectio Quinta. De Formis Secundi Gradus.

Articuli 165–200

Carolus Fridericus Gauss

Generalia de repraesentationibus numerorum

165.

Forma $9x^2 + 14xy - 4yy$ in formam $-12x'^2 - 18x'y' + 39y'^2$ transmutatur tum proprie, ponendo

$$x = 4x' + 11y', \quad y = -2y',$$

tum improprie, ponendo

$$x = -74x' + 89y', \quad y = 15x' - 18y'.$$

Hic igitur $a + a'$, $b + b'$, $a'' + b''$, $c + c'$ sunt -70 , 100 , -20 ; autem r' , s' , t' , u' , v' sunt 14 , 3 , 14 , 5 , 5 , 1 , $= 1$.

$\mu = 0$, $\nu = -1$. Numeri autem a , b , c inveniuntur -237 , -1170 , 48 , quorum divisor communis maximus $= 3 = r$; denique $\varepsilon = 3$.

Hinc transformatio (S) fit haec, $x = bt - u$, $y = -at$. Per quam forma $(3, 7, -4)$ transit in formam ancipitem $tt - 10tu + uu$.

Si formae F , F' sunt aequivalentes: forma G , sub F contenta, etiam sub F' contenta erit. Sed quoniam eandem formam etiam implicat, ipsi aequivalens erit, et proin etiam formae F . In hoc igitur casu theorema ita enunciabitur:

Si F , F' tam proprie, quam improprie sunt aequivalentes: forma anceps utriusque aequivalens inveniri poterit.

Ceterum in hoc casu $\varepsilon = +1$, adeoque etiam r , ipsum ε metiens, $= 1$ erit.

Haec de formarum transformatione in genere sufficient: transimus itaque ad considerationem repraesentationum.

Generalia de repraesentationibus numerorum per formas,
earumque nexu cum transformationibus.

166.

Si forma F formam F' implicat: quicunque numerus per F' repraesentari potest, etiam per F poterit.

Sint indeterminatae formarum F , F' respective x, y ; x', y' : ponamusque numerum M per F' repraesentari, faciendo $x' = m$, $y' = n$, formam F vero in F' transire per substitutionem

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y'.$$

Tum manifestum est, si ponatur

$$x = \alpha m + \beta n, \quad y = \gamma m + \delta n,$$

F transire in M .

Si M pluribus modis per formam F' repraesentari potest, e.g. etiam faciendo $x' = m'$, $y' = n'$: plures repraesentationes ipsius M per F inde sequentur. Si enim esset tum

$$\alpha m + \beta n = \alpha m' + \beta n' \quad \text{tum} \quad \gamma m + \delta n = \gamma m' + \delta n'$$

foret aut $\alpha\delta - \beta\gamma = 0$ adeoque etiam determinans formae $F = 0$ contra hyp.,

aut $m = m'$, $n = n'$. Hinc sequitur, M ad minimum totidem modis diversis per F repraesentari posse, quot per F' .

Si igitur tum F ipsam F' , tum F' ipsam F implicat i.e. si F , F' sunt aequivalentes: numerusque M per alterutram repraesentari potest: etiam per alteram repraesentari poterit, et quidem totidem modis diversis per alteram, quot per alteram.

Denique observamus, in hocce casu divisorem communem maximum numerorum m, n aequalem esse divisorii comm. max. numerorum $\alpha m + \beta n$, $\gamma m + \delta n$. Sit ille $= \mu$, numerique μ, ν ita accepti, ut fiat $\mu m + \nu n = \mu$. Tum erit

$$(\delta\mu - \gamma\nu)(\alpha m + \beta n) - (\beta\mu - \alpha\nu)(\gamma m + \delta n) = (\alpha\delta - \beta\gamma)(\mu m + \nu n) = \pm\mu.$$

Hinc div. comm. max. numerorum $\alpha m + \beta n$, $\gamma m + \delta n$ metietur ipsum μ , μ vero etiam illum metietur, quia manifeste ipsos $\alpha m + \beta n$, $\gamma m + \delta n$ metitur. Quare necessario ille erit $= \mu$. Quando igitur m, n inter se primi sunt, etiam $\alpha m + \beta n$, $\gamma m + \delta n$ inter se primi erunt.

167.

Theorem. Si formae

$$axx + 2bxy + cyy \tag{F}$$

$$a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y' \tag{F'}$$

sunt aequivalentes ipsarum determinans $= D$, posteriorque in priorem transit ponendo

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y';$$

porro numerus M per F repraesentatur faciendo $x = m$, $y = n$, adeoque per F' faciendo

$$x' = \alpha m + \beta n = m', \quad y' = \gamma m + \delta n = n'$$

et quidem ita, ut m ad n eoque ipso etiam m' ad n' sit primus: ambae repraesentationes aut ad eundem valorem expressionis $\sqrt{D} \pmod{M}$ pertinebunt, aut ad oppositos, prout transformatio formae F' in F propria est vel impropria.

Dem. Determinentur numeri μ, ν ita, ut fiat $\mu m + \nu n = 1$, ponaturque

$$\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb) = N,$$

qui erunt integri propter $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$. Tum erit $\mu m + \nu n = 1$. (Cf. art. prae. fin.)

Porro sit

$$\mu(b'm' + c'n') - \nu(a'm' + b'n') = N';$$

eruntque N, N' valores expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$, ad quos repraesentatio prima et secunda pertinent.

Si in N pro a', b', c' valores ipsorum substituuntur,

$$\begin{aligned} \text{pro } a, & \quad \alpha\alpha' + 2\alpha\gamma b' + \gamma\gamma', \\ \text{pro } b, & \quad \alpha\beta a' + b'(\alpha\delta + \beta\gamma) + c'\gamma\delta, \\ \text{pro } c, & \quad \beta\beta a' + 2\beta\delta b' + \delta\delta c', \end{aligned}$$

invenietur evolutione facta $N = N'(\alpha\delta - \beta\gamma)$.

Quare erit aut $N = N'$, aut $N = -N'$, prout $\alpha\delta - \beta\gamma = +1$ aut $= -1$, i.e. repraesentationes pertinebunt ad eundem valorem expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$ vel ad oppositos, prout transformatio formae F' in F est propria vel impropria. Q.E.D.

Si itaque plures repraesentationes numeri M per formam (a, b, c) ope valorum inter se primorum indeterminatarum x, y , habentur ad valores diversos expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$ pertinentes: repraesentationes respondentes per formam (a', b', c') ad eosdem resp. valores pertinebunt, et si nulla repraesentatio numeri M per formam aliquam ad valorem quendam determinatum pertinens datur, nulla quoque dabitur ad hunc valorem pertinens per formam illi aequivalentem.

168.

Theorem. Si numerus M per formam $axx + 2bxy + cyy$ repraesentatur, tribuendo ipsis x, y valores inter se primos m, n , valorque expressionis $\sqrt{D} \pmod{M}$, ad quem haec repraesentatio pertinet, est N : formae (a, b, c) , $(M, N, \frac{NN-D}{M})$ proprie aequivalentes erunt.

Demonstr. Ex art. 155 patet, numeros integros μ, ν inveniri posse ita ut sit

$$\mu m + \nu n = 1, \quad \mu(mb + nc) - \nu(ma + nb) = N.$$

Quo facto forma (a, b, c) per substitutionem $x = mx' - \nu y'$, $y = nx' + \mu y'$, quae manifesto est propria, transit in formam, cuius determinans $= D(m\mu + n\nu)^2 = D$, sive in formam aequivalentem: quae forma si ponitur $= (M', N', \frac{N'N'-D}{M'})$, erit

$$M' = am m + 2bm n + cn n = M, \quad N' = -m\mu a + (m\nu - n\mu)b + n\nu c = N.$$

Quare forma, in quam (a, b, c) per transformationem illam mutatur, erit $(M, N, \frac{NN-D}{M})$. Q.E.D.

Ceterum ex aequationibus

$$m\mu + n\nu = 1, \quad \mu(mb + nc) - \nu(ma + nb) = N$$

deducitur

$$\mu = \frac{nN + ma + nb}{M}, \quad \nu = \frac{mb + nc - mN}{M},$$

qui numeri itaque erunt integri.

Porro observandum, hanc propositionem locum non habere, si $M = 0$; tum enim terminus $\frac{NN-D}{M}$ fit indeterminatus¹.

169.

Si plures repraesentationes numeri M per (a, b, c) habentur, ad eundem valorem expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$, N , pertinentes (ubi valores ipsorum x, y semper inter se primos supponimus): plures etiam transformationes propriae formae $(a, b, c) \dots (F)$ in $(M, N, \frac{NN-D}{M}) \dots (G)$ inde deducuntur. Scilicet si etiam per hos valores $x = m$, $y = n$ talis repraesentatio provenit, (F) etiam per substitutionem

$$x = mx' + \frac{m'N - m'b - n'c}{M}y', \quad y = nx' + \frac{n'N + m'a + n'b}{M}y'$$

in (G) transit. Vice versa, ex quavis transformatione propria formae (F) in (G) sequetur repraesentatio numeri M per formam (F) , ad valorem N pertinens. Scilicet si (F) transit in (G) positis $x = mx' + \mu y'$, $y = nx' + \nu y'$, M repraesentatur per (F) ponendo $x = m$, $y = n$, et quoniam hic $m\mu + n\nu = 1$ valor expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$, ad quem repraesentatio pertinet, erit $\mu(bm + cn) - \nu(am + bn)$ i.e. N . Ex pluribus vero transformationibus propriis diversis sequuntur totidem repraesentationes diversae ad N pertinentes². Hinc facile colligitur, si omnes transformationes propriae formae (F) in (G) habeantur, ex his omnes repraesentationes ipsius M per (F) ad valorem N pertinentes sequi. Unde quaestio de repraesentationibus numeri dati per formam datam (in quibus indeterminatae valores inter se primos nanciscuntur) investigandis, reducta est ad quaestionem de inveniendis omnibus transformationibus propriis formae illius in datam aequivalentem.

Applicando iam ad haec ea, quae in art. 162 docuimus, facile concluditur:

Si repraesentatio aliqua numeri M per formam (F) ad valorem N pertinens sit haec: $x = \alpha$, $y = \gamma$: formulam generalem omnes repraesentationes eiusdem numeri per formam (F) , ad valorem N pertinentes, comprehendentem fore hanc:

$$x = \alpha t - (\alpha h + \gamma c)u, \quad y = \gamma t + (\alpha a + \gamma h)u,$$

uni m divisor communis maximus numerorum $a, 2b, c$; et t, u omnes numeri indefinite, aequationi $tt - Duu = mm$ satisfaciunt.

Si forma (a, b, c) ancipiti alicui aequivalens, adeoque formae $(M, N, \frac{NN-D}{M})$ tam proprie, quam improprie, sive tam formae $(M, N, \frac{NN-D}{M})$, quam huic $(M, -N, \frac{NN-D}{M})$ proprie: repraesentationes numeri M habebuntur per formam (F) , tam ad valorem N , quam ad valorem $-N$ pertinentes. Et vice versa si plures repraesentationes numeri M per eandem formam (F) ad valores oppositos expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$, N , $-N$, pertinentes habentur: forma (F) formae (G) tam proprie quam improprie aequivalens erit, formaque anceps assignari poterit, cui (F) aequivaleat.

Haec generalia de repraesentationibus hic sufficiant: de repraesentationibus, in quibus indeterminatae valores inter se non primos habent, infra dicemus. Respectu aliarum proprietatum, formae, quarum determinans est negativus, prorsus alio modo quam formae determinantis positivi sunt tractandae: quare iam utrasque seorsim considerabimus. Ab illis tamquam facilioribus initium facimus.

¹In hoc enim casu, si ad ipsum phrasin extendere volumus, haec: N esse valorem expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$, sive $NN \equiv D \pmod{M}$ significabit $NN - D$ esse multipulum ipsius M , adeoque $= 0$.

²Si ex duabus transformationibus propriis diversis eadem repraesentatio defluere supponitur, illae ita se habere debent 1) $x = mx' - \nu y'$, $y = nx' + \mu y'$; 2) $x = mx' - \nu' y'$, $y = nx' + \mu' y'$. Sed ex duabus aequationibus $m\mu + n\nu = m\mu' + n\nu'$, $\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb) = \mu'(mb + nc) - \nu'(ma + nb)$ facile deducitur, esse aut $M = 0$ aut $m = m'$, $n = n'$, $\mu = \mu'$, $\nu = \nu'$. Casum $M = 0$ iam exclusimus.

De formis determinantis negativi.

171.

Problema. Proposita forma quacunque, (a, b, a') , cuius determinans negativus, $= -D$, designante D numerum positivum, invenire formam huic proprie aequivalentem, (A, B, C) , in qua A nec maior quam $\sqrt{\frac{4}{3}D}$, C , nec minor quam $2B$.

Solutio. Supponimus in forma proposita non omnes tres conditiones simul locum habere; alioquin enim aliam formam quaerere opus non esset. Sit b' residuum abs. min. numeri $-b$ secundum modulum a' , atque $a'' = \frac{bb'+D}{a'}$; erit integer, quia $b'b' \equiv bb$, $b'b'+D \equiv bb+D = aa' \pmod{a}$. Iam si $a'' < a'$, fiat denuo b'' resid. abs. min. ipsius $-b'$ secundum mod. a'' , atque $a''' = \frac{b'b''+D}{a''}$. Si hic iterum $a''' < a''$, sit rursus b''' res. abs. min. ipsius $-b''$ secundum mod. a'' atque $a''' = \frac{b''b''' + D}{a''}$. Haec operatio continuetur, donec in progressionem a', a'', a''', a^{IV} etc. ad terminum a^m perveniatur qui praecedente suo a^{m-1} non sit minor, quod tandem evenire debet, quia alias progressio infinita numerorum integrorum continuo decrescentium haberetur. Tum forma (a^m, b^m, a^{m+1}) omnibus conditionibus satisfaciet.

Dem. I. In progressionem formarum (a, b, a') , (a', b', a'') , (a'', b'', a''') etc. quaevis praecedenti est contigua, quare ultima primae proprie aequivalens erit (artt. 159, 160).

II. Quum b^m sit residuum absolute minimum ipsius $-b^{m-1}$ secundum mod. a^m , maior quam $\frac{1}{2}a^m$ non erit (art. 4).

III. Quia $a^m a^{m+1} = D + b^m b^m$, atque $a^{m+1} \text{ non } < a^m$, $a^m a^{m+1}$ non erit $> D + b^m b^m$, et quum $b^m \text{ non } > \frac{1}{2}a^m$, $a^m a^{m+1}$ non erit $> D + \frac{1}{4}a^m a^m$ et $a^m a^{m+1} \text{ non } > D$, tandemque $a^m \text{ non } > \sqrt{\frac{4}{3}D}$.

Exempl. Proposita sit forma (304, 217, 155), cuius determinans $= -31$.

Hic invenitur progressio formarum

$$(304, 217, 155), \quad (155, -62, 25), \quad (25, 12, 7), \quad (7, 2, 5), \quad (5, -2, 7).$$

Ultima est quaesita. Eodem modo formae (121, 49, 20), cuius determinans $= -19$, aequivalentes inveniuntur: (20, 9, 5), (5, -1, 4), (4, 1, 5): quare (4, 1, 5) erit forma quaesita.

Tales formas (A, B, C) , quarum determinans est negativus et in quibus A nec maior quam $\sqrt{\frac{4}{3}D}$, C nec minor quam $2B$, **formas reductas** vocabimus. Quare cuivis formae determinantis negativae, forma reducta proprio aequivalens inveniri poterit.

172.

Problema. Invenire conditiones, sub quibus duae formae reductae non identicae, eiusdem determinantis $-D$, (a, b, c) , (a', b', c') proprie aequivalentes esse possint.

Solutio. Supponamus, id quod licet, a esse non $> c$, formamque $axx + 2bxy + cyy$ transire in $a'x'x' + 2b'x'y' + c'y'y'$ per substitutionem propriam $x = \alpha x + \beta y$, $y = \gamma x + \delta y$. Tum habebuntur aequationes

$$a\alpha\alpha + 2b\alpha\gamma + c\gamma\gamma = a' \tag{1}$$

$$a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + c\gamma\delta = b' \tag{2}$$

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \tag{3}$$

Ex (1) sequitur $a'a = (a\alpha + b\gamma)^2 + D\gamma\gamma$; quare $a'a$ erit positivus; et quum $ac = D + bb$, $a'c' = D + b'b'$, etiam ac , $a'c'$ positivi erunt: quare a , a' , c , c' omnes eadem signa

habebunt. Sed tum a tum a' non $> \sqrt{\frac{4}{3}D}$, adeoque $a'a'$ non $> \frac{4}{3}D$; quare multo minus $D\gamma\gamma(= a'a - (a\alpha + b\gamma)^2)$ maior quam $\frac{4}{3}D$ esse poterit. Hinc γ erit aut $= 0$, aut $= \pm 1$.

I. Si $\gamma = 0$, ex (3) sequitur, esse aut $\alpha = 1$, $\delta = 1$, aut $\alpha = -1$, $\delta = -1$.

In utroque casu fit ex (1) $a = a'$, et ex (2) $b' - b = \pm a\alpha\beta$. Sed b non $> \frac{1}{2}a$, et b' non $> \frac{1}{2}a$ proin etiam non $> \frac{1}{2}a$. Quare aequatio $b' - b = \pm a\alpha\beta$ consistere nequit, nisi fuerit aut $b = b'$, unde sequeretur $c = \frac{D+bb}{a} = \frac{D+b'b'}{a'} = c'$, quare formae (a, b, c) , (a', b', c') identicae essent contra hyp.

aut $b = -b' \pm \frac{1}{2}a$. In hoc etiam casu erit $c = c'$ formaque (a', b', c') erit $(a, -b, c)$ i.e. formae (a, b, c) opposita. Simul patet, formas has esse ancipites propter $2b = \pm a$.

II. Si $\gamma = \pm 1$, fit ex (1) $a\alpha\alpha + c = a' + 2b\alpha$. Sed c non minor quam a , adeoque non minor quam a' ; hinc $a\alpha\alpha + c - a'$ sive $2b\alpha$ certo non minor quam $a\alpha\alpha$. Quare quum $2b$ non sit maior quam a , erit $\alpha\alpha$ non minor quam α ; unde necessario aut $\alpha = 0$, aut $\alpha = \pm 1$.

1) Si $\alpha = 0$, fit ex (1) $a' = c$, et quoniam a neque maior quam c , neque minor quam a' , erit necessario $a' = a = c$. Porro ex (3) fit $\beta\gamma = -1$, unde ex (2) $b + b' = \pm \frac{1}{2}c = \pm \frac{1}{2}a$. Hinc simili modo ut in (I) sequitur esse

aut $b = b'$, in quo casu formae (a, b, c) , (a', b', c') forent identicae, contra hyp.

aut $b = -b'$, in quo casu formae (a', b', c') erunt oppositae (a, b, c) .

2) Si $\alpha = \pm 1$, ex (1) sequitur $+2b = \alpha(a' + c - a)$. Quare quum neque a neque $c < a'$, erit $2b$ non $< a$ et non $< c$. Sed $2b$ etiam non $> a$ neque $> c$, unde necessario $\pm 2b = a = c$, et hinc ex aequ. $2b = a + c - a'$, etiam $= a'$. Fit igitur ex (2)

$$b' = a(\alpha\beta + \gamma\delta) + b(\alpha\delta + \beta\gamma)$$

sive, propter $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$,

$$b' - b = a(\alpha\beta + \gamma\delta \pm \beta\gamma).$$

quare necessario, ut ante

aut $b = b'$, unde formae (a, b, c) , (a', b', c') identicae, contra hyp.

aut $b = -b'$, adeoque formae illae oppositae. Simul in hoc casu propter $a = \pm 2b$, formae erunt ancipites.

Ex his omnibus colligitur, formas (a, b, c) , (a', b', c') proprie aequivalentes esse non posse, nisi fuerint oppositae, simulque aut ancipites, aut $a = c = a' = c'$.

In hisce casibus formas (a, b, c) , (a', b', c') proprie aequivalere, vel a priori facile praevideri potuit; si enim formae sunt oppositae, improprie, et si insuper ancipites, etiam proprie aequivalentes esse debent; si vero $a = c$, forma $\frac{D+(a-b)^2}{2a}$ formae (a, b, c) contigua et proin aequivalens erit; sed propter $D + bb = ac = aa$ fit $\frac{D+(a-b)^2}{2a} = \frac{2aa-2ab}{2a} = 2a - 2b$, forma vero $(2a - 2b, a - b, a)$ est anceps; quare (a, b, c) oppositae suae etiam proprie aequivalebit.

Aequae facile iam diiudicari potest, quando duae formae reductae (a, b, c) , (a', b', c') non oppositae improprie aequivalentes esse possunt. Erunt enim impr. aequivalentes, si (a, b, c) , $(a', -b', c')$, quae non identicae erunt, proprie sunt aequivalentes, et contra. Hinc patet, conditionem, sub qua illae improprie sint aequivalentes, esse, ut sint identicae, insuperque aut ancipites aut $a = c$.

Formae vero reductae, quae neque identicae sunt neque oppositae, neque proprie neque improprie aequivalentes esse possunt.

173.

Problema. Propositis duabus formis eiusdem determinantis negativi, F et F' , investigare, utrum sint aequivalentes.

Solutio. Quaerantur duae formae reductae f, f' formis F, F' resp. proprie aequivalentes: si formae f, f' sunt proprie, vel improprie vel utroque modo aequivalentes, etiam F, F' erunt; si vero f, f' nullo modo aequivalentes sunt, etiam F, F' non erunt.

Ex art. prae. dari possunt quatuor casus:

- 1) Si f, f' neque identicae neque oppositae, F, F' nullo modo aequivalentes erunt.
- 2) Si f, f' sunt primo vel identicae vel oppositae, et secundo vel ancipites, vel terminos suos extremos aequales habent: F, F' tum proprie, tum improprie aequivalentes erunt.
- 3) Si f, f' sunt identicae, neque vero ancipites neque terminos extremos aequales habent: F, F' proprie tantum aequivalebunt.
- 4) Si f, f' sunt oppositae, neque vero ancipites, neque terminos extremos aequales habent: F, F' improprie tantum aequivalentes erunt.

Ex. Formis (41, 35, 30), (7, 18, 47), quarum determinans = -5 , reductae (1, 0, 5), (2, 1, 3) non aequivalentes inveniuntur, quare illae nullo modo aequivalentes erunt. Formis vero (23, 38, 63), (15, 20, 27) aequivalet eadem reducta (2, 1, 3), quae quum simul sit anceps, formae (23, 38, 63), (15, 20, 27) tum proprie tum improprie aequivalebunt. Formis (37, 53, 78), (53, 73, 102), aequivalent reductae (9, 2, 9), (9, -2 , 9), quae quum sint oppositae, ipsarumque termini extremi aequales: formae propositae tam proprie quam improprie erunt aequivalentes.

174.

Multitudo omnium formarum reductarum, determinantem datum $-D$ habentium, semper est finita, et, respectu numeri D , satis modica: formae hae ipsae vero duplici modo inveniri possunt. Designemus formas reductas determinantis $-D$ indefinite per (a, b, c) , ubi itaque omnes valores ipsorum a, b, c determinari debent.

Methodus prima. Accipiantur pro a omnes numeri, tum positivi tum negativi non maiores quam $\sqrt{\frac{4}{3}D}$, quorum residuum quadraticum = $-D$, et pro singulis a , fiat b successive aequalis omnibus valoribus expr. $\sqrt{-D} \pmod{a}$, maioribus quam $\frac{1}{2}a$, tum positive tum negative acceptis; c vero pro singulis valoribus determinatis ipsorum a, b , ponatur = $\frac{bb+D}{a}$. Si quae formae hoc modo oriuntur, in quibus $c < a$, hae erunt reiiciendae, reliquae autem manifesto erunt reductae.

Methodus secunda. Accipiantur pro b omnes numeri tum positivi tum negativi, non maiores quam $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{4}{3}D}$, sive $\frac{1}{3}\sqrt{3D}$; pro singulis b resolvatur $bb + D$ omnibus quibus fieri potest modis in binos factores (etiam signorum diversitatis ratione habita) ambos ipso $2b$ non minores ponaturque alter factor, et quidem, quando factores sunt inaequales, minor = a , alter = c . Quum a non erit $> \frac{2}{3}\sqrt{3D}$, omnes formae, quae hoc modo prodeunt, manifesto erunt reductae. Denique patet, nullam formam reductam dari posse, quae non per utramque methodum inveniatur.

Ex. Sit $D = 85$. Hic limes valorum ipsius a est $\sqrt{\frac{340}{3}}$, qui iacet inter 10 et 11. Numeri vero inter 1 et 10 (incl.), quorum residuum = -85 , sunt 1, 2, 5, 10. Unde habentur formae duodecim:

$$(1, 0, 85), \quad (2, 1, 43), \quad (2, -1, 43), \quad (5, 0, 17), \quad (10, 5, 11), \quad (10, -5, 11); \\ (-1, 0, -85), \quad (-2, 1, -43), \quad (-2, -1, -43), \quad (-5, 0, -17), \quad (-10, 5, -11), \quad (-10, -5, -11).$$

Per methodum alteram limes valorum ipsius b habetur $\frac{1}{3}\sqrt{255}$, qui situs est inter 5 et 6. Pro $b = 0$, prodeunt formae

$$(1, 0, 85), \quad (-1, 0, -85), \quad (5, 0, 17), \quad (-5, 0, -17),$$

pro $b = \pm 1$ hae $(2, 1, 43)$, $(-2, -1, -43)$.

Pro $b = \pm 2$ nullae habentur, quia 89 in duos factores, qui ambo non < 4 , resolvi nequit. Idem valet de ± 3 , ± 4 . Tandem pro $b = \pm 5$, proveniunt

$$(10, 5, 11), \quad (-10, -5, -11).$$

175.

Si ex omnibus formis reductis determinantis dati, formarum binarum, quae, licet non identicae, tamen proprie sunt aequivalentes, alterutra reiicitur; formae remanentes hac insigni proprietate erunt praeditae, ut, quaevis forma eiusdem determinantis alicui ex ipsis proprie sit aequivalens, et quidem unicae tantum (alias enim inter ipsas aliquae proprie aequivalentes forent). Unde patet, omnes formas eiusdem determinantis in totidem classes distribui posse, quot formae remanserint, referendo scilicet formas eidem reductae proprie aequivalentes in eandem classem. Ita pro $D = 85$, remanent formae

$$\begin{aligned} (1, 0, 85), \quad (2, 1, 43), \quad (5, 0, 17), \quad (10, 5, 11), \\ (-1, 0, -85), \quad (-2, 1, -43), \quad (-5, 0, -17), \quad (-10, 5, -11) \end{aligned}$$

quare omnes formae determinantis -85 in octo classes distribui poterunt, prout formae primae, aut secundae etc. proprie aequivalent. Perspicuum vero est, formas in eadem classe locatas proprie aequivalentes fore, formas ex diversis classibus proprie aequivalentes esse non posse. Sed hoc argumentum de classificatione formarum infra multo fusius exsequemur.

Hic unicam observationem adiicimus. Iam supra ostendimus, si determinans formae (a, b, c) fuerit negativus $= -D$, a et c eadem signa habere (quia scilicet $ac = bb + D$ adeoque positivus); eadem ratione facile perspicitur si formae (a, b, c) , (a', b', c') sint aequivalentes, omnes a , c , a' , c' eadem signa habituros. Si enim prior in posteriorem per Substitut. $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$ transit: erit $a\alpha\alpha + 2b\alpha\gamma + c\gamma\gamma = a'$, hinc $a'a = (a\alpha + b\gamma)^2 + D\gamma\gamma$ adeoque certo non negativus; quoniam vero neque a neque $a' = 0$ esse potest, erit aa' positivus et proin signa ipsorum a , a' eadem. Hinc manifestum est, formas, quarum termini exteri sint positivi, ab iis, quorum termini exteri sint negativi, prorsus esse separatas, sufficitque ex formis reductis eas tantum considerare, quae terminos suos externos positivos habent, nam reliquae totidem sunt multitudo et ex illis oriuntur, tribuendo terminis exteris signa opposita; idemque valet de formis ex reductis reiiciendis et remanentibus.

176.

Ecce itaque pro determinantibus quibusdam negativis tabulam formarum, secundum quas omnes reliquae eiusdem determinantis in classes distinguere possunt; apponimus autem, ad annotat. art. prae., semissem tantum, scilicet, eas quarum termini exteri positivi.

D	Formae reductae
1	(1, 0, 1)
2	(1, 0, 2)
3	(1, 0, 3), (2, 1, 2)
4	(1, 0, 4), (2, 0, 2)
5	(1, 0, 5), (2, 1, 3)
6	(1, 0, 6), (2, 0, 3)
7	(1, 0, 7), (2, 1, 4)
8	(1, 0, 8), (2, 0, 4), (3, 1, 3)
9	(1, 0, 9), (2, 1, 5), (3, 0, 3)
10	(1, 0, 10), (2, 0, 5)
11	(1, 0, 11), (2, 1, 6), (3, 1, 4), (3, -1, 4)
12	(1, 0, 12), (2, 0, 6), (3, 0, 4), (4, 2, 4)

Superfluum foret hanc tabulam hic ulterius continuare, quippe quam infra multo aptius disponere docebimus.

Patet itaque, quamvis formam determinantis -1 , formae $xx + yy$ proprie aequivalere, si ipsius termini exteri sint positivi, vel huic $-xx - yy$, si sint negativi; quamvis formam determinantis -2 , cuius termini exteri positivi, formae $xx + 2yy$ etc.; quamvis formam determinantis -11 , cuius termini exteri positivi, alicui ex his $xx + 11yy$, $2xx + 2xy + 6yy$, $3xx + 2xy + 4yy$, $3xx - 2xy + 4yy$ etc.

177.

Problema. Habetur series formarum, quarum quaevis praecedenti a parte posteriori contigua: desideratur transformatio aliqua propria primae in formam quamcunque seriei.

Solutio. Sint formae $(a, b, a') = F$; $(a', b', a'') = F'$; $(a'', b'', a''') = F''$; $(a''', b''', a^{IV}) = F'''$ etc. Designentur $\frac{b+b'}{a'}$, $\frac{b'+b''}{a''}$, $\frac{b''+b'''}{a'''}$ etc. respective per h' , h'' , h''' etc. Sint indeterminatae formarum F , F' , F'' etc. x, y ; x', y' ; x'', y'' etc.

Ponatur F transmutari

$$\begin{aligned} &\text{in } F' \text{ positis } x = -y', \quad y = x' + h'y'; \\ &\text{in } F'' \text{ positis } x = -y'', \quad y = x'' + h''y''; \\ &\text{in } F''' \text{ positis } x = -y''', \quad y = x''' + h'''y''' \text{ etc. (art. 160)} \end{aligned}$$

facile eruatur sequens algorithmus (art. 159):

$$\begin{aligned} \alpha' &= 0, & \beta' &= -1, & \gamma' &= 1, & \delta' &= h'; \\ \alpha'' &= \gamma', & \beta'' &= h''\gamma' - \beta', & \gamma'' &= \alpha', & \delta'' &= h''\alpha' - \delta'; \\ \alpha''' &= \gamma'', & \beta''' &= h''' \gamma'' - \beta'', & \gamma''' &= \alpha'', & \delta''' &= h''' \alpha'' - \delta'' \text{ etc.} \end{aligned}$$

sive

$$\begin{aligned} \alpha' &= 0, & \beta' &= -1; \\ \alpha'' &= 1, & \beta'' &= h''; \\ \alpha''' &= h''', & \beta''' &= h'''h'' + 1; \\ \alpha^{IV} &= h'''h'' + 1, & \beta^{IV} &= h^{IV}h'''h'' + h^{IV} + h'' \text{ etc.} \end{aligned}$$

haec ad formas determinantis negativi non est restricta, sed ad omnes casus patet, si modo nullus numerorum a' , a'' , a''' etc. $= 0$.

178.

Problema. Propositis duabus formis F, f , eiusdem determinantis negativi, proprie aequivalentibus: invenire transformationem aliquam propriam alterius in alteram.

Sol. Supponamus formam F esse (A, B, A') et per methodum art. 171 inventam esse progressionem formarum $(A, B, A'), (A', B', A''), (A'', B'', A''')$ etc. usque ad (A^m, B^m, A^{m+1}) , quae sit reducta: similiterque f esse (a, b, a') et per eandem methodum inventam seriem $(a', b', a''), (a'', b'', a''')$ usque ad (a^n, b^n, a^{n+1}) , quae sit reducta. Tum duo casus locum habere possunt.

I. Si formae $(A^m, B^m, A^{m+1}), (a^n, b^n, a^{n+1})$ sunt aut identicae, aut oppositae simulque ancipites. Tum formae $(A^{m-1}, B^{m-1}, A^m), (a^{n-1}, -b^{n-1}, a^n)$ erunt contiguae (designante A^{m-1} terminum progressionis $A, A', A'' \dots A^m$ penultimum, similiaque a^{n-1}, b^{n-1}, a^n). Nam $A^m \equiv B^{m-1} \equiv B^m \pmod{A^{m-1}}, b^{n-1} \equiv -b^n \pmod{a^n}$ sive A^m ; unde $B^{m-1} - b^{n-1} \equiv B^m - b^n = 0$, si formae $(A^m, B^m, A^{m+1}), (a^n, b^n, a^{n+1})$ sunt identicae, et $\equiv 2B^m$ adeoque $= 0$, si sunt oppositae et ancipites. Quare in progressionem formarum

$$(A, B, A'), \quad (A', B', A''), \quad \dots \quad (A^{m-1}, B^{m-1}, A^m), \\ (a^{n-1}, -b^{n-1}, a^n), \quad (a^{n-2}, -b^{n-2}, a^{n-1}), \quad \dots \quad (a, b, a'), \quad (a, b, a')$$

quaevis forma praecedenti contigua erit, adeoque per art. prae. transformatio propria primae F in ultimam f inveniri poterit.

II. Si formae $(A^m, B^m, A^{m+1}), (a^n, b^n, a^{n+1})$ non identicae, sed oppositae simulque $A^m = A^{m+1} = a^n = a^{n+1}$. Tum progressio formarum

$$(A, B, A'), \quad (A', B', A''), \quad \dots \quad (A^{m-1}, B^{m-1}, A^m), \\ (a^{n-1}, -b^{n-1}, a^n), \quad (a^{n-2}, -b^{n-2}, a^{n-1}), \quad \dots \quad (a, b, a'), \quad (a, b, a')$$

eadem proprietate erit praedita. Nam $A^{m+1} = a^n$, et $B^{m-1} - b^{n-1} = -(B^m + B^m)$ per a^n divisibilis. Unde per art. prae. invenietur transformatio propria formae primae F in ultimam f .

Ex. Ita pro formis $(23, 38, 63), (15, 20, 27)$ habetur progressio

$$(23, 38, 63), (63, 25, 10), (10, 5, 3), (3, 1, 2), (2, -7, 27), (27, -20, 15), (15, 20, 27)$$

quare

$$h' = 1, \quad h'' = 3, \quad h''' = 2, \quad h^{IV} = -3, \quad h^V = -1, \quad h^{VI} = 3.$$

Hinc deducitur transformatio formae $23xx + 76xy + 63yy$ in $15tt + 40tu + 27uu$ haec: $x = -13t - 18u, y = 8t + 11u$.

Ex solutione hac nullo negotio sequitur solutio problematis: Si formae F, f improprie sunt aequivalentes, invenire transformationem impropriam formae F in f . Sit enim $f = att + 2btu + duu$ eritque forma opposita $app - 2bpq + dqg$ formae F proprio aequivalens. Quaeratur transformatio propria formae F in illam, $X = \alpha p + \beta q, Y = \gamma p + \delta q$, patetque F transire in f positis $x = \alpha t - \beta u, y = \gamma t - \delta u$, hancque transformationem fore impropriam.

Quodsi igitur formae F, f tam proprie quam improprie sunt aequivalentes, inveniri poterit tam transformatio propria aliqua quam impropria.

179.

Problema. Si formae F, f sunt aequivalentes: invenire omnes transformationes formae F in f .

Sol. Si formae F, f unico tantum modo sunt aequivalentes i.e. proprio tantum vel improprie tantum: quaeratur per art. prae. transformatio una formae F in f , patetque

alias quam quae huic sint similes, dari non posse. Si vero formae F, f tam proprie quam improprie aequivalent, quaerantur duae transformationes, altera propria, altera impropria. Iam sit forma $F = (A, B, C)$, $BB - AC = -D$, numerorumque $A, 2B, C$ divisor communis maximus $= m$. Tum ex art. 162 patet, in priori casu omnes transformationes formae F in f ex una transformatione, in posteriori omnes proprias ex propria omnesque improprias ex impropria deduci posse, si modo omnes solutiones aequationis $tt + Duu = mm$ habeantur. His igitur inventis problema erit solutum.

Habetur autem $D = AC - BB$, $4D = 4AC - 4BB$, quare $\frac{4D}{mm} = 4\frac{A}{m}\frac{C}{m} - (\frac{2B}{m})^2$ erit integer. Iam si

1) $\frac{4D}{mm} > 4$, erit $D > mm$: quare in $tt + Duu = mm$, u necessario debet esse $= 0$, adeoque t alios valores quam $+m$ et $-m$ habere nequit. Hinc si F, f unico tantum modo aequivalentes sunt et transformatio aliqua

$$X = \alpha x' + \beta y', \quad Y = \gamma x' + \delta y'$$

praeter hanc ipsam, quae prodit ex $t = m$ (art. 162), et hanc

$$x = -\alpha x' - \beta y', \quad y = -\gamma x' - \delta y'$$

aliae locum habere non possunt. Si vero F, f tum proprie tum improprie aequivalent, atque propria aliqua transformatio habetur

$$X = \alpha x' + \beta y', \quad Y = \gamma x' + \delta y'$$

impropriaque

$$X = \alpha' x' + \beta' y', \quad Y = \gamma' x' + \delta' y'$$

praeter illam (ex $t = m$) hancce

$$x = -\alpha x' - \beta y', \quad y = -\gamma x' - \delta y' \quad (\text{ex } t = -m)$$

alia propria non dabitur; similiterque nulla impropria praeter

$$x = -\alpha' x' - \beta' y', \quad y = -\gamma' x' - \delta' y' \quad (\text{ex } t = -m)$$

et $x = \alpha' x' + \beta' y', y = \gamma' x' + \delta' y'$ (ex $t = m$).

2) Si $\frac{4D}{mm} = 4$, sive $D = mm$, aequatio $tt + Duu = mm$ quatuor solutiones admittet: $t, u = m, 0; -m, 0; 0, 1; 0, -1$. Hinc F, f unico tantum modo aequivalentes sunt et transformatio aliqua

$$X = \alpha x' + \beta y', \quad Y = \gamma x' + \delta y'$$

quatuor omnino transformationes dabuntur,

$$\begin{aligned} x &= +\alpha x' + \beta y', & y &= +\gamma x' + \delta y'; \\ x &= -\alpha x' - \beta y', & y &= -\gamma x' - \delta y'; \\ x &= +\gamma x' - \delta y', & y &= -\alpha x' + \beta y'; \\ x &= -\gamma x' + \delta y', & y &= +\alpha x' - \beta y'. \end{aligned}$$

Si vero F, f duobus modis aequivalent, sive praeter transformationem illam datam alia ipsi dissimilis habetur, haec quoque suppeditabit quatuor illis dissimiles, ita ut octo transformationes habeantur. Ceterum facile demonstrari potest, in hoc casu F, f semper revera

duobus modis aequivalere. Nam quum $D = mm = AC - BB$, m etiam ipsum B metietur. Formae $(\frac{A}{m}, \frac{B}{m}, \frac{C}{m})$ determinans $= -1$, quare formae erit vel huic $(1, 0, 1)$ vel huic $(-1, 0, -1)$ aequivalens.

Facile vero perspicitur, per eandem transformationem, per quam $(\frac{A}{m}, \frac{B}{m}, \frac{C}{m})$ transeat in $(+1, 0, +1)$ formam (A, B, C) transire in $(+m, 0, +m)$, ancipitem. Quare forma (A, B, C) , ancipiti aequivalens, cuivis formae, cui aequivalet, tum proprie tum improprie aequivalebit.

3) Si $\frac{4D}{mm} = 3$, sive $4D = 3mm$. Tum m erit par omnesque solutiones aequationis $tt + Duu = mm$ erunt sex,

$$t, u = m, 0; -m, 0; \frac{1}{2}m, 1; -\frac{1}{2}m, -1; \frac{1}{2}m, -1; -\frac{1}{2}m, 1.$$

Si itaque duae transformationes dissimiles formae F in f habentur

$$x = \alpha x + \beta y, \quad y = \gamma x + \delta y$$

habebuntur duodecim transformationes, scilicet sex priori similes

$$x = \pm \alpha x' + \beta y', \quad y = \pm \gamma x' + \delta y'$$

et sex posteriori similes, quae ex his nascuntur ponendo pro $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ hos $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$.

Quod vero in hoc casu semper F, f utroque modo aequivalent, ita demonstramus. Formae $(\frac{A}{m}, \frac{B}{m}, \frac{C}{m})$ determinans erit $= -\frac{3}{4}mm = -3$, adeoque haec forma (art. 176) aut formae $(+1, 0, +3)$ aut huic $(+2, +1, +2)$ aequivalens. Unde facile perspicitur, formam (A, B, C) aut formae $(+4m, 0, +\frac{1}{4}m)$ aut huic $(+m, +\frac{1}{2}m, +m)^3$, quae ambae sunt ancipites, aequivalere adeoque, cuivis aequivalenti, utroque modo.

4) Si supponitur $\frac{4D}{mm} = 2$, fit $4D = 4mm - 2$, adeoque $= 2 \pmod{4}$. Sed quum nullum quadratum esse possit $= 2 \pmod{4}$, hic casus locum habere nequit.

5) Supponendo $\frac{4D}{mm} = 1$, fit $4D = 4mm - 1 \equiv -1 \pmod{4}$. Quod quum impossibile sit, etiam hic casus nequit locum habere.

Ceterum quum D neque $= 0$, neque negativus sit, alii casus praeter enumeratos dari non possunt.

180.

Problema. Invenire omnes repraesentationes numeri dati M per formam $axx + 2bxy + cyy \dots F$ determinantis negativum $-D$, in quibus x, y valores inter se primos nanciscuntur.

Sol. Ex art. 154 patet, M eo quo requiritur modo repraesentari non posse, nisi $-D$ sit resid. quadr. ipsius M . Investigentur itaque primo omnes valores diversi (i.e. incongrui) expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$, qui sint $N, -N, N', -N', N'', -N''$ etc.; quo simplicior evadat calculus, omnes N, N' etc. ita determinari possunt, ut non sint $> \frac{1}{2}M$. Iam quoniam quaevis repraesentatio ad aliquem horum valorum pertinere debet, singuli seorsim considerentur.

Si formae $F, (M, N, \frac{NN-D}{M})$ non sunt proprie aequivalentes, nulla repraesentatio ipsius M ad valorem N pertinens dari potest (art. 168). Si vero sunt, investigetur transformatio propria formae F in $Mxx + 2Nxy + \frac{NN-D}{M}yy$, quae sit

$$X = \alpha x + \beta y, \quad Y = \gamma x + \delta y;$$

eritque $x = \alpha, y = \gamma$ repraesentatio numeri M per F ad N pertinens. Sit div. comm. max. numerorum $A, 2B, C, = m$; distinguanturque tres casus (art. prae.):

³Demonstrari potest, formam (A, B, C) necessario posteriori aequivalere: sed hoc hic non necessarium.

1) Si $\frac{4D}{mm} > 4$, aliae repraesentationes ad N pertinentes quam hae duae $x = \pm\alpha$, $y = \pm\gamma$; $x = \mp\alpha$, $y = \mp\gamma$ non dabuntur (artt. 169, 179).

2) Si $\frac{4D}{mm} = 4$, habebuntur quatuor repraesentationes.

3) Si $\frac{4D}{mm} = 3$, habebuntur sex repraesentationes.

Eodem modo quaerendae sunt repraesentationes ad valores $-N$, N' , $-N'$ etc. pertinentes.

181.

Investigatio repraesentationum numeri M per formam F , in quibus x, y valores inter se non primos habent, ad casum iam consideratum facile reduci potest. Fiat talis repraesentatio ponendo $x = \mu e$, $y = \mu f$, ita ut μ sit div. comm. max. ipsorum x, y , i.e. sive e, f inter se primi. Tum erit $M = \mu\mu(Aee + 2Bef + Cff)$ adeoque per $\mu\mu$ divisibilis; substitutio vero $x = e$, $y = f$ erit repraesentatio numeri $\frac{M}{\mu\mu}$ per formam F , in qua x, y valores inter se primos habent. Si itaque M per nullum quadratum (praeter 1) divisibilis est, e.g. si est numerus primus, tales repraesentationes ipsius M non dabuntur.

Si vero M divisores quadraticos implicat, sint hi $\mu\mu$, $\nu\nu$, $\tau\tau$ etc. Quaerantur primo omnes repraesentationes numeri $\frac{M}{\mu\mu}$ per formam (A, B, C) , in quibus x, y valores inter se primos habent, qui valores si per μ multiplicantur praebebunt omnes repraesentationes ipsius M , in quibus div. comm. max. numerorum x, y est μ . Simili modo omnes repraesentationes ipsius $\frac{M}{\nu\nu}$, in quibus valores ipsorum x, y inter se primi sunt, praebebunt omnes repraesentationes ipsius M , in quibus div. comm. max. valorum ipsorum x, y est ν etc.

Palam igitur est, per praecepta praecedentia omnes repraesentationes numeri dati per formam datam determinantis negativi inveniri posse.

Applicationes speciales ad discriptionem numerorum in quadrata duo, in quadratum simplex et duplex, in simplex et triplex.

182.

Descendimus ad quosdam casus particulares, tum propter insignem ipsorum elegantiam tum propter assiduam operam ab ill. Euler ipsis impensam, unde classicam quasi dignitatem sunt nacti.

I. Per formam $xx + yy$ ita repraesentari, ut x ad y sit primus (sive in duo quadrata inter se prima discerpi), nullus numerus potest nisi cuius residuum quadraticum est -1 , tales vero numeri, positive accepti, omnes poterunt. Sit M talis numerus, omnesque valores expr. $\sqrt{-1} \pmod{M}$ hi: $N, -N, N', -N', N'', -N''$ etc. Tum per art. 176 forma $(M, N, \frac{NN+1}{M})$ formae $(1, 0, 1)$ proprie aequivalens erit. Sit transformatio aliqua propria huius in illam, $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$; eruntque repraesentationes numeri M per formam $xx + yy$ ad N pertinentes hae quatuor⁴: $x = +\alpha$, $y = +\gamma$; $x = -\gamma$, $y = +\alpha$; $x = +\gamma$, $y = -\alpha$; $x = -\alpha$, $y = -\gamma$.

Quum forma $(1, 0, 1)$ sit anceps, patet, etiam formam $(M, N, \frac{NN+1}{M})$ ipsi proprie aequivalentem fore, illamque proprie in hanc transmutari positis $X = \alpha x - \beta y$, $y = -\gamma x + \delta y$. Hinc derivantur quatuor repraesentationes ipsius M ad $-N$ pertinentes, $x = +\alpha$, $y = -\gamma$; $x = +\gamma$, $y = +\alpha$; $x = -\gamma$, $y = -\alpha$; $x = -\alpha$, $y = +\gamma$. Manifestum itaque est, octo

⁴Patet enim, hunc casum sub (2) art. 180 contentum esse.

repraesentationes ipsius M dari, quarum semissis altera ad N , altera ad $-N$ pertineat; sed hae omnes unicum tantummodo discriptionem numeri M in duo quadrata exhibent, $M = \alpha\alpha + \gamma\gamma$, siquidem ad quadrata ipsa tantum neque vero ad ordinem radicumve signa spectamus.

Quodsi itaque alii valores expr. $\sqrt{-1} \pmod{M}$ praeter N et $-N$ non dantur, quod e.g. evenit, quando M est numerus primus, M unico tantum modo in duo quadrata inter se prima resolvi poterit. Iam quum -1 sit residuum quadraticum cuiusvis numeri primi formae $4n + 1$ (art. 108), manifestoque numerus primus in duo quadrata inter se non prima discerpi nequeat, habemus theorema

Quivis numerus primus formae $4n + 1$ in duo quadrata decomponi potest, et quidem unico tantum modo.

$2 = 1 + 1$, $5 = 1 + 4$, $13 = 4 + 9$, $17 = 1 + 16$, $29 = 4 + 25$, $37 = 1 + 36$, $41 = 16 + 25$, $53 = 4 + 49$, $61 = 25 + 36$, $73 = 9 + 64$, $89 = 25 + 64$, $97 = 16 + 81$ etc.

Theorema hoc elegantissimum iam Fermatio notum fuit, sed ab ill. Euler primo demonstratum est, Comm. nov. Petr. T. V, ad annos 1754, 1755, p. 3 sqq. In T. IV, diss. exstat ad idem argumentum pertinens, p. 3 sqq., sed tum rem penitus nondum absolverat, vid. imprimis art. 27.

Si igitur numerus aliquis formae $4n + 1$ aut pluribus modis aut nullo modo in duo quadrata resolvi potest, certo non erit primus.

Vice versa autem, si expr. $\sqrt{-1} \pmod{M}$ praeter N et $-N$ alios adhuc valores habet, aliae adhuc repraesentationes ipsius M dabuntur, ad hos pertinentes. In hoc itaque casu M pluribus modis in duo quadrata resolvi poterit e.g.

$$65 = 1 + 64 = 16 + 49, \quad 221 = 25 + 196 = 100 + 121.$$

Repraesentationes reliquae, in quibus x , y valores obtinent non primos inter se, per methodum nostram generalem facile inveniri possunt. Observamus tantummodo, si numerus aliquis factores formae $4n + 3$ involvens, per nullam divisionem per quadratum ab his liberari possit (quod fiet, si aliquis aut plures talium factorum dimensionem imparem habet), hunc nullo modo in duo quadrata resolvi posse⁵.

II. Per formam $xx + 2yy$ nullus numerus, cuius non-residuum -2 , ita repraesentari potest, ut x ad y sit primus, reliqui omnes poterunt. Sit -2 residuum numeri M , atque N valor aliquis expr. $\sqrt{-2} \pmod{M}$. Tum per art. 176 formae $(1, 0, 2)$, $(M, N, \frac{NN+2}{M})$ proprio aequivalentes erunt. Transeat illa proprie in hanc ponendo $x = \alpha x' + \beta y'$, $y = \gamma x' + \delta y'$; eritque $x = \alpha$, $y = \gamma$ repraesentatio numeri M ad N pertinens. Praeter hanc et $x = -\alpha$, $y = -\gamma$ aliae ad N non pertinebunt (art. 180).

Simili modo, ut supra, perspicitur, repraesentationes $x = \pm\alpha$, $y = \mp\gamma$ ad valorem $-N$ pertinere. Omnes vero hae quatuor repraesentationes unicum tantum discriptionem ipsius M in quadratum et quadratum duplex exhibent, et si praeter N et $-N$ alii valores

⁵Si numerus $M = 2^\mu \cdot 3^\alpha \cdot 5^\beta \cdot 7^\gamma \dots$ ita ut a , b , c etc. sint numeri primi inaequales formae $4n + 1$, atque S productum ex omnibus factoribus primis ipsius M formae $4n + 3$ (ad quam formam quivis numerus positivus reduci potest, faciendo $S = 1$, quando M est impar, et $S = 2$, quando M nullos factores formae $4n + 3$ implicat): M nullo modo in duo quadrata resolvi poterit, si S est non-quadratus; si vero S est quadratus, dabuntur $\frac{1}{2}(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1) \dots$ discriptiones ipsius M , quando aliquis numerorum α , β , γ etc. est impar, aut $\frac{1}{2}(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1) \dots + \frac{1}{2}$, quando omnes α , β , γ etc. sunt pares (siquidem ad quadrata ipsa tantum respicitur). Qui in calculo combinationum aliquantum sunt versati, demonstrationem huius theorematismis (cui, perinde ut aliis particularibus, immorari nobis non licet) ex theoria nostra generali haud difficulter eruere poterunt. Cf. art. 105.

expr. $\sqrt{-2} \pmod{M}$ non dantur, aliae discriptiones non dabuntur. Hinc adiumento propos. art. 116 facile deducitur theorema

Quivis numerus primus formae $8n + 1$, vel $8n + 3$, in quadratum et quadratum duplex decomponi potest et quidem unico tantum modo.

$1 = 1 + 0$, $3 = 1 + 2$, $11 = 9 + 2$, $17 = 9 + 8$, $19 = 1 + 18$, $41 = 9 + 32$, $43 = 25 + 18$, $59 = 9 + 50$, $67 = 49 + 18$, $73 = 1 + 72$, $83 = 81 + 2$, $89 = 81 + 8$, $97 = 25 + 72$ etc.

Etiam hoc theorema, ut plura similia, Fermatio innotuit: sed ill. La Grange primus demonstrationem dedit, Suite des recherches d'Arithmetique, Nouv. Mem. de l'Ac. de Berlin 1775, p. 323 sqq. Multa ad idem argumentum pertinentia iam ill. Euler absolverat, Specimen de usu observationum in mathesi pura Comm. nov. Petr. T. VI, p. 185 sqq. Sed demonstratio completa theorematis semper ipsius industriam elusit, p. 220. Conf. etiam diss. in T. VIII (ad annos 1760, 1761), Supplementum quorundam theorematum arithmetorum, sub fin.

III. Per methodum similem demonstratur, quemvis numerum, cuius residuum quadr. sit -3 , repraesentari posse aut per formam $xx + 3yy$, aut per hanc $2xx + 2xy + 2yy$, ita ut valor ipsius x ad valorem ipsius y sit primus. Quare quum -3 sit residuum omnium numerorum primorum formae $3n + 1$ (art. 119) manifestoque per formam $2xx + 2xy + 2yy$ numeri pares tantum repraesentari possint: eodem modo ut supra habetur theorema:

Quivis numerus primus formae $3n + 1$ in quadratum et quadratum triplex decomponi potest, et quidem unico tantum modo.

$1 = 1 + 0$, $7 = 4 + 3$, $13 = 1 + 12$, $19 = 16 + 3$, $31 = 4 + 27$, $37 = 25 + 12$, $43 = 16 + 27$, $61 = 49 + 12$, $67 = 64 + 3$, $73 = 25 + 48$ etc.

Demonstrationem huius theorematis ill. Euler primus tradidit in commentatione modo laudata, Comm. nov. Petr. T. VIII, p. 105 sqq.

Simili modo ulterius progredi et e.g. ostendere possemus, quemvis numerum primum formae $20n + 1$, vel $20n + 3$, vel $20n + 7$, vel $20n + 9$ (quippe quorum residuum $= -5$) per alterutram formam $xx + 5yy$, $2xx + 2xy + 3yy$ repraesentari posse, et quidem numeros primos formae $20n + 1$ et $20n + 9$ per priorem, primos formae $20n + 3$, $20n + 7$ per posteriorem, nec non dupla primorum formae $20n + 1$, $20n + 9$ per formam $2xx + 2xy + 3yy$, dupla primorum formae $20n + 3$, $20n + 7$ per formam $xx + 5yy$: sed hanc propositionem infinitasque alias particulares quivis proprio Marte ex praecedentibus et infra tradendis derivare poterit. Transimus itaque ad formas determinantem positivi, et quum harum indoles prorsus alia sit, quando determinans est quadratus, alia, quando non-quadratus: formas determinantis quadrati hic primo excludimus posteaque seorsim considerabimus.

De formis determinantis positivi non-quadrati.

183.

Problema. Proposita forma quacunque (a, b, a') , cuius determinans positivus non-quadratus $= D$: invenire formam huic proprie aequivalentem, (A, B, C) , in qua B sit positivus et $< \sqrt{D}$; A vero si est positivus, vel $-A$, si A negativus, inter $\sqrt{D} + B$ et $\sqrt{D} - B$ situs.

Sol. Supponimus in forma proposita utramque conditionem nondum locum habere; alioquin enim aliam formam quaerere opus non esset. Porro observamus, in forma determinantis non-quadrati terminum primum vel ultimum $= 0$ esse non posse (art. 171 ann.). Sit $b' \equiv -b \pmod{a'}$ atque intra limites $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a'$ situs (accepto signo superiore, quando a positivus, inferiori, quando est negativus), quod fieri posse simili ratione ut art. 3, facile demonstratur; ponaturque $\frac{b'b'-D}{a'} = a''$, qui erit integer, quia $b'b' - D \equiv bb - D = aa' \pmod{a}$. Iam si $a'' < a'$, fiat denuo $b'' \equiv -b' \pmod{a''}$ et inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a''$ situs (prout a' positivus vel negativus) et $\frac{b''b''-D}{a''} = a'''$. Si hic iterum $a''' < a''$, sit rursus $b''' \equiv -b'' \pmod{a'''}$ et inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a'''$ situs atque $\frac{b'''b'''-D}{a'''} = a^{IV}$. Haec operatio continuetur, donec in progressionem a', a'', a''', a^{IV} etc. ad terminum a^m perveniatur, praecedente a^{m-1} non minorem, quod tandem evenire debet, quia alioquin progressio infinita numerorum integrorum continuo decrescentium haberetur. Tum positis $a^m = A$, $b^m = B$, $a^{m+1} = C$, forma (A, B, C) omnibus conditionibus satisfaciet.

Dem. I. Quoniam in progressionem formarum (a, b, a') , (a', b', a'') , (a'', b'', a''') etc. quaevis praecedenti est contigua: ultima (A, B, C) primae (a, b, a') proprie aequivalens erit.

II. Quia B inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp A$ situs est (accipiendo semper signum superius, quando A est positivus, inferius, quando A est negativus) patet, si ponatur $\sqrt{D} - B = p$, $B - (\sqrt{D} \mp A) = q$, hos p, q fore positivos. Iam facile confirmatur, fore $qq + 2pq + 2p\sqrt{D} = D + AA - BB$; quare $D + AA - BB$ erit numerus positivus, quem ponemus $= r$. Hinc propter $D = BB - AC$, fit $r = AA - AC$, adeoque $AA - AC$ numerus positivus: quia vero per hyp. A non est maior quam C , manifeste illud aliter fieri nequit, quam AC est negativus, adeoque signa ipsorum A, C opposita. Hinc $BB = D + AC < D$ adeoque $B < \sqrt{D}$.

III. Porro quia $-AC = D - BB$, erit $AC < D$, et hinc (quia A non $> C$), $A < \sqrt{D}$. Quare $\sqrt{D} \mp A$ erit positivus, adeoque etiam B , qui inter limites $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp A$ est situs.

IV. Hinc a potiori $\sqrt{D} + B > A$ positivus, et quia $\sqrt{D} - B > A = -q$, est negativus, $+A$ situs erit inter $\sqrt{D} + B$ et $\sqrt{D} - B$. Q.E.D.

Ex. Proposita sit forma $(67, 97, 140)$, cuius determinans $= 29$. Hic invenitur progressio formarum $(67, 97, 140)$, $(140, -97, 67)$, $(67, -37, 20)$, $(20, -3, 1)$, $(-1, 5, 4)$. Ultima erit quaesita.

Tales formas (A, B, C) determinantis positivi non-quadrati D , in quibus A positive acceptus iacet inter $\sqrt{D} + B$ et $\sqrt{D} - B$, B vero positivus est atque $< \sqrt{D}$, **formas reductas** vocabimus. Formae itaque reductae determinantis positivi non-quadrati aliquantum differunt a formis reductis determinantis negativi; sed propter magnam analogiam inter has et illas, denominationes diversas introducere noluimus.

184.

Si aequivalentia duarum formarum reductarum determinantis positivi aequae facile di-
gnosci posset, ut in formis determinantis negativi (art. 172), aequivalentiam duarum formarum quarumcunque eiusdem determinantis positivi nullo negotio diiudicare possemus. Sed hic res longe aliter se habet, fierique potest ut permultae formae reductae inter se

aequivalentes sint. Antequam itaque problema hoc aggrediamur, profundius in naturam formarum reductarum (determinantis positivi non-quadrati, quod semper hic subintelligendum) inquirere necesse erit.

1) Si (a, b, c) est forma reducta, a et c signa opposita habebunt. Nam posito determinante formae $= D$, erit $ac = bb - D$ adeoque, propter $b < \sqrt{D}$, negativus.

2) Numerus c perinde ut a , positive acceptus, inter $\sqrt{D} + b$ et $\sqrt{D} - b$ situs erit. Nam $-c = \frac{D-bb}{a}$; quare, abstractione facta a signo, c iacebit inter $\sqrt{D} + b$ et $\sqrt{D} - b$.

3) Hinc patet, etiam (c, b, a) fore formam reductam.

4) Tum a tum c erunt $< 2\sqrt{D}$. Uterque enim est $< \sqrt{D} + b$, adeoque a potiori $< 2\sqrt{D}$.

5) Numerus b situs erit inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a$ (accepto signo superiori, quando a positivus, inferiori, quando est negativus). Quia enim $+a$ iacet inter $\sqrt{D} + b$ et $\sqrt{D} - b$, erit $+a - (\sqrt{D} - b)$, sive $b - (\sqrt{D} \mp a)$ positivus; $b - \sqrt{D}$ autem est negativus; quamobrem b inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a$ erit situs. Prorsus eodem modo demonstratur, b inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp c$ iacere (prout c pos. vel neg.).

6) Cuius formae reductae (a, b, c) ab utraque parte contigua est reducta una, et non plures.

Fiat $a' = c$, $b' \equiv -b \pmod{a'}$ et inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a'$ situs⁶, $c' = \frac{bb-D}{a'}$; eritque forma (a', b', c') formae (a, b, c) ab ultima parte contigua, simulque manifestum est, si ulla forma reducta formae (a, b, c) ab ultima parte contigua detur, eam ab hac (a', b', c') diversam esse non posse. Hanc vero revera esse reductam, ita demonstramus.

A) Si ponitur

$$\sqrt{D} + b = p, \quad +a - (\sqrt{D} - b) = q, \quad \sqrt{D} - b = r$$

hi p, q, r ex (2) supra et defin. formae reductae erunt positivi. Porro ponatur

$$b' - (\sqrt{D} \mp a') = q', \quad \sqrt{D} - b' = r'$$

eruntque q', r' positivi, quia b' iacet inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a'$. Denique sit $b + b' = \pm ma'$, eritque m integer. Iam patet esse $p + q = b + b'$, adeoque $b + b'$ sive $\pm ma'$ positivum, et proin etiam m ; unde sequitur, $m - 1$ certe non esse negativum. Porro fit

$$r + q' + md = 2b' + d, \quad \text{sive } 2b' = r + q' + (m - 1)d$$

umde $2b'$ et b' necessario erunt positivi. Et quoniam $b' + r' = \sqrt{D}$, erit $b' < \sqrt{D}$.

B) Porro fit

$$r + md = \sqrt{D} + b', \quad \text{sive } r + (m - 1)a' = \sqrt{D} - b' + a'$$

quare $\sqrt{D} + b' > a'$ erit positivus. Hinc et quoniam $+a' - (\sqrt{D} - b') = q'$, adeoque positivus, $+a'$ iacebit inter $\sqrt{D} + b'$ et $\sqrt{D} - b'$. Quocirca (a', b', c') erit forma reducta.

Eodem modo demonstratur, si fiat $'c = a$, $'b \equiv -b \pmod{'c}$ et inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp 'c$ situs, $'a = \frac{bb-D}{'c}$: formam (a', b', c') fore reductam. Manifesto autem forma haec formae (a, b, c) a parte prima est contigua, aliaque reducta praeter (a', b', c') hac proprietate praedita esse non poterit.

Ex. Formae reductae $(5, 11, -14)$, cuius determinans $= 191$, a parte ultima contigua reducta $(-14, 3, 13)$, a parte prima vero haec $(-22, 9, 5)$.

⁶Ubi signa ambigua sunt, superiora semper valent, quando a' est positivus, inferiora, quando a' negativus.

7) Si formae reductae (a, b, c) a parte ultima contigua est reducta (a, b', c) : reductae (c, b, a) contigua erit a prima parte forma (c, b', a) ; et si reductae (a, b, c) a prima parte contigua est forma (a', b', c) : reductae (c, b, a) reducta (c, b', a) contigua erit ab ultima parte. Porro etiam formae $(-a', b, -c)$, $(-a, b, -c)$, $(a', b', -c')$ reductae erunt, et secunda primae, tertia secundae ab ultima parte contiguae, sive prima secundae, secundaque tertiae a parte prima; similiterque tres formae $(-c, b', -a')$, $(-c, b, -a)$, $(-c, b', -a)$. Haec tam obvia sunt, ut explicatione non egeant.

185.

Multitudo omnium formarum reductarum determinantis dati D semper est finita, ipsae vero duplici modo inveniri possunt. Designemus indefinite omnes formas reductas determinantis D per (a, b, c) , ita ut omnes valores ipsorum a, b, c determinare oporteat.

Methodus prima. Accipiantur pro a omnes numeri (tum positive, tum negative) minores quam $2\sqrt{D}$, quorum residuum quadraticum $= D$, et pro singulis a , ponatur b aequalis omnibus valoribus positivis expr. $\sqrt{D} \pmod{a}$ inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a$ iacentibus; c vero pro singulis valoribus determinatis ipsorum a, b , ponatur $= \frac{bb-D}{a}$. Si quae formae hoc modo oriuntur, in quibus $+a$ extra $\sqrt{D} + b$ et $\sqrt{D} - b$ situs est, reiiciendae sunt.

Methodus secunda. Accipiantur pro b omnes numeri positivi minores quam $\sqrt{D}$; pro singulis $bb - D$ resolvatur omnibus quibus fieri potest modis in binos factores, qui neglecto signo inter $\sqrt{D} + b$ et $\sqrt{D} - b$ iaceant, ponaturque alter $= a$, alter $= c$. Manifestum est, singulas resolutiones in factores praebere binas formas, quia uterque factor tum $= a$, tum $= c$ poni debet.

Ex. Sit $D = 79$ eruntque valores ipsius a viginti duo $\pm 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15$. Unde inveniuntur formae undeviginti:

$$\begin{aligned} (1, 8, -15), (2, 7, -15), (3, 8, -5), (3, 7, -10), (5, 8, -3), (5, 7, -6), \\ (6, 7, -5), (6, 5, -9), (7, 4, -9), (7, 3, -10), (9, 5, -6), (9, 4, -7), \\ (10, 7, -3), (10, 3, -7), (13, 1, -6), (14, 3, -5), (15, 8, -1), (15, 7, -2), (15, 2, -5) \end{aligned}$$

totidemque aliae quae fiunt ex his, si terminorum exterorum signa commutantur, puta $(-1, 8, 15)$, $(-2, 7, 15)$ etc., ita ut omnes triginta octo sint. Sed ex his reiiciendae sex $(+13, 1, \mp 6)$, $(+14, 3, \mp 5)$, $(+15, 2, \mp 5)$, reliquae triginta duae omnes reductas amplectuntur. Per methodum secundam eadem formae prodeunt sequenti ordine⁷:

$$\begin{aligned} (+7, 3, \mp 10), (+10, 3, \mp 7), (+7, 4, \mp 9), (+9, 4, \mp 7), (+6, 5, \mp 9), (+9, 5, \mp 6), \\ (+2, 7, \mp 15), (+3, 7, \mp 10), (+5, 7, \mp 6), (+6, 7, \mp 5), (+10, 7, \mp 3), (+15, 7, \mp 2), \\ (+1, 8, \mp 15), (+3, 8, \mp 5), (+5, 8, \mp 3), (+15, 8, \mp 1). \end{aligned}$$

186.

Sit F forma reducta determinantis D , ipsique ab ultima parte contigua forma reducta F' ; huic iterum ab ultima parte contigua reducta F'' ; reducta F''' ipsi F'' contigua ab ultima parte etc. Tum patet, omnes formas F', F'', F''' etc. esse prorsus determinatas, et tum inter se tum formae F proprie aequivalentes. Quoniam vero multitudo omnium formarum reductarum determinantis dati est finita, manifestum est, omnes formas in progressionem infinitam F, F', F'' etc. diversas esse non posse. Ponamus F^m et F^{m+n} esse identicas, eruntque F^{m-1} et F^{m+n-1} ei dem formae reductae a parte prima contiguae,

⁷Pro $b = 1, -78$ in duos factores, qui neglecto signo inter $\sqrt{79} + 1$ et $\sqrt{79} - 1$ iaceant, resolvi nequit; quare hic valor est praetereundus, ex eademque ratione valores 2 et 6.

adeoque identicae; hinc eodem modo F^{m-2} et F^{m+n-2} etc. tandemque F et F^n identicae erunt. Quare in progressionem F, F', F'' etc., si modo satis longe continuatur, necessario tandem forma prima F recurret; et si supponimus F^n esse primam identicam cum F , sive omnes $F', F'' \dots F^{n-1}$ a forma F diversas: facile perspicitur, omnes formas $F, F', F'' \dots F^{n-1}$ diversas fore. Complexum harum formarum vocabimus **periodum** formae F . Si igitur progressio ultra ultimam periodi formam producit, eadem formae F, F', F'' etc. iterum prodibunt, progressioque tota infinita F, F', F'' etc. constituta erit ex hac periodo formae F infinities repetita.

Progressio F, F', F'' etc. etiam retro continuari potest, praeponendo formae F reductam $'F$, quae ipsi a parte prima est contigua; huic iterum reductam $''F$, quae ipsi a prima parte contigua etc. Hoc modo habebitur progressio formarum utrimque infinita

$$\dots ''F, 'F, F, F', F'', F''' \dots$$

perspicieturque facile, $'F$ identicam fore cum F^{n-1} , $''F$ cum F^{n-2} etc. adeoque progressionem etiam a laeva parte e periodo formae F , infinities repetita, esse constitutam.

Si formis F, F', F'' etc.; $'F, ''F$ etc. tribuuntur indices 0, 1, 2 etc.; $-1, -2$ etc., generaliterque formae F^m index m , formae $''F$ index $-m$: patet, formas quascunque seriei identicas fore vel diversas, prout ipsarum indices congrui sint vel incongrui secundum modulum n .

Ex. Periodus formae $(3, 8, -5)$, cuius determinans = 79, invenitur haec: $(3, 8, -5)$, $(-5, 7, 6)$, $(6, 5, -9)$, $(-9, 4, 7)$, $(7, 3, -10)$, $(-10, 7, 3)$. Post ultimam iterum prodit $(3, 8, -5)$. Hic itaque $n = 6$.

187.

Ecce quasdam observationes generales circa has periodos.

1) Si formae F, F', F'' etc.; $'F, ''F, ''''F$ etc. ita exhibentur:

$$(a, b, -a'), (-a', b', a''), (a'', b'', -a''') \dots; (-a, 'b, a'), ('a, ''b, -''a) \dots$$

omnes a, a', a'', a''' etc. $'a, ''a, ''''a$ etc. eadem signa habebunt (art. 184, 1), omnes vero b, b', b'' etc. $'b, ''b$ etc. erunt positivi.

2) Hinc manifestum est, numerum n (multitudinem formarum, ex quibus periodus formae F constat) semper esse parem. Etenim terminus primus formae cuiusvis F^m ex hac periodo manifesto idem signum habebit uti terminus primus formae F , si m est par, oppositum, si m est impar. Quare quum F^n et F identicae sint, n necessario erit par.

3) Demonstravimus (art. 184), quomodo forma reducta F^m periodi formae F contigua sit a parte prima, nempe = $(a^m, b^{m-1}, -a^{m-1})$; et a parte posteriori, = $(a^m, b^{m+1}, -a^{m+1})$. Hinc facile colligitur, omnes periodos formarum reductarum determinantis dati D , quae quidem ex eodem termino a incipiunt, eandem seriem terminorum b, b', b'' etc. habere.

4) Omnes formae reductae eiusdem periodi eandem signorum dispositionem habent. Signorum autem dispositionem vocabimus eam relationem, qua termini primi formarum $F, F', F'' \dots F^{n-1}$ ad signa sua respiciunt. Ita in exemplo nostro signa terminorum primorum sunt $+, -, +, -, +, -$.

5) Formae reductae, quae diversis periodis pertinentes eandem signorum dispositionem habent, periodis suis in ordinem similem redactis, aequivalentes erunt. Ut si periodus formae F redacta in ordinem est $(a, b, -a'), (-a', b', a''), (a'', b'', -a''')$ etc., et periodus formae G pariter est $(c, d, -c'), (-c', d', c''), (c'', d'', -c''')$ etc.: formae F et G aequivalentes erunt. Hinc facile diiudicari poterit, an duae formae reductae eidem periodo an diversis adnumerandae sint.

6) Vocamus formas socias, quae ex iisdem terminis constant, sed ordine inverso positae, ut $(a, b, -a')$ et $(-a', b, a)$. Tum facile perspicitur ex art. 184, 7, si periodus formae reductae F sit $F, F', F'' \dots F^{n-1}$, formae F socia f formisque $F^{n-1}, F^{n-2} \dots F', F$ resp. sociae sint formae $f', f'' \dots f^{n-2}, f^{n-1}$: periodum formae f fore $f, f', f'' \dots f^{n-2}, f^{n-1}$ adeoque ex totidem formis constare, ut periodum formae F . Periodos formarum sociarum vocabimus periodos socias. Ita in exemplo nostro sociae sunt periodi III et VI; IV et V.

7) Sed fieri etiam potest, ut forma f ipsa in periodo sociae suae F occurrat, uti in ex. nostro in periodo I et II, adeoque periodus formae F cum periodo formae f conveniat, sive ut periodus formae F sibi ipsi sit socia. Quoties hoc evenit, in hac periodo duae formae ancipites invenientur. Ponamus enim periodum formae F constare e $2m$ formis sive F et F^{2m} esse identicas; porro sit $m + 1$ index formae f in periodo formae F^8 , sive $F^{m+1} = f$ sociae. Tum patet etiam F' et F^{m+2} fore socias nec non F'' et F^{m+3} , unde etiam F^m et F^{2m+1} . Sit $F^m = (a^m, b^m, -a^{m+1})$, $F^{m+1} = (-a^{m+1}, b^{m+1}, a^{m+2})$. Tum erit $b^m + b^{m+1} \equiv 0 \pmod{a^{m+1}}$; ex defin. formarum sociarum vero erit $b^m = b^{m+1}$ atque hinc $2b^{m+1} \equiv 0 \pmod{a^{m+1}}$, sive forma F^{m+1} anceps. Eodem modo F^{2m+1} et F^{2m} erunt sociae; hinc F^{m-1} et F^{m+2} , F^{m-2} et F^{m+3} etc. tandemque F^{2m+1} et F^m , quarum posterior erit anceps, uti per simile ratiocinium facile probatur. Quia vero $m + 1$ et $m + m + 1$ secundum mod. m sunt incongrui, formae F^{m+1} et F^{m+m+1} identicae non erunt (art. 186, ubi n idem denotat, quod hic $2m$). Ita in I sunt formae ancipites $(1, 8, -15)$, $(2, 7, -15)$; in II vero $(-1, 8, 15)$, $(-2, 7, 15)$.

8) Vice versa, quaevis periodus, in qua forma anceps occurrit, sibi ipsi socia est. Facile enim perspicitur, si F^m sit forma reducta anceps: formam ipsi sociam (quae etiam est reducta) simul ipsi a parte prima contiguam esse, i.e. F^{m-1} et F^m socias. Tum vero tota periodus sibi ipsi socia erit. Hinc patet, fieri non posse, ut unica tantum forma anceps in periodo aliqua contenta sit.

9) Sed etiam plures quam duae in eadem periodo esse nequeunt. Ponamus enim in periodo formae F , ex $2n$ formis constante, tres formas ancipites dari F^λ, F^μ, F^ν , ad indices λ, μ, ν respective pertinentes, ita ut λ, μ, ν sint numeri inaequales inter limites 0 et $2n - 1$ (incl.) siti. Tum formae $F^{\lambda-1}$ et F^λ erunt sociae; similiterque $F^{\mu-1}$ et F^μ etc. tandemque $F^{\nu-1}$ et F^ν . Ex eadem ratione F^λ et $F^{2\lambda-1}$ sociae erunt, nec non F^μ et $F^{2\mu-1}$; quare $F^{2\lambda-1}, F^{2\mu-1}, F^{2\nu-1}$ identicae, indicesque $2\lambda - 1, 2\mu - 1, 2\nu - 1$ secundum modulum $2n$ congrui erunt, et proin etiam $\lambda \equiv \mu \equiv \nu \pmod{n}$. Q.E.A. quia manifeste inter limites 0 et $2n - 1$ tres numeri diversi secundum modulum n congrui iacere nequeunt.

188.

Quum omnes formae ex eadem periodo proprio sint aequivalentes, quaestio oritur, annon etiam formae e periodis diversis proprio aequivalentes esse possint. Sed antequam ostendamus, hoc esse impossibile, quaedam de transformatione formarum reductarum sunt exponenda.

Quoniam in sequentibus de formarum transformationibus persaepe agendum erit: ut prolixitatem quantum fieri potest evitemus, sequenti scribendi compendio abhinc semper utemur. Si forma aliqua $L'XX + 2M'XY + N'YY$ per substitutionem $X = \alpha x + \beta y$, $Y = \gamma x + \delta y$ in formam $lxx + 2mxy + nyy$ transformetur: simpliciter dicemus, (L, M, N) transformari in (l, m, n) per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Hoc modo opus non erit, indeterminatas formarum singularum, de quibus agitur, per signa propria denotare. Palam vero est, indeterminatam primam a secunda in quavis forma probe distingui debere.

⁸Index hic necessario erit impar, quia manifesto termini primi formarum F, f signa opposita habent (vid. supra, 2).

Proposita sit forma reducta $(a, b, -a') \dots f$, determinantis D . Formetur simili modo ut in art. 186 progressio formarum reductarum utrimque infinita,

$$\dots {}''''f, {}''f, {}'f, f, f', f'', f''' \dots$$

et quidem sit

$$\begin{aligned} f &= (a, b, -a'), & f' &= (-a', b', a''), & f'' &= (a'', b'', -a''') \text{ etc.}; \\ {}'f &= (-a, {}'b, a'), & {}''f &= ({}'a, {}''b, -{}'a) \text{ etc.} \end{aligned}$$

Ponatur

$$\begin{aligned} \frac{b+b'}{-a'} &= h', & \frac{b'+b''}{a''} &= h'', & \frac{b''+b'''}{-a'''} &= h''' \text{ etc.}, \\ \frac{{}'b+b}{a} &= {}'h, & \frac{{}''b+{}'b}{-{}'a} &= {}''h, & \frac{{}'''b+{}''b}{{}''a} &= {}'''h \text{ etc.} \end{aligned}$$

Tum patet, si (ut in art. 177) numeri $\alpha', \alpha'', \alpha'''$ etc.; $\beta', \beta'', \beta'''$ etc. etc. formantur secundum algorithmum sequentem:

$$\begin{aligned} \alpha' &= 0, & \beta' &= -1, & \gamma' &= 1, & \delta' &= h'; \\ \alpha'' &= \gamma', & \beta'' &= h''\gamma' - \beta', & \gamma'' &= \alpha', & \delta'' &= h''\alpha' - \delta'; \\ \alpha''' &= \gamma'', & \beta''' &= h''' \gamma'' - \beta'', & \gamma''' &= \alpha'', & \delta''' &= h''' \alpha'' - \delta'' \text{ etc.} \end{aligned}$$

f transformatum iri

$$\begin{aligned} &\text{in } {}'f \text{ per substitutionem } \alpha', \beta', \gamma', \delta' \\ &\text{in } {}''f \text{ per substitutionem } \alpha'', \beta'', \gamma'', \delta'' \\ &\text{in } {}'''f \text{ per substitutionem } \alpha''', \beta''', \gamma''', \delta''' \text{ etc.} \end{aligned}$$

omnesque has transformationes fore proprias.

Quum $'f$ transeat in f per substitutionem propriam $0, -1, 1, h$ (art. 158): f transibit in $'f$ per subst. prop. $h, 1, -1, 0$. Ex simili ratione $'f$ transibit in $''f$ per subst. propr. $'h, 1, -1, 0$; $''f$ in $'''f$ per subst. pr. ${}''h, 1, -1, 0$ etc. Hinc per art. 159 eodem modo ut art. 177 colligitur, si numeri $\alpha, {}''\alpha, {}'''\alpha$ etc.; $\beta, {}''\beta, {}'''\beta$ etc. etc. formantur secundum algorithmum sequentem:

$$\begin{aligned} {}'\alpha &= h, & {}'\beta &= 1, & {}'\gamma &= -1, & {}'\delta &= 0; \\ {}''\alpha &= {}'\gamma, & {}''\beta &= {}'h'\gamma - {}'\beta, & {}''\gamma &= {}'\alpha, & {}''\delta &= {}'h'\alpha - {}'\delta; \\ {}'''\alpha &= {}''\gamma, & {}'''\beta &= {}''h''\gamma - {}''\beta, & {}'''\gamma &= {}''\alpha, & {}'''\delta &= {}''h''\alpha - {}''\delta \text{ etc.} \end{aligned}$$

f transformatum iri

$$\begin{aligned} &\text{in } {}'f \text{ per substitutionem } {}'\alpha, {}'\beta, {}'\gamma, {}'\delta \\ &\text{in } {}''f \text{ per substitutionem } {}''\alpha, {}''\beta, {}''\gamma, {}''\delta \\ &\text{in } {}'''f \text{ per substitutionem } {}'''\alpha, {}'''\beta, {}'''\gamma, {}'''\delta \\ &\text{etc.} \end{aligned}$$

omnesque has transformationes fore proprias.

Si ponitur $\alpha = 1, \beta = 0, \gamma = 0, \delta = 1$: hi numeri eandem rationem habebunt ad formam f , quam habent $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$ ad f' ; $\alpha'', \beta'', \gamma'', \delta''$ ad f'' etc.; $\alpha, \beta, \gamma, \delta$

ad $'f$ etc. Scilicet per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ forma f transibit in f' . Tum vero progressionem infinitam $\alpha, \alpha'', \alpha'''$ etc., $'\alpha, ''\alpha, '''\alpha$ etc., per intercalationem termini $\alpha' = 0$, concinne iungentur, ita ut unam continuam utrimque infinitam constituere concipi possint secundum eandem legem ubique progredientem... $'''\alpha, ''\alpha, '\alpha, \alpha, \alpha', \alpha'', \alpha'''$... Lex progressionis haec est:

$$'''\alpha + '\alpha = '' h \cdot ''\alpha, \quad ''\alpha + \alpha = ' h \cdot '\alpha, \quad '\alpha + \alpha' = h \cdot \alpha, \quad \alpha + \alpha'' = h' \cdot \alpha', \quad \alpha' + \alpha''' = h'' \cdot \alpha'' \quad \text{etc.}$$

sive generaliter (si indicem negativum a dextra scriptum idem designare supponimus, ac positivum a laeva)

$$\alpha^{m-1} + \alpha^{m+1} = h^m \alpha^m.$$

Simili modo progressio ... $''\beta, '\beta, \beta, \beta', \beta''$... continua erit, cuius lex

$$\beta^{m-1} + \beta^{m+1} = h^m \beta^m$$

et proprio cum praecedente identica, omnibus terminis uno loco promotis, $''\beta = '\alpha, '\beta = \alpha, \beta = \alpha'$ etc. Lex progressionis continuae ... $''\gamma, '\gamma, \gamma, \gamma', \gamma''$... erit haec

$$\gamma^{m-1} + \gamma^{m+1} = h^m \gamma^m$$

et lex huius ... $''\delta, '\delta, \delta, \delta', \delta''$... erit

$$\delta^{m-1} + \delta^{m+1} = h^m \delta^m.$$

insuperque generaliter $h^m = \gamma^{m+1} \delta^m - \gamma^m \delta^{m+1}$.

Ex. Sit forma proposita f haec $(3, 8, -5)$, quae transformabitur in formam $'''f = (-10, 7, 3)$ per substitutionem $-805, -152, +143, +27$

$$\begin{array}{llll}'''f = (-10, 7, 3) & \dots & -805, -152, +143, +27 \\''f = (3, 8, -5) & \dots & -152, -27, +27, +5 \\'f = (-5, 7, 6) & \dots & +27, +5, -10, -2 \\f = (6, 5, -9) & \dots & -10, -2, +3, +1 \\f' = (-9, 4, 7) & \dots & +3, +1, -1, 0 \\f'' = (7, 3, -10) & \dots & -1, 0, 0, 1 \\f''' = (-10, 7, 3) & \dots & 0, 1, 1, 0 \\f^{IV} = (3, 8, -5) & \dots & 1, 0, 0, 1 \\f^V = (-5, 7, 6) & \dots & 0, 1, 1, 0 \\f^{VI} = (6, 5, -9) & \dots & 1, 0, 0, 1 \\f^{VII} = (-9, 4, 7) & \dots & 0, 1, 1, 0 \quad \text{etc.}\end{array}$$

189.

1) Ex legibus progressionis in art. prae. traditis sequitur, omnes numeros $\alpha^m, \beta^m, \gamma^m, \delta^m$ (pro indice quocunque m) esse integros, quorum priores duo secundis ita sunt coniuncti, ut sit $\alpha^m \delta^m - \beta^m \gamma^m = (-1)^m$.

2) Hinc facile deducitur, fractionem $\frac{\gamma^m}{\alpha^m}$ ei dem signo gaudere atque a vel a' , prout m est par vel impar, adeoque $\frac{\gamma^m}{\alpha^m}$ semper signum habere oppositum signo ipsius a^{m+1} ; fractionem vero $\frac{\delta^m}{\beta^m}$ (quando denominator non est $= 0$) signum oppositum habere signo

ipsius a^m , ita ut progressio $\frac{\gamma'}{\alpha'}, \frac{\gamma''}{\alpha''}, \frac{\gamma'''}{\alpha'''}$ etc. continuo crescat, signumque termini α^m sit +, −, −, +, prout $m \equiv 0, 1, 2, 3 \pmod{4}$.

3) Hoc modo invenitur, omnes quatuor progressiones infinitas $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc.; $\gamma, \gamma', \gamma''$ etc.; $'\alpha, ''\alpha, '''\alpha$ etc.; $'\gamma, ''\gamma, '''\gamma$ etc. continuo crescere, adeoque etiam sequentes cum illis identicas: β, β', β'' etc.; $\delta, \delta', \delta''$ etc.; $\beta', \delta', \beta'', \delta''$ etc.; $'\beta, ''\beta, '''\beta$ etc.; et, prout $m \equiv 0, 1, 2, 3 \pmod{4}$, signum

ipsius α^m ,	+	−	−	+	ipsius β^m ,	+	−	+	−
ipsius γ^m ,	+	+	−	−	ipsius δ^m ,	+	+	−	−
ipsius ${}^m\alpha$,	+	+	−	−	ipsius ${}^m\beta$,	+	+	−	−
ipsius ${}^m\gamma$,	+	−	+	−	ipsius ${}^m\delta$,	+	−	+	−

valentibus superioribus, quando a est positivus, inferioribus, quando a negativus.

Teneatur imprimis haec proprietas: Designante m indicem quemcunque positivum, α^m et γ^m habebunt eadem signa, quando a positivus, opposita, quando a negativus, similiterque β^m et δ^m ; contra ${}^m\alpha$ et ${}^m\gamma$, vel ${}^m\beta$ et ${}^m\delta$ habebunt eadem signa, quando a negativus, opposita, quando a positivus.

4) In signis art. 27 magnitudo ipsorum α^m etc. concinne ita exhiberi potest, ponendo

$$\pm h' = k', \quad \pm h'' = k'', \quad \pm h''' = k''' \text{ etc.}, \quad \pm' h = 'k, \quad \pm'' h = ''k \text{ etc.}$$

ita ut omnes k', k'' etc. $'k, ''k$ etc. sint numeri positivi:

$$\begin{aligned} \alpha^m &= \pm[k', k'', k''' \dots k^{m-1}], & \beta^m &= \pm[k', k'', \dots k^m] \\ \gamma^m &= \pm[k'', k''' \dots k^{m-1}], & \delta^m &= \pm[k', k'', k''' \dots k^m] \\ {}^m\alpha &= \pm['k, ''k \dots {}^{m-1}k], & {}^m\beta &= \pm['k, ''k \dots {}^mk] \\ {}^m\gamma &= \pm[''k \dots {}^{m-1}k], & {}^m\delta &= \pm['k, ''k \dots {}^{m-1}k] \end{aligned}$$

signa vero ad praecepta modo tradita determinari debent. Secundum has formulas, quarum demonstrationem propter facilitatem omittimus, calculus semper expeditissime absolvi poterit.

190.

Lemma. Designantibus m, μ, m', n, ν, n' numeros integros quoscunque, ita tamen ut trium posteriorum nullus sit $= 0$: dico, si $\frac{\mu}{\nu}$ iaceat inter limites $\frac{m}{n}$ et $\frac{m'}{n'}$ exclusive, atque sit $mn' - nm' = +1$, denominatorem ν fore maiorem quam n et n' .

Dem. Manifesto $\frac{\mu}{\nu} \cdot nn'$ iacebit inter $\frac{m}{n} \cdot nn'$ et $\frac{m'}{n'} \cdot nn'$; adeoque ab utroque limite minus differet quam limes alter ab altero, i.e. erit $\frac{m}{n}nn' - \frac{\mu}{\nu}nn' < nn' \cdot |\frac{m}{n} - \frac{m'}{n'}|$ et $\frac{\mu}{\nu}nn' - \frac{m'}{n'}nn' < nn' \cdot |\frac{m}{n} - \frac{m'}{n'}|$, sive $\mu n' - \nu m < \frac{n'}{\nu}$ et $\nu m' - \mu n < \frac{n}{\nu}$. Hinc sequitur, quoniam $\mu n' - \nu m$ certe non $= 0$ (alioquin enim foret $\frac{\mu}{\nu} = \frac{m}{n}$ contra hyp.), neque $\nu m' - \mu n = 0$ (ex simili ratione) sed uterque ad minimum $= 1$, fore $\nu > n'$ et $> n$. Q.E.D.

Perspicuum itaque est, ν non posse esse $= 1$, i.e. si fuerit $mn' - nm' = +1$, inter fractiones $\frac{m}{n}, \frac{m'}{n'}$ nullum numerum integrum iacere posse. Quare etiam cifra inter ipsas iacere nequit, i.e. fractiones istae signa opposita habere nequeunt.

191.

Theorem. Si forma reducta $(a, b, -a')$ determinantis D per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ transit in reductam $(A, B, -A')$ eiusdem determinantis: iacebit, primo, $\frac{-\gamma}{\alpha}$ inter $-\frac{\sqrt{D+b}}{a}$ et $-\frac{\sqrt{D-b}}{a}$ (siquidem neque γ neque $\alpha = 0$, i.e. si uterque limes est finitus), accepto

signo superiore, quando neuter horum limitum habet signum signo ipsius a oppositum (sive clarius, quando aut uterque idem habet, aut alter idem, alter est $= 0$), inferiori, quando neuter habet idem ut a ; secundo $\frac{\delta}{\beta}$ inter $-\frac{\sqrt{D+b}}{a'}$ et $-\frac{\sqrt{D-b}}{a'}$ (siquidem neque α neque $\beta = 0$), signo superiori accepto, quando limes neuter signum signo ipsius a' (vel a) oppositum habet, inferiori, quando neuter habet idem ut a'^9 .

Dem. Habentur aequationes

$$a\alpha\alpha + 2b\alpha\gamma - a'\gamma\gamma = A \quad (1)$$

$$a\beta\beta + 2b\beta\delta - a'\delta\delta = -A' \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{D}+b}{a} \cdot \alpha + \frac{-\sqrt{D}+b}{a} \cdot \gamma = \frac{-\sqrt{D}+B}{A} \text{ sive } \frac{\sqrt{D}+B}{A} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{D}+b}{a} \cdot \beta + \frac{-\sqrt{D}+b}{a} \cdot \delta = \frac{-\sqrt{D}-B}{-A'} \text{ sive } \frac{\sqrt{D}-B}{-A'} \quad (4)$$

$$\frac{\sqrt{D}+b}{a'} \cdot \gamma + \frac{-\sqrt{D}+b}{a'} \cdot \alpha = \frac{\sqrt{D}+B}{A} \text{ sive } \frac{-\sqrt{D}+B}{A} \quad (5)$$

$$\frac{\sqrt{D}+b}{a'} \cdot \delta + \frac{-\sqrt{D}+b}{a'} \cdot \beta = \frac{\sqrt{D}-B}{-A'} \text{ sive } \frac{-\sqrt{D}-B}{-A'} \quad (6)$$

Aequatio 3, 4, 5, 6 reiicienda erit, si $\gamma, \delta, \alpha, \beta$ resp. $= 0$. Sed dubium hic manet, quae signa quantitatibus radicalibus tribui debeant; hoc sequenti modo decidemus.

Statim patet, in (3) et (4) necessario signa superiora accipi debere, quando neque $-\frac{\sqrt{D+b}}{a}$ neque $-\frac{\sqrt{D-b}}{a}$ signum habeat signo ipsius a oppositum; quoniam accepto signo inferiori $-\frac{\sqrt{D+b}}{a}$ et γ fierent quantitates negativae. Quia vero A et A' signa eadem habent, $\sqrt{D}$ cadet inter $\sqrt{D + \frac{AA'}{aa'}}$ et $\sqrt{D - \frac{AA'}{aa'}}$ adeoque in hocce casu $-\frac{\gamma}{\alpha}$ inter $-\frac{\sqrt{D+b}}{a}$ et $-\frac{\sqrt{D-b}}{a}$. Quare pars prima theorematis pro casu priori est demonstrata.

Eodem modo perspicitur, in (5) et (6) necessario signa inferiora accipi debere quando neque $-\frac{\sqrt{D+b}}{a'}$ neque $-\frac{\sqrt{D-b}}{a'}$ signum idem habeant ut a' sive a quia accepto superiori $-\frac{\delta}{\beta}$ necessario fierent quantitates positivae. Unde protinus sequitur, $-\frac{\delta}{\beta}$ pro hocce casu iacere inter $-\frac{\sqrt{D+b}}{a'}$ et $-\frac{\sqrt{D-b}}{a'}$. Demonstrata est itaque etiam pars secunda theorematis pro casu posteriori. Quodsi aequae facile ostendi posset, in (3) et (4) signa inferiora accipi debere, quando neutra quantitatium $-\frac{\gamma}{\alpha}, -\frac{\delta}{\beta}$ signum idem habeat ut a , et in (5) et (6) superiora, quando neque $-\frac{\delta}{\beta}$ neque $-\frac{\gamma}{\alpha}$ signum oppositum habeat: hinc simili modo sequeretur, pro illo casu $-\frac{\gamma}{\alpha}$ iacere inter $-\frac{\sqrt{D+b}}{a}$ et $-\frac{\sqrt{D-b}}{a}$, pro hoc $-\frac{\delta}{\beta}$ inter $-\frac{\sqrt{D+b}}{a'}$ et $-\frac{\sqrt{D-b}}{a'}$ sive pars prima theorematis etiam pro casu posteriori et secunda pro casu priori demonstratae forent. Sed quum illud difficile quidem non sit, attamen sine quibusdam ambagibus fieri nequeat, methodum sequentem praeferimus.

Quando nullus numerorum $\alpha, \beta, \gamma, \delta = 0$, $-\frac{\gamma}{\alpha}$ et $-\frac{\delta}{\beta}$ eadem signa habebunt ut $-\frac{\sqrt{D+b}}{a}$ vel $-\frac{\sqrt{D-b}}{a}$. Quando itaque neutra harum quantitatium signum idem habet ut a' sive a , adeoque $-\frac{\gamma}{\alpha}$ et $-\frac{\delta}{\beta}$ inter $-\frac{\sqrt{D+b}}{a}$ et $-\frac{\sqrt{D-b}}{a}$ cadit: neutra quantitatium $-\frac{\gamma}{\alpha}, -\frac{\delta}{\beta}$ signum idem ut a habebit, cadetque $-\frac{\delta}{\beta} = \frac{-a'\gamma}{a\beta}$ (propter $aa' = DD - bb$) inter $-\frac{\sqrt{D+b}}{a}$ et $-\frac{\sqrt{D-b}}{a}$. Quare pro eo casu, ubi neque α neque $\beta = 0$, pars prima theor. etiam pro casu secundo est demonstrata (nam conditio, ut neque γ neque $\delta = 0$, iam in theor. ipso est adiuncta). Simili modo, quando nullus numerorum $\alpha, \beta, \gamma, \delta = 0$, et neque $-\frac{\gamma}{\alpha}$ neque $-\frac{\delta}{\beta}$ signum

⁹Manifestum est, alios casus locum habere non posse, quum ex art. prae. propter $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$, limites bini neque signa opposita habere, neque simul $= 0$ esse possint.

signo ipsius a vel a' oppositum habet adeoque $-\frac{\gamma}{\alpha}$ inter $-\frac{\sqrt{D}+b}{a}$ et $-\frac{\sqrt{D}-b}{a}$ iacet: etiam $\frac{\delta}{\beta}$ et $\frac{\gamma}{\alpha}$ signum oppositum signo ipsius a' non habebit, cadetque $-\frac{\delta}{\beta} = \frac{-a\gamma}{a'\beta}$ inter $-\frac{\sqrt{D}+b}{a'}$ et $-\frac{\sqrt{D}-b}{a'}$. In eo igitur casu, ubi neque γ neque $\delta = 0$, pars secunda theor. etiam pro casu secundo est demonstrata.

Nihil itaque superesset quam ut demonstretur, partem primam theor. etiam pro casu secundo locum habere, si alteruter numerorum α , β sit $= 0$, et partem secundam pro casu primo si aut γ aut $\delta = 0$. At omnes hi casus sunt impossibiles.

Supponamus enim, pro parte prima theor., esse neque γ neque $\delta = 0$; $-\frac{\gamma}{\alpha}$ non habere signum idem ut a atque esse 1) $\alpha = 0$. Tum ex aequ. $\alpha\delta - \beta\gamma = +1$ fit $\beta = +1$, $\gamma = +1$. Hinc ex (1) $A = -a'$, quare $A > a'$, adeoque etiam a et A signa opposita habent, unde fit $\sqrt{D - \frac{AA'}{aa'}} > \sqrt{D} > b$. Hinc patet, in (4) necessario signum inferius accipi debere, quia accepto superiori $-\frac{\delta}{\beta}$ manifesto signum idem obtineret ut a' . Fit itaque $-\frac{\delta}{\beta} > \frac{-\sqrt{D}+b}{-a'} > \frac{\sqrt{D}}{a'}$ (propter $a' < \sqrt{D} + b$ ex def. formae reductae), Q.E.A. quia $\frac{\delta}{\beta} = +1$ et δ non $= 0$. Sit $\beta = +1$, 2) $\alpha = 0$. Tum ex aequ. $\alpha\delta - \beta\gamma = +1$ fit $\alpha = +1$, $\delta = +1$. Hinc ex (2) $-A' = a'$, quare a' et a et A signa eadem habebunt, unde fit $\sqrt{D + \frac{AA'}{aa'}} > \sqrt{D} > b$. Hinc patet, in (3) signum inferius accipi debere, quia accepto superiori $-\frac{\gamma}{\alpha}$ signum idem obtineret ut a . Fit itaque $-\frac{\gamma}{\alpha} > \frac{-\sqrt{D}+b}{a} > 1$, Q.E.A. eadem ratione ut ante.

Pro parte secunda si supponimus neque α neque $\beta = 0$; $-\frac{\delta}{\beta}$ non habere signum signo ipsius a' oppositum atque 1) $\gamma = 0$: ex aequ. $\alpha\delta - \beta\gamma = +1$ fit $\alpha = +1$, $\delta = +1$. Hinc ex (1) $A = a$, quare a' et A signa eadem habebunt, unde fit $\sqrt{D + \frac{AA'}{aa'}} > \sqrt{D} > b$. Quocirca in (6) signum superius erit accipiendum, quia accepto inferiori, $\frac{\delta}{\beta}$ obtineret signum oppositum signo ipsius a' . Fit igitur $\frac{\delta}{\beta} < \frac{-\sqrt{D}+b}{-a'} < 1$, Q.E.A., quia $\delta = +1$ et β non $= 0$. Tandem 2) si esset $\delta = 0$, ex $\alpha\delta - \beta\gamma = +1$ fit $\beta = +1$, $\gamma = +1$, adeoque ex (2) $-A' = a'$. Hinc $\sqrt{D - \frac{AA'}{aa'}} > \sqrt{D} > b$, quare in (5) signum superius accipiendum. Hinc $\frac{\gamma}{\alpha} < \frac{-\sqrt{D}+b}{a'} < 1$. Quare theorema in omni sua extensione est demonstratum.

Quum differentia inter $-\frac{\sqrt{D}+b}{a}$ et $-\frac{\sqrt{D}-b}{a}$ sit $= \frac{2b}{a} < 1$: differentia inter $-\frac{\gamma}{\alpha}$ et $-\frac{\sqrt{D}+b}{a}$ vel $-\frac{\sqrt{D}-b}{a}$ erit $< \frac{1}{|\alpha|}$; inter $-\frac{\delta}{\beta}$ autem et $-\frac{\sqrt{D}+b}{a'}$, vel inter illam quantitatem et $-\frac{\sqrt{D}-b}{a'}$ nulla fractio iacere poterit, cuius denominator non sit maior quam γ aut δ (lemma prae.). Eodem modo differentia quantitatis $-\frac{\delta}{\beta} = \frac{-a\gamma}{a'\beta}$ a fractione $-\frac{\gamma}{\alpha}$ vel hac a $\frac{\delta}{\beta}$ erit minor quam $\frac{1}{|\beta|}$, et inter illam quantitatem et $-\frac{\gamma}{\alpha}$ neutram harum fractionum iacere potest fractio, cuius denominator non sit maior quam α et β .

192.

Ex applicatione theor. prae. ad algorithmum art. 188 sequitur, quantitatem $-\frac{\gamma}{\alpha}$, quam per L designabimus, iacere inter $-\frac{\gamma'}{\alpha'}$ et $-\frac{\gamma''}{\alpha''}$; inter $-\frac{\gamma''}{\alpha''}$ et $-\frac{\gamma'''}{\alpha'''}$; inter $-\frac{\gamma'''}{\alpha'''}$ et $-\frac{\gamma^{IV}}{\alpha^{IV}}$ etc. (facile enim ex art. 189, 3 fin. deducitur, nullum horum limitum habere signum oppositum signo ipsius a ; quare quantitati radicali $\sqrt{D}$ signum positivum tribui debet) sive inter $-\frac{\gamma'}{\alpha'}$ et $-\frac{\gamma''}{\alpha''}$; inter $-\frac{\gamma''}{\alpha''}$ et $-\frac{\gamma'''}{\alpha'''}$ etc.

Omnes itaque fractiones $-\frac{\gamma'}{\alpha'}$, $-\frac{\gamma'''}{\alpha'''}$, $-\frac{\gamma^V}{\alpha^V}$ etc. ab eadem parte iacebunt, omnesque $-\frac{\gamma''}{\alpha''}$, $-\frac{\gamma^{IV}}{\alpha^{IV}}$, $-\frac{\gamma^{VI}}{\alpha^{VI}}$ etc. ipsi $-\frac{\gamma}{\alpha}$ a parte altera. Quoniam vero $\gamma' < \gamma'' < \gamma'''$ etc., $-\frac{\gamma''}{\alpha''}$ iacebit extra $-\frac{\gamma'}{\alpha'}$ et $-\frac{\gamma'''}{\alpha'''}$, similique ratione $-\frac{\gamma^{IV}}{\alpha^{IV}}$ extra $-\frac{\gamma'''}{\alpha'''}$ et $-\frac{\gamma^V}{\alpha^V}$ etc. Unde manifestum est,

has quantitates iacere sequenti ordine

$$-\frac{\gamma'}{\alpha'} > -\frac{\gamma'''}{\alpha'''} > -\frac{\gamma^V}{\alpha^V} \dots > L > \dots > -\frac{\gamma^{VI}}{\alpha^{VI}} > -\frac{\gamma^{IV}}{\alpha^{IV}} > -\frac{\gamma''}{\alpha''}.$$

Differentia autem inter $-\frac{\gamma}{\alpha}$ et L erit minor quam differentia inter $-\frac{\gamma'}{\alpha'}$ et $-\frac{\gamma''}{\alpha''}$, i.e. $< \frac{1}{|\alpha'\alpha''|}$; similique ratione differentia inter $-\frac{\gamma''}{\alpha''}$ et L erit $< \frac{1}{|\alpha''\alpha''|}$ etc. Quamobrem $-\frac{\gamma'}{\alpha'}$, $-\frac{\gamma''}{\alpha''}$, $-\frac{\gamma'''}{\alpha'''}$ etc. continuo propius ad limitem L accedunt, et quoniam α' , α'' , α''' continuo in infinitum crescunt, differentia fractionum a limite quavis quantitate data minor fieri potest.

Ex art. 189 nulla quantitatum $'\gamma/'\alpha$, $''\gamma/''\alpha$, $''' \gamma/''' \alpha$ etc. signum idem habebit ut a : hinc per ratiocinia praecedentibus omnino similia sequitur, illas et hanc $'\gamma/'\alpha$, quam per L' designabimus, iacere sequenti ordine

$$\frac{'\alpha}{'\gamma} > \frac{''\alpha}{''\gamma} > \frac{''' \alpha}{''' \gamma} \dots > L' > \dots > \frac{'''\alpha}{''' \gamma} > \frac{''\alpha}{''\gamma} > \frac{'\alpha}{'\gamma}.$$

Differentia autem inter $-\frac{'\gamma}{'\alpha}$ et L' minor erit quam $\frac{1}{|'\alpha''\alpha|}$, differentia inter $-\frac{''\gamma}{''\alpha}$ et L' minor quam $\frac{1}{|''\alpha''' \alpha|}$ etc. Quare fractiones $'\gamma/'\alpha$, $''\gamma/''\alpha$, $''' \gamma/''' \alpha$ etc. continuo propius ad L' accedunt, et differentia quavis quantitate data minor fieri poterit.

In ex. art. 188 fit $L = -\frac{\gamma'''}{\alpha'''} = -\frac{143}{805} = 0,1776388$ et fractiones appropinquantes $-\frac{\gamma}{\alpha} = 0$, $-\frac{\gamma'}{\alpha'} = \frac{1}{5}$, $-\frac{\gamma''}{\alpha''} = \frac{2}{11}$, $-\frac{\gamma'''}{\alpha'''} = \frac{3}{16}$, $-\frac{\gamma^{IV}}{\alpha^{IV}} = \frac{5}{27}$ etc. Est autem $L = 0,1776388\dots$

Ibidem fit $L' = -\frac{'\gamma}{'\alpha} = \frac{27}{152} = 0,1776315$, fractionesque approximantes $\frac{'\gamma}{'\alpha} = -\frac{1}{5}$, $-\frac{''\gamma}{''\alpha} = -\frac{2}{11}$, $-\frac{''' \gamma}{''' \alpha} = -\frac{3}{16}$, $-\frac{'''\gamma}{''' \alpha} = -\frac{5}{27}$, $-\frac{'''' \gamma}{'''' \alpha} = -\frac{8}{43}$ etc. Est vero $L' = 0,1776315\dots$

193.

Theorem. Si formae reductae f , F proprie aequivalentes sunt: altera in alterius periodo contenta erit.

Sit $f = (a, b, -a')$, $F = (A, B, -A')$, determinans harum formarum D , transeatque illa in hanc per substitutionem propriam $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{D}$. Tum dico, si periodus formae f quaeratur progressioque utrimque infinita formarum reductarum atque transformationum formae f in ipsas eruatur, eodem modo ut art. 188: vel $+\mathfrak{A}$ fore aequalem termino alicui progressionis $\dots''\alpha$, $'\alpha$, α , α' , $\alpha''\dots$, hocque posito $= \alpha^m$, $+\mathfrak{B}$ fore $= \beta^m$, $+\mathfrak{C} = \gamma^m$, $+\mathfrak{D} = \delta^m$; vel $-\mathfrak{A}$ fore aequalem termino alicui $'\alpha^m$, $-\mathfrak{B} = \beta^m$, $-\mathfrak{C} = \gamma^m$, $-\mathfrak{D} = \delta^m$ (ubi m etiam indicem negativum designare potest). In utroque casu F manifesto identica erit cum f^m .

Dem. I. Habentur quatuor aequationes

$$a\mathfrak{A}\mathfrak{A} + 2b\mathfrak{A}\mathfrak{C} - a'\mathfrak{C}\mathfrak{C} = A \quad (1)$$

$$a\mathfrak{A}\mathfrak{B} + b(\mathfrak{A}\mathfrak{D} + \mathfrak{B}\mathfrak{C}) - a'\mathfrak{C}\mathfrak{D} = B \quad (2)$$

$$a\mathfrak{B}\mathfrak{B} + 2b\mathfrak{B}\mathfrak{D} - a'\mathfrak{D}\mathfrak{D} = -A' \quad (3)$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{D} - \mathfrak{B}\mathfrak{C} = 1 \quad (4)$$

Consideramus autem primo casum, ubi aliquis numerorum $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{D} = 0$.

1° Si $\mathfrak{D} = 0$, fit ex (4) $\mathfrak{B}\mathfrak{C} = -1$, adeoque $\mathfrak{B} = +1$, $\mathfrak{C} = +1$. Hinc ex (1), $-a' = A$; ex (2), $-b - a' = B$ sive $B \equiv -b \pmod{A}$; unde sequitur formam $(A, B, -A')$ formae $(a, b, -a')$ ab ultima parte contiguam esse. Quoniam vero illa est reducta, necessario cum f' identica erit. Ergo $B = b'$, adeoque ex (2) $b + b' = -a'\mathfrak{B}\mathfrak{D} = +a'\mathfrak{D}$; hinc propter $\mathfrak{A}\mathfrak{D} = A'$ fit $\mathfrak{D} = h'\mathfrak{A}'$. Unde colligitur, $+\mathfrak{A}$, $+\mathfrak{B}$, $+\mathfrak{C}$, $+\mathfrak{D}$ esse resp. $= 0$, -1 , $+1$, h' sive, $= \alpha'$, β' , γ' , δ' .

2° Si $\mathfrak{B} = 0$, fit ex (4) $\mathfrak{A} = \pm 1$, $\mathfrak{D} = \pm 1$; ex (3) $a' = A'$; ex (2) $b \pm a'\mathfrak{A} = B$, sive $b \equiv B \pmod{a'}$. Quoniam vero tum b tum B iacebunt inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a'$ (prout a' pos. vel neg., art. 184, 5). Quare erit necessario $b = B$, et $\mathfrak{D} = 0$. Hinc formae f , F sunt identicae atque $+\mathfrak{A}$, $+\mathfrak{B}$, $+\mathfrak{C}$, $+\mathfrak{D} = 1, 0, 0, 1 = \alpha, \beta, \gamma, \delta$ (resp.).

3° Si $\mathfrak{C} = 0$, fit ex (4) $\mathfrak{A} = +1$, $\mathfrak{D} = +1$; ex (1) $a = A$; ex (2) $+a\mathfrak{B} + b = B$ sive $b \equiv B \pmod{a}$. Quia vero tum b tum B iacent inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp a$: erit necessario $B = b$ et $\mathfrak{B} = 0$. Quare casus hic a praecedente non differt.

4° Si $\mathfrak{A} = 0$, ex (4) $\mathfrak{B} = +1$, $\mathfrak{C} = +1$; ex (3) $a' = -A''$, ex (2) $+b\mathfrak{B} - a' = B$ sive $B \equiv -b \pmod{a'}$. Hinc forma F formae f a parte prima contigua erit, et proin cum forma $'f$ identica. Quare propter $'f = F$, et $B = 'b$, erit $+\mathfrak{D} = A$. Unde colligitur $+\mathfrak{A}$, $+\mathfrak{B}$, $+\mathfrak{C}$, $+\mathfrak{D}$ resp. esse $= h, 1, -1, 0, = ' \alpha, \beta', \gamma', \delta'$.

Superest itaque casus, ubi nullus numerorum $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D} = 0$. Hic per Lemma art. 190 quantitates $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}$ idem signum habebunt, oriunturque inde duo casus, quum signum hoc vel cum signo ipsorum a, a' convenire vel ipsi oppositum esse possit.

II. Si $\mathfrak{C}, \mathfrak{D}$ idem signum habent ut a : quantitas $-\frac{\mathfrak{C}}{\mathfrak{A}}$ (quam designabimus per L) inter has fractiones $-\frac{\gamma'}{\alpha'}$, $-\frac{\gamma''}{\alpha''}$, $-\frac{\gamma'''}{\alpha'''}$ etc. sita erit (art. 191). Demonstrabimus iam, $\frac{\mathfrak{C}}{\mathfrak{A}}$ aequalem fore alicui fractionum $-\frac{\gamma'}{\alpha'}$, $-\frac{\gamma''}{\alpha''}$, $-\frac{\gamma'''}{\alpha'''}$ etc., atque $\frac{\mathfrak{D}}{\mathfrak{B}}$ proxime sequenti, scilicet si $-\frac{\mathfrak{C}}{\mathfrak{A}}$ fuerit $= -\frac{\gamma^m}{\alpha^m}$, $\frac{\mathfrak{D}}{\mathfrak{B}}$ fore $= -\frac{\delta^m}{\beta^m}$. In art. prae. ostendimus, quantitates $-\frac{\gamma'}{\alpha'}$, $-\frac{\gamma''}{\alpha''}$, $-\frac{\gamma'''}{\alpha'''}$ etc. (quas brevitatis gratia per (1), (2), (3) etc. denotabimus), atque L , hunc ordinem (I) observare: (1), (3), (5)... L ... (6), (4), (2); prima harum quantitatuum est $= 0$ (propter $\alpha' = 0$), reliquae omnes idem signum habent ut L sive a . Quoniam vero per hyp. $\mathfrak{C}, \mathfrak{D}$ (pro quibus scribemus $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$) idem signum habent: patet has quantitates ipsi (1) a dextra iacere (aut si mavis ab eadem parte a qua L), et quidem, quum L iaceat inter ipsas, alteram ipsi L a dextra, alteram a laeva. Facile vero ostendi potest, $\mathfrak{M}$ ipsi (2) a dextra iacere non posse, alioquin enim $\mathfrak{M}$ iaceret inter (1) et L , unde sequeretur primo (2) iacere inter $\mathfrak{M}$ et $\mathfrak{N}$, adeoque denominatorem fractionis (2) maiorem esse denominatorem fractionis $\mathfrak{M}$ (art. 190), secundo $\mathfrak{N}$ iacere inter (1) et (2), adeoque denom. fractionis $\mathfrak{N}$ esse maiorem quam denom. fractionis (2). Q.E.A.

Supponamus $\mathfrak{M}$ nulli fractionum (2), (3), (4) etc. aequalem esse, ut, quid inde sequatur, videamus. Tum manifestum est, si fractio $\mathfrak{M}$ ipsi L a laeva iaceat, necessario eam sitam esse aut inter (1) et (3), aut inter (3) et (5), aut inter (5) et (7) etc. (quoniam L est irrationalis, adeoque ipsi $\mathfrak{M}$ certo inaequalis, fractionesque (1), (3), (5) etc. quavis quantitate data, ipsi L inaequali propius ad L accedere possunt). Si vero $\mathfrak{M}$ ipsi L a dextra iacet: necessario iacebit aut inter (2) et (4), aut inter (4) et (6) aut inter (6) et (8) etc. Ponamus itaque $\mathfrak{M}$ iacere inter (m) et $(m+2)$, patetque quantitates $\mathfrak{M}, (m), (m+1), (m+2), L$ iacere sequenti ordine

$$(II)^{10}: \quad \mathfrak{M}, (m), (m+2), L, (m+1).$$

Tum erit necessario $\mathfrak{N} = (m+1)$. Iacebit enim $\mathfrak{N}$ ipsi L a dextra; si vero etiam ipsi $(m+1)$ a dextra iaceret, $(m+1)$ iaceret inter $\mathfrak{N}$ et $\mathfrak{M}$, unde $\gamma^{m+1} > \mathfrak{N}$, $\mathfrak{M}$ vero inter (m) et $(m+1)$, unde $\gamma^{m+1} > \mathfrak{M}$ (art. 190), Q.E.A.; si vero $\mathfrak{N}$ ipsi $(m+1)$ a laeva iaceret, sive inter $(m+2)$ et $(m+1)$, foret $\mathfrak{D} > \gamma^{m+1}$ et quia $(m+2)$ inter $\mathfrak{M}$ et $\mathfrak{N}$ foret $\gamma^{m+1} > \mathfrak{M}$, Q.E.A. Erit itaque $\mathfrak{N} = (m+1)$ sive $\frac{\mathfrak{D}}{\mathfrak{B}} = -\frac{\delta^m}{\beta^m} = \frac{\gamma^{m+1}}{\alpha^{m+1}}$.

Quia $\mathfrak{A}\mathfrak{D} - \mathfrak{B}\mathfrak{C} = 1$, $\mathfrak{A}$ erit primus ad $\mathfrak{C}$ et ex simili ratione $\mathfrak{B}$ primus ad $\mathfrak{D}$. Unde facile perspicitur aequationem $\frac{\mathfrak{C}}{\mathfrak{A}} = \frac{\gamma^m}{\alpha^m}$ consistere non posse, nisi fuerit aut $\mathfrak{A} = \alpha^m$, $\mathfrak{D} = \delta^m$, aut $\mathfrak{A} = -\alpha^m$, $\mathfrak{D} = -\delta^m$. Iam quum forma f per substitutionem propriam $\alpha^m, \beta^m, -\gamma^m$,

$-\delta^m$ in formam f^m transmutetur, quae est $(+a^m, b^m, +a^{m+1})$: habebuntur aequationes

$$a\alpha^m\alpha^m + 2b\alpha^m\gamma^m - a'\gamma^m\gamma^m = +a^{m+1} \quad (5)$$

$$a\alpha^m\beta^m + b(\alpha^m\delta^m + \beta^m\gamma^m) - a'\gamma^m\delta^m = b^m \quad (6)$$

$$a\beta^m\beta^m + 2b\beta^m\delta^m - a'\delta^m\delta^m = +a^{m+2} \quad (7)$$

$$\alpha^m\delta^m - \beta^m\gamma^m = 1 \quad (8)$$

Hinc fit: (ex aequ. 7 et 3), $\pm a^{m+2} = A$. Porro multiplicando aequationem (2) per $a\alpha^m\delta^m - \beta^m\gamma^m$, aequationem (6) per $2(\mathfrak{A}\mathfrak{D} - \mathfrak{B}\mathfrak{C})$ et subtrahendo facile per evolutionem confirmatur esse

$$B - b^m = (\mathfrak{C}\alpha^m - \mathfrak{A}\gamma^m)(a\mathfrak{B}\beta^m + b(\mathfrak{A}\delta^m + \mathfrak{D}\alpha^m) - \beta'\mathfrak{D}\gamma^m) + b((\mathfrak{C}\alpha^m + \mathfrak{A}\gamma^m) - \alpha(\mathfrak{C}\gamma^m)) + (\mathfrak{B}\delta^m - \mathfrak{D}\beta^m)(a\mathfrak{A}\alpha^m) \quad (9)$$

sive quoniam vel $\mathfrak{A}\alpha^m = \mathfrak{D}\delta^m$, $\mathfrak{C}\gamma^m = \mathfrak{D}\beta^m$ vel $\mathfrak{A}\alpha^m = -\mathfrak{D}\delta^m$, $\mathfrak{C}\gamma^m = -\mathfrak{D}\beta^m$,

$$B - b^m = \pm((\mathfrak{C}\alpha^m - \mathfrak{A}\gamma^m)(\mathfrak{B}\delta^m - \mathfrak{D}\beta^m) \cdot 2b\gamma^m) \pm a'\mathfrak{D}\gamma^m \cdot 2\gamma^m.$$

Hinc $B \equiv b^m \pmod{A'}$; quia vero tum B tum b^m , inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp A$ iacent, necessario erit $B = b^m$, adeoque $\mathfrak{C}\alpha^m - \mathfrak{A}\gamma^m = 0$, sive $\frac{\mathfrak{C}}{\mathfrak{A}} = \frac{\gamma^m}{\alpha^m}$, i.e. $\mathfrak{M} = (m)$.

Hoc modo itaque ex suppositione, $\mathfrak{M}$ nulli quantitatum (2), (3), (4) etc. aequalem esse, deduximus, eam revera alicui aequalem esse. Quodsi vero ab initio supponimus, esse $\frac{\mathfrak{C}}{\mathfrak{A}} = \frac{\gamma^m}{\alpha^m}$ vel $= (m)$, manifesto erit vel $\mathfrak{A} = \alpha^m$, $\mathfrak{C} = \gamma^m$, $-\mathfrak{A} = \alpha^m$, $-\mathfrak{C} = \gamma^m$. In utroque casu fit ex (1) et (5) $A = \pm a^m$, et ex (9) $B - b^m = \pm(\mathfrak{B}\delta^m - \mathfrak{D}\beta^m) \cdot 2b\gamma^m$ sive $B \equiv b^m \pmod{A}$. Hinc simili modo ut supra concluditur $B = b^m$, et hinc $\mathfrak{B}\delta^m - \mathfrak{D}\beta^m = 0$; quare quum $\mathfrak{B}$ ad $\mathfrak{D}$ primus sit et β^m ad δ^m : erit aut $\mathfrak{B} = \beta^m$, $\mathfrak{D} = \delta^m$, aut $-\mathfrak{B} = \beta^m$, $-\mathfrak{D} = \delta^m$, et proin ex (7) $-A' = \pm a^{m+2}$. Quamobrem formae F , f^m identicae erunt. Adiuvento aequationis $\mathfrak{A}\mathfrak{D} - \mathfrak{B}\mathfrak{C} = \alpha^m\delta^m - \beta^m\gamma^m = 1$ autem nullo negotio probatur, poni debere $-\frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{A}} = \beta^m$, $-\frac{\mathfrak{D}}{\mathfrak{C}} = \delta^m$, quando $+\mathfrak{A} = \alpha^m$, $+\mathfrak{C} = \gamma^m$; contra $-\mathfrak{B} = \beta^m$, $-\mathfrak{D} = \delta^m$, quando $-\mathfrak{A} = \alpha^m$, $-\mathfrak{C} = \gamma^m$. Q.E.D.

III. Si signum quantitatum $\mathfrak{C}$, $\mathfrak{D}$ signo ipsius a oppositum: demonstratio praecedenti tam similis est, ut praecipua tantum momenta addigavisse sufficiat. $-\frac{\mathfrak{C}}{\mathfrak{A}}$ iacebit inter $\frac{\gamma'}{\alpha}$ et $\frac{\gamma''}{\alpha}$. Fractio $\frac{\mathfrak{C}}{\mathfrak{A}}$ alicui fractionum γ'/α , γ''/α , γ'''/α etc. aequalis erit (I); qua posita $-\frac{\mathfrak{D}}{\mathfrak{B}} = \delta^m/\beta^m$, $-\frac{\mathfrak{D}}{\mathfrak{C}}$ erit $= \delta^m/\gamma^m$ (II).

Demonstratur autem (I) ita: Si $\frac{\mathfrak{C}}{\mathfrak{A}}$ nulli illarum fractionum aequalis esse supponitur: inter duas tales $\frac{\gamma'}{\alpha}$ et $\frac{\gamma^{m+1}}{\alpha^{m+1}}$ iacere debet. Hinc vero eodem modo ut supra deducitur, necessario esse $-\frac{\mathfrak{D}}{\mathfrak{B}} = \frac{\delta'}{\beta}$ atque vel $\mathfrak{A} = \alpha$, $\mathfrak{C} = \gamma$, vel $-\mathfrak{A} = \alpha$, $-\mathfrak{C} = \gamma$. Quoniam vero f per substitutionem propriam $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ in formam f transit: hinc emergunt tres aequationes, ex quibus coniunctis cum aequ. 1, 2, 3, 4 atque hac, $\alpha \cdot \delta - \beta \cdot \gamma = 1$ deducitur eodem modo ut supra, terminum primum A formae F termino primo formae f aequalem esse, illiusque terminum medium medio huius congruum secundum modulum A , unde sequitur, quia utraque forma est reducta, adeoque utriusque terminus medius inter $\sqrt{D}$ et $\sqrt{D} \mp A$ situs, hos terminos medios aequales esse: hinc vero deducitur $\frac{\mathfrak{C}}{\mathfrak{A}} = \gamma'/\alpha$. Veritas itaque assertionis (I) derivata hic est ex suppositione illam esse falsam.

Supponendo autem $\frac{\mathfrak{C}}{\mathfrak{A}} = \gamma'/\alpha$, prorsus simili modo et per easdem aequationes demonstratur, $-\frac{\mathfrak{D}}{\mathfrak{B}} = \delta'/\beta$ esse etiam $= \delta'/\gamma$ quod erat secundum (II). Hinc vero adiuvento aequationum $\mathfrak{A}\mathfrak{D} - \mathfrak{B}\mathfrak{C} = \alpha \cdot \delta - \beta \cdot \gamma = 1$ deducitur esse vel

$$\mathfrak{A} = \alpha, \mathfrak{B} = \beta, \mathfrak{C} = \gamma, \mathfrak{D} = \delta$$

vel

$$\mathfrak{A} = -'\alpha, \mathfrak{B} = -'\beta, \mathfrak{C} = -'\gamma, \mathfrak{D} = -'\delta$$

formasque $F, 'f$ identicas.

Q.E.D.

194.

Quum formae quas supra socias vocavimus (art. 187, 6), semper sint improprie aequivalentes (art. 159), perspicuum est, si formae reductae F, f improprie aequivalentes sint, formaque F socia forma G , formas f, G proprie aequivalentes fore adeoque formam G in periodo formae f contentam. Quodsi itaque formae F, f tum proprie tum improprie aequivalentes sunt, patet, tum F tum G in periodo formae f reperiri debere. Quare periodus haec sibi ipsi socia erit, duasque formas ancipites continebit (art. 187, 7). Unde theorema art. 165 egregie confirmatur, ex quo iam poteramus esse certi, formam aliquam ancipitem dari formis F, f aequivalentem.

195.

Problema. Propositis duabus formis quibuscunque Φ, φ eiusdem determinantis: diiudicare utrum aequivalentes sint, annon.

Sol. Quaerantur duae formae reductae F, f propositis Φ, φ resp. proprie aequivalentes (art. 183). Quae prout aut proprie tantum aequivalent, aut improprie tantum, aut utroque modo, aut neutro; etiam propositae aut proprie tantum, aut improprie tantum, aut utroque aut neutro modo aequivalentes erunt. Evolvatur periodus alterutrius formae reductae e.g. periodus formae f . Si forma F in hac periodo occurrit neque vero simul forma ipsi F socia, manifesto casus, primus locum habebit; contra si socia haec adest neque vero F ipsa, secundus; si utraque, tertius; si neutra, quartus.

Ex. Propositae sint formae (129, 92, 65), (42, 59, 81) determinantis 79. His proprie aequivalentes inveniuntur reductae (10, 7, -3), (5, 8, -3). Periodus formae prioris haec est: (10, 7, -3), (-3, 8, 5), (5, 7, -6), (-6, 5, 9), (9, 4, -7), (-7, 3, 10). In qua quum forma (5, 8, -3) ipsa non reperitur, sed tamen socia (-3, 8, 5): formas propositas improprie tantum aequivalere concludimus.

Si omnes formae reductae determinantis dati eodem modo ut supra (art. 187, 5) in periodos P, Q, R etc. distribuuntur, atque e quavis periodo forma aliqua ad libitum eligitur, ex P, F ; ex Q, G ; ex R, H etc.: inter has formas F, G, H etc. duae quae proprie aequivalent esse non poterunt. Quaevis autem alia forma eiusdem determinantis alicui ex istis proprie aequivalens erit et quidem unicae tantum. Hinc manifestum est, omnes formas huius determinantis in totidem classes distribui posse, quot habeantur periodi, scilicet referendo eas, quae formae F proprie aequivalent in primam classem, eas quae formae G proprie aequivalent in secundam etc. Hoc modo omnes formae in eadem classe contentae proprie aequivalentes erunt, formae vero e classibus diversis non poterunt proprie aequivalere. Sed hic huic argumento infra fusius explicando non immoramur.

196.

Problema. Propositis duabus formis proprie aequivalentibus Φ, φ : invenire transformationem propriam alterius in alteram.

Sol. Per methodum art. 183 inveniri poterunt duae series formarum

$$\Phi, \Phi', \Phi'' \dots \Phi^n \quad \text{et} \quad \varphi, \varphi', \varphi'' \dots \varphi^m$$

tales ut quaevis forma sequens praecedenti proprie aequivaleat, ultimaeque Φ^n, φ^m sint formae reductae; et quum Φ, φ proprie aequivalentes esse supponantur, necessario Φ^n in

periodo formae φ^m contenta erit. Sit $\varphi^m = f$ ipsiusque periodus usque ad formam Φ^n haec

$$f, f', f'' \dots f^n = \Phi^n$$

ita ut in hac periodo index formae Φ^n sit m ; designenturque formae quae oppositae sunt sociis formarum

$$\Phi, \Phi', \Phi'' \dots \Phi^n \text{ per } \Psi, \Psi', \Psi'' \dots \Psi^n \text{ resp.}^{11}$$

Tum in progressionem

$$\varphi, \varphi', \varphi'' \dots \varphi^m = f, f', f'' \dots f^{n-1}, \Psi^{n-1}, \Psi^{n-2} \dots \Psi', \Psi, \Phi$$

quaevis forma praecedenti ab ultima parte contigua erit, unde per art. 177 inveniri poterit transformatio propria primae φ in ultimam Φ . Illud autem de formis reliquis progressionis nullo negotio perspicitur; de his f^{n-1}, Ψ^{n-1} sic probatur: Sit

$$f^{n-1} = (g, h, i); \quad f^n \text{ sive } \Phi^n = (g', h', i'); \quad f^{n+1} = (g'', h'', i'').$$

Forma (g', h', i') tum formae (g, h, i) tum formae (g'', h'', i'') ab ultima parte contigua erit; hinc $i = g' = i''$, et $-h \equiv h' \equiv -h'' \pmod{i \text{ vel } g \text{ vel } i''}$. Unde manifestum est, formam $(i'', -h'', g'')$, i.e. formam Ψ^{n-1} formae (g, h, i) , i.e. formae f^{n-1} ab ultima parte contiguam esse.

Si formae Φ, φ improprie aequivalentes sunt: forma φ proprio aequivalebit formae, cui opposita est Φ . Inveniri poterit itaque transformatio propria formae φ in formam, cui est opposita; quae si supponitur fieri per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, facile perspicitur, φ improprie transformari in ipsam Φ per substitutionem $\alpha, -\beta, \gamma, -\delta$.

Hinc etiam perspicuum est, si formae Φ, φ tum proprie tum improprie aequivalentes sint, inveniri posse duas transformationes, propriam et impropriam.

Ex. Quaeritur transformatio impropria formae $(129, 92, 65)$ in formam $(42, 59, 81)$, quam illi improprie aequivalere in art. prae. invenimus. Investiganda erit itaque primo transformatio propria formae $(129, 92, 65)$ in formam $(42, -59, 81)$. Ad hunc finem evolvi-
tur progressio formarum haec: $(129, 92, 65), (65, -27, 10), (10, 7, -3), (-3, 8, 5), (5, 22, 81), (81, 59, 42), (42, -59, 81)$. Hinc deducitur transformatio propria 47, 56, 73, 87, per quam $(129, 92, 65)$ transit in $(42, -59, 81)$; quare per impropriam $-47, -56, 73, 87$ transibit in $(42, 59, 81)$.

197.

Si transformatio una formae alicuius $(a, h, c) \dots \varphi$ in aequivalentem Φ habetur: ex hac omnes transformationes similes formae φ in Φ deduci poterunt, si modo omnes solutiones aequationis indeterminatae $tt - Duu = mm$ assignari possunt, designante D determinan-
tem formarum Φ, φ ; m divisorem communem maximum numerorum $a, 2h, c$ (art. 162). Hoc igitur problema, quod pro valore negativo ipsius D iam supra solvimus, nunc pro positivo aggrediemur. Quia vero manifesto quivis valor ipsius t aequationi satisfaciens etiamnum mutato signo satisfacit, similiterque quivis valor ipsius u : sufficet si omnes valores positivos ipsorum t, u assignare possimus, fungeturque quaelibet solutio per valores positivos, quatuor solutionum vice. Hoc negotium ita absolvemus, ut primo valores minimos ipsorum t, u (praeter hos per se obvios $t = m, u = 0$) invenire, tum ex his omnes reliquos derivare doceamus.

¹¹Ita ut Ψ oriatur ex commutando terminum primum et ultimum tribuendoque medio signum oppositum, similiterque de reliquis.

198.

Problema. Invenire numeros minimos t, u aequationi indeterminatae $tt - Duu = mm$ satisfaciētes, siquidem forma aliqua (M, N, P) datur, cuius determinans est D , numerorumque $M, 2N, P$ divisor communis maximus $= m$.

Sol. Accipiat ad libitum forma reducta $(a, b, -a') \dots f$, determinantis D , ubi divisor communis maximus numerorum $a, 2b, a'$ sit m , qualem dari vel inde manifestum est, quod forma reducta formae (M, N, P) aequivalens inveniri potest, quae per art. 161 hac proprietate erit praedita; sed ad propositum praesens quaevis forma reducta, in qua conditio haec locum habet, poterit adhiberi.

Evolvatur periodus formae f , quam ex n formis constare supponemus. Retentis omnibus signis, quibus in art. 188 usi sumus, f^n erit $(+a^n, b^n, -a^{n+1})$, quia n par, et in hanc formam transibit f per substitutionem propriam $\alpha^n, \beta^n, \gamma^n, \delta^n$.

Quia vero f et f^n sunt identicae: f transibit in f^n etiam per substitutionem propriam 1, 0, 0, 1. Ex his duabus transformationibus similibus formae f in f^n per art. 162 deduci poterit solutio aequationis $tt - Duu = mm$ in integris, scilicet $t = \frac{1}{2}(\alpha^n + \delta^n)m$ (aequ. 18 art. 162), $u = \frac{\gamma^n}{m}$ (aequ. 19)¹². Designentur hi valores positive accepti si forte nondum sunt per T, U , eruntque hi T, U valores minimi ipsorum t, u , praeter hos $t = m, u = 0$ (a quibus necessario erunt diversi, quia manifesto γ^n non poterit esse $= 0$).

Supponamus enim dari adhuc minores valores ipsorum t, u puta t, u qui sint positivi et $u \neq 0$. Tum per art. 162 forma f per substitutionem propriam $-(t - bu), -\beta'u, -au, -(t + bu)$ transformabitur in formam cum ipsa identicam. Iam ex art. 193, II sequitur, aut $-(t - bu)$ aut $+(t + bu)$ alicui numerorum $\alpha', \alpha'', \alpha'''$ etc. aequalem esse debere, puta $= \alpha^m$ (quia enim $u^2 = D\mu^2 + mm = bb\mu^2 + aa'\mu^2 + mm$, erit $u^2 > bb\mu^2$, adeoque $t > bu$ positivus; hinc fractio $-\frac{t-bu}{-au}$, quae respondet fractioni $-\frac{\gamma}{\alpha}$ in art. 193, idem signum habebit ut a vel a'); atque in casu priori $-(t - bu), -au, -(t + bu)$, in posteriori easdem quantitates mutatis signis, resp. $= \alpha^m, \gamma^m, \beta^m, \delta^m$. Sed quum sit $u < U$ i.e. $\mu < \frac{\gamma^n}{m}$ et $] > 0$: erit $\gamma^m < \gamma^n$ et $] > 0$; quocirca quum progressio $\gamma, \gamma', \gamma''$ etc. continuo crescat, necessario μ iacebit inter 0 et n excl. Forma vero respondens, f^μ identica erit cum forma f , Q.E.A., quum omnes formae f, f', f'' etc. usque ad f^{n-1} diversae esse supponantur. Ex his colligitur, minimos valores ipsorum t, u (exceptis valoribus $m, 0$) esse T, U .

Ex. Si $D = 79, m = 1$: adhiberi poterit forma $(3, 8, -5)$, pro qua $n = 6$, atque $\alpha^n = -805, \gamma^n = -143, \delta^n = -152$ (art. 188). Hinc $T = 80, U = 9$, qui sunt valores minimi numerorum t, u , aequationi $tt - 79uu = 1$ satisfaciētes.

199.

Ad praxin formulae adhuc commodiores erui possunt. Erit nimirum $2b\gamma^n = -a(\alpha^n - \delta^n)$, quod facile ex art. 162 deducitur, multiplicando aequ. [19] per $2b$, [20] per a et mutando characteres illic adhibitos in praesentes. Hinc fit $\alpha^n + \delta^n = 2\delta^n - \frac{a'}{b}\gamma^n$, adeoque

$$\pm T = \frac{m}{2}(\delta^n + \gamma^n), \quad \pm U = \frac{\gamma^n}{m}$$

Per similem methodum bos valores obtinemus

$$\pm T = \frac{m}{2}(\alpha^n + \delta^n), \quad \pm U = \frac{\alpha^n - \delta^n}{2b}$$

Tum hae tum illae formulae perquam commode evadunt, propter $\gamma^n = \beta^{n-1}, \alpha^n = \delta^{n-1}$, ita ut si his uteris, solam progressionem $\delta', \delta'', \delta''' \dots \delta^n$; si illis uti mavis, solam hanc

¹²Quae in art. 162 erant $\alpha, \beta, \gamma, \delta; \alpha', \beta', \gamma', \delta'; A, B, C; a, b, c; e, h$ etc. hic sunt 1, 0, 0, 1; $\alpha^n, \beta^n, \gamma^n, \delta^n; a, b, -a'; a, b, -a'; 1$.

$\gamma', \gamma'', \gamma''' \dots$ etc. supputavisse sufficiat. Praeterea ex art. 189, 3 facile deducitur quum n necessario sit par, α^n et $-\delta^n$ eadem signa habere; neque minus β^n et $-\gamma^n$, ita ut in formula priori pro T differentia absoluta, in posteriori summa absoluta accipi debeat neque adeo ad signa respicere omnino opus sit. Receptis signis in art. 189, 4 adhibitis erit ex formula priori

$$T = m[k', k'', k''' \dots k^{n-1}] - \frac{a'}{b}[k', k'', k''' \dots k^{n-2}], \quad U = \frac{1}{m}[k', k'', k''' \dots k^{n-1}]$$

ex posteriori

$$T = m[k', k'' \dots k^{n-1}] + \frac{a'}{b}[k'', k''' \dots k^n], \quad U = \frac{1}{m}[k', k'' \dots k^n]$$

umi pro valore ipsius T etiam $m[k'', k''' \dots k^n, -k']$ scribi poterit.

Ex. Pro $D = 61$, $m = 1$ adhiberi potest forma $(2, 7, -6)$, pro qua eruitur $n = 6$; $k', k'', k''', k^{IV}, k^V, k^{VI}$ resp. $= 2, 2, 7, 2, 2, 7$. Hinc fit

$$T = 2[2, 2, 7, 2, 2, 7] - 7[2, 2, 7, 2, 2] = 2888 - 1365 = 1523$$

ex formula prima; idem provenit ex secunda

$$T = 2[2, 7, 2, 2] + 7[2, 7, 2, 2, 7]$$

U vero fit $= [2, 2, 7, 2, 2] = \frac{1}{2}[2, 7, 2, 2, 7] = 195$.

Ceterum plura artificia adhuc dantur, per quae calculus contrahi potest, sed de his fusius hic loqui brevitatis non permittit.

200.

Ut ex valoribus minimis ipsorum t, u omnes obtineamus, aequationem $TT - DUU = mm$ ita exhibemus

$$\left(\frac{T}{m} + \frac{U}{m}\sqrt{D}\right) \left(\frac{T}{m} - \frac{U}{m}\sqrt{D}\right) = 1$$

inde etiam erit

$$\left(\frac{T}{m} + \frac{U}{m}\sqrt{D}\right)^e \left(\frac{T}{m} - \frac{U}{m}\sqrt{D}\right)^e = 1 \quad (1)$$

denotante e numerum quemcunque. Iam designabimus brevitatis caussa valores quantitatum

$$\frac{1}{2}m \left[\left(\frac{T}{m} + \frac{U}{m}\sqrt{D}\right)^e + \left(\frac{T}{m} - \frac{U}{m}\sqrt{D}\right)^e \right],$$

$$\frac{1}{2\sqrt{D}}m \left[\left(\frac{T}{m} + \frac{U}{m}\sqrt{D}\right)^e - \left(\frac{T}{m} - \frac{U}{m}\sqrt{D}\right)^e \right]$$

generaliter per t^e, u^e resp. i.e. illarum valores pro $e = 0$, per t^0, u^0 (qui erunt $m, 0$); pro $e = 1$ per t', u' (qui fiunt T, U); pro $e = 2$ per t'', u'' ; pro $e = 3$ per t''', u''' etc. demonstrabimusque, si pro e accipiantur omnes numeri integri non negativi i.e. 0, omnesque positivi ab 1 usque ad ∞ , expressiones illas exhibere omnes valores positivos ipsorum t, u : scilicet I) omnes valores illarum expressionum esse revera valores ipsorum t, u ; II) omnes valores illos esse numeros integros; III) nullos valores positivos ipsorum t, u dari, qui sub formulis illis non contineantur¹³.

¹³In his solis quatuor expressionibus et in aequ. [1] e denotat exponentem potestatis; in reliquis literae apici adscriptae semper indicem designant.

I. Substitutis pro t^e , u^e valoribus suis nullo negotio adiumento aequ. [1] confirmatur, esse

$$(t^e + u^e\sqrt{D})(t^e - u^e\sqrt{D}) = mm, \quad \text{i.e.} \quad t^e t^e - Du^e u^e = mm.$$

II. Eodem modo facile confirmatur, esse generaliter

$$t^{e+1} = \frac{2T}{m}t^e - t^{e-1}, \quad u^{e+1} = \frac{2T}{m}u^e - u^{e-1}.$$

Hinc manifestum est, duas progressionem t^0, t', t'', t''' etc., u^0, u', u'', u''' etc. esse recurrentes, et utriusque scalam relationis $= \frac{2T}{m}, -1$, scilicet

$$t'' = \frac{2T}{m}t' - t^0, \quad t''' = \frac{2T}{m}t'' - t' \text{ etc.}, \quad u'' = \frac{2T}{m}u' - u^0 \text{ etc.}$$

Iam quoniam per hyp. forma aliqua datur, (M, N, P) , determinantis D , in qua $M, 2N, P$ per m sunt divisibiles: habebitur

$$TT = (NN - MP)UU + mm$$

eritque adeo manifeste $\frac{2T}{m}$ per m divisibilis. Hinc $\frac{2T}{m}$ erit numerus integer et quidem positivus. Quia vero $t^0 = m, t' = T, u^0 = 0, u' = U$, adeoque integri: omnes t'', t''' etc., u'', u''' , etc. etiam integri erunt. Porro perspicuum est, quia $TT > mm$, omnes t^0, t', t'', t''' etc. positivos et continuo in infinitum crescentes esse, nec non omnes u^0, u', u'', u''' etc.

III. Supponamus, dari adhuc alios valores positivos ipsorum t, u , qui in progressionem t^0, t', t'' etc., u^0, u', u'' etc. non contenti sint, puta $\mathfrak{T}, \mathfrak{U}$. Manifestum est, quum progressio u^0, u' etc. a 0 in infinitum crescat, $\mathfrak{U}$ necessario inter duos terminos proximos, u^λ et $u^{\lambda+1}$ situm fore, ita ut sit $u^\lambda < \mathfrak{U} < u^{\lambda+1}$. Ut absurditatem huius suppositionis demonstremus, observamus

1° Aequationi $tt - Duu = mm$ satisfactum iri etiam ponendo

$$t = \frac{1}{m}(\mathfrak{T}T \mp \mathfrak{U}UD), \quad u = \frac{1}{m}(\mathfrak{T}U \mp \mathfrak{U}T)$$

unde, quoniam

$$tt - Duu = \frac{1}{mm}(\mathfrak{T}\mathfrak{T} - D\mathfrak{U}\mathfrak{U})(TT - DUU) = \frac{1}{mm} \cdot mm \cdot mm = mm,$$

hi valores ipsorum t, u aequationi satisfaciunt.

2° Eisdem valores esse integros. Nam quum $TT - DUU = mm$, erit $T \equiv 0, U \equiv 0 \pmod{m}$, adeoque $\mathfrak{T}T \mp \mathfrak{U}UD$ et $\mathfrak{T}U \mp \mathfrak{U}T$ per m divisibiles. Porro vero hi valores integri erunt, quoniam $t^\lambda t' - Du^\lambda u' = mm$ et $t^{\lambda+1}t' - Du^{\lambda+1}u' = mm$.

3° Valores istos esse minores quam T, U , contra hyp. Quoniam enim $u^\lambda < \mathfrak{U} < u^{\lambda+1}$ et $t^\lambda < \mathfrak{T}$, erit $\frac{1}{m}(\mathfrak{T}U - \mathfrak{U}T) < \frac{1}{m}(t^{\lambda+1}U - u^{\lambda+1}T) = U$; similique modo $\frac{1}{m}(\mathfrak{T}T - \mathfrak{U}UD) < T$. Q.E.A.

Quare omnes valores positivi ipsorum t, u in progressionem illa continentur, et problema penitus est solutum.

Carl Friedrich Gauß Werke — Band I, Teil V

De formis secundi gradus disquisitiones generales

Carl Friedrich Gauß

Determinantes positivi non-quadrati

200. Hoc quidem nullo negotio per substitutionem confirmatur: quod vero hi valores, quos ponemus brevitatis gratia $= t, u$, semper sunt numeri integri, ita ostendimus.

Si (M, N, P) est formae determinantis D , atque m divisor communis numerorum $M, 2N, P$: erit tum $Mt^2 + 2Ntu + Pu^2$ tum $Mt'^2 + 2Nt'u' + Pu'^2$ per m divisibilis adeoque etiam $U(Mt^2 + 2Ntu + Pu^2) - u(Mt'^2 + 2Nt'u' + Pu'^2)$ sive $MU^2 - mu^2$. Quare U erit integer et proin etiam T , quia $TT = DUU + mm$.

2° Patet U non posse esse $= 0$; hinc enim sequeretur $m^2 = T^2$, sive $U^2 = m^2$, contra hyp. ex qua $U > m$.

Quum igitur praeter valorem 0, minimus valor ipsius u sit U , erit U certe non minor quam U .

3° Facile ex valoribus ipsorum $t^\lambda, t^{\lambda+1}, u^\lambda, u^{\lambda+1}$ confirmari potest, esse $t^\lambda u^{\lambda+1} - t^{\lambda+1} u^\lambda = mm$. Quare $t^\lambda u^{\lambda+1} - t^{\lambda+1} u^\lambda$ certe non erit minor quam $u^\lambda t^{\lambda+1} - t^{\lambda+1} u^\lambda$.

4° Iam ex aequatione $t^{\lambda\lambda} - Du^\lambda u^\lambda = mm$ habetur

$$t^\lambda = m \sqrt{\left(\frac{t^\lambda}{m}\right)^2 - \frac{D}{mm} u^\lambda u^\lambda}$$

et similiter

$$t^{\lambda+1} = m \sqrt{\left(\frac{t^{\lambda+1}}{m}\right)^2 - \frac{D}{mm} u^{\lambda+1} u^{\lambda+1}};$$

unde facile deducitur esse $t^\lambda > t^{\lambda+1}$. Hinc vero et ex conclusione in 3° sequitur $u^{\lambda+1} > u^\lambda$, sive, evolutione facta, et loco ipsorum $t^\lambda t^\lambda, t^{\lambda+1} t^{\lambda+1}$ substitutis valoribus suis $DUU + mm, Du^\lambda u^\lambda + mm, Du^{\lambda+1} u^{\lambda+1} + mm$, unde, quoniam utraque quantitas manifesto positiva, fit transponendo

$$\frac{U + u^{\lambda+1}}{U + u^\lambda} > \frac{u^{\lambda+1}}{u^\lambda}.$$

Quantitatis prioris pars prima minor est quam pars prima quantitatis secundae, nec non illius secunda minor quam secunda huius. Quamobrem suppositio consistere nequit et progressionem t^0, t', t'' etc. u^0, u, u'' etc. omnes valores positivos ipsorum t, u exhibebunt.

Ex. Pro $D = 61$, $m = 2$ valores minimos positivos ipsorum t, u invenimus 1523, 195: quare omnes valores positivi exhibebuntur per has formulas

$$t = \frac{1}{2}((1523 + 195\sqrt{61})^e + (1523 - 195\sqrt{61})^e),$$
$$u = \frac{1}{2\sqrt{61}}((1523 + 195\sqrt{61})^e - (1523 - 195\sqrt{61})^e).$$

Invenitur autem $t^0 = 2$, $t' = 1523$, $t'' = 1523t' - t^0 = 2319527$, $t''' = 1523t'' - t' = 3532618098$ etc. $u^0 = 0$, $u = 195$, $u'' = 1523u' - u^0 = 296985$, $u''' = 1523u'' - u' = 452307960$ etc.

201. Circa problema in artt. praec. tractatum sequentes observationes adhuc adiicimus.

1) Quum aequationem $tt - Duu = mm$ pro omnibus casibus solvere docuerimus, ubi m est divisor communis maximus trium numerorum $M, 2N, P$, talium ut $NN - MP = D$: operae pretium est omnes numeros qui tales divisores esse possunt sive omnes valores ipsius m pro valore dato ipsius D assignare. Ponatur $D = nnD'$, ita ut D' a factoribus quadraticis omnino sit liber, quod obtinetur, si pro nn assumitur maximum quadratum ipsum D metiens: sin vero D iam per se nullum factorem quadraticum implicaret, fieri deberet $n = 1$.

Tum dico *Primo*, si D' fuerit formae $4k + 1$, quemvis divisorem ipsius $2n$ fore valorem ipsius m , et vice versa. Si enim g est divisor ipsius $2n$, habebitur forma $(g, n, -\frac{nn(D'-1)}{g})$, cuius determinans est D , et in qua manifeste divisor communis maximus numerorum $g, 2n, -\frac{nn(D'-1)}{g}$ erit g (patet enim $-\frac{nn(D'-1)}{g} = \frac{nn}{g} \cdot \frac{D'-1}{g}$ esse numerum integrum). Si vero, vice versa, g supponitur esse valor ipsius m , scilicet divisor communis maximus numerorum $M, 2N, P$, atque $NN - MP = D$: eodem modo ut supra gg metietur ipsum $4D$ sive $4nnD'$. Hinc vero sequitur, $2n$ necessario per g divisibilem esse. Si enim g ipsum $2n$ non metiretur, g et $2n$ haberent divisorem communem maximum minorem quam g , quo posito $= \delta$, atque $2n = \delta n'$, $g = \delta g'$, foret nnD' per δ divisibilis, n' ad δ adeoque etiam $n'n'$ ad δ primus et proin etiam D' per δ divisibilis, contra hyp. secundum quam D' ab omni factore quadratico est liberatus.

Secundo, si D' fuerit formae $4k + 2$ vel $4k + 3$, quemvis divisorem ipsius n fore valorem ipsius m , et vice versa quemvis valorem ipsius m metiri ipsum n . Si enim g est divisor ipsius n , habebitur forma $(g, 0, -\frac{nnD'}{g})$, cuius determinans $= D$, et ubi manifesto numerorum $g, 0, -\frac{nnD'}{g}$ divisor communis maximus erit g . Si vero g supponitur esse valor ipsius m , puta divisor communis maximus numerorum $M, 2N, P$, atque $NN - MP = D$: eodem modo ut supra gg metietur ipsum $2n$, sive $-\frac{2n}{g}$ erit integer. Si quotiens hic esset impar: quadratum $\frac{4nn}{gg}$ foret $\equiv 1 \pmod{4}$, adeoque $\frac{nnD'}{gg}$ aut $\equiv 2$ aut $\equiv 3 \pmod{4}$. At $\frac{nn}{gg} \equiv \frac{1}{gg} \equiv 1 \pmod{4}$, et proin aut $\equiv 2$ aut $\equiv 3 \pmod{4}$, Q.E.A., quia omne quadratum aut cifrae aut unitati secundum modulum 4 congruum esse debet. Quare quotiens $-\frac{2n}{g}$ necessario erit par, adeoque $-\frac{n}{g}$ integer, sive g divisor ipsius n .

Patet itaque, 1 semper esse valorem ipsius m , sive aequationem $tt - Duu = 1$ pro quovis valore positivo non quadrato ipsius D per praecedentia resolvibilem esse; 2 tunc tantummodo esse valorem ipsius m , si D fuerit aut formae $4k$, aut formae $4k + 1$.

2) Si m est maior quam 2, attamen numerus idoneus, solutio aequationis $tt - Duu = mm$ reduci potest ad solutionem similis aequationis, ubi m est aut 1 aut 2. Scilicet posito ut ante $D = nnD'$, si m ipsum n metitur, metietur mm ipsum D . Tum si valores minimi ipsorum p, q in aequatione $pp - D'qq = 1$ supponuntur esse $p = P$, $q = Q$, valores minimi ipsorum t, u in aequatione $tt - Duu = mm$ erunt $t = mP$, $u = nQ$. Si vero m ipsum n non metitur, metietur saltem ipsum $2n$ eritque certo par; $\frac{m}{2}$ autem integer. Et si tunc valores minimi ipsorum p, q in aequatione $pp - D'qq = 4$ inventi sunt $p = P$, $q = Q$: valores minimi ipsorum t, u in aequatione $tt - Duu = mm$ erunt $t = \frac{m}{2}P$, $u = nQ$. In utroque autem casu non solum ex valoribus minimis ipsorum p, q valores minimi ipsorum t, u , sed ex omnibus valoribus illorum omnes valores horum per hanc methodum manifesto deduci poterunt.

3) Designantibus t^0, u^0 ; t', u' ; t'', u'' etc. omnes valores positivos ipsorum t, u in aequatione $tt - Duu = mm$ (ut in art. praec.), si contingit ut valores quidam ex serie illa, valoribus primis in eadem secundum modulum quemcunque datum r , congrui sint, puta $t^\rho \equiv t^0$ (sive m), $u^\rho \equiv u^0 \equiv 0 \pmod{r}$; simulque valores proxime sequentes valoribus secundis, puta $t^{\rho+1} \equiv t'$, $u^{\rho+1} \equiv u$ (mod r): erit etiam $t^{\rho+2} \equiv t''$, $u^{\rho+2} \equiv u''$; $t^{\rho+3} \equiv t'''$, $u^{\rho+3} \equiv u'''$ etc. Hoc facile inde deducitur, quod utraque series t^0, t', t'' etc., u^0, u, u'' etc. est ex recurrentium genere, scilicet quoniam $t^{\rho+2} = 2t't^{\rho+1} - t^\rho$, $u^{\rho+2} = 2t'u^{\rho+1} - u^\rho$, erit similiterque de reliquis. Hinc autem sequitur, fore generaliter $t^{h+\rho} \equiv t^h$, $u^{h+\rho} \equiv u^h \pmod{r}$ denotante h numerum quemcunque, nec non adhuc generalius, si fuerit $h \equiv h' \pmod{\rho}$, fore $t^h \equiv t^{h'}$, $u^h \equiv u^{h'} \pmod{r}$.

4) Conditionibus autem in observ. praec. requisitis semper satisfieri potest, scilicet semper inveniri potest index ρ (pro modulo quocunque dato r), pro quo sit $t^\rho \equiv t^0$, $t^{\rho+1} \equiv t'$, $u^\rho \equiv u^0$, $u^{\rho+1} \equiv u$. Ad quod demonstrandum observamus, primo, conditioni tertiae semper satisfieri posse. Nullo enim negotio per criteria in (1) tradita perspicietur, etiam aequationem $pp - r \cdot Dqq = mm$ solubilem fore; et si valores minimi positivi ipsorum p, q (praeter hos $m, 0$) supponuntur esse P, Q : inter valores ipsorum t, u manifeste erunt etiam $t = P$, $u = rQ$. Quare P, rQ in progressionibus t^0, t' etc., u^0, u etc. contenti erunt, et si $P = t^\lambda$, $rQ = u^\lambda$, erit $u^{\lambda+1} \equiv u^\lambda \equiv 0 \pmod{r}$. Praeterea facile perspicietur, inter u^0 et u^λ nullum terminum fore ipsi u^0 secundum modulum r congruum.

Secundo patet, si hic insuper tres reliquae conditiones adimpletae sint, puta si etiam $t^{\lambda+1} \equiv t'$, $u^{\lambda+1} \equiv u'$, $t^\lambda \equiv t^0$, poni tantummodo debere $\rho = \lambda$. Si vero una aut altera illarum conditionum locum non habet, dico certe statui posse $\rho = 2\lambda$. Nam ex aequat. [1] formulisque generalibus pro t^h, u^h in art. praec. deducitur

$$\frac{u^{2\lambda}}{m} = \frac{2t^\lambda}{m} \cdot \frac{u^\lambda}{m} = \frac{2P}{m} \cdot \frac{rQ}{m} = \frac{2PrQ}{mm},$$

adeoque $\frac{u^{2\lambda}}{r} = \frac{2PrQ}{rmm}$ quae quantitas erit numerus integer, quia per hyp. r ipsum u^λ metitur, nec non mm ipsum $4D$, adeoque a potiori m ipsum $2D$. Porro erit $u^{2\lambda+1} = t'u^{2\lambda} + mu^\lambda$, et quoniam $4t'u^{2\lambda}$ per mm divisibilis, $2t'u^{2\lambda}$ erit divisibilis per m , et proin $u^{2\lambda+1}$ per r , sive $u^{2\lambda+1} \equiv u^0 \pmod{r}$. Tertio invenitur $\frac{t^{2\lambda+1}-t'}{m} = \frac{2u^{2\lambda}D}{mr}$ et quoniam ex simili ratione $\frac{2u^{2\lambda}D}{m}$ est integer, erit $t^{2\lambda+1} \equiv t' \pmod{r}$. Tandem reperitur $\frac{u^{2\lambda+1}-u'}{m} = \frac{2t'u^{2\lambda}}{m}$ et quoniam $2t'u^{2\lambda}$ per m divisibilis est, $u^{2\lambda+1}$ per r : erit $u^{2\lambda+1} \equiv u' \pmod{r}$. Q.E.D.

Ceterum usus posteriorum duarum observationum in sequentibus apparebit.

202. Casus particularis problematis, nempe solvere aequationem $tt - Duu = 1$, iam a geometris seculi praecedentis fuit agitatus. Sagacissimus Fermatius problema hoc analystis Anglis proposuit, Wallisiusque Brounkerum tamquam inventorem solutionis, quam in Alg. Cap. 98, Opp. T. II, p. 418 sqq. tradit, nominat; Ozanam Fermatium; denique ill. Euler, qui de illo egit in Comm. Petr. VI, p. 175, Comm. Nov. XI, p. 28¹, Algebra P. II, p. 226, Opusc. An. I, p. 310, Pellium, unde problema illud a quibusdam auctoribus Pellianum vocatum est. Omnes hae solutiones, si essentiam spectas, conveniunt cum ea quam obtinemus, si in art. 198 formam reductam eam adoptamus in qua $a = 1$; attamen operationem quam praescribunt tandem necessario finem, sive problema semper revera solubile esse, nemo ante ill. La Grange rigorose² demonstravit, Mélanges de la Soc. de Turin T. IV, p. 19, et concinnius Hist. de l'Ac. de Berlin, 1767, p. 237. Exstat haec

¹In hac comm. algorithmus quem art. 27 exposuimus, per similia signa exhibetur, quod nos illic annotare negleximus.

²Quae Wallisius ad hunc finem protulit l.c. p. 427, 428 nihil ponderis habent. Paralogismus in eo consistit, quod p. 428 l. 4, supponit, proposita quantitate p inveniri posse numeros integros a, z tales ut

disquisitio etiam in supplementum ad Euleri Algebram iam saepius laudatis. Ceterum methodus nostra (ex principiis omnino diversis petita, neque ad casum $m = 1$ restricta) plerumque plures vias ad solutionem perveniendi suppeditat, quoniam in art. 198 a quavis alia forma reducta $(a, b, -a')$ proficisci possumus.

203. PROBLEMA. Si formae φ, ψ sunt aequivalentes, omnes transformationes alterius in alteram exhibere.

SOL. Quando formae hae unico tantum modo aequivalentes sunt (i.e. aut proprio tantum aut improprie tantum), quaeratur per art. 196 transformatio una formae φ in ψ , quae sit $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, patetque alias quam quae huic sint similes, dari non posse.

Quando vero φ, ψ tum proprio tum improprie aequivalent, quaerantur duae transformationes dissimiles, i.e. altera propria altera impropria, puta $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ et $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$, eritque quaevis alia transformatio aut huic aut illi similis.

Si itaque forma ψ est (a, b, c) , ipsius determinans $= D$, divisor communis maximus numerorum $a, 2b, c$ (uti semper in praec.) $= m$, atque t, u indefinite omnes numeri aequationi $tt - Duu = mm$ satisfaciens: in casu priori omnes transformationes formae φ in ψ contentae erunt sub prima formularum sequentium I, in posteriori vel sub prima I vel sub secunda II.

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & \frac{1}{m}(\alpha t - (\alpha b + \gamma c)u), & \frac{1}{m}(\beta t - (\beta b + \delta c)u), \\ & \frac{1}{m}(\gamma t + (\alpha a + \gamma b)u), & \frac{1}{m}(\delta t + (\beta a + \delta b)u) \\ \text{II.} \quad & \frac{1}{m}(\alpha' t - (\alpha' b + \gamma' c)u), & \frac{1}{m}(\beta' t - (\beta' b + \delta' c)u), \\ & \frac{1}{m}(\gamma' t + (\alpha' a + \gamma' b)u), & \frac{1}{m}(\delta' t + (\beta' a + \delta' b)u) \end{aligned}$$

Ex. Desiderantur omnes transformationes formae $(129, 92, 65)$ in formam $(42, 59, 81)$. Has improprie tantum aequivalentes esse, in art. 195 invenimus et in art. seq. transformationem impropriam illius in hanc eruimus $-47, -56, 73, 87$. Quamobrem omnes transformationes formae $(129, 92, 65)$ in $(42, 59, 81)$ exhibebuntur per formulam

$$\frac{1}{2}(-47t + 421u), \quad \frac{1}{2}(-56t + 503u), \quad \frac{1}{2}(73t - 653u), \quad \frac{1}{2}(87t - 780u)$$

ubi t, u sunt indefinite omnes numeri aequationi $tt - 79 \cdot uu = 1$ satisfaciens; hi vero exhibentur per formulas

$$\pm t = \frac{1}{2}((80 + 9\sqrt{79})^e + (80 - 9\sqrt{79})^e), \quad \pm u = \frac{1}{2\sqrt{79}}((80 + 9\sqrt{79})^e - (80 - 9\sqrt{79})^e)$$

ubi pro e omnes numeri integri non negativi sunt accipiendi.

204. Perspicuum est, formulam generalem omnes transformationes exhibentem eo simpliciore evadere, quo simplicior fuerit transformatio initialis, ex qua formula est deducta. Iam quum arbitrium sit, a qua transformatione proficiscamur, saepenumero formula generalis simplicior reddi potest, si ex formula primo inventa transformatio simplicior deducitur tribuendo ipsis t, u valores determinatos, et tunc ex hac alia formula componitur. Ita e.g. positus in formula in ex. art. praec. inventa, $t = 80, u = -9$, prodit transformatio simplicior quam ea, a qua profecti eramus, scilicet $29, 47, -37, -60$, unde deducitur formula generalis $29t - 263u, 47t - 424u, -37t + 337u, -60t + 543u$.

Quando itaque per praecepta praecedentia formula generalis eruta est, tentari poterit, an non, tribuendo ipsis t, u valores determinatos $\pm t', \pm u'; \pm t'', \pm u''$ etc. transformatio obtineatur simplicior quam ea, ex qua formula deducta fuit, in quo casu ex illa transformatione formula simplicior derivari poterit.

$\frac{a}{z}$ minor sit quam p , defectus vero assignato minor. Hoc utique verum est, quando defectus assignatus est quantitas data, neque vero, quando ab a et z pendet adeoque variabilis est, uti in casu praesenti evenit.

De formis determinantis quadrati

205. PROBLEMA. Invenire omnes repraesentationes numeri dati M per formulam datam $axx + 2bxy + cyy$, cuius determinans positivus non-quadratus $= D$.

SOL. Primo observamus, investigationem repraesentationum per valores ipsorum x, y inter se non primos hic prorsus eodem modo, ut supra (art. 181) pro formis determinantis negativis, ad eum casum reduci posse, ubi repraesentationes per valores indeterminatarum inter se primos quaeruntur, quod igitur hic repetere superfluum foret. Ad possibilitatem repraesentationum per valores ipsorum x, y inter se primos autem requiritur, ut D sit residuum quadraticum ipsius M , et si omnes valores expressionis $\sqrt{D} \pmod{M}$ sunt $N, -N, N', -N', N'', -N''$ etc. (quos ita accipere licet ut nullus sit $> \frac{1}{2}M$), quaevis repraesentatio numeri M per formam propositam ad aliquem horum valorum pertinebit. Ante omnia itaque valores illi erui debebunt; tunc repraesentationes ad singulos pertinentes deinceps investigari.

Repraesentationes ad valorem N pertinentes non dabuntur, nisi formae (a, b, c) et $(M, N, \frac{NN-D}{M})$ proprio aequivalentes sunt; si vero sunt, quaeratur transformatio aliqua propria prioris in posteriorem, quae sit $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Tum habebitur repraesentatio numeri M per formam (a, b, c) ad valorem N pertinens haec: $x = \alpha, y = \gamma$, omnesque repraesentationes ad hunc valorem pertinentes exhibebuntur per formulam

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{m}(\alpha t - (\alpha b + \gamma c)u), \\ y &= \frac{1}{m}(\gamma t + (\alpha a + \gamma b)u) \end{aligned}$$

designante m divisorem communem maximum numerorum $a, 2b, c$; et t, u indefinite omnes numeros aequationi $tt - Duu = mm$ satisfaciens.

Ex. Quaeruntur omnes repraesentationes numeri 585 per formulam $42xx + 62xy + 21yy$. Quod ad repraesentationes per valores ipsorum x, y inter se non primos pertinet, statim patet alias huius generis dari non posse, quam in quibus divisor communis maximus ipsorum x, y sit 3: quum 585 per unicum quadratum 9 divisibilis sit. Quando itaque omnes repraesentationes numeri 65 per formam $14xx + 62xy + 21yy$ inventae sunt, in quibus x ad y primus; omnes repraesentationes numeri 585 per formam $42xx + 62xy + 21yy$, in quibus x ad y non primus, ex illis derivabuntur ponendo $x = 3x', y = 3y'$.

Valores expressionis $\sqrt{79} \pmod{65}$ sunt $\pm 12, \pm 27$. Repraesentatio numeri 65 ad valorem -12 pertinens invenitur $x = 1, y = -1$; quocirca omnes repraesentationes ipsius 65 ad hunc valorem pertinentes exhibebuntur per formulam $x = 2t - 41u, y = -t + 53u$, adeoque omnes repraesentationes ipsius 585 hinc oriundae per formulam $x = 6t - 123u, y = -3t + 159u$. Simili modo invenitur formula generalis omnes repraesentationes numeri 65 ad valorem $+12$ pertinentes exhibens $x = 11t - 100u, y = -23t + 211u$; et formula omnes repraesentationes numeri 585 hinc oriundas complectens $x = 66t - 597u, y = -69t + 633u$. Ad valores ± 27 autem nulla repraesentatio numeri 65 pertinet.

Ut repraesentationes numeri 585 per valores ipsorum x, y inter se primos inveniantur, primo valores expressionis $\sqrt{79} \pmod{585}$ eruere oportet, qui sunt $\pm 77, \pm 103, \pm 157, \pm 248$. Ad valores $+77, +103, +248$ invenitur nullam repraesentationem pertinere; ad valorem -157 autem pertinet repraesentatio $x = 3, y = 1$, unde deducitur formula generalis omnes repraesentationes ad hunc valorem pertinentes exhibens $x = 3t - 1141u, y = t + 157u$; similiterque invenitur repraesentatio ad $+157$ pertinens $x = 83, y = -87$, et formula in qua omnes similes sunt contentae $x = 83t - 746u, y = -87t + 789u$. Habentur itaque quatuor formulae generales, sub quibus omnes repraesentationes numeri 585 per

formam $42xx + 62xy + 21yy$ contentae sunt:

$$\begin{array}{ll} x = 6t - 123u, & y = -3t + 159u; \\ x = 66t - 597u, & y = -69t + 633u; \\ x = 3t - 1141u, & y = t + 157u; \\ x = 83t - 746u, & y = -87t + 789u; \end{array}$$

ubi t, u indefinite omnes numeros integros denotant, qui aequationi $tt - 79 \cdot uu = 1$ satisfaciunt.

Applicationibus specialibus disquisitionum praecedentium de formis determinantis positivi non-quadrati brevitatis gratia non immoramur, quippe quas simili modo ut artt. 176, 182 quisque, sine negotio, proprio Marte instituere poterit, statimque ad formas determinantis positivi quadrati, quae solae adhuc supersunt, properamus.

206. PROBLEMA. Proposita forma (a, b, c) determinantis quadrati hh , designante h ipsius radicem positivam, invenire formam (A, B, C) illi proprie aequivalentem, in qua A iaceat inter limites 0 et $2h - 1$ incl., B sit $= h$, $C = 0$.

SOL. I. Quoniam $hh = bb - ac$, erit $(h - b) : a = c : -(h + b)$. Sit huic rationi aequalis ratio $\varepsilon : \zeta$, ita ut ε ad ζ sit primus, determinanturque α, γ ita, ut sit $\alpha\zeta - \varepsilon\gamma = 1$, quae fieri poterunt. Per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ transeat forma (a, b, c) in (a', b', c') , quae igitur illi proprie aequivalens erit. Habebitur autem

$$\begin{aligned} b' &= a\alpha\alpha' + b(\alpha\delta' + \beta\gamma') + c\gamma\delta' = h(\alpha\delta - \beta\gamma) = h, \\ c' &= a\beta^2 + 2b\beta\delta + c\delta^2 = \frac{1}{\zeta^2}((h - b)\alpha^2 + 2b\alpha\zeta - (h + b)\zeta^2) = 0. \end{aligned}$$

Quodsi itaque insuper a' inter limites 0 et $2h - 1$ iam est situs, forma (a', b', c') omnibus conditionibus satisfaciet.

II. Si vero a' extra limites 0 et $2h - 1$ iacet, sit A residuum minimum positivum ipsius a' secundum modulum $2h$, quod manifesto inter hos limites situm erit, ponaturque $A - a' = 2hk$. Tum forma (a', b', c') i.e. $(a', h, 0)$ per substitutionem $1, 0, k, 1$ transibit in formam $(A, h, 0)$, quae formis (a', b', c') , (a, b, c) proprie aequivalens erit omnibusque conditionibus satisfaciet. Ceterum perspicuum est, formam (a, b, c) transire in formam $(A, h, 0)$ per substitutionem $\alpha + \beta k, \beta, \gamma + \delta k, \delta$.

Ex. Proposita sit forma $(27, 15, 8)$, cuius determinans $= 9$. Hic $h = 3$; rationibus $-12 : 27 = 8 : -18$ in numeris minimis aequalis est ratio $4 : -9$. Positis itaque $\beta = 4$, $\delta = -9$, $\alpha = -1$, $\gamma = 2$, forma (a, b, c) fit $(-1, 3, 0)$, quae transit in formam $(5, 3, 0)$ per substitutionem $1, 0, 1, 1$. Haec igitur est forma quaesita, transitque in eam proposita per substitutionem propriam $3, 4, 7, -9$.

Tales formas (A, B, C) , in quibus $C = 0$, $B = h$, A inter limites 0 et $2h - 1$ situs, *formas reductas* vocabimus, quae igitur a formis reductis determinantis negativis, vel positivi non-quadrati, probe sunt distinguendae.

207. THEOREMA. Duae formae reductae $(a, h, 0)$, $(a', h, 0)$, non identicae proprie aequivalentes esse non possunt.

DEM. Si enim proprie aequivalere supponuntur, transeat prior in posteriorem per substitutionem propriam $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, habebunturque quatuor aequationes:

$$a\alpha\alpha + 2h\alpha\gamma = a' \tag{1}$$

$$a\alpha\beta + h(\alpha\delta + \beta\gamma) = h \tag{2}$$

$$a\beta\beta + 2h\beta\delta = 0 \tag{3}$$

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \tag{4}$$

Multiplicando aequationem secundam per β , tertiam per α et subtrahendo fit $-h(\alpha\delta - \beta\gamma)\beta = \beta h$, sive, propter (4), $-\beta h = \beta h$, unde necessario $\beta = 0$. Quare ex (4), $\alpha\delta = 1$, et $\alpha^2 = +1$. Hinc ex (1), $a + 2\gamma h = a'$, quae aequatio consistere nequit, nisi $\gamma = 0$ (quoniam tum a tum a' per hyp. inter 0 et $2h - 1$ iacent) i.e. nisi $a = a'$, sive formae $(a, h, 0)$, $(a', h, 0)$ identicae, contra hyp.

Hinc sequentia problemata, quae pro determinantibus non-quadratis multo maiorem difficultatem facessbant, nullo negotio solvi poterunt.

I. Propositis duabus formis F, F' eiusdem determinantis quadrati, investigare an proprie aequivalent. Quaerantur duae formae reductae formis F, F' resp. proprie aequivalentes; quae si identicae sunt, propositae proprie aequivalentes erunt, sin minus, non erunt.

II. Iisdem positis investigare an improprie aequivalent. Sit forma alterutri propositarum e.g. formae F opposita, G ; quae si formae F' proprie aequivalet, F et F' improprie aequivalent, et contra.

208. PROBLEMA. Propositis duabus formis F, F' determinantis hh proprie aequivalentibus: invenire transformationem propriam alterius in alteram.

SOL. Formae F proprie aequivalet forma reducta φ , quae itaque per hyp. etiam formae F' proprie aequivalet. Quaeratur per art. 206 transformatio propria formae F in φ , quae sit $\alpha, \beta, \gamma, \delta$; nec non transformatio propria formae F' in φ , quae sit $\alpha', \beta', \gamma', \delta'$. Tunc φ transformabitur in F' per substitutionem propriam $\delta', -\beta', -\gamma', \alpha'$ et hinc F in F' per substitutionem propriam

$$\alpha\delta' - \beta\gamma', \beta\alpha' - \alpha\beta', \gamma\delta' - \delta\gamma', \delta\alpha' - \gamma\beta'.$$

Operae pretium est, aliam formulam pro hac transformatione formae F in F' evolvere, ad quam formam reductam ipsam novisse ne opus quidem sit. Ponamus formam F esse (a, b, c) , $F' = (a', b', c')$, $\varphi = (A, h, 0)$.

Quoniam rationibus $h - b : a$ vel $c : -(h + b)$ in numeris minimis aequalis est ratio $\varepsilon : \zeta$, facile perspicitur $\frac{h-b}{a} = \frac{\varepsilon}{\zeta}$ fore integrum, qui sit f ; nec non $\frac{c}{-(h+b)} = \frac{\varepsilon}{\zeta}$ integrum fore qui ponatur $= g$. Habebitur autem $A = a\alpha a + 2b\alpha\gamma + c\gamma\gamma$ adeoque $\beta A = aa\alpha\beta + 2ba\beta\gamma + c\beta\gamma\gamma$ sive (substitutis pro $a\beta$, $B(h - b)$, pro c , $-\frac{\varepsilon}{\zeta}(h + b)$)

$$\beta A = aaB(h - b) + b(2\beta\gamma - \alpha\delta)\alpha - \beta\gamma\gamma(h + b) = 2a(\alpha h - \beta\gamma)h + (\alpha h - \beta\gamma)\varepsilon = 2\varepsilon h + g.$$

Simili modo $BA = aa\alpha B + 2baB\gamma + c\gamma\gamma B = aabB + b(2aB - \beta\gamma)\gamma - \beta\gamma\gamma h = (\alpha B - \gamma\beta)\varepsilon + 2\gamma(\alpha h - \beta\gamma)h = 2\gamma h + f$.

$$\text{Quare } \alpha = \frac{\beta'g - \beta g'}{2h}, \gamma = \frac{\gamma'g - \gamma g'}{2h}.$$

$$\text{Prorsus eodem modo positis } \frac{h-b'}{a'} = f', \frac{c'}{-(h+b')} = g' \text{ fit } \alpha' = \frac{\beta'f - \beta f'}{2h}, \gamma' = \frac{\gamma'f - \gamma f'}{2h}.$$

Quibus valoribus ipsorum $\alpha, \gamma, \alpha', \gamma'$ in formula modo tradita pro transformatione formae F in F' substitutis, transit in hanc:

$$\frac{\beta f' - \beta' f}{2h}, \frac{\beta' g - \beta g'}{2h}, \frac{\gamma f' - \gamma' f}{2h}, \frac{\gamma' g - \gamma g'}{2h}$$

ex qua A omnino abiit.

Si duae formae F, F' improprie aequivalentes proponuntur, et transformatio impropria alterius in alteram quaeritur, sit forma G opposita formae F , et transformatio propria formae G in F' haec $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Tunc manifestum est, $\alpha, \beta, -\gamma, -\delta$ fore transformationem impropriam formae F in F' .

209. Nihil itaque iam superest quam ut ex una transformatione omnes reliquas similes deducere doceamus. Hoc vero pendet a solutione aequationis indeterminatae $tt - hhuu = mm$, designante m divisorem communem maximum numerorum $a, 2b, c$, si (a, b, c) est alterutra formarum aequivalentium. Sed haec aequatio semper duobus tantum modis solvi potest, nempe ponendo aut $t = m, u = 0$, aut $t = -m, u = 0$. Ponamus enim dari adhuc aliam solutionem $t = T, u = U$, ita ut $U \neq 0$. Quia mm ipsum $4hh$ certo metitur, erit

$$\frac{4TT}{mm} = 4 + \frac{4hhUU}{mm}, \quad \frac{4TT}{mm} = \left(\frac{2T}{m}\right)^2, \quad \frac{4hhUU}{mm} = \left(\frac{2hU}{m}\right)^2$$

atque tum $\frac{2T}{m}$ tum $\frac{2hU}{m}$ quadrata integra. Ibed nullo negotio perspicitur, numerum 4 duorum quadratorum integrorum differentiam esse non posse, nisi quadratum minus sit $= 0$, i.e. $U = 0$, contra hyp.

Si itaque forma F in formam F' per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ transit, alia transformatio huic similis non dabitur praeter transformationem $-\alpha, -\beta, -\gamma, -\delta$.

Quare si duae formae aut proprie tantum, aut improprie tantum aequivalent, duae tantum transformationes dabuntur; si vero tum proprie tum improprie, quatuor, nempe duae propriae duaeque impropriae.

210. THEOREMA. Si duae formae reductae $(a, h, 0), (a', h, 0)$ improprie sunt aequivalentes, erit $aa' \equiv mm \pmod{2mh}$, designante m divisorem communem maximum numerorum $a, 2h$; et vice versa, si $a, 2h; a', 2h$ eundem divisorem communem maximum m habent, atque est $aa' \equiv mm \pmod{2mh}$, formae $(a, h, 0), (a', h, 0)$ improprie aequivalentes erunt.

DEM. I. Transeat forma $(a, h, 0)$ in formam $(a', h, 0)$ per substitutionem impropriam $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, ita ut habeantur quatuor aequationes:

$$a\alpha\alpha + 2h\alpha\gamma = a' \quad (1)$$

$$a\alpha\beta + h(\alpha\delta + \beta\gamma) = h \quad (2)$$

$$a\beta\beta + 2h\beta\delta = 0 \quad (3)$$

$$\alpha\delta - \beta\gamma = -1 \quad (4)$$

Hinc sequitur, multiplicando (4) per h et subtrahendo a (2), quod ita exprimimus $[2] - h[4]$,

$$(\alpha a + 2h\gamma)\beta = 2h \quad (5)$$

similiter ex $\alpha\beta[2] - \alpha\alpha[3] - (\alpha\beta\delta + \alpha\beta\gamma + h\gamma\gamma)[4]$ deletis quae sese destruunt $-(\alpha a + 2h\gamma)\delta = a'$, sive $-(\alpha a + 2h\gamma)\delta = a'$. Denique ex $\alpha[1] \dots \alpha a(\alpha a + 2h\gamma) = aa'$, sive

$$(\alpha a + 2h\gamma)^2 \equiv aa' \pmod{2h(\alpha a + 2h\gamma)} \quad (7)$$

Iam ex (5) et (6) sequitur, $\alpha a + 2h\gamma$ metiri ipsos $2h$ et a , adeoque etiam ipsum m , qui est divisor communis maximus ipsorum $a, 2h$; manifesto autem m metietur etiam ipsum $\alpha a + 2h\gamma$; quare necessario $\alpha a + 2h\gamma$ erit aut $= +m$ aut $= -m$. Hinc statim sequitur ex (7), $mm \equiv aa' \pmod{2mh}$. Q.E.P.

II. Si $a, 2h; a', 2h$ eundem divisorem communem maximum m habent, insuperque est $aa' \equiv mm \pmod{2mh}$, erunt $\frac{a'}{m}, \frac{2h}{m}, \frac{aa' - mm}{2mh}$ integri. Facile vero confirmatur, formam $(a, h, 0)$ transire in $(a', h, 0)$ per substitutionem $\frac{a'}{m}, \frac{aa' - mm}{2mh}, \frac{1}{m}, \frac{a}{m}$; nec non hanc transformationem esse impropriam. Quare formae illae erunt improprie aequivalentes. Q.E.S.

Hinc etiam statim diiudicari potest, an forma aliqua reducta data $(a, h, 0)$ sibi ipsi improprie aequivalens sit. Scilicet designato divisore communi maximo numerorum $a, 2h$ per m , esse debeat $aa \equiv mm \pmod{2mh}$.

211. Omnes formae reductae determinantis dati hh obtinentur, si in forma indefinita $(A, h, 0)$ pro A omnes numeri a 0 usque ad $2h - 1$ incl. substituuntur, quarum itaque multitudo erit $2h$. Perspicuum est, omnes formas determinantis hh in totidem classes distribui posse, hasque iisdem proprietatibus praeditas fore, quas supra (artt. 175, 195) pro classibus formarum determinantis negativi, et positivi non-quadrati attigimus.

Ex. Ita omnes formae determinantis 25 in decem classes distribuentur, quae per formas reductas in singulis contentas distingui poterunt. Hae formae reductae sunt: $(0, 5, 0)$, $(1, 5, 0)$, $(2, 5, 0)$, $(5, 5, 0)$, $(8, 5, 0)$, $(9, 5, 0)$, quae sibi ipsae simul improprie aequivalent; $(3, 5, 0)$ cui improprie aequivalet $(7, 5, 0)$; $(4, 5, 0)$ cui improprie aequivalet $(6, 5, 0)$.

212. PROBLEMA. Invenire omnes repraesentationes numeri dati M per formam datam $axx + 2bxy + cyy$ determinantis hh .

Solutio huius problematis ex principiis art. 168 prorsus eodem modo peti potest, ut supra (artt. 180, 181, 205) pro formis determinantis negativi et positivi non-quadrati ostendimus; quod, quum nulli difficultati sit obnoxium, hic repetere superfluum esset. Contra haud abs re erit, solutionem ex alio principio, quod casui praesenti proprium est, deducere.

Positis ut artt. 206, 208

$$\frac{h-b}{a} = \frac{c}{-(h+b)} = \frac{\varepsilon}{\zeta}, \quad \frac{h-b'}{a'} = \frac{c'}{-(h+b')} = \frac{\varepsilon'}{\zeta'}$$

nullo negotio probatur, formam propositam esse productum ex factoribus $hx - \zeta y$ et $fx - gy$. Unde manifestum est, quamvis repraesentationem numeri M per formam propositam praebere resolutionem numeri M in binos factores.

Si igitur omnes divisores numeri M sunt d, d', d'' etc. (inclusis etiam 1 et M , et singulis bis sumtis puta tum positive tum negative), patet omnes repraesentationes numeri M obtineri, si successive ponatur

$$\begin{aligned} hx - \zeta y &= d, & fx - gy &= \frac{M}{d}, \\ hx - \zeta y &= d', & fx - gy &= \frac{M}{d'} \end{aligned}$$

etc. valores ipsorum x, y hinc evolvantur, eaeque repraesentationes eiiciantur, ubi x aut y valores fractos obtinent. Manifesto vero ex duabus primis aequationibus sequitur

$$x = \frac{hM - g \cdot \frac{M}{d}}{(\delta f - \zeta g)d}, \quad y = \frac{fM - f \cdot \frac{M}{d}}{(\delta f - \zeta g)d}$$

quos valores semper determinatos fore inde manifestum, quod $\delta f - \zeta g = 2h$, adeoque numerator certo non = 0.

Ceterum ex eodem principio, puta resolubilitate cuiusvis formae determinantis quadrati in binos factores, etiam reliqua problemata solvi potuissent: sed methodo ei, quam supra pro formis determinantis non-quadrati tradidimus, analogam etiam hic uti maluimus.

Ex. Quaeruntur omnes repraesentationes numeri 12 per formam $3xx + 2xy - 7yy$. Haec resolvitur in factores $x - y$ et $3x + 7y$. Omnes divisores numeri 12 sunt $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$. Positis $x - y = 1, 3x + 7y = 12$ fit $x = \frac{19}{10}, y = \frac{9}{10}$, qui valores tamquam fracti sunt reiiciendi. Eodem modo ex divisoribus $-1, +3, +4, +6, +12$ valores inutiles

obtinentur; ex divisore $+2$ vero obtinentur valores $x = 2, y = 0$, et ex divisore -2 hi $x = -2, y = 0$; praeter has duas repraesentationes igitur aliae non dantur.

Methodus haec adhiberi nequit, si $M = 0$. In hoc casu manifestum est, omnes valores ipsorum x, y aut aequationi $hx - \zeta y = 0$, aut huic $fx - gy = 0$ satisfacere debere. Omnes autem solutiones aequationis prioris continentur in formula $x = \zeta z, y = hz$, designante z indefinite numerum integrum quemcunque (siquidem uti supponitur ζ, h inter se primi sunt); similiterque ponendo divisorem communem maximum numerorum $f, g = m$, omnes solutiones aequationis posterioris exhibebuntur per formulam $x = \frac{g}{m}z, y = \frac{f}{m}z$. Quare hae duae formulae generales omnes repraesentationes numeri M in hoc casu complectentur.

Formae sub aliis contentae quibus tamen non aequivalent

213. Supra artt. 157, 158 ostendimus, si forma f determinantis D formam F determinantis E implicet atque in ipsam transeat per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, fore $E = (\alpha\delta - \beta\gamma)^2 D$; si fuerit $\alpha\delta - \beta\gamma = \pm 1$, formam f non modo implicare formam F sed ipsi aequivalentem esse et proin si f ipsam F implicet neque vero eidem aequivaleat, quotientem $\frac{E}{D}$ esse integrum maiorem quam 1.

Problema itaque hic solvendum erit, diiudicare an forma data f determinantis D formam datam F determinantis Dee implicet, ubi e supponitur esse numerus positivus maior quam 1.

I. Ponamus omnes divisores positivos numeri e (inclusis etiam 1 et e) esse m, m', m'' etc., atque $e = mn = m'n' = m''n''$ etc. Designemus brevitatis gratia formam in quam f transit per substitutionem propriam $m, 0, 0, n$ per $(m; 0)$, formam in quam f transit per substitutionem propriam $m, 1, 0, n$ per $(m; 1)$ etc. generaliterque formam in quam f per subst. propriam $m, k, 0, n$ transmutatur per $(m; k)$. Simili modo transeat f per subst. propriam $m', 0, 0, n'$ in $(m'; 0)$; per hanc $m', 1, 0, n'$ in $(m'; 1)$ etc., per $m'', 0, 0, n''$ in $(m''; 0)$ etc. etc. Omnes hae formae sub f proprie contentae erunt, et cuiusvis determinans = Dee . Complexum omnium formarum $(m; 0), (m; 1), (m; 2) \dots (m; m-1), (m'; 0), (m'; 1) \dots (m'; m'-1), (m''; 0)$ etc. quarum multitudo erit $m + m' + m'' + \dots$ et quas omnes inter se diversas fore facile perspicitur, designemus per Ω .

Si e.g. forma f est haec $(2, 5, 7)$ atque $e = 5$, Ω comprehendet sequentes sex formas $(1; 0), (5; 0), (5; 1), (5; 2), (5; 3), (5; 4)$, quae si evolvuntur, sunt $(2, 25, 175), (50, 25, 7), (50, 35, 19), (50, 45, 35), (50, 55, 55), (50, 65, 79)$.

II. Iam dico, si forma F determinantis Dee sub f contenta est, eam necessario alicui ex formis in Ω contentis aequivalentem esse debere.

DEM. Quoniam F sub f contenta supponitur, transeat f in F per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, ita ut sit $\alpha\delta - \beta\gamma = e$. Sint g, h divisores communes maximi primorum resp. numerorum α, β et γ, δ , atque determinantur g', g'', h', h'' ita ut sit $gg' + \beta g'' = g, \gamma h' + \delta h'' = h$. Tum statuatur $m = gh, mn = e$, et fiat substitutio $m, 0, 0, n$, quae transformabit f in formam $(m; 0)$. Porro fiat $m' = g'h, m'n' = e$, et substitutio $m', 1, 0, n'$ transformabit f in $(m'; 1)$ etc. Iam facile perspicietur, formam F formae $(m; k)$ aequivalere, si accipiatur $k \equiv g''h' - g'h'' \pmod{m}$. Unde sequitur, formam F necessario alicui ex formis in Ω contentis aequivalere. Q.E.D.

214. PROBLEMA. Invenire omnes transformationes formae datae f in formam F sub f contentam, si dentur omnes transformationes formae datae f in quamlibet formam F' eidem aequivalentem.

SOL. Sint omnes transformationes formae f in F' hae $\alpha, \beta, \gamma, \delta; \alpha', \beta', \gamma', \delta'; \alpha'', \beta'', \gamma'', \delta''$ etc., atque transformatio propria formae F' in F haec $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{D}$. Tunc facile perspicitur, si forma f in F' transeat per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$: eandem in F transire per substitutionem $\alpha\mathfrak{A} + \beta\mathfrak{C}, \alpha\mathfrak{B} + \beta\mathfrak{D}, \gamma\mathfrak{A} + \delta\mathfrak{C}, \gamma\mathfrak{B} + \delta\mathfrak{D}$.

215. PROBLEMA. Propositis duabus formis F et f prioris determinantis Dee , posterioris D : diiudicare an F sub f contenta sit, et in hoc casu omnes transformationes formae f in F invenire.

SOL. I. Quaeratur per praecepta art. praec. multitudo finita formarum sub f contentarum Ω . Quae si forma F contineat, eadem certo alicui ex his formis aequivalebit, quae inveniri poterit per art. 207, 208 pro det. quadrato; per artt. 194 etc. pro det. positivo non-quadrato; per artt. 170 etc. pro det. negativo.

II. Quando forma F aequivalet alicui ex formis in Ω contentis, inveniri poterunt omnes transformationes formae f in F per methodos in art. praec. traditas.

Ex. Pro forma $f = (17, 35, 18)$ det. 1, quaeritur an forma $F = (53, 100, 47)$ det. 25 sub illa contenta sit. Omnes formae in Ω (ponendo $e = 5$) sunt: $(17, 175, 450)$, $(425, 180, 18)$, $(425, 215, 27)$, $(425, 250, 38)$, $(425, 285, 51)$, $(425, 320, 66)$. Per art. 207 forma F reducta fit $(2, 5, 0)$, quae est formae $(425, 180, 18)$ reductae similis. Hinc forma F formae $(425, 180, 18)$ proprie aequivalet, adeoque sub f contenta est.

216. Investigemus nunc solutionem generalem aequationis indeterminatae secundi gradus duas incognitas implicantis, in qua coefficientes omnes sint integri.

Sit aequatio proposita

$$axx + 2bxy + cyy + 2dx + 2ey + f = 0$$

seu brevitatis caussa $ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0$, designantibus a, b, c, d, e, f numeros integros datos, x, y incognitas.

Primo observamus, per solutions aequationis propositae valorem expressionis $ax^2 + 2bxy + cy^2$ fieri $= -2dx - 2ey - f$. Si iam valores ipsorum x, y fracti esse possunt, puta $x = \frac{t}{u}$, $y = \frac{v}{w}$: reducendo ad communem denominatorem, valores simplices ipsorum x, y erunt fractiones quarum numerator et denominator inter se primi sunt. Ponamus m esse divisorem communem maximum coefficientium $a, 2b, c$, atque $D = bb - ac$ esse determinantem huius formae.

217. Quum per solutions aequationis propositae valor expressionis $axx + 2bxy + cyy$ fiat $= -2dx - 2ey - f$: patet solutiones omnes in integris vel in integris vel in fractionibus contentas esse debere. Si iam valores ipsorum x, y fracti sunt, puta $x = \frac{g}{h}$, $y = \frac{k}{h}$, ita ut g, h, k sint integri, et quidem g, k ad h primi, facile perspicitur, fractionem x reduci posse ad formam in qua denominator est ad a primus.

218. Si D est negativus, aequatio proposita solutionem in integris aut non admittit aut solutiones infinitas admittit.

219. Si D est positivus non-quadratus, proposita aequatione $axx + 2bxy + cyy + 2dx + 2ey + f = 0$, determinantibus D et Δ eandem classificationem subeunt.

220. Pro eo quem exclusimus casu, ubi $ae = bd$, methodum peculiarem indagare oportet. Supponamus, a, e inter se primos esse, quod licere ex art. 215. I constat, eritque $\frac{d}{a} = \frac{e}{b}$ numerus integer (art. 19), quem statuemus $= h$. Tunc aequatio proposita hanc induit formam:

$$(ma'x + m'ey + h)^2 - hh + mf = 0$$

manifestoque adeo rationaliter solvi nequit, nisi $hh - mf$ fuerit numerus quadratus. Sit $hh - mf = kk$, patetque aequationi propositae sequentes duas aequivalere:

$$ma'x + m'ey + h + k = 0 \quad \text{et} \quad ma'x + m'ey + h - k = 0$$

i.e. quamlibet solutionem aequationis propositae etiam alterutri harum aequationum satisfacere, et vice versa. Aequatio prior manifesto in integris solvi nequit, nisi $h + k$ per m fuerit divisibilis, similiterque posterior solutionem in integris non admittet, nisi $h - k$ per m fuerit divisibilis. Hae vero conditiones ad resolubilitatem utriusque aequationis sufficiunt (quia a, e inter se primi esse supponuntur), omnesque solutiones secundum regulas notas exhiberi poterunt.

221. Casum in art. 217 consideratum (quia omnium difficillimus est) exemplo illustramus. Proposita sit aequatio $9xx + xy + yy + 2x - 4y + 1 = 0$. Ex hac primo per introductionem aliarum incognitarum $p = 10x - 9$, $q = 10y + 6$ derivatur aequatio $pp + pq + Cq = -540$. Huius autem solutiones omnes in integris, contineri inveniuntur sub quatuor formulis sequentibus:

$$\begin{array}{ll} p = 2t, & q = -24t - 90u; \\ p = 2t, & q = -24t + 90u; \\ p = -2t, & q = 24t - 90u; \\ p = -2t, & q = 24t + 90u; \end{array}$$

denotantibus t, u indefinite omnes numeros integros positivos aequationi $tt - 15uu = 1$ satisfaciētes, quos complectitur formula:

$$\begin{aligned} t &= \frac{1}{2}((4 + \sqrt{15})^e + (4 - \sqrt{15})^e), \\ u &= \frac{1}{2\sqrt{15}}((4 + \sqrt{15})^e - (4 - \sqrt{15})^e) \end{aligned}$$

si e indefinite omnes numeros integros positivos (inclusa etiam cifra) designat.

Quamobrem omnes valores ipsorum x, y contenti erunt sub formulis his:

$$\begin{array}{ll} x = \frac{1}{10}(2t + 3), & y = -\frac{1}{10}(8t + 30u - 2); \\ x = \frac{1}{10}(2t + 3), & y = -\frac{1}{10}(8t - 30u + 2); \\ x = \frac{1}{10}(-2t + 3), & y = \frac{1}{10}(8t - 30u - 2); \\ x = \frac{1}{10}(-2t + 3), & y = \frac{1}{10}(8t + 30u - 2). \end{array}$$

Praeceptis autem nostris rite applicatis, reperietur, ut valores integri prodeant, in formula prima et secunda eos valores ipsorum t, u accipi debere, qui proveniant ex indice e pari; in tertia quartaque vero eos, qui ex impari e obtineantur.

Solutiones simplicissimae habentur hae: $x = 1, -1, -1$; $y = -2, 0, 12$ resp.

Ceterum observare convenit, solutionem problematis in artt. praec. explicati plerumque per multifaria artificia abbreviari posse, praesertim quantum ad exclusionem solutionum inutilium i.e. fractiones implicantium pertinet; sed haec ne nimis longi fiamus hoc loco praeterire coacti sumus.

Annotationes historicae

222. Quoniam complura ex iis quae hucusque pertractavimus, etiam ab aliis geometris considerata sunt, horum merita silentio praeterire non possumus. De formarum aequivalentia disquisitiones generales instituit ill. La Grange, Nouv. Mém. de l'Ac. de Berlin, 1773, p. 263 et 1775, p. 323 sqq., ubi imprimis docuit, pro quovis determinante dato multitudinem finitam formarum dari ita comparatarum, ut quaevis forma illius determinantis

alicui ex ipsis aequivalens sit, adeoque omnes formas determinantis dati in classes distribui posse. Postea clar. Le Gendre plures proprietates elegantes huius classificationis ad maximam partem per inductionem detexit, quas infra trademus demonstrationibus munimus. Ceterum distinctionem aequivalentiae propriae et impropriae, cuius usus maxime in disquisitionibus subtilioribus conspicuus est, nemo hucusque attigerat.

Problema famosum in art. 216 sqq. explicatum ill. La Grange primus complete resolvit, Hist. de l'Ac. de Berlin, 1767 p. 165 et 1768 p. 181 sqq. Exstat solutio (sed minus completa) etiam in Suppl. ad Euleri Algebram iam saepius laudatis. Iam antea ill. Euler idem argumentum aggressus fuerat, Comm. Petr. T. VI p. 175; Comm. Nov. T. IX p. 3; Ibid. T. XVIII p. 185 sqq., sed investigationem suam eo semper restrinxit, ut ex aliqua solutione, quam iam cognitam esse supponit, aliae deriventur; praetereaue ipsius methodi in paucis tantummodo casibus omnes solutiones suppeditare valent (vid. La Grange Hist. de l'Ac. de Berlin 1767, p. 237). Quum ultima harum trium commentt. recentioris dati sit quam solutio La Grangeana, quae problema omni generalitate amplectitur nihilque hoc respectu desiderandum relinquit: Euler tunc temporis (Tomus XVIII Commentariorum pertinet ad annum 1773, et a. 1774 est publicatus) illam solutionem nondum novisse videtur. Ceterum solutio nostra (perinde ut omnia reliqua quae in hac sectione hactenus tradidimus), principiis omnino diversis est superstructa.

Quae ab aliis, Diophanto, Fermatio etc. huc pertinentia sunt tradita, casus maxime speciales spectant; quare quum eorum quae praesertim memoratu digna visa sunt, iam supra mentio facta sit, sigillatim omnia enarrare supersedemus.

Quae hactenus de formis secundi gradus exposuimus, pro primis tantum elementis huius doctrinae sunt habenda: innixius hanc disquisitionem persequentibus campus se aperuit nobis vastissimus, ex quo ea quae attentione imprimis digna videntur, in sequentibus excerpamus. Namque argumentum hoc tam fertile est, ut permulta alia, quae iam nunc invenire nobis contigit, brevitatis gratia silentio praeterire oporteat: multo vero plura sine dubio adhuc latent novosque conatus expectant. Ceterum in limine harum investigationum statim adnotare convenit, formas determinantis negativi inde exclusas esse, nisi contrarium moneatur.

Disquisitiones ulteriores de formis

Distributio formarum determinantis dati in classes

223. Iam supra (artt. 175, 195, 211) ostendimus, proposito numero quocunque integro D (sive positivo sive negativo) assignari posse multitudinem finitam formarum F, F', F'' etc. determinantis D , ita comparatarum, ut quaevis forma determinantis D proprie aequivalens sit alicui ex illis et quidem unicae tantum. Omnes igitur formae determinantis D (quarum multitudo est infinita) secundum illas formas classificari poterunt, formando scilicet e complexu omnium formarum formae F proprie aequivalentium classem primam; e formis quae formae F' proprie aequivalent, secundam etc.

Ex singulis classibus formarum determinantis dati D , forma aliqua eligi et tamquam *forma repraesentans* totius classis considerari potest. Per se quidem prorsus arbitrarium est, quaenam forma ex quaque classe accipiat, attamen ea semper praefenda erit, quae reliquas simplicitate superare videtur. Simplicitas formae alicuius (a, b, c) manifesto ex magnitudine numerorum a, b, c aestimanda est, meritoque forma (a', b', c') minus simplex dicetur quam (a, b, c) , si $a' > a, b' > b, c' > c$. Sed hinc res nondum determinatur penitus, arbitrioque nostro relinquitur e.g. utram ex formis $(17, 0, -45), (5, 0, -153)$ pro simpliciori

habere malimus. Plerumque tamen e re erit, sequentem normam observare:

I. Quando determinans D est negativus, adoptentur formae reductae in singulis classibus contentae tamquam formae repraesentantes; ubi vero in eadem classe duae formae reductae reperiuntur (quae erunt oppositae, art. 172), recipiatur ea, cuius terminus medius positivus.

II. Quando determinans D est positivus non-quadratus, evolvatur periodus formae alicuius reductae in classe proposita contentae, in qua aut duae formae ancipites invenientur aut nulla (art. 187).

1) In casu priori sint formae ancipites hae: (A, B, C) , (A', B', C') ; residua minima numerorum B, B' secundum modulus A, A' resp. M, M' (quae positive accipi poterunt nisi sunt $= 0$); denique $\frac{BB-M}{A} = N$, $\frac{B'B'-M'}{A'} = N'$.

His ita factis, ex formis $(A, M, -N)$, $(A', M', -N')$ ea quae simplicissima videtur, pro forma repraesentante accipiat. In hoc iudicio forma cuius terminus medius $= 0$, praefertur; quando vero terminus medius aut in utraque aut in neutra est, ea quae terminum primum minorem habet, alteri prae habenda, et quando termini primi magnitudine sunt aequales signis diversi, signum negativum positivo postponendum.

2) Quando vero nulla forma anceps in tota periodo habetur, eligatur ex omnibus periodi formis ea, quae terminum primum sine respectu signi minimum habet, ita quidem, ut si duae formae in eadem periodo occurrant, in quarum altera idem terminus primus signo positive affectus sit, in altero negative, posterior priori postponatur. Sit haec forma (A, B, C) , deducaturque ex ipsa eodem modo ut in casu praec. forma alia $(A, M, -N)$ (puta, accipiendo pro M residuum absolute minimum ipsius B secundum mod. A , et faciendo $N = -\frac{BB-M}{A}$): haec demum pro repraesentante adoptetur.

Quodsi vero eveniret, ut idem terminus primus minimus A pluribus periodi formis communis sit, omnes hae formae eo quo praescripsimus modo tractandae et ex formis prodeuntibus ea, cuius terminus medius quam minimus evadit, tamquam forma repraesentans assumenda erit.

III. Quando determinans est positivus quadratus $= kk$, eruatur forma reducta $(A, k, 0)$ in classe proposita contenta et, si $A < k$ aut $= k$, pro forma repraesentante ipsa recipiatur; si vero $A > k$, assumatur illius loco forma $(A - 2k, k, 0)$, cuius terminus primus erit negativus, sed minor quam k .

Ex. Hoc modo omnes formae determinantis -235 distribuuntur in classes sedecim, quarum repraesentantes erunt: $(1, 0, 235)$, $(2, 1, 118)$, $(4, 1, 59)$, $(4, -1, 59)$, $(5, 0, 47)$, $(10, 5, 26)$, $(13, 5, 20)$, $(13, -5, 20)$, octoque aliae a praecedentibus in solis signis terminorum externorum diversae, $(-1, 0, -235)$, $(-2, 1, -118)$ etc.

Omnes formae determinantis 79 in sex classes discedunt, quarum repraesentantes $(1, 0, -79)$, $(3, 1, -26)$, $(3, -1, -26)$, $(-1, 0, 79)$, $(-3, 1, 26)$, $(-3, -1, 26)$.

224. Per hanc itaque classificationem formae quae proprie aequivalentes sunt, a reliquis omnino segregabuntur. Duae formae eiusdem determinantis D , si ex eadem classe sunt, proprie aequivalentes erunt; quivis numerus per unam repraesentabilis etiam per alteram repraesentari poterit; et si numerus quicumque M per formam priorem ita repraesentari potest, ut indeterminatae valores inter se primos habeant, idem numerus per alteram formam eodem modo repraesentari poterit, et quidem ita, ut utraque repraesentatio ad eundem valorem expressionis $\sqrt{D} \pmod{M}$ pertineat.

Si vero duae formae ad classes diversas pertinent, proprie aequivalentes non erunt; a repraesentabilitate numeri alicuius dati per unam ad repraesentabilitatem eiusdem numeri per alteram concludi nequit; contra, si numerus M per alteram repraesentari potest, ita ut valores indeterminatarum inter se primi sint, statim certi sumus, nullam similem

repraesentationem eiusdem numeri per formam alteram dari, quae ad eundem valorem expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$ pertineat (V. artt. 167, 168).

Contra utique fieri potest, ut formae duae F, F' , e classibus diversis K, K' improprie aequivalentes sint, in quo casu quaevis forma ex altera classe cuiusvis formae ex altera improprie aequivalebit; quaevis forma ex K formam sibi oppositam habebit in K' classesque ipsae K, K' *oppositae* dicentur. Ita in exemplo primo art. praec. classis tertia formarum det. -235 quartae, septima octavae opposita est; in ex. secundo classis secunda tertiae, quinta sextae. Propositis itaque duabus formis quibuscunque e classibus oppositis, quivis numerus M , qui per alteram repraesentari potest, etiam per alteram poterit; quod, si in altera fit per valores indeterminatarum inter se primos, in altera perinde fieri poterit, ita tamen, ut hae duae repraesentationes ad valores oppositos expr. $\sqrt{D} \pmod{M}$ pertineant.

Ceterum regulae supra traditae pro electione formarum repraesentantium ita sunt constitutae, ut classes oppositae formas repraesentantes oppositas semper nanciscantur.

Denique dantur etiam *classes sibi ipsis oppositae*. Scilicet si forma aliqua simul cum forma opposita in eadem classe continetur, facile perspicitur, omnes formas huius classis tum proprie tum improprie inter se aequivalentes esse, oppositasque suas secum habere. Hanc indolem quaevis classis habebit, in qua forma anceps continetur, et vice versa in quavis classe sibi ipsi opposita necessario forma anceps reperietur (art. 163, 165), quamobrem *classis anceps* nuncupabitur.

Ita inter classes formarum determinantis -235 octo ancipites habentur, quarum repraesentantes sunt $(1, 0, 235)$, $(2, 1, 118)$, $(5, 0, 47)$, $(10, 5, 26)$, $(-1, 0, -235)$, $(-2, 1, -118)$, $(-5, 0, -47)$, $(-10, 5, -26)$; inter classes formarum determinantis 79 duae, quarum repraesentantes $(1, 0, -79)$, $(-1, 0, 79)$.

Ceterum si formae repraesentantes secundum regulas nostras determinatae sunt, classes ancipites nullo negotio inde cognosci poterunt. Scilicet pro determinante positivo non-quadrato classis anceps certo formam repraesentantem ancipitem nanciscitur (art. 194); pro determinante negativo forma repraesentans classis ancipitis aut ipsa anceps erit, aut talis cuius termini externi sunt aequales (art. 172); denique pro determinante positivo quadrato per art. 210 facile diiudicatur, an forma repraesentans sibi ipsi improprie aequivalens sit adeoque classis, quam repraesentat, anceps.

225. Iam supra (art. 175) ostendimus, in forma (a, b, c) determinantis negativum terminos externos eadem signa habere tum inter se tum cum terminis externis cuiusvis alius formae illi aequivalentis. Si a, c sunt positivi, formam (a, b, c) *positivam* vocabimus, nec non totam classem, in qua (a, b, c) continetur et quae e solis formis positivis constabit, *classem positivam* dicemus. Contra (a, b, c) erit forma *negativa*, et in classe negativa contenta, si a, c sunt negativi. Per formam positivam numeri negativi, per negativam positivi repraesentari nequeunt.

Si forma (a, b, c) est repraesentans alicuius classis positivae, forma $(-a, b, -c)$ repraesentans classis negativae erit, unde sequitur, multitudinem classium positivarum multitudini negativarum aequalem esse, et, simul ac illae fuerint assignatae, etiam has haberi. Quocirca in disquisitionibus super formis determinantis negativum plerumque sufficit classes positivas considerare, quippe quarum proprietates ad classes negativas facile transferuntur.

Ceterum distinctio haec unice in formis determinantis negativum locum habet; per formas determinantis positivum sine discrimine numeri positivum et negativum repraesentari possunt, quin adeo haud raro duae formae tales (a, b, c) , $(a, b, -c)$ in hoc casu ad eandem classem sunt referendae.

Distributio classium in ordines

226. Formam quamcunque (a, b, c) *primitivam* vocamus, si numeri a, b, c divisorem communem non habent; alioquin dicitur *derivata*, et quidem, posito numerorum a, b, c divisore communi maximo $= m$, forma (a, b, c) erit derivata e forma primitiva $(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}, \frac{c}{m})$. Ex hac definitione statim liquet, omnes formas, quarum determinans per nullum quadratum (praeter 1) divisibilis sit, necessario primitivas esse. Porro ex art. 161 patet, si in aliqua classe data formarum determinantis D forma primitiva inveniatur, omnes formas huius classis primitivas fore, in quo casu classis ipsa *primitiva* dicitur.

Porro manifestum est, si forma aliqua F determinantis D derivata sit ex forma primitiva f determinantis $\frac{D}{mm}$, classesque in quibus formae F, f resp. contineantur, sint K, k , omnes formas e classe K derivatas fore e classe primitiva k ; quocirca classem K ipsam ex classe primitiva k *derivatam* in hoc casu vocabimus.

Si (a, b, c) est forma primitiva, neque vero a, c simul pares (i.e. si aut uterque impar aut saltem alteruter), facile intelligitur, non modo a, b, c , sed etiam $a, 2b, c$ divisorem communem habere non posse, in quo casu forma (a, b, c) dicitur *proprie primitiva* sive simpliciter *forma propria*. Si vero (a, b, c) est forma primitiva, numeri a, c autem ambo pares, patet, numeros $a, 2b, c$ divisorem communem 2 habere (qui simul erit maximus), vocabiturque (a, b, c) forma *improprie primitiva*, sive simpliciter *forma impropria*³. In hoc casu b necessario erit impar (alioquin enim (a, b, c) non esset forma primitiva); quare erit $bb \equiv 1 \pmod{4}$ adeoque, quoniam ac per 4 divisibilis, determinans $bb - ac \equiv 1 \pmod{4}$. Formae impropriae itaque tantummodo pro determinante formae $4n + 1$, si est positivus, vel formae $-(4n + 3)$, si est negativus, locum habent.

Ex art. 161 autem perspicuum est, si in classe aliqua data forma proprie primitiva inveniatur, omnes formas huius classis proprie primitivas esse; contra classem, quae formam improprie primitivam implicet, ex solis formis improprie primitivis constare. Quamobrem classis ipsa in casu priori *proprie primitiva* seu simpliciter *propria*; in posteriori *improprie primitiva* seu *impropria* appellabitur.

Ita e.g. inter classes positivas formarum determinantis -235 sex sunt propriae, puta quarum repraesentantes $(1, 0, 235)$, $(4, 1, 59)$, $(4, -1, 59)$, $(5, 0, 47)$, $(13, 5, 20)$, $(13, -5, 20)$, totidemque inter negativas; binae vero inter utrasque impropriae. Classes formarum determinantis 79 (utpote numeri formae $4n + 3$) omnes sunt propriae.

Si forma (a, b, c) est derivata, et quidem e primitiva $(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}, \frac{c}{m})$, haec aut proprie primitiva aut improprie esse poterit. In casu priori m erit divisor communis maximus etiam numerorum $a, 2b, c$; in posteriori horum numerorum div. comm. max. erit $2m$. Hinc intelligitur distinctio inter formam e forma proprie primitiva derivatam et formam ex improprie primitiva derivatam; nec non (quoniam propter art. 161 omnes formae eiusdem classis hoc respectu perinde se habent) inter classem derivatam e classe proprie primitiva et classem ex improprie primitiva derivatam.

227. Per has distinctiones fundamentum primum nacti sumus, cui distributionem omnium classium formarum determinantis dati in varios *ordines* superstruere possumus. Classes duas, quarum repraesentantes sunt formae (a, b, c) , (a', b', c') in eundem ordinem coniiciemus, si tum numeri a, b, c eundem divisorem communem maximum habent ut a', b', c' , tum $a, 2b, c$ eundem ut $a', 2b', c'$; si vero aut alterutra aut utraque harum conditionum locum non habet, classes ad ordines diversos referentur.

³Hos terminos proprie et improprie ideo hic elegimus, quia alii magis idonei non occurrebant, quod admonemus, ne quis inter hanc significationem eamque qua inde ab art. 157 usi sumus, nexum occultum quaerat, qui nullus adest. Ceterum ambiguitas certe hinc non est metuenda.

Hinc statim patet, omnes classes proprie primitivas unum ordinem constituere; omnes classes improprie primitivas, alium; si mm est quadratum determinantem D metiens, classes derivatae e classibus proprie primitivis determinantis $\frac{D}{mm}$ formabunt ordinem peculiarem, aliumque classes derivatae e classibus improprie primitivis determinantis $\frac{D}{mm}$ etc.

Si forte D per nullum quadratum (praeter 1) divisibilis est, ordines classium derivatarum non aderunt adeoque aut unus tantum ordo dabitur (quando $D \equiv 2$ vel $3 \pmod{4}$), puta ordo classium proprie primitivarum, aut duo (quando $D \equiv 1 \pmod{4}$) scilicet O. classium proprie primitivarum et O. cl. impr. primitivarum.

Per principia calculi combinationum haud difficile conditur regula sequens generalis: Si supponitur $D = D' \cdot 2^\mu a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$ ita ut D' nullum factorem quadraticum implicet, et a, b, c etc. sint numeri primi impares diversi (ad quam formam quivis numerus redigi potest faciendo $\mu = 0$, quando D per 4 non est divisibilis; et α, β, γ etc. omnes $= 0$, sive quod eodem redit omitendo factores $a^\alpha, b^\beta, c^\gamma$ etc., quando D per nullum quadratum impar dividi potest): habebuntur aut ordines $\frac{1}{2}(\mu + 2)(\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) \dots$ nempe quando $D' \equiv 2$ vel $3 \pmod{4}$; aut ordines $\frac{1}{2}(\mu + 2)(\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) \dots$ quando $D' \equiv 1 \pmod{4}$.

Ex. 1. Pro $D = 45 = 5 \cdot 3^2$ habentur sex classes, quarum repraesentantes $(1, 0, -45)$, $(-1, 0, 45)$, $(2, 1, -22)$, $(-2, 1, 22)$, $(3, 0, -15)$, $(6, 3, -6)$. Hae distribuuntur in quatuor ordines, scilicet O. I comprehendet duas classes proprias, quarum repr. $(1, 0, -45)$, $(-1, 0, 45)$; O. II continebit duas classes improprias, quarum repr. $(2, 1, -22)$, $(-2, 1, 22)$; O. III continebit unam classem derivatam e propria determinantis 5, puta cuius repr. $(3, 0, -15)$; O. IV constabit ex una classe derivata ex impropria det. 5, puta cuius repr. $(6, 3, -6)$.

Ex. 2. Classes positivae determinantis $-99 = -11 \cdot 3^2$ inter quatuor ordines distribuuntur: O. I complectetur classes proprie primitivas sequentes: $(1, 0, 99)$, $(4, 1, 25)$, $(4, -1, 25)$, $(5, 1, 20)$, $(5, -1, 20)$, $(9, 0, 11)$; O. II continebit classes improprias $(2, 1, 50)$, $(10, 1, 10)$; O. III classes derivatas e propriis determinantis -11 , $(3, 0, 33)$, $(9, 3, 12)$, $(9, -3, 12)$; O. IV classem unicam derivatam ex impropria det. -11 , $(6, 3, 18)$. Classes negativae huius determinantis prorsus eodem modo in ordines distribui poterunt.

Observamus, classes oppositas semper ad eundem ordinem referri, cuius theorematis ratio nullo negotio perspicitur.

228. THEOREMA. Per formam quamcunque proprie primitivam F repraesentari possunt infinite multi numeri per numerum primum quemcunque datum p non divisibiles.

DEM. Si forma $F = axx + 2bxy + cyy$, manifestum est, p omnes tres numeros $a, 2b, c$ simul metiri non posse. Iam quando a per p non est divisibilis, patet, si pro x assumatur numerus quicunque per p non divisibilis, pro y vero numerus per p divisibilis, valorem formae F fieri non divisibilem per p ; quando c per p non est divisibilis, idem obtinetur tribuendo ipsi x valorem divisibilem ipsique y valorem non divisibilem; denique quando tum a tum c per p sunt divisibiles, adeoque $2b$ non divisibilis, forma F valorem per p non divisibilem induet tribuendo tum ipsi x tum ipsi y valores quoscunque per p non divisibiles. Q.E.D.

Manifestum est, theorema etiam pro formis improprie primitivis locum habere, si modo non fuerit $p = 2$. Quoniam plures huiusmodi conditiones simul consistere possunt, ut idem numerus per quosdam numeros primos datos divisibilis sit, per alios non divisibilis (v. art. 32): facile perspicitur, numeros x, y infinite multis modis ita determinari posse, ut forma primitiva $axx + 2bxy + cyy$ valorem per quotcunque numeros primos datos non divisibilem adipiscatur, a quibus unice excludendus est 2, quoties forma est improprie primitiva. Hinc patet, theorema generalius ita proponi posse: *Per formam quamcunque*

primitivam repraesentari possunt infinite multi numeri, qui ad numerum quemcunque datum (imparem, quando forma est improprie primitiva) sint primi.

229. THEOREMA. Sit F forma primitiva determinantis D , p numerus primus ipsum D metiens: tum numeri per p non divisibiles, qui per formam F repraesentari possunt, in eo convenient, ut vel omnes sint residua quadratica ipsius p , vel omnes non-residua.

DEM. Sit $F = (a, b, c)$; m, m' duo numeri quicunque per p non divisibiles, qui per formam F repraesentari possunt, scilicet

$$m = ag^2 + 2bgh + ch^2, \quad m' = ag'^2 + 2bg'h' + ch'^2.$$

Tum erit

$$mm' = (agg' + b(gh' + hg') + chh')^2 - D(gh' - hg')^2,$$

quare mm' quadrato congruus erit secundum modulum D , adeoque etiam secundum p , i.e. mm' erit residuum quadraticum ipsius p . Hinc sequitur, aut utrumque m, m' esse residuum quadraticum ipsius p , aut utrumque non-residuum. Q.E.D.

Simili modo probatur, quando determinans D per 4 sit divisibilis, omnes numeros impares per F repraesentabiles vel esse $\equiv 1$, vel omnes $\equiv 3 \pmod{4}$. Scilicet productum e duobus numeris talibus in hoc casu semper erit residuum quadr. ipsius 4, adeoque $\equiv 1 \pmod{4}$; quare vel uterque erit $\equiv 1$, vel uterque $\equiv 3$.

Denique quando D per 8 est divisibilis, productum e duobus numeris quibuscunque imparibus, qui per F repraesentari possunt, erit R.Q. ipsius 8 et proin $\equiv 1 \pmod{8}$. Quare in hoc casu omnes numeri impares per F repraesentabiles vel erunt $\equiv 1$, vel omnes $\equiv 3$, vel omnes $\equiv 5$, vel omnes $\equiv 7 \pmod{8}$.

Ita e.g. quum per formam $(10, 3, 17)$ repraesentari possit numerus 10, qui est N.R. ipsius 7: omnes numeri per 7 non divisibiles, qui per formam illam repraesentari possunt, non-residua ipsius 7 erunt.

Ceterum, si ad propositum praesens necessarium esset, facile demonstrare possemus, numeros per formam F repraesentabiles ad nullum numerum primum, qui ipsum D non metiatur, talem relationem fixam habere, sed promiscue tum residua tum non-residua numeri cuiusvis primi ipsum D non metientis per formam F repraesentari posse. Contra respectu numerorum 4 et 8 analogon quoddam etiam in aliis casibus locum habet, quos praeterire non possumus.

I. Quando determinans D formae primitivae F est $\equiv 2$ vel $3 \pmod{4}$: omnes numeri impares, per formam F repraesentabiles, erunt vel $\equiv 1$, vel omnes $\equiv 3 \pmod{4}$. Si enim m, m' sunt duo numeri per F repraesentabiles, productum mm' eodem modo ut supra sub formam $pp - Dqq$ redigi poterit. Quando itaque uterque m, m' est impar, necessario alter numerorum p, q par erit, alter impar adeoque alterum quadratorum pp, qq , $\equiv 0$, alterum $\equiv 1 \pmod{4}$. Unde facile deducitur, $pp - Dqq$ certo esse $\equiv 1 \pmod{4}$, adeoque aut utrumque m, m' , $\equiv 1$, aut utrumque $\equiv 3 \pmod{4}$. Ita e.g. per formam $(10, 3, 17)$ alii numeri impares quam qui sunt formae $4n + 1$, repraesentari nequeunt.

II. Quando determinans D formae primitivae F est $\equiv 1 \pmod{8}$: omnes numeri impares, per formam F repraesentabiles, erunt vel partim $\equiv 1$, partim $\equiv 7$, vel partim $\equiv 3$, partim $\equiv 5 \pmod{8}$. Ponamus enim, m, m' esse duos numeros impares per F repraesentabiles, quorum igitur productum mm' sub formam $pp - Dqq$ redigi poterit. Quando ergo uterque m, m' est impar, necessario p impar esse debet (quia D par), adeoque $pp \equiv 1 \pmod{8}$; qq vero erit vel $= 0$ vel $\equiv 1$ vel $\equiv 4$, et proin Dqq vel $\equiv 0$ vel $\equiv 2$. Hinc $mm' = pp - Dqq$ fit vel $\equiv 1$ vel $\equiv 7 \pmod{8}$; si itaque m est vel $\equiv 1$ vel $\equiv 7$, etiam m' erit vel $\equiv 1$ vel $\equiv 7$; si vero m est vel $\equiv 3$ vel $\equiv 5$, etiam m' erit vel $\equiv 3$ vel

$\equiv 5$. E.g. omnes numeri impares per formam $(3, 1, 5)$ repraesentabiles sunt aut $\equiv 3$ aut $\equiv 5 \pmod{8}$, nullique numeri formae $8n + 1$ aut $8n + 7$ per formam illam repraesentari possunt.

III. Quando determinans D formae primitivae F est $\equiv 5 \pmod{8}$: per formam hanc repraesentari possunt numeri impares vel tales tantum qui sunt $\equiv 1$ et $\equiv 3 \pmod{8}$, vel tales tantum qui sunt $\equiv 5$ et $\equiv 7 \pmod{8}$. Demonstrationem praecedenti (in II) omnino similem quisque nullo negotio evolvere poterit.

Ita e.g. per formam $(5, 1, 7)$ unice tales numeri impares possunt repraesentari, qui sunt aut $\equiv 5$ aut $\equiv 7 \pmod{8}$.

230. Omnes igitur numeri, qui per formam primitivam datam F determinantis D repraesentari possunt, relationem fixam habebunt ad singulos divisores primos ipsius D (per quos quidem ipsi non sunt divisibiles), numeri impares vero qui per F possunt repraesentari, in quibusdam casibus etiam ad numeros 4 et 8 relationem fixam habebunt, scilicet ad 4, quoties D aut $\equiv 2$ aut $\equiv 3 \pmod{4}$, et ad 8, quoties D aut $\equiv 0$, aut $\equiv 2$ aut $\equiv 6 \pmod{8}$)⁴. Talem relationem ad singulos hos numeros *characterem* seu *characterem particularem* formae F vocabimus sequentique modo exprimemus: Quando sola residua quadratica numeri primi p per formam F repraesentari possunt, tribuimus ipsi characterem Rp , in casu opposito characterem Np ; similiter scribemus 1, 4, quando alii numeri impares per formam F repraesentari nequeunt nisi, qui sunt $\equiv 1 \pmod{4}$, unde statim liquet, quales characteres exprimantur per signa 3, 4; 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8. Denique formis per quas numeri impares tales soli repraesentari possunt qui sec. mod. 8 sunt vel $\equiv 1$ vel $\equiv 7$, tribuimus characterem 1 et 7, 8; ex quo significatio characterum 3 et 5, 8; 1 et 3, 8; 5 et 7, 8 sponte sequitur.

Characteres singuli formae primitivae datae (a, b, c) determinantis D semper ex uno saltem numerorum a, c (qui manifesto per formam illam ambo sunt repraesentabiles) cognosci possunt. Nam quoties p est divisor primus ipsius D , certe unus numerorum a, c per p non erit divisibilis; si enim uterque per p divisibilis esset, p etiam ipsum $bb (= D + ac)$ metiretur, et proin etiam ipsum b , i.e. forma (a, b, c) non esset primitiva. Simili modo in iis casibus, ubi forma (a, b, c) ad numerum 4 vel 8 relationem fixam habet, certo ad minimum unus numerorum a, c impar erit, ex quo igitur relatio illa deprehendi poterit.

Ita e.g. character formae $(7, 0, 23)$ respectu numeri 23 e numero 7 concluditur $N23$, eiusdem formae character respectu numeri 7 habetur ex numero 23 puta $R7$; denique character huius formae respectu numeri 4, puta 3, 4, vel e numero 7 vel e numero 23 colligi potest.

Quoniam omnes numeri, qui per formam aliquam F in classe K contentam repraesentari possunt, etiam per quamlibet aliam formam huius classis sunt repraesentabiles: manifesto singuli characteres formae F omnibus reliquis formis huius classis quoque competent, quapropter illos tamquam *characteres totius classis* considerare licebit. Singuli itaque characteres classis cuiuslibet primitivae datae ex ipsius forma repraesentante cognoscuntur. Classes oppositae semper characteres omnes eosdem habebunt.

231. Complexus omnium characterum particularium formae vel classis datae constituet *characterem integrum* huius formae vel classis. Ita e.g. character integer formae $(10, 3, 17)$, vel totius classis quam repraesentat erit 1, 4; $N7$; $N23$. Simili modo character integer formae $(7, 1, -17)$ erit 7, 8; $R3$; $N5$, nam character particularis 3, 4 in hoc casu omittitur, quia in characterem 7, 8 iam est contentus.

Ex hoc fonte petimus subdivisionem totius ordinis classium proprie primitivarum (po-

⁴Pro determinantibus per 8 divisibilibus relatio ad numerum 4 negligi potest, quoniam in hoc casu sub relatione ad 8 iam est contenta.

sitivarum quando det. est negativus) determinantis dati in plura *genera* diversa, referendo omnes classes, quae eundem characterem integrum habent, ad genus idem; quarumque characteres integri diversi sunt, ad genera diversa. Singulis vero generibus eos characteres integres tribuimus, quos classes sub ipsis contentae habent.

Ita e.g. pro determinante -161 habentur sedecim classes positivae proprie primitivae, quae sequenti modo in quatuor genera distribuuntur:

1, 4 <i>R7</i> <i>R23</i>	1, 4 <i>N7</i> <i>R23</i>	3, 4 <i>R7</i> <i>N23</i>	3, 4 <i>N7</i> <i>N23</i>
(1, 0, 161)	(4, 1, 41)	(2, 1, 81)	(7, 0, 23)
(5, 2, 33)	(4, -1 , 41)	(2, -1 , 81)	(7, 2, 25)
(5, -2 , 33)	(11, 2, 15)	(10, 3, 17)	(10, 1, 17)
(9, 2, 19)	(11, -2 , 15)	(10, -3 , 17)	(10, -1 , 17)

Ex quo exemplo patet, non omnes characteres possibiles revera dari. In exemplo quidem nostro horum semissi tantum revera classes sive genera respondent, nullaeque classes positivae dantur, quibus characteres 1, 4; *R7*; *N23* vel 1, 4; *N7*; *R23*; vel 3, 4; *R7*; *R23* vel 3, 4; *N7*; *N23* competant. De quo argumento gravissimo infra fusius agetur.

Formae $(1, 0, -D)$, quae haud dubie inter omnes formas determinantis D pro simplicissima habenda est, nomen *formae principalis* abhinc tribuimus; classem totam, in qua illa reperitur, *classem principalem* vocabimus; denique genus totum, in quo classis principalis contenta est, *genus principale* dicetur. Probe itaque distinguendae sunt forma principalis, forma e classe principali et forma e genere principali; nec non classis principalis et classis e genere principali. His denominationibus semper utemur, etiamsi forte pro determinante aliquo aliae classes praeter principalem, vel alia genera praeter genus principale non dentur, uti e.g. evenit plerumque, quando D est numerus primus positivus formae $4n + 1$.

232. Quamquam ea, quae de formarum characteribus explicata sunt, proxime eum in finem sunt allata, ut subdivisio ordinis positivi proprie primitivi inde petatur: tamen nihil impedit quominus eadem etiam ad formas classesque negativas aut ad improprie primitivas applicentur, atque tum ordo improprie primitivus positivus, tum ordo proprie primitivus negativus, tum ordo improprie primitivus negativus ex eodem principio in genera subdividantur.

Ita postquam e.g. ordo proprie primitivus formarum determinantis 145 in duo genera sequentia subdivisus est

$$\begin{array}{cc} R5, R29 & N5, N29 \\ (1, 0, -145), & (3, 1, -48), (3, -1, -48) \end{array}$$

etiam ordo improprie primitivus perinde in duo genera subdividi potest:

$$\begin{array}{cc} R5, R29 & N5, N29 \\ (4, 1, -36), (4, -1, -36) & (2, 1, -72), (10, 5, -12) \end{array}$$

vel, sicuti classes positivae formarum determinantis -129 in quatuor genera distribuuntur:

$$\begin{array}{ll} 1, 4; R3; R43 & (1, 0, 129), (10, 1, 13), (10, -1, 13) \\ 1, 4; N3; N43 & (2, 1, 65), (5, 1, 26), (5, -1, 26) \\ 3, 4; R3; N43 & (3, 0, 43), (7, 2, 19), (7, -2, 19) \\ 3, 4; N3; R43 & (6, 3, 23), (11, 5, 14), (11, -5, 14) \end{array}$$

233. Subiungimus sequentes observationes, per quas natura characterum ulterius illustratur.

I. Si $M(a, b, c)$ est R.Q. numeri m , hic determinantem formae (a, b, c) metietur. Si enim (g, h) est valor expressionis $\sqrt{M(a, b, c)} \pmod{m}$, sive $gg \equiv aM$, $gh \equiv bM$, $hh \equiv cM \pmod{m}$ erit $bbMM - acMM \equiv 0$, sive $(bb - ac)MM$ per m divisibilis. Quoniam autem M ad m primus esse supponitur, etiam $bb - ac$ per m divisibilis erit.

II. Si $M(a, b, c)$ est R.Q. ipsius m , atque m aut numerus primus aut potestas numeri primi, puta $= p^\mu$: character particularis formae (a, b, c) respectu numeri p erit vel Rp vel Np , prout M est residuum vel non-residuum ipsius p . Hoc statim inde sequitur, quod tum aM tum cM est residuum ipsius m sive ipsius p , atque ad minimum unus numerorum a, c per p non divisibilis (art. 230). Simili modo, si (manentibus reliquis) $m = 4$, erit vel 1, 4 vel 3, 4 character part. formae (a, b, c) , prout $M \equiv 1$ vel $\equiv 3$; nec non si $m = 8$ vel altior potestas numeri 2, erit 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8 char. part. formae (a, b, c) , prout $M \equiv 1$; 3; 5; 7 (mod 8) resp.

III. Vice versa si m est numerus primus aut numeri primi imparis potestas $= p^\mu$, determinantem $bb - ac$ metiens, atque M vel residuum vel non-residuum ipsius p , prout character formae (a, b, c) respectu ipsius p est Rp vel Np resp., erit $M(a, b, c)$ resid. quadr. ipsius m .

IV. Si determinans formae (a, b, c) est $= D$, atque $M(a, b, c)$ res. qu. ipsius D , omnes characteres particulares formae (a, b, c) tum respectu singulorum divisorum primorum imparium ipsius D , tum respectu numeri 4 vel numeri 8 (si ipsum D metiuntur) ex numero M statim cognosci possunt. Ita e.g. quum $3(20, 10, 27)$ sit resid. qu. ipsius 440, scilicet $(150, 9)$ valor expr. $\sqrt{3(20, 10, 27)}$ sec. mod. 440, atque $3N5$, $3R11$: characteres formae $(20, 10, 27)$ sunt 3, 8; $N5$; $R11$. Soli characteres particulares respectu numerorum 4 et 8, quoties determinantem non metiuntur, nexum necessarium cum numero M non habent.

V. Vice versa, si numerus M ad D primus omnes characteres particulares formae (a, b, c) in se complectitur (exceptis characteribus respectu numerorum 4, 8, quando ipsum D non metiuntur): erit $M(a, b, c)$ res. qu. ipsius D . Nam ex III patet, si D sub formam $2^\mu A^\alpha B^\beta C^\gamma \dots$ redigatur, ita ut A, B, C etc. sint numeri primi diversi, fore $M(a, b, c)$ resid. qu. singulorum $A^\alpha, B^\beta, C^\gamma$ etc. Si igitur valor expr. $\sqrt{M(a, b, c)}$ secundum mod. A^α , est $(\mathfrak{G}, \mathfrak{H})$; secundum mod. B^β , $(\mathfrak{G}', \mathfrak{H}')$; sec. mod. C^γ , $(\mathfrak{G}'', \mathfrak{H}'')$ etc. numerique g, h ita determinantur, ut sit $g \equiv \mathfrak{G}, \mathfrak{G}', \mathfrak{G}''$ etc.; $h \equiv \mathfrak{H}, \mathfrak{H}', \mathfrak{H}''$ etc. secundum modulus $A^\alpha, B^\beta, C^\gamma$ etc. resp. (art. 32): facile perspicitur, fore $gg \equiv aM$, $gh \equiv bM$, $hh \equiv cM$ secundum omnes modulus $A^\alpha, B^\beta, C^\gamma$ etc. adeoque etiam secundum modulum D , qui illorum est productum.

VI. Propter has rationes numeri tales ut M vocabuntur *numeri characteristici* formae (a, b, c) , poteruntque per V. plures huiusmodi numeri nullo negotio inveniri, simulac omnes characteres particulares huius formae sunt eruti; simplicissimi autem tentando plerumque evolvuntur facillime. Manifestum est, si M sit numerus characteristicus formae primitivae datae determinantis D , omnes numeros, ipsi M secundum mod. D congruos, fore numeros characteristicos eiusdem formae; formas in eadem classe, sive etiam in classibus diversis ex eodem genere, contentas eosdem numeros characteristicos habere, quamobrem quivis numerus characteristicus formae datae etiam toti classi et generi tribui potest; denique 1 semper esse numerum characteristicum formae classis et generis principalis, sive quamlibet formam e genere principali esse residuum determinantis sui.

VII. Si (g, h) est valor expr. $\sqrt{M(a, b, c)} \pmod{m}$, atque $g' \equiv g$, $h' \equiv h \pmod{m}$: erit etiam (g', h') valor eiusdem expressionis. Tales valores pro aequivalentibus haberi

possunt; contra si (g, h) , (g', h') sunt valores eiusdem expr. $\sqrt{M(a, b, c)}$, neque tamen simul $g' \equiv g$, $h' \equiv h \pmod{m}$, diversi sunt censendi. Manifeste quoties (g, h) est valor talis expressionis, etiam $(-g, -h)$ erit, facileque demonstratur, hos valores semper esse diversos nisi $m = 2$. Aequae facile demonstratur, expressionem $\sqrt{M(a, b, c)} \pmod{m}$ plures valores diversos quam duos tales (oppositos) habere non posse, quando m sit aut numerus primus impar aut numeri primi imparis potestas aut $= 4$; quando vero m sit $= 8$ aut altior potestas numeri 2, quatuor omnino dari.

Hinc facile deducitur per VI, si determinans D formae (a, b, c) sit $= 2^\mu A^\alpha B^\beta \dots$, designantibus A, B etc. numeros primos impares diversi, quorum multitudo $= n$, atque M numerus characteristicus illius formae: dari omnino vel 2^n vel 2^{n+1} vel 2^{n+2} valores diversos expr. $\sqrt{M(a, b, c)} \pmod{D}$, prout $\mu < 2$ vel $= 2$ vel > 2 . Ita e.g. habentur sedecim valores expr. $\sqrt{7(12, 6, -17)} \pmod{240}$, puta $(\pm 12, \mp 1)$, $(\pm 18, \pm 29)$, $(\pm 18, \pm 91)$, $(\pm 18, \pm 109)$, $(\pm 78, \pm 19)$, $(\pm 78, \pm 59)$, $(\pm 78, \pm 61)$, $(\pm 78, \pm 101)$. Demonstrationem ampliorem, quum ad sequentia non sit adeo necessaria, brevitatis gratia non apponimus.

VIII. Denique observamus, si duarum formarum aequivalentium (a, b, c) , (a', b', c') determinans sit D , numerus characteristicus M , priorque transeat in posteriorem per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$: ex quovis valore expr. $\sqrt{M(a, b, c)}$, ut (g, h) , sequi valorem expr. $\sqrt{M(a', b', c')}$, puta $(\alpha g + \gamma h, \beta g + \delta h)$. Demonstrationem quisque nullo negotio eruere poterit.

De compositione formarum

234. Postquam haec de formis in classes, genera et ordines distribuendis praemisimus, proprietatesque generales, quae ex his distinctionibus statim defluunt, explicavimus, ad aliud argumentum gravissimum transimus a nemine hucusque attactum, de *formarum compositione*.

In cuius disquisitionis limine, ne posthac demonstrationum seriem continuam interrumpere oporteat, statim intercalamus

Lemma.

Habentur quatuor series numerorum integrorum

$$\begin{aligned} a, a', a'' \dots a^n \\ b, b', b'' \dots b^n \\ c, c', c'' \dots c^n \\ d, d', d'' \dots d^n \end{aligned}$$

ex aequae multis (puta $n + 1$) terminis constantes, atque ita comparatae, ut

$$\begin{aligned} cd' - dc' &= k(ab' - ba'), \\ cd'' - dc'' &= k(ab'' - ba'') \text{ etc.}, \\ c'd'' - d'c'' &= k(a'b'' - b'a'') \text{ etc. etc.} \end{aligned}$$

sive generaliter $c^\lambda d^\mu - d^\lambda c^\mu = k(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)$ denotante k numerum integrum datum; λ , μ integros quoscunque inaequales inter 0 et n incl. quorum maior $> \mu^5$; praeterea omnes $a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu$ divisorem communem non habent.

⁵Considerando a tamquam a^0 , b tamquam b^0 etc. — Ceterum manifesto eadem aequatio valebit quoque, quando $\lambda = \mu$ aut $\lambda > \mu$.

Tunc inveniri possunt quatuor numeri integri $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ tales, ut sit

$$\begin{array}{lll} \alpha a + \beta b = c, & \alpha a' + \beta b' = c', & \alpha a'' + \beta b'' = c'' \text{ etc.} \\ \gamma a + \delta b = d, & \gamma a' + \delta b' = d', & \gamma a'' + \delta b'' = d'' \text{ etc.} \end{array}$$

sive generaliter $\alpha a^\lambda + \beta b^\lambda = c^\lambda$, $\gamma a^\lambda + \delta b^\lambda = d^\lambda$ quo facto erit $\alpha\delta - \beta\gamma = k$.

Quum per hyp. numeri $ab' - ba'$, $ab'' - ba''$ etc. $a'b'' - b'a''$ etc. (quorum multitudo erit $= \frac{1}{2}(n+1)n$) divisorem communem non habeant, inveniri poterunt totidem alii numeri integri, per quos illis resp. multiplicatis productorum summa fiat $= 1$ (art. 40). Designentur hi multiplicatores per $(0, 1)$, $(0, 2)$ etc. $(1, 2)$ etc., sive generaliter multiplicator ipsius $a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu$ per (λ, μ) , ita ut sit $\Sigma(\lambda, \mu)(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu) = 1$ (Per litteram Σ denotamus aggregatum omnium valorum expressionis, cui praefixa est).

Werke Band 1, Teil 6

De formis secundi gradus

(*Disquisitiones Arithmeticae, Sectio V, Art. 234–260*)

Carl Friedrich Gauß

COMPOSITIO FORMARUM.

Dem. I. Denotante ν numerum quemcunque integrum inter 0 et n , erit

$$\begin{aligned}\alpha a^\nu + 6b^\nu &= \Sigma(\lambda, \mu)(c^\lambda b^\mu a^\nu - b^\lambda c^\mu a^\nu + a^\lambda c^\mu b^\nu - c^\lambda a^\mu b^\nu) \\ &= \frac{1}{k}\Sigma(\lambda, \mu)(c^\lambda d^\mu c^\nu - d^\lambda c^\mu c^\nu) \\ &= \frac{1}{k}c^\nu \Sigma(\lambda, \mu)(c^\lambda d^\mu - d^\lambda c^\mu) \\ &= c^\nu \Sigma(\lambda, \mu)(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu) = c^\nu.\end{aligned}$$

Et per calculum similem eruitur

$$\gamma a^\nu + \delta b^\nu = d^\nu. \quad \text{Q. E. P.}$$

II. Quoniam igitur

$$c^\lambda = \alpha a^\lambda + 6b^\lambda, \quad c^\mu = \alpha a^\mu + 6b^\mu$$

fit

$$c^\lambda b^\mu - b^\lambda c^\mu = \alpha(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)$$

similique modo

$$\begin{aligned}a^\lambda c^\mu - c^\lambda a^\mu &= 6(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu) \\ d^\lambda b^\mu - b^\lambda d^\mu &= \gamma(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu) \\ a^\lambda d^\mu - d^\lambda a^\mu &= \delta(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)\end{aligned}$$

ex quibus formulis valores ipsorum $\alpha, 6, \gamma, \delta$ multo facilius erui possunt, si modo λ, μ ita accipiuntur, ut $a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu$ non sit $= 0$, quod certo fieri poterit, quia omnes $a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu$ per hyp. divisorem communem non habent, adeoque omnes $= 0$ esse nequeunt.

Ex iisdem aequationibus deducitur, multiplicando primam per quartam, secundam per tertiam et subtrahendo,

$$(\alpha\delta - 6\gamma)(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)^2 = (a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)(c^\lambda d^\mu - d^\lambda c^\mu) = k(a^\lambda b^\mu - b^\lambda a^\mu)^2$$

unde necessario

$$\alpha\delta - 6\gamma = k. \quad \text{Q. E. S.}$$

Si forma $AXX + 2BXY + CYY \dots F$ transit in productum e duabus formis

$$aaxx + 2bxy + cyy \dots f, \quad \text{et} \quad dx'x + 2b'x'y + c'y'y \dots f'$$

per Substitutionem talem

$$\begin{aligned} X &= pxx' + p'xy' + p''yx' + p'''yy' \\ Y &= qxx' + q'xy' + q''yx' + q'''yy' \end{aligned}$$

(quod brevitatis causa in sequentibus semper ita exprimemus: Si F transit in ff' per Substitutionem $p, p', p'', p''' \setminus q, q', q'', q'''$), dicemus simpliciter, formam F transformabilem esse in ff' ; si insuper haec transformatio ita est comparata, ut sex numeri

$$pq' - qp', \quad pq'' - qp'', \quad pq''' - qp''',$$

$$p'q'' - q'p'', \quad p'q''' - q'p''', \quad p''q''' - q''p'''$$

divisorem communem non habeant: formam F e formis f, f' compositam vocabimus.

Inchoabimus hanc disquisitionem a suppositione generalissima, formam F in ff' transire per substitutionem $p, p', p'', p''' \setminus q, q', q'', q'''$ et quae inde sequantur evolvemus. Manifesto huic suppositioni ex asse aequivalebunt sequentes novem aequationes (i.e. simulac hae aequationes locum habent, F per substitutionem dictam transibit in ff' , et vice versa):

$$App + 2Bpq + Cqq = aa' \quad (1)$$

$$Ap'p' + 2Bpq' + Cq'q' = ac' \quad (2)$$

$$Ap''p'' + 2Bp''q'' + Cq''q'' = ca' \quad (3)$$

$$Ap'''p''' + 2Bp'''q''' + Cq'''q''' = cc' \quad (4)$$

$$App' + B(pq' + qp') + Cqq' = ab' \quad (5)$$

$$App'' + B(pq'' + qp'') + Cqq'' = ba' \quad (6)$$

$$Ap'p'' + B(p'q'' + q'p'') + Cq'q'' = bc' \quad (7)$$

$$Ap'p''' + B(p'q''' + q'p''') + Cq'q''' = cb' \quad (8)$$

$$A(pp''' + p'p'') + B(pq''' + p'q'' + p''q' + p'''q) + C(qq''' + q'q'') = 2bb' \quad (9)$$

¹In hac igitur designatione ad ordinem tum coefficientium p, p' etc. tum formarum f, f' probe respicere oportet. Facile autem perspicietur, si ordo formarum f, f' convertatur, ut prior fiat posterior f' , coefficientes p', q' cum his p'', q'' commutandos esse, reliquos suo quemlibet loco manere.

Sint determinantes formarum F, f, f' resp. D, d, d' ; divisores communes maximi numerorum $A, 2B, C$; $a, 2b, c$; $a', 2b', c'$ resp. M, m, m' ; sitque m numerus ad M primus, sive $M = 1$.

236.

Problema. Propositis duabus formis quarum determinantes aut aequales sunt aut saltem rationem quadratorum inter se habent: invenire formam ex illis compositam.

Sol. Sint formae componendae $(a, b, c) \dots f, (a', b', c') \dots f'$; harum determinantes d, d' ; divisores communes maximi numerorum $a, 2b, c$; $a', 2b', c'$ resp. m, m' ; divisor comm. maximus numerorum $dmm', d'm'm$, eodem signo ut d, d' affectus D . Tunc $\frac{d}{m'm'}, \frac{d'}{mm'}$ erunt numeri integri positivi inter se primi, ipsorumque productum quadratum; quare ipsi erunt quadrata (art. 21). Hinc $\sqrt{\frac{d}{m'm'}}, \sqrt{\frac{d'}{mm'}}$ erunt quantitates rationales quas ponemus $= n, n'$, et quidem accipiemus pro n valorem positivum vel negativum, prout forma f in compositionem vel directe vel inverse ingredi debet, similiterque signum ipsius n' ex ratione qua f' in compositionem ingredi debet, determinabimus. Erunt itaque $mn, m'n'$ numeri integri inter se primi; n et n' autem etiam fractiones esse possunt.

His ita factis, observamus, $an', cn, a'n, c'n, bn + b'n, bn - b'n$ esse integros, quod de quatuor prioribus per se manifestum est (quum $an' = \frac{-D}{m'n'}$ etc.); de duobus reliquis eodem modo probatur, ut in art. praec. demonstratum fuit R et S per e divisibiles esse.

Iam accipiantur quatuor numeri integri $\Omega, \Omega', \Omega'', \Omega'''$ ad libitum, ea sola conditione, ut quatuor quantitates in aequatione sequente (I) ad laevam positae non omnes simul $= 0$ fiant, ponaturque

$$\begin{aligned}\Omega'an' + \Omega''a'n + \Omega'''(bn' + b'n) &= \mu q \\ -\Omega'an' + \Omega'''cn - \Omega''(bn' - b'n) &= \mu q' \\ \Omega'''cn' - \Omega'an + \Omega'(bn' - b'n) &= \mu q'' \\ -\Omega''cn' - \Omega'cn - \Omega(bn' + b'n) &= \mu q'''\end{aligned}$$

ita ut q, q', q'', q''' fiant integri divisorem communem non habentes, quod obtinebitur accipiendo pro μ divisorem communem maximum quatuor numerorum, qui in his aequationibus sunt ad laevam. Tunc igitur per art. 40 inveniri poterunt quatuor numeri integri $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$ tales ut fiat

$$\mathfrak{P}\Omega + \mathfrak{P}'\Omega' + \mathfrak{P}''\Omega'' + \mathfrak{P}'''\Omega''' = 1$$

Quo facto determinantur numeri p, p', p'', p''' per aequationes sequentes:

$$\begin{aligned}\mathfrak{P}'an' + \mathfrak{P}''a'n + \mathfrak{P}'''(bn' + b'n) &= p \\ -\mathfrak{P}'an' + \mathfrak{P}'''cn - \mathfrak{P}''(bn' - b'n) &= p' \\ \mathfrak{P}'''cn' - \mathfrak{P}'an + \mathfrak{P}'(bn' - b'n) &= p'' \\ -\mathfrak{P}''cn' - \mathfrak{P}'cn - \mathfrak{P}(bn' + b'n) &= p'''\end{aligned}$$

Tandem ponatur

$$\begin{aligned}p'p'' - pp''' &= Ann', \\ \frac{1}{2}(pq''' + p'q'' - p''q' - p'''q) &= Bnn', \\ p''p''' - p'p''' &= Cnn'.$$

Tunc A, B, C erunt numeri integri formaque $(A, B, C) \dots F$ ex formis f, f' composita.

Dem. I. Ex aequatt. I nullo negotio confirmantur sequentes quatuor aequationes

$$\begin{aligned} 0 &= q'cn' - q''c'n - q'''(bn' - b'n) \\ tagIII0 &= qcn' + q'''a'n - q''(bn' + b'n) \\ 0 &= q'''an' + q'c'n - q'(bn' + b'n) \\ 0 &= q''an' - q'a'n - q(bn' - b'n) \end{aligned}$$

II. Iam ponamus, numeros integros $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}', \mathfrak{N}, \mathfrak{N}'$ ita determinatos esse ut fiat

$$\begin{aligned} \mathfrak{A}a + 2\mathfrak{B}b + \mathfrak{C}c &= m \\ \mathfrak{A}'a' + 2\mathfrak{B}'b' + \mathfrak{C}'c' &= m' \\ \mathfrak{N}m'n + \mathfrak{N}'mn' &= 1 \end{aligned}$$

Tunc erit

$$\mathfrak{A}a\mathfrak{N}'n' + 2\mathfrak{B}b\mathfrak{N}'n' + \mathfrak{C}c\mathfrak{N}'n' + \mathfrak{A}'a'\mathfrak{N}n + 2\mathfrak{B}'b'\mathfrak{N}n + \mathfrak{C}'c'\mathfrak{N}n = 1$$

Hinc atque ex aequatt. (III) facile confirmatur, si statuatur

$$\begin{aligned} -q'\mathfrak{A}\mathfrak{N}' - q''\mathfrak{A}'\mathfrak{N} - q'''(\mathfrak{B}\mathfrak{N}' + \mathfrak{B}'\mathfrak{N}) &= q \\ q\mathfrak{A}\mathfrak{N}' - q'''c\mathfrak{N} + q''(\mathfrak{B}\mathfrak{N}' - \mathfrak{B}'\mathfrak{N}) &= q' \\ -q'''c\mathfrak{N}' + q\mathfrak{A}'\mathfrak{N} - q'(\mathfrak{B}\mathfrak{N}' - \mathfrak{B}'\mathfrak{N}) &= q'' \\ q''c\mathfrak{N}' + q'c'\mathfrak{N} + q(\mathfrak{B}\mathfrak{N}' + \mathfrak{B}'\mathfrak{N}) &= q''' \end{aligned}$$

fore

$$\begin{aligned} q'an' + q''a'n + q'''(bn' + b'n) &= q \\ -qan' + q'''cn - q''(bn' - b'n) &= q' \\ q'''cn' - qa'n + q'(bn' - b'n) &= q'' \\ -q''cn' - q'c'n - q(bn' + b'n) &= q''' \end{aligned} \tag{IV}$$

Quoties $\mu = 1$, hae aequationes non sunt necessariae, sed ipsarum loco aequationes (I), quibus omnino analogae sunt, retineri possunt.

Quodsi nunc ex aequatt. II, IV valores ipsorum $Ann', 2Bnn', Cnn'$ (i.e. numerorum $q'q'' - qq'''$ etc.) evolvuntur, et quae mutuo se destruunt, delentur: invenietur, singulorum partes esse vel producta ex integris in nn' , vel ex integris in dnn' , vel ex integris in $d'nn'$, insuperque omnes partes constituentes ipsius $2Bnn'$ implicare factorem 2. Hinc concluditur (quoniam $dnn' = d'nn'$, et proin $\frac{d}{n'n'}, \frac{d'}{nn'}$ sunt integri), A, B, C esse numeros integros. Q. E. P.

III. Substituendo ex aequatt. (II) valores ipsorum p, p', p'', p''' , facile comprobatur adiumento aequatt. (III) et huius

$$\begin{aligned} pq' - qp' &= an', \\ pq'' - qp'' &= a'n, \\ p'q''' - q'p''' &= cn', \\ p''q''' - q''p''' &= c'n, \\ pq''' + p'q'' - p''q' - p'''q &= 2(bn' + b'n), \\ p'q'' - pq''' &= 2(bn' - b'n) \end{aligned}$$

esse

$$\begin{array}{lll} pq' - qp' = an', & pq'' - qp'' - p'q + q'p = 2bn', & p''q''' - q''p''' = c'n \\ pq'' - qp'' = a'n, & pq''' - qp''' - p''q + q''p = 2b'n, & p'q''' - q'p''' = cn' \end{array}$$

unde facile deducitur, sex numeros $pq' - qp'$ etc. divisorem communem non habere. Q. E. S.

IV. Denotemus per (1) expressionem $App + B(pq + qp) + Cqq$ i.e. numerum aa' , per (2) expressionem $Ap'p' + B(p'q' + q'p') + Cq'q'$ i.e. ac' etc.; nec non per Ω complexum aequationum (III), per Ψ aequationes novem modo inventas. Facile erit perspicuum, Ψ sequi ex Ω (quae est ipsarum (III) aggregatio), si valores ipsorum p, p' etc. ex aequatt. II substituantur, adeoque Ψ subsistere non posse, nisi Ω subsistat. Iam facile confirmabitur, per eliminationem ipsius q''' ex secunda, tertia, quarta aequatione Ψ , provenire aequationem

$$\frac{1}{n'}((p'q'' - q'p'')(cn' + c'n) + (p'q''' - q'p''')(a'n - an') + (p''q''' - q''p''')(bn' - b'n)) = 2b' \quad (10)$$

quae manifesto non implicat q''' , ita ut perinde ut Ψ ex Ω sequatur, etiam ex Ω sequatur. Simili modo eliminando q'' ex prima, tertia, quarta, item q' ex prima, secunda, quarta aequatione Ψ , prodibunt aequationes duae posteriores, nec non aequatio $2b'$ involventes. His ita factis, perspicietur, Ψ et quatuor has sequentes aequationes

$$\begin{aligned} p'q'' - q'p'' &= \frac{1}{n'}(cn' + c'n) \\ p'q''' - q'p''' &= \frac{1}{n'}(a'n - an') \\ p''q''' - q''p''' &= \frac{1}{n'}(bn' - b'n) \\ pq''' - p'q'' + p''q' - p'''q &= \frac{1}{n'}(bn' + b'n) \end{aligned} \quad (11)$$

ex Ω et quatuor (10) sequi, nec minus vice versa Ω et (10) ex illis novem; illae novem igitur et hae tredecim sunt aequationes aequivalentes, i.e. simulac una harum tredecim non subsistit, simul non subsistunt omnes novem illae, unde vice versa simulac illae omnes subsistunt, etiam hae tredecim omnes locum habebunt. Denique ex Ψ et (11) sequuntur sex aequationes, quas Φ designabimus:

$$\begin{aligned} pq' - qp' &= an', \\ pq'' - qp'' &= a'n, \\ p'q''' - q'p''' &= cn', \\ p''q''' - q''p''' &= c'n, \\ pq''' - p'q'' + p''q' - p'''q &= \frac{2}{n'}(bn' + b'n), \\ p'q'' - pq''' &= \frac{2}{n'}(bn' - b'n) \end{aligned}$$

et vice versa Ψ et (11) ex Φ .

V. Denique patet, si forma F transit in ff' per substitutionem p, p' etc., tum eandem transituram esse in eodem productum per has substitutiones, quae e formulais (11) derivantur, ita ut semper infinitis modis transformatio possibilis sit.

237.

Theorema. Si forma F e formis f, f' composita est, formaque f formam g , et f' formam g' proprie implicat: tum etiam F ex g et g' composita erit.

Dem. Sint formae f, g, f', g', F resp. $(a, b, c), (l, m, n), (a', b', c'), (l', m', n'), (A, B, C)$, per substitutiones

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta; \quad \alpha', \beta', \gamma', \delta'$$

respectu, sitque F in ff' transiens per substitutionem $p, p', p'', p''' \setminus q, q', q'', q'''$. Manifesto per substitutionem

$$\alpha p + \gamma q, \quad \alpha' p' + \gamma' q', \quad \alpha p'' + \gamma q'', \quad \alpha' p''' + \gamma q''' \setminus \beta p + \delta q, \quad \beta' p' + \delta q', \quad \beta p'' + \delta q'', \quad \beta' p''' + \delta q'''$$

F transit in productum $g \cdot g'$; et per calculum facilem confirmatur, sex numeros $pq' - qp'$ etc. hinc productos iri per ll' ; quare hi sex numeri, quum $ll' = 1$, divisorem communem non habebunt. Q. E. D.

238.

Theorema. Si forma F ex formis f, f' composita est, atque forma f'' formas f, f' simul implicat: tum F etiam ex f'' et f' composita erit.

Dem. Iisdem signis ut in art. praec. adhibitis, sit forma $f'' = (a'', b'', c'')$, et transeat f'' in ff' per substitutionem

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta \quad \setminus \quad \alpha', \beta', \gamma', \delta'$$

ita ut

$$\alpha\delta - \beta\gamma = l, \quad \alpha'\delta' - \beta'\gamma' = l' \quad \alpha\delta' - \beta\gamma' - \alpha'\delta + \beta'\gamma = m$$

Ponatur F in ff' transire per substitutionem $p, p', p'', p''' \setminus q, q', q'', q'''$. Manifesto F transibit in $f''f'$ per substitutionem

$$\alpha p + \beta p', \quad \gamma p + \delta p', \quad \alpha'' p'' + \beta'' p''', \quad \gamma'' p'' + \delta'' p''' \setminus \alpha q + \beta q', \quad \gamma q + \delta q', \quad \alpha'' q'' + \beta'' q''', \quad \gamma'' q'' + \delta'' q'''$$

et sex numeri $pq' - qp'$ etc. inde prodibunt $= l \cdot (p'q'' - q'p'')$ etc.; quare hi numeri divisorem communem non habebunt. Q. E. D.

239.

Theorema. Si forma F ex formis f, f' composita est, formaque f'' formam f implicat: tum F ex f'' et f' composita erit.

Dem. Iisdem fere signis ut in art. praec. adhibitis, sit $f = (a, b, c)$, $f'' = (a'', b'', c'')$, $f' = (a', b', c')$, $F = (A, B, C)$, transeatque f in ff'' per substitutionem $p, p'', p', p''' \setminus q, q'', q', q'''$, ita ut F ex f et f' composita sit. Ponatur f'' in f transire per substitutionem a, β, γ, δ , i.e. sit

$$a'' = a\alpha\alpha + 2b\alpha\gamma + c\gamma\gamma \quad b'' = a\alpha\beta + b(\alpha\delta + \beta\gamma) + c\gamma\delta \quad c'' = a\beta\beta + 2b\beta\delta + c\delta\delta$$

Manifesto F transibit in $f''f'$ per substitutionem

$$\alpha p + \gamma q, \quad \beta p + \delta q, \quad p', \quad p''' \setminus \alpha q'' + \gamma q, \quad \beta q'' + \delta q, \quad q', \quad q'''$$

et calculo facili prodibit, sex numeros $pq' - qp'$ etc. productos iri per numerum $a\delta - \beta\gamma$, adeoque divisorem communem non habituros. Q. E. D.

Ex his theorematibus sponte sequitur: Si forma F ex formis f, f' composita est, formaque f proprie aequivaleat formae g , et f' formae g' : tum F etiam ex g et g' composita erit.

240.

Si ex formis f, f' composita est F , ex F et f'' composita F' , ex f' et f'' composita F'' : tum ex f et F'' composita erit F' . Nam quum F' ex f, f', f'' composita sit, manifesto F' e f et F'' composita erit.

Hinc ulterius sequitur, si F ex f, f' composita sit, G ex F et F' ex f, f' similiter composita: tum G etiam ex f et F' composita erit. Quum enim F' ex f, f' composita sit, et G ex F et F' : erit G ex F, f, f' composita, adeoque etiam ex G et f' , denique ex f et F' .

Theorema. Sint f, g formae proprie aequivalentes, f', g' item proprie aequivalentes; sitque F ex f, f' , et G ex g, g' composita: tum F et G proprie aequivalentes erunt.

Dem. Sint formae f, g, f', g', F, G resp. $(a, b, c), (l, m, n), (a', b', c'), (l', m', n'), (A, B, C), (L, M, N)$. Accipiantur numeri $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ ita ut f transeat in g , et $a', \beta', \gamma', \delta'$ ita ut f' transeat in g' . Porro sit F in ff' transiens per substitutionem $p, p', p'', p''' \setminus q, q', q'', q'''$. Tum F transibit in gg' per substitutionem

$$\alpha p + \beta q, \quad \alpha' p' + \beta' q', \quad \alpha p'' + \beta q'', \quad \alpha' p''' + \beta' q''' \setminus \gamma p + \delta q, \quad \gamma' p' + \delta' q', \quad \gamma p'' + \delta q'', \quad \gamma' p''' + \delta' q'''$$

et proin ex g et g' composita erit. Simul vero facile confirmatur, his substitutionibus respondereterminum $a\delta - \beta\gamma \cdot a'\delta' - \beta'\gamma'$, adeoque $= 1$. Q. E. D.

241.

Talem formam ut F vel F' , quae oritur, si una trium formarum datarum componitur cum ea, quae ex compositione duarum reliquarum resultat, ex his tribus formis compositam vocabimus, patetque ex art. praec., nihil hic interesse, quonam ordine tres formae componantur. Simili modo propositis quotcunque formis f, f', f'', f''' etc. (quarum determinantes rationem quadratorum inter se habere debent), si forma f componitur cum f' , resultans cum f'' , quae hinc oritur cum f''' etc.: forma quae ad finem huius operationis prodit ex omnibus formis f, f', f'', f''' etc. composita dicetur. Facile vero demonstratur, etiam hic arbitrium esse, quonam ordine formae componantur; i.e. quocunque ordine hae formae componantur, formas ex compositione oriundas semper proprie aequivalentes esse. Porro manifestum est, si formis f, f', f'' etc. proprie aequivaleant formae g, g', g'' etc. resp., formam compositam ex his proprie aequivalentem fore formae ex illis compositae.

242.

Propositiones praecedentes formarum compositionem maxima universalitate complectuntur; progredimur iam ad applicationes magis particulares, per quas illarum ordinem interrumpere noluimus. Ac primo quidem resumemus problema art. 236, quod per conditiones sequentes limitabimus: primo ut formae componendae eundem determinantem habeant, sive sit $d = d'$; secundo ut $m = m' = 1$, sive ut utraque forma proprie primitiva sit; tertio ut ad utramque pertineat valor expresssionis $\sqrt{d} \pmod{m}$ idem (sive $a \equiv a'$). Hisce ita factis, erit $d = d', m = m'$, adeoque $n = n' = 1$; et quatuor numeri $\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}', \mathfrak{Q}'', \mathfrak{Q}'''$ ad arbitrium accipi poterunt, unde pro $\mathfrak{P}, \mathfrak{P}', \mathfrak{P}'', \mathfrak{P}'''$ accipere licebit valores $1, 0, 0, 0$ resp., unde erit $p = 0, p' = c, p'' = c', p''' = b' - b$, et $q = a, q' = b + b', q'' = 0, q''' = -a$. Hinc prodit $F = (A, B, C)$, ubi

$$A = cc', \quad B = -bc' - b'c, \quad C = (bb' + d)cc' + a(b - b')^2.$$

Porro habetur

$$A = aa', \quad 2B = 2bb' + ac' + ca', \quad C = cc',$$

unde F ex formis f et f' proprie composita dicitur, quum hae formae proprie primitivae sint et eundem valorem expressionis $\sqrt{d}$ admittere supponantur.

243.

Si in aequationibus praecedentibus pro f' forma f accipitur, i.e. si forma f secum ipsa componitur: orietur forma F proprie ex f composita. Quum si f est (a, b, c) , sit $d = b^2 - ac$, prodibit $F = (a^2, b', c')$, ubi $b' \equiv b^2 - ac \equiv d \pmod{a^2}$, et $c' = \frac{b'^2 - d}{a^2}$; sive brevius, $F = (a^2, b(2b), c')$, ubi $c' = \frac{b^2(4b^2 - 1) - d}{a^2} = \frac{4b^2d + d}{a^2} = \frac{d(4b^2 + 1)}{a^2}$ etc.

Verum generalius, si pro f' accipitur forma quaecunque f proprie aequivalens, e.g. forma ex f per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ oriunda: tum forma ex f et f' composita proprie aequivalebit formae ex f secum ipsa compositae (art. 240).

244.

Si formae componendae sunt oppositae (a, b, c) et $(a, -b, c)$, adeoque $d = d'$, $m = m'$, et ad utramque pertinet idem valor expressionis $\sqrt{d}$: forma ex iis composita erit (aa, b', c') , cuius determinans $= d$. Manifesto haec forma per a repraesentat numerum a , sive est forma anceps. Si forma f proprie primitiva est, erit forma ex f et opposita ipsius f composita proprie primitiva et anceps.

Compositio ordinum.

245.

Theorema. Si forma f ad eundem ordinem referenda est ut g , similiterque f' est ex eodem ordine ut g' : forma F ex f, f' composita eundem determinantem habebit ex eodemque ordine erit ut forma G ex g, g' composita.

Dem. Sint formae $f, f', F = (a, b, c), (a', b', c'), (A, B, C)$ resp., ipsarumque determinantes $= d, d', D$. Porro sit numerorum $a, 2b, c$ div. comm. max. $= m$; numerorum a, b, c div. comm. max. $= m$; similesque significationes habeant m', m' respectu formae f' , et $M, \mathfrak{M}$ respectu formae F . Tunc ordo formae f determinabitur per numeros d, m, m , unde iidem numeri etiam pro forma g valebunt; eadem ratione numeri d', m', m' idem erunt pro forma g' quod sunt pro forma f' . Iam per art. 235, numeri $D, M, \mathfrak{M}$ determinati sunt per d, d', m, m', m, m' ; scilicet erit D divisor communis maximus ipsorum $dm'm', d'mm$; $M = mm'$; atque $\mathfrak{M} = mm'$ (si simul $m = m, m' = m'$) vel $= 2mm'$ (si $m = 2m$, aut $m' = 2m'$). Quae proprietates ipsorum $D, M, \mathfrak{M}$, quum inde sequantur, quod F ex f, f' composita est: facile perspicitur, D, M et $\mathfrak{M}$ etiam pro forma G valere, adeoque G esse ex eodem ordine ut F . Q. E. D.

Ex hac ratione ordinem, in quo est forma F , compositum dicemus ex ordinibus in quibus sunt formae f, f' . Ita e.g. ex duobus ordinibus proprie primitivis semper compositus est similis ordo; ex proprie primitivo et improprie primitivo, improprie primitivus. Simili modo intelligendum est, si ordo aliquis ex pluribus aliis ordinibus compositus vocabitur.

Compositio generum.

246.

Problema. Propositis duabus formis primitivis quibuscunque f, f' , ex quarum compositione oritur F : ex generibus ad quae pertinent f, f' definire genus, ad quod referenda erit F .

Sol. I. Consideremus primo eum casum, ubi ad minimum una formarum f, f' e.g. prior est proprie primitiva, designemusque determinantes formarum f, f', F per d, d', D . Tunc D erit divisor communis maximus numerorum $dm'm, d'$, ubi m est aut 1 aut 2, prout forma f' est proprie aut improprie primitiva; F autem in casu illo pertinebit ad ordinem proprie primitivum, in hoc ad improprie primitivum. Iam genus formae F definietur per ipsius characteres particulares, nempe tum respectu singulorum divisorum primorum imparium ipsius D , tum, pro quibusdam casibus, respectu numerorum 4 aut 8. Hos igitur singulos determinare oportebit.

1°. Si p est divisor quicunque primus impar ipsius D , necessario etiam ipsos d, d' metietur, adeoque etiam inter characteres formarum f, f' occurrent ipsarum relationes ad p . Iam si per f repraesentari potest numerus a , per f' numerus a' , productum aa' repraesentari poterit per F . Si itaque tum per f , tum per f' repraesentari possunt residua quadratica ipsius p (per p non divisibilia) etiam per F residua quadratica ipsius p repraesentari poterunt, i.e. si utraque f, f' habet characterem Rp , forma F eundem characterem habebit. Simili ratione F habebit characterem Np , si utraque f, f' habet characterem Np ; contra F habebit char. Np , si altera formarum f, f' habet Rp , altera Np .

2°. Si in characterem integrum formae F ingreditur relatio ad numerum 4, talis relatio etiam in characteres formarum f, f' ingredi debet. Nam illud tunc tantummodo evenit, quando D est aut $\equiv 0$ aut $\equiv 3 \pmod{4}$. Quando D per 4 est divisibilis, etiam $dm'm$ et d' per 4 divisibiles erunt, unde statim patet, f' non posse esse improprie primitivam, adeoque esse $m' = 1$; hinc tum d tum d' per 4 divisibiles erunt, et in utriusque characterem ingreditur relatio ad 4. Quando $D \equiv 3 \pmod{4}$, metietur D ipsos d, d' ; quotientes erunt quadrata, adeoque etiam d, d' necessario vel $\equiv 0$ vel $\equiv 3 \pmod{4}$, et inter characteres ipsarum f, f' relatio ad 4. Hinc eodem modo ut in (1°) sequitur, characterem formae F fore 1, 4, si vel utraque f, f' habeat 1, 4 vel utraque 3, 4; contra characterem formae F fore 3, 4, si altera formarum f, f' habeat 1, 4, altera 3, 4.

3°. Quando D per 8 est divisibilis, etiam d' erit $\equiv 0$; hinc f' certo proprie primitiva, $m' = 1$, atque etiam d per 8 divisibilis, quare inter characteres formae F aliquis e characteribus 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8 tunc tantum locum habere potest, si etiam in caractere tum formae f , tum formae f' talis relatio ad 8 adest. Facile autem confirmatur eodem modo ut ante, characterem formae F fore 1, 8, si f et f' respectu ipsius 8 eundem habeant; characterem formae F fore 3, 8, si altera formarum f, f' habeat 1, 8 altera 3, 8, vel altera 5, 8 altera 7, 8; F habere 5, 8, si f, f' habeant 1, 8 et 5, 8 vel 3, 8 et 7, 8; F habere 7, 8, si f et f' habeant vel 1, 8 et 7, 8, vel 3, 8 et 5, 8.

4°. Quando est $D \equiv 2 \pmod{8}$, erit d' vel $\equiv 0$ vel $\equiv 2$ vel $\equiv 4 \pmod{8}$; hinc $m' = 1$, adeoque etiam d vel $\equiv 0$ vel $\equiv 2$ vel $\equiv 4 \pmod{8}$; attamen uterque d, d' per 8 divisibilis esse nequit, quoniam D est divisor communis maximus ipsorum. Quare in eo tantum casu alteruter characterum 1, 8 et 7, 8; 3, 8 et 5, 8, formae F tribui debet, ubi vel utraque forma f, f' aliquem ex illis habet, vel altera aliquem ex illis, altera aliquem horum 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8. Hinc facile deducitur, characterem formae F determinari per tabulam sequentem, si character in margine positus pertineat ad alteram formarum f, f' , ad alteram vero character in facie:

	1, 8	3, 8	5, 8	7, 8
1, 8	1, 8	3, 8	5, 8	7, 8
3, 8	3, 8	1, 8	7, 8	5, 8
5, 8	5, 8	7, 8	1, 8	3, 8
7, 8	7, 8	5, 8	3, 8	1, 8

Et quidem character formae F determinabitur per hanc tabulam, si character formae alterutrius est e serie 1, 8; 3, 8; 5, 8; 7, 8, et alterius eadem. Si vero alterius formae character est 3, 8 vel 5, 8, et alterius 1, 8 vel 7, 8: tum character formae F erit is, qui in tabula loco respondet, si modo signum eius formae, cuius character ex serie 1, 8; 7, 8 est desumptus, anteponatur.

247.

II. Quando ambae formae f, f' sunt improprie primitivae, sint m, m' divisores communes maximi numerorum $a, 2b, c$ et $a', 2b', c'$ resp., ita ut m, m' sint vel $= 2$ vel $= 1$. Sit porro $\mathfrak{M}$ div. comm. max. ipsorum A, B, C . Erit $\mathfrak{M} = mm'$, si simul $m = m'$ et $m' = m'$ (i.e. si utraque forma est ex ordine improprie primitivo), vel $\mathfrak{M} = 2mm'$, si alterutra forma est ex ordine derivato.

Porro D erit div. comm. max. ipsorum $4d, 4d'$, i.e. $D = 4D'$, ubi D' est div. comm. max. ipsorum d, d' ; adeoque $\frac{D}{4}$ est integer. Hinc facile perspicitur, F semper esse formam derivatam e forma proprie primitiva cuius determinans $= \frac{D}{4}$.

Genus itaque formae F definiri poterit per characteres particulares respectu divisorum primorum imparium ipsius D' ; et perinde atque in I facile demonstratur, F habiturum characterem Rp , si utraque f, f' habet Rp , vel altera Rp altera Np ; et characterem Np , si utraque habet Np .

Quod attinet ad relationes ad 4 et 8: quum $\frac{D}{4}$ sit integer, ad genus formae F non pertinebit character respectu numeri 4, sed respectu numeri 8 tantummodo, si $\frac{D}{4}$ est impar. In hoc casu autem facile demonstratur, si f est forma (a, b, c) , esse $a \equiv c \equiv 0 \pmod{2}$, $b \equiv 1 \pmod{2}$, et $d \equiv 1 \pmod{4}$; eodemque modo $d' \equiv 1 \pmod{4}$. Porro $\mathfrak{M}$ erit par, adeoque F erit forma ex ordine derivato, et genus eius respectu 8 determinari debet. Demonstratur autem eodem modo ut in I, characterem formae F respectu 8 determinari per normas ibi traditas.

248.

Theorema. Sint f, f' formae eiusdem ordinis eiusdemque generis, F ex f, f' composita: tum F erit ex eodem ordine et genere.

Dem. Quum f, f' sint eiusdem ordinis, F erit ex eodem ordine (art. 245). Iam genus formae F determinatur per characteres e compositorum generum normis art. praec. facile eruentes. In casu I, si f, f' eundem characterem respectu alicuius divisoris habent, etiam F eundem habebit; si diversos, diversum. In casu II similiter. Q. E. D.

Hinc patet, si ex formis eiusdem generis f et f' composita sit F , et f implicet formam g, f' formam g' eiusdem generis: tum F etiam ex g et g' composita erit eiusdem generis.

249.

Si ex classibus quibuscunque C, C' eiusdem ordinis eiusdemque determinantis oritur classis C'' , si nempe forma e classe C'' ex formis classium C, C' composita est: dicemus C'' ex C et C' compositam. Porro si classis C implicat classem D , et classis C' implicat

classem D' : tum classis C'' ex D et D' composita erit. Denique si formis classis C omnes formae classium D, D' etc. proprie aequivalentur, similiterque formis classis C' omnes formae classium E, E' etc.: tum formis classis C'' omnes formae ex ordinibus D, D' etc. cum formis ex ordinibus E, E' etc. compositae proprie aequivalentur. In his signis classium compositio designabitur per signum $+$, ita ut $C + C' = C''$ scribatur; identitas classium per signum aequalitatis.

250.

Theorema. Si ex classibus C, C' composita est C'' , et C implicat D , C' implicat D' : tum C'' ex D et D' composita erit.

Dem. Sint formae classium C, C', C'' resp. f, f', F , ita ut F ex f, f' composita sit. Sit porro g forma classis D , g' forma classis D' . Iam f implicat g , f' implicat g' : ergo F ex g et g' composita erit (art. 238, 239). Q. E. D.

Corollarium. Ex compositione classium oppositarum oritur classis principalis. Nam si C est classis quaecunque, C' ipsi opposita, K classis principalis: formae classis C sint (a, b, c) , classis C' sint $(a, -b, c)$ (sive formae oppositae). Iam ex his formis composita erit (aa, b', c') cuius determinans $= D$; et quum haec forma per a repraesentet numerum a , adeoque sit forma anceps: patet, classem e compositione ortam esse classis principalis.

251.

Hinc facile perspicitur, si ex classibus C, C' composita sit C'' , et C''' sit classis ipsi C' opposita: tum C ex C'' et C''' composita erit. Scilicet quum $C' + C''' = K$ (classis principalis), erit $C'' + C''' = C + C' + C''' = C + K = C$.

Porro patet, si duae classes C, C' eandem classem C'' productant compositione cum eadem classe tertia C''' (sive sit $C + C''' = C' + C'''$), tum C et C' necessario identicas esse. Nam si C^{iv} sit classis ipsi C''' opposita, erit $C = C + C''' + C^{iv} = C' + C''' + C^{iv} = C'$.

Denique perspicuum est, si classis C'' ex classibus C, C' composita sit, tum etiam ex C' et C compositam fore (permutatione mutua classium C, C'). Hinc ulterius sequitur, si ex classibus C, C', C'' etc. composita sit classis $C^{(n)}$, ordine classium pro lubitu mutato, semper eandem classem $C^{(n)}$ prodiisse.

252.

Theorema. Denotantibus K classem principalem, atque C classem quamcunque eiusdem ordinis eiusdemque determinantis: si ex K et C composita est classis C' , tum C' erit ipsa classis C .

Dem. Sit forma classis C sit $f = (a, b, c)$. Classis principalis K continebit formam $(1, 0, -D)$ vel $(1, 1, \frac{1-D}{4})$, prout D est par aut impar. Iam ex f et hac forma composita prodibit ipsa forma f . Q. E. D.

Hinc patet, classis principalis in compositione classium instar unitatis fungi, quomobrem eam per 1 denotabimus, ita ut $1 + C = C$.

253.

Theorema. Si ex classibus C, C' composita est C'' , et C''' est classis ipsi C opposita, C^{iv} classis ipsi C' opposita: tum classis C'' opposita erit ex C''' et C^{iv} composita.

Dem. Sint formae classium C, C', C'' resp. $(a, b, c), (a', b', c'), (A, B, C)$, atque F ex f, f' composita. Formae classis C''' sunt $(a, -b, c)$, classis C^{iv} sunt $(a', -b', c')$. Manifesto forma ex his duabus composita erit $(A, -B, C)$, sive classis opposita classi C'' . Q. E. D.

Designabimus itaque classem oppositam classi C per $-C$, ita ut $C + (-C) = 0$ (classis principalis).

Compositio classium.

Theorema. Propositis duabus classibus C, C' eiusdem ordinis eiusdemque determinantis, semper datur classis C'' eiusdem ordinis eiusdemque determinantis, quae ex C et C' composita sit.

Dem. Sint formae classium C, C' resp. $f = (a, b, c), f' = (a', b', c')$, quorum determinantes sint d, d' . Per art. 236 inveniri poterit forma F ex f, f' composita, si modo d et d' rationem quadratorum inter se habent. Quum vero C, C' sint eiusdem ordinis, determinantes d, d' vel sunt aequales, vel saltem rationem quadratorum habent (si formae sunt ex ordine derivato). Q. E. D.

Multitudines classium in singulis generibus contentarum.

254.

Theorema. Designante O ordinem quemcunque determinantis D , atque K classem huius ordinis in qua est forma simplicissima; si K cum classe aliqua C ordinis O determinantis D composita producit classem C' : tum omnes classes ordinis O determinantis D , e quibus cum K compositis oritur C' , inter se diversae erunt, et omnino eundem numerum habebunt, quot sunt classes ordinis proprie primitivi (positivi) eiusdem determinantis.

Dem. Sint classes, e quibus cum K compositis oritur C' , hae: C, C_1, C_2 etc. omnes diversae. Iam si ex K et C composita est C' , et C'' est classis ipsi C opposita: tum ex C' et C'' composita erit K . Porro si ex K et C_1 item composita est C' , etiam ex C' et $C_1^\wedge$ (classi C_1 opposita) composita erit K . Hinc C'' et $C_1^\wedge$ ex eadem classe cum C' composita productunt K ; quare $C'' = C_1^\wedge$, et proin C_1 est ipsi C opposita, sive $C_1 = C''$. Eodem modo demonstratur, si plures classes darentur, omnes inter se identicas esse debere.

Quodsi itaque K cum classe C composita producit classem C' , et ex classe principali ordinis O determinantis D cum K composita oritur K ipsa: facile hinc colligitur, si omnium classium ordinis O sit m , multitudinem omnium classium proprie primitivarum (positivarum) eiusdem determinantis fore m . Habemus itaque regulam generalem: Denotantibus K, L classes quascunque ordinis O , atque r multitudinem classium proprie primitivarum diversarum eiusdem determinantis, quae singulae cum K compositae ipsam L producunt, multitudo omnium classium in ordine proprie primitivo (positivo) r vicibus maior erit quam multitudo classium ordinis O .

Quum classes K, L in ordine O omnino ad libitum assumi possint, etiam classes identicas accipere licebit, et quidem e re erit ea classe uti, in qua continetur forma huius ordinis simplicissima. Quam itaque pro K et L assumendo, res eo reducta est, ut omnes classes proprie primitivae assignentur, quae cum K compositae ipsam K reproducant. Huc via sternitur per sequens

255.

Theorema. Si $F = (A, B, C)$ est forma simplicissima ordinis O determinantis D , atque $f = (a, b, c)$ forma proprie primitiva eiusdem determinantis: per hanc formam f repraesentari poterit numerus AA , si F oritur per compositionem formarum f, F ; et vice versa F ex se ipsa atque f composita erit, si AA per f repraesentari potest.

Dem. I. Si F in productum fF transit per substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q'''$: ex art. 235 habemus

$$A(aq'q' - 2bqq''' + cqq) = A^2, \quad \text{unde} \quad AA = aq'q' - 2bqq''' + cqq. \quad \text{Q. E. P.}$$

II. Si supponitur, AA per f repraesentari posse, designentur valores indeterminatarum per quos hoc efficitur per $q'', -q$, sive sit $AA = aq'q'' - 2bqq''' + cqq$, ponaturque

$$q''a - q(b + B) = Ap, \quad -qC = Ap', \quad q''(b - B) - qc = Ap'', \quad -q''C = Ap''', \quad -qa - q'(b - B) = Aq, \quad q$$

Quo facto, facile confirmatur, F transire in productum fF per substitutionem $p, p', p'', p'''; q, q', q'', q'''$, atque adeo ex f et F compositam esse, si modo omnes numeri p, p' etc. sint integri. Iam per descriptionem formae simplicissimae, B est vel $\equiv 0$ vel $\equiv A$, adeoque $\frac{2B}{A}$

semper integer; indidem patet, $\frac{C}{A}$ semper integrum. Hinc $q - p, p, q'' - p', p'''$ erunt integri, superestque adeo tantummodo, ut probetur p et p'' esse integros. Fit autem

$$p = \frac{aq'' - q(b + B)}{A}, \quad p'' = \frac{q''(b - B) - qc}{A}$$

quamobrem si $B = 0$, fit

$$p = \frac{aq'' - bq}{A} - \frac{qC}{A} = \frac{q'q''}{A}, \quad p'' = \frac{q''b - qc}{A} - \frac{q'''B}{A} = \frac{q''q'}{A}$$

et proin p, p'' integri; si vero $B = \frac{1}{2}A$, fit

$$p + p' = \frac{aq'' - qc}{A} - \frac{qC + q'''A}{A} = \frac{q'q'' - qq'''}{A}$$

unde aequae facile concluditur, p et p'' in hoc quoque casu esse integros. Ex his colligitur, F ex f et F esse compositam. Q. E. S.

256.

Problema itaque eo reductum est, ut omnes classes proprie primitivas determinantis D assignare oporteat, per quarum formas repraesentari potest AA .

Manifeste AA repraesentari potest per quamvis formam cuius terminus primus est vel AA vel quadratum partis aliquotae ipsius A ; vice versa autem, si AA repraesentari potest per formam f , tribuendo ipsius indeterminatis valores $\alpha e, \gamma e$, quorum divisor communis maximus e , forma f per substitutionem $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, transibit in formam, cuius terminus primus $= AA$, formaque haec proprie aequivalebit formae f , si δ, β ita accipiuntur ut fiat $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, unde patet, in quavis classe, per cuius formas repraesentari possit AA , inveniri formas, quarum terminus primus sit AA vel quadratum partis aliquotae ipsius A . Res itaque in eo versatur, ut omnes classes proprie primitivae det. D eruantur, in quibus huiusmodi formae occurrant, quod obtinetur sequenti modo: Sint a, a', a'' etc. omnes divisores (positivi) ipsius A ; investigentur omnes valores expr. $\sqrt{D} \pmod{aa}$ inter 0 et $aa - 1$ incl. siti, qui sint b, b', b'' etc. statuaturque

$$bb - D = aac, \quad b'b' - D = aac', \quad b''b'' - D = aac'' \text{ etc.}$$

complexus formarum $(aa, b, c), (aa, b', c')$ etc. designetur per V . Tunc facile perspicitur, in quavis classe det. D , in qua occurrat forma, cuius terminus primus $= aa$, etiam aliquam formam ex V contentam esse debere. Simili modo eruantur omnes formae det. D , quarum terminus primus $= a'a'$, medius inter 0 et $a'a' - 1$ incl. situs, designeturque ipsarum complexus per V' ; eademque ratione sit V'' complexus similium formarum quarum terminus primus $= a''a''$ etc.

Eiciantur ex V, V', V'' etc. omnes formae, quae non sunt proprie primitivae, reducantur reliquae in classes, et, si forte plures adsint ad eandem classem pertinentes, in singulis classibus una tantum retineatur. Hoc modo omnes classes quaesitae habebuntur, eritque harum multitudo ad unitatem, ut multitudo omnium classium proprie primitivarum (positivarum) ad multitudinem classium in ordine O .

Ex. Sit $D = -531$, atque O ordo positivus derivatus ex ordine improprie primitivo det. -59 , in quo forma simplicissima $(6, 3, 90)$. Hic $A = 6$. a, a', a'', a''' erunt $1, 2, 3, 6$; V continebit formas $(1, 0, 531), (4, 1, 133), (4, 3, 135)$; V' has $(9, 0, 59), (9, 3, 60), (9, 6, 63)$;

denique V'' has $(36, 3, 15), (36, 9, 17), (36, 15, 21), (36, 21, 27), (36, 27, 35), (36, 33, 45)$: sed ex his duodecim formis sex sunt reiiciendae, puta ex V'' secunda et tertia, ex V''' prima, tertia, quarta et sexta, quae omnes sunt formae derivatae; sex reliquae omnes ad classes diversas pertinere inveniuntur. Revera multitudo classium proprie primitivarum (positivarum) det. -531 est 18, multitudoque classium impr. primitivarum (pos.) det. -59 (sive multitudo classium det. -531 ex his derivatarum) $= 3$, adeoque illa ad hanc ut 6 ad 1.

De multitudine classium ancipitum.

257.

Inter omnes classes in ordine dato determinantis dati imprimis classes ancipites disquisitionem uberiores postulant, determinatioque multitudinis harum classium ad multa alia viam nobis aperiet. Sufficit autem, hanc multitudinem in solo ordine pr. primitivo assignare, quum casus reliqui ad hunc facile reduci possint. Hoc negotium ita absolvemus, ut primo omnes formas ancipites pr. primitivas (A, B, C) determinantis propositi D , in quibus vel $B = 0$ vel $B = \frac{1}{2}A$ eruere, tunc ex harum multitudine multitudinem omnium classium ancipitum pr. primitivarum det. D invenire doceamus.

I. Omnes formae pr. primitivae $(A, 0, C)$ determinantis D manifesto inveniuntur, accipiendo pro A singulos divisores ipsius D (tum positive tum negative), pro quibus $C = \frac{-D}{A}$ fit primus ad A . Quando itaque $D = \pm 1$, duae huiusmodi formae dantur $(1, 0, -1), (-1, 0, 1)$; totidem quando $D = -1$, puta $(1, 0, 1), (-1, 0, -1)$; quando D est numerus primus aut numeri primi potestas (sive $\pm D$), quatuor dabuntur $(1, 0, -D), (-1, 0, D), (D, 0, -1), (-D, 0, 1)$. Generaliter autem, quando D per n numeros primos diversos est divisibilis (inter quos hoc loco etiam 2 in computum ingredi debet): dabuntur omnino 2^{n+1} huiusmodi formae; scilicet posito $D = \pm PQR \dots$, designantibus P, Q, R etc. numeros primos diversos aut numerorum primorum diversorum potestates, quorum multitudo $= n$, valores ipsius A erunt $1, P, Q, PQ$ etc. atque producta ex quocunque horum numerorum; horum valorum multitudo fit per theoriam combinationum 2^n , sed duplicanda est quoniam singulis valoribus tum signum positivum tum negativum tribuere oportet.

II. Simili modo patet, omnes formas pr. primitivas $(2B, B, C)$ determinantis D obtineri, si pro B accipiantur omnes divisores ipsius D (positive et negative), pro quibus $C = \frac{-(B^2-D)}{2B} = \frac{D-B^2}{2B}$ fit integer et ad $2B$ primus. Quum itaque C necessario debeat esse impar, adeoque $CC \equiv 1 \pmod{8}$, ex $D = BB - 2BC = (B - C)^2 - CC$ sequitur, D esse vel $\equiv 3 \pmod{4}$, quando B impar, vel $\equiv 0 \pmod{8}$, quando B par; quoties itaque D alicui numerorum $1, 2, 4, 5, 6$ sec. mod. 8 est congruus, nullae huiusmodi formae dabuntur. Quando $D \equiv 3 \pmod{4}$, C fit integer et impar, quicunque divisor ipsius D pro B accipitur; ne vero C divisorem comm. cum $2B$ habeat, B ita accipi debebit, ut $\frac{D-B^2}{2B}$ ad $2B$ fiat primus; hinc pro $D = -1$ duae formae habentur $(2, 1, 1), (-2, -1, -1)$, generaliterque facile perspicitur, si multitudo omnium numerorum primorum ipsum D metientium sit n , omnino emergere 2^{n+1} formas. Quando D per 8 est divisibilis, C fit integer, accipiendo pro B divisorem quemcunque parem ipsius $\frac{D}{4}$; conditioni alteri autem, ut $C = \frac{D-B^2}{2B}$ ad $2B$ sit primus, satisfit primo, accipiendo pro B omnes divisores impariter pares ipsius $\frac{D}{4}$, pro quibus $\frac{D}{2B}$ cum B divisorem communem non habet, quorum multitudo (habita ratione diversitatis signorum) erit 2^{n+1} , si D per n numeros primos impares diversos divisibilis esse supponitur; secundo, accipiendo pro B omnes divisores pariter pares ipsius $\frac{D}{4}$, pro quibus $\frac{D}{2B}$ fit primus ad B , quorum multitudo quoque erit 2^{n+1} : ita ut in hoc casu omnino habeantur 2^{n+2} huiusmodi formae. Scilicet ponendo $D = \pm 2^\mu PQR \dots$, designante μ exponentem maiorem quam 2; P, Q, R numeros primos impares diversos aut talium numerorum primorum potestates quorum multitudo n : tum pro $\frac{D}{2B}$, tum pro B accipi possunt valores $1, P, Q, R$ etc. productaque ex quocunque horum numerorum, signo et positivo et negativo.

Ex his omnibus colligitur, si D per n numeros primos impares diversos divisibilis supponatur (statuendo $n = 0$, quando $D = \pm 1$ aut ± 2 aut potestas binarii), multitudinem omnium formarum pr. primitivarum (A, B, C) , in quibus $B = 0$ vel $B = \frac{1}{2}A$, fore 2^{n+1} quando D aut $\equiv 1$ aut $\equiv 5 \pmod{8}$; 2^{n+2} quando $D \equiv 2, 3, 4, 6$ aut $7 \pmod{8}$; denique

2^{n+3} quando $D \equiv 0 \pmod{8}$. Quam comparando cum iis quae in art. 231 pro multitudine omnium characterum possibilium formarum primitivarum det. D tradidimus, observamus, illam in omnibus casibus praecise esse duplo hac maiorem. Ceterum manifestum est, quando D sit negativus, inter illas formas totidem positivas affore quot negativas.

258.

Omnes formae in art. praec. erutae manifesto pertinent ad classes ancipites, et vice versa in quavis classe ancipite pr. primitiva det. D saltem una illarum formarum contenta esse debet; in tali enim classe certo adsunt formae ancipites et cuivis formae ancipiti pr. primitivae (a, b, c) det. D aliqua formarum art. praec. aequivalet, scilicet vel

$$(a, 0, \frac{-D}{a}) \quad \text{vel} \quad (a, \frac{1}{2}a, \frac{a^2-4D}{4a}) = (a, \frac{1}{2}a, \frac{1}{4}a - \frac{D}{a})$$

prout $b \equiv 0$ vel $\equiv \frac{1}{2}a \pmod{a}$. Problema itaque eo reductum est, ut quot classes diversas illae formae constituent, investigemus.

Si forma $(a, 0, c)$ est inter formas art. praec., forma $(c, 0, a)$ inter easdem occurrit et ab illa semper erit diversa, unico casu excepto, ubi $a = c = \pm 1$ adeoque $D = -1$, quem aliquantisper seponemus. Quoniam vero hae formae manifesto ad eandem classem pertinent, sufficit unam retinere, et quidem reiiciamus eam cuius terminus primus est maior quam tertius; eum casum ubi $a = -c = +1$ sive $D = -1$ quoque seponemus. Hoc modo omnes formas $(A, 0, C)$ ad semissem reducere possumus, retinendo e binis semper unam; et in omnibus remanentibus erit $A < \sqrt{+D}$.

Simili modo si inter formas art. praec. occurrit forma $(2b, b, c)$, inter easdem reperietur

$$(4c - 2b, 2c - b, c) = (-\frac{D}{b}, -\frac{2D}{4b}, c)$$

quae illi proprio aequivalens et ab ipsa diversa erit, unico quem seponimus casu excepto, ubi $b = c = \pm 1$, adeoque $D = -1$. Quare etiam hic e binis formis unam retinere sufficit, eamque cuius terminus primus minor est quam tertius.

Denique ex his omnibus formis, quas retinuimus, complexum formarum W faciamus, in quo nullae formae identicae nec oppositae occurrant. Omnes hae formae manifesto ad classes ancipites diversas pertinent. Nam omnes formae $(A, 0, C)$ erunt reductae; similiter omnes formae $(2B, B, C)$ reductae erunt, praeter eas in quibus $C < 2B$; in tali vero forma erit $2C < 2B + C$; unde (quoniam $B < C$, i.e. $B < 2C - B$, adeoque $2B < 2C$, sive $B < C$), $2C - 2B < C$ et $C - B < \frac{1}{2}C$ et proin $(C, C - B, C)$, quae manifesto illi aequivalet, forma reducta. Hoc modo totidem formae reductae habentur, quot formae habentur in W , et quum facile perspiciatur, inter illas neque identicas neque oppositas occurrere posse, (unico casu excepto, ubi $C - B = 0$, in quo erit $B = C = +1$, adeoque $D = -1$, quem iam seposuimus): omnes ad classes diversas pertinebunt. Hinc colligitur, multitudinem omnium classium ancipitum pr. primitivarum det. D multitudini formarum in W seu semissi multitudinis formarum art. praec. aequalem esse; in casu excepto autem $D = -1$ per compensationem idem evenit, scilicet duae classes habentur, ad quarum alteram pertinent formae $(1, 0, 1)$, $(2, 1, 1)$, ad alteram hae $(-1, 0, -1)$, $(-2, -1, -1)$. Generaliter itaque pro determinante negativo multitudo omnium classium ancipitum pr. prim. aequalis est multitudini omnium characterum assignabilium formarum primitivarum huius determinantis; multitudo classium ancipitum pr. prim. positivarum autem semissis erit.

259.

Multitudo classium ancipitum improprie primitivarum determinantis dati D multitudi-
ni proprie primitivarum eiusdem det. semper est aequalis. Sit K classis principalis, atque
 K', K'' etc. reliquae classes ancipites pr. primitivae huius determinantis; L aliqua classis
anceps improprie primitiva eiusdem det., e.g. ea in qua est forma $(2, 1, \frac{1-D}{2})$. Prodibit
itaque ex compositione classis L cum K classis L ipsa; ex compositione classis L cum
 K', K'' etc. provenire supponamus classes L', L'' etc. resp., quae manifesto omnes ad eun-
dem determinantem D pertinebunt, atque improprie primitivae et ancipites erunt. Patet
itaque, theorema demonstratum fore, simulac probatum fuerit, omnes classes L, L', L'' etc.
esse diversas, aliasque ancipites impr. prim. det. D praeter illas non dari.

Ad hunc finem sequentes casus distinguimus:

I. Quando multitudo classium impr. primitivarum multitudini pr. primitivarum aequa-
lis est, quaevis illarum oritur ex compositione classis L cum classe determinata proprie
primitiva, unde necessario omnes L, L', L'' etc. erunt diversae. Designante autem $\mathfrak{L}$ clas-
sem quamcunque ancipitem impr. prim. det. D , dabitur classis proprie primitiva $\mathfrak{K}$ talis,
ut sit $\mathfrak{K} + L = \mathfrak{L}$; si classi $\mathfrak{K}$ opposita est classis $\mathfrak{K}'$, erit etiam (quoniam classes $L, \mathfrak{L}$ sibi
ipsae oppositae sunt) $\mathfrak{K}' + L = \mathfrak{L}$, unde necessario $\mathfrak{K}$ cum $\mathfrak{K}'$ identica erit, adeoque classis
anceps; hinc $\mathfrak{K}$ reperietur inter classes K, K', K'' etc. atque $\mathfrak{L}$ inter has L, L', L'' etc.

II. Quando multitudo classium improprie primitivarum ter minor est quam multitudo
classium pr. primitivarum, sit H classis in qua est forma $(4, 1, \frac{1-D}{4})$, H' ea in qua est forma
 $(4, 3, \frac{9-D}{4})$, eruntque H, H' proprie primitivae et tum inter se tum a classe principali K
diversae, atque $H + H' = K$; $2H = H'$, $2H' = H$; et si $\mathfrak{L}$ est classis quaecunque
improprie primitiva det. D , quae oritur ex compositione classis L cum proprie primitiva
 $\mathfrak{K}$, erit etiam $\mathfrak{L} = L + \mathfrak{K} + H$ et $\mathfrak{L} = L + \mathfrak{K} + H'$; praeter tres classes (pr. prim. atque
diversas) $\mathfrak{K}, \mathfrak{K} + H, \mathfrak{K} + H'$ aliae non dabuntur, quae cum L compositae ipsam $\mathfrak{L}$ producant.
Quoniam igitur, si $\mathfrak{K}$ est anceps atque $\mathfrak{K}'$ ipsi $\mathfrak{K}$ opposita, etiam $\mathfrak{L} + \mathfrak{L} = \mathfrak{L}$, necessario $\mathfrak{K}'$
cum aliqua illarum trium classium identica erit. Si $\mathfrak{K}' = \mathfrak{K}$, erit $\mathfrak{K}$ anceps; si $\mathfrak{K}' = \mathfrak{K} + H$,
erit $K = \mathfrak{K} + \mathfrak{K}' = 2\mathfrak{K} + H = 2(\mathfrak{K} + H')$ adeoque $\mathfrak{K} + H'$ anceps; similiterque si $\mathfrak{K}' = \mathfrak{K} + H'$,
erit $\mathfrak{K} + H$ anceps, unde concluditur, $\mathfrak{K}$ inter classes L, L', L'' etc. necessario reperiri. Facile
autem perspicitur, inter tres classes $\mathfrak{K}, \mathfrak{K} + H, \mathfrak{K} + H'$ plures ancipites esse non posse; si
enim tum $\mathfrak{K}$ tum $\mathfrak{K} + H$ ancipites essent sive cum oppositis suis $\mathfrak{K}', \mathfrak{K}' + H'$ resp. identicae,
foret $\mathfrak{K} + H = \mathfrak{K} + H'$; eadem conclusio resultat ex suppositione, $\mathfrak{K}$ et $\mathfrak{K} + H'$ esse ancipites;
denique si $\mathfrak{K} + H, \mathfrak{K} + H'$ ancipites sive cum oppositis suis $\mathfrak{K}' + H', \mathfrak{K}' + H$ identicae essent,
fieret $\mathfrak{K} + H + \mathfrak{K}' + H = \mathfrak{K}' + H' + \mathfrak{K} + H'$, unde $2H = 2H'$, sive $H' = H$. Quamobrem
unica tantum classis anceps pr. prim. dabitur, quae cum L composita ipsam $\mathfrak{L}$ producit,
adeoque omnes L, L', L'' etc. erunt diversae.

Multitudo classium ancipitum in ordine derivato manifesto aequalis est multitudini
classium ancipitum in ordine primitivo, ex quo est derivatus, adeoque per praecedentia
semper poterit assignari.

260.

Problema. Classis proprie primitiva K determinantis D oritur ex duplicatione classis
proprie primitivae k eiusdem determinantis: quaeruntur omnes similes classes, ex quarum
duplicatione classis K oritur.

Sol. Sit H classis principalis det. D atque H', H'', H''' etc. reliquae classes ancipites pr.
primitivae eiusdem determinantis; classes quae ex harum compositione cum k oriuntur,
 $k + H', k + H'', k + H'''$ designentur per k', k'', k''' etc. Tunc omnes classes k, k', k'' etc.
erunt pr. primitivae det. D et inter se diversae; aequae facile perspicitur, ex singularum
duplicatione oriri classem K .

Denotante autem $\mathfrak{K}$ classem quamcunque pr. prim. det. D , quae duplicata producit classem K , necessario inter classes k, k', k'' etc. contenta erit. Ponatur enim $\mathfrak{K} = k + \mathfrak{H}$, ita ut $\mathfrak{H}$ sit classis pr. prim. det. D (art. 249), eritque

$$2\mathfrak{K} = 2k + 2\mathfrak{H} = K + 2\mathfrak{H}$$

unde $2\mathfrak{H} = H$ (classis principalis), i.e. $\mathfrak{H}$ est anceps, adeoque inter H, H', H'' etc. contenta. Q. E. D.

Band 1, Teil 7

Carl Friedrich Gauß

MULTITUDO CLASSIUM ANCIPITUM

$= K = 2k$, unde

$$\frac{1}{2}\mathfrak{S}$$

coincidere cum classe principali, $\mathfrak{S}$ esse ancipitem sive inter H, H', H'' etc. contentam, atque

$$\frac{1}{2}(2k - 2\mathfrak{S}) = k - \mathfrak{S}$$

k, k', k'' etc.

facile concluditur,

quamobrem hae classes completam problematis solutionem exhibent.

Ceterum manifestum est, in eo casu, ubi D sit negativus, e classibus k, k', k'' etc. semissem fore classes positivas, semissem negativas.

Quum igitur quaevis classis pr. prim. det. D , quae ex ullius classis similis duplicatione oriri potest, omnino ex totidem classium similium duplicatione proveniat, quot classes ancipites pr. prim. det. D dantur: perspicuum est, si multitudo cunctarum classium pr. prim. det. D sit r , multitudo omnium classium ancipitum pr. prim. huius det. n , multitudinem omnium classium pr. prim. eiusdem det. quae ex duplicatione similis classis produci possint, fore $\frac{rn}{n}$.

Eadem formula resultat, si, pro det. negativo, characteres multitudinem classium positivarum designant, ille omnium pr. prim., hic solarum ancipitum.

Ita e. g. pro $D = -161$ multitudo omnium classium pr. prim. positivarum est 16, multitudo ancipitum 4, unde multitudo omnium classium, quae per duplicationem alicuius classis oriri possunt, debeat esse 4.

Et revera invenitur, omnes classes in genere principali contentas hac proprietate esse praeditas; scilicet $(1, 0, 161)$ ex duplicatione classium $(1, 0, 161)$; $(2, 1, 81)$ ex duplicatione classium $(3, \pm 1, 54)$, $(6, \pm 1, 27)$; $(9, 1, 18)$ ex duplicatione classium $(3, \pm 1, 54)$, $(5, \pm 2, 33)$, $(10, \pm 3, 17)$; denique $(5, 2, 33)$ ex duplicatione classium $(10, \pm 3, 17)$.

Quodsi enim D sit negativus, e classibus k, k', k'' etc. semissem fore classes positivas, semissem negativas.

Certe semissi omnium characterum pro determinante dato assignabilium genera proprie primitiva (positiva pro det. neg.) respondere nequeunt.

261. Theorema.

Semissi omnium characterum assignabilium pro determinante positivo non-quadrato nulla genera proprie primitiva respondere possunt; pro determinante negativo autem nulla genera proprie primitiva positiva.

DEM. Sit m multitudo omnium generum proprie primitivorum (positivorum) determinantis D ; k multitudo classium in singulis generibus contentarum, ita ut km sit multitudo omnium classium proprie primitivarum (positivarum); n multitudo omnium characterum diversorum pro hoc det. assignabilium. Tunc per art. 258 multitudo omnium classium ancipitum (positivarum) pr. primitivarum erit $\frac{1}{2}n$; hinc per art. praec. multitudo omnium classium pr. prim. quae ex duplicatione similis classis oriri possunt, erit $\frac{km}{\frac{1}{2}n} = \frac{2km}{n}$.

Sed per art. 247 hae classes omnes pertinent ad genus principale, in quo continentur k classes; itaque si omnes classes generis principalis ex duplicatione alicuius classis provenire possunt (quod revera semper locum habere in sequentibus demonstrabitur) erit $\frac{2km}{n} = k$, sive $m = \frac{1}{2}n$; certo autem nequit esse $m > \frac{1}{2}n$, neque adeo $m = \frac{1}{2}n$.

Quoniam itaque multitudo omnium generum pr. prim. (positivorum) certo non est maior quam semissis omnium characterum assignabilium, ad minimum herum semissi talia genera respondere nequeunt.

Q. E. D.

Ceterum probe notandum est, hinc nondum sequi, semissi omnium characterum assignabilium revera respondere genera pr. prim. (positiva), sed huius propositionis gravissimae veritas infra demum e reconditissimis numerorum mysteriis enodari poterit.

Quum pro determinante negative totidem genera negativa semper exstent quot positiva, manifeste ex theorema nostro sequitur, ex omnibus characteribus assignabilibus non plures quam semissis generibus pr. prim. negativis competere possunt, de qua re ut et de generibus impr. prim. infra loquemur.

Denique observamus, theorema ad determinantes positivos quadratos non extendi, pro quibus nullo negotio perspicitur singulis characteribus assignabilibus genera revera respondere.

Theorematis fundamentalis et reliquorum theorematum ad residua -1 , $+2$, -2 pertinentium demonstratio secunda.

262.

In eo itaque casu, ubi pro determinante non-quadrato dato modo characteres diversi assignari possunt, unico tantum genus pr. primitivum (positivum) respondebit, (quod non poterit esse aliud quam genus principale), alter nulli formae pr. prim. (pos.) illius determinantis competet.

Hoc evenit pro determinantibus -1 , -4 , numeris primis formae $4n + 3$ positive, iisque formae $8n + 3$, $8n + 5$ negative acceptis; denique pro omnibus numerorum primorum formae $4n + 1$ potestatibus exponentis imparis positive sumtis, et pro potestatibus numerorum primorum formae $4n + 3$ positive vel negative sumtis, prout exponentes sunt pares vel impares.

Ex hoc principio methodum novam haurire possumus, non modo theorema fundamentale, sed etiam reliqua theoremata Sect. praec. ad residua -1 , $+2$, -2 pertinentia demonstrandi quae a methodis in Sect. praec. adhibitis omnino est diversa, elegantiaque haud neutiquam inferior aestimanda videtur. Determinantem -4 autem, et qui sunt numerorum primorum potestates, quum nihil novi doceant, praeteribimus.

Pro determinante $-p$, itaque nulla forma positiva datur, cuius character sit Np ; pro determinante $+2$ nulla omnino forma, cuius character sit 5 et $7, 8$; pro determinante -2

nulli formae positivae competet character 3 et 5, 8; pro determinante $+p$, si p est numerus primus formae $4n + 1$, character Np ; vel pro determinante $-p$, si p est numerus primus formae $4n + 3$, nulli formae pr. pr. (positivae in casu post.) competet character Np .

Hinc theoremata Sect. praec. sequenti modo demonstramus:

I. Est -1 non-residuum cuiusvis numeri (positivi) formae $4n + 3$.

Si enim numeri A esset, faciendo $-1 = BB - AC$, foret (A, B, C) forma positiva det. -1 , cuius character 3, 4.

II. Est -1 residuum cuiusvis numeri primi p formae $4n + 1$.

Nam $(1, 0, p)$, sicuti omnium proprie primitivarum det. p , erit Rp adeoque $-1 Rp$.

III. Tum $+2$ tum -2 est residuum cuiusvis numeri primi p formae $8n + 1$.

Nam vel formae $(8, 1, \frac{1-p}{8})$, $(-8, 1, \frac{-1-p}{8})$, vel hae $(8, 3, \frac{9-p}{8})$, $(-8, 3, \frac{-9-p}{8})$ erunt proprie primitivae (prout n impar vel par), adeoque ipsarum character hinc $+8 Rp$ et $-8 Rp$, unde etiam $2 Rp$, $-2 Rp$.

IV. Est $+2$ non-residuum cuiusvis numeri formae $8n + 3$ aut $8n + 5$.

Si enim esset residuum talis numeri A , daretur forma (A, B, C) determinantis -2 , cuius character 3 et 5, 8.

V. Simili modo -2 est non-residuum cuiusvis numeri formae $8n + 5$ aut $8n + 7$, alioquin enim daretur forma (A, B, C) determinantis -2 , cuius character 5 et 7, 8.

VI. Est -2 residuum cuiusvis numeri primi p formae $8n + 3$.

Hanc propositionem per methodum duplicem demonstrare licet.

Primo, quum per IV sit $+2 Np$, atque per I, $-1 Np$, necessario erit $-2 Rp$.

Demonstratio secunda petitur ex consideratione determinantis $+2p$, pro quo quatuor characteres sunt assignabiles, puta Rp , 1 et 3, 8; Rp , 5 et 7, 8; Np , 1 et 3, 8; Np , 5 et 7, 8, ex quibus igitur saltem duobus nulla genera respondebunt.

Iam formae $(1, 0, -2p)$, $(-2p)$, $(p, 0, -2)$ relative ad numerum 8 sit 1, 8, quare qui est Rp reiici debent; formae $(p, 0, -2)$, $(1, 0, -2p)$ competunt character primus et quartus; unde itaque character formae $(-2, 1, \frac{p+1}{2})$ erit $-Rp$, hinc $-2 Np$.

VII. Est $+2$ residuum cuiusvis numeri primi p formae $8n + 7$, quod per methodum duplicem demonstrare licet.

Primo, quum ex I et V sit $-1 Np$, $+2 Np$, necessario erit $+2 Rp$.

Secundo quum vel $(8, 1, \frac{-p+1}{8})$ vel $(8, 3, \frac{-p+9}{8})$ pro n par vel impar proprie primitiva determinantis $-p$ erit, ipsius character relative ad p non poterit esse alius quam $+2 Rp$, adeoque $8 Rp$ et $2 Rp$.

VIII. Quilibet numerus primus p formae $4n + 1$ est non-residuum cuiusvis numeri imparis q , qui ipsius p non-residuum est.

Patet enim, si p esset residuum ipsius q , dari formam proprie primitivam determinantis p , cuius character Np .

IX. Simili modo si numerus quicunque impar q est non-residuum numeri primi p formae $4n + 3$, erit $-p$ non-residuum ipsius q .

X. Quivis numerus primus p formae $4n + 1$ est residuum cuiusvis alius numeri primi q , qui ipsius p residuum est.

Si etiam q est formae $4n + 1$, statim sequitur ex VIII; si vero q est formae $4n + 3$, erit etiam $-q$ residuum ipsius p (propter II), adeoque $p Rq$ (ex IX).

XI. Si numerus quicunque primus q est residuum alius numeri primi p formae $4n + 3$, erit $-p$ residuum ipsius q .

Si enim q est formae $4n + 1$, ex VIII sequitur $p Rq$, adeoque (per II) $-p Rq$; casus autem ubi etiam q est formae $4n + 3$, huic methodo se subducit, attamen facile ex consideratione determinantis $+pq$ absolvi potest.

Scilicet quum ex quatuor characteribus pro hoc determinante assignabilibus $Rp, Rq; Rp, Nq; Np, Rq; Np, Nq$ duobus nulla genera respondere possint, atque formarum $(1, 0, -pq)$, $(-1, 0, pq)$ characteres resp. sint primus et quartus, character secundus et tertius nulli formae $-pq$ competere possunt. Quum itaque character formae $(q, 0, p)$ resp. numeri p per hyp. sit Rp , eiusdem formae character respectu numeri q debet esse Rq , adeoque $p Rq$. Q. E. D.

Si in proposs. VIII et IX, q supponitur designare numerum primum, hae cum X et XI iunctae theorema fundamentale Sect. praec. exhibent.

Characteres quibus genera respondere nequeunt, proprius determinantur.

263.

Postquam theorema fundamentale demonstratione nova comprobavimus, eam characterum semissem, quibus nullae formae pr. primitivae (positivae) respondere possunt, pro determinante quocunque non-quadrato dato discernere ostendemus, quod negotium eo brevius absolvere licebit, quum ipsius fundamentum iam in disquisitione artt. 147–150 sit contentum.

Sit ee quadratum maximum, determinantem propositum D metiens, ita ut $D = D'ee$, atque D' nullum factorem quadratum implicet; porro sint a, b, c etc. omnes divisores primi impares ipsius D' , adeoque D' sine respectu signi sui vel productum ex his numeris vel duplum huius producti.

Designetur per Q complexus characterum particularium Na, Nb, Nc etc. solus, quando $D' \equiv 1 \pmod{4}$; adiuncto characterem 3, 4, quando $D' \equiv 3 \pmod{4}$ atque e impar aut impariter par; adiunctis his 3, 8 atque 5, 8, quando $D' \equiv 3 \pmod{4}$ atque e pariter par; adiuncto vel characterem 3 et 5, 8, vel duobus 3, 8 atque 7, 8, quando $D' \equiv 2 \pmod{8}$ atque e vel impar vel par; denique adiuncto vel characterem $5e 7, 8$, vel duobus 5, 8 atque 7, 8, quando $D' \equiv 6 \pmod{8}$ atque e vel impar vel par.

His ita factis, omnibus characteribus integris, in quibus Q continetur, nulla genera proprie primitiva (positiva) determinantis D respondere poterunt.

In omnibus casus multitudo impar characterum particularium qui exprimunt relationem ad tales divisores primos ipsius D , qui ipsum D' non metiuntur: ad generum possibilitatem vel impossibilitatem nihil conferunt.

Ex theoria combinationum autem facillime perspicitur, hoc modo revera semissem omnium characterum integrorum assignabilium excludi.

Demonstratio horum praeceptorum adornatur sequenti modo.

E principiis Sect. praec. denuo demonstratis nullo negotio deducitur, si p sit numerus primus (impar positivus) ipsum D non metiens, cui aliquis e characteribus reiectis competat, D' implicare multitudinem imparem factorum, qui sint non-residua ipsius p , atque adeo D' , et hinc etiam D , esse non-residuum ipsius p ; porro facile perspicitur, productum e numeris quocunque imparibus ad D primis, quorum nulli aliquis characterum reiectorum competat, etiam cum tali characterem consentire non posse; hinc vice versa perspicuum est, quemvis numerum imparem positivum ad D primum, cui aliquis characterum reiectorum conveniat, certe aliquem factorem primum eiusdem qualitatis implicare, et etiam huius non-residuum esse. Si itaque forma proprie primitiva (positiva) determinantis D daretur, alicui characterum reiectorum respondens, adeoque D foret non-residuum cuiusvis numeri

positivi imparis ad ipsum primi per talem formam repraesentabilis, quod manifesto cum theoremate art. 154 consistere nequit.

Tamquam exempla conferantur classificationes in artt. 231, 232 traditae, quarum numerum quisque pro lubitu augere poterit.

264.

Hoc itaque modo pro quovis determinante non-quadrato dato omnes characteres assignabiles in duas species P , Q aequaliter distribuuntur, ita ut nulli characterum Q forma proprie primitiva (positiva) respondere possit, reliquis autem P , quantum quidem hucusque novimus, nihil obstat, quominus ad tales formas pertineant.

Circa has characterum species notetur imprimis propositio sequens, quae ex ipsarum criterio facile deducitur: Si character ex P cum character ex Q componitur (ad normam art. 246 perinde ac si etiam huic genus responderet) prodibit character ex Q ; si vero duo characteres ex P , vel duo ex Q componuntur, character resultans ad P pertinebit.

Adiumento huius theorematis etiam pro generibus negativis atque improprie primitivis semissis omnium characterum assignabilium excludi potest sequenti modo.

I. Pro determinante negativo D genera negativa positivis hoc respectu prorsus contraria erunt, scilicet nullus characterum P pertinebit ad genus proprie primitivum negativum, sed haec genera omnia habebunt characteres ex Q .

Quando enim $D' \equiv 1 \pmod{4}$, erit $-D$ numerus positivus formae $4n+3$, adeoque inter a, b, c etc. multitudo impar numerorum formae $4n+3$, singulorum non-residuum erit -1 , unde patet, in characterem integrum formae $(-1, 0, D)$ in hoc casu ingredi multitudinem imparem characterum particularium ex Q , sive illum pertinere ad Q ; quando $D' \equiv 3 \pmod{4}$, nullus numerus formae $4n+3$ inter a, b, c etc., sed quum vel $3, 4$ vel $3, 8$ vel $7, 8$ in hoc casu occurrat inter characteres particulares formae $(-1, 0, D)$, patet, characterem integrum huius formae etiam hic pertinere ad Q .

Eadem conclusio aequae facile in casibus reliquis obtinetur, ita ut forma negativa $(-1, 0, D)$ semper habeat characterem ex Q .

Sed quoniam haec forma cum quacunque alia pr. primitiva negativa eiusdem det. composita similem formam positivam producit, facile perspicitur, nullam formam pr. prim. negativam characterem ex P habere posse.

II. Pro generibus improprie primitivis (positivis) simili modo probatur, rem vel eodem modo se habere ut in proprio primitivis vel contrario, prout $D' \equiv 1 \pmod{8}$ vel $D' \equiv 5 \pmod{8}$.

Nam in casu priori erit etiam $D' \equiv 1 \pmod{8}$, unde facile concluditur, inter numeros a, b, c etc. vel nullum numerum formae $8n+5$ reperiri vel duos vel quatuor etc. (scilicet productum ex quocunque numeris imparibus, inter quos numeri formae $8n+3$ et $8n+5$ coniunctim multitudinem imparem efficiunt, semper evadit vel $\equiv 3$ vel $\equiv 5 \pmod{8}$); atque hinc etiam patet, ex omnibus a, b, c etc. multitudinem imparium factorum formae $8n+3$ atque $8n+5$ coniunctim multitudinem imparem efficiunt, semper evadit vel $\equiv 3$ vel $\equiv 5 \pmod{8}$), atque hinc etiam patet, ex omnibus a, b, c etc. multitudinem imparium factorum formae $8n+5$ aequale esse debet vel ipsi D' vel ipsi $-D'$; hinc characterem integrum formae $(2, 1, \frac{1-D}{2})$ involvere vel nullum characterem particularem ex Q , vel duos vel quatuor etc., adeoque pertinere ad P .

Iam quum quaevis forma improprie primitiva (positiva) determinantis D spectari possit tamquam composita ex $(2, 1, \frac{1-D}{2})$ atque proprio primitiva (positiva) eiusdem determinantis, perspicuum est, nullam formam improprie primitivam (positivam) in hoc casu

characterem ex Q habere posse.

In casu altero, quando $D' \equiv 5 \pmod{8}$, certo multitudinem imparem factorum formae $8n + 3$ atque $8n + 5$ implicabit, unde concluditur, characterem cuiusvis formae improprie primitivae (pos.) det. D pertinere ad Q , adeoque nulli characterum P genus impr. prim. pos. respondere posse.

III. Denique pro determinante negativo genera improprie primitiva negativa rursus contraria sunt generibus improprie primitivis positivis, scilicet illa non poterunt habere characterem ex P vel ex Q , prout $D' \equiv 1$ vel $\equiv 5 \pmod{8}$, sive prout $-D$ est formae $8n + 7$ vel $8n + 3$. Hoc nullo negotio deducitur inde, quod ex compositione formae $(-1, 0, D)$, cuius character est ex Q , cum formis improprie primitivis negativis eiusdem determinantis formae improprie primitivae positivae proveniunt, adeoque, quando ab his exclusi sunt characteres Q , necessario ab illis exclusi esse debent characteres P , et contra.

Methodus peculiaris, numeros primos in duo quadrata decomponendi.

265.

Ex disquisitionibus artt. 257, 258 supra multitudine classium ancipitum, quibus omnia praecedentia sunt superstructa, multae aliae conclusiones attentione perdignae deduci possunt, quas brevitatis causa suppressere oportet; sequentem tamen, elegantia sua insignem, praeterire non possumus.

Pro determinante positivo p , qui est numerus primus formae $4n + 1$, unicam tantummodo classem ancipitem proprie primitivam dari ostendimus; quapropter omnes formae ancipites proprie primitivae talis determinantis proprie aequivalentes erunt.

Si itaque h est numerus integer positivus proxime minor quam $\sqrt{p}$, formae $(1, h, h^2 - p)$, $(p - h^2, h, 1)$ proprie aequivalebunt, adeoque, quum utraque manifesto sit forma reducta, altera in alterius periodo erit contenta.

Tribuendo formae priori in periodo sua indicem 0, index posterioris necessario erit impar (quoniam termini primi harum duarum formarum signa opposita habent) atque $= 2m + 1$.

Porro facile perspicitur, si formae indicum 0, $2m$ resp. sint $(a, 0, -a)$, $(a', 0, -a')$, formae indicum $m - 1$, $m + 1$ resp. responsuras esse formas (h, a, a') , $(h, -a, -a')$, formamque indicis m esse $(-a'', h, a)$, ubi a'' etc.

Hinc colligitur, si forma indicis m sit (A, B, C) , adeoque $C = -A$ et $p = BB + AA$.

Quare quivis numerus primus formae $4n + 1$ in duo quadrata decomponi potest (quam propositionem supra, art. 182, e principiis prorsus diversis deduximus) et ad talem decompositionem pervenire possumus per methodum simplicissimam et omnino uniformem, scilicet per evolutionem periodi formae reductae, cuius determinans est ille numerus primus et cuius terminus primus 1, usque ad formam, cuius termini externi magnitudine sunt aequales, signis oppositi.

Ita e. g. pro $p = 233$ habetur $(1, 15, -8)$, $(-8, 9, 19)$, $(19, 10, -7)$, $(-7, 11, 16)$, $(16, 5, -13)$, $(-13, 8, 13)$, atque $233 = 64 + 169$.

Ceterum patet, A necessario fieri imparem (quoniam p sit forma proprie primitiva), et proin $(A, B, -A)$ debet esse B parem.

Quum pro determinante positivo, qui est numerus primus formae $4n + 1$, etiam in ordine improprie primitivo unica tantum classis anceps contineatur, perspicuum est, si g sit

numerus impar proxime minor quam $\sqrt{p}$, formas reductas improprie primitivas $(2, g, \frac{p-gg}{2})$, atque $(\frac{p-gg}{2}, g, 2)$ proprie aequivalere, adeoque alteram in alterius periodo contentam esse.

Hinc per ratiocinia praecedentibus omnino similia concluditur, in periodo formae $(2, g, \frac{p-gg}{2})$ reperiri formam cuius termini externi magnitudine aequales sint, signa habeant opposita, ita ut discerptio numeri p in duo quadrata etiam hinc peti possit.

Patet autem terminos exteriores huius formae fore pares, adeoque medium imparem, et quum constet, numerum primum unico tantum modo in duo quadrata decomponi posse, forma per hanc posteriorem methodum inventa erit vel $(B, +A, -B)$ vel $(B, +A, B)$.

Ita in exemplo nostro pro $p = 233$ habetur $(2, 15, -4)$, $(-4, 13, 16)$, $(16, 3, -14)$, $(8, 13, -8)$, et $233 = 169 + 64$ ut supra.

269.

Si non modo forma f implicat ipsam g , sed etiam haec illam, formae f, g *aequivalentes* vocabuntur. In hoc itaque casu non modo E ipsum D metietur, sed etiam D ipsum E , unde facile concluditur, esse debere $D = E$, ideoque $k = \pm 1$.

Vice versa autem, si forma f implicat formam g eiusdem determinantis hae duae formae erunt aequivalentes. Erit enim (adhibendo eadem signa ut in art. praec. excipiendoque casum ubi $D = 0$) $k = \pm 1$, adeoque forma f , in quam transit f per substitutionem (S') , cum f identica erit; in hoc casu etiam formas F, G , adeoque formas f, g adiunctas inter se aequivalentes fore, posterioremque in priorem transire per substitutionem (S''') orro patet, si formae F, G aequivalentes esse supponuntur, atque prior transit in posteriorem per substitutionem T , etiam formae f, g aequivalentes erunt, transibitque f in g per substitutionem ipsi T adiunctam, atque g in f per eam, quae oritur ex transpositione substitutionis T .

Denique vice versa, si formae f, g aequivalentes sunt, resp. transit forma ipsi f adiuncta in formam ipsi g adiunctam atque haec in illam per has duas substitutiones; hae duae formae autem oriuntur ex f, g multiplicando singulos coefficientes per D ; unde nullo negotio concluditur, per easdem substitutiones transire f in g atque g in f resp.

270.

Si forma ternaria f formam ternariam f' implicat, atque haec formam f'' : f implicabit etiam f ipsam f'' .

Facillime enim perspicietur f in f'' per substitutionem compositam transmutatum iri, si f transeat in f' per substitutionem (S) et f' in f'' per substitutionem (T) .

In eo itaque casu, ubi f aequivalet ipsi f' , atque f' ipsi f'' , forma f etiam formae f'' aequivalebit.

Ceterum sponte manifestum est, quomodo haec theoremata ad plures formas sint applicanda.

271.

Hinc iam patet, omnes formas ternarias, perinde ac binarias, in classes distribui posse, referendo ad classem eandem formas aequivalentes, non-aequivalentes ad diversas.

Formae itaque determinantium diversorum certo ad classes diversas pertinebunt, et proin classes infinite multae formarum ternariarum dabuntur; formae autem ternariae eiusdem determinantis modo minorem modo maiorem classium numerum efficiunt; quod

vero tamquam proprietas palmaris harum formarum est considerandum, omnes formae eiusdem determinantis dati semper constituunt classium multitudinem finitam.

Evolutioni uberiori huius gravissimi theorematis praemittenda est explicatio sequentis differentiae essentialis, quae inter formas ternarias obtinet.

Quaedam formae ternariae ita sunt comparatae, ut per ipsas sine discrimine repraesentari possint numeri positivi et negativi, e.g. forma $xx + yy - zz$, quamobrem formae *indefinitae* vocabuntur.

Contra per alias numeri negativi repraesentari nequeunt, sed (praeter cifram quae prodit, ponendo singulas indeterminatas = 0) positivi tantum, ut $xx + yy + zz$, quae formae *positivae* dicuntur; denique per alias numeri positivi repraesentari nequeunt, ut $-xx - yy - zz$, unde *negativae* appellabuntur; formae positivae et negativae nomine communi *definitae* dicuntur.

Ecce jam criteria generalia, per quae haec formarum indoles discerni poterit.

I. Multiplicando formam ternariam $f = axx + a'x'x' + a''x''x'' + 2bx'x'' + 2b'xx'' + 2b''xx'$ determinantis D per a , denotandoque coefficientes formae ipsi f adiunctae perinde ut in art. 267 per A, A', A'', B, B', B'' , prodit

$$(ax + b''x' + b'x'')^2 - A'x'x' + 2Bx'x'' - Ax''x'' = g$$

multiplicando denuo per A' , provenit

$$A'(ax + b''x' + b'x'')^2 - (A'x' - Bx'')^2 + aDx''x'' = h$$

Hinc statim concluditur, si tum aD tum A' sint numeri negativi, omnes valores ipsius h esse negativos; unde manifeste per formam f tales tantummodo numeri repraesentari poterunt, quorum signum oppositum est signo ipsius aA' , i. e. idem cum signo ipsius D .

In hoc itaque casu f erit forma *definita* quidem positiva vel negativa, sive prout a est positivus vel negativus, sive oppositum signo ipsius D (neuter enim numerorum a, A' potest esse = 0).

Si vero vel uterque numerorum aD, A' est positivus, vel alter positivus alter negativus: facile perspicitur, h per debitam quantitatem x, x', x'' determinationem valores tum positivos tum negativos nancisci posse.

Quare in hoc casu f valores tum eodem signo affectos ut aA' tum opposito obtinere poterit, eritque adeo forma *indefinita*.

Pro 2 extdegree casu, ubi $A' = 0$, neque vero simul $a = 0$, fit $g = (ax + b''x' + b'x'')^2 - x'(A'x' - 2Bx'')$ Tribuendo ipsi x' valorem arbitrium (qui tamen non = 0), accipiendoque x'' ita ut $-x''$ signum idem obtineat ut Bx (quod fieri posse facile perspicitur, quum B nequeat esse = 0, hinc enim foret $BB - AA' = aD = 0$, adeoque etiam $D = 0$, quem casum excludimus), erit $x'(A'x' - 2Bx'')$ quantitas positiva, unde facile patet, x ita determinari posse, ut g obtineat valorem negativum.

Manifesto hi valores etiam ita accipi poterunt, ut, si desideretur, omnes sint integri.

Denique patet, tam magnum accipi posse x , ut, si ipsis x', x'' valores quicunque tribuantur, ipsum g fiat positivus. Hinc concluditur, in hoc casu formam f esse indefinitam.

Denique si $a = 0$, erit $f = a'x'x' + a''x''x'' + 2bx'x'' + 2b'xx'' + 2b''xx'$. Accipiendo itaque x ad lubitum, manifesto fieri poterit, ut f valores tum positivos tum negativos obtineat, nisi simul b' et b'' sint = 0; sed tunc foret $D = 0$, quem casum excludimus.

Quare etiam in hoc casu f erit forma indefinita.

Eodem modo, ut hic ex numeris aD, A' indolem formae f diiudicavimus, etiam aD et A'' adhiberi possunt, ita ut f sit forma definita, si tum aD tum A'' sit negativus; indefinita in omnibus reliquis casibus.

Nec non prorsus simili modo eidem fini inservire potest consideratio numerorum $a'D$ et A , vel horum $a'D$ et A'' , vel horum $a''D$ et A vel denique ipsorum $a''D$ et A' .

Ex his omnibus colligitur, in forma definita sex numeros $A, A', A'', aD, a'D, a''D$ esse negativos, et quidem in forma positiva a, a', a'' erunt positivi, D negativus; in negativa autem a, a', a'' erunt negativi, D positivus. Hinc patet, omnes formas ternarias determinantis dati positivi distribui in negativas et indefinitas; omnes autem determinantis negativi in positivas et indefinitas; denique formas positivas determinantis positivi, seu negativas determinantis negativi omnino non dari.

Indidem facile perspicitur, formae definitae semper adiunctam esse definitam et quidem negativam, indefinitae indefinitam.

Quum omnes numeri per formam ternariam datam repraesentabiles manifesto etiam per omnes formas huic aequivalentes repraesentari possint: formae ternariae in eadem classe contentae vel omnes erunt indefinitae, vel omnes positivae, vel omnes negativae.

Quamobrem has formarum denominationes etiam ad classes integras transferre licebit.

272.

Theorema in art. praec. propositum, quod omnes formae ternariae determinantis dati in multitudinem finitam classium distribuuntur, per methodum ei qua in formis binariis usi sumus analogam tractabimus, scilicet ostendendo, primo, quo pacto quaevis forma ternaria ad formam simpliciore reduci possit, dein, formarum simplicissimarum (ad quas per tales reductiones perveniatur) multitudinem pro quovis determinante dato esse finitam.

Supponamus generaliter, propositam esse formam ternariam f determinantis D (a cifra diversi), quae per substitutionem (S) transeat in aequivalentem g determinantis D , ita ut coefficientes ita definiantur, ut forma g simplicior evadat quam f .

Sint formae ipsis f, g adiunctae resp. F, G , quae designentur per F, G .

Tunc per art. 269 F transibit in G per substitutionem ipsi S adiunctam, G autem in F per substitutionem ex transpositione ipsius S oriundam.

Numerum k qui esse debebit vel $= +1$ vel $= -1$ denotabimus per k .

Quibus ita factis, observamus:

I. Si fiat $\gamma = 0$, $\gamma' = 0$, $\gamma'' = 1$, fore $m = a\alpha^2 + 2b''\alpha\alpha' + a'\alpha'^2$, $m' = a''$, $n = b\alpha\beta' + b'\alpha'\beta + b''(\alpha\beta' + \alpha'\beta) + a''\gamma$, etc.

Hinc manifestum est, formam binariam (a, b'', a') , cuius determinans est A' , transmutari per substitutionem in formam binariam (m, n, m') determinantis M' , et proin (m, n, m') ipsi (a, b'', a') aequivalere propter $\alpha\beta' - \beta\alpha' = +1$, unde etiam $M' = A'$.

Nisi itaque (a, b'', a') iam est forma simplicissima in classe sua, ipsos $\alpha, \beta, \alpha', \beta'$ ita determinare licebit, ut (m, n, m') sit forma simplicior; et quidem e theoria aequivalentiae formarum binariarum facile concluditur, hoc ita fieri posse, ut m non sit maior quam $\sqrt{\pm A'}$, si A' fuerit negativus, vel non maior quam $\sqrt{\pm A'}$ si A' fuerit positivus, vel $m = 0$, si $A' = 0$.

Hoc itaque modo forma f ad aliam reducitur coefficientem primum, si fieri potest, minorem habentem, et cuius coefficientem tertium eundem habet ut forma F ipsi f adiuncta. In hoc consistit *reductio prima*.

II. Si vero $k = 1$, fit $\alpha = 1$, $\alpha' = 0$, $\alpha'' = 0$, erit $\gamma = 0$, $\gamma' = 0$, $\gamma'' = 1$. Hinc patet, formam binariam (A'', B, A') , cuius determinans est Da , transire per substitutionem in formam (M'', N, M') determinantis Dm , adeoque ipsi aequivalere.

Nisi itaque (A'', B, A') iam est forma simplicissima classis suae, coefficientes ita determinari poterunt, ut (M'', N, M') sit simplicior. Hoc itaque modo forma f reducitur ad aliam coefficientem primum eundem habentem, sed cuius forma adiuncta coefficientem tertium si fieri potest minorem habeat quam forma F ipsi f adiuncta. In hoc consistit *reductio secunda*.

III. Si itaque f est forma ternaria, ad quam neque reductio prima neque secunda est applicabilis, i. e. quae per neutram in formam simpliciore transmutari potest: tum erit vel $a < \sqrt{\pm A''}$ vel $a = \sqrt{\pm A''}$, tum $A'A' < \pm aD$ sine respectu signi.

IV. Quodsi vero ad formam ternariam quamcunque datam determinantis D alternis vicibus reductio prima et secunda applicentur, manifestum est, tandem necessario ad formam perventum iri, ad quam neutra amplius applicari possit.

Quum enim magnitudo absoluta tum coefficientium primorum formarum hoc modo prodeuntium tum coefficientium tertiorum formarum illis adiunctarum continuo alternis vicibus eadem maneat atque decrescat, hic progressus necessario finietur.

Hinc iam nacti sumus egregium **theoremata**: *Quaevs forma ternaria determinantis D reduci potest ad aliam aequivalentem cuius coefficiens primus non sit maior, quam $\sqrt{\pm D^3}$ atque coefficiens tertius formae ipsi adiunctae non maior quam $\sqrt{\pm D^3}$ sine respectu signi, siquidem forma proposita his proprietatibus ipsa nondum est praedita.*

273.

Ecce iam quaedam exempla per quae praecepta praecedentia magis illustrabuntur.

Ex. 1. Sit $f = (19 \ 21 \ 50 \ 28 \ 0 \ 0)$, cuius determinans $D = -825$, et cui adiuncta est $F = (-825 \ -166 \ -398 \ 257 \ 573 \ -370)$. Quum $(19, 1, 21)$ sit forma binaria reducta, cui alia, termini primi minoris quam 19 non aequivalet, reductio prima hic non est applicabilis; forma binaria $(A'', B, A') = (-398, 257, -166)$ autem per theoriam aequivalentiae formarum binariarum in simpliciore aequivalentem transmutabilis invenitur. Faciendo itaque $\beta' = 2$, $\gamma' = 1$, $\beta'' = -11$, $\gamma'' = -7$, $\alpha = 1$, $\alpha' = 0$, $\alpha'' = 0$, applicanda ad formam f est substitutio $(1, 0, 0; 2, 1, -11; 1, 0, -7)$, per quam transmutetur in $f' = (19 \ -82 \ -4513 \ 10 \ 3 \ -2)$, cui adiuncta est $F' = (-825 \ -2 \ -32 \ 4133 \ -301 \ -82)$. Coefficiens primus per reductionem primam amplius diminui non potest, neque formae ipsi adiunctae tertius per secundam.

Ex. 2. Proposita sit forma $f = (10 \ 2 \ 3 \ 1 \ 3 \ -2)$, cui adiuncta est $F = (-1 \ -2 \ -3 \ 2 \ 3 \ 5)$, et cuius determinans $D = 2$. Hic successive reperiuntur, applicando alternatim reductionem secundam et primam, formae aequivalentes f' , f'' , f''' etc.

274.

Adhibendo signa eadem ut in art. 272, i. e. ponendo $\alpha = 1$, $\alpha' = 0$, $\alpha'' = 0$, $\gamma = 0$, $\gamma' = 0$, $\gamma'' = 1$, et $\beta = 0$, erit $m = a$, $m' = a'\beta'\beta' + 2b''\beta' + a''$, $n = b + a'\beta'\gamma' + b'\beta' + b''(\beta'\gamma' + \gamma) + a''\gamma$, $n' = b' + a\gamma + b\beta' + b''(\beta'\gamma + \gamma') + a''\gamma\gamma'$, $n'' = a\beta + a'\beta' + b''(\beta + \beta') + a''$, etc.

275.

Si habetur series formarum ternariarum aequivalentium f, f', f'', f''' etc., atque transformationes cuiusvis harum formarum in sequentem: ex transformatione formae f in f' , formaeque f' in f'' per art. 270 deducitur transformatio formae f in f'' ; ex hac atque transf. formae f'' in f''' sequitur transf. formae f in f''' etc.

276.

I. Multitudo omnium formarum $(0 \ a' \ a'' \ b \ b' \ b'')$ determinantis dati D , in quibus $a = 0$, b'' non maior quam semissis divisoris comm. max. numerorum a', b' , a debet esse $= b''$, manifesto est finita.

II. Simili modo finita est multitudo omnium formarum $(a \ a' \ a'' \ b \ b' \ b'')$ determinantis D , in quibus a non $= 0$, neque maior quam $\sqrt{\pm D^3}$, $b''b''$ ad B et $b''b''$ neque maior quam $\sqrt{\pm D^3}$, b'' non maior quam $\sqrt{\pm a'}$, $ab'' - bb' = B'$ non maiores quam $\sqrt{\pm A'}$.

277.

Pro $D = 1$, formae I hae sex (per ambiguitatem signorum) prodeunt: $(0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ \pm 1)$, $(0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ \pm 1)$, et ex combinationum hinc oriundarum b'', A'' alios valores quam ± 1 habere nequeunt. In formis II a et a'' singulis quatuor ± 1 , B et B' poni debent $= 0$, unde emergunt quatuor formae.

Simili modo pro $D = -1$, $D = 2$ etc. formae eruuntur.

278.

Per formam ternariam f , cuius indeterminatae sunt x, x', x'' , repraesentantur tum numeri, tribuendo ipsis x, x', x'' valores determinatos, tum formae binariae per huiusmodi substitutiones $x = mt + nu$, $x' = m't + n'u$, $x'' = m''t + n''u$ (designantibus m, n, m' , etc. numeros determinatos; t, u indeterminatas formae repraesentatae).

Ad theoriam itaque completam formarum ternariarum requireretur solutio sequentium problematum:

I. Invenire omnes repraesentationes numeri dati per formam ternariam datam.

II. Invenire omnes repraesentationes formae binariae datae per ternariam datam.

III. Diiudicare, utrum duae formae ternariae datae eiusdem determinantis aequivalentes sint, necne, et in casu priori omnes transformationes alterius in alteram invenire.

IV. Diiudicare, utrum forma ternaria data aliam datam determinantis maioris implicet, necne, et in casu priori omnes transformationes illius in hanc assignare.

De quibus problematibus longe difficilioribus quam analogia in formis binariis alio loco pluribus agemus: hic disquisitionem nostram restringimus ad ostendendum, quomodo primum ad secundum, secundumque ad tertium reduci possit; tertium vero pro casibus quibusdam simplicissimis formarumque binariarum theoriam imprimis illustrantibus solve docebimus; quartum hic omnino excludemus.

279.

Lemma. Propositis tribus numeris integris quibuscunque a, a', a'' (qui tamen non omnes simul $= 0$): invenire sex alios A, A', A'', B, B', B'' ita comparatos ut fiat $B'C'' - B''C' = a$, $B''C - BC'' = a'$, $BC' - B'C = a''$.

Sit α div. comm. max. ipsorum a, a', a'' , ita ut fiat $A\alpha + A'a' + A''a'' = \alpha$, accipianturque integri A, A', A'' .

280.

Supponamus, formam binariam $\phi = att + 2btu + cuu$ cuius determinans $= D$, repraesentari per formam ternariam f , cuius indeterminatae x, x', x'' , ponendo $x = mt + nu$, $x' =$

$m't + n'u, x'' = m''t + n''u$, ipsique f adiunctam esse formam F , cuius indeterminatae X, X', X'' .

Tunc per calculum facile confirmatur (designando coefficientes formarum f, F per literas peculiare) sive etiam ex art. 268, II. protinus deducitur, numerum D repraesentari per F ponendo $X = mn' - m'n, X' = m''n - mn'', X'' = mn'' - m''n$, quae repraesentatio numeri D repraesentationi formae ϕ per f adiuncta commode dici potest.

Si valores ipsarum X, X', X'' divisorem communem non habent, brevitatis causa hanc repraesentationem ipsius D *propriam* vocabimus, sin secus, *impropriam*, easdem denominationes etiam repraesentationi formae ϕ per f , cui illa repraesentatio ipsius D adiuncta est, tribuemus.

281.

Investigatio repraesentationum impropriarum numeri dati D per formam F ad casum praecedentem facile reducitur. Scilicet manifestum est, si D per nullum quadratum (praeter 1) divisibilis sit, tales repraesentationes omnino non dari;

282.

Investigatio repraesentationum formae binariae datae, cuius determinans $= D$, per ternariam datam pendet ab observationibus sequentibus:

I. Ex quavis repraesentatione propria formae binariae (p, q, r) determinantis $= D$ per ternariam f determinantis A deduci possunt integri B, B' ita ut sit $BB \equiv \frac{1}{4}p, BB' \equiv -\frac{1}{2}q, B'B' \equiv r \pmod{D}$, i. e. B, B' valor expressionis $\sqrt{A(p, -q, r)} \pmod{D}$.

II. Si quaevis repraesentatio propria formae ϕ per f adiuncta est, etiam formae ψ , in quam ϕ transeat per substitutionem propriam, per f adiuncta erit.

III. Denique si duae formae binariae ϕ, ψ determinantis D per f repraesentari possunt, alicuique repraesentationi unius eadem repraesentatio propria ipsius D per F adiuncta est, atque alicui repraesentationi alterius: illae formae necessario erunt proprie aequivalentes.

283.

Ex his principiis deducitur methodus sequens, omnes repraesentationes proprias formae binariae $\phi = pt^2 + 2qtu + ru^2$ determinantis D per ternariam f determinantis A inveniendi.

I. Eruantur omnes valores diversi (i. e. non-aequivalentes) expressionis $\sqrt{A(p, -q, r)} \pmod{D}$. Hoc problema pro eo casu, ubi D primus, supra (art. 233) solutum est, atque A ad D primus est, ϕ est forma primitiva casusque reliqui ad hunc facillime reducuntur.

II. Designemus multitudinem horum valorum per m , supponamusque, inter eos reperiiri n valores, qui sibi ipsis oppositi sint (statuendo $n = 0$, quando tales non adsunt). Tunc manifestum est, ex reliquis $m - n$ valoribus binos semper oppositos fore; reiiciatur e binis quibusque valoribus oppositis unus ad libitum, remanebuntque omnino valores $\frac{1}{2}(m + n)$.

III. His ita factis manifestum est, quam vis repraesentationem propriam formae ϕ per f necessario ad aliquem e valoribus remanentibus pertinere debere, et quidem ad unicum tantum.

284.

Quum repraesentationes impropriae formae binariae ϕ determinantis D per ternariam f , cui adiuncta est F , eae sint, ex quibus repraesentationes impropriae numeri D per formam

F sequuntur: per f manifesto nequit improprie repraesentari, nisi D factores quadratos implicet.

285.

De quaestionibus problema tertium nobis propositum constituentibus (ad quod duo priora in praeced. sunt redacta), scilicet propositis duabus formis ternariis eiusdem determinantis, diiudicare, utrum aequivalentes sint necne, et in casu priori omnes transformationes alterius in alteram invenire, pauca tantum hoc loco inserere possumus, quum solutio completa, qualem pro problematibus analogis in formis binariis tradidimus, hic adhuc maioribus difficultatibus sit obnoxia.

286.

Problema. Proposita forma binaria $F = (A, B, C)$ determinantis D ad genus principale pertinente: invenire formam binariam f , e cuius duplicatione illa oriatur.

Sol. I. Quaeratur repraesentatio propria formae ipsi F oppositae $F' = (A, -B, C)$ per formam ternariam $xx - 2yz$, quae sit $x = \alpha T + \beta U$, $y = \alpha' T + \beta' U$, $z = \alpha'' T + \beta'' U$.

Quum enim F per hyp. sit e genere principali, dabitur valor expr. $\sqrt{(A, B, C)}$ (mod D), unde inveniri poterit forma ternaria ϕ determinantis 1, in quam $(A, -B, C)$ tamquam pars ingrediatur. Aequae facile intelligitur, ϕ fore formam indefinitam (quoniam F certo non est forma negativa); unde necessario formae $xx - 2yz$ aequivalens erit.

Tunc igitur erit $A = \alpha\alpha - 2\alpha'\alpha''$, $-B = \alpha\beta - \alpha'\beta'' - \alpha''\beta'$, $C = \beta\beta - 2\beta'\beta''$.

Porro designatis numeris $\alpha\beta' - \alpha'\beta$, $\alpha\beta'' - \alpha''\beta$, $\alpha'\beta'' - \alpha''\beta'$ per a, b, c resp., hi divisorem communem non habebunt eritque $D = bb - ac$.

II. Hinc adiumento observationis ultimae art. 235 facile concluditur, F transire per substitutionem $(2a, -b, c)$ in productum formae $(2a, b, c)$ in se ipsam.

Iam divisor communis maximus numerorum $2a, 2b, 2c$ est 2; si itaque $(2a, b, c)$ forma proprie primitiva erit; in casu priori, ubi a est impar, F orietur ex duplicatione formae $(a, b, -b, 2c)$; in casu posteriori, ubi a est par, F orietur ex duplicatione formae $(2a, b, c)$.

Ex. Proposita sit forma $(5, 2, 31)$, huius determinans $D = -151$. Valor expressionis $\sqrt{(5, 2, 31)}$ huic per praecepta art. 272 aequivalens invenitur forma $(221, 22)$; hinc forma ternaria $\phi = \begin{pmatrix} 1 & -6 & -2 & 0 & -17 & 11 \end{pmatrix}$ det. 1. Quae in $xx - 2yz$ transire debet per substitutionem datam. Hinc adiumento transformationum invenitur $a = 11$, $b = -17$, $c = 20$; quare quum a sit impar, F oritur ex duplicatione formae $(11, 17, 40)$.

287.

Circa problema in art. praec. solutum sequentes adhuc annotationes adiicimus.

I. Si forma F per substitutionem (h, i, k) , (h', i', k') transformatur in productum duarum formarum (h, i, k) , (h', i', k') , habebuntur aequationes, ex concl. 3 art. 235 facile deducendae.

II. Si forma F e duabus formis (h, i, k) , (h', i', k') oritur, orietur etiam e duplicatione formae cuivis alii formae cum f in eadem classe contentae sive classis formae F e duplicatione classis formae f (V. art. 238).

Ex una classe positiva non dabitur, quia etc. Ita in ex. art. praec. forma $(5, 2, 31)$ oritur e classe formae $(11, 17, 40)$ proprie aequivalentis (si plures dentur) per dupl. classis formae F oritur.

III. Quum per solutionem ipsius probl. art. praec. evictum sit, quamvis classem formarum binariarum proprie primitivam (positivam) ad genus principale pertinentem ex cuius classis pr. prim. eiusdem det. duplicatione oriri posse: theorema art. 261, per quod certi eramus, ad minimum semissi omnium characterum pro determinante non-quadrato dato D assignabilium genera proprio primitiva (positiva) respondere non posse, eo iam ampliatur, ut praecise semissi omnium horum characterum talia genera revera respondeant, alterique ideo semissi nulla respondere possint (V. demonstr. illius theor.).

Quare quum in art. 264 omnes illi characteres assignabiles in duas species P , Q aequaliter distributi sint, e quibus posteriores Q formis pr. prim. (positivis) respondere non posse probatum erat, de reliquis autem P incertum maneret, an singulis genera semper revera responderent: nunc hoc dubium penitus est sublatum certique sumus, in toto characterum complexu P nullum adesse, cui genus non respondeat.

Hinc facile quoque deducitur, pro determinante negativo in ordine pr. prim. negativa, in quo omnes P impossibiles solosque Q possibiles esse in art. 264 ostensum est, omnes Q revera possibiles esse.

Haecce theoremata, ni vehementer fallimur, ad pulcherrima in theoria formarum binariarum sunt referenda, eo magis quod licet summa simplicitate gaudeant, tamen tam recondita sint, ut ipsarum demonstrationem rigorosam absque tot aliarum disquisitionum subsidio condere non liceat.

Theoria decompositionis tum numerorum tum formarum binariarum in tria quadrata.

Transimus iam ad aliam applicationem digressionis praecedentis, ad discriptionem tum numerorum tum formarum binariarum in terna quadrata, cui praemittimus sequens

288.

Problema. Designante M numerum positivum, invenire conditiones sub quibus formae binariae primitivae negativae determinantis $-M$ dari possint, quae sint residua quadratica ipsius M sive pro quibus 1 sit numerus characteristicus.

Sol. Designemus per Q complexum omnium characterum particularium, quos praebent relationes numeri M tum ad numerum 2 quando 4 vel 8 ipsum M metitur; tum ad singulos divisores primos (impares) ipsius M , denotantibus p, p', p'' etc. illos divisores; manifesto hi characteres erunt Rp, Rp', Rp'' etc., quando $M \equiv 1 \pmod{4}$; adiuncto caractere 1, 4 quando $M \equiv 3 \pmod{4}$ et 8 ipsum M metitur; etc.

Iam utamur literis P, Q in eadem significatione ut in art. praec. sive ut in 264.

Distinguamus casus sequentes:

I. Quando M per 4 divisibilis est, Q erit character integer, patetque ex art. 233 V, 1 talium tantummodo formarum numerum characteristicum esse posse, quarum character sit Q . Sed manifestum est, Q fore characterem principalis $(1, 0, M)$, adeoque ad P pertinere et proin formae proprie primitivae negativae competere non posse; quare quum formae improprie primitivae pro tali M non dentur, nullae omnino formae prim. neg. in hoc casu dantur, quae sint residua ipsius M .

II. Quando $M \equiv 3 \pmod{4}$, prorsus eadem ratiocinia valent, ea sola exceptione, ut in hoc casu ordo improprie primitivus negativus exstet, in quo characteres P vel possibiles erunt, vel impossibiles, prout $M \equiv 3$ vel $\equiv 7 \pmod{8}$, V. art. 264, III. In casu igitur priori

in hoc ordine genus dabitur, cuius character sit Q , unde erit 1 numerus characteristicus omnium formarum in ipso contentarum; in casu posteriori nullae omnino formae negativae hac proprietate praeditae dari poterunt.

III. Quando $M \equiv 1 \pmod{4}$, Q nondum est character completus, sed insuper accedere debet relatio ad numerum 4, quo fiat character completus, patet autem Q necessario in characterem formae, cuius num. char. sit 1 ingredi debere, et vice versa, formam quamvis, cuius character sit vel $Q; 1, 4$, vel $Q; 3, 4$, habere numerum char. 1.

Iam $Q; 1, 4$ manifesto est character generis principalis qui ad P pertinet adeoque in ordine pr. prim. negative impossibilis est; ex eadem ratione $Q; 3, 4$ ad Q pertinebit, unde ipsi in ordine pr. prim. negativo genus respondebit, (art. 263), cuius formae omnes habebunt num. char. 1.

Ordo improprie primitivus in hoc casu non datur.

IV. Quando $M \equiv 2 \pmod{4}$, ad Q accedere debet relatio ad 8, quo fiat character completus, puta vel 1 et 3, 8, vel 5 et 1, 8, quando $M \equiv 2 \pmod{8}$; vel 3 et 5, 8, vel 5 et 7, 8, quando $M \equiv 6 \pmod{8}$.

Pro casu priori character $Q; 1$ et 3, 8 manifesto pertinet ad P , adeoque $Q; 5$ et 7, 8 ad Q , unde ipsi respondebit genus pr. prim. neg. ; similique ratione pro posteriori unum genus in ordine pr. prim. negative dabitur, cuius formae proprietate praescripta praeditae sint, puta cuius character $Q; 3$ et 5, 8.

Ex his colligitur, formas primitivas negativas det. $-M$, quarum numerus characteristicus sit 1, dari, quando M alicui numerorum 1, 2, 3, 5, 6 secundum modulum 8 congruus sit et quidem in unico semper genere, quod improprium erit, quando $M \equiv 0, 4$ vel 7 (mod 8); tales formas omnino non dari, quando $M \equiv 0, 4$ vel 7 (mod 8).

Ceterum manifestum est, si (a, b, c) sit forma primitiva negativa, cuius num. char. = 1, (a, b, c) esse formam primitivam positivam, cuius num. char. = 1; hinc perspicuum est, in quinque casibus prioribus (quando $M \equiv 1, 2, 3, 5, 6$) dari genus unum primitivum positivum, cuius formae habeant num. char. 1, et quidem pro $M \equiv 3$ improprium, in tribus reliquis vero (quando $M \equiv 0, 4, 7$) tales formas positivas omnino dari non posse.

289.

Circa repraesentationes proprias formarum binariarum per ternariam $f = xx + yy + zz$ e theoria generali in art. 282 tradita colliguntur haec:

I. Forma binaria ϕ per f proprie repraesentari nequit, nisi fuerit forma positiva primitiva, atque $-\det.\phi$ (i. e. det. formae f) ipsius numerus characteristicus. Quare pro determinante positivo, nec non pro negativo per 4 divisibili vel formae $8n + 7$, nullae formae binariae per f proprie repraesentabiles dantur.

II. Si vero $\phi = (p, q, r)$ est forma positiva primitiva determinantis $-M$, adeoque $-\det.\phi = M =$ numerus characteristicus formae ϕ , atque etiam oppositae $(p, -q, r)$: dabuntur repraesentationes propriae formae ϕ per f ad quemlibet valorem datum expr. $\sqrt{(p, -q, r)}$ pertinentes.

Scilicet ϕ forma definita, adeoque ipsi f certo aequivalens (art. 285, I).

III. Multitudo omnium repraesentationum ad eundem valorem expr. $\sqrt{(p, -q, r)}$ pertinentium in omnibus casibus, praeter $M = 1$ et $M = 2$, aequae magna est ac multitudo transformationum formae f in ϕ , adeoque, per art. 285, = 48; inde patet, si una repraesentatio ad valorem datum habeatur, 47 reliquas inde derivari possunt, valores ipsorum x, y, z transformando.

Caroli Friderici Gauss

Werke Band I — Disquisitiones Arithmeticae

Seiten 351–400

DE FORMIS TERNARIIS SECUNDI GRADUS (Continuatio)

De compositione formarum binariarum in tria quadrata.

289. (*Continuatio.*) Omnibus quibus fieri potest modis tum inter se permutando tum signis oppositis afficiendo; quare omnes 48 repraesentationes unicam decompositionem formae φ in tria quadrata producant, si ad quadrata ipsa tantum, neque ad ipsorum ordinem radicumve signa respicitur.

IV. Posita multitudine omnium numerorum primorum imparium diversorum ipsum M metientium $= \mu$, haud difficile ex art. 233 concluditur, multitudinem omnium valorum diversorum expressionis $\sqrt{-(p, -q, r)} \pmod{M}$ fore $= 2^\mu$, e quibus per art. 283 semissem tantum considerare oportet (quando $M > 2$). Quare multitudo omnium repraesentationum propriarum formae φ per f erit $= 48 \cdot 2^{\mu-1} = 3 \cdot 2^{\mu+3}$; multitudo autem discernitionum diversarum in terna quadrata $= 2^{\mu+1}$.

Ex. Sit $\varphi = 19tt + 6tu + 41uu$, adeoque $M = 770$; hic quatuor valores sequentes expr. $\sqrt{-(19, -3, 41)} \pmod{770}$ considerare oportet (art. 283):

$$(39, 237), \quad (171, -27), \quad (269, -83), \quad (291, -127).$$

Ut inveniantur repraesentationes ad valorem $(39, 237)$ pertinentes, primo eruitur forma ternaria $(3, 1, 1) = g$, in quam per praecepta artt. 272, 275 f transire invenitur per substitutionem

$$\begin{pmatrix} 1 & -6 & -3 \\ -2 & -3 & -2 \\ -11 & -3 & 1 \end{pmatrix},$$

umde habetur repraesentatio formae φ per f haec:

$$x = t - 6u, \quad y = -3t - 2u, \quad z = -11t - u;$$

repraesentationes 47 reliquas ad eundem valorem pertinentes, quae ex horum valorum permutatione signorumque conversione oriuntur, brevitatis caussa non adscribimus. Omnes vero 48 repraesentationes eandem discerptionem formae φ in tria quadrata

$$t^2 - 12tu + 36u^2, \quad 9t^2 + 12tu + 4u^2, \quad 121t^2 + 66tu + 9u^2$$

producunt.

Prorsus simili modo valor $(171, -27)$ suppeditat discerptionem in quadrata $(3t + 5u)^2, (3t - 4u)^2$; valor $(269, -83)$ hanc $(t + 6u)^2 + (6t + u)^2 + (7t - 2u)^2$; denique valor $(291, -127)$ hanc $(t + 3u)^2 + (3t + 4u)^2 + (3t - 4u)^2$; singulae hae decompositiones 48 repraesentationibus aequipollent.

Praeter has 192 repraesentationes autem, sive quatuor discerptiones, aliae non dabuntur, quum 770 per nullum quadratum divisibilis sit, adeoque repraesentationes impropriae exstare non possint.

De formis determinantis -1 et -2 .

290. De formis determinantis -1 et -2 , quae quibusdam exceptionibus obnoxiae erant, paucis seorsim agemus. Praemittimus *Observationem generalem*: si φ, φ' sint formae binariae aequivalentes quaecunque, (S) transformatio data illius in hanc, ex combinatione repraesentationis cuiusvis formae φ per aliquam ternariam f cum substitutione (S) prodire repraesentationem formae φ' per f ; porro ex repraesentationibus propriis ipsius φ hoc modo ori repraesentationes proprias formae φ' , e diversis diversas, denique e cunctis cunctas. Haec omnia per calculum facillime comprobantur. Quare una formarum φ, φ' totidem modis per f repraesentari poterit ac altera.

I. Sit primo $\varphi = tt + uu$, atque φ' forma quaecunque alia binaria positiva det. -1 , cui itaque φ aequivalet; transeat φ in φ' per substitutionem

$$t = \alpha t' + \beta u, \quad u = \gamma t' + \delta u'.$$

Forma φ repraesentatur per ternariam $f = xx + yy + zz$ ponendo $x = t, y = u, z = 0$; permutando x, y, z hinc emergunt sex repraesentationes, et e singulis rursus quatuor mutando signa ipsorum t, u , ita ut omnino 24 repraesentationes diversae habeantur, quibus unica discerptio in tria quadrata aequipollet et praeter quas alias dari non posse facile perspicitur. Hinc concluditur, etiam formam φ' unico tantum modo in tria quadrata decomponi posse, puta in $(\alpha t' + \beta u')^2, (\gamma t' + \delta u')^2$ et 0 , quae discerptio 24 repraesentationibus aequivalet.

II. Sit $\varphi = tt + 2uu$, φ' quaecunque alia forma binaria positiva det. -2 , in quam φ transeat per substitutionem $t = \alpha t' + \beta u, u = \gamma t' + \delta u$. Tunc simili modo ut in casu praec. concluditur, φ , et proin etiam φ' , unico tantum modo in tria quadrata discerpi posse, puta φ in $tt + uu + uu$, atque φ' in $(\alpha t' + \beta u)^2 + (\gamma t' + \delta u)^2 + (\gamma t' + \delta u)^2$; talem decompositionem 24 repraesentationibus aequipollere facile perspicitur potest.

Hinc colligitur, formas binarias determinantium -1 et -2 respectu multitudinis repraesentationum per ternariam $xx + yy + zz$ cum aliis formis binariis omnino convenire; quum enim in utroque casu fiat $\mu = 0$, formula in art. praec. IV tradita utique producit 24 repraesentationes. Ratio huius rei est, quod duae exceptiones, quibus tales formae obnoxiae erant, se mutuo compensant.

Theoriam generalem repraesentationum improprium in art. 284 explicatam ad formam $xx + yy + zz$ applicare, brevitatis gratia supersedemus.

Quaestio de inveniendis omnibus repraesentationibus propriis numeri dati per $xx + yy + zz$.

291. Quaestio de inveniendis omnibus repraesentationibus propriis numeri positivi dati M per formam $xx + yy + zz$ primo per art. 281 reducitur ad investigationem repraesentationum propriarum numeri $-M$ per formam $-xx - yy - zz = f$; hae vero per praecepta art. 280 ita eruuntur:

I. Evolvantur omnes classes formarum binariarum determinantis $-M$, quarum formae per $XX + YY + ZZ = F$ (cui formae ternariae adiuncta est f) proprie repraesentari possunt. Quando $M \equiv 0, 4$ vel $7 \pmod{8}$, tales classes per art. 288 non dantur, adeoque M in tria quadrata, quae divisorem communem non habent, discerpi nequit¹. Quando vero $M \equiv 1, 2, 5$ vel 6 , dabitur genus positivum proprie primitivum, et quando $M \equiv 3$, improprie primitivum, quod omnes illas classes complectetur: designemus multitudinem harum classium per k .

II. Eligantur iam ex hisce classibus k formae ad lubitum, e singulis una, quae sint $\varphi, \varphi', \varphi''$ etc.; investigentur omnes omnium repraesentationes propriae per F , quarum itaque multitudo erit $48 \cdot 2^{\mu-1} \cdot k = K$, designante μ multitudinem factorum primorum (imparium) ipsius M ; denique e quavis huiusmodi repraesentatione ut

$$X = mt + nu, \quad Y = m't + n'u, \quad Z = m''t + n''u$$

derivetur repraesentatio ipsius M per $xx + yy + zz$ haec

$$x = mn' - m'n, \quad y = m''n - mn'', \quad z = m'n'' - m''n'.$$

In complexu harum K repraesentationum, quem per Ω designemus, omnes repraesentationes ipsius M necessario contentae erunt.

III. Superest itaque tantummodo, ut inquiramus, num in Ω repraesentationes identicae occurrere possint; et quum ex art. 280, III iam constet, eas repraesentationes in Ω , quae e formis diversis e. g. ex φ et φ' derivatae sint, necessario diversas esse, sola disquisitio restat, an repraesentationes diversae eiusdem formae, e. g. ipsius φ , per F , repraesentationes identicas numeri M per $xx + yy + zz$ producere possint.

Iam statim manifestum est, si inter repraesentationes ipsius φ reperiatur haec

$$X = mt + nu, \quad Y = m't + n'u, \quad Z = m''t + n''u \quad \dots \quad (r)$$

inter easdem fore hanc

$$X = -mt - nu, \quad Y = -m't - n'u, \quad Z = -m''t - n''u \quad \dots \quad (r')$$

atque ex utraque derivari eandem repraesentationem ipsius M , quae designetur per (R) ; examinemus itaque, num eadem (R) ex aliis adhuc repraesentationibus formae φ sequi possit.

Ex art. 280, III facile deducitur, statuendo ibi $\psi = \varphi$, si omnes transformationes propriae formae φ in se ipsam exhibeantur per $t = \alpha t + \beta u$, $u = \gamma t + \delta u$, omnes eas

¹Haec impossibilitas etiam inde manifesta, quod summa trium quadratorum imparium necessario fit $\equiv 3 \pmod{8}$; summa duorum imparium cum uno pari vel $\equiv 2$ vel $\equiv 6$; summa unius imparis cum duobus paribus vel $\equiv 1$ vel $\equiv 5$; denique summa trium parium vel $\equiv 0$ vel $\equiv 4$; sed in casu postremo repraesentatio manifeste est impropria.

repraesentationes formae φ , e quibus R sequatur, expressum iri per

$$\begin{aligned} X &= (\alpha m + \beta n)t + (\beta m + \delta n)u, \\ Y &= (\alpha m' + \beta n')t + (\beta m' + \delta n')u, \\ Z &= (\alpha m'' + \beta n'')t + (\beta m'' + \delta n'')u. \end{aligned}$$

At e theoria transformationum formarum binariarum det. negativi in art. 179 explicata sequitur, in omnibus casibus praeter $M = 1$ et $M = 3$, duas tantummodo transformationes proprias formae φ in se ipsam dari, puta $\alpha, \beta, \gamma, \delta = 1, 0, 0, 1$ et $= -1, 0, 0, -1$ resp. (quum enim φ sit forma primitiva, id quod in art. 179 designabatur per m , erit vel 1 vel 2, et proin, praeter casus exceptos, certo (1) locum ibi habebit). Quare (R) e solis r, r' provenire poterit, adeoque quaevis repraesentatio propria numeri M bis et non pluries in Ω repetietur, et multitudo omnium repraesentationum propriarum diversarum ipsius M erit $\frac{1}{2}K = 3 \cdot 2^{\mu+2} \cdot k$.

Quod attinet ad casus exceptos, multitudo transformationum propriarum formae φ in se ipsam per art. 179 erit 4 pro $M = 1$, et 6 pro $M = 3$; reveraque facile confirmatur, multitudinem repraesentationum propriarum numerorum 1, 3 esse 6, 8 resp.; scilicet uterque numerus unico tantum modo in tria quadrata discerpi potest, 1 in $1 + 0 + 0$, 3 in $1 + 1 + 1$; discerptio ipsius 1 suppeditat sex, discerptio ipsius 3 octo repraesentationes diversas; K vero fit $= 24$ pro $M = 1$ (ubi $\mu = 0, k = 1$) et $= 48$ pro $M = 3$ (ubi $\mu = 1, k = 1$).

Ceterum observamus, si h designet multitudinem classium in genere principali, cui multitudo classium in quovis alio genere proprio primitivo per art. 252 aequalis est, fore $k = h$ pro $M \equiv 1, 2, 5$ vel $6 \pmod{8}$, sed $k = \frac{1}{3}h$ pro $M \equiv 3 \pmod{8}$, unico casu $M = 3$ excepto, ubi $k = h = 1$. Pro numeris itaque formae $8n + 3$ multitudo repraesentationum generaliter est $= 2^{\mu+1}h$, quum in numero 3 duae exceptiones sese compensent.

292. Discerptiones numerorum (ut formarum binariarum supra) in tria quadrata a repraesentationibus per formam $xx + yy + zz$ ita distinguimus, ut in illis ad solam quadratorum magnitudinem, in his vero insuper ad ipsorum ordinem radicunque signa respiciamus, adeoque repraesentationes $x = a, y = b, z = c$, et $x = a', y = b', z = c'$ pro diversis habeamus, nisi simul $a = a', b = b', c = c'$; discerptiones autem in $aa + bb + cc$ et in $a'a' + b'b' + c'c'$ pro una, si nullo ordinis respectu habito haec quadrata illis aequalia sunt.

Hinc patet,

I. Discerptionem numeri M in quadrata $aa + bb + cc$ aequipollere 48 repraesentationibus, si nullum sit $= 0$ omniaque inaequalia; 24 autem, si vel unum $= 0$, reliqua inaequalia, vel nullum $= 0$ atque duo inter se aequalia. Si vero in discerptione numeri dati in tria quadrata duo sint $= 0$, tertiaque sit $= e$, discerptio haec unicae tantum repraesentationi aequivalet, quae tamen e sex emergit, puta ponendo $x = \pm e, y = z = 0$, nec non permutando.

II. Quando omnes discerptiones propriae formae φ indefinite exhibeantur per $(gt + hu)^2 + (g't + h'u)^2 + (g''t + h''u)^2$, omnes discerptiones formae φ' expressum iri per $(gt - hu)^2 + (g't - h'u)^2 + (g''t - h''u)^2$ nec non ex his easdem discerptiones numeri M derivari ut ex illis.

III. Quando itaque multitudinem omnium discerptionum propriarum diversarum numeri M in terna quadrata quaerimus, erit illa $= \frac{1}{48}E$ vel $= \frac{1}{24}E$ vel $= \frac{1}{8}E$ vel $= \frac{1}{6}E$ vel $= \frac{1}{2}E$, prout dimidia pars omnium classium (opposita cum oppositis computata), puta k , contineat formas, e quibus discerptiones nullae, aut ex quibus singulae 48, 24, 8 vel 6 repraesentationes propriae numeri M prodeant.

At e theoria formarum binariarum facile deducitur, e fore vel $= 0$ vel $= 2^{\mu-1}$, prout -1 sit non-residuum vel residuum quadraticum ipsius M , nec non $e' = 0$ vel $= 2^{\mu-1}$, prout

-2 non-residuum vel residuum ipsius M , denotante μ multitudinem factorum primorum (imparium) ipsius M (v. art. 182; expositionem uberiores hic supprimimus). Hinc facile colligitur, fore $E = 2^{\mu-1} \cdot k$, si tum -1 tum -2 sit N.R. ipsius M ; $E = 2^{\mu-1}(k+2)$, si uterque numerus sit residuum; denique $E = 2^{\mu-1}(k+e')$, si alter residuum sit, alter non-residuum.

In casibus exclusis $M = 1$ et $M = 2$, haec formula praeberet $E = \frac{1}{2}$, quum esse debeat $E = 1$; pro $M = 3$ autem recte provenit $E = 1$, exceptionibus se mutuo compensantibus.

Si itaque M est numerus primus, fit $\mu = 1$, adeoque $E = \frac{1}{4}(k+2)$, quando $M \equiv 1 \pmod{8}$; $E = \frac{1}{4}(k+e')$, quando $M \equiv 3$ aut 5 aut $7 \pmod{8}$. Haecce theorematum specialia ab ill. Le Gendre per inductionem detecta et in commentatione egregia iam saepius laudata *Hist. de l'Ac. de Paris 1785*, p. 530 sqq., prolata fuerunt, etsi sub forma aliquantum diversa, cuius rei ratio imprimis in eo est sita, quod aequivalentiam propriam ab impropria non distinxit, et proin classes oppositas commiscuit.

II. Ad inventionem omnium disceptionum numeri M in terna quadrata (sine div. comm.) non opus est, omnes repraesentationes proprias omnium formarum φ , φ' , φ'' eruere. Primo enim facile confirmatur, omnes (48) repraesentationes formae φ ad eundem valorem expr. $\sqrt{-(p, -q, r)}$ pertinentes (statuendo $\varphi = (p, q, r)$) disceptionem eandem numeri M praebere, adeoque sufficere, si una ex illis habeatur, sive quod eodem redit, si tantummodo omnes diversae disceptiones² formae φ in terna quadrata conscriptae sint, et perinde de reliquis φ' , φ'' etc.

Dein si φ est e classe non ancipite, eam formam, quae e classe opposita electa est, omnino praeterire licebit, sive e binis classibus oppositis unicam considerare sufficit. Quum enim prorsus arbitrarium sit, quatenam

disceptiones propriae formae φ indefinite exhibeantur per $(gt + hu)^2 + (g't + h'u)^2 + (g''t + h''u)^2$, omnes disceptiones formae φ' expressum iri per $(gt - hu)^2 + (g't - h'u)^2 + (g''t - h''u)^2$ nec non ex his easdem disceptiones numeri M derivari ut ex illis.

Denique pro eo casu, ubi φ est forma e classe ancipite, attamen neque e classe principali neque formae $(2, 0, \frac{1}{2}M)$ aut $(2, 1, \frac{1}{2}(M+1))$ aequivalens (prout M par aut impar), e valoribus expr. $\sqrt{-(p, -q, r)}$ semissem omittere licet; sed brevitatis causa hocce compendium fusius hic non explicamus.

Ceterum iisdem compendiis etiam uti possumus, quando omnes repraesentationes propriae ipsius M per $xx + yy + zz$ desiderantur, quum hae e disceptionibus facillime evolvantur.

Exempli causa investigabimus omnes disceptiones numeri 770 in terna quadrata, ubi $\mu = 3$, $e = e' = 0$, adeoque $E = \frac{1}{4} \cdot 2k$. Per classificationem formarum binariarum positivarum determinantis -770 , quam quoniam a quovis ad normam art. 231 facile condi potest, brevitatis gratia non adscribimus, invenitur classium positivarum multitudo $= 32$, quae omnes sunt proprie primitivae et inter 8 genera distribuuntur, ita ut sit $k = 4$, et proin $E = 8$.

Genus cuius numerus characteristicus $= 1$, respectu numerorum 5, 7, 11 manifesto characteres particulares $R5$; $N7$; $N11$ habere debet, unde per art. 263 facile concluditur, ipsius characterem respectu numeri 8 esse debere 1 et 3, 8.

Iam in eo genere, cuius character 1 et 3, 8; $R5$; $N7$; $N11$, quatuor classes reperiuntur, pro quarum repraesentantibus eligimus formas $(6, 2, 129)$, $(6, -2, 129)$, $(19, 3, 41)$, $(19, -3, 41)$; classem secundam vero et quartam reiicimus, utpote primae et tertiae oppositas.

²Designabimus has per *disceptiones diversas formae* φ .

Quatuor discriptiones formae $(19, 3, 41)$ iam in art. 289 tradidimus, e quibus sequuntur discriptiones numeri 770 in $9 + 361 + 400$, $16 + 25 + 729$, $81 + 400 + 289$, $576 + 169 + 25$.

Simili ratione inveniuntur quatuor discriptiones formae $6tt + 4tu + 129uu$ in $(t - 8u)^2 + (2t + u)^2 + (t + 8u)^2$ etc.

resp. e valoribus expressionis $\sqrt{-(6, -2, 129)}$ hisce oriundae $(48, 369)$, $(62, -149)$, $(92, -159)$, $(202, 61)$; unde prodeunt discriptiones numeri 770 in $225 + 256 + 289$, $1 + 144 + 625$, $64 + 81 + 625$, $16 + 225 + 529$. Praeter has octo discriptiones aliae non dantur.

Quae ad discriptiones numerorum in terna quadrata divisores communes habentia attinent, tam facile e theoria generali art. 281 sequuntur, ut non opus sit huic rei immorari.

Demonstratio theorematum Fermatianorum, quemvis integrum in tres numeros trigonales vel quatuor quadrata discerni posse.

293. Disquisitiones praecedentes etiam suppeditant demonstrationem theorematis famosi, omnem numerum integrum positivum in tres numeros trigonales discerni posse, quod a Fermatio olim inventum est, sed cuius demonstratio rigorosa hactenus desiderabatur. Manifestum est, quamvis discriptionem numeri M in trigonales $\frac{1}{2}x(x+1) + \frac{1}{2}y(y+1) + \frac{1}{2}z(z+1)$ producere discriptionem numeri $8M + 3$ in terna quadrata imparia $(2x+1)^2 + (2y+1)^2 + (2z+1)^2$ et vice versa. Quivis autem numerus integer positivus $8M + 3$ per theoriam praecedentem in tria quadrata resolubilis est, quae necessario erunt imparia (V. annot. art. 291); resolutionumque multitudo pendet tum a multitudine factorum primorum ipsius $8M + 3$, tum a multitudine classium, in quas formae binariae determinantis $-(8M + 3)$ distribuuntur. Totidem discriptiones numeri M in ternos trigonales dabuntur.

Supponimus autem, $\frac{1}{2}x(x+1)$ pro valore quocunque integro ipsius x tamquam *trigonalem* spectari; quodsi magis placeret cifram excludere, theorema ita immutare oporteret: Quivis integer positivus vel ipse triangularis est, vel in duos vel in tres trigonales resolubilis. Similis mutatio in theoremate sequente facienda esset, si cifram a quadratis excludere placeret.

Ex iisdem principiis demonstratur aliud Fermati theorema, quemvis numerum integrum positivum in quatuor quadrata decomponi posse. Subtrahendo a numero formae $4n + 1$ quadratum par, a numero formae $4n + 3$ quadratum impar, residuum in omnibus his casibus in tria quadrata resolubile erit, adeoque numerus propositus in quatuor. Denique numerus formae $4n$ exhiberi potest per $4N$, ita ut N ad aliquam trium formarum praecedentium pertineat: resolutum autem ipso N in quatuor quadrata, etiam $4N$ resolutus erit.

A numero formae $8n + 3$ etiam subduci potest quadratum radice pariter paris, a numero formae $8n + 1$ quadratum radice impariter paris, a numero formae $8n + 4$ quadratum impar, residuumque in tria quadrata resolubile erit.

Ceterum hocce theorema iam ab ill. La Grange demonstratum erat, *Nouv. Mem. de l'Ac. de Berlin* 1770, p. 123, quam demonstrationem (a nostra prorsus diversam) fusius explicavit ill. Euler in *Actis Ac. Petr.* Vol. II, p. 48.

Alia Fermati theoremata, quae praecedentium quasi continuationem constituunt, quemvis numerum integrum in quinque numeros pentagonales, sex hexagonales, septem heptagonales etc. resolubilem esse, demonstratione hactenus carent, aliaque principia requirere videntur.

Solutio aequationis $axx + byy + czz = 0$.

294. THEOREMA. Designantibus a, b, c numeros inter se primos, quorum nullus neque $= 0$ neque per quadratum divisibilis, aequatio

$$axx + byy + czz = 0 \quad \dots \quad (Q)$$

resolutionem in integris non admittet (praeter hanc $x = y = z = 0$, ad quam non respicimus), nisi $-bc$, $-ac$, $-ab$ resp. sint residua quadratica ipsorum a, b, c , atque hi numeri signis inaequalibus affecti; his vero quatuor conditionibus locum habentibus, (Q) in integris resolubilis erit.

Dem. Si (Q) per integros omnino est solubilis, etiam per tales valores ipsorum x, y, z resolvi poterit, qui divisorem communem non habent; nam valores quicunque, aequ. Q satisfaciunt, etiamnum satisfaciunt, si per divisorem communem maximum dividuntur. Iam supponendo $app + bq + crr = 0$, atque p, q, r a divisore communi liberos, etiam inter se primi erunt; si enim q, r divisorem communem δ implicant, etiam p per δ divisibilis erit, contra hyp. Quum igitur $-bc$ sit determinans formae ternariae $axx + byy + czz = f$, patet, $-bc$ esse debere residuum quadraticum ipsius app adeoque etiam ipsius a erit (art. 154); eodem modo erit $-ac Rb$, $-ab Rc$. Quod vero (Q) resolutionem admittere non possit, si a, b, c idem signum habent, tam obvium est, ut explicatio non egeat.

Demonstrationem propositionis inversae, quae theorematis partem secundam constituit, ita adornabimus, ut primo formam ternariam ipsi $(a, b, c) = f$ aequivalentem invenire doceamus, cuius coefficientes $2\mathfrak{A}$, $3\mathfrak{B}$, $4\mathfrak{C}$ per abc divisibiles sint, unde secundo solutionem aequationis (Q) deducemus.

I. Investigentur tres integri A, B, C a divisore communi liberi, atque ita comparati, ut A primus sit ad b et c ; B ad a et c ; C ad a et b ; $aAA + bBB + cCC$ autem per abc divisibilis, quod efficietur sequenti modo.

Sint $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ resp. valores expressionum $\sqrt{bc} \pmod{a}$, $\sqrt{ac} \pmod{b}$, $\sqrt{-ab} \pmod{c}$, qui necessario ad a, b, c resp. primi erunt. Accipiantur tres integri α, β, γ omnino ad lubitum, modo ita ut ad a, b, c resp. primi sint (e. g. omnes $= 1$), determinenturque A, B, C ita ut sit

$$\begin{aligned} A &\equiv \mathfrak{B}c \pmod{b} & \text{et} & \equiv \mathfrak{C}b \pmod{c}, \\ B &\equiv \mathfrak{C}a \pmod{c} & \text{et} & \equiv \mathfrak{A}c \pmod{a}, \\ C &\equiv \mathfrak{A}b \pmod{a} & \text{et} & \equiv \mathfrak{B}a \pmod{b}. \end{aligned}$$

Tunc fiet $aAA + bBB + cCC \equiv \mathfrak{A}\alpha(b\mathfrak{B}\mathfrak{B} + c\mathfrak{C}\mathfrak{C}) \equiv \mathfrak{A}\alpha(b\mathfrak{B}\mathfrak{B} - \mathfrak{B}\mathfrak{B}b) = 0 \pmod{a}$ sive per a divisibilis, et perinde per b, c , adeoque etiam per abc divisibilis erit.

Praeterea patet, A necessario fieri primum ad b et c ; B ad a et c ; C ad a et b . Si vero hi valores ipsorum A, B, C divisorem communem (maximum) λ implicant, hic manifesto ad a, b, c adeoque ad abc primus erit; quare illos valores per λ dividendo novos obtinebimus a div. comm. liberos, qui omnibus conditionibus satisfaciunt.

II. Inveniri poterunt itaque integri $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ tales, ut sit $\mathfrak{a}A\mathfrak{a} + \mathfrak{b}B\mathfrak{b} + \mathfrak{c}C\mathfrak{c} = 1$; quaerantur insuper sex integri $\alpha', \beta', \gamma', \alpha'', \beta'', \gamma''$ tales, ut sit

$$\beta'\gamma'' - \gamma'\beta'' = \mathfrak{a}A, \quad \gamma'\alpha'' - \alpha'\gamma'' = \mathfrak{b}B, \quad \alpha'\beta'' - \beta'\alpha'' = \mathfrak{c}C.$$

Iam transeat f per substitutionem

$$\begin{pmatrix} \mathfrak{a}A & \alpha' & \alpha'' \\ \mathfrak{b}B & \beta' & \beta'' \\ \mathfrak{c}C & \gamma' & \gamma'' \end{pmatrix}$$

in formam ternariam $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = g$, cuius determinans erit $= abc$; patetque, coefficientes $2\mathfrak{A}$, $3\mathfrak{B}$, $4\mathfrak{C}$ per abc divisibiles esse.

III. Ponamus, concinnitatis caussa, determinantem formarum f , g , i. e. numerum $-abc = d$, $md = M$, $m = M'd$, $n = Nd$, $n' = N'd$, $n'' = N''d$, patetque, f transire per substitutionem

$$\begin{pmatrix} \mathfrak{a}d & \alpha & \alpha' \\ \mathfrak{b}d & \beta & \beta' \\ \mathfrak{c}d & \gamma & \gamma'' \end{pmatrix} [S]$$

in formam ternariam $(\mathfrak{A}d, N'd, N''d) = g'$, determinantis d^2 , quae itaque sub f contenta erit. Iam dico, huic formae g' necessario aequivalere hanc $(\mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}') = g''$.

Patet enim, $(\mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}'') = g'''$ esse formam ternariam determinantia 1; porro quum per hyp. a, b, c eadem signa non habeant, f erit forma indefinita, unde facile concluditur, etiam g' et g''' indefinitas esse debere; quare g''' aequivalebit formae $(1, -1, 1)$ (art. 277), poteritque transformatio (S') illius in hanc inveniri; manifesto autem per (S') forma g' transibit in g'' . Hinc etiam g'' sub f contenta erit, et ex combinatione substitutionum (S) , (S') deducetur transformatio formae f in g'' . Quae si fuerit

$$\begin{pmatrix} \delta & \varepsilon & \zeta \\ \delta' & \varepsilon' & \zeta' \\ \delta'' & \varepsilon'' & \zeta'' \end{pmatrix}$$

manifestum est, duplicem solutionem aequationis (Q) haberi, puta

$$x = \delta', \quad y = \varepsilon', \quad z = \zeta'; \quad \text{et} \quad x = \delta'', \quad y = \varepsilon'', \quad z = \zeta'';$$

simul patet, neutros valores simul $= 0$ evadere posse, quum necessario fiat

$$\delta\varepsilon'\zeta'' + \delta'\varepsilon''\zeta + \delta''\varepsilon\zeta' - \delta\varepsilon''\zeta' - \delta'\varepsilon\zeta'' - \delta''\varepsilon'\zeta = d. \quad Q. E. S.$$

Exemplum. Sit aequatio proposita $7xx - 15yy + 23zz = 0$, quae resolubilis est, quia $345 R 7$, $-161 R 15$, $105 R 23$. Habentur hic valores ipsorum $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ hi 3, 7, 6; faciendoque $\alpha = \beta = \gamma = 1$ invenitur $A = 98$, $B = -39$, $C = -8$. Hinc eruitur substitutio

$$\begin{pmatrix} 7 & 1 & -25 \\ -15 & -2 & 28 \\ 23 & 2 & 28 \end{pmatrix}$$

per quam f transit in $(-1520, 14490, -7245) = g$. Hinc fit $(\mathfrak{A}', \mathfrak{B}', \mathfrak{C}'') = g''$:

$$\begin{pmatrix} 3670800 & 6 & -3 \\ -2440 & -4066 & -813 \\ -433 & -722 & -144 \end{pmatrix}$$

Forma g''' transire invenitur in $(1, -1, 1)$ per substitutionem

$$\begin{pmatrix} 9 & 11 & 121 \\ -1 & 9 & -9 \end{pmatrix} (S')$$

per quam f transit in g'' . Habemus itaque duplicem aequationis propositae solutionem $x = 11$, $y = 9$, $z = 1$, et $x = 12$, $y = -9$, $z = 3$; posterior simplicior redditur dividendo valores per divisorem communem 3, unde $x = 4$, $y = -3$, $z = 1$.

295. Pars posterior theorematis art. praec. etiam sequenti modo absolvi potest. Quae-
ratur integer h talis, ut sit $ahh \equiv -b \pmod{c}$, (characteres $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ eadem significatione
accipimus ut in art. praec.), fiatque $ahh + b = ci$. Tunc facile perspicitur, i fieri integrum,
numerumque $-ab$ esse determinantem formae binariae $(ac, ah, i) = \varphi$.

Haec forma certo non erit positiva (quum enim per hyp. a , b , c eadem signa non
habeant, ab et ac simul positivi esse nequeunt); porro habebit numerum characteristicum
 -1 , quod synthetice ita demonstramus:

Determinentur integri e , e' ita ut sit

$$\begin{aligned} e &\equiv 0 \pmod{a} & \text{et} & \equiv \mathfrak{B} \pmod{b}, \\ ce &\equiv \mathfrak{A} \pmod{a} & \text{et} & \equiv \mathfrak{B}\mathfrak{C} \pmod{b}; \end{aligned}$$

eritque (e, e') valor expr. $\sqrt{-(ac, ah, i)} \pmod{-ab}$. Nam secundum modulum a erit

$$\begin{aligned} ee' &\equiv 0 \equiv -ac, \\ cee' &\equiv \mathfrak{A}\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv -bc \equiv -aci \end{aligned}$$

adeoque $ee' \equiv -i$; secundum modulum b autem erit

$$\begin{aligned} ee' &\equiv \mathfrak{B}\mathfrak{B} \equiv -ac, \\ cee' &\equiv \mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{B}\mathfrak{C} \equiv -ac\mathfrak{C}h \equiv -aci \end{aligned}$$

adeoque $ee' \equiv -i$; eadem vero tres congruentiae, quae secundum utrumque modulum
 a , b locum habent, etiam secundum modulum ab valebunt. Hinc per theoriam formarum
ternariarum facile concluditur, φ repraesentabilem esse per formam $(-1, 0, 1)$, sit itaque

$$actt + 2ahtu + iuu = -(\alpha t + \beta u)^2 + 2(\gamma t + \delta u)(\varepsilon t + \zeta u).$$

eritque, multiplicando per c ,

$$a(ct + hu)^2 + biuu = -c(\alpha t + \beta u)^2 + 2c(\gamma t + \delta u)(\varepsilon t + \zeta u).$$

Hinc patet, si ipsis t , u tales valores determinati tribuantur, ut vel $\gamma t + \delta u$, vel $\varepsilon t + \zeta u$
fiat $= 0$, haberi solutionem aequationis Q , cui igitur satisfiet tum per

$$x = \zeta c - \gamma h, \quad y = \gamma, \quad z = ah - \beta \gamma$$

tum per

$$x = \zeta c - \varepsilon h, \quad y = \varepsilon, \quad z = \alpha \zeta - \beta \varepsilon;$$

simul manifestum est, neque illos valores neque hos simul $= 0$ fieri posse; si enim $\zeta c - \gamma h =$
 0 , $\gamma = 0$, fieret etiam $\zeta = 0$ atque $\varphi = -(\alpha t + \beta u)^2$, unde $ab = 0$, contra hyp., et perinde
de alteris.

In exemplo nostro invenimus formam φ hanc $(161, -63, 24)$, valorem expr. $\sqrt{-\varphi}$
 $\pmod{105} = (7, -51)$, atque repraesentationem formae φ per $(-1, 0, 1)$ hanc, $\varphi = -(7t -$
 $4u)^2 + 2(11t - 4u)(14t - 5u)$; hinc prodeunt solutiones $x = 7$, $y = 11$, $z = -8$; $x = 20$,
 $y = 15$, $z = -5$, sive dividendo per 5 et negligendo signum ipsius z , $x = 4$, $y = 3$, $z = 1$.

Ex his duabus methodis aequationem Q solvendi posterior eo praestat, quod plerum-
que per numeros minores absolvitur; prior vero, quae etiam per varia artificia hic silentio
praetereunda contrahi potest, elegantior videtur ea imprimis ratione, quod numeri a , b ,
 c prorsus eodem modo tractantur, calculusque per horum permutationem quamcunque
nihil mutatur. Hoc secus se habet in methodo secunda, ubi calculus maxime commo-
dus plerumque provenit, si pro a accipitur minimus, pro c maximus trium numerorum
datorum, uti in exemplo nostro fecimus.

De methodo per quam ill. Le Gendre theorema fundamentale tractavit.

296. Elegans theorema in artt. praec. explicatum primo inventum est ab ill. Le Gendre, *Hist. de l'Ac. de Paris* 1785, p. 507, atque demonstratione pulcra (a duabus nostris omnino diversa) munitum. Simul vero hic egregius geometra hoc loco operam dedit, demonstrationem propositionum, quae cum theoremate fundamentali Sect. praec. conveniunt, inde derivare, quam ad hunc scopum non idoneam nobis videri iam supra declaravimus, art. 151. Hic itaque locus erit, hanc demonstrationem (per se valde elegantem) breviter exponendi iudiciiue nostri rationes adiungendi.

Praemittitur sequens *observatio*: Si numeri a, b, c omnes sunt $\equiv 1 \pmod{4}$, aequatio $axx + byy + czz = 0$ solubilis esse nequit. Facillime enim perspicitur, valorem ipsius $axx + byy + czz$ necessario in hoc casu fieri vel $\equiv 1$, vel $\equiv 2$, vel $\equiv 3 \pmod{4}$, nisi omnes x, y, z simul pares accipiantur; si itaque Q solubilis esset, hoc aliter fieri non posset quam per valores pares ipsorum x, y, z . *E. A.*, quoniam valores quicunque aequationi Q satisfaciunt etiamnum satisfaciunt, si per divisorem communem maximum dividuntur, unde necessario ad minimum unus impar prodire debet.

Iam casus diversi theorematism demonstrandi ad sequentia momenta referuntur:

I. Designantibus p, q numeros primos formae $4n + 1$ (positivos inaequales), nequit simul esse $p R q, q R p$. Si enim possibile esset, manifestum est statuendo $1 = a, -p = b, -q = c$, omnes conditiones ad resolubilitatem aequationis $axx + byy + czz = 0$ adimpletas esse (art. 294); eadem vero per observationem praec. resolutionem non admittit; quare suppositio consistere nequit. Hinc protinus sequitur propositio 7 art. 131.

II. Si p est numerus primus formae $4n + 1$, q numerus primus formae $4n + 3$, nequit simul esse $q R p, p N q$. Alioquin enim foret $-p R q$, atque aequatio $xx + pyy - qzz = 0$ resolubilis, quae per obs. praec. resolutionem respuit. Hinc derivantur casus 4 et 5 art. 131.

III. Si p, q sunt numeri primi formae $4n + 1$, nequit simul esse $p R q, q N p$. Accipiat alius numerus primus r formae $4n + 3$, qui sit residuum ipsius q et cuius non-residuum sit p . Tunc erit per casus modo (II) demonstratos $q R r, r N p$. Si itaque esset $p R q, q N p$, foret $qr R p, pr R q, pq N r$ et proin $-pq R r$. Hinc aequatio $pxx + qyy - rzz = 0$ resolubilis esset contra obs. praec.; quare suppositio consistere nequit. Hinc sequuntur casus 1 et 2 art. 131.

Concinnius hic casus sequenti modo tractatur. Designet r numerum primum formae $4n + 3$, cuius non-residuum sit p . Tunc erit etiam $r N p$, adeoque (supponendo $p R q, q N p$) $qr R p$, porro $-p R q, -p R r$ et proin etiam $-p R qr$, quare aequatio $xx + pyy - qrzz = 0$ resolubilis esset contra obs. praec. Hinc etc.

IV. Si p est numerus primus formae $4n + 1$, q primus formae $4n + 3$, nequit simul esse $p R q, q N p$. Accipiat alius numerus primus auxiliaris r formae $4n + 1$, qui sit non-residuum utriusque p, q . Tunc erit (per II) $q N r$ et (per III) $p N r$; hinc $pq R r$; si itaque esset $p R q, q N p$, haberetur etiam $pr N q, -pr R q, qr R p$; quare aequatio $pxx - qyy + rzz = 0$ resolubilis esset. *Q. E. A.* Hinc derivantur casus 3 et 6 art. 131.

V. Designantibus p, q numeros primos formae $4n + 3$, nequit simul esse $p N q, q N p$. Supponendo enim fieri posse, et accipiendo numerum primum auxiliarem r formae $4n + 1$, qui sit non-residuum utriusque p, q , erit $qr R p, pr R q$; porro (per II) $p N r, q N r$, unde $pq R r$ et $-pq R r$; hinc aequatio $-pxx - qyy + rzz = 0$ possibilis, contra obs. praec. Hinc deducitur casus 8 art. 131.

297. Demonstrationem praec. propius contemplando quisque facile intelliget, casus

I et II ita absolutos esse, ut nihil obiici possit. At demonstrationes casuum reliquorum innituntur existentiae numerorum auxiliarium, qua nondum demonstrata methodus manifesto omnem vim perdit. Quae suppositiones, etsi tam speciosae sint, ut minus attendenti demonstratione ne opus quidem esse videri possit, atque certe theorema demonstrandum ad maximum probabilitatis gradum evehant, tamen si rigor geometricus desideretur, nequam gratuito sunt admittendae.

Quod quidem attinet ad suppositionem in IV et V, exstare numerum primum r formae $4n + 1$, qui duorum aliorum primorum datorum p, q non-residuum sit, e Sect. IV facile concluditur, omnes numeros ipso $4pq$ minores ad ipsumque primos (quorum multitudo est $2(p-1)(q-1)$) in quatuor classes aequaliter distribui, quarum una contineat non-residua utriusque p, q , tres reliquae residua ipsius p non-residua ipsius q , non-residua ipsius p residua ipsius q , residua utriusque p, q ; et in singulis classibus semissem fore numeros formae $4n + 1$, semissem formae $4n + 3$. Habebuntur itaque inter illos $\frac{1}{4}(p-1)(q-1)$ non-residua utriusque p, q formae $4n + 1$, qui sint g, g', g'' etc.; numeri $\frac{1}{4}(p-1)(q-1)$ reliqui sint h, h', h'' etc.

Manifesto omnes numeri in formis $4pqt + g, 4pqt + g', 4pqt + g''$ etc. (G) contenti quoque erunt non-residua ipsorum p, q formae $4n + 1$. Iam patet, ad suppositionem stabiliendam demonstrari tantummodo debere, sub formis (G) certo contineri numeros primos, quod sane iam per se valde plausibile videtur, quum hae formae una cum his $4pqt + h, 4pqt + h'$ etc. (H) omnes numeros ad $4pq$ primos adeoque etiam omnes numeros absolute primos (praeter 2, p, q) comprehendant, nullaue ratio adsit, quin numerorum primorum series inter illas formas aequaliter distributi sint, ita ut pars octava referantur ad (G), reliqui ad (H). Attamen perspicuum est, tale ratiocinium a rigore geometrico longe abesse.

Ill. Le Gendre ipse fatetur, demonstrationem theorematis, sub tali forma $kt + l$, designantibus k, l numeros inter se primos datos, t indefinitum, certo contineri numeros primos, satis difficilem videri, methodumque obiter addigitat, quae forsitan illuc conducere possit; multae vero disquisitiones praeliminares necessariae nobis videntur, antequam hacce quidem via ad demonstrationem rigorosam pervenire liceat.

Circa aliam vero suppositionem (III. meth. secunda) dari numerum primum r formae $4n + 3$, cuius non-residuum sit alius numerus primus datus p formae $4n + 1$, ill. Le Gendre nihil omnino adiecit. Supra demonstravimus (art. 129), numeros primos quorum N.R. sit p certo dari, sed methodus nostra haud idonea videtur ad existentiam talium numerorum primorum qui simul sint formae $4n + 3$ ostendendam (ut hic requiritur neque vero in dem. nostra prima).

Ceterum veritatem quidem huius suppositionis ita facile probare possumus. Per art. 287 dabitur genus positivum formarum binariarum det. $-p$, cuius character 3, 4; Np ; sit (a, b, c) talis forma atque a impar (quod supponere licet). Tum a erit formae $4n + 3$ atque vel ipse primus vel saltem factorem primum r formae $4n + 3$ implicabit. Erit autem $-pRa$, adeoque etiam $-pRr$, unde pNr . At probe notandum est, propp. artt. 263, 287 theoremati fundamentali inniti, adeoque circulum vitiosum fore, si qua huius pars illis superstruatur.

Denique suppositio in methodo prima III adhuc multo magis gratuita est, ita ut non opus sit plura de illa hic adicere.

Liceat observationem addere circa casum V, qui per methodum praec. quidem non satis probatur, attamen per sequentem commode absolvitur. Si illic simul esset pNq, qNp , foret $-pRq, -qRp$, unde facile derivatur, -1 esse numerum characteristicum formae $(p, 0, q)$, quae proin (secundum theoriam formarum ternariarum) per formam $xx + yy + zz$

repraesentari poterit. Sit

$$ptt + quu = (\alpha t + \beta u)^2 + (\alpha' t + \beta' u)^2 + (\alpha'' t + \beta'' u)^2$$

sive

$$\alpha\alpha + \alpha'\alpha' + \alpha''\alpha'' = p, \quad \beta\beta + \beta'\beta' + \beta''\beta'' = q, \quad \alpha\beta + \alpha'\beta' + \alpha''\beta'' = 0.$$

298. PROBLEMA. Designantibus a, b, c numeros quoscunque, quorum tamen nullus $= 0$: invenire conditiones resolubilitatis aequationis

$$axx + byy + czz = 0 \quad \dots \quad (\omega)$$

Sol. Sint $\alpha\alpha, \beta\beta, \gamma\gamma$ quadrata maxima ipsos bc, ac, ab resp. metientia, fiatque $\alpha a = \beta\gamma A, \beta b = \alpha\gamma B, \gamma c = \alpha\beta C$. Tum A, B, C erunt integri, inter se primi; aequatio (ω) autem resolubilis erit vel non erit, prout haec

$$AXX + BYY + CZZ = 0 \quad \dots \quad (Q)$$

resolutionem admittit vel non admittit, quod per art. 294 diiudicari poterit.

Dem. Ponatur $bc = \mathfrak{A}\alpha\alpha, ac = \mathfrak{B}\beta\beta, ab = \mathfrak{C}\gamma\gamma$, eruntque $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ integri a factoribus quadratis liberi atque $\mathfrak{A} = BC, \mathfrak{B} = AC, \mathfrak{C} = AB$; hinc $\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C} = (ABC)^2$, adeoque $ABC = \mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{B}\mathfrak{C} = \mathfrak{C}\mathfrak{A}$ necessario integer.

Sit numerorum $\mathfrak{A}, A\mathfrak{B}$ divisor comm. max. m , atque $\mathfrak{A} = gm, A\mathfrak{B} = hm$, eritque g primus ad A , nec non (quia $\mathfrak{A}$ liber a fact. qu.) ad m . Iam fit $hgm = gAA\mathfrak{B} = g\mathfrak{A}\mathfrak{B}\mathfrak{C} = g\mathfrak{B}\mathfrak{C}m$, unde g metietur ipsum hgm , quod manifesto impossibile est, nisi $\frac{h}{g} = \pm 1$. Hinc $\mathfrak{A} = \pm m, A = \pm A$, et proin integer, et perinde B, C integri erunt. *Q. E. P.*

Quum $\mathfrak{A} = BC$ factores quadratos non implicet, necessario B, C inter se primi esse debebunt; et similiter A ad C et ad B primus erit. *Q. E. S.*

Denique patet, si aequationi (Q) satisfiat $X = P, Y = Q, Z = R$, aequationem (ω) resolvi per $x = \alpha P, y = \beta Q, z = \gamma R$, et vice versa si huic satisfiat per $x = p, y = q, z = r$, illi satisfieri per $X = \beta\gamma p, Y = \alpha\gamma q, Z = \alpha\beta r$, unde vel utraque resolubilis vel neutra. *Q. E. T.*

Repraesentatio cifrae per formas ternarias quascunque.

299. PROBLEMA. Proposita forma ternaria

$$f = axx + a'x'x' + a''x''x'' + 2bx'x'' + 2b'xx' + 2b''xx''$$

invenire, an cifra per eam repraesentari possit (per valores indeterminatarum qui non simul $= 0$).

Sol.

I. Quando $a = 0$, valores ipsorum x', x'' ad libitum assumi possunt, patetque ex aequatione $axx + 2b'xx' + 2b''xx'' = -(2bx'x'' + a'x'x' + a''x''x'')$, inde valorem determinatum rationalem nancisci; quoties pro x hoc modo fractio provenit, oportet tantummodo, valores ipsorum x, x', x'' per fractionis denominatorem multiplicare, habebunturque integri. Unice excludendi sunt tales valores ipsorum x', x'' , qui reddunt $b'x'' + b''x' = 0$, nisi simul faciant $a'x'x' + 2bx'x'' + a''x''x'' = 0$, in quo casu x ad libitum accipi poterit.

Simul patet, hoc modo omnes solutiones possibiles obtineri posse. Ceterum is casus, ubi b' et $b'' = 0$, huc non pertinet; tunc enim x in f non ingreditur, sive f est forma binaria, cifraeque repraesentabilitas per f e theoria talium formarum diiudicari debet.

II. Quando vero non est $a = 0$, aequationi $f = 0$ aequivalebit haec

$$(ax + b''x' + b'x'')^2 - A''x'x' + 2Bx'x'' - A'x''x'' = 0$$

ponendo $b''b'' - aa' = A''$, $ab - b'b'' = B$, $b'b' - aa'' = A'$.

Iam quando hic $A'' = 0$, neque vero $B = 0$, manifestum est, si $ax + b''x' + b'x''$ atque x'' ad lubitum assumantur, x et x' inde rationaliter determinari, et quando integri non fiant, saltem multiplicatorem idoneum integres producturum. Pro unico valore ipsius x'' puta pro $x'' = 0$ valor ipsius $ax + b''x' + b'x''$ non est arbitrarius sed quoque $= 0$ poni debet; tunc vero x' ad lubitum assumi poterit valoremque rationalem ipsius x producet.

Quando vero simul A'' et $B = 0$, patet, si A' sit quadratum $= kk$, aequationem $f = 0$ reduci ad has duas lineares (e quibus vel una vel altera locum habere debet)

$$ax + b''x' + (b' + k)x'' = 0, \quad ax + b''x' + (b' - k)x'' = 0;$$

si vero (in eadem hyp.) A' est non-quadratus, manifeste solutio aequ. propositae pendet ab his (quae simul locum habere debent) $x'' = 0$ et $ax + b''x' = 0$.

Ceterum vix necessarium erit observare, methodum in I etiam applicari posse, quando a' vel $a'' = 0$, methodumque in II, quando $A'' = 0$.

III. Quando vero nec a nec $A'' = 0$, aequationi $f = 0$ aequivalet haec

$$A''(ax + b''x' + b'x'')^2 - (A''x' - Bx'')^2 + Dax''x'' = 0$$

designando per D determinantem formae f sive per Da numerum $BB - A'A''$.

Quando $D = 0$, solutio simili modo se habebit ut in fine casus praec.; scilicet si A' est quadratum $= kk$, aequ. prop. reducitur ad has $kax + (kb'' - A')x' + (kb' + B)x'' = 0$, $kax + (kb'' + A')x' + (kb' - B)x'' = 0$; si vero A' est non-quadratus, fieri debet $ax + b''x' + b'x'' = 0$, $A''x' - Bx'' = 0$.

Quando autem $D \neq 0$, reducti sumus ad aequationem $Att - uu + Davv = 0$, cuius possibilitas per art. praec. diiudicari potest. Quodsi haec aliter resolvi nequit, quam per $t = 0$, $u = 0$, $v = 0$, manifesto etiam proposita aliam solutionem non admittet, quam hanc $x = 0$, $x' = 0$, $x'' = 0$; si vero illa aliter solubilis est, e valoribus integris quibusvis ipsorum t , u , v derivabuntur per aequationes $ax + b''x' + b'x'' = t$, $A''x' - Bx'' = u$, $x'' = v$ saltem valores rationales ipsorum x , x' , x'' , e quibus, si fractiones involvunt, per idoneum multiplicatorem integri elici poterunt.

Quamprimum autem una solutio aequationis $f = 0$ in integris inventa est, problema ad casum I reduci, et perinde ac illic solutiones omnes exhiberi poterunt sequenti modo. Satisfaciant aequationi $f = 0$ valores ipsorum x , x' , x'' hi a , a' , a'' , quos a factoribus communibus liberos supponimus, accipiantur (per artt. 40, 279) integri δ , δ' , δ'' , γ , γ' , γ'' tales, ut sit $a\delta + a'\delta' + a''\delta'' = 0$, atque transeat f per substitutionem

$$x = a\gamma + \delta p + \gamma q, \quad x' = a'\gamma' + \delta'p + \gamma'q, \quad x'' = a''\gamma'' + \delta''p + \gamma''q \quad [S]$$

in $g = cpp + c'p'p' + c''q'' + 2dp'q'' + 2d'pq' + 2d''pq$.

Tunc manifesto erit $c = 0$, atque g ipsi f aequivalens, unde facile concluditur, ex omnibus solutionibus aequationis $g = 0$ derivari (per S) omnes solutiones aequationis $f = 0$ in integris.

Iam ex I sequitur, omnes solutiones aequ. $g = 0$ contineri sub formulis $p = -z(c''pp - 4pq + c'qq)$, $p' = 2z(d''pp + dpq)$, $q = 2z(d''pq + d'qq)$, designantibus p, q integros indefinitos, z numerum indefinitum, pro quo etiam fractiones accipi possunt, modo ita ut p, p', q integri maneant. His valoribus ipsorum p, p', q in (S) substitutis, omnes solutiones aequ. $f = 0$ in integris habebuntur.

Ita e. g. si $f = xx + x'x' + x''x'' - 4x'x'' + 2xx' + 2xx''$ atque una solutio aequationis $f = 0$ habetur $x = 1, x' = -2, x'' = 1$: faciendo $\delta, \delta', \delta'', \gamma, \gamma', \gamma'' = 0, 1, 0, 0, 0, 1$ prodit $g = yy' + yy'' + y'y'' - 4y'y''$. Hinc omnes solutiones aequ. $g = 0$ in integris contentae erunt sub formula $y = -z(pp - 4pq + qq)$, $y' = 2zpq$, $y'' = 2zqq$ et proin omnes solutiones aequ. $f = 0$ sub hac $x = -z(pp - 4pq + qq)$, $x' = 2z(pp + 2pq + qq)$, $x'' = -z(pp - 4pq - 11qq)$.

Solutio generalis aequationum indeterminatarum secundi gradus duas incognitas implicantium per quantitates rationales.

300. E problemate art. praec. sponte defluit solutio aequationis indeterminatae

$$axx + 2hxy + cyy + 2dx + 2ey + f = 0,$$

si valores tantummodo rationales desiderantur, quam, si integri postulantur, supra (art. 216 sqq.) iam absolvimus. Nam omnes valores rationales ipsorum x, y exhiberi possunt per $\frac{t}{v}, \frac{u}{v}$, ita ut t, u, v sint integri, unde patet, solutionem illius aequationis per numeros rationales identicam esse cum solutione aequationis $att + 2htu + cuu + 2dtv + 2euv + fvv = 0$ per numeros integros; haec vero convenit cum aequ. in art. praec. tractata. Excludi debent eae solae solutiones, ubi $v = 0$; tales autem provenire nequeunt, quando $hh - ac$ est numerus non-quadratus.

Ita e. g. omnes solutiones aequationis (in art. 221 per integros generaliter solutae) $xx + 2xy + yy + 7x - 5y + 1 = 0$ per numeros rationales contentae erunt sub formula

$$x = \frac{pp - 4pq - 11qq}{pp - 4pq + qq}, \quad y = \frac{2(pp + 2pq + qq)}{pp - 4pq + qq},$$

designantibus p, q integros quoscunque.

Ceterum de his duobus problematibus arctissimo nexu coniunctis breviter tantummodo hic egimus, multasque observationes huc pertinentes suppressimus, tum ne nimis prolixi fieremus, tum quod solutionem aliam probl. art. praec. habemus, principiis generalibus innixam, cuius expositionem, quia penitiorum formarum ternariarum disquisitionem postulat, ad aliam occasionem nobis reservare debemus.

De multitudine mediocri generum.

301. Revertimur ad formas binarias, de quibus adhuc plures proprietates singulares recensere oportet. Et primo quasdam observationes circa multitudinem generum et classium in ordine proprio primitivo (positivo pro det. neg.) adiiciemus, ad quem brevitatis causa disquisitionem restringimus.

Multitudo generum, in quae omnes formae (pr. prim. pos.) determinantis dati positivi vel negativi $\pm D$ distribuuntur, semper est 1, 2, 4 vel altior potestas numeri 2, cuius exponens pendet a factoribus ipsius D , et per disquisitiones praec. omnino a priori inveniri potest. Iam quum in serie numerorum naturali numeri primi cum magis minusque compositis permixti sint, evenit, ut pro pluribus determinantibus successivis $\pm D$, $\pm(D+1)$, $\pm(D+2)$ etc. multitudo generum nunc crescat nunc decrescat, nullusque in hac serie perturbata ordo adesse videatur. Nihilominus si multitudines generum multis dett. successivis $\pm D$, $\pm(D+1)$... $\pm(D+m)$ respondentes adduntur, summaque per determinantium multitudinem dividitur, multitudo generum mediocris provenit, quae circa medium determinantium $\pm(D + \frac{1}{2}m)$ locum habere censi potest, progressionemque valde regularem constituit.

Supponimus autem, non modo m esse satis magnum, sed etiam D multo maiorem, ut ratio determinantium extremorum D , $D+m$ non nimis a ratione aequalitatis discrepet. Regularitas illius progressionis ita intelligenda est: si D' est numerus multo maior quam D , multitudo generum mediocris circa determinantem $\pm D'$ sensibilibiter maior erit quam circa D ; si vero D , D' non nimis differunt, etiam generum multitudines mediocres circa D et D' fere aequales erunt. Ceterum multitudo mediocris generum circa determinantem positivum $+D$ semper fere aequalis invenitur multitudini mediocri circa negativum $-D$, eoque exactius quo maior est D , quum pro valore parvo prior paullulum maior evadat quam posterior.

Hae observationes magis illustrabuntur per exempla sequentia, e tabula classificationis formarum binariarum plures quam 4000 determinantes complectente excerpta. Inter centum determinantes a 801 usque ad 900 reperiuntur 7 quibus unicum genus respondet; 32, 52, 8, 1 quibus resp. 2, 4, 8, 16 genera respondent; hinc omnino emergunt genera 359, unde multitudo mediocris = 3,59. Centum determinantes negativi a -801 usque ad -900 producant genera 360.

Exempla sequentia omnia desumuntur a determinantibus negativis. In centade 16 (a -1501 usque ad -1600) mult. med. generum invenitur 3,89; in centade 25 est 4,03; in centade 51 prodit 4,24; e sexcentis dett. -9401 ... -10000 computatur 4,59. Ex his exemplis patet, multitudinem generum mediore multo lentius crescere quam determinantes; revera per disquisitionem theoreticam invenimus, multitudinem mediocrem generum circa determinantem $-D$ proxime exprimi per formulam

$$\alpha \log D + \beta$$

umbi α , β sunt quantitates constantes, et quidem

$$\alpha = \frac{2}{\pi\pi} = 0,4052847346$$

(designante π semiperipheriam circuli cuius radius = 1),

$$\beta = 2\alpha\mathfrak{C} + 3\alpha \log 2 - \frac{1}{2}\alpha \log 2 = 0,8830460462$$

umbi $\mathfrak{C}$ est summa seriei $1 - \log(1+1) + \frac{1}{2} - \log(1+\frac{1}{2}) + \frac{1}{3} - \log(1+\frac{1}{3}) + \text{etc.} = 0,5772156649$ (V. Euler *Inst. Calc. Diff.* p. 444); h vero summa seriei $\frac{1}{2} \log 2 + \frac{1}{3} \log 3 + \frac{1}{5} \log 5 + \frac{1}{7} \log 7 + \text{etc.}$ quae per approximationem inventa est = 0,9375482543.

Ex hac formula patet, multitudinem mediocrem generum crescere in progressionem arithmetica, si determinantes augeantur in geometrica. Valores huius formulae pro $D = 850\frac{1}{2}$, $1550\frac{1}{2}$, $2450\frac{1}{2}$, $5050\frac{1}{2}$, $9700\frac{1}{2}$ inveniuntur 3,617; 3,86; 4,046; 4,339; 4,604, qui a multitudinibus mediocribus supra datis parum discrepant. Quo maior fuerit determinans medius, et e quo pluribus multitudo mediocris computetur, eo minus a valore formulae differt.

Adiumento huius formulae etiam aggregatum multitudinum generum determinantibus successivis $\pm D$, $\pm(D+1)$ etc. $\pm(D+m)$ respondentium quam proxime erui potest, si multitudines mediocres singulis respondentibus computantur et in summam colliguntur, quantumvis diversi sint extremi D , $D+m$. Haec summa erit $= \alpha(\log D + \log(D+1) + \text{etc.} + \log(D+m)) + \beta(m+1)$ sive satis exacte $= \alpha((D+m)\log(D+m) - (D-1)\log(D-1)) + (\beta - \alpha)(m+1)$.

Hoc modo summa mult. gen. pro dett. -1 usque ad -100 invenitur $= 234,4$, quum revera sit 233 ; similiter, a -1 usque ad -2000 , $= 7116,6$, quum sit 7112 ; a -9001 usque ad -10000 ubi est 4595 formula praebet $4594,9$, qualis consensus vix exspectari potuisset.

De multitudine mediocri classium.

302. Respectu multitudinis classium (pr. primit. posit., quod semper subintelligendum) determinantes positivi prorsus aliter se habent quam negativi; quamobrem utrosque seorsim considerabimus. In eo hi cum illis conveniunt, quod pro determinante dato in singulis generibus classes aequae multae continentur, adeoque multitudo omnium classium aequalis est producto e multitudine generum in multitudinem classium in singulis generibus contentarum.

Quod primo attinet ad determinantes negativos, multitudo classium pluribus dett. successivis $-D$, $-(D+1)$, $-(D+2)$ etc. respondentium progressionem aequae perturbatam constituit, ac multitudo generum. Multitudo classium mediocris autem (cui definitione opus non erit) valde regulariter crescit, ut ex exemplis sequentibus apparebit.

Centum determinantes a -500 usque ad -600 suppeditant classes 1729 , unde multitudo mediocris $= 17,29$. Similiter in centade 15 multitudo classium mediocris invenitur $28,26$; e centadibus duabus 24 et 25 computatur $36,28$; e tribus 61 , 62 et 63 prodit $58,50$; e quinque $91 \dots 95$ fit $71,56$; denique e quinque $96 \dots 100$ fit $73,54$.

Haec exempla ostendunt, classium multitudinem mediocrem lentius quidem crescere, quam determinantes, multo tamen citius, quam multitudinem mediocrem generum; levi autem attentione cognoscetur, illam satis exacte crescere in ratione radicum quadratarum e determinantibus mediis. Revera per disquisitionem theoreticam invenimus, classium multitudinem mediocrem circa determinantem $-D$ proxime exprimi per

$$\gamma\sqrt{D} - \delta$$

umbi $\gamma = 0,7467183115 = \frac{2\pi}{\pi\pi}$, denotante e summam seriei $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \text{etc.}$; $\delta = 0,2026423673 = \frac{\alpha}{2}$.

Valores mediocres secundum hanc formulam computati ab iis, quos supra e tabula classificationum exscripsimus, parum differunt. Adiumento huius formulae etiam aggregatum multitudinum omnium classium (pr. pr. pos.) determinantibus successivis $-D$, $-(D+1)$, $-(D+2) \dots -(D+m-1)$ respondentium quam proxime assignari potest, quantumvis extremi sint diversi, summando multitudines mediocres illis determinantibus secundum formulam respondentes, unde erit $= \gamma(\sqrt{D} + \sqrt{D+1} + \text{etc.} + \sqrt{D+m-1}) - \delta m$ sive quam proxime $= \frac{2}{3}\gamma((D+m-\frac{1}{2})^{\frac{3}{2}} - (D-\frac{1}{2})^{\frac{3}{2}}) - \delta m$.

Ita e. g. illud aggregatum pro centum dett. $-1 \dots -100$ ex formula computatur $= 481,1$, quum revera sit 477 ; mille determinantes $-1 \dots -1000$ secundum tabulam suppeditant 15533 classes, formula dat $15551,4$; millias secunda sistit classes 28595 secundum tabulam, formula praebet $28585,7$; similiter millias tertia revera suggerit 37092 classes, formula dat $37074,3$; millias decima dat 72549 per tabulam, formula 72572 .

303. Tabula determinantium negativorum secundum diversitatem classificationum ipsis respondentium digesta multas alias observationes singulares offert. Pro determinantibus formae $-(8n + 3)$ multitudo classium (tum earum quae in omnibus, tum earum quae in singulis generibus pr. primitivis contentae sunt) semper divisibilis est per 3, unico determinante -3 excepto, cuius rei ratio ex art. 256, VI sponte sequitur.

Pro iis determinantibus, quorum formae unicum genus conficiunt, multitudo classium semper impar est; quum enim pro tali determinante unica tantum classis anceps detur, puta principalis, multitudo classium reliquarum, e quibus binae semper oppositae erunt, necessario erit par, adeoque multitudo omnium impar; ceterum haec posterior proprietas etiam pro determinantibus positivis valet.

Porro series determinantium, quibus eadem classificatio data (i. e. multitudo data tum generum tum classium) respondet, semper abrumpi videtur, quam observationem satis miram per aliquot exempla illustrabimus. (Numerus primus, romanus, indicat multitudinem generum pr. prim. pos.; sequens multitudinem classium in singulis generibus contentarum; tunc sequitur series determinantium, quibus illa classificatio respondet.)

I. 1 ... 1, 2, 3, 4, 7

I. 3 ... 11, 19, 23, 27, 31, 43, 67, 163

I. 5 ... 47, 79, 103, 127

I. 7 ... 71, 151, 223, 343, 463, 487

II. 1 ... 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 25, 28, 37, 58

II. 2 ... 14, 17, 20, 32, 34, 36, 39, 46, 49, 52, 55, 63, 64, 73, 82, 97, 100, 142, 148, 193

IV. 1 ... 21, 24, 30, 33, 40, 42, 45, 48, 57, 60, 70, 72, 78, 85, 88, 93, 102, 112, 130, 133, 177, 190, 232

VIII. 1 ... 105, 120, 165, 168, 210, 240, 273, 280, 312, 330, 345, 357, 385, 408, 462, 520, 760

XVI. 1 ... 840, 1320, 1365, 1848

Similiter 20 determinantes reperiuntur (maximus = -1423), quibus classificatio I. 9 respondet; 4 (maximus = -1303), quibus respondet classificatio I. 11 etc.; classificationes II. 3; II. 4; II. 5; IV. 2 respondent determinantibus non pluribus quam 48, 31, 44, 69 resp., e quibus maximi -652 , -862 , -1318 , -1012 .

Quum tabula, ex qua haec exempla sumsimus, longe ultra maximos determinantes hic occurrentes producta sit³, nec ulli amplius prodierint ad illas classificationes pertinentes: nullum dubium esse videtur, quin series adscriptae revera abruptae sint, et per analogiam conclusionem eandem ad quasvis alias classificationes extendere licebit. E. g. quum in tota milliade decima determinantium nullus se obtulerit, cui multitudo classium infra 24 respondeat: maxime est verisimile, classificationes I. 23; I. 21 etc.; II. 11; II. 10 etc.; IV. 5; IV. 4; IV. 3; VIII. 2 iam ante -9000 desiisse, aut saltem perpauca determinantibus ultra -10000 competere. Demonstrationes autem rigorosae harum observationum perdifficiles esse videntur.

Non minus admiratione dignum est, quod omnes determinantes, quorum formae in 32 aut plura genera distribuantur, ad minimum binas classes in singulis generibus habeant, adeoque classificationes XXXII. 1, LXIV. 1 etc. omnino excident (minimo ex huiusmodi dett., -9240 , respondet XXXII. 2); satisque probabile videtur, multitudine generum crescente continuo plures classificationes excidere.

304. Multitudo classium pr. primitivarum, quas formae binariae det. positivi quadrati kk constituunt, omnino a priori assignari potest, multitudinique numerorum ad $2k$

³Nimirum ultra -10000 .

primorum ipsoque minorum aequalis est; unde per ratiocinia non difficilia sed hic supprimenda deducitur, multitudinem mediocrem classium ad tales determinantes circa kk pertinentium proxime exprimi per $\frac{8k}{\pi\pi}$.

Determinantes positivi non-quadrati autem hoc respectu phaenomena prorsus singularia offerunt. Scilicet quum classium multitudo parva, e. g. classificatio I. 1 aut I. 3 aut II. 1 etc. pro determinantibus negativis et quadratis parvis tantum et mox omnino cessantium locum habeat: contra e determinantibus positivis non-quadratis, saltem non permagnis, pars longe maxima tales classificationes praebeant, ubi unica classis in quovis genere continetur, ita ut hae I. 3; I. 5; II. 2; II. 3; IV. 2 etc. sint rarissimae.

Ita e. g. inter 90 dett. non-qu. infra 100 reperiuntur 11, 48, 27, quibus respondent classificationes I. 1, II. 1, IV. 1 resp.; unicus tantum (37) habet I. 3; duo (34 et 82) habent II. 2; unus (79) II. 3. Attamen, determinantibus crescentibus, classium multitudines maiores sensim frequentiores fiunt; ita inter 96 dett. non-qu. a 101 usque ad 200 duo (101, 197) habent I. 3; quatuor (145, 146, 178, 194) II. 2; tres (141, 148, 189) II. 3.

Ex 197 dett. a 801 usque ad 1000 tres habent I. 3; quatuor II. 2; tres II. 3. Multitudo classium mediocris in ratione parum maiori increscit, quam multitudo generum, longeque lentius quam radices quadratae e determinantibus; inter 800 et 1000 illa invenitur = 5,01.

Liceat his observationibus aliam adiicere, quae analogiam inter determinantes positivos et negativos quodammodo restituit. Scilicet invenimus, pro determinante positivo D non tam multitudinem classium ipsam, quam potius hanc multitudinem per logarithmum quantitatis $t + u\sqrt{D}$ multiplicatam (designantibus t, u numeros minimos, praeter 1, 0, aequationi $tt - Duu = 1$ satisfaciens) multitudini classium pro determinante negativo pluribus rationibus hic fusius non explicandis analogam esse, atque valorem mediocrem illius producti aequae exacte exprimi per formulam talem $m\sqrt{D} - n$; sed valores quantitatum constantium m, n hactenus per theoriam determinare non licuit; si quid ex aliquot centadibus determinantium inter se comparatis concludere permissum est, m parum a 2α differre videtur.

Ceterum de principiis disquisitionum praecedentium circa valores mediocres quantitatum lege analytica non progredientium, sed ad talem legem asymptotice continuo magis approximantium alia occasione fusius agere nobis reservamus. Transimus iam ad aliam disquisitionem, qua classes diversae pr. prim. eiusdem det. inter se comparabuntur, finisque huic longae sectioni imponetur.

Algorithmus singularis classium proprie primitivarum; determinantes regulares et irregulares etc.

305. THEOREMA. Designante K classem principalem formarum determinantis dati D , C classem quamcunque aliam e genere principali formarum eiusdem det.; $2C$, $3C$, $4C$ etc. classes resp. e duplicatione, triplicatione, quadruplicatione etc. classis C ortas (ut in art. 249): in progressionem C , $2C$, $3C$ etc. satis continuata tandem ad classem cum K identicam pervenitur; supponendoque, mC esse primam cum K identicam, atque multitudinem omnium classium generis principalis = n : erit vel $m = n$ vel m pars aliquota ipsius n .

Dem. I. Omnes classes $K, C, 2C, 3C \dots (m-1)C$ inter se diversas esse facile demonstratur. Si enim esset $rC = sC$ atque $r > s$, eritque etiam $(r-1)C = (s-1)C$, $(r-2)C = (s-2)C$ etc. et $(r+1-s)C = C$, unde $(r-s)C = K$. *Q. E. P.*

II. Hinc etiam protinus sequitur, esse vel $m = n$ vel $m < n$, superestque tantummodo,

ut ostendamus, in casu posteriori m esse partem aliquotam ipsius n .

Quum classes $K, C, 2C \dots (m-1)C$, quarum complexum per $\mathfrak{S}$ designabimus, totum genus principale in hoc casu nondum exhauriant, sit C' aliqua classis huius generis in $\mathfrak{S}$ non contenta, designeturque complexus classium, quae ex compositione ipsius C' cum singulis classibus in $\mathfrak{S}$ oriuntur, puta $C', C' + C, C' + 2C \dots C' + (m-1)C$ per $\mathfrak{S}'$. Iam facile perspicitur, omnes classes in $\mathfrak{S}'$ tum inter se tum ab omnibus in $\mathfrak{S}$ diversas esse et ad genus principale pertinere; quodsi itaque $\mathfrak{S}$ et $\mathfrak{S}'$ hoc genus omnino exhauriunt, habebimus $n = 2m$; sin minus, erit $n > 2m$.

Sit in casu posteriori C'' aliqua classis generis principalis nec in $\mathfrak{S}$ nec in $\mathfrak{S}'$ contenta, designeturque complexus classium ex compositione ipsius C'' cum singulis classibus in $\mathfrak{S}$ prodeuntium i. e. harum $C'', C'' + C, C'' + 2C \dots C'' + (m-1)C$ per $\mathfrak{S}''$; patetque facile, has omnes inter se et ab omnibus in $\mathfrak{S}$ et $\mathfrak{S}'$ diversas esse, et ad genus principale pertinere. Quare si $\mathfrak{S}, \mathfrak{S}', \mathfrak{S}''$ hoc genus exhauriunt, erit $n = 3m$; sin minus, $n > 3m$, in quo casu classis alia C''' in genere principali contenta, neque vero in $\mathfrak{S}, \mathfrak{S}'$ vel $\mathfrak{S}''$, simili modo tractata docebit, esse vel $n = 4m$ vel $n > 4m$, et sic porro.

Iam quum n et m sint numeri finiti, genus principale necessario tandem exhaurietur, eritque n multipulum ipsius m , sive m pars aliquota ipsius n . *Q. E. S.*

Ex. Sit $D = -356$, $C = (5, 2, 72)^4$, invenieturque $2C = (20, 8, 21)$, $3C = (4, 0, 89)$, $4C = (20, -8, 21)$, $5C = (5, -2, 72)$, $6C = (1, 0, 356)$. Hic itaque est $m = 6$, n vero pro hoc determinante est 12. Accipiendo pro C classem $(8, 2, 45)$, classes quinque reliquae in $\mathfrak{S}'$ erunt $(9, -2, 40)$, $(9, 2, 40)$, $(8, -2, 45)$, $(17, 1, 21)$, $(17, -1, 21)$.

306. Demonstratio theor. praec. omnino analogia invenietur demonstrationibus in artt. 45, 49, reveraque theoria multiplicationis classium cum argumento in Sect. III. tractato permagnam undique affinitatem habet. At limites huius operis non permittunt, illam theoriam ea qua digna est ubertate hic persequi; quocirca paucas tantummodo observationes hic adiiciemus, eas quoque demonstrationes, quae apparatus prolixiorum requirerent, supprimemus, disquisitionemque ampliorem ad aliam occasionem nobis reservabimus.

I. Si series $K, C, 2C, 3C$ etc. ultra $(m-1)C$ producit, eadem classes iterum comparent, $mC = K$, $(m+1)C = C$, $(m+2)C = 2C$ etc. generaliterque (spectando concinnitatis causa K tamquam $0C$) classes $gC, g'C$ identicae erunt vel diversae, prout g et g' secundum modulum m congrui sunt vel incongrui. Classis itaque nC semper identica est cum principali K .

II. Complexum classium $K, C, 2C \dots (m-1)C$, quem supra per $\mathfrak{S}$ designavimus, vocabimus *periodum* classis C , quae expressio non est confundenda cum *periodis formarum reductarum* det. positivi non-quadrati in art. 186 sqq. tractatis. Patet itaque, e compositione classium quocunque in eadem periodo contentarum oriri classem in ea periodo quoque contentam $gC + g'C + g''C$ etc. $= (g + g' + g'' + \text{etc.})C$.

III. Quum $C + (m-1)C = K$, classes C et $(m-1)C$ oppositae erunt, et perinde $2C$ et $(m-2)C$, $3C$ et $(m-3)C$ etc. Si itaque m est par, classis $\frac{1}{2}mC$ sibi ipsa opposita erit adeoque anceps; vice versa, si in $\mathfrak{S}$ praeter K adhuc alia classis anceps occurrit, puta gC , erit $gC = (m-g)C$ adeoque $g = m-g = \frac{1}{2}m$. Hinc sequitur, si m sit par, praeter duas K et $\frac{1}{2}mC$; si vero m sit impar, praeter unam K , aliam classem ancipitem in $\mathfrak{S}$ contentam esse non posse.

IV. Si periodus alicuius classis hC in $\mathfrak{S}$ contentae supponitur esse $hC, 2hC, 3hC, 4hC \dots (m'-1)hC$, manifestum est, $m'h$ esse multipulum minimum ipsius h per m divisibile. Si itaque m et h inter se primi sunt, erit $m' = m$, duaeque periodi easdem classes sed ordine

⁴Classes hic semper per formas (simplicissimas) in ipsis contentas exprimuntur.

diverso dispositas continebunt; generaliter autem designante μ divisorem comm. max. ipsorum m, h , erit $m' = \frac{m}{\mu}$.

Hinc patet, multitudinem classium in periodo cuiusvis classis ex $\mathfrak{S}$ contentarum esse vel m vel partem aliquotam ipsius m ; et quidem tot classes in $\mathfrak{S}$ habebunt periodos m terminorum, quot numeri ex his $0, 1, 2 \dots m-1$ ad m primi sunt, sive φm , utendo signo art. 39; generaliter vero tot classes in $\mathfrak{S}$ habebunt periodos $\frac{m}{\mu}$ terminorum, quot numeri ex his $0, 1, 2 \dots m-1$ divisorem maximum μ cum m communem habent, quorum multitudinem esse $\varphi \frac{m}{\mu}$ facile perspicitur.

Si itaque $m = n$, sive totum genus principale sub $\mathfrak{S}$ contentum, dabuntur in hoc genere omnino φn classes, quarum periodi idem genus totum includunt, et φe classes, quarum periodi ex e terminis constant, denotante e divisorem quemcunque ipsius n . Haec conclusio generaliter valet, quando in genere principali ulla classis datur, cuius periodus ex n terminis constat.

V. Sub eadem suppositione, systema classium generis principalis aptius disponi nequit, quam aliquam classem, periodum n terminorum habentem, quasi pro basi adoptando, generisque principalis classes eodem ordine collocando, quo in illius periodo progrediuntur. Quodsi tunc classi principali inde ab adscribitur, classi, quae pro basi accepta est, index 1 et sic porro: per solam indicum additionem inveniri poterit, quaenam classis e compositione classium quarumcunque generis principalis oriatur. Ecce exemplum pro determinante -356 , ubi classem $(9, 2, 40)$ pro basi accepimus:

$$\begin{array}{ll} (1, 0, 356) = 0 & (20, 8, 21) = 4 \\ (9, 2, 40) = 1 & (17, 1, 21) = 5 \\ (5, 2, 72) = 2 & (4, 0, 89) = 6 \\ (8, -2, 45) = 3 & (17, -1, 21) = 7 \\ & (20, -8, 21) = 8 \\ & (8, 2, 45) = 9 \\ & (5, -2, 72) = 10 \\ & (9, -2, 40) = 11 \end{array}$$

VI. Quamquam vero tum analogia cum Sect. III, tum inductio circa plures quam 200 determinantes negativos, longeque adhuc plures positivos non-quadratos instituta maximam probabilitatem afferre videantur, illam suppositionem pro omnibus determinantibus locum habere: talis conclusio nihilominus falsa foret, et per tabulae classificationum continuationem refelleretur. Liceat, brevitatis caussa, eos determinantes, pro quibus totum genus principale unicae periodo includi potest, *regulares* vocare, reliquos vero, pro quibus hoc fieri nequit, *irregulares*. Hoc argumentum, quod ad arithmeticae sublimioris mysteria maxime recondita pertinere, disquisitionibusque difficillimis locum relinquere videtur, paucis tantum observationibus hic illustrare possumus, quibus sequentem generalem praemittimus.

VII. Si in genere principali classes C, C' occurrunt, quarum periodi ex m, m' classibus constant, atque M est numerus minimus per m et m' divisibilis: in eodem genere etiam classes dabuntur, quarum periodi M terminos contineant.

Resolvatur M in duos factores r, r' inter se primos, quorum alter (r) metiatur ipsum m , alter (r') ipsum m' (v. art. 73), habebitque classis $\lambda C + \lambda' C' = C''$ proprietatem praescriptam. Supponamus enim, periodum classis C'' constare ex g terminis, eritque

$$K = gC'' = gmC + \frac{gm'}{r'}C' = K + \frac{gm'}{r'}C' = \frac{gm'}{r'}C',$$

umde $\frac{gm'}{r'}$ per m' divisibilis esse debeat sive gr per r' , adeoque etiam g per r' . Prorsus simili modo $\frac{gm}{r}$ per r divisibilis invenitur, unde etiam per $rr' = M$ divisibilis erit. Sed quum manifesto sit $MC'' = K$, erit etiam M per g divisibilis; quare necessario $M = g$.

Hinc nullo negotio sequitur, multitudinem maximam classium, in ulla periodo contentarum (pro det. dato), divisibilem esse per multitudinem classium in quavis alia periodo (classis ex eodem genere principali). Simul hinc methodus derivari potest, talem classem cuius periodus sit quam maxima (adeoque pro det. regulari totum genus principale complectatur) eruendi, methodo artt. 73, 74 prorsus analogae, etsi in praxi laborem per plura artificia contrahere liceat.

Quotiens e divisione numeri n per multitudinem classium in periodo maxima, qui pro determinantibus regularibus est 1, pro irregularibus semper fit integer maior quam 1, et pro his imprimis commodus est ad diversas irregularitatis species exprimendas; quomobrem *exponens irregularitatis* dici poterit.

VIII. Hactenus regula generalis non habetur, per quam determinantes regulares ab irregularibus a priori distingui possent, praesertim quum inter posteriores numeri tum primi tum compositi reperiantur; sufficiat itaque quasdam observationes particulares hic adiunxisse.

Quando in genere principali plures quam duae classes ancipites continentur, determinans certo est irregularis atque exponens irregularitatis par; quando vero una tantum aut duae in illo genere adsunt, det. aut regularis erit aut saltem exp. irr. impar.

Omnes determinantes negativi formae $-(216k + 27)$, unico -27 excepto, irregulares sunt, et exp. irr. per 3 divisibilis; idem valet de dett. negg. formae $-(1000k + 75)$ et $-(1000k + 675)$, unico -75 excepto, infinitisque aliis. Si exp. irr. est numerus primus p , aut saltem per p divisibilis, n per pp divisibilis erit, unde sequitur, si n nullum divisorem quadratum implicet, determinantem certo esse regularem.

Pro solis determinantibus quadratis positivis *ee* a priori semper dignosci potest, utrum regulares sint an irregulares; scilicet illud evenit, quando e est 1 aut 2 aut numerus primus impar aut potestas numeri primi imparis; hoc in omnibus reliquis casibus.

Pro dett. negg., irregulares continuo frequentiores evadunt, quo maiores fiunt determinantes: e.g. in tota miliade prima tredecim irregulares reperiuntur, (signo negative omisso) 576, 580, 820, 884, 900, quorum exp. irr. est 2, atque 243, 307, 339, 459, 675, 755, 891, 974, quorum exp. irr. 3; in milliade secunda reperti sunt 13, quorum exp. irr. 2, atque 15, quorum exp. irr. 3; in milliade decima 31 cum exp. irr. 2 atque 32 cum exp. irr. 3. Num determinantes cum exp. irr. maiori quam 3 infra -10000 occurrant, decidere nondum licet; ultra hunc limitem exponentes quicunque dati provenire possunt.

Frequentiam determinantium negativorum irregularium ad frequentiam regularium continuo magis, dett. crescentibus, ad rationem constantem appropinquare, per ratiocinia, quae hic suppressimus, colligitur.

IX. Pro determinantibus irregularibus methodus in V explicata generis principalis classes in periodos distribuendi locum habere nequit, quum periodus maxima ex classibus paucioribus quam n constet, adeoque ad genus principale totum amplectendum una vel adeo plures adhuc classes hic esse accipiendas, e quarum multiplicatione et compositione omnes producantur. Hinc indices duplices aut multiplices emergent, qui eundem fere usum praestabunt ac simplices pro regularibus. Sed hanc rem alio tempore fusius tractabimus.

X. Denique observamus, quum omnes proprietates in hoc art. et praec. consideratae imprimis a numero n pendeant, qui simile quid est ac $p - 1$ in Sect. III, hunc numerum summa attentione dignum esse; quomobrem quam maxime optandum esset, ut inter ipsum atque determinantem, ad quem pertinet, nexus generalis detegatur. De qua re gravissima

eo minus desperandum censemus, quoniam iam successit, valorem mediocrem producti ex n in multitudinem generum (quae a priori assignari potest) saltem pro determinantibus negativis formulae analyticae subiicere (art. 302).

307. Disquisitiones artt. praec. solas classes generis principales complectuntur, adeoque sufficiunt tum pro dett. poss., ubi unicum omnino genus datur, tum pro negativis, ubi unicum genus positivum adest, si ad genus negativum respicere nolumus. Superest, ut de reliquis quoque generibus (pr. primitivis) quaedam adiciamus.

I. Quando in genere G' a principali G (eiusdem det.) diverso ulla classis anceps datur, totidem in ipso aderunt ac in G . Sint in G classes ancipites L, M, N etc. (inter quas etiam erit classis principalis K), in G' vero hae L', M', N' etc., designeturque illarum complexus per A , complexus harum per A' . Quum manifesto omnes classes $L + L', M + L', N + L'$ etc. ancipites diversaeque sint, et ad G' pertineant, adeoque sub A' contentae esse debeant: multitudo classium in A certo nequit esse minor quam in A' ; similiter quum classes $L' + L, M' + L, N' + L$ etc. diversae ancipitesque sint et ad G pertineant, adeoque sub A contineantur, multitudo classium in A' nequit esse minor quam in A ; quare multitudines classium in A et A' necessario aequales erunt.

II. Quum multitudo omnium classium ancipitum multitudini generum aequalis sit (artt. 261, 287 III): manifestum est, si in G una tantum classis anceps detur, in quovis genere unam classem ancipitem contentam esse debere; si in G duae ancipites exstent, in semissi omnium generum binas dari, in reliquis nullas; denique si in G plures ancipites contineantur, puta a^5 , partem $a/2^{\nu-1}$ omnium generum a classes ancipites continere, reliqua nullas.

III. Sint, pro eo casu, ubi G duas classes ancipites continet, G, G', G'' etc. ea genera, quae binas, atque H, H', H'' etc. ea quae nullas continent, designeturque complexus illorum per $\mathfrak{G}$, complexus horum per $\mathfrak{H}$. Quum e compositione duarum classium ancipitum semper proveniat classis anceps (art. 249), nullo negotio perspicietur, e compositione duorum generum ex $\mathfrak{G}$ semper prodire genus ex $\mathfrak{G}$. Hinc porro sequitur, e compositione generis ex $\mathfrak{G}$ cum genere ex $\mathfrak{H}$ prodire genus ex $\mathfrak{H}$; si enim e. g. $G' + H$ non ad $\mathfrak{G}$ sed ad $\mathfrak{H}$ pertineret, etiam $G' + H + G'$ ad $\mathfrak{G}$ referendum esset, *Q. E. A.*, quoniam $G' + G' = G$ adeoque $G' + H + G' = H$. Denique facillime intelligitur, genera $G + H, G' + H, G'' + H$ etc., una cum $H + H, H' + H, H'' + H$ etc. omnia diversa fore adeoque cum $\mathfrak{G}$ et $\mathfrak{H}$ simul sumtis identica; sed, per ea quae modo demonstrata sunt, genera $G + H, G' + H, G'' + H$ etc. omnia pertinent ad $\mathfrak{H}$ adeoque hunc complexum exhaustiunt; quare necessario reliqua $H + H, H' + H, H'' + H$ etc. omnia ad $\mathfrak{G}$ pertinebunt, i.e. e compositione duorum generum ex $\mathfrak{H}$ semper oritur genus ex $\mathfrak{G}$.

IV. Si E est classis generis V , a principali G diversi, patet, $2E, 4E, 6E$ etc. omnes pertinere ad G ; has vero $3E, 5E, 7E$ etc. ad V . Si itaque periodus classis $2E$ e. g. m terminis constat: manifesto in serie $E, 2E, 3E$ etc. classis $2mE$, nec ulla prior, cum K identica erit, sive periodus classis E ex $2m$ terminis constabit. Hinc multitudo terminorum in periodo classis cuiuscunque, ex alio genere quam principali, erit vel $2n$ vel pars aliquota ipsius $2n$, designante n multitudinem classium in singulis generibus.

V. Sit C classis data generis principalis G ; E classis generis V , e cuius duplicatione C oriatur (qualis semper dabitur, art. 286), atque omnes classes ancipites (pr. prim. eiusdem det.) K, K', K'' etc., eruntque omnes classes, e quarum duplicatione C oritur, hae: E ($= E + K$), $E + K', E + K''$ etc., quarum complexus exprimatur per $\mathfrak{Q}$; multitudo harum classium aequalis erit multitudini classium ancipitum sive multitudini generum.

Manifestum est, e classibus in $\mathfrak{Q}$ tot ad genus V pertinere, quot ancipites dentur in

⁵Hoc pro solis determinantibus irregularibus evenire potest, eritque a semper potestas binarii.

G ; designando itaque harum multitudinem per a , patet, in quovis genere vel a classes ex $\mathfrak{Q}$ dari vel nullas. Hinc facile colligitur, quando sit $a = 1$, in quovis genere contineri unam classem ex $\mathfrak{Q}$; quando $a = 2$, semissem omnium generum binas classes ex $\mathfrak{Q}$ continere, reliqua nullas, et quidem semissem priorem vel totam cum $\mathfrak{G}$ coincidere (in eadem significatione ut supra III), posteriorem cum $\mathfrak{H}$, vel hanc cum $\mathfrak{G}$, illam cum $\mathfrak{H}$.

Quando a adhuc maior est, semper pars $a/2^\nu$ omnium generum classes $\mathfrak{Q}$ includent (singula a classes).

VI. Supponamus iam, C esse talem classem, cuius periodus ex n terminis constet, perspicieturque facile, in eo casu, ubi $a = 2$ adeoque n par, nullam ex $\mathfrak{Q}$ ad G pertinere posse (tunc enim talis classis in periodo classis C contenta foret; si itaque esset $= rC$, sive $2rC = C$, foret $2r \equiv 1 \pmod{n}$ *Q. E. A.*); quamobrem quum G ad $\mathfrak{G}$ pertineat, necessario omnes classes $\mathfrak{Q}$ inter genera $\mathfrak{H}$ distributae erunt. Hinc colligitur, quoniam (pro det. reg.) in G omnino dantur φn classes periodos n terminorum habentes, pro eo casu ubi $a = 2$ inveniri in quovis genere $\mathfrak{H}$ omnino $2\varphi n$ classes, quarum periodi $2n$ terminos, adeoque tum genus suum tum principale, complectantur; quando vero $a = 1$, in quovis genere a principali diverso φn huiusmodi classes dabuntur.

VII. His observationibus methodum sequentem superstruimus, systema omnium classium pr. prim. pro quolibet determinante regulari dato (irregulares enim omnino seponimus) quam aptissime construendi. Eligatur ad lubitum classis E , cuius periodus $2n$ terminos, adeoque tum genus suum quod sit V tum principale G complectatur; classes horum duorum generum ita disponantur, ut in illa periodo progrediuntur. Hoc modo res iam absoluta erit, quando plura genera quam haec duo omnino non adsunt, sive reliqua adiacere non necesse videtur (e. g. pro tali det. neg., ubi duo tantum genera positiva dantur).

Quando vero quatuor aut plura genera construenda sunt, reliqua hoc modo tractentur. Sit V' aliquod e reliquis atque $V + V' = V''$; dabunturque in V' et V'' duae classes ancipites (puta vel in utroque una, vel in altero duae, in altero nulla); ex his eligatur una A ad lubitum, patetque facile, si A cum singulis classibus in G et V componatur, prodire $2n$ classes diversas ad V' et V'' pertinentes, adeoque haec genera omnino exhaustivae; ita haec quoque genera ordinari poterunt.

Si praeter haec quatuor genera alia adhuc supersunt, sit V''' unum e reliquis, atque $V'' + V''' = V''''$, $V + V''' = V^v$, $V' + V''' = V^{v'}$ genera ea, quae prodeunt e compositione generis V''' cum V , V' et V'' . Haec quatuor genera $V''' \dots V^{v'}$ quatuor classes ancipites continebunt, patetque, si ex his una A' eligatur atque cum singulis classibus in G , V , V' , V'' componatur, omnes classes in $V''' \dots V^{v'}$ prodire. Si adhuc plura genera supersunt, simili modo continuetur, donec omnia exhausta sint.

Patet, si multitudo omnium generum construendorum sit 2^ν , omnino opus fore $\nu - 1$ classibus ancipitibus, et quamvis classem horum generum produci posse vel e multiplicatione classis E , vel e compositione classis, e tali multiplicatione ortae, cum una pluribusve ancipitibus.

Ecce duo exempla, per quae haec praecepta illustrabuntur; plura de usu talis constructionis vel de artificiis, per quae labor sublevari potest, hic adiacere non licet.

I. *Determinans* – 161. Quatuor genera positiva; in singulis quaternae classes.

$G: (1, 0, 161) = K$	$(9, 1, 18) = C$	$(9, -1, 18) = 2C$	$(2, 1, 81) = 3C$
$V: (5, 2, 33) = E$	$(7, 3, 24) = E + C$	$(7, -3, 24) = E + 2C$	$(5, -2, 33) = E + 3C$
$V': (10, 3, 17) = A$	$(11, 5, 17) = A + C$	$(11, -5, 17) = A + 2C$	$(10, -3, 17) = A + 3C$
$V'': (6, 1, 27) = A + E$	$(3, 1, 54) = A + E + C$	$(3, -1, 54) = A + E + 2C$	$(6, -1, 27) = A + E + 3C$

II. Determinans −546. Octo genera positiva; in singulis ternae classes.

G 1 et 3, 8; $R3$; $R7$; $R13$	
$(1, 0, 546) = K$	$(22, -2, 25) = 2E (22, 2, 25) = 4E$
V 5 et 7, 8; $N3$; $N7$; $N13$	
$(5, 2, 110) = E$	$(21, 0, 26) = 3E (5, -2, 110) = 5E$
V' 1 et 3, 8; $N3$; $R7$; $N13$	
$(2, 0, 273) = A$	$(11, -2, 50) = A + 2E (11, 2, 50) = A + 4E$
V'' 5 et 7, 8; $R3$; $N7$; $N13$	
$(10, 2, 55) = A + E$	$(13, 0, 42) = A + 3E (10, -2, 55) = A + 5E$
V''' 1 et 3, 8; $N3$; $N7$; $R13$	
$(3, 0, 182) = A'$	$(17, 7, 35) = A' + 2E (17, -7, 35) = A' + 4E$
V'''' 5 et 7, 8; $R3$; $R7$; $N13$	
$(15, -3, 37) = A' + E$	$(7, 0, 78) = A' + 3E (15, 3, 37) = A' + 5E$
V^v 1 et 3, 8; $R3$; $N7$; $N13$	
$(6, 0, 91) = A + A'$	$(19, 9, 33) = A + A' + 2E (19, -9, 33) = A + A' + 4E$
$V^{v'}$ 5 et 7, 8; $N3$; $R7$; $N13$	
$(23, 11, 29) = A + A' + E$	$(14, 0, 39) = A + A' + 3E (23, -11, 29) = A + A' + 5E$

SECTIO SEXTA

VARIAE DISQUISITIONUM PRAECEDENTIUM APPLICATIONES.

308. Quam fertilis sit arithmetica sublimior veritatibus, quae in aliis quoque mathe-
seos partibus usum praestent, pluribus iam passim locis addigitavimus; quasdam vero
applicationes, quae expositionem ampliore merentur, seorsim tractare non inutile duxi-
mus, non tam ut hoc argumentum, quo plura volumina facile impleri possent, exhaustur,
quam potius ut per aliqua specimina illustretur. In hacce quidem Sectione primo de reso-
lutione fractionum in simpliciores agemus; dein de conversione fractionum communium in
decimales; tum methodum novam exclusionis explicabimus, solutioni aequationum inde-
terminatarum secundi gradus inservientem; tandem methodos novas expeditas trademus,
numeros primos a compositis dignoscendi, horumque factores explorandi. In Sectione
sequente autem theoriam generalem generis peculiaris functionum, per totam analysin la-
tissime patentis, quatenus cum arithmetica sublimiori arctissime connexa est, stabiliemus,
imprimisque theoriam sectionis circuli, cuius prima tantum elementa hactenus innotue-
runt, novis incrementis amplificare studebimus.

Resolutio fractionum in simpliciores.

309. PROBLEMA. Fractionem $\frac{m}{n}$, cuius denominator n est productum e duobus numeris
inter se primis a, b , in duas alias discernere, quarum denominatores sint a, b .

Sol. Sint fractiones quaesitae $\frac{x}{a}, \frac{y}{b}$, fierique debebit $bx + ay = m$; hinc x erit radix
congruentiae $bx \equiv m \pmod{a}$, quae per Sect. II erui poterit, y vero fiet $= \frac{m-bx}{a}$. Ceterum
constat, congruentiam $bx \equiv m$ radices infinitas multas, sed secundum a congruas, habere,
unica vero tantum positiva minorque quam a dabitur; fieri autem potest etiam, ut y
evadat negativus. Vix necesse erit monere, y etiam per congruentiam $ay \equiv m \pmod{b}$,
atque x per aequationem $x = \frac{m-ay}{b}$ inveniri posse.

E. g. proposita fractione $\frac{58}{77}$, erit 4 valor expr. $\frac{58}{11} \pmod{7}$, unde $\frac{58}{77}$ resolvitur in $\frac{4}{7} + \frac{30}{77}$.

310. Si fractio $\frac{m}{n}$ proponitur, cuius denominator n est productum e factoribus quot-
cunque inter se primis a, b, c, d etc.: per art. praec. primo in duas resolvi potest, quarum
denominatores sint a et bcd etc.; secunda iterum in duas denominatorem b et cd etc.;
posterior rursus in duas et sic porro, unde tandem fractio proposita sub hanc formam
redigetur

$$\frac{m}{n} = \frac{\alpha}{a} + \frac{\beta}{b} + \frac{\gamma}{c} + \frac{\delta}{d} + \text{etc.} + k.$$

Numeratores $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ etc. manifesto positivos ac denominatoribus suis minores accipere
licebit, praeter ultimum, qui reliquis determinatis non amplius est arbitrarius, atque etiam
negativus aut denominatore maior fieri potest (siquidem non supponimus $m < n$). Tum
plerumque e re erit, ipsum sub formam $\frac{\varepsilon}{e} + k'$ redigere, ita ut ε sit positivus ac minor
quam e , k' vero integer. Denique patet, a, b, c etc. ita accipi posse, ut sint vel numeri
primi vel numerorum primorum potestates.

Ex. Fractio $\frac{391}{924}$, cuius denominator $= 4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 11$ hoc modo resolvitur in $\frac{3}{4} + \frac{1}{3} + \frac{7}{7} + \frac{7}{11}$; $\frac{1}{3}$
in $\frac{1}{3}$; $\frac{7}{77}$ in $\frac{5}{7} - \frac{7}{11}$; $-\frac{7}{11}$ in $-\frac{4}{11} - \frac{1}{7}$; unde, scribendo $-\frac{1}{7}$ pro $-\frac{7}{7}$, fit $\frac{391}{924} = \frac{3}{4} + \frac{1}{3} + \frac{5}{7} - \frac{4}{11} - 1$.

311. Fractio $\frac{m}{n}$ unico tantum modo sub formam $\frac{\alpha}{a} + \frac{\beta}{b} + \frac{\gamma}{c} + \text{etc.} + k$ reduci potest, ita ut α, β etc. sint positivi ac minores quam a, b etc., scilicet supponendo

$$\frac{m}{n} = \frac{\alpha}{a} + \frac{\beta}{b} + \text{etc.} + k = \frac{\alpha'}{a} + \frac{\beta'}{b} + \text{etc.} + k'$$

atque etiam α', β' etc. positivos ac minores quam a, b etc., necessario erit $\alpha = \alpha', \beta = \beta', \gamma = \gamma'$ etc., $k = k'$.

Multiplicando enim per $n = abc$ etc., patet fieri $m \equiv \alpha' bcd$ etc. (mod a), unde, quoniam bcd etc. ad a primus est, necessario $\alpha \equiv \alpha'$ adeoque $\alpha = \alpha'$, et perinde $\beta = \beta'$ etc., unde etiam sponte $k = k'$.

Iam quum prorsus arbitrarium sit, cuiusnam denominatoris numerator primus supputetur, manifestum est, omnes numeratores ita investigari posse, ut in art. praec., puta β per congruentiam βacd etc. $\equiv m$ (mod b), γ per hanc γabd etc. $\equiv m$ (mod c) etc.; summa omnium fractionum sic inventarum vel propositae $\frac{m}{n}$ aequalis erit, vel differentia numerus integer $= k$, qua via simul confirmationem calculi nanciscimur.

Ita in ex. art. praec. valores expr. $\frac{391}{11 \cdot 3 \cdot 7}$ (mod 4), $\frac{391}{4 \cdot 7 \cdot 11}$ (mod 3), $\frac{391}{4 \cdot 3 \cdot 11}$ (mod 7), $\frac{391}{4 \cdot 3 \cdot 7}$ (mod 11) statim suppeditant numeratores 1, 2, 1, 4 denominatoribus 4, 3, 7, 11 respondentes, summaque harum fractionum propositam unitate superare invenitur.

Conversio fractionum communium in decimales.

312. DEFINITIO. Si fractio communis in decimalem convertitur, seriem figurarum decimalium⁶ (excluso si quis adest numero integro), sive finita sit, sive in infinitum excurrat, *fractionis mantissam* vocamus, expressionem, alias tantummodo apud logarithmos usitam, in significatione latiori accipientes. Ita e. g. fractionis $\frac{1}{8}$ mantissa est 125, mantissa fractionis $\frac{3}{16}$ est 1875, fractionis $\frac{2}{37}$ mantissa 054054 ... in inf.

Ex hac definitione statim patet, fractiones eiusdem denominatoris $\frac{l}{n}, \frac{m}{n}$ etc. easdem vel diversas mantissas habere, prout numeratores l, m secundum n congrui sint vel incongrui. Mantissa finita non mutatur, si ad dextram cifrae quotcunque apponantur. Mantissa fractionis $\frac{10m}{n}$ obtinetur, rescindendo a mantissa fractionis $\frac{m}{n}$ figuram primam et generaliter mantissa fractionis $\frac{10^k m}{n}$ invenitur rescindendo k figuras primas mantissae ipsius $\frac{m}{n}$. Mantissa fractionis $\frac{m}{n}$ statim figura significativa (i.e. a cifra diversa) incipit, si n non > 10 ; si vero $n > 10$ ac nulli potestati ipsius 10 aequalis, multitudoque figurarum e quibus constat est k , primae $k - 1$ figurae mantissae ipsius $\frac{m}{n}$ erunt cifrae atque demum sequens k^{ta} erit significativa.

Hinc facile deducitur, si $\frac{l}{n}, \frac{m}{n}$ mantissas diversas habeant (i.e. si l, m sec. n incongrui), has certo in primis k figuris convenire non posse, sed saltem in k^{ta} discrepare debere.

313. PROBLEMA. Dato denominatore fractionis $\frac{m}{n}$ atque primis k figuris ex ipsis mantissa, invenire numeratorem m , quem ipso n minorem supponimus.

Sol. Considerentur illae k figurae tamquam numerus integer, qui per n multiplicetur, productumque per 10^k dividatur (sive k ultimae figurae resecantur). Si quotiens est integer (sive figurae resectae cifrae), ipse manifesto erit numerator quaesitus atque mantissa data completa; sin minus, numerator quaesitus erit integer proxime maior, sive ille quotiens unitate auctus, postquam figurae decimales sequentes reiectae sunt.

⁶Brevitatis caussa disquisitionem sequentem ad systema vulgare decadicum restringimus, quum facile ad quodvis aliud extendi possit.

Ratio huius regulae tam facile ex iis, quae ad finem art. praec. observavimus, cognoscitur, ut explicatione uberiori opus non sit.

Ex. Si constat, duas figuras primas mantissae fractionis, cuius denominator 23, esse 69, habemus productum $23 \cdot 69 = 1587$, a quo duas ultimas figuras abiiciendo, unitatemque addendo, numerator quaesitus prodit $= 16$.

314. Inchoamus a consideratione talium fractionum, quarum denominatores sunt numeri primi vel numerorum primorum potestates, posteaque reliquas ad has reducere ostendemus. Et primo statim observamus, mantissam fractionis $\frac{a}{p^\mu}$, (cuius numeratorem a per numerum primum p non divisibilem esse semper supponimus) finitam esse, atque ex μ figuris constare, si $p = 2$ aut $= 5$; in casu priori haec mantissa, tamquam numerus integer considerata, erit $= 5^\mu a$, in posteriori $= 2^\mu a$. Haec tam obvia sunt, ut expositione non egeant.

Si vero p est alius numerus primus, $10^r a$ per p^μ numquam divisibilis erit, quantumvis magnus accipiat r , unde sponte sequitur, mantissam fractionis $F = \frac{a}{p^\mu}$ necessario in infinitum progredi.

Supponamus, 10^e esse potestatem infimam numeri 10, quae unitati secundum modulum p^μ congrua fit (Conf. Sectio III, ubi ostendimus, e vel numero $(p-1)p^{\mu-1}$ aequalem vel ipsius partem aliquotam esse), perspicieturque facile, etiam $10^e a$ fore numerum, in serie $10a, 100a, 1000a$ etc. primum, qui ipsi a secundum eundem modulum sit congruus.

Iam quum per art. 312 mantissae fractionum $\frac{10a}{p^\mu}, \frac{100a}{p^\mu} \dots \frac{10^e a}{p^\mu}$ oriantur, demendo mantissae fractionis F figuram primam, duas $\dots e$ figuras primas resp., manifestum est, in hac mantissa post primas e figuras, neque prius, easdem iterum repetiri.

Has primas e figuras, e quibus infinities repetitis mantissa formata est, *periodum* huius mantissae sive fractionis F vocare possumus, patetque, magnitudinem periodi, i.e. multitudinem figurarum, e quibus constat, quae est $= e$, et numeratore a omnino independentem esse, et per solum denominatorem determinari.

Ita e. g. periodus fractionis $\frac{1}{11}$ est 09, fractionis $\frac{3}{7}$ periodus 428571⁷.

315. Simulac igitur fractionis alicuius periodus habetur, mantissa ad figuras quotcunque produci poterit. Porro patet, si fuerit $b \equiv 10^\lambda a \pmod{p^\mu}$, periodum fractionis $\frac{b}{p^\mu}$ oriri, si primae λ figurae periodi fractionis F (supponendo $\lambda < e$ quod licet) reliquis $e - \lambda$ postscribantur, adeoque cum periodo fractionis F simul periodos omnium fractionum haberi, quarum numeratores ipsis $10a, 100a, 1000a$ etc. secundum denominatorem p^μ sint congrui.

Ita e. g. quum $6 \equiv 3 \cdot 10^5 \pmod{7}$, periodus fractionis $\frac{6}{7}$ statim e periodo fractionis $\frac{3}{7}$ fit 857142.

Quoties itaque pro modulo p^μ numerus 10 est radix primitiva (artt. 57, 89), e periodo fractionis $\frac{1}{p^\mu}$ protinus deduci poterit periodus cuiusvis alius fractionis $\frac{m}{p^\mu}$ (cuius numerator m per p non divisibilis), tot figuras ab illa a laeva resecando et ad dextram restituendo, quot unitates habet index ipsius m , numero 10 pro basi accepto. Hinc perspicuum est, quamobrem in hocce casu numerus 10 in tabula I semper pro basi acceptus sit (v. art. 72).

Quando vero 10 non est radix primitiva, e periodo fractionis $\frac{1}{p^\mu}$ earum tantummodo fractionum periodi exscindi possunt, quarum numeratores alicui potestati ipsius 10 secundum p^μ sunt congrui. Sit 10^f potestas infima ipsius 10 unitati secundum p^μ congrua, $(p-1)p^{\mu-1} = ef$, atque talis radix primitiva r pro basi accepta, ut index numeri 10 fiat f (art. 71).

⁷Gel. Robertson periodi initium et finem duobus punctis figurae primae et ultimae superscriptis indicat (*Theory of circulating fractions*, Philos. Trans. 1769, p. 207), quod hic non necessarium putamus.

In hoc itaque systemate numeratores fractionum, quarum periodi e periodo fractionis $\frac{1}{p^\mu}$ exscindi possunt, habebunt indices $f, 2f, 3f \dots ef - f$; simili modo e periodo fractionis $\frac{10}{p^\mu}$ deduci possunt periodi fractionum, quarum numeratores $10r, 100r, 1000r$ etc. indicibus $f + 1, 2f + 1, 3f + 1$ etc. respondentes; e periodo fractionis cum numeratore r^2 (cuius index 2) deducuntur periodi fractionum cum numeratoribus quorum indices $f + 2, 2f + 2, 3f + 2$ etc.; generaliterque e periodo fractionis cum numeratore r^i derivari poterunt periodi fractionum cum numeratoribus, quorum indices $f + i, 2f + i, 3f + i$ etc.

Hinc facile colligitur, si tantummodo periodi fractionum cum numeratoribus $1, r, rr, r^3 \dots r^{e-1}$ habeantur, omnes reliquas inde per solam transpositionem deduci posse adiumento regulae sequentis:

Sit index numeratoris m fractionis propositae $\frac{m}{p^\mu}$, in systemate ubi r pro basi acceptus est, $= i$ (quem supponimus minorem quam $(p - 1)p^{\mu-1}$); fiat (dividendo per f) $i = af + b$, ita ut a, b sint integri positivi (sive etiam 0) atque $b < f$; quo facto orietur periodus fractionis $\frac{m}{p^\mu}$, e periodo fractionis, cuius numerator r^b (adeoque 1, quando $b = 0$), collocando huius a primas figuras post reliquas (adeoque hanc ipsam periodum retinendo, quando $a = 0$). Haec sufficienter declarabunt, cur in condenda tabula I normam in art. 72 explicatam sequuti simus.

316. Secundum haec principia pro omnibus denominatoribus formae p^μ infra 1000 tabulam periodorum necessariarum construximus, quam integram sive etiam ulterius continuatam occasione data publici iuris faciemus. Hoc loco tabula III usque ad 100 tantum producta tamquam specimen sufficiat, cui explicatione vix opus erit. Pro iis denominatoribus, ubi 10 est radix primitiva, periodos fractionum cum numeratore 1 exhibet (puta pro 7, 17, 19, 23, 29, 47, 59, 61, 97); pro reliquis, f periodos numeratoribus $1, r, rr, \dots r^{e-1}$ respondentes, quae per numeros adscriptos (0), (1), (2) etc. sunt distinctae; pro basi r semper eadem radix primitiva adoptata est ut in tabula I.

Hinc igitur periodus fractionis cuiusvis, cuius denominator in hac tabula continetur, adiumento praeceptorum art. praec. erui poterit, postquam numeratoris index per tabulam I est computatus.

Ceterum pro denominatoribus tam parvis negotium aequae facile absque tabula I absolvere poterimus, si per divisionem vulgarem tot figuras initiales mantissae quaesitae computamus, quot per art. 313 necessariae sunt, ut ab omnibus aliis eiusdem denominatoris distingui possit (pro tabula III non plures quam 2), omnesque periodos denominatori dato respondentes perlustramus, usquedum ad illas figuras initiales perveniamus, quae periodi initium haud dubio indicabunt; monere tamen oportet, illas figuras etiam separatas esse posse, ita ut prima (vel plures) finem alicuius periodi constituent, reliqua vel reliquae eiusdem initium.

Ex. Quaeritur periodus fractionis $\frac{45}{53}$. Hic pro modulo 19 per tab. I habetur ind. $45 = 2$ ind. $3 +$ ind. $5 = 49 \equiv 3 \pmod{18}$ (art. 57); quare quum pro hoc casu unica tantum periodus numeratori 1 respondens habeatur, huius tres primas figuras ad finem translocare oportet, unde fit periodus quaesita 631578947368421052. Aequae facile periodi initium e duabus primis figuris 63 inventum fuisset.

Si periodus fractionis $\frac{45}{53}$ desideratur, fit pro modulo 53, ind. $45 = 2$ ind. $3 +$ ind. $5 = 49$; multitudo periodorum hic est $4 = f$, atque $49 = 12f + 1$, quare a periodo cum (1) signata 12 primae figurae postponendae erunt ultimae, periodusque quaesita fit 8490566037735. Figurae initiales 84 in hoc casu separatae sunt in tabula.

Observabimus adhuc, adiumento tabulae III etiam numerum inveniri posse, qui pro modulo dato (in ipsa sub denominatoris titulo contento) indici dato respondeat, ut in art. 59 polliciti sumus. Patet enim per praec., inveniri posse periodum fractionis, cuius

numeratori (licet incognitus sit) index datus respondeat; sufficit autem, tot figuras initiales huius periodi excerpere, quot figuras habet denominator; ex illis per art. 313 eruetur numerator sive numerus quaesitus indici dato respondens.

317. Per praecedentia mantissa fractionis cuiuscunque, cuius denominator est numerus primus aut numeri primi potestas intra limites tabulae, ad figuras quotcunque sine computo erui potest; sed adiumento disquisitionum in initio huius Sectionis tabulae ambitus multo latius patet, omnesque fractiones, quarum denominatores sunt producta e numeris primis aut primorum potestatibus intra ipsius limitem, complectitur. Quum enim talis fractio in alias decomponi possit, quarum denominatores sint hi factores, atque has in fractiones decimales ad figuras quotcunque convertere liceat, restat tantummodo, ut hae in summam uniantur. Ceterum vix opus erit monere, summae sic prodeuntis figuram ultimam iusto minorem evadere posse; manifeste autem defectus ad tot unitates adscendere nequit, quot fractiones particulares adduntur, unde hae ad aliquot figuras ulterius computare conveniet, quam fractio proposita iusta desideratur.

Exempli caussa considerabimus fractionem $F = \frac{1}{1271808720}$, cuius denominator est productum e numeris 16, 9, 5, 49, 13, 47, 59⁸.

Per praecepta supra data invenitur $F = \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{4}{5} + \frac{7}{49} + \frac{7}{13} + \frac{7}{47} + \frac{7}{59}$, quae fractiones particulares, ita ut sequitur, in decimales convertuntur:

$$\begin{aligned}\frac{1}{16} &= 0,0625 \\ \frac{1}{9} &= 0,44444444444444444444 \\ \frac{4}{5} &= 0,44897959183673469387 \\ \frac{7}{49} &= 0,38461538461538461538 \\ \frac{7}{13} &= 0,14893617021276595744 \\ \frac{7}{47} &= 0,88135593220338983050 \\ F &= 4,79583152331271954166\end{aligned}$$

Defectus huius summae a iusto certo minor est quinque unitatibus in figura ultima vigesima secunda, quare viginti primae inde mutari nequeunt. Calculum ad plures figuras producendo, pro duabus figuris ultimis 17 prodit 1893936 ...

Ceterum vel nobis non monentibus quisque videbit, hanc methodum, fractiones communes in decimales convertendi, ei potissimum casui accommodatam esse, ubi multae figurae decimales desiderantur; quando enim paucae sufficiunt, divisio vulgaris sive logarithmi aequae expedite plerumque adhiberi poterunt.

318. Quum itaque resolutio talium fractionum, quarum denominatores e pluribus numeris primis diversis compositi sunt, ad eum casum iam reducta sit, ubi denominator est primus aut primi potestas: de illarum mantissis pauca tantum adiciemus.

Si denominator factorem 2 et 5 non continet, mantissa etiam hic e periodis constabit, quoniam pro hoc quoque casu in serie 10, 100, 1000 ad terminum, unitati secundum denominatorem congruum, tandem pervenitur, simulque huius termini exponens, qui per art. 92 facile determinari poterit, periodi magnitudinem a numeratore independentem, indicabit, siquidem hic ad denominatorem primus fuerit.

Si vero denominator est formae $2^\alpha 5^\beta N$, designante N numerum ad 10 primum, α et β numeros, quorum unus saltem non est 0, fractionis mantissa post primas α vel β figuras (prout α vel β maior) e periodis constare incipiet, cum periodis fractionum cum denominatore N respectu longitudinis convenientibus; hoc facillime inde derivatur, quod

⁸Haec fractio est una ex iis, quae ad radicem quadratam ex $2\frac{3}{7}$ quam proxime appropinquant, et quidem excessus est minor quam septem unitates in loco figurae decimalis vigesimae.

illa fractio in duas alias cum denominatoribus $2^\alpha 5^\beta$ et N resolubilis est, quarum prior post primas α vel β figuras abrumpetur.

Ceterum de hoc argumento multas alias observationes adiicere possemus, praesertim circa artificia, talem tabulam ut III quam citissime construendi, quas brevitatis caussa eo lubentius hoc loco supprimimus, quum plura huc pertinentia tum a cel. Robertson l. c., tum a cel. Bernoulli (Nouv. Mem. de l'Ac. de Berlin 1771, p. 273) iam sint tradita.

Solutio congruentiae $xx \equiv A$ per methodum exclusionis.

319. Congruentiae $xx \equiv A \pmod{m}$, quae convenit cum aequatione indeterminata $xx = A + my$, possibilitatem in Sect. IV (art. 146) ita tractavimus, ut nihil amplius desiderari posse videatur; respectu investigationis incognitae ipsius autem, iam supra (art. 152) observavimus, methodos indirectas directis longe esse praeferendas. Si m est numerus primus (ad quem casum reliqui facile reducuntur), tabulam indicum I (cum III secundum obs. art. 316 combinatam) ad hunc finem adhibere possemus, ut in art. 60 generalius ostendimus: haec vero methodus intra tabulae limites restricta foret. Propter has rationes methodum sequentem generalem ac expeditam arithmeticae amatoribus haud ingratam fore speramus.

Ante omnia observamus, sufficere, si ii tantummodo valores ipsius x habeantur, qui sint positivi atque non maiores quam $\frac{1}{2}m$, quum quivis alius horum alicui vel ipsi vel negative sumto secundum modulum m congruus sit; pro tali vero valore ipsius x valor ipsius y necessario inter limites $-\frac{A}{m}$ et $\frac{xx}{4m}$ contentus erit.

Methodus itaque, quae statim se offert, in eo consisteret, ut pro singulis valoribus ipsius y intra hos limites contentis, quorum complexum exprimemus per Ω , valor ipsius $A + my$, quem per V denotabimus, computetur, iique soli retineantur, pro quibus V fit quadratum. Quando m est numerus parvus (e. g. infra 40), hoc tentamen tam breve est ut contractione vix opus sit; quando autem m est magnus, labor per methodum exclusionis sequentem, quantum lubet, abbreviari poterit.

320. Sit E numerus arbitrarius integer ad m primus ac maior quam 2; omnia eius non-residua quadratica diversa (i.e. secundum E incongrua) haec a, b, c etc.; denique radices congruentiarum $A + my \equiv a, A + my \equiv b, A + my \equiv c$ etc. sec. mod. E hae α, β, γ etc., quas omnes positivas ac minores quam E accipere licebit.

Si itaque ipsi y valor alicui ex his numeris α, β, γ etc. secundum E congruus tribuitur, valor ipsius $V = A + my$ inde oriundus alicui ex his a, b, c etc. congruus et proin non-residuum ipsius E erit, neque adeo quadratum esse poterit. Hinc patet, ex Ω omnes statim numeros tamquam inutiles excludi posse, qui sub formis $Et + \alpha, Et + \beta, Et + \gamma$ etc. contenti sint, sufficetque, tentamen de reliquis, quorum complexus fit Ω' , instituisse. In illa operatione numero E nomen *excludentis* tribui potest.

Accipiendo autem pro excludente numerum idoneum alium E' , prorsus simili modo invenientur tot numeri α', β', γ' etc., quot non-residua diversa quadratica habet, quibus y secundum modulum E' congruus esse nequit. Quare denuo ex Ω' eiicere licebit omnes numeros sub formis $E't + \alpha', E't + \beta', E't + \gamma'$ etc. contentos. Hoc modo continuari poterit, alios aliosque semper excludentes adhibendo, donec multitudo numerorum ex Ω tantum deminuta fuerit, ut non difficilior videatur, omnes superstites tentamini revera subiicere, quam exclusiones novas instituire.

Ex. Proposita aequatione $xx = 22 + 97y$, limites valorum ipsius y erunt $-\frac{22}{97}$ et $24\frac{1}{4} - \frac{22}{97}$, unde (quoniam inutilitas valoris 0 per se est obvia) Ω comprehendet numeros 1, 2, 3 . . . 24.

Pro $E = 3$ habetur unicum non-residuum $a = 2$; unde fit $\alpha = 1$; excludendi sunt itaque ex Ω omnes numeri formae $3t + 1$; multitudo remanentium Ω' erit 16.

Simili modo pro $E = 4$ habetur $a = 2$, $b = 3$, unde $\alpha = 0$, $\beta = 1$; quare reiici debent numeri formae $4t$ et $4t + 1$, restantque hi octo 2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 23.

Perinde pro $E = 5$ reiiciendi inveniuntur numeri formarum $5t$ et $5t + 3$; remanentque hi 2, 6, 11, 14. Excludens 6 removeret numeros formarum $6t + 1$ et $6t + 4$, hi vero (qui cum numeris formae $3t + 1$ conveniunt) iam absunt. Excludens 7 eiicit numeros formarum $7t + 2$, $7t + 3$, $7t + 5$, ac relinquit hos 6, 11, 14. Hi pro y substituti producant resp. $V = 604$, 1089, 1380, e quibus valor secundus solus est quadratus, unde $x = \pm 33$.

321. Quum operatio cum excludente E instituta e valoribus ipsius V , valoribus ipsius y in Ω respondentibus, omnes eos releget, qui sunt non-residua quadratica ipsius E , residua vero eiusdem numeri non attingat; facile intelligitur, usum excludentium E et $2E$ nihil differe, si E sit impar, quum in hoc casu E et $2E$ eadem residua et non-residua habeant. Hinc patet, si successive numeri 3, 4, 5 etc. tamquam excludentes adhibeantur, numeros impariter pares 6, 10, 14 etc. tamquam superfluos praetereundos esse.

Porro perspicuum est, operationem duplicem, cum excludentibus E , E' institutam, omnes eos valores ipsius V remove, qui vel utriusque E , E' vel unius non-residua sint, eosque, qui sint utriusque residua, remanere. Tam quum in eo casu, ubi E et E' divisorem communem non habent, illi numeri eiecti omnes sint non-residua, atque hi superstites residua producti EE' , manifestum est, usum excludentis EE' in hoc casu omnino tantundem efficere, ac usum duorum E , E' , adeoque illum, post hunc, superfluum fieri. Quare eos quoque excludentes omnes praeterire licebit, qui in duos factores inter se primos resolvi possunt, sufficetque iis uti, qui sunt vel numeri primi (ipsum m non metientes) vel primorum potestates.

Denique manifestum est, post usum excludentis p^μ , qui sit potestas numeri primi p , excludentem p seu p^ν , quando $\nu < \mu$, superfluum fieri; quum enim p^μ inter valores ipsius V sola sui residua reliquerit, a potiori non-residua ipsius p aut potestatis cuiusvis inferioris p^ν non amplius aderunt. Si vero p aut p^ν iam ante p^μ adhibitus est, hic manifesto tales tantum valores ipsius V eiicere potest, qui simul sunt residua ipsius p (aut p^ν) atque non-residua ipsius p^μ ; quare huiusmodi tantum non-residua ipsius p^μ pro a , b , c etc. accipere sufficet.

322. Computus numerorum α , β , γ etc. cuivis excludenti dato E respondentium multum contrahitur per observationes sequentes. Sint $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc. radices congruentiarum $my \equiv a$, $my \equiv b$, $my \equiv c$ etc. (mod E) atque k radix huius $my \equiv -A$, patetque fieri $\alpha \equiv \mathfrak{A} + k$, $\beta \equiv \mathfrak{B} + k$, $\gamma \equiv \mathfrak{C} + k$ etc.

Iam si ipsos $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc. revera per solutionem illarum congruentiarum eruere oportet, haec via ipsos α , β , γ etc. inveniendi nihilo utique brevior foret, quam ea quam supra ostendimus: sed illud neutiquam est necessarium. Si enim, primo, E est numerus primus, atque m residuum qu. ipsius E , patet per art. 98, ipsos $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ etc.

Band 1, Teil 9

Carl Friedrich Gauß

SOLUTIO AEQUATIONIS INDETERMINATAE $mx + ny = A$.

323

Omnes repraesentationes numeri dati A per formam binariam $mx + ny$, sive solutiones aequationis indeterminatae $mx + ny = A$, in Sectione V methodo generali invenire docuimus, cuius brevitatis quoque nihil desiderandum relinquere videtur, si omnes valores expr. $\sqrt{\frac{A}{mn}}$ secundum modulum A ipsum, et per suos factores quadratos divisum, iam habentur; hic autem pro eo casu, ubi mn est positivus, solutionem explicabimus, directa multo expeditiorem, si ad hanc illos valores antea computare oportet.

Supponemus autem, numeros m , n et A esse positivos atque inter se primos, quum casus reliqui ad hunc facile possint reduci. Manifesto quoque sufficit, valores positivos ipsorum x , y eruere, quum reliqui inde per solam signorum mutationem deducantur.

Perspicuum est, x ita comparatum esse debere, ut $\frac{A-mx}{n}$, pro quo scribemus V , positivus, integer, et quadratus evadat. Conditio prima requirit, ut x non sit maior quam $\sqrt{\frac{A}{m}}$; secunda iam per se locum habet, quando $n = 1$, alioquin requirit, ut valor expr. $-\frac{A}{n}(\text{mod. } m)$ sit residuum quadraticum ipsius m , designandoque omnes valores diversos expr. $\sqrt{-\frac{A}{n}(\text{mod. } m)}$ per $\pm r$, $\pm r'$ etc., x sub aliqua formarum $nt + r$, $nt - r$, $nt + r'$ etc. contentus esse debeat.

Simplicissimum itaque foret, omnes numeros harum formarum infra litem $\sqrt{\frac{A}{m}}$, quorum complexum per Ω exprimemus, pro x substituere, eosque solos retinere, pro quibus V fit quadratum. Hoc tentamen, quantum lubeat, contrahere, in art. sq. docebimus.

324

Methodus exclusionum, per quam hoc efficiemus, perinde ac in disqu. praec. in eo consistit, ut plures numeros, etiam hic *excludentes* vocandos, ad lubitum accipiamus, pro quibusnam valoribus ipsius x valor ipsius V fiat non-residuum qu. horum excludentium, investigemus, talesque e Ω eiiciamus.

Per ratiocinia iis quae in art. 321 exposuimus, omnino analoga apparet, tales tantum excludentes adhibendos esse, qui sint numeri primi aut numerorum primorum potestates, et pro excludente posterioris generis ea tantum ipsius non-residua a valoribus ipsius V arcenda, quae sint residua omnium potestatum inferiorum eiusdem numeri primi, siquidem exclusio cum his iam est instituta.

Si itaque excludens $E = p^\mu$ (includendo etiam eum casum ubi $\mu = 1$), ubi p est numerus primus ipsum m non metiens, supponamusque¹ p^ν esse summam potestatem eiusdem

¹Brevitatis caussa duos casus, in quibus n per p est divisibilis ac non divisibilis, simul complectimur; in posteriori $\nu = 0$ ponere oportet.

numeri primi per quam n sit divisibilis. Sint a, b, c etc. non-residua quadratica ipsius E (omnia, quando $\mu = 1$; necessaria sive ea quae sunt residua potestatum inferiorum, quando $\mu > 1$). Computentur radices congruentiarum $mz \equiv A - na, mz \equiv A - nb$ etc. (mod. $Ep^\nu = p^{\mu+\nu}$), quae sint α, β, γ etc., patetque facile, si pro quo valore ipsius x fiat $xx \equiv \alpha$ (mod. Ep^ν), valorem respondentem ipsius V fieri $\equiv na$ (mod. E) sive non-residuum ipsius E , similiterque de numeris reliquis β, γ etc.; aequae facile vice versa perspicitur, si quis valor ipsius x producat $V \equiv na$ (mod. E), pro eodem fieri $mx \equiv A - na$ (mod. Ep^ν), adeoque omnes valores ipsius x , pro quibus mx nulli numerorum α, β, γ etc. sec. mod. Ep^ν congruus sit, tales valores ipsius V producere, qui nulli numerorum a, b, c etc. sec. mod. E sint congrui.

Eligantur iam e numeris α, β, γ etc. omnia residua quadratica ipsius Ep^ν , quae sint h, h', h'' etc., computentur valores expressionum $\sqrt{h}, \sqrt{h'}, \sqrt{h''}$ etc. (mod. Ep^ν), ponamusque hinc prodire $\pm k, \pm k', \pm k''$ etc. His ita factis manifestum est, omnes numeros formarum $Ep^\nu t + k, Ep^\nu t + k', Ep^\nu t + k''$ etc. e Ω tuto eiici posse, nullique valori ipsius x in Ω post hanc exclusionem remanenti valorem ipsius V sub formis $Eu + a, Eu + b, Eu + c$ etc. contentum respondere posse.

Ceterum manifestum est, tales valores ipsius V iam per se e nullo valore ipsius x prodire posse, quando inter numeros α, β, γ etc. nulla residua qu. ipsius Ep^ν inveniantur, adeoque in hoc casu numerum E tamquam excludentem applicari non posse.

Huiusmodi excludentes, quot placet, adhiberi, atque sic numeri in Ω ad lubitum diminui possunt.

Videamus iam, annon etiam numeros primos ipsum m metientes, taliumve numerorum potestates tamquam excludentes adhibere liceat.

Sit B valor expr. $-\frac{A}{m}$ (mod. m), patetque, V semper ipsi B secundum mod. m congruum fieri, quicunque valor pro x accipiat, adeoque ad possibilitatem aequ. prop. necessario requiri, ut B sit residuum quadraticum ipsius m . Designante itaque p divisorem quemcunque primum imparem ipsius m , qui per hyp. ipsos n et A , adeoque etiam ipsum B non metietur, pro valore quocunque ipsius x erit V residuum ipsius p adeoque etiam cuiuscunque potestatis ipsius p ; quamobrem p ipsiusque potestates nequeunt excludentium loco haberi.

Prorsus simili ratione, quando m per 8 est divisibilis, ad aequ. prop. possibilitatem necessario requiri, ut sit $B \equiv 1$ (mod. 8), unde etiam V pro valore quocunque ipsius x fiet $\equiv B \equiv 1$ (mod. 8), et proin binarii potestates ad exclusionem non idoneae.

Quando autem m per 4 neque vero per 8 est divisibilis, ex simili ratione esse debet $B \equiv 1$ (mod. 4), adeoque valor expr. $-\frac{A}{m}$ (mod. 8) vel 1 vel 5, designetur per C . Nullo negotio perspicitur, pro valore pari ipsius x hic fieri $V \equiv C$; pro impari, $V \equiv C+4$ (mod. 8); unde patet, valores pares reiiciendos esse, quando $C = 5$; impares, quando $C = 1$.

Denique quando m per 2, neque vero per 4 est divisibilis, sit ut ante C valor expr. $-\frac{A}{m}$ (mod. 8), qui erit 1, 3, 5 vel 7; atque D valor huius $-\frac{A}{m}$ (mod. 4), qui erit 1 vel 3. Iam quum valor ipsius V manifesto semper fiat $\equiv C - D \cdot \frac{1}{2}(xx - x)$ (mod. 8), adeoque pro x pari $\equiv C$, pro impari $\equiv C - 2D$, facile hinc colligitur, reiiciendos esse omnes valores impares ipsius x , quando $C = 1$; omnes pares, quando $C = 3$ et $D = 1$, aut $C = 7$ et $D = 3$, atque valores remanentes omnes producere $V \equiv 1$ (mod. 8) sive residuum cuiusvis potestatis binarii; in casibus reliquis autem, puta quando $C = 5$, aut $C = 3$ et $D = 3$, aut $C = 7$ et $D = 1$, fiet $V \equiv 3, 5$ vel 7 (mod. 8), sive x accipiat par sive impar, unde liquet, in his casibus aequationem prop. solutionem omnino non admittere.

Ceterum quum prorsus simili modo, ut hic valorem ipsius x per exclusiones invenire docuimus, etiam, mutatis mutandis, valorem ipsius y elicere possimus, methodum exclu-

sionis ad problematis propositi solutionem duobus semper modis applicare licebit (nisi $m = n = 1$, ubi coincidunt), e quibus is plerumque est praeferendus, pro quo $\mathfrak{Q}$ terminorum multitudinem minorem continet, quod facile a priori aestimari poterit.

Denique vix necesse erit observare, si post aliquot exclusiones omnes numeri e $\mathfrak{Q}$ abierint, hoc ut certum indicium impossibilitatis aequationis propositae esse considerandum.

325

Ex. Proposita sit aequatio $455xx + 3yy = 10857362$, quam duplici modo solvemus, primo investigando valores ipsius x , dein valores ipsius y .

Limes illorum in hoc casu est $\sqrt{\frac{36191201}{455}}$, qui cadit inter 1902 et 1903; valor expr. $-\frac{A}{n} \pmod{m}$ est 354 atque valores expr. $\sqrt{354} \pmod{455}$ hi $\pm 82, \pm 152, \pm 173, \pm 212$. Hinc $\mathfrak{Q}$ constat e 33 numeris sequentibus:

82, 152, 173, 212, 243, 282, 303, 373, 537, 607, 628, 667, 698, 737, 758,
828, 992, 1062, 1083, 1122, 1153, 1192, 1213, 1283, 1447, 1517, 1538, 1577, 1608, 1647, 1668, 1738, 1902

Numerus 3 in hoc casu ad exclusionem adhiberi nequit, quia ipsum m metitur.

Pro excludente 4 habemus $a = 2, b = 3$, unde $\alpha = 1, \beta = 3; \mathfrak{h} = 1$, atque valores expr. $\sqrt{1} \pmod{4}$ hos 1 et 3; hinc sequitur, omnes numeros formarum $4t$ et $4t + 2$, i. e. omnes pares e $\mathfrak{Q}$ eiiciendos esse; designentur (sedecim) reliqui per $\mathfrak{Q}'$.

Pro $E = 5$, qui etiam ipsum n metitur, habemus radices congruentiarum $mz \equiv A - 2n$ et $mz \equiv A - 3n \pmod{25}$ has 9 et 24, quae ambae sunt residua ipsius 25, valoresque expressionum $\sqrt{9}$ et $\sqrt{24} \pmod{25}$ fiunt $\pm 3, \pm 7$; eiectis e $\mathfrak{Q}'$ omnibus numeris formarum $25t + 3, 25t + 7$ restant hi decem ($\mathfrak{Q}''$):

173, 373, 537, 667, 737, 1083, 1213, 1283, 1517, 1577.

Pro $E = 7$, habemus congruentiarum $mz \equiv A - 2n, mz \equiv A - 3n, mz \equiv A - 5n, mz \equiv A - 6n \pmod{49}$ radices 32, 39, 18, 11, quae omnes sunt residua ipsius 49, atque valores expr. $\sqrt{32}, \sqrt{39}, \sqrt{18}, \sqrt{11} \pmod{49}$ hos $\pm 9, \pm 23, \pm 19, \pm 13$; eiectis e $\mathfrak{Q}''$ numeris formarum $49t + 9, 49t + 19, 49t + 23$ remanent hi quinque ($\mathfrak{Q}'''$):

537, 737, 1083, 1213, 1517.

Pro $E = 8$ habemus $a = 5$, unde $\alpha = 5$, qui est non-residuum ipsius 8; quare excludens 8 non potest adhiberi.

Numerus 9 ex eadem ratione praetereundus est ut 3.

Pro $E = 11$ numeri a, b etc. fiunt 2, 6, 7, 8, 10; $\nu = 0$; unde numeri α, β etc. = 8, 10, 5, 0, 1, e quibus tres sunt residua ipsius 11 puta 0, 1, 5; hinc deducitur, e $\mathfrak{Q}'''$ reiiciendos esse numeros formarum $11t, 11t + 1, 11t + 4$, quo facto remanent 537, 1083, 1213. Quos tentando prodeunt pro V resp. valores 21961, 16129, 14161, e quibus secundus ac tertius soli sunt quadrata.

Quare aequ. prop. duas solutiones per valores positivos ipsorum x, y admittit:

$$x = 1083, y = 127, \quad \text{et} \quad x = 1213, y = 119.$$

SECUNDO. Si alteram eiusdem aequationis incognitam per exclusiones indagare placet, ponatur haec sub formam $455yy + 3xx = 10857362$, commutando x cum y , ut omnia signa artt. 323, 324 retinere liceat.

Limes valorum ipsius x hic cadit inter 154 et 155; valor expr. $-\frac{A}{m} \pmod{n}$ est 1; valores huius $\sqrt{1} \pmod{3}$ sunt +1 et -1. Quare Ω continet omnes numeros formarum $3t + 1$ et $3t - 1$, i.e. omnes per 3 non divisibiles usque ad 154 incl., quorum multitudo est 103; applicando autem praecepta supra data invenitur, pro excl. 3; 4; 9; 11; 17; 19; 23 reiiciendos esse numeros formarum $9t + 4$, 5; $4t + 2$ sive omnes pares; $27t + 1$, $27t + 10$; $11t$, $11t + 1$, $11t + 3$; $17t + 3$, $17t + 4$, $17t + 5$, $17t + 7$; $19t + 2$, $19t + 3$, $19t + 8$, $19t + 9$; $23t$, $23t + 1$, $23t + 5$, $23t + 7$, $23t + 9$, $23t + 10$. His deletis superstites inveniuntur 119, 127, qui duo soli ipsi V valorem quadratum conciliant, easdemque solutiones suggerunt, ad quas supra pervenimus.

326

Methodus praecedens iam per se tam expedita est, ut vix quidquam optandum relinquat; attamen per multifaria artificia magnopere adhuc contrahi potest, e quibus hic pauca tantum attingere licet. Restringemus itaque disquisitionem ad eum casum, ubi excludens est numerus primus impar ipsum A non metiens, sive talis primi potestas, praesertim quoniam casus reliqui vel ad hunc reduci vel methodo analogae tractari possunt.

Supponendo p non ipsum m neque n metiri, excludentem $E = p$ esse numerum primum ipsos m , n non metientem, atque valores expr. $\frac{A}{m}$, $-\frac{na}{m}$, $-\frac{nb}{m}$, $-\frac{nc}{m}$ etc. $\pmod{p}$ resp. k , $\mathfrak{k}$, $\mathfrak{l}$, $\mathfrak{m}$ etc.: numeri α , β , γ etc. inveniuntur per congruentias $\alpha \equiv k + \mathfrak{k}$, $\beta \equiv k + \mathfrak{l}$, $\gamma \equiv k + \mathfrak{m}$ etc. $\pmod{p}$. Numeri $\mathfrak{k}$, $\mathfrak{l}$, $\mathfrak{m}$ etc. autem per artificium ei prorsus simile, quo in art. 322 usi sumus, sine congruentiarum computatione erui possunt, et vel cum omnibus non-residuis, vel cum omnibus residuis ipsius p (praeter 0) convenient, prout valor expr. $-\frac{n}{m} \pmod{p}$, sive (quod hic eodem redit) numerus $-\frac{4}{m}mn$ est residuum vel non-residuum ipsius p .

Ita in ex. II art. praec. pro $E = 11$ fit $k = 1$; $-mn = -1365 \equiv 12$ est non-residuum ipsius 17; hinc numeri $\mathfrak{k}$, $\mathfrak{l}$ etc. erunt 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16 adeoque numeri α , β etc. 8, 9, 11, 15, 16, 3, 5, 6; ex his residua sunt 8, 9, 11, 15, 16, unde $\pm \mathfrak{k}'$ fiunt ± 3 , ± 7 .

Quibus saepius occasio est huiusmodi problemata solvendi, commoditati suae eximie consulent, si pro pluribus numeris primis p , valores ipsorum $\mathfrak{k}$, $\mathfrak{l}$ etc. singulis valoribus ipsorum k (1, 2, 3... $p - 1$) respondentibus, in duplici suppositione (puta ubi $-mn$ est residuum et ubi non-residuum ipsius p) computent.

Ceterum observamus adhuc, multitudinem numerorum $\mathfrak{k}$, $\pm \mathfrak{k}'$, $\mathfrak{l}$ etc. semper esse $\frac{1}{4}(p - 1)$, quando uterque numerus k et $-mn$ sit residuum vel uterque non-residuum ipsius p ; $\frac{1}{4}(p - 3)$, quando prior R., posterior N.; $\frac{1}{4}(p + 1)$, quando prior N., posterior R.; sed demonstrationem huius theorematis, ne nimis prolixi fiamus, suppressere debemus.

Quod autem, secundo, eos casus attinet, ubi E est numerus primus ipsum n metiens, aut potestas numeri primi (imparis) ipsum n metientis seu non metientis, hi adhuc expeditius tractari possunt. Omnes hos casus simul complectemur, omnibusque art. 324 signis retentis ponemus $n = \tilde{n}p^\nu$, ita ut $\tilde{n}$ per p non sit divisibilis.

Numeri a , b , c etc. erunt producta numeri $p^{\nu-1}$ vel in omnes numeros ipso p minores (praeter 0), vel in omnia non-residua ipsius p infra p prout ν est par vel impar; exprimantur indefinite per $up^{\nu-1}$. Sit k valor expr. $\frac{A\tilde{n}}{m} \pmod{p^{\mu+\nu}}$, eritque per p non divisibilis, quia eadem proprietas in A supponitur; porro patet, omnes α , β , γ etc. ipsi k sec. mod. p congruos fieri, adeoque p^μ nihil e Ω excludere, si $k \not\equiv 0 \pmod{p}$; si vero $k \equiv 0 \pmod{p}$ adeoque etiam $k \equiv 0 \pmod{p^{\mu+\nu}}$, sit r valor expr. $\sqrt{k} \pmod{p^{\mu+\nu}}$, qui per p non erit divisibilis, atque ε valor huius $\frac{rr-A}{rp^{\nu-1}} \pmod{p}$, eritque $\alpha \equiv rr + 2\varepsilon rup^{\nu-1} \pmod{p^{\mu+\nu}}$, unde facile colligitur, α esse residuum ipsius $p^{\mu+\nu}$, atque valores expr. $\sqrt{\alpha} \pmod{p^{\mu+\nu}}$ fieri $\pm(r + \varepsilon up^{\nu-1})$; hinc omnes $\mathfrak{k}$, $\mathfrak{k}'$, $\mathfrak{k}''$ etc. exprimentur per $r + \varepsilon up^{\nu-1}$.

Denique nullo negotio hinc concluditur, numeros $\mathfrak{k}$, $\mathfrak{k}'$, $\mathfrak{k}''$ etc. oriuri ex additione numeri r cum productis numeri $p^{\nu+\mu-1}$ vel in omnes numeros infra p (praeter 0), puta quando μ par; vel in omnia non-residua ipsius p infra hunc limitem, quando μ impar atque $\varepsilon R p$ sive, quod hic eodem redit, quando $-\frac{4}{m}mn R p$; vel in omnia residua (praeter 0), quando μ impar atque $-\frac{4}{m}mn N p$.

Ceterum simulac pro singulis excludentibus, quos applicare placet, numeri $\mathfrak{k}$, $\mathfrak{k}'$ etc. sunt eruti, exclusionem ipsam etiam per operationes mechanicas perficere licebit, quales quisque harum rerum peritus facile proprio Marte excogitare poterit, si operae pretium esse videbitur.

Tandem observare debemus, quamvis aequationem $axx + 2bxy + cyy = M$, in qua $bb - ac$ negativus $= -D$, facile ad eam formam, quam in praec. consideravimus, reduci posse. Designando enim divisorem communem maximum numerorum a , b per m , et ponendo $a = md$, $b = mb'$, $-de + mb'b' = n$, $dx + b'y = x$ aequ. illa manifesto aequivalet huic $mxx + nyy = dM$, quae per praecepta supra tradita solvi poterit. Ex huius autem solutionibus ea tantum erunt retinendae, in quibus $x' - b'y$ per d fit divisibilis, sive unde x valores integres nanciscitur.

ALIA METHODUS CONGRUENTIAM $xx \equiv A$ SOLVENDI PRO EO CASU, UBI A EST NEGATIVUS.

327

Quemadmodum solutio directa aequationis $axx + 2bxy + cyy = M$ in Sect. V contenta valores expr. $\sqrt{(bb - ac)} \pmod{M}$ notos supponit: ita vice versa pro eo casu, ubi $bb - ac$ est negativus, solutio indirecta in praec. exposita methodum expeditissimam subministrat, illos valores eruendi, quae, praesertim pro valore permagno ipsius M , methodo art. 322 sqq. longo est praeferenda.

Supponemus autem, M esse numerum primum, aut saltem ipsius factores, si compositus esset, adhuc incognitos; si enim constaret, numerum primum p ipsum M metiri, atque esse $M = p^\mu M'$, ita ut M' factorem p non amplius implicet, longe commodius foret, valores expr. $\sqrt{\mu(bb - ac)}$ pro modulis p^μ et M' sigillatim explorare (priores ex valoribus secundum modulum p , art. 101), valoresque sec. mod. M ex horum combinatione deducere (art. 105).

Quaerendi sint itaque omnes valores expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$, ubi D et M positivi supponuntur, atque M sub forma divisorum ipsius $xx + D$ contentus (art. 147 sqq.), alioquin enim a priori constaret, nullos numeros expressioni propositae satisfacere posse.

Sint valores quaesiti, e quibus bini semper oppositi erunt, $\pm r$, $\pm r'$, $\pm r''$ etc., atque $D + rr = Mh$, $D + r'r' = Mh'$, $D + r''r'' = Mh''$ etc.; porro designentur classes, ad quas formae (M, r, h) , $(M, -r, h)$, (M, r', h') , $(M, -r', h')$, (M, r'', h'') , $(M, -r'', h'')$ etc. pertinent, resp. per $\mathfrak{C}$, $-\mathfrak{C}$, $\mathfrak{C}'$, $-\mathfrak{C}'$, $\mathfrak{C}''$, $-\mathfrak{C}''$ etc., ipsarumque complexus per $\mathfrak{G}$.

Hae classes quidem, generaliter loquendo, tamquam incognitae sunt spectandae; at tamen perspicuum est, primo, omnes esse positivas atque proprie primitivas, secundo, omnes ad idem genus pertinere, cuius character ex indole numeri M , i. e. ex ipsius relationibus ad singulos divisores primos ipsius D (insuperque ad 4 aut 8, quando hae sunt necessariae) facile cognosci possit (art. 230).

Quum suppositum sit, M contineri sub forma divisorum ipsius $xx + D$, a priori certi esse possumus, huic characteri necessario genus pos. pr. pr. formarum determ. $-D$ respondere, etiamsi fors expressioni $\sqrt{-D} \pmod{M}$ satisfieri nequeat; quum itaque hoc

genus sit notum, omnes classes in ipso contentae erui poterunt, quae sint C, C', C'' etc., atque ipsarum complexus G .

Patet igitur, singulas classes $\mathfrak{C}, -\mathfrak{C}$ etc. cum aliqua classe in G identicas esse debere; fieri potest quoque, ut plures classes in $\mathfrak{G}$ inter se, adeoque cum eadem in G identicae sint, et quando G unicam classem continet, certo omnes in $\mathfrak{G}$ cum hac convenient.

Quare si e classibus C, C', C'' etc. formae (simplissimae) f, f', f'' etc. eliguntur, (una e singulis): e singulis classibus in $\mathfrak{G}$ una forma inter has reperietur.

Iam si $axx+2bxy+cyx$ est forma in classe $\mathfrak{C}$ contenta, dabuntur duae repraesentationes numeri M per ipsam ad valorem r pertinentes, et si una est $x = m, y = n$, altera erit $x = -m, y = -n$; unicus casus excipi debet, ubi $D = 1$, in quo quatuor repraesentationes dabuntur (v. art. 180).

Ex his colligitur, si omnes repraesentationes numeri M per singulas formas f, f', f'' etc. investigentur (per methodum indirectam in praec. traditam), atque hinc valores expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$, ad quos singulae pertinent deducantur (art. 154 sqq.), omnes valores huius expressionis inde obtineri, et quidem singulos bis, aut, si $D = 1$, quater. Q. E. F.

Si quae formae inter f, f' etc. reperiuntur, per quas M repraesentari nequit, hoc est indicium, ipsas ad nullam classem in $\mathfrak{G}$ pertinere, adeoque negligendas esse: si vero M per nullam illarum formarum repraesentari potest, necessario $-D$ debebit esse non-residuum quadraticum ipsius M .

Circa has operationes teneantur adhuc observationes sequentes.

I. Repraesentationes numeri M per formas f, f' etc., quas hic adhibemus, subintel-
liguntur esse tales, in quibus indeterminatarum valores inter se primi sunt; si quae aliae se offerunt, in quibus hi valores divisorem communem μ habent (quod tunc tantummodo accidere potest, ubi μ^2 ipsum M metitur, certoque accidet, quando $-D \equiv 0$): hae ad institutum praesens omnino negligi debent, etsi alio respectu utiles esse possint.

II. Ceteris paribus labor manifesto eo facilius erit, quo minor est multitudo classium f, f', f'' etc., adeoque brevissimus, quando D est unus e 65 numeris in art. 303 traditis, pro quibus in singulis generibus unica tantum classis datur.

III. Quum binae semper huiusmodi repraesentationes $x = m, y = n; x = -m, y = -n$ ad eundem valorem pertineant, perspicuum est, sufficere, si eae tantummodo repraesentationes considerentur, in quibus y positivus. Tales itaque repraesentationes diversae semper valoribus diversis expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$ respondent, unde multitudo omnium valorum diversorum multitudini omnium talium repraesentationum prodeuntium aequalis erit (semper excipiendo casum $D = 1$, ubi illa huius semissis erit).

IV. Quoniam, simulac alter duorum valorum oppositorum $+r, -r$, cognitus est, alter sponte innotescit, operationes adhuc aliquantum abbreviari possunt. Si valor r obtinetur e repraesentatione numeri M per formam in classe C contentam, i. e. si $\mathfrak{C} = C$; valor oppositus $-r$ manifesto emerget e repraesentatione per formam, in classe ipsi C opposita contentam, quae differens erit a classe C , nisi haec est anceps. Hinc sequitur, quando non omnes classes in G ancipites sint, e reliquis semissem tantum considerare oportere, puta e binis oppositis quibusque unam, alteram negligendo, e qua valores iis, quos prior suppeditavit, oppositos resultare iam absque calculo praevidere licet. Quando autem C est anceps, ambo valores r et $-r$ simul inde emergent; puta, si ex C forma anceps $axx+2bxy+cyx$ electa est, atque valor r prodiit e repr. $x = m, y = n$, valor $-r$ prodibit ex hac $x = -m, y = n$.

V. Pro eo casu, ubi $D = 1$, una tantum classis omnino datur, e qua formam $xx + yy$ electam esse supponere licebit. Quodsi valor r ex repraesentatione $x = m, y = n$ provenit, idem ex his prodibit $x = -m, y = -n; x = n, y = -m; x = -n, y = m$, oppositusque

$-r$ ex his $x = m, y = -n; x = -m, y = n; x = n, y = m; x = -n, y = -m$; quare ex his octo repr., quae unicam discriptionem constituunt, una sufficit, si modo valori inde resultanti oppositum associemus.

VI. Valor expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$, ad quem repr. haec $M = amm + 2bmn + cnn$ pertinet, per art. 155 est $\mu(mb + nc) - \nu(ma + nb)$ sive numerus quicunque huic secundum M congruus, ipsis μ, ν ita acceptis, ut fiat $\mu m + \nu n = 1$. Designando itaque talem valorem per v , erit

$$mv \equiv m(\mu b + \nu c) - \nu(M - mn) \equiv \mu(mb + nc) \equiv \mu r \pmod{M}.$$

Hinc patet, v esse valorem expr. $\frac{\mu r}{m} \pmod{M}$; similique modo invenitur, v esse valorem expr. $-\frac{\nu r}{n} \pmod{M}$. Hae formulae saepenumero ei, ex qua deductae fuerunt, praeferendae sunt.

328

EXEMPLA.

I. Quaeruntur omnes valores expr. $\sqrt{-1365} \pmod{5428681 = M}$; numerus M hic est $= 1, 1, 1, 6, 11 \pmod{4, 3, 5, 7, 13}$ adeoque sub forma divisorum ipsorum $xx + 1, xx + 3, xx + 7, xx - 5$, et sub forma non-divisorum ipsorum $xx + 1, xx - 13$, et proin sub forma divisoris ipsius $xx + 1365$ contentus; characterque generis, in quo classes $\mathfrak{G}$ reperientur, erit $1, 4; R3; R5; N7; N13$. In hoc genere unica classis continetur, e qua eligimus formam $6xx + 6xy + 229yy$; ut omnes repraesentationes numeri M per hanc inveniantur, ponemus $2x + y = x'$, unde fieri debebit $6x'x' + 455yy = 2M$. Haec aequatio quatuor solutiones admittit, in quibus y est positivus, puta $y = 127, x' = \pm 1083, y = 119, x' = \pm 1213$. Hinc prodeunt quatuor solutiones aequ. $6xx + 6xy + 229yy = M$, in quibus y positivus,

x	y
30517	127
3249	127
478	119
-605	119

Solutio prima dat pro v valorem expr. $\frac{30517}{127}$ sive $-\frac{605}{127} \pmod{M}$, unde invenitur 2350978; secunda producit valorem oppositum -2350978 ; tertia hunc 2600262, quarta oppositum -2600262 .

II. Si quaerendi sunt valores expr. $\sqrt{-286} \pmod{4272943 = M}$, character generis, in quo classes $\mathfrak{G}$ contentae sunt, invenitur $1, 7, 8; R11; R13$; quare erit genus principale, in quo tres classes continentur, per formas $(1, 0, 286), (14, 6, 23), (14, -6, 23)$ exhibitae; ex his tertiam, utpote secundae oppositam negligere licet. Per formam $xx + 286yy$ duae repraesentationes numeri M inveniantur, in quibus y positivus, puta $y = 103, x = \pm 1113$, unde prodeunt valores expr. propositae hi 1493445, -1493445 . Per formam $(14, 6, 23)$ autem M non repraesentabilis invenitur, unde concluditur, praeter duos valores inventos alios non dari.

III. Proposita expr. $\sqrt{-70} \pmod{997331}$, classes $\mathfrak{G}$ contentae esse debebunt in genere, cuius character 1 et $7, 8; R5; N7; N11$; in hoc unica classis reperitur, cuius forma repraesentans haec $(5, 0, 14)$. At calculo instituto invenitur, numerum 997331 per formam $(5, 0, 14)$ non esse repraesentabilem, quamobrem -70 necessario erit non-residuum qu. illius numeri.

DUAE METHODI, NUMEROS COMPOSITOS A PRIMIS DIGNOSCENDI, ILLORUMQUE FACTORES INVESTIGANDI.

329

Problema, numeros primos a compositis dignoscendi, hosque in factores suos primos resolvendi, ad gravissima ac utilissima totius arithmeticae pertinere, et geometrarum tum veterum tum recentiorum industriam ac sagacitatem occupavisse, tam notum est, ut de hac re copiose loqui superfluum foret. Nihilominus fateri oportet, omnes methodos hucusque prolatas vel ad casus valde speciales restrictas esse, vel tam operosas et prolixas, ut iam pro numeris talibus, qui tabularum a viris meritis constructarum limites non excedunt, i.e. pro quibus methodi artificiales supervacuae sunt, calculatoris etiam exercitati patientiam fatigent, ad maiores autem plerumque vix applicari possint.

Etsi vero illae tabulae, quae in omnium manibus versantur, et quas subinde adhuc ulterius continuatum iri sperare licet, in plerisque casibus vulgo occurrentibus utique sufficient: tamen calculatori perito occasio haud raro se offert, e numerorum magnorum resolutione in factores magna emolumenta capiendi, quae temporis dispendium mediocre largiter compensent; praetereaque scientiae dignitas requirere videtur, ut omnia subsidia ad solutionem problematis tam elegantis ac celebris sedulo excolantur.

Propter has rationes non dubitamus, quin duae methodi sequentes, quarum efficaciam ac brevitem longa experientia confirmare possumus, arithmeticae amatoribus haud ingratae sint futurae. Ceterum in problematis natura fundatum est, ut methodi quaecunque continuo prolixiores evadant, quo maiores sunt numeri, ad quos applicantur; attamen pro methodis sequentibus difficultates perlente increscunt, numerique e septem, octo vel adeo adhuc pluribus figuris constantes praesertim per secundam felici semper successu tractati fuerunt, omnique celeritate, quam pro tantis numeris expectare aequum est, qui secundum omnes methodos hactenus notas laborem, etiam calculatori indefatigabili intolerabilem, requirerent.

Antequam methodi sequentes in usum vocentur, semper utilissimum est, divisionem numeri cuiusque propositi per aliquot numeros primos minimos tentare, puta per 2, 3, 5, 7 etc. usque ad 19 aut adhuc ulterius, non solum, ne poeniteat, talem numerum, quando divisor est, per methodos subtiles ac artificiosas eruisse, qui multo facilius per solam divisionem inveniri potuisset², sed etiam, quod tunc, ubi nulla divisio successit, applicatio methodi secundae residuis ex illis divisionibus ortis magno cum fructu utitur.

Ita e.g. si numerus 314159265 in factores suos resolvendus est, divisio per 3 bis succedit, posteaque etiam divisiones per 5 et 7, unde habetur $314159265 = 9 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 997331$, sufficitque numerum 997331, qui per 11, 13, 17, 19 non divisibilis invenitur, examini subtiliori subiicere. Similiter proposito numero 43429448, factorem 8 auferemus, methodosque magis artificiales ad quotientem 5428681 applicabimus.

330

Fundamentum methodi primae est theorema, quemvis numerum positivum seu negativum, qui alius numeri M residuum quadraticum sit, etiam residuum cuiusvis divisoris ipsius M esse. Vulgo notum est, si M per nullum numerum primum infra $\sqrt{M}$ divisibilis sit,

²Eo magis, quod inter sex numeros, generaliter loquendo, vix unus per omnes 2, 3, 5...19 non divisibilis reperitur.

certo M esse primum; si vero omnes numeri primi infra hunc limitem, ipsum M metientes sint p, q etc. numerum M vel ex his solis (ipsorumve potestatibus) compositum esse, vel unum tantum alium factorem primum maiorem quam $\sqrt{M}$ implicare posse, qui invenitur, dividendo ipsum M per p, q etc., quoties licet.

Designando itaque complexum omnium numerorum primorum infra $\sqrt{M}$ (exclusis iis, per quos divisio frustra iam tentata est) per Ω , manifesto sufficit, si omnes divisores primi ipsius M , in Ω contenti, habeantur.

Iam si alicunde constat, numerum aliquem r (non-quadratum) esse residuum quadraticum ipsius M , nullus certo numerus primus cuius N est r divisor ipsius M esse potest; quare e Ω omnes huiusmodi numeros primos (qui plerumque omnium semissem fere efficient) eiicere licebit.

Si insuper de alio numero non-quadrato, r' , constat, ipsum esse residuum ipsius M , e numeris primis in Ω post primam exclusionem relictis iterum eos excludere poterimus, quorum N est r' , qui rursus illorum semissem fere conficient, siquidem residua r et r' sunt independentia, (i. e. nisi alterum necessario per se est residuum omnium numerorum, quorum residuum est alterum, quod eveniret, quando rr' esset quadratum).

Si adhuc alia residua ipsius M noti sunt, r'', r''' etc., quae omnia a reliquis sunt independentia³, cum singulis exclusiones similes institui possunt, per quas multitudo numerorum in Ω rapidissime diminuetur, ita ut mox vel omnes deleti sint, in quo casu M certo erit numerus primus, vel tam pauci restent (inter quos omnes divisores primi ipsius M , si quos habet, manifeste reperientur), ut divisio per ipsos nullo negotio tentari possit.

Pro numero millionem non multum superante plerumque sex aut septem; pro numero ex octo aut novem figuris constante, novem aut decem exclusiones abunde sufficient. Duo iam sunt, de quibus agere oportebit, primo quomodo residua ipsius M idonea et satis multa inveniri possint, deinde quo pacto exclusionem ipsam commodissime perficere liceat. Sed ordinem harum quaestionum invertemus, praesertim quoniam secunda docebit, qualia potissimum residua ad hunc finem sint commoda.

331

Numeros primos, quorum residuum est numerus datus r (quem per nullum quadratum divisibilem supponere licet), ab iis, quorum non-residuum est, sive divisores expr. $xx - r$ a non-divisoribus distinguere, in Sect. IV copiose docuimus, scilicet omnes priores sub certis huiusmodi formulis $rz + a, rz + b$ etc., aut talibus $4rz + a, 4rz + b$ etc. contentos esse, posterioresque sub aliis similibus.

Quoties r est numerus valde parvus, exclusiones adiumento harum formularum percommode perfici possunt; e. g. excludendi erunt omnes numeri formae $4z + 3$, quando $r = -1$; omnes numeri formarum $8z + 3$ et $8z + 5$, quando $r = 2$ etc.

Sed quum non semper in potestate sit, huiusmodi residua numeri propositi M invenire, neque formularum applicatio pro valore magno ipsius r satis commoda sit, ingens lucrum est, laboremque exclusionis mirifice sublevat, si pro multitudine satis magna numerorum (r) per quadratum non divisibilium tum positivorum tum negativorum tabula iam constructa habetur, in qua numeri primi, quorum residua sunt illi singuli (r), ab iis, quorum non-residua sunt, distinguuntur.

³Si productum e numeris quocunque r, r', r'' etc. quadratum est: quisque ipsorum e. g. r erit residuum cuiusvis numeri primi (nullum ex ipsis metientis), qui reliquorum r', r'' etc. residuum est. Ut igitur residua quocunque tamquam independentia considerari possint, nullum productum nec e binis, nec e ternis etc. quadratum esse oportet.

Talis tabula perinde adornari poterit ac specimen ad calcem huius operis adiectum supraque iam descriptum; sed ut ad institutum praesens utilitatem satis amplam praestet, numeri primi in margine positi (moduli) longe ulterius puta saltem usque ad 1000 aut ad 10000 continuati esse debent, praetereaue commoditas multum augetur, si in facie etiam numeri compositi et negativi recipiuntur, etsi hoc non sit absolute necessarium, ut e Sect. IV perspicuum est.

Ad summum autem commoditatis fastigium usus talis tabulae evehetur, si singulae columellae verticales, e quibus constat, exsecantur lamellisque aut baculis (Neperianis similibus) agglutinantur, ita ut eae, quae in quovis casu sunt necessariae i. e. quae numeris r, r', r'' etc., residuis numeri propositi in factores resolvendi, respondent, separate examinari possint. Quibus iuxta tabulae columnam primam (quae modulus exhibet) rite positae, i. e. ita, ut loca singulorum baculorum eidem numero primo columnae primae respondentium cum hoc in directum iaceant, sive in eadem linea horizontali siti sint: manifesto ei numeri primi, qui post exclusiones cum residuis r, r', r'' etc. e Ω remanent, per solam inspectionem immediate cognosci poterunt; nimirum hi convenient cum iis in columna prima, quibus in omnibus baculis adiacentibus lineolae respondent, reiciique debent omnes, quibus in ullo bacillo spatium vacuum adiacet.

Per exemplum haec sufficienter illustrabuntur. Si alicunde constat, numeros $-6, +13, -14, +17, +37, -53$ esse residua ipsius 997331, consociandae erunt columna prima (quae in hoc casu usque ad 997 continuata esse debet, i. e. usque ad numerum primum proxime minorem quam $\sqrt{997331}$) atque lamellae, in quarum facie numeri $-6, +13$ etc. sunt suprascripti.

Ecce partem schematis hoc modo prodeuntis:

	-6	+13	-14	+17	+37	-53	
3		—		—	—	—	
5	—			—	—	—	
7	—		—		—	—	
11		—	—	—	—		
13	—	—		—		—	
17		—		—	—	—	997331
19	—	—	—	—			
23		—	—		—	—	
29	—	—	—	—		—	
31		—		—	—	—	
37	—	—	—	—	—		
41		—	—	—	—	—	
43		—	—		—	—	
47	—	—		—		—	
53	—	—	—			—	
59	—	—	—	—	—		
61		—	—	—	—	—	
67	—		—		—	—	
71		—	—		—	—	
73	—	—	—		—		
79	—	—	—	—		—	
83		—	—	—	—		
89		—		—	—	—	
97	—	—	—	—	—	—	
	-6	+13	-14	+17	+37	-53	

Hinc perspicitur, ex Ω deletis numeris, quorum N est -6 (qui sunt 7, 13, 17, 19, 29, 37, 47, 53, 59, 67, 73, 79, 97), porro quorum N est $+13$ (qui sunt 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47, 53, 59, 61, 71, 73, 79, 83, 89, 97), quorum N est -14 (qui sunt 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97), quorum N est $+17$ (qui sunt 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97), quorum N est $+37$ (qui sunt 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97), quorum N est -53 (qui sunt 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97), omnes plane numeri primi infra 997 exclusi sunt, exceptis hisce 127 et 7853, qui igitur soli in Ω remanent, nec non in columna postrema adscripti sunt.

332

Restat, ut doceamus, quomodo residua ipsius M inveniri possint. Hic imprimis sequentes observationes ad rem faciunt.

Primo: non opus est, ut residua ipsa per se simplicissima sint; omnes enim numeri per quadrata divisibilia aequae utilia sunt ac parva; omniaque residua per methodos sequentes suppeditata a factoribus suis quadratis statim liberata supponemus.

Secundo: si duo pluresve numeri sunt residua, etiam productum ex ipsis residuum erit. Combinando hanc observationem cum praec., persaepe e pluribus residuis, quae non omnia sunt satis simplicia, aliud admodum simplex deduci potest, si modo illa multos factores

communes implicant. Hanc ob causam talia quoque residua valde sunt opportuna, quae e multis factoribus non nimis magnis composita sunt, convenietque omnia statim in factores suos resolvere.

Vis harum observationum melius per exempla usumque frequentem quam per praecepta percipietur.

I. Methodus simplicissima, iisque, qui per frequentem exercitationem iam aliquam dexteritatem sibi conciliaverunt, commodissima, consistit in eo, ut M aut generalius multipulum quodcunque ipsius M quomodocunque in duas partes decomponatur $kM = a + b$ (sive utraque sit positiva sive altera positiva altera negativa), quarum productum signo mutato erit residuum ipsius M ; erit enim $-ab \equiv aa \equiv bb \pmod{M}$, adeoque $-ab \text{ R.}$ Numeri a, b ita accipiendi sunt, ut productum per quadratum magnum divisibile quotiensque vel parvus vel saltem in factores non nimis magnos resolubilis evadat, quod semper non difficile effici poterit.

Imprimis commendandum est, ut pro a accipiat vel quadratum, vel quadratum duplex, vel triplex etc. a numero M numero vel parvo vel in factores commodos resolubili discrepans.

Ita e. g. invenitur

$$\begin{aligned} 997331 &= 999^2 - 2 \cdot 5 \cdot 67 = 994^2 + 5 \cdot 11 \cdot 13^2 = 2 \cdot 706^2 + 3 \cdot 17 \cdot 31^2 \\ &= 3 \cdot 575^2 + 11 \cdot 31 \cdot 41^2 = 3 \cdot 577^2 - 7 \cdot 13 \cdot 41^2 = 3 \cdot 578^2 - 7 \cdot 19 \cdot 37 \\ &= 11 \cdot 299^2 + 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 29 \cdot 41^2 = 11 \cdot 301^2 + 5 \cdot 12^2 \quad \text{etc.} \end{aligned}$$

Hinc habentur residua sequentia:

$$2 \cdot 5 \cdot 67, -5 \cdot 11, -2 \cdot 3 \cdot 17, -3 \cdot 11 \cdot 31, 3 \cdot 7 \cdot 13, 3 \cdot 7 \cdot 19 \cdot 37, -2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 29;$$

discerptio ultima suppeditat residuum $-5 \cdot 11$ quod iam habemus.

Pro residuis $-3 \cdot 11 \cdot 31, -2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 29$ haec adoptare possumus $3 \cdot 5 \cdot 31, 2 \cdot 3 \cdot 29$, ex illorum combinatione cum $-5 \cdot 11$ oriunda.

II. Methodus secunda et tertia inde petuntur, quod, si duae formae binariae $(A, B, C), (A', B', C')$ eiusdem determinantia M , aut $-M$, aut generalius $\pm kM$, ad idem genus pertinent, numeri $AA', AC', A'C$ sunt residua ipsius kM ; hoc nullo negotio inde perspicitur, quod numerus quivis characteristicus unius formae, puta m , etiam est numerus char. alterius, adeoque mA, mC, mA', mC' omnes residua ipsius kM .

Si itaque (a, b, a') est forma reducta determinantis positivi M aut generalius kM , atque $(a'', b'', a''), (a''', b''', a''')$ etc. formae ex ipsius periodo, adeoque ipsi aequivalentes et a potiori sub eodem genere contentae: numeri aa', aa'', aa''' etc. omnes erunt residua ipsius M . Computus multitudinis magnae formarum talis periodi facillime adiumento algorithmi art. 187 instituitur; residua simplicissima plerumque prodeunt statuendo $a = 1$; ea quae factores nimis magnos implicant, erunt reiicienda.

Ecce initia periodorum formarum $(1, 998, 1327)$ et $(1, 1412, -918)$, quorum determinantes sunt 997331, 1994662:

(1,	998,	1327)	
(3,	-1,	332444)	1C
(9,	2,	110815)	3C
(27,	7,	36940)	4C
(81,	34,	12327)	5C
(243,	-34,	4109)	6C
(729,	209,	1428)	7C
(476,	-209,	2187)	8C
(1027,	342,	1085)	9C
(932,	-437,	1275)	10C
(425,	12,	2347)	11C

Hinc promanant residua (inutilibus reiectis) $3 \cdot 476$, 1027, 1085, 425 sive (tollendo factores quadratos) $3 \cdot 7 \cdot 17$, $13 \cdot 79$, $5 \cdot 7 \cdot 31$, 17, e quorum combinatione apta cum octo residuis in I inventis facile eruuntur duodecim sequentia $-2 \cdot 3$, 13, $-2 \cdot 7$, 17, 37, -53 , $-5 \cdot 11$, 79, -83 , $-2 \cdot 59$, $-2 \cdot 5 \cdot 31$, $2 \cdot 5 \cdot 67$; sex priora sunt eadem, quibus in art. 331 usi sumus. Adiiici potuissent residua 19 et -29 , si ea quoque in usum vocare voluissemus, quae in I reperta sunt; reliqua illic eruta ab iis quae hic evolvimus iam sunt dependentia.

333

Methodus secunda, numerum datum M in factores resolvendi, petitur e consideratione valorum talis expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$, observationibusque sequentibus innititur.

I. Quando M est numerus primus aut potestas numeri primi (imparis ipsumque D non metientis), erit $-D$ residuum vel non-residuum ipsius M , prout M vel in forma divisorum vel in forma non-divisorum ipsius $xx + D$ continetur, et in casu priori expressio $\sqrt{-D} \pmod{M}$ duos tantummodo valores diversos habebit, qui oppositi erunt.

II. Quando vero M est compositus, puta $= pp'p''$ etc., designantibus p, p', p'' etc. numeros primos (diversos impares ipsumque D non metientes) aut talium numerorum potestates: $-D$ tunc tantummodo residuum ipsius M erit, quando est residuum singulorum p, p', p'' etc., i. e. quando hi numeri omnes in formis divisorum ipsius $xx + D$ continentur.

Designando autem valores expr. $\sqrt{-D}$ sec. modulus p, p', p'' etc. resp. per $\pm r, \pm r', \pm r''$ etc., omnes valores eiusdem expressionis sec. mod. M orientur, eruendo numeros, qui secundum p sint $\equiv +r$ aut $\equiv -r$, secundum p' aut $\equiv +r'$ aut $\equiv -r'$ etc., quocirca ipsorum multitudo fiet $= 2^\mu$, designante μ multitudinem numerorum p, p', p'' etc.

Quodsi itaque hi valores sunt $R, -R, R', -R', R''$ etc., sponte erit $R \equiv -R$ secundum omnes p, p', p'' etc., sed secundum nullos $R \equiv +R$, unde divisor communis maximus numeri M cum $R - (-R)$ erit M , et 1 div. comm. max. ipsius M cum $R + (+R)$; sed valores duo nec identici nec oppositi ut R et R' necessario secundum unum pluresve numerorum p, p', p'' etc., neque vero secundum omnes, congrui erunt, et secundum reliquos $R \equiv -R'$; hinc illorum productum erit divisor communis maximus numerorum M et $R - R'$, productumque horum d. c. m. ipsorum M et $R + R'$. Hinc facile sequitur, si omnes divisores communes maximi ipsius M cum differentiis inter singulos valores expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$ atque aliquem valorem datum computentur, horum complexum continere numeros 1, p, p', p'' etc. atque omnia producta e binis, ternis etc. horum numerorum. Hoc itaque modo e valoribus illius expressionis numeros p, p', p'' etc. eruere licebit.

Ceterum quum methodus art. 327 singulos hosce valores ad valores expressionum huius formae $\frac{r}{n} \pmod{M}$ reducat, ita ut denominator n ad M primus sit: ad institutum praesens

ne necessarium quidem est, has ipsas computare. Nam div. comm. max. numeri M cum differentia inter R et R' , qui cum $\frac{r}{n}$, $\frac{r'}{n}$ conveniunt, manifesto etiam erit div. comm. max. ipsorum M et $nn(R - R')$, sive ipsorum M et $rn' - r'n$, quippe cui $nn(R - R')$ secundum modulum M est congruus.

334

Applicatio observationum praec. ad problema, de quo agimus, duplici modo institui potest; prior non solum decidet, utrum numerus propositus M primus sit an compositus, sed in hoc casu etiam factores ipsos suppeditat; posterior autem eatenus praestat, quod plerumque calculum expeditiorem permittit, sed factores ipsos numerorum compositorum, quos quoque a primis protinus distinguit, interdum non profert, nisi pluries repetatur.

I. Investigetur numerus negativus $-D$, qui sit residuum quadraticum ipsius M , ad quem finem methodi in art. 332 sub I et II traditae adhiberi poterunt. Per se quidem arbitrarium est, quidnam residuum eligatur, neque hic ut in methodo praec. opus est, ut D sit numerus parvus; sed calculus eo brevior erit, quo minor est multitudo classium formarum binariarum in singulis generibus pr. pr. det. $-D$ contentarum; quamobrem in primis talia residua, quae inter 65 numeros art. 303 continentur, si quae se offerunt, opportuna erunt. Ita pro $M = 997331$ ex omnibus residuis negativis supra erutis hoc -102 maxime idoneum esset.

Eruantur omnes valores diversi expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$; quodsi duo tantum proveniunt (oppositi), M certo erit vel numerus primus vel numeri primi potestas; si plures, puta 2^μ , M compositus erit ex μ numeris primis, aut primorum potestatibus, diversis, qui factores per methodum art. praec. erui poterunt.

Utrum vero hi factores numeri primi sint an primorum potestates, tum per se facillimum erit dignoscere; tum etiam via ipsa, per quam valores expr. $\sqrt{-D}$ inveniuntur, omnes numeros primos, quorum potestas aliqua ipsum M metitur, sponte indicat; scilicet, si M divisibilis est per quadratum numeri primi π , ille calculus certo etiam unam pluresve repraesentationes tales numeri $M = amm + 2bmn + cnn$, produxerit, in quibus divisor comm. max. numerorum m, n est π (et quidem ideo, quod in hoc casu $-D$ etiam est residuum ipsius $\frac{M}{\pi\pi}$). Quando vero nulla repraesentatio prodiit, in qua m et n divisorem communem habent, hoc certum indicium est, M per nullum quadratum divisibilem esse adeoque omnes p, p', p'' etc. numeros primos.

Ex. Per methodum supra traditam inveniuntur quatuor valores expr. $\sqrt{-408} \pmod{997331}$ cum valoribus harum $\frac{1664}{3}, \frac{2824}{113}$ convenientes; divisores communes maximi 997331 cum his $3 \cdot 1664 - 113 \cdot 2824$ et $3 \cdot 1664 + 113 \cdot 2824$ sive cum 314120 et 324104 eruuntur hi 7853 et 127, unde $997331 = 127 \cdot 7853$, ut supra.

II. Accipiatur aliquis numerus negativus $-D$ talis, ut M contentus sit in forma divisorum ipsius $xx + D$; per se arbitrarium est, quis huiusmodi numerus eligatur, sed commoditatis caussa imprimis videndum est, ut multitudo classium in generibus det. $-D$ sit quam maxime parva. Ceterum inventio talis numeri nulli difficultati obnoxia est, si tentando adeatur; nam plerumque inter multitudinem considerabilem numerorum tentatorum pro totidem fere M in forma divisorum continetur, ac in forma non-divisorum.

Quare maxime e re erit, tentamen a 65 numeris art. 303 inchoare (et quidem a maximis), et si eveniret, ut nullus idoneus esset (quod tamen generaliter loquendo inter 16384 casus semel tantum accidit), ad alios progredi, ubi classes binae in singulis generibus continentur.

Tunc investigentur valores expr. $\sqrt{-D} \pmod{M}$, et si qui inveniuntur, factores ipsius M prorsus eodem modo inde deducantur ut supra; si vero nulli valores prodeunt, adeoque $-D$ est non-residuum ipsius M , certo M neque numerus primus neque numeri primi potestas esse poterit.

Quodsi in hoc casu factores ipsi desiderantur, vel eandem operationem repetere oportet, alios valores pro D accipiendo, vel ad methodum aliam confugere.

Ita e.g. tentamine facto 997331 contentus invenitur in forma non-divisorum ipsorum $xx + 1848$, $xx + 1365$, $xx + 840$, sed in forma divisorum ipsius $xx + 840$; pro valoribus expr. $\sqrt{-840} \pmod{997331}$ prodeunt $\pm \frac{1664}{3}$, $\pm \frac{3288}{17}$, unde iidem factores deducuntur ut ante.

Si quis plura exempla desiderat, art. 328 consulat, ubi primum docet esse $5428681 = 307 \cdot 17683$; secundum, 4272943 esse numerum primum; tertium, 997331 certe e pluribus primis compositum esse.

Ceterum limites huius operis praecipua tantum momenta utriusque methodi factors investigandi hic exsequi permiserunt; disquisitionem uberiores una cum pluribus tabulis auxiliaribus aliisque subsidiis alii occasione reservamus.

SECTIO SEPTIMA.

DE AEQUATIONIBUS CIRCULI SECTIONES DEFINIENTIBUS.

335

Inter incrementa splendidissima, mathesi per recentiorum labores adiecta, theoria functionum a circulo pendentium procul dubio locum imprimis insignem tenet. Cui mirabili quantitatum generi, ad quod in disquisitionibus maxime heterogeneis saepissime deferimur, cuiusque subsidio nulla universae matheseos pars carere potest, summi geometrae recentiores industriam sagacitatemque suam tam assidue impenderunt, disciplinamque tam vastam inde efformaverunt, ut parum expectari potuisset, ullam huius theoriae partem, nedum elementarem atque in limine quasi positam, gravium adhuc incrementorum capacem esse. Loquor de theoria functionum trigonometricarum, arcubus cum peripheria commensurabilibus respondentium, sive de theoria polygonorum regularium, cuius quam parva pars hucusque enucleata sit, Sectio praesens patefaciet.

Mirari possent lectores, talem disquisitionem in hocce potissimum opere, disciplinae primo aspectu maxime heterogeneae imprimis dicato, institui; sed tractatio ipsa abunde declarabit, quam intimo nexu hoc argumentum cum arithmetica sublimiori coniunctum sit. Ceterum principia theoriae, quam exponere aggredimur, multo latius patent, quam hic extenduntur. Namque non solum ad functiones circulares, sed pari successu ad multas alias functiones transscendentes applicari possunt, e. g. ad eas, quae ab integrali $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$ pendent, praetereaque etiam ad varia congruentiarum genera: sed quoniam de illis functionibus transscendentibus amplum opus peculiare paramus, de congruentiis autem in continuatione disquisitionum arithmeticarum copiose tractabitur, hoc loco solas functiones circulares considerare visum est.

Imo has quoque, quas summa generalitate amplecti liceret, per subsidia in art. sq. exponenda ad casum simplicissimum reducemus, tum brevitati consulentes, tum ut principia plane nova huius theoriae eo facilius intelligantur.

336

Disquisitio reducitur ad casum simplicissimum, ubi multitudo partium, in quas circulum secare oportet, est numerus primus.

Designando circuli peripheriam sive quatuor angulos rectos per P , supponendoque m, n esse integros, atque n productum e factoribus inter se primis a, b, c etc.: angulus $A = \frac{m}{n}P$ per art. 310 sub hanc formam reduci potest $A = (\frac{m}{a} \pm \frac{m'}{b} \pm \frac{m''}{c} \pm \text{etc.})P$, functionesque trigonometricae ipsi respondentes e functionibus ad partes $\frac{P}{a}, \frac{P}{b}, \frac{P}{c}$ etc. pertinentibus per methodos notas deducuntur.

Quoniam itaque pro a, b, c etc. numeros primos aut numerorum primorum potestates accipere licet: manifeste sufficit, sectionem circuli in partes, quarum multitudo est numerus primus aut primi potestas, considerare, polygonumque n laterum e polygonis a, b, c etc. laterum protinus habebitur.

Attamen hoc loco disquisitionem ad eum casum restringemus, ubi circulus in partes dividendus est, quarum multitudo est numerus primus (impar), sequenti praesertim ratione inducti. Constat, functiones circulares angulo $\frac{kP}{n}$ respondentes e functionibus ad $\frac{P}{n}$ pertinentibus per solutionem aequationis p^μ gradus derivari, et perinde ex illis per aequationem aequae altam functiones ad $\frac{P}{n^2}$ pertinentes etc., ita ut, si polygonum p^μ laterum iam habetur, ad determinationem polygoni $p^{\mu+1}$ laterum necessario solutio $p - 1$ aequationum p^μ gradus requiratur. Etiam si vero theoriam sequentem ad hunc quoque casum extendere liceret, tamen hac via non minus ad totidem aequationes p^μ gradus delaberemur, quae, siquidem p est numerus primus, ad inferiores deprimi nullo modo possunt.

Ita e.g. infra ostendetur, polygonum 17 laterum geometricè construi posse: sed ad determinationem polygoni 289 laterum aequationem 17^{ti} gradus nullo modo evitare licet.

337

Aequationes pro functionibus trigonometricis arcuum, qui sunt pars m^a partes totius peripheriae; reductio functionum trigonometricarum ad radices aequationis $x^n - 1 = 0$.

Satis constat, functiones trigonometricas omnium angulorum $\frac{kP}{n}$, denotando per k indefinite omnes numeros $0, 1, 2 \dots n - 1$, per radices aequationum n^{ti} gradus exprimi, puta sinus per radices huius

$$x^n - \frac{n}{1}x^{n-2} + \frac{n.n-3}{1.2}x^{n-4} - \frac{n.n-4.n-5}{1.2.3}x^{n-6} + \text{etc.} \pm \frac{n}{1}x = 0 \quad (\text{I})$$

cosinus per radices huius

$$x^n - nx^{n-2} + \frac{n.n-3}{1.2}x^{n-4} - \frac{n.n-4.n-5}{1.2.3}x^{n-6} + \text{etc.} \pm 2x - 1 = 0 \quad (\text{II})$$

denique tangentes per radices huius

$$nx - \frac{n.n-1.n-2}{1.2.3}x^3 + \frac{n.n-1.n-2.n-3.n-4}{1.2.3.4.5}x^5 - \text{etc.} \pm nx^{n-2} = 0 \quad (\text{III})$$

Hae aequationes (quae generaliter pro quovis valore impari ipsius n valent, II vero pro pari quoque), ponendo $n = 2m+1$, facile ad gradum m^{ti} deprimuntur; scilicet I et III, dividendo partem a laeva per x et substituendo y pro xx . Aequatio II autem manifesto radicem $x = 1$ ($= \cos 0$) implicat, et e reliquis binae semper aequales sunt ($\cos \frac{P}{n} = \cos \frac{(n-1)P}{n}$,

$\cos \frac{2P}{n} = \cos \frac{(n-2)P}{n}$ etc.); quare ipsius pars a laeva per $x - 1$ divisibilis, quotiensque quadratum erit, cuius radicem quadratam extrahendo, aequatio II reducitur ad hanc

$$x^m - \frac{1}{2}x^{m-1} - \frac{1}{4} \cdot \frac{m-1}{2}x^{m-2} + \frac{1}{8} \cdot \frac{(m-1)(m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}x^{m-3} - \text{etc.} \pm \frac{m+1}{2^{m-1}}x - \frac{1}{2^{m-1}} = 0$$

cuius radices erunt cosinus angulorum $\frac{P}{n}, \frac{2P}{n}, \frac{3P}{n} \dots \frac{mP}{n}$. Ulteriores reductiones harum aequationum, pro eo quidem casu, ubi n est numerus primus, hactenus non habebantur.

Attamen nulla harum aequationum tam tractabilis et ad institutum nostrum tam idonea est, quam haec $x^n - 1 = 0$, cuius radices cum radicibus illarum arctissime connexas esse constat. Scilicet, scribendo brevitatis caussa i pro quantitate imaginaria $\sqrt{-1}$, radices aequationis $x^n - 1 = 0$ exhibentur per

$$\cos \frac{kP}{n} + i \sin \frac{kP}{n} = r^k$$

ubi pro k accipiendi sunt omnes numeri $0, 1, 2 \dots n-1$.

Quocirca quum sit $\frac{1}{r^k} = \cos \frac{kP}{n} - i \sin \frac{kP}{n}$, radices aequationis I exhibebuntur per $\frac{1}{2i}(r^k - \frac{1}{r^k})$, sive per $\frac{1}{2i}(r^k - r^{-k})$; radices aequationis II per $\frac{1}{2}(r^k + \frac{1}{r^k}) = \frac{1}{2}(r^k + r^{-k})$; denique radices aequationis III per $\frac{i(r^k - r^{-k})}{r^k + r^{-k}}$. Hanc ob causam disquisitionem considerationi aequationis $x^n - 1 = 0$ superstruemus, ipsum n esse numerum primum imparem supponendo.

Ne vero investigationum ordinem interrumpere oporteat, sequens lemma hic praemitimus.

338

PROBLEMA. Data aequatione

$$(W) \quad z^\lambda + Az^{\lambda-1} + \text{etc.} = 0 \quad (W)$$

invenire aequationem (W'), cuius radices sint potestates X^{tae} radicum aequationis (W), designante λ exponentem integrum positivum datum.

SOL. Designatis radicibus aequationis W per a, b, c etc., radices aequ. W' esse debent $a^\lambda, b^\lambda, c^\lambda$ etc. Per theorema notum NEWTONIANUM e coefficientibus aequ. W invenire licet aggregata quarumlibet potestatum radicum a, b, c etc. Quaerantur itaque summae $a^\lambda + b^\lambda + c^\lambda + \text{etc.}$, $a^{2\lambda} + b^{2\lambda} + c^{2\lambda} + \text{etc.}$ etc. usque ad $a^{n\lambda} + b^{n\lambda} + c^{n\lambda} + \text{etc.}$, unde via inversa per idem theorema coefficientes aequ. W' deduci poterunt. Q. E. F.

Simul hinc liquet, si omnes coefficientes in W sint rationales, omnes quoque in W' rationales evadere.

Alia quidem via probari potest, si illi omnes integri sint, etiam hos omnes integros fieri; huic autem theoremati, ad institutum nostrum non adeo necessario, hic non immoramur.

339

THEORIA RADICUM AEQUATIONIS $x^n - 1 = 0$ (UBI SUPPONITUR, n ESSE NUMERUM PRIMUM).

Omittendo radicem 1, reliquae (Ω) continentur in aequatione $X = x^{n-1} + x^{n-2} + \text{etc.} + x + 1 = 0$.

FUNCTIO X RESOLVI NEQUIT IN FACTORES INFERIORES, IN QUIBUS OMNES COEFFICIENTES SINT RATIONALES.

340

THEOREMA. Si functio X per functionem inferioris gradus $P = x^\lambda + Ax^{\lambda-1} + Bx^{\lambda-2} + \dots + Kx + L$ est divisibilis, coefficientes $A, B \dots L$ omnes integri esse nequeunt.

DEM. Sit $X = PQ$, atque $\mathfrak{p}$ complexus radicum aequationis $P = 0$, $\mathfrak{q}$ complexus radicum aequationis $Q = 0$, ita ut Ω constet ex $\mathfrak{p}$ et $\mathfrak{q}$ simul sumtis. Porro sit $\mathfrak{R}$ complexus radicum ipsis $\mathfrak{p}$ reciprocarum, $\mathfrak{Q}$ complexus radicum ipsis $\mathfrak{q}$ reciprocarum, sintque radices, quae continentur in $\mathfrak{R}$, radices aequationis $R = 0$ (quam fieri $x^\lambda + \mathfrak{a}x^{\lambda-1} + \text{etc.} + \mathfrak{k}x + \mathfrak{l} = 0$ facile perspicitur), eaeque quae continentur in $\mathfrak{Q}$ radices aequationis $\mathfrak{S} = 0$. Manifesto etiam radices $\mathfrak{R}$ et $\mathfrak{Q}$ iunctae complexum Ω efficient, ac erit $RS = X$.

Iam quatuor casus distinguimus.

I. Quando $\mathfrak{p}$ convenit cum $\mathfrak{R}$ adeoque $P = R$.

In hoc casu manifesto binae semper radices in $\mathfrak{p}$ reciprocae erunt, adeoque P productum ex $\frac{1}{2}\lambda$ factoribus talibus duplicibus $xx - 2x \cos \omega + 1$; quum talis factor sit $= (x - \cos \omega)^2 + (\sin \omega)^2$, facile perspicitur, P pro valore quocunque reali ipsius x necessario valorem realem positivum obtinere.

Sint aequationes, quarum radices sunt quadrata, cubi, biquadrata. . . potestates $n-1^{tae}$ radicum in $\mathfrak{p}$ resp. hae $P' = 0, P'' = 0, P''' = 0, \dots P^{(n-1)} = 0$, sintque valores functionum $P, P', P'' \dots P^{(n-1)}$, quos obtinent statuendo $x = 1$, resp. $p, p', p'' \dots p^{(n-1)}$, tunc per ante dicta p erit quantitas positiva et prorsus simili ratione etiam p', p'' etc. positivae erunt.

Quum itaque p sit valor functionis $(1-t)(1-u)(1-v)$ etc., quem obtinet ponendo pro t, u, v etc. radices in $\mathfrak{p}$; p' valor eiusdem, statuendo pro t, u, v etc. quadrata illarum radicum etc., insuperque valor pro $t = 1, u = 1, v = 1$ etc. manifesto fiat $= 0$: summa $p + p' + p'' \dots + p^{(n-1)}$ erit integer per n divisibilis.

Praeterea facile perspicitur, productum $PP'P'' \dots$ fieri $= X^\lambda$, adeoque $pp'p'' \dots = n^\lambda$. Iam si omnes coefficientes in P rationales essent, omnes quoque in P', P'' etc. per art. 338 rationales evaderent; per art. 42 autem cuncti hi coefficientes necessario forent integri. Hinc etiam p, p', p'' etc. omnes integri forent, quorum productum quum sit $= n^\lambda$, multitudo vero $n-1 > \lambda$, necessario quidam ex ipsis (saltem $n-1-\lambda$) esse debebunt $= 1$, reliqui vero ipsi n vel potestati ipsius n aequales.

Quodsi itaque g ex ipsis sunt $= 1$, summa $p + p' + p'' + \text{etc.}$ manifesto erit $\equiv g \pmod{n}$ adeoque certo per n non divisibilis. Quare suppositio consistere nequit.

II. Quando $\mathfrak{p}$ et $\mathfrak{R}$ non quidem coincidunt, attamen quasdam radices communes continent, sit $\mathfrak{S}$ harum complexus atque $T = 0$ aequatio, cuius radices sunt. Tunc T erit divisor communis maximus functionum P, R (ut e theoria aequationum constat). Manifesto autem binae semper radices in $\mathfrak{S}$ reciprocae erunt, unde per ante demonstrata omnes coefficientes in T rationales esse nequeunt. Hoc vero certo eveniret, si omnes in P adeoque etiam omnes in R rationales essent, ut e natura operationis, divisorem comm. max. investigandi sponte sequitur. Quare suppositio est absurda.

III. Quando $\mathfrak{q}$ et $\mathfrak{Q}$ vel coincidunt, vel saltem radices communes implicant, prorsus eodem modo omnes coefficientes in Q rationales esse nequeunt; fierent vero rationales, si omnes in P rationales essent; hoc itaque est impossibile.

IV. Si vero neque $\mathfrak{p}$ cum $\mathfrak{R}$, neque $\mathfrak{q}$ cum $\mathfrak{Q}$ ullam radicem communem habet, omnes radices $\mathfrak{p}$ necessario reperientur in $\mathfrak{Q}$, omnesque $\mathfrak{q}$ in $\mathfrak{R}$, unde erit $P = \mathfrak{S}$ et $Q = R$. Quamobrem $X = PQ$ erit productum ex P in R i.e. ex $x^\lambda + Ax^{\lambda-1} \dots + Kx + L$ in $x^\lambda + \mathfrak{a}x^{\lambda-1} \dots + \mathfrak{k}x + \mathfrak{l}$, unde statuendo $x = 1$, fit $n = (1+A+B \dots + K+L)(1+\mathfrak{a}+\mathfrak{b} \dots + \mathfrak{k}+\mathfrak{l})$.

Iam si omnes coefficientes in P rationales, adeoque per art. 42 etiam integri essent, L qui coefficientem ultimum in X i.e. unitatem metiri deberet, necessario foret $= +1$,

unde $+n$ esset numerus quadratus. Quod quum hypothese repugnet, suppositio consistere nequit.

Ex hoc itaque theoremate liquet, quomodocunque X in factores resolvatur, horum coefficientes partim saltem irrationales fieri, adeoque aliter, quam per aequationem elevatam, determinari non posse.

341

Propositum disquisitionum sequentium, quod paucis declaravisse haud inutile erit, eo tendit, ut X in factores continuo plures gradatim resolvatur, et quidem ita, ut horum coefficientes per aequationes ordinis quam infimi determinantur, usque dum hoc modo ad factores simplices sive ad radices Ω ipsas perveniatur.

Scilicet ostendemus, si numerus $n - 1$ quomodocunque in factores integros α, β, γ etc. resolvatur (pro quibus singulis numeros primos accipere licet), X in α factores $\frac{n-1}{\alpha}$ dimensionum resolvi posse, quorum coefficientes per aequationem α^{ti} gradus determinantur; singulos hos factores iterum in β alios $\frac{n-1}{\alpha\beta}$ dimensionum adiumento aequationis β gradus etc., ita ut designante ν multitudinem factorum α, β, γ etc. inventio radicum Ω ad resolutionem ν aequationum $\alpha^{ti}, \beta^{ti}, \gamma^{ti}$ etc. gradus reducat. E. g. pro $n = 17$, ubi $n - 1 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$, quatuor aequationes quadraticas solvere oportebit; pro $n = 73$ tres quadraticas duasque cubicas.

Quum in sequentibus persaepe tales potestates radices r considerandae sint, quarum exponentes rursus sunt dignitates, huiusmodi expressiones autem non sine molestia typis describantur: ad facilitandam impressionem sequenti in posterum abbreviatione utemur.

Pro r, r^2, r^3 etc. scribemus $[1], [2], [3]$ etc., generaliterque pro r^λ , denotante λ integrum quemcunque, $[\lambda]$. Tales itaque expressiones penitus determinatae nondum sunt, sed fiunt, simulac pro r sive $[1]$ radix determinata ex Ω accipitur.

Erunt itaque generaliter $[\lambda], [\mu]$ aequales vel inaequales, prout λ, μ secundum modulum n congrui sunt vel incongrui; porro $[0] = 1$; $[\lambda] \cdot [\mu] = [\lambda + \mu]$; $[\lambda]^\mu = [\lambda\mu]$; summa $[0] + [\lambda] + [2\lambda] \dots + [(n-1)\lambda]$ vel $= 0$ vel $= n$, prout λ per n non divisibilis est vel divisibilis.

342

OMNES RADICES Ω IN CERTAS CLASSES (PERIODOS) DISTRIBUUNTUR.

Si, pro modulo n , g est numerus talis, qualem in Sect. III radicem primitivam diximus, $n - 1$ numeri $1, g, g^2 \dots g^{n-2}$ iis $1, 2, 3 \dots n - 1$ secundum mod. n congrui erunt, etsi alio ordine, puta quivis numerus unius seriei congruum habebit in altera.

Hinc sponte sequitur, radices $[1], [g], [g^2] \dots [g^{n-2}]$ cum Ω coincidere; et prorsus simili modo generalius $[\lambda], [\lambda g], [\lambda g^2] \dots [\lambda g^{n-2}]$ cum Ω coincident, designante λ integrum quemcunque per n non divisibilem.

Porro quum sit $g^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, nullo negotio perspicietur, duas radices $[\lambda g^\mu], [\lambda g^\nu]$ identicas vel diversas esse, prout μ, ν secundum $n - 1$ congrui sint vel incongrui.

Si itaque G est alia radix primitiva, radices $[1], [G], [G^2] \dots [G^{n-2}]$ etiam cum his $[1], [g], [g^2] \dots [g^{n-2}]$ convenient, si ad ordinem non respicitur.

Sed praeterea facile probatur, si e sit divisor ipsius $n - 1$, atque ponatur $n - 1 = ef$, $g^e = h$, $G^e = H$, etiam f numeros $1, h, h^2 \dots h^{f-1}$ iis $1, H, H^2 \dots H^{f-1}$ secundum n congruos esse (sine respectu ordinis).

Supponamus enim $G \equiv g^\omega \pmod{n}$ sitque μ numerus arbitrarius positivus et $< f$ atque ν residuum minimum ipsius $\mu\omega \pmod{f}$. Tunc erit $\nu \equiv \mu\omega \pmod{f}$, hinc $g^{e\nu} \equiv g^{e\mu\omega} \equiv G^{e\mu} \pmod{n}$, sive $H^\mu \equiv h^\nu$, i. e. quivis numerus posterioris seriei 1, H , H^2 etc. congruum habebit in serie 1, h , $h^2 \dots$ et perinde vice versa.

Hinc manifestum est, f radices $[1], [h], [h^2] \dots [h^{f-1}]$ identicas esse cum his $[1], [H], [H^2] \dots [H^{f-1}]$, generaliusque eodem modo facile perspicietur, $[\lambda], [\lambda h], [\lambda h^2] \dots [\lambda h^{f-1}]$ cum $[\lambda], [\lambda H], [\lambda H^2] \dots [\lambda H^{f-1}]$ convenire.

Aggregatum talium f radicum $[\lambda] + [\lambda h] + \text{etc.} + [\lambda h^{f-1}]$, quod, quum non mutetur accipiendo pro g aliam radicem primitivam, tamquam independens a g considerandum est, per (f, λ) designabimus; earundem radicum complexum vocabimus *periodum* (f, λ) , ubi ad radicum ordinem non respicitur⁴.

In exhibenda tali periodo e re erit, singulas radices, e quibus constat, ad expressionem simplicissimam reducere, puta pro numeris $\lambda, \lambda h, \lambda h^2$ etc. residua minima sec. mod. n substituere, secundum quorum magnitudinem, si placet, etiam periodi partes ordinari poterunt.

E. g. Pro $n = 19$, ubi 2 est radix primitiva, periodus $(6, 1)$ constat e radicibus $[1], [8], [64], [512], [4096], [32768]$, sive $[1], [7], [8], [11], [12], [18]$. Similiter periodus $(6, 2)$ constat ex $[2], [3], [5], [14], [16], [17]$. Periodus $(6, 3)$ cum praec. identica invenitur. Periodus $(6, 4)$ continet $[4], [6], [9], [10], [13], [15]$.

343

VARIA THEOREMATA DE PERIODIS RADICUM Ω .

Circa huiusmodi periodos statim se offerunt observationes sequentes:

I. Quum sit $\lambda h^f \equiv \lambda, \lambda h^{f+1} \equiv \lambda h$ etc. $\pmod{n}$, manifestum est, ex iisdem radicibus, e quibus constet (f, λ) , etiam constare $(f, \lambda h), (f, \lambda h^2)$ etc.; generaliter itaque designante $[\lambda']$ radicem quamcunque ex (f, λ) , haec periodus cum (f, λ') omnino identica erit.

Si itaque duae periodi ex aequae multis radicibus constantes (quales *similes* dicemus) ullam radicem communem habent, manifesto identicae erunt. Quare fieri nequit, ut duae radices in aliqua periodo simul contineantur, in alia simili vero una earum tantum reperia-
tur; porro patet, si duae radices $[\lambda], [\lambda']$ ad eandem periodum f terminorum pertineant, valorem expr. $\frac{\lambda'}{\lambda} \pmod{n}$ alicui potestati ipsius h congruum esse, sive supponi posse $\lambda' \equiv \lambda g^{ee} \pmod{n}$.

II. Si $f = n - 1$, $e = 1$, periodus $(f, 1)$ manifesto cum Ω coincidit; in reliquis vero casibus Ω ex e periodis $(f, 1), (f, g), (f, g^2) \dots (f, g^{e-1})$ compositus erit. Hae periodi itaque omnino inter se diversae erunt, patetque, quamvis aliam similem periodum (f, λ) cum harum aliqua coincidere, siquidem $[\lambda]$ ad Ω pertineat, i. e. si λ per n non divisibilis sit. Periodus $(f, 0)$ autem (f, kn) manifesto ex f unitatibus est composita.

Aequae facile perspicitur, si λ sit numerus quicunque per n non divisibilis, etiam complexum e periodis $(f, \lambda), (f, \lambda g), (f, \lambda g^2) \dots (f, \lambda g^{e-1})$ cum Ω convenire. Ita e. g. pro $n = 19$, $f = 6$, Ω constat e tribus periodis $(6, 1), (6, 2), (6, 4)$, ad quarum aliquam quaevis alia similis, praeter $(6, 0)$ reducitur.

III. Si $n - 1$ est productum e tribus numeris positivis α, b, c , manifestum est, quamvis periodum bc terminorum ex b periodis c terminorum compositam esse, puta (bc, λ) ex $(c, \lambda), (c, \lambda h^a), (c, \lambda h^{2a}) \dots (c, \lambda h^{(b-1)a})$, unde hae sub illa contentae dicuntur. Ita pro

⁴Aggregatum in sequentibus etiam periodi *valorem numericum* vocare licebit, aut simpliciter *periodum*, ubi ambiguitas non metuenda.

$n = 19$ periodus $(6, 1)$ constat e tribus $(2, 1)$, $(2, 8)$, $(2, 7)$, quarum prima continet radices r , r^{18} ; secunda r^8 , r^{11} ; tertia r^7 , r^{12} .

344

THEOREMA. Sint (f, λ) , (f, μ) duae periodi similes, identicae aut diversae, constetque (f, λ) e radicibus $[\lambda]$, $[\lambda']$, $[\lambda'']$ etc. Tunc productum ex (f, λ) in (f, μ) erit aggregatum f periodorum similium puta

$$= (f, \lambda + \mu) + (f, \lambda' + \mu) + (f, \lambda'' + \mu) + \text{etc.} = W$$

DEM. Sit ut supra $n - 1 = ef$; g radix primitiva pro modulo n , atque $h = g^e$, unde per praecedentia erit $(f, \lambda) = (f, \lambda h) = (f, \lambda h h)$ etc. Hinc productum quaesitum erit

$$\begin{aligned} & [\lambda + \mu] + [\lambda h + \mu h] + [\lambda h^2 + \mu h^2] \dots + [\lambda h^{f-1} + \mu h^{f-1}] \\ & + [\lambda' + \mu] + [\lambda' h + \mu h] + [\lambda' h^2 + \mu h^2] \dots + [\lambda' h^{f-1} + \mu h^{f-1}] \text{ etc.} \end{aligned}$$

quae expressio omnino f radices continet. Quodsi hic singulae columnae verticales seorsim in summam colliguntur, manifesto prodit

$$(f, \lambda + \mu) + (f, \lambda' + \mu) + \dots + (f, \lambda h^{f-1} + \mu)$$

quam expressionem cum W convenire nullo negotio perspicitur, quum numeri λ , λ' , λ'' etc. per hyp. ipsis λ , λh , $\lambda h^2 \dots \lambda h^{f-1}$ secundum modulum n congrui esse debeant (quonam ordine hic nihil interest) adeoque etiam $\lambda + \mu$, $\lambda' + \mu$, $\lambda'' + \mu$ etc. ipsis $\lambda + \mu$, $\lambda h + \mu$, $\lambda h^2 + \mu \dots \lambda h^{f-1} + \mu$. Q. E. D.

Huic theoremati adiungimus corollaria sequentia:

I. Designante k integrum quemcunque, productum ex $(f, k\lambda)$ in $(f, k\mu)$

$$= (f, k(\lambda + \mu)) + (f, k(\lambda' + \mu)) + (f, k(\lambda'' + \mu)) + \text{etc.}$$

II. Quum singulae partes, e quibus W constat, vel cum aggregato $(f, 0)$, quod est $= f$, vel cum aliquo ex his $(f, 1)$, (f, g) , $(f, g^2) \dots (f, g^{e-1})$ convenient, W ad formam sequentem reduci poterit

$$W = af + b(f, 1) + b'(f, g) + b''(f, g^2) + \dots + b^e(f, g^{e-1})$$

ubi coefficientes a , b , b' etc. erunt integri positivi (sive etiam quidam $= 0$): porro patet, productum ex $(f, k\lambda)$ in $(f, k\mu)$ tunc fieri $= af + b(f, k) + b'(f, kg) + \dots + b^e(f, kg^{e-1})$.

Ita e. g. pro $n = 19$ productum ex aggregato $(6, 1)$ in se ipsum, sive quadratum huius aggregati fit $= (6, 2) + (6, 8) + (6, 9) + (6, 12) + (6, 13) + (6, 19) = 6 + 2(6, 1) + (6, 2) + 2(6, 4)$.

III. Quum productum ex singulis partibus ipsius W in periodum similem (f, ν) ad formam analogam reduci possit, manifestum est, etiam productum e tribus periodis $(f, \lambda) \cdot (f, \mu) \cdot (f, \nu)$ per $c + d(f, 1) \dots + d^e(f, g^{e-1})$ exhiberi posse, et coefficientes c , d etc. integros ac positivos (sive $= 0$) evadere, insuperque pro valore quocunque integro ipsius k fieri $(f, k\lambda) \cdot (f, k\mu) \cdot (f, k\nu) = c + d(f, k) + d'(f, kg) + \text{etc.}$

Perinde hoc theorema ad producta e periodis similibus quotcunque extenditur nihilque interest, sive hae periodi omnes diversae sint, sive partim aut cunctae identicae.

IV. Hinc colligitur, si in functione quacunque algebraica rationali integra $F = \varphi(t, u, v \dots)$ pro indeterminatis t , u , v etc. resp. substituantur periodi similes (f, λ) , (f, μ) , (f, ν) etc., eius valorem ad formam $A + B(f, 1) + B'(f, g) + B''(f, gg) \dots + B^e(f, g^{e-1})$ reducibilem esse, coefficientesque A , B , B' etc. omnes integros fieri, si omnes coefficientes determinati in F sunt integri; si vero postea pro t , u , v etc. resp. substituantur $(f, k\lambda)$, $(f, k\mu)$, $(f, k\nu)$ etc., valorem ipsius F reduci ad $A + B(f, k) + B'(f, kg) + \text{etc.}$

345

THEOREMA. Supponendo, k esse numerum per n non divisibilem, et scribendo brevitatis ergo p pro (f, λ) , quaevis alia similis periodus (f, μ) , ubi etiam μ per n non divisibilis supponitur, reduci potest sub formam talem $a + bp + cp^2 + \dots + \vartheta p^{e-1}$ ita ut coefficientes a, b etc. sint quantitates determinatae rationales.

DEM. Designentur ad abbreviandum periodi $(f, \lambda g)$, $(f, \lambda g^2)$, $(f, \lambda g^3)$ etc. usque ad $(f, \lambda g^{e-1})$, quarum multitudo est $e - 1$, et cum quarum aliqua (f, μ) necessario conveniet, per p' , p'' , p''' etc. Habetur itaque statim aequatio

$$0 = 1 + p + p' + p'' + p''' + \text{etc.} \quad (\text{I})$$

evolvendo autem secundum praecepta art. praec. valores potestatum ipsius p usque ad $e - 1^{\text{tam}}$, $e - 2$ alias tales promanabunt.

$$0 = pp + A + ap + a'p' + a''p'' + a'''p''' \dots \quad (\text{II})$$

$$0 = p^3 + B + bp + b'p' + b''p'' + b'''p''' \dots \quad (\text{III})$$

$$0 = p^4 + C + cp + c'p' + c''p'' + c'''p''' \dots \quad (\text{IV})$$

etc.

ubi omnes coefficientes A, a, a' etc. B, b, b' etc. etc. erunt integri, atque, quod probe notandum est et ex art. praec. sponte sequitur, a λ omnino independentes; i. e. eadem aequationes etiamnum valebunt, quicumque alius valor ipsi λ tribuatur; haec annotatio manifesto etiam ad aequ. I extenditur, si modo λ per n non divisibilis accipiatur.

Supponamus $(f, \mu) = p'$; facillime enim perspicietur, si (f, μ) cum alia periodo ex p'' , p''' etc. conveniat, ratiocinia sequentibus prorsus analogia adhiberi posse.

Quum multitudo aequationum I, II, III etc. sit $e - 1$, quantitates p'' , p''' etc., quarum multitudo $= e - 2$, per methodos notas inde eliminari possunt, ita ut prodeat aequatio talis (Z) ab ipsis libera

$$0 = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}p + \mathfrak{C}p^2 + \text{etc.} + \mathfrak{M}p^{e-2} + \mathfrak{N}p^{e-1}$$

quod ita fieri poterit, ut omnes coefficientes $\mathfrak{A}, \mathfrak{B} \dots \mathfrak{N}$ sint integri atque certe non omnes $= 0$.

Iam si hic non est $\mathfrak{N} = 0$, protinus liquet, p' inde ita, ut in theoremate enuntiatum est, determinari. Superest itaque, ut demonstramus, $\mathfrak{N} = 0$ fieri non posse.

Supponendo esse $\mathfrak{N} = 0$, aequatio Z fit $\mathfrak{M}p^{e-2} + \text{etc.} + \mathfrak{B}p + \mathfrak{A} = 0$, cui, quum ultra gradum $e - 1^{\text{um}}$ certo non ascendat, plures quam $e - 1$ valores diversi ipsius p satisfacere nequeunt. At quum aequationes, e quibus Z deducta fuit, a λ sint independentes, liquet, etiam Z a λ non pendere, sive locum habere, quicumque integer per n non divisibilis pro λ accipiatur.

Quare aequ. Z satisfiet, cuicumque ex e aggregatis $(f, 1)$, (f, g) , $(f, g^2) \dots (f, g^{e-1})$ aequalis statuatur p , unde sponte sequitur, haec aggregata omnia inaequalia esse non posse, sed ad minimum duo inter se aequalia esse debere.

Contineat unum e duobus talibus aggregatis aequalibus radices $[\mathfrak{C}]$, $[\mathfrak{C}']$, $[\mathfrak{C}']$ etc., alterum has $[\mathfrak{D}]$, $[\mathfrak{D}']$, $[\mathfrak{D}']$ etc., supponamusque (quod licet), omnes numeros $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}', \mathfrak{C}''$ etc., $\mathfrak{D}, \mathfrak{D}', \mathfrak{D}''$ etc. esse positivos et $< n$; manifesto omnes etiam diversi erunt, nullusque $= 0$. Designetur functio $x^{\mathfrak{C}} + x^{\mathfrak{C}'} + x^{\mathfrak{C}''} + \text{etc.} - x^{\mathfrak{D}} - x^{\mathfrak{D}'} - x^{\mathfrak{D}''} - \text{etc.}$, cuius terminus summus non ultra x^{n-1} ascendet, per Y , patetque fieri $Y = 0$, si statuatur $x = [1]$; hinc

Y implicabit factorem $x - [1]$, quem cum functione in praec. per X denotata communem habebit; hoc vero absurdum esse, facile monstrari poterit.

Si enim Y cum X ullum factorem communem haberet, divisor communis maximus functionum X, Y (quem certo usque ad $n - 1$ dimensiones ascendere non posse iam inde patet, quod Y per x est divisibilis), omnes coefficientes suos rationales haberet, ut e natura operationum, divisorem communem maximum duarum talium functionum investigandi, quarum coefficientes omnes sunt rationales, sponte sequitur. Sed in art. 341 ostendimus, X implicare non posse factorem pauciorum quam $n - 1$ dimensionum, cuius coefficientes omnes sint rationales: quamobrem suppositio, esse $\mathfrak{N} = 0$, consistere nequit.

Ex. Pro $n = 19$, $f = 6$, fit $pp = 6 + 2p + p' + 2p''$, unde ex $0 = 1 + p + p' + p''$ deducitur $p' = 4 - p - pp$, $p'' = -5 - p + pp$. Quare

$$\begin{aligned}(6, 2) &= 4 - (6, 1) - (6, 1)^2 \\ (6, 4) &= -5 - (6, 1) + (6, 1)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(6, 4) &= 4 - (6, 2) - (6, 2)^2 \\ (6, 1) &= -5 - (6, 2) + (6, 2)^2 \\ (6, 1) &= 4 - (6, 4) - (6, 4)^2 \\ (6, 2) &= -5 - (6, 4) + (6, 4)^2.\end{aligned}$$

346

THEOREMA. Si $F = \varphi(t, u, v \dots)$ est functio *invariabilis*⁵ algebraica rationalis integra indeterminatarum t, u, v etc., atque substituendo pro his radices in periodo (f, λ) contentas, valor ipsius F per praecepta art. 340 ad formam $A + A'[1] + A''[2] + \text{etc.} = W$ reducitur: radices quae in hac expressione ad eandem periodum quamcunque f terminorum pertinent, coefficientes aequales habebunt.

DEM. Sint $[p], [q]$ duae radices ad unam eandemque periodum pertinentes, supponanturque p, q positivi et minores quam n , ita ut demonstrare oporteat, $[p]$ et $[q]$ in W eundem coefficientem habere.

Sit $q \equiv pg^{ee} \pmod{n}$; sint porro radices in (f, λ) contentae $[\lambda], [\lambda'], [\lambda'']$ etc., ubi numeros $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. positivos et minores quam n supponimus; denique sint residua minima positiva numerorum $\lambda g^{ee}, \lambda' g^{ee}, \lambda'' g^{ee}$ etc., secundum modulum n , haec μ, μ', μ'' etc., quae manifesto cum numeris $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. identica erunt, etsi ordine transposito.

Iam ex art. 340 patet, $\varphi([\lambda g^{ee}], [\lambda' g^{ee}], [\lambda'' g^{ee}] \dots)$ reduci ad $A + A'[\mu] + A''[2\mu] + \text{etc.}$ aut ad $A + A'[\mathfrak{b}] + A''[\mathfrak{b}'] + \text{etc.} = (W')$ designando per $\mathfrak{b}, \mathfrak{b}'$ etc. residua minima numerorum $g^{ee}, 2g^{ee}$ etc. secundum modulum n , unde manifestum est, $[q]$ habere eundem coefficientem in (W') , quem $[p]$ habeat in (W) .

Sed nullo negotio perspicitur, ex evolutione expressionis (I) idem provenire atque ex evolutione huius $\varphi([\lambda g^{ee}], [\lambda' g^{ee}], [\lambda'' g^{ee}] \dots)$, quoniam $[\lambda g^{ee}] \equiv [\lambda q]$, $[\lambda' g^{ee}] \equiv [\lambda' q]$ etc. $\pmod{n}$; haec vero expressio idem producit ac haec $\varphi([\lambda], [\lambda'], [\lambda''] \dots)$, quoniam numeri μ, μ', μ'' etc. ordine tantum ab his $\lambda, \lambda', \lambda''$ etc. discrepant, cuius in functione invariabili nihil interest. Hinc colligitur, W omnino identicam fore cum W' ; quamobrem radix $[q]$ eundem coefficientem in W habebit ut $[p]$. Q. E. D.

⁵Functiones invariables eas vocari constat, quibus omnes indeterminatae eodem modo insunt, sive clarius, quae non mutantur, quomodocunque indeterminatae inter se permutentur; cuiusmodi sunt e.g. summa omnium, productum ex omnibus, summa productorum e binis etc.

Hinc manifestum est, W reduci posse sub formam $A + a(f, 1) + a'(f, g) + a''(f, gg) \dots + a^e(f, g^{e-1})$ ita ut coefficientes $A, a \dots a^e$ sint quantitates determinatae, quae insuper integri erunt, si omnes coefficientes rationales in F sunt integri.

Ita e. g. si $n = 19$, $f = 6$, $\lambda = 1$, atque functio φ designat aggregatum productorum e binis indeterminatis, eius valor reducitur ad $3 + (6, 1) + (6, 4)$.

Porro facile perspicietur, si postea pro t, u, v etc. radices ex alia periodo $(f, k\lambda)$ substituantur, valorem ipsius F fieri $A + a(f, k) + a'(f, kg) + a''(f, kgg) + \text{etc.}$

347

Quum in aequatione quacunque coefficientes a, b, γ etc. sint functiones invariabiles radicum, puta a summa omnium, b summa productorum e binis, γ summa productorum e ternis etc.: in aequatione, cuius radices sunt radices in periodo (f, λ) contentae, coefficientis primus erit $= (f, \lambda)$, singuli reliqui vero sub formam talem $A + a(f, 1) + a'(f, g) \dots$ reduci poterunt, ubi omnes A, a, a' etc. erunt integri; praeterea patet, aequationem, cuius radices sint radices in quacunque alia periodo $(f, k\lambda)$ contentae, ex illa derivari, si in singulis coefficientibus pro $(f, 1)$ substituaturs (f, k) ; pro (f, g) , (f, kg) et generaliter pro (f, p) , (f, kp) . Hoc itaque modo assignari poterunt e aequationes $z = 0, z' = 0, z'' = 0$ etc., quarum radices sint radices contentae in $(f, 1)$, in (f, g) , (f, g^2) etc., quamprimum e aggregata $(f, 1), (f, g), (f, g^2)$ etc. innotuerunt, aut potius quamprimum unum quodcunque eorum inventum est, quoniam per art. 346 ex uno omnia reliqua rationaliter deducere licet.

Quo pacto simul functio X in α factores f dimensionum resoluta habetur: productum enim e functionibus z, z', z'' etc. manifesto erit $= X$.

Ex. Pro $n = 19$ summa omnium radicum in periodo $(6, 1)$ est $= (6, 1) = \alpha$; summa productorum e binis fit $= 3 + (6, 1) + (6, 4) = \beta$; similiter summa productorum e ternis invenitur $= 2 + 2(6, 1) + (6, 2) = \gamma$; summa productorum e quaternis $= 3 + (6, 1) + (6, 4) = \delta$; summa productorum e quinis $= (6, 1) = \varepsilon$; productum ex omnibus $= 1$; quare aequatio $z = x^6 - \alpha x^5 + \beta x^4 - \gamma x^3 + \delta x^2 - \varepsilon x + 1 = 0$ omnes radices in $(6, 1)$ contentas complectitur.

Quodsi in coefficientibus α, β, γ etc. pro $(6, 1), (6, 2), (6, 4)$ resp. substituantur $(6, 2), (6, 4), (6, 1)$, prodibit aequatio $z' = 0$, quae radices in $(6, 2)$ complectetur; et si eadem commutatio hie denuo applicatur, habebitur aequatio $z'' = 0$, radices in $(6, 4)$ complectens, productumque $zz'z''$ erit $= X$.

348

Plerumque commodius est, praesertim quoties f est numerus magnus, coefficientes β, γ etc. secundum theorema NEWTONIANUM e summis potestatum radicum deducere. Scilicet sponte patet, summam quadratorum radicum in (f, λ) contentarum esse $= (f, 2\lambda)$, summam cuborum $= (f, 3\lambda)$ etc.

Scribendo itaque brevitatis caussa pro $(f, \lambda), (f, 2\lambda), (f, 3\lambda)$, etc. q, q', q'' etc. erit

$$\alpha = q, \quad 2\beta = \alpha q - q', \quad 3\gamma = \beta q - \alpha q' + q'' \text{ etc.}$$

ubi producta e duabus periodis per art. 345 statim in summas periodorum sunt convertenda.

Ita in exemplo nostro, scribendo pro $(6, 1)$, $(6, 2)$, $(6, 4)$ resp. p , p' , p'' , sunt q , q' , q'' , q''' , q^{IV} , q^V resp. $= p$, p , p' , p , p , p'' ; hinc

$$\alpha = p,$$

$$2\beta = pp - p' = 6 + 2p + 2p'',$$

$$3\gamma = (3 + p + p'')p - pp + p' = 6 + 6p + 3p',$$

$$4\delta = (2 + 2p + p')p - (3 + p + p'')p + pp - p'' = 12 + 4p + 4p'', \text{ etc.}$$

Ceterum sufficit semissem coefficientium tantum hoc modo computare; etenim non difficile probatur, ultimos ordine inverso primis vel aequales esse, puta ultimum $= 1$, penultimum $= \alpha$, antepenultimum $= \beta$ etc., vel ex iisdem resp. deduci, si pro $(f, 1)$, (f, g) etc. substituantur $(f, -1)$, $(f, -g)$ etc. sive $(f, n - 1)$, $(f, n - g)$ etc. Casus prior locum habet, quando f est par; posterior, quando f impar; coefficientis ultimus autem semper fit $= 1$. Fundamentum huius rei innititur theoremati art. 79; sed brevitatis causa huic argumento non immoramur.

349

THEOREMA. Sit $n - 1$ productum e tribus integris positivis α , b , γ ; constet periodus $(b\gamma, \lambda)$, quae est $b\gamma$ terminorum, ex b periodis minoribus γ terminorum his (γ, λ) , (γ, λ') , (γ, λ'') etc., supponamusque, si in functione F indeterminatarum, similiter affecta ut in art. 347, puta in $F = \varphi(t, u, v \dots)$ pro indeterminatis t , u , v etc. substituantur aggregata (γ, λ) , (γ, λ') , (γ, λ'') etc. resp., eius valorem per praecepta art. 345. IV reduci ad

$$W = A + a(\gamma, 1) + a'(\gamma, g) \dots + a^e(\gamma, g^{e-1}).$$

Tum dico, si F sit functio invariabilis, eas, periodos in W , quae sub eadem periodo $b\gamma$ terminorum contentae sint, i. e. generaliter tales (γ, g^μ) et $(\gamma, g^{\mu+f\varrho})$, designante ϱ integrum quemcunque, coefficientes eosdem habituras esse.

DEM. Quum periodus $(b\gamma, \lambda g^{f\varrho})$ identica sit cum hac $(b\gamma, \lambda)$, minores hae $(\gamma, \lambda g^{f\varrho})$, $(\gamma, \lambda' g^{f\varrho})$, $(\gamma, \lambda'' g^{f\varrho})$ etc., e quibus manifesto prior constat, necessario cum iis convenient, e quibus posterior constat, etsi alio ordine. Quodsi itaque, illis pro t , u , v etc. resp. substitutis, F in W transire supponitur, W coincidit cum W .

At per art. 347 erit

$$W = A + a(\gamma, g^\varrho) + a'(\gamma, g^{\varrho+1}) \dots + a^e(\gamma, g^{\varrho+e-1}).$$

$= A + a(\gamma, 1) + a'(\gamma, g) \dots + a^e(\gamma, g^{e-1})$ quare quum haec expressio cum W convenire debeat, coefficientis primus, secundus, tertius etc. in W (incipiendo ab a) necessario convenient cum $a^{+1\varrho}$, $a^{+2\varrho}$, $a^{+3\varrho}$ etc., unde nullo negotio concluditur, generaliter coefficientes periodorum (γ, g^μ) , $(\gamma, g^{\mu+f\varrho})$, $(\gamma, g^{\mu+2f\varrho}) \dots (\gamma, g^{\mu+(b-1)f\varrho})$, qui sunt $a^{+1\mu}$, $a^{+1\mu+f\varrho}$, $a^{+2\mu+f\varrho} \dots a^{+b\mu+f\varrho}$, inter se convenire debere. Q. E. D.

Hinc manifestum est, W reduci posse ad formam $A + a(b\gamma, 1) + a'(b\gamma, g) \dots + a^e(b\gamma, g^{e-1})$ ubi omnes coefficientes A , a etc. integri erunt, si omnes coefficientes determinati in F sunt integri. Porro facile perspicietur, si postea pro indeterminatis in F substituantur b periodi γ terminorum in alia periodo $b\gamma$ terminorum, puta in $(b\gamma, \lambda k)$ contentae, quae manifesto erunt $(\gamma, \lambda k)$, $(\gamma, \lambda' k)$, $(\gamma, \lambda'' k)$ etc., valorem inde prodeuntem fore $A + a(b\gamma, k) + a'(b\gamma, gk) \dots + a^e(b\gamma, g^{e-1}k)$.

Ceterum patet, theorema ad eum quoque casum extendi posse, ubi $\alpha = 1$, sive $b\gamma = n - 1$; scilicet hic omnes coefficientes in W aequales erunt, unde W reducetur sub formam $A + a(b\gamma, 1)$.

350

Retentis itaque omnibus signis art. praec., manifestum est, singulos coefficientes aequationis, cuius radices sunt b aggregata (γ, λ) , (γ, λ') , (γ, λ'') etc., sub formam talem $A + a(b\gamma, 1) + a'(b\gamma, g) \dots + a^e(b\gamma, g^{e-1})$ reduci posse, atque numeros A , a etc. omnes fieri integros; aequationem autem, cuius radices sunt b periodi γ terminorum in alia periodo $(b\gamma, k\lambda)$ contentae, ex illa derivari, si ubique in coefficientibus pro qualibet periodo $(b\gamma, \mu)$ substituatur $(b\gamma, k\mu)$.

Si igitur $\alpha = 1$, omnes b periodi γ terminorum determinabuntur per aequationem b^{ti} gradus, cuius singuli coefficientes sub formam $A + a(b\gamma, 1)$ rediguntur, adeoque sunt quantitates cognitae, quoniam $(b\gamma, 1) = (n - 1, 1) = -1$.

Si vero $\alpha > 1$, coefficientes aequationis, cuius radices sunt omnes periodi γ terminorum in aliqua periodo data $b\gamma$ terminorum contentae, quantitates cognitae erunt, simulac valores numerici omnium α periodorum $b\gamma$ terminorum innotuerunt.

Ceterum calculus coefficientium harum aequationum saepe commodius instituitur, praesertim quando b non est valde parvus, si primo summae potestatum radicum eruuntur, ac dein ex his per theorema NEWTONIANUM coefficientes deducuntur, simili modo ut supra art. 349.

EX. I. Quaeritur pro $n = 19$ aequatio, cuius radices sint aggregata $(6, 1)$, $(6, 2)$, $(6, 4)$. Designando has radices per p , p' , p'' resp., et aequationem quaesitam per $x^3 - Axx + Bx - C = 0$ fit $A = p + p' + p''$, $B = pp' + pp'' + p'p''$, $C = pp'p''$. Hinc $A = (18, 1) = -1$; porro habetur

$$\begin{aligned} pp &= 6 + 2p + p' + 2p'' \\ pp' &= 2p + 3p' + p'' \\ pp'' &= 3p + p' + 2p'' \end{aligned}$$

unde $B = 6(p + p' + p'') = 6(18, 1) = -6$; denique fit $C = (p + 2p' + 3p'')p = 3(6, 0) + 11(p + p' + p'') = 18 - 11 = 7$ quare aequatio quaesita $x^3 + xx - 6x - 7 = 0$.

Utendo methodo altera habemus $p + p' + p'' = -1$; $pp = 6 + 2p + p' + 2p''$; $pp' = 6 + 2p' + p'' + 2p$; $pp'' = 6 + 2p + p' + 2p''$ unde $pp + pp' + pp'' = 18 + 5(p + p' + p'') = 13$; similiterque $p^3 + p'^3 + p''^3 = 36 + 34(p + p' + p'') = 2$; hinc per theorema NEWTONIANUM eadem aequatio derivatur ut ante.

II. Quaeritur pro $n = 19$ aequatio, cuius radices sint aggregata $(2, 1)$, $(2, 7)$, $(2, 8)$. Quibus resp. per q , q' , q'' designatis, invenitur

$$q + q' + q'' = (6, 1), \quad qq' + qq'' + q'q'' = (6, 1) + (6, 4), \quad qq'q'' = 2 + (6, 2)$$

umde, retentis signis ex. praec., aequatio quaesita erit $x^3 - pxx + (p + p'')x - 2 - p' = 0$. Aequatio, cuius radices sunt aggregata $(2, 2)$, $(2, 3)$, $(2, 5)$, sub $(6, 2)$ contenta, e praecedente deducitur, substituendo pro p , p' , p'' resp. p' , p'' , p , eademque substitutione iterum facta, prodit aequatio, cuius radices sunt aggregata $(2, 4)$, $(2, 6)$, $(2, 9)$ sub $(6, 4)$ contenta.

DISQUISITIONIBUS PRAEC. SUPERSTRUITUR SOLUTIO AEQUATIONIS $X = 0$.

351

Theoremata praecedentia cum consecrariis annexis praecipua totius theoriae momenta continent, modusque valorum radicum Ω inveniendi paucis iam tradi poterit.

Ante omnia accipiendus est numerus g qui pro modulo n sit radix primitiva, residuaque minima potestatum ipsius g usque ad g^{n-2} secundum modulum n eruenda. Resolvatur $n - 1$ in factores, et quidem, si problema ad aequationes gradus quam infimi reducere lubet, in factores primos; sint hi (ordine prorsus arbitrario) $\alpha, \beta, \gamma \dots \zeta$, ponaturque $\frac{n-1}{\alpha} = \varepsilon\gamma \dots \zeta = \alpha', \frac{n-1}{\alpha\beta} = \gamma \dots \zeta = \beta'$, etc.

Distribuantur omnes radices Ω in α periodos α' terminorum; hae singulae rursus in β periodos β' terminorum; hae singulae denuo in γ periodos etc.

Quaeratur per art. praec. aequatio α^{ti} gradus (A), cuius radices sint illa α aggregata α' terminorum, quorum itaque valores per resolutionem huius aequationis innotescunt. At hic difficultas oritur, quum incertum videatur, cuinam radici aequationis (A) quodvis aggregatum aequale statuendum sit, puta quaenam radix per $(\alpha, 1)$, quaenam per (α, g) etc. denotari debeat: huic rei sequenti modo remedium afferri poterit.

Per $(\alpha, 1)$ designari potest radix quaecunque aequationis (A); quum enim quaevis radix huius aequ. sit aggregatum α radicum ex Ω , omninoque arbitrarium sit, quaenam radix ex Ω per [1] denotetur, manifeste supponere licebit, aliquam ex iis radicibus, e quibus radix quaecunque data aequ. (A) constat, per [1] exprimi, unde illa radix aequ. (A) fiet $(\alpha, 1)$; radix [1] vero hinc nondum penitus determinatur, sed etiamnum prorsus arbitrarium seu indefinitum manet, quamnam radicem ex iis, quae $(\alpha, 1)$ constituunt, pro [1] adoptare velimus.

Simulac vero $(\alpha, 1)$ determinatum est, etiam omnia reliqua aggregata α terminorum rationaliter inde deduci poterunt (art. 346). Hinc simul patet, unicam tantummodo radicem per huius resolutionem eruere oportere.

Potest etiam methodus sequens, minus directa, ad hunc finem adhiberi. Accipiat pro [1] radix determinata, i.e. ponatur $[1] = \cos \frac{P}{n} + i \sin \frac{P}{n}$, integre k ad lubitum electo, ita tamen ut per n non sit divisibilis; quo facto etiam [2], [3] etc. radices determinatas indicabunt, unde etiam aggregata $(\alpha, 1)$, (α, g) etc. quantitates determinatas designabunt. Quibus e tabulis sinuum levi tantum calamo computatis, puta ea praecisione, ut quae maiora quaeve minora sint decidi possit, nullum dubium superesse poterit, quibusnam signis singulae radices aequ. (A) sint distinguendae.

Quando hoc modo omnia α aggregata α' terminorum inventa sunt, investigetur per art. praec. aequatio β^{ti} gradus (B), cuius radices sint β aggregata β' terminorum sub $(\alpha, 1)$ contenta; coefficientes huius aequationis omnes erunt quantitates cognitae. Quum adhuc arbitrarium sit, quaenam ex $\alpha = \beta\beta'$ radicibus sub $(\alpha, 1)$ contentis per [1] denotetur, quaelibet radix data aequ. (B) per $(\beta, 1)$ exprimi poterit, quia manifesto supponere licet, aliquam β radicem, e quibus composita est, per [1] denotari.

Investigetur itaque una radix quaecunque aequationis (B) per eius resolutionem, statuatur $= (\beta, 1)$, deriventurque inde per art. 346 omnia reliqua aggregata β terminorum. Hoc modo simul calculi confirmationem nanciscimur, quum semper ea aggregata β terminorum, quae ad easdem periodos α terminorum pertinent, summas notas conficere debeant.

In quibusdam casibus aequale expeditum esse potest, $\alpha - 1$ alias aequationes β^{ti} gradus eruere, quarum radices sint resp. singula ε aggregata β terminorum in reliquis periodis α terminorum, (α, g) , (α, gg) etc. contenta, atque omnes radices tum harum aequationum tum aequationis (B) per resolutionem investigare: tunc vero simili modo ut supra adiumento tabulae sinuum decidere oportebit, quibusnam periodis β terminorum singulae radices hoc modo prodeuntes aequales statui debeant.

Ceterum ad hocce iudicium varia alia artificia adhiberi possunt, quae hoc loco complete explicare non licet; unum tamen, pro eo casu ubi $\beta = 2$, quod imprimis utile est, ac per

exempla brevius quam per praecepta declarari poterit, in exemplis sequentibus cognoscere licebit.

Postquam hoc modo valores omnium $\alpha\beta$ aggregatorum β terminorum inventi sunt, prorsus simili modo hinc per aequationes γ^{ti} gradus omnia $\alpha\beta\gamma$ aggregata γ terminorum determinari poterunt. Scilicet vel unam aequationem γ^{ti} gradus, cuius radices sint γ aggregata γ' terminorum sub $(\beta, 1)$ contenta, per art. 350 eruere; per eius resolutionem unam radicem quamcunque elicere et $= (\gamma, 1)$ statuere, tandemque hinc per art. 346 omnia reliqua similia aggregata deducere oportebit; vel simili modo omnino $\alpha\beta$ aequationes γ^{ti} gradus evolvere, quarum radices sint resp. γ aggregata γ' terminorum in singulis periodis β terminorum contenta, valores omnium radicum omnium harum aequationum per resolutionem extrahere, tandemque ordinem harum radicum perinde ut supra adiumento tabulae sinuum, vel, pro $\gamma = 2$, per artificium infra in exemplis ostendendum determinare.

Hoc modo pergendo, manifesto tandem omnia $\frac{n-1}{\zeta}$ aggregata ζ terminorum habebuntur; evolvendo itaque per art. 348 aequationem ζ^{ti} gradus, cuius radices sint ζ radices ex Ω in $(\zeta, 1)$ contentae, huius coefficientes omnes erunt quantitates cognitae; quodsi per resolutionem una eius radix quaecunque elicatur, hanc $= [1]$ statuere licebit, omnesque reliquae radices Ω per huius potestates habebuntur.

Si magis placet, etiam omnes radices illius aequationis per resolutionem erui, praeterea per solutionem $\frac{n-1}{\zeta} - 1$ aliarum aequationum ζ^{ti} gradus, quae resp. omnes ζ radices in singulis reliquis periodis ζ terminorum contentas exhibent, omnes reliquae radices Ω inveniri poterunt.

Ceterum patet, simulac prima aequatio (A) soluta sit, sive simulac valores omnium α aggregatorum α' terminorum habeantur, etiam resolutionem functionis X in α factores α' dimensionum per art. 348 sponte haberi; porroque post solutionem aequ. (B), sive postquam valores omnium $\alpha\beta$ aggregatorum β' terminorum inventi sint, singulos illos factores iterum in β , sive X in $\alpha\beta$ factores β' dimensionum resolveri etc.

352

EXEMPLUM PRIMUM PRO $n = 19$.

Quum hic fiat $n - 1 = 3 \cdot 3 \cdot 2$, inventio radicum Ω ad solutionem duarum aequationum cubicarum uniusque quadraticae est reducenda. Hoc exemplum eo facilius intelligetur, quod operationes necessariae ad maximam partem in praecedentibus iam sunt contentae.

Accipiendo pro radice primitiva g numerum 2, residua minima eius potestatum haec prodeunt (exponentes potestatum in serie prima residuis sunt superscripti):

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	4	8	16	13	7	14	9	18	17	15	11	3	6	12	5	10

Hinc per artt. 344, 345 facile deducitur distributio sequens omnium radicum Ω in tres periodos senorum, harumque singularum in ternas binorum terminorum:

$$\begin{array}{rcl}
 & & (2, 1) \dots [1], [18] \\
 (6, 1) & & (2, 8) \dots [8], [11] \\
 & & (2, 7) \dots [7], [12] \\
 & & (2, 2) \dots [2], [17] \\
 \Omega = (18, 1) & (6, 2) & (2, 16) \dots [3], [16] \\
 & & (2, 14) \dots [5], [14] \\
 & & (2, 4) \dots [4], [15] \\
 (6, 4) & & (2, 13) \dots [6], [13] \\
 & & (2, 9) \dots [9], [10]
 \end{array}$$

Aequatio (A), cuius radices sunt aggregata (6, 1), (6, 2), (6, 4), invenitur $x^3 + xx - 6x - 7 = 0$, cuius una radix eruitur $= -1,2218761623$. Hanc per (6, 1) exprimendo fit

$$\begin{aligned}
 (6, 2) &= 4 - (6, 1)^2 = 2,5070186441 \\
 (6, 4) &= -5 - (6, 1) + (6, 1)^2 = -2,2851424818
 \end{aligned}$$

Hinc X in tres factores 6 dimensionum resoluta erit, si hi valores in art. 348 substituuntur.

Aequatio (B), cuius radices sunt aggregata (2, 1), (2, 7), (2, 8), prodit haec

$$x^3 - (6, 1)x^2 + ((6, 1) + (6, 4))x - 2 - (6, 2) = 0$$

sive $x^3 + 1,2218761623x^2 - 3,5070186441x - 4,5070186441 = 0$, cuius una radix elicitur $= -1,3545631433$, quam per (2, 1) exprimemus.

Per methodum art. 346 autem inveniuntur aequationes sequentes, ubi brevitatis caussa q pro (2, 1) scribitur:

$$\begin{aligned}
 (2, 2) &= q^2 - 2, & (2, 3) &= q^3 - 3q, & (2, 4) &= q^4 - 4q^2 + 2, \\
 (2, 5) &= q^5 - 5q^3 + 5q, & (2, 6) &= q^6 - 6q^4 + 9q^2 - 2, & (2, 7) &= q^7 - 7q^5 + 14q^3 - 7q, \\
 (2, 8) &= q^8 - 8q^6 + 20q^4 - 16q^2 + 2, & (2, 9) &= q^9 - 9q^7 + 27q^5 - 30q^3 + 9q.
 \end{aligned}$$

Commodius quam per praecepta art. 346 hae aequationes in casu praesenti per reflexiones sequentes evolvi possunt.

Supponendo $[1] = \cos \frac{P}{19} + i \sin \frac{P}{19}$ fit $[18] = \cos \frac{18P}{19} + i \sin \frac{18P}{19} = \cos \frac{P}{19} - i \sin \frac{P}{19}$, adeoque $(2, 1) = 2 \cos \frac{P}{19}$ nec non generaliter $[\lambda] = \cos \frac{\lambda P}{19} + i \sin \frac{\lambda P}{19}$, adeoque $(2, \lambda) = [\lambda] + [18\lambda] = [\lambda] + [-\lambda] = 2 \cos \frac{\lambda P}{19}$.

Quare si $\frac{P}{19} = \omega$, erit $(2, 2) = 2 \cos 2\omega$, $(2, 3) = 2 \cos 3\omega$ etc., unde per aequationes notas pro cosinibus angulorum multiplicium eadem formulae ut supra derivantur.

Iam ex his formulis valores numerici sequentes eliciuntur:

$$\begin{aligned}
 (2, 2) &= -0,1651586909 & (2, 3) &= 1,5782810188 \\
 (2, 4) &= -1,9727226068 & (2, 5) &= 1,0938963162 \\
 (2, 6) &= 0,4909709743 & (2, 7) &= -1,7589475024 \\
 (2, 8) &= 1,8916344834 & (2, 9) &= -0,8033908493
 \end{aligned}$$

Valores ipsorum (2, 7), (2, 8) etiam ex aequatione (B), cuius duae reliquae radices sunt, elici possunt, dubiumque, utra harum radicum fiat (2, 7) et utra (2, 8), vel per calculum approximatum secundum formulas praec., vel per tabulas sinuum tolletur, quae obiter tantum consultae ostendent, fieri $(2, 1) = 2 \cos \omega$ ponendo $\omega = \frac{P}{19}$, unde fieri oportet $(2, 7) = 2 \cos \frac{7P}{19} = 2 \cos 7\omega$, et $(2, 8) = 2 \cos \frac{8P}{19} = 2 \cos 8\omega$.

Similiter aggregata $(2, 2)$, $(2, 3)$, $(2, 5)$ etiam per aequationem $x^3 - (6, 2)x^2 + ((6, 1) + (6, 2))x - 2 - (6, 4) = 0$, cuius radices sunt, invenire licet, incertitudoque, quaenam radices illis aggregatis resp. aequales statuendae sint, prorsus eodem modo removebitur, ut ante; et perinde etiam aggregata $(2, 4)$, $(2, 6)$, $(2, 9)$ per aequationem $x^3 - (6, 4)x^2 + ((6, 2) + (6, 4))x - 2 - (6, 1) = 0$ elici poterunt.

Denique [1] et [18] sunt radices aequationis $xx - (2, 1)x + 1 = 0$, quarum altera fit $= \frac{1}{2}(2, 1) + \frac{1}{2}\sqrt{((2, 1)^2 - 4)} = \frac{1}{2}(2, 1) + \frac{1}{2}i\sqrt{(4 - (2, 2))}$, altera $= \frac{1}{2}(2, 1) - \frac{1}{2}i\sqrt{(4 - (2, 2))}$, hinc valores numerici $= -0,6772815716 + 0,7357239107i$.

Sedecim radices reliquae vel ex evolutione potestatum utriusvis harum radicum, vel e solutione octo aliarum similium aequationum deduci possunt, ubi in methodo posteriori vel per tabulas sinuum vel per artificium in ex. sq. explicandum decidi debebit, pro utra radice parti imaginariae signum positivum et pro utra negativum praefigendum sit. Hoc modo inventi sunt valores sequentes, ubi signum superius radici priori, inferius posteriori respondere supponitur:

[1] et [18] $= -0,6772815716 \pm 0,7357239107i$	[2] et [17] $= -0,08257$
[3] et [16] $= 0,7891405094 \pm 0,6142127127i$	[4] et [15] $= -0,98636$
[5] et [14] $= 0,5469481581 \pm 0,8371664783i$	[6] et [13] $= 0,24548$
[7] et [12] $= -0,8794737512 \pm 0,4759473930i$	[8] et [11] $= 0,94581$
[9] et [10]	$= -0,4016954247 \pm 0,9157733267i$

353

EXEMPLUM SECUNDUM PRO $n = 17$.

Hic habetur $n - 1 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$, quamobrem calculus radicum Ω ad quatuor aequationes quadraticas reducendus erit. Pro radice primitiva hic accipiemus numerum 3, cuius potestates residua minima sequentia secundum modulum 17 suppeditant:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3	9	10	13	5	15	11	16	14	8	7	4	12	2	6

Hinc emergunt distributiones sequentes complexus Ω in periodos duas octonorum, quatuor quaternorum, octo binorum terminorum:

	$(2, 1) \dots [1], [16]$
$(4, 1)$	$(2, 13) \dots [13], [4]$
	$(2, 16) \dots [16], [1]$
	$(2, 9) \dots [9], [8]$
$(8, 1)$	$(4, 9) (2, 15) \dots [15], [2]$
	$(2, 4) \dots [4], [13]$
	$(2, 8) \dots [8], [9]$
$\Omega = (16, 1)$	$(2, 2) \dots [2], [15]$
	$(2, 14) \dots [14], [3]$
	$(2, 3) \dots [3], [14]$
$(4, 3)$	$(2, 5) \dots [5], [12]$
$(8, 3)$	$(2, 6) \dots [6], [11]$
	$(2, 10) \dots [10], [7]$
	$(2, 7) \dots [7], [10]$
$(4, 10)$	$(2, 11) \dots [11], [6]$
	$(2, 12) \dots [12], [5]$

His factis, quaerenda est aequatio (A), cuius radices sint aggregata (8, 1), (8, 3). Per art. 351 invenitur $x^2 + x - 4 = 0$, unde radices sunt $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{17})$ et $\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{17})$; quamnam harum radicum per (8, 1), quamnam per (8, 3) exprimere oporteat, aestimando quantitates propositas definiemus.

Statuendo $[1] = \cos \frac{kP}{17} + i \sin \frac{kP}{17}$ fit $(8, 1) = 2 \cos \frac{P}{17} + 2 \cos \frac{13P}{17} + 2 \cos \frac{16P}{17} + 2 \cos \frac{4P}{17} + 2 \cos \frac{9P}{17} + 2 \cos \frac{8P}{17} + 2 \cos \frac{2P}{17} + 2 \cos \frac{15P}{17}$, et huius valor per methodos notas invenitur $= 1,8649444588$, qui fit radix prior; itaque habemus

$$\begin{aligned}(8, 1) &= \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{17}) \\ (8, 3) &= \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{17})\end{aligned}$$

Progredimur iam ad aggregata quatuor terminorum. Quaeritur aequatio (B), cuius radices sint aggregata (4, 1), (4, 9), (4, 3), (4, 10) sub (8, 1) et (8, 3) contenta.

Primo invenitur per art. 351 productum ex (4, 1) + (4, 9) in (4, 3) + (4, 10); puta si priorum aggregatum per p , posteriorum per q denotatur, erit $p + q = (8, 1)$, $pq = -1 + (8, 1) + (8, 3) = -4$, adeoque p et q radices aequationis $x^2 - (8, 1)x - 4 = 0$, unde $p = \frac{1}{2}(8, 1) + \frac{1}{2}\sqrt{(16 + (8, 1)^2)}$, $q = \frac{1}{2}(8, 1) - \frac{1}{2}\sqrt{(16 + (8, 1)^2)}$.

Simili modo si ponitur $p' = (4, 1) + (4, 3)$, $q' = (4, 9) + (4, 10)$, erit $p' + q' = (8, 3)$, $p'q' = -4$, adeoque p' et q' radices aequationis $x^2 - (8, 3)x - 4 = 0$.

Habebimus itaque radices quatuor

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(8, 1) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(16 + (8, 1)^2)} \\ \frac{1}{2}(8, 3) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(16 + (8, 3)^2)}\end{aligned}$$

quarum secunda est negativa, reliquae positivae; patetque, radicem secundam esse $= (4, 9) + (4, 10)$, cum sit $= \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{17}) - \frac{1}{2}\sqrt{(34 + 2\sqrt{17})}$, adeoque negativa. Quamnam vero reliquarum ipsi (4, 1), quamnam ipsi (4, 3) tribuere oporteat, pendet a valore expressionis $(4, 1) - (4, 9)$, cuius quadratum $= 12 + 4(8, 1) + 3(8, 3)$, adeoque positiva; manifesto autem valor ipsius $(4, 1) - (4, 9)$ positivus est (quoniam per se patet, (4, 1) esse quantitatem positivam, (4, 9) vero negativam); quare habetur

$$\begin{aligned}(4, 1) &= \frac{1}{2}(8, 1) + \frac{1}{2}\sqrt{(16 + (8, 1)^2)} = \frac{1}{2}(8, 1) + \frac{1}{2}\sqrt{(12 + 4(8, 1) + 3(8, 3))} \\ (4, 9) &= \frac{1}{2}(8, 1) - \frac{1}{2}\sqrt{(16 + (8, 1)^2)}\end{aligned}$$

Eadem methodus etiam hanc formulam largitur $(4, 9) = -1 - (8, 1) + (8, 1)^2$, unde valor idem elicitur, quem ante tradidimus.

Secundo vero aggregata (4, 3), (4, 10) etiam per resolutionem aequationis, cuius radices sunt, determinare licet, quae aequatio fit $xx - (8, 3)x - 1 = 0$, unde eius radices sunt $\frac{1}{2}(8, 3) \pm \frac{1}{2}i\sqrt{(4 + (8, 3)^2)}$, sive $\frac{1}{2}(8, 3) + \frac{1}{2}\sqrt{(12 + 4(8, 1) + 3(8, 3))}$ et $\frac{1}{2}(8, 3) + \frac{1}{2}\sqrt{(12 + 4(8, 1) - 3(8, 3))}$; dubium vero, utram radicem per (4, 3) et utram per (4, 10) exprimere oporteat, per artificium sequens, cuius mentionem in art. 352 inieciimus, tolletur.

Evolvatur productum ex $(4, 1) - (4, 9)$ in $(4, 3) - (4, 10)$, unde emergere invenietur $2(8, 1) - 2(8, 3)^6$; iam huius expressionis valor manifesto est positivus puta $= +2\sqrt{17}$, praetereaue etiam producti factor primus $(4, 1) - (4, 9)$ positivus est puta $= \frac{1}{2}\sqrt{(12 + 3(8, 1) + 4(8, 3))}$, quare necessario etiam alter factor $(4, 3) - (4, 10)$ positivus esse debet, et proin (4, 3) radici priori, in qua signum positivum radicali praefigitur, et (4, 10) posteriori aequale statui.

⁶Vera indoles huius artificii in eo consistit, quod a priori praevideri poterat, hocce productum evolutum aggregata quatuor terminorum non continere sed per sola aggregata octo terminorum exhiberi posse, cuius rei rationem hic brevitatis caussa praetereundam periti facillimeprehendent.

Ceterum hinc iidem valores numerici derivantur ut supra.

Cunctis aggregatis quatuor terminorum inventis, progredimur ad aggregata duorum terminorum. Aequatio (C), cuius radices sunt hae $(2, 1)$, $(2, 13)$, sub $(4, 1)$ contentae, eruitur haec $xx - (4, 1)x + (4, 3) = 0$; huius radices sunt $\frac{1}{2}(4, 1) \pm \frac{1}{2}\sqrt{(-4(4, 3) + (4, 1)^2)}$ sive $\frac{1}{2}(4, 1) + \frac{1}{2}i\sqrt{(4 + (4, 9) - 2(4, 3))}$; eam, ubi quantitas radicalis positive sumitur et cuius valor reperitur $= 1,8649444588$, statuimus $= (2, 1)$, unde $(2, 13)$ aequale fiet alteri, cuius valor $= 0,1845367189$.

Si aggregata reliqua duorum terminorum per methodum art. 346 investigare placet, pro $(2, 2)$, $(2, 3)$, $(2, 4)$, $(2, 5)$, $(2, 6)$, $(2, 7)$, $(2, 8)$ eaedem formulae adhiberi poterunt, quae in ex. praec. pro quantitibus similiter designatis tradidimus, puta $(2, 2)$, (sive $(2, 15)$), $= (2, 1)^2 - 2$ etc.

Si vero magis arridet, binas per resolutionem aequationis quadraticae computare, pro his $(2, 9)$, $(2, 15)$ invenitur aequatio $xx - (4, 9)x + (4, 10) = 0$, cuius radices evolvuntur $\frac{1}{2}(4, 9) + \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 1) - 2(4, 10))}$; quo pacto vero signum ambiguum hic definire oporteat, simili modo decidetur ut supra.

Scilicet per evolutionem producti $(2, 1) - (2, 13)$ in $(2, 9) - (2, 15)$ producitur $-(4, 1) + (4, 9) - (4, 3) + (4, 10)$; quod quum manifesto sit negativum, factor $(2, 1) - (2, 13)$ vero positivus, necessario $(2, 9) - (2, 15)$ negativus esse debet, quocirca in expressione ante data signum superius positivum pro $(2, 15)$, pro $(2, 9)$ inferius negativum adoptandum erit. Hinc computatur $(2, 9) = -1,9659461994$, $(2, 15) = 1,4780178344$.

Perinde quum ex evolutione producti ex $(2, 1) - (2, 13)$ in $(2, 3) - (2, 5)$ prodeat $(4, 9) - (4, 10)$, adeoque quantitas positiva, factorem $(2, 3) - (2, 5)$ positivum esse concludimus; hinc simili calculo ut ante instituto invenitur

$$\begin{aligned}(2, 3) &= \frac{1}{2}(4, 3) + \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 10) - 2(4, 9))} = 0,8914767116 \\ (2, 5) &= \frac{1}{2}(4, 3) - \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 10) - 2(4, 9))} = -0,5473259801\end{aligned}$$

Denique per operationes omnino analogas eruitur

$$\begin{aligned}(2, 10) &= \frac{1}{2}(4, 10) - \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 3) - 2(4, 1))} = -1,7004342715 \\ (2, 11) &= \frac{1}{2}(4, 10) + \frac{1}{2}\sqrt{(4 + (4, 3) - 2(4, 1))} = -1,2052692728\end{aligned}$$

Superest ut ad radices Ω ipsas descendamus. Aequatio (D), cuius radices sunt $[1]$ et $[16]$, prodit $xx - (2, 1)x + 1 = 0$, unde radices $\frac{1}{2}(2, 1) + \frac{1}{2}\sqrt{((2, 1)^2 - 4)}$ aut potius $\frac{1}{2}(2, 1) + \frac{1}{2}i\sqrt{(4 - (2, 1)^2)}$ sive $\frac{1}{2}(2, 1) + \frac{1}{2}i\sqrt{(2 - (2, 15))}$; signum superius pro $[1]$, inferius pro $[16]$ adoptamus.

Quatuordecim reliquae radices vel per potestates ipsius $[1]$ habebuntur; vel per resolutionem septem aequationum quadraticarum, quae singulae binas exhibent, ubi incertitudo de signis quantitatum radicalium per idem artificium tolli poterit ut in praecedentibus.

Ita $[4]$ et $[13]$ sunt radices aequationis $xx - (2, 13)x + 1 = 0$, adeoque $\frac{1}{2}(2, 13) + \frac{1}{2}i\sqrt{(2 - (2, 9))}$; per evolutionem producti ex $[1] - [16]$ in $[4] - [13]$ autem prodit $(2, 5) - (2, 3)$, adeoque quantitas realis negativa, quare quum $[1] - [16]$ sit $+\frac{1}{2}i\sqrt{(2 - (2, 15))}$, i.e. productum ex imaginaria i in realem positivam, etiam $[4] - [13]$ esse debet productum ex i in realem positivam propter $ii = -1$; hinc colligitur, pro $[4]$ signum superius, pro $[13]$ inferius accipiendum esse.

Simili modo pro radicibus $[8]$ et $[9]$ invenitur $\frac{1}{2}(2, 9) \pm \frac{1}{2}i\sqrt{(2 - (2, 1))}$, ubi, quoniam productum ex $[1] - [16]$ in $[8] - [9]$ fit $(2, 9) - (2, 10)$ adeoque negativum, pro $[8]$ signum superius, pro $[9]$ inferius accipere oportet.

Computando perinde radices reliquas, sequentes valores numericos obtinemus, ubi radicibus prioribus signa superiora, posterioribus inferiora respondere subintelligendum est:

$$\begin{array}{ll}
 [1], [16] = 0,9324722294 \pm 0,3612416662i & [2], [15] = 0,7390089172 \pm 0,6736956436i \\
 [3], [14] = 0,4457383558 \pm 0,8951632914i & [4], [13] = 0,0922683595 \pm 0,9957341763i \\
 [5], [12] = -0,2736629901 \pm 0,9618256432i & [6], [11] = -0,6026346364 \pm 0,7980172273i \\
 [7], [10] = -0,8502171357 \pm 0,5264321629i & [8], [9] = -0,9829730997 \pm 0,1837495178i
 \end{array}$$

354

Possent quidem ea, quae in praec. sunt tradita, ad solutionem aequationis $x^n - 1 = 0$ adeoque etiam ad inventionem functionum trigonometricarum arcubus cum peripheria commensurabilibus respondentium sufficere: attamen, propter rei gravitatem, finem huic disquisitioni imponere non possumus, quin antea ex magna copia tum observationum hoc argumentum illustrantium tum positionum ei affinium vel inde pendentium quaedam hic annectamus. Inter quae talia potissimum eligemus, quae sine magno aliarum disquisitionum apparatu absolvere licet, aliterque ea considerari nolumus quam ut specimina huius amplissimae doctrinae, in posterum copiose pertractandae.

DISQUISITIONES ULTERIORES DE RADICUM PERIODIS.

AGGREGATA, IN QUIBUS TERMINORUM MULTITUDO PAR, SUNT QUANTITATES REALES.

355

Quum n semper supponatur impar, erit 2 inter factores ipsius $n - 1$, complexusque Ω ex $\frac{1}{2}(n - 1)$ periodis duorum terminorum formatus. Talis per

Disquisitiones Arithmeticae

Sectio Quinta. De Formis Secundi Gradus.

Articulus 165 — retype from scan (Werke Vol. I, p. 141)

Carolus Fridericus Gauss

GENERALIA DE REPRAESENTATIONIBUS NUMERORUM.

165.

Ex. Forma $3xx + 14xy - 4yy$ in formam $-12x'x' - 18x'y' + 39y'y'$ transmutatur tum proprie, ponendo

$$x = 4x' + 11y', \quad y = x' - 2y',$$

tum improprie, ponendo

$$x = -74x' + 89y', \quad y = 15x' - 18y'.$$

Hic igitur $\alpha + \alpha'$, $\beta + \beta'$, $\gamma + \gamma'$, $\delta + \delta'$ sunt -70 , 100 , 14 , -20 ; est autem

$$-70 : 14 = 100 : -20 = 5 : -1.$$

Faciemus itaque $m = 5$, $n = -1$, $\mu = 0$, $\nu = -1$. Numeri autem a, b, c inveniuntur -237 , -1170 , 48 , quorum divisor communis maximus $= 3 = r$; denique fit $e = 3$. Hinc transformatio (S) haec erit,

$$x = 5t - u, \quad y = -t.$$

Per quam forma $(3, 7, -4)$ transit in formam ancipitem

$$tt - 16tu + 3uu.$$

Si formae F , F' sunt aequivalentes: forma G , sub F contenta, etiam sub F' contenta erit. Sed quoniam eandem formam etiam implicat, ipsi aequivalens erit, et proin etiam formae F . In hoc igitur casu theorema ita enunciabitur:

Si F , F' tam proprie, quam improprie sunt aequivalentes: forma anceps utriusque aequivalens inveniri poterit.

Ceterum in hoc casu $e = \pm 1$, adeoque etiam r , ipsum e metiens, $= 1$ erit.

Haec de formarum transformatione in genere sufficient: transimus itaque ad considerationem repraesentationum.

Generalia de repraesentationibus numerorum per formas, earumque nexu cum transformationibus.

Disquisitiones Arithmeticae

Articuli 43–49 — missing fill from scan
(end of Sectio Secunda, opening of Sectio Tertia)

Carolus Fridericus Gauss

43.

Congruentia m^{ti} gradus

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \text{etc.} + Mx + N \equiv 0,$$

cuius modulus est numerus primus p , ipsum A non metiens, pluribus quam m modis diversis solvi non potest, sive plures quam m radices secundum p incongruas non habet (Vid. artt. 25, 26).

Si quis neget, ponamus dari congruentias diversorum graduum m, n etc., quae plures quam m, n etc. radices habeant, sitque minimus gradus m , ita ut omnes similes congruentiae inferiorum graduum theoremati nostro sint consentaneae. Quod quum de primo gradu iam supra sit demonstratum (art. 26), manifestum est, m fore aut $= 2$ aut maiorem. Admittet itaque congruentia

$$Ax^m + Bx^{m-1} + \text{etc.} + Mx + N \equiv 0$$

saltem $m + 1$ radices, quae sint $x \equiv \alpha, x \equiv \beta, x \equiv \gamma$ etc., ponamusque id quod licet omnes hosce numeros α, β, γ etc. esse positivos et minores quam p , et quidem minimum α . Iam in congruentia proposita substituatur pro $x, y + \alpha$, transeatque inde in hanc

$$A'y^m + B'y^{m-1} + C'y^{m-2} + \text{etc.} + M'y + N' \equiv 0.$$

Tum manifestum est, huic congruentiae satisfieri, si ponatur $y \equiv 0$, aut $\equiv \beta - \alpha$, aut $\equiv \gamma - \alpha$ etc., quae radices omnes erunt diversae, numerusque earum $= m + 1$. At ex $y \equiv 0$ sit radix, sequitur, N' per p divisibilem fore. Quare etiam haec expressio

$$y(A'y^{m-1} + B'y^{m-2} + \text{etc.} + M') \equiv 0 \pmod{p}$$

si ipsi y valoribus $\beta - \alpha, \gamma - \alpha$ etc. tribuitur, qui omnes sunt > 0 et $< p$, adeoque in omnibus hisce casibus etiam

$$A'y^{m-1} + B'y^{m-2} + \text{etc.} + M' \equiv 0 \pmod{p} \text{ (art. 22),}$$

i. e. congruentia

$$A'y^{m-1} + B'y^{m-2} + \text{etc.} + M' \equiv 0,$$

quae radices habet $m - 1^{\text{ti}}$, m radices habet, et theoremati nostro adversatur (patet enim facile, A' fore $= A$, adeoque per p non divisibilem, uti requiritur); licet supposuerimus, omnes congruentias inferioris gradus quam m^{ti} , theoremati consentire. Q. E. A.

44.

Quamvis hic supposuerimus, modulum p non metiri coefficientem termini summi, tamen theorema ad hunc casum non restringitur. Si enim primus coefficientis sive etiam aliqui sequentium per p divisibiles essent, hi termini tuto reici possent, congruentiaque tandem ad inferiorem gradum deprimeretur, ubi coefficientis primus per p non amplius foret divisibilis, siquidem non omnes coefficientes per p dividi possunt; in quo casu congruentia foret identica atque incognita prorsus indeterminata.

Theorema hoc primum ab ill. LA GRANGE propositum atque demonstratum est (*Mém. de l'Ac. de Berlin, Année 1768*, p. 192). Exstat etiam in dissert. ill. LE GENDRE, *Recherches d'Analyse indéterminée, Hist. de l'Acad. de Paris 1785*, p. 466. Ill. EULER in *Nov. Comm. Ac. Petr. XVIII* p. 93 demonstravit, congruentiam $x^n - 1 \equiv 0$ plures quam n radices diversas habere non posse. Quae quamvis sit particularis, tamen methodus, qua vir summus usus est, omnibus congruentiis facile adaptari potest. Casum adhuc magis limitatum iam antea absolverat, *Comm. nov. Ac. Petr. V* p. 6, sed haec methodus generaliter adhiberi nequit. Infra Sect. VIII alio adhuc modo theorema demonstrabimus; at quantumvis diverso primo aspectu omnes hae methodi videri possint, periti qui comparare eas voluerint, facile certiores fient, omnes eidem principio superstructas esse. Ceterum quum hoc theorema hic tantum tanquam lemma sit considerandum, neque completa expositio huc pertineat: de modulis compositis seorsim agere supersedemus.

SECTIO TERTIA

DE

RESIDUIS POTESSTATUM.

Residua terminorum progressionis geometricae ab unitate incipientis constituunt seriem periodicam.

45.

THEOREMA. *In omni progressionem geometricam $1, a, a^2, a^3$ etc. praeter primum 1 , alius adhuc datur terminus a^t , secundum modulum p ad a primum unitati congruus, cuius exponens $t < p$.*

Demonstr. Quoniam modulus p ad a , adeoque ad quamvis ipsius a potestatem est primus, nullus progressionis terminus erit $\equiv 0 \pmod{p}$, sed quivis alicui ex his numeris $1, 2, 3, \dots, p-1$ congruus. Quorum multitudo quum sit $p-1$, manifestum est, si plures quam $p-1$ progressionis termini considerentur, omnes residua minima diversa habere non posse. Quocirca inter terminos $1, a, aa, a^3, \dots, a^{p-1}$ bini ad minimum congrui invenientur. Sit itaque $a^m \equiv a^n$ et $m > n$, fietque dividendo per a^n , $a^{m-n} \equiv 1$ (art. 22), ubi $m-n < p$, et > 0 . Q. E. D.

Ex. In progressionem $2, 4, 8$ etc. terminus primus, qui secundum modulum 13 unitati est congruus, invenitur $2^{12} = 4096$. At secundum modulum 23 in eadem progressionem fit $2^{11} = 2048 \equiv 1$. Similiter numeri 5 potestas sexta, 15625 , unitati congrua secundum modulum 7 , quinta vero, 3125 , secundum modulum 11 . In aliis igitur casibus potestas exponentis minoris quam $p-1$ unitati congrua evadit, in aliis contra usque ad potestatem $p-1^{\text{tam}}$ ascendere necesse est.

46.

Quando progressio ultra terminum, qui unitati est congruus, continuatur, eadem, quae ab initio habebantur, residua prodeunt iterum. Scilicet si $a^t \equiv 1$, erit $a^{t+1} \equiv a$, $a^{t+2} \equiv aa$ etc., donec ad terminum a^{2t} perveniatur, cuius residuum minimum iterum erit $\equiv 1$, atque residuorum periodum denuo inchoat. Habetur itaque periodus t residua comprehendens, quae simulac finita est ab initio semper repetitur; neque alia residua quam quae in hac periodo continentur, in tota progressionem occurrere possunt. Generaliter erit $a^{mt} \equiv 1$, et $a^{mt+n} \equiv a^n$, id quod per designationem nostram ita exhibetur:

$$\text{Si } r \equiv \rho \pmod{t}, \text{ erit } a^r \equiv a^\rho \pmod{p}.$$

47.

Petitur ex hoc theoremate compendium potestatum quantumvis magno exponente affectarum residua expedite inveniendi, simulac potestas unitati congrua innotescat. Si ex. gr. residuum e divisione potestatis 3^{1000} per 13 oriundum quaeritur, erit propter $3^3 \equiv 1 \pmod{13}$, $t \equiv 3$; quare quum sit $1000 \equiv 1 \pmod{3}$, erit $3^{1000} \equiv 3 \pmod{13}$.

48.

Quando a^t est *infima* potestas unitati congrua (praeter $a^0 = 1$, ad quem casum hic non respicimus), illi t termini, residuorum periodum constituentes, omnes erunt diversi, ut ex demonstratione art. 45 nullo negotio perspicitur. Tum autem propositio art. 46 converti potest; scilicet si $a^m \equiv a^n \pmod{p}$, erit $m \equiv n \pmod{t}$. Si enim m, n secundum modulum t incongrui essent, residua eorum minima μ, ν diversa forent. At $a^\mu \equiv a^m$, $a^\nu \equiv a^n$, quare $a^\mu \equiv a^\nu$ i. e. non omnes potestates infra a^t incongruae forent contra hyp.

Si itaque $a^k \equiv 1 \pmod{p}$, erit $k \equiv 0 \pmod{t}$ i. e. k per t divisibilis.

Hactenus de modulis quibuscunque si modo ad a sint primi diximus. Iam modulus qui sunt numeri absolute primi seorsim consideremus atque huic fundamento investigationem generaliorem postea superstruamus.

49.

THEOREMA. Si p est numerus primus ipsum a non metiens, atque a^t infima ipsius a potestas secundum modulum p unitati congrua, exponens t aut erit $= p - 1$ aut pars aliquota huius numeri.

Conferantur exempla art. 45.

Demonstr. Quum iam ostensum sit, t esse aut $= p - 1$, aut $< p - 1$, superest, in posteriori casu t semper ipsius $p - 1$ partem aliquotam esse evincatur.

I. Colligantur residua minima positiva omnium horum terminorum $1, a, aa, a^3, \dots a^{t-1}$, quae per $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. designentur, ita ut sit $\alpha = 1, \alpha' \equiv a, \alpha'' \equiv aa$ etc. Perspicuum est, haec omnia fore diversa; si enim duo termini a^m, a^n idem residuum praeberent, foret (supponendo $m > n$) $a^{m-n} \equiv 1$ atque $m - n < t$, Q. E. A. quum nulla inferior potestas quam a^t unitati sit congrua (hyp.). Porro omnes α, α' etc. in serie numerorum $1, 2, 3, \dots p-1$ continentur, quam tamen non exhaurient, quum $t < p - 1$. Complexum omnium α, α' etc. per (A) designabimus. Comprehendet igitur (A) terminos t .

II. Accipiatur numerus quicumque β ex his $1, 2, 3, \dots, p - 1$ qui in (A) desit. Multiplicetur β per omnes α, α' etc., sintque residua minima inde oriunda β, β', β'' etc., quorum numerus etiam erit t . At haec residua tum inter se quam ab omnibus α, α' etc. erunt diversa. Si enim *prior* assertio falsa esset, haberetur $\beta a^m \equiv \beta a^n$, adeoque dividendo per β , $a^m \equiv a^n$, contra ea quae modo demonstravimus; si vero *posterior*, haberetur $\beta a^m \equiv a^n$, unde, quando $m < n$, $\beta \equiv a^{n-m}$ i. e. alicui ex his α, α' etc. congruus contra hyp.; quando vero $m > n$, sequitur multiplicando per a^{t-m} , $\beta a^t \equiv a^{t+n-m}$, sive propter $a^t \equiv 1$, $\beta \equiv a^{t+n-m}$ etc., quae est eadem absurditas. Designetur complexus omnium β, β', β'' etc., quorum multitudo $= t$, per (B), habebunturque iam $2t$ numeri ex his $1, 2, 3, \dots p - 1$. Quodsi igitur (A) et (B) omnes hos numeros exhauriant, fit $\frac{p-1}{2} = t$ adeoque theorema demonstratum.

III. Si vero adhuc aliqui desint, sit numerus aliquis γ . Per hunc multiplicentur omnes α, α' etc., productorumque residua minima sint $\gamma, \gamma', \gamma''$ etc., omnium complexus per (C) designetur. (C) igitur comprehendet t numeros ex his $1, 2, 3, \dots p - 1$, qui omnes tum inter se quam a numeris in (A) et (B) contentis erunt diversi. Assertionem priorem eodem modo demonstrantur ut in II, tertia ita. Si esset $\gamma a^m \equiv \beta a^n$, fieret $\gamma \equiv \beta a^{n-m}$, aut $\equiv \beta a^{t+n-m}$ prout $m < n$ aut $> n$, in utroque casu γ alicui ex (B) congrua contra hyp. Habetur igitur $3t$ numeri ex his $1, 2, 3, \dots p - 1$, atque si nulli amplius desunt, fiet $t = \frac{p-1}{3}$, adeoque theorema erit demonstratum.

IV. Si vero etiamnum aliqui desunt, eodem modo ad quartum numerorum complexum (D) progrediendum erit etc. Patet vero, quoniam numerorum $1, 2, 3, \dots p - 1$ multitudo est finita, tandem eam exhaustum iri, adeoque multiplum ipsius t fore: quare t erit pars aliquota numeri $p - 1$. Q. E. D.

[Hic terminatur articulus 49. Sequitur articulus 50 (Fermati Theorema), qui in fasciculo earlier source draft v1 sub initio capitis Sectionis Tertiae continetur.]