

aufgeht; denn jede echte Vielfachenkette der $\mathfrak{p}$ muß nach höchstens r Schritten abbrechen. Somit gibt es Elemente a_i aus $\mathfrak{p}_i$, derart, daß $a_i^{e_i} \equiv 0(\mathfrak{q}_i)$ und $a_2 \not\equiv 0(\mathfrak{p}_1)$; ... $a_r \not\equiv 0(\mathfrak{p}_1)$ wird. Ist weiter $q_1 \not\equiv 0(\mathfrak{m})$ ein Element aus $\mathfrak{q}_1$, so wird $q_1 a_2^{e_2} \dots a_r^{e_r} \equiv 0(\mathfrak{m})$, aber keine Potenz von $(a_2^{e_2} \dots a_r^{e_r})$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar, da sonst Teilbarkeit durch $\mathfrak{p}_1$ folgen würde; $\mathfrak{m}$ ist also kein schwaches Primärideal. Ersetzt man durchweg die Elemente durch Ideale, also q_1 durch $\mathfrak{q}_1$ und a_i durch $a_i[\not\equiv (\mathfrak{p}_1)]$, aber $a_i^{e_i} \equiv 0(\mathfrak{q}_i)$, so ergibt sich der Beweis für starke Primärideale²⁵⁾.

4. *Modul- und Idealquotient.* Sei $\mathfrak{T}$ ein Erweiterungsring von $\mathfrak{R}$, seien $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \dots, \mathfrak{R}$ -Moduln in $\mathfrak{T}$. Der *Quotient* $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ ist definiert als ein Modul, der den Bedingungen genügt: $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$ und aus $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$ folgt $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{C})$ — es ist also $\mathfrak{C}$ der „kleinste“ Modul, für den $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$ wird. Dadurch ist der Quotient eindeutig bestimmt als größter gemeinsamer Teiler aller Moduln $\mathfrak{D}$, für die $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$ gilt; solche $\mathfrak{D}$ existieren, da der Nullmodul sicher ein solcher Modul ist.

Aus der Definition folgt: Ist $\mathfrak{B}$ ein Vielfaches von $\overline{\mathfrak{B}}$, so wird $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ ein Vielfaches von $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$. Ist $\mathfrak{A}$ ein Vielfaches von $\overline{\mathfrak{A}}$, so wird $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ ein Vielfaches von $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Es wird $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}$.

Fällt der Erweiterungsring $\mathfrak{T}$ mit $\mathfrak{R}$ zusammen, so geht der Modulquotient in den *Idealquotient* $a : b$ über, für den somit auch die obigen Rechenregeln gelten. Wegen $ab \equiv 0(a)$ folgt hier noch $a \equiv 0(a : b)$.

5. Ist $a : b = a$, so heißt b *prim* zu a . Ein Ideal $\mathfrak{b}$ ist also dann und nur dann prim zu $\mathfrak{a}$, wenn aus $\mathfrak{d}\mathfrak{b} \equiv 0(\mathfrak{a})$ stets folgt $\mathfrak{d} \equiv 0(\mathfrak{a})$. Aus den Rechenregeln unter 4. folgt: Sind $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{c}$ prim zu $\mathfrak{a}$, so ist auch ihr Produkt und ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches prim zu $\mathfrak{a}$. Ist sowohl $\mathfrak{b}$ prim zu $\mathfrak{a}$, wie $\mathfrak{a}$ prim zu $\mathfrak{b}$, so heißen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ gegenseitig prim. Aus § 4, 4 β folgt: Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ teilerfremd, so sind sie auch gegenseitig prim.

§ 6.

Idealtheorie bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes.

Zugrunde gelegt sei ein (kommutativer) Ring $\mathfrak{R}$, für den *Axiom I des Teilerkettensatzes* erfüllt ist; weiter sei im folgenden stets eine feste *Wohlordnung aller Elemente* aus $\mathfrak{R}$ zugrunde gelegt. Damit ist aber zugleich auch eine *Wohlordnung aller Ideale* aus $\mathfrak{R}$ gegeben. Denn die beiden Voraussetzungen ergeben sofort, daß jedes Ideal aus $\mathfrak{R}$ eine aus endlich vielen Elementen bestehende Idealbasis besitzt. Geht man also von der Wohlordnung der Elemente aus $\mathfrak{R}$ über zu einer quasi-lexikographischen An-

²⁵⁾ Diese Modifikation meines ursprünglichen Beweises, durch die der Teilerkettensatz entbehrlich wird, verdanke ich B. L. van der Waerden.

ordnung aller endlichen Untermengen von $\mathfrak{R}^{26}$), und ordnet jedem Ideal als ausgezeichnete Basis die unter den verschiedenen möglichen Basen erste in der Wohlordnung der endlichen Untermengen zu, so sind mit den endlichen Untermengen auch die Ideale wohlgeordnet.

Satz I. Jedes Ideal aus $\mathfrak{R}$ läßt — bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes — eine Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen zu, d. h. von Idealen die sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei echten Teilern darstellen lassen.

Zum Beweis ist zu zeigen: Ist Satz I für ein Ideal m nicht erfüllt, so besitzt m einen echten Teiler, für den Satz I ebenfalls nicht erfüllt ist; daraus läßt sich entgegen dem vorausgesetzten Teilerkettensatz eine nicht im Endlichen abbrechende Teilerkette konstruieren. In der Tat muß m reduzibel sei, da sonst $m = [m]$ die gewünschte Darstellung liefern würde. Wird $m = [a, b]$, so kann Satz I nicht für a und b gleichzeitig erfüllt sein, da sonst eine entsprechende Darstellung für m folgen würde. Es gibt also echte Teiler von m , für die Satz I nicht erfüllt ist; sei a_1 der in der Wohlordnung der Ideale erste. Indem man entsprechend zu a_1 einen echten Teiler a_2 konstruiert, und allgemein zu a_i einen echten Teiler a_{i+1} , kommt man zu einer wohlbestimmten, nicht im Endlichen abbrechenden Teilerkette, gegen die Voraussetzung²⁷⁾.

²⁶⁾ Darunter ist folgendes zu verstehen: die Elemente $a_1, \dots, a_n$ einer endlichen Untergruppe $\mathfrak{A}_n$ seien so bezeichnet, daß die Anordnung der Indizes mit der in $\mathfrak{R}$ gegebenen Wohlordnung übereinstimmt. Jede Untergruppe $\mathfrak{A}_n$ gehe einer solchen mit $m > n$ Elementen voran. Sind $\mathfrak{A}_n$ und $\mathfrak{B}_n$ Untergruppen von gleich vielen Elementen, so heiße $\mathfrak{A}_n$ früher als $\mathfrak{B}_n$, wenn das erste Element a_i , das von dem entsprechenden b_i verschieden ist, in der Wohlordnung von $\mathfrak{R}$ dem b_i vorangeht. Damit ist jedem System endlicher Untergruppen ein erstes Element $\mathfrak{A}_n$ zugeordnet.

Bei gegebener Wohlordnung von $\mathfrak{R}$ bedarf es also keines weiteren Auswahlpostulats; ist insbesondere $\mathfrak{R}$ abzählbar — wie etwa im Fall des algebraischen Zahlkörpers —, so liegt überhaupt kein Auswahlpostulat zugrunde.

Auf die Rolle des Auswahlpostulats in der Idealtheorie ist ohne nähere Ausführungen in Idealtheorie, Anmerkung ⁹⁾, hingewiesen.

²⁷⁾ Satz I gilt offenbar genau so für Modulbereiche, wenn der Teilerkettensatz für das System aller Moduln vorausgesetzt wird. Satz I trägt nämlich rein mengentheoretischen Charakter — er ist zugleich der einzige, bei dessen Beweis die Wohlordnung der Ideale benutzt wird. Es handelt sich, unabhängig von allen Verknüpfungen, um die folgenden mengentheoretischen Begriffe:

In einer Menge $\mathfrak{M}$ sei eine Untergruppe Σ der Potenzmenge — also ein System von Untergruppen — ausgezeichnet. Σ sei als wohlgeordnet angenommen; die Elemente von Σ seien etwa als Σ -Mengen bezeichnet. In Σ sei der *Kettensatz* vorausgesetzt: Jede Kette von Σ -Mengen, $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_r, \dots$, derart, daß $\mathfrak{A}_r$ eine echte Obermenge von $\mathfrak{A}_{r-1}$ ist, bricht im Endlichen ab. Eine Σ -Menge $\mathfrak{A}$ heiße *reduzibel*

Wegen des vorausgesetzten Teilerkettensatzes kann nach § 5, 2. von Primäridealien schlechthin gesprochen werden. Den Zusammenhang zwischen primär und irreduzibel ergibt

Satz II. Bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes ist jedes irreduzible Ideal primär, m. a. W. jedes nichtprimäre Ideal ist reduzibel.

Da beim Übergang zum Restklassenring $\mathfrak{R}|\mathfrak{m}$ wegen der Homomorphie der Teilerkettensatz erhalten bleibt, da der Darstellung von $\mathfrak{m}$ als kleinstem gemeinsamen Vielfachen die Darstellung des Nullideals entspricht und da wegen des ersten Isomorphiesatzes (§ 4, 3.) den primären Teilern von $\mathfrak{m}$ wieder solche in $\mathfrak{R}|\mathfrak{m}$ entsprechen und umgekehrt, kann man sich auf die Zerlegung des Nullideals im Restklassenring beschränken. Da dieser ein Ring gleicher Allgemeinheit ist, kann man von vornherein das zu zerlegende Ideal als Nullideal von $\mathfrak{R}$ voraussetzen.

Sei also das Nullideal von $\mathfrak{R}$ nichtprimär, so daß es mindestens ein Paar von Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ gibt — wobei noch $\mathfrak{b}$ als Hauptideal vorausgesetzt werden darf — derart, daß $\mathfrak{a} \neq (0)$, $\mathfrak{b}^\infty \neq (0)$ für jedes ∞ , aber $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = (0)$. Es sei die — nach Voraussetzung im Endlichen abbrechende — Teilerkette der Idealquotienten gebildet: $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}:\mathfrak{b}, \dots, \mathfrak{a}:\mathfrak{b}^\nu, \dots$; sei etwa $\mathfrak{t} = \mathfrak{a}:\mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a}:\mathfrak{b}^m \dots$ gleich allen folgenden Idealen der Kette; also $\mathfrak{t} = \mathfrak{t}:\mathfrak{b}$ oder $\mathfrak{b}$ prim zu $\mathfrak{t}$. Weiter ist $\mathfrak{t}$ als Teiler von $\mathfrak{a}$ vom Nullideal verschieden, ebenso $\mathfrak{b}^\infty$ für jeden Exponenten ∞ . Zum Beweise von Satz II genügt es also, eine Darstellung $(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}]$ nachzuweisen.

Nach Definition ist:

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0(\mathfrak{a}), \quad \text{also} \quad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

es ist also nur zu zeigen:

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}] = 0(\mathfrak{b}^m\mathfrak{t}).$$

Dies folgt aus den Voraussetzungen, daß $\mathfrak{b}$ Hauptideal und zu $\mathfrak{t}$ prim ist. Jedes Element c aus $\mathfrak{c}$ läßt wegen der Teilbarkeit durch $\mathfrak{b}^{m+1}$ eine Darstellung zu — unter n Symbol einer ganzen Zahl verstanden —:

$$c = k\mathfrak{b}^{m+1} + n\mathfrak{b}^{m+1} = r\mathfrak{b}^m,$$

wo r jetzt wieder ein Element aus $\mathfrak{R}$ bedeutet. Aus $c \equiv 0(\mathfrak{t})$ folgt also $r\mathfrak{b}^m \equiv 0(\mathfrak{t})$ und damit $r \equiv 0(\mathfrak{t})$ wegen $\mathfrak{t}:\mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Damit ist aber $c \equiv 0(\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m)$ und Satz II bewiesen.

Satz III. Bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes läßt jedes Ideal eine kürzeste Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich
wenn sie Durchschnitt von zwei Σ -Mengen ist, die beide echte Obermengen von $\mathfrak{A}$ werden, im entgegengesetzten Fall irreduzibel. Dann ergeben die obigen Überlegungen: Jede Σ -Menge läßt sich als Durchschnitt von endlich vielen irreduziblen Σ -Mengen darstellen.

vielen, zu verschiedenen Primidealen gehörigen, also größten Primärkomponenten zu²⁸⁾).

Um zu einer solchen Darstellung zu gelangen, hat man nur, was immer möglich, die nach Satz I existierende Darstellung durch irreduzible, also nach Satz II primäre Ideale durch eine kürzeste zu ersetzen. Faßt man die zu gleichen Primidealen gehörigen Primär Ideale zusammen, so ergibt sich die gesuchte Darstellung nach § 5, 3. Die Primärkomponenten können als größte bezeichnet werden, da das kleinste gemeinsame Vielfache von irgendwelchen unter ihnen nicht mehr primär ist.

§ 7.

Idealtheorie bei Voraussetzung des Doppelkettensatzes.

Die Vereinfachungen gegenüber der bis jetzt entwickelten Theorie beruhen auf den unter 1. und 2. zu gebenden Hilfssätzen.

1. *Ist in einem kommutativen Ring ohne Nullteiler der Vielfachenkettensatz erfüllt, so ist der Ring zugleich Körper.* Es ist zu zeigen, daß für $a \neq 0$ die Gleichung $ax = b$ stets eine Lösung im Ring besitzt; daß sie nicht mehr als eine Lösung besitzen kann, folgt daraus, daß der Ring ohne Nullteiler vorausgesetzt ist.

Sei $\mathfrak{a}$ das aus a abgeleitete Hauptideal; nach Voraussetzung bricht die Reihe der Potenzen im Endlichen ab; sei etwa $\mathfrak{a}^m$ gleich allen folgenden. Bezeichnet $\mathfrak{b}$ das aus b abgeleitete Hauptideal, so kommt also:

$$\mathfrak{a}^m \mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1} \mathfrak{b} \quad \text{mit} \quad \mathfrak{a}^{m+1} \mathfrak{b} = (\mathfrak{a}^{m+1} b).$$

Das ergibt insbesondere für das Element $a^m b$ eine Darstellung — unter n Symbol für eine ganze Zahl verstanden —

$$a^m b = k a^{m+1} b + n a^{m+1} c = a^{m+1} c,$$

wo c wieder Element aus $\mathfrak{R}$. Da nach Voraussetzung keine Nullteiler existieren, kommt daraus $b = ac$, womit die Körpereigenschaft bewiesen ist.

2. Aus 1. folgt unmittelbar der

Hilfssatz: Ist in einem kommutativen Ring der Vielfachenkettensatz erfüllt, so besitzt ein Primideal keinen von 0 verschiedenen echten Teiler.

Ebenso folgt der Zusatz. *Ist nur Axiom II erfüllt — Vielfachenkettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal —, so besitzt jedes*

²⁸⁾ Dabei sind die zugehörigen Primideale und die isolierten Komponenten eindeutig bestimmt. Vgl. Idealtheorie oder auch W. Krull, Ein neuer Beweis für die Hauptsätze der allgemeinen Idealtheorie. Math. Ann. 90 (1923), S. 55—64. In § 7 wird ein direkter Beweis der Eindeutigkeit für den dort auftretenden einfachen Spezialfall gegeben werden. Die dort als eindeutig erkannten Primär Ideale sind isolierte Komponenten.

vom Nullideal verschiedene Primideal keinen von $\mathfrak{o}$ verschiedenen echten Teiler.

Denn der Restklassenring nach einem Primideal $\mathfrak{p}$ wird nach Definition ein Ring ohne Nullteiler; und da wegen der Homomorphie auch hier der Vielfachenkettensatz erfüllt ist, nach 1. ein Körper. Wegen des eindeutigen Entsprechens der Teiler von $\mathfrak{p}$ und der Ideale im Restklassenring besitzt also $\mathfrak{p}$ keinen von $\mathfrak{o}$ verschiedenen echten Teiler²⁹⁾.

Satz IV. *Ist in einem kommutativen Ring der Doppelkettensatz erfüllt, so sind in jeder kürzesten Darstellung eines Ideals diejenigen primären Komponenten, die nicht zum Einheitsideal $\mathfrak{o}$ gehören, eindeutig bestimmt.*

Zusatz. *Bei Voraussetzung von Axiom I und II gilt Satz IV für jedes vom Nullideal verschiedene Ideal.*

Seien $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r] = [\bar{\mathfrak{q}}, \bar{\mathfrak{q}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{q}}_r]$ kürzeste Darstellungen von $\mathfrak{m}$ durch größte Primärkomponenten, seien $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ bzw. $\mathfrak{o}, \bar{\mathfrak{p}}_1, \dots, \bar{\mathfrak{p}}_r$ die zugehörigen Primideale. Dabei soll $\mathfrak{q}$ bzw. $\bar{\mathfrak{q}}$ fortgelassen werden, wenn kein zu $\mathfrak{o}$ gehöriges Primärideal auftritt. Wegen $\mathfrak{o}e \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_r^{e_r} \equiv 0 (\mathfrak{m})$ muß jedes $\mathfrak{p}_i$ in einem $\mathfrak{p}_i$ aufgehen, also nach dem Hilfssatz mit diesem identisch sein. Da ebenso jedes $\mathfrak{p}_k$ mit einem $\bar{\mathfrak{p}}_k$ übereinstimmen muß, stimmen also die von $\mathfrak{o}$ verschiedenen Primideale überein, $\mathfrak{p}_\lambda = \bar{\mathfrak{p}}_\lambda$. Es wird weiter $\mathfrak{q} \mathfrak{q}_1 \dots \mathfrak{q}_r \equiv 0 (\bar{\mathfrak{q}}_\lambda)$ und daraus $\mathfrak{q}_\lambda \equiv 0 (\bar{\mathfrak{q}}_\lambda)$, da die übrigen Komponenten nicht durch $\mathfrak{p}_\lambda$ teilbar, also prim zu $\bar{\mathfrak{q}}_\lambda$ sind. Da ebenso $\bar{\mathfrak{q}}_\lambda \equiv 0 (\mathfrak{q}_\lambda)$ folgt, ist also die Eindeutigkeit der nicht zu $\mathfrak{o}$ gehörigen Primärkomponenten gezeigt. Tritt schließlich $\mathfrak{q}$ wirklich auf, so muß wegen der kürzesten Darstellung auch $\bar{\mathfrak{q}}$ wirklich auftreten, womit noch die Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale gezeigt ist. Weiter zeigt der Eindeutigkeitsbeweis noch, daß jede Darstellung, die keine zu $\mathfrak{o}$ gehörige Primärkomponente enthält, zugleich kürzeste ist.

3. Fügt man zu der Voraussetzung des Doppelkettensatzes noch die Existenz des Einheitselementes hinzu, so verschärft sich Satz IV zu

Satz V. *Ist in einem kommutativen Ring mit Einheitselement der Doppelkettensatz erfüllt, so läßt sich jedes Ideal eindeutig als Produkt von endlich vielen, paarweise teilerfremden Primärideal darstellen.*

Zusatz. *Bei Voraussetzung von Axiom I, II, III gilt Satz V für jedes vom Nullideal verschiedene Ideal.*

²⁹⁾ Dabei braucht in $\mathfrak{R}$ und damit in $\mathfrak{o}$ — dem aus allen Elementen von $\mathfrak{R}$ bestehenden Einheitsideal — kein Einheitselement zu existieren, obwohl es nach 1. im Restklassenring eine Einheitsklasse gibt. Das einfachste Beispiel dieser Art — wo es sich um den schwächeren Fall des Zusatzes handelt — bildet das System aller geraden Zahlen.

Wegen der Existenz des Einheitselementes wird $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$, und damit wird jedes zu $\mathfrak{o}$ gehörige Primärideal gleich $\mathfrak{o}$, kann also in einer kürzesten Darstellung eines von $\mathfrak{o}$ verschiedenen Ideals nicht auftreten; somit sind nach Satz IV die Primärkomponenten eindeutig bestimmt. Zugleich wird jede Darstellung durch Fortlassen von $\mathfrak{o}$ zu einer kürzesten. Zwei verschiedene Primideale werden ferner nach dem Hilfssatz unter 2. stets teilerfremd; also gilt nach den Rechenregeln aus § 4, 4. dasselbe für die Primärkomponenten; das kleinste gemeinsame Vielfache wird somit zum Produkt.

Aus den Voraussetzungen folgt weiter der

Hilfssatz. In einem kommutativen Ring mit Einheitselement und Doppelkettensatz sind außer dem Einheitsideal alle und nur die Primideale prim zu einem Ideal $\mathfrak{m}$, die nicht in $\mathfrak{m}$ aufgehen. Die Begriffe prim und teilerfremd fallen zusammen.

Zusatz. Bei Voraussetzung der Axiome I, II, III muß $\mathfrak{m}$ vom Nullideal verschieden angenommen werden.

Geht $\mathfrak{p}$ nicht in $\mathfrak{m}$ auf, so ist es von allen zu $\mathfrak{m}$ gehörigen Primidealen verschieden, also nach dem Hilfssatz unter 2. durch keines dieser — von $\mathfrak{o}$ verschiedenen — Primideale teilbar; somit wird $\mathfrak{p}$ prim zu jeder Primärkomponente und damit zu $\mathfrak{m}$. Zugleich wird $\mathfrak{p}$ teilerfremd zu jeder Primärkomponente und damit zu $\mathfrak{m}$.

Geht $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ in $\mathfrak{m}$ auf, so muß es mit einem der zugehörigen Primideale übereinstimmen. Gehört es etwa zur Komponente $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_1$, so wird demnach $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ ein echter Teiler von $\mathfrak{q}$ — wegen $\mathfrak{p}^{e-1} \equiv 0 (\mathfrak{q} : \mathfrak{p})$; $\not\equiv 0 (\mathfrak{q})$. Zugleich wird $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ als Teiler von $\mathfrak{p}^{e-1}$ nur durch ein Primideal $\neq \mathfrak{o}$ teilbar und also primär. Wegen der eindeutigen Zerlegbarkeit wird daher auch das durch $\mathfrak{m} : \mathfrak{p}$ teilbare Produkt $(\mathfrak{q} : \mathfrak{p}) \cdot \mathfrak{q}_2 \dots \mathfrak{q}_r$ ein echter Teiler von $\mathfrak{m}$; es wird also $\mathfrak{p}$ nicht prim zu $\mathfrak{m}$.

Somit wird ein Ideal $\mathfrak{t} \neq \mathfrak{o}$ dann und nur dann prim zu $\mathfrak{m}$, wenn keines der zu $\mathfrak{t}$ gehörigen Primideale in $\mathfrak{m}$ aufgeht; in diesem Fall wird aber $\mathfrak{t}$ auch teilerfremd zu $\mathfrak{m}$. Da umgekehrt zwei teilerfremde Ideale stets gegenseitig prim sind (§ 5, 5.), so fallen also unter den obigen Voraussetzungen die beiden Begriffe zusammen.

§ 8.

Idealtheorie bei ganzer Abgeschlossenheit im Quotientenkörper.

Die bis hierher entwickelte Idealtheorie soll jetzt durch Hinzunahme der beiden letzten Axiome zu der üblichen verschärft werden.

1. Hilfssatz. *Ist $\Re$ ein kommutativer Ring ohne Nullteiler mit Einheitselement, und wird in $\Re$ der Teilerkettensatz vorausgesetzt (Axiom*

I, III, IV), so folgt aus $a = ab$ und $a \neq (0)$ stets $b = o$. Es wird also $c^e \neq c^{e+1}$ für alle von Null- und Einheitsideal verschiedenen Ideale³⁰⁾.

Der Beweis ergibt sich wie bei dem Hilfssatz § 1, 3., da man ab als endlichen Modul in bezug auf b auffassen kann. Bedeutet $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine wegen I existierende Idealbasis von a , so folgt aus $a = ab$ das Gleichungssystem $\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \dots + b_{in}\alpha_n$ mit $b_{ik} \equiv 0(b)$ für $i=1, \dots, n$.

Da $\Re$ ohne Nullteiler vorausgesetzt, folgt daraus $|b_{ik} - e_{ik}| = 0$; mit $e_{ik} = 0$ für $i \neq k$; $e_{ii} = e$. Aus der Gleichung $e^n + b_1 e^{n-1} + \dots + b_n = 0$ mit $b_i \equiv 0(b)$ folgt aber $e \equiv 0(b)$ und damit $b = o$.

2. Es ist jetzt nur noch zu zeigen, daß durch Hinzunahme der Voraussetzung der *ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper* (Axiom V) zu den Axiomen I bis IV folgt, daß jedes vom Nullideal verschiedene *Primärideal eine Potenz seines zugehörigen Primideals* wird. Die *Eindeutigkeit* der daraus folgenden Darstellung $m = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$ für alle vom Nullideal verschiedenen Ideale ist schon durch Satz V und den Hilfssatz unter 1. bewiesen; zugleich ist gezeigt, daß diese Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen. Der Beweis soll für den Exponenten zwei unter Heranziehung der Dedekindschen Folgerung II (§ 1, 4.) geführt werden, allgemein durch volle Induktion.

Hilfssatz. *Bei Voraussetzung der Axiome I bis V gibt es keine weiteren Primär ideale vom Exponenten zwei als $q = p^2$.*

Zum Beweis ist zu zeigen, daß aus $p^2 \equiv 0(q)$; $q \equiv 0(p)$; aber $q \not\equiv 0(p^2)$ notwendig q gleich p folgt. Sei also

$$c \equiv 0(q); \quad \text{mithin } c \equiv 0(p); \quad \text{aber } c \not\equiv 0(p^2).$$

Dann folgt aus dem Hilfssatz § 7, 3., daß $oc:p$ echter Teiler von oc wird; also gibt es ein Element b , derart, daß

$$bp \equiv 0(oc) \equiv 0(q); \quad \text{aber } b \not\equiv 0(oc);$$

mithin $\gamma = b/c$ nicht ganz wird, d. h. zum Quotientenkörper, aber nicht zu $\Re$ gehört.

Es ist $b \not\equiv 0(p)$ nachzuweisen, woraus — da q primär und zu p gehörig — $p \equiv 0(q)$ folgt.

Nach der Dedekindschen Folgerung II gibt es Elemente m, n aus $\Re$ derart, daß $\gamma = b/c = m/n$ wird und auch m^2/n nicht ganz; daß also

$$bn = mc; \quad m \not\equiv 0(on); \quad m^2 \not\equiv 0(on)$$

³⁰⁾ Dagegen kann bei den gleichen Voraussetzungen *nicht* von $ab = ac$ auf $b = c$ geschlossen werden, wie das folgende Beispiel zeigt, wo $\Re$ als Polynombereich in x, y mit Koeffizienten aus einem Körper angenommen ist: $a = (x, y)$; $b = (x^2, xy, y^2)$; $c = (x^2, y^2)$. Tatsächlich wird $ab = ac = a^2$; aber $b \neq c$.

wird. Durch Multiplikation von bp mit m folgt:

$$mbp \equiv 0(\mathfrak{o}mc); \text{ also } \equiv 0(\mathfrak{o}nb) \text{ und daraus } mp \equiv 0(\mathfrak{o}n),$$

letzteres, da es sich um einen Ring ohne Nullteiler handelt. Hieraus folgt

$$m \not\equiv 0(\mathfrak{p}) \text{ wegen } m^2 \not\equiv 0(\mathfrak{o}n) \text{ und } n \equiv 0(\mathfrak{p});$$

letzteres nach dem Hilfssatz § 7, 3; da $\mathfrak{o}n:\mathfrak{p}$ echter Teiler von $\mathfrak{o}n$ wegen $m \not\equiv 0(\mathfrak{o}n)$. Die vier Relationen

$$m \not\equiv 0(\mathfrak{p}); \quad n \equiv 0(\mathfrak{p}); \quad c \equiv 0(\mathfrak{p}); \not\equiv 0(\mathfrak{p}^2); \quad bn = mc$$

ergeben aber $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Denn da $\mathfrak{p}^2$ primär, kommt vorerst $mc \not\equiv 0(\mathfrak{p}^2)$, und damit folgt $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ wegen $bn = mc$. Damit ist der Hilfssatz bewiesen.

3. Hilfssatz. Bei Voraussetzung der Axiome I bis V gibt es keine weiteren Primärideale vom Exponenten q als $q = \mathfrak{p}^e$.

Der Hilfssatz ergibt sich aus dem Hilfssatz unter 2. ohne Anwendung der Axiome³¹⁾. Zum Beweise ist vorerst zu zeigen:

Ist $c \equiv 0(\mathfrak{p}); \not\equiv 0(\mathfrak{p}^2)$, so wird $\mathfrak{p}^\sigma = (\mathfrak{o}c^\sigma, \mathfrak{p}^{\sigma+1})$ für jedes σ .

Es wird $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ nach dem Hilfssatz unter 2. Setzt man also voraus $\mathfrak{p}^{\sigma-1} = (\mathfrak{o}c^{\sigma-1}, \mathfrak{p}^\sigma)$, so folgt durch Multiplikation mit $\mathfrak{p}$ nach dem distributiven Gesetz:

$$\mathfrak{p}^\sigma = (\mathfrak{p}c^{\sigma-1}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) = (\mathfrak{o}c^\sigma, \mathfrak{p}^2c^{\sigma-1}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) = (\mathfrak{o}c^\sigma, \mathfrak{p}^{\sigma+1}).$$

Der zu beweisende Hilfssatz kann auf die folgende zweite Fassung gebracht werden:

Ist $q \equiv 0(\mathfrak{p}^\sigma); \not\equiv 0(\mathfrak{p}^{\sigma+1})$ und ist $\mathfrak{p}^{\sigma+\lambda} \equiv 0(q)$ mit $\lambda \geq 1$, so wird auch $\mathfrak{p}^{\sigma+\lambda-1} \equiv 0(q)$.

Denn wegen $q \equiv 0(\mathfrak{p}); \not\equiv 0(\mathfrak{p}^{e+1})$ existiert für jedes Primärideal ein solcher Exponent $\sigma \geq 1$; dabei folgt $q \not\equiv 0(\mathfrak{p}^{e+1})$ aus $\mathfrak{p}^e \equiv 0(q)$ und $\mathfrak{p}^e \not\equiv \mathfrak{p}^{e+1}$ nach dem Hilfssatz unter 1. Die endlich oftmalige Anwendung der zweiten Fassung ergibt aber $\mathfrak{p}^\sigma \equiv 0(q)$ und damit $q = \mathfrak{p}^e$.

Aus der Voraussetzung der zweiten Fassung folgt unter Berücksichtigung der Darstellung von $\mathfrak{p}^\sigma$ für jedes Element q aus q :

$$q \equiv bc^\sigma(\mathfrak{p}^{\sigma+1}) \text{ mit } b \not\equiv 0(\mathfrak{p}) \text{ oder } bc^\sigma \equiv 0(q, \mathfrak{p}^{\sigma+1}).$$

Da $(q, \mathfrak{p}^{\sigma+1})$ primär, folgt daraus $c^\sigma \equiv 0(q, \mathfrak{p}^{\sigma+1})$ oder

$$c^{\sigma+\lambda-1} \equiv 0(q, \mathfrak{p}^{\sigma+\lambda}) \text{ und damit } \mathfrak{p}^{\sigma+\lambda-1} \equiv 0(q).$$

³¹⁾ Der Beweis von Hilfssatz 3. unter Voraussetzung der Gültigkeit von Hilfssatz 2. findet sich bei Masazo Sono, On Congruences II, §§ 9 und 10. Vgl. Anm. ¹⁹⁾.

4. Zusammenfassend kommt

Satz VI. *Sind in einem kommutativen Ring die Axiome I bis V erfüllt, so läßt sich jedes von Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal eindeutig darstellen als Potenzprodukt von endlich vielen, von Null- und Einheitsideal verschiedenen Primidealen; diese Primideale besitzen keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler.*

§ 9.

Die Axiome als Folge der vorausgesetzten Zerlegung.

Um aus der Existenz der üblichen Idealzerlegung — die nach Satz VI aus den Axiomen I bis V folgt — auch umgekehrt diese Axiome erschließen zu können, ist die Zerlegung in der folgenden Fassung vorauszusetzen:

Voraussetzung. *In dem kommutativen Ring $\mathfrak{R}$ ist jedes nicht vom Null- oder Einheitsideal abgeleitete Ideal eindeutig als Potenzprodukt von Primidealen darstellbar. Diese Primideale sind nicht vom Einheitsideal abgeleitete einfache Ideale — d. h. sie besitzen keinen von $\mathfrak{o}$ verschiedenen echten Teiler; umgekehrt sind alle einfachen Ideale Primideale. Die Eindeutigkeit gilt in der scharfen Fassung, daß $\mathfrak{a}^2 \neq \mathfrak{a}^{2+1}$ wird für jedes nicht vom Null- oder Einheitsideal abgeleitete Ideal.*

Die Existenz des Einheitselementes ist dabei nicht vorausgesetzt; gibt es kein Einheitsideal, so stellt die Bedingung „nicht vom Einheitsideal abgeleitet“ keine Einschränkung dar.

1. Nachweis von Axiom III (Existenz des Einheitselementes). Sei Axiom III nicht erfüllt; es ist zu zeigen, daß $\mathfrak{o}^2$ einfaches Ideal wird, ohne Primideal zu sein, gegen die Voraussetzung. Nach der Eindeutigkeitsvoraussetzung wird $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; es wird also $\mathfrak{o} \not\equiv 0 (\mathfrak{o}^2)$, aber $\mathfrak{o}^2 \equiv 0 (\mathfrak{o}^2)$, und mithin $\mathfrak{o}^2$ kein Primideal. Es wird aber $\mathfrak{o}^2$ einfach; denn $\mathfrak{o}^2$ kann durch kein von $\mathfrak{o}$ verschiedenes Primideal teilbar sein, besitzt also wegen der vorausgesetzten Produktdarstellung keine von $\mathfrak{o}$ oder $\mathfrak{o}^2$ verschiedenen Teiler.

2. Nachweis von Axiom IV (Ring ohne Nullteiler). Ist a Nullteiler, also $ab = 0$, aber $a \neq 0$ und $b \neq 0$, so kommt durch Multiplikation der Darstellungen der aus a und b abgeleiteten Hauptideale: $(0) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_k^{e_k}$, wo die $\mathfrak{p}$ von Null- und Einheitsideal verschieden sind letzteres wegen Existenz des Einheitselementes. Die Darstellung soll als kürzeste vorausgesetzt werden in dem Sinne, daß durch Weglassen irgendeines Faktors ein echter Teiler der Null entsteht — eine Bedingung, die nicht von selbst erfüllt zu sein braucht, da über das Nullideal keine

Voraussetzung über eindeutige Darstellung gemacht ist. Tritt in dieser Darstellung nur ein Primideal auf, so wird $(0) = \mathfrak{p}^e = \mathfrak{p}^{e+1}$, entgegen der scharfen Eindeutigkeitsforderung. Tritt aber mehr als ein Primideal auf, so kommt

$$\mathfrak{p}_1^{e_1+1} = (\mathfrak{p}_1^{e_1+1}, \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_k^{e_k}) = \mathfrak{p}_1^{e_1} (\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2^{e_2} \dots \mathfrak{p}_k^{e_k}) = \mathfrak{p}_1^{e_1};$$

denn wegen der Existenz des Einheitselementes wird $\mathfrak{p}_1$ zu allen übrigen Primidealen teilerfremd; also ergibt sich auch hier ein Widerspruch gegen die scharfe Eindeutigkeitsforderung.

3. Nachweis der Axiome I und II (Kettensätze). Die Voraussetzungen ergeben für jedes vom Nullideal verschiedene Ideal: *Aus Teilbarkeit folgt Produktdarstellung*; d. h. aus $\mathfrak{m} = 0(\mathfrak{a})$ und $\mathfrak{a} \neq \mathfrak{o}$ folgt $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ mit $\mathfrak{b} \neq 0(\mathfrak{m})$. Sei

$$\mathfrak{m} = 0(\mathfrak{a}); \quad \mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_r^{e_r} \quad \text{und} \quad \mathfrak{a} = \bar{\mathfrak{p}}_1^{\sigma_1} \dots \bar{\mathfrak{p}}_r^{\sigma_r};$$

dann folgt, daß jedes $\bar{\mathfrak{p}}$ mit einem $\mathfrak{p}$ identisch ist, und daß $\sigma_i \leq e_i$ wird, also die Behauptung mit $\mathfrak{b} = \mathfrak{p}_1^{e_1-\sigma_1} \dots \mathfrak{p}_r^{e_r-\sigma_r}$, wo natürlich einige der σ_i Null werden können. Es gibt also nur die endlich vielen, den Kombinationen $0 \leq \sigma_i \leq e_i$ entsprechenden Teiler von $\mathfrak{m}$; somit gilt im Restklassenring nach $\mathfrak{m}$ der Doppelkettensatz. Damit ist aber Axiom I und II nachgewiesen: der Teilerkettensatz gilt auch in $\mathfrak{R}$ selbst, da jeder echte Teiler des Nullideals vom Nullideal verschieden ist.

Der Nachweis des Axioms V der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper setzt die üblichen Folgerungen aus der Idealzerlegung voraus, die daher erst abzuleiten sind.

4. *Der Restklassenring nach jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal ist Hauptidealring.* Das Ideal darf vom Einheitsideal verschieden angenommen werden, da hier für den nur aus dem Nullelement bestehenden Restklassenring die Bedingung sicher erfüllt ist.

Ist das Ideal vorerst primär, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^e$, und ist $\mathfrak{c} \equiv 0(\mathfrak{p}); \neq 0(\mathfrak{p}^2)$, so folgt aus 3., daß $\mathfrak{o}\mathfrak{c} = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ wird mit $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. Es kommt also $\mathfrak{p}^\sigma = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}^\sigma, \mathfrak{p}^e)$ für jedes $\sigma \leq e$; im Restklassenring nach einem Primideal wird somit jedes Ideal Hauptideal. Sei jetzt allgemein

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdot \mathfrak{q}_2 \dots \mathfrak{q}_r \quad \text{mit} \quad \mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{e_i}; \quad \text{sei} \quad \mathfrak{R}|\mathfrak{m} = \bar{\mathfrak{a}}_1 + \dots + \bar{\mathfrak{a}}_r$$

die entsprechende Darstellung des Restklassenringes als direkter Summe (§ 4, 5.). Es wird $\bar{\mathfrak{a}}_i$ isomorph zu $\mathfrak{R}|\mathfrak{q}_i$, und folglich wird jedes Ideal aus $\bar{\mathfrak{a}}_i$ Hauptideal. Ist $\bar{\mathfrak{c}}$ ein beliebiges Ideal des Restklassenringes, so wird also $\bar{\mathfrak{a}}_i \bar{\mathfrak{c}}$ Hauptideal $\bar{\mathfrak{a}}_i \bar{\mathfrak{c}}_i$; es kommt

$$\bar{\mathfrak{c}} = \bar{\mathfrak{o}}\bar{\mathfrak{c}} = \bar{\mathfrak{a}}_1 \bar{\mathfrak{c}} + \dots + \bar{\mathfrak{a}}_r \bar{\mathfrak{c}} = \bar{\mathfrak{a}}_1 \bar{\mathfrak{c}}_1 + \dots + \bar{\mathfrak{a}}_r \bar{\mathfrak{c}}_r = \bar{\mathfrak{a}}_1 \bar{\mathfrak{c}} + \dots + \bar{\mathfrak{a}}_r \bar{\mathfrak{c}} = \bar{\mathfrak{o}}\bar{\mathfrak{c}},$$

wobei $\bar{c} = \bar{c}_1 + \dots + \bar{c}_r$ gesetzt ist. Denn wegen $\bar{a}_i \bar{a}_k = (0)$ und wegen $\bar{c}_i \equiv 0 (\bar{a}_i)$ stimmen die Hauptideale $\bar{a}_i \bar{c}_i$ und $\bar{a}_i \bar{c}$ aus $\bar{a}_i$ überein.

Der Satz vom Hauptidealring läßt bekanntlich noch die folgende Fassung zu:

Ist c ein beliebiges Ideal, so läßt es sich in ein Hauptideal verwandeln durch Multiplikation mit einem zu einem gegebenen Ideal b teilerfremden Ideal.

Denn setzt man $m = bc$, so wird c modulo m zum Hauptideal, d. h. es wird $c = (oc, m) = (ca, cb) = c(a, b)$; somit wird $oc = ca$ und $(a, b) = o$.

5. Theorie der gebrochenen Ideale. Als *gebrochenes Ideal* bezeichnet man jeden endlichen $\mathfrak{R}$ -Modul im Quotientenkörper $\mathfrak{K}$.

Satz. *Die vom Nullmodul verschiedenen endlichen $\mathfrak{R}$ -Moduln aus $\mathfrak{K}$ bilden gegenüber der Multiplikation eine Abelsche Gruppe.*

Das Produkt zweier endlicher $\mathfrak{R}$ -Moduln ist wieder ein endlicher $\mathfrak{R}$ -Modul; die Multiplikation ist assoziativ und kommutativ; wegen $\mathfrak{A} = o\mathfrak{A}$ wird das Einheitsideal Einheitselement des Systems. Es ist also nur noch zu zeigen, daß die Gleichung $\mathfrak{A}\mathfrak{X} = o$ stets eine Lösung im System der endlichen $\mathfrak{R}$ -Moduln besitzt.

Vorbemerkung. Wenn die Gleichung $\mathfrak{A}\mathfrak{X} = \mathfrak{B}$ eine und nur eine Lösung hat, so wird $\mathfrak{X}$ gleich dem Modulquotient $\mathfrak{B}:\mathfrak{A}$ (§ 5, 4.). Denn es wird

$$\mathfrak{X} \equiv 0 (\mathfrak{B}:\mathfrak{A}); \text{ also } \mathfrak{B} = \mathfrak{A}\mathfrak{X} \equiv 0 (\mathfrak{A} \cdot (\mathfrak{B}:\mathfrak{A})) \equiv 0 (\mathfrak{B}) \text{ oder } \mathfrak{A} \cdot (\mathfrak{B}:\mathfrak{A}) = \mathfrak{B}.$$

Sei jetzt vorerst $\mathfrak{A}$ *Hauptmodul*, $\mathfrak{A} = (a)$, so kommt $\mathfrak{X} = (e/a)$ als Lösung von $\mathfrak{A}\mathfrak{X} = o$; es ist $\mathfrak{X}$ wieder endlicher $\mathfrak{R}$ -Modul. Daraus folgt: *Jeder endliche $\mathfrak{R}$ -Modul ist Modulquotient zweier Ideale aus $\mathfrak{R}$* , wodurch sich die Bezeichnung gebrochenes Ideal rechtfertigt. Denn sei $\tau_1, \dots, \tau_r$ eine Modulbasis von $\mathfrak{X}$, sei $\tau_i = t_i/a$ und sei t das aus den t_i abgeleitete Ideal in $\mathfrak{R}$. Dann wird $oa \cdot \mathfrak{X} = t$, woraus nach der Vorbemerkung $\mathfrak{X} = (t:oa)$ folgt, der Quotient in $\mathfrak{K}$ genommen.

Die Lösung von $\mathfrak{A}\mathfrak{X} = o$ läßt sich jetzt allgemein angeben. Sei gesetzt: $\mathfrak{A} = a:oc$ und sei b so bestimmt, daß ab gleich einem Hauptideal oa wird. Dann kommt: $\mathfrak{A}c = a$ und daraus $\mathfrak{A}bc = oa$ oder $\mathfrak{A} \cdot (bc:oa) = o$; dabei wird $\mathfrak{X}$ als Quotient eines Ideals durch ein Hauptideal wieder endlicher $\mathfrak{R}$ -Modul. Aus der damit bewiesenen Gruppeneigenschaft folgt noch, daß der Modulquotient irgend zweier Ideale $a:b$ als Lösung der Gleichung $b\mathfrak{X} = a$ endlicher $\mathfrak{R}$ -Modul wird.

6. Aus der Gruppeneigenschaft ergeben sich die weiteren Folgerungen:

6a. Man kann kürzen, d. h. aus $\mathfrak{I} = \mathfrak{A}\mathfrak{M}:\mathfrak{B}\mathfrak{M}$ folgt $\mathfrak{I} = \mathfrak{A}:\mathfrak{B}$ und umgekehrt. Denn aus $\mathfrak{I}\mathfrak{B}\mathfrak{M} = \mathfrak{I}\mathfrak{A}\mathfrak{M}$ kommt $\mathfrak{I}\mathfrak{B} = \mathfrak{I}\mathfrak{A}$ und umgekehrt.

6b. Jedes gebrochene Ideal (endlicher $\mathfrak{R}$ -Modul) läßt eine Darstellung zu: $\mathfrak{C} = \mathfrak{a}:\mathfrak{b}$, wo $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ teilerfremd; durch diese Bedingung sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ eindeutig bestimmt. Die Möglichkeit der Darstellung ergibt sich aus 5. und 6a; aus $\mathfrak{C} = \mathfrak{a}:\mathfrak{b} = \bar{\mathfrak{a}}:\bar{\mathfrak{b}}$ ergibt sich aber $\mathfrak{a}\bar{\mathfrak{b}} = \mathfrak{b}\bar{\mathfrak{a}}$ und damit Eindeutigkeit, wenn sowohl $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, wie $\bar{\mathfrak{a}}, \bar{\mathfrak{b}}$ als zueinander teilerfremd vorausgesetzt werden.

6γ. Jeder aus einem nichtganzen (d. h. zu $\mathfrak{R}$ und nicht zu $\mathfrak{R}$ gehörigen) Element abgeleitete Hauptmodul $\mathfrak{o}\eta$ läßt eine Darstellung als Quotient von Hauptidealen zu derart, daß keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar wird. Sei in gekürzter Darstellung $\mathfrak{o}\eta = \mathfrak{b}:\mathfrak{c}$, wo also $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; sei (nach 4.) $\mathfrak{o}\mathfrak{b} = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ und $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Dann kommt $\mathfrak{o}\eta = \mathfrak{a}\mathfrak{b}:\mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{b}:\mathfrak{a}\mathfrak{c}$, und wegen $\mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}\mathfrak{b}:\mathfrak{o}\eta$ wird auch $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ Hauptideal, also $\mathfrak{o}\eta = \mathfrak{o}\mathfrak{b}:\mathfrak{o}\mathfrak{c}$. Es wird aber keine Potenz von $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{c}$ teilbar, wegen $(\mathfrak{a}\mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ und $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$.

7. Nachweis des Axioms V der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper. Aus 6γ folgt, daß jedes nichtganze Element aus $\mathfrak{R}$ eine Quotientendarstellung zuläßt, $\eta = \mathfrak{a}:\mathfrak{c}$ derart, daß in $\mathfrak{R}$ keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar wird. Denn aus $\mathfrak{o}\eta = \mathfrak{o}\mathfrak{b}:\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ folgt, daß η sich nur bis auf eine Einheit aus $\mathfrak{R}$ von dem Quotienten $\mathfrak{b}:\mathfrak{c}$ unterscheidet. Ein solches Element η kann mithin keiner Gleichung genügen, die es als ganz in bezug auf $\mathfrak{R}$ charakterisiert; denn aus $\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \dots + r_n = 0$ folgt $\mathfrak{a}^n \equiv 0(\mathfrak{o}\mathfrak{c})$ in $\mathfrak{R}$.

8. Folgerung: Sind in einem kommutativen Ring $\mathfrak{R}$ die Axiome I bis IV erfüllt, und ist jedes primäre Ideal irreduzibel, so ist auch Axiom V der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper erfüllt. Wegen der Axiome I bis III ist jede Primidealpotenz $\mathfrak{p}^e$ zugleich Primärideal; das gilt insbesondere für $\mathfrak{p}^2$; es wird somit $\mathfrak{p}^2$ nach Voraussetzung ein irreduzibles Ideal. Hieraus ist die Darstellung $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}, \mathfrak{p}^2)$ nachzuweisen; denn damit folgt nach dem Hilfssatz § 8, 3, daß jedes Primärideal Primidealpotenz wird, was zusammen mit den andern Voraussetzungen nach 7. die ganze Abgeschlossenheit nach sich zieht.

Wegen des Teilerkettensatzes kommt $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{o}\mathfrak{c}_k, \mathfrak{p}^2)$, wobei als Multiplikatoren der $\mathfrak{c}$ nur die Restklassen nach $\mathfrak{p}$ in Betracht kommen, und wobei die $\mathfrak{c}$ als linear unabhängig in bezug auf den Restklassenkörper nach $\mathfrak{p}$ vorausgesetzt werden dürfen. Aus dieser Linearunabhängigkeit folgt aber für $k > 1$ eine Darstellung: $\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2]$, wo $\mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}_1\mathfrak{p}^2)$ und $\mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}\mathfrak{c}_2, \dots, \mathfrak{o}\mathfrak{c}_k, \mathfrak{p}^2)$ gesetzt ist; es werden somit $\mathfrak{q}_1$ und $\mathfrak{q}_2$ echte

Teiler von p^2 , und es wird p^2 gegen Voraussetzung reduzibel. Damit ist $p = (p^2, p^2)$ mit der sich daraus ergebenden Folgerung bewiesen.

Daß umgekehrt als Folge der Axiome I bis V jedes Primärideal irreduzibel wird, ist unmittelbar klar, da eine Primidealpotenz p^2 sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches echter Teiler der Form p^σ und p^τ darstellen lassen kann.

9. Sind Nullteiler im Ring zugelassen, so folgt aus den Axiomen I bis III und der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenring nicht, daß jedes Primärideal irreduzibel wird³²⁾. Denn es bedeute $\mathfrak{T}$ einen Ring, in dem alle Axiome I bis IV außer der ganzen Abgeschlossenheit erfüllt sind; solche Ringe gibt es, z. B. sind die vom System aller in bezug auf $\mathfrak{R}$ ganzen Größen verschiedenen endlichen Ordnungen eines endlichen Erweiterungskörpers des Quotientenkörpers von $\mathfrak{R}$ solche Ringe, wenn in $\mathfrak{R}$ die Axiome I bis V gelten (§ 3, 2.). Nach der Folgerung 8. gibt es in $\mathfrak{T}$ *reduzible* Primärideale q ; es bedeute p^σ ein echtes Vielfaches von q und $\overline{\mathfrak{R}}$ den Restklassenring $\mathfrak{T}/p^\sigma$, in dem also das q zugeordnete Ideal $\bar{q}$ ein vom Nullideal verschiedenes *reduzibles* Primärideal wird. In $\overline{\mathfrak{R}}$ sind die Axiome I bis III erfüllt, aber es gilt auch die ganze Abgeschlossenheit im Quotientenring. Denn da in $\mathfrak{T}$ jedes nicht durch p teilbare Element zu p^σ teilerfremd wird, sind in $\overline{\mathfrak{R}}$ alle regulären Elemente Einheiten; es ist also $\overline{\mathfrak{R}}$ mit seinem Quotientenring identisch.

§ 10.

Doppelkettensatz und Kompositionsreihe.

Im folgenden soll gezeigt werden, daß für beliebige, als wohlgeordnet angenommene Modulbereiche (§ 2) die *Voraussetzung der Gültigkeit des Doppelkettensatzes* — jede Teilerkette und jede Vielfachenkette von Moduln bricht im Endlichen ab — identisch ist mit der *Voraussetzung, daß eine Kompositionsreihe existiert*³³⁾. Die Spezialisierung des Modulbereichs zu einem kommutativen Ring ergibt dann die entsprechenden Tatsachen für das System aller Ideale des Ringes; dabei ist unter 2. durchweg der Modulisomorphismus durch Ringisomorphismus zu ersetzen.

³²⁾ Vgl. Anm. ¹³⁾.

³³⁾ Die Moduln des Bereichs sind Abelsche Gruppen gegenüber der Addition, und zwar handelt es sich um *verallgemeinerte* Abelsche Gruppen, da der Multiplikatorenbereich aus den Elementen aus $\mathfrak{R}$ besteht. Da es sich um Abelsche Gruppen handelt, fällt der Begriff der Kompositionsreihe mit dem der Hauptreihe zusammen. Die Sätze dieses Paragraphen bleiben bestehen, wenn unter „Moduln“ die Gesamtheit der Normalteiler einer beliebigen nicht kommutativen, auch verallgemeinerten Gruppe verstanden wird. An die Gruppentheorie soll die von der früheren etwas abweichende Bezeichnung erinnern.

Ein Modulbereich $\mathfrak{G}$ heißt *einfach*, wenn es in $\mathfrak{G}$ keine weiteren $\mathfrak{R}$ -Moduln als $\mathfrak{G}$ selbst und den Nullmodul $\mathfrak{E}$ gibt. Ein Modul $\mathfrak{A}$ heißt *einfach in $\mathfrak{G}$* , wenn $\mathfrak{G}|\mathfrak{A}$ einfach ist (größter Normalteiler).

Eine *Vielfachenkette* $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$ heißt *Kompositionsreihe von $\mathfrak{G}$ von der Länge r* , wenn alle Moduln der Kette verschieden, und wenn jeder Modul *einfach in dem vorangehenden* ist, wenn also die Restklassenmoduln (die Quotientengruppen) $\mathfrak{A}_{i-1}|\mathfrak{A}_i$ einfache Modulbereiche sind, ebenso $\mathfrak{G}|\mathfrak{A}_1$ und $\mathfrak{A}_r$. Durch Bildung des Restklassenmoduls $\mathfrak{G}|\mathfrak{A}$ läßt sich der Fall, daß eine Kompositionsreihe von $\mathfrak{G}$ bis $\mathfrak{A} \neq \mathfrak{E}$ existiert, auf den Fall der Kompositionsreihe schlechthin zurückführen.

1. Wird in $\mathfrak{G}$ die Gültigkeit des Doppelkettensatzes vorausgesetzt, so existiert in $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe — dabei ist $\mathfrak{G} \neq \mathfrak{E}$ vorausgesetzt. Aus der vorausgesetzten Wohlordnung von $\mathfrak{G}$ und aus der Existenz des Teilerkettensatzes ergibt sich, wie in § 6, durch quasi-lexikographische Anordnung eine Wohlordnung des Systems aller Moduln. Vermöge dieser Wohlordnung folgt aus der Voraussetzung des Teilerkettensatzes die Existenz von mindestens einem in $\mathfrak{G}$ *einfachen Modul*. Ist nämlich $\mathfrak{C}_1$ der in der Wohlordnung erste echte Teiler von $\mathfrak{G}$, allgemein $\mathfrak{C}_i$ der erste echte Teiler von $\mathfrak{C}_{i-1}$, so bricht die wohlbestimmte Kette $\mathfrak{G}, \mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_i, \dots$ im Endlichen ab, führt also notwendig zu einem in $\mathfrak{G}$ einfachen Modul $\mathfrak{A}_1$. Ist $\mathfrak{A}_1 \neq \mathfrak{E}$, so gibt es nach demselben Verfahren einen in $\mathfrak{A}_1$ einfachen Modul $\mathfrak{A}_2$; ist allgemein $\mathfrak{A}_{i-1} \neq \mathfrak{E}$, so gibt es einen in $\mathfrak{A}_{i-1}$ einfachen Modul $\mathfrak{A}_i$. Man kommt auf diese Art zu einer wohlbestimmten Vielfachenkette $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_i, \dots$, die nach der Voraussetzung des Vielfachenkettensatzes im Endlichen abbricht und somit eine *Kompositionsreihe von $\mathfrak{G}$* ergibt.

2. Wird in $\mathfrak{G}$ die Existenz einer Kompositionsreihe vorausgesetzt, so gilt in $\mathfrak{G}$ der Doppelkettensatz. Der Beweis erfolgt durch volle Induktion, wobei die Wohlordnung für $\mathfrak{G}$ nicht vorausgesetzt zu werden braucht. Im Laufe des Induktionsschlusses ergibt sich zugleich ein Beweis des Jordan-Hölderschen Satzes unter alleiniger Voraussetzung der Existenz einer Kompositionsreihe ³⁴⁾.

³⁴⁾ Vgl. Masazo Sono (Anm. ¹⁹⁾), On Congruences I, § 11–13, für den Fall der Ringe. Es wird dort auch das Analogon zur Kompositionsreihe in nicht kommutativen Gruppen behandelt, nämlich Reihen $\mathfrak{R}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$, wo jeweils $\mathfrak{A}_i$ Ideal und einfach in $\mathfrak{A}_{i-1}$ ist, nicht Ideal in $\mathfrak{R}$ zu sein braucht. Tatsächlich bleiben alle obigen Überlegungen für nichtkommutative Gruppen erhalten, wenn man unter Vielfachenkette eine solche $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_i, \dots$ versteht, wo jeweils $\mathfrak{A}_i$ normal in $\mathfrak{A}_{i-1}$, und wenn Teilerketten entsprechend definiert werden. Vgl. ferner Dedekind, Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe (Math. Ann. 53 (1900), S. 371–403). Hier ist für viel allgemeinere Bereiche (Modulgruppen) ebenfalls nur unter der Existenz-

Sei vorerst $\mathfrak{G}$ einfach, also $r=0$, so daß nur die einzige Kompositionsreihe $\mathfrak{G}, \mathfrak{E}$ existiert. Es sind hier die Voraussetzungen erfüllt:

α) Durch jeden in $\mathfrak{G}$ einfachen Modul läßt sich eine Kompositionsreihe ziehen.

β) Jordan-Hölderscher Satz: Jede Kompositionsreihe ist von gleicher Länge und das System der Quotientengruppen (Restklassenmoduln) stimmt bis auf die Anordnung überein, d. h. entsprechende Quotientengruppen sind isomorph.

γ) Durch jeden beliebigen, von $\mathfrak{G}$ verschiedenen Modul läßt sich eine Kompositionsreihe ziehen.

δ) Gültigkeit des Vielfachenkettensatzes.

ϵ) Gültigkeit des Teilerkettensatzes.

Die Voraussetzungen α) bis ϵ) dürfen also für jeden Modulbereich, der eine Kompositionsreihe von der Länge $\bar{r} < r+1$ besitzt, als erfüllt angenommen werden. Sie sollen als erfüllt nachgewiesen werden unter der Annahme, daß in $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$ von der Länge $r+1$ existiert.

2 α . Gibt es keinen von $\mathfrak{A}$ verschiedenen in $\mathfrak{G}$ einfachen Modul, so ist nichts zu beweisen. Sei also $\mathfrak{B}$ ein in $\mathfrak{G}$ einfacher Modul $\neq \mathfrak{A}$; es ist zu zeigen, daß in $\mathfrak{G}$ eine durch $\mathfrak{B}$ laufende Kompositionsreihe existiert. Da $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ beide in $\mathfrak{G}$ einfach und voneinander verschieden, so wird notwendig $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$; setzt man noch $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, so kommt nach dem zweiten Isomorphiesatz (§ 4, 2.):

$$\mathfrak{G}|\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}|\mathfrak{M} \quad \text{und} \quad \mathfrak{G}|\mathfrak{A} \simeq \mathfrak{B}|\mathfrak{M};$$

es wird also $\mathfrak{M}$ einfach in $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$. Da $\mathfrak{A}$ eine Kompositionsreihe der Länge $r < r+1$ besitzt, gibt es somit nach den Voraussetzungen α) und β) in $\mathfrak{A}$ eine durch $\mathfrak{M}$ laufende Kompositionsreihe der Länge r , etwa $\mathfrak{A}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}$; damit wird aber $\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}$ eine durch $\mathfrak{B}$ laufende Kompositionsreihe von $\mathfrak{G}$.

2 β . Zum Nachweis des Jordan-Hölderschen Satzes seien

(1) $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$ und (2) $\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_s, \mathfrak{E}$ mit $s \geq r$

zwei Kompositionsreihen von $\mathfrak{G}$. Wird hier $\mathfrak{A}$ gleich $\mathfrak{B}$, so ist nach der für $r < r+1$ geltenden Voraussetzung alles erledigt. Im andern Fall zeigt der Vergleich mit den unter 2 α konstruierten Reihen

(3) $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}$ und (4) $\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}$

voraussetzung der Jordan-Höldersche Satz bewiesen (§ 6, XVI). An Stelle des zweiten Isomorphiesatzes tritt hier eine etwas schwächere Zuordnungsbeziehung, und infolgedessen ist auch die Aussage des Satzes etwas schwächer; der Beweis ist aber im Prinzip mit dem oben gegebenen identisch.

das Folgende: Nach der für $r < r + 1$ gemachten Voraussetzung stimmt das System der Quotientengruppen von (1) und (3) überein; ebenso von (2) und (4), da die in (4) durch $\mathfrak{B}$ laufende Kompositionsreihe von der Länge r ist; es wird also s gleich r . Wegen der unter 2α angegebenen Isomorphie besteht weiter Übereinstimmung zwischen (3) und (4), womit die Übereinstimmung zwischen (1) und (2) und damit der *Jordan-Höldersche Satz bewiesen ist*.

2 γ . Vorbemerkung. Seien $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{H}$ Moduln aus $\mathfrak{G}$; sei $\mathfrak{B}$ einfach in $\mathfrak{A}$; dann stimmen die Moduln $(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})$ und $(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})$ entweder überein, oder $(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})$ ist einfach in $(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})$. Nach dem zweiten Isomorphiesatz (§ 4, 2.) kommt:

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{H}) | (\mathfrak{B}, \mathfrak{H}) \simeq \mathfrak{A} | [\mathfrak{A}, (\mathfrak{B}, \mathfrak{H})] \quad \text{oder} \quad - \quad \text{wegen } \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A}) - \\ (\mathfrak{A}, \mathfrak{H}) | (\mathfrak{B}, \mathfrak{H}) \simeq \mathfrak{A} | \mathfrak{C} \quad \text{für} \quad \mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, (\mathfrak{B}, \mathfrak{H})].$$

Dabei wird $\mathfrak{C} \equiv 0(\mathfrak{A})$; andererseits wird $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{C})$ wegen $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$ und $\mathfrak{B} \equiv 0((\mathfrak{B}, \mathfrak{H}))$; es liegt also $\mathfrak{C}$ zwischen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ und ist somit nach Voraussetzung mit $\mathfrak{A}$ oder $\mathfrak{B}$ identisch, woraus die Vorbemerkung folgt.

Sei jetzt wieder $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{C}$ eine Kompositionsreihe von $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{H}$ ein beliebiger, von $\mathfrak{G}$ verschiedener Modul aus $\mathfrak{G}$. Um zu zeigen, daß durch $\mathfrak{H}$ eine Kompositionsreihe läuft, sei die Reihe der Moduln $\mathfrak{G}, (\mathfrak{A}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{H}), \dots, (\mathfrak{A}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}$ gebildet. Nach der Vorbemerkung bilden die verschiedenen unter diesen Moduln $\mathfrak{G}, \mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_s, \mathfrak{H}$ eine Kompositionsreihe von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{H}$; es wird also $\mathfrak{C}$ — was im Spezialfall 2α mit $\mathfrak{H}$ zusammenfällt — ein in $\mathfrak{G}$ einfacher Modul. Somit existiert nach 2α in $\mathfrak{C}$ eine Kompositionsreihe der Länge $r < r + 1$, und folglich läßt sich in $\mathfrak{C}$ nach Voraussetzung eine Kompositionsreihe durch $\mathfrak{H}$ ziehen, was durch Zufügung von $\mathfrak{G}$ in $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe durch $\mathfrak{H}$ ergibt. Die wiederholte Anwendung dieser Überlegung zeigt noch, daß man eine solche Kompositionsreihe insbesondere als Verlängerung der von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{H}$ konstruierten annehmen kann.

2 δ . Nachweis des Vielfachenkettensatzes. Sei wieder in $\mathfrak{G}$ die Existenz einer Kompositionsreihe der Länge $r + 1$ vorausgesetzt, und sei $\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_r, \dots$ eine Vielfachenkette; dabei sei jeder Modul als echtes Vielfaches des vorangehenden vorausgesetzt. Daß die Kette mit $\mathfrak{G}$ beginnt, ist keine Beschränkung der Allgemeinheit, da man immer $\mathfrak{G}$ als erstes Glied zufügen kann. Nach 2γ gibt es eine durch $\mathfrak{B}$ laufende Kompositionsreihe in $\mathfrak{G}$, und somit besitzt $\mathfrak{B}$ eine Kompositionsreihe von kürzerer Länge. Also bricht nach Voraussetzung die Kette $\mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_r, \dots$ im Endlichen ab; es gilt also auch das gleiche für die durch Hinzufügung von $\mathfrak{G}$ verlängerte.

2ε. Nachweis des Teilerkettensatzes. Sei wieder in $\mathfrak{G}$ die Existenz einer Kompositionsreihe der Länge $r + 1$ vorausgesetzt, und sei $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_r, \dots$ eine Teilerkette; dabei sei jeder Modul als echter Teiler des vorangehenden vorausgesetzt. Daß die Kette mit $\mathfrak{C}$ beginnt, ist wieder keine Beschränkung der Allgemeinheit. Nach 2γ gibt es eine durch $\mathfrak{C}$ laufende Kompositionsreihe in $\mathfrak{G}$, somit gibt es in $\mathfrak{G}|\mathfrak{C}$ eine Kompositionsreihe von kürzerer Länge. Also bricht nach Voraussetzung in $\mathfrak{G}|\mathfrak{C}$ die Teilerkette $\mathfrak{C}|\mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1|\mathfrak{C}, \dots, \mathfrak{C}_r|\mathfrak{C}, \dots$ im endlichen ab. Wegen des eindeutigen Entsprechens — nach dem ersten Isomorphiesatz (§ 4, 2.) — gilt das gleiche für die ursprüngliche, mit $\mathfrak{C}$ beginnende Kette, und damit auch für die durch Hinzufügung von $\mathfrak{C}$ verlängerte.

Die Äquivalenz der Voraussetzungen — Kompositionsreihe oder Doppelkettensatz — ist damit bewiesen.

(Eingegangen am 13. 8. 1925.)