

## Über die Stabilität des Gleichgewichts.

Von G. Lejeune Dirichlet.

Crelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. 32, S. 85–88.

### Über die Stabilität des Gleichgewichts.

[Auszug aus einer am 22. Januar 1846 in der Königl. Akademie der Wissenschaften gelesenen Abhandlung.]<sup>1</sup>

Wenn auf ein System materieller Punkte anziehende oder abstossende, bloss von der Entfernung abhängige Kräfte wirken, die entweder nach festen Centren gerichtet sind, oder für die, wenn sie gegenseitig zwischen zwei Massen stattfinden, Wirkung und Gegenwirkung einander gleich sind, und überdies die Bedingungsgleichungen, welche die Coordinaten der Punkte unter einander verbinden, die Zeit nicht enthalten, so gilt immer das sogenannte Integral der lebendigen Kraft, welches in seiner ganzen Allgemeinheit zuerst von D. Bernoulli aufgestellt worden und in der Gleichung:

$$\Sigma mv^2 = f(x, y, z, x', \dots) + C$$

enthalten ist. Das Summenzeichen erstreckt sich auf alle Massen des Systems, von denen jede mit  $m$ , ihre Geschwindigkeit mit  $v$  bezeichnet ist, und  $C$  bedeutet die willkürliche Constante. Die Function der Coordinaten hängt bloss von der Natur der Kräfte ab und lässt sich immer durch eine bestimmte Anzahl unabhängiger Variabeln  $\lambda, \mu, \nu, \dots$  ausdrücken, wodurch die Gleichung in:

$$\Sigma mv^2 = \varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots) + C$$

übergeht. Die Function  $\varphi$  steht in inniger Beziehung zu den Gleichgewichtslagen des Systems, indem die Bedingung, dass für eine, bestimmten Werthen von  $\lambda, \mu, \nu, \dots$  entsprechende Lage Gleichgewicht stattfinde, mit der zusammenfällt, dass für diese Werthe das vollständige Differential von  $\varphi$  verschwinde; so dass also im Allgemeinen für jede Gleichgewichtslage die Function ein Maximum oder Minimum sein wird. Findet wirklich das Maximum statt, so hat das Gleichgewicht den Charakter der Stabilität, d. h. das System wird sich, wenn die Punkte aus einer solchen Lage nur wenig verrückt werden und kleine Anfangsgeschwindigkeiten erhalten, im Laufe der Zeit nie über gewisse enge Grenzen hinaus von derselben entfernen.

Der eben erwähnte Satz gehört unstreitig zu den wichtigsten der ganzen Mechanik; auf ihm beruht namentlich die Theorie der kleinen Schwingungen, welche so viele interessante physikalische Anwendungen in sich begreift, und man muss sich in der That wundern, dass die Wahrheit desselben bisher nicht mit der nöthigen Strenge dargethan worden ist. Setzt man voraus, dass die Gleichgewichtslage oder das Maximum der Function  $\varphi$  den Werthen  $\lambda = 0$ ,  $\mu = 0$ ,  $\nu = 0$ ,  $\dots$  entspricht, was immer geschehen kann, ohne der Allgemeinheit Abbruch zu thun, so besteht der von Lagrange<sup>2</sup> gegebene Beweis darin, dass die Entwicklung der Function nach Potenzen von  $\lambda, \mu, \nu, \dots$ , welche mit den Gliedern zweiter Ordnung beginnt, auf diese beschränkt wird, und dass dann aus dem bekannten Kriterium für das Maximum, nach welchem die Glieder zweiter Ordnung als eine Summe von negativen Quadraten dargestellt werden können, Grenzen

<sup>1</sup>Im Jahrgang 1846 der Akademie-Berichte wird der Auszug auf S. 34 mit den Worten eingeleitet: Hr. Lejeune Dirichlet las *über die Bedingungen der Stabilität des Gleichgewichts*. Für den Abdruck im Journal hat Dirichlet den Titel, so wie an einigen Stellen den Text etwas verändert und den ganzen Absatz am Schlusse neu hinzugefügt. K.

<sup>2</sup>Mécanique analytique, première partie, section III.

für  $\lambda, \mu, \nu, \dots$  abgeleitet werden, die sie nicht überschreiten können. Diese Schlussweise, welche auch bei anderen Fragen der Stabilität, und namentlich in der physischen Astronomie nicht selten in Anwendung gebracht wird, ermangelt aber offenbar der Beweiskraft, und es kann mit Recht gezweifelt werden, ob Grössen, für die man unter der Voraussetzung, dass sie immer klein bleiben — denn nur in dieser liegt die Befugniss, die höheren Glieder zu vernachlässigen —, kleine Grenzen findet, nach einer beliebigen Zeit wirklich in diese oder überhaupt nur in enge Grenzen eingeschlossen sein werden.

Der oben erwähnte Beweis ist, so viel ich weiss, bisher ohne wesentliche Veränderung von allen Schriftstellern reproducirt worden, welche sich mit diesem Gegenstande beschäftigt haben, und was namentlich Poisson<sup>3</sup> zu demselben hinzugefügt hat, um die Glieder höherer Ordnung zu berücksichtigen, beruht auf der ganz unhaltbaren Annahme, dass jedes Glied zweiter Ordnung den Inbegriff aller höheren Glieder übertreffe. Aber selbst wenn die von Lagrange angestellten Betrachtungen für den Fall, worauf sie sich beziehen, und wo sich das Maximum in den Gliedern zweiter Ordnung zu erkennen giebt, vervollständigt würden, wäre damit der fragliche Satz noch nicht in seinem ganzen Umfange bewiesen. Bekanntlich ist die Existenz eines Maximums mit dem Verschwinden der Glieder zweiter Ordnung verträglich; nur muss immer die niedrigste Ordnung, für welche nicht sämmtliche Glieder verschwinden, eine gerade sein und das Aggregat aller dieser Glieder immer negativ bleiben. Die vollständigen Kriterien für diese letztere Bedingung sind bisher, selbst wenn es sich um die vierte Ordnung handelt, nicht aufgestellt worden (Théorie des fonctions, seconde partie, no. 57);<sup>4</sup> sie wären daher vor Allem aufzusuchen; was nothwendig in den Beweis des mechanischen Satzes grosse Complication bringen würde.

Glücklicherweise lässt sich das Princip der Stabilität des Gleichgewichts unabhängig von diesen Kriterien und durch höchst einfache, unmittelbar an den Begriff des Maximums anknüpfende Betrachtungen nachweisen.

Indem wir die obige Voraussetzung beibehalten, dass die Gleichgewichtslage verschwindenden Werthen von  $\lambda, \mu, \nu, \dots$  entspricht, machen wir noch die zweite: dass der Werth von  $\varphi(0, 0, 0, \dots)$  ebenfalls Null ist; was wegen der willkürlichen Constante gestattet ist. Bestimmt man nun die Constante aus dem gegebenen Anfangszustande, für welchen  $v, \lambda, \mu, \nu, \dots$  mit  $v_0, \lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots$  bezeichnet werden sollen, so erhält man:

$$\Sigma m v^2 = \varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots) - \varphi(\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots) + \Sigma m v_0^2.$$

Vermöge der Annahme, dass  $\varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$  für  $\lambda = 0, \mu = 0, \nu = 0, \dots$  ein Maximum ist, dessen Werth selbst verschwindet, lassen sich nun immer so kleine positive Grössen  $l, m, n, \dots$  angeben, dass für jedes System  $\lambda, \mu, \nu, \dots$ , wenn die Zahlenwerthe dieser Variabeln respective nicht grösser als  $l, m, n, \dots$  sind,  $\varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$  stets negativ ist; den einzigen Fall ausgenommen, wo  $\lambda, \mu, \nu, \dots$  gleichzeitig verschwinden. Dieser Fall wird ausgeschlossen, wenn wir nur solche Systeme betrachten, in welchen wenigstens eine der Variabeln  $\lambda, \mu, \nu, \dots$ , abgesehen vom Zeichen, ihrer Grenze  $l, m, n, \dots$  gleich ist. Ist von allen diesen negativen Werthen der Function,  $-p$ , abgesehen vom Zeichen, der kleinste, so lässt sich leicht zeigen, dass, wenn  $\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots$  numerisch kleiner als  $l, m, n, \dots$  genommen werden und zugleich der Bedingung:

$$-\varphi(\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots) + \Sigma m v_0^2 < p$$

Genüge geschieht, jede der Variabeln  $\lambda, \mu, \nu, \dots$  im Laufe der Bewegung numerisch unter ihrer Grenze  $l, m, n, \dots$  bleiben wird. Fände das Gegentheil statt, so müsste, da die anfänglichen Werthe  $\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots$  der Voraussetzung nach die eben ausgesprochene Bedingung erfüllen und bei der Stetigkeit der Variabeln  $\lambda, \mu, \nu, \dots$ ,<sup>5</sup> zu einer gewissen Zeit zuerst Gleichheit zwischen einem oder mehreren der Zahlenwerthe von  $\lambda, \mu, \nu, \dots$  und der entsprechenden Grenze  $l, m, n, \dots$

<sup>3</sup>Traité de Mécanique, tome second, page 492.

<sup>4</sup>Dieses Citat fehlt im Akademie-Bericht. K.

<sup>5</sup>Die Worte „und bei der Stetigkeit der Variabeln  $\lambda, \mu, \nu, \dots$ “ fehlen im Akademie-Bericht. K.

eintreten, ohne dass einer der übrigen diese noch überschritten hätte. Für diesen Zeitpunkt wäre der negative Werth von  $\varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$

numerisch nicht kleiner als  $p$ , und also die zweite Seite unserer Gleichung wegen der obigen auf den Anfangszustand sich beziehenden Ungleichheit negativ; was mit der Natur der ersten Seite in Widerspruch steht. Zugleich ist klar, dass auch die Geschwindigkeiten  $v$  immer in Grenzen eingeschlossen bleiben werden, da stets:

$$\Sigma mv^2 \leq \Sigma mv_0^2 - \varphi(\lambda_0, \mu_0, \nu_0, \dots)$$

sein wird, so wie auch, dass die Grenzen für jedes  $v$ , so wie für jede der die Lage des Systems bestimmenden Variablen  $\lambda, \mu, \nu, \dots$ , beliebig enge gemacht werden können, da  $l, m, n, \dots$  jedes Grades von Kleinheit fähig sind.<sup>6</sup>

Schliesslich wollen wir noch auf einen merkwürdigen, bei verschiedenen Schriftstellern vorkommenden Irrthum aufmerksam machen, welcher den eben besprochenen Gegenstand betrifft.<sup>7</sup> Es wird behauptet, dass, wenn das System im Laufe der Bewegung durch mehrere Gleichgewichtslagen hindurch geht, diese abwechselnd Lagen des stabilen und unstabilen Gleichgewichts, d. h. solche sind, denen ein Maximum oder Minimum der Function  $\varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$  entspricht; und diese Behauptung wird darauf gegründet, dass 1° ein Maximum oder Minimum diesen Charakter nicht verliert, wenn die früher als unabhängig betrachteten Variablen  $\lambda, \mu, \nu, \dots$  die besonderen Werthe, für welche ein solches stattfindet, dadurch erhalten, dass sie Functionen von einer neuen Grösse  $t$  werden, und dann 2° darauf, dass bei einer Function einer einzigen Variablen  $t$  Maxima und Minima einander abwechselnd folgen. Beides ist richtig, berechtigt aber nicht zu der daraus gezogenen Folgerung; es wäre vielmehr erforderlich, dass das Erstere auch umgekehrt gültig bliebe, d. h. dass die bloss von  $t$  abhängige Function  $\varphi(\lambda, \mu, \nu, \dots)$ , wenn sie für ein bestimmtes  $t$  ein Maximum oder Minimum darbietet, dieselbe Eigenschaft behielte, wenn man die entsprechenden Werthe von  $\lambda, \mu, \nu, \dots$  als besondere Werthe der als unabhängige Variablen betrachteten Grössen  $\lambda, \mu, \nu, \dots$  ansieht. Dies braucht aber nicht der Fall zu sein, selbst dann nicht, wenn nur eine Grösse, z. B.  $\lambda$ , vorkommt. So hat die Function  $\lambda^2$  nur ein Minimum und gar kein Maximum, während für die Function  $\sin^2 t$ , in welche jene durch die Annahme  $\lambda = \sin t$  übergeht, nicht nur unendlich viele Minima, welche einander und dem früheren gleich sind, sondern überdies unendlich viele Maxima stattfinden. Der Irrthum, in welchen man in dieser Beziehung verfallen ist, muss um so mehr befremden, als die Unrichtigkeit der aufgestellten Behauptung sich schon bei der gewöhnlichen Pendelbewegung zu erkennen giebt.

---

<sup>6</sup>Hier schliesst der Auszug im Akademie-Bericht (vgl. S. 37 im Jahrgang 1846). K.

<sup>7</sup>Traité de Mécanique par Poisson, tome second, page 491.