

GEOMETRISCHE SEITE DER TERNÄREN FORMEN.

Ein Punkt im Raume (0) sei als Anfangspunkt angenommen. Der Uebergang von da zu drei andern Punkten P, P', P'' , die mit jenem nicht in einer Ebene liegen, sei resp. t, t', t'' ; wo, so oft keine Verwechslung möglich ist, die Punkte P, P', P'' selbst durch $(t), (t'), (t'')$ bezeichnet werden mögen.

Es sei ferner allgemein (t, t') das Product der Länge der beiden Linien t, t' in den Cosinus ihrer Neigung etc.

Man hat allgemein $(\alpha t + \alpha' t' + \alpha'' t'' + \dots \quad \mathfrak{C}u + \mathfrak{C}'u' + \mathfrak{C}''u'' + \dots)$ wenn man die Multiplication

$$(\alpha t + \alpha' t' + \alpha'' t'' + \dots) \times (\mathfrak{C}u + \mathfrak{C}'u' + \mathfrak{C}''u'' + \dots)$$

ausführt und statt $tu, tu', tu'', t'u', t'u'' \dots$ u.s.w. $(t, u), (t, u'), (t, u''), (t', u'), (t', u'') \dots$ u.s.w. schreibt.

Jeder Punkt im Raume wird durch ein Trinomium

$$(xt + x't' + x''t'')$$

dargestellt werden können.

Für alle Punkte, die in einer bestimmten Ebene liegen, wird dann eine Gleichung

$$\lambda x + \lambda' x' + \lambda'' x'' = L$$