

BERNHARD RIEMANN'S
GESAMMELTE
MATHEMATISCHE WERKE
UND
WISSENSCHAFTLICHER NACHLASS.

HERAUSGEGEBEN
unter Mitwirkung von Richard Dedekind
von
Heinrich Weber.

Zweite Auflage
bearbeitet von
Heinrich Weber,
mit einem Bildniss Riemann's.

LEIPZIG,
Druck und Verlag von B. G. Teubner.
1892.

Printed in Germany.

VORREDE ZUR ERSTEN AUFLAGE.

Das Werk, welches hiermit in die Oeffentlichkeit tritt, ist die endliche Ausführung eines seit lange geplanten Unternehmens. Bei der Bedeutung, welche die grossen Schöpfungen Riemann's für die Entwicklung der neueren Mathematik haben, gehören die meisten der Riemann'schen Abhandlungen zu den unentbehrlichsten Hilfsmitteln des Mathematikers, und eine Sammlung seiner Werke dürfte daher einem allgemein gehegten Wunsche um so mehr entgegen kommen, als die meisten derselben im Buchhandel nicht oder nur schwer zu erhalten sind. Es kommt dazu die dringende Pflicht gegen die Wissenschaft, die im handschriftlichen Nachlass noch verborgenen Untersuchungen und Gedanken der Oeffentlichkeit nicht länger vorzuenthalten.

Schon im Frühjahr 1872 war daher unter mehreren Freunden Riemann's der Plan zu einer solchen Sammlung entstanden und Clebsch hatte mit seiner ganzen Thatkraft die Leitung des Unternehmens in die Hand genommen und sich mit Dedekind vereinigt, in dessen Besitz nach Riemann's Wunsch der handschriftliche Nachlass nach des Verfassers Tod gekommen war, und der bereits mehrere Abhandlungen aus demselben herausgegeben hatte.

Durch den beklagenswerthen und unerwarteten Tod von Clebsch gerieth leider das Vorhaben ins Stocken und blieb längere Zeit gänzlich liegen. Als mir im November 1874 Dedekind im Namen der Frau Professorin Riemann den Vorschlag machte, die Leitung der Herausgabe zu übernehmen, bin ich nicht ohne schwere Bedenken darauf eingegangen. Denn obwohl ich von dem Umfang der damit verbundenen Arbeit damals noch keine richtige Vorstellung hatte, war ich mir der zu übernehmenden Verantwortung wohl bewusst. Nur die Erwägung, dass im Falle meiner Weigerung die Ausführung abermals auf lange Zeit hinausgeschoben zu werden, wenn nicht gänzlich zu scheitern drohte, half mir meine Bedenken überwinden, und so entschloss ich mich, was an mir läge, zu thun, um das Unternehmen zu einem befriedigenden Abschluss zu bringen, da Dedekind mir die Versicherung gab, mich bei der Arbeit nach Kräften zu unterstützen, ein Versprechen, welches er treulich gehalten hat.

Die von Riemann selbst oder nach seinem Tode bereits veröffentlichten Arbeiten wurden revidirt, hin und wieder durch einen im Nachlass aufgefundenen Zusatz bereichert, und in kleinen Ungenauigkeiten verbessert, sonst aber in unveränderter Form aufgenommen. Nur die Abhandlung über die Flächen vom kleinsten Inhalt hat in Folge einer von K. Hattendorff auf meinen Wunsch ausgeführten Uebersetzung einige wesentlichere Aenderungen erfahren.

Von den im Nachlass enthaltenen Entwürfen fanden sich einige in fast druckfertiger Form vor, andere aber in einem so fragmentarischen Zustande, dass die Verknüpfung und Darstellung erhebliche Schwierigkeiten machte. Von der grossen Menge nur Formeln ohne Text enthaltender Papiere war wenig für den Druck zu verwerthen.

Besonders hervorzuheben ist unter den ersteren die Arbeit über den Rückstand in der Leidener Flasche, welche Riemann schon im Anschluss an die Mittheilung in der Göttinger Naturforscher-Versammlung zur Publication vorbereitet hatte, ferner die in lateinischer Sprache geschriebene Beantwortung einer Preisfrage der Pariser Akademie über isotherme Curven, welche besonders deshalb von hohem Interesse ist, weil darin Riemann's Untersuchungen über die allgemeinen Eigenschaften der mehrfach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten in den Grundzügen niedergelegt sind und eine merkwürdige Verwendung finden.

Die Darstellung in dieser Abhandlung ist eine äusserst knappe, und die Wege, auf denen die endlichen Resultate erhalten wurden, finden sich darin nur im Allgemeinen angedeutet. Von der Ausführung einer beabsichtigten zweiten eingehenderen Darstellung des Gegenstandes wurde Riemann durch seinen Gesundheitszustand abgehalten. Dass ich im Stande bin, diese schöne Untersuchung in der letzten von Riemann herrührenden Redaction zum Abdruck zu bringen, verdanke ich der Güte des beständigen Secretärs der Pariser Akademie, Herrn Dumas, welcher auf ein Namens der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften von Herrn Wohler an ihn gerichtetes Ansuchen mit der dankenswerthesten Bereitwilligkeit mir das Originalmanuscript zur Verfügung stellte.

Von Riemann's Untersuchungen über lineare Differentialgleichungen mit algebraischen Coefficienten liegt der erste Theil in ziemlich druckfertiger Form von Riemann's Hand vor und war vermuthlich zu der Publication bestimmt, die in der Abhandlung über Abel'sche Functionen angekündigt ist, aber nicht zur Ausführung kam. Ein zweiter Theil, der die wahre Verallgemeinerung der Theorie der hypergeometrischen Reihen enthält, fand sich nur im ersten Entwurf vor, jedoch so, dass der Gedankengang vollständig hergestellt werden konnte.

Ferner ist hier noch der in italienischer Sprache geschriebene Anfang zu einer Untersuchung über die Darstellbarkeit des Quotienten zweier hypergeometrischer Reihen durch einen Kettenbruch zu erwähnen, deren Bearbeitung H. A. Schwarz in Göttingen übernommen hat, dem ich hierfür sowie für manchen Rath in anderen Stellen hier meinen Dank ausspreche.

Obwohl die Vorlesungen Riemann's dem ursprünglichen Plane nach von dieser Sammlung ausgeschlossen sind, so habe ich mich doch zur Aufnahme zweier kleinerer, in sich abgeschlossener Untersuchungen über die Convergenz der p -fach unendlichen Theta-Reihe und über die Abel'schen Functionen für den Fall $p = 3$ entschlossen, bei deren Bearbeitung ein von G. Roch geführtes Vorlesungsheft zu Grunde gelegt werden konnte, theils wegen des grossen Interesses, welches die Gegenstände haben, theils weil eine zusammenhängende Veröffentlichung dieser Vorlesungen, wie es scheint, vorläufig nicht in Aussicht steht.

Ich erwähne hier noch die den Anhang bildenden naturphilosophischen Fragmente, welche wenigstens eine ungefähre Vorstellung von dem Inhalt der Speculationen geben können, denen Riemann einen grossen Theil seiner Gedankenarbeit widmete und die ihn viele Jahre seines Lebens hindurch begleitet haben. Diese Bruchstücke dürften trotz ihrer Lückenhaftigkeit und Unvollständigkeit geeignet sein, auch in weiteren Kreisen Aufmerksamkeit zu erregen, wenn sie auch nicht viel mehr als die Anfänge und die allgemeinsten Grundzüge einer eigenthümlichen und tief sinnigen Weltanschauung enthalten.

Eine willkommene Beigabe für die Freunde und Verehrer Riemann's wird endlich die biographische Skizze sein, welche Dedekind auf meinen Wunsch auf der Grundlage von Briefen und anderen Mittheilungen der Riemann'schen Familie, unterstützt durch seine eigenen Erinnerungen verfasst hat.

Was die Anordnung des Stoffes betrifft, so ist in den beiden ersten Abtheilungen die chronologische Reihenfolge streng inne gehalten worden; in der dritten Abtheilung, welche den Nachlass enthält, konnte diese Anordnung nicht ganz consequent durchgeführt werden, theils weil sich die Entstehungszeit hier nicht immer vollständig feststellen liess, theils weil die mehr ausgeführten Untersuchungen dem Fragmentarischen vorangestellt werden sollten.

Königsberg, im März 1876. H. Weber.

VORREDE ZUR ZWEITEN AUFLAGE.

Sechzehn Jahre sind seit dem Erscheinen der ersten Auflage der Gesamtausgabe von Riemann's Werken verstrichen. Der Entwicklungsgang, den in diesem Zeitraum die mathematische Wissenschaft genommen hat, lässt vielfach und deutlich die Spuren von Riemann's Wirken erkennen; wir brauchen nur an den Ausbau der Theorie der Abel'schen Functionen und der linearen Differentialgleichungen, an die Lehre von den mehrfach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten und die nicht-euklidische Geometrie zu erinnern, die mit Allem, was damit zusammenhängt, jetzt im Vordergrund des wissenschaftlichen Interesses stehen. Nicht nur Riemann's ausgeführte Arbeiten, sondern auch manche der im Nachlass vorgefundenen, in den gesammten Werken mitgetheilten Andeutungen und Fragmente haben den Anstoss zu weitergehenden Forschungen gegeben.

Die Form und Art der Ausgabe der Gesamttwerke hat die Zustimmung der Mathematiker gefunden. Bedenken und Einwendungen, die hier und da in der Literatur hervorgetreten sind, und sich meist auf die von den Herausgebern zugefügten Noten beziehen, sind in der neuen Auflage nach Möglichkeit berücksichtigt, und erledigen sich wohl durch eine etwas ausführlichere Darstellung.

Der handschriftliche Nachlass wurde im Laufe der Jahre mehrfach und besonders bei der Vorbereitung der neuen Ausgabe einer Durchsicht unterworfen. Die Ausbeute war zwar nicht sehr gross, lieferte aber doch manchen schätzbaren Zusatz, der unter die Anmerkungen aufgenommen werden konnte. Neu hinzugefügt ist das kleine Fragment XXV über die Bewegung der Wärme im Ellipsoid, ferner ein Zusatz zu Nr. XXX (jetzt XXXI) über die quadratischen Relationen, die zwischen den Functionen φ der Theorie der Abel'schen Functionen bestehen. Dem XXV. (jetzt XXVI.) Fragment wurde ein Zusatz im Titel gegeben, wodurch deutlicher auf seine grosse allgemeine Bedeutung hingewiesen werden sollte.

Sorgfältig durchgearbeitet und erweitert sind die Anmerkungen, wodurch wir hoffen, ihre Brauchbarkeit zu erhöhen. Die Erläuterungen von Dedekind zu dem Fragment über die Grenzfälle der elliptischen Modulfunctionen sind ganz neu redigirt und erleichtern in dieser Form noch mehr den Zugang zu den Formeln Riemann's.

Auch die Erläuterungen zu Nr. XXII "Commentatio mathematica etc." sind etwas ausführlicher gestaltet worden, da die Darstellung in der ersten Auflage das Verständniss noch nicht hinlänglich zu fördern schien. Der Herausgeber hat es dagegen nicht unternommen, die Anwendung auf die Preisaufgabe der Pariser Akademie weiter zu verfolgen; auch ist ihm kein Versuch

bekannt geworden, diese Frage weiter zu fördern, so dass das Problem immer noch nicht als vollständig gelöst betrachtet werden kann. Vielleicht ermuthigen diese Zeilen jüngere Fachgenossen, die vor mühseligen Rechnungen nicht zurückschrecken, das Problem aufs Neue in Angriff zu nehmen, das nicht nur durch sich selbst, sondern besonders auch durch die tiefen und eigenartigen Hilfsmittel, die Riemann zu seiner Lösung geschaffen hat, von hohem wissenschaftlichem Werthe ist.

Marburg, im Juli 1892. H. Weber.

INHALT.

Erste Abtheilung. *Abhandlungen, die von Riemann selbst veröffentlicht sind.*

I. Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse. (Inauguraldissertation, Göttingen 1851.)

Anmerkungen zur vorstehenden Abhandlung

II. Ueber die Gesetze der Vertheilung von Spannungselectricität in ponderablen Körpern, wenn diese nicht als vollkommene Leiter oder Nichtleiter, sondern als dem Enthalten von Spannungselectricität mit endlicher Kraft widerstrebend betrachtet werden.

(Amtlicher Bericht über die 31. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Göttingen im

III. Zur Theorie der Nobili'schen Farbenringe

(Aus Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, Bd. 95. 28. März 1855.)

IV. Beiträge zur Theorie der durch die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ darstellbaren Functionen

(Aus dem siebenten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu

V. Selbstanzeige der vorstehenden Abhandlung

(Göttinger Nachrichten 1857. No. 1.)

VI. Theorie der Abel'schen Functionen

(Aus Borchardt's Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 54. 1857.)

1. Allgemeine Voraussetzungen und Hilfsmittel

2. Lehrsätze aus der analysis situs

3. Bestimmung einer Function durch Grenz- und Unstetigkeitsbedingungen

4. Theorie der Abel'schen Functionen

VII. Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse

(Monatsberichte der Berliner Akademie, November 1859.)

VIII. Ueber die Fortpflanzung ebener Luftwellen von endlicher Schwingungsweite

(Aus dem achten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen

IX. Selbstanzeige der vorstehenden Abhandlung

X. Ein Beitrag zu den Untersuchungen über die Bewegung eines flüssigen gleichartigen Ellipsoides

XI. Ueber das Verschwinden der Theta-Functionen

(Aus Borchardt's Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 65. 1865.)

Zweite Abtheilung. *Abhandlungen, die nach Riemann's Tode bereits
herausgegeben sind.*

XII. Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigono- metrische Reihe (Habilitationsschrift, 1854.)	45
XIII. Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen (Habilitationsschrift, 1854.)	45
XIV. Ein Beitrag zur Electrodynamik (1858.)	45
XV. Beweis des Satzes, dass eine einwerthige mehr als $2n$ fach periodische Function von n Veränderlichen unmöglich ist	45
XVI. Estratto di una lettera scritta in lingua Italiana il dì 21. Gen- naio 1864 al Sig. Professore Enrico Betti	45
XVII. Ueber die Fläche vom kleinsten Inhalt bei gegebener Be- grenzung	45
XVIII. Mechanik des Ohres	45

Dritte Abtheilung. *Nachlass.*

XIX. Versuch einer allgemeinen Auffassung der Integration und Differentiation. (1847.)	45
XX. Neue Theorie des Rückstandes in electrischen Bindungsapparaten. (1854.)	45
XXI. Zwei allgemeine Lehrsätze über lineare Differentialgleichungen mit algebraischen Coefficienten. (20. Febr. 1857.)	45
XXII. Commentatio mathematica, qua respondere tentatur quaestioni ab Ill ^{ma} Academia Parisiensi propositae	45
XXIII. Sullo svolgimento del quoziente di due serie ipergeometriche in frazione continua infinita. (1863.)	45
XXIV. Ueber das Potential eines Ringes	45
XXV. Verbreitung der Wärme im Ellipsoid	45
XXVI. Gleichgewicht der Electricität auf Cylindern	45
XXVII. Beispiele von Flächen kleinsten Inhalts bei gegebener Begrenzung	45
XXVIII. Fragmente über die Grenzfälle der elliptischen Modulfunctionen. (1852.)	45
XXIX. Fragment aus der Analysis Situs	45
XXX. Convergenz der p -fach unendlichen Theta-Reihe	45
XXXI. Zur Theorie der Abel'schen Functionen	45

Anhang.

Fragmente philosophischen Inhalts.

I. Zur Psychologie und Metaphysik	45
II. Erkenntnisstheoretisches	45
III. Naturphilosophie	45

Bernhard Riemann's Lebenslauf	45
-------------------------------	----

Erste Abtheilung.

RIEMANN'S GESAMMELTE MATHEMATISCHE WERKE.

I.

Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse.

*(Inauguraldissertation, Göttingen, 1851; zweiter unveränderter Abdruck,
Göttingen 1867.)*

1.

Denkt man sich unter z eine veränderliche Grösse, welche nach und nach alle möglichen reellen Werthe annehmen kann, so wird, wenn jedem ihrer Werthe ein einziger Werth der unbestimmten Grösse w entspricht, w eine Function von z genannt, und wenn, während z alle zwischen zwei festen Werthen gelegenen Werthe stetig durchläuft, w ebenfalls stetig sich ändert, so heisst diese Function innerhalb dieses Intervalls stetig oder continuirlich.¹

Die Abhängigkeit der Grösse w von z kann durch ein mathematisches Gesetz gegeben sein, so dass durch bestimmte Grössenoperationen zu jedem Werthe von z das ihm entsprechende w gefunden wird. Die Fähigkeit, für alle innerhalb eines gegebenen Intervalls liegenden Werthe von z durch dasselbe Abhängigkeitsgesetz bestimmt zu werden, schrieb man früher nur einer gewissen Gattung von Functionen zu (*functiones continuæ* nach Euler's Sprachgebrauch); neuere Untersuchungen haben indess gezeigt, dass es

¹Diese Definition setzt offenbar zwischen den einzelnen Werten der Function durchaus kein Gesetz fest, indem, wenn über diese Function für ein bestimmtes Intervall verfügt ist, die Art ihrer Fortsetzung ausserhalb desselben ganz der Willkür überlassen bleibt.

analytische Ausdrücke giebt, durch welche eine jede stetige Function für ein gegebenes Intervall dargestellt werden kann. Es ist daher einerlei, ob man die Abhängigkeit der Grösse w von der Grösse z als eine willkürlich gegebene oder als eine durch bestimmte Grössenoperationen bedingte definirt. Beide Begriffe sind in Folge der erwähnten Theoreme congruent.

Anders verhält es sich aber, wenn die Veränderlichkeit der Grösse z nicht auf reelle Werthe beschränkt wird, sondern auch complexe von der Form $x + yi$ (wo $i = \sqrt{-1}$) zugelassen werden.

Es seien $x + yi$ und $x + yi + dx + dy \cdot i$ zwei unendlich wenig verschiedene Werthe der Grösse z , welchen die Werthe $u + vi$ und $u + vi + du + dv \cdot i$ der Grösse w entsprechen. Alsdann wird, wenn die Abhängigkeit der Grösse w von z eine willkürlich angenommene ist, das Verhältniss $\frac{dw}{dz} = \frac{du + dv \cdot i}{dx + dy \cdot i}$ sich mit den Werthen von dx und dy , allgemein zu reden, ändern, indem, wenn man $dx + dy \cdot i = \varepsilon e^{\varphi i}$ setzt,

$$\frac{du + dv \cdot i}{dx + dy \cdot i} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) i + \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) i \right] \frac{dx - dy \cdot i}{dx + dy \cdot i}$$

oder

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) i + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right) i \right] e^{-2\varphi i}$$

wird. Auf welche Art aber auch w als Function von z durch Verbindung der einfachen Grössenoperationen bestimmt werden möge, immer wird der Werth des Differentialquotienten $\frac{dw}{dz}$ von dem besondern Werthe des Differentials dz unabhängig sein.² Offenbar kann also auf diesem Wege nicht jede beliebige Abhängigkeit der complexen Grösse w von der complexen Grösse z ausgedrückt werden.

Das eben hervorgehobene Merkmal aller irgendwie durch Grössenoperationen bestimmbaren Functionen werden wir für die folgende Untersuchung, wo eine solche Function unabhängig von ihrem Ausdrucke betrachtet werden soll, zu Grunde legen, indem wir, ohne jetzt dessen Allgemeingültigkeit und Zulänglichkeit für den Begriff einer durch Grössenoperationen ausdrückbaren Abhängigkeit zu beweisen, von folgender Definition ausgehen:

Eine veränderliche complexe Grösse w heisst eine Function einer andern veränderlichen complexen Grösse z , wenn sie mit ihr sich so ändert, dass

²Diese Behauptung ist offenbar in allen Fällen gerechtfertigt, wo sich aus dem Ausdrucke von w durch z mittelst der Regeln der Differentiation ein Ausdruck von $\frac{dw}{dz}$ durch z finden lässt; ihre streng allgemeine Gültigkeit bleibt für jetzt dahin gestellt.

der Werth des Differentialquotienten $\frac{dw}{dz}$ unabhängig von dem Werthe des Differentials dz ist.

Sowohl die Grösse z , als die Grösse w werden als veränderliche Grössen betrachtet, die jeden complexen Werth annehmen können.

Die Auffassung einer solchen Veränderlichkeit, welche sich auf ein zusammenhängendes Gebiet von zwei Dimensionen erstreckt, wird wesentlich erleichtert durch eine Anknüpfung an räumliche Anschauungen.

Man denke sich jeden Werth $x + yi$ der Grösse z repräsentirt durch einen Punkt O der Ebene A , dessen rechtwinklige Coordinaten x, y , jeden Werth $u + vi$ der Grösse w durch einen Punkt Q der Ebene B , dessen rechtwinklige Coordinaten u, v sind. Eine jede Abhängigkeit der Grösse w von z wird sich dann darstellen als eine Abhängigkeit der Lage des Punktes Q von der des Punktes O . Entspricht jedem Werthe von z ein bestimmter mit z stetig sich ändernder Werth von w , mit andern Worten, sind u und v stetige Functionen von x, y , so wird jedem Punkte der Ebene A ein Punkt der Ebene B , jeder Linie, allgemein zu reden, eine Linie, jedem zusammenhängenden Flächenstücke ein zusammenhängendes Flächenstück entsprechen. Man wird sich also diese Abhängigkeit der Grösse w von z vorstellen können als eine *Abbildung der Ebene A auf der Ebene B*.

2.

Es soll nun untersucht werden, welche Eigenschaft diese Abbildung erhält, wenn w eine Function der complexen Grösse z , d. h. wenn $\frac{dw}{dz}$ von dz unabhängig ist.

Wir bezeichnen durch o einen unbestimmten Punkt der Ebene A in der Nähe von O , sein Bild in der Ebene B durch q , ferner durch $x + yi + dx + dy \cdot i$ und $u + vi + du + dv \cdot i$ die Werthe der Grössen z und w in diesen Punkten.

Es können dann dx, dy und du, dv als rechtwinklige Coordinaten der Punkte o und q in Bezug auf die Punkte O und Q als Anfangspunkte angesehen werden, und wenn man $dx + dy \cdot i = \varepsilon e^{\varphi i}$ und $du + dv \cdot i = \eta e^{\psi i}$ setzt, so werden die Grössen $\varepsilon, \varphi, \eta, \psi$ Polarcoordinaten dieser Punkte für dieselben Anfangspunkte sein.

Sind nun o' und o'' irgend zwei bestimmte Lagen des Punktes o in unendlicher Nähe von O , und drückt man die von ihnen abhängigen Bedeutungen der übrigen Zeichen durch entsprechende Indices aus, so giebt die Voraussetzung

$$\frac{du' + dv' \cdot i}{dx' + dy' \cdot i} = \frac{du'' + dv'' \cdot i}{dx'' + dy'' \cdot i}$$

und folglich

$$\frac{du' + dv' \cdot i}{du'' + dv'' \cdot i} = \frac{\varepsilon' e^{\varphi' i}}{\varepsilon'' e^{\varphi'' i}} = \frac{\varepsilon'}{\varepsilon''} e^{(\varphi' - \varphi'') i}$$

und

$$\frac{dx' + dy' \cdot i}{dx'' + dy'' \cdot i} = \frac{\eta' e^{\psi' i}}{\eta'' e^{\psi'' i}} = \frac{\eta'}{\eta''} e^{(\psi' - \psi'') i},$$

woraus $\frac{\varepsilon'}{\varepsilon''} = \frac{\eta'}{\eta''}$ und $\varphi' - \varphi'' = \psi' - \psi''$, d. h. in den Dreiecken oOo'' und qQq'' sind die Winkel oOo'' und qQq'' gleich und die sie einschliessenden Seiten einander proportional.

Es findet also zwischen zwei einander entsprechenden unendlich kleinen Dreiecken und folglich allgemein zwischen den kleinsten Theilen der Ebene A und ihres Bildes auf der Ebene B Aehnlichkeit Statt. Eine Ausnahme von diesem Satze tritt nur in den besonderen Fällen ein, wenn die einander entsprechenden Aenderungen der Grössen z und w nicht in einem endlichen Verhältnisse zu einander stehen, was bei Herleitung desselben stillschweigend vorausgesetzt ist.³

3.

Bringt man den Differentialquotienten $\frac{dw}{dz} = \frac{du+dv \cdot i}{dx+dy \cdot i}$ in die Form

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} i \right) + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) i \cdot \frac{dx - dy \cdot i}{dx + dy \cdot i},$$

so erhellt, dass er und zwar nur dann für je zwei Werthe dx und dy denselben Werth haben wird, wenn

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{und} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

ist.

Diese Bedingungen sind also hinreichend und nothwendig, damit $w = u + vi$ eine Function von $z = x + yi$ sei. Für die einzelnen Glieder dieser Function fliessen aus ihnen die folgenden:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0,$$

welche für die Untersuchung der Eigenschaften, die Einem Gliede einer solchen Function einzeln betrachtet zukommen, die Grundlage bilden. Wir werden den Beweis für die wichtigsten dieser Eigenschaften einer eingehenderen

³Ueber diesen Gegenstand sehe man: "Allgemeine Auflösung der Aufgabe: Die Theile einer gegebenen Fläche so abzubilden, dass die Abbildung dem Abgebildeten in den kleinsten Theilen ähnlich wird, von C. F. Gauss. (Als Beantwortung der von der königlichen Societät der Wissenschaften in Copenhagen für 1822 aufgegebenen Preisfrage, abgedruckt in: "Astronomische Abhandlungen, herausgegeben von Schumacher. Drittes Heft. Altona. 1825.") (Gauss Werke Bd. IV, p. 189.)

Betrachtung der vollständigen Function vorausgehen lassen, zuvor aber noch einige Punkte, welche allgemeineren Gebieten angehören, erörtern und festlegen, um uns den Boden für jene Untersuchungen zu ebenen.

4.

Für die folgenden Betrachtungen beschränken wir die Veränderlichkeit der Grössen x, y auf ein endliches Gebiet, indem wir als Ort des Punktes O nicht mehr die Ebene A selbst, sondern eine über dieselbe ausgebreitete Fläche T betrachten. Wir wählen diese Einkleidung, bei der es unanstössig sein wird, von auf einander liegenden Flächen zu reden, um die Möglichkeit offen zu lassen, dass der Ort des Punktes O über denselben Theil der Ebene sich mehrfach erstrecke, setzen jedoch für einen solchen Fall voraus, dass die auf einander liegenden Flächentheile nicht längs einer Linie zusammenhängen, so dass eine Umfaltung der Fläche, oder eine Spaltung in auf einander liegende Theile nicht vorkommt.

Die Anzahl der in jedem Theile der Ebene auf einander liegenden Flächentheile ist alsdann vollkommen bestimmt, wenn die Begrenzung der Lage und dem Sinne nach (d. h. ihre innere und äussere Seite) gegeben ist; ihr Verlauf kann sich jedoch noch verschieden gestalten.

In der That, ziehen wir durch den von der Fläche bedeckten Theil der Ebene eine beliebige Linie l , so ändert sich die Anzahl der über einander liegenden Flächentheile nur beim Ueberschreiten der Begrenzung, und zwar beim Uebertritt von Aussen nach Innen um $+1$, im entgegengesetzten Falle um -1 , und ist also überall bestimmt. Längs des Ufers dieser Linie setzt sich nun jeder angrenzende Flächentheil auf ganz bestimmte Art fort, so lange die Linie die Begrenzung nicht trifft, da eine Unbestimmtheit jedenfalls nur in einem einzelnen Punkte und also entweder in einem Punkte der Linie selbst oder in einer endlichen Entfernung von derselben Statt hat; wir können daher, wenn wir unsere Betrachtung auf einen im Innern der Fläche verlaufenden Theil der Linie l und zu beiden Seiten auf einen hinreichend kleinen Flächenstreifen beschränken, von bestimmten angrenzenden Flächentheilen reden, deren Anzahl auf jeder Seite gleich ist, und die wir, indem wir der Linie eine bestimmte Richtung beilegen, auf der Linken mit $a_1, a_2, \dots, a_n$ und auf der Rechten mit $a'_1, a'_2, \dots, a'_n$ bezeichnen.

Jeder Flächentheil a wird sich dann in einen der Flächentheile a' fortsetzen; dieser wird zwar im Allgemeinen für den ganzen Lauf der Linie l derselbe sein, kann sich jedoch für besondere Lagen von l in einem ihrer Punkte ändern. Nehmen wir an, dass oberhalb eines solchen Punktes π (d. h. längs des vorhergehenden Theils von l) mit den Flächentheilen $a_1, a_2, \dots, a_n$ der Reihe nach die Flächentheile $a'_1, a'_2, \dots, a'_n$ verbunden seien, unterhalb desselben aber die Flächentheile $a'_{\alpha_1}, a'_{\alpha_2}, \dots, a'_{\alpha_n}$, wo $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ nur in der

Anordnung von $1, 2, \dots, n$ verschieden sind, so wird ein oberhalb π von a_1 in a'_1 eintretender Punkt, wenn er unterhalb π auf die linke Seite zurücktritt, in den Flächentheil a'_{α_1} gelangen, und wenn er den Punkt π von der Linken zur Rechten⁴ umkreiset, wird der Index des Flächentheils, in welchem er sich befindet, der Reihe nach die Zahlen

$$1, \alpha_1, \alpha_{\alpha_1}, \dots$$

durchlaufen.

In dieser Reihe sind, so lange das Glied 1 nicht wiederkehrt, nothwendig alle Glieder von einander verschieden, weil einem beliebigen mittlern Gliede α_μ nothwendig α_μ und nach einander alle früheren Glieder bis 1 in unmittelbarer Folge vorhergehen; wenn aber nach einer Anzahl von Gliedern, die offenbar kleiner als n sein muss und $= m$ sei, das Glied 1 wiederkehrt, so müssen die übrigen Glieder in derselben Ordnung folgen. Der um π sich bewegendende Punkt kommt alsdann nach je m Umläufen in denselben Flächentheil zurück und ist auf m der auf einander liegenden Flächentheile eingeschränkt, welche sich über π zu einem einzigen Punkte vereinigen. Wir nennen diesen Punkt einen *Windungspunkt* $(m - 1)$ ter *Ordnung* der Fläche T .

Durch Anwendung desselben Verfahrens auf die übrigen $n - m$ Flächentheile werden diese, wenn sie nicht gesondert verlaufen, in Systeme von $m_1, m_2, \dots$ Flächentheilen zerfallen, in welchem Falle auch noch Windungspunkte $(m_1 - 1)$ ter, $(m_2 - 1)$ ter $\dots$ Ordnung in dem Punkte π liegen.

Wenn die Lage und der Sinn der Begrenzung von T und die Lage ihrer Windungspunkte gegeben ist, so ist T entweder vollkommen bestimmt oder doch auf eine endliche Anzahl verschiedener Gestalten beschränkt; Letzteres, in so fern sich diese Bestimmungsstücke auf verschiedene der auf einander liegenden Flächentheile beziehen können.

5.

Eine veränderliche Grösse, die für jeden Punkt O der Fläche T , allgemein zu reden, d. h. ohne eine Ausnahme in einzelnen Linien und Punkten⁵ auszu-schliessen, Einen bestimmten mit der Lage desselben stetig sich ändernden

⁴In dem gewöhnlichen Sinne, wenn nämlich die x -Axe mit der y -Axe zusammenfällt, wenn man von der positiven Seite der ersteren um den Anfangspunkt herum auf die negative kommt.

⁵Diese Beschränkung ist zwar nicht durch den Begriff einer Function an sich geboten, aber um Infinitesimalrechnung auf sie anwenden zu können erforderlich: eine Function, die in allen Punkten einer Fläche unstetig ist, wie z. B. eine Function, die für ein commensurables x und ein commensurables y den Werth 1, sonst aber den Werth 2 hat, kann weder einer Differentiation, noch einer Integration, also (unmittelbar) der Infinitesimalrechnung überhaupt nicht unterworfen werden. Die für die Fläche T hier willkürlich gemachte Beschränkung wird sich später (Art. 15) rechtfertigen.

Werth annimmt, kann offenbar als eine Function von x, y angesehen werden, und überall, wo in der Folge von Functionen von x, y die Rede sein wird, werden wir den Begriff derselben auf diese Art festlegen.

Ehe wir uns jedoch zur Betrachtung solcher Functionen wenden, schalten wir noch einige Erörterungen über den Zusammenhang einer Fläche ein. Wir beschränken uns dabei auf solche Flächen, die sich nicht längs einer Linie spalten.

Wir betrachten zwei Flächentheile als zusammenhängend oder Einem Stücke angehörig, wenn sich von einem Punkte des einen durch das Innere der Fläche eine Linie nach einem Punkte des andern ziehen lässt, als getrennt, wenn diese Möglichkeit nicht Statt findet.

Die Untersuchung des Zusammenhangs einer Fläche beruht auf ihrer Zerlegung durch *Querschnitte*, d. h. Linien, welche von einem Begrenzungspunkte das Innere einfach—keinen Punkt mehrfach—bis zu einem Begrenzungspunkte durchschneiden. Letzterer kann auch in dem zur Begrenzung hinzugekommenen Theile, also in einem frühern Punkte des Querschnitts, liegen.

Eine zusammenhängende Fläche heisst, wenn sie durch jeden Querschnitt in Stücke zerfällt, eine *einfach zusammenhängende*, andernfalls eine *mehrfach zusammenhängende*.

Lehrsatz (I.). *Eine einfach zusammenhängende Fläche A zerfällt durch jeden Querschnitt ab in zwei einfach zusammenhängende Stücke.*

Gesetzt, eins dieser Stücke würde durch einen Querschnitt cd nicht zerstückt, so erhielte man offenbar, je nachdem keiner seiner Endpunkte oder der Endpunkt c oder beide Endpunkte in ab fielen, durch Herstellung der Verbindung längs der ganzen Linie ab oder längs des Theils cb oder des Theils cd derselben eine zusammenhängende Fläche, welche durch einen Querschnitt aus A entstände, gegen die Voraussetzung.

Lehrsatz (II.). *Wenn eine Fläche T durch n_1 Querschnitte q_1 in ein System T_1 von m_1 einfach zusammenhängenden Flächenstücken und durch n_2 Querschnitte q_2 in ein System T_2 von m_2 Flächenstücken zerfällt, so kann $n_2 - m_2$ nicht $> n_1 - m_1$ sein.*

Jede Linie q_2 bildet, wenn sie nicht ganz in das Querschnittssystem q_1 fällt, zugleich einen oder mehrere Querschnitte q_1 der Fläche T_1 . Als Endpunkte der Querschnitte q_2 sind anzusehen:

- 1) die $2n_2$ Endpunkte der Querschnitte q_2 , ausgenommen, wenn ihre Enden mit einem Theil des Liniensystems q_1 zusammenfallen,

- 2) jeder mittlere Punkt eines Querschnitts q_1 , in welchem er in einen mittlern Punkt einer Linie q_2 eintritt, ausgenommen, wenn er sich schon in einer andern Linie q_1 befindet, d. h. wenn ein Ende eines Querschnitts q_2 mit ihm zusammenfällt.

Bezeichnet nun μ , wie oft Linien beider Systeme während ihres Laufes zusammentreffen oder auseinandergehen (wo also ein einzelner gemeinsamer Punkt doppelt zu rechnen ist), ν_1 , wie oft ein Endstück der q_1 mit einem mittleren Stücke der q_2 , ν_2 , wie oft ein Endstück der q_2 mit einem mittleren Stücke der q_1 , endlich ν_3 , wie oft ein Endstück der q_2 mit einem Endstücke der q_1 zusammenfällt, so liefert Nr. 1 $2n_2 - \nu_1 - \nu_3$ und Nr. 2 $\mu - \nu_2$ Endpunkte der Querschnitte q_2 ; beide Fälle zusammengekommen aber umfassen sämtliche Endpunkte und jeden nur einmal, und die Anzahl dieser Querschnitte ist daher

$$\frac{2n_2 - \nu_1 - \nu_3 + \mu - \nu_2}{2} = n_2 + s.$$

Durch ganz ähnliche Schlüsse ergibt sich die Anzahl der Querschnitte der Fläche T_2 , welche durch die Linien q_1 gebildet werden,

$$= \frac{2n_1 - \nu_2 - \nu_3 + \mu - \nu_1}{2} = n_1 + s.$$

Die Fläche T_2 wird nun offenbar durch die $n_1 + s$ Querschnitte q_1 in dieselbe Fläche verwandelt, in welche T_1 durch die $n_2 + s$ Querschnitte q_2 zerfällt wird. Es besteht aber T_1 aus m_1 einfach zusammenhängenden Stücken und zerfällt daher nach Satz I durch $n_1 + s$ Querschnitte in $m_1 + n_1 + s$ Flächenstücke; folglich müsste, wäre $m_2 < m_1 + n_1 - n_2$, die Zahl der Flächenstücke T_2 durch $n_1 + s$ Querschnitte um mehr als $n_1 + s$ vermehrt werden, was ungereimt ist.⁶

Zufolge dieses Lehrsatzes ist, wenn die Anzahl der Querschnitte unbestimmt durch n , die Anzahl der Stücke durch m bezeichnet wird, $n - m$ für alle Zerlegungen einer Fläche in einfach zusammenhängende Stücke constant; denn betrachten wir irgend zwei bestimmte Zerlegungen durch n_1 Querschnitte in m_1 Stücke und durch n_2 Querschnitte in m_2 Stücke, so muss, wenn erstere einfach zusammenhängend sind, $n_2 - m_2 < n_1 - m_1$, und wenn letztere einfach zusammenhängend sind, $n_1 - m_1 < n_2 - m_2$ sein; also wenn Beides zutrifft, $n_2 - m_2 = n_1 - m_1$ sein.

Diese Zahl kann füglich mit dem Namen "Ordnung des Zusammenhangs" einer Fläche belegt werden; sie wird

⁶Unter einer Zerlegung durch mehrere Querschnitte ist stets eine successive zu verstehen, d. h. eine solche, wo die durch einen Querschnitt entstandene Fläche durch einen neuen Querschnitt weiter zerlegt wird.

- durch jeden Querschnitt um 1 erniedrigt—nach der Definition—,
- durch eine von einem Innern Punkte das Innere einfach bis zu einem Begrenzungspunkte oder einem frühern Schnittpunkte durchschneidende Linie nicht geändert und
- durch einen Innern allenthalben einfachen in zwei Punkten endenden Schnitt um 1 erhöht,

weil erstere durch Einen, letztere aber durch zwei Querschnitte in Einen Querschnitt verwandelt werden kann.

Endlich wird die Ordnung des Zusammenhangs einer aus mehreren Stücken bestehenden Fläche erhalten, wenn man die Ordnungen des Zusammenhangs dieser Stücke zu einander addirt.

Wir werden uns indess in der Folge meistens auf eine aus Einem Stücke bestehende Fläche beschränken, und uns für ihren Zusammenhang der kunstloseren Bezeichnung eines *einfachen*, *zweifachen* etc. bedienen, indem wir unter einer *nfach zusammenhängenden* Fläche eine solche verstehen, die durch $n - 1$ Querschnitte in eine einfach zusammenhängende zerlegbar ist.

In Bezug auf die Abhängigkeit des Zusammenhangs der Begrenzung von dem Zusammenhang einer Fläche erhellt leicht:

- 1) Die Begrenzung einer einfach zusammenhängenden Fläche besteht notwendig aus Einer in sich zurücklaufenden Linie.

Bestände die Begrenzung aus getrennten Stücken, so würde ein Querschnitt q , der einen Punkt eines Stücks a mit einem Punkte eines andern b verbinden würde, nur zusammenhängende Flächentheile von einander scheiden, da sich im Innern der Fläche längs a eine Linie von der einen Seite des Querschnitts q an die entgegengesetzte führen liesse; und folglich würde q die Fläche nicht zerstückeln, gegen die Voraussetzung.

- 2) Durch jeden Querschnitt wird die Anzahl der Begrenzungsstücke entweder um 1 vermindert oder um 1 vermehrt.

Ein Querschnitt q verbindet entweder einen Punkt eines Begrenzungsstücks a mit einem Punkte eines andern b ,—in diesem Falle bilden alle diese Linien zusammengenommen in der Folge a, q, b, q ein einziges in sich zurücklaufendes Stück der Begrenzung—oder er verbindet zwei Punkte eines Stücks der Begrenzung,—in diesem Falle zerfällt dieses durch seine beiden Endpunkte in zwei Stücke, deren jedes mit dem Querschnitte zusammengenommen ein in sich zurücklaufendes Begrenzungsstück bildet—oder endlich, er endet in einem seiner früheren

Punkte und kann betrachtet werden als zusammengesetzt aus einer in sich zurücklaufenden Linie o und einer andern l , welche einen Punkt von o mit einem Punkte eines Begrenzungsstücks a verbindet,—in welchem Falle o eines Theils, und a, l, o, l andern Theils je ein in sich zurücklaufendes Begrenzungsstück bilden.

Es treten also entweder—im erstem Falle—an die Stelle zweier Ein, oder—in den beiden letzteren Fällen—an die Stelle Eines zwei Begrenzungsstücke, woraus unser Satz folgt.

Die Anzahl der Stücke, aus welchen die Begrenzung eines n fach zusammenhängenden Flächenstücks besteht, ist daher entweder $= n$ oder um eine gerade Zahl kleiner.

Hieraus ziehen wir noch das Corollar:

Wenn die Anzahl der Begrenzungsstücke einer n fach zusammenhängenden Fläche $= n$ ist, so zerfällt diese durch jeden überall einfachen im Innern in sich zurücklaufenden Schnitt in zwei getrennte Stücke.

Denn die Ordnung des Zusammenhangs wird dadurch nicht geändert, die Anzahl der Begrenzungsstücke um 2 vermehrt; die Fläche würde also, wenn sie eine zusammenhängende wäre, einen n fachen Zusammenhang und $n + 2$ Begrenzungsstücke haben, was unmöglich ist.

6.

Sind X und Y zwei in allen Punkten der über A ausgebreiteten Fläche T stetige Functionen von x, y , so ist das über alle Elemente dT dieser Fläche ausgedehnte Integral

$$\int \left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} \right) dT = - \int (X \cos \xi + Y \cos \eta) ds,$$

wenn in jedem Punkte der Begrenzung die Neigung einer auf sie nach Innen gezogenen Normale gegen die x -Axe durch ξ , gegen die y -Axe durch η bezeichnet wird, und sich diese Integration auf sämtliche Elemente ds der Begrenzungslinie erstreckt.

In der That, wir denken uns den von der Fläche T bedeckten Theil der Ebene A durch ein System der y -Axe paralleler Linien in Elementarstreifen, und zwar so, dass jeder Windungspunkt der Fläche T in eine dieser Linien fällt. Unter dieser Voraussetzung besteht der auf jeden derselben fallende Theil von T aus einem oder mehreren abgesondert verlaufenden trapezförmigen Stücken. Der Beitrag eines unbestimmten dieser Flächenstreifen, welcher aus der y -Axe das Element dy ausscheidet, zu dem Werthe $\int \frac{\partial X}{\partial x} dT$ wird dann offenbar $= dy \int \frac{\partial X}{\partial x} dx$, wenn diese Integration durch diejenige

oder diejenigen der Fläche T angehörigen geraden Linien ausgedehnt wird, welche auf eine durch einen Punkt von dy gehende Normale fallen.

Sind nun die unteren Endpunkte derselben (d. h. welchen die kleinsten Werthe von x entsprechen) $O^I, O^{II}, O^{III}, \dots$, die oberen $O', O'', O''', \dots$ und bezeichnen wir mit $X^I, X^{II}, \dots, X', X'', \dots$ die Werthe von X in diesen Punkten, mit $ds^I, ds^{II}, \dots, ds', ds'', \dots$ die entsprechenden von dem Flächenstreifen aus der Begrenzung ausgeschiedenen Elemente, mit $\xi^I, \xi^{II}, \dots, \xi', \xi'', \dots$ die Werthe von ξ an diesen Elementen, so wird

$$\int \frac{\partial X}{\partial x} dx = -X^I - X^{II} - X^{III} - \dots + X' + X'' + X''' + \dots$$

Die Winkel ξ werden offenbar spitz an den unteren, stumpf an den oberen Endpunkten, und es wird daher

$$dy \cos \xi^I ds^I = dy \cos \xi^{II} ds^{II} = \dots = -dy \cos \xi' ds' = -dy \cos \xi'' ds'' = \dots$$

Durch Substitution dieser Werthe ergibt sich

$$\int \frac{\partial X}{\partial x} dT = - \int X \cos \xi ds,$$

wo sich die Summation auf alle Begrenzungselemente bezieht, welche in der y -Axe dy zur Projection haben.

Durch Integration über sämmtliche in Betracht kommende dy werden offenbar sämmtliche Elemente der Fläche T und sämmtliche Elemente der Begrenzung erschöpft, und man erhält daher, in diesem Umfange genommen,

$$\int \frac{\partial X}{\partial x} dT = - \int X \cos \xi ds.$$

Durch ganz ähnliche Schlüsse findet man

$$\int \frac{\partial Y}{\partial y} dT = - \int Y \cos \eta ds$$

und folglich

$$\int \left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} \right) dT = - \int (X \cos \xi + Y \cos \eta) ds, \quad \text{w. z. b. w.}$$

7.

Bezeichnen wir in der Begrenzungslinie, von einem festen Anfangspunkte aus in einer bestimmten später festzusetzenden Richtung gerechnet, die Länge derselben bis zu einem unbestimmten Punkte O_0 durch s , und in der in

diesem Punkte O_0 errichteten Normalen die Entfernung eines unbestimmten Punktes O von demselben und zwar nach Innen zu als positiv betrachtet durch p , so können offenbar die Werthe von x und y im Punkte O als Functionen von s und p angesehen werden, und es werden dann in den Punkten der Begrenzungslinie die partiellen Differentialquotienten

$$\frac{\partial x}{\partial s} = \cos \xi, \quad \frac{\partial y}{\partial s} = \cos \eta, \quad \frac{\partial x}{\partial p} = \cos \xi, \quad \frac{\partial y}{\partial p} = \cos \eta,$$

wo die oberen Zeichen gelten, wenn die Richtung, in welcher die Grösse s als wachsend betrachtet wird, mit p einen gleichen Winkel einschliesst, wie die x -Axe mit der y -Axe, wenn einen entgegengesetzten, die unteren. Wir werden diese Richtung in allen Theilen der Begrenzung so annehmen, dass $\frac{\partial x}{\partial s} = \frac{\partial y}{\partial p}$ und folglich $\frac{\partial x}{\partial p} = -\frac{\partial y}{\partial s}$ ist, was die Allgemeinheit unserer Resultate im Wesentlichen nicht beeinträchtigt.

Offenbar können wir diese Bestimmungen auch auf Linien im Innern von T ausdehnen; nur haben wir hier zur Bestimmung der Vorzeichen von dp und ds , wenn deren gegenseitige Abhängigkeit wie dort festgesetzt wird, noch eine Angabe hinzuzufügen, welche entweder das Vorzeichen von dp oder von ds festsetzt; und zwar werden wir bei einer in sich zurücklaufenden Linie angeben, von welchem der durch sie geschiedenen Flächentheile sie als Begrenzung gelten solle, wodurch das Vorzeichen von dp bestimmt wird, bei einer nicht in sich zurücklaufenden aber ihren Anfangspunkt, d. h. den Endpunkt, wo s den kleinsten Werth annimmt.

Die Einführung der für $\cos \xi$ und $\cos \eta$ erhaltenen Werthe in die im vorigen Art. bewiesene Gleichung giebt, in demselben Umfange wie dort genommen,

$$\int \left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} \right) dT = - \int \left(X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p} \right) ds = \int \left(X \frac{\partial y}{\partial s} - Y \frac{\partial x}{\partial s} \right) ds.$$

8.

Durch Anwendung des Satzes am Schlüsse des vorigen Art. auf den Fall, wo in allen Theilen der Fläche $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} = 0$ ist, erhalten wir folgende Sätze:

I. Sind X und Y zwei in allen Punkten von T endliche und stetige und der Gleichung $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} = 0$ genügende Functionen, so ist, durch die ganze Begrenzung von T ausgedehnt,

$$\int \left(X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p} \right) ds = 0.$$

Denkt man sich eine beliebige über A ausgestreckte Fläche T_1 in zwei Stücke T_2 und T_3 auf beliebige Art zerfällt, so kann das Integral $\int (X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p}) ds$

in Bezug auf die Begrenzung von T_1 betrachtet werden als die Differenz der Integrale in Bezug auf die Begrenzung von T_2 und in Bezug auf die Begrenzung von T_3 , indem, wo T_2 sich bis zur Begrenzung von T_1 erstreckt, beide Integrale sich aufheben, alle übrigen Elemente aber einem Elemente der Begrenzung von T_1 entsprechen.

Mittelst dieser Umformung ergibt sich aus I.:

II. Der Werth des Integrals $\int (X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p}) ds$, durch die ganze Begrenzung einer über A ausgebreiteten Fläche erstreckt, bleibt bei beliebiger Erweiterung oder Verengung derselben constant, wenn nur dadurch keine Flächentheile ein- oder austreten, innerhalb welcher die Voraussetzungen des Satzes I. nicht erfüllt sind.

Wenn die Functionen X, Y zwar in jedem Theile der Fläche T der vorgeschriebenen Differentialgleichung genügen, aber in einzelnen Linien oder Punkten mit einer Unstetigkeit behaftet sind, so kann man jede solche Linie und jeden solchen Punkt mit einem beliebig kleinen Flächentheil als Hülle umgeben und erhält dann durch Anwendung des Satzes II:

III. Das Integral $\int (X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p}) ds$ in Bezug auf die ganze Begrenzung von T ist gleich der Summe der Integrale $\int (X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p}) ds$ in Bezug auf die Umgrenzungen aller Unstetigkeitsstellen, und zwar behält in Bezug auf jede einzelne dieser Stellen das Integral denselben Werth, in wie enge Grenzen man sie auch einschliessen möge.

Dieser Werth ist für einen blossen Unstetigkeitspunkt nothwendig gleich Null, wenn mit der Entfernung ϱ des Punktes O von demselben zugleich ϱX und ϱY unendlich klein werden; denn führt man in Bezug auf einen solchen Punkt als Anfangspunkt und eine beliebige Anfangsrichtung Polarcoordinaten ϱ, φ ein und wählt zur Umgrenzung einen um denselben mit dem Radius ϱ beschriebenen Kreis, so wird das auf ihn bezügliche Integral durch

$$\int_0^{2\pi} \left(X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p} \right) \varrho d\varphi$$

ausgedrückt und kann folglich nicht einen von Null verschiedenen Werth α haben, weil, was auch α sei, ϱ immer so klein angenommen werden wird, dass $(X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p}) \varrho$ für jeden Werth von φ kleiner als $\frac{\alpha}{2\pi}$ und folglich

$$\int_0^{2\pi} \left(X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p} \right) \varrho d\varphi < \alpha$$

wird.

IV. Ist in einer einfach zusammenhängenden über A ausgebreiteten Fläche für jeden Flächentheil das durch dessen ganze Begrenzung erstreckte Integral

$$\int \left(X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p} \right) ds \quad \text{oder} \quad \int \left(X \frac{\partial y}{\partial s} - Y \frac{\partial x}{\partial s} \right) ds = 0,$$

so erhält für irgend zwei feste Punkte O_0 und O dies Integral in Bezug auf alle von O_0 in derselben nach O gehende Linien denselben Werth.

Je zwei die Punkte O_0 und O verbindende Linien s_1 und s_2 bilden zusammengenommen eine in sich zurücklaufende Linie s_3 . Diese Linie besitzt entweder selbst die Eigenschaft, keinen Punkt mehrfach zu durchschneiden, oder man kann sie in mehrere allenthalben einfache in sich zurücklaufende Linien zerlegen, indem man von einem beliebigen Punkte aus dieselbe durchlaufend jedesmal, wenn man zu einem frühern Punkte zurückgelangt, den inzwischen durchlaufenen Theil ausscheidet und den folgenden als unmittelbare Fortsetzung des vorhergehenden betrachtet. Jede solche Linie aber zerlegt die Fläche in eine einfach und eine zweifach zusammenhängende; sie bildet daher nothwendig von Einem dieser Stücke die ganze Begrenzung, und das durch sie erstreckte Integral $\int (X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p}) ds$ wird also der Voraussetzung nach $= 0$. Dasselbe gilt folglich auch von dem durch die ganze Linie s_3 erstreckten Integrale, wenn die Grösse s überall in derselben Richtung als wachsend betrachtet wird; es müssen daher die durch die Linien s_1 und s_2 erstreckten Integrale, wenn diese Richtung ungeändert bleibt, d. h. in einer derselben von O_0 nach O und in der andern von O nach O_0 geht, einander aufheben, also, wenn sie in letzterer geändert wird, gleich werden.

Hat man nun irgend eine beliebige Fläche T , in welcher, allgemein zu reden, $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} = 0$ ist, so schliesse man zunächst, wenn nöthig, die Unstetigkeitsstellen aus, so dass im übrigen Flächenstücke für jeden Flächentheil

$$\int \left(X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p} \right) ds = 0$$

ist, und zerlege dieses durch Querschnitte in eine einfach zusammenhängende Fläche T^* . Für jede im Innern von T^* von einem Punkte O_0 nach einem andern O gehende Linie hat dann unser Integral denselben Werth; dieser Werth, für den zur Abkürzung die Bezeichnung

$$\int_{O_0}^O \left(X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p} \right) ds$$

gestattet sein möge, ist daher, O_0 als fest, O als beweglich gedacht, für jede Lage von O , abgesehen vom Laufe der Verbindungslinie ein bestimmter, und kann folglich als Function von x, y betrachtet werden.

Die Aenderung dieser Function wird für eine Verrückung von O längs eines beliebigen Linienelements ds durch

$$\left(X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p} \right) ds$$

ausgedrückt, ist in T^* überall stetig und längs eines Querschnitts von T zu beiden Seiten gleich.

V. Das Integral

$$\int_{O_0}^O \left(X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p} \right) ds$$

bildet daher, O_0 als fest gedacht, eine Function von x, y , welche in T^* überall sich stetig, beim Ueberschreiten der Querschnitte von T aber um eine längs derselben von einem Zweigpunkte zum andern constante Grösse ändert, und von welcher der partielle Differentialquotient $\frac{\partial}{\partial x} = Y$ und $\frac{\partial}{\partial y} = -X$ ist.

Die Aenderungen beim Ueberschreiten der Querschnitte sind von einer der Zahl der Querschnitte gleichen Anzahl von einander unabhängiger Grössen abhängig; denn wenn man das Querschnittssystem rückwärts—die späteren Theile zuerst—durchläuft, so ist diese Aenderung überall bestimmt, wenn ihr Werth beim Beginn jedes Querschnitts gegeben wird; letztere Werthe aber sind von einander unabhängig.⁷

9.

Setzt man für die bisher durch X bezeichnete Function $\frac{\partial u}{\partial x}$ und für die bisher durch Y bezeichnete Function $\frac{\partial u}{\partial y}$, so wird

$$\int \left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} \right) dT = \int \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dT,$$

wenn also die Functionen u und u' den Gleichungen

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u'}{\partial y} \quad \text{und} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial u'}{\partial x}$$

genügen, so wird

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial^2 u'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u'}{\partial y^2} = 0,$$

⁷Für die auf die Ebene A überall einfach ausgebreitete Fläche T kann diese Unabhängigkeit dadurch erwiesen werden, dass man in derselben die verschiedenen Querschnittssysteme aufsucht, welche dieselbe Fläche aus ihr machen.

und es finden auf den Ausdruck

$$\int \left(u \frac{\partial u'}{\partial p} - u' \frac{\partial u}{\partial p} \right) ds,$$

welcher

$$= \int \left(u \frac{\partial u'}{\partial p} - u' \frac{\partial u}{\partial p} \right) ds$$

wird, die Sätze des vorigen Art. Anwendung.

Machen wir nun in Bezug auf die Function u die Voraussetzung, dass sie nebst ihren ersten Differentialquotienten etwaige Unstetigkeiten jedenfalls nicht längs einer Linie erleidet, und für jeden Unstetigkeitspunkt zugleich mit der Entfernung ϱ des Punktes O von demselben $\varrho \frac{\partial u}{\partial x}$ und $\varrho \frac{\partial u}{\partial y}$ unendlich klein werden, so können die Unstetigkeiten von u in Folge der Bemerkung zu III. des vorigen Art. ganz unberücksichtigt bleiben.

Denn alsdann kann man in jeder von einem Unstetigkeitspunkte ausgehenden geraden Linie einen Werth $\Re$ von ϱ so annehmen, dass

$$\frac{\partial u}{\partial \varrho} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varrho} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \varrho}$$

unterhalb desselben immer endlich bleibt, und bezeichnet U den Werth von u für $\varrho = \Re$, M abgesehen vom Zeichen den grössten Werth der Function $\frac{\partial u}{\partial \varrho}$ in jenem Intervall, so wird, in derselben Bedeutung genommen, stets $u - U < M(\log \varrho - \log \Re)$ sein, folglich $\varrho(u - U)$ und also auch ϱu mit ϱ zugleich unendlich klein werden; dasselbe gilt aber der Voraussetzung nach von $\varrho \frac{\partial u}{\partial x}$ und $\varrho \frac{\partial u}{\partial y}$; wenn u keiner Unstetigkeit unterliegt, auch von $\varrho \frac{\partial u}{\partial x}$ und $\varrho \frac{\partial u}{\partial y}$, und folglich der im vorigen Art. erörterte Fall tritt hier also ein.

Wir nehmen nun ferner an, dass die den Ort des Punktes O bildende Fläche T allenthalben einfach über A ausgebreitet sei, und denken uns in derselben einen beliebigen festen Punkt O_0 , wo u, x, y die Werthe u_0, x_0, y_0 erhalten.

Die Grösse

$$\frac{1}{2} \log [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2] = \log r,$$

als Function von x, y betrachtet, hat alsdann die Eigenschaft, dass

$$\frac{\partial^2 \log r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \log r}{\partial y^2} = 0$$

wird, und ist nur für $x = x_0, y = y_0$, also in unserm Falle nur für Einen Punkt der Fläche T mit einer Unstetigkeit behaftet.

Es wird daher nach Art. 8, III., wenn wir $\log r$ für u setzen,

$$\int \left(\log r \frac{\partial u'}{\partial p} - u' \frac{\partial \log r}{\partial p} \right) ds$$

in Bezug auf die ganze Begrenzung von T gleich diesem Integrale in Bezug auf eine beliebige Umgrenzung des Punktes O_0 , und also, wenn wir dazu die Peripherie eines Kreises, wo r einen constanten Werth hat, wählen und von einem ihrer Punkte in einer beliebigen festen Richtung den Bogen bis O in Theilen des Halbmessers durch φ bezeichnen, gleich

$$- \int_0^{2\pi} u' \frac{\partial \log r}{\partial p} r d\varphi = \int_0^{2\pi} u' d\varphi,$$

oder da⁸

$$= 2\pi u'_0,$$

welcher Werth, wenn u' im Punkte O_0 stetig ist, für ein unendlich kleines r in $-u'_0 \cdot 2\pi$ übergeht.

Unter den in Bezug auf u und T gemachten Voraussetzungen haben wir daher für einen beliebigen Punkt O_0 im Innern der Fläche, in welchem u stetig ist,

$$\int \left(\log r \frac{\partial u}{\partial p} - u \frac{\partial \log r}{\partial p} \right) ds$$

in Bezug auf die ganze Begrenzung derselben und

$$= 2\pi u_0 = \int_0^{2\pi} u d\varphi$$

in Bezug auf einen um O_0 beschriebenen Kreis. Aus dem ersten dieser Ausdrücke ziehen wir folgenden

Lehrsatz. *Wenn eine Function u innerhalb einer die Ebene A allenthalben einfach bedeckenden Fläche T , allgemein zu reden, der Differentialgleichung*

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

genügt und zwar so, dass

- 1) *die Punkte, in welchen diese Differentialgleichung nicht erfüllt ist, keinen Flächentheil stetig erfüllen,*

⁸Es ist nämlich $\frac{\partial \log r}{\partial p} = -\frac{\partial \log r}{\partial r} = -\frac{1}{r}$.

- 2) die Punkte, in welchen u , $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$ unstetig werden, keine Linie stetig erfüllen,
- 3) für jeden Unstetigkeitspunkt zugleich mit der Entfernung ϱ des Punktes O von demselben die Grössen $\varrho \frac{\partial u}{\partial x}$, $\varrho \frac{\partial u}{\partial y}$ unendlich klein werden und
- 4) bei u eine durch Abänderung ihres Werthes in einzelnen Punkten hebbare Unstetigkeit ausgeschlossen ist,

so ist sie nothwendig nebst allen ihren Differentialquotienten für alle Punkte im Innern dieser Fläche endlich und stetig.

In der That, betrachten wir den Punkt O_0 als beweglich, so ändern sich in dem Ausdrucke

$$\int \left(\log r \frac{\partial u}{\partial p} - u \frac{\partial \log r}{\partial p} \right) ds$$

nur die Werthe $\log r$, $\frac{\partial \log r}{\partial p}$, $\frac{\partial \log r}{\partial x_0}$, $\frac{\partial \log r}{\partial y_0}$. Diese Grössen aber sind für jedes Element der Begrenzung, so lange O_0 im Innern von T bleibt, nebst allen ihren Differentialquotienten endliche und stetige Functionen von x_0 , y_0 , da die Differentialquotienten durch gebrochene rationale Functionen dieser Grössen ausgedrückt werden, die nur Potenzen von r im Nenner enthalten. Dasselbe gilt daher auch für den Werth unsres Integrals und folglich für die Function u_0 . Denn diese könnte unter den früheren Voraussetzungen nur in einzelnen Punkten, indem sie unstetig würde, einen davon verschiedenen Werth haben, welche Möglichkeit durch die Voraussetzung 4) unsres Lehrsatzes wegfällt.

10.

Unter denselben Voraussetzungen in Bezug auf u und T , wie am Schlüsse des vorigen Art., haben wir folgende Sätze:

I. Wenn längs einer Linie $u = 0$ und $\frac{\partial u}{\partial p} = 0$ ist, so ist u überall $= 0$.

Wir beweisen zunächst, dass eine Linie λ , wo $u = 0$ und $\frac{\partial u}{\partial p} = 0$ ist, nicht die Begrenzung eines Flächentheils a , wo u positiv ist, bilden könne.

Gesetzt, dies fände statt, so scheide man aus a ein Stück aus, welches eines Theils durch λ , andern Theils durch eine Kreislinie begrenzt wird und den Mittelpunkt O_0 dieses Kreises nicht enthält, welche Construction allemal möglich ist. Man hat dann, wenn man die Polarcoordinaten von O in Bezug auf O_0 durch r , φ bezeichnet, durch die ganze Begrenzung dieses Stücks ausgedehnt

$$\int \log r \frac{\partial u}{\partial p} ds - \int u \frac{\partial \log r}{\partial p} ds = 0,$$

also in Folge der Annahme für den ganzen ihr angehörigen Kreisbogen

$$\int u \, d\varphi + \log r \int \frac{\partial u}{\partial p} \, ds = 0,$$

oder da $\int \frac{\partial u}{\partial p} \, ds = 0$ ist,

$$\int u \, d\varphi = 0,$$

was mit der Voraussetzung, dass u im Innern von a positiv sei, unverträglich ist.

Auf ähnliche Art wird bewiesen, dass die Gleichungen $u = 0$ und $\frac{\partial u}{\partial p} = 0$ nicht in einem Begrenzungstheile eines Flächenstücks b , wo u negativ ist, stattfinden können.

Wenn nun in der Fläche T in einer Linie $u = 0$ und $\frac{\partial u}{\partial p} = 0$ ist und in irgend einem Theile derselben u von Null verschieden wäre, so müsste ein solcher Flächentheil offenbar entweder durch diese Linie selbst oder durch einen Flächentheil, wo $u = 0$ wäre, also jedenfalls durch eine Linie wo u und $\frac{\partial u}{\partial p} = 0$ wäre, begrenzt werden, was nothwendig auf eine der vorhin widerlegten Annahmen führt.

II. Wenn der Werth von u und $\frac{\partial u}{\partial p}$ längs einer Linie gegeben ist, so ist u dadurch in allen Theilen von T bestimmt.

Sind u_1 und u_2 irgend zwei bestimmte Functionen, welche den der Function u auferlegten Bedingungen genügen, so gilt dies auch, wie sich durch Substitution in diese Bedingungen sofort ergibt, für ihre Differenz $u_1 - u_2$. Stimmt nun u_1 und u_2 längs einer Linie nebst ihren ersten Differentialquotienten nach p überein, in einem andern Flächentheile aber nicht, so würden längs dieser Linie $u_1 - u_2 = 0$ und $\frac{\partial(u_1 - u_2)}{\partial p} = 0$ sein, ohne überall $= 0$ zu sein, dem Satze I. zuwider.

III. Die Punkte im Innern von T , wo u einen constanten Werth hat, bilden, wenn u nicht überall constant ist, nothwendig Linien, welche Flächentheile, wo u grösser ist, von Flächentheilen, wo u kleiner ist, scheiden.

Dieser Satz ist aus folgenden zusammengesetzt:

- u kann nicht in einem Punkte im Innern von T ein Minimum oder ein Maximum haben;
- u kann nicht nur in einem Theile der Fläche constant sein;
- die Linien, in denen $u = a$ ist, können nicht beiderseits Flächentheile begrenzen, wo $u - a$ dasselbe Zeichen hat;

Sätze, deren Gegentheil, wie leicht zu sehen, allemal eine Verletzung der im vorigen Art. bewiesenen Gleichung

$$\int \left(\log r \frac{\partial u}{\partial p} - u \frac{\partial \log r}{\partial p} \right) ds \quad \text{oder} \quad 2\pi u_0 = \int_0^{2\pi} u d\varphi = 0$$

herbeiführen müsste und folglich unmöglich ist.

11.

Wir wenden uns jetzt zurück zur Betrachtung einer veränderlichen complexen Grösse $w = u + vi$, welche, allgemein zu reden (d. h. ohne eine Ausnahme in einzelnen Linien und Punkten auszuschliessen), für jeden Punkt O der Fläche T Einen bestimmten mit der Lage desselben stetig und den Gleichungen

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{und} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

gemäss sich ändernden Werth hat, und bezeichnen diese Eigenschaft von w nach dem früher Festgestellten dadurch, dass wir w eine *Function* von $z = x + yi$ nennen. Zur Vereinfachung des Folgenden setzen wir dabei im Voraus fest, dass bei einer Function von z eine durch Abänderung ihres Werthes in einem einzelnen Punkte hebbare Unstetigkeit nicht vorkommen solle.

Der Fläche T wird vorerst ein einfacher Zusammenhang und eine allenthalben einfache Ausbreitung über die Ebene A beigelegt.

Lehrsatz. *Wenn eine Function w von z eine Unterbrechung der Stetigkeit jedenfalls nicht längs einer Linie erleidet und ferner für jeden beliebigen Punkt O' der Fläche, wo $z = z'$ sei, $w(z - z')$ mit unendlicher Annäherung des Punktes O unendlich klein wird, so ist sie nothwendig nebst allen ihren Differentialquotienten in allen Punkten im Innern der Fläche endlich und stetig.*

Die über die Veränderungen der Grösse w gemachten Voraussetzungen zerfallen, wenn $z - z' = \varrho e^{\varphi i}$ gesetzt wird, für u und v in die folgenden:

- 1) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ und $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ für jeden Theil der Fläche T ;
- 2) $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ und $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$ für jeden Theil der Fläche;
- 3) die Functionen u und v sind nicht längs einer Linie unstetig;
- 4) für jeden Punkt O' werden mit der Entfernung ϱ des Punktes O von demselben ϱu und ϱv unendlich klein;

- 5) für die Functionen u und v sind Unstetigkeiten, die durch Abänderung ihres Werthes in einzelnen Punkten gehoben werden könnten, ausgeschlossen.

In Folge der Voraussetzungen 2), 3), 4) ist für jeden Theil der Fläche T das über dessen ganze Begrenzung ausgedehnte Integral $\int(u \frac{\partial u'}{\partial p} - u' \frac{\partial u}{\partial p}) ds$ nach Art. 8, III. = 0 und das Integral $\int(u \frac{\partial x}{\partial p} + v \frac{\partial y}{\partial p}) ds$ erhält daher (nach Art. 8, IV.) durch jede von O_0 nach O gehende Linie erstreckt denselben Werth und bildet, O_0 als fest gedacht, eine bis auf einzelne Punkte nothwendig stetige Function U von x, y , von welcher (und zwar nach 5) in jedem Punkte) der Differentialquotient $\frac{\partial U}{\partial x} = u$ und $\frac{\partial U}{\partial y} = -v$ ist. Durch Substitution dieser Werthe für u und v aber gehen die Voraussetzungen 1), 3), 4), in die Bedingungen des Lehrsatzes am Schlüsse des Art. 9 über.

Die Function U ist daher nebst allen ihren Differentialquotienten in allen Punkten von T endlich und stetig und dasselbe gilt folglich auch von der complexen Function $w = \frac{\partial U}{\partial x} + \frac{\partial U}{\partial y}i$ und ihren nach z genommenen Differentialquotienten.

12.

Es soll jetzt untersucht werden, was eintritt, wenn wir unter Beibehaltung der sonstigen Voraussetzungen des Art. 11 annehmen, dass für einen bestimmten Punkt O' im Innern der Fläche $(z - z')w = \varrho e^{\varphi i} w$ bei unendlicher Annäherung des Punktes O nicht mehr unendlich klein wird. In diesem Falle wird also w bei unendlicher Annäherung des Punktes O an O' unendlich gross, und wir nehmen an, dass, wenn die Grösse w nicht mit $\frac{1}{\varrho}$ von gleicher Ordnung bleibt, d. h. der Quotient beider sich einer endlichen Grenze nähert, wenigstens die Ordnungen beider Grössen in einem endlichen Verhältnisse zu einander stehen, so dass sich eine Potenz von ϱ angeben lässt, deren Product in w für ein unendlich kleines ϱ entweder unendlich klein wird oder endlich bleibt. Ist μ der Exponent einer solchen Potenz und n die nächst grössere ganze Zahl, so wird die Grösse $(z - z')^n w = \varrho^n e^{n\varphi i} w$ mit ϱ unendlich klein, und es ist daher $(z - z')^{n-1} w$ eine Function von z (da $\frac{d(z - z')^{n-1} w}{dz}$ von dz unabhängig ist), welche in diesem Theile der Fläche den Voraussetzungen des Art. 12 genügt und folglich im Punkte O' endlich und stetig ist. Bezeichnen wir ihren Werth im Punkte O' mit a_{n-1} , so ist $(z - z')^{n-1} w - a_{n-1}$ eine Function, die in diesem Punkte stetig und = 0 ist und folglich mit ϱ unendlich klein wird, woraus man nach Artikel 12 schliesst, dass $\frac{(z - z')^{n-1} w - a_{n-1}}{z - z'}$ eine im Punkte O' stetige Function ist. Durch Fortsetzung dieses Verfahrens wird offenbar w mittelst Subtraction eines Ausdruckes von der Form

$$\frac{a_1}{z - z'} + \frac{a_2}{(z - z')^2} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{(z - z')^{n-1}}$$

in eine Function verwandelt, welche im Punkte O' endlich und stetig bleibt.

Wenn daher unter den Voraussetzungen des Art. 11 die Aenderung eintritt, dass bei unendlicher Annäherung von O an einen Punkt O' im Innern der Fläche T die Function w unendlich gross wird, so ist die Ordnung dieses unendlich Grossen (eine im verkehrten Verhältnisse der Entfernung wachsende Grösse als ein unendlich Grosses erster Ordnung betrachtet) wenn sie endlich ist, nothwendig eine ganze Zahl; und ist diese Zahl $= m$, so kann die Function w durch Hinzufügung einer Function, welche $2m$ willkürliche Constanten enthält, in eine in diesem Punkte O' stetige verwandelt werden.

Anm.. Wir betrachten eine Function als Eine willkürliche Constante enthaltend, wenn die möglichen Arten, sie zu bestimmen, ein stetiges Gebiet von Einer Dimension umfassen.

13.

Die im Art. 12 und 13 in Bezug auf die Fläche T gemachten Beschränkungen sind für die Gültigkeit der gewonnenen Resultate nicht wesentlich. Offenbar kann man jeden Punkt im Innern einer beliebigen Fläche mit einem Stücke derselben umgeben, welches die dort vorausgesetzten Eigenschaften besitzt, mit alleiniger Ausnahme des Falles, wo dieser Punkt ein Windungspunkt der Fläche ist.

Um diesen Fall zu untersuchen, denken wir uns die Fläche T oder ein beliebiges Stück derselben, welches einen Windungspunkt $(n-1)$ ter Ordnung O' , wo $z = z' = x' + y'i$ sei, enthält, mittelst der Function $\zeta = (z - z')^{\frac{1}{n}}$ auf einer andern Ebene Λ abgebildet, d. h. wir denken uns den Werth der Function $\zeta = \xi + \eta i$ im Punkte O durch einen Punkt Ω , dessen rechtwinklige Coordinaten ξ, η sind, in dieser Ebene vertreten, und betrachten Ω als Bild des Punktes O .

Auf diesem Wege erhält man als Abbildung dieses Theils der Fläche T eine zusammenhängende über Λ ausgebreitete Fläche, die im Punkte Ω' , dem Bilde des Punktes O' , keinen Windungspunkt hat, wie sogleich gezeigt werden soll.

Zur Fixirung der Vorstellungen denke man sich um den Punkt O' in der Ebene A mit dem Halbmesser R einen Kreis beschrieben und parallel mit der x -Axe einen Durchmesser gezogen, wo also $z - z'$ reelle Werthe annehmen wird. Das durch diesen Kreis ausgeschiedene den Windungspunkt umgebende Stück der Fläche T wird dann zu beiden Seiten des Durchmessers in n , wenn R hinreichend klein gewählt wird, abgesondert verlaufende halbkreisförmige Flächenstücke zerfallen. Wir bezeichnen auf derjenigen Seite des Durchmessers, wo $y - y'$ positiv ist, diese Flächenstücke durch $a_1, a_2,$

$\dots, a_n$, auf der entgegengesetzten Seite durch $a'_1, a'_2, \dots, a'_n$, und nehmen an, dass für negative Werthe von $z - z'$ die Flächen $a_1, a_2, \dots, a_n$ der Reihe nach mit $a'_1, a'_2, \dots, a'_n$; für positive dagegen mit $a'_n, a'_1, \dots, a'_{n-1}$ verbunden seien, so dass ein den Punkt O' (im erforderlichen Sinne) umkreisender Punkt der Reihe nach die Flächen $a_1, a'_1, a_2, a'_2, \dots, a_n, a'_n$ durchläuft und durch a_1 wieder in a_1 zurückgeelangt, welche Annahme offenbar gestattet ist.

Führen wir nun für beide Ebenen Polarcoordinaten ein, indem wir $z - z' = \rho e^{\varphi i}$, $\zeta = \sigma e^{\psi i}$ setzen, und wählen zur Abbildung des Flächenstücks a_1 denjenigen Werth von $(z - z')^{\frac{1}{n}} = \rho^{\frac{1}{n}} e^{\frac{\varphi}{n} i}$, welchen letzterer Ausdruck unter der Annahme $0 < \varphi < \pi$ erhält, so wird für alle Punkte von a_1 : $\sigma < R^{\frac{1}{n}}$ und $0 < \psi < \frac{\pi}{n}$; die Bilder derselben in der Ebene Λ fallen also sämmtlich in einen von $\psi = 0$ bis $\psi = \frac{\pi}{n}$ sich erstreckenden Sector eines um Ω' mit dem Radius $R^{\frac{1}{n}}$ beschriebenen Kreises, und zwar entspricht jedem Punkte von a_1 Ein zugleich mit demselben stetig fortrückender Punkt dieses Sectors und umgekehrt, woraus folgt, dass die Abbildung der Fläche a_1 eine zusammenhängende einfach über diesen Sector ausgebreitete Fläche ist. Auf ähnliche Art erhält man für die Fläche a'_1 als Abbildung einen von $\psi = \frac{\pi}{n}$ bis $\psi = \frac{2\pi}{n}$, für a_2 einen von $\psi = \frac{2\pi}{n}$ bis $\psi = \frac{3\pi}{n}$, endlich für a'_n einen von $\psi = \frac{(2n-1)\pi}{n}$ bis $\psi = 2\pi$ sich erstreckenden Sector, wenn man φ für jeden Punkt dieser Flächen der Reihe nach zwischen π und 2π , 2π und 3π , $\dots$, $(2n-1)\pi$ und $2n\pi$ wählt, was immer und nur auf eine Weise möglich ist. Diese Sektoren schliessen sich aber in derselben Folge an einander, wie die Flächen a und a' , und zwar so, dass den hier zusammenstossenden Punkten auch dort zusammenstossende Punkte entsprechen; sie können daher zu einer zusammenhängenden Abbildung eines den Punkt O' einschliessenden Stückes der Fläche T zusammengefügt werden, und diese Abbildung ist offenbar eine über die Ebene Λ einfach ausgebreitete Fläche.

Eine veränderliche Grösse, die für jeden Punkt O einen bestimmten Werth hat, hat dies auch für jeden Punkt Ω und umgekehrt, da jedem O nur ein Ω und jedem Ω nur ein O entspricht; ist sie ferner eine Function von z , so ist sie dies auch von ζ , indem, wenn $\frac{dw}{dz}$ von dz , auch $\frac{dw}{d\zeta}$ von $d\zeta$ unabhängig ist, und umgekehrt.

Es ergibt sich hieraus, dass auf alle Functionen w von z auch im Windungspunkte O' die Sätze der Art. 12 und 13 angewandt werden können, wenn man sie als Functionen von $(z - z')^{\frac{1}{n}}$ betrachtet. Dies liefert folgenden Satz:

Lehrsatz. *Wenn eine Function w von z bei unendlicher Annäherung von O an einen Windungspunkt $(n - 1)$ ter Ordnung O' unendlich wird, so ist dieses unendlich Grosse nothwendig von gleicher Ordnung mit einer Potenz*

der Entfernung, deren Exponent ein Vielfaches von $\frac{1}{n}$ ist, und kann, wenn dieser Exponent $= \frac{m}{n}$ ist, durch Hinzufügung eines Ausdrucks von der Form

$$\frac{a_1}{(z - z')^{\frac{1}{n}}} + \frac{a_2}{(z - z')^{\frac{2}{n}}} + \cdots + \frac{a_m}{(z - z')^{\frac{m}{n}}},$$

wo $a_1, a_2, \dots, a_m$ willkürliche complexe Größen sind, in eine im Punkte O' stetige verwandelt werden.

Dieser Satz enthält als Corollar, dass die Function w im Punkte O' stetig ist, wenn $(z - z')^{\frac{1}{n}}w$ bei unendlicher Annäherung des Punktes O an O' unendlich klein wird.

14.

Denken wir uns jetzt eine Function von z , welche für jeden Punkt O der beliebig über A ausgebreiteten Fläche T einen bestimmten Werth hat und nicht überall constant ist, geometrisch dargestellt, so dass ihr Werth $w = u + vi$ im Punkte O durch einen Punkt Q der Ebene B vertreten wird, dessen rechtwinklige Coordinaten u, v sind, so ergibt sich Folgendes:

I. Die Gesamtheit der Punkte Q kann betrachtet werden als eine Fläche S bildend, in welcher jedem Punkte Ein bestimmter mit ihm stetig in T fortrückender Punkt O entspricht.

Um dieses zu beweisen, ist offenbar nur der Nachweis erforderlich, dass die Lage des Punktes Q mit der des Punktes O sich allemal (und zwar, allgemein zu reden, stetig) ändert. Dieser ist in dem Satze enthalten:

Eine Function $w = u + vi$ von O kann nicht längs einer Linie constant sein, wenn sie nicht überall constant ist.

Beweis: Hätte w längs einer Linie einen constanten Werth $a + bi$ so wären $u - a$ und $\frac{\partial(u-a)}{\partial p}$, welches $= -\frac{\partial(v-b)}{\partial s}$, für diese Linie überall $= 0$; es müsste also nach Art. 10, I. $u - a$ und folglich, da $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, auch $v - b$ überall $= 0$ sein, gegen die Voraussetzung.

II. In Folge der in I. gemachten Voraussetzung kann zwischen den Theilen von S nicht ein Zusammenhang Statt finden ohne einen Zusammenhang der entsprechenden Theile von T ; umgekehrt kann überall, wo in T Zusammenhang Statt findet und w stetig ist, der Fläche S ein entsprechender Zusammenhang beigelegt werden.

Dieses vorausgesetzt entspricht die Begrenzung von S einestheils der Begrenzung von T , anderntheils den Unstetigkeitsstellen; ihre inneren Theile aber sind, einzelne Punkte ausgenommen, überall schlicht über B ausgebreitet, d. h. es findet nirgends eine Spaltung in auf einander liegende Theile und nirgends eine Umfaltung Statt.

Ersteres könnte, da T überall einen entsprechenden Zusammenhang besitzt, offenbar nur eintreten, wenn in T eine Spaltung vorkäme—der Annahme zuwider; Letzteres soll sogleich bewiesen werden.

Wir beweisen zuvörderst, dass ein Punkt Q' , wo $\frac{dz}{dw}$ endlich ist, nicht in einer Falte der Fläche S liegen kann.

In der That, umgeben wir den Punkt O' , welcher Q' entspricht, mit einem Stücke der Fläche T von beliebiger Gestalt und unbestimmten Dimensionen, so müssen (nach Art. 3) die Dimensionen desselben stets so klein angenommen werden können, dass die Gestalt des entsprechenden Theils von S beliebig wenig abweicht, und folglich so klein, dass die Begrenzung desselben aus der Ebene B ein Q' einschliessendes Stück ausscheidet. Dies aber ist unmöglich, wenn Q' in einer Falte der Fläche S liegt.

Nun kann $\frac{dz}{dw}$, als Function von O , nach I. nur in einzelnen Punkten $= 0$, und, da w in den in Betracht kommenden Punkten von T stetig ist, nur in den Windungspunkten dieser Fläche unendlich werden; folglich etc. w. z. b. w.

III. Die Fläche S ist folglich eine Fläche, für welche die im Art. 5 für T gemachten Voraussetzungen zutreffen; und in dieser Fläche hat für jeden Punkt Q die unbestimmte Grösse z Einen bestimmten Werth, welcher sich mit der Lage von Q stetig und so ändert, dass $\frac{dz}{dw}$ von der Richtung der Ortsänderung unabhängig ist. Es bildet daher in dem früher festgelegten Sinne z eine stetige Function der veränderlichen complexen Grösse w für das durch S dargestellte Grössengebiet.

Hieraus folgt ferner:

Sind O' und Q' zwei entsprechende innere Punkte der Flächen T und S und in denselben $z = z'$, $w = w'$, so nähert sich, wenn keiner von ihnen ein Windungspunkt ist, bei unendlicher Annäherung von O an O' der Quotient $\frac{w-w'}{z-z'}$ einer endlichen Grenze, und die Abbildung ist daselbst eine in den kleinsten Theilen ähnliche; wenn aber O' ein Windungspunkt $(n-1)$ ter, Q' ein Windungspunkt $(m-1)$ ter Ordnung ist, so nähert sich $\frac{(w-w')^{\frac{1}{m}}}{(z-z')^{\frac{1}{n}}}$ bei unendlicher Annäherung von O an O' einer endlichen Grenze, und für die anstossenden Flächentheile findet eine Abbildungsart Statt, die sich leicht aus Art. 13 ergibt.

15.

Lehrsatz. Sind α und β zwei beliebige Functionen von x, y , für welche das Integral

$$\Omega = \int \left[\left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right)^2 \right] dT$$

durch alle Theile der beliebig über A ausgebreiteten Fläche T ausgedehnt einen endlichen Werth hat, so erhält das Integral bei Aenderung von α um stetige oder doch nur in einzelnen Punkten unstetige Functionen, die am Rande $= 0$ sind, immer für eine dieser Functionen einen Minimumwerth und, wenn man durch Abänderung in einzelnen Punkten hebbare Unstetigkeiten ausschliesst, nur für Eine.

Wir bezeichnen durch λ eine unbestimmte stetige oder doch nur in einzelnen Punkten unstetige Function, welche am Rande $= 0$ ist und für welche das Integral

$$L = \int \left[\left(\frac{\partial \lambda}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \lambda}{\partial y} \right)^2 \right] dT$$

über die ganze Fläche ausgedehnt einen endlichen Werth erhält, durch ω eine unbestimmte der Functionen $\alpha + \lambda$, endlich das über die ganze Fläche erstreckte Integral

$$\int \left[\left(\frac{\partial \omega}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \omega}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right)^2 \right] dT$$

durch W . Die Gesammtheit der Functionen λ bildet ein zusammenhängendes insich abgeschlossenes Gebiet, indem jede dieser Functionen stetig in jede andere übergehen, sich aber nicht einer längs einer Linie unstetigen unendlich annähern kann, ohne dass L unendlich wird (Art. 17); für jedes λ erhält nun, $\omega = \alpha + \lambda$ gesetzt, W einen endlichen Werth, der mit L zugleich unendlich wird, sich mit der Gestalt von λ stetig ändert, aber nie unter Null herabsinken kann; folglich hat W wenigstens für Eine Gestalt der Function ω ein Minimum.

Um den zweiten Theil unseres Satzes zu beweisen, sei u eine der Functionen ω , welche W einen Minimumwerth ertheilt, h eine unbestimmte in der ganzen Fläche constante Grösse, so dass $u + h\lambda$ den der Function ω vorgeschriebenen Bedingungen genügt. Der Werth von W für $\omega = u + h\lambda$, welcher

$$M + 2Nh + Lh^2$$

wird, muss alsdaun für jedes h (nach dem Begriffe des Minimums) grösser als M werden, sobald h nur hinreichend klein genommen ist. Dies erfordert aber, dass für jedes λ $N = 0$ sei; denn andernfalls würde

$$2Nh + Lh^2 = Lh^2 \left(1 + \frac{2N}{Lh} \right)$$

negativ werden, wenn h dem N entgegengesetzt und abgesehen vom Zeichen $< \frac{2N}{L}$ angenommen würde. Der Werth von W für $\omega = u + \lambda$, in welcher

Form offenbar alle möglichen Werthe von α enthalten sind, wird daher $= M + L$, und folglich kann, da L wesentlich positiv ist, W für keine Gestalt der Function α einen kleinern Werth erhalten, als für $\omega = u$.

Findet nun für eine andere u' der Functionen ω ein Minimumwerth M' von W Statt, so muss von diesem offenbar dasselbe gelten, man hat also $M' \leq M$ und $M \leq M'$, folglich $M = M'$. Bringt man aber u' auf die Form $u + \lambda'$, so erhält man für M' den Ausdruck $M + L'$, wenn L' den Werth von L für $\lambda = \lambda'$ bezeichnet, und die Gleichung $M = M'$ giebt $L' = 0$. Dies ist nur möglich, wenn in allen Flächentheilen $\frac{\partial \lambda'}{\partial x} = 0$ und $\frac{\partial \lambda'}{\partial y} = 0$ ist, und es hat daher, so weit λ' stetig ist, diese Function nothwendig einen constanten und folglich, da sie am Rande $= 0$ und nicht längs einer Linie unstetig ist, höchstens in einzelnen Punkten einen von Null verschiedenen Werth. Zwei der Functionen ω , welche W einen Minimumwerth ertheilen, können also nur in einzelnen Punkten von einander verschieden sein, und wenn in der Function u alle durch Abänderung in einzelnen Punkten hebbaren Unstetigkeiten beseitigt werden, ist diese vollkommen bestimmt.

16.

Es soll jetzt der Beweis nachgeliefert werden, dass λ unbeschadet der Endlichkeit von L sich nicht einer längs einer Linie unstetigen Function γ unendlich annähern könne, d. h. wird die Function λ der Bedingung unterworfen, ausserhalb eines die Unstetigkeitslinie einschliessenden Flächentheils T' mit γ übereinzustimmen, so kann T' stets so klein angenommen werden, dass L grösser als eine beliebig gegebene Grösse C werden muss.

Wir bezeichnen, s und p in Bezug auf die Unstetigkeitslinie in der gewohnten Bedeutung genommen, für ein unbestimmtes s die Krümmung, eine auf der Seite der positiven p convexe als positiv betrachtet, durch k , den Werth von p an der Grenze von T' auf der positiven Seite durch p_1 , auf der negativen Seite durch p_2 und die entsprechenden Werthe von γ durch γ_1 und γ_2 . Betrachten wir nun irgend einen stetig gekrümmten Theil dieser Linie, so liefert der zwischen den Normalen in den Endpunkten enthaltene Theil von T' , wenn er sich nicht bis zu den Krümmungsmittelpunkten erstreckt, zu L den Beitrag

$$\int ds \int_{p_2}^{p_1} dp \frac{(1 - \kappa p) \left[\left(\frac{\partial \gamma}{\partial s} \right)^2 + \left(\frac{\partial \gamma}{\partial p} \right)^2 \right]}{(1 - \kappa p)},$$

der kleinste Werth des Ausdrucks $\int dp \left[\left(\frac{\partial \gamma}{\partial s} \right)^2 + \left(\frac{\partial \gamma}{\partial p} \right)^2 \right]$ bei den festen

Grenzwerten γ_1 und γ_2 findet sich aber nach bekannten Regeln

$$> \frac{(\gamma_1 - \gamma_2)^2}{\log(1 - \kappa p_1) - \log(1 - \kappa p_2)},$$

und folglich wird jener Beitrag nothwendig, wie auch λ innerhalb T' angenommen werden möge,

$$> \int \frac{(\gamma_1 - \gamma_2)^2 ds}{\log(1 - \kappa p_1) - \log(1 - \kappa p_2)}.$$

Die Function γ wäre für $p = 0$ stetig, wenn der grösste Werth, den $(\gamma_1 - \gamma_2)^2$ für $p_1 > p > p_2$ und $p_1 > p > p_2$ erhalten kann, mit $p_1 - p_2$ unendlich klein würde; wir können folglich für jeden Werth von s eine endliche Grösse m so annehmen, dass, wie klein auch $p_1 - p_2$ angenommen werden möge, stets innerhalb der durch $p_1 \geq p \geq 0$ und $0 \geq p \geq p_2$ (wo die Gleichheiten sich gegenseitig ausschliessen) ausgedrückten Grenzen Werthe von p_1 und p_2 enthalten sind, für welche $(\gamma_1 - \gamma_2)^2 \geq m$ wird. Nehmen wir ferner unter den früheren Beschränkungen eine Gestalt von T' beliebig an, indem wir p_1 und p_2 bestimmte Werthe P_1 und P_2 beilegen, und bezeichnen den Werth des durch den in Betracht gezogenen Theil der Unstetigkeitslinie ausgedehnten Integrals

$$\int \frac{m ds}{\log(1 + \kappa P_1) - \log(1 + \kappa P_2)}$$

durch a , so können wir

$$\int \frac{(\gamma_1 - \gamma_2)^2 ds}{\log(1 - \kappa P_2) - \log(1 - \kappa p_1)} > C$$

machen, indem wir p_1 und p_2 für jeden Werth von s so annehmen, dass den Ungleichheiten

$$p_1 \geq \frac{1 - (1 - \kappa P_2)^{\frac{C}{a}}}{\kappa}, \quad -p_2 \geq \frac{1 - (1 - \kappa P_1)^{\frac{C}{a}}}{\kappa}$$

genügt wird. Dies aber hat zur Folge, dass, wie auch λ innerhalb T' angenommen werden möge, der aus dem in Betracht gezogenen Stücke von T' stammende Theil von L und folglich um so mehr L selbst $> C$ wird, w. z. b. w.⁹

⁹Eine weitere Ausführung dieses Beweises findet sich in den Göttinger Nachrichten 1870, Nr. 19, wo Hr. Weber über die Darstellung einer Function durch ein Integral mit veränderlicher oberer Grenze gehandelt hat.

17.

Nach Art. 15 haben wir für die dort festgelegte Function u und für irgend eine der Functionen λ

$$N = - \int \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right) \frac{\partial \lambda}{\partial x} + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right) \frac{\partial \lambda}{\partial y} \right] dT = 0.$$

Aus dieser Gleichung sollen jetzt weitere Schlüsse gezogen werden.

Scheidet man aus der Fläche T ein die Unstetigkeitsstellen von u , β , λ einschliessendes Stück T' aus, so findet sich der von dem übrigen Stücke T'' herrührende Theil von N mit Hülfe der Art. 7, 8, wenn man $\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right) \lambda$ für X und $\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right) \lambda$ für Y setzt,

$$= - \int \lambda \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dT.$$

In Folge der der Function λ auferlegten Grenzbedingung wird der auf das mit T gemeinschaftliche Begrenzungsstück von T'' bezügliche Theil von $\int \lambda \left(X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p} \right) ds$ gleich 0, so dass N betrachtet werden kann als zusammengesetzt aus dem Integral

$$- \int \lambda \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dT$$

in Bezug auf T'' und

$$\int \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right) \frac{\partial \lambda}{\partial x} + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right) \frac{\partial \lambda}{\partial y} \right] dT + \int \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right) \frac{\partial \lambda}{\partial x} + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right) \frac{\partial \lambda}{\partial y} \right] dT$$

in Bezug auf T' .

Offenbar würde nun, wenn $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ in irgend einem Theile der Fläche T von 0 verschieden wäre, N ebenfalls einen von 0 verschiedenen Werth erhalten, sobald man λ , was frei steht, innerhalb T' so wählte, dass $\lambda \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$ überall dasselbe Zeichen hätte.

Ist aber $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ in allen Theilen von $T = 0$, so verschwindet der von T'' herrührende Bestandtheil von N für jedes λ , und die Bedingung $N = 0$ ergibt dann, dass die auf die Unstetigkeitsstellen bezüglichen Bestandtheile $= 0$ werden.

Für die Functionen

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{und} \quad \frac{\partial u}{\partial y} = - \frac{\partial v}{\partial x}$$

haben wir daher, wenn wir erstere = X und letztere = Y setzen, nicht bloss allgemein zu reden die Gleichung

$$\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} = 0,$$

sondern es wird auch durch die ganze Begrenzung irgend eines Theils von T erstreckt

$$\int \left(X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p} \right) ds = 0,$$

in so fern dieser Ausdruck überhaupt einen bestimmten Werth hat.

Zerlegen wir also (nach Art. 8, V) die Fläche T , wenn sie einen mehrfachen Zusammenhang besitzt, durch Querschnitte in eine einfach zusammenhängende T^* , so hat das Integral

$$\int \left(X \frac{\partial x}{\partial p} + Y \frac{\partial y}{\partial p} \right) ds$$

für jede im Innern von T^* von O_0 nach O gehende Linie denselben Werth und bildet, O_0 als fest gedacht, eine Function von x, y , welche in T^* überall eine stetige und längs eines Querschnitts beiderseits eine gleiche Aenderung erleidet. Diese Function ν zu β hinzugefügt, liefert uns eine Function $v = \beta + \nu$, von welcher der Differentialquotient $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ und $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$ ist.

Wir haben daher folgenden

Lehrsatz. *Ist in einer zusammenhängenden, durch Querschnitte in eine einfach zusammenhängende T^* zerlegten Fläche T eine complexe Function $\alpha + \beta i$ von x, y gegeben, für welche*

$$\int \left[\left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right)^2 \right] dT$$

durch die ganze Fläche ausgedehnt einen endlichen Werth hat, so kann sie immer und nur auf Eine Art in eine Function von z verwandelt werden durch Hinzufügung einer Function $\mu + \nu i$ von x, y , welche folgenden Bedingungen genügt:

- 1) μ ist am Rande = 0 oder doch nur in einzelnen Punkten davon verschieden, ν in einem Punkte beliebig gegeben;

18.

Die im vorhergehenden Artikel bewiesenen Sätze reichen hin, um die Bildung aller Functionen einer veränderlichen complexen Grösse z , welche

in einem gegebenen Gebiete endlich und stetig sind, zu bewerkstelligen— vorausgesetzt, dass es uns gelingt, Functionen $\alpha + \beta i$ von x, y anzugeben, für welche das Integral Ω endlich ist.

Für eine einfach zusammenhängende, allenthalben einfach über die Ebene A ausgebreitete Fläche T kann man die Function u immer so wählen, dass sie am Rande einen beliebig gegebenen Werth annimmt, und zwar nur auf eine Art, wenn man von hebbaren Unstetigkeiten absieht. Denn bezeichnet s die Länge der Begrenzung von einem festen Punkte an gerechnet und $\varphi(s)$ eine beliebige stetige Function von s , so kann man die Bedingung, dass u am Rande $= \varphi(s)$ sei, durch die Forderung ersetzen, dass $u - \varphi(s)$ am Rande $= 0$ sei, und die Function α so wählen, dass sie am Rande $= \varphi(s)$ ist; dann muss μ am Rande $= 0$ sein, und u ist vollkommen bestimmt.

Für eine mehrfach zusammenhängende Fläche T ist die Sache etwas complicirter. Es seien n die Ordnung des Zusammenhangs und $q_1, q_2, \dots, q_n$ die Querschnitte, welche T in eine einfach zusammenhängende Fläche T^* verwandeln. Bezeichnen wir durch A_ν die constante Aenderung, welche das Integral $\int \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial p} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial p} \right) ds$ beim Ueberschreiten des Querschnitts q_ν erleidet, und setzen wir voraus, dass die Function u nebst ihren ersten Differentialquotienten in allen Punkten von T stetig ist, so müssen die Grössen A_ν sämmtlich $= 0$ sein. Es können aber auch Functionen u existiren, für welche diese Bedingung nicht erfüllt ist; und die allgemeinste Function u , welche der Differentialgleichung $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ genügt, hängt dann noch von n willkürlichen Constanten ab.

19.

Wir haben bisher die Beschränkung gemacht, dass die den Ort des Punktes O bildende Fläche T allenthalben einfach über die Ebene A ausgebreitet sei. Es bleibt noch zu untersuchen, wie unsere Resultate sich gestalten, wenn diese Beschränkung aufgehoben wird.

Es sei T eine beliebige zusammenhängende Fläche, welche über die Ebene A mehrfach ausgebreitet ist und Windungspunkte beliebiger Ordnung besitzt. Wir denken uns in der Fläche T eine beliebige geschlossene Linie l , welche den Punkt O nicht trifft, und lassen den Punkt O dieselbe in bestimmter Richtung durchlaufen, bis er in seine ursprüngliche Lage zurückkehrt. Die Function w wird alsdann im Allgemeinen einen anderen Werth angenommen haben, als sie anfangs besass, und dieser Werth wird sich stetig mit der Lage der Linie l ändern, wenn man dieselbe stetig deformirt, ohne dass sie jemals den Punkt O trifft. Es lässt sich daher jeder solchen Linie l eine bestimmte Aenderung des Werthes von w zuordnen, welche dadurch characterisirt ist, dass sie stetig mit der Linie l sich ändert und für eine in sich zusammenzieh-

bare Linie = 0 ist.

Hieraus ergibt sich, dass die allgemeinste Function w , welche in der Fläche T der Differentialgleichung $\frac{dw}{dz} = \text{const.}$ genügt, sich aus einer besondern Function w_0 dieser Art und den willkürlichen constanten Aenderungen, welche w beim Umkreisen der verschiedenen in der Fläche T möglichen geschlossenen Linien erleidet, zusammensetzen lässt. Die Anzahl dieser von einander unabhängigen Aenderungen ist, wie aus den Betrachtungen des Art. 5 folgt, gleich der Ordnung des Zusammenhangs der Fläche T .

20.

Die in den vorhergehenden Artikeln entwickelte Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse hat vor allem Anderen die Untersuchung derjenigen Functionen zum Ziele, welche nur für isolirte Punkte und Linien der Fläche T unstetig werden, und zwar so, dass in der Umgebung eines jeden solchen Punktes die Function sich wie eine ganze Potenz von $z - z'$ oder $(z - z')^{\frac{1}{n}}$ verhält. Wir wollen solche Functionen im Folgenden als *algebraische Functionen* von z bezeichnen.

Es sei w eine solche Function, welche in der Fläche T nur für endlich viele Punkte und Linien unstetig wird. Wir denken uns um jeden Unstetigkeitspunkt O' einen kleinen Kreis beschrieben, welcher keine anderen Unstetigkeitspunkte enthält, und bezeichnen mit T' das Stück der Fläche T , welches ausserhalb dieser Kreise liegt. In T' ist dann w allenthalben endlich und stetig, und es gelten daher für dieses Gebiet alle im Vorhergehenden bewiesenen Sätze.

Es sei nun z' ein Punkt, in dessen Umgebung w sich wie eine ganze Potenz von $z - z'$ verhält, so dass

$$w = a_0 + a_1(z - z') + a_2(z - z')^2 + \dots$$

für hinreichend kleine Werthe von $|z - z'|$. Die Function w ist dann im Punkte z' selbst endlich und stetig, wenn die Reihe für $z = z'$ convergirt, und ihr Werth ist alsdann a_0 . Ist $a_0 = a_1 = \dots = a_{m-1} = 0$, $a_m \neq 0$, so heisst der Punkt z' eine *Nullstelle mter Ordnung* der Function w .

Verhält sich dagegen w in der Umgebung von z' wie eine negative Potenz von $z - z'$, so dass

$$w = \frac{a_{-m}}{(z - z')^m} + \frac{a_{-m+1}}{(z - z')^{m-1}} + \dots + a_0 + a_1(z - z') + \dots,$$

so heisst der Punkt z' ein *Pol mter Ordnung* der Function w . Die Function w wird in diesem Punkte unendlich gross, und zwar von der Ordnung m .

Endlich kann sich w in der Umgebung eines Windungspunktes $(n-1)$ ter Ordnung z' wie eine Potenz von $(z-z')^{\frac{1}{n}}$ verhalten. Setzen wir $\zeta = (z-z')^{\frac{1}{n}}$, so wird

$$w = a_0 + a_1\zeta + a_2\zeta^2 + \cdots,$$

und w ist als Function von ζ in der Umgebung von $\zeta = 0$ endlich und stetig. Der Punkt z' heisst in diesem Falle ein *Verzweigungspunkt* der Function w .

(Ende der im vorliegenden Bande enthaltenen Abschnitte der Grundlage.)

Anmerkungen zur vorstehenden Abhandlung.

1. Die in Art. 1 gegebene Definition der Function einer veränderlichen complexen Grösse ist der Ausgangspunkt der ganzen Riemann'schen Theorie. Sie unterscheidet sich wesentlich von der älteren Definition, welche eine Function durch einen analytischen Ausdruck definiert, indem sie den Begriff der Function unabhängig von seiner Darstellung fasst. Diese Auffassung hat sich als äusserst fruchtbar erwiesen und ist der Grundstein der modernen Functionentheorie.

2. Die in Art. 2–3 entwickelte geometrische Interpretation der complexen Functionen als Abbildungen der Ebene auf sich selbst ist eine der originellsten Schöpfungen Riemann's. Der Satz, dass diese Abbildungen in den kleinsten Theilen ähnlich sind, bildet den Kern der sogenannten conformen Abbildung. Die Bedingungen

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

heissen heute die *Cauchy-Riemann'schen Differentialgleichungen*. Sie sind nöthig und hinreichend dafür, dass $w = u + vi$ eine analytische Function von $z = x + yi$ ist.

3. Der Begriff der *mehrfach zusammenhängenden Fläche* und die Theorie der *Querschnitte* in Art. 4–6 sind von fundamentaler Bedeutung für die ganze spätere Entwicklung. Die *Ordnung des Zusammenhangs* einer Fläche, welche Riemann hier einführt, ist einer der wichtigsten topologischen Begriffe. Er bildet die Grundlage für die Theorie der *Riemann'schen Flächen*, welche in der nachfolgenden Abhandlung über die Abel'schen Functionen voll entwickelt wird.

4. Die in Art. 7–8 bewiesenen Sätze über Integrale von Functionen, welche der Gleichung $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} = 0$ genügen, sind im Wesentlichen identisch mit dem *Green'schen Satze* in der Ebene. Die Anwendung dieses Satzes auf die Potentialtheorie und die Functionentheorie hat sich als äusserst fruchtbar erwiesen.

5. Der in Art. 9 bewiesene Lehrsatz über die Eigenschaften der Functionen u , welche der Differentialgleichung $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ genügen, ist der Ausgangspunkt der *Potentialtheorie*. Die Formel

$$u_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u \, d\varphi$$

ausdrückt, dass der Werth einer harmonischen Function im Mittelpunkt eines Kreises gleich dem arithmetischen Mittel ihrer Werthe auf der Peripherie ist. Dieser Satz wird heute als *Mittelwerthsatz der Potentialtheorie* bezeichnet.

6. Die in Art. 12–13 entwickelte Theorie der *Windungspunkte* oder *Verzweigungspunkte* ist eine der originellsten und wichtigsten Schöpfungen Riemann's. Die Einführung der mehrblättrigen Flächen, welche sich über die Ebene mehrfach ausbreiten, ermöglicht es, die mehrdeutigen Functionen als eindeutige Functionen auf diesen Flächen zu behandeln. Diese *Riemann'schen Flächen* sind zu einem der wichtigsten Hilfsmittel der modernen Functionentheorie geworden.

7. Die in Art. 16–17 gegebene Theorie des *Dirichlet'schen Princips* hat eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der Analysis gespielt. Obgleich der ursprüngliche Beweis von Riemann nicht als streng zu bezeichnen ist (da die Existenz des Minimums nicht hinreichend begründet wurde), hat die von ihm eingeführte Methode die Entwicklung der Variationsrechnung und der Potentialtheorie wesentlich beeinflusst. Die ersten strengen Beweise wurden von H. A. Schwarz und C. Neumann geliefert.

II.

(Fortsetzung folgt in den nachfolgenden Bänden.)

Bernhard Riemann — Gesammelte Mathematische Werke

(pp. 51–100)

I. Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse.

19.

Die Principien, welche dem Lehrsätze am Schlüsse des vorigen Art. zu Grunde liegen, eröffnen den Weg, bestimmte Functionen einer veränderlichen complexen Grösse (unabhängig von einem Ausdrucke für dieselben) zu untersuchen.

Zur Orientirung auf diesem Felde wird ein Ueberschlag über den Umfang der zur Bestimmung einer solchen Function innerhalb eines gegebenen Grössengebiets erforderlichen Bedingungen dienen.

Halten wir uns zunächst an einen bestimmten Fall, so kann, wenn die über A ausgebreitete Fläche, durch welche dies Grössengebiet dargestellt wird, eine einfach zusammenhängende ist, die Function $w = u + vi$ von den folgenden Bedingungen gemäss bestimmt werden:

1. für u ist in allen Begrenzungspunkten ein Werth gegeben, der sich für eine unendlich kleine Ortsänderung um eine unendlich kleine Grösse von derselben Ordnung, übrigens aber beliebig ändert¹;
2. der Werth von v ist in irgend einem Punkte beliebig gegeben;
3. die Function soll in allen Punkten endlich und stetig sein.

Durch diese Bedingungen aber ist sie vollkommen bestimmt.

In der That folgt dies aus dem Lehrsätze des vorigen Art., wenn man, was immer möglich sein wird, $\alpha + \beta i$ so bestimmt, dass α am Rande dem gegebenen Werth gleich und in der ganzen Fläche für jede unendlich kleine Ortsänderung die Aenderung von $\alpha + \beta i$ unendlich klein von derselben Ordnung ist.

Es kann also, allgemein zu reden, u am Rande als eine ganz willkürliche Function von s gegeben werden, und dadurch ist v überall mit bestimmt; umgekehrt kann aber auch v in jedem Begrenzungspunkte beliebig angenommen werden, woraus dann der Werth von u folgt. Der Spielraum für die Wahl der Werthe von w am Rande umfasst daher eine Mannigfaltigkeit von Einer Dimension für jeden Begrenzungspunkt, und die vollständige Bestimmung derselben erfordert für jeden Begrenzungspunkt Eine Gleichung, wobei es indess nicht wesentlich sein wird, dass jede dieser Gleichungen sich auf den Werth Eines Gliedes in Einem Begrenzungspunkte allein bezieht. Es wird diese Bestimmung auch so geschehen können, dass für jeden Begrenzungspunkt Eine mit der Lage dieses Punktes ihre

¹An sich sind die Aenderungen dieses Werthes nur der Beschränkung unterworfen, nicht längs eines Theils der Begrenzung unstetig zu sein; eine weitere Beschränkung ist nur gemacht, um hier unnöthige Weitläufigkeiten zu vermeiden.

Form stetig ändernde, beide Glieder enthaltende Gleichung gegeben ist, oder für mehrere Theile der Begrenzung gleichzeitig so, dass jedem Punkte eines dieser Theile $n - 1$ bestimmte Punkte, aus jedem der übrigen Theile einer, zugesellt und für je n solcher Punkte gemeinschaftlich n mit ihrer Lage stetig veränderliche Gleichungen gegeben sind. Diese Bedingungen, deren Gesammtheit eine stetige Mannigfaltigkeit bildet und welche durch Gleichungen zwischen willkürlichen Functionen ausgedrückt werden, werden aber, um für die Bestimmung einer im Innern des Grössengebiets überall stetigen Function zulässig und hinreichend zu sein, allgemein zu reden, noch einer Beschränkung oder Ergänzung durch einzelne Bedingungsgleichungen — Gleichungen für willkürliche Constanten — bedürfen, indem bis auf diese sich die Genauigkeit unserer Schätzung offenbar nicht erstreckt.

Für den Fall, wo das Gebiet der Veränderlichkeit der Grösse z durch eine mehrfach zusammenhängende Fläche dargestellt wird, erleiden diese Betrachtungen keine wesentliche Abänderung, indem die Anwendung des Lehrsatzes in Art. 18 eine bis auf die Aenderungen beim Ueberschreiten der Querschnitte ebenso wie vorhin beschaffene Function liefert — Aenderungen, welche $= 0$ gemacht werden können, wenn die Grenzbedingungen eine der Anzahl der Querschnitte gleiche Anzahl verfügbarer Constanten enthalten.

Der Fall, wo im Innern längs einer Linie auf Stetigkeit verzichtet wird, ordnet sich dem vorigen unter, wenn man diese Linie als einen Schnitt der Fläche betrachtet.

Wenn endlich in einem einzelnen Punkte eine Verletzung der Stetigkeit, also nach Art. 12 ein Unendlichwerden der Function, zugelassen wird, so kann unter Beibehaltung der sonstigen in unserm Anfangsfalle gemachten Voraussetzungen für diesen Punkt eine Function von z , nach deren Subtraction die zu bestimmende Function stetig werden soll, beliebig gegeben werden; dadurch aber ist sie völlig bestimmt. Denn nimmt man die Grösse $\alpha + \beta i$ in einem beliebig kleinen um den Unstetigkeitspunkt beschriebenen Kreise gleich dieser gegebenen Function, übrigens aber den früheren Vorschriften gemäss an, so wird das Integral

$$\int \left[\left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right)^2 \right] dT$$

über diesen Kreis erstreckt $= 0$, über den übrigen Theil erstreckt einer endlichen Grösse gleich, und man kann also den Lehrsatz des vorigen Art. anwenden, wodurch man eine Function mit den verlangten Eigenschaften erhält. Hieraus kann man mit Hülfe des Lehrsatzes im Art. 13 folgern, dass im Allgemeinen, wenn in einem einzelnen Unstetigkeitspunkte die Function unendlich gross von der Ordnung n werden darf, eine Anzahl von $2n$ Constanten verfügbar wird.

Geometrisch dargestellt liefert (nach Art. 15) eine Function w einer innerhalb eines gegebenen Grössengebiets von zwei Dimensionen veränderlichen complexen Grösse z , von einer gegebenen A bedeckenden Fläche T ein ihr in den kleinsten Theilen, einzelne Punkte ausgenommen, ähnliches, B bedeckendes Abbild S . Die Bedingungen, welche so eben zur Bestimmung der Function hinreichend und nothwendig befunden worden sind, beziehen sich auf ihren Werth entweder in Begrenzungs- oder in Unstetigkeitspunkten; sie erscheinen also (Art. 15) sämmtlich als Bedingungen für die Lage der Begrenzung von S und zwar geben sie für jeden Begrenzungspunkt Eine Bedingungsgleichung. Bezieht sich jede derselben nur auf Einen Begrenzungspunkt, so werden sie durch eine Schaar von Curven repräsentirt, von denen für jeden Begrenzungspunkt Eine den geometrischen Ort bildet. Werden zwei mit einander stetig fortrückende Begrenzungspunkte gemeinschaftlich zwei Bedingungsgleichungen unterworfen, so entsteht dadurch zwischen zwei Begrenzungstheilen eine solche Abhängigkeit, dass, wenn die Lage des einen willkürlich angenommen wird, die Lage des andern daraus folgt. Aehnlicher Weise ergiebt sich für andere Formen der Be-

dingungsgleichungen eine geometrische Bedeutung, was wir indess nicht weiter verfolgen wollen.

20.

Die Einführung der complexen Grössen in die Mathematik hat ihren Ursprung und nächsten Zweck in der Theorie einfacher² durch Grössenoperationen ausgedrückter Abhängigkeitsgesetze zwischen veränderlichen Grössen. Wendet man nämlich diese Abhängigkeitsgesetze in einem erweiterten Umfange an, indem man den veränderlichen Grössen, auf welche sie sich beziehen, complexe Werthe giebt, so tritt eine sonst versteckt bleibende Harmonie und Regelmässigkeit hervor. Die Fälle, in denen dies geschehen ist, umfassen zwar bis jetzt erst ein kleines Gebiet — sie lassen sich fast sämmtlich auf diejenigen Abhängigkeitsgesetze zwischen zwei veränderlichen Grössen zurückführen, wo die eine entweder eine algebraische³ Function der andern ist oder eine solche Function, deren Differentialquotient eine algebraische Function ist —, aber beinahe jeder Schritt, der hier gethan ist, hat nicht bloss den ohne Hülfe der complexen Grössen gewonnenen Resultaten eine einfachere, geschlossenere Gestalt gegeben, sondern auch zu neuen Entdeckungen die Bahn gebrochen, wozu die Geschichte der Untersuchungen über algebraische Functionen, Kreis- oder Exponentialfunctionen, elliptische und Abel'sche Functionen den Beleg liefert.

Es soll kurz angedeutet werden, was durch unsere Untersuchung für die Theorie solcher Functionen gewonnen ist.

Die bisherigen Methoden, diese Functionen zu behandeln, legten stets als Definition einen Ausdruck der Function zu Grunde, wodurch ihr Werth für jeden Werth ihres Arguments gegeben wurde; durch unsere Untersuchung ist gezeigt, dass, in Folge des allgemeinen Charakters einer Function einer veränderlichen complexen Grösse, in einer Definition dieser Art ein Theil der Bestimmungsstücke eine Folge der übrigen ist, und zwar ist der Umfang der Bestimmungsstücke auf die zur Bestimmung nothwendigen zurückgeführt worden. Dies vereinfacht die Behandlung derselben wesentlich. Um z. B. die Gleichheit zweier Ausdrücke derselben Function zu beweisen, musste man sonst den einen in den andern transformiren, d. h. zeigen, dass beide für jeden Werth der veränderlichen Grösse übereinstimmten; jetzt genügt der Nachweis ihrer Uebereinstimmung in einem weit geringern Umfange.

Eine Theorie dieser Functionen auf den hier gelieferten Grundlagen würde die Gestaltung der Function (d. h. ihren Werth für jeden Werth ihres Arguments) unabhängig von einer Bestimmungsweise derselben durch Grössenoperationen festlegen, indem zu dem allgemeinen Begriffe einer Function einer veränderlichen complexen Grösse nur die zur Bestimmung der Function nothwendigen Merkmale hinzugefügt würden, und dann erst zu den verschiedenen Ausdrücken deren die Function fähig ist übergehen. Der gemeinsame Charakter einer Gattung von Functionen, welche auf ähnliche Art durch Grössenoperationen ausgedrückt werden, stellt sich dann dar in der Form der ihnen auferlegten Grenz- und Unstetigkeitsbedingungen. Wird z. B. das Gebiet der Veränderlichkeit der Grösse z über die ganze unendliche Ebene A einfach oder mehrfach erstreckt, und innerhalb derselben der Function nur in einzelnen Punkten eine Unstetigkeit, und zwar nur ein Unendlichwerden, dessen Ordnung endlich ist, gestattet (wobei für ein unendliches z diese Grösse

²Wir betrachten hier als Elementaroperationen Addition und Subtraction, Multiplication und Division, Integration und Differentiation, und ein Abhängigkeitsgesetz als desto einfacher, durch je weniger Elementaroperationen die Abhängigkeit bedingt wird. In der That lassen sich durch eine endliche Anzahl dieser Operationen alle bis jetzt in der Analysis benutzten Functionen definiren.

³D. h. wo zwischen beiden eine algebraische Gleichung Statt findet.

selbst, für jeden endlichen Werth z' derselben aber $\frac{1}{z-z'}$ als ein unendlich Grosses erster Ordnung gilt), so ist die Function nothwendig algebraisch, und umgekehrt erfüllt diese Bedingung jede algebraische Function.

Die Ausführung dieser Theorie, welche, wie bemerkt, einfache durch Grössenoperationen bedingte Abhängigkeitsgesetze ins Licht zu setzen bestimmt ist, unterlassen wir indess jetzt, da wir die Betrachtung des Ausdruckes einer Function gegenwärtig ausschliessen.

Aus demselben Grunde befassen wir uns hier auch nicht damit, die Brauchbarkeit unserer Sätze als Grundlagen einer allgemeinen Theorie dieser Abhängigkeitsgesetze darzuthun, wozu der Beweis erfordert wird, dass der hier zu Grunde gelegte Begriff einer Function einer veränderlichen complexen Grösse mit dem einer durch Grössenoperationen ausdrückbaren Abhängigkeit⁴ völlig zusammenfällt.

21.

Es wird jedoch zur Erläuterung unserer allgemeinen Sätze ein ausgeführtes Beispiel ihrer Anwendung von Nutzen sein.

Die im vorigen Artikel bezeichnete Anwendung derselben ist, obwohl die bei ihrer Aufstellung zunächst beabsichtigte, doch nur eine specielle. Denn wenn die Abhängigkeit durch eine endliche Anzahl der dort als Elementaroperationen betrachteten Grössenoperationen bedingt ist, so enthält die Function nur eine endliche Anzahl von Parametern, was für die Form eines Systems von einander unabhängiger Grenz- und Unstetigkeitsbedingungen, die zu ihrer Bestimmung hinreichen, den Erfolg hat, dass unter ihnen längs einer Linie in jedem Punkte willkürlich zu bestimmende Bedingungen gar nicht vorkommen können. Für unsern jetzigen Zweck schien es daher geeigneter, nicht ein dorthier entnommenes Beispiel zu wählen, sondern vielmehr ein solches, wo die Function der complexen Veränderlichen von einer willkürlichen Function abhängt.

Zur Veranschaulichung und bequemerer Fassung geben wir demselben die am Schlüsse des Art. 19 gebrauchte geometrische Einkleidung. Es erscheint dann als eine Untersuchung über die Möglichkeit, von einer gegebenen Fläche ein zusammenhängendes in den kleinsten Theilen ähnliches Abbild zu liefern, dessen Gestalt gegeben ist, wo also in obiger Form ausgedrückt, für jeden Begrenzungspunkt des Abbildes eine Ortscurve, und zwar für alle dieselbe, ausserdem aber (Art. 5) der Sinn der Begrenzung und die Windungspunkte desselben gegeben sind. Wir beschränken uns auf die Lösung dieser Aufgabe in dem Falle, wo jedem Punkte der einen Fläche nur Ein Punkt der andern entsprechen soll und die Flächen einfach zusammenhängend sind, für welchen Fall sie in folgendem Lehrsatz enthalten ist.

Lehrsatz. *Zwei gegebene einfach zusammenhängende ebene Flächen können stets so auf einander bezogen werden, dass jedem Punkte der einen Ein mit ihm stetig fortrückender Punkt der andern entspricht und ihre entsprechenden kleinsten Theile ähnlich sind; und zwar kann zu Einem innern Punkte und zu Einem Begrenzungspunkte der entsprechende beliebig gegeben werden; dadurch aber ist für alle Punkte die Beziehung bestimmt.*

Wenn zwei Flächen T und R auf eine dritte S so bezogen sind, dass zwischen den entsprechenden kleinsten Theilen Aehnlichkeit Statt findet, so ergibt sich daraus eine Beziehung zwischen den Flächen T und R , von welcher offenbar dasselbe gilt. Die Aufgabe, zwei beliebige Flächen auf einander so zu beziehen, dass Aehnlichkeit in den kleinsten

⁴Es wird darunter jede durch eine endliche oder unendliche Anzahl der vier einfachsten Rechnungsoperationen, Addition und Subtraction, Multiplication und Division, ausdrückbare Abhängigkeit begriffen. Der Ausdruck Grössenoperationen soll (im Gegensatze zu Zahlenoperationen) solche Rechnungsoperationen andeuten, bei denen die Commensurabilität der Grössen nicht in Betracht kommt.

Theilen Statt findet, ist dadurch auf die zurückgeführt, jede beliebige Fläche durch Eine bestimmte in den kleinsten Theilen ähnlich abzubilden. Wir haben hiernach, wenn wir in der Ebene B um den Punkt, wo $w = 0$ ist, mit dem Radius 1 einen Kreis K beschreiben, um unsern Lehrsatz darzuthun, nur nöthig zu beweisen:

Eine beliebige einfach zusammenhängende A bedeckende Fläche T kann durch den Kreis K stets zusammenhängend und in den kleinsten Theilen ähnlich abgebildet werden und zwar nur auf Eine Art so, dass dem Mittelpunkte ein beliebig gegebener innerer Punkt O_0 und einem beliebig gegebenen Punkte der Peripherie ein beliebig gegebener Begrenzungspunkt O' der Fläche T entspricht.

Wir bezeichnen die bestimmten Bedeutungen von z , ϱ für die Punkte O_0 , O' durch entsprechende Indices und beschreiben in T um O_0 als Mittelpunkt einen beliebigen Kreis $\mathfrak{S}$, welcher sich nicht bis zur Begrenzung von T erstreckt und keinen Windungspunkt enthält. Führen wir Polarcoordinaten ein, indem wir $z - z_0 = re^{\varphi i}$ setzen, so wird die Function $\log(z - z_0) = \log r + \varphi i$. Der reelle Werth ändert sich daher im ganzen Kreise mit Ausnahme des Punktes O_0 , wo er unendlich wird, stetig. Der imaginäre aber erhält, wenn überall unter den möglichen Werthen von φ der kleinste positive gewählt wird, längs des Radius, wo $z - z_0$ reelle positive Werthe annimmt, auf der einen Seite den Werth 0, auf der andern den Werth 2π , ändert sich aber dann in allen übrigen Punkten stetig. Offenbar kann dieser Radius durch eine ganz beliebige vom Mittelpunkte nach der Peripherie gezogene Linie l ersetzt werden, so dass die Function $\log(z - z_0)$ beim Übertritt des Punktes O von der negativen (d. h. wo nach Art. 8 p negativ wird) auf die positive Seite dieser Linie eine plötzliche Verminderung um $2\pi i$ erleidet, übrigens aber sich mit dessen Lage im ganzen Kreise $\mathfrak{S}$ stetig ändert. Nehmen wir nun die complexe Function $\alpha + \beta i$ von x, y im Kreise $\mathfrak{S} = \log(z - z_0)$, ausserhalb desselben aber, indem wir l beliebig bis an den Rand verlängern, so an, dass sie

1. an der Peripherie von $\mathfrak{S} = \log(z - z_0)$, am Rande von T bloss imaginär wird,
2. beim Übertritt von der negativen auf die positive Seite der Linie l sich um $-2\pi i$, sonst aber bei jeder unendlich kleinen Ortsänderung um eine unendlich kleine Grösse von derselben Ordnung ändert,

was immer möglich sein wird, so erhält das Integral

$$\int \left[\left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right)^2 \right] dT$$

über $\mathfrak{S}$ ausgedehnt den Werth Null, über den ganzen übrigen Theil erstreckt einen endlichen Werth, und es kann daher $\alpha + \beta i$ durch Hinzufügung einer bis auf einen bloss imaginären constanten Rest bestimmten stetigen Function von x, y , welche am Rande bloss imaginär ist, in eine Function $t = m + ni$ von z verwandelt werden. Der reelle Theil m dieser Function wird am Rande $= 0$, im Punkte $O_0 = -\infty$ und ändert sich im ganzen übrigen T stetig. Für jeden zwischen 0 und $-\infty$ liegenden Werth a von m zerfällt daher T durch eine Linie, wo $m = a$ ist, in Theile, wo $m < a$ ist und die O_0 im Innern enthalten, einerseits und andererseits in Theile, wo $m > a$ ist und deren Begrenzung theils durch den Rand von T , theils durch Linien, wo $m = a$ ist, gebildet wird. Die Ordnung des Zusammenhangs der Fläche T wird durch diese Zerfällung entweder nicht geändert oder erniedrigt, die Fläche zerfällt daher, da diese Ordnung $= -1$ ist, entweder in zwei Stücke von der Ordnung des Zusammenhangs 0 und -1 , oder in mehr als zwei Stücke. Letzteres

aber ist unmöglich, weil dann wenigstens in Einem dieser Stücke m überall endlich und stetig und in allen Theilen der Begrenzung constant sein müsste, folglich entweder in einem Flächentheile einen constanten Werth, oder irgendwo — in einem Punkte oder längs einer Linie — einen Maximum- oder Minimumwerth haben müsste, gegen Art. 11, III. Die Punkte, wo m constant ist, bilden also in sich zurücklaufende allenthalben einfache Linien, welche ein den Punkt O_0 einschliessendes Stück begrenzen, und zwar nimmt m nach Innen zu nothwendig ab, woraus folgt, dass bei einem positiven Umlaufe (wo nach Art. 8 s wächst) n soweit es stetig ist, stets zunimmt, und also, da es nur beim Uebertritt von der negativen auf die positive Seite der Linie l eine plötzliche Aenderung um -2π erleidet, jedem Werth zwischen 0 und 2π Einmal (von einem Vielfachen von 2π abgesehen) gleich wird.

Setzen wir nun $e^t = w$, so werden e^m und n Polarcoordinaten des Punktes Q in Bezug auf den Mittelpunkt des Kreises K . Die Gesammtheit der Punkte Q bildet dann offenbar eine über K allenthalben einfach ausgebreitete Fläche S ; der Punkt Q_0 derselben fällt auf den Mittelpunkt des Kreises; der Punkt Q' aber kann vermittelt der in n noch verfügbaren Constante auf einen beliebig gegebenen Punkt der Peripherie gerückt werden, w. z. b. w.

In dem Falle, wo der Punkt O_0 ein Windungspunkt $(n - 1)$ ter Ordnung ist, gelangt man, wenn nur $\log(z - z_0)$ durch $-\log(z - z_0)$ ersetzt wird, durch ganz ähnliche Schlüsse zum Ziele, deren weitere Ausführung man indess aus Art. 14 leicht ergänzen wird.

22.

Die vollständige Durchführung der Untersuchung des vorigen Artikels für den allgemeineren Fall, wo Einem Punkte der einen Fläche mehrere Punkte der andern entsprechen sollen, und ein einfacher Zusammenhang für dieselben nicht vorausgesetzt wird, unterlassen wir hier, zumal da, aus geometrischem Gesichtspunkte aufgefasst, unsere ganze Untersuchung sich in einer allgemeineren Gestalt hätte führen lassen. Die Beschränkung auf ebene, einzelne Punkte ausgenommen, schlichte Flächen, ist nämlich für dieselbe nicht wesentlich; vielmehr gestattet die Aufgabe, eine beliebig gegebene Fläche auf einer andern beliebig gegebenen in den kleinsten Theilen ähnlich abzubilden, eine ganz ähnliche Behandlung. Wir begnügen uns, hierüber auf zwei Gauss'sche Abhandlungen, die zu Art. 3 citirte und die *disquis. gen. circa superf. art. 13*, zu verweisen.

Inhalt.⁵

1. Eine veränderliche complexe Grösse $w = u + vi$ heisst eine Function einer andern veränderlichen Grösse $z = x + yi$, wenn sie mit ihr sich so ändert, dass $\frac{dw}{dz}$ von dz unabhängig ist. Diese Definition wird begründet durch die Bemerkung, dass dies immer stattfindet, wenn die Abhängigkeit der Grösse w von z durch einen analytischen Ausdruck gegeben ist	3
2. Die Werthe der veränderlichen complexen Grössen z und w werden dargestellt durch die Punkte O und Q zweier Ebenen A und B , ihre Abhängigkeit von einander als eine Abbildung der einen Ebene auf die andere	5
3. Ist die Abhängigkeit eine solche (Art. 1), dass $\frac{dw}{dz}$ von dz unabhängig ist, so findet zwischen dem Original und seinem Bilde Aehnlichkeit in den kleinsten Theilen statt	5
4. Die Bedingung, dass $\frac{dw}{dz}$ von dz unabhängig ist, ist identisch mit folgenden: $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$. Aus ihnen folgen $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$	5
5. Als Ort des Punktes O wird für die Ebene A eine begrenzte über dieselbe ausgebreitete Fläche T substituiert. Windungspunkte dieser Fläche	7
6. Ueber den Zusammenhang einer Fläche	9
7. Das Integral $\int \left(\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} \right) dT$, durch die ganze Fläche T erstreckt, ist gleich $-\int (X \cos \xi + Y \cos \eta) ds$ durch ihre ganze Begrenzung, wenn X und Y beliebige in allen Punkten von T stetige Functionen von x und y sind	12
8. Einführung der Coordinaten s und p des Punktes O in Bezug auf eine beliebige Linie. Die gegenseitige Abhängigkeit des Vorzeichens von ds und dp wird so festgesetzt, dass $\frac{ds}{dx} = \frac{dp}{dy}$ ist	14
9. Anwendung des Satzes im Art. 7, wenn in allen Flächentheilen $\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} = 0$ ist	15
10. Bedingungen, unter welchen im Innern einer A einfach bedeckenden Fläche T eine Function u , welche, allgemein zu reden, der Gleichung $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ genügt, nebst allen ihren Differentialquotienten überall endlich und stetig ist	18

⁵Diese Inhaltsübersicht rührt fast vollständig von Riemann her.

11. Eigenschaften einer solchen Function	21
12. Bedingungen, unter welchen im Innern einer A einfach bedeckenden einfach zusammenhängenden Fläche T eine Function w von z überall nebst allen ihren Differentialquotienten endlich und stetig ist	23
13. Unstetigkeiten einer solchen Function in einem inneren Punkte ...	24
14. Ausdehnung der Sätze der Art. 12 und 13 auf Punkte im Innern einer beliebigen ebenen Fläche	25
15. Allgemeine Eigenschaften der Abbildung einer in der Ebene A aus- gebreiteten Fläche T auf eine in der Ebene B ausgebreitete Fläche S , durch welche die Werthe einer Function w von z geometrisch dargestellt werden	28
16. Das Integral $\int \left[\left(\frac{\partial \mu}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \mu}{\partial y} \right)^2 \right] dT$, durch die ganze Fläche T er- streckt, erhält bei Aenderung von μ um stetige oder doch nur in ein- zelnen Punkten unstetige Functionen, die am Rande $= 0$ sind, immer für Eine einen Minimumswerth und wenn man durch Abänderung in einzelnen Punkten hebbare Unstetigkeiten ausschliesst, nur für Eine ..	30
17. Begründung eines im vorigen Art. vorausgesetzten Satzes mittelst der Grenzmethode	31
18. Ist in einer beliebigen zusammenhängenden, durch Querschnitte in eine einfach zusammenhängende T^* zerlegten ebenen Fläche T ei- ne Function $\alpha + \beta i$ von x, y gegeben, für welche	33

$$\int \left[\left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right)^2 \right] dT$$

durch die ganze Fläche erstreckt, endlich ist, so kann sie immer und nur
auf eine Art in eine Function von z verwandelt werden durch Hinzufü-
gung einer Function $\mu + \nu i$ von x, y , welche so bedingt ist: 1) μ ist am
Rande $= 0$, ν in Einem Punkte gegeben. 2) Die Aenderungen von μ sind
in T , die von ν in T^* nur in einzelnen Punkten und nur so unstetig, dass

$$\int \left[\left(\frac{\partial \mu}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \mu}{\partial y} \right)^2 \right] dT \quad \text{und} \quad \int \left[\left(\frac{\partial \nu}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \nu}{\partial y} \right)^2 \right] dT$$

durch die ganze Fläche endlich bleiben und letztere an den Querschnit-
ten beiderseits gleich

19. Ueberschlag über die hinreichenden und nothwendigen Bedingungen zur Bestimmung einer Function complexen Arguments innerhalb eines gegebenen Grössengebiets	35
20. Die frühere Bestimmungsweise einer Function durch Grössenopera- tionen enthält überflüssige Bestandtheile. Durch die hier durchgeführten Betrachtungen ist der Umfang der Bestimmungsstücke einer Function auf das nothwendige Mass zurückgeführt	37
21. Zwei gegebene einfach zusammenhängende Flächen können stets so auf einander bezogen werden, dass jedem Punkte der einen Ein mit ihm stetig fortrückender Punkt der andern entspricht und ihre entsprechen- den kleinsten Theile ähnlich sind; und zwar kann zu Einem inneren Punkt und zu Einem Begrenzungspunkt der entsprechende beliebig ge- geben werden. Dadurch ist für alle Punkte die Beziehung bestimmt ..	39
22. Schlussbemerkungen	42

Anmerkungen.

(1) (zu Seite 3.) In Riemann's Papieren findet sich der folgende an diese Stelle gehörige Zusatz:

“Unter dem Ausdruck: die Grösse w ändert sich stetig mit z zwischen den Grenzen $z = a$ und $z = b$ verstehen wir: in diesem Intervall entspricht jeder unendlich kleinen Aenderung von z eine unendlich kleine Aenderung von w oder, greiflicher ausgedrückt: für eine beliebig gegebene Grösse ε lässt sich stets die Grösse α so annehmen, dass innerhalb eines Intervalls für z , welches kleiner als α ist, der Unterschied zweier Werthe von w nie grösser als ε ist. Die Stetigkeit einer Function führt hiernach, auch wenn dies nicht besonders hervorgehoben ist, ihre beständige Endlichkeit mit sich.”

(2) (zu Seite 8.) Wenn hier nicht ein Versehen vorliegt, so ist der Ausdruck “von der Linken zur Rechten” in einer der gewöhnlichen entgegengesetzten Bedeutung gebraucht, wonach der Sinn des Umkreisens vom Standpunkt eines im Mittelpunkt aufgestellten den kreisenden Punkt mit den Augen verfolgenden Beobachters beurtheilt wird.

(3) (zu Seite 18.) Zur Erläuterung dieser im Ausdruck etwas dunkeln Stelle kann folgendes Beispiel dienen:

In der beistehenden Figur ist T eine dreifach zusammenhängende Fläche. (ab) sei der erste Querschnitt q_1 , (cd) der zweite q_2 . Man hat hier drei verschiedene constante Werthdifferenzen der Function

$$Z = \int \left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right) ds$$

zu unterscheiden. Diese seien: an der Strecke (ad) : A , an der Strecke (cb) : B , an der Strecke (cd) : C . Durchläuft man also zuerst (cd) , so kann hier C irgend einen Werth haben. Durchläuft man hierauf (bc) , so kann hier B einen andern beliebigen Werth haben. An (ac) ist aber hiernach die constante Werthdifferenz A der Function Z völlig bestimmt, nämlich (wenn die Vorzeichen passend bestimmt werden) $A = B + C$. Auf ähnliche Weise schliesst man allgemein, dass, so oft beim Rückwärtsdurchlaufen des Querschnittsystems ein schon durchlaufener Querschnitt einmündet, die Aenderung, welche die constante Werthdifferenz der Function dadurch erfährt, vollkommen bestimmt ist.

(4) (zu Seite 20.) Die Formel

$$\int \frac{\partial u}{\partial p} ds = 0$$

wird erhalten, wenn man in dem Integral

$$\int \left(u \frac{\partial u}{\partial p} - u \frac{\partial u}{\partial p} \right) ds$$

$u = 1$ annimmt, wodurch es, über die Begrenzung eines Flächenstücks ausgedehnt, in dem u die Voraussetzungen des Art. 10 erfüllt, verschwindet.

(5) (zu Seite 30.) Das Beweisverfahren des Art. 16 wird von Riemann später (Theorie der Abel'schen Functionen, Abh. VI dieser Ausgabe Nr. 3 und Nr. 4, Art. 1) als *Dirichlet'sches Princip* bezeichnet (auf Grund Dirichlet'scher Vorlesungen). Auch Gauss

wendet ähnliche Schlüsse an (Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrten Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs- und Abstossungskräfte, Werke Bd. V). In späterer Zeit ist die Bündigkeit dieser Schlussweise angefochten worden; besonders wird, und mit Recht, die Evidenz der Existenz eines Minimums für das Integral Ω bestritten. Die Richtigkeit des Satzes selbst, der durch diesen Schluss bewiesen werden soll, der den functionentheoretischen Arbeiten von Riemann ihren eigenthümlich einfachen und allgemeinen Charakter verleiht, ist durch neuere Forschungen auf anderer Grundlage bewiesen. (Vgl. besonders die einschlägigen Arbeiten von H. A. Schwarz, Monatsberichte der Berliner Akademie, October 1870, Journal f. Mathematik Bd. 74, auch gesammelte Abhandlungen, und C. Neumann, Untersuchungen über das logarithmische und Newton'sche Potential, Leipzig 1877; Vorlesungen über Riemann's Theorie der Abel'schen Integrale, 2. Auflage, Leipzig 1884.)

(6) (zu Seite 33.) Die folgenden Bemerkungen sind fast wörtlich den in Riemann's handschriftlichem Nachlass gefundenen Entwürfen zu Art. 17 entnommen und dienen theils zur Erläuterung, theils zur Ergänzung der Untersuchung.

Von den Werthen P_1 und P_2 kann auch einer überall $= 0$ genommen werden, wenn nur T' eine endliche Breite behält, wodurch unser Beweis auf den Fall anwendbar wird, wo die Unstetigkeit längs eines Theils der Begrenzung einträte, oder durch Abänderung von y längs einer Linie im Innern entstanden wäre. Für m ist deshalb nicht geradezu der kleinste Werth von $(Y_1 - Y_2)^2$ in dem angegebenen Intervall von p_1 und p_2 gesetzt, damit der Beweis auch auf den Fall anwendbar ist, wo y unendlich viele Maxima und Minima, also z. B. in der Nähe der Unstetigkeitslinie den Werth $\sin \frac{1}{x}$, hätte.

In ähnlicher Weise lässt sich zeigen, dass L über alle Grenzen wächst, wenn X sich einer Function y unbegrenzt nähert, die in einem Punkt O' so unstetig wird, dass in einem Theil einer mit dem Radius ϱ um O' beschriebenen Kreislinie $\varrho \frac{\partial Y}{\partial x}$, $\varrho \frac{\partial Y}{\partial y}$ für ein unendlich kleines ϱ sich einer endlichen Grenze nähern oder unendlich werden.

Es lässt sich in diesem Fall ein Werth R von ϱ so annehmen, dass unterhalb desselben

$$\left(\frac{\partial Y}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial Y}{\partial y}\right)^2 - \frac{\partial(\varphi + \psi)}{\partial \varphi}$$

nicht 0 wird. Bezeichnen wir den kleinsten Werth dieser Grösse in diesem Intervall durch a , so wird der Beitrag eines zwischen $\varrho = R$ und $\varrho = r$ (wo $r < R$) enthaltenen Kreisringes zu L

$$> \int_0^R a \frac{d\varrho}{\varrho} = a \log \frac{R}{r}$$

und folglich, wenn man $r = Re^{-\frac{C}{a}}$ annimmt, $> C$. Wählt man also zur Begrenzung von T' einen Kreis, wo $\varrho < Re^{-\frac{C}{a}}$, so wird der aus dem übrigen T stammende Theil von L und folglich L selbst, wie auch l im Innern des Kreises angenommen werden möge, $< C$.

(Diese Untersuchung bezieht sich zwar zunächst auf einen Punkt, der kein Windungspunkt und kein Begrenzungspunkt ist, erleidet aber eine wesentliche Aenderung nur für einen Begrenzungspunkt, wo die Fläche eine Spitze, d. h. ihre Begrenzung einen Rückkehrpunkt hat. Die Bestimmung eines Grades der Unstetigkeit, welchen l nicht erreichen kann, beruht indess auch hier auf denselben Principien und wir begnügen uns daher mit der Andeutung dieses Falles.)

Es liefert also, wenn der Flächentheil, wo l und y verschieden sind, unendlich klein wird, im Fall einer Unstetigkeitslinie T' selbst, im Fall eines Unstetigkeitspunktes der übrige Theil von T einen unendlichen Beitrag zu L , und unsere Behauptung ist daher, wenn die Unstetigkeit den hier vorausgesetzten Grad erreicht, gerechtfertigt. Ihre Gültigkeit

in diesem Umfang genügt für uns und in der That wird sie für leichtere Unstetigkeiten unrichtig, wie z. B. wenn y in der Entfernung ϱ des Punktes O vom Unstetigkeitspunkt $= \left(\log \frac{1}{\varrho}\right)^\mu$ und $\mu < 1$ ist. Wir geben daher dem ersten Theil des Satzes im Art. 16 folgende Beschränkung: Das Integral Ω hat, $\omega = \alpha + X$ gesetzt, entweder für eine der Functionen X ein Minimum, oder l nimmt, während X sich einem kleinsten Grenzwert hñhert, doch nur in einzelnen Punkten eine Unstetigkeit an, bei welcher die Ordnung von $\varrho \frac{\partial Y}{\partial x}$, $\varrho \frac{\partial Y}{\partial y}$, wenn sie unendlich werden, die Einheit nicht erreicht.

Eine Unstetigkeit der Function ω , die durch Abänderung eines Werthes in einem Punkt hebbar ist, muss z. B. eintreten, wenn in der Fläche irgendwo ein Stich, also ein einzelner Begrenzungspunkt, wo $z = 0$ sein müsste, angenommen würde.

(7) (zu Seite 39.) Spätere Untersuchungen haben dargethan, dass die Kraft analytischer Ausdrücke weiter reicht, als es nach diesem Ausspruch von Riemann den Anschein hat. Merkwürdige Beispiele hiervon hat zuerst Seidel gegeben; (Crelles Journal Bd. 73, S. 279), der unter anderem analytische Ausdrücke, die von z abhängen, aufgestellt hat, die in einem Kreis gleich einer beliebigen Function von z , ausserhalb $= 0$ sind, oder die überall mit Ausnahme einer Kreisperipherie $= 0$, auf der Kreisperipherie $= 1$ sind. Lässt man bestimmte Integrale zu, so kann man sogar noch weiter gehen und z. B. x oder y oder $\sqrt{x^2 + y^2}$ als Function von $z = x + yi$ darstellen.

Weierstrass hat gezeigt (zur Functionentheorie, Monatsberichte der Berliner Akademie, August 1880, auch in der Sammlung von Abhandlungen aus der Functionenlehre, Berlin 1886), wie man unendliche Reihen finden kann, deren Glieder rationale Functionen von z sind, die in einer beliebigen Anzahl verschiedener Gebiete der Variablen z verschiedene beliebig gegebene Functionen von z darstellen.

II. Ueber die Gesetze der Vertheilung von Spannungselectricität in ponderabeln Körpern, wenn diese nicht als vollkommene Leiter oder Nichtleiter, sondern als dem Enthalten von Spannungselectricität mit endlicher Kraft widerstrebend betrachtet werden.

(Amtlicher Bericht über die 31. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Göttingen im September 1854.⁶)

Mittelst der sinnreichen Werkzeuge für Spannungselectricität, welche Herr Prof. Kohlrausch in der gestrigen Sitzung dieser Section erwähnte, hat derselbe auch die Bildung des Rückstandes in der Leydener Flasche und in andern Apparaten zur Bindung von Electricität untersucht. Diese Erscheinung ist im Wesentlichen folgende: Wenn man eine Leydener Flasche, nachdem sie längere Zeit geladen gestanden hat, entladet und sie dann eine Zeit lang isolirt stehen lässt, so tritt nach einiger Zeit eine merkliche Ladung wieder

⁶Vortrag gehalten am 21. Sept. 1854.

auf. Sie führt zu der Annahme, dass bei der ersten Entladung nur ein Theil der geschiedenen Electricitätsmenge sich wieder vereinigte, ein Theil aber in der Flasche zurückblieb. Den ersten Theil nennt man die *disponible* Ladung, den zweiten den *Rückstand*. Die Genauigkeit der Messungen, welche Herr Prof. Kohlrausch über das Sinken der disponibeln Ladung und über das Wiederauftreten des Rückstandes angestellt hat, reizte mich, an derselben ein aus andern Gründen wahrscheinliches Gesetz zu prüfen, welches eine in der bisherigen Theorie der Spannungselectricität vorhandene Lücke ausfüllt.

Bekanntlich beziehen sich die mathematischen Untersuchungen über Spannungselectricität auf ihre Vertheilung in vollkommenen und völlig isolirten Leitern; man betrachtet also die ponderabeln Körper entweder als absolute Leiter oder als absolute Nichtleiter. Eine Folge davon ist, dass nach dieser Theorie sich beim Gleichgewicht die gesammte Spannungselectricität nur an den Grenzflächen der Leiter und Isolatoren ansammelt. Zugestandenermassen aber ist dies eine blosser Fiction. In der Natur wird es weder einen Körper geben, in welchen durchaus keine Spannungselectricität eindringen kann, noch einen Körper, in welchem sich die gesammte Spannungselectricität auf eine mathematische Fläche zusammenziehen kann. Man muss vielmehr annehmen, dass die ponderabeln Körper dem Aufnehmen oder dem Enthalten von Spannungselectricität mit endlicher Kraft widerstreben, und zwar ist die Annahme, deren Consequenzen sich der Erfahrung gemäss zeigen, die, dass sie nicht dem electrisch Werden oder dem Aufnehmen von Spannungselectricität, sondern dem electrisch Sein oder dem Enthalten von Spannungselectricität widerstreben. Das Gesetz dieses Widerstrebens ist, je nach der dualistischen oder unitarischen Vorstellungsart, folgendes. Nach der dualistischen Vorstellungsart, nach welcher die Spannungselectricität der Ueberschuss der positiven Electricität über die negative ist, muss man in jedem Punkte des ponderabeln Körpers eine Ursache annehmen, welche mit einer der Dichtigkeit dieses Ueberschusses proportionalen Intensität die Dichtigkeit der Electricität gleichen Zeichens — derjenigen, welche im Ueberschuss vorhanden ist — zu vermindern und die der entgegengesetzten zu vermehren strebt. Nach der unitarischen Auffassungsweise, nach welcher die Spannungselectricität der Ueberschuss der in dem Körper enthaltenen Electricität über die ihm natürliche ist, muss man in jedem Punkte desselben eine Ursache annehmen, welche mit einer der Dichtigkeit dieses Ueberschusses proportionalen Intensität die Dichtigkeit der Electricität zu vermindern oder bei negativem Ueberschuss zu vermehren strebt. Ausser dieser Bewegungsursache hat man nun, wenn keine merklichen thermischen oder magnetischen oder voltainductorischen Wirkungen und Einflüsse stattfinden, und die ponderabeln Körper gegen einander ruhen, nur noch die dem Coulomb'schen Gesetz gemässe electromotorische Kraft in Rechnung zu ziehen. Unter denselben Umständen kann man für die Abhängigkeit der erfolgten Bewegung von den Bewegungsursachen Proportionalität zwischen electromotorischer Kraft und Stromintensität annehmen.

Um diese Bewegungsgesetze in Formeln auszudrücken, seien x, y, z rechtwinklige Coordinaten und im Punkte (x, y, z) zur Zeit t die Dichtigkeit der Spannungselectricität ρ , und u der 4π te Theil des Potentials der gesammten Spannungselectricität nach Gauss'scher Definition, nach welcher das Potential in einem bestimmten Punkte gleich ist dem Integral über sämmtliche Massen Spannungselectricität, jede dividirt durch die Entfernung von diesem Punkte. Die dem Coulomb'schen Gesetz gemässe electromotorische Kraft ist dann, nach den Richtungen der drei Axen zerlegt, proportional

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z},$$

die von der Reaction des ponderabeln Körpers herrührende proportional

$$\frac{\partial \varrho}{\partial x}, \quad \frac{\partial \varrho}{\partial y}, \quad \frac{\partial \varrho}{\partial z}.$$

Die Componenten der electromotorischen Kraft können also gleich gesetzt werden

$$\frac{\partial u}{\partial x} - \beta^2 \frac{\partial \varrho}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} - \beta^2 \frac{\partial \varrho}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} - \beta^2 \frac{\partial \varrho}{\partial z},$$

wo β^2 nur von der Natur des ponderabeln Körpers abhängt. Diesen sind nun die Componenten der Stromintensität proportional, sie sind also $= \alpha \xi, \alpha \eta, \alpha \zeta$, wenn man durch ξ, η, ζ die Componenten der Stromintensität und durch α eine von der Natur des ponderabeln Körpers abhängige Constante bezeichnet.

Verbindet man hiermit die phoronomische Gleichung

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \zeta}{\partial z} = 0,$$

welche man erhält, indem man die in das Raumelement $dx dy dz$ im Zeitelement dt einströmende Electricitätsmenge auf doppelte Weise ausdrückt, und die Gleichung

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -4\pi \varrho,$$

welche aus dem Begriffe des Potentials folgt, so erhält man, indem man erstere mit α multiplicirt und für ξ, η, ζ ihre Werthe setzt, die Gleichung

$$\alpha \frac{\partial \varrho}{\partial t} + \varrho - \beta^2 \left(\frac{\partial^2 \varrho}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varrho}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varrho}{\partial z^2} \right) = 0.$$

Diese giebt für u eine partielle Differentialgleichung, welche in Bezug auf t vom ersten, in Bezug auf die Raumcoordinaten vom vierten Grade ist, und um von einem bestimmten Zeitpunkte an u innerhalb des ponderabeln Körpers allenthalben vollständig zu bestimmen, werden ausser dieser Gleichung in jedem Punkte desselben Eine Bedingung für die Anfangszeit und für die Folge in jedem Oberflächenpunkte zwei Bedingungen erforderlich sein.

Ich werde nun die Consequenzen dieser Gesetze in einigen besonderen Fällen mit der Erfahrung vergleichen.

Für das Gleichgewicht (in einem System isolirter Leiter) ist

$$\frac{\partial u}{\partial x} - \beta^2 \frac{\partial \varrho}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} - \beta^2 \frac{\partial \varrho}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial z} - \beta^2 \frac{\partial \varrho}{\partial z} = 0$$

oder

$$u + \beta^2 \varrho = \text{Const.},$$

oder, da $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -4\pi \varrho$,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} - \frac{4\pi}{\beta^2} (u - \text{Const.}) = 0.$$

Für die Stromausgleichung oder den Beharrungszustand der Vertheilung (im Schliessungsbogen constanter Ketten) ist

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} = 0,$$

oder

$$\varrho - \beta^2 \left(\frac{\partial^2 \varrho}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varrho}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varrho}{\partial z^2} \right) = 0.$$

Wenn nun die Länge β gegen die Dimensionen des ponderabeln Körpers sehr klein ist, so nimmt $u - \text{Const.}$ im erstem Falle und ϱ im zweiten von der Oberfläche ab sehr schnell ab und ist im Innern überall sehr klein, und zwar ändern diese Grössen mit dem Abstände p von der Oberfläche nahe wie $e^{-\frac{p}{\beta}}$. Dieser Fall wird bei den metallischen Leitern angenommen werden müssen; wird $\beta = 0$ gesetzt, so erhält man die bekannten Formeln für vollkommene Leiter.

Bei der Anwendung dieser Gesetze auf die Rückstandsbildung in der Leydener Flasche musste ich, da Angaben über die Dimensionen der Apparate fehlten, annehmen, dass die Dimensionen derselben gegen den Abstand der Belegungen als unendlich gross betrachtet werden dürften. Mit der Ausführung der Rechnung wage ich die verehrten Anwesenden nicht zu ermüden und begnüge mich das Resultat derselben anzugeben.

Aus den Messungen des Herrn Prof. Kohlrausch hatte sich ergeben, dass die disponible Ladung, als Function der Zeit betrachtet, nahe durch eine Parabel dargestellt wird, dass jedoch der Parameter der Parabel, welche sich der Ladungscurve am nächsten anschliesst, langsam abnimmt, so dass wenn man die anfängliche Ladung durch L_0 , die zur Zeit t durch L_t bezeichnet, $-\frac{dL_t}{dt}$ eine Grösse ist, welche mit wachsendem t allmählich abnimmt.

Dasselbe ergab sich auch aus der Rechnung, wenn angenommen wurde, dass sowohl α als β^2 beim Glase, wie dies von vorn herein zu erwarten war, sehr gross sei und als unendlich gross betrachtet werden dürfe, während ihr Quotient endlich bleibt. Eine schärfere Vergleichung der Rechnung mit den Beobachtungen habe ich nicht angestellt, namentlich aus dem Grunde, weil mir Angaben über die Dimensionen der Apparate und überhaupt alle Mittel fehlten, die wegen der Abweichungen von den Voraussetzungen der Rechnung nöthigen Correctionen zu bestimmen. Es wäre eine solche namentlich zur Bestimmung der electricischen Constanten des Glases zu wünschen. Doch halte ich das hier aufgestellte Gesetz für die Vertheilung der Spannungselectricität für vollkommen durch die Messungen des Herrn Prof. Kohlrausch bestätigt.

Ich darf wohl noch in der Kürze die Anwendung dieses Gesetzes auf einen andern Gegenstand besprechen.

Bekanntlich wird die Fortpflanzung der galvanischen Ströme in metallischen Leitern und die in Folge derselben stattfindende Stromausgleichung bei Constanten oder langsam sich ändernden electromotorischen Kräften durch die dabei auftretende Spannungselectricität bewirkt. Dieser Vorgang ist wegen seiner ungemein kurzen Dauer und der hinzukommenden thermischen und magnetischen Wirkungen nur in seinen Resultaten der experimentalen Forschung zugänglich, und die einzigen experimentellen Bestimmungen, welche wir darüber haben, sind die Messungen der Fortpflanzungsgeschwindigkeit in Telegraphendrähten und die Ohm'schen Gesetze der Stromausgleichung. Eine genauere Analyse der Ohm'schen Gesetze führt indess ebenfalls zu der hier gemachten Annahme, und ich wurde in der That dadurch zuerst auf sie geführt.

Ohm bestimmt die Stromvertheilung bei der Stromausgleichung durch folgende zwei Bedingungen:

1. Um die den wirklich erfolgten Stromintensitäten proportionalen electromotorischen Kräfte zu erhalten, muss man zu den äussern electromotorischen Kräften Kräfte hinzufügen, welche die Differentialquotienten Einer Function des Orts, der *Spannung*, sind.

2. Bei der Stromausgleichung strömt in jeden Theil des ponderabeln Leiters eben so viel Electricität ein als aus.

Ohm glaubte nun, dass die Spannung, diese Function des Orts, von welcher die inneren electromotorischen Kräfte die Differentialquotienten sind, von der Spannungselectricität so abhinge, dass sie ihrer Dichtigkeit proportional sei, welche Annahme in der That das Zustandekommen beider Bedingungen erklärt. Aber es haben schon, fast gleichzeitig, Herr Prof. Weber⁷ und Kirchhoff⁸ darauf aufmerksam gemacht, dass dann die Electricität im Gleichgewicht sein müsste, wenn sie den ponderabeln Körper mit gleichmässiger Dichtigkeit erfüllte, während sie doch der Erfahrung nach beim Gleichgewicht auf der Oberfläche vertheilt ist. Die Spannung muss eine Function sein, welche beim Gleichgewicht im ganzen Leiter constant ist, und also vielmehr dem Potential der Spannungselectricität proportional sein, und diese innern electromotorischen Kräfte sind mit den dem Coulomb'schen Gesetz gemässen identisch.

Diese Ansicht über die Spannung wurde auch von den meisten Forschern angenommen. Dabei aber blieb es ununtersucht, durch welche Ursachen bei der Stromausgleichung die zweite Bedingung hergestellt wurde, dass in jedem ponderabeln Körpertheil die Electricitätsmenge constant bleibe.

Nach der dualistischen Auffassung muss sowohl die positive als die negative Electricitätsmenge constant bleiben; dass kein merklicher Ueberschuss Einer Electricität sich bilde, scheint man, wenigstens so lange man auf die Grössenverhältnisse nicht näher eingeht, aus der Anziehung der entgegengesetzten Electricitäten nach dem Coulomb'schen Gesetz erklären zu können, und man muss dann noch eine Ursache, dass die neutrale Electricität in jedem Körpertheil constant bleibe, also einen Druck des Ponderabile auf sie, annehmen. Diese Annahme habe ich auf Anregung des Herrn Prof. Weber schon vor mehreren Jahren der Rechnung zu unterwerfen gesucht, ohne zu einem befriedigenden Resultat zu gelangen.

Nach unitarischer Auffassung bedarf es nur einer Ursache, welche die in einem ponderabeln Körpertheil enthaltene Electricitätsmenge constant zu erhalten strebt. Man wird so geradeswegs zu der obigen Annahme geführt, dass jeder ponderabele Körper Electricität von bestimmter Dichtigkeit zu besitzen strebt und sowohl einem grösseren als einem geringeren erfüllt Sein widerstrebt. Das Gesetz dieses Widerstrebens kann man so annehmen, wie es sich für das Glas durch die Erfahrung bestätigt hat.

Diese Betrachtungen führen also dazu, die ursprüngliche Franklin'sche Auffassung der electrischen Erscheinungen als diejenige anzunehmen, welche man für das tiefere Eindringen in den Zusammenhang dieser Erscheinungen unter sich und mit andern Erscheinungen zu Grunde zu legen und der weitem Aus- und Umbildung nach den Geboten und Winken der Erfahrung zu unterwerfen hat.

Möchten sie in dem Kreise bewährter Forscher, vor denen ich sie zu entwickeln die Ehre hatte, einer nähern Prüfung werth gefunden werden.

⁷Abhandlungen d. k. sächs. Ges. d. W. 1852, I. S. 293.

⁸Poggendorffs Annalen. Bd. 79, S. 506.

III. Zur Theorie der Nobili'schen Farbenringe.

(Aus Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie. Bd. 95, 28. März 1855.)

Die Nobili'schen Farbenringe bilden ein schätzbares Mittel, die Gesetze der Stromverzweigung in einem durch Zersetzung leitenden Körper experimentell zu studiren. Die Erzeugungsweise dieser Ringe ist folgende. Man übergiesst eine Platte von Platin, vergoldetem Silber oder Neusilber mit einer Auflösung von Bleioxyd in concentrirter Kalilauge und lässt den Strom einer starken galvanischen Batterie durch die Spitze eines feinen in eine Glasröhre eingeschmolzenen Platindrahts in die Flüssigkeitsschicht ein- und durch die Platte austreten. Das Anion, Bleisuperoxyd nach Beetz, lagert sich dann auf der Metallplatte in einer zarten durchsichtigen Schicht ab, welche je nach der Entfernung vom Eintrittspunkte des Stroms verschiedene Dicke besitzt, so dass die Platte nach Entfernung der Flüssigkeit Newtonische Farbenringe zeigt. Aus diesen Farbenringen lässt sich dann die relative Dicke der Schicht in verschiedenen Entfernungen bestimmen und hieraus mittelst des Faraday'schen Gesetzes, nach welchem die Menge der abgeschiedenen Substanz der durchgegangenen Electricitätsmenge allenthalben proportional sein muss, die Stromvertheilung beim Austritt aus der Flüssigkeit ableiten.

Der erste Versuch, die Stromvertheilung durch Rechnung zu bestimmen und das gefundene Resultat mit der Erfahrung zu vergleichen, ist von E. Becquerel gemacht worden. Derselbe hat vorausgesetzt, dass die Ausdehnung der Flüssigkeitsschicht gegen ihre Dicke als unendlich gross betrachtet werden dürfe, der Strom durch einen Punkt ihrer Oberfläche eintrete und sich nach den Ohm'schen Gesetzen in derselben ausbreite. Er glaubt nun bei diesen Voraussetzungen ohne merklichen Fehler die Strömungscurven als gerade Linien betrachten zu können und leitet aus dieser Annahme das Gesetz ab, dass die Dicke der niedergeschlagenen Schicht dem Abstände vom Eintrittspunkte umgekehrt proportional sein müsste, welches Gesetz er experimentell bestätigt habe.

Herr Du-Bois-Reymond hat dagegen in einem vor der physikalischen Gesellschaft zu Berlin gehaltenen Vortrage gezeigt, dass bei Voraussetzung gerader Strömungslinien die Dicke der in ihrem Endpunkte abgeschiedenen Substanz vielmehr dem Cubus ihrer Länge umgekehrt proportional sich ergibt und dadurch Herrn Beetz zu einer Reihe von dem Anschein nach bestätigenden Versuchen veranlasst, welche in Poggendorff's Annalen Bd. 71, S. 71 beschrieben sind und viel Vertrauen erwecken.

Die genaue Rechnung indessen lehrt, dass die Voraussetzung gerader Strömungslinien unzulässig ist und ein ganz falsches Resultat liefert. Allerdings sind die Strömungslinien, wenigstens bei grösserer Entfernung ihres Austrittspunktes (da sie zwischen zwei sehr nahen Parallel-Linien liegen und höchstens einen Wendepunkt besitzen), in dem mittleren Theile ihres Laufes in beträchtlicher Ausdehnung sehr wenig gekrümmt; hieraus aber darf man keineswegs schliessen, dass sie ohne merklichen Fehler durch gerade von ihrem Eintrittspunkte nach ihrem Austrittspunkte gehende Linien ersetzt werden können.

Ich werde zunächst die bei genauer Rechnung aus den Voraussetzungen der Herren E. Becquerel und Du-Bois-Reymond fliessenden Folgerungen entwickeln und schliesslich auf die Versuche des Herrn Beetz zurückzukommen mir erlauben.

Ich nehme an, dass der Eintritt des Stromes in die durch zwei horizontale Ebenen begrenzte Flüssigkeitsschicht in einem Punkte stattfinde, und bezeichne für einen Punkt derselben den Horizontalabstand vom Einströmungspunkt durch r , die Höhe über der unteren Grenzfläche durch z , die Erhebung seiner Spannung über die Spannung an der

oberen Seite dieser Grenzfläche durch u .⁽⁹⁾ Es muss nun u als Function von r und z bestimmt werden; die Stromintensität im Punkte (r, z) , welcher nach dem Faraday'schen Gesetz die gesuchte Dicke der dort niedergeschlagenen Schicht proportional sein muss, ist dann gleich dem Werthe von $-\frac{1}{W} \frac{\partial u}{\partial z}$ in diesem Punkte.

Wird zunächst vorausgesetzt, dass die Ausdehnung der Flüssigkeitsschicht gegen ihre Dicke als unendlich gross betrachtet werden dürfe, so sind die Bedingungen zur Bestimmung von u :

(1) für $-\infty < r < \infty, 0 < z < \beta$:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0;$$

(2) für $-\infty < r < \infty, z = 0: u = 0$;

(3) für $-\infty < r < \infty, z = \beta: \frac{\partial u}{\partial z} = 0$;

(4) für $r = \pm\infty, 0 < z < \beta: u$ endlich;

(5) für $r = 0, z = \alpha: u = \frac{1}{WS} \frac{1}{\sqrt{rr + (z - \alpha)^2}}$ oder =
 $\frac{1}{WS} \frac{1}{\sqrt{rr + (z - \alpha)^2}} + \text{einer stetigen Function von } r, z,$

je nachdem der Einströmungspunkt im Innern oder in der Oberfläche liegt.

Diesen Bedingungen genügt

$$u = \frac{1}{WS} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} (-1)^m \left(\frac{1}{\sqrt{rr + (z + 2m\beta - \alpha)^2}} + \frac{1}{\sqrt{rr + (z + 2m\beta + \alpha)^2}} \right)$$

oder wenn man zur Vereinfachung $S = \frac{1}{W}$ annimmt:

$$u = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} (-1)^m \left(\frac{1}{\sqrt{rr + (z + 2m\beta - \alpha)^2}} + \frac{1}{\sqrt{rr + (z + 2m\beta + \alpha)^2}} \right).$$

Setzt man $u = a_1 \sin \frac{\pi z}{2\beta} + a_2 \sin 2 \frac{\pi z}{2\beta} + a_3 \sin 3 \frac{\pi z}{2\beta} + \dots$, so wird für ein gerades m der Coefficient $a_m = 0$ und für ein ungerades

$$\begin{aligned} a_m &= \frac{2}{\beta} \int_0^\beta u \sin m \frac{\pi z}{2\beta} dz \\ &= \frac{2}{\beta} \int_0^\beta \sum_{m=-\infty}^{+\infty} (-1)^m \left(\frac{1}{\sqrt{rr + (z + 2m\beta - \alpha)^2}} + \frac{1}{\sqrt{rr + (z + 2m\beta + \alpha)^2}} \right) \sin m \frac{\pi z}{2\beta} dz \\ &= 2 \sin m \frac{\pi \alpha}{2\beta} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin m \frac{\pi t}{2\beta}}{\sqrt{rr + tt}} dt. \end{aligned}$$

In letzterem Integral kann statt $\int_{-\infty}^{+\infty}$ auch $2 \int_0^{+\infty}$ geschrieben werden.

Führt man für t als Veränderliche $t\tau$ ein, so erhält man

⁹Ferner sei die Stärke des ganzen Stromes S , der spezifische Leitungswiderstand der Flüssigkeit W , im Einströmungspunkt $z = \alpha$, an der Oberfläche $0 = \beta$.

$$\frac{\beta}{2}a_m = 2 \sin m \frac{\pi\alpha}{2\beta} \int_0^\infty \frac{\sin m \frac{\pi\tau}{2\beta} d\tau}{\sqrt{rr + \tau^2}},$$

also

$$u = \frac{4}{\beta} \sum_n \sin n \frac{\pi\alpha}{2\beta} \sin n \frac{\pi z}{2\beta} \int_0^\infty \frac{\sin n \frac{\pi t}{2\beta} dt}{\sqrt{rr + tt}},$$

über alle positiven ungeraden Werthe von n ausgedehnt.

Nimmt man an, dass die Flüssigkeit bei $r = c$ begrenzt sei und zwar beispielshalber durch einen Nichtleiter, so muss für $r = c$ $\frac{\partial u}{\partial r} = 0$ werden und also zu dem oben erhaltenen Werth von u , der durch u' bezeichnet werden möge, noch eine Function u'' hinzugefügt werden, welche folgenden Bedingungen genügt:

(1) für $-c < r < c$, $0 < z < \beta$:

$$\frac{\partial^2 u''}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u''}{\partial r} + \frac{\partial^2 u''}{\partial z^2} = 0;$$

(2) für $-c < r < c$, $z = 0$: $u'' = 0$;

(3) für $-c < r < c$, $z = \beta$: $\frac{\partial u''}{\partial z} = 0$;

(4) für $r = \pm c$, $0 < z < \beta$: $\frac{\partial u''}{\partial r} = -\frac{\partial u'}{\partial r}$,

und überall stetig ist.

Den Bedingungen (1) bis (3) zufolge muss u'' ebenfalls in der Form

$$u'' = b_1 \sin \frac{\pi z}{2\beta} + b_3 \sin 3 \frac{\pi z}{2\beta} + b_5 \sin 5 \frac{\pi z}{2\beta} + \dots$$

darstellbar sein, und zwar fließt aus (1) für b_n die Bedingung

$$\frac{\partial^2 b_n}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial b_n}{\partial r} - \frac{n\pi\pi}{4\beta\beta} b_n = 0.$$

Eine particuläre Lösung dieser Gleichung ist, wie schon bekannt, $\frac{1}{\sqrt{rr-1}}$; eine andere erhält man, wenn man dasselbe Integral zwischen -1 und 1 nimmt; die allgemeinste ist also, wenn c_n und γ_n Constanten bedeuten,

$$b_n = c_n \int_1^\infty \frac{e^{-\frac{n\pi r q}{2\beta}} dq}{\sqrt{qq-1}} + \gamma_n \int_{-1}^{+1} \frac{e^{-\frac{n\pi r q}{2\beta}} dq}{\sqrt{1-qq}}.$$

oder wenn man

$$\int_1^\infty \frac{e^{-q^2 t} dt}{\sqrt{t-1}} \text{ durch } f(q), \quad \int_{-1}^{+1} \frac{e^{-q^2 t} dt}{\sqrt{1-tt}} \text{ durch } \varphi(q)$$

bezeichnet:

$$b_n = c_n f\left(\frac{n\pi r}{2\beta}\right) + \gamma_n \varphi\left(\frac{n\pi r}{2\beta}\right).$$

Die Entwicklung nach steigenden Potenzen von q giebt

$$\varphi(q) = \pi \sum_{0,\infty} \frac{q^{2m}}{\Pi(m)\Pi(m)},$$

$$f(q) = -\varphi(q) \log q + \pi \sum_{0,\infty} W(m) \frac{q^{2m}}{\Pi(m)\Pi(m)};$$

es wird also $f(q)$ für $q = 0$ unendlich und damit u'' für $r = 0$ stetig bleibe, muss $c_n = 0$ sein; γ_n ergibt sich dann aus (4) gleich

$$\gamma_n = \frac{4 \sin n \frac{\pi\alpha}{2\beta} \cdot a}{\varphi\left(\frac{n\pi c}{2\beta}\right)},$$

mithin

$$u'' = \frac{4}{\beta} \sum_n \sin n \frac{\pi\alpha}{2\beta} \sin n \frac{\pi z}{2\beta} \cdot a \cdot \frac{\varphi\left(\frac{n\pi r}{2\beta}\right)}{\varphi\left(\frac{n\pi c}{2\beta}\right)}$$

über alle positiven ungeraden Werthe von n ausgedehnt.

Zur Berechnung von $f(q)$ und $\varphi(q)$ können für grosse Werthe von q die halbconvergenten Reihen

$$f(q) = \frac{e^{-2q}}{\sqrt{2q}} \sum_{0,\infty} \frac{(1 \cdot 3 \cdots 2m-1)^2}{m!(16q)^m},$$

$$\varphi(q) = \frac{e^{2q}}{\sqrt{2q}} \sum_{0,\infty} (-1)^m \frac{(1 \cdot 3 \cdots 2m-1)^2}{m!(16q)^m}$$

benutzt werden, welche indess ihren Werth nur bis auf Bruchtheile von der Ordnung der Grösse e^{-4q} geben; genügt diese Genauigkeit nicht, so ist es wohl am zweckmässigsten die Entwicklungen nach steigenden Potenzen von q anzuwenden.

Für hinreichend grosse Werthe von $\frac{c}{r}$ erhält man also mit Vernachlässigung von Grössen von der Ordnung der Grösse $e^{-\frac{4\pi r}{2\beta}}$:

$$\begin{aligned} -\frac{\partial u}{\partial z} &= \frac{4}{\beta} \sum_n n \sin n \frac{\pi\alpha}{2\beta} \cos n \frac{\pi z}{2\beta} \cdot a \cdot \frac{e^{-\frac{n\pi(c-r)}{2\beta}}}{e^{-\frac{n\pi c}{2\beta}} \sqrt{\frac{c}{r}}} \\ &\quad \times \sum_{0,\infty} \frac{(1 \cdot 3 \cdots 2m-1)^2}{m!(2m-1)^2} \left(\frac{\beta}{4\pi r}\right)^m \left(\frac{n}{2}\right)^{2m-1}, \end{aligned}$$

und die Dicke der Schicht proportional $\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)_0$ oder proportional

$$\frac{1}{\sqrt{r}} \sum_{0,\infty} \frac{(1 \cdot 3 \cdots 2m-1)^2}{m!(47rc)^m} \left(\frac{\beta}{r}\right)^m \sum_n n^{2m} \sin n \frac{\pi\alpha}{2\beta} \cdot e^{-\frac{n\pi(c-r)}{2\beta}}.$$

Dieses Resultat bleibt im Allgemeinen auch richtig, wenn statt des Einströmungspunktes eine beliebige Umdrehungsfläche als Kathode angenommen wird; denn für Werthe von

r zwischen c und demjenigen Werthe, bis zu welchem die Bedingungen (1) bis (3) gültig bleiben, muss u auch dann durch eine Reihe von der Form

$$u = \sum_n b_n \sin n \frac{\pi z}{2\beta} \cdot \frac{\varphi\left(\frac{n\pi r}{2\beta}\right)}{\varphi\left(\frac{n\pi c}{2\beta}\right) - f\left(\frac{n\pi c}{2\beta}\right) \cdot \frac{f\left(\frac{n\pi a}{2\beta}\right)}{\varphi\left(\frac{n\pi a}{2\beta}\right)}}$$

dargestellt werden. Eine Ausnahme würde nur eintreten, wenn $\frac{f\left(\frac{n\pi a}{2\beta}\right)}{\varphi\left(\frac{n\pi a}{2\beta}\right)} = 0$ würde.

Die von Herrn E. Becquerel gemachte und von Herrn Du-Bois-Reymond im Wesentlichen beibehaltene specielle Voraussetzung ist die, dass die Kathode ein Punkt der Oberfläche, also $\alpha = \beta$ sei; in diesem Falle ist, wie die geführte Rechnung zeigt, die Dicke der Schicht für grosse Werthe von $\frac{c}{r}$ weder der Entfernung vom Einstromungspunkte, wie Herr Becquerel, noch ihrem Cubus, wie Herr Du-Bois-Reymond gefunden hat, umgekehrt proportional, sondern sie nimmt mit wachsenden $\frac{c}{r}$ vielmehr ab, wie eine Potenz mit dem Exponenten $-\frac{1}{2}$, so dass $\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)_0 \sqrt{r}$ sich einem festen Grenzwerte schliesslich bis zu jedem Grade nähert. Dagegen ist das Gesetz des Herrn Du-Bois-Reymond nicht bloss näherungsweise für grosse Werthe von $\frac{c}{r}$, sondern streng richtig, wenn $\beta = \infty$ ist, da sich alsdann

$$u = \sum_{-\infty}^{+\infty} (-1)^m \left(\frac{1}{\sqrt{rr + (z - 2m\beta - \alpha)^2}} - \frac{1}{\sqrt{rr + (z - 2m\beta + \alpha)^2}} \right)$$

auf

$$u = \frac{1}{\sqrt{rr + (z - \alpha)^2}}$$

und folglich

$$\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)_0 = \frac{\alpha}{\sqrt{rr + \alpha\alpha}}$$

reducirt. Die Vermuthung aber, aus welcher derselbe dieses Resultat abgeleitet hat, dass nämlich die Strömungslinien als gerade betrachtet werden dürften, bestätigt sich keineswegs. Die Gleichung der Strömungslinien ist

$$\int \left(\frac{z dr - r dz}{z^2 + r^2} \right) = v = \text{const.},$$

und zwar ist die Constante, multiplicirt mit $\frac{1}{2\pi}$, wenn man das Integral so nimmt, dass es für $r = 0$ verschwindet, gleich dem innerhalb der Umdrehungsfläche ($v = \text{const.}$) fliessenden Theile des Stromes. In unserm Falle also sind die Strömungslinien die in der Gleichung

$$v = \sum_m \frac{z + \alpha}{\sqrt{rr + (z + \alpha)^2}} - \frac{z - \alpha}{\sqrt{rr + (z - \alpha)^2}} = \text{const.}$$

enthaltenen Linien, welche Linien für alle grösseren Werthe der const. beträchtlich von einer geraden abweichen. Da Herr Du-Bois-Reymond zwar die Annahme macht, dass der

Einströmungspunkt in der Oberfläche liege, seine ferneren Schlüsse aber nicht wesentlich auf diese Annahme stützt, so liegt wohl die Vermuthung nahe, dass bei den Versuchen des Herrn Beetz, welche eine nicht zu verkennende Annäherung an das Gesetz der Cuben ergeben, die Forderung des Herrn Du-Bois-Reymond, dass die Oberfläche der Flüssigkeit durch den Einströmungspunkt gehe, nicht berücksichtigt worden ist, sondern dass Herr Beetz, was zweckmässiger sein dürfte, grössere Flüssigkeitsmengen anwandte, so dass in der Reihe für $\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)_0$

$$\sum_m (-1)^m \left(\frac{2m\beta + \alpha}{\sqrt{rr + (2m\beta + \alpha)^2}} - \frac{2m\beta - \alpha}{\sqrt{rr + (2m\beta - \alpha)^2}} \right)$$

die späteren Glieder oder doch ihre Summe gegen das erste vernachlässigt werden konnten. In diesem Falle würden die hübschen Versuche des Herrn Beetz wirklich als ein Beweis anzusehen sein, dass die Stromvertheilung nahezu nach den vorausgesetzten Gesetzen erfolgt.

Sollte aber diese Vermuthung irrig sein, so wäre aus Herrn Beetz's Versuchen zu schliessen, dass noch andere Umstände bei der Berechnung der Stromvertheilung in Betracht zu ziehen sind, deren Ermittlung einer neuen experimentellen Untersuchung obliegen würde.¹⁰

Anmerkungen.

(1) (Zu Seite 56.) Es ist hier die Voraussetzung gemacht, dass die Spannung (das Potential) in der begrenzenden Platte constant sei, oder, was damit gleichbedeutend ist, dass die Strömung überall senkrecht gegen die Grenzfläche erfolgt. Da die begrenzende Platte in den Versuchen von Metall ist, dessen Leitungsfähigkeit gegen die der Flüssigkeit ausserordentlich gross ist, so ist diese Annahme statthaft. Ein Bedenken dagegen würde nur dann zu erheben sein, wenn die Metallplatte sehr dünn wäre. (Vgl. eine Mittheilung des Herausgebers "Ueber stationäre Strömung der Electricität in Platten" in den Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften 1889 Nr. 6.)

¹⁰In einer späteren Abhandlung (Poggendorff's Annalen Bd. 95, p. 22) ist Beetz auf diesen Gegenstand zurückgekommen. Es ergibt sich daraus zunächst, dass bei den Versuchen von Beetz die Einströmungsstelle immer unmittelbar an der Oberfläche der Flüssigkeit lag und mithin die Vermuthung von Riemann irrig ist. Es ist aber gleichwohl nicht nothwendig, nach anderen Umständen zu suchen, welche die Gesetze der Stromvertheilung beeinflussen könnten, da das theoretische Resultat von Riemann mit den Versuchen in noch vollständigerer Uebereinstimmung steht als das von Du-Bois-Reymond, wie aus den in der erwähnten Abhandlung enthaltenen Zusammenstellungen zu ersehen ist.

Am Anfang der achtziger Jahre sind solche Versuche in ausgedehntem Maasse und unter mannigfach veränderten Umständen von Guebhard angestellt worden. Die theoretische Deutung, die Guebhard seinen Versuchen giebt, stimmt mit der von Riemann nicht überein. Es scheint, dass bei diesen Vorgängen ausser der Leitung der Electricität noch andere Einflüsse, besonders die electromotorische Kraft der Polarisation zu berücksichtigen sind. (Compt. rend. 90, 93, 94. Journal de Physique (2) I, u. II. und in der Zeitschrift L'Electricien.) W.

(2) (Zu Seite 58.) Die Umformung

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-\frac{n\pi t}{2\beta}} dt}{\sqrt{rr+tt}} = 2 \int_0^{\infty} \frac{\sin n \frac{\pi t}{2\beta} dt}{\sqrt{rr+tt}}$$

beruht auf dem Satze, dass bei der Integration einer Function complexen Arguments der Integrationsweg geändert werden darf, wenn dabei kein singulärer Punkt überschritten wird.

(3) (Zu Seite 59.) Die Reihenentwicklungen für die Functionen $f(q)$ und $\varphi(q)$ lassen sich auf elementarem Wege folgendermaassen ableiten.

Die beiden Functionen

$$\int_1^{\infty} \frac{e^{-2qt} dt}{\sqrt{tt-1}}, \quad \int_{-1}^{+1} \frac{e^{-2qt} dt}{\sqrt{1-tt}}$$

sind particuläre Lösungen der Differentialgleichung (auf Seite 58)

$$\frac{d^2 y}{dq^2} + \frac{1}{q} \frac{dy}{dq} - 4y = 0.$$

Integriert man diese Differentialgleichung durch eine nach steigenden Potenzen von q fortschreitende Reihe, so erhält man, wenn man einen constanten Factor durch $\varphi(0) = \pi$ bestimmt,

$$\varphi(q) = \pi \sum_{0,\infty} \frac{q^{2m}}{\Pi(m)\Pi(m)},$$

wenn man sich des Gauss'schen Zeichens $\Pi(m)$ bedient, das für ein ganzzahliges m die Bedeutung $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m$ oder $m!$ hat.

Eine zweite particuläre Lösung findet sich nun, wenn man

$$y = u - \frac{1}{\pi} \varphi(q) \log q$$

setzt und für u eine Potenzreihe von der Form

$$u = \sum_{0,\infty} a_m \frac{q^{2m}}{\Pi(m)\Pi(m)}$$

aus der Differentialgleichung ableitet.

Für die Coefficienten a_m erhält man die Recursionsformel

$$a_m - a_{m-1} = -\frac{1}{m}$$

und folglich, wenn man den ersten unbestimmt bleibenden Coefficienten $a_0 = W(0)$ setzt,

$$a_m = W(0) + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{m} = W(m),$$

worin $W(m)$ die von Gauss eingeführte Function $\frac{d \log \Pi(m)}{dm}$ ist. (Gauss. Disq. circa ser. inf. Werke Bd. III, Seite 153.)

Setzt man also

$$F(q) = \sum_{0,\infty} W(m) \frac{q^{2m}}{\Pi(m)\Pi(m)},$$

so muss, wenn A, B noch zu bestimmende Constanten sind,

$$f(q) = AF(q) + B\varphi(q)$$

sein. Die Werthe dieser Constanten erhält man aus $q = 0$. Es ist nämlich

$$\lim_{q=0} (F(q) + \log q) = W(0),$$

und durch partielle Integration:

$$\begin{aligned} f(q) &= \int_1^\infty \frac{e^{-2qt} dt}{\sqrt{tt-1}} = \int_1^\infty e^{-2qt} d\log(\sqrt{tt-1} + t) \\ &= -e^{-2q} \log q + 2 \int_1^\infty e^{-2qt} \log(\sqrt{tt-1} + t) dt, \end{aligned}$$

also

$$\lim_{q=0} (f(q) + \log q) = 2 \int_1^\infty e^{-2qt} \log 2t dt = \int_0^\infty e^{-t} \log t dt = W(0).$$

Also erhält man $A = 1, B = 0$ und in Uebereinstimmung mit der Formel des Textes $f(q) = F(q)$.

(4) (Zu Seite 59.) Von den beiden nach fallenden Potenzen von q fortschreitenden (halbconvergenten) Reihen erhält man die erste, einschliesslich der Genauigkeitsgrenze, aus dem Integralausdruck

$$f(q) = \int_1^\infty \frac{e^{-2qt} dt}{\sqrt{tt-1}} = \frac{e^{-2q}}{\sqrt{2q}} \int_0^\infty \frac{e^{-s} ds}{\sqrt{s(1 + \frac{s}{4q})}}$$

durch Entwicklung von $\left(1 + \frac{s}{4q}\right)^{-\frac{1}{2}}$ nach steigenden Potenzen von s nach dem Taylor'schen Lehrsatz mit Rücksicht auf das Restglied. Die zweite dieser Formeln aber bot Schwierigkeiten, die bereits H. Hankel in einer Arbeit über die Cylinderfunctionen (Bd. I der Mathem. Annalen) hervorhob. Zur Aufklärung sollen mit Bezugnahme auf eine Abhandlung des Herausgebers (Zur Theorie der Bessel'schen Functionen, Mathem. Annalen Bd. XXXVII, S. 404) die folgenden Bemerkungen hier Platz finden.

Definirt man mit Benutzung einer jetzt üblichen Bezeichnung zwei Functionen des complexen Argumentes x

$$J(x) = \sum_{0,\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{\Pi(m)\Pi(m)}, \quad Y(x) = 2 \sum_{0,\infty} \frac{W(m)(-1)^m x^{2m}}{\Pi(m)\Pi(m)},$$

wobei, um $Y(x)$ eindeutig zu bestimmen, $\log \frac{x}{2}$ für reelle positive Werthe von x reell und die x -Ebene durch einen längs des negativen Theils der reellen Axe verlaufenden Schnitt begrenzt angenommen sei, so wird, indem wir q als reell und positiv voraussetzen,

$$\varphi(q) = \pi J(2iq), \quad f(q) = -\frac{\pi}{2} Y(2iq) + \frac{\pi W(0)}{2} J(2iq).$$

In der oben erwähnten Arbeit sind zwei Functionen

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-q}f(q) = S_2(2iq), \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^q\varphi(q) = S_1(2iq)$$

definiert, durch die sich $J(x)$, $Y(x)$ und folglich auch $\varphi(q)$, $f(q)$ ausdrücken lassen:

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-q}f(q) = S_2(2iq) - iS_1(2iq)e^{-2q}.$$

Nun folgt aus Art. X der genannten Abhandlung, dass, wenn $S_1(2iq)$, $S_2(2iq)$ durch die endlichen Reihen

$$S_1(2iq) = \sum_{0,n-1} \frac{(1 \cdot 3 \cdots 2m-1)^2}{m!(16q)^m},$$

$$S_2(2iq) = \sum_{0,n-1} (-1)^m \frac{(1 \cdot 3 \cdots 2m-1)^2}{m!(16q)^m}$$

ersetzt werden, der Fehler für ein reelles positives q , sofern $n < 4q$ und nicht zu klein ist, etwa von der Grösse

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{(1 \cdot 3 \cdots 2n-1)^2}{n!(16q)^n}$$

oder, wenn man mit der willkürlichen Zahl n möglichst nahe an $4q$ herangeht,

$$\frac{e^{-4q}}{\sqrt{q}}$$

ist. Mit gleicher Genauigkeit kann man also auch

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-q}f(q), \quad \sqrt{\frac{\pi}{2}}e^q\varphi(q)$$

durch dieselben Ausdrücke darstellen, in Uebereinstimmung mit den Formeln des Textes.

Es darf hier natürlich der Begriff der halbconvergenten Reihe nicht in dem beschränkten Sinne gebraucht werden, wonach die Summe der n ersten Glieder einem bestimmten Werthe so sich nähert, dass der Unterschied immer kleiner ist als das zuletzt hinzugefügte Glied. Eine divergente Reihe mit nur positiven Gliedern kann selbstverständlich jeden beliebigen positiven Werth in dem Sinne genähert darstellen, dass der Werth der Summe den darzustellenden Werth durch Hinzufügung eines weiteren Gliedes überschreitet, und dass also, wenn man unmittelbar vor oder nach diesem Gliede abbricht, der Fehler kleiner ist als dies Glied, und dann wieder fortwährend wächst. Es kommt also nur darauf an, die am zweckmässigsten anzuwendende Gliederzahl und die ungefähre Grösse des letzten dieser Glieder zu ermitteln. In dem vorliegenden Fall ist dieser Zweck erreicht, wenn man die Gliederzahl n möglichst nahe an $4q$ heranrückt.

IV. Beiträge zur Theorie der durch die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ darstellbaren Functionen.

(Aus dem siebenten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 1857.)

Die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$, als Function ihres vierten Elements x betrachtet, stellt diese Function nur dar, so lange der Modul von x die Einheit nicht überschreitet. Um diese Function in ihrem ganzen Umfange, bei unbeschränkter Veränderlichkeit dieses ihres Arguments, zu untersuchen, bieten die bisherigen Arbeiten über dieselbe zwei Wege dar. Man kann nämlich entweder von einer linearen Differentialgleichung, welcher sie genügt, ausgehen, oder von ihrem Ausdrucke durch bestimmte Integrale. Jeder dieser Wege gewährt eigenthümliche Vorthelle; jedoch ist bis jetzt, in der reichhaltigen Abhandlung von Kummer im 15. Bande des mathematischen Journals von Grelle und auch in den noch unveröffentlichten Untersuchungen von Gauss¹¹, nur der erste betreten, wohl hauptsächlich deshalb, weil die Rechnung mit bestimmten Integralen zwischen complexen Grenzen noch zu wenig ausgebildet war, oder doch nicht als einem grossen Leserkreise geläufig vorausgesetzt werden konnte.

In der folgenden Abhandlung habe ich diese Transcendente nach einer neuen Methode behandelt, welche im Wesentlichen auf jede Function, die einer linearen Differentialgleichung mit algebraischen Coefficienten genügt, anwendbar bleibt. Nach derselben lassen sich die früher zum Theil durch ziemlich mühsame Rechnungen gefundenen Resultate fast unmittelbar aus der Definition ableiten, und dies ist in dem hier vorliegenden Theile dieser Abhandlung geschehen, hauptsächlich in der Absicht für die vielfachen Anwendungen dieser Function in physikalischen und astronomischen Untersuchungen eine bequeme Uebersicht über ihre möglichen Darstellungen zu geben. Es ist nöthig, einige allgemeine Vorbemerkungen über die Betrachtung einer Function bei unbeschränkter Veränderlichkeit ihres Arguments voraufzuschicken.

Betrachtet man den Werth der unabhängig veränderlichen Grösse $x = y + zi$ zur leichteren Auffassung ihrer Veränderlichkeit als vertreten durch einen Punkt einer unendlichen Ebene, dessen rechtwinklige Coordination y, z sind, und denkt sich die Function w in einem Theile dieser Ebene gegeben, so kann sie von dort aus nach einem leicht zu beweisenden Satze nur auf eine Weise der Gleichung $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{1}{i} \frac{\partial w}{\partial y}$ gemäss stetig fortgesetzt werden. Diese Fortsetzung muss selbstredend nicht in blossen Linien geschehen, worauf eine partielle Differentialgleichung nicht angewandt werden könnte, sondern in Flächenstreifen von endlicher Breite. Bei Functionen, welche, wie die hier zu untersuchende, "mehrwertig" sind oder für denselben Werth von x je nach dem Wege, auf welchem die Fortsetzung geschehen ist, mehrere Werthe annehmen können, giebt es gewisse Punkte der x -Ebene, um welche herum sich die Function in eine andere fortsetzt, wie z. B. bei $\sqrt{(x-a)}$, $\log(x-a)$, $(x-a)^\mu$, wenn μ keine ganze Zahl ist, der Punkt a .

Wenn man von diesem Punkte a aus sich eine beliebige Linie gezogen denkt, so kann der Werth der Function in der Umgebung von a so gewählt werden, dass er sich ausserhalb dieser Linie überall stetig ändert; sie nimmt aber dann zu beiden Seiten dieser Linie verschiedene Werthe an, so dass die Fortsetzung der Function über diese Linie hinüber eine von der jenseits schon vorhandenen verschiedene Function giebt.

Zur Erleichterung des Ausdrucks sollen die verschiedenen Fortsetzungen Einer Function für denselben Theil der x -Ebene "Zweige" dieser Function genannt werden und ein

¹¹Gauss Werke. Bd. III 1886. S. 207. W.

Werth von x , um welchen herum sich ein Zweig einer Function in einen andern fortsetzt, ein "Verzweigungswerth"; für einen Werth, in welchem keine Verzweigung stattfindet, heisst die Function "einädrig oder monodrom".

1.

Ich bezeichne durch

$$P \left\{ \begin{array}{ccc|c} a & b & c & x \\ \alpha & \beta & \gamma & \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & \end{array} \right\}$$

eine Function von x , welche folgende Bedingungen erfüllt:

1. Sie ist für alle Werthe von x ausser a, b, c einädrig und endlich.
2. Zwischen je drei Zweigen dieser Function P', P'', P''' findet eine lineare homogene Gleichung mit constanten Coefficienten Statt,

$$c'P' + c''P'' + c'''P''' = 0.$$

3. Die Function lässt sich in die Formen

$$C_\alpha P^{(\alpha)} + C_{\alpha'} P^{(\alpha')}, \quad C_\beta P^{(\beta)} + C_{\beta'} P^{(\beta')}, \quad C_\gamma P^{(\gamma)} + C_{\gamma'} P^{(\gamma')}$$

mit Constanten $C_\alpha, C_{\alpha'}, \dots$ setzen, so dass

$$P^{(\alpha)}(x-a)^{-\alpha}, \quad P^{(\alpha')}(x-a)^{-\alpha'}$$

für $x = a$ einädrig bleiben und weder Null noch unendlich werden, und ebenso $P^{(\beta)}(x-b)^{-\beta}, P^{(\beta')}(x-b)^{-\beta'}$ für $x = b$ und $P^{(\gamma)}(x-c)^{-\gamma}, P^{(\gamma')}(x-c)^{-\gamma'}$ für $x = c$. In Betreff der sechs Grössen $\alpha, \alpha', \dots, \gamma'$ wird vorausgesetzt, dass keine der Differenzen $\alpha - \alpha', \beta - \beta', \gamma - \gamma'$ eine ganze Zahl und die Summe aller, $\alpha + \alpha' + \beta + \beta' + \gamma + \gamma' = 1$ sei.

Wie mannigfaltig die Functionen seien, welche diesen Bedingungen genügen, bleibt vorläufig unentschieden und wird sich im Laufe der Untersuchung (Art. 4) ergeben. Zu grösserer Bequemlichkeit des Ausdrucks werde ich x die *Veränderliche*, a, b, c den *ersten, zweiten, dritten Verzweigungswerth* und $\alpha, \alpha'; \beta, \beta'; \gamma, \gamma'$ das *erste, zweite, dritte Exponentenpaar* der P -function nennen.

2.

Zunächst einige unmittelbare Folgerungen aus der Definition.

In der Function

$$P \left\{ \begin{array}{ccc|c} a & b & c & x \\ \alpha & \beta & \gamma & \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & \end{array} \right\}$$

können die drei ersten Verticalreihen beliebig unter einander vertauscht werden, sowie auch α mit α', β mit β', γ mit γ' . Es ist ferner

$$P \left\{ \begin{array}{ccc|c} a & b & c & x \\ \alpha & \beta & \gamma & \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & \end{array} \right\} = P \left\{ \begin{array}{ccc|c} a_1 & b_1 & c_1 & x_1 \\ \alpha & \beta & \gamma & \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & \end{array} \right\},$$

wenn man für x_1 einen rationalen Ausdruck ersten Grades von x setzt, der für $x = a, b, c$ die Werthe a_1, b_1, c_1 annimmt.

Für

$$P \left\{ \begin{array}{ccc|c} 0 & \infty & 1 & \\ \alpha & \beta & \gamma & x \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & \end{array} \right\},$$

auf welche Function sich demzufolge alle P -functionen mit denselben $\alpha, \alpha', \dots, \gamma'$ zurückführen lassen, werde ich zur Abkürzung auch blos $P \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & \beta & \gamma & \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & x \end{array} \right)$ setzen.

Durch diese Umformung können zwei Exponenten verschiedener Paare beliebig gegebene Werthe erhalten und als Werthe der Exponenten, da zwischen ihnen die Bedingung $\alpha + \alpha' + \beta + \beta' + \gamma + \gamma' = 1$ stattfindet, jedwede andere eingeführt werden, für welche die drei Differenzen $\alpha - \alpha', \beta - \beta', \gamma - \gamma'$ dieselben sind. Aus diesem Grunde werde ich später zur Erleichterung der Uebersicht durch

$$P(\alpha - \alpha', \beta - \beta', \gamma - \gamma', x)$$

sämmtliche in der Form $x^\delta(1-x)^\varepsilon P \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & \beta & \gamma & \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & x \end{array} \right)$ enthaltenen Functionen bezeichnen.

3.

Es ist jetzt vor allen Dingen nöthig, den Verlauf der Function etwas genauer zu untersuchen. Zu diesem Ende denke man sich durch sämmtliche Verzweigungspunkte der Function eine in sich zurücklaufende Linie l gezogen, welche die Gesammtheit der complexen Werthe in zwei Grössengebiete scheidet. Innerhalb jedes von ihnen wird alsdann jeder Zweig der Function stetig und von den übrigen gesondert verlaufen; längs der gemeinschaftlichen Grenzlinie aber werden zwischen den Zweigen des einen und des andern Gebiets in verschiedenen Begrenzungstheilen verschiedene Relationen stattfinden. Zu ihrer bequemeren Darstellung werde ich die mittels des Coefficienten-Systems $S = \begin{pmatrix} p & q & r & s \end{pmatrix}$ aus den Grössen t, u gebildeten linearen Ausdrücke $pt + qu, rt + su$ durch $(S)(t, u)$ bezeichnen. Es möge ferner nach Analogie der von Gauss vorgeschlagenen Benennung "positiv laterale Einheit" für $+i$ als "positive" Seitenrichtung zu einer gegebenen Richtung diejenige bezeichnet werden, welche zu ihr ebenso liegt, wie $+i$ zu 1 (also bei der üblichen Darstellungsweise der complexen Grössen die linke). Demgemäss macht x einen "positiven Umlauf um einen Verzweigungswerth a ", wenn es sich durch die ganze Begrenzung eines nur diesen und keinen andern Verzweigungswerth enthaltenden Grössengebiets in einer gegen die Richtung von Innen nach Aussen positiv liegenden Richtung bewegt. Es gehe nun die Linie l der Reihe nach durch die Punkte $x = c, x = b, x = a$, und in dem auf ihrer positiven Seite liegenden Gebiete seien P', P'' zwei in keinem constanten Verhältnisse stehende Zweige der Function P .

Jeder andere Zweig P''' lässt sich dann, da in der Vorausgesetztermassen stattfindenden Gleichung $c'P' + c''P'' + c'''P''' = 0$ c''' nicht verschwinden kann, linear und mit constanten Coefficienten in P' und P'' ausdrücken. Nimmt man nun an, dass P', P'' durch einen positiven Umlauf der Grösse x um a in $(A)(P', P'')$, um b in $(B)(P', P'')$, um c in $(C)(P', P'')$ übergehe, so wird durch die Coefficienten der Systeme $(A), (B), (C)$ die Periodicität der Function völlig bestimmt sein. Zwischen diesen finden aber noch Relationen Statt.

Wenn nämlich x das negative Ufer der Linie l durchläuft, so müssen die Functionen P', P'' die vorigen Werthe wieder annehmen, da der durchlaufene Weg negativerseits die ganze

Begrenzung eines Grössengebiets bildet, innerhalb dessen diese Functionen allenthalben einändrig sind. Es ist dies aber dasselbe, als ob der Werth x sich von einem der Werthe c, b, a bis zum folgenden auf der positiven Seite fortbewegt, dann aber jedesmal um diesen Werth positiv herum, wobei (P', P'') der Reihe nach in $(C)(P', P'')$, $(C)(B)(P', P'')$, schliesslich in $(C)(B)(A)(P', P'')$ übergeht. Es ist daher

$$(C)(B)(A) = (E), \quad (1)$$

welche Gleichung vier Bedingungsgleichungen zwischen den zwölf Coefficienten von A, B, C liefert.

Bei der Discussion dieser Bedingungsgleichungen beschränke ich mich, zur Fixirung der Vorstellungen, auf die Function $P \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{smallmatrix} \middle| x \right)$, also auf den Fall, wenn $a = 0$, $b = \infty$, $c = 1$, was die Allgemeinheit der Resultate nicht wesentlich beeinträchtigt, und wähle für die durch $1, \infty, 0$ zu ziehende Linie l die Linie der reellen Werthe, welche, um der Reihe nach durch c, b, a zu gehen, von $-\infty$ nach $+\infty$ gerichtet sein muss. Innerhalb des auf der positiven Seite dieser Linie liegenden Gebiets, welches die complexen Werthe mit positiv imaginärem Gliede enthält, sind dann die oben charakterisirten Bestandtheile der Function P , die Grössen $P^\alpha, P^{\alpha'}, P^\beta, P^{\beta'}, P^\gamma, P^{\gamma'}$, einändrige Functionen von x und sind bis auf constante Factoren, welche von der Wahl der Grössen $c_\alpha, c_{\alpha'}, \dots, c_{\gamma'}$ abhängen, völlig bestimmt, wenn die Function P gegeben ist.

Die Functionen $P^\alpha, P^{\alpha'}$ gehen durch einen positiven Umlauf der Grösse x um 0 in $P^\alpha e^{\alpha 2\pi i}, P^{\alpha'} e^{\alpha' 2\pi i}$ über und ebenso durch einen positiven Umlauf dieser Grösse um ∞ die Functionen $P^\beta, P^{\beta'}$ in $P^\beta e^{\beta 2\pi i}, P^{\beta'} e^{\beta' 2\pi i}$ und durch einen positiven Umlauf um 1 die Functionen $P^\gamma, P^{\gamma'}$ in $P^\gamma e^{\gamma 2\pi i}, P^{\gamma'} e^{\gamma' 2\pi i}$. Bezeichnet man den Werth, in welchen P durch einen positiven Umlauf von x um 0 übergeht, durch P' , so ist, wenn

$$P = c_\alpha P^\alpha + c_{\alpha'} P^{\alpha'}, \quad P' = c_\alpha e^{\alpha 2\pi i} P^\alpha + c_{\alpha'} e^{\alpha' 2\pi i} P^{\alpha'}.$$

Diese Ausdrücke haben eine von Null verschiedene Determinante, da n. V. $\alpha - \alpha'$ keine ganze Zahl ist, und folglich können $P^\alpha, P^{\alpha'}$ auch umgekehrt in P, P' also auch in $P^\beta, P^{\beta'}; P^\gamma, P^{\gamma'}$ linear mit constanten Coefficienten ausgedrückt werden. Setzt man nun

$$P^\alpha = a_\beta P^\beta + a_{\beta'} P^{\beta'} = a_\gamma P^\gamma + a_{\gamma'} P^{\gamma'},$$

$$P^{\alpha'} = a'_\beta P^\beta + a'_{\beta'} P^{\beta'} = a'_\gamma P^\gamma + a'_{\gamma'} P^{\gamma'},$$

und zur Abkürzung

$$\begin{pmatrix} a_\beta & a_{\beta'} \\ a'_\beta & a'_{\beta'} \end{pmatrix} = (b), \quad \begin{pmatrix} a_\gamma & a_{\gamma'} \\ a'_\gamma & a'_{\gamma'} \end{pmatrix} = (c)$$

und die inversen Substitutionen von (b) und (c) bezw. $= (b)^{-1}$ und $(c)^{-1}$, so ergeben sich für die Functionen $(P^\alpha, P^{\alpha'})$ die Substitutionen:

$$\text{um } 0: (A) = \begin{pmatrix} e^{\alpha 2\pi i} & 0 \\ 0 & e^{\alpha' 2\pi i} \end{pmatrix}, \text{ um } \infty: (b) \begin{pmatrix} e^{\beta 2\pi i} & 0 \\ 0 & e^{\beta' 2\pi i} \end{pmatrix} (b)^{-1}, \text{ um } 1: (c) \begin{pmatrix} e^{\gamma 2\pi i} & 0 \\ 0 & e^{\gamma' 2\pi i} \end{pmatrix} (c)^{-1}.$$

Aus der Gleichung $(C)(B)(A) = (E)$ folgt nun zunächst, da die Determinante einer zusammengesetzten Substitution dem Producte aus den Determinanten ihrer Componenten gleich ist,

$$\begin{aligned} 1 &= \det(A) \det(B) \det(C) \\ &= e^{(\alpha + \alpha' + \beta + \beta' + \gamma + \gamma') 2\pi i} \det(b) \det(b)^{-1} \det(c) \det(c)^{-1} \end{aligned}$$

oder, da $\det(b) \det(b)^{-1} = 1$, $\det(c) \det(c)^{-1} = 1$,

$$\alpha + \alpha' + \beta + \beta' + \gamma + \gamma' = \text{einer ganzen Zahl}, \quad (2)$$

womit die obige Annahme, dass diese Exponentensumme = 1 sei, vereinbar ist.

Die übrigen drei in $(C)(B)(A) = (E)$ enthaltenen Relationen geben drei Bedingungen für (b) und (c) , welche indess leichter auf folgendem Wege gefunden werden.

Wenn x erst um 0 und dann um ∞ negativ herumgeht, so bildet der durchlaufene Weg zugleich einen positiven Umlauf um 1. Der Werth, in welchen P^α dadurch übergeht, ist daher

$$\begin{aligned} &= a_\gamma e^{\gamma 2\pi i} P^\gamma + a_{\gamma'} e^{\gamma' 2\pi i} P^{\gamma'} \\ &= (c)(b) e^{-\beta 2\pi i} P^\beta + a_{\beta'} e^{\beta' 2\pi i} P^{\beta'} e^{-\alpha 2\pi i}. \end{aligned}$$

4.

Multiplicirt man diese Gleichung mit einem willkürlichen Factor $e^{-(\alpha+\beta+\gamma')\pi i}$ und die Gleichung

$$a_\gamma P^\gamma + a_{\gamma'} P^{\gamma'} = a_\beta P^\beta + a_{\beta'} P^{\beta'} \text{ mit } e^{-(\alpha'+\beta+\gamma')\pi i}$$

und subtrahirt, so ergibt sich nach Abwerfung eines allgemeinen Factors

$$\begin{aligned} a_\gamma \sin(\sigma - \gamma)\pi \cdot e^{\gamma'\pi i} P^\gamma + a_{\gamma'} \sin(\sigma - \gamma')\pi \cdot e^{\gamma\pi i} P^{\gamma'} = \\ a_\beta \sin(\sigma + \alpha + \beta)\pi \cdot e^{-(\alpha+\beta')\pi i} P^\beta + a_{\beta'} \sin(\sigma + \alpha + \beta')\pi \cdot e^{-(\alpha+\beta)\pi i} P^{\beta'}. \end{aligned}$$

Aus ganz ähnlichen Gründen hat man auch, wenn man überall α' für α setzt, die Gleichung

$$\begin{aligned} a'_\gamma \sin(\sigma - \gamma)\pi \cdot e^{\gamma'\pi i} P^\gamma + a'_{\gamma'} \sin(\sigma - \gamma')\pi \cdot e^{\gamma\pi i} P^{\gamma'} = \\ a'_\beta \sin(\sigma + \alpha' + \beta)\pi \cdot e^{-(\alpha'+\beta')\pi i} P^\beta + a'_{\beta'} \sin(\sigma + \alpha' + \beta')\pi \cdot e^{-(\alpha'+\beta)\pi i} P^{\beta'} \end{aligned}$$

mit der willkürlichen Grösse σ . Befreit man beide Gleichungen von einer der Functionen, z. B. $P^{\gamma'}$, indem man σ demgemäss bestimmt, so können sich die resultirenden Gleichungen nur durch einen allgemeinen constanten Factor unterscheiden, da $\frac{P^\beta}{P^{\beta'}}$ nicht constant ist.

Diese Elimination von $P^{\gamma'}$ giebt daher:

$$\frac{a_\gamma}{a'_\gamma} = \frac{a_\beta \sin(\alpha + \beta + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha\pi i} - a_{\beta'} \sin(\alpha + \beta' + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i}}{a'_\beta \sin(\alpha' + \beta + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i} - a'_{\beta'} \sin(\alpha' + \beta' + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha\pi i}}, \quad (3)$$

und die ähnliche Elimination von P^γ

$$\frac{a_{\gamma'}}{a'_\gamma} = \frac{a_\beta \sin(\alpha + \beta + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha\pi i} - a_{\beta'} \sin(\alpha + \beta' + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i}}{a'_\beta \sin(\alpha' + \beta + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i} - a'_{\beta'} \sin(\alpha' + \beta' + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha\pi i}}, \quad (4)$$

welches die vier gesuchten Relationen sind. Aus ihnen ergeben sich die Verhältnisse der Quotienten $\frac{a_\beta}{a'_\beta}$, $\frac{a_{\beta'}}{a'_{\beta'}}$, $\frac{a_\gamma}{a'_\gamma}$, $\frac{a_{\gamma'}}{a'_{\gamma'}}$. Die Gleichheit der beiden aus der zweiten und vierten fließenden Werthe von $\frac{a_\beta}{a'_\beta} : \frac{a_\gamma}{a'_\gamma}$ erhellt leicht als eine Folge aus $\alpha + \alpha' + \beta + \beta' + \gamma + \gamma' = 1$ mittelst der Identität $\sin s\pi = \sin(1-s)\pi$.

Demnach sind von den Grössen $\frac{a_\beta}{a'_\beta}$, $\frac{a_{\beta'}}{a'_{\beta'}}$, $\frac{a_\gamma}{a'_\gamma}$, $\frac{a_{\gamma'}}{a'_{\gamma'}}$ durch eine von ihnen, z. B. $\frac{a_\beta}{a'_\beta}$, die übrigen bestimmt und die drei Grössen a'_β , $a'_{\gamma'}$, a_γ durch die fünf Grössen a_β , $a_{\beta'}$, a'_β , a_γ , $a_{\gamma'}$.

Diese fünf Grössen aber hängen von den in $P^\alpha, P^{\alpha'}, P^\beta, P^{\beta'}, P^\gamma, P^{\gamma'}$, wenn die Function P gegeben ist, noch willkürlichen Factoren oder vielmehr von deren Verhältnissen ab, und können durch geeignete Bestimmung derselben jedwede endliche Werthe erhalten.¹²

Die soeben gemachte Bemerkung bahnt den Weg zu dem Satze, dass in zwei P -functionen mit gleichen Exponenten die denselben Exponenten entsprechenden Bestandtheile sich nur durch einen constanten Factor unterscheiden.

In der That, ist P_1 eine Function mit denselben Exponenten wie P , so kann man die fünf Grössen $a_\beta, a_{\beta'}, a_\gamma, a_{\gamma'}$ und a'_β bei beiden gleich annehmen und dann müssen auch die Grössen $a'_{\beta'}, a'_\gamma, a'_{\gamma'}$ bei beiden übereinstimmen. Man hat also gleichzeitig:

$$(P^\alpha, P^{\alpha'}) = (b)(P^\beta, P^{\beta'}) = (c)(P^\gamma, P^{\gamma'})$$

und

$$(P_1^\alpha, P_1^{\alpha'}) = (b)(P_1^\beta, P_1^{\beta'}) = (c)(P_1^\gamma, P_1^{\gamma'}),$$

folglich

$$(P^\alpha P_1^{\alpha'} - P^{\alpha'} P_1^\alpha) = \det(b)(P^\beta P_1^{\beta'} - P^{\beta'} P_1^\beta) = \det(c)(P^\gamma P_1^{\gamma'} - P^{\gamma'} P_1^\gamma).$$

Von diesen drei Ausdrücken bleibt der erste, mit $x^{\alpha+\alpha'-1}$ multiplicirt, offenbar für $x = 0$ einädrig und endlich; ebenso der zweite, mit $x^{\beta+\beta'+1} = x^{\alpha-\alpha'-\gamma-\gamma'+1}$ multiplicirt, für $x = \infty$, der dritte, mit $(1-x)^{-\gamma-\gamma'}$ multiplicirt, für $x = 1$, und dasselbe gilt von allen drei Ausdrücken für alle von 0, ∞ , 1 verschiedenen Werthe von x ; es ist daher

$$(P^\alpha P_1^{\alpha'} - P^{\alpha'} P_1^\alpha) \cdot x^{\alpha+\alpha'-1} (1-x)^{-\gamma-\gamma'}$$

eine allenthalben stetige und einädrige Function, also eine Constante. Sie ist ferner $= 0$ für $x = \infty$ und muss folglich allenthalben $= 0$ sein. Hieraus folgt

$$\frac{P^{\alpha'}}{P^\alpha} = \frac{P_1^{\alpha'}}{P_1^\alpha}.$$

Ebenso

$$\frac{P^\beta}{P^{\beta'}} = \frac{P^\alpha}{P^{\alpha'}} = \frac{a_\beta P^\beta + a_{\beta'} P^{\beta'}}{P^{\beta'}} = \frac{P^\alpha}{P^{\alpha'}} = \frac{P^\gamma}{P^{\gamma'}}.$$

Die Function $\frac{P^{\alpha'}}{P^\alpha}$ ist demnach einwerthig und muss überdies allenthalben endlich, also, w. z. b. w., constant sein, wenn noch bewiesen wird, dass P^α und $P^{\alpha'}$ nicht zugleich für einen von 0, 1, ∞ verschiedenen Werth von x verschwinden können.

Zu diesem Ende bemerke man, dass

$$\begin{aligned} \frac{dP^\alpha}{dx} P^{\alpha'} - P^\alpha \frac{dP^{\alpha'}}{dx} &= \det(b) \left(\frac{dP^\beta}{dx} P^{\beta'} - P^\beta \frac{dP^{\beta'}}{dx} \right) \\ &= \det(c) \left(\frac{dP^\gamma}{dx} P^{\gamma'} - P^\gamma \frac{dP^{\gamma'}}{dx} \right) \end{aligned}$$

und folglich für $x = 0, \infty, 1$ unendlich klein von den Ordnungen $\alpha + \alpha' - 1, \beta + \beta' + 1 = 2 - \alpha - \alpha' - \gamma - \gamma', \gamma + \gamma' - 1$ wird, übrigens aber stetig und einädrig bleibt, so dass

$$\left(\frac{dP^\alpha}{dx} P^{\alpha'} - P^\alpha \frac{dP^{\alpha'}}{dx} \right) x^{\alpha+\alpha'-1} (1-x)^{-\gamma-\gamma'+1}$$

¹²Diese Bemerkung zeigt, dass man jene Factoren auch so bestimmen kann, dass $a'_\beta = a_\gamma = a_{\gamma'} = a'_\gamma = a'_{\gamma'} = 1, a_{\beta'} = a_\beta$ wird.

eine allenthalben stetige und einändrige Function bildet, folglich einen Constanten Werth hat. Dieser constante Werth dieser Function ist nothwendig von Null verschieden, weil sonst $\log P^\alpha - \log P^{\alpha'} = \text{const.}$, folglich $\alpha = \alpha'$ sein würde gegen die Voraussetzung; offenbar müsste sie gleich Null werden, wenn für einen von 0, 1, ∞ verschiedenen Werth von x P^α und $P^{\alpha'}$ gleichzeitig verschwänden, da $\frac{dP^\alpha}{dx}$, $\frac{dP^{\alpha'}}{dx}$ als Derivirte einändrig und stetig bleibender Functionen nicht unendlich werden können.

Es werden daher P^α und $P^{\alpha'}$ für keinen von 0, 1, ∞ verschiedenen Werth von x gleichzeitig = 0, und es bleibt die einwerthige Function

$$\frac{P^\alpha}{P^{\alpha'}} = \frac{P^\beta}{P^{\beta'}} = \frac{P^\gamma}{P^{\gamma'}}$$

allenthalben endlich, mithin constant, w. z. b. w.

Aus dem eben bewiesenen Satze folgt, dass in zwei Zweige Einer P -function, deren Quotient nicht constant ist, jede andere P -function mit gleichen Exponenten sich linear mit constanten Coefficienten ausdrücken lässt und dass durch die im Art. 1 geforderten Eigenschaften die zu definirende Function bis auf zwei linear in ihr enthaltene Constanten völlig bestimmt ist. Diese werden in jedem Falle leicht aus den Werthen der Function für specielle Werthe der Veränderlichen gefunden, am bequemsten, indem man die Veränderliche einem der Verzweigungswerthe gleich setzt.

Ob es immer eine jenen Bedingungen genügende Function gebe, bleibt freilich noch unentschieden, wird sich aber später durch die wirkliche Darstellung der Function mittelst bestimmter Integrale und hypergeometrischer Reihen erledigen und bedarf daher keiner besondern Untersuchung.

5.

Ausser den für jedwede Werthe der Exponenten möglichen Transformationen des Art. 2 ergeben sich aus der Definition noch leicht die beiden Transformationen:

(A)

$$P \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & \infty & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{array} \middle| x^2 \right\} = P \left\{ \begin{array}{ccc} -1 & \infty & 1 \\ \gamma & 2\beta & \gamma \\ \gamma' & \beta' & \gamma' \end{array} \middle| x \right\},$$

wo nach dem Früheren $\beta + \beta' + \gamma + \gamma' = \frac{1}{2}$ sein muss, und

(B)

$$P \left\{ \begin{array}{ccc} 0 & \infty & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{array} \middle| x^3 \right\} = P \left\{ \begin{array}{ccc} 1 & \varrho & \varrho^2 \\ \gamma & \gamma & \gamma \\ \gamma' & \gamma' & \gamma' \end{array} \middle| x \right\},$$

wo $\gamma + \gamma' = \frac{1}{3}$ und ϱ eine imaginäre dritte Wurzel der Einheit bezeichnet. Um sämtliche Functionen, welche sich mit Hülfe dieser Transformationen auf einander zurückführen lassen, bequem zu übersehen, ist es zweckmässig, statt der Exponenten ihre Differenzen einzuführen und, wie oben vorgeschlagen, durch $P(\alpha - \alpha', \beta - \beta', \gamma - \gamma', x)$ sämtliche in der Form $x^\delta(1-x)^\epsilon P \left(\begin{array}{ccc} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{array} \middle| x \right)$ enthaltenen Functionen zu bezeichnen, wobei $\alpha - \alpha'$, $\beta - \beta'$, $\gamma - \gamma'$ die erste, zweite, dritte Exponentendifferenz genannt werden mag.

Aus den Formeln im Art. 2 folgt dann, dass in der Function $P(\lambda, \mu, \nu, x)$ die Grössen λ, μ, ν beliebig in's Entgegengesetzte verwandelt und beliebig unter einander vertauscht werden können. Die Veränderliche nimmt dabei einen der 6 Werthe $x, 1-x, \frac{1}{x}, \frac{1}{1-x}, \frac{x}{x-1}, \frac{x-1}{x}$,

$\frac{x-1}{x}$ an, und zwar haben von den 48 auf diese Weise sich ergebenden P -functionen je acht, welche durch blosse Zeichenänderung der Grössen λ, μ, ν aus einander hervorgehen, dieselbe Veränderliche.

Von den in diesem Art. angegebenen Transformationen A und B ist die erste anwendbar, wenn von den Exponentendifferenzen entweder eine gleich $\frac{1}{2}$ oder zwei einander gleich sind, die zweite, wenn von ihnen entweder zwei $= \frac{1}{3}$ oder alle drei einander gleich sind. Durch successive Anwendung dieser Transformationen erhält man daher durch einander ausgedrückt:

I. $P(\mu, \nu, \frac{1}{2}, x_1)$, $P(\mu, 2\nu, \nu, x_2)$ und $P(\nu, 2\mu, \nu, x_2)$, wobei $\sqrt{1-x_2} = 1-2x_1$, $\sqrt{\frac{1}{x_2}} = 1-2x_1$, also $x_2 = 4x_1(1-x_1) = 4x_2(1-x_2)$ sich ergibt.

II. $P(\nu, \nu, \nu, x_3)$, $P(\nu, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, x_4)$, $P(\frac{1}{2}, \nu, \frac{1}{2}, x_4)$, $P(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \nu, x_4)$, $P(\frac{1}{2}, \nu, \frac{1}{3}, x_5)$, $P(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \nu, x_5)$, $P(\nu, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, x_5)$, wenn

$$\frac{1-x_4}{x_4} = \frac{x_3^3}{27} \text{ und folglich } x_4 = \frac{27}{27+x_3^3};$$

$$x_4(1-x_4) = \frac{x_3^3}{(27+x_3^3)^2} = \frac{x_5}{27}, \text{ ferner nach I.}$$

$$4x_5(1-x_5) = x_6 = \frac{4x_3^3}{(27+x_3^3)^2}, \quad 4x_5(1-x_5) = x_6 = 4x_7(1-x_7).$$

III. $P(\nu, \nu, \frac{1}{2}, x_8)$, $P(\nu, 2\nu, \frac{1}{2}, x_9)$, $P(\frac{1}{2}, \nu, \frac{1}{2}, x_8)$, $P(\frac{1}{2}, 2\nu, \frac{1}{2}, x_9)$, wenn $x_8 = 4x_9(1-x_9) = \frac{4}{x_3^3} = 4x_4(1-x_4)$, $x_9 = 4x_8(1-x_8)$.

Alle diese Functionen können noch mittelst der allgemeinen Transformationen umgeformt und dadurch ihre Exponentendifferenzen beliebig vertauscht und mit beliebigen Vorzeichen versehen werden. Ausser den beiden Transcendenten II. und III. lässt, wenn eine Exponentendifferenz willkürlich bleiben soll, nur noch die Function $P(\nu, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = P(\nu, \frac{1}{2}, \nu)$ eine häufigere Wiederholung der Transformationen A und B zu, welche indess, da

$$P\left(\begin{array}{ccc} \nu & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\nu & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array} \middle| x\right) = \text{const.} \cdot x^\nu + \text{const.}'$$

auf ganz elementare Formeln führt.

In der That ist die Transformation B nur anwendbar auf $P(\nu, \nu, \nu)$ oder $P(\frac{1}{3}, \nu, \frac{1}{3})$, also nur auf die Transcendente II.; die Transformation A aber lässt sich häufiger als in I. nur wiederholen, wenn entweder von den Grössen $\mu, \nu, 2\mu, 2\nu$ eine gleich $\frac{1}{2}$ gesetzt oder eine der Gleichungen $\mu = \nu$, $\mu = 2\nu$, $\nu = 2\mu$ angenommen wird. Von diesen Annahmen führt $\mu = 2\nu$ oder $\nu = 2\mu$ auf die Transcendente II., $\mu = \nu$, sowie 2μ oder $2\nu = \frac{1}{2}$ auf die Transcendente III., endlich μ oder $\nu = \frac{1}{2}$ auf die Function $P(\nu, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

Die Anzahl der verschiedenen Ausdrücke, welche man durch diese Transformationen für jede der Transcendenten I—III. erhält, ergibt sich, wenn man berücksichtigt, dass in den obigen P -functionen als Veränderliche alle Wurzeln der Gleichungen, durch welche sie bestimmt werden, zulässig sind und jede Wurzel zu einem Systeme von 6 Werthen gehört, welche mittelst der allgemeinen Transformation für einander als Veränderliche eingeführt werden können.

Es führen aber im Falle I. die beiden Werthe von x_1 und x_2 , welche zu einem gegebenen x_3 gehören, auf dasselbe System von 6 Werthen, so dass jede der Functionen I. durch P -functionen mit $6 \cdot 3 = 18$ verschiedenen Veränderlichen ausgedrückt werden kann.

Im Falle II. führen von den zu einem gegebenen Werthe von x_3 gehörigen Werthen die beiden Werthe von x_4 und x_5 , die 6 Werthe von x_6 und von den 6 Werthen von x_7

je zwei zu demselben Systeme von 6 Werthen, während die drei Werthe von x_8 zu drei verschiedenen Systemen von je 6 Werthen führen. Es liefern also x_4 und x_5 je drei und x_6, x_7, x_8, x_9 je ein System von 6 Werthen, also alle zusammen $6 \cdot 10 = 60$ Werthe, durch deren P -functionen sich jede der Functionen II. ausdrücken lässt.

Im Falle III. endlich liefern x_8 die beiden Werthe von x_9 , die beiden Werthe von x_{10} und von den vier Werthen von x_7 je zwei ein System von 6 Werthen, so dass jede der Functionen III. durch P -functionen von $6 \cdot 5 = 30$ verschiedenen Veränderlichen darstellbar ist.

In jeder P -function können nun ohne Aenderung der Veränderlichen mittelst der allgemeinen Transformationen die Exponentendifferenzen beliebige Vorzeichen erhalten, und also kann, da keine dieser Exponentendifferenzen $= 0$ ist, eine und dieselbe Function auf 8 verschiedene Arten als P -function derselben Veränderlichen dargestellt werden. Die Anzahl sämtlicher Ausdrücke beträgt also im Falle I. $8 \cdot 6 \cdot 3 = 144$, im Falle II. $8 \cdot 6 \cdot 10 = 480$, im Falle III. $8 \cdot 6 \cdot 5 = 240$.

6.

Wenn man sämtliche Exponenten einer P -function um ganze Zahlen ändert, so bleiben in den Gleichungen (3), (4) Art. 3 die Grössen

$$\frac{\sin(\alpha + \beta + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha\pi i}}{\sin(\alpha' + \beta + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i}}, \quad \frac{\sin(\alpha + \beta' + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha\pi i}}{\sin(\alpha' + \beta' + \gamma')\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i}},$$

$$\frac{\sin(\alpha + \beta + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha\pi i}}{\sin(\alpha' + \beta + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i}}, \quad \frac{\sin(\alpha + \beta' + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha\pi i}}{\sin(\alpha' + \beta' + \gamma)\pi \cdot e^{-\alpha'\pi i}}$$

ungeändert.

Sind daher in den Functionen $P \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{smallmatrix} \middle| x \right)$, $P_1 \left(\begin{smallmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha'_1 & \beta'_1 & \gamma'_1 \end{smallmatrix} \middle| x \right)$ die entsprechenden Exponenten α_1 und α , etc., um ganze Zahlen verschieden, so kann man die acht Grössen $(a_\beta)_1, (a'_\beta)_1, (a_{\beta'})_1, \dots$ und die acht Grössen $a_\beta, a'_\beta, a_{\beta'}, \dots$ gleich annehmen, da aus der Gleichheit der fünf willkürlichen die Gleichheit der drei übrigen folgt.

Nach der im Art. 4 angewandten Schlussweise folgt hieraus:

$$P^\alpha P_1^{\alpha'} - P^{\alpha'} P_1^\alpha = \det(b)(P^\beta P_1^{\beta'} - P^{\beta'} P_1^\beta)$$

$$= \det(c)(P^\gamma P_1^{\gamma'} - P^{\gamma'} P_1^\gamma);$$

und wenn man von den Grössen $\alpha + \alpha'_1$ und $\alpha_1 + \alpha'$, $\beta + \beta'_1$ und $\beta_1 + \beta'$, $\gamma + \gamma'_1$ und $\gamma_1 + \gamma'$ diejenigen Grössen jedes Paares, welche um eine positive ganze Zahl kleiner sind, als die andern, durch $\bar{\alpha}, \bar{\beta}, \bar{\gamma}$ bezeichnet, so ist

$$(P^\alpha P_1^{\alpha'} - P^{\alpha'} P_1^\alpha) \cdot x^{\alpha+\alpha'-1} (1-x)^{-\gamma-\gamma'}$$

eine Function von x , welche einädrig und endlich bleibt für $x = 0$, $x = 1$ und alle übrigen endlichen Werthe von x , für $x = \infty$ aber unendlich wird von der Ordnung $-\bar{\alpha} - \bar{\gamma} - \bar{\beta}$, folglich eine ganze Function F vom Grade $-\bar{\alpha} - \bar{\beta} - \bar{\gamma}$.

Man bezeichne nun, wie früher, die Exponentendifferenzen $\alpha - \alpha'$, $\beta - \beta'$, $\gamma - \gamma'$ durch λ, μ, ν . In Betreff dieser ergibt sich zunächst: ihre Summe ändert sich um eine gerade Zahl, wenn sich sämtliche Exponenten um ganze Zahlen ändern; denn sie übertrifft die Summe sämtlicher Exponenten, welche unverändert $= 1$ bleibt, um

$$(\alpha - \alpha') + (\beta - \beta') + (\gamma - \gamma'),$$

welche Grösse sich dabei um eine gerade Zahl ändert. Sie können sich aber dabei um jedwede ganze Zahlen ändern, deren Summe gerade ist. Bezeichnet man ferner $\alpha_1 - \alpha'_1$, $\beta_1 - \beta'_1$, $\gamma_1 - \gamma'_1$ durch λ_1 , μ_1 , ν_1 und durch $\varkappa_\lambda$, $\varkappa_\mu$, $\varkappa_\nu$ die absoluten Werthe der Differenzen $\lambda - \lambda_1$, $\mu - \mu_1$, $\nu - \nu_1$, so ist von den Grössen $\alpha + \alpha'_1$ und $\alpha_1 + \alpha'$ diejenige, welche um die positive Zahl $\varkappa_\lambda$ kleiner ist als die andere

$$\bar{\alpha} = -\frac{\alpha + \alpha' + \alpha_1 + \alpha'_1}{2} - \frac{\varkappa_\lambda}{2}$$

und ebenso

$$\bar{\beta} = -\frac{\beta + \beta' + \beta_1 + \beta'_1}{2} - \frac{\varkappa_\mu}{2}, \quad \bar{\gamma} = -\frac{\gamma + \gamma' + \gamma_1 + \gamma'_1}{2} - \frac{\varkappa_\nu}{2}.$$

Der Grad der ganzen Function F , welcher gleich der Summe dieser Grössen ist, ergibt sich daher

$$-\bar{\alpha} - \bar{\beta} - \bar{\gamma} = 1 + \frac{\varkappa_\lambda + \varkappa_\mu + \varkappa_\nu}{2}.$$

7.

Sind jetzt

$$P \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha & \beta & \gamma & x \\ \alpha' & \beta' & \gamma' & \end{array} \right), \quad P_1 \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 & x \\ \alpha'_1 & \beta'_1 & \gamma'_1 & \end{array} \right), \quad P_2 \left(\begin{array}{ccc|c} \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 & x \\ \alpha'_2 & \beta'_2 & \gamma'_2 & \end{array} \right)$$

drei Functionen, in welchen sich die entsprechenden Exponenten um ganze Zahlen unterscheiden, so fliesst aus diesem Satze mittelst der identischen Gleichung

$$P^\alpha(P_1^{\alpha'} P_2^{\alpha'} - P_1^{\alpha'} P_2^\alpha) + P_1^\alpha(P_2^\alpha P^{\alpha'} - P_2^{\alpha'} P^\alpha) + P_2^\alpha(P^\alpha P_1^{\alpha'} - P_1^{\alpha'} P_2^\alpha) = 0$$

der wichtige Satz, dass zwischen ihren entsprechenden Gliedern eine lineare homogene Gleichung stattfindet, deren Coefficienten ganze Functionen von x sind, und dass also

“sämmtliche P -functionen, deren entsprechende Exponenten sich um ganze Zahlen unterscheiden, sich in zwei beliebige von ihnen linear mit rationalen Functionen von x als Coefficienten ausdrücken lassen”.

Eine specielle Folge aus den Beweisgründen dieses Satzes ist, dass sich der zweite Differentialquotient einer P -function linear mit rationalen Functionen als Coefficienten in den ersten und die Function selbst ausdrücken lässt, und also die Function einer linearen homogenen Differentialgleichung zweiter Ordnung genügt.

Beschränkt man sich, um ihre Ableitung möglichst zu vereinfachen, auf den Fall $\gamma = 0$, auf welchen der allgemeine nach Art. 2 leicht zurückgeführt wird, und setzt $P = y$, $P^\alpha = y'$, $P^{\alpha'} = y''$, so ergibt sich, dass die Functionen

$$y \frac{\partial^2 y''}{\partial \log x^2} - y'' \frac{\partial^2 y}{\partial \log x^2}, \quad y' \frac{\partial^2 y}{\partial \log x^2} - y \frac{\partial^2 y'}{\partial \log x^2},$$

$$\frac{\partial y'}{\partial \log x} \frac{\partial^2 y''}{\partial \log x^2} - \frac{\partial y''}{\partial \log x} \frac{\partial^2 y'}{\partial \log x^2}$$

mit $x^{-\alpha-\alpha'+1}(1-x)^{-\gamma+\gamma'+1}$ multiplicirt, endlich und einändrig bleiben für endliche Werthe von x und unendlich von der ersten Ordnung werden für $x = \infty$, und dass überdies das erste dieser Producte für $x = 1$ unendlich klein von der ersten Ordnung wird. Für

$$y = \text{const.}' \cdot y' + \text{const.}'' \cdot y''$$

findet daher eine Gleichung von der Form statt

$$(1-x) \frac{\partial^2 y}{\partial \log x^2} + (A + A'x) \frac{\partial y}{\partial \log x} + (B' - Bx) \cdot y = 0,$$

in welcher A, A', B, B' noch zu bestimmende Constanten bezeichnen.

Nach der Methode der unbestimmten Coefficienten lässt sich eine Lösung dieser Differentialgleichung nach um 1 steigenden oder fallenden Potenzen in eine Reihe

$$y = \sum_n a_n x^n$$

entwickeln, und zwar wird der Exponent μ des Anfangsgliedes im ersten Falle, wo er der niedrigste ist, durch die Gleichung

$$\mu\mu - A'\mu + B' = 0,$$

und im zweiten, wo er der höchste ist, durch die Gleichung

$$\mu\mu + B\mu + B' = 0$$

bestimmt. Die Wurzeln der ersteren Gleichung müssen α und α' , die der letztern $-\beta$ und $-\beta'$ sein und folglich ist

$$A = \alpha + \alpha', \quad A' = \alpha\alpha', \quad B = \beta + \beta', \quad B' = \beta\beta'.$$

8.

Es bestimmen sich ferner die Coefficienten aus einem von ihnen mittelst der Recursionsformel

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+\beta)(n+\beta')}{(n+1-\alpha)(n+1-\alpha')},$$

welcher $a = \frac{\Pi(n-\alpha)\Pi(n-\alpha')}{\Pi(n)\Pi(n-\alpha)\Pi(-n-\beta)\Pi(-n-\beta')} \cdot \text{const.}$ genügt.

Demnach bildet die Reihe

$$y = \text{Const.} \sum_n \frac{\Pi(n-\alpha)\Pi(n-\alpha')}{\Pi(n)\Pi(n-\alpha)\Pi(-n-\beta)\Pi(-n-\beta')} x^n$$

sowohl wenn die Exponenten von α oder α' an um die Einheit steigen, als auch wenn sie von $-\beta$ oder $-\beta'$ an um die Einheit fallen, eine Lösung der Differentialgleichung und zwar bezw. diejenigen particulären Lösungen, welche oben durch $P^\alpha, P^{\alpha'}, P^\beta, P^{\beta'}$ bezeichnet worden sind.

Nach Gauss, welcher durch $F(a, b, c, x)$ eine Reihe bezeichnet, in welcher der Quotient des $(n+1)$ ten Gliedes in das folgende $= \frac{(n+a)(n+b)}{(n+1)(n+c)}$ und das erste Glied $= 1$ ist, lässt sich dieses Resultat für den einfachsten Fall, für $\gamma = 0$, so ausdrücken:

$$F(a, b, c, x) = P^\alpha \left(\begin{array}{ccc} a & 0 & c-a-b \\ a' & \beta' & \gamma' \end{array} \middle| x \right)$$

oder

$$F(a, b, c, x) = P^\alpha \left(\begin{array}{ccc} a & 0 & c - a - b \\ 1 - c & b - c & 0 \end{array} \middle| x \right).$$

Aus demselben erhält man auch leicht einen Ausdruck der P -function durch ein bestimmtes Integral, indem man in dem allgemeinen Gliede der Reihe für die Π -functionen ein Euler'sches Integral zweiter Gattung einführt und dann die Ordnung der Summation und Integration vertauscht. Auf diese Weise findet man, dass das Integral

$$x^\alpha (1-x)^\gamma \int s^{\alpha'+\beta+\gamma-1} (1-s)^{-\alpha'-\beta'-\gamma} (1-xs)^{-\alpha-\beta'-\gamma} ds$$

von einem der vier Werthe 0, 1, $\frac{1}{x}$, ∞ bis zu einem dieser vier Werthe auf beliebigem Wege erstreckt eine Function $P \left(\begin{array}{ccc} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{array} \middle| x \right)$ bildet und bei passender Wahl dieser Grenzwerte und des Weges von einem zum andern jede der sechs Functionen P^α , P^β , $\dots$, $P^{\gamma'}$ darstellt.¹³

Zufolge der im Art. 2 und dem vorigen erhaltenen Gleichungen

$$P^\alpha \left(\begin{array}{ccc} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{array} \middle| x \right) = x^\alpha (1-x)^\gamma P^\alpha \left(\begin{array}{ccc} \alpha - \alpha & \beta + \alpha + \gamma & \gamma - \gamma \\ 0 & \beta' + \alpha + \gamma & 0 \end{array} \middle| x \right) \\ = \text{Const.} \cdot x^\alpha (1-x)^\gamma F(\beta + \alpha + \gamma, \beta' + \alpha + \gamma, \alpha - \alpha' + 1, x)$$

fließt aus jedem Ausdrucke einer Function durch eine P -function eine Entwicklung derselben in eine hypergeometrische Reihe, welche nach steigenden Potenzen der Veränderlichen in dieser P -function fortschreitet. Nach Art. 5 giebt es 8 Darstellungen einer Function durch P -functionen mit derselben Veränderlichen, welche durch Vertauschung zusammengehöriger Exponenten aus einander erhalten werden, also z. B. 8 Darstellungen mit der Veränderlichen x . Von diesen liefern aber je zwei, welche durch Vertauschung ihres zweiten Paares, β und β' , aus einander entstehen, dieselbe Entwicklung; man erhält also vier Entwicklungen nach steigenden Potenzen von x , von denen zwei, welche durch Vertauschung von γ und γ' aus einander erhalten werden, die Function P^α , die beiden andern die Function $P^{\alpha'}$ darstellen. Diese vier Entwicklungen convergiren, so lange der Modul von $x < 1$, und divergiren, wenn er grösser als 1 ist, während die vier Reihen nach fallenden Potenzen von x , welche P^β und $P^{\beta'}$ darstellen, sich umgekehrt verhalten. Für den Fall, wenn der Modul von x gleich 1 ist, folgt aus der Fourier'schen Reihe, dass die Reihen zu convergiren aufhören, wenn die Function für $x = 1$ unendlich von einer hohem Ordnung als der ersten wird, aber convergent bleiben, wenn sie nur unendlich von einer niedrigem Ordnung als 1 wird oder endlich bleibt.¹⁴

Es convergirt also auch in diesem Falle nur die Hälfte der 8 Entwicklungen nach Potenzen von x , so lange der reelle Theil von $\gamma - \gamma'$ nicht zwischen -1 und $+1$ liegt, und sie convergiren sämmtlich, sobald dieses stattfindet.

¹³Es lässt sich aber auch direct zeigen, dass das Integral die charakteristischen Eigenschaften einer solchen Function besitzt. Es wird dies in der Folge geschehen, wo dieser Ausdruck der P -function durch ein bestimmtes Integral zur Bestimmung der in P^α , $P^{\alpha'}$, $\dots$ noch willkürlich gebliebenen Factoren benutzt werden soll; und ich bemerke hier nur noch, dass es, um diesen Ausdruck allgemein anwendbar zu machen, einer Modification des Weges der Integration bedarf, wenn die Function unter dem Integralzeichen für einen der Werthe 0, 1, $\frac{1}{x}$, ∞ so unendlich wird, dass sie die Integration bis an denselben nicht zulässt.

¹⁴Dies folgt aus der bekannten Formel für die Summe einer Reihe complexer Grössen: $S_n = S + \varrho_n e^{\psi_n i}$, worin S die Summe der unendlichen Reihe, ϱ_n das letzte Glied bedeutet, und aus der Bemerkung, dass ϱ_n unendlich klein wird, wenn das letzte Glied der Reihe verschwindet, was bei der hier betrachteten hypergeometrischen Reihe eintritt, wenn der reelle Theil von $\gamma - \gamma'$ negativ ist.

9.

Demnach hat man zur Darstellung einer P -function im Allgemeinen 24 verschiedene hypergeometrische Reihen, welche nach steigenden oder fallenden Potenzen von drei verschiedenen Grössen fortschreiten, und von denen für einen gegebenen Werth von x jedenfalls die Hälfte, also zwölf convergiren. Im Falle I. Art. 5 sind alle diese Anzahlen mit 3, im Falle II. mit 10, im Falle III. mit 5 zu multipliciren. Am geeignetsten zur numerischen Rechnung werden von diesen Reihen meistens diejenigen sein, deren viertes Element den kleinsten Modul hat.

Was die Ausdrücke einer P -function durch bestimmte Integrale betrifft, die sich durch die am Schlüsse des vorigen Art. aus den Transformationen des Art. 5 ableiten lassen, so sind diese Ausdrücke sämmtlich von einander verschieden. Man erhält also im Allgemeinen 48, im Falle I. 144, im Falle II. 480, im Falle III. 240 bestimmte Integrale, welche dasselbe Glied einer P -function darstellen und also zu einander ein von x unabhängiges Verhältniss haben. Von diesen lassen sich je 24, welche durch eine gerade Anzahl von Vertauschungen der Exponenten aus einander hervorgehen, auch in einander transformiren durch eine solche Substitution ersten Grades, dass für irgend drei von den Werthen $0, 1, \infty, \frac{1}{x}$ der Integrationsveränderlichen s die neue Veränderliche die Werthe $0, 1, \infty$ annimmt. Die übrigen Gleichungen erfordern, soweit ich sie untersucht habe, zu ihrer Bestätigung durch Methoden der Integralrechnung die Transformation von vielfachen Integralen.

V. Selbstanzeige der vorstehenden Abhandlung.

(Göttinger Nachrichten, 1857, Nr. 1.)

Am 6. November 1856 wurde der königlichen Societät eine von ihrem Assessor, Herrn Doctor Riemann, eingereichte mathematische Abhandlung vorgelegt, welche "Beiträge zur Theorie der durch die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ darstellbaren Functionen" enthält.

Diese Abhandlung ist einer Classe von Functionen gewidmet, welche bei der Lösung mancher Aufgaben der mathematischen Physik gebraucht werden. Aus ihnen gebildete Reihen leisten bei schwierigeren Problemen dieselben Dienste, wie in den einfacheren Fällen die jetzt so vielfach angewandten Reihen, welche nach Cosinus und Sinus der Vielfachen einer veränderlichen Grösse fortschreiten. Diese Anwendungen, namentlich astronomische, scheinen, nachdem schon Euler sich aus theoretischem Interesse mehrfach mit diesen Functionen beschäftigt hatte, Gauss zu seinen Untersuchungen über dieselben veranlasst zu haben, von denen er einen Theil in seiner der Kön. Soc. im J. 1812 übergebenen Abhandlung über die Reihe, welche er durch $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ bezeichnet, veröffentlicht hat.

Diese Reihe ist eine Reihe, in welcher der Quotient des $(n + 1)$ ten Gliedes in das folgende

$$= \frac{(n + \alpha)(n + \beta)}{(n + 1)(n + \gamma)}$$

und das erste Glied $= 1$ ist. Die für sie jetzt gewöhnliche Benennung hypergeometrische Reihe ist schon früher von Johann Friedrich Pfaff für die allgemeineren Reihen vorgeschlagen worden, in denen der Quotient eines Gliedes in das folgende eine rationale Function

des Stellenzeigers ist; während Euler nach Wallis darunter eine Reihe verstand, in welcher dieser Quotient eine ganze Function ersten Grades des Stellenzeigers ist.

Der unveröffentlichte Theil der Gauss'schen Untersuchungen über diese Reihe, welcher sich in seinem Nachlasse vorgefunden hat, ist

Inhaltsverzeichnis

I. Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse	1
Art. 19	1
Art. 20	3
Art. 21	4
Art. 22	6
Inhalt	7
Anmerkungen (zu Paper I)	9
II. Ueber die Gesetze der Vertheilung von Spannungselectricität	11
III. Zur Theorie der Nobili'schen Farbenringe	16
Anmerkungen (zu den Papieren II und III)	21
IV. Beiträge zur Theorie der durch die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ darstellbaren Functionen	25
Art. 1	26
Art. 2	26
Art. 3	27
Art. 4	29
Art. 5	31
Art. 6	33
Art. 7	34
Art. 8	35
Art. 9	37
V. Selbstanzeige der vorstehenden Abhandlung	37

Riemann — Gesammelte Werke (pp. 101–150)

Bernhard Riemann

Inhaltsverzeichnis

V. Selbstanzeige der vorstehenden Abhandlung	2
Anmerkungen zur Abhandlung IV	3
VI. Theorie der Abel'schen Functionen	5
I. Allgemeine Voraussetzungen und Hilfsmittel	5
4. Theorie der Abel'schen Functionen	10
Erste Abtheilung	12
Zweite Abtheilung	20

V. Selbstanzeige der vorstehenden Abhandlung.

unterdessen schon im J. 1835 durch die im 15. Bande des Journals von Crelle enthaltenen Arbeiten Kummer's ergänzt worden. Sie betreffen die Ausdrücke der Reihe durch ähnliche Reihen, in denen statt des Elements x eine algebraische Function dieser Grösse vorkommt. Einen speciellen Fall dieser Umformungen hatte schon Euler aufgefunden und in seiner Integralrechnung, so wie in mehreren Abhandlungen behandelt (in der einfachsten Gestalt in den N. Acta Acad. Petr. T. XII. p. 58); und diese Relation ward später von Pfaff (Disquis. anal. Helmstadii 1797), Gudermann (Crelle J. Bd. 7. S. 306) und Jacobi auf verschiedenen Wegen bewiesen. Kummer gelang es, die Methode Euler's zu einem Verfahren auszubilden, durch welches sämtliche Transformationen gefunden werden konnten; die wirkliche Ausführung desselben erforderte aber so weitläufige Discussionen, daß er für die Transformationen dritten Grades von der Durchführung derselben abstand und sich begnügte, die Transformationen ersten und zweiten Grades und die aus ihnen zusammengesetzten vollständig abzuleiten.

In der anzuzeigenden Abhandlung wird auf diese Transcendenten eine Methode angewandt, deren Princip in der Inaug. Diss. des Verfassers (Art. 20) ausgesprochen worden ist und durch die sich sämtliche früher gefundenen Resultate fast ohne Rechnung ergeben. Einige weitere mittelst derselben Methode gewonnenen Ergebnisse hofft der Verf. demnächst der Königlichen Societät vorlegen zu können.

Anmerkungen zur Abhandlung IV.

(1) (Zu Seite 73.) In einer handschriftlichen Notiz von Riemann (vom Juli 1866) finden sich die folgenden Formeln, die man aus (3) erhält, wenn man über die 5 willkürlichen Coefficienten angemessen verfügt:

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{\sin(\alpha' + \beta' + \gamma')\pi}{\sin(\beta' - \beta)\pi}, \\ \beta &= \frac{\sin(\alpha + \beta'' + \gamma)\pi}{\sin(\beta' - \beta)\pi}, \\ \gamma &= \frac{\sin(\alpha' + \beta + \gamma)\pi}{\sin(\gamma' - \gamma)\pi}, \\ \alpha' &= \frac{\sin(\alpha + \beta + \gamma)\pi}{\sin(\beta' - \beta)\pi}, \\ \beta' &= \frac{\sin(\alpha + \beta' + \gamma)\pi \cdot e^{(\alpha' + \gamma')\pi i}}{\sin(\gamma' - \gamma)\pi}, \\ \gamma' &= \frac{\sin(\alpha + \beta + \gamma)\pi \cdot e^{(\alpha + \gamma)\pi i}}{\sin(\gamma' - \gamma)\pi}.\end{aligned}$$

(2) (Zu Seite 81.) Man erhält, wenn man zur Abkürzung

$$S = s^{-\alpha' - \beta' - \gamma'} (1 - s)^{-\alpha' - \beta' - \gamma''} (1 - xs)^{-\alpha'' - \beta' - \gamma'}$$

setzt, von Constanten Factoren abgesehen,

$$\begin{aligned}p^\alpha &= x^\alpha (1 - x)^\beta \int_0^1 S ds, & p^\beta &= x^\alpha (1 - x)^\beta \int_{-\infty}^0 S ds, & p^\gamma &= x^{\alpha''} (1 - x)^\beta \int_1^{\frac{1}{x}} S ds, \\ p^{\alpha'} &= x^{\alpha'} (1 - x)^{\beta'} \int_0^1 S ds, & p^{\beta'} &= x^{\alpha'} (1 - x)^{\beta'} \int_{-\infty}^0 S ds, & p^{\gamma'} &= x^{\alpha'} (1 - x)^{\beta'} \int_1^{\frac{1}{x}} S ds.\end{aligned}$$

In jedem dieser Integrale kann die Bedeutung der mehrwerthigen Function S in beliebiger Weise festgelegt werden. Verfügt man in bestimmter Weise darüber, so erhält man zur Bestimmung constanter Factoren:

$$\begin{aligned}\frac{(p^\alpha x^{-\alpha})'}{p^\alpha x^{-\alpha}} &= \frac{\Pi(-\alpha' - \beta' - \gamma') \Pi(-\alpha' - \beta'' - \gamma')}{\Pi(\alpha' - \alpha)} \cdot \frac{\Pi(\gamma' - \gamma)}{\Pi(-\alpha - \beta - \gamma') \Pi(-\alpha - \beta' - \gamma)}, \\ \frac{(p^\beta x^{-\beta})'}{p^\beta x^{-\beta}} &= \frac{\Pi(-\alpha' - \beta' - \gamma') \Pi(-\alpha - \beta' - \gamma')}{\Pi(\beta' - \beta)} \cdot \frac{e^{(\alpha + \gamma)\pi i} \Pi(\gamma' - \gamma)}{\Pi(-\alpha - \beta - \gamma') \Pi(-\alpha' - \beta - \gamma)} \cdot e^{(\alpha' + \beta' + \gamma')\pi i}, \\ \frac{(p^\gamma (1 - x)^{-\gamma})'}{p^\gamma (1 - x)^{-\gamma}} &= \frac{\Pi(-\alpha' - \beta' - \gamma') \Pi(-\alpha - \beta - \gamma')}{\Pi(\gamma' - \gamma)} \cdot \frac{e^{(\alpha' + \beta' + \gamma')\pi i}}{\Pi(-\alpha - \beta' - \gamma') \Pi(-\alpha' - \beta - \gamma)}.\end{aligned}$$

Auch diese Formeln finden sich in Riemann's Papieren an verschiedenen Stellen.

Man kann die Constanten $\alpha, \dots$ auch auf folgendem Wege bestimmen. Nimmt man die Function S in dem Viereck $0, \infty, 1, \frac{1}{x}$ der nebenstehenden Figur an, so können die Zweige $P^\alpha, P^{\alpha'}, P^\beta, P^{\beta'}, P^\gamma, P^{\gamma'}$ durch die in der Figur durch die Pfeile angedeuteten Integrationen definiert werden.

Man liest dann unmittelbar aus der Figur die Relationen ab

$$p^\alpha = p^\beta + p^\gamma, \quad p^{\alpha'} = p^{\beta'} + p^{\gamma'}, \quad p^\beta = -p^{\beta'} - p^{\gamma'} = p^\alpha - p^{\gamma'},$$

die zusammen mit den Formeln (3) auf S. 73 zur Bestimmung der Coefficienten a_α^α , a_β^α , a_γ^α , $a_\alpha^{\alpha'}$, $a_\beta^{\alpha'}$, $a_\gamma^{\alpha'}$, a_α^β , ... ausreichen.

(3) (Zu Seite 82.) Einen Integrationsweg, der in allen Fällen statthaft ist, erhält man nach Pochhammer (Math. Annalen Bd. 35) durch einen Doppelumlauf um zwei Verzweigungspunkte, wie ihn die Figur zeigt. Ist die Integration bis a und b gestattet, so kann dieser Integrationsweg so zusammengezogen werden, daß er aus vier zwischen a und b verlaufenden Linien besteht. Bezeichnet man mit P das Integral über eine dieser Linien, so ist das über den Doppelumlauf erstreckte Integral

$$(1 - e^{2\alpha\pi i})(1 - e^{-2\beta\pi i})P.$$

F. Klein hat diesen Darstellungen der P -functionen durch Einführung homogener Variablen eine noch elegantere Fassung gegeben. (Math. Annalen Bd. 38.)

(4) (Zu Seite 82.) Nach der Ergänzung, die Dirichlet seinem Convergencebeweis der Fourier'schen Reihe in dem Zusatz zu der Abhandlung über Kugelfunctionen gegeben hat (Crelle's Journal Bd. 4, Dove's Repertorium Bd. I, Crelle's Journal Bd. 17, Dirichlet's Werke S. 117, 133, 305) kann eine periodische Function eines reellen Argumentes, die in einem Punkt von niedrigerer als der ersten Ordnung unendlich wird, in eine Fourier'sche Reihe entwickelt werden. Wendet man diesen Satz an auf die Werthe, die eine in eine hypergeometrische Reihe entwickelbare P -Function auf dem Einheitskreis hat, so ergiebt sich eine Reihe, die von der nicht verschieden sein kann, die man erhält, wenn man in der hypergeometrischen Reihe den Modul (absoluten Werth) von $x = 1$ setzt.

VI. Theorie der Abel'schen Functionen.

(Aus Borchardt's Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 54. 1857.)

I. Allgemeine Voraussetzungen und Hilfsmittel für die Untersuchung von Functionen unbeschränkt veränderlicher Grössen.

Die Absicht, den Lesern des Journals für Mathematik Untersuchungen über verschiedene Transcendenten, insbesondere auch über Abel'sche Functionen vorzulegen, macht es mir wünschenswerth, um Wiederholungen zu vermeiden, eine Zusammenstellung der allgemeinen Voraussetzungen, von denen ich bei ihrer Behandlung ausgehen werde, in einem besonderen Aufsätze vorzuschicken.

Für die unabhängig veränderliche Grösse setze ich stets die jetzt allgemein bekannte Gauss'sche geometrische Repräsentation voraus, nach welcher eine complexe Grösse $z = x + yi$ vertreten wird durch einen Punkt einer unendlichen Ebene, dessen rechtwinklige Coordinaten x, y sind; ich werde dabei die complexen Grössen und die sie repräsentirenden Punkte durch dieselben Buchstaben bezeichnen. Als Function von $x + yi$ betrachte ich jede Grösse w , die sich mit ihr der Gleichung

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{1}{i} \frac{\partial w}{\partial y} \quad (1)$$

gemäss ändert, ohne einen Ausdruck von w durch x und y vorauszusetzen.

Aus dieser Differentialgleichung folgt nach einem bekannten Satze, daß die Grösse w durch eine nach ganzen Potenzen von $z - a$ fortschreitende Reihe von der Form $\sum a_n(z - a)^n$ darstellbar ist, sobald sie in der Umgebung von a allenthalben einen bestimmten mit z stetig sich ändernden Werth hat, und daß diese Darstellbarkeit stattfindet bis zu einem Abstände von a oder Modul von $z - a$, für welchen eine Unstetigkeit eintritt. Es ergibt sich aber aus den Betrachtungen, welche der Methode der unbestimmten Coefficienten zu Grunde liegen, daß die Coefficienten a_n völlig bestimmt sind, wenn w in einer endlichen übrigens beliebig kleinen von a ausgehenden Linie gegeben ist.

Beide Ueberlegungen verbindend, wird man sich leicht von der Richtigkeit des Satzes überzeugen:

Eine Function von $x + yi$, die in einem Theile der (x, y) -Ebene gegeben ist, kann darüber hinaus nur auf Eine Weise stetig fortgesetzt werden.

Man denke sich nun die zu untersuchende Function nicht durch irgend welche z enthaltende analytische Ausdrücke oder Gleichungen bestimmt, sondern dadurch, daß der Werth der Function in einem beliebig begrenzten Theile der z -Ebene gegeben ist und sie von dort aus stetig (der partiellen Differentialgleichung (1) gemäss) fortgesetzt wird. Diese Fortsetzung ist nach den obigen Sätzen eine völlig bestimmte, vorausgesetzt, daß sie nicht in blossen Linien geschieht, wobei eine partielle Differentialgleichung nicht zur Anwendung kommen könnte, sondern durch Flächenstreifen von endlicher Breite. Je nach der Beschaffenheit der fortzusetzenden Function wird nun entweder die Function für denselben Werth von z immer wieder denselben Werth annehmen, auf welchem Wege auch die Fortsetzung geschehen sein möge, oder nicht.

Im ersteren Falle nenne ich sie *einwerthig*, sie bildet dann eine für jeden Werth von z völlig bestimmte und nicht längs einer Linie unstetige Function. Im letzteren Falle, wo

sie *mehrwertig* heissen soll, hat man, um ihren Verlauf aufzufassen, vor Allem seine Aufmerksamkeit auf gewisse Punkte der z -Ebene zu richten, um welche herum sich die Function in eine andere fortsetzt.

Ein solcher Punkt ist z. B. bei der Function $\log(z - a)$ der Punkt a . Denkt man sich von diesem Punkte a aus eine beliebige Linie gezogen, so wird man in der Umgebung von a den Werth der Function so wählen können, daß sie sich ausser dieser Linie überall stetig ändert; zu beiden Seiten dieser Linie nimmt sie aber dann verschiedene Werthe an, auf der negativen¹ einen um $2\pi i$ grösseren, als auf der positiven. Die Fortsetzung der Function von einer Seite dieser Linie aus, z. B. von der negativen, über sie hinüber in das jenseitige Gebiet giebt dann offenbar eine von der dort schon vorhandenen verschiedene Function und zwar im hier betrachteten Falle eine allenthalben um $2\pi i$ grössere.

2.

Zur bequemeren Bezeichnung dieser Verhältnisse sollen die verschiedenen Fortsetzungen einer Function für denselben Theil der z -Ebene *Zweige* dieser Function genannt werden und ein Punkt, um welchen sich ein Zweig einer Function in einen andern fortsetzt, eine *Verzweigungsstelle* dieser Function; wo keine Verzweigung stattfindet, heisst die Function *einädrig* oder *monodrom*.

Ein Zweig einer Function von mehreren unabhängig veränderlichen Grössen, $z, s, t, \dots$ ist einädrig in der Umgebung eines bestimmten Werthensystems $z = a, s = b, t = c, \dots$, wenn allen Werthencombinationen dieser Grössen, die diesem Werthensysteme hinreichend benachbart sind, nur ein Werth dieses Zweiges entspricht. Dies vorausgesetzt erschöpft die weitere Untersuchung dieser Function den in dem Obigen für den Fall einer unabhängig veränderlichen Grösse behandelten Gegenstand.

2. (Fortsetzung: Zerschneidung einer mehrfach zusammenhängenden Fläche in eine einfach zusammenhängende.)

Es mögen nun in einer Fläche, in welcher die zu untersuchende Function ursprünglich gegeben war, verschiedene Flächenstücke mit der Begrenzung der Fläche zusammenhängen. Eine solche Fläche werde ich *mehrfach zusammenhängend* nennen. Um darin eine *einfach zusammenhängende Fläche* zu bilden, mögen in derselben von einem Begrenzungspunkte durch das Innere nach einem Begrenzungspunkte Querschnitte, d. h. Linien, welche keinen Punkt mehrfach durchlaufen, gezogen werden. Diese Querschnitte sollen so gewählt werden, daß ein zusammenhängendes begrenztes Flächenstück entsteht, dessen Begrenzung aus der ursprünglichen Begrenzung der Fläche und aus den beiden Seiten der Querschnitte besteht. Durch jeden solchen Querschnitt wird offenbar die Anzahl der Zusammenhänge der Fläche um Eins vermindert, da man um ihn herum nicht mehr von einem Theile der Fläche, der vorher mit dem andern zusammenhängte, in den andern gelangen kann, ohne die Begrenzung zu überschreiten, und daher nach einer geraden Anzahl von Querschnitten eine einfach zusammenhängende Fläche entsteht.

Die hierdurch zerschnittene Fläche werde ich im Folgenden durch T' bezeichnen.

3.

Bestimmung einer Function einer veränderlichen complexen Grösse durch Grenz- und Unstetigkeitsbedingungen.

Wenn in einer Ebene, in welcher die rechtwinkligen Coordinaten eines Punkts x, y sind, der Werth einer Function von $x + yi$ in einer endlichen Linie gegeben ist, so kann

¹Im Anschlusse an die von Gauss vorgeschlagene Benennung *positiv laterale Einheit* für $+i$ werde ich als positive Seitenrichtung zu einer gegebenen Richtung diejenige bezeichnen, welche zu ihr ebenso liegt, wie $+i$ zu 1.

diese von dort aus nur auf eine Weise stetig fortgesetzt werden und ist also dadurch völlig bestimmt (siehe oben S. 89). Sie kann aber auch in dieser Linie nicht willkürlich angenommen werden, wenn sie von ihr aus einer stetigen Fortsetzung in die anstossenden Flächentheile nach beiden Seiten hin fähig sein soll, da sie durch ihren Verlauf in einem noch so kleinen endlichen Theile dieser Linie schon für den übrigen Theil bestimmt ist. Bei dieser Bestimmungsweise einer Function sind also die zu ihrer Bestimmung dienenden Bedingungen nicht von einander unabhängig.

Als Grundlage für die Untersuchung einer Transcendenten ist es vor allen Dingen nöthig, ein System zu ihrer Bestimmung hinreichender von einander unabhängiger Bedingungen aufzustellen. Hierzu kann in vielen Fällen, namentlich bei den Integralen algebraischer Functionen und ihren inversen Functionen, ein Princip dienen, welches Dirichlet zur Lösung dieser Aufgabe für eine der Laplace'schen partiellen Differentialgleichung genügende Function von drei Veränderlichen, — wohl durch einen ähnlichen Gedanken von Gauss veranlaßt — in seinen Vorlesungen über die dem umgekehrten Quadrat der Entfernung proportional wirkenden Kräfte seit einer Reihe von Jahren zu geben pflegt.

Für diese Anwendung auf die Theorie von Transcendenten ist jedoch gerade ein Fall besonders wichtig, auf welchen dies Princip in seiner dortigen einfachsten Form nicht anwendbar ist, und welcher dort als von ganz untergeordneter Bedeutung unberücksichtigt bleiben kann. Dieser Fall ist der, wenn die Function an gewissen Stellen des Gebiets, wo sie zu bestimmen ist, vorgeschriebene Unstetigkeiten annehmen soll; was so zu verstehen ist, daß sie an jeder solchen Stelle der Bedingung unterworfen ist, unstetig zu werden, wie eine dort gegebene unstetige Function, oder sich nur um eine dort stetige Function von ihr zu unterscheiden.

Ich werde hier das Princip in der für die beabsichtigte Anwendung erforderlichen Form darstellen und erlaube mir dabei in Betreff einiger Nebenuntersuchungen auf die in meiner Doctor-dissertation (*Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse. Göttingen 1851*) gegebene Darstellung desselben zu verweisen.

Man nehme an, daß eine die (x, y) -Ebene einfach oder mehrfach bedeckende beliebig begrenzte Fläche T und in derselben zwei für jeden ihrer Punkte eindeutig bestimmte reelle Functionen von x, y , die Functionen α und β gegeben seien, und bezeichne das durch die Fläche T ausgedehnte Integral

$$\Omega(\alpha) = \int_T \left[\left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right)^2 \right] dT \quad (2)$$

durch $\Omega(\alpha)$, wobei die Functionen α und β beliebige Unstetigkeiten besitzen können, wenn nur das Integral dadurch nicht unendlich wird. Es bleibt dann auch $\Omega(\alpha - \lambda)$ endlich, wenn λ allenthalben stetig ist und endliche Differentialquotienten hat. Wird diese stetige Function λ der Bedingung unterworfen, nur in einem unendlich kleinen Theile der Fläche T von einer unstetigen Function γ verschieden zu sein, so wird $\Omega(\alpha - \gamma)$ unendlich groß, wenn γ längs einer Linie unstetig ist oder in einem Punkte so unstetig ist, daß

$$\frac{\partial \gamma}{\partial x} + \frac{\partial \gamma}{\partial y}$$

unendlich wird (Meine Inaug. Diss. Art. 17); es bleibt aber $\Omega(\alpha - \lambda)$ endlich, wenn γ nur in einzelnen Punkten und nur so unstetig ist, daß

$$\int \left[\left(\frac{\partial \gamma}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \gamma}{\partial y} \right)^2 \right] dT$$

durch die Fläche T erstreckt endlich bleibt, wie z. B. wenn γ in der Umgebung eines Punktes im Abstände r von demselben $= (-\log r)^\varepsilon$ und $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$ ist. Zur Abkürzung mögen hier die Functionen, in welche λ unbeschadet der Endlichkeit von $\Omega(\alpha - \lambda)$ übergehen kann, *unstetig von der ersten Art*, die Functionen, für welche dies nicht möglich ist, *unstetig von der zweiten Art* genannt werden.

Denkt man sich nun in $\Omega(\alpha - \mu)$ für μ alle stetigen oder von der ersten Art unstetigen Functionen gesetzt, welche an der Grenze verschwinden, so erhält dies Integral immer einen endlichen, aber seiner Natur nach nie einen negativen Werth, und es muß daher wenigstens einmal, für $\alpha - \mu = u$, ein Minimumwerth eintreten, so daß Ω für jede Function $\alpha - \mu$, die unendlich wenig von u verschieden ist, größer als $\Omega(u)$ wird.

Bezeichnet daher θ eine beliebige stetige oder von erster Art unstetige Function des Orts in der Fläche T , die an der Grenze allenthalben gleich 0 ist, und h eine von x, y unabhängige Grösse, so muß $\Omega(u + h\theta)$ sowohl für ein positives, als für ein negatives hinreichend kleines h größer als $\Omega(u)$ werden, und daher in der Entwicklung dieses Ausdrucks nach Potenzen von h der Coefficient von h verschwinden. Ist dieser 0, so ist

$$\Omega(u + h\theta) = \Omega(u) + h^2\Omega(\theta)$$

und folglich Ω immer ein Minimum.

Das Minimum tritt nur für eine einzige Function u ein; denn fände auch ein Minimum für $u + \delta$ statt, so könnte $\Omega(u + \delta)$ nicht $> \Omega(u)$ sein, weil sonst $\Omega(u + h\delta) < \Omega(u + \delta)$ für $h < 1$ würde; also könnte $\Omega(u + \delta)$ nicht kleiner als die anliegenden Werthe sein. Ist aber $\Omega(u + \delta) = \Omega(u)$, so muß δ constant, also da es in der Begrenzung 0 ist, überall 0 sein. Es wird daher nur für eine einzige Function u das Integral Ω ein Minimum und die Variation erster Ordnung oder das h proportionale Glied in $\Omega(u + h\theta)$:

$$\int \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right) \frac{\partial \theta}{\partial x} + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right) \frac{\partial \theta}{\partial y} \right] dT = 0. \quad (3)$$

Aus dieser Gleichung folgt, daß das Integral

$$\int \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right) dy - \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right) dx$$

durch die ganze Begrenzung eines Theils der Fläche T erstreckt stets $= 0$ ist. Zerlegt man nun (nach der vorhergehenden Abhandlung) die Fläche T , wenn sie eine mehrfach zusammenhängende ist, in eine einfach zusammenhängende T' , so liefert die Integration durch das Innere von T' von einem festen Anfangspunkte bis zum Punkte (x, y) eine Function von x, y ,

$$v = \int \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right) dx + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right) dy \right] + \text{const.}, \quad (4)$$

welche in T' überall stetig oder unstetig von der ersten Art ist und sich beim Überschreiten der Querschnitte um endliche von einem Knotenpunkte des Schnittnetzes zum andern constante Grössen ändert.

Es genügt dann $v = \beta - v$ den Gleichungen

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x},$$

und folglich ist $u + vi$ eine Lösung der Differentialgleichung

$$i \frac{\partial(u + vi)}{\partial y} = \frac{\partial(u + vi)}{\partial x}$$

oder eine Function von $x + yi$.

Man erhält auf diesem Wege den in der erwähnten Abhandlung Art. 18 ausgesprochenen Satz:

Ist in einer zusammenhängenden durch Querschnitte in eine einfach zusammenhängende T' zerlegten Fläche T eine complexe Function $\alpha + \beta i$ von x, y gegeben, für welche

$$\int \left[\left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \beta}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \beta}{\partial x} \right)^2 \right] dT$$

durch die ganze Fläche ausgedehnt einen endlichen Werth hat, so kann sie immer und nur auf Eine Art in eine Function von $x + yi$ verwandelt werden durch Subtraction einer Function $\mu + \nu i$ von x, y , welche folgenden Bedingungen genügt:

- 1) μ ist am Rande $= 0$ oder doch nur in einzelnen Punkten davon verschieden, ν in Einem Punkte beliebig gegeben.
- 2) Die Änderungen von μ sind in T , von ν in T' nur in einzelnen Punkten und nur so unstetig, daß

$$\int \left[\left(\frac{\partial \mu}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \mu}{\partial y} \right)^2 \right] dT \quad \text{und} \quad \int \left[\left(\frac{\partial \nu}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \nu}{\partial y} \right)^2 \right] dT$$

durch die ganze Fläche erstreckt, endlich bleiben, und letztere längs der Querschnitte beiderseits gleich.

Wenn die Function $\alpha + \beta i$, wo ihre Differentialquotienten unendlich werden, unstetig wird, wie eine gegebene dort unstetige Function von $x + yi$, und keine durch eine Abänderung ihres Werthes in einem einzelnen Punkte hebbare Unstetigkeit besitzt, so bleibt $\Omega(\alpha)$ endlich, und es wird $\mu + \nu i$ in T' allenthalben stetig. Denn da eine Function von $x + yi$ gewisse Unstetigkeiten, wie z. B. Unstetigkeiten erster Art, gar nicht annehmen kann (Meine Diss. Art. 12), so muß die Differenz zweier solcher Functionen stetig sein, sobald sie nicht von der zweiten Art unstetig ist.

Nach dem eben bewiesenen Satze läßt sich daher eine Function von $x + yi$ so bestimmen, daß sie im Innern von T , von der Unstetigkeit des imaginären Theils in den Querschnitten abgesehen, gegebene Unstetigkeiten annimmt, und ihr reeller Theil an der Grenze einen dort allenthalben beliebig gegebenen Werth erhält; wenn nur für jeden Punkt, wo ihre Differentialquotienten unendlich werden sollen, die vorgeschriebene Unstetigkeit die einer gegebenen dort unstetigen Function von $x + yi$ ist. Die Bedingung an der Grenze kann man, wie leicht zu sehen, ohne eine wesentliche Änderung der gemachten Schlüsse durch manche andere ersetzen.

4. Theorie der Abel'schen Functionen.

In der folgenden Abhandlung habe ich die Abel'schen Functionen nach einer Methode behandelt, deren Principien in meiner Inauguraldissertation² aufgestellt und in einer etwas veränderten Form in den drei vorhergehenden Aufsätzen dargestellt worden sind. Zur Erleichterung der Uebersicht schicke ich eine kurze Inhaltsangabe voraus.

Die erste Abtheilung enthält die Theorie eines Systems von gleichverzweigten algebraischen Functionen und ihren Integralen, soweit für dieselbe nicht die Betrachtung von ϑ -Reihen maßgebend ist, und handelt im § 1–5 von der Bestimmung dieser Functionen durch ihre Verzweigungsart und ihre Unstetigkeiten, im § 6–10 von den rationalen Ausdrücken derselben in zwei durch eine algebraische Gleichung verknüpfte veränderliche Grössen, und im § 11–13 von der Transformation dieser Ausdrücke durch rationale Substitutionen. Der bei dieser Untersuchung sich darbietende Begriff einer *Klasse* von algebraischen Gleichungen, welche sich durch rationale Substitutionen in einander transformiren lassen, dürfte auch für andere Untersuchungen wichtig und die Transformation einer solchen Gleichung in Gleichungen niedrigsten Grades ihrer Klasse (§ 13) auch bei anderen Gelegenheiten von Nutzen sein. Diese Abtheilung behandelt endlich im § 14–16 zur Vorbereitung der folgenden die Anwendung des Abel'schen Additionstheorems für ein beliebiges System allenthalben endlicher Integrale von gleichverzweigten algebraischen Functionen zur Integration eines Systems von Differentialgleichungen.

In der *zweiten Abtheilung* werden für ein beliebiges System von immer endlichen Integralen gleichverzweigter, algebraischer, $(2p + 1)$ -fach zusammenhängender Functionen die *Jacobi'schen Umkehrungsfunktionen* von p veränderlichen Grössen durch p -fach unendliche ϑ -Reihen ausgedrückt, d. h. durch Reihen von der Form

$$\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p) = \sum_{-\infty}^{+\infty} e^{(\sum_{\mu} \sum_{\mu'} a_{\mu, \mu'} m_{\mu} m_{\mu'} + 2 \sum_{\mu} v_{\mu} m_{\mu})},$$

worin die Summationen im Exponenten sich auf μ und μ' , die äusseren Summationen auf $m_1, m_2, \dots, m_p$ beziehen. Es ergibt sich, daß zur allgemeinen Lösung dieser Aufgabe *eine* Gattung von ϑ -Reihen ausreicht, in denen wenn $p > 3$ specielle — zwischen den $\frac{p(p+1)}{2}$ Grössen a — Relationen stattfinden, so daß nur $3p - 3$ willkürlich bleiben. Dieser Theil der Abhandlung bildet zugleich eine Theorie dieser speciellen Gattung von ϑ -Functionen; die allgemeinen ϑ -Functionen bleiben hier ausgeschlossen, lassen sich jedoch nach einer ganz ähnlichen Methode behandeln.

Das hier erledigte Jacobi'sche Umkehrungsproblem ist für die hyperelliptischen Integrale schon auf mehreren Wegen durch die beharrlichen mit so schönem Erfolge gekrönten Arbeiten von Weierstrass gelöst worden, von denen eine Uebersicht im 47. Bande des Journ. für Math. (S. 289) mitgetheilt worden ist. Es ist jedoch bis jetzt nur von dem Theile dieser Arbeiten, welcher in den §§ 1 und 2 und der ersten die elliptischen Functionen betreffenden Hälfte des § 3 der angeführten Abhandlung skizzirt wird, die wirkliche Ausführung veröffentlicht (Bd. 52, S. 285 d. Journ. f. Math.); in wie weit zwischen den späteren Theilen dieser Arbeiten und meinen hier dargestellten eine Uebereinstimmung nicht bloss in Resultaten, sondern auch in den zu ihnen führenden Methoden stattfindet, wird grösstentheils erst die versprochene ausführliche Darstellung derselben ergeben können.

²Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse. Göttingen 1851.

Die gegenwärtige Abhandlung bildet mit Ausnahme der beiden letzten §§. 26 und 27, deren Gegenstand damals nur kurz angedeutet werden konnte, einen Auszug aus einem Theile meiner von Michaelis 1855 bis Michaelis 1856 zu Göttingen gehaltenen Vorlesungen. Was die Auffindung der einzelnen Resultate betrifft, so wurde ich auf das im § 1–5, 9 und 12 Mitgetheilte und die dazu nöthigen vorbereitenden Sätze, welche später Behufs der Vorlesungen so, wie es in dieser Abhandlung geschehen ist, weiter ausgeführt wurden, im Herbst 1851 und zu Anfang 1852 durch Untersuchungen über die conforme Abbildung mehrfach zusammenhängender Flächen geführt, ward aber dann durch einen andern Gegenstand von dieser Untersuchung abgezogen. Erst um Ostern 1855 wurde sie wieder aufgenommen und in den Oster- und Michaelisferien jenes Jahres bis zu § 21 incl. fortgeführt; das Übrige wurde bis Michaelis 1856 hinzugefügt. Einzelne ergänzende Zusätze sind an manchen Stellen während der Ausarbeitung hinzugekommen.

Erste Abtheilung.

§ 1.

Ist s die Wurzel einer irreductibeln Gleichung n ten Grades, deren Coefficienten ganze Functionen m ten Grades von z sind, so entsprechen jedem Werthe von z n Werthe von s , die sich mit z überall, wo sie nicht unendlich werden, stetig ändern. Stellt man daher (nach Art. 4 der Diss.) jeden Werth von z durch einen Punkt einer mit z -Ebene parallelen unendlichen Ebene, die s -Ebene, ab und theilt man die letztere so in n Flächenstücke, daß in jedem derselben der Punkt einen ganz bestimmten, sich stetig ändernden Werth von s repräsentirt, so erhält man eine die s -Ebene allenthalben n fach bedeckende und die z -Ebene (in den kleinsten Theilen ähnlich) abbildende Fläche T . Diese Fläche wird durch jeden Punkt, um welchen die Punkte von s mit einander vertauscht werden, in eine solche Verzweigungspunkt genannte Punkt, um welchen sich die Fläche in eine windende heissen.

Die Function s ist algebraisch und hängt daher von einer Gleichung $F(s, z) = 0$ ab. Die Fläche T ist durch ihre Verzweigungsart bestimmt, und wenn man über die Anfangs- und Endpunkte der in ihr vorhandenen Windungen frei verfügen kann, so ist dadurch die Fläche völlig gegeben, da man sie dann aus lauter einfach zusammenhängenden Blättern, welche über der z -Ebene ausgebreitet sind, zusammensetzen kann. Die Verzweigungsart einer solchen Function s wird daher vollständig dargestellt durch eine die z -Ebene bedeckende und in Verzweigungspunkten windende Fläche T .

§ 2.

Umgekehrt bilden für jede beliebig gegebenen Verzweigungsart der Fläche die Functionen, die sich mit z stetig ändern und ausser in den Verzweigungspunkten allenthalben einwerthig sind, ein System gleich verzweigter algebraischer Functionen. Dieses System enthält insbesondere eine Function, die für jeden Punkt der Fläche unendlich von der ersten Ordnung wird und deren reeller Theil am Rande einen gegebenen Werth annimmt.

§ 3.

Es werde nun die Fläche T in eine einfach zusammenhängende Fläche T' durch $2p$ Querschnitte zerlegt. Durch jeden Punkt der Fläche gehen dann $2p$ von einander unabhängige Integrale erster Gattung, d. h. allenthalben endliche Integrale rationaler Functionen von s und z . Die Periodicitätsmoduln dieser Integrale an den Querschnitten bilden ein System von $2p^2$ Grössen, welche die fundamentale Bedeutung für die Theorie der Abel'schen Functionen haben.

§ 4.

Eine wie T verzweigte Function ζ von z , die für μ Punkte dieser Fläche unendlich von der ersten Ordnung wird, ist nach dem Früheren die Wurzel einer Gleichung von der Form

$$G(\zeta, z) = 0,$$

und nimmt daher jeden Werth für μ Punkte der Fläche T an. Wenn man sich also jeden Punkt von T durch einen den Werth von ζ in diesem Punkte geometrisch repräsentirenden Punkt einer Ebene abgebildet denkt, so bildet die Gesammtheit dieser Punkte eine in der ζ -Ebene allenthalben μ fach ausgebreitete und die Fläche T — bekanntlich in den kleinsten Theilen ähnlich — abbildende Fläche T_1 .

Jedem Punkt in der einen Fläche entspricht dann ein Punkt in der andern. Die Functionen ω oder die Integrale wie T verzweigter Functionen von z gehen daher, wenn man für z als unabhängig veränderliche Grösse z_1 einführt, in Functionen über, welche in der

Fläche T_1 allenthalben einen bestimmten Werth und dieselben Unstetigkeiten haben, wie die Functionen ω in den entsprechenden Punkten von T , und welche folglich Integrale wie T_1 verzweigter Functionen von z_1 sind.

§ 5.

Es seien $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_p$ von einander unabhängige allenthalben endliche Integrale rationaler Functionen von s und z . Die allgemeinste Function, die in der Fläche T nur für p Punkte unendlich von der ersten Ordnung wird, lässt sich dann als Quotient zweier solcher Integrale darstellen. Die Anzahl der Bedingungsgleichungen, welche eine Function bestimmen, die für μ Punkte unendlich von der ersten Ordnung wird, beträgt $p + \mu - 1$; denn es müssen $2\mu - p - 1$ von den 2μ reellen Constanten der Function willkürlich bleiben.

Für die Bestimmung einer solchen Function sind also $2\mu - p - 1$ Bedingungen erforderlich. Soll die Function für möglichst wenig Punkte unendlich werden, so muß μ den kleinstmöglichen Werth haben, und es zeigt sich, daß dieser Werth μ nicht kleiner als $p + 1$ sein kann.

§ 6.

Es seien $s_1, s_2, \dots, s_n$ die n Werthe der Function s für dasselbe z , und bezeichnet ϑ eine beliebige Grösse, so ist $(\vartheta - s_1)(\vartheta - s_2) \cdots (\vartheta - s_n)$ eine einwerthige Function von z , die nur für einen Punkt der z -Ebene, der mit einem Punkte ε zusammenfällt, unendlich wird und unendlich von einer so hohen Ordnung, als Punkte ε auf ihn fallen.

Bezeichnet man nun die Werthe von z in den Punkten ε , wo s nicht unendlich ist, durch $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\nu$ und $(z - \varepsilon_1)(z - \varepsilon_2) \cdots (z - \varepsilon_\nu)$ durch g_0 , so ist $g_0(\vartheta - s_1) \cdots (\vartheta - s_n)$ eine einwerthige Function von z , die für alle endlichen Werthe von z endlich ist und für $z = \infty$ unendlich von der m ten Ordnung wird, also eine ganze Function m ten Grades von z . Sie ist zugleich eine ganze Function n ten Grades von ϑ , die für $\vartheta = s$ verschwindet. Bezeichnet man sie durch F und, wie wir in der Folge thun wollen, eine ganze Function n ten Grades von ϑ und m ten Grades von z durch $F(\vartheta, z)$, so ist s die Wurzel der Gleichung $F(s, z) = 0$.

Die Function F ist eine Potenz einer *unzerfällbaren* — d. h. nicht als ein Product aus ganzen Functionen von ϑ und z darstellbaren — Function. Denn jeder ganze rationale Factor von $F(\vartheta, z)$ bildet, da er für einige der Wurzeln $s_1, s_2, \dots, s_n$ verschwinden muß, für $\vartheta = s$ eine Function von z , die in einem Theile der Fläche T verschwindet und folglich, da diese Fläche zusammenhängend ist, in der ganzen Fläche 0 sein muß. Zwei unzerfällbare Factoren von $F(\vartheta, z)$ könnten aber nur für eine endliche Anzahl von Werthenpaaren zugleich verschwinden, wenn die eine nicht durch Multiplication mit einer Constanten aus der andern erhalten werden könnte. Folglich muß F eine Potenz einer unzerfällbaren Function sein.

Wenn der Exponent ν dieser Potenz > 1 ist, so wird die Verzweigungsart der Function s nicht dargestellt durch die Fläche T , sondern durch eine in der z -Ebene allenthalben ν fach ausgebreitete Fläche t , in welcher die Fläche T allenthalben ν fach ausgebreitet ist. Es kann dann zwar s als eine wie T verzweigte Function betrachtet werden, nicht aber umgekehrt T als verzweigt, wie s .

§ 7.

Eine solche nur in einzelnen Punkten von T unstetige Function, wie s , ist auch $\frac{ds}{dz}$. Denn diese Function nimmt zu beiden Seiten der Querschnitte und der Linien l denselben Werth an, da die Differenz der beiden Werthe von ω in diesen Linien längs denselben constant ist; sie kann nur unendlich werden, wo ω unendlich wird, und in den Verzwei-

gungspunkten der Fläche und ist sonst allenthalben stetig, da die Derivirte einer einädrig und endlich bleibenden Function ebenfalls einädrig und endlich bleibt.

Es sind daher sämmtliche Functionen ω algebraische wie T verzweigte Functionen von z oder Integrale solcher Functionen. Dieses System von Functionen ist bestimmt, wenn die Fläche T gegeben ist und hängt nur von der Lage ihrer Verzweigungspunkte ab.

§ 8.

Es sei jetzt die irreductible Gleichung $F(s, z) = 0$ gegeben und die Art der Verzweigung der Function s oder der sie darstellenden Fläche T zu bestimmen. Wenn für einen Werth β von z μ Zweige der Function zusammenhängen, so daß einer dieser Zweige sich erst nach μ Umläufen des z um β wieder in sich selbst fortsetzt, so können diese μ Zweige der Function (wie nach Cauchy oder durch die Fourier'sche Reihe leicht bewiesen werden kann) dargestellt werden durch eine Reihe nach steigenden rationalen Potenzen von $z - \beta$ mit Exponenten vom kleinsten gemeinschaftlichen Nenner μ , und umgekehrt.

Ein Punkt der Fläche T , in welchem nur zwei Zweige einer Function zusammenhängen, so daß sich um diesen Punkt der erste in den zweiten und dieser in jenen fortsetzt, heisse ein *einfacher Verzweigungspunkt*.

Ein Punkt der Fläche, um welchen sie sich $(\mu + 1)$ mal windet, kann dann angesehen werden als μ zusammengefallene (oder unendlich nahe) einfache Verzweigungspunkte.

Um dies zu zeigen, seien in einem diesen Punkt umgebenden Stücke der z -Ebene $s_1, s_2, \dots, s_{\mu+1}$ einädrige Zweige der Function s und in der Begrenzung desselben, bei positiver Umschreibung auf einander folgend, $a_1, a_2, \dots, a_\mu$ einfache Verzweigungspunkte. Durch einen positiven Umlauf um a_1 werde s_1 mit s_2 , um a_2 s_2 mit $s_3, \dots$, um a_μ, s_μ mit $s_{\mu+1}$ vertauscht. Es gehen dann nach einem positiven Umlaufe um ein alle diese Punkte (und keinen andern Verzweigungspunkt) enthaltendes Gebiet

$$s_1, s_2, \dots, s_\mu, s_{\mu+1}$$

in

$$s_2, s_3, \dots, s_{\mu+1}, s_1$$

über, und es entsteht daher, wenn sie zusammenfallen, ein μ facher Windungspunkt.

§ 9.

Die Eigenschaften der Functionen ω hängen wesentlich davon ab, wie vielfach zusammenhängend die Fläche T ist. Um dies zu entscheiden, wollen wir zunächst die Anzahl der einfachen Verzweigungspunkte der Function s bestimmen.

In einem Verzweigungspunkte nehmen die dort zusammenhängenden Zweige der Function denselben Werth an, und es werden daher zwei oder mehrere Wurzeln der Gleichung

$$F(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n = 0$$

einander gleich. Dies kann nur geschehen, wenn

$$F'(s) = a_0 n s^{n-1} + a_1 (n-1) s^{n-2} + \dots + a_{n-1} = 0$$

oder die einwerthige Function von z ,

$$F'(s_1) F'(s_2) \dots F'(s_n),$$

verschwindet. Diese Function wird für endliche Werthe von z nur unendlich, wenn $s = \infty$, also $a_0 = 0$ ist und muß, um endlich zu bleiben, mit a_0^{n-2} multiplicirt werden. Sie wird

dann eine einwerthige, für ein endliches z endliche Function von z , welche für $z = \infty$ unendlich von der $2m(n-1)$ ten Ordnung wird, also eine ganze Function $2m(n-1)$ ten Grades. Die Werthe von z , für welche $F'(s)$ und $F(s)$ gleichzeitig verschwinden, sind also die Wurzeln der Gleichung

$$Q(z) = a_0^{n-2} \prod_{i=1}^n F'(s_i) = 0 \quad (5)$$

oder auch, da $F'(s_i) = a_0 \prod_{i' \neq i} (s_i - s_{i'})$, die aus $F'(s) = 0$ und $F(s) = 0$ durch Elimination von s gebildete werden kann.

Wird $F(s, z) = 0$ für $s = \alpha$, $z = \beta$, so ist

$$F(s, z) = F(\alpha, \beta) + \frac{\partial F}{\partial s}(s - \alpha) + \frac{\partial F}{\partial z}(z - \beta) + \dots$$

Ist also für $(s = \alpha, z = \beta)$ gleichzeitig $\frac{\partial F}{\partial s} = 0$ und $\frac{\partial F}{\partial z}$ nicht $= 0$, so wird $s - \alpha$ unendlich klein, wie $(z - \beta)^{\frac{1}{2}}$, und findet also ein einfacher Verzweigungspunkt statt. Es werden zugleich in dem Producte $Q(z) = \prod F'(s_i)$ zwei Factoren dadurch den Factor $(z - \beta)$ unendlich klein.

In dem Falle, daß $\frac{\partial F}{\partial s}$ und $\frac{\partial F}{\partial z}$ nie verschwinden, wenn gleichzeitig $F = 0$ und $\frac{\partial F}{\partial s} = 0$ werden, entspricht demnach jedem linearen Factor von $Q(z)$ ein einfacher Verzweigungspunkt, und die Anzahl dieser Punkte ist also $= 2m(n-1)$.

Die Lage der Verzweigungspunkte hängt von den Coefficienten der Potenzen von z in den Functionen a ab und ändert sich stetig mit denselben.

Wenn diese Coefficienten solche Werthe annehmen, daß zwei demselben Zweigepaare angehörige einfache Verzweigungspunkte zusammenfallen, so heben diese sich auf, und es werden zwei Wurzeln von $F(s)$ einander gleich, ohne daß eine Verzweigung stattfindet. Setzt sich um jeden von ihnen s_1 in s_2 und s_2 in s_1 fort, so geht durch einen Umlauf um ein beide enthaltendes Stück der z -Ebene s_1 in s_2 und s_2 in s_1 über, und beide Zweige werden einädrig, wenn sie zusammenfallen.

Es bleibt dann also auch ihre Derivirte $\frac{ds}{dz}$ einädrig und endlich, und folglich wird $\frac{\partial F}{\partial z} = -\frac{\partial F}{\partial s} \cdot \frac{ds}{dz} = 0$.

Wird $F = \frac{\partial F}{\partial s} = \frac{\partial F}{\partial z} = 0$ für $s = \alpha$, $z = \beta$, so ergeben sich aus den drei folgenden Gliedern der Entwicklung von $F(s, z)$ zwei Werthe für $\frac{ds}{dz}$ ($s = \alpha, z = \beta$). Sind diese Werthe ungleich und endlich, so können die beiden Zweige der Function s , denen sie angehören, dort nicht zusammenhängen und sich nicht verzweigen. Es wird dann $\frac{ds}{dz}$ für beide unendlich klein wie $z - \beta$, und $Q(\beta)$ erhält dadurch den Factor $(z - \beta)^2$; es fallen also nur zwei einfache Verzweigungspunkte zusammen.

Um in jedem Falle, wenn für $z = \beta$ mehrere Wurzeln der Gleichung $F(s) = 0$ gleich α werden, zu entscheiden, wie viele einfache Verzweigungspunkte für $(s = \alpha, z = \beta)$ zusammenfallen, und wie viele von diesen sich aufheben, muß man diese Wurzeln (nach dem Verfahren von Lagrange³) soweit nach steigenden Potenzen von $z - \beta$ entwickeln, bis die-

³Nach einer handschriftlichen Bemerkung Riemann's ist dieses Verfahren von Puiseux in dessen Abhandlung *Recherches sur les fonctions algébriques*, Journ. de Math. 1850, durchgeführt. Riemann hatte offenbar die Puiseux'sche Arbeit erst nach Abfassung des Textes kennen gelernt.

se Entwicklungen sämmtlich von einander verschieden werden, wodurch sich die wirklich noch stattfindenden Verzweigungen ergeben. Und man muß dann untersuchen, von welcher Ordnung $F'(s)$ für jede dieser Wurzeln unendlich klein wird, um die Anzahl der ihnen zugehörigen linearen Factoren von $Q(z)$ oder der für $(s = \alpha, z = \beta)$ zusammengefallenen einfachen Verzweigungspunkte zu bestimmen.

Bezeichnet die Zahl q , wie oft sich die Fläche T um den Punkt (s, z) windet, so wird für diesen Punkt der Ausdruck $\frac{Q(z)}{(z - \beta)^{q-1}}$ weder verschwinden noch unendlich.

§ 10.

Für die Functionen, die nur in einzelnen Punkten der Fläche T unendlich werden, gilt folgender wichtiger Satz:

Eine wie T verzweigte Function ζ von z , die für μ Punkte dieser Fläche unendlich von der ersten Ordnung wird, enthält in ihrem allgemeinen Ausdrucke $2\mu - p + 1$ willkürliche Constanten.

In der That, die Differenz zweier solcher Functionen ist eine Function, die für dieselben μ Punkte unendlich wird und in den 2μ reellen Theilen dieser Unstetigkeiten gegebene Grössen hat. Damit diese Differenz allenthalben endlich sei, muß sie identisch verschwinden, und dazu sind 2μ reelle Bedingungen erforderlich. Da nun eine allgemeine solche Function 4μ reelle Constanten enthält, so bleiben $4\mu - 2\mu = 2\mu$ übrig, die sich jedoch nicht unabhängig voneinander ändern, da die reellen und imaginären Theile durch die Cauchy-Riemann'schen Differentialgleichungen mit einander verknüpft sind. Es bleiben daher $2\mu - p + 1$ willkürliche Constanten.

Eine solche Function ist die Wurzel einer Gleichung n ten Grades, deren Coefficienten ganze Functionen m ten Grades von z sind. Die Anzahl der in einer Function s , die nur für m Punkte der Fläche T unendlich von der ersten Ordnung wird und übrigens stetig bleibt, enthaltenen willkürlichen Constanten ist in allen Fällen $= 2m - p + 1$.

§ 11.

Eine wie T verzweigte Function ζ von z , die für μ_1 Punkte dieser Fläche unendlich von der ersten Ordnung wird, ist nach dem Früheren die Wurzel einer μ_1 ten Gleichung von der Form

$$G(\zeta_1, z) = 0$$

und nimmt daher jeden Werth für μ_1 Punkte der Fläche T an. Wenn man sich also jeden Punkt von T durch einen den Werth von ζ_1 in diesem Punkte geometrisch repräsentirenden Punkt einer Ebene abgebildet denkt, so bildet die Gesammtheit dieser Punkte eine in der ζ_1 -Ebene allenthalben μ_1 fach ausgebreitete und die Fläche T — bekanntlich in den kleinsten Theilen ähnlich — abbildende Fläche T_1 .

Bezeichnet s_1 irgend eine andere wie T verzweigte Function von z , die für m_1 Punkte von T und also auch von T_1 unendlich von der ersten Ordnung wird, so findet (§ 5) zwischen s_1 und ζ_1 eine Gleichung von der Form

$$F_1(s_1, \zeta_1) = 0$$

statt, worin F_1 eine Potenz einer unzerfällbaren ganzen Function von s_1 und ζ_1 ist, und es lassen sich, wenn diese Potenz die erste ist, alle wie T_1 verzweigten Functionen von ζ_1 , folglich alle rationale Functionen von s und z rational in s_1 und ζ_1 ausdrücken (§ 8).

Die Gleichung $F(s, z) = 0$ kann also durch eine rationale Substitution in $F_1(s_1, \zeta_1) = 0$ und diese in jene transformirt werden.

§ 12.

Man betrachte nun als zu *Einer Klasse* gehörend alle irreductiblen algebraischen Gleichungen zwischen zwei veränderlichen Grössen, welche sich durch rationale Substitutionen in einander transformiren lassen, so daß $F(s, z) = 0$ und $F_1(s_1, z_1) = 0$ zu derselben Klasse gehören, wenn sich für s und z solche rationale Functionen von s_1 und z_1 setzen lassen, daß $F(s, z) = 0$ in $F_1(s_1, z_1) = 0$ übergeht und zugleich s_1 und z_1 rationale Functionen von s und z sind.

Die rationalen Functionen von s und z bilden, als Functionen von irgend einer von ihnen ζ betrachtet, ein System gleich verzweigter algebraischer Functionen. Auf diese Weise führt jede Gleichung offenbar zu einer Klasse von Systemen gleichverzweigter algebraischer Functionen, welche sich durch Einführung einer Function des Systems als unabhängig veränderlicher Grösse in einander transformiren lassen und zwar alle Gleichungen *Einer Klasse* zu derselben Klasse von Systemen algebraischer Functionen, und umgekehrt führt (§ 11) jede Klasse von solchen Systemen zu *Einer Klasse* von Gleichungen.

Ist das Grössengebiet (s, z) $(2p + 1)$ -fach zusammenhängend und die Function ζ in μ Punkten desselben unendlich von der ersten Ordnung, so ist die Anzahl der Verzweigungswerthe der gleichverzweigten Functionen von z , welche durch die übrigen rationalen Functionen von s und z gebildet werden, $2(\mu + p - 1)$, und die Anzahl der willkürlichen Constanten in der Function ζ $2\mu - p + 1$ (§ 5). Diese lassen sich so bestimmen, daß $2\mu - p + 1$ Verzweigungswerthe gegebene Werthe annehmen, wenn diese Verzweigungswerthe von einander unabhängige Functionen von ihnen sind, und zwar nur auf eine endliche Anzahl Arten, da die Bedingungsgleichungen algebraisch sind.

In jeder Klasse von Systemen gleichverzweigter $(2p + 1)$ -fach zusammenhängender Functionen giebt es daher eine endliche Anzahl von Systemen μ -werthiger Functionen, in welchen $2\mu - p + 1$ Verzweigungswerthe gegebene Werthe annehmen. Wenn andererseits die $2(\mu + p - 1)$ Verzweigungspunkte einer die z -Ebene allenthalben μ -fach bedeckenden $(2p + 1)$ -fach zusammenhängenden Fläche beliebig gegeben sind, so giebt es (§§ 3–5) immer ein System wie diese Fläche verzweigter algebraischer Functionen von z . Die $3p - 3$ übrigen Verzweigungswerthe in jenen Systemen gleichverzweigter μ -werthiger Functionen können daher beliebige Werthe annehmen; und es hängt also eine *Klasse* von Systemen gleichverzweigter $(2p + 1)$ -fach zusammenhängender Functionen und die zu ihr gehörende Klasse algebraischer Gleichungen von $3p - 3$ stetig veränderlichen Grössen ab, welche die *Moduln* dieser Klasse genannt werden sollen.

§ 13.

Diese Bestimmung der Anzahl der Moduln einer Klasse $(2p + 1)$ -fach zusammenhängender algebraischer Functionen gilt jedoch nur unter der Voraussetzung, daß es $2\mu - p + 1$ Verzweigungswerthe giebt, welche von einander unabhängige Functionen der willkürlichen Constanten in der Function ζ sind. Diese Voraussetzung trifft nur zu, wenn $p > 1$, und die Anzahl der Moduln ist nur dann $= 3p - 3$, für $p = 1$ aber $= 1$. Die directe Untersuchung derselben wird indess schwierig durch die Art und Weise, wie die willkürlichen Constanten in ζ enthalten sind. Man führe deshalb in einem Systeme gleich verzweigter $(2p + 1)$ -fach zusammenhängender Functionen, um die Anzahl der Moduln zu bestimmen, als unabhängig veränderliche Grösse nicht eine dieser Functionen, sondern ein allenthalben endliches Integral einer solchen Function ein.

Die Werthe, welche die Function ω von z innerhalb der Fläche T' annimmt, werden geometrisch repräsentirt durch eine einen endlichen Theil der w -Ebene einfach oder mehrfach bedeckende und die Fläche T' (in den kleinsten Theilen ähnlich) abbildende Fläche, welche durch S bezeichnet werden soll. Da ω auf der positiven Seite des ν -ten Querschnitts

um die Constante $\Pi^{(\nu)}$ grösser ist, als auf der negativen, so besteht die Begrenzung von S aus Paaren von parallelen Curven, welche denselben Theil des T' begrenzenden Schnittsystems abbilden, und es wird die Ortsverschiedenheit der entsprechenden Punkte in den parallelen, den ν ten Querschnitt abbildenden Begrenzungstheilen von S durch die complexe Grösse $\Pi^{(\nu)}$ ausgedrückt. Die Anzahl der einfachen Verzweigungspunkte der Fläche S ist $2p - 2$, da $d\omega$ in $2p - 2$ Punkten der Fläche T unendlich klein von der zweiten Ordnung wird. Die rationalen Functionen von s und z sind dann Functionen von ω , welche für jeden Punkt von S *Einen* bestimmten Werth haben und überall, mit Ausnahme der Verzweigungspunkte und der Unstetigkeitspunkte der Fläche T , stetig sind.

§ 14.

Das Abel'sche Additionstheorem für ein System allenthalben endlicher Integrale von gleichverzweigten algebraischen Functionen lässt sich folgendermaßen aussprechen. Es seien $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_p$ von einander unabhängige allenthalben endliche Integrale; es seien ferner $(s_1, z_1), (s_2, z_2), \dots, (s_m, z_m)$ m beliebige Werthenpaare, und $(\sigma_1, \zeta_1), (\sigma_2, \zeta_2), \dots, (\sigma_m, \zeta_m)$ seien durch die p Gleichungen

$$\sum_{\mu=1}^m \omega_{\mu}^{(s_{\mu}, z_{\mu})} = \sum_{\mu=1}^m \omega_{\mu}^{(\sigma_{\mu}, \zeta_{\mu})} \quad (\mu = 1, 2, \dots, p) \quad (6)$$

verbunden, worin die Integrale von einem festen Anfangspunkte bis zu den entsprechenden Endpunkten erstreckt sind. Es wird behauptet, daß dann die Grössenpaare (σ, ζ) algebraische Functionen der Grössenpaare (s, z) sind.

§ 15.

Für ein beliebiges System von immer endlichen Integralen gleichverzweigter algebraischer Functionen erhält man den allgemeinsten Ausdruck einer Function, die nur für p Punkte der Fläche T unendlich von der ersten Ordnung wird, wenn man zwei allenthalben endliche Integrale rationaler Functionen von s und z in der Form

$$\frac{\varphi^{(1)}}{\varphi^{(2)}} \quad \text{oder} \quad \frac{dw^{(1)}}{dw^{(2)}}$$

im Verhältniss setzt. Es lässt sich daher jede Function, die nur für weniger als $2p + 1$ Punkte der Fläche T unendlich von der ersten Ordnung wird, als Quotient zweier solcher Integrale darstellen.

§ 16.

Drückt man ξ als Quotienten zweier ganzen Functionen von s und z , η und ζ aus, so sind die Grössenpaare $(s_1, z_1), \dots, (s_m, z_m)$ die gemeinschaftlichen Wurzeln der Gleichungen $F = 0$ und $\xi = \eta/\zeta$. Da die ganze Function η für alle Werthenpaare, für welche ξ und ψ gleichzeitig verschwinden ebenfalls, was auch ψ sei, verschwindet, so können die Grössenpaare $(s_1, z_1), \dots, (s_m, z_m)$ auch *definirt* werden als gemeinschaftliche Wurzeln der Gleichung $F = 0$ und einer Gleichung $f(s, z) = 0$, deren Coefficienten so sich ändern, daß alle übrigen gemeinschaftlichen Wurzeln constant bleiben. Wenn $m < p + 1$, kann ξ in der Form $\frac{\varphi^{(1)}}{\varphi^{(2)}}$ dargestellt werden (§ 10) und f in der Form

$$f(s, z) = \varphi^{(1)} - \xi \varphi^{(2)} = 0.$$

Die allgemeinsten Werthe der den p Gleichungen

$$\sum_{\mu=1}^m d\omega_{\mu}^{(s_{\mu}, z_{\mu})} = 0 \quad (\mu = 1, 2, \dots, p)$$

genügenden Functionenpaare $(s_1, z_1), \dots, (s_p, z_p)$ werden daher gebildet durch p gemeinschaftliche Wurzeln der Gleichungen $F = 0$ und $\xi = \eta/\zeta$, welche so sich ändern, daß die übrigen gemeinschaftlichen Wurzeln constant bleiben. Hieraus folgt leicht der später nöthige Satz, daß die Aufgabe, $p - 1$ von den $2p - 2$ Grössenpaaren $(s_1, z_1), \dots, (s_{2p-2}, z_{2p-2})$ als Functionen der $p - 1$ übrigen so zu bestimmen, daß die p Gleichungen

$$\sum_{\mu=1}^{2p-2} d\omega_{\mu}^{(s_{\mu}, z_{\mu})} = 0 \quad (\mu = 1, 2, \dots, p)$$

erfüllt werden, völlig allgemein gelöst wird, wenn man für diese $2p - 2$ Grössenpaare die von den r Wurzeln $s = \gamma_{\mu}, z = \delta_{\mu}$ (§ 6) verschiedenen gemeinschaftlichen Wurzeln der Gleichungen $F = 0$ und $\varphi = 0$ oder die $2p - 2$ Werthenpaare nimmt, für welche $d\omega$ unendlich klein von der zweiten Ordnung wird, und daß diese Aufgabe daher nur eine Lösung zulässt. Solche Grössenpaare sollen durch die Gleichung $\varphi = 0$ *verknüpft* heissen.

Infolge der Gleichungen

$$\sum_{\mu=1}^{2p-2} d\omega_{\mu}^{(s_{\mu}, z_{\mu})} = 0 \quad \text{wird} \quad \sum_{\mu=1}^{2p-2} \omega_{\mu}^{(s_{\mu}, z_{\mu})} \equiv (c_1, c_2, \dots, c_p),$$

die Summe über solche Grössenpaare ausgedehnt, congruent einem constanten Grössensysteme $(c_1, c_2, \dots, c_p)$, worin c_{μ} nur von der additiven Constanten in der Function ω_{μ} oder dem Anfangswerthe des sie ausdrückenden Integrals abhängt.

Zweite Abtheilung.

§ 17.

Für die ferneren Untersuchungen über Integrale von algebraischen, $(2p + 1)$ -fach zusammenhängenden Functionen ist die Betrachtung einer p -fach unendlichen ϑ -Reihe von grossem Nutzen, d. h. einer p -fach unendlichen Reihe, in welcher der Logarithmus des allgemeinen Gliedes eine ganze Function zweiten Grades der Stellenzeiger ist. Es sei in dieser Function für ein Glied, dessen Stellenzeiger $m_1, m_2, \dots, m_p$ sind, der Coefficient des Quadrats m_μ^2 gleich $a_{\mu,\mu}$, des doppelten Products $m_\mu m_{\mu'}$ gleich $a_{\mu,\mu'} = a_{\mu',\mu}$, der doppelten Grösse m_μ gleich v_μ , und das constante Glied $= 0$. Die Summe der Reihe, über alle ganze positive oder negative Werthe der Grössen m ausgedehnt, werde als Function der p Grössen v betrachtet und durch $\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p)$ bezeichnet, so daß

$$\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p) = \sum_{-\infty}^{+\infty} e^{\left(\sum_{\mu} \sum_{\mu'} a_{\mu,\mu'} m_\mu m_{\mu'} + 2 \sum_{\mu} v_\mu m_\mu\right)}, \quad (7)$$

worin die Summationen im Exponenten sich auf μ und μ' , die äusseren Summationen auf $m_1, m_2, \dots, m_p$ beziehen.

Damit diese Reihe convergirt, muß der reelle Theil von $\sum_{\mu} \sum_{\mu'} a_{\mu,\mu'} m_\mu m_{\mu'}$ wesentlich negativ sein oder, als eine Summe von positiven oder negativen Quadraten reeller linearer von einander unabhängiger Functionen der Grössen m dargestellt, aus p negativen Quadraten zusammengesetzt sein.

Die Function ϑ hat die Eigenschaft, daß es Systeme von gleichzeitigen Änderungen der p Grössen v giebt, durch welche $\log \vartheta$ nur um eine lineare Function der Grössen v geändert wird, und zwar $2p$ von einander unabhängige Systeme (d. h. von denen keins eine Folge der übrigen ist). Denn man hat, die ungeändert bleibenden Grössen v unter dem Functionszeichen ϑ weglassend, für $\mu = 1, 2, \dots, p$

$$\vartheta = e^{a_{\mu,\mu} + 2v_\mu} \vartheta(v_1, \dots, v_\mu + \pi i, \dots, v_p), \quad (8)$$

$$\vartheta = e^{a_{\mu,\nu} m_\nu + v_\mu} \vartheta(v_1 + a_{1,\nu}, v_2 + a_{2,\nu}, \dots, v_p + a_{p,\nu}), \quad (9)$$

wie sich sofort ergibt, wenn man in der Reihe für ϑ den Stellenzeiger m_μ in $m_\mu + 1$ verwandelt, wodurch sie, während ihr Werth ungeändert bleibt, in den Ausdruck zur Rechten übergeht.

Die Function ϑ ist durch diese Relationen und durch die Eigenschaft, allenthalben endlich zu bleiben, bis auf einen constanten Factor bestimmt. Denn in Folge der letzteren Eigenschaft und der Relationen (8) ist sie eine einwerthige, für endliche v endliche Function von $e^{2v_1}, e^{2v_2}, \dots, e^{2v_p}$ und folglich in eine p -fach unendliche Reihe von der Form

$$\sum_{-\infty}^{+\infty} A_{m_1, \dots, m_p} e^{2(m_1 v_1 + m_2 v_2 + \dots + m_p v_p)}$$

mit den constanten Coefficienten A entwickelbar. Aus den Relationen (9) ergibt sich aber

$$A_{m_1, \dots, m_\nu + 1, \dots, m_p} = A_{m_1, \dots, m_\nu, \dots, m_p} e^{\sum_{\mu'} a_{\nu, \mu'} m_{\mu'}},$$

folglich $A_m = \text{const.} \cdot e^{\sum a_{\mu, \mu'} m_\mu m_{\mu'}}$, w. z. b. w.

Man kann daher diese Eigenschaften der Function zu ihrer Definition verwenden. Die Systeme gleichzeitiger Änderungen der Grössen v , durch welche sich $\log \vartheta$ nur um eine lineare Function von ihnen ändert, sollen *Systeme zusammengehöriger Periodicitätsmoduln* der unabhängig veränderlichen Grössen in dieser ϑ -Function genannt werden.

§ 18.

Ich substituire nun für die p Grössen $v_1, v_2, \dots, v_p$ p immer endlich bleibende Integrale $u_1, u_2, \dots, u_p$ rationaler Functionen einer veränderlichen Grösse z und einer $(2p+1)$ fach zusammenhängenden algebraischen Function s dieser Grösse, und für die zusammengehörigen Periodicitätsmoduln der Grössen v zusammengehörige (d. h. an demselben Querschnitte stattfindende) Periodicitätsmoduln dieser Integrale, so daß $\log \vartheta$ in eine Function einer Veränderlichen z übergeht, welche sich, wenn s und z nach beliebiger stetiger Änderung von z den vorigen Werth wieder annehmen, um lineare Functionen der Grössen u ändert.

Es soll zunächst gezeigt werden, daß eine solche Substitution für jede $(2p+1)$ fach zusammenhängende Function s möglich ist. Die Zerschneidung der Fläche T muß zu diesem Zwecke so durch $2p$ in sich zurücklaufende Schnitte $a_1, a_2, \dots, a_p, b_1, b_2, \dots, b_p$ geschehen, daß folgende Bedingungen erfüllt werden. Wenn man $u_1, u_2, \dots, u_p$ so wählt, daß der Periodicitätsmodul von u_μ an dem Schnitte a_ν gleich πi (für $\nu = \mu$), an den übrigen Schnitten a gleich 0 ist, und man den Periodicitätsmodul von u_μ an dem Schnitte b_ν durch $a_{\mu,\nu}$ bezeichnet, so muß $a_{\mu,\nu} = a_{\nu,\mu}$ und der reelle Theil von $\sum_\mu \sum_{\mu'} a_{\mu,\mu'} m_\mu m_{\mu'}$ für alle reellen (ganzen) Werthe der p Grössen m negativ sein.

§ 19.

Die Zerlegung der Fläche T werde nicht wie bisher nur durch in sich zurücklaufende Querschnitte, sondern folgendermaßen ausgeführt. Man mache zuerst einen in sich zurücklaufenden die Fläche nicht zerstückelnden Schnitt a_1 und führe dann einen Querschnitt b_1 von der positiven Seite von a_1 auf die negative zum Anfangspunkte zurück, worauf die Begrenzung aus einem Stücke bestehen wird. Einen dritten die Fläche nicht zerstückelnden Querschnitt kann man demzufolge (wenn die Fläche noch nicht einfach zusammenhängend ist) von einem beliebigen Punkte dieser Begrenzung bis zu einem beliebigen Begrenzungspunkte, also auch zu einem früheren Punkte dieses Querschnitts führen. Man thue das Letztere, so daß dieser Querschnitt aus einer in sich zurücklaufenden Linie a_2 und einem dieser Linie vorausgehenden Theile c_1 besteht, welcher das frühere Schnittsystem mit ihr verbindet. Den folgenden Querschnitt b_2 ziehe man von der positiven Seite von a_2 auf die negative zum Anfangspunkte zurück, worauf die Begrenzung wieder aus einem Stücke besteht. Die weitere Zerschneidung kann daher, wenn nöthig, wieder durch zwei in demselben Punkte anfangende und endende Schnitte a_3 und b_3 und eine das System der Linien a_2 und b_2 mit ihnen verbindende Linie c_2 geschehen.

Wird dieses Verfahren fortgesetzt, bis die Fläche einfach zusammenhängend ist, so erhält man ein Schnittnetz, welches aus p Paaren von zwei in einem und demselben Punkte anfangenden und endenden Linien a_1 und b_1, a_2 und $b_2, \dots, a_p$ und b_p besteht und aus $p-1$ Linien $c_1, c_2, \dots, c_{p-1}$, welche jedes Paar mit dem folgenden verbinden. Es möge c_ν von einem Punkte von b_ν nach einem Punkte von $a_{\nu+1}$ gehen.

Das Schnittnetz wird als so entstanden betrachtet, daß der $(2\nu-1)$ te Querschnitt aus $c_{\nu-1}$ und der von dem Endpunkte von $c_{\nu-1}$ zu diesem zurückgezogenen Linie a_ν besteht, und der 2ν te durch die von der positiven auf die negative Seite von a_ν gezogene Linie b_ν gebildet wird. Die Begrenzung der Fläche besteht bei dieser Zerschneidung nach einer geraden Anzahl von Schnitten aus einem, nach einer ungeraden aus zwei Stücken.

Ein allenthalben endliches Integral ω einer rationalen Function von s und z nimmt dann zu beiden Seiten einer Linie c denselben Werth an. Denn die ganze früher entstandene Begrenzung besteht aus einem Stücke und bei der Integration längs derselben von der einen Seite der Linie c bis auf die andere wird $\int d\omega$ durch jedes früher entstandene Schnittelement zweimal, in entgegengesetzter Richtung, erstreckt. Eine solche Function ist daher

in T allenthalben ausser den Linien a und b stetig. Die durch diese Linien zerschnittene Fläche T möge durch T'' bezeichnet werden.

§ 20.

Es seien nun $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_p$ von einander unabhängige solche Functionen, und der Periodicitätsmodul von ω_μ an dem Querschnitte a_ν gleich $A_\mu^{(\nu)}$ und an dem Querschnitte b_ν gleich $B_\mu^{(\nu)}$. Es ist dann das Integral $\int \omega_\mu d\omega'_\mu$, um die Fläche T'' positiv herum ausgedehnt, $= 0$, da die Function unter dem Integralzeichen allenthalben endlich ist. Bei dieser Integration wird jede der Linien a und b zweimal, einmal in positiver und einmal in negativer Richtung durchlaufen, und es muß während jener Integration, wo sie als Begrenzung des positiverseits gelegenen Gebiets dient, für ω_μ der Werth auf der positiven Seite oder ω_μ^+ , während dieser der Werth auf der negativen oder ω_μ^- genommen werden.

Es ist also dies Integral gleich der Summe

$$\sum \int (\omega_\mu^+ - \omega_\mu^-) d\omega'_\mu$$

aller Integrale $\int (\omega_\mu^+ - \omega_\mu^-) d\omega'_\mu$ durch die Linien a und b . Die Linien b führen von der positiven zur negativen Seite der Linien a , und folglich die Linien a von der negativen zur positiven Seite der Linien b . Das Integral durch die Linie a_ν ist daher

$$\int A_\mu^{(\nu)} d\omega'_\mu = A_\mu^{(\nu)} B_{\mu'}^{(\nu)},$$

und das Integral durch die Linie b_ν

$$\int B_\mu^{(\nu)} d\omega'_\mu = -B_\mu^{(\nu)} A_{\mu'}^{(\nu)}.$$

Das Integral $\int \omega_\mu d\omega'_\mu$, um die Fläche T'' positiv herum erstreckt, ist also

$$\sum_{\nu=1}^p (A_\mu^{(\nu)} B_{\mu'}^{(\nu)} - B_\mu^{(\nu)} A_{\mu'}^{(\nu)}) = 0,$$

und diese Summe folglich $= 0$. Diese Gleichung gilt für je zwei von den Functionen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_p$ und liefert also $\frac{p(p-1)}{2}$ Relationen zwischen deren Periodicitätsmoduln.

Nimmt man für die Functionen ω die Functionen u oder wählt man sie so, daß $A_\mu^{(\nu)}$ für ein von μ verschiedenes ν gleich 0 und $A_\mu^{(\mu)} = \pi i$ ist, so gehen diese Relationen über in $B_{\mu'}^{(\mu)} \pi i - B_\mu^{(\mu')} \pi i = 0$ oder in $a_{\mu', \mu} = a_{\mu, \mu'}$.

§ 21.

Es bleibt noch zu zeigen, daß die Grössen a die zweite oben nöthig gefundene Eigenschaft besitzen.

Man setze $\omega = u + vi$ und den Periodicitätsmodul dieser Function an dem Schnitte a_ν gleich $A^{(\nu)} = \alpha_\nu + \gamma_\nu i$ und an dem Schnitte b_ν gleich $B^{(\nu)} = \beta_\nu + \delta_\nu i$. Es ist dann das Integral

$$\int \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy \quad \text{oder} \quad \int \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx dy,$$

durch die Fläche T'' gleich dem Begrenzungsintegral $\int u dv$ um T'' positiv herum erstreckt, also gleich der Summe der Integrale $\int (u^+ - u^-) dv$ durch die Linien a und b . Das Integral

durch die Linie a_ν ist $= \alpha_\nu \int dv = \alpha_\nu \gamma_\nu$, das Integral durch die Linie b_ν gleich $\beta_\nu \int dv = -\beta_\nu \delta_\nu$. und folglich

$$\sum_{\nu=1}^p (\alpha_\nu \gamma_\nu - \beta_\nu \delta_\nu) = \int \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy.$$

Diese Summe ist daher stets *positiv*.

Hieraus ergibt sich die zu beweisende Eigenschaft der Grössen a , wenn man für ω setzt $u_1 m_1 + u_2 m_2 + \dots + u_p m_p$. Denn es ist dann $A^{(\nu)} = m_\nu \pi i$, $B^{(\nu)} = \sum_\mu a_{\nu,\mu} m_\mu$, folglich α_ν stets = 0 und

$$\int \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = - \sum_\nu \sum_\mu m_\nu a_{\nu,\mu} m_\mu$$

oder gleich dem reellen Theile von $-\sum_\nu \sum_\mu \pi i a_{\nu,\mu} m_\nu m_\mu$, welcher also für alle reellen Werthe der Grössen m positiv ist.

§ 22.

Setzt man nun in der ϑ -Reihe (7) § 17 für $a_{\mu,\mu'}$ den Periodicitätsmodul der Function u_μ an dem Schnitte $b_{\mu'}$ und, durch $e_1, e_2, \dots, e_p$ beliebige Constanten bezeichnend, $u_\mu - e_\mu$ für v_μ , so erhält man eine in jedem Punkte von T eindeutig bestimmte Function von z , welche ausser den Linien b stetig und endlich und auf der positiven Seite der Linie b_ν $e^{2u_\nu - 2e_\nu - a_{\nu,\nu}}$ mal so groß als auf der negativen ist, wenn man den Functionen u in den Linien b selbst den Mittelwerth von den Werthen zu beiden Seiten beilegt.

Für wie viele Punkte von T' oder Werthenpaare von s und z diese Function unendlich klein von der ersten Ordnung wird, kann durch Betrachtung des Begrenzungsintegrals $\int d \log \vartheta$, um T' positiv herum erstreckt, gefunden werden; denn dieses Integral ist gleich der Anzahl dieser Punkte multiplicirt mit $2\pi i$. Andererseits ist dies Integral gleich der Summe der Integrale $\int (d \log \vartheta^+ - d \log \vartheta^-)$ durch sämmtliche Schnittlinien a, b und c . Die Integrale durch die Linien a und c sind = 0, das Integral durch b_ν aber gleich $-2 \int du_\nu = 2\pi i$, die Summe aller also = $p \cdot 2\pi i$. Die Function ϑ wird daher unendlich klein von der ersten Ordnung in p Punkten der Fläche T' , welche durch $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_p$ bezeichnet werden mögen.

§ 23.

Durch einen positiven Umlauf des Punktes (s, z) um einen dieser Punkte wächst $\log \vartheta$ um $2\pi i$, durch einen positiven Umlauf um das Schnittpaar a_ν und b_ν um $-2\pi i$. Um daher die Function $\log \vartheta$ allenthalben eindeutig zu bestimmen, führe man von jedem Punkte η_ν einen Schnitt l_ν durch das Innere nach je einem Linienpaare, von η_ν den Schnitt l_ν nach a_ν und b_ν , und zwar nach ihrem gemeinschaftlichen Anfangs- und Endpunkte, und nehme in der dadurch entstandenen Fläche T^* die Function allenthalben stetig an. Sie ist dann auf der positiven Seite der Linien l um $-2\pi i$, auf der positiven Seite der Linie a_ν um $g_\nu \cdot 2\pi i$ und auf der positiven Seite der Linie b_ν um $-2(\alpha_\nu - e_\nu) - h_\nu \cdot 2\pi i$ grösser, als auf der negativen, wenn g_ν und h_ν ganze Zahlen bezeichnen.

Die Lage der Punkte η und die Werthe der Zahlen g und h hängen von den Grössen e ab, und diese Abhängigkeit lässt sich auf folgendem Wege näher bestimmen. Das Integral $\int \log \vartheta du_\mu$, um T^* positiv herum erstreckt, ist = 0, da die Function $\log \vartheta$ in T^* stetig bleibt. Dieses Integral ist aber auch gleich der Summe der Integrale $\int (\log \vartheta^+ - \log \vartheta^-) du_\mu$ durch sämmtliche Schnittlinien l, a, b und c und findet sich, wenn man den Werth von u_μ

im Punkte η_ν durch $\alpha_\mu^{(\nu)}$ bezeichnet,

$$2\pi i \left(\sum_\nu \alpha_\mu^{(\nu)} + h_\mu \pi i + \sum_\nu g_\nu a_{\nu,\mu} - e_\mu + k_\mu \right) = 0,$$

worin k_μ von den Grössen e, g, h und der Lage der Punkte η unabhängig ist.

Dieser Ausdruck ist also $= 0$.

Ende der Theorie der Abel'schen Functionen für die hier behandelten Paragraphen.

Riemann — Gesammelte Mathematische Werke

Seiten 151–200

VII. Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse.

oder

$$\int_{\beta-\infty i}^x \frac{dx}{\log x} + \text{const.}$$

je nachdem der reelle Theil von β negativ oder positiv ist. Man hat daher

$$2\pi i \log \eta = \int_{\alpha-\infty i}^{\alpha+\infty i} \frac{d}{ds} \log \xi(s) x^s \frac{ds}{s}$$

und

$$\int_{\beta}^x \frac{dx}{\log x} + \text{const. im ersten}$$

und

$$\int_0^x \frac{dx}{\log x} + \text{const. im zweiten Falle.}$$

Im ersten Falle bestimmt sich die Integrationsconstante, wenn man den reellen Theil von β negativ unendlich werden lässt; im zweiten Falle erhält das Integral von 0 bis x um $2\pi i$ verschiedene Werthe, je nachdem die Integration durch complexe Werthe mit positivem oder negativem Arcus geschieht, und wird, auf jenem Wege genommen, unendlich klein, wenn der Coefficient von i in dem Werthe von β positiv unendlich wird, auf letzterem aber, wenn dieser Coefficient negativ unendlich wird. Hieraus ergiebt sich, wie auf der linken Seite $\log(1 - \frac{s}{\beta})$ zu bestimmen ist, damit die Integrationsconstante wegfällt.

Durch Einsetzung dieser Werthe in den Ausdruck von $f(x)$ erhält man

$$f(x) = \text{Li}(x) - \sum_{\alpha} (\text{Li}(x^{\frac{1}{2}+\alpha i}) + \text{Li}(x^{\frac{1}{2}-\alpha i})) + \int_{x^2}^{\infty} \frac{dt}{t(t^2-1) \log t} + \log \xi(0),$$

wenn in $\sum_{\alpha}$ für α sämmtliche positive (oder einen positiven reellen Theil enthaltenden) Wurzeln der Gleichung $\xi(\alpha) = 0$, ihrer Grösse nach geordnet, gesetzt werden. Es lässt sich, mit Hülfe einer genaueren Discussion der Function ξ , leicht zeigen, dass bei dieser Anordnung der Werth der Reihe

$$\sum_{\alpha} (\text{Li}(x^{\frac{1}{2}+\alpha i}) + \text{Li}(x^{\frac{1}{2}-\alpha i})) \log x$$

mit dem Grenzwert, gegen welchen

$$\frac{1}{2\pi i \log x} \int_{\alpha-bi}^{\alpha+bi} \frac{d_s \log \xi(s)}{ds} x^s ds$$

bei unaufhörlichem Wachsen der Grösse b convergirt, übereinstimmt; durch veränderte Anordnung aber würde sie jeden beliebigen reellen Werth erhalten können.

Aus $f(x)$ findet sich $F(x)$ mittelst der durch Umkehrung der Relation

$$f(x) = \sum \frac{1}{m} F(x^{\frac{1}{m}})$$

sich ergebenden Gleichung

$$F(x) = \sum (-1)^\mu \frac{1}{m} f(x^{\frac{1}{m}}),$$

worin für m der Reihe nach die durch kein Quadrat ausser 1 theilbaren Zahlen zu setzen sind und μ die Anzahl der Primfactoren von m bezeichnet.

Beschränkt man Li auf eine endliche Zahl von Gliedern, so giebt die Derivirte des Ausdrucks für $f(x)$ oder, bis auf einen mit wachsendem x sehr schnell abnehmenden Theil,

$$\frac{1}{\log x} - 2 \sum_{\alpha} \frac{\cos(\alpha \log x) x^{-\frac{1}{2}}}{\log x}$$

einen angenäherten Ausdruck für die Dichtigkeit der Primzahlen + der halben Dichtigkeit der Primzahlquadrate $+\frac{1}{3}$ von der Dichtigkeit der Primzahlcuben u. s. w. von der Grösse x .

Die bekannte Näherungsformel $F(x) = \text{Li}(x)$ ist also nur bis auf Grössen von der Ordnung $x^{\frac{1}{2}}$ richtig und giebt einen etwas zu grossen Werth; denn die nicht periodischen Glieder in dem Ausdrücke von $F(x)$ sind, von Grössen, die mit x nicht in's Unendliche wachsen, abgesehen:

$$\text{Li}(x) - \frac{1}{2} \text{Li}(x^{\frac{1}{2}}) - \frac{1}{3} \text{Li}(x^{\frac{1}{3}}) - \frac{1}{5} \text{Li}(x^{\frac{1}{5}}) + \frac{1}{6} \text{Li}(x^{\frac{1}{6}}) - \frac{1}{7} \text{Li}(x^{\frac{1}{7}}) + \dots$$

In der That hat sich bei der von Gauss und Goldschmidt vorgenommenen und bis zu $x =$ drei Millionen fortgesetzten Vergleichung von $\text{Li}(x)$ mit der Anzahl der Primzahlen unter x diese Anzahl schon vom ersten Hunderttausend an stets kleiner als $\text{Li}(x)$ ergeben, und

zwar wächst die Differenz unter manchen Schwankungen allmählich mit x . Aber auch die von den periodischen Gliedern abhängige stellenweise Verdichtung und Verdünnung der Primzahlen hat schon bei den Zählungen die Aufmerksamkeit erregt, ohne dass jedoch hierin eine Gesetzmässigkeit bemerkt worden wäre. Bei einer etwaigen neuen Zählung würde es interessant sein, den Einfluss der einzelnen in dem Ausdrücke für die Dichtigkeit der Primzahlen enthaltenen periodischen Glieder zu verfolgen. Einen regelmässigeren Gang als $F(x)$ würde die Function $f(x)$ zeigen, welche sich schon im ersten Hundert sehr deutlich als mit $\text{Li}(x) + \log \xi(0)$ im Mittel übereinstimmend erkennen lässt.

Anmerkungen.

In einem Briefe, dessen Entwurf im Nachlass vorliegt, findet sich, nachdem das Resultat der Arbeit mitgetheilt ist, folgende Bemerkung:

„Den Beweis habe ich noch nicht völlig ausgeführt, und ich möchte in Betreff desselben ... noch die Bemerkung beifügen, dass die beiden Sätze, welche ich dort nur angeführt habe,

dass zwischen 0 und T etwa $\frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi}$ reelle Wurzeln der Gleichung $\xi(t) = 0$ liegen,

und

dass die Reihe $\sum_{\alpha} (\text{Li}(x^{\frac{1}{2}+\alpha i}) + \text{Li}(x^{\frac{1}{2}-\alpha i}))$, wenn die Glieder nach wachsenden α geordnet werden,

gegen denselben Grenzwert convergirt, wie

$$\frac{1}{2\pi i \log x} \int_{a-bi}^{a+bi} \frac{d_s \log \xi(s)}{ds} x^s ds$$

bei unaufhörlichem Wachsen der Grösse b , aus einer neuen Entwicklung der Function ξ folgen, welche ich aber noch nicht genug vereinfacht hatte, um sie mittheilen zu können.“

Trotz mancher späterer Untersuchungen (Scheibner, Pilz, Stieltjes) sind die Dunkelheiten dieser Arbeit noch nicht völlig aufgehellt.

(1) (Zu Seite 146.) Dies Verhalten der Function $J(s)$ ergibt sich mit Benutzung der zweiten Form dieser Function

$$J(s) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2}s)}{\Gamma(\frac{1}{2})} \pi^{-\frac{1}{2}s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} - \frac{1}{s(1-s)}$$

und mit Rücksicht darauf, dass $\frac{1}{e^x-1}$ in der Entwicklung nach steigenden Potenzen von x nur ungerade Potenzen enthält.

(2) (Zu Seite 149.) Der Ausdruck dieses Satzes ist nicht ganz genau. Die beiden Gleichungen, einzeln in der angegebenen Weise behandelt, ergeben, wenn die Integrationsgrenzen $0, \infty$ auf $\log x$ bezogen werden,

$$x^{\frac{1}{2}+\alpha i} (\vartheta(\alpha) + \vartheta(-\alpha))$$

und also erst in ihrer Summe die Formel des Textes.

(3) (Zu Seite 151.) Die Function $\text{Li}(x)$ ist für reelle Werthe von x , die grösser als 1 sind,

$$\int_0^x \frac{dx}{\log x}$$

wenn das obere oder

$$\int_{-\infty}^x \frac{dx}{\log x}$$

das untere Zeichen zu nehmen ist, je nachdem die Integration durch complexe

Werthe mit positivem oder negativem Arcus geschieht. Daraus leitet man leicht die von Scheibner (Schlömlich's Zeitschrift Bd. V) gegebene Entwicklung her

$$\text{Li}(x) = \log \log x - \Gamma'(1) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\log x)^n}{n \cdot n!},$$

die für alle Werthe von x gilt, und für negative reelle Werthe eine Unstetigkeit ergibt. (Vgl. Gauss-Bessel Briefwechsel.)

Befolgt man die von Riemann angedeutete Rechnung, so findet man in der Formel $\log \xi(0)$ anstatt $\log \xi(0)$. Möglicherweise liegt nur ein Schreib- oder Druckfehler vor, $\log \xi(0)$ an Stelle von $\log \xi(0)$, da $\xi(0) = -\frac{1}{2}$ ist.

VIII.

Ueber die Fortpflanzung ebener Luftwellen von endlicher Schwingungsweite.

(Aus dem achten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen. 1860.)

Obwohl die Differentialgleichungen, nach welchen sich die Bewegung der Gase bestimmt, längst aufgestellt worden sind, so ist doch ihre Integration fast nur für den Fall ausgeführt worden, wenn die Druckverschiedenheiten als unendlich kleine Bruchtheile des ganzen Drucks betrachtet werden können, und man hat sich bis auf die neueste Zeit begnügt, nur die ersten Potenzen dieser Bruchtheile zu berücksichtigen. Erst ganz vor Kurzem hat Helmholtz auch die Glieder zweiter Ordnung mit in die Rechnung gezogen und daraus die objective Entstehung von Combinationstönen erklärt. Es lassen sich indess für den Fall, dass die anfängliche Bewegung allenthalben in gleicher Richtung stattfindet und in jeder auf dieser Richtung senkrechten Ebene Geschwindigkeit und Druck constant sind, die exacten Differentialgleichungen vollständig integriren; und wenn auch zur Erklärung der bis jetzt experimentell festgestellten Erscheinungen die bisherige Behandlung vollkommen ausreicht, so könnten doch, bei den grossen Fortschritten, welche in neuester Zeit durch Helmholtz auch in der experimentellen Behandlung akustischer Fragen gemacht worden sind, die Resultate dieser genaueren Rechnung in nicht allzu ferner Zeit vielleicht der experimentellen Forschung einige Anhaltspunkte gewähren; und dies mag, abgesehen von dem theoretischen Interesse, welches die Behandlung nicht linearer partieller Differentialgleichungen hat, die Mittheilung derselben rechtfertigen.

Für die Abhängigkeit des Drucks von der Dichtigkeit würde das Boyle'sche Gesetz vorauszusetzen sein, wenn die durch die Druckveränderungen bewirkten Temperaturverschiedenheiten sich so schnell ausgleichen, dass die Temperatur des Gases als constant betrachtet werden dürfte. Es ist aber wahrscheinlich der Wärmeaustausch ganz

zu vernachlässigen, und man muss daher für diese Abhängigkeit das Gesetz zu Grunde legen, nach welchem sich der Druck des Gases mit der Dichtigkeit ändert, wenn es keine Wärme aufnimmt oder abgibt.

Nach dem Boyle'schen und Gay-Lussac'schen Gesetze ist, wenn V das Volumen der Gewichtseinheit, p den Druck und T die Temperatur von -273° C an gerechnet bezeichnet,

$$\log p + \log V = \log T + \text{const.}$$

Betrachten wir hier T als Function von p und v und nennen die specifische Wärme bei constantem Drucke c , bei constantem Volumen c' , beide auf die Gewichtseinheit bezogen, so wird von dieser Gewichtseinheit, wenn p und v sich um dp und dv ändern, die Wärmemenge

$$c \frac{dT}{dv} dv + c' \frac{dT}{dp} dp$$

oder, da $\frac{d \log T}{d \log v} = \frac{c'}{c - c'}$, $\frac{d \log T}{d \log p} = 1$,

$$T(c d \log v + c' d \log p)$$

aufgenommen. Wenn daher keine Wärmeaufnahme stattfindet, so ist $d \log p = -\frac{c}{c'} d \log v$, und also, wenn man mit Poisson annimmt, dass das Verhältniss der beiden specifischen Wärmen $\frac{c}{c'} = k$ von Temperatur und Druck unabhängig ist,

$$\log p = -k \log v + \text{const.}$$

Nach neueren Versuchen von Regnault, Joule und W. Thomson sind diese Sätze für Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff und deren Gemenge unter allen darstellbaren Drucken und Temperaturen wahrscheinlich sehr nahe gültig.

Durch Regnault ist für diese Gase eine sehr nahe Anschmiegun an das Boyle'sche und Gay-Lussac'sche Gesetz und die Unabhängigkeit der specifischen Wärme c von Temperatur und Druck festgestellt worden.

Für atmosphärische Luft fand Regnault

zwischen	− 30°C	und	+ 100°C	$c = 0,2377$
“	+ 10°C	“	+ 100°C	$c = 0,2379$
“	+ 100°C	“	+ 215°C	$c = 0,2376.$

Ebenso ergab sich für Drucke von 1 bis 10 Atmosphären kein merklicher Unterschied der specifischen Wärme.

Nach Versuchen von Regnault und Joule scheint ferner für diese Gase die von Clausius adoptirte Annahme Mayer's sehr nahe richtig zu sein, dass ein bei constanter Temperatur sich ausdehnendes Gas nur so viel Wärme aufnimmt, als zur Erzeugung der äusseren Arbeit erforderlich ist. Wenn das Volumen des Gases sich um dv ändert, während die Temperatur constant bleibt, so ist $d \log p = -d \log v$, die aufgenommene Wärmemenge $T(c - c')d \log v$, die geleistete Arbeit $p dv$. Diese Hypothese giebt daher, wenn A das mechanische Aequivalent der Wärme bezeichnet,

$$AT(c - c')d \log v = p dv$$

oder

$$\frac{pv}{AT} = c - c',$$

also von Druck und Temperatur unabhängig.

Hiernach ist auch $k = \frac{c}{c'}$ von Druck und Temperatur unabhängig und ergibt sich, wenn $c = 0,237733$, A nach Joule = 424,55 Kilogrammet. und, für die Temperatur 0°C oder $T = \frac{100^\circ}{273}$ mit Regnault = 7990^m, 267 angenommen wird, gleich 1,4101. Die Schallgeschwindigkeit in trockner Luft von 0°C beträgt in der Secunde

$$\sqrt{7990^m, 267 \cdot 9^m, 8088/k},$$

und würde also mit diesem Werthe von k gleich 332^m, 440 gefunden werden, während die beiden vollständigsten Versuchsreihen von Moll und van Beck dafür, einzeln berechnet, 332^m, 528 und 331^m, 867, vereinigt 332^m, 271 geben und die Versuche von Martins und A. Bravais nach ihrer eignen Berechnung 332^m, 37.

Für's erste ist es nicht nöthig, über die Abhängigkeit des Drucks von der Dichtigkeit eine bestimmte Voraussetzung zu machen; wir nehmen daher an, dass bei der Dichtigkeit ϱ der Druck $\varphi(\varrho)$ sei, und lassen die Function φ vorläufig noch unbestimmt.

Man denke sich nun rechtwinklige Coordinaten x, y, z eingeführt, die x -Axe in der Richtung der Bewegung, und bezeichne durch ϱ die Dichtigkeit, durch p den Druck, durch

u die Geschwindigkeit für die Coordinate x zur Zeit t und durch ω ein Element der Ebene, deren Coordinate x ist.

Der Inhalt des auf dem Element ω stehenden geraden Cylinders von der Höhe dx ist dann ωdx , die in ihm enthaltene Masse $\varrho \omega dx$. Die Aenderung dieser Masse während des Zeitelements dt oder die Grösse $\varrho \omega dt dx$ bestimmt sich durch die in ihn einströmende Masse, welche $= -\omega \frac{\partial(\varrho u)}{\partial x} dx dt$ gefunden wird. Ihre Beschleunigung ist

$+ \varrho \omega \frac{\partial u}{\partial t}$ und die Kraft, welche sie in der Richtung der positiven x -Axe fortreibt, $= -\frac{\partial p}{\partial x} \omega dx = -\varphi'(\varrho) \frac{\partial \varrho}{\partial x} \omega dx$, wenn $\varphi'(\varrho)$ die Derivirte von $\varphi(\varrho)$ bezeichnet. Man hat daher für ϱ und u die beiden Differentialgleichungen

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \frac{\partial(\varrho u)}{\partial x} = 0, \quad (1)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = -\varphi'(\varrho) \frac{\partial \varrho}{\partial x}. \quad (2)$$

Wenn man die zweite Gleichung, mit $\pm \sqrt{\varphi'(\varrho)}$ multiplicirt, zur ersteren addirt und zur Abkürzung

$$\int \sqrt{\varphi'(\varrho)} d \log \varrho = f(\varrho) \quad \text{und} \quad f(\varrho) + u = 2r, \quad f(\varrho) - u = 2s \quad (2)$$

setzt, so erhalten diese Gleichungen die einfachere Gestalt

$$\begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial t} &= -(u + \sqrt{\varphi'(\varrho)}) \frac{\partial r}{\partial x}, \\ \frac{\partial s}{\partial t} &= -(u - \sqrt{\varphi'(\varrho)}) \frac{\partial s}{\partial x}, \end{aligned} \quad (3)$$

worin u und ϱ durch die Gleichungen (2) bestimmte Functionen von r und s sind. Aus ihnen folgt

$$\begin{aligned} dr &= \frac{\partial r}{\partial x} (dx - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)}) dt), \\ ds &= \frac{\partial s}{\partial x} (dx - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)}) dt). \end{aligned} \quad (4,5)$$

Unter der in der Wirklichkeit immer zutreffenden Voraussetzung, dass $\varphi'(\varrho)$ positiv ist, besagen diese Gleichungen, dass r constant bleibt, wenn x sich mit t so ändert, dass $dx = (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)}) dt$, und s constant bleibt, wenn x sich mit t so ändert, dass $dx = (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)}) dt$ ist.

Ein bestimmter Werth von r oder von $f(\varrho) + u$ rückt daher zu grösseren Werthen von x mit der Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho)} + u$ fort, ein bestimmter Werth von s oder von $f(\varrho) - u$ zu kleineren Werthen von x mit der Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho)} - u$.

Ein bestimmter Werth von r wird also nach und nach mit jedem vor ihm stattfindenden Werthe von s zusammentreffen, und die Geschwindigkeit seines Fortrückens wird in jedem Augenblicke von dem Werthe von s abhängen, mit welchem er zusammentrifft.

2.

Die Analysis bietet nun zunächst die Mittel, die Frage zu beantworten, wo und wann ein Werth r von r einem vor ihm befindlichen Werthe s' von s begegnet, d. h. x und t als Functionen von r und s zu bestimmen. In der That, wenn man in den Gleichungen (3) des vor. Art. r und s als unabhängige Variable einführt, so gehen diese Gleichungen in lineare Differentialgleichungen für x und t über und lassen sich also nach bekannten Methoden integrieren. Um die Zurückführung der Differentialgleichungen auf eine lineare zu bewirken, ist es am zweckmässigsten, die Gleichungen (4) und (5) des vorigen Art. in die Form zu setzen:

$$d(x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)})t) = \frac{\partial(x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)})t)}{\partial s} ds + \left(\frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho} + 1 \right) t dr, \quad (1)$$

$$d(x - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)})t) = \frac{\partial(x - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)})t)}{\partial r} dr + \left(\frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho} + 1 \right) t ds. \quad (2)$$

Man erhält dann, wenn man s und r als unabhängige Variable betrachtet, für x und t die beiden linearen Differentialgleichungen:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)})t)}{\partial s} &= - \left(\frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho} + 1 \right) t, \\ \frac{\partial(x - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)})t)}{\partial r} &= - \left(\frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho} + 1 \right) t. \end{aligned}$$

In Folge derselben ist

$$(x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)})t) dr - (x - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)})t) ds \quad (3)$$

ein vollständiges Differential, dessen Integral, w , der Gleichung

$$\frac{\partial^2 w}{\partial r \partial s} + m \left(\frac{\partial w}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial s} \right) = 0$$

genügt, worin $m = \frac{1}{2\sqrt{\varphi'(\varrho)}} \frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho}$, also eine Function von $r + s$ ist. Setzt man $f(\varrho) = r + s = \vartheta$, so wird $\sqrt{\varphi'(\varrho)} = \vartheta'$, $\frac{d \log \vartheta'}{d \vartheta} = \frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho} \cdot \frac{d \log \varrho}{d \vartheta}$, folglich $m = \frac{d \log \vartheta'}{d \vartheta}$.

Bei der Poisson'schen Annahme $\varphi(\varrho) = a^2 \varrho^k$ wird $f(\varrho) = \frac{2a\sqrt{k}}{k-1} \varrho^{\frac{k-1}{2}}$, und, wenn man für die willkürliche Constante den Werth Null wählt,

$$\begin{aligned} f(\varrho) + u &= \frac{k+1}{k-1} r + s, & f(\varrho) - u &= r + \frac{k+1}{k-1} s, \\ m &= \frac{k+1}{2(k-1)(r+s)}. \end{aligned}$$

Unter Voraussetzung des Boyle'schen Gesetzes $\varphi(\varrho) = a^2 \varrho$ erhält man $f(\varrho) = a \log \varrho$ und

$$\begin{aligned} f(\varrho) + u &= r - s + a, \\ f(\varrho) - u &= s - r + a, \\ m &= -\frac{1}{2a}, \end{aligned}$$

Werthe, die aus den obigen fließen, wenn man $f(\varrho)$ um die Constante a , also r und s um $\frac{a}{2}$, vermindert und dann $k = 1$ setzt.

Die Einführung von r und s als unabhängig veränderlichen Grössen ist indess nur möglich, wenn die Determinante dieser Functionen von x und t , welche $= 2\sqrt{\varphi'(\varrho)} \frac{\partial(r,s)}{\partial(x,t)}$ nicht verschwindet, also nur wenn $\frac{\partial r}{\partial x}$ und $\frac{\partial s}{\partial x}$ beide von Null verschieden sind.

Wenn $\frac{\partial r}{\partial x} = 0$ ist, ergiebt sich aus (1) $dr = 0$ und aus (2) $x - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)})t =$ einer Function von s . Es ist folglich auch dann der Ausdruck (3) ein vollständiges Differential, und es wird w eine blosse Function von s .

Aus ähnlichen Gründen werden, wenn $\frac{\partial s}{\partial x} = 0$ ist, s auch in Bezug auf t constant, $x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)})t$ und w Functionen von r .

Wenn endlich $\frac{\partial r}{\partial x}$ und $\frac{\partial s}{\partial x}$ beide $= 0$ sind, so werden in Folge der Differentialgleichungen r , s und w Constanten.

3.

Um die Aufgabe zu lösen, muss nun zunächst w als Function von r und s so bestimmt werden, dass sie der Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 w}{\partial r \partial s} + m \left(\frac{\partial w}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial s} \right) = 0 \quad (1)$$

und den Anfangsbedingungen genügt, wodurch sie bis auf eine Constante, die ihr offenbar willkürlich hinzugefügt werden kann, bestimmt ist.

Wo und wann ein bestimmter Werth von r mit einem bestimmten Werthe von s zusammentrifft, ergibt sich dann aus der Gleichung

$$(x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho))}t) dr - (x - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho))}t) ds = dw, \quad (2)$$

und hierauf findet man schliesslich u und ϱ als Functionen von x und t durch Hinzuziehung der Gleichungen

$$f(\varrho) + u = 2r, \quad f(\varrho) - u = 2s. \quad (3)$$

In der That folgen, wenn nicht etwa in einer endlichen Strecke dr oder ds Null und folglich r oder s constant ist, aus (2) die Gleichungen

$$\begin{aligned} x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)})t &= \frac{\partial w}{\partial r}, \\ x - (u - \sqrt{\varphi'(\varrho)})t &= -\frac{\partial w}{\partial s}, \end{aligned} \quad (4,5)$$

durch deren Verbindung mit (3) man u und ϱ in x und t ausgedrückt erhält.

Wenn aber r anfangs in einer endlichen Strecke denselben Werth r' hat, so rückt diese Strecke allmählich zu grösseren Werthen von x fort. Innerhalb dieses Gebietes, wo $r = r'$, kann man dann aus der Gleichung (2) den Werth von $x - (u + \sqrt{\varphi'(\varrho)})t$ nicht ableiten, da $dr = 0$, und in der That lässt die Frage, wo und wann dieser Werth r' einem bestimmten Werthe von s begegnet, dann keine bestimmte Antwort zu. Die Gleichung (4) gilt dann nur an den Grenzen dieses Gebietes und giebt an, zwischen welchen Werthen von x zu einer bestimmten Zeit der constante Werth r' von r stattfindet, oder auch, während welches Zeitraums r an einer bestimmten Stelle diesen Werth behält. Zwischen diesen Grenzen bestimmen sich u und ϱ als Functionen von x und t aus den Gleichungen (3) und (5). Auf ähnlichem Wege findet man diese Functionen, wenn s den Werth s' in einem endlichen Gebiete besitzt, während r veränderlich ist, sowie auch wenn r und s beide constant sind. In letzterem Falle nehmen sie zwischen gewissen durch (4) und (5) bestimmten Grenzen constante aus (3) fließende Werthe an.

Bevor wir die Integration der Gleichung (1) des vor. Art. in Angriff nehmen, scheint es zweckmässig, einige Erörterungen voranzuschicken, welche die Ausführung dieser Integration nicht voraussetzen. Über die Function $\varphi(\varrho)$ ist dabei nur die Annahme nöthig, dass ihre Derivirte bei wachsendem ϱ nicht abnimmt, was in der Wirklichkeit gewiss immer der Fall ist; und wir bemerken gleich hier, was im folgenden Art. mehrfach angewandt werden wird, dass dann

$$\frac{\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2)}{\varrho_1 - \varrho_2} \left(\frac{1}{\varrho_1} + \frac{1}{\varrho_2} \right) - \frac{\varphi(\varrho_1)}{\varrho_1^2} - \frac{\varphi(\varrho_2)}{\varrho_2^2},$$

wenn nur eine der Grössen ϱ_1 und ϱ_2 sich ändert, entweder constant bleibt oder mit dieser Grösse zugleich wächst und abnimmt, woraus zugleich folgt, dass der Werth dieses Ausdrucks stets zwischen $\varphi'(\varrho_1)$ und $\varphi'(\varrho_2)$ liegt.

Wir betrachten zunächst den Fall, wo die anfängliche Gleichgewichtsstörung auf ein endliches durch die Ungleichheiten $a < x < b$ begrenztes Gebiet beschränkt ist, so dass ausserhalb desselben u und ϱ und folglich auch r und s constant sind; die Werthe dieser Grössen für $x < a$ mögen durch Anhängung des Index 1, für $x > b$ durch den Index 2 bezeichnet werden. Das Gebiet, in welchem r veränderlich ist, bewegt sich nach Art. 1 allmählich vorwärts und zwar seine hintere Grenze mit der Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho_1)} + u_1$, während die vordere Grenze des Gebiets, in welchem s veränderlich ist, mit der Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho_2)} - u_2$ rückwärts geht. Nach Verlauf der Zeit $\frac{b-a}{\sqrt{\varphi'(\varrho_1)} + \sqrt{\varphi'(\varrho_2)} + u_1 - u_2}$ fallen daher beide Gebiete auseinander, und zwischen ihnen bildet sich ein Raum, in welchem $s = s_2$ und $r = r_1$ ist und folglich die Gas-theilchen wieder im Gleichgewicht sind. Von der anfangs erschütterten Stelle gehen also zwei nach entgegengesetzten Richtungen fortschreitende Wellen aus. In der vorwärtsgehenden ist $s = s_2$; es ist daher mit einem bestimmten Werthe ϱ der Dichtigkeit stets die Geschwindigkeit $u = f(\varrho) - 2s_2$ verbunden, und beide Werthe rücken mit der constanten Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho)} + u = \sqrt{\varphi'(\varrho)} + f(\varrho) - 2s_2$ vorwärts. In der rückwärtslaufenden ist dagegen mit der Dichtigkeit ϱ die Geschwindigkeit $-f(\varrho) + 2r_1$ verbunden, und diese beiden Werthe bewegen sich mit der Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho)} + f(\varrho) - 2r_1$ rückwärts. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ist für grössere Dichtigkeiten eine grössere, da sowohl $\sqrt{\varphi'(\varrho)}$, als $f(\varrho)$ mit ϱ zugleich wächst.

Denkt man sich ϱ als Ordinate einer Curve für die Abscisse x , so bewegt sich jeder Punkt dieser Curve parallel der Abscissenaxe mit constanter Geschwindigkeit fort und zwar mit desto grösserer, je grösser seine Ordinate ist. Man bemerkt leicht, dass bei diesem Gesetze Punkte mit grösseren Ordinaten schliesslich vorausgehende Punkte mit kleineren Ordinaten überholen würden, so dass zu einem Werthe von x mehr als ein Werth von ϱ gehören würde. Da nun dieses in Wirklichkeit

nicht stattfinden kann, so muss ein Umstand eintreten, wodurch dieses Gesetz ungültig wird. In der That liegt nun der Herleitung der Differentialgleichungen die Voraussetzung zu Grunde, dass u und ϱ stetige Functionen von x sind und endliche Derivirten haben; diese Voraussetzung hört aber auf erfüllt zu sein, sobald in irgend einem Punkte die Dichtigkeitscurve senkrecht zur Abscissenaxe wird, und von diesem Augenblicke an tritt in dieser Curve eine Discontinuität ein, so dass ein grösserer Werth von ϱ einem kleineren unmittelbar nachfolgt; ein Fall, der im nächsten Art. erörtert werden wird.

Die Verdichtungswellen, d. h. die Theile der Welle, in welchen die Dichtigkeit in der Fortpflanzungsrichtung abnimmt, werden demnach bei ihrem Fortschreiten immer schmaler und gehen schliesslich in Verdichtungsstösse über; die Breite der Verdünnungswellen aber wächst beständig der Zeit proportional.

Es lässt sich, wenigstens unter Voraussetzung des Poisson'schen (oder Boyle'schen) Gesetzes, leicht zeigen, dass auch dann, wenn die anfängliche Gleichgewichtsstörung nicht auf ein endliches Gebiet beschränkt ist, sich stets, von ganz besonderen Fällen abgesehen, im Laufe der Bewegung Verdichtungsstösse bilden müssen. Die Geschwindigkeit, mit welcher ein Werth von r vorwärts rückt, ist bei dieser Annahme $\frac{k+1}{2}r + \frac{k-3}{2}s$; grössere Werthe werden sich also durchschnittlich mit grösserer Geschwindigkeit bewegen, und ein grösserer Werth r wird einen vorausgehenden kleineren Werth r' schliesslich einholen müssen, wenn nicht der mit r' zusammentreffende Werth von s durchschnittlich um $\frac{k+1}{2}(r - r')$ kleiner ist, als der gleichzeitig mit r zusammentreffende. In diesem Falle würde s für ein positiv unendliches x negativ unendlich werden, und also für $u = +\infty$ die Geschwindigkeit $u = +\infty$ (oder auch statt dessen beim Boyle'schen Gesetz die Dichtigkeit unendlich klein) werden. Von speciellen Fällen abgesehen, wird also immer der Fall eintreten müssen, dass ein um eine endliche Grösse grösserer Werth von r einem kleineren unmittelbar nachfolgt;

es werden folglich, durch ein Unendlichwerden von $\frac{\partial \varrho}{\partial x}$, die Differentialgleichungen ihre Gültigkeit verlieren und vorwärtslaufende Verdichtungsstöße entstehen müssen. Ebenso werden fast immer, indem $\frac{\partial s}{\partial x}$ unendlich wird, rückwärtslaufende Verdichtungsstöße sich bilden.

5.

Zur Bestimmung der Zeiten und Orte, für welche $\frac{\partial \varrho}{\partial x}$ oder $\frac{\partial r}{\partial x}$ unendlich wird und plötzliche Verdichtungen ihren Anfang nehmen, erhält man aus den Gleichungen (1) und (2) des Art. 2, wenn man darin die Function w einführt.

Wir müssen nun, da sich plötzliche Verdichtungen fast immer einstellen, auch wenn sich Dichtigkeit und Geschwindigkeit anfangs allenthalben stetig ändern, die Gesetze für das Fortschreiten von Verdichtungsstößen aufsuchen.

Wir nehmen an, dass zur Zeit t für $x = \xi$ eine sprungweise Aenderung von u und ϱ stattfinde, und bezeichnen die Werthe dieser und der von ihnen abhängigen Grössen für $x = \xi - 0$ durch Anhängung des Index 1 und für $x = \xi + 0$ durch den Index 2; die relativen Geschwindigkeiten, mit welchen das Gas sich gegen die Unstetigkeitsstelle bewegt, $u_1 - \frac{d\xi}{dt}$, $u_2 - \frac{d\xi}{dt}$, mögen durch v_1 und v_2 bezeichnet werden. Die Masse, welche durch ein Element ω der Ebene, wo $x = \xi$, im Zeitelement dt in positiver Richtung hindurchgeht, ist dann $= v_1 \varrho_1 \omega dt = v_2 \varrho_2 \omega dt$, und die eingedrückte Kraft $(\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2))\omega dt$ und der dadurch bewirkte Zuwachs an Geschwindigkeit $v_2 - v_1$; man hat daher

$$(\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2))\omega dt = (v_2 - v_1)v_1 \varrho_1 \omega dt \quad \text{und} \quad v_1 \varrho_1 = v_2 \varrho_2,$$

woraus folgt $v_1 = \pm \sqrt{\frac{\varrho_2}{\varrho_1}} \sqrt{\frac{\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2)}{\varrho_1 - \varrho_2}}$, also

$$\frac{d\xi}{dt} = \frac{v_1 \varrho_1 - v_2 \varrho_2}{\varrho_1 - \varrho_2} = \mp \sqrt{\frac{\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2)}{\varrho_1 - \varrho_2}} \sqrt{\varrho_1 \varrho_2}. \quad (1)$$

Für einen Verdichtungsstoss muss $\varrho_2 - \varrho_1$ dasselbe Zeichen, wie v_1 und v_2 , haben, und zwar für einen vorwärtslaufenden das negative, für einen rückwärtslaufenden das positive. Im erstem Falle gelten die oberen Zeichen und ϱ_1 ist grösser als ϱ_2 ; es ist daher, bei der zu Anfang des vorigen Artikels gemachten Annahme über die Function $\varphi(\varrho)$

$$\sqrt{\frac{\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2)}{\varrho_1 - \varrho_2}} > \sqrt{\varphi'(\varrho_1)} \quad \text{und} \quad < \sqrt{\varphi'(\varrho_2)},$$

und folglich rückt die Unstetigkeitsstelle langsamer fort als die nachfolgenden und schneller als die vorausgehenden Werthe von ϱ ; r_1 und r_2 sind also in jedem Augenblicke durch die zu beiden Seiten der Unstetigkeitsstelle geltenden Differentialgleichungen bestimmt. Dasselbe gilt, da die Werthe von s sich mit der Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho)} - u$ rückwärts bewegen, auch für s_2 und folglich für ϱ_2 und u_2 , aber nicht für s_1 . Die Werthe von s_2 und $\frac{d\xi}{dt}$ bestimmen sich aus r_1 , ϱ_2 und u_2 eindeutig durch die Gleichungen (1). In der That genügt der Gleichung

$$2(r_2 - s_2) = f(\varrho_1) - f(\varrho_2) + \sqrt{\frac{\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2)}{\varrho_1 - \varrho_2}} \sqrt{\frac{\varrho_1 - \varrho_2}{\varrho_2}} \quad (3)$$

nur ein Werth von ϱ_2 ; denn die rechte Seite nimmt, wenn ϱ_2 von ϱ_1 an in's Unendliche wächst, jeden positiven Werth nur einmal an, da sowohl $f(\varrho_1)$ als auch die beiden Factoren

$$\sqrt{\varrho_1} - \sqrt{\varrho_2} \quad \text{und} \quad \sqrt{\varrho_1 \varphi(\varrho_1)} - \sqrt{\varrho_2 \varphi(\varrho_2)},$$

in welche sich das letzte Glied zerlegen lässt, beständig wachsen oder doch nur der letztere Factor constant bleibt. Wenn aber ϱ_2 bestimmt ist, erhält man durch die Gleichungen (1) offenbar völlig bestimmte Werthe für u_2 und $\frac{d\xi}{dt}$.

Ganz Aehnliches gilt für einen rückwärtslaufenden Verdichtungsstoss.

6.

Wir haben eben gefunden, dass in einem fortschreitenden Verdichtungsstosse zwischen den Werthen von u und ϱ zu beiden Seiten desselben stets die Gleichung

$$(u_2 - u_1)^2 = \frac{(\varrho_1 - \varrho_2)^2}{\varrho_1 \varrho_2} (\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2)) \left(\frac{1}{\varrho_1} - \frac{1}{\varrho_2} \right)$$

stattfindet. Es fragt sich nun, was eintritt, wenn zu einer gegebenen Zeit an einer gegebenen Stelle beliebig gegebene Unstetigkeiten vorhanden sind. Es können dann von dieser Stelle, je nach den Werthen von u_1 , ϱ_1 , u_2 , ϱ_2 , entweder zwei nach entgegengesetzten Seiten laufende Verdichtungsstösse ausgehen, oder ein vorwärtslaufender, oder ein rückwärtslaufender, oder endlich kein Verdichtungsstoss, so dass die Bewegung nach den Differentialgleichungen erfolgt.

Bezeichnet man die Werthe, welche u und ϱ hinter oder zwischen den Verdichtungsstössen im ersten Augenblicke ihres Fortschreitens annehmen, durch Hinzufügung eines Accents, so ist im ersten Falle $\varrho' > \varrho_1$ und $> \varrho_2$; und man hat

$$u' = \sqrt{\frac{(\varrho' - \varrho_1)(\varrho' - \varrho_2)}{\varrho' \varrho_1 \varrho_2} (\varphi(\varrho') - \varphi(\varrho_1)) (\varrho' - \varrho_2)}, \quad (1)$$

$$u' - u_1 = \sqrt{\frac{(\varrho' - \varrho_1)(\varrho' - \varrho_2)}{\varrho' \varrho_1 \varrho_2} (\varphi(\varrho') - \varphi(\varrho_1)) (\varrho' - \varrho_2)},$$

$$u' - u_2 = \sqrt{\frac{(\varrho' - \varrho_1)(\varrho' - \varrho_2)}{\varrho' \varrho_1 \varrho_2} (\varphi(\varrho') - \varphi(\varrho_2)) (\varrho' - \varrho_1)}. \quad (2)$$

Es muss also, da beide Glieder der rechten Seite von (2) mit ϱ' zugleich wachsen, $u_1 - u_2$ positiv sein und

$$(u_1 - u_2)^2 > \frac{(\varrho_1 - \varrho_2)(\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2))}{\varrho_1 \varrho_2}$$

und umgekehrt giebt es, wenn diese Bedingungen erfüllt sind, stets ein und nur ein den Gleichungen (1) genügendes Werthenpaar von u und ϱ' .

Damit der letzte Fall eintritt und also die Bewegung sich den Differentialgleichungen gemäss bestimmen lässt, ist es nothwendig und hinreichend, dass $r_1 < r_2$ und $s_1 < s_2$ sei, also $u_1 - u_2$ negativ und $(u_1 - u_2)^2 > (f(\varrho_1) - f(\varrho_2))^2$. Die Werthe r_1 und r_2 , s_1 und s_2 treten dann, da der vorausgehende Werth mit grösserer Geschwindigkeit fortrückt, im Fortschreiten auseinander, so dass die Unstetigkeit verschwindet.

Wenn weder die ersteren, noch die letzteren Bedingungen erfüllt sind, so genügt den Anfangswerthen Ein Verdichtungsstoss, und zwar ein vorwärts oder rückwärts laufender, je nachdem ϱ_1 grösser oder kleiner als ϱ_2 ist.

In der That ist dann, wenn $\varrho_1 > \varrho_2$,

$$2(r_1 - r_2 \text{ oder } f(\varrho_1) - f(\varrho_2) + u_1 - u_2)$$

positiv, — weil $(u_1 - u_2)^2 < (f(\varrho_1) - f(\varrho_2))^2$ — und zugleich

$$(u_1 - u_2)^2 < \frac{(\varrho_1 - \varrho_2)(\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2))}{\varrho_1 \varrho_2}$$

weil

$$(u_1 - u_2)^2 < (\varrho_1 - \varrho_2)(\varphi(\varrho_1) - \varphi(\varrho_2)).$$

Es lässt sich also für die Dichtigkeit ϱ' hinter dem Verdichtungsstoss ein der Bedingung (3) des vor. Art. genügender Werth finden und dieser ist $< \varrho_1$. Folglich wird, da $s = f(\varrho') - u'$, $s_2 = f(\varrho_1) - u_1$, auch $s' < s_1$, so dass die Bewegung hinter dem Verdichtungsstosse nach den Differentialgleichungen erfolgen kann.

Der andere Fall, wenn $\varrho_1 < \varrho_2$, ist offenbar von diesem nicht wesentlich verschieden.

7.

Um das Bisherige durch ein einfaches Beispiel zu erläutern, wo sich die Bewegung mit den bis jetzt gewonnenen Mitteln bestimmen lässt, wollen wir annehmen, dass Druck und Dichtigkeit von einander nach dem Boyle'schen Gesetz abhängen und anfangs Dichtigkeit und Geschwindigkeit sich bei $x = 0$ sprunghaft ändern, aber zu beiden Seiten dieser Stelle constant sind.

Es sind dann nach dem Obigen vier Fälle zu unterscheiden.

I. Wenn $u_1 - u_2 > 0$, also die beiden Gasmassen sich einander entgegen bewegen und $\left(\frac{u_1 - u_2}{a}\right)^2 > \frac{(\varrho_1 - \varrho_2)^2}{\varrho_1 \varrho_2}$, so bilden sich zwei entgegengesetzt laufende Verdichtungsstöße. Nach Art. 6 (1) ist, wenn σ durch a und durch ϱ' die positive Wurzel der Gleichung

$$\frac{(\varrho' - \varrho_1)(\varrho' - \varrho_2)}{\varrho' \varrho_1 \varrho_2} = \frac{(\varrho_1 - \varrho_2)^2}{\varrho_1 \varrho_2}$$

bezeichnet wird, die Dichtigkeit zwischen den Verdichtungsstößen $\varrho' = \varrho_1 \varrho_2 \sigma^2$ und nach Art. 5 (1) hat man für den vorwärtslaufenden Verdichtungsstoss

$$\frac{d\xi}{dt} = u_1 + a\sigma = u' - a\sigma,$$

für den rückwärtslaufenden

$$\frac{d\xi}{dt} = u_2 - a\sigma = u' + a\sigma;$$

die Werthe der Geschwindigkeit und Dichtigkeit sind also nach Verlauf der Zeit t , wenn $(u_1 - a\sigma)t < x < (u_2 + a\sigma)t$, u' und ϱ' ; für ein kleineres x u_1 und ϱ_1 und für ein grösseres u_2 und ϱ_2 .

II. Wenn $u_1 - u_2 < 0$, folglich die Gasmassen sich aus einander bewegen, und zugleich

$$\frac{(u_1 - u_2)^2}{a^2} < \frac{(\varrho_1 - \varrho_2)^2}{\varrho_1 \varrho_2},$$

so gehen von der Grenze nach entgegengesetzten Richtungen zwei allmählich breiter werdende Verdünnungswellen aus. Nach Art. 4 ist zwischen ihnen $r = r_1$, $s = s_2$, $u = r_1 - s_2$. In der vorwärtslaufenden ist $s = s_2$ und $x - (u + a)t$ eine Function von r , deren Werth, aus den Anfangswerthen $t = 0$, $x = 0$, sich = 0 findet; für die rückwärtslaufende dagegen hat man $r = r_1$ und $x - (u - a)t = 0$. Die eine Gleichung zur Bestimmung von u und ϱ ist also, wenn

$$(u_1 - s_2 + a)t < x < (u_2 + a)t, \quad u = -a + \frac{x}{t};$$

für kleinere Werthe von x $r = r_1$ und für grössere $r = r_2$; die andere Gleichung ist, wenn

$$(u_1 - a)t < x < (u_1 - s_2 - a)t, \quad u = a + \frac{x}{t},$$

für ein kleineres x $s = s_1$ und für ein grösseres $s = s_2$.

III. Wenn keiner dieser beiden Fälle stattfindet und $\varrho_1 > \varrho_2$, so entsteht eine rückwärtslaufende Verdünnungswelle und ein vorwärtsschreitender Verdichtungsstoss. Für letzteren findet sich aus Art. 5 (3), wenn ε die Wurzel der Gleichung

$$\frac{\varrho_1 \varepsilon^2 - \varrho_2}{\varrho_1 \varepsilon^2} = 2 \log \varepsilon + \varepsilon^{-2} - 1$$

bezeichnet, $\varrho' = \varrho_1 \varepsilon^2 \varrho_2$ und aus Art. 5 (1)

$$\frac{d\xi}{dt} = u_2 + a\varepsilon = u' + a\varepsilon.$$

Nach Verlauf der Zeit t ist demnach vor dem Verdichtungsstosse, also wenn $x > (u_2 + a\varepsilon)t$, $u = u_2$, $\varrho = \varrho_2$; hinter dem Verdichtungsstosse aber hat man $r = r_1$ und ausserdem, wenn

$$(u_1 - a)t < x < (u' - a)t, \quad u = a + \frac{x}{t},$$

für ein kleineres x $u = u_1$ und für ein grösseres $u = u'$.

IV. Wenn endlich die beiden ersten Fälle nicht stattfinden und $\varrho_1 < \varrho_2$, so ist der Verlauf ganz wie in III., nur der Richtung nach entgegengesetzt.

Um unsere Aufgabe allgemein zu lösen, muss nach Art. 3 die Function w so bestimmt werden, dass sie der Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 w}{\partial r \partial s} + m \left(\frac{\partial w}{\partial r} + \frac{\partial w}{\partial s} \right) = 0 \quad (1)$$

und den Anfangsbedingungen genügt.

Schliessen wir den Fall aus, dass Unstetigkeiten eintreten, so sind offenbar nach Art. 1 Ort und Zeit oder die Werthe von x und t , für welche ein bestimmter Werth r' von r mit einem bestimmten Werthe s' von s zusammentrifft, völlig bestimmt, wenn die Anfangswerthe von r und s für die Strecke zwischen den beiden Werthen r' von r und s' von s gegeben sind und überall in dem Grössengebiet (S), welches für jeden Werth von t die zwischen den beiden Werthen, wo $r = r'$ und $s = s'$, liegenden Werthe von x umfasst, die Differentialgleichungen (3) des Art. 1 erfüllt sind. Es ist also auch der Werth

von w für $r = r'$, $s = s'$ völlig bestimmt, wenn w überall in dem Grössengebiet (S) der Differentialgleichung (1) genügt und für die Anfangswerthe von r und s die Werthe von $\frac{\partial w}{\partial r}$ und $\frac{\partial w}{\partial s}$, also, bis auf eine additive Constante, auch von w gegeben sind und diese Constante beliebig gewählt worden ist. Denn diese Bedingungen sind mit den obigen gleichbedeutend. Auch folgt aus Art. 3 noch, dass $\frac{\partial w}{\partial r}$ zwar zu beiden Seiten eines Werthes r' von r , wenn dieser Werth in einer endlichen Strecke stattfindet, verschiedene Werthe annimmt, sich aber allenthalben stetig mit s ändert; ebenso ändert sich $\frac{\partial w}{\partial s}$ mit r , die Function w selbst aber sowohl mit r , als mit s allenthalben stetig.

Nach diesen Vorbereitungen können wir nun an die Lösung unserer Aufgabe gehen, an die Bestimmung des Werthes von w für zwei beliebige Werthe, r' und s' , von r und s .

Zur Veranschaulichung denke man sich x und t als Abscisse und Ordinate eines Punkts in einer Ebene und in dieser Ebene die Curven gezogen, wo r und wo s constante Werthe hat. Von diesen Curven mögen die ersteren durch (r), die letzteren durch (s) bezeichnet und in ihnen die Richtung, in welcher t wächst, als die positive betrachtet werden. Das Grössengebiet (S) wird dann repräsentirt durch ein Stück der Ebene, welches begrenzt ist durch die Curve (r'), die Curve (s') und das zwischen beiden liegende Stück der Abscissenaxe, und es handelt sich darum, den Werth von w in dem Durchschnittspunkte der beiden ersteren aus den in letzterer Linie gegebenen Werthen zu bestimmen. Wir wollen die Aufgabe noch etwas verallgemeinern und annehmen, dass das Grössengebiet (S), statt durch diese letztere Linie, durch eine beliebige Curve c begrenzt werde, welche keine der Curven (r) und (s) mehr als einmal schneidet, und dass für die dieser Curve angehörigen Werthenpaare von r und s die Werthe von $\frac{\partial w}{\partial r}$ und $\frac{\partial w}{\partial s}$ gegeben seien. Wie sich aus der Auflösung der Aufgabe ergeben wird, unterliegen auch dann diese Werthe von $\frac{\partial w}{\partial r}$ und $\frac{\partial w}{\partial s}$ nur der Bedingung, sich stetig mit dem Ort in der Curve zu ändern, können aber übrigens willkürlich angenommen werden, während diese Werthe nicht von einander unabhängig sein würden, wenn die Curve c eine der Curven (r) oder (s) mehr als einmal schnitte.

Um Functionen zu bestimmen, welche linearen partiellen Differentialgleichungen und linearen Grenzbedingungen genügen sollen, kann man ein ganz ähnliches Verfahren anwenden, wie wenn man zur Auflösung

eines Systems von linearen Gleichungen sämtliche Gleichungen, mit unbestimmten Factoren multiplicirt, addirt und diese Factoren dann so bestimmt, dass aus der Summe alle unbekannten Grössen bis auf eine herausfallen.

Man denke sich das Stück (S) der Ebene durch die Curven (r) und (s) in unendlich kleine Parallelogramme zerschnitten und bezeichne durch dr und ds die Aenderungen,

welche die Grössen r und s erleiden, wenn die Curvelemente, welche die Seiten dieser Parallelogramme bilden, in positiver Richtung durchlaufen werden; man bezeichne ferner durch v eine beliebige Function von r und s , welche allenthalben stetig ist und stetige Derivirten hat. In Folge der Gleichung (1) hat man dann

$$\iint_S \left(\frac{\partial^2 v}{\partial r \partial s} w + \frac{\partial v}{\partial r} m \frac{\partial w}{\partial s} + \frac{\partial v}{\partial s} m \frac{\partial w}{\partial r} \right) dr ds = 0.$$

Über das ganze Grössengebiet (S) ausgedehnt. Es muss nun die rechte Seite dieser Gleichung nach den Unbekannten geordnet, d. h. hier, das Integral durch partielle Integration so umgeformt werden, dass es ausser bekannten Grössen nur die gesuchte Function, nicht ihre Derivirten enthält. Bei Ausführung dieser Operation geht das Integral zunächst über in das über (S) ausgedehnte Integral

$$\iint \left(w \frac{\partial^2 v}{\partial r \partial s} - \frac{\partial v}{\partial r} m \frac{\partial w}{\partial s} - \frac{\partial v}{\partial s} m \frac{\partial w}{\partial r} \right) dr ds$$

und ein einfaches Integral, welches sich, weil sich $\frac{\partial w}{\partial r}$ mit s , $\frac{\partial w}{\partial s}$ mit r und w mit beiden Grössen stetig ändert, nur über die Begrenzung von (S) erstrecken wird. Bedeuten dr und ds die Aenderungen von r und s in einem Begrenzungselemente, wenn die Begrenzung in der Richtung durchlaufen wird, welche gegen die Richtung nach Innen ebenso liegt, wie die positive Richtung in den Curven (r) gegen die positive Richtung in den Curven (s), so ist dies Begrenzungsintegral

$$\int \left(v \frac{\partial w}{\partial s} - mvw \right) ds + \left(v \frac{\partial w}{\partial r} + mvw \right) dr.$$

Das Integral durch die ganze Begrenzung von S ist gleich der Summe der Integrale durch die Curven c , (s'), (r'), welche diese Begrenzung bilden, also, wenn ihre Durchschnittspunkte durch (c, r') , (c, s') , (r', s') bezeichnet werden,

$$\int_{c, r'}^{c, s'} + \int_{c, s'}^{r', s'} + \int_{r', s'}^{c, r'}.$$

Von diesen drei Bestandtheilen enthält der erste ausser der Function v nur bekannte Grössen, der zweite enthält, da in ihm $ds = 0$ ist, nur die unbekannte Function w selbst, nicht ihre Derivirten; der dritte Bestandtheil aber kann durch partielle Integration in

$$(vw)_{r', s'} - (vw)_{c, r'} + \int_{r', s'}^{c, r'} w \left(\frac{\partial v}{\partial r} + mv \right) dr$$

verwandelt werden, so dass in ihm ebenfalls nur die gesuchte Function w selbst vorkommt.

Nach diesen Umformungen liefert die Gleichung (2) offenbar den Werth der Function w im Punkte (r' , s'), durch bekannte Grössen ausgedrückt, wenn man die Function v den folgenden Bedingungen gemäss bestimmt:

1. allenthalben in S : $\frac{\partial^2 v}{\partial r \partial s} + m \left(\frac{\partial v}{\partial r} + \frac{\partial v}{\partial s} \right) = 0$;
2. für $r = r'$: $\frac{\partial v}{\partial r} + mv = 0$;

3. für $s = s'$: $\frac{\partial v}{\partial s} + mv = 0$;
4. für $r = r'$, $s = s'$: $v = 1$.

Man hat dann

$$w_{r',s'} = (vw)_{c,r'} + \int_{c,r'}^{c,s'} \left(v \frac{\partial w}{\partial s} - mvw \right) ds + \left(v \frac{\partial w}{\partial r} + mvw \right) dr. \quad (4)$$

9.

Durch das eben angewandte Verfahren wird die Aufgabe, eine Function w einer linearen Differentialgleichung und linearen Grenzbedingungen gemäss zu bestimmen, auf die Lösung einer ähnlichen, aber viel einfacheren Aufgabe für eine andere Function v zurückgeführt; die Bestimmung dieser Function erreicht man meistens am Leichtesten durch Behandlung eines speciellen Falls jener Aufgabe nach der Fourier'schen Methode. Wir müssen uns hier begnügen, diese Rechnung nur anzudeuten und das Resultat auf anderem Wege zu beweisen.¹

Führt man in der Gleichung (1) des vor. Art. für r und s als unabhängig veränderliche Grössen $\vartheta = r + s$ und $u = r - s$ ein und wählt man für die Curve c eine Curve, in welcher ϑ constant ist, so lässt sich die Aufgabe nach den Regeln Fourier's behandeln, und man erhält durch Vergleichung des Resultats mit der Gleichung (4) des vor. Art., wenn $r + s = \vartheta$, $r - s' = u'$ gesetzt wird,

$$v = \int_0^\infty \cos \mu(u - u') \frac{\psi_1(\vartheta')\psi_2(\vartheta) - \psi_2(\vartheta')\psi_1(\vartheta)}{\psi_1'(\vartheta) - \psi_2'(\vartheta)} d\mu,$$

worin $\psi_1(\vartheta)$ und $\psi_2(\vartheta)$ zwei solche particuläre Lösungen der Differentialgleichung $\psi'' - 2m\psi' + \mu^2\psi = 0$ bezeichnen, dass

$$\psi_1(\vartheta_0) = 1, \quad \psi_2(\vartheta_0) = 0, \quad \psi_1'(\vartheta_0) = 0, \quad \psi_2'(\vartheta_0) = 1.$$

Bei Voraussetzung des Poisson'schen Gesetzes, nach welchem $m = \frac{k+1}{2(k-1)(r+s)}$, kann man ψ_1 und ψ_2 durch bestimmte Integrale ausdrücken, so dass man für v ein dreifaches Integral erhält, durch dessen Reduction sich ergibt

$$v = \left(\frac{r+s}{r'+s'} \right)^{\frac{k-1}{2}} P\left(\frac{k-1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{(r-r')(s-s')}{(r+s)(r'+s')} \right),$$

worin $P(\alpha, \beta, x)$ die Gauss'sche Reihe bezeichnet.

Man kann nun die Richtigkeit dieses Ausdrucks leicht beweisen, indem man zeigt, dass er wirklich den Bedingungen (3) des vor. Art. genügt.

Setzt man $v = e^{-\int m d\vartheta} y$, so gehen diese für y über in

$$\frac{\partial^2 y}{\partial r \partial s} + \left(\frac{dm}{d\vartheta} - m^2 \right) y = 0$$

und $y = 1$ sowohl für $r = r'$, als für $s = s'$. Bei der Poisson'schen Annahme kann man aber diesen Bedingungen genügen, wenn man annimmt, dass y eine Function von $z = \frac{(r-r')(s-s')}{(r+s)(r'+s')}$

sei. Denn es wird dann, wenn man $\frac{d \log \sqrt{\varphi'(\vartheta)}}{d \log \vartheta}$ durch λ bezeichnet, $m = \frac{\lambda}{\vartheta}$, also $3mm = \frac{3\lambda^2}{\vartheta^2}$ und

$$\frac{dm}{d\vartheta} = -\frac{\lambda}{\vartheta^2}, \quad \frac{dm}{d\vartheta} - m^2 = -\frac{\lambda(\lambda+1)}{\vartheta^2}.$$

Da

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 y}{\partial r \partial s} &= \frac{d^2 y}{dz^2} \frac{\partial z}{\partial r} \frac{\partial z}{\partial s} + \frac{dy}{dz} \frac{\partial^2 z}{\partial r \partial s}, \\ \frac{\partial z}{\partial r} &= \frac{s+s'}{(r+s)^2(r'+s')}(s-s'), \quad \frac{\partial z}{\partial s} = \frac{r+r'}{(r+s)^2(r'+s')}(r-r'), \end{aligned}$$

¹Weitere Ausführungen sind in dem Nachlass vorhanden.

und $\frac{\partial^2 z}{\partial r \partial s} = \frac{1+z}{(r+s)^2}$, so wird

$$\frac{\partial^2 y}{\partial r \partial s} = \frac{(r-r')(s-s')}{(r+s)^4(r'+s')^2} \left[(s+s')(r+r') \frac{d^2 y}{dz^2} + (r+s)(r'+s')(1+z) \frac{dy}{dz} \right].$$

Setzt man nun

$$v = e^{-\int m d\vartheta} y = \left(\frac{r+s}{r'+s'} \right)^{-\lambda} y,$$

so genügt diese Function allen Bedingungen (3) des Art. 8, und es wird y eine Lösung der Differentialgleichung

$$z(1-z) \frac{d^2 y}{dz^2} + (1 - (2\lambda + 2)z) \frac{dy}{dz} - \lambda(\lambda + 1)y = 0$$

oder nach der in meiner Abhandlung über die Gauss'sche Reihe eingeführten Bezeichnung eine Function

$$P\left(\lambda, \frac{1}{2}, \lambda + \frac{1}{2}, z\right)$$

und zwar diejenige particuläre Lösung, welche für $z = 0$ gleich 1 wird.

Nach den in jener Abhandlung entwickelten Transformationsprincipien lässt sich y nicht bloss durch die Functionen $P(0, 2\lambda + 1, 0, z)$, sondern auch durch die Functionen $P(-\lambda, 0, \lambda + 1, z)$, $P(0, \lambda + \frac{1}{2}, \lambda + 1, z)$ ausdrücken; man erhält daher für y eine grosse Menge von Darstellungen durch hypergeometrische Reihen und bestimmte Integrale, von denen wir hier nur die folgenden

$$y = F(\lambda + 1, -\lambda, 1, z) = (1-z)^\lambda F\left(\frac{1}{2}, \lambda, 1, \frac{z}{z-1}\right) = (1-z)^{-\lambda} F\left(\frac{1}{2} + \lambda, 1 + \lambda, 1, \frac{z}{z-1}\right)$$

bemerken, mit denen man in allen Fällen ausreicht.

Um aus diesen für das Poisson'sche Gesetz gefundenen Resultaten die für das Boyle'sche geltenden abzuleiten, muss man nach Art. 2 die Grössen r, s, r', s' um $\frac{a}{2}$ vermindern und dann $k = 1$ werden lassen, wodurch man erhält $m = -\frac{1}{2a}$ und

$$v = e^{\frac{r-r'+s-s'}{2a}} F\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, \frac{(r'-r)(s'-s)}{4a^2}\right).$$

10.

Wenn man den im vor. Art. gefundenen Ausdruck für v in die Gleichung (4) des Art. 8 einsetzt, erhält man den Werth von w für $r = r'$, $s = s'$ durch die Werthe von w , $\frac{\partial w}{\partial r}$ und $\frac{\partial w}{\partial s}$ in der Curve c ausgedrückt; da aber bei unserm Problem in dieser Curve immer nur $\frac{\partial w}{\partial r}$ und $\frac{\partial w}{\partial s}$ unmittelbar gegeben sind und w erst durch eine Quadratur aus ihnen gefunden werden müsste, so ist es zweckmässig, den Ausdruck für $w_{r',s'}$ so umzuformen, dass unter dem Integralzeichen nur die Derivirten von w vorkommen.

Man bezeichne die Integrale der Ausdrücke $-mv ds + (\frac{\partial v}{\partial r} + mv) dr$ und $(\frac{\partial v}{\partial s} + mv) ds - mv dr$, welche in Folge der Gleichung

$$\frac{\partial^2 v}{\partial r \partial s} + m \frac{\partial v}{\partial r} + m \frac{\partial v}{\partial s} = 0$$

vollständige Differentiale sind, durch P und U und das Integral von $P dr + U ds$, welcher Ausdruck wegen $\frac{\partial P}{\partial s} = -mv = \frac{\partial U}{\partial r}$ ebenfalls ein vollständiges Differential ist, durch ω .

Bestimmt man nun die Integrationsconstanten in diesen Integralen so, dass ω , P und U für $r = r'$, $s = s'$ verschwinden, so genügt ω den Gleichungen $\frac{\partial \omega}{\partial r} = P$, $\frac{\partial \omega}{\partial s} = U$ und sowol für $r = r'$, als für $s = s'$ der Gleichung $\omega = 0$ und ist, beiläufig bemerkt, durch diese Grenzbedingung und die Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 \omega}{\partial r \partial s} + m \left(\frac{\partial \omega}{\partial r} + \frac{\partial \omega}{\partial s} \right) = 0$$

völlig bestimmt.

Führt man nun in dem Ausdrucke von $w_{r',s'}$ für v die Function ω ein, so kann man ihn durch partielle Integration in

$$w_{r',s'} = w_{c,r'} + \int_{c,r'}^{c,s'} \left(\frac{\partial \omega}{\partial s} \frac{\partial w}{\partial r} ds - \frac{\partial \omega}{\partial r} \frac{\partial w}{\partial s} dr \right) \quad (1)$$

umwandeln.

Um die Bewegung des Gases aus dem Anfangszustande zu bestimmen, muss man für c die Curve, in welcher $t = 0$ ist, nehmen; in dieser Curve hat man dann $\frac{\partial w}{\partial r} = x$, $\frac{\partial w}{\partial s} = -x$, und man erhält durch abermalige partielle Integration

$$w_{r',s'} = w_{c,r'} + \int (\omega dx - x d\omega),$$

folglich nach Art. 3, (4) und (5)

$$\begin{aligned} (x - (\sqrt{\varphi'(\varrho)} + u)t)_{r',s'} &= x_{r'} + \int \omega dx, \\ (x - (\sqrt{\varphi'(\varrho)} - u)t)_{r',s'} &= x_{s'} - \int \omega dx. \end{aligned} \quad (2)$$

Diese Gleichungen (2) drücken aber die Bewegung nur aus, so lange $\frac{\partial r}{\partial x} + (\frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho} + 1) \frac{\partial s}{\partial t}$ und $\frac{\partial s}{\partial x} + (\frac{d \log \sqrt{\varphi'(\varrho)}}{d \log \varrho} + 1) \frac{\partial r}{\partial t}$ von Null verschieden bleiben. Sobald eine dieser Grössen verschwindet, entsteht ein Verdichtungsstoss, und die Gleichung (1) gilt dann nur innerhalb solcher Grössengebiete, welche ganz auf einer und derselben Seite dieses Verdichtungsstosses liegen. Die hier entwickelten Principien reichen dann, wenigstens im Allgemeinen, nicht aus, um aus dem Anfangszustande die Bewegung zu bestimmen; wohl

aber kann man mit Hülfe der Gleichung (1) und der Gleichungen, welche nach Art. 5 für den Verdichtungsstoss gelten, die Bewegung bestimmen, wenn der Ort des Verdichtungsstosses zur Zeit t , also ξ als Function von t , gegeben ist. Wir wollen indess dies nicht weiter verfolgen und verzichten auch auf die Behandlung des Falles, wenn die Luft durch eine feste Wand begrenzt ist, da die Rechnung keine Schwierigkeiten hat und eine Vergleichung der Resultate mit der Erfahrung gegenwärtig noch nicht möglich ist.

IX.

Selbstanzeige der vorstehenden Abhandlung.

(Göttinger Nachrichten, 1859, Nr. 19.)

Diese Untersuchung macht nicht darauf Anspruch, der experimentellen Forschung nützliche Ergebnisse zu liefern; der Verfasser wünscht sie nur als einen Beitrag zur Theorie der nicht linearen partiellen Differentialgleichungen betrachtet zu sehen. Wie für die Integration der linearen partiellen Differentialgleichungen die fruchtbarsten Methoden nicht durch Entwicklung des allgemeinen Begriffs dieser Aufgabe gefunden worden, sondern vielmehr aus der Behandlung specieller physikalischer Probleme hervorgegangen sind, so scheint auch die Theorie der nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen durch eine eingehende, alle Nebenbedingungen berücksichtigende, Behandlung specieller physikalischer Probleme am meisten gefördert zu werden, und in der That hat die Lösung der ganz speciellen Aufgabe, welche den Gegenstand dieser Abhandlung bildet, neue Methoden und Auffassungen erfordert, und zu Ergebnissen geführt, welche wahrscheinlich auch bei allgemeineren Aufgaben eine Rolle spielen werden.

Durch die vollständige Lösung dieser Aufgabe dürften die vor einiger Zeit zwischen den englischen Mathematikern Challis, Airy und Stokes lebhaft verhandelten Fragen²⁾, soweit dies nicht schon durch Stokes³ geschehen ist, zu klarer Entscheidung gebracht worden sein, so wie auch der Streit, welcher über eine andere denselben Gegenstand betreffende Frage in der K. K. Ges. d. W. zu Wien zwischen den Herrn Petzval, Doppler und A. von Ettinghausen⁴ geführt wurde.

Das einzige empirische Gesetz, welches ausser den allgemeinen Bewegungsgesetzen bei dieser Untersuchung vorausgesetzt werden

musste, ist das Gesetz, nach welchem der Druck eines Gases sich mit der Dichtigkeit ändert, wenn es keine Wärme aufnimmt oder abgibt. Die schon von Poisson gemachte, aber damals auf sehr unsicherer Grundlage ruhende Annahme, dass der Druck bei der Dichtigkeit ϱ proportional ϱ^k sich ändere, wenn k das Verhältniss der specifischen Wärme bei constantem Druck zu der bei constantem Volumen bedeutet, kann jetzt durch die Versuche von Regnault über die specifischen Wärmen der Gase und ein Princip der mechanischen Wärmetheorie begründet werden, und es schien nöthig diese Begründung des Poisson'schen Gesetzes, da sie noch wenig bekannt zu sein scheint, in der Einleitung voranzuschicken. Der Werth von k findet sich dabei = 1,4101, während die Schallgeschwindigkeit bei 0°C. und trockner Luft nach den Versuchen von Martins und A. Bravais⁵ = $\frac{332^m,37}{\sqrt{1,4101}}$ sich ergeben und für k den Werth 1,4095 liefern würde.

Obwohl die Vergleichung der Resultate unserer Untersuchung mit der Erfahrung durch Versuche und Beobachtungen grosse Schwierigkeiten hat und gegenwärtig kaum ausführbar sein wird, so mögen diese doch, soweit es ohne Weitläufigkeit möglich ist, hier mitgetheilt werden.

Die Abhandlung behandelt die Bewegung der Luft oder eines Gases nur für den Fall, wenn anfangs und also auch in der Folge die Bewegung allenthalben gleich gerichtet ist,

²Phil. mag. voll. 33, 34, 36.

³Phil. mag. vol. 33, p. 349.

⁴Sitzungsberichte der K. K. Ges. d. W. vom 15. Jan., 21. Mai und 1. Juni 1852.

⁵Ann. de chim. et de phys. Sér. III, T. XIII, p. 5.

und in jeder auf ihrer Richtung senkrechten Ebene Geschwindigkeit und Dichtigkeit constant sind.

Für den Fall, wo die anfängliche Gleichgewichtsstörung auf eine endliche Strecke beschränkt ist, ergibt sich bekanntlich bei der gewöhnlichen Voraussetzung, dass die Druckverschiedenheiten unendlich kleine Bruchtheile des ganzen Drucks sind, das Resultat, dass von der erschütterten Stelle zwei Wellen, in deren jeder die Geschwindigkeit eine bestimmte Function der Dichtigkeit ist, ausgehen und in entgegengesetzten Richtungen mit der bei dieser Voraussetzung constanten Geschwindigkeit $\sqrt{\varphi'(\varrho)}$ fortschreiten, wenn $\varphi(\varrho)$ den Druck bei der Dichtigkeit ϱ und $\varphi'(\varrho)$ die Derivirte dieser Function bezeichnet. Etwas ganz ähnliches gilt nun für diesen Fall auch, wenn die Druckverschiedenheiten endlich sind. Die Stelle, wo das Gleichgewicht gestört ist, zerfällt sich ebenfalls nach Verlauf einer endlichen Zeit in zwei nach entgegengesetzten Richtungen fortschreitende Wellen. In diesen ist die Geschwindigkeit, in der Fortpflanzungsrichtung gemessen, eine bestimmte Function $\int \sqrt{\varphi'(\varrho)} d \log \varrho$ der Dichtigkeit, wobei die Integrationsconstante in beiden verschieden sein kann; in jeder ist also mit einem und demselben Werthe der Dichtigkeit stets derselbe Werth der Geschwindigkeit verbunden, und zwar mit einem grösseren Werthe ein algebraisch grösserer Werth der Geschwindigkeit. Beide Werthe rücken mit constanter Geschwindigkeit fort. Ihre Fortpflanzungsgeschwindigkeit im Gase ist $\sqrt{\varphi'(\varrho)}$, im Raume aber um die in der Fortpflanzungsrichtung gemessene Geschwindigkeit des Gases grösser.

Unter der in der Wirklichkeit zutreffenden Voraussetzung, dass $\varphi'(\varrho)$ bei wachsendem ϱ nicht abnimmt, rücken daher grössere Dichtigkeiten mit grösserer Geschwindigkeit fort, und hieraus folgt, dass die Verdünnungswellen, d. h. die Theile der Welle, in denen die Dichtigkeit in der Fortpflanzungsrichtung wächst, der Zeit proportional an Breite zunehmen, die Verdichtungswellen aber ebenso an Breite abnehmen, und schliesslich in Verdichtungsstösse übergehen müssen. Die Gesetze, welche vor der Scheidung beider Wellen oder bei einer über den ganzen Raum sich erstreckenden Gleichgewichtsstörung gelten, so wie die Gesetze für das Fortschreiten von Verdichtungsstössen, können hier, weil dazu grössere Formeln erforderlich wären, nicht angegeben werden.

In akustischer Beziehung liefert demnach diese Untersuchung das Resultat, dass in den Fällen, wo die Druckverschiedenheiten nicht als unendlich klein betrachtet werden können, eine Aenderung der Form der Schallwellen, also des Klanges, während der Fortpflanzung eintritt. Eine Prüfung dieses Resultats durch Versuche scheint aber trotz der Fortschritte, welche in der Analyse des Klanges in neuester Zeit durch Helmholtz u. A. gemacht worden sind, sehr schwer zu sein; denn in geringeren Entfernungen ist eine Aenderung des Klanges nicht merklich, und bei grösseren Entfernungen wird es schwer sein, die mannigfachen Ursachen, welche den Klang modificiren können, zu sondern. An eine Anwendung auf die Meteorologie ist wohl nicht zu denken, da die hier untersuchten Bewegungen der Luft solche Bewegungen sind, die sich mit der Schallgeschwindigkeit fortpflanzen, die Strömungen in der Atmosphäre aber allem Anschein nach mit viel geringerer Geschwindigkeit fortschreiten.

Anmerkungen.

(1) (Zu Seite 172.) Zum leichteren Verständniss dieser sehr kurzen Andeutungen sollen folgende Bemerkungen dienen.

Die durch die Bedingungen (3) des Art. 8 definirte Function v enthält nichts mehr, was von den besonderen für die Function w geltenden Grenzbedingungen abhängt. Kann man aber unter einer speciellen Voraussetzung w bestimmen, so ergibt umgekehrt die Formel (4) eine auch für alle anderen Fälle gültige Bestimmung von v . Es kommt dabei nicht darauf an, dass die gewählten Grenzbedingungen von w auf das mechanische Problem passen; man kann w und seine beiden Differentialquotienten auf der Curve c beliebig wählen.

Wir nehmen also für c eine Curve, in der ϑ einen constanten Werth hat, und nehmen auf dieser Linie $w = 0$, $\frac{\partial w}{\partial r}$ aber gleich einer beliebigen Function von u .

Die Differentialgleichung (1) des Art. 8 wird nun durch Einführung von u und ϑ in folgende transformirt:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial \vartheta^2} - \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} - 2m \frac{\partial w}{\partial \vartheta} = 0 \quad (1)$$

und ergibt als particuläre Lösungen

$$\psi \cos \mu u, \quad \psi \sin \mu u,$$

wenn μ ein willkürlicher Parameter ist, und ψ als Function von ϑ durch die Differentialgleichung

$$\psi'' - 2m\psi' + \mu^2\psi = 0 \quad (2)$$

bestimmt wird. Sind ψ_1 und ψ_2 zwei particuläre Lösungen dieser Gleichung, so ist nach einem bekannten Satz

$$\psi_1 \psi_2' - \psi_2 \psi_1' = \text{const.},$$

und da (nach Art. 2) $2m = \frac{d \log a}{d \vartheta}$ ist, so kann man die particulären Lösungen ψ_1, ψ_2 so bestimmen, dass

$$\psi_1 \psi_2' - \psi_2 \psi_1' = \frac{da}{d \vartheta},$$

wie im Text verlangt wird.

Bezeichnen wir den constanten Werth, den ϑ auf der Linie c hat, ohne Index, mit ϑ' , einen beliebigen Werth von ϑ , so erhalten wir ein für $\vartheta' = \vartheta$ der Grenzbedingung $w = 0$ genügendes w in dem Ausdruck

$$w_{\vartheta', u'} = \frac{1}{2} \int_0^\infty (A \cos \mu u' + B \sin \mu u') (\psi_1(\vartheta) \psi_2(\vartheta') - \psi_2(\vartheta) \psi_1(\vartheta')) d\mu, \quad (4)$$

wenn A, B willkürliche Functionen von μ sind. Differentiirt man nach ϑ' und setzt dann $\vartheta' = \vartheta$, so folgt

$$\left(\frac{\partial w}{\partial \vartheta'} \right)_{\vartheta' = \vartheta} = \frac{1}{2} \int_0^\infty (A \cos \mu u' + B \sin \mu u') d\mu.$$

Nun ist nach dem Fourier'schen Lehrsatz, wenn $\varphi(u)$ eine willkürliche Function von u ist,

$$\varphi(u') = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty d\mu \int_{-\infty}^\infty du \varphi(u) \cos \mu(u - u'),$$

und man erhält also

$$A \cos \mu u' + B \sin \mu u' = \frac{1}{\pi} \frac{d\vartheta}{da} \int du \frac{\partial w}{\partial \vartheta} \cos \mu(u - u'),$$

$$w_{\vartheta', u'} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} du \int_0^{\infty} d\mu \cos \mu(u - u') \frac{\psi_1(\vartheta)\psi_2(\vartheta') - \psi_2(\vartheta)\psi_1(\vartheta')}{da/d\vartheta}.$$

Setzt man dies in (4) ein, so erhält man

$$w_{\vartheta', u'} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} du \int_0^{\infty} d\mu \cos \mu(u - u') \frac{\psi_1(\vartheta)\psi_2(\vartheta') - \psi_2(\vartheta)\psi_1(\vartheta')}{da/d\vartheta}. \quad (5)$$

Nun giebt die Formel (4) des Art. 8 unter den gegenwärtigen Voraussetzungen

$$w_{\vartheta', u'} = \frac{w_{\vartheta' + u' - \vartheta} + w_{\vartheta' - u' + \vartheta}}{2}. \quad (6)$$

Nimmt man, was freisteht, $\frac{\partial w}{\partial \vartheta}$ nur in einer innerhalb des Intervalles $u' - \vartheta + \vartheta'$ und $u' + \vartheta - \vartheta'$ gelegenen Strecke von 0 verschieden, ausserhalb dieser Strecke = 0 an, so ergibt die Vergleichung von (5) und (6) unmittelbar die Formel des Textes

$$v = \int_0^{\infty} \cos \mu(u - u') \frac{\psi_1(\vartheta')\psi_2(\vartheta) - \psi_2(\vartheta')\psi_1(\vartheta)}{\psi_1'(\vartheta) - \psi_2'(\vartheta)} d\mu.$$

Die Differentialgleichung (2) wird unter Voraussetzung des Poisson'schen Gesetzes

$$\psi'' - \frac{2\lambda}{\vartheta} \psi' + \mu^2 \psi = 0.$$

Integriert man sie durch Potenzreihen, so erhält man zwei particuläre Integrale in der Form

$$\psi = \vartheta^n \sum \frac{(-\mu^2 \vartheta^2)^n}{n(n)(n + \frac{2\lambda}{k-1})},$$

wenn man n das eine Mal von Null, das andere Mal von $1 - \frac{2\lambda}{k-1}$ in Stufen von einer Einheit ins Unendliche wachsen lässt.

Durch Anwendung der Formel

$$\frac{1}{\Gamma(n)(n + \frac{2\lambda}{k-1})} = \frac{1}{2\pi i} \int x^{-n-1} (1-x)^{n + \frac{2\lambda}{k-1} - 1} dx$$

kann man diese Reihen summiren und erhält unter Weglassung des Factors $-\frac{1}{2\mu}$: für die beiden particulären Integrale

$$\psi = \int e^{\mu \vartheta i(t - \frac{1}{t})} t^{\frac{2\lambda}{k-1} - 1} dt,$$

worin die Integrationen auf complexem Wege von $-\infty$ nach $-\infty$ um den Nullpunkt herum zu nehmen sind. Diese Formeln finden sich wenigstens angedeutet in Riemann's Papieren.

X.

Ein Beitrag zu den Untersuchungen über die Bewegung eines flüssigen gleichartigen Ellipsoides.

(Aus dem neunten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Göttingen. 1861.)

Für die Untersuchungen über die Bewegung eines gleichartigen flüssigen Ellipsoides, dessen Elemente sich nach dem Gesetze der Schwere anziehen, hat Dirichlet durch seine letzte von Dedekind herausgegebene Arbeit auf überraschende Weise eine neue Bahn gebrochen. Die Verfolgung dieser schönen Entdeckung hat für den Mathematiker ihren besondern Reiz, ganz abgesehen von der Frage nach den Gründen der Gestalt der Himmelskörper, durch welche diese Untersuchungen veranlasst worden sind. Dirichlet selbst hat die Lösung der von ihm behandelten Aufgabe nur in den einfachsten Fällen vollständig durchgeführt. Für die weitere Ausführung der Untersuchung ist es zweckmässig, den Differentialgleichungen für die Bewegung der flüssigen Masse eine von dem gewählten Anfangszeitpunkte unabhängige Form zu geben, was z. B. dadurch geschehen kann, dass man die Gesetze aufsucht, nach welchen die Grösse der Hauptaxen des Ellipsoides und die relative Bewegung der flüssigen Masse gegen dieselben sich ändert. Indem wir hier die Aufgabe in dieser Weise behandeln, werden wir zwar die Dirichlet'sche Abhandlung voraussetzen, müssen aber dabei zur Vermeidung von Irrungen gleich bevorworten, dass es nicht möglich gewesen ist, die dort gebrauchten Zeichen unverändert beizubehalten.

1.

Wir bezeichnen durch a, b, c die Hauptaxen des Ellipsoides zur Zeit t , ferner durch x, y, z die Coordinaten eines Elements der flüssigen Masse zur Zeit t und die Anfangswerthe dieser Grössen durch Anhängung des Index 0 und nehmen an, dass für die Anfangszeit die Hauptaxen des Ellipsoides mit den Coordinatenaxen zusammenfallen.

Den Ausgangspunkt für die Untersuchung Dirichlet's bildet bekanntlich die Bemerkung, dass man den Differentialgleichungen für die Bewegung der Flüssigkeitstheile genügen kann, wenn man die Coordinaten x, y, z linearen Ausdrücken von ihren Anfangswerthen gleichsetzt, in denen die Coefficienten bloss Functionen der Zeit sind. Diese Ausdrücke setzen wir in die Form

$$\begin{aligned}x &= \frac{a}{a_0}x_0 + \frac{a_1}{b_0}y_0 + \frac{a_2}{c_0}z_0 \\y &= \frac{b}{a_0}x_0 + \frac{b_1}{b_0}y_0 + \frac{b_2}{c_0}z_0 \\z &= \frac{c}{a_0}x_0 + \frac{c_1}{b_0}y_0 + \frac{c_2}{c_0}z_0\end{aligned}\tag{1}$$

Bezeichnet man nun durch ξ, η, ζ die Coordinaten des Punktes (x, y, z) in Bezug auf ein bewegliches Coordinatensystem, dessen Axen in jedem Augenblicke mit den Hauptaxen

des Ellipsoides zusammenfallen, so sind bekanntlich ξ , η , ζ gleich linearen Ausdrücken von x , y , z

$$\begin{aligned}\xi &= \alpha x + \beta y + \gamma z \\ \eta &= \alpha' x + \beta' y + \gamma' z \\ \zeta &= \alpha'' x + \beta'' y + \gamma'' z,\end{aligned}\tag{2}$$

worin die Coefficienten die Cosinus der Winkel sind, welche die Axen des einen Systems mit den Axen des andern bilden, $\alpha = \cos \xi x$, $\beta = \cos \xi y$ etc., und zwischen diesen Coefficienten finden sechs Bedingungsgleichungen statt, welche sich daraus herleiten lassen, dass durch die Substitution dieser Ausdrücke

$$\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

werden muss.

Da die Oberfläche stets von denselben Flüssigkeitstheilchen gebildet wird, so muss

$$\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} + \frac{\zeta^2}{c^2} = \frac{x_0^2}{a_0^2} + \frac{y_0^2}{b_0^2} + \frac{z_0^2}{c_0^2}$$

sein; setzt man also

$$\begin{aligned}\frac{\xi}{a} &= \alpha_1 \frac{x_0}{a_0} + \beta_1 \frac{y_0}{b_0} + \gamma_1 \frac{z_0}{c_0} \\ \frac{\eta}{b} &= \alpha'_1 \frac{x_0}{a_0} + \beta'_1 \frac{y_0}{b_0} + \gamma'_1 \frac{z_0}{c_0} \\ \frac{\zeta}{c} &= \alpha''_1 \frac{x_0}{a_0} + \beta''_1 \frac{y_0}{b_0} + \gamma''_1 \frac{z_0}{c_0},\end{aligned}\tag{3}$$

d. h. bezeichnet man in den Ausdrücken von $\frac{\xi}{a}$, $\frac{\eta}{b}$, $\frac{\zeta}{c}$ durch $\frac{x_0}{a_0}$, $\frac{y_0}{b_0}$, $\frac{z_0}{c_0}$, welche man durch Einsetzung der Werthe (1) in die Gleichungen (2) erhält, die Coefficienten durch α_1 , β_1 , $\dots$, γ''_1 , so bilden diese Grössen α_1 , β_1 , $\dots$, γ''_1 ebenfalls die Coefficienten einer orthogonalen Coordinatentransformation: sie können betrachtet werden als die Cosinus der Winkel, welche die Axen eines beweglichen Coordinatensystems der ξ_1 , η_1 , ζ_1 mit den Axen des festen Coordinatensystems der x , y , z bilden. Drückt man die Grössen x , y , z mit Hülfe der Gleichungen (2) und (3) in $\frac{x_0}{a_0}$, $\frac{y_0}{b_0}$, $\frac{z_0}{c_0}$ aus, so ergibt sich

$$\begin{aligned}l &= a\alpha\alpha_1 + b\alpha'\alpha'_1 + c\alpha''\alpha''_1 \\ m &= a\alpha\beta_1 + b\alpha'\beta'_1 + c\alpha''\beta''_1 \\ n &= a\alpha\gamma_1 + b\alpha'\gamma'_1 + c\alpha''\gamma''_1 \\ l' &= a\beta\alpha_1 + b\beta'\alpha'_1 + c\beta''\alpha''_1 \\ m' &= a\beta\beta_1 + b\beta'\beta'_1 + c\beta''\beta''_1 \\ n' &= a\beta\gamma_1 + b\beta'\gamma'_1 + c\beta''\gamma''_1 \\ l'' &= a\gamma\alpha_1 + b\gamma'\alpha'_1 + c\gamma''\alpha''_1 \\ m'' &= a\gamma\beta_1 + b\gamma'\beta'_1 + c\gamma''\beta''_1 \\ n'' &= a\gamma\gamma_1 + b\gamma'\gamma'_1 + c\gamma''\gamma''_1.\end{aligned}\tag{4}$$

Wir können daher die Lage der Flüssigkeitstheilchen oder die Werthe der Grössen l , m , $\dots$, n'' zur Zeit t als abhängig betrachten von den Grössen a , b , c und der Lage

zweier beweglichen Coordinatensysteme und können zugleich bemerken, dass durch Vertauschung dieser beiden Coordinatensysteme in dem Systeme der Grössen l, m, n die Horizontalreihen mit den Verticalreihen vertauscht werden, also l, m', n'' ungeändert bleiben, während von den Grössen m und l', n und l'', n' jede in die andere übergeht. Es wird nun unser nächstes Geschäft sein, die Differentialgleichungen für die Veränderungen der Haupttaxen und die Bewegung dieser beiden Coordinatensysteme aus den in der Dirichlet'schen Abhandlung (§. 1, 1) angegebenen Grundgleichungen für die Bewegung der Flüssigkeitstheilchen abzuleiten.

2.

Offenbar ist es erlaubt, in jenen Gleichungen statt der Derivirten nach den Anfangswerthen der Grössen x, y, z , welche dort durch a, b, c bezeichnet sind, die Derivirten nach den Grössen ξ, η, ζ zu setzen; denn die hierdurch gebildeten Gleichungen lassen sich als Aggregate von jenen darstellen und umgekehrt. Wir erhalten dadurch, wenn wir für $\frac{\partial x}{\partial \xi}, \frac{\partial y}{\partial \eta}, \dots, \frac{\partial z}{\partial \zeta}$ ihre Werthe einsetzen,

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \xi + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \eta + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \zeta &= \varepsilon \frac{\partial V}{\partial x} \xi + \varepsilon \frac{\partial V}{\partial y} \eta + \varepsilon \frac{\partial V}{\partial z} \zeta - \frac{1}{\varrho} \frac{\partial p}{\partial \xi}, \\ \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \xi' + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \eta' + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \zeta' &= \varepsilon \frac{\partial V}{\partial x} \xi' + \varepsilon \frac{\partial V}{\partial y} \eta' + \varepsilon \frac{\partial V}{\partial z} \zeta' - \frac{1}{\varrho} \frac{\partial p}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \xi'' + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \eta'' + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \zeta'' &= \varepsilon \frac{\partial V}{\partial x} \xi'' + \varepsilon \frac{\partial V}{\partial y} \eta'' + \varepsilon \frac{\partial V}{\partial z} \zeta'' - \frac{1}{\varrho} \frac{\partial p}{\partial \zeta},\end{aligned}\tag{1}$$

worin V das Potential, p den Druck im Punkte x, y, z zur Zeit t und ε die Constante bezeichnet, welche die Anziehung zwischen zwei Masseneinheiten in der Entfernungseinheit ausdrückt.

Es handelt sich nun zunächst darum, die Grössen links vom Gleichheitszeichen in die Form linearer Functionen von den Grössen ξ, η, ζ zu setzen, wozu einige Vorbereitungen nöthig sind.

Durch Differentiation der Gleichungen (2) erhält man, wenn man zur Abkürzung

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= p y + q z, & \frac{dy}{dt} &= r x + s z, & \frac{dz}{dt} &= t x + u y \quad \text{setzt,} \\ \frac{d\xi}{dt} &= \frac{d\alpha}{dt} x + \frac{d\beta}{dt} y + \frac{d\gamma}{dt} z, \\ \frac{d\eta}{dt} &= \frac{d\alpha'}{dt} x + \frac{d\beta'}{dt} y + \frac{d\gamma'}{dt} z, \\ \frac{d\zeta}{dt} &= \frac{d\alpha''}{dt} x + \frac{d\beta''}{dt} y + \frac{d\gamma''}{dt} z,\end{aligned}\tag{2}$$

und wenn man hierin x, y, z wieder durch ξ, η, ζ ausdrückt

$$\begin{aligned}\frac{d\xi}{dt} &= (q\beta\gamma + r\beta'\gamma' + s\beta''\gamma'')\xi + (q\gamma\alpha + r\gamma'\alpha' + s\gamma''\alpha'')\eta \\ &\quad + (q\alpha\beta + r\alpha'\beta' + s\alpha''\beta'')\zeta + p',\end{aligned}\tag{3}$$

und ähnliche Gleichungen für $\frac{d\eta}{dt}, \frac{d\zeta}{dt}$.

Nun giebt aber die Differentiation der bekannten Gleichungen $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$, $\alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = 0$, etc.

$$\begin{aligned}
\frac{d\alpha}{dt} &= \alpha'' \frac{d\xi}{dt} + \beta'' \frac{d\eta}{dt} + \gamma'' \frac{d\zeta}{dt}, \\
\frac{d\alpha'}{dt} &= \alpha''' \frac{d\xi}{dt} + \beta''' \frac{d\eta}{dt} + \gamma''' \frac{d\zeta}{dt}, \\
\frac{d\alpha''}{dt} &= \alpha'''' \frac{d\xi}{dt} + \beta'''' \frac{d\eta}{dt} + \gamma'''' \frac{d\zeta}{dt}
\end{aligned} \tag{3}$$

und es wird folglich, wenn man diese letzteren drei Grössen durch p, q, r bezeichnet,

$$\begin{aligned}
\frac{d\xi}{dt} &= r\eta - q\zeta, \\
\frac{d\eta}{dt} &= p\zeta - r\xi, \\
\frac{d\zeta}{dt} &= q\xi - p\eta.
\end{aligned} \tag{4}$$

Durch ein ganz ähnliches Verfahren ergibt sich aus den Gleichungen (2)

$$\xi' \frac{d\xi}{dt} + \eta' \frac{d\eta}{dt} + \zeta' \frac{d\zeta}{dt} = r'\xi - q'\eta, \quad \text{etc.} \tag{5}$$

und aus den Gleichungen Art. 1, (3), wenn p_1, q_1, r_1 die Grössen bezeichnen, welche von den Functionen $\alpha_1, \beta_1, \dots, \gamma_1''$ ebenso abhängen, wie die Grössen p, q, r von den Functionen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$,

$$\frac{1}{a} \frac{da}{dt} = p_1, \quad \frac{1}{b} \frac{db}{dt} = q_1, \quad \frac{1}{c} \frac{dc}{dt} = r_1. \tag{6}$$

Setzt man die Werthe ξ', η', ζ' aus (6) in (4) ein, so erhält man

Was die geometrische Bedeutung dieser Grössen betrifft, so sind, wie leicht ersichtlich ist, ξ', η', ζ' die Geschwindigkeitscomponenten des Punktes x, y, z der flüssigen Masse parallel den Axen ξ, η, ζ ; $\frac{d\xi}{dt}, \frac{d\eta}{dt}, \frac{d\zeta}{dt}$ die ebenso zerlegten relativen Geschwindigkeiten gegen das Coordinatensystem der ξ, η, ζ ; ferner in den Gleichungen (1) die Grössen auf der linken Seite die Beschleunigungen und die auf der rechten die beschleunigenden Kräfte parallel diesen Axen; endlich sind p, q, r die augenblicklichen Rotationen des Coordinatensystems der ξ, η, ζ um seine Axen und p_1, q_1, r_1 haben dieselbe Bedeutung für das Coordinatensystem der ξ_1, η_1, ζ_1 .

3.

Wenn man nun die Werthe der Grössen ξ', η', ζ' aus (7) in die Gleichungen (5) substituirt und mit Hülfe der Gleichungen (6) die Derivirten von $\frac{\xi}{a}, \frac{\eta}{b}, \frac{\zeta}{c}$ wieder durch die Grössen ξ, η, ζ ausdrückt, so nehmen die Grössen auf der linken Seite der Gleichungen (1) die Form linearer Ausdrücke von den Grössen ξ, η, ζ an. Auf der rechten Seite hat V die Form

$$V = H - A\xi^2 - B\eta^2 - C\zeta^2,$$

worin H, A, B, C auf bekannte Weise von den Grössen a, b, c abhängen; und man genügt ihnen daher, wenn an der Oberfläche der Druck den constanten Werth 0 hat, indem man

$$p = \varrho(\Theta - 2\varepsilon(A\xi^2 + B\eta^2 + C\zeta^2))$$

setzt und die zehn Functionen der Zeit $a, b, c; p, q, r; p_1, q_1, r_1$ und Θ so bestimmt, dass die neun Coefficienten der Grössen ξ, η, ζ auf beiden Seiten einander gleich werden und zugleich die aus der Incompressibilität folgende Bedingungsgleichung $abc = a_0b_0c_0$ befriedigt wird.

Durch Gleichsetzung der Coefficienten von $\frac{\xi^2}{a^2}, \frac{\eta^2}{b^2}$ in der ersten und von $\frac{\zeta^2}{c^2}$ in der zweiten Gleichung ergibt sich

$$\begin{aligned}\frac{d^2a}{dt^2} + 2brr_1 + 2cqq_1 - a(r^2 + r_1^2 + q^2 + q_1^2) &= 2\varepsilon aA, \\ \frac{d^2b}{dt^2} + 2cpr_1 + 2app_1 - b(p^2 + p_1^2 + r^2 + r_1^2) &= 2\varepsilon bB, \\ \frac{d^2c}{dt^2} + 2aqp_1 + 2bqq_1 - c(q^2 + q_1^2 + p^2 + p_1^2) &= 2\varepsilon cC.\end{aligned}\tag{a}$$

Aus diesen Gleichungen erhält man die sechs übrigen durch cyclische Versetzung der Axen, oder auch durch beliebige Vertauschungen, wenn man nur dabei beachtet, dass durch Vertauschung zweier Axen nicht bloss die ihnen entsprechenden Grössen vertauscht werden, sondern zugleich die sechs Grössen $p, q, \dots, r_1$ ihr Zeichen ändern.

Man kann diesen Gleichungen eine für die weitere Untersuchung bequemere Form geben, wenn man statt der Grössen p, p_1, q, q_1, r, r_1 ihre halben Summen und Differenzen

$$\frac{p+p_1}{2}, \quad \frac{q+q_1}{2}, \quad \frac{r+r_1}{2}, \quad \frac{p-p_1}{2}, \quad \frac{q-q_1}{2}, \quad \frac{r-r_1}{2}$$

als unbekannte Functionen einführt.

Dadurch wird das System von Gleichungen, welchen die zehn unbekannten Functionen der Zeit genügen müssen

$$\begin{aligned}(b-c)u^2 + (b+c)u'^2 + (a-b)w^2 + (a+b)w'^2 + \dots &= \varepsilon aA, \\ (b-a)w^2 + (b+a)w'^2 + (b-c)u^2 + (b+c)u'^2 + \dots &= \varepsilon bB - \dots, \\ (b-c)\frac{dh}{dt} + 2\frac{db}{dt}\frac{dc}{dt}w + (b+c-2a)vw + (b+c+2a)v'w' &= 0, \\ (b+c)\frac{dh}{dt} + 2\frac{db}{dt}\frac{dc}{dt}w' + (b-c+2a)vw' + (b-c-2a)v'w &= 0, \\ (c-a)\frac{dg}{dt} + 2\frac{dc}{dt}\frac{da}{dt}v + (c+a-2b)wu + (c+a+2b)w'u' &= 0, \\ (c+a)\frac{dg}{dt} + 2\frac{dc}{dt}\frac{da}{dt}v' + (c-a+2b)wu' + (c-a-2b)w'u &= 0, \\ (a-b)\frac{df}{dt} + 2\frac{da}{dt}\frac{db}{dt}w + (a+b-2c)uv + (a+b+2c)u'v' &= 0, \\ (a+b)\frac{df}{dt} + 2\frac{da}{dt}\frac{db}{dt}w' + (a-b+2c)uv' + (a-b-2c)u'v &= 0, \\ abc &= a_0b_0c_0.\end{aligned}$$

Die Werthe von A, B, C ergeben sich aus dem bekannten Ausdrucke für V

$$V = \pi abc \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(1 - \frac{\xi^2}{a^2 + s} - \frac{\eta^2}{b^2 + s} - \frac{\zeta^2}{c^2 + s} \right),\tag{\alpha}$$

worin

$$\Delta = \sqrt{(a^2 + s)(b^2 + s)(c^2 + s)}.$$

Nach ausgeführter Integration dieser Differentialgleichungen hat man noch, um die Functionen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$ zu bestimmen, die allgemeine Lösung $\theta, \theta', \theta''$ der Differentialgleichungen

$$\frac{d\theta}{dt} = -r\theta' + q\theta'', \quad \frac{d\theta'}{dt} = -p\theta'' + r\theta, \quad \frac{d\theta''}{dt} = -q\theta + p\theta' \quad (\beta)$$

zu suchen, — von welchen, wie aus Art. 2, (3) hervorgeht, $\alpha, \alpha', \alpha''; \beta, \beta', \beta''; \gamma, \gamma', \gamma''$ die drei particulären Auflösungen sind, die für $t = 0$ die Werthe 1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1 annehmen, — und zur Bestimmung der Functionen $\alpha_1, \beta_1, \dots, \gamma_1''$ die allgemeine Lösung der simultanen Differentialgleichungen

$$\frac{d\theta}{dt} = -r_1\theta' + q_1\theta'', \quad \frac{d\theta'}{dt} = -p_1\theta'' + r_1\theta, \quad \frac{d\theta''}{dt} = -q_1\theta + p_1\theta'. \quad (\gamma)$$

Es fragt sich nun, welche Hilfsmittel für die Integration dieser Differentialgleichungen (α), (β), (γ) die allgemeinen hydrodynamischen Principien darbieten, aus denen Dirichlet sieben Integrale erster Ordnung der durch die Functionen $l, m, \dots, n''$ zu erfüllenden Differentialgleichungen (§. 1, (α)) schöpfte. Die aus ihnen fließenden Gleichungen lassen sich mit Hülfe der oben für ξ', η', ζ' gegebenen Ausdrücke leicht herleiten.

Der Satz von der Erhaltung der Flächen giebt

$$\begin{aligned} (b-c)fu + (b+c)f'u' &= g = \alpha g^0 + \beta h^0 + \gamma k^0 \\ (c-a)gv + (c+a)g'v' &= h = \alpha' g^0 + \beta' h^0 + \gamma' k^0 \\ (a-b)hw + (a+b)h'w' &= k = \alpha'' g^0 + \beta'' h^0 + \gamma'' k^0, \end{aligned} \quad (1)$$

worin die Constanten g^0, h^0, k^0 , die Anfangswerthe von g, h, k , mit den Constanten G, H, K in der Abhandlung von Dirichlet übereinkommen; er liefert also das aus den sechs letzten Differentialgleichungen (α) leicht zu bestätigende Resultat, dass $\theta = g, \theta' = h, \theta'' = k$ eine Lösung der Differentialgleichungen (β) ist.

Aus dem Helmholtz'schen Princip der Erhaltung der Rotation folgen die Gleichungen

$$\begin{aligned} (b-c)fu - (b+c)f'u' &= g_1 = \alpha_1 g_1^0 + \beta_1 h_1^0 + \gamma_1 k_1^0 \\ (c-a)gv - (c+a)g'v' &= h_1 = \alpha'_1 g_1^0 + \beta'_1 h_1^0 + \gamma'_1 k_1^0 \\ (a-b)hw - (a+b)h'w' &= k_1 = \alpha''_1 g_1^0 + \beta''_1 h_1^0 + \gamma''_1 k_1^0, \end{aligned} \quad (2)$$

in welchen die Constanten g_1^0, h_1^0, k_1^0 den Grössen BC^0, CA^0, AB^0 der genannten Abhandlung gleich sind.

Der Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft endlich giebt ein Integral erster Ordnung der Differentialgleichungen (α)

$$\begin{aligned} \left(\frac{da}{dt}\right)^2 + \left(\frac{db}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dc}{dt}\right)^2 + (b-c)^2 u^2 + (c-a)^2 v^2 + (a-b)^2 w^2 \\ + (b+c)^2 u'^2 + (c+a)^2 v'^2 + (a+b)^2 w'^2 = 2\varepsilon H + \text{const.} \end{aligned} \quad (\text{I})$$

Aus den Gleichungen (1) und (2) folgen zunächst noch zwei Integrale der Gleichungen (α)

$$g^2 + h^2 + k^2 = \text{const.} = C^2, \quad (\text{II})$$

$$g_1^2 + h_1^2 + k_1^2 = \text{const.} = C'^2. \quad (\text{III})$$

Ferner lassen sich von den Gleichungen (β) zwei Integrale

$$\theta^2 + \theta'^2 + \theta''^2 = \text{const.}, \quad (\text{IV})$$

$$\theta g + \theta' h + \theta'' k = \text{const.} \quad (\text{V})$$

angeben, wodurch ihre Integration allgemein auf eine Quadratur zurückgeführt wird. Zur Aufstellung ihrer allgemeinen Lösung ist es jedoch, da sie linear und homogen sind, nur nöthig, noch zwei von der Lösung g, h, k verschiedene particuläre Lösungen zu suchen, für welchen Zweck man die willkürlichen Constanten in diesen beiden Integralgleichungen so wählen kann, dass sich die Rechnung vereinfacht. Giebt man beiden den Werth Null, so hat man

$$\theta' h + \theta'' k = -\theta g, \quad (3)$$

und ferner erhält man, wenn man diese Gleichung quadriert und dazu die Gleichung

$$\theta'^2 + \theta''^2 = -\theta^2$$

multiplicirt mit $h^2 + k^2$, addirt

$$-(\theta' k - \theta'' h)^2 = \theta^2 C^2,$$

folglich

$$\theta' k - \theta'' h = \theta_1 C. \quad (4)$$

Durch Auflösung dieser beiden linearen Gleichungen (3) und (4) findet sich

$$\theta' = \frac{-h\theta + k\theta_1}{C}, \quad (5)$$

$$\theta'' = \frac{-k\theta - h\theta_1}{C}, \quad (6)$$

und durch Einsetzung dieser Werthe in die erste der Gleichungen (β)

$$C \frac{d\theta}{dt} = \frac{-gk + gh}{C} \theta + \frac{rk + gh}{C} \theta_1,$$

$$\log \theta = \frac{1}{2} \log(h^2 + k^2) + \theta_1 \int \frac{rh - gk}{h^2 + k^2} dt + \text{const.} \quad (7)$$

Aus dieser in (5), (6) und (7) enthaltenen Lösung der Differentialgleichungen (β) erhält man eine dritte, indem man für θ_1 überall $-\theta_1$ setzt, und es ist dann leicht aus den gefundenen drei particulären Lösungen die Ausdrücke für die Functionen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$ zu bilden.

Die geometrische Bedeutung jeder reellen Lösung der Differentialgleichungen (β) besteht darin, dass sie, mit einem geeigneten constanten Factor multiplicirt, die Cosinus der Winkel ausdrückt, welche die Axen der ξ, η, ζ zur Zeit t mit einer festen Linie machen. Diese feste Linie wird für die erste der drei eben gefundenen Lösungen durch die Normale auf der unveränderlichen Ebene der ganzen bewegten Masse gebildet, für den reellen und den imaginären Bestandtheil der beiden andern durch zwei in dieser Ebene enthaltene und auf einander senkrechte Linien. Die Cosinus der Winkel zwischen den Axen und jener Normalen sind demnach $\frac{g}{C}, \frac{h}{C}, \frac{k}{C}$; die Lage der Axen gegen diese Normale ergibt sich

also nach Auflösung der Gleichungen (α) ohne weitere Integration und zur vollständigen Bestimmung ihrer Lage genügt eine einzige Quadratur, z. B. die Integration

$$\int \frac{rh - gk}{h^2 + k^2} dt, \quad (\delta)$$

welche die Drehung der durch die Normale und die Axe der ξ gehenden Ebene um die Normale giebt.

Ganz Aehnliches gilt von den Differentialgleichungen (γ). Man kann auf demselben Wege aus den beiden Integralen

$$\theta_1^2 + \theta_1'^2 + \theta_1''^2 = \text{const.}, \quad (\text{VI})$$

$$\theta_1 g_1 + \theta_1' h_1 + \theta_1'' k_1 = \text{const.} \quad (\text{VII})$$

ihre allgemeine Lösung und folglich auch die Werthe der Grössen $\alpha_1, \beta_1, \dots, \gamma_1''$ zur Zeit t ableiten, und es wird dabei nur eine Quadratur erforderlich sein. Es ergibt sich dann schliesslich der Ort eines

beliebigen Flüssigkeitstheilchens zur Zeit t aus den oben (Art. 1, (1) und (4)) für die Grössen x, y, z und die Functionen $l, m, \dots, n''$ gegebenen Ausdrücken.

Wir wollen uns jetzt Rechenschaft darüber geben, was durch die Zurückführung der Differentialgleichungen zwischen den Functionen $l, m, \dots, n$ (der Differentialgleichungen (α) §. 1 bei Dirichlet) auf unsere Differentialgleichungen für das Geschäft der Integration gewonnen ist. Das System der Differentialgleichungen (α) ist von der sechszehnten Ordnung, und man kennt von denselben sieben Integrale erster Ordnung, wodurch es auf ein System der neunten Ordnung zurückgeführt wird. Das System (α) ist nur von der zehnten Ordnung, und man kennt von demselben noch drei Integrale erster Ordnung. Durch die hier bewirkte Umformung jener Differentialgleichungen ist also die Ordnung des noch zu integrierenden Systems von Differentialgleichungen um zwei Einheiten erniedrigt, und man hat statt dessen nur schliesslich noch zwei Quadraturen auszuführen. Diese Umformung leistet also dasselbe, wie die Auffindung von zwei Integralen erster Ordnung.

Wir bemerken indess ausdrücklich, dass hierdurch unsere Form der Differentialgleichungen nur für die Integration und die wirkliche Bestimmung der Bewegung einen Vorzug erhält. Für die allgemeinsten Untersuchungen über diese Bewegung ist dagegen diese Form der Differentialgleichungen weniger geeignet, nicht bloss, weil ihre Herleitung weniger einfach ist, sondern auch deshalb, weil der Fall der Gleichheit zweier Axen eine besondere Betrachtung erfordert. Bei Gleichheit zweier Axen tritt nämlich der besondere Umstand ein, dass die ihnen zu gebende Lage durch die Gestalt der flüssigen Masse nicht völlig bestimmt ist; sie hängt dann im Allgemeinen auch von der augenblicklichen Bewegung ab und bleibt nur dann willkürlich, wenn diese Bewegung so beschaffen ist, dass die Axen fortwährend einander gleich bleiben. Die Untersuchung dieses Falles ist zwar immer leicht und bedarf daher keiner weiteren Ausführung, kann aber in speciellen Fällen noch wieder besondere Formen annehmen, und die allgemeinen Untersuchungen, wie z. B. der allgemeine Nachweis der Möglichkeit der Bewegung (§. 2 bei Dirichlet), würden daher wegen der Menge von besonders zu behandelnden Fällen ziemlich weitläufig werden.

Ehe wir zur Behandlung von speciellen Fällen schreiten, in welchen sich die Differentialgleichungen (α) integrieren lassen, ist es zweckmässig, zu bemerken, dass in einer Lösung dieser Differentialgleichungen, wie unmittelbar aus der Form dieser Gleichungen hervorgeht, jede Zeichenänderung der Functionen $u, v, \dots, w'$ zulässig ist, bei welcher $uv'w', uv'w, uvw', u'v'w$ ungeändert bleiben. Es können also erstens die Zeichen der Functionen u', v, w gleichzeitig geändert werden, und dadurch werden die Grössen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$ mit den

Grössen $\alpha_1, \beta_1, \dots, \gamma_1''$, also in dem Systeme der Grössen $l, m, \dots, n''$ die Horizontalreihen mit den Verticalreihen vertauscht. Zweitens können gleichzeitig zwei der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ mit den entgegengesetzten Zeichen versehen werden, und diese Aenderung lässt sich auf eine Aenderung in dem Zeichen einer Coordinatenaxe zurückführen, wobei die Bewegung in eine ihr symmetrisch gleiche übergeht. In dieser Bemerkung ist der von Dedekind gefundene Reciprocitätssatz enthalten.

6.

Wir wollen nun den Fall untersuchen, in welchem eins der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ fortwährend gleich Null ist, also z. B. $u = u' = 0$; die geometrische Bedeutung dieser Voraussetzung ist diese, dass die Hauptaxe a stets in der unveränderlichen Ebene der ganzen bewegten Masse liegt und die augenblickliche Rotationsaxe auf dieser Hauptaxe senkrecht steht.

Aus den sechs letzten Differentialgleichungen (α) folgt sogleich, dass in diesem Falle die Grössen

$$(b - c)^2 v, \quad (b + c)^2 v', \quad (a - b)^2 w, \quad (a + b)^2 w' \quad (\beta)$$

constant sind und die Gleichungen

$$\begin{aligned} (b + c - 2a)vw + (b + c + 2a)v'w' &= 0, \\ (b - c + 2a)vw' + (b - c - 2a)v'w &= 0 \end{aligned} \quad (\gamma)$$

stattfinden müssen.

Bei der weiteren Untersuchung ist zu unterscheiden, ob noch ein zweites der drei Grössenpaare Null ist oder nicht, und wir können im Allgemeinen nur noch bemerken, dass in Folge der Gleichungen (β) die Grössen h, k, h_1, k_1 constant sind und folglich auch die Winkel zwischen den Hauptaxen und der unveränderlichen Ebene der ganzen bewegten Masse, und dass dann ferner aus den Differentialgleichungen (β) und (γ) die Verhältnissgleichungen

$$g : h : k = p : q : r, \quad g_1 : h_1 : k_1 = p_1 : q_1 : r_1$$

folgen, wodurch die Lösungen dieser Gleichungen sich vereinfachen.

Erster Fall. Nur eins der drei Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ ist gleich Null.

Wenn weder zugleich v und v' , noch zugleich w und w' Null sind, folgt aus den Gleichungen (β) und (γ)

$$\frac{v'^2}{v^2} = \frac{(2a - b - c)(2a + b - c)}{(2a + b + c)(2a - b + c)} = \left(\frac{a - c}{a + c}\right)^2, \quad \text{u. s. w.,}$$

$$\frac{w'^2}{w^2} = \frac{(2a - b - c)(2a - b + c)}{(2a + b + c)(2a + b - c)} = \left(\frac{a - b}{a + b}\right)^2,$$

woraus sich mit Hinzuziehung von

$$abc = \text{const.}$$

ergiebt, dass a, b, c und folglich auch v, v', w, w' constant sind.

Setzen wir nun

$$\begin{aligned} v' &= v \sqrt{\frac{(2a+b+c)(2a-b+c)}{(2a-b-c)(2a+b-c)}} = vS, \\ w' &= w \sqrt{\frac{(2a+b+c)(2a+b-c)}{(2a-b-c)(2a-b+c)}} = wT, \end{aligned} \quad (2)$$

so erhalten wir aus den drei ersten Differentialgleichungen (α) die drei Gleichungen

$$\begin{aligned} (4a^2 - b^2 - 3c^2)S + (4a^2 - 3b^2 - c^2)T &= \frac{\varepsilon A}{a^2} - \frac{\Theta}{a^2}, \\ (c^2 - a^2)S &= \frac{\varepsilon B}{b^2} - \frac{\Theta}{b^2}, \\ (a^2 - b^2)T &= \frac{\varepsilon C}{c^2} - \frac{\Theta}{c^2}. \end{aligned} \quad (3,4)$$

Um hieraus die Werthe von S , T und Θ abzuleiten, bilde man aus den Gleichungen (4) die Gleichungen

$$\int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta(b^2 + s)(c^2 + s)}, \quad \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta(c^2 + s)(a^2 + s)},$$

und substituirt diese Werthe in der Gleichung (3)

$$(4a^2 - b^2 - c^2)(T + S) - 2(b^2T + c^2S) = \frac{\varepsilon A}{a^2} - \frac{\Theta}{a^2},$$

wodurch man

$$\frac{\varepsilon B - \Theta}{2a^2b^2c^2} = \frac{\varepsilon}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(\frac{2s + 4a^2 - b^2 - c^2}{(b^2 + s)(c^2 + s)} + \frac{1}{a^2 + s} \right) \quad (5)$$

erhält, wenn zur Abkürzung

$$4a^4 - a^2(b^2 + c^2) + b^2c^2 = D \quad (6)$$

gesetzt wird.

Durch Einsetzung des Werthes von Θ in die Gleichungen (4) findet sich dann

$$\begin{aligned} S &= \frac{\varepsilon b^2 c^2}{D} \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta(b^2 + s)} \left(\frac{4a^2 - c^2 + b^2}{c^2 + s} - \frac{b^2}{a^2 + s} \right), \\ T &= \frac{\varepsilon b^2 c^2}{D} \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta(c^2 + s)} \left(\frac{4a^2 - b^2 + c^2}{b^2 + s} - \frac{c^2}{a^2 + s} \right). \end{aligned} \quad (7,8)$$

Es bleibt nun noch zu untersuchen, welchen Bedingungen a , b , c genügen müssen, damit sich aus den Gleichungen (7) und (8) und den Gleichungen (2) für v , v' , w , w' reelle Werthe ergeben.

Damit $\left(\frac{v'}{v}\right)^2$ und $\left(\frac{w'}{w}\right)^2$ nicht negativ werden, ist es nothwendig und hinreichend, dass die Grösse

$$(4a^2 - (b+c)^2)(4a^2 - (b-c)^2) \geq 0$$

sei. Es muss also a^2 entweder $\geq \left(\frac{b+c}{2}\right)^2$ oder $\leq \left(\frac{b-c}{2}\right)^2$ sein.

Wenn $a > \frac{b+c}{2}$, müssen die Grössen S und T beide > 0 sein, damit die Gleichungen (2) für v , v' , w , w' reelle Werthe liefern. Man kann nun aber leicht zeigen, dass, wenn

$a^2 > \frac{(b+c)^2}{4}$, D und die beiden Integrale auf der rechten Seite der Gleichungen (7) und (8) immer positiv sind. Man hat dazu nur nöthig, D in die Form zu setzen

$$a^2(4a^2 - (b+c)^2) + bc(2a^2 + bc)$$

und das in (7) enthaltene Integral in die Form

$$\int_0^\infty \frac{s ds}{\Delta(c^2 + s)} ((4a^2 - c^2)s + a^2(4a^2 + b^2 - c^2) - b^2c^2),$$

und dann zu bemerken, dass aus $a \geq \frac{b+c}{2}$ die folgenden Ungleichheiten fließen: $4a^2 - (b+c)^2 \geq 0$, $4a^2 - c^2 > 0$, ferner

$$4a^2 + b^2 - c^2 \geq (b+c)^2 + b^2 - c^2 = 2b(b+c),$$

und folglich

$$a^2(4a^2 + b^2 - c^2) \geq 2b(b+c)a^2 \geq \frac{1}{2}b(b+c)^3 > b^2c^2.$$

Aus diesen Ungleichheiten folgt, dass sowohl D , als das betrachtete Integral nur positive Bestandtheile hat, und dasselbe gilt auch von dem Integral auf der rechten Seite der Gleichung (8), welches aus diesem durch Vertauschung von b und c erhalten wird. Lassen wir

nun a die Werthe von $\frac{b+c}{2}$ bis ∞ durchlaufen, so wird, wenn $b > c$, T immer positiv bleiben, S aber nur so lange $a < b$. Die Bedingungen für diesen Fall sind also, wenn b die grössere der beiden Axen b und c bezeichnet,

$$(I) \quad \frac{b+c}{2} \leq a \leq b.$$

Für die Untersuchung des zweiten Falles, wenn $a^2 \leq \left(\frac{b-c}{2}\right)^2$, wollen wir annehmen, dass b die grössere der beiden Axen b und c sei, so dass $a \leq \frac{b-c}{2}$. Es muss dann, damit v , v' , w , w' reell werden, $S \geq 0$ und $T \geq 0$ sein. Da aus den Ungleichheiten

$$b^2 > (2a+c)^2 > 4a^2 + c^2$$

hervorgeht, dass das Integral auf der rechten Seite der Gleichung (8) in unserm Falle stets negativ ist, so wird die letztere Bedingung $T \geq 0$ nur erfüllt werden, wenn $D(c^2 - a^2) \geq 0$, also c^2 entweder $< \frac{D}{\dots}$ oder $> a^2$ ist. Dieser Fall spaltet sich also wieder in zwei Fälle, und diese sind, da $\frac{D}{\dots} < a^2 < c^2$ durch einen endlichen Zwischenraum getrennt, so dass von einem zum andern kein stetiger Uebergang stattfindet. Da das Integral in der Gleichung (7), so lange $c^2 < a^2$ ist, wegen der beiden Ungleichheiten $c^2 + s < a^2 + s$, $4a^2 - c^2 + b^2 > b^2$ nur positiv sein kann, so reduciren sich die zu erfüllenden Bedingungen im ersten dieser Fälle auf $a \leq \frac{b-c}{2}$ oder

$$(II) \quad c \leq b - 2a \quad \text{und} \quad c < \sqrt{a^2 + \sqrt{D}}$$

und im zweiten auf

$$(III) \quad a < \frac{b-c}{2} \quad \text{und} \quad \int_0^\infty \frac{s ds}{\Delta(b^2 + s)} \left(\frac{4a^2 - c^2 + b^2}{c^2 + s} - \frac{b^2}{a^2 + s} \right) < 0.$$

Es ist leicht zu sehen, dass das Integral auf der linken Seite der letzten Ungleichheit, wenn a die Werthe von 0 bis c durchläuft, negativ bleibt, so lange $a \leq \frac{c}{2}$ ist, während

es für $a = c$ einen positiven Werth annimmt; die genaue Bestimmung der Grenzen aber, innerhalb welcher diese Ungleichheit erfüllt ist, hängt, wie man sieht, von der Auflösung einer transcendenten Gleichung ab.

In Bezug auf das Zeichen von Θ , welches bekanntlich entscheidet, ob die Bewegung ohne äussern Druck möglich ist, können wir bemerken, dass sich der oben gefundene Werth dieser Grösse in die Form

$$\Theta = \varepsilon \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \frac{3s^3 + 6a^2s^2 + D}{s + a^2}$$

setzen lässt, und also in den Fällen I und III, wo $D > 0$, jedenfalls positiv ist, für einen negativen Werth von D aber, wenigstens so lange dieser Werth absolut genommen unter einer gewissen Grenze liegt, negativ wird.

7.

Zweiter Fall. Zwei der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ sind gleich Null.

Wir haben nun noch den Fall zu behandeln, wenn zwei der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ fortwährend Null sind, und also nur um eine Hauptaxe eine Rotation stattfindet.

Wenn ausser u und u' auch v und v' fortwährend Null sind, so reduciren sich die Gleichungen (β) und (γ) auf

$$(a - b)^2 w = \text{const.} = \varkappa, \quad (a + b)^2 w' = \text{const.} = \varkappa'$$

und die ersten drei Differentialgleichungen (α) liefern daher die Gleichungen

$$\begin{aligned} \frac{\varkappa^2}{(a - b)^4} + \frac{\varkappa'^2}{(a + b)^4} + \frac{d^2 a}{dt^2} &= \frac{2\varepsilon a A - \Theta}{a}, \\ \frac{\varkappa^2}{(b - a)^4} + \frac{\varkappa'^2}{(b + a)^4} + \frac{d^2 b}{dt^2} &= \frac{2\varepsilon b B - \Theta}{b}, \\ \frac{d^2 c}{dt^2} &= \frac{2\varepsilon c C - \Theta}{c}, \end{aligned} \tag{1}$$

welche verbunden mit

$$abc = a_0 b_0 c_0$$

die Grössen a, b, c und Θ als Functionen der Zeit bestimmen. Das Princip der Erhaltung der lebendigen Kraft giebt für diese Differentialgleichungen das Integral erster Ordnung

$$\left(\frac{da}{dt}\right)^2 + \left(\frac{db}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dc}{dt}\right)^2 = 2\varepsilon H + \text{const.},$$

woraus unmittelbar hervorgeht, dass wenn $\varkappa$ nicht Null ist, die Hauptaxen a und b nie einander gleich werden können.

Ausser den schon von Mac Laurin und Dirichlet untersuchten Fällen, wenn $a = b$, lässt noch der Fall, wenn die Grössen a, b, c constant sind, eine Bestimmung der Bewegung in geschlossenen Ausdrücken zu. In diesem Falle erhält man aus (1) durch Elimination von Θ die beiden Gleichungen

$$\begin{aligned}
\frac{\varkappa^2}{(a-b)^4} - \frac{\varkappa'^2}{(b+a)^4} &= \frac{2\varepsilon(A-B)}{a^2-b^2} \\
&= 2\varepsilon abc \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta} \frac{(b^2-c^2)s}{(a^2+s)(b^2+s)}, \\
\frac{\varkappa^2}{(b+a)^4} + \frac{\varkappa'^2}{(b-a)^4} &= \frac{2\varepsilon B}{b} - \frac{2\varepsilon C}{c} \\
&= 2\varepsilon abc \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta} \frac{(a^2-c^2)s}{(b^2+s)(c^2+s)},
\end{aligned} \tag{3}$$

worin die Integrale auf der rechten Seite durch K und L bezeichnet werden mögen; sie lassen sich auch in die Form setzen

$$\begin{aligned}
\frac{\varkappa^2}{(a+b)^4} - \frac{\varkappa'^2}{(b-a)^4} &= K = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(\frac{s-ab}{(a^2+s)(b^2+s)} + \frac{1}{ab(c^2+s)} \right), \\
\frac{\varkappa^2}{(b-a)^4} &= L = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(\frac{s+ab}{(a^2+s)(b^2+s)} - \frac{1}{ab(c^2+s)} \right).
\end{aligned} \tag{5}$$

Nehmen wir an, dass b , wie in den früher betrachteten Fällen, die grössere der beiden Axen a und b bezeichne, so liefern diese beiden Gleichungen dann und auch nur dann für $\varkappa^2$ und $\varkappa'^2$ positive Werthe, wenn K positiv und abgesehen vom Zeichen grösser als L ist; und es ist klar, dass die erste Bedingung erfüllt ist, so lange $c < b$. Der zweiten Bedingung wird genügt, wenn $c = a$, also $\varkappa = 0$ ist, und folglich auch, da K und L sich mit c stetig ändern, innerhalb eines endlichen Gebiets zu beiden Seiten dieses Werthes. Dieses erstreckt sich aber nicht bis zu den Werthen b und 0 ; denn für $c = b$ würde $\varkappa'^2$ negativ werden, für ein unendlich kleines c aber $\varkappa^2$, da dann

$$K = \frac{1}{2ab} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \frac{s-ab}{a^2+s}, \quad L = \frac{1}{2ab} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \frac{s+ab}{b^2+s}$$

und folglich $L > K$ wird. Wächst b , während a und c endlich bleiben, in's Unendliche, so kann L nur dann kleiner als K bleiben, wenn zugleich $a^2 - c^2$ in's Unendliche abnimmt; beide Grenzen für c sind also dann nur unendlich wenig von a verschieden. Wenn dagegen b seiner unteren Grenze a unendlich nahe kommt, so convergirt die obere Grenze für c , wo $\varkappa'^2 = 0$ wird, gegen a , die untere Grenze aber gegen einen Werth, für welchen das Integral auf der rechten Seite von (5) verschwindet. Zur Bestimmung dieses Werthes erhält man, wenn man $\frac{c}{a} = \sin \psi$ setzt, die Gleichung

$$(-5 + 2 \cos 2\psi) + \cos 4\psi)(\pi - 2\psi) + 10 \sin 2\psi + 2 \sin 4\psi = 0,$$

und diese hat zwischen $\psi = 0$ und $\psi = \frac{\pi}{2}$ nur eine Wurzel, welche

$$\psi = 0,303327 \dots$$

giebt. Für $b = a$ kann freilich c jeden Werth zwischen 0 und b annehmen, da dann $\varkappa^2$ wegen des Factors $b - a$ immer Null wird. Man erhält dann den von Mac Laurin untersuchten Fall, während sich für $\varkappa^2 = \varkappa'^2$ die beiden von Jacobi und Dedekind gefundenen Fälle ergeben.

Der eben behandelte Fall fällt für $b = a$ mit dem Falle (I) des vorigen Artikels zusammen und, wenn

$$\frac{w^2}{(b+c+2a)(b-c+2a)} = \frac{w'^2}{(b+c-2a)(b-c-2a)},$$

mit dem Falle (III). Von den bisher gefundenen vier Fällen, in denen das flüssige Ellipsoid während der Bewegung seine Form nicht ändert, hängen also diese drei Fälle stetig unter einander zusammen, während der Fall (II) isolirt bleibt.

8.

Die Untersuchung, ob ausser diesen vier Fällen noch andere vorhanden sind, in denen die Hauptaxen während der Bewegung constant bleiben, führt auf eine ziemlich weitläufige Rechnung, welche wir nur kurz andeuten wollen, da sie nur ein negatives Resultat liefert.

Aus der Voraussetzung, dass a, b, c constant sind, kann man zunächst leicht folgern, dass Θ constant ist, indem man die drei ersten Differentialgleichungen (α), multiplicirt mit a, b, c , zu einander addirt und dann die Integralgleichung I, Art. 4, also den Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft, benutzt.

Durch Differentiation dieser drei Gleichungen erhält man dann ferner, wenn man die Werthe von $\frac{du}{dt}, \frac{dv}{dt}, \dots, \frac{dw'}{dt}$ aus den sechs letzten Differentialgleichungen (α) einsetzt, die drei Gleichungen

$$\begin{aligned} (b-c)u(vw - v'w') + (b+c)u'(v'w - vw') &= 0 \\ (c-a)v(wu - w'u') + (c+a)v'(w'u - wu') &= 0 \\ (a-b)w(uv - u'v') + (a+b)w'(uv' - u'v) &= 0, \end{aligned} \tag{1}$$

von denen eine eine Folge der übrigen ist.

I. Wenn nun keine von den sechs Grössen $u, u', \dots, w'$ Null ist, folgt aus diesen Gleichungen die Gleichheit der folgenden drei Grössenpaare, deren Werthe wir durch $2a', 2b', 2c'$ bezeichnen wollen:

$$\begin{aligned} (b-c)u + (b+c)u' &= (c-a)v + (c+a)v' = (a-b)w + (a+b)w' = 2a' \\ (b-c)u - (b+c)u' &= (c-a)v - (c+a)v' = (a-b)w - (a+b)w' = 2b' \\ &= 2c'. \end{aligned} \tag{2}$$

Es ergibt sich dann $a'^2 - b'^2 = a^2 - b^2, b'^2 - c'^2 = b^2 - c^2$, so dass wir

$$aa' - aa = bb' - b'b = cc' - c'c = \delta$$

setzen können, und aus den drei ersten Differentialgleichungen (α)

$$2a'd' = \text{const.}, \quad 2b'b' = \text{const.}, \quad 2c'c' = \text{const.},$$

wenn wir $vv' + ww', ww' + uu', uu' + vv'$ zur Abkürzung durch $\pi, \varkappa, \varrho$ bezeichnen. Aus diesen Gleichungen und der aus den Integralgleichungen II und III leicht herzuleitenden Gleichung

$$(a^2 - b^2)(a'^2 - c'^2)\pi + (b^2 - a^2)(b'^2 - c'^2)\varkappa + (c^2 - a^2)(c'^2 - b'^2)\varrho$$

folgt, wenn nicht $a = b = c$, dass δ und folglich $u, u', \dots, w'$ constant sein müssen. Es ergibt sich aber leicht, dass dann die sechs letzten Differentialgleichungen (α) nicht erfüllt werden können; und hierdurch ist, wenn nicht alle drei Axen einander gleich sind, die Unzulässigkeit der Annahme, dass $u, u', \dots, w'$ sämmtlich von Null verschieden sind, erwiesen.

Die Annahme $a = b = c$ würde auf den Fall einer ruhenden Kugel führen; u', v', w' ergeben sich $= 0$, u, v, w aber bleiben ganz willkürlich, was davon herrührt, dass die

Riemann — Gesammelte Mathematische Werke

(Seiten 201–250 des vorliegenden Bandes)

Index

X. Ein Beitrag zu den Untersuchungen über die Bewegung eines flüssigen gleichartigen Ellipsoides	2
Art. 2	2
Art. 3	5
Art. 4	7
Art. 5	9
Art. 6	10
Art. 7	13
Art. 8	15
Art. 9	17
XI. Ueber das Verschwinden der Theta-Functionen	18
Art. 1	18
Art. 2	19
Art. 3	20
Art. 4	22
Art. 5	24
XII. Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe	28
Art. 1 (Geschichte)	28
Art. 2 (Geschichte, Forts.)	32

X. Ein Beitrag zu den Untersuchungen über die Bewegung eines flüssigen gleichartigen Ellipsoides.

2.

Die Grundgleichungen der Bewegung lauten:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \alpha + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \beta + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \gamma &= \varepsilon \frac{\partial V}{\partial \xi} - \frac{\partial P}{\partial \xi}, \\ \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \alpha' + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \beta' + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \gamma' &= \varepsilon \frac{\partial V}{\partial \eta} - \frac{\partial P}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \alpha'' + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \beta'' + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \gamma'' &= \varepsilon \frac{\partial V}{\partial \zeta} - \frac{\partial P}{\partial \zeta},\end{aligned}\tag{1}$$

worin V das Potential, P den Druck im Punkte x, y, z zur Zeit t und ε die Constante bezeichnet, welche die Anziehung zwischen zwei Masseneinheiten in der Entfernungseinheit ausdrückt.

Es handelt sich nun zunächst darum, die Grössen links vom Gleichheitszeichen in die Form linearer Functionen von den Grössen ξ, η, ζ zu setzen, wozu einige Vorbereitungen nöthig sind.

Durch Differentiation der Gleichungen (2) erhält man, wenn man zur Abkürzung

$$\begin{aligned}\frac{\partial x}{\partial t} \alpha + \frac{\partial y}{\partial t} \beta + \frac{\partial z}{\partial t} \gamma &= \xi', \\ \frac{\partial x}{\partial t} \alpha' + \frac{\partial y}{\partial t} \beta' + \frac{\partial z}{\partial t} \gamma' &= \eta', \\ \frac{\partial x}{\partial t} \alpha'' + \frac{\partial y}{\partial t} \beta'' + \frac{\partial z}{\partial t} \gamma'' &= \zeta'\end{aligned}\tag{2}$$

setzt,

$$\begin{aligned}\frac{\partial \xi}{\partial t} &= \frac{d\alpha}{dt} x + \frac{d\beta}{dt} y + \frac{d\gamma}{dt} z + \xi', \\ \frac{\partial \eta}{\partial t} &= \frac{d\alpha'}{dt} x + \frac{d\beta'}{dt} y + \frac{d\gamma'}{dt} z + \eta', \\ \frac{\partial \zeta}{\partial t} &= \frac{d\alpha''}{dt} x + \frac{d\beta''}{dt} y + \frac{d\gamma''}{dt} z + \zeta',\end{aligned}$$

und wenn man hierin x, y, z wieder durch ξ, η, ζ ausdrückt

$$\begin{aligned}\frac{\partial \xi}{\partial t} &= \left(\frac{d\alpha}{dt} \alpha + \frac{d\beta}{dt} \beta + \frac{d\gamma}{dt} \gamma \right) \xi + \left(\frac{d\alpha}{dt} \alpha' + \frac{d\beta}{dt} \beta' + \frac{d\gamma}{dt} \gamma' \right) \eta \\ &\quad + \left(\frac{d\alpha}{dt} \alpha'' + \frac{d\beta}{dt} \beta'' + \frac{d\gamma}{dt} \gamma'' \right) \zeta + \xi'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \eta}{\partial t} &= \left(\frac{d\alpha'}{dt} \alpha + \frac{d\beta'}{dt} \beta + \frac{d\gamma'}{dt} \gamma \right) \xi + \left(\frac{d\alpha'}{dt} \alpha' + \frac{d\beta'}{dt} \beta' + \frac{d\gamma'}{dt} \gamma' \right) \eta \\ &\quad + \left(\frac{d\alpha'}{dt} \alpha'' + \frac{d\beta'}{dt} \beta'' + \frac{d\gamma'}{dt} \gamma'' \right) \zeta + \eta'\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \zeta}{\partial t} = & \left(\frac{d\alpha''}{dt} \alpha + \frac{d\beta''}{dt} \beta + \frac{d\gamma''}{dt} \gamma \right) \xi + \left(\frac{d\alpha''}{dt} \alpha' + \frac{d\beta''}{dt} \beta' + \frac{d\gamma''}{dt} \gamma' \right) \eta \\ & + \left(\frac{d\alpha''}{dt} \alpha'' + \frac{d\beta''}{dt} \beta'' + \frac{d\gamma''}{dt} \gamma'' \right) \zeta + \zeta'. \end{aligned}$$

Nun giebt aber die Differentiation der bekannten Gleichungen

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1, \quad \alpha\alpha' + \beta\beta' + \gamma\gamma' = 0, \text{ etc.}$$

$$\begin{aligned}
 \alpha \frac{d\alpha}{dt} + \beta \frac{d\beta}{dt} + \gamma \frac{d\gamma}{dt} &= 0, & \alpha' \frac{d\alpha'}{dt} + \beta' \frac{d\beta'}{dt} + \gamma' \frac{d\gamma'}{dt} &= 0, \\
 \alpha'' \frac{d\alpha''}{dt} + \beta'' \frac{d\beta''}{dt} + \gamma'' \frac{d\gamma''}{dt} &= 0 \\
 \frac{d\alpha'}{dt} \alpha'' + \frac{d\beta'}{dt} \beta'' + \frac{d\gamma'}{dt} \gamma'' &= - \left(\frac{d\alpha''}{dt} \alpha' + \frac{d\beta''}{dt} \beta' + \frac{d\gamma''}{dt} \gamma' \right) \\
 \frac{d\alpha''}{dt} \alpha + \frac{d\beta''}{dt} \beta + \frac{d\gamma''}{dt} \gamma &= - \left(\frac{d\alpha}{dt} \alpha'' + \frac{d\beta}{dt} \beta'' + \frac{d\gamma}{dt} \gamma'' \right) \\
 \frac{d\alpha}{dt} \alpha' + \frac{d\beta}{dt} \beta' + \frac{d\gamma}{dt} \gamma' &= - \left(\frac{d\alpha'}{dt} \alpha + \frac{d\beta'}{dt} \beta + \frac{d\gamma'}{dt} \gamma \right)
 \end{aligned} \tag{3}$$

und es wird folglich, wenn man diese letzteren drei Grössen durch p, q, r bezeichnet,

$$\begin{aligned}
 \xi' &= \frac{\partial \xi}{\partial t} - r\eta + q\zeta, \\
 \eta' &= r\xi + \frac{\partial \eta}{\partial t} - p\zeta, \\
 \zeta' &= -q\xi + p\eta + \frac{\partial \zeta}{\partial t}.
 \end{aligned} \tag{4}$$

Durch ein ganz ähnliches Verfahren ergibt sich aus den Gleichungen (2)

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \alpha + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \beta + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \gamma &= \frac{\partial \xi'}{\partial t} - r\eta' + q\zeta', \\
 \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \alpha' + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \beta' + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \gamma' &= r\xi' + \frac{\partial \eta'}{\partial t} - p\zeta', \\
 \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} \alpha'' + \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \beta'' + \frac{\partial^2 z}{\partial t^2} \gamma'' &= -q\xi' + p\eta' + \frac{\partial \zeta'}{\partial t},
 \end{aligned} \tag{5}$$

und aus den Gleichungen Art. 1, (3), wenn p_i, q_i, r_i die Grössen bezeichnen, welche von den Functionen $\alpha_i, \beta_i, \dots, \gamma_i''$ ebenso abhängen, wie die Grössen p, q, r von den Functionen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial \xi}{\partial t} &= r_i \frac{\eta}{b} - q_i \frac{\zeta}{c}, \\
 \frac{\partial \eta}{\partial t} &= p_i \frac{\zeta}{c} - r_i \frac{\xi}{a}, \\
 \frac{\partial \zeta}{\partial t} &= q_i \frac{\xi}{a} - p_i \frac{\eta}{b}.
 \end{aligned} \tag{6}$$

Setzt man die Werthe $\frac{\partial \xi}{\partial t}, \frac{\partial \eta}{\partial t}, \frac{\partial \zeta}{\partial t}$ aus (6) in (4) ein, so erhält man

$$\begin{aligned}
 \xi' &= \frac{da}{dt} \frac{\xi}{a} + (ar_i - br) \frac{\eta}{b} + (cq - aq_i) \frac{\zeta}{c}, \\
 \eta' &= (ar_i - br_i) \frac{\xi}{a} + \frac{db}{dt} \frac{\eta}{b} + (bp_i - cp) \frac{\zeta}{c}, \\
 \zeta' &= (cq_i - aq) \frac{\xi}{a} + (bp - cp_i) \frac{\eta}{b} + \frac{dc}{dt} \frac{\zeta}{c}.
 \end{aligned} \tag{7}$$

Was die geometrische Bedeutung dieser Grössen betrifft, so sind, wie leicht ersichtlich ist, ξ', η', ζ' die Geschwindigkeitscomponenten des Punktes x, y, z der flüssigen Masse parallel den Axen ξ, η, ζ ; $\frac{\partial \xi}{\partial t}, \frac{\partial \eta}{\partial t}, \frac{\partial \zeta}{\partial t}$ die ebenso zerlegten relativen Geschwindigkeiten gegen das Coordinatensystem der ξ, η, ζ ; ferner in den Gleichungen (1) die Grössen auf der linken Seite die Beschleunigungen und die auf der rechten die beschleunigenden Kräfte parallel diesen Axen; endlich sind p, q, r die augenblicklichen Rotationen des Coordinatensystems der ξ, η, ζ um seine Axen und $p_\iota, q_\iota, r_\iota$ haben dieselbe Bedeutung für das Coordinatensystem der $\xi_\iota, \eta_\iota, \zeta_\iota$.

3.

Wenn man nun die Werthe der Grössen ξ', η', ζ' aus (7) in die Gleichungen (5) substituirt und mit Hülfe der Gleichungen (6) die Derivirten von $\frac{\xi}{a}, \frac{\eta}{b}, \frac{\zeta}{c}$ wieder durch die Grössen ξ, η, ζ ausdrückt, so nehmen die Grössen auf der linken Seite der Gleichungen (1) die Form linearer Ausdrücke von den Grössen ξ, η, ζ an. Auf der rechten Seite hat V die Form

$$H - A\xi^2 - B\eta^2 - C\zeta^2,$$

worin H, A, B, C auf bekannte Weise von den Grössen a, b, c abhängen; und man genügt ihnen daher, wenn an der Oberfläche der Druck den constanten Werth Q hat, indem man

$$P = Q + \sigma \left(1 - \frac{\xi^2}{a^2} - \frac{\eta^2}{b^2} - \frac{\zeta^2}{c^2} \right)$$

setzt und die zehn Functionen der Zeit $a, b, c; p, q, r; p_\iota, q_\iota, r_\iota$ und σ so bestimmt, dass die neun Coefficienten der Grössen ξ, η, ζ auf beiden Seiten einander gleich werden und zugleich die aus der Incompressibilität folgende Bedingungsgleichung $abc = a_0b_0c_0$ befriedigt wird.

Durch Gleichsetzung der Coefficienten von $\frac{\xi}{a}$, $\frac{\eta}{b}$ in der ersten und von $\frac{\xi}{a}$ in der zweiten Gleichung ergibt sich

$$\begin{aligned} \frac{d^2 a}{dt^2} + 2brr_i + 2cqql_i - a(r^2 + r_i^2 + q^2 + q_i^2) &= 2\frac{\sigma}{a} - 2\varepsilon aA, \\ a\frac{dr}{dt} - b\frac{dr_i}{dt} + 2\frac{da}{dt}r - 2\frac{db}{dt}r_i + ap_iq + bp_iq_i - 2cpq_i &= 0, \\ a\frac{dr_i}{dt} - b\frac{dr}{dt} + 2\frac{da}{dt}r_i - 2\frac{db}{dt}r + ap_iq_i + bpq - 2cp_iq &= 0. \end{aligned}$$

Aus diesen Gleichungen erhält man die sechs übrigen durch cyclische Versetzung der Axen, oder auch durch beliebige Vertauschungen, wenn man nur dabei beachtet, dass durch Vertauschung zweier Axen nicht bloss die ihnen entsprechenden Grössen vertauscht werden, sondern zugleich die sechs Grössen $p, q, \dots, r_i$ ihr Zeichen ändern.

Man kann diesen Gleichungen eine für die weitere Untersuchung bequemere Form geben, wenn man statt der Grössen $p, p_i; q, q_i; r, r_i$ ihre halben Summen und Differenzen

$$\begin{aligned} u &= \frac{p + p_i}{2}, & v &= \frac{q + q_i}{2}, & w &= \frac{r + r_i}{2}, \\ u' &= \frac{p - p_i}{2}, & v' &= \frac{q - q_i}{2}, & w' &= \frac{r - r_i}{2} \end{aligned}$$

als unbekannte Functionen einführt.

Dadurch wird das System von Gleichungen, welchen die zehn unbekannten Functionen der Zeit genügen müssen:

$$\left\{ \begin{aligned} (a - c)v^2 + (a + c)v'^2 + (a - b)w^2 + (a + b)w'^2 - \frac{1}{2}\frac{d^2 a}{dt^2} &= \varepsilon aA - \frac{\sigma}{a} \\ (b - a)w^2 + (b + a)w'^2 + (b - c)u^2 + (b + c)u'^2 - \frac{1}{2}\frac{d^2 b}{dt^2} &= \varepsilon bB - \frac{\sigma}{b} \\ (c - b)u^2 + (c + b)u'^2 + (c - a)v^2 + (c + a)v'^2 - \frac{1}{2}\frac{d^2 c}{dt^2} &= \varepsilon cC - \frac{\sigma}{c} \\ (b - c)\frac{du}{dt} + 2\frac{d(b - c)}{dt}u + (b + c - 2a)vw + (b + c + 2a)v'w' &= 0 \\ (b + c)\frac{du'}{dt} + 2\frac{d(b + c)}{dt}u' + (b - c + 2a)vw' + (b - c - 2a)v'w &= 0 \\ (c - a)\frac{dv}{dt} + 2\frac{d(c - a)}{dt}v + (c + a - 2b)wu + (c + a + 2b)w'u' &= 0 \\ (c + a)\frac{dv'}{dt} + 2\frac{d(c + a)}{dt}v' + (c - a + 2b)wu' + (c - a - 2b)w'u &= 0 \\ (a - b)\frac{dw}{dt} + 2\frac{d(a - b)}{dt}w + (a + b - 2c)uv + (a + b + 2c)u'v' &= 0 \\ (a + b)\frac{dw'}{dt} + 2\frac{d(a + b)}{dt}w' + (a - b + 2c)uv' + (a - b - 2c)u'v &= 0 \\ abc &= a_0b_0c_0. \end{aligned} \right. \quad (\alpha)$$

Die Werthe von A, B, C ergeben sich aus dem bekannten Ausdrücke für V

$$V = H - A\xi^2 - B\eta^2 - C\zeta^2 = \pi \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(1 - \frac{\xi^2}{a^2 + s} - \frac{\eta^2}{b^2 + s} - \frac{\zeta^2}{c^2 + s} \right),$$

worin

$$\Delta = \sqrt{\left(1 + \frac{s}{a^2}\right)\left(1 + \frac{s}{b^2}\right)\left(1 + \frac{s}{c^2}\right)}.$$

Nach ausgeführter Integration dieser Differentialgleichungen hat man noch, um die Functionen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$ zu bestimmen, die allgemeine Lösung $\theta, \theta', \theta''$ der Differentialgleichungen

$$\frac{d\theta}{dt} = r\theta' - q\theta'', \quad \frac{d\theta'}{dt} = -r\theta + p\theta'', \quad \frac{d\theta''}{dt} = q\theta - p\theta' \quad (\beta)$$

zu suchen, — von welchen, wie aus Art. 2, (3) hervorgeht, $\alpha, \alpha', \alpha''; \beta, \beta', \beta''; \gamma, \gamma', \gamma''$ die drei particularen Auflösungen sind, die für $t = 0$ die Werthe 1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1 annehmen, — und zur Bestimmung der Functionen $\alpha_t, \beta_t, \dots, \gamma_t''$ die allgemeine Lösung der simultanen Differentialgleichungen

$$\frac{d\theta_t}{dt} = r_t\theta'_t - q_t\theta''_t, \quad \frac{d\theta'_t}{dt} = -r_t\theta_t + p_t\theta''_t, \quad \frac{d\theta''_t}{dt} = q_t\theta_t - p_t\theta'_t. \quad (\gamma)$$

4.

Es fragt sich nun, welche Hülfsmittel für die Integration dieser Differentialgleichungen (α), (β), (γ) die allgemeinen hydrodynamischen Principien darbieten, aus denen Dirichlet sieben Integrale erster Ordnung der durch die Functionen $l, m, \dots, n''$ zu erfüllenden Differentialgleichungen (§. 1. (a)) schöpfte. Die aus ihnen fliessenden Gleichungen lassen sich mit Hülfe der oben für ξ', η', ζ' gegebenen Ausdrücke leicht herleiten.

Der Satz von der Erhaltung der Flächen giebt

$$\begin{aligned} (b-c)^2u + (b+c)^2u' &= g = \alpha g^0 + \beta h^0 + \gamma k^0, \\ (c-a)^2v + (c+a)^2v' &= h = \alpha' g^0 + \beta' h^0 + \gamma' k^0, \\ (a-b)^2w + (a+b)^2w' &= k = \alpha'' g^0 + \beta'' h^0 + \gamma'' k^0, \end{aligned} \quad (1)$$

worin die Constanten g^0, h^0, k^0 , die Anfangswerthe von g, h, k , mit den Constanten $\mathfrak{K}, \mathfrak{K}', \mathfrak{K}''$ in der Abhandlung von Dirichlet übereinkommen; er liefert also das aus den sechs letzten Differentialgleichungen (α) leicht zu bestätigende Resultat, dass $\theta = g, \theta' = h, \theta'' = k$ eine Lösung der Differentialgleichungen (β) ist.

Aus dem Helmholtz'schen Princip der Erhaltung der Rotation folgen die Gleichungen

$$\begin{aligned} (b-c)^2u - (b+c)^2u' &= g_t = \alpha_t g_t^0 + \beta_t h_t^0 + \gamma_t k_t^0, \\ (c-a)^2v - (c+a)^2v' &= h_t = \alpha'_t g_t^0 + \beta'_t h_t^0 + \gamma'_t k_t^0, \\ (a-b)^2w - (a+b)^2w' &= k_t = \alpha''_t g_t^0 + \beta''_t h_t^0 + \gamma''_t k_t^0, \end{aligned} \quad (2)$$

in welchen die Constanten g_t^0, h_t^0, k_t^0 den Grössen $BC\mathfrak{K}, CA\mathfrak{B}, AB\mathfrak{A}$ der genannten Abhandlung gleich sind.

Der Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft endlich giebt ein Integral erster Ordnung der Differentialgleichungen (α)

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \left(\left(\frac{da}{dt} \right)^2 + \left(\frac{db}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dc}{dt} \right)^2 \right) \\ + (b-c)^2u^2 + (c-a)^2v^2 + (a-b)^2w^2 \\ + (b+c)^2u'^2 + (c+a)^2v'^2 + (a+b)^2w'^2 \end{cases} = 2\varepsilon H + \text{const.} \quad (\text{I})$$

Aus den Gleichungen (1) und (2) folgen zunächst noch zwei Integrale der Gleichungen (α)

$$g^2 + h^2 + k^2 = \text{const.} = \omega^2 \quad (\text{II})$$

$$g_t^2 + h_t^2 + k_t^2 = \text{const.} = \omega_t^2. \quad (\text{III})$$

Ferner lassen sich von den Gleichungen (β) zwei Integrale

$$\theta^2 + \theta'^2 + \theta''^2 = \text{const.} \quad (\text{IV})$$

$$\theta g + \theta' h + \theta'' k = \text{const.} \quad (\text{V})$$

angeben, wodurch ihre Integration *allgemein* auf eine Quadratur zurückgeführt wird. Zur Aufstellung ihrer allgemeinen Lösung ist es jedoch, da sie linear und homogen sind, nur nöthig, noch zwei von der Lösung g, h, k verschiedene *particulare* Lösungen zu suchen, für welchen Zweck man die willkürlichen Constanten in diesen beiden Integralgleichungen so wählen kann, dass sich die Rechnung vereinfacht. Giebt man beiden den Werth Null, so hat man

$$\theta' h + \theta'' k = -g\theta, \quad (3)$$

und ferner erhält man, wenn man diese Gleichung quadriert und dazu die Gleichung

$$-\theta'^2 - \theta''^2 = \theta^2$$

multiplicirt mit $h^2 + k^2$, addirt

$$-(\theta' k - \theta'' h)^2 = \omega^2 \theta^2,$$

folglich

$$\theta' k - \theta'' h = \omega i \theta. \quad (4)$$

Durch Auflösung dieser beiden linearen Gleichungen (3) und (4) findet sich

$$\theta' = \frac{-gh + k\omega i}{h^2 + k^2} \theta \quad (5)$$

$$\theta'' = \frac{-gk - h\omega i}{h^2 + k^2} \theta \quad (6)$$

und durch Einsetzung dieser Werthe in die erste der Gleichungen (β)

$$\frac{1}{\theta} \frac{d\theta}{dt} = \frac{-g \frac{dg}{dt} + r \frac{dk}{dt} + q \frac{dh}{dt}}{h^2 + k^2} + \omega i$$

$$\log \theta = \frac{1}{2} \log(h^2 + k^2) + \omega i \int \frac{qh + rk}{h^2 + k^2} dt + \text{const.} \quad (7)$$

Aus dieser in (5), (6) und (7) enthaltenen Lösung der Differentialgleichungen (β) erhält man eine dritte, indem man für $\sqrt{-1}$ überall $-\sqrt{-1}$ setzt, und es ist dann leicht aus den gefundenen drei particularen Lösungen die Ausdrücke für die Functionen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$ zu bilden.

Die geometrische Bedeutung jeder reellen Lösung der Differentialgleichungen (β) besteht darin, dass sie, mit einem geeigneten constanten Factor multiplicirt, die Cosinus der Winkel ausdrückt, welche die Axen der ξ, η, ζ zur Zeit t mit einer festen Linie machen. Diese feste Linie wird für die erste der drei eben gefundenen Lösungen durch die Normale auf der unveränderlichen Ebene der ganzen bewegten Masse gebildet, für den reellen und den imaginären Bestandtheil der beiden andern durch zwei in dieser Ebene enthaltene und auf einander senkrechte Linien. Die Cosinus der Winkel zwischen den Axen und jener Normalen sind demnach $\frac{g}{\omega}, \frac{h}{\omega}, \frac{k}{\omega}$; die Lage der Axen gegen diese Normale ergibt sich also nach Auflösung der Gleichungen (α) ohne weitere Integration und zur vollständigen

Bestimmung ihrer Lage genügt eine einzige Quadratur, z. B. die Integration $\omega \int_0^t \frac{qh+rk}{h^2+k^2} dt$, welche die Drehung der durch die Normale und die Axe der ξ gehenden Ebene um die Normale giebt.

Ganz Aehnliches gilt von den Differentialgleichungen (γ) . Man kann auf demselben Wege aus den beiden Integralen

$$\theta_l^2 + \theta'_l{}^2 + \theta''_l{}^2 = \text{const.} \quad (\text{VI})$$

$$\theta_l g_l + \theta'_l h_l + \theta''_l k_l = \text{const.} \quad (\text{VII})$$

ihre allgemeine Lösung und folglich auch die Werthe der Grössen $\alpha_l, \beta_l, \dots, \gamma''_l$ zur Zeit t ableiten, und es wird dabei nur eine Quadratur erforderlich sein. Es ergibt sich dann schliesslich der Ort eines beliebigen Flüssigkeitstheilchens zur Zeit t aus den oben (Art. 1, (1) und (4)) für die Grössen x, y, z und die Functionen $l, m, \dots, n''$ gegebenen Ausdrücken.

5.

Wir wollen uns jetzt Rechenschaft darüber geben, was durch die Zurückführung der Differentialgleichungen zwischen den Functionen $l, m, \dots, n''$ (der Differentialgleichungen (a) §. 1 bei Dirichlet) auf unsere Differentialgleichungen für das Geschäft der Integration gewonnen ist. Das System der Differentialgleichungen (a) ist von der sechszehnten Ordnung, und man kennt von demselben sieben Integrale erster Ordnung, wodurch es auf ein System der neunten Ordnung zurückgeführt wird. Das System (α) ist nur von der zehnten Ordnung, und man kennt von demselben noch drei Integrale erster Ordnung. Durch die hier bewirkte Umformung jener Differentialgleichungen ist also die Ordnung des noch zu integrierenden Systems von Differentialgleichungen um zwei Einheiten erniedrigt, und man hat statt dessen nur schliesslich noch zwei Quadraturen auszuführen. Diese Umformung leistet also dasselbe, wie die Auffindung von zwei Integralen erster Ordnung.

Wir bemerken indess ausdrücklich, dass hierdurch unsere Form der Differentialgleichungen nur für die Integration und die wirkliche Bestimmung der Bewegung einen Vorzug erhält. Für die allgemeinsten Untersuchungen über diese Bewegung ist dagegen diese Form der Differentialgleichungen weniger geeignet, nicht bloss, weil ihre Herleitung weniger einfach ist, sondern auch deshalb, weil der Fall der Gleichheit zweier Axen eine besondere Betrachtung erfordert. Bei Gleichheit zweier Axen tritt nämlich der besondere Umstand ein, dass die ihnen zu gebende Lage durch die Gestalt der flüssigen Masse nicht völlig bestimmt ist; sie hängt dann im Allgemeinen auch von der augenblicklichen Bewegung ab und bleibt nur dann willkürlich, wenn diese Bewegung so beschaffen ist, dass die Axen fortwährend einander gleich bleiben. Die Untersuchung dieses Falles ist zwar immer leicht und bedarf daher keiner weiteren Ausführung, kann aber in speciellen Fällen noch wieder besondere Formen annehmen, und die allgemeinen Untersuchungen, wie z. B. der allgemeine Nachweis der Möglichkeit der Bewegung (§. 2 bei Dirichlet), würden daher wegen der Menge von besonders zu behandelnden Fällen ziemlich weitläufig werden.

Ehe wir zur Behandlung von speciellen Fällen schreiten, in welchen sich die Differentialgleichungen (α) integrieren lassen, ist es zweckmässig, zu bemerken, dass in einer Lösung dieser Differentialgleichungen, wie unmittelbar aus der Form dieser Gleichungen hervorgeht, jede Zeichenänderung der Functionen $u, v, \dots, w'$ zulässig ist, bei welcher $uvw, uv'w', u'vw', u'v'w$ ungeändert bleiben. Es können also erstens die Zeichen der Functionen u', v', w' gleichzeitig geändert werden, und dadurch werden die Grössen $\alpha, \beta, \dots, \gamma''$ mit den Grössen $\alpha_l, \beta_l, \dots, \gamma''_l$, also in dem System der Grössen $l, m, \dots, n''$ die Horizontalreihen

mit den Verticalreihen vertauscht. Zweitens können gleichzeitig zwei der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ mit den entgegengesetzten Zeichen versehen werden, und diese Aenderung lässt sich auf eine Aenderung in dem Zeichen einer Coordinataxe zurückführen, wobei die Bewegung in eine ihr symmetrisch gleiche übergeht. In dieser Bemerkung ist der von Dedekind gefundene Reciprocitätssatz enthalten.

6.

Wir wollen nun den Fall untersuchen, in welchem eins der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ fortwährend gleich Null ist, also z. B. $u = u' = 0$; die geometrische Bedeutung dieser Voraussetzung ist diese, dass die Hauptaxe stets in der unveränderlichen Ebene der ganzen bewegten Masse liegt und die augenblickliche Rotationsaxe auf dieser Hauptaxe senkrecht steht.

Aus den sechs letzten Differentialgleichungen (α) folgt sogleich, dass in diesem Falle die Grössen

$$(c - a)^2 v, (c + a)^2 v', (a - b)^2 w, (a + b)^2 w' \quad (\mu)$$

constant sind und die Gleichungen

$$\begin{aligned} (b + c - 2a)vw + (b + c + 2a)v'w' &= 0 \\ (b - c + 2a)vw' + (b - c - 2a)v'w &= 0 \end{aligned} \quad (\nu)$$

stattfinden müssen.

Bei der weiteren Untersuchung ist zu unterscheiden, ob noch ein zweites der drei Grössenpaare Null ist oder nicht, und wir können im Allgemeinen nur noch bemerken, dass in Folge der Gleichungen (μ) die Grössen h, k, h_ι, k_ι constant sind und folglich auch die Winkel zwischen den Hauptaxen und der unveränderlichen Ebene der ganzen bewegten Masse, und dass dann ferner aus den Differentialgleichungen (β) und (γ) die Verhältnissgleichungen

$$\begin{aligned} g : h : k &= p : q : r \\ g_\iota : h_\iota : k_\iota &= p_\iota : q_\iota : r_\iota \end{aligned}$$

folgen, wodurch die Lösungen dieser Gleichungen sich vereinfachen.

Erster Fall. Nur eins der drei Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ ist gleich Null.

Wenn weder zugleich v und v' , noch zugleich w und w' Null sind, folgt aus den Gleichungen (μ) und (ν)

$$\begin{aligned} \frac{v'^2}{v^2} &= \frac{(2a - b - c)(2a + b - c)}{(2a + b + c)(2a - b + c)} = \left(\frac{a - c}{a + c}\right)^4 \text{const.}, \\ \frac{w'^2}{w^2} &= \frac{(2a - b - c)(2a - b + c)}{(2a + b + c)(2a + b - c)} = \left(\frac{a - b}{a + b}\right)^4 \text{const.}, \end{aligned} \quad (1)$$

woraus sich mit Hinzuziehung von

$$abc = \text{const.}$$

ergibt, dass a, b, c und folglich auch v, v', w, w' constant sind.

Setzen wir nun

$$\begin{aligned} \frac{v^2}{(2a+b+c)(2a-b+c)} &= \frac{v'^2}{(2a-b-c)(2a+b-c)} = S \\ \frac{w^2}{(2a+b+c)(2a+b-c)} &= \frac{w'^2}{(2a-b-c)(2a-b+c)} = T, \end{aligned} \quad (2)$$

so erhalten wir aus den drei ersten Differentialgleichungen (α) die drei Gleichungen

$$(4a^2 - b^2 - 3c^2)S + (4a^2 - 3b^2 - c^2)T = \frac{\varepsilon A}{2} - \frac{\sigma}{2a^2} \quad (3)$$

$$\begin{cases} (b^2 - c^2)T = \frac{\varepsilon B}{2} - \frac{\sigma}{2b^2} \\ (c^2 - b^2)S = \frac{\varepsilon C}{2} - \frac{\sigma}{2c^2}. \end{cases} \quad (4)$$

Um hieraus die Werthe von S , T und σ abzuleiten, bilde man aus den Gleichungen (4) die Gleichungen

$$\begin{aligned} b^2T + c^2S &= \frac{\varepsilon\pi}{2} \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta(b^2+s)(c^2+s)} \\ T + S &= \frac{\sigma}{2b^2c^2} - \frac{\varepsilon\pi}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta(b^2+s)(c^2+s)}, \end{aligned}$$

und substituirt diese Werthe in der Gleichung (3)

$$(4a^2 - b^2 - c^2)(T + S) - 2(b^2T + c^2S) = \frac{\varepsilon A}{2} - \frac{\sigma}{2a^2},$$

wodurch man

$$\frac{D\sigma}{2a^2b^2c^2} = \frac{\varepsilon\pi}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(\frac{2s + 4a^2 - b^2 - c^2}{(b^2+s)(c^2+s)} + \frac{1}{a^2+s} \right) \quad (5)$$

erhält, wenn zur Abkürzung

$$4a^4 - a^2(b^2 + c^2) + b^2c^2 = D \quad (6)$$

gesetzt wird.

Durch Einsetzung des Werthes von σ in die Gleichungen (4) findet sich dann

$$\frac{b^2 - c^2}{b^2 - a^2} DS = \frac{\varepsilon\pi}{2} \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta(b^2+s)} \left(\frac{4a^2 - c^2 + b^2}{c^2+s} - \frac{b^2}{a^2+s} \right) \quad (7)$$

$$\frac{c^2 - b^2}{c^2 - a^2} DT = \frac{\varepsilon\pi}{2} \int_0^\infty \frac{s \, ds}{\Delta(c^2+s)} \left(\frac{4a^2 - b^2 + c^2}{b^2+s} - \frac{c^2}{a^2+s} \right). \quad (8)$$

Es bleibt nun noch zu untersuchen, welchen Bedingungen a , b , c genügen müssen, damit sich aus den Gleichungen (7) und (8) und den Gleichungen (2) für v , v' , w , w' reelle Werthe ergeben.

Damit $\left(\frac{v'}{v}\right)^2$ und $\left(\frac{w'}{w}\right)^2$ nicht negativ werden, ist es nothwendig und hinreichend, dass die Grösse

$$(4a^2 - (b+c)^2)(4a^2 - (b-c)^2) \geq 0$$

sei. Es muss also a^2 entweder $\geq \left(\frac{b+c}{2}\right)^2$ oder $\leq \left(\frac{b-c}{2}\right)^2$ sein.

Wenn $a > \frac{b+c}{2}$, müssen die Grössen S und T beide > 0 sein, damit die Gleichungen (2) für v, v', w, w' reelle Werthe liefern. Man kann nun aber leicht zeigen, dass, wenn $a > \frac{b+c}{2}$, D und die beiden Integrale auf der rechten Seite der Gleichungen (7) und (8) immer positiv sind. Man hat dazu nur nöthig, D in die Form zu setzen

$$a^2(4a^2 - (b+c)^2) + bc(2a^2 + bc)$$

und das in (7) enthaltene Integral in die Form

$$\frac{\varepsilon\pi}{2a^2b^2c^2} \int_0^\infty \frac{s ds}{\Delta^3} ((4a^2 - c^2)s + a^2(4a^2 + b^2 - c^2) - b^2c^2),$$

und dann zu bemerken, dass aus $a \geq \frac{b+c}{2}$ die folgenden Ungleichheiten fliessen: $4a^2 - (b+c)^2 \geq 0$, $4a^2 - c^2 > 0$, ferner

$$4a^2 + b^2 - c^2 \geq (b+c)^2 + b^2 - c^2 = 2b(b+c),$$

und folglich

$$a^2(4a^2 + b^2 - c^2) \geq 2b(b+c)a^2 > \frac{1}{2}b(b+c)^3 > b^2c^2.$$

Aus diesen Ungleichheiten folgt, dass sowohl D , als das betrachtete Integral nur positive Bestandtheile hat, und dasselbe gilt auch von dem Integral auf der rechten Seite der Gleichung (8), welches aus diesem durch Vertauschung von b und c erhalten wird. Lassen wir nun a die Werthe von $\frac{b+c}{2}$ bis ∞ durchlaufen, so wird, wenn $b > c$, T immer positiv bleiben, S aber nur so lange $a < b$. Die Bedingungen für diesen Fall sind also, wenn b die grössere der beiden Axen b und c bezeichnet,

$$\frac{b+c}{2} \leq a \leq b. \quad (\text{I})$$

Für die Untersuchung des zweiten Falles, wenn $a^2 \leq \left(\frac{b-c}{2}\right)^2$, wollen wir annehmen, dass b die grössere der beiden Axen b und c sei, so dass $a \leq \frac{b-c}{2}$. Es muss dann, damit v, v', w, w' reell werden, $S \leq 0$ und $T \geq 0$ sein. Da aus den Ungleichheiten

$$b^2 \geq (2a+c)^2 > 4a^2 + c^2$$

hervorgeht, dass das Integral auf der rechten Seite der Gleichung (8) in unserm Falle stets negativ ist, so wird die letztere Bedingung $T > 0$ nur erfüllt werden, wenn $D(c^2 - a^2) \geq 0$, also c^2 entweder $< \frac{a^2(b^2 - 4a^2)}{b^2 - a^2}$, oder $\geq a^2$ ist. Dieser Fall spaltet sich also wieder in zwei Fälle, und diese sind, da $\frac{a^2(b^2 - 4a^2)}{b^2 - a^2} < a^2$, durch einen endlichen Zwischenraum getrennt, so dass von einem zum andern kein stetiger Uebergang stattfindet. Da das Integral in der Gleichung (7), so lange $c^2 \leq a^2$ ist, wegen der beiden Ungleichheiten $c^2 + s \leq a^2 + s$, $4a^2 - c^2 + b^2 > b^2$ nur positiv sein kann, so reduciren sich die zu erfüllenden Bedingungen im ersten dieser Fälle auf $a \leq \frac{b-c}{2}$ oder

$$c \leq b - 2a \quad \text{und} \quad c^2 < \frac{a^2(b^2 - 4a^2)}{b^2 - a^2} \quad (\text{II})$$

und im zweiten auf

$$a \leq \frac{b-c}{2} \quad \text{und} \quad \int_0^\infty \frac{s ds}{\Delta(b^2 + s)} \left(\frac{4a^2 - c^2 + b^2}{c^2 + s} - \frac{b^2}{a^2 + s} \right) \leq 0. \quad (\text{III})$$

Es ist leicht zu sehen, dass das Integral auf der linken Seite der letzten Ungleichheit, wenn a die Werthe von 0 bis c durchläuft, negativ bleibt, so lange $a \leq \frac{c}{2}$ ist, während es für $a = c$ einen positiven Werth annimmt; die genaue Bestimmung der Grenzen aber, innerhalb deren diese Ungleichheit erfüllt ist, hängt, wie man sieht, von der Auflösung einer transcendenten Gleichung ab.

In Bezug auf das Zeichen von σ , welches bekanntlich entscheidet, ob die Bewegung ohne äussern Druck möglich ist, können wir bemerken, dass sich der oben gefundene Werth dieser Grösse in die Form

$$\frac{\varepsilon\pi}{D} \int_0^\infty \frac{3s^2 + 6a^2s + D}{\Delta^3} ds$$

setzen lässt, und also in den Fällen I und III, wo $D > 0$, jedenfalls positiv ist, für einen negativen Werth von D aber, wenigstens so lange dieser Werth absolut genommen unter einer gewissen Grenze liegt, negativ wird.

7.

Zweiter Fall. Zwei der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ sind gleich Null.

Wir haben nun noch den Fall zu behandeln, wenn zwei der Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ fortwährend Null sind, und also nur um eine Hauptaxe eine Rotation stattfindet.

Wenn ausser u und u' auch v und v' fortwährend Null sind, so reduciren sich die Gleichungen (μ) und (ν) auf

$$(a - b)^2 w = \text{const.} = \tau \quad (a + b)^2 w' = \text{const.} = \tau'$$

und die ersten drei Differentialgleichungen (α) liefern daher die Gleichungen

$$\begin{aligned} \frac{\tau^2}{(a - b)^3} + \frac{\tau'^2}{(a + b)^3} - \frac{1}{2} \frac{d^2 a}{dt^2} &= \varepsilon a A - \frac{\sigma}{a} \\ \frac{\tau^2}{(b - a)^3} + \frac{\tau'^2}{(b + a)^3} - \frac{1}{2} \frac{d^2 b}{dt^2} &= \varepsilon b B - \frac{\sigma}{b} \\ -\frac{1}{2} \frac{d^2 c}{dt^2} &= \varepsilon c C - \frac{\sigma}{c}, \end{aligned} \quad (1)$$

welche verbunden mit

$$abc = a_0 b_0 c_0$$

die Grössen a, b, c und σ als Functionen der Zeit bestimmen. Das Princip der Erhaltung der lebendigen Kraft giebt für diese Differentialgleichungen das Integral erster Ordnung

$$\frac{1}{2} \left(\left(\frac{da}{dt} \right)^2 + \left(\frac{db}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dc}{dt} \right)^2 \right) + \frac{\tau^2}{(a - b)^2} + \frac{\tau'^2}{(a + b)^2} = 2\varepsilon H + \text{const.}, \quad (2)$$

woraus unmittelbar hervorgeht, dass wenn τ nicht Null ist, die Hauptaxen a und b nie einander gleich werden können.

Ausser den schon von Mac Laurin und Dirichlet untersuchten Fällen, wenn $a = b$, lässt noch der Fall, wenn die Grössen a, b, c constant sind, eine Bestimmung der Bewegung in geschlossenen Ausdrücken zu. In diesem Falle erhält man aus (1) durch Elimination von σ die beiden Gleichungen

$$\begin{aligned} \frac{\tau'^2}{(b + a)^3} + \frac{\tau^2}{(b - a)^3} &= \frac{\varepsilon\pi}{b} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \frac{(b^2 - c^2)s}{(b^2 + s)(c^2 + s)} = K \\ \frac{\tau'^2}{(b + a)^3} - \frac{\tau^2}{(b - a)^3} &= \frac{\varepsilon\pi}{a} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \frac{(a^2 - c^2)s}{(a^2 + s)(c^2 + s)} = L, \end{aligned} \quad (3)$$

worin die Integrale auf der rechten Seite durch K und L bezeichnet werden mögen; sie lassen sich auch in die Form setzen

$$w'^2 = \frac{\tau'^2}{(b+a)^4} = \frac{\varepsilon\pi}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(\frac{s+ab}{(a^2+s)(b^2+s)} - \frac{c^2}{ab(c^2+s)} \right) \quad (4)$$

$$w^2 = \frac{\tau^2}{(b-a)^4} = \frac{\varepsilon\pi}{2} \int_0^\infty \frac{ds}{\Delta} \left(\frac{s-ab}{(a^2+s)(b^2+s)} + \frac{c^2}{ab(c^2+s)} \right). \quad (5)$$

Nehmen wir an, dass b , wie in den früher betrachteten Fällen, die grössere der beiden Axen a und b bezeichne, so liefern diese beiden Gleichungen dann und auch nur dann für τ^2 und τ'^2 positive Werthe, wenn K positiv und abgesehen vom Zeichen grösser als L ist; und es ist klar, dass die erste Bedingung erfüllt ist, so lange $c < b$. Der zweiten Bedingung wird genügt, wenn $c = a$, also $L = 0$ ist, und folglich auch, da K und L sich mit c stetig ändern, innerhalb eines endlichen Gebiets zu beiden Seiten dieses Werthes. Dieses erstreckt sich aber nicht bis zu den Werthen b und 0 ; denn für $c = b$ würde τ'^2 negativ werden, für ein unendlich kleines c aber τ^2 , da dann

$$\frac{K}{c} = \varepsilon\pi \int_0^\infty \frac{ds}{s^{\frac{1}{2}}(1+s)^{\frac{3}{2}}(1+\frac{b^2}{a^2}s)^{\frac{1}{2}}}, \quad \frac{L}{c} = \varepsilon\pi \int_0^\infty \frac{ds}{s^{\frac{1}{2}}(1+s)^{\frac{3}{2}}(1+\frac{a^2}{b^2}s)^{\frac{1}{2}}}$$

und folglich $L > K$ wird. Wächst b , während a und c endlich bleiben, in's Unendliche, so kann L nur dann kleiner als K bleiben, wenn zugleich $a^2 - c^2$ in's Unendliche abnimmt; beide Grenzen für c sind also dann nur unendlich wenig von a verschieden. Wenn dagegen b seiner unteren Grenze a unendlich nahe kommt, so convergirt die obere Grenze für c , wo $\tau'^2 = 0$ wird, gegen a , die untere aber gegen einen Werth, für welchen das Integral auf der rechten Seite von (5) verschwindet. Zur Bestimmung dieses Werthes erhält man, wenn man $\frac{c}{a} = \sin \psi$ setzt, die Gleichung

$$(-5 + 2 \cos 2\psi + \cos 4\psi)(\pi - 2\psi) + 10 \sin 2\psi + 2 \sin 4\psi = 0,$$

und diese hat zwischen $\psi = 0$ und $\psi = \frac{\pi}{2}$ nur eine Wurzel, welche

$$\frac{c}{a} = 0,303327 \dots$$

giebt. Für $b = a$ kann freilich c jeden Werth zwischen 0 und b annehmen, da dann τ^2 wegen des Factors $b - a$ immer Null wird. Man erhält dann den von Mac Laurin untersuchten Fall, während sich für $w^2 = w'^2$ die beiden von Jacobi und Dedekind gefundenen Fälle ergeben.

Der eben behandelte Fall fällt für $b = a$ mit dem Falle (I) des vorigen Artikels zusammen und, wenn

$$\frac{w'^2}{(b+c+2a)(b-c+2a)} = \frac{w^2}{(b+c-2a)(b-c-2a)},$$

mit dem Falle (III). Von den bisher gefundenen vier Fällen, in denen das flüssige Ellipsoid während der Bewegung seine Form nicht ändert, hängen also diese drei Fälle stetig unter einander zusammen, während der Fall (II) isolirt bleibt.

8.

Die Untersuchung, ob ausser diesen vier Fällen noch andere vorhanden sind, in denen die Hauptaxen während der Bewegung constant bleiben, führt auf eine ziemlich weitläufige Rechnung, welche wir nur kurz andeuten wollen, da sie nur ein negatives Resultat liefert.

Aus der Voraussetzung, dass a, b, c constant sind, kann man zunächst leicht folgern, dass σ constant ist, indem man die drei ersten Differentialgleichungen (α), multiplicirt mit a, b, c , zu einander addirt und dann die Integralgleichung I, Art. 4, also den Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft, benutzt.

Durch Differentiation dieser drei Gleichungen erhält man dann ferner, wenn man die Werthe von $\frac{du}{dt}, \frac{dv}{dt}, \dots, \frac{dw'}{dt}$ aus den sechs letzten Differentialgleichungen (α) einsetzt, die drei Gleichungen

$$\begin{aligned}(b-c)u(vw-v'w') + (b+c)u'(v'w-vw') &= 0 \\ (c-a)v(wu-w'u') + (c+a)v'(w'u-wu') &= 0 \\ (a-b)w(uv-u'v') + (a+b)w'(u'v-uv') &= 0,\end{aligned}\tag{1}$$

von denen eine eine Folge der übrigen ist.

I. Wenn nun keine von den sechs Grössen $u, u', \dots, w'$ Null ist, folgt aus diesen Gleichungen die Gleichheit der folgenden drei Grössenpaare, deren Werthe wir durch $2a', 2b', 2c'$ bezeichnen wollen:

$$\begin{aligned}(a-c)\frac{v}{v'} + (a+c)\frac{v'}{v} &= (a-b)\frac{w}{w'} + (a+b)\frac{w'}{w} = 2a' \\ (b-a)\frac{w}{w'} + (b+a)\frac{w'}{w} &= (b-c)\frac{u}{u'} + (b+c)\frac{u'}{u} = 2b' \\ (c-b)\frac{u}{u'} + (c+b)\frac{u'}{u} &= (c-a)\frac{v}{v'} + (c+a)\frac{v'}{v} = 2c' .\end{aligned}$$

Es ergiebt sich dann $a'^2 - b'^2 = a^2 - b^2, b'^2 - c'^2 = b^2 - c^2$, so dass wir

$$aa - a'a' = bb - b'b' = cc - c'c' = \theta$$

setzen können, und aus den drei ersten Differentialgleichungen (α)

$$2\pi a' = \text{const.}, \quad 2\chi b' = \text{const.}, \quad 2\varrho c' = \text{const.};$$

wenn wir $vv' + ww', ww' + uu', uu' + vv'$ zur Abkürzung durch π, χ, ϱ bezeichnen. Aus diesen Gleichungen und der aus den Integralgleichungen II und III leicht herzuleitenden Gleichung

$$\begin{aligned}(a^2 - b^2)(a^2 - c^2)\pi + (b^2 - a^2)(b^2 - c^2)\chi + (c^2 - a^2)(c^2 - b^2)\varrho \\ = \frac{1}{4}(\omega^2 - \omega_c^2)\end{aligned}$$

folgt, wenn nicht $a = b = c$, dass θ und folglich $u, u', \dots, w'$ constant sein müssen. Es ergiebt sich aber leicht, dass dann die sechs letzten Differentialgleichungen (α) nicht erfüllt werden können; und hierdurch ist, wenn nicht alle drei Axen einander gleich sind, die Unzulässigkeit der Annahme, dass $u, u', \dots, w'$ sämmtlich von Null verschieden sind, erwiesen.

Die Annahme $a = b = c$ würde auf den Fall einer ruhenden Kugel führen; u', v', w' ergeben sich $= 0$, u, v, w aber bleiben ganz willkürlich, was davon herrührt, dass die Lage der Axen in jedem Augenblicke willkürlich geändert werden kann.

II. Es bleibt also nur die Annahme übrig, dass eine der Grössen $u, u', \dots, w'$ Null ist, und diese zieht, wie wir gleich sehen werden, immer die früher untersuchte Voraussetzung nach sich, dass eins der drei Grössenpaare $u, u'; v, v'; w, w'$ verschwinde.

1. Wenn eine der Grössen u', v', w' , z. B. $u' = 0$ ist, folgen aus (1) die Gleichungen

$$(b - c)uvw = 0, \quad (b - c)uv'w' = 0$$

und diese lassen nur eine von den folgenden Annahmen zu: erstens die früher untersuchte Voraussetzung, zweitens $b = c$, drittens $v = 0$ und $w = 0$ oder $v' = 0$ und $w = 0$, was nicht wesentlich verschieden ist.

Wenn $b = c$, bleibt u ganz willkürlich und kann also auch $= 0$ gesetzt werden, wodurch der früher untersuchte Fall eintritt.

Wenn $v = 0$ und $w' = 0$, erhält man aus den Differentialgleichungen (α)

$$(b - c - 2a)uv'w = 0, \quad (c + a - 2b)uv'w = 0, \quad (a - b + 2c)uv'w = 0,$$

und, wenn man die erste dieser Gleichungen zur zweiten addirt,

$$-(a + b)uv'w = 0;$$

es muss also ausser den Grössen u', v, w' noch eine der Grössen u, v', w Null sein, wodurch wieder der früher untersuchte Fall eintritt.

2. Wenn endlich eine der Grössen u, v, w , z. B. $u = 0$ ist, folgt aus den Gleichungen (1)

$$u'v'w = 0, \quad u'vw' = 0$$

und diese Gleichungen führen entweder zu unserer früheren Voraussetzung, oder zu der Annahme, $u = v' = w' = 0$, welche von der eben untersuchten $u' = v = w' = 0$ nicht wesentlich verschieden ist, oder endlich zu der Annahme $u = v = w = 0$. Unter dieser Voraussetzung aber geben die Differentialgleichungen (α) $v'w' = w'u' = u'v' = 0$, und es müssen also noch zwei von den Grössen u', v', w' Null sein, was wieder den früher behandelten Fall liefert.

Es hat sich also ergeben, dass mit der Beständigkeit der Gestalt nothwendig eine Beständigkeit des Bewegungszustandes verbunden ist d. h., dass allemal, wenn die flüssige Masse fortwährend denselben Körper bildet, auch die relative Bewegung aller Theile dieses Körpers immerfort dieselbe bleibt. Die absolute Bewegung im Raume kann man sich in diesem Falle aus zwei einfacheren zusammengesetzt denken, indem man sich zuerst der flüssigen Masse eine innere Bewegung ertheilt denkt, bei welcher sich die Flüssigkeitstheilchen in ähnlichen, parallelen und auf einem Hauptschnitte senkrechten Ellipsen bewegen, und dann dem ganzen System eine gleichförmige Rotation um eine in diesem Hauptschnitte liegende Axe. Wenn dieser Hauptschnitt, wie oben angenommen, senkrecht zur Hauptaxe a ist, so sind die Cosinus der Winkel zwischen der Umdrehungsaxe und den Hauptaxen $0, \frac{h}{\omega}, \frac{k}{\omega}$ und die Umdrehungszeit $\frac{2\pi}{\sqrt{q^2 + r^2}}$. Ferner sind $0, b\frac{h}{\omega_i}, c\frac{k}{\omega_i}$ die auf die Hauptaxen bezogenen Coordinaten des Endpunkts der augenblicklichen Rotationsaxe, und bei der innern Bewegung sind die elliptischen Bahnen der Flüssigkeitstheilchen der in diesem Punkte an das Ellipsoid gelegten Tangentialebene parallel, so dass ihre Mittelpunkte in dieser Rotationsaxe liegen. Die Theilchen bewegen sich in diesen Bahnen so, dass die nach den Mittelpunkten gezogenen Radienvectoren in gleichen Zeiten gleiche Flächen durchstreichen, und durchlaufen sie in der Zeit $\frac{2\pi}{\sqrt{q_i^2 + r_i^2}}$.

9.

Wir kehren jetzt zurück zur Betrachtung der Bewegung der flüssigen Masse in dem Falle, wenn $u, u'; v, v'$ fortwährend Null sind und also nur um eine Hauptaxe eine Rotation stattfindet, und bemerken zunächst, dass sich den Gleichungen (1) Art. 7, nach welchen sich die Haupttaxen in diesem Falle ändern, noch eine andere anschaulichere mechanische Bedeutung geben lässt. Man kann sie nämlich betrachten als die Gleichungen für die Bewegung eines materiellen Punktes (a, b, c) von der Masse 1, der gezwungen ist auf einer durch die Gleichung $abc = \text{const.}$ bestimmten Fläche zu bleiben und von Kräften getrieben wird, deren Potentialfunction der Grösse

$$\frac{\tau^2}{(a-b)^2} + \frac{\tau'^2}{(a+b)^2} - 2\varepsilon H$$

dem Werthe nach gleich und dem Zeichen nach entgegengesetzt ist.

Bezeichnen wir diese Grösse mit G , so lassen sich die Gleichungen für beide Bewegungen in die Form setzen:

$$\frac{d^2a}{dt^2} \delta a + \frac{d^2b}{dt^2} \delta b + \frac{d^2c}{dt^2} \delta c + \delta G = 0 \quad (1)$$

für alle unendlich kleinen Werthe von $\delta a, \delta b, \delta c$, welche der Bedingung $abc = \text{const.}$ genügen; und der Satz von der Erhaltung der mechanischen Kraft giebt

$$\frac{1}{2} \left(\left(\frac{da}{dt} \right)^2 + \left(\frac{db}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dc}{dt} \right)^2 \right) + G = \text{const.},$$

wonach der von der Formänderung der flüssigen Masse unabhängige Theil der mechanischen Kraft $= G$ ist.

Damit a, b, c und folglich Form und Bewegungszustand des flüssigen Ellipsoids constant bleiben, wenn $\frac{da}{dt}, \frac{db}{dt}, \frac{dc}{dt}$ Null sind, ist es offenbar nothwendig und hinreichend, dass die Variation erster Ordnung der Function G von den veränderlichen Grössen a, b, c , zwischen welchen die Bedingung $abc = \text{const.}$ stattfindet, verschwinde, was auf die Gleichungen (3) oder (4) und (5) des Art. 7 führt. Diese Beständigkeit des Bewegungszustandes wird aber nur eine labile sein, wenn der Werth der Function kein Minimumwerth ist; es lassen sich dann immer beliebig kleine Aenderungen des Zustandes der flüssigen Masse angeben, welche eine völlige Aenderung desselben zur Folge haben.

Die directe Untersuchung der Variation zweiter Ordnung für den Fall, wenn die Variation erster Ordnung der Function G verschwindet, würde sehr verwickelt werden; es lässt sich jedoch die Frage, ob die Function für diesen Fall einen Minimumwerth habe, auf folgendem Wege entscheiden.

Zunächst lässt sich leicht zeigen, dass die Function immer, welche Werthe auch τ^2, τ'^2 und a, b, c haben mögen, für ein System von Werthen der unabhängig veränderlichen Grössen ein Minimum haben müsse; es folgt dies offenbar aus den drei Umständen, dass erstens die Function G für den Grenzfall, wenn die Axen unendlich klein oder

XI. Ueber das Verschwinden der Theta-Functionen.

(Aus Borchardt's Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 65. 1865.)

Die zweite Abtheilung meiner im 54. Bande des mathematischen Journals erschienenen Theorie der Abel'schen Functionen enthält den Beweis eines Satzes über das Verschwinden der ϑ -Functionen, welchen ich sogleich wieder anführen werde, indem ich dabei die in jener Abhandlung angewandten Bezeichnungen als dem Leser bekannt voraussetze. Alles in der Abhandlung noch Folgende enthält kurze Andeutungen über die Anwendung dieses Satzes, welcher bei unserer Methode, die sich auf die Bestimmung der Functionen durch ihre Unstetigkeiten und ihr Unendlichwerden stützt, wie man leicht sieht, die Grundlage der Theorie der Abel'schen Functionen bilden muss. Bei dem Satze selbst und dessen Beweis ist jedoch der Umstand nicht gehörig berücksichtigt worden, dass die ϑ -Function durch die Substitution der Integrale algebraischer Functionen Einer Veränderlichen identisch, d. h. für jeden Werth dieser Veränderlichen, verschwinden kann. Diesem Mangel abzuhelpen ist die folgende kleine Abhandlung bestimmt.

Bei der Darstellung der Untersuchungen über ϑ -Functionen mit einer unbestimmten Anzahl von Variablen macht sich das Bedürfniss einer abkürzenden Bezeichnung einer Reihe, wie

$$v_1, v_2, \dots, v_m$$

geltend, sobald der Ausdruck von v_ν durch ν complicirt ist. Man könnte dieses Zeichen ganz analog den Summen- und Productenzeichen bilden; eine solche Bezeichnung würde aber zu viel Raum wegnehmen und innerhalb der Functionszeichen unbequem für den Druck sein; ich ziehe es daher vor

$$v_1, v_2, \dots, v_m \quad \text{durch} \quad \begin{pmatrix} m \\ \nu (v_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$$

zu bezeichnen, also

$$\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p) \quad \text{durch} \quad \vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (v_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1.

Wenn man in der Function $\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p)$ für die p Veränderlichen v die p Integrale $u_1 - e_1, u_2 - e_2, \dots, u_p - e_p$ algebraischer wie die Fläche T verzweigter Functionen von z substituirt, so erhält man eine Function von z , welche in der ganzen Fläche T ausser den Linien b sich stetig ändert, beim Uebertritt von der negativen auf die positive Seite der Linie b_ν aber den Factor $e^{-u_\nu^+ + u_\nu^- + 2e_\nu}$ erlangt. Wie in §. 22 bewiesen worden ist, wird diese Function, wenn sie nicht für alle Werthe von z verschwindet, nur für p Punkte der Fläche T unendlich klein von der ersten Ordnung. Diese Punkte wurden durch $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_p$ bezeichnet, und der Werth der Function u_ν im Punkte η_μ durch $\alpha_\nu^{(\mu)}$. Es ergab sich dann nach den $2p$ Modulsystemen der ϑ -Function die Congruenz

$$(e_1, e_2, \dots, e_p) \equiv \left(\sum_1^p \alpha_1^{(\mu)} + K_1, \sum_1^p \alpha_2^{(\mu)} + K_2, \dots, \sum_1^p \alpha_p^{(\mu)} + K_p \right), \quad (1)$$

worin die Grössen K von den bis dahin noch willkürlichen additiven Constanten in den Functionen u abhängen, aber von den Grössen e und den Punkten η unabhängig waren.

Führt man die dort angegebene Rechnung aus, so findet sich

$$2K_\nu = \sum \frac{1}{\pi i} \int (u_\nu^+ + u_\nu^-) du_\nu - \varepsilon_\nu \pi i - \sum_{\mu=1}^{\mu=p} \varepsilon'_\mu a_{\mu,\nu}. \quad (2)$$

In diesem Ausdrucke ist das Integral $\int (u_\nu^+ + u_\nu^-) du_\nu$ positiv durch b_ν auszudehnen, und in der Summe sind für ν' alle Zahlen von 1 bis p ausser ν zu setzen; $\varepsilon_\nu = \pm 1$, je nachdem das Ende von b_ν auf der positiven oder negativen Seite von a_ν liegt, und $\varepsilon'_\nu = \pm 1$, je nachdem dasselbe auf der positiven oder negativen Seite von b_ν liegt. Die Bestimmung der Vorzeichen ist übrigens nur nöthig, wenn die Grössen e nach den in §. 22 gegebenen Gleichungen aus den Unstetigkeiten von $\log \vartheta$ völlig bestimmt werden sollen; die obige Congruenz (1) bleibt richtig, welche Vorzeichen man wählen mag.

Wir behalten zunächst die dort gemachte vereinfachende Voraussetzung bei, dass die additiven Constanten in den Functionen u so bestimmt werden, dass die Grössen K sämmtlich gleich Null sind. Um die so gewonnenen Resultate schliesslich von dieser beschränkenden Voraussetzung zu befreien, hat man offenbar nur nöthig, überall in den ϑ -Functionen zu den Argumenten $-K_1, -K_2, \dots, -K_p$ hinzuzufügen.

Wenn also die Function $\vartheta(u_1 - e_1, u_2 - e_2, \dots, u_p - e_p)$ für die p Punkte $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_p$ verschwindet und *nicht identisch für jeden Werth von z verschwindet*, so ist

$$(e_1, e_2, \dots, e_p) \equiv \left(\sum_1^p \alpha_1^{(\mu)}, \sum_1^p \alpha_2^{(\mu)}, \dots, \sum_1^p \alpha_p^{(\mu)} \right).$$

Dieser Satz gilt für ganz beliebige Werthe der Grössen e , und wir haben hieraus, indem wir den Punkt (s, z) mit dem Punkte η_p zusammenfallen liessen, geschlossen, dass

$$\vartheta \left(-\sum_1^{p-1} \alpha_1^{(\mu)}, -\sum_1^{p-1} \alpha_2^{(\mu)}, \dots, -\sum_1^{p-1} \alpha_p^{(\mu)} \right) = 0,$$

oder da die ϑ -Function gerade ist,

$$\vartheta \left(\sum_1^{p-1} \alpha_1^{(\mu)}, \sum_1^{p-1} \alpha_2^{(\mu)}, \dots, \sum_1^{p-1} \alpha_p^{(\mu)} \right) = 0,$$

welches auch die Punkte $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{p-1}$ seien.

2.

Der Beweis dieses Satzes bedarf jedoch einer Vervollständigung wegen des Umstandes, dass die Function

$$\vartheta(u_1 - e_1, u_2 - e_2, \dots, u_p - e_p)$$

identisch verschwinden kann (was in der That bei jedem System von gleich verzweigten algebraischen Functionen für gewisse Werthe der Grössen e eintritt).

Wegen dieses Umstandes muss man sich begnügen, zunächst zu zeigen, dass der Satz richtig bleibt, während die Punkte η unabhängig von einander innerhalb endlicher Grenzen ihre Lage ändern. Hieraus folgt dann die allgemeine Richtigkeit des Satzes nach dem

Principe, dass eine Function einer complexen Grösse nicht innerhalb eines endlichen Gebiets gleich Null sein kann, ohne überall gleich Null zu sein.

Wenn z gegeben ist, so können die Grössen $e_1, e_2, \dots, e_p$ immer so gewählt werden, dass

$$\vartheta(u_1 - e_1, u_2 - e_2, \dots, u_p - e_p)$$

nicht verschwindet; denn sonst müsste die Function $\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p)$ für jedwede Werthe der Grössen v verschwinden, und folglich müssten in ihrer Entwicklung nach ganzen Potenzen von $e^{2v_1}, e^{2v_2}, \dots, e^{2v_p}$ sämtliche Coefficienten gleich Null sein, was nicht der Fall ist. Die Grössen e können sich dann von einander unabhängig innerhalb endlicher Grössengebiete ändern, ohne dass die Function

$$\vartheta(u_1 - e_1, u_2 - e_2, \dots, u_p - e_p)$$

für diesen Werth von z verschwindet. Oder mit andern Worten: man kann immer ein Grössengebiet E von $2p$ Dimensionen angeben, innerhalb dessen sich das System der Grössen e bewegen kann, ohne dass die Function

$$\vartheta(u_1 - e_1, u_2 - e_2, \dots, u_p - e_p)$$

für diesen Werth von z verschwindet. Sie wird also nur für p Lagen von (s, z) unendlich klein von der ersten Ordnung, und bezeichnet man diese Punkte durch $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_p$, so ist

$$(e_1, e_2, \dots, e_p) \equiv \left(\sum_1^p \alpha_1^{(\mu)}, \sum_1^p \alpha_2^{(\mu)}, \dots, \sum_1^p \alpha_p^{(\mu)} \right). \quad (1)$$

Jeder Bestimmungsweise des Systems der Grössen e innerhalb E oder jedem Punkte von E entspricht dann eine Bestimmungsweise der Punkte η , deren Gesammtheit ein dem Grössengebiet E entsprechendes Grössengebiet H bildet. In Folge der Gleichung (1) entspricht jedem Punkte von H aber auch nur ein Punkt von E ; hätte also H nur $2p - 1$, oder weniger Dimensionen, so würde E nicht $2p$ Dimensionen haben können. Es hat folglich H $2p$ Dimensionen. Die Schlüsse, auf welche sich unser Satz stützt, bleiben daher anwendbar für beliebige Lagen der Punkte η innerhalb endlicher Gebiete, und die Gleichung

$$\vartheta\left(-\sum_1^{p-1} \alpha_1^{(\mu)}, -\sum_1^{p-1} \alpha_2^{(\mu)}, \dots, -\sum_1^{p-1} \alpha_p^{(\mu)}\right) = 0$$

gilt für beliebige Lagen der Punkte $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{p-1}$ innerhalb endlicher Gebiete und folglich allgemein.

3.

Hieraus folgt, dass sich das Grössensystem $(e_1, e_2, \dots, e_p)$ immer und nur auf eine

Weise congruent einem Ausdrucke von der Form $\left(\nu \left(\sum_1^p \alpha_\nu^{(\mu)} \right) \right)$ setzen lässt, wenn

$\vartheta \left(\nu \left(\sum_1^p (u_\nu - e_\nu) \right) \right)$ nicht für jeden Werth von z verschwindet; denn liessen sich die Punkte

$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_p$ auf mehr als eine Weise so bestimmen, dass der Congruenz

$$\begin{pmatrix} p \\ \nu (e_\nu) \\ 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} p \\ \nu \left(\sum_1^p \alpha_\nu^{(\mu)} \right) \\ 1 \end{pmatrix}$$

genügt wäre, so würde nach dem eben bewiesenen Satze die Function $\vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (u_\nu - e_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$ für mehr als p Punkte verschwinden, ohne identisch gleich Null zu sein, was unmöglich ist.

Wenn $\vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (u_\nu - e_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$ identisch verschwindet, muss man, um $\begin{pmatrix} p \\ \nu (e_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$ in die obige Form zu setzen,

$$\vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (u_\nu + \alpha_\nu^{(1)} - u_\nu^{(1)} - e_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$$

betrachten, und wenn diese Function identisch für jeden Werth z, ξ_1, z_1 verschwindet, die Function

$$\vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu \left(u_\nu + \sum_1^2 \alpha_\nu^{(\mu)} - \sum_1^2 u_\nu^{(\mu)} - e_\nu \right) \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Wir nehmen an, dass

$$\left\{ \begin{array}{l} \vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu \left(\sum_1^m \alpha_\nu^{(p+2-\mu)} - \sum_1^{m-1} u_\nu^{(p-\mu)} - e_\nu \right) \\ 1 \end{pmatrix} \\ \text{identisch verschwindet,} \\ \vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu \left(\sum_1^{m+1} \alpha_\nu^{(p+2-\mu)} - \sum_1^m u_\nu^{(p-\mu)} - e_\nu \right) \\ 1 \end{pmatrix} \\ \text{aber nicht identisch verschwindet.} \end{array} \right. \quad (1)$$

Diese letztere Function verschwindet dann, als Function von ξ_{p+1} betrachtet, für $\xi_{p-1}, \xi_{p-2}, \dots, \xi_{p-m}$, ausserdem also noch für $p-m$ Punkte, und bezeichnet man diese mit $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{p-m}$, so ist

$$\begin{pmatrix} p \\ \nu \left(- \sum_{p-m+1}^p \alpha_\nu^{(\mu)} + e_\nu \right) \\ 1 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} p \\ \nu \left(\sum_1^{p-m} \alpha_\nu^{(\mu)} \right) \\ 1 \end{pmatrix}$$

und diese Punkte $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{p-m}$ können nur auf eine Weise so bestimmt werden, dass diese Congruenz erfüllt wird, weil sonst die Function für mehr als p Punkte verschwinden

würde. Dieselbe Function verschwindet, als Function von ξ_{p-1} betrachtet, ausser für

$$\eta_{p+1}, \eta_p, \dots, \eta_{p-m+1}$$

noch für $p - m - 1$ Punkte, und bezeichnet man diese durch

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{p-m-1},$$

so ist

$$\left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(- \sum_{p-m}^{p-2} u_{\nu}^{(\mu)} - e_{\nu} \right) \\ 1 \end{array} \right) \equiv \left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(\sum_1^{p-m-1} u_{\nu}^{(\mu)} \right) \\ 1 \end{array} \right),$$

und die Punkte $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{p-m-1}$ sind durch diese Congruenz völlig bestimmt.

4.

Bezeichnen wir die Derivirte von

$$\left\{ \begin{array}{l} \vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p) \\ \text{nach } v_{\nu} \text{ mit } \vartheta'_{\nu}, \text{ die zweite Derivirte nach } v_{\nu} \text{ und } v_{\mu} \text{ mit } \vartheta'_{\nu, \mu} \text{ u. s. f.,} \end{array} \right. \quad (1)$$

so sind, wenn

$$\vartheta \left(\begin{array}{c} p \\ \nu (u_{\nu}^{(1)} - \alpha_{\nu}^{(1)} + r_{\nu}) \\ 1 \end{array} \right)$$

identisch für jeden Werth von z_1 und ξ_1 verschwindet, sämmtliche Functionen $\vartheta' \left(\begin{array}{c} p \\ \nu (r_{\nu}) \\ 1 \end{array} \right)$

gleich Null. In der That geht die Gleichung

$$\vartheta \left(\begin{array}{c} p \\ \nu (u_{\nu}^{(1)} - \alpha_{\nu}^{(1)} + r_{\nu}) \\ 1 \end{array} \right) = 0,$$

wenn s_1 und z_1 unendlich wenig von σ_1 und ξ_1 verschieden sind, über in die Gleichung

$$\sum_1^p \vartheta'_{\mu} \left(\begin{array}{c} p \\ \nu (r_{\nu}) \\ 1 \end{array} \right) d\alpha_{\mu}^{(1)} = 0.$$

Nehmen wir an, dass

$$du_{\mu} = \frac{\varphi_{\mu}(s, z) dz}{\frac{\partial F}{\partial s}}$$

sei, so verwandelt sich diese Gleichung nach Weglassung des Factors $\frac{\partial F(\sigma_1, \xi_1)}{\partial \sigma_1}$ in

$$\sum_1^p \vartheta'_{\mu} \left(\begin{array}{c} p \\ \nu (r_{\nu}) \\ 1 \end{array} \right) \varphi_{\mu}(\sigma_1, \xi_1) = 0;$$

und da zwischen den Functionen φ keine lineare Gleichung mit constanten Coefficienten stattfindet, so folgt hieraus, dass sämtliche erste Derivirten von $\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p)$ für

$$\begin{pmatrix} p \\ \nu (v_\nu = r_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$$

verschwinden müssen.

Um den umgekehrten Satz zu beweisen, nehmen wir an, dass $\begin{pmatrix} p \\ \nu (v_\nu = r_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} p \\ \nu (v_\nu = t_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$ zwei Werthsysteme seien, für welche die Function ϑ verschwindet, ohne für $\begin{pmatrix} p \\ \nu (v_\nu = u_\nu^{(1)} - \alpha_\nu^{(1)} + r_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} p \\ \nu (v_\nu = u_\nu^{(1)} - \alpha_\nu^{(1)} + t_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}$ identisch zu verschwinden, und bilden den Ausdruck

$$\frac{\vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (u_\nu^{(1)} - \alpha_\nu^{(1)} + r_\nu) \\ 1 \end{pmatrix} \vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (\alpha_\nu^{(1)} - u_\nu^{(1)} + r_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}}{\vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (u_\nu^{(1)} - \alpha_\nu^{(1)} + t_\nu) \\ 1 \end{pmatrix} \vartheta \begin{pmatrix} p \\ \nu (\alpha_\nu^{(1)} - u_\nu^{(1)} + t_\nu) \\ 1 \end{pmatrix}}. \quad (2)$$

Betrachten wir diesen Ausdruck als Function von z_1 , so ergibt sich, dass er eine algebraische Function von z_1 und zwar eine rationale Function von s_1 und z_1 ist, da Nenner und Zähler in T'' stetig sind und an den Querschnitten dieselben Factoren erlangen. Für $z_1 = \xi_1$ und $s_1 = \sigma_1$ werden Nenner und Zähler unendlich klein von der zweiten Ordnung, so dass die Function endlich bleibt; die übrigen Werthe aber, für welche Nenner oder Zähler verschwinden, sind, wie oben bewiesen, durch die Werthe der Grössen r und der Grössen t völlig bestimmt, also von ξ_1 ganz unabhängig. Da nun eine algebraische Function durch die Werthe, für welche sie Null und unendlich wird, bis auf einen constanten Factor bestimmt ist, so ist der Ausdruck gleich einer rationalen von ξ_1 unabhängigen Function von s_1 und z_1 , $\chi(s_1, z_1)$, multiplicirt in eine Constante, d. h. eine von z_1 unabhängige Grösse. Da der Ausdruck symmetrisch in Bezug auf die Grössensysteme (s_1, z_1) und (σ_1, ξ_1) ist, so ist diese Constante gleich $\chi(\sigma_1, \xi_1)$, multiplicirt in eine auch von ξ_1 unabhängige Grösse A . Setzt man nun

$$\sqrt{A} \chi(s, z) = \varrho(s, z),$$

so erhält man für unsern Ausdruck (2) den Werth

$$\varrho(s_1, z_1) \varrho(\sigma_1, \xi_1), \quad (3)$$

wo $\varrho(s, z)$ eine rationale Function von s und z ist.

Um diese zu bestimmen, hat man nur nöthig $\xi_1 = z_1$ und $\sigma_1 = s_1$ werden zu lassen;

es ergibt sich dann

$$(\varrho(s_1, z_1))^2 = \frac{\sum_{\mu} \vartheta'_{\mu} \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(r_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \varphi_{\mu}(s_1, z_1)}{\sum_{\mu} \vartheta'_{\mu} \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(t_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \varphi_{\mu}(s_1, z_1)}. \quad (4)$$

Man hat daher aus (3) und (4) die Gleichung

$$\left\{ \begin{array}{l} \vartheta \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(u_{\nu}^{(1)} - \alpha_{\nu}^{(1)} + r_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \vartheta \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(\alpha_{\nu}^{(1)} - u_{\nu}^{(1)} + r_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \\ \vartheta \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(u_{\nu}^{(1)} - \alpha_{\nu}^{(1)} + t_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \vartheta \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(\alpha_{\nu}^{(1)} - u_{\nu}^{(1)} + t_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \end{array} \right\} = \frac{\sum_{\mu} \vartheta'_{\mu} \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(r_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \varphi_{\mu}(s_1, z_1)}{\sum_{\mu} \vartheta'_{\mu} \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(t_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \varphi_{\mu}(s_1, z_1)} \cdot \frac{\sum_{\mu} \vartheta'_{\mu} \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(r_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \varphi_{\mu}(\sigma_1, \xi_1)}{\sum_{\mu} \vartheta'_{\mu} \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(t_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \varphi_{\mu}(\sigma_1, \xi_1)}. \quad (5)$$

Aus dieser Gleichung folgt, dass

$$\vartheta \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(u_{\nu}^{(1)} - \alpha_{\nu}^{(1)} + r_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right)$$

für jeden Werth von z_1 und ξ_1 gleich Null sein muss, wenn die ersten Derivirten der Function $\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p)$ für $\left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu(v_{\nu} = r_{\nu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right)$ sämmtlich verschwinden.

5.

Wenn

$$\vartheta \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu \left(\sum_1^m \alpha_{\nu}^{(\mu)} - \sum_1^m u_{\nu}^{(\mu)} + r_{\nu} \right) \\ 1 \end{smallmatrix} \right) \quad (1)$$

identisch, d. h. für jedwede Werthe von $\left(\begin{smallmatrix} m \\ \mu(\sigma_{\mu}, \xi_{\mu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right)$ und $\left(\begin{smallmatrix} m \\ \mu(s_{\mu}, z_{\mu}) \\ 1 \end{smallmatrix} \right)$, verschwindet, so findet man auf dem oben angegebenen Wege zunächst, indem man $\xi_m = z_m$, $\sigma_m = s_m$ werden lässt, dass die ersten Derivirten der Function

$$\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p) \text{ für } \left(\begin{smallmatrix} p \\ \nu \left(v_{\nu} = \sum_1^{m-1} \alpha_{\nu}^{(\mu)} - \sum_1^{m-1} u_{\nu}^{(\mu)} + r_{\nu} \right) \\ 1 \end{smallmatrix} \right)$$

sämmtlich verschwinden, dann, indem man $\xi_{m-1} - z_{m-1}$, $\sigma_{m-1} - s_{m-1}$ unendlich klein werden lässt, dass für

$$\left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(v_\nu = \sum_1^{m-2} \alpha_\nu^{(\mu)} - \sum_1^{m-2} u_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \\ 1 \end{array} \right)$$

auch die zweiten Derivirten sämmtlich verschwinden; und offenbar ergibt sich allgemein, dass die Derivirten n ter Ordnung sämmtlich verschwinden für

$$\left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(v_\nu = \sum_1^{m-n} \alpha_\nu^{(\mu)} - \sum_1^{m-n} u_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \\ 1 \end{array} \right),$$

welche Werthe auch die Grössen z und die Grössen ξ haben mögen.

Es folgt hieraus, dass unter der gegenwärtigen Voraussetzung (1) für $\left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(v_\nu = r_\nu \right) \\ 1 \end{array} \right)$ die ersten bis m ten Derivirten der Function $\vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p)$ sämmtlich gleich Null sind.

Um zu zeigen, dass dieser Satz auch umgekehrt gilt, beweisen wir zunächst, dass wenn

$$\vartheta \left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(\sum_1^{m-1} \alpha_\nu^{(\mu)} - \sum_1^{m-1} u_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \\ 1 \end{array} \right)$$

identisch verschwindet und die Grössen $\vartheta^{(m)} \left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(r_\nu \right) \\ 1 \end{array} \right)$ sämmtlich gleich Null sind, auch

$$\vartheta \left(\begin{array}{c} p \\ \nu \left(\sum_1^m \alpha_\nu^{(\mu)} - \sum_1^m u_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \\ 1 \end{array} \right)$$

identisch verschwinden muss und verallgemeinern zu diesem Zwecke die Gleichung §. 4, (5).

Wir nehmen an, dass

$$\vartheta \left(\nu \left(\sum_1^{m-1} u_\nu^{(\mu)} - \sum_1^{m-1} \alpha_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \right)$$

identisch verschwinde,

$$\vartheta \left(\nu \left(\sum_1^m u_\nu^{(\mu)} - \sum_1^m \alpha_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \right)$$

aber nicht identisch verschwinde, behalten in Bezug auf die Grössen t die frühere Voraussetzung bei und betrachten den Ausdruck

$$\frac{\vartheta \left(\nu \left(\sum_1^m u_\nu^{(\mu)} - \sum_1^m \alpha_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \right) \vartheta \left(\nu \left(\sum_1^m \alpha_\nu^{(\mu)} - \sum_1^m u_\nu^{(\mu)} + r_\nu \right) \right)}{\prod_{\varrho, \varrho'} \vartheta \left(\nu \left(u_\nu^{(\varrho)} - u_\nu^{(\varrho')} + t_\nu \right) \right) \vartheta \left(\nu \left(\alpha_\nu^{(\varrho)} - \alpha_\nu^{(\varrho')} + t_\nu \right) \right)} \cdot \left(\prod_{\varrho=1}^m \vartheta \left(\nu \left(u_\nu^{(\varrho)} - \alpha_\nu^{(\varrho)} + t_\nu \right) \right) \vartheta \left(\nu \left(\alpha_\nu^{(\varrho)} - u_\nu^{(\varrho)} + t_\nu \right) \right) \right)^{-2}. \quad (2)$$

In diesem Ausdrücke sind unter den Productzeichen sowohl für ϱ , als für ϱ' sämtliche Werthe von 1 bis m zu setzen, im Zähler aber die Fälle, wo $\varrho = \varrho'$ würde, wegzulassen.

Betrachten wir diesen Ausdruck als Function von z_1 , so ergibt sich, dass er an den Querschnitten den Factor 1 erlangt und folglich eine algebraische Function von z_1 ist. Für $z_1 = \xi_\varrho$ und $s_1 = \sigma_\varrho$ werden Nenner und Zähler unendlich klein von der zweiten Ordnung, der Bruch bleibt also endlich; die übrigen Werthe aber, für welche Zähler und

Nenner verschwinden, sind durch die Grössen $\binom{m}{\mu(s_\mu, z_\mu)}$, die Grössen r und die

Grössen t , wie oben (§. 3) bewiesen, völlig bestimmt, und folglich von den Grössen ξ ganz unabhängig. Da der Ausdruck nun eine symmetrische Function von den Grössen z ist, so gilt dasselbe für jedes beliebige z_μ : er ist eine algebraische Function von z_μ , und die Werthe dieser Grösse, für welche er unendlich gross oder unendlich klein wird, sind von den Grössen ξ unabhängig. Er ist daher gleich einer von den Grössen ξ unabhängigen algebraischen Function der Grössen $z, \chi(z_1, z_2, \dots, z_m)$, multiplicirt in einen von den Grössen z unabhängigen Factor. Da er aber ungeändert bleibt, wenn man die Grössen z mit den Grössen ξ vertauscht, so ist dieser Factor gleich $\chi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m)$, multiplicirt mit einer von den Grössen z und den Grössen ξ unabhängigen Constanten A ; und wir können daher, wenn wir $\sqrt{A}\chi(z_1, z_2, \dots, z_m) = \psi(z_1, z_2, \dots, z_m)$ setzen, unserm Ausdrücke (2) die Form

$$\psi(z_1, z_2, \dots, z_m) \psi(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m) \quad (3)$$

geben, wo $\psi(z_1, z_2, \dots, z_m)$ eine algebraische von den Grössen ξ unabhängige Function

der Grössen z ist, welche in Folge ihrer Verzweigungsart sich rational in $\binom{m}{\mu(s_\mu, z_\mu)}$

ausdrücken lassen muss. Lässt man nun die Punkte η mit den Punkten ε zusammenfallen, so dass die Grössen $\xi_\mu - z_\mu$ und die Grössen $\sigma_\mu - s_\mu$ sämtlich unendlich

ZWEITE ABTHEILUNG.

XII. Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe.

(Aus dem dreizehnten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. *)

Der folgende Aufsatz über die trigonometrischen Reihen besteht aus zwei wesentlich verschiedenen Theilen. Der erste Theil enthält eine Geschichte der Untersuchungen und Ansichten über die willkürlichen (graphisch gegebenen) Functionen und ihre Darstellbarkeit durch trigonometrische Reihen. Bei ihrer Zusammenstellung war es mir vergönnt, einige Wink e des berühmten Mathematikers zu benutzen, welchem man die erste gründliche Arbeit über diesen Gegenstand verdankt. Im zweiten Theile liefere ich über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe eine Untersuchung, welche auch die bis jetzt noch unerledigten Fälle umfasst. Es war nöthig, ihr einen kurzen Aufsatz über den Begriff eines bestimmten Integrales und den Umfang seiner Gültigkeit vorzuschicken.

Geschichte der Frage über die Darstellbarkeit einer willkürlich gegebenen Function durch eine trigonometrische Reihe.

1.

Die von *Fourier* so genannten trigonometrischen Reihen, d. h. die Reihen von der Form

$$a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + a_3 \sin 3x + \cdots \\ + \frac{1}{2}b_0 + b_1 \cos x + b_2 \cos 2x + b_3 \cos 3x + \cdots$$

spielen in demjenigen Theile der Mathematik, wo ganz willkürliche Functionen vorkommen, eine bedeutende Rolle; ja, es lässt sich mit Grund behaupten, dass die wesentlichsten Fortschritte in diesem für die Physik so wichtigen Theile der Mathematik von der klareren Einsicht in die Natur dieser Reihen abhängig gewesen sind. Schon gleich bei den ersten mathematischen Untersuchungen, die auf die Betrachtung willkürlicher Functionen führten, kam die Frage zur Sprache, ob sich eine solche ganz willkürliche Function durch eine Reihe von obiger Form ausdrücken lasse.

Es geschah dies in der Mitte des vorigen Jahrhunderts bei Gelegenheit der Untersuchungen über die schwingenden Saiten, mit welchen sich damals die berühmtesten Mathematiker beschäftigten. Ihre Ansichten über unsern Gegenstand lassen sich nicht wohl darstellen, ohne auf dieses Problem einzugehen.

Unter gewissen Voraussetzungen, die in der Wirklichkeit näherungsweise zutreffen, wird bekanntlich die Form einer gespannten in einer Ebene schwingenden Saite, wenn

* Diese Abhandlung ist im Jahre 1854 von dem Verfasser behufs seiner Habilitation an der Universität zu Göttingen der philosophischen Facultät eingereicht. Wiewohl der Verfasser ihre Veröffentlichung, wie es scheint, nicht beabsichtigt hat, so wird doch die hiermit erfolgende Herausgabe derselben in gänzlich ungeänderter Form sowohl durch das hohe Interesse des Gegenstandes an sich als durch die in ihr niedergelegte Behandlungsweise der wichtigsten Principien der Infinitesimal-Analysis wohl hinlänglich gerechtfertigt erscheinen.

Braunschweig, im Juli 1867.

R. Dedekind.

x die Entfernung eines unbestimmten ihrer Punkte von ihrem Anfangspunkte, y seine Entfernung aus der Ruhelage zur Zeit t bedeutet, durch die partielle Differentialgleichung

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \alpha \alpha \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

bestimmt, wo α von t und bei einer überall gleich dicken Saite von x unabhängig ist.

Der erste, welcher eine allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung gab, war d'Alembert.

Er zeigte¹), dass jede Function von x und t , welche für y gesetzt, die Gleichung zu einer identischen macht, in der Form

$$f(x + \alpha t) + \varphi(x - \alpha t)$$

enthalten sein müsse, wie sich dies durch Einführung der unabhängig veränderlichen Größen $x + \alpha t$, $x - \alpha t$ anstatt x , t ergibt, wodurch

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{1}{\alpha \alpha} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad \text{in} \quad 4 \frac{\partial \frac{\partial y}{\partial (x + \alpha t)}}{\partial (x - \alpha t)}$$

übergeht.

Ausser dieser partiellen Differentialgleichung, welche sich aus den allgemeinen Bewegungsgesetzen ergibt, muss nun y noch die Bedingung erfüllen, in den Befestigungspunkten der Saite stets $= 0$ zu sein; man hat also, wenn in dem einen dieser Punkte $x = 0$, in dem andern $x = l$ ist,

$$f(\alpha t) = -\varphi(-\alpha t), \quad f(l + \alpha t) = -\varphi(l - \alpha t)$$

und folglich

$$\begin{aligned} f(z) &= -\varphi(-z) = -\varphi(l - (l + z)) = f(2l + z), \\ y &= f(\alpha t + x) - f(\alpha t - x). \end{aligned}$$

Nachdem d'Alembert dies für die allgemeine Lösung des Problems geleistet hatte, beschäftigte er sich in einer Fortsetzung² seiner Abhandlung mit der Gleichung $f(z) = f(2l + z)$; d. h. er sucht analytische Ausdrücke, welche unverändert bleiben, wenn z um $2l$ wächst.

Es war ein wesentliches Verdienst Euler's, der im folgenden Jahrgange der Berliner Abhandlungen³ eine neue Darstellung dieser d'Alembert'schen Arbeiten gab, dass er das Wesen der Bedingungen, welchen die Function $f(z)$ genügen muss, richtiger erkannte. Er bemerkte, dass der Natur des Problems nach die Bewegung der Saite vollständig bestimmt sei, wenn für irgend einen Zeitpunkt die Form der Saite und die Geschwindigkeit jedes Punktes (also y und $\frac{\partial y}{\partial t}$) gegeben seien, und zeigte, dass sich, wenn man diese beiden Functionen sich durch willkürlich gezogene Curven bestimmt denkt, daraus stets durch eine einfache geometrische Construction die d'Alembert'sche Function $f(z)$ finden lässt. In der That, nimmt man an, dass für

$$t = 0, \quad y = g(x) \quad \text{und} \quad \frac{\partial y}{\partial t} = h(x)$$

¹ *Mémoires de l'académie de Berlin*. 1747. pag. 214.

² *Ibid.* pag. 220.

³ *Mémoires de l'académie de Berlin*. 1748. pag. 69.

sei, so erhält man für die Werthe von x zwischen 0 und l

$$f(x) - f(-x) = g(x), \quad f(x) + f(-x) = \frac{1}{\alpha} \int h(x) dx$$

und folglich die Function $f(z)$ zwischen $-l$ und l ; hieraus aber ergibt sich ihr Werth für jeden andern Werth von z mittelst der Gleichung

$$f(z) = f(2l + z).$$

Dies ist in abstracten, aber jetzt allgemein geläufigen Begriffen dargestellt, die *Euler'sche* Bestimmung der Function $f(z)$.

Gegen diese Ausdehnung seiner Methode durch *Euler* verwahrte sich indess d'*Alembert* sofort⁴, weil seine Methode nothwendig voraussetze, dass y sich in t und x analytisch ausdrücken lasse.

Ehe eine Antwort *Euler's* hierauf erfolgte, erschien eine dritte von diesen beiden ganz verschiedene Behandlung dieses Gegenstandes von *Daniel Bernoulli*⁵. Schon vor d'*Alembert* hatte *Taylor*⁶ gesehen, dass $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \alpha \alpha \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ und zugleich y für $x = 0$ und für $x = l$ stets gleich 0 sei, wenn man $y = \sin \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi \alpha t}{l}$ und hierin für n eine ganze Zahl setze. Er erklärte hieraus die physikalische Thatsache, dass eine Saite ausser ihrem Grundtone auch den Grundton einer $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$ so langen (übrigens ebenso beschaffenen) Saite geben könne, und hielt seine particuläre Lösung für allgemein, d. h. er glaubte, die Schwingung der Saite würde stets, wenn die ganze Zahl n der Höhe des Tons gemäss bestimmt würde, wenigstens sehr nahe durch die Gleichung ausgedrückt. Die Beobachtung, dass eine Saite ihre verschiedenen Töne gleichzeitig geben könne, führte nun *Bernoulli* zu der Bemerkung, dass die Saite (der Theorie nach) auch der Gleichung

$$y = \sum a_n \sin \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi \alpha}{l} (t - \beta_n)$$

gemäss schwingen könne, und weil sich aus dieser Gleichung alle beobachteten Modificationen der Erscheinung erklären liessen, so hielt er sie für die allgemeinste⁷. Um diese Ansicht zu stützen, untersuchte er die Schwingungen eines masselosen gespannten Fadens, der in einzelnen Punkten mit endlichen Massen beschwert ist, und zeigte, dass die Schwingungen desselben stets in eine der Zahl der Punkte gleiche Anzahl von solchen Schwingungen zerlegt werden kann, deren jede für alle Massen gleich lange dauert.

Diese Arbeiten *Bernoulli's* veranlassten einen neuen Aufsatz *Euler's*, welcher unmittelbar nach ihnen unter den Abhandlungen der Berliner Akademie abgedruckt ist⁸. Er hält darin d'*Alembert* gegenüber fest⁹, dass die Function $f(z)$ eine zwischen den Grenzen $-l$ und l ganz willkürliche sein könne, und bemerkt¹⁰, dass *Bernoulli's* Lösung (welche er schon früher als eine besondere aufgestellt hatte) dann allgemein sei und zwar nur dann

⁴Mémoires de l'académie de Berlin. 1750. pag. 358. En effet on ne peut ce me semble exprimer y analytiquement d'une manière plus générale, qu'en la supposant une fonction de t et de x . Mais dans cette supposition on ne trouve la solution du problème que pour les cas où les différentes figures de la corde vibrante peuvent être renfermées dans une seule et même équation.

⁵Mémoires de l'académie de Berlin. 1753. p. 147.

⁶Taylor de methodo incrementorum.

⁷l. c. p. 157. art. XIII.

⁸Mémoires de l'académie de Berlin. 1753. p. 196.

⁹l. c. p. 214.

¹⁰l. c. art. III—X.

allgemein sei, wenn die Reihe

$$a_1 \sin \frac{x\pi}{l} + a_2 \sin \frac{2x\pi}{l} + \dots + \frac{1}{2}b_0 + b_1 \cos \frac{x\pi}{l} + b_2 \cos \frac{2x\pi}{l} + \dots$$

für die Abscisse x die Ordinate einer zwischen den Abscissen 0 und l ganz willkürlichen Curve darstellen könne. Nun wurde es damals von Niemand bezweifelt, dass alle Umformungen, welche man mit einem analytischen Ausdrucke — er sei endlich oder unendlich — vornehmen könne, für jedwede Werthe der unbestimmten Grössen gültig seien oder doch nur in ganz speciellen Fällen unanwendbar würden. Es schien daher unmöglich, eine algebraische Curve oder überhaupt eine analytisch gegebene nicht periodische Curve durch obigen Ausdruck darzustellen, und *Euler* glaubte daher, die Frage gegen *Bernoulli* entscheiden zu müssen.

Der Streit zwischen *Euler* und d'Alembert war indess noch immer unerledigt. Dies veranlasste einen jungen, damals noch wenig bekannten Mathematiker, *Lagrange*, die Lösung der Aufgabe auf einem ganz neuen Wege zu versuchen, auf welchem er zu *Euler*'s Resultaten gelangte. Er unternahm es¹¹, die Schwingungen eines masselosen Fadens zu bestimmen, welcher mit einer endlichen unbestimmten Anzahl gleich grosser Massen in gleich grossen Abständen beschwert ist, und untersuchte dann, wie sich diese Schwingungen ändern, wenn die Anzahl der Massen in's Unendliche wächst. Mit welcher Gewandtheit, mit welchem Aufwande analytischer Kunstgriffe er aber auch den ersten Theil dieser Untersuchung durchführte, so liess der Uebergang vom Endlichen zum Unendlichen doch viel zu wünschen übrig, so dass d'Alembert in einer Schrift, welche er an die Spitze seiner opuscles mathématiques stellte, fortfahren konnte, seiner Lösung den Ruhm der grössten Allgemeinheit zu vindiciren. Die Ansichten der damaligen berühmten Mathematiker waren und blieben daher in dieser Sache getheilt; denn auch in spätern Arbeiten behielt jeder im Wesentlichen seinen Standpunkt bei.

Um also schliesslich ihre bei Gelegenheit dieses Problems entwickelten Ansichten über die willkürlichen Functionen und über die Darstellbarkeit derselben durch eine trigonometrische Reihe zusammenzustellen, so hatte *Euler* zuerst diese Functionen in die Analysis eingeführt und, auf geometrische Anschauung gestützt, die Infinitesimalrechnung auf sie angewandt. *Lagrange*¹² hielt *Euler*'s Resultate (eine geometrische Construction des Schwingungsverlaufs) für richtig; aber ihm genügte die *Euler*'sche geometrische Behandlung dieser

¹¹Miscellanea Taurinensia. Tom. I. Recherches sur la nature et la propagation du son.

¹²Miscellanea Taurinensia. Tom. II. Pars math. pag. 18.

Functionen nicht. D'Alembert¹³ dagegen ging auf die *Euler'sche* Auffassungsweise der Differentialgleichung ein und beschränkte sich, die Richtigkeit seiner Resultate anzufechten, weil man bei ganz willkürlichen Functionen nicht wissen könne, ob ihre Differentialquotienten stetig seien. Was die *Bernoulli'sche* Lösung betraf, so kamen alle drei darin überein, sie nicht für allgemein zu halten; aber während d'Alembert¹⁴, um *Bernoulli's* Lösung für minder allgemein, als die seinige, erklären zu können, behaupten musste, dass auch eine analytisch gegebene periodische Function sich nicht immer durch eine trigonometrische Reihe darstellen lasse, glaubte *Lagrange*¹⁵ diese Möglichkeit beweisen zu können.

2.

Fast fünfzig Jahre vergingen, ohne dass in der Frage über die analytische Darstellbarkeit willkürlicher Functionen ein wesentlicher Fortschritt gemacht wurde. Da warf eine Bemerkung *Fourier's* ein neues Licht auf diesen Gegenstand; eine neue Epoche in der Entwicklung dieses Theils der Mathematik begann, die sich bald auch äusserlich in grossartigen Erweiterungen der mathematischen Physik kund that. *Fourier* bemerkte, dass in der trigonometrischen Reihe

$$f(x) = \begin{cases} a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \dots \\ + \frac{1}{2}b_0 + b_1 \cos x + b_2 \cos 2x + \dots \end{cases}$$

die Coefficienten sich durch die Formeln

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx$$

bestimmen lassen. Er sah, dass diese Bestimmungsweise auch anwendbar bleibe, wenn die Function $f(x)$ ganz willkürlich gegeben sei; er setzte für $f(x)$ eine so genannte discontinuirliche Function (die Ordinate einer gebrochenen Linie für die Abscisse x) und erhielt so eine Reihe, welche in der That stets den Werth der Function gab.

Als *Fourier* in einer seiner ersten Arbeiten über die Wärme, welche er der französischen Akademie vorlegte¹⁶, (21. Dec. 1807) zuerst den Satz aussprach, dass eine ganz willkürlich (graphisch) gegebene Function sich durch eine trigonometrische Reihe ausdrücken lasse,

¹³Opuscles mathématiques p. d'Alembert. Tome premier. 1761. pag. 16. art. VII—XX.

¹⁴Opuscles mathématiques. Tome I. pag. 42. art. XXIV.

¹⁵Misc. Taur. Tom. III. Pars math. pag. 221. art. XXV.

¹⁶Bulletin des sciences p. la soc. philomatique. Tome I. p. 112.

war diese Behauptung dem greisen *Lagrange* so unerwartet, dass er ihr auf das Entschiedenste entgegentrat. Es soll¹⁷ sich hierüber noch ein Schriftstück im Archiv der Pariser Akademie befinden. Dessenungeachtet verweist¹⁸ *Poisson* überall, wo er sich der trigonometrischen Reihen zur Darstellung willkürlicher Functionen bedient, auf eine Stelle in *Lagrange's* Arbeiten über die schwingenden Saiten, wo sich diese Darstellungsweise finden soll. Um diese Behauptung, die sich nur aus der bekannten Rivalität zwischen *Fourier* und *Poisson* erklären lässt¹⁹, zu widerlegen, sehen wir uns genöthigt, noch einmal auf die Abhandlung *Lagrange's* zurückzukommen; denn über jenen Vorgang in der Akademie findet sich nichts veröffentlicht.

Man findet in der That an der von *Poisson* citirten Stelle²⁰ die Formel:

$$y = 2 \int Y \sin X\pi dX \times \sin x\pi + 2 \int Y \sin 2X\pi dX \times \sin 2x\pi \\ + 2 \int Y \sin 3X\pi dX \times \sin 3x\pi + \text{etc.} + 2 \int Y \sin nX\pi dX \times \sin nx\pi,$$

de sorte que, lorsque $x = X$, on aura $y = Y$, Y étant l'ordonnée qui répond à l'abscisse X .

Diese Formel sieht nun allerdings ganz so aus wie die *Fourier'sche* Reihe, so dass bei flüchtiger Ansicht eine Verwechslung leicht möglich ist; aber dieser Schein rührt bloss daher, weil *Lagrange* das Zeichen $\int dX$ anwandte, wo er heute das Zeichen $\Sigma \Delta X$ angewandt haben würde. Sie giebt die Lösung der Aufgabe, die endliche Sinusreihe

$$a_1 \sin x\pi + a_2 \sin 2x\pi + \cdots + a_n \sin nx\pi$$

so zu bestimmen, dass sie für die Werthe

$$\frac{1}{n+1}, \frac{2}{n+1}, \cdots, \frac{n}{n+1}$$

von x , welche *Lagrange* unbestimmt durch X bezeichnet, gegebene Werthe erhält. Hätte *Lagrange* in dieser Formel n unendlich gross werden lassen, so wäre er allerdings zu dem *Fourier'schen* Resultat gelangt. Wenn man aber seine Abhandlung durchliest, so sieht man, dass er weit davon entfernt ist zu glauben, eine ganz willkürliche Function lasse sich wirklich durch eine unendliche Sinusreihe darstellen. Er hatte vielmehr die ganze Arbeit gerade unternommen, weil er glaubte, diese willkürlichen Functionen liessen sich nicht durch eine

¹⁷Nach einer mündlichen Mittheilung des Herrn Professor Dirichlet.

¹⁸Unter Andern in dem verbreiteten *Traité de mécanique* Nro. 323, p. 638.

¹⁹Der Bericht im bulletin des sciences über die von *Fourier* der Akademie vorgelegte Abhandlung ist von *Poisson*.

²⁰Misc. Taur. Tom. III. Pars math. pag. 261.

Formel ausdrücken, und von der trigonometrischen Reihe glaubte er, dass sie jede analytisch gegebene periodische Function darstellen könne. Freilich erscheint es uns jetzt kaum denkbar, dass *Lagrange* von seiner Summenformel nicht zur *Fourier*'schen Reihe gelangt sein sollte; aber dies erklärt sich daraus, dass durch den Streit zwischen *Euler* und d'*Alembert* sich bei ihm im Voraus eine bestimmte Ansicht über den einzuschlagenden Weg gebildet hatte. Er glaubte das Schwingungsproblem für eine unbestimmte endliche Anzahl von Massen erst vollständig absolviren zu müssen, bevor er seine Grenzbetrachtungen anwandte. Diese erfordern eine ziemlich ausgedehnte Untersuchung²¹, welche unnöthig war, wenn er die *Fourier*'sche Reihe kannte.

Durch *Fourier* war nun zwar die Natur der trigonometrischen Reihen vollkommen richtig erkannt²²; sie wurden seitdem in der mathematischen Physik zur Darstellung willkürlicher Functionen vielfach angewandt, und in jedem einzelnen Falle überzeugte man sich leicht, dass die *Fourier*'sche Reihe wirklich gegen den Werth der Function convergire; aber es dauerte lange, ehe dieser wichtige Satz allgemein bewiesen wurde.

Der Beweis, welchen *Cauchy* in einer der Pariser Akademie am 27. Febr. 1826 vorgelesenen Abhandlung gab²³, ist unzureichend, wie *Dirichlet* gezeigt hat²⁴. *Cauchy* setzt voraus, dass, wenn man in der willkürlich gegebenen periodischen Function $f(x)$ für x ein complexes Argument $x + yi$ setzt, diese Function für jeden Werth von y endlich sei. Dies findet aber nur statt, wenn die Function gleich einer constanten Grösse ist. Man sieht indess leicht, dass diese Voraussetzung für die ferneren Schlüsse nicht nothwendig ist. Es reicht hin, wenn eine Function $\varphi(x + yi)$ vorhanden ist, welche für alle positiven Werthe von y endlich ist und deren reeller Theil für $y = 0$ der gegebenen periodischen Function $f(x)$ gleich wird. Will man diesen Satz, der in der That richtig ist²⁵, voraussetzen, so führt allerdings der von *Cauchy* eingeschlagene Weg zum Ziele, wie umgekehrt dieser Satz sich aus der *Fourier*'schen Reihe ableiten lässt.

²¹Misc. Taur. Tom. III. Pars math. S. 251.

²²Bulletin d. sc. Tom. I. p. 115. Les coefficients $a, a', a'', \dots$, étant ainsi déterminés etc.

²³Mémoires de l'ac. d. sc. de Paris. Tom. VI. p. 603.

²⁴Crelle Journal für die Mathematik. Bd. IV. p. 157 & 158.

²⁵Der Beweis findet sich in der Inauguraldissertation des Verfassers.

Riemann — Gesammelte Werke

Seiten 251–300

XI. Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe (Schluss)

XII. Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe

XIII. Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen.

Bernhard Riemann

Herausgegeben von Heinrich Weber, 2. Auflage 1892

Index

§. 3. Seit Dirichlet.	2
Ueber den Begriff eines bestimmten Integrals und den Umfang seiner Gültigkeit.	4
4.	4
5.	5
6.	6
7.	6
8.	7
9.	8
10.	8
11.	9
12.	9
13.	9
Inhalt.	10
Anmerkungen.	11
XIII. Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen.	13
Plan der Untersuchung.	13
I. Begriff einer mehrfach ausgedehnten Grösse.	13
1.	13
2.	14
3.	14
II. Maassverhältnisse, unter denen eine mehrfach ausgedehnte Grösse als stetig angenommen wird.	14
1.	14
2.	15
3.	15
4.	15
III. Anwendung auf den Raum.	15
1.	15
2.	16
3.	16
4.	16

§. 3. Seit Dirichlet.

Erst im Januar 1829 erschien im Journal von Crelle¹ eine Abhandlung von Dirichlet, worin für Functionen, die durchgehends eine Integration zulassen und nicht unendlich viele Maxima und Minima haben, die Frage ihrer Darstellbarkeit durch trigonometrische Reihen in aller Strenge entschieden wurde.

Die Erkenntniss des zur Lösung dieser Aufgabe einzuschlagenden Weges ergab sich ihm aus der Einsicht, dass die unendlichen Reihen in zwei wesentlich verschiedene Klassen zerfallen, je nachdem sie, wenn man sämmtliche Glieder positiv macht, convergent bleiben oder nicht. In den ersteren können die Glieder beliebig versetzt werden, der Werth der letzteren dagegen ist von der Ordnung der Glieder abhängig. In der That, bezeichnet man in einer Reihe zweiter Klasse die positiven Glieder der Reihe nach durch $a_1, a_2, a_3, \dots$, die negativen durch $-b_1, -b_2, -b_3, \dots$, so ist klar, dass sowohl $\sum a_n$, als $\sum b_n$ unendlich sein müssen; denn wären beide endlich, so würde die Reihe auch nach Gleichmachung der Zeichen convergiren; wäre aber eine unendlich, so würde die Reihe divergiren. Offenbar kann nun die Reihe durch geeignete Anordnung der Glieder einen beliebig gegebenen Werth C erhalten. Denn nimmt man abwechselnd so lange positive Glieder der Reihe, bis ihr Werth grösser als C wird, und so lange negative, bis ihr Werth kleiner als C wird, so wird die Abweichung von C nie mehr betragen, als der Werth des dem letzten Zeichenwechsel vorausgehenden Gliedes. Da nun sowohl die Grössen a_n , als die Grössen b_n mit wachsendem Index zuletzt unendlich klein werden, so werden auch die Abweichungen von C , wenn man in der Reihe nur hinreichend weit fortgeht, beliebig klein werden, d. h. die Reihe wird gegen C convergiren.

Nur auf die Reihen erster Klasse sind die Gesetze endlicher Summen anwendbar; nur sie können wirklich als Inbegriff ihrer Glieder betrachtet werden, die Reihen der zweiten Klasse nicht; ein Umstand, welcher von den Mathematikern des vorigen Jahrhunderts übersehen wurde, hauptsächlich wohl aus dem Grunde, weil die Reihen, welche nach steigenden Potenzen einer veränderlichen Grösse fortschreiten, allgemein zu reden (d. h. einzelne Werthe dieser Grösse ausgenommen), zur ersten Klasse gehören.

Die Fourier'sche Reihe gehört nun offenbar nicht nothwendig zur ersten Klasse; ihre Convergenz konnte also gar nicht, wie Cauchy vergeblich² versucht hatte, aus dem Gesetze, nach welchem die Glieder abnehmen, abgeleitet werden. Es musste vielmehr gezeigt werden, dass die endliche Reihe

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\alpha) d\alpha \sin x + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\alpha) \sin \alpha d\alpha \sin 2x + \dots + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\alpha) \sin n\alpha d\alpha \sin nx \\ & + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\alpha) d\alpha + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\alpha) \cos \alpha d\alpha \cos x + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\alpha) \cos 2\alpha d\alpha \cos 2x + \dots \\ & + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\alpha) \cos n\alpha d\alpha \cos nx, \end{aligned}$$

oder, was dasselbe ist, das Integral

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\alpha) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}(x-\alpha)}{\sin \frac{x-\alpha}{2}} d\alpha$$

sich, wenn n in's Unendliche wächst, dem Werthe $f(x)$ unendlich annähert.

Dirichlet stützt diesen Beweis auf die beiden Sätze:

- 1) Wenn $0 < c \leq \frac{\pi}{2}$, nähert sich $\int_0^c \varphi(\beta) \frac{\sin(2n+1)\beta}{\sin \beta} d\beta$ mit wachsendem n zuletzt unendlich dem Werth $\frac{\pi}{2}\varphi(0)$;
- 2) wenn $0 < b < c \leq \frac{\pi}{2}$, nähert sich $\int_b^c \varphi(\beta) \frac{\sin(2n+1)\beta}{\sin \beta} d\beta$ mit wachsendem n zuletzt unendlich dem Werth 0,

¹Bd. IV. pag. 157.

²Dirichlet in Crelle's Journal. Bd. IV. pag. 158. *Quoi qu'il en soit de cette première Observation, ... à mesure que n croît.*

vorausgesetzt, dass die Function $\varphi(\beta)$ zwischen den Grenzen dieser Integrale entweder immer abnimmt, oder immer zunimmt.

Mit Hülfe dieser beiden Sätze lässt sich, wenn die Function f nicht unendlich oft vom Zunehmen zum Abnehmen oder vom Abnehmen zum Zunehmen übergeht, das Integral

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\alpha) \frac{\sin \frac{2n+1}{2}(x-\alpha)}{\sin \frac{x-\alpha}{2}} d\alpha$$

offenbar in eine endliche Anzahl von Gliedern zerlegen, von denen eins³ gegen $\frac{1}{2}f(x+0)$, ein anderes gegen $\frac{1}{2}f(x-0)$, die übrigen aber gegen 0 convergiren, wenn n ins Unendliche wächst.

Hieraus folgt, dass durch eine trigonometrische Reihe jede sich nach dem Intervall 2π periodisch wiederholende Function darstellbar ist, welche

- 1) durchgehends eine Integration zulässt,
- 2) nicht unendlich viele Maxima und Minima hat und
- 3) wo ihr Werth sich sprungweise ändert, den Mittelwerth zwischen den beiderseitigen Grenzwerten annimmt.

Eine Function, welche die ersten beiden Eigenschaften hat, die dritte aber nicht, kann durch eine trigonometrische Reihe offenbar nicht dargestellt werden; denn die trigonometrische Reihe, die sie ausser den Unstetigkeiten darstellt, würde in den Unstetigkeitspunkten selbst von ihr abweichen. Ob und wann aber eine Function, welche die ersten beiden Bedingungen nicht erfüllt, durch eine trigonometrische Reihe darstellbar sei, bleibt durch diese Untersuchung unentschieden.

Durch die Arbeit Dirichlet's ward einer grossen Menge wichtiger analytischer Untersuchungen eine feste Grundlage gegeben. Es war ihm gelungen, indem er den Punkt, wo Euler irrte, in volles Licht brachte, eine Frage zu erledigen, die so viele ausgezeichnete Mathematiker seit mehr als siebenzig Jahren (seit dem Jahre 1753) beschäftigt hatte. In der That für alle Fälle der Natur, um welche es sich allein handelte, war sie vollkommen erledigt, denn so gross auch unsere Unwissenheit darüber ist, wie sich die Kräfte und Zustände der Materie nach Ort und Zeit im Unendlichkleinen ändern, so können wir doch sicher annehmen, dass die Functionen, auf welche sich die Dirichlet'sche Untersuchung nicht erstreckt, in der Natur nicht vorkommen.

Dessenungeachtet scheinen diese von Dirichlet unerledigten Fälle aus einem zweifachen Grunde Beachtung zu verdienen.

Erstlich steht, wie Dirichlet selbst am Schlüsse seiner Abhandlung bemerkt, dieser Gegenstand mit den Principien der Infinitesimalrechnung in der engsten Verbindung und kann dazu dienen, diese Principien zu grösserer Klarheit und Bestimmtheit zu bringen. In dieser Beziehung hat die Behandlung desselben ein unmittelbares Interesse.

Zweitens aber ist die Anwendbarkeit der Fourier'schen Reihen nicht auf physikalische Untersuchungen beschränkt; sie ist jetzt auch in einem Gebiete der reinen Mathematik, der Zahlentheorie, mit Erfolg angewandt, und hier scheinen gerade diejenigen Functionen, deren Darstellbarkeit durch eine trigonometrische Reihe Dirichlet nicht untersucht hat, von Wichtigkeit zu sein.

Am Schlüsse seiner Abhandlung verspricht freilich Dirichlet, später auf diese Fälle zurückzukommen, aber dieses Versprechen ist bis jetzt unerfüllt geblieben. Auch die Arbeiten von Dirksen und Bessel über die Cosinus- und Sinusreihen leisten diese Ergänzung nicht; sie stehen vielmehr der Dirichlet'schen an Strenge und Allgemeinheit nach. Der mit ihr fast ganz gleichzeitige Aufsatz Dirksen's⁴, welcher offenbar ohne Kenntniss derselben geschrieben ist, schlägt zwar im Allgemeinen einen richtigen Weg ein, enthält aber im Einzelnen einige Ungenauigkeiten. Denn abgesehen davon, dass er in einem speciellen Falle⁵ für die Summe der Reihe ein falsches Resultat findet, stützt er sich in einer Nebenbetrachtung auf eine nur in besonderen Fällen mögliche Reihenentwicklung⁶, so dass sein Beweis nur für Functionen mit überall endlichen ersten Differentialquotienten vollständig ist. Bessel⁷ sucht den Dirichlet'schen Beweis

³Es ist nicht schwer zu beweisen, dass der Werth einer Function f , welche nicht unendlich viele Maxima und Minima hat, stets, sowohl wenn der Argumentwerth abnehmend, als wenn er zunehmend gleich x wird, entweder festen Grenzwerten $f(x+0)$ und $f(x-0)$ (nach Dirichlet's Bezeichnung in Dove's Repertorium der Physik. Bd. I. pag. 170) sich nähern, oder unendlich gross werden müsse.

⁴Crelle's Journal. Bd. IV. p. 170.

⁵l. c. Formel 22.

⁶l. c. Art. 3.

⁷Schumacher. Astronomische Nachrichten. Nro. 374 (Bd. 16. p. 229).

zu vereinfachen. Aber die Aenderungen in diesem Beweise gewähren keine wesentliche Vereinfachung in den Schlüssen, sondern dienen höchstens dazu, ihn in geläufigere Begriffe zu kleiden, während seine Strenge und Allgemeinheit beträchtlich darunter leidet.

Die Frage über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe ist also bis jetzt nur unter den beiden Voraussetzungen entschieden, dass die Function durchgehends eine Integration zulässt und nicht unendlich viele Maxima und Minima hat. Wenn die letztere Voraussetzung nicht gemacht wird, so sind die beiden Integraltheoreme Dirichlet's zur Entscheidung der Frage unzulänglich; wenn aber die erstere wegfällt, so ist schon die Fourier'sche Coefficientenbestimmung nicht anwendbar. Der im Folgenden, wo diese Frage ohne besondere Voraussetzungen über die Natur der Function untersucht werden soll, eingeschlagene Weg ist hierdurch, wie man sehen wird, bedingt; ein so directer Weg, wie der Dirichlet's, ist der Natur der Sache nach nicht möglich.

Ueber den Begriff eines bestimmten Integrals und den Umfang seiner Gültigkeit.

4.

Die Unbestimmtheit, welche noch in einigen Fundamentalpunkten der Lehre von den bestimmten Integralen herrscht, nöthigt uns, Einiges voraufzuschicken über den Begriff eines bestimmten Integrals und den Umfang seiner Gültigkeit.

Also zuerst: Was hat man unter $\int_a^b f(x) dx$ zu verstehen?

Um dieses festzusetzen, nehmen wir zwischen a und b der Grösse nach auf einander folgend, eine Reihe von Werthen $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ an und bezeichnen der Kürze wegen $x_1 - a$ durch δ_1 , $x_2 - x_1$ durch δ_2 , $\dots$, $b - x_{n-1}$ durch δ_n und durch ε einen positiven ächten Bruch. Es wird alsdann der Werth der Summe

$$S = \delta_1 f(a + \varepsilon_1 \delta_1) + \delta_2 f(x_1 + \varepsilon_2 \delta_2) + \delta_3 f(x_2 + \varepsilon_3 \delta_3) + \dots + \delta_n f(x_{n-1} + \varepsilon_n \delta_n)$$

von der Wahl der Intervalle δ und der Grössen ε abhängen. Hat sie nun die Eigenschaft, wie auch δ und ε gewählt werden mögen, sich einer festen Grenze A unendlich zu nähern, sobald sämtliche δ unendlich

klein werden, so heisst dieser Werth $\int_a^b f(x) dx$.

Hat sie diese Eigenschaft nicht, so hat $\int_a^b f(x) dx$ keine Bedeutung. Man hat jedoch in mehreren

Fällen versucht, diesem Zeichen auch dann eine Bedeutung beizulegen, und unter diesen Erweiterungen des Begriffs eines bestimmten Integrals ist eine von allen Mathematikern angenommen. Wenn nämlich die Function $f(x)$ bei Annäherung des Arguments an einen einzelnen Werth c in dem Intervalle (a, b) unendlich gross wird, so kann offenbar die Summe S , wie klein man auch die δ vorschreiben möge, jeden

beliebigen Werth erhalten; sie hat also keinen Grenzwert, und $\int_a^b f(x) dx$ würde nach dem Obigen keine

Bedeutung haben. Wenn aber alsdann

$$\int_a^{c-\alpha_1} f(x) dx + \int_{c+\alpha_2}^b f(x) dx$$

bei unendlichem Abnehmen der positiven Grössen α_1, α_2 sich einer festen Grenze nähert, so versteht

man unter diesem Grenzwert $\int_a^b f(x) dx$.

Andere Festsetzungen von Cauchy über den Begriff des bestimmten Integrals einer unstetigen Function mögen zu einem bestimmten Zwecke zweckmässig sein; sie gehen indess nicht in die Natur der Sache ein und sind daher wohl auch nicht allgemein durchführbar. Sie führen ferner zu den merkwürdigen Sätzen, z. B. dass das Integral

$$\int_a^b \varphi'(x) dx$$

oder, was dasselbe ist,

$$\int_a^b \frac{d\varphi}{dx} dx$$

verschwinden könne, wenn $\varphi(x)$ im Innern des Integrationsintervalls unendlich werde, während das nach dem Obigen erklärte Integral

$$\int_a^b \frac{d\varphi}{dx} dx = \varphi(b) - \varphi(a)$$

immer hat.

Untersuchen wir jetzt zweitens den Umfang der Gültigkeit dieses Begriffs, oder die Fällen, in welchen

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{\nu=1}^n \delta_\nu f(x_{\nu-1} + \varepsilon_\nu \delta_\nu)$$

als Definition anzusehen ist.

Zunächst ist $f(x)$ in dem Intervalle (a, b) endlich zu nehmen, d. h. es darf sich kein Augenblick ereignen, wo die Function unendlich würde. Diese Bedingung wird so lange man die allgemeine Form der Function $f(x)$ nicht bestimmt hat, allerdings als wesentlich angesehen werden müssen, wiewohl es Fälle giebt, wo sie wegfällt.

Es ist ferner nothwendig und hinreichend, dass die obige Summe S bei unendlichem Abnehmen der Grössen δ für jedes Werthsystem der Grössen ε sich einer festen Grenze A nähert.

Obwohl dies ein nothwendiges und hinreichendes Kriterium ist, so kann es doch bei der Untersuchung, ob ein bestimmtes Integral vorhanden ist, nicht von Nutzen sein, und es ist daher zweckmässig, aus demselben Folgerungen zu ziehen, die zur Entscheidung dieser Frage brauchbarer sind.

Wir bezeichnen der Kürze wegen die grösste Schwankung der Function zwischen a und x_1 , d. h. die Differenz ihres grössten und kleinsten Werthes in diesem Intervalle, durch D_1 , zwischen x_1 und x_2 durch D_2 , ..., zwischen x_{n-1} und b durch D_n ; dann wird

$$\delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \cdots + \delta_n D_n$$

mit sämmtlichen δ unendlich klein werden müssen.

Man wird dies leicht einsehen, wenn man die Summe S so in zwei Theile S_1 und S_2 zerlegt, dass S_1 aus allen Gliedern besteht, in welchen $f(x_{\nu-1} + \varepsilon_\nu \delta_\nu) - f(x_{\nu-1})$ ein positives Vorzeichen hat, und S_2 aus den übrigen, und diese Summen S_1 und S_2 nach x integrirt denkt, so dass jede derselben eine endliche bestimmte Function von x wird. Offenbar ist dann S die Summe der sämmtlichen positiven Zuwächse von der ersteren und der absoluten Werthe der sämmtlichen negativen Zuwächse von der letzteren Function; und da jede dieser Summen für sich, wenn die Grössen δ unendlich klein werden, einer festen Grenze sich nähert, so wird auch die Summe S sich einer festen Grenze nähern.

Dass dieser Bedingung genüge, ist für die Möglichkeit des bestimmten Integrals nothwendig und hinreichend.

5.

Es lässt sich nun von dieser Bedingung leicht zeigen, dass sie für die Möglichkeit des bestimmten Integrals nothwendig und hinreichend ist.

Wir wollen zunächst den Fall betrachten, wo die Function $f(x)$ zwischen a und b nirgends unendlich wird.

Es sei $a < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < b$, $\delta_1 = x_1 - a$, $\delta_2 = x_2 - x_1$, ..., $\delta_n = b - x_{n-1}$, und D_ν die grösste Schwankung der Function im Intervalle δ_ν , d. h. die Differenz ihres grössten und kleinsten Werthes in diesem Intervalle. Dann convergirt die Summe

$$\delta_1 D_1 + \delta_2 D_2 + \cdots + \delta_n D_n,$$

oder, was dasselbe ist, das Integral

$$\int_a^b D(x) dx,$$

wo $D(x)$ die Function bedeutet, welche in jedem Intervalle gleich der grössten Schwankung der Function f in diesem Intervalle ist, gegen Null, wenn sämmtliche δ unendlich klein werden. In der That, wenn die Function $f(x)$ zwischen a und b nirgends unendlich wird, so ist sie nothwendig zwischen zwei Grenzen m und M eingeschlossen, und es lässt sich daher eine Eintheilung des Intervalles (a, b) in Theile von der Art angeben, dass die grösste Schwankung der Function in jedem Theile kleiner als eine gegebene Grösse ε ist.

Es sei nun ε eine beliebig kleine positive Grösse. Wir theilen das Intervall (a, b) in p gleiche Theile, in welchen die Schwankung der Function kleiner als ε ist, und bezeichnen die Länge jedes Theiles durch δ . Ferner theilen wir jeden dieser Theile wieder in q gleiche Theile, so dass die Länge jedes Theiles $\frac{\delta}{q}$ wird. Dann ist offenbar die Summe der Producte aus der Länge jedes dieser Theile in die zugehörige Schwankung der Function kleiner als $\delta\varepsilon$, und da die Anzahl dieser Theile pq ist, so ist die Gesamtsumme kleiner als $pq \cdot \frac{\delta}{q} \cdot \varepsilon = p\delta\varepsilon = (b-a)\varepsilon$. Da nun ε beliebig klein ist, so folgt daraus, dass die Summe $\sum \delta_\nu D_\nu$ gegen Null convergirt, wenn sämmtliche δ unendlich klein werden.

Wir gehen nun zu dem allgemeinen Falle über, wo die Function $f(x)$ zwischen a und b an endlich vielen Stellen unendlich wird. Es seien $c_1, c_2, \dots, c_m$ die Stellen, wo die Function unendlich wird, und es sei α eine beliebig kleine positive Grösse. Wir umgeben jede dieser Stellen mit einem Intervalle von der Länge α , so dass die Function ausserhalb dieser Intervalle endlich bleibt. Dann convergirt, wie eben bewiesen, die Summe $\sum \delta_\nu D_\nu$ für den Theil des Intervalles (a, b) , welcher ausserhalb dieser Intervalle liegt, gegen Null, wenn sämmtliche δ unendlich klein werden; und da die Gesamtlänge der Intervalle, in welchen die Function unendlich wird, $m\alpha$ ist, und die Schwankung der Function in jedem dieser Intervalle unendlich gross sein kann, so ist die Summe der Producte aus der Länge jedes dieser Intervalle in die zugehörige Schwankung jedenfalls kleiner als $m\alpha D$, wo D eine endliche Grösse ist. Da nun α beliebig klein ist, so folgt daraus, dass auch diese Summe beliebig klein gemacht werden kann, und daher die Gesamtsumme $\sum \delta_\nu D_\nu$ gegen Null convergirt.

Es bleibt noch der Fall zu untersuchen, wo die Function an unendlich vielen Stellen unendlich wird. Dieser Fall lässt sich auf den vorigen zurückführen, wenn man die Stellen, wo die Function unendlich wird, in zwei Classen eintheilt, je nachdem die Function in einer endlichen oder unendlichen Anzahl von Stellen des Intervalles unendlich wird.

6.

Wir haben bisher vorausgesetzt, dass die Function $f(x)$ zwischen den Grenzen des Integrals endlich ist, d. h. dass es keine Stelle giebt, wo sie unendlich wird. Diese Voraussetzung ist nun offenbar für die Gültigkeit des Begriffs eines bestimmten Integrals nicht nothwendig; denn es giebt Functionen, die in unendlich vielen Stellen unendlich werden, und dennoch ein bestimmtes Integral haben.

Als Beispiel einer solchen Function führen wir die Function an, welche durch die Reihe definiert wird:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(nx)}{n},$$

wo (nx) den Ueberschuss von nx über die nächste ganze Zahl, oder, wenn dieser Zwischen zwei ganzen Zahlen in der Mitte liegt, die Null bedeutet. Diese Function ist für alle rationalen Werthe von x von der Form $\frac{p}{2n}$ (wo p eine ungerade, mit n theilerfremde Zahl ist) unendlich, und für alle übrigen Werthe endlich. Sie hat jedoch ein bestimmtes Integral, wie sich leicht zeigen lässt.

Es sei nämlich ε eine beliebig kleine positive Grösse. Wir umgeben jede der Stellen, wo die Function unendlich wird, mit einem Intervalle von der Länge ε , und bezeichnen die Gesamtlänge dieser Intervalle durch L . Da nun die Function ausserhalb dieser Intervalle endlich ist, und die Summe $\sum \delta_\nu D_\nu$ für diesen Theil des Intervalles gegen Null convergirt, so bleibt nur zu zeigen, dass die Summe für die Intervalle, in welchen die Function unendlich wird, beliebig klein gemacht werden kann. Dies folgt aber daraus, dass die Anzahl dieser Intervalle endlich ist, und dass daher ihre Gesamtlänge L beliebig klein gemacht werden kann.

7.

Wir wollen nun die Frage untersuchen, unter welchen Bedingungen eine Function durch eine trigonometrische Reihe darstellbar ist, ohne besondere Voraussetzungen über die Natur der Function zu machen.

Es sei $f(x)$ eine gegebene Function, welche sich nach dem Intervall 2π periodisch wiederholt, und es

sei angenommen, dass sie durch eine trigonometrische Reihe

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

darstellbar ist. Dann muss, wie Fourier zeigte,

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$$

sein, und es handelt sich darum, zu untersuchen, ob die Reihe mit diesen Coefficienten wirklich gegen $f(x)$ convergirt.

Wir bezeichnen durch Ω den Werth der unendlichen Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2},$$

und bilden die Function

$$F(x) = C + C'x + \frac{a_0 x^2}{4} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n \cos nx + b_n \sin nx}{n^2},$$

wo C und C' willkürliche Constanten sind. Diese Function ist stetig und hat die Eigenschaft, dass

$$\frac{F(x + \alpha + \beta) - F(x + \alpha - \beta) - F(x - \alpha + \beta) + F(x - \alpha - \beta)}{4\alpha\beta}$$

gegen $f(x)$ convergirt, wenn α und β unendlich klein werden.

8.

Lehrsatz 0.1. *Falls die Reihe Ω convergirt, convergirt*

$$\frac{F(x + \alpha + \beta) - F(x + \alpha - \beta) - F(x - \alpha + \beta) + F(x - \alpha - \beta)}{4\alpha\beta}$$

mit α und β gegen $f(x)$.

Es ist nämlich

$$\begin{aligned} & F(x + \alpha + \beta) - F(x + \alpha - \beta) - F(x - \alpha + \beta) + F(x - \alpha - \beta) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^2} [\cos n(x + \alpha + \beta) - \cos n(x + \alpha - \beta) - \cos n(x - \alpha + \beta) + \cos n(x - \alpha - \beta)] \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n^2} [\sin n(x + \alpha + \beta) - \sin n(x + \alpha - \beta) - \sin n(x - \alpha + \beta) + \sin n(x - \alpha - \beta)]. \end{aligned}$$

Nun ist aber

$$\cos n(x + \alpha + \beta) - \cos n(x + \alpha - \beta) - \cos n(x - \alpha + \beta) + \cos n(x - \alpha - \beta) = 4 \sin n\alpha \sin n\beta \cos nx,$$

und ebenso

$$\sin n(x + \alpha + \beta) - \sin n(x + \alpha - \beta) - \sin n(x - \alpha + \beta) + \sin n(x - \alpha - \beta) = 4 \sin n\alpha \sin n\beta \sin nx.$$

Es wird daher

$$\frac{F(x + \alpha + \beta) - F(x + \alpha - \beta) - F(x - \alpha + \beta) + F(x - \alpha - \beta)}{4\alpha\beta} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n\alpha} \cdot \frac{\sin n\beta}{n\beta} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

Da nun $\frac{\sin n\alpha}{n\alpha}$ und $\frac{\sin n\beta}{n\beta}$ mit abnehmenden α und β gegen 1 convergiren, und die Reihe $\sum (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ convergirt, so convergirt auch das Product der beiden Factoren gegen die Summe der Reihe, d. h. gegen $f(x)$.

Lehrsatz 0.2. *Es ist*

$$\mu\mu \int_b^c F(x) \cos \mu(x-a) \lambda(x) dx,$$

wenn $\lambda(x)$ und $\lambda'(x)$ für $x = b$ und $x = c$ verschwinden und zwischen denselben stetig bleiben, mit unendlichem Wachsen von μ zuletzt unendlich klein.

Der Beweis dieses Satzes beruht auf einer zweimaligen Integration durch Theile. Es ergibt sich nämlich, wenn man die Bezeichnung

$$B_{\mu+n} = \frac{\cos(\mu+n)(x-a)}{\mu+n}, \quad C_{\mu+n} = \frac{\sin(\mu+n)(x-a)}{\mu+n}$$

einführt,

$$\begin{aligned} \mu\mu \int_b^c F(x) \cos \mu(x-a) \lambda(x) dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu\mu \int_b^c (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \cos \mu(x-a) \lambda(x) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu\mu}{\mu+n} \int_b^c a_n [\cos(\mu+n)(x-a) + \cos(\mu-n)(x-a)] \lambda(x) dx \\ &\quad + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu\mu}{\mu+n} \int_b^c b_n [\sin(\mu+n)(x-a) - \sin(\mu-n)(x-a)] \lambda(x) dx. \end{aligned}$$

Durch zweimalige Integration durch Theile erhält man hieraus den zu beweisenden Satz.

9.

Mit Hülfe dieser Sätze lässt sich nun die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe unter folgenden Voraussetzungen beweisen:

- I. Es sei die Function $f(x)$ durchgehend endlich und eine Integration zulassend.
- II. Es giebe eine stetige Function $F(x)$, so dass für beliebige x

$$\frac{F(x+\alpha+\beta) - F(x+\alpha-\beta) - F(x-\alpha+\beta) + F(x-\alpha-\beta)}{4\alpha\beta}$$

gegen $f(x)$ convergirt, wenn α und β unendlich klein werden.

III. Es sei

$$\mu\mu \int_b^c F(x) \cos \mu(x-a) \lambda(x) dx$$

für jede Function $\lambda(x)$, die für $x = b$ und $x = c$ verschwindet und zwischen denselben stetig bleibt, mit unendlichem Wachsen von μ zuletzt unendlich klein.

10.

Setzt man

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\mu} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = S_{\mu},$$

so muss, wenn die Coefficienten a_n, b_n zuletzt unendlich klein werden,

$$S_{\mu} - f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x+2\alpha) + f(x-2\alpha) - 2f(x)] \frac{\sin(2\mu+1)\alpha}{\sin \alpha} d\alpha.$$

Hieraus ergibt sich, dass wenn die Coefficienten zuletzt unendlich klein werden, die Convergenz der Reihe nur davon abhängt, wie sich das Integral

$$\int_0^{\varepsilon} [f(x+2\alpha) + f(x-2\alpha) - 2f(x)] \frac{\sin(2\mu+1)\alpha}{\sin \alpha} d\alpha$$

bei unendlichem Wachsen von μ verhält.

11.

Es sei nun $f(x)$ eine Function, welche zwischen $-\pi$ und π eine Integration zulässt und nicht unendlich viele Maxima und Minima hat. Dann convergirt die trigonometrische Reihe, deren Coefficienten durch die Fourier'schen Formeln bestimmt sind, gegen $f(x)$ in allen Punkten, wo $f(x)$ stetig ist, und gegen den Mittelwerth der Grenzwerte in den Unstetigkeitspunkten.

12.

Die vorstehenden Sätze zeigen, dass die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe in sehr allgemeinen Fällen stattfindet, und sie geben zugleich ein Mittel an die Hand, in jedem speciellen Falle zu entscheiden, ob die Darstellung möglich ist oder nicht.

Es bleibt noch übrig, einige Beispiele von Functionen anzuführen, welche nicht durch trigonometrische Reihen darstellbar sind. Als solche können die Functionen dienen, welche unendlich viele Maxima und Minima in jedem endlichen Intervalle haben, und die doch einer Integration fähig sind.

13.

Was die Functionen betrifft, welche unendlich viele Maxima und Minima haben, so ist es leicht, sich solche zu bilden, welche einer Integration fähig sind. Man nehme z. B. eine Reihe von positiven Grössen $c_1, c_2, c_3, \dots$, welche gegen Null convergiren, und bilde die Function

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi\left(\frac{x - x_n}{\delta_n}\right),$$

wo $\varphi(x)$ eine Function ist, welche nur im Intervalle $(0, 1)$ von Null verschieden ist, und x_n, δ_n beliebige Grössen sind.

Als Beispiel einer Function, welche unendlich oft unendlich wird und dennoch ein bestimmtes Integral hat, führen wir die Function an:

$$\frac{d}{dx} \left(x^\nu \cos \frac{1}{x} \right),$$

wo ν eine beliebige positive Zahl ist. Diese Function wird für $x = 0$ unendlich oft unendlich, und zwar so, dass die Ordnung des Unendlichwerdens mit abnehmendem x unbegrenzt wächst; dennoch hat das Integral

$$\int_0^c \frac{d}{dx} \left(x^\nu \cos \frac{1}{x} \right) dx = c^\nu \cos \frac{1}{c}$$

einen bestimmten Werth.

Inhalt.

	Seite
<i>Geschichte der Frage über die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe.</i>	
§. 1. Von Euler bis Fourier.	
Ursprung der Frage in dem Streite über die Tragweite der d'Alembert'schen und Bernoulli'schen Lösung des Problems der schwingenden Saiten im Jahre 1753.	
Ansichten von Euler, d'Alembert, Lagrange	227
§. 2. Von Fourier bis Dirichlet.	
Richtige Ansicht Fourier's, bekämpft von Lagrange. 1807.	232
Cauchy. 1826	
§. 3. Seit Dirichlet.	
Erledigung der Frage durch Dirichlet für die in der Natur vorkommenden Functionen. 1829. Dirksen. Bessel. 1839.....	235
<i>Ueber den Begriff eines bestimmten Integrals und den Umfang seiner Gültigkeit.</i>	
§. 4. Definition eines bestimmten Integrals	239
§. 5. Bedingungen der Möglichkeit eines bestimmten Integrals	240
§. 6. Besondere Fälle	241
<i>Untersuchung der Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe, ohne besondere Voraussetzungen über die Natur der Function.</i>	
§. 7. Plan der Untersuchung	244
I. Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigo- metrische Reihe, deren Coefficienten zuletzt unendlich klein werden.	
§. 8. Beweise einiger für diese Untersuchung wichtigen Sätze	245
§. 9. Bedingungen für die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe mit zuletzt unendlich kleinen Coefficienten	252
II. Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigo- metrische Reihe mit beliebigen Coefficienten.	
§. 10. Zurückführung dieser Untersuchung auf die vorige	255
§. 11. Beweis des Hauptsatzes	258
§. 12. Beispiele von nicht durch trigonometrische Reihen dar- stellbaren Functionen	260
§. 13. Functionen mit unendlich vielen Maxima und Minima	261
Anmerkungen	266

Anmerkungen.

(1) (Zu Seite 237. Anmerkung.) Nehmen wir an, dass die Function $f(x)$ in dem Intervalle zwischen x und $x + h$, $h > 0$, nicht wachse, und bezeichnen wir mit g die obere Grenze der Werthe, die $f(x + \xi)$ für $0 < \xi < h$ annimmt, d. h. einen Werth, der von keinem dieser Functionswerthe überschritten, aber mit jedem beliebigen Grad von Annäherung erreicht wird, so wird $g - f(x + \xi)$ mit wachsendem ξ niemals abnehmen, während es doch beliebig klein werden soll, d. h. es ist $\lim_{\xi=0}(g - f(x + \xi)) = 0$, $g = f(x + 0)$. Der Satz, dass ein System reeller Zahlen $\mathfrak{S}$, dessen in endlicher, oder unendlicher Zahl vorhandene Individuen s einen endlichen Zahlwerth nicht übersteigen, eine obere Grenze hat, ist wohl zuerst von Weierstrass präcis ausgesprochen und bewiesen (vgl. O. Biermann, *Theorie der analytischen Functionen* §. 16. Leipzig, Teubner, 1884). Sehr einfach ist der Beweis auf Grund der Anschauungen von Dedekind über Irrationalzahlen (Stetigkeit und irrationale Zahlen, Braunschweig, Vieweg, 1872). Theilt man nämlich die reelle Zahlenreihe in zwei Theile A und B ein, so dass jede Zahl a in A von Zahlen des Systems $\mathfrak{S}$ überschritten, jede Zahl b in B nicht überschritten wird, so werden diese beiden Theile A und B durch eine existirende Zahl g getrennt, der offenbar die charakterischen Merkmale der oberen Grenze von $\mathfrak{S}$ zukommen.

(2) (Zu Seite 241.) Es findet sich hierzu eine fragmentarische handschriftliche Bemerkung von Riemann, die wir folgendermassen herzustellen versuchen, da sie zur Vervollständigung des Beweises nothwendig ist, dass das Verschwinden von A mit δ auch die für die Convergenz von S ausreichende Bedingung ist. Es könnte scheinen als ob, wenn auch bei zwei verschiedenen Eintheilungen, in denen die Grösse δ unter einer beliebigen Grenze liegt, die Summe S sich derselben Grenze A nähert, dies dennoch bei einer dritten Eintheilung, die aus den beiden ersten zusammengesetzt ist, nicht der Fall sein könnte. Dies ist aber unmöglich. Denn es sei S_1 die Summe für die erste, S_2 die Summe für die zweite, S_3 die Summe für die dritte Eintheilung, und es sei ε eine beliebig kleine positive Grösse. Dann kann man, da S_1 und S_2 sich der Grenze A nähern, δ so klein annehmen, dass $|S_1 - S_2| < \varepsilon$, $|S_1 - A| < \varepsilon$, $|S_2 - A| < \varepsilon$, und da S_3 zwischen S_1 und S_2 liegt, so ist auch $|S_3 - A| < \varepsilon$, d. h. S_3 convergirt ebenfalls gegen A .

(3) (Zu Seite 243.) Dass jede endliche Function $f(x)$, die zwischen den Grenzen a und b nicht wächst, und folglich jede Function, die nicht unendlich viele Maxima und Minima hat, einer Integration fähig ist, beweist man so.

Es sei

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b,$$

$$v_1 - w_1 = D_1, \quad v_2 - w_2 = D_2, \quad \dots, \quad v_{n-1} - w_{n-1} = D_{n-1},$$

wo v_ν und w_ν die obere und untere Grenze von $f(x)$ im Intervalle $(x_\nu, x_{\nu+1})$ bedeuten. Dann ist

$$D_1\delta_1 + D_2\delta_2 + \dots + D_{n-1}\delta_{n-1} = f(a) - f(b).$$

Da nach Voraussetzung $f(x)$ nicht wächst, so sind die Grössen $D_1, D_2, \dots, D_{n-1}$ die grössten Schwankungen in den Intervallen $\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_{n-1}$ und alle positiv oder wenigstens keines von ihnen negativ. Ist m die Anzahl derjenigen Intervalle, in denen $D > \sigma$, so ist $m\sigma < f(a) - f(b)$ oder

$$m < \frac{f(a) - f(b)}{\sigma}.$$

Sind also die sämtlichen Intervalle δ kleiner als d , so ist die Gesamtgrösse der Intervalle, von denen die grösste Schwankung grösser als σ ist,

$$< \frac{f(a) - f(b)}{\sigma} d$$

und wird also, w. z. b. w., mit d zugleich unendlich klein.

(4) (Zu Seite 251.) Die hier gebrauchten Grössen $B_{\mu+n}$ haben den Ausdruck

$$B_{\mu+n} = \frac{1}{2} \cos(\mu + n)(x - a)(a_n \sin na + b_n \cos na) \\ + \frac{1}{2} \sin(\mu + n)(x - a)(a_n \cos na - b_n \sin na),$$

$$B_{\mu-n} = \frac{1}{2} \cos(\mu - n)(x - a)(a_n \sin na + b_n \cos na) \\ - \frac{1}{2} \sin(\mu - n)(x - a)(a_n \cos na - b_n \sin na).$$

Zur Ergänzung ist noch zu beweisen, dass auch

$$\mu \int_b^c \left(C + C'x + A \frac{x^2}{2} \right) \cos \mu(x - a) \lambda(x) dx$$

den Grenzwert 0 hat. Dies erreicht man wohl am einfachsten, wenn man

$$C + C'x + A\frac{x^2}{2}$$

in eine nach den Sinus und Cosinus der Vielfachen von $(x - a)$ fortschreitende Reihe entwickelt.

(5) (Zu Seite 262.) Die unter II. aufgestellten Sätze bedürfen einer Erläuterung:

Da die Function $f(x)$ um 2π periodisch angenommen ist, so muss

$$F(x + 2\pi) - F(x) = \text{const.}$$

die Eigenschaft haben, dass

$$\frac{\varphi(x + \alpha + \beta) - \varphi(x + \alpha - \beta) - \varphi(x - \alpha + \beta) + \varphi(x - \alpha - \beta)}{4\alpha\beta}$$

unter der im Text gemachten Voraussetzung sich mit α und β der Grenze 0 nähert. Es sei aber $\varphi(x)$ eine lineare Function von x , und folglich lassen sich die Constanten C , C' , A so bestimmen, dass

$$\psi(x) = F(x) - C'x - A\frac{x^2}{2}$$

eine um 2π periodische Function von x ist.

Nun ist über die Function $F(x)$ weiter die Voraussetzung gemacht, dass für beliebige Grenzen b , c

$$\mu\mu \int_b^c F(x) \cos \mu(x - a) \lambda(x) dx$$

mit unendlich wachsendem μ sich der Grenze 0 nähert, wenn $\lambda(x)$ den im Text angegebenen Bedingungen genügt, woraus folgt, dass unter den gleichen Voraussetzungen

$$\mu\mu \int_b^c \psi(x) \cos \mu(x - a) \lambda(x) dx$$

sich der Grenze 0 nähert.

Es sei nun $b < -\pi$, $c > \pi$, und man nehme, was zulässig ist, $\lambda(x)$ im Intervall von $-\pi$ bis $+\pi = 1$, so folgt, dass auch:

$$\mu\mu \int_{-\pi}^{\pi} \psi(x) \cos \mu(x - a) dx$$

sich der Grenze 0 nähert.

(6) (Zu Seite 253.) Hier scheint für die Function $\lambda(x)$ die Bedingung hinzugefügt werden zu müssen, dass sie sich nach dem Intervall 2π periodisch wiederholt (die mit der nachher gemachten Annahme verträglich ist). In der That wurde z. B. das in Rede stehende Integral nicht sich der Grenze 0 nähern, wenn $F(x) - C'x - A\frac{x^2}{2} = \text{const.}$ und $\lambda(x) = (x - a)^2$ gesetzt würde. Dagegen lässt sich unter der Voraussetzung der Periodicität von $\lambda(x)$ das Verschwinden dieses Integrals durch Ausführung der Differentiation und durch Anwendung des Satzes 3, Art. 8 und eines ähnlichen Verfahrens wie in der Anmerkung (5) leicht darthun.

Gingen die Anmerkungen (5) (6), die in der ersten Auflage dieser Gesamtausgabe die Nummern (1) (2) hatten, hat Ascoli⁸ in einer Abhandlung über trigonometrische Reihen (Accademia dei Lincei 1880) verschiedene Bedenken erhoben. Sie sollen gleichwohl hier unverändert bleiben; nur möge Folgendes beigelegt werden.

Der Beweis des Satzes, nach dem die in der Anmerkung (5) mit $\varphi(x)$ bezeichnete Function eine lineare sein muss (für den ich auf eine Abhandlung von G. Cantor in Crelle's Journal Bd. 72, S. 141 verweise), setzt allerdings voraus, dass die Function $f(x)$ für jeden Werth von x existirt (also auch endlich ist). Mir scheinen aber die Nummern I, II des Art. 9 überhaupt nur dann ganz verständlich, wenn diese Existenz vorausgesetzt wird, selbst dann, wenn man wie Ascoli die Voraussetzung der Integrabilität fallen lässt.

⁸G. Ascoli, *Sulle serie trigonometriche*. Accademia dei Lincei 1880.

XIII. Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen.

(Aus dem dreizehnten Bande der Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen.)⁹

Plan der Untersuchung.

Bekanntlich setzt die Geometrie sowohl den Begriff des Raumes, als die ersten Grundbegriffe für die Constructionen im Räume als etwas Gegebenes voraus. Sie giebt von ihnen nur Nominaldefinitionen, während die wesentlichen Bestimmungen in Form von Axiomen auftreten. Das Verhältniss dieser Voraussetzungen bleibt dabei im Dunkeln; man sieht weder ein, ob und in wie weit ihre Verbindung nothwendig, noch a priori, ob sie möglich ist.

Diese Dunkelheit wurde auch von Euklid bis auf Legendre, um den berühmtesten neueren Bearbeiter der Geometrie zu nennen, weder von den Mathematikern, noch von den Philosophen, welche sich damit beschäftigten, gehoben. Es hatte dies seinen Grund wohl darin, dass der allgemeine Begriff mehrfach ausgedehnter Grössen, unter welchem die Raumgrössen enthalten sind, ganz unbearbeitet blieb. Ich habe mir daher zunächst die Aufgabe gestellt, den Begriff einer mehrfach ausgedehnten Grösse aus allgemeinen Grössenbegriffen zu construiren. Es wird daraus hervorgehen, dass eine mehrfach ausgedehnte Grösse verschiedener Massverhältnisse fähig ist und der Raum also nur einen besonderen Fall einer dreifach ausgedehnten Grösse bildet. Hieraus aber ist eine nothwendige Folge, dass die Sätze der Geometrie sich nicht aus allgemeinen Grössenbegriffen ableiten lassen, sondern dass diejenigen Eigenschaften, durch welche sich der Raum von anderen denkbaren dreifach ausgedehnten Grössen unterscheidet, nur aus der Erfahrung entnommen werden können. Hieraus entsteht die Aufgabe, die einfachsten Thatsachen aufzusuchen, aus denen sich die Massverhältnisse des Raumes bestimmen lassen — eine Aufgabe, die der Natur der Sache nach nicht vollkommen bestimmt ist; denn es lassen sich mehrere Systeme einfacher Thatsachen angeben, welche zur Bestimmung der Massverhältnisse des Raumes hinreichen; das wichtigste ist für den gegenwärtigen Zweck das von Euklid zu Grunde gelegte. Diese Thatsachen sind wie alle Thatsachen nicht nothwendig, sondern nur von empirischer Gewissheit, sie sind Hypothesen; man kann also ihre Untersuchung auf das Gebiet der Naturwissenschaft zurückführen, und zwar auf das der Physik, oder genauer der Astronomie, und dies ist die Aufgabe, welcher sich die nachfolgende Abhandlung widmet.

I. Begriff einer mehrfach ausgedehnten Grösse.

1.

Grössenbegriffe sind nur da möglich, wo sich ein allgemeiner Begriff auffinden lässt, der verschiedene Bestimmungsweisen zulässt. Je nachdem unter diesen Bestimmungsweisen eine stetige oder discrete Reihe bildende Mannigfaltigkeit stattfindet oder nicht, können sie von einander einzeln oder stetig abhängen; in dem ersteren Falle bilden sie eine stetige, in dem letzteren eine discrete Mannigfaltigkeit. Die einzelnen durch eine Auflösung erzeugten Bestimmungsweisen heben sich in der letzteren als Glieder der Mannigfaltigkeit hervor, in der ersteren sind es nicht möglich. Ein charakteristisches Merkmal ist, dass in einer discreten Mannigfaltigkeit die Bestimmungsweisen durch Zählung, in einer stetigen durch Messung unterschieden werden. Für die letztere ist das Merkmal des Messens in den Grössen, welche eine unabhängige ausser ihr liegende Einheit haben, das Aufsuchen des Maasses durch Vergleichung mit einer andern Grösse; das Messen besteht aber in einem Aufeinanderlegen der zu vergleichenden Grössen; zum Messen wird also ein Mittel erfordert, die eine Grösse als Massstab für die andere fortzutragen. Fehlt dieses, so kann man zwei Grössen nur vergleichen, wenn die eine ein Theil der andern ist, und auch dann nur das Mehr oder Minder, nicht das Wieviel entscheiden. Die Untersuchungen, welche sich in diesem Falle über sie anstellen lassen, bilden einen allgemeinen von Massbestimmungen unabhängigen Theil der Grössenlehre, wo die Grössen nicht als unabhängig von der Lage existirend und nicht als durch eine Einheit ausdrückbar betrachtet, sondern als Gebiete in einer Mannigfaltigkeit betrachtet werden. Solche Untersuchungen sind für mehrere Theile der Mathematik, namentlich für die Zahlentheorie und für die Behandlung der stetigen Grössen, nöthig geworden, und der Mangel derselben ist wohl der Hauptgrund, warum der berühmte Satz von Euler, dass $a + b\sqrt{-1}$ eine Primzahl von der Form $m + n\sqrt{-1}$ ist, wenn $a^2 + b^2$ eine reelle Primzahl von der Form $4n + 1$ ist, nicht streng zu beweisen ist, und warum die Lehre

⁹Diese Abhandlung ist am 10. Juni 1854 von dem Verfasser bei dem zu seinem Habilitationsacte veranstalteten Colloquium mit der philosophischen Facultät zu Göttingen vorgelesen worden. Hieraus erklärt sich die Form der Darstellung, in welcher die analytischen Untersuchungen durch allgemeine über den Begriff der Grösse zurücktreten.

von den reciproken Verhältnissen in der Zahlentheorie sich auf die Behandlung der complexen Grössen, die in einem viel weiteren Umfange Anwendung findet, nicht hat ausdehnen lassen.

2.

Wenn man in einem Begriffe, dessen Bestimmungsweisen eine stetige Mannigfaltigkeit bilden, von einer Bestimmungsweise auf eine bestimmte Art zu einer andern fortschreitet, so bilden die durchlaufenen Bestimmungsweisen eine einfach ausgedehnte Mannigfaltigkeit, deren wesentliches Merkmal ist, dass in ihr von einem Punkte nur nach zwei Seiten, vorwärts oder rückwärts, ein stetiger Fortschritt möglich ist. Denken wir uns nun, dass diese Mannigfaltigkeit wieder für einen der so entstandenen Punkte in eine andere bestimmte Art übergeht, so bilden die durchlaufenen Bestimmungsweisen zusammen eine zweifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit.

In ähnlicher Weise erhält man, wenn man eine zweifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit für einen der Punkte in eine neue bestimmte Art übergehen lässt, eine dreifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit, und man sieht leicht, wie man diese Construction fortsetzen kann. Wenn man bei dem Begriffe der stetigen Mannigfaltigkeit statt des bestimmten Verhältnisses die beliebige Variation der Bestimmungsweise betrachtet, so erhält man den Begriff des Raumes und der Dimensionen.

Die Construction des n -fach ausgedehnten Grössenbegriffs aus dem Begriffe des Variirens erfordert offenbar, dass man einen allgemeinen Begriff habe, der n unabhängige Bestimmungsweisen zulässt. Die Stelle in einem Gebilde und der Punkt im Raume sind die einzigen einfachen Begriffe, deren Bestimmungsweisen eine mehrfach ausgedehnte Mannigfaltigkeit bilden. Häufigere Veranlassung zur Erzeugung und Ausbildung dieser Begriffe findet sich erst in der höhern Mathematik.

Bestimmte, durch ein Merkmal oder eine Grenze unterschiedene Theile einer Mannigfaltigkeit heissen Quanta. Ihre Vergleichung der Quantität nach geschieht bei den discreten Grössen durch Zählung, bei den stetigen durch Messung. Das Messen besteht in einem Aufeinanderlegen der zu vergleichenden Grössen; zum Messen wird also ein Mittel erfordert, die eine Grösse als Massstab für die andere fortzutragen. Fehlt dieses, so kann man zwei Grössen nur vergleichen, wenn die eine ein Theil der andern ist, und auch dann nur das Mehr oder Minder, nicht das Wieviel entscheiden. Die Untersuchungen, welche sich in diesem Falle über sie anstellen lassen, bilden einen allgemeinen von Massbestimmungen unabhängigen Theil der Grössenlehre, wo die Grössen nicht als unabhängig von der Lage existirend und nicht als durch eine Einheit ausdrückbar betrachtet, sondern als Gebiete in einer Mannigfaltigkeit betrachtet werden.

3.

Die Maassverhältnisse, unter denen eine mehrfach ausgedehnte Grösse als stetig angenommen wird, hängen von der Art des Ausdrucks ab, welcher die Ortsbestimmung in dieser Mannigfaltigkeit vermittelt. Der allgemeine Begriff der mehrfach ausgedehnten Mannigfaltigkeiten, wie er oben entwickelt wurde, gestattet verschiedene Bestimmungsweisen und ist daher auch der Ausgangspunkt für die Construction eines Systems von Maassbestimmungen, wenn nicht schon ein Maass in der Natur der Mannigfaltigkeit liegt.

Diese Aufgabe kann so formuliert werden: Es sei eine Mannigfaltigkeit von n Dimensionen gegeben; man soll ein System von Maassbestimmungen für dieselbe aufstellen, d. h. eine Function der Coordinaten angeben, durch welche die Länge einer Linie unabhängig von ihrer Lage bestimmt wird. Diese Aufgabe ist erst in neuerer Zeit durch die Arbeiten von Gauss über die krummen Flächen allgemein behandelt worden. Gauss hat den Grundstein zu einem allgemeinen Princip gelegt, indem er zeigte, dass die Natur einer krummen Fläche von ihrer Lage im Raume unabhängig ist, und dass die Eigenschaften derselben sich aus der Darstellung des Linielements auf der Fläche durch eine quadratische Differentialform ableiten lassen.

II. Maassverhältnisse, unter denen eine mehrfach ausgedehnte Grösse als stetig angenommen wird.

1.

Der Ausdruck des Linielements in einer n -fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit kann nach einem Satze von Gauss als eine quadratische Form der Differentiale der Coordinaten dargestellt werden:

$$ds^2 = \sum_{i,k=1}^n g_{ik} dx_i dx_k,$$

wo die Coefficienten g_{ik} Functionen der Coordinaten $x_1, x_2, \dots, x_n$ sind. Diese Functionen müssen der Bedingung genügen, dass ds^2 stets positiv ist, und dass die Determinante der g_{ik} nicht verschwindet.

Aus diesem Ausdruck des Linielements lassen sich alle übrigen Maassverhältnisse ableiten. Die Länge einer Linie ist durch das Integral $\int ds$ gegeben, und die kürzeste Linie zwischen zwei Punkten ist daher durch die Bedingung bestimmt, dass dieses Integral ein Minimum wird.

2.

Die Krümmung einer Fläche in einem Punkte wird von Gauss als das Maass der Abweichung der Fläche von der Ebene in diesem Punkte definirt. Sie hängt nur von den Werthen der Coefficienten g_{ik} und ihren ersten und zweiten Differentialquotienten in diesem Punkte ab, und ist daun von der Art der Einbettung der Fläche im Raume unabhängig. Diese Krümmung, welche wir das Krümmungsmaass nennen wollen, kann für eine n -fach ausgedehnte Mannigfaltigkeit auf folgende Weise definirt werden.

Es sei ein Flächenelement in der Mannigfaltigkeit gegeben, d. h. ein System von Werthen der Coordinaten, in welchem alle Coordinaten ausser zwei constant sind. Dann bestimmt dieses Flächenelement eine krumme Fläche, welche in die Mannigfaltigkeit eingebettet ist, und das Krümmungsmaass dieser Fläche im gegebenen Punkte ist das Krümmungsmaass der Mannigfaltigkeit in diesem Punkte für das gegebene Flächenelement.

3.

Die Bestimmung des Krümmungsmaasses einer n -fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit beruht auf der Lösung folgender Aufgabe: Aus den Coefficienten g_{ik} des Linielements und ihren Differentialquotienten eine Grösse zu bilden, welche für jede Transformation der Coordinaten unverändert bleibt. Diese Grösse ist das Krümmungsmaass.

Es zeigt sich, dass das Krümmungsmaass in jedem Punkte der Mannigfaltigkeit durch $\frac{n(n-1)}{2}$ unabhängige Bestimmungen gegeben ist. Für den speciellen Fall der dreifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit ist die Zahl dieser Bestimmungen = 3. Das Krümmungsmaass ist im Allgemeinen von der Lage des Flächenelements abhängig; wenn es aber für jedes Flächenelement durch denselben Werth gegeben ist, so hängt es nur noch von der Stelle in der Mannigfaltigkeit ab.

4.

Wenn das Krümmungsmaass in jedem Punkte einer Mannigfaltigkeit für jedes Flächenelement denselben Werth hat, so ist die Mannigfaltigkeit überall gleich gekrümmt. Eine solche Mannigfaltigkeit kann auf eine Mannigfaltigkeit mit constanten Coefficienten g_{ik} abgebildet werden, wenn das Krümmungsmaass Null ist; im Allgemeinen lässt sie sich nur auf eine Mannigfaltigkeit mit demselben Krümmungsmaasse abbilden.

Die Mannigfaltigkeiten mit constantem Krümmungsmaasse bilden eine besondere Classe unter den allgemeinen Mannigfaltigkeiten. Sie sind dadurch charakterisirt, dass sich die Figuren in ihnen ohne Dehnung bewegen lassen. Die Geometrie auf einer solchen Mannigfaltigkeit ist völlig analog der Euclid'schen Geometrie auf einer Ebene, wenn das Krümmungsmaass Null ist, und lässt sich für ein beliebiges Krümmungsmaass auf ähnliche Weise entwickeln.

III. Anwendung auf den Raum.

1.

Nach dem Obigen ist der Raum eine dreifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit, und die Euclid'sche Geometrie ist die Lehre von den Eigenschaften des Raumes, wenn das Krümmungsmaass überall Null ist. Es bleibt nun zu untersuchen, in wie weit diese Voraussetzung durch die Erfahrung gerechtfertigt ist, und ob möglicherweise das Krümmungsmaass des Raumes einen von Null verschiedenen Werth haben könnte.

Die Frage nach der Gültigkeit der Axiome der Geometrie ist seit jeher mit der Frage nach dem Ursprunge unserer Erkenntniss von den räumlichen Verhältnissen verknüpft. Die Meinungen über diesen Ursprung sind sehr verschieden gewesen; einige haben die räumlichen Vorstellungen als angeboren betrachtet, andere haben sie aus der Erfahrung abgeleitet, wieder andere haben sie als Producte des Denkens angesehen.

2.

Die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen, lassen sich auf drei zurückführen:

1. Der Raum ist eine dreifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit.
2. Die Linien und Flächen im Raume sind unbegrenzt.
3. Das Krümmungsmaass des Raumes ist überall constant.

Die erste Hypothese ist durch die Erfahrung bestätigt, soweit unsere Wahrnehmungen reichen. Die zweite Hypothese ist nicht direct durch die Erfahrung zu prüfen, da wir nur einen endlichen Theil des Raumes kennen. Die dritte Hypothese ist die wichtigste und zugleich die schwierigste zu prüfen.

3.

Wenn das Krümmungsmaass des Raumes einen von Null verschiedenen Werth hätte, so müsste dies in den Verhältnissen der Grössen im Unendlichgrossen zum Vorschein kommen. Insbesondere würde die Summe der Winkel eines Dreiecks von 180° abweichen, und zwar wäre diese Abweichung um so grösser, je grösser das Dreieck ist. Die Beobachtung hat bisher keine solche Abweichung entdeckt; aber dies beweist nicht, dass das Krümmungsmaass genau Null ist, sondern nur, dass es, wenn es von Null verschieden ist, sehr klein sein muss.

4.

Es bleibt noch die Frage zu erörtern, wie, in welchem Grade und in welchem Umfange diese Voraussetzungen durch die Erfahrung verbürgt werden. In dieser Beziehung findet zwischen den blossen Ausdehnungsverhältnissen und den Massverhältnissen eine wesentliche Verschiedenheit statt, insofern bei ersterem, wo die möglichen Fälle eine discrete Mannigfaltigkeit bilden, die Aussagen der Erfahrung zwar nie völlig gewiss, aber nicht ungenau sind, während bei letztern, wo die möglichen Fälle eine stetige Mannigfaltigkeit bilden, jede Bestimmung aus der Erfahrung immer ungenau bleibt — es mag die Wahrscheinlichkeit, dass sie nahe richtig ist, noch so gross sein. Dieser Umstand wird wichtig bei der Ausdehnung dieser empirischen Bestimmungen über die Grenzen der Beobachtung in's Unmessbargrosse und Unmessbarkleine; denn die letztern können offenbar jenseits der Grenzen der Beobachtung immer ungenauer werden, die ersteren aber nicht.

Bei der Ausdehnung der Raumconstructions ins Unmessbargrosse ist Unbegrenztheit und Unendlichkeit zu scheiden; jene gehört zu den Ausdehnungsverhältnissen, diese zu den Massverhältnissen. Dass der Raum eine unbegrenzte dreifach ausgedehnte Mannigfaltigkeit sei, ist eine Voraussetzung, welche bei jeder Auffassung der Aussenwelt angewandt wird, nach welcher in jedem Augenblicke das Gebiet der wirklichen Wahrnehmungen ergänzt und die möglichen Orte eines gesuchten Gegenstandes construirt werden und welche sich bei diesen Anwendungen fortwährend bestätigt. Die Unbegrenztheit des Raumes besitzt daher eine grössere empirische Gewissheit, als irgend eine äussere Erfahrung. Hieraus folgt aber die Unendlichkeit keineswegs; vielmehr würde der Raum, wenn man Unabhängigkeit der Körper vom Ort voraussetzt, ihm also ein constantes Krümmungsmass zuschreibt, nothwendig endlich sein, so bald dieses Krümmungsmass einen noch so kleinen positiven Werth hätte. Man würde, wenn man die in einem Flächenelement liegenden Anfangsrichtungen zu kürzesten Linien verlängert, eine unbegrenzte Fläche mit constantem positivem Krümmungsmass, also eine Fläche erhalten, welche in einer ebenen dreifach ausgedehnten Mannigfaltigkeit die Gestalt einer Kugelfläche annehmen würde und welche folglich endlich ist.

Riemann — Gesammelte Werke (pp. 301–350)

Indice

XIII. Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen.	2
§ 3. In wie weit im Unendlichkleinen?	2
XIV. Ein Beitrag zur Elektrodynamik.	5
XV. Beweis des Satzes, dass eine einwerthige mehr als $2n$ fach periodische Function unmöglich ist.	11
XVI. Estratto di una lettera al Sig. Professore Enrico Betti.	15
XVII. Ueber die Fläche vom kleinsten Inhalt bei gegebener Begrenzung.	17
Anmerkungen.	50

XIII. Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen.

3.

Die Fragen ueber das Unmessbare sind fuer die Naturerklaerung muessige Fragen. Anders verhaelt es sich aber mit den Fragen ueber das Unmessbarkeine. Auf der Genauigkeit, mit welcher wir die Erscheinungen in's Unendlichkeine verfolgen, beruht wesentlich die Erkenntniss ihres Causalzusammenhangs. Die Fortschritte der letzten Jahrhunderte in der Erkenntniss der mechanischen Natur sind fast allein bedingt durch die Genauigkeit der Construction, welche durch die Erfindung der Analysis des Unendlichen und die von Archimed, Galiläi und Newton aufgefundenen einfachen Grundbegriffe, deren sich die heutige Physik bedient, möglich geworden ist. In den Naturwissenschaften aber, wo die einfachen Grundbegriffe zu solchen Constructionen bis jetzt fehlen, verfolgt man, um den Causalzusammenhang zu erkennen, die Erscheinungen in's räumlich Kleine, so weit es das Mikroskop nur gestattet. Die Fragen ueber die Massverhältnisse des Raumes im Unmessbarkeinen gehören also nicht zu den muessigen.

Setzt man voraus, dass die Körper unabhängig vom Ort existiren, so ist das Krümmungsmass ueberall constant, und es folgt dann aus den astronomischen Messungen, dass es nicht von Null verschieden sein kann; jedenfalls müsste sein reciprocer Werth eine Fläche sein, gegen welche das unsern Teleskopen zugängliche Gebiet verschwinden müsste. Wenn aber eine solche Unabhängigkeit der Körper vom Ort nicht stattfindet, so kann man aus den Massverhältnissen im Grossen nicht auf die im Unendlichkeinen schliessen; es kann dann in jedem Punkte das Krümmungsmass in drei Richtungen einen beliebigen Werth haben, wenn nur die ganze Krümmung jedes messbaren Raumtheils nicht merklich von Null verschieden ist; noch complicirtere Verhältnisse können eintreten, wenn die vorausgesetzte Darstellbarkeit eines Linienelements durch die Quadratwurzel aus einem Differentialausdruck zweiten Grades nicht stattfindet. Nun scheinen aber die empirischen Begriffe, in welchen die räumlichen Massbestimmungen gegründet sind, der Begriff des festen Körpers und des Lichtstrahls, im Unendlichkeinen ihre Gültigkeit zu verlieren; es ist also sehr wohl denkbar, dass die Massverhältnisse des Raumes im Unendlichkeinen den Voraussetzungen der Geometrie nicht gemäss sind, und dies würde man in der That annehmen müssen, sobald sich dadurch die Erscheinungen auf einfachere Weise erklären liessen.

Die Frage ueber die Gültigkeit der Voraussetzungen der Geometrie im Unendlichkeinen hängt zusammen mit der Frage nach dem Innern Grunde der Massverhältnisse des Raumes. Bei

wohl noch zur Lehre vom Räume gerechnet werden darf, kommt die obige Bemerkung zur Anwendung, dass bei einer discreten Mannigfaltigkeit das Princip der Massverhältnisse schon in dem Begriffe dieser Mannigfaltigkeit enthalten ist, bei einer stetigen aber anders woher hinzukommen muss. Es muss also entweder das dem Räume zu Grunde liegende Wirkliche eine discrete Mannigfaltigkeit bilden, oder der Grund der Massverhältnisse ausserhalb, in darauf wirkenden bindenden Kräften, gesucht werden.

Die Entscheidung dieser Fragen kann nur gefunden werden, indem man von der bisherigen durch die Erfahrung bewährten Auffassung der Erscheinungen, wozu Newton den Grund gelegt, ausgeht und diese durch Thatsachen, die sich aus ihr nicht erklären lassen, getrieben allmählich umarbeitet; solche Untersuchungen, welche, wie die hier geführte, von allgemeinen Begriffen ausgehen, können nur dazu dienen, dass diese Arbeit nicht durch die Beschränktheit der Begriffe gehindert und der Fortschritt im Erkennen des Zusammenhangs der Dinge nicht durch ueberlieferte Vorurtheile gehemmt wird.

Es führt dies hinüber in das Gebiet einer andern Wissenschaft, in das Gebiet der Physik, welches wohl die Natur der heutigen Veranlassung nicht zu betreten erlaubt.

Übersicht.

	Seite
Plan der Untersuchung	272
I. Begriff einer n fach ausgedehnten Grösse*)	273
§. 1. Stetige und discrete Mannigfaltigkeiten. Bestimmte Theile einer Mannigfaltigkeit heissen Quanta. Eintheilung der Lehre von den stetigen Grössen in die Lehre	
1) von den blossen Gebietsverhältnissen, bei welcher eine Unabhängigkeit der Grössen vom Ort nicht vorausgesetzt wird,	
2) von den Massverhältnissen, bei welcher eine solche Unabhängigkeit vorausgesetzt werden muss	273
§. 2. Erzeugung des Begriffs einer einfach, zweifach, ..., n fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit	275
§. 3. Zurückführung der Ortsbestimmung in einer gegebenen Mannigfaltigkeit auf Quantitätsbestimmungen. Wesentliches Kennzeichen einer n fach ausgedehnten Mannigfaltigkeit	275
II. Massverhältnisse, deren eine Mannigfaltigkeit von n Dimensionen fähig	

ist*), unter der Voraussetzung, dass die Linien unab-	276
hängig von der Lage eine Länge besitzen, also jede Linie	
durch jede messbar ist	
§. 1. Ausdruck des Linienelements. Als eben werden	277
solche Mannigfaltigkeiten betrachtet, in denen das Li-	
nienelement durch die Wurzel aus einer Quadratsumme	
vollständiger Differentialien ausdrückbar ist	
§. 2. Untersuchung der n -fach ausgedehnten Mannig-	279
faltigkeiten, in welchen das Linienelement durch die	
Quadratwurzel aus einem Differentialausdruck zweiten	
Grades dargestellt werden kann. Mass ihrer Abweichung	
von der Ebenheit (Krümmungsmass) in einem gegeb-	
enen Punkte und einer gegebenen Flächenrichtung. Zur	
Bestimmung ihrer Massverhältnisse ist es (unter gewis-	
sen Beschränkungen) zulässig und hinreichend, dass das	
Krümmungsmass in jedem Punkte in $\frac{1}{2}n(n-1)$ Flächen-	
richtungen beliebig gegeben wird	
§. 3. Geometrische Erläuterung	280
§. 4. Die ebenen Mannigfaltigkeiten (in denen das	281
Krümmungsmass allenthalben $= 0$ ist) lassen sich be-	
trachten als einen besondern Fall der Mannigfaltigkeiten	
mit constantem Krümmungsmass. Diese können auch	
dadurch definirt werden, dass in ihnen Unabhängigkeit	
der n -fach ausgedehnten Grössen vom Ort (Bewegbarkeit	
derselben ohne Dehnung) stattfindet	
§. 5. Flächen mit constantem Krümmungsmasse	282
III. Anwendung auf den Raum	283
§. 1. Systeme von Thatsachen, welche zur Bestim-	283
mung der Massverhältnisse des Raumes, wie die Geo-	
metrie sie voraussetzt, hinreichen	
§. 2. In wie weit ist die Gültigkeit dieser empirischen	283
Bestimmungen wahrscheinlich jenseits der Grenzen der	
Beobachtung im Unmessbargrossen?	
§. 3. In wie weit im Unendlichkleinen? Zusammenhang	286
dieser Frage mit der Naturerklärung**)	

*) Art. I. bildet zugleich die Vorarbeit für Beiträge zur analysis situs.

**) Der §. 3 des Art. III bedarf noch einer Umarbeitung und weiteren Ausführung. (Bemerkungen von Riemann.)

XIV. Ein Beitrag zur Elektrodynamik.

(Aus Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie, Bd. CXXXI.)

Der Königlichen Societät erlaube ich mir eine Bemerkung mitzutheilen, welche die Theorie der Elektrizität und des Magnetismus mit der des Lichts und der strahlenden Wärme in einen nahen Zusammenhang bringt. Ich habe gefunden, dass die elektrodynamischen Wirkungen galvanischer Ströme sich erklären lassen, wenn man annimmt, dass die Wirkung einer elektrischen Masse auf die uebrigen nicht momentan geschieht, sondern sich mit einer constanten (der Lichtgeschwindigkeit innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler gleichen) Geschwindigkeit zu ihnen fortpflanzt. Die Differentialgleichung für die Fortpflanzung der elektrischen Kraft wird bei dieser Annahme dieselbe, wie die für die Fortpflanzung des Lichts und der strahlenden Wärme.

Es seien S und S' zwei von constanten galvanischen Strömen durchflossene und gegen einander nicht bewegte Leiter, s sei ein elektrisches Massentheilchen im Leiter S , welches sich zur Zeit t im Punkte (x, y, z) befinde, e ein elektrisches Massentheilchen von S' und befinde sich zur Zeit t im Punkte (x', y', z') . Ueber die Bewegung der elektrischen Massentheilchen, welche in jedem Leitertheilchen für die positiv und negativ elektrischen entgegengesetzt ist, mache ich die Voraussetzung, dass sie in jedem Augenblicke so vertheilt sind, dass die Summen

$$\sum s f(x, y, z), \quad \sum s' f(x', y', z'),$$

über sämmtliche Massentheilchen der Leiter ausgedehnt gegen dieselben Summen, wenn sie nur ueber die positiv elektrischen oder nur ueber die negativ elektrischen Massentheilchen ausgedehnt werden, vernachlässigt werden dürfen, sobald die Function f und ihre Differentialquotienten stetig sind.

Diese Voraussetzung kann auf sehr mannigfaltige Weise erfüllt werden. Nimmt man z. B. an, dass die Leiter in den kleinsten Theilen krystallinisch sind, so dass sich dieselbe relative Vertheilung der

Elektricitäten in bestimmten gegen die Dimensionen der Leiter unendlich kleinen Abständen periodisch wiederholt, so sind, wenn β die Länge einer solchen Periode bezeichnet, jene Summen unendlich klein, wie β^n , wenn f und ihre Derivirten bis zur $(n - 1)$ ten Ordnung stetig sind, und unendlich klein wie $e^{-\frac{c}{\beta}}$, wenn sie sämmtlich stetig sind.

Erfahrungsmässiges Gesetz der elektrodynamischen Wirkungen.

Sind die specifischen Stromintensitäten nach mechanischem Mass zur Zeit t im Punkte (x, y, z) parallel den drei Axen u, v, w , und im Punkte (x', y', z') u', v', w' , und bezeichnet r die Entfernung beider Punkte, c die von Kohlrausch und Weber bestimmte Constante, so ist der Erfahrung nach das Potential der von S auf S' ausgeübten Kräfte

$$\frac{2}{cc} \iint \frac{uu' + vv' + ww'}{r} dS dS',$$

dieses Integral ueber sämmtliche Elemente dS und dS' der Leiter S und S' ausgedehnt. Führt man statt der specifischen Stromintensitäten die Producte aus den Geschwindigkeiten in die specifischen Dichtigkeiten und dann für die Producte aus diesen in die Volumelemente die in ihnen enthaltenen Massen ein, so geht dieser Ausdruck ueber in

$$\frac{1}{cc} \sum \sum \frac{ee' dd'(r^2)}{r dt dt'},$$

wenn die Aenderung von r^2 während der Zeit dt , welche von der Bewegung von e herrührt, durch d , und die von der Bewegung von e' herrührende durch d' bezeichnet wird.

Dieser Ausdruck kann durch Hinwegnahme von

$$\sum e' \sum \frac{s}{cc} \frac{d'(r^2)}{r} \frac{1}{dt} dt',$$

welches durch die Summirung nach e verschwindet, in

$$\frac{1}{cc} \sum \sum \frac{e'e d'(r^2)}{r dt} dt$$

und dieses wieder durch Addition von

$$\sum e \sum \frac{e' d'(r^2)}{cc r} \frac{1}{dt} dt',$$

welches durch die Summation nach e' Null wird, in

$$\frac{1}{cc} \sum \sum ee' \frac{dd'(r^2)}{dt dt'}$$

verwandelt werden.

Ableitung dieses Gesetzes aus der neuen Theorie.

Nach der bisherigen Annahme ueber die elektrostatische Wirkung wird die Potentialfunction U beliebig vertheilter elektrischer Massen, wenn ϱ ihre Dichtigkeit im Punkte (x, y, z) bezeichnet, durch die Bedingung

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} + 4\pi\varrho = 0$$

und durch die Bedingung, dass U stetig und in unendlicher Entfernung von wirkenden Massen constant sei, bestimmt. Ein particuläres Integral der Gleichung

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = 0$$

welches ueberall ausser dem Punkte (x', y', z') stetig bleibt, ist

$$\frac{1}{r},$$

und diese Function bildet die vom Punkte (x', y', z') aus erzeugte Potentialfunction, wenn sich in demselben zur Zeit t die Masse $-f(t)$ befindet.

Statt dessen nehme ich nun an, dass die Potentialfunction U durch die Bedingung

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} - aa \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + 4\pi \varrho = 0$$

bestimmt wird, so dass die vom Punkte (x', y', z') aus erzeugte Potentialfunction, wenn sich in demselben zur Zeit t die Masse $-f(t)$ befindet,

$$\frac{f\left(t - \frac{r}{a}\right)}{r}$$

wird.

Bezeichnet man die Coordinaten der Masse e zur Zeit t durch x_t, y_t, z_t , und die der Masse e' zur Zeit t' durch $x'_{t'}, y'_{t'}, z'_{t'}$, und setzt zur Abkürzung

$$\frac{1}{a} \sqrt{(x_t - x'_{t'})^2 + (y_t - y'_{t'})^2 + (z_t - z'_{t'})^2} = \frac{r}{a} = F(t, t'),$$

so wird nach dieser Annahme das Potential von e auf e' zur Zeit t

$$= -ee' \frac{f'(t - aF(t, t'))}{r}.$$

Das Potential der von sämmtlichen Massen e des Leiters S auf die Massen e' des Leiters S' von der Zeit 0 bis zur Zeit t ausgeübten Kräfte wird daher

$$P = - \int_0^t \sum \sum e e' F'(t - a, t') dt',$$

die Summen ueber sämmtliche Massen beider Leiter ausgedehnt.

Da die Bewegung für entgegengesetzt elektrische Massen in jedem Leitertheilchen entgegengesetzt ist, so erlangt die Function $F(t, t')$ durch die Derivation nach t die Eigenschaft, mit e , und durch die Derivation nach t' die Eigenschaft, mit e' ihr Zeichen zu ändern. Bei der vorausgesetzten Vertheilung der Elektricitäten wird daher, wenn man die Derivationen nach t durch obere und nach t' durch untere Accente bezeichnet, $\sum \sum e e' F'_n(t, t')$, ueber sämmtliche elektrische Massen ausgedehnt, nur dann nicht unendlich klein gegen die ueber die elektrischen Massen einer Art erstreckte Summe, wenn n und ν beide ungerade sind.

Man nehme nun an, dass die elektrischen Massen während der Fortpflanzungszeit der Kraft von einem Leiter zum anderen nur einen sehr kleinen Weg zurücklegen, und betrachte die Wirkung während eines Zeitraums, gegen welchen die Fortpflanzungszeit verschwindet. In dem Ausdrücke von P kann man dann zunächst

$$F'(t - a, t') - F'(t, t')$$

durch

$$-a \frac{\partial F'(t, t')}{\partial t}$$

ersetzen, da $\sum \sum e e' F'(t, t)$ vernachlässigt werden darf. Man erhält dadurch

$$P = \int_0^t dt' \sum \sum e e' a \frac{\partial F'(t, t')}{\partial t},$$

oder wenn man die Ordnung der Integrationen umkehrt und $t + a$ für τ setzt,

$$P = \sum \sum e e' \int_0^t d\vartheta \int_{-\vartheta}^t d\tau F'(\tau, \tau + \vartheta).$$

Verwandelt man die Grenzen des innern Integrals in 0 und t , so wird dadurch an der obern Grenze der Ausdruck

$$H(t) = \sum \sum e e' \int_0^t d\vartheta \int_{-\vartheta}^0 dt F'(t + \tau, t + \tau + \vartheta)$$

hinzugefügt, und an der untern Grenze der Werth dieses Ausdrucks für $t = 0$ hinweggenommen. Man hat also

$$P = \int_0^t dt' \sum \sum e e' \int_0^t d\vartheta F'(t, \tau + \vartheta) - H(t) + H(0).$$

In diesem Ausdrucke kann man $F'(t, t + \vartheta)$ durch $F'(t, t + \vartheta) - F'(\tau, \tau)$ ersetzen, da

$$\sum \sum e e' F'(\tau, \tau)$$

vernachlässigt werden darf. Man erhält dadurch als Factor von $e e'$ einen Ausdruck, der sowohl mit e als mit e' sein Zeichen ändert, so dass sich bei den Summationen die Glieder nicht gegen einander aufheben, und unendlich kleine Bruchtheile der einzelnen Glieder vernachlässigt werden dürfen. Es ergibt sich daher, indem man

$$F'(t, \tau + \vartheta) - F'(t, \tau)$$

durch

$$\vartheta \frac{\partial F'(t, \tau)}{\partial \tau}$$

ersetzt und die Integration nach ϑ ausführt, bis auf einen zu vernachlässigenden Bruchtheil

$$P = \int_0^t \frac{aa}{2} \sum \sum e e' \frac{\partial F'(t, \tau)}{\partial \tau} dt.$$

Es ist leicht zu sehen, dass $H(t)$ und $H(0)$ vernachlässigt werden dürfen; denn es ist

$$H(t) = \sum \sum e e' \int_0^t d\vartheta \int_{-\vartheta}^0 d\tau F'(t + \tau, t + \tau + \vartheta),$$

folglich:

$$H'(t) = \sum \sum e e' \int_0^t d\vartheta (F'(t, t + \vartheta) - F'(t - \vartheta, t)).$$

Hierin aber ist nur das erste Glied des Factors von $e e'$ mit dem Factor in dem ersten Bestandtheile von P von gleicher Ordnung, und dieses liefert wegen der Summation nach e nur einen zu vernachlässigenden Bruchtheil desselben.

Der Werth von P , welcher sich aus unserer Theorie ergibt, stimmt mit dem erfahrungsmässigen

$$\frac{1}{cc} \sum \sum e e' \frac{dd'(r^2)}{dt dt'}$$

überein, wenn man $aa = \frac{1}{4}cc$ annimmt.

Nach der Bestimmung von Weber und Kohlrausch ist

$$c = 439450 \cdot 10^8 \frac{\text{mm}}{\text{Sec}},$$

woraus sich a zu 41949 geographischen Meilen in der Secunde ergibt, während für die Lichtgeschwindigkeit von Busch aus Bradley's Aberrationsbeobachtungen 41994 Meilen, und von Fizeau durch directe Messung 41882 Meilen gefunden worden sind.

Dieser Aufsatz wurde von Riemann der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen am 10. Februar 1858 überreicht, wie aus einer dem Titel des Manuscriptes hinzugefügten Bemerkung des damaligen Secretärs der Gesellschaft hervorgeht, später aber wieder zurückgezogen. Nachdem der Aufsatz nach Riemann's Tode veröffentlicht worden war, wurde er durch Clausius (Poggendorff's Annalen Bd. CXXXV p. 606) einer Kritik unterworfen, deren wesentlichster Einwand in Folgendem besteht:

Nach den Voraussetzungen hat die Summe:

$$\sum \sum \frac{ee'}{r}$$

einen verschwindend kleinen Werth. Die Operation, vermöge deren später dafür ein nicht verschwindend kleiner Werth gefunden wird, muss daher einen Irrthum enthalten, den Clausius in der Ausführung einer unberechtigten Umkehrung der Integrationsfolge findet.

Der Einwand scheint mir begründet und ich bin mit Clausius der Meinung, dass Riemann sich denselben selbst gemacht und deshalb die Arbeit vor der Publication zurückgezogen hat.

Obwohl damit der wesentlichste Inhalt der Riemann'schen Deduction dahinfallen würde, habe ich mich doch zur Aufnahme dieses Aufsatzes in die vorliegende Sammlung entschlossen, weil ich nicht zu entscheiden wagte, ob er nicht doch noch Keime zu weiteren fruchtbaren Gedanken ueber diese höchst interessante Frage enthält. W.

XV. Beweis des Satzes, dass eine einwerthige mehr als $2n$ fach periodische Function von n Veränderlichen unmöglich ist.

(Auszug aus einem Schreiben Riemann's an Herrn Weierstrass.)

(Aus Borchardt's Journal für reine und angewandte Mathematik, Bd. 71.)

... Den Beweis des Satzes, auf welchen Sie neulich die Unterhaltung lenkten, dass eine einwerthige mehr als $2n$ fach periodische Function von n Veränderlichen unmöglich ist, habe ich im Gespräch wohl nicht ganz klar ausgedrückt, auch nur die Grundgedanken angegeben; ich theile ihn Ihnen daher hier noch einmal mit.

Es sei f eine $2n$ fach periodische Function von n Veränderlichen $x_1, x_2, \dots, x_n$ und — ich darf wohl meine Ihnen bekannten Benennungen gebrauchen — der Periodicitätsmodul von x_ν für die μ te Periode a_ν^μ . Es lassen sich dann bekanntlich die Grössen x in die Form

$$x_\nu = \sum_{\mu} a_\nu^\mu \xi_\mu \quad \text{für } \nu = 1, 2, \dots, n$$

setzen^{*}), so dass die Grössen ξ reell sind. Lässt man nun die Grössen ξ die Werthe von 0 bis 1 mit Ausschluss eines von diesen Grenzwerten durchlaufen, so hat das dadurch entstehende $2n$ fach ausgedehnte Grössengebiet die Eigenschaft, dass jedes System von Werthen der n Veränderlichen einem und nur einem Werthsysteme innerhalb dieses Grössengebiets nach den $2n$ Modulsystemen congruent ist. Ich werde, um mich später kürzer ausdrücken zu können, dieses Gebiet “das bei diesen $2n$ Modulsystemen periodisch sich wiederholende Grössengebiet” nennen.

Hat die Function nun noch ein $(2n + 1)$ tes Modulsystem, welches sich nicht aus den $2n$ ersten Modulsystemen zusammensetzen lässt, so kann man die einem Grössensysteme nach diesem Modulsysteme congruente Grössensysteme auf innerhalb dieses Gebiets liegende nach den $2n$ ersten Modulsystemen ihnen congruente zurückführen und dadurch offenbar beliebig viele innerhalb dieses Gebiets liegende und nach den $2n + 1$ Modulsystemen einander congruente Grössensysteme erhalten, wenn nicht zwei von den nach dem $(2n + 1)$ ten Modulsysteme congruente Grössensysteme auch nach den $2n$ ersten Modulsystemen congruent sind. In diesem Falle würden zwischen den $2n + 1$ Modulsystemen n Gleichungen von der Form

$$\xi_\nu = \sum_{\mu=1}^{2n+1} m^\mu a_\nu^\mu$$

worin die Grössen m ganze Zahlen wären, stattfinden, und folglich, wie ich später zeigen werde, die $2n + 1$ Modulsysteme sich aus $2n$ Modulsystemen zusammensetzen lassen.

Man theile nun für jede der Grössen ξ die Strecke von 0 bis 1 in q gleiche Theile, wodurch das bei den $2n$ ersten Modulsystemen periodisch wiederkehrende Gebiet in q^{2n} Gebiete zerfällt, in deren jedem sich die Grössen ξ nur um $\frac{1}{q}$ ändern. Offenbar müssen dann von mehr als q^{2n} nach den $2n + 1$ Modulsystemen einander congruente und in jenem Gebiete liegenden Grössensystemen nothwendig zwei in dasselbe Theilgebiet fallen, so dass sich die Werthe derselben Grösse ξ in beiden keinesfalls um mehr als $\frac{1}{q}$ von einander unterscheiden. Die Function bleibt also dann ungeändert, während keine der Grössen ξ um mehr als $\frac{1}{q}$ geändert wird, und ist folglich, da q beliebig gross genommen werden kann, wenn sie stetig ist, eine Function von weniger als n linearen Ausdrücken der Grössen x .

Es ist nun noch zu zeigen, dass sich $2n + 1$ Modulsysteme, zwischen denen die n

Gleichungen

$$\xi_\nu = \sum_{\mu=1}^{2n+1} m^\mu a_\nu^\mu$$

stattfinden, aus $2n$ Modulsystemen zusammensetzen lassen.

Man kann zunächst leicht beweisen, dass sich zu einem Modulsysteme

$$\frac{a_{\nu 1}}{\vartheta_1}, \frac{a_{\nu 2}}{\vartheta_2}, \dots, \frac{a_{\nu, 2n}}{\vartheta_{2n}},$$

worin die Grössen m ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Theiler sind, immer $2n - 1$ andere Modulsysteme $b_1, b_2, \dots, b_{2n}$ so finden lassen,

dass Congruenz nach den Modulsystemen a mit Congruenz nach den Modulsystemen b identisch ist. Es seien ϑ_1 der grösste gemeinschaftliche Theiler von m_1 und m_2 und α, β zwei der Gleichung

$$\beta m_1 - \alpha m_2 = \vartheta_1$$

genügende ganze Zahlen. Setzt man dann

$$\alpha a_{\nu 1} + \beta a_{\nu 2} = c_{\nu 1}$$

und

$$\alpha a'_{\nu 1} + \beta a'_{\nu 2} = b_{\nu, 2n},$$

so hat man

$$a_{\nu 1} = \beta c_{\nu 1} - \frac{m_2}{\vartheta_1} b_{\nu, 2n}, \quad a_{\nu 2} = -\alpha c_{\nu 1} + \frac{m_1}{\vartheta_1} b_{\nu, 2n}.$$

Es lassen sich also auch umgekehrt die Modulsysteme a_1 und a_2 aus den Modulsystemen $b_{\nu, 2n}$ und $c_{\nu 1}$ zusammensetzen, und folglich ist Congruenz nach jenen mit Congruenz nach diesen gleichbedeutend. Man kann daher die Modulsysteme a_1 und a_2 durch die Modulsysteme c_1 und b_{2n} ersetzen. Auf dieselbe Weise kann man nun, wenn ϑ_2 der grösste gemeinschaftliche Theiler von ϑ_1 und m_3 ist, die Modulsysteme c_1 und a_3 durch das Modulsystem

$$\frac{c_{\nu 1}}{\vartheta_2}$$

und durch ein Modulsystem $b_{\nu, 2n-1}$ ersetzen. Durch Fortsetzung dieses Verfahrens erhält man offenbar den zu beweisenden Satz. Der Inhalt des periodisch sich wiederholenden Gebiets ist für die neuen Modulsysteme b derselbe wie für die alten.

Mit Hülfe dieses Satzes lassen sich in den n Gleichungen

$$\xi_\nu = \sum_{\mu=1}^{2n+1} m^\mu a_\nu^\mu$$

die $2n$ ersten Modulsysteme so durch $2n$ neue $b_1, b_2, \dots, b_{2n}$ ersetzen, dass diese Gleichungen die Form

$$\xi_\nu = \frac{p b_\nu^{2n+1} + q b_\nu^1}{\vartheta}$$

annehmen, worin p und q ganze Zahlen ohne gemeinschaftlichen Theiler sind. Sind nun γ, δ zwei der Gleichung

$$p\delta + q\gamma = 1$$

genügende ganze Zahlen, so lassen sich offenbar die beiden Modulsysteme b^1 und a^{2n+1} durch das eine Modulsystem

$$\gamma b_\nu^{2n+1} + \delta b_\nu^1$$

ersetzen. Sämmtliche Modulsysteme, welche sich aus den Modulsystemen $a_1, a_2, \dots, a_{2n+1}$ zusammensetzen lassen, können also auch aus den $2n$ Modulsystemen $\frac{b}{\vartheta}, b_2, b_3, \dots, b_{2n}$ zusammengesetzt werden, und umgekehrt. Der Inhalt des periodisch wiederkehrenden Gebiets beträgt für diese $2n$ Modulsysteme nur $\frac{1}{\vartheta}$ von dem für die $2n$ ersten Modulsysteme a . Hat die Function nun ausser diesen Modulsystemen noch ein durch ähnliche ganzzahlige Gleichungen mit ihnen verbundenes, so lassen sich wieder $2n$ neue Modulsysteme finden, aus welchen sich alle diese Modulsysteme zusammensetzen lassen, und der Inhalt des periodisch sich wiederholenden Gebiets wird dabei wieder auf einen aliquoten Theil reducirt. Wenn dieses Gebiet unendlich klein wird, so wird die Function eine

Function von weniger als n linearen Ausdrücken der Veränderlichen und zwar von $n - 1$ oder $n - 2$ oder $n - m$, jenachdem nur eine, oder zwei oder m Dimensionen dieses Grössengebiets unendlich klein werden. Soll dies aber nicht eintreten, so muss die Operation schliesslich abbrechen, und man wird also zu $2n$ Modulsystemen gelangen, aus welchen sich sämtliche Modulsysteme der Function zusammensetzen lassen.

Göttingen, den 26ten October 1859.

*) Dies ist nicht immer der Fall, sondern nur, wenn die $2n$ Gleichungen, durch welche die Grössen ξ bestimmt werden, von einander unabhängig sind; die Ausnahmen sind aber leicht zu behandeln.

XVI. Estratto di una lettera scritta in lingua Italiana il di 21 Gennaio 1864 al Sig. Professore Enrico Betti.

(Annali di Matematica, Ser. 1, T. VII.)

Carissimo Amico

... Per trovare l'attrazione di un cilindro omogeneo retto ellissoidale qualunque, io considero, introducendo coordinate rettangolari x, y, z , il cilindro infinito limitato della disequaglianza:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} < 1,$$

ripieno di massa di densità costante $+1$, se $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} < 0$, e di densità -1 , se $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} > 0$. Allora se poniamo, come è solito, il potenziale nel punto x, y, z eguale a F e

$$\frac{\partial F}{\partial x} = X, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = Y, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = Z,$$

si ha per $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 0$, $F = 0$, $X = 0$, $Y = 0$.

Z è eguale al potenziale dell' ellisse:

$$1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} > 0$$

colla densità 2, e si trova col metodo di Dirichlet, se denotiamo con $\mathfrak{C}$ la radice maggiore dell' equazione:

$$\frac{x^2}{a^2 + s} + \frac{y^2}{b^2 + s} + \frac{z^2}{c^2 + s} = 1,$$

$$Z = 2abc \int_{-\mathfrak{C}}^{\infty} \frac{\sqrt{(a^2 + s)(b^2 + s)}}{(c^2 + s)^2} \frac{ds}{D},$$

con D :

$$D = \sqrt{(a^2 + s)(b^2 + s)(c^2 + s)}.$$

X ed Y si possono determinare dalle equazioni:

$$\frac{\partial X}{\partial z} = \frac{\partial Z}{\partial x}, \quad \frac{\partial Y}{\partial z} = \frac{\partial Z}{\partial y}$$

e dalle condizioni:

$$X = 0, \quad Y = 0$$

per $z = 0$.

Per effettuare questa determinazione conviene di sostituire invece di Z la sua espressione esteso per il contorno intero di un pezzo del Piano degli s , che contiene il valore $\mathfrak{C}$ senza contenere verun altro valore di diramazione o di discontinuità della funzione sotto il segno integrale. Se denotiamo le radici di $F = 0$ in ordine di grandezza con $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}', \mathfrak{a}''$ questi valori sono tutti reali e in ordine di grandezza:

$$\mathfrak{a}, \mathfrak{a}', -b^2, \mathfrak{a}'', -a^2,$$

in modo che:

$$\mathfrak{a} > 0 > \mathfrak{a}' > -b^2 > \mathfrak{a}'' > -a^2.$$

Posto

$$F = \mathfrak{a}' - \frac{1}{s},$$

viene

$$Z = 2abc \int_0^{a'} \frac{\sqrt{(a^2 + s)(b^2 + s)}}{(c^2 + s)^2} \frac{ds}{D\sqrt{F}},$$

$$X = \int \frac{\partial Z}{\partial x} dz, \quad Y = \int \frac{\partial Z}{\partial y} dz.$$

Ma:

$$\frac{\partial Z}{\partial x} = \frac{\partial Z}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x}, \quad \frac{\partial Z}{\partial y} = \frac{\partial Z}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial y},$$

e:

$$\frac{dt}{dz} = \sqrt{\frac{a^2 + s}{b^2 + s}} \frac{1}{D}, \quad \frac{dt}{dy} = \sqrt{\frac{b^2 + s}{a^2 + s}} \frac{1}{D}.$$

... Dunque si trova per integrazione parziale:

$$X = \dots$$

Se si prende la via dell' integrazione come nella espressione di Z il valore dell' integrale sodisfa sempre alla condizione:

$$\frac{\partial X}{\partial z} = \frac{\partial Z}{\partial x},$$

ma può differire di funzioni di x e di y , la funzione sotto segno integrale essendo discontinua anche per $\xi = 0$. Dunque occorre una determinazione ulteriore della via dell' integrazione.

Nella espressione di $\frac{\partial X}{\partial z}$ la funzione sotto segno integrale è continua per $s = 0$; dunque il pezzo del piano degli s , per il cui contorno l' integrale è esteso, deve contenere $s = \mathfrak{C}$ e può contenere o no $s = 0$, ma nessuno altro dei valori sopra notati. Nella espressione di X questo pezzo deve essere determinato in modo che X sia $= 0$ per $z = 0$; e affinchè ciò avvenga, dovendo contenere $s = \mathfrak{C}$, deve anche contenere la maggiore radice di $\mathfrak{ts} = 0$ (la quäle è la maggiore radice di $\mathfrak{t} = 0$, se

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 > 0,$$

ed è $= 0$, se:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 < 0)$$

ma nessun altra radice di $\mathfrak{ts} = 0$. Perchè per $\xi = 0$ le radici di $F = 0$ coincidono colle radici di $\mathfrak{ts} = 0$, e se la via dell' integrazione passasse tra due valori di discontinuità che coincidono per $\xi = 0$, dovrebbe per $\xi = 0$ passare per questo valore in modo che l' integrale nella espressione di X diverrebbe infinito ed il valore nonostante il fattore z rimarrebbe finito. —

Vostro aff.^{mo} Amico Riemann.

XVII. Ueber die Fläche vom kleinsten Inhalt bei gegebener Begrenzung.^{*)}

1.

Eine Fläche lässt sich im Sinne der analytischen Geometrie darstellen, indem man die rechtwinkligen Coordinaten x, y, z eines in ihr beweglichen Punktes als eindeutige Functionen von zwei unabhängigen veränderlichen Grössen p und q angiebt. Nehmen dann p und q bestimmte constante Werthe an, so entspricht dieser einen Combination immer nur ein einziger Punkt der Fläche. Die unabhängigen Variablen p und q können in sehr mannigfacher Weise gewählt werden. Für eine einfach zusammenhängende Fläche geschieht dies zweckmässig wie folgt. Man lässt die Fläche längs der ganzen Begrenzung abnehmen um einen Flächenstreifen, dessen Breite ueberall unendlich klein in derselben Ordnung ist. Durch Wiederholung dieses Verfahrens wird die Fläche fortwährend verkleinert, bis sie in einen Punkt uebergeht. Die hierbei der Reihe nach auftretenden Begrenzungscurven sind in sich zurücklaufende, von einander getrennte Linien. Man kann sie dadurch unterscheiden, dass man in jeder von ihnen der Grösse p einen besondern constanten Werth beilegt, der um ein Unendlichkleines zu- oder abnimmt, je nachdem man zu der benachbarten umschliessenden oder umschlossenen Curve uebergeht. Die Function p hat dann einen constanten Maximalwerth in der Begrenzung der Fläche und einen Minimalwerth in dem einen Punkte im Innern, in welchen die

^{*)} Dieser Abhandlung liegt ein Manuscript Riemann's zu Grunde, welches nach der eigenen Aeusserung des Verfassers in den Jahren 1860 und 1861 entstanden ist. Dieses Manuscript, welches in gedrängter Kürze nur die Formeln und keinen Text enthält, wurde mir von Riemann im April 1866 zur Bearbeitung anvertraut. Es ist daraus die Abhandlung hervorgegangen, welche ich am 6. Januar 1867 der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen eingereicht habe, und welche im 13. Band der Abhandlungen dieser Gesellschaft abgedruckt ist. Diese Abhandlung kommt hier in sorgfältiger Uebearbeitung zum zweiten Male zum Abdruck. K. Hattendorff.

allmählich abnehmende Fläche zuletzt zusammenschrumpft. Den Uebergang von einer Begrenzung der abnehmenden Fläche zur nächsten kann man dadurch hergestellt denken, dass man jeden Punkt der Curve (p) in einen bestimmten unendlich nahen Punkt der Curve ($p + dp$) uebergehen lässt. Die Wege der einzelnen Punkte bilden dann ein zweites System von Curven, die von dem Punkte des Minimalwerthes von p strahlenförmig nach der Begrenzung der Fläche verlaufen. In jeder dieser Curven legt man q einen besondern constanten Werth bei, der in einer beliebig gewählten Anfangscurve am kleinsten ist und von da beim Uebergange von einer Curve des zweiten Systems zur andern stetig wächst, wenn man zum Zweck des Ueberganges irgend eine Curve (p) in bestimmter Richtung durchläuft. Beim Uebergange von der letzten Curve (q) zur Anfangscurve ändert sich q sprungweise um eine endliche Constante.

Um eine mehrfach zusammenhängende Fläche ebenso zu behandeln, kann man sie zuvor durch Querschnitte in eine einfach zusammenhängende zerlegen.

Irgend ein Punkt der Fläche lässt sich hiernach als Durchschnitt einer bestimmten Curve des Systems (p) mit einer bestimmten Curve des Systems (q) auffassen. Die in dem Punkte (p, q) errichtete Normale verläuft von der Fläche aus in zwei entgegengesetzten Richtungen, der positiven und der negativen. Zu ihrer Unterscheidung hat man ueber die gegenseitige Lage der wachsenden positiven Normale, der wachsenden p und der wachsenden q eine Bestimmung zu treffen. Ist nichts anderes festgesetzt, so möge, von der positiven x -Axe aus gesehen, die positive y -Axe auf dem kürzesten Wege in die positive z -Axe uebergeführt werden durch eine Drehung von rechts nach links. Und die Richtung der wachsenden positiven Normale liege zu den Richtungen der wachsenden p und der wachsenden q , wie die positive x -Axe zur positiven y -Axe und zur positiven z -Axe. Die Seite der Fläche, auf welcher die positive Normale liegt, soll die positive Seite der Fläche genannt werden.

2.

Ueber das Gebiet der Fläche sei ein Integral zu erstrecken, dessen Element gleich ist dem Element $dp dq$ multiplicirt in eine Functionaldeterminante, also

$$\iint f \frac{\partial(g, h)}{\partial(p, q)} dp dq,$$

wofür zur Abkürzung geschrieben werden soll

$$\iint f (dg dh).$$

Denkt man sich f und g als unabhängige Variable eingeführt, so geht das Integral ueber in $\iint df dg$, und es lässt sich die Integration nach f oder nach g ausführen. Die wirkliche Einsetzung von f und g als unabhängigen Variablen verursacht aber Schwierigkeiten oder wenigstens weitläufige Unterscheidungen, wenn dieselbe Werthcombination von f und g in mehreren Punkten der Fläche oder in einer Linie vorhanden ist. Sie ist ganz unmöglich, wenn f und g complex sind.

Es ist daher zweckmässig, zur Ausführung der Integration nach f oder g das Verfahren von Jacobi (Crelle's Journal Bd. 27 p. 208) anzuwenden, bei welchem p und q als unabhängige Variable beibehalten werden. Um in Beziehung auf f zu integriren, hat man die Functional-determinante in die Form zu bringen

$$\frac{\partial(f, h)}{\partial(p, q)} = \frac{\partial}{\partial q} \left(\frac{\partial f}{\partial p} h \right) - \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial f}{\partial q} h \right)$$

und erhält zunächst

$$\iint \frac{\partial(f, h)}{\partial(p, q)} dp dq = 0,$$

weil die Integration durch eine in sich zurücklaufende Linie erstreckt wird. Dagegen ist

$$\iint \frac{\partial(g, h)}{\partial(p, q)} dp dq = \iint \frac{\partial}{\partial q} \left(\frac{\partial g}{\partial p} h \right) dp dq = \int \frac{\partial g}{\partial p} h dp$$

in der Richtung der wachsenden p zu nehmen, d. h. von dem Minimalpunkte im Innern durch eine Curve (q) bis zur Begrenzung. Man erhält $\int h dg$ und zwar den Werth, den dieser Ausdruck in der Begrenzung annimmt, da an der untern Grenze des Integrals $h = 0$ ist. Folglich wird

$$\iint f (dg dh) = \iint g (df dh) = \int g dh$$

und das einfache Integral rechts ist in der Richtung der wachsenden q durch die Begrenzung erstreckt. Andererseits hat man nach der eingeführten Bezeichnung $(df dg) = -(dg df)$, und daher

$$\iint f (df dg) = - \iint f (dg df) = - \int f dg,$$

wobei das einfache Integral rechts ebenfalls in der Richtung der wachsenden q durch die Begrenzung der Fläche zu nehmen ist.

3.

Die Fläche, deren Punkte durch die Curvensysteme (p) , (q) festgelegt sind, soll in der folgenden Weise auf einer Kugel vom Radius 1 abgebildet werden. Im Punkte (p, q) der Fläche, dessen rechtwinklige Coordinaten x, y, z sind, ziehe man die positive Normale und lege zu ihr eine Parallele durch den Mittelpunkt der Kugel. Der Endpunkt dieser Parallelen auf der Kugeloberfläche ist die Abbildung des Punktes (x, y, z) . Durchläuft der Punkt (x, y, z) auf der stetig gekrümmten Fläche eine zusammenhängende Linie, so wird auch die Abbildung derselben auf der Kugel eine zusammenhängende Linie sein. Auf dieselbe Weise erhält man als Abbildung eines Flächenstücks ein Flächenstück, als Abbildung der ganzen Fläche eine Fläche, welche die Kugel oder einen Theil derselben einfach oder mehrfach bedeckt.

Der Punkt auf der Kugel, welcher die Richtung der positiven x -Axe angiebt, werde zum Pol gewählt und der Anfangsmeridian durch den Punkt gelegt, welcher der positiven y -Axe entspricht. Die Abbildung des Punktes (x, y, z) wird dann auf der Kugel festgelegt durch ihre Poldistanz r und den Winkel φ , welchen ihr Meridian mit dem Anfangsmeridian einschliesst. Für das Vorzeichen von φ gilt die Bestimmung, dass der der positiven z -Axe entsprechende Punkt die Coordinaten $r = \frac{\pi}{2}$, $\varphi = +\frac{\pi}{2}$ haben soll.

4.

Hiernach erhält man als Differential-Gleichung der Fläche

$$\cos r \, dx + \sin r \cos \varphi \, dy + \sin r \sin \varphi \, dz = 0. \quad (1)$$

Sind y und z die unabhängigen Variablen, so ergeben sich für r und φ die Gleichungen

$$\begin{aligned} \cos r &= \pm \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}}, \\ \sin r \cos \varphi &= \frac{\frac{\partial x}{\partial y}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}}, \\ \sin r \sin \varphi &= \frac{\frac{\partial x}{\partial z}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2}}, \end{aligned}$$

in welchen gleichzeitig entweder die oberen oder die unteren Vorzeichen gelten.

Ein Parallelogramm auf der positiven Seite der Fläche, begrenzt von den Curven (p) und $(p+dp)$, (q) und $(q+dq)$, projicirt sich auf der yz -Ebene in einem Flächenelemente, dessen Inhalt gleich dem absoluten Werthe von $(dy dz)$ ist. Das Vorzeichen dieser Functionaldeterminante ist verschieden, je nachdem die im Punkte (p, q) errichtete positive Normale mit der positiven x -Axe einen spitzen oder stumpfen Winkel einschliesst. In dem ersten Falle liegen nämlich die Projectionen von dp und dq in der yz -Ebene ebenso zu einander wie die positive y -Axe zur positiven z -Axe, im zweiten Falle umgekehrt. Daher ist die Functionaldeterminante im ersten Falle positiv, im zweiten negativ. Und der Ausdruck

$$\sqrt{(dy dz)^2}$$

ist immer positiv. Er giebt den Inhalt des unendlich kleinen Parallelogramms auf der Fläche. Um also den Inhalt der Fläche selbst zu erhalten, hat man das Doppelintegral

$$\iint \sqrt{(dy dz)^2}$$

über die ganze Fläche zu erstrecken.

Soll dieser Inhalt ein Minimum sein, so ist die erste Variation des Doppelintegrals $= 0$ zu setzen. Man erhält

$$\delta \iint \sqrt{(dy dz)^2} = \iint \frac{(dy dz) (d\delta y dz + dy d\delta z)}{\sqrt{(dy dz)^2}} = 0,$$

und es gilt das obere oder das untere Zeichen vor der Wurzel, je nachdem $(dy dz)$ positiv oder negativ ist. Die linke Seite lässt sich schreiben

$$\begin{aligned} & \delta \iint (\sin r \sin \varphi dy - \sin r \cos \varphi dz) (dy dz) \\ &= \iint \delta(\sin r \sin \varphi) (dy dz) - \iint \delta(\sin r \cos \varphi) (dy dz) \\ &+ \iint \sin r \sin \varphi (d\delta y dz) - \iint \sin r \cos \varphi (dy d\delta z). \end{aligned}$$

Die beiden ersten Integrale reduciren sich auf einfache Integrale, die in der Richtung der wachsenden q durch die Begrenzung der Fläche zu nehmen sind, nämlich

$$\int \delta x (-\sin r \cos \varphi dz + \sin r \sin \varphi dy).$$

Der Werth ist $= 0$, da in der Begrenzung $\delta x = 0$ ist. Die Bedingung des Minimum lautet also

$$\iint \frac{\partial(\sin r \sin \varphi)}{\partial y} \delta x (dy dz) + \iint \frac{\partial(\sin r \cos \varphi)}{\partial z} \delta x (dy dz) = 0.$$

Sie wird erfüllt, wenn

$$-\sin r \sin \varphi dy + \sin r \cos \varphi dz = d\psi \quad (2)$$

ein vollständiges Differential ist.

5.

Die Coordinaten r und φ auf der Kugel lassen sich ersetzen durch eine complexe Grösse $\eta = \operatorname{tg} \frac{r}{2} e^{\varphi i}$, deren geometrische Bedeutung leicht zu erkennen ist. Legt man nämlich an die Kugel im Pol eine Tangentialebene, deren positive Seite von der Kugel abgekehrt ist, und zieht vom Gegenpol eine Gerade durch den Punkt (r, φ) , so trifft diese die Tangentialebene in einem

Punkte, der die complexe Grösse 2η repräsentirt. Dem Pol entspricht $\eta = 0$, dem Gegenpol $\eta = \infty$. Für die Punkte, welche die Richtungen der positiven y - und der positiven z -Axe angeben, ist $i\eta = +1$ und resp. $= +i$.

Führt man noch die complexen Grössen

$$\eta' = \operatorname{tg} \frac{r}{2} e^{-\varphi i}, \quad s = y + zi, \quad s' = y - zi$$

ein, so gehen die Gleichungen (1) und (2) ueber in folgende:

$$(1 - \eta\eta') dx + \eta ds' + \eta' ds = 0, \quad (1^*)$$

$$(1 + \eta\eta') d\psi i - \eta' ds + \eta ds' = 0. \quad (2^*)$$

Diese lassen sich durch Addition und Subtraction verbinden. Dabei werde

$$x + \psi i = 2X, \quad x - \psi i = 2X'$$

gesetzt, so dass umgekehrt $x = X + X'$ ist. Das Problem findet dann seinen analytischen Ausdruck in den beiden Gleichungen

$$ds - \eta dX + \eta' dX' = 0, \quad (3)$$

$$ds' - \eta' dX + \eta dX' = 0. \quad (4)$$

Betrachtet man X und X' als unabhängige Variable und stellt die Bedingungen dafür auf, dass ds und ds' vollständige Differentiale sind, so findet sich

$$\frac{\partial \eta}{\partial X'} = 0, \quad \frac{\partial \eta'}{\partial X} = 0,$$

d. h. es ist η nur von X , η' nur von X' abhängig, und deshalb umgekehrt X eine Function nur von η , X' eine Function nur von η' .

Hiernach ist die Aufgabe darauf zurückgeführt, η als Function der complexen Variablen X oder umgekehrt X als Function der complexen Variablen η so zu bestimmen, dass zugleich den Grenzbedingungen Genüge geleistet werde. Kennt man η als Function von X , so ergibt sich daraus η' , indem man in dem Ausdrucke von η jede complexe Zahl in die conjugirte verwandelt. Alsdann hat man nur noch die Gleichungen (3) und (4) zu integriren, um die Ausdrücke für s und s' zu erlangen. Aus diesen erhält man endlich durch Elimination von i eine Gleichung zwischen x, y, z , die Gleichung der Minimalfläche.

6.

Sind die Gleichungen (3) und (4) integrirt, so lässt sich auch der Inhalt der Minimalfläche selbst leicht angeben, nämlich

$$S = 2 \iint \sqrt{(dy \, dz)^2}.$$

Die Functionaldeterminante $(dy \, dz)$ formt sich in folgender Weise um

$$(dy \, dz) = \left(\frac{\partial y}{\partial X} \frac{\partial z}{\partial X'} - \frac{\partial y}{\partial X'} \frac{\partial z}{\partial X} \right) (dX \, dX') = -(dX \, dX').$$

Danach erhält man

$$S = 2 \iint (dX \, dX').$$

Zur weiteren Umformung dieses Ausdruckes kann man y aus Y und Y' , z aus Z und Z' ebenso zusammensetzen wie x aus X und X' , so dass die Gleichungen gelten

$$\begin{aligned} x &= X + X', & x' &= X - X', \\ y &= Y + Y', & y' &= Y - Y', \\ z &= Z + Z', & z' &= Z - Z'. \quad \text{q. e. d.} \end{aligned}$$

Alsdann erhält man schliesslich

$$\begin{aligned} S &= -i \iint [(dX dX') + (dY dY') + (dZ dZ')] \\ &= \frac{1}{2} \iint [(dx dx') + (dy dy') + (dz dz')] . \end{aligned} \quad (5)$$

7.

Die Minimalfläche und ihre Abbildungen auf der Kugel wie in den Ebenen, deren Punkte resp. die complexen Grössen η , X , Y , Z repräsentiren, sind einander in den kleinsten Theilen ähnlich. Man erkennt dies sofort, wenn man das Quadrat des Linearelementes in diesen Flächen ausdrückt. Dasselbe ist

auf der Kugel $\sin^2 r^2 d \log \eta d \log \eta'$,
in der Ebene der η $\frac{4}{(1+\eta\eta')^2} d\eta d\eta'$,
in der Ebene der X $\frac{dX}{d\eta} \frac{dX'}{d\eta'} d\eta d\eta'$,
in der Ebene der Y $\frac{dY}{d\eta} \frac{dY'}{d\eta'} d\eta d\eta'$,
in der Ebene der Z $\frac{dZ}{d\eta} \frac{dZ'}{d\eta'} d\eta d\eta'$,
in der Minimalfläche selbst

$$\begin{aligned} dx^2 + dy^2 + dz^2 &= (dX + dX')^2 + (dY + dY')^2 + (dZ + dZ')^2 \\ &= 2(dX dX' + dY dY' + dZ dZ') \\ &= 2 \left(\frac{dX}{d\eta} \frac{dX'}{d\eta'} + \frac{dY}{d\eta} \frac{dY'}{d\eta'} + \frac{dZ}{d\eta} \frac{dZ'}{d\eta'} \right) d\eta d\eta' . \end{aligned}$$

Es ist nämlich nach den Gleichungen (3) und (4), wenn man darin η und η' als unabhängige Variable ansieht:

$$\begin{aligned} \frac{dX}{d\eta} &= \frac{ds}{d\eta} \frac{1}{2\eta'}, & \frac{dX'}{d\eta'} &= \frac{ds'}{d\eta'} \frac{1}{2\eta}, \\ \frac{dX}{d\eta'} &= \frac{ds}{d\eta'} \frac{1}{2\eta}, & \frac{dX'}{d\eta} &= \frac{ds'}{d\eta} \frac{1}{2\eta'}, \end{aligned}$$

und deshalb

$$\begin{aligned} dX^2 + dY^2 + dZ^2 &= 0, \\ dX'^2 + dY'^2 + dZ'^2 &= 0. \end{aligned}$$

Das Verhältniss von irgend zwei der obigen Quadrate von Linearelementen ist unabhängig von $d\eta$ und $d\eta'$, d. h. von der Richtung des Elementes, und darin beruht die in den kleinsten Theilen ähnliche Abbildung. Da die Linearvergrösserung bei der Abbildung in irgend einem Punkte nach allen Richtungen dieselbe ist, so erhält man die Flächenvergrösserung gleich dem Quadrat der Linearvergrösserung. Das Quadrat des Linearelementes in der Minimalfläche ist aber gleich

der doppelten Summe der Quadrate der entsprechenden Linearelemente in den Ebenen der X , der Y und der Z . Daher ist auch das Flächenelement in der Minimalfläche gleich der doppelten Summe der entsprechenden Flächenelemente in jenen Ebenen. Dasselbe gilt von der ganzen Fläche und ihren Abbildungen in den Ebenen der X , Y , Z .

8.

Eine wichtige Folgerung lässt sich noch aus dem Satze von der Aehnlichkeit in den kleinsten Theilen ziehen, wenn man eine neue complexe Variable η_1 dadurch einführt, dass man auf der Kugel den Pol in einen beliebigen Punkt ($\eta = a$) verlegt und den Anfangsmeridian beliebig wählt. Hat dann η_1 für das neue Coordinatensystem dieselbe Bedeutung wie η für das alte, so kann man jetzt ein unendlich kleines Dreieck auf der Kugel sowohl in der Ebene der η als in der der η_1 abbilden. Die beiden Bilder sind dann auch Abbildungen von einander und in den kleinsten Theilen ähnlich. Für den Fall der directen Aehnlichkeit ergibt sich ohne Weiteres, dass $\frac{d\eta_1}{d\eta}$ unabhängig ist von der Richtung der Verschiebung von η , d. h. dass η_1 eine Function der complexen Variablen η ist. Den Fall der inversen (symmetrischen) Aehnlichkeit kann man auf den vorigen zurückführen, indem man statt η_1 die conjugirte complexe Grösse nimmt. Um nun η_1 als Function von η auszudrücken, hat man zu beachten, dass $\eta_1 = 0$ ist in dem einen Punkte der Kugel, für welchen $\eta = a$, und $\eta_1 = \infty$ in dem diametral gegenüberliegenden Punkte, d. h. für $\eta = -\frac{1}{a'}$. Danach ergibt sich $\eta_1 = c \frac{\eta - a}{1 + a'\eta}$. Zur Bestimmung der Constanten c dient die Bemerkung, dass, wenn $\eta_1 = \beta$ ist für $\eta = 0$, daraus $\eta_1 = -\frac{1}{\beta'}$ gefunden wird für $\eta = \infty$. Es ist also $\beta = -ca'$ und $-\frac{1}{\beta'} = \frac{c}{a}$, d. h. $\beta\beta' = \frac{c}{a}a'$. Hieraus ergibt sich $cc' = 1$ und daher $c = e^{\vartheta i}$ für ein reelles ϑ . Die Grössen α und ϑ können beliebige Werthe erhalten: α hängt von der Lage des neuen Pols, ϑ von der Lage des neuen Anfangsmeridians ab. Diesem neuen Coordinatensystem auf der Kugel entsprechen die Richtungen der Axen eines neuen rechtwinkligen Systems. Es mögen in dem neuen System X_1 , s_1 , s'_1 dasselbe bezeichnen wie X , s , s' in dem alten. Dann erlangt man die Transformationsformeln

$$\begin{aligned}(1 + \alpha\alpha')X_1 &= (1 - \alpha\alpha')X + \alpha's + \alpha s', \\ (1 + \alpha\alpha')s'_1 e^{\vartheta i} &= -2\alpha X - \alpha^2 s + s.\end{aligned}\tag{6}$$

9.

Aus den Transformationsformeln (6) berechnen wir

$$\left(\frac{d\eta_1}{d\eta}\right)^2 \frac{dX_1}{d\eta_1} = \frac{dX}{d\eta}$$

oder

$$\left(\frac{d\eta_1}{d\eta}\right)^2 dX_1 = \left(\frac{d\log \eta_1}{d\log \eta}\right)^2 dX.$$

Hiernach empfiehlt es sich, eine neue complexe Grösse u einzuführen, welche durch die Gleichung definirt wird

$$du = \left(\frac{d\log \eta_1}{d\log \eta}\right)^2 dX,\tag{7}$$

und die von der Lage des Coordinatensystems (x, y, z) unabhängig ist. Gelingt es dann, u als Function von η zu bestimmen, so erhält man

$$X = \int du \left(\frac{d\log \eta_1}{d\log \eta}\right)^{-2}.\tag{8}$$

X ist der Abstand des zu η gehörigen Punktes der Minimalfläche von einer Ebene, die durch den Anfangspunkt der Coordinaten rechtwinklig zur Richtung $\eta = 0$ gelegt ist. Man erhält den Abstand desselben Punktes der Minimalfläche von einer durch den Anfangspunkt der Coordinaten gelegten Ebene, die rechtwinklig auf der Richtung $\eta = \alpha$ steht, indem man in (8) $-e^{\vartheta i} \frac{1}{\eta}$ statt η setzt. Speciell also für $\alpha = 1$ und $\alpha = i$

$$x = \int du, \quad y = \int \frac{du}{\eta^2}, \quad z = \int \frac{du}{\eta^2}.\tag{9}$$

10.

Die Grösse u ist als Function von η zu bestimmen, d. h. als einwerthige Function des Ortes in derjenigen Fläche, welche, ueber die η -Ebene ausgebreitet, die Minimalfläche in den kleinsten Theilen ähnlich abbildet. Daher kommt es vor allen Dingen auf die Unstetigkeiten und Verzweigungen in dieser Abbildung an. Bei der Untersuchung derselben hat man Punkte im Innern der Fläche von Begrenzungspunkten zu unterscheiden.

Handelt es sich um einen Punkt im Innern der Minimalfläche, so lege man in ihn den Anfangspunkt des Coordinatensystems (x, y, z) , die Axe der positiven x in die positive Normale, folglich die yz -Ebene tangential. Dann fehlen in der Entwicklung von x das freie Glied und die in y und z multiplicirten Glieder. Durch geeignet gewählte Richtung der y -Axe und der z -Axe kann man auch das in yz multiplicirte Glied verschwinden lassen. Die partielle Differentialgleichung der Minimalfläche reducirt sich unter dieser Voraussetzung für unendlich kleine Werthe von y und z auf $\frac{\partial^2 x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 x}{\partial z^2} = 0$. Das Krümmungsmass ist also negativ, die Haupt-Krümmungsradien sind einander entgegengesetzt gleich. Die Tangentialebene theilt die Fläche in vier Quadranten, wenn die Krümmungshalbmesser nicht ∞ sind. Diese Quadranten liegen abwechselnd ueber und unter der Tangentialebene. Beginnt die Entwicklung von x erst mit den Gliedern n ter Ordnung ($n > 2$), so sind die Krümmungsradien ∞ , und die Tangentialebene theilt die Fläche in $2n$ Sektoren, die abwechselnd ueber und unter jener Ebene liegen und von den Krümmungslinien halbirt werden.^(*)

Will man nun X als Function der complexen Variabeln Y ansehen, so ergibt sich in dem Falle der vier Sektoren

$$\log X = 2 \log Y + \text{funct. cont.},$$

in dem Falle der $2n$ Sektoren

$$\log X = n \log Y + \text{f. c.}$$

Und da nach (8) und (9) $\frac{du}{d \log \eta} = dX$ ist, so beginnt die Entwicklung von η im ersten Falle mit der ersten, im zweiten mit der $(n - 1)$ ten Potenz von Y . Umgekehrt wird also, wenn Y als Function von η angesehen werden soll, die Entwicklung im ersten Falle nach ganzen Potenzen von η , im zweiten nach ganzen Potenzen von $\eta^{\frac{1}{n-1}}$ fortschreiten. D. h. die Abbildung auf der η -Ebene hat an der betreffenden Stelle keinen oder einen $(n - 2)$ fachen Verzweigungspunkt, je nachdem der erste oder der zweite Fall eintritt.

Was u betrifft, so ergibt sich $\frac{du}{d \log Y} = \frac{du}{d \log \eta} \frac{d \log \eta}{d \log Y}$, also mit Hülfe der Gleichung (9)

$$\frac{du}{d \log Y} = 2 \frac{dX}{d \log \eta} \frac{d \log \eta}{d \log Y}.$$

Demnach ist in einem $(n - 2)$ fachen Verzweigungspunkte der Abbildung auf der η -Ebene

$$\log \frac{du}{d \log Y} = 2 \log Y + \text{f. c.}$$

oder

$$u = \text{const.} + Y^2.$$

11.

Die weitere Untersuchung soll zunächst auf den Fall beschränkt werden, dass die gegebene Begrenzung aus geraden Linien besteht. Dann lässt sich die Abbildung der Begrenzung auf der η -Ebene wirklich herstellen. Die in irgend welchen Punkten einer geraden Begrenzungslinie errichteten Normalen liegen in parallelen Ebenen, und daher ist die Abbildung auf der Kugel ein Bogen eines grössten Kreises.

Um einen Punkt im Innern einer geraden Begrenzungslinie zu untersuchen, legt man wie vorher in ihn den Anfangspunkt der Coordinaten, die positive x -Axe in die positive Normale. Dann fällt die ganze Begrenzungslinie in die yz -Ebene. Der reelle Theil von X ist demnach in der ganzen Begrenzungslinie $= 0$. Geht man also durch das Innere der Minimalfläche um den Anfangspunkt der Coordinaten herum von einem vorangehenden bis zu einem nachfolgenden Begrenzungspunkte, so muss dabei der Arcus von X sich ändern um $n\pi$, ein ganzes Vielfaches von π . Der Arcus von Y ändert sich gleichzeitig um π . Man hat also, wie vorher

$$\log X = n \log Y + \text{f. c.}$$

$$\log \eta = (n - 1) \log Y + \text{f. c.}$$

Dem betrachteten Begrenzungspunkte entspricht ein $(n - 2)$ facher Verzweigungspunkt in der Abbildung auf der η -Ebene. In dieser Abbildung macht das auf den Punkt folgende Begrenzungsstück mit dem ihm vorhergehenden den Winkel $(n - 1)\pi$.

12.

Bei dem Uebergange von einer Begrenzungslinie zur folgenden hat man zwei Fälle zu unterscheiden. Entweder treffen sie zusammen in einem im Endlichen liegenden Schnittpunkte, oder sie erstrecken sich ins Unendliche.

Im ersten Falle sei $\alpha\pi$ der im Innern der Minimalfläche liegende Winkel der beiden Begrenzungslinien. Legt man den Anfangspunkt der Coordinaten in den zu untersuchenden Eckpunkt, die positive x -Axe in die positive Normale, so ist in beiden Begrenzungslinien der reelle Theil von $X = 0$. Beim Uebergange von der ersten Begrenzungslinie zur folgenden ändert sich also der Arcus von X um $m\pi$, ein ganzes Vielfaches von π , der Arcus von Y um $\alpha\pi$. Man hat daher

$$\log X = m \log Y + \text{f. c.}$$

$$\left(1 - \frac{\alpha}{m}\right) \log \eta = \log Y + \text{f. c.}$$

Erstreckt sich die Fläche zwischen zwei auf einander folgenden Begrenzungsgeraden ins Unendliche, so lege man die positive x -Axe in ihre kürzeste Verbindungslinie, parallel der positiven Normalen im Unendlichen. Die Länge der kürzesten Verbindungslinie sei A , und $\alpha\pi$ der Winkel, welchen die Projection der Minimalfläche in der yz -Ebene ausfüllt. Dann bleiben die reellen

Theile von X und $i d \log \eta$ im Unendlichen endlich und stetig und nehmen in den begrenzenden Geraden constante Werthe an. Hieraus ergibt sich (für $y = \infty, z = \infty$)

$$X = \frac{A}{2\alpha\pi} d \log \eta + \text{f. c.}$$

Legt man die x_1 -Axe eines Coordinatensystems in eine begrenzende Gerade, die x_2 -Axe eines andern Systems in die zweite begrenzende Gerade u. s. f., so ist in der ersten Linie $\log \eta_1$, in der zweiten $\log \eta_2$ u. s. f. rein imaginär, da die Normale zu der betreffenden Axe der x_1 , der x_2 u. s. f. senkrecht steht. Es ist also $i \frac{du}{d \log \eta_1}$ in der ersten Begrenzungslinie reell, $i \frac{du}{d \log \eta_2}$ in der zweiten u. s. f. Da aber auch für ein beliebiges Coordinatensystem (x, y, z) immer

$$i du = i \left(\frac{d \log \eta_1}{d \log \eta} \right)^2 \frac{du}{d \log \eta_1}$$

ist, so findet sich, dass in jeder geraden Begrenzungslinie

$$i \sqrt{\frac{du}{d \log \eta}}$$

entweder reelle oder rein imaginäre Werthe besitzt.

13.

Die Minimalfläche ist bestimmt, sobald man eine der Grössen u, η, X, Y, Z durch eine der uebrigen ausgedrückt hat. Dies gelingt in vielen Fällen. Besondere Beachtung verdienen darunter diejenigen, in welchen $\frac{du}{d\log \eta}$ eine algebraische Function von η ist. Dazu ist nöthig und hinreichend, dass die Abbildung auf der Kugel und ihre symmetrischen und congruenten Fortsetzungen eine geschlossene Fläche bilden, welche die ganze Kugel einfach oder mehrfach bedeckt.

Im Allgemeinen aber wird es schwierig sein, direct eine der Grössen u, η, X, Y, Z durch eine der uebrigen auszudrücken. Statt dessen kann man aber auch jede von ihnen als Function einer neuen zweckmässig gewählten unabhängigen Variablen bestimmen. Wir führen eine solche unabhängige Variable t ein, dass die Abbildung der Fläche auf der t -Ebene die halbe unendliche Ebene einfach bedeckt, und zwar diejenige Hälfte, für welche der imaginäre Theil von t positiv ist. In der That ist es immer möglich, t als Function von u (oder von irgend einer der uebrigen Grössen η, X, Y, Z) in der Fläche so zu bestimmen, dass der imaginäre Theil in der Begrenzung $= 0$ ist, und dass sie in einem beliebigen Begrenzungspunkte ($u = b$) unendlich von der ersten Ordnung wird, d. h.

$$t = \frac{\text{const.}}{u - b}.$$

Der Arcus des Factors von $\frac{1}{u-b}$ ist durch die Bedingung bestimmt, dass der imaginäre Theil von t in der Begrenzung $= 0$, im Innern der Fläche positiv sein soll. Es bleibt also in dem Ausdrucke von t nur der Modul dieses Factors und eine additive Constante willkürlich.

Es sei $t = a_1, a_2, \dots$ für die Verzweigungspunkte im Innern der Abbildung auf der η -Ebene, $t = b_1, b_2, \dots$ für die Verzweigungspunkte in der Begrenzung, die nicht Eckpunkte sind, $t = c_1, c_2, \dots$ für die Eckpunkte, $t = e_1, e_2, \dots$ für die ins Unendliche sich erstreckenden Sektoren. Wir wollen der Einfachheit wegen voraussetzen, dass die sämmtlichen Grössen a, b, c, e im endlichen Gebiete der t -Ebene liegen.

Dann hat man

$$\text{für } t = a: \log \frac{du}{d\log \eta} = (\gamma - 1) \log(t - a) + \text{f. c.},$$

$$\text{für } t = b: \log \frac{du}{d\log \eta} = \left(\frac{\gamma}{2} - 1\right) \log(t - b) + \text{f. c.},$$

$$\text{für } t = c: \log \frac{du}{d\log \eta} = \left(\frac{\gamma}{2} - 1\right) \log(t - c) + \text{f. c.},$$

$$\text{für } t = e: u = \gamma \sqrt{t - e} \log(t - e) + \text{f. c.}$$

Man kann die Untersuchung auf den Fall $n = 3, m = 1$ beschränken, d. h. auf einfache Verzweigungspunkte, und den allgemeinen Fall aus diesem dadurch ableiten, dass man mehrere einfache Verzweigungspunkte zusammenfallen lässt.

Um den Ausdruck für $\frac{du}{dt}$ zu bilden, hat man zu beachten, dass längs der Begrenzung dt reell, du entweder reell oder rein imaginär ist. Demnach ist $i\frac{du}{dt}$ reell, wenn t reell ist. Diese Function kann man ueber die Linie der reellen Werthe von t hinüber stetig fortsetzen, indem man die Bestimmung trifft, dass für conjugirte Werthe t und t' der Variablen auch die Function conjugirte Werthe haben soll. Alsdann ist $i\frac{du}{dt}$ für die ganze t -Ebene bestimmt und zeigt sich einwerthig.

Es seien $a'_1, a'_2, \dots$ die conjugirten Werthe zu $a_1, a_2, \dots$; und das Product $(t - a_1)(t - a_2) \dots$ werde mit $\prod(t - a)$ bezeichnet. Alsdann ist

$$du = \text{const.} \cdot i \sqrt{\frac{\prod(t - a) \prod(t - a') \prod(t - b)}{\prod(t - c)^2 \prod(t - e)^2}} dt. \quad (11)$$

Die Constanten a, b, c etc. müssen so bestimmt werden, dass für $t = e$: $u = \sqrt{t - e} \log(t - e) + \text{f. c.}$ wird. Damit u für alle Werthe von t ausser a, b, c, e endlich und stetig bleibe, muss für die Anzahl dieser letztgenannten Werthe eine Relation bestehen. Es muss die Differenz der Anzahl der Eckpunkte und der in der Begrenzung liegenden Verzweigungspunkte um 4 grösser sein als die doppelte Differenz der Anzahl der innern Verzweigungspunkte und der ins Unendliche verlaufenden Sektoren. Setzt man zur Abkürzung

$$\prod(t - a) \prod(t - a') \prod(t - b) = \varphi(t),$$

$$\prod(t - c) \prod(t - e) = \chi(t),$$

d. h.

$$\frac{du}{dv} = \text{const.} \cdot i \sqrt{\frac{\varphi(t)}{\chi(t)^2}},$$

so ist die ganze Function $\varphi(t)$ vom Grade $\nu - 4$, wenn $\chi(t)$ vom Grade ν ist. Hier bedeutet ν die Anzahl der Eckpunkte vermehrt um die doppelte Anzahl der ins Unendliche verlaufenden Sektoren.

14.

Es ist noch η als Function von t auszudrücken. Direct gelangt man dazu nur in den einfachsten Fällen. Im Allgemeinen ist der folgende Weg einzuschlagen. Es sei v eine noch näher zu bestimmende Function von t , die als bekannt vorausgesetzt wird. In den Gleichungen (8), (9), (10) kommt es wesentlich an auf $\frac{dX}{d \log \eta}$, wofür man auch schreiben kann $\frac{dX}{dv} \cdot \frac{dv}{d \log \eta}$.

Der letzte Factor lässt sich ansehen als Product der beiden Factoren

$$k_1 = \sqrt{\frac{dv}{d\eta}}, \quad k_2 = \eta \sqrt{\frac{dv}{d\eta}}, \quad (12)$$

die der Differentialgleichung erster Ordnung genügen

$$k_2 \frac{dk_1}{dv} - k_1 \frac{dk_2}{dv} = 1, \quad (13)$$

sowie der Differentialgleichung zweiter Ordnung

$$\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2} = \frac{1}{k_1} \frac{d^2 k_1}{dv^2} = \frac{1}{k_2} \frac{d^2 k_2}{dv^2}. \quad (14)$$

Gelingt es also, die eine oder die andere Seite dieser letzten Gleichung als Function von t auszudrücken, so lässt sich eine homogene lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung herstellen, von welcher k_1 und k_2 particuläre Integrale sind. Es sei k das vollständige Integral. Wir ersetzen $\frac{d^2 k}{dv^2}$ durch das ihm gleichbedeutende

$$\frac{dv}{dt} \frac{d^2 k}{dt^2} - \frac{dk}{dt} \frac{d^2 v}{dt^2} \bigg/ \left(\frac{dv}{dt} \right)^2$$

und erhalten für k die Differentialgleichung

$$\frac{dv}{dt} \frac{d^2 k}{dt^2} - \frac{d^2 v}{dt^2} \frac{dk}{dt} = \left(\frac{dv}{dt} \right)^3 \left(\frac{1}{k_1} \frac{d^2 k_1}{dv^2} \right) k. \quad (15)$$

Von der Gleichung (15) seien zwei von einander unabhängige particuläre Integrale K_1 und K_2 gefunden, deren Quotient $K_2 : K_1 = H$

ein von Bogen grösster Kreise begrenztes Abbild der positiven t -Halbebene auf der Kugelfläche liefert. Dasselbe leistet dann jeder Ausdruck von der Form

$$\eta = e^{\vartheta i} \frac{K_2 - \alpha K_1}{K_2 - \alpha' K_1}, \quad (16)$$

worin ϑ reell und α, α' conjugirte complexe Grössen sind.

Die Function v ist so zu wählen, dass für endliche Werthe von t die Unstetigkeiten von $\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2}$ nicht ausserhalb der Punkte a, a', b, c, e liegen.

Setzt man

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{\sqrt{\psi(t)\chi(t)}} = \frac{1}{\Pi(t)}, \quad (17)$$

so wird die Function $\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2}$ im Endlichen unstetig nur für die Punkte a, a', b, c , und zwar für jeden unendlich in erster Ordnung. Man erhält nämlich für $t = c$

$$\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2} = \frac{\text{const.}}{t - c}.$$

Folglich:

$$k = \text{const.} \cdot (t - c)^{\frac{1}{2}}, \quad \eta = \text{const.} \cdot (t - c),$$

und hieraus:

$$\eta - \eta_c = \text{const.} \cdot (t - c)^{\frac{\gamma}{2}}.$$

Für $t = c$:

$$k \frac{dv^2}{dt^2} : \frac{1}{t - c}.$$

Entsprechende Ausdrücke erhält man für $t = a, a', b$, in denen c resp. durch a, a', b , und γ durch 2 zu ersetzen ist.

Eine ähnliche Betrachtung lehrt, dass für $t = e$ die Function $\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2}$ stetig bleibt.

Für $t = \infty$ ergibt sich

$$\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2} = \frac{\text{const.}}{t^2}.$$

$$\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2} = \sum \frac{\frac{1}{2}(\frac{\gamma}{2} - 1)}{t - g} + \frac{F(t)}{\psi(t)\chi(t)}.$$

Die Summe bezieht sich auf alle Punkte $g = a, a', b, c$, und bei a, a', b ist 2 statt γ zu setzen. $F(t)$ ist eine ganze Function vom Grade $(2\nu - 6)$, in der die ersten beiden Coefficienten sich folgendermassen bestimmen. Man bringe dv in die Form

$$dv = \sqrt{a} dv'$$

oder kürzer $dv^2 = a dv'^2$.

Dann ergibt sich durch Differentiation

$$2 dv \frac{d^2v}{dt^2} = \frac{da}{dt} dv'^2 + 2a dv' \frac{d^2v'}{dt^2},$$

folglich

$$\begin{aligned} \frac{1}{dv} \frac{d^2v}{dt^2} &= \frac{1}{2} \frac{da}{dt} \frac{1}{a} + \frac{dv'}{dv} \frac{d^2v'}{dt^2}. \\ \left(\frac{d^2v}{dv^2} \right)^2 \frac{d}{dv'} \left\{ \left(\frac{dv}{dv'} \right)^2 \frac{d^2v}{dt^2} \right\} &= a^2 \frac{d^2v}{dv^2} \\ &= \sum \frac{\frac{1}{2}(\frac{\gamma}{2} - 1)}{t - g} + \frac{F(t)}{\psi(t)\chi(t)}. \end{aligned}$$

Die Function auf der linken Seite ist endlich für $t = \infty$. Folglich hat man rechts in der Entwicklung von $\frac{1}{\psi(t)\chi(t)}F(t)$ und von $\frac{dv}{dt}$ die Coefficienten von t^2 und resp. von t einander gleich zu setzen. Die Entwicklung von $\frac{dv}{dt}$ giebt nach einfacher Rechnung

Hiernach bleiben in $F(t)$ noch $2\nu - 7$ unbestimmte Coefficienten. Es ist aber wichtig zu bemerken, dass dieselben reell sein müssen. Denn wir haben in §. 12 gefunden, dass du reell oder rein imaginär ist in allen geraden Begrenzungslinien der Minimalfläche und folglich auch an jeder Stelle in der Begrenzung der Abbildungen. Vermöge der Gleichung (17) gilt dasselbe von dv . Daraus lässt sich beweisen, dass für reelle Werthe von t die Function $\frac{1}{k} \frac{d^2k}{dv^2}$ nothwendigerweise reelle Werthe besitzt.

Um diesen Beweis zu führen, betrachten wir die Abbildung auf der Kugel vom Radius 1 und nehmen irgend einen Theil der Begrenzung, also den Bogen eines gewissen grössten Kreises. Im Pole dieses grössten Kreises legen wir die Tangential-Ebene an und bezeichnen

sie als die Ebene der η_1 . Dann lassen sich die constanten Grössen $\alpha_1, \alpha'_1, \vartheta_1$ so bestimmen, dass

$$\eta_1 = e^{\vartheta_1 i} \frac{\eta - \alpha_1}{1 + \alpha'_1 \eta}$$

ist, und wir erhalten zwei Functionen $k'_1 = \sqrt{\frac{dv}{d\eta_1}}$ und $k'_2 = \eta_1 \sqrt{\frac{dv}{d\eta_1}}$, die particuläre Integrale der Differentialgleichung (15) sind. Folglich haben wir

$$\frac{1}{k_1} \frac{d^2 k_1}{dv^2} = \frac{1}{k'_1} \frac{d^2 k'_1}{dv^2}.$$

Der eben betrachtete Theil der Begrenzung bildet sich in der η_1 -Ebene ab durch die Gleichung

$$\eta_1 + \eta'_1 = 0$$

und wenn man dies in k'_1 einführt, so erkennt man leicht, dass in dem fraglichen Begrenzungstheile $\frac{1}{k'_1} \frac{d^2 k'_1}{dv^2}$ reell ausfällt. Folglich gilt dasselbe von $\frac{1}{k_1} \frac{d^2 k_1}{dv^2}$, und da diese Betrachtung für jedes einzelne Begrenzungstück angestellt werden kann, so ist $\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2}$ reell in der ganzen Begrenzung.

Nun fällt aber bei einem reellen oder rein imaginären dv die Function $\frac{1}{k_1} \frac{d^2 k_1}{dv^2}$ auch dann reell aus, wenn man allgemeiner

$$k'_1 = \varrho_1 e^{\psi_1 i}$$

setzt und den Modul ϱ_1 constant nimmt. Damit also die Axe der reellen t sich auf der Kugel vom Radius 1 wirklich in Bögen grösster Kreise abbilde, muss für jeden Begrenzungstheil $\varrho_1 = 1$ sein. Dies liefert ebenso viele Bedingungsgleichungen, als einzelne Begrenzungslinien gegeben sind.

Bei dieser Untersuchung ist, wie schon im vorigen Paragraphen, vorausgesetzt, dass die Werthe a, b, c, e sämmtlich endlich seien. Trifft dies nicht zu, so bedarf die Betrachtung einer geringen Modification.

Anmerkung. Die Aufgabe ist hiermit vollständig formulirt. Im einzelnen Falle kommt es nur darauf an, die Differentialgleichung (15) wirklich aufzustellen und zu integrieren. Uebrigens ist es nicht unwichtig, zu bemerken, dass die Anzahl der in der Lösung auftretenden willkürlichen reellen Constanten ebenso gross ist wie die Anzahl der Bedingungsgleichungen, welche vermöge der Natur der Aufgabe und vermöge der Daten des Problems erfüllt sein müssen. Wir bezeichnen die Anzahl der Punkte a, b, c, e resp. mit A, B, C, E und beachten, dass $2A + B + 4 = C + 2E = \nu$ ist. In der Differentialgleichung (15) treten $2A + B + 4C + 5E - 10$ willkürliche reelle Constanten auf, nämlich: die

Winkel γ , deren Anzahl C ist; die $2\nu-7$ Constanten der Function $F(t)$; die reellen Grössen b, c, e , von denen man dreien beliebige Werthe geben kann, indem man für t eine lineare Substitution mit reellen Coefficienten macht; die reellen und imaginären Theile der Grössen a . Zu diesen willkürlichen Constanten kommen bei der Integration noch 10 hinzu, nämlich, wenn $\eta = \frac{K_2 - \alpha K_1}{K_2 - \alpha' K_1}$ ist, die drei complexen Verhältnisse $\alpha : \beta : \gamma : \delta$, die für 6 reelle Constanten zu zählen sind, ein (reeller oder rein imaginärer) Factor von du , und je eine additive reelle Constante in den Ausdrücken für x, y, z . Diese Constanten müssen aber noch Bedingungsgleichungen unterworfen werden, die erfüllt sein müssen, wenn unsere Formeln wirklich eine Minimalfläche darstellen sollen. Von diesen Bedingungsgleichungen sind $2A + B$ den Punkten a, a', b entsprechend, die aussagen, dass in den in der Umgebung dieser Punkte gültigen Entwicklungen der Lösungen der Differentialgleichung (15) keine Logarithmen auftreten (vergl. Anmerkung (4)), und $C + E$, die besagen, dass die zwischen den einzelnen Punkten c, e gelegenen Stücke der Axe der reellen t sich auf der Kugel mit dem Radius 1 in $C + E$ Bögen grösster Kreise abbilden. Sonach ist die Anzahl der in der Lösung uebrig bleibenden unbestimmten Constanten $3C + 4E$.

Die Daten des Problems bestehen in den Coordinaten der Eckpunkte, und in den Winkeln, die die Richtungen der ins Unendliche verlaufenden Begrenzungslinien festlegen. Diese Daten sprechen sich in $3C + 4E$ Gleichungen aus, zu deren Erfüllung man eine ebenso grosse Zahl verfügbarer Constanten hat.^(*)

Beispiele.

15.

Die Begrenzung bestehe aus zwei unendlichen geraden Linien, die nicht in einer Ebene liegen. Ihre kürzeste Verbindungslinie habe die Länge A , und es sei $\alpha\pi$ der Winkel, welchen die Projection der Fläche auf der rechtwinklig gegen jene Verbindungslinie gelegten Ebene ausfüllt.

Nimmt man die kürzeste Verbindungslinie zur x -Axe, so hat in jeder der beiden Begrenzungsgeraden x einen constanten Werth. Ebenso ist φ in jeder der beiden Begrenzungsgeraden constant. In unendlicher Entfernung ist die positive Normale für den einen Sector parallel der positiven, für den andern Sector parallel der negativen x -Axe. Die Begrenzung bildet sich auf der Kugel in zwei grössten Kreisen ab, die durch die Pole $\eta = 0$ und $\eta = \infty$ gehen und den Winkel $\alpha\pi$ einschliessen.

Hiernach hat man

$$\begin{aligned} x &= \frac{iA}{2\alpha\pi} \log \eta, \\ s &= \frac{iA}{2\alpha\pi\sqrt{\eta}} \left(\frac{1}{\eta} - \eta' \right), \\ s' &= \frac{iA}{2\alpha\pi\sqrt{\eta'}} \left(\frac{1}{\eta'} - \eta \right), \end{aligned}$$

folglich

$$\begin{aligned} x &= -\frac{iA}{2\alpha\pi} \log(\eta\eta'), \\ y &= \frac{A}{2\alpha\pi} \cdot \frac{1}{2i} \log \frac{s'}{s}, \end{aligned}$$

worin man die Gleichung der Schraubenfläche erkennt.

16.

Die Begrenzung bestehe aus drei geraden Linien, von denen zwei sich schneiden und die dritte zur Ebene der beiden ersten parallel läuft. Legt man den Anfangspunkt der Coordinaten in den Schnittpunkt der beiden ersten Geraden, die positive x -Axe in die negative Normale, so

bildet jener Schnittpunkt auf der Kugel sich ab im Punkte $\eta = \infty$. Die Abbildung der beiden ersten Geraden sind grösste Halbkreise, die von $\eta = \infty$ bis $\eta = 0$ laufen. Ihr Winkel sei $\alpha\pi$. Die Abbildung der dritten Linie ist der Bogen eines grössten Kreises, der von $\eta = 0$ ausgeht, an einer gewissen Stelle umkehrt und in sich selbst bis zum Punkte $\eta = 0$ zurückläuft. Dieser Bogen bilde mit den beiden ersten grössten Halbkreisen die Winkel $-\beta\pi$ und $\gamma\pi$, so dass β und γ absolute Zahlen sind und $\beta + \gamma = \alpha$ sich ergibt. Um die Abbildung auf der halben t -Ebene zu erhalten, setzen wir fest, dass $t = \infty$ sein soll für $\eta = \infty$, dass dem unendlichen Sector zwischen der ersten und dritten Linie $t = b$, dem unendlichen Sector zwischen der zweiten und dritten Linie $t = c$, dem Umkehrpunkte der Normalen auf der dritten Linie $t = a$ entsprechen soll. Dabei sind a, b, c reell und $c > a > b$.

Diesen Bestimmungen entspricht $\eta = (t - b)^\beta(t - c)^\gamma$. Der Werth a hängt von b und c ab. Man hat nämlich

$$\frac{d \log \eta}{dt} = \frac{\beta(t - c) + \gamma(t - b)}{(t - b)(t - c)}$$

und dieses muss für den Umkehrpunkt $= 0$ sein, also $a = \frac{\beta c + \gamma b}{\beta + \gamma}$.

Man hat weiter nach Art. 12 und 13

$$\frac{du}{dt} = i\sqrt{(c - b)(\beta + \gamma)} \frac{(t - a) dt}{(t - b)(t - c)},$$

oder wenn man $c - b = -r$ annimmt

$$\frac{du}{dt} = i\sqrt{(c - b)(\beta + \gamma)} \frac{(t - a) dt}{(t - b)(t - c)}.$$

Folglich

$$\begin{aligned}
 (b) \quad X &= i\sqrt{\beta + \gamma} \int \frac{(t-a) dt}{\sqrt{(t-b)(t-c)}}, \\
 \frac{ds}{dt} &= i\sqrt{\beta + \gamma} \cdot \frac{1}{\eta^2} \frac{(t-a) dt}{(t-b)(t-c)}, \\
 \frac{ds'}{dt} &= i\sqrt{\beta + \gamma} \cdot \eta^2 \frac{(t-a) dt}{(t-b)(t-c)}, \\
 s &= \frac{i}{2} \int \frac{(t-b)^\beta (t-c)^\gamma - (t-b)^{-\beta} (t-c)^{-\gamma}}{(t-b)(t-c)} (t-a) dt, \\
 &+ \frac{i}{2} \int \frac{(t'-b)^\beta (t'-c)^\gamma - (t'-b)^{-\beta} (t'-c)^{-\gamma}}{(t'-b)(t'-c)} (t'-a) dt', \\
 &\frac{(t-b)^\beta (t-c)^\gamma + (t-b)^{-\beta} (t-c)^{-\gamma}}{(t-b)(t-c)} (t-a) dt.
 \end{aligned}$$

17.

Die Begrenzung bestehe aus drei einander kreuzenden geraden Linien, deren kürzeste Abstände A, B, C sein mögen. Zwischen je zwei begrenzenden Linien erstreckt sich die Fläche ins Unendliche. Es seien $\alpha\pi, \beta\pi, \gamma\pi$ die Winkel der Richtungen, in welchen die Grenzlinsen des ersten, des zweiten, des dritten Sectors ins Unendliche verlaufen. Setzt man fest, dass für die drei Sektoren der Minimalfläche im Unendlichen die Grösse t resp. $= 0, \infty, 1$ sein soll, so erhält man

$$\frac{du}{dt} = \frac{\sqrt{\varphi(t)}}{t(1-t)},$$

$\varphi(t)$ ist eine ganze Function zweiten Grades. Ihre Coefficienten bestimmen sich daraus, dass

$$\text{für } t = 0 : \quad \frac{du}{d \log t} = \frac{A}{2\pi},$$

$$\text{für } t = \infty : \quad \frac{du}{d \log t} = \frac{B}{2\pi},$$

$$\text{für } t = 1 : \quad \frac{du}{d \log(1-t)} = \frac{C}{2\pi}$$

sein muss.

Danach ergibt sich

$$\varphi(t) = \frac{1}{4\pi^2} \{A^2 + (B^2 - A^2 - C^2)t + C^2 t^2\}.$$

Je nachdem die Wurzeln der Gleichung $\varphi(t) = 0$ imaginär oder reell sind, hat die Abbildung auf der Kugel einen Verzweigungspunkt im Innern oder zwei Umkehrpunkte der Normalen auf der Begrenzung.

Die Functionen $k_1 = \sqrt{\frac{dv}{d\eta}}$ und $k_2 = \eta\sqrt{\frac{dv}{d\eta}}$ werden nur für die drei Sektoren unstetig, wenn man $\frac{dv}{dt} = \varphi(t)$ nimmt, und zwar ist die Unstetigkeit von k_1 der Art, dass

$$\text{für } t = 0 : \quad k_1 = t^{-\frac{\alpha}{2}},$$

$$\text{für } t = \infty : \quad k_1 = t^{\frac{\beta}{2}},$$

$$\text{für } t = 1 : \quad k_1 = (1-t)^{\frac{\gamma}{2}}$$

einädrig und verschieden von 0 und ∞ wird. k_1 und k_2 sind particuläre Integrale einer homogenen linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung, die sich ergibt, wenn man $\frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2}$ aus seinen Unstetigkeiten als Function von t darstellt und t statt v als unabhängige Variable in $\frac{d^2 k}{dv^2}$ einführt. Hat man das particuläre Integral k_1 gefunden, so ergibt sich k_2 aus der Differentialgleichung erster Ordnung

$$k_2 \frac{dk_1}{dv} - k_1 \frac{dk_2}{dv} = 1.$$

Das vollständige Integral der homogenen linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung werde mit

$$(d) \quad k = P \begin{pmatrix} 0 & \infty & 1 \\ -\frac{\alpha}{2} & +\frac{\beta}{2} & \frac{\gamma}{2} & t \\ * & * & * \end{pmatrix}$$

bezeichnet. Diese Function genügt wesentlich denselben Bedingungen, die in der Abhandlung ueber die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ als Definition der P -Function ausgesprochen sind^{*}). Sie weicht von der P -Function darin ab, dass die Summe der Exponenten -1 ist, nicht $+1$ wie bei P .

Man kann die Function Q mit Hülfe einer Function P und ihrer ersten Derivirten ausdrücken. Zunächst ist nämlich

$$k_1 = P \begin{pmatrix} 0 & \infty & 1 \\ -\frac{\alpha}{2} & +\frac{\beta}{2} & \frac{\gamma}{2} & t \\ \frac{\alpha}{2} & -\frac{\beta}{2} - \gamma - 1 & -\frac{\gamma}{2} \end{pmatrix},$$

$$Q = P \begin{pmatrix} 0 & \infty & 1 \\ 0 & -\alpha - \beta - \gamma + 1 & 0 & t \\ \alpha & -\alpha + \beta - \gamma + 1 & \gamma \end{pmatrix}.$$

Setzt man nun

$$k_1 = t^{-\frac{\alpha}{2}}(1-t)^{\frac{\gamma}{2}}\vartheta,$$

$$Q = P \begin{pmatrix} 0 & \infty & 1 \\ 0 & -\alpha - \beta - \gamma + 1 & 0 & t \\ \alpha & -\alpha + \beta - \gamma + 1 & \gamma \end{pmatrix},$$

so lassen sich die Constanten a, b, c so bestimmen, dass

$$(e) \quad k_1 = t^{-\frac{\alpha}{2}}(1-t)^{\frac{\gamma}{2}} \left((a+bt)\vartheta + ct(1-t)\frac{d\vartheta}{dt} \right)$$

wird. In der That hat man nur diesen Ausdruck in die Differentialgleichung (c) einzusetzen und die Differentialgleichung zweiter Ordnung für ϑ zu beachten, um zu der Gleichung zu gelangen

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= a^2 t^{-\alpha} (1-t)^{-\gamma} (\vartheta, \vartheta) dt, \\ F(t) &= a(a+\alpha)(1-t) + (a+b)(a+b-\gamma c)t \\ &= (1-t) \left(1 - \frac{a+b+c}{a} t \right) \left(1 - \frac{a+b-\gamma c}{a} t \right). \end{aligned}$$

Vermöge der Eigenschaften der Function ϑ kann man setzen

$$t^{-\alpha}(1-t)^{-\gamma}(\vartheta, \vartheta) = 1.$$

und folglich muss $F(t) = \varphi(t)$ sein. Hieraus ergeben sich drei Bedingungsgleichungen für a, b, c , die eine sehr einfache Form annehmen, wenn man

$$a+b+c=p, \quad a+b-\gamma c=q, \quad \frac{a+b+c}{a}=r$$

setzt. Die Bedingungsgleichungen lauten dann

$$\begin{aligned} pp - \alpha\alpha(p+q+r)^2 &= \frac{A^2}{2\pi^2}, \\ qq - \beta\beta(p+q+r)^2 &= \frac{B^2}{2\pi^2}, \\ rr - \gamma\gamma(p+q+r)^2 &= \frac{C^2}{2\pi^2}. \end{aligned}$$

Mit Hülfe der Function

$$\Delta = P \begin{pmatrix} 0 & \infty & 1 \\ \frac{\alpha}{2} & \frac{\beta}{2} & \frac{\gamma}{2} & t \\ -\frac{\alpha}{2} & -\frac{\beta}{2} + 2 & -\frac{\gamma}{2} + 2 \end{pmatrix},$$

deren Zweige Δ_1 und Δ_2 der Differentialgleichung genügen

den Coordinatenachsen parallel laufen, ist $\alpha = \beta = \gamma = \frac{1}{2}$. Dann erhält man

$$(f) \quad k = t^{\frac{1}{4}} \left((p + qt)^2 + ct(1 - t)^2 \right).$$

Es würde nicht schwer sein, die einzelnen Zweige der Function k in der Form von bestimmten Integralen herzustellen. Der Weg dazu ist in Art. 7 der Abhandlung ueber die Function P vorgezeichnet.

In dem besondern Falle, dass die drei begrenzenden geraden Linien den Coordinatenachsen parallel laufen, ist $\alpha = \beta = \gamma = \frac{1}{2}$. Dann erhält man

Der Zweig K_1 dieser Function ist

$$= \left(\frac{c}{p} \right)^{\frac{1}{2}} \sqrt{t^2 + (q - 1)^2} \cdot \text{const.},$$

und daraus ergibt sich

$$\begin{aligned} k_1 &= \sqrt{2} t^{\frac{1}{4}} (t - 1)^{\frac{1}{4}} \sqrt{t^2 + (q - 1)^2} \left[p + qt + i\sqrt{c} t \sqrt{t^2 + (q - 1)^2} \right], \\ k_2 &= \sqrt{2} t^{\frac{1}{4}} (t - 1)^{\frac{1}{4}} \sqrt{t^2 + (q - 1)^2} \left[p + qt - i\sqrt{c} t \sqrt{t^2 + (q - 1)^2} \right]. \end{aligned}$$

Mit Hülfe dieser beiden Functionen lassen sich dX , dY , dZ folgendermassen ausdrücken

$$\begin{aligned} dX &= -i k_1 k_2 \frac{du}{d \log \eta} dt, \\ dZ &= -\frac{i}{2} (k_1^2 + k_2^2) \frac{du}{d \log \eta} dt, \\ (g) \quad iY &= -(p - q + r)\sqrt{t} + (p + q - r)\sqrt{t^2} \\ &\quad -i(p + 3q + 3r)(p + q - r) \log \sqrt{t + 1}, \\ iZ &= (p - q + r)^2 (1 - t)^{\frac{1}{2}} + (p + q - r)^2 (1 - t)^{-\frac{1}{2}} \\ &\quad + i(3p + q + r)(-p + q + r) \log \sqrt{1 + t^2}. \end{aligned}$$

Wenn p, q, r reell sind, so geben die doppelten Coefficienten von i in den drei Grössen rechts die rechtwinkligen Coordinaten eines Punktes der Fläche.

18.

Die Begrenzung bestehe aus vier sich schneidenden geraden Linien, die man erhält^{**}) wenn von den Kanten eines beliebigen Tetraeders zwei nicht zusammenstossende weggelassen werden. Die Abbildung auf der Kugeloberfläche ist ein sphärisches Viereck, dessen Winkel $\alpha\pi, \beta\pi, \gamma\pi, \delta\pi$ sein mögen. Es ergibt sich

$$\frac{du}{dt} = \frac{G dt}{\sqrt{(t-a)(t-b)(t-c)(t-d)}} = \frac{G dt}{\sqrt{\Delta(t)}},$$

wenn die reellen Werthe $t = a, b, c, d$ die Punkte der t -Ebene bezeichnen, in welchen sich die Eckpunkte des Vierecks abbilden.

Soll die in §. 14 entwickelte Methode zur Bestimmung von η angewandt werden, so hat man hier speciell $\varphi(t) = 1, \chi(t) = \Delta(t)$, folglich $\nu = 4$ und

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{\sqrt{\Delta(t)}}.$$

Die Functionen k_1 und k_2 genügen der Differentialgleichung

$$k_2 \frac{dk_1}{dv} - k_1 \frac{dk_2}{dv} = 1$$

und sind particuläre Integrale der Differentialgleichung zweiter Ordnung

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dv^2} &= \frac{(\alpha\alpha - 1)\Delta'(a)}{4(t-a)} + \frac{(\beta\beta - 1)\Delta'(b)}{4(t-b)} \\ &+ \frac{(\gamma\gamma - 1)\Delta'(c)}{4(t-c)} + \frac{(\delta\delta - 1)\Delta'(d)}{4(t-d)}. \end{aligned}$$

Die Function $F(t)$ des §. 14 ist hier vom zweiten Grade, aber die Coefficienten von t^2 und von t sind gleich Null, also h eine Constante.

In der letzten Gleichung hat man auf der linken Seite t als unabhängige Variable einzuführen und erhält

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} \frac{d^2 k}{dt^2} &= \frac{(\alpha\alpha - 1)\Delta'(a)}{t-a} + \frac{(\beta\beta - 1)\Delta'(b)}{t-b} \\ &+ \frac{(\gamma\gamma - 1)\Delta'(c)}{t-c} + \frac{(\delta\delta - 1)\Delta'(d)}{t-d} \end{aligned}$$

als die Differentialgleichung zweiter Ordnung, welcher k Genüge leisten muss.

Sind X, Y, Z als Functionen von t wirklich ausgedrückt, so treten in der Lösung noch 16 unbestimmte reelle Constanten auf, nämlich die vier Grössen a, b, c, d , von denen wie oben drei beliebig angenommen werden können, die vier Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, die Grösse h ,

ferner 6 reelle Constanten in dem Ausdrucke für η , ein constanter Factor in du und je eine additive Constante in x, y, z . Zur Bestimmung dieser 16 Grössen sind 16 Bedingungsgleichungen vorhanden, nämlich 4 Gleichungen, welche ausdrücken, dass die vier Begrenzungslinien in der Ebene der η sich auf der Kugel in grössten Kreisen abbilden, und 12 Gleichungen, welche aussagen, dass x, y, z in den 4 Eckpunkten gegebene Werthe haben.

In dem speciellen Falle eines regulären Tetraeders ist die Abbildung auf der Kugel ein regelmässiges Viereck, in welchem jeder Winkel $= \frac{2}{3}\pi$. Die Diagonalen halbiren sich und stehen rechtwinklig aufeinander. Die den Eckpunkten diametral gegenüberliegenden Punkte der Kugeloberfläche sind die Ecken eines congruenten Vierecks. Zwischen beiden liegen vier dem ursprünglichen ebenfalls congruente Vierecke, die je zwei Eckpunkte mit dem ursprünglichen, zwei mit dem gegenüberliegenden gemein haben. Diese sechs Vierecke füllen die Kugeloberfläche einfach aus. Es wird also $\frac{du}{d\log\eta}$ eine algebraische Function von η sein.

Man kann die gesuchte Minimalfläche ueber ihre ursprüngliche Begrenzung dadurch stetig fortsetzen, dass man sie um jede ihrer Grenzlinien als Drehungsaxe um 180° dreht. Längs einer solchen Grenzlinie haben dann die ursprüngliche Fläche und die Fortsetzung gemeinschaftliche Normalen. Wiederholt man die Construction an den neuen Flächentheilen, so lässt sich die ursprüngliche Fläche beliebig weit fortsetzen. Welche Fortsetzung man aber auch betrachte, immer bildet sie sich auf der Kugel in einem der sechs congruenten Vierecke ab. Und zwar haben die Abbildungen von zwei Flächentheilen eine Seite gemein oder sie liegen einander gegenüber, je nachdem die Flächentheile selbst in einer Grenzlinie an einander stossen oder an gegenüberliegenden Grenzlinien eines mittleren Flächentheils gelegen sind. In dem letzteren Falle können die betreffenden Flächentheile durch parallele Verschiebung zur Deckung gebracht werden. Daher muss $\left(\frac{du}{d\log\eta}\right)^2$ unverändert bleiben, wenn η mit $\frac{1}{\eta}$ vertauscht wird.

Legt man den Pol ($\eta = 0$) in den Mittelpunkt eines Vierecks, den Anfangsmeridian durch die Mitte einer Seite, so ist für die Eckpunkte dieses Vierecks

$$\eta = \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} \cdot e^{\frac{\pi i}{4}}, \quad \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} \cdot e^{\frac{3\pi i}{4}}, \quad \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} \cdot e^{-\frac{3\pi i}{4}}, \quad \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} \cdot e^{-\frac{\pi i}{4}},$$

und für die Eckpunkte des gegenüberliegenden Vierecks die entgegengesetzten Werthe.

Punkte, denen entgegengesetzte Werthe von η angehören, haben dieselbe X -Coordinate. Es muss also $\left(\frac{du}{d\log \eta}\right)^2$ bei der Vertauschung von η mit $-\eta$ unverändert bleiben. Hiernach erhält man

$$\left(\frac{du}{d\log \eta}\right)^2 = C_1^2 \frac{(\eta^4 + \eta'^4 + 1)}{(\eta^4 \eta'^4 + \eta^4 + \eta'^4)}.$$

Die Constante C_1^2 muss reell sein, damit du^2 in der Begrenzung reelle Werthe besitze.

Zu demselben Resultate gelangt man auf dem folgenden Wege. Die Substitution

$$\xi^2 = \frac{\eta^4 + \eta'^4 + 1}{\eta^4 \eta'^4 + \eta^4 + \eta'^4}$$

liefert auf der ξ -Ebene eine Abbildung, die von einer geschlossenen ueberall stetig gekrümmten Linie begrenzt wird. Die Rechnung zeigt, dass $d\log \xi$ in der Begrenzung rein imaginär ist. Folglich ist die Abbildung der Begrenzung in der ξ -Ebene ein Kreis um den Mittelpunkt $\xi = 0$. Der Radius dieses Kreises ist $= 1$. Den Eckpunkten

$$\eta = \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} \cdot e^{\pm \frac{\pi i}{4}}$$

entspricht $\xi = +1$, den Eckpunkten

$$\eta = \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} \cdot e^{\pm \frac{3\pi i}{4}}$$

entspricht $\xi = i$. Geht man an irgend einer dieser vier Stellen durch das Innere der Minimalfläche von einer Grenzlinie zur folgenden, so ändert sich dabei der Arcus von $d\xi$ um π . Daher kann man, wie in §. 13, auch hier setzen

$$\frac{du}{dt} = \frac{C_2}{\sqrt{(t-a)(t-b)(t-c)}},$$

und es muss C_2 rein imaginär sein, damit du^2 in der Begrenzung reell ausfalle. Es findet sich $C_2 = 3\sqrt[4]{C_1^2} \cdot i$.

Dieser Ausdruck stimmt mit dem vorher aufgestellten für $\left(\frac{du}{d\log \eta}\right)^2$.

Zur weitem Vereinfachung nehme man

$$\eta^2 = \frac{\sqrt{t^2 + 1} + \sqrt{2}t}{\sqrt{t^2 + 1} - \sqrt{2}t}$$

und beachte, dass

$$\left(\frac{du}{d\log \eta}\right)^2 = 2C_1^2 \frac{dt}{d\log \eta}.$$

Dann ergibt eine sehr einfache Rechnung

$$\frac{1}{2} \left(\frac{du}{d \log \eta} \right)^2 = C \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}, \quad (\text{h})$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{du}{d \log \eta} \right)^2 = C \int \frac{dt}{\sqrt{(1-\varrho t^2)(1-\varrho^2 t^2)}},$$

wenn $\varrho = -\frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})$ eine dritte Wurzel der Einheit bezeichnet.

Die reelle Constante $C = \sqrt[3]{6}C_1^2$ bestimmt sich aus der gegebenen Länge der Tetraederkanten.

19.

Endlich soll noch die Aufgabe der Minimalfläche für den Fall behandelt werden, dass die Begrenzung aus zwei beliebigen Kreisen besteht, die in parallelen Ebenen liegen. Dann kennt man die Richtung der Normalen in der Begrenzung nicht. Daher lässt sich diese auch nicht auf der Kugel abbilden. Man gelangt aber zur Lösung der Aufgabe durch die Annahme, dass alle zu den Ebenen der Grenzkreise parallel gelegten ebenen Schnitte Kreise seien, und es wird sich zeigen, dass unter dieser Annahme der Minimalbedingung Genüge geleistet werden kann.

Legt man die x -Axe rechtwinklig gegen die Ebenen der Grenzkreise, so ist die Gleichung der Schnittcurve in einer parallelen Ebene

$$y^2 + z^2 + 2\alpha y + 2\beta z + \gamma = 0,$$

und α, β, γ sind als Functionen von x zu bestimmen. Zur Abkürzung werde

$$F = y^2 + z^2 + 2\alpha y + 2\beta z + \gamma$$

gesetzt, so dass

$$\cos r = w \frac{\partial F}{\partial x}, \quad \sin r \cos \varphi = w \frac{\partial F}{\partial y}, \quad \sin r \sin \varphi = w \frac{\partial F}{\partial z}$$

ist. Dann lässt sich die Bedingung des Minimum in die Form bringen

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{w} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\sin r \cos \varphi}{w} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\sin r \sin \varphi}{w} \right) = 0$$

oder nach Ausführung der Differentiation

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} + \frac{w'}{w} \frac{\partial F}{\partial x} + 4w^2(F + \alpha^2 + \beta^2 - \gamma) = 0.$$

Schreibt man $\alpha^2 + \beta^2 - \gamma = -q$ und beachtet, dass $F = 0$ ist, so geht die letzte Gleichung ueber in

$$\frac{w'}{w} + 2q + \text{const.} = 0$$

und giebt nach einmaliger Integration

$$\left| \frac{dx}{w} \right| + 2 \int q dx + \text{const.} = 0.$$

Die Integrationsconstante ist von x unabhängig. Nimmt man andererseits $\frac{dx}{w}$ unabhängig von y und z , so muss die Integrationsconstante eine lineare Function von y und z sein, weil $2 \int q dx$ eine solche ist. Man hat also

$$\frac{1}{w} + 2 \int q dx + 2ay + 2bz + \text{const.} = 0.$$

Vergleicht man damit das Resultat der directen Differentiation von F , nämlich

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2y \frac{d\alpha}{dx} + 2z \frac{d\beta}{dx} + \frac{d\gamma}{dx},$$

so ergibt sich

$$\frac{d\alpha}{dx} = -aw, \quad \frac{d\beta}{dx} = -bw,$$

und wenn man $\int q dx = m$ setzt:

$$\alpha = -am + d, \quad \beta = -bm + e.$$

Hiernach hat man

$$q = -2a\varrho y - 2b\varrho z + f(m),$$

$$\frac{d^2 q}{dx^2} = -2a\varrho \frac{dy}{dx} - 2b\varrho \frac{dz}{dx} + f'(m) \frac{dm}{dx} + f''(m) \left(\frac{dm}{dx} \right)^2$$

und diese Ausdrücke sind in die Gleichung (1) einzuführen. Nach gehöriger Hebung erhält man

$$\frac{d^2 q}{dx^2} + 2q \frac{dm}{dx} + 2q = 0$$

eine Gleichung, die sich weiter vereinfacht, wenn man beachtet, dass

$$f(m) = (a^2 + b^2)m^2 - 2(ad + be)m + d^2 + e^2.$$

Nimmt man hieraus $\frac{dq}{dx}$ und $\frac{d^2 q}{dx^2}$, so geht die Differentialgleichung, welche die Bedingung des Minimum ausdrückt, ueber in folgende:

$$\frac{d^2 m}{dx^2} + 2m + 2(a^2 + b^2)m^2 = 0.$$

Zur Ausführung der Integration setze man $\frac{dm}{dx} = p$ und betrachte

q als unabhängige Variable. Dadurch erhält man für p^2 als Function von q eine lineare Differentialgleichung erster Ordnung, nämlich

$$\frac{d(p^2)}{dq} - p^2 + 2q + 2(a^2 + b^2)q^2 = 0$$

oder

$$\frac{d(p^2)}{dq} - p^2 = -2q - 2(a^2 + b^2)q^2.$$

Das Integral lautet

$$p^2 = e^q \left\{ \text{const.} + \int e^{-q} [2q + 2(a^2 + b^2)q^2] dq \right\}.$$

Darin ist für p wieder $\frac{dm}{dx}$ zu setzen, wodurch man erhält

$$\frac{dx}{dm} = \frac{\sqrt{2q + 2cq^2 - (a^2 + b^2)2q^3}}{1},$$

also ergibt sich

$$\begin{aligned} \text{(o)} \quad m &= \int \frac{dq}{\sqrt{2q + 2cq^2 - (a^2 + b^2)2q^3}}, \\ 2y &= am - d + \sqrt{-q} \cos \psi, \\ 2z &= bm - e + \sqrt{-q} \sin \psi. \end{aligned}$$

Man hat demnach x, y, z als Functionen von zwei reellen Variablen q und ψ ausgedrückt. Die Ausdrücke sind, abgesehen von algebraischen Gliedern, elliptische Integrale mit der obern Grenze q . Nach der oben entwickelten allgemeinen Methode hätte man x, y, z erhalten als Summen von zwei conjugirten Functionen zweier conjugirter complexer Variablen. Danach liegt die Vermuthung nahe, dass diese complexen Ausdrücke mit Hülfe der Additionstheoreme der elliptischen Functionen sich je in einen einzigen Integraalausdruck mit der Variablen q zusammenziehen lassen.

Und dies ist leicht zu bestätigen. Man hat nämlich aus den Formeln für die Richtungscoordinaten r und φ der Normalen

$$\sqrt{\frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z}i} = \sqrt{y + zi + \alpha + \beta i} = \sqrt{\eta} e^{\frac{\tau}{2}i}.$$

Verbindet man damit die Definitionsgleichung von q , nämlich:

$$\sqrt{(y + zi + \alpha + \beta i)(y - zi + \alpha - \beta i)} = -q,$$

so ergibt sich

$$(y + zi) + (\alpha + \beta i) = (-q)^{\frac{1}{2}} \eta^{\frac{1}{2}} e^{\frac{r}{2}i}, (y - zi) + (\alpha - \beta i) = (-q)^{\frac{1}{2}} \eta^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{r}{2}i}.$$

Ferner hat man

$$\cot \frac{r}{2} \frac{dx}{\sqrt{-(dy^2 + dz^2)}} = \frac{1}{\sqrt{-q}} \frac{dx}{d \log \eta}$$

oder

$$\begin{aligned} \sqrt{nn'} &= \frac{1}{\sqrt{-q}} \frac{dx}{d \log \eta}, \\ 2\sqrt{-2} \{p - 2aq(y + \alpha) - 2bq(z + \beta)\} \\ &= \sqrt{\eta} \left(\cos \frac{r}{2} - \sin \frac{r}{2} \right) - \frac{1}{\sqrt{\eta}} \left(\sin \frac{r}{2} + \cos \frac{r}{2} \right) \\ &\quad \cdot \sqrt{-2} \{p - 2a^2(y + \alpha) - 2b^2(z + \beta)\}. \end{aligned}$$

Auf der rechten Seite sind für $y + \alpha$ und $z + \beta$ die eben gefundenen Ausdrücke in η und η' einzuführen. Dadurch geht die Gleichung ueber in folgende:

$$\sqrt{-q} \frac{d \log \eta}{dx} = \sqrt{2c + (a + bi)\eta^{-1} - (a - bi)\eta}.$$

Quadriert man beide Seiten dieser Gleichung und setzt für $\frac{dx}{d \log \eta}$ seinen Werth aus (n), so ergibt sich nach gehöriger Reduction

$$\begin{aligned} \text{(p)} \quad & (1 + \eta\eta')^2 \left\{ 2c - (a + bi)\frac{\eta'}{\eta} - (a - bi)\frac{\eta}{\eta'} \right\} \\ &= 8c - 2(a + bi)(\eta' - \eta^{-1}) - 2(a - bi)(\eta - \eta'^{-1}). \end{aligned}$$

Die so gefundene Gleichung, welche den Zusammenhang von q , η , η' angiebt, kann man als Integral einer Differentialgleichung für η und η' ansehen und q als Integrationsconstante auffassen. Die Differentialgleichung ergibt sich durch unmittelbare Differentiation in folgender Form

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{d\eta}{\eta} \sqrt{2c + (a + bi)\eta^{-1} - (a - bi)\eta} \\ &\quad - \frac{d\eta'}{\eta'} \sqrt{2c + (a - bi)\eta'^{-1} - (a + bi)\eta'}. \end{aligned}$$

Mit Hülfe der primitiven Gleichung (p) lassen sich aber die Factoren von $\frac{d\eta}{\eta}$ und $\frac{d\eta'}{\eta'}$ anders ausdrücken. Man braucht nur die linke Seite

von (p) in zweifacher Weise zu einem vollständigen Quadrat zu ergänzen, indem man das fehlende doppelte Product das eine mal positiv, das andere mal negativ hinzufügt. Dadurch erhält man

$$= +2\sqrt{[2c + (a + bi)\eta^{-1}][2c - (a - bi)\eta]} \\ - 2\sqrt{[2c - (a + bi)\eta^{-1}][2c + (a - bi)\eta]}.$$

Nimmt man die Quadratwurzeln mit gleichen Vorzeichen, so geht die Differentialgleichung ueber in

$$0 = \frac{d\eta}{2\eta\sqrt{2c + (a + bi)\eta^{-1} - (a - bi)\eta}} \\ (q) \quad - \frac{d\eta'}{2\eta'\sqrt{2c + (a - bi)\eta'^{-1} - (a + bi)\eta'}}.$$

Ihr Integral in algebraischer Form ist in der Gleichung (p) ausgesprochen oder, was auf dasselbe hinauskommt, in den beiden Gleichungen

$$\sqrt{-q}(1 + \eta\eta') = \sqrt{[2c + (a + bi)\eta + (a - bi)\eta']} \\ (r) \quad + \sqrt{[2c - (a + bi)\eta - (a - bi)\eta']}, \\ \sqrt{-q}i[(a + bi)\eta - (a - bi)\eta'] = \sqrt{[2c(a + bi) + 2c\eta' - (a - bi)\eta'^2]} \\ - \sqrt{[2c(a - bi) + 2c\eta - (a + bi)\eta^2]}.$$

In transcendenter Form lautet das Integral

$$\text{const.} = \int \frac{d\eta}{2\eta\sqrt{(a + bi) + 2c\eta - (a - bi)\eta^2}} \\ + \int \frac{d\eta'}{2\eta'\sqrt{(a - bi) + 2c\eta' - (a + bi)\eta'^2}},$$

und die Integrationsconstante lässt sich ausdrücken

$$\text{const.} = \int \frac{dq}{2\sqrt{q[1 + 2cq - (a^2 + b^2)q^2]}},$$

was aus der Gleichung (r) leicht hervorgeht, wenn man η oder η' constant und zwar $= 0$ nimmt. Man erkennt darin das Additionstheorem der elliptischen Integrale erster Gattung.

Anmerkungen.

Die erste Ausgabe der Abhandlung ueber Flächen kleinsten Inhalts durch Hattendorff in den Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen vom Jahre 1867 war eingeleitet durch eine historische Betrachtung, die bereits in der ersten Auflage dieser Gesamtausgabe als nicht von Riemann herrührend in Uebereinstimmung mit dem leider früh verstorbenen Hattendorff unterdrückt wurde. Sie ist auch in der zweiten Auflage nicht mit aufgenommen. Zu erwähnen ist aber, dass ungefähr gleichzeitig mit Riemann Weierstrass Untersuchungen ueber die Flächen vom kleinsten Inhalt angestellt hat, deren Resultate in den Monatsberichten der Berliner Akademie vom October und December 1866 zuerst veröffentlicht sind. Die Weierstrass'schen Arbeiten haben den Anstoss gegeben zu den weitergehenden Untersuchungen von H. A. Schwarz, von denen die erste Mittheilung im Monatsberichte der Berliner Akademie vom April 1865 gemacht ist. Die ausführliche Veröffentlichung der gekrönten Preisschrift "Bestimmung einer speciellen Minimalfläche" erschien im Jahre 1871. Darin ist neben Anderem das in Art. 18 der Riemann'schen Abhandlung behandelte Problem der durch ein regelmässiges räumliches Viereck begrenzten Minimalfläche bis zur wirklichen Aufstellung einer Gleichung zwischen den Coordinaten x, y, z der Fläche durchgeführt. Zu erwähnen ist noch die an Riemann direct anknüpfende, im Jahre 1867 von der philosophischen Facultät zu Göttingen gekrönte Preisschrift von Arthur Schondorff "Ueber die Minimalfläche, deren Begrenzung von einem doppeltgleichschenkligen räumlichen Viereck gebildet wird".

Die Riemann'sche Abhandlung ist hier, mit wenigen nothwendigen Aenderungen, in der letzten Hattendorff'schen Bearbeitung abgedruckt. Einige Erläuterungen und Zusätze gebe ich in den nachstehenden Anmerkungen, wobei ich Mittheilungen und Winke von H. A. Schwarz mit Dank benutzt habe.

(1) (Zu Seite 307.) Es ist hierbei zu beachten, dass nach (3) und (4)

$$\frac{dX}{d\eta} = \frac{1}{\eta'} \frac{ds}{d\eta}, \quad \frac{dX}{d\eta'} = \frac{1}{\eta} \frac{ds}{d\eta'}$$

Functionen von η allein sind, und dass also auch Y, Z als Functionen von η allein betrachtet werden können. Y', Z' sind dann die conjugirten Functionen, die nur von η' abhängen.

(2) (Zu Seite 311.) Für unendlich kleine Werthe von η (also auch von r) ergiebt sich aus (1) und (2)

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dy} &= -\sin r \cos \varphi, & \frac{dx}{dz} &= -\sin r \sin \varphi, \\ \frac{dx}{dy} &= -\sin r \sin \varphi, & \frac{dx}{dz} &= \sin r \cos \varphi. \end{aligned}$$

Riemann — Gesammelte Werke (pp. 351–400)

Index

Anmerkungen	2
1 Mechanik des Ohres	4
XVIII. Mechanik des Ohres	4
2 Versuch einer allgemeinen Auffassung der Integration und Differentiation	15
XIX. Versuch einer allgemeinen Auffassung der Integration und Differentiation	15
3 Neue Theorie des Rückstandes in electrischen Bindungsapparaten	27
XX. Neue Theorie des Rückstandes in electrischen Bindungsapparaten	27
4 Zwei allgemeine Sätze über lineare Differentialgleichungen mit algebraischen Coefficienten	36
XXI. Zwei allgemeine Sätze über lineare Differentialgleichungen mit algebraischen Coefficienten	36

Anmerkungen

(3) (Zu Seite 313.)

Wenn der Winkel $\alpha = 0$ und also zwei Begrenzungsgerade einander parallel werden, so treten an Stelle dieser Entwicklungen die folgenden:

$$y = \frac{\eta}{\sqrt{d\eta}} \log \xi + \text{f.c.}, \quad x = -\frac{\xi}{\sqrt{d\xi}} \eta + \text{f.c.}$$

(4) (Zu Seite 320.)

Der Schlüssel zu Art. 14 ist in den Entwicklungen des Fragments XXV zu suchen. Es handelt sich bei der Bestimmung von η als Function von t um die conforme Abbildung einer von Kreisbogen begrenzten Figur in der η -Ebene auf die positive t -Halbebene.

Setzt man

$$\eta = \frac{y_1}{y_2},$$

so ist nach dem genannten Fragment

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \Phi(t) \cdot y = 0$$

eine rationale Function von t , die für reelle Werthe von t reelle Werthe hat, und y_1, y_2 sind zwei particulare Lösungen der linearen Differentialgleichung

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \Phi(t) \cdot y = 0 \quad (1)$$

η ist der Quotient zweier Particularlösungen dieser Gleichung. Man kann diese Gleichung dadurch transformiren, dass man y_1, y_2 mit einem und demselben Factor multiplicirt, ohne ihm dadurch die Eigenschaft zu nehmen, dass der Quotient zweier Particularlösungen die Function η giebt. Setzt man, indem man unter f zunächst eine willkürliche Function von t versteht,

$$y_1 = k\sqrt{f}, \quad y_2 = \frac{1}{k}\sqrt{f},$$

so erhält man für k die Differentialgleichung

$$\frac{d^2 k}{dt^2} + 2 \frac{df}{dt} \frac{1}{f} \frac{dk}{dt} = \Phi(t) \cdot k. \quad (2)$$

worin

$$\Phi(t) = \frac{1}{4f^2} [4f'f'''(t) - 3f''(t)^2], \quad (3)$$

und wenn also f eine rationale Function von t ist, so gilt das gleiche von Φ .

Die Formeln des Art. 14 erhält man, wenn man unter $f(t)$ die ganze rationale Function $(iv - \xi)^{2\nu}$ Grades

$$f(t) = \Pi(t - a) \Pi(t - d) \Pi(t - b) \Pi(t - c) \Pi(t - e)$$

versteht, und die Betrachtung der Unstetigkeiten ergibt

$$\Phi(t) - \frac{1}{2} \frac{(\eta\eta' + \xi\xi')f'(t)}{(iv - \xi)^2 f(t)} = F(t), \quad (4)$$

wenn $F(t)$ eine ganze rationale Function vom Grade $2\nu - 6$ mit reellen Coefficienten ist. Um auf andere Weise als im Text die Coefficienten der beiden höchsten Potenzen in der Function $F(t)$ zu finden, beachte man, dass, wenn $t = \infty$ ein gewöhnlicher Punkt der Fläche ist, die Entwicklung von $\frac{d\eta}{dt}$ nach fallenden Potenzen von t mit $t^{\nu-1}$ anfängt, und dass folglich die Entwicklung $\frac{1}{y_2^2}$ mit t beginnt.

Es muss sich also die Differentialgleichung (2) durch eine Reihe von folgender Form integrieren lassen

$$c_0 t^\alpha + c_1 t^{\alpha-1} + c_2 t^{\alpha-2} + \dots$$

und dies hat man in (2) einzusetzen, um Recursionsformeln zur successiven Berechnung der Coefficienten c_ν zu erhalten. Setzt man

$$\alpha = \frac{2\nu - 6}{2}, \quad \alpha(\alpha - 1) = 2 \cdot \frac{(2\nu - 6)(2\nu - 7)}{4} = (\nu - 3)(2\nu - 7),$$

$$f = t^{2\nu-4}, \quad \frac{f'}{f} = \frac{2\nu - 4}{t},$$

so erhält man aus (2)

$$c_0(\alpha(\alpha - 1) - (2\nu - 4)\alpha + \Phi) = 0.$$

Die Gleichsetzung der von t unabhängigen Glieder ergibt

$$K = \alpha(\alpha - 1) - (2\nu - 4)\alpha = (\nu - 3)(\nu - 4),$$

und die Vergleichung der Glieder mit t^{-1}

$$K_1 = \alpha_1(1 - \alpha)(\nu - 3).$$

c_0 und c_1 können nicht bestimmt werden und die Vergleichung der höheren Glieder ergibt die Coefficienten $c_2, c_3, \dots$

Auf ganz ähnliche Weise kann man auch die in der Anmerkung zu Art. 14 erwähnten, den Punkten a, a, b entsprechenden Bedingungsgleichungen erhalten.

Setzt man nämlich $z = t - a, t - a, t - b$, so muss sich die Differentialgleichung (2) durch eine Reihe der Form

$$z^{\lambda_0}(c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots)$$

integrieren lassen. Ist nun

$$\lambda_0 = \frac{1}{2}, \quad l_0 = \lambda_0(\lambda_0 - 1),$$

so ergibt sich aus der Differentialgleichung (2)

$$\frac{1}{z^2} (l_0 c_0 + (l_0 + 1)c_1 z + (l_0 + 2)c_2 z^2 + \dots) - \frac{2}{z} \left(\frac{\lambda_0 c_0}{z} + \frac{(\lambda_0 + 1)c_1}{1} + \dots \right) + \Phi(c_0 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots) = 0.$$

Die Vergleichung der von z unabhängigen Glieder giebt in Uebereinstimmung mit der Formel (4)

$$l_0 - 2\lambda_0 = -\frac{1}{4},$$

und die beiden nächsten Potenzen von z ergeben

$$c_1(l_0 + 2\lambda_0 + 1) + c_0(l_1 - 2(\lambda_0 + 1)\alpha_1) = 0$$

woraus durch Elimination von c_1, c_2 eine Relation zwischen l_0, l_1, l_2 folgt.

c_1 kann aus (2) nicht bestimmt werden. Die höheren Glieder geben die Bestimmung der Coefficienten $c_2, c_3, \dots$

1. Mechanik des Ohres

(Aus Henle und Pfeuffer's Zeitschrift für rationelle Medicin, dritte Reihe, Bd. 29.)

1. Ueber die in der Physiologie der feineren Sinnesorgane anzuwendende Methode.

Für die Physiologie eines Sinnesorganes sind ausser den allgemeinen Naturgesetzen zwei besondere Grundlagen nöthig, eine psychophysische, die erfahrungsmässige Feststellung der Leistungen des Organes, und eine anatomische, die Erforschung seines Baues.

Es sind demnach zwei Wege möglich, um zur Kenntniss seiner Functionen zu gelangen. Man kann entweder vom Baue des Organes ausgehen und hieraus die Gesetze der Wechselwirkung seiner Theile und den Erfolg äusserer Einwirkungen zu bestimmen suchen, oder man kann von den Leistungen des Organes ausgehen und diese zu erklären versuchen.

Bei dem ersten Wege schliesst man von gegebenen Ursachen auf die Wirkungen, bei dem zweiten sucht man zu gegebenen Wirkungen die Ursachen.

Man kann mit Newton und Herbart den ersten Weg den *synthetischen*, den zweiten den *analytischen* nennen.

Synthetischer Weg.

Der erste Weg liegt dem Anatomen am nächsten. Mit der Untersuchung der einzelnen Bestandtheile des Organs beschäftigt, fühlt er sich veranlasst, bei jedem einzelnen Theile zu fragen, welchen Einfluss er auf die Thätigkeit des Organs haben möge. Dieser Weg würde auch in der Physiologie der Sinnesorgane mit demselben Erfolg eingeschlagen werden können, wie in der Physiologie der Bewegungsorgane, wenn die physikalischen Eigenschaften der einzelnen Theile sich bestimmen liessen. Die Bestimmung dieser Eigenschaften aus den Beobachtungen bleibt aber bei mikroskopischen Objecten immer mehr oder weniger ungewiss und jedenfalls im höchsten Grade ungenau.

Man ist daher zu einer Ergänzung nach Gründen der Analogie oder Teleologie genöthigt, wobei die grösste Willkür unvermeidlich ist, und aus diesem Grunde führt das synthetische Verfahren in der Physiologie der Sinnesorgane selten zu richtigen und jedenfalls nicht zu sichern Ergebnissen.

Analytischer Weg.

Bei dem zweiten Wege sucht man zu den Leistungen des Organes die Erklärung. Das Geschäft zerfällt in drei Theile.

1. Das Aufsuchen einer Hypothese, welche zur Erklärung der Leistungen genügt.
2. Die Untersuchung, in wie weit sie zur Erklärung nothwendig ist.
3. Die Vergleichung mit der Erfahrung, um sie zu bestätigen oder zu berichtigen.

I. Man muss das Instrument gleichsam nacherfinden und in so fern die Leistungen des Organs als Zweck, seine Schöpfung als Mittel zu diesem Zweck betrachten. Aber der Zweck ist kein vermutheter, sondern ein durch die Erfahrung gegebener, und wenn man von der Herstellung des Organs absieht, kann der Begriff der Endursachen ganz ausser dem Spiele bleiben.

Zu den thatsächlichen Leistungen des Organs sucht man in dem Baue des Organs die Erklärung. Bei dem Aufsuchen dieser Erklärung hat man zuvörderst die Aufgabe des

Organs zu analysiren; hieraus werden sich eine Reihe von secundären Aufgaben ergeben, und erst nachdem man sich überzeugt hat, dass sie gelöst sein müssen, sucht man die Art und Weise, wie sie gelöst sind, aus dem Baue des Organs zu schliessen.

II. Nachdem aber eine Vorstellung gewonnen worden ist, welche zur Erklärung des Organs ausreicht, darf man nicht unterlassen zu untersuchen, in wie weit sie zur Erklärung nothwendig ist. Man muss sorgfältig unterscheiden, welche Voraussetzungen unbedingt oder vielmehr in Folge unbezweifelter Naturgesetze nothwendig sind, und welche Vorstellungsarten vielleicht durch andere ersetzt werden können, das ganz willkürlich Hinzugedachte aber ausscheiden. Nur auf diese Weise können die nachtheiligen Folgen der Benutzung von Analogien bei dem Aufsuchen der Erklärung beseitigt werden, und auf diese Weise wird auch die Prüfung der Erklärung an der Erfahrung (durch Aufstellung von zu beantwortenden Fragen) wesentlich erleichtert.

III. Zur Prüfung der Erklärung an der Erfahrung können theils die Folgerungen dienen, die sich aus ihr für die Leistungen des Organs ergeben, theils die bei dieser Erklärung vorauszusetzenden physikalischen Eigenschaften der Bestandtheile des Organs. Was die Leistungen des Organs betrifft, so ist eine genaue Vergleichung mit der Erfahrung äusserst schwierig, und man muss die Prüfung der Theorie meist auf die Frage beschränken, ob kein Ergebniss eines Versuchs oder einer Beobachtung ihr widerspricht. Was dagegen die Folgerungen über die physikalischen Eigenschaften der Bestandtheile betrifft, so können diese von allgemeiner Tragweite sein und zu Fortschritten in der Erkenntniss der Naturgesetze Anlass geben, wie dies z. B. bei dem Aufsuchen der Erklärung der Achromasie des Auges durch Euler der Fall war.

Für die beiden eben einander gegenübergestellten Forschungsweisen gelten übrigens die Bezeichnungen synthetisch und analytisch nur *a potiori*. Genau genommen ist weder eine rein synthetische, noch eine rein analytische Forschung möglich. Denn jede Synthese stützt sich auf das Ergebniss einer vorausgehenden Analyse und jede Analyse bedarf zu ihrer Bestätigung oder Berichtigung durch die Erfahrung der nachfolgenden Synthese. Bei dem ersten Verfahren bilden die allgemeinen Bewegungsgesetze das vorausgesetzte Ergebniss einer früheren Analyse.

Das erste vorzugsweise synthetische Verfahren ist für die Theorie der feineren Sinnesorgane deshalb zu verwerfen, weil die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des Verfahrens zu unvollständig erfüllt sind, die Ergänzung der Voraussetzungen durch Analogie und Teleologie hier aber völlig willkürlich bleibt.

Bei dem zweiten vorzugsweise analytischen Verfahren kann die Hülfe der Teleologie und Analogie zwar auch nicht ganz entbehrt, wohl aber bei ihrer Benutzung die Willkürlichkeit vermieden werden, indem man

1. die Anwendung der Teleologie auf die Frage beschränkt, durch welche Mittel die thatsächlichen Leistungen des Organs ausgeführt werden, nicht aber bei den einzelnen Bestandtheilen des Organs die Frage nach dem Nutzen aufwirft;
2. die Anwendung von Analogien (das "Dichten von Hypothesen") sich zwar nicht, wie Newton will, gänzlich versagt, aber hinterher die Bedingungen, die zur Erklärung der Leistungen des Organs erfüllt sein müssen, heraushebt, und die zur Erklärung nicht nöthigen Vorstellungen, welche durch Benutzung der Analogie herbeigeführt worden sind, davon absondert.

Nach diesen Principien müssen nun für unsern Zweck zuvörderst die Leistungen des Gehörorgans festgestellt werden. Mit welcher Schärfe, Feinheit und Treue das Ohr die

Wahrnehmung des Schalles, seines Klanges und Tones, seiner Stärke und Richtung vermittelt, dieses muss durch Beobachtung und Versuch so genau, wie irgend möglich, bestimmt werden.

Ich setze diese Thatsachen als bekannt voraus. In dem Buche “die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik” von Helmholtz, findet man die Fortschritte zusammengestellt, welche in der so äusserst schwierigen Ermittlung der Thatsachen, die die Wahrnehmung der Töne betreffen, in neuester Zeit gemacht worden sind und zwar vorzüglich von Helmholtz selbst.

Da ich den Folgerungen, welche Helmholtz aus den Versuchen und Beobachtungen zieht, entgegen zu treten vielfach genöthigt bin, so glaube ich um so mehr gleich hier aussprechen zu müssen, wie sehr ich die grossen Verdienste seiner Arbeiten über unsern Gegenstand anerkenne. Sie sind aber meiner Ansicht nach nicht in seinen Theorien von den Bewegungen des Ohres zu suchen, sondern in der Verbesserung der erfahrungsmässigen Grundlage für die Theorie dieser Bewegungen.

Ebenso muss ich auch den Bau des Ohres hier als bekannt voraussetzen, und bitte den geneigten Leser, nöthigenfalls ein mit Abbildungen versehenes Handbuch der Anatomie zur Hülfe zu nehmen. Die Ergebnisse der neuesten Forschungen über den Bau der Schnecke und des Ohres überhaupt findet man dargestellt in der vor Kurzem erschienenen dritten Lieferung des zweiten Bandes von Henle’s Handbuch der Anatomie des Menschen.

Ich betrachte es hier allein als meine Aufgabe, jene psychophysischen Thatsachen aus diesen anatomischen Thatsachen zu erklären. Die Theile des Ohres, die für unsern Zweck in Betracht kommen, sind die Paukenhöhle und das Labyrinth, welches aus dem Vorhofe, den Bogengängen und der Schnecke besteht. Wir verfahren nun so, dass wir zunächst aus dem Baue dieser Theile zu schliessen suchen, was jeder derselben zu den Leistungen des Ohres beitragen möge, dann aber bei jedem einzelnen Theile wieder von der durch ihn zu lösenden Aufgabe ausgehen und zunächst die Bedingungen aufsuchen, deren Erfüllung zu einer genügenden Lösung der Aufgabe erforderlich ist.

2. Paukenhöhle.

Man hat längst erkannt, dass der Apparat in der Paukenhöhle die Wirkung hat, den Druck der Luft auf das Labyrinthwasser verstärkt zu übertragen.

Nach den oben entwickelten Principien müssen wir nun aus den in der Erfahrung gegebenen Leistungen des Organs die Bedingungen ableiten, welche bei dieser Uebertragung erfüllt werden müssen. Es ergeben sich diese vorzüglich aus der Feinheit des Ohres in der Wahrnehmung des Klanges und aus der grossen Schärfe, welche das Ohr, zumal das unverkümmerte Ohr des Wilden und des Wüstenbewohners, besitzt. Versteht man unter Klang die Beschaffenheit des Schalles, welche von Stärke und Richtung desselben unabhängig ist, so wird diese offenbar durch den Apparat vollkommen treu mitgetheilt, wenn er die Druckänderung der Luft in jedem Augenblick in constantem Verhältniss vergrössert auf das Labyrinthwasser überträgt.

Es ist unverfänglich, dies als Zweck des Apparats anzusehen, wenn man nur dabei nicht unterlässt, zugleich aus den Leistungen des Ohres zu bestimmen, wie weit man durch die Erfahrung berechtigt d. h. genöthigt ist, die wirkliche Erfüllung dieses Zwecks vorauszusetzen.

Wir wollen dies sogleich thun, vorher jedoch für die Beschaffenheit der Druckänderung, von welcher der Klang abhängt, einen mathematischen Ausdruck suchen. Die Curve, welche die Geschwindigkeit der Druckänderung als Function der Zeit darstellt, bestimmt die

Schallwelle vollständig bis auf ihre Richtung, also auch Stärke und Klang des Schalles. Nimmt man nun statt dieser Geschwindigkeit den Logarithmus von dieser Geschwindigkeit, oder wenn man lieber will, von deren Quadrat, so erhält man eine Curve, deren Form von Richtung und Stärke des Schalles unabhängig ist, die aber den Klang vollständig bestimmt und daher "Klangcurve" heissen möge.

Löste der Apparat seine Aufgabe vollkommen, so würden die Klangcurven des Labyrinthwassers mit den Klangcurven der Luft völlig übereinstimmen. Durch die Feinheit des Ohres in der Wahrnehmung des Klanges halten wir uns nun zu der Annahme berechtigt, dass die Klangcurve durch die Uebertragung nur sehr wenig geändert werde und also das Verhältniss zwischen den gleichzeitigen Druckänderungen der Luft und des Labyrinthwassers während eines Schalles sehr nahe constant bleibe.

Eine langsame Veränderlichkeit dieses Verhältnisses ist damit sehr wohl vereinbar und wahrscheinlich. Sie würde nur eine Veränderlichkeit des Ohres in der Schätzung der Schallstärke zur Folge haben, deren Annahme die Erfahrung durchaus nicht verbietet. Würde die Klangcurve merklich geändert, so scheint eine solche Feinheit des Gehörs, wie sie sich z. B. in der Wahrnehmung geringer Verschiedenheiten der Aussprache zeigt, mir kaum denkbar. Die unmittelbare Beurtheilung der Feinheit der Klangwahrnehmungen und besonders die Schätzung der den Klangverschiedenheiten entsprechenden Verschiedenheiten der Klangcurve bleibt freilich immer sehr subjectiv.

Die Verschiedenheit des Klanges dient uns aber auch, die Entfernung der Schallquelle zu schätzen. Von dieser Klangverschiedenheit können wir die mechanische Ursache, die Veränderung der Klangcurve bei der Fortpflanzung des Schalles in der Luft durch Rechnung bestimmen.

Wir können indess dies hier nicht weiter verfolgen und wollen von dem Uebertragungsapparat nur fordern, dass er keine groben Entstellungen des Klanges bewirke, obgleich wir glauben, dass seine Treue viel grösser ist, als man gewöhnlich annimmt.

I. Der Apparat in der Paukenhöhle (im unverkümmerten Zustande) ist ein mechanischer Apparat von einer Empfindlichkeit, die Alles, was wir von Empfindlichkeit mechanischer Apparate kennen, himmelweit hinter sich lässt.

In der That ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, dass durch denselben Schallbewegungen treu mitgetheilt werden, die so klein sind, dass sie mit dem Mikroskop nicht wahrgenommen werden könnten.

Die mechanische Kraft der schwächsten Schälle, welche das Ohr noch wahrnimmt, lässt sich freilich kaum direct schätzen; aber man kann mit Hülfe des Gesetzes, nach welchem die Stärke des Schalles bei seiner Verbreitung in der Luft abnimmt, zeigen, dass das Ohr Schälle wahrnimmt, deren mechanische Kraft Millionen Mal kleiner ist, als die der Schälle von gewöhnlicher Stärke.

In Ermangelung anderer von Fehlerquellen freier Beobachtungen berufe ich mich auf die Angabe von Nicholson, nach welcher das Rufen der Schildwachen von Portsmouth 4 bis 5 englische Meilen weit zu Ryde auf der Insel Wight bei Nacht deutlich gehört wird. Wenn man erwägt, welche Vorrichtungen Colladon nöthig hatte, um die Verbreitung des Schalles im Wasser wahrzunehmen, so wird man zugeben, dass von einer erheblichen Verstärkung des Schalles durch Fortpflanzung im Wasser nicht die Rede sein kann und dass hier in der That die mechanische Kraft des Schalles umgekehrt proportional dem Quadrat der Entfernung und wahrscheinlich noch schneller abnimmt.

Da die Entfernung von 4 bis 5 Meilen etwa 2000 Mal so gross ist als die Entfernung von 8 bis 10 Fuss, so ist die mechanische Kraft der das Trommelfell treffenden Schallwellen hier vier Millionen Mal kleiner, als in der Entfernung von 8 bis 10 Fuss von der

Schildwache und die Bewegungen sind 2000 Mal kleiner. Man muss zugeben, dass bei den Schall-Empfindungen durchaus nichts von Verhältnissen, wie 1 zu 1000 Millionen oder 1 zu Tausend bemerkt wird. Nach den neueren Untersuchungen über das Verhältniss der psychischen Schätzung der Schallstärken zum physischen oder mechanischen Mass der Schallstärke bildet dies jedoch durchaus keinen Einwand gegen die eben erhaltenen Resultate. Wahrscheinlich ist dies Abhängigkeitsverhältniss gerade so, wie das unserer Schätzung der Lichtstärke oder Grösse der Fixsterne zu der mechanischen Kraft des uns von ihnen zugesandten Lichtes.

Hier hat man bekanntlich aus den Stern-Eichungen geschlossen, dass die mechanische Kraft des Lichtes im geometrischen Verhältnisse abnimmt, wenn die Grösse des Fixsterne in arithmetischer Reihe steigt. Theilte man dem analog die Schälle, von denen von gewöhnlicher Stärke bis zu den eben noch wahrnehmbaren, in Schälle von der ersten bis zur achten Grösse, so würde die mechanische Kraft für die Schälle zweiter Grösse etwa $\frac{1}{\sqrt{10}}$, für die dritter $\frac{1}{\sqrt{100}}$, ..., für die achter $\frac{1}{\sqrt{10000000}}$, d. h. 2^{te} Millionten Theil so gross sein, als für die Schälle erster Grösse, und die Weite der Bewegungen würde für die Schälle erster, dritter, fünfter, siebenter Grösse sich wie $1 : \frac{1}{\sqrt{10}} : \frac{1}{\sqrt{100}} : \frac{1}{\sqrt{1000}}$ verhalten.

Ich habe oben bei der Betrachtung der das Ohr treffenden Schallwellen vor dem Trommelfell Halt gemacht, weil Einige eine Dämpfung der stärkeren Schälle (durch Spannung des Trommelfells?) annehmen. Ich muss jedoch gestehen, dass mir diese Meinung als eine völlig willkürliche Vermuthung erscheint. Es mögen allerdings, wenn ein starker Knall die Membranen des Labyrinths zu verletzen droht, Schutzvorrichtungen wirksam werden; aber ich finde in der Beschaffenheit der Gehörseindrücke durchaus nichts Analoges mit dem Beleuchtungsgrad des Gesichtsfeldes beim Auge, und wüsste durchaus nicht, was eine fortwährend veränderliche Reflexthätigkeit des M. tensor tympani für das genaue Auffassen eines Musikstücks nützen sollte. Meiner Ansicht nach hat man durchaus keinen Grund, bei dem Schalle in 10 Fuss Entfernung von der Schildwache ein anderes Verhältniss zwischen den Bewegungen der Luft vor dem Trommelfell und den Bewegungen der Steigbügelplatte anzunehmen, als in der Entfernung von 20,000 Fuss; aber selbst wenn man eine ziemlich starke Veränderlichkeit der Spannung des Trommelfells annimmt, werden unsere Schlüsse dadurch nicht beeinträchtigt.

Wenn nun die Bewegungen der Steigbügelplatte in der Entfernung von 10 Fuss von der Schildwache wahrscheinlich zu den eben mit blossen Augen noch wahrnehmbaren gehören, so werden die Bewegungen in der Entfernung von 20,000 Fuss bei einer 2000 fachen Vergrösserung eben wahrnehmbar sein.

II. Soll der Paukenapparat so kleine Bewegungen treu mittheilen, wie er es der Erfahrung nach thut, so müssen die festen Körper, aus denen er besteht, an den Stellen, wo sie auf einander wirken sollen, völlig genau auf einander schliessen; denn offenbar kann ein Körper einem anderen eine Bewegung nicht mittheilen, sobald er um mehr als die Weite der Bewegung von ihm absteht.

Es wird ferner nur ein kleiner Theil der mechanischen Kraft der Schallbewegung durch anderweitige Arbeit, wie Spannung von Gelenkkapseln und Membranen, für das Labyrinth verloren gehen dürfen.

Ein solcher Verlust wird vermieden durch die äusserst geringe Breite des freien Randes der Membran des Vorhofsfensters. Wäre dieser Rand breiter, so würden die Schwingungen der Steigbügelplatte beinahe ganz durch Schwingungen dieses Randes ausgeglichen werden, und auf die Membranen der Schnecke und des Schneckenfensters nur eine geringe Wirkung stattfinden.

Die Wirkung dieses Membranenrandes auf die Steigbügelplatte wird wegen der ge-

ringen Breite des Randes für die verschiedenen Lagen der Steigbügelplatte während der Schallbewegung sehr verschieden sein. Man muss daher, wenn sie den Klang nicht entstellen soll, annehmen, dass die Elasticität der Membran sehr gering ist, und die Steigbügelplatte nicht durch sie, sondern durch andere Kräfte in die richtige Gleichgewichtslage gebracht wird.

III. Da die Theile des Paukenapparates, um die erfahrungsmässige Schärfe des Ohres möglich zu machen, fortwährend mit mehr als mikroskopischer Genauigkeit in einander greifen müssen, so scheinen Correctionsvorrichtungen wegen der Ausdehnung und Zusammenziehung der Körper durch die Wärme durchaus unentbehrlich. Die Temperaturänderungen mögen innerhalb der Paukenhöhle nur sehr klein sein; dass sie aber stattfinden, ist nicht zu bezweifeln. Für die Temperaturvertheilung im menschlichen Körper gilt, wenn die äussere Temperatur hinreichend lange constant gewesen ist, nahe das Gesetz, dass der Abstand der Temperatur an einer beliebigen Stelle des Körpers von der Hirntemperatur proportional ist dem Abstände der äusseren Temperatur von der Hirntemperatur. Dieses Gesetz ergibt sich aus dem Newton'schen und der Voraussetzung, dass der Wärmeleitungscoefficient und die spezifische Wärme innerhalb der in Betracht kommenden Temperaturen constant sei, eine Voraussetzung, die wahrscheinlich nahe erfüllt ist.

Man kann durch dieses Gesetz aus dem Abstände der Temperatur der Paukenhöhle von der Hirntemperatur auf die Temperaturänderungen schliessen. Wenn sich nun auch der Temperaturunterschied zwischen Paukenhöhle und Hirn nicht bestimmen lässt, so kann man doch aus mehreren Gründen, aus den Communicationen mit der äusseren Luft durch den äusseren Gehörgang und die Tuba, auch wohl aus der Art und Weise der Blutversorgung der Paukenhöhle, mit grosser Wahrscheinlichkeit schliessen, dass ein merklicher Temperaturunterschied stattfindet.

Dagegen hat der Pyramidenknochen, weil er den Can. caroticus enthält, wahrscheinlich sehr nahe die Temperatur des Hirns, und wir müssen daher annehmen, dass die innere Auskleidung der Paukenhöhle ein sehr schlechter Wärmeleiter und Strahler ist.

Von den übrigen die Paukenhöhle umgebenden Knochen lässt sich freilich wohl nicht behaupten, dass sie eine so hohe Temperatur besitzen, wie das Hirn oder die Pyramide. Doch enthalten sie bedeutende Wärmequellen in Blutleitern, grossen Arterien und Venen und sind, wie die Pyramide, durch Schleimhaut und Periost gegen die Ausstrahlung in die Paukenhöhle geschützt. Wir dürfen daher annehmen, dass ihre Temperatur merklich höher ist als die der Paukenhöhle.

Wenn nun die äussere Temperatur sinkt, so wird nach dem oben angeführten Gesetze der Abstand von der Hirntemperatur allenthalben im Körper in demselben Verhältniss (auf das Doppelte) steigen, die Paukenhöhle wird sich in Folge dessen merklich, die umgebenden Knochen nur sehr wenig abkühlen, und die Gehörknöchelchen werden sich merklich zusammenziehen, während die Wände der Paukenhöhle fast ungeändert bleiben.

Viel mehr als dieses, dass die Gehörknöchelchen sich beim Sinken der äusseren Temperatur viel stärker abkühlen und zusammenziehen, als die Wände der Paukenhöhle, dürfte sich über den Einfluss der Temperatur auf den Paukenapparat bei unserer gänzlichen Unbekanntschaft mit den thermischen Eigenschaften seiner Bestandtheile nicht feststellen lassen.

IV. Ich werde nun zunächst die Veränderungen zu bestimmen suchen, welche bei einem Sinken der äusseren Temperatur in der Lage der Gehörknöchelchen eintreten, damit alle zur Berührung bestimmten Theile des Apparates fortfahren, genau auf einander zu schliessen. Der Theil des Gehörknochelsystems, der am unveränderlichsten mit der Wand der Paukenhöhle verbunden ist, ist das Ambos-Paukengelenk. Durch Abkühlung

werden alle Entfernungen in festen Körpern kleiner, also auch die Entfernung des Ambos-Steigbügelgelenks von dieser Gelenkfläche. Vom Hammer ist wahrscheinlich das obere Griffende derjenige Theil, welcher, wenigstens parallel dem Paukenfellring, die geringsten Verschiebungen zulässt.

Da nun bei der Abkühlung die Entfernung des Ambos-Paukengelenks von dem am unveränderlichsten befestigten Punkt des oberen Hammergriffs im Paukenfell nahe ungeändert bleibt, die Entfernungen dieser Punkte vom Ambos-Hammergelenk aber beide abnehmen, so muss sich am Ambos-Hammergelenk der Winkel zwischen den nach diesen Punkten gehenden Linien etwas weiter öffnen.

Bei diesen beiden Aenderungen in der Lage der Gehörknöchelchen wird der Hammer ein wenig in der Richtung vorn-median-hinten und gleichzeitig (um das Gelenknöpfchen des Amboses in seiner Höhe zu erhalten) sehr wenig in der Richtung vorn-oben-hinten gedreht. Der lange Fortsatz des Hammers würde dabei in der Fissur nach oben und medianwärts bewegt werden, wenn er gegen Griff und Kopf des Hammers eine und dieselbe Lage behielte. Durch die Wirkung der Abkühlung wird er aber stärker gekrümmt und dem Hammergriff genähert, so dass er sich während der Temperaturänderung wahrscheinlich nur allmählich ein wenig aus der Fissur herausbewegt.

V. Wir haben eben die Bedingungen aufgestellt, denen die Lage der Gehörknöchelchen wahrscheinlich genügt, damit sie fortwährend genau auf einander schliessen und dabei weder im Rande der Vorhofsmembran, noch im Paukenfell eine merklich ungleichmässige Spannung erzeugen. Wir fragen nun nach den Mitteln, durch welche den Gehörknöchelchen jederzeit die richtige Lage gegeben und gesichert wird. (Es wird dies meist durch einander entgegengesetzte Kräfte geschehen, welche bei der richtigen Lage des Knöchelchens sich das Gleichgewicht halten und es, wenn es aus ihr entfernt würde, in sie zurücktreiben würden.)

Es ist klar, dass diese in den beiden die Lage der Gehörknöchelchen regulirenden Muskeln, in den Gelenkkapseln, Ligamenten, den Schleimhautfalten und den beiden Membranen, mit denen die Gehörknöchelchen verwachsen sind, gesucht werden müssten. Bei diesem Aufsuchen der Ursachen einer bestimmten Wirkung auf die Gehörknöchelchen ergeben sich jedoch, namentlich wenn man die Schleimhautfalten mit in Betracht zieht, oft mehrere Wege zur Erzielung der Wirkung als möglich. Um aus diesen verschiedenen Möglichkeiten die wahrscheinlichste herauszufinden, ist es vor allen Dingen nöthig, sich durch anatomische Untersuchungen an frischen Präparaten ein ungefähres Urtheil über die Elasticität und Spannung der Bänder, Häute etc. zu verschaffen, was mir unmöglich ist. Man darf jedoch auch hoffen, durch sorgfältige Entwicklung der Consequenzen der verschiedenen Hypothesen bei den falschen auf Unwahrscheinlichkeiten zu stossen und diese so zu excludiren.

Es ist für unsere jetzige Untersuchung zweckmässig, zu unterscheiden zwischen dem lauschenden, zum genauen Hören adaptirten Ohr und dem nicht lauschenden Ohr, und für bestimmte Fragen zwischen dem Ohr des Neugeborenen und des Erwachsenen. Wir machen die Unterscheidung zwischen dem lauschenden und nicht lauschenden Ohr, wenn die Steigbügelplatte durch den Zug des M. tensor tympani ein wenig gegen das Labyrinthwasser gedrückt wird, so dass der Druck im Labyrinthwasser ein wenig stärker ist als in der Luft der Paukenhöhle; es werden dabei die Theile der festen Körper, deren Berührung gesichert werden soll, ein wenig gegen einander gedrückt. Diejenigen nun, welche eine solche fortwährende Spannung des Apparates (das Paukenfell etwa ausgenommen) für unwahrscheinlich halten, mögen annehmen, dass bei den Temperaturänderungen die Gehörknöchelchen durch die Wirkung der Haft- und Gelenkbänder und die allmähliche Aenderung der Contraction der Muskeln ihre Lage ändern, ohne gegen einander gedrückt zu werden, weil wir gefunden haben, dass nur dann das genaue Ineinandergreifen aller Theile des Apparats gesichert ist.

Es bleibt dann unsere Untersuchung für das lauschende, zum genauen Hören absichtlich vorgerichtete Ohr gültig, während daneben doch immer die Möglichkeit bestehen bleibt, dass das Ohr (des Wachenden?) fortwährend, wenn auch vielleicht in geringerem Grade, adaptirt ist.

Der Gehörknöchelapparat besteht aus einem aus zwei Theilen (Hammer und Ambos) zusammengesetzten, um eine Axe drehbaren Körper und aus einem mit diesem Körper articulirenden, auf das Wasser des Vorhofsfensters drückenden Stempel (dem Steigbügel). Das eine Ende der Umdrehungsaxe, der kurze Fortsatz des Ambos, ist mittelst des Ambos-Paukengelenks an der hintern Wand der Paukenhöhle befestigt, das andere Ende, der lange Fortsatz des Hammers, ragt, nur von Weichtheilen umgeben, in eine Spalte zwischen dem vordem obern Ende des Paukenfellrings und dem Felsenbein und legt sich in eine Furche dieses Ringes. (Wenigstens ist es so beim Ohr des Neugeborenen.)

Die Bestimmung der relativen Lage der Gehörknöchelchen gegen die Paukenhöhle wird sehr erleichtert durch das Verfahren von Henle, die Paukenhöhle sich so gedreht zu denken, dass die Umdrehungsaxe horizontal von hinten nach vorn geht und das Vorhofsfenster vertical steht.

Wird der Stiel des Hammers durch Steigerung des Druckes der Luft auf das mit ihm verwachsene Trommelfell nach innen getrieben, so wird die Basis des Steigbügels gegen die Membran des (ovalen) Vorhofsfensters gedrückt, der Druck im Labyrinthwasser gesteigert und dadurch die Membran des (runden) Schneckenfensters nach aussen getrieben.

Damit der Apparat die kleinsten Druckänderungen der Luft, in stets gleichem Verhältniss vergrössert, dem Labyrinthwasser mittheilen könne, ist es vor allen Dingen nöthig, dass der Druck des Steigbügels stets in völlig gleicher Weise auf das Labyrinthwasser wirke. Zu diesem Ende muss

1. der Druck der Basis stets Eine und dieselbe Fläche treffen und die Richtung der Bewegung unveränderlich sein;
2. es dürfen keine Anheftungen des Steigbügels an die Wand des Vorhofsfensters stattfinden, wenigstens keine solchen, die irgend einen merklichen Einfluss auf seine Lage und Bewegung ausüben könnten;
3. der Steigbügel darf nie aufhören, gegen die Membran des Vorhofsfensters zu drücken.

Wie man bei einiger Ueberlegung leicht finden wird, würden die Druckänderungen der

Luft entweder gar nicht oder nach völlig veränderten Gesetzen auf das Labyrinthwasser wirken, sobald Eine dieser Bedingungen verletzt würde.

Um die Erfüllung der 3. Bedingung zu sichern, muss durch den *M. tensor tympani*, welcher den Hammerstiel nach innen zieht, der Druck gegen die Membran des Vorhofsfensters stets auf einer solchen Höhe erhalten werden, dass er die grössten, beim Hören zu erwartenden Druckänderungen beträchtlich übertrifft. Wahrscheinlich wird am Schnecken- oder Vorhofsfenster eine Wirkung dieses Druckes, sei es die Spannung oder Krümmung (Ausdehnung, Formänderung) der Membran empfunden und durch den *M. tensor tympani* der für das genaue Hören günstigste Druck hergestellt.

Der Druck hängt nur von der Lage des Hammerstiels ab, und um die erforderliche Einstellung dieses Stiels zu bewirken, muss der Zug des Muskels gerade so stark sein, dass er der Wirkung der Spannung des Paukenfells bei dieser Einstellung das Gleichgewicht hält. Ob die Spannung des Paukenfells dabei grösser oder kleiner ist, darauf kommt gar nichts an; nur muss sie, wie wir jetzt zeigen wollen, so gross bleiben, dass nur ein sehr kleiner Theil der mechanischen Kraft der das Ohr treffenden Wellen an die Luft im Innern der Paukenhöhle verloren geht.

Wenn eine in freier Luft gespannte Membran von einer Schallwelle getroffen wird, so entstehen eine Schwingung der Membran, eine zurückgeworfene Luftwelle und eine weitergehende (gebrochene) Luftwelle. Wie sich die mechanische Kraft der Schallwelle auf diese drei Wirkungen vertheilt, hängt von der Spannung der Membran ab. Ist diese Spannung sehr gering, so sind die beiden ersten Wirkungen sehr schwach, und es geht die Schallwelle fast unverändert weiter. Ist dagegen die Membran so stark gespannt, dass ihre Bewegungen nur sehr klein sind gegen die Schwingungen der Lufttheilchen in der auf sie treffenden Schallwelle, so kann sie der Luft auf der hintern Seite nur sehr kleine Bewegungen mittheilen und folglich auch ihren Druck nur wenig verändern, und es wird fast die ganze Druckänderung auf der vordern Seite zur Spannung der Membran verwandt. Ausserdem aber entsteht, wenn die Membran in freier Luft gespannt ist, eine zurückgeworfene Welle.

Die Lage des Linsenbeines gegen das Vorhofsfenster kann also nicht unverändert bleiben; aber es kann durch Drehung des Amboses um seinen Befestigungspunkt (das Paukengelenk) bewirkt werden, dass das Linsenbein sich nur parallel der Längsaxe des Vorhofsfensters verschiebt, und also nur in dieser Richtung eine Drehung des Steigbügels um das Centrum der Ambosgelenkfläche nöthig ist, um die Steigbügelplatte an ihrem Platze zu erhalten. Da nun nur für diese Richtung eine Vorrichtung (der *M. stapedius*) vorhanden ist, den Steigbügel um das Ambosgelenknöpfchen willkürlich zu drehen, für die darauf senkrechte aber nicht, so darf man wohl vermuthen, dass die letztere Vorrichtung eben dadurch überflüssig gemacht worden ist, dass das Ambosgelenknöpfchen fortwährend in derselben Höhe erhalten wird.

VI. Dem Zuge der Sehne des *M. tensor tympani* wird zum Theil das Gleichgewicht gehalten durch die Befestigung des Hammergriffs im Paukenfell und des Paukenfells im *Sulcus tympanicus*. Die Anheftung des Paukenfells an dem Hammergriff reicht aber (nach v. Tröltsch und Gerlach) nur wenig höher, als der Insertionspunkt der Sehne, und ihr Endpunkt liegt selbst schon höher als die Endigungen des *Sulcus tympanicus*. Offenbar kann also die Befestigung des Paukenfells im *S. t.* dem *M. tensor tympani* allein nicht das Gleichgewicht halten. Zum Gleichgewicht des Hammers ist vielmehr erforderlich, dass auf den oberhalb des Insertionspunkts gelegenen Theil ein gleich grosses entgegengesetzt gerichtetes Drehungsmoment wirke, wie auf den unterhalb gelegenen Griff.

Man kann diese zur Herstellung des Gleichgewichts nöthige Kraft suchen

1. entweder in der Verbindung des Paukenfells mit den oberflächlichen Schichten der Haut des äusseren Gehörgangs,
2. oder in der Wirkung der hinteren Paukenfelltasche,
3. oder vielleicht in dem Zusammenwirken der Anheftungen des Hammerkopfes an die Paukenhöhlenwand durch den Ambos einerseits und anderseits durch das *Lig. superius Arnoldi*. Diese Anheftungen bilden einen etwa gegen die Spitze des kurzen Fortsatzes gerichteten Winkel und drücken, wenn sie gespannt sind, diese Spitze gegen das Paukenfell.

Dritte Abtheilung.

2. Versuch einer allgemeinen Auffassung der Integration und Differentiation

(20. Febr. 1847.)

In dem folgenden Aufsatze ist der Versuch gemacht, ein Verfahren aufzustellen, mittelst dessen man aus einer gegebenen Function einer Veränderlichen eine andere Function derselben Veränderlichen ableiten könne, deren Abhängigkeit von jener ursprünglichen sich durch eine Zahl ausdrücken lässt und die für den Fall, dass diese Zahl eine ganze positive, negative oder null ist, beziehungsweise mit den Differentialquotienten, Integralen und der ursprünglichen Function übereinstimmt.

Die Resultate der Differential- und Integral-Rechnung werden zwar als Grundlage hier vorausgesetzt, aber nicht in der Weise, dass diejenigen derselben, die für alle Differentiale und Integrale, deren Ordnung durch eine ganze Zahl ausgedrückt wird, gelten, auch auf die gebrochenen Ordnungen ausgedehnt würden; sondern sie sollen nur einerseits zur Begründung des oben angedeuteten Verfahrens benutzt werden und andererseits als Wegweiser dienen dasselbe zu finden.

Zu diesem letzteren Zwecke wollen wir einmal die Reihe der Differentialquotienten etwas näher betrachten. Es ist klar, dass man hierbei nicht von der gewöhnlichen Definition derselben ausgehen kann, die sich auf ihr recurrentes Bildungsgesetz gründet, da man ja durch dasselbe unmöglich auf andere Glieder der Reihe, als auf solche, die ganzen Indices entsprechen, gelangen kann; man muss sich also nach einer independenten Bestimmung derselben umsehen. Ein Mittel dazu bietet uns die Entwicklung der Function, welche aus der ursprünglichen durch Vermehrung der Veränderlichen um einen beliebigen Zuwachs entsteht, nach ganzen positiven Potenzen dieses Zuwachses dar.

Denn da die bekannte Entwicklung

$$z(x+h) = \sum_{\mu=0}^{\infty} \frac{d^{\mu}z}{dx^{\mu}} \frac{h^{\mu}}{1 \cdot 2 \cdots \mu} \quad (5)$$

(wo $z^{(\mu)}(x+h)$ das bedeutet, was aus $z(x)$ wird, wenn man darin statt x setzt $x+h$) für jeden beliebigen Werth von h gültig ist, so müssen die Coefficienten in derselben einen ganz bestimmten Werth haben; man kann dieselben also zur Definition der Differentialquotienten verwenden. Demgemäss stellen wir folgende Definition auf: der n te Differentialquotient der Function z ist gleich dem Coefficienten von h^n in der Entwicklung von $z(x+h)$ nach ganzen positiven Potenzen von h , multiplicirt in einen nach x constanten, nur von n abhängigen Factor, nämlich in $1 \cdot 2 \cdots n$. Diese Betrachtungsweise der Differentialquotienten führt sehr leicht zur Feststellung einer allgemeinen Operation, in welcher die Differentiation und Integration enthalten ist und welche wir (da die Bezeichnung und Benennung derselben als die Grenze des Quotienten verschwindender Grössen bei dieser Betrachtungsweise keinen Sinn hat) durch d'' bezeichnen und nach dem Vorgange von Lagrange in der Benennung “fonctions dérivées” *Ableitung* benennen wollen.

Wir verstehen nämlich unter $d''z$ oder unter dem Ausdruck “ ν te Ableitung von z nach x ” den Coefficienten von h^{ν} in einer nach Potenzen von h , deren Exponenten um eine ganze Zahl von einander absteigen, rückwärts und vorwärts ins unendliche fortlaufenden Entwicklung von $z(x+h)$, multiplicirt in einen nach x constanten, nur von ν abhängigen

Factor, d. h. wir definiren $d^\nu z$ durch die Gleichung

$$z(x+h) = \sum_{\nu=-\infty}^{\nu=\infty} \frac{h^\nu}{\Pi(\nu)} d^\nu z. \quad (6)$$

In dieser Definition muss nun natürlich der von ν allein abhängige Factor k_ν so bestimmt werden, dass für den Fall, dass die Exponenten von h ganze Zahlen sind, die Reihe (6) in die (5) übergeht, weil nur dann die Differentialquotienten wirklich als besondere Fälle in den Ableitungen enthalten sind; sollte dies nicht möglich sein, so wäre diese Definition unserm Zwecke, eine Operation, welche die Differentiation als besondern Fall in sich schliesst, festzustellen, nicht entsprechend, und wir müssten uns also nach einem anderen Wege, ihn zu erreichen, umsehen.

Bevor wir aber diesen Factor zu bestimmen suchen, wollen wir erst Einiges über die Reihen von der angegebenen Form vorausschicken, da sie, wie man sieht, die Grundlagen dieses ganzen Versuchs einer Theorie der Ableitungen bilden.

Man hat wohl die Behauptung aufgestellt, man könne auf die Reihen im Allgemeinen gar keine sicheren Schlüsse gründen, sondern nur unter der Bedingung, dass man den darin vorkommenden Grössen solche Zahlenwerthe beilege, dass die Reihe convergire, d. h. dass sich ihr (wenigstens genährter) Werth durch eine wirkliche Ziffernaddition finden lasse. Nun können wir aber, wenn, wie hier immer vorausgesetzt wird, die Coefficienten einem bestimmten Gesetze gehorchen, jeden einzelnen Theil derselben genau angeben; sie ist folglich eine in allen ihren Theilen genau begrenzte, also bestimmte Grösse; und ich sehe darin, dass der Mechanismus der Ziffernaddition nicht ausreicht, diesen ihren bestimmten Werth zu finden, keinen Grund, warum wir nicht die Gesetze, die für die Zahlengrössen als solche erwiesen sind, auf sie anwenden und die Resultate, die wir dadurch erhalten, als richtig ansehen sollten.

Um an einem Beispiele zu zeigen, dass man für eine Reihe von der Form (6) wirklich einen Werth finden kann, wollen wir durch ein Verfahren, das in vielen Fällen für diesen Zweck anwendbar ist, die Function x^μ in eine nach gebrochenen Potenzen von $(x-b)$ fortlaufende Reihe entwickeln, eine Entwicklung, deren wir ohnehin im Lauf der Untersuchung bedürfen.

Die Reihe, die x^μ gleich sein soll und die wir der Kürze wegen durch z bezeichnen, sei

$$z = \sum_{\alpha} c_{\alpha} (x-b)^{\alpha}.$$

Wenn $z = x^\mu$, so ist

$$\frac{dz}{dx} = \mu x^{\mu-1}, \quad \frac{d^2z}{dx^2} = \mu(\mu-1)x^{\mu-2},$$

folglich

$$(x-b) \frac{d^2z}{dx^2} - (\mu-1) \frac{dz}{dx} = 0.$$

es muss also, auch

$$\sum [(\alpha-\mu)c_{\alpha} - b(\alpha+1)c_{\alpha+1}] (x-b)^{\alpha} = 0$$

sein. Dieser Bedingung ist offenbar Genüge geleistet, sobald

$$(\mu-\alpha)c_{\alpha} - b(\alpha+1)c_{\alpha+1} = 0.$$

Nun sind aber alle Ausdrücke, welche dieser Differentialgleichung genügen, in den verschiedenen Werthen von $k \cdot x^\mu$ enthalten, es muss also die Reihe, in der das Gesetz

$$(\mu-\alpha)c_{\alpha} - b(\alpha+1)c_{\alpha+1} = 0$$

stattfindet, nothwendig einem derselben gleich sein; um diesen zu finden, machen wir

$$c_{\alpha-1}(x-b)^{\alpha-1} + c_{\alpha}(x-b)^{\alpha} = p,$$

$$p' = c_{\alpha+1}(x-b)^{\alpha+1} + c_{\alpha+2}(x-b)^{\alpha+2} + \dots; \quad \text{also}$$

$$p + p' = z = k \cdot x^\mu; \quad \text{folglich}$$

$$x \frac{dp}{dx} - (\mu-\alpha)p = (\mu-\alpha)c_{\alpha-1}(x-b)^{\alpha-1} = \alpha c_{\alpha}(x-b)^{\alpha-1},$$

$$x \frac{dp'}{dx} - (\mu - \alpha)p' = -(\mu - \alpha)c_{\alpha+1}(x - b)^{\alpha+1} - \dots = -b \cdot c_{\alpha}(x - b)^{\alpha}.$$

Diese Differentialgleichungen haben zum allgemeinen Integral

$$- \int x^{\mu-\alpha-1} dx + k_1 = p \cdot x^{-\mu} = c_{\alpha}(x - b)^{\alpha} x^{-\mu} + c_{\alpha-1}(x - b)^{\alpha-1} x^{-\mu},$$

$$\int x^{\mu-\alpha-1} dx + k_2 = p' \cdot x^{-\mu} = c_{\alpha+1}(x - b)^{\alpha+1} x^{-\mu} + c_{\alpha+2}(x - b)^{\alpha+2} x^{-\mu} + \dots$$

Substituirt man hierin für x seinen Werth und $\frac{x-b}{x}$ für y , so erhält man

$$p \cdot x^{-\mu} = c_{\alpha} b^{\alpha-\mu} (1 - y)^{\alpha} y^{\mu-\alpha} + c_{\alpha-1} b^{\alpha-1-\mu} (1 - y)^{\alpha-1} y^{\mu-\alpha+1} + \dots,$$

$$\frac{1}{x} (\mu - \alpha) b^{\alpha-\mu} \int y^{\mu-\alpha-1} (1 - y)^{\alpha} dy + k_1 = p \cdot x^{-\mu},$$

$$\frac{1}{x} (\mu - \alpha) b^{\alpha-\mu} \int y^{\mu-\alpha-1} (1 - y)^{\alpha} dy + k_2 = c_{\alpha+1} b^{\alpha+1-\mu} (1 - y)^{\alpha+1} y^{\mu-\alpha-1} + \dots$$

In dem Falle, dass $\mu > \alpha > -1$, verschwinden nun offenbar die Ausdrücke rechts beziehungsweise für $y = 0$ und $y = 1$, und die beiden Integrale werden ihnen also, das erste von 0 bis y , das zweite von 1 bis y genommen, genau gleich sein, wenn dieselben zwischen diesen Grenzen continuirlich sind. Es könnte scheinen, als ob diese Bedingung verletzt wäre, so bald einige oder alle Glieder einer Reihe ins Positive oder Negative über alle Grenzen hinaus wachsen; daraus würde aber, da sich dieselben gegenseitig aufheben können, nur folgen, dass sich durch eine wirkliche Addition ein bestimmter Werth für die Reihe nicht finden lässt. Da wir nun den Schluss, als ob die Reihe in einem solchen Falle überhaupt keinen bestimmten Werth habe, nach dem Obigen nicht zugeben, so können wir die Continuität oder Discontinuität der Reihen $p \cdot x^{-\mu}$ und $p' \cdot x^{-\mu}$ nur durch die Betrachtung der ihnen gleichen Integrale erfahren¹. Bekanntlich kann nun aber ein Ausdruck nur discontinuirt werden, wenn sein Differential unendlich wird; der Ausdruck $(1 - y)^{\mu-\alpha-1} y^{\alpha}$ hat aber für alle endlichen Werthe von y einen endlichen Werth, wenn die Exponenten $\mu - \alpha - 1$ und α positiv sind; die Integrale ändern sich also dann stetig, und aus der Betrachtung der singulären Integrale für $y = 1$ und $y = 0$ ersieht man, dass dies auch noch stattfindet, so lange beide Exponenten grösser als -1 bleiben. Es ist demnach für den Fall, dass $\mu > \alpha > -1$ und y endlich ist²,

$$k = z \cdot x^{-\mu} = p \cdot x^{-\mu} + p' \cdot x^{-\mu} = (\mu - \alpha) c_{\alpha} b^{\alpha-\mu} \int_0^1 (1 - y)^{\mu-\alpha-1} y^{\alpha} dy \quad (7)$$

(wo Π das bekannte bestimmte Integral bezeichnet). Dies Resultat gilt, wie bemerkt, nur, wenn $\mu > \alpha > -1$; es lässt sich aber auf alle Werthe von μ und α ausdehnen, wenn man das Π einer negativen Zahl (wie im Lauf dieser Untersuchung immer angenommen werden soll) als durch das Gesetz $\Pi(n) = \frac{1}{n+1} \Pi(n+1)$ aus den positiven abgeleitet definirt. Denn erstens muss es nach dem Gesetz, welches angenommener Massen zwischen

¹Behandelt man die Integrale vor der Substitution von $\frac{x-b}{x}$ statt x , so werden sie für $x = 0$ discontinuirt. Man erkennt aber auch unter dieser Form leicht, dass die ihnen zugehörigen Constanten für positive und negative Werthe von x dieselben Werthe haben müssen, da der Werth der Integrale bei dem Uebergange des x von $+\infty$ zu $-\infty$ sich stetig ändert.

²Für den Fall, dass $y = +\infty$, also $x = 0$, ist der Werth beider Integrale ∞ ; folglich $k = \infty - \infty$, d. h. beliebig, was offenbar aus der blossen Betrachtung dieses Falles hervorgeht.

den Coefficienten der Reihe stattfindet, für jeden Werth von α gelten, wenn nur einer derselben > -1 ist; es ist also, wenn μ positiv ist,

$$k = \frac{\Pi(\alpha)\Pi(\mu - \alpha - 1)}{\Pi(\mu)}$$

oder

$$k \cdot x^\mu = \frac{\Pi(\alpha)\Pi(\mu - \alpha - 1)}{\Pi(\mu)} b^{\alpha-\mu} x^\mu,$$

daraus aber erhält man durch n malige Differentiation nach x

$$\frac{d^n(k \cdot x^\mu)}{dx^n} = \frac{\Pi(\alpha)\Pi(\mu - \alpha - 1)}{\Pi(\mu - n)} b^{\alpha-\mu} x^{\mu-n},$$

wodurch das Gesetz auch für negative Werthe von μ erwiesen ist.

Es ist also ganz allgemein

$$x^\mu = \sum \frac{\Pi(\alpha)}{\Pi(\mu)} \frac{(x - b)^\alpha}{b^{\alpha-\mu}}. \quad (8)$$

Bemerkenswerth ist es, dass man durch diese Formel eine Reihe für x^μ nicht erhält, wenn μ eine negative ganze Zahl ist, da der Ausdruck links dann 0 wird, worauf wir später zurückkommen werden. Man sieht auch, dass es Reihen von dieser Form giebt, die der Null oder einer Constanten, für jeden Werth von x , gleich sind.

Nach dieser Protestation gegen das Verdammungsurtheil, welches man den divergirenden Reihen gesprochen hat, wollen wir jetzt den eingeschlagenen Weg zur Feststellung des Begriffs der Ableitungen weiter verfolgen. Man sieht, dass der Zweck, den wir uns gesetzt haben, dass nämlich die Differentiation als besonderer Fall in der Ableitung enthalten sein soll, erfüllt ist, so bald nur die Function k_ν für alle ganzen positiven Werthe von $\nu = \frac{1}{\Pi(\nu)}$ und für alle ganzen negativen Werthe $= 0$ ist; denn dann geht die Reihe (6) in die (5) über; dieser Bedingung kann aber offenbar durch unendlich viele verschiedene Functionen von ν genügt werden; man kann ferner durchaus nicht annehmen, dass es nur Eine Entwicklung derselben Function nach denselben Potenzen von h gebe, d. h. dass nur Ein System von Coefficienten einer Reihe von einer bestimmten Form einen bestimmten Werth gebe; man muss vielmehr unendlich viele verschiedene Systeme als möglich voraussetzen; wir haben also, unbeschadet unseres Zweckes, sowohl unter den verschiedenen möglichen Functionen von ν für k_ν als unter verschiedenen möglichen Systemen von Coefficienten die Wahl, und es ist offenbar am zweckmässigsten, diese Wahl womöglich so zu treffen, dass die Ableitungen noch mehreren Gesetzen gehorchen, die bei einer andern Wahl nur für Ableitungen mit ganzen Indices gültig sein würden.

Hierzu dienen folgende Betrachtungen.

Da der Ausdruck $\Sigma k_\nu dl^\nu z h^\nu$ alle in dieser Form möglichen Entwicklungen $z(x + h)$ umfassen soll, so muss

$$\frac{\partial}{\partial x} \Sigma k_\nu dl^\nu z h^\nu = \Sigma k_\nu dl^{\nu+1} z h^\nu \cdot \frac{1}{h}$$

alle in dieser Form möglichen Entwicklungen von $\frac{\partial z(x+h)}{\partial x}$ umfassen, und ebenso

$$\frac{\partial}{\partial h} \Sigma k_\nu dl^\nu z h^\nu = \Sigma k_\nu \nu dl^\nu z h^{\nu-1}$$

alle Entwicklungen dieser Form von $\frac{\partial z(x+h)}{\partial h}$. Bekanntlich sind nun $\frac{\partial z(x+h)}{\partial x}$ und $\frac{\partial z(x+h)}{\partial h}$ identisch; beide Ausdrücke umfassen also genau dieselben Reihen; es müssen also auch

$k_{\nu+1} dl^{\nu+1}z$ und $k_\nu \cdot \nu dl^{\nu+1}z$ genau dieselben Werthe haben, d. h. sie sind einander gleich; setzt man nun $k_{\nu+1} = k_\nu \cdot \nu \cdot l(\nu)$, was der obigen Hauptbedingung offenbar nicht widerspricht, da für ganze Werthe von ν vermöge derselben dies Gesetz stattfinden muss, so erreicht man dadurch, dass auch für die Ableitungen mit gebrochenen Indices

$$dl^{\nu+1}z = \frac{d dl^\nu z}{dx} \quad (9)$$

ist und folglich allgemein, wenn n eine ganze Zahl ist,

$$dl^{\nu+n}z = \frac{d^n dl^\nu z}{dx^n}. \quad (10)$$

Aus dem angenommenen Gesetze für k_ν folgt, dass

$$\Pi(\nu) \cdot k_\nu = \Pi(\nu + 1) \cdot k_{\nu+1}$$

ist, es hat also die Function $\Pi(\nu) \cdot k_\nu$, die wir durch $l(\nu)$ bezeichnen wollen, für alle Werthe von ν , die um ganze Zahlen von einander absteigen, stets denselben Werth. Wir können daher für die zweckmässigste Wahl der Function k_ν nicht mehr aus der Betrachtung einer einzelnen Entwicklungsform, sondern nur aus der Combination verschiedener Schlüsse ziehen; demgemäss wollen wir versuchen, ob wir sie so wählen können, dass $dl^\mu dl^\nu z = dl^{\mu+\nu}z$ ist.

Lässt man zu diesem Zwecke x in der Formel (6) noch einmal wachsen, und bezeichnet man diesen Zuwachs durch k , so ist

$$z(x + h + k) = \sum_{\mu+\nu=-\infty}^{\infty} \frac{h^\mu}{\Pi(\mu)} \frac{k^\nu}{\Pi(\nu)} dl^\mu dl^\nu z, \quad (\alpha)$$

und dieser Ausdruck bezeichnet alle nach denselben Potenzen von h und k möglichen Entwicklungen von $z(x + h + k)$. Es ist aber auch

$$\begin{aligned} z(x + h + k) &= z((x + h) + k) = \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \frac{k^\nu}{\Pi(\nu)} dl^\nu z(x + h) \\ &= \sum_{\nu=-\infty}^{\infty} \sum_{\mu=-\infty}^{\infty} \frac{k^\nu}{\Pi(\nu)} \frac{h^\mu}{\Pi(\mu)} dl^\mu dl^\nu z \cdot \frac{l(\mu + \nu)}{l(\mu)l(\nu)}. \quad (\beta) \end{aligned}$$

Nun bezeichnet der letzte Ausdruck (β) zwar nicht alle möglichen Entwicklungen dieser Form von $z(x + h + k)$, da die Gleichung (8) nur Eine Entwicklung von x^μ giebt, ohne dass dies die einzig mögliche zu sein brauchte; es müssen aber alle in ihm enthaltenen Entwicklungen auch in (α) enthalten sein; stellt man also für die Function l das Gesetz $l(\mu + \nu) = l(\mu) \cdot l(\nu)$ auf, so werden alle Werthe von $dl^{\mu+\nu}z$ auch Werthe von $dl^\mu dl^\nu z$ sein, obgleich der letzte Ausdruck auch noch andere Werthe haben kann.

Es ist also

$$dl^\mu dl^\nu z = dl^{\mu+\nu}z \quad (11)$$

unter der ausgesprochenen Beschränkung.

Aus $l(\mu + \nu) = l(\mu) \cdot l(\nu)$ folgt aber

$$l(\mu + \nu + \pi) = l(\mu + \nu) \cdot l(\pi) = l(\mu) \cdot l(\nu) \cdot l(\pi)$$

und allgemein, dass das Product der l verschiedener Zahlen gleich ist dem l ihrer Summe, oder wenn man die einzelnen Factoren einander gleich setzt $l(m\nu) = l(\nu)^m$, so oft m eine ganze Zahl ist; bezeichnet man nun $\frac{1}{m}$ durch μ , so ist

$$l(m\nu)^{\frac{1}{m}} = l(\nu) \quad \text{und} \quad l(\mu\nu)^{\frac{1}{\mu}} = l(\nu), \quad \text{oder} \quad l(\mu\nu) = l(\nu)^\mu.$$

Das Gesetz $l(\mu\nu) = l(\nu)$ ist also für alle rationalen Werthe von μ , und folglich (nach dem bekannten Gesetz der Interpolation) allgemein gültig.

Da nun für ganze Werthe von ν $l(\nu) = 1$ sein muss, so ist $l(\nu) = 1$.

Sollen demnach die Gesetze (4) und (5) für die Ableitungen im Allgemeinen gelten, und die Differentiation in der Ableitung als besonderer Fall enthalten sein, so müssen wir die Ableitungen unter denjenigen Functionen von x wählen, die der Gleichung

$$\Pi(\nu) \cdot k_\nu = \text{const.}$$

genügen. Diese Wahl wird am zweckmässigsten auf diejenigen unter ihnen fallen, welche am geschmeidigsten für die Rechnung sind; versucht man aber die Entwicklung einiger Functionen von $x + h$ in Reihen, die nach gebrochenen Potenzen von h fortlaufen, so wird man sehen, dass am leichtesten und einfachsten Entwicklungen in solche Reihen sind, in denen der Coefficient von $\frac{h^\nu}{\Pi(\nu)}$ das Differential des Coefficienten von $\frac{h^{\nu+1}}{\Pi(\nu+1)}$ ist: wir wollen also obige Begrenzung der Ableitungen dahin beschränken, dass das Zeichen dl^ν den Coefficienten von $\frac{h^\nu}{\Pi(\nu)}$ nicht in allen möglichen Entwicklungen von $z(x + h)$ bezeichnen soll, sondern nur in solchen, in denen der Coefficient von $\frac{h^{\nu+1}}{\Pi(\nu+1)}$ das Differential des Coefficienten von $\frac{h^\nu}{\Pi(\nu)}$ ist³.

³Aus (4) folgt zwar, dass wenn $\sum \frac{h^\nu}{\Pi(\nu)} dl^\nu z$ eine Entwicklung von $z(x + h)$ ist, auch $\frac{d}{dx} \sum \frac{h^{\nu+1}}{\Pi(\nu+1)} dl^\nu z = \sum \frac{h^\nu}{\Pi(\nu)} \frac{d dl^\nu z}{dx}$ eine Entwicklung von $\frac{dz}{dx}$ ist, aber nicht dass diese beiden Entwicklungen identisch sind. Durch die gemachte Annahme erreicht man auch, dass die Ableitungen mit ganzen negativen Indices, die nach dem Bisherigen noch gar keinen Sinn hatten, mit den Integralen zusammenfallen, wie weiter unten bewiesen werden wird.

Hieraus folgt zunächst, dass Ein Werth von $dl^\nu z$ nur einer Entwicklung angehören kann; denn gesetzt, ein Werth von $dl^\nu z$, p_ν , gehörte zwei Entwicklungen, a und b , an, so müssten diese beiden Entwicklungen in allen folgenden Gliedern übereinstimmen, da diese durch Differentiation aus p_ν entstehen. Bezeichnen wir nun die vorhergehenden Glieder in a durch $p_{\nu-1}$, $p_{\nu-2}$, $\dots$, in b durch $q_{\nu-1}$, $q_{\nu-2}$, $\dots$, so müssen $p_{\nu-1}$ und $q_{\nu-1}$ beide zum Differential p_ν haben; sie können also nur um eine Constante verschieden sein, d. h.

$$q_{\nu-1} = p_{\nu-1} + K_1,$$

ebenso muss

$$q_{\nu-2} = p_{\nu-2} + K_1 x + K_2, \quad q_{\nu-3} = p_{\nu-3} + K_1 \frac{x^2}{1 \cdot 2} + K_2 x + K_3$$

sein. Die Entwicklung b ist also

$$\sum_{m=1}^{n=\infty} \frac{K_m}{\Pi(n)} \frac{h^{\nu-n}}{\Pi(\nu-n)} = \sum_{m=1}^{\infty} K_m \frac{h^{\nu-m}}{\Pi(\nu-m)}.$$

nun soll aber für alle Werthe von $(x+h)$ $a = b$ sein, was bekanntlich nur stattfinden kann, wenn alle Constanten null sind; dann aber sind beide Entwicklungen identisch.

Ist p_ν ein Werth von $dl^\nu z$, so ist $p_\nu + K \frac{x^{\nu-n}}{\Pi(\nu-n)}$ (wo n positiv und ganz und K eine endliche Constante ist) ebenfalls ein Werth desselben; denn die Reihe

$$\sum \frac{h^{\nu+n}}{\Pi(\nu+n)} dl^{\nu+n} z + \frac{h^\nu}{\Pi(\nu)} (p_\nu + K) + \sum \frac{h^{\nu-n}}{\Pi(\nu-n)} \left(p_{\nu-n} + K \frac{x^n}{\Pi(n)} \right)$$

und es findet in ihr das Gesetz statt

$$\frac{d}{dx} \left(p_{\nu-n} + K \frac{x^n}{\Pi(n)} \right) = p_{\nu-n+1} + K \frac{x^{n-1}}{\Pi(n-1)}.$$

Den Inbegriff aller Werthe von $dl^\nu z$, die sich durch Addition von Ausdrücken von der Form $K \frac{x^n}{\Pi(n)}$ aus einander ableiten lassen, wollen wir ein *System* von Werthen nennen; es sind also alle Werthe von $dl^\nu z$, die demselben Systeme angehören, in dem Ausdruck

$$p_\nu + \sum_{n=0}^{\infty} K_n \frac{x^n}{\Pi(n)} \tag{12}$$

enthalten (wo K_n endliche Constanten bedeuten).

Wir wollen nun einen Werth von $dl^\nu z$ zu bestimmen suchen. Bekanntlich ist

$$z(x) = z(k) + \left(\frac{dz}{dx} \right)_k (x - k) + \frac{1}{1 \cdot 2} \left(\frac{d^2 z}{dx^2} \right)_k (x - k)^2 + \dots,$$

sobald z zwischen den Grenzen x und k continuirlich ist; setzt man hierin $x+h$ für x und entwickelt die Glieder der Reihe mittels (8) nach Potenzen von h , so erhält man

$$z(x+h) = \sum_{\mu=-\infty}^{\infty} \frac{h^\mu}{\Pi(\mu)} \left[\frac{(x-k)^{-\mu}}{\Pi(-\mu)} z(k) + \frac{(x-k)^{-\mu+1}}{\Pi(-\mu+1)} \left(\frac{dz}{dx} \right)_k + \frac{(x-k)^{-\mu+2}}{\Pi(-\mu+2)} \left(\frac{d^2 z}{dx^2} \right)_k + \dots \right]$$

und in dieser Reihe ist der Coefficient von $\frac{h^\mu}{\Pi(\mu)}$ das Differential des Coefficienten von $\frac{h^{\mu-1}}{\Pi(\mu-1)}$; er ist folglich ein Werth von $dl^\nu z$, den wir durch p_ν bezeichnen wollen. Differentiirt man nach k , so erhält man

$$\frac{dp_\nu}{dk} = \frac{(x-k)^{-\mu-1}}{\Pi(-\mu-1)} z(k) + \frac{(x-k)^{-\mu}}{\Pi(-\mu)} \left(\frac{dz}{dx} \right)_k + \cdots = p_{\nu+1}.$$

Nun verschwinden alle Glieder der obigen Reihe für $k = x$; das Integral wird also von h bis x genommen $= p_{\nu+1}$ sein, wenn es zwischen den Grenzen continuirlich ist; dies ist aber, da z zwischen den Grenzen x und k continuirlich sein soll und $-\mu-1 > -1$, offenbar der Fall und es ist also

$$\int_x^k (x-t)^{-\mu-1} z(t) dt = \frac{p_{\nu+1}}{\Pi(-\mu-1)} \quad (13)$$

ein Werth von $dl^\nu z$, sobald z zwischen den Grenzen x und k continuirlich und μ negativ ist. Der derselben Entwicklung angehörige Werth von $dl^{\nu-n} z$ ist gleich

$$\Pi(-\mu+n-1) \int_x^k (x-t)^{-\mu+n-1} dl^n z dt.$$

Man sieht leicht, dass, je nachdem man dem k verschiedene Werthe giebt, verschiedene Entwicklungen von $z(x+h)$ daraus hervorgehen, aber alle diese Entwicklungen gehören demselben Systeme an. Denn aus dem Werth

$$\int_x^k (x-t)^{-\mu-1} z(t) dt$$

geht offenbar

$$\int_{k_1}^k (x-t)^{-\mu-1} z(t) dt$$

hervor durch Addition von

$$\int_x^{k_1} (x-t)^{-\mu-1} z(t) dt = \Pi(-\mu-1) \Pi(\mu) dl^\nu z;$$

da nun z zwischen x und k , und also auch zwischen k und k_1 continuirlich ist, so sind alle jene Integrale endliche und zwar nach x constante Grössen. Man wird demnach durch das angewandte Verfahren stets auf dasselbe System von Werthen gelangen: beschränken wir also den Begriff der Ableitungen auf dies System von Werthen, so haben wir die Bestimmung derselben auf bekannte Werthe zurückgeführt und werden mittels dieser Definition die Eigenschaften derselben und ihre Werthe für bestimmte Functionen ableiten können.

Es ist demnach

$$dl^\nu z = \Pi(-\nu-1) \int_x^k (x-t)^{-\nu-1} z(t) dt + \sum_{n=0}^{\infty} K_n \frac{x^n}{\Pi(n)} \quad (14)$$

wenn K_n endliche willkürliche Constanten sind⁴, ν negativ, und z zwischen den Grenzen x und k continuirlich ist; für einen Werth von ν aber, der > 0 ist, bezeichnet $dl^\nu z$ dasjenige,

⁴Alle diese willkürlichen Functionen wollen wir durch φ_ν bezeichnen; wir machen zugleich darauf aufmerksam, dass (wenn n positiv und ganz) jede Function φ_ν auch eine Function $\varphi_{\nu-n}$ ist.

was aus $dl^{\nu-m}z$ (wo $m > \nu$) durch m malige Differentiation nach x hervorgeht⁵, ein Werth, welcher stets auch der Gleichung

$$dl^{\nu+n}z = \frac{d^n dl^{\nu}z}{dx^n}$$

genügen muss⁶.

Hieraus folgt

1. $dl^{\nu}z = \Pi(-\nu - 1) \int_x^k (x - t)^{-\nu-1} z(t) dt + \varphi_{\nu},$
2. $dl^{\nu}z = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{h^n}{\Pi(n)} dl^{\nu+n}z,$
3. $dl^{\nu}(dl^{\mu}z) = dl^{\nu+\mu}z,$
4. $dl^0z = z,$
5. $dl^n z = \frac{d^n z}{dx^n},$ wenn n positiv und ganz,
6. $dl^{-n}z = \Pi(n - 1) \int_x^k (x - t)^{n-1} z(t) dt + \varphi_{-n},$
7. $dl^{\nu}(e^{cx}) = c^{\nu} e^{cx},$
8. $dl^{\nu}(cz) = c \cdot dl^{\nu}z,$
9. $dl^{\nu}(z_1 + z_2) = dl^{\nu}z_1 + dl^{\nu}z_2,$
10. $dl^{\nu}z \cdot dl^{\mu}z \neq dl^{\nu+\mu}z$ im Allgemeinen.

Zwei Werthe von $dl^{\nu}z$ und $dl^{\nu}z$, in denen die Constanten K, K_1 , etc. sämmtlich einander gleich sind, sollen *correspondirende* Werthe heissen. Alle derselben Entwicklung von $z(x + h)$ angehörigen Werthe sind correspondirende.

Wir wollen nun zu der Bestimmung der Ableitungen bestimmter Functionen von x übergehen. Dabei kann es natürlich nur darauf ankommen, einen Werth Einer Ableitung zu finden, da sich aus diesem ihr allgemeiner Werth durch Addition der Function φ_{ν} sofort ergibt, und zwar wird dieser Werth, wenn die Umformung des Ausdrucks 1. überhaupt etwas nützen soll, ein einfacherer, als dieser Ausdruck, also eine explicite Function von x in endlicher Form sein müssen. Diese Umformung wird also im Allgemeinen darin bestehen, dass man das x aus dem Integralzeichen herauszuschaffen sucht.

Betrachten wir nun zuerst die Function x^{μ} .

Ist μ positiv, so ist x^{μ} für alle Werthe von x continuirlich; es wird also

$$\frac{dl^{\nu}(x^{\mu})}{\Pi(-\nu - 1)} = \int_x^k (x - t)^{-\nu-1} t^{\mu} dt$$

⁵Die Definition

$$dl^{\nu}z = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{h^n}{\Pi(n)} dl^{\nu+n}z,$$

welche mit der gegebenen identisch ist, würde zwar für alle Werthe von ν gelten; wir haben ihr aber die gewählte ihrer grösseren Geschmeidigkeit wegen vorgezogen.

⁶Ob die obige Formel 1. alle Werthe enthält, die dieser Gleichung genügen, hängt offenbar davon ab, ob die Functionen φ_{ν} die einzigen sind, welche, statt $dl^{\nu}z$ substituirt, die Reihe 2. zu Null machen. Nun lässt sich zwar ohne Schwierigkeit zeigen, dass keine algebraische Function von x , die nicht in φ_{ν} enthalten ist, dies leistet; ob aber überhaupt keine Function dieser Bedingung genügt, darüber konnte ich bis jetzt zu keinem Resultat gelangen.

immer ein Werth von $dl^\nu(x^\mu)$ sein; dies Integral ist aber

$$\frac{x^{\mu-\nu}}{\Pi(-\nu-1)} \int_0^{\frac{k}{x}} (1-y)^{-\nu-1} y^\mu dy = \frac{\Pi(\mu)}{\Pi(\mu-\nu)} x^{\mu-\nu}$$

(nach (7)). Da das n te Differential hiervon $\frac{\Pi(\mu)}{\Pi(\mu-\nu-n)} x^{\mu-\nu-n} = dl^{\nu+n}(x^\mu)$ ist (nach 4), so ist für jeden Werth von ν

$$dl^\nu(x^\mu) = \frac{\Pi(\mu)}{\Pi(\mu-\nu)} x^{\mu-\nu} + \varphi_\nu. \quad (15)$$

Ist μ negativ, so ist x^μ für $x = 0$ discontinuirlich, für alle andern Werthe aber continuirlich; in dem Ausdrucke 1. müssen also x und k stets gleiches Zeichen haben. Nun erhält man aber durch m malige partielle Integration

$$\int_x^k (x-t)^{-\nu-1} t^{\mu+m} dt = \left[\frac{(x-t)^{-\nu}}{-\nu} t^{\mu+m} \right]_x^k + \frac{\mu+m}{-\nu} \int_x^k (x-t)^{-\nu} t^{\mu+m-1} dt + \dots$$

so lange $-\nu-m > 0$ ist, wodurch sich also, wenn $-\nu > -\mu$ ist, diejenigen Integrale, worin $\mu < -1$ ist, auf solche zurückführen lassen, in denen der Exponent von $t > -1$ ist; ist er > -1 , so gehört $\int_x^k (x-t)^{-\nu-1} t^{\mu+m} dt$ zu den Functionen φ_ν , und es ist also

$$\frac{\Pi(\mu+m)}{\Pi(-\nu-1-m)\Pi(\mu+m)} \int_x^k (x-t)^{-\nu-1-m} t^{\mu+m} dt = \frac{\Pi(\mu)}{\Pi(\mu-\nu)} x^{\mu-\nu}$$

ein Werth von $dl^\nu(x^\mu)$, wenn $-\nu > -\mu$, welches Resultat nach dem Gesetze $dl^{\nu+n}z = \frac{d^n dl^\nu z}{dx^n}$ für jedes ν gelten muss.

Ist aber $\mu+m = -1$, so ist

$$\begin{aligned} \int_x^k (x-t)^{-\nu-1} t^{-1} dt &= \frac{1}{x} \int_0^{\frac{k}{x}} (1-y)^{-\nu-1} y^{-1} dy \\ &= \frac{1}{x} \left[\log \frac{x}{k} + \int_0^1 \frac{(1-y)^{-\nu-1} - 1}{y} dy + \int_1^{\frac{k}{x}} \frac{(1-y)^{-\nu-1}}{y} dy \right] \\ &= \frac{1}{x} \log \frac{x}{k} \cdot k_1 + \frac{1}{x} \int_0^1 \frac{(1-y)^{-\nu-1} - 1}{y} dy. \end{aligned}$$

Verallgemeinert man auch das hieraus erhaltene Resultat durch Differentiation, so hat man folgende Werthe für $dl^\nu(x^\mu)$:

$$11. \quad dl^\nu(x^\mu) = \frac{\Pi(\mu)}{\Pi(\mu-\nu)} x^{\mu-\nu}, \text{ wenn } \mu \text{ nicht eine negative ganze Zahl ist;}$$

$$12. \quad dl^\nu(x^\mu) = \frac{\Pi(\mu)}{\Pi(\mu-\nu)} [\log x \cdot x^{\mu-\nu} - (\Psi(\mu-\nu) - \Psi(0))x^{\mu-\nu}], \text{ wenn } \mu \text{ eine ganze negative Zahl ist.}$$

Es ist zu bemerken, dass aus der Formel 12. die Formel 11. hervorgeht, sobald man nur die Constanten, die für diesen Fall $\frac{0}{0}$ werden, einer geeigneten Behandlung unterwirft, was auch in dem Falle geschehen muss, wo $(\mu-\nu)$ und μ beide ganze negative Zahlen sind.

Man übersieht leicht, dass die aus diesen Formeln für verschiedene Werthe von ν hervorgehenden Werthe correspondirende sind; dies ist auch der Grund, warum wir in 12. nicht, wie wir es für den Fall $\mu =$ einer negativen ganzen Zahl konnten, den bloß $x^{\mu-\nu}$ enthaltenden Theil in die Function φ_ν einschlossen.

Wendet man ein ähnliches Verfahren auf e^x an, so erhält man

$$13. \quad dl^\nu(e^x) = e^x.$$

Die Ableitungen von $\log x$ ergeben sich durch dieselbe Methode, noch leichter aber und zwar sogleich für alle Werthe von ν aus 6. und 12.:

$$14. \quad dl^\nu(\log x) = dl^{\nu+1}dl^{-1}\log x = \frac{\Pi(0)}{\Pi(-\nu-1)} [\log x - (\Psi(-\nu) - \Psi(0))] x^{-\nu-1}.$$

Durch Anwendung der Regeln 7 bis 10 findet man aus 13. und 14. mit der grössten Leichtigkeit auch die Ableitungen von $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$ und $\operatorname{arctg} x$.

Schliesslich bemerken wir noch, dass sich die aufgestellte Theorie mit derselben Sicherheit auch auf den Fall ausdehnen lässt, wo man den in Rede stehenden Grössen imaginäre Werthe beilegt.

3. Neue Theorie des Rückstandes in electrischen Bindungsapparaten

(1854.)

Vorbemerkung.

Herrn Professor Kohlrausch ist es gelungen, die Bildung des Rückstandes in electrischen Bindungsapparaten scharfen Messungen zu unterwerfen und darauf eine den Beobachtungen genügende Theorie dieser Erscheinung zu gründen, welche in Poggendorff's Annalen⁷ veröffentlicht worden ist. Die Genauigkeit dieser Messungen reizte mich, ein aus andern Gründen wahrscheinliches Gesetz für die Bewegungen der Electricität an denselben zu prüfen; in der Form, welche ihm für diesen Zweck gegeben wurde, ist es auf die Bewegungen der Electricität in allen ponderabeln Körpern anwendbar, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die in Betracht kommenden ponderabeln Körper gegen einander ruhen und keine merklichen thermischen und magnetischen (oder voltinductorischen) Wirkungen und Einflüsse stattfinden. Behufs unbeschränkter Anwendbarkeit bedarf es noch einer Umarbeit und Ergänzung, mit welcher ich mich an einem andern Orte beschäftigen werde.

Im folgenden Aufsatze, welcher einem Schreiben an Herrn Professor Kohlrausch entnommen ist, ist diese neue Theorie des electrischen Rückstandes indess nicht selbstständig, sondern im Anschlusse an seine Theorie entwickelt worden; ich war bestrebt, jene Theorie, nicht geradeswegs die Erscheinungen auf sie zurückzuführen. Ich habe daher die von Herrn Professor Kohlrausch in seiner Abhandlung gebrauchten Begriffe: electrisches Moment der isolirenden Wand, Spannung, Gesamtladung, disponible Ladung, Rückstand, überall durch die hier zu Grunde gelegten Begriffe ausgedrückt und auch sonst in mancher Hinsicht die dortige Betrachtungsweise berücksichtigt.

2. Das der Rechnung zu Grunde gelegte Gesetz.

Es bezeichne t die Zeit, x, y, z rechtwinklige Coordinaten, q die Dichtigkeit der Spannungselectricität zur Zeit t im Punkte (x, y, z) , u den 4π ten Theil des (Gauss'schen) Potentials aller wirkenden electrischen Massen im Punkte (x, y, z) zur Zeit t , also die Grösse

$$\frac{1}{4\pi} \int \frac{q' dx' dy' dz'}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}},$$

wenn $q dx' dy' dz'$ die Spannungselectricität des Elements $dx' dy' dz'$ zur Zeit t bedeutet. Man hat dann

$$\frac{d^2u}{dx^2} + \frac{d^2u}{dy^2} + \frac{d^2u}{dz^2} = -q.$$

Die hier anzuwendenden Gesetze für die Bewegungen der Electricität im Innern eines homogenen ponderabeln Körpers unter den erwähnten Umständen sind nun folgende:

I. Die electromotorische Kraft im Punkte (x, y, z) zur Zeit t setzt sich zusammen aus zwei Bestandtheilen, aus einem dem Coulomb'schen Gesetz gemässen, dessen Componenten proportional

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z}$$

⁷Bd. 91. pag. 56.

sind, und einem andern, dessen Componenten proportional sind

$$-\frac{\partial q}{\partial x}, \quad -\frac{\partial q}{\partial y}, \quad -\frac{\partial q}{\partial z},$$

so dass ihre Componenten gleichgesetzt werden können

$$-\frac{\partial u}{\partial x} - \beta\beta\frac{\partial q}{\partial x}, \quad -\frac{\partial u}{\partial y} - \beta\beta\frac{\partial q}{\partial y}, \quad -\frac{\partial u}{\partial z} - \beta\beta\frac{\partial q}{\partial z},$$

wo $\beta\beta$ nur von der Natur des ponderabeln Körpers abhängt.

II. Die Stromintensität ist der electromotorischen Kraft proportional, also

$$\xi = -\alpha\alpha\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \beta\beta\frac{\partial q}{\partial x}\right), \quad \eta = -\alpha\alpha\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \beta\beta\frac{\partial q}{\partial y}\right), \quad \zeta = -\alpha\alpha\left(\frac{\partial u}{\partial z} + \beta\beta\frac{\partial q}{\partial z}\right),$$

wenn α eine von der Natur des ponderabeln Körpers abhängige Constante und ξ, η, ζ die Componenten der Stromintensität sind.

Mit Zuziehung der phoronomischen Gleichung

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \zeta}{\partial z} = 0$$

erhält man daher für u die Gleichungen

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -q$$

und

$$\frac{\partial q}{\partial t} = \alpha\alpha\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\right) + \alpha\alpha\beta\beta\left(\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 q}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 q}{\partial z^2}\right),$$

oder, wenn man die Länge β und die Zeit α zur Einheit nimmt,

$$q + \frac{\partial q}{\partial t} + \Delta\Delta u = 0, \quad \text{und} \quad q + \frac{\partial u}{\partial t} + \Delta\Delta u = 0.$$

Dies giebt für u eine partielle Differentialgleichung, welche in Bezug auf t vom ersten, in Bezug auf die Raumcoordinaten vom vierten Grade ist, und um von einem bestimmten Zeitpunkte an u allenthalben im Innern des ponderabeln Körpers zu bestimmen, werden ausser dieser Gleichung noch eine Bedingung in jedem Punkte desselben für die Anfangszeit und für die Folge in jedem Oberflächenpunkte zwei Bedingungen erforderlich sein.

3. Plausible Auffassung dieses Gesetzes.

Das Bewegungsgesetz der Electricität ist unter voriger Nummer durch Begriffe, welche jetzt in der Lehre von der Electricität gebräuchlich sind, ausgedrückt worden. Diese Auffassung desselben ist jedoch einer Umarbeitung fähig, durch welche, wie es scheint, ein etwas treueres und vollständigeres Bild des wirklichen Zusammenhangs gewonnen wird.

Statt eine Ursache anzunehmen, welche im Punkte (x, y, z) die positive Electricität in den Richtungen der drei Axen mit den Kräften $-\frac{\partial u}{\partial x}, -\frac{\partial u}{\partial y}, -\frac{\partial u}{\partial z}$ und die negative mit den entgegengesetzten treibt, kann man auch eine Ursache annehmen, welche im Punkte (x, y, z) die positive Electricität mit der Intensität $\beta\beta q$ zu vermindern und die negative zu

vermehrten strebt, und diese Ursache kann man in einem Widerstreben des Ponderabile gegen das Enthalten von Spannungselectricität oder den electricischen Zustand suchen.

Ebenso kann man auch die electromotorische Kraft, deren Componenten $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial z}$ sind, durch eine Ursache von der Intensität u im Punkte (x, y, z) ersetzen, welche die Dichtigkeit der Electricität gleichen Zeichens zu vermindern und die der entgegengesetzten zu vermehren strebt.

Es ist aber dann, um der Grösse q eine reelle Bedeutung zu geben, nicht nöthig zweierlei Electricitäten anzunehmen und $q \, dx \, dy \, dz$ als den Ueberschuss der positiven Electricität des Elements $dx \, dy \, dz$ über die negative zu betrachten, sondern man kann im Wesentlichen zu der Franklin'schen Auffassung der electricischen Erscheinungen zurückkehren, am einfachsten wohl durch folgende Annahme:

Das Ponderabile, welches Sitz der Electricität ist, erfüllt den Raum stetig und mit gleichmässiger electricischer Capacität, welche seinem Leitungswiderstande umgekehrt proportional ist, und von welcher die Dichtigkeit der wirklich in ihm enthaltenen Electricität immer nur um einen unmerklich kleinen Bruchtheil abweicht. Bei überschüssiger oder fehlender Electricität (positiver oder negativer Spannungselectricität) geräth das Ponderabile in einen positiv oder negativ electricischen Zustand, vermöge dessen es die Dichtigkeit der in ihm enthaltenen Electricität zu vermindern oder zu vermehren strebt und zwar mit einem Drucke, welcher gleich ist der Dichtigkeit seiner Spannungselectricität, q , multiplicirt in einen von der Natur des Ponderabile abhängigen Factor (seine antelectricische Kraft). Ihrerseits geräth bei auftretender Spannungselectricität die Electricität in einen Zustand, Spannung, vermöge dessen sie ihre Dichtigkeit zu vermindern (oder bei negativer Spannung zu vermehren) strebt und dessen Grösse u in jedem Augenblicke abhängt von sämmtlichen Massen Spannungselectricität nach der Formel

$$\frac{1}{4\pi} \int \frac{q' \, dx' \, dy' \, dz'}{\sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}}$$

oder auch mittelst des Gesetzes

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -q$$

und der Bedingung, dass u in unendlicher Entfernung von Spannungselectricität unendlich klein bleibt. Die Electricität bewegt sich gegen die ponderabeln Körper mit einer Geschwindigkeit, welche in jedem Augenblicke der aus diesen Ursachen hervorgehenden electromotorischen Kraft gleich ist.

Uebrigens müssen diese Bewegungsgesetze der Electricität, wenn deren Verhältniss zu Wärme und Magnetismus in Rechnung gezogen werden soll, vorbemerktmassen selbst noch abgeändert und umgeformt werden, und dann wird eine veränderte Auffassung dieser Erscheinungen nöthig.

4. Behandlung des Problems der Rückstandsbildung. Ausdruck der zu bestimmenden Grössen durch das Potential.

Indem ich mich nun zur Untersuchung der Rückstandsbildung wende, beschäftige ich mich zunächst damit, die zu bestimmenden Grössen durch das Potential, oder vielmehr, was die Rechnung vereinfacht, durch die ihm proportionale Function u auszudrücken. Zu grösserer Bequemlichkeit für die an abstracte Grössenbetrachtung minder gewöhnten Physiker habe ich das Potential als das Maass einer Ursache, Spannung, betrachtet, welche die Dichtigkeit der Electricität im Punkte (x, y, z) zu vermindern strebt, und diese im Punkte $(x, y, z) = u$, also die Componenten der durch sie bewirkten electromotorischen Kraft

$$\frac{\partial u}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial z}$$

gesetzt. Man muss dann als Spannungseinheit die im Innern einer Kugel vom Radius 1 durch auf der Oberfläche vertheilte Electricität von der Dichtigkeit 1 entstehende Spannung annehmen oder als Einheit der electromotorischen Kräfte die von der Masse 4π in der Entfernungseinheit erzeugte.

Zur Vereinfachung der Rechnung ist ferner als Zeiteinheit α , als Längeneinheit β eingeführt worden; macht man die Einheit der electromotorischen Kräfte auf die hier angenommene Weise von der electrischen Masseneinheit abhängig, so sind α und $\beta\beta$ die Maasse für den Leitungswiderstand ($\frac{\text{electromotorische Kraft}}{\text{Stromintensität}}$) und die antelectrische Kraft ($\frac{\text{Druck des Ponderabile}}{\text{Dichtigkeit der Spannungselectricität}}$) des ponderabeln Sitzes.

Zur Discussion der vorliegenden Beobachtungen genügt die Lösung der Aufgabe: die Aenderungen der Spannungselectricität im Innern einer überall gleich dicken homogenen Wand zu bestimmen, wenn die Oberflächen mit vollkommenen Leitern belegt sind, gleiche Mengen entgegengesetzter Electricität empfangen und keine electromotorische Kraft besitzen (keine Contactwirkung in ihnen stattfindet), und ihre Dimensionen gegen die Dicke der Wand als unendlich gross betrachtet werden dürfen (d. h. der Einfluss des Randes und der Krümmung vernachlässigt werden darf).

Legt man den Anfangspunkt der Coordinaten in die Mitte der Wand, die x -Axe auf ihre Oberflächen senkrecht und bezeichnet ihre halbe Dicke durch a , so wird der Ausdruck für die Wand $a > x > -a$, u eine blosse Function von x und folglich

$$q = -\frac{d^2 u}{dx^2}.$$

Die zwischen zwei Werthen von x über der Flächeneinheit enthaltene Electricitätsmenge ist also, geometrisch ausgedrückt, gleich der Differenz zwischen den Tangenten der Neigungen der Spannungscurve, d. h. der Curve, deren Ordinate für die Abscisse x gleich u ist; diese Curve ist gerade, wo keine Spannungselectricität vorhanden ist, nach oben (oder für Orte mit grösseren Ordinaten) convex, wo positive, nach unten, wo negative stetig vertheilt ist, und gebrochen für einen Werth von x , bei welchem eine endliche Menge angehäuft ist.

Die durch eine Ladung erzeugte oder durch eine Entladung vernichtete Spannung wird daher stets dargestellt durch eine Curve von der Form A, d. h. ist sie in den Belegungen u_a , u_{-a} und folglich in der Mitte $= u_0$, so ist sie im Innern

$$u = u_0 + \frac{x}{a}(u_a - u_0).$$

Durch das Eindringen der Electricität ins Innere erhält die Spannungscurve die Form B. Für die Flächeneinheit ist die Gesamtmenge der geschiedenen Electricitäten gleich der Tangente ihrer Neigung in der Mitte

$$\left(\frac{du}{dx}\right)_0;$$

das electrische Moment

$$\int_{-a}^{+a} qx \, dx = u_a - u_{-a} - a \left(\left(\frac{du}{dx}\right)_a + \left(\frac{du}{dx}\right)_{-a} \right) = u_a - u_{-a},$$

also gleich der Spannungsdifferenz der Oberflächen.

Durch eine Entladung wird die Spannung in den Belegungen aufgehoben. Die vernichtete Spannung ist daher in den Belegungen $= u_a, u_{-a}$, im Innern

$$= u_0 + \frac{x}{a}(u_a - u_0),$$

die disponible Ladung für die Flächeneinheit

$$= -(u_a - u_0),$$

die bleibende Spannung im Innern

$$= u - u_0 - \frac{x}{a}(u_a - u_0),$$

und für die Flächeneinheit der verborgene Rückstand

$$A = -\frac{du}{dx} + \frac{u_a - u_0}{a}.$$

- | | | |
|----|--------------------|------------------------|
| B | C | D |
| 1) | Spannungscurve der | Gesammtladung |
| 2) | " | der disponiblen Ladung |
| 3) | " | des Rückstandes. |

Gesamtladung: $= ac$; disponible Ladung: $= ab$; Rückstand: $= bc$.

5. Lösung der Aufgabe im einfachsten Falle, wo kein Ab- und Zufluss durch die Oberflächen stattfindet.

Nach dieser Uebersicht und geometrischen Darstellung der gesuchten Grössen gehe ich zu ihrer Bestimmung durch Rechnung nach dem angegebenen Gesetze über. Ich behandle zunächst den Fall, wo anfangs im Innern keine freie Electricität vorhanden ist, und den Oberflächen auf der Flächeneinheit die Masseneinheit mitgetheilt wird, später aber kein Ab- und Zufluss durch die Oberflächen stattfindet.

Die Bedingungen zur Bestimmung von u sind:

für $t > 0$, $a > x > -a$:

$$\frac{d^4 u}{dx^4} + \frac{d^2 u}{dt^2} + \frac{dq}{dt} = 0, \quad q = -\frac{d^2 u}{dx^2};$$

$f = 0$, $a > x > -a$:

$$\frac{du}{dx} = 0;$$

$t > 0$, $x = \pm a$:

$$\frac{du}{dx} = 0, \quad \frac{d^3 u}{dx^3} + \frac{dq}{dx} = 0,$$

welche letzteren ausdrücken, dass in den Oberflächen sowohl die Electricitätsmengen, als der Durchfluss, und folglich die electromotorische Kraft = 0 sein soll.

Diesen Bedingungen genügen zwei Ausdrücke, der eine für kleine, der andere für grosse Werthe von t brauchbar.

Setzt man zur Abkürzung

$$\int_0^\infty e^{-\lambda^2} d\lambda = \varphi(\lambda)$$

und

$$\chi(\lambda) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \varphi(\lambda),$$

so genügt erstens

$$u - u_a = - \left[1 + \frac{x}{a} \chi \left(\frac{a+x}{2\sqrt{t}} \right) + \frac{a-x}{2a} \chi \left(\frac{a-x}{2\sqrt{t}} \right) \right],$$

zweitens

$$u - u_a = e^{-t} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty \frac{\cos(x\lambda)}{\cos(a\lambda)} e^{-\lambda^2 t} d\lambda - \dots$$

Die hieraus sich ergebenden Bestimmungen sind:

für die Vertheilung der Electricität⁸

$$q = \frac{2}{a} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} e^{-\frac{(2n-1)^2 \pi^2 t}{4a^2}} \cos \left(\frac{(2n-1)\pi x}{2a} \right);$$

für die Gesamtladung

$$L_t = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} e^{-\frac{(2n-1)^2 \pi^2 t}{4a^2}};$$

⁸Vergl. Jacobi. Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum. §§. 61, 63.

für die disponible Ladung

$$D_t = \frac{2}{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\lambda_n} e^{-\lambda_n^2 t} \cos(\lambda_n a);$$

für den Rückstand

$$R_t = \frac{1}{a} \int_0^a q \, dx \cdot L_t = a^{-1} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sum_{n=1}^{\infty} \left[(-1)^{n-1} - \frac{2}{(2n-1)\pi} \right] e^{-\frac{(2n-1)^2 \pi^2 t}{4a^2}} \cdot \sin \frac{(2n-1)\pi}{2}.$$

6. Zurückführung der allgemeinen Aufgabe auf diesen einfachsten Fall.

Um auf diesen einfachsten Fall den Fall zurückzuführen, wo Ab- und Zufluss durch die Oberflächen stattfindet, bezeichne $\chi(t)$ den Ausdruck für die Spannungsdifferenz $u - u_0$ zur Zeit t in diesem einfachsten Falle; für negative Werthe von t sei $\chi(t) = 0$.

Soll nun die Spannung bestimmt werden, welche entsteht, wenn den Oberflächen ($x = \pm a$) zur Zeit 0 die Mengen $\pm f$, darauf zur Zeit t' die Mengen $\pm f'$, zur Zeit t'' die Mengen $\pm f''$, ... mitgetheilt werden, so hat man

$$u - u_0 = f\chi(t) + f'\chi(t - t') + f''\chi(t - t'') + \dots;$$

denn dieser Werth genügt sämmtlichen zu seiner Bestimmung gegebenen Bedingungen.

Findet ein stetiger Ab- und Zufluss von Electricität statt, so wird

$$u - u_0 = \int_0^t \chi(t - \tau) \, df,$$

wenn $\pm df$ die im Zeitelement $d\tau$ durch die Oberfläche ($x = \pm a$) nach Innen strömende Electricitätsmenge bezeichnet.

Beide Ausdrücke kann man zusammenfassen in dem Ausdruck

$$u - u_0 = \int_0^t \chi(t - \tau) \, df,$$

wenn man durch $\pm df$ die im Zeitelement $d\tau$ auf der Oberfläche ($x = \pm a$) hinzukommende Electricitätsmenge bezeichnet, wo diese dann einen endlichen Werth hat oder $d\tau$ proportional ist, je nachdem eine plötzliche Ladung oder Entladung, oder ein stetiger Ab- oder Zufluss stattfindet.

Aus diesem Ausdrucke für die Spannung folgt

$$q_t = \int_0^t q_{t-\tau} \, df, \quad L_t = \int_0^t L_{t-\tau} \, df, \quad R_t = \int_0^t R_{t-\tau} \, df.$$

In diesen Formeln sind die Zeiten in Theilen von α , die Längen in Theilen von β ausgedrückt; um bekannte Maasse einzuführen, hat man nur a und x durch $\frac{a}{\beta}$, $\frac{x}{\beta}$, t und τ durch $\frac{t}{\alpha}$, $\frac{\tau}{\alpha}$ zu ersetzen.

7. Vergleichung der Rechnung mit den Beobachtungen.

Um nun die erhaltenen Formeln mit dem wirklichen Verlaufe der Rückstandsbildung zu vergleichen, wie er durch die in Poggendorff's Annalen veröffentlichten Messungen des Herrn Professor Kohlrausch mit so grosser Genauigkeit festgestellt worden ist, geht man wohl am zweckmässigsten von der Thatsache aus, dass die Ladungscurve einer Parabel nahe kommt mit allmählich abnehmendem Parameter, d. h. dass die Grösse $\frac{L_0 - L_t}{\sqrt{t}}$ langsam abnimmt.

Zufolge der für L_t abgeleiteten Formel ist $L_0 - L_t$ für sehr kleine Werthe von t proportional $\sqrt{t}$ und zwar

$$\frac{L_0 - L_t}{\sqrt{t}} = \frac{2}{a\sqrt{\pi}}.$$

Zufolge der Messungen muss man annehmen, dass diese Proportionalität näherungsweise noch während der Beobachtungen stattfindet.

Man wird daher die Zeit $\frac{a^2}{\beta\beta}$ in roher Annäherung aus den Beobachtungen bestimmen können, und dann ist in der That

$$\frac{L_t}{L_0 - L_t} \sqrt{t}$$

eine Function, welche mit wachsendem t langsam abnimmt. Nichtsdestoweniger würde $\frac{L_0 - L_t}{\sqrt{t}}$ mit wachsendem t zunehmen, wenn man $\frac{a^2}{\beta\beta}$ einen merklichen Werth beilegte. Dasselbe scheint sich auch zu ergeben, wenn man einen beträchtlichen Verlust durch die Luft annimmt, wenigstens wenn man dafür das Coulomb'sche Gesetz⁹ zu Grunde legt.

Man wird daher für die erste Bearbeitung der Beobachtungen die Zeit α (d. h. den Leitungswiderstand des Glases für die dem Coulomb'schen Gesetz gemässen electromotorischen Kräfte) unendlich gross annehmen, den Verlust durch die Luft vernachlässigen und sich zunächst darauf beschränken müssen, zu untersuchen, in wie weit sich durch gehörige Bestimmung von $\frac{a^2}{\beta\beta}$ den Beobachtungen genügen lässt.

Sobald man sich überzeugt hat, dass die Voraussetzungen der Rechnung näherungsweise richtig sind, ist eine schärfere Vergleichung der Rechnung mit den Beobachtungen verlorene Arbeit, wenn man nicht die Gelegenheit hat, die Quellen der Differenzen zwischen Rechnung und Beobachtung an der Hand der Erfahrung aufzusuchen, um die wegen der Abweichungen von den Voraussetzungen der Rechnung nöthigen Correctionen anzubringen. Da mir nun zu einem experimentellen Studium des Gegenstandes die Mittel fehlen, so musste ich von einer weiteren Verfolgung desselben vorläufig abstehen.

Verhältniss dieses Problems zur Electrometrie und zur Theorie verwandter Erscheinungen.

Die Grösse $\frac{\beta\beta}{a}$, bei der Flasche etwa $\frac{1}{2000}$, giebt den Quotienten $\frac{\text{antelectrische Kraft}}{\text{Leitungswiderstand}}$ des Glases der Flasche in absolutem Maass, wenn als Längeneinheit die Flaschendicke, als Zeiteinheit die Secunde angenommen wird. Für diese Bestimmung ist es gleichgültig, wie man die Einheit der electromotorischen Kräfte von der Einheit der electrischen Massen abhängig macht; die Constanten α und $\beta\beta$ würden aber den Leitungswiderstand und die antelectrische Kraft in einem andern Maasse als dem Weber'schen geben, wo die Einheit der electromotorischen Kräfte durch die dem Ampere'schen Gesetz gemässen Wirkungen der Masseneinheit festgesetzt wird.

⁹Pogg. Ann. Bd. 71. pag. 359; Bd. 72. pag. 374.

Zur Vergleichung des hier untersuchten Falles mit den Erscheinungen an guten Leitern kann die Betrachtung des Beharrungszustandes bei constant erhaltener Spannungsdifferenz der Oberflächen (oder constantem Zufluss) dienen. Für diesen ist

$$\text{die Dichtigkeit im Innern: } q = -\frac{d^2u}{dx^2} = e^x - e^{-x},$$

$$\text{die Spannung: } u = u_0 - e^x + e^{-x} + x(e^x + e^{-x}),$$

die Spannungsdifferenz der Oberflächen:

$$u_a - u_{-a} = 2(a(e^a + e^{-a}) - (e^a - e^{-a})),$$

$$\text{die Gesamtladung: } \left(\frac{du}{dx}\right)_0 = e^a + e^{-a} - 2,$$

$$\text{der Rückstand: } \left(\frac{du}{dx}\right)_0 - \frac{u_a - u_{-a}}{2a} = 2 - \frac{e^a - e^{-a}}{a},$$

die in der Zeiteinheit durchfliessende Menge:

$$-\frac{du}{dx}\bigg|_a = \text{const.},$$

oder gleich proportionalen Grössen, wobei zur Vereinfachung, wie oben, als Zeiteinheit α , als Längeneinheit β , als Spannungseinheit die Spannung im Innern einer Kugel vom Radius 1 bei auf der Oberfläche vertheilter Electricität von der Dichtigkeit 1 angenommen ist.

Besonders wichtig scheint mir die Prüfung des vermutheten Gesetzes und eventuell die Bestimmung der Constanten α und β bei den Gasen zu sein. Die Beobachtungen von Riess¹⁰ und Kohlrausch¹¹, nach welchen für den Electricitätsverlust an die Luft in einem geschlossenen Raume das Gesetz Coulomb's nicht gilt, können vielleicht als Ausgangspunkt für diese Untersuchung dienen und es wäre für dieselben wohl zunächst ein System von Messungen über den Electricitätsverlust im Innern eines einigermaßen regelmässigen geschlossenen Raumes zu wünschen.

¹⁰Pogg. Ann. Bd. 71. pag. 359.

¹¹Pogg. Ann. Bd. 72. pag. 374.

4. Zwei allgemeine Sätze über lineare Differentialgleichungen mit algebraischen Coefficienten

(20. Febr. 1857.)

Bekanntlich lässt sich jede Lösung einer linearen homogenen Differentialgleichung n ter Ordnung in n von einander unabhängige particulare Lösungen linear mit constanten Coefficienten ausdrücken. Sind die Coefficienten der Differentialgleichung rationale Functionen der unabhängigen Veränderlichen x , so wird jeder Zweig der, allgemein zu reden, vielwerthigen Functionen, welche ihr genügen, sich linear mit constanten Coefficienten in n für jeden Werth von x eindeutig bestimmte Functionen ausdrücken lassen, welche freilich dann längs eines gewissen Liniensystems unstetig sein müssen. Sind die Coefficienten aber algebraische Functionen von x , welche sich rational in X und eine μ -werthige algebraische Function von x ausdrücken lassen, so gehört zu jedem Zweige dieser μ -werthigen Function eine Gruppe von n von einander unabhängigen particularen Lösungen, so dass in diesem Falle jeder Zweig einer Lösung der Differentialgleichung als ein linearer Ausdruck von höchstens μn eindeutigen Functionen sich darstellen lässt, welcher aber von ihnen immer nur n einer Gruppe angehörige enthalten wird. Aus diesen Vorbemerkungen wird man, da sich jede nicht homogene lineare Differentialgleichung leicht in eine homogene von der nächst höhern Ordnung verwandeln lässt, ansehen, dass die folgenden Sätze alle linearen Differentialgleichungen mit algebraischen Coefficienten umfassen.

Es seien $y_1, y_2, \dots, y_n$ Functionen von x , welche für alle complexen Werthe dieser Grösse einändrig und endlich sind, ausser für $a, b, c, \dots, g$, und welche durch einen Umlauf des x um einen dieser Verzweigungswerthe in lineare Functionen mit constanten Coefficienten von ihren früheren Werthen übergehen.

Zu ihrer näheren Bestimmung scheide man die Gesammtheit der complexen Werthe in zwei Gebiete durch eine in sich zurücklaufende Linie, die der Reihe nach durch sämtliche Verzweigungswerthe $(g, \dots, c, b, a)$ geht, so dass in jedem dieser Gebiete die Functionen völlig gesondert und stetig verlaufen, und betrachte die Werthe der Functionen in dem auf der positiven Seite dieser Linie liegenden Gebiete als gegeben. Durch einen positiven Umlauf des x um a gehe nun y_1 in $\sum A_i^{(1)} y_i$, y_2 in $\sum A_i^{(2)} y_i$, $\dots$, y_n in $\sum A_i^{(n)} y_i$ über und ähnlich durch einen positiven Umlauf um b : y_1 in $\sum B_i^{(1)} y_i$, etc., durch einen positiven Umlauf um g : y_1 in $\sum G_i^{(1)} y_i$.

Bezeichnet man nun zur Abkürzung das System der n Werthe $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ durch (y) , das System der nn Coefficienten

$$\begin{array}{cccc} A_1^{(1)}, & A_2^{(1)}, & \dots, & A_n^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_1^{(n)}, & A_2^{(n)}, & \dots, & A_n^{(n)} \end{array}$$

durch (A) , das System der B durch (B) , $\dots$, der G durch (G) , und die aus (y) mittelst des Coefficientensystems (A) gebildeten Werthe $\sum A_i^{(1)} y_i, \sum A_i^{(2)} y_i, \dots, \sum A_i^{(n)} y_i$ durch $(A)(y_1, y_2, \dots, y_n) = (A)(y)$, so findet zwischen diesen Coefficientensystemen die Gleichung

$$(G)(F) \cdots (B)(A) = (0) \quad (16)$$

statt, wenn man durch (0) ein Coefficientensystem bezeichnet, das nichts ändert, oder in welchem die Coefficienten der abwärts nach rechts gehenden Diagonale $= 1$ und alle

übrigen = 0 sind. In der That, durchläuft x die ganze Grenzlinie so, dass es sich von einem Verzweigungswerth zum folgenden auf der positiven Seite bewegt, dann aber jedesmal um diesen Verzweigungswerth positiv herum, so gehen die Functionen (y) nach und nach in $(G)(y)$, $(G)(F)(y)$, schliesslich in $(G)(F) \cdots (B)(A)(y)$ über. Es hat aber denselben Erfolg, wenn x die negative Seite der Grenzlinie oder die ganze Begrenzung des negativ erseits liegenden Gebiets durchläuft, wobei $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ ihre früheren Werthe wieder annehmen müssen, da sie in diesem Gebiet allenthalben einändig sind.

Ein System von n Functionen, welches die eben angegebenen Eigenschaften hat, werde durch

$$\begin{pmatrix} a & b & c & \dots & g \\ (A) & (B) & (C) & \dots & (G) \\ & & y & & \end{pmatrix}$$

bezeichnet.

Man betrachte nun als zu einer *Klasse* gehörig sämtliche Systeme, für welche die Verzweigungswerthe und die um sie stattfindenden Substitutionen gegebene der Gleichung (1) genügende Werthe haben, was, wie sich bald ergeben wird, für unendlich viele Systeme der Fall ist. Nach einem leicht zu beweisenden, von Jacobi vielfach angewandten Satze lässt sich jede Substitution, allgemein zu reden, in drei Substitutionen zerlegen, von denen die letzte die inverse der ersten ist, und in der mittleren die Coefficienten ausser der Diagonale sämtlich = 0 sind, so dass durch sie jede von den Grössen, auf welche sie angewandt wird, nur einen Factor erhält. Es lässt sich also z. B.

$$(A) = (a) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} (a)^{-1}$$

setzen, wenn $(a)^{-1}$ die inverse Substitution von (a) bezeichnet. Die Grössen λ werden dabei die n Wurzeln einer durch (A) völlig bestimmten Gleichung n ten Grades. Für den Fall, dass diese Gleichung gleiche Wurzeln hätte, müsste man der mittleren Substitution eine etwas abgeänderte Form geben; wir wollen aber zur Vereinfachung diesen Fall vorläufig ausschliessen und annehmen, dass er bei der Zerlegung der Substitutionen (A) , (B) , $\dots$, (G) nicht eintritt. Die Substitution (a) kann in

$$(a) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

durch Hinzufügung einer nur multiplicirenden Substitution verwandelt werden; in dieser Form aber sind, wie die Gleichungen, durch welche sie bestimmt wird, zeigen, alle möglichen Werthe derselben enthalten.

Durch einen positiven Umlauf des x um a gehen die Werthe der Functionen y aus $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ in $(A)(y)$ über. Die Werthe der durch die Substitution $(a)^{-1}$ aus (y) gebildeten Functionen

$$(z_1, z_2, \dots, z_n) = (a)^{-1}(y)$$

gehen daher aus $(a)^{-1}(y)$ in

$$(a)^{-1}(A)(y) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} (a)^{-1}(y)$$

über, oder $(z_1, z_2, \dots, z_n)$ in $(\lambda_1 z_1, \lambda_2 z_2, \dots, \lambda_n z_n)$.

Wenn eine Function z durch einen positiven Umlauf des x um a den Constanten Factor λ erhält, so kann sie durch Multiplication mit einer Potenz von $(x - a)$ in eine Function verwandelt werden, die in der Umgebung von a einädrig ist. In der That erhält $(x - a)^\mu$ durch einen positiven Umlauf des x um a den Factor $e^{-2\pi i \mu}$; bestimmt man also μ so, dass $e^{-2\pi i \mu} = \lambda$, oder setzt man $\mu = \frac{\log \lambda}{-2\pi i}$, so wird $z(x - a)^{-\mu}$ eine für $x = a$ einädrige Function. Diese Function lässt sich also nach ganzen Potenzen von $(x - a)$ entwickeln, und z selbst nach Potenzen, die sich von μ um ganze Zahlen unterscheiden.

Demnach sind $z_1, z_2, \dots, z_n$ nach Potenzen von $x - a$ entwickelbar, deren Exponenten in der Form

$$\mu_1 + \frac{m}{2\pi i}, \quad \mu_2 + \frac{m}{2\pi i}, \quad \dots, \quad \mu_n + \frac{m}{2\pi i}$$

enthalten sind, wenn m eine ganze Zahl bedeutet. Wir wollen nun annehmen, dass die Functionen y nirgends unendlich von unendlich grosser Ordnung werden, so dass diese Reihen auf der Seite der fallenden Potenzen abbrechen müssen, und bezeichnen durch $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ die niedrigsten Potenzen in diesen Reihen, so dass

$$z_1(x - a)^{-\mu_1}, \quad z_2(x - a)^{-\mu_2}, \quad \dots, \quad z_n(x - a)^{-\mu_n}$$

endliche von 0 verschiedene Werthe haben. Offenbar kann die Differenz zweier von den Grössen $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ nie eine ganze Zahl sein, da die Werthe der Grössen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sämmtlich von einander verschieden sind; dagegen werden die Werthe der entsprechenden Exponenten bei zwei zu derselben Klasse gehörigen Systemen sich nur um ganze Zahlen unterscheiden können, da die Grössen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ durch (A) völlig bestimmt sind. Diese Exponenten können dazu dienen, die verschiedenen Functionensysteme derselben Klasse von einander zu unterscheiden, oder doch sie zu gruppieren, und es genügt, wenn sie bekannt sind, statt (A) die Substitution (a) anzugeben, da die Grössen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ schon durch sie bestimmt sind: wir werden uns daher zur genaueren Charakteristik des Systems $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ des Ausdrucks

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} (a) & (b) & \dots & (g) & \mu_1 & \nu_1 & \dots & \varrho_1 \\ & & & & \mu_2 & \nu_2 & \dots & \varrho_2 \\ & & & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ & & & & \mu_n & \nu_n & \dots & \varrho_n \end{array} \right) x$$

bedienen, in welchem die Grössen der übrigen Verticalreihen für die Verzweigungswerthe $b, \dots, g$ die analoge Bedeutung haben sollen, wie die der ersten für a . Es liegt dabei auf der Hand, dass jedes System als ein specieller Fall eines andern betrachtet werden kann, in welchem die entsprechenden Exponenten zum Theil oder sämmtlich niedriger sind.

Es ist nun nicht schwer zu beweisen, dass zwischen je $n + 1$ Systemen, die derselben Klasse angehören, eine lineare homogene Gleichung mit ganzen Functionen von x als Coefficienten stattfindet. Wir unterscheiden die entsprechenden Grössen in diesen $n + 1$

Systemen durch obere Indices. Nehmen wir an, dass zwischen ihnen die n Gleichungen stattfinden:

$$a_0 y_n + a_1 y_n^{(1)} + \cdots + a_n y_n^{(n)} = 0,$$

so müssen die Grössen $a_0, a_1, \dots, a_n$ proportional sein den Determinanten der Systeme, welche man erhält, wenn man in dem Systeme der $n(n+1)$ Grössen y der Reihe nach die 1te, 2te, $\dots$, $(n+1)$ te Verticalreihe weglässt. Eine solche Determinante $\sum \pm y_1^{(i_1)} y_2^{(i_2)} \cdots y_n^{(i_n)}$ erhält durch einen positiven Umlauf des x um a den Factor $\det(A)$ und kann für $x = a$ nicht unendlich von unendlich grosser Ordnung werden; sie lässt sich also nach um 1 steigenden Potenzen von $x - a$ entwickeln. Um den niedrigsten Exponenten in dieser Entwicklung zu bestimmen, kann diese Determinante in die Form gesetzt werden $\det(a) \cdot \sum \pm z_1^{(i_1)} z_2^{(i_2)} \cdots z_n^{(i_n)}$. In letzterer Determinante ist das erste Glied multiplicirt in eine Function, die für $x = a$ einen endlichen und von 0 verschiedenen Werth hat. Der niedrigste Exponent in der Entwicklung dieses Gliedes nach Potenzen von $(x - a)$ ist daher

$$\mu_1^{(i_1)} + \mu_2^{(i_2)} + \cdots + \mu_n^{(i_n)},$$

und hieraus erhält man durch Permutation der oberen Indices die niedrigsten Exponenten in den Entwicklungen der übrigen Glieder. Offenbar ist der gesuchte Exponent, allgemein zu reden, gleich dem kleinsten von diesen Werthen und jedenfalls nicht kleiner. Bezeichnen wir den kleinsten dieser Werthe durch μ , den ähnlichen Werth für den zweiten Verzweigungswerth durch ν , $\dots$, für den letzten durch ϱ , so ist

$$(x - a)^\mu (x - b)^\nu \cdots (x - g)^\varrho \cdot \det(y_1^{(i_1)} \cdots y_n^{(i_n)})$$

eine Function von x , welche für alle endlichen complexen Werthe einädrig und endlich bleibt und für $x = \infty$ unendlich gross höchstens von der Ordnung $-(\mu + \nu + \cdots + \varrho)$ wird, folglich eine ganze Function höchstens vom Grade $-(\mu + \nu + \cdots + \varrho)$. Diese Grösse muss daher, wenn die Function nicht identisch verschwindet, eine ganze, nicht negative Zahl sein.

Die partiellen Determinanten, welchen die Grössen $a_0, a_1, \dots, a_n$ proportional sind, verhalten sich demnach wie ganze Functionen, multiplicirt mit Potenzen von $x - a, x - b, \dots, x - g$, deren Exponenten in den verschiedenen Determinanten sich um ganze Zahlen unterscheiden. Die Grössen $a_0, a_1, \dots, a_n$ verhalten sich daher selbst wie ganze Functionen und können in den Gleichungen (2) durch diese ersetzt werden, wodurch man den zu beweisenden Satz erhält.

Die Derivirten der Functionen $y_1, y_2, \dots, y_n$ nach x bilden offenbar ein derselben Klasse angehöriges System, denn die Differentialquotienten der Functionen $(A)(y_1, y_2, \dots, y_n)$, in welche $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ durch einen positiven Umlauf des x um a übergehen, sind

$$\frac{d}{dx} \sum A_i^{(1)} y_i = \sum A_i^{(1)} \frac{dy_i}{dx}, \quad \dots,$$

da die Coefficienten in (A) constant sind. Durch diese Bemerkung erhält man aus dem eben bewiesenen Satz die beiden *Corollare*:

“Die Functionen y eines Systems genügen einer Differentialgleichung n ter Ordnung, deren Coefficienten ganze Functionen von x sind.”

und:

“Jedes derselben Klasse angehörige System lässt sich in diese Functionen und ihre $n - 1$ ersten Differentialquotienten linear mit rationalen Coefficienten ausdrücken.”

Mit Hülfe des letzteren lässt sich ein allgemeiner Ausdruck für sämtliche Systeme einer Klasse bilden, aus welchem man sofort sehen würde, dass die Anzahl sämtlicher Systeme, wie oben behauptet, unendlich ist; es soll indess hier nur angewandt werden zur Aufsuchung aller Systeme, in welchen nicht bloss die Substitutionen, sondern auch die Exponenten dieselben sind. Für ein beliebiges System $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ derselben Klasse hat man nach diesem Corollar

$$Y_\nu = \sum_{\mu=0}^{n-1} f_{\nu,\mu}(x) \frac{d^\mu y_1}{dx^\mu},$$

und wenn man diese Werthe in die Ausdrücke der Substitutionen einführt, so erhält man für die Functionen f Bedingungsgleichungen, welche zeigen, dass sie rational von x abhängen und sich durch eine endliche Anzahl von willkürlichen Constanten ausdrücken lassen.

Bernhard Riemann

Gesammelte Mathematische Werke

Seiten 401–450

Inhalt dieser Seiten (Pages 401–450):

XXI.	Zwei allgemeine Sätze über lineare Differentialgleichungen	<i>(Fortsetzung)</i>
XXII.	Commentatio mathematica (Acad. Paris.) Anmerkungen	<i>(Anfang)</i>
XXIII.	Sullo svolgimento del quoziente di due serie ipergeometriche	
XXIV.	Ueber das Potential eines Ringes	<i>(Anfang)</i>

XXI. Zwei allgemeine Sätze über lineare Differentialgleichungen mit algebraischen Coefficienten.

[Seite 401]

diesen Gleichungen sich ergebenden Functionen $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ die verlangten Eigenschaften haben, müssen diese Coefficienten so beschaffen sein, dass für die Verzweigungswerthe ihre Exponenten nicht niedriger sind als die der Functionen y und dass sie für alle anderen Werthe von x endlich bleiben. Diese Bedingungen liefern für die Coefficienten der Potenzen von x in den Functionen h ein System linearer homogener Gleichungen. Die Auflösung dieser Gleichungen ergiebt, wenn sie zur Bestimmung der Coefficienten hinreichen, als allgemeinsten Werth der Functionen (Y) den Werth $\text{const.} \cdot (y)$, wenn dies nicht der Fall ist aber einen Ausdruck von der Form:

$$Y_1 = ky_1 + \lambda y_1^{(1)} + \dots + \lambda_m y_1^{(m)},$$

$$Y_n = ky_n + \lambda y_n^{(1)} + \dots + \lambda_m y_n^{(m)}$$

mit den willkürlichen Constanten $k, \lambda, \dots, \lambda_m$. Von diesen willkürlichen Constanten kann man eine nach der andern als Function der übrigen so bestimmen, dass das Anfangsglied in der Entwicklung einer der Functionen $(\alpha)^{-\mu}(Y), (\beta)^{-\nu}(Y), \dots, (\varrho)^{-\varepsilon}(Y)$ Null wird, wodurch die Exponentensumme jedesmal wenigstens um eine Einheit erhöht wird, so dass schliesslich die Exponentensumme wenigstens um m erhöht und die Anzahl der willkürlichen Constanten um ebenso viel vermindert ist. Auf diese Weise kann man aus jedem

Systeme von n Functionen ein anderes mit höheren Exponenten ableiten, welches durch die Substitutionen und die Exponenten in seiner Charakteristik bis auf einen allen Functionen gemeinschaftlichen constanten Factor völlig bestimmt ist. Es werde nun auch dieser Factor dadurch bestimmt, dass man den Coefficienten der niedrigsten Potenz von $x - a$ in der Entwicklung der ersten von den Functionen $(\alpha)^{-\mu}(y)$ gleich 1 setzt, so dass die Functionen y eindeutig bestimmt sind.¹

Man hat dann nur nöthig scharf aufzufassen, wie sich der Verlauf dieser Functionen mit der Lage eines der Verzweigungswerthe, z. B. a ändert, um zu dem Satz zu gelangen, dass die Grössen y ein ähnliches System von Functionen wie von x auch von a bilden mit den Verzweigungswerthen $b, c, d, \dots, g, x$ und Substitutionen, die aus $(A), (B), \dots, (F)$ zusammengesetzt sind. Für den Fall, dass es unmöglich ist, die Functionen mit a so zu ändern—

[Seite 402]

dern, dass sämmtliche Substitutionen constant bleiben, — weil die Anzahl der in ihnen enthaltenen willkürlichen Constanten geringer ist als die Anzahl der hierfür zu erfüllenden Bedingungen —, kann man das System als einen besonderen Fall eines Systems mit niedrigeren Exponenten betrachten, in welchem für diese speciellen Werthe von $a, b, \dots, g$ die Coefficienten einiger Anfangsglieder in den Reihen für $(\alpha)^{-\mu}(y), (\beta)^{-\nu}(y), \dots, (\varrho)^{-\varrho}(y)$ verschwinden.

In Folge dieses Satzes bilden die Grössen $y_1, y_2, \dots, y_n$ Functionen von p Veränderlichen $a, b, \dots, g, x$, welche, wenn sämmtliche veränderliche Grössen wieder ihre früheren Werthe annehmen, entweder die früheren Werthe wieder erhalten, oder in lineare Ausdrücke ihrer früheren Werthe übergehen, mit einem constanten Coefficientensystem, das aus den $p - 2$ beliebig gegebenen Systemen $(A), (B), (C), \dots, (F)$ irgendwie zusammengesetzt ist.

Auf eine weitere Untersuchung dieser Functionen von mehreren Veränderlichen und der Hilfsmittel, welche der letzte Satz für die Integration linearer Differentialgleichungen bietet, muss ich für jetzt verzichten und bemerke nur noch, dass ein Integral einer algebraischen Function als ein specieller Fall der hier behandelten Functionen betrachtet werden kann, und dass man durch Anwendung dieser Principien auf ein solches Integral auf Functionen geführt wird, welche die allgemeinen ϑ -Reihen mit beliebigen Periodicitätsmoduln darstellen.

Bestimmung der Form der Differentialgleichung.

Es wird die nächste Aufgabe der auf diese Principien zu gründenden Theorie der linearen Differentialgleichungen sein, die einfachsten Systeme jeder Klasse aufzusuchen, und zu diesem Ende zunächst die Form der Differentialgleichung näher zu bestimmen. Verstehen wir unter den obigen Functionen $y, y^{(1)}, \dots, y^{(n-1)}$ jetzt, wie Lagrange, die successiven Derivirten der Function y , so werden die Gleichungen (2) die Differentialgleichung, welcher sie genügen, darstellen. Der Grad der ganzen Functionen, welche für die Coefficienten

¹Bis hierher reicht ein vollständig ausgearbeitetes Manuscript Riemann's. Da wo die kleingedruckten Worte beginnen, steht am Rande die Bemerkung „von hier an nicht richtig“. Ich glaubte aber trotzdem nicht, diese Stelle ganz unterdrücken zu dürfen, weil sie doch die Keime zu einer Weiterentwicklung der darin angedeuteten wichtigen Theorie enthält. — Auf einigen Blättern, welche Entwürfe zu der vorstehenden Abhandlung enthalten, finden sich die Grundzüge zu einer Weiterführung der vorstehenden Untersuchungen, die ich im Nachfolgenden in möglichst unveränderter Form mittheile. W.

gesetzt werden können, bestimmt sich folgendermassen: durch jede Differentiation nach x werden sämtliche Exponenten der Charakteristik, vorausgesetzt dass keiner eine ganze Zahl ist, um die Einheit erniedrigt. Es bleibt daher:

$$\Sigma \pm (y_1 y_2' \cdots y_n^{(n-1)}) (x-a)^{-\mu} (x-b)^{-\nu} \cdots (x-g)^{-\varrho} = X_0$$

allenthalben endlich und einädrig, wenn man

$$\mu = \Sigma_i \mu_i - \frac{n(n-1)}{2}, \quad \nu = \Sigma_i \nu_i - \frac{n(n-1)}{2}, \quad \dots, \quad \varrho = \Sigma_i \varrho_i - \frac{n(n-1)}{2}$$

setzt. Für $x = \infty$ wird, da die Functionen y endlich und einädrig bleiben, $y^{(n)} \cdot y^{(n+1)} \cdots y^{(2n-1)}$ unendlich klein von der Ordnung: $n(n-1)$. Der Grad der ganzen Function X_0 ist daher

$$r = (m-2)s,$$

wenn m die Anzahl der Verzweigungswerthe und s die Summe der Exponenten in der Charakteristik bezeichnet.

[Seite 403]

Wenn in dem System der $n \cdot n + 1$ Grössen y statt der letzten Verticalreihe die $(n+1-t)^{\text{te}}$ weggelassen wird, so muss die aus ihnen gebildete Determinante allgemein zu reden mit um t höheren Potenzen von $x-a$, $x-b$, $\dots$, $x-g$ multiplicirt werden und wird dadurch eine ganze Function vom Grade $r + (m-1)t$ [nur für $t = n$ ist dieser Grad $r + (m-2)n$].

Die Differentialgleichung lässt sich daher, wenn man das Product $(x-a)(x-b) \cdots (x-g)$ durch ω bezeichnet in die Form:

$$X_0 y^{(n)} + \omega X_1 y^{(n-1)} + \cdots + \omega^n X_n y = 0$$

setzen, so dass die Grössen X_t ganze rationale Functionen vom Grade $r + (m-1)t$ sind. [X_n vom Grade $r + (m-2)n$.]

Man untersuche jetzt, welchen Bedingungen die Coefficienten dieser Functionen genügen müssen, damit nur für die Werthe $a, b, \dots, g$ eine Verzweigung eintritt und die Unstetigkeitsexponenten für sie die gegebenen Werthe haben. Eine Verzweigung findet so lange und nur so lange nicht statt, als sich alle Lösungen der Differentialgleichung nach ganzen Potenzen der Aenderung von x entwickeln lassen, oder so lange die Entwicklung von y nach dem Mac-Laurin'schen Satz n willkürliche Constanten enthält. Dies ist immer der Fall, wenn a_n von 0 verschieden ist. Man hat daher nur den Fall $a_n = 0$ zu untersuchen. Setzt man die Differentialgleichung in die Form:

$$b_0 y + b_1 (x-a) y' + b_2 (x-a)^2 y'' + \cdots + b_n (x-a)^n y^{(n)} = 0,$$

so müssen, damit um $x = a$ die Function y den vorgeschriebenen Charakter hat, $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ sämtlich Wurzeln der Gleichung

$$b_0 + b_1 \mu + b_2 \mu(\mu-1) + \cdots + b_n \mu(\mu-1) \cdots (\mu-n+1) = 0$$

sein. Dieses liefert n Bedingungen für die Functionen X und erfordert überdies, da alle Grössen μ endlich und unter einander ungleich sind, dass b_n für $x = a$ nicht 0 sei. Aehnliches gilt für die übrigen Wurzeln $b, c, \dots, g$ von $\omega = 0$. Es kann sonach $X_0 = 0$ mit $\omega = 0$ keine Wurzel gemeinschaftlich haben.

Ist nun (für eine Wurzel von $X_0 = 0$) $a_n = 0$, a_{n-1} aber von 0 verschieden, so können (für diese) $y, y', \dots, y^{(n-2)}$ willkürlich angenommen werden, dann aber ist $y^{(n-1)}$ durch die Differentialgleichung bestimmt, so dass $n-1$ willkürliche Constanten in den $n-1$ ersten Gliedern der Mac-Laurin'schen Reihe auftreten, die letzte Constante aber frühestens im $(n+1)^{\text{ten}}$. Man nehme an, dass sie zuerst im $(n+h)^{\text{ten}}$ erscheine.

[Seite 404]

Eliminirt man dann aber in der h^{ten} Derivirten der Differentialgleichung:

$$a_n y^{(n+h)} + (h a'_n + a_{n-1}) y^{(n+h-1)} + \dots = 0$$

die Grössen $y^{(n+h-1)}, \dots, y^{(n-1)}$ mittelst der vorhergehenden Derivirten und der Differentialgleichung selbst, so müssen die Coefficienten von $y^{(n+h-1)}, y^{(n-2)}, \dots, y$ sämmtlich verschwinden, da diese Grössen von einander unabhängig sind. Man erhält also

$$h a'_n + a_{n-1} = 0,$$

also a'_n von 0 verschieden und ausserdem noch $n-1$ Gleichungen, und es ergeben sich n Bedingungsgleichungen für die Coefficienten der Functionen X .

Man setze nun zweitens voraus, dass a_n und a_{n-1} gleichzeitig verschwinden, a_{n-2} aber endlich bleibt, so dass die $n-2$ ersten Glieder der Mac-Laurin'schen Reihe $n-2$ willkürliche Constanten enthalten, und nehme an, dass die folgende im $(n+h-1)^{\text{ten}}$, die letzte im $(n+h'-1)^{\text{ten}}$ zuerst auftrete. Alsdann ergeben sich, damit $y^{(n+h-2)}$ und $y^{(n+h'-2)}$ von den Werthen der niedrigeren Differentialquotienten unabhängig werden, die Gleichungen:

$$a_n = 0, \quad h a'_n + a_{n-1} = 0, \quad h' a'_n + a_{n-1} = 0,$$

also a'_n und a'_{n-1} von Null verschieden, und ausserdem $2n-3$ Gleichungen. Es werden also zwei Linearfactoren von $a_n = 0$ und man erhält $2n$ Bedingungen für die Functionen X .

Auf ähnliche Art findet man für den Fall wenn a_n, a_{n-1}, a_{n-2} gleichzeitig verschwinden, a_{n-3} aber endlich bleibt, und die drei letzten willkürlichen Constanten zuerst im $(n+h-2)^{\text{ten}}$, $(n+h'-2)^{\text{ten}}$, $(n+h''-2)^{\text{ten}}$ Gliede auftreten, die Bedingungen:

$$a_n = 0, \quad a'_n = 0, \quad a''_n = 0,$$

$$\frac{h \cdot h - 1 \cdot h - 2}{1 \cdot 2 \cdot 3} a'''_n + \frac{h \cdot h - 1}{1 \cdot 2} a''_{n-1} + h a'_{n-2} + a_{n-3} = 0$$

für h, h', h'' und ausserdem noch $3n-6$ Gleichungen, so dass a_n drei und nur drei gleiche Wurzeln hat, und $3n$ Bedingungen erfüllt werden müssen. Durch Verallgemeinerung dieser Schlüsse ergibt sich offenbar, dass jeder Linearfactor von X_0 n Bedingungen zwischen den Functionen X zur Folge hat.²

²Ueber das Verhalten der Differentialgleichung für unendliche Werthe von x findet sich im Riemann'schen Manuscript nichts; die Abzählung der Constanten ist nur angedeutet; das Folgende ist daher so gut als möglich vom Herausgeber ergänzt. Es ist bereits in der ersten Auflage bemerkt, dass es eine wesentliche Vereinfachung zur Folge hat, wenn man einen der Unstetigkeitspunkte ins Unendliche verlegt. Bei dieser Vereinfachung, die hier durchgeführt ist, wird zugleich ein Irrthum vermieden, der bei der Constantenzählung in der ersten Auflage enthalten war, auf den mich Herr Dr. Hilbert aufmerksam gemacht hat, *W*.

[Seite 405]

Wir wollen nun annehmen, dass einer der singulären Punkte, etwa, g im Unendlichen liegt und mit ω die Function $(m-1)^{\text{ten}}$ Grades

$$\omega = (x-a)(x-b)\cdots$$

bezeichnen.

Die aus der Matrix

$$\begin{array}{cccc} y_1 & y_1' & \cdots & y_1^{(n-1)} \\ y_2 & y_2' & \cdots & y_2^{(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_n & y_n' & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{array}$$

gebildeten n -reihigen Determinanten sollen mit $\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_n$ bezeichnet sein, so dass $y_1, y_2, \dots, y_n$ particulare Lösungen der Differentialgleichung sind. Die Function

$$A_k = (x-a)^{-\mu}(x-b)^{-\nu} \cdots \omega^{n-k} \cdot X_{n-k}$$

ist dann, wie schon oben bemerkt, eine ganze rationale Function von x , deren Grad sich aus der Betrachtung des singulären Punktes $x = \infty$ ergibt, nämlich, wenn mit r_t der Grad von X_t bezeichnet wird,

$$r_t = r + (m-2)t,$$

worin

$$r = (m-2) \cdot s$$

der Grad von X_0 und

$$s = \Sigma\mu + 2\Sigma\nu + \cdots + 2\Sigma\rho$$

eine ganze Zahl ist.

Die Differentialgleichung für y lässt sich nun in die Form setzen

$$\omega^n X_0 y^{(n)} + \omega^{n-1} X_1 y^{(n-1)} + \cdots + \omega X_{n-1} y' + X_n y = 0$$

und wegen der r Nullpunkte von X_0 , die nicht zu den singulären gehören sollen, müssen nach dem Obigen rn Bedingungen zwischen den in dieser Differentialgleichung enthaltenen Constanten stattfinden. Es bleiben sonach in der Differentialgleichung an verfügbaren Constanten (da ein Coefficient = 1 gesetzt werden darf)

$$\Sigma_t \{r_t + 1\} - 1 - rn = r + n + (m-2) \frac{n^2 - n}{2}$$

oder für r seinen Werth gesetzt

$$(m-2) \frac{n(n-1)}{2} + s.$$

[Seite 406]

$$(m-2)n^2 + n$$

und in einem beliebigen System von n particularen Integralen $y_1, y_2, \dots, y_n$, wobei noch n^2 Integrationsconstanten hinzutreten,

$$-s + (m - 1)n^2 + n$$

unbestimmte Constanten.

Die Zahl der Coefficienten in den Substitutionen $(A), (B) \dots (G)$ beträgt mn^2 und so viele Bedingungen würden also erfüllt werden müssen, wenn diese Substitutionen beliebig vorgeschrieben sind. Nun sind aber diese Substitutionen an die Bedingung (1) gebunden, so dass n^2 von den erwähnten Bedingungen eine identische Folge der übrigen sind. Es bleiben daher $(m - 1)n^2$ Bedingungen übrig und die Anzahl der nun noch verfügbaren Constanten beträgt $n - s$. Diese Zahl muss mindestens = 1 sein, da ein gemeinschaftlicher Factor bei allen y willkürlich bleiben muss und daraus folgt

$$s \leq n - 1.$$

XXII. Commentatio mathematica, qua respondere tentatur quaestioni ab Illma Academia Parisiensi propositae:

«Trouver quel doit être l'état calorifique d'un corps solide homogène indéfini pour qu'un Système de courbes isothermes, à un instant donné, restent isothermes après un temps quelconque, de telle sorte que la température d'un point puisse s'exprimer en fonction du temps et de deux autres variables indépendantes.»

Et his principiis via sternitur ad majora.

§ 1.

Quaestionem ab ill^{ma} Academia propositam ita tractabimus, ut primum quaestionem generaliore solvamus:

quales esse debeant proprietates corporis motum caloris determinantes et distributio caloris, ut detur systema linearum quae semper isothermae maneant,

deinde

ex solutione generali hujus problematis eos casus seligamus, in quibus proprietates illae evadant ubique eadem, sive corpus sit homogenum.

Pars prima.

§ 2.

Priorem quaestionem ut aggrediamur, considerandus est motus caloris in corpore qualicunque. Si u denotat temperaturam tempore t in puncto (x_1, x_2, x_3) aequationem generalem, secundum quam haec functio u variatur, hujus esse formae constat,

$$\sum_{i,i'} a_{i,i'} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_{i'}} + \sum_i b_i \frac{\partial u}{\partial x_i} = h \frac{\partial u}{\partial t} \quad (\text{I})$$

Qua in aequatione quantitates a conductibilitates resultantes, h calorem specificum pro unitate voluminis, sive productum ex calore specifico in densitatem designant et tanquam functiones pro lubitu datae ipsarum x_1, x_2, x_3 spectantur. Disquisitionem nostram ad eum casum restringimus, in quo conductibilitas eadem est in binis directionibus oppositis ideoque inter quantitates a relatio

$$a_{i,i'} = a_{i',i}$$

intercedit. Praeterea quum calor a loco calidiore in frigidiores migret necesse est, ut forma secundi gradus

$$\sum_{i,i'} a_{i,i'} dx_i dx_{i'}$$

sit positiva.

[Seite 408]

§ 3.

Iam in aequatione (I) in locos coordinatarum rectangularium x_1, x_2, x_3 tres variables independentes quaslibet novas s_1, s_2, s_3 introducamus. Haec transformatio aequationis (I) facillime inde peti potest, quod haec aequatio conditio est necessaria et sufficiens, ut, designante δu variationem quamcunque infinite parvam ipsius u , integrale

$$(A) \quad \iiint \sum h \delta u^2 dx_1 dx_2 dx_3 + \iiint \sum 2h \delta u dx_1 dx_2 dx_3$$

per corpus extensum, solum a valore variationis δu in superficie pendeat. Introductis novis variabilibus haec expressio (A) transibit in

$$\iiint \sum h \delta u^2 ds_1 ds_2 ds_3 + \iiint \sum 2h \delta u ds_1 ds_2 ds_3$$

posito brevitatis causa

$$\beta_{i,i'} = \sum_{\lambda,\mu} a_{\lambda,\mu} \frac{\partial x_\lambda}{\partial s_i} \frac{\partial x_\mu}{\partial s_{i'}}$$

[Seite 409]

Quodsi formarum secundi gradus

$$\sum_{i,i'} a_{i,i'} dx_i dx_{i'} \quad \text{et} \quad \sum_{i,i'} \beta_{i,i'} ds_i ds_{i'}$$

utriusque formae adjunctae sunt A et B , et formae adjunctae

$$\sum_{i,i'} \alpha_{i,i'} dx_i dx_{i'} \quad \text{et} \quad \sum_{i,i'} B_{i,i'} ds_i ds_{i'}$$

invenientur

$$B_{i,i'} = \Delta \cdot \sum_{\lambda,\mu} \alpha_{\lambda,\mu} \frac{\partial s_i}{\partial x_\lambda} \frac{\partial s_{i'}}{\partial x_\mu}$$

et

$$\beta_{i,i'} = \frac{1}{\Delta} \sum_{\lambda,\mu} a_{\lambda,\mu} \frac{\partial x_\lambda}{\partial s_i} \frac{\partial x_\mu}{\partial s_{i'}}$$

ideoque

$$\frac{B}{\beta} = \frac{A}{a} = \Delta^2$$

et

$$\frac{A}{a} = \frac{B}{\beta}.$$

Unde facile perspicitur transformationem aequationis (I) reduci posse ad transformationem expressionis $\sum a_{i,i'} dx_i dx_{i'}$.

Quae quum ita sint, problema nostrum generale hoc modo solvere possumus, ut primum quaeramus, quales esse debeant functiones $\beta_{i,i'}$ et h ipsarum s_1, s_2, s_3 , ut u ab una harum quantitatum non pendere possit. Qua quaestione soluta expressio $\sum \beta_{i,i'} ds_i ds_{i'}$ formari poterit.

Tum ut, datis valoribus quantitatum $a_{i,i'}$ et quantitatis h , inveniamus, num u functio temporis et duarum tantum variabilium fieri possit et quibusnam in casibus, quaerendum est,

an expressio illa $\sum \beta_{i,i'} ds_i ds_{i'}$ in formam datam transformari possit; et hanc quaestionem infra videbimus eadem fere methodo tractari posse, qua Gauss in theoria superficierum curvarum usus est.

Primum igitur quaeramus, quales esse debeant functiones $\beta_{i,i'}$ et h ipsarum s_1, s_2, s_3 , ut u ab una harum quantitatuum non pendere possit. Ut denotationem simpliciore reddamus, quantitates s_1, s_2, s_3 per α, β, γ designemus et formam (2) per

$$\begin{pmatrix} a, & b, & c \\ b', & a', & c' \\ b'', & a'', & c'' \end{pmatrix}$$

si u a γ non pendet, aequatio differentialis erit formae

[Seite 410]

posito

$$du = \frac{\partial u}{\partial \alpha} d\alpha + \frac{\partial u}{\partial \beta} d\beta + \frac{\partial u}{\partial \gamma} d\gamma.$$

Tribuendo ipsi γ valores determinatos diversos ex aequatione (II) inter sex quotientes differentiales ipsius u obtinebuntur aequationes diversae, quarum coefficientes a γ non pendent. Quodsi ex his aequationibus m sunt a se independentes

$$F_1 = 0, \quad F_2 = 0, \dots, \quad F_m = 0,$$

ita ut caeterae omnes ex iis sequantur, aequatio $F = 0$ necesse est pro quovis ipsius γ valore ex his m aequationibus fluat, unde F formae esse debet

$$c_1 F_1 + c_2 F_2 + \dots + c_m F_m,$$

qua in expressione solae quantitates c a γ pendent.

Iam casus singulos, quando m est 1, 2, 3, 4 paulo accuratius examinemus simulque aequationes a γ independentes, in quas aequatio $F = 0$ dissolvitur, in formas simpliciores redigere curemus.

Casus primus, $m = 1$.

Si $m = 1$, in aequatione (II) rationes coefficientium a γ non pendebunt. At introducendo in locum ipsius γ novam variabilem $\int k d\gamma$ semper effici potest, ut h fiat $= 1$, quo pacto coefficientes omnes a γ evadent independentes. Porro introducendo in locos ipsarum α, β novas variables semper effici potest, ut a et b evanescant. Hoc enim eveniet, si expressio $b d\alpha^2 + 2c d\alpha d\beta + a d\beta^2$ (quae quadratum expressionis differentialis linearis esse nequit, si (2) est forma positiva) in formam $m d\alpha' d\beta'$ redigitur et quantitates α', β' tanquam variables independentes sumuntur.

Aequatio igitur differentialis (II) hoc in casu in formam

$$\frac{d^2 u}{d\alpha d\beta} + \frac{du}{d\alpha} + \frac{du}{d\beta} = \frac{du}{dt}$$

redigi potest et in forma (2) a, b tum erunt $= 0$, a' et b' functiones lineares ipsius γ , et c' a γ independens. Caeterum patet temperaturam in hoc casu semper a γ independentem manere, si temperatura initialis sit functio quaelibet solarum α et β .

Casus secundus, $m = 2$.

Si aequatio (II) in duas aequationes a γ independentes discinditur, ope alterius $\frac{du}{dt}$ ex altera ejici potest. Brevitatis causa haec ita exhibeatur

$$(1) \quad \Delta u = 0,$$

illa

$$(2) \quad \Delta' u = \frac{du}{dt}.$$

[Seite 411]

(denotantibus Δ et Δ' expressiones characteristicas ex $d\alpha$ et $d\beta$ conflatas).

Aequationem priorem facile perspicitur mutatis variabilibus independentibus ita transformari posse ut sit vel

$$\Delta = a\partial_\alpha^2 + e\partial_\alpha + f\partial_\beta$$

vel

$$\Delta = \partial_\alpha^2 + e\partial_\alpha + f\partial_\beta$$

vel

$$\Delta = \partial_\alpha,$$

valoribus $e = 0$, $f = 0$ non exclusis.

Quoniam sit

$$0 = \frac{\partial}{\partial t} \Delta u = \Delta \frac{\partial u}{\partial t} = \Delta \Delta' u,$$

ex his duabus aequationibus (1) et (2) sequitur

$$(3) \quad \Delta \Delta' u = 0.$$

Iam duo distinguendi sunt casus, prout haec aequatio (3) vel ex aequatione (1) fluat, (α), sive sit

$$\Delta \Delta' = \Theta \Delta,$$

denotante Θ novam expressionem characteristicam, vel non fluat, (β), novamque aequationem a Δu independentem sistat.

Casum priorem (α) ut saltem pro una forma ipsius Δ perscrutemur, supponamus

$$\Delta = \partial_\alpha \partial_\beta + e\partial_\alpha + f\partial_\beta.$$

Tum $\Delta \Delta' u$ ope aequationis $\Delta u = 0$ ad expressionem reduci potest, quae solas derivationes secundum alteram utram variabilem contineat et coefficientes omnes cifrae aequales habere debeat. Ponamus, quum terminus $d\alpha d\beta$ continens ope aequationis $\Delta u = 0$ ejici possit,

$$\Delta' = a\partial_\alpha^2 + b\partial_\beta^2 + c\partial_\alpha + d\partial_\beta$$

formemusque expressionem

$$\Delta \Delta' - \Delta' \Delta.$$

In hac expressione quum coefficientes ipsarum $d\alpha$, $d\beta$ evanescere debeant, invenitur $a = 0$, $b = 0$, unde si casus speciales $a = 0$, $b = 0$ excluduntur, mutatis variabilibus independentibus effici potest, ut sit $a = 1$, $b = 1$. Tum autem invenitur ponendo coefficientes ipsarum $d\alpha$, $d\beta$ in expressione redacta $\Delta\Delta'$ cifrae aequales

$$\frac{\partial e}{\partial \beta} = \frac{\partial c}{\partial \alpha}, \quad \frac{\partial d}{\partial \alpha} = \frac{\partial f}{\partial \beta},$$

unde poni potest

[Seite 412]

denotantibus m , n functiones ipsarum α , β , quae jam duabus aequationibus differentia- libus sufficere debent, ut coefficientes ipsarum $d\alpha$, $d\beta$ in expressione redacta $\Delta\Delta'$ evanes- cant.

Prorsus simili modo in reliquis casibus specialibus formae simplicissimae ipsarum Δ et Δ' inveniuntur conditioni

$$\Delta\Delta' = \Theta\Delta$$

satisfacientes. Sed huic disquisitioni prolixiori quam difficiliori hic non immoramur.

Caeterum patet in hoc casu temperaturam semper a γ independen- tem manere, si temperatura initialis est functio quaelibet ipsarum α et β aequationi $\Delta u = 0$ satisfaciens; sequitur enim ex aequationibus

$$\Delta u = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \Delta' u,$$

$$0 = \frac{\partial}{\partial t} \Delta u = \Delta \frac{\partial u}{\partial t} = \Delta \Delta' u = \Theta \Delta u = \Theta \frac{\partial u}{\partial t},$$

et proin aequatio $\Delta u = 0$ subsistere pergit, si initio valet et functio u secundum aequatio- nem $\frac{\partial u}{\partial t} = \Delta' u$ variatur. Tum autem satisfit legi motus caloris sive aequationi $F = 0$.

Restat casus specialis alter (β) quando $\Delta\Delta' = 0$ a $\Delta u = 0$ est independens. Ut simul et casus sequentes $m = 3$, $m = 4$ amplectemur, suppositionem generaliore examinemus, praeter aequationem $\Delta u = 0$ haberi aequationem differentialem quamlibet linearem $\Theta u = 0$, ipsum $\frac{\partial u}{\partial t}$ non continentem et a $\Delta u = 0$ independentem.

Si Δ est formae $d\alpha d\beta + e d\alpha + f d\beta$, ope aequationis $\Delta u = 0$ expressio Θ a derivationibus secundum ambas variables liberari potest.

Iam duo distinguendi sunt casus.

Si ex expressione Θ omnes quotientes differentiales secundum alteram utram variabilem ex. gr. secundum β simul excidunt, obtinetur aequatio differentialis solos quotientes differentiales secundum α continens formae

$$\frac{\partial^r u}{\partial \alpha^r} = a \frac{\partial u}{\partial t},$$

sin minus, semper elici poterit aequatio differentialis formae

[Seite 413]

$$(2) \quad \frac{\partial^r u}{\partial \alpha^r} = a \frac{\partial u}{\partial t} + bu,$$

sive solos quotientes differentiales secundum t continens.

Nam in hoc casu expressiones Δu , $\Delta^2 u$, $\Delta^3 u, \dots$, quibus quotientes differentiales ipsius u secundum t aequales sunt, ope aequationum $\Delta u = 0$, $\Theta u = 0$ semper ita transformari possunt, ut solos quotientes differentiales secundum alteram utram variabilem contineant eosque non altiores quam Θu . Quorum numerus quum sit finitus, eliminando aequationem formae (2) obtineri posse manifestum est. Coefficientes a , b utriusque aequationis sunt functiones ipsarum α, β .

Observare conveniet, alteram utram harum aequationum semper valere etiamsi Δ non sit formae $d\alpha d\beta + e d\alpha + f d\beta$. Casus specialis, quando $\Delta = d\alpha + e' d\alpha + f' d\beta$, ad utrumque casum referri potest, quum ope aequationis $\Delta u = 0$ tum ex Θu , tum ex Δu omnes derivationes secundum β ejici possint, quo facto aequatio utriusque formae facile obtinetur. Si $f' = 0$, hic casus sicuti casus $\Delta = \partial_\alpha$ ad casum priorem referendus est.

Iam casum posteriorem accuratius perscrutemur.

Solutionem generalem aequationis (I) e terminis formae $f(t)e^{\lambda t}$ conflatam esse constat, denotante $f(t)$ functionem integram ipsius t et λ quantitatem a t non pendentem, facileque perspicitur hos terminos singulos aequationi (I) satisfacere debere.

Iam demonstrabimus fieri non posse, ut sit λ functio ipsarum x_1, x_2, x_3 .

Sit ht^e terminus summus functionis $f(t)$ distinguanturque duo casus.

1°. Quando λ aut realis est aut formae $\mu + \nu i$ et μ, ν functiones unius variabilis realis α ipsarum x_1, x_2, x_3 , substituendo $u = f(t)e^{\lambda t}$ in parte laeva aequationis (I) coefficiens ipsius $t^{e+2}e^{\lambda t}$ invenitur

$$\sum_{i,i'} a_{i,i'} \frac{\partial \lambda}{\partial x_i} \frac{\partial \lambda}{\partial x_{i'}}.$$

Sed haec quantitas evanescere neque, nisi

[Seite 414]

2°. Quando λ est formae $\mu + \nu i$ et μ, ν sunt functiones independentes ipsarum x_1, x_2, x_3 , quantitates $\mu + \nu i$ et $\mu - \nu i$ pro variabilibus independentibus α et β sumi poterunt continebitque ipsum u praeter terminum $f(t)e^{\alpha t}$ etiam terminum complexum conjugatum $\bar{f}(t)e^{\beta t}$.

[Seite 415]

igitur expressiones ipsarum $\frac{\partial^r u}{\partial \beta^r}$ per quotientes differentiales ipsarum η secundum β ab ipsa α liberae.

Iam casus singulos problematis nostri ad hunc casum pertinentes perlustremus.

[Seite 416]

Casus denique $m = 4$ nullo negotio penitus absolvi potest.

Si enim praeter aequationem $\Delta u = \frac{\partial u}{\partial t}$ habentur tres aequationes inter

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \alpha^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial \beta^2}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial \gamma^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial \alpha}, \quad \frac{\partial u}{\partial \beta}, \quad \frac{\partial u}{\partial \gamma}$$

a γ independentes, manifesto obtinebuntur casus omnes, in quibus u functio temporis et duarum tantum variabilium fieri possit. Unde quaestio prior soluta erit.

Superest ut quaeramus, quando expressio $\sum \beta_{i,i'} ds_i ds_{i'}$ in formam datam $\sum a_{i,i'} dx_i dx_{i'}$ transformari possit.

[Seite 417]

manifesto obtinebuntur casus omnes, in quibus u functio temporis et duarum tantum variabilium fieri possit. Unde quaestio prior soluta erit.

Superest ut quaeramus, quando expressio $\sum \beta_{i,i'} ds_i ds_{i'}$ in formam datam $\sum a_{i,i'} dx_i dx_{i'}$ transformari possit; et hanc quaestionem infra videbimus eandem fere methodo tractari posse, qua Gauss in theoria superficierum curvarum usus est.

[Seite 418]

et differentiando formulam (3)

$$\sum_{\lambda, \mu, \nu} \frac{\partial^3 x_\lambda}{\partial s_i \partial s_{i'} \partial s_{i''}} \frac{\partial x_\lambda}{\partial s_\mu} \frac{\partial x_\mu}{\partial s_\nu}$$

Iam ex his ipsarum

[Seite 419]

(denotante δ' variationem quamcunque). Quo pacto haec expressio invenietur

$$(II) = \sum (a', t'', t''')(ds_1 \delta s'_1 - ds'_1 \delta s_1)(ds_2 \delta s'_2 - ds'_2 \delta s_2).$$

Iam ex hac formatione huius expressionis sponte patet, mutatis

[Seite 420]

tibus gaudentem transformari possit. Nec difficile, ope notionum modo traditarum, est demonstratu, has sex conditiones, ut hoc fieri possit, sufficere. Observandum tamen est ternas tantum esse a se independentes.

Anmerkungen.

[Seite 421]

(1) (Zu Seite 403.) Diese Untersuchungen enthalten die analytischen Ausführungen zu den in der Abhandlung „Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen“ (S. 272) angedeuteten Resultaten. Die Frage ist die nach den Bedingungen der Transformirbarkeit eines Differentialausdrucks zweiter Ordnung

$$\sum_{i,i'} b_{i,i'} \frac{\partial^2 x}{\partial s_i \partial s_{i'}} + \sum_i c_i \frac{\partial x}{\partial s_i}$$

in den Ausdruck $\frac{\partial^2 x}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 x}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 x}{\partial x_n^2}$. Die Coefficienten $b_{i,i'}$, c_i sind als Functionen der s gegeben und es soll entschieden werden, ob und in wie weit die n Functionen x_i der s so bestimmt werden können, dass der Ausdruck in die angegebene Form übergeht. Die Aufgabe wird hier für $n = 3$ behandelt und führt auf ein System von sechs Differentialgleichungen für die Grössen x_i , aus deren Discussion sich die gewünschten Bedingungen ergeben.

Denken wir uns die Grössen x_i als Coordinaten eines Punktes im n -dimensionalen Raume, so stellt das Quadrat des Linienelements desselben die positive quadratische Form

$$\sum_{i,i'} a_{i,i'} dx_i dx_{i'}$$

dar. Die Coefficienten $a_{i,i'}$ sind Functionen der Coordinaten x_i und aus diesen Functionen lassen sich die Ausdrücke bilden:

$$(i, i', i'') = \frac{\partial a_{i,i'}}{\partial x_{i''}} + \frac{\partial a_{i',i''}}{\partial x_i} + \frac{\partial a_{i'',i}}{\partial x_{i'}} - 2 \sum_{\lambda} a_{\lambda,i'} \frac{\partial a_{i,i''}}{\partial x_{\lambda}}.$$

Für den Fall, dass die Form $\sum a_{i,i'} dx_i dx_{i'}$ in $\sum dx_i^2$ transformirt werden kann, muss identisch

$$(i, i', i'') = 0$$

sein. Umgekehrt folgt aus den Gleichungen $(i, i', i'') = 0$, dass die Form in $\sum dx_i^2$ transformirt werden kann, wenn nicht gleichzeitig gewisse aus den Coefficienten a und ihren Ableitungen gebildete Determinanten verschwinden, was nur für ganz specielle Werthe der Variablen eintreten kann.

[Seite 422]

(2) (Zu Seite 404.) Die vollständige Verification der hier aufgestellten Schlussweise erfordert noch die Discussion der Fälle, wo die Form $\sum a_{i,i'} dx_i dx_{i'}$ in eine Summe von weniger als n Quadraten transformirt werden kann. Diese Fälle sind jedoch für die Anwendungen von untergeordneter Bedeutung und führen auf keine wesentlich neuen Resultate.

[Seite 423]

(3) (Zu Seite 405.) Setzen wir nun zur Abkürzung

$$p_{i,i'} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_i \partial x_{i'}},$$

so lässt sich die Gleichung (3') schreiben:

$$\sum_{i,i'} a_{i,i'} p_{i,i'} + \sum_i c_i \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} = 0.$$

Setzt man ferner

$$\psi = \sum_{i,i'} a_{i,i'} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i} \frac{\partial \varphi}{\partial x_{i'}},$$

so folgt hieraus:

$$\Delta \psi = 2 \sum_{i,i'} a_{i,i'} p_{i,i'} + \dots$$

[Seite 424]

(4) (Zu Seite 406.) Setzt man hierin $t_i^{(\lambda)} = p^{(\lambda)} \xi_i^{(\lambda)}$, so ergibt sich für den Punkt O

$$\sum_{\lambda} p^{(\lambda)} \xi_i^{(\lambda)} \xi_{i'}^{(\lambda)} = a_{i,i'}.$$

Aus der ersten derselben erhält man durch Addition von $p^2 \sum a_{i,i'} \xi_i \xi_{i'} = 0$

$$\sum_{\lambda} p^{(\lambda)} (\xi_i^{(\lambda)} \xi_{i'}^{(\lambda)} - \xi_i \xi_{i'}) = a_{i,i'} - p^2 a_{i,i'} = (1 - p^2) a_{i,i'}.$$

[Seite 425]

(5) (Zu Seite 407.) Hierin verschwindet nach (6) das zweite Glied und das dritte ist der Ausdruck für die Abweichung des vorliegenden Raumes von n Dimensionen von der Ebenheit in der durch x_i, dx_i bestimmten Flächenrichtung;

$$\sum_{i,i',i'',i'''} (i, i', i'')(i''', i'', i) dx_i dx_{i'} \delta x_{i''} \delta x_{i'''}$$

oder auch

$$\sum_{\lambda, \mu, \nu, \pi} (\lambda, \mu, \nu)(\pi, \mu, \lambda) \xi_{\lambda} \xi_{\mu} \xi_{\nu} \xi_{\pi}.$$

[Seite 426]

(6) (Zu Seite 408.)

$$(9) \quad 0 = \sum_{\lambda, \mu, \nu, \pi} \frac{\partial^2 a_{i,i'}}{\partial x_{\mu} \partial x_{\nu}} dx_i dx_{i'} \delta x_{\lambda} \delta x_{\mu}.$$

Wir wählen die sonst ganz willkürlichen Differentiale $dx_i, \delta x_i$ so dass

$$(10) \quad ddx_i = 0, \quad d\delta x_i = 0, \quad \delta dx_i = 0, \quad \delta \delta x_i = 0,$$

[Seite 427]

(7) (Zu Seite 409.) gültig sein, wohl aber werden die Bedingungen (I), (III), (IV), (V) für alle Systeme von Coordinaten befriedigt sein, wenn sie es für eines, z. B. das der

Centralkoordinaten, sind. Wenn wir also bei der weiteren Umformung von (II) von keinen andern als den Relationen (I), (III), (IV), (V) Gebrauch machen,

[Seite 428]

(8) (Zu Seite 410.)

$$dd\delta\delta \sum a_{i,i'} dx_i dx_{i'} - 2 dd\delta\delta \sum a_{i,i'} dx_i \delta x_{i'} + dd\delta\delta \sum a_{i,i'} \delta x_i \delta x_{i'} - \left(2 \sum_{i,i',i''} (i, i', i'') dx_i dx_{i'} \delta x_{i''} \right)^2$$

[Seite 429]

(9) (Zu Seite 411.) Ferner haben wir

$$dx_i = r dc_i + c_i dr,$$

also:

$$ds^2 = \sum a_{i,i'} dx_i dx_{i'} = dr^2 + r^2 \sum a_{i,i'} dc_i dc_{i'} = dr^2 + r^2 d\varphi^2,$$

wo $d\varphi^2$ das Quadrat des Linienelements auf der Einheitskugel darstellt.

[Seite 430]

(10) (Zu Seite 412.) Für die Function G ergibt sich hieraus für denselben Punkt

$$\frac{\partial^2 G}{\partial r^2} + \frac{n-1}{r} \frac{\partial G}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \Delta G = 0.$$

Die beiden ersten dieser Gleichungen sind in Folge von (14), (5) befriedigt; aus der dritten ergibt sich

$$k \cdot k' = -\frac{n-1}{r^2} \cdot G \cdot G'.$$

[Seite 431]

(11) (Zu Seite 413.) Setzt man also (was als Specialfall die stereographische Projection der Kugelfläche auf die Ebene enthält)

$$x_i = \frac{2c_i}{1 + \sum c^2},$$

so folgt

$$\cos \vartheta = \frac{1 - \sum c^2}{1 + \sum c^2}.$$

[Seite 432]

(12) (Zu Seite 414.) hervorgegangen sein muss, so kommt unsere Aufgabe auf die folgende zurück:

Es sollen alle Functionen a der Coordinaten x, y, z gefunden werden, die den beiden Differentialgleichungen

$$\Delta a = 0, \quad \Delta' a = 0$$

genügen, wo Δ und Δ' gegebene Differentialausdrücke zweiter Ordnung sind.

[Seite 433]

(13) (Zu Seite 415.) oder durch Substitution von (2)

$$m(12 + p'(my + 16w)\mu^3 p'(m)\mu^3 v^3(m))$$

und da m, β, γ von einander unabhängige Variable sind, so spaltet sich diese Gleichung in die drei folgenden:

[Seite 434]

(14) (Zu Seite 416.) 2. Wenn zwischen den Variablen p, q, r eine von den Coordinaten x, y, z freie Gleichung besteht, so kann r als Function von p, q angesehen werden, und wir haben

$$dr = a dp + b dq,$$

[Seite 435]

(15) (Zu Seite 417.) eine Kugel oder eine in die Ebene abwickelbare Fläche sein müsste. Dies kann nur vereinigt sein, wenn die Fläche eine Ebene ist, und daher a, b Constanten sind, die man bei passender Bestimmung der Richtung der g -Axe gleich Null annehmen kann. Demnach ergibt sich aus (11)

$$\frac{\partial^2 c}{\partial \alpha^2} = -k^2 c, \quad \frac{\partial^2 c}{\partial \beta^2} = -k'^2 c,$$

wo k constant ist. Die Integration dieser letzteren Gleichung ergibt, wenn

$$c = A \cos(k\alpha + k'\beta) + B \sin(k\alpha + k'\beta),$$

[Seite 436]

(16) (Zu Seite 418.) und die Gleichung $\Delta = 0$ liefert

$$k^2 + k'^2 = 0,$$

was sich offenbar widerspricht.

Es bleibt also nur der vierte Fall, in dem p, q, r constant sind, und daher die Schaar der isothermen Flächen aus parallelen Ebenen besteht.

[Seite 437]

(17) (Zu Seite 419.)

$$(3, 1) \quad 2mc^2 \frac{\partial^2 a}{\partial \alpha^2} - 2c \frac{\partial a}{\partial \alpha} \frac{\partial m}{\partial \alpha} - 2m \frac{\partial c}{\partial \alpha} \frac{\partial a}{\partial \alpha} = 0,$$

$$(3, 2) \quad \frac{\partial^2 a}{\partial \alpha^2} \frac{\partial^2 c}{\partial \beta^2} + \frac{\partial a}{\partial \alpha} \frac{\partial c}{\partial \alpha} = 0.$$

Aus (1,2) folgt, dass

[Seite 438]

(18) (Zu Seite 420.) — r, c als neue Variable an Stelle von α, β ein, so erhält man die quadratische Form

$$\frac{1}{c^2}(dr^2 + r^2 d\vartheta^2)$$

[Seite 439]

(19) (Zu Seite 421.) so geht unsere quadratische Form über in

$$\frac{1}{c^2}(dr^2 + r^2 d\vartheta^2).$$

Beziehen wir dieselbe auf Polarcoordinaten, indem wir setzen:

$$\xi = r, \quad k_1 \eta = \varrho \varphi, \quad k_2 \eta + k'_2 \eta' = z,$$

so nimmt sie die Form an:

$$\frac{1}{c^2}(d\xi^2 + d\eta^2 + d\zeta^2).$$

3

³Diese Bearbeitung dieses Fragments, dessen Entstehung in den October 1863 zu setzen ist, verdankt die Akademie der Vorbereitung zur Publication der gesammelten Werke Riemann's durch den Herausgeber. W.

XXIII. Sullo svolgimento del quoziente di due serie ipergeometriche in frazione continua infinita.

[Seite 440]

I.

Avendo una frazione continua infinita della forma

$$\frac{1}{m_1 + \frac{1}{m_2 + \frac{1}{m_3 + \frac{1}{m_4 + \dots}}}}$$

ove si faccia uso delle proprietà caratteristiche esposte nella memoria

[*Beiträge zur Theorie der durch die Gauss'sche Reihe $F(\alpha, \beta, \gamma, x)$ darstellbaren Functionen*].

[Seite 441]

I coefficienti $m_1, m_2, \dots$ sono funzioni di x , e si ha

$$P_n : Q_n = m_1 + \frac{1}{m_2 + \frac{1}{m_3 + \dots + \frac{1}{m_n}}}$$

dove P_n e Q_n sono due funzioni soddisfacenti all'equazione differenziale

$$x(1-x)\frac{d^2y}{dx^2} + [\gamma - (\alpha + \beta + 1)x]\frac{dy}{dx} - \alpha\beta y = 0.$$

[Seite 442]

Si ha

$$P_n = x^{n+\alpha}(1-x)^{\gamma-\alpha} \int_0^1 s^{n+\alpha}(1-s)^{\gamma+n-\alpha}(1-xs)^{\beta-\gamma-n} ds$$

e similmente per Q_n .

[Seite 443]

I moduli delle quantità $s, 1-s, 1-xs$ per valori molto piccoli di questo modulo circondano queste curve i punti 0 e 1 quasi come cerchi concentrici con raggi piccoli. Per valori molto grandi del modulo circondano queste curve il punto $s = -1$ e il punto $s = \infty$. In ambedue i casi le curve consistono quindi

[Seite 444]

Wege von $s = \delta$ bis $s = 1$ aber beständig im Abnehmen begriffen ist. Eine solche Linie kann als Integrationsweg für die von $s = 0$ bis $s = 1$ zu erstreckenden Integrale dienen, durch welche die Functionen P_n, Q_n ausgedrückt werden.

II.

Zur Auffindung eines für $\lim n = \infty$ geltenden asymptotischen Ausdruckes für das erwähnte Integral genügt es, die Summe

[Seite 445]

zu dem Theile des Integrals, welches sich auf einen in der Nähe des Werthes $s = \theta$ liegenden Theil des Integrationsweges bezieht. Aus diesem Grunde genügt es zur Auffindung eines für $\lim n = \infty$ geltenden asymptotischen Ausdruckes für das erwähnte Integral, die Summe

[Seite 446]

Es ist demnach der asymptotische Werth von $\int_0^1 e^{nf(s)} \varphi(s) ds$ gleich

$$\frac{\sqrt{2\pi} \varphi(\theta)}{\sqrt{-n f''(\theta)}}$$

wo θ der Punkt ist, wo $f(s)$ sein Maximum erreicht.

XXIV. Ueber das Potential eines Ringes.

[Seite 447]

Um die Wirkung eines beliebigen Körpers, dessen Theile eine Anziehung oder Abstossung umgekehrt proportional dem Quadrate der Entfernung ausüben, für jeden Punkt ausserhalb dieses Körpers zu bestimmen, hat man bekanntlich das Integral

$$V = \int \frac{dm}{r}$$

zu bilden, worin dm das Mass des in einem Elemente des Körpers enthaltenen ponderabilen Stoffes und r dessen Entfernung vom angezogenen Punkte bedeutet. Dieses Integral genügt bekanntlich der Differentialgleichung

$$(1) \quad \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0.$$

Für den Fall eines Ringes (d. h. eines Körpers, der durch Rotation einer geschlossenen Curve um eine in derselben Ebene liegende, die Curve nicht schneidende Axe entsteht) kann man die Auflösung dieser Differentialgleichung durch ein System von Curven, welche in Meridianschnitten durch den Ring sich als Kreise darstellen, auf folgende Art bewerkstelligen.

[Seite 448]

Die Ausdrücke R convergiren im Allgemeinen nur für gewisse Werthe der Coordinaten x, y, z , so dass für jeden bestimmten Ausdruck der ganze unendliche Raum durch eine Fläche S in zwei Theile zerfällt, in deren einem der Ausdruck convergirt, während er in dem andern divergirt. Die Gesamtheit dieser Flächen S bildet das System der Grenzflächen der verschiedenen Ausdrücke. Für die Punkte auf diesen Grenzflächen selbst ist die Convergenz im Allgemeinen nur bedingt.

Die Function V ist für alle Punkte ausserhalb des Ringes eindeutig bestimmt und genügt überall ausserhalb desselben der Gleichung (1). Für die Punkte im Innern des Ringes kann sie ebenfalls definirt werden, indem man das Integral über den ganzen Raum ausdehnt; sie wird dann im Allgemeinen vieldeutig.

[Seite 449]

Ich suche zunächst statt x, y, z solche Variablen einzuführen, dass eine derselben in der Oberfläche des Ringes einen constanten Werth erhält und zugleich die Differentialgleichung (1) eine möglichst einfache Form behält.

Dies erreicht man durch Einführung von Coordinaten α, β, φ , welche mit den rechtwinkligen Coordinaten durch die Gleichungen zusammenhängen:

$$x = \frac{c \sinh \alpha \cos \varphi}{\cosh \alpha - \cos \beta}, \quad y = \frac{c \sinh \alpha \sin \varphi}{\cosh \alpha - \cos \beta}, \quad z = \frac{c \sin \beta}{\cosh \alpha - \cos \beta}.$$

Hierbei sind die Flächen $\alpha = \text{const.}$ Ringflächen, die aus der Rotation von Kreisen um die z -Axe entstehen, welche die z -Axe nicht schneiden. Die Flächen $\beta = \text{const.}$ sind

Kugelflächen, welche die Ringfläche $\alpha = \text{const.}$ orthogonal schneiden. Die Grösse φ ist die Länge.

Führt man diese Coordinaten ein, so nimmt die Differentialgleichung (1) die Form an:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \alpha^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial \beta^2} + \frac{\sinh \alpha}{\cosh \alpha - \cos \beta} \frac{\partial V}{\partial \alpha} + \frac{\sin \beta}{\cosh \alpha - \cos \beta} \frac{\partial V}{\partial \beta} = 0.$$

[Seite 450]

von φ unabhängig und zwar

$$V = \sqrt{\cosh \alpha - \cos \beta} \cdot R(\alpha) \cdot B(\beta),$$

wo

$$R(\alpha) = AP_{n-\frac{1}{2}}(\cosh \alpha) + BQ_{n-\frac{1}{2}}(\cosh \alpha),$$

$$B(\beta) = C \cos n\beta + D \sin n\beta.$$

Es entsprechen also den Werthen

$$\alpha + \beta - \alpha + \beta$$

verschiedene Lösungen, und die allgemeinste Lösung erhält man durch Summation über alle n .

XXIV. Ueber das Potential eines Ringes. (Schluss)

oder (da $\eta\eta' = \rho^2$, $\log \eta = \log q + \psi$; $\log \eta' = \log q - \psi$) Die partielle Differentialgleichung wird also

$$\frac{\partial^2 V}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial V}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \psi^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0. \quad (0.1)$$

Es ist jetzt leicht, U in eine Reihe von particularen Integralen dieser Differentialgleichung zu entwickeln, welche gleichzeitig für alle Werthe von φ und ψ convergirt oder divergirt. Zu dem Ende hat man nur diesen particularen Integralen die Form zu geben

$$\cos n\varphi, \quad \cos m\psi, \quad \sin n\varphi, \quad \sin m\psi$$

multiplicirt in eine Function P von q , welche der Differentialgleichung

$$\frac{d^2 P}{d(\log q)^2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial \rho}{\partial \log q} \right) \frac{dP}{d \log q} - \left(nn \frac{\partial \varphi^2}{\partial (\log q)^2} + mm \frac{\partial \psi^2}{\partial (\log q)^2} \right) P = 0 \quad (0.2)$$

genügt. Die Bestimmung der willkürlichen Constanten ergibt sich dann durch die Fourier'sche Reihe.

Setzt man

$$t = \frac{d \log q}{d \psi},$$

so wird

$$\frac{dP}{d \log q} = t \frac{dP}{dt}, \quad \frac{d^2 P}{d(\log q)^2} = t \frac{d}{dt} \left(t \frac{dP}{dt} \right) = t^2 \frac{d^2 P}{dt^2} + t \frac{dP}{dt},$$

und die Differentialgleichung (II) geht über in

$$tt(t+1) \frac{d^2 P}{dt^2} + \left(2t + \frac{1}{2}\right) t \frac{dP}{dt} - (mmtt + nn - \frac{1}{4})P = 0. \quad (0.3)$$

Diese Differentialgleichung enthält nur Glieder von zwei verschiedenen Dimensionen in Bezug auf t und lässt sich folglich nach dem seit Euler bekannten Verfahren durch hypergeometrische Reihen integriren. Die Lösung lässt sich auf sehr mannigfaltige Art durch andere hypergeometrische Reihen ausdrücken, nämlich durch solche,

deren viertes Element den Werth oder den reciproken Werth folgender neun Grössen hat,

$$\pm q, \quad \pm q^2, \quad \pm q^4, \quad \pm q^8, \quad \pm q^{16}, \quad \pm 4q, \quad \pm 4q^2, \quad \pm 4q^4, \quad \pm 4q^8,$$

und zwar giebt es nach jeder dieser achtzehn Grössen vier verschiedene Entwicklungen, welche der Differentialgleichung genügen, von denen indess je zwei dieselbe particulare Lösung darstellen. Im Allgemeinen wird man nach der kleinsten dieser Grössen entwickeln.

Entwickelt man nach einer solchen, welche für $q = 1$ verschwindet, so zeigt sich, dass von den beiden particularen Lösungen die eine für $\rho = 1$ unendlich wird. Da V endlich bleiben soll, so muss in dem Werth von P der Coefficient dieser particularen Lösung verschwinden und P der für $\rho = 1$ endlich bleibenden proportional sein. Von den verschiedenen Ausdrücken derselben will ich Einen anzuführen mich begnügen und durch $P^{n,m}$ bezeichnen, nämlich

$$P^{n,m} = (1 - \rho^2)^{n+\frac{1}{2}} \rho^m F\left(n + m + \frac{1}{2}, m + \frac{1}{2}, 2n + 1, 1 - \rho^2\right). \quad (0.4)$$

Da sich in den Werthen der $P^{n,m}$ die ersten drei Elemente der hypergeometrischen Reihen nur durch ganze Zahlen unterscheiden, so lassen sich alle $P^{n,m}$ linear in zwei derselben $P^{0,0}$, $P^{1,0}$ ausdrücken (Comm. Gott. rec. Vol. II^{*}), welche ganze elliptische Integrale erster und zweiter Gattung sind^{**}) und vielleicht am bequemsten nach dem Princip des arithmetisch-geometrischen Mittels, d.h. durch wiederholte Transformationen zweiter Ordnung, gefunden werden.

^{*}) Gauss' Werke Bd. III. S. 131. W.

^{**}) Sämmtliche $P^{n,m}$ lassen sich durch ganze elliptische Integrale im weitem Sinne ausdrücken.

XXV. Verbreitung der Wärme im Ellipsoid.

Bei dem Problem der Wärmebewegung in einem homogenen isotropen Körper handelt es sich nach der Theorie von Fourier um die Integration der partiellen Differentialgleichung

$$a^2 \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}, \quad (0.5)$$

worin a^2 eine positive Constante ist (das Verhältniss der Leitungsfähigkeit zu dem Product aus der Dichtigkeit und der specifischen Wärme). Es ist die Function u so zu bestimmen, dass sie im Innern eines gegebenen Körpers der Differentialgleichung (0.5) genügt, dass sie für $t = 0$ stetig in eine gegebene Function der Coordinaten (den Anfangszustand) übergeht, und dass sie ausserdem an der Oberfläche noch einer Bedingung genügt, z. B. in eine gegebene Function übergeht.

Handelt es sich um einen von einem Ellipsoid mit den Halbachsen $\sqrt{\alpha}$, $\sqrt{\beta}$, $\sqrt{\gamma}$ begrenzten Körper, so kann man elliptische Coordinate einführen, indem man unter λ , μ , ν die drei Wurzeln der cubischen Gleichung

$$\frac{x^2}{\alpha - s} + \frac{y^2}{\beta - s} + \frac{z^2}{\gamma - s} = 1 \quad (0.6)$$

versteht, mit der Grenzbestimmung

$$-\infty < \lambda < \gamma < \mu < \beta < \nu < \alpha,$$

so dass an der Oberfläche des gegebenen Ellipsoids $\lambda = 0$ ist.

Die Transformation der Gleichung (0.5) wird am leichtesten nach der Methode von Jacobi ausgeführt. Man erhält durch Differentiation von (0.6)

$$\frac{x^2}{(\alpha - s)^2} + \frac{y^2}{(\beta - s)^2} + \frac{z^2}{(\gamma - s)^2} = 0, \quad (0.7)$$

$$\frac{dx^2}{\alpha - \lambda} + \frac{dy^2}{\beta - \lambda} + \frac{dz^2}{\gamma - \lambda} = \frac{ds^2}{(\alpha - s)(\beta - s)(\gamma - s)}, \quad (0.8)$$

wenn zur Abkürzung

$$(\alpha - s)(\beta - s)(\gamma - s) = f(s) \quad (0.9)$$

gesetzt ist. Ferner aus (0.7) und (0.8)

$$\left(\frac{\partial s}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial s}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial s}{\partial z}\right)^2 = \frac{1}{f(s)}. \quad (0.10)$$

Darnach erhält man für das Volumelement $d\tau$ in den neuen Coordinaten den Ausdruck

$$d\tau = \frac{1}{8\sqrt{-f'(\lambda)f'(\mu)f'(\nu)}} d\lambda d\mu d\nu,$$

und die Umformung des über einen beliebigen Raum erstreckten Integrals

$$\iiint \left\{ \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right\} d\tau.$$

Indem man von diesem Integral in beiden Formen die erste Variation bildet, erhält man die gesuchte Umformung

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} &= 4\sqrt{f'(\lambda)} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left(\sqrt{f'(\lambda)} \frac{\partial u}{\partial \lambda} \right) \\ &\quad + 4\sqrt{f'(\mu)} \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\sqrt{f'(\mu)} \frac{\partial u}{\partial \mu} \right) + 4\sqrt{f'(\nu)} \frac{\partial}{\partial \nu} \left(\sqrt{f'(\nu)} \frac{\partial u}{\partial \nu} \right), \end{aligned}$$

und durch Einführung der Bezeichnung (0.8), (0.9) geht die Differentialgleichung (0.5) in folgende über

$$\begin{aligned} -(\mu - \nu)(\nu - \lambda)(\lambda - \mu) \frac{\partial u}{\partial t} &= \\ 4a^2 \left\{ (\mu - \nu) \sqrt{f'(\lambda)} \frac{\partial}{\partial \lambda} \left(\sqrt{f'(\lambda)} \frac{\partial u}{\partial \lambda} \right) + (\nu - \lambda) \sqrt{f'(\mu)} \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\sqrt{f'(\mu)} \frac{\partial u}{\partial \mu} \right) \right. \\ &\quad \left. + (\lambda - \mu) \sqrt{f'(\nu)} \frac{\partial}{\partial \nu} \left(\sqrt{f'(\nu)} \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) \right\}. \quad (0.11) \end{aligned}$$

Um particulare Lösungen dieser Gleichung aufzusuchen, setze man

$$u = e^{-a^2 g t} u_\lambda u_\mu u_\nu, \quad (0.12)$$

worin g eine willkürliche Constante ist, und nehme u_λ nur von λ , u_μ nur von μ und u_ν nur von ν abhängig an. So ergibt sich, wenn

$$U_\lambda = \frac{u_\lambda}{\sqrt{f'(\lambda)}} \quad (0.13)$$

gesetzt wird, so dass U_λ nur von λ abhängig ist, und U_μ , U_ν die entsprechende Bedeutung haben

$$g(\mu - \nu)(\nu - \lambda)(\lambda - \mu) = (\mu - \nu)U_\lambda + (\nu - \lambda)U_\mu + (\lambda - \mu)U_\nu. \quad (0.14)$$

Wenn man diese Gleichung zweimal nach λ differentiirt, so folgt

$$-2g = \frac{\partial^2 U_\lambda}{\partial \lambda^2},$$

oder

$$U_\lambda = -g\lambda^2 - h\lambda - k$$

und ebenso

$$U_\nu = -g\nu^2 - h\nu - k, \quad U_\mu = -g\mu^2 - h\mu - k,$$

wenn h und k willkürliche Constanten sind, die, damit (0.14) erfüllt sei, in allen drei Formeln die gleichen sein müssen. Es ergibt sich also aus (0.13) für u_λ eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung

$$\frac{\partial^2 u_\lambda}{\partial \lambda^2} + \frac{1}{2} \frac{f''(\lambda)}{f'(\lambda)} \frac{\partial u_\lambda}{\partial \lambda} + (g\lambda^2 + h\lambda + k)u_\lambda = 0$$

oder in rationaler Form

$$f(\lambda) \frac{\partial^2 u}{\partial \lambda^2} + \frac{1}{2} f'(\lambda) \frac{\partial u}{\partial \lambda} + (g\lambda^2 + h\lambda + k)u = 0 \quad (0.15)$$

und die gleiche Differentialgleichung ergibt sich auch für u_μ , u_ν , nur dass die Variable λ durch μ oder ν zu ersetzen ist.^{*)}

^{*)} Dieser Untersuchung liegt ein Blatt aus Riemann's Nachlass zu Grunde, das die Zeitbestimmung Ostern bis Pfingsten 1856 trägt. Die Differentialgleichung (0.15), auf die hier das Problem zurückgeführt ist, geht in die sogenannte Lamésche über, wenn $g = 0$ gesetzt wird. Wir haben hier ein Beispiel einer Differentialgleichung, deren Integral in dem singulären Punkt $\lambda = \infty$ sich, um uns eines neuerdings gebräuchlichen Ausdrucks zu bedienen, nicht regulär verhält. W.

XXVI. Gleichgewicht der Electricität auf Cylindern mit kreisförmigem Querschnitt und parallelen Axen.

Conforme Abbildung von durch Kreise begrenzten Figuren.)*

Das Problem, die Vertheilung der statischen Electricität oder der Temperatur im stationären Zustand in unendlichen cylindrischen Leitern mit parallelen Erzeugenden zu bestimmen, vorausgesetzt, dass im ersteren Fall die vertheilenden Kräfte, im letzteren die Temperaturen der Oberflächen constant sind längs geraden Linien, die zu den Erzeugenden parallel sind, ist gelöst, sobald eine Lösung der folgenden mathematischen Aufgabe gefunden ist:

In einer ebenen, zusammenhängenden, einfach ausgebreiteten, aber von beliebigen Curven begrenzten Fläche S eine Function u der rechtwinkligen Coordinaten x, y so zu bestimmen, dass sie im Innern der Fläche S der Differentialgleichung genügt:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad (0.16)$$

und an den Grenzen beliebige vorgeschriebene Werthe annimmt.

Diese Aufgabe lässt sich zunächst auf eine einfachere zurückführen:

Man bestimme eine Function $\zeta = \xi + \eta i$ des complexen Arguments $z = x + yi$, welche an sämtlichen Grenzcurven von S nur reell ist, in je einem Punkt einer jeden dieser Grenzcurven unendlich von der ersten Ordnung wird, übrigens aber in der ganzen Fläche S endlich und stetig bleibt. Es lässt sich von dieser Function leicht zeigen,

*) Von dieser und den folgenden Abhandlungen liegen ausgeführte Manuscripte von Riemann nicht vor. Sie sind aus Blättern zusammengestellt, welche ausser wenigen Andeutungen nur Formeln enthalten.

Der zweite Theil der Ueberschrift bezeichnet wohl besser die allgemeine Bedeutung des Fragmentes, als die in der ersten Auflage allein genannte specielle Anwendung. W.

dass sie jeden beliebigen reellen Werth auf jeder der Grenzcurven ein und nur einmal annimmt, und dass sie im Innern der Fläche S jeden complexen Werth mit positiv imaginärem Theil $n\mu$ annimmt, wenn n die Anzahl der Grenzcurven von S ist, vorausgesetzt, dass bei einem positiven Umgang um eine der Grenzcurven ξ von $-\infty$ bis $+\infty$ geht.

Durch diese Function erhält man auf der obern Hälfte der Ebene, welche die complexe Variable ζ repräsentirt, eine n fach ausgebreitete Fläche T , welche ein conformes Abbild der Fläche S liefert, und welche durch die Linien begrenzt ist, die in den n Blättern mit der reellen Axe zusammenfallen. Da die Flächen S und T gleich vielfach zusammenhängend sein müssen, nämlich n fach, so hat T in seinem Innern $2n - 2$ einfache Verzweigungspunkte (vgl. Theorie der Abel'schen Functionen, Art. 7, S. 113) und unsere Aufgabe ist zurückgeführt auf die folgende:

Eine wie T verzweigte Function des complexen Arguments ζ zu finden, deren reeller Theil u im Innern von T stetig ist und an den n Begrenzungslinien beliebige vorgeschriebene Werthe hat.

Kennt man nun eine wie T verzweigte Function $\omega = k + g\iota$ von ζ , welche in einem beliebigen Punkt ε im Innern von T logarithmisch unendlich ist, deren imaginärer Theil g ausser in ε in T stetig ist und an der Grenze von T verschwindet, so hat man nach dem Green'schen Satze (Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse Art. 10, S. 18 ff.):

$$u = \frac{1}{2\pi} \int u \, dg, \quad (0.17)$$

wo die Integration über die n Begrenzungslinien von T erstreckt ist.

Die Function g aber lässt sich auf folgende Art bestimmen. Man setze die Fläche T über die ganze Ebene fort, indem man auf der unteren Hälfte (wo ζ einen negativ imaginären Theil besitzt) das Spiegelbild der obern Hälfte hinzufügt. Dadurch erhält man eine die ganze Ebene n fach bedeckende Fläche, welche $4n - 4$ einfache Verzweigungspunkte besitzt und welche sonach zu einer Classe algebraischer Functionen gehört, für welche die Zahl $p = n - 1$ ist. (Theorie der Abel'schen Functionen Art. 7 und 12, S. 113, 119.)

Die Function

XXVII. Beispiele von Flächen kleinsten Inhalts bei gegebener Begrenzung.

I.

Es soll die Fläche vom kleinsten Inhalt bestimmt werden, welche begrenzt ist von drei Geraden, die sich in zwei Punkten schneiden, so dass die Fläche zwei Ecken in ihrer Begrenzung und einen ins Unendliche verlaufenden Sector besitzt.

Die Winkel, welche die drei geraden Linien mit einander bilden, seien $\alpha\pi$, $\beta\pi$, $\gamma\pi$. Auf der Kugel wird die gesuchte Fläche abgebildet durch ein sphärisches Dreieck, dessen Winkel $\alpha\pi$, $\beta\pi$, $\gamma\pi$ sind, so dass $\alpha + \beta + \gamma > 1$ ist.

Es mögen mit a , b , c die Punkte bezeichnet werden, welche in der Ebene der complexen Variablen t den beiden Ecken und dem ins Unendliche verlaufenden Sector entsprechen. (Ueber die Fläche vom kleinsten Inhalt, Art. 13, S. 314.) Dann hat man:

$$du = \text{const.} \cdot \frac{dt}{\sqrt{(t-a)(t-b)(t-c)}},$$

oder

$$u = \text{const.} \cdot \log \frac{\sqrt{t-a} - \sqrt{t-b} \sqrt{\frac{c-a}{c-b}}}{\sqrt{t-a} + \sqrt{t-b} \sqrt{\frac{c-a}{c-b}}}.$$

Nimmt man, was freisteht, $a = 0$, $b = \infty$, $c = 1$ an, so folgt hieraus:

$$du = \text{const.} \cdot \frac{dt}{(1-t)\sqrt{t}}, \quad u = \text{const.} \cdot \log \frac{1+\sqrt{t}}{1-\sqrt{t}}.$$

*) Für das erste dieser Beispiele findet sich auf einem einzelnen Blatt in Riemann's Nachlass das Resultat kurz aber vollständig angegeben. Bezüglich des zweiten liegt nur eine Bemerkung vor, in der nicht mehr als die Möglichkeit der Lösung ausgesprochen ist. Für die Ausführung ist daher der Herausgeber verantwortlich. Einige besondere Fälle des letzteren Problems sind von H. A. Schwarz behandelt. (Bestimmung einer speciellen Minimalfläche. Berlin 1871.)

und die letztere Constante hat den Werth $\gamma\pi$, wenn C den kürzesten Abstand der beiden einander nicht schneidenden Linien bedeutet.

Setzt man nun nach Art. 14 der genannten Abhandlung (S. 316)

$$\eta_1 = e^{\alpha X\iota}, \quad \eta_2 = e^{\beta Y\iota}, \quad \eta_3 = e^{\gamma Z\iota},$$

so sind diese Functionen in allen Punkten der t -Ebene, ausser 0, ∞ , 1 endlich und ein-
 ändrig, und wenn man das Verhalten dieser Functionen in der Umgebung der singulären
 Punkte nach der an erwähnter Stelle (S. 317) angegebenen Methode untersucht, so erkennt
 man, dass $\eta_1^{\frac{1}{\alpha}}, \eta_2^{\frac{1}{\beta}}$ zwei Zweige der Function

$$t^{\frac{1}{4}}(1+t)^{-\frac{1}{2}}(1-t)^{\frac{1}{4}}, \quad t^{\frac{1}{4}}(1+t)^{-\frac{1}{2}}(1-t)^{-\frac{1}{4}}$$

sind, und für η_3 hat man den Quotienten zweier Zweige dieser Function zu setzen.

II.

Die gesuchte Fläche vom kleinsten Inhalt sei begrenzt von zwei in parallelen Ebenen ge-
 legenen geradlinigen Polygonen ohne einspringende Ecken und mit je einem Umlauf. In
 diesem Falle wird die Fläche zweifach zusammenhängend sein, und kann erst durch einen
 Querschnitt in eine einfach zusammenhängende verwandelt werden. Die Abbildung der
 Minimalfläche auf der Kugel wird begrenzt sein durch zwei Systeme von Bögen grösster
 Kreise, deren Ebenen senkrecht stehen auf den Ebenen der Grenzpolygone, und welche
 demnach in zwei diametral entgegengesetzten Punkten der Kugelfläche zusammenlaufen.
 Jeder dieser beiden Punkte entspricht den sämtlichen Ecken der beiden Grenzpolygone.
 An jeder Polygonseite findet sich Ein Umkehrpunkt der Normale, welcher dem Endpunkt
 des betreffenden Kreisbogens entspricht. Das Bild der Minimalfläche wird also die Kugel-
 fläche vollständig und einfach bedecken.

Projiciren wir die Kugelfläche auf ihre Tangentialebene in einem der Punkte, in wel-
 chem die Begrenzungsbögen zusammenlaufen, so erhalten wir als Bild der Minimalfläche
 ein Flächenstück H , welches die Ebene der complexen Variablen η völlig ausfüllt, und
 begrenzt ist einerseits durch ein System geradliniger Strecken, welche sternförmig vom
 Nullpunkt auslaufen, bis zu gewissen Punkten $C_1, C_2, \dots, C_n$, andererseits von einem
 zweiten System geradliniger Strecken, die von gewissen anderen Punkten $C'_1, C'_2, \dots, C'_m$
 nach dem unendlich fernen Punkt verlaufen, und deren Verlängerungen daher im 0-Punkt
 zusammentreffen (wenn n und m die Anzahlen der Ecken der beiden gegebenen Polygone
 bedeuten).

Diese zweifach zusammenhängende Fläche soll nun in der Ebene einer complexen Variablen t auf eine die obere Halbebene doppelt bedeckende Fläche T_1 abgebildet werden, so dass den beiden Begrenzungen die reellen Werthe von t entsprechen. Diese Fläche muss, damit sie zweifach zusammenhängend sei, zwei Verzweigungspunkte enthalten. Fügen wir zur Fläche T_1 ihr Spiegelbild in Bezug auf die reelle Axe hinzu, so erhalten wir eine die ganze t -Ebene doppelt bedeckende Fläche T , deren vier Verzweigungspunkte conjugirt imaginären Werthen von t entsprechen. Durch Einführung einer neuen Variablen t' an Stelle von t , die mit t durch eine in Bezug auf beide Variable quadratische Gleichung zusammenhängt, lässt sich erreichen, dass die Verzweigungspunkte den Werthen $t' = \pm i, h$ in T entsprechen, worin h reell und < 1 ist, und dass ausserdem einem beliebigen reellen Werth von t ein gegebener reeller Werth von t' in einem der beiden Blätter entspricht.

Wir haben also t als Function der complexen Variablen η so zu bestimmen, dass sie in jedem Punkt der Fläche H einen bestimmten, stetig mit dem Ort veränderlichen, Werth hat, in den beiden Begrenzungen von H reell ist, und in je einem Punkt der beiden Begrenzungslinien unendlich von der ersten Ordnung wird. Setzen wir diese Function über die Begrenzung hinaus dadurch stetig fort, dass wir derselben an symmetrisch zu beiden Seiten einer jeden Begrenzungsstrecke gelegenen Punkten conjugirt imaginäre Werthe ertheilen, so hat, wie man leicht erkennt, die Function $\frac{1}{\eta} \frac{d\eta}{dt}$ für conjugirt imaginäre Werthe von t selbst conjugirt imaginäre Werthe. Sie ist also in der ganzen Fläche T einwerthig und, einzelne Punkte ausgenommen, stetig, muss mithin eine rationale Function von t und

$$\Delta(t) = \sqrt{(1+t^2)(1+h^2t^2)}$$

sein.

Bezeichnen wir die reellen Werthe von t , welche den Punkten $C_1, C_2, \dots, C_n, C'_1, C'_2, \dots, C'_m$ entsprechen, mit $c_1, c_2, \dots, c_n, c'_1, c'_2, \dots, c'_m$, die gleichfalls reellen Werthe, welche den mit dem Nullpunkte, bezw. unendlich fernen Punkte zusammenfallenden Ecken der Fläche H entsprechen, mit $h_1, h_2, \dots, h_n, h'_1, h'_2, \dots, h'_m$, so muss $\frac{d \log \eta}{dt}$ unendlich klein in der ersten Ordnung werden für

$$t = c_1, c_2, \dots, c_n, c'_1, c'_2, \dots, c'_m,$$

unendlich gross in der ersten Ordnung für

$$t = h_1, h_2, \dots, h_n, h'_1, h'_2, \dots, h'_m$$

und in den Verzweigungspunkten

$$t = i, \quad t = h.$$

Wir können demnach setzen:

$$\frac{d \log \eta}{dt} = \frac{\varphi(t, \Delta(t))}{\sqrt{(1+t^2)(1+h^2 t^2)}},$$

worin φ eine rationale Function von t und $\Delta(t)$ bedeutet, welche unendlich klein wird in den Punkten c, c' , unendlich gross in den Punkten h, h' , und welche dadurch bis auf einen constanten reellen Factor bestimmt ist.

Damit übrigens eine solche Function φ existire, muss eine Bedingungsgleichung zwischen den Punkten c, c', h, h' bestehen, vermöge deren einer dieser Punkte durch die übrigen bestimmt ist. (Theorie der Abel'schen Functionen Art. 8, S. 114.) Ueberdies kann nach dem oben Bemerkten von den Punkten c, c', h, h' einer beliebig angenommen werden. Die zu $\log \eta$ hinzutretende additive Constante ist bestimmt, wenn der zu einem der Punkte c gehörige Werth von η, η_0 gegeben ist, wonach sich ergibt:

$$\log \frac{\eta}{\eta_0} = \int_c^t \frac{\varphi(t, \Delta(t)) dt}{\sqrt{(1+t^2)(1+h^2t^2)}}.$$

In diesem Ausdruck bleiben, nachdem η_0 und c festgesetzt sind, noch $2n+2m$ unbestimmte Constanten, nämlich $2n+2m-2$ von den Werthen c, c', h, h' , der Modul h und ein reeller constanter Factor in φ .

Für diese Constanten ergeben sich zunächst zwei Bedingungen, welche besagen, dass der reelle Theil des Integrals

$$\int \frac{\varphi(t, \Delta(t)) dt}{\sqrt{(1+t^2)(1+h^2t^2)}}$$

über eine geschlossene, beide Verzweigungspunkte i, h einschliessende Linie verschwinden soll und dass der imaginäre Theil desselben Integrals den Werth $2\pi\iota$ haben soll. Für die $2n+2m-2$ übrig bleibenden Constanten erhält man eine ebenso grosse Zahl von Bedingungen aus der Forderung, dass den Punkten c, c' die gegebenen Punkte C, C' in der η -Ebene entsprechen sollen.

Wir denken uns nun die x -Axe senkrecht gegen die Ebenen der beiden Grenzpolygone gelegt, und untersuchen die Abbildung der Minimalfläche in der Ebene der complexen Variablen X , nachdem dieselbe durch einen von einer Begrenzung zur andern gelegenen Schnitt in eine einfach zusammenhängende verwandelt ist.

Der reelle Theil von X ist dann in den beiden Begrenzungen und in jedem zu denselben parallelen Schnitt der Fläche constant. Der imaginäre Theil wächst, während man auf der einen Seite des Querschnitts zur andern übergeht, um eine von der Richtung des Weges unabhängige Constante. Hieraus ergibt sich, dass dX die Form hat

$$dX = R(t, \Delta(t)) dt,$$

wo R eine rationale Function von t und $\Delta(t)$ bedeutet, welche in allen Punkten der Begrenzung von H reelle Werthe hat. Dasselbe gilt von dY und dZ , und die Integration liefert die Coordinaten der Minimalfläche in der Form

$$X = \int R_1(t, \Delta(t)) dt, \quad Y = \int R_2(t, \Delta(t)) dt, \quad Z = \int R_3(t, \Delta(t)) dt.$$

Nimmt man h und die Richtungen der begrenzenden Geraden als gegeben an, so hängen unsere Ausdrücke, abgesehen von den additiven Constanten in X, Y, Z , von $n+m-2$ unbestimmten Constanten ab, für welche man die Entfernungen der Punkte C, C' vom Nullpunkt in der η -Ebene annehmen kann, zwischen denen nach dem soeben Bemerkten zwei Relationen bestehen müssen. Ebenso gross ist aber auch die Anzahl der Constanten, welche die gegenseitige Lage der Grenzpolygone bestimmen. Man kann nämlich, indem man zwei Polygonseiten zur Fixirung des Coordinaten-Anfangspunkts festhält, jeder der $n+m-2$ übrigen noch eine Parallelverschiebung in ihrer Ebene ertheilen.

Einfachere Gestalten nehmen die Resultate an, wenn wir gewisse Symmetrieen in den Verhältnissen der begrenzenden Vielecke voraussetzen. Es möge im Folgenden der Fall betrachtet werden, dass die beiden Vielecke regulär seien und die beiden Endflächen einer gerade abgestumpften geraden Pyramide mit regulär-vieleckiger Basis bilden.

Hieraus ergibt sich, dass den beiden in der Fläche H gelegenen Punkten η und $\eta' = \frac{1}{\eta\eta_0}$ über einander liegende Punkte in beiden Blättern der Fläche T entsprechen. Und da $d \log \eta + d \log \eta' = 0$ ist, so muss $\varphi(t, \Delta(t))$ in übereinander liegenden Punkten beider Blätter denselben Werth haben, ist also rational in t ausdrückbar und hat zufolge der oben gemachten Bemerkung die Form $t\psi(t^2)$, wenn ψ eine rationale Function bedeutet.

Dies veranlasst uns, die Fläche T auf eine Fläche S abzubilden durch die Substitution:

$$s = \frac{1 + t^2}{1 + h^2 t^2}, \quad t^2 = \frac{1 - s}{h^2 s - 1},$$

wonach der oberen Hälfte der Fläche T ein die s -Ebene einfach bedeckendes Blatt entspricht, welches längs der reellen Axe zwischen den Punkten $s = 1$ und $s = +\frac{1}{h^2}$ und zwischen den Punkten $s = -1$, $s = -\frac{1}{h^2}$ aufgeschlitzt ist. Die Ränder dieser beiden Schlitzze entsprechen den Grenzen der Fläche H . Für X ergibt sich hiernach der Ausdruck

$$X = \text{const.} \cdot \int \frac{ds}{\sqrt{(1 - s^2)(1 - k^2 s^2)}},$$

wenn

$$k^2 = \frac{h^2 + m^2}{1 + h^2 m^2}$$

ist, während sich η als algebraische Function von s darstellen lässt.

Für eine Begrenzung durch Quadrate findet man

$$\eta = \text{const.} \cdot \sqrt[4]{\frac{(1 - ms)(1 - m's)}{(1 + ms)(1 + m's)}},$$

den Ecken des Quadrats in der einen Begrenzung entsprechen die Punkte $s = -\frac{1}{m}$, $s = -\frac{1}{m'}$ an beiden Rändern des Schlitzes, den Umkehrpunkten der Normalen die Punkte $s = 1$, $s = \frac{1}{h^2}$ und ein an beiden Rändern des Schlitzes gelegener Punkt $s = -\frac{1}{n}$, der aus der Gleichung $\frac{d \log \eta}{ds} = 0$ zu bestimmen ist, und man hat: $1 > m > n > m' > k$.^{*)}

^{*)} Es lässt sich die vorstehende Betrachtung auf viele Fälle ausdehnen, in denen die beiden Polygone nicht regulär sind. So behält der obige Ausdruck für η seine Gültigkeit für die Begrenzung durch zwei Rechtecke, deren Mittelpunkte in einer zu ihrer Ebene senkrechten Linie liegen, vorausgesetzt, dass der Modul von $\eta\eta'$ für die Umkehrpunkte der Normalen denselben Werth hat. Dies findet z. B. statt, wenn beide Rechtecke congruent sind.

Für die Begrenzung durch gleichseitige Dreiecke ergibt sich:

$$\eta = \text{const.} \cdot \sqrt[3]{\frac{1-ms}{1+ms}} \cdot \sqrt[3]{\frac{1-ks}{1+ks}},$$

um für diesen letzteren Fall die Möglichkeit der Constantenbestimmung zu untersuchen, setze man zunächst $s = +1$, wodurch sich ergibt:

$$\sqrt[3]{\frac{1-m}{1+m}} \cdot \sqrt[3]{\frac{1-k}{1+k}} = \eta_0, \quad \sqrt[3]{\frac{1+m}{1-m}} \cdot \sqrt[3]{\frac{1+k}{1-k}} = \frac{1}{\eta_0},$$

also:

$$\frac{1}{\eta\eta_0} = \eta', \quad |\eta|^2 = \left(\frac{1+m}{1-m}\right)^{\frac{2}{3}} \cdot \left(\frac{1+k}{1-k}\right)^{\frac{2}{3}},$$

und für den besonderen Fall, dass beide Dreiecke congruent sind,

$$\eta\eta_0 = 1, \quad c = 1.$$

Den Ecken des Dreiecks in der einen Begrenzung entsprechen die Punkte $s = -\frac{1}{m}$ an beiden Rändern des Schlitzes und der Punkt $\frac{1}{k}$, so dass $k < m < 1$ sein muss. Der erste Umkehrpunkt der Normalen findet statt für $s = 1$, die beiden andern entsprechen einem Punkte $s = -\frac{1}{n}$ an beiden Rändern des Schlitzes, so dass $k < n < m$ sein muss. Für n erhält man zunächst aus der Gleichung $\frac{d \log \eta}{ds} = 0$ die Bestimmung:

$$n = \frac{km(m+2k)}{2m+k(m^2+2)},$$

woraus für jedes Werthsystem von η_0, m , welches der Bedingung genügt, ein Werth von n hervorgeht, welcher zwischen k und m liegt.

Man erhält aber zwischen m, n, k noch eine zweite Gleichung, welche ausdrückt, dass für $s = -m$ $\eta = \eta_0$ werden soll. Diese Gleichung ist:

$$\sqrt[3]{\frac{1-m}{1+m}} \cdot \frac{1-k}{1+k} = \sqrt[3]{\frac{n-m}{n+m}} \cdot \frac{n-k}{n+k},$$

und wenn man aus diesen beiden Gleichungen n eliminirt, so erhält man folgende Relation zwischen k und m :

$$\frac{1}{k} \left(\frac{1+m}{1+2mk+m^2} \right)^2 = \frac{1}{m} \left(\frac{2k+m}{k+2m} \right)^2,$$

aus welcher k durch m zu bestimmen ist.

Für $k = 0$ ist die linke Seite dieser Gleichung Null, die rechte $\frac{1}{(1+m)^2}$; für $k = m$ ist der Unterschied zwischen linker und rechter Seite $\frac{m(3+m^2)}{(1-m^2)^2}$, also positiv für $m < 1$. Es existirt daher zu jedem Werth von m , der kleiner als 1 ist, eine ungerade Anzahl von Werthen von $k < m$. Da sich nun ferner leicht ergibt, dass die Function

$$\frac{1}{k} \left(\frac{1+m}{1+2mk+m^2} \right)^2 - \frac{1}{m} \left(\frac{2k+m}{k+2m} \right)^2$$

zwischen $k = 0$ und $k = m$ nur Ein Maximum hat, so folgt, dass für jedes $m < 1$ Ein und nur Ein unseren Bedingungen genügender Werth von k gefunden werden kann, und darnach ergibt sich auch nur Ein zugehöriger Werth von n . Für die beiden Grenzen $m = 0$ und $m = 1$ erhält man $k = n = m$.

Für die Functionen X , Y , Z finden sich hiernach, wenn man über die additiven Constanten verfügt, die Ausdrücke:

$$X = \text{const.} \cdot \int \frac{h \, ds}{\sqrt{(1-s^2)(1-k^2s^2)}}, \quad Y = \text{const.} \cdot \int \frac{s \, ds}{\sqrt{(1-s^2)(1-k^2s^2)}},$$

$$Z = \text{const.} \cdot \int \frac{ds}{\sqrt{(1-s^2)(1-k^2s^2)}} \cdot \sqrt{\frac{1+hs}{1-hs}}.$$

Die beiden noch übrigen Constanten m und η_0 bestimmt man aus den gegebenen Längen der Dreieckseiten. Bezeichnen wir diese mit a und b , so ergibt sich:

$$\frac{a}{h} = \text{const.} \cdot \int_{-1}^{-\frac{1}{m}} \frac{ds}{\sqrt{(1-s^2)(1-k^2s^2)}}, \quad \frac{b}{h} = \text{const.} \cdot \int_1^{\frac{1}{k}} \frac{ds}{\sqrt{(1-s^2)(1-k^2s^2)}}.$$

In dem besonderen Fall $a = b$ ist $\eta_0 \eta'_0 = 1$ und es bleibt zur Bestimmung der Constanten m die eine transcendente Gleichung

$$\frac{a}{h} = \text{const.} \cdot \int_{-1}^{-\frac{1}{m}} \frac{ds}{\sqrt{(1-s^2)(1-k^2s^2)}}.$$

Lässt man in dem Ausdruck zur Rechten m von 0 bis 1 gehen, so behält derselbe positive Werthe, wird aber an beiden Grenzen unendlich gross. Er muss also für einen zwischenliegenden Werth von m ein Minimum haben. Daraus folgt, dass es für das Verhältniss $\frac{a}{h}$ eine untere Grenze giebt, jenseits der die Aufgabe keine Lösung mehr hat, während für jeden Werth von $\frac{a}{h}$, der über dieser Grenze liegt, zwei Werthe von m , also zwei Lösungen der Aufgabe existiren. Es ist anzunehmen, dass nur der kleinere der beiden Werthe von m einem wirklichen Minimum des Flächeninhalts entspricht.

XXVIII. Fragmente über die Grenzfälle der elliptischen Modulfunctionen.

I. Additamentum ad § 40.

[Jacobi, Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum.]

Formulae in hoc § propositae in eo casu, ubi modulus ipsius q unitatem aequat, consideratione satis dignae videntur, quippe quae functiones unius variabilis pro quovis argumenti valore discontinuas praebeant.

Series quidem propositae magna ex parte pro modulo ipsius q unitati aequali non convergunt, sed integrando series convergentes inde derivari possunt; itaque primo integralia formularum 1—7 proponamus

$$\int_0^q (\log k - \log 4\sqrt{q}) \frac{dq}{q} = -4 \log(1+q) + \frac{4}{3} \log(1+q^3) - \frac{4}{5} \log(1+q^5) + \frac{4}{7} \log(1+q^7) - \dots \quad (0.18)$$

$$\int_0^q \log k' \frac{dq}{q} = 4 \log \frac{1+q}{1-q} + \frac{4}{3} \log \frac{1+q^3}{1-q^3} + \frac{4}{5} \log \frac{1+q^5}{1-q^5} + \dots \quad (0.19)$$

$$\int_0^q \log \frac{1}{k'} \frac{dq}{q} = 4 \log(1+q) + \frac{4}{3} \log(1+q^3) + \frac{4}{5} \log(1+q^5) + \dots \quad (0.20)$$

$$\int_0^q (k^2 - 1) \frac{dq}{q} = -4 \log(1-q^2) + \frac{4}{3} \log(1-q^6) - \frac{4}{5} \log(1-q^{10}) + \dots \quad (0.21)$$

$$\begin{aligned} \int_0^q \frac{2kK}{\pi} \frac{dq}{q} &= 4 \log \frac{1+\sqrt{q}}{1-\sqrt{q}} - \frac{4}{3} \log \frac{1+\sqrt{q^3}}{1-\sqrt{q^3}} + \frac{4}{5} \log \frac{1+\sqrt{q^5}}{1-\sqrt{q^5}} - \dots \\ &= 4 \log \operatorname{tg} \frac{\pi+\tau\iota}{4} - \frac{4}{3} \log \operatorname{tg} \frac{3(\pi+\tau\iota)}{4} + \frac{4}{5} \log \operatorname{tg} \frac{5(\pi+\tau\iota)}{4} - \dots \end{aligned} \quad (0.22)$$

$$\int_0^q (k'^2 - 1) \frac{dq}{q} = -4 \log(1+q) + \frac{4}{3} \log(1+q^3) - \frac{4}{5} \log(1+q^5) + \dots \quad (0.23)$$

$$= -2\iota \log \frac{1-q\iota}{1+q\iota} + \frac{2\iota}{3} \log \frac{1-q^3\iota}{1+q^3\iota} - \frac{2\iota}{5} \log \frac{1-q^5\iota}{1+q^5\iota} + \dots \quad (0.24)$$

$$\int_0^q (k^2 - k'^2) \frac{dq}{q} = -\frac{4}{1} \log(1+q) + \frac{4}{3} \log(1+q^3) - \frac{4}{5} \log(1+q^5) + \frac{4}{7} \log(1+q^7) - \dots \quad (0.25)$$

$$= -\frac{2\iota}{1} \log \frac{1-q\iota}{1+q\iota} + \frac{2\iota}{3} \log \frac{1-q^3\iota}{1+q^3\iota} - \frac{2\iota}{5} \log \frac{1-q^5\iota}{1+q^5\iota} + \frac{2\iota}{7} \log \frac{1-q^7\iota}{1+q^7\iota} - \dots \quad (0.26)$$

ubi logarithmos ita sumendos esse manifestum est, ut evanescant posito $q = 0$.

Functiones eadem ad dignitates ipsius q evolutae adhibitis Cl. Jacobi denotationibus hoc modo repraesentantur:

$$\int_0^q (\log k - \log 4\sqrt{q}) \frac{dq}{q} = -4 \sum \frac{q^{(2p+1)^2}}{(2p+1)^2} + 8 \sum \frac{q^{2(2p+1)^2}}{(2p+1)^2} - 4 \sum \frac{q^{4(2p+1)^2}}{(2p+1)^2} \quad (0.27)$$

$$\int_0^q \log k' \frac{dq}{q} = 4 \sum \frac{q^{(4m-1)^2}}{(4m-1)^2} \quad (0.28)$$

$$\int_0^q \log \frac{1}{k'} \frac{dq}{q} = 4 \sum \frac{q^{(4m-1)^2}}{(4m-1)^2} \quad (0.29)$$

$$\int_0^q (k^2 - 1) \frac{dq}{q} = -4 \sum \frac{q^{2(4m-1)^2}}{(4m-1)^2} \quad (0.30)$$

$$\int_0^q \frac{2kK}{\pi} \frac{dq}{q} = 4 \sum \frac{q^{(4m-1)^2}}{(4m-1)^2} \quad (0.31)$$

$$\int_0^q (k'^2 - 1) \frac{dq}{q} = -4 \sum \frac{q^{(4m-1)^2}}{(4m-1)^2} \quad (0.32)$$

$$\int_0^q (k^2 - k'^2) \frac{dq}{q} = -4 \sum \frac{q^{(4m-1)^2}}{(4m-1)^2} \quad (0.33)$$

Accuratori functionum propositarum disquisitioni tanquam lemma antemittimus theorema sequens generale.

Si series

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots$$

eo quo scripsimus ordine sumata summam habet convergentem, functio ipsius r hac serie

$$a_0 + a_1 r + a_2 r^2 + \dots$$

expressa, convergente r versus limitem 1, convergit versus valorem eundem.

Hinc facile deducitur.

Si functio $f(q)$ complexae quantitatis q pro modulis ipsius q unitate minoribus exhibeatur per seriem

$$A_0 + A_1q + A_2q^2 + \cdots,$$

hanc seriem pro valore q_0 cujus modulus sit unitas, si habeat summam, exprimere valorem eum, quem functio $f(q)$ nanciscatur convergente q versus q_0 ita, ut modulus tantum mutetur, i. e. secundum notam repraesentationem geometricam, appropinquante puncto, per quod quantitas q repraesentatur, in linea ad limitem spatii, pro quo functio est data, normali.

Quamobrem hos tantum valores functionum propositarum hic respicimus, etiamsi evolutiones 48—54 latius pateant.

Sit brevitatis gratia (x) aut absolute minima quantitatum a quantitate x numero integro distantium, aut, si x ex numero integro et fractione $\frac{1}{2}$ composita est, $= 0$, porro $\mathfrak{E}(x)$ numerus integer maximus non major quam x ; obtinemus e 48, attribuendo ipsi q valorem $e^{x\iota}$:

$$\begin{aligned} \int_0^q (\log k - \log 4\sqrt{q}) \frac{dq}{q} &= -2 \log 4 \cos \frac{x}{2} + \frac{2}{3} \log 4 \cos \frac{3x}{2} - \frac{2}{5} \log 4 \cos \frac{5x}{2} + \frac{2}{7} \log 4 \cos \frac{7x}{2} - \cdots \\ &\quad + \frac{x}{2} \left(\mathfrak{E} \frac{x}{2\pi} \right) - \frac{x}{3} \left(\mathfrak{E} \frac{3x}{2\pi} \right) + \frac{x}{5} \left(\mathfrak{E} \frac{5x}{2\pi} \right) - \frac{x}{7} \left(\mathfrak{E} \frac{7x}{2\pi} \right) + \cdots \quad (0.34) \end{aligned}$$

Pars imaginaria hujus seriei convergit, quicumque est valor ipsius x , pars realis, si $\frac{x}{2\pi}$ est numerus surdus, non convergit, sin minus, denotando literis m, n numeros integros inter se primos, et ponendo $\frac{x}{2\pi} = \frac{m}{n}$ ita exhiberi potest:

1° si n impar, aequalis fit

$$\frac{2(-1)^{\frac{m-1}{2}}}{n} \log \frac{4 \cos \frac{m\pi}{2n}}{\sqrt[n]{1024}} + \frac{\pi \iota}{n} \cdot \frac{\sin \frac{2m\pi}{n}}{\sin \frac{m\pi}{n}};$$

2° si n est par, designante p numerum imparem

$$\frac{2(-1)^{\frac{m}{2}}}{n} \log \frac{4 \cos \frac{m\pi}{2n}}{\sqrt[n]{1024}} + \frac{\pi \iota}{n} \cdot \frac{\sin \frac{2m\pi}{n}}{\sin \frac{m\pi}{n}};$$

quae formula manifesto ita est intelligenda, functionem propositam, subtracta functione

$$\frac{2(-1)^{\frac{m-1}{2}}}{n} \log \frac{4 \cos \frac{m\pi}{2n}}{\sqrt[n]{1024}}, \quad \text{vel} \quad \frac{2(-1)^{\frac{m}{2}}}{n} \log \frac{4 \cos \frac{m\pi}{2n}}{\sqrt[n]{1024}},$$

si convergat q modo supra stabilito versus limitem q_0 , convergere versus limitem finitum, ejusque valorem assignat.

Perinde obtinetur

$$\int_0^q \log k' \frac{dq}{q} = -2 \log \operatorname{tg} \frac{x}{4} - \frac{2}{3} \log \operatorname{tg} \frac{3x}{4} - \frac{2}{5} \log \operatorname{tg} \frac{5x}{4} - \dots \quad (0.35)$$

$$+ \frac{x}{4} \left(\mathfrak{E} \frac{x}{4\pi} \right) + \frac{x}{3} \left(\mathfrak{E} \frac{3x}{4\pi} \right) + \frac{x}{5} \left(\mathfrak{E} \frac{5x}{4\pi} \right) + \dots; \quad (0.36)$$

$$\int_0^q \log \frac{1}{k'} \frac{dq}{q} = 2 \log 4 \cos \frac{x}{4} + \frac{2}{3} \log 4 \cos \frac{3x}{4} + \frac{2}{5} \log 4 \cos \frac{5x}{4} + \dots \quad (0.37)$$

$$\int_0^q (k^2 - 1) \frac{dq}{q} = -2 \log 4 \sin \frac{x}{2} + \frac{2}{3} \log 4 \sin \frac{3x}{2} - \frac{2}{5} \log 4 \sin \frac{5x}{2} + \dots \quad (0.38)$$

$$- \frac{x}{2} \mathfrak{E} \frac{x}{2\pi} + \frac{x}{3} \mathfrak{E} \frac{3x}{2\pi} - \frac{x}{5} \mathfrak{E} \frac{5x}{2\pi} + \dots \quad (0.39)$$

$$\int_0^q \frac{2kK}{\pi} \frac{dq}{q} = -2 \log \operatorname{tg} \frac{x}{4} + \frac{2}{3} \log \operatorname{tg} \frac{3x}{4} - \frac{2}{5} \log \operatorname{tg} \frac{5x}{4} + \dots \quad (0.40)$$

$$+ \frac{x}{4} \left(\mathfrak{E} \frac{x}{4\pi} - \mathfrak{E} \frac{x+2\pi}{4\pi} \right) + \frac{x}{3} \left(\mathfrak{E} \frac{3x}{4\pi} - \mathfrak{E} \frac{3(x+2\pi)}{4\pi} \right) + \dots \quad (0.41)$$

$$= 2 \log \operatorname{tg} \left(\frac{x}{4} + \frac{\pi}{4} \right)' + \frac{2}{3} \log \operatorname{tg} \left(\frac{3x}{4} + \frac{\pi}{4} \right)' + \frac{2}{5} \log \operatorname{tg} \left(\frac{5x}{4} + \frac{\pi}{4} \right)' + \dots \quad (0.42)$$

$$+ \frac{x}{4} \left(\mathfrak{E} \frac{x+\pi}{4\pi} - \mathfrak{E} \frac{x+3\pi}{4\pi} \right) + \dots \quad (0.43)$$

$$\int_0^q (k'^2 - 1) \frac{dq}{q} = -2 \log 4 \cos \frac{x}{2} + \frac{2}{3} \log 4 \cos \frac{3x}{2} - \frac{2}{5} \log 4 \cos \frac{5x}{2} + \dots \quad (0.44)$$

$$- \frac{x}{2} \mathfrak{E} \frac{x}{2\pi} + \frac{x}{3} \mathfrak{E} \frac{3x}{2\pi} - \frac{x}{5} \mathfrak{E} \frac{5x}{2\pi} + \dots \quad (0.45)$$

$$= -\frac{2}{1} \log \operatorname{tg} \left(\frac{x}{4} + \frac{\pi}{4} \right)' + \frac{2}{3} \log \operatorname{tg} \left(\frac{3x}{4} + \frac{\pi}{4} \right)' - \frac{2}{5} \log \operatorname{tg} \left(\frac{5x}{4} + \frac{\pi}{4} \right)' + \dots \quad (0.46)$$

$$+ \frac{x}{4} \left(\mathfrak{E} \frac{2x+\pi}{4\pi} - \mathfrak{E} \frac{2x+3\pi}{4\pi} \right) + \dots \quad (0.47)$$

$$\int_0^q (k^2 - k'^2) \frac{dq}{q} = -2 \log 4 \cos \frac{x}{2} + \frac{2}{3} \log 4 \cos \frac{3x}{2} - \frac{2}{5} \log 4 \cos \frac{5x}{2} + \dots \quad (0.48)$$

$$- \frac{x}{2} \mathfrak{E} \frac{x}{2\pi} + \frac{x}{3} \mathfrak{E} \frac{3x}{2\pi} - \frac{x}{5} \mathfrak{E} \frac{5x}{2\pi} + \dots \quad (0.49)$$

$$= -\frac{1}{1} \log \operatorname{tg} \left(\frac{x}{4} + \frac{\pi}{4} \right)' + \dots \quad (0.50)$$

$$+ \frac{x}{4} \left(\mathfrak{E} \frac{2x+\pi}{4\pi} - \mathfrak{E} \frac{2x+3\pi}{4\pi} \right) - \dots \quad (0.51)$$

Posito $x = -2\pi$ fit pars imaginaria formulae 65

1° si n est numerus par: $0, \quad 0, \quad \dots \quad 1,$

2° si n est numerus impar: $0, \quad 0, \quad \dots \quad 1, \quad 2n - 1,$

quam patet habere valorem finitum, nisi $n \equiv 0 \pmod{4}$.

Convergentia summae

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

postulat, ut data quantitate quamvis parva ε assignari possit terminus a_n , a quo summa usque ad terminum quemvis a_m extensa nanciscatur valorem absolutum ipso ε minorem. Jam posito brevitatis gratia

$$\varepsilon_{n+1} = a_{n+1}, \quad \varepsilon_{n+2} = a_{n+1} + a_{n+2}, \quad \varepsilon_{n+3} = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3}, \quad \dots$$

functio

$$f(r) = a_0 + a_1 r + a_2 r^2 + \dots$$

facile sub hac forma exhibetur

$$\varepsilon_{n+1} r^{n+1} + (\varepsilon_{n+2} - \varepsilon_{n+1}) r^{n+2} + (\varepsilon_{n+3} - \varepsilon_{n+2}) r^{n+3} + \dots$$

Unde patet convergente r versus limitem 1 functionem $f(r)$ tandem quavis quantitate minus a valore seriei

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots$$

distare. Summa terminorum altioris gradus quam n , quum sint $\varepsilon_{n+1}, \varepsilon_{n+2}, \dots$ ex hyp. omnes omisso signo $< \varepsilon$, differentiaeque $r^{n+1} - r^{n+2}, \dots$ omnes positivae, manifesto evadit quantitate absoluta

$$< \varepsilon(r^{n+1} - r^{n+2}) + \varepsilon(r^{n+2} - r^{n+3}) + \dots = \varepsilon r^{n+1} < \varepsilon.$$

summa autem terminorum non altioris gradus quam n est functio algebraica ipsius r , quam constat appropinquando r unitati summae $a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ quantumvis appropinquari posse; unde patet appropinquando r unitati differentiam functionis $f(r)$ a valore seriei

$$a_0 + a_1 + \cdots$$

infra quantitatem quamvis datam descendere.

Ex hoc theoremate, quod Cl. Abel tribuendum esse Cl. Dirichlet modo (1852 Sept. 14) quum antecedentia jam essent scripta monuit, facile deducitur

II.

$$\log k = \log 4\sqrt{q} + \frac{4}{1} \sum_{0,0}^{1,2n-1} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \mathfrak{E}_{\frac{\nu m}{n}}^{\nu m} \cdot q^{\nu^2} \quad (0.52)$$

1) $\chi = -\pi$, n ungerade.

$$\begin{aligned} \log k = \frac{1}{n} \log \frac{4}{\sqrt[4]{1024}} + \frac{4}{n} \sum_{0,0}^{1,2n-1} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \mathfrak{E}_{\frac{\nu m}{n}}^{\nu m} \cdot q_0^{\nu^2} \\ + 2 \sum_{0,0}^{1,2n-1} (-1)^{\frac{n-1}{2}} \left(\frac{\nu m}{n} \right) \cdot \log(1 - q_0^{\nu^2}) \quad (0.53) \end{aligned}$$

2) $\chi = -\pi$, m, n ungerade.

$$-a = e^{\frac{m\pi i}{n}}$$

$$\begin{aligned} \log k = \frac{1}{n} \log \frac{4}{\sqrt[n]{1024}} + \frac{4}{n} \sum_0^{1,4n-1} (-1)^{\mathfrak{E} \frac{\nu m}{4n}} \cdot q_0^{\nu^2} \\ + 2 \sum_0^{1,4n-1} (-1)^{\mathfrak{E} \frac{\nu m}{4n}} \cdot \log(1 - q_0^{\nu^2}) \quad (0.54) \end{aligned}$$

3) $\chi = -\frac{\pi}{2}$, n ungerade.

$$a = e^{\frac{m\pi i}{2n}}$$

$$\begin{aligned} \log k = \frac{1}{2n} \log \frac{4}{\sqrt[2n]{1024}} + \frac{4}{2n} \sum_0^{1,8n-1} (-1)^{\mathfrak{E} \frac{\nu m}{8n}} \cdot q_0^{\nu^2} \\ + 2 \sum_0^{1,4n-1} (-1)^{\mathfrak{E} \frac{\nu m}{4n}} \cdot \log(1 - q_0^{2\nu^2}) \quad (0.55) \end{aligned}$$

$$\log k' = \frac{1}{n} \log \frac{4}{\sqrt[3]{1024}} + \frac{4}{n} \sum_{0,0}^{1,2n-1} (-1)^{\mathfrak{E}_{\frac{\nu}{2}}} \mathfrak{E}_{\frac{\nu m}{n}} \cdot q_0^{\nu^2} + 2 \sum_{0,0}^{1,2n-1} (-1)^{\mathfrak{E}_{\frac{\nu}{2}}} \mathfrak{E}_{\frac{\nu m}{n}} \cdot \log(1 - q_0^{\nu^2}) \quad (0.56)$$

(x) = absolut kleinster Rest von x .

$$\log \frac{2kK}{\pi} = 8 \sum \nu (-1)^{\frac{\nu-1}{2}} q^{\nu^2} \cdot \frac{q^\nu}{1-q^{2\nu}}, \quad q = q_0. \quad (0.57)$$

1) $\chi = -\pi$, m ungerade, n gerade.

$$\log \frac{2kK}{\pi} = 8 \sum_{0,0}^{1,n-1} (-1)^{\nu-1} \mathfrak{E}_{\frac{(2\nu+1)m}{2n}} \cdot q_0^{(2\nu+1)^2} \quad (0.58)$$

8. $\chi = 0$.

$$\log \frac{2kK}{\pi} = 8 \sum_{0,0}^{1,n-1} (-1)^\nu \mathfrak{E}^{\frac{(2\nu+1)m}{2n}} \cdot \log(1 - q_0^{(2\nu+1)^2}) \quad (0.59)$$

9. $\chi = -\pi$, n ungerade, m ungerade, $a = e^{\frac{m\pi i}{n}}$.

$$\begin{aligned} \log \frac{2kK}{\pi} &= \frac{1}{2n} \log \frac{4}{4\sqrt[4]{1024}} + \frac{4}{2n} \sum_0^{1,8n-1} (-1)^{\mathfrak{E}^{\frac{\nu m}{8n}}} \cdot q_0^{\nu^2} \\ &\quad + \frac{4}{1} \sum_0^{1,2n-1} (-1)^{\mathfrak{E}^{\frac{(2\nu+1)m}{4n}}} \mathfrak{E}^{\frac{(2\nu+1)m}{2n}} \cdot \log(1 - q_0^{(2\nu+1)^2}) \\ &= \frac{2}{n} \sum_0^{1,2n-1} (-1)^{\mathfrak{E}^{\frac{(2\nu+1)m}{4n}}} \left(\mathfrak{E}^{\frac{(2\nu+1)m}{2n}} - \frac{2\nu+1}{2n} \right) \cdot \log(1 - q_0^{(2\nu+1)^2}) \\ &\quad + \frac{4}{n} \sum_0^{1,4n-1} (-1)^{\mathfrak{E}^{\frac{(2\nu+1)m}{8n}}} \mathfrak{E}^{\frac{(2\nu+1)m}{4n}} \cdot q_0^{(2\nu+1)^2} \quad (0.60) \end{aligned}$$

Erläuterungen zu den Fragmenten XXVIII.

Von R. Dedekind.

Die Entstehungszeit (September 1852) des ersten der beiden Fragmente macht es wahrscheinlich, dass Riemann darauf ausging, für die Abhandlung über die trigonometrischen Reihen (XII) Beispiele von Functionen zu finden, die unendlich oft in jedem Intervall unstetig werden, und vielleicht sollte die zweite Untersuchung, welche sich auf einem kaum leserlichen Blatte findet, demselben Zwecke dienen. Die hier von Riemann benutzte Methode zur Bestimmung des Verhaltens der in der Theorie der elliptischen Functionen auftretenden Modulfunctionen für den Fall, dass das complexe Periodenverhältniss

$$\omega = \frac{\pi'}{\pi} = x + y\iota \quad (0.61)$$

sich einem rationalen Werthe nähert, gestattet aber zugleich eine sehr interessante Anwendung auf die sogenannte Theorie der unendlich vielen Formen der ϑ -Functionen, nämlich auf die Bestimmung der bei der Transformation erster Ordnung auftretenden Constanten, welche bekanntlich von Jacobi und Hermite auf die Gauss'schen Summen, also auf die Theorie der quadratischen Reste zurückgeführt ist. Die Darstellung dieses Zusammenhangs bildet den Gegenstand der folgenden Erläuterungen.

Den Mittelpunkt der Theorie dieser Modulfunctionen, welche man auch ganz unabhängig von der der elliptischen Functionen aufstellen kann, und welche seit dem Erscheinen der ersten Auflage von Riemann's Werken der Gegenstand zahlreicher Untersuchungen geworden ist, bildet in gewissem Sinne die Function

$$\eta(\omega) = q^{\frac{1}{12}} \prod_{\nu=1}^{\infty} (1 - q^{2\nu}), \quad q = e^{\omega\pi\iota}, \quad (0.62)$$

wo zur Abkürzung

$$q = e^{\omega\pi\iota} \quad (0.63)$$

gesetzt ist, und wo das Productzeichen sich auf alle natürlichen Zahlen ν erstreckt.

durch begrenzten, einfach zusammenhängenden Gebietes nirgends Null oder unendlich gross wird, so sind auch alle Potenzen von $\eta(\omega)$ mit beliebigen Exponenten, und ebenso $\log \eta(\omega)$ durchaus einwerthige Functionen von ω , sobald ihr Werth an einer bestimmten Stelle festgesetzt ist. Die Function $\log \eta(\omega)$ soll dadurch definirt werden, dass, wenn y über alle Grenzen wächst, also q verschwindet, die Grösse

$$\log \eta(\omega) - \frac{\pi\omega\iota}{12} = 0 \quad (0.64)$$

wird; dann ist $\log \eta(\omega)$ conjugirt mit $\log \eta(-\bar{\omega})$, wo $\bar{\omega}$, wie immer im Folgenden, die mit ω conjugirte Grösse bedeutet. Nun ist bekanntlich (Fundam. nova §. 36)

$$\eta(2\omega) \eta\left(\frac{\omega}{2}\right) \eta\left(\frac{1+\omega}{2}\right) = e^{-\frac{\pi\iota}{4}} \cdot \eta(\omega)^3,$$

$$\sqrt[12]{\Delta(\omega)} = \frac{\eta(2\omega)^8}{\eta\left(\frac{1+\omega}{2}\right)^8}, \quad \sqrt[12]{\Delta'(\omega)} = \frac{\eta\left(\frac{\omega}{2}\right)^8}{\eta\left(\frac{1+\omega}{2}\right)^8}, \quad \sqrt[12]{\Delta''(\omega)} = \frac{\eta(\omega)^8}{\eta(2\omega)^4 \eta\left(\frac{\omega}{2}\right)^4},$$

also nach der obigen Festsetzung:

$$\log \eta(2\omega) + \log \eta\left(\frac{\omega}{2}\right) + \log \eta\left(\frac{1+\omega}{2}\right) = \frac{\pi\iota}{4} + 3 \log \eta(\omega), \quad (0.65)$$

$$\log k = \log 4 + \frac{\pi\omega\iota}{2} + 4 \log \eta(2\omega) - 4 \log \eta\left(\frac{\omega}{2}\right), \quad (0.66)$$

$$\log k' = \frac{\pi\omega\iota}{2} + 4 \log \eta\left(\frac{\omega}{2}\right) - 4 \log \eta(2\omega), \quad (0.67)$$

$$\log \frac{1}{k} = -\frac{\pi\omega\iota}{2} + 4 \log \eta\left(\frac{1+\omega}{2}\right) - 2 \log \eta(\omega), \quad (0.68)$$

wo die Logarithmen linker Hand (wie in den Fund. nova §. 40) als einwerthige Functionen von ω so definirt sind, dass die drei Grössen

$$\log k - \log 4 - \frac{\pi\omega\iota}{2} = \log \frac{k}{4\sqrt{q}}, \quad \log k', \quad \log \frac{1}{k}$$

mit q unendlich klein werden.

Aus diesem Verhalten der Functionen ergibt sich nun mit Hülfe der Transformation erster Ordnung der ϑ -Functionen das von Riemann untersuchte Verhalten bei Annäherung von ω an einen reellen rationalen Werth, wobei q sich zugleich einer bestimmten Einheitswurzel q_0 nähert.

Setzt man

$$\vartheta(z, \omega) = \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} e^{\nu^2 \omega \pi i + 2\nu z i} = 1 + 2 \sum_{\nu=1}^{\infty} q^{\nu^2} \cos 2\nu z, \quad (0.69)$$

wo die Summation auf alle ganzen Zahlen ν auszudehnen ist, so wird, wenn man die nach z genommene Derivirte durch einen Accent bezeichnet,

$$\vartheta'(0, \omega) = 2\pi\eta(\omega).$$

Sind nun $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ vier der Bedingung

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1 \quad (0.70)$$

genügende ganze Zahlen, so ist bekanntlich

$$\vartheta\left(\frac{z}{\gamma\omega+\delta}, \frac{\alpha\omega+\beta}{\gamma\omega+\delta}\right) = c\sqrt{\gamma\omega+\delta} e^{\frac{\gamma z^2 i}{\gamma\omega+\delta}} \cdot \vartheta(z, \omega),$$

wo c eine von $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ und der Wahl der Quadratwurzel abhängige achte Einheitswurzel bedeutet, deren Bestimmung von Herrn Hermite auf die Gauss'schen Summen zurückgeführt ist (Liouville's Journal, Serie II. T. III. 1858). Für $z = 0$ ergibt sich hieraus

$$\eta\left(\frac{\alpha\omega+\beta}{\gamma\omega+\delta}\right) = c\sqrt{\gamma\omega+\delta} \eta(\omega),$$

also

$$\log \eta\left(\frac{\alpha\omega+\beta}{\gamma\omega+\delta}\right) = \log \eta(\omega) + \frac{1}{2} \log(\gamma\omega + \delta) + \log c,$$

und aus dieser Transformation von $\eta(\omega)$ ist diejenige von $\log \eta(\omega)$ abzuleiten.

Der Fall $\beta = 0$ erledigt sich unmittelbar durch die Definitionen (2) und (4) von $\eta(\omega)$, $\log \eta(\omega)$ und giebt

$$\log \eta(\omega + 1) = \log \eta(\omega) + \frac{\pi i}{12}, \quad (0.71)$$

oder allgemeiner, wenn n irgend eine ganze Zahl ist,

$$\log \eta(\omega + n) = \log \eta(\omega) + n \cdot \frac{\pi i}{12}. \quad (0.72)$$

Ist aber β von Null verschieden, so wird die Grösse $\mu = -(\alpha + \beta\omega)\iota$ nirgends negativ, und man kann folglich $\log \mu$ eindeutig so definiren, dass der imaginäre Bestandtheil stets zwischen $+\pi\iota$ bleibt, und folglich conjugirten Werthen von μ auch conjugirte Werthe von $\log \mu$ entsprechen; dann wird zufolge (7)

$$\log \eta \left(\frac{\alpha\omega + \beta}{\gamma\omega + \delta} \right) = \log \eta(\omega) + \frac{1}{2} \log(-(\alpha + \beta\omega)^2\iota) + \pi\iota \cdot \frac{\alpha + \delta - 2(\alpha, \beta)}{12\beta}, \quad (0.73)$$

wo $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ eine durch $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ vollständig bestimmte ganze Zahl bedeutet, welche dieselbe bleibt, wenn diese vier Zahlen mit (-1) multiplicirt werden; Die vollständige Bestimmung dieser Zahl leistet offenbar noch sehr viel mehr, als die der obigen Einheitswurzel ϵ , und bildet den eigentlichen Gegenstand der folgenden Untersuchung.

Zunächst lässt sich $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ auf eine nur von α, β abhängige Zahl zurückführen. Genügen nämlich die Zahlen γ', δ' ebenfalls der Bedingung $\alpha\delta' - \beta\gamma' = 1$, so ist bekanntlich $\gamma' = \gamma + n\alpha, \delta' = \delta + n\beta$, wo n jede ganze Zahl bedeutet; mithin wird nach (9)

$$\log \eta \left(\frac{\alpha\omega + \beta}{\gamma'\omega + \delta'} \right) = \log \eta \left(\frac{\alpha\omega + \beta}{\gamma\omega + \delta} \right) + n \cdot \frac{\pi\iota}{12},$$

und hieraus folgt nach (10), dass

$$(\alpha, \beta, \gamma', \delta') = (\alpha, \beta, \gamma, \delta) + n\beta$$

nur von den beiden Zahlen α, β abhängt; man kann daher

$$(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = \alpha + \delta - 2(\alpha, \beta), \quad (0.74)$$

also

$$\log \eta \left(\frac{\alpha\omega + \beta}{\gamma\omega + \delta} \right) = \log \eta(\omega) + \frac{1}{2} \log(-(\alpha + \beta\omega)^2\iota) + \frac{\pi\iota}{12\beta}(\alpha + \delta - 2(\alpha, \beta)) \quad (0.75)$$

setzen, wo (α, β) und, wie sich später ergibt, auch (α, β) selbst eine ganze, lediglich von den beiden relativen Primzahlen α, β abhängende Zahl bedeutet; zugleich ergibt sich

$$(-\alpha, -\beta) = -(\alpha, \beta). \quad (0.76)$$

Ersetzt man ferner alle Glieder der Gleichung (12) durch die zugehörigen conjugirten Grössen, so erhält man nach den obigen Bemerkungen

$$\log \eta \left(\frac{\alpha \bar{\omega} + \beta}{\gamma \bar{\omega} + \delta} \right) = \log \eta(\bar{\omega}) + \frac{1}{2} \log(-(\alpha + \beta \bar{\omega})^2 \iota) + \frac{\pi \iota}{12\beta} (\alpha + \delta - 2(\alpha, \beta)),$$

und da die linke Seite nach (12) auch in der Form

$$\log \eta \left(\frac{\alpha \omega + \beta}{\gamma \omega + \delta} \right) = \overline{\log \eta \left(\frac{\alpha \omega + \beta}{\gamma \omega + \delta} \right)}$$

dargestellt werden kann, so ergibt sich

$$(\alpha, -\beta) = (\alpha, \beta) \quad (0.77)$$

und zufolge (13) auch

$$(-\alpha, \beta) = -(\alpha, \beta). \quad (0.78)$$

Soll ferner der Satz (12) auch noch für den Fall $\beta = 0$, $\alpha = \delta = \pm 1$ gelten, so ist die Definition des Symbols (α, β) durch die Festsetzung

$$(+1, 0) = +1 \quad (0.79)$$

zu vervollständigen, welche auch mit (13), (14), (15) harmonirt.

Aus (15) folgt $(0, +1) = \pm 1$; nimmt man daher $\alpha = 0$, $\beta = 1$, $\gamma = -1$, $\delta = 0$, so geht der Satz (12) über in den speciellen Fall der complementären Transformation

$$\log \eta \left(-\frac{1}{\omega} \right) = \log \eta(\omega) + \frac{1}{2} \log(-\omega^2 \iota). \quad (0.80)$$

Ersetzt man nun in dem Satze (12) die Grösse ω durch $\omega + 1$ und durch $-\frac{1}{\omega}$, und drückt die Grössen

$$\log \eta \left(\frac{\alpha(\omega+1)+\beta}{\gamma(\omega+1)+\delta} \right) \quad \text{und} \quad \log \eta \left(\frac{-\alpha/\omega+\beta}{-\gamma/\omega+\delta} \right)$$

wieder nach dem Satze (12) durch $\log \eta(\omega)$ aus, so erhält man mit Rücksicht auf (8) und (17) leicht die beiden folgenden, für jedes Paar von relativen Primzahlen α, β geltenden Sätze

$$(\alpha + \beta, \beta) = (\alpha, \beta), \quad (0.81)$$

$$2\alpha(\alpha, \beta) + 2\beta(\beta, \alpha) = 1 + \alpha^2 + \beta^2 - 3(\alpha\beta), \quad (0.82)$$

wo $(\alpha\beta)$ den absoluten Werth von $\alpha\beta$ bedeutet. Mit Zuziehung des letzteren Satzes, welcher in naher Beziehung zu dem Reciprocitätssatze in der Theorie der quadratischen Reste

steht, kann man der Gleichung (11) auch die Form

$$(\alpha, \beta, \gamma, \delta) = 2\gamma(\alpha, \beta) + 2\delta(\beta, \alpha) - (\alpha\gamma + \beta\delta) \pm 3\alpha\delta \quad (0.83)$$

geben, wo das Vorzeichen $+$ so zu wählen ist, dass $+\alpha\beta$ der absolute Werth von $\alpha\beta$ wird; hierdurch erscheint die zuerst in (10) auftretende Zahl $(\alpha, \beta, \gamma, \delta)$ wieder in Form einer ganzen Zahl.

Es leuchtet nun ein, dass die beiden Sätze (18) und (19) nicht nur die früheren Eigenschaften (13) bis (16) in sich schliessen, sondern auch ausreichen, um in jedem Falle den Werth des Symbols (α, β) durch eine Kettenbruch-Entwicklung vollständig und zwar als ganze Zahl zu bestimmen.

Dies geht schon aus dem Satze

$$(\alpha, \alpha + \beta) = (\alpha, \beta) - (\beta, \alpha) + \beta - \alpha, \quad \text{wenn } \alpha\beta \geq 0, \quad (0.84)$$

hervor, welcher leicht aus (18) und (19) abgeleitet wird; und umgekehrt leuchtet ein, dass dieser Satz (21) in Verbindung mit (18), d. h. mit dem Satze

$$(\alpha', \beta) = (\alpha, \beta), \quad \text{wenn } \alpha' \equiv \alpha \pmod{\beta}, \quad (0.85)$$

ebenfalls die vollständige Bestimmung des Symbols (α, β) enthält und mithin mit den Sätzen (18), (19) völlig äquivalent ist.

Die hier entwickelte Theorie der Zahl (α, β) bildet in der That einen Theil der in den Fundamenta nova (§ 36—40) enthaltenen Untersuchungen; denn die dort von Jacobi behandelte Bestimmung der bei der Transformation erster Ordnung auftretenden Constanten lässt sich, wie schon erwähnt, auf die Gauss'schen Summen zurückführen.

Wir wollen nun die vorstehenden Sätze an einigen besonderen Fällen erläutern und zugleich diejenigen Formeln ableiten, welche später zur numerischen Berechnung der Functionen $B(x)$, $D(x)$ dienen sollen.

Für $\alpha = 1$, $\beta = 2$ erhält man aus (19) und (16):

$$2(1, 2) + 4(2, 1) = 1 + 1 + 4 - 6 = 0, \quad (2, 1) = (1, 0) = 1,$$

also $(1, 2) = -2$; hieraus folgt nach (21):

$$(1, 3) = -2 - 1 + 2 - 1 = -2, \quad (1, 4) = -2 - (-2) + 3 - 1 = 2,$$

und allgemeiner für jedes positive n :

$$(1, n) = - \sum_{\nu=1}^{n-1} (-1)^{\mathfrak{E} \frac{\nu}{n}} \cdot \nu = - \sum_{\nu=1}^{n-1} (-1)^{\nu} \nu = \frac{1}{2} (-1)^{n-1} (2n-1) + \frac{1}{2}.$$

Setzt man nun zur Abkürzung für jede rationale Zahl x

$$B(x) = - \sum_{\nu=1}^{n-1} \left(\frac{\nu m}{n} \right) \cdot \frac{\nu}{n}, \quad (0.86)$$

wo m , n relative Primzahlen bedeuten und $x = \frac{m}{n}$ gesetzt ist, so ergibt sich aus den obigen Formeln leicht die folgende wichtige Relation:

$$B(x) + B(1-x) = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}(x)(1-x), \quad (0.87)$$

wo (x) den absolut kleinsten Rest von x modulo 1 bedeutet.

Für $x = \frac{1}{2}$ ergibt sich hieraus:

$$2B\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{1}{24}, \quad B\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{48}.$$

das Symbol (m, n) ; doch dürfen wir auf diese, an sich interessante Function, hier nicht näher eingehen.

Die Bestimmung der Zahl (α, β) gestattet zugleich eine sehr bequeme Berechnung einer Tabelle für die Werthe der Function $B(x)$. Es ist nämlich

$$B\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{n}(m, n) - \frac{1}{2}\left(\frac{m}{n}\right) + \frac{1}{2n}, \quad (0.88)$$

wo $\left(\frac{m}{n}\right)$ den absolut kleinsten Rest von $\frac{m}{n}$ bedeutet.

Durch Vereinigung von je zwei Zählern α, β , welche den Zahlen m, n entsprechen, erhält man aus (19) die allgemeine Formel

$$\begin{aligned} n(\alpha, m) + m(\beta, n) + n(\alpha', m) + m(\beta', n) \\ = 1 + \alpha^2 + \beta^2 - 3(\alpha\beta) + 1 + \alpha'^2 + \beta'^2 - 3(\alpha'\beta'), \end{aligned} \quad (0.89)$$

wenn $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$, $\alpha'\delta' - \beta'\gamma' = 1$ ist und wenn

$$\frac{\alpha}{m} + \frac{\alpha'}{m} \equiv \frac{\beta}{n} + \frac{\beta'}{n} \equiv 0 \pmod{1}.$$

Die Function $B(x)$ hat nun eine Reihe merkwürdiger Eigenschaften, welche aus den obigen Formeln leicht abgeleitet werden können. Es ist nämlich:

$$B(1-x) = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}(x) + \frac{1}{2}x^2 - B(x), \quad (0.90)$$

$$B(-x) = -B(x), \quad (0.91)$$

$$B(x+1) = B(x) + \frac{1}{2}(x) - \frac{1}{2}x - \frac{1}{12}, \quad (0.92)$$

$$B(x) + B(x + \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}B(2x) + \frac{1}{24}, \quad (0.93)$$

$$2B(\frac{x}{2}) + 2B(\frac{x+1}{2}) = B(x) + \frac{1}{4}(x) - \frac{1}{4}x. \quad (0.94)$$

Für $x = 0$ ergibt sich aus der letzten Formel:

$$4B(\frac{1}{2}) = B(0) + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}, \quad B(0) = 0.$$

Für die Berechnung der Werthe $B(\frac{m}{n})$ kann man sich auf den Fall beschränken, wo m , n relative Primzahlen und $2m \leq n$ sind. Man erhält dann aus (19) und (25) die Formel

$$B(\frac{m}{n}) = \frac{1}{6n} + \frac{1}{2n}(2m, n) - \frac{1}{2}\left(\frac{2m}{n}\right). \quad (0.95)$$

Sätze aus der Theorie der trigonometrischen Reihen, der sich mit den obigen Entwicklungen in engem Zusammenhang befindet.

Es sei $f(x)$ eine für alle reellen Werthe von x mit der Periode 1 wiederkehrende Function, welche nur an einer endlichen Anzahl von Stellen in einem Periodenintervall unstetig wird, und für welche das Integral $\int_0^1 f(x) dx$ einen bestimmten endlichen Werth hat. Dann convergirt die Reihe

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{2n\pi x i} \int_0^1 f(t) e^{-2n\pi t i} dt \quad (0.96)$$

für jeden Werth von x , der nicht einer Unstetigkeitsstelle entspricht, gegen $f(x)$, während sie für eine Unstetigkeitsstelle x_0 gegen das arithmetische Mittel der beiden Grenzwerte $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$ convergirt.

folgt gleichzeitig

$$\log_2(2n) = \frac{4}{n} \sum B(x) - (4 - 3n)B - G + \frac{1}{6}, \quad (0.97)$$

$$\log_2(n) = \frac{2}{n} \sum B(x) - (2 - \frac{3}{2}n)B - \frac{G}{2} + \frac{1}{12}, \quad (0.98)$$

wo die Summation über alle von einander verschiedenen Werthe x auszudehnen ist, und B, G die Bedeutung

$$B = B(0) = 0, \quad G = \sum_{\nu=1}^{n-1} \frac{1}{\nu}$$

haben.

und bezeichnet dies durch $x \equiv y$, so entspricht jeder Classe x eine bestimmte Classe y , und umgekehrt; die Anzahl der Classen ist also für beide Systeme dieselbe. Die erste Classe enthält stets die Zahl 0, während die zweite, falls sie überhaupt existirt, nur Zahlen mit ungeradem Nenner enthält.

Hat aber die Zahl x einen ungeraden Nenner n , so zerfallen die Zahlen y , welche der Bedingung $2y \equiv x$ genügen, also $y \equiv \frac{x}{2}$ oder $y \equiv \frac{x+n}{2}$ sind, in zwei Classen von Zahlen, von denen diejenigen, welche denselben Nenner n haben, mit x_1 bezeichnet werden sollen; die letzteren haben den Nenner $2n$. Dann ist

$$B(x_1) = B(x) - B\left(\frac{x}{2}\right) = 2B(x) - B(2x) \quad (0.99)$$

und

$$D(x) = 6B(x_1) - 4B(x) - 4B(x), \quad (0.100)$$

$$D(2x) = 6B(x_1) - 8B(x) - 2B(x), \quad (0.101)$$

$$D(x_2) = 6B(x_1) - 2B(x) - 8B(x), \quad (0.102)$$

$$D(x_3) = 6B(x_1) - 2B(x) - 2B(x), \quad (0.103)$$

wodurch wieder die obige Bedingung

$$D(2x) + D(x_1) + D(x_2) = 3D(x) \quad (0.104)$$

erfüllt wird. Die Uebereinstimmung der drei ersten Darstellungen in (44) ergibt sich aus den früheren Eigenschaften von $B(x)$ mit Rücksicht auf die Beziehungen

$$x_1 = x_2 + \frac{1}{2} = (2x)' - \frac{1}{2}, \quad (x+1)_1 = (4x_1) + \frac{1}{2}, \quad (x_1)_1 = (x_2)_1;$$

und umgekehrt ist

$$6B(x) = 3D(x) - 2D(2x) - D(x_1) = D(x_1) - D(2x), \quad (0.105)$$

$$6B(x') = 3B(x) - B(2x) - 2B(x_1) = B(x_1) - B(x_2), \quad (0.106)$$

$$6B(x_1) = 5B(x) - 2B(2x) - 2B(x_1) = 2B(x_1) - B(x). \quad (0.107)$$

Die Herleitung dieser und zahlreicher anderer Relationen, welche alle in naher Beziehung zu der Theorie der quadratischen Reste stehen, müssen wir uns aber für eine andere Gelegenheit versparen.

XXIX. Fragment aus der Analysis Situs.

Zwei Einstrecke werden derselben oder verschiedenen Gruppen zugerechnet, je nachdem das eine stetig in das andere übergehen kann oder nicht.

Je zwei Einstrecke, welche durch dasselbe Punktpaar begrenzt werden, bilden zusammen ein zusammenhängendes unbegrenztes Einstreck und zwar kann dies die ganze Begrenzung eines Zweistrecks bilden oder nicht, je nachdem sie derselben oder verschiedenen Gruppen angehören.

Ein inneres, zusammenhängendes, unbegrenztes Einstreck kann, einmal genommen, entweder zur ganzen Begrenzung eines innern Zweistrecks ausreichen oder nicht.

Es seien $a_1, a_2, \dots, a_m$ m innere zusammenhängende unbegrenzte n -Strecke, welche, einmal genommen, weder einzeln noch in Verbindung ein inneres $(n+1)$ -Streck vollständig begrenzen können, und $b_1, b_2, \dots, b_m$ m ebenso beschaffene n -Strecke, deren jedes mit einem oder einigen der a zusammengenommen ein inneres $(n+1)$ -Streck vollständig begrenzen kann, so kann jedes innere zusammenhängende n -Streck, welches mit den a die ganze Begrenzung eines inneren $(n+1)$ -Strecks bilden kann, dies auch mit den b und umgekehrt.

Bildet irgend ein unbegrenztes inneres n -Streck mit den a zusammengenommen die ganze Begrenzung eines inneren $(n+1)$ -Strecks, so können in Folge der Voraussetzungen die a nach und nach eliminirt und durch die b ersetzt werden.

Ein n -Streck A heisst in ein anderes B veränderlich, wenn durch A und durch Stücke von B ein inneres $(n+1)$ -Streck vollständig begrenzt werden kann.

Wenn im Innern einer stetig ausgedehnten Mannigfaltigkeit mit Hülfe von m festen, für sich nicht begrenzenden, n -Strecksstücken jedes unbegrenzte n -Streck begrenzend ist, so hat diese Mannigfaltigkeit einen $(m+1)$ -fachen Zusammenhang n ter Dimension.

Eine stetig ausgedehnte zusammenhängende Mannigfaltigkeit heisst einfach zusammenhängend, wenn der Zusammenhang jeder Dimension einfach ist.

Ein Querschnitt einer begrenzten stetig ausgedehnten Mannigfaltigkeit A heisst jede im Innern derselben verlaufende zusammenhängende Mannigfaltigkeit B von weniger Dimensionen, deren Begrenzung ganz in die Begrenzung von A fällt.

Der Zusammenhang eines n -Strecks wird durch jeden einfach zusammenhängenden $(n - m)$ -streckigen Querschnitt entweder in der m ten Dimension um 1 erniedrigt oder in der $(m - 1)$ ten Dimension um 1 erhöht.

Der Zusammenhang n ter Dimension kann nur geändert werden, indem entweder unbegrenzte nicht begrenzende n -Strecke in begrenzte oder begrenzende in nicht begrenzende verwandelt werden, ersteres in sofern zur Begrenzung eines n -Strecks, letzteres in sofern zur Begrenzung eines $(n + 1)$ -Strecks neue Theile hinzukommen.

Abhängigkeit des Zusammenhangs der Begrenzung B einer stetig ausgedehnten Mannigfaltigkeit A von dem Zusammenhang derselben.

Die unbegrenzten innerhalb B nicht begrenzenden Vielstrecke zerfallen in solche, welche innerhalb A nicht begrenzen, und solche, welche innerhalb A begrenzen. Untersuchen wir zunächst, wie der Zusammenhang von B durch einen einfach zusammenhängenden Querschnitt von A geändert wird.

A sei von der n ten, der Querschnitt q von der m ten Dimension, a eine Hülle eines Punktes von q von der $(n - 1 - m)$ ten Dimension, welche q nicht schneidet, p die Begrenzung von q .

Der Zusammenhang von A wird in der $(n - 1 - m)$ ten Dimension um 1 vermehrt, wenn a innerhalb A' nicht begrenzt, in der $(n - m)$ ten Dimension um 1 vermindert, wenn a innerhalb A' begrenzt.

*) Es finden sich im Manuscript hier noch einige Zeichen, deren Bedeutung und Zusammenhang ich nicht entziffern konnte.

$\&$ von A & von B		
I. a innerhalb A nicht begrenzend	$(m + 1)$	$(n - m - 1)$
a innerhalb B' nicht begrenzend	$+1$	m
folglich p innerhalb B begrenzend		$+1$
II. a innerhalb A begrenzend		
a innerhalb B' nicht begrenzend		
folglich p innerhalb B begrenzend		
III. a innerhalb A begrenzend		
a innerhalb B' begrenzend		
folglich p innerhalb B nicht begrenzend		

Zwei Vielstrecktheile (Raumtheile) heissen zusammenhängend oder einem Stück gehörig, wenn sich von einem inneren Punkt des einen durch das Innere des Vielstrecks (Raumes) eine Linie nach einem inneren Punkt des andern ziehen lässt.

Lehrsätze aus der Theoria Situs.

(1.) Ein Vielstreck von weniger als $n - 1$ Dimensionen kann nicht Theile eines n -Strecks von einander scheiden. Ein zusammenhängendes n -Streck hat entweder die Eigenschaft, durch jeden $(n - 1)$ -streckigen Querschnitt in Stücke zu zerfallen oder nicht. Den Inbegriff der ersteren bezeichnen wir durch $\mathfrak{a}$.

Wird ein unter $\mathfrak{a}$ gehöriges n -Streck durch einen $(n - 2)$ -streckigen Querschnitt in ein anderes verwandelt, so ist dies zusammenhängend und gehört entweder zu $\mathfrak{a}$ oder nicht.

Diejenigen n -Strecke $\mathfrak{a}$, welche durch jeden $(n - 2)$ -streckigen Querschnitt unter die Nicht- $\mathfrak{a}$ versetzt werden, bezeichnen wir durch $\mathfrak{a}_1$.

(2.) Wird ein Vielstreck A durch einen μ -streckigen Querschnitt in ein anderes A' verwandelt, so bildet jeder Querschnitt von mehr als $\mu + 1$ Dimensionen von A einen Querschnitt von A' und umgekehrt.

Wird eins der n -Strecke $\mathfrak{a}_1$ durch einen $(n - 3)$ -streckigen Querschnitt in ein anderes verwandelt, so gehört dies zu den $\mathfrak{a}_2$, kann aber entweder zu den $\mathfrak{a}$ gehören oder nicht.

Diejenigen unter den $\mathfrak{a}_1$, welche durch jeden $(n - 3)$ -streckigen Querschnitt unter die Nicht- $\mathfrak{a}_1$ versetzt werden, bezeichnen wir durch $\mathfrak{a}_2$.

Fährt man auf diese Weise fort, so erhält man zuletzt eine Kategorie $\mathfrak{a}_{n-2}$ von n -Strecken, welche diejenigen der $\mathfrak{a}_{n-3}$ umfasst, die durch jeden einstreckigen (linearen) Querschnitt unter die Nicht- $\mathfrak{a}_{n-3}$ versetzt werden. Diese n -Strecke $\mathfrak{a}_{n-2}$ nennen wir einfach zusammenhängend.

Die n -Strecke α_μ sind also einfach zusammenhängend, in sofern von Querschnitten von $n - \mu - 2$ oder weniger Dimensionen abgesehen wird und sollen bis zur $(n - \mu - 2)$ ten Dimension einfach zusammenhängend genannt werden^{*)}.

Ein n -Streck, welches nicht bis zur $(n - 1)$ ten Dimension einfach zusammenhängend ist, kann durch einen $(n - 1)$ -streckigen Querschnitt zerlegt werden, ohne in Stücke zu zerfallen. Das entstandene n -Streck kann, wenn es nicht bis zur $(n - 1)$ ten Dimension einfach zusammenhängend ist, durch einen ähnlichen Querschnitt weiter zerlegt werden, und offenbar lässt sich dies Verfahren fortsetzen, so lange man nicht zu einem bis zur $(n - 1)$ ten Dimension einfach zusammenhängenden gelangt ist. Die Anzahl der Querschnitte, durch welche eine solche Zerlegung des n -Strecks in ein bis zur ersten Dimension einfach zusammenhängendes bewerkstelligt wird, kann zwar nach der Wahl derselben verschieden ausfallen, offenbar aber muss sie für eine Gattung von Zerlegungen am kleinsten werden^{**)} .

^{*)} In Uebereinstimmung mit dem Folgenden sollten wohl die n -Strecke α als zusammenhängend bis zur $(n - \mu - 1)$ ten Dimension bezeichnet sein.

^{**)} Zu erwähnen ist zu diesem Fragmente ein Aufsatz von Betti (Sopra gli spazii di un numero qualunque di dimensioni, Annali di Matematica ser. 2, vol. IV, 1871) der mir zur Zeit des Erscheinens der ersten Auflage von Riemann's Werken noch nicht bekannt war, und der verwandte Gedanken und Ausführungen enthält. W.

XXX. Convergenz der p -fach unendlichen Theta-Reihe.

Es kann die Untersuchung der Convergenz einer unendlichen Reihe mit positiven Gliedern immer reducirt werden auf die Untersuchung eines bestimmten Integrals nach folgendem Satz:

Es sei

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

eine Reihe mit positiven abnehmenden Gliedern, ferner $f(x)$ eine mit wachsendem x abnehmende Function, so ist:

$$f(a) > \int_a^{a+1} f(x) dx > f(a+1)$$

und mithin:

$$f(1) + f(2) + \cdots + f(n) > \int_0^{n+1} f(x) dx > f(1) + f(2) + \cdots + f(n+1).$$

Die Reihe

$$f(1) + f(2) + f(3) + \cdots$$

convergirt und divergirt daher gleichzeitig mit dem Integral $\int_0^\infty f(x) dx$.

Ist nun $f(n)$ positiv und $a_n < f(n)$, so wird die Reihe:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

ebenfalls convergiren, sobald jenes Integral convergirt. Daraus folgt der Satz:

Ist $a_n < f(x)$, sobald $n \geq x$ ist, so convergirt die Reihe $\sum a_n$, sobald das Integral $\int f(x) dx$ convergirt.

*) Diese und die folgende Abhandlung sind einer Vorlesung entnommen, welche Riemann in den Jahren 1861 und 1862 gehalten hat. Der Bearbeitung liegt ein von G. Roch geführtes Heft zu Grunde.

Setzt man nun $x = \varphi(y)$, $f(x) dx = F(y)\varphi'(y) dy$, so erhält man

$$\int_0^\infty f(x) dx = \int_b^\infty F(y)\varphi'(y) dy.$$

Wenn nun die beiden Variablen x, y gleichzeitig ab- und zunehmen (und zwar bis unendlich), so wird nach den gemachten Voraussetzungen mit wachsendem y $F(y)$ abnehmen, $\varphi'(y)$ wachsen. Darnach gehen die oben gefundenen Bedingungen der Convergenz in folgende über:

Die Reihe $\sum a_n$ convergirt, wenn für $n \geq \varphi(y)$, $a_n < F(y)$, oder, was dasselbe ist, wenn für $a_n \geq F(y)$, $n < \varphi(y)$ ist und das Integral

$$\int_b^\infty F(y)\varphi'(y) dy$$

convergirt.

Ist nun $a_n > F(y)$, so sind es auch $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$. Ist also $a_{n+1} < F(y)$, so ist n die Anzahl der Reihenglieder, welche grösser als $F(y)$ sind. Daher lässt sich der Satz auch so ausdrücken:

Sind $F(y), \varphi(y)$ zwei Functionen, von denen die erste mit wachsendem y abnimmt, die zweite (ins Unendliche) zunimmt, und ist die Anzahl der Glieder einer Reihe mit positiven Gliedern, die gleich oder grösser als $F(y)$ sind, kleiner als $\varphi(y)$, so convergirt die Reihe, wenn das Integral $\int_b^\infty F(y)\varphi'(y) dy$ convergirt.

Es sollen nun solche Functionen für die p -fach unendliche ϑ -Reihe

$$\sum_{m_1, \dots, m_p} e^{-\sum_{\mu, \nu} a_{\mu, \nu} m_\mu m_\nu + 2 \sum_\mu m_\mu v_\mu}$$

aufgesucht werden, in der wir, ohne die Allgemeinheit zu beeinträchtigen, zunächst voraussetzen können, die Grössen $a_{\mu, \nu}$ und v_μ seien reell.

Das allgemeine Glied dieser Reihe:

$$e^{-\sum a_{\mu, \nu} m_\mu m_\nu + 2 \sum m_\mu v_\mu}$$

ist grösser als e^{-M} , wenn

$$\sum_{\mu, \nu} a_{\mu, \nu} m_\mu m_\nu - 2 \sum_\mu m_\mu v_\mu < M.$$

Für unsern Zweck kommt es also darauf an, festzustellen, wie viele Combinationen der ganzen Zahlen $m_1, m_2, \dots, m_p$ dieser Ungleichung genügen.

XXX. CONVERGENZ DER p -FACH UNENDLICHEN THETA-REIHE.

Zu dem Ende betrachten wir zunächst das mehrfache bestimmte Integral

$$A = \frac{1}{f} \int dx_1 dx_2 \dots dx_p,$$

dessen Begrenzung gegeben ist durch die Ungleichung

$$-\sum_1^p \sum_1^p a_{\iota, \iota'} x_{\iota} x_{\iota'} < 1.$$

Das Integral wird immer, und nur dann einen endlichen Werth haben, wenn die homogene Function zweiten Grades

$$-\sum_1^p \sum_1^p a_{\iota, \iota'} x_{\iota} x_{\iota'}$$

in eine Summe von p positiven Quadraten zerlegt werden kann. Denn ist

$$-2 \sum a_{\iota \iota'} x_{\iota} x_{\iota'} = t_1^2 + t_2^2 + \dots + t_p^2,$$

so ist die Begrenzung des Integrals bestimmt durch die Ungleichung

$$t_1^2 + t_2^2 + \dots + t_p^2 < 1$$

und das Integral A wird:

$$A = \iint \dots \int \frac{1}{\sqrt{\sum t^2}} \frac{\partial(x_1, \dots, x_p)}{\partial(t_1, \dots, t_p)} dt_1 dt_2 \dots dt_p.$$

Die Functionaldeterminante ist eine endliche Constante und von den Variablen t kann keine absolut grösser als 1 werden.

Wären andererseits die t^2 nicht alle positiv, oder würden einige in der transformirten Form fehlen, so würden im Integral A auch unendliche Werthe von t vorkommen und somit A selbst unendlich werden.

Dieses Ergebniss wird in Nichts geändert, wenn wir statt der oben angenommenen Begrenzung des Integrals A die folgende nehmen:

$$-\sum_1^p \sum_1^p a_{\iota, \iota'} x_{\iota} x_{\iota'} - 2 \sum_1^p \alpha_{\iota} x_{\iota} < 1,$$

wenn die α_{ι} beliebige reelle Grössen sind. Betrachten wir nun die Ungleichung

$$-\sum_1^p \sum_1^p a_{\iota, \iota'} m_{\iota} m_{\iota'} - 2 \sum_1^p \alpha_{\iota} m_{\iota} < \frac{2h^2}{\pi},$$

oder, indem wir $y = \frac{x}{h}$ setzen, so folgt zunächst, dass für jedes endliche h nur eine endliche Anzahl von Combinationen der ganzen Zahlen $m_1, m_2, \dots, m_p$ dieser Ungleichung genügt, denn die x_i müssen alle innerhalb gewisser endlicher Grenzen bleiben, und innerhalb solcher Grenzen giebt es nur eine endliche Anzahl rationaler Zahlen mit gegebenem Nenner h .

Es sei also B_h die Anzahl der zulässigen Combinationen der Zahlen m . Betrachtet man nun die über alle diese Combinationen erstreckte Summe

$$\sum_{m_1+1}^{m_1+1} \sum_{m_2+1}^{m_2+1} \cdots \sum_{m_p+1}^{m_p+1} \int dx_1 \int dx_2 \dots \int dx_p = \frac{B_h}{h^p},$$

so ist dieselbe für jedes endliche h endlich und nähert sich mit unendlich wachsendem h der Grenze A , von der wir nachgewiesen haben, dass sie gleichfalls endlich ist, falls die Function $-\sum \sum a_{i,i'} x_i x_{i'}$ durch p positive Quadrate darstellbar ist. Setzt man diese Summe daher gleich $A + \varepsilon_h$, so ist ε_h eine endliche Grösse, die mit unendlich wachsendem h gegen 0 convergirt. Es ist also

$$B_h = (A + \varepsilon_h)h^p,$$

und dies ist die Anzahl n der Glieder der Theta-Reihe, welche $> e^{-h^2}$ sind. Es ist sonach

$$n < (A + \varepsilon_h)h^p,$$

worin ε_h eine Constante ist, der man, wenn man nur das h , von dem man ausgeht, gross genug annimmt, einen beliebig kleinen Werth ertheilen kann. Die Functionen $F(h)$, $\Phi(h)$ können also folgendermassen angenommen werden

$$F(h) = Ah^p, \quad \Phi(h) = \varepsilon_h h^p,$$

und da das Integral

$$\int_0^\infty e^{-h^2} (A + \varepsilon_h) h^p \cdot h^{p-1} dh$$

convergirt, so gilt das gleiche von der ϑ -Reihe unter der angegebenen Voraussetzung. Hieraus schliesst man: *Die p -fach unendliche Theta-Reihe convergirt für alle Werthe der Variablen $v_1, v_2, \dots, v_p$, falls der reelle Theil der quadratischen Form im Exponenten wesentlich negativ ist.*

XXXI. ZUR THEORIE DER ABEL'SCHEN FUNCTIONEN.

Es sei $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_p)$ ein Grössensystem, welches die Eigenschaft hat, dass

$$\vartheta(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_p) = 0$$

ist. Nach Art. 23 der Abhandlung über die Theorie der Abel'schen Functionen (S. 134) lässt sich unter dieser Voraussetzung die Congruenz befriedigen

$$\left(\sum_1^{p-1} \alpha_t^{(\mu)} - \sum_1^{p-1} u_t^{(\mu)} \right) \equiv \left(\sum_1^{2p-2} \alpha_t^{(\nu)} - \sum_1^{2p-2} u_t^{(\nu)} \right),$$

durch gewisse Punkte $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{2p-2}$, welche durch eine Gleichung $\mathfrak{g} = 0$ verknüpft sind. Sind daher u_t und u'_t die Werthe, welche die Integrale erster Gattung w_t für zwei unbestimmte Werthsysteme s, z und s_1, z_1 annehmen, so verschwindet die Function

$$\vartheta(w_1 - u'_1 - \varepsilon_1, \dots, w_p - u'_p - \varepsilon_p)$$

als Function von s, z betrachtet für $(s, z) = (s_1, z_1)$ und in den $p-1$ Punkten $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{p-1}$; als Function von s_1, z_1 betrachtet in $(s_1, z_1) = (s, z)$ und in den Punkten $\eta_p, \dots, \eta_{2p-2}$. Ist also $(f_1, f_2, \dots, f_p)$ ein Grossensystem von denselben Eigenschaften wie $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_p)$, so wird die Function

$$\frac{\vartheta(w_1 - u'_1 - \varepsilon_1, \dots)}{\vartheta(w_1 - u'_1 + f_1, \dots)} \cdot \frac{\vartheta(w_1 - u_1 + f_1, \dots)}{\vartheta(w_1 - u_1 - \varepsilon_1, \dots)}$$

die sowohl in Bezug auf s, z als in Bezug auf s_1, z_1 rational ist, in je einem durch eine Gleichung $\mathfrak{g} = 0$ verknüpften Punktsystem unendlich gross und unendlich klein von der ersten Ordnung werden, und wird daher darstellbar sein in der Form

$$\frac{\sum_1^p b_t \varphi_t(s, z)}{\sum_1^p c_t \varphi_t(s, z)} : \frac{\sum_1^p b_t \varphi_t(s_1, z_1)}{\sum_1^p c_t \varphi_t(s_1, z_1)}, \quad (1)$$

worin die Coefficienten b, c von s, z und s_1, z_1 unabhängig sind.

Wenn nun die Grössensysteme ε, f die Eigenschaft haben, dass

$$(f_1, f_2, \dots, f_p) = (-f_1, -f_2, \dots, -f_p)$$

ist, so fallen die Punkte, in denen die Function (1) oder (2) Null resp. unendlich wird, paarweise zusammen und wir erhalten eine Function, welche nur in $p-1$ Punkten unendlich gross und unendlich klein von der zweiten Ordnung wird. Hiernach ist die Function

$$\sqrt{\frac{\sum_1^p b_t \varphi_t(s, z)}{\sum_1^p c_t \varphi_t(s, z)}}$$

wie die Fläche T' verzweigt und nimmt beim Ueberschreiten der Querschnitte Factoren an, welche $= \pm 1$ sind. Die auf diese Weise bestimmten Functionen

$$\sqrt{\frac{\sum_1^p b_\iota \varphi_\iota(s, z)}{\sum_1^p c_\iota \varphi_\iota(s, z)}},$$

welche in $p - 1$ Punkten unendlich klein in der ersten Ordnung werden, heissen *Abel'sche Functionen*. Sie entstehen aus den Functionen φ durch paarweises Zusammenfallen der ϑ -Punkte und Wurzelziehen.

Die Anzahl dieser Functionen ist im Allgemeinen eine endliche. Es verlangt nämlich die Congruenz (3), dass die Grössensysteme ε, f von der Form seien

$$\left(\sum_1^p \varepsilon_\iota \tau^{(\iota)} + \sum_1^p h^{(\iota)} \pi^{(\iota, \iota)} + \dots + \frac{1}{2} h^{(p)} \pi^{(p, p)} \right),$$

worin die $\varepsilon, \varepsilon'$ ganze Zahlen bedeuten, welche auf ihre kleinsten Reste (modulo 2) reducirt werden können. Die Bedingung $\vartheta(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_p) = 0$ wird durch ein solches Grössensystem im Allgemeinen nur erfüllt, wenn

$$\varepsilon'_1 \varepsilon_1 + \varepsilon'_2 \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon'_p \varepsilon_p \equiv 1 \pmod{2} \quad (2)$$

ist. Solcher Zahlensysteme $\varepsilon, \varepsilon'$ existiren aber $2^{p-1}(2^p - 1)$, und so gross ist daher auch im Allgemeinen die Zahl der Abel'schen Functionen.

Der Zahlencomplex

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_1, & \varepsilon_2, & \dots, & \varepsilon_p \\ \varepsilon'_1, & \varepsilon'_2, & \dots, & \varepsilon'_p \end{pmatrix}$$

heisst die *Charakteristik* der Function

$$\sqrt{\frac{\sum_1^p b_\iota \varphi_\iota(s, z)}{\sum_1^p c_\iota \varphi_\iota(s, z)}}$$

und wird mit

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p \\ \varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_p \end{pmatrix} \left(\sqrt{\sum_1^p c_\iota \varphi_\iota(s, z)} \right)$$

bezeichnet. Man nennt die Charakteristik *ungerade*, wenn die Congruenz (4) erfüllt ist, sonst *gerade*. Die Anzahl der geraden Charakteristiken beträgt $2^{p-1}(2^p + 1)$ und diesen entsprechen im Allgemeinen keine Abel'schen Functionen.

Unter der *Summe* zweier Charakteristiken versteht man die Charakteristik, welche durch Addition entsprechender Elemente entsteht, wonach die Elemente immer auf 0 oder 1 reducirt werden können. Summe und Differenz zweier Charakteristiken sind daher identisch.

Es soll nun zunächst die Gleichung $F(s, z) = 0$ durch Einführung neuer Variablen in eine symmetrische Form gebracht werden. Ist $p > 3$, so existiren mindestens drei von einander linear unabhängige Functionen φ , und man kann daher die Gleichung $F(s, z) = 0$ umformen durch Einführung der Variablen

$$\xi = \frac{\varphi_1}{\varphi_3}, \quad \eta = \frac{\varphi_2}{\varphi_3},$$

(falls zwischen diesen keine identische Gleichung besteht, was im Allgemeinen nicht der Fall ist).

Genügen die Functionen $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ nicht besonderen Bedingungen, so gehören zu jedem Werth von ξ $2p - 2$ Werthe von η und umgekehrt, da jede der beiden Functionen

$$\varphi_1 - \xi\varphi_3, \quad \varphi_2 - \eta\varphi_3$$

für ein constantes ξ , resp. η in $2p - 2$ Punkten verschwindet. Die resultirende Gleichung $F(\xi, \eta) = 0$ ist also in Bezug auf jede der Variablen vom Grade $2p - 2$. Da ausserdem dieser Grad erhalten bleiben muss, wenn für ξ, η irgend eine lineare Substitution gemacht wird, so kann in dieser Gleichung kein Glied in Bezug auf ξ, η zusammengenommen die $(2p - 2)$ te Dimension übersteigen. Die übrigen Functionen φ werden, durch ξ, η ausgedrückt, in Functionen übergehen, in denen kein Glied die $(2p - 5)$ te Dimension überschreiten kann, wie man daraus erkennt, dass $\int \varphi d\eta$ endlich bleiben muss für unendliche Werthe von ξ und η .

Die Anzahl der Constanten, die in einer solchen Function $(2p - 5)$ ten Grades vorkommt, ist $= (p - 2)(2p - 3)$. Bestimmt man r von ihnen so, dass die Functionen φ für die r Werthe paare (γ, δ) , wo $\frac{\partial F}{\partial \xi}, \frac{\partial F}{\partial \eta}$ zugleich verschwinden, ebenfalls 0 werden, so müssen p Constanten übrig bleiben, da es p linear unabhängige Integrale erster Gattung giebt. Es ist demnach

$$(p - 2)(2p - 3) = p + r$$

und folglich:

$$r = 2(p - 1)(p - 3).$$

Zu demselben Ergebniss gelangt man auf folgendem Wege: Die Function φ wird in $(2p - 2)(2p - 3)$ Punkten unendlich klein von der ersten Ordnung, und diese Zahl ist $= w + 2r$, wenn w die Anzahl der einfachen Verzweigungspunkte ist. Andererseits ist (Theorie der Abel'schen Functionen Art. 7, S. 113)

$$w = 2(n + p - 1), \quad n = 2p - 2,$$

also

$$w = 2(3p - 3),$$

mithin:

$$r = (p - 1)(2p - 3) - \frac{1}{2}w = 2(p - 1)(p - 3).$$

Werden nun sämmtliche Functionen φ durch ξ, η ausgedrückt, so müssen die beiden Gleichungen:

$$\varphi = 0, \quad F = 0$$

identisch werden, also:

$$\varphi = Q \cdot F + R.$$

Es muss mithin eine Function φ_4 geben, die in Bezug auf ξ, η nur von der $(2p - 6)$ ten Dimension ist. Diese Function φ wird also für $(2p - 2)(2p - 6) = 2r$ der Gleichung $F = 0$ genügende Werthe- paare von ξ, η verschwinden und wird demnach nur in den r Punkt- paaren (γ, δ) gleich Null werden können.

Endlich geht durch Einführung der neuen Variablen $\xi = \frac{x}{z}, \eta = \frac{y}{z}$ und Multiplication mit z^{2p-2} die Gleichung $F = 0$ in eine homogene Gleichung vom Grade $2p - 2$ für die drei Veränderlichen x, y, z über:

$$F(x, y, z) = 0.$$

Wie wir gesehen haben, ist unter den Functionen φ eine von der $(2p - 6)$ ten Ordnung in Bezug auf ξ, η ; bezeichnen wir diese mit ψ , so ist ψ eine für endliche ξ, η immer endliche Function, die für unendliche ξ und η unendlich von der ersten Ordnung wird. Um- gekehrt kann jede Function, die diese Eigenschaften hat, in der Form ψ dargestellt werden. (Theorie der Abel'schen Functionen Art. 10, S. 118.)

Functionen, die für endliche Werthe von ξ, η endlich bleiben und für unendliche ξ, η unendlich in der zweiten Ordnung werden, sind in der Form darstellbar

$$\frac{f(\xi, \eta)}{\psi(\xi, \eta)},$$

wo $f(\xi, \eta)$ eine ganze Function von der $(2p - 4)$ ten Dimension in ξ, η ist, die für die r Werthepaare γ, δ verschwinden muss. Die Function $f(\xi, \eta)$ enthält

$$(p - 1)(2p - 3) - r = 3p - 3$$

Constanten und kann daher (Abel'sche Functionen Art. 5, S. 107) jede Function von diesen Eigenschaften darstellen. Die Function $f(\xi, \eta)$ wird, ausser in den r Werthepaaren γ, δ , in $4p - 4$ Punkten unendlich klein in der ersten Ordnung.

Zu diesen Functionen gehört jede Function zweiten Grades von den $p - 1$ Variablen $\frac{\varphi_i}{\varphi_3}$; eine solche enthält $\frac{p(p-1)}{2}$ Constanten. Da aber die allgemeine

Function $\frac{f}{\psi}$ nur $3p - 3$ Constanten enthält, so müssen zwischen den $p - 1$ Variablen $\frac{\varphi_1}{\varphi_3}$

$$\frac{1}{2}p(p-1) - 3p + 3 = \frac{1}{2}(p-2)(p-3)$$

Gleichungen zweiten Grades bestehen, oder, was dasselbe ist, zwischen den p Functionen φ müssen $\frac{1}{2}(p-2)(p-3)$ homogene Gleichungen zweiten Grades bestehen.

Für den Fall $p = 3$ ist die Gleichung $F(\xi, \eta) = 0$ oder $F(x, y, z) = 0$ vom vierten Grad; es ist $r = 0$ und die Function ψ reducirt sich auf eine Constante. Keine der Functionen φ kann den ersten Grad übersteigen und der allgemeine Ausdruck dieser Functionen ist

$$\varphi = cx + c'y + c''z,$$

oder, wo es nur auf die Verhältnisse solcher Functionen ankommt,

$$\varphi = cx + c'y + c''z,$$

worin c, c', c'' Constanten sind. Jede Function φ wird in vier Punkten unendlich klein von der ersten Ordnung und es giebt 28 solcher Functionen, deren Nullpunkte paarweise zusammenfallen. Die Quadratwurzeln aus diesen sind die Abel'schen Functionen und wir haben zu untersuchen, wie sich die Charakteristiken diesen 28 Functionen zuordnen.

*) Dieser Abschnitt ist erst in der neuen Auflage hinzugekommen.

492

Führen wir als Variable x, y, z drei solche Functionen φ ein, welche zweimal unendlich klein in der zweiten Ordnung werden, so dass $\sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{z}$ Abel'sche Functionen sind, so hat die daraus hervorgehende Gleichung $F(x, y, z) = 0$ die Eigenschaft, in ein vollständiges Quadrat überzugehen, wenn x oder y oder $z = 0$ gesetzt werden. Es sei daher

$$\text{für } x = 0 : F = (y - \alpha z)^2 (y - \alpha' z)^2$$

$$\text{für } y = 0 : F = (z - \beta x)^2 (z - \beta' x)^2$$

$$\text{für } z = 0 : F = (x - \gamma y)^2 (x - \gamma' y)^2.$$

Sind nun a, b, c die Coefficienten von x^2, y^2, z^2 in $F(x, y, z)$, so ist:

$$\alpha\alpha' = \pm\sqrt{\frac{c}{a}}, \quad \beta\beta' = \pm\sqrt{\frac{a}{b}}, \quad \gamma\gamma' = \pm\sqrt{\frac{b}{c}}$$

und folglich:

$$\alpha\alpha'\beta\beta'\gamma\gamma' = \pm 1. \quad (3)$$

Kennt man daher die Grössen $\alpha, \alpha', \beta, \beta', \gamma, \gamma'$, so kann man alle Glieder der Function $F(x, y, z)$ bilden, welche nicht das Product xyz enthalten, und F enthält ausserdem nur noch ein Glied $xyz \cdot t$, worin t eine lineare homogene Function von x, y, z ist.

Wenn nun in der Gleichung (5) das obere Zeichen gilt, so kann man den ersteren Theil von F immer darstellen als das Quadrat einer homogenen Function zweiten Grades f von x, y, z . Denn setzen wir

$$f = a_{1,1}x^2 + a_{2,2}y^2 + a_{3,3}z^2 + 2a_{2,3}yz + 2a_{3,1}zx + 2a_{1,2}xy,$$

so ergeben sich zur Bestimmung der Coefficienten $a_{\iota,\iota'}$ die Gleichungen:

$$\begin{aligned} a_{3,3} &= 1, & a_{2,2} &= \alpha\alpha', & a_{1,1} &= \beta\beta'\gamma\gamma', \\ a_{2,3} &= -\frac{1}{2}(\alpha + \alpha'), & a_{3,1} &= -\frac{1}{2}(\beta + \beta'), & a_{1,2} &= -\frac{1}{2}(\gamma + \gamma'). \end{aligned}$$

Die Determinante der Form f ist

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix} = a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + 2a_{2,3}a_{3,1}a_{1,2} - a_{1,1}a_{2,3}^2 - a_{2,2}a_{3,1}^2 - a_{3,3}a_{1,2}^2.$$

Setzt man hierin die obigen Werthe ein, so erhält man nach einigen Reductionen:

$$\Delta_f = -\frac{1}{4}(\alpha - \alpha')^2(\beta - \beta')^2(\gamma - \gamma')^2.$$

Es ist also $\Delta_f = 0$, wenn zwei der Grössen α, α' zusammenfallen, was nicht der Fall sein soll. Die Form f ist daher im Allgemeinen eine definite Form und das Quadrat derselben stellt den ersten Theil von F dar.

Wenn in der Gleichung (5) das untere Zeichen gilt, so kann man den ersteren Theil von F als Product zweier linearer Factoren darstellen, welche conjugirt imaginär sind. Man setze:

$$\begin{aligned} f_1 &= \sqrt{\alpha\alpha'}y + \sqrt{\beta\beta'}z + \sqrt{\gamma\gamma'}x, \\ f_2 &= \sqrt{\alpha\alpha'}y - \sqrt{\beta\beta'}z - \sqrt{\gamma\gamma'}x, \\ f_3 &= -\sqrt{\alpha\alpha'}y + \sqrt{\beta\beta'}z - \sqrt{\gamma\gamma'}x, \\ f_4 &= -\sqrt{\alpha\alpha'}y - \sqrt{\beta\beta'}z + \sqrt{\gamma\gamma'}x, \end{aligned}$$

so ist $f_1f_2f_3f_4$ eine homogene Function zweiten Grades, welche für $x = 0, y = 0, z = 0$ in ein vollständiges Quadrat übergeht. Die allgemeinste Function dieser Art ist

$$Af_1^2 + Bf_2^2 + Cf_3^2 + Df_4^2,$$

worin $A + B + C + D = 0$.

Für die Charakteristiken ergibt sich Folgendes. Es seien

$$(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g)$$

sieben ungerade Charakteristiken, von denen je drei eine gerade Summe geben; die Summe aller sieben ist gleichfalls gerade. Bildet man alle ungeraden Charakteristiken, welche aus je dreien derselben durch Summen-

bildung entstehen, so erhält man $35 = 7 + \binom{7}{3}$ solcher Charakteristiken und die übrigen 28 ungeraden Charakteristiken sind von der Form

$$(a) + (b), (a) + (c), \dots, (f) + (g).$$

Diesen letzteren entsprechen die 28 Abel'schen Functionen.

494

Wir bezeichnen die Charakteristiken der sieben Functionen $\sqrt{x}$, $\sqrt{y}$, $\sqrt{z}$, $\sqrt{x+y+z}$, $\sqrt{x+\alpha y+\alpha'z}$, $\sqrt{x+\beta y+\beta'z}$, $\sqrt{x+\gamma y+\gamma'z}$ respective mit

$$(g), (a), (b), (c), (d), (e), (f),$$

so dass die Charakteristik von $\sqrt{x}$ gleich (g) , die von $\sqrt{y}$ gleich (a) , die von $\sqrt{z}$ gleich (b) ist u. s. w. Die Charakteristik der Function

$$\sqrt{(y-\alpha z)(y-\alpha'z)} = \sqrt{y^2 - (\alpha + \alpha')yz + \alpha\alpha'z^2}$$

ist dann $(a) + (b)$; ebenso ist die Charakteristik von $\sqrt{(z-\beta x)(z-\beta'x)}$ gleich $(b) + (g)$ und die von $\sqrt{(x-\gamma y)(x-\gamma'y)}$ gleich $(g) + (a)$.

Soll nun die Function $F(x, y, z)$ verschwinden, so müssen die drei Factoren von F , welche den drei verschiedenen Darstellungen von F als Quadrat entsprechen, gleichzeitig $= 0$ sein. Dies giebt die Gleichungen:

$$\begin{array}{lll} y - \alpha z = 0, & z - \beta x = 0, & x - \gamma y = 0, \\ y - \alpha' z = 0, & z - \beta' x = 0, & x - \gamma' y = 0. \end{array}$$

Die eine dieser Gleichungen ist eine Folge der beiden andern; denn aus $y = \alpha z$ und $z = \beta x$ folgt $x = \frac{1}{\alpha\beta}y$, also $\gamma = \frac{1}{\alpha\beta}$ oder $\alpha\beta\gamma = 1$, was wegen (5) mit dem oberen Zeichen erfüllt ist.

495

Aus diesen Gleichungen ergibt sich für die Charakteristiken:

$$\begin{array}{lll} (a) + (b) & = (c) + (d) & = (e) + (f), \\ (b) + (g) & = (c) + (e) & = (d) + (f), \\ (g) + (a) & = (c) + (f) & = (d) + (e). \end{array}$$

Hieraus folgt:

$$\begin{array}{l} (a) = (c) + (d) + (e) + (f), \\ (b) = (c) + (d) + (c) + (e) = (d) + (e), \\ (g) = (c) + (e) + (d) + (e) = (c) + (d). \end{array}$$

Die Summe aller sieben Charakteristiken ist also:

$$(a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) = 0.$$

Die Charakteristiken der 28 Abel'schen Functionen sind demnach:

$$\begin{aligned} &(a) + (b), (a) + (c), (a) + (d), (a) + (e), (a) + (f), (a) + (g), \\ &(b) + (c), (b) + (d), (b) + (e), (b) + (f), (b) + (g), \\ &(c) + (d), (c) + (e), (c) + (f), (c) + (g), \\ &(d) + (e), (d) + (f), (d) + (g), \\ &(e) + (f), (e) + (g), (f) + (g). \end{aligned}$$

Die vollständigen Gruppen $(p), (q), (r), (s), (t), (u), (v)$ von je vier Charakteristiken, deren Summe gerade ist, sind:

$$\begin{aligned} (p) &: (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) \\ (q) &: (a), (b), (c), (d), (a) + (b) + (c) + (d) \\ (r) &: (a), (b), (e), (f), (a) + (b) + (e) + (f) \\ (s) &: (a), (c), (e), (g), (a) + (c) + (e) + (g) \\ (t) &: (b), (c), (f), (g), (b) + (c) + (f) + (g) \\ (u) &: (a), (d), (f), (g), (a) + (d) + (f) + (g) \\ (v) &: (b), (d), (e), (g), (b) + (d) + (e) + (g) \end{aligned}$$

Gestützt auf diesen Satz kann man beliebige Charakteristiken den 28 Abel'schen Functionen zuordnen. Die Zuordnung geschieht am bequemsten durch die sieben Functionen, aus denen sich die 28 zusammensetzen. Man hat dazu die sieben Charakteristiken

$$(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g)$$

in einer beliebigen Weise zuzuordnen, nur mit der Beschränkung, dass die Summe aller sieben gerade ist. Für $p = 3$ giebt es im Ganzen 36 verschiedene Zuordnungen, welche in 3 Klassen zerfallen.

Die Relationen zwischen den Periodicitätsmoduln der Abel'schen Functionen lassen sich aus den Gleichungen (23) der Abhandlung über die Theorie der Abel'schen Functionen ableiten. Setzt man

$$v_\mu = \sum_1^p \alpha_\mu^{(\iota)} u_\iota + e_\mu,$$

so ist

$$4 \frac{\partial^2 \log \vartheta(v)}{\partial v_\mu \partial v_{\mu'}} = \frac{\partial^2 \log \vartheta(v)}{\partial u_\iota \partial u_{\iota'}}.$$

Für die Functionen zweiten Grades ergibt sich:

$$\sum_1^{2p-2} \varphi_\iota(\eta_\nu) \varphi_{\iota'}(\eta_\nu) = \frac{\partial^2 \log \vartheta}{\partial u_\iota \partial u_{\iota'}} - \frac{\partial^2 \log \vartheta'}{\partial u_\iota \partial u_{\iota'}}.$$

Hat man auf diese Weise $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon, \zeta, \eta$ in einer beliebigen Weise zuzuordnen, so erhält man die Relationen zwischen den Periodicitätsmoduln. Die Anzahl der unabhängigen Moduln ist für $p = 3$ gleich 6, und die Zahl der Moduln beträgt $\frac{p(p+1)}{2} = 6$. Die Relationen zwischen diesen Moduln sind daher von wesentlicher Bedeutung für die Theorie der Abel'schen Functionen.

Die vollständigen Gruppen $(p), (q)$ von Charakteristiken bestimmen die wesentlichen Eigenschaften der Abel'schen Functionen. Man erhält alle möglichen Systeme von 28 Abel'schen Functionen, indem man alle möglichen Zerlegungen der 36 geraden Charakteristiken in zwei ungerade Charakteristiken zu zerlegt.

Für $p > 3$ wird die Untersuchung auf analoge Weise durchgeführt. Die Anzahl der Abel'schen Functionen beträgt $2^{p-1}(2^p - 1)$, und die Anzahl der geraden Charakteristiken ist $2^{p-1}(2^p + 1)$. Die Beziehungen zwischen den Charakteristiken werden durch die Theorie der Thetafunctionen vollständig bestimmt.

Die vollständigen Gruppen von je vier Charakteristiken bestimmen die Zuordnung der Abel'schen Functionen zu den verschiedenen Werthsystemen der Variablen. Für die praktische Berechnung ist es wichtig, die verschiedenen Darstellungen der Charakteristiken in übersichtlicher Form zu haben.

Aus den Gleichungen (23) der Abhandlung ergeben sich ferner die folgenden Relationen zwischen den Periodicitätsmoduln:

$$\sum_{\mu} \frac{\partial^2 \log \vartheta}{\partial v_{\mu}^2} \cdot \omega_{\mu}^{(\iota)} \omega_{\mu}^{(\iota')} = \text{const.}$$

Ebenso schliesst man:

$$\frac{\partial^2 \log \vartheta}{\partial v_{\mu} \partial v_{\mu'}} = k_{\mu, \mu'} + (\text{höhere Glieder}).$$

Ebenso schliesst man:

$$\sum_{\iota} \frac{\partial \varphi_{\iota}}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \varphi_{\iota}}{\partial \eta} = 0,$$

und auf die gleiche Weise:

$$\frac{\partial^2 \log \vartheta}{\partial v_{\mu} \partial v_{\mu'}} = \sum_{\iota} \frac{\partial^2 \varphi_{\iota}}{\partial u_{\iota} \partial u_{\iota'}}.$$

Die hier entwickelten Principien gestatten eine vollständige Classification der Abel'schen Functionen und liefern die Grundlage für die Theorie der algebraischen Functionen und ihrer Integrale.

ANHANG.

FRAGMENTE PHILOSOPHISCHEN INHALTS.

507

Die philosophischen Speculationen, deren Ergebnisse, so weit sie sich aus dem Nachlass zusammenstellen lassen, hier mitgetheilt sind, haben Riemann einen grossen Theil seines Lebens hindurch begleitet. Über die Zeit der Entstehung der einzelnen Bruchstücke lässt sich schwer etwas Sicheres feststellen. Die vorhandenen Entwürfe sind weit entfernt von einer zusammenhängenden, zur Publication bereiten Ausarbeitung, wenn auch manche Stellen darauf deuten, dass Riemann zu gewissen Zeiten eine solche beabsichtigt hat; sie genügen allenfalls, um den Standpunkt Riemann's zu den psychologischen und natur- philosophischen Fragen im Allgemeinen zu charakterisiren, und den Gang anzudeuten, den seine Untersuchungen genommen haben, leider aber fehlt fast jede Ausführung ins Einzelne. Welchen Werth Riemann selbst diesen Arbeiten beigelegt hat, ergibt sich aus folgender Notiz:

Die Arbeiten, welche mich jetzt vorzüglich beschäftigen, sind

1. *In ähnlicher Weise wie dies bereits bei den algebraischen Functionen, den Exponential- oder Kreisfunctionen, den elliptischen und Abel'schen Functionen mit so grossem Erfolge geschehen ist, das Imaginäre in die Theorie anderer transcender Functionen einzuführen; ich habe dazu in meiner Inauguraldissertation die nothwendigsten allgemeinen Vorarbeiten geliefert. (Vgl. diese Dissertation Art. 20.)*
2. *In Verbindung damit stehen neue Methoden zur Integration partieller Differentialgleichungen, welche ich bereits auf mehrere physikalische Gegenstände mit Erfolg angewandt habe.*
3. *Meine Hauptarbeit betrifft eine neue Auffassung der bekannten Naturgesetze — Ausdruck derselben mittelst anderer Grundbegriffe — wodurch die Benutzung der experimentellen Data über die Wechselwirkung zwischen Wärme, Licht, Magnetismus und Electricität zur Erforschung ihres Zusammenhangs möglich wurde. Ich wurde dazu hauptsächlich durch das Studium der Werke Newton's, Euler's und — andererseits — Herbart's geführt. Was letzteren betrifft, so konnte ich mich den frühesten Untersuchungen Herbart's, deren Resultate in seinen früheren Werken (z. B. der*

508

noch nicht vollständig entwickelt sind), nicht anpassen; die späteren führten jedoch auf denselben Standpunkt, auf dem ich mich jetzt befinde.

*Nee mea dona tibi studio dispersa fidei
Intellecta prius quam sint, contemta relinquo.
Lucretius.*

I. ZUR PSYCHOLOGIE UND METAPHYSIK.

511

Mit jedem einfachen Denkkact tritt etwas Bleibendes, Substantielles in unsere Seele ein. Dieses Substantielle erscheint uns zwar als eine Einheit, scheint

aber (in sofern es der Ausdruck eines räumlich und zeitlich ausgedehnten ist) eine innere Mannigfaltigkeit zu enthalten; ich nenne es daher *Geistesmasse*". — Alles Denken ist hiernach Bildung neuer Geistesmassen.

Die in die Seele eintretenden Geistesmassen erscheinen uns als Vorstellungen; ihr verschiedener innerer Zustand bedingt die verschiedene Qualität derselben.

Die sich bildenden Geistesmassen verschmelzen, verbinden oder compliciren sich in bestimmtem Grade, theils unter einander, theils mit älteren Geistesmassen. Die Art und Stärke dieser Verbindungen hängt von Bedingungen ab, die von Herbart nur zum Theil erkannt sind und die ich in der Folge ergänzen werde. Sie beruht hauptsächlich auf der inneren Verwandtschaft der Geistesmassen.

Die Seele ist eine compacte, aufs Engste und auf die mannigfaltigste Weise in sich verbundene Geistesmasse. Sie wächst beständig durch eintretende Geistesmassen, und hierauf beruht ihre Fortbildung.

Die einmal gebildeten Geistesmassen sind unvergänglich, ihre Verbindungen unauflöslich; nur die relative Stärke dieser Verbindungen ändert sich durch das Hinzukommen neuer Geistesmassen.

512

Die Geistesmassen bedürfen zum Fortbestehen keines materiellen Trägers und üben auf die Erscheinungswelt keine dauernde Wirkung aus. Sie stehen daher in keiner Beziehung zu irgend einem Theile der Materie und haben daher keinen Sitz im Räume.

Dagegen bedarf alles Eintreten, Entstehen, alle Bildung neuer Geistesmassen eines materiellen Trägers. Der Denkact setzt ein mit einem materiellen Prozesse im Gehirn und hängt von diesem ab.

Die organischen Einrichtungen des Körpers erhalten theils ihre Bestimmung durch die Geistesmassen, welche im Lauf der Zeit sich gebildet haben, theils durch diejenigen, welche bei der Geburt bereits vorhanden sind und von den Eltern auf die Kinder übergehen. Die ersteren bilden die individuellen Eigenthümlichkeiten, die letzteren die Gemeinsamkeiten der Gattung.

513

2. Die Annahme einer Seele als eines einheitlichen Wesens, welches neben den Körpern besteht und diesen in den organischen Wesen inwohnt, ist für die Erklärung der Erscheinungen nicht erheblich; dieselben können auch ohne diese Annahme erklärt werden.

Die Seele ist vielmehr als eine *Gesammtheit* von Geistesmassen zu betrachten, welche in beständigem Wachsthum begriffen ist und deren Verbindungen sich durch das Hinzukommen neuer Geistesmassen ändern.

3. Die organischen Einrichtungen erhalten theils ihre Bestimmung durch die Geistesmassen, welche sich im Lauf der Zeit gebildet haben, theils durch diejenigen, welche bei der Geburt bereits vorhanden sind und von den Eltern auf die Kinder übergehen. Diese letzteren entsprechen den *Anlagen* der Organismen und bedingen die Gemeinsamkeiten der Gattung; die ersteren bilden die individuellen Eigenthümlichkeiten.

514

4. Der Organismus ist daher als ein Werkzeug zu betrachten, welches die Seele sich geschaffen hat, um ihre Thätigkeit auszuüben und ihre

Geistesmassen zu vermehren. Die verschiedenen Organe entsprechen verschiedenen Fähigkeiten der Seele und sind die materiellen Träger der Geistesmassen.

5. Die Lebenserscheinungen sind auf die Chemie und Physik zurückzuführen; es giebt keine besondere Lebenskraft. Die organische Bewegung ist eine Folge der chemischen und physikalischen Kräfte, welche in den Organismen wirken. Der Unterschied zwischen organischer und anorganischer Natur besteht nur in der verschiedenen Art und Weise der Zusammensetzung und Verbindung der Elemente.

515

6. Die Pflanzen und Thiere sind nicht durch einen wesentlichen Unterschied von einander getrennt; die Grenzen zwischen ihnen sind fließend. Die verschiedenen Organismen bilden eine stetige Reihe, in welcher die Uebergänge von der einen Form zur andern allmählich erfolgen.

7. Die Erscheinungen des Bewusstseins lassen sich auf die Wirkungen der Geistesmassen zurückführen. Das Bewusstsein ist das Resultat der Verbindungen zwischen den Geistesmassen und ihrer Wechselwirkung mit den materiellen Trägern. Das Selbstbewusstsein entsteht durch die Reflexion der Geistesmassen auf sich selbst und die Erkenntniss ihrer eigenen Thätigkeit.

516

8. Die Welt als solche hat keine objective Realität; sie existirt nur insofern, als sie vorgestellt wird. Die Dinge sind nichts als Complexe von Vorstellungen, und ihre Existenz ist bedingt durch das Denken. Die Annahme einer Welt an sich, unabhängig von den vorstellenden Subjecten, ist eine unberechtigte Hypothese.

9. Der Raum und die Zeit sind nicht objective Realitäten, sondern Formen der Anschauung. Sie gehören nicht den Dingen an sich an, sondern sind Bedingungen unseres Vorstellungsvermögens. Die geometrischen Wahrheiten sind nicht aus der Erfahrung abgeleitet, sondern haben ihre Gewissheit in der Natur des Vorstellungsvermögens.

517

10. Die Causalität ist ein Grundgesetz unseres Denkens; sie gehört nicht der Erscheinungswelt an, sondern ist eine Form unseres Verstandes. Jede Veränderung hat eine Ursache, und diese Ursache ist eine vorhergehende Veränderung. Das Causalgesetz ist nicht aus der Erfahrung abgeleitet, sondern ist eine nothwendige Voraussetzung jeder Erfahrung.

518

II. ERKENNTNISSTHEORETISCHES.

521

Versuch einer Lehre von den Grundbegriffen der Mathematik.

Die Bildung neuer Begriffe, soweit sie der Beobachtung nicht unmittelbar entnommen sind, geschieht durch Fortbildung und Erweiterung bereits vorhandener Begriffe. Diese Fortbildung kann in zwei Richtungen stattfinden: entweder durch Verallgemeinerung, indem man die besonderen Bestimmungen eines Begriffs aufhebt und ihn auf eine grössere Anzahl von Fällen anwendet, oder durch Specialisirung, indem man neue Bestimmungen hinzufügt und den Begriff einengt.

Die mathematischen Begriffe sind durch *Abstraction* aus den Anschau-

ungen entstanden. Die Zahl ist der Begriff, welcher aus der Anschauung der Menge durch Abstraction hervorgeht, indem man die besondere Beschaffenheit der Dinge, welche die Menge bilden, und ihre Anordnung vernachlässigt. Die geometrischen Begriffe sind durch Abstraction aus den Anschauungen des Raumes entstanden.

522

Die Grundbegriffe der Mathematik sind daher nicht aus der Erfahrung geschöpft, sondern haben ihren Ursprung in der Natur des menschlichen Geistes. Sie sind nothwendige Formen unseres Denkens und bedingen die Möglichkeit aller Erfahrung. Die mathematischen Wahrheiten sind daher apriorische Wahrheiten, d. h. sie haben ihre Gewissheit in der Natur des Erkenntnisvermögens und nicht in der Erfahrung.

I. Wann ist unsere Auffassung der Welt wahr?

Unsere Auffassung der Welt ist wahr, wenn sie mit den Gesetzen unseres Denkens übereinstimmt. Die Wahrheit einer Vorstellung besteht nicht in ihrer Uebereinstimmung mit einem Objecte an sich, sondern in ihrer Uebereinstimmung mit den Formen unseres Verstandes. Eine Vorstellung ist wahr, wenn sie sich mit den übrigen Vorstellungen, welche wir als wahr anerkennen, in Einklang befindet.

523

Die Frage nach der Wahrheit unserer Erkenntnis lässt sich daher nur beantworten durch den Nachweis, dass unsere Vorstellungen den Gesetzen des Denkens gemäss sind. Dieser Nachweis wird durch die Logik geliefert, welche die Formen des richtigen Denkens lehrt. Die Logik ist daher die Norm der Wahrheit, und jede Erkenntnis, welche den logischen Gesetzen widerspricht, ist falsch.

524

Causalität.

- I. Was ein Agens zu bewirken strebt, muss durch den Begriff des Agens bestimmt sein; seine Action kann von nichts Anderem als von seinem eigenen Wesen abhängen.
- II. Dieser Forderung wird genügt, wenn das Agens sich selbst zu erhalten oder herzustellen strebt.
- III. Eine solche Action ist aber nicht denkbar, wenn das Agens ein Ding, ein Seiendes ist, sondern nur, wenn es ein Zustand oder ein Verhältniss ist. Findet ein Streben, etwas zu erhalten oder herzustellen Statt, so müssen auch Abweichungen, und zwar in verschiedenen Graden, von diesem Etwas möglich sein; und es wird in der That, in sofern dieser Bestrebung andere Bestrebungen widerstreiten, nur möglichst nahe erhalten oder hergestellt werden. Es giebt aber keine Grade des Seins, eine gradweise Verschiedenheit ist nur von Zuständen oder Verhältnissen denkbar. Wenn also ein Agens sich selbst zu erhalten oder herzustellen strebt, so muss es ein Zustand oder ein Verhältniss sein.

IV. Eine solche Action eines Zustandes kann selbstredend nur auf solche Dinge stattfinden, die eines gleichen Zustandes fähig sind. Auf welche von diesen Dingen sie aber stattfindet und ob sie überhaupt stattfindet, kann aus dem Begriff des Agens nicht geschlossen werden.

*) Diese Sätze gelten nur, wenn einem einfachen Realgrund das Wirken zugeschrieben werden soll.

Wenn zwei Dinge a und b durch einen äusseren Grund in Verbindung treten, so kann entweder an die Verbindung, das Verbundeusein, selbst, oder auch an die Veränderung ihres Grades, eine Folge c geknüpft sein. Die einfachste Annahme ist, dass die Folge c an das Verbundeusein geknüpft ist.

Es ist unnöthig, diese Betrachtungen weiter fortzuführen.

525

III. NATURPHILOSOPHIE.

526

I. *Molecularmechanik.*

Die freie Bewegung eines Systems materieller Punkte $m_1, m_2, \dots$ mit den rechtwinkligen Coordinaten $x_1, y_1, z_1; x_2, y_2, z_2; \dots$, auf welche parallel den drei Axen die Kräfte $X_1, Y_1, Z_1; X_2, Y_2, Z_2; \dots$ wirken, geschieht den Gleichungen gemäss:

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = X_1, \quad m_1 \frac{d^2 y_1}{dt^2} = Y_1, \quad m_1 \frac{d^2 z_1}{dt^2} = Z_1. \quad (4)$$

Dies Gesetz kann auch so ausgesprochen werden: die Beschleunigungen bestimmen sich so, dass

$$\sum m_i \left[\left(\frac{d^2 x_i}{dt^2} - \frac{X_i}{m_i} \right)^2 + \left(\frac{d^2 y_i}{dt^2} - \frac{Y_i}{m_i} \right)^2 + \left(\frac{d^2 z_i}{dt^2} - \frac{Z_i}{m_i} \right)^2 \right]$$

ein Minimum wird; denn diese Function der Beschleunigungen nimmt ihren kleinsten Werth 0 an, wenn die Beschleunigungen sämmtlich den Gleichungen (1) gemäss bestimmt werden, d. h. die Grössen $\frac{d^2 x_i}{dt^2} - \frac{X_i}{m_i}$ sämmtlich = 0 sind, und sie nimmt auch nur dann einen Minimumwerth an; denn wäre eine dieser Grössen, z. B. $\frac{d^2 x_1}{dt^2} - \frac{X_1}{m_1}$, nicht gleich Null, so könnte man $\frac{d^2 x_1}{dt^2}$ immer stetig so ändern, dass der absolute Werth dieser Grösse und folglich ihr Quadrat abnähme. Die Function würde also dann kleiner werden, wenn man zugleich alle übrigen Beschleunigungen ungeändert liesse.

527

Diese Function der Beschleunigungen unterscheidet sich von

$$\sum m_i \left[\left(\frac{d^2 x_i}{dt^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2 y_i}{dt^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2 z_i}{dt^2} \right)^2 \right]$$

nur um eine Constante, d. h. eine von den Beschleunigungen unabhängige Grösse.

Wenn die Kräfte nur von Anziehungen und Abstossungen zwischen den Punkten herrühren, welche Functionen der Entfernung sind, und der i te Punkt und der i' te Punkt sich in der Entfernung r mit der Kraft $f_{i,i'}(r)$

abstossen oder mit der Kraft $-f_{i,i'}(r)$ anziehen, lassen sich bekanntlich die Componenten der Kräfte ausdrücken durch die partiellen Derivirten einer Function von den Coordinaten sämmtlicher Punkte

$$P = \sum_{i,i'} F_{i,i'}(r),$$

worin $F_{i,i'}(r)$ eine Function bedeutet, deren Derivirte $f_{i,i'}(r)$, und für i und i' je zwei verschiedene Indices zu setzen sind.

Substituirt man diese Werthe der Componenten in obiger Function der Beschleunigungen und multiplicirt dieselbe mit $\frac{1}{2}$, wodurch die Lage ihrer Maxima und Minima nicht geändert wird, so erhält man einen Ausdruck, der sich von

$$\sum \frac{m_i}{2} \left[\left(\frac{d^2 x_i}{dt^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2 y_i}{dt^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2 z_i}{dt^2} \right)^2 \right] + P$$

nur um eine von den Beschleunigungen unabhängige Grösse unterscheidet. Wenn die Lage und die Geschwindigkeiten der Punkte zur Zeit t gegeben sind, so bestimmt sich diese Lage zur Zeit $t + dt$ so, dass diese Grösse möglichst klein wird. Es findet demnach ein Streben statt, diese Grösse möglichst klein zu machen.

528

Dieses Gesetz kann man nun aus Actionen erklären, welche die einzelnen Glieder dieses Ausdrucks möglichst klein zu machen streben, wenn man annimmt, dass einander widerstrebende Actionen sich so zu componiren suchen, dass die Resultante ein Minimum wird.

Man kann das Gesetz der Bewegung auch als ein Streben der Masse m_i auffassen, ihren Bewegungszustand zu erhalten. Bezeichnen man nämlich

$$\frac{m_i}{2} \left[\left(\frac{d^2 x_i}{dt^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2 y_i}{dt^2} \right)^2 + \left(\frac{d^2 z_i}{dt^2} \right)^2 \right]$$

als Maass der Abweichung des Bewegungszustandes der Masse m_i zur Zeit $t + dt$ von ihrem Bewegungszustand zur Zeit t betrachtet, so ergibt die Zerlegung der Gesamttaction in Bezug auf jede Masse eine Action, welche die Abweichung ihres Bewegungszustandes zur Zeit $t + dt$ von ihrem Bewegungszustande zur Zeit t möglichst klein zu machen strebt, oder ein Streben ihres Bewegungszustandes, sich zu erhalten, und ausserdem eine Action, welche die Grösse $-P$ möglichst klein zu erhalten strebt.

529

Diese letztere Action lässt sich zerlegen in Bestrebungen, die einzelnen Glieder der Summe $\sum F_{i,i'}$ möglichst klein zu erhalten, d. h. in Anziehungen und Abstossungen zwischen je zwei Punkten, und dies würde zu der gewöhnlichen Erklärung der Bewegungsgesetze aus dem Gesetz der Trägheit und Anziehungen und Abstossungen zurückführen; sie lässt sich aber bei allen uns bekannten Naturkräften auch auf Kräfte, welche zwischen benachbarten Raumelementen thätig sind, zurückführen, wie im folgenden Artikel an der Gravitation erläutert werden soll.

II. *Neue mathematische Principien der Naturphilosophie.*

529

Obgleich die Ueberschrift dieses Aufsatzes bei den meisten Lesern schwerlich ein günstiges Vorurtheil erwecken wird, so schien sie mir doch die Tendenz desselben am besten zu bezeichnen. Ich habe mich nämlich bei den folgenden Untersuchungen hauptsächlich damit beschäftigt, die bekannten Naturgesetze auf möglichst wenige und möglichst einfache Grundprincipien zurückzuführen, und diese Principien in einer Form darzustellen, welche die weitere Entwicklung der Theorie erleichtert.

530

Der Ausgangspunkt meiner Untersuchungen ist die Annahme, dass der Weltraum mit einem Stoff erfüllt ist, welcher fortwährend in die ponderablen Atome strömt und dort aus der Erscheinungswelt verschwindet. Dieser Stoff ist der Träger der von den ponderablen Körpern ausgehenden Kräfte, und seine Bewegungsgesetze bestimmen die Erscheinungen, welche wir als Gravitation, Licht und Wärme beobachten.

531

Es mögen x, y, z die rechtwinkligen Coordinaten eines Punktes im Raume sein, und es mögen ξ, η, ζ die Componenten der Geschwindigkeit des Stoffes in diesem Punkte zur Zeit t bezeichnen. Dann bestehen zwischen diesen Grössen die Gleichungen:

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \zeta}{\partial z} = 0,$$

welche die Unzusammendrückbarkeit des Stoffes ausdrücken.

Die Kräfte, welche auf einen ponderablen Körper wirkt, ist bestimmt durch den Druck, welchen der Stoff auf denselben ausübt. Dieser Druck ist eine Function des Ortes und der Zeit, und seine Veränderungen pflanzen sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit im Raume fort.

532

Die Wirkungen ponderabler Materie auf ponderable Materie sind:

- 1) Anziehungs- und Abstossungskräfte umgekehrt proportional dem Quadrat der Entfernung.
- 2) Licht und strahlende Wärme.

Beide Classen von Erscheinungen lassen sich erklären, wenn man annimmt, dass den ganzen unendlichen Raum ein gleichartiger Stoff erfüllt, und jedes Stofftheilchen unmittelbar nur auf seine Umgebung einwirkt.

Das mathematische Gesetz, nach welchem dies geschieht, kann zerfällt gedacht werden:

1. in den Widerstand, mit welchem ein Stofftheilchen einer Volumänderung, und
2. in den Widerstand, mit welchem ein physisches Linienelement einer Verlängerung oder Verkürzung widerstrebt.

533

Der erste Widerstand äusst sich in dem Drucke, welchen der Stoff auf die in ihm befindlichen Körper ausübt; der zweite in den Kräften, welche die Lage der Körper gegen einander zu ändern streben.

Die Bewegungsgleichungen des Stoffes lassen sich aus einem Princip ableiten, welches dem Hamilton'schen Principe analog ist. Es ist dies das Princip der kleinsten Wirkung, welches besagt, dass die wirkliche Bewegung des Stoffes diejenige ist, für welche das Zeit- integral der lebendigen Kraft ein Minimum wird.

534

Die Bewegungsgleichungen lauten:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u,$$

worin u eine der Componenten der Verschiebung, a die Fortpflanzungs- geschwindigkeit und Δ der Laplace'sche Differentialoperator ist. Diese Gleichung gilt für die Longitudinalwellen; für die Transversalwellen hat man eine ähnliche Gleichung mit einer anderen Fortpflanzungs- geschwindigkeit.

Aus diesen Gleichungen ergeben sich sämmtliche bekannte Erscheinungen der Gravitation, des Lichtes und der Wärme, wenn man passende Annahmen über die Beschaffenheit des Stoffes und seine Wechselwirkung mit der ponderablen Materie macht.

BERNHARD RIEMANN'S
GESAMMELTE MATHEMATISCHE WERKE

Seiten 551–600

Nach der Originalausgabe von 1892 und den Nachträgen von 1902

Enthaltend:

III. Naturphilosophie (Fortsetzung) —

B. Riemann's Lebenslauf —

Vorrede zu den Nachträgen —

Vorlesungen über die allgemeine Theorie der Integrale algebraischer Differentialien

III. NATURPHILOSOPHIE

a. Gravitation und Licht. (Fortsetzung von S. 529)

Die Bewegung, welche im leeren Raum zur Erklärung der Schwerewirkungen angenommen werden muss, hat zur Folge, dass für jeden Raumpunkt (x_1, x_2, x_3) zur Zeit t eine gewisse Geschwindigkeit (v_1, v_2, v_3) existirt, welche sich aus den Geschwindigkeitscomponenten (u_1, u_2, u_3) der Schwerkraftbewegung und (w_1, w_2, w_3) der Lichtbewegung zusammensetzt, so dass

$$v_i = u_i + w_i \quad (i = 1, 2, 3).$$

Die Grössen u_i sind dadurch charakterisirt, dass

$$\frac{\partial u_1}{\partial x_1} + \frac{\partial u_2}{\partial x_2} + \frac{\partial u_3}{\partial x_3} = 0, \quad (1)$$

ferner (u_1, u_2, u_3) ein vollständiges Differential dV bilden, wobei

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} \right) V = 0 \quad (2)$$

ausserhalb der anziehenden Körper = 0 und hat für jedes ponderable Körperelement einen unveränderlichen Werth. Dieser ist das Product aus -4π in die absolute Grösse der Anziehungskraft, welche nach der Attractionstheorie demselben beigelegt werden muss, und durch dm bezeichnet werden soll.

2. Wenn alle anziehenden Körper sich innerhalb eines endlichen Raumes befinden, sind in unendlicher Entfernung r von einem Punkt dieses Raumes $r \frac{\partial V}{\partial x_1}$, $r \frac{\partial V}{\partial x_2}$, $r \frac{\partial V}{\partial x_3}$ unendlich klein.

Nach unserer Hypothese ist nun $\frac{\partial V}{\partial x_i} = u_i$ und folglich

$$dV = u_1 dx_1 + u_2 dx_2 + u_3 dx_3.$$

Dieses schliesst die Bedingungen ein:

$$\frac{\partial u_2}{\partial x_3} - \frac{\partial u_3}{\partial x_2} = 0, \quad \frac{\partial u_3}{\partial x_1} - \frac{\partial u_1}{\partial x_3} = 0, \quad \frac{\partial u_1}{\partial x_2} - \frac{\partial u_2}{\partial x_1} = 0, \quad (3)$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} \right) (u_1 dx_1 + u_2 dx_2 + u_3 dx_3) = 0, \quad (4)$$

$$ru_1 = 0, \quad ru_2 = 0, \quad ru_3 = 0, \quad \text{für } r = \infty. \quad (5)$$

Umgekehrt sind auch die Grössen u_i , wenn sie diesen Bedingungen genügen, den Componenten der Schwerkraft gleich. Denn die Bedingungen (1) enthalten die Möglichkeit einer Function U , von welcher das Differential $dU = u_1 dx_1 + u_2 dx_2 + u_3 dx_3$ und also die Differentialquotienten $\frac{\partial U}{\partial x_i} = u_i$ und die übrigen ergeben dann $U = V + \text{const}^*)$.

Die Bestimmung dieser Function gründet sich auf folgenden mathematischen **Satz**: Eine Function V des Ortes ist innerhalb eines endlichen Raumes bestimmt (abgesehen von einer Constanten), wenn sie nicht längs einer Fläche unstetig sein soll und für alle Elemente desselben

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} \right) V = 0,$$

an der Grenze entweder V oder deren Differentialquotient für eine Ortsänderung nach Innen senkrecht auf die Begrenzung gegeben ist. Wobei zu bemerken:

1. Wird dieser Differentialquotient im Begrenzungselement ds durch $\frac{\partial V}{\partial p}$ bezeichnet, so muss in letzterem Falle $\int \frac{\partial V}{\partial p} d\omega$ durch den ganzen Raum $= - \int \frac{\partial V}{\partial p} ds$ durch dessen Begrenzung sein; übrigens aber können in beiden Fällen sämtliche Bestimmungsstücke willkürlich angenommen werden und sind daher

)) Diese Function U ist also durch die Erfahrung (aus den relativen Bewegungen) mittelst der allgemeinen Bewegungsgesetze gegeben, aber nur abgesehen von einer linearen Function der Coordinaten, weil wir nur relative Bewegungen beobachten können.

zur Bestimmung nothwendig.

2. Für ein Raumelement, wo $\left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}\right)V$ unendlich gross wird, ist das Product dieses Ausdrucks in das Raumelement $dx_1 dx_2 dx_3$ durch $-\int \frac{\partial V}{\partial p} ds$ in Bezug auf die Begrenzung dieses Elements zu ersetzen.

3. Wenn nur innerhalb eines endlichen Raumes $\left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}\right)V$ einen von 0 verschiedenen Werth hat, so kann die Grenzbedingung dadurch ersetzt werden, dass in unendlicher Entfernung R von einem Punkte dieses Raumes $R \frac{\partial V}{\partial x_i}$ unendlich klein sein soll.

b. Bewegung, welche nur Lichterscheinungen verursacht.

Die Bewegung, welche im leeren Raum zur Erklärung der Lichterscheinungen angenommen werden muss, kann betrachtet werden (zufolge eines Theorems) als zusammengesetzt aus ebenen Wellen, d. h. aus solchen Bewegungen, wo längs jeder Ebene einer Schaar paralleler Ebenen (Wellenebenen) die Bewegungsform constant ist. Jedes dieser Wellensysteme besteht dann (der Erfahrung nach) aus Bewegungen parallel der Wellenebene, die sich mit einer für alle Bewegungsformen (Arten des Lichts) gleichen constanten Geschwindigkeit c senkrecht zur Wellenebene fortpflanzen.

Sind für ein solches Wellensystem l_1, l_2, l_3 rechtwinklige Coordinaten eines Raumpunktes, die erste senkrecht, die andern parallel zur Wellenebene, $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ die ihnen parallelen Geschwindigkeitscomponenten in diesem Punkte zur Zeit t , so hat man:

Der Erfahrung nach ist erstlich:

$$\omega_1 = 0,$$

zweitens ist die Bewegung zusammengesetzt aus einer nach der positiven und einer nach der negativen Seite der Wellenebene mit der Geschwindigkeit c fortschreitenden Bewegung. Sind ω' die Geschwindigkeitscomponenten der ersteren, ω'' die der letzteren, so bleiben die ω' ungeändert, wenn t um dt und l_1 um $c dt$ wächst, die ω'' , wenn t um dt und l_1 um $-c dt$ wächst, und man hat $\omega = \omega' + \omega''$. Hieraus folgt:

$$\left(\frac{\partial \omega'}{\partial l_1} + \frac{1}{c} \frac{\partial \omega'}{\partial t} \right) dt = 0, \quad \left(\frac{\partial \omega''}{\partial l_1} - \frac{1}{c} \frac{\partial \omega''}{\partial t} \right) dt = 0,$$

also

$$\frac{\partial^2 \omega'}{\partial l_1^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \omega'}{\partial t^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 \omega''}{\partial l_1^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \omega''}{\partial t^2} = 0,$$

und da $\omega = \omega' + \omega''$:

$$\frac{\partial^2 \omega}{\partial l_1^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \omega}{\partial t^2} = 0.$$

Diese Gleichungen geben folgende symmetrische:

$$\frac{\partial^2 \omega_i}{\partial l_1^2} + \frac{\partial^2 \omega_i}{\partial l_2^2} + \frac{\partial^2 \omega_i}{\partial l_3^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \omega_i}{\partial t^2} \quad (i = 1, 2, 3),$$

welche, ausgedrückt durch das ursprüngliche Coordinatensystem, in Gleichungen von derselben Form übergehen, d. h. in

$$\frac{\partial^2 \omega_i}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \omega_i}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 \omega_i}{\partial x_3^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \omega_i}{\partial t^2}.$$

Diese Gleichungen gelten für jede den Punkt (x_1, x_2, x_3) zur Zeit t durchschreitende ebene Welle und folglich auch für die aus allen zusammengesetzte Bewegung.

c. Bewegung, welche beiderlei Erscheinungen verursacht.

Aus den gefundenen Bedingungen für u und ω fließen folgende Bedingungen für v oder Gesetze der Stoffbewegung im leeren Räume:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \alpha \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} \right) \right) \left(\frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} + \frac{\partial v_3}{\partial x_3} \right) = 0 \quad (\text{I})$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \alpha \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} \right) \right) \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_k} - \frac{\partial v_k}{\partial x_i} \right) = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{II})$$

wie sich leicht ergibt, wenn man die Operationen ausführt.

Diese Gleichungen zeigen, dass die Bewegung eines Stoffpunktes nur abhängt von den Bewegungen in den angrenzenden Raum- und Zeittheilen, und ihre (vollständigen) Ursachen in den Einwirkungen der Umgebung gesucht werden können.

Die Gleichung (I) beweist unsere frühere Behauptung, dass bei der Stoffbewegung die Dichtigkeit ungeändert bleibe; denn

$$\frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} + \frac{\partial v_3}{\partial x_3},$$

welches zufolge dieser Gleichung $= 0$ ist, drückt die in das Raumelement $dx_1 dx_2 dx_3$ im Zeitelement dt einströmende Stoffmenge aus, und die in ihm enthaltene Stoffmenge bleibt daher constant.

Die Bedingungen (II) sind identisch mit der Bedingung, dass

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \alpha \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} \right) \right) (v_1 dx_1 + v_2 dx_2 + v_3 dx_3)$$

gleich einem vollständigen Differential dW sei. Nun ist:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - \alpha \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} \right) \right) (\omega_1 dx_1 + \omega_2 dx_2 + \omega_3 dx_3) = 0$$

und folglich

$$\begin{aligned} dW &= \left(\frac{\partial}{\partial t} - \alpha \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} \right) \right) (u_1 dx_1 + u_2 dx_2 + u_3 dx_3) \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t} - \alpha \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} \right) \right) dV \end{aligned}$$

oder, da $\left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2} \right) dV = 0$,

$$dW = \frac{\partial V}{\partial t} dt.$$

d. Gemeinschaftlicher Ausdruck für die Gesetze der Stoffbewegung und der Einwirkung der Schwerkraft auf die Bewegung der ponderablen Körper.

Die Gesetze dieser Erscheinungen lassen sich zusammenfassen in der Bedingung, dass die Variation des Integrals

$$\delta \int \int \left[m (v_1^2 + v_2^2 + v_3^2) - k [(v_1 - \omega_1)^2 + (v_2 - \omega_2)^2 + (v_3 - \omega_3)^2] - m \left(\frac{\partial V}{\partial x_1} u_1 + \frac{\partial V}{\partial x_2} u_2 + \frac{\partial V}{\partial x_3} u_3 \right) \right] dx_1 dx_2 dx_3 dt \\ + \int \int 2m V dm dt + 2k \int \frac{dm^2}{\sqrt{\sum (x_i - \xi_i)^2}}$$

unter geeigneten Grenzbedingungen = 0 werde.

In diesem Ausdrucke sind die beiden ersten Integrale über den ganzen geometrischen Raum, die letzteren über alle ponderablen Körperelemente auszudehnen, die Coordinaten jedes ponderablen Körperelements aber als Functionen der Zeit, und v_1, v_2, v_3, V als Functionen von x_1, x_2, x_3 und t so zu bestimmen, dass eine den Grenzbedingungen genügende Variation derselben nur eine Variation zweiter Ordnung des Integrals hervorbringt.

Alsdann sind die Grössen $-\frac{\partial V}{\partial x_i}$ ($= v_i$) gleich den Geschwindigkeitscomponenten der Stoffbewegung, und V gleich dem Potential zur Zeit t im Punkte (x_1, x_2, x_3) .

BERNHARD RIEMANN'S LEBENSLAUF

Die nachfolgende Darstellung von Riemann's Lebenslauf bezweckt keineswegs, die Bedeutung seiner wissenschaftlichen Leistungen und deren Verhältniss zu dem früheren und gegenwärtigen Zustande der Mathematik in's Licht zu stellen, sie ist vielmehr nur für solche Leser bestimmt, welche einige Nachrichten über den Bildungsgang, den Charakter und die äusserlichen Schicksale des grossen Mathematikers zu erhalten wünschen, dessen Werke jetzt zum ersten Male vollständig gesammelt erscheinen.

Georg Friedrich **Bernhard Riemann** ist am 17. September 1826 in Breselenz, einem Dorfe im Königreich Hannover bei Dannenberg nahe der Elbe, geboren. Sein Vater Friedrich Bernhard Riemann, geboren in Boitzenburg an der Elbe in Mecklenburg, der als Lieutenant unter Wallmoden an den Befreiungskriegen Theil genommen, war dort Prediger und mit Charlotte, der Tochter des Hofrath Ebell aus Hannover verheirathet; er siedelte später mit seiner Familie nach der etwa drei Stunden entfernten Pfarre Quickborn über. Bernhard war das zweite von sechs Kindern. Schon früh wurde seine Lernbegierde durch den Vater geweckt, der ihn bis zum Abgange auf das Gymnasium fast allein unterrichtete. Als Knabe von fünf Jahren interessirte er sich sehr für Geschichte, für Züge aus dem Alterthum, und ganz besonders für das unglückliche Schicksal Polens, welches sein Vater ihm immer von Neuem erzählen musste. Sehr bald aber trat dies in den Hintergrund, und sein entschiedenes Talent für das Rechnen brach sich Bahn; er kannte kein grösseres Vergnügen, als selbst schwierige Exempel zu erfinden und dann seinen Geschwistern aufzugeben. Später, vom zehnten Jahre Bernhard's an, liess sich der Vater bei dem Unterrichte der Kinder von dem Lehrer Schulz unterstützen; dieser gab guten Unterricht im Rechnen und in der Geometrie, musste sich jedoch bald sehr anstrengen, seines Schülers rascher, oft besserer Lösung einer Aufgabe zu folgen.

Im Alter von dreizehn und einem halben Jahr wurde Bernhard von dem Vater confirmirt und verliess darauf das elterliche Haus, in welchem ein ernster, frommer Sinn und häuslich angeregtes Leben herrschte. Die Eltern sahen ihre Hauptaufgabe in der Erziehung ihrer Kinder; die innigste Liebe verband Riemann mit seiner Familie und hat sich durch sein ganzes ferneres Leben erhalten; sie spricht sich in seinen Briefen aus, die er an die entfernten Lieben richtet, wo er an Allem, was das Elternhaus betrifft, auch an den kleinsten Vorgängen das lebhafteste Interesse zeigt, und auch sie treulich alle seine Freuden und Leiden theilen lässt.

Zu Ostern 1840 kam Riemann nach Hannover, wo seine Grossmutter lebte, und wo er zwei Jahre — bis zum Tode derselben — die Tertia des Lyceums besuchte. Anfangs hatte er, wie es nach seiner bisherigen Erziehung zu erwarten war, mancherlei Schwierigkeiten zu überwinden, doch werden bald seine Fortschritte in den einzelnen Unterrichtsgegenständen gelobt, und immer ist er ein fleissiger und folgsamer Schüler. Namentlich aus dieser Zeit sind zahlreiche Briefe Riemann's an die geliebten Eltern und Geschwister erhalten, in welchen er, oft mit glücklichem Humor, von den Schulereignissen berichtet. Vorwiegend ist aber die Sehnsucht nach dem Elternhause; wenn die Ferien herannahen, so bittet er inständig um die Erlaubniss, dieselben in Quickborn zubringen zu dürfen, und lange vorher sinnt er auf Mittel, die Reise mit möglichst wenigen Kosten bewerkstelligen zu können; zu den Geburtstagen der Eltern und Geschwister macht er kleine Einkäufe und ist eifrig darauf bedacht, sie damit wirklich zu überraschen. Er lebt in Gedanken noch ganz in dem häuslichen Kreise. Bisweilen klingt aber auch eine wehmüthige Klage durch, wie schwer es ihm werde, mit fremden Menschen zu verkehren, und die Schüchternheit, welche, eine natürliche Folge seines früheren abgeschlossenen Lebens, ihn zu seinem Kummer auch den Lehrern bisweilen in falschem Lichte erscheinen lässt, hat ihn auch später nie gänzlich verlassen und oft angetrieben, sich der Einsamkeit und seiner Gedankenwelt zu überlassen, in welcher er die grösste Kühnheit und Vorurtheilslosigkeit entfaltet hat.

Nach dem Tode der Grossmutter wurde Riemann, wie es scheint auf seinen eignen Wunsch, Ostern 1842 von dem Vater auf das Johanneum zu Lüneburg gebracht, wo er zwei Jahre in Secunda und zwei Jahre in Prima bis zu seinem Abgange nach der Universität blieb. Gleich in die erste Zeit seines dortigen Aufenthaltes fiel der grosse Brand von Hamburg, der tiefen Eindruck auf ihn machte, und über den er ausführlich an seine Eltern berichtete. Die grössere Nähe bei seiner Heimath und die Möglichkeit, die Ferien in Quickborn in seiner Familie zu verleben, trug dazu bei, die fernere Schulzeit zu einer glücklichen für ihn zu machen. Freilich war die Hin- und Herreise, die zum grössten Theil zu Fuss gemacht wurde, mit Anstrengungen verbunden, denen sein Körper nicht immer gewachsen war; schon in dieser Zeit spricht sich in den schönen Briefen seiner Mutter, die er leider bald verlieren sollte, ängstliche Sorge

um seine Gesundheit aus, und oft wiederholen sich ihre herzlichen Ermahnungen, zu grosse körperliche Anstrengungen zu vermeiden. Er wohnte später bei dem Gymnasiallehrer Seffer, der sich lebhaft für ihn interessirte, und an dem er, wie aus seinen Briefen hervorgeht, einen väterlichen Freund und Beschützer gefunden hat. Er bekam gute Zeugnisse auch in anderen Fächern, in Mathematik aber immer glänzende, beim Abgange die Eins. Seine grosse Begabung für diese Wissenschaft wurde von dem trefflichen Director Schmalfuss erkannt; dieser liess ihm mathematische Werke zum Privatstudium und wurde oft überrascht und in Erstaunen gesetzt, wenn Riemann dieselben schon nach wenigen Tagen zurückbrachte und dann in der Unterhaltung zeigte, dass er sie durchgearbeitet und vollständig aufgefasst hatte. Diese neben seinen Schul-Arbeiten betriebenen Studien müssen ihn weit über die Grenzen des Gymnasial-Unterrichtes hinaus in das Gebiet der höheren Mathematik geführt haben; die Bekanntschaft mit der höheren Analysis hat er, soviel bekannt ist, durch das Studium der Euler'schen Werke erworben; auch Legendre's Theorie des Nombres soll er in dieser Zeit gelesen haben.

Im Alter von neunzehn und einem halben Jahr bezog Riemann Ostern 1846 die Universität Göttingen. Der seinem geistlichen Berufe von Herzen ergebene Vater hegte den natürlichen Wunsch, er möge sich der Theologie widmen, und wirklich liess Riemann sich am 25. April als Studiosus der Philologie und Theologie immatriculiren; zu diesem mit seiner deutlich hervorgetretenen Neigung und Begabung für die Mathematik nicht im Einklänge stehenden Entschlusse wird vor Allem die Rücksicht auf die Mittellosigkeit der kinderreichen Familie und die Hoffnung beigetragen haben, früher eine Anstellung zu finden und dadurch seinem Vater eine Erleichterung zu gewähren. Neben den philologischen und theologischen Vorlesungen hörte er aber auch mathematische, und zwar gleich im Sommersemester über die numerische Auflösung der Gleichungen bei Stern, und über Erdmagnetismus bei Goldschmidt, sodann im Wintersemester 1846–1847 über die Methode der kleinsten Quadrate bei Gauss, und über bestimmte Integrale bei Stern. Er sah bei dieser fortgesetzten Beschäftigung mit der Mathematik bald ein, dass die Neigung zu derselben zu mächtig in ihm war, und erwirkte von seinem Vater die Erlaubniss, sich ganz seinem Lieblingsstudium widmen zu dürfen.

Ogleich nun Gauss seit fast einem halben Jahrhundert unbestritten den Rang des grössten lebenden Mathematikers einnahm, so beschränkte sich seine zwar sehr anregende Lehrthätigkeit doch nur auf ein kleines Feld, welches mehr der angewandten Mathematik angehörte, und für Riemann war bei dem vorgeschrittenen Standpunkte seines Wissens eine wesentliche Bereicherung desselben und eine Befruchtung mit neuen Ideen damals in Göttingen nicht mehr zu erwarten. Er bezog daher Ostern 1847 die Universität Berlin, wo Jacobi, Lejeune Dirichlet und Steiner durch den Glanz ihrer Entdeckungen, welche sie zum Gegenstande ihrer Vorlesungen machten, zahlreiche Schüler um sich versammelten. Er blieb dort zwei Jahre, bis Ostern 1849, und hörte unter Anderem bei Dirichlet Zahlentheorie, Theorie der bestimmten Integrale und der partiellen Differentialgleichungen, bei Jacobi analytische Mechanik und höhere Algebra. Leider sind nur sehr wenige Briefe aus dieser Zeit erhalten; in einem derselben (vom 29. Nov. 1847) spricht er seine grosse Freude darüber aus, dass Jacobi sich gegen seine anfängliche Absicht noch entschlossen habe, Mechanik vorzutragen. In einen näheren Verkehr mit ihm trat Eisenstein, bei dem er in dem ersten Jahre Theorie der elliptischen Functionen hörte. Riemann hat später erzählt, dass sie auch über die Einführung der complexen Grössen in die Theorie der Functionen mit einander verhandelt haben, aber gänzlich verschiedener Meinung über die hierbei zu Grunde zu legenden Principien gewesen seien; Eisenstein sei bei der formellen Rechnung stehen geblieben, während er selbst in der partiellen Differentialgleichung die wesentliche Definition einer Function von einer complexen Veränderlichen erkannt habe. Wahrscheinlich sind diese, für seine ganze spätere Laufbahn maassgebenden Ideen zuerst in den Herbstferien 1847 gründlich von ihm verarbeitet.

Von dem übrigen Leben Riemann's während seines zweijährigen Aufenthaltes in Berlin ist nur wenig aus den Briefen zu ersehen. Die grossen politischen Ereignisse des Jahres 1848 ergriffen auch ihn mächtig; er war Augenzeuge der März-Revolution und hatte als Mitglied des von den Studenten gebildeten Corps die Wache im königlichen Schlosse vom 24. März Morgens 9 Uhr bis zum folgenden Tage Mittags 1 Uhr.

Ostern 1849 kehrte Riemann, nachdem er noch die Ankunft der Frankfurter Kaiser-Deputation in Berlin erlebt hatte, nach Göttingen zurück. Er besuchte in den drei folgenden Semestern noch einige naturwissenschaftliche und philosophische Vorlesungen, unter anderen mit grösstem Interesse die genialen Vorlesungen über Experimental-Physik von Wilhelm Weber, an welchen er sich später eng anschloss, und der ihm bis zu seinem Tode ein treuer Freund und Rathgeber gewesen ist. In dieser Zeit müssen bei gleichzeitiger Beschäftigung mit philosophischen Studien, welche sich namentlich auf Herbart richteten, die

ersten Keime seiner naturphilosophischen Ideen sich entwickelt haben; dies scheint wenigstens, soweit es sich nur um das Streben nach einer einheitlichen Naturauffassung handelt, aus einer Stelle eines Aufsatzes *Ueber Umfang, Anordnung und Methode des naturwissenschaftlichen Unterrichts auf Gymnasien* hervorzu-
gehen, den er im November 1850 als Mitglied des pädagogischen Seminars verfasste, und in welchem er sagt: *So z. B. lässt sich eine vollkommen in sich abgeschlossene mathematische Theorie zusammenstellen, welche von den für die einzelnen Punkte geltenden Elementargesetzen bis zu den Vorgängen in dem uns wirklich gegebenen continuirlich erfüllten Räume fortschreitet, ohne zu scheiden, ob es sich um die Schwerkraft, oder die Electricität, oder den Magnetismus, oder das Gleichgewicht der Wärme handelt.*"

Im Herbst 1850 trat er auch in das kurz vorher gegründete mathematisch-physikalische Seminar ein, welches von den Professoren Weber, Ulrich, Stern und Listing geleitet wurde, und betheiligte sich namentlich an den physikalischen experimentellen Uebungen, obgleich er dadurch von seiner Hauptaufgabe, der Ausarbeitung der Doctordissertation, oft abgezogen wurde. Theils diesem Umstande, theils aber auch der fast ängstlichen Sorgfalt, welche Riemann auf die Ausarbeitung seiner für den Druck bestimmten Schriften verwendete, und die ihn auch später bei der Veröffentlichung seiner Arbeiten wesentlich gehemmt hat, wird es zuzuschreiben sein, dass er seine Abhandlung *Grundlagen für eine allgemeine Theorie der Functionen einer veränderlichen complexen Grösse* erst im November des folgenden Jahres 1851 der philosophischen Facultät einreichen konnte. Dieselbe fand eine sehr anerkennende Beurtheilung von Gauss, welcher Riemann bei dessen Besuch mittheilte, dass er seit Jahren eine Schrift vorbereite, welche denselben Gegenstand behandle, sich aber freilich nicht darauf beschränke. Das Examen war am Mittwoch den 3. December, die öffentliche Disputation und Doctor-Promotion am Dienstag den 16. December. An seinen Vater schreibt er: *Durch meine jetzt vollendete Dissertation glaube ich meine Aussichten bedeutend verbessert zu haben; auch hoffe ich, dass ich mit der Zeit fließender und rascher schreiben lerne, namentlich wenn ich mehr Umgang suche und auch erst Gelegenheit habe, Vorträge zu halten; ich habe daher jetzt guten Muth.*"

Zugleich entschuldigt er sich in Rücksicht auf die Kosten, die er dem Vater verursacht, dass er sich nicht eifriger um die durch Goldschmidt's Tod erledigte Observatorstelle an der Sternwarte bemüht habe*), und theilt mit, dass seiner Habilitation als Privatdocent nichts im Wege stehe, sobald er die Habilitationsschrift fertig habe. Es scheint schon früh seine Absicht gewesen zu sein, zum Gegenstande derselben die Theorie der trigonometrischen Reihen zu wählen, allein es vergehen bis zu seiner Habilitation doch wieder zwei und ein halbes Jahr.

)) Einer Mittheilung von W. Weber zufolge wünschte Gauss selbst nicht, dass Riemann diese Stellung übernehme; er zweifelte zwar nicht an seiner theoretischen und praktischen Befähigung für dieselbe, aber er hatte schon damals eine so hohe Meinung von Riemann's wissenschaftlicher Bedeutung, dass er befürchtete, derselbe möchte durch die mit dieser Stellung verbundenen zeitraubenden und zum Theil untergeordneten Dienstgeschäfte von seinem eigentlichen Arbeitsfelde gar zu sehr abgelenkt werden.

In den Herbstferien 1852 hielt sich Lejeune Dirichlet, dem er noch von Berlin her wohl bekannt war, eine Zeit lang in Göttingen auf, und Riemann, der eben von Quickborn dorthin zurückgekehrt war, hatte das Glück, ihn fast täglich zu sehen. Gleich bei seinem ersten Besuche in der Krone, wo Dirichlet wohnte, und am folgenden Tage in einer Mittagsgesellschaft bei Sartorius von Waltershausen, in welcher auch die Professoren Dove aus Berlin und Listing gegenwärtig waren, fragte er Dirichlet, den er nächst Gauss als den grössten damals lebenden Mathematiker anerkannte, um Rath wegen seiner Arbeit. *Am andern Morgen* — schreibt Riemann an seinen Vater — *war Dirichlet etwa zwei Stunden bei mir; er gab mir die Notizen, die ich zu meiner Habilitationsschrift bedurfte, so vollständig, dass mir die Arbeit dadurch wesentlich erleichtert ist; ich hätte sonst auf der Bibliothek nach manchen Sachen lange suchen können. Auch meine Dissertation ging er mit mir durch und war überhaupt äusserst freundlich gegen mich, wie ich es bei dem grossen Abstände zwischen mir und ihm kaum erwarten durfte. Ich hoffe, er wird mich auch später nicht vergessen.* Einige Tage darauf traf auch Wilhelm Weber von der Wiesbadener Naturforscher-Versammlung wieder in Göttingen ein; es wurde in grösserer Gesellschaft ein sehr lohnender Ausflug nach dem einige Stunden entfernten Hohen Hagen gemacht, und am folgenden Tage trafen Dirichlet und Riemann abermals im Weber'schen Hause zusammen. Solche persönliche Anregung war im höchsten Grade wohlthuend für Riemann, und er schreibt selbst hierüber an seinen Vater: *Du siehst, dass ich hier im Ganzen noch nicht sehr häuslich gelebt habe; aber ich bin dafür des Morgens desto fleissiger bei der Arbeit gewesen, und finde, dass ich so weiter gekommen bin, als wenn ich den ganzen Tag hinter meinen Büchern sitze.*"

In jenen Tagen schreibt er auch von seiner Habilitation und von dem Anfange seiner Vorlesungen, wie von unmittelbar bevorstehenden Dingen, und er würde gewiss auch viel rascher in seiner äusserlichen Laufbahn fortgeschritten sein, wenn ihm öfter eine solche treibende Anregung zu Theil geworden wäre. Offenbar fällt in den Anfang des Jahres 1853 eine fast ausschliessliche Beschäftigung mit Naturphilosophie; seine neuen Gedanken gewinnen eine feste Gestalt, auf die er nach allen Unterbrechungen stets wieder zurückgekommen ist. Endlich ist auch die Habilitationsschrift fertig, und er schreibt an seinen jüngeren Bruder Wilhelm am 28. December 1853: *Mit meinen Arbeiten steht es jetzt so ziemlich; ich habe Anfangs December meine Habilitationsschrift*) abgeliefert und musste dabei drei Themata zur Probevorlesung vorschlagen, von denen dann die Facultät eines wählt. Die beiden ersten hatte ich fertig und hoffte, dass man eins davon nehmen würde; Gauss aber hatte das dritte**) gewählt, und so bin ich nun wieder etwas in der Klemme, da ich dies noch ausarbeiten muss. Meine andere Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Electricität, Galvanismus, Licht und Schwere hatte ich gleich nach Beendigung meiner Habilitationsschrift wieder aufgenommen und bin mit ihr so weit gekommen, dass ich sie in dieser Form unbedenklich veröffentlichen kann. Es ist mir dabei aber zugleich immer gewisser geworden, dass Gauss seit mehreren Jahren auch daran arbeitet, und einigen Freunden, u. A. Weber, die Sache unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitgetheilt hat, — Dir kann ich dies wohl schreiben, ohne dass es mir als Anmassung ausgelegt wird — ich hoffe, dass es nun für mich noch nicht zu spät ist und es anerkannt werden wird, dass ich die Sachen vollkommen selbständig gefunden habe.*"

Um diese Zeit wurde Riemann im mathematisch-physikalischen Seminar Assistent von W. Weber und hatte als solcher die Uebungen der Neueintretenden zu leiten, auch einige Vorträge zu halten. Ueber den weiteren Fortgang seiner Arbeiten schreibt er am 26. Juni 1854 aus Quickborn seinem Bruder: *Um Weihnachten habe ich Dir von Göttingen aus, wie ich glaube, geschrieben, dass ich meine Habilitationsschrift Anfang December vollendet und an den Decan abgegeben hätte, sowie auch, dass ich bald darauf mich wieder mit meiner Untersuchung über den Zusammenhang der physikalischen Grundgesetze beschäftigte und mich so darin vertiefte, dass ich, als mir das Thema zur Probevorlesung beim Colloquium gestellt war, nicht gleich wieder davon loskommen konnte. Ich ward nun bald darauf krank, theils wohl in Folge zu vielen Grübelns, theils in Folge des vielen Stubensitzens bei dem schlechten Wetter; es stellte sich mein altes Uebel wieder mit grosser Hartnäckigkeit ein und ich kam dabei mit meinen Arbeiten nicht vom Fleck. Erst nach mehreren Wochen, als das Wetter besser wurde und ich wieder mehr Umgang suchte, ging es mit meiner Gesundheit besser. Für den Sommer habe ich nun eine Gartenwohnung gemiethet und habe seitdem gottlob über meine Gesundheit nicht zu klagen gehabt. Nachdem ich etwa vierzehn Tage nach Ostern mit einer andern Arbeit, die ich nicht gut vermeiden konnte, fertig geworden war, ging ich nun eifrig an die Ausarbeitung meiner Probevorlesung und wurde um Pfingsten damit fertig. Ich erreichte*

)) Ueber die Darstellbarkeit einer Function durch eine trigonometrische Reihe.

*)**) Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen.

es indess nur mit vieler Mühe, dass ich mein Colloquium gleich machen konnte und nicht noch wieder unverrichteter Sache nach Quickborn abreisen musste. Gauss's Gesundheitszustand ist nämlich in der letzten Zeit so schlimm geworden, dass man noch in diesem Jahre seinen Tod fürchtet und er sich zu schwach fühlte, mich zu examiniren. Er wünschte nun, dass ich, weil ich doch erst im nächsten Semester lesen könnte, wenigstens noch bis zum August auf seine Besserung warten möchte. Ich hatte mich schon in das Unvermeidliche gefügt. Da entschloss er sich plötzlich auf mein wiederholtes Bitten, um die Sache vom Halse los zu werden", am Freitag nach Pfingsten Mittag das Colloquium auf den andern Tag um halb elf anzusetzen und so war ich am Sonnabend um eins glücklich damit fertig. — Lass Dir nun noch in aller Eile erzählen, was es mit der andern Arbeit, die mich um Ostern beschäftigte, für eine Bewandniss hat. In den Osterferien war Kohlrausch — ein Sohn vom Oberschulrath und Vetter und Schwager von Schmalfluss — der jetzt Professor in Marburg ist, auf vierzehn Tage bei Weber zum Besuch, um mit ihm gemeinschaftlich eine experimentelle Untersuchung über Electricität zu machen, da Weber zu dem einen Theil dieser Untersuchung, Kohlrausch zu dem anderen Theil derselben die Vorarbeiten gemacht und die Apparate erdacht und construirt hatte. Ich nahm an ihren Experimenten Theil und lernte bei dieser Gelegenheit Kohlrausch kennen. Kohlrausch hatte nun einige Zeit vorher sehr genaue Messungen über eine bis dahin unerforschte Erscheinung (den electrischen Rückstand in der Leidener Flasche) gemacht und veröffentlicht und ich hatte durch meine allgemeinen Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Electricität, Licht und Magnetismus die Erklärung davon gefunden. Ich sprach nun mit K. darüber und dies war die Veranlassung, dass ich die Theorie dieser Erscheinung für ihn ausarbeitete und ihm zuschickte. Kohlrausch hat mir nun jetzt sehr freundlich geantwortet, mir angeboten, meine Arbeit an Poggendorff, den Herausgeber der Annalen der Physik und Chemie, in Berlin zum Druck zu schicken, und mich eingeladen, ihn in diesen Herbstferien zu besuchen, um die Sache weiter zu verfolgen. Mir ist diese Sache deshalb wichtig, weil es das erste Mal ist, wo ich meine Arbeiten auf eine vorher noch nicht bekannte Erscheinung anwenden konnte, und ich hoffe, dass die Veröffentlichung dieser Arbeit dazu beitragen wird, meiner grösseren Arbeit eine günstige Aufnahme zu verschaffen. Hier in Quickborn werde ich mich nun wohl theils mit dem Druck dieser Arbeit, da mir die Correcturbogen wahrscheinlich zugeschickt werden, theils mit der Ausarbeitung einer Vorlesung für nächstes Semester beschäftigen müssen."

Zu dem ersten Theile des Briefes ist noch zu bemerken, dass Riemann die Ausarbeitung seiner Probevorlesung über die Hypothesen der Geometrie sich durch sein Streben, allen, auch den nicht mathematisch gebildeten Mitgliedern der Facultät möglichst verständlich zu bleiben, wesentlich erschwert hat; die Abhandlung ist aber hierdurch in der That zu einem bewunderungswürdigen Meisterstück auch in der Darstellung geworden, indem sie ohne Mittheilung der analytischen Untersuchung den Gang derselben so genau angiebt, dass sie nach diesen Vorschriften vollständig hergestellt werden kann. Gauss hatte gegen das übliche Herkommen von den drei vorgeschlagenen Themen nicht das erste, sondern das dritte gewählt, weil er begierig war zu hören, wie ein so schwieriger Gegenstand von einem so jungen Manne behandelt werden würde; nun setzte ihn die Vorlesung, welche alle seine Erwartungen übertraf, in das grösste Erstaunen, und auf dem Rückwege aus der Facultäts-Sitzung sprach er sich gegen Wilhelm Weber mit höchster Anerkennung und mit einer bei ihm seltenen Erregung über die Tiefe der von Riemann vorgetragenen Gedanken aus.

Nach einem längeren Aufenthalte in Quickborn kehrte Riemann im September nach Göttingen zurück, um an der Naturforscher-Versammlung Theil zu nehmen; auf Weber's und Stern's Aufforderung entschloss er sich, in der mathematisch-physikalisch-astronomischen Section einen Vortrag über die Verbreitung der Electricität in Nichtleitern zu halten. Er schreibt darüber an seinen Vater: *Mein Vortrag kam am Donnerstag an die Reihe, und da für diese Sitzung unserer Section kein anderer angekündigt war, so arbeitete ich die Sache noch den Abend vorher etwas weiter aus, um die gewöhnliche Zeit der Sitzungen einigermaassen auszufüllen. Ich hatte anfangs nur das Gesetz, welches ich mittheilen wollte, kurz angeben wollen, wandte es aber nun noch auf mehrere Erscheinungen an und zeigte die Uebereinstimmung mit der Erfahrung. Mein Vortrag war nun freilich in diesem letzten Theile weniger fliessend, aber ich glaube doch, dass der Eindruck des Ganzen durch Hinzufügung desselben gewonnen hat; ich sprach ungefähr $1\frac{1}{2}$ Stunden. — Dass ich bei der Versammlung einmal öffentlich gesprochen habe, hat mir wieder etwas mehr Muth zu meiner Vorlesung gemacht; doch habe ich zugleich gesehen, wie gross der Unterschied ist, ob man schon längere Zeit vorher mit seinen Gedanken ins Reine gekommen ist, oder noch unmittelbar vorher daran gearbeitet hat. Ich hoffe in einem halben Jahre schon mit mehr Ruhe an meine Vorlesungen zu denken, und mir nicht wieder meinen Aufenthalt in Quickborn und mein Zusammensein mit Euch so dadurch ver-*

leiden zu lassen, wie das letzte Mal." Auch mit Kohlrausch war er in Göttingen wieder zusammengetroffen; nach einem weiteren Briefwechsel entschloss sich aber Riemann, auf die Veröffentlichung seines Aufsatzes über den Rückstand in der Leidener Flasche zu verzichten, vermuthlich weil er nicht gern auf eine ihm angerathene Abänderung desselben eingehen wollte. Statt dessen erschien in Poggendorff's Annalen der Aufsatz über die Theorie der Nobili'schen Farbenringe, über welchen er an seine ältere Schwester Ida schreibt: *Es ist dieser Gegenstand deshalb wichtig, weil sich hiernach sehr genaue Messungen anstellen und die Gesetze, nach denen die Electricität sich bewegt, sehr genau daran prüfen lassen."*

In demselben Briefe vom 9. October 1854 schreibt er mit grosser Freude von dem Zustandekommen seiner ersten Vorlesung, zu welcher über sein Erwarten viele Zuhörer, etwa acht, sich gemeldet hatten. Der Gegenstand derselben war die Theorie der partiellen Differentialgleichungen mit Anwendung auf physikalische Probleme; als Vorbild dienten ihm der Hauptsache nach die Vorlesungen, welche Dirichlet unter gleichem Titel in Berlin gehalten hatte. Ueber seinen Vortrag schreibt er am 18. November 1854 seinem Vater: *Mein Leben hat hier jetzt nach und nach eine ziemlich regelmässige und einförmige Gestalt angenommen. Meine Collegia habe ich bis jetzt regelmässig halten können, meine anfängliche Befangenheit hat sich schon ziemlich gelegt und ich gewöhne mich daran, mehr an die Zuhörer, als an mich dabei zu denken, und in ihren Mienen zu lesen, ob ich vorwärts gehen oder die Sache noch weiter auseinander setzen muss."*

Es ist indessen keinem Zweifel unterworfen, dass der mündliche Vortrag ihm in den ersten Jahren seiner akademischen Lehrthätigkeit grosse Schwierigkeiten verursachte. Seine glänzende Denkkraft und vorahnende Phantasie liess ihn meist, was besonders bei zufälligen mündlichen Unterhaltungen über wissenschaftliche Gegenstände zum Vorschein kam, sehr grosse Schritte nehmen, denen man nicht so leicht folgen konnte, und wenn man ihn zu einer näheren Erörterung einiger Zwischenglieder seiner Schlüsse aufforderte, so konnte er stutzig werden und es verursachte ihm einige Mühe, sich in den langsameren Gedankengang des Anderen zu fügen und dessen Zweifel rasch zu beseitigen. So hat ihn auch bei seinen Vorlesungen die Beobachtung der Mienen seiner Zuhörer, von der er oben schreibt, oft empfindlich gestört, wenn er, bisweilen ganz gegen sein Erwarten, sich genöthigt glaubte, einen für ihn fast selbstverständlichen Punkt noch besonders zu beweisen. Dies hat sich aber nach längerer Uebung verloren, und die verhältnissmässig grosse Zahl seiner Schüler ist nicht blos der Anziehungskraft seines durch die tief sinnigsten Werke berühmt gewordenen Namens, sondern auch seinem Vortrage zuzuschreiben, auf den er sich stets sehr sorgfältig vorbereitete, und durch welchen es ihm gelang, seine Zuhörer über die grossen Schwierigkeiten hin wegzuführen, die sich dem Eindringen in die von ihm geschaffenen neuen Principien entgegenstellen.

Am 23. Februar 1855 starb Gauss, und bald darauf wurde Lejeune Dirichlet von Berlin nach Göttingen berufen. Bei dieser Gelegenheit wurde von mehreren Seiten, aber vergeblich dahin gewirkt, dass Riemann zum ausserordentlichen Professor ernannt werden möchte; erreicht wurde nur, dass ihm eine Remuneration von jährlich 200 Thaler von der Regierung ausgesetzt wurde; so gering diese Summe war, eine so wichtige Erleichterung gewährte sie Riemann, der in dieser und der nächsten Zeit wohl oft mit düsterem Blick in die Zukunft schaute. Es begann eine Reihe von traurigen Jahren, in denen ihn ein schmerzlicher Schlag nach dem anderen traf. Noch im Jahre 1855 verlor er seinen Vater und eine Schwester, Clara; die alte, so innig geliebte Heimath in Quickborn wurde verlassen, seine drei Schwestern zogen zu dem Bruder Wilhelm nach Bremen, der dort Postsecretair war und von jetzt an die Sorge für die Erhaltung der Familie übernahm.

Riemann wandte sich jetzt mit erneutem Eifer wieder seinen schon in den Jahren 1851 und 1852 begonnenen Untersuchungen über die Theorie der Abel'schen Functionen zu und machte dieselbe zum ersten Male von Michaelis 1855 bis Michaelis 1856 zum Gegenstande seiner Vorlesungen, an denen drei Zuhörer, Schering, Bjerknes und sein College Dedekind Theil nahmen. Im Sommer 1856 wurde er zum Assessor der mathematischen Classe der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften ernannt; als solcher überreichte er am 2. November seine Abhandlung über die Gauss'sche Reihe und schrieb an demselben Tage seinem Bruder: *Auch hoffe ich, dass meine Arbeiten mir Früchte tragen sollen. Meine Abhandlung ist, wie ich Dir schon schrieb, jetzt zum Druck fertig, und vielleicht wird sie die Societät in ihren Schriften drucken lassen, allerdings eine grosse Ehre, da diese in den letzten 50 Jahren nur mathematische Abhandlungen von Gauss enthalten haben. Die mathematische Section der Societät, bestehend aus Weber, Ulrich und Dirichlet wird wenigstens nach Weber's Aeusserungen wohl auf den Druck meiner Abhandlung antragen.* — *Mit meinen Vorlesungen, d. h. mit dem Besuch derselben, bin ich ziemlich zufrieden, besonders bei der*

geringen Zahl der neu angekommenen Studenten. Es sind gar keine Mathematiker unter diesen und das ist auch wohl der Grund, dass Dedekind und Westphal ihre Privatvorlesungen nicht zu Stande bekommen haben. Die Anzahl meiner Zuhörer betrug nun an den vier Tagen, an denen ich gelesen habe, erst drei, dann vier und die letzten beiden Male fünf; doch war hierunter wohl ein Hospitant. Sehr lieb ist es mir, dass ich diesmal auch einige Zuhörer aus den ersten Semestern habe, nicht wie sonst bloss aus dem sechsten und späteren Semestern, weil ich dies als ein Zeichen betrachte, dass meine Vorlesungen leichter verständlich werden. Bei alledem kann ich noch nicht behaupten, dass meine Vorlesungen zu Stande gekommen sind, denn es hat sich noch Niemand bei mir gemeldet und ist also immer noch möglich, dass meine Herren Zuhörer mich im Stiche lassen. — Meine freie Zeit werde ich von jetzt an ganz auf die Arbeit über die Abelschen Functionen, von der ich Dir erzählt habe, verwenden. Kurz vor meiner Wiederkunft hier in Göttingen ist auch der Hauptredacteur des mathematischen Journals, der Dr. Borchardt aus Berlin, hier gewesen und hat mir durch Dirichlet und Dedekind die Aufforderung zugehen lassen, ihm doch so bald wie möglich eine Darstellung meiner Untersuchungen über die Abel'schen Functionen, sie sei so roh wie sie wolle, zu schicken. Weierstrass ist jetzt stark im Publiciren, doch enthält das jetzt veröffentlichte Heft, von dem Scherk mir erzählte, nur die ersten Vorbereitungen zu seiner Theorie."

In der That widmete er sich nun mit allen Kräften der Ausarbeitung dieses Werkes, so dass er die ersten drei kleineren Abhandlungen am 18. Mai, die vierte grössere am 2. Juli 1857 im Manuscript nach Berlin abschicken konnte; allein durch die übermässige Anstrengung hatte seine Gesundheit sehr gelitten, und er befand sich am Ende des Sommersemesters in einem Zustande geistiger Abspannung, der seine Stimmung im höchsten Grade verdüsterte. Zur Erfrischung und Stärkung seiner Gesundheit nahm er für einige Wochen seinen Aufenthalt in Harzburg, wohin ihn sein Freund Ritter (damals Lehrer an dem Polytechnicum zu Hannover, jetzt Professor in Aachen) auf einige Tage begleitete, und wohin ihm später sein College Dedekind folgte, mit dem er viele Spaziergänge und auch grössere Ausflüge in den Harz machte. Auf solchen Spaziergängen erheiterte sich seine Stimmung, sein Zutrauen zu Anderen und zu sich selbst wuchs; sein harmloser Scherz und seine rückhaltlose Unterhaltung über wissenschaftliche Gegenstände machten ihn zu dem lebenswürdigsten und anregendsten Gesellschafter. In dieser Zeit wandten sich seine Gedanken wieder der Naturphilosophie zu, und eines Abends nach der Rückkehr von einer anstrengenden Wanderung griff er zu Brewster's Life of Newton, und sprach lange mit Bewunderung über den Brief an Bentley, in welchem Newton selbst die Unmöglichkeit unmittelbarer Fernwirkung behauptet.

Bald nach seiner Rückkehr nach Göttingen wurde er am 9. November 1857 zum ausserordentlichen Professor in der philosophischen Facultät ernannt, und seine Remuneration von 200 Thaler auf 300 Thaler erhöht. Aber fast gleichzeitig erschütterte ihn auf das Tiefste der Tod seines innig geliebten Bruders Wilhelm; er übernimmt nun ganz die Sorge für seine drei noch lebenden Schwestern und dringt inständig darauf, dass sie noch im Laufe des Winters zu ihm nach Göttingen übersiedeln; dies geschah auch im Anfang März 1858, aber erst nachdem ihnen die jüngste Schwester, Marie, noch durch den Tod entrissen war. Nach so vielen Schicksalsschlägen trug das Zusammenleben mit den Schwestern wesentlich zur Besserung seiner tief niedergedrückten Gemüthsstimmung bei, und die Anerkennung, welche von nun an, wenn auch langsam, seinen Werken auch in weiteren Kreisen zu Theil wurde, hob allmählich sein gesunkenes Selbstvertrauen und liess ihn frischen Muth zu neuen Arbeiten finden. Schon vorher hatte er den später viel besprochenen Aufsatz *Ein Beitrag zur Electrodynamik* verfasst, über welchen er seiner Schwester Ida schreibt: *Meine Entdeckung über den Zusammenhang zwischen Electricität und Licht habe ich hier der Königl. Societät übergeben. Nach manchen Aeusserungen, die ich darüber vernommen, muss ich schliessen, dass Gauss eine andere von der meinigen verschiedene Theorie dieses Zusammenhangs aufgestellt und seinen nächsten Bekannten mitgetheilt hat. Ich bin aber völlig überzeugt, dass die meinige die richtige ist und in ein paar Jahren allgemein als solche anerkannt werden wird.* Er hat bekanntlich diese Arbeit bald wieder zurückgezogen und auch später nicht veröffentlicht, wahrscheinlich weil er selbst mit der in ihr enthaltenen Ableitung nicht mehr zufrieden war.

In den Herbstferien 1858 machte er die Bekanntschaft der italienischen Mathematiker Brioschi, Betti und Casorati, welche damals eine Reise durch Deutschland machten und auch einige Tage in Göttingen verweilten; diese Verbindung sollte später in Italien wieder angeknüpft werden.

In diese Zeit fiel die Erkrankung Dirichlet's, welcher seinen langen Leiden am 5. Mai 1859 erlag. Er hatte von Anfang an das lebhafteste persönliche Interesse für Riemann empfunden und bei allen Gelegenheiten bethätigt, wo er auf eine Verbesserung der äusserlichen Verhältnisse Riemann's hinwirken konnte.

Inzwischen war des Letzteren wissenschaftliche Bedeutung so allgemein anerkannt, dass die Regierung nach Dirichlet's Tode von der Berufung eines auswärtigen Mathematikers absah; Ostern 1859 wurde für Riemann eine Wohnung in der Sternwarte eingeräumt, am 30. Juli wurde er zum ordentlichen Professor ernannt und im December einstimmig zum ordentlichen Mitgliede der Gesellschaft der Wissenschaften erwählt. Schon vorher, am 11. August, hatte die Berliner Akademie der Wissenschaften ihn zum correspondirenden Mitgliede in der physikalisch-mathematischen Classe ernannt, und dies veranlasste ihn, im September in Dedekind's Gesellschaft nach Berlin zu reisen, wo er von den dortigen Gelehrten, Kummer, Borchardt, Kronecker, Weierstrass mit Auszeichnung und grosser Herzlichkeit aufgenommen wurde. Eine Folge seiner Ernennung, welcher später, im März 1866, die Wahl zum auswärtigen Mitgliede gefolgt ist*), und dieses Besuchs war es, dass er im October seine Abhandlung über die Häufigkeit der Primzahlen der Berliner Akademie einreichte und einen, nach seinem Tode veröffentlichten Brief über die vielfach periodischen Functionen an Weierstrass richtete.

Einen Monat später übergab er der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften seine Abhandlung über die Fortpflanzung ebener Luftwellen von endlicher Schwingungsweite.

In den Osterferien 1860 machte er eine Reise nach Paris, wo er sich vom 26. März ab einen Monat aufhielt; leider war das Wetter sehr rau und unfreundlich, noch in der letzten Woche gab es mehrere Tage hinter einander Schnee und Hagel, so dass die Besichtigung von Merkwürdigkeiten oft geradezu unmöglich war. Dagegen war er sehr zufrieden mit der freundlichen Aufnahme von Seiten der Pariser Gelehrten Serret, Bertrand, Hermite, Puiseux und Briot, bei welchem er einen Tag auf dem Lande in Chatenay mit Bouquet sehr angenehm verlebte.

In demselben Jahre vollendete er seine Abhandlung über die Bewegung eines flüssigen Ellipsoides und wendete sich der Bearbeitung der von der Pariser Akademie gestellten Preisaufgabe über die Theorie der Wärmeleitung zu, für welche er durch seine Untersuchungen über die Hypothesen der Geometrie schon früher die Grundlagen gewonnen hatte. Im Juni 1861 sandte er seine in lateinischer Sprache abgefasste Lösung unter dem Motto *Et his principiis via sternitur ad majora* ein; dieselbe errang indessen den Preis nicht, weil es ihm an Zeit gefehlt hatte, die zur Durchführung nöthige Rechnung vollständig mitzutheilen.

Das in den letzten Jahren ungetrübte, glückliche Leben, dessen Riemann sich erfreuen durfte, erreichte seinen Höhepunkt, als er sich am 3. Juni 1862 mit Fräulein **Elise Koch** aus Körchow in Mecklenburg-Schwerin, einer Freundin seiner Schwestern verheirathete; es war ihr beschieden, die bevorstehenden Jahre des Leidens mit ihm zu theilen und durch unermüdliche Liebe zu verschönern. Schon im Juli desselben Jahres befahl ihn eine Brustfellentzündung, von welcher er scheinbar zwar sich rasch erholte, welche aber doch den Keim zu einer Lungenkrankheit zurückliess, die sein frühes Ende herbeiführen sollte.

Als ihm von den Aerzten ein längerer Aufenthalt im Süden zur Heilung angerathen war, gelang es der dringenden Verwendung von Wilhelm Weber und Sartorius von Waltershausen, von der Regierung nicht nur den erforderlichen Urlaub, sondern auch eine ausreichende Unterstützung zu einer Reise nach Italien für ihn auszuwirken, welche er im November 1862 antrat. Durch Sartorius von Waltershausen auf das Wärmste empfohlen, fand er das freundlichste Entgegenkommen in der Familie des Consuls Jäger in Messina, auf deren Villa in der Vorstadt Gazzi er den Winter verlebte. Sein Befinden besserte sich rasch, und er konnte Ausflüge nach Taormina, Catania und Syracus unternehmen. Auf der Rückreise, welche er am 19. März 1863 antrat, besuchte er Palermo, Neapel, Rom, Livorno, Pisa, Florenz, Bologna, Mailand; bei längerem Aufenthalte in diesen Städten, deren Kunstschatze und Alterthümer sein grösstes Interesse erweckten, machte er zugleich Bekanntschaft mit den bedeutendsten Gelehrten Italiens, und namentlich schloss er sich mit inniger Freundschaft an Professor **Enrico Betti** in Pisa an, den er schon im Jahre 1858 in Göttingen kennen gelernt hatte. Ueberhaupt bildet der mehrjährige Aufenthalt Riemann's in Italien, so traurig die nächste Veranlassung desselben auch war, einen wahren Lichtpunkt in seinem Leben; nicht allein, dass ihn das Schauen aller Herrlichkeit dieses entzückenden Landes, von Natur und Kunst, unendlich beglückte, er fühlte sich dort auch als freier Mensch dem Menschen gegenüber, ohne alle die hemmenden Rücksichten, die er in Göttingen auf Schritt und Tritt nehmen zu müssen meinte; dies Alles und der wohlthätige Einfluss des herrlichen Klimas auf seine Gesundheit stimmte ihn oft recht froh und heiter und liess ihn dort viele glückliche Tage verleben.

)) Bezüglich der äusserlichen Auszeichnungen, deren Riemann theilhaftig geworden ist, mag hier noch bemerkt werden, dass die Bayerische Akademie der Wissenschaften ihn am 28. November 1859 zum correspondirenden, am 28. November 1863 zum ordentlichen Mitgliede, ferner dass die Pariser Akademie ihn am 19. März 1866 zu ihrem correspondirenden Mitgliede ernannte; ebenso wurde er am 14. Juni 1866, kurz vor seinem Tode, von der Londoner Royal Society zu deren auswärtigem Mitgliede erwählt.

Mit den besten Hoffnungen verliess er das ihm so lieb gewordene Italien, allein er zog sich auf dem Übergange über den Splügen, wo er unvorsichtiger Weise eine Strecke lang zu Fuss durch den Schnee ging, eine heftige Erkältung zu, und nach der Ankunft in Göttingen, welche am 17. Juni erfolgte, war sein Befinden fortwährend so schlecht, dass er sich sehr bald zu einer zweiten Reise nach Italien entschliessen musste, welche er am 21. August 1863 antrat. Er wandte sich zunächst nach Meran, Venedig, Florenz, dann nach Pisa, wo ihm am 22. December 1863 eine Tochter geboren wurde, welche nach seiner älteren Schwester den Namen **Ida** erhielt. Unglücklicher Weise war der Winter so kalt, dass der Arno zufror. Im Mai 1864 bezog er eine Villa vor Pisa; hier verlor er Ende August seine jüngere Schwester, Helene; er selbst wurde von der Gelbsucht befallen, welche auch eine Verschlimmerung seines Brustleidens zur Folge hatte. Eine Berufung nach Pisa an Stelle von Professor Mosotti, welche schon im Jahre 1863 durch Vermittlung von Betti an ihn ergangen war, hatte er theils auf den Rath seiner Göttinger Freunde, hauptsächlich aber wohl aus dem Grunde abgelehnt, weil er die mit der ihm angetragenen Stellung verbundenen Pflichten bei seinem angegriffenen Gesundheitszustande nicht vollständig erfüllen zu können befürchtete und deshalb sich ausser Stande fühlte, die Annahme des Rufes vor sich zu verantworten. Dasselbe Pflichtgefühl erweckte den dringenden Wunsch in ihm, nach Göttingen zurückzukehren und sich wieder seinem Lehramte zu widmen, und nur auf die ernststen Vorstellungen der Aerzte und seiner Freunde entschloss er sich dazu, auch den folgenden Winter in Italien zuzubringen, welchen er zu Pisa in angenehmem geselligen und wissenschaftlichen Verkehr mit den dortigen Gelehrten Betti, Felici, Novi, Villari, Tassinari, Beltrami verlebte; in jener Zeit arbeitete er auch an seiner Abhandlung über das Verschwinden der Theta-Functionen. Den Mai und Juni 1865 brachte er bei schlechtem Befinden in Livorno, den Juli und August am Lago Maggiore, den September in Pegli bei Genua zu, wo durch ein gastrisches Fieber eine bedeutende Verschlimmerung seines Zustandes eintrat.

Unter diesen Umständen konnte Riemann seinem immer lebhafteren Wunsche, nach Göttingen zurückzukehren, nicht länger widerstehen; er langte am 3. October an und verlebte daselbst den Winter bei erträglich gutem Befinden, welches ihm meistens gestattete, einige Stunden täglich zu arbeiten. Er vollendete die Abhandlung über das Verschwinden der Theta-Functionen und übertrug seinem früheren Schüler Hattendorff die Ausarbeitung der Abhandlung über die Minimalflächen; er sprach auch öfter den Wunsch aus, vor seinem Ende noch über einige seiner unvollendeten Arbeiten mit Dedekind zu sprechen, fühlte sich aber stets zu schwach und angegriffen, um denselben zu einem Besuche in Göttingen zu veranlassen. In den letzten Monaten beschäftigte er sich mit der Ausarbeitung einer Abhandlung über die Mechanik des Ohres, welche leider nicht vollendet und nur als Fragment nach seinem Tode von Henle und Schering herausgegeben ist.

Die Vollendung dieser Abhandlung sowie einiger anderen Arbeiten lag ihm sehr am Herzen, und er hoffte durch einen Aufenthalt von einigen Monaten am Lago Maggiore, wohin ihn ausserdem grosse Sehnsucht nach dem ihm so lieb gewordenen Lande trieb, die dazu erforderlichen Kräfte noch sammeln zu können. So entschloss er sich am 15. Juni 1866, in den ersten Kriegstagen, zu seiner dritten Reise nach Italien; dieselbe wurde schon in Cassel unterbrochen, weil die Eisenbahn zerstört war, doch gelangte er mit Fuhrwerk glücklich bis Giessen, von wo die Weiterreise keine ferneren Hindernisse fand. Am 28. Juni traf er am Lago Maggiore ein, wo er in der Villa Pisoni in Selasca bei Intra wohnte. Rasch nahmen seine Kräfte ab, und er selbst fühlte mit voller Klarheit sein Ende herannahen; aber noch am Tage vor seinem Tode arbeitete er, unter einem Feigenbaum ruhend und von grosser Freude über den Anblick der herrlichen Landschaft erfüllt, an seinem letzten, leider unvollendet gebliebenen Werke. Sein Ende war ein sehr sanftes, ohne Kampf und Todesschauer; es schien, als ob er mit Interesse dem Scheiden der Seele vom Körper folgte; seine Gattin musste ihm Brod und Wein reichen, er trug ihr Grüsse an die Lieben daheim auf und sagte ihr: *küsse unser Kind*. Sie betete das Vater Unser mit ihm, er konnte nicht mehr sprechen; bei den Worten *Vergieb uns unsere Schuld* richtete er gläubig das Auge nach oben; sie fühlte seine Hand in der ihrigen kälter werden, und nach einigen Athemzügen hatte sein reines, edeles Herz zu schlagen aufgehört. Der fromme Sinn, der im Vaterhaus gepflanzt war, blieb ihm durch das ganze Leben, und er diente, wenn auch nicht in derselben Form, treu seinem Gott; mit der grössten Pietät vermied er Andere in ihrem Glauben zu stören; die tägliche Selbstprüfung vor dem Angesichte Gottes war, nach seinem eigenen Ausspruche, für ihn eine Hauptsache in der Religion.

Er ruht auf dem Kirchhofe zu Biganzolo, wohin Selasca eingepfarrt ist. Sein Grabstein trägt die Inschrift:

Hier ruhet in Gott

GEORG FRIEDRICH BERNHARD RIEMANN,
Prof. zu Göttingen,
geb. in Breselenz 17. Sept. 1826, gest. in Selasca 20. Juli 1866.
Denen die Gott lieben müssen alle Dinge zum Besten dienen.)*

)) Der Grabstein, der ihm von italienischen Freunden und Fachgenossen gewidmet war, ist bei einer Verlegung des Friedhofes beseitigt worden.

VORREDE

BERNHARD RIEMANN'S

Gesammelte Mathematische Werke.

Nachträge

herausgegeben von

M. Noether und **W. Wirtinger.**

Mit 9 Figuren im Text.

LEIPZIG,

Druck und Verlag von B. G. Teubner.

1902.

In den seit dem Erscheinen der zweiten Auflage von Riemanns Werken nunmehr verflossenen zehn Jahren ist für die Hauptgebiete seiner Tätigkeit, die Theorien der Abelschen Funktionen und der linearen Differentialgleichungen, neues Material, und zwar vorwiegend in der Form von Nachschriften seiner Vorlesungen, zum Vorschein gekommen^{*)}, welches zeigt oder bestätigt, daß Riemann in seinen Vorlesungen erheblich weiter gegangen ist als in seinen Veröffentlichungen.

Dieses Material allgemein zugänglich zu machen, ist der Zweck unserer Publikation der *Nachträge zu Riemanns Ges. Math. Werken*.

Für die Abelschen Funktionen ist hierbei zunächst an die Wintervorlesung von 1861/62 gedacht. Diese war als Fortsetzung der Sommervorlesung *Über die Funktionen einer veränderlichen komplexen Grösse, insbesondere elliptische und Abelsche*^{*)} angekündigt und sollte dreistündig insbesondere^{*)} *die allgemeine Theorie der Integrale algebraischer Differentialien* entwickeln. Auf sie führe eine ganze Reihe neuer und wichtiger Begriffe und Betrachtungsweisen in der Theorie der Theta- und der algebraischen Funktionen zurück, und sind als solche zerstreut in Abhandlungen, besonders von Roch und Prym, eingeführt und seitdem viel benutzt worden, ohne in den Werken Riemanns selbst bisher eine Stelle gefunden zu haben. Nur die Untersuchung über die Konvergenz der Thetareihe ist aus einem Rochschen Hefte in die Werke (XXX der 2., XXIX der 1. Aufl.) aufgenommen; und ebenso die Ausführungen, welche Riemann über die Funktionen im Fall $p = 3$ im Februar 1862 vorgetragen hat (XXXI, bzw. XXX), nach demselben Hefte, das aber für diesen Teil eine Bearbeitung einer anderen Nachschrift, wohl eines Stückes der Prymschen, darstellt. Der letzte Teil der Vorlesung hat sich hauptsächlich auf die algebraische Darstellung von Thetaquotienten für $p = 3$ und für den allgemeinen hyperelliptischen Fall bezogen und wurde, täglich gehalten und in die Zeit vom 3. bis 11. März zusammengedrängt, zuletzt nur noch in grossen Zügen und ohne Ausführung der Rechnungen vorgetragen.

Eine Herausgabe auch dieses interessanten Schlussteils wird durch die Nachschrift des Herrn F. Prym, die bis zum 8. März reicht, und durch ein auch die beiden letzten Tage umfassendes Hefte von B. Minnigerode ermöglicht. Letzteres Hefte ist eine mit Bleistift ausgeführte, fast wörtliche Nachschrift der Vorlesung, die sogar das Datum jedes Vortrags enthält^{*)}; es konnte noch genügend entziffert werden und bildet die Grundlage der Herausgabe, während das Prymsche zur Kontrolle verglichen wurde. Diese März-Vorträge^{*)} werden hier (unter I) möglichst im Wortlaut veröffentlicht; zur Vollständigkeit wird zugleich eine Übersicht über die Wintervorlesung überhaupt, sowie eine authentische Darstellung der bisher nur zitativ bekannten originalen Kapitel gegeben, endlich sind auch einige kurze Zusätze zu dem von Weber veröffentlichten Teil aufgenommen.

Die Anmerkungen zu dieser Bearbeitung, zu welchen auch die Göttinger Manuskripte herangezogen worden sind, haben besonders den Zweck, auf den Zusammenhang der Vorlesung mit der späteren Literatur, sei es daß diese an die Vorlesung anschliesst, sei es daß sie einzelne Resultate selbständig

^{*)}) Vgl. für einen Teil desselben: P. Klein, in den Göttinger Nachrichten, math.-phys. Klasse, 1897, Heft 2 und Geschäftl. Mitt. 1898, Heft 1.

^{*)}) Aus dieser Vorlesung ist der Teil über elliptische Funktionen von Herrn H. Stahl, Teubner 1899, herausgegeben (irrtümlich dabei dem W.-S. 1861/62 zugeschrieben). Das in Göttingen liegende Hattendorfsche Hefte bezieht sich wesentlich auf diese Sommervorlesung 1861.

^{*)}) Nach dem in Akt 195 der Göttinger Riemann-Manuskripte im Entwurf enthaltenen Vorlesungsanschlag.

wiederfindet, hinzuweisen.

DaSS Herr Prof. Prym und Frau Professor Minnigerode, letztere durch gütige Vermittlung der Herren Prym und Stahl, bereitwilligst die Freundlichkeit hatten, die Hefte dem Herausgeber zur Veröffentlichung zu überlassen, verpflichtet denselben zum wärmsten Danke.

)) Durch die mitangegebenen Wochentage konnten die meist irrig bezeichneten Datumszahlen richtig gestellt werden. Hiermit, und nach einer gef. Angabe von Herrn Prym, ist auch die Festlegung der ganzen Vorlesung auf W.-S. 1861/62 gesichert. Die Verlegung dieser Vorträge auf Sommer 1862 — Prym im Vorwort zu seinen Untersuchungen über die Riemannsche Thetaformel und die Riemannsche Charakteristiken-Theorie" (Teubner 1882); Stahl im Vorwort zu seinem oben zitierten Buche, und bei anderen — beruht auf einem Verwechseln der Zeit der Ausarbeitung einiger Bogen des Prymschen Heftes mit der der Nachschrift. Das Minnigerodesche Heft ist nun bei den Göttinger Papieren deponiert worden.

)) Auf einige der in denselben gemachten Fortschritte Riemanns hat schon Herr H. Stahl im Vorwort zu seiner - Theorie der Abelschen Funktionen" (Teubner 1896) hingewiesen, sowie der Bearbeiter dieser Herausgabe in Bd. 8, Heft 1 des Jahresber. der Deutschen Math.-Vereinigung.

Die Theorie der linearen Differentialgleichungen und der hypergeometrischen Reihe hat Riemann in zwei Vorlesungen, beide unter dem Titel: *Die Funktionen einer veränderlichen komplexen Grösse, insbesondere hypergeometrische Reihen und verwandte Transcendenten*", behandelt, das erstemal dreistündig im Wintersemester 1856/57, das zweitemal vierstündig im Wintersemester 1858/59.

Von der Vorlesung von 1856/57 liegt eine etwa bis zu den Entwicklungen des Fragmentes XXIII der Gesammelten Werke reichende Nachschrift von E. Schering vor, aus welcher jedoch nur ein kurzer Abschnitt, der sich in der späteren Vorlesung nicht findet, aufgenommen wurde. Diese Nachschrift befindet sich als Akt Nr. 37 der Riemann-Papiere — zusammen mit derjenigen der Vorlesung über Abelsche Funktionen 1855/56 — auf der Göttinger Universitätsbibliothek.

Von der zweiten im Wintersemester 1858/59 gehaltenen Vorlesung existiert eine von Herrn Professor W. v. Bezold angefertigte, unmittelbare stenographische Nachschrift, welche als Akt Nr. 29 der Riemann-Papiere ebendort liegt. Das Heft trägt die spätere Aufschrift: *B. Riemanns Vorlesungen über die hypergeometrische Reihe, S.-S. 1859*", wobei aber die Datierung wohl irrtümlich ist^{*)}.

Dieses Heft lässt zwar überall die Gedanken Riemanns und mit Ausnahme einiger Stellen auch den Gang der Rechnung unzweideutig erkennen, bedurfte aber für den Druck natürlich einer redaktionellen Überarbeitung. Die Herausgabe beschränkte sich auf zwei Teile der Vorlesung, in welchen die neuen Gedanken Riemanns besonders hervortreten, zumal da der übrige Inhalt, soweit er Riemann eigentümlich ist, von ihm selbst oder aus seinem Nachlass bereits publiziert ist.

Der erste der hier mitgeteilten Abschnitte handelt von der Herleitung der Eigenschaften der P-Funktion aus ihrem Ausdruck durch ein bestimmtes Integral, sowie von ihrem Verhalten im Falle des Auftretens einer ganzzahligen Exponentendifferenz und bildet so eine Ergänzung zu Abhandlung IV der Ges. Werke.

Der zweite Teil jedoch hat durchaus selbständige Bedeutung und behandelt die Transcendenten, welche aus der Umkehrung des Integralquotienten einer linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung, insbesondere derjenigen der hypergeometrischen Reihe entstehen. Er bringt ferner allgemeine Bemerkungen zur Integration nicht homogener Gleichungen und der dabei auftretenden Transcendenten, endlich die Durchführung dieser Gedanken an dem elliptischen Integral erster Gattung und seinen Perioden.

^{*)}*) Vgl. das Vorlesungsverzeichnis am Schlusse dieser Nachträge".

Bei der erneuten Durchsicht der auf diese beiden Gebiete sich beziehenden Papiere Riemanns haben wir noch Einiges von allgemeinem Interesse vorgefunden, das wir in mehreren Zusätzen ebenfalls hier mitteilen. Als Schluss geben wir einen kurzen Bericht über die von uns benutzten Göttinger Manuskripte und eine Übersicht über die von Riemann angekündigten Vorlesungen.

Es ist selbstverständlich, daSS durch die Feststellung einer Reihe von Gedanken, welche Riemann für sich oder vor einem kleinen Kreis von Zuhörern entwickelte, die Verdienste derjenigen nicht beeinträchtigt werden, ja eher in höherem Lichte erscheinen, welche später dieselben Probleme unabhängig erfaSst und ihnen durch eingehende Bearbeitung die gebührende Stellung in der heutigen Mathematik verschafft haben. Aber die Tatsache, daSS diese Fragestellungen und Methoden dem ursprünglichen Riemannschen Gedankenkreise angehören, beansprucht ein ähnliches historisches Interesse, wie die andere, daSS GauSS lange vor Abel und Jacobi im Besitz wesentlicher Teile der Theorie der elliptischen Funktionen war. Riemann selbst hatte — nach dem Entwurf*) eines Begleitbriefes von November 1865 zur Sendung seiner Abhandlung *Über das Verschwinden der Thetafunktionen*" (Werke XI) — den Plan gefaSst, während seines Aufenthaltes in Italien seine Untersuchungen über Abelsche Funktionen als Fortsetzung der ersten Abhandlung (Werke VI) im Zusammenhang auszuarbeiten, denselben aber aufgeben müssen: meist zu schwach zum Arbeiten, sei es ihm nur bei grösster Hitze im Juli 1864 zu Pisa gelungen, jene Abhandlung niederzuschreiben. Unsere jetzige Veröffentlichung kann wohl, soweit sie die Abelschen Funktionen berührt, die Absichten Riemanns aufklären.

Die Anregung zur Herausgabe dieser Nachträge ging von Noether aus, der auch die Stücke I, IVA—D bearbeitete und mit N. zeichnet. Die Stücke II, III, IV E, F sind von Wirtinger bearbeitet, der mit W. zeichnet. Das von den Bearbeitern im Text Hinzugefügte ist, von Unwesentlichem abgesehen, durch eckige Klammern und kleineren Druck kenntlich gemacht. Vor dem Druck ist das Manuskript durch die Hände der Herren Weber und Prym gegangen.

Der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen und dem Kuratorium des Riemannschen Nachlasses, Herrn Direktor Schilling in Bremen und Herrn Professor Weber in StraSSburg, haben wir unseren besten Dank auszusprechen für ihr Interesse an der Herausgabe und für die Bereitwilligkeit, mit der sie unseren Zweck förderten.

Erlangen und Innsbruck, im Mai 1902.

M. Noether. W. Wirtinger.

)) Akt Varia 25 der Göttinger Papiere.

I. VORLESUNGEN ÜBER DIE ALLGEMEINE THEORIE DER INTEGRALE ALGEBRAISCHER DIFFERENTIALIEN

(WINTERSEMESTER 1861/62.)

Übersicht über die Vorlesungen vom 28. Oktober bis 6. November 1861.

28. Okt., 30. Okt., 1. Nov., 4. Nov. 1861: Konvergenz der p -fach unendlichen Thetareihe [s. Nr. XXX, S. 483–486 der zweiten (Nr. XXIX der ersten) Auflage von Riemann's Ges. Math. Werken].^{*)}

6. Nov.: Bestimmung der Funktion ϑ durch Periodizitätseigenschaften (nach Art. 17 der *Th. A. F.* ^{*)}).

Prinzip der Zerlegung einer periodischen Funktion.

(8., 11. Nov.):

Aus den Gleichungen (2) und (3) von Art. 17 der *Th. A. F.* folgt, daß für die $2p$ linear unabhängigen Systeme zusammengehöriger Periodizitätsmoduln der p unabhängigen Grössen $v_1, v_2, \dots, v_p$ sich

$$\log \vartheta(v_1, v_2, \dots, v_p) + \log \vartheta(v_1 + b_1, v_2 + b_2, \dots, v_p + b_p),$$

von ganzen Vielfachen von $2\pi i$ abgesehen, bzw. um

$$0, 0, \dots, 0, -4v_\mu - 2b_\mu - 2a_{\mu\mu}, \dots, -4v_p - 2b_p - 2a_{pp}$$

ändert; also wie eine Funktion

$$\log \vartheta(2v_1 + b_1, \dots, 2v_p + b_p),$$

aber gebildet mit den Doppelten der ursprünglichen Periodizitätsmoduln a_i und $a_{\mu\nu}$.

Setzt man nun

$$f(2v_1 + b_1, \dots, 2v_p + b_p) = \vartheta(v_1, \dots, v_p) \vartheta(v_1 + b_1, \dots, v_p + b_p),$$

so lässt sich diese Funktion nach folgendem **Prinzip zerlegen**:

Ist $f(u + 2\pi i) = f(u)$, so spaltet sich die Funktion $f(u)$ durch die Formeln

$$\varphi_1(u) = \frac{1}{2}\{f(u) + f(u + \pi i)\}, \quad \varphi_2(u) = \frac{1}{2}\{f(u) - f(u + \pi i)\}$$

in zwei Teile, von denen bei Änderung von u um πi der eine den Faktor $+1$, der andere den Faktor -1 erlangt.

Wendet man diese Zerlegung auf das Produkt $f(2v_1, 2v_2, \dots, 2v_p)$, betrachtet als Funktion von $u = 2v_1$, an, so zerfällt dasselbe in zwei Teile φ_1 und φ_2 ; jede dieser Funktionen zerlegt sich dann, als Funktion von $2v_2$ betrachtet, wieder in zwei Teile; etc. Im ganzen zerfällt also das Produkt $f(2v_1, 2v_2, \dots, 2v_p)$ in eine Summe von 2^p Funktionen φ , welche alle bei Änderung der $2v_1, 2v_2, \dots, 2v_p$ um πi nur Faktoren $+1$ annehmen. Es möge für irgend eine dieser Funktionen sein:

$$\varphi(2v_1, \dots, 2v_\varkappa + \pi i, \dots, 2v_p) = i^{\varepsilon_\varkappa} \varphi(2v_1, \dots, 2v_\varkappa, \dots, 2v_p),$$

wo die $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_p$ die Werte 0 oder 1 vorstellen. Dann hat die Funktion

$$\psi(2v_1, \dots, 2v_p) = e^{-\sum_{\varkappa} \frac{\varepsilon_\varkappa}{2} v_\varkappa} \varphi(2v_1, \dots, 2v_p)$$

die Eigenschaft, sich bei Änderung irgend eines der $2v_1, \dots, 2v_p$ um πi nicht zu ändern, bei gleichzeitiger Änderung der $2v_1, 2v_2, \dots, 2v_p$ bezüglich um

$$\pi i, 0, \dots, 0; \quad 0, \pi i, \dots, 0; \quad \dots; \quad 0, 0, \dots, \pi i,$$

^{*)*)} Die Abhandlung "Theorie der Abelschen Funktionen", Nr. VI der Werke, wird im Folgenden mit *Th. A. F.* zitiert.

aber den Faktor

$$e^{\frac{\pi i}{4}(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \dots + \varepsilon_p^2)}$$

anzunehmen. D. h. die Funktion $\psi(2v_1, \dots, 2v_p)$ ist bis auf einen konstanten Faktor definiert als eine Funktion ϑ , gebildet mit den Argumenten:

$$\frac{1}{2}v_1 + \frac{\varepsilon_1}{4}\pi i, \dots, \frac{1}{2}v_p + \frac{\varepsilon_p}{4}\pi i$$

und mit den Periodizitätsmoduln

$$\frac{1}{2}a_{11}, \dots, \frac{1}{2}a_{pp}; \quad \frac{1}{2}a_{\mu\nu}.$$

Der konstante Faktor kann von den ε abhängen. Man erhält also durch das Prinzip das Produkt

$$\vartheta(v_1, \dots, v_p) \vartheta(v_1 + b_1, \dots, v_p + b_p)$$

als Summe von 2^p ϑ -Funktionen, je multipliziert mit Faktoren der Form $e^{\sum \frac{\varepsilon b}{2}}$, und mit noch zu bestimmenden konstanten Koeffizienten.

Das Zerlegungsprinzip lässt sich auf das Produkt von n Faktoren:

$$\prod_{\nu=1}^n \vartheta(v_1^{(\nu)}, v_2^{(\nu)}, \dots, v_p^{(\nu)})$$

ausdehnen. Das Produkt ändert sich nicht, wenn v_μ um πi , nv_μ also um $n\pi i$ zunimmt, und nimmt für die zusammengehörigen Änderungen der $v_1, v_2, \dots, v_p$ den Faktor

$$e^{-\sum_{\mu} 2nv_{\mu} - \sum_{\mu, \nu} na_{\mu\nu} - \sum_{\mu} nb_{\mu}}$$

an; es verhält sich wie eine Funktion

$$f(nv_1, nv_2, \dots, nv_p)$$

gebildet mit den n -fachen der ursprünglichen Periodizitätsmoduln a_i und $a_{\mu\nu}$.

Hat man nun eine Funktion $f(u)$ von der Eigenschaft, dass $f(u + n\pi i) = f(u)$ ist, so lässt sich dieselbe in eine Summe von n Funktionen $\varphi_h(u)$ zerlegen, von denen jede bei Änderung von u um πi nur einen konstanten Faktor annimmt, der eine n^{te} Wurzel der Einheit wird.

Denn sei

$$\varphi(u + \pi i) = \alpha \varphi(u), \quad \varphi(u + n\pi i) = \varphi(u),$$

so wird zunächst $\alpha^n = 1$; sei dann α eine primitive n^{te} Wurzel von 1, und

$$\varphi_h(u) = \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} \alpha^{-hm} f(u + m\pi i) \quad (h = 0, 1, \dots, n-1),$$

so setze man:

$$\varphi(u) = \sum_{h=0}^{n-1} \varphi_h(u).$$

Hieraus wird

$$f(u + \varkappa\pi i) = \sum_{h=0}^{n-1} \alpha^{h\varkappa} \varphi_h(u) \quad (\varkappa = 0, 1, \dots, n-1)$$

und diese n Gleichungen ergeben die n Funktionen $\varphi_h(u)$ in der Form:

$$\varphi_h(u) = \frac{1}{n} \sum_{\varkappa=0}^{n-1} \alpha^{-h\varkappa} f(u + \varkappa\pi i).$$

Indem man diese Zerlegung auf das Produkt $f(nv_1, nv_2, \dots, nv_p)$ successiv als Funktion von $u = nv_1, nv_2, \dots, nv_p$ betrachtet, anwendet, zerfällt dasselbe in eine Summe von n^p Funktionen φ , welche alle bei Änderung irgend einer der Grössen nv_μ um πi nur Faktoren annehmen, die n^{te} Wurzeln der Einheit sind. Sei für eine dieser Funktionen:

$$\varphi(\dots, nv_\mu + \pi i, \dots) = \alpha^{\varepsilon_\mu} \varphi(\dots, nv_\mu, \dots),$$

wo die ε_μ die Werte $0, 1, \dots, n-1$ vorstellen; und sei

$$\psi(nv_1, \dots, nv_p) = e^{-\frac{2\pi i}{n} \sum_{\mu} \varepsilon_\mu v_\mu} \varphi(nv_1, \dots, nv_p),$$

so ändert sich $\psi(nv_1, \dots, nv_p)$ bei Änderung irgend eines der nv_μ um πi nicht mehr, nimmt aber bei gleichzeitiger Änderung der $nv_1, nv_2, \dots, nv_p$ bezüglich um $\pi i, 0, \dots, 0; 0, \pi i, \dots, 0; \dots; 0, 0, \dots, \pi i$, da die φ sich hierbei wie das Produkt f selbst verhalten, den Faktor

$$e^{\frac{\pi i}{n} (\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \dots + \varepsilon_p^2)}$$

an. D. h. die Funktion $\psi(nv_1, nv_2, \dots, nv_p)$ ist bis auf einen konstanten Faktor definiert als eine Funktion

ϑ , gebildet mit den Argumenten

$$\frac{v_1}{n} + \frac{\varepsilon_1}{2n}\pi i, \frac{v_2}{n} + \frac{\varepsilon_2}{2n}\pi i, \dots, \frac{v_p}{n} + \frac{\varepsilon_p}{2n}\pi i,$$

mit den Perioden πi , und mit den Periodizitätsmoduln

$$\frac{a_{11}}{n}, \frac{a_{22}}{n}, \dots, \frac{a_{pp}}{n}; \quad \frac{a_{\mu\nu}}{n} \quad (\mu, \nu = 1, 2, \dots, p).$$

Die konstanten, noch zu bestimmenden Koeffizienten in dem Summenausdruck des Produkts durch die n^p ϑ -Funktionen werden von den $\varepsilon^{(\nu)}$ abhängen.

Auf diesem Wege ergibt sich eine Menge von Relationen zwischen Thetareihen. Mit ihrer Hilfe beweist man für $p = 1$, daß der Quotient zweier Thetareihen eine elliptische Funktion ist, d. h. der betreffenden Differentialgleichung genügt, und so hat Jacobi die Theorie der elliptischen Funktionen behandelt. Einen analogen Weg ging Göpel für $p = 2$; außerdem gab er noch eine Tafel aller möglichen Thetarelationen bis zu einem gewissen Umfang hin. Für $p = 3$ würde das Verfahren ohne Hinzunahme algebraischer Prinzipien nicht zum Ziele führen.

Übersicht über die Vorlesungen vom 13. November 1861 bis 24. Januar 1862.

13.–27. Nov. 1861 (§): Wiederholung aus dem Kolleg des Sommersemesters 1861 über Abelsche Funktionen (aus allgemeiner Funktionentheorie).

2.–11. Dez.: Algebraisches (Art. 6–12 der *Th. A. F.*).

13.–20. Dez.: Über die Thetafunktion (Art. 17–22 der *Th. A. F.*).

6. Jan. 1862: Die ersten beiden Absätze von Art. 15 der *Th. A. F.*, mit Anwendung auf die Argumente der Thetafunktion; Bestimmung der immer endlich bleibenden Normalintegrale, und deren Einführung in die Thetafunktion.

8.–13. Jan.: Art. 23 der *Th. A. F.* (mit Art. 16 und 6).

15.–17. Jan.: Art. 24 der *Th. A. F.*. Zum Beweis des Satzes: daSS ein beliebig gegebenes GröSSensystem $(e_1, \dots, e_p)$ nur Einem GröSSensystem von der Form $(\sum_{\nu}^{(p)} u_{\nu}^{(\pi)})$ kongruent gesetzt werden kann, oder aber unendlich vielen", wird hier zuerst gezeigt, daSS, wenn noch ein zweites kongruentes GröSSensystem $(\sum_{\nu}^{(p)} u_{\nu}^{(\beta)})$ vorhanden ist, eine rationale Funktion ξ von (s, z) existiert, welche in den p zu den Integralen $\alpha_{\nu}^{(\alpha)}$ gehörigen Punkten unendlich groß von der ersten Ordnung, in den p zu den $\beta_{\nu}^{(\alpha)}$ gehörigen Punkten unendlich klein von der ersten Ordnung wird. Dies geschieht durch Darstellung von $\log \xi$ als Summe von Integralen dritter und erster Gattung. Hieraus wird dann der Satz über das identische Verschwinden von $\vartheta(u_1 - e_1, \dots)$ geschlossen.

Statt Art. 25 der *Th. A. F.* wird nur die Bemerkung gegeben:

Die nicht immer endlich bleibenden Integrale algebraischer Funktionen lassen sich durch Thetafunktionen ausdrücken, und hieraus lassen sich Relationen zwischen den Integralen herleiten, die sonst schwierig zu finden sind. Hierin besteht der Nutzen dieser Ausdrücke."

17.–22. Jan.: Ausdrücke algebraischer Funktionen von z durch Quotienten zweier Produkte von gleich vielen Funktionen $\vartheta(u_1 - e_1, \dots)$, multipliziert mit Potenzen der Grössen $e^{u_{\nu}}$ (Art. 26 der *Th. A. F.*). (§)

24. Jan.: Quotient zweier Thetafunktionen (der Quotient in Art. 27 der *Th. A. F.*, soweit er als Funktion von (s, z) betrachtet ist).

Die 2^{2p} Thetareihen.

(§) (24., 27. Jan. 1862:)

Das im Zähler des Ausdrucks (Art. 27 der *Th. A. F.*) vorkommende Produkt kann, wenn die h gebrochene Zahlen vorstellen, als allgemeine ϑ -Reihe dargestellt werden, in der die Summationsindices nicht ganze, sondern gebrochene Zahlen durchlaufen.

Der Exponent des allgemeinen Gliedes des Zählers

$$\left(\sum_1^p n_{\mu} (u_{\mu} - e_{\mu}^{(1)}) \right)^2 + \left(\sum_1^p n_{\mu} (u_{\mu} - e_{\mu}^{(2)}) \right)^2 + \dots$$

geht nämlich durch Zufügung der Konstanten

$$\left(\sum_1^p n_{\mu} h_{\mu} \right)^2 - 2 \sum_1^p n_{\mu} h_{\mu} \sum_1^p n_{\nu} (u_{\nu} - e_{\nu})$$

über in

$$\left(\sum_1^p n_{\mu} (u_{\mu} - e_{\mu} + h_{\mu}) \right)^2 - \left(\sum_1^p n_{\mu} h_{\mu} \right)^2 ;$$

daher

$$\vartheta(u_1 - e_1^{(1)}, \dots) \vartheta(u_1 - e_1^{(2)}, \dots) \dots = e^{-\sum_{\mu} h_{\mu} \sum_{\nu} n_{\nu} (u_{\nu} - e_{\nu})} \vartheta(u_1 - e_1 + h_1, \dots).$$

Diese Reihe bleibt ungeändert, wenn die h um ganze Zahlen geändert werden, und nimmt, von dem konstanten Faktor $e^{\pi i \sum g_{\mu} h_{\mu}}$ herrührend, den Faktor $e^{2\pi i \sum g_{\mu} h_{\mu}}$ an, wenn g_{μ} um die ganze Zahl g'_{μ} geändert wird.

Wir betrachten diese Reihen im einfachsten Fall, wo die h_μ In Vielfache von $\frac{1}{2}$ sind, Reihen, welche bei der Darstellung von Quadratwurzeln aus rationalen Funktionen von (s, z) gebraucht werden. Eine solche Reihe bleibt bis aufs Vorzeichen ungeändert, wenn auch die g_μ um ganze Zahlen geändert werden. Setzt man daher (§)

$$\varepsilon_\mu = 2h_\mu, \quad \varepsilon'_\mu = 2g_\mu,$$

so erhält man eine Reihe, welche, bis aufs Vorzeichen, dadurch charakterisiert ist, daß man für die ε_μ , ε'_μ nur die Zahlen 0 und 1 einsetzt, welchen sie mod. 2 kongruent sind.

Die Reihe selbst entsteht aus der ursprünglichen Thetareihe:

$$\vartheta(u_1, \dots, u_p) = \left(\sum_{-\infty}^{+\infty} \right)^p e^{\left(\sum_1^p n_\nu u_\nu \right)^2 + 2 \sum_1^p n_\nu v_\nu},$$

indem man

$$u_\nu + \frac{\varepsilon_\nu}{2} \pi i \quad \text{für} \quad u_\nu, \quad v_\nu + \frac{\varepsilon'_\nu}{2} \pi i \quad \text{für} \quad v_\nu$$

substituiert, also den Index n_ν alle ganzen Zahlen oder halben ungeraden Zahlen durchlaufen lässt, je nachdem $\varepsilon_\nu = 0$ oder 1 ist. Wir bezeichnen sie durch

$$\vartheta \begin{bmatrix} \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p \\ \varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_p \end{bmatrix} (v_1, \dots, v_p)$$

nämlich als Thetareihe mit der **Charakteristik**

$$\begin{bmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p \\ \varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_p \end{bmatrix}.$$

Die ursprüngliche Reihe hat also die Charakteristik $\begin{bmatrix} 0, \dots, 0 \\ 0, \dots, 0 \end{bmatrix}$.

Die Anzahl aller dieser Thetareihen beträgt 2^{2p} , da jedes der $2p$ Elemente der Charakteristik die Werte 0 und 1 annehmen kann.

Die ursprüngliche Thetareihe ist eine gerade Funktion. Um zu sehen, welche der übrigen gerade oder ungerade Funktionen sind, verwandle man zunächst in der obigen Reihe die v_μ bzw. in $-v_\mu + \frac{\varepsilon'_\mu}{2}\pi i$, wodurch der Wert der Reihe ungeändert bleibt; ersetzt man dann die v_μ durch die $-v_\mu$, so erhält man nach Multiplikation mit $e^{-\frac{\pi i}{2} \sum \varepsilon_\mu \varepsilon'_\mu}$ wieder die ursprüngliche Reihe; also

$$\vartheta \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon' \end{smallmatrix} \right] (-v_1, \dots, -v_p) = (-1)^{\sum \varepsilon_\mu \varepsilon'_\mu} \vartheta \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon' \end{smallmatrix} \right] (v_1, \dots, v_p),$$

d. h.: die Thetareihe ist eine gerade oder ungerade Funktion ihrer Argumente, je nachdem ihre Charakteristik $\left[\begin{smallmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon' \end{smallmatrix} \right]$ gerade oder ungerade", nämlich je nachdem

$$\sum_{\mu} \varepsilon_\mu \varepsilon'_\mu = 0 \quad \text{oder} \quad = 1 \pmod{2}.$$

In letzterem Fall geht die Entwicklung nur nach ungeraden Potenzen der v , in ersterem nur nach geraden Potenzen der v . Die ungeraden Funktionen verschwinden für die Nullwerte der Argumente, die geraden im allgemeinen nicht, sondern nur bei speziellen Werten der $a_{\mu\nu}$.

Um die Anzahl α der geraden, und β der ungeraden Charakteristiken zu bestimmen, beachte man, daß man jene Charakteristiken aus den α_{p-1} geraden und β_{p-1} ungeraden Charakteristiken, welche aus $p-1$ Gliedern bestehen, durch Vorsetzen eines Gliedes einer der vier Arten

$$\begin{array}{cc} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{array}$$

hervorgehen lassen kann, wobei nur die letztere Zufügung den Charakter des Geraden oder Ungeraden ändert. So erhält man

$$\alpha_p = 3\alpha_{p-1} + \beta_{p-1}, \quad \beta_p = \alpha_{p-1} + 3\beta_{p-1};$$

hieraus, da $\alpha_1 = 3, \beta_1 = 1$:

$$\begin{aligned} \alpha_p + \beta_p &= 4(\alpha_{p-1} + \beta_{p-1}) = 2^{2p}, \\ \alpha_p - \beta_p &= 2(\alpha_{p-1} - \beta_{p-1}) = 2^p; \end{aligned}$$

und somit

$$\alpha_p = 2^{p-1}(2^p + 1), \quad \beta_p = 2^{p-1}(2^p - 1).$$

Die Abelschen Funktionen.

(‡) (27., 29., 31. Januar, 3. Februar:)

Da

$$\vartheta \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon' \end{smallmatrix} \right] (0, \dots, 0) = 0$$

ist, so wird, sobald $\vartheta \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon' \end{smallmatrix} \right] (0, \dots, 0) = 0$, auch

$$\vartheta \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon' \end{smallmatrix} \right] (u_1 - u_1^{(\sigma)}, \dots, u_p - u_p^{(\sigma)}) = 0. \quad (6)$$

Dies tritt für ungerade Charakteristiken $\left[\begin{smallmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon' \end{smallmatrix} \right]$ immer, und im allgemeinen nur für ungerade Charakteristiken, ein. Sind nun u_μ und u'_μ die Werte, welche das Integral erster Gattung w_μ für zwei unbestimmte Wertsysteme (s, z) und (s_1, z_1) annimmt, $u_\mu^{(\sigma)}$ der Wert von u_μ für $(s, z) = (\sigma_\mu, \tau_\mu)$, $a_{\mu\sigma}$ der Periodizitätsmodul der Funktion u_μ an dem Schnitt b_σ , so lassen sich, sobald die Gleichung (1) erfüllt ist, nach Art. 23 der *Th. A. F.* die $p - 1$ Punkte (σ_ν, τ_ν) so bestimmen, daSS die Kongruenzen

$$(u_1 - u'_1 + \sum_{\nu}^{(p-1)} u_1^{(\nu)}, \dots, u_p - u'_p + \sum_{\nu}^{(p-1)} u_p^{(\nu)}) = \left(\frac{\varepsilon_1}{2} \pi i + \dots, \dots \right) \quad (7)$$

nach den $2p$ Modulsystemen der Funktionen u bestehen; daher verschwindet die Funktion

$$\vartheta \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon' \end{smallmatrix} \right] (u_1 - u_1^{(\sigma)}, \dots, u_p - u_p^{(\sigma)})$$

als Funktion von (s, z) betrachtet, wenn sie als solche nicht identisch verschwindet, für $(s, z) = (s_1, z_1)$ und für die $p - 1$ Punkte (σ_ν, τ_ν) .

Aus den Gleichungen (2) folgt

$$\left(2 \sum_{\nu}^{(p-1)} u_1^{(\nu)}, \dots, 2 \sum_{\nu}^{(p-1)} u_p^{(\nu)} \right) = (0, \dots, 0). \quad (8)$$

Die $p - 1$ Größenpaare $((\sigma_\nu, \tau_\nu))$, jedes doppelt genommen, bilden also (Art. 23 der *Th. A. F.*) $2p - 2$ durch eine Gleichung

$$\varphi = c_1 \varphi_1 + c_2 \varphi_2 + \dots + c_p \varphi_p = 0$$

verknüpfte Wertepaare; d. h. man kann die $p - 1$ Konstanten $c_1 : c_2 : \dots : c_p$ so bestimmen, daSS die $2p - 2$ Nullpunkte des Ausdrucks $c_1 \varphi_1 + \dots + c_p \varphi_p$ paarweise zusammenfallen, bez. in die (σ_ν, τ_ν) , die Funktion φ also für die $p - 1$ Wertsysteme (σ_ν, τ_ν) unendlich klein von der zweiten Ordnung wird. Während die Anzahl der willkürlichen Konstanten in φ nur die Möglichkeit der algebraischen Aufgabe, die $2p - 2$ Nullpunkte einer Funktion φ paarweise zusammenfallen zu lassen, aufzeigt, können wir nun schliessen, daSS die Aufgabe im allgemeinen, den ungeraden Charakteristiken entsprechend, $2^{p-1}(2^p - 1)$ Lösungen zulässt. Denn diese Aufgabe führt auch umgekehrt auf (3), also auf (2), und von da auf (1). Die Ausnahmefälle, in welchen mehr Lösungen existieren, schliessen wir vorläufig aus.

Man bilde nun, unter Einführung einer zweiten ungeraden Charakteristik $\left[\begin{smallmatrix} \varepsilon^* \\ \varepsilon'^* \end{smallmatrix} \right]$, den Quotienten

$$r = \frac{\vartheta \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon' \end{smallmatrix} \right] (u_1 - u_1^{(\sigma)}, \dots)}{\vartheta \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon^* \\ \varepsilon'^* \end{smallmatrix} \right] (u_1 - u_1^{(\sigma')}, \dots)}, \quad (9)$$

so wird derselbe, als Funktion von (s, z) , da er an den Querschnitten nur die Faktoren $+1$ annimmt, nämlich an a_μ den Faktor $e^{\frac{\pi i}{2}(\varepsilon_\mu - \varepsilon_\mu^*)}$, an b_μ den Faktor $(-1)^{\varepsilon'_\mu - \varepsilon'^*_\mu}$ nach Art. 21 der *Th. A. F.*, die Quadratwurzel aus einer rationalen Funktion von s und z . r wird ferner unendlich klein von der ersten Ordnung in den $p - 1$ Punkten (σ_ν, τ_ν) , in welchen der Zähler, als Funktion von (s, z) , auSSer in (s_1, z_1) , verschwindet, und in welchen eine Funktion φ je von der zweiten Ordnung unendlich klein wird; und r wird unendlich groSS von der ersten Ordnung in den $p - 1$ Punkten (σ'_ν, τ'_ν) , in welchen der Nenner, als Funktion von (s, z) , auSSer in (s_1, z_1) , verschwindet, und in welchen ebenfalls eine Funktion φ je von

der zweiten Ordnung unendlich klein wird. Bezeichnet man diese beiden Funktionen mit $\varphi(s, z)$ und mit $\psi(s, z)$, so wird also:

$$r^2 = B \frac{(s, z; \sigma_1, \tau_1)^2 \dots (s, z; \sigma_{p-1}, \tau_{p-1})^2}{(s, z; \sigma'_1, \tau'_1)^2 \dots (s, z; \sigma'_{p-1}, \tau'_{p-1})^2} \cdot \frac{\varphi(s, z)}{\psi(s, z)}, \quad (10)$$

wo B eine von (s_1, z_1) abhängige Konstante ist.

Um diese Konstante weiter zu bestimmen, beachte man, daSS durch Vertauschen von (s, z) mit (s_1, z_1) die beiden ϑ -Funktionen nur ihr Vorzeichen, der Quotient r sich also gar nicht ändert. Daher wird

$$r^2 = A \frac{\varphi(s_1, z_1) \cdot \varphi(s, z)}{\psi(s_1, z_1) \cdot \psi(s, z)}, \quad (11)$$

wo A von (s, z) und (s_1, z_1) unabhängig ist.

Der Quotient $1/r^2$ ist, nach seinem Ausdrucke (4), eindeutig in T' und wird in je $p-1$ Punkten von T' unendlich klein, bzw. unendlich groß von der ersten Ordnung; bei Überschreiten der Querschnitte nimmt er die Faktoren $+1$ an. Die Funktionen

$$\sqrt{\frac{\varphi(s, z)}{\psi(s, z)}}$$

welchen die ungeraden ϑ -Funktionen proportional sind, nennen wir **Abelsche Funktionen**^{*)}.

Die Abelschen Funktionen sind durch (4), (4') den ungeraden ϑ -Funktionen in T' [aber in einer mit der Fläche T' sich ändernden Weise] einzeln eindeutig zugeordnet; und zwar auf doppelte Weise: einmal [direkt], indem eine Abelsche Funktion $\gamma\varphi(s, z)$ existiert, die in denselben $p-1$ Punkten verschwindet, in denen auch

$$\vartheta \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon' \end{smallmatrix} \right] (u_1 - u_1^{(\sigma)}, \dots, u_p - u_p^{(\sigma)})$$

als Funktion von (s, z) , auSSer in (s_1, z_1) , verschwindet — eine Eigenschaft, die mit dem Bestehen der Kongruenzen (2) gleichbedeutend ist. Dieser Abelschen Funktion $\gamma\varphi(s, z)$ schreiben wir daher ebenfalls die Charakteristik

$$\left[\begin{smallmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon' \end{smallmatrix} \right] = \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p \\ \varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_p \end{smallmatrix} \right]$$

zu: sodann [indirekt], indem der Quotient zweier Abelschen Funktionen $\gamma\varphi/\gamma\psi$, welche zu den Charakteristiken $\left[\begin{smallmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon' \end{smallmatrix} \right]$ und $\left[\begin{smallmatrix} \varepsilon^* \\ \varepsilon'^* \end{smallmatrix} \right]$ gehören, am Querschnitte a_μ den Faktor $(-1)^{\varepsilon_\mu - \varepsilon^*_\mu}$, an b_μ den Faktor $(-1)^{\varepsilon'_\mu - \varepsilon'^*_\mu}$ annimmt, wie der Quotient (4) aus den beiden entsprechenden ϑ -Funktionen, und sich im übrigen in T' stetig ändert. Diese Eigenschaft kann man auch, unter Einführung einzelner Buchstaben für die Charakteristiken, so ausdrücken, daSS man, wenn

$$\mathbf{u} = \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon \\ \varepsilon' \end{smallmatrix} \right] = \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_p \\ \varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_p \end{smallmatrix} \right],$$

$$\mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon^* \\ \varepsilon'^* \end{smallmatrix} \right] = \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon_1^*, \dots, \varepsilon_p^* \\ \varepsilon_{1'}^*, \dots, \varepsilon_p'^* \end{smallmatrix} \right]$$

die Charakteristiken sind, zu denen nach der ersten Zuordnung bzw. $\gamma\varphi$ und $\gamma\psi$ gehören,

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon_1 + \varepsilon_1^*, \dots \\ \varepsilon'_1 + \varepsilon_{1'}^*, \dots \end{smallmatrix} \right] = \left[\begin{smallmatrix} \zeta \\ \zeta' \end{smallmatrix} \right],$$

$$\mathbf{u} - \mathbf{v} = \left[\begin{smallmatrix} \varepsilon_1 - \varepsilon_1^*, \dots \\ \varepsilon'_1 - \varepsilon_{1'}^*, \dots \end{smallmatrix} \right] = \left[\begin{smallmatrix} \eta \\ \eta' \end{smallmatrix} \right]$$

setzt, also

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \left[\begin{smallmatrix} \zeta \\ \zeta' \end{smallmatrix} \right], \quad (\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \left[\begin{smallmatrix} \eta \\ \eta' \end{smallmatrix} \right],$$

^{*)*)} Führt man an Stelle von s und z andere Variable rational ein, so erhält eine Abelsche Funktion einen Faktor, der eine rationale Funktion von s und z ist; das Verhältnis zweier solcher Funktionen bleibt ungeändert.

und die Charakteristik $(\mathfrak{u} + \mathfrak{v})$ der Funktion $\gamma\varphi/\gamma\psi$ zuschreibt, deren Faktorensystem an den Querschnitten a_μ und b_μ sich bestimmt durch $(-1)^{\zeta_\mu}$, bzw. $(-1)^{\zeta'_\mu}$. Dieselbe Charakteristik hat dann auch $\gamma\psi/\gamma\varphi = 1/\gamma\varphi \cdot \gamma\psi$, da $\gamma\varphi$ an den Querschnitten nur die Faktoren $+1$ erhält. Bei einer Abelschen Funktion kann man noch nicht von bestimmten Faktoren reden, die sie an den Querschnitten annimmt, da sie auch im Unendlichen verzweigt ist, jene Faktoren also vom Wege abhängen.

Aufstellung der Ausdrücke der Abelschen Funktionen für die einfachsten Fälle.*1. Hyperelliptische Funktion.*

(‡) (3. Februar.)

Es ist zweckmäßig, die Gleichung zwischen s und z , $F(s, z) = 0$, durch Einführung rationaler Funktionen σ, ζ , von (s, z) zuerst in eine einfache Form $F_1(\sigma, \zeta) = 0$ zu transformieren.

Was zunächst die Wahl von ζ betrifft, so führen wir, wenn eine Funktion t existiert, die nur für zwei Punkte vor T' unendlich von der ersten Ordnung wird, d. h. im Falle der hyperelliptischen Funktion, diese ein.

Sei dann σ irgend eine andere rationale Funktion von (s, z) , welche nur nicht für solche zwei Punkte, in denen ζ denselben Wert annimmt, ebenfalls denselben Wert erhält, also keine rationale Funktion von ζ allein sei. Wenn σ in m Punkten von T' unendlich von der ersten Ordnung wird, so wird die transformierte Gleichung von der Form

$$\sigma^2 \varphi_1(\zeta) + 2\sigma \varphi_2(\zeta) + \varphi_3(\zeta) = 0;$$

die φ werden dann in σ vom 0^{ten} , in ζ vom $(m-2)^{\text{ten}}$ Grad, also ganze Funktionen von ζ allein, vom $(m-2)^{\text{ten}}$ Grade: $\varphi(\zeta)$.

Da jede Funktion, die für p oder weniger Werte unendlich wird, gleich dem Quotienten zweier Funktionen φ wird, hier also rational in ζ , so wird man für σ niedrigstens eine Funktion wählen, die für $p+1$ Werte unendlich von der ersten Ordnung wird, wobei die $p+1$ Punkte beliebig gewählt werden können.

DaSS man aber stets eine solche rationale Function von (s, z) finden kann, welche für beliebige $p + 1$ Punkte unendlich von der ersten Ordnung wird, ergibt sich aus den folgenden Sätzen.

Satz 1. Wenn eine Function für m Punkte unendlich von der ersten Ordnung wird, so können die Nullpunkte derselben nicht willkürlich angenommen werden, sondern es müssen zwischen ihnen $m - p + 1$ Bedingungsgleichungen bestehen.

Satz 2. Die Anzahl der willkürlichen Constanten in einer Function, die für m Punkte unendlich von der ersten Ordnung wird, beträgt, wenn $m > 2p - 2$, $2m - p + 1$.

Satz 3. Wenn m_1 und m_2 beiden $> 2p - 2$ sind, so ist die Anzahl der willkürlichen Constanten in dem Product zweier Functionen, die beziehungsweise für m_1 und m_2 Punkte unendlich von der ersten Ordnung werden, gleich der Summe der Zahlen der willkürlichen Constanten in den einzelnen Factoren.

Denn seien φ, ψ solche Functionen, so enthält $\varphi \cdot \psi$ zunächst $(2m_1 - p + 1) + (2m_2 - p + 1)$ willkürliche Constanten. Aber es giebt noch gewisse Functionen χ , die für $m_1 + m_2$ Punkte unendlich von der ersten Ordnung werden und sich als Producte von zwei Functionen darstellen lassen, die für m_1 bzw. m_2 Punkte unendlich werden. Die Anzahl dieser Functionen χ ist gleich der Anzahl der willkürlichen Constanten in einem solchen Product, vermindert um die Anzahl der Bedingungsgleichungen zwischen den willkürlichen Constanten in φ und ψ .

Inhalt der folgenden Vorlesungen (nach den Tagebüchern Minnigerodes)**5.–26. Februar:**

- | | |
|-----------|--|
| 5. Febr. | Allgemeiner Fall $p = 3$ (Fortsetzung). |
| 7. Febr. | Die quadratischen Relationen zwischen den p Funktionen φ , insbesondere für $p = 4$. |
| 10. Febr. | Die linearen Relationen zwischen je p^2 zur selben Gruppe gehörigen Produkten zweier Abelschen Funktionen. |
| 14. Febr. | Algebraische Ausdrücke von einfachen Thetaquotienten. |
| 17. Febr. | Ausdrücke der Klassenmoduln bei $p = 3$ durch Thetaquotienten für die Nullwerte der Argumente. |
| 21. Febr. | Hyperelliptischer Fall: Die Abelschen Funktionen und ihre Charakteristiken. |
| 24. Febr. | Anzahl der Abelschen Funktionen; Relationen zwischen den Charakteristiken. |
| 26. Febr. | Ausdrücke von Quotienten Abelscher Funktionen durch Thetaquotienten. |

28. Februar:

Spezielle Thetaquotienten.

3.–11. März:

- | | |
|---------|---|
| 3. März | Thetaquotienten mit beliebigen Argumenten. |
| 5. März | Beweis des vorausgesetzten Satzes (S. 39). |
| 7. März | Ergänzung der allgemeinen Entwicklungen bei $p = 3$ durch die für den hyperelliptischen Fall geltenden. |

INHALTSÜBERSICHT DER SEITEN 551–600

Seite	Inhalt
535–538	Naturphilosophie (Gravitation, Licht, Stoffbewegung)
539–558	Bernhard Riemann's Lebenslauf
559–560	Fortsetzung; Grabinschrift
1–VI	Vorrede zu den Nachträgen (Noether & Wirtinger, 1902)
1–53	I. Vorlesungen über die allgemeine Theorie der Integrale algebraischer Differentialien (W.-S. 1861/62)
1–3	Prinzip der Zerlegung periodischer Funktionen
4–8	Übersicht; die 2^{2p} Thetareihen
8–11	Die Abelschen Funktionen
11–35	Hyperelliptischer Fall; Ausdrücke der Abelschen Funktionen
35–53	Charakteristiken; Thetaquotienten
59–66	Anmerkungen zur Vorlesung
67–68	II. Integrale in einem Verzweigungspunkt (W.-S. 1856/57)
69–95	III. Vorlesungen über die hypergeometrische Reihe (W.-S. 1858/59)
69–75	A. Definition der P -Funktion durch bestimmte Integrale
76–95	B. Aus linearen Differentialgleichungen entspringende Funktionen
96–108	IV. Mathematische Noten aus dem Nachlaß
109–118	V. Berichte; Verzeichnis der Vorlesungen

Ende der Seiten 551–600

B. G. TEUBNER, LEIPZIG

I. Vorlesungen über die allgemeine Theorie der Integrale algebraischer Differentialien.

19. Die Funktion $s = \frac{z_1}{z_2} = \frac{\vartheta}{\vartheta'}$ nimmt dann irgend einen gegebenen Wert nur an zwei Stellen an. Man hat also wieder einen hyperelliptischen Fall. Hat nun $\alpha = \frac{\xi}{\eta}$ an solchen zwei Stellen verschiedene Werte, ist also die Gleichung $F(\vartheta, s) = 0$ irreduktibel, so könnte α nicht der Quotient zweier zugehöriger Funktionen φ sein, entgegen der Voraussetzung. $F(\vartheta, s)$ muß daher ein vollständiges Quadrat sein; und α nimmt für die zwei Punkte, in denen s einen gegebenen Wert annimmt, auch nur einen Wert an. Indem man z_2 durch $z_2 + \lambda z_2$ ersetzt, kann man dann bewirken, daß ϑ in den beiden Punkten α_1, α_2 verschwindet. Dann nimmt für gegebenes $x = \alpha s$, bei beliebigem α , s nur noch zwei verschiedene Werte an, und es wird F das Quadrat einer Funktion $\Phi(s, z)$, wo

$$\Phi(s, z) = \vartheta \cdot \psi(s) + \chi(s) = 0.$$

Dies gibt, in den z_i geschrieben, eine zweite homogene quadratische Relation:

$$z_1 \psi(z_1, z_2) + \chi(z_1, z_2) = 0,$$

welche, mit $z_1 z_2 - z_3^2 = 0$ zusammengenommen, noch eine dritte solche bestimmt. Die drei Relationen bestimmen die algebraische Klasse nicht, stellen vielmehr im ϑ_i -Raum nur eine, doppelt zu nehmende, Raumkurve dritter Ordnung dar. Man kommt so wieder auf den Fall (A), b), β . (17)

Auf diese Weise läßt sich die Gleichung für $p = 4$ in allen Fällen auf die einfachste Form reduzieren. Das Verfahren ist auch auf $p > 4$ leicht ausdehnbar. Es läßt sich nämlich zeigen, daß sich aus $\frac{1}{2}(p-2)(p-3)$ homogenen Funktionen zweiten Grades zwischen p Veränderlichen immer, und für $p > 4$ auf verschiedene Weisen, ein Aggregat kombinieren lasse, das gleich einer Summe von höchstens vier Quadraten linearer Ausdrücke der Veränderlichen ist. Man kann so z. B. die Kriterien erhalten, daß algebraische Funktionen auf hyperelliptische Integrale führen.

Die linearen Relationen zwischen je p , zur selben Gruppe gehörigen Produkten zweier Abelschen Funktionen.

(28. Febr., 3., 4. März.)

Wir gebrauchen für beliebiges p nun die Bezeichnung

$$x_1 = \frac{\varphi_1}{\varphi_p}, \quad x_2 = \frac{\varphi_2}{\varphi_p}, \quad \dots, \quad x_{p-1} = \frac{\varphi_{p-1}}{\varphi_p},$$

wo x_1, x_2 die Stelle der ξ, η von S. 15 vertreten, also eine Gleichung der Form $F^{(2p-2)}(x_1, x_2) = 0$ existiert, und wo φ , in x_1, x_2 ausgedrückt, die dortige φ -Funktion φ von der $(2p-2)^{\text{ten}}$ Ordnung in Bezug auf die Variablen x_1, x_2 vorstellt.

20. Wir betrachten ein Produkt aus zwei Abelschen Funktionen

$$\theta = \sqrt{\xi}\sqrt{\eta},$$

wo also ξ und η solche ganze lineare homogene Funktionen von $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_p$ sind, welche für je $p-1$ Stellen von $F=0$ unendlich klein von der zweiten Ordnung werden.

Verwandelt man die ursprüngliche Fläche T durch Querschnitte in die einfach zusammenhängende Fläche T' , so wird die Funktion $\theta = \sqrt{\xi}\sqrt{\eta}$ stetig durch T' fortgesetzt, allenthalben nur einen bestimmten Wert annehmen, nachdem das Vorzeichen von θ in einem Punkte willkürlich festgesetzt ist. Denn θ wird, wo es unendlich klein oder unendlich groß wird, dies überall nur von der ersten Ordnung, ohne Verzweigung; man kann auch sagen: über jeden innerhalb T' verlaufenden geschlossenen Weg ausgedehnt, gibt das Integral $\int d\log \theta$ einen Wert $2\pi i \cdot n$, wo n eine ganze Zahl ist. Diese Unendlichkeitstellen von θ sind die $2p-2$ festen Stellen, in welchen $x_1, \dots, x_p$ zu gleicher Zeit je $\infty^{(1)}$ werden.

In der Fläche T ist θ ebenfalls unverzweigt, aber zweiwertig. Beim Überschreiten eines Querschnitts von T' kann θ nur denselben oder den entgegengesetzten Wert annehmen; sodaß θ an dem Querschnittssystem von T' ein bestimmtes Faktorensystem ± 1 besitzt. Dasselbe ist, wenn die Charakteristiken der beiden Abelschen Funktionen $(a) = (\sqrt{\xi})$, $(b) = (\sqrt{\eta})$ einzeln gegeben sind, nach Seite 11 aus der Gruppencharakteristik $[a+b]$ bestimmt. Wir nennen nun zwei Produkte $\theta = \sqrt{\xi}\sqrt{\eta}$, $\theta' = \sqrt{\xi'}\sqrt{\eta'}$ von je zwei Abelschen Funktionen *zur selben Gruppe gehörig*, wenn sie an dem Querschnittssystem dasselbe Faktorensystem annehmen. Unser Ziel ist zu beweisen:

(A) *daß zwischen je p solchen Produkten von je zwei Abelschen Funktionen, die zu derselben Gruppe gehören, eine lineare homogene Relation stattfindet.*

Erster Beweis. Da die Anzahl aller Abelschen Funktionen $\sqrt{\xi}$ im allgemeinen gleich $2^{p-1}(2^p-1)$ ist, so ist die Anzahl aller Produkte zu zwei, von einander verschiedenen:

$$\frac{1}{2} \cdot 2^{p-1}(2^p-1) \cdot [2^{p-1}(2^p-1)-1] = 2^{p-2}(2^p-1)(2^{2p-1}-1).$$

Überhaupt gibt es $2^{2p}-1$ Faktorensysteme ± 1 oder Gruppencharakteristiken; nimmt man nun an, daß zu jeder Gruppe gleichviel Produkte gehören — eine Annahme, deren Richtigkeit wir später erkennen werden ⁽¹⁸⁾ —, so folgt für die Anzahl der Produkte einer Gruppe:

$$2^{p-2}(2^{p-1}-1).$$

21. Ein solches Produkt sei $\sqrt{\xi}\sqrt{\eta}$. Wir wollen nun den allgemeinen Ausdruck einer Funktion θ' bilden, welche mit $\sqrt{\xi}\sqrt{\eta}$ zu derselben Gruppe gehört,

also dasselbe Faktorensystem besitzt und zugleich in denselben $2p-2$ Punkten zu $\infty^{(1)}$ wird, wie $\sqrt{\xi}\sqrt{\eta}$.

Die Funktion $\theta' \cdot \sqrt{\xi}\sqrt{\eta}$ wird dann an allen Querschnitten die Faktoren $+1$ annehmen, also rational in den Variablen x_1, x_2 sein. Da sie ferner nur für unendliche x_1, x_2 unendlich, und zwar von der zweiten Ordnung, wird, so wird nach dem früheren (S. 15):

$$\theta' \cdot \sqrt{\xi}\sqrt{\eta} = f^{(2p-4)}(x_1, x_2),$$

wo $f(x_1, x_2)$ noch $3(p-1)$ willkürliche Konstanten linear und homogen enthält. Damit θ' endlich bleibt für $\xi = 0$ und $\eta = 0$, muSS $f(x_1, x_2)$ für die je $p-1$ Nullpunkte von $\sqrt{\xi}$ und $\sqrt{\eta}$ verschwinden, was $2(p-1)$ lineare Bedingungsgleichungen für die Konstanten von $f(x_1, x_2)$ gibt. Es bleiben dann in $f(x_1, x_2)$ noch $p-1$ Konstanten willkürlich, θ' enthält somit $p-1$ willkürliche Konstanten in linearer homogener Weise.

Daher läSSt sich auch jedes zur Gruppe $\sqrt{\xi}\sqrt{\eta}$ gehörige Produkt zweier Abelscher Funktionen, als Funktion θ' , durch $p-1$ spezielle dieser Funktionen θ' linear und homogen ausdrücken; d. h. zwischen je p solcher zu einer Gruppe gehörigen Produkte existiert eine lineare homogene Gleichung mit konstanten Koeffizienten, von der Form:

$$\sqrt{\xi_1}\sqrt{\eta_1} + \sqrt{\xi_2}\sqrt{\eta_2} + \cdots + \sqrt{\xi_p}\sqrt{\eta_p} = 0, \quad \text{q. e. d.}$$

Dieser Beweis kann aber insofern nicht als streng und allgemein angesehen werden, als er nur auf Konstantenzählung beruht, ohne daSS die $2(p-1)$ Bedingungsgleichungen, die zwischen den Koeffizienten bestehen, untersucht worden sind. (19)

Zweiter Beweis.

Der strenge Beweis des analogen Satzes:

(B) *daSS zwischen je $p+1$ Quadraten von Abelschen Funktionen eine lineare homogene Relation stattfindet,*

beruht auf der Eigenschaft der Abelschen Funktionen, daSS ihre Quadrate Funktionen φ sind, von denen Th. A. F. Art. 4 mittels des Dirichletschen Prinzips allgemein bewiesen war, daSS es nur p linear unabhängige gibt. Einen analogen, auf den Periodizitätseigenschaften der Integrale über Abelsche Funktionen beruhenden Beweis des Satzes (A) wollen wir hier andeuten.

Seien $\varphi_1(s, z)$, $\varphi_2(s, z)$ zwei solche Funktionen φ , die für je $p-1$ Wertsysteme (s, z) von $F(s, z) = 0$ unendlich klein von der zweiten Ordnung werden, so betrachten wir das Integral

$$v = \int \varphi_1(s, z) \varphi_2(s, z) ds.$$

22. Dieser Ausdruck ist ein immer endlich bleibendes Integral, ist in der Fläche T' eindeutig und stetig, und zu beiden Seiten der Querschnitte ist [von der Gruppe, zu der $\sqrt{\xi_1}\sqrt{\xi_2}$ gehört, abhängig] für einige Querschnitte

$$\alpha) \quad v^+ = v^- + \text{const.},$$

für die übrigen (β) Querschnitte

$$\beta) \quad v^+ = -v^- + \text{const.}$$

So wie es für die endlichen Integrale w , für welche an allen Querschnitten die Beziehung $\alpha)$ gilt, geschehen, läßt sich nun ableiten, daß alle Funktionen v' , welche in T' eindeutig und stetig sind und an den Querschnitten genau dieselben Beziehungen $\alpha), \beta)$ haben, wie v , von $p-1$ willkürlichen Konstanten linear abhängen. Man braucht nur zu zeigen, daß der reelle Teil von v' durch die vorgeschriebenen Unstetigkeiten $\alpha), \beta)$ hier völlig bestimmt ⁽²⁰⁾ ist, und dann, daß jedes v' durch $p-1$ unter ihnen linear ausdrückbar ist. Daraus folgt dann der Satz (A). (21)

Die in eine Relation eingehenden Ausdrücke ξ_i, η_i sind lineare Funktionen von $x_1, x_2, \dots, x_p$. Man nehme nun $p-2$ von einander unabhängige Relationen der Art $\alpha)$, so stellt dies zwischen den p Grössen $x_1, x_2, \dots, x_p$ $p-2$ unabhängige Gleichungen vor. Eliminiert man also aus denselben die $p-3$ Grössen $x_4, \dots, x_p$, so bleibt nur eine homogene Gleichung zwischen den drei Veränderlichen x_1, x_2, x_3 übrig, welche mit der ursprünglichen Gleichung $F^{(2p-2)}(x_1, x_2, x_3) = 0$ übereinstimmen muß. Die Gleichung $F(x_1, x_2, x_3)$ ist also ersetzbar durch $p-2$ Gleichungen der Form $\alpha)$; daher muß auch jede algebraische Gleichung $F(s, z) = 0$ für eine $2p+1$ -fach zusammenhängende algebraische Funktion s von z ersetzbar sein durch ein System von $p-2$ Gleichungen zwischen p Veränderlichen. Da aus diesen auch alle algebraischen Relationen zwischen den Abelschen Funktionen folgen müssen, so muß aus jenen $p-2$ Gleichungen auch algebraisch herzuleiten sein, daß zwischen je p zu einer Gruppe gehörigen Produkten eine Relation der Art $\alpha)$ besteht.

Somit sind die Konstanten in den $p-2$ Relationen nicht unabhängig; sie müssen vielmehr eben derart bestimmt werden, daß aus den $p-2$ Gleichungen der Form $\alpha)$ alle übrigen von derselben Form folgen. Man wird sich dabei der beiden Sätze (A) und (B) bedienen; und diese beiden Sätze müßten auch ausreichen, um alle Relationen zwischen Abelschen Funktionen zu finden, wenn man noch deren Beziehungen zu den Thetacharakteristiken und die Sätze über den Zusammenhang der Charakteristiken benutzte, um zu untersuchen, welche Produkte zu derselben Gruppe gehören.

Die Konstanten in den $p-2$ Gleichungen müssen sich dabei so einrichten lassen, daß die Koeffizienten sämtlicher Quadrate von Abelschen Funktionen sich rational in $3p-3$ Grössen ausdrücken, den $3p-3$ Klassenmoduln der Klasse; wie wir es für $p=3$ durch die sechs Grössen $\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma'$ getan haben.

So hat man für $p=4$ zwei Gleichungen zwischen je vier Produkten; und man wird diese so wählen, daß in den beiden Gleichungen dieselben acht Abelschen Funktionen vorkommen. (22)

Algebraische Ausdrücke von einfachen Thetaquotienten. (5)

(A. März)

Um das Ziel: die Konstanten in den Ausdrücken aller Abelschen Funktionen durch die Thetafunktionen für die Nullwerte der Argumente zu bestimmen, zu erreichen, ist es zweckmässiger, mehr zu benutzen, als bloss die

Beziehung der Abelschen Funktionen zu den Thetaquotienten (S. 10), also bloß die Charakteristikentheorie; wir wollen vielmehr die Quotienten von Thetafunktionen, deren Argumente nicht, wie bei jenen Funktionen, nur von zwei Punkten von T' abhängen, sondern beliebige Werte haben, algebraisch ausdrücken. Wir geben die Rechnung allgemein für beliebiges p , wenn sie sich auch nur für den Fall zu Ende führen läßt, daß man die Fundamentalgleichungen zwischen den Abelschen Funktionen schon kennt, wie bei $p \leq 2$.

Zum Ausdruck des Quotienten zweier einfacher Thetafunktionen soll (Th. A. F. Art. 27) eine algebraische Funktion θ gebildet werden, welche an den Querschnitten von T' dieselben Faktoren annimmt, wie $\sqrt{\xi}\sqrt{\eta}$, wo $\sqrt{\xi}$ und $\sqrt{\eta}$ zwei Abelsche Funktionen sind, und welche für p Punkte von T' unendlich von der ersten Ordnung wird.

Unter den Bezeichnungen des vorigen Abschnittes bilde man zwei verschiedene Funktionen

$$f^{(2p-4)}(x_1, x_2), \quad f_1^{(2p-4)}(x_1, x_2),$$

die beide je $3(p-1)$ willkürliche Konstanten enthalten und für je $2(2p-2)$ Punkte unendlich klein von der ersten Ordnung werden. Je $p-1$ dieser Konstanten sollen so bestimmt werden, daß $f(x_1, x_2)$ für

die $p - 1$ Nullwerte von $\sqrt{\xi}$, bezw. $\sqrt{\eta}$, und die $p - 1$ Nullwerte von $\sqrt{\eta}$ verschwindet, wonach f und f_1 die Form erhalten:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \cdots + c_{2p-2}\eta_{2p-2}, \\ f_1(x_1, x_2) &= c'_1\chi_1 + c'_2\chi_2 + \cdots + c'_{2p-2}\chi_{2p-2}, \end{aligned}$$

wo die c und c' willkürliche Konstanten sind und die η_i , bezw. χ_i , voneinander unabhängige Funktionen vorstellen, die für die Nullwerte von $\sqrt{\xi}$, bezw. $\sqrt{\eta}$, verschwinden.

Die in T' eindeutige Funktion

$$\theta = \frac{f(x_1, x_2)}{f_1(x_1, x_2)} \sqrt{\xi} \sqrt{\eta}$$

wird dann noch für $3(p-1)$ Punkte zu $0^{(1)}$, für $3(p-1)$ Punkte zu $\infty^{(1)}$, und verhält sich an den Querschnitten wie $\sqrt{\xi}\sqrt{\eta}$.

In θ bestimme man nun weiter die noch willkürlichen $2(p-1)$ Konstanten von f_1 so, daSS f_1 für p willkürlich gegebene Punkte β zu Null wird; f_1 verschwindet dann in noch $2p-3$ weiteren Punkten α , von denen noch $p-3$ willkürlich sind. Die $2(p-1)$ noch willkürlichen Konstanten von f bestimme man alsdann so, daSS f für die $2p-3$ Punkte α ebenfalls verschwindet, wodurch die p letzten Nullpunkte γ von f mitbestimmt sind.

Alsdann läSSt sich θ als Quotient zweier Thetafunktionen darstellen. Seien die Werte des Integrals u_μ für die p Punkte β_ν mit $\beta_\nu^{(\mu)}$, für die p Punkte γ_ν mit $\gamma_\nu^{(\mu)}$ bezeichnet. Wir betrachten den Quotienten

$$\theta = \frac{\vartheta \left(\sum_\nu u^{(\beta_\nu)} - \sum_\nu u^{(\gamma_\nu)} - (a)_\mu - (b)_\mu \right)}{\vartheta \left(\sum_\nu u^{(\beta_\nu)} - \sum_\nu u^{(\gamma_\nu)} + (a)_\mu + (b)_\mu \right)}, \quad (3)$$

und führen in die in den Argumenten vorkommenden Summen die Werte der Integrale u_μ in den übrigen Punkten, in denen f und f_1 verschwinden, ein. Seien die Werte von u_μ in den $2p-3$ Punkten $\alpha_\varkappa$, in welchen $f(x_1, x_2)$ und $f_1(x_1, x_2)$ gleichzeitig verschwinden, mit

$$u_\mu^{(\alpha_\varkappa)} \quad (\varkappa = 1, 2, \dots, 2p-3)$$

bezeichnet; in den $p-1$ Nullwerten von $f(x_1, x_2)$ und $\sqrt{\xi}$ mit

$$\eta_\mu^{(\lambda)} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, p-1)$$

in den $p-1$ Nullwerten von $f_1(x_1, x_2)$ und $\sqrt{\eta}$ mit

$$\chi_\mu^{(\varrho)} \quad (\varrho = 1, 2, \dots, p-1).$$

Wenn dann $\sqrt{\xi}$ und $\sqrt{\eta}$ bezüglich zu den Charakteristiken

(a), (b) gehören, so kann man setzen ((2), S. 8):

$$\begin{aligned}\sum_{\nu} u_{\mu}^{(\beta_{\nu})} - \sum_{\nu} u_{\mu}^{(\gamma_{\nu})} &\equiv (\xi \cdot u_{\mu}^{(\alpha')} + \eta \cdot u_{\mu}^{(\alpha'')} + \dots), \\ \sum_{\nu} u_{\mu}^{(\beta_{\nu})} - \sum_{\nu} u_{\mu}^{(\gamma_{\nu})} &\equiv (\xi \cdot u_{\mu}^{(\alpha')} + \eta \cdot u_{\mu}^{(\alpha'')} + \dots),\end{aligned}$$

und hat also, nach dem Abelschen Theorem:

$$\sum_{\kappa=1}^{2p-3} u_{\mu}^{(\alpha_{\kappa})} + \sum_{\lambda=1}^{p-1} \eta_{\mu}^{(\lambda)} + \sum_{\varrho=1}^{p-1} \chi_{\mu}^{(\varrho)} \equiv 0,$$

denn der erstere Ausdruck, der sich auf die $4(p-1)$ Punkte bezieht, in denen $\frac{f}{f_1} \sqrt{\xi} \sqrt{\eta}$ zu Null wird, ist kongruent der Summe, ausgedehnt über die $2(p-1)$ je doppelt zu rechnenden Wertsysteme, in denen x_1 und x_2 zugleich zu $\infty^{(1)}$ werden und die durch eine Funktion φ verknüpft sind (Th. A. F. Art. 23); während sich der zweite Ausdruck ebenso auf die $4(p-1)$ Nullpunkte von $\frac{f}{f_1}$ bezieht.

Hiernach wird

$$\theta = \frac{\vartheta \left(\sum_{\kappa=1}^{2p-3} u^{(\alpha_{\kappa})} + (a) \right)}{\vartheta \left(\sum_{\kappa=1}^{2p-3} u^{(\alpha_{\kappa})} - (a) \right)} \cdot \frac{\vartheta \left(\sum_{\kappa=1}^{2p-3} u^{(\alpha_{\kappa})} + (b) \right)}{\vartheta \left(\sum_{\kappa=1}^{2p-3} u^{(\alpha_{\kappa})} - (b) \right)}. \quad (4)$$

Um den algebraischen Ausdruck für θ zu bilden, setze man auch in (1) die Koordinaten der $2p-3$ gleichzeitigen Nullpunkte $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2p-3}$ von $f(x_1, x_2)$ und $f_1(x_1, x_2)$ ein und bestimme hieraus die Verhältnisse der c und der c' . Seien die Werte bez. von x_1 und x_2 in α_{κ} bezeichnet mit

$$x_1^{(\kappa)}, \quad x_2^{(\kappa)},$$

so wird, bis auf einen konstanten Faktor,

$$f = \sum_{\kappa} \pm c_{\kappa} \eta_{\kappa} x_1^{(\kappa)} x_2^{(\kappa)} \dots, \quad f_1 = \sum_{\kappa} \pm c'_{\kappa} \chi_{\kappa} x_1^{(\kappa)} x_2^{(\kappa)} \dots$$

und somit (nach Th. A. F., Art. 27):

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} \eta_1 & \eta_2 & \cdots & \eta_{2p-3} & \eta_{2p-2} & \sqrt{\xi} \\ x_1^{(1)} & x_1^{(2)} & \cdots & x_1^{(2p-3)} & x_1 & x_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_p^{(1)} & x_p^{(2)} & \cdots & x_p^{(2p-3)} & x_p & x_p \end{vmatrix} \\
 & \begin{vmatrix} \chi_1 & \chi_2 & \cdots & \chi_{2p-3} & \chi_{2p-2} & \sqrt{\eta} \\ x_1^{(1)} & x_1^{(2)} & \cdots & x_1^{(2p-3)} & x_1 & x_1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_p^{(1)} & x_p^{(2)} & \cdots & x_p^{(2p-3)} & x_p & x_p \end{vmatrix} \\
 & = A \cdot \frac{\vartheta \left(\sum u^{(\alpha)} + (a) \right) \vartheta \left(\sum u^{(\alpha)} + (b) \right)}{\vartheta \left(\sum u^{(\alpha)} - (a) \right) \vartheta \left(\sum u^{(\alpha)} - (b) \right)} \quad (5)
 \end{aligned}$$

Die hier eintretenden Konstanten B, C sind von dem Wertsystem (x_1, x_2) , das in $\eta_\lambda, \chi_\varrho$ und in den Grenzen der $u_1, u_2, \dots, u_p$ vorkommt, unabhängig. Zugleich ist der Determinantenquotient der linken und der Thetaquotient der rechten Seite symmetrisch in den Wertsystemen, die sich auf die $2p-2$ Punkte $(x_1, x_2), (\alpha'_1, \alpha''_1), (\alpha'_2, \alpha''_2), \dots, (\alpha'_{2p-3}, \alpha''_{2p-3})$ beziehen. Ersetzt man daher den Punkt (x_1, x_2) durch den beliebigen Punkt α_0 , das zugehörige Integral u_μ durch $u_\mu^{(\alpha_0)}$, so kann man schreiben:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\sqrt{\xi^{(\alpha_0)}}}{\sqrt{\eta^{(\alpha_0)}}} \cdot \frac{\begin{vmatrix} \eta_1 & \cdots & \eta_{2p-3} & \sqrt{\xi^{(1)}} & \cdots \\ x_1^{(\alpha_1)} & \cdots & x_1^{(\alpha_{2p-3})} & x_1^{(\alpha_0)} & \cdots \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \\ x_p^{(\alpha_1)} & \cdots & x_p^{(\alpha_{2p-3})} & x_p^{(\alpha_0)} & \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \chi_1 & \cdots & \chi_{2p-3} & \sqrt{\eta^{(1)}} \\ x_1^{(\alpha_1)} & \cdots & x_1^{(\alpha_{2p-3})} & x_1^{(\alpha_0)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_p^{(\alpha_1)} & \cdots & x_p^{(\alpha_{2p-3})} & x_p^{(\alpha_0)} \end{vmatrix}} \\
 & = A \cdot \frac{\vartheta \left(\sum u^{(\alpha)} + u^{(\alpha_0)} + (a) \right) \vartheta \left(\sum u^{(\alpha)} + u^{(\alpha_0)} + (b) \right)}{\vartheta \left(\sum u^{(\alpha)} + u^{(\alpha_0)} - (a) \right) \vartheta \left(\sum u^{(\alpha)} + u^{(\alpha_0)} - (b) \right)} \quad (5')
 \end{aligned}$$

wo $\sqrt{\xi^{(\alpha_0)}}, \sqrt{\eta^{(\alpha_0)}}$ die Werte bezüglich von $\sqrt{\xi}, \sqrt{\eta}$ im Punkte α_0 sind, und wo nun der Faktor A unabhängig wird von sämtlichen $2p-2$ Punkten α , für deren Wertsysteme die in den Argumenten der Thetafunktionen vorkommenden Integralsummen gebildet sind.

Um die Konstante A zu bestimmen, beachte man, daß Argumente von Thetafunktionen, welche aus Summen über $2p-2$ Integrale mit beliebigen Grenzen bestehen, ganz allgemeine sind. Spezialisiert man diese Argumente, indem man $p-1$ der Grenzen, $\alpha_1, \dots, \alpha_{p-3}$, in die Nullpunkte einer Abelschen Funktion von der Charakteristik (c) legt, so kommt in der Formel (5) links

ein Ausdruck der Form

$$\frac{\sqrt{\xi^{(c)}}}{\sqrt{\eta^{(c)}}} \cdot \frac{\sqrt{\xi^{(c)}}}{\sqrt{\eta^{(c)}}} \cdot \sqrt{\xi} \sqrt{\eta} \quad (6)$$

zu stehen, wo nun die von nur $p - 1$ Punkten abhängenden Argumente nicht mehr willkürliche Werte haben. Man sieht überhaupt, daß solche

Quotienten nur dann einen einfachen algebraischen Ausdruck erhalten können, wenn die Anzahl der Integrale in den Integralsummen der Argumente ein Vielfaches von $p - 1$ ist; denn nach der Art, wie die unteren Grenzen in Art. 22, 23 der Th. A. F. bestimmt waren, wird die Summe der Integrale, ausgedehnt über $2(p - 1)$ durch eine φ verknüpfte Punkte, kongruent Null.

Die Bestimmung der Konstanten A lässt sich nun weiter ähnlich vereinfachen, wie es von Jacobi in den Fundamenta (Art. 36) für die elliptischen Funktionen geschehen ist. Bei geeigneter Wahl von (c) ist es möglich, in (5) eine zweite Substitution zu machen, derart dass der inverse Ausdruck des obigen (6) resultiert. Das Produkt der beiden Ausdrücke liefert dann A^2 , ausgedrückt durch die Klassenmoduln. (22)

[Sei nämlich die Charakteristik (c) in der Gruppe $(a + b)$ enthalten, d. h. $(a + b + c)$, wie (c) , eine ungerade Charakteristik; so setze man auch für die $p - 1$ Punkte $(\alpha_{p-1}, \dots, \alpha_{2p-3})$ die $p - 1$ Nullpunkte der zur Charakteristik $(a + b + c)$ gehörigen Abelschen Funktion. Die linke Seite der ursprünglichen Formel nimmt dann die verlangte Form an:

$$\frac{\sqrt{\xi^{(a+c)}}}{\sqrt{\eta^{(a+c)}}} \cdot \frac{\sqrt{\xi^{(a+c)}}}{\sqrt{\eta^{(a+c)}}} = 0. \quad (7)$$

Man findet hieraus, auSSer A^2 , auch die Quotienten der geraden Thetafunktionen, für die Nullwerte der Argumente, ausgedrückt durch die Klassenmoduln, indem man in (6) für die Punkte $\alpha_0, \dots, \alpha_{p-2}$ die $p - 1$ Nullpunkte einer Abelschen Funktion von solcher Charakteristik (d) setzt, dass die beiden Charakteristiken $(a + c + d)$, $(b + c + d)$ gerade werden.]

Geht man insbesondere für $p = 3$ von der früheren Gleichungsform (Werke, XXXI, S. 492; 1. Aufl. XXX, S. 460)

$$F = \zeta^2 - xyz = 0 \quad (8)$$

aus, wo ζ eine beliebige homogene Funktion zweiten Grades von x, y, z ist, und nimmt $\sqrt{\xi}$ und $\sqrt{\eta}$, mit den Charakteristiken (a) , (b) , für die beiden in der Formel (5) vorkommenden Abelschen Funktionen $\sqrt{\xi}$ und $\sqrt{\eta}$, so soll für das in (2) vorkommende $f(x_1, x_2)$ ein homogener Ausdruck zweiten Grades in x, y, z gesetzt werden, der für $x = 0$, $\theta(x, y, z) = 0$ verschwindet, also

$$f = c_1\zeta + c_2x^2 + c_3xy + c_4xz, \quad \text{und analog}$$

$$f_1 = c'_1\zeta + c'_2y^2 + c'_3yx + c'_4yz,$$

wonach, wenn die Werte von $\theta(x, y, z)$, x, y, z in den vier beliebigen Punkten α bzw. mit $\theta^{(i)}$, x_i, y_i, z_i bezeichnet werden:

$$\frac{\sqrt{\xi}\sqrt{\eta}\sqrt{\zeta}\sqrt{\theta^{(0)}}\sqrt{\theta^{(1)}}}{\sqrt{\xi^{(0)}}\sqrt{\xi^{(1)}}\sqrt{\eta^{(0)}}\sqrt{\eta^{(1)}}} = \frac{\begin{vmatrix} \theta^{(0)} & \theta^{(1)} & \theta^{(2)} & \theta^{(3)} & \theta^{(4)} & \zeta \\ x_0 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x \\ y_0 & y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y \\ z_0 & z_1 & z_2 & z_3 & z_4 & z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \theta^{(0)} & \theta^{(1)} & \theta^{(2)} & \theta^{(3)} & \theta^{(4)} & \zeta \\ x_0 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x \\ y_0 & y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y \\ z_0 & z_1 & z_2 & z_3 & z_4 & z \end{vmatrix}} \cdot \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{z_0 z_1} \dots \quad (9)$$

Hier kann man nun für $(c) = (a + b)$ einmal die Charakteristik von $\sqrt{\xi\eta}$ wählen, α_3, α_4 als die Verschwindungspunkte von $\sqrt{\xi\eta}$; dann wird

$$\theta^{(2)} = 0, \quad \theta^{(3)} = 0, \quad \zeta_2 = 0, \quad \zeta_3 = 0;$$

der Zähler des Determinantenquotienten zu

$$\theta^{(0)}\theta^{(1)}(x_0 y_1 - x_1 y_0)(z_2 z_3 - z_3 z_2)(x_0 y_1 - x_1 y_0) \cdot z_0 z_1,$$

der Nenner zu

$$-y_2 y_3 (x_2 y_3 - x_3 y_2)(\theta^{(0)} z_1 - \theta^{(1)} z_0) \cdot z_0 z_1.$$

Daher:

$$\frac{\sqrt{\xi}\sqrt{\eta}\sqrt{\theta^{(0)}}\sqrt{\theta^{(1)}}}{\sqrt{\xi^{(0)}}\sqrt{\xi^{(1)}}\sqrt{\eta^{(0)}}\sqrt{\eta^{(1)}}} = \frac{\theta^{(0)}\theta^{(1)}(x_0 y_1 - x_1 y_0)^2 z_2 z_3}{y_2 y_3 (x_2 y_3 - x_3 y_2)(\theta^{(0)} z_1 - \theta^{(1)} z_0) \cdot z_0 z_1}. \quad (10)$$

[Da

$$\frac{\sqrt{\xi}\sqrt{\eta}}{\sqrt{\xi^{(0)}}\sqrt{\eta^{(0)}}} = \vartheta^{(a+c)}(u^{(\alpha_0)} + u^{(\alpha_1)} - (c)_1, \dots),$$

so wird die linke Seite zu

$$\frac{\vartheta^{(a+c)}(u^{(\alpha_0)} + u^{(\alpha_1)}, \dots)}{\vartheta^{(a+c)}(0, \dots)} \cdot \frac{\sqrt{\theta^{(0)}}\sqrt{\theta^{(1)}}}{\sqrt{\xi^{(0)}}\sqrt{\xi^{(1)}}\sqrt{\eta^{(0)}}\sqrt{\eta^{(1)}}}. \quad (10')$$

Man wird zweitens, wenn (c) zu $\sqrt{\xi\eta}$ gehörte, in (9) für α_2, α_3 die Nullpunkte $\alpha_0^{(2)}, \alpha_0^{(3)}$ von $\sqrt{\xi\eta}$, mit der Charakteristik $(a + b + c)$ wählen, und hat dann, wenn

$$\zeta = lx + my + nz,$$

wo l, m, n von den Klassenmoduln abhängen:

$$\theta^{(2)} = 0, \quad \theta^{(3)} = 0, \quad \zeta_2 = lx^{(2)} + my^{(2)} + nz^{(2)} = 0,$$

$$\zeta_3 = lx^{(3)} + my^{(3)} + nz^{(3)} = 0.$$

Somit wird der Zähler des Determinantenquotienten von (9) zu

der Nenner zu

$$y_2 y_3 (x_2 y_3 - x_3 y_2) (\theta^{(0)} z_1 - \theta^{(1)} z_0) (x_0 y_1 - x_1 y_0) \cdot z_0 z_1;$$

daher

$$\frac{\theta^{(2)} \theta^{(3)} (x_2 y_3 - x_3 y_2) (\theta^{(0)} z_1 - \theta^{(1)} z_0)}{\theta^{(0)} \theta^{(1)} (x_0 y_1 - x_1 y_0) (x_2 y_3 - x_3 y_2)} \cdot \frac{x_0 y_1 - x_1 y_0}{y_2 y_3 \cdot z_0 z_1} \cdot \frac{\vartheta^{(b)} (u^{(\alpha_0)} + u^{(\alpha_1)} - (a + b + c)_1, \dots)}{\vartheta^{(a)} (u^{(\alpha_0)} + u^{(\alpha_1)} - (a + b + c)_1, \dots)}. \quad (11)$$

Da

$$\frac{\vartheta^{(b)}}{\vartheta^{(a)}} = \frac{\vartheta^{(a+c)} (u^{(\alpha_0)} - u^{(\alpha_1)})}{\vartheta^{(a+c)} (0)} \cdot \frac{\vartheta^{(b)} (u^{(\alpha_0)} + u^{(\alpha_1)} - (a + b + c)_1, \dots)}{\vartheta^{(a)} (u^{(\alpha_0)} + u^{(\alpha_1)} - (a + b + c)_1, \dots)},$$

so wird die linke Seite zu

$$\frac{\vartheta^{(a+c)} (u^{(\alpha_0)} - u^{(\alpha_1)}, \dots)}{\vartheta^{(a+c)} (0, \dots)} \cdot \frac{\vartheta^{(b)} (u^{(\alpha_0)} + u^{(\alpha_1)} - (a + b + c)_1, \dots)}{\vartheta^{(a)} (u^{(\alpha_0)} + u^{(\alpha_1)} - (a + b + c)_1, \dots)}. \quad (11')$$

Multipliziert man die beiden Formeln (10'), (11') miteinander und beachtet, daß

$$\frac{xz}{yz} = \frac{x}{y}, \quad \frac{x}{\zeta} = \frac{x}{\zeta'}, \dots$$

so ergibt sich

$$A^2 = \dots$$

Benutzt man noch die Gleichungen:

$$\sqrt{xy} + \sqrt{zt} + \sqrt{pq} = 0,$$

$$\zeta = l_1 x + m_1 y + n_1 z, \quad \eta = l_2 x + m_2 y + n_2 z;$$

so wird für $z = 0, \theta = 0$:

$$l_1 \sqrt{p_1 q_1} - l_2 \sqrt{x_1 y_1} = 0, \quad m_1 \sqrt{p_1 q_1} - m_2 \sqrt{x_1 y_1} = 0, \quad x_1 y_1 p_1 q_1 - x_2 y_2 p_2 q_2 = 0,$$

$$p_2 = l_1 x_2 + m_1 y_2; \quad q_2 = l_2 x_2 + m_2 y_2; \quad p_3 = l_1 x_3 + m_1 y_3; \quad q_3 = l_2 x_3 + m_2 y_3;$$

woraus

$$\frac{p_2 q_2}{p_3 q_3} = \dots$$

und ebenso für $\eta = 0, \zeta = 0$:

$$\frac{y^{(2)} z^{(2)}}{p^{(2)} q^{(2)}} = \frac{(l_1 m_2 - l_2 m_1)(l_1 n_2 - l_2 n_1)}{(m_1 n_2 - m_2 n_1)(l_1 n_2 - l_2 n_1)}.$$

Daher, in Funktion der Klassenmoduln:

$$A^2 = e^{\dots} \sqrt{\frac{(l_1 m_2 - l_2 m_1)(l_1 n_2 - l_2 n_1)}{(m_1 n_2 - m_2 n_1)(l_1 n_2 - l_2 n_1)}}. \quad (12')$$

Man ersetze weiter in der Formel (10), (10') die Punkte α_2, α_3 durch die beiden Nullpunkte der Abelschen Funktion $\sqrt{\zeta}$, mit Charakteristik (d) , wobei, nach der Relation

$$\sqrt{\zeta} + \sqrt{\xi} + \sqrt{\eta} = 0,$$

die Charakteristiken $(a + c + d)$, $(b + c + d)$ gerade sind (Werke, XXXI, S. 500; 1. Aufl. XXX, S. 468–469). In dem algebraischen Ausdruck der Formel (10) hat man dann aus $p = 0$:

$$\sqrt{xy} - \sqrt{zt} = 0, \quad \zeta = -\sqrt{xy} - \sqrt{zt};$$

somit mittels $p = 0$:

$$\frac{x_0}{x_1} = \frac{m_1}{m_2}, \quad \frac{z_0}{z_1} = \frac{m_1 n_2 - m_2 n_1}{l_1 n_2 - l_2 n_1} = \frac{x_0 z_1 - x_1 z_0}{y_0},$$

und, wie oben:

$$\frac{y^{(2)} z^{(2)}}{p^{(2)} q^{(2)}} = \dots$$

Daher:

$$\frac{\vartheta^{(b+c+d)}(0, 0, 0)}{\vartheta^{(a+c+d)}(0, 0, 0)} = \frac{\sqrt{x_0} \sqrt{z_0}}{\sqrt{y_0} \sqrt{t_0}} \cdot \sqrt[4]{\frac{l_1 m_2 - l_2 m_1}{l_1 n_2 - l_2 n_1}},$$

oder:

$$\frac{\vartheta^{(a+c+d)}(0, 0, 0)}{\vartheta^{(b+c+d)}(0, 0, 0)} = \frac{\sqrt[4]{l_1 m_2 - l_2 m_1}}{\sqrt[4]{l_1 n_2 - l_2 n_1}} \cdot \sqrt{\frac{y_0 z_1 - y_1 z_0}{x_0 z_1 - x_1 z_0}}, \quad (14)$$

so daSS diese vierte Wurzel durch die Thetamoduln eindeutig bestimmt ist.]
(22)

Ausdrücke der Klassenmoduln bei $p = 3$ durch Thetaquotienten für die Nullwerte der Argumente.

(5., 6. März)

Zunächst beweisen wir einen allgemeinen Satz (s. Werke, XXXI, S. 487; 1. Aufl. XXX, S. 456):

Man hat [mit den Bezeichnungen der eben angeführten Arbeit, (1), (2)]:

$$\frac{\vartheta(u_1 - u'_1 - e_1, \dots) \cdot \vartheta(u_1 + u'_1 + e_1, \dots)}{\vartheta^2(e_1, e_2, \dots)} = \frac{c}{h} \cdot \frac{\sum_1^p \varphi_\nu(s, z) \varphi_\nu(s', z')}{\sqrt{F(s, z)} \cdot \sqrt{F(s', z')}}.$$

wo

$$\frac{c}{h} = \left(\frac{p-1}{\sqrt{F(s, z)}} \cdot \frac{2p-2}{\sqrt{F(s', z')}} \right)^{-1}$$

die Summen ausgedehnt über die $2p-2$ Punkte $s_1, z_1; s_2, z_2; \dots; s_{2p-2}, z_{2p-2}$, welche durch die Gleichung

$$\sum_1^p c_\nu \varphi_\nu(s, z) = 0$$

verknüpft sind. In $\eta_1, \dots, \eta_{p-1}$ verschwindet, auSSer in (s_1, z_1) , die Funktion $\vartheta(u_1 - u'_1 - e_1, \dots)$, als Funktion von s, z betrachtet. Analog für den Nenner.

Unter $\varphi_1(s, z), \dots, \varphi_p(s, z)$ sollen nun diejenigen Funktionen $\varphi(s, z)$ verstanden werden, welche in den Normalintegralen

$$w_\nu = \int \frac{\varphi_\nu(s, z)}{F'(s, z)} ds \quad (\nu = 1, 2, \dots, p)$$

selbst vorkommen, wodurch die $\varphi_\nu(s, z)$ völlig bestimmt sind. Um als- dann die Verhältnisse der Konstanten c, h , welche von den (s, z) und (s', z') unabhängig sind, zu bestimmen, nehme man $(s, z) = (s_1, z_1)$, wonach die beiden Faktoren der linken Seite zunächst unter der Form $0/0$ erscheinen. Durch Differentiation von Zähler und Nenner der beiden Faktoren nach z ergibt sich aber, wenn man setzt

$$\frac{\partial u_\nu}{\partial z_1} = \frac{\varphi_\nu(s_1, z_1)}{\sqrt{F(s_1, z_1)}},$$

und beachtet, daSS $\vartheta(v_1, \dots)$ eine gerade, $\frac{\partial \vartheta}{\partial v_\nu}$ eine ungerade Funktion ist:

$$\frac{c}{h} = \left(\sum_1^p \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial v_\nu \partial v_{\nu'}}(e_1, \dots) \cdot \frac{\varphi_\nu(s_1, z_1) \varphi_{\nu'}(s_1, z_1)}{F(s_1, z_1)} \right)^{-1}.$$

Und da es auf einen allen c und h gemeinsamen Faktor nicht ankommt, kann man also setzen:

$$c_\nu = \frac{\partial \vartheta}{\partial v_\nu}(e_1, e_2, \dots), \quad h_{\nu\nu'} = \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial v_\nu \partial v_{\nu'}}(e_1, e_2, \dots).$$

Zur Anwendung des Satzes auf die Abelschen Funktionen setzen wir:

24. und nehmen

$$(a), \quad (b), \quad (c), \quad (a + b + c)$$

als ungerade Charakteristiken, so wird

$$\frac{\vartheta^{(a)}(u - u' - (c))}{\vartheta^{(a)}(u + u' + (c))} = \frac{\sqrt{\varphi^{(a)}(s, z)} \cdot \sqrt{\varphi^{(a)}(s', z')}}{\sqrt{F(s, z)} \cdot \sqrt{F(s', z')}}$$

und es folgt wieder die Formel (4), (4'), S. 9, 10, nur mit Konstantenbestimmung in den φ . Es wird:

$$\frac{\vartheta^{(a)}\vartheta^{(b)}}{\vartheta(e_1, \dots) \cdot \vartheta(u_1 - u'_1 - e_1, \dots)} = \frac{\varphi_1(s, z) \cdot \varphi_1(s', z')}{\varphi_1(s_1, z_1) \cdots \varphi_p(s_1, z_1)},$$

wo die Abelschen Funktionen von den Charakteristiken (a) , (b) sind. Die in diese Ausdrücke eingehenden Konstanten werden, nach S. 7:

$$\frac{\vartheta^{(c)}(e_1, \dots)}{\vartheta(e_1, \dots)} = \frac{\sqrt{\varphi^{(c)}}}{\sqrt{\varphi^{(0)}}}.$$

Es sollen nun für $p = 3$, nach dem am Anfang des vorigen Abschnittes angegebenen Ziele, umgekehrt wie dort, die algebraischen Moduln $\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma'$ durch die Thetamoduln bestimmt, also jene sechs Grössen durch Thetaquotienten für die Nullwerte der Argumente, mit gegebenen Thetamoduln, ausgedrückt werden.

Wir gehen hier von den früher gegebenen Entwicklungen und Bezeichnungen aus (Werke XXXI, S. 495–504; 1. Aufl. XXX, S. 463–472), insbesondere von der dortigen Formel (10):

Von den 28 Abelschen Funktionen stehen 22 in (21), 1. c.; die sechs letzten sind die S. 503–4 (1. Aufl. S. 470–1) mit (λ) , (k_1) ; (h_1) , (h_2) ; (k'_1) , (k'_2) bezeichneten. Die Moduln $\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma'$ sind die in den Formeln (17) vorkommenden Grössen. Um sie zu bestimmen, drücken wir erst die Quadrate

der Abelschen Funktionen, die bezw. zu den Charakteristiken

$$(n+p), \quad (n+q), \quad (n+r), \quad (n+q+r), \quad \dots$$

gehören, durch diejenigen φ aus, welche in den Normalintegralen w_1, w_2, w_3 vorkommen. Seien diese letzteren φ bezw. mit x', y', z' bezeichnet, so wird, wenn man zur Abkürzung $\vartheta^{(a)}(0, \dots) = \vartheta'_a$ schreibt:

$$\begin{aligned} \varphi_{n+p} &= \vartheta'_1(n+p) \cdot x' + \vartheta'_2(n+p) \cdot y' + \vartheta'_3(n+p) \cdot z', \\ \varphi_{n+q} &= \vartheta'_1(n+q) \cdot x' + \vartheta'_2(n+q) \cdot y' + \vartheta'_3(n+q) \cdot z', \\ \varphi_{n+r} &= \vartheta'_1(n+r) \cdot x' + \vartheta'_2(n+r) \cdot y' + \vartheta'_3(n+r) \cdot z' \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} \varphi_{n+q+r} &= \vartheta'_1(n+q+r) \cdot x' + \vartheta'_2(n+q+r) \cdot y' + \vartheta'_3(n+q+r) \cdot z', \\ \varphi_{n+r+p} &= \vartheta'_1(n+r+p) \cdot x' + \vartheta'_2(n+r+p) \cdot y' + \vartheta'_3(n+r+p) \cdot z', \\ \varphi_{n+p+q} &= \vartheta'_1(n+p+q) \cdot x' + \vartheta'_2(n+p+q) \cdot y' + \vartheta'_3(n+p+q) \cdot z'. \end{aligned}$$

Aus diesen beiden Systemen berechnen wir φ_d , von der Charakteristik (d) , doppelt, indem wir vermöge

$$\varphi_d = \vartheta'_1(d) \cdot x + \vartheta'_2(d) \cdot y + \vartheta'_3(d) \cdot z$$

jeweils x, y, z eliminieren. Wir führen zu dem Zwecke allgemein die Bezeichnung ein:

$$\begin{vmatrix} \vartheta'_1(a) & \vartheta'_2(a) & \vartheta'_3(a) \\ \vartheta'_1(b) & \vartheta'_2(b) & \vartheta'_3(b) \\ \vartheta'_1(c) & \vartheta'_2(c) & \vartheta'_3(c) \end{vmatrix} = (a, b, c),$$

wo a, b, c irgend drei ungerade Charakteristiken vorstellen, und erhalten:

$$\varphi_d^2 = (d, n+q, n+r)(n+p, n+q, n+r) \cdot \varphi_{n+p}^2 + \dots$$

Will man, daSS die zu

$$(n+p), (n+q), (n+r), (n+q+r), (n+r+p), (n+p+q), (d)$$

gehörigen Abelschen Funktionen von der in (21), 1. c. angegebenen Form

$$\sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{z}, \sqrt{t}, \sqrt{p}, \sqrt{q}, \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{-t} + \sqrt{-p} + \sqrt{-q}$$

werden, so setze man

$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= \frac{(d, n+q, n+r)(n+p, n+q, n+r)}{(n+p, n+q, n+r)} \varphi_{n+p}, \\ \sqrt{y} &= \frac{(d, n+r+p, n+p+q)}{(n+p, n+q, n+r)} \varphi_{n+q}, \\ \sqrt{z} &= \frac{(d, n+p+q, n+q+r)}{(n+p, n+q, n+r)} \varphi_{n+r}.\end{aligned}$$

Dann wird:

$$\sqrt{t} = i\sqrt{x} + j\sqrt{y} + k\sqrt{z}, \quad \sqrt{p} = i'\sqrt{x} + j'\sqrt{y} + k'\sqrt{z}, \quad \sqrt{q} = i''\sqrt{x} + j''\sqrt{y} + k''\sqrt{z},$$

wo i, j, k [eine numerische Konstante ist]; und

$$\sqrt{x} : \sqrt{y} : \sqrt{z} = \sqrt{(n+p)} : \sqrt{(n+q)} : \sqrt{(n+r)},$$

so daSS man die Quadrate der $(n+p), (n+q), (n+r)$ als lineare Funktionen von x, y, z erhält, mit gegebenen numerischen Koeffizienten. Und da aus den Formeln

$$\sqrt{x}\sqrt{y}\sqrt{z} = \sqrt{(n+p)(n+q)(n+r)}$$

folgt, so kann man auch die Produkte $\sqrt{(n+p)}\sqrt{(n+q)}$ etc. bestimmen.

Die Verhältnisse der Konstanten $i : j : k$ etc. hängen nur ab von den Charakteristiken; die absoluten Werte dagegen auch von den Moduln. Die ersteren sind daher aus den Charakteristiken allein zu bestimmen; und gerade hierbei wird die Betrachtung der hyperelliptischen Funktionen von wesentlichem Nutzen sein.

25. Die hier eintretenden Konstanten B, C sind von dem Wertsystem (x_1, x_2) , das in η_λ und χ_ϱ und in den Grenzen der $u_1, u_2, \dots, u_p$ vorkommt, unabhängig. Zugleich ist der Determinantenquotient der linken und der Thetaquotient der rechten Seite symmetrisch in den Wertsystemen, die sich auf die $2p - 2$ Punkte $(x_1, x_2), (\alpha'_1, \alpha''_1), (\alpha'_2, \alpha''_2), \dots, (\alpha'_{2p-3}, \alpha''_{2p-3})$ beziehen.

Als Funktion von (s_1, z_1) verschwindet der Zähler dieses Ausdrucks in a und in den $p - 1$ Punkten $(s_2, z_2), \dots, (s_p, z_p)$, für welche

$$\sum_2^p u^{(s_\nu, z_\nu)} \equiv \int_a^{(s_1, z_1)} du_\mu + (c)_\mu.$$

Die Punkte $(s_1, z_1); (s'_1, z'_1), (s_2, z_2); (s'_2, z'_2), \dots$ sind mit einander durch eine Funktion φ verknüpft; daher wird in unserem hyperelliptischen Falle $z_\nu = \zeta_\nu$, während s'_ν die von s_ν verschiedene Wurzel von $F(s, \zeta_\nu) = 0$ wird. Ebenso verschwindet der Nenner des Quotienten, als Funktion von (s_1, z_1) , in b und denselben $p - 1$ Punkten (s_ν, z_ν) .

Der Quotient wird daher zu

$$\frac{\sqrt{\xi_a} \sqrt{\eta_b}}{\sqrt{\xi_b} \sqrt{\eta_a}} \cdot \frac{f_a(s_1, z_1)}{f_b(s_1, z_1)}$$

und wegen der Symmetrie in den ζ Punkten (s_ν, ζ_ν) zu

$$B \cdot \frac{\sqrt{\prod_\nu (s_1 - s_\nu)}}{\sqrt{\prod_\nu (z_1 - \zeta_\nu)}}$$

wo B von den ζ unabhängig wird und nach der früheren Methode zu bestimmen ist. Zu dem Zwecke teile man hier die $2p + 2$ Verzweigungspunkte in drei Gruppen von einander verschiedener:

$$a, b; \quad c_1, c_2, \dots; \quad d_1, d_2, \dots$$

indem man für die ζ_ν einmal die c_ν , dann die d_ν einsetzt, erhält man

$$B_c = \frac{\sqrt{\xi_a^{(c)}} \sqrt{\eta_b^{(c)}}}{\sqrt{\xi_b^{(c)}} \sqrt{\eta_a^{(c)}}} \cdot \frac{\sqrt{\prod_\nu (a - c_\nu)}}{\sqrt{\prod_\nu (b - c_\nu)}}, \quad B_d = \dots$$

und da

$$u^{(a)} + u^{(b)} + u^{(c)} + u^{(d)} \equiv 0 \quad (\text{mod. Perioden}),$$

so wird durch Multiplikation B algebraisch erhalten in der Form:

$$B = h \cdot \sqrt[4]{\frac{\prod (b - b')}{\prod (a - a')}},$$

wo unter a alle Verzweigungspunkte außer a selbst, unter b' alle solche außer b selbst verstanden sind, h ein Exponentialfaktor [der noch die Moduln enthält].

26. und nehmen als ungerade Charakteristiken, so wird

$$\frac{\vartheta^{(a)}}{\vartheta^{(b)}} = \frac{\varphi_1(s, z)}{\varphi_1(s_1, z_1)} \cdot \frac{\varphi_2(s', z')}{\varphi_2(s_1, z_1)},$$

und es folgt wieder die Formel (4), (4'), S. 9, 10, nur mit Konstantenbestimmung in den φ . Es wird:

$$\frac{\vartheta^{(a)}(u_1 - u'_1, \dots)}{\vartheta^{(b)}(u_1 - u'_1, \dots)} = \frac{\varphi_1(s, z) \cdot \varphi_1(s', z')}{\varphi_2(s, z) \cdot \varphi_2(s', z')},$$

wo die Abelschen Funktionen von den Charakteristiken (a) , (b) sind.

Die in diese Ausdrücke eingehenden Konstanten werden, nach S. 7:

$$\frac{\vartheta^{(c)}(0, \dots)}{\vartheta(0, \dots)} = \sqrt{\frac{\varphi^{(c)}}{\varphi^{(0)}}}.$$

Es sollen nun für $p = 3$, nach dem am Anfang des vorigen Abschnittes angegebenen Ziele, umgekehrt wie dort, die algebraischen Moduln $\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma'$ durch die Thetamoduln bestimmt, also jene sechs Grössen durch Thetaquotienten für die Nullwerte der Argumente, mit gegebenen Thetamoduln, ausgedrückt werden.

Wir gehen hier von den früher gegebenen Entwicklungen und Bezeichnungen aus (Werke XXXI, S. 495–504; 1. Aufl. XXX, S. 463–472), insbesondere von der dortigen Formel (10):

Von den 28 Abelschen Funktionen stehen 22 in (21), 1. c.; die sechs letzten sind die S. 503–4 (1. Aufl. S. 470–1) mit $(\lambda), (k_1); (h_1), (h_2); (k'_1), (k'_2)$ bezeichneten. Die Moduln $\alpha, \beta, \gamma, \alpha', \beta', \gamma'$ sind die in den Formeln (17) vorkommenden Grössen. Um sie zu bestimmen, drücken wir erst die Quadrate

der Abelschen Funktionen, die bezw. zu den Charakteristiken

$$(n+p), (n+q), (n+r), (n+q+r), \dots$$

gehören, durch diejenigen φ aus, welche in den Normalintegralen w_1, w_2, w_3 vorkommen. Seien diese letzteren φ bezw. mit x', y', z' bezeichnet, so wird, wenn man zur Abkürzung $\vartheta^{(a)}(0, \dots) = \vartheta'_a$ schreibt:

$$\begin{aligned}\varphi_{n+p} &= \vartheta'_1(n+p) \cdot x' + \vartheta'_2(n+p) \cdot y' + \vartheta'_3(n+p) \cdot z', \\ \varphi_{n+q} &= \vartheta'_1(n+q) \cdot x' + \vartheta'_2(n+q) \cdot y' + \vartheta'_3(n+q) \cdot z', \\ \varphi_{n+r} &= \vartheta'_1(n+r) \cdot x' + \vartheta'_2(n+r) \cdot y' + \vartheta'_3(n+r) \cdot z'\end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned}\varphi_{n+q+r} &= \vartheta'_1(n+q+r) \cdot x' + \vartheta'_2(n+q+r) \cdot y' + \vartheta'_3(n+q+r) \cdot z', \\ \varphi_{n+r+p} &= \vartheta'_1(n+r+p) \cdot x' + \vartheta'_2(n+r+p) \cdot y' + \vartheta'_3(n+r+p) \cdot z', \\ \varphi_{n+p+q} &= \vartheta'_1(n+p+q) \cdot x' + \vartheta'_2(n+p+q) \cdot y' + \vartheta'_3(n+p+q) \cdot z'.$$

Aus diesen beiden Systemen berechnen wir φ_d , von der Charakteristik (d) , doppelt, indem wir vermöge

$$\varphi_d = \vartheta'_1(d) \cdot x + \vartheta'_2(d) \cdot y + \vartheta'_3(d) \cdot z$$

jeweils x, y, z eliminieren. Wir führen zu dem Zwecke allgemein die Bezeichnung ein:

$$\begin{vmatrix} \vartheta'_1(a) & \vartheta'_2(a) & \vartheta'_3(a) \\ \vartheta'_1(b) & \vartheta'_2(b) & \vartheta'_3(b) \\ \vartheta'_1(c) & \vartheta'_2(c) & \vartheta'_3(c) \end{vmatrix} = (a, b, c),$$

wo a, b, c irgend drei ungerade Charakteristiken vorstellen, und erhalten:

$$\varphi_d^2 = (d, n+q, n+r)(n+p, n+q, n+r) \cdot \varphi_{n+p}^2 + \dots$$

Will man, daSS die zu

$$(n+p), (n+q), (n+r), (n+q+r), (n+r+p), (n+p+q), (d)$$

gehörigen Abelschen Funktionen von der in (21), 1. c. angegebenen Form

$$\sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{z}, \sqrt{t}, \sqrt{p}, \sqrt{q}, \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{-t} + \sqrt{-p} + \sqrt{-q}$$

werden, so setze man

$$\begin{aligned}\sqrt{x} &= \frac{(d, n+q, n+r)(n+p, n+q, n+r)}{(n+p, n+q, n+r)} \varphi_{n+p}, \\ \sqrt{y} &= \frac{(d, n+r+p, n+p+q)}{(n+p, n+q, n+r)} \varphi_{n+q}, \\ \sqrt{z} &= \frac{(d, n+p+q, n+q+r)}{(n+p, n+q, n+r)} \varphi_{n+r}.\end{aligned}$$

Dann wird:

$$\sqrt{t} = i\sqrt{x} + j\sqrt{y} + k\sqrt{z}, \quad \sqrt{p} = i'\sqrt{x} + j'\sqrt{y} + k'\sqrt{z}, \quad \sqrt{q} = i''\sqrt{x} + j''\sqrt{y} + k''\sqrt{z},$$

wo i, j, k [eine numerische Konstante ist]; und

$$\sqrt{x} : \sqrt{y} : \sqrt{z} = \sqrt{(n+p)} : \sqrt{(n+q)} : \sqrt{(n+r)},$$

so daSS man die Quadrate der $(n+p), (n+q), (n+r)$ als lineare Funktionen von x, y, z erhält, mit gegebenen numerischen Koeffizienten. Und da aus den Formeln

$$\sqrt{x}\sqrt{y}\sqrt{z} = \sqrt{(n+p)(n+q)(n+r)}$$

folgt, so kann man auch die Produkte $\sqrt{(n+p)}\sqrt{(n+q)}$ etc. bestimmen.

Die Verhältnisse der Konstanten $i : j : k$ etc. hängen nur ab von den Charakteristiken; die absoluten Werte dagegen auch von den Moduln. Die ersteren sind daher aus den Charakteristiken allein zu bestimmen; und gerade hierbei wird die Betrachtung der hyperelliptischen Funktionen von wesentlichem Nutzen sein.

27. [wo j eine numerische Konstante ist]; und

$$\sqrt{x} : \sqrt{y} : \sqrt{z} = \sqrt{(n+p)} : \sqrt{(n+q)} : \sqrt{(n+r)},$$

so daSS man die Quadrate der $(n+p)$, $(n+q)$, $(n+r)$ als lineare Funktionen von x, y, z erhält, mit gegebenen numerischen Koeffizienten. Und da aus den Formeln

$$\sqrt{x}\sqrt{y}\sqrt{z} = \sqrt{(n+p)(n+q)(n+r)}$$

folgt, so kann man auch die Produkte $\sqrt{(n+p)}\sqrt{(n+q)}$ etc. bestimmen.

Die Verhältnisse der Konstanten $i : j : k$ etc. hängen nur ab von den Charakteristiken; die absoluten Werte dagegen auch von den Moduln. Die ersteren sind daher aus den Charakteristiken allein zu bestimmen; und gerade hierbei wird die Betrachtung der hyperelliptischen Funktionen von wesentlichem Nutzen sein.

Insbesondere haben wir im allgemeinen Falle $p = 3$ die Relationen zwischen den $\vartheta'_{\mu\nu}(0, \dots)$ und den $\vartheta^{(a)}(0, \dots)$ (S. 34–35) übersichtlich zu entwickeln.

Fortsetzung: 7. Beweis des vorausgesetzten Satzes (S. 39).

(11. März)

Zur Ausfüllung der bei dem Satze (S. 39) gelassenen Lücke sollen die Charakteristiken mit Bezug auf eine gegebene Querschnittzerlegung für den hyperelliptischen Fall wirklich bestimmt werden.

Als bestimmte Zerlegung der die z -Ebene zweifach bedeckenden Fläche T , mit den Verzweigungspunkten

$$a_0, a_1, a_2, \dots, a_{2p+1}$$

nehmen wir folgende: man verbinde die Punkte in der genannten Ordnung, zuletzt auch a_{2p+1} durch das Unendliche mit a_0 , durch eine Linie. Auf beiden Seiten der Linie sind die Blätter von T unverzweigt; die Verbindung wechselt bei jedem Verzweigungswerte. Abwechselnd findet also Kreuzung der Blätter statt, so etwa zwischen $a_1 - a_2$, $a_3 - a_4$; $\dots$; $a_{2p+1} - a_0$; während zwischen $a_0 - a_1$, $a_2 - a_3$, $\dots$, $a_{2p} - a_{2p+1}$ keine Kreuzung vorhanden ist.

28. Zur Zerlegung von T in eine einfach zusammenhängende Fläche T' seien die Querschnitte

$$a'_1, a'_2, \dots, a'_p; \quad b'_1, b'_2, \dots, b'_p$$

bezw. um

$$a_2 - a_3, a_4 - a_5, \dots, a_{2p} - a_{2p+1};$$

$$a_1 - a_2, a_3 - a_4, \dots, a_{2p-1} - a_{2p}, a_{2p+1} - a_0$$

gezogen.

Wir benutzen zunächst die Definition der Gruppencharakteristiken durch Integralsummen:

$$\sum_{\nu} \gamma_{\nu} u^{(a_{\nu})} - \sum_{\nu} \gamma_{\nu} u^{(a'_{\nu})} = \sum_{\nu} \left(\gamma_{\nu} \int_{\alpha_{\nu}}^{a_{\nu}} du_{\mu} + \gamma'_{\nu} \int_{\alpha'_{\nu}}^{a'_{\nu}} du_{\mu} \right).$$

Wendet man diese Definition auf ein beliebiges Integral erster Gattung $w = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \dots + a_p u_p + \text{const}$ an, so wird

$$w^+ - w^- = \sum_{\lambda} \varepsilon_{\lambda} a_{\lambda}^{(\mu)} + \sum_{\lambda} \varepsilon'_{\lambda} b_{\lambda}^{(\mu)},$$

wo die ε_{λ} , ε'_{λ} ganze Zahlen sind und wo die $a_{\lambda}^{(\mu)}$, $b_{\lambda}^{(\mu)}$ die Periodizitätsmoduln von w am Querschnitte a'_{λ} , bezw. b'_{λ} vorstellen.

Um die Wertänderung eines Integrals w auf einem in T' laufenden Weg zwischen zwei Punkten von T' zu erhalten, kann man auch einen nicht in T' verlaufenden Weg zwischen denselben Punkten wählen, wenn man dabei die sprunghaften Änderungen an den Querschnitten mitnimmt. Insbesondere drückt sich so der Wert des Integrals zwischen zwei Verzweigungspunkten a_{∞} und a_{λ} , auf einem in T' verlaufenden Wege, aus als der negativ genommene Wert desselben Integrals auf demselben Wege, aber je im anderen Blatt von T durchlaufen. Auf letzterem Wege liefert jede Überschreitung eines Querschnittes von T' den bezüglichen Periodizitätsmodul als Beitrag zum Integral.

29. Führt man dies für die einzelnen Integrale $w_1, \dots, w_p$ aus, so ergibt sich für die Wege von a_0 bis $a_{2\kappa-1}$, bzw. $a_{2\kappa}$:

$$\text{Charakteristik } (a_{2\kappa-1}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1^{(\kappa)} & 0 & \cdots \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \cdots \end{pmatrix},$$

$$\text{Charakteristik } (a_{2\kappa}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0^{(\kappa)} & 0 & \cdots \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \cdots \end{pmatrix},$$

$$\text{Charakteristik } (n) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

die $(\kappa - 1)$ -malige Wiederholung von $\frac{1}{2}$ bedeutend. (23)

Ganz dasselbe erhält man, wenn man die Definition der Gruppencharakteristiken durch Querschnittsfaktoren benutzt.

Ist nun der zu beweisende Satz richtig, so muß eine Charakteristik (n) existieren, derart daß

$$(n) + \sum_1^{p+m} (a_\kappa)$$

gerade ist für $m = 0$ oder 1 , ungerade für $m = 2, 3 \pmod{4}$.

Wir nehmen an, der Lehrsatz sei bewiesen für Charakteristiken aus bloß p Gliedern, und beweisen ihn dann für solche aus $p + 1$ Gliedern. Für $p = 1$, wo $(a_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $(a_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $(n) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$, gilt aber der Satz.

Die p -gliedrigen Charakteristiken setzen wir aus

$$(n); (a_1), (a_2), \dots, (a_{2p}),$$

die $(p + 1)$ -gliedrigen entsprechend aus

$$(n'); (a'_1), (a'_2), \dots, (a'_{2p+2})$$

zusammen. Dabei sollen die $2p + 2$ Charakteristiken (a') aus den $2p$ Charakteristiken (a) entstehen, indem man

30. $p - 1$ oder weniger Faktoren der Art $\sqrt{z - a}$ rational ist, sondern erst

$$\sqrt{f(z)} \cdot \sqrt[4]{\prod_1^{2p+2} (z - a_\nu)}$$

das Produkt der $2p + 2$ verschiedenen Faktoren $\sqrt{z - a}$.

Obwohl wir bei diesen Zuordnungen der Abelschen Funktionen zu den Charakteristiken eine bestimmte Zerlegung der Fläche T zu Grunde legen muSSten, braucht doch diese Zerlegung nicht ausgeführt zu werden, insofern die Resultate unabhängig von ihr sind.

Fortsetzung: 2. Anzahl der Abelschen Funktionen.

(7., 8. März)

Zählen wir die den verschiedenen Fällen $m = 0, 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$ bzw. $\frac{p-2}{2}$ entsprechenden Abelschen Funktionen im hyperelliptischen Fall an

$$\sqrt{f(z)} \cdot \sqrt[4]{\prod_1^{2p+2} (z - a_\nu)^m}$$

((1), S. 35) ab.

1) $m = 2n, p - 1 - 4n \geq 0$. Man hat

$$\frac{(2p+2)!}{(p-1-4n)!(p+3+4n)!}$$

Anordnungen, durch Zerlegung von $2p + 2$ Faktoren in je $p - 1 - 4n$ und $p + 3 + 4n$; und ebenso viele Abelsche Funktionen, von verschiedenen Charakteristiken, je mit der Konstantenzahl $2n + 1$.

Zur Summation Z dieser Charakteristiken für $n = 0, 1, 2, \dots, n < \frac{p+3}{4}$ bildet man aus dem binomischen Satze:

$$\sum_{\nu=0}^{2p+2} \binom{2p+2}{\nu} x^\nu = (1+x)^{2p+2}$$

und summiert beide Seiten über $x = +1, -1, +i, -i$. Dabei heben sich rechts alle Glieder gegenseitig weg, in welchen der Exponent von x nicht durch 4 teilbar ist, und die rechte Seite wird für $\nu = p - 1 - 4n$ zu:

$$4 \sum \frac{(2p+2)!}{\nu! (2p+2-\nu)!} = 4 \sum \frac{(2p+2)!}{(p-1-4n)! (p+3+4n)!},$$

die linke Seite zu

$$2(1+1)^{2p+2} + 2(1-1)^{2p+2} = 2^{2p+3}.$$

Daher wird

$$\sum_{n=0}^{\frac{p-1}{4}} \frac{(2p+2)!}{(p-1-4n)!(p+3+4n)!} = 2^{2p},$$

also gleich der Anzahl β_p aller ungeraden Charakteristiken.

Sobald also noch ungerade m zulässig sind, was für $p \geq 3$ der Fall ist, muß es noch ebensoviele Abelsche Funktionen mit geraden Charakteristiken — entsprechend geraden Thetafunktionen, die für die Nullwerte der Argumente verschwinden — geben, als Zerlegungen Z' von $2p+2$ Faktoren in je $p-3-4n$ und $p+5+4n$, für $n = 0, 1, \dots, \frac{p-3}{4}$.

2) $m = 2n + 1$, $p - 3 - 4n \geq 0$, $n = 0, 1, \dots, \frac{p-3}{4}$.

[Man erhält im ganzen, durch analoge Rechnung, wie in 1):

$$Z' = \sum_{n=0}^{\frac{p-3}{4}} \frac{(2p+2)!}{(p-3-4n)!(p+5+4n)!} = 2^{p-1}(2^{p-1}-1) = \frac{\beta_p + \alpha_p}{2} = \frac{2^{p-1}(2^p-1) + 2^{p-1}(2^p-1)}{2}$$

verschiedene Charakteristiken, je zu Abelschen Funktionen mit der Konstantenzahl $2n+2$ gehörig.]

Es ist $Z' = 1$ für $p = 3$; $Z' = 10$ für $p = 4$; $Z' = 66$ für $p = 5$.

Ebensoviele gerade Thetafunktionen verschwinden für die Nullwerte der Argumente. Für $p = 2$ stellt dies eine, für $p = 4$ aber, da die hyperelliptische Funktion $p = 4$ noch 7 algebraische Moduln enthält, nicht 10, sondern nur 3 Relationen zwischen den Moduln der Thetafunktion vor.

Aus dem Umstande, daß es ebensoviel $[\beta_p]$ Abelsche Funktionen mit ungerader Charakteristik gibt, als Kombinationen Z von Produkten $\sqrt{f(z)} \cdot \sqrt[4]{\prod (z-a)^m}$ mit geradem m , und ebensoviele $[\alpha_p = \frac{1}{2}(2^p+1)_{p+1}]$ Abelsche Funktionen mit gerader Charakteristik, als Kombinationen Z' von $\sqrt{f(z)} \cdot \sqrt[4]{\prod (z-a)^m}$ mit ungeradem m , läßt sich vermuten daß den

geraden,	bezw.	ungeraden m
die Abelschen Funktionen mit		
ungerader,	bezw.	gerader Charakteristik

entsprechen mögen. Wir setzen diesen Satz, den wir später (s. Fortsetzung 7) vollständig beweisen werden, zunächst voraus.

31. Fortsetzung: 3. Relationen zwischen den Charakteristiken der Abelschen Funktionen.

(8. März)

Die $2p + 2$ Verzweigungspunkte a seien bezeichnet mit

$$a_0, a_1, a_2, \dots, a_{2p+1}.$$

Die Charakteristik der Abelschen Funktion

$$\sqrt{(z - a_0)^{p-1}}$$

sei (n) , wobei

$$(\gamma_1 u_1^{(a)} + \gamma_2 u_2^{(a)} + \dots) \equiv (0) - (n),$$

wenn $u_\nu(a)$ der Wert von u_ν im Punkte a ist.

Wir schreiben dann der Funktion $\sqrt{z - a_\infty}$ die Gruppencharakteristik (a_∞) zu, indem entweder ihr Faktorensystem an den Querschnitten bestimmt wird, oder

$$(\gamma_1 u_1^{(a)} + \gamma_2 u_2^{(a)} + \dots) = (u_1^{(a)} - u_1^{(a_0)}, \dots)$$

sei; beidemal ist die Zuordnung für eine bestimmte Zerschneidung von T gefunden.

Da das Produkt von $2p + 1$ verschiedenen Faktoren

$$\sqrt[2p+2]{\prod_{\nu=1}^{2p+1} (z - a_\nu)} \quad (\nu = 1, 2, \dots, 2p + 1)$$

eine rationale Funktion von s, z wird, und da die Charakteristik desselben die Summe der Charakteristiken der einzelnen Faktoren ist, so hat man zwischen den Charakteristiken $(a_1), \dots, (a_{2p+1})$ die identische Relation:

$$(a_1) + (a_2) + \dots + (a_{2p+1}) \equiv (0),$$

d. h. (a_{2p+1}) ist durch die $2p$ ersten Charakteristiken bestimmt. Dagegen findet zwischen diesen selbst keine lineare Identität statt, da keines der Produkte, aus irgend k verschiedenen der $2p$ ersten Faktoren zusammengesetzt, eine rationale Funktion sein kann.

Aus der linearen Unabhängigkeit der Charakteristiken

$$(a_1), (a_2), \dots, (a_{2p})$$

folgt, daß irgend zwei Charakteristiken, welche sich aus ihnen durch

Addition zusammensetzen, nur dann einander gleich sind, wenn sie in den $(a_1), \dots, (a_{2p})$ denselben Ausdruck erhalten. Bildet man aus denselben alle Kombinationen

$$\alpha_1 \cdot (a_1) + \alpha_2 \cdot (a_2) + \dots + \alpha_{2p} \cdot (a_{2p}),$$

wo die α nur die Werte 0 und 1 erhalten, so erhält man 2^{2p} von einander verschiedene Ausdrücke, und also auch 2^{2p} verschiedene Charakteristiken, wenn man (0) einschließt. Und da es nur ebenso viele Charakteristiken gibt, so lassen sich alle Gruppencharakteristiken aus $(a_1), (a_2), \dots, (a_{2p})$ zusammensetzen; auch (0) eingeschlossen, wenn man $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_{2p} = 0$ setzt.

Addiert man weiter die Charakteristik (n) zu allen diesen Gruppencharakteristiken, (0) eingeschlossen, so erhält man wieder alle 2^{2p} Charakteristiken, da aus $(n+a) = (n+b)$ auch $(a) = (b)$ folgt. Wir drücken daher alle Charakteristiken in der Form aus

$$(n) + U,$$

unter U irgend welche Summen der (a_ν) ($\nu = 1, 2, \dots, 2p$) verstanden.

Wenn man nun beachtet, daß der Quotient

$$\sqrt{f(z)} \cdot \sqrt[p-1-2m]{\prod_1 (z - a_\varkappa)} / \sqrt{f(z)} \cdot \sqrt[p-2-2m]{\prod_1 (z - a_\varkappa)}$$

die Gruppencharakteristik

$$\sum_1^{p-1-2m} (a_\varkappa), \quad \text{bezw.} \quad \sum_1^{p-2-2m} (a_\varkappa)$$

hat, je nachdem a_0 unter den $a_\varkappa$ des Zählers nicht vorkommt, oder ja, so folgt:

Die Charakteristik von

$$\sqrt{f(z)} \cdot \sqrt[p-1-2m]{\prod_1 (z - a_\varkappa)}$$

ist

$$(n) + \sum_1^{p-1-2m} (a_\varkappa), \quad \text{bezw.} \quad (n) + \sum_1^{p-2-2m} (a_\varkappa),$$

je nachdem a_0 unter den $a_\varkappa$ nicht oder ja vorkommt.

Setzt man nun den am Schluss des vorigen Abschnittes (S. 39) vermuteten Satz als richtig voraus, so folgt weiter:

Die ungeraden Charakteristiken werden von den Formen

$$(n) + \sum_1^{p-1-4m} (a_{\varkappa}), \quad (n) + \sum_1^{p-2-4m} (a_{\varkappa})$$

wobei sich $\varkappa$ auf die Zahlen $1, 2, \dots, 2p$ bezieht.

Da dasselbe auch bei Hinzunahme von a_{2p+1} gelten muSS, so erhält man weiter, indem man (a_{2p+1}) durch $(a_1) + (a_2) + \dots + (a_{2p})$ ersetzt:

Auch die Charakteristiken von den Formen

$$(n) + \sum_1^{p+1+4m} (a_{\varkappa}), \quad (n) + \sum_1^{p+2+4m} (a_{\varkappa})$$

wobei sich $\varkappa$ ebenfalls auf die Zahlen $1, 2, \dots, 2p$ bezieht, sind ungerade, d. h. alle aus (n) und den $(a_1), \dots, (a_{2p})$ zusammengesetzten Charakteristiken sind ungerade, sobald die Anzahl dieser $(a_{\varkappa}) \equiv p-1$ oder $p-2 \pmod{4}$ ist.

Die übrigen Kombinationen müssen dann die geraden Charakteristiken liefern; diese werden also von den Formen

$$(n) + \sum_1^{p+4m} (a_{\varkappa}), \quad (n) + \sum_1^{p+1+4m} (a_{\varkappa})$$

d. h. alle aus (n) und den $(a_1), \dots, (a_{2p})$ zusammengesetzten Charakteristiken sind gerade, sobald die Anzahl dieser $(a_{\varkappa}) \equiv p$ oder $p+1 \pmod{4}$ ist.

In unserem hyperelliptischen Falle existiert auch unter den letzteren Formen von geraden Charakteristiken eine Reihe von Abelschen Funktionen, nämlich diejenigen, für welche die Summen die Formen annehmen:

$$(n) + \sum_1^{p-3-4m} (a_{\varkappa}), \quad (n) + \sum_1^{p-4-4m} (a_{\varkappa})$$

und

$$(n) + \sum_1^{p+5+4m} (a_{\varkappa}), \quad (n) + \sum_1^{p+4+4m} (a_{\varkappa}), \quad \text{für } m \geq 0.$$

32. Für $m > 0$ muß $\vartheta^{(g)}(q) (u_1 - u'_1, \dots)$ für $q = 0$ verschwinden. Die Anzahl der verschwindenden geraden Thetafunktionen ist daher gleich der Anzahl Z' der oben bestimmten Zerlegungen mit ungeradem m , und diese ist $2^{p-2}(2^{p-1} - 1)$.

Nun hatte man für die geraden Charakteristiken, welche Abelschen Funktionen entsprechen:

$$(n) + \sum_1^{p+1}(a_{\varkappa}), \quad (n) + \sum_1^{p+2}(a_{\varkappa}),$$

für die nicht entsprechenden:

$$(n) + \sum_1^p(a_{\varkappa}), \quad (n) + \sum_1^{p+3}(a_{\varkappa}),$$

und aus der Theorie der Thetafunktionen weiß man, daß stets eine gerade Thetafunktion für die Nullwerte der Argumente verschwindet, sobald ihre Charakteristik in der Form darstellbar ist:

$$(n) + \sum_1^{p+3}(a_{\varkappa}).$$

Dies läßt sich auch aus der allgemeinen Theorie der Klassenmoduln ableiten. Denn betrachtet man die Bedingungen dafür, daß eine gerade Thetafunktion für die Nullwerte der Argumente verschwindet, so erhält man Gleichungen, welche ausdrücken, daß gewisse Determinanten verschwinden. Diese Determinantenbedingungen sind aber gerade diejenigen, welche die Existenz von Abelschen Funktionen mit den entsprechenden Charakteristiken ausschließen.

Fortsetzung: 4. Ausdrücke von Quotienten Abelscher Funktionen durch Thetaquotienten.

(8. März)

Betrachten wir die Thetafunktionen mit den Charakteristiken, welche zu den Abelschen Funktionen gehören. Sei (a) eine ungerade Charakteristik, $(n+a)$ die zugehörige Charakteristik der Abelschen Funktion. Dann gilt für die Quotienten:

33. Die Quotienten der Abelschen Funktionen lassen sich durch Thetaquotienten ausdrücken. Für zwei Abelsche Funktionen $\sqrt{\xi}$, $\sqrt{\eta}$ mit den Charakteristiken (a) , (b) gilt:

$$\frac{\sqrt{\xi}}{\sqrt{\eta}} = \frac{\vartheta^{(a)}(u_1 - u'_1, \dots)}{\vartheta^{(b)}(u_1 - u'_1, \dots)} \cdot \sqrt{\frac{\varphi_a}{\varphi_b}}.$$

Die Konstanten $\sqrt{\varphi_a/\varphi_b}$ hängen von den Moduln ab und müssen durch diese bestimmt werden.

Die Betrachtung der hyperelliptischen Funktionen gestattet nun, diese Konstanten vollständig zu bestimmen. Die Methode beruht darauf, daß man die Thetaquotienten für spezielle Werte der Argumente berechnet, bei denen die Abelschen Funktionen bekannte algebraische Ausdrücke annehmen.

Für $p = 3$ kann man die sämtlichen Konstanten durch die Thetamoduln ausdrücken. Man erhält so vollständige Formeln für die Darstellung der Abelschen Funktionen durch Thetafunktionen.

Fortsetzung: 5. Anzahl der Moduln und Charakteristiken.

(9., 10. März)

Für die allgemeine algebraische Funktion vom Geschlecht p beträgt die Anzahl der Moduln $3p - 3$ (für $p > 1$). Im hyperelliptischen Falle reduziert sich diese Anzahl auf $2p - 1$. Die Moduln sind durch die Verhältnisse der Perioden der Normalintegrale bestimmt.

Die Anzahl der geraden Charakteristiken beträgt $2^{p-1}(2^p + 1)$, die der ungeraden $2^{p-1}(2^p - 1)$. Davon entsprechen

$$Z' = 2^{p-2}(2^{p-1} - 1)$$

gerade Charakteristiken solchen Thetafunktionen, die für die Nullwerte verschwinden.

34. Die Anzahl der Thetafunktionen, die für die Nullwerte der Argumente verschwinden, lässt sich auch direkt bestimmen. Man hat:

Für $p = 1$: keine verschwindende gerade Thetafunktion.

Für $p = 2$: 1 gerade Thetafunktion verschwindet.

Für $p = 3$: $Z' = 1$ (wie oben berechnet).

Für $p = 4$: $Z' = 10$ gerade Thetafunktionen verschwinden; aber da die hyperelliptische Funktion $p = 4$ noch 7 algebraische Moduln enthält, stellen diese 10 Verschwindungen nur 3 unabhängige Relationen zwischen den Moduln der Thetafunktion dar.

Für $p = 5$: $Z' = 66$.

Die allgemeine Formel für die Anzahl der verschwindenden geraden Thetafunktionen ist:

$$Z' = \frac{1}{2} \left[\binom{2p+2}{p-1} + \binom{2p+2}{p+3} \right] - 2^{2p-2}.$$

Fortsetzung: 6. Bestimmung der Charakteristiken aus den Theta-moduln.

(10. März)

Die Charakteristiken der Abelschen Funktionen lassen sich aus den Theta-moduln bestimmen, indem man die Verschwindungseigenschaften der Thetafunktionen ausnutzt. Die geraden Charakteristiken, für welche die Thetafunktion verschwindet, müssen von der Form

$$(n) + \sum_1^{p+3+4m} (a_{\varkappa})$$

sein. Man kann daher die $(a_{\varkappa})$ aus den Verschwindungseigenschaften berechnen.

35. Die Fortsetzung der Entwicklungen von S. 47 ergibt, daß die Quotienten der Abelschen Funktionen sich als algebraische Funktionen der Verzweigungspunkte ausdrücken lassen. Insbesondere gilt für den hyperelliptischen Fall:

$$\frac{\sqrt{\xi_a}\sqrt{\eta_b}}{\sqrt{\xi_b}\sqrt{\eta_a}} = \sqrt[4]{\frac{\prod(b-b_\nu)}{\prod(a-a_\nu)}} \cdot \frac{\vartheta^{(a)}(0, \dots)}{\vartheta^{(b)}(0, \dots)}.$$

Die hier eintretenden Produkte sind über sämtliche Verzweigungspunkte zu erstrecken, mit Ausnahme von a bzw. b .

Die so erhaltenen Ausdrücke gestatten, sämtliche Relationen zwischen den Thetamoduln aufzustellen. Für den Fall $p = 3$ lassen sich diese Relationen besonders übersichtlich darstellen.

Fortsetzung: 7. Beweis des vorausgesetzten Satzes (S. 39).

(11. März)

Zur Ausfüllung der bei dem Satze (S. 39) gelassenen Lücke sollen die Charakteristiken mit Bezug auf eine gegebene Querschnittzerlegung für den hyperelliptischen Fall wirklich bestimmt werden.

36. Als bestimmte Zerlegung der die z -Ebene zweifach bedeckenden Fläche T , mit den Verzweigungspunkten

$$a_0, a_1, a_2, \dots, a_{2p+1}$$

nehmen wir folgende: man verbinde die Punkte in der genannten Ordnung, zuletzt auch a_{2p+1} durch das Unendliche mit a_0 , durch eine Linie. Auf beiden Seiten der Linie sind die Blätter von T unverzweigt; die Verbindung wechselt bei jedem Verzweigungswerte. Abwechselnd findet also Kreuzung der Blätter statt, so etwa zwischen $a_1 - a_2, a_3 - a_4; \dots; a_{2p+1} - a_0$; während zwischen $a_0 - a_1, a_2 - a_3, \dots, a_{2p} - a_{2p+1}$ keine Kreuzung vorhanden ist.

Zur Zerlegung von T in eine einfach zusammenhängende Fläche T' seien die Querschnitte

$$a'_1, a'_2, \dots, a'_p; \quad b'_1, b'_2, \dots, b'_p$$

bezw. um

$$a_2 - a_3, a_4 - a_5, \dots, a_{2p} - a_{2p+1};$$

$$a_1 - a_2, a_3 - a_4, \dots, a_{2p-1} - a_{2p}, a_{2p+1} - a_0$$

gezogen.

Wir benutzen zunächst die Definition der Gruppencharakteristiken durch Integralsummen:

$$\sum_{\nu} \gamma_{\nu} u^{(a_{\nu})} - \sum_{\nu} \gamma_{\nu} u^{(a'_{\nu})} = \sum_{\nu} \left(\gamma_{\nu} \int_{\alpha_{\nu}}^{a_{\nu}} du_{\mu} + \gamma'_{\nu} \int_{\alpha'_{\nu}}^{a'_{\nu}} du_{\mu} \right).$$

37. Wendet man diese Definition auf ein beliebiges Integral erster Gattung $w = a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_p u_p + \text{const. an}$, so wird

$$w^+ - w^- = \sum_{\lambda} \varepsilon_{\lambda} a_{\lambda}^{(\mu)} + \sum_{\lambda} \varepsilon'_{\lambda} b_{\lambda}^{(\mu)},$$

wo die ε_{λ} , ε'_{λ} ganze Zahlen sind und wo die $a_{\lambda}^{(\mu)}$, $b_{\lambda}^{(\mu)}$ die Periodizitätsmoduln von w am Querschnitte a'_{λ} , bezw. b'_{λ} vorstellen.

Um die Wertänderung eines Integrals w auf einem in T' laufenden Weg zwischen zwei Punkten von T' zu erhalten, kann man auch einen nicht in T' verlaufenden Weg zwischen denselben Punkten wählen, wenn man dabei die sprunghaften Änderungen an den Querschnitten mitnimmt. Insbesondere drückt sich so der Wert des Integrals zwischen zwei Verzweigungspunkten $a_{\varkappa}$ und a_{λ} , auf einem in T' verlaufenden Wege, aus als der negativ genommene Wert desselben Integrals auf demselben Wege, aber je im anderen Blatt von T durchlaufen. Auf letzterem Wege liefert jede Überschreitung eines Querschnittes von T' den bezüglichen Periodizitätsmodul als Beitrag zum Integral.

Führt man dies für die einzelnen Integrale $w_1, \dots, w_p$ aus, so ergibt sich für die Wege von a_0 bis $a_{2\varkappa-1}$, bezw. $a_{2\varkappa}$:

$$\text{Charakteristik } (a_{2\varkappa-1}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1^{(\varkappa)} & 0 & \cdots \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \cdots \end{pmatrix},$$

$$\text{Charakteristik } (a_{2\varkappa}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0^{(\varkappa)} & 0 & \cdots \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \cdots \end{pmatrix},$$

$$\text{Charakteristik } (n) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

die $(\varkappa - 1)$ -malige Wiederholung von $\frac{1}{2}$ bedeutend.

38. Ganz dasselbe erhält man, wenn man die Definition der Gruppencharakteristiken durch Querschnittsfaktoren benutzt.

Ist nun der zu beweisende Satz richtig, so muß eine Charakteristik (n) existieren, derart daß

$$(n) + \sum_1^{p+m} (a_{\varkappa})$$

gerade ist für $m = 0$ oder 1 , ungerade für $m = 2, 3 \pmod{4}$.

Wir nehmen an, der Lehrsatz sei bewiesen für Charakteristiken aus bloß p Gliedern, und beweisen ihn dann für solche aus $p + 1$ Gliedern. Für $p = 1$, wo $(a_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $(a_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $(n) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$, gilt aber der Satz.

Die p -gliedrigen Charakteristiken setzen wir aus

$$(n); (a_1), (a_2), \dots, (a_{2p}),$$

die $(p + 1)$ -gliedrigen entsprechend aus

$$(n'); (a'_1), (a'_2), \dots, (a'_{2p+2})$$

zusammen. Dabei sollen die $2p + 2$ Charakteristiken (a') aus den $2p$ Charakteristiken (a) entstehen, indem man

1) vor alle (a) das Glied $\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ setzt,

2) die zwei Charakteristiken $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ hinzunimmt.

Das gesuchte (n') ist dann, wie wir zeigen wollen, von der Form anzunehmen:

$$(n') = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \varepsilon_1 & \varepsilon_2 & \cdots & \varepsilon_p \\ \varepsilon' & \gamma_1 & \gamma_2 & \cdots & \gamma_p \end{pmatrix},$$

wo $\varepsilon, \varepsilon', \gamma$ noch zu bestimmende Konstanten sind.

39. Ist nämlich zunächst

$$p \equiv \left(\sum a \right) \pmod{2},$$

so wird $2(a) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, und

$$(n') + 2(a') = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \varepsilon & \cdots \\ \varepsilon' + 1 & \gamma & \cdots \end{pmatrix}.$$

Da aber, nach Annahme,

$$(n) + \sum_1^p (a) \equiv 0 \pmod{2},$$

so wird, wie es sein soll:

$$(n') + \sum_1^p (a') \equiv 1 \pmod{2},$$

sobald $\varepsilon + p$ und ε' beide $\equiv 1 \pmod{2}$ genommen werden. Wir nehmen also

$$\varepsilon = p + 1, \quad \varepsilon' = 1 \pmod{2}.$$

Benutzt man nun dieses (n) für alle möglichen Kombinationen der (a) , so gilt der Satz. In der Tat: für die Frage, ob

$$(n') + \sum_1^{p+1+m} (a') \equiv \text{gerade} \quad \text{wenn } m \equiv 0; \quad \text{ungerade} \quad \text{wenn } m \equiv 2 \pmod{4},$$

sind vier Fälle zu betrachten:

- 1) die (a') der Summe sind alle von der Form $\begin{pmatrix} 0 & a \\ \frac{1}{2} & b \end{pmatrix}$;
- 2) eines der (a') der Summe hat die Form $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & a \\ 0 & b \end{pmatrix}$;
- 3) eines der (a') hat die Form $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & a \\ \frac{1}{2} & b \end{pmatrix}$;
- 4) zwei der (a') sollen von den letzteren beiden Formen sein.

Im Fall 1) wird

$$(n') + \sum_1^{p+1+m} (a') = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \varepsilon + \cdots \\ \varepsilon' & \gamma + \cdots \end{pmatrix} = (n) + \sum_1^{p+m} (a)$$

und der Satz ist für alle Werte von m erfüllt; in den Fällen 2), 3), 4) wird bezw.

$$(n') + \sum_1^{p+m} (a') + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \varepsilon' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \varepsilon' \end{pmatrix} + (n) + \sum_1^{p+m} (a),$$

40.

$$(n') + \sum_1^{p+m} (a') + \left(\frac{1}{2}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ \varepsilon' + 1 \end{pmatrix} + (n) + \sum_1^{p+m} (a),$$

$$(n') + \sum_1^{p+m-1} (a') + \left(\frac{1}{0}\right) + \left(\frac{1}{2}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ \varepsilon' + 1 \end{pmatrix} + (n) + \sum_1^{p+m-1} (a),$$

und auch hier ist der Satz für alle m erfüllt. Daher gilt der Satz für $p + 1$. Nach dem Gesetz, nach dem (n) aus (n) gebildet wurde, wird

41. Als Funktion von (s_1, z_1) verschwindet der Zähler dieses Ausdrucks in a und in den $p - 1$ Punkten $(s_2, z_2), \dots, (s_p, z_p)$, für welche

$$\sum_2^p u^{(s_\nu, z_\nu)} \equiv \int_a^{(s_1, z_1)} du_\mu + (c)_\mu.$$

Die Punkte $(s_1, z_1); (s'_1, z'_1), (s_2, z_2); (s'_2, z'_2), \dots$ sind mit einander durch eine Funktion φ verknüpft; daher wird in unserem hyperelliptischen Falle $z_\nu = \zeta_\nu$, während s'_ν die von s_ν verschiedene Wurzel von $F(s, \zeta_\nu) = 0$ wird. Ebenso verschwindet der Nenner des Quotienten, als Funktion von (s_1, z_1) , in b und denselben $p - 1$ Punkten (s_ν, z_ν) .

Der Quotient wird daher zu

$$\frac{\sqrt{\xi_a} \sqrt{\eta_b}}{\sqrt{\xi_b} \sqrt{\eta_a}} \cdot \frac{f_a(s_1, z_1)}{f_b(s_1, z_1)}$$

und wegen der Symmetrie in den ζ Punkten (s_ν, ζ_ν) zu

$$B \cdot \frac{\sqrt{\prod_\nu (s_1 - s_\nu)}}{\sqrt{\prod_\nu (z_1 - \zeta_\nu)}}$$

wo B von den ζ unabhängig wird und nach der früheren Methode zu bestimmen ist. Zu dem Zwecke teile man hier die $2p + 2$ Verzweigungspunkte in drei Gruppen von einander verschiedener:

$$a, b; \quad c_1, c_2, \dots; \quad d_1, d_2, \dots$$

indem man für die ζ_ν einmal die c_ν , dann die d_ν einsetzt, erhält man

42. Ist nämlich zunächst

$$p \equiv \left(\sum a \right) \pmod{2},$$

so wird $2(a) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, und

$$(n') + 2(a') = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \varepsilon & \cdots \\ \varepsilon' + 1 & \gamma & \cdots \end{pmatrix}.$$

Da aber, nach Annahme,

$$(n) + \sum_1^p (a) \equiv 0 \pmod{2},$$

so wird, wie es sein soll:

$$(n') + \sum_1^p (a') \equiv 1 \pmod{2},$$

sobald $\varepsilon + p$ und ε' beide $\equiv 1 \pmod{2}$ genommen werden. Wir nehmen also

$$\varepsilon = p + 1, \quad \varepsilon' = 1 \pmod{2}.$$

Benutzt man nun dieses (n) für alle möglichen Kombinationen der (a) , so gilt der Satz. In der Tat: für die Frage, ob

$$(n') + \sum_1^{p+1+m} (a') \equiv \text{gerade} \quad \text{wenn } m \equiv 0; \quad \text{ungerade} \quad \text{wenn } m \equiv 2 \pmod{4},$$

sind vier Fälle zu betrachten:

- 1) die (a') der Summe sind alle von der Form $\begin{pmatrix} 0 & a \\ \frac{1}{2} & b \end{pmatrix}$;
 - 2) eines der (a') der Summe hat die Form $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & a \\ 0 & b \end{pmatrix}$;
 - 3) eines der (a') hat die Form $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & a \\ \frac{1}{2} & b \end{pmatrix}$;
 - 4) zwei der (a') sollen von den letzteren beiden Formen sein.
- Im Fall 1) wird

$$(n') + \sum_1^{p+1+m} (a') = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \varepsilon + \cdots \\ \varepsilon' & \gamma + \cdots \end{pmatrix} = (n) + \sum_1^{p+m} (a)$$

und der Satz ist für alle Werte von m erfüllt; in den Fällen 2), 3), 4) wird bezw.

$$(n') + \sum_1^{p+m} (a') + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \varepsilon' \end{pmatrix} + (n) + \sum_1^{p+m} (a),$$

$$(n') + \sum_1^{p+m} (a') + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \varepsilon' + 1 \end{pmatrix} + (n) + \sum_1^{p+m} (a),$$

$$(n') + \sum_1^{p+m-1} (a') + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \varepsilon' + 1 \end{pmatrix} + (n) + \sum_1^{p+m-1} (a),$$

und auch hier ist der Satz für alle m erfüllt. Daher gilt der Satz für $p + 1$.

43. und auch hier ist der Satz für alle m erfüllt. Daher gilt der Satz für $p+1$. Nach dem Gesetz, nach dem (n) aus (n) gebildet wurde, wird

44. Die Anzahl der Abelschen Funktionen mit gerader Charakteristik ist gleich der Anzahl der Zerlegungen von $2p+2$ Faktoren in zwei Gruppen von je $p+1+2m$ und $p+1-2m$ Faktoren, für $m=0, 1, 2, \dots$

Für $m=0$ erhält man die Anzahl der Zerlegungen in zwei gleiche Gruppen:

$$\frac{1}{2} \binom{2p+2}{p+1}.$$

Dies ist zugleich die Anzahl der geraden Charakteristiken, die Abelschen Funktionen entsprechen. Die übrigen geraden Charakteristiken

$$(n) + \sum_1^{p+4m} (a_{\varkappa}), \quad (n) + \sum_1^{p+3+4m} (a_{\varkappa})$$

entsprechen solchen Thetafunktionen, die für die Nullwerte der Argumente verschwinden.

45. Die Anzahl der Abelschen Funktionen mit ungerader Charakteristik ist gleich der Anzahl der Zerlegungen mit geradem m , die mit gerader Charakteristik gleich der Anzahl mit ungeradem m . Insgesamt erhält man so sämtliche 2^{2p} Charakteristiken.

46. 1 und $f(z)$. Den ersteren 28 Funktionen entsprechen die Charakteristiken

$$(n+p), (n+q), (n+r), (n+q+r), (n+r+p), (n+p+q), (d),$$

wo (d) die Charakteristik der Funktion $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z}$ ist.

Die noch übrigen 21 geraden Charakteristiken werden durch die Formen geliefert:

$$\begin{aligned} & (n) + (a_{\varkappa}) + (a_{\lambda}) + (a_{\mu}) + (a_{\nu}), \\ & (n) + (a_{\varkappa}) + (a_{\lambda}) + (a_{\mu}) + (a_{\nu}) + (a_{\varrho}) + (a_{\sigma}), \end{aligned}$$

wo $\varkappa, \lambda, \mu, \nu, \varrho, \sigma$ verschiedene Indizes aus $1, 2, \dots, 2p$ bedeuten.

47. Im Fall 1) muß die Determinante $\vartheta^{(g)}(h)$ für $g = h$ verschwinden. Die Anzahl der Geraden Charakteristiken, für welche dies eintritt, ist gleich der Anzahl der Zerlegungen von $2p+2$ in zwei Gruppen von je $p-1$ und $p+3$ Elementen, also

$$\binom{2p+2}{p-1}.$$

Davon entsprechen

$$Z = \binom{2p+2}{p-1} - 2^{2p-2}$$

solchen geraden Charakteristiken, für welche die Thetafunktion identisch verschwindet.

$$48. \quad \sqrt{(z-a)}, \sqrt{(z-a')(z-b')(z-c')}, \sqrt{(z-a)(z-b)(z-c)}$$

Die weiteren Entwicklungen zeigen, daß die Anzahl der verschwindenden Thetafunktionen sich auch aus der Theorie der algebraischen Moduln ableiten läßt. Die Moduln müssen gewissen Relationen genügen, damit die entsprechende Riemannsche Fläche hyperelliptisch wird. Diese Relationen lassen sich in der Form schreiben:

$$R(\tau_{11}, \tau_{12}, \dots, \tau_{pp}) = 0,$$

wo R ein Polynom in den Moduln τ_{ik} ist. Die Anzahl dieser Relationen ist gleich der Anzahl Z' der verschwindenden geraden Thetafunktionen.

49. Die hier vorkommenden GröSsen der Art

$$\sqrt{\frac{(z-a_1)(z-a_2)\cdots(z-a_{p+1})}{(z-b_1)(z-b_2)\cdots(z-b_{p+1})}}$$

sind diejenigen, welche Weierstraß vorzugsweise Abelsche Funktionen" nennt (Zur Theorie der Abelschen Funktionen", Formel (2), Grelles J., Bd. 47). Es verhalten sich nämlich, bei festen $b_1, b_2, \dots, b_{p+1}$, diese Ausdrücke wie die entsprechenden Thetafunktionen bis auf Exponentialfaktoren; um diese letzteren auszurechnen und zu beseitigen, müßte man die Charakteristiken der Thetafunktionen einführen und hierzu die Integrale alle von dem festen Verzweigungspunkte a_0 an nehmen, für welchen dem Ausdruck $\sqrt{(z-a_0)^{p-1}}$ die Charakteristik (n) zugelegt wurde (S. 40).

Der Quotient, von dem wir ausgingen (S. 47), erhalte dann die Form

$$\frac{\vartheta^{(a)}(u^{(a)} - u^{(b)}, \dots)}{\vartheta^{(b)}(u^{(a)} - u^{(b)}, \dots)} = \sqrt[4]{\frac{\prod(b-b_\nu)}{\prod(a-a_\nu)}} \cdot \text{Exponentialfaktor.}$$

50. Im Fall 1) muSS die Determinante $\vartheta^{(g)}(h)$ für $g = h$ verschwinden. Die Anzahl der Geraden Charakteristiken, für welche dies eintritt, ist gleich der Anzahl der Zerlegungen von $2p + 2$ in zwei Gruppen von je $p - 1$ und $p + 3$ Elementen, also

$$\binom{2p+2}{p-1}.$$

Davon entsprechen

$$Z = \binom{2p+2}{p-1} - 2^{2p-2}$$

solchen geraden Charakteristiken, für welche die Thetafunktion identisch verschwindet.

Die weiteren Entwicklungen zeigen, daSS die Anzahl der verschwindenden Thetafunktionen sich auch aus der Theorie der algebraischen Moduln ableiten läSSt. Die Moduln müssen gewissen Relationen genügen, damit die entsprechende Riemannsche Fläche hyperelliptisch wird. Diese Relationen lassen sich in der Form schreiben:

$$R(\tau_{11}, \tau_{12}, \dots, \tau_{pp}) = 0,$$

wo R ein Polynom in den Moduln τ_{ik} ist. Die Anzahl dieser Relationen ist gleich der Anzahl Z' der verschwindenden geraden Thetafunktionen.

51. $5fZ^\alpha = (k_1 + l_1 + m_1)(0, 0, 0)$ so er

Die Moduln der Thetafunktionen genügen, wie schon bemerkt, gewissen Relationen, sobald die zugrunde liegende algebraische Funktion hyperelliptisch wird. Diese Relationen sind notwendige und hinreichende Bedingungen dafür, daß eine gegebene periodische Funktion vom Geschlecht p sich auf die hyperelliptische Form bringen läßt.

Die Bestimmung dieser Relationen für allgemeines p ist eines der wichtigsten Probleme der Theorie. Für $p = 3$ erhält man beispielsweise eine einzige Relation, welche aussagt, daß eine gewisse Determinante verschwindet. Für höhere Werte von p wächst die Anzahl der Relationen sehr schnell an.

52. Die Bestimmung der Charakteristiken aus den Thetamoduln beruht auf der Eigenschaft, daß gewisse gerade Thetafunktionen für die Nullwerte der Argumente verschwinden, sobald die zugehörige Riemannsche Fläche hyperelliptisch ist. Diese Verschwindungseigenschaften gestatten, die Charakteristiken (a_∞) und (n) als Funktionen der Moduln auszudrücken.

53. (S. 33) und die entstehenden Determinantenkoeffizienten der Art (k, l, m) durch Produkte von Thetafunktionen für die Nullwerte auszudrücken.

Entwickelt man so, indem man

$$(k) = (n) + (p), \quad (l) = (n) + (q), \quad (m) = (n) + (r)$$

setzt, die Zerlegungen der Gruppen

$$(n + p), (n + q), (n + r), (n + d'),$$

so ergibt sich, auSSer der Zerlegung $(n + p) + (n + q)$ der ersteren, noch:

$$\begin{aligned} (p) + (q) &= (k' + l + m) + (n + q + r) \\ &= (n + p + d') + (n + q + d') = \cdots = (n + p + g') + (n + q + g'), \end{aligned}$$

wonach die fünf Systeme von Charakteristiken (k') , (l) , (m) bezw. werden:

1. $(n + q + r), \quad (n + p + r), \quad (n + p + q),$
2. $(n + p + d'), \quad (n + q + d'), \quad (n + r + d')$
mit Summe $(n_2) = (n + p + q + r + d') \equiv (e + f + g),$
3. $(n + p + e), \quad (n + q + e), \quad (n + r + f),$
mit Summe $(n_3) = -(n + p + q + r + g') \equiv (d + e + f).$

Daher wird

$$(n + p, n + q, n + r) = \pm \sqrt{\vartheta^{(n)} \vartheta^{(e+f+g)} \vartheta^{(d+f+g)} \vartheta^{(d+e+g)} \vartheta^{(d+e+f)}},$$

woraus durch Vertauschungen von p, q, r, d', e, f, g' sich die übrigen Determinanten bis aufs Vorzeichen ergeben.

Die so gefundene Relation zwischen $\varphi_{n+p}, \varphi_{n+q}, \varphi_{n+r}, \varphi_{n+d'}$ wird identisch, wenn die φ_{n+p} u. s. w. wieder durch ihre Ausdrücke in x, y, z ersetzt werden; aber die hierzu nur nötigen Relationen zwischen den Verhältnissen von Determinanten der Form (k, l, m) und den Quotienten von Thetaprodukten für die Nullwerte sind schon durch das Additionstheorem leicht zu beweisen, nach dem von Jacobi und Rosenhain für $p = 1$, bezw. 2 gegebenen Verfahren. Man hat nur das Additionstheorem selbst durch einfache Rechnung an den Thetareihen herzustellen. Daraus folgen dann schon die früher (S. 34, 35) gegebenen vollständigen Ausdrücke der Klassenmoduln durch die Thetaproducte.

Von diesem Gesichtspunkte aus sind folgende Schriften zu nennen: Preisschrift von Rosenhain, in den Mem. Sav. Etrangers XI, 1851, über die ultr elliptischen Funktionen, auch die erweiterten elliptischen Funktionen umfassend; Göpel, Grelles Journal 35. (28)

Anmerkungen.

(1) (Zu Seite 1.) Die Vorlesung begann mit der Überführung einer quadratischen Form in eine Summe von Quadraten und mit dem bekannten einfachen Beweis des Trägheitsgesetzes der quadratischen Formen. Zu letzterem Beweis machte Riemann die für die Geschichte dieses Gesetzes nicht unwichtige Bemerkung (Minnigerodesches Heft, 30. Okt. 1861): Der Beweis rührt von Gauß her, aus der Vorlesung über die Methode der kleinsten Quadrate" [von Riemann wohl im Wintersemester 1846/47 gehört]; in der Vorlesung hat ihn Gauß an die Spitze gestellt, niemals aber in der Abhandlung gebracht, weil er überall die Maxime hat, das Gerüst abzubauen, nur das Gebäude stehen zu lassen." Vgl. übrigens Gauß, Disquisitiones arithmeticae, Nr. 271.

(2) (Zu Seite 1.) Mitgeteilt aus dem Rochschen und Minnigerodeschen Heft; auch noch in dem Hattendorffschen Heft enthalten. Das Prinzip ist, für $p = 2$, schon von Herrn Prym in dessen Untersuchungen über die Riemannsche Thetaformel und die Riemannsche Charakteristikentheorie" (Leipzig, Teubner 1882), Abh. I, Art. 2 — als (s. dessen Vorrede) von Riemann herrührend und von demselben in einer Vorlesung als ein für die Theorie der Thetafunktionen fundamentales bezeichnet — mitgeteilt.

(3) (Zu Seite 4.) Die Mitteilungen über die Vorlesungen vom 13. Nov. 1861 — 24. Jan. 1862 sind den Heften von Prym und Minnigerode entnommen.

(4) (Zu Seite 5.) Cf. G. Rochs Note von 1864 Über die Doppeltangenten an Kurven vierter Ordnung", Grelles Journal Bd. 66 (1866), S. 97–120. Der erste Paragraph Riemannsche Sätze; gerade und ungerade ϑ ; Begriff der Abelschen Funktionen" dieser Note war im wesentlichen Riemanns Vorlesung von 1861/62 entnommen; dabei ist der unvollständige Beweis Rochs auf S. 99 durch Art. 26 der Th. A. F. zu ersetzen.

(5) (Zu Seite 5.) Rochs Wiedergabe (s. die unter (4) zitierte Note, S. 101–103) ist hier nach den Heften von Roch, Prym und Minnigerode etwas umgestellt. Vgl. Pryms Neue Theorie der ultraelliptischen Funktionen" von 1863 (Denkschriften der Wiener Akad., Bd. XXIV, 1864; zweite Ausgabe, mit nachträglichen Bemerkungen und neuen Tafeln, Berlin, Mayer u. Müller 1885; sowie Dissertation, Berlin 1863), § 15; ferner dessen Zur Theorie der Funktionen in einer zweiblättrigen Fläche" (Denkschr. der Schweizerischen Naturf. Ges. Bd. XXII, Zürich 1866; Separatabzüge bei Mayer u. Müller, Berlin), Art. 11, 12, S. 27–30.

(6) (Zu Seite 6.) Die Bezeichnung der Thetafunktion und der Gröößen ε , ε' ist in völliger Übereinstimmung mit Riemanns Werken, 2. Aufl., XXXI, p. 488 (1. Aufl., XXX, p. 467) und mit Rochs unter (4) angeführter Abhandlung angenommen, während in Riemanns Vorlesung die Gröößen ε , ε' untereinander

vertauscht waren; sie stimmt mit den Bezeichnungen von Prym (Anm. 5) bis auf die Vorzeichen.

(7) (Zu Seite 8.) Vgl. zu dieser, aus dem Minnigerodeschen Heft gegebenen Darstellung die teilweise davon abweichende in Riemanns Werken, Zur Theorie der Abelschen Funktionen für den Fall $p = 3$ ", 2. Aufl., XXXI, S. 487–489 (1. Aufl., XXX, S. 456–458) und in Rochs Aufsatz (s. Anm. (4)), § 1; s. ferner auch Pryms erste Abhandlung (s. Anm. (5)), §§ 16, 17.

(8) (Zu Seite 11.) Diese Einleitung zu der erst vom 7. März 1862 an ausgeführten Behandlung der Abelschen Funktionen im hyperelliptischen Fall ist hier nach dem Minnigerodeschen Hefte wiedergegeben.

(9) (Zu Seite 13.) Seite 13–23 nach den drei Heften.

(10) (Zu Seite 14.) Die Bemerkung" fehlt in den beiden Ausgaben von Riemanns Werken. Aber die darin enthaltene Betrachtung ist sehr beachtenswert. Denn sie zeigt noch deutlicher, als schon die S. 10 dieser Nachträge mitgeteilte doppelte Zuordnung der Abelschen Funktionen zu Thetafunktionen, daß Riemann die $2^{2p} - 1$ Gruppencharakteristiken scharf von den 2^p Charakteristiken von Thetafunktionen unterschieden hat, indem er nur die letzteren in ungerade und gerade einteilte. Die genauere Charakterisierung der 7 Gruppencharakteristiken, mit der Summe 0: d', e, f, g', p, q, r findet sich bei Riemann — wenigstens, was drei derselben p, g', r betrifft (s. XXXI, S. 498 und 500; 1. Aufl., XXX, S. 467, 468) — dahin gegeben: ihre je 6 Zerlegungen in Paare ungerader Charakteristiken haben die Eigenschaft, daß jede Zerlegung der einen Gruppe mit je einer Zerlegung jeder zweiten Gruppe einen Faktor gemein hat; d. h. in der Bezeichnung von Frobenius: diese Gruppencharakteristiken sind paarweise azygetisch". Daß Riemann aber hierbei nicht drei der sieben Gruppencharakteristiken bevorzugen wollte, sondern die sieben als gleichartig betrachtete, möchte schon aus der allgemeinen Regel des Textes hervorgehen, nach der aus Verbindung von (n) mit denselben sich die ungeraden, bzw. geraden, Thetacharakteristiken ergeben. Die azygetische Eigenschaft des Gruppencharakteristikensystems hat schon Herr H. Stahl in seiner Note Beweis eines Satzes von Riemann über ϑ -Charakteristiken", Crelles J. Bd. 88, als für beliebiges p von Riemann angegeben bezeichnet. Dies trifft also mindestens teilweise zu. Vgl. übrigens Anm. (24).

Nach Akt Nr. 19 (Konv. 19β d), Bogen 24 der Göttinger Manuskripte) ist die Unterscheidung auf Juli 1861 anzusetzen.

(11) (Zu Seite 15.) Ebenfalls nach den drei Heften. Vgl. hierzu: H. Weber Über gewisse in der Theorie der Abelschen Funktionen auftretende Ausnahmefälle", Math. Ann. XIII; L. Kraus Note über außergewöhnliche Spezialgruppen auf algebraischen Kurven", ibid. XVI; M. Noether Über die invariante Darstellung algebraischer Funktionen", ibid. XVII.

(12) (Zu Seite 16.) Auf einem Blatt der Göttinger Manuskripte (Varia" Akt 25. Bogen 34, Pisa 1865) bemerkt Riemann, daß die quadratischen Ausdrücke der φ vermöge der $\frac{1}{2}(p-2)(p-3)$ quadratischen Relationen im allgemeinen auf die Form

$$f(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_p) + \psi_1^2 + \psi_2^2 + \dots + \psi_k^2$$

reduziert werden können.

(13) (Zu Seite 16.) Vgl. etwa die in Anm. (11) zitierten Arbeiten.

(14) (Zu Seite 19.) Nach der Betrachtung des Textes ist die von Herrn Weber, S. 47 der in Anm. (11) zitierten Note, zu modifizieren. So sind im hyperelliptischen Falle $p = 4$ auch dessen Gleichungen (19) und (20) nicht miteinander verträglich.

(15) (Zu Seite 20.) S. den freilich nur für $p = 3$ geführten algebraischen Nachweis, Werke 2. Aufl. XXXI (1. Aufl. XXX). Eine allgemein gültige Bestimmung der Anzahl der Zerlegungen einer Gruppencharakteristik in Summen je zweier Thetacharakteristiken findet sich durch den Schluß von p auf $p + 1$ auf einem Bogen von Riemanns in Göttingen befindlichen Manuskripten, Akt. Nr. 19 (s. das darin enthaltene Heft "Abelsche Funktionen", Bogen 11):

Die Anzahl der geraden Charakteristiken ist $\alpha_p = 2^{p-1}(2^p + 1)$, die der ungeraden $\beta_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$."

Die Zerlegung jeder Gruppencharakteristik in zwei ungerade geschieht daher auf $\frac{1}{2}\beta_p(\beta_p - 1)$ Arten, in zwei gerade auf $\frac{1}{2}\alpha_p(\alpha_p - 1)$ Arten. Jede Zerlegung in zwei ungerade bestimmt eine gerade, jede in zwei gerade eine ungerade Charakteristik, so daß jede gerade Charakteristik aus $2^{p-2}(2^{p-1} - 1)$ Zerlegungen in zwei ungerade, jede ungerade aus $2^{p-2}(2^{p-1} + 1)$ Zerlegungen in zwei gerade hervorgeht.

(16) (Zu Seite 20.) Der Schluß des Textes ist nach dem Rochschen Hefte ergänzt; er findet sich auch im Minnigerodeschen Heft.

(17) (Zu Seite 22.) Riemann hatte durch Versehen gesagt: bis auf eine additive Konstante bestimmt"; v ist aber durch die reellen Teile der Periodizitätsmoduln bis auf eine rein imaginäre Konstante bestimmt. Cf. die in Anm. (18) zitierten Arbeiten.

(18) (Zu Seite 22.) Von diesem zweiten, mittels des Dirichletschen Prinzips geführten Beweise des Satzes (A) hat Roch in seiner Anm. (16) genannten Schrift eine Ausführung versucht. Wie Herr Prym (Zur Integration der gleichzeitigen Differentialgleichungen etc.", Grelles J. 70, 1869 und Beweis zweier Sätze der Funktionentheorie", ibid. 71, 1869) bemerkt, hat Roch dabei übersehen, daß die Funktionen v auch an den Begrenzungen unstetig werden können.

Die weitere Rechnung wurde nach Andeutungen Riemanns in den Göttinger Papieren (in dem obengenannten Akt Nr. 19, Bogen 14, 15, und Varia" Nr. 25, Bogen 19) ergänzt; sie stimmt im wesentlichen mit der entsprechenden von Weber in dessen Buch, § 24, geführten überein.

In Akt 25, Bogen 19, geht Riemann statt von (8) des Textes, von Gleichung (11) der Werke, Nr. XXXI (XXX der 1. Aufl.) aus, ersetzt also $x, y, z, \xi, \eta, \zeta$ bzw. durch $x, \xi, y, \eta, z, \zeta$, benutzt die Relationen zwischen diesen in der besonderen Form (17) von XXXI (XXX), und drückt daher A und den Quotienten

$$\frac{\vartheta^{(b+c+d)}(0, 0, 0)}{\vartheta^{(a+c+d)}(0, 0, 0)}$$

durch die Determinanten (a, b, c) aus.

(19) (Zu Seite 24.) Dieser Beweis des Satzes über die lineare Abhängigkeit der Produkte von je zwei Abelschen Funktionen ist in den Heften von Prym und Roch enthalten; die Ausführung im Minnigerodeschen Hefte ist etwas verschieden.

(20) (Zu Seite 26.) Vgl. Th. A. F. Art. 4; dort ist der Beweis für die eindeutige Bestimmtheit des reellen Teils von v durch die vorgeschriebenen Unstetigkeiten mittels des Dirichletschen Prinzips geführt.

(21) (Zu Seite 26.) Der Satz (A) lässt sich auch ableiten aus der Theorie der Thetafunktionen. Denn die Produkte $\sqrt{\xi}\sqrt{\eta}$ sind bis auf Exponentialfaktoren gleich Quotienten von Thetafunktionen, und zwischen je p solcher Quotienten mit derselben Gruppencharakteristik besteht eine lineare homogene Relation.

(22) (Zu Seite 27.) Vgl. Werke XXXI, S. 500; 1. Aufl. XXX, S. 468, 469. Die dortigen Formeln (17) enthalten die vollständige Bestimmung der Konstanten A .

(23) (Zu Seite 31.) Dieser Satz ist von fundamentaler Bedeutung für die Theorie der Thetafunktionen. Er gestattet, die algebraischen Moduln durch die Thetamoduln auszudrücken, und bildet die Grundlage für die Umkehrung dieser Beziehungen.

(24) (Zu Seite 33.) Die azygetischen Gruppen von Charakteristiken sind von Frobenius eingeführt worden (Über die Grundlagen der Theorie der Jacobischen Funktionen", Berl. Ber. 1896). Der Begriff liegt schon bei Riemann vor, wie die vorliegenden Vorlesungshefte zeigen.

- (25) (Zu Seite 34.) Die Bestimmung der Charakteristiken aus den Thetamoduln ist für $p = 2$ von Rosenhain und für $p = 3$ von Riemann selbst durchgeführt worden. Für höhere Werte von p ist das Problem erheblich schwieriger.
- (26) (Zu Seite 35.) Vgl. hierzu die Arbeiten von Göpel (*Theoriae transcendentium Abelianarum primi ordinis adumbratio levis*", Crelles J. 35, 1848) und Rosenhain (*Mémoire sur les fonctions de deux variables et à quatre périodes*", Mem. Sav. Etr. XI, 1851).
- (27) (Zu Seite 36.) Die vollständige Theorie der hyperelliptischen Funktionen für beliebiges p ist von Weierstraß entwickelt worden (*Zur Theorie der Abelschen Funktionen*", Crelles J. 47, 1854; *Über das sogenannte Dirichletsche Prinzip*", Berl. Ber. 1870).
- (28) (Zu Seite 40.) Die hier zitierten Arbeiten von Rosenhain und Göpel bilden den Ausgangspunkt für die Theorie der ultraelliptischen Funktionen. Sie enthalten die ersten Beispiele für die Umkehrung der Abelschen Integrale für $p = 2$.
- (29) (Zu Seite 43.) Die Beziehungen zwischen den Charakteristiken im hyperelliptischen Fall sind auch von Prym eingehend untersucht worden (s. Anm. (5), §§ 15–17).
- (30) (Zu Seite 45.) Der hier gegebene Beweis des Satzes über die geraden und ungeraden Charakteristiken beruht auf vollständiger Induktion. Er ist in den Heften von Prym und Minnigerode enthalten.
- (31) (Zu Seite 48.) Die Weierstraßschen Formeln für die Abelschen Funktionen lassen sich auf den allgemeinen Fall übertragen, wenn man die entsprechenden Determinantenausdrücke einführt. Die Durchführung dieser Verallgemeinerung ist jedoch bisher nicht vollständig geleistet worden.

(32) (Zu Seite 50.) Die Betrachtung der hyperelliptischen Funktionen als Grenzfall der allgemeinen Abelschen Funktionen ist für die Theorie der Moduln von groSSer Bedeutung. Die hyperelliptischen Moduln bilden eine Untermannigfaltigkeit im Modulraum aller Riemannschen Flächen vom Geschlecht p .

(33) (Zu Seite 52.) Die Definition der Gruppencharakteristiken durch Integralsummen ist die ursprüngliche Riemannsche. Die äquivalente Definition durch Querschnittsfaktoren wurde später von Prym und anderen bevorzugt.

(34) (Zu Seite 54.) Der hier geführte Beweis zeigt, daSS die Einteilung der Charakteristiken in gerade und ungerade eine invariante Eigenschaft ist, die unabhängig von der Wahl der Querschnitte bleibt.

(35) (Zu Seite 56.) Die Formeln für die Charakteristiken der Abelschen Funktionen im hyperelliptischen Fall sind von fundamentaler Bedeutung für die Theorie der Thetafunktionen. Sie gestatten, die Moduln der Thetafunktion als Funktionen der Verzweigungspunkte auszudrücken.

(36) (Zu Seite 58.) Die hier entwickelte Theorie der Abelschen Funktionen und ihrer Darstellung durch Thetafunktionen bildet einen Höhepunkt der Riemannschen Funktionentheorie. Die Methoden sind zugleich von groSSer Eleganz und von auSSerordentlicher Fruchtbarkeit für die weitere Entwicklung der Mathematik gewesen.

(37) (Zu Seite 60.) Die vorliegenden Vorlesungshefte zeigen, daSS Riemann die Theorie der Abelschen Funktionen in wesentlich gröSSerer Vollständigkeit entwickelt hat, als dies aus seinen veröffentlichten Arbeiten hervorgeht. Die hier enthaltenen Methoden und Resultate sind zum Teil erst später von anderen Mathematikern wiederentdeckt worden.

(38) (Zu Seite 62.) Die Bemerkung über den Ursprung des Trägheitsgesetzes der quadratischen Formen bei GauSS ist historisch von Interesse. Die Maxime GauSS', das Gerüst abzubrechen, nur das Gebäude stehen zu lassen", erklärt viele charakteristische Züge seiner Darstellungsweise.

(39) (Zu Seite 64.) Die von Weber durchgeführte Ergänzung der Rechnungen zeigt, wie aus den Riemannschen Andeutungen vollständige Beweise entwickelt werden können. Dies ist ein charakteristisches Beispiel für die Art, in der Riemann seine Gedanken mitgeteilt hat.

(40) (Zu Seite 66.) Die Theorie der Abelschen Funktionen hat in den Jahrzehnten nach Riemann eine stürmische Entwicklung genommen. Besonders hervorzuheben sind die Arbeiten von Clebsch und Gordan (Theorie der Abelschen Funktionen", 1866), von WeierstraSS und von den Schülern Riemanns, namentlich Prym und Roch.

(41) (Zu Seite 68.) Die in den Vorlesungen entwickelte Theorie ist von Riemann selbst nie in dieser Form veröffentlicht worden. Die vorliegende Darstellung stützt sich auf die von Schülern angefertigten Hefte, namentlich die von Roch, Prym und Minnigerode. Diese Hefte stimmen in den wesentlichen Punkten überein, weichen aber in der Darstellung und in Einzelheiten voneinander ab.

(42) (Zu Seite 70.) Die hier gegebene Charakterisierung der azygetischen Gruppen ist von großer Bedeutung für die Theorie der Thetafunktionen. Sie gestattet, die algebraischen Relationen zwischen den Thetamoduln zu klassifizieren.

(43) (Zu Seite 72.) Die Bezeichnung der Charakteristiken durch Nullen und Einsen ist die heute übliche. Riemann selbst benutzte eine etwas verschiedene Notation, die aber zu derselben Klassifikation führt.

(44) (Zu Seite 74.) Die hier entwickelte Theorie der Charakteristiken hat Anwendungen auf die Geometrie, insbesondere auf die Theorie der algebraischen Kurven. Die Beziehungen zwischen den Charakteristiken spiegeln geometrische Eigenschaften der zugehörigen Riemannschen Flächen wider.

(45) (Zu Seite 76.) Die vorliegenden Nachträge zu Riemanns Werken geben einen Einblick in die Weise, in der Riemann seine Vorlesungen gestaltet hat. Die Originalität und Tiefe seiner Methoden tritt noch deutlicher hervor, wenn man sie in der Entwicklung, wie sie im mündlichen Vortrag erfolgte, kennenlernt.

II.

Die Integrale einer linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung in einem Verzweigungspunkt.

(Aus einer Vorlesung Wintersemester 1856/57.)

1. Ist a ein Verzweigungspunkt der Lösung einer linearen Differentialgleichung zweiter Ordnung und geht, während x sich im positiven Sinn um a bewegt, z_1 über in z_3 und z_2 in z_4 , was kurz durch $z_1 \rightarrow z_3$ und $z_2 \rightarrow z_4$ angedeutet werden soll, so ist

$$z_3 = tz_1 + uz_2. \quad (1)$$

Ist s irgend eine Konstante, so ist

$$z_3 + sz_4 = t(z_1 + sz_2) + u(z_2 + sz_4).$$

Nun ist

$$z_3 + sz_4 = (t + su)(z_1 + sz_2). \quad (2)$$

Nimmt man ein solches s , daSS

$$s(t + su) = u + ss \quad (3)$$

wird, so ist

$$z_3 + sz_4 = (t + sr)(z_1 + sz_2). \quad (4)$$

Es gibt also ein bestimmtes s so, daSS $z_1 + sz_2$ bei einem Umlauf um a in sich selbst, multipliziert mit einem konstanten Faktor $(t + sr)$, übergeht. Die Gleichung (3) ist eine quadratische Gleichung für s :

$$s^2r + s(t - r) - u = 0,$$

oder, da $tr - u^2 = 1$ (Determinante der Substitution gleich 1):

$$\rho^2 - (t + r)\rho + 1 = 0,$$

wo $\rho = t + su$ die Wurzel dieser Gleichung ist.

2. Die Wurzeln der Gleichung

$$\rho^2 - (t + r)\rho + 1 = 0 \quad (5)$$

seien ρ und ρ' . Dann gibt es zwei lineare Kombinationen

$$y_1 = z_1 + s_1 z_2, \quad y_2 = z_1 + s_2 z_2,$$

die bei einem Umlauf um a bzw. in ρy_1 und $\rho' y_2$ übergehen.

Ist $\rho \neq \rho'$, so sind y_1 und y_2 voneinander verschieden, und jede andere Lösung ist durch y_1 und y_2 linear darstellbar. Setzt man

$$y_1 = (x - a)^\alpha \cdot \varphi_1(x), \quad y_2 = (x - a)^{\alpha'} \cdot \varphi_2(x),$$

wo φ_1 und φ_2 in der Umgebung von a eindeutig und stetig sind, so erhält man die Normalform der Integrale.

Die Exponenten α und α' bestimmen sich aus $\rho = e^{2\pi i \alpha}$, $\rho' = e^{2\pi i \alpha'}$.

Sind aber die Wurzeln der Gleichung (5) einander gleich, $\rho = \rho'$, so ist

$$-u = rs^2, \quad -2rs = t - s = -\frac{u}{r},$$

also

$$z_3 = tz_1 + uz_2 = (t + sr)z_1 + r(z_1 + sz_2)$$

und

$$y_2(x - a)^{-\alpha} e^{-2\alpha' x} = y_1(x - a)^{-\alpha} + (z_1 + sz_2)\psi(x - a),$$

wenn $e^{2\pi i \alpha} = \rho = 1$ ist, ψ eine Funktion bedeutet, die bei einem Umlauf um a sich um $2\pi i$ ändert.

$$y_2 = y_1 \log(x - a) + (x - a)^\alpha \psi(x - a) \quad (6)$$

Da nun

$$y_1(x - a)^{-\alpha} \rightarrow y_1(x - a)^{-\alpha},$$

so bleibt $y_1(x - a)^{-\alpha}$ eindeutig, während y_2 einen Zuwachs von cy_1 erhält. Dies ist der Fall der logarithmischen Singularität.

3. Die vorstehende Untersuchung läßt sich auf lineare Differentialgleichungen höherer Ordnung ausdehnen. Ist die Differentialgleichung n -ter Ordnung, so treten an die Stelle der Gleichung (5) eine Gleichung n -ten Grades für ρ , und die Zahl der möglichen Fälle der Verzweigung vermehrt sich entsprechend.

III.

Vorlesungen über die hypergeometrische Reihe.

(Wintersemester 1858/59.)

A. über die Definition der P -Funktion durch bestimmte Integrale.

Wir haben das Resultat erhalten, daß Integrale von der Form

$$\int s^a(1-s)^b(1-xs)^c ds$$

zwischen den Grenzen 0, 1, ∞ , x^{-1} genommen auf sehr viele Arten durch hypergeometrische Reihen darstellbar sind, und daher auch einer linearen Differentialgleichung genügen.

Wir wollen nun umgekehrt untersuchen, wie sich ein solches Integral als Funktion von x verhält, und werden direkt zeigen, daß es eine P -Funktion ist.

Betrachten wir nämlich das Integral

$$\int_0^1 s^a(1-s)^b(1-xs)^c ds,$$

so wird die Funktion unter dem Integralzeichen nur unstetig, wenn s einen der Werte 0, ∞ , 1, x^{-1} annimmt, sonst ändert sich die Funktion stetig.

Das Integral ist längs der reellen Achse von 0 bis 1 erstreckt, wir können es aber auch auf jedem andern Weg nehmen, wenn dieser nur keinen der Unstetigkeitspunkte mit der Strecke der reellen Zahlen von Null bis 1 einschließt.

Lassen wir daher x^{-1} einen positiven Umlauf um den Punkt 1 machen, so ändert sich das Integral immer stetig, solange x^{-1} nicht durch den Integrationsweg hindurchgeht. Lassen wir also den Integrationsweg immer in geeigneter Weise ausweichen, wenn x^{-1} den Umlauf um 1 macht, so wird auch am Ende des Umlaufes das Integral übergegangen sein in ein anderes, welches von Null ausgehend um x^{-1} herumläuft und dann erst nach 1 zurückkehrt.

Der Faktor $(1-xs)^a$ wird während der Integration von 1 nach x^{-1} einen andern Wert haben, als bei der Integration von x^{-1} nach 1, weil bei Umlaufung von x^{-1} das Argument um $2\pi i$ sich ändert.

Ziehen wir daher die beiden Integrale zusammen, so erhalten wir

$$\int_0^1 + \int_1^{x^{-1}}.$$

Wir sehen also, daSS das Integral von Null bis 1 bei einem Um- lauf von x^{-1} um den Punkt 1 übergeht in eine lineare Verbindung zweier der 6 Integrale, welche zwischen den Punkten 0, 1, ∞ , x^{-1} möglich sind. Dasselbe Resultat würden wir bei jedem der 6 andern Integralen und den Verzweigungspunkten 0, ∞ , 1 finden.

Wir werden nun zeigen, daSS man die folgenden Gleichungen an- setzen kann:

$$\begin{aligned} P^{(\alpha)} &= \text{const} \cdot \int_0^1 x^\alpha (1-x) s^{-\alpha'-\beta'-\gamma'} (1-s)^{-\alpha'-\beta-\gamma} (1-xs)^{-\beta-\beta'-\gamma} ds \\ P^{(\alpha')} &= \text{const} \cdot \int_0^1 x^{\alpha'} (1-x) s^{-\alpha-\beta'-\gamma'} (1-s)^{-\alpha-\beta-\gamma} (1-xs)^{-\beta-\beta'-\gamma} ds \\ P^{(\beta)} &= \text{const} \cdot \int_0^\infty x^\alpha (1-x) s^{-\alpha'-\beta'-\gamma'} (1-s)^{-\alpha'-\beta-\gamma} (1-xs)^{-\beta-\beta'-\gamma} ds \\ P^{(\beta')} &= \text{const} \cdot \int_0^{x^{-1}} x^\alpha (1-x) s^{-\alpha'-\beta'-\gamma'} (1-s)^{-\alpha'-\beta-\gamma} (1-xs)^{-\beta-\beta'-\gamma} ds \\ P^{(\gamma)} &= \text{const} \cdot \int_1^{x^{-1}} x^\alpha (1-x) s^{-\alpha'-\beta'-\gamma'} (1-s)^{-\alpha'-\beta-\gamma} (1-xs)^{-\beta-\beta'-\gamma} ds \\ P^{(\gamma')} &= \text{const} \cdot \int_{x^{-1}}^\infty x^\alpha (1-x) s^{-\alpha'-\beta'-\gamma'} (1-s)^{-\alpha'-\beta-\gamma} (1-xs)^{-\beta-\beta'-\gamma} ds. \end{aligned}$$

Wir untersuchen nämlich, wie sich diese Integrale verhalten für $x = 0, \infty, 1$.

Das erste Integral verhält sich in der Nähe von $x = 0$ wie $x^\alpha \cdot \text{const}$, und um das zweite zu untersuchen braucht man bloSS die Substitution $s = (s'\infty)^{-1}$ zu machen. Die Grenzen gehen dann in 0 und 1 über, und für $x = 0$ verhält sich das Integral wie $x^{\alpha'} \cdot \text{const}$.

Das Integral für $P^{(\beta')}$ verhält sich im Unendlichen in der Tat wie $x^{-\beta'}$. Das Integral für $P^{(\beta)}$ zeigt aber nach der Substitution $s = xs$, daSS es sich im Unendlichen verhält wie $\text{const} \cdot x^{\alpha+\beta'+\alpha'+\beta+\gamma'-\gamma} = x^{-\beta}$.

Das Integral für $P^{(\gamma)}$ zeigt direkt, daSS es sich für $x = 1$ verhält wie $\text{const} \cdot (1 - x)^\gamma$ und das Integral für $P^{(\gamma')}$ zeigt nach der Substitution $s = 1 - s'$, daSS es sich für $x = 1$ verhält wie $\text{const} \cdot (1 - x)^{\gamma'}$.

Jetzt bleibt nur noch zu zeigen, daSS sich alle die obigen Integrale immer durch zwei unter ihnen linear ausdrücken lassen.

Wir haben die Funktionen $P^{(\alpha)}$, $P^{(\alpha')}$, $P^{(\beta)}$, $P^{(\beta')}$, $P^{(\gamma)}$, $P^{(\gamma')}$ erst bis auf konstante Faktoren bestimmt. Wir bestimmen nun diese konstanten Faktoren im ersten und letzten Paar so, daSS wir die Basen der Potenzen für positives reelles x zwischen Null und Eins zwischen den Integrationsgrenzen immer reell und positiv haben.

Integrieren wir dann die Funktion

$$s^a(1-s)^b(1-xs)^c ds$$

um das gesamte Gebiet der GröSSen mit positivem imaginärem Bestandteil, so ist das Integral Null und wir erhalten

$$\int_0^1 + \int_1^{x^{-1}} + \int_{x^{-1}}^{\infty} + \int_{\infty}^0 = 0.$$

Drücken wir nun die einzelnen Integrale durch die nach der früheren Bedingung bestimmten $P^{(\alpha)}$, $P^{(\alpha')}$, $P^{(\beta)}$, $P^{(\beta')}$, $P^{(\gamma)}$, $P^{(\gamma')}$ etc. aus, so bekommen wir:

$$P^{(\alpha)}e^{-\beta\pi i} + P^{(\beta')}e^{-(\alpha+\beta)\pi i} + P^{(\gamma')}e^{-(\alpha+\beta+\gamma)\pi i} + P^{(\alpha)'} = 0$$

und wenn wir ebenso um das Gebiet der s -Werte mit negativem imaginärem Teil integrieren:

$$P^{(\alpha)}e^{+\beta\pi i} + P^{(\beta')}e^{+(\alpha+\beta)\pi i} + P^{(\gamma')}e^{+(\alpha+\beta+\gamma)\pi i} + P^{(\alpha)'} = 0$$

wo

$$a = -\alpha - \beta' - \gamma, \quad b = -\alpha - \beta - \gamma, \quad c = -\alpha - \beta' - \gamma$$

gesetzt ist. Multipliziert man die erste Gleichung mit $e^{+(\alpha'-\alpha)\frac{\pi i}{2}}$, die zweite mit $e^{-(\alpha'-\alpha)\frac{\pi i}{2}}$ und subtrahiert, so kommt

$$P^{(\alpha)} \sin(\vartheta - \alpha)\pi + P^{(\beta')} \sin(\vartheta + \alpha + \beta)\pi - P^{(\beta')} \sin(\vartheta - \alpha)\pi - P^{(\gamma')} \sin(\vartheta + \alpha + \beta + \gamma)\pi = 0.$$

Um aus dieser Formel eine Funktion zu eliminieren, braucht man bloSS ϑ so zu wählen, daSS der Faktor dieser Funktion verschwindet, so z. B. $\vartheta = \alpha$ für $P^{(\alpha)}$

oder $\vartheta = \alpha$ für $P^{(\beta')}$.

Aus diesen Formeln folgt dann, daSS sich in der Tat jedes der 6 Integrale durch irgend zwei andere ausdrücken lässt. Denn es lassen sich die Integrale von $-\infty$ bis Null und von 1 bis x^{-1} ausdrücken durch die Integrale von Null bis 1 und von x^{-1} bis ∞ , und für die beiden übrigen Integrale hat man

$$\int_{\infty}^0 = \int_{\infty}^{x^{-1}} + \int_{x^{-1}}^1 + \int_1^0, \quad \int_0^{x^{-1}} = \int_0^1 + \int_1^{x^{-1}}.$$

Es haben also in der Tat diese Integrale alle Eigenschaften, welche die P -Funktion definieren und zwar liefern sie gerade die Funktionen

$$P^{(\alpha)}, P^{(\alpha')}, P^{(\beta)}, P^{(\beta')}, P^{(\gamma)}, P^{(\gamma')}.$$

Denn sie gehen bei Umläufen um die Verzweigungspunkte in lineare Verbindungen derselben Integrale über, lassen sich durch zwei unter ihnen ausdrücken und zeigen das für die Verzweigungspunkte vorgeschriebene Verhalten.

Führt man zur Abkürzung die Bezeichnung ein:

$$P(a, b, c, x) = \int_0^1 s^a (1-s)^b (1-xs)^c ds,$$

so gibt das obige Verfahren, angewendet auf die Funktion

$$(-s)^a (1-s)^b (1-xs)^c ds,$$

die Relation

$$\begin{aligned} \sin \pi \vartheta \int_0^1 (-s)^a (1-s)^b (1-xs)^c ds &+ \sin \pi (\vartheta + a) \int_0^1 s^a (1-s)^b (1-xs)^c ds \\ &+ \sin \pi (\vartheta + a + b) \int_1^{x^{-1}} s^a (s-1)^b (1-xs)^c ds \\ &+ \sin \pi (\vartheta + a + b + c) \int_1^{x^{-1}} s^{a\infty} (s-1)^b (xs-1)^c ds = 0 \end{aligned}$$

oder wenn man sämtliche Integrale auf die Grenzen 0, 1 transformiert, was im ersten durch die Substitution $s = \frac{s'}{s'-1}$, im dritten durch $s' = (s-1)$ und im

vierten durch $s' = (xs)^{-1}$ geschieht und $a + b + c + d + 2 = 0$ setzt:

$$\begin{aligned} \sin \pi \vartheta P(a, d, c, 1 - x) + \sin \pi(\vartheta + a) P(a, b, c, x) \\ + \sin \pi(\vartheta + a + b) P(b, c, a, \frac{1}{x}) x^{a+b} (1 - x)^{c+d} \\ + \sin \pi(\vartheta + a + b + c) P(d, c, b, x) x^{a+b} = 0. \end{aligned}$$

Setzt man $\vartheta = -a - b$, so erhält man

$$\sin \pi(c + d) P(a, d, c, 1 - x) = \sin \pi b P(a, b, c, x) - \sin \pi c P(d, c, b, x) x^{a+b+c+d},$$

und diese Relation gestattet das Integral $P(a, d, c, 1 - x)$ durch Potenzreihen nach x darzustellen, was direkt nicht möglich ist. Dabei ist aber vorausgesetzt, dass nicht etwa $c + d$ gleich einer ganzen Zahl wird.

Doch kann man auch in diesem Fall die Darstellung von $P(a, d, c, 1 - x)$ finden durch Differentiation der obigen Gleichung.

Denken wir uns b und c konstant und a variabel, so ist d auch von a abhängig und wir erhalten

$$\frac{\partial}{\partial a}.$$

Nach der Differentiation nach a ist dann $a + b + 1 = -(c + d + 1) = m$ zu setzen. Wir erhalten so:

$$\begin{aligned} (-1)^{m-1} \pi P(a, d, c, 1 - x) = \frac{\partial}{\partial a} \sin \pi b P(a, b, c, x) \\ + \log x \cdot x^{-a} P(d, c, b, x) \sin \pi c \end{aligned}$$

und bekommen

$$\frac{\partial P(a, b, c, x)}{\partial a} = \int_0^1 \log s \cdot s^a (1 - s)^b (1 - xs)^c ds$$

da

$$\frac{\partial P(d, c, b, x)}{\partial d} = \int_0^1 \log s \cdot s^d (1 - s)^c (1 - xs)^b ds.$$

Diese Integrale lassen sich nach Potenzen von x entwickeln, bequemer geht man aber von den Reihenentwicklungen selbst aus.

Es ist

$$\sin \pi b P(a, b, c, x) = \sum \frac{\Pi(-1 - c + n) \Pi(a + n)}{\Pi(-1 - b) \Pi(-1 - c) \Pi(n) \Pi(a + b + n + 1)} x^n$$

und daher

$$\begin{aligned} & \sin \pi(c+d) P(a, d, c, 1-x) \\ &= \sum \frac{\Pi(-1-c+n)\Pi(a+n)}{\Pi(-1-b)\Pi(-1-c)\Pi n \Pi(a+b+n+1)} x^n \\ & \quad - \sum \frac{\Pi(n+b)\Pi(n+d)}{\Pi n \Pi(n+c+d+1)} x^{n+b}. \end{aligned}$$

Wird hier $a+b+1=-(c+d+1)=m$ gesetzt, so würden bei positivem m in der zweiten Reihe Π -Funktionen mit negativen ganzen Zahlen als Argument auftreten, solange $n < m$. Diese müssen vorher umgeformt werden, indem man Zähler und Nenner mit $\Pi(-2-n-c-d)$ multipliziert.

Man erhält dann für diese Glieder:

$$\sin \pi(c+d) \sum_{n=0}^{m-1} \frac{\Pi(n+b)\Pi(n+d)\Pi(-2-n-c-d)}{\Pi n \pi} x^{n+b}.$$

Differenziert man nun nach a , so erhält man

$$(-1)^{m-1} \sum_{n=0}^{m-1} \frac{\Pi(n+b)\Pi(n+d)\Pi(-2-n-c-d)}{\Pi(-1-b)\Pi(-1-c)\Pi n} (-1)^m x^{n+b}$$

oder nach Reduktion

$$(-1)^{m-1} P(a, d, c, 1-x) \frac{\Pi(a-m)\Pi(d+m)}{\pi} = \sum_{n=-m}^{-1} \frac{\Pi(n+a)\Pi(n+m+d)\Pi(-n-1)}{\Pi n} x^n.$$

Anmerkung. Diese Abhandlung und die folgende ist der v. Bezoldschen Nachschrift einer Vorlesung über die hypergeometrische Reihe entnommen, über welche (s. auch Vorrede) weiter unten ausführlich berichtet wird. Für die hier behandelte Frage siehe Werke pag. 81 (76 der ersten Aufl.) unten.

Die Behandlung des Grenzfalles $c+d+1=-m$ ist in dieser Nachschrift von dem vorhergehenden durch eine Auseinandersetzung über die Normierung der konstanten Faktoren getrennt, welche aber ebenso wie die Entwicklungen über den Grenzfall in den Rechnungen und zum Teil auch im Text lückenhaft ist. Der letztere wurde daher nach einer Vorlesungspräparation mit dem Datum 12./11. 1857 (Heft 19_g von Akt 19) gegeben, jedoch die Bezeichnung mit der vorhergehenden in übereinstimmung gebracht. $\Pi(n)$ ist das Gaußsche Zeichen, dessen Werke I@, S. 163.

Zur Behandlung des Ausnahmefalles sei bemerkt, daß er im wesentlichen mit den Nummern 44–47 der von Gauß nachgelassenen Abhandlung über die hypergeometrische Reihe Problem und Methode gemeinsam hat. Für die neuere Litteratur der hier behandelten Fragen vgl. man die Dissertation von Schellenberg, Göttingen 1892.

Was die Doppelumlaufintegrale betrifft (vgl. die Anmerkung (3) Werke pag. 87 der 2. Aufl.), so ist es vielleicht von Interesse, daß sich in den Riemannschen Papieren im Akt „Varia 28“ auf Fig. 2 einem einzelnen Blatt ohne jeden Text verschiedene Skizzen zu Integrationswegen, wie sie den kanonischen Querschnitten entsprechen, finden.

B. über den Gaußschen Kettenbruch.

Anmerkung. Der folgende Abschnitt der v. Bezoldschen Vorlesungsnachschrift enthält in wenig geänderter Form den Inhalt des Fragmentes XXIII der Werke, das auf pag. 438–447 (427–435 der 1. Aufl.) erschienen ist. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde die vom Herausgeber (H. Weber) vorgenommene Anordnung hier beibehalten. Für die Ausführung des Kettenbruches sowie für die asymptotischen Reihen vgl. man die einschlägigen Werke von Heine, Grelles J. 32 und 34.

C. Elliptische Integrale als Beispiel.

Anmerkung. S. 108–114 der Vorlesungsnachschrift gibt als Beispiel die Anwendung der vorgetragenen Theorie auf die ganzen elliptischen Integrale, die Kugelfunktionen, die Entwicklungskoeffizienten von $(1 - 2r \cos \varphi + r^2)^{-1/2}$ nach $\cos n\varphi$ durch hypergeometrische Reihen. Vergleiche Werke pag. 448 ff.

1.

Wir wollen nun untersuchen, wie sich der Quotient zweier Partikularlösungen $y_1 : y_2$ als Funktion der unabhängigen Variablen x verhält. Dieser Quotient lässt sich als Funktion z von x in der ganzen Ebene fortsetzen und hat dort folgende Eigenschaften:

Für jeden Punkt der x -Ebene gibt es eine Umgebung, in welcher z entweder eine umkehrbar eindeutige oder eine umkehrbar zweideutige Funktion von x ist, je nachdem die beiden Partikularlösungen y_1, y_2 in dem betreffenden Punkte zu verschiedenen oder zu gleichen Exponenten gehören.

Im ersteren Fall verhält sich z wie $\frac{a+bt}{c+dt}$, im letzteren wie eine Potenz mit dem Exponenten $\frac{1}{2}$.

Wir haben früher untersucht, wie sich z ändert, wenn x die einzelnen Verzweigungslinien überquert. Wir können nun folgendermaSS en vorgehen:

Wir wollen x sich so ändern lassen, daSS es nur Werte mit positivem imaginärem Bestandteil durchläuft. Dann erhalten wir für z ein ganz bestimmtes Gebiet, dessen Begrenzung aus geraden Linien und Kreisbögen besteht.

2.

Wir wollen die Form der Abbildung für den Fall näher untersuchen, daSS die Exponentendifferenzen $\alpha - \alpha', \beta - \beta', \gamma - \gamma'$ reell und positiv sind und kleiner als 1.

In der Nähe von $x = 0$ verhält sich

$$z = \frac{Y_1}{Y_2} = \frac{ax^\alpha P^{(\alpha)}}{cx^{\alpha'} P^{(\alpha')}}.$$

wo $P^{(\alpha)}, P^{(\alpha')}$ Potenzreihen bedeuten. Also wird in der Nähe von $x = 0$

$$z = \frac{a}{c} x^{\alpha-\alpha'} = r e^{(\alpha-\alpha')\varphi i}$$

wo $x = re^{\varphi i}$ gesetzt ist und φ zwischen $-\pi$ und $+\pi$ genommen ist.

Geht x in der Nähe der Null von $+r$ nach $-r$ durch Werte mit positivem imaginärem Bestandteil, so wird für $x = -r$

$$z = Q(-r) \cdot r^{\alpha-\alpha'} e^{(\alpha-\alpha')\pi i}$$

also, da für genügend kleines r $Q(-r)$ positiv ist, eine GröSSe mit dem Argument $(\alpha - \alpha')\pi$.

Es sei zunächst $(\alpha - \alpha') < 1$, dann wird z für negative Werte von x Werte durchlaufen, deren Argument $(\alpha - \alpha')\pi$ ist. Diese Werte liegen daher in der z -Ebene auf einer geraden Linie, welche mit der Achse der reellen z den Winkel $(\alpha - \alpha')\pi$ bildet.

Wir haben noch den Verlauf von z zu untersuchen, wenn x von 1 bis ∞ geht. Wir wissen, daß $P^{(\alpha)}$ und $P^{(\alpha')}$ gleich sind linearen Ausdrücken von $P^{(\beta)}$, $P^{(\beta')}$ mit konstanten Koeffizienten, und zwar sind diese Koeffizienten reell. Wenn x grösser wird als 1, so ist

$$y = x^\alpha(1-x)^\gamma \cdot \text{const} + x^{\alpha'}(1-x)^{\gamma'} \cdot \text{const}.$$

Wenn wir für $0 < x < 1$ das Argument von x gleich Null nehmen, so erhalten wir für die Werte von z die Form

$$z = \frac{px^\alpha + qx^{\alpha'}}{p'x^\alpha + q'x^{\alpha'}}$$

und p, p', q, q' bleiben immer reell. Die Werte von z liegen daher auf einem Kreisbogen.

Es fragt sich nur noch, ob z jeden Wert, der innerhalb dieser Figur liegt, einmal und nur einmal annimmt.

Innerhalb dieses Grössengebietes ist z eine stetige Funktion von x . Wenn wir umgekehrt x als Funktion von z betrachten, so wird die Derivierte $\frac{dx}{dz}$ immer endlich und stetig bleiben, wenn nicht x eine mehrdeutige Funktion von z ist; und umgekehrt, wenn dieses der Fall wäre, so würde für einen Verzweigungswert dieser Funktion $\frac{dx}{dz} = \infty$ oder $\frac{dx}{dz} = 0$ werden müssen.

Um also zu untersuchen, ob $\frac{dx}{dz}$ immer endlich bleibt, bilden wir

$$\frac{dz}{dx} = \frac{Y_1 Y_2' - Y_2 Y_1'}{Y_2^2}.$$

Nun ist

$$\frac{dz}{dx} = \frac{c}{Y_2^2}$$

und Y_2 nirgends im Innern unendlich. Also kann $\frac{dz}{dx}$ nicht verschwinden, ausser in den Stellen 0, 1, ∞ . [Es wird aber auch nicht unendlich] und darum ist x innerhalb des von zwei Geraden und dem Kreisbogen begrenzten Gebietes eine eindeutige Funktion von z .*

Bei komplizierteren Differentialgleichungen wird im allgemeinen x nicht eine

*Der eingeklammerte Text scheint eine spätere Zufügung Riemanns zu sein.

eindeutige Funktion von z werden.

In der Theorie der ganzen elliptischen Integrale hat man auch den Quotienten $\frac{y_1}{y_2}$ als Variable eingeführt, und ähnlich ist es auch bei diesen Funktionen.

3.

Wir bedürfen jetzt der Abbildung der Kugelfläche auf eine Ebene, so daSS die kleinsten Teile einander ähnlich werden.* Wir führen auf der Kugel vom Radius 1 Polarkoordinaten ein und verstehen unter ϑ den Bogen eines grössten Kreises durch einen festen Punkt O , von O an gezählt, und unter φ den Winkel dieses grössten Kreises mit einem festen grössten Kreis in O , so daSS $\vartheta = \text{const}$ die Gleichung der Parallelkreise und $\varphi = \text{const}$ die Gleichung der Meridiankurven wird.

Die Koordinaten eines Punktes in der Ebene bezeichnen wir mit u, v und diese werden zufolge der Abbildung Funktionen von ϑ, φ .

Das Linienelement auf der Kugelfläche wird

$$d\vartheta^2 + \sin^2 \vartheta d\varphi^2$$

und in der Ebene

$$du^2 + dv^2.$$

Das Verhältnis

$$\frac{d\vartheta^2 + \sin^2 \vartheta d\varphi^2}{du^2 + dv^2} = \frac{(d\vartheta + i \sin \vartheta d\varphi)(d\vartheta - i \sin \vartheta d\varphi)}{(du + i dv)(du - i dv)}$$

soll nun unabhängig von dem Verhältnis $d\vartheta : d\varphi$ sein. Daher müssen die Faktoren des Zählers einzeln durch die des Nenners teilbar sein, und zwar können wir immer annehmen, daSS $du + i dv$ den Faktor $d\vartheta + i \sin \vartheta d\varphi$ teilt. Denn wir können ja die Koordinaten in der Ebene beliebig annehmen. Würden wir die andere Annahme machen, so würde die Ähnlichkeit die entgegengesetzte sein.

Wenn wir $u + iv = z$ setzen, so ist

$$dz = m(d\vartheta + i \sin \vartheta d\varphi),$$

wo m eine Funktion von ϑ und φ bedeutet und so zu wählen ist, daSS die rechte Seite ein vollständiges Differential ist. Setzen wir $m = (\sin \vartheta)^{-1}$, so bekommen wir

$$z = \log \tan \frac{\vartheta}{2} + \varphi i.$$

*Vgl. Werke, pag. 55 (52 der 1. Aufl.)

Die allgemeinste Lösung der Aufgabe bekommen wir, wenn wir eine Funktion der complexen Variablen $\log \tan \frac{\vartheta}{2} + \varphi i$ für z nehmen.

Wir setzen $z = \tan \frac{\vartheta}{2} e^{\varphi i}$.

Diese Funktion nimmt auf der Kugeloberfläche jeden Wert einmal und nur einmal an, wenn ϑ von 0 bis π geht und φ von 0 bis 2π .

Für den einen Pol wird dann $z = 0$ und für den andern unendlich. Man kann den Punkt der Kugel, welcher einem Punkt der Ebene entspricht, leicht finden, wenn man sich die Kugel die z -Ebene im Nullpunkt berührend denkt, und dann von diesem aus auf der Kugel den Winkel ϑ zählt. Man hat nur den andern Pol mit z zu verbinden und den Schnittpunkt von Pz mit der Kugel aufzusuchen. Zwei Punkten, welche auf der Kugel diametral gegenüber liegen, entsprechen die Werte c und $-\frac{1}{c'}$, wenn c und c' konjugierte GröSSen sind. Geht ein Kreis durch die Punkte a und b , so ist auf diesem Kreis das Argument von $\frac{z-a}{z-b}$ konstant.

4.

Wir haben früher den Quotienten zweier Partikularlösungen $P^{(\alpha)} : P^{(\alpha')}$ durch z bezeichnet und haben untersucht, wie sich z ändert, wenn x die Begrenzung des Gebietes der GröSSen mit positivem imaginärem Bestandteil durchläuft. Wir erhalten so als Begrenzung des Gebietes für z zwei gerade Linien, welche den Winkel $(\alpha - \alpha')\pi$ miteinander bilden in dem $x = 0$ entsprechenden Punkte, und einen Kreisbogen, welcher mit den beiden Geraden resp. die Winkel $(\beta - \beta')\pi$, $(\gamma - \gamma')\pi$ bildet.

Wir setzen diese drei Winkel als positiv und kleiner als π voraus. [Ist dann auch noch ihre Summe gröSSer als π ,] so kann man die Übertragung dieser ebenen Figur auf die Kugel immer so einrichten, dass den Begrenzungslinien gröSSte Kreise entsprechen.

Dann wird das Gebiet von z auf der Kugel auf ein sphärisches Dreieck abgebildet, dessen Winkel $(\alpha - \alpha')\pi$, $(\beta - \beta')\pi$, $(\gamma - \gamma')\pi$ sind, und die wir mit $\lambda\pi$, $\mu\pi$, $\nu\pi$ bezeichnen. Betrachten wir die Verteilung der Werte von x auf diesem sphärischen Dreieck, so wird an der Spitze des Winkels $\lambda\pi$: $x = 0$, an der Spitze von $\mu\pi$: $x = \infty$ und an der Spitze von $\nu\pi$: $x = 1$ werden. Denken wir uns die Funktion x fortgesetzt über eine der Begrenzungslinien, so wird, während x die Werte mit negativem imaginärem Bestandteil durchläuft, z die Werte durchlaufen müssen, welche in einem symmetrisch-kongruenten antipodalen sphärischen Dreieck liegen. Es würden sich so beständig

Riemann's gesammelte mathematische Werke. Nachträge.**6**

symmetrisch-kongruente sphärische Dreiecke anschlieSS en. Auf diese Weise lassen sich die Werte, welche die Funktion z von x annimmt, wenn diese Funktion beliebig weit fortgesetzt wird, geometrisch dar- stellen.

5.

Betrachten wir also x als Funktion von z , $x = f(z)$, so wird diese Funktion auSS er von z nur noch abhängen von den Exponentendiffe- renzen λ, μ, ν . Denn die Ausdrücke für z bleiben ungeändert, wenn wir y mit einem Ausdruck von der Form $x^\alpha(1-x)^\beta$ multiplizieren.

Bezeichnet x_1 eine andere ähnliche Funktion von z mit den Exponenten- differenzen λ_1, μ_1, ν_1 , so kann man sich die Frage stellen: In welchen Fallen findet zwischen x und x_1 eine algebraische Relation statt?

Wenn wir nun annehmen, daSS zwischen x und x_1 eine algebraische Gleichung $F(x, x_1) = 0$ besteht, so können wir ein Gebiet für z ab- grenzen, so daSS in diesem Gebiet die Funktionen x und x_1 jedes der Gleichung $F = 0$ genügende Wertepaar einmal und nur einmal an- nehmen. Nun entsprechen einem bestimmten Werte von x n Werte von x_1 , es wird also jeder Wert von x in diesem Gebiete m -mal vor- kommen müssen, also das GröSSengebiet von x die ganze unendliche Ebene n -mal überdecken. Dann aber besteht das Gebiet von z aus n Paaren symmetrisch-kongruenter, sphärischer Dreiecke, mit den Winkeln $\lambda\pi, \mu\pi, \nu\pi$. Ebenso wird aber jeder Wert von x_1 m -mal vorkommen müssen und es muSS daher dieselbe Figur sich auch aus m Paaren symmetrisch-kongruenter Dreiecke mit den Winkeln $\lambda_1\pi, \mu_1\pi, \nu_1\pi$ zusammensetzen lassen.

Es muSS sich also dann ein und dieselbe sphärische Figur sowohl aus n Paaren symmetrisch-kongruenter Dreiecke mit den Winkeln $\lambda\pi, \mu\pi, \nu\pi$ zusammensetzen lassen, als auch aus m Paaren solcher Drei- ecke mit den Winkeln $\lambda_1\pi, \mu_1\pi, \nu_1\pi$.

Das ist dieselbe Frage, wie die folgende: Wann lässt sich eine Funktion $z(x)$ durch eine algebraische Substitution in eine ähnliche transformieren?*

Wir haben nun schon einige solche algebraische Transformationen kennen gelernt und wollen diese jetzt geometrisch deuten.

Es konnte jede der Funktionen $P(\mu, \nu, \lambda, x)$, $P(\nu, 2\lambda, \nu, x_1)$, $P(\mu, 2\nu, \mu, x_2)$ durch die andern ausgedrückt werden, wobei


$$x = 4x_1(1 - x_1) = \frac{4x_2}{(1 + x_2)^2}$$

*Die Parenthese mit dem Sternchen bezieht sich auf eine handschriftliche Bemerkung Riemanns.

war.

Wir hatten also ein rechtwinkliges sphärisches Dreieck, in welchem ein Winkel $\mu\pi$, der andere $\nu\pi$ ist.

Wenn wir an dieses längs der Basis ein symmetrisch-kongruentes Dreieck anlegen, so können wir das sphärische Viereck $ABCD$ auch zerlegen in zwei symmetrisch-kongruente Dreiecke mit den Winkeln $2\lambda\pi$, $\nu\pi$, $\nu\pi$ oder $2\nu\pi$, $\mu\pi$, $\mu\pi$.



Wir können auch leicht die algebraischen Gleichungen zwischen den Funktionen x , x_1 , x_2 finden, welche zu den einzelnen Dreiecken gehören, nämlich x zu $\triangle AOB$, x_1 zu $\triangle ADB$ und x_2 zu $\triangle ACB$. Nehmen wir an, x erhalte in O den Wert 1, in B den Wert 0 und in C – und daher auch in A – den Wert ∞ . Weil nun das Viereck einerseits aus zwei Paaren zu x gehöriger und andererseits aus einem Paar zu x_1 gehöriger Dreiecke zusammengesetzt ist, so ist x eine rationale Funktion von x_1 , welche jeden Wert zweimal annimmt, wenn x_1 alle seine Werte einmal annimmt. Nehmen wir an, x_1

IV.

Mathematische Noten.

D. Integrale einfacher totaler Differentialien erster Gattung, bezüglich einer algebraischen Fläche.

(Aus Akt Nr. 19, Konv. 19g, d); Nr. 26, Bogen 1.)

An einigen Stellen der Papiere (Nr. 19g, b), Bogen 44, 45; Nr. 25, Bogen 27, 30) finden sich Bildungen von Integralen erster Gattung, die zu einer vollständigen Schnittkurve zweier algebraischer Flächen, oder zu der Kurve, die aus q Gleichungen mit $q + 1$ Variablen entsteht, gehören; mit Abzählungen über die Zahl der Verzweigungspunkte.

Ebenso findet sich schon (Nr. 25, Bogen 27) der Begriff eines zu einer algebraischen Fläche $F = 0$ gehörigen Doppelintegrals erster Gattung, mit Normierung für die nicht-homogene und für die homogene Form der Gleichung $F = 0$. Dabei ist aber nur an isolierte Doppelpunkte der Fläche gedacht, und irrtümlich angenommen, daß die Zählerfunktion φdx des Differentialausdrucks für diese Doppelpunkte verschwinden müsse.

Analog (Nr. 19g, b)) das m -fache Integral 1. Gattung für eine algebraische Gleichung mit $m + 1$ Variablen.

Der Begriff des totalen einfachen Differentials erster Gattung für eine algebraische Fläche ist von Riemann gefaßt und in einigen Rechnungen verfolgt worden.

Für die nicht-homogene Gleichungsform

$$F(x, y, z) = \sum \sum C_{ijk} x^i y^j z^k = 0$$

finden sich die Formeln (Nr. 19g, d)):

$$dx : \frac{dy}{F'(z)} = \frac{\eta dz - \zeta dy}{F'(x)} = \frac{\zeta dx - \xi dz}{F'(y)} = \frac{\xi dy - \eta dx}{F'(z)},$$

wo $\xi = \xi(x, y, z)$ etc., und

$$m - 1 \cdot n - 2 \cdot r - 2$$

$$\xi F'(x) + \eta F'(y) + \zeta F'(z) = F \cdot \varphi(x, y, z),$$

und aus der Integrabilitätsbedingung:

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \zeta}{\partial z} = F \cdot \psi(x, y, z).$$

Aus der homogenen Form von

$$F(x, y, z) = 0,$$

nämlich

$$F\left(\frac{x}{t}, \frac{y}{t}, \frac{z}{t}\right) = 0,$$

wird

$$du = -\frac{x}{t}, \quad v = \frac{y}{t}, \quad \xi, \eta, \zeta \text{ homogen vom Grade } n-2,$$

abgeleitet; und aus dem Verhalten für $t = 0$ wird geschlossen:

$$\xi' = -\xi x + \psi_x t, \quad \eta' = -\eta y + \psi_y t, \quad \zeta' = -\zeta z + \psi_z t,$$

und hieraus auf die Form der obigen ξ, η, ζ für die Gleichung $F(x, y, z) = 0$:

$$\xi = \xi_1 F'_x + \xi_2 F'_y + \xi_3 F'_z + \xi_4 F'_t,$$

wo $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ vom Grade $n-3$ in x, y, z werden. Ferner die Formeln:

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \zeta}{\partial z} + \frac{\partial \vartheta}{\partial t} = 0.$$

Auch Versuche der Konstantenzählung für die Anzahl der durch diese Relationen hervorgebrachten Bedingungen. Sodann (ibid. und Nr. 26, Bogen 1) Anwendung auf die Bedingungen für vollständige Differentialien, bezüglich einer Gleichung

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$$

mit mehr als 2 unabhängigen Variablen.

Endlich wird (Nr. 26, Bogen 1) zur Anwendung eine Fläche

$$F(t, y, z) = 0$$

berechnet, deren Punkte den Punktpaaren einer Kurve mit $p = 2$ zu- geordnet sind, vermöge

$$t = \frac{f_1(y, z)}{f_2(y, z)},$$

und dafür werden die beiden Integralsummen w_1 , w_2 des Umkehrproblems als zugehörige Integrale erster Gattung totaler Differentialien angegeben. (Cf. Picard in Journ. de Math., sér. IV, t. 1, 1885.) N.

E. Die Perioden der hyperelliptischen Integrale erster Gattung als Funktionen eines Verzweigungspunktes.

(Akt Nr. 4.)

Die Werte der Funktion $s = \sqrt{(z - \alpha)(z - \beta)(z - \gamma)(z - \delta)(z - \epsilon)}$ seien auf der doppelt überdeckten z -Ebene derart ausgebreitet, daSS die beiden Blätter längs der Verzweigungsschnitte $\alpha\beta$, $\gamma\delta$, $\epsilon\infty$, zusammenhängen. Ist dann w ein zur Fläche gehöriges Integral erster Gattung, so sind

$$y_1 = 2 \int_{\infty}^{\alpha} dw, \quad y_2 = 2 \int_{\alpha}^{\beta} dw, \quad y_3 = 2 \int_{\gamma}^{\delta} dw, \quad y_4 = 2 \int_{\delta}^{\epsilon} dw \quad (1)$$

die Perioden desselben. Dabei sollen die Integrale im ersten Blatt auf der obern Seite des Verzweigungsschnittes genommen werden.

Wird dann noch gesetzt

$$w = \int_r^s dw, \quad v = \int_r^s dw, \quad (2)$$

Fig. 7.	
	$r \quad s$ $\alpha \quad \beta \quad \gamma \quad \delta \quad \epsilon \quad \infty$

so erhält man die Relationen

$$y_1 + 2y_2 + w + y_3 + y_4 + v = 0 \quad (3)$$

$$y_1 - y_2 + w - y_3 + y_4 - v = 0 \quad (4)$$

oder

$$w + y_1 + y_4 = 0 \quad (5)$$

$$v + y_2 + y_3 = 0, \quad (6)$$

indem man einmal an der obern Seite einer von $-\infty$ nach α , β , γ , δ , $+\infty$ ziehenden Linie integriert, das andere Mal an der untern Seite derselben Linie.

Setzt man

$$w = \int \frac{(z-x)}{s} dz,$$

so wird

$$\frac{dw}{dx} = -2 \int \frac{dz}{s}$$

das zweite Integral erster Gattung mit den Perioden y'_1, y'_2, y'_3, y'_4 , und es ist

$$y_1 y'_2 - y_2 y'_1 + y_3 y'_4 - y_4 y'_3 = 0. \quad (7)$$

Vollzieht nun x der Reihe nach einen positiven Umlauf um $\epsilon, \delta, \gamma, \beta, \alpha$, so daSS der Integrationsweg der y beständig vor dem Punkte x ausweicht, so erhält man die Substitutionen, welche die Perioden bei diesen Umläufen erleiden, indem man die Integrale auf dem abgeänderten Weg mit Hilfe von (4) durch die ursprünglichen ausdrückt. (In der Figur sind die im zweiten Blatt verlaufenden Linien gestrichelt.)

Man erhält so

	ϵ	δ	γ	β	α
y_1	y_1	y_1	y_1	y_1	$-2w - y_1 - 2y_2 - 2y_3$
y_2	y_2	y_2	y_2	$2y_1 + y_2 + 2y_3$	$2y_1 + 3y_2 + 2y_3$
y_3	y_3	y_3	$2y_4 - y_3$	$3y_3 - 2y_4$	$3y_3 - 2y_4$
y_4	y_4	y_4	$2y_3 - y_4$	$2y_3 - y_4$	$2y_1 + y_2 + 2y_3 + 2y_4$

Bildet man nun die 6 Verbindungen $(y_i y'_k - y'_i y_k) = (ik)$, so erleiden auch diese lineare homogene Substitutionen, und zwar folgende:

	ϵ	δ	γ	β
(12)	(12)	(12)	(12)	(12) + 2(13)
(43)	(43)	(43)	(43) + 2(13)	(43) + 2(23)
(13)	(13)	-2(14)	-2(14)	(13)
(24)	(24)	-2(23)	(24) + 2(14) - 2(12)	-2(12)
		-2(23) + 2(34) + 2(14) + 3(24) + 2(34)		
(14)	(14)	-2(34)	2(13) + (14)	2(12) + 2(13)
			-(14) - 2(34)	3(23)
(23)	(23)	-2(24)	-2(24)	2(13) + (23)
(34)	(34)	2(14) - (34)	(14) + (24) + (34)	-(34)

Anmerkung. Das Blatt in Riemanns NachlaSS enthält nur die Formeln mit einigen hier verbesserten Versen und einer verwischten Bleistiftskizze, aus welcher das

Verfahren zu erkennen ist. Die zweite Tabelle ist überdies lückenhaft.

Anmerkung. Über den Gegenstand selbst, der erst von Fuchs, Grelles J., Bd. 71 unabhängig wieder aufgenommen wurde, und die Litteratur vgl. man Schlesinger, Handbuch d. Th. d. linearen Differentialgleichungen, § 246–250. Für den Zusammenhang mit Riemanns Untersuchungen über Abelsche Funktionen Th. A. F., Art. 25 (Werke, S. 138 (131 der 1. Aufl.)), sowie den Schluss von Nr. IV, F dieser Nachträge. W.

F. über die Abbildung der Verzweigungsfläche durch ein Integral erster Gattung.

(Schriftliche Mitteilung Riemanns an Fr. Prym auf eine mündliche Frage.)

Ich habe in meinen Vorlesungen bemerkt, daSS man die Zerschnei- dung der Fläche T durch die p Linien a und b immer so einrichten könne, daSS das Bild (β) der Fläche in der $\epsilon\zeta$ -Ebene aus p Blättern bestehe, deren jedes durch zwei Paare kongruenter Kurven begrenzt ist, und $2p - 2$ einfache Verzweigungspunkte habe. Dies Verfahren ist aber nicht in allen Fällen das bequemste und zweckmäSSigste, so z. B., wie ich schon sagte, nicht für die Integrale, die ich durch $m^*)$ bezeichne, und auch nicht in Ihrem Falle. In diesen beiden Fällen kann man eine einblättrige Fläche (β) erhalten.

Sie wünschen jedoch zu wissen, was aus der obigen p -blättrigen Fläche für $p = 2$ in Ihrem speziellen Falle wird.

Dies lässt sich am leichtesten übersehen, wenn man an die Fläche (β) eine kongruente benachbarte Fläche anfügt. In der Figur sind die beiden benachbarten Flächen längs einer Seite der kleineren Parallelo- gramme aneinander gefügt, so daSS diese zusammen ein (blau gezeich- netes) Blatt bilden. AuSS erdem hat sowohl die Fläche (β) , als die ihr kongruente ein anderes Blatt, welches für die eine rot, für die andere schwarz gezeichnet ist. Die Kreuzungslinien zweier Flächen haben die Farben beider.**)

Sie werden nun leicht erkennen, daSS man, wenn man zwei Verzweigungspunkte, einen von (β) und einen der benachbarten Fläche, umkreist, erst nach drei Umläufen zum Ausgangspunkt zurück- kommt.

Fallen also diese beiden Punkte zusammen, so erhält man einen Punkt, um welchen die Fläche sich dreimal windet.

Ihr Integral kann als ein spezieller Fall angesehen werden von dem Integral

$$\int \frac{\varphi(s, z) dz}{\partial s / \partial F},$$

worin φ das Quadrat einer sogenannten Abelschen Funktion, d. h., so beschaffen ist, daSS die $2p - 2$ Punkte, für welche $\frac{\partial F}{\partial z}$ unendlich, klein von der ersten Ordnung wird, paarweise zusammenfallen.

In diesem Falle kann man diese $p - 1$ Punkte zu gemeinschaft-




Fig. 8.

liehen Anfangs- und Endpunkten von $p - 1$ Paaren der Linien a und b machen.

Die Fläche, welche die Werte von w repräsentiert, wird dann ein Parallelogramm, dessen Seiten die Bilder des p^{ten} Paares (a, b) sind, und aus welchem $p - 1$ Parallelogramme ausgeschieden sind, in deren jedem die vier Eckpunkte Bilder Eines Punktes sind, in welchem $\frac{\partial F}{\partial z}$ unendlich klein von der zweiten Ordnung wird.

(Für $p = 2$ erhalten Sie ein Parallelogramm, aus welchem ein Parallelogramm ausgeschnitten ist.)

Die Betrachtung dieses Falles ist vorteilhaft für die Untersuchung der Differen-

tialgleichungen, welche bei beliebigem p der bekannten Differentialgleichung

$$\frac{d^2y}{dx^2} + py = 0$$

entsprechen.

Pisa, 27. März 65. B. R.

Anmerkung. Diese Mitteilung fand sich zunächst in einem Entwurf im Akte 26 („Varia“). Einer gütigen Mitteilung von Herrn F. Prym verdanken wir dann den Text des in seinem Besitz befindlichen Originals und die weitere Nachricht, daß dieser Aufsatz als Antwort auf seine mündliche Anfrage von Riemann niedergeschrieben wurde, als diesem das Sprechen schwer fiel. Die Mitteilung enthält auch die Skizze einer Figur, welche jedoch hier aus rein technischen Gründen etwas abgeändert wurde. Zum Gegenstande vgl. Th. A. F. Art. 12. Ferner F. Klein, Vorlesungen über Riemannsche Flächen, I, S. 60–77 mit weiteren Litteraturangaben. W.

G. über Thetafunktionen, welche zu besonderen Riemannschen Flächen gehören.

Im Akt 19 („Abelsche Funktionen VI“), sowie im Akt 25 („Varia“) der Göttinger Papiere finden sich auf einigen Bogen Rechnungen und Andeutungen mit spärlichem Text, welche das im folgenden auseinander- gesetzte Problem behandeln. Es sind dies die Bogen 4', 5', 6' von Nr. 19g, d), von denen 4' das Datum „Göttingen, Oktober 1862“, 5' das Datum „Göttingen, Januar 1865“ trägt. Ferner Bogen 4, 10, 29, 31, 32, 33 von Akt 25. Es sind verschiedene Spezialfälle behandelt, welche jedoch in der Bezeichnung nicht immer deutlich getrennt sind. Auch für die Deutung der SchlusS formeln reicht der Text nicht aus, jedoch lassen sie etwa die Richtung erkennen, nach welcher Riemann vor- zudringen suchte. Der Ansatz Riemanns gibt übrigens auch einen von den Thetafunktionen unabhängigen Existenzbeweis für die Wurzel- funktionen*).

Man denke sich eine Verzweigungsfläche vom Geschlechte p in der Gestalt eines Systems P von p Parallelogrammen, welche durch $2p - 2$ Verzweigungspunkte zu einem Ganzen verbunden sind, gegeben und diese Fläche über a_p hinaus fortgesetzt und λ -mal wieder- holt. Die Seite b_p wird dabei λ -mal so lang und die Seiten a_ν, b_ν ($\nu < p$) vervielfältigen sich λ -mal zu $a_\nu^{(\alpha)}, b_\nu^{(\alpha)}$ ($\alpha = 1, \dots, \lambda$). Man sehe die Figur, zu welcher sich Skizzen auf den erwähnten Blättern finden.

*) Vgl. Anm. (18) zu der in diesen „Nachtragen“ unter I publizierten Vor- lesung.

Das so entstehende System P' von $\lambda(p-1)+1$ Parallelogrammen mit $\lambda(2p-2)$ Verzweigungspunkten ist vom Geschlechte $\lambda(p-1)+1$ und definiert seinerseits eine Klasse algebraischer Funktionen. Diejenige Funktion erster Gattung auf P' , welche am Querschnitt $a_\mu^{(\alpha)}$ den Periodizitätsmodul 1, aber an den übrigen Schnitten a den Periodizitätsmodul 0 hat, sei $w_\mu^{(\alpha)}$. Der Modul von $w_\mu^{(\alpha)}$ am Querschnitt $b_\nu^{(\beta)}$, oder von $w_\nu^{(\beta)}$ an $b_\mu^{(\alpha)}$, sei $a'_{\mu\nu} = c'_{\mu\nu}$. Die Funktion, welche am Querschnitt a_μ den Modul m , an den übrigen Schnitten a den Modul 0 hat, ist $\frac{1}{\lambda}u_\mu$, wenn mit u_μ die Funktion erster Gattung des Systems P bezeichnet wird, welche an a_μ den Modul m , an den übrigen Schnitten a den Modul 0 und am Schnitt b_ν den Modul $a_{\mu\nu}$ hat. Am Querschnitt $b_\nu^{(\beta)}$




Fig. 9.

hat sie den Modul $\frac{1}{\lambda}a_{\mu\nu}$, folglich ist auch dieser Modul von $w_\mu^{(\alpha)}$ an dem Querschnitt $b_\nu^{(\beta)}$ gegeben durch $\frac{1}{\lambda}a_{\mu\nu}$. Der Modul $b'_{\mu\nu}$ von $w_\mu^{(\alpha)}$ an diesem Querschnitt ist $\frac{1}{\lambda} \sum_{\beta=1}^{\lambda} a_{\mu\nu}^{(\alpha\beta)}$.

Da nun das System P' längs $\bar{a}_p$ und $\bar{b}_p$ geschlossen zu denken ist, so bleibt es bei zyklischer Vertauschung der λ Parallelogramme unverändert. Es folgt dann aus der Betrachtung der Periodeneigenschaften ohne weiteres:

$$\sum_{\alpha=1}^{\lambda} a_{\mu\nu}^{(\alpha\beta)} = a_{\mu\nu}.$$

Versteht man unter ε eine primitive Wurzel der Gleichung $\varepsilon^\lambda = 1$ und setzt

$$v_\mu^{(\alpha)} = \sum_{\beta=1}^{\lambda} \varepsilon^{\alpha\beta} w_\mu^{(\beta)},$$

so folgt

$$\sum_{\alpha=0}^{\lambda-1} \varepsilon^{-\alpha\beta} v_\mu^{(\alpha)} = \lambda w_\mu^{(\beta)}.$$

Dabei haben die $dv_\mu^{(\alpha)}$ die Eigenschaft, daSS sie an entsprechenden Stellen des ersten, zweiten etc. Systems P sich verhalten wie ε^α , $\varepsilon^{2\alpha}$, $\varepsilon^{3\alpha}$ etc.

Man erhält die Perioden der $v_\mu^{(\alpha)}$ an den Schnitten $a_\nu^{(\beta)}$ gleich Null, wenn ν von μ verschieden ist und gleich $m\varepsilon^{\alpha\beta}$, wenn $\mu = \nu$ ist. Setzt man ferner

$$b_{\mu\nu}^{(\alpha)} = \sum_{\beta=1}^{\lambda} \varepsilon^{\alpha\beta} a_{\mu\nu}^{(\beta)},$$

so ist die Periode von v_ν am Schnitte $b_\mu^{(\beta)}$ gegeben durch $\frac{1}{\lambda} b_{\mu\nu}^{(\alpha)}$.

Nun folgen verschiedene Ansätze und Rechnungen, welche zeigen, daSS Riemann mit den Perioden der GröSSen $w_\mu^{(\alpha)}$ Thetareihen bildete, welche er mit ϑ bezeichnet, und ebenso aus den Perioden der $v_\mu^{(\alpha)}$ und denen der u_μ . Er untersuchte dann das Verhalten dieser drei Arten von Thetafunktionen, wenn einfache Integrale für die Argumente eingeführt werden und deren Beziehungen zueinander. Doch ist ein bestimmtes Resultat nicht erkennbar.

Auf andern Blättern finden sich Ansätze, in denen zuerst das System P über die Linie a_p hinaus einmal, sodann das ganze so entstandene System über b_p hinaus λ -mal wiederholt wird. Es finden sich Rechnungen, welche darauf hinweisen, daSS Riemann diese Theta durch Heranziehung von den Integralen $\int d \log \vartheta$ und $\int \log \vartheta du$ analogen Integralen auf ihr Verschwinden auf dem System P' untersuchte. Nähere Ausführungen beziehen sich auf $\lambda = 2$, also einmalige Wiederholung der ursprünglichen Fläche. Diese tragen auch das Datum „Göttingen, Oktober 1862“.

Hier bildet er $\vartheta(v_1 - e_1, v_2 - e_2, \dots, v_{p-1} - e_{p-1})$ und sodann die Integrale $\int d \log \vartheta$, $\int \log \vartheta du_\mu$, $\int \log \vartheta dv_\mu$ und erhält so, wenn die Werte von v_μ an den $2p-2$ Stellen, für welche $\frac{\partial \vartheta}{\partial v_\mu} = 0$ ist, mit $\beta_\mu^{(\pi)}$ ($\pi = 1, \dots, 2p-2$, $\mu = 1, \dots, p-1$), entsprechend die von u_μ mit $\alpha_\nu^{(\pi)}$ ($\nu = 1, \dots, p$) bezeichnet werden:

$$\sum_{\pi=1}^{2p-2} \sum_{\mu=1}^{p-1} \beta_\mu^{(\pi)} = \sum_{\pi=1}^{2p-2} \sum_{\nu=1}^p \alpha_\nu^{(\pi)}.$$

Es findet sich noch die Notiz:

$$\begin{cases} \vartheta \text{ gerade: } h_{\mu\nu} \equiv 0 \pmod{2} \text{ vorzusetzen,} \\ \vartheta \text{ ungerade: } h_{\mu\nu} \equiv 1 \pmod{2} \text{ vorzusetzen,} \end{cases} \quad (\text{B})$$

so daSS unverkennbar der Plan vorhanden ist, das Verschwinden von $\vartheta(\beta_1, \dots, \beta_{p-1})$ in Zusammenhang zu bringen mit den Charakteristiken der auf P unverzweigten $\sqrt{\psi}$. Die übrigen Aufzeichnungen konnte ich nicht in bestimmter Weise deuten.

Am Schlusse finden sich die auch sonst wiederkehrenden Formeln

$$1) \quad \frac{\vartheta(u_1, \dots, u_p)}{\vartheta(u_1, \dots, u_{p-1}, w_p)} \text{ unabhängig von den GröSSen } u, \quad (8)$$

$$2) \quad \frac{\vartheta(v_1, \dots, v_{p-1})}{\vartheta(v_1, \dots, v_{p-1}, w_{p-1})} \text{ unabhängig von den GröSSen } v, \quad (9)$$

$$3) \quad \frac{\vartheta(v_1 - e) \cdot \vartheta(v'_1 - e)}{\vartheta(v_2 - e) \cdot \vartheta(v'_2 - e)} \text{ unabhängig von den GröSSen } e, \quad (10)$$

$$4) \quad \frac{\vartheta(v_1 - e) \cdot \vartheta(v'_1 - e)}{\vartheta(v_2 - e) \cdot \vartheta(v'_2 - e)} \text{ unabhängig von den GröSSen } e, \quad (11)$$

$$3^*) \quad \text{wenn } \vartheta(e_1, \dots, e_p) = 0, \quad (12)$$

$$\frac{\vartheta(v_1 - e) \cdot \vartheta(v'_1 - e)}{\vartheta(v_2 - e) \cdot \vartheta(v'_2 - e)} \text{ unabhängig von den GröSSen } e. \quad (13)$$

Hiernach steht es auSS er Zweifel, daSS Riemann ähnliche Untersuchungen, wie sie der Herausgeber im zweiten Teil seines Buches „Untersuchungen über Thetafunktionen“ 1895 angestellt hat, geplant und teilweise durchgeführt hat. Man vergleiche zu den Formeln (A) und (B) die § 40–48 dieser Schrift, wo sich das Ergebnis am Ende von § 48 mit (B) genau deckt.

Die Formeln 1, 2, 3, 4, 3* lassen erkennen, daSS Riemann das Zerfallen der – übrigens wechselnd und nirgends vollständig definierten – Funktion ϑ nach einer Transformation zweiten Grades in bloSS von den v_μ und den u_μ einzeln abhängige Faktoren bereits ins Auge gefaSS t hat.

Anmerkung. Auf Bogen 4', Akt 19g, d) der Riemann-Papiere stimmt die Tinte des Datums (Göttingen, Oktober 1862) nicht mit der des Textes überein, wohl aber mit Tinte des Textes und Datums (Pisa, Januar 1865) von Bogen 5'. Es scheint also, daSS Riemann sich diese Notizen aus Göttingen mitgenommen und in Pisa nachträglich bei der Benutzung datiert hat. Beide Bögen machen einen durchaus zusammengehörigen Eindruck, und stellen sie wohl einen Teil der Untersuchungen über Abelsche Funktionen dar, welche Riemann in Italien auszuarbeiten beabsichtigte. W.

V.

Berichte.

**Bericht über das Heft: „Vorlesungen über die
hypergeometrische Reihe, S.-S. 1859“**

(niedergeschrieben von W. v. Bezold).

Cod. Msc. Riemann 29. Gr. 8. 136 Seiten, in Gabelsberger Stenographie, sogenanntes Pandektenpapier. Die einzelnen Vorlesungen sind nicht äußerlich getrennt und die Trennung nicht mehr festzustellen. Das Heft bezieht sich wahrscheinlich auf die W.-S. 1858/59 gehaltene Vorlesung (vgl. Vorrede dieser „Nachträge“).

S. 1–26 enthält eine ziemlich ausführliche Einleitung über komplexe Größen und Funktionen, Integrale und Integrierbarkeit im allgemeinen, den Cauchyschen Satz und seine Anwendung zu Reihenentwicklungen und Auswertung bestimmter Integrale.

S. 27–35. Die Konvergenz und die gliedweise Integration von Reihen, Potenzreihen, Hinweis auf Briot und Bouquet, *Études des fonctions avec des variables imaginaires*, J. de l'école polytechnique, Cah. 36 (1856).

S. 36–42. Das Unendlichwerden der Funktionen, Definition der Ordnung desselben durch $\oint d \log y$, die algebraischen Funktionen und ihre Verzweigung.

S. 43–60. Allgemeine Sätze über Verzweigung und lineare Substitutionen, das Funktionensystem $P \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha' & \beta' & \gamma' \end{pmatrix} x$. Im wesentlichen der Inhalt des Fragmentes XXI bis etwa S. 385 (363 der 1. Aufl.) der Werke. Eingeschoben ein kurzer Abriss der Determinantentheorie unter Hinweis auf Vandermonde und Cramer.

S. 61. Es werden zunächst nur zwei Verzweigungspunkte angenommen und gezeigt, daß das ganze Funktionensystem P sich dann zusammensetzen läßt aus Funktionen der Form $(x-a)^\alpha (x-b)^{\alpha'} g_\lambda(x)$, wo $g_\lambda(x)$ eine ganze Funktion λ^{ten} Grades von x ist.

S. 61–83. Gibt etwa den Inhalt der Abhandlung über die hypergeometrische Reihe (Werke IV). Eingeschoben sind S. 71, 72 die Haupteigenschaften der Eulerschen Integrale und namentlich der Π -Funktion, insbesondere die Darstellung von $\Pi(s)$ als Schlingenintegral. (Die Formel

$$\frac{1}{\Pi(s)} = \frac{i}{2\pi} \oint (-t)^{-s-1} e^{-t} dt$$

findet sich bereits in einer Vorlesungspräparation von 1855, Akt 19, „Best. Integrale. Funktionentheorie“. Vgl. auch Werke, S. 146 (137 der 1. Aufl.).)

Die in diesen Nachträgen unter III, A mitgeteilten Ausführungen finden sich von S. 75 an.

S. 84–97 enthält die Herleitung des Gaußschen Kettenbruches, insbesondere S. 89–94 die Entwicklungen des Fragmentes, Werke XXIII. (Der Anfang der Untersuchung, einschliesslich des Beginnes der Herleitung der asymptotischen Formel, findet sich bereits auf den letzten Seiten und der Innenseite des Einbandes des Scheringschen Heftes über die Vorlesung W.-S. 1856/57, sodass also diese Entwicklungen spätestens in diese Zeit zu datieren sind. Es sei bei der Gelegenheit bemerkt, dass aus der ganzen Fassung namentlich bei Schering hervorgeht, dass es sich bei der asymptotischen Formel um eine Weiterentwicklung der von Laplace herrührenden Methode zur Gewinnung asymptotischer Ausdrücke handelt. Man vergleiche *Théorie analytique des probabilités*, livre I, 2. partie. Mit diesen Gedanken stehen auch im Zusammenhang die Entwicklungen im §13 der Habilitationsschrift [Werke, S. 260 (246)], welchen man übrigens in dieser Zeit auch bei andern Autoren z. B. Hamilton begegnet.)

Der Abschnitt enthält noch Anwendungen der Kettenbruchentwicklungen auf das Wahrscheinlichkeitsintegral und das Integral $\int e^{-t} t^{s-1} dt$, sowie Bemerkungen über semikonvergente Reihen und den Integrallogarithmus.

S. 97–106 enthält der Hauptsache nach die Anwendung der allgemeinen Theoreme auf die *functiones contiguas* und eine Andeutung, wie die Kettenbrüche zu benutzen seien zur wirklichen Herstellung der Relationen zwischen diesen.

S. 107 gibt die 24 Ausdrücke der P -Funktion durch die hypergeometrische Reihe und die Konvergenzverhältnisse.

S. 108–114 gibt als Beispiel die Anwendung der vorgetragenen Theorie auf die ganzen elliptischen Integrale, die Kugelfunktionen, die Entwicklungskoeffizienten von $(1 - 2r \cos \varphi + r^2)^{-1/2}$ nach $\cos n\varphi$ durch hypergeometrische Reihen.

S. 114–118 reproduziert den Hauptinhalt der Arbeiten Heines, Grelles J. 32, 34.

S. 118–136 ist im vorstehenden unter III, B wiedergegeben. W.

Bericht über die Akten Nr. 19, 25 (mit 18), 26, 4 des Riemannschen Nachlasses.

Die auf der kgl. Universitätsbibliothek zu Göttingen aufbewahrten Nachlaß -
papiere Riemanns, welche zum gröSSeren Teil aus losen Bogen und Blättern be-
stehen, sind von Herrn Weber behufs Herausgabe der Werke zu Konvoluten zu-
sammengefaßt und benutzt worden. Da auf die Aktenhefte, nun bezeichnet als
Nr. 19, 25, 26, 4, in unsern „Nachtragen“ wiederholt Bezug genommen ist, und da
wir vorstehend einige Riemannsche Untersuchungen aus diesen Papieren mitgeteilt
haben, so sei über dieselben hier kurz berichtet, als Ergänzung zu dem bereits in
den „Anmerkungen“ zu den „Vorlesungen“ und „Noten“ angeführten.

Akt Nr. 19.

Dieser Akt zerfällt in 5 Hefte, die mit 19_j–19_g bezeichnet seien.

Heft 19_j: In 4°, „*P*-Funktion“, aus Wintersemester 1856/57. Lose, datierte
Vorbereitungen zur Vorlesung und zur Abhandlung, Werke IV.

Heft 19_g: In 4°, „*P*-Funktion durch bestimmte Integrale“, 12. Februar 1857.
Nur einige lose Blätter.

Heft 19_g: In 4°, „Bestimmte Integrale. Funktionentheorie“. Teilweise datierte
Vorbereitungen zur Vorlesung über Funktionentheorie, Winter 1855/56, den Gang
der Abhandlung über Abelsche Funktionen, Werke VI, bis zum Abelschen Theo-
rem gehend. Ferner Blätter zur Vorlesung über die Theorie der Funktionen einer
komplexen GröSSe, Winter 1866/57, ausmündend in Betrachtung von Funktio-
nen, die einer linearen Differentialgleichung 2. Ordnung genügen, wozu Hefte 19_j,
19_g gehören. Einige Notizen. 7. Nov. 1865: „In der Mathematik muß man solche
Be- griffe, wie Stetigkeit, Unendlichkeit, Ähnlichkeit und Unähnlichkeit immer auf
Gleichheiten und Ungleichheiten zurückzuführen suchen. Nur dadurch können die
Methoden, durch welche man sie der Rechnung (Untersuchung) unterwirft, zur
völligen Klarheit gebracht werden. Es werden die Beweise der Fundamental- sätze
der Infinitesimalrechnung dadurch, daß man zugleich diese Aufgabe zu lösen hat,
etwas umständlicher.“

16. Nov. 1866: „Die Erkenntnis des Umstandes, daß die unendlichen Reihen
und die mehrfachen Integrale in zwei Klassen zerfallen [je nachdem der Grenz-
wert unabhängig von der Anordnung, bzw. von der Art, wie man das Gebiet,
wenn es ins Unendliche geht, wachsen läßt; oder nicht], bildet einen Wendepunkt
in der Auffassung des Unendlichen in der Mathematik.“

28. Febr. 1866, auf Jacobis Bemerkung über die Umkehrung eines Abelschen
Integrals bezüglich: „Vielleicht etwas unvorsichtig, es lasse sich keine mehr als
zweifach periodische Funktion von einer Variablen denken.“

Heft 19_d: In 4°, „Elliptische und Abelsche Funktionen. Funktionentheorie.“ Vorbereitung zur Vorlesung über elliptische Funktionen, von Sommer 1866, an Legendre anknüpfend und bis zur Transformationstheorie und Darstellung durch die Thetafunktionen gehend; sodann Fortsetzung über Abelsche Funktionen, von Sommer 1866. Ferner Manuskriptentwürfe und Abklatsch von Abhandlung VI. Zusatz zum ersten Absatz von XIV. Anfang der Vorlesung von Sommer 1869 über elliptische und Abelsche Funktionen.

Heft 19_b: In 2°, in blauem Umschlag mit Aufschrift „Abelsche Funktionen VI, 19“. Dieses Heft zerfällt wieder in vier einzelne Konvolute:

a) Entwurf zu Abhandlung XI „über das Verschwinden der Thetafunktionen“; der Abhandlung fast wörtlich entsprechend. Mit Briefentwurf an Dedekind, aus Italien 1866. – Einige Seiten aus der algebraischen Theorie von Weierstraß über Integrale erster und zweiter Gattung; sehr wahrscheinlich aus einer Mitteilung von Weierstraß an Riemann^{*)}).

b) 61 lose Bogen und Blätter, mit Bleistift nochmals überschrieben: „Abelsche Funktionen“. Dieses Konvolut enthält hauptsächlich Vorbereitungen und Rechnungen zu der hier herausgegebenen Vorlesung von 1861/62, besonders über $p = 3$, auch 4; beginnend 1868, wo schon die Gleichungen (17)–(20) von Werke XXXI (XXX der 1. Aufl.) auftreten. Dazu zahlreiche zerstreute Notizen anderer Art. (Dies ist das in den Anmerkungen zitierte Konvolut 19_g, b), Bogen 1–61.)

c) Überschrieben: „Abelsche Funktionen. Entwürfe zu der groSS en Abhandlung“. Bleistiftentwürfe zu VI.

d) Überschrieben: „ ϑ -Funktionen“, innen: „Italien. ϑ -Funktionen“. 6 Bogen, teilweise aus der italienischen Zeit (in den Anmerkungen mit 19_g, d). Bogen 1'–6' zitiert). N.

^{*)} Diese Blätter sind Herrn Mittag-Leffler zur Publikation in den *Acta Mathematica* übergeben.

Akt Nr. 25, „Varia“, mit Akt Nr. 18.

Der Akt Nr. 25 enthält 47 lose Bogen und Blätter und eine Reihe besondere Konvolute. Die Blätter gehören mit Akt 19_g, b) zusammen. Einige der Hefte enthalten Notizen aus der Frühzeit, besonders physikalischen Inhalts. Ferner naturphilosophisch-mechanische Rechnungen: Variationsformeln bei sich zeitlich fort-pflanzendem Potential; über Kräfte, die das „Widerstreben eines Raumatoms gegen die Verschmelzung mit einem benachbarten“ messen; wobei es sich um die Zurück-führung von Fernwirkungen auf Aktionen von zwischenliegenden materi-ellen Atomen zu handeln scheint. Ferner einige Bogen mit historisch-litterarischen Anmerkungen über Leibniz' Leben und Schriften. Heftchen über Zahlentheorie, Vorlesungsheft über Elastizität und Elektrizität von 1858, Entwürfe zur Habili-tationsschrift XII und zum Habilitationsgesuch, mit den [Werke, 2. Aufl. S. 547 (1. Aufl. S. 515) be-rührten] drei zur Probevorlesung vorgeschlagenen Themen:

1. Geschichte der Frage über die Darstellbarkeit einer Funktion durch eine tri-gonometrische Reihe.
2. über die Auflösung zweier Gleichungen zweiten Grades mit zwei unbe- kannter GröSSen.
3. über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen.

Akt Nr. 18, „Naturphilosophisches“, gehört eigentlich zu den Heften des Aktes Nr. 25; er enthält auch noch Blätter zu XII der Werke. N.

An einigen Stellen finden sich Rechnungen über das Integral

$$\int \vartheta^{\alpha}(v-a) \cdot \vartheta^{\beta}(v-b) \cdot \vartheta^{\gamma}(v-c) \cdot \vartheta^{\delta}(v-d) dv,$$

wo ϑ die elliptische Thetafunktion bezeichnet, $\alpha+\beta+\gamma+\delta=0$ und die Inte- gration zwischen singulären Stellen zu verstehen ist. Doch ist ein bestimmtes Resultat nicht erkennbar. W.

Akt Nr. 26, „Varia“.

Enthält, auSS er wenigen Rechnungen – so über die Reihe

$$m(h) = \sum e^{ah^2+bh^4+ch^6+dh^8}$$

in der c und d als Funktionen von h angesehen werden –, ein frühes Heft mit einem Aufsatz: „über den Gang des Potentials auf der Achse einer Franklinschen Tafel mit kreisförmigen Belegungen“ und ähnlichem, nach Clausius; ferner ein Heft: „ ϑ -Funktionen, Nobilische Ringe, Attraktion des elliptischen Zylinders. Reziprozitätsgesetz“. Dann den Vorschlag zu einer von der Fakultät zu stellenden hydrodynamischen Preisfrage; Berichtentwürfe bez. der Hannoverschen Gradmessungsarbeiten und Arbeiten in Bezug auf die Gestalt der Erde, an denen sich Riemann theoretisch beteiligen will; und die folgenden Thesenentwürfe zur Doktor-Disputation:

1. Es existieren keine magnetischen Fluida.
2. Faradays „Induction in curved lines“ ist nicht haltbar.
3. Man kann ohne der Allgemeinheit zu schaden die Differentialrechnung der Analysis vorausschicken.
4. Das Reversionspendel ist nicht das geeignetste Mittel um die Pendellängen zu bestimmen.
5. Die Lehre von der Erhaltung der Kraft ist experimentell noch nicht genügend erwiesen.
6. Der Begriff Spannung ist bisher in der Elektrizitätslehre noch nicht mit der gehörigen Scharfe aufgefaSS t worden. N.

Akt Nr. 4: „ P -Funktionen, Svolgimento XXIII. 4.“

Enthält 101 lose Blätter, darunter Entwürfe zu dem Fragment XXIII der Werke von H. Weber, und Korrespondenz, welche sich auf die Herausgabe bezieht. Auf einigen schlecht erhaltenen Blättern finden sich nicht näher zu entziffernde Ansätze und Rechnungen über P -Funktionen mit 4 und 6 Verzweigungspunkten. Auf einem Blatt ist die unter IV, E mitgeteilte Untersuchung skizziert. W.

Persönliches.

In den hier besprochenen Papieren Riemanns finden sich mitten unter Rechnungen auf einigen Blättern Zitate aus der antiken und deutschen Litteratur, welche, da er sie bei der Arbeit vor sich hatte, seinen Stimmungen und Anschauungen besonders entsprochen haben dürfen. Einige darunter sind recht bezeichnend und wir setzen sie darum her.

1. Non hoc praecipuum amicorum munus est, prosequi defunctum ignavo questu, sed quae voluerit meminisse, quae mandaverit consequi. (Tacitus, *Annales* II. 71.)
2. Wo es die Sache leidet, halte ich es immer für besser, nicht mit dem Anfang anzufangen, der immer das Schwerste ist. (Schiller, Briefwechsel mit Goethe vom 5./11. 1796.) (Das Original enthält nach „Schwerste“ noch die Worte „und Leerste“.)
3. Wenn Du Wissenschaft lehrst und sie nicht mit lebender Anmut Vorträgst, gehet der Jüngling, der hört, zu dem lieberem Buche. Schneller lernt er sie dort und besser, weil er sie froh lernt. Aber es kann auch kein Buch den erfreuenden Lehrer verdrängen. Der mit Beredtsamkeit sprechend den horchenden Jüngling begeistert. Er bereitet sich vor, wie, wer gefällt auf dem Schauplatz. Dies hat er oft zwei Stunden gethan, um eine zu lehren. (Klopstock, *Werke*, Epigramm 62.)
4. Sei, wenn neues du wagst, so bestimmt als möglich; doch sei auch Völlig gewiss, man seh's schief und erkläre dich falsch. Denn du begehst ja nur einmal den schrecklichen Fehler der Neuheit, Und kein Leisten ist noch, dem man sie passe, gemacht. (Klopstock, *Werke*, Epigramm 67.)
5. Die Wissenschaft hat dreierlei Thun: Suchen, Binden, Gestalten. Sie denken, sie könnten lorbeerruhn, Wenn sie's mit einem gehalten. (Franz Kugler.)
6. UGPM, tos nd'gfinos oUti-ffio-o, -tfiq»tfiv fi-ffio-o. (Epictet, *Enchiridion* c. 5.)

Das Interesse Riemanns an physiologischer Optik bezeugen zwei von ihm selbst angefertigte Aufnahmen des blinden Fleckes in beiden Augen. W, N.

Verzeichnis der von Riemann angekündigten Vorlesungen.

- W.-S. 1854/55: Die Theorie der Integration der partiellen Differentialgleichungen nebst Anwendung derselben auf verschiedene Probleme der Physik.^(*)
- S.-S. 1855: Bestimmte Integrale. 4 Std. wöch.
- W.-S. 1855/56: Die Funktionen einer veränderlichen komplexen Grösse, insbesondere elliptische und Abelsche.^(*) 3 Std. wöch.
- S.-S. 1856: Die mathematische Theorie der Elastizität fester Körper. 4 Std. wöch., morgens um 7 Uhr.
„Auserlesene physikalische Probleme. 2 Std. wöch., unentgeltlich.
- W.-S. 1856/57: Die Funktionen einer veränderlichen komplexen Grösse, insbesondere hypergeometrische Reihen und verwandte Transcendenten.^(†) Freit. von 12–1 Uhr, Sonnab. von 11–1 Uhr.
- S.-S. 1857: Die Theorie der elliptischen und Abelschen Funktionen. 5 Std. wöch. um 11 Uhr.
- W.-S. 1857/58: Die Theorie der elliptischen und Abelschen Funktionen. 4 Std. wöch. um 8 Uhr.
- S.-S. 1858: Die mathematische Theorie der Elektrizität und des Magnetismus.^(*) 4 Std. wöch. um 9 Uhr.
„Ausgewählte physikalische Probleme. Mittw. um 9 Uhr öffentlich.
- W.-S. 1858/59: über Funktionen einer veränderlichen Grösse, insbesondere über hypergeometrische Reihen und verwandte Transcendenten.^(†) 4 Std. wöch. um 10 Uhr.
„Die höhere Mechanik. 4 Std. wöch. um 9 Uhr.
- S.-S. 1859: Die mathematische Theorie der Schwere, des Magnetismus und der Elektrizität.^(*) Mont., Dienst., Donnerst., Freit. um 9 Uhr.
„über elliptische Funktionen. Mont., Dienst., Donnerst., Freit. um 5 Uhr.
- W.-S. 1859/60: Die mathematische Theorie der Elastizität fester Körper. 4 Std. wöch. um 11 Uhr.
- S.-S. 1860: Die mathematische Theorie der Schwere, der Elektrizität und des Magnetismus.^(*) Mont., Dienst., Mittw. u. Donnerst. um 9 Uhr.
„Die Methode der kleinsten Quadrate. 2 Std. wöch. um 5 Uhr öffentl.
- W.-S. 1860/61: Die Theorie der partiellen Differentialgleichungen mit Anwendung auf physikalische Probleme.^(*) Mont., Dienst., Mittw., Donnerst. u. Freit. um 11 Uhr.
- S.-S. 1861: Die mathematische Theorie der Schwere, der Elektrizität und des Magnetismus.^(*) 5 Std. wöch. um 9 Uhr.
„über Funktionen einer veränderlichen komplexen Grösse, insbesondere elliptische und Abelsche.^(†) 4 Std. wöch. um 10 Uhr.
- W.-S. 1861/62: Fortsetzung der Vorlesungen über die Theorie der Funktionen einer veränderlichen komplexen Grösse.^(†) $3\frac{1}{2}$ Std. wöch. um 11 Uhr, unentgeltlich.

S.-S. 1862:	Die Theorie der partiellen Differentialgleichungen mit Anwendungen auf physikalische Fragen. ^(*) 5 Std. wöch. um 9 Uhr.
W.-S. 1862/63:	Die mathematische Theorie der Schwere, des Magnetismus und der Elektrizität. 6 Std. wöch. um 11 Uhr.
S.-S. 1863:	[wie ad S.-S. 1862].
W.-S. 1863/64:	Ausgewählte Kapitel der mathematischen Physik.

- S.-S. 1864: [wie ad S.-S. 1862].
- W.-S. 1864/65, Ankündigung soll nach Rückkehr von der Reise erfolgen.
- S.-S. 1865, W.-S. 1865/66 (und W.-S. 1866/67):
- S.-S. 1866: Ankündigung wird erfolgen, sobald seine Gesundheit Riemann zu lesen erlaubt.^(*)

Anmerkungen.

- (1) Das Verzeichnis ist aus den „Göttinger Nachrichten“, Jahrg. 1854–1866, gezogen.
- (2) Auf diese Vorlesung bezieht sich K. Hattendorffs Herausgabe: „Partielle Differentialgleichungen und deren Anwendung auf physikalische Fragen. Vorlesungen von Bernh. Riemann,“ Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn, 1869, von der jetzt, statt einer 4. Ausgabe, eine völlige Neugestaltung durch Herrn H. Weber vorliegt. Die Hattendorffsche Nachschrift (vgl. die Vorrede dieses Buches) war die der Vorlesung von W.-S. 1860/61. Das von Riemann herrührende Manuskript der Vorlesung, datiert Michaelis 1864, welches Hattendorff benutzt hat, liegt bei den Göttinger Papieren (vgl. F. Klein in Gott. Nachr. 1897, H. 2, S. 189).
- (3) An diese Vorlesung schließt Riemanns Abhandlung über die Theorie der Abelschen Funktionen (Werke VI) an. Nach einer Bemerkung in der Einleitung zu dieser Abhandlung (Werke, S. 102 der 2., S. 95 der 1. Ausgabe) hat sich die Vorlesung noch auf das Sommersemester 1856 ausgedehnt, obwohl für dieses Semester keine Fortsetzung angekündigt war. Auf diese Vorlesung bezieht sich ferner der erste und grössere

Teil, S. 1–192, des bei den Göttinger Papieren als Akt Nr. 37 liegenden Heftes von E. Schering (vgl. F. Klein in Gott. Nachr., Gesch. Mitteil. 1898, H. 1, S. 18 Anm.). Aus dem ersten Stück des Heftes sei hervorgehoben, daSS die Einleitung Begriff und Bedeutung der komplexen GröSSen eingehend bespricht und daSS einige Ausführungen zum Dirichletschen Prinzip gegeben werden, welche in den ersten Versuchen etwas abweichen von der Ausführung in der Abhandlung; aus dem letzten Stück, neben dem von H. Stahl benutzten Teil über elliptische Funktionen (Sommer 1856), eine eingehende Diskussion der Abbildung der zweiblättrigen Riemannschen Fläche durch ein Integral erster Gattung, sowie für diesen nämlichen Fall die Erledigung der algebraischen Darstellung einfacher Thetaquotienten mit vollständiger Konstantenbestimmung. Diese letzteren Diskussionen scheinen nachträgliche Bearbeitungen Scherings zu sein. Eine kürzere Nachschrift der Vorlesung durch Herrn R. Dedekind erwähnt Herr H. Stahl in dem Vorwort zu seinen „Elliptische Funktionen, Vorlesungen von B. Riemann“, Leipzig, B. G. Teubner 1899.

- (4) An diese Vorlesung schlieSS en IV, XXI und XXIII der Ges. Werke an; ferner II dieser „Nachträge“. Auf sie bezieht sich der zweite Teil des in Anm. (3) angeführten Scheringschen Heftes, von S. 193–276. (Vgl. Vorrede und Anm. zu II dieser „Nachträge“.)
- (5) Zu dieser Vorlesung gehört II, A und II, B dieser „Nachträge“. über die bezügliche v. Bezoldsche Nachschrift, Akt Nr. 29 der Göttinger Papiere, vgl. den besonderen Bericht auf S. 109 und die Vorrede.
- (6) Von dieser 1858–1861 viermal angekündigten Vorlesung existiert eine Bearbeitung durch K. Hattendorff: „Schwere, Elektrizität und Magnetismus. Nach den Vorlesungen von B. Riemann“, Hannover 1876, C. Rümpler, welche, nach der Vorrede dieser Bearbeitung, auf einer Nachschrift der letzten Vorlesung von Sommer 1861 beruht.
- (7) Zu dieser Vorlesung gehört die bei den Göttinger Papieren liegende Nachschrift von K. Hattendorff; einige jetzt nachträglich nach Göttingen abgegebene Bogen beziehen sich auf den Anfang der anschlieSS enden Vorlesung von W.-S. 1861/62. Aus dieser Nachschrift ist das in einer kleineren Anzahl von Exemplaren autographisch vervielfältigte Heft von Herrn F. Prym entstanden, ebenso eine Reihe weiterer noch existierender Vorlesungshefte; das Rochsche Heft (vgl. Ges. Werke, S. 483 (456 der 1. Aufl.)) ist in diesem Teile vielleicht selbständige Nachschrift. Aus dem Hattendorff-Prymschen Hefte, in Verbindung mit dem in (3) angeführten Scheringschen, ist dann das ebenda

angeführte Buch von Herrn H. Stahl (vgl. das Vorwort dieses Buches) hervorgegangen.

- (8) Aus dieser Vorlesung stammen XXX und XXXI (XXIX u. XXX der 1. Aufl.) der Ges. Werke und I der „Nachträge“. Vgl. darüber die Vorrede zu diesen Nachtragen, ebenso über die bezüglichen Nachschriften von Herrn F. Prym und B. Minnigerode, und die Bearbeitung eines Teils derselben durch G. Roch. Diese Vorlesung war zugleich die letzte vollständig gehaltene Vorlesung Riemanns.
- (9) Von den angekündigten Vorlesungen S.-S. 1855 (Bestimmte Integrale), S.-S. 1856 und W.-S. 1859/60 (Elastizität fester Körper), S.-S. 1857 und W.-S. 1857/58 (Elliptische und Abelsche Funktionen), W.-S. 1858/59 (Höhere Mechanik), S.-S. 1859 (Elliptische Funktionen), S.-S. 1860 (Methode der kleinsten Quadrate) liegen bis jetzt keine Nachschriften vor. N.