

# 1. Построение системы форм для тернарной формы четвёртой степени

Sitzungsberichte Физико-медицинского общества в Эрлангене 39 (1907), с. 176–179

(Отрывок из диссертации авторки.)

Систему форм тернарной биквадратичной формы, то есть тернарной формы четвёртой степени, изучали Гордан, Майзано и Паскаль.<sup>1</sup> Гордан строит полную систему форм, состоящую из 54 построений, для специальной автоморфной формы

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1,$$

исходя из принципов, подобных тем, которые он дал для систем форм в бинарной области.

У Майзано для общей биквадратичной формы построены все формы до пятого порядка включительно,<sup>2</sup> а также некоторые инварианты, коварианты и контраварианты более высокого порядка. Он использует метод, применённый Горданом в первом томе *Mathematische Annalen* к тернарной кубической форме. Паскаль, пользуясь результатами Майзано, занимается главным образом вопросом о разложении биквадратичной формы на множители.<sup>3</sup>

**Цель моих исследований состоит в построении системы форм для общей тернарной формы четвёртой степени. Сначала я даю только основные основания и строю так называемую "относительно полную систему".<sup>4</sup>**

Основная идея построения систем тернарных форм та же, что и в бинарной области. Начиная с первой относительно полной системы, то есть с системы форм, перенесённых из бинарного случая, по определённому закону переходят к системам со всё более высоким модулем. Этот процесс продолжается до тех пор, пока система некоторого модуля, если сам модуль взять за основную форму, не станет конечной и известной, либо пока модуль не удастся свести к формам, имеющим инвариант множителем. В первом случае абсолютно полная система получается трансвекцией относительно полной системы с системой модуля; во втором случае относительно полная и абсолютно полная системы совпадают. Благодаря общей теореме Гильберта о конечности систем форм эта процедура необходимо должна завершиться.

В нашем случае модуль  $(abc)$  первой относительно полной системы можно свести к модулям

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{и} \quad \nu = (abu)^4;$$

<sup>1</sup>P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form*  $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$  (Math. Annalen, т. XVII, с. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado* (Giorn. di Battaglini XIX). 2. *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

<sup>2</sup>Под "порядком" здесь понимается степень по коэффициентам, а под "степенью" – степень по переменным.

<sup>3</sup>Во второй короткой заметке Майзано пытается доказать линейную зависимость трёх ковариантов порядка 6 и степени 6. В противоположность этому не вполне полному доказательству Паскаль считает доказанной линейную независимость этих трёх ковариантов порядка 6, а также трёх инвариантов порядка 9. Однако в ходе моих вычислений выяснилось, что линейное соотношение действительно существует как между тремя ковариантами, так и между тремя инвариантами. В обозначениях Паскаля явные формулы имеют вид:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

<sup>4</sup>О термине см. Gordan–Kerschenshteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, т. II, с. 227.

отсюда легко получается относительно полная система по модулю  $\nu$ . В качестве ряда модулей теперь выбираем формы

$$\nu; \quad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \\ \nu^{(s)} = (ss'u)^4 \dots$$

и присоединяем как дальнейшие модули две квадратичные формы, возникающие при построении относительно полной системы по модулю  $s$ , а именно  $u_\sigma^2$  и  $t_x^2$ . Затем можно показать, что модуль, следующий за  $s$ , то есть  $(ss'u)^4$ , сводим к модулю  $(\varrho, t)$ . Но одновременная система двух квадратичных форм конечна и известна; тем самым достигнуто описанное выше завершение. Относительно полная система по модулю  $(\varrho, t)$  даёт 331 построение. —

Добавлю ещё несколько замечаний о применяемом методе.

Основной процесс образования форм, процесс свёртки, в тернарной области можно определить следующим образом.

Если в символическом произведении

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

заменить пары множителей

|                   |           |                   |                                 |                                 |
|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| соответственно на | $s_x t_x$ | $u_\sigma u_\tau$ | $s_x u_\sigma$ или $s_x u_\tau$ | $t_x u_\tau$ или $t_x u_\sigma$ |
| свёртка           | $(stu)$   | $(\sigma\tau x)$  | $s_\sigma$ или $s_\tau$         | $t_\tau$ или $t_\sigma$         |
|                   | I         | II                | III                             | IV                              |

то возникающие формы получены из исходной формы свёрткой.<sup>5</sup>

При этом всегда ещё можно положить  $s_\sigma = 0$  и  $t_\tau = 0$ . Для связи между отдельными свёртками справедлива следующая теорема.

**Свёртки I и II являются основными свёртками. Из них, независимо от порядка композиции, можно составить свёртки III и IV. Другими словами: чтобы построить все формы, возникающие из данного выражения путём свёртки, достаточно применять только свёртки I и II.**<sup>6</sup>

Под "рядом форм" мы понимаем начальную форму вместе со всеми формами, возникающими из неё повторной свёрткой с самой собой. По этой теореме ряд форм

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

можно расположить в прямоугольной схеме. При продвижении в этой схеме получают:

1. на одну колонку вправо — все формы, возникающие из соседних форм посредством свёртки I;
2. на одну строку вниз — все формы, возникающие из стоящих выше форм посредством свёртки II.

Тем самым получают все формы, возникающие посредством свёртки.

При этих предположениях теоремы о редуцентах можно сформулировать в самой общей форме, используя определение

**редуцент — это редуцируемый ряд форм.**

Тогда общая теорема имеет вид:

**Если начальная форма ряда форм редуцируема потому, что один из её членов возник посредством свёртки с редуцентом, и если конечная форма этого ряда возникла из того же самого члена посредством свёртки, то весь ряд форм редуцируем.**

В качестве дальнейших методов редукции следует назвать:

<sup>5</sup>Gordan, Math. Annalen, т. XVII, с. 219.

<sup>6</sup>Теорема имеет исключение в случае, когда  $n$  и  $\mu$ , соответственно  $m$  и  $\nu$ , одновременно обращаются в нуль; тогда ряд форм сводится к диагональному члену.

1. так называемую двойную редукцию, то есть редукцию одной формы двумя способами для получения соотношения между формами более высокого порядка;
2. свёртку с формами, разлагающимися на множители; этот метод отчасти имеет характер редукции при помощи редуцентов, а отчасти характер двойной редукции.

## 2. Построение системы форм для тернарной биквадратичной формы

*Journal für die reine und angewandte Mathematik* 134 (1908), с. 23–90 и две таблицы

### Введение.

Систему форм тернарной биквадратичной формы изучали Гордан, Майзано и Паскаль.<sup>12</sup> Гордан строит полную систему форм, состоящую из 54 построений, для специальной автоморфной формы

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

исходя из принципов, подобных тем, которые он дал для систем форм в бинарной области.

У Майзано для общей биквадратичной формы построены все формы до пятого порядка включительно,<sup>3</sup> а также некоторые инварианты, коварианты и контраварианты более высокого порядка. Он использует метод, применённый Горданом в первом томе *Mathematische Annalen* к тернарной кубической форме. Паскаль, опираясь на результаты Майзано, занимается главным образом вопросом о разложении биквадратичной формы на множители.<sup>4</sup>

*Цель следующих исследований состоит в построении системы форм для общей тернарной биквадратичной формы. В этой работе даны только основные основания и построена так называемая "относительно полная система".*<sup>5</sup>

Работа тесно примыкает к работе Гордана; однако принципы, которые там были даны лишь в самом общем виде, сначала требовалось разработать в деталях. С помощью теоремы о связи между свёртками и через введение "ряда форм" (§ 1) теоремы редукции формулируются точно и дополняются (§ 3), тогда как рекурсивное построение специальных разложений в ряды (§ 2) даёт вычислительное средство для фактического проведения редукций.

Основная идея построения систем тернарных форм та же, что и в бинарной области. Начиная с первой относительно полной системы — системы форм, перенесённых из бинарного случая, — по определённому закону переходят к системам со всё более высоким модулем. Этот процесс продолжается до тех пор, пока система некоторого модуля, если сам модуль взять за основную форму, не станет конечной и известной, либо пока модуль не удастся свести к формам, имеющим инварианты множителями. В первом случае абсолютно полная система получается трансвекцией относительно полной системы с системой модуля; во втором случае относительно полная и абсолютно полная системы совпадают. Благодаря общей теореме Гильберта о конечности систем форм эта процедура необходимо должна завершиться.

<sup>1</sup>Краткий отрывок из введения и главы I появился в *Sitzungsberichte der physikalisch-medizinischen Sozietät Erlangen* 1907, с. 176–179.

<sup>2</sup>P. Gordan, *Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form*

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, т. XVII (1880), с. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado*. (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria*. (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

<sup>3</sup>Под "порядком" здесь понимается степень по коэффициентам, а под "степенью" — степень по переменным.

<sup>4</sup>Во второй короткой заметке Майзано пытается доказать линейную зависимость трёх ковариантов порядка 6 и степени 6. В противоположность этому не вполне завершённому доказательству Паскаль считает, что он доказал линейную независимость этих трёх ковариантов порядка 6, а также трёх инвариантов порядка 9. Однако то, что линейное соотношение действительно существует между тремя ковариантами, с одной стороны, и тремя инвариантами, с другой, показывают формулы (13), § 11, и (22), примечание к § 17, настоящей работы, где эти соотношения даны явно. По сообщению Паскаля, противоречие объясняется численной ошибкой в выражении его контраварианта  $p$  (здесь обозначенного  $\varrho$ ), с. 46 его статьи.

<sup>5</sup>О термине см. § 3а.

В нашем случае модуль  $(abc)$  первой относительно полной системы (§ 4) сводится к модулям

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{и} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), а затем находится относительно полная система по модулю  $\nu$  (§ 6). Эти результаты уже приведены в работе Гордана для общей биквадратичной формы; однако наш способ их вывода легче переносится на формы более высокой степени.

В качестве ряда модулей теперь выбираем формы (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

При построении относительно полной системы по модулю  $s$  две квадратичные формы, возникающие в системе,  $u_\varrho^2$  и  $t_x^2$ , присоединяются как модули (§§ 9 и 10), и соответственно строится относительно полная система по модулю  $(s, \varrho, t)$ . Затем показано (§ 17), что модуль  $(ss'u)^4$  сводится к модулям  $\varrho$  и  $t$ . Благодаря этому следующая более высокая система переходит в относительно полную систему по модулю  $(\varrho, t)$ . Но одновременная система двух квадратичных форм конечна и известна, а в общем случае состоит из 20 построений;<sup>6</sup> тем самым с построением относительно полной системы по модулю  $(\varrho, t)$  достигнуто описанное выше завершение. Трансвекция этой системы с системой  $(\varrho, t)$  для построения абсолютно полной системы остаётся на будущее.

В качестве относительно полной системы по модулю  $(\varrho, t)$  найдено 331 построение; в приложенной таблице они упорядочены по степени в переменных  $x$  и  $u$ .

В заключение дадим обзор введённых символов:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

<sup>6</sup>Ср. Clebsch–Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie* (т. I, с. 288 и далее), система двух когреддиентных форм. Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten* (*Math. Ann.*, т. XIX, с. 530), система двух контрагреддиентных форм.

# Глава I. Общие теоремы о тернарных формах.

## § 1. Процесс свёртки. Ряды форм.

Основным процессом образования форм является процесс свёртки, который в тернарной области можно определить следующим образом. Пусть дано символическое произведение

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Если пары множителей

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ или } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ или } t_x u_\sigma$$

заменить соответственно на

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ или } s_\tau \quad t_\tau \text{ или } t_\sigma,$$

то есть на свёртки

$$\text{I} \quad \text{II} \quad \text{III} \quad \text{IV},$$

то возникающие формы получены из исходной формы посредством свёртки.<sup>1</sup>

При этом выражение  $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$  можно рассматривать либо как настоящее произведение двух форм  $S \cdot T$ , либо как единственную форму с несколькими рядами символов:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

В первом случае мы говорим о свёртке формы  $S$  с формой  $T$ , во втором – о «свёртке формы  $A$  с самой собой». Для краткости в дальнейшем всегда предполагаем (что действительно имеет место для всех форм, рассматриваемых ниже), что

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\chi = 0 \quad (\text{a})$$

для любых  $\lambda$  и  $\chi$ , отличных от нуля, и вместе с любыми другими свёртками. Это означает, что форма  $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$  является так называемой «нормальной формой», то есть при применении  $\Omega$ -процесса она обращается в нуль как по переменным  $x$  и  $u$ , так и по переменным  $y$  и  $v$ .

Следовательно, условие (a) не является ограничением; его всегда можно добиться.<sup>2</sup>

Для связи между отдельными свёртками справедлива следующая теорема:

*Теорема I. Свёртки I и II являются основными свёртками; из них, независимо от порядка композиции, можно составить свёртки III и IV. Другими словами: чтобы построить все формы, возникающие из данного выражения посредством свёртки, надо применять только свёртки I и II.*

Доказательство. По теореме тождества, соответственно по теореме произведения для матриц, с учётом (a) получаем

$$\begin{aligned} (\widehat{st}\sigma x) &= -t_\sigma, & (\widehat{\sigma\tau}su) &= -s_\tau, \\ (\widehat{st}\tau x) &= s_\tau, & (\widehat{\sigma\tau}tu) &= t_\sigma, \\ (stu)(\sigma\tau x) &= s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma. \end{aligned}$$

Следовательно, посредством композиции свёрток I и II возникают свёртки III и IV; это происходит как при применении свёртки II к свёртке I, то есть к множителям  $(stu)u_\sigma u_\tau$ , так и при применении свёртки I к свёртке II, то есть к множителям  $(\sigma\tau x)s_x t_x$ .

Под *рядом форм*<sup>3</sup> мы понимаем начальную форму вместе со всеми формами, возникшими из неё посредством свёртки с самой собой, и обозначаем ряд форм его начальной формой. «Более высокой формой» здесь считается всякая форма с большим числом свёрток с самой собой; при этом

<sup>1</sup>Gordan, *Math. Annalen*, т. XVII, с. 219.

<sup>2</sup>Ср. Gordan, *Math. Annalen*, т. V, с. 104.

<sup>3</sup>Ср. Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss., т. XVII): § 17 и конец § 18. «Ряд форм» отличается от введённой там «собственно редуцированной эквивалентной системы» принципом упорядочения по более высоким формам.

среди равноправных свёрток  $s_\tau$  и  $t_\sigma$  одну необходимо нормировать как более высокую. Из закона построения ряда форм следует:

- 1) Каждая форма ряда линейна по символам начальной формы.
- 2) Ряд форм однозначно определён для начальных форм, каждая из которых имеет два ряда контрагredientных символов; для начальных форм с большим числом рядов символов его надо однозначно нормировать, выделяя специальные свёртки среди тех, которые связаны теоремой тождества.

По теореме I ряд форм  $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$  ( $m > n$ ;  $\mu > \nu$ ) можно расположить по следующей прямоугольной схеме:

$$\begin{array}{c|c|c|c}
 s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\
 (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\
 (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\
 (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\
 \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots
 \end{array}$$

и соответственно продолженную нижнюю часть<sup>4</sup>

$$\begin{array}{c|c|c}
 (stu)^n & \dots & \dots \\
 t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\
 t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n.
 \end{array}$$

Здесь получают, если двигаться

- 1) на одну колонку вправо, все формы, возникающие из соседних форм посредством свёртки I;
  - 2) на одну строку вниз, все формы, возникающие из стоящих выше форм посредством свёртки II;
- а следовательно, все формы, возникающие посредством свёртки.

Произвольная форма полного ряда форм,  $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$  или  $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ , образует начало нового ряда форм. Он состоит из всех тех форм прямоугольной схемы, которые имеют форму  $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$  или  $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$  в качестве левого верхнего угла и имеют множитель  $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$ .

Дополнительное замечание. Теорема I имеет исключение в случае, когда числа  $n$  и  $\mu$  (соответственно  $m$  и  $\nu$ ) равны нулю, так что свёртки I, II и IV больше не существуют, но свёртка III (соответственно IV) ещё существует. В этом случае рядом форм мы называем диагональный член схемы:

$$\begin{array}{cc}
 s_x^m u_\tau^\nu & t_x^n u_\sigma^\mu \\
 & s_\tau \quad t_\sigma \\
 & s_\tau^2 \quad t_\sigma^2 \\
 & \ddots \\
 & s_\tau^\nu \quad t_\sigma^\mu.
 \end{array}$$

В соответствии с отсутствием свёрток I и II разложение в ряд по полярам ряда форм в этом случае всегда сводится к начальному члену; однако теоремы о редуцентах остаются в силе.

<sup>4</sup>Здесь, и подобным образом далее, нижнюю часть, отмеченную звёздочкой, следует присоединять к так же отмеченному месту справа вверху схемы.

## § 2. Разложения в ряд по полярам ряда форм.

Для форм с  $n$  переменными явно построены два вида разложений в ряд<sup>1</sup>:

1) для форм, каждая из которых имеет один ряд контрагredientных переменных,  $s_x^m u_\tau^\nu$ , – ряд, идущий по степеням  $u_x$ , коэффициенты которого являются «нормальными формами»;

2) для форм с двумя рядами когredientных переменных  $s_x^m t_x^n$  – разложение по полярам элементарных ковариантов (полярам ряда форм  $s_x^m t_x^n$ ), которое в тернарном случае имеет следующий вид<sup>2</sup>:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

Мы объединяем оба разложения, строя для форм, каждая из которых имеет два ряда контрагredientных переменных,

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

разложения по степеням  $u_x$ , коэффициентами которых являются составные поляры ряда форм  $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ , взятые по переменным  $x$  и  $u$ .

Достаточно построить ряд для двух контрагredientных рядов символов (соответственно переменных), так как, объединяя каждые два ряда символов (переменных) в один новый ряд, формы с большим числом рядов символов (переменных) можно свести к этому случаю.

Чтобы добиться того, что все формы ряда форм содержат только по два ряда символов или переменных, специализируем:

$$\begin{aligned} \text{a) } \sigma &= \widehat{st}, & \text{a') } y &= \widehat{uv}, \\ \text{b) } s &= \widehat{\sigma\tau}, & \text{b') } v &= \widehat{xy}, \end{aligned}$$

и выполняем разложение для специализации а), а').

Прямым переносом разложения I получаются составные поляры для форм  $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ , тогда как для форм  $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$  вместо составных поляр возникают члены такого типа, вычисление которых требует введения всё новых вспомогательных переменных, приравняваемых лишь в конце; из-за этого вычисление излишне усложняется.

Поэтому мы выбираем косвенный путь: представляем составные поляры всех форм ряда форм, то есть выражения

$$[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

через начальные члены этих поляр и, обращая возникающую рекурсивную систему уравнений, получаем требуемое разложение по полярам.

По принципу переноса для  $\lambda$ -й поляры формы  $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$  ( $\lambda \leq n$ ) справедливо следующее разложение (случай  $\lambda > n$  сводится к первому посредством разложения  $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}^3$ ):

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

и соответственно для  $\kappa$ -й поляры формы  $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_{\varrho} (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

<sup>1</sup>Ср. Gordan, *Über Combinanten*, § 2 и 5 (*Math. Ann.*, т. V).

<sup>2</sup>Ср. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. В отличие от приведённого там вывода, наш даёт метод быстрого вычислительного определения числовых коэффициентов  $C_{pr\varrho}$ . Разложение Клебша–Штуди при специализации а), а') имело бы вид:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{xw})},$$

и поэтому не допускает упрощения, которое в нашем разложении возникает уже в ходе вычисления, если известно, что все члены с множителем  $u_x$  следует опустить.

<sup>3</sup>Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (Kap. I, § 5). *Rend. Circ. Mat. di Palermo* XXII. 1906.



Умножением, с введением специализации а) и а'), получаем

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}}^{v^\kappa} = \sum_{r, \varrho} c_{r\varrho} (\widehat{stu})^r (\widehat{stuv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

а отсюда, разлагая по степеням  $u_x$  с выделением первого члена ( $\sum'_{r, \varrho}$  означает, что член  $r = 0, \varrho = 0$  следует опустить) и учитывая (а) на с. 26,

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{\widehat{uv}}^{v^\kappa} \\ &= \sum'_{r, \varrho} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \quad (\text{II})$$

где

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{для } \lambda \leq n, \\ \kappa \leq \nu. \end{array}$$

и соответственно для остальных сочетаний чисел

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

Следовательно, выражение

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

сведено к составной поляре и, с применением тождества

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

к сумме аналогично построенных выражений, соответствующих более высоким формам ряда форм.

Итерацией приходим к разложению:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p, r, \varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\kappa-\varrho+p}, v_x^{r-p}}. \quad (\text{III})$$

Числовые коэффициенты  $C_{pr\varrho}$  однозначно и рекурсивно вычисляются из коэффициентов  $c_{r\varrho}$ ,  $c'_{r\varrho}$  системы уравнений, возникающей при итерации (II.) (см. пример на с. 42). Аналогичные разложения получаются при остальных специализациях.

### § 3. Редукционные теоремы.

Известные теоремы о редукции форм и систем форм теперь надо связать с параграфами 1 и 2; для этого нужны некоторые определения, заимствованные из теории бинарных форм.

а) *Относительно полной системой* по модулю заданного ряда форм мы называем систему форм со следующим свойством: все образования, возникающие при свёртке произвольного произведения этих форм, можно выразить как целые рациональные функции форм системы, с точностью до добавочного члена из выражений, возникших при свёртке системных форм с системой модуля<sup>1</sup>.

б) Форму будем называть *редуцируемой*, если она выражается через формы, имеющие инварианты множителями, или через «более высокие формы»; то есть через более высокие формы полного ряда форм, которому она принадлежит, либо через формы, содержащие символы модуля в более высоком порядке.

Теоремы о редуцентах<sup>2</sup> в наиболее общей форме можно сформулировать так:

Определение: *Редуцент есть редуцируемый ряд форм.*

*Теорема II. Пусть начальная форма ряда форм редуцируема потому, что один из её членов возник при свёртке с редуцентом (то есть имеет редуцент множителем), и пусть конечная форма этого ряда форм возникла из того же самого члена при свёртке. Тогда весь ряд форм редуцируем<sup>3</sup>.*

Доказательство: ряд форм возникает из начального члена при свёртке с самим собой, то есть, с одной стороны, при более высоких свёртках с редуцентом, а с другой – при свёртке редуцента с самим собой. В обоих случаях, по § 2, все формы ряда форм можно представить как поляры (перекрывания) над рядом форм редуцента.

Переход от начальной формы ко всему ряду форм больше не действует для остальных методов редукции. Это следующие методы:

1) так называемая «двойная редукция».

Под этим мы понимаем редукцию выражения, имеющего множителями два независимых друг от друга редуцента, двумя способами; вследствие этого возникают соотношения между более высокими формами, к которым выражение было сведено.

Систематическим применением «двойной редукции», с одной стороны, надо получить все соотношения<sup>4</sup>; с другой стороны, если «двойная редукция», применённая к различным выражениям, не даёт новых соотношений, мы имеем одновременно критерий независимости более высоких форм и контроль вычисления.

2) *Свёртка с распадающимися формами.*

Под «распадающимися формами», с небольшим обобщением обычного понятия, будем понимать формы, которые выражаются через произведения форм меньшей степени и через «более высокие» формы. Произведения форм при однократной свёртке переходят в произведения; так же и произведения нелинейных форм при двукратной свёртке в специализациях а') и б') (§ 2), по теореме произведения:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (a b \widehat{y x})^2.$$

Следовательно, первые поляры (перекрывания) и некоторые вторые поляры распадающихся форм снова являются распадающимися формами. Отсюда следует:

<sup>1</sup>Gordan–Kerscheneister, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, т. II, с. 227.

<sup>2</sup>Gordan, *Math. Annalen*, т. XVII, с. 222.

<sup>3</sup>Упрощение, которое даёт теорема II, можно видеть на следующем примере. Для специальной формы  $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$  выражение  $a_y^2 a_x^2 u_y^2$  является редуцентом. Отсюда по теореме II следует редукция ряда форм

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x) \theta_x^3 u_\nu^2 = a_\nu^2 (a b u) - a_\nu b_\nu (a b a),$$

так как  $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (a b u)^2$  возникла из члена  $a_\nu^2 (a b u)$  при свёртке. У Гордана, там же, с. 231, напротив, редукция форм

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$$

проводится по отдельности.

<sup>4</sup>Так, например, с помощью «двойной редукции» были найдены: редукция формы  $a_\eta^4$  (§ 10), единственной формы, которую Maisano излишне включил в систему; затем – упомянутые в примечании к введению соотношения между 3 ковариантами и 3 инвариантами.

Член однократного (соответственно двукратного) перекрывания над распадающейся формой, возникший при однократной (соответственно двукратной) свёртке с такой формой, сам становится распадающейся формой:

а) если следующие более высокие формы в ряду форм распадающейся формы распадаются или становятся редуцируемыми, либо если при однократной свёртке наступают специализации  $y = \widehat{uv}$  или  $v = \widehat{xy}$ ;

б) если остальные однократные свёртки приводят к более высоким формам (ср. § 12, В.  $H_k$  и  $H_k(k\eta x)$ ).

Такой член перекрывания также может распасться:

с) если остальные однократные свёртки приводят к более низким формам, которые, независимо от свёртки с распадающейся формой, сами распадаются, то есть выражаются через произведения и через редуцируемую форму. При этом каждый раз надо сначала вычислением убедиться, что числовой коэффициент соответствующего члена не исчезает тождественно. Это не что иное, как «двойная редукция» низшей формы (ср. § 23, С.  $H_q(\theta Hu)(\theta su)$ ).

Распадающиеся формы возникают при всех однократных свёртках с функциональными детерминантами<sup>5</sup>, а кроме того – при некоторых более высоких свёртках. Имеем

$$\begin{aligned}(sty\widehat{x})s_y &= \frac{1}{2}t s_y^2 - \frac{1}{2}s t_y^2 + \frac{1}{2}(sty\widehat{x})^2, \\ (sty\widehat{x})^2 s_y^2 &= \frac{1}{3}t s_y^3 - \frac{1}{3}s t_y^3 + s_y(sty\widehat{x})^2 - \frac{1}{3}(sty\widehat{x})^3.\end{aligned}$$

Аналогичные формулы справедливы для дуалистических форм

$$(\sigma\tau\widehat{v}u)v_\sigma \quad \text{и} \quad (\sigma\tau\widehat{v}u)v_\sigma^2.$$

Из теорем этого параграфа для построения всех нередуцируемых форм, возникающих из свёртки  $S$  с  $T$ , получается следующее правило:

Начиная с самых низких свёрток, надо продвигаться в построении ряда форм  $ST$  по любому заранее зафиксированному пути (например, построено или симметрично к диагональному члену), пока не дойдём до формы, имеющей редукцент множителем. Ряд форм, определённый этой формой, следует опустить, как только конечная форма удовлетворяет условию, установленному в теореме II. После исключения всех редуцируемых рядов форм нужно, применяя двойную редукцию, удалить все остальные редуцируемые формы, а также все распадающиеся формы. Места полного ряда форм, дважды покрытые независимыми друг от друга редуцируемыми рядами форм, дают повод к редукции более высоких форм (ср. § 11, D).

<sup>5</sup>Ср. Gordan, там же, § 3.

**Теорема III.** *Формы, заимствованные из бинарной области, то есть те формы, которые возникают из системных форм соответствующей бинарной формы по принципу переноса Клебша путём окаймления, образуют относительно полную систему по модулю  $(abc)$ .*

**Доказательство:** Бинарному соотношению, утверждающему, что формы  $Q'_1, \dots, Q'_n$  образуют полную систему бинарной основной формы:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\} \varphi_{\lambda}^*$$

путём окаймления соответствует тернарное соотношение:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}.$$

Но это и есть определяющее равенство для относительно полной системы по модулю  $(abc)$ . Для биквадратичной формы система заимствованных форм состоит из следующих форм:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

среди которых первые четыре образуют относительно полную систему по модулю  $((abc), \nu)$ .

## § 5. Сведение модуля $(abc)$ к модулям $\mathfrak{A}$ и $\nu$ .

Модуль  $(abc)$ , заданный лишь одним скобочным множителем, в соответствии с определением (§ 3, а) надо свести к формам системы. Иными словами: ряд форм  $(abc)$  надо однозначно нормировать (ср. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\mathfrak{A}u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\mathfrak{A}u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Ряд модулей:  $(abc); \mathfrak{A}; s; t$  (система модуля  $t$  состоит из единственной формы  $t$ ).<sup>1</sup>

Окажется, что форм

$$\mathfrak{A} = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

как модуля достаточно, то есть что формы

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_\nu &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_\nu^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_\nu^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

задают ряд форм  $(abc)$ . В ряду форм  $a_\nu$  форма  $a_\nu^3$  отсутствует в силу тождества

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Чтобы свести модуль к более высокому, по определению надо свести самые общие свёртки или все специальные рассматриваемые свёртки с этим модулем к свёрткам с более высоким модулем.

В нашем случае самые общие свёртки возникают из выражений

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

(заимствованных из кубических форм),

$$(abc) a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(заимствованного из квадратичных форм) и путём поляризации этих выражений.

Чтобы вычислить эти выражения через поляры  $\mathfrak{A}$  и ряда форм  $a_\nu$ , соответственно через их начальные члены, мы, как и в § 2, выбираем косвенный путь. Разлагаем полярные члены

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x) a_x a_y a_z \quad \text{и т. д.}$$

как линейные комбинации выражений с символическим множителем  $(abc)$  и, обращая систему уравнений, получаем искомые соотношения, а также соотношение между полярами, взятыми по различным комбинациям переменных. Для вычисления служат теорема тождества и теорема произведения для детерминантов.

<sup>1</sup>Gordan–Kerschensteiner, там же, с. 134.

Система уравнений для  $(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$  имеет вид:

$$\begin{aligned}
1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y^*, \\
2) \quad & 3(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y \\
& - 4 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x, \\
3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z = 2 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x, \\
4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6}i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_xa_ya_zb_y^2b_zc_z^2c_x.
\end{aligned}$$

Отсюда для

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3,$$

и аналогичным вычислением для

$$(abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x, \quad (abc)a_xb_yc_z a_z^2b_x^2c_x^2$$

получаем:

$$\begin{aligned}
(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 &= \frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z \\
&- \frac{1}{12}i \cdot (xyz)^3, \\
(IV.) \quad (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_zb_xc_x &= \frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2c_x \cdot (xyz) \\
&+ \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz), \\
(abc)a_xb_yc_z a_z^2b_x^2c_x^2 &= \frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_z^2c_z^2 \cdot (xyz).
\end{aligned}$$

Тем самым мы получили относительно полную систему по модулю  $(\mathfrak{A}, \nu)$ , состоящую из четырёх форм:  $f, \theta, K, j$ . Отсюда следует: все перекрывания  $f$  над  $\theta$ , не заимствованные из бинарной области, так же как перекрывание  $(a\theta u)^2$ , редуцируемое в бинарной области к  $(ab)^4$ , выражаются через символы  $\mathfrak{A}$  и  $\nu$ .<sup>2</sup>

Основные для дальнейшего редукционные формулы мы получаем специализацией разложения IV или, короче, прямым вычислением (перестановкой символов) для  $a_\vartheta(a\theta u)^2$ ,  $a_\vartheta^2(a\theta u)^2$ ,  $(a\theta u)^2$  по следующим исходным формулам:

$$\begin{aligned}
a_\vartheta(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\
a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2,
\end{aligned}$$

для  $((a\theta u)^2)^*$ :

$$\begin{aligned}
(abu)a_y^3b_x^3 &= \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\
((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3.
\end{aligned}$$

---

<sup>2</sup> $\sum_3$  относится к сумме трёх членов, возникающих из начального члена при циклической перестановке переменных. Уравнения справедливы также отдельно для каждого члена суммы.

$$\left. \begin{aligned} (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x \cdot \mathfrak{A}, \\ a_\vartheta(a\theta u) &= 0, \\ a_\vartheta^2 &= \mathfrak{A}, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

К этому добавим формулу, также возникшую из редукции модуля  $(abc)$ :

$$a_\nu^3 a_x u_\nu = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

Из формул (1.) и (2.) и из аналогично построенных формул для основной формы  $\nu$  посредством поляризации выводятся все последующие редукционные формулы, за исключением соотношений для распадающихся форм. Из формул (1.) видим:

Ряд форм приводит:

$$\begin{aligned} a_\vartheta(a\theta u)^2 &\text{ к одним символам } \nu, \\ a_\vartheta &\text{ к символам } \mathfrak{A} \text{ и } \nu, \\ (a\theta u)^2 &\text{ к символам } j, \mathfrak{A} \text{ и } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ при свёртке I} &\text{ к символам } j \text{ и } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ при свёртке II} &\text{ к символам } \mathfrak{A} \text{ и } \nu. \end{aligned}$$

Итак, можно заменять:

1. по модулю  $(\mathfrak{A}, \nu)$ : свёртки с  $j$  соответствующими свёртками с  $(a\theta u)^2$  или  $(a\theta u)^3$ ;
2. по модулю  $(\nu)$ : свёртки с  $\mathfrak{A}$  соответствующими свёртками с  $a_\vartheta$  или  $a_\vartheta(a\theta u)$ , а также специальными свёртками с  $(a\theta u)^2$  (которые ведут только к однократной свёртке I).

В частности:

$$\begin{aligned} (a\theta u)^2 \theta_y^2 \theta_x^2 &= \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)^2 u_y \theta_y &= -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 \nu_y^2 &= \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)(a\theta \nu)u_\vartheta \nu_\vartheta &= -\frac{1}{6}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 u_\nu^2 \vartheta_\nu^2 &= \frac{1}{3}(\mathfrak{A}u\nu)^2 \mathfrak{A}_\nu \pmod{\nu}. \end{aligned}$$

## § 6. Сведение модуля $(\mathfrak{A}, \nu)$ к модулю $(\nu)$ .

Редукционные формулы предыдущего параграфа дают нам средство прямо построить относительно полную систему по модулю  $\nu$ ; мы увидим, что к системе заимствованных форм нужно добавить только формы  $\mathfrak{A}$  и  $(a\mathfrak{A}u) = N$  (аналогично кубической форме и вообще как общее правило).

Для редукции модуля  $\mathfrak{A}$  рассмотрим все специальные свёртки, которые здесь нужно учитывать, то есть свёртки относительно полной системы по модулю  $(\mathfrak{A}, \nu)$  с системой  $\mathfrak{A}$ , и начнём с форм, самых низких по коэффициентам, а именно со свёрток  $f$  с  $\mathfrak{A}$ .

Чтобы редуцировать формы  $(a\mathfrak{A}u)^2$ ,  $(a\mathfrak{A}u)^3$ ,  $(a\mathfrak{A}u)^4$ , по § 5 заменяем символы  $\mathfrak{A}$  более низкими формами ряда форм, то есть раскладываем выражения

$$a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3$$

- 1) по полярам ряда форм  $a_{\vartheta}$  (символы  $\mathfrak{A}$  и  $\nu$ ),
  - 2) по полярам ряда форм  $b_{\vartheta}(b\theta u)^2$  (символы  $\nu$ )
- и получаем редукционные формулы (вычисление см. ниже):

$$\begin{aligned} \text{a) } (a\mathfrak{A}u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_{\nu}^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{б) } (a\mathfrak{A}u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_{\nu}(\vartheta\nu x), \\ \text{с) } (a\mathfrak{A}u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \tag{3}$$

(К тем же результатам приводит также двойная редукция выражений  $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2$ ,  $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^3$ ,  $a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2)$  и  $a_{\vartheta}^2((a\theta u)(b\theta u))^3$  после исключения  $a_{\vartheta}^2$ .)

Из формул (3.) следует, что  $(a\mathfrak{A}u)^2$  является редуцентом относительно модуля  $\nu$ . Отсюда получаем:

1) Редукция системы  $\mathfrak{A}$ : ряд форм  $(\mathfrak{A}\mathfrak{A}'u)^2 = a_{\vartheta}^2((a\mathfrak{A}u)^2)$  имеет редуцент  $(a\mathfrak{A}u)^2$  множителем.

2) Редукция системы, возникшей свёрткой с модулем  $\mathfrak{A}$ :

ряд форм  $(\theta\mathfrak{A}u)^2$  имеет редуцент  $(a\mathfrak{A}u)^2$  множителем.

Для форм  $(\theta\mathfrak{A}u)$  и  $\mathfrak{A}_{\vartheta}$  получаем:

$$(a\mathfrak{A}u)^2(abu) = (\theta\mathfrak{A}u) - u_x \cdot \mathfrak{A}_{\vartheta}(\theta\mathfrak{A}u),$$

$$(a\mathfrak{A}u)(a\mathfrak{A}b) = -\frac{1}{2}\mathfrak{A}_{\vartheta} + \frac{1}{2}u_x \cdot \mathfrak{A}_{\vartheta}^2.$$

Из редуцента  $(\theta\mathfrak{A}u)$  следует редукция системы, возникающей при свёртке с модулем  $\mathfrak{A}$ .

Итак, относительно полная система по модулю  $\nu$  состоит из шести форм:

$$f, \theta, K, j, \mathfrak{A}, N.$$

В качестве примера разложения в ряд из § 2 подробно выведем формулу (3.)а; в дальнейших вычислениях будем сразу записывать конечную формулу  $\Pi$ . (Поляры исчезающих форм уже опущены в ходе вычисления; первая строка даёт значения, подставленные по разложению  $\Pi$ , вторая строка – конечные значения, найденные рекурсивно, начиная с последнего уравнения системы.) По разложению  $\Pi$  следует:

$$\begin{aligned} 1) \quad m &= 3, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = 0, \quad \nu = \chi = 1, \\ a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta b)(b\theta u)\} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
& -\frac{1}{7}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - 2u_xa_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} + u_x^2a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\
& = \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 \\
& \quad - \frac{1}{15}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\
2) \quad & m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 1, \\
a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u) & = \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - u_xa_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta}\} + \frac{1}{2}a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 \\
& \quad - \frac{1}{5}\{a_{\vartheta}^2(b\theta u)(a\theta u) - u_xa_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u)\} \\
& = \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f \\
& \quad - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\
3) \quad & m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2, \\
a_{\vartheta}(a\theta b)b_{\vartheta}(b\theta u) & = \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta b)(a\theta u)b_{\vartheta} - u_xa_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\
& = \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\
4) \quad & m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = \chi = 1, \\
a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} & = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) \\
& = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b; \\
5) \quad & m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2, \\
a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} & = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) \\
& = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\
6) \quad & m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 3, \\
a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta} & = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3; \\
7) \quad & m = 2, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = \nu = \chi = 0, \quad (\text{по разложению I}), \\
a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 & = [a_{\vartheta}^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2\}; \\
8) \quad & m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 0, \quad (\text{разложение I}), \\
a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) & = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b; \\
9) \quad & m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = \chi = 1, \quad \nu = 0, \quad (\text{разложение I}), \\
a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) & = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2.
\end{aligned}$$

Из 1) и 4) следует:

$$\begin{aligned}
(a\Delta u)^2 & = \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b \\
& \quad - \frac{3}{10}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2, \\
(a\Delta u)^2 & = -a_{\nu}b_{\nu} + \frac{3}{5}fa_{\nu}^2 + \frac{4}{5}u_xa_{\nu}^2b_{\nu} - \frac{3}{20}u_x^2a_{\nu}^2b_{\nu}^2 - \frac{1}{12}u_x^2if.
\end{aligned}$$

(О пересчёте в символы  $\theta$  см. § 8 и § 9.) Формулу (3.)а можно было бы вычислить ещё короче прямым переносом разложения I с введением вспомогательных переменных  $w = x\hat{u}b$ , тогда как уже для формул (3.)б и (3.)с выбранный нами путь становится проще; для (3.)б заранее известно, по § 9,

что все члены с множителем  $u_x$  надо опустить. Для вычисления (3.)b и (3.)с получаем:

$$\begin{aligned}
(3.)b) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}, \\
2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}; \\
(3.)с) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\
&\quad - \frac{6}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2, \\
2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 &= \frac{3}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.
\end{aligned}$$

Примечание. Аналогично вычисляются редуцируемые по § 5 перекрывания  $f$  над  $j$ . Получаем

$$\begin{aligned}
g_{\nu} &= -\theta_{\nu} + u_x \left( \frac{9}{2}\theta_{\nu}^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\
g_{\nu}^2 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\
g_{\nu}^3 &= -\frac{7}{10}\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_{\nu}^4 = \frac{3}{5}\theta.
\end{aligned} \tag{4}$$

$$g_{\nu}^3 = -\frac{7}{10}\theta_{\nu}^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_{\nu}^4 = \frac{3}{5}\theta. \tag{4}$$

Из (3.) и (4.) следует, переносом из бинарной области,

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \pmod{\nu}.^1$$

Остальные формы ряда форм  $(\theta\theta'u)^2$  и форма  $\theta'_{\nu}$  редуцируемы к символам  $\nu$ . Значит, можно заменять:

$$\text{mod } \nu : \quad \text{свёртки с } f \cdot j \text{ соответствующими с } (\theta\theta'u)^2.$$

Далее имеем:

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \mathfrak{A}, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

---

<sup>1</sup>Gordan–Kerschensteiner, там же, с. 181.

### Глава III. Относительно полная система по модулю $(s, \varrho, t)$ .

#### § 7. Обзор построения системы.

Чтобы перейти от относительно полной системы по модулю  $\nu$  к относительно полной системе со следующим более высоким модулем, согласно определению § 3 надо построить систему формы  $\nu$  относительно этого более высокого модуля и свернуть ее с формами относительно полной системы по модулю  $\nu$ . Но  $\nu = u_\nu^4$ , как контравариант четвертой степени, дуалистически противопоставлен форме  $f$ . Поэтому, рассматривая  $\nu$  как основную форму, мы получаем относительно полную систему из шести форм по модулю  $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$ .

Следовательно, для построения относительно полной системы по модулю  $s$  (система III) надо перекрывать

Система I:  $f, \theta, K, j, \mathfrak{A}, N$  над

Система II:  $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2u_\nu^2u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x)H_x^2u_\nu^3u_\eta^3,$   
 $g = (\nu\eta x)^4H_x^2, \sigma = H_\eta^2u_\nu^2u_\eta^4, (\nu\sigma x).$

Ниже будет видно (формула (13.)), что форма  $g$  редуцируема; значит, система II фактически состоит только из пяти форм.

В ходе вычисления квадратичные формы

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4u_\vartheta^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4H_x^2$$

присоединяются как модули, так что получается относительно полная система по модулю  $(s, \varrho, t)$ ; при этом модуль  $(\varrho, t)$  считается более высоким, чем модуль  $s$ .

Отдельные формы упорядочиваются по порядку в коэффициентах. Будем считать свертку

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

более высокой, чем свертка

$$H_y(H_y, L_y, \dots).$$

Тем самым, по § 1 и § 3b, порядок отдельных форм одного и того же порядка определяется однозначно.

Построение форм одинакового порядка проводится таблично:

I. Указывается, какие формы систем I и II надо свертывать между собой, чтобы получить заданный порядок в коэффициентах.

II. Выписываются нередуцируемые формы по схеме ряда форм.

III. Редуцируются редуцируемые или распадающиеся на множители ряды форм или формы, то есть те места, где полный ряд форм обрывается; этим доказывается, что все нередуцируемые образования исчерпываются указанными.

IV. Делаются выводы, а именно: 1) указываются вновь возникшие редуценты; 2) указываются те формы, которые не входят в произведениях с формами той же системы в свертку с формами другой системы.

Будет видно, что возникают только:

- 1) свертки одной формы системы I с одной формой системы II;
- 2) свертки степеней  $\theta$  или  $H$ , либо двух форм одной системы с одной формой второй системы.

Получим следующую схему свертки:

| Система I                                   | свертывается с | Система II                      |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1. порядок $f$                              |                | 2. порядок $\nu$                |
| 2. порядок $\theta$                         |                | 4. порядок $H$                  |
| 3. порядок $K, j, \mathfrak{A}$             |                | 6. порядок $L, \sigma$          |
| 4. порядок $N, \theta^2, f \cdot j$         |                | 8. порядок $(\nu\sigma x), H^2$ |
| 5. порядок $\theta \cdot K$                 |                | 10. порядок $H \cdot L$         |
| 6. порядок $\theta^3, \mathfrak{A} \cdot j$ |                | 12. порядок $H^3$ .             |

Для контроля вычислений, кроме «двойной редукции», служат две специальные формы:

$$\begin{aligned}
 & f = \sum x_1^3 x_2, \quad u_\nu^2 = \frac{i}{6} u_x^2, \quad s = \frac{i}{3} f, \\
 \text{I.} \quad & a_\eta^2 = -\frac{1}{9} i \theta, \quad H_\nu^2 = \frac{i}{6} \theta, \quad \sigma = -\frac{i}{6} j, \\
 & g = -\frac{2}{3} i \Delta, \quad \varrho = 0, \quad t = 0, \\
 & f = \sum x_1^4, \quad s = \frac{4}{3} i f, \quad a_\eta^2 = \frac{2}{9} i \theta, \\
 \text{II.} \quad & \Delta_\nu^2 = \frac{1}{15} i \theta, \quad \sigma = \frac{4}{3} i j, \quad g = \frac{4}{3} i \Delta, \\
 & \varrho = 0, \quad t = 0.
 \end{aligned}$$

Примечание. Формулам (1.), (2.), (3.), (4.) для основной формы  $\nu$  соответствуют следующие:

$$\begin{array}{l|l|l}
 (\nu \eta x)^2 = A & H_\nu(\nu \eta x) = 0 & H_\nu^2 = \sigma \\
 (\nu \eta x)^3 = 0 & H_\nu(\nu \eta x)^2 = B & H_\nu^2(\nu \eta x) = 0 \\
 (\nu \eta x)^4 = g & H_\nu(\nu \eta x)^3 = 0 & H_\nu^2(\nu \eta x)^2 = C,
 \end{array} \quad (5)$$

$$A = \frac{1}{6} s \nu - \frac{2}{3} u_x s_\nu + \frac{2}{3} u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18} u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6} s_\nu + \frac{7}{6} u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^3, \quad C = \frac{2}{3} s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^2.$$

$$s_\nu^3 u_x s_\nu = \frac{1}{3} u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3} J u_x. \quad (6)$$

$$\text{a) } (\nu \sigma x)^2 = \frac{1}{2} (H s u)^2 - \frac{2}{5} \nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x s_\eta (H s u)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} J \cdot \nu - \frac{1}{40} (s s' u)^4 \right\}, \quad (7)$$

$$\text{b) } (\nu \sigma x)^3 = -\frac{3}{10} s_\eta (H s u),$$

$$\text{c) } (\nu \sigma x)^4 = \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - \frac{6}{5} u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10} u_x^2 s_\eta^4.$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } g_\nu &= -s_\eta + u_x \left( \frac{9}{2} s_\eta^2 - \frac{1}{2} Z \right) - 3 u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^3 s_\eta^4, \\
 \text{b) } g_\nu^2 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - 2 u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^2 s_\eta^4, \\
 \text{c) } g_\nu^3 &= -\frac{7}{10} s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x s_\eta^4, \\
 \text{d) } g_\nu^4 &= \frac{3}{5} s_\eta^4.
 \end{aligned} \quad (8)$$

## § 8. Формы третьего порядка (система III).

**Свертка  $f$  с  $\nu$ .**

*Нередуцируемые формы:*

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

*Редукция:*

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \quad (\text{формула (2.)}).$$

*Следствия:* 1)  $a_\nu^3$  является редуцентом. 2)  $f$  входит в свертку с  $\nu$  только в произведениях с контраградиентными формами  $(j)$ . То же самое относится к  $\nu$  по отношению к  $f$ .

## § 9. Формы четвертого порядка (система III).

**Свертка  $\theta$  с  $\nu$ .**

*Нередуцируемые формы:*

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

*Редукции:* Из редуцента  $a_\nu^3$  посредством двойной редукции выражений  $a_\nu^3(abu)$ ,  $a_\nu^3b_\nu$ ,  $a_\nu^3b_\nu(abu)$  по следующей исходной схеме:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2b_\nu(abu) = 2a_\nu^2b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \\ \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3b_\nu + a_\nu^2b_\nu^2 - \frac{1}{3}s \\ &= 2a_\nu^3b_\nu - 2a_\nu^2b_\nu^2 + \frac{1}{6}s \\ &= \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3b_\nu - \frac{1}{6}s, \\ \theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) = a_\nu^3b_\nu(abu). \end{aligned}$$

Отсюда получаются формулы:

$$\left. \begin{array}{l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^4u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \end{array} \right| \text{ (присоед. модуль, § 7),} \quad (9)$$

*Следствия:* 1)  $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$  является редуцентом. 2)  $\nu$  входит в свертку с  $\theta$  только в произведениях с контрагredientными формами  $(g)$ .

## § 10. Формы пятого порядка (система III).

$$\text{Свертка} \begin{cases} K, j, \mathfrak{A} \text{ с } \nu, \\ f \text{ с } H. \end{cases}$$

Нередуцируемые формы:

$$\begin{array}{llll} \text{A)} & \begin{array}{ccc} \cdot & K_\nu & \cdot \quad \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 \quad \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot \quad \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot \quad \cdot \end{array} & \text{B)} & \begin{array}{c} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} & \text{C)} & \begin{array}{c} \mathfrak{A}_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \\ & & & & & \\ & \text{D)} & \begin{array}{ccc} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot \quad \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 \quad \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot \quad \cdot \end{array} & & & \end{array}$$

Редукции:

А) Ряд форм  $K_\nu^3$ : редуцент  $a_\nu^3$ .

Форма  $K_\nu^2(k\nu x)^2$ : редуцент  $\theta_\nu^2(\nu\nu x)^2$ .

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

являются распадающимися на множители формами по § 3.

В) Форма

$$\begin{aligned} (j\nu x)^4 &= (\hat{a}\theta\nu x)^4 \\ &= a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\hat{a}\theta\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\hat{a}\theta\nu x)\}^2 \\ &= \Re f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\hat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\hat{a}\theta\nu x)^3, \end{aligned}$$

и поэтому

$$(j\nu x)^4 = \Re f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\mathfrak{A}, \nu)}, \quad (\text{ср. конец § 5}).$$

С) Форма  $\mathfrak{A}_\nu^4$ : редуцент  $\theta_\nu^4$ .

Формы  $\mathfrak{A}_\nu^2$  и  $\mathfrak{A}_\nu^3$ : редуцент  $a_\nu^3$  или  $\theta_\nu^4$  благодаря замене формы  $\mathfrak{A}$  нижними формами ряда форм (конец § 5), то есть посредством двойной редукции выражений

$$a_\vartheta a_\nu^3, \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu, \quad a_\vartheta \theta_\nu^4.$$

Двойное вычисление  $\mathfrak{A}_\nu^3$  дает основание для редукции более высокой формы  $a_\eta^3$ .

Формулы редукции:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \mathfrak{A}_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\Re^2 - t), \\ \text{b)} \quad \mathfrak{A}_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\Re + \frac{3}{5}u_x \left( \frac{13}{10}a_\Re^2 - \frac{2}{5}t \right), \\ \text{c)} \quad \mathfrak{A}_\nu^4 &= a_\Re^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Вывод формул:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} u x^2 \\ &\quad + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} \\ &\quad - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \mathfrak{A}_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x \mathfrak{A}_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 \\ &\quad + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{b)} \quad a_{\vartheta} a_{\nu}^3 \theta_{\nu} &= 0 = [a_{\vartheta}]_{\nu^4} + \frac{9}{14} [a_{\vartheta}^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 \\
&+ \frac{17}{120} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 - \frac{9}{14} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} \\
&- \frac{1}{24} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
0 &= \frac{5}{6} \mathfrak{A}_{\nu}^3 - \frac{1}{2} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^4 - \frac{1}{4} a_{\eta}^3 + \frac{1}{20} u_x a_{\eta}^4; \\
\text{b')} \quad a_{\vartheta} \theta_{\nu}^4 &= a_{\mathfrak{A}} = a_{\vartheta} \theta_{\nu} \{a_{\nu} - (a\theta \nu x)\}^3 \\
&= -\frac{3}{2} [a_{\vartheta}]_{\nu^3} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 - \frac{37}{120} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\
&+ \frac{3}{2} u_x [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120} u_x [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
a_{\mathfrak{A}} &= -\frac{3}{2} \mathfrak{A}_{\nu}^3 + \frac{3}{2} u_x \mathfrak{A}_{\nu}^4 - \frac{11}{20} a_{\eta}^3 + \frac{7}{20} u_x a_{\eta}^4; \\
\text{c)} \quad a_{\vartheta}^2 \theta_{\nu}^4 &= a_{\mathfrak{A}}^2 = [a_{\vartheta}^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\
a_{\mathfrak{A}}^2 &= \mathfrak{A}_{\nu}^4 + \frac{2}{5} a_{\eta}^4.
\end{aligned}$$

D) Редукция  $a_{\eta}^3$  посредством двойной редукции  $\mathfrak{A}_{\nu}^3$  (C).

Остальные редукции получаются вычислением, дуалистически противоположным вычислению в § 9.

*Формулы редукции:*

$$\begin{aligned}
a_{\eta}^2 (aHu) &= -\frac{1}{6} (asu)^3, \\
a_{\eta}^3 &= -a_{\mathfrak{A}} + \frac{3}{5} u_x a_{\mathfrak{A}}^2 + \frac{1}{5} u_x t,
\end{aligned}
\quad \left| \begin{aligned}
a_{\eta}^2 (aHu)^2 &= \frac{4}{9} i\nu - \frac{1}{6} (asu)^4, \\
a_{\eta}^3 (aHu) &= 0, \\
a_{\eta}^4 &= t \quad (\text{присоединено как модуль}).
\end{aligned} \right. \quad (11)$$

*Следствия:*

1)  $(j\nu x)^4$ ,  $\mathfrak{A}_{\nu}^2$ ,  $a_{\eta}^2 (aHu)$  являются редуцентами.

2)  $\nu$  входит только в произведениях с контрагredientными формами в свертку с  $K, j, \mathfrak{A}$ ; то же относится к  $f$  относительно  $H$  и к  $j$  относительно  $\nu$ , поскольку  $\theta_{\nu}(\theta \cdot j, \nu, x^3)$  по § 11 В становится редуцируемой.



## § 11. Формы шестого порядка (система III).

$$\text{Свертка} \begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N \text{ с } \nu, \\ \theta \text{ с } H. \end{cases}$$

Нередуцируемые формы:

$$\text{A) } (\vartheta^2 \nu x)^3, \quad \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 \quad \text{B) } a_\nu(j \nu x), \quad a_\nu^2(j \nu x) \quad \text{C) } N_\nu$$

$$\text{D) } \begin{array}{c} (\vartheta \eta x) \\ (\vartheta \eta x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta H u) \\ \theta_\eta \\ H_\vartheta(\vartheta \eta x), \theta_\eta(\vartheta \eta x) \\ \theta_\eta(\vartheta \eta x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta H u)^2 \\ H_\vartheta(\theta H u), \theta_\eta(\theta H u) \\ \theta_\eta^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_\eta(\theta H u)^2 \\ \theta_\eta^2(\theta H u) \\ \cdot \end{array} \right.$$

Редукции:

A)  $(\vartheta^2 \nu x)^4$  распадается по формуле (3.)а:

$$(a \mathfrak{A} \vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2 \nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2(\nu \vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\mathfrak{A}^2 + f\mathfrak{A}_\vartheta^2.$$

B)  $a_\nu(j \nu x)^2$  распадается по формуле (9.)а, если по концу § 6 заменить  $f \cdot j$  на  $(\theta \theta' u)^2$  и учесть редуцируемость  $\theta'_\vartheta$ :

$$\frac{1}{3}a_\nu(j \nu x)^2 = (\theta \theta' \nu x)^2 \theta_\nu = \theta_\nu^3 \theta - \theta_\nu^2 \theta'_\nu = \theta_\nu^3 \theta + \theta_\nu^2(\widehat{j \nu \theta' u}) = \theta_\nu^3 \theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3 \theta.$$

Формы  $a_\nu(j \nu x)^3$  и  $a_\nu^2(j \nu x)^2$ : редуценты  $a_j$  и  $(j \nu x)^4$ :

$$a_\nu(j \nu x)^3 = a_j(j \nu x)^3 - (j \nu x)^3(j \nu \widehat{a} u),$$

$$a_\nu^2(j \nu x)^2 = a_j^2(j \nu x)^2 - 2a_j(j \nu x)^2(j \nu \widehat{a} u) + (j \nu x)^2(j \nu \widehat{a} u)^2.$$

C) Ряд форм  $N_\nu^2$ ; редуцент  $\mathfrak{A}_\nu^2$ .  $(\nu \nu x)$  и  $N_\nu(\nu \nu x)$  распадутся как перетаскивание над функциональными детерминантами по § 3.

D) Обзор редукций:

а) Ряд форм  $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ : редуцент  $a_\eta^2(a H u)$ . (Приводит к формам с более высокими символами.)

б) Ряд форм  $\theta_\eta H_\vartheta$ : редуцент  $a_\eta^2(a H u)$  посредством двойной редукции. (Приводит к формам с более высокими символами и к более высоким формам общего ряда форм, то есть к ряду форм  $\theta_\eta^2$ .) Вместо  $\theta_\eta H_\vartheta$  рассматриваем ряд форм

$$\theta_\eta(\vartheta \eta x)(\theta H u) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

в нем заменяем символы  $\theta$  нижней формой  $(a b u)$  и таким образом приходим к двойной редукции ряда форм

$$a_\eta^2(a H u)(a b u) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \pmod{s}$$

вплоть до конечной формы

$$a_\eta^3 b_\eta(b H u)(a b u) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

с) Ряд форм  $\theta_\eta^3$ : посредством двойной редукции тех форм, которые одновременно принадлежат рядам форм  $\theta_\eta H_\vartheta$  и  $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ , то есть форм ряда  $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ , к формам с более высокими символами с одной стороны, и к формам с более высокими символами и к более высокому ряду форм  $\theta_\eta^3$  с другой стороны.

d) Формы  $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$ ,  $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$ ,  $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ : посредством двойной редукции при помощи редуцента  $a$  аналогично вычислению в § 9.

e) Формы  $\theta_\eta^2(\theta H u)^2$  и  $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)^2$ : посредством двойной редукции выражений  $\mathfrak{A}_\nu^2(a \mathfrak{A} u)^4$  и  $(a \mathfrak{A} \nu x)^4$  при помощи редуцентов  $\mathfrak{A}_\nu^2$  и  $(a \mathfrak{A} u)^4$ .

f) Формы  $H_\vartheta$  и  $H_\vartheta^2$ : распадающиеся формы. Для  $H_\vartheta^2$  это получается посредством двойной редукции выражения  $\mathfrak{A}_\nu^2(a \mathfrak{A} u)^2$  или также прямым вычислением произведений  $(a_\nu^2)^2$ ,  $a_\nu^2 b_{\nu_1}$  формами системы. (Аналогичное вычисление  $(a_\nu)^2$  дает соотношение между распадающимися формами.)

g) Редукция более высоких форм за счет того, что формы ряда  $\theta \cdot H$  допускают две возможности редукции (принадлежат двум редуцируемым рядам форм), а именно:

$g$ : посредством двойной редукции  $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ ; допускает редукции d) и e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$ : посредством двойной редукции  $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ ; допускает редукции c) и d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$ : посредством двойной редукции  $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ ; допускает редукцию a) и имеет редуцент  $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$  как множитель.

$s_\nu^2$ : посредством двойной редукции  $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ ; допускает редукции a) и c).

Доказательство независимости остальных форм получается посредством двойной редукции ряда форм  $\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 = \theta_\eta^2$ .

*Выполнение редукций:*

Существование редукций a), b), c), d) априори ясно, поскольку по указанному закону построения соотношения, возникающие при двойной редукции, независимы друг от друга. Для редукций e), f), g) нужно вычислением доказать, что тождества не возникают.

Симметрично диагональному члену в ряду форм  $\theta \cdot H$ , продвигаясь к форме  $\theta_\eta$ , мы приводим, частично лишь с указанием вычисления, также формулы, полученные редукциями a), b), c), d), поскольку они частично применяются при редукциях e), f), g), а частично позднее.

1)  $H_\vartheta$  и  $H_\vartheta^2$  по f). По исходной схеме<sup>1</sup>

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2 \{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu \{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2 (aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2 (\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

при подстановке значения  $\theta_\eta H_\vartheta$  возникают формулы:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad H_\vartheta &\sim 2a_\nu a_\eta^2 + 2\nu b_\nu (\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ \text{b)} \quad H_\vartheta^2 &\sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \quad (12)$$

2)  $\theta_\eta H_\vartheta$  по b):

$$\begin{aligned} a_\eta^2 (aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2 (aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2 (aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ &+ a_\eta (\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta (\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

По формулам (5.) и (11.) следует:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3)  $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$  вычисляется по b) аналогично  $\theta_\eta H_\vartheta$ :

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4)  $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$  по b);  $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$  по d) (ср. § 9):

$$\begin{aligned} \theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) &\sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{A}x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su), \\ \theta_\eta^2(\vartheta\eta x) &\sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\mathfrak{A}x). \end{aligned}$$

5)

$$\begin{array}{lll} \theta_\eta H_\vartheta^2 \text{ по b)}, & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ по a)}, & \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ по b)}, \text{ а тем самым } \theta_\eta^3 \text{ по c)}, \\ \text{из } a_\eta^2(aHb)(bHu); & \text{из } a_\eta^3(Hab)(abu); & \text{из } a_\eta^3(bHu)(abu). \end{array}$$

<sup>1</sup>Знак  $\sim$  вместо знака равенства означает, что произведения из  $u_x$  с формами более высокими, чем возникающие посредством сверток III и IV, опущены.

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\Re - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\Re - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\Re - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \quad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.$$

6)  $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$  по е):

$$\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^2 = [(a\mathfrak{A}u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\Re \quad (\text{по формуле (3.)с}),$$

$$\mathfrak{A}_\nu^2(a\mathfrak{A}u)^4 = [\mathfrak{A}_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad (\text{по формуле (10.)а}),$$

$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\Re.$$

7)  $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$  по d) и е). Отсюда редукция более высокой формы  $g$ .

По вычислению, аналогичному § 9, следует:

$$\begin{aligned} \theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\Re x)^2 + \frac{4}{15}fa_\Re^2 + \frac{8}{15}ft \quad (\text{по формуле (11.)}). \end{aligned}$$

По соответствующему вычислению, как выше, следует:

$$((a\mathfrak{A}\nu x)^4) = [(a\mathfrak{A}u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad (\text{по формуле (3.)с}),$$

$$\begin{aligned} (a\mathfrak{A}\nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\mathfrak{A} + 6[\mathfrak{A}_\nu^2]a^2 - 4[\mathfrak{A}_\nu^3]a + \mathfrak{A}_\nu^4 f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\Re x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\Re^2 + \frac{74}{25}ft \quad (\text{по формуле (10.)}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\Re x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\mathfrak{A} + \frac{37}{25}fa_\Re^2 + \frac{74}{25}ft, \end{aligned}$$

и, сравнивая два значения  $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$  по g), получаем:

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\Re x)^2 + \frac{4}{3}i\mathfrak{A} - \frac{4}{5}fa_\Re^2 - \frac{8}{5}ft. \quad (13)$$

8)  $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$  по а) и b), отсюда  $\theta_\eta^3(\theta Hu)$  по с) (формы с множителем  $u_x$  исчезают):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\Re x),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\Re x),$$

$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9)  $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$  по а) и b), отсюда  $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$  по с).  $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$  по d), отсюда редукция более высокой формы  $s_\vartheta^2(\theta su)$  по g) (формы с множителем  $u_x$  исчезают):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu),$$

$$\begin{aligned}
\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) &= \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su), \\
\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) &= \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su), \\
\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) &= \frac{2}{5}\theta_{\Re}(\vartheta \Re x) + \frac{1}{5}(atu), \\
s_\vartheta^2(\theta su) &= \frac{4}{5}\theta_{\Re}(\vartheta \Re x) + \frac{2}{5}(atu). \tag{14}
\end{aligned}$$

10)  $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$  по а) и через редукцент  $\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$ ,  $\theta_\eta^3 H_\vartheta$  по а) и с),  $\theta_\eta^4$  по с), отсюда редукция более высоких форм  $s_\vartheta^2(\theta su)^2$  и  $s_\nu^2$  по г):

$$\begin{aligned}
\text{По а)} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu \eta x)^2 \\
&= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2. \\
\text{Через } \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2 : \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1} \nu_1 x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 \\
&= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu \Re x)^2. \\
\text{По а)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\
&\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\
&= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_{\Re}^2 - \frac{7}{90}(\nu \Re x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2. \\
\text{По с)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta \eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu \eta x)^2 \\
&\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\
&\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu \eta x)^2,
\end{aligned}$$

и поэтому

$$\begin{aligned}
\theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu \Re x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\
&\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.
\end{aligned}$$

По с)

$$\begin{aligned}
\theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_{\Re}^2 \\
&\quad - \frac{14}{45}(\nu \Re x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.
\end{aligned}$$

По г) из двух значений для  $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ :

$$\begin{aligned}
s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu \Re x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\
&= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_{\Re}^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu \Re x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2. \tag{15}
\end{aligned}$$

По г) из двух значений для  $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ :

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_{\Re}^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu \Re x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2. \tag{16}$$

Формула (16.) дает основу для редукции модуля  $(ss'u)^4$ , формула (13.) – для редукции системы  $s$ . (§ 17.)

*Следствия:*

1)  $a_\nu(j\nu x)^3$ ,  $\theta_\eta H_\vartheta$ ,  $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$ ,  $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$  являются редукцентами;  $a_\nu(j\nu x)^2$ ,  $H_\vartheta$  и  $H_\vartheta^2$  являются распадающимися формами.

2) Форма системы II:  $j(\nu) = g = (\nu \eta x)^4 H_x^2$  является редуцируемой.

3) Поскольку единственная контрагredientная форма  $g$  становится редуцируемой,  $\nu$  вообще не входит ни в степени, ни в произведениях с формами той же системы в свертку с системой I.

$\theta$ , рассматриваемая как контравариант, входит в свертку только в произведениях или степенях, и соответственно  $H$ , рассматриваемая как ковариант (ср. § 13 В).

## § 12. Формы седьмого порядка.

$$\text{Свертка} \begin{cases} \theta \cdot K \text{ с } \nu, \\ K, j, \mathfrak{A} \text{ с } H, \\ f \text{ с } L, \sigma. \end{cases}$$

Нередуцируемые формы:

$$\begin{array}{l} \text{В)} \quad \begin{array}{ccccc} \cdot & \cdot & (KHu)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta & \cdot & K_\eta(KHu)^2 & \cdot \\ (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot & \cdot \\ (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2, K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \\ \\ \text{С)} \quad \begin{array}{cc} (j\eta x) & H_j \\ \cdot & H_j(j\eta x) \\ \cdot & H_j^2 \end{array} \quad \text{D)} \quad \begin{array}{c} (\mathfrak{A}Hu) \\ \mathfrak{A}_\eta \end{array} \\ \\ \text{Е)} \quad \begin{array}{ccccc} a_i & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & a_i(aLu)^2 & a_i(aLu)^3 & \cdot \\ \cdot & a_i^2 & \cdot & \cdot & \cdot \end{array} \end{array}$$

Редукции:

А)  $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$  распадается как однократное перекладывание над распадающейся формой  $(\vartheta^2 \nu x)^4$ .

В) Ряд форм  $H_k K_\eta$ : редуцент  $H_\vartheta \theta_\eta$ .

Ряд форм  $K_\eta^2(KHu)$ : редуцент  $a_\eta^2(aHu)$ .

Ряд форм  $K_\eta^2(k\eta x)$ : редуцент  $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ .

Получающаяся отсюда двойная редукция ряда форм  $K_\eta^3$  дает основание для редукции более высокого ряда форм  $(j\eta x)^3$ .

$(KHu)$ ,  $(k\eta x)$ ,  $K_\eta(k\eta x)$  являются распающимися формами по § 3.

$H_k(KHu)$ ,  $K_\eta(KHu)$  распадаются как возникшие через однократную свертку с распающейся формой  $K_\nu(k\nu x)$  и функциональным детерминантом

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

Двойному представлению  $K_\nu^2$  соответствует соотношение между распающимися формами. Получаем:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) \\ &= 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2 \theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\vartheta^3 \pmod{\nu^3}, \\ K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2 \theta + a_\nu^2 \theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Следовательно

$$0 = a_\nu^2 \theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \quad (17)$$

Формы  $H_k$ ,  $H_k(k\eta x)$ ,  $H_k^2$ ,  $H_k^2(k\eta x)$  распадаются как возникшие через однократную свертку с распающимися формами  $H_\vartheta$  и  $H_\vartheta^2$  (ср. § 3. 2), а) и б)).

Имеем

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(специализация  $y = uv$  из 2)а)).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta \theta_\eta f, \quad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S 3.2)b),$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \quad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2 \theta_\eta f.$$

С) Ряд форм  $(j\eta x)^3$ : редуцируем через двойную редукцию ряда форм  $K_\eta^3$  по В), по схеме:

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Аналогичная схема действует вплоть до конечной формы ряда форм:

$$0 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)a_\eta^3 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\vartheta^2(j\eta x)^4 \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}.$$

Форма  $(j\eta x)^2$  распадается: 1) через двукратную поляризацию соотношения для распадающейся формы  $H_\vartheta^2$  ((12.) б);

2) через прямое вычисление произведения  $a_\nu\theta_\nu^3$ ; отсюда распад более высокой формы  $(\mathfrak{A}Hu)^2$ .  
Получаем:

$$\left. \begin{array}{l} \text{а) } \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{б) } (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array} \right\} \pmod{(\nu^3, s, \mathfrak{R}, t, i, J)}. \quad (18)$$

по схеме:

$$H_\vartheta^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{A}Hu)^2 = 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta_\nu^3 &= -(a\widehat{\nu}u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu}u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

Д) Ряд форм  $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$ : редуцент  $\mathfrak{A}_\nu^2$ .

$(\mathfrak{A}Hu)^2$  является распадающейся формой по С).

Е) Ряд форм  $a_i^2(aLu)$ : редуцент  $a_\eta^2(aHu)$ . Формы  $(aLu)$  и  $a_i(aLu)$ : распадаются как перекладывания над функциональными детерминантами по § 3.

Ф) Ряд форм  $a_\sigma^3$ : редуцент  $a_{\mathfrak{R}}^3$ .

Формы  $a_\sigma^2$  и  $a_\sigma^3$ : редуценты  $a_\nu^3$  и  $a_\eta^3$  через двойную редукцию соответствующих выражений

$$H_\nu a_\nu^3 \text{ и } H_\nu a_\eta^3, \quad H_\nu a_\nu^3 a_\nu \text{ и } H_\nu a_\eta^4$$

(ср. § 10. С) редукцию  $\mathfrak{A}_\nu^2$  и  $\mathfrak{A}_\nu^3$ .

Отсюда редукция для более высоких форм  $a_\nu s_\nu(asu)^2$ ,  $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$  и для форм в символах  $\mathfrak{R}, t(a_\nu, a_\eta^2)$  с учетом (16.):

$$\left. \begin{array}{l} a_\nu s_\nu(asu)^2 = \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 = 0, \end{array} \right\} \pmod{(\mathfrak{R}, t)}. \quad (19)$$

Форма  $a_\sigma$  распадается через поляризацию (12.)б или, короче, через прямое разложение произведения  $a_\nu^2\theta_\nu^3$  по схеме:

$$a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 = (a_\nu^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1x)^2 a_\nu^2\theta_{\nu_1}$$

и с учетом редукции  $H_j(j\eta x)^2$  (С):

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \pmod{(s, \mathfrak{R}, t, i)}. \quad (20)$$

*Следствия:*

1)  $(j\eta x)^3$ ,  $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$ ,  $a_\sigma^2$  являются редуцентами;  $(j\eta x)^2$ ,  $(\mathfrak{A}Hu)^2$ ,  $a_\sigma$  являются распадающимися формами.

2)  $f$  входит только в произведения с контрагredientными формами в свертке с  $L$ ;  $f$ , а потому также  $K$  и  $N$ , вообще не входят в свертку с  $\sigma$  и, следовательно, также с  $(\nu\sigma x)$ .  $j$  входит только в произведения с контрагredientными формами;  $\mathfrak{A}$  вообще не входит в произведения в свертке с  $H$  и  $L$  (это следует из  $\mathfrak{A}_\eta(\mathfrak{A}Hu)$  и  $(\mathfrak{A}Hu)^2$ ). Равным образом  $\sigma$ , а значит и  $(\nu\sigma x)$ , не входит в произведения в свертке с какой-либо формой системы I. Из произведений в системе II, с учетом следствий в § 11, остаются только степени  $H$  и произведения  $H$  с  $L$ .



### § 13. Формы восьмого порядка (система III).

$$\text{Свертка} \begin{cases} \mathfrak{A} \cdot j \in \nu, \\ \theta^2, f \cdot j, N \in H, \\ \theta \in L, \sigma. \end{cases}$$

Нередуцируемые формы:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & \mathfrak{A}_\nu(j\nu x) \\ \text{B)} & \frac{(\vartheta^2 \eta x)^3}{(\vartheta^2 \eta x)^4} \quad H_\vartheta(\vartheta^2 \eta x)^3, \theta_\eta(\vartheta^2 \eta x)^3, \\ \text{C)} & (aHu)H_j, \quad a_\eta(aHu)H_j \\ \text{D)} & H_n, \quad N_\eta. \end{array}$$

$$\text{E)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta l x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta l x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2, \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right|$$

Редукции:

A)  $\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^3$ : редуцент  $a_\nu(j\nu x)^3$ .

$\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2$  редуцируема через распадающуюся форму  $a_\nu(j\nu x)^2$  по § 3. 2)б с учетом редуцента  $\theta_{\vartheta j}$ . Действительно, по § 11 B) получаем:

$$\begin{aligned} & \frac{3}{10} \mathfrak{A}_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5} a_\nu(j\nu x) a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10} a_\nu(j\nu x)^2 \\ &= \frac{3}{5} \theta_\nu^3 \theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5} \theta_\nu^3 \theta_{\vartheta j} \theta_{\vartheta j}, \end{aligned}$$

(редуценты  $a_j$  и  $\theta_{\vartheta j}$ ).

B) Формы  $H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2$ ,  $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)$ ,  $H_\vartheta^2(\vartheta' \eta x)^2$  распадаются как возникшие через последовательную однократную свертку с распадающимися формами  $H_\vartheta$  и  $H_\vartheta^2$ , соответственно  $H_\vartheta a_\eta$  и  $H_\vartheta^2 a_\eta$ , по § 3. 2)б) и по соотношению:

$$H_\vartheta(\vartheta' \eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Ряд форм  $a_\eta(j\eta x)^2$ : редуценты  $a_j$  и  $(j\eta x)^3$ .

Форма  $a_\eta(j\eta x)$  распадается: редуцент  $a_j$  и однократная свертка с распадающейся формой  $(j\eta x)^2$  по § 3, 2)а (специализация  $y = uv$ ).

Форма  $a_\eta H_j$  распадается: 1) через однократную свертку с распадающейся формой  $a_\nu(j\nu x)^2$ ;

2) через специальную двукратную свертку с распадающейся формой  $(j\eta x)^2$ ; отсюда соотношение между распадающимися формами.

Из  $a_\nu(j\nu x)^2$ :

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu + 2a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{A}, t, i, J)}.$$

Из  $(j\eta x)^2$ :

$$0 = \theta'_\nu \theta_\nu - \frac{3}{2} a_\eta H_j \pmod{(s, \mathfrak{A}, t, i, J)}$$

(произведения с контравариантами опущены), по схеме:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2} a_\nu(abu)^2 \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} u_x(ubu) \theta_{\nu_1}^3(\theta bu) - \frac{3}{4} (\widehat{j\eta bu})^2 \\ &+ \frac{3}{4} H_j(\widehat{j\eta bu}) - \frac{1}{8} f H_j^2 \end{aligned}$$

и перестановкой символов в  $a_\nu(ubu)(\theta bu) \theta_{\nu_1}^3$ .

D) Ряд форм  $N_\eta(NHu)$ : редуцент  $\mathfrak{A}_\nu$ .

$(NHu)$ ,  $(n\eta x)$ ,  $N_\eta(n\eta x)$ ,  $H_\eta(NHu)$  являются распадающимися формами (ср. § 12 B);  $(NHu)^2$  распадается через однократную свертку с формой  $(\mathfrak{A}Hu)^2$ .

E) Ряды форм  $\theta_i L_\vartheta$ ,  $\theta_i^2(\theta Lu)^2$ ,  $\theta_i^2(\vartheta l x)$ :

редуценты:  $\theta_\eta H_\vartheta, \theta_\eta^2(\theta H u)^2, \theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$ .

Формы  $(\theta L u), (\vartheta l x), L_\vartheta, L_\vartheta(\theta L u), \theta_i(\theta L u), L_\vartheta(\vartheta l x), \theta_i(\vartheta l x), L_\vartheta^2, L_\vartheta^2(\theta L u), \theta_i^2(\theta L u)$  распадаются. (Они дуалистически противоположны распадающимся формам из § 12 В.)

Г) Ряд форм  $\theta_\sigma(\vartheta \sigma x)$ : редуцент  $a_\sigma^2$ .

Формы  $(\vartheta \sigma x)$  и  $(\vartheta \sigma x)^2$  распадаются как возникшие через однократную свертку с распадающейся формой  $a_\sigma$ ;  $\theta_\sigma$ , возникшая через двукратную свертку, распадается, поскольку ряд форм

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \mathfrak{A}, t, i, J)} :$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a_\nu^2(abu)^2\theta_\nu^3.$$

*Следствия:*

$\theta^3$  или  $\theta^2 K$  не входит в свертку с  $H$ ;  $\theta$ , рассматриваемая только как контравариант, входит в степени или произведения в свертке с  $L$ , но вообще не входит в свертку с  $\sigma$  и  $(\nu \sigma x)$ .

$N$  не входит в произведения в свертке с какой-либо формой системы II, равно как и со степенями или произведениями форм системы II. Из произведений в системе I, с учетом следствий последних параграфов, остаются только произведения  $f \cdot j, \mathfrak{A} \cdot j$ , степени  $\theta$  и произведения  $\theta \cdot K$ .

#### § 14. Формы девятого порядка (система III).

$$\text{Свертка} \begin{cases} \theta \cdot K \in H, \\ K, j, \mathfrak{A} \in L, \\ j, \mathfrak{A} \in \sigma, \\ f \in H^2. \end{cases}$$

Неприводимые формы:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, \quad H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4 \\ \text{B)} & (KLu)^3, \quad K_i(KLu)^3, \quad K_i^2, \\ & (klx)^3, \quad K_i(klx)^3 \\ \text{C)} & L_j, \quad L_j^2 \\ \text{D)} & \mathfrak{A}_i, \\ \text{E)} & (j\sigma x) \\ \text{G)} & (aH^2u)^3, \quad (aH^2u)^4, \quad a_\eta(aH^2u)^3. \end{array}$$

Редукции:

A) Формы  $H_\vartheta(k\eta x)^3$ ,  $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$ ,  $H_\vartheta^2(k\eta x)^3$  разлагаются как возникшие через последовательную однократную свертку с разлагающимися формами.

B) Ряды форм  $K_i L_k$ ,  $K_i^2(KLu)$ ,  $K_i^2(klx)$ :

редуценты:  $\theta_\eta H_\vartheta$ ,  $a_\eta^2(aHu)$ ,  $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ .

Формы  $L_i$ ,  $K_i(KLu)$ ,  $K_i(klx)$ ,  $(KLu)^2$ ,  $(klx)^2$  разлагаются как трансвекции над функциональными детерминантами (§ 3).

Формы  $L_k$ ,  $L_k(KLu)$ ,  $L_k(KLu)^2$ ,  $L_k(klx)$ ,  $L_k(klx)^2$ ,  $L_k^2$ ,  $L_k^2(KLu)$ ,  $L_k^2(klx)$ ,  $L_k^3$ ,  $K_i(KLu)^2$ ,  $K_i(klx)^2$  разлагаются как возникшие через однократную свертку с разлагающимися формами:

$$\begin{array}{cccc} L_\vartheta, & H_k(KHu), & L_\vartheta(\vartheta lx), & H_k^2, \\ L_\vartheta^2, & L_\vartheta^2(\theta Lu), & K_\eta(KHu), & \theta_i(\vartheta lx), \end{array}$$

по § 3. 2), а) и б).

C) Ряд форм  $(jlx)^3$ : редуцент  $(j\eta x)^3$ .

Формы  $(jlx)^2$  и  $L_j(jlx)$  возникли через однократную свертку с разлагающейся формой  $(j\eta x)^2$ .

D) Ряд форм  $\mathfrak{A}_i(\mathfrak{A}Lu)$ : редуцент  $\mathfrak{A}_i^2$ .

Формы  $(\mathfrak{A}Lu)^2$ ,  $(\mathfrak{A}Lu)^3$ : однократная свертка с разлагающейся формой  $(\mathfrak{A}Hu)^2$ .

E) Ряд форм  $(j\sigma x)^2$ : редуцент  $a_\sigma^2$  через замену  $j$  низшими формами ряда форм (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \quad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Ряд форм  $\mathfrak{A}_\sigma^2$ : редуцент  $a_\sigma^2$ .

Форма  $\mathfrak{A}_\sigma$ : редуцент  $a_\sigma^2$  через замену  $\mathfrak{A}$  низшими формами ряда форм:

$$a_\sigma a_{\mathfrak{A}}^2 = \frac{2}{3}\mathfrak{A}_\sigma \pmod{\nu}.$$

Следствия: Только форма  $j$  входит в свертку с  $\sigma$  и  $(\nu\sigma x)$ .

$N$  не входит в свертку с  $L$ , поскольку соответствующая  $\mathfrak{A}_i$  форма  $N_i$  разлагается.

**§ 15. Формы десятого порядка (система III).**

$$\text{Свертка} \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \in L, \\ \theta \in H^2. \end{cases}$$

*Неприводимые формы:*

A)  $(\vartheta^2 l x)^4, \quad \theta_i (\vartheta^2 l x)^4$

B)  $(aLu)^2 L_j, \quad a_i (aLu)^2 L_j,$

C)  $(\theta H^2 u)^3, \quad (\theta H^2 u)^4, \quad H_\vartheta(\theta H^2 u), \quad \theta_\eta(\theta H^2 u)^3.$

*Редукции:*

A) и B): остальные формы разлагаются посредством однократной свертки с разлагающимися формами.

C) Остальные формы разлагаются по § 13 B) посредством дуалистически противоположного рассмотрения.

*Следствия:*

$\theta^2 K$  не входит в свертку с  $L$ ; соответственно  $H^2 L$  не входит в свертку с  $K$ .  $H^3$  и  $H^2 L$  не входят в свертку с  $\theta$ . Тем самым схема свертки из § 7 доказана.

## § 16. Формы 11-го, 12-го, 13-го и 15-го порядков (система III).

11-й порядок.

$$\text{Свертка} \begin{cases} \theta \cdot K \in L, \\ K, j \in H^2, \\ j \in (\nu \sigma x), \\ f \in H \cdot L. \end{cases}$$

Неприводимые формы:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, l, x)^5, \quad \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 \\ \text{B)} & (KH^2u)^4, \quad K_\eta(KH^2u)^4, \\ \text{C)} & (\nu \sigma j), \\ \text{D)} & (a_\eta H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

12-й порядок.

$$\text{Свертка} \begin{cases} \theta^3 \in L, \\ \theta \in H \cdot L. \end{cases}$$

Неприводимые формы:

$$\text{E)} (\vartheta^3 l x)^6, \quad \text{F)} (\theta, H \cdot L, u)^4, \quad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

13-й порядок.

$$\text{Свертка } K \in H \cdot L.$$

Неприводимые формы:

$$\text{G)} (K, H \cdot L, u)^5, \quad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15-й порядок.

$$\text{Свертка } K \in H^3.$$

Неприводимая форма:

$$\text{H)} (KH^3u)^6.$$

Редукции:

Формы  $H_j^2, H_j^2$ . Редуцент  $L_j^3$  из соотношения:

$$(\nu l x)L_x^3 = -\frac{1}{2}H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

Разложение или приводимость остальных форм следует из рассмотрений предыдущих параграфов.

Следствия:

По схеме свертки из § 7 и следствиям §§ 8–15 тем самым исчерпаны неприводимые формы системы III (117 форм).

## Глава IV. Относительно полная система по модулю $(\varrho, t)$ .

### § 17. Редукция модуля $(ss'u)^4$ и системы от $s$ .

Для построения следующей более высокой относительно полной системы надо, по аналогии с § 7, построить систему от  $s$  относительно следующего модуля

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

и сворачивать ее с формами относительно полной системы по модулю  $s$ . Нужно показать, что при введении модуля  $(\varrho, t)$  как более высокого модуля

- А) модуль  $(ss'u)^4$  становится приводимым,
- В) система от  $s$  состоит из единственной формы  $s$ .

А) Редукция модуля  $(ss'u)^4$  сразу получается из редуцента  $s_\nu^2$ , найденного по формуле (16), § 11. Из

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

посредством поляризации  $x$  по  $\nu_1$  следует:

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 \\ &\quad + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^2 \cdot \nu, \end{aligned} \quad (21)$$

а тем самым и редукция модуля  $(ss'u)^4$ .

В) Редукция

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

и отсюда редукция системы от  $s$  получается заменой формы  $Z$  более низкой формой  $g_\nu^2$  по формуле (8)b, § 7, с учетом соотношения

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

Форма  $g_\nu^2$  по формуле (13), § 11 имеет редуцент  $s_\nu^2$  множителем. По формулам (8) и (16) получаем:

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \pmod{(\varrho, t)},$$

а по формулам (13), (14), (15), (16):

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2 (\theta su)^2] \widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3}i\mathfrak{A}_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \end{aligned}$$

Отсюда следует

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta \pmod{(\varrho, t)}. \quad (23)$$

Итак, относительно полная система по модулю  $((ss'u)^4, \varrho, t)$  переходит в относительно полную систему по модулю  $(\varrho, t)$ , а из нее посредством трансекции над известной системой двух квадратичных форм возникает абсолютно полная система. Для построения относительно полной

---

<sup>0</sup>Из формулы (21) следует упомянутое в примечании к введению соотношение между тремя инвариантами 9-го порядка при применении формулы (10)c.

системы по модулю  $(\varrho, t)$  нам надо, поскольку по формуле (23) система от  $s$  редуцируется к форме  $s$ , перекрывать относительно полную систему по модулю  $(s, \varrho, t)$  с  $s$  и степенями  $s$ . Ниже будет показано, что степени  $s$  входят в свертку только с системой I.

Объявленное соотношение таково:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2a_\nu^2a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2b_\nu^2(tab)^2 \\ &\quad - \frac{52}{5}H_\varrho^2a_\nu^4 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned}\tag{22}$$

Как *высшие формы* среди форм одинакового порядка и одинаковой степени мы определяем те формы, которые возникли из более высоких форм относительно полной системы по модулю  $(s, \varrho, t)$  посредством свертки с  $s$ , рассматривая свертку с  $s$  только как поляризацию исходных форм. Тем самым порядок отдельных форм определен однозначно (ср. § 1. ряды форм 2). Например:

$$\begin{aligned}(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 &\text{ выше, чем } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)^*, \\ (\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) &\text{ выше, чем } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.\end{aligned}$$

Возникающую систему делим на четыре подсистемы:

- Система  $s_I$ : возникает посредством свертки  $s$  и степеней  $s$  с системой I,
- Система  $s_{II}$ : возникает посредством свертки  $s$  с системой II,
- Система  $s_{III}$ : возникает посредством свертки  $s$  с отдельными формами (без произведений) системы III и с произведениями по одной форме из систем I и II,
- Система  $s_{IV}$ : возникает посредством свертки  $s$  с произведениями по одной форме из систем I и III, II и III, III и III.

Отметим еще, что отныне все формулы следует понимать по модулю  $(\varrho, t)$ , а начиная с формулы (27) – по модулю  $(\varrho, t, i, J, \text{высшие формы})$ , не указывая этого каждый раз явно.

Для редукции соберем ранее полученные формулы:

$$\begin{aligned}s_\nu^2 &= \frac{4}{3}i a_\nu^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2, \\ s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J \cdot u_x, & s_\nu^4 &= J, \\ g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2, \\ Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta, \\ g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J \cdot \theta \right\}, \\ g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta, & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0.\end{aligned}\tag{24}$$

1

*Следствия:*

$$s_\nu^2, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2s_\nu, \quad s_\vartheta^2\theta_\nu$$

являются редуцентами.

<sup>1</sup>Для более краткой записи мы берем член трансекции вместо полной трансекции  $[(\theta Hu)^2]_{su}s$  как форму системы. При составлении формул все трансекции заменяются их начальными членами; например,  $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$  заменяется на  $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$ .

## § 18. Система $s_I$ .

$$\text{Свертка} \begin{cases} s \circ f; \theta; K, j, \Delta; f \cdot j, N; \Delta \cdot j, \\ s^2 \circ \theta, K. \end{cases}$$

*Неприводимые формы.*

5-й порядок:

$$(asu); \quad (asu)^2; \quad (asu)^3; \quad (asu)^4.$$

6-й порядок:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7-й порядок:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 & & & \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 & \text{B) } s_j, & & \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot & \text{C) } (\Delta su), (\Delta su)^2. & & \end{array}$$

8-й порядок:

$$\text{A) } s_j(asu), s_j(asu)^2, s_j(asu)^3, \quad \text{B) } \cdot \quad (Nsu)^2 \\ s_n \quad s_n(Nsu).$$

10-й порядок:

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \quad \text{B) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11-й порядок:

$$\begin{array}{c} (Ks^2u)^6 \\ s_k(Ks^2u)^5 \quad s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

*Редукции:*

Ряды форм

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

имеют редуцент  $s_\vartheta^2(\theta su)$  множителем, а  $s_j^2$  и  $(\Delta su)^3$  получаются возвращением от  $j$  и  $\Delta$  к более низким формам ряда форм:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

Формы  $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$  и  $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$ : редуценты  $s_\vartheta^2(\theta su)$  и  $\theta_{\vartheta'}$ :

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} &= s_\vartheta^2 \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\hat{\vartheta}'x), \\ s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\hat{\vartheta}'x). \end{aligned}$$

Ряд форм  $s_j(\Delta su)^2$ : редуценты  $\Delta_j$  и  $(\Delta su)^3$ .

*Следствия:*

$s$  в степенях не входит в свертку с  $f, j, \Delta, N$ . Формы  $f, j, \Delta, N$  входят в свертку только в произведениях с контраградиентными формами; однако в произведениях с  $f$  эти формы еще могут быть квадратичными по  $x$ , а в произведениях с  $\Delta$  – линейными по  $x$ ; то есть нужно рассматривать следующие произведения форм:

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

где  $(\mu, \lambda)$  означает форму  $\mu$ -й степени по  $x$  и  $\lambda$ -й степени по  $u$ .



$\theta$  или  $K$  не входят в степенях или произведениях с произвольными формами в свертку с  $s$  или  $s^2$ . Для произведений с функциональным детерминантом  $K$ ,  $K \cdot \varphi_x$  ( $\varphi \neq f$  или  $\theta$ ), выполняется соотношение между разлагающимися формами:

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi a u).$$

Тем самым приведенная выше схема свертки системы  $s_I$  доказана.

## § 19. Система $s_{II}$ .

Свертка  $s$  с  $v$ ;  $H$ ;  $L$ ;  $H^2$ .

Неприводимые формы:

| 6-й порядок   | 8-й порядок      | 10-й порядок       | 12-й порядок |
|---------------|------------------|--------------------|--------------|
| $s_\nu$       | $(Hsu), (Hsu)^2$ | $(Lsu)^2, (Lsu)^3$ | $(H^2su)^3$  |
| $\cdot$       | $s_\eta$         | $s_l$              | $\cdot$      |
| $\cdot$       | $\cdot$          | $\cdot$            | $\cdot$      |
| $s_\nu^4 = J$ | $\cdot$          | $\cdot$            | $\cdot$      |

*Редукции:*

Ряды форм  $s_\eta(Hsu)$  и  $s_l(Lsu)$ : редуцент  $s_\nu^2$ .

Ряд форм  $s_\sigma$ : редуцент  $s_\nu^2$  из  $H$ ,  $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$ .

$(H^2su)^4$  разлагается по формуле (7.)а. (ср. § 11. А). Отсюда: разложение  $(H \cdot L, s, u)^4$ .

*Следствия:*

$s^2$  не входит в свертку с системой II.

$\nu$  входит только в произведениях с контрагredientными формами, а  $H$ , рассматриваемая как ковариант, входит в свертку в произведениях с формами  $(1, \lambda)$ ,  $(2, \lambda)$ ,  $(3, \lambda)$ , где  $\lambda$  произвольно.

$\sigma$  и  $(\nu\sigma x)$  вообще не входят, а  $L$  как функциональный детерминант не входит в произведениях в свертку (полные трансекции над ковариантами системы III становятся приводимыми).

Как произведения систем I и II остаются:

$$f \cdot \nu, \quad \Delta \cdot \nu.$$

## § 20. Формы 7-го порядка (система $s_{III}$ ).

Свертка  $s$  с  $f \cdot \nu, a_\nu, a_\nu^2$ .

Неприводимые формы:

$$s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3, \\ a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2.$$

Редукции:

Самоочевидные редукции, возникающие из прямой свертки с редуцентами  $s_\nu^2$  и  $s_\eta(Hsu)$ , отдельно упоминаться не будут; равно как и разложение трансвекций с функциональными детерминантами.

Форма  $a_\nu s_\nu(asu)^2$  и  $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ : см. формулу (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Ряд форм  $a_\nu^2 s_\nu$ : редуцент  $s_\vartheta^2(\theta su)$  получается возвращением  $a_\nu^2$  к более низким формам, то есть двойной редукцией выражений

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u), \quad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

по следующему разложению:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

При этом выполняется  $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$ .

Получаются формулы:

$$\begin{aligned} \underline{a_\nu^2 s_\nu} &= \frac{4}{3}i \cdot a_\nu^2 b_\nu, & \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2} &= \frac{1}{3}i \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3} &= 0, & \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)} &= 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)^2} &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Следствия:

1)  $a_\nu s_\nu(asu)^2, a_\nu^2 s_\nu$  являются редуцентами.

2) Отсюда получаются значения форм  $(\Delta su)^3, (\Delta su)^4$ , которые в § 19 были признаны приводимыми; аналогично для соответствующего ряда форм  $(agu)^2$ , который при свертке с  $\nu$  через редуцент  $g_\nu$  приводит к двойной редукции.

$$\begin{aligned} \text{а) } (\Delta su)^3 &= -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\vartheta\nu x), \\ \text{б) } (\Delta su)^4 &= -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

Из формул (24.) и (26.), по модулю  $(i, J)$  (ср. с. 71):

$$\begin{aligned} \text{а) } (agu)^2 &= \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ \text{б) } (agu)^3 &= 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ \text{в) } (agu)^4 &= -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

## § 21. Формы 8-го порядка (система $s_{III}$ ).

Свертка  $s$  с формами 4-го порядка (система III). (§ 9.)

Неприводимые формы:

$$\begin{array}{c} \cdot \quad \left( \begin{array}{c} (\vartheta \nu x) s_\nu, ((\vartheta \nu x)^2, s, u) \\ (\vartheta \nu x)^2 s_\nu \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^2, (\theta_\nu s u) \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \theta s_\nu \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u) s_\nu, (\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u) \end{array} \right| \star \\ \star \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^3, (\theta_\nu s u)^2 \\ ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^3, (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^2, (\theta_\nu^2 s u) \\ \cdot \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} ((\vartheta \nu x), s, u)^4, (\theta_\nu s u)^3 \\ (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^3, (\theta_\nu^2 s u)^2 \\ (\theta_\nu^3 s u) \end{array} \right| \begin{array}{c} \cdot \\ (\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^4 \\ \cdot \end{array} \end{array}$$

Редукции:

$((\vartheta \nu x), s, u) s_\nu$  разлагается как трансвекция над функциональными детерминантами по § 3.

Ряд форм  $((\vartheta \nu x), s, u)^2 s_\nu$ : редуценты  $s_\nu^2$  и  $s_\nu^2 \theta_\nu$ :

$$(\widehat{\vartheta \nu s u}) s_\nu (\theta s u) = s_\nu s_\vartheta (\theta s u) = -\frac{1}{2} (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u),$$

$$\theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) s_\nu = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2} \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u})^2.$$

Ряд форм  $\theta_\nu s_\nu (\theta s u)$ : редуцент  $a_\nu s_\nu (a s u)^2$  через двойную редукцию выражений

$$a_\nu s_\nu (a s u)^2 (a b u) \quad \text{с} \quad a_\nu s_\nu (a s u)^2 (a b u) (s b u);$$

$\theta_\nu s_\nu (\theta s u)^3$  через двойную редукцию  $(a g u)^3 (a b u) (b g u)^3$ .

Ряд форм  $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu$ : редуцент  $a_\nu^2 s_\nu$  из равенства  $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu = a_\nu^2 (a b u) s_\nu$ .

Ряд форм  $(\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u)$ : двойная редукция форм ряда  $\theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) s_\nu$ , которые одновременно принадлежат к рядам форм  $((\vartheta \nu x) s u)^2 s_\nu$  и  $\theta_\nu (\vartheta \nu x) s_\nu$ .

Форма  $(\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)$  разлагается как однократная трансвекция над функциональным детерминантом  $\theta_\nu (\vartheta \nu x) = a_\nu^2 (a b u)$ .

Форма  $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^4$ : двойная редукция выражения  $(a \mathfrak{A} u)^2 (\mathfrak{A} s u)^4$ , или также  $(\theta g u)^4$ , из формул (27.) и аналогично редукции  $(j \eta x)^4$  (§ 12 С)).

Двойная редукция дает формулы:

$$\begin{aligned} 0 &= \theta_\nu s_\nu (\theta s u) - \frac{1}{6} (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u) - \frac{1}{12} (H s u), \\ 0 &= \theta_\nu s (\theta s u)^2 - \frac{1}{4} (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u)^2 - \frac{1}{24} (H s u)^2, \\ 0 &= (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u)^2 + 2 \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) (\theta s u)^2 + 3 \theta_\nu^2 (\theta s u)^2 - \frac{1}{3} H (s u)^2, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu (\theta s u)^3 + \frac{1}{2} \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u}) (\theta s u)^3, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4} s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta (\theta s u), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta (\theta s u)^2. \end{aligned} \tag{28}$$

Последняя группа соответствует  $((\theta_\nu (\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \dots)$ .

Следствия:

- 1)  $\theta (\vartheta \nu x) s_\nu, (\widehat{\vartheta \nu s u}) (\theta s u) s_\nu, \theta_\nu (\widehat{\vartheta \nu s u})^2, (\widehat{\vartheta \nu s u})^2 (\theta s u)^2$  являются редуцентами.
- 2) Формы четвертого порядка  $(5, \lambda), (6, \lambda)$  и т. д. не входят в свертку с  $s^2$ .
- 3) Для ряда форм  $(\theta g u)^2$  из формул (27.), с учетом редукций этого параграфа, получаем формулы:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s \cdot H \\
&\quad - \frac{1}{3}f \cdot a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2 \cdot (asu)^2, \\
\text{b)} \quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su) \\
&\quad - \theta_\nu^2(\theta su), \\
\text{c)} \quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta\nu su})(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su}), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s \cdot \theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

## § 22. Формы 9-го порядка (система $s_{III}$ ).

Свертка  $s$  с формами 5-го порядка (система III) и с произведением  $\mathfrak{A} \cdot \nu$  (§ 10).  
Неприводимые формы:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A)</p> $\begin{array}{c c} \cdot & \cdot \\ \cdot & ((k\nu x)^2, s, u)^2, K_\nu s_\nu \\ (k\nu x)^2 s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u) & ((k\nu x)^3, s, u)^2 \\ (k\nu x)^3 s_\nu & ((k\nu x)^3, s, u) s_\nu, (K_\nu (k\nu x)^3, s, u) \\ \star (K_\nu s u)^3 & (K_\nu s u)^4 \end{array}$                                                  | $\begin{array}{c c} (K_\nu s u)^2 & \star \\ ((k\nu x)^2, s, u)^3 & \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \cdot & (K_\nu^2 s u)^4 \end{array}$ |
| <p>B)</p> $\begin{array}{c c} (j\nu x) s_\nu, ((j\nu x)^2, s, u) & ((j\nu x)^2, s, u)^2 \\ ((j\nu x)^3, s, u) & \cdot \end{array}$                                                                                                                                                                                                    | <p>C)</p> $\begin{array}{c c} s_\nu (\mathfrak{A} s u), (\mathfrak{A}_\nu s u), & \\ \cdot & \end{array}$                                     |
| <p>D)</p> $\begin{array}{c c} \cdot & ((aHu), s, u)^2, ((aHu)^2, s, u) \\ (aHu) s_\eta, (a_\eta s u) & (aHu)^2 s_\eta, (a_\eta s u)^2 \\ \cdot & (a_\eta^2 s u) \\ \star ((aHu), s, u)^3, ((aHu)^2, s, u)^2 & ((aHu), s, u)^4 \\ (a_\eta s u)^3, (a_\eta (aHu), s, u)^2, (a_\eta (aHu)^2, s, u) & (a_\eta (aHu), s, u)^3 \end{array}$ | $\begin{array}{c c} \star & \end{array}$                                                                                                      |

Редукции:

A) Редукции непосредственно следуют из редукций § 21 посредством однократной свертки. Ряд форм  $K_\nu s_\nu (K s u)^2$  имеет редукторы  $a_\nu s_\nu (a s u)^2$  и  $\theta_\nu s_\nu (\theta s u)^2$  множителями. Отсюда разложение высших форм  $K_\nu^2 (K s u)^2$ ,  $K_\nu^2 (K s u)^3$  по следующему разложению:

$$0 = a_\nu s_\nu (a s u)^2 (a \theta u) = K_\nu s_\nu (K s u)^2 = \theta_\nu s_\nu (\theta s u)^2 (a \theta u).$$

B) Ряд форм  $(j\nu x)^2 s_\nu$ : редуктор  $a_\nu^2 s_\nu$  из

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu (a \theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$ : редуктор  $a_\nu^2 s_\nu$  из

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu (a \theta u)^2 (\theta s u).$$

C) Формы  $\mathfrak{A}_\nu (\mathfrak{A} s u)^2$  и  $s_\nu (\mathfrak{A} s u)^2$ : редуктор  $g_\nu$  из формулы (27.)а.

Форма  $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$ : 1) редуктор  $a_\nu^2 s_\nu$  из  $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3} \mathfrak{A}_\nu s_\nu$ ;

2) разлагается по формуле (27.)а через двойную редукцию выражения  $(\mathfrak{A} s \hat{\nu} x)^2$ .

Отсюда: разложение высшей формы  $a_\eta s_\eta$ .

D) Ряд форм  $(aHu)^2 s_\eta (a s u)$ : редуктор  $a_\nu s_\nu (a s u)^2$  через двойную редукцию ряда форм  $[a_\nu s_\nu (a s u)^2]_{\hat{\nu} \hat{1} x}$ ; редукция  $(aHu)^2 s_\eta (a s u)^2$  из  $a_\nu s_\nu (a s u)^2$  и  $a_\nu s_\nu (a s u)^3$ . Отсюда редукция  $(a_\eta, s, u)^4$ .

Ряд форм  $a_\eta (aHu) s_\eta$ : редукторы  $a_\nu^2 s_\nu$ ,  $a_\eta^2 s_\eta$  через двойную редукцию выражения  $(\mathfrak{A} s \hat{\nu} x)^3$ , так как  $a_\eta^2 s_\eta$  не возникает из редуцированного члена  $a_\nu^2 s_\nu (\nu \nu_1 x)$  формы  $a_\eta (aHu) s_\eta$  посредством свертки.

Ряд форм  $(a_\eta^2 s u)^2$ : редуктор  $a_\nu^2 s_\nu$  из

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2} a_\eta^2 (H s u)^2.$$

Форма  $(a_\eta (aHu), s, u)$  разлагается как трансвекция над функциональным детерминантом.

Получаются редукционные формулы:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad 0 &= (aHu)^2 (a s u) s_\eta - a_\eta (a s u) (H s u)^2 - a_\eta (aHu) (a s u) (H s u), \\ \text{b)} \quad 0 &= (aHu)^2 (a s u)^2 s_\eta - a_\eta (aHu) (a s u)^2 (H s u), \\ \text{c)} \quad 0 &= a_\eta (a s u)^2 (H s u)^2, \\ 0 &= a_\eta s_\eta + \frac{1}{4} a_\nu^2 \cdot g - \frac{1}{4} s \cdot a_\eta^2, \\ 0 &= a_\eta (aHu) s_\eta - \frac{1}{2} a_\eta^2 (H s u), \quad 0 = a_\eta^2 (H s u)^2, \dots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta. \end{aligned} \tag{30}$$

*Следствия:*

1)  $(j\nu x)^2 s_\nu$ ,  $\mathfrak{A}_\nu s_\nu$ ,  $\mathfrak{A}_\nu(\mathfrak{A}su)^2$  и, следовательно,  $N_\nu(Nsu)^2$ ,  $(aHu)^2(asu)s_\eta$ ,  $a_\eta(aHu)s_\eta$ ,  $a_\eta^2(Hsu)^2$  являются редуцентами;  $a_\eta s_\eta$  является разлагающейся формой, которая при всех одно- и двукратных свертках переходит в разлагающиеся формы.

2) Формы 5-го порядка  $(5, \lambda)$ ,  $(6, \lambda)$  и т. д. не входят в свертку с  $s^2$ .

### § 23. Формы 10-го порядка (система $s_{III}$ ).

Свертка  $s$  с формами 6-го порядка (система III) (§ 11).

Неприводимые формы:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \left( \begin{array}{c} (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu \\ \cdot \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} \cdot \\ (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta, \theta_\nu (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta \end{array} \right. \\
 \text{B)} \quad \left( \begin{array}{c} \cdot \\ a_\nu (j \nu x) s_\nu \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} (a_\nu (j \nu x), s, u)^2 \quad (a_\nu (j \nu x), s, u)^3 \quad (a_\nu (j \nu x), s, u)^4 \\ \cdot \quad (a_\nu^2 (j \nu x), s, u)^2 \quad (a_\nu^2 (j \nu x), s, u)^3 \end{array} \right. \\
 \text{C)} \quad \left( \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ ((\vartheta \eta x)^2, s, u) \\ \cdot \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} \cdot \\ ((\vartheta \eta x), s, u)^2, (\theta H u) s_\eta, (\theta_\eta s u) \\ \cdot \\ (\theta_\eta (\vartheta \eta x)^2, s, u) \end{array} \right| \left( \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^2, ((\theta H u)^2, s, u) \\ ((\vartheta \eta x), s, u)^3, (\theta_\eta s u)^2 \\ (\theta_\eta^2 s u) \\ \cdot \end{array} \right) \\
 \left( \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^3, ((\theta H u)^2, s, u)^2 \\ (H_\vartheta (\theta H u), s, u)^2, (\theta_\eta (\theta H u), s, u)^2, (\theta_\eta (\theta H u)^2, s, u) \\ \cdot \end{array} \right) \left| \begin{array}{c} ((\theta H u), s, u)^4 \\ (\theta_\eta s u)^4, (\theta_\eta (\theta H u), s, u)^3 \\ (\theta_\eta^2 (\theta H u), s, u)^2 \end{array} \right.
 \end{array}$$

Редукции:

А) формы  $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2, ((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$  разлагаются:

$$(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu s u})(\widehat{\vartheta' \nu s u}) = (\vartheta \nu x) s_\vartheta s_{\vartheta'} - (\vartheta \nu x) s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta \nu x) s_\nu s_\vartheta + (\vartheta \nu x) s_\vartheta^2.$$

Остальные формы: либо имеют редуценты множителями, либо являются однократными свертками с разлагающимися формами.

В) Редуцент  $a_\nu^2 s_\nu$  и  $(\widehat{j \nu s u}) s_\nu$ .

С) 1. Ряд форм  $(\theta H u)^2 s_\eta$ : а) редуцент  $(a H u)^2 (a s u) s_\eta$ ; б) двойная редукция рядов форм  $(\theta g u)^3 g_\nu$  и  $g_\nu (a g u)^3 (b g u)^2 (a b u)$ .

Отсюда редукция высших форм  $(\theta_\eta s u)^3, (H_\vartheta (\theta H u), s, u)^3$  и  $(a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2, s, u)^4$  [последняя форма вместо  $(H_\vartheta s u)^4$ ].

2.  $((\vartheta \eta x), s, u)^4$ : редуцент  $(a_\eta s u)^4$ .

3.  $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^3$ : редуцент  $s_\vartheta^2 s_\nu$  из  $(\widehat{\vartheta \eta s u})^2 (H s u)$ . Формы  $(\vartheta \eta x) s_\eta, (\vartheta \eta x)^2 s_\eta, ((\vartheta \eta x)^2, s, u)^2, \theta_\eta s_\eta$  разлагаются посредством свертки с разлагающейся формой  $a_\eta s_\eta$ .

4. Ряды форм  $H_\vartheta (\theta H u) s_\eta, \theta_\eta (\theta H u) s_\eta, H_\vartheta (\vartheta \eta x) s_\eta, \theta_\eta (\vartheta \eta x) s_\eta$ : редуценты  $a_\eta (a H u) s_\eta$  и  $a_\eta^2 s_\eta$ .

Ряд форм  $(\theta_\eta (\vartheta \eta x), s, u)^2$ : редуцент  $a_\eta^2 (H s u)^2$  [за исключением  $(\theta_\eta^2 (\theta H u), s, u)^2$ , которое возникает из члена  $a_\eta^2 (b s u) (H s u)$  посредством свертки].

5.  $(H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u), (H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u)^2$ : двойная редукция  $a_\eta (a H u) s_\eta (a b u)$  и  $g_\vartheta (\theta g u) g_\nu$ .

Ряд форм  $(H_\vartheta (\vartheta \eta x), s, u)^3$ : редуцент  $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$ .

6.  $(H_\vartheta (\theta H u), s, u)$  разлагается посредством однократной свертки с разлагающейся формой  $(\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)$  по § 3. 2), с); то есть через двойную редукцию более низкой разлагающейся формы  $(H_\vartheta s u)^2$ :<sup>1</sup>

$$\begin{aligned}
 0 &\equiv \theta_\nu (\vartheta \nu \nu_1) (\theta s u) + \frac{2}{3} \theta_\nu^2 (\vartheta \nu_1 x) (\theta s u) + \theta_\nu (\vartheta \nu x) (\theta s u) s_{\nu_1} \\
 &\equiv -\frac{1}{2} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) + \theta_\eta (\theta s u) (H s u) + \frac{1}{2} H_\vartheta (\theta s u) (H s u) \\
 &\equiv -\frac{1}{2} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) + \theta_\eta (\theta s u) (H s u) + \frac{1}{2} [H_\vartheta]_{\widehat{s u}^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u) \\
 &\equiv -\frac{3}{5} H_\vartheta (\theta H u) (\theta s u).
 \end{aligned}$$

<sup>1</sup>Знак  $\equiv$  означает, что произведения форм более низкой степени опущены.



Через двойную редукцию по 1. и 5. получаются формулы:

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) \\
&\quad - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su) - (asu)^3 \cdot b_\eta(bHu)^2 - a_\nu(asu)^3 \cdot b_{\nu_1}^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2 (bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u), \quad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta \eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

*Следствия:*

1)  $(\theta Hu)^2 s_\eta$ ,  $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$ ,  $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$ ,  $H_\vartheta(\vartheta \eta x)s_\eta$ ,  $\theta_\eta(\vartheta \eta x)s_\eta$ ,  $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)$ ,  $(\theta_\eta(\vartheta \eta x), s, u)^2$  являются редуцентами.

2)  $s^2$  не входит в свертку с формами (5,  $\lambda$ ) и т. д. 6-го порядка.

## § 24. Формы 11-го порядка (система $s_{III}$ ).

Свертка  $s$  с формами 7-го порядка (система III) (§ 12).

Неприводимые формы:

$$\begin{array}{l}
 \text{A)} \quad \begin{array}{c|c|c|c} \cdot & \cdot & \cdot & ((KHu)^2 su)^2 \\ \cdot & \cdot & (K_\eta su)^2 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ ((k\eta x)^3, s, u) & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & (K_\eta(k\eta x)^3, s, u) & \cdot & \cdot \end{array} \\
 \begin{array}{c|c} ((KHu)^2, s, u)^3 & ((KHu)^2, s, u)^4 \\ \cdot & (K_\eta(KHu)^2, s, u)^3 \end{array} \\
 \text{B)} \quad ((j\eta x), s, u)^2, (H_j su) \mid ((j\eta x), s, u)^3, \quad \text{C)} \quad (\mathfrak{D}_\eta su), \\
 \text{D)} \quad \begin{array}{c|c|c} \cdot & ((aLu)^2, s, u)^2, ((aLu)^3, s, u) & ((aLu)^2, s, u)^3 \\ (aLu)^2 s_\eta, (a_l su)^2 & (a_l su)^3 & (a_l(aLu)^2, s, u)^2 \end{array}
 \end{array}$$

Редукции:

А) Редукция или разложение посредством однократной свертки с соответствующими формами в символах  $\theta \cdot H$ .

$(K_\eta(KHu)^2, s, u)$  и  $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$ : разложение по § 3. 2), а), посредством свертки с  $K_\nu^2(Ksu)$ ,  $K_\nu^2(Ksu)^2$ .

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}, s, u)^4$ : разложение по § 3. 2), б), из разлагающейся формы  $K_\nu^2(Ksu)^3$ .

В) Ряд форм  $(j\eta x)s_\eta$ : редуцент  $(j\nu x)^2 s_\nu$ .

Форма  $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$ : редуцент  $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$ .

Форма  $H_j(j\eta x)(Hsu)$ : разлагается посредством редукции разлагающейся формы  $((j\eta x)^2, s, u)^2$  редуцентом  $(j\nu x)^2 s_\nu$  (формула (18.а)):

$$0 = -2(j\nu x)^2 s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{\widehat{su}^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

С) Редуценты  $\mathfrak{D}_{\nu s_\nu}$  и  $\mathfrak{D}_\nu(\mathfrak{D}su)^2$ .

Д) Редукция и разложение посредством однократной свертки с соответствующими формами в символах  $f \cdot H$ .

Е) Из (30.с) получается редукция разлагающегося ряда форм  $(a_\sigma su)^2$ :

$$\begin{aligned}
 0 &= a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)^2 \\
 &= a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu}\eta u)^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2 \\
 &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2, \\
 0 &= a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu}x)(asu) \\
 &= a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu}\eta u)(\widehat{\nu}\eta su)(Hsu)^2(asu) \\
 &= \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.
 \end{aligned}$$

Следствие:  $s^2$  не входит в свертку с формами 7-го порядка.

**§ 25. Формы 12-го, 13-го, 14-го, 15-го порядков (система  $s_{III}$ ).**

Свертка  $s$  с формами 8-го, 9-го, 10-го, 11-го порядков (система III) (§§ 13–16).

*Неприводимые формы:*

12-й порядок.

$$\begin{array}{ll}
\text{A)} & \left. ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \right|_{\theta_\eta (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta} \\
\text{C)} & \left. ((\theta L u)^2, s, u)^2, ((\theta L u)^3, s, u) \right|_{(\theta_l s u)^2} \quad \left. ((\theta L u)^2, s, u)^3 \right|_{(\theta_l (\theta L u)^2, s, u)^2}
\end{array}
\quad \text{B)} \quad ((a H u) H_j, s, u)^2 \mid ((a H u) H_j, s, u)^3$$

*Редукции:* Редукции, возникающие посредством прямой свертки с редукентами или разложимыми формами, далее уже не будут упоминаться.

В) Разложение  $((aHu)H_j, s, u)$  и  $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$  как трансвекция через функциональные детерминанты.

Разложение  $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$ : двойная редукция разложимой формы  $[\theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1}^3]_{su^3}$  (§ 13. С):

$$\begin{aligned}
0 &\equiv [\theta_{\nu_1}^{\prime 3} \cdot \theta_{\nu}]_{su^3} \\
&\equiv -\frac{3}{4} \theta_{\nu} (\theta_{su})^2 (\theta \theta' u) \theta_{\nu_1}^{\prime 3} \\
&\equiv -\frac{9}{8} (\theta \theta' \eta su) (\theta \theta' u) (\theta Hu) (\theta' Hu) \theta'_{\eta} (\theta su) \\
&\equiv -\frac{3}{8} a_{\eta} (aHu) H_j (asu)^2.
\end{aligned}$$

С) Из формул (31.) следует редукция разложимых форм

$$[L_{\vartheta}(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}} \quad \text{и} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su^3}},$$

то есть произведений  $[\theta_\nu^2 \cdot H]_{\widehat{su^3}}$  и  $[a_\nu^2 \cdot (bHu)^2]_{\widehat{su^3}}$ :

$$\begin{aligned}
0 &\equiv \theta_\nu^2(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{su^4}, \\
0 &\equiv a_\nu^2(asu)^2(bHu)^2(bsu) + 6\theta_l(\theta Lu)^2(\theta su)(Lsu), \\
0 &\equiv \theta_\nu^3(\theta su)(Hsu)^2 \quad \text{из } 0 \equiv \theta_l^2(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\
&\quad (\text{редуцент } a_\eta^2(Hsu)^2).
\end{aligned} \tag{32}$$

*Неприводимые формы.*

13-й порядок.

A)  $((KLu)^3, s, u)^2$ ;  $((KLu)^3, s, u)^3$ ,  
 B)  $(L_jsu)^2$ ,  
 C)  $((aH^2u)^3, s, u)^2$ .

14-й порядок.

A)  $((aLu)^2 L_j, s, u)^2$ ,  
 B)  $((\theta H^2 u)^3, s, u)^2$ .

15-й порядок.

$$((KH^2u)^4, s, u)^2.$$

*Редукции:* Разложение  $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$ ,  $(H_\vartheta(\theta H^2 u)^3, s, u)$ ,  $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$  по § 3. 2), с); то есть при одновременном рассмотрении разложимых форм  $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$ ,  $(H_\vartheta(\theta H' u)^2, s, u)^2$ ,  $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$ .

**Следствие:**  $s^2$  не входит в свертку с отдельными формами системы III.

## § 26. Система $s_{IV}$ .

1) *Свертка  $s$  с системами I–III.*

*Редукции:* После редукций последних параграфов  $(a_\nu^2 s_\nu, (aHu)^2(asu)s_\eta$  и т. д.) формы  $(0, \lambda), (1, \lambda), (2, \lambda)$  не допускают одновременно сверток I и III; следовательно, по § 18, для образования системы  $s_{IV}$  формы  $f, \mathfrak{D}, N$  не входят в произведениях в свертку.

$j$  не входит в свертку, поскольку по тем же редукциям сверткам, контрагredientным к  $j$ ,

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \quad ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \quad \text{и т. д.}$$

соответствуют свертки, когredientные к  $j$ :

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \quad (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{и т. д.}$$

2) *Свертка  $s$  с системой II–III, то есть  $s$  с  $H \cdot (1, \lambda), H \cdot (2, \lambda), H \cdot (3, \lambda)$ .*

*Неприводимые формы:*

- A)  $(a_\nu \cdot H, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4,$   
 $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$
- B)  $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
- C)  $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4,$   
 $((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$
- D)  $(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
- E)  $((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4, ((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4,$
- F)  $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4, ((j\eta x) \cdot H, s, u)^4,$   
 $(H_j \cdot H, s, u)^3, (L_j \cdot H, s, u)^4.$

*Редукции:*  $\nu$  не входит в свертку аналогично  $j$ .

B) и D).  $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$  и  $(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$  разлагаются из формул (27.)с) и (29.)с), с учетом  $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s \cdot \sigma$ :

$$(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4 \cdot \sigma, \quad (\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4 \cdot \sigma;$$

отсюда разложение  $(a_\eta(aHu) \cdot H, s, u)^4, (\theta_\eta(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$ .

$(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_\nu^3 \cdot H, s, u)^3$  и отсюда  $(\theta_\eta^2(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$  разлагаются по § 25, формы 12-го порядка C).

3) *Свертка  $s$  с системой III–III, то есть  $s$  с формами системы III:*

$$(3, \lambda)(3, \lambda), \quad (3, \lambda)(2, \lambda), \quad (3, \lambda)(1, \lambda), \quad (2, \lambda)(2, \lambda), \quad (2, \lambda)(1, \lambda), \quad (1, \lambda)(1, \lambda).$$

*Неприводимые формы:*

- A)  $(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4, (a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3,$
- B)  $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4,$   
 $((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2, ((aH^2u)^3 \cdot H_j, s, u)^3.$

*Редукции:*

Произведения II–III при одинаковом порядке в символах  $\nu$  и  $f$  следует считать более высокими, чем произведения III–III.

Редукции возникают частично из соотношений между произведениями (сизигий), частично путем замены произведений соответствующими разложимыми формами и редукции свертки этих форм с  $s$ . Произведения, содержащие контраварианты, всегда опускаются, поскольку они переходят в произведения.

А)  $f$  квадратично, символы  $\nu$  произвольного порядка. По § 11, формулам (12.) и аналогичным вычислением имеем:

$$\begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \cdot b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f \cdot (aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta \cdot H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 \cdot H_\vartheta^2, \\ 2) \quad 0 &= a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 + f \cdot a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta, \\ 3) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2. \end{aligned}$$

Отсюда следует:

$$\begin{aligned} 4) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x) \quad (\text{из 3}), \\ 5) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{из 2}), \\ 6) \quad L_\vartheta(\theta Lu) &= -6a_\nu \cdot b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 \cdot H \quad (\text{из 1}), \\ 7) \quad 0 &= a_\nu \cdot (bHu)^2 + f \cdot (aLu)^3 + \theta_\nu \cdot H \quad (\text{из 1}), \\ 8) \quad 0 &= a_\nu \cdot (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 \cdot H, \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 \cdot (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 \cdot H, \\ 10) \quad 0 &= a_\eta (aHu)^2 \cdot b_\eta (bHu)^2 \quad (\text{из 5) и 6}), \\ 11) \quad 0 &\equiv [a_\nu^2 \cdot b_\eta (bHu)]_{su^4} \quad (\text{из формулы (30.)b}). \end{aligned}$$

Редукции

$$(H_\vartheta su)^4, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(формулы (31.) и (32.)) вместе с формулами 1) до 11) дают редукцию всех сверток  $s$  с произведениями, квадратичными в символах  $f$  и произвольными по  $\nu$ .

В) Произведения каждых двух из символов  $f, \theta, j; \nu$  произвольного порядка. По формулам (17.), (18.), (20.) и прямым вычислением получаем соотношения:

$$\left. \begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta \cdot (aHu)^2 + \frac{1}{4}f \cdot (\theta Hu)^2, \\ 2) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta \cdot (\theta Hu)^2 \end{aligned} \right\}$$

(прямое вычисление аналогично А 1).

Отсюда следует:

$$\begin{aligned} 3) \quad 0 &= 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3, \\ 4) \quad 0 &= 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3, \\ 5) \quad 0 &= a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2, \\ 6) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta (aHu)^2 \quad (\text{формула (17.)}), \\ 7) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta (\theta Hu)^2 + \frac{1}{6}f \cdot H_j \\ &\quad [\text{аналогичное выведение, как для 6) из } \theta_\nu^2(\theta\theta'\nu_1 x)], \\ 8) \quad 0 &= a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j \quad (\text{из 6}), \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j \quad (\text{из 8}), \\ 10) \quad 0 &= \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j \quad (\text{из 7) и 8}), \\ 11) \quad 0 &= a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\ 12) \quad 0 &= a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\mathfrak{D}Hu)^2 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} 11) \\ 12) \end{aligned}} \right\} \quad (\text{формула (18.)}),$$

$$13) \quad 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2}a_\sigma \quad (\text{формула (20.)}),$$

$$14) \quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3,$$

$$0 = a_\eta H_j \quad (\S 13.C)).$$

Формулы доведены до того места, где произведения становятся поляризуемыми; то есть при свертке возникает только одно новое произведение, потому что а) свертка произведения с самим собой становится приводимой, б) остальные произведения, возникающие при свертке, становятся приводимыми или ведут к контравариантам (ср. § 3. 2), а) и б)).

Формулы 1) до 5) дают редукцию всех сверток  $s$  с произведениями, возникающими из  $a_\nu \theta_\nu$  при свертке. Формулы 6) до 10) дают редукцию тех произведений, которые возникают из  $a_\nu \theta_\nu^2$  при свертке. По § 24 А), с учетом формул 6) до 10), свертки  $s$  с произведениями, возникающими из  $a_\nu^2 \theta_\nu$ , разлагаются.

Имеем:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su). \end{aligned}$$

Редуценты:

$$\begin{aligned} &((j\eta x)^2, s, u)^3 [\text{из } (\vartheta \eta \widehat{su})^2 (Hsu). \S 23. C 3)], \\ &(H_j(j\eta x), s, u)^2 [\S 24, B], \quad ((\mathfrak{D}Hu)^2, s, u)^2 [\S 24, C], \quad (a_\sigma su)^2 [\S 24, E] \end{aligned}$$

вместе с формулами 11) до 14) дают редукцию всех произведений, возникающих из  $a_\nu \theta_{\nu_1}^3$ ,  $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^2$ ,  $a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^3$ .

Наши предшествующие вычисления можно суммировать в следующем *выводе*:

Относительно полная система по модулю  $(\mathfrak{R}, t)$  состоит из следующих 331 форм и подсистем; ниже мы также приводим их в табличном порядке.

|                                                                                   |                                         |                                                      |                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| $u_x$<br>система I<br>система II<br>система III                                   | 1 форма<br>6 форм<br>5 форм<br>117 форм | }                                                    | Относительно полная система по модулю $(s, \varrho, t)$<br>[см. таблицу I]. |                   |
| $s$<br>система $s_I$<br>система $s_{II}$<br>система $s_{III}$<br>система $s_{IV}$ |                                         | 1 форма<br>35 форм<br>9 форм<br>125 форм<br>32 формы | }                                                                           | [см. таблицу II]. |

Таблица I (см. с. 90)

| $\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$ | 0       | 1                                | 2                         | 3                         | 4                           | 5                          | 6                                   | 7                        | 8                   | 9                             | 10                  | 11                           | 12                  | 13                             | 14                   | 15                              | 16 | 17                               | 18 | 19 | 20 | 21                |
|------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|----|----------------------------------|----|----|----|-------------------|
| 0                                              | $t$     |                                  |                           |                           | $f$                         |                            | $\mathfrak{A}$                      |                          | $K_\nu(k\nu x)^3$   |                               | $K_\eta(k\eta x)^3$ |                              |                     |                                | $(\theta^3\eta x)^4$ | $H_k(k \cdot \theta, \eta x)^4$ |    | $\theta_l(\theta \cdot k, lx)^5$ |    |    |    | $(\theta^2 lx)^6$ |
| 1                                              |         | $u_x$                            |                           |                           | $\theta_\nu(\theta\nu x)^2$ |                            | $\theta_\eta(\theta\eta x)^2$       | $N$                      | $(k\nu x)^3$        | $\theta_\nu(\theta^2\nu x)^3$ | $\{k\eta x\}^3$     | $H_\theta(\theta^2\eta x)^3$ |                     | $\theta_l(\theta^2 lx)^4$      |                      | $(\theta k, \eta, x)^4$         |    | $(\theta k, l, x)^5$             |    |    |    |                   |
| 2                                              |         |                                  | $a_\nu^2$                 |                           | $\theta_\nu^2$              |                            | $(\theta\nu x)^2$                   | $K_\nu(k\nu x)^2$        | $(\theta\eta x)^2$  | $H_k(k\eta x)^2$              | $K_\eta(k\eta x)^2$ |                              | $(\theta^2\nu x)^3$ | $\theta_\nu(\theta^2\eta x)^3$ | $(\theta^2\eta x)^3$ | $(\theta^2 lx)^4$               |    |                                  |    |    |    |                   |
| 3                                              |         | $\theta_\nu^3$                   |                           | $a_\nu$                   | $\theta_\nu(\theta\nu x)$   | $\mathfrak{A}_\nu$         | $\mathfrak{A}_\eta$                 | $H_\theta(\theta\eta x)$ | $\mathfrak{A}_\eta$ | $(k\nu x)^2$                  |                     | $(k\eta x)^2$                |                     | $\theta_l(\theta lx)^2$        |                      | $(klx)^3$                       |    |                                  |    |    |    |                   |
| 4                                              | $\nu$   |                                  | $H$                       | $(j\nu x)^3$              | $\theta_\nu^2$              | $(\theta\nu x)$            |                                     | $N_\nu$                  | $(\theta\eta x)$    |                               | $H_\eta$            | $N_\eta$                     |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
|                                                |         |                                  | $\theta_\nu^2$            | $a_\eta(aHu)$             |                             | $a_\eta^2$                 |                                     |                          |                     |                               | $(\theta lx)^2$     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| 5                                              |         | $a_\eta(aHu)^2$                  | $\theta_\nu^2(\theta Hu)$ | $\theta_\nu$              | $\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$     | $\theta_\eta$              | $\frac{K_\eta^2}{(\mathfrak{A}Hu)}$ |                          | $\mathfrak{A}_l$    |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| 6                                              | $j$     |                                  |                           | $(j\nu x)^2$              | $\frac{L}{(aHu)^2}$         | $\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$ |                                     | $K_\eta$                 |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| $\sigma$                                       |         |                                  |                           | $H_\theta(\theta Hu)$     | $\theta_\nu(\theta Hu)$     |                            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| 7                                              |         | $\theta_\eta(\theta Hu)^2$       | $H_j(j\eta x)$            | $a_l(aLu)^2$              | $a_\nu(j\nu x)$             | $\mathfrak{A}_\nu(j\nu x)$ | $\theta_l$                          | $K_l^2$                  |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| 8                                              | $H_j^2$ | $(\nu\sigma x)$                  | $(\theta Hu)^2$           | $K_\eta(KHu)^2$           |                             |                            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| $a_l(aLu)^3$                                   |         | $(j\nu x)$                       |                           | $(aLu)^2$                 |                             |                            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| 9                                              |         | $H_j$                            | $a_\eta(aHu)H_j$          | $(aLu)^3$                 | $L_\theta(\theta Lu)^2$     | $\theta_l(\theta Lu)^2$    |                                     | $(KHu)$                  |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| $\theta_l(\theta Lu)^3$                        |         | $(j\sigma x)$                    | $a_\eta(aH^3u)^3$         |                           | $H_j(aHu)$                  | $(\theta Lu)^2$            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
|                                                |         | $(\theta Lu)^3$                  |                           |                           |                             |                            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
|                                                |         | $(aH^2u)^4$                      | $a_l(aLu)^2L_j$           | $H_\theta(\theta H^2u)^3$ | $\theta_\nu(\theta H^2u)^3$ |                            | $(KLu)^3$                           |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| 12                                             |         | $(\nu\sigma j)$                  |                           |                           |                             |                            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
|                                                |         | $(\theta H^2u)^4$                | $K_\eta(KH^2u)^4$         | $(a, H \cdot Lu)^4$       |                             |                            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| 14                                             |         | $L_\theta(\theta, H \cdot Lu)^3$ |                           |                           |                             |                            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| 15                                             |         | $(\theta, H \cdot Lu)^3$         |                           |                           |                             |                            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| 16                                             |         | $K_\eta(K, H \cdot Lu)^3$        |                           |                           |                             |                            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| 17                                             |         | $(K, H \cdot Lu)^3$              |                           |                           |                             |                            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| 18                                             |         |                                  |                           |                           |                             |                            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| 19                                             |         |                                  |                           |                           |                             |                            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| 20                                             |         |                                  |                           |                           |                             |                            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |
| 21                                             |         | $(KH^3u)^6$                      |                           |                           |                             |                            |                                     |                          |                     |                               |                     |                              |                     |                                |                      |                                 |    |                                  |    |    |    |                   |

(Числа в верхней горизонтальной строке обозначают степень по  $x$ ; числа в первой вертикальной строке обозначают степень по  $u$ .)

**Таблица II (см. с. 90)**

[illegible]

(Числа в верхней горизонтальной строке обозначают степень по  $x$ ; числа в первой вертикальной строке обозначают степень по  $u$ .)



### 3. К инвариантной теории форм от $n$ переменных<sup>1</sup>

*Jahresbericht d. DMV* 19 (1910), с. 101–104

В проективной инвариантной теории форм от  $n$  переменных главная задача решена: доказана конечность системы форм. Однако ряд дальнейших вопросов еще не рассмотрен, а именно вопросы, относящиеся к методам исследования связи между формами. Результаты, которые я получила по таким вопросам, я хочу кратко сообщить, но ради ясности сначала намечу постановки задач в тернарной области, где они уже известны.

Я прежде всего имею в виду две фундаментальные теоремы символического метода: теорему о том, что все инвариантные образования можно представить символически, и вторую теорему, по которой все отношения между инвариантами получаются последовательным применением небольшого числа символических тождеств; следовательно, символический метод дает все отношения, не выходя из области инвариантов.<sup>2</sup> На этом основаны процессы образования форм, символический процесс свертки и несимволические процессы дифференцирования, теория разложений в ряды и т. п. Сюда же я хотела бы добавить еще одну теорему, доказанную в моей диссертации,<sup>3</sup> а именно: все свертки можно породить последовательным применением двух возможных “когреддиентных” сверток; под этим для символического произведения  $s_x t_x u_\sigma u_\tau$  я понимаю две свертки  $(stu)$  и  $(\sigma\tau x)$ . На этой теореме можно построить теорию редуцентов и редукции систем форм, аналогично бинарной области, как я показала в своей диссертации.

Если теперь перейти к  $n$ -арной области, то уже первая теорема символического метода верна лишь условно. Как известно, уже для кватернарных форм, кроме точечных координат  $x$  и координат плоскостей  $u$ , возникают координаты прямых  $p_{ik}$ , то есть миноры из двух строк точечных координат. Аналогично в  $n$ -арной области мы имеем строки переменных  $p_\rho$ , отдельные элементы которых являются минорами из  $\rho$  строк  $x$ , и строки символов  $S^\rho$ , элементы которых ведут себя как миноры из  $\rho$  строк  $s$ , когреддиентных к  $u$ . Символическое представление через детерминанты, как известно, действительно только тогда, когда строки символов  $S^\rho$  разложены на строки  $s$  и эти строки распределены между различными детерминантами; тогда реальный смысл имеют только такие агрегаты детерминантов, которые зависят от  $S^\rho$ . Но невозможно заранее обзреть, какие именно агрегаты детерминантов это обеспечивают; тем самым теряются все остальные теоремы, названные для тернарной области.

Теперь я хочу указать простой принцип, позволяющий получить символическое представление, явное относительно строк  $S^\rho$ , и тем самым вернуть также остальные теоремы. Это применение известной теоремы о соответствующих матрицах: “Каждой строке переменных  $p_\rho$  взаимно однозначно соответствует другая строка  $q_{n-\rho}$ , отдельные элементы которой являются минорами из  $n - \rho$  строк  $u$ , связанных с  $\rho$  строками  $x$  уравнениями  $(u | x) = 0$ .” Соответственно каждой строке символов  $S^\rho$  поставлена в соответствие другая строка  $S_{n-\rho}$ , ведущая себя так, как если бы она была составлена из  $n - \rho$  строк, когреддиентных к  $x$ .

Эта теорема допускает также вторую формулировку, удобную для приложений: “Каждому матричному произведению  $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ ,<sup>4</sup> где строки второй матрицы контрагреддиентны строкам первой, соответствует детерминант; и обратно, каждый детерминант можно преобразовать в матричное произведение с заранее заданным числом строк  $\rho$ .” Тем самым детерминант и матричное произведение выступают как полностью эквивалентные, а первая теорема символического метода принимает форму: “Все инвариантные образования можно символически представить матричными произведениями.” Из двух строк символов  $S^\sigma, T^\tau$  при помощи строк переменных теперь очень легко образовать матричное произведение, явно содержащее эти строки символов и потому

<sup>1</sup> Доклад, прочитанный на Зальцбургском собрании естествоиспытателей 1909 года.

<sup>2</sup> Работа: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

<sup>3</sup> *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. § 1. (*Crelle's Journal*, Bd. 134, 1908.)

<sup>4</sup> То есть сумме по произведениям соответствующих детерминантов, образованных из матрицы  $\rho$  строк  $v$  и матрицы  $\rho$  строк  $y$ .

представляющее инвариантное образование формы  $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$ , а именно:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ или } n - \sigma). \quad (1)$$

Важнее обратное утверждение: все инвариантные образования можно явно представить матричными произведениями, так что указанный процесс является расширением бинарного и тернарного процесса свертки. Для доказательства этого обратного утверждения необходимо перенести вторую теорему символического метода на  $n$ -арную область, то есть установить всю совокупность независимых неразложимых тождеств, в которых все строки  $S^\rho$ ,  $p_\rho$  рассматриваются как неразложимые. Эти тождества получаются из известных тождеств, содержащих только строки  $x$  и  $u$ ,<sup>5</sup> если заменить теорему о произведении для детерминантов системой теорем о произведении для матриц и стягивать различные матричные произведения в одно именно с помощью этих теорем о произведении. Так приходят к двум дуалистическим формулам, из которых приведу только одну:

$$(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \dots S_k^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon (S_1^{\rho_1} \dots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \dots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} | S_{n-\rho_i} x), \quad (2)$$

$$\rho = \sum_{i=1}^k \rho_i < n, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

Единственная специализация, содержащаяся в этих формулах, а именно появление строки  $x$ , неизбежна; для совершенно общих строк символов и строк переменных мы приходим к “тождеству разложения”, то есть к тождеству, в котором строка  $p_\rho$  разлагается на отдельные строки  $x$ . Простейший частный случай тождества разложения уже использовал Клебш в своей “фундаментальной задаче инвариантной теории” для вывода элементарных ковариантов в теории разложений в ряды. С помощью этих тождеств, которые осуществляют переход от неявных детерминантных выражений к матричному произведению, действительно можно доказать, что матричное представление дает желаемое явное символическое представление.

Для процесса свертки, однако, верна теорема, вполне аналогичная тернарному случаю; на ней точно так же аналогично можно построить теоремы редукции. Если в (1) назвать число  $\lambda$  дефектом свертки, а свертки, для которых  $\sigma = \tau$ , назвать когредиентными, то все свертки можно породить последовательным применением когредиентных сверток дефекта 1. Доказательство этой теоремы существенно опирается на то, что наиболее общие формы можно заменить “нормальными формами”, то есть формами, которые тождественно обращаются в нуль при применении всех инвариантных дифференциальных операций. В кватернарной области этот последний факт доказал Мертенс;<sup>6</sup> наше знание наиболее общих дифференциальных операций – которые, как известно, возникают из процессов свертки заменой строк символов дифференциальными символами – позволяет, применяя тождество разложения, почти дословно перенести доказательство Мертенса на  $n$ -арную область.

<sup>5</sup>Е. Pascal в *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

<sup>6</sup>*Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte*. Bd. 98, 1889.

## 4. К инвариантной теории форм от $n$ переменных

*Journal f. d. reine u. angew. Math.* 139 (1911), с. 118–154

### Введение.

В проективной инвариантной теории форм от  $n$  переменных вопросы, примыкающие к главной проблеме – доказательству конечности системы форм, – почти не рассматривались, если выйти за пределы бинарной и тернарной областей. Это вопросы о взаимной зависимости форм и о методах овладения этой связью между формами. Эти методы существенно опираются – как это полностью доказано в бинарной и тернарной областях – на две теоремы, названные Study “фундаментальными теоремами символического метода”, а именно на теорему о символической представимости форм и теорему о символических тождествах.<sup>1</sup> Последняя теорема утверждает, что все отношения между целыми инвариантными образованиями получаются последовательным применением небольшого числа символических тождеств; следовательно, символический метод, и только он, дает знание связи между формами, не выходя из области инвариантов.

На причину трудности при переходе к  $n$  переменным уже указал Gordan в своей Эрлангенской программе;<sup>2</sup> она состоит в том, что первая теорема символического метода в ее общей формулировке уже не верна. Как известно, в  $n$ -арной области появляются строки переменных более высокого уровня  $p_\rho$ <sup>3</sup> и аналогично строки символов более высокого уровня  $S^\rho$ ; к этим строкам приходят как тогда, когда, следуя первоначальному подходу Clebsch,<sup>4</sup> исходят из форм с произвольно многими строками  $p_\rho$ , так и тогда, когда исходят из форм, содержащих только произвольно много когredientных строк  $x$ , по подходу F. Deruyts и A. Capelli.<sup>5</sup> Символического представления, которое явно<sup>6</sup> содержало бы строки  $p_\rho$ ,  $S^\rho$ , теперь не существует; необходимо разложить  $p_\rho$ ,  $S^\rho$  на отдельные строки  $x$  и контрагredientные им  $s$  и распределить их между различными детерминантами. Правда, с помощью дифференциальных условий (ср. формулу (19.)) можно проверить, что данный агрегат детерминантов обладает свойством зависеть только от строк  $p_\rho$ ,  $S^\rho$ ; но таким способом невозможно получить обзор всей совокупности инвариантных образований и процессов их порождения.<sup>7</sup>

Теперь мы покажем в §§ 2 и 6, как, применяя “теорему о соответствующих матрицах”,<sup>8</sup> можно вновь получить первую фундаментальную теорему во всей ее общности, заменив представление через детерминанты представлением через “матричные произведения”. В § 2 показывается, что всякое матричное произведение, явно содержащее строки  $S^\rho$ ,  $p_\rho$ , является инвариантным образованием основной формы; обратное утверждение, данное в § 6, а именно что всякое инвариантное образование можно явно представить матричными произведениями, удастся только через перенос второй фундаментальной теоремы (§§ 3–5).

Эта теорема известна для форм, содержащих только строки переменных  $x$ .<sup>9</sup> Общая проблема – установить всю совокупность неразложимых тождеств, в которых все строки  $S^\rho$ ,  $p_\rho$  рассматриваются как неразложимые, – была сформулирована Study;<sup>10</sup> одновременно он видит в числе возникающих

<sup>1</sup>E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – О появлении этих фундаментальных теорем также в инвариантной теории специальных групп преобразований ср. Study, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Bd. 49 [1897]) и *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Bd. 10 [1909]; в оригинальном издании ошибочно напечатано Bd. 1).

<sup>2</sup>P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

<sup>3</sup>Об обозначении ср. § 1.

<sup>4</sup>A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Bd. XVII, 1872).

<sup>5</sup>Ср. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, и приведенную там литературу.

<sup>6</sup>Более точное определение “явного представления” в § 2.

<sup>7</sup>Также вычислительно очень ценное дальнейшее развитие символики, восходящее к Study (сообщено F. Engel, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, S. 126, а для кватернарной области – E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135), не является явным представлением в нашем смысле. Например, оно едва ли привело бы к несимволическим процессам дифференцирования для порождения форм.

<sup>8</sup>Если не считать Graßmann-овой *Ausdehnungslehre* 1862 года, Nr. 112, это впервые встречается у A. Brill, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Bd. 4, 1871).

<sup>9</sup>E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), S. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), S. 119; ib. *Mem.* (4) 5 (1888), S. 375.

<sup>10</sup>*Methoden* ..., S. 204, примечание 17).

тождеств меру трудности методов в  $n$ -арной области. Поскольку теперь удастся объединить всю совокупность тождеств в одну формулу (36.), эта трудность по крайней мере сведена к минимуму. В приложениях, однако, часто будут возникать некоторые выделенные специальные случаи (36.), такие как (20.), (21.), характеризующиеся тем, что они допускают явное представление без подстановки новых строк; или формула (31.), называемая “тождеством разложения”, поскольку строка  $p_\rho$  в ней как будто разложена на строки  $y$ .

На двух фундаментальных теоремах теперь легко построить дальнейшую теорию. Первая теорема непосредственно дает процессы порождения форм, символический процесс свертки и несимволические процессы дифференцирования,<sup>11</sup> тогда как тождество разложения устраняет среди этих процессов все эквивалентные (§ 6). Знание процессов дифференцирования далее дает перенос понятия “нормальной формы” на  $n$ -арную область и, с помощью способа доказательства, указанного Mertens<sup>12</sup> в кватернарной области, теорему о том, что систему инвариантных образований можно заменить эквивалентной системой нормальных форм (§ 7). При этом последнем предположении я показала в своей диссертации,<sup>13</sup> что тернарный процесс свертки можно породить последовательным применением двух основных сверток. На основании этой теоремы и теории разложений в ряды я затем, введя понятие “ряда форм”, развила основные теоремы редукции для систем форм. Совершенно аналогично в  $n$ -арной области процесс свертки можно породить из  $n - 1$  основных сверток (§ 8), и можно установить теоремы редукции (§ 9).

**Послесловие.** По поводу Зальцбургского сообщения проф. Е. Мюллер из Вены обратил мое внимание на то, что вычисление с матричными произведениями, лежащее в основе этой работы, в принципе тождественно исчислению Graßmann-овой теории протяженности.<sup>14</sup> Действительно, Graßmann-ово “комбинаторное произведение”  $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$  можно рассматривать как матрицу, заданную этими строками (ср. § 2), причем “прогрессивное произведение” является матрицей самих строк, “регрессивное” – матрицей сопоставленных строк  $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$ , а матрица, соответствующая “смешанному произведению”, возникает, когда несколько строк  $S$  объединяются подстановкой (9.) в новые строки  $P, Q$ . Нашей “сопоставленной строке” при этом соответствует Graßmann-ово “дополнение”, а нашему “матричному произведению” – “смешанное произведение уровня 0”.

При таком сопоставлении разложение, данное в *Ausdehnungslehre* 1862 года, Nr. 113, становится тождественным формуле, дуалистической к нашей формуле (32.). В специальном случае  $\rho = 1$  формула (32.) переходит в (17.), а дуалистическая формула – в (16.). Из этих специальных случаев Graßmann-ова разложения Мюллер недавно вывел упомянутые выше тождества (20.), (21.).<sup>15</sup>

В отличие от вывода Graßmann–Müller, наш вывод одновременно дает доказательство полноты тождеств, что для рассматриваемых здесь вопросов представляется самым существенным; от (20.), (21.) он далее переходит к наиболее общим неразложимым тождествам (36.), которые, по-видимому, до сих пор еще не были замечены.

<sup>11</sup> В работе *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) Mertens другим, не непосредственно обобщаемым путем пришел к кватернарному процессу свертки. Возникающий там альтернированный инвариант от 6 строк  $S^2$  отличается от нашего, возникающего при однократном применении подстановки (11.), агрегатом четных инвариантов. Для одного специального случая кватернарный процесс свертки встречается также у P. Gordan, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56, 1903).

<sup>12</sup> F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98, Abt. IIa, 1889.)

<sup>13</sup> *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. (Этот журнал, Bd. 134, 1908.)

<sup>14</sup> *Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel* (Leipzig, Teubner, 1896).

<sup>15</sup> E. Müller, *Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze*. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118, Abt. IIa, Juli 1909), Satz 16 и 18.

## § 1. Обозначения и определения. Сводка известных результатов.

Как обычно, будем обозначать через строку переменных  $x$  строку элементов  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , а аналогично через строку переменных  $p_\rho$  ( $\rho = 1, 2, \dots, n-1$ ) – строку из  $\binom{n}{\rho}$  элементов  $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ , где  $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$  означает  $\binom{n}{\rho}$  детерминантов, образованных из матрицы  $\rho$  строк  $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\rho)}$ :

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \quad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \dots, n).$$

По теореме о соответствующих матрицах<sup>1</sup> каждой строке  $p_\rho$  взаимно однозначно сопоставлена вторая строка  $q_{n-\rho}$  посредством соотношения, справедливого для каждого элемента строки:

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \quad (1)$$

где  $i$  и  $j$  по отдельности упорядочены и вместе образуют полную перестановку чисел от 1 до  $n$ . Строка  $q_{n-\rho}$  состоит из  $\binom{n}{\rho}$  детерминантов степени  $n-\rho$ ,  $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$ , образованных из матрицы  $n-\rho$  строк  $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$ , контрагredientных к  $x$ . Эти строки удовлетворяют  $\rho(n-\rho)$  уравнениям условий:

$$(u^{(k)} | x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha}^{(k)} x_{\alpha}^{(l)} = 0; \quad (k = 1, 2, \dots, n-\rho; l = 1, 2, \dots, \rho). \quad (2)$$

Вместе с Clebsch<sup>2</sup> будем считать их нормированными так, что множитель пропорциональности, который иначе входил бы в (1.), положен равным единице.

По Clebsch<sup>3</sup> (и так же по более поздним исследованиям F. Deruyts и A. Capelli, ср. Введение), самые общие формы можно свести к таким, которые содержат не более одной из каждой из  $n-1$  строк  $p_\rho$ , то есть символически представляются следующим образом:

$$(S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}, \quad (3)$$

где, по аналогии с (2.), положено

$$(S^\rho | p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_\rho} p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}.$$

Из-за нелинейных тождественных соотношений между элементами строки  $p_\rho$  строки символов  $S^\rho$  можно нормировать так, чтобы они удовлетворяли тем же самым тождествам, то есть вели себя как детерминанты  $\rho$ -строчной матрицы, строки которой  $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\rho)}$  контрагredientны к  $x$ .<sup>4</sup> Поэтому каждой строке  $S^\rho$  можно взаимно однозначно сопоставить другую строку  $S_{n-\rho}$  посредством соотношения:

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_\rho}, \quad (4)$$

где снова  $i$  и  $j$  по отдельности упорядочены и вместе в точности исчерпывают числа от 1 до  $n$ . Элементы  $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$  строки  $S_{n-\rho}$  ведут себя как детерминанты, образованные из  $(n-\rho)$  строк  $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$ , когredientных к  $x$ , а строки  $s$  и  $\sigma$  связаны  $\rho(n-\rho)$  условиями:

$$(s^{(k)} | \sigma^{(l)}) = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, \rho; l = 1, 2, \dots, n-\rho). \quad (5)$$

<sup>1</sup>Ср., например: Gordan–Kerscheneiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, S. 99.

<sup>2</sup>а. а. О. § 5.

<sup>3</sup>а. а. О. § 12.

<sup>4</sup>Clebsch, а. а. О. § 4.

Из соотношений (1.) и (4.) следует, что каждый множитель в (3.) допускает эквивалентное четырехкратное символическое представление:

$$\begin{aligned}(S^\rho | p_\rho) &= (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) \\ &= (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} | S_{n-\rho}),\end{aligned}\tag{6}$$

где, как и всюду далее,  $(S^\rho q_{n-\rho})$  и  $(S_{n-\rho} p_\rho)$  служат сокращениями для детерминантов  $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$  и  $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$ ; разложение Лапласа показывает, что они зависят только от строк  $S^\rho, q_{n-\rho}$  соответственно  $S_{n-\rho}, p_\rho$ , на что и должна указывать приведенная запись. Выражения  $(S^\rho | p_\rho)$  и  $(q_{n-\rho} | S_{n-\rho})$  означают, согласно сказанному выше, произведения матриц строк  $s$  и  $x$ , соответственно строк  $u$  и  $\sigma$ , причем под матричным произведением понимается сумма произведений соответствующих детерминантов, то есть значение детерминанта матрицы произведения.

Характеристическое число  $\rho(n - \rho)$ , принадлежащее строке символов (соответственно строке переменных), мы, вслед за Clebsch, называем весом строки;<sup>5</sup> число  $\rho$ , задающее число строк  $s$ , – верхним весовым индексом, а число  $n - \rho$ , задающее число строк  $\sigma$ , – нижним весовым индексом. Из соотношений (4.) следует, что строка символов может входить в одно и то же соотношение один раз с верхним и другой раз с нижним весовым индексом; то же верно для появления соответствующих друг другу строк  $p_\rho$  и  $q_{n-\rho}$ . Отметим еще, что вообще мы обозначаем: строки переменных более высокого уровня, соответствующая матрица которых состоит из строк  $x$ , через  $p$ ; те, матрица которых состоит из строк  $u$ , через  $q$ ; строки символов, когредииентные к  $x$ , малыми греческими буквами  $\sigma, \tau, \alpha, \beta$ ; строки символов, когредииентные к  $u$ , малыми латинскими буквами  $s, t, a, b$ ; все остальные строки символов – большими латинскими буквами с весовым индексом:  $S^\rho, T^\tau, A^\rho$  или  $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$ . В соответствии с верхним или нижним весовым индексом мы также пишем отдельные элементы строки с верхними или нижними индексами, как, например, в (4.).

---

<sup>5</sup>а. а. О. § 11.

## § 2. Представление матричными произведениями.

В дальнейшем под “матричным произведением” мы всегда понимаем сумму по произведениям соответствующих детерминантов двух матриц с одинаковым числом строк, где строки второй матрицы контрагredientны строкам первой. При этом строки каждой матрицы могут: 1. быть заданы по отдельности, 2. как в (6.) быть объединены в одну строку  $S^\rho$ , 3. быть объединены в различные строки  $S^\rho, S^\sigma \dots$ . Матричное произведение будем обозначать символом  $( \mid )$ , использованным в (6.). Представление (6.) является специальным применением второй формулировки теоремы о соответствующих матрицах: “Каждому  $\rho$ -строчному матричному произведению  $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$  сопоставлен детерминант; и обратно, каждому детерминанту можно сопоставить матричное произведение заранее заданного числа строк  $\rho$  ( $\rho = 1, 2, \dots, n - 1$ )”.<sup>1</sup> В самом деле, достаточно лишь объединить строки  $y$  в одну строку  $p_\rho$  (соответственно строки  $v$  в одну строку  $q_\rho$ ) и выполнить подстановки, заданные (1.), чтобы от данного матричного произведения перейти к детерминанту и обратно. Значение детерминанта при этом, однако, не задается его отдельными элементами, а получается только через разложение Лапласа. Итак, поскольку детерминант и матричное произведение оказываются эквивалентными, теорему о символической представимости форм (первую фундаментальную теорему) можно выразить также следующим образом:

*Теорема I:* “Все инвариантные образования можно символически представить матричными произведениями, и обратно, все матричные произведения являются инвариантными образованиями”.<sup>2</sup>

Представление матричными произведениями позволяет преодолеть существенную трудность неявного представления, вызванную детерминантным представлением.<sup>3</sup> Под “явным представлением” мы здесь понимаем такое, в которое входят только сами строки  $S^\rho, T^\tau, \dots$  или строки  $R^\rho$ , однозначно выводимые из них, но в котором отдельные частичные строки  $s, t, \dots$  уже не появляются. В § 6 мы для всех инвариантных образований, которые зависят только от строк символов  $S^\rho, T^\tau, \dots$ , получим явное представление через эти строки символов, а тем самым и перенос порождающих процессов, процесса свертки и процессов дифференцирования, на  $n$ -арную область. Возможность явного представления становится понятной из того, что только простейшие матричные произведения можно прямо сопоставить детерминантам, возникающим в детерминантном представлении; следовательно, все остальные матричные произведения являются объединениями разных детерминантов в одно выражение. Ведь если разложить строки символов и строки переменных на отдельные строки  $s, u, x$ , то по первой фундаментальной теореме в ее обычной форме необходимо должен возникнуть агрегат детерминантов. Доказательство того, что, обратно, все агрегаты детерминантов, представляющие инвариантные образования заранее заданных основных форм, можно объединить в явные матричные произведения, получается с использованием второй фундаментальной теоремы (§ 6).

Чтобы теперь из двух строк символов  $S^\sigma, T^\tau$  с помощью строк переменных получить инвариантное образование основной формы  $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$ , явно содержащее все строки (процесс свертки), достаточно образовать матричное произведение третьего типа по определению, данному в начале этого параграфа:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

В развернутом виде (7.) дает:

$$\begin{aligned} & \left( v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(\sigma)} \mid \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)} \right) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

<sup>1</sup>Для  $\rho > n$  матричное произведение, как известно, равно нулю; для  $\rho = n$  оно переходит в произведение двух детерминантов.

<sup>2</sup>Инвариантными образованиями заранее заданных основных форм являются, конечно, лишь такие агрегаты матричных произведений, которые зависят от строк символов  $S^\rho \dots$

<sup>3</sup>Ср. Введение.

то есть выражение, зависящее только от строк  $S, T, q, p$ . Здесь  $\varepsilon = \pm 1^4$ , а сумму следует понимать так: индексы каждой строки  $S \dots$  упорядочены между собой по возрастанию, и для каждой комбинации  $i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$  как  $k$ , так и  $l$  по отдельности пробегает все еще возможные перестановки чисел  $i$ . Число  $\lambda$ , входящее в (7.), мы называем дефектом свертки в случае  $\sigma \geq \tau$ ; причина этого последнего ограничения выяснится в § 6.<sup>5</sup>

Детерминанты двух матриц, входящих в (7.), можно рассматривать как элементы новых строк  $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$ , сопоставленные которым строки пусть будут  $Q_\lambda, P^\lambda$ . Эти строки  $Q, P$  можно, по (8.), выразить через исходные  $S$  и  $q$ , соответственно через  $T$  и  $p$ . Мы обозначаем это уравнениями:

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{или также} & \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{или также} & \quad P^\lambda = [T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

С учетом (4.) тогда, аналогично (6.), для матричного произведения (7.) справедливо эквивалентное четырехкратное символическое представление:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) &= (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma P^\lambda) \\ &= (Q_\lambda T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) \\ &= (-1)^{\lambda(n-\lambda)} \left( P^\lambda \middle| Q_\lambda \right). \end{aligned} \quad (10)$$

Еще одну подстановку новых строк можно выполнить в (7.), положив:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) = \left( R^{\sigma+\lambda} \middle| p_{\sigma+\lambda} \right) (R^{\tau-\lambda} p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

И здесь (8.) показывает, что произведения элементов строк  $R$  однозначно выражаются через строки  $S$  и  $T$ . Подстановки (9.) и (11.) будут применяться в частности тогда, когда вместе с (7.) выполняется дальнейшая свертка с другими строками.

Матричное представление позволяет нам инвариантно записать квадратичные соотношения между элементами строки  $p_\rho$  (из которых, как известно, следуют все остальные), то есть, по § 1, линейные по коэффициентам основной формы соотношения, которым удовлетворяют строки  $S^\rho$ . Это тождества:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

где  $p$  и  $q$  следует рассматривать как произвольные величины. В § 5 мы увидим, что тождества с нечетным числом дефекта  $\lambda$  являются следствием тождеств более высокого дефекта. Соотношения (12.) являются прямым следствием соотношений (5.); действительно, имеем:

$$\begin{aligned} &(q_{n-\rho-\lambda} S^\rho | S_{n-\rho} p_{\rho-\lambda}) \\ &= (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}), \end{aligned}$$

и применение теоремы о произведении вследствие (5.) дает нулевой  $(n - \lambda)$ -строчный детерминант. Тождества (12.) утверждают, что для отыскания всех типов сверток достаточно сворачивать произведение форм, линейных в каждой строке переменных; или также, по § 6, что нормированная форма  $(S^\rho | p_\rho)^m$  не имеет инвариантного образования, линейного по коэффициентам.<sup>6</sup>

Условия (12.) также достаточны для характеристики строк  $p_\rho$ . Поскольку свойство того, что отдельные элементы  $p_\rho$  являются детерминантами матрицы, инвариантно, оно должно также иметь инвариантное выражение; а условия (12.), по теореме VI, задают наибольшее возможное инвариантное ограничение для  $p_\rho$ , а именно то, что линейная форма, образованная из строки  $p_\rho$  как из коэффициентов, вообще не имеет инвариантных образований.

<sup>4</sup>Это обозначение будет сохраняться всюду далее.

<sup>5</sup>Число  $\lambda$  всегда пробегает до меньшего из двух последних указанных чисел.

<sup>6</sup>Ср. дополнение Study в сочинениях Graßmann, первый том, вторая часть, с. 510 (условие, что величина  $S^\rho$  является простой).



### § 3. Символические тождества.

Теперь нам нужно перенести вторую фундаментальную теорему символического метода, а именно установить всю совокупность неприводимых неразложимых тождеств, в которых все строки  $S^\rho, p_\rho$  рассматриваются как неразложимые. При этом условимся еще о следующем. Соответственно значению строк символов и строк переменных составными следует считать те тождества, которые возникают, когда строку переменных  $p_\rho$  специализируют до  $p_{\rho-1}u$  и к возникающим выражениям применяют одно из тождеств системы; с другой стороны, тождества, содержащие  $k$  строк символов, должны считаться неразложимыми даже тогда, когда они возникают из тождеств с меньшим числом строк символов при помощи указанного процесса. Строки  $S^\rho, p_\rho$  не обязаны входить в тождества явно; для их понимания как неразложимых величин достаточно доказать, что возникающие матричные произведения зависят только от этих строк. Но мы покажем, что в этом случае, отчасти с применением подстановки (11.), всегда можно получить явное представление. Общие тождества мы получаем при помощи принципа матричного представления из специальных тождеств, данных Pascal, которые содержат только строки  $x$  и  $u$  и являются прямым переносом тождеств, данных Study для тернарной области:<sup>1</sup>

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left( a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (13)$$

$$\sum \pm \left( a^{(1)} \middle| x^{(1)} \right) \left( a^{(2)} \middle| x^{(2)} \right) \dots \left( a^{(n)} \middle| x^{(n)} \right) = (a^{(1)} \dots a^{(n)}) (x^{(1)} \dots x^{(n)}). \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \left( u \middle| a^{(i)} \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u|x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}). \quad (15)$$

Еще два тождества получаются из (13.) и (15.) подстановками  $(a^{(i)} \mid x) = (a^{(i)} q_{n-1})$  соответственно  $(u \mid a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$ , так что в нашем понимании их не следует считать существенно отличными. (14.) представляет теорему о произведении для детерминантов; мы покажем, как можно заменить (13.) и (14.) (а дуалистически также (15.) и (14.)) системой подходящим образом образованных теорем о произведении для матриц. Теорема о произведении, образованная один раз для  $\rho$ -строчных и один раз для  $(\rho - 1)$ -строчных матриц, имеет вид:

$$\begin{aligned} \left( a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) &= (a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \mid x y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= \sum \pm \left( a^{(1)} \middle| x \right) \left( a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left( a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right), \\ \sum \pm \left( a^{(2)} \middle| y^{(2)} \right) \dots \left( a^{(\rho)} \middle| y^{(\rho)} \right) &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \mid y^{(2)} \dots y^{(\rho)}) \\ &= (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}); \end{aligned}$$

и отсюда следует система теорем о произведении, где  $\rho = 2, 3, \dots, n$ :

$$\begin{aligned} \left( a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho)} \middle| x p_{\rho-1} \right) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left( a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} \mid p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left( a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}). \end{aligned} \quad (16)$$

<sup>1</sup>О формулировке задачи и литературе ср. Введение.

При  $\rho = n$  (16.) переходит в (13.); если далее специализировать  $p_{n-1} = y^{(2)}p_{n-2}$ ,  $p_{n-2} = y^{(3)}p_{n-3}$  и т. д. и применить тождества (16.) к выражениям  $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(2)}p_{n-2})$ ,  $(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(h-1)} a^{(h+1)} \dots a^{(n)} \mid y^{(3)}p_{n-3})$  и т. д., то мы переходим от (13.) к (14.). Следовательно, тождество (14.) по нашему определению составлено из тождеств (16.); или система (16.) эквивалентна тождествам (13.) и (14.). Система (16.) удовлетворяет одному из условий, требуемых для общих тождеств: она содержит строку  $p_{\rho-1}$  как неразложимую величину и одновременно в явной форме. Это единственная система, удовлетворяющая этому и только этому требованию. Ведь из строк  $a, x, p$  мы не можем образовать никаких других детерминантов или матричных произведений; а между ними не может быть соотношений, независимых от (16.), поскольку иначе после исключения  $(a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \mid xp_{\rho-1})$  возникло бы соотношение между  $\rho$  ( $\rho \leq n$ ) выражениями  $(a^{(i)} \mid x)(a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})^2$ , тогда как по (13.) в соотношение должны входить по меньшей мере  $n+1$  таких выражений. Из аналогичных соображений получается система, эквивалентная (15.) и (14.):

$$\begin{aligned} & \left( uq_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(\rho)} \right) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left( u \mid a^{(i)} \right) (q_{\rho-1} \mid a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} \left( u \mid a^{(i)} \right) (p_{n-\rho+1} a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}). \end{aligned} \quad (17)$$

Чтобы перейти от (16.) к тождествам между произвольными строками  $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$ , заметим, что эти тождества должны становиться тождественными с (16.), как только мы разлагаем  $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \dots a^{(\rho_1)}$ ,  $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \dots b^{(\rho_2)}$  и т. д.; и что их также можно объединить в заключительные выражения только при помощи операций, определенных (16.), как только отдельные выражения имеют тип входящих в (16.). Поэтому, если еще положить

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_k \leq n, \quad (18)$$

то получаем:

$$\begin{aligned} & \left( a^{(1)} \dots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \dots b^{(\rho_2)} \dots k^{(1)} \dots k^{(\rho_k)} \mid xp_{\rho-1} \right) \\ &= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} \mid xp_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} \left( a^{(i)} \mid x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &+ (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} \left( b^{(i)} \mid x \right) (b^{(1)} \dots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \dots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &+ \dots \\ &+ (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1}) \rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} \left( k^{(i)} \mid x \right) \\ &\times (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots (K-1)^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}). \end{aligned}$$

Каждая отдельная сумма (но еще не часть суммы) действительно содержит строки  $A^{\rho_1}, B^{\rho_2} \dots$  как неразложимую величину, поскольку она удовлетворяет необходимым и достаточным условиям:<sup>3</sup>

$$\left( a^{(i+1)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right) = 0; \dots; \left( k^{(j+1)} \mid \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

<sup>2</sup>В оригинальной печати и в R823 в этом месте пропущено многоточие; формула (16.) однозначно дает  $a^{(i+1)} \dots a^{(\rho)}$ . Здесь многоточие восстановлено редакционно.

<sup>3</sup>Capelli, а. а. О. § 23, дает достаточные условия:  $(a^{(k)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0$ ,  $(k > i, i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1)$ . Из них необходимые и достаточные условия проще всего следуют применением процесса скобок Пуассона по Wellstein, *Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten*, Math. Ann. 67 (1909), § 3.

Покажем, что она содержит все строки также явно. Действительно, если положить  $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho_1+1} = q_{n-\rho_1+1}$ , то по (16.) и (10.) получаем:

$$\begin{aligned} & \sum (-1)^{i+1} \left( a^{(i)} \middle| x \right) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho_1+1}) \\ &= (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}) \\ &= (A_{n-\rho_1} x p_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\ &= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x). \end{aligned}$$

Если аналогично вычислить остальные суммы и после этого, поскольку строки уже охарактеризованы как различные весовыми индексами, положить  $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$ ,  $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}$ , ..., то получаем искомые тождества:

$$\begin{aligned} & (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | x p_{\rho_1-1}) \\ &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_i} x), \quad (20) \\ &\delta_i = (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1}) \rho_i + (\rho_i + 1)(n + 1). \end{aligned}$$

А из (17.) получаются дуалистические тождества:

$$\begin{aligned} & (u q_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) \\ &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (u A^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \quad (21) \\ &\varepsilon_i = (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1}) \sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma). \end{aligned}$$

*Теорема II.* Тождествами (20.) и (21.) исчерпывается вся совокупность неразложимых тождеств между строками  $A^{\rho_i}, x, p$ , соответственно  $A_{\sigma_i}, u, q$ , и вместе с тем вся совокупность тех неразложимых тождеств, которые допускают явное представление без выполнения подстановки (11.).

Первая часть теоремы следует из соображений, ведущих к (20.) и (21.); вторая часть – из невозможности тождества между двумя строками символов:

$$\begin{aligned} (q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau}) &= \varepsilon_1 (q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) \\ &+ \varepsilon_2 (q_{\rho} q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}), \end{aligned}$$

где  $\rho \leq \tau \leq \sigma$  и ни одна из строк не имеет веса  $1 \cdot (n - 1)$ . (Другие предположения о  $\rho, \tau, \sigma$  можно свести к этому перестановкой обозначений строк.) Эта невозможность следует, например, из развертывания (8.) при специализации  $q_{\rho} = l M^{\rho-1}$ ,  $q_{n-\tau} = l N^{n-\tau-1}$ , если положить  $l_1 = 1$ ,  $M^{2,3,\dots,\rho} = 1$ ,  $A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$ , все остальные элементы строк  $l, M, A$  равными нулю, тогда как  $N$  и  $B$  произвольны. Поскольку тождества между произвольными строками, после разложения строки  $p_{\tau}$  на  $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$ , переходят в тождества, составленные из (20.), вторая часть утверждения будет доказана, как только (20.) можно будет получить из тождеств только с двумя строками символов. Действительно, из

$$\begin{aligned} (A^{\rho_1} A^{\rho_2} | x p_{\rho_1-1}) &= \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | x p_{\rho_1-1}), \quad (20a) \\ &\text{где } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho_1+1}, \end{aligned}$$

посредством специализации  $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$ , то есть посредством

$$\begin{aligned} (B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | x p_{\rho_1-1}) &= \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | x p_{\sigma_1-1}), \\ &\text{где } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1}, \end{aligned}$$

получаем тождество (20.) в трех строках символов; а дальнейшими специализациями  $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$  и т. д. – общие тождества (20.). Следовательно, несуществование явного представления тождества между двумя строками символов и двумя произвольными строками переменных влечет несуществование и при произвольно многих строках символов, если среди строк переменных нет строки  $x$  или  $u$ .

## § 4. Тождества разложения.

Теперь рассмотрим самый общий случай тождеств между произвольными строками символов и строками переменных, в заключительных выражениях которых без выполнения подстановки (11.) строка  $p_\tau$  появляется разложенной на отдельные строки  $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$ , и будем называть такие тождества тождествами разложения. Опираясь на замечание в конце предыдущего параграфа, сначала определим их для случая только двух строк символов, то есть развернем выражение  $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$ . При этом положим:

$$\begin{aligned} q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &\sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}, \\ p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} &= y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}, \\ p_\tau &= y^{(1)} \dots y^{(\tau)}. \end{aligned} \quad (22)$$

Относительно чисел  $\rho, \sigma, \tau$  надо различать четыре случая:

- 1)  $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2)  $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3)  $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4)  $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma.$

Выделим первый из них, а затем кратко охарактеризуем остальные. По (20.), (10.) и (9.), если разложить строку  $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$  на  $y^{(1)}$  и  $y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ , получаем:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= (q_{\rho-1}^{(1)} A^\sigma | y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &\quad + (-1)^\rho (q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} | y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \end{aligned} \quad (23)$$

Последний член в (23.) имеет точно форму исходного выражения – только  $\sigma$  заменено на  $\sigma - 1$ , а  $\tau$  на  $\tau - 1$ , – значит, он снова допускает равенство (23.). Поэтому, так как  $\tau \leq \sigma$ , мы можем применить операцию (23.)  $\tau$  раз и с учетом (10.) приходим к соотношению:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left( q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} | y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right). \end{aligned} \quad (24)$$

Каждый член под знаком суммы снова имеет тип исходного выражения: в нем  $\rho$  заменено на  $\rho - 1$ ,  $\sigma$  на  $\sigma - i_1 + 1$ ,  $\tau$  на  $\tau - i_1$ , так что условие 1) выполнено еще сильнее. Поэтому, так как  $\tau \leq \rho$ , мы можем применить операцию (24.)  $\tau$  раз и получаем нужное тождество разложения:

$$\begin{aligned} &(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ &= \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &\quad + \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} \left( q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)} \right) \\ &\quad + \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} \left( q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)} \right) + \dots \\ &\quad + \varepsilon_{i_\tau} \left( q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} \right) \\ &= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} \left( q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \right). \end{aligned} \quad (25)$$

Для модуля  $\varepsilon$  из (24.) получается:

$$\begin{aligned}\varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \\ \delta_{i_\alpha} &= \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\ &\quad + (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1),\end{aligned}\tag{26}$$

где надо положить  $i_0 = 0$ . Знак суммы в (25.) следует понимать так, что к каждой комбинации  $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$ , где  $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$ , присоединяются все значения  $i_\alpha$ , для которых  $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$ . Отдельные суммы в (25.), как легко убедиться с учетом (26.), удовлетворяют дифференциальным уравнениям, аналогичным (19.):

$$\left( \frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1),\tag{27}$$

и потому зависят только от строки  $p_\tau$ . Значит, тождество разложения является неразложимым тождеством между строками  $A, B, q, p$ ; к явному представлению мы вернемся в следующем параграфе.

В случае 2) операцию (23.) также можно применить  $\tau$  раз, но операция (24.) обрывается после  $\rho$ -го раза. Поэтому в заключительном выражении (25.) первый знак суммы надо заменить на  $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$ . В случаях 3) и 4) операцию (23.) можно выполнить только  $\sigma$  раз; вместо (24.) тогда возникает соотношение:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = (-1)^{\rho\sigma} \left( q_{\rho-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} \middle| A_{n-\sigma} p_{\tau-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)} \right) \\ + \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} \left( q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{(\sigma-i_1+1)} \middle| y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau} \right); \end{aligned}\tag{28}$$

$(\tau - \sigma)$ -кратное повторение (28.), при котором знак суммы переходит в  $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$ , — как показывает  $(\sigma - i_1 + 1)$ -кратное применение (23.) к членам под знаком суммы в (28.), — дает все члены отдельной суммы в (25.), соответствующей индексу  $\alpha = \tau - \sigma$ , с соответствующим знаком. После этого случаи 3) и 4) переходят в случаи 1) и 2), потому что числа, соответствующие  $\sigma, \tau$ , становятся такими:  $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$ ,  $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$ ; а при продолжении процедуры будет  $\tau' < \sigma'$ . Поэтому в заключительном выражении (25.) первый знак суммы надо заменить на  $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau, \rho}$ .

Аналогично из (21.) получается дуалистическое тождество разложения, в котором строка  $q_\rho$  разлагается на отдельные строки  $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$ . Положим

$$\begin{aligned}\dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &\sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \\ \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} &= v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \\ q_\rho &= v^{(1)} \dots v^{(\rho)}.\end{aligned}\tag{29}$$

Тогда имеем:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ = \sum_{\beta=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon \\ \left( \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \middle| A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} \right),\end{aligned}\tag{30}$$

где индекс суммирования  $\beta$  пробегает от большего из нижних значений до меньшего из верхних. Все члены отдельной суммы в (25.) и (30.) являются полярами одной формы, возникшей через полярные процессы

$$\left( \frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \right), \quad \left( q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Чтобы это выразить, обозначим через  $\Pi$  агрегат таких полярных операций, умноженный на постоянные, и тогда вместо (25.) и (30.) получаем соотношение:

$$\begin{aligned}
 & (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) \\
 &= \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \Pi (q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) .
 \end{aligned} \tag{31}$$

## § 5. Тождества разложения в явной форме.

Если в случае 4) в (25.) специализировать  $\tau$  до  $\sigma + \rho$ , то получается:

$$\begin{aligned} (q_\rho A^\sigma | y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)}) &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} (q_\rho | y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)}) \\ &\cdot (A^\sigma | y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})}), \end{aligned} \quad (32)$$

где  $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$ ,  $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$ . Это более общая форма теоремы о произведении для матриц, чем (16.) и (17.); она получается из разложения Лапласа детерминанта продуктовой матрицы

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Следовательно, более общая теорема о произведении составлена из тождеств (20.), соответственно (21.), и этим объясняется выделение специальной формы (16.), (17.).

Соотношение (32.) теперь дает средство для явного представления тождеств разложения. Для этого рассмотрим формы, входящие в (31.), как основные формы; то есть выполним подстановку (11.), которая ничего не меняет в явном представлении через строки  $A, B$ , поскольку по (8.) вновь введенные строки  $R$  выражаются через сами строки  $A, B$ , а не через их частичные строки  $a^{(1)} a^{(2)} \dots, b^{(1)} b^{(2)} \dots$ . Пусть, следовательно,

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} | R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}), \quad (33)$$

тогда для отдельной суммы из (25.), соответствующей индексу  $\alpha$ , получаем:

$$\begin{aligned} &\sum \varepsilon_{i_\alpha} (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \sum \varepsilon_{i_\alpha} ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \varepsilon ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} | p_\tau) = \varepsilon (R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}). \end{aligned} \quad (34)$$

Тем самым действительно задано явное заключительное выражение, а симметрическая форма, в которой входят  $q_\rho$  и  $p_\tau$ , показывает, что (30.) приводит к тому же заключительному выражению, которое поэтому не зависит от исходного разложения. Различие между (25.) и (30.) существует лишь до тех пор, пока сами строки  $y$  и  $v$  имеют самостоятельное значение, то есть пока тождество разложения по нашему определению переходит в разложимое тождество. Чтобы перейти к тождествам с большим числом строк символов, нужно по § 3 (конец) лишь разложить строку  $q_\rho$  в  $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ , соответственно  $p_\tau$  в  $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$ . Тогда возникают выражения:

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} | [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]_\lambda R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} | p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}), \quad (35)$$

а они имеют точно тот же тип, что и в случае двух строк символов, и потому при подстановке, соответствующей (33.), снова допускают явное представление; повторением получается явное представление для произвольного числа строк. Стоит еще отметить, что первая и последняя суммы в (25.), соответственно (30.), дают явное представление без применения (33.), только по формуле (32.), или вообще сводятся к одному члену, явно содержащему все строки. Соотношение, возникающее из (32.) при разложении  $q_\rho$  в  $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$  и т. д., можно рассматривать как теорему о произведении в ее самой общей форме.

Подводя итог, покажем:

*Теорема III.* Тождествами

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \varepsilon (R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}), \quad (36)$$

где строки  $R$  определяются через (33.), и тождествами, возникающими из них при разложении  $q_\rho, p_\tau$  в  $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$  и т. д., исчерпывается вся совокупность неразложимых тождеств.

Действительно, возникающие тождества являются самыми общими в своем роде, поскольку отдельные строки уже не подчиняются никаким ограничениям по весу и числу, как это еще было в случае (20.), (21.). Но между этими строками не существует и никаких других тождеств: при разложении строки  $p_\tau$  в  $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$  самые общие тождества составлены из (20.), следовательно, по § 3 (конец), из (20а.); причем композиция, обсуждавшаяся после (16.), есть именно та, которая проведена в § 4. Переход к произвольному числу строк, как показывает обсуждение (20а.), дает применение одной и той же операции к выражениям, возникающим при разложении  $q_\rho$  в  $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$  и т. д. Отсюда также следует, что прямой переход от (20.) вместо (20а.) не дает ничего нового; это легко подтвердить вычислением, если один раз специализировать строку  $q_\rho$  в (25.), а другой раз выполнить переход от (20.) методом § 4. В обоих случаях возникают одни и те же суммы, которые при применении общей теоремы о произведении (см. выше) переходят в тождества, вытекающие из (36.). Тождества (20.), (21.) соответствуют специальным случаям  $\tau = 1, \rho = 1$ ; тогда появляются только по две отдельные суммы, а значит, согласно замечанию выше, явное представление без подстановки (33.), что согласуется с прежним.

В заключение кратко упомянем еще два специальных случая тождества разложения. Если в (31.) положить  $\tau = \sigma, \rho = n - \sigma$  и обозначить строку  $p_\tau$  как  $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$ , то получается:

$$(A^\sigma | p_\sigma) (B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma) (B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

Это формула Клебша<sup>1</sup> для разложения формы с двумя когредидентными строками  $p_\sigma, p'_\sigma$  по элементарным ковариантам. Элементарные коварианты, принадлежащие форме  $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$ , тогда следующие:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon (q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

Они, как мы коротко будем говорить, возникают из основной формы через “когредидентную свертку с дефектом  $\rho$ ” (ср. § 2).

Во-вторых, если положить  $\tau = \sigma - \lambda, \rho = n - \sigma - \lambda; B^\sigma = A^\sigma$ , то получается:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) = (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \quad (39)$$

Следовательно, как отмечено в § 2, условия (12.), характеризующие строки символов, при нечетном дефекте  $\lambda$  являются следствием условий более высокого дефекта. Для линейной формы  $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$  из (39.) следует, что ее неприводимые инвариантные образования, квадратичные по коэффициентам, сводятся к образованиям четного дефекта; это согласуется с известным фактом, что линейная форма в бинарной и тернарной областях не имеет инвариантных образований.

Заметим, что общие тождества первоначально были выведены при предположении, что отдельные строки удовлетворяют условиям (12.). Однако, поскольку эти отдельные строки входят в тождества только линейно, последние справедливы и для более общих строк, не удовлетворяющих условиям (12.).

<sup>1</sup>Clebsch, а. а. О., S. 25–32. Клебш доказывает, что отдельные члены правых частей зависят только от строк  $A, B$ ; явное представление получалось бы применением (32.) к его выражениям  $\Phi_h$ .



## § 6. Явное представление инвариантных образований. Процессы свертки и дифференцирования.

Результаты предыдущих параграфов позволяют завершить сформулированную в § 2 теорему о символической представимости (первую фундаментальную теорему), добавляя явную представимость; а именно мы покажем:

*Теорема IV:* “Все инвариантные образования произвольных основных форм можно явно представить матричными произведениями; то есть в заключительные выражения, кроме строк переменных  $p_\rho$ , входят только строки  $S^\sigma, \dots, T^\tau$  исходных форм или строки  $P, Q, R$ , полученные из них подстановкой (9.) или (11.).”

Для доказательства предположим, что инвариантное образование, кроме строк переменных, может зависеть от строк  $S^\sigma, \dots, T^\tau$ ; причем эти строки достаточно далеко разложены на отдельные строки:  $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$ , чтобы сделать возможным представление детерминантами. Пусть строки упорядочены в произвольном самом по себе, но фиксированном порядке  $S^\sigma, \dots, T^\tau$ . Выделим такой агрегат детерминантов, который зависит от первой полной строки  $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$ , а не только от отдельных ее частичных строк. По § 3–§ 5 эта зависимость является следствием общих тождеств. Если теперь разложить строку переменных  $p_\rho$  в строки  $y, v$  или одну из последующих строк  $T$  в отдельные строки  $t$ , соответственно  $\tau$ , то самые общие тождества составлены из (20.), (21.). Но эти последние тождества всегда приводят к выражению, явно содержащему строку  $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$ , то есть к левой стороне (20.), (21.); через (19.) действительно убеждаемся, что только полная сумма справа, а не ее часть, соответствующая члену (20а.), обладает свойством зависеть только от  $S^\sigma$ . При продолжении процедуры все строки, однажды вошедшие явно, остаются явно сохраненными; применение тождеств может потребовать лишь объединения нескольких строк в одну, то есть подстановки (9.). Если наконец остается привести к явной форме только одну строку  $T^\tau$ , возможны два случая. Может еще появляться свободная строка переменных, то есть не связанная с другими строками подстановкой (9.); ее разложением на частичные строки  $y$  или  $v$  процедуру можно завершить, и возникают, как в (31.), поляры одной или нескольких форм, явно содержащих все строки. Если же свободной строки переменных больше нет, то по способу их возникновения мы распознаем в совокупности выражений, которые содержат отдельные строки  $t$  или  $\tau$ , но зависят от строки  $T^\tau$ , члены тождества разложения; а они по § 5 при применении подстановки (11.) всегда допускают явное представление во всех строках. Тем самым указанная выше теорема доказана в общем случае. Стоит еще отметить, что если появляются только две строки символов, подстановка (11.) никогда не возникает: действительно, ввиду  $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$  строки переменных могут не входить только тогда, когда обе строки символов объединены в одном детерминанте, то есть появляются явно; как только входят строки переменных, (34.) и (33.) показывают, что подстановка (11.) излишня.

Из сказанного следует, что для порождения всех инвариантных образований достаточно, добавляя строки переменных, объединять строки символов во все возможные матричные произведения. Самое общее матричное произведение имеет форму:

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

где  $P$  и  $Q$  могут быть строками исходных форм, или возникать из исходных строк через последовательность подстановок (9.) или (11.), или, наконец, быть строками переменных. Но выражения (40.) можно породить последовательным объединением попарно строк символов в матричное произведение с помощью строк переменных; ведь из

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

при объединении со строкой  $Q_{\nu_2}$  получаем выражение

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} | Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

и, продолжая процедуру, получаем выражение (40.). Если при этом  $P$  и  $Q$  не являются строками исходных форм, то (9.) и (11.) вместе с только что доказанным показывают, что они также возникли через последовательность объединений попарно строк символов. Отсюда следует:

*Теорема V:* Процесс порождения всех инвариантных образований, процесс свертки, состоит в последовательном объединении попарно строк символов в матричное произведение с помощью строк переменных.

Из двух строк символов  $S^\sigma, T^\tau$ , где  $\sigma \geq \tau$ , можно образовать следующие матричные произведения:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

Но из (31.) для (42.) и (43.) получаются значения:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi (q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma} S^\sigma)(T_{n-\tau} p_\tau) + \sum_{\beta} \Pi (q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Следовательно, формы (42.) линейно выражаются через (41.) и поляры от (41.), а формы (43.) – через поляры основной формы и форм (41.). Так же из (31.) следует линейная зависимость форм (41.) от (42.) и полярных от (42.). Поэтому по определению Клебша<sup>1</sup> формы (42.) эквивалентны формам (41.), тогда как (43.) сводит обратно к основной форме. Следовательно, порождающий процесс равноправно задается (41.) или (42.); процесс (41.), более простой по числу  $\lambda$ , мы будем определять как процесс свертки. Число  $\lambda$ , дефект свертки (ср. § 2), дает число строк, недостающих до детерминантного произведения, причем именно в том матричном произведении, которое при заданной свертке содержит максимальное число строк. Поскольку  $\lambda$  пробегает только до меньшего из двух значений  $\tau, n - \sigma$ , где  $\sigma \geq \tau$ , то:

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ четное}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ нечетное}. \quad (44)$$

Сведение (42.) и (43.) к (41.) остается справедливым и тогда, когда при дальнейшей свертке строки  $p, q$  перешли в строки символов; ведь по (36.) получается:

$$(A^{n-\tau-\kappa} T^\tau | S_{n-\sigma} B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon (R^{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} R_{n-\sigma-\alpha}),$$

где строки  $R$  возникли из  $S$  и  $T$  по (33.). Значит, эти формы, содержащие только строки символов, получают сверткой  $(q_\tau A^{n-\tau-\kappa} | B_{\sigma-\kappa} p_{n-\sigma})$  соответственно  $(q_{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} p_{n-\sigma-\alpha})$  – в зависимости от того,  $\sigma - \tau \geq 2\kappa$  – с основной формой и формами (41.).

Из символического процесса свертки известным способом получают инвариантные процессы дифференцирования: нужно лишь заменить строки символов  $S^\sigma, T_{n-\tau}$  строками дифференциальных символов  $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ , причем, как известно, каждому произведению  $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$  соответствует реальное значение  $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ . Поскольку строки  $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$  когреддиентны строкам  $S^\sigma, T_{n-\tau}$ , они удовлетворяют тем же тождествам, что и эти строки, в частности также тем, которые существуют между (42.) и (42a.), (43.) и (43a.). Подводя итог, получаем:

*Теорема VI:* Все инвариантные образования произвольных основных форм возникают из них повторным применением символического процесса свертки (41.) или также инвариантных процессов дифференцирования:

$$\left( q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

Остается заметить, что при каждой свертке (41.) общий вес формы, то есть сумма весов отдельных строк переменных (ср. § 1), уменьшается на положительное число  $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$ . Отсюда,

<sup>1</sup>Clebsch, a. a. O. § 7.

независимо от общего доказательства конечности, следует конечность ряда форм, то есть совокупности инвариантных образований данной основной формы, линейных по коэффициентам.<sup>2</sup>

Далее заметим, что теорема VI остается справедливой также для форм, не удовлетворяющих условиям (12.). Действительно, каждый множитель из (3.),  $(S^p|p_\rho)^{m_\rho}$ , можно заменить произведением  $m_\rho$  линейных множителей  $(A^p|p_\rho)(B^p|p_\rho)\cdots(M^p|p_\rho)$ ; при этом инвариантные образования переходят в образования системы линейных форм, которые лишь впоследствии нужно приравнять друг к другу. Но для каждой отдельной линейной формы условия (12.), которые при введении дифференциальных символов содержат только частные производные 2-го порядка, всегда выполнены.

---

<sup>2</sup>Ср. Clebsch, а. а. О. § 11 и 12. Конечность системы элементарных ковариантов.

## § 7. Разложение общих форм по нормальным формам.

В дальнейшем, в § 8, мы выведем главное свойство процесса свертки (41.), а именно его составимость из основных сверток. Для этого нужно перенести на  $n$ -арную область важную теорему, которую Mertens<sup>1</sup> дал в кватернарной области. Эта теорема утверждает, что произвольную конечную систему форм можно заменить эквивалентной системой нормальных форм. Под “нормальной формой” мы, обобщая бинарное и тернарное определение<sup>2</sup>, понимаем форму, все инвариантные образования которой, линейные по коэффициентам, тождественно исчезают, за исключением самой основной формы. Поэтому по Теореме VI (§ 6) нормальная форма  $\varphi$  удовлетворяет системе дифференциальных уравнений:

$$\left( q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

где строки  $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$  следует рассматривать как произвольные величины. В кватернарной области, с учетом (39.) при  $\sigma = \tau = 2$ , эти дифференциальные уравнения полностью совпадают с десятью дифференциальными уравнениями, которые Mertens дал без введения произвольных строк  $p, q$  (указ. соч., формула 28)). Знание этих уравнений вместе с Теоремой VI позволяет почти дословно перенести его способ доказательства на  $n$  переменных. Добавить нужно только проверку, получаемую с помощью тождества разложения (30.), что построенные формы являются нормальными формами; в кватернарной области эта проверка еще получается без дальнейшего преобразования. Поэтому достаточно кратко изложить доказательство, причем для простоты в единственном случае, который понадобится далее, а именно для одной основной формы  $f$  и ее ряда форм (ср. конец § 6), поскольку для инвариантных образований произвольной степени по коэффициентам произвольного числа основных форм доказательство остается тем же.

Основная идея доказательства такова: введением преобразованных коэффициентов заменить форму с  $n - 1$  строками  $p_\rho$  формами с  $n$  строками  $\xi$ , когредииентными с  $x$ , то есть строками величин преобразования. Из этих форм искомые нормальные формы непосредственно выводятся инвариантными процессами дифференцирования. Разложение общих форм по нормальным формам опосредуется рядовым разложением для форм с  $\rho$  ( $\rho \leq n$ ) когредииентными строками  $\xi$ ; инвариантные процессы дифференцирования возвращают к формам в исходных строках  $p_\rho$ .

Пусть  $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$  – строки величин преобразования, так что имеем:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Преобразованные коэффициенты форм  $f, \varphi, \dots$  будем обозначать через  $(f), (\varphi), \dots$ , и пусть

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots \\ &\cdot (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \quad (48)$$

где  $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$  и так далее. Из каждого коэффициента  $(f)$ , для которого

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

процесс дифференцирования, точно исчерпывающий строки  $\xi$ ,

$$\begin{aligned} &\left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{k_1 - k_2} \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{k_2 - k_3} \dots \\ &\cdot \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{k_{n-1} - k_n} \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right)^{k_n} \end{aligned} \quad (50)$$

<sup>1</sup>F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (см. Введение), далее цитируется как “Mertens”.

<sup>2</sup>Study, указ. соч., с. 54.

дает форму

$$\varphi = (s^{(1)} | p_1)^{k_1-k_2} (s^{(1)} s^{(2)} | p_2)^{k_2-k_3} \dots \cdot (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} | p_{n-1})^{k_{n-1}-k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \quad (51)$$

Формы  $\varphi$  и есть искомые нормальные формы. Действительно, они обладают следующими свойствами, определяющими нормальные формы.

1. Они являются инвариантными образованиями основной формы  $f$ , линейными по коэффициентам. Это следует из того, что они возникают из  $f$  с помощью инвариантных процессов дифференцирования  $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \left| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)} \right.\right)$  и (50.). Следовательно, по концу § 6, они линейно выражаются через поляры конечного ряда форм  $f$ . Эти поляры получают, рассматривая переменные  $p_\rho$ , входящие в  $\varphi$ , как коэффициенты формы, разложенной на линейные формы со строками переменных  $p_\rho$ :

$$H = (q_{n-1} | p_{n-1})^{k_1-k_2} (q_{n-2} | p_{n-2})^{k_2-k_3} \dots \cdot (q_1 | p_1)^{k_{n-1}-k_n}. \quad (52)$$

Симультанные инварианты рядов форм  $f$  и  $H$  дают все поляры, которые здесь входят в рассмотрение, так как последние должны иметь в отдельных строках  $p_\rho$  ту же размерность, что и сама  $\varphi$ .

2. Они удовлетворяют дифференциальным уравнениям (46.). Если применить к  $\varphi$  дифференциальный процесс (45.), то получается:

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

Из тождества разложения (30.) следует, если строки  $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$  и  $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$ , образованные из строк  $s$ , отождествить с входящими там  $q_\rho, p_\tau$ , что

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon \left( \dot{q}_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} \left| p_{\sigma+\lambda} \dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \right. \right).$$

При этом

$$\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

где  $i_1, \dots, i_\beta$  означают произвольные  $\beta$  попарно различные числа, выбранные из чисел от 1 до  $\sigma$ . Так как  $\beta > \sigma - \tau$ , среди этих чисел  $i_1, \dots, i_\beta$  необходимо есть такие, которые лежат между 1 и  $\tau$ ; поэтому  $\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$  тождественно исчезает, а следовательно исчезает каждое отдельное матричное произведение и вместе с ним  $\varphi'$ .

Для эквивалентности системы нормальных форм с рядом форм  $f$  остается только показать, что все формы ряда форм раскладываются по полярам нормальных форм в смысле, зафиксированном в пункте 1. Пусть  $\Pi$  – агрегат полярных операций

$$\left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \left| \xi^{(k)} \right. \right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho), \quad (53)$$

и пусть  $\Pi^\sigma$  – агрегат тех специальных операций (53.), для которых  $i = \sigma$  и  $k < \sigma$ . Для формы  $F$  от  $\rho$  строк  $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ , имеющей в строке  $\xi^{(\rho)}$  степень  $k_\rho$ , справедливо разложение<sup>3</sup>:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

где  $F_\alpha$  имеет степень  $\alpha$  в последней строке  $\xi^{(\rho)}$  и возникает из  $F$  с помощью инвариантных дифференциальных операций

$$\left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \left| \xi^{(1)} \dots \xi^{(\rho)} \right. \right)^\alpha \quad (55)$$

<sup>3</sup>F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Формула 20).

и  $\Pi^\rho$ . Если при построении  $F_\alpha$  заменить процесс (55.) на

$$\left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \Big| p_\rho \right)^\alpha, \quad (56)$$

то возникает форма  $F_\alpha(p_\rho)$  только с  $\rho - 1$  строками  $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$ , к которой снова можно применить (54.). Продолжение процедуры приводит к формам  $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$ . Чтобы из них получить разложение  $F$  по (54.), нужно отдельные строки  $p_\rho$  заменить на  $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$  и к возникающим формам применить полярный процесс  $\Pi$  (53.); это дает, ср. (48.), сумму преобразованных коэффициентов ( $G$ ). При  $\rho = n$  на первом шаге сохраняется процесс (55.). Если  $c$  означает числовые постоянные и, для краткости, положено

$$\begin{aligned} (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)}) &\sim \Delta, \\ \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) &= \nabla, \end{aligned} \quad (57)$$

то в случае  $\rho = n$  получается:

$$F = \sum c \Delta^\alpha(G), \quad (58)$$

тогда как при  $\rho < n$  справа входит только  $\alpha = 0$ , то есть  $\sum c(G)$ .

Применим (58.) к преобразованному коэффициенту ( $f$ ) (48.). В силу коммутативности полярных процессов  $\Pi^\sigma$  со всеми операциями (56.), для которых  $\rho \geq \sigma$ , и потому что поляры преобразованных коэффициентов снова дают преобразованные коэффициенты, получаем:

$$\begin{aligned} G &= \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \Big| p_1 \right)^{\beta_1} \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \Big| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \\ &\quad \cdot \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \Big| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi, \end{aligned}$$

и из (58.) следует:

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha(\varphi) \quad (\text{Mertens, формула 23}). \quad (59)$$

Чтобы перейти от (59.) к разложению самой  $f$ , снова рассмотрим переменные  $p_\rho$  как коэффициенты формы  $H$  (52.) со степенями  $m_1, \dots, m_{n-1}$ , соответствующими  $f$ , и пусть  $m = m_1 + \dots + m_{n-1}$ . Тогда по определению инвариантов

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

а применение процесса  $\nabla^m$ , точно исчерпывающего строки  $\xi$ , дает:

$$f = \sum c \Phi, \quad (60)$$

где формы  $\Phi$  выводятся из  $\varphi$  и  $H$  инвариантными процессами дифференцирования по переменным, то есть являются симультанными инвариантами рядов форм  $\varphi$  и  $H$ .<sup>4</sup> Но так как  $\varphi$  является нормальной формой, ряд форм  $\varphi$  сводится к самой форме  $\varphi$ ; ряд форм  $H$  содержит все вообще возможные инвариантные соединения переменных. Поэтому симультанные инварианты  $\varphi$  и  $H$  являются полярами  $\varphi$  в смысле, указанном в пункте 1; то есть (60.) дает разложение  $f$  по полярам нормальных форм. Теперь нужно еще доказать такое же разложение для произвольной формы  $\theta$  из ряда форм  $f$ . Пусть  $\Gamma$  – нормальные формы, выведенные из  $(\theta)$  с помощью (50.), так что

$$(\theta) = \sum c \Delta^\beta(\Gamma). \quad (61)$$

<sup>4</sup>Вместо прямого заключения Mertens в § 7 вводит ряд дальнейших дифференциальных процессов, которые по существу служат построению ряда форм  $H$ ; у нас это выполняет Теорема VI.

Формы  $\theta$  характеризуются отношением, справедливым для каждого преобразованного коэффициента:

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Mertens, формула 9}).$$

Но каждая форма  $F$  от  $n$  строк  $\xi$ , содержащая множитель  $\Delta^\sigma$ , содержит также второй выраженный член  $\nabla^\sigma \Pi F$  (Mertens, формула 20)); отсюда

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \quad \text{следовательно} \quad \Gamma = \sum c\varphi,$$

и поэтому из (61.) имеем отношение, соответствующее (59.):

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

которое для  $\theta$  влечет разложение (60.) по полярам нормальных форм  $\varphi$ . Подводя итог, получаем:

*Теорема VII.* Каждый ряд форм  $f$  можно заменить эквивалентной системой нормальных форм.

## § 8. Сведение процесса свертки к основным сверткам.

Опираясь на Теорему VII, мы теперь проводим упомянутое в начале § 7 сведение процесса свертки к основным сверткам. При этом (ср. § 5) всякую свертку двух когredientных рядов  $S^\rho, T^\rho$  будем называть “когredientной сверткой”, а именно когredientную свертку дефекта 1 двух рядов  $S^\rho, T^\rho$  — “основной сверткой типа  $\rho$ ”. Тогда, в дополнение к Теореме VI, мы докажем следующую теорему.

*Теорема VIII.* Общий процесс свертки (41.) можно составить из  $(n - 1)$  основных сверток типа  $\rho$ , где  $\rho = 1, 2, \dots, n - 1$ . Иными словами, для порождения всех инвариантных образований достаточно последовательного применения этих  $n - 1$  основных сверток.

В бинарной области процесс свертки (41.) прямо совпадает с единственно возможной основной сверткой; в тернарной области я доказала Теорему VIII в § 1 своей диссертации (ср. Введение). Там, вследствие (44.), общие когredientные свертки еще тождественны основным сверткам, и существенно, что Теорема VIII для  $n$  переменных дает сведение именно к основным сверткам, а не только гораздо более слабое сведение к когredientным сверткам. Доказательство по идее построено по тернарному образцу: самые общие свертки конструируются из основных сверток с помощью символических тождеств. Мы будем порождать:

1. произвольные свертки дефекта 1 с помощью когredientных сверток дефекта 1, то есть с помощью основных сверток (аналог тернарного случая);
2. произвольные свертки дефекта  $\lambda$  с помощью когredientных сверток дефекта  $\lambda$  и произвольных сверток дефекта 1;
3. когredientные свертки дефекта  $\lambda$  с помощью когredientных сверток дефекта  $\lambda - 1$  и произвольных сверток дефекта 1.

При этом существенно, что по Теореме VII мы предполагаем обе формы  $S$  и  $T$ , которые нужно свернуть, нормальными формами. Следовательно, по (46.) имеют место соотношения:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda} S^{\sigma_1} | S_{n-\sigma_2} p_{\sigma_2-\lambda}) &= 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2, \lambda = 1, 2, \dots, \sigma_2, n - \sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda} T^{\tau_1} | T_{n-\tau_2} p_{\tau_2-\lambda}) &= 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2, \lambda = 1, 2, \dots, \tau_2, n - \tau_1). \end{aligned} \quad (62)$$

Далее, по § 2 (конец), достаточно считать формы  $S$  и  $T$  линейными по всем строкам переменных; то есть построенные формы принадлежат следующему ряду форм:

$$f = (S^1 | p_1) (S^2 | p_2) \cdots (S^{n-1} | p_{n-1}) (T^1 | p_1) (T^2 | p_2) \cdots (T^{n-1} | p_{n-1}).$$

1) Порождение свертки  $(q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$ , где  $\sigma > \tau$ , из основных сверток типа  $\tau + \alpha$ ;  $\alpha = 0, 1, \dots, \sigma - \tau$ . Из основной свертки типа  $\tau$

$$(q_{n-\tau-1} S^\tau | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$$

с помощью подстановки  $w \sim T_{n-\tau} p_{\tau-1}$  получаем форму ряда форм  $f$  с тремя строками верхнего весового индекса (ср. § 1)  $\tau + 1$ :

$$(w S^\tau | p_{\tau+1}) (S^{\tau+1} | p_{\tau+1}) (T^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (63)$$

Основная свертка типа  $\tau + 1$ , примененная к (63.), дает:

$$(q_{n-\tau-2} w S^\tau | S_{n-\tau-1} p_\tau);$$

отсюда по (31.), после подстановки  $q_{n-\tau-2} w = q'_{n-\tau-1}$ , получается значение:

$$\varepsilon (q_{n-\tau-2} w S^{\tau+1} | S^\tau p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau, n-\tau-1} \Pi (q'_{n-\tau-1-\alpha} S^{\tau+1} | S_{n-\tau} p_{\tau-\alpha}).$$



Выражение под знаком суммы тождественно исчезает по (62.); тем самым мы приходим к форме

$$(wS^{\tau+1}|p_{\tau+2}) (S^{\tau+2}|p_{\tau+2}) (T^{\tau+2}|p_{\tau+2}),$$

которая получается из (63.) заменой  $\tau$  на  $\tau + 1$ . Поэтому  $(\sigma - \tau)$ -кратное повторение процесса приводит к искомой свертке:

$$(wS^\sigma|p_{\sigma+1}) = \varepsilon (q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1}).$$

Проведенный процесс кратко обозначим формулой:

$$T^\tau S^\tau, S^{\tau+1}, S^{\tau+2}, \dots, S^\sigma; \quad (64)$$

мы видим, что используется только свойство  $S$  быть нормальной формой, но не соответствующее свойство  $T$ . Дуалистический к (64.) процесс можно провести в обратном порядке, используя лишь свойство  $T$  быть нормальной формой, а именно:

$$S^\sigma T^\sigma, T^{\sigma-1}, T^{\sigma-2}, \dots, T^\tau, \quad (65)$$

по соотношениям:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon (T_{n-\sigma}y|p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}|T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}) &= \varepsilon (T_{n-\sigma+1}y|p_{\sigma-2}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1}T^\tau|T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon (q_{n-\sigma-1}S^\sigma|T_{n-\tau}p_{\tau-1}). \end{aligned}$$

Следует еще указать на связь с убыванием общего веса, приведенным в конце § 6: для сверток дефекта 1 это убывание имеет значение  $2(1 + (\sigma - \tau))$ , а для основных сверток – значение  $2 \cdot 1$ . Поэтому, если составимость из основных сверток вообще возможна, необходимо требуются именно  $\sigma - \tau + 1$  таких сверток, как и было проведено выше.

2) Порождение общих сверток из когredientных и основных сверток. Убывание веса для общей свертки (41) равно

$$2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau)) = 2[\lambda^2 + (\sigma - \tau)(1 + (\lambda - 1))],$$

и поэтому дает возможность разложения на когredientную свертку дефекта  $\lambda$  (убывание веса  $2\lambda^2$ ) и  $\sigma - \tau$  сверток дефекта 1 с разностью весовых индексов  $\lambda - 1$  (убывание веса  $2\{1 + (\lambda - 1)\}$ ). В случае  $\lambda = 1$  это разложение совпадает с указанным в пункте 1); мы покажем, что оно действительно реализуется.

Из когredientной свертки дефекта  $\lambda$

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^\tau|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

с помощью подстановки  $R^\lambda \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$  получаем форму с двумя строками верхних весовых индексов  $\tau + \lambda$  и  $\tau + 1$ :

$$(R^\lambda S^\tau|p_{\tau+\lambda}) (S^{\tau+1}|p_{\tau+1}). \quad (66)$$

Строка с меньшим весовым индексом  $\tau + 1$  принадлежит нормальной форме; следовательно, (66.) допускает свертку дефекта 1, составленную из  $\lambda$  основных сверток, в порядке (65.):

$$(R^\lambda S^\tau)S^{\tau+\lambda}, S^{\tau+\lambda-1}, S^{\tau+\lambda-2}, \dots, S^{\tau+1}.$$

Это дает, с учетом (31.) и (62.):

$$(q_{n-\tau-\lambda-1}R^\lambda S^\tau|S_{n-\tau-1}p_\tau) = \varepsilon (R^\lambda S^{\tau+1}|p_{\tau+\lambda+1}),$$

то есть форму, которая получается из (66.) заменой  $\tau$  на  $\tau + 1$ , аналогично тому, как в пункте 1) это произошло с (63.).  $(\sigma - \tau)$ -кратное повторение процесса приводит к искомой свертке:

$$\left(R^\lambda S^\sigma \middle| p_{\sigma+\lambda}\right) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}).$$

Во всем этом процессе использовалось только свойство  $S$  быть нормальной формой; рассмотрение  $T$  как нормальной формы приводит к дуалистическому процессу с полным обращением порядка, по формулам:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda-1}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1} T^\tau | T_{n-\tau-1} R_\lambda p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}). \end{aligned}$$

3) Порождение когredientных сверток дефекта  $\lambda$  из когredientных сверток дефекта  $\lambda - 1$  и основных сверток. Убывание веса для когredientных сверток дефекта  $\lambda$  равно

$$2\lambda^2 = 2((\lambda - 1)^2 + 2\lambda - 1),$$

поэтому оно допускает возможность разложения на когredientную свертку дефекта  $\lambda - 1$  и  $2\lambda - 1$  основных сверток. Это разложение проще всего найти, если сначала специально положить  $n = 2\lambda$ . Единственно возможной когredientной сверткой дефекта  $\lambda$  будет  $(S^\lambda | T_\lambda) = (S^\lambda | T_{n/2})$ ; она содержит на одну строку  $u$  и одну строку  $x$  меньше, чем свертка дефекта  $\lambda - 1$  тех же самых рядов  $(u S^\lambda | T_\lambda x)$ . Обратно, мы составляем свертку дефекта  $\lambda$  из основных сверток, которые вызывают исчезновение одной строки  $u$  и одной строки  $x$  (убывание веса  $2(n - 1) = 2(2\lambda - 1)$ ) и одновременно порождают новую символическую строку  $R^\lambda$ , а также из когredientной свертки дефекта  $\lambda - 1$ . Простейшая свертка, выполняющая это, есть следующая свертка дефекта 1:

$$(s T^\lambda | \sigma p_\lambda) = \varepsilon(S^{2\lambda-1} | R_{\lambda-1} p_\lambda) = \varepsilon(R^\lambda | p_\lambda),$$

где положено:

$$R^{\lambda+1} = s T^\lambda, \quad s = S^1, \quad \sigma = S_1, \quad R^\lambda \sim \sigma R_{\lambda-1}.$$

По (65.) и (64.) она составлена из следующих  $2\lambda - 1$  основных сверток:

$$T^\lambda S^\lambda, S^{\lambda-1}, \dots, S^1; \quad R^{\lambda+1} S^{\lambda+1}, S^{\lambda+2}, \dots, S^{2\lambda-1}. \quad (67)$$

С учетом (21.) и (62.) свертка дефекта  $\lambda - 1$  дает:

$$(u S^\lambda | \sigma R_{\lambda-1} x) = \varepsilon(R^{\lambda+1} | S_\lambda x) = \varepsilon(s T^\lambda | S^\lambda x) = \varepsilon(S^\lambda | T_\lambda).$$

Общий случай, для двух рядов  $S^\rho, T^\rho$  и произвольного  $n$ , теперь прямо переносится из специального случая. Вместо (67.) появляются следующие  $2\lambda - 1$  основных сверток:

$$T^\rho S^\rho, S^{\rho-1}, \dots, S^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho+1} S^{\rho+1}, S^{\rho+2}, \dots, S^{\rho+\lambda-1}. \quad (68)$$

Первая половина сверток дает форму:

$$(q_{n-\rho-1} T^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda}),$$

из которой с помощью подстановок

$$S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \sim w, \quad T^\rho w = R^{\rho+1}$$

и применения второй половины сверток получается:

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} | R_{n-\rho-1} p_\rho).$$

Если подставить:

$$q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \sim y,$$

то через когредидентную свертку дефекта  $\lambda - 1$  получаем:

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}S^\rho|yR_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}). \quad (69)$$

Покажем, что это и есть искомая свертка дефекта  $\lambda$ . Если подставить

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

и учесть, что после разрешения относительно  $y$  получается

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}R^\lambda|S_{n-\rho}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}|S_{n-\rho}p'_{\rho-1}) = 0,$$

то по (20.) для (69.) получается значение:

$$\varepsilon(S^\rho R^\lambda|p_{\rho+\lambda-1}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1}|[S^\rho R^\lambda]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}).$$

Но эта свертка имеет тип (43.), а значит, эквивалентна

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho|R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(wT^\rho|R_\lambda p_{\rho-\lambda+1}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\rho-\lambda}S^\rho.$$

Здесь  $R_\lambda$  уже имеет требуемую конечную форму; выражение соответствует форме  $(sT^\lambda|S_\lambda x)$  в специальном случае. Если теперь учесть, что после разрешения относительно  $w$  и  $R_\lambda$  получается

$$\begin{aligned} (wR^{n-\lambda}|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}) &= \varepsilon(q'_{n-1}R^{n-\lambda}|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) \\ &= \varepsilon(q''_{n-\sigma-1}S^\rho|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = 0, \end{aligned}$$

то по (21.) получается значение:

$$\begin{aligned} (wq_{n-\rho+\lambda-1}|T_{n-\rho}R_\lambda) &= \varepsilon(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_\lambda]^{n-\lambda}|S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) \\ &\text{эквивалентное} \quad (q_{n-\rho-\lambda}S^\rho|T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}). \end{aligned}$$

Во всем процессе использовалось только свойство  $S$  быть нормальной формой, но не соответствующее свойство  $T$ ; следовательно, когредидентную свертку дефекта  $\lambda - 1$ , нужную для порождения (69.), можно заменить  $2\lambda - 3$  основными свертками и когредидентной сверткой дефекта  $\lambda - 2$ , которая, в свою очередь, снова допускает разложение на основные свертки, и т. д. Аналогично получается порождение при использовании свойства  $T$  быть нормальной формой и применении дуалистического процесса, то есть основных свертков:

$$\begin{aligned} S^\rho T^\rho, \quad T^{\rho-1}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}; \\ R^{\rho-1} T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}, \end{aligned}$$

и свертки, дуалистической к (69.). Теперь возникает свертка, эквивалентная предыдущей:

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^\rho|S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

Добавляя разложение, полученное в пункте 2), мы действительно получаем порождение самых общих свертков из основных свертков. Остается еще доказать, что это порождение, не считая перестановки порядка, однозначно, то есть что каждой свертке соответствует одно и только одно число  $\alpha_\rho$  основных свертков типа  $\rho$ , где  $\rho = 1, 2, \dots, n-1$ .

Пусть  $m_\rho$  обозначают степени в строках переменных  $p_\rho$  исходной формы  $f$ , а  $l_\rho$  — степени формы, возникшей через свертку. Каждая основная свертка типа  $\rho$  преобразует степени  $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$

соответственно в  $m_{\rho-1} + 1, m_{\rho} - 2, m_{\rho+1} + 1$ . Следовательно, числа  $\alpha$  удовлетворяют системе уравнений:

$$m_{\rho} - l_{\rho} = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_{\rho} - \alpha_{\rho+1}, \quad (\rho = 1, 2, \dots, n-1), \quad (70)$$

где следует положить  $\alpha_0 = \alpha_n = 0$ , и определитель этой системы имеет значение  $n$ .<sup>1</sup> Тем самым числа  $\alpha$  определены однозначно, причем по Теореме VIII как положительные целые числа; это дает условия для разностей  $m_{\rho} - l_{\rho}$ .

Результаты этого параграфа справедливы в силу соотношений (62.); однако если соотношения (62.) не выполняются, вовсе не следует считать, что конечные выражения эквивалентны исходным. Данное в § 6 определение эквивалентности допускает также такую формулировку:<sup>2</sup> “Две формы тогда и только тогда эквивалентны, когда они различаются на формы более высокой свертки, то есть на формы с большим убыванием веса”. Это большее убывание веса всегда имеет место, когда обе входящие в свертку строки  $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$  действительно являются строками переменных, как это было в (41.), (42.), в свертках этого параграфа, выступающих как эквивалентные, или также в эквивалентных формах Теоремы VII. Но оно не обязано иметь место, когда эти строки получены из символических строк подстановкой, как это было с формами этого параграфа, которые в силу (62.) выражались друг через друга. Легко видеть, что исчезающие формы отчасти даже имеют больший общий вес.

<sup>1</sup>Если  $\Delta_n$  обозначает  $n$ -строчный определитель, то справедлива рекуррентная формула  $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$ ; то есть  $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \dots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$ , так как  $\Delta_2 = 3, \Delta_1 = 2$ .

<sup>2</sup>Ср. с рассуждением в конце следующего параграфа.

## § 9. Ряды форм. Редукционные теоремы.

Введенный в § 6 (в конце) ряд форм теперь определим несколько точнее как “совокупность инвариантных образований данной исходной формы, линейных по коэффициентам, то есть совокупность форм, возникающих из исходной формы через свертку ее с самой собой, в порядке более высоких форм”.

Для объяснения более высоких форм пусть исходная форма, по Теореме VII, задана как произведение двух нормальных форм  $S \cdot T$ ; более высокой формой мы будем называть форму с более высокой сверткой с самой собой, а среди форм с одинаковой такой сверткой – специально нормированную форму. Точнее: пусть форма  $A$  возникла посредством  $\alpha_\rho$  основных сверток типа  $\rho$ , а форма  $B$  – посредством  $\beta_\rho$  основных сверток того же типа. Тогда  $B$  выше, чем  $A$ :

1. если в системе неравенств  $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$ ,  $\rho = 1, 2, \dots, n-1$ , хотя бы для одного значения  $\rho$  неравенство строгое;<sup>1</sup>
2. если для всех значений  $\rho$  стоит знак равенства, но меньше символических строк объединено в одно матричное произведение. Эта нормировка оказывается необходимой из-за редукций в § 8. Соответственно, например,

$$(S^{n-1}|T_{n-1}) \quad \text{выше, чем} \quad (S^{n-1}|[S^1 T^\rho]_{n-\rho-1} \rho).$$

3. Если для всех значений  $\rho$  стоит знак равенства и число символических строк, объединенных в одно матричное произведение, одинаково, то  $B$  становится выше, чем  $A$ , благодаря нормировке, самой по себе произвольной, но фиксированной раз и навсегда. Такая нормировка всегда возможна из-за конечного числа форм, принадлежащих одной системе значений  $\alpha$ ; ее можно, например, осуществить выделением одной формы  $S$  (большее число символических строк  $S$ , большая сумма верхних весовых индексов строк  $S$  и так далее).

Удобно представлять ряд форм упорядоченным как  $(n-1)$ -мерное множество решеточных точек, где  $n-1$  направлений соответствуют  $n-1$  основным сверткам. Тогда каждой форме соответствует одна и только одна система значений  $\alpha$ , то есть положительная целочисленная решеточная точка, тогда как различные формы, принадлежащие одной системе значений  $\alpha$ , однозначно определены в своем порядке указанной выше нормировкой. Произвольная форма ряда форм задает исходную форму нового ряда форм, который содержится как часть в общем ряду форм; именно как та часть, которая состоит из форм, получаемых из новой исходной формы движением в  $n-1$  положительных направлениях.

В силу Теоремы VIII и общей теории рядовых разложений для рядов форм имеют место в точности те же редукционные теоремы, что и в бинарной и тернарной областях (ср. диссертацию, § 3); главную из них мы еще кратко выведем. Сначала дадим определение:

“В заданной системе форм пусть некоторое конечное число форм объединено в модуль; редуцируемой будем называть форму, которую можно выразить через формы, имеющие инварианты множителями, или через “более высокие формы”; то есть через более высокие формы общего ряда форм, которому эта форма принадлежит, или через формы, содержащие символы модуля в более высоком порядке. Редуцируемый ряд форм назовем редуцентом.” Тогда:

*Теорема IX.* Если исходная форма ряда форм редуцируема вследствие того, что она возникла посредством свертки с редуцентом, то весь ряд форм, возникающий из этой исходной формы, редуцируем.

Для доказательства учтем, что форму  $h$ , возникшую посредством свертки формы  $f$  со второй формой  $g$ , ввиду (45.) можно рассматривать как форму  $f$ , содержащую несколько когredientных строк переменных  $p_\rho, p'_\rho$ . Такие формы по общей теории рядового разложения можно представить как поляры элементарных ковариантов  $f$ , последовательно применяя рядовое разложение к каждой

<sup>1</sup>Если в системе неравенств отчасти стоит знак  $>$ , а отчасти знак  $<$ , то формы несравнимы между собой, поскольку форме, возникшей из другой посредством свертки, всегда соответствует положительная система значений основных сверток, значит в нашем случае положительные или нулевые значения  $\beta_\rho - \alpha_\rho$ .

паре когреддиентных строк переменных  $p_\rho, p'_\rho$ . При этом по (38.) возникающие элементарные коварианты являются формами, порожденными когреддиентной сверткой. Но так как порядок применения рядового разложения еще произволен, мы можем, в частности, выбрать такой порядок, который соответствует порождению общих сверток из основных сверток. Тогда получающаяся система элементарных ковариантов тождественна ряду форм  $f$ ; именно формы, возникающие посредством когреддиентной свертки более высокого дефекта, упорядочиваются среди форм, порожденных основными свертками. К полярам ряда форм  $f$  приходят также при произвольном порядке рядового разложения, которому может соответствовать вторая система элементарных ковариантов. Поскольку ряд форм исчерпывает совокупность инвариантных образований, всякую форму второй системы можно линейно выразить через поляры ряда форм, причем через поляры тех форм, которые имеют такое же или большее убывание веса. Последнее следует из того, что (ср. § 7) поляры можно рассматривать как симультанные инварианты ряда форм  $H$  (52.) с соответствующими форме  $h$  степенями и ряда форм  $f$ . Каждой свертке  $H$  с самой собой соответствует убывание веса, которое после выполнения подстановки (11.) переносится на символические строки, а тем самым и на формы из  $f$ .<sup>2</sup>

Произвольная форма ряда форм  $h$  возникла посредством свертки  $h$  с самой собой; то есть посредством более высокой свертки  $g$  с  $f$ , с одной стороны, и посредством свертки  $f$  или  $g$  с самими собой, с другой. В обоих случаях рядовое разложение, так же как выше было показано для исходной формы  $h$ , приводит к полярам ряда форм  $f$ . Если, в частности,  $f$  является редуцентом, то получается разложение по полярам редуцента; следовательно, ряд форм  $h$  становится редуцируемым.

Приложения теоремы к редукции полных систем форм получаются аналогично бинарной и тернарной областям.

---

<sup>2</sup>Это рассуждение лежит также в основе второй формулировки понятия эквивалентности (§ 8, конец). Более подробные объяснения различных систем элементарных ковариантов в тернарной области имеются у Study, там же, II, § 7, теоремы 7) и 8). В силу нашей Теоремы VII то же самое справедливо и для  $n$  переменных.

## 5. Поля рациональных функций

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Следующие вопросы первоначально восходят к беседам с Э. Фишером. Некоторые из них, впрочем, для специального случая одной неопределенной – причем при более общих предположениях о поле коэффициентов – уже были поставлены и решены Э. Штайницем.<sup>1</sup>

Под “полем рациональных функций” я понимаю поле, элементы которого являются рациональными функциями от  $n$  неопределенных с коэффициентами из заранее заданного числового поля, которое, в частности, может содержать и все комплексные числа. Примерами таких полей служат поле симметрических функций от  $n$  величин или, более общо, совокупность рациональных функций от  $n$  неопределенных, допускающих перестановки некоторой группы (лагранжевы области родов); далее – поле инвариантов.

Между двумя первыми названными полями и последним имеется характерное различие: первые содержат  $n$  алгебраически независимых функций, элементарные симметрические функции; тогда как число алгебраически независимых инвариантов всегда меньше числа неопределенных. Поэтому важно, что вообще такие поля второго типа можно взаимно однозначно сопоставлять с полями первого типа, заменяя некоторые из неопределенных числами. Поэтому далее я ограничусь полями первого типа, то есть полями с  $n$  алгебраически независимыми функциями; в силу этого сопоставления результаты затем имеют общий характер.

Вопросы группируются вокруг трех базисных понятий: рациональная база, минимальная база и интегральная база.

1. Под “рациональной базой” я понимаю конечное число функций поля такое, что всякую функцию поля можно представить как рациональную комбинацию этого конечного числа функций с коэффициентами из заданной области коэффициентов. Простыми рассуждениями – которые в случае одной неопределенной имеются также у Э. Штайница, там же – доказывалось существование рациональной базы для всякого поля рациональных функций. Например, по теореме Лагранжа элементарные симметрические функции и одна функция, принадлежащая группе, образуют рациональную базу для упомянутых выше лагранжевых областей родов.

2. Всякая рациональная база должна (для полей первого типа) содержать по меньшей мере  $n$  функций; если она содержит ровно  $n$  функций, которые тогда должны быть алгебраически независимыми, я называю ее “минимальной базой”. Вопрос о существовании минимальной базы частично решается теоремами Люрота, Кастельнуово и Энрикеса.<sup>2</sup> Из них следует, что для полей от одной неопределенной минимальная база всегда существует: это функция Люрота данного поля, единственно определенная с точностью до дробно-линейного преобразования (ср. Штайниц, § 24). Для полей от двух неопределенных минимальная база существует всегда и, вообще говоря, только тогда, когда допускается алгебраическое расширение поля коэффициентов, тогда как для трех и более неопределенных минимальная база вообще не существует. Охарактеризовать специальные поля с минимальной базой еще не пытались.

Теперь я продолжила исследовать вопрос о минимальной базе для лагранжевых областей родов. Здесь он приобретает следующий смысл: “Если лагранжева область родов, принадлежащая группе  $G$ , обладает минимальной базой, то всю совокупность уравнений с заданной группой  $G$  можно рационально построить посредством параметрического представления; и именно для всякого числового поля, содержащего область коэффициентов минимальной базы – следовательно, в частности, для любого числового поля, если эта область коэффициентов есть поле рациональных чисел.”

Самый простой пример дает симметрическая группа; здесь элементарные симметрические функции образуют минимальную базу с рациональными числовыми коэффициентами. Отсюда

<sup>1</sup>E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (особенно § 24). Crelles Journal 137. 1910.

<sup>2</sup>J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. 9. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. 44. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. 21. 21. Jan. 1912.

в качестве параметрического представления получается просто уравнение с неопределенными коэффициентами. Как от него перейти к сколь угодно многим уравнениям “без аффекта” над каждым числовым полем, показывает теорема Гильберта о неприводимости.

Теперь непосредственно из теорем Люрота и Кастельнуово следует существование минимальной базы для всех групп, возникающих при уравнениях 3-й и 4-й степеней; при этом далее оказывается, что эта минимальная база имеет рациональные числовые коэффициенты. Значит, над произвольным числовым полем можно рационально построить совокупность уравнений 3-й и 4-й степеней с заданной группой. Для циклических и диэдральных групп существует минимальная база с полем  $n$ -х корней из единицы в качестве области коэффициентов; то же справедливо и для некоторых других метациклических групп. Вопрос, является ли минимальная база вообще характерной для некоторых групп, должен остаться нерешенным.

3. Чтобы перейти к последнему базисному понятию, я рассматриваю совокупность полиномов, содержащихся в поле. Под “интегральной базой” я понимаю конечное число этих полиномов такое, что всякий полином поля можно представить как целую рациональную комбинацию этого конечного числа полиномов с коэффициентами из заданной области коэффициентов. Вопрос о существовании интегральной базы – который, например, как специальный случай включает конечность системы инвариантов – был поставлен Гильбертом в его “Математических проблемах”<sup>3</sup> в несколько иной формулировке, как проблема относительно целых функций.

Пока я могу указать лишь один класс полей, для которых интегральная база существует. А именно, если поле содержит систему из  $n$  полиномов такую, что однородная результата членов наивысшей степени этих полиномов отлична от нуля, то интегральная база существует; ее дают коэффициенты всех  $u$  в неприводимом над полем уравнении для линейной формы:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_nx_n.^4$$

Если, в частности, значение результата равно единице области коэффициентов, то обеспечена также интегральность представления. Пример этого класса полей дают лагранжевы области родов, поскольку результата элементарных симметрических функций имеет значение  $\pm 1$ . Еще один пример (без интегральности) дают все поля, содержащие только один алгебраически независимый полином; интегральная база здесь тождественна функции Люрота наименьшего подполя, содержащего все полиномы. Так, как известно, все целые рациональные проективные инварианты квадратичной формы от  $n$  переменных являются целыми функциями дискриминанта.

Указанное условие является только достаточным, отнюдь не необходимым для существования интегральной базы. Легко построить поля, в которых результата любых  $n$  полиномов обращается в нуль и которые тем не менее обладают интегральной базой, заданной коэффициентами того неприводимого уравнения. Возникает вопрос, дают ли, быть может, и в самом общем случае коэффициенты того уравнения интегральную базу.

<sup>3</sup>D. Hilbert: Mathematische Probleme. Доклад, Париж 1900. Проблема 14. Göttinger Nachr. 1900.

<sup>4</sup>Это неприводимое уравнение в случае одной неопределенной встречается у Э. Штайница в доказательстве теоремы Люрота.



## 6. Поля и системы рациональных функций

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Настоящая работа рассматривает вопросы о базах для произвольных систем рациональных и целых рациональных функций. Используемые здесь методы теории полей показывают, что существенным является решение этих вопросов для полей из рациональных функций — полей рациональных функций<sup>1</sup> —, тогда как обобщение результатов на произвольные системы получается как следствие.

Из вопросов о базах для общих систем до сих пор было известно лишь существование модульной базы, обеспеченное теоремой Гильберта (Math. Ann. 36). Ниже вопрос о рациональной представимости полностью решается через существование рациональной базы для всякой произвольной системы (§ 7); рациональная база полей получается уже в § 4. Это существование рациональной базы позволяет всюду исходить из абстрактно определенного поля или системы и тем самым избегать трудностей, которые вызваны только специальным выбором рациональной базы, а не самой системой, например появлением специальных знаменателей или фундаментальных точек базисных функций.

Для полей будет также рассмотрен вопрос о минимальной базе, то есть о рациональной базе из алгебраически независимых функций (§ 6). Методы теории полей далее приводят к выделенной рациональной базе, инволюционной базе<sup>2</sup> (§ 5), которая становится особенно существенной для интегральных областей из полиномов (§ 8). Здесь она дает представление с фиксированным знаменателем (степенью функции, определенной интегральной областью), как это известно, например, в специальном случае типического представления инвариантов.

Из рациональной представимости теперь выводятся как можно более далеко идущие следствия для целой рациональной представимости, то есть для вопроса о конечности в более узком смысле.

Все известные до сих пор теоремы о конечности опираются на тот факт, что теорема Гильберта о модульной базе гарантирует конечность для всех таких систем, в которых представление

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

влечет второе представление

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

где  $B_i$  принадлежат системе и имеют меньшую степень, чем  $F$ .

Напротив, теорема о рациональной базе и методы теории полей позволяют заключать о конечности при предположениях совсем другого рода.

Так, как частичный ответ на одну из проблем Гильберта (Mathematische Probleme 14), получается класс относительно целых функций (относительно целые области первого типа), которые являются конечными интегральными областями и чья интегральная база задается упомянутой выше инволюционной базой (§ 10). По аналогии с гильбертовым доказательством теоремы Кронекера о фундаментальной системе алгебраически целых величин (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) далее можно показать, что все регулярные системы из полиномов — то есть все системы, которые можно отобразить в системы без фундаментальных точек, — обладают интегральной базой (§ 12), тогда как нерегулярные системы без интегральной базы легко указать. В качестве простого примера этого факта упомянем теорему: “Во всякой произвольной системе из бесконечно многих полиномов от одной неопределенной существует конечное число этих полиномов такое, что всякий полином системы можно представить как целую рациональную комбинацию этого конечного числа.” Дальнейшие примеры находятся в § 13.

<sup>1</sup>Ср. предварительное сообщение по случаю Венского съезда естествоиспытателей: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, где дан обзор постановок вопросов и результатов, относящихся к функциональным полям.

<sup>2</sup>Название выбрано потому, что рациональное функциональное поле в геометрическом толковании задает самую общую инволюцию в линейном пространстве.

Наконец, последние параграфы (§§ 14 и 15) дают усиление теорем о базах в отношении целоалгебраичности.

Существенным вспомогательным средством исследования служит принцип переноса из § 3, согласно которому достаточно рассматривать все поставленные здесь вопросы о базах для таких систем, в которых число неопределенных совпадает с числом алгебраически независимых функций системы.

Толчком к настоящей работе стали беседы с Э. Фишером, в частности его вопрос о минимальной базе лагранжевых областей родов. Относящиеся к этому исследования, которые привели к построению уравнений с заданной группой (ср. цитированное сообщение о “Полях рациональных функций”, часть 2), оставлены для дальнейшей публикации.

Существенное расширение этой работы по сравнению с первоначальным сообщением состоит в том, что теоремы о базах, сформулированные там только для полей или специальных интегральных областей, здесь перенесены на произвольные системы. Этот перенос удается простым образом благодаря понятию наименьшего поля, содержащего произвольную систему, как обобщению поля частных интегральной области (§ 7). К образованию этого понятия меня привело то, что К. Генцельт, узнав рациональную базу полей, смог доказать существование рациональной базы для произвольных систем обходным путем через гильбертову модульную базу. Также к теореме об интегральной базе регулярных систем меня привело замечание К. Генцельта, что рассуждения, примененные мной к интегральным областям, справедливы для произвольных систем, подчиняющихся тем же предположениям; кроме того, я обязана Генцельту еще несколькими отдельными небольшими замечаниями.

Наконец, отметим, что в случае одной неопределенной рациональная база и минимальная база полей имеются у Э. Штайница в его “Algebraische Theorie der Körper”, § 24 (Crelles Journ. 137); при этом область коэффициентов там берется как поле в самом общем смысле. Вопрос, насколько при этих более общих предположениях сохраняются данные здесь теоремы, ниже не затрагивается; во всяком случае доказательства требуют модификации, поскольку, например, уже средства из теории функциональных детерминант отказывают для полей характеристики  $p$ .

## § 1. Поля $\mathfrak{K}_{n\rho}$ и системы $\mathfrak{S}_{n\rho}$ .

В дальнейшем речь идет об исследовании систем рациональных функций от  $n$  неопределенных, в особенности о полях рациональных функций.

Под  $f(x_1, \dots, x_n)$ ,  $g(x_1, \dots, x_n)$ , ... или сокращенно  $f(x)$ ,  $g(x)$ , ... поэтому всегда понимаются рациональные функции от  $x_1, \dots, x_n$ ; они предполагаются заданными в сокращенном виде, то есть с взаимно простыми числителем и знаменателем. Целые рациональные функции (полиномы) будут обозначаться большими буквами  $F(x)$ ,  $G(x)$ , .... Область коэффициентов  $\Omega$  предполагается некоторым числовым полем, следовательно, в частности может содержать и все комплексные числа;  $\Omega$  может также содержать еще конечное число параметров.

Величины из  $\Omega$ , то есть все функции нулевой степени, всегда считаются принадлежащими системе.

После этих соглашений поле из рациональных функций — рациональное функциональное поле — можно определить абстрактно.

*Определение I:* Система рациональных функций называется полем, если она удовлетворяет условиям:

1. Вместе с  $f(x)$  она содержит также  $c \cdot f(x)$  для каждой величины  $c$  из  $\Omega$ .
2. Вместе с  $f(x)$  и  $g(x)$  она всегда содержит также  $f(x) + g(x)$ ,  $f(x) \cdot g(x)$  и, при  $g(x) \neq 0$ , частное  $f(x) : g(x)$ .<sup>1</sup>

Специальные поля суть те, которые возникают присоединением к  $\Omega$  конечного числа рациональных функций

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x);$$

они будут обозначаться через

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{или} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k).$$

<sup>2</sup> Среди этих специальных полей упомянем еще поле, возникающее присоединением  $x_1, \dots, x_n$  к  $\Omega$ :

$$\Omega(x_1, \dots, x_n),$$

оно тождественно совокупности рациональных функций от  $x_1, \dots, x_n$  с коэффициентами из  $\Omega$ .

Введем еще, следуя Э. Штайницу, понятие промежуточного поля:

“Поле  $\mathfrak{M}$  лежит между  $\Omega_1$  и  $\Omega_2$ , если оно содержит  $\Omega_1$  и содержится в  $\Omega_2$ ”;

тогда Определение I допускает и такую формулировку:

Поле рациональных функций от  $n$  неопределенных есть промежуточное поле между  $\Omega$  и  $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ , которое по меньшей мере в одной функции действительно содержит все  $n$  неопределенных.

Наряду с числом неопределенных для систем рациональных функций возникает еще одно характеристическое число: число алгебраически независимых функций, или алгебраический ранг, по следующему определению.

*Определение II:* Система рациональных функций имеет алгебраический ранг  $\rho$ , если можно указать  $\rho$  функций системы, являющихся алгебраически независимыми, тогда как любые  $(\rho + 1)$  функций системы алгебраически зависимы.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> При этом  $f(x)$  и  $g(x)$  могут быть также нулевой степени, то есть величинами из  $\Omega$ .

<sup>2</sup> То, что эти “специальные поля” уже исчерпывают все поля, следует в § 4.

<sup>3</sup>  $\rho$  функций  $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$  называются алгебраически независимыми, если из каждого соотношения

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{тождественно по } x_1, \dots, x_n$$

следует:

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{тождественно по } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

В противоположном случае они называются алгебраически зависимыми.

Системы из конечного или бесконечного числа рациональных функций от  $n$  неопределенных и алгебраического ранга  $\rho$  будут обозначаться двойным индексом

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

В частности, под

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

понимается поле от  $n$  неопределенных и алгебраического ранга  $\rho$ . Имеет место неравенство:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Приведем еще несколько примеров полей  $\mathfrak{K}_{nn}$  и  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ .

1. Полями  $\mathfrak{K}_{nn}$  являются лагранжевы области родов, которые можно определить как

“совокупность рациональных (и целых рациональных) функций от  $x_1, \dots, x_n$ , допускающих перестановки некоторой группы перестановок  $G$  величин  $x_1, \dots, x_n$ .”

Они всегда содержат поле симметрических функций, а значит, и  $n$  алгебраически независимых элементарных симметрических функций.

2. Полями  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  являются проективные поля инвариантов, образованные из совокупности рациональных (и целых рациональных) инвариантов одной или нескольких основных форм.<sup>4</sup> Здесь  $\rho < n$ , так как число алгебраически независимых инвариантов всегда меньше числа коэффициентов.

Соответствующее утверждение справедливо для полей инвариантов относительно подгрупп проективной группы.

---

<sup>4</sup>Целесообразно рассматривать только преобразования с детерминантом 1; тогда всякая рациональная комбинация произвольного числа инвариантов снова допускает это преобразование, и действительно получается поле. Одни лишь однородные изобарные инварианты поля не образуют, но образуют систему  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ .

## § 2. Вспомогательная лемма об алгебраически зависимых функциях.

С помощью вспомогательной леммы этого параграфа в § 3 выяснится, что алгебраический ранг системы является собственно характеристическим числом. А именно, лемма показывает, что при такой последовательной числовой специализации некоторых неопределенных, при которой  $\rho$  алгебраически независимых функций остаются алгебраически независимыми, произвольная функция, алгебраически зависящая от этих  $\rho$  функций, не может ни тождественно исчезнуть, ни стать неопределенной.

Пусть, следовательно, система

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

имеет алгебраический ранг  $\rho$ , где  $\rho < n$ , а  $h(x)$  является рациональной функцией, алгебраически зависящей от функций (1). По известным теоремам ранг функциональной матрицы системы (1) равен  $\rho$ . Поэтому неопределенные можно, например, так перенумеровать, что

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

где  $G(x)$ , как известно, означает общий знаменатель функций (1).

Число  $a$  теперь выбирается так, чтобы произведение  $G(x) \cdot \Gamma(x)$  не делилось на  $(x_i - a)$ , где под  $i$  понимается одно из чисел  $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$ . Следовательно, при  $x_i = a$  общий знаменатель функций (1) не может исчезнуть, и  $\rho$  функций

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

тоже являются алгебраически независимыми. Алгебраический ранг системы (1), как мы будем говорить, сохраняется подстановкой  $x_i = a$ .

Пусть неприводимое уравнение, которому  $h(x)$  удовлетворяет относительно функций (1), имеет вид

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \quad (4)$$

причем  $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$  и  $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$  не исчезают тождественно. Чтобы перейти отсюда к тождеству между полиномами, положим:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

и заметим, что вследствие предполагаемого сокращенного вида  $h(x)$  функции  $H_1(x)$  и  $H_2(x)$  взаимно просты. В силу (5) уравнение (4) переходит в:

$$\begin{aligned} & B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau \\ & + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots \\ & + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \end{aligned} \quad (6)$$

где  $B_k$  являются однородными формами от  $G, G_i$ , и по меньшей мере один из неотрицательных показателей  $\sigma_k$  должен быть равен нулю.

Предположим теперь, что  $H_1(x)$  делился бы на  $(x_i - a)$ . Тогда по (6) также

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

делился бы на  $(x_i - a)$ . Для  $G(x)$  это исключено по предположению; значит, из делимости  $B_\tau$  следовала бы также делимость

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

и между функциями (3) существовало бы соотношение  $A_\tau = 0$ , вопреки предполагаемой алгебраической независимости. Наконец,  $H_2(x)$ , как взаимно простой с  $H_1(x)$ , также не может

делиться на  $(x_i - a)^1$ ; следовательно, предположение, что  $H_1(x)$  делится на  $(x_i - a)$ , приводит к противоречию. Так же показывают, что и  $H_2(x)$  не может делиться на  $(x_i - a)$ . Следовательно, функция  $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$  не может ни тождественно исчезнуть, ни стать неопределенной.

К системе (3) и функции  $h'(x)$ , которую снова предполагаем заданной в сокращенном виде, можно вновь применить приведенное выше рассуждение, и продолжение процедуры в конце концов приводит к следующей лемме.

*Вспомогательная лемма. Пусть обе системы*

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x),$$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x)$$

*имеют алгебраический ранг  $\rho$ , где  $\rho < n$ , и пусть, например,*

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

*Пусть числа*

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

*выбраны так, что при подстановке*

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

*произведение  $G(x) \cdot \Gamma(x)$  не исчезает, то есть алгебраический ранг системы (1) сохраняется. В последовательных подстановках*

$$\begin{aligned} [h(x)]_{x_n=a_n} &= h^{(n-1)}(x), & [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho) \end{aligned}$$

*пусть функции  $h(x)$ ,  $h^{(n-1)}(x)$ , ...,  $h^{(\rho+1)}(x)$  каждый раз приведены к сокращенному виду. При этих предположениях в функции  $h^*(x_1, \dots, x_\rho)$  ни числитель, ни знаменатель не могут тождественно исчезнуть, и сама функция также не может стать  $\frac{0}{0}$ .<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>Этот последний вывод, основанный на сокращенном виде, уже был бы невозможен при подстановке  $x_i = a$ ,  $x_k = b$  с сохранением прочих предположений. Тогда  $H_1(x)$  и  $H_2(x)$  могли бы одновременно исчезнуть, и частное из-за подстановки стало бы неопределенным, то есть  $\frac{0}{0}$ ; например,

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

при подстановке  $x_3 = 0$ ,  $x_4 = 0$ .

<sup>2</sup>Последовательная подстановка дает, например, в функции  $h(x)$  из предыдущего примечания:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

### § 3. Взаимно однозначное отображение систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ на системы $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ .

Из вспомогательной леммы мы непосредственно получим отображение систем  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  на системы  $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$  благодаря тому, что некоторые неопределенные заменяются числами; алгебраический ранг  $\rho$  тем самым оказывается собственно характеристическим числом.

Так как  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  имеет алгебраический ранг  $\rho$ , существуют  $\rho$  функций из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

которые алгебраически независимы. Далее, если  $f(x)$  обозначает произвольную функцию из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , то система

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

также имеет алгебраический ранг  $\rho$ ; следовательно, системы (1) и (2) удовлетворяют условиям вспомогательной леммы.<sup>1</sup>

Поэтому определим числа

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

по вспомогательной лемме так, чтобы алгебраический ранг  $\rho$  системы (1) сохранялся при подстановке — что возможно сколь угодно многими способами. Тогда в функции, определенной посредством

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

а именно в функции

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho), \quad (3)$$

ни числитель, ни знаменатель не могут тождественно исчезнуть.

Пусть теперь  $f(x)$  пробегает все (конечно или бесконечно многие) функции из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ . Рассмотрим систему, состоящую из совокупности всех функций (3); она обладает следующими свойствами:

1. Она имеет алгебраический ранг  $\rho$ , ибо содержит функции, возникающие из (1),

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

которые вследствие выбора  $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$  алгебраически независимы. Поэтому эту систему будем обозначать через

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*.$$

2

2. Сопоставление функций  $f(x)$  и  $f^*(x)$  без исключений взаимно однозначно.

Действительно, если  $f_1(x)$  и  $f_2(x)$  принадлежат  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , то и разность

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

алгебраически зависит от системы (1); кроме того, имеет место:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Так как  $d(x)$  вместе с системой (1) удовлетворяет условиям вспомогательной леммы, то из

$$d(x) \neq 0$$

необходимо следует:

$$d^*(x) \neq 0;$$

то есть различным функциям из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  соответствуют различные функции из  $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ .

<sup>1</sup>При необходимости неопределенные следует перенумеровать.

<sup>2</sup>Под  $f^*(x), g^*(x), \dots$  соответственно всюду следует понимать функции отображения, то есть функции от  $x_1, \dots, x_\rho$ .

3. Из всякого соотношения между функциями из  $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ :

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{тождественно по } x_1, \dots, x_\rho$$

для взаимно однозначно соответствующих функций из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  следует:

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{тождественно по } x_1, \dots, x_n.$$

Действительно, вместе с  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$  всякая рациональная комбинация этих функций также алгебраически зависит от системы (1).

Далее из

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)) \end{aligned} \quad (4)$$

по вспомогательной лемме следует, что из

$$h(x) \neq 0 \quad \text{также} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Итак, получаем следующую теорему.

*Теорема I. Каждой системе  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  из (конечно или бесконечно многих) рациональных функций можно — сколь угодно многими способами — взаимно однозначно сопоставить систему  $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$  так, что все соотношения, существующие между функциями из  $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ , сохраняются также в  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , и наоборот. При этом полю  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  по (4) в частности снова соответствует поле  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ .*

Из теоремы I мы выводим еще следствие, упрощающее все дальнейшие доказательства: *свойства систем  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , которые характеризуются конечным или бесконечным числом соотношений между функциями системы, справедливы для систем  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , как только они справедливы для системы отображения  $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ .*

Это следствие мы кратко называем “принципом переноса”.



Простейший пример этого отображения дает теория алгебраических инвариантов. Действительно, линейным преобразованием всегда можно численно зафиксировать некоторые коэффициенты основной формы так, чтобы все соотношения, справедливые для специальной формы, сохранялись и в общем случае.

## § 4. Рациональная база полей $\mathfrak{K}_{n\rho}$ .

В дальнейших исследованиях, сгруппированных вокруг понятий базы, мы всюду пользуемся «принципом переноса» из § 3. Сначала мы доказываем существование базы для полей, но определения даем в общем виде:

*Определение III: Конечное число функций из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  называется рациональной базой, если каждую функцию из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  можно представить как рациональную комбинацию этого конечного числа функций с коэффициентами из  $\Omega$ .*

Рациональная база должна содержать  $\rho$  алгебраически независимых функций, поскольку алгебраический ранг системы, полученной из рациональной базы, равен алгебраическому рангу самой рациональной базы.

Сначала покажем, что доказательство существования рациональной базы допускает принцип переноса. А именно, Определение III можно сформулировать так:

Функции из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

тогда и только тогда образуют рациональную базу, когда выполнены бесконечно многие соотношения:

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

где  $f(x)$  пробегает все функции из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , а  $\gamma$  обозначает рациональную функцию от  $k$  аргументов, меняющуюся вместе с  $f$ .

Следовательно, если в системе отображения  $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$  рациональная база задана функциями

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

что влечет соотношения

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)),$$

то по Теореме I для  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  выполнены соотношения (1). Иными словами, *принцип переноса для рациональной базы* гласит:

*Из существования рациональной базы для системы отображения  $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$  следует существование рациональной базы для исходной системы  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ .*<sup>1</sup>

Чтобы доказать существование рациональной базы всех полей  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ , мы, таким образом, можем ограничиться полями  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ ; здесь к цели ведет прямое обобщение рассуждения, примененного Э. Штайницем.<sup>2</sup>

Пусть

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

есть система из  $\rho$  алгебраически независимых функций из  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ . Элиминация  $x_1, \dots, x_\rho$  дает  $\rho$  соотношений:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

причем в каждом соотношении  $F_i = 0$  неопределенная  $x_i$  действительно входит; иначе, вопреки предположению, между функциями (2) существовала бы алгебраическая зависимость. Соотношения (3) означают, что

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

являются алгебраическими элементами относительно

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)).$$

Поэтому поле, возникающее присоединением  $x_1, \dots, x_\rho$ ,

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

<sup>1</sup>Соответственно формулируется принцип переноса для каждого вопроса о базе, рассматриваемого здесь.

<sup>2</sup>E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

есть конечное алгебраическое расширение над  $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ . По известной теореме<sup>3</sup>  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  как промежуточное поле между  $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$  и  $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$  само является алгебраическим расширением над  $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ , тогда как  $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$  является алгебраическим расширением над  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ . Значит,  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  получается из  $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$  присоединением конечного числа элементов из  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ , или также присоединением *одной* подходяще выбранной функции; то есть

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^* = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_{\rho+1}^*, \dots, g_k^*) = \Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, g_0^*).$$

По принципу переноса мы тем самым получаем

*Теорема II: Каждое поле  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  обладает рациональной базой алгебраического ранга  $\rho$ ; в частности, рациональную базу можно выбрать так, чтобы она содержала не более  $\rho + 1$  функций.*

Пусть дана произвольная система из  $\rho$  алгебраически независимых функций из  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ :  $h_1(x), \dots, h_\rho(x)$ . По приведенному выше методу ее можно расширить до рациональной базы

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x); h_{\rho+1}(x), \dots, h_\sigma(x).$$

По определяющему свойству существуют соотношения:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x), \dots, g_k(x)) & (i = 1, 2, \dots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x), \dots, h_\sigma(x)) & (j = 1, 2, \dots, k), \end{aligned}$$

где  $\chi_i, \psi_j$  обозначают рациональные функции своих аргументов. То есть:

Из любой рациональной базы всякая другая рациональная база получается бирациональным преобразованием. Кроме того:

если

$$h_1(x), \dots, h_\rho(x)$$

есть произвольная система из  $\rho$  алгебраически независимых функций из  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ , то  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  является конечным алгебраическим расширением над

$$\Omega(h_1(x), \dots, h_\rho(x)).$$

<sup>3</sup>См., например, Weber, Lehrbuch d. Algebra 1, § 144 (1-е изд.) или § 55 (малое изд.).

## § 5. Инволюционная форма и инволюционная база полей $\mathfrak{K}_{nr}$ .

В то время как каждая рациональная база, построенная в § 4, имела тот недостаток, что зависела от произвольно выбранных исходных функций, теперь мы показываем существование *рациональной базы, однозначно определенной полем*.

По § 4 поле  $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$  является алгебраическим полем – скажем, степени  $i$  – над  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  и, ввиду

$$\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

возникает присоединением элементов  $x_1, \dots, x_\rho$ , алгебраических относительно  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ . Поэтому рассмотрим неприводимую относительно  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  целую функцию  $\Phi^*(z, u)$  с нулем

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \dots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

имеющую степень  $i$  по  $z$ . Кроме того, как произведение величин, сопряженных с  $[z - u(x)]$ ,  $\Phi^*(z, u)$  является однородной формой степени  $i$  по  $z, u_1, \dots, u_\rho$ ; следовательно, коэффициентом при  $z^i$  она имеет не зависящую от  $u$  функцию из  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ . Сделав этот старший коэффициент равным 1 делением, мы однозначно определяем неприводимую функцию  $\Phi^*(z, u)$ . Определенная таким образом однородная форма

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \quad (1)$$

будет называться *инволюционной формой*<sup>1</sup> поля  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ ; из (1) получается

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \quad (2)$$

как *инволюционная форма* поля  $\mathfrak{K}_{nr}$ .

Коэффициенты инволюционной формы  $\Phi^*(z, u)$  окажутся рациональной базой поля  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ ; то есть имеет место соотношение

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho)) = \mathfrak{K}_{\rho\rho}^* \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i). \quad (3)$$

Для доказательства заметим, что  $\Phi^*(z, u)$  имеет коэффициенты из  $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$  и, вследствие неприводимости относительно  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ , тем более неприводима относительно этого подполя. Значит,  $\Phi^*(z, u)$  задает неприводимое уравнение для  $u(x)$  относительно  $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ . Отсюда следует, что  $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$  является алгебраическим полем – степени  $i$  – над  $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$ . Поскольку  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  лежит между  $\Omega(g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x))$  и  $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ , из равенства степеней, как известно, следует равенство полей, а значит соотношение (3). По принципу переноса коэффициенты  $\Phi(z, u)$  соответственно дают рациональную базу поля  $\mathfrak{K}_{nr}$ ; то есть мы имеем

*Теорему III: Коэффициенты инволюционной формы образуют определенную полем рациональную базу, инволюционную базу; для полей  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  эта база определена однозначно.*<sup>2</sup>

Добавим еще иррациональное толкование этого факта, устанавливающее связь с геометрической теорией инволюции.

Пусть разложение  $\Phi^*(z, u)$  на линейные множители в некотором поле расширения задано так:

$$\Phi^*(z, u) = (z - u_1x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \quad (4)$$

Сравнение с (1) показывает, что функции

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

<sup>1</sup>Основание для этого названия выясняется в конце параграфа;  $\sum'$  означает, что суммирование распространяется на все члены, кроме  $z^i$ .

<sup>2</sup>Для полей  $\mathfrak{K}_{nr}$  инволюционная форма может зависеть от отображения; однозначности можно достичь отображением с неопределенными коэффициентами.

тождественны элементарным симметрическим функциям рядов величин:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

Следовательно, каждая функция из  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  является рациональной комбинацией этих элементарных функций, симметричной по рядам (5), и наоборот, каждая симметрическая функция рядов (5) принадлежит  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ .

Итак, когда

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

пробегает все функции из  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ , имеет место система бесконечно многих соотношений:

$$\begin{aligned} \frac{F^*(x)}{H^*(x)} &= \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots \\ &= \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \end{aligned} \quad (6)$$

или, в свернутой форме:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \dots, i-1),$$

где ни  $F^*(x^{(k)})$ , ни  $H^*(x^{(k)})$  – как сопряженные с  $F^*(x)$ ,  $H^*(x)$  и формально симметрические – не обращаются тождественно в нуль.

Обратно, для каждого ряда величин  $\xi$ , удовлетворяющего бесконечно многим соотношениям

$$\begin{aligned} F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) &= 0, \\ H^*(\xi) &\neq 0, \end{aligned} \quad (7)$$

получается принадлежность к рядам величин (5).

В самом деле, если  $G^*(x)$  обозначает общий знаменатель коэффициентов  $\Phi^*(z, u)$ , то по предположению (7) целая также по  $\xi$  функция

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

не обращается тождественно в нуль – то есть коэффициенты  $\Phi^*(z, u; \xi)$  не становятся неопределенными – и имеет нуль

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Поэтому в силу (7) и  $\Phi^*(z, u; x)$  имеет нуль  $z = u(\xi)$ ; то есть  $\xi$  принадлежит рядам величин (5). Соответствующее утверждение следует из (6), если  $\xi$  удовлетворяет системе уравнений относительно сопряженного ряда величин:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

то есть ряды величин (5) определяются как решения  $\xi$  системы уравнений

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

где  $F^*(x) : H^*(x)$  пробегает все функции из  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ ; при этом ряд  $x$  можно заменить любым сопряженным рядом.

Геометрически это означает следующее, если понимать каждый ряд  $x$  как точку: решения (7) задают в  $\rho$ -мерном линейном пространстве  $\infty^\rho$  группы по  $i$  точек так, что любая точка группы однозначно определяет всю отдельную группу. Такая система групп точек называется «инволюцией в линейном пространстве».<sup>3</sup>

Соответственно, поле  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  характеризует инволюцию в линейном пространстве, состоящую из кривых, поверхностей и т. д.

Так как, по сказанному выше, степень  $i$  поля  $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$  относительно  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  равна числу систем решений (7) с дополнительным условием  $H^*(\xi) \neq 0$  – которые мы можем назвать системами решений поля  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ , – то рассуждение, использованное для доказательства существования инволюционной базы, допускает также иррациональную формулировку:

«Если  $\mathfrak{L}^*$  является делителем  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  и каждая система решений поля  $\mathfrak{L}^*$  является также системой решений  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ , то  $\mathfrak{L}^*$  и  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  тождественны».

Соответствующее утверждение по принципу переноса справедливо для делителей  $\mathfrak{L}$  поля  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ .

---

<sup>3</sup>Исключенные решения (7), для которых  $F^*(\xi) = 0$ ,  $H^*(\xi) = 0$ , – а также исключенные решения системы уравнений, соответствующей инволюционной базе, – называются фундаментальными точками инволюции; при этом следует учитывать и те, которые возникают при гомогенизации, то есть «лежащие на бесконечности».

## § 6. Минимальная база полей $\mathfrak{K}_{n\rho}$ .

Этот параграф дает обзор известных теорем, но в расширенной форме, которую делают возможной принцип переноса и существование рациональной базы.

*Определение IV:* Рациональная база поля  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  называется минимальной базой, если она содержит только минимальное число  $\rho$  функций; тогда эти функции должны быть алгебраически независимыми.

Из теорем Люрота, Кастельнуово и Энрикеса<sup>1</sup> следуют такие факты:

I. Каждое поле  $\mathfrak{K}_{n1}$  имеет минимальную базу: это функция Люрота данного поля, однозначно определенная с точностью до дробно-линейного преобразования.

II. Для полей  $\mathfrak{K}_{n2}$  минимальная база существует всегда тогда и, вообще говоря, только тогда, когда допускается алгебраическое расширение поля коэффициентов  $\Omega$ .

III. Для полей  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  ( $\rho \geq 3$ ) вообще говоря минимальной базы не существует. Характеризация специальных полей  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ , имеющих минимальную базу, еще не была предпринята.

Кратко напомним доказательство теоремы Люрота для полей  $\mathfrak{K}_{11}^*$ , данное Э. Штайницем.<sup>2</sup>

Пусть  $\Phi^*(z, u)$  является инволюционной формой поля  $\mathfrak{K}_{11}^*$ , а  $\psi^*(x)$  — каким-либо коэффициентом  $\Phi^*(z, u)$ , действительно содержащим неопределенную  $x$ . Оказывается, что степень  $\Omega(x)$  относительно  $\Omega(\psi^*(x))$  равна степени  $\Omega(x)$  относительно  $\mathfrak{K}_{11}^*$ , откуда следует тождество полей. Далее, если  $\Omega(\chi^*(x))$  равна  $\Omega(\psi^*(x))$ , то из взаимной рациональной зависимости  $\chi^*(x)$  и  $\psi^*(x)$  следует дробно-линейная зависимость этих двух функций.

Следовательно, по принципу переноса теорема Люрота допускает также такую формулировку:

*Минимальная база полей  $\mathfrak{K}_{n1}$  состоит из какой-либо функции инволюционной базы; и любые две функции инволюционной базы поля  $\mathfrak{K}_{n1}$  дробно-линейно зависят друг от друга.*

Доказательство факта II Кастельнуово проводит с помощью геометрической теории инволюции для полей  $\mathfrak{K}_{22}^*$ , выведенных из рациональной базы из трех функций. Поскольку принцип переноса сохраняется также при конечном алгебраическом расширении поля коэффициентов  $\Omega$ , существование рациональной базы тем самым дает доказательство для всех полей  $\mathfrak{K}_{n2}$ .

Относительно III следует заметить, что Энрикес строит нерациональную инволюцию в трехмерном пространстве, то есть поле  $\mathfrak{K}_{33}$ , не имеющее минимальной базы.

<sup>1</sup>J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc, Vol. 21, 21. Jan. 1912.

<sup>2</sup>A. a. O. § 24.

## § 7. Произвольная система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , линейное семейство $\mathfrak{L}_{n\rho}$ и область целостности $\mathfrak{J}_{n\rho}$ рациональных функций. Существование рациональной базы.

Из существования рациональной базы полей  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  теперь будет выведена рациональная база для произвольных систем рациональных и целых рациональных функций. Мы упорядочим эти системы так, как они последовательно возникают одна из другой посредством элементарных операций сложения, умножения и деления.

I. Пусть, как всегда,  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  обозначает произвольную систему рациональных (или целых рациональных) функций от  $n$  неопределённых, алгебраического ранга  $\rho$ . Элементы из  $\Omega$  также считаются принадлежащими системе.

II. Система  $\mathfrak{L}_{n\rho}$  называется *линейным семейством*, если она удовлетворяет условиям:

1. вместе с  $f(x)$  система  $\mathfrak{L}_{n\rho}$  всегда содержит также  $c \cdot f(x)$ , где  $c$  — произвольный элемент из  $\Omega$ ;
2. вместе с  $f(x)$  и  $g(x)$  система  $\mathfrak{L}_{n\rho}$  всегда содержит также  $f(x) + g(x)$ .

III. Линейное семейство  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  называется *областью целостности* при дополнительном условии:

3. вместе с  $f(x)$  и  $g(x)$  область  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  всегда содержит также  $f(x) \cdot g(x)$ .

IV. Область целостности  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  называется *полем* при дополнительном условии:

4. вместе с  $f(x)$  и  $g(x)$  — где  $g(x) \neq 0$  — поле  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  всегда содержит также частное  $f(x) : g(x)$ .

Условия 1–4 являются теми же условиями, которые в § 1 были заданы для поля.<sup>1</sup>

Теперь эти области должны быть последовательно выведены одна из другой.

а) Произвольная система  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  расширяется до линейного семейства  $\mathfrak{L}_{n\rho}$  следующим требованием:  $\mathfrak{L}_{n\rho}$  содержит, кроме  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , все функции  $h(x)$  и только те, которые можно линейно представить с коэффициентами из  $\Omega$  через конечное число функций из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ :

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_k f_k(x),$$

где  $f_1(x), \dots, f_k(x)$  пробегает все функции из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , а  $c_1, \dots, c_k$  пробегает все элементы из  $\Omega$ .

Действительно, добавление рациональных комбинаций функций системы не меняет алгебраического ранга системы.  $\mathfrak{L}_{n\rho}$  удовлетворяет условиям 1 и 2, следовательно, является линейным семейством. Кроме того, всякое линейное семейство, содержащее  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , по условиям 1 и 2 содержит также  $\mathfrak{L}_{n\rho}$ ; поэтому  $\mathfrak{L}_{n\rho}$  есть наименьшее линейное семейство, содержащее  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ .

б) Соответственно, из линейного семейства  $\mathfrak{L}_{n\rho}$  наименьшая содержащая его область целостности  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  возникает по требованию:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$  содержит, кроме  $\mathfrak{L}_{n\rho}$ , все функции  $h(x)$  и только те, которые можно представить как *целую рациональную комбинацию* — с коэффициентами из  $\Omega$  — конечного числа функций из  $\mathfrak{L}_{n\rho}$ ,  $f_1(x), \dots, f_k(x)$ , где  $f_1(x), \dots, f_k(x)$  пробегает все функции из  $\mathfrak{L}_{n\rho}$ .

с) Наконец, из области целостности  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  наименьшее содержащее её поле  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  возникает по требованию:  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  содержит, кроме  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ , все функции  $h(x)$  и только те, которые можно представить как частные двух функций из  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ .

Если объединить эти три расширения в один шаг, получается:

*Всякую систему  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  можно расширить до наименьшего содержащего её поля  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  следующим требованием:*

*$\mathfrak{K}_{n\rho}$  содержит, кроме  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , все функции  $h(x)$  и только те, которые можно представить как рациональные комбинации — с коэффициентами из  $\Omega$  — конечного числа функций из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ,  $f_1(x), \dots, f_k(x)$ , где  $f_1(x), \dots, f_k(x)$  пробегает все функции из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ .*

Из последнего факта непосредственно следует существование рациональной базы для произвольных областей:

Пусть  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  есть наименьшее поле, содержащее  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , и пусть рациональная база  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  задана функциями

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

<sup>1</sup>  $f(x)$  и  $g(x)$  могут также иметь нулевую степень, то есть быть элементами из  $\Omega$ .



По определению  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  существуют соотношения

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

где  $r_1, \dots, r_\sigma$  являются рациональными функциями своих аргументов, и

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

все принадлежат  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ . Благодаря соотношениям (2), наряду с (1), также (3) задаёт рациональную базу  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ; а поскольку функции (3) принадлежат  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , она одновременно является рациональной базой  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ . Итак, имеем:

*Теорема IV: Произвольная система  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  рациональных (или целых рациональных) функций обладает рациональной базой алгебраического ранга  $\rho$ , состоящей из конечного числа функций самой системы.*

Пусть теперь специально  $\mathfrak{L}_{n\rho}$  является линейным семейством, а

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

есть рациональная база  $\mathfrak{L}_{n\rho}$ . Пусть, например,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

алгебраически независимы. Если тогда положить

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

то  $c_i$  можно выбрать как элементы из  $\Omega$  так, что

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

станет рациональной базой наименьшего содержащего поля  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ . Но так как  $\mathfrak{L}_{n\rho}$  является линейным семейством,  $g(x)$  принадлежит  $\mathfrak{L}_{n\rho}$ , и (5) задаёт рациональную базу  $\mathfrak{L}_{n\rho}$ ; то есть:

*Теорема V: Рациональную базу каждого линейного семейства  $\mathfrak{L}_{n\rho}$  рациональных (или целых рациональных) функций, а следовательно, в частности, рациональную базу каждой области целостности  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  и каждого поля  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ , можно специально выбрать так, чтобы она содержала не более  $\rho + 1$  функций (и не менее  $\rho$ ).*

Следовательно, ограничение числа функций рациональной базы, найденное в § 4 для поля, основано на свойстве поля быть линейным семейством; тогда как ограничение до  $\rho$  функций в случае существования минимальной базы использует все предпосылки поля.

Заметим ещё, что согласно § 3 (4) все характеристические свойства систем и наименьших содержащих их систем сохраняются при отображении.

## § 8. Инволюционная база областей целостности $\mathfrak{J}_{n\rho}$ из полиномов.

В следующих параграфах речь идет о системах  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , элементы которых являются целыми рациональными функциями, то есть полиномами; прежде всего об областях целостности  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  из полиномов. Для этих областей  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  сначала нужно зафиксировать понятия делимости.

Пусть  $F(x), G(x)$  — два полинома из  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ , а  $L(x)$  — общий делитель этих полиномов, так что имеем:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$  тогда и только тогда называется *общим делителем* в  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ , когда три полинома  $L(x), F_1(x), G_1(x)$  принадлежат  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ .

Два полинома из  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  называются *взаимно простыми* в  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ , если они не имеют общего делителя в  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ .

Пусть  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  — наименьшее поле, содержащее  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ . Тогда из определения следует, что каждая функция из  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  имеет представление

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

где  $F_1(x), F_2(x)$  принадлежат  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  и взаимно просты в  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ . Соответственно, несколько функций из  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  можно привести к общему знаменателю в  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ :

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$  тогда и только тогда называется *наименьшим общим знаменателем* в  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ , когда полиномы из  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ :

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$$

взаимно просты в  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ .

Такое представление может быть возможно различными способами, поскольку в  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  вообще говоря не действуют законы единственного разложения на неприводимые функции.

Теперь исследуем значение инволюционной базы  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  для  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ , перенося понятия инволюционной формы и инволюционной базы на области целостности. Пусть

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

является инволюционной формой  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ , а  $G(x)$  — наименьшим общим знаменателем в  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  коэффициентов  $\Phi(z, u)$ . Умножением на  $G(x)$  форма  $\Phi(z, u)$  переходит в форму  $\Psi(z, u)$ , коэффициенты которой являются полиномами из  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  и взаимно просты в  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ :

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i).$$

Всякую форму  $\Psi(z, u)$ , которая возникает из инволюционной формы  $\Phi(z, u)$  поля  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  умножением на полином из  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  так, что коэффициенты  $\Psi(z, u)$  являются полиномами из  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  и взаимно просты в  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ , будем называть *инволюционной формой*  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ; коэффициенты  $\Psi(z, u)$  будем называть соответствующей *инволюционной базой*.

Прежде всего из значения инволюционной базы  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  ясно, что каждая инволюционная база  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  одновременно является рациональной базой. Для дальнейшего исследования рассмотрим область отображения  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ , для наименьшего содержащего ее поля  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  неприводимое уравнение с нулем

$$z = u_1 x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

задано как  $\Phi^*(z, u) = 0$ .

По § 5 коэффициенты формы

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

задают элементарные симметрические функции рядов величин, сопряженных относительно  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ :

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}.$$

Пусть  $F^*(x)$  — произвольный полином из  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ . Тогда из равенства

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left( F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

следует, что  $F^*(x)$  является целой симметрической функцией этих рядов величин и потому выражается как целая рациональная комбинация элементарных симметрических функций, то есть функций

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x).$$

Если теперь

$$\begin{aligned} G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) &= \Psi^*(z, u) \\ &= G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

является инволюционной формой  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ , то всякий полином из  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ , а значит в частности всякий полином из  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ , является целой рациональной комбинацией частных

$$G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

С учетом принципа переноса отсюда получается:

*Теорема VI: Для каждой области целостности из полиномов  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  существует по меньшей мере одна выделенная рациональная база, инволюционная база, такая, что в рациональном представлении всех полиномов из  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  через функции инволюционной базы в знаменателе появляется только степень одной фиксированной функции — старшего коэффициента соответствующей инволюционной формы.*

## § 9. Относительно целые области $\mathfrak{G}_{n\rho}$ из полиномов.

Далее рассматриваем специальные области целостности из полиномов, промежуточные между областью целостности и полем.

Область целостности из полиномов  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  называется “относительно целой областью” при условии:

4а)  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  вместе с  $F(x)$  и  $G(x)$  — где  $G(x) \neq 0$  — содержит частное  $F(x) : G(x)$  тогда и только тогда, когда это частное цело по неопределенным, то есть является полиномом.

Сначала нужно доказать, что относительно целые области совпадают с совокупностями полиномов некоторого поля  $\mathfrak{K}_{n\sigma}$  ( $\sigma \geq \rho$ ) рациональных функций.

Пусть  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  есть наименьшее поле, содержащее  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ . Для каждой функции  $f(x)$  из  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  существует представление в виде частного двух полиномов из  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ :

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

причем допускаются и полиномы нулевой степени. Как только  $f(x)$  становится полиномом, она по условию 4а) принадлежит  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ; а так как  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  не может содержать ничего сверх полиномов, то каждая относительно целая область  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  тождественна совокупности полиномов наименьшего содержащего ее поля.

Обратно, пусть  $\mathfrak{K}_{n\sigma}$  есть произвольное поле рациональных функций (то есть не обязательно наименьшее поле, содержащее данную систему), и пусть  $\mathfrak{J}$  есть совокупность полиномов, содержащихся в  $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ .  $\mathfrak{J}$  удовлетворяет условиям 1, 2, 3 области целостности и условию 4а), следовательно является относительно целой областью; то есть совокупность полиномов, содержащихся в поле  $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ , образует относительно целую область  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  ( $\rho \leq \sigma$ ).<sup>1</sup>

Далее покажем тождественность относительно целых областей введенным Гильбертом “областям целостности из относительно целых функций”.<sup>2</sup>

Пусть

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \tag{1}$$

есть рациональная база  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ . По условиям 1, 2, 3, 4а) каждая рациональная комбинация полиномов (1), целая по неопределенным, то есть становящаяся полиномом, принадлежит  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ . Обратно, каждый полином из  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  по понятию рациональной базы рационально выражается через полиномы (1); поэтому  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  тождественна совокупности тех рациональных комбинаций полиномов (1), которые целы по неопределенным, то есть являются полиномами. Тем самым мы имеем определение Гильберта, исходящее из специальной рациональной базы, тогда как наше определение использует только абстрактные свойства области.

Для относительно целых областей определение общего делителя из § 8 для общих областей целостности упрощается:

Пусть  $F(x), G(x)$  — два полинома из  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ , а  $L(x)$  — общий делитель этих полиномов. Тогда  $L(x)$  называется *общим делителем* в  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  тогда и только тогда, когда  $L(x)$  принадлежит  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ .

В самом деле, тогда принадлежность частных  $F(x) : L(x)$  и  $G(x) : L(x)$  следует из условия 4а).

Другое существенное свойство относительно целых областей состоит в том, что понятие “алгебраически целого относительно  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” можно определять через произвольное уравнение точно так же, как для алгебраических числовых полей или для поля  $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ .

*Определение V:* Величина  $\xi$  называется алгебраически целой относительно  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  — или также относительно алгебраически целой —, если она удовлетворяет некоторому уравнению, старший коэффициент которого является единицей, а остальные коэффициенты являются полиномами из  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ .

В самом деле, пусть относительно алгебраически целая величина  $\xi$  удовлетворяет, например, уравнению

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0.$$

<sup>1</sup>Возможен также случай  $\rho = 0$ ; то есть совокупность полиномов из  $\mathfrak{K}_{n\sigma}$  состоит из элементов области коэффициентов  $\Omega$ .

<sup>2</sup>D. Hilbert: Mathematische Probleme. Доклад, Париж 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

$L(z)$  делится на целую функцию

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x),$$

неприводимую относительно наименьшего поля  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ , содержащего  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ . Но из этой делимости по известному обобщению теоремы Гаусса<sup>3</sup> следует, что рациональные функции  $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$  являются полиномами из  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ , а значит принадлежат  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ . Тем самым определение относительно алгебраически целой величины  $\xi$  получается из неприводимого уравнения. В частности, каждый полином  $F(x)$  из  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  также алгебраически цел относительно  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ , поскольку он удовлетворяет уравнению  $z - F(x) = 0$ .

Далее отметим, что для области целостности  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  из полиномов, аналогично наименьшему содержащему полю, определена и наименьшая содержащая ее относительно целая область  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  следующим требованием:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$  вместе с  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  содержит все полиномы  $H(x)$ , и только те, которые можно представить как частные двух полиномов из  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ .

Из этого определения далее следует: из каждой инволюционной формы и инволюционной базы  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  соответствующая форма и база для  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  получаются так, что нужно самое большее выделить общий делитель в  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  всех полиномов базы.

Действительно,  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  и  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  имеют одно и то же наименьшее содержащее поле  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ; и каждая инволюционная форма  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  возникает из инволюционной формы  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  умножением на полином из  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ , поэтому имеет коэффициенты из  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ , которые, однако, могут иметь общий делитель в  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ .<sup>4</sup>

Наконец отметим, что область отображения относительно целой области  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ , которая по § 7 снова является областью целостности  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  из полиномов, не обязана сама быть относительно целой областью. Действительно, если  $F(x)$  и  $G(x)$  — два полинома из  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ , частное которых не является полиномом и потому не принадлежит  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ , то частное  $F^*(x) : G^*(x)$  также не принадлежит  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ . Но это частное, возникающее специализацией некоторых неопределенных, вполне может быть полиномом, и тогда для  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  условие 4а) не выполнено.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Ср. J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2, или Weber (малое издание), § 20.

<sup>4</sup>Например, для области целостности  $\mathfrak{J}_{22}$ , состоящей из всех целых рациональных комбинаций  $x_1^2$  и  $x_1x_2$ , инволюционная форма имеет вид:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Так как  $x_1^2$  принадлежит  $\mathfrak{J}_{22}$ , а тем более наименьшей содержащей ее относительно целой области  $\mathfrak{G}_{22}$ , и потому является общим делителем в  $\mathfrak{G}_{22}$ , инволюционная форма  $\mathfrak{G}_{22}$  имеет вид:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

<sup>5</sup>Пусть, например,  $\mathfrak{G}_{22}$  состоит из всех полиномов, рационально выражаемых через  $F = x_1^2 x_2$  и  $G = x_1^2(1 + x_3)$ . Допустимая специализация  $x_3 = 0$  дает  $F^* : G^* = x_2$ , тогда как  $F : G$  не полином. Следовательно,  $\mathfrak{J}_{22}^*$  не является относительно целой областью.

## § 10. Относительно целые области первого рода и их интегральный базис.

Понятие “относительно алгебраически целого”, введенное в § 9 (Определение V), позволяет указать класс относительно целых областей, которые являются конечными областями целостности, и тем самым хотя бы для этого класса положительно ответить на вопрос, поставленный Д. Гильбертом (Mathematische Probleme, проблема 14). Дадим следующее

*Определение VI:* Конечное число полиномов из  $\mathfrak{G}_{nr}$  называется интегральным базисом, если каждый полином из  $\mathfrak{G}_{nr}$  можно представить как целую рациональную комбинацию этого конечного числа с коэффициентами из  $\Omega$ . Область целостности из полиномов, имеющая интегральный базис, называется конечной областью целостности.

Рассматриваемый класс относительно целых областей, для которых инволюционный базис окажется интегральным базисом, будем называть относительно целыми областями первого рода по следующему определению:

*Определение VII:* Относительно целая область  $\mathfrak{G}_{nr}$  называется областью первого рода, если ее область отображения является относительно целой областью  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$  такой, что каждый произвольный полином от  $x_1, \dots, x_\rho$  (с коэффициентами из  $\Omega$ ) алгебраически цел над  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ .

Действительно, по этому определению неопределенные  $x_1, \dots, x_\rho$ , а следовательно и линейная форма  $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$ , алгебраически целы над  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ . Поэтому неприводимая целая функция с корнем  $z = u(x)$  — инволюционная форма наименьшего содержащего поля  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  — имеет старшим коэффициентом единицу, а остальными коэффициентами полиномы из  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ . Следовательно, она одновременно является инволюционной формой  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ , и в  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$  не может существовать другая инволюционная форма. По принципу переноса  $\mathfrak{G}_{nr}$  также имеет инволюционную форму, старший коэффициент которой равен единице; а так как по теореме VI в рациональном представлении всех полиномов из  $\mathfrak{G}_{nr}$  через соответствующий инволюционный базис в знаменатель входит только этот старший коэффициент, инволюционный базис становится интегральным базисом, то есть:

*Теорема VII.* Каждая относительно целая область первого рода является конечной областью целостности; интегральный базис задается инволюционным базисом, полученным из характеризующей области отображения. В частности, интегральный базис относительно целых областей первого рода  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$  задается однозначно определенным инволюционным базисом  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ .

Дадим еще критерий для относительно целых областей первого рода. Пусть  $\mathfrak{G}_{nr}$  является областью первого рода, и пусть интегральный базис  $\mathfrak{G}_{nr}$  задан полиномами

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Тогда по вспомогательной теореме Гильберта<sup>1</sup> существуют  $\rho$  алгебраически независимых полиномов из  $\mathfrak{G}_{nr}$ :

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

таких, что полиномы (1), а значит и каждый полином из  $\mathfrak{G}_{nr}$ , алгебраически целы над полиномами (2). То же верно для каждого полинома области отображения  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$  относительно соответствующих полиномов

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

По Определению VII тогда и каждый произвольный полином от  $x_1, \dots, x_\rho$  алгебраически цел над полиномами (3).

Обратно, пусть область отображения  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  произвольной относительно целой области  $\mathfrak{G}_{nr}$  содержит  $\rho$  полиномов (3), над которыми каждый полином от  $x_1, \dots, x_\rho$  алгебраически цел. Тогда покажем, что отсюда сама  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  получается как относительно целая область  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ , и далее, что  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ , а следовательно и  $\mathfrak{G}_{nr}$ , являются областями первого рода.

<sup>1</sup>D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Вспомогательная теорема, сформулированная там только для однородных полиномов, так же верна для неоднородных.)

В самом деле, пусть  $F^*(x)$  — полином из наименьшего поля  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ , содержащего  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ; по предположению он алгебраически цел над полиномами (3). Тогда соответствующая функция из  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  алгебраически цела над  $\rho$  полиномами из  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ , значит является полиномом  $F(x)$  и потому принадлежит  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ; следовательно,  $F^*(x)$  принадлежит  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ . Область отображения  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  содержит все полиномы из  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  и является относительно целой областью  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ . Для  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ , а значит и для  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ , из предположения по Определениям V и VII непосредственно следует, что они являются областями первого рода, то есть:

*Относительно целые области первого рода  $\mathfrak{G}_{n\rho}$  характеризуются тем, что в области отображения  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  существуют  $\rho$  полиномов, над которыми каждый произвольный полином от  $x_1, \dots, x_\rho$  алгебраически цел. Из этого предположения сама область отображения получается как относительно целая область.*<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Например, в области  $\mathfrak{G}_{22}$ , упомянутой в заключительном замечании к § 9, допустимая специализация  $x_1 = 1$  дает два полинома  $F^* = x_2$ ,  $G^* = 1 + x_3$ , над которыми каждый произвольный полином от  $x_2, x_3$  алгебраически цел. Следовательно,  $\mathfrak{G}_{22}$  является областью первого рода, причем с  $F(x)$  и  $G(x)$  в качестве интегрального базиса.

## § 11. Вспомогательная теорема об алгебраически целой зависимости.

Теперь дадим критерий того, что каждый произвольный полином от  $x_1, \dots, x_\rho$  алгебраически цел над  $\rho$  полиномами от  $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Если полиномы (1) специально являются однородными формами, то при каждой специальной системе значений, обращающей (1) в нуль, одновременно обращаются в нуль и все алгебраически цело зависимые формы; в частности, также  $x_1, \dots, x_\rho$ .

Следовательно, формы (1) не могут обращаться в нуль ни при какой системе значений, кроме

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0;$$

их результат должен быть отличен от нуля.

Обратно, это условие также достаточно и допускает распространение на неоднородные полиномы согласно следующей

*Вспомогательной теореме: Достаточным условием того, что каждый произвольный полином от  $x_1, \dots, x_\rho$  алгебраически цел над  $\rho$  полиномами от  $x_1, \dots, x_\rho$*

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x),$$

*является неравенство нулю результата, взятого по  $x_1, \dots, x_\rho$ , старших однородных частей*

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

*полиномов (1):*

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

*Для однородных форм (1) условие (2) необходимо.<sup>1</sup>*

Для доказательства образуем полиномы

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

где  $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$  обозначают неопределенные, а  $\Phi^*(x)$  — произвольный полином от  $x_1, \dots, x_\rho$ . Пусть результат полиномов (3) по  $x_1, \dots, x_\rho, 1^2$  задан как

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

это целая рациональная функция от  $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ . По Ф. Мертенсу в разложении (4) по степеням  $\mu$  можно явно указать старший коэффициент;<sup>3</sup> получается

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

где  $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$  обозначают целые целочисленные функции от  $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$  и коэффициентов полиномов (3). Это разложение прежде всего показывает, что при предположении (2),  $R_0 \neq 0$ , также  $R(\lambda, \mu)$  не может тождественно обращаться в нуль. Далее тождество по  $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ :

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

<sup>1</sup>О теории результатов ср. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Частично воспроизведено у J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

<sup>2</sup>То есть однородный результат по  $x_1, \dots, x_\rho, x_0$ , если однородить полиномы (3) посредством дополнительной неопределенной  $x_0$  так, чтобы степень по  $x$  сохранялась.

<sup>3</sup>А. а. О. § 3 (доказательство Satz I) и явно § 6 (определение совокупности всех членов результата  $R$ , содержащих заданное степенное произведение  $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$  как множитель). В нашем случае положено  $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$ . Воспроизведено у König, Kap. VI, § 9.



при подстановке

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x)$$

переходит в:

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \dots \\ &+ A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \tag{6}$$

чем вспомогательная теорема доказана, поскольку  $R_0$  по предположению является числом из  $\Omega$ .

## § 12. Интегральный базис регулярных систем

### $\mathfrak{S}_{n\rho}$ из полиномов.

Вспомогательная теорема § 11 вместе с заключением § 10 непосредственно дает следующий факт:

*Если в области отображения  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  области  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  существуют  $\rho$  полиномов таких, что однородный результат их старших однородных частей не обращается тождественно в нуль —  $R_0 \neq 0$  —, то  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  является областью первого рода и, следовательно, конечной областью целостности, причем ее инволюционный базис является интегральным базисом.*

Условие  $R_0 \neq 0$  позволяет теперь, посредством вспомогательной теоремы, дать второе доказательство существования интегрального базиса, по существу принадлежащее Д. Гильберту;<sup>1</sup> это доказательство, правда, не позволяет распознать инволюционный базис как таковой, но зато равномерно действует для всех систем  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  с указанным свойством.

А именно, пусть  $\rho$  полиномов из  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ , для которых  $R_0 \neq 0$  и которые, следовательно, алгебраически независимы, заданы как

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

По вспомогательной теореме каждый произвольный полином от  $x_1, \dots, x_\rho$ , а значит, в частности, каждый полином наименьшего поля  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ , содержащего  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ , алгебраически цел над полиномами (1). Если им в  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  соответствуют полиномы

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

то по принципу переноса каждый полином наименьшего поля  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ , содержащего  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , а следовательно, в частности, каждый полином из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , алгебраически цел над полиномами (2). Обратно, всякая функция из  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ , алгебраически целая над полиномами (2), также является полиномом. Поэтому, рассматривая  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  (по § 4) как алгебраическое поле над  $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$ , получаем, что совокупность полиномов из  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  — относительно целая область  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  — тождественна совокупности алгебраически целых величин этого поля. Пусть  $G(x)$  есть полином из  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ , дополняющий (2) до рационального базиса, а  $D(x)$  — дискриминант неприводимого уравнения  $k$ -й степени, которому  $G(x)$  удовлетворяет относительно  $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$ . Тогда каждый полином из  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ , в частности каждый полином  $F(x)$  из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , как алгебраически целая величина допускает представление

$$F(x) = \frac{1}{D(x)} (\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)). \quad (3)$$

Пусть теперь  $F(x)$  пробегает все полиномы из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ . Тогда применение гильбертовой теоремы I о модульном базисе (Math. Ann. 36) к системе, образуемой из соответствующих функций

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i),$$

показывает существование конечного числа полиномов из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ :

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x), \quad (4)$$

таких, что каждый полином из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  допускает представление

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

где  $A_1, \dots, A_\lambda$  обозначают полиномы от  $G_i(x)$ . Полиномы (2) и (4), следовательно, образуют интегральный базис  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ; то есть:

<sup>1</sup>Über die vollen Invariantensysteme, § 2. У Гильберта, при предположении уже иначе полученного существования интегрального базиса поля инвариантов, речь идет лишь о толковании этого базиса через кронекерову фундаментальную систему алгебраически целых величин поля.

*Теорема VIII:* Если в системе отображения  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  системы полиномов  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  существуют  $\rho$  полиномов таких, что результат старших однородных частей не обращается тождественно в нуль —  $R_0 \neq 0$  —, то  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  обладает интегральным базисом.

Эта теорема допускает еще небольшое обобщение. Достаточно, чтобы  $\rho$  полиномов (1), для которых  $R_0 \neq 0$ , принадлежали наименьшей области целостности  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ , содержащей  $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ . В самом деле, рассуждения, ведущие к теореме VIII, показывают, что и тогда представление (5) еще остается в силе. Но по определению каждый полином  $L(x)$  наименьшей содержащей области целостности  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  можно цело и рационально представить через конечное число — меняющееся вместе с  $L(x)$  — полиномов из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ; следовательно, существуют  $\sigma$  полиномов из  $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x), \quad (6)$$

таких, что полиномы  $G_i(x)$  становятся целыми рациональными комбинациями полиномов (6). Поэтому (6) и (4) дают интегральный базис. Вводя:

*Определение VIII:* Система  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  полиномов называется регулярной, если в области отображения  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  наименьшей содержащей области целостности существуют  $\rho$  полиномов таких, что результат старших однородных частей не обращается тождественно в нуль —  $R_0 \neq 0$  —

получаем:

*Теорема IX:* Каждая регулярная система  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  из полиномов обладает интегральным базисом.<sup>2</sup>

Дадим еще, аналогично § 5 для инволюции, геометрическое толкование регулярных систем. Для этого рассмотрим, как там в (7), систему уравнений

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

где  $L^*(x)$  пробегает все полиномы из  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ . Если однородить посредством  $x_0, \xi_0$ , то пусть (7) переходит в систему уравнений между однородными формами

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

причем, если  $H^*(x)$  обозначает старшие однородные части  $L^*(x)$ , имеет место соотношение

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Фундаментальными точками  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  будем называть (ср. примечание к § 5) решения (8), не зависящие от  $x$ , то есть отличные от рядов, сопряженных с  $x$ . Следовательно, фундаментальные точки суть системы значений, отличные от  $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$ , для которых одновременно выполняется

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

или, ввиду (9),

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

Если теперь существуют  $\rho$  форм  $H^*(\xi)$ , для которых  $R_0 \neq 0$ , то есть не имеющих общей системы решений, то  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  не может иметь фундаментальной точки. Если, в частности,  $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$  состоит из

<sup>2</sup>Что существуют нерегулярные системы без интегрального базиса, Гильберт показал на примере (Gött. Nachr. 1891, с. 233). Еще немного проще следующий пример:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1 x_2, x_1 x_2^2, \dots, x_1 x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

Существование интегрального базиса здесь было бы равносильно существованию целого положительного числа  $\nu$  такого, что выполняются тождества

$$x_1 x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1 x_2)^{i_1} (x_1 x_2^2)^{i_2} \dots (x_1 x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

Сравнение размерностей по  $x_1, x_2$  уже при  $\sigma = 1$  приводит к двум уравнениям условий для показателей:

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

которые очевидно не имеют решения в неотрицательных целых числах. Следовательно,  $\mathfrak{S}_{22}$  не обладает интегральным базисом.

однородных форм, то при  $R_0 \neq 0$  и сама  $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$  не может иметь фундаментальной точки, поскольку такая точка была бы одновременно фундаментальной точкой  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ . Но верно и обратное. Для этого рассмотрим систему  $\mathfrak{J}(H^*)$ , образованную из совокупности форм  $H^*(x)$ ; она снова образует область целостности.

Из гильбертовой теоремы I о модульном базисе и гильбертовой вспомогательной теоремы (ср. цитату в § 10) следует существование  $\rho$  форм из  $\mathfrak{J}(H^*)$ , обращение которых в нуль влечет обращение в нуль всех форм из  $\mathfrak{J}(H^*)$ . Если теперь  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  не имеет фундаментальной точки, эти  $\rho$  форм не могут обращаться в нуль одновременно; их результат  $R_0 \neq 0$ .

Итак:

*Регулярные системы  $\mathfrak{S}_{n\rho}$  из полиномов характеризуются тем, что область отображения  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  наименьшей содержащей области целостности не имеет фундаментальной точки. Для регулярных систем  $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$  из однородных форм уже сама система не имеет фундаментальной точки.*<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Нерегулярная система  $\mathfrak{S}_{22}$ , указанная в предыдущем примечании, имеет фундаментальную точку:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

### § 13. Примеры относительно целых областей первого рода и регулярных систем.

1. В качестве первого примера относительно целой области первого рода  $\mathfrak{S}_{nn}$  рассмотрим совокупность полиномов от  $x_1, \dots, x_n$ , допускающих заданную группу перестановок  $G$ , то есть совокупность полиномов лагранжевой области родов. Так как  $x_1, \dots, x_n$  в силу тождества

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

алгебраически целы над элементарными симметрическими функциями, принадлежащими  $\mathfrak{S}_{nn}$ , и потому по определению V алгебраически цело зависят от  $\mathfrak{S}_{nn}$ , область  $\mathfrak{S}_{nn}$  имеет первый род. Далее, как область первого рода, поскольку ее элементы являются однородными формами и  $n = \rho$ ,  $\mathfrak{S}_{nn}$  образует (по заключению § 10) регулярную систему. Действительно, в силу (1) результат  $R_0$  элементарных симметрических функций не может тождественно обращаться в нуль; по правилам теории результатов он вычисляется как  $\pm 1$ . Инволюционная форма области  $\mathfrak{S}_{nn}$ , поскольку  $\mathfrak{S}_{nn}$  имеет первый род и  $n = \rho$ , однозначно определяется как инволюционная форма соответствующей лагранжевой области родов. Величины, сопряженные с  $x_1, \dots, x_n$  относительно этой области, получаются перестановками группы  $G$ ; следовательно, эта инволюционная форма задается равенством

$$\begin{aligned} \Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad (2)$$

где произведение берется по всем перестановкам из  $G$ . Формула (2) задает “форму Галуа группы  $G$ ”, и потому верен следующий факт:

*Все полиномы от  $x_1, \dots, x_n$ , допускающие группу перестановок  $G$ , являются целыми рациональными комбинациями коэффициентов  $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$  формы Галуа этой группы.*

2. В качестве примера *регулярных систем* рассмотрим системы  $\mathfrak{S}_{n1}$  из полиномов, то есть системы, содержащие только один алгебраически независимый полином.

Действительно, пусть  $\mathfrak{S}_{11}^*$  будет системой отображения для  $\mathfrak{S}_{n1}$ , а

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

будет полиномом из  $\mathfrak{S}_{11}^*$ . Тогда

$$R_0 = a_0 \neq 0. \quad (3)$$

Следовательно,  $\mathfrak{S}_{n1}$  регулярна по определению VIII, и потому:

*Каждая система  $\mathfrak{S}_{n1}$  из полиномов, в частности каждая система из бесконечно многих полиномов одной неопределенной, обладает интегральным базисом.*<sup>1</sup>

3. Теперь специализируем системы  $\mathfrak{S}_{n1}$  до относительно целых областей  $\mathfrak{S}_{n1}$ , которые как регулярные системы, по § 12, являются относительно целыми областями первого рода. Их интегральный базис поэтому задается инволюционным базисом, который одновременно является инволюционным базисом наименьшего содержащего поля  $\mathfrak{K}_{n1}$ . По § 6 любая функция инволюционного базиса  $\mathfrak{K}_{n1}$  одновременно является минимальным базисом — мы называли ее функцией Люрота этого поля — и всякая функция инволюционного базиса линейно-дробно зависит от этой функции Люрота. В нашем случае функция Люрота, поскольку она принадлежит  $\mathfrak{S}_{n1}$ , является полиномом; всякий другой полином инволюционного базиса линейно-дробно зависит от нее, а в силу (3) эта зависимость также алгебраически цела, то есть фактически цела и линейна. Тем самым функция Люрота  $L(x)$  становится интегральным базисом. Если еще положить  $u_1 = 1$ , инволюционная форма  $\mathfrak{S}_{11}^*$  имеет вид

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

<sup>1</sup>Самые простые возможные нерегулярные системы без интегрального базиса являются, таким образом, системами  $\mathfrak{S}_{22}$ . Что такие системы действительно существуют, показывают пример Гильберта и пример, приведенный в примечании к § 12.

откуда снова видно, что  $L(x)$  является интегральным базисом. Следовательно:

*Относительно целые области  $\mathfrak{G}_{n1}$  имеют первый род; их интегральный базис состоит из одного полинома, функции Люрота наименьшего содержащего поля.*

4. В качестве еще одного примера относительно целой области  $\mathfrak{G}_{n1}$  упомянем, в частности, целые рациональные проективные инварианты квадратичной формы от  $s$  переменных. В согласии с предыдущим, они, как известно, представляются как целые рациональные комбинации детерминанта  $|a_{ik}|$  этой формы; и этот детерминант одновременно является функцией Люрота соответствующего поля инвариантов.

## § 14. Системы из целочисленных полиномов.

Полученные теоремы о базисах теперь нужно усилить в отношении целочисленности.

Поэтому далее коэффициентную область  $\Omega$  будем считать (конечным) алгебраическим числовым полем; через  $[\Omega]$  обозначим совокупность алгебраически целых чисел из  $\Omega$ , которые для краткости будем называть целыми числами. Под целочисленным полиномом будем понимать полином с коэффициентами из  $[\Omega]$ ; отныне  $F(x), G(x), \dots$  будут означать только целочисленные полиномы.

По аналогии с § 7 рассмотрим различные системы из целочисленных полиномов:

Произвольную систему из целочисленных полиномов будем называть целочисленной системой  $\mathfrak{S}_{nr}$ .

Целочисленное линейное семейство  $\mathfrak{L}_{nr}$  есть целочисленная система, которая вместе с  $F_1(x)$  и  $F_2(x)$  всегда содержит также  $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$ , где  $c_1, c_2$  — произвольные целые числа из  $[\Omega]$ .

Целочисленная область целостности  $\mathfrak{J}_{nr}$  есть целочисленное линейное семейство, которое вместе с  $F(x)$  и  $G(x)$  всегда содержит также  $F(x) \cdot G(x)$ .

Целочисленная относительно целая область  $\mathfrak{G}_{nr}$  есть область целостности, которая вместе с  $F(x)$  и  $G(x)$  — где  $G(x) \neq 0$  — тогда и только тогда содержит частное  $F(x) : G(x)$ , когда это частное является целочисленным полиномом.

Так же, как в § 7, наименьшая целочисленная область целостности  $\mathfrak{J}_{nr}$ , содержащая целочисленную систему  $\mathfrak{S}_{nr}$ , состоит из всех полиномов  $H(x)$ , которые являются целыми рациональными целочисленными комбинациями конечного числа полиномов из  $\mathfrak{S}_{nr}$ ;

наименьшая целочисленная относительно целая область  $\mathfrak{G}_{nr}$ , содержащая ее, состоит из всех целочисленных полиномов  $H(x)$ , которые являются рациональными комбинациями конечного числа полиномов из  $\mathfrak{S}_{nr}$ .

Теперь перейдем к переносу теорем о базисах. В отношении рационального базиса нужно отметить, что понятия поля, наименьшего содержащего поля и рационального базиса, основанные только на “рациональном”, не изменяются. Кроме того, систему отображения  $\mathfrak{S}_{nr}^*$  целочисленной системы  $\mathfrak{S}_{nr}$  можно снова выбрать целочисленной системой сколь угодно многими способами. Так как и для целочисленного линейного семейства сохраняются рассуждения, ведущие к ограничению числа, то верно:

*Теорема V': Каждая целочисленная система  $\mathfrak{S}_{nr}$  обладает рациональным базисом; рациональный базис целочисленного линейного семейства  $\mathfrak{L}_{nr}$  можно, в частности, выбрать так, чтобы он содержал не более  $r + 1$  полиномов.*

Теперь исследуем аналог инволюционного базиса областей целостности из полиномов (§ 8). Для этого теорему о симметрических функциях рядов величин нужно расширить в отношении целочисленности следующим

*вспомогательным утверждением. Целые целочисленные симметрические функции от  $n$  рядов величин  $(yz \dots t)$ :*

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

*являются целыми целочисленными функциями конечного числа среди них, а именно элементарных симметрических функций*

$$\begin{array}{l} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{array} \quad (2)$$

*и функций*

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

*которые алгебраически цело и целочисленно зависят от функций (2).*

Действительно,  $n$  величин  $y_1, \dots, y_n$  алгебраически цело и целочисленно зависят от  $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$ ; соответствующее утверждение верно для  $z_1, \dots, z_n$  в отношении  $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$  и

т.д. Следовательно, поле симметрических функций рядов величин (1) образует алгебраическое поле над полем, определенным функциями (2), так, что алгебраически целые и целочисленные величины этого поля тождественны целым целочисленным симметрическим функциям рядов величин (1). Поэтому, если выбрать (3) как кронекерову фундаментальную систему, вспомогательное утверждение доказано.

Пусть теперь  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  есть целочисленная область целостности,  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$  — целочисленная область отображения, и

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

есть инволюционная форма  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ ; при этом  $G^*(x)$  может также иметь нулевую размерность, то есть быть числом из  $[\Omega]$ . Элементарные симметрические функции, соответствующие функциям (2), тогда задаются некоторыми из частных

$$G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Так как по вспомогательному утверждению функции (3) алгебраически цело и целочисленно зависят от (2), то — по расширению теоремы Гаусса на полиномы с алгебраически целочисленными коэффициентами — функции из  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ , соответствующие (3), задаются в виде

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

где  $K_\nu^*(x)$  — целочисленные полиномы из  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ . Следовательно, если речь идет об относительно целых областях,  $K_\nu^*(x)$  принадлежат области; вообще же они являются частными полиномов из  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ .

Если теперь  $F^*(x)$  есть произвольный целочисленный полином из  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ , то имеем

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left( F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

и поэтому  $i \cdot F^*(x)$  становится целой целочисленной симметрической функцией рядов величин  $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$ .

Следовательно, по вспомогательному утверждению и принципу переноса верно:

*Теорема VI:* Для целочисленных областей целостности  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  каждая инволюционная форма определяет выделенный рациональный базис так, что каждый полином  $F(x)$  из  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  допускает представление

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

где  $\Gamma$  обозначает целую целочисленную функцию. Для целочисленных относительно целых областей  $\mathfrak{G}_{n\rho}$ , у которых целочисленная относительно целая область  $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$  является областью отображения, знаменатель  $H(x)$  задается старшим коэффициентом соответствующей инволюционной формы.



## § 15. Целочисленные относительно целые области первого рода и регулярные системы.

Вместо интегрального базиса для целочисленных систем выступает целочисленный интегральный базис, то есть конечное число целочисленных полиномов системы такое, что каждый целочисленный полином системы представляется как целая целочисленная комбинация этого конечного числа.

Теоремы о целочисленном интегральном базисе в существенном идут параллельно прежним, и только доказательства требуют небольших изменений.

Сначала определение V (§ 9) непосредственно переносится.

*Определение V': величина  $\xi$  называется алгебраически целой и целочисленной относительно целочисленной относительно целой области  $\mathfrak{G}_{nr}$ , если она удовлетворяет некоторому уравнению, старший коэффициент которого является единицей из  $[\Omega]$ , а остальные полиномы принадлежат  $\mathfrak{G}_{nr}$ .*

Действительно, расширение теоремы Гаусса на полиномы с алгебраически-целочисленными коэффициентами показывает, как и в § 9, что отсюда можно получить определение на неприводимом уравнении.

Из определения V' далее получается перенос определения VII.

*Определение VII': целочисленная относительно целая область  $\mathfrak{G}_{nr}$  называется областью первого рода, если она имеет областью отображения относительно целую область  $\mathfrak{G}_{rr}^*$  такую, что каждый произвольный целочисленный полином от  $x_1, \dots, x_r$  алгебраически целю и целочисленно зависит от  $\mathfrak{G}_{rr}^*$ .*

Чтобы показать конечность этих областей первого рода, сначала заметим, что, как в § 10, из определения следует: старший коэффициент инволюционной формы является единицей из  $[\Omega]$ .

Следовательно, по теореме VI' (§ 14) каждый полином  $F(x)$  из  $\mathfrak{G}_{nr}$  допускает представление:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Если здесь к системе, образованной из целочисленных полиномов  $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$ , применить гильбертову теорему II о целочисленном модульном базисе (Math. Ann. 36), сформулированную для целых рациональных числовых коэффициентов, в ее распространении на алгебраически-целочисленные полиномы<sup>1</sup>, то отсюда выясняется существование целочисленного интегрального базиса, то есть:

*Теорема VII': каждая целочисленная относительно целая область первого рода обладает целочисленным интегральным базисом.*

Далее переносим определение регулярных систем:

*Определение VIII': целочисленная система  $\mathfrak{G}_{nr}$  называется целочисленно-регулярной, если в области отображения  $\mathfrak{J}_{rr}^*$  наименьшей содержащей целочисленной области целостности существуют  $\rho$  полиномов такие, что результат членов наивысшей размерности является единицей из  $[\Omega]$ , то есть  $R_0 = \varepsilon$ .*

Чтобы перенести доказательство существования интегрального базиса, заметим, что вспомогательная теорема из § 11 допускает следующую более острую формулировку; она получается из уравнений (5) и (6) в § 11 и из того обстоятельства, что  $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$  являются целыми целочисленными функциями от  $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ :

*Достаточное условие для того, чтобы каждый произвольный целочисленный полином от  $x_1, \dots, x_r$  алгебраически целю и целочисленно зависел от  $\rho$  целочисленных полиномов, состоит в том, что результат членов наивысшей размерности этих полиномов является единицей из  $[\Omega]$ , то есть  $R_0 = \varepsilon$ .*

<sup>1</sup>Если  $w_1, \dots, w_k$  обозначает фундаментальную систему алгебраически целых чисел из  $\Omega$ , и если положить

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \dots + \Gamma_k(H)w_k,$$

то  $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$  имеют целые рациональные числовые коэффициенты. Применение теоремы II к системе, образованной из форм  $v_1\Gamma_1(H) + \dots + v_k\Gamma_k(H)$ , непосредственно показывает справедливость этого распространения.

Из этой вспомогательной теоремы точно так же, как в § 12, для каждого полинома  $F(x)$  целочисленно-регулярной системы следует представление (3) из § 12, где теперь  $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$  являются целочисленными полиномами от  $G_i$ . И далее, как в § 12, применение гильбертовой теоремы II (Math. Ann. 36) в ее распространении на алгебраически-целочисленные полиномы, вместе с определением наименьшей содержащей целочисленной области целостности, дает существование целочисленного интегрального базиса; то есть:

*Теорема IX': каждая целочисленно-регулярная система обладает целочисленным интегральным базисом.*

В качестве примера целочисленной относительно целой области первого рода, по аналогии с примером 1 в § 13, укажем на совокупность  $\mathfrak{G}_{nn}$  целочисленных полиномов лагранжевой родовой области. То, что  $\mathfrak{G}_{nn}$  имеет целочисленно-первый род, следует из тождества:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

так как результат элементарных симметрических функций имеет значение  $\pm 1$ ,  $\mathfrak{G}_{nn}$  является также целочисленной регулярной системой.

Еще один пример, по вспомогательной теореме из § 14, дает совокупность целых целочисленных симметрических функций от  $n$  рядов величин.

Эрланген, май 1914.

## 7. Теорема конечности для инвариантов конечных групп

Math. Ann. 77 (1916), с. 89–92

Ниже будет дано вполне элементарное доказательство конечности инвариантов конечных групп, основанное только на теории симметрических функций и одновременно дающее фактическое указание полной системы. Обычное же доказательство, опирающееся на гильбертову теорему о модульном базисе (Апп. 36), является только доказательством существования.<sup>1</sup>

Пусть конечная группа  $\mathfrak{H}$  состоит из  $h$  линейных преобразований (с ненулевым детерминантом)  $A_1, \dots, A_h$ , причем  $A_k$  задает линейное преобразование

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

или, сокращенно,  $(x^{(k)}) = A_k(x)$ . Следовательно, группа  $\mathfrak{H}$  переводит ряд  $(x)$  с элементами  $x_1, \dots, x_n$  в ряды  $(x^{(k)})$  с элементами  $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ . Так как среди  $A_1, \dots, A_h$  должна содержаться тождественность, среди рядов  $(x^{(k)})$  содержится также ряд  $(x)$ . Под целым рациональным (абсолютным) инвариантом группы понимается такая целая рациональная функция от  $x_1, \dots, x_n$ , которая при применении  $A_1, \dots, A_h$  остается тождественно неизменной. Поэтому для такого инварианта  $f(x)$  имеем

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

### 1.

Формула (1) выражает, что  $f(x)$  есть целая рациональная симметрическая функция рядов величин  $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$ . При этом, поскольку каждое слагаемое  $f(x^{(k)})$  содержит только один ряд  $(x^{(k)})$ , речь идет о простейшем случае, обычно называемом *одноформным*. По известной теореме о симметрических функциях рядов величин<sup>2</sup> функция  $f(x)$  цело и рационально выражается через элементарные симметрические функции этих рядов, то есть через коэффициенты  $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$  “резольвенты Галуа”

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left( \begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

где  $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$  являются инвариантами степени  $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$  по переменным  $x$ . Тем самым доказано:

*Коэффициенты  $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$  резольвенты Галуа образуют полную систему инвариантов группы в том смысле, что каждый инвариант можно цело и рационально выразить через эти конечные многие инварианты.*

### 2.

Исходя из (1), можно провести и следующее еще более элементарное рассмотрение,<sup>3</sup> которое одновременно приводит ко второй полной системе. Пусть

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \dots x_n^{\mu_n} + \dots + c x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n},$$

<sup>1</sup>Ср., например, Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2-е изд.), т. 2, § 57.

<sup>2</sup>Ср. примечание к 2.

<sup>3</sup>Оно сводится к доказательству теоремы о симметрических функциях рядов величин в указанном выше одноформном случае.

где  $a, b, \dots, c$  обозначают константы. Тогда по (1) получаем

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \dots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \dots \mu_n} + \dots + c \cdot J_{\nu_1 \dots \nu_n}. \end{aligned}$$

Значит, каждый инвариант можно составить как целую линейную комбинацию специальных инвариантов

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

и потому достаточно доказать утверждение для этих специальных инвариантов. Но  $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ , с точностью до числового множителя, является коэффициентом при  $u_1^{\mu_1} \dots u_n^{\mu_n}$  в выражении

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

где положено  $\mu = \mu_1 + \dots + \mu_n$ , и это выражение есть  $\mu$ -я степенная сумма  $h$  линейных форм

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \dots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \dots + u_n x_n^{(h)}.$$

Как известно, бесконечно многие степенные суммы  $S_\mu$  являются целыми рациональными комбинациями

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

коэффициенты которых задаются инвариантами

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h).$$

Тем самым получена вторая полная система:

*Полная система инвариантов группы задается всеми инвариантами  $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ , для которых  $\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h$ , где  $h$  означает порядок группы.*

Связь с 1. устанавливается замечанием, что степенные суммы  $S_1, \dots, S_h$  можно заменить элементарными симметрическими функциями от  $\xi_1, \dots, \xi_h$ , что приводит к данной там полной системе  $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ . Оба результата показывают, что все инварианты можно цело и рационально выразить через те из них, степень которых по переменным  $x$  не превосходит порядка  $h$  группы.

### 3.

Из только что доказанного можно вывести следствия для рационального представления. Каждый рациональный абсолютный инвариант можно, как непосредственно видно из домножения числителя и знаменателя на сопряженные знаменателя относительно группы, представить в виде частного двух целых рациональных абсолютных инвариантов, не обязательно взаимно простых. Отсюда следует, что каждый рациональный абсолютный инвариант можно рационально выразить через коэффициенты  $G_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$  резольвенты Галуа  $\Phi(z, u)$ . Эту теорему можно легко доказать разными способами и без прохода через теорему конечности; она уже сформулирована у Weber II, § 58.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Однако данное там доказательство не является состоятельным: показано лишь, что функция  $\Psi(t)$  в формуле (7) имеет инварианты коэффициентами, но не показано, что эти инварианты рационально выражаются через коэффициенты  $\Phi(t)$ . Этот пробел устраняется, если для представления  $x_i^{(k)}$  через  $\xi_k$  вместо интерполяционной формулы Лагранжа применить известную процедуру дифференцирования. Это соотношение, полученное дифференцированием тождества  $\Phi(-\xi_k, u) = 0$  по всем  $u$ :

$$\left[ \frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

#### 4.

Наконец, следует упомянуть, что выведенные здесь результаты неявно содержатся в моей работе “Поля и системы рациональных функций”;<sup>5</sup> именно, полная система, данная в 1., содержится в теоремах VI и VII, а доказательство рационального представления, независимое от этой теоремы конечности, содержится в теореме III.<sup>6</sup> В данном специальном случае ход доказательства и результат, однако, существенно упрощаются по сравнению с общей теорией. К применению общих исследований к инвариантам конечных групп меня привели беседы с Э. Фишером; от него же по существу происходят и доказательство, данное в 2. (в общем случае возникающая там полная система не является рационально определимой), и примечание к 3.

Эрланген, май 1915 г.

---

Соответственно, вместо формул (7) и (8) у Weber для каждой рациональной функции  $\omega(x)$  должна стоять формула

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega\left(\frac{\partial\Phi/\partial u_1}{\partial\Phi/\partial z}, \dots, \frac{\partial\Phi/\partial u_n}{\partial\Phi/\partial z}\right)\bigg|_{z=-\xi_k},$$

которая содержит уже только коэффициенты  $\Phi(z, u)$  и суммирование которой по всем  $k$  для инвариантов  $\omega(x)$  дает требуемое представление.

<sup>5</sup>Math. Ann. 76, с. 161 (1915).

<sup>6</sup>Для относительных инвариантов теоремы VIII и IX содержат доказательство конечности, которое также основано на иной основе, чем обычное, но тоже является только доказательством существования; причина в том, что относительные инварианты не образуют поля.

## 8. О целом рациональном представлении инвариантов системы произвольно многих основных форм

Math. Ann. 77 (1916), с. 93–102

В конце своего вклада в юбилейный сборник в честь Шварца “Об инвариантах системы произвольно многих основных форм” Д. Гильберт высказывает предположение, что эти инварианты можно цело и рационально представить через конечное число инвариантов системы  $(J, PJ)$ , где  $J$  обозначает полную систему инвариантов для линейно независимых основных форм, а инварианты  $PJ$  получаются из  $J$  полярными процессами.

Ниже, в I, я показываю, что это предположение действительно верно, а именно как простое следствие редукционной теоремы: всякую форму от произвольно многих рядов по  $n$  переменных в каждом можно представить как сумму поляр форм, содержащих только  $n$  фиксированных рядов и сами выведенных из исходной формы полярными процессами. Эта редукционная теорема есть специальный случай, впервые сформулированный Ф. Мертенсом, обобщения разложения Клебша–Гордана по рядам на формы от произвольно многих рядов по  $n$  переменных; это обобщение, данное А. Капелли, Ф. Мертенсом и Ж. Дерейтсом, доказано формальным преобразованием процессов дифференцирования.<sup>1</sup>

В II я даю также более понятийное доказательство редукционной теоремы, рассматривая вопрос как проблему эквивалентности линейных семейств форм. Этот взгляд, равно как и существенную часть использованных соображений, я беру из работы “Об алгебраических модульных системах”<sup>2</sup> и из примыкающих к ней неопубликованных теорем Э. Фишера, пользоваться которыми он любезно мне разрешил.

Наконец, в III я показываю, как соответствующие соображения приводят также к самым общим разложениям по рядам.

### I.

Пусть  $\theta$  есть форма, однородная в каждом из  $N > n$  рядов

$$A_1, A_2, \dots, A_N,$$

где вообще ряд  $A_k$  состоит из  $n$  элементов

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}.$$

Коэффициенты  $\theta$  могут быть неопределёнными или величинами заданной области рациональности. Далее пусть  $P$  обозначает целую рациональную функцию – с рациональными целыми коэффициентами – от полярных процессов

$$P_{hk} = \left( A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

причём под произведением  $P_{hk}P_{ij}\theta$  следует понимать применение  $P_{hk}$  к  $P_{ij}\theta$ .

Тогда упомянутая редукционная теорема задаётся тождеством

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

<sup>1</sup>F. Mertens: “Über eine Formel der Determinantentheorie.” (формула 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), и подробнее (с приложениями) в: “Über ganze Funktionen von  $m$  Systemen von je  $n$  Unbestimmten”. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). Для некоторых доказательств Капелли (с 1882 г.) ср., например: Math. Ann. 37 или автографированные “Lezioni sulla teoria delle forme algebriche” (1902). J. Deruyts: *Essai d’une théorie générale des formes algébriques*, Mém. d. 1. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

<sup>2</sup>E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

где формы  $Z$  содержат уже только ряды

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

и выведены из  $\theta$  полярными процессами  $P$ .

Рассмотрим теперь систему основных форм  $(F')$ , состоящую из  $N$  форм одного порядка и с одним и тем же числом переменных

$$F_1, F_2, \dots, F_N,$$

коэффициенты которых соответственно берутся как  $N$  рядов

$$A_1, A_2, \dots, A_N.$$

Пусть  $(J)$  обозначает полную систему – состоящую из конечного числа инвариантов – форм  $F_1, \dots, F_n$ , такую, что каждый инвариант форм  $F_1, \dots, F_n$  можно цело и рационально выразить через инварианты  $(J)$ . Тогда гильбертово предположение, подлежащее доказательству, состоит в том, что для симультанных инвариантов  $S$  форм  $F_1, \dots, F_N$  полная система задаётся конечным числом инвариантов  $(J, PJ)$ , где  $PJ$  означает все инварианты, выводимые из  $J$  полярными процессами  $P$ .

В самом деле, каждый симультанный инвариант  $S$  системы  $(F')$  с рациональными целыми коэффициентами является формой, однородной в каждом из  $N$  рядов  $A_1, \dots, A_N$ , с рациональными целыми коэффициентами; следовательно, к нему применимо тождество (1). Так как применение полярных процессов  $P$  к  $S$ , как известно, снова даёт инварианты, формы  $Z$  также являются инвариантами, именно симультанными инвариантами форм  $F_1, \dots, F_n$ , поскольку они содержат только ряды  $A_1, \dots, A_n$ ; значит, по предположению, они являются целыми рациональными функциями инвариантов  $(J)$ . Поэтому тождество (1) переходит в

$$S = \sum PY,$$

где  $Y$  обозначают произведения степеней инвариантов  $(J)$ . Но фактическое выполнение процессов  $P$  над  $Y$ , по определению  $P$ , состоит в последовательном, конечное число раз повторённом выполнении простых полярных операций  $P_{hk}$ , которые по правилу дифференцирования произведений приводят к суммам произведений инвариантов  $(J)$  и  $(PJ)$ . То же относится к применению  $P_{hk}$  к произведению из  $(J)$  и  $(PJ)$ ; следовательно, и  $PY$  даёт только целые рациональные комбинации из  $(J, PJ)$ . Тем самым доказана целая рациональная представимость всех инвариантов  $S$  через  $(J, PJ)$ .

## II.

Перед доказательством редукционной теоремы напомним некоторые факты о линейных семействах форм. Под *линейным семейством форм над  $K$*  мы понимаем систему форм одной и той же степени, полную в том смысле, что вместе с  $\theta_1$  и  $\theta_2$  она всегда содержит также  $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$ , где  $c_1, c_2$  – величины предписанной области рациональности  $K$ , а  $K$  содержит область коэффициентов форм  $\theta$ . Среди этих форм всегда есть конечное число – скажем,  $\rho$  – линейно независимых над  $K$ , тогда как любые  $\rho + 1$  форм удовлетворяют линейному соотношению с коэффициентами из  $K$ ; семейство имеет *ранг  $\rho$  относительно  $K$* .<sup>3</sup> Мы будем пользоваться легко усматриваемым фактом: если  $\mathcal{L}$  и  $\mathcal{T}$  суть два линейных семейства над  $K$  одного и того же ранга  $\rho$ , и  $\mathcal{T}$  является подсемейством  $\mathcal{L}$ , то  $\mathcal{L}$  и  $\mathcal{T}$  тождественны (эквивалентны).

После этого переходим к редукционной теореме. Тождество из I

$$\theta = \sum PZ$$

переходит в аналогичное тождество для  $P\theta$ , если к обеим частям применить один и тот же полярный процесс  $P$ ; значит, редукционная теорема одновременно даёт представление всех поляр  $\theta$  суммами

<sup>3</sup>Более общие линейные семейства форм – ранг которых не обязан быть конечным – получаются, если отбросить ограничение одинаковой степени или также ограничение, что  $K$  содержит область коэффициентов форм  $\theta$ .

специальных поляр  $PZ$ . С другой стороны, эти специальные поляры несомненно содержатся среди всех поляр, так что редукционная теорема утверждает эквивалентность этих двух линейных семейств форм; в частности, и эквивалентность тех подсемейств, формы которых в каждом отдельном ряду имеют ту же степень, что и  $\theta$ . Для доказательства этой эквивалентности введём промежуточное семейство, определяемое формами  $Z$ . Ради простоты сначала дадим доказательство в случае трёх бинарных рядов ( $N = 3, n = 2$ ), а затем кратко укажем полностью параллельное общее доказательство.

Итак, пусть  $\theta(x, y, z)$  имеет соответственно степени  $\alpha, \beta, p$  в рядах

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

коэффициенты  $\theta$  пока пусть будут неопределёнными  $a$  (или также рациональными числами). Тогда рассмотрим следующие три линейных семейства форм.

1. Семейство  $\mathcal{L}$ , состоящее из всех форм  $f(x, y, z)$ , которые получены из  $\theta$  полярными процессами  $P$  и в отдельных рядах  $x, y, z$  имеют ту же степень, что и  $\theta$ ; в частности,  $\mathcal{L}$  содержит и  $\theta$ . Если рассматривать  $f(x, y, z)$  как форму от  $x, y, z$  и неопределённых  $a$ , то область коэффициентов есть поле  $R$  рациональных чисел; для  $K$  также нужно взять  $R$ , поскольку только при рационально-целых  $\theta_1, \theta_2$  выражение  $c_1P_1 + c_2P_2$  снова становится процессом  $P$ ; пусть  $\mathcal{L}$  имеет ранг  $\rho$  относительно  $R$ .

2. Семейство  $\mathcal{S}$ , состоящее из всех форм  $g(\lambda; x, y)$ , определённых посредством

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1x + \lambda_2y),$$

или, в выражении через полярные процессы,

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[ (\lambda_1x + \lambda_2y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy)\lambda_1^p + g_1(x, y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2 + \cdots + g_p(xy)\lambda_2^p, \end{aligned}$$

причём

$$i!(p-i)!g_i(xy) = \left( y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left( x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

<sup>4</sup> Тем самым  $g_i(xy)$  задают формы  $Z$  из тождества (1): формы  $g$  являются рационально-целыми формами от  $x, y, \lambda$  и неопределённых  $a$ ; пусть  $\mathcal{S}$  имеет ранг  $\sigma$  относительно  $R$ .

3. Семейство  $\mathcal{T}$ , получающееся из  $\mathcal{S}$  обратным полярным процессом так же, как  $\mathcal{S}$  получается из  $\mathcal{L}$ ; формы  $h$  семейства  $\mathcal{T}$  определены через

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[ z \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz), \end{aligned}$$

где по 2. имеем

$$h_i(xyz) = \left( z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left( z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

Отдельные  $h_i$ , а следовательно и  $h$ , являются формами  $PZ$  и их суммами; пусть  $\mathcal{T}$  имеет ранг  $\tau$  относительно  $R$ .

---

<sup>4</sup>Как и в I,

$$\left( t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

а значит, в частности,

$$\begin{aligned} \left[ (\lambda_1x + \lambda_2y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1x_1 + \lambda_2y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1x_2 + \lambda_2y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[ z \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$



Как показывает построение форм  $h(x, y, z)$  семейства  $\mathcal{T}$ , эти формы получены из  $\theta$  полярными процессами  $P$  и в рядах  $x, y, z$  по отдельности имеют ту же степень, что и  $\theta$ ; поэтому семейство  $\mathcal{T}$  образует подсемейство  $\mathcal{L}$ , и по упомянутому выше факту для доказательства эквивалентности остаётся доказать только равенство рангов. При этом доказательстве специальная структура форм  $f(xyz)$  – то есть то, что они являются полярами одной и той же формы  $\theta$  – далее уже не используется.

а) Для сравнения рангов  $\mathcal{L}$  и  $\mathcal{S}$  служит вспомогательная лемма а): из  $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$  необходимо следует  $f(x, y, z) = 0$ . Это непосредственно следует из тождественного соотношения между тремя бинарными рядами

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

которое влечёт

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Из  $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$  (тождественно по  $\lambda$ ), следовательно, как показывает подстановка  $\lambda_1 = (zy)$ ,  $\lambda_2 = (xz)$ , и поскольку  $(xy) \neq 0$ , необходимо следует  $f(x, y, z) = 0$ .

По этой лемме между формами из  $\mathcal{S}$  и формами из  $\mathcal{L}$  существует взаимно однозначное соответствие. Действительно, из

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

необходимо следует

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Далее каждое соотношение в  $\mathcal{S}$  сохраняется также между однозначно соответствующими формами в  $\mathcal{L}$  (и обратно). Ибо из

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \dots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

по лемме необходимо следует

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \dots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

Тем самым доказано равенство рангов  $\mathcal{L}$  и  $\mathcal{S}$ ;  $\rho = \sigma$ .

б) Для сравнения рангов  $\mathcal{S}$  и  $\mathcal{T}$  соответственно служит вспомогательная лемма б): из  $h(x, y, z) = 0$  необходимо следует  $g(\lambda; xy) = 0$ . Для доказательства заметим, что по 3. равенство  $h(x, y, z) = 0$  равносильно исчезновению отдельных произведений степеней

$$\left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p,$$

откуда дальнейшим дифференцированием следует также исчезновение произведений степеней

$$\begin{aligned} & \left( \frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left( \frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left( \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left( \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy) \end{aligned}$$

Следовательно, исчезает и всякая линейная комбинация этих произведений степеней, а значит, всякая форма

$$f \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, xy).$$

Если специально выбрать  $f$  так, что

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

то получаем также

$$g\left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

или – если положить

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1} \lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

где  $G_i$  являются рационально-целыми линейными формами от неопределённых  $a$ , – имеем

$$\sum \nu_1! \nu_2! \alpha_1! \alpha_2! \beta_1! \beta_2! G_i^2 = 0$$

и, следовательно,  $g(\lambda; xy) = 0$ .

Из вспомогательной леммы б), точно так же как в а), следует равенство рангов  $\mathcal{S}$  и  $\mathcal{T}$ ;  $\sigma = \tau$ .

Итак, по а) и б) имеем  $\rho = \tau$ ; тем самым – поскольку  $\mathcal{T}$  есть подсемейство  $\mathcal{L}$  – доказана эквивалентность этих двух линейных семейств. Поэтому всякую форму из  $\mathcal{L}$ , в частности и  $\theta$ , можно представить как линейную рационально-целую комбинацию  $\rho$  линейно независимых форм  $h(x, y, z)$ :

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Это тождество, выведенное для неопределённых коэффициентов  $a$  формы  $\theta$ , сохраняется, если заменить неопределённые  $a$  величинами любой области рациональности, и *редукционная теорема тем самым доказана вообще в случае трёх бинарных рядов*.

Общее доказательство для  $N$  рядов по  $n$  переменных в каждом проходит теперь совершенно параллельно. Пусть  $\theta(A)$  имеет соответственно степень  $\alpha_i$  в ряду  $A_i$ . Тогда снова рассмотрим три линейных семейства форм:

1. семейство  $\mathcal{L}$ , состоящее из всех форм  $f(A)$ , которые получены из  $\theta(A)$  полярными процессами  $P$  и в каждом отдельном ряду  $A_i$  имеют ту же степень, что и  $\theta(A)$ ;

2. семейство  $\mathcal{S}$ , состоящее из всех форм  $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ , которые получаются из  $f(A)$  подстановками

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n, \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

при этом коэффициенты отдельных произведений степеней  $\lambda$  в  $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$  задают формы  $Z$  тождества (1);

3. семейство  $\mathcal{T}$ , состоящее из всех форм  $h(A)$ , определённых посредством

$$\begin{aligned} h(A) &= \left[ A_{n+1} \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \\ &\cdots \left[ A_N \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n). \end{aligned}$$

$h(A)$  есть сумма форм  $PZ$ .

Теперь благодаря тождественному соотношению между любыми  $n + 1$  рядами вспомогательная лемма а) сохраняется; так же справедлива вспомогательная лемма б), в доказательстве которой число переменных вообще не играло роли. Следовательно,  $\mathcal{L}$  и  $\mathcal{T}$  имеют одинаковый ранг и – поскольку  $\mathcal{T}$  является подсемейством  $\mathcal{L}$  – тождественны. Поэтому тождество

$$\theta = \sum PZ$$

имеет место для неопределённых коэффициентов, а следовательно, и для коэффициентов, являющихся величинами любой области рациональности; *тем самым редукционная теорема доказана в общем виде*.

### III.

Коротко покажем ещё, как аналогичные соображения дают также *общее разложение по рядам* (для  $N \leq n$ ). Пусть  $Z$  есть отдельно однородная форма  $n$  рядов  $A_1, \dots, A_n$  по  $n$  величин в каждом, и пусть  $\Delta$  есть детерминант этих рядов. Сначала докажем соответствующее (1) тождество:

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \quad (2)$$

где формы  $H$  содержат уже только ряды  $A_1, \dots, A_{n-1}$  и выведены из  $Z$  процессами  $P$ .

Доказательство состоит в превращении соотношений, выведенных в II, в конгруэнции по модулю  $\Delta$ . Ради простоты положим в основу три тернарных ряда  $x, y, z$ ; коэффициенты предполагаются неопределёнными.

Три линейных семейства  $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$  пусть будут определены как в II для случая бинарных рядов; их ранги пусть будут  $\rho, \sigma, \tau$ , тогда как  $\rho^*$  и  $\tau^*$  обозначают ранги  $\mathcal{L}$  и  $\mathcal{T}$  по модулю  $\Delta$  (то есть существуют  $\rho^*$ , но не  $\rho^* + 1$  форм из  $\mathcal{L}$ , линейно независимых по модулю  $\Delta$ ). Тогда, как в II, имеет место

*Вспомогательная лемма а):* из  $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$  необходимо следует  $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$  (и обратно). Действительно, в силу соотношения между четырьмя тернарными рядами

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

между тремя тернарными рядами всегда существует линейное соотношение по модулю  $\Delta$ :

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

и поэтому, как в II,

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Из  $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$  (тождественно по  $\lambda$ ) отсюда – поскольку  $\Delta$  неприводим и  $\Delta_3$  не делится на  $\Delta$  – необходимо следует  $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ . Обратное ясно из  $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ . Отсюда, как в II, заключаем:  $\rho^* = \sigma$ .

Вспомогательная лемма б) остаётся в силе вместе с доказательством, и поэтому имеем  $\sigma = \tau$ .

Для доказательства  $\tau = \tau^*$  служит

*Вспомогательная лемма с):* из  $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$  необходимо следует  $h(x, y, z) = 0$ . Действительно,  $h(x, y, z)$  как поляра исчезает при применении известного  $\Omega$ -процесса; это выражается дифференциальным уравнением

$$\Delta \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0.$$

Если теперь  $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$ , то дальнейшим дифференцированием исчезает также

$$k \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z),$$

а следовательно, и  $h(x, y, z)$ . Поэтому имеем  $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$ , и, так как  $\mathcal{T}$  есть подсемейство  $\mathcal{L}$ , тождество (2) доказано; соответствующее рассуждение даёт доказательство и при  $n$  переменных.<sup>5</sup>

Применяя тождество (2) к множителю при  $\Delta$ , получаем разложение

$$Z = \varphi_0 + \Delta \varphi_1 + \Delta^2 \varphi_2 + \dots + \Delta^\mu \varphi_\mu,$$

<sup>5</sup>По 3. имеется соответствующее, исчезающее из-за детерминантного множителя, соотношение для  $\Omega(h)$ ; в операторной записи это уравнение, возникающее из произведений

$$\left( \lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta} \right), \quad \left[ z \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right]$$

и оно исчезает из-за исчезновения детерминантного множителя.

где каждая из  $\varphi_i$  исчезает при применении  $\Omega$ -процесса.  $i$ -кратное повторение процесса даёт, поскольку вообще  $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1 \psi + c_2 \Delta \cdot \Omega(\psi)$ ,

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

с другой стороны, по (2) имеем

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

где  $H_i$  выведены из формы  $\Omega^i(Z)$  так же, как  $H$  из  $Z$ . По вспомогательной лемме с) (в распространении на  $n$  переменных) получаем поэтому  $\varphi_i = \sum PH_i$ , и, следовательно:

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \dots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

как самое общее разложение формы от  $n$  рядов по  $n$  переменных по полярам форм только от  $n - 1$  рядов.

Разложение по рядам для форм от  $N$  рядов по  $n$  переменных ( $N < n$ ) получается отсюда, как известно, простой подстановкой. Положим (для  $N = 3, n > 3$ ):

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

и разложим  $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$  по (3). Тогда, поскольку  $\xi, \eta, \zeta$  входят только в комбинациях  $u, v, w$ , имеем

$$\left( \eta \frac{\partial}{\partial \xi} \right) = \left( v \frac{\partial}{\partial u} \right) \dots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left( \frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w} \right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

В силу специализации  $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1; \xi_2 = \xi_3 = \dots = \zeta_2 = 0$  форма  $H(u, v, w)$  переходит в  $H(x, y, z)$ , а  $\nabla_{uvw}(xyz)$  – с точностью до числового множителя – в  $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$ , поскольку применение  $(y\partial/\partial x)$  и т. д. к детерминантам  $(xyz)_{ikl}$  обращает их в нуль. Так как соответствующее верно и для  $N$  рядов, из (3) следует разложение

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \dots + \sum P\Phi_\mu, \quad (4)$$

где  $\Phi_i$  получены из  $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$  процессами  $P$  и содержат уже только ряды  $A_1, \dots, A_{N-1}$ , за исключением детерминантных комбинаций, входящих в  $\nabla^i$ , которые, как сказано, при поляризации не принимаются в расчёт.

Если поэтому заменить эти детерминанты в  $\nabla^i$  неопределёнными  $p$ , то возникающие формы можно снова разложить по (4); так в конце концов получается разложение

$$H = \left[ \sum P\psi(p) \right]_{p=\text{детерминанты } A_1 \dots A_N}, \quad (5)$$

где  $\psi$  получаются из исходной формы процессами  $P$  и  $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p)$ ,  $\nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$  и т. д. Этими разложениями и их комбинациями – например, если применить к формам  $Z$ , входящим в (1), сначала (3), а затем (4) и (5), – исчерпываются все известные разложения для форм от произвольно многих рядов по  $n$  координатных переменных в каждом.

Эрланген, 5 января 1915 г.

## 9. Наиболее общие области целых трансцендентных чисел

Math. Ann. 77 (1916), с. 103–128

В силу теоремы о вполне упорядочении Э. Цермело построил область «целых трансцендентных чисел», то есть числовую область  $\mathfrak{G}$ , обладающую следующими *абстрактными* свойствами:

- I. Сумма, разность и произведение двух чисел из  $\mathfrak{G}$  снова являются числом из  $\mathfrak{G}$ .
- II. Каждое действительное или комплексное число является частным двух чисел из  $\mathfrak{G}$ .
- III. Каждое целое рациональное (соответственно алгебраическое) число является элементом  $\mathfrak{G}$ .
- IV. Никакое нецелое рациональное (соответственно алгебраическое) число не принадлежит  $\mathfrak{G}$ .<sup>1</sup>

Конструкция основана на том, что теорема о вполне упорядочении позволяет установить существование *алгебраической базы* всех чисел, то есть *системы  $H$  чисел  $\eta$ , между которыми нет алгебраических соотношений, но через которые можно алгебраически выразить все остальные числа*. Благодаря алгебраической независимости эти базовые числа  $\eta$  можно рассматривать как *неопределённые*; тем самым искомая область переходит в область *целостности* из рациональных и алгебраических функций от неопределённых  $\eta$ ,<sup>2</sup> коэффициенты которых принадлежат полю  $K$  всех алгебраических чисел. Специальная область  $\mathfrak{G}_\eta$ , построенная Цермело, тогда характеризуется следующими *базовыми свойствами*:

$\mathfrak{G}_\eta$  содержит:

- 1) все базовые числа  $\eta$ ,
- 2) все многочлены от  $\eta$  с целочисленными<sup>3</sup> коэффициентами,
- 3) все целые алгебраические функции от  $\eta$  с целочисленными коэффициентами.

$\mathfrak{G}_\eta$  исключает:

- 4) все рационально-дробные функции от  $\eta$  с целочисленными коэффициентами,
- 5) все алгебраически-дробные функции от  $\eta$  с целочисленными коэффициентами.<sup>4</sup>

Теперь легко видеть (ср. примеры в § 2 и 3), что существуют области  $\mathfrak{G}$ , *существенно отличные* от области Цермело  $\mathfrak{G}_\eta$ , то есть такие области  $\mathfrak{G}$ , которые ни при каком *вполне упорядочении* не обладают всеми базовыми свойствами 1)–5) и, следовательно, ни при каком вполне упорядочении не могут быть получены конструкцией Цермело. Иными словами, существуют области  $\mathfrak{G}$ , которые *нельзя* взаимно однозначно и изоморфно отобразить на  $\mathfrak{G}_\eta$ . Тем самым возникает вопрос о *наиболее общих областях целых трансцендентных чисел*; ниже он полностью решается.

Для этого сначала надо установить, какие из базовых свойств являются следствиями абстрактных определяющих свойств, а какие обусловлены специальной конструкцией. Оказывается (§ 1), что для каждой заранее заданной области  $\mathfrak{G}$  существует вполне упорядочение, при котором выполняются базовые свойства 1) и 2); *следовательно, каждую область  $\mathfrak{G}$  можно построить с помощью алгебраической базы всех чисел*. Из остальных базовых свойств ни одно не обязано выполняться (§ 2 и 3). Отсюда, в частности, следует, что ещё одно абстрактное свойство области Цермело не принадлежит всем областям  $\mathfrak{G}$ : *алгебраически-целая замкнутость*. Его можно сформулировать так:

<sup>1</sup>Э. Цермело, «О целых трансцендентных числах», Math. Ann. 75, с. 434 (1914).

<sup>2</sup>По этой причине рассуждения настоящей работы отчасти идут параллельно рассуждениям прежней работы автора: «Поля и системы рациональных функций», Math. Ann. 76, с. 161 (1915).

<sup>3</sup>Под «целочисленный» здесь и далее понимается, что коэффициенты принадлежат области целостности  $[K]$  всех целых алгебраических чисел. Для определения  $\mathfrak{G}_\eta$  в пунктах 1)–5) было бы достаточно рассматривать только целые рациональные числовые коэффициенты; однако для более общих областей базовые свойства тогда стали бы менее простыми.

<sup>4</sup>Цермело, цит. соч., § 3.

V. Каждое число, алгебраически-цело и целочисленно зависящее от конечного числа чисел из  $\mathfrak{G}$ , принадлежит  $\mathfrak{G}$ .

Специальные области, которым наряду с I–IV присуще также V, будем называть областями  $\mathfrak{H}$  из алгебраически-целых трансцендентных чисел. Для наиболее общих областей  $\mathfrak{H}$  получаются простые результаты (§ 4):

- а) Пересечение всех областей  $\mathfrak{H}$ , которые можно построить с помощью одной и той же базы  $H$ , задаётся всеми целыми алгебраическими функциями этой базы, то есть областью Цермело  $\mathfrak{G}_\eta$ , которая сама является областью  $\mathfrak{H}$ . (Тем самым одновременно получена абстрактная характеристика области Цермело.)
- б) Каждая область  $\mathfrak{H}$  возникает из  $\mathfrak{G}_\eta$  посредством алгебраически-целого присоединения<sup>5</sup> произвольной системы  $\mathfrak{S}(\eta)$ ; при этом  $\mathfrak{S}(\eta)$  должна удовлетворять лишь одному условию: в результате присоединения в область не должно войти никакое алгебраически-дробное число.

Менее просты результаты для наиболее общих областей  $\mathfrak{G}$ , если за основу взята алгебраическая база. Здесь пересечение всех областей  $\mathfrak{G}$  само уже не является областью  $\mathfrak{G}$ ; поэтому и конструкцию наиболее общих областей труднее обозреть (§ 5).

Чтобы получить результаты, аналогичные результатам для областей  $\mathfrak{H}$ , алгебраическая база заменяется рациональной базой  $\Theta$ , то есть системой  $\Theta$  чисел  $\vartheta$ , которые позволяют рационально выразить все числа, тогда как по меньшей мере при одном вполне упорядочении никакое базовое число не может быть рационально представлено через конечное число предшествующих. На эту рациональную базу  $\Theta$  надо ещё наложить дополнительное условие: область целостности  $[\Theta]$ , состоящая из всех целочисленных многочленов от  $\vartheta$ , не должна содержать никакого алгебраически-дробного числа. (Построение такой базы с дополнительным условием показано в § 7.) Тогда для наиболее общих областей  $\mathfrak{G}$ , которые можно было бы также назвать областями из рационально-целых трансцендентных чисел, снова получаются простые результаты (§ 6):

- а) Пересечение всех областей  $\mathfrak{G}$ , которые можно построить с помощью одной и той же рациональной базы  $\Theta$ , задаётся всеми целыми рациональными функциями этой базы, то есть областью  $[\Theta]$ , которая сама является областью  $\mathfrak{G}$ .
- б) Каждая область  $\mathfrak{G}$  возникает из  $[\Theta]$  посредством рационально-целого присоединения произвольной системы  $\mathfrak{S}(\vartheta)$ ; при этом  $\mathfrak{S}(\vartheta)$  должна удовлетворять лишь одному условию: в результате присоединения в область не должно войти никакое алгебраически-дробное число.

Чтобы иметь полную аналогию с областями  $\mathfrak{H}$ , следовало бы не включать алгебраические числа в определяющие свойства III и IV для областей  $\mathfrak{G}$ . При такой модификации III и IV конструкция целых элементов с помощью рациональной базы переносится на любое произвольное поле (§ 10), тогда как конструкция Цермело предполагает алгебраическую замкнутость поля.

Когда  $H$  пробегает все алгебраические базы, а  $\Theta$  — все рациональные базы, удовлетворяющие дополнительному условию, результаты а) и б) дают совокупность всех областей  $\mathfrak{H}$  и  $\mathfrak{G}$ . Если объединить все изоморфные области в один класс, то из этой совокупности можно выделить подмножество, представляющее совокупность всех классов — по § 9 по меньшей мере счётно бесконечно многих — классов (§ 8).

---

<sup>5</sup>Пояснение этого термина дано в § 4.

## § 1. Доказательство базовых свойств 1) и 2) для всех областей $\mathfrak{G}$ .

Пусть  $\mathfrak{G}$  есть произвольно заданная область целых трансцендентных чисел, то есть область, обладающая абстрактными свойствами I–IV. По процедуре, которую Э. Цермело применил к полю всех комплексных чисел, выберем из  $\mathfrak{G}$  алгебраическую базу  $H$  всех чисел из  $\mathfrak{G}$ . Так как по II каждое действительное или комплексное число можно представить как частное двух чисел из  $\mathfrak{G}$ , то  $H$  одновременно является алгебраической базой всех чисел. Следовательно, для каждой произвольно заданной области  $\mathfrak{G}$  алгебраическую базу всех чисел можно выбрать так, чтобы она принадлежала  $\mathfrak{G}$ ; тем самым базовое свойство 1) выполнено. Далее, по III область  $\mathfrak{G}$  содержит область целостности  $[K]$  всех целых алгебраических чисел, а потому по I также все многочлены от базовых величин  $\eta$  с коэффициентами из  $[K]$ , то есть все целочисленные многочлены от  $\eta$ , образующие область целостности  $[H]$ . Значит, базовое свойство 2) также всегда выполнено; то есть каждую область  $\mathfrak{G}$  можно построить посредством алгебраической базы  $H$  всех чисел так, что  $\mathfrak{G}$  содержит область целостности  $[H]$  как делитель.

**Замечание.** Тем не менее, конечно, можно, исходя из базы  $H$ , построить область  $\mathfrak{G}$ , для которой базовые свойства 1) и 2) выполняются не именно относительно  $H$ , а относительно какой-нибудь другой базы  $H'$ . Пусть, например,  $\mathfrak{G}'$  возникает из области Цермело  $\mathfrak{G}_\eta$  так, что во всей конструкции некоторая базовая величина  $\eta$  заменяется многочленом  $f(\eta)$ . Тогда  $\mathfrak{G}'$  не содержит ни  $\eta$ , ни  $[H]$ ; но если в базе  $H$  заменить базовую величину  $\eta$  на  $\xi = f(\eta)$  — причём  $H$  снова переходит в алгебраическую базу  $H'$  —, то базовые свойства 1) и 2) для  $\mathfrak{G}'$  выполняются относительно  $H'$ .

## § 2. Исключение базовых свойств 4) и 5).

Теперь нужно показать, что области  $\mathfrak{G}$  не обязаны удовлетворять ни одному из дальнейших базовых свойств. Сначала свойства 4) и 5) будут исключены тем, что в конструкции Цермело область целостности  $[H]$  заменяется областью из целых рациональных «функционалов».

По Веберу<sup>1</sup> под *рациональным функционалом* понимают всякую рациональную функцию с рациональными числовыми коэффициентами в следующем однозначно определённом представлении:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

где  $E_1, E_2$  являются взаимно простыми примитивными многочленами с целыми рациональными числовыми коэффициентами, а  $a$  — положительным рациональным числом (абсолютной величиной  $A$ ). Если, в частности,  $a$  есть *целое рациональное* число, то  $A$  называется *целым рациональным функционалом*. Как специальные случаи среди целых рациональных функционалов содержатся целые рациональные числа и многочлены с целыми рациональными числовыми коэффициентами, тогда как рационально-дробные числа и многочлены с рационально-дробными коэффициентами следует относить к дробным рациональным функционалам.

Пусть теперь область  $\mathfrak{G}$  состоит из совокупности  $\mathfrak{F}$  всех целых рациональных функционалов от каждого раз конечного числа базовых величин  $\eta$  и из всех функций, алгебраически целых над  $\mathfrak{F}$  — то есть удовлетворяющих некоторому уравнению, старший коэффициент которого равен единице, а остальные коэффициенты являются целыми рациональными функционалами.

Доказательство свойств I–IV для  $\mathfrak{G}$  идёт совершенно параллельно соответствующему доказательству у Цермело; кратко его наметим. Прежде всего II и III ясны, поскольку  $\mathfrak{G}$  содержит область Цермело  $\mathfrak{G}_\eta$  как делитель. Далее, по теореме Гаусса о многочленах с целыми рациональными числовыми коэффициентами сумма, разность и произведение целых рациональных функционалов снова являются *целыми* рациональными функционалами; значит,  $\mathfrak{F}$  образует область целостности, а по известным рассуждениям<sup>2</sup> областью целостности становится также  $\mathfrak{G}$ , чем выполнено I. Кроме того, из расширенной теоремы Гаусса<sup>3</sup> следуют две вспомогательные леммы: «Если  $z$  алгебраически цел над  $\mathfrak{F}$  посредством *какого-либо* уравнения, то он алгебраически цел и посредством *неприводимого* уравнения, которому  $z$  удовлетворяет относительно поля всех рациональных функционалов»<sup>4</sup> и «уравнение, неприводимое относительно поля всех рациональных чисел, которому удовлетворяет алгебраическое число, неприводимо также относительно поля всех рациональных функционалов». Следовательно,  $\mathfrak{G}$  не может содержать никакого дробного алгебраического числа; этим доказано IV, а значит, и все абстрактные свойства I–IV.

Напротив, ни при каком вполне упорядочении нельзя выбрать из  $\mathfrak{G}$  базу так, чтобы  $\mathfrak{G}$  исключала все рационально- и алгебраически-дробные функции от базовых величин. Действительно, пусть  $z(\eta)$  есть какая-либо функция области, которую следует выбрать в качестве базовой величины, то есть функция, определённая уравнением:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

где

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

являются целыми рациональными функционалами. Тогда функция  $\frac{a_k}{z}$  принадлежит  $\mathfrak{G}$ , и точно так же принадлежат  $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$ ,  $\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$  и т. д.<sup>5</sup> Тем самым базовые свойства 4) и 5) для совокупности областей  $\mathfrak{G}$  исключены.

<sup>1</sup>Г. Вебер, *Учебник алгебры*. Малое издание, §§ 96 и 97.

<sup>2</sup>Ср., например, Вебер, § 97, 8.

<sup>3</sup>Вебер, § 20, 5.

<sup>4</sup>Ср. Вебер, § 97, 4.

<sup>5</sup>Совершенно аналогично каждую алгебраическую функцию от  $\eta$  можно, умножив на целое рациональное число, превратить в величину функциональной области  $\mathfrak{G}$ . Тем самым эта область обладает свойством: *каждое комплексное число можно представить как частное величины из  $\mathfrak{G}$  и целого рационального числа* — по аналогии с алгебраическими числами.



**Замечание.** Пример в § 3 покажет, что  $\mathfrak{G}$  при каждом вполне упорядочении может содержать рационально-дробные функционалы, не содержа рационально- или алгебраически-дробного числа.

### § 3. Исключение базового свойства 3).

Для исключения базового свойства 3) служит обобщённая *модульная область*: в ней аргументами многочленов области являются уже не сами неопределённые, а все целые алгебраические функции от этих неопределённых<sup>1</sup>; сами же неопределённые принимают на себя роль модульной базы.

Пусть  $\mathfrak{G}$  состоит из *всех величин*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \quad (1)$$

где  $\alpha$  пробегает все алгебраически целые числа,  $\eta_1 \cdots \eta_t$  пробегают все базовые величины, а  $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$  при каждой фиксированной комбинации  $\eta_1 \cdots \eta_t$  по отдельности пробегают все целые алгебраические функции от  $\eta$ .<sup>2</sup>

Легко проверить, что свойства I–IV для этой модульной области выполнены. Сначала выполнено I, поскольку сумма, разность и произведение двух величин  $z$  снова имеют форму (1). Кроме того,  $\mathfrak{G}$  содержит все базовые величины  $\eta$ , а также все величины  $\eta \cdot g(\eta)$ , где  $g(\eta)$  пробегает все целые алгебраические функции от  $\eta$ . Значит, все *целые* алгебраические функции от  $\eta$ , а потому и все алгебраические функции от  $\eta$  вообще, можно представить как частные двух величин из  $\mathfrak{G}$ ; этим доказано II. В представлении (1), в частности при  $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$ , содержатся все алгебраически целые числа; но  $z$  не может быть равным никакому дробному алгебраическому числу. Действительно, если  $z$  представляет алгебраическое число  $\beta$ , то из тождества по  $\eta$

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

необходимо следует  $\beta = \alpha$ . Это видно из специализации

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

при которой множители  $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$  как целые алгебраические функции остаются конечными, поскольку переходят в целые алгебраические функции или числа.<sup>3</sup> Итак, условия I–IV для  $\mathfrak{G}$  выполнены.

Напротив, ни при каком вполне упорядочении нельзя выбрать из  $\mathfrak{G}$  базу так, чтобы все целые алгебраические функции от базовых величин принадлежали  $\mathfrak{G}$ . Пусть  $z(\eta)$  есть любая функция области, которую следует выбрать в качестве базовой величины, то есть функция, которая действительно содержит неопределённые  $\eta$ . Мы покажем, что функции

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

начиная с некоторого конечного значения  $\nu$ , зависящего от  $z$ , уже не могут принадлежать  $\mathfrak{G}$ .

Действительно, предположим, что  $\xi$  принадлежит  $\mathfrak{G}$ . Тогда по (1) оно имеет вид

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

где снова  $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$  являются целыми алгебраическими функциями от  $\eta$ , а  $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$  являются произвольными базовыми величинами, которые в частности могут совпадать с  $\eta_1 \cdots \eta_t$ . Прежде всего нужно доказать, что алгебраически целое число  $\gamma$  равно нулю. Поскольку  $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$  являются целыми алгебраическими функциями,  $\xi$  становится равным  $\gamma$  при  $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$  и произвольных значениях остальных  $\eta$ ; в частности, имеем  $\xi = \gamma$  при

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

<sup>1</sup>Под «целыми алгебраическими функциями» здесь всегда понимаются функции с *целочисленными* коэффициентами, то есть функции, удовлетворяющие некоторому уравнению, старший коэффициент которого равен единице, а остальные коэффициенты являются многочленами от  $\eta$  с алгебраически-целыми числовыми коэффициентами, то есть многочленами из  $[H]$ . В частности, все многочлены из  $[H]$  принадлежат к целым алгебраическим функциям.

<sup>2</sup>Модульное свойство принадлежит величинам  $z - \alpha$ .

<sup>3</sup>Это более подробное доказательство IV приведено из-за расширенного примера в конце параграфа. Здесь хватило бы замечания, что  $z$  по конструкции является целой алгебраической функцией.

Но при этой специализации функция  $(z - \alpha)$  исчезает по (1), а значит исчезает и  $\xi$ ; следовательно,  $\gamma = 0$ , и имеем

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Возведение в степень  $\nu$  даёт

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

где  $F_\nu(\eta)$  обозначает однородную, не тождественно нулевую, форму степени  $\nu$  по  $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ , коэффициенты которой являются целыми алгебраическими функциями от  $\eta$ . Теперь  $z - \alpha$ , которое по (1) является *целой* алгебраической функцией от  $\eta$ , удовлетворяет неприводимому относительно  $[H]$  уравнению

$$(z - \alpha)^\lambda + B(\eta)(z - \alpha)^{\lambda-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

где последний коэффициент  $C(\eta)$ , произведение  $(z - \alpha)$  с его сопряжёнными, является многочленом; пусть его *степень* равна  $\lambda$ . С другой стороны, из  $z - \alpha = F_\nu(\eta)$  умножением  $F_\nu(\eta)$  на соответствующие сопряжённые получаем

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

где  $G_{\nu\chi}(\eta)$  обозначает однородную форму степени  $\nu\chi$  по  $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ , коэффициенты которой являются многочленами от  $\eta$ . Значит,  $G_{\nu\chi}$  имеет степень по  $\eta$  по меньшей мере  $\nu\chi$ , то есть  $\lambda \geq \nu\chi$ . Иными словами, функции  $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$ , для которых  $\nu > \lambda/\chi$ , не принадлежат  $\mathfrak{F}$ . Поэтому базовое свойство 3) исключено для совокупности областей  $\mathfrak{F}$ .

**Замечание.** Небольшое обобщение только что построенной области ведёт к области  $\mathfrak{F}$ , которая при каждом вполне упорядочении содержит также *дробные функционалы*. Пусть  $\mathfrak{F}$  состоит из всех величин

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

где теперь  $\gamma(\eta)$  пробегают все алгебраически целые, но *не обязательно целочисленные* функции от  $\eta$ . Доказательство свойств I–IV остаётся тем же, что выше. Но поскольку  $\mathfrak{F}$  наряду с каждой функцией  $z$  содержит также  $a \cdot (z - \alpha)$ , где  $a$  обозначает произвольное рациональное или алгебраически-дробное число, при каждом вполне упорядочении возникают также дробные функционалы.

## § 4. Самые общие области из алгебраически целых трансцендентных чисел.

Для более удобной формулировки дальнейшего введём выражение: «величина  $z$  алгебраически цела над  $\mathfrak{T}$ ». Это означает, что  $z$  удовлетворяет некоторому уравнению, старший коэффициент которого равен единице, а остальные коэффициенты являются целочисленными многочленами от величин из  $\mathfrak{T}$ , где  $\mathfrak{T}$  обозначает любую заданную область.<sup>1</sup>

Область  $\mathfrak{T}$  будем называть *интегрально замкнутой*, если она выполняет условие (ср. введение):

V. Всякая величина, алгебраически целая над  $\mathfrak{T}$ , принадлежит  $\mathfrak{T}$ .

Сначала покажем, что абстрактное свойство V принадлежит области Цермело  $\mathfrak{G}_\eta$ . Пусть величина  $z$  алгебраически цела над  $\mathfrak{G}_\eta$  посредством уравнения  $f(z) = 0$ . Тогда умножение  $f(z)$  на его сопряжённые относительно  $[H]$  показывает, что  $z$  также алгебраически цела над  $[H]$  и, следовательно, принадлежит  $\mathfrak{G}_\eta$ . Точно так же доказывается интегральная замкнутость функциональной области, рассмотренной в § 2.

То, что свойство V не принадлежит каждой области  $\mathfrak{G}$ , показывает модульная область из § 3, которая как раз не имеет базового свойства 3). Ещё точнее, в § 3 показано, что модульная область не интегрально замкнута относительно *ни одного трансцендентного* элемента области, тогда как по III и IV это, конечно, имеет место относительно *каждого алгебраического* элемента области.

Поэтому из всей совокупности областей  $\mathfrak{G}$  сначала выделим те, которым принадлежит ещё и абстрактное свойство V; их будем называть «областями  $\mathfrak{H}$  из алгебраически целых трансцендентных чисел».

Пусть  $\mathfrak{H}$  есть такая область, а  $H$  — алгебраическая база всех чисел из  $\mathfrak{H}$ ; по II,  $H$  одновременно является алгебраической базой *всех* чисел. По III, I и V область  $\mathfrak{H}$  содержит, помимо  $H$ , также все целые алгебраические функции от  $\eta$ , то есть область Цермело  $\mathfrak{G}_\eta$ . Следовательно, по аналогии с § 1: *каждую область  $\mathfrak{H}$  из алгебраически целых трансцендентных чисел можно построить посредством алгебраической базы всех чисел так, что  $\mathfrak{H}$  содержит область Цермело  $\mathfrak{G}_\eta$  как делитель*.

Теперь пусть  $H$  будет какой-либо алгебраической базой всех чисел, и пусть  $\mathfrak{M}(H)$  обозначает совокупность всех областей  $\mathfrak{H}$ , содержащих  $H$ . Каждая область  $\mathfrak{H}$  из  $\mathfrak{M}(H)$  содержит, как только что доказано, область Цермело  $\mathfrak{G}_\eta$  как делитель; а поскольку сама  $\mathfrak{G}_\eta$  является областью  $\mathfrak{H}$ , то  $\mathfrak{G}_\eta$  есть *наибольший общий делитель, или пересечение, всех областей  $\mathfrak{H}$  из  $\mathfrak{M}(H)$* . Тем самым  $\mathfrak{G}_\eta$  определена абстрактно. Одновременно прямо следует, что  $\mathfrak{M}(H)$  замкнута относительно образования пересечений, то есть пересечение всех областей  $\mathfrak{H}$  произвольной подсистемы из  $\mathfrak{M}(H)$  снова принадлежит  $\mathfrak{M}(H)$ . Действительно, как пересечение оно выполняет I и V; II и III следуют из того, что  $\mathfrak{G}_\eta$  является делителем; IV следует, поскольку пересечение является делителем области  $\mathfrak{H}$ .

Как показывает пример функциональной области в § 2, области  $\mathfrak{H}$  в общем случае содержат и дальнейшие функции помимо  $\mathfrak{G}_\eta$ . Пусть  $\psi(\eta)$  есть такая рациональная или алгебраическая функция от  $\eta$ . Тогда по I к  $\mathfrak{H}$  принадлежат также все целые рациональные комбинации  $\psi$  и каждый раз конечного числа функций из  $\mathfrak{G}_\eta$ . Возникающую таким образом область целостности, состоящую из всех многочленов от  $\psi$  с коэффициентами из  $\mathfrak{G}_\eta$ , обозначим  $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ , а ведущий к ней процесс назовём «*рационально-целым присоединением  $\psi$  к  $\mathfrak{G}_\eta$* ». По V к  $\mathfrak{H}$  далее принадлежат все функции, алгебраически целые над  $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ ; возникающую таким образом область обозначим  $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ , а соответствующий процесс назовём «*алгебраически-целым присоединением  $\psi$  к  $\mathfrak{G}_\eta$* ». Область  $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$  состоит из всех целых алгебраических функций от  $\psi$  с коэффициентами из  $\mathfrak{G}_\eta$  и потому по известным рассуждениям<sup>2</sup> является областью целостности.

Покажем, что  $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$  также интегрально замкнута, то есть выполняет условие V. Действительно, пусть  $z$  алгебраически цела над  $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$  посредством уравнения

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

<sup>1</sup>Для области целостности  $\mathfrak{T}$  старший коэффициент равен единице, а остальные коэффициенты являются величинами из  $\mathfrak{T}$ .

<sup>2</sup>Ср., например, Вебер, § 97, 6 и 7.

где  $a \cdots c$  как величины из  $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$  удовлетворяют уравнениям с коэффициентами из  $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ :

$$\begin{aligned} a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda &= 0, \\ \vdots \\ c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu &= 0, \end{aligned}$$

и пусть их корни заданы как  $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$ . Если теперь образовать произведение по всем комбинациям корней,

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

то  $g(z)$  имеет единицу старшим коэффициентом, а остальными коэффициентами — величины из  $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ ; следовательно,  $z$  принадлежит  $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ .<sup>3</sup>

Итак, область  $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$  имеет свойства I и V; а поскольку  $\mathfrak{G}_\eta$  является её делителем, она имеет также II и III. Выполнено ли IV, зависит от выбора  $\psi$ : например, IV не выполнено для  $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$ , потому что тогда  $\frac{1}{n}$  принадлежит области; зато по § 2 оно выполнено для  $\psi = \frac{1}{\eta}$ , а также для  $\psi = \frac{\eta}{n}$ . Действительно, в последнем случае, если функция из  $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$  представляет алгебраическое число, её значение сохраняется при  $\eta = 0$ ; тем самым она переходит в функцию из  $\mathfrak{G}_\eta$ , а значит, в алгебраически целое число.

Следовательно,  $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$  становится областью  $\mathfrak{H}$ , как только на  $\psi$  наложено условие, что алгебраически-целое присоединение не вводит в область никакого алгебраически-дробного числа.

Совершенно аналогично определяется рационально-целое, соответственно алгебраически-целое, присоединение произвольной системы  $\mathfrak{S}$  рациональных или алгебраических функций от  $\eta$  к  $\mathfrak{G}_\eta$ . Рационально-целое присоединение ведёт к области целостности  $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$ , состоящей из всех целочисленных многочленов от каждый раз конечного числа величин из  $\mathfrak{G}_\eta$  и  $\mathfrak{S}$ . Алгебраически-целое присоединение даёт область  $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ , состоящую из всех величин, алгебраически целых над  $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$ . Дословно как выше показывается, что область целостности  $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$  интегрально замкнута, а также что выполнены II и III. Поэтому, как и выше:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$  становится областью  $\mathfrak{H}$ , как только на  $\mathfrak{S}$  наложено условие, что алгебраически-целое присоединение не вводит в область никакого алгебраически-дробного числа — то есть когда  $\mathfrak{S}$  становится допустимой системой.<sup>4</sup>

Теперь важно, что верно и обратное утверждение: области  $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$  действительно исчерпывают все области  $\mathfrak{H}$  из  $\mathfrak{M}(H)$ , когда  $\mathfrak{S}$  пробегает все допустимые системы. Действительно, пусть  $\mathfrak{H}$  будет произвольной областью из  $\mathfrak{M}(H)$ , и пусть  $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$  обозначает систему, образованную из всех функций из  $\mathfrak{H}$ , не принадлежащих  $\mathfrak{G}_\eta$ . По V область  $\mathfrak{H}$  содержит  $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$  как делитель; но  $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$  также делится на  $\mathfrak{H}$ , потому что она содержит  $\mathfrak{G}_\eta$  и  $\mathfrak{L}$ , а так как они не имеют общего элемента, содержит и  $\mathfrak{H}$ . Следовательно,  $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ ; а поскольку IV выполнено для  $\mathfrak{H}$ , система  $\mathfrak{L}$ , конечно, является допустимой.<sup>5</sup>

Когда  $H$  пробегает все возможные алгебраические базы, то, как доказано в начале,  $\mathfrak{M}(H)$  пробегает совокупность всех областей  $\mathfrak{H}$ . Следовательно, вопрос о самых общих областях  $\mathfrak{H}$  из алгебраически целых трансцендентных чисел полностью решён результатами этого параграфа:

- а) Пересечение всех областей  $\mathfrak{H}$  из  $\mathfrak{M}(H)$  задаётся областью Цермело  $\mathfrak{G}_\eta$ , которая сама является областью  $\mathfrak{H}$ ;  $\mathfrak{M}(H)$  замкнута относительно образования пересечений.

<sup>3</sup>Итак, если алгебраическая целостность определяется через какое-либо уравнение, понятие неприводимости относительно основного поля становится ненужным для доказательства I и V. Ср. также § 2, где только для доказательства IV нужна вспомогательная лемма, переходящая от определения алгебраической целостности через произвольное уравнение к неприводимому. Поскольку эта вспомогательная лемма в настоящем случае вообще уже не действует, IV приходится налагать на функцию  $\psi$  как особое условие.

<sup>4</sup>В общем случае аналогично показывается: если  $\mathfrak{T}$  есть произвольная область, а  $\{\mathfrak{T}\}$  обозначает совокупность величин, алгебраически целых над  $\mathfrak{T}$ , то  $\{\mathfrak{T}\}$  интегрально замкнута.

<sup>5</sup>Уже присоединения некоторой подсистемы из  $\mathfrak{L}$  может быть достаточно; например, функциональная область из § 2 возникает через алгебраически-целое присоединение всех целых рациональных функционалов, за исключением многочленов, к  $\mathfrak{G}_\eta$ .

- б) Каждая область  $\mathfrak{H}$  из  $\mathfrak{M}(H)$  возникает через алгебраически-целое присоединение допустимой системы  $\mathfrak{S}$  к  $\mathfrak{S}_\eta$ . Когда  $H$  пробегает все возможные алгебраические базы,  $\mathfrak{M}(H)$  пробегает совокупность всех областей  $\mathfrak{H}$ .<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Допустимые системы  $\mathfrak{S}$  можно найти следующим образом. Подчинить все алгебраически-дробные функции от  $\eta$  некоторому вполне упорядочению  $\Omega$  и взять в  $\mathfrak{S}$  все функции, кроме тех, которые, будучи алгебраически-цело присоединены к  $\mathfrak{S}_\eta$  и ранее принятым функциям, порождают алгебраически-дробное число. Эту процедуру можно прерывать в любом месте. Когда  $\Omega$  пробегает все вполне упорядочения и для каждого фиксированного  $\Omega$  процедура прерывается в любом месте, этим исчерпываются все допустимые системы  $\mathfrak{S}$ .

## § 5. Самые общие области из целых трансцендентных чисел при выборе алгебраической базы.

Пусть  $H$  есть какая-либо алгебраическая база всех чисел, и пусть  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  обозначает совокупность всех областей  $\mathfrak{G}$ , которые содержат  $H$  и потому также  $[H]$ . Когда  $H$  пробегает все возможные базы,  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  пробегает совокупность всех областей  $\mathfrak{G}$ ; поэтому, как и в § 4, можно ограничиться рассмотрением областей  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ .

Все области  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  содержат  $[H]$  как делитель; но, поскольку сам  $[H]$  не является областью  $\mathfrak{G}$ , нельзя, как в § 4, заключить, что  $[H]$  является наибольшим общим делителем. Что это всё же так, показывает счётное множество областей  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ , возникающих небольшим обобщением модульной области из § 3 и действительно не имеющих ни одного общего элемента, кроме  $[H]$ .

Пусть для каждого фиксированного  $\nu$  области  $\mathfrak{G}_\nu$  ( $\nu = 1, 2, \dots$ ) состоят из всех величин

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \quad (1)$$

где  $f(\eta)$  пробегает все целочисленные многочлены от  $\eta$ ;  $\eta_1, \dots, \eta_t$  пробегают все базовые величины, а  $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$  при каждой фиксированной комбинации  $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$  по отдельности пробегают все целые алгебраические функции от  $\eta$ .

Как и в § 3, видно, что областям  $\mathfrak{G}_\nu$  принадлежат абстрактные свойства I–IV; область  $\mathfrak{G}_\nu$  содержит только целые алгебраические функции и при  $\nu = 1$  совпадает с областью из § 3. Теперь покажем, что области  $\mathfrak{G}_\nu$  не имеют никакого другого общего элемента, кроме многочленов  $f(\eta)$  из  $[H]$ . Действительно, пусть  $z$  есть произвольная целая алгебраическая, но не рациональная, функция от  $\eta$ , удовлетворяющая неприводимому относительно  $[H]$  уравнению

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0, \quad (2)$$

где  $\chi > 1$ ; и пусть  $\lambda$  есть наибольшая из степеней многочленов  $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$ . Если  $z$  принадлежит  $\mathfrak{G}_\nu$ , то величина  $\xi = z - f(\eta)$  удовлетворяет также неприводимому относительно  $[H]$  уравнению

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0, \quad (3)$$

причём  $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$  как симметрические функции от  $\xi$  содержат, согласно (1), среди членов наименьшей степени члены по крайней мере степеней  $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$ . Сравнение (2) и (3) даёт

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Следовательно, если величина  $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$  удовлетворяет уравнению

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0, \quad (4)$$

то

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

где  $b_1(\eta)$  начинается членами по крайней мере степени  $\nu$ . Теперь  $c_i(\eta)$ , как показывает сравнение (2) с (4), имеют степень  $\chi$  по коэффициентам  $a_i(\eta)$  из (2), а значит, степень не выше  $\chi\lambda$  по  $\eta$ ; с другой стороны, все  $b_i(\eta)$  начинаются членами по крайней мере степени  $\nu$ . Поэтому, если выбрать  $\nu > \chi\lambda$ , из (5) следует

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{или} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0,$$

то есть  $z$ , вопреки предположению, становится рациональной функцией от  $\eta$ . Итак:

Если  $z$  есть целая алгебраическая, не рациональная функция от  $\eta$ , то  $z$  не может принадлежать никакой области  $\mathfrak{G}_\nu$  при  $\nu > \chi\lambda$ , или:

Пересечение всех областей  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  задаётся областью целостности  $[H]$ , которая сама не является областью  $\mathfrak{G}$ ; следовательно,  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  не замкнута относительно образования пересечений.

Поэтому и конструкцию самых общих областей  $\mathfrak{G}$  посредством алгебраической базы труднее обозреть, чем конструкцию областей  $\mathfrak{H}$ . Области  $[H]$  принадлежат свойства I, III и IV; поэтому, если рационально-цело присоединить произвольную систему  $\mathfrak{S}$ , то для возникающей области целостности  $[H, \mathfrak{S}]$  свойства I и III сохраняются, тогда как IV становится особым условием на  $\mathfrak{S}$ . Чтобы возникла область  $\mathfrak{G}$ , нужно также наложить на  $\mathfrak{S}$  как условие свойство II; или, иначе говоря: для каждого конечного над  $(H)^1$  поля  $\mathfrak{K}$  должно существовать конечное над  $\mathfrak{K}$  поле  $\mathfrak{L}$  такое, что  $[H, \mathfrak{S}]$  содержит примитивный элемент из  $\mathfrak{L}$ .<sup>2</sup> Обратно, всякую область  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  также можно представить в форме  $[H, \mathfrak{S}]$ ; тем самым все области  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  получаются, когда  $\mathfrak{S}$  пробегает все системы, ограниченные таким образом. Структура систем  $\mathfrak{S}$  проще выяснится в следующем параграфе посредством «рациональной базы»; вместе с тем будет получена полная аналогия с теоремами § 4.

---

<sup>1</sup> $(H)$  означает поле, состоящее из всех рациональных функций от  $\eta$  с алгебраическими числовыми коэффициентами.

<sup>2</sup>Ср. по этому поводу § 7.



## § 6. Самые общие области из целых трансцендентных чисел при выборе рациональной базы.

По аналогии с алгебраической базой рациональную базу следует определить так: «Система  $\Theta$  чисел  $\vartheta$  называется рациональной базой всех чисел, если  $\Theta$  позволяет выразить каждое число рационально — с коэффициентами из  $K^1$  — тогда как при по меньшей мере одном вполне упорядочении никакое базовое число не выражается рационально — с коэффициентами из  $K$  — через конечное число предшествующих базовых чисел».<sup>2</sup>

Пусть область  $\mathfrak{G}$  из целых трансцендентных чисел подчинена вполне упорядочению  $\Omega$ . Тогда может случиться, что величина  $z$  из  $\mathfrak{G}$  рационально выражается через конечное число предшествующих величин из  $\mathfrak{G}$ , то есть удовлетворяет уравнению  $z = \varphi(\xi)$ , где  $\varphi(\xi)$  есть рациональная функция с коэффициентами из  $K$  от  $\xi_1, \dots, \xi_t$ ; в частности, каждое алгебраическое число  $\alpha$  области удовлетворяет уравнению  $z = \alpha$ . Остальные величины  $\vartheta$  из  $\mathfrak{G}$  образуют систему  $\Theta$ , которую надо доказать как рациональную базу всех величин из  $\mathfrak{G}$ . Действительно, по предположению каждая величина  $\vartheta$  рационально независима от предшествующих величин из  $\Theta$ . Индукционный вывод<sup>3</sup> далее показывает, что всякое отношение  $z = \varphi(\xi)$  влечет отношение  $z = \psi(\vartheta)$ ; иначе должен был бы существовать первый элемент  $z_0 = \varphi_0(\xi_1, \dots, \xi_t)$ , который не выражается рационально через  $\vartheta$ , тогда как предшествующие  $\xi_1, \dots, \xi_t$  являются рациональными функциями от  $\vartheta$ ; так получается противоречие. По II система  $\Theta$  вместе с тем является рациональной базой всех чисел; по III и I область  $\mathfrak{G}$  наряду с  $\Theta$  содержит как делитель область целостности  $[\Theta]$ , состоящую из всех целочисленных многочленов от  $\vartheta$ , тогда как по IV  $[\Theta]$  не содержит никакого алгебраически-дробного числа. Следовательно, рациональная база всех чисел  $\Theta$  удовлетворяет дополнительному условию: выведенная из  $\Theta$  область целостности  $[\Theta]$  не содержит никакого алгебраически-дробного числа;<sup>4</sup>  $\Theta$  есть рациональная база с дополнительным условием для всех чисел. Поэтому по аналогии с § 2 верно: каждая область  $\mathfrak{G}$  может быть построена посредством рациональной базы с дополнительным условием так, что  $\mathfrak{G}$  содержит область целостности  $[\Theta]$  как делитель.

Пусть  $\Theta$  есть какая-либо рациональная база с дополнительным условием для всех чисел, существование которой тем самым обеспечено существованием областей  $\mathfrak{G}$ . Обозначим через  $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$  совокупность всех областей  $\mathfrak{G}$ , которые содержат  $\Theta$  и, следовательно,  $[\Theta]$ . Когда  $\Theta$  пробегает любую базу с дополнительным условием,  $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$  по сказанному выше пробегает совокупность всех областей  $\mathfrak{G}$ ; поэтому мы снова можем ограничиться областями  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ .

Теперь сам  $[\Theta]$  является областью  $\mathfrak{G}$ : ведь каждое число выражается рационально через  $\Theta$ , то есть как частное двух многочленов из  $[\Theta]$ ; кроме того,  $[\Theta]$  по своей конструкции удовлетворяет и остальным условиям I, III, IV. Следовательно,  $[\Theta]$  является наибольшим общим делителем или пересечением всех областей  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ; кроме того,  $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$  замкнута относительно образования пересечений, то есть и пересечение всех областей  $\mathfrak{G}$  любой подсистемы из  $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$  принадлежит  $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ . Действительно, для пересечения выполнено I; II и III следуют из того, что  $[\Theta]$  является делителем; IV — из того, что область-пересечение содержится как делитель в некоторой области  $\mathfrak{G}$ .

Рационально-целое присоединение произвольной системы  $\mathfrak{S}$  рациональных функций от  $\vartheta$  к  $[\Theta]$  — каждая алгебраическая функция от  $\vartheta$  благодаря свойству рациональной базы рационально выражается через некоторые другие  $\vartheta$  — дает область целостности  $[\Theta, \mathfrak{S}]$ , которой принадлежат свойства I, II, III и которая поэтому становится областью  $\mathfrak{G}$ , как только  $\mathfrak{S}$  является «допустимой системой», то есть удовлетворяет условию, что через рационально-целое присоединение в область

<sup>1</sup>Под рациональными функциями всегда понимаются функции с алгебраическими числовыми коэффициентами; эти алгебраические числовые коэффициенты включены в определение из-за III и IV. Более соответствующим было бы требовать рациональные числовые коэффициенты как в III и IV, так и в определении рациональной базы. Выводы § 6 и § 7 при этом дословно сохраняются, если только поле  $K$  всех алгебраических чисел заменить полем всех рациональных чисел.

<sup>2</sup>В отличие от линейной и алгебраической базы, здесь порядок элементов играет роль. В порядке  $\eta, \sqrt[3]{\eta}$ , например, надо взять оба элемента, а в обратном порядке только  $\sqrt[3]{\eta}$ .

<sup>3</sup>Ср. Zermelo, указ. соч., § 1.

<sup>4</sup>Что это действительно является условием, видно, например, из того, что две величины  $\eta, \frac{1}{2\sqrt{\eta}}$  недопустимы как базовые элементы, а величины  $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$  допустимы.

не входит никакое алгебраически-дробное число. Обратно, каждая область  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$  допускает представление  $[\Theta, \mathfrak{S}]$ , если только  $\mathfrak{S}$  означает остаточную систему  $\mathfrak{G} - [\Theta]$ . Следовательно, для самых общих областей  $\mathfrak{G}$  в полной аналогии с § 4 справедливы результаты:

- а) *Пересечение всех областей  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$  задается областью целостности  $[\Theta]$ , которая сама является областью  $\mathfrak{G}$ ;  $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$  замкнута относительно образования пересечений.*
- б) *Каждая область  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$  возникает через рационально-целое присоединение допустимой системы  $\mathfrak{S}$  к  $[\Theta]$ . Когда  $\Theta$  пробегает каждую возможную рациональную базу с дополнительным условием,  $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$  пробегает совокупность всех областей  $\mathfrak{G}$ .<sup>5</sup>*

*Замечание:* Если из  $\Theta$  выбрать алгебраическую базу  $H$  всех величин из  $\Theta$ , то  $H$  вместе с тем становится алгебраической базой всех чисел; обратно, всякую алгебраическую базу можно дополнить до рациональной, поставив  $H$  в начало вполне упорядочения. Поэтому построение областей  $\mathfrak{G}$ , данное в § 5 посредством алгебраической базы, можно истолковать так: систему  $\mathfrak{S}$ , присоединяемую к  $[H]$ , разлагают на две подсистемы  $\mathfrak{S}_1$  и  $\mathfrak{S}_2$ ; присоединение  $\mathfrak{S}_1$  сводится к дополнению  $H$  до рациональной базы с дополнительным условием, к которой затем еще рационально-цело присоединяется допустимая система  $\mathfrak{S}_2$ .

---

<sup>5</sup>О самых общих допустимых системах  $\mathfrak{S}$  остается в силе сказанное в § 4, если только заменить «алгебраически» на «рационально».

## § 7. Построение самой общей рациональной базы с дополнительным условием.

Результаты предыдущего параграфа нуждаются в дополнении в том отношении, что там было доказано *существование* рациональной базы с дополнительным условием для всех чисел, но не метод ее построения — при заданном вполне упорядочении. Из-за дополнительного условия это построение становится сложнее, когда вместо области  $\mathfrak{E}$  дано поле всех комплексных чисел.<sup>1</sup>

Пусть поле всех комплексных чисел подчинено вполне упорядочению  $\Omega$ . Тогда могут появляться величины трех типов:

1. Величины  $y$ , рационально-целое присоединение которых к предшествующим — рекурсивно определенным в § 3. — базовым величинам<sup>2</sup> вызывает вхождение алгебраически-дробного числа в возникающую область целостности; если никакая базовая величина не предшествует, эта область состоит из всех целочисленных многочленов от  $y$ . В частности, все алгебраически-дробные числа являются величинами  $y$ , поскольку возникающая область целостности содержит величины  $y = \beta$ .
2. Величины  $z$ , которым свойство 1. не принадлежит, но которые выражаются рационально через конечное число предшествующих чисел, отличных от  $y$ , то есть удовлетворяют отношению  $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$ , где  $\varphi$  есть рациональная функция с коэффициентами из  $K$ , а среди  $\xi$  нет никаких  $y$ . В частности, сюда относятся все целые алгебраические числа  $\alpha$ , поскольку им не принадлежит 1. и они удовлетворяют отношению  $z = \alpha$ .
3. Величины  $\vartheta$ , для которых не выполняется ни 1., ни 2. и которые следует называть базовыми величинами. В частности, первое во вполне упорядочении трансцендентное число  $\vartheta_0$  является такой базовой величиной: ведь целочисленные многочлены от  $\vartheta_0$  не могут представить алгебраически-дробное число, а  $\vartheta_0$  также не может быть рационально зависимым от предшествующих алгебраических чисел.

Теперь надо доказать, что система  $\Theta$  всех базовых величин  $\vartheta$  является рациональной базой с дополнительным условием для всех чисел.

Так как среди  $\vartheta$  нет никакой величины  $y$ , область целостности  $[\Theta]$  не может содержать алгебраически-дробное число; следовательно, дополнительное условие выполнено. Так как, далее, среди  $\vartheta$  нет никакой величины  $z$ , каждая  $\vartheta$  рационально независима от предшествующих базовых величин. Индукционный вывод, точно как в § 6, далее показывает, что всякое отношение  $z = \varphi(\xi)$  — где среди  $\xi$  нет величин  $y$  — влечет отношение  $z = \psi(\vartheta)$ , так что все величины  $z$  рационально выражаются через  $\vartheta$ .

Остается только более трудное доказательство того, что и величины  $y$  рационально выражаются через  $\vartheta$ . Сначала покажем, что  $y$  алгебраически зависит от  $\vartheta$ . Действительно, по предположению для каждого  $y$  существует по меньшей мере одно алгебраически-дробное число  $\beta$ , допускающее представление

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \dots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \quad (1)$$

где  $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$  являются многочленами из  $[\Theta]$  и поэтому не могут представлять алгебраически-дробное число. Если бы теперь  $y$  было алгебраически независимым от  $\vartheta$ , то (1) выполнялось бы тождественно по  $y$ , и мы имели бы  $\beta = f_0(\vartheta)$ , вопреки свойствам  $[\Theta]$ .

Чтобы из алгебраической зависимости вывести рациональную, выберем из  $\Theta$  алгебраическую базу  $H$  всех величин из  $\Theta$ . Тогда каждое  $y$ , как алгебраическая функция от  $\vartheta$ , является также

<sup>1</sup>В § 6, b) было бы достаточно заставлять  $\Theta$  пробегать только такие специальные рациональные базы, которые состоят из алгебраической базы и алгебраически целых функций базовых величин; тогда дополнительное условие выполняется само собой. Чтобы это увидеть, надо лишь по § 6 дополнить алгебраическую базу из  $\mathfrak{E}$  до рациональной и в полученной базе каждую алгебраически-дробную функцию от  $\eta$  умножить на подходяще выбранный многочлен от  $\eta$ ; при этом базовое свойство сохраняется. Это построение без изменений переносится на поле всех комплексных чисел. Однако возникающий из § 6 вопрос о самой общей рациональной базе с дополнительным условием имеет и самостоятельный интерес.

<sup>2</sup>Как показывает индукционный вывод, такое рекурсивное определение возможно.

алгебраически зависимым от  $\eta$ ; значит, через  $y = y(\eta)$  определяется алгебраическое поле  $(H, y(\eta))$  над  $(H)$ . Доказательство рациональной зависимости — поскольку все  $\eta$  вместе с тем являются величинами  $\vartheta$  — сводится к тому, чтобы показать: для каждого такого поля существуют примитивные элементы, которые являются рациональными функциями от  $\vartheta$ . Точнее, будет показано, что после умножения  $y(\eta)$  на некоторый многочлен от  $\eta$  она теряет свойство 1. и потому переходит в такой элемент.

Как известно, между  $(H)$  и  $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$  лежит только конечное число промежуточных полей. Пусть  $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$  суть те из них, которые имеют примитивный элемент, рационально выражаемый через  $\vartheta$ , так что каждый элемент поля становится рациональной функцией от  $\vartheta$ ; это условие по меньшей мере для  $\Omega_0 = (H)$  всегда выполнено. Пусть примитивная функция, соответствующая  $\Omega_i$ , задана как  $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$ , где  $g_i, h_i$  — многочлены из  $[\Theta]$ . Тогда — если под  $\alpha_i$  понимать подходяще выбранное целое число — многочлен из  $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

становится примитивной функцией от  $\Omega_i$  или от алгебраического поля над  $\Omega_i$ ,<sup>3</sup> и поэтому каждая функция  $\psi(\eta)$  из  $\Omega_i$  допускает представление

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \dots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \quad (2)$$

где  $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$  являются целочисленными многочленами от  $\eta$ , а значит  $A(\eta, \xi_i)$  и  $a(\eta)$  являются величинами из  $[\Theta]$ .

Пусть неприводимое относительно  $\Omega_i$  уравнение, которому удовлетворяет  $y$ , благодаря (2) имеет вид

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \dots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

и все коэффициенты этого уравнения принадлежат  $[\Theta]$ . Тогда функция  $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$  удовлетворяет также неприводимому относительно  $\Omega_i$  уравнению

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \dots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1} f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

благодаря которому она вместе с тем алгебраически цело зависит от  $[H, \xi_i]$ ; то же верно для произведения  $y_i$  на произвольный многочлен от  $\eta$ . В частности, функция

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \dots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

алгебраически цело зависит от всех областей  $[H, \xi_i]$  благодаря всякий раз неприводимому относительно  $\Omega_i$  уравнению

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \dots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma). \quad (4)$$

Теперь покажем, что  $Y$  представляет искомый примитивный элемент, рационально выражаемый через  $\vartheta$ . Пусть через  $Y$  и  $[\Theta]$  представлено, например, алгебраическое число  $\gamma$ :

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \dots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \quad (5)$$

где  $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$  являются многочленами из  $[\Theta]$ . Теперь определим неприводимое уравнение, которому  $Y$  удовлетворяет относительно поля  $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$ , возникающего из области коэффициентов в (5). Как известно, оно задается неприводимым уравнением  $Y$  относительно поля-пересечения поля  $\mathfrak{K}$  и  $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ , лежащего между  $(H)$  и  $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ . Теперь  $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$  по (3) тождественно с  $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$ ; кроме того, все элементы из  $\mathfrak{K}$ , а значит и все элементы поля-пересечения, рационально выражаются через конечное

<sup>3</sup>Ср. об этом конец § 5.

число  $\vartheta$ . Поэтому последнее поле необходимо задается одним из полей  $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ , скажем  $\Omega_\tau$ . Искомое неприводимое уравнение, следовательно, по (4) имеет степень  $\lambda_\tau$  и получается в виде

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \dots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

с многочленами из  $[\Theta]$  в качестве коэффициентов. Посредством (6) представление (5) можно преобразовать в

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \dots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \quad (7)$$

где  $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$  принадлежат  $\mathfrak{K}$  и, с другой стороны, являются многочленами из  $[\Theta]$ . Но поскольку  $\gamma$  есть алгебраическое число, отношение (7) по  $Y$  не достигает степени  $\lambda_\tau$  и поэтому выполняется *тождественно* по  $Y$ . Следовательно,

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

то есть  $\gamma$  принадлежит  $[\Theta]$  и, значит, является целым алгебраическим числом.

Когда теперь  $\gamma$  пробегает все алгебраические числа, представимые через  $Y$  и  $[\Theta]$ , поле-пересечение  $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$  и соответствующего поля  $\mathfrak{K}$  всегда пробегает только поля  $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ , и все приведенные выше выводы сохраняются; то есть *через рационально-целое присоединение  $Y$  к  $[\Theta]$  не может быть представлено никакое алгебраически-дробное число*. Следовательно,  $Y$  уже не имеет свойства 1.; по 2) или 3) оно является величиной  $z$  или  $\vartheta$  и поэтому рационально выражается через конечное число  $\vartheta$ ; то же по (3) верно для  $y$ :  *$\Theta$  доказана как рациональная база всех чисел*. Обратно, если поставить  $\Theta$  в начало вполне упорядочения, всякая рациональная база с дополнительным условием может быть построена по 1), 2), 3). Тем самым доказано: *построение, заданное в 1), 2), 3), приводит к самой общей рациональной базе с дополнительным условием для всех чисел*.

## § 8. Разбиение областей $\mathfrak{G}$ и $\mathfrak{H}$ на классы.

Наряду с вопросом о наиболее общих областях  $\mathfrak{G}$  и  $\mathfrak{H}$  возникает дальнейший вопрос о *существенно отличных* областях, которые — в смысле, подлежащем ниже более точному уточнению, — нельзя получить одним и тем же принципом построения. Это приводит к разбиению этих областей на классы.

Две области будем называть принадлежащими к одному и тому же классу, или изоморфными, если их элементы можно взаимно однозначно поставить в соответствие так, что сумме и произведению любых двух элементов одной области всегда соответствуют сумма и произведение соответствующих элементов другой области. Из этого определения следует, что при всяком изоморфном соответствии нуль и единица соответствуют сами себе, а все алгебраические соотношения между конечным числом элементов сохраняются для соответствующих элементов, и обратно. В частности, наряду с единицей все рациональные числа также соответствуют сами себе, тогда как совокупность алгебраических чисел — и точно так же совокупность алгебраически целых чисел — переходит в себя, хотя отдельному алгебраическому числу вполне может соответствовать сопряжённое.

Прежде всего заметим, что всякая область из совокупности  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  всех областей  $\mathfrak{G}$ , содержащих фиксированную алгебраическую базу  $H$ , изоморфна некоторой области из совокупности  $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ , принадлежащей другой алгебраической базе  $H^*$ . Действительно, поле всех комплексных чисел получается из всякой алгебраической базы алгебраическим расширением и потому имеет ту же мощность, что и база;<sup>1</sup> следовательно,  $H$  и  $H^*$  имеют одинаковую мощность, и требуемое изоморфное отображение получается сопоставлением базовых величин  $\eta_i$  и  $\eta_i^*$ .<sup>2</sup> Напротив,  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  содержит неизоморфные, или существенно отличные, области  $\mathfrak{G}$ , как следует из примеров в §§ 2, 3 и 5. В самом деле, при изоморфном отображении все алгебраические соотношения сохраняются, поэтому алгебраической базе снова должна соответствовать алгебраическая база; но в §§ 2 и 3 было показано, что функциональная и модульная области не обладают такой алгебраической базой, для которой выполнялись бы все базовые свойства области Цермело. Поскольку функциональная область из § 2 алгебраически цело замкнута, подмножество  $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$  также содержит существенно отличные области  $\mathfrak{H}$ .

Теперь, по аналогии с построением базы, покажем, как из  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  можно выделить такое подмножество  $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ , что все области  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$  существенно отличны, но каждая область из  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  — а следовательно, и всякая область  $\mathfrak{G}$  вообще — изоморфна некоторой области из  $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ . Пусть  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  подчинено вполне упорядочению  $\Omega$ ; тогда область  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  может быть изоморфна какой-либо предшествующей области, а может и не быть. Области  $\mathfrak{G}$ , не изоморфные никакой предшествующей, образуют множество  $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ , которое по своему построению содержит только существенно отличные области  $\mathfrak{G}$ . Индукционное рассуждение далее показывает, что всякая область из  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  изоморфна некоторой области из  $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ . Действительно, пусть  $\mathfrak{G}_1$  была бы первой областью, для которой это не выполнено. Тогда  $\mathfrak{G}_1$  либо принадлежит  $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ , либо изоморфна предшествующей области  $\mathfrak{G}_0$ , которая по предположению изоморфна некоторой области из  $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ ; значит, то же самое было бы верно и для  $\mathfrak{G}_1$ . Так как всякая область  $\mathfrak{G}$  принадлежит некоторому множеству  $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$  и потому изоморфна некоторой области из  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ , совокупность классов областей  $\mathfrak{G}$  тем самым представлена множеством  $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ .

Если в области  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$  заменить базовые величины  $\eta$  величинами  $\eta^*$  какой-либо другой базы, то, как показано выше, возникает область, изоморфная  $\mathfrak{G}$ . Обратно, пусть  $\mathfrak{G}^*$  — произвольная область и, следовательно, изоморфна некоторой области  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ . Если при этом базовым величинам  $\eta$  соответствуют величины  $\eta^*$  из  $\mathfrak{G}^*$ , то они снова образуют алгебраическую базу, а  $\mathfrak{G}^*$  содержит те же алгебраические функции от  $\eta^*$ , что и  $\mathfrak{G}$  от  $\eta$ , — или их сопряжённые. Следовательно, всякая область, изоморфная  $\mathfrak{G}$ , возникает так: в  $\mathfrak{G}$  и в её сопряжённых относительно  $(H)^3$  — если они

<sup>1</sup>Steinitz, §§ 23 и 24.

<sup>2</sup>Этот вывод, разумеется, не верен для множеств  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  и  $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ , принадлежащих двум рациональным базам  $\Theta$  и  $\Theta^*$ ; также из взаимной рациональной выразимости  $\Theta$  и  $\Theta^*$  ещё нельзя заключить об изоморфности  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  и  $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ . Однако этим устанавливается изоморфное соответствие между полями  $(\Theta)$  и  $(\Theta^*)$ .

<sup>3</sup>Элементы этих областей, сопряжённых с  $\mathfrak{G}$ , по II заведомо можно рационально выразить через элементы  $\mathfrak{G}$ , но не

отличны от  $\mathfrak{G}$  — алгебраическая база  $H$  пробегает все возможные алгебраические базы. Из каждой фиксированной области  $\mathfrak{G}_i$  из  $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$  таким образом возникает класс  $\mathfrak{R}_i$ , который содержит все и только те области  $\mathfrak{G}$ , которые изоморфны  $\mathfrak{G}_i$ , но, возможно, каждую область по нескольку раз или даже бесконечно много раз. Из  $\mathfrak{R}_i$  указанным выше способом можно выделить подмножество  $\mathfrak{R}_i^*$ , содержащее каждую область, изоморфную  $\mathfrak{G}_i$ , один и только один раз. Когда  $\mathfrak{R}_i^*$  пробегает все классы, получается совокупность всех областей  $\mathfrak{G}$ , каждая область один и только один раз. Для характеристики класса  $\mathfrak{R}_i$  вместо  $\mathfrak{G}_i$  можно, конечно, взять любую другую область этого класса, из которой, как выше, выводятся все области из  $\mathfrak{R}_i$ . Итак, получаем:

*Из  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  можно выделить подмножество  $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$  так, что области  $\mathfrak{G}$  из  $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$  взаимно однозначно соответствуют совокупности классов (без повторения). При этом из  $\mathfrak{G}_i$  соответствующий класс  $\mathfrak{R}_i$  возникает тем, что в  $\mathfrak{G}_i$  и в его сопряжённых относительно  $(H)$  база  $H$  пробегает все возможные алгебраические базы. Если  $\mathfrak{R}_i^*$  означает все попарно различные области из  $\mathfrak{R}_i$ , и  $\mathfrak{R}_i^*$  пробегает все классы, то возникает совокупность всех областей  $\mathfrak{G}$ , каждая область один и только один раз.<sup>4</sup>*

Аналогичное утверждение верно для областей  $\mathfrak{H}$  из алгебраически целых трансцендентных чисел.

---

обязательно цело и рационально; поэтому сопряжённые могут отличаться от  $\mathfrak{G}$ .

<sup>4</sup>При этом  $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$  следует строить по §§ 6 и 7: по § 7 алгебраическую базу  $H$  дополняют до каждой рациональной базы  $\Theta$  с дополнительным условием, возникающей из неё, и для каждой  $\Theta$  по § 6 b) строят совокупность  $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$  всех областей  $\mathfrak{G}$ , содержащих  $\Theta$ .

## § 9. Пример счётно бесконечного числа классов областей $\mathfrak{G}$ .

Мощность конструкций, указанных в § 4 б) и § 6 б), из соответствующих замечаний читается как равная мощности всех вполне упорядочений, то есть равная  $2^c$ , если  $c$  обозначает мощность континуума. Но отсюда нельзя сделать вывод ни о мощности совокупности всех областей  $\mathfrak{G}$ , если каждую область считать один раз и только один раз, ни тем более о мощности всех классов. Что число классов во всяком случае не конечно, покажем теперь на примере счётно бесконечного числа областей  $\mathfrak{G}$  — аналогичных областям из § 5, — которые все окажутся существенно отличными и потому дадут счётно бесконечно много классов.<sup>1</sup>

Аналогично § 5, (1), пусть область  $\mathfrak{G}_\sigma$  состоит из совокупности величин

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma(\eta)}, \quad (1)$$

где  $a_i(\eta)$  обозначают однородные формы  $i$ -го измерения от  $\eta$ , а модуль  $\mathfrak{M}_\sigma$  содержит в качестве базы все степенные произведения  $\sigma$ -го измерения от  $\eta^2$  и в качестве множителей — все целые алгебраические функции от  $\eta$ . Мы покажем, что при изоморфном соответствии между двумя областями  $\mathfrak{G}_\sigma$  и  $\mathfrak{G}_\tau$  ( $\sigma \neq \tau$ ) модули  $\mathfrak{M}_\sigma$  и  $\mathfrak{M}_\tau$  необходимо также изоморфно соответствуют друг другу; отсюда уже легко следует невозможность.

Неопределённые в  $\mathfrak{G}_\tau$  обозначим через  $\xi$ ; при изоморфном соответствии этим  $\xi$  сопоставляются величины  $f(\eta)$  из  $\mathfrak{G}_\sigma$ . Поскольку изоморфное соответствие сохраняется и при образовании частных, области  $\mathfrak{G}_\xi$  всех целых алгебраических функций от  $\xi$  соответствует алгебраически цело замкнутая область  $\mathfrak{T}$ , состоящая из всех функций, алгебраически целых над  $f(\eta)$ , а следовательно также алгебраически целых по  $\eta$ .

Пусть (1) соответствует величине из  $\mathfrak{M}_\tau$ . Тогда по модульному свойству  $\mathfrak{M}_\tau$  произведение (1) с произвольной величиной  $\psi(\eta)$  из  $\mathfrak{T}$  также должно принадлежать  $\mathfrak{G}_\sigma$ ; в формулах:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \dots + b_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (2)$$

Так как при обращении всех  $\eta$  в нуль получается  $a_0\psi(0) = b_0$ , формула (2) переписывается в виде

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \dots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (3)$$

Так как наряду с  $\psi(\eta)$  также функции

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

при каждом  $\nu$  принадлежат  $\mathfrak{T}$ , и так как  $\chi_\nu(0) = 0$ , то аналогично (3) имеют место формулы:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \dots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

Пусть  $A(\eta)$  степени  $\lambda$  обозначает произведение  $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$  с его  $\kappa - 1$  сопряжёнными; ввиду  $\chi_1(0) = 0$  выражение  $A(\eta)$  должно начинаться с членов по крайней мере первого измерения. Из (4) получается:

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \quad (5)$$

и потому, для  $a_0 \neq 0$ , так же как в § 3,  $\lambda > \nu\kappa$ . Но  $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$  противоречит алгебраически целой замкнутости  $\mathfrak{T}$ , поэтому необходимо  $a_0 = 0$ . Из (4) теперь получается:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \quad (6)$$

и отсюда, поскольку  $A(\eta)$  начинается с членов по крайней мере первого измерения,  $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$ . Значит, в полной аналогии с (5), для каждого  $\nu$  имеем:

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

<sup>1</sup>Области  $\mathfrak{G}$  из § 6 также дают счётно бесконечно много классов; однако доказательство несколько сложнее.

<sup>2</sup>Разумеется, в каждом отдельном  $z$  в модуле встречается лишь конечное число степенных произведений от  $\eta$ .



и отсюда  $a_1(\eta) = 0$ . Продолжая так, попеременное применение (5) и (6) даёт

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

то есть, поскольку аналогичное рассмотрение справедливо и относительно  $\mathfrak{G}_\tau$ : *при всяком изоморфном соответствии между  $\mathfrak{G}_\sigma$  и  $\mathfrak{G}_\tau$  ( $\sigma \neq \tau$ ) модули  $\mathfrak{M}_\sigma$  и  $\mathfrak{M}_\tau$  изоморфно соответствуют друг другу.*

Пусть, например,  $\sigma > \tau$ : неопределённым  $\xi$  соответствовали величины  $f(\eta)$  из  $\mathfrak{G}_\sigma$ ; и, поскольку все величины из  $\mathfrak{G}_\tau$  можно представить полиномами от  $\xi$  по модулю  $\mathfrak{M}_\tau$ , из соответствия  $\mathfrak{M}_\tau$  и  $\mathfrak{M}_\sigma$  следует, что все величины из  $\mathfrak{G}_\sigma$  получаются как полиномы от  $f(\eta)$  по модулю  $\mathfrak{M}_\sigma$ . Так как при  $\sigma > \tau \geq 1$  неопределённые  $\eta$  заведомо не принадлежат  $\mathfrak{M}_\sigma$  и, значит, цело и рационально выразимы через  $f(\eta)$  по модулю  $\mathfrak{M}_\sigma$ , должно существовать такое  $f(\eta)$  с ненулевыми линейными членами. Итак, пусть соответствует:

$$\begin{aligned} \xi : f(\eta) &\equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0], \\ \xi^\tau : [f(\eta)]^\tau &\equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{для } a_0 \neq 0, \\ &\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{для } a_0 = 0. \end{aligned}$$

$\xi^\tau$  принадлежит  $\mathfrak{M}_\tau$ ;  $[f(\eta)]^\tau$  начинается с ненулевых членов нулевого или  $\tau$ -го измерения и при  $\tau < \sigma$  не может принадлежать  $\mathfrak{M}_\sigma$ , вопреки выведенному соответствию  $\mathfrak{M}_\sigma$  и  $\mathfrak{M}_\tau$ . Так как случай  $\tau > \sigma$  одновременно покрывается перестановкой  $\eta$  и  $\xi$ , тем самым показано, что области  $\mathfrak{G}_\sigma$  и  $\mathfrak{G}_\tau$  неизоморфны, или существенно отличны. Следовательно, области  $\mathfrak{G}_i$  ( $i = 1, 2, \dots$  in inf.) дают пример счётно бесконечного числа классов областей  $\mathfrak{G}$ .

*Замечание.* Хотя любые две области  $\mathfrak{G}_i$  неизоморфны, для двух областей вполне может случиться, что каждая из них изоморфна части другой.<sup>3</sup> Пусть, например,  $\tau = 1$ , а  $\sigma$  произвольно:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \dots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

При сопоставлении  $\xi = \eta$  область  $\mathfrak{G}_\sigma$  становится собственным делителем  $\mathfrak{G}_1$ ; при взаимно однозначном сопоставлении в  $\mathfrak{G}_1$  и  $\mathfrak{G}_\sigma$ ,  $\xi = \eta^\sigma$ ,  $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ , наоборот,  $\mathfrak{G}_1$  становится собственным делителем  $\mathfrak{G}_\sigma$ ; следовательно, каждое  $\mathfrak{G}_i$  также изоморфно собственному делителю самого себя. Поэтому, в отличие от понятия пересечения, понятие класса пересечения — то есть такого класса, что каждая его область была бы изоморфна собственному делителю каждой области всякого другого класса, — не существует, по крайней мере как однозначно определённое.

<sup>3</sup>Такое поведение может встречаться и для полей; ср. Steinitz, указ. соч., конец.

## § 10. Целые величины произвольного поля.

Построения предыдущих параграфов — если в определяющие свойства III и IV для областей  $\mathfrak{F}$  не включать алгебраические числа — для областей  $\mathfrak{F}$  опирались только на тот факт, что совокупность всех комплексных чисел образует поле;<sup>1</sup> для областей  $\mathfrak{H}$  — еще и на то, что это поле алгебраически замкнуто. Поэтому полученные результаты непосредственно допускают *обобщение на самое общее поле*, которое вслед за Вебером и Э. Штейницем<sup>2</sup> абстрактно определяется как “система элементов с двумя операциями, сложением и умножением, которые подчинены ассоциативному и коммутативному законам, связаны дистрибутивным законом и допускают неограниченные и однозначные обратные операции”.<sup>3</sup>

Каждое такое поле содержит единичный элемент, а следовательно, и выведенное из него операциями сложения и умножения и обратными к ним операциями “простое поле”, которое либо имеет тип поля рациональных чисел (характеристика 0), либо тип системы классов вычетов по простому числу  $p$  (характеристика  $p$ ).<sup>4</sup> *Целые величины простого поля* тогда хорошо определены как величины, возникающие из единичного элемента сложением и вычитанием; для простых полей характеристики  $p$  целые величины уже исчерпывают простое поле, и дробных величин простого поля не существует. Каждое алгебраически замкнутое поле содержит “абсолютно алгебраическое поле”, возникающее из простого поля присоединением всех элементов, алгебраических над простым полем; поэтому для полей характеристики 0 оно имеет тип поля всех алгебраических чисел. *Алгебраически целые величины абсолютно алгебраического поля* тогда хорошо определены как все величины, алгебраически целые над целыми величинами простого поля (или, что то же самое, над единицей); для полей характеристики  $p$  поэтому также не существует алгебраически дробных величин абсолютно алгебраического поля. После этих предварительных замечаний определение “целых” и “алгебраически целых” величин можно перенести соответственно на произвольные поля и на алгебраически замкнутые поля: *целые величины поля  $\mathfrak{K}$  определяются как область целостности  $\mathfrak{G}$  величин из  $\mathfrak{K}$ , поле частных которой<sup>5</sup> исчерпывает  $\mathfrak{K}$  и которая содержит единичный элемент, но не содержит дробной величины простого поля.*

*Алгебраически целые величины алгебраически замкнутого поля  $\mathfrak{K}$  определяются как алгебраически цело замкнутая область целостности  $\mathfrak{H}$  величин из  $\mathfrak{K}$ , поле частных которой исчерпывает  $\mathfrak{K}$  и которая содержит единичный элемент, но не содержит алгебраически дробной величины абсолютно алгебраического поля.*

Для полей характеристики нуль буквально сохраняются результаты, полученные в предыдущих параграфах, если только заменить “алгебраические числа” величинами простого поля или соответственно абсолютно алгебраического поля. Для полей характеристики  $p$  результаты еще существенно упрощаются потому, что простое поле не содержит дробных величин, а значит, дополнительное условие для рационального базиса и для присоединяемых систем просто отпадает.<sup>6</sup> Итак, результат таков: *абстрактное определение допускает в качестве целых величин поля характеристики  $p$ : каждую область целостности, выведенную из произвольного рационального базиса, само поле и каждую область целостности, лежащую между этими областями и полем. Соответственно, алгебраически целыми величинами алгебраически замкнутого поля простой характеристики считаются: каждая алгебраически цело замкнутая область целостности, лежащая между областью, выведенной из алгебраического базиса, и самим полем, — включая обе граничные области.* Поэтому для самых общих полей простой характеристики, как и для соответствующих простых полей, различие между целым и дробным стирается.

Эрланген, 30 марта 1915 г.

<sup>1</sup>Только в § 7 была использована дополнительная предпосылка, что “простое поле” рациональных чисел содержит бесконечно много элементов; в случае простого поля лишь с конечным числом элементов этот параграф, как мы увидим, просто отпадает.

<sup>2</sup>Там же, введение.

<sup>3</sup>Исключить нужно только деление на нуль.

<sup>4</sup>Штейниц, § 4.

<sup>5</sup>То есть поле, состоящее из всех частных любых двух величин из  $\mathfrak{G}$ .

<sup>6</sup>Ср. первое примечание к этому параграфу.

## 10. Функциональные уравнения изоморфного отображения

Math. Ann. 77 (1916), с. 536–545

По Дедекинду<sup>1</sup> под *изоморфным отображением поля  $\mathfrak{A}$  на систему  $\mathfrak{B}$*  — которая впоследствии сама также оказывается полем — понимают *такое однозначное соответствие, при котором каждому элементу из  $\mathfrak{A}$  соответствует один и только один элемент из  $\mathfrak{B}$ ; и при котором сумме, разности, произведению и частному любых двух элементов из  $\mathfrak{A}$  снова соответствуют сумма, разность, произведение и частное однозначно соответствующих элементов из  $\mathfrak{B}$ .*

Пусть такое отображение задается — по сказанному выше, однозначной — функцией  $f(z)$ . Когда  $z$  пробегает все элементы  $x, y, \dots$  поля  $\mathfrak{A}$ , функция  $f(z)$  характеризуется функциональными уравнениями:

$$(1) \quad f(x + y) = f(x) + f(y); \quad (2) \quad f(x - y) = f(x) - f(y);$$

$$(3) \quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (4) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}.$$

Далее будут указаны самые общие однозначные решения  $f(z)$  этих функциональных уравнений в случае, когда  $x, y, \dots$  пробегают все действительные и комплексные числа; то есть самая общая функция  $f(z)$ , осуществляющая изоморфное отображение поля всех комплексных чисел.<sup>2</sup> Совершенно аналогично получается решение для произвольных полей.

Самые общие решения функционального уравнения (1) Г. Гамель<sup>3</sup> построил при помощи линейного базиса всех чисел. Данная здесь конструкция решений уравнений (1)–(4) — то есть функции отображения, относительно которой рациональные и алгебраические операции инвариантны, — пользуется *рациональным и алгебраическим базисами* всех чисел. После того как в п. 1 изоморфное отображение будет обсуждено точнее, в п. 2 будут даны необходимые условия для  $f(z)$ , которые в п. 3, будучи признаны достаточными, приведут к самой конструкции.<sup>4</sup> — Решения (1)–(4), как известно, за исключением  $f(z) = z$  или  $\bar{z}$ , разрывны; в п. 4 будет показано более сильное утверждение, что они «экстремально разрывны», — факт, который Г. Гамель доказал для действительных решений (1), но который там в комплексной области не обязан выполняться.<sup>5</sup>

1. Сначала выведем несколько следствий из функциональных уравнений (1)–(4), причем непосредственно для общих полей  $\mathfrak{A}$ . По (1) из однозначности следует:  $f(0) = 0$ . Если  $f(y)$  не обращается в нуль, то и исходный элемент  $y$  не может обращаться в нуль; поэтому функциональные уравнения (1)–(4) показывают, что *система образов  $\mathfrak{B}$  всех значений  $f(z)$  снова образует поле*. Обратно, если задать начальное условие  $f(0) = 0$ , то из (2) следует однозначность функции  $f(z)$ : *требование однозначности и начальное условие  $f(0) = 0$  тем самым равносильны*. Из (4) следует, что  $f(z)$  не может тождественно обращаться в нуль; из (3) далее следует, что  $f(z)$  обращается в нуль только при  $z = 0$ . Действительно, из  $f(y) = 0$  и  $y \neq 0$  следовало бы, поскольку  $z/y$  также принадлежит  $\mathfrak{A}$ , что

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

<sup>1</sup>Ср., например: Dirichlet–Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4-е изд.), Supplement XI, § 161. Название «изоморфное отображение» или «изоморфизм», образованное по образцу теории групп, встречается лишь в более поздней литературе; Дедекинд говорит о «перестановках поля».

<sup>2</sup>Этот вопрос время от времени ставил передо мной Ландау. Как я позднее заметила, часть решений уже имеется у Н. Lebesgue: Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans. Atti Acad. Torino, 1906/07; а также неявно у А. Ostrowski: Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie. Crelles Journal 143 (1913), § 2.

<sup>3</sup>G. Hamel: Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung:  $f(x + y) = f(x) + f(y)$ , Math. Ann. 60, с. 459 (1905).

<sup>4</sup>Ср. параллельные соображения в моей работе: Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen. Math. Ann. 77, с. 103 (1915), особенно § 8 и § 10.

<sup>5</sup>Гамелев термин «полностью разрывный» в остальной литературе употребляется в другом смысле.

то есть, вопреки (4), функция  $f(z)$  тождественно обращалась бы в нуль. Следовательно, из  $f(x) = f(y)$  получается  $x = y$ ; то есть каждому значению  $f(z)$  соответствует также одно и только одно значение  $z$ :  $f(z)$  есть взаимно однозначная функция от  $z$ . Как показывают функциональные уравнения, отображение, задаваемое обратной функцией, снова изоморфно. Так как каждая рациональная операция составляется из конечного числа сложений, умножений и обратных им операций, можно также сказать: *изоморфное отображение устанавливает взаимно однозначную связь между элементами из  $\mathfrak{A}$  и из  $\mathfrak{B}$ , так что все рациональные соотношения, существующие между любыми конечными наборами элементов из  $\mathfrak{A}$ :*

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

*сохраняются в  $\mathfrak{B}$  и обратно.*

Следует еще заметить, что для поля функция  $f(z)$  уже характеризуется функциональными уравнениями (1) и (3), требованием, чтобы  $f(z)$  не обращалась тождественно в нуль, и начальным условием  $f(0) = 0$ . Действительно, (2) следует из (1), если заменить  $x$  принадлежащим  $\mathfrak{A}$  элементом  $(x - y)$ ; затем (2) вместе с  $f(0) = 0$  дает однозначность  $f(z)$ . Как было показано выше, из (3) далее следует, если заменить  $x$  принадлежащим  $\mathfrak{A}$  элементом  $x/y$ , что  $f(y)$  при  $y \neq 0$  не может обращаться в нуль; значит, получаем справедливость (4) и одновременно взаимную однозначность. Если же вместо поля взять за основу область целостности  $\mathfrak{S}$ , то  $x/y$  не обязан принадлежать  $\mathfrak{S}$ , и из (3) нельзя заключить взаимную однозначность. Здесь, однако, достаточно следующей, наиболее привычной формулировки: *изоморфное отображение есть взаимно однозначное соответствие между элементами из  $\mathfrak{S}$  и  $\mathfrak{S}'$ , такое, что сумме и произведению всегда соответствуют сумма и произведение.*<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ср. к п. 1: Дедекинд, указ. место, § 161.

2. С этого момента, для простоты, вместо  $\mathfrak{A}$  берём за основу поле  $\mathfrak{C}$  всех действительных и комплексных чисел. Прежде всего нужно обсудить системы значений, которые принимает  $f(z)$ . Из (3) или (4) следует:  $f(1) = 1$ , а отсюда, в силу функциональных уравнений, для каждого рационального числа  $\alpha$ :  $f(\alpha) = \alpha$ ; следовательно, каждое рациональное число при отображении соответствует самому себе. Так как алгебраическое число  $\beta$  удовлетворяет неприводимому уравнению с рациональными числовыми коэффициентами  $F(\beta, \alpha) = 0$ , то по п. 1 и только что сказанному для  $f(\beta)$  получаем:  $F(f(\beta), \alpha) = 0$ ; следовательно, каждое алгебраическое число переходит в себя или в одно из своих сопряжённых, а совокупности алгебраических чисел, ввиду взаимной однозначности, снова соответствует поле всех алгебраических чисел. Чтобы понять поведение трансцендентных чисел и одновременно отделить сопряжённые значения, положим в основу рациональный базис всех чисел<sup>1</sup>, то есть систему  $\Theta$  чисел  $\vartheta$ , которая позволяет выразить все числа рационально — с рациональными числовыми коэффициентами<sup>2</sup> — тогда как по крайней мере при одном вполне упорядочении ни одно базисное число не выражается рационально через конечное число предшествующих. Существование такого базиса следует из теоремы о вполне упорядочении совершенно аналогично существованию линейных и алгебраических базисов.

Пусть  $\mathfrak{C}$  подчинено вполне упорядочению  $\Omega$ . Тогда каждое число либо рационально выражается через конечное число предшествующих, либо рационально независимо от предшествующих. Именно эти последние числа образуют базис  $\Theta$ , а индукция показывает, что действительно каждое число рационально выражается через конечное число  $\vartheta$ .

Для каждого базисного числа  $\vartheta$  определено «поле начального отрезка  $\mathfrak{K}(\vartheta)$ »: оно состоит из всех рациональных комбинаций тех базисных чисел, которые предшествуют  $\vartheta$  во вполне упорядочении. Полем начального отрезка первого базисного числа следует считать поле  $\mathfrak{A}$  всех рациональных чисел. Число  $\vartheta$  может вести себя относительно  $\mathfrak{K}(\vartheta)$  двояко: оно может быть алгебраически зависимым от  $\mathfrak{K}(\vartheta)$  или алгебраически независимым от него. Так как по п. 1 все соотношения, справедливые в  $\mathfrak{C}$ , справедливы также в поле образов, и обратно, совокупность значений  $f(\vartheta)$ , соответствующих  $\vartheta$ , образует базис области образов, который сам вполне упорядочен порядком, унаследованным от  $\Theta$ . Следовательно, полю начального отрезка  $\mathfrak{K}(\vartheta)$  в частности соответствует поле начального отрезка  $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$ ; и в зависимости от того, является ли  $\vartheta$  алгебраически зависимым или независимым от  $\mathfrak{K}(\vartheta)$ , то же самое справедливо для  $f(\vartheta)$  относительно  $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$ ; а в случае зависимости соответствуют друг другу также неприводимые уравнения для  $\vartheta$  и  $f(\vartheta)$ . Совокупность тех значений  $\vartheta$ , которые каждый раз алгебраически независимы от  $\mathfrak{K}(\vartheta)$ , образует — как снова показывает индукция — алгебраический базис всех чисел<sup>3</sup>, то есть систему  $H$  чисел  $\eta$ , через которые все числа можно выразить алгебраически, но между которыми самими нет никаких алгебраических соотношений. Этому алгебраическому базису  $H$  в области образов снова соответствует алгебраический базис  $Z$ , который ввиду взаимной однозначности имеет ту же мощность, что и  $H$ , а именно мощность континуума, поскольку алгебраическое расширение, как известно, мощности не увеличивает.<sup>4</sup> Но из знания значений  $f(\vartheta)$  непосредственно получается  $f(z)$  для всех систем значений, так как из  $z = \psi(\vartheta)$  всегда следует:  $f(z) = \psi(f(\vartheta))$ .

<sup>1</sup>Ср. мою цитированную работу о «целых трансцендентных числах», § 6.

<sup>2</sup>Под «рациональной функцией» здесь всегда следует понимать такую функцию, коэффициенты которой также являются рациональными числами.

<sup>3</sup>Ср. E. Zermelo: *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

<sup>4</sup>Ср. E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*. Crelles Journal 137 (1910), § 24.

3. Теперь покажем, что найденные необходимые условия действительно дают и построение  $f(z)$ . Базис  $Z$ , взаимно однозначно соответствующий алгебраическому базису  $H$ , построим и сопоставим с  $H$  следующим образом. Положим в основу второе вполне упорядочение  $\Omega'$ , которое даёт алгебраический базис  $Z'$  всех чисел; пусть  $Z$ , с элементами  $\xi$ , будет подмножеством  $Z'$  той же мощности, что и  $Z'$ , а следовательно, и  $H$ . Каждому элементу  $\eta_i$  из  $H$  теперь взаимно однозначно сопоставим один элемент  $\xi_i$  с тем же номером по правилу:  $\xi_i$  есть *первый* во вполне упорядочении  $\Omega'$  из всех тех элементов  $Z$ , которые ещё не сопоставлены никакому элементу из  $H$ , предшествующему  $\eta_i$ .

Теперь  $f(z)$  определим так:

- (a) для всех рациональных чисел  $\alpha$  по правилу  $f(0) = 0$ ,  $f(\alpha) = \alpha$ ;
- (b) для всех величин алгебраического базиса  $H$  по правилу  $f(\eta_i) = \xi_i$ ;
- (c) для всех прочих величин  $\vartheta$  рационального базиса  $\Theta$  — тех, которые алгебраически зависят от поля начального отрезка  $\mathfrak{K}(\vartheta)$  и потому удовлетворяют неприводимому в  $\mathfrak{K}(\vartheta)$  уравнению  $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \dots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$ , — как корень уравнения  $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \dots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$ ;
- (d) для всех прочих значений  $z$ , которые по определению  $\Theta$  представимы в виде  $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \dots, \vartheta_{k_\nu})$ , по правилу  $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \dots, f(\vartheta_{k_\nu}))$ .<sup>1</sup>

Чтобы показать, что так определённая  $f(z)$  действительно удовлетворяет функциональным уравнениям (1)–(4), по п. 1 достаточно доказать это для (1) и (3), так как  $\mathfrak{C}$  является полем, а  $f(z)$  вследствие (a) и (b) не может тождественно обращаться в нуль и, кроме того, удовлетворяет начальному условию  $f(0) = 0$ . С помощью рационального базиса  $\Theta$  пусть  $x, y, x + y$  выражаются так:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t).$$

Тогда доказательство того, что  $f(z)$  удовлетворяет функциональному уравнению (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

по (d) равнозначно доказательству, что из

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

всегда следует

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

где  $H_1, H_2$  обозначают целые рациональные функции своих аргументов. К точно такой же форме условия приводит и функциональное уравнение (3); значит, выполнение всех функциональных уравнений равнозначно выполнению следующего — по пп. 1 и 2 также необходимого — условия: для *каждой* целой рациональной функции  $H(\vartheta)$  из  $H(\vartheta) = 0$  всегда следует также  $H(f(\vartheta)) = 0$ , а из  $H(\vartheta) \neq 0$  также  $H(f(\vartheta)) \neq 0$ ; последнее требуется из-за появления знаменателя.

Что это действительно так, показывает индукция. Пусть, например, в  $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$  базисная величина  $\vartheta_t$  является последней во вполне упорядочении среди  $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$ ;<sup>2</sup> тогда  $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$  можно рассматривать как соотношение, которому  $\vartheta_t$  удовлетворяет относительно поля начального отрезка  $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$ , и так же  $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$  как соотношение для  $f(\vartheta_t)$  относительно  $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$ . Если бы не все соотношения  $H(\vartheta) = 0$  выполнялись также для  $f(\vartheta)$ , и наоборот, то должна была бы существовать первая базисная величина — скажем,  $\vartheta_0$ , — для которой по крайней мере одно соотношение, справедливое относительно  $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ , не сохранялось бы в поле образов, или наоборот, тогда как предыдущие поля начальных отрезков  $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$  и  $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$  были бы изоморфны. В

<sup>1</sup>В (d) пункт (a) содержится как частный случай.

<sup>2</sup>Выражения  $H(\vartheta)$ , имеющие нулевую степень по  $\vartheta$ , при отображении переходят в себя, поэтому их не нужно рассматривать дальше.

частности, по (а) поле начального отрезка первой базисной величины из  $\Theta$ , то есть поле  $\mathfrak{K}$  всех рациональных чисел, изоморфно своему полю образов. Пусть теперь  $H(\vartheta_0)$  имеет вид

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^\chi + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \dots + a_\chi(\vartheta),$$

где  $a_i(\vartheta)$  являются величинами из  $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ . Тогда есть две возможности:

1)  $\vartheta_0$  алгебраически независима от  $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ . Тогда  $H(\vartheta_0) = 0$  выполняется тождественно по  $\vartheta_0$ ,<sup>3</sup> то есть  $a_i(\vartheta) = 0$  для всех коэффициентов, а значит, вследствие изоморфизма  $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$  и  $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ , также  $a_i(f(\vartheta)) = 0$ . Поэтому из  $H(\vartheta_0) = 0$  всегда следует  $H(f(\vartheta_0)) = 0$ . Обратно, пусть  $H(f(\vartheta_0)) = 0$ . Так как  $\vartheta_0$ , будучи алгебраически независимой от  $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ , принадлежит алгебраическому базису  $H$ , то  $f(\vartheta_0)$  по (б) принадлежит алгебраическому базису  $Z$  и алгебраически независима от  $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ . Следовательно, обращаются в нуль все  $a_i(f(\vartheta))$ , а вследствие изоморфизма — все  $a_i(\vartheta)$ ; из  $H(f(\vartheta_0)) = 0$  следует  $H(\vartheta_0) = 0$ , или из  $H(\vartheta_0) \neq 0$  также  $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$ .

2)  $\vartheta_0$  алгебраически зависима от  $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ . Тогда  $H(\vartheta_0)$  делится на неприводимое относительно  $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$  уравнение  $F(\vartheta_0)$ , то есть тождественно по  $t$  имеем

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

А поскольку все входящие коэффициенты принадлежат  $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ , в соответствующем изоморфном поле  $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$  выполняется соответствующее соотношение:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta_i)).$$

Но по (с)  $f(\vartheta_0)$  было выбрано так, что оно является корнем  $F(t; f(\vartheta))$ ; поэтому из  $H(\vartheta_0) = 0$  следует  $H(f(\vartheta_0)) = 0$ .

Обратно, если  $H(f(\vartheta_0)) = 0$ , то так же из делимости  $H(t; a_i(f(\vartheta)))$  на неприводимую относительно  $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$  функцию  $F(t; f(\vartheta))$  для изоморфного поля  $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$  следует делимость  $H(t; a_i(\vartheta))$  на  $F(t; \vartheta)$ . А так как  $F(t; f(\vartheta))$  возникла из неприводимого уравнения для  $\vartheta_0$  посредством изоморфного соответствия, и это соответствие взаимно однозначно, то  $F(t; \vartheta)$  необходимо является той неприводимой функцией, корнем которой служит  $\vartheta_0$ . Следовательно, из  $H(f(\vartheta_0)) = 0$  следует  $H(\vartheta_0) = 0$ , или из  $H(\vartheta_0) \neq 0$  также  $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$ .

Итак, из изоморфных полей начальных отрезков  $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$  и  $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$  посредством присоединения  $\vartheta_0$ , соответственно  $f(\vartheta_0)$ , снова получаются изоморфные поля; предположение, что для некоторого  $\vartheta_0$  это не так, приводит к противоречию. Тем самым доказано, что *функция  $f(z)$ , определённая по (а)–(д), действительно представляет решение функциональных уравнений (1)–(4), и притом, по п. 2, самое общее.*

Все рассуждения, использованные для построения  $f(z)$ , опирались только на тот факт, что совокупность  $\mathfrak{E}$  всех чисел образует поле, и потому справедливы для каждого абстрактно определённого поля  $\mathfrak{A}$ . При этом надо заметить, что полю  $\mathfrak{K}$  рациональных чисел соответствует «простое поле» поля  $\mathfrak{A}$ , то есть поле, полученное из единичного элемента  $\mathfrak{A}$  операциями сложения и умножения и обратными к ним операциями. Поэтому, если в (а)–(д) заменить рациональные числа элементами простого поля, то *получающаяся таким образом функция  $f(z)$  осуществляет самое общее изоморфное отображение произвольного абстрактно определённого поля.*

<sup>3</sup>В силу выразимости  $x, y, \dots$  через  $\vartheta$  такая форма соотношения вполне может возникать.

4. Теперь остается показать, что функции  $f(z)$ , определенные для поля  $\mathbb{C}$  всех действительных и комплексных чисел, — которые, как известно, за исключением  $f(z) = z$  или  $\bar{z}$ , разрывны, — являются *экстремально разрывными*. Иными словами, в окрестности любого действительного или комплексного числа  $z_0$  существуют значения  $z$ , для которых  $f(z)$  сколь угодно близко подходит к любому наперед заданному значению  $Z_0$ . Эта экстремальная разрывность, как доказал Г. Гамель в указанной работе, присуща *действительным* решениям  $\varphi(x)$ , определенным для всех *действительных* чисел, функционального уравнения (1). Но, как показывают приведенные ниже примеры, она не обязана иметь место для решений, определенных на комплексных числах. Рассуждение Гамеля таково. Если  $\varphi(x)$  отличается от  $C \cdot x$ , то существуют по крайней мере два значения линейного базиса<sup>1</sup>, скажем  $x_1$  и  $x_2$ , такие, что  $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$ . Тогда две системы равенств

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \quad \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

имеют решение в действительных числах  $\alpha, \beta$ ; следовательно,  $a$  и  $b$  можно сколь угодно хорошо аппроксимировать рациональными числами  $\alpha, \beta$ . А поскольку  $\alpha, \beta$  рациональны, то  $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$  действительно равно  $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$ . Для комплексных систем значений этот вывод уже не работает. Действительно, и в комплексной области можно задать решения (1), разрывные, но не экстремально разрывные, например:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

где  $\varphi(x)$  означает действительное решение, экстремально разрывное на действительной прямой; или еще проще  $\varphi(z) = \varphi(x)$ . В обоих случаях действительная часть  $\varphi(z)$  экстремально разрывна, тогда как мнимая часть определяется действительной.

Это поведение, а вместе с ним и поведение функции  $f(z)$ , становится совершенно ясным, если ввести понятие ранга. Положим  $z = x + iy$ ,  $\varphi(z) = X + iY$ , и будем называть  $\varphi(z)$  соответственно функцией ранга четыре, три, два или один, смотря по тому, существует ли ноль, одно, два или три линейно независимых соотношения

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

где  $c$ , конечно, действительные числа.

1) Пусть  $\varphi(z)$  имеет *ранг четыре*. Тогда существуют по крайней мере четыре значения линейного базиса, скажем  $z_1, z_2, z_3, z_4$ , такие, что определитель

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

не обращается в нуль. Поэтому уравнения

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \dots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \dots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \dots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

имеют решение в действительных числах  $\alpha, \dots, \delta$ , а  $a, b, A, B$  можно сколь угодно хорошо аппроксимировать рациональными числами  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ . Кроме того, имеем:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

Следовательно, «в общем случае» решения  $\varphi(z)$  и в комплексной области экстремально разрывны; значения *разрывности*  $\varphi(z)$  в окрестности  $z_0 = a + ib$  образуют *двумерное линейное многообразие*.

<sup>1</sup>Линейный базис всех (действительных) чисел задается системой (действительных) чисел, позволяющей линейно, с рациональными коэффициентами, выразить все (действительные) числа, тогда как между любым конечным набором базисных чисел нет линейного соотношения с рациональными коэффициентами.



2)  $\varphi(z)$  имеет *ранг три*. Тогда существуют по крайней мере три системы значений линейного базиса, скажем  $z_1, z_2, z_3$ , такие, что приведенный выше определитель имеет ранг три. Значения  $a, b, A, B$ , удовлетворяющие соотношению

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0,$$

и только они, могут быть сколь угодно хорошо аппроксимированы; значения *разрывности* образуют *одномерное линейное многообразие*, определенное числом  $z_0 = a + ib$ . Как показывают приведенные примеры, этот случай действительно может возникать.

3)  $\varphi(z)$  имеет *ранг два*. Так как всегда можно выбрать два комплексных числа  $z_1, z_2$  так, что

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

соотношения имеют вид

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \quad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Получающееся отсюда выражение

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

и есть самое общее *непрерывное* решение функционального уравнения (1) в области комплексных чисел.

4)  $\varphi(z)$  имеет *ранг один*. В области комплексных чисел этот случай невозможен; в области *действительных* чисел он означает *непрерывное* решение  $\varphi(x) = C \cdot x$ .

Теперь покажем, что *решения  $f(z)$  функциональных уравнений (1)–(4), определенные для всех действительных и комплексных чисел, могут иметь только ранг два или ранг четыре*. При этом ранг два дает только две *непрерывные* функции  $f(z) = z$  или  $\bar{z}$ , как показывает специализация  $f(1) = 1$  и  $f(i) = \pm i$  вместе с п. 3. Так как ранг один уже исключен выше, остается исключить ранг три. Итак, предположим, что существует хотя бы одно соотношение

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

так что  $f(z)$  имеет ранг три, возможно более низкий, и покажем, что при этом предположении всегда наступает именно последний случай. Как снова показывает специализация  $f(1) = 1, f(i) = \pm i$ , соотношение переходит в

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

где  $c_3$  и  $c_4$  не обращаются в нуль одновременно. Сначала пусть, например,  $c_4 = 0$ . Соотношение  $(X - x) = 0$  означает, что чисто мнимому  $z$  соответствует также чисто мнимое  $f(z)$ . Поэтому для каждого действительного  $y$  имеем  $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$ , где  $\mathfrak{Y}$  снова действительно. Но из-за

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{также} \quad f(y) = \pm \mathfrak{Y};$$

каждому действительному  $z$  соответствует также действительное  $f(z)$ ; а из-за  $(X - x)$  все действительные значения переходят в себя. Тем самым остаются только  $f(z) = z$  или  $\bar{z}$ , то есть фактически ранг два. Совершенно аналогично рассуждаем, когда  $c_3 = 0, c_4 \neq 0$ .

Теперь пусть  $c_3$  и  $c_4$  отличны от нуля, так что соотношение можно записать в виде

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

с действительным, отличным от нуля и конечным  $c$ . Это означает, что при  $y = \pm cx$  также  $Y = c \cdot X$ . Поэтому, учитывая функциональные уравнения, для каждого действительного  $x$  выполняется

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

где  $\mathfrak{X}$  снова действительно. Но здесь по п. 1 множитель при  $f(x)$  не может тождественно обращаться в нуль, и деление дает

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

с действительными  $\sigma$  и  $\tau$ , не зависящими от  $x$  и  $\mathfrak{X}$ . В частности, значению  $x = 1$  также соответствует некоторое действительное  $X_0$ , а условие  $1 = X_0(\sigma + i\tau)$  показывает, что необходимо  $\tau = 0$ , значит  $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$ . Следовательно, каждому действительному  $z$  соответствует также действительное  $f(z)$ ; иначе говоря, из  $y = 0$  необходимо следует  $Y = 0$ . Тогда линейное соотношение для действительных  $z$  переходит в  $X - x = 0$ ;<sup>2</sup> каждое действительное значение соответствует самому себе. Снова остаются только  $f(z) = z$  или  $\bar{z}$ , то есть фактически ранг два. Тем самым ранг три исключен во всех случаях. Но, как показывают исследования первых пунктов, разрывные решения действительно существуют и потому необходимо имеют ранг четыре; следовательно, по п. 1 получаем теорему: «Все решения  $f(z)$  функциональных уравнений (1)–(4), за исключением непрерывных решений  $f(z) = z$  или  $\bar{z}$ , экстремально разрывны в действительной и комплексной областях».<sup>3</sup>

Эрланген, 30 октября 1915 г.

---

<sup>2</sup>Здесь используется факт, что  $c \neq 0$ , то есть что ни  $c_3$ , ни  $c_4$  не обращается в нуль, тогда как выше использовалось только  $c_4 \neq 0$ ; поэтому случай, когда один из этих двух коэффициентов обращается в нуль, нужно было рассмотреть заранее.

<sup>3</sup>Lebesgue в указанной работе показывает, что действительная и мнимая части  $f(z)$  обе являются «неизмеримыми» функциями от  $x$  и  $y$ ; как показывает пример в начале п. 4,  $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$ , отсюда еще не следует экстремальная разрывность в комплексной области.

## 11. Уравнения с заданной группой

Math. Ann. 78 (1918), с. 221–229

Проблему построения уравнений с заданной группой можно атаковать в двух направлениях, которые коротко можно назвать «иррациональным», то есть характеризующим корни, и «рациональным», то есть характеризующим коэффициенты.

К «иррациональному» направлению, работающему функционально-теоретически и арифметически, относится теорема Кронекера о том, что все абелевы поля в области рациональных чисел являются циклотомическими полями, а также соответствующие теоремы для относительно абелевых полей относительно квадратичных числовых полей. Эти теоремы, с одной стороны, дают реализуемость всех абелевых групп относительно этих специальных областей рациональности; с другой стороны, они дают всю совокупность уравнений и вместе с тем более глубокое понимание структуры определяемых ими числовых полей. Однако каждая отдельная теорема ограничена специальной областью рациональности, и каждая новая область рациональности требует совершенно нового рассмотрения.

«Рациональное», алгебраическое направление опирается на теорему Гильберта о неприводимости, согласно которой в представлении коэффициентов можно ограничиться параметрическим представлением. Сюда относятся, например, существование сколь угодно многих уравнений с альтернирующей группой относительно любой заданной области рациональности. Здесь, естественно, отсутствует описанное выше понимание структуры полей, задаваемых уравнениями; но преимущество этого «рационального» направления состоит в том, что реализуемость групп доказывается для *всех областей рациональности одновременно*; однако известные до сих пор параметрические представления вообще не дают всей совокупности уравнений.<sup>1</sup>

Дальнейшее является вкладом в это «рациональное» направление: здесь указываются *достаточные условия для существования параметрических представлений, которые при любой области рациональности дают всю совокупность уравнений с заданной группой*. Эти условия состоят в том, что инвариантное поле, принадлежащее группе, – лагранжев родовый домен, – рационально представляется через *независимые* функции этой области, то есть обладает «минимальной базой»; или, иначе говоря, изоморфно полю всех рациональных функций от  $n$  неизвестных. Как будет показано еще в § 2, это, например, выполнено для всех групп, возникающих у уравнений 3-й и 4-й степеней. Фактическое построение и более точное обсуждение этих уравнений 3-й и 4-й степеней содержится в диссертации Ф. Зейделя,<sup>2</sup> выдержка из которой непосредственно следует за этим сообщением.

Вопрос о минимальной базе лагранжевых родовых доменов был, как уже упоминалось в работе «Körper und Systeme rationaler Funktionen» (Math. Ann. 76), поставлен передо мной Э. Фишером независимо от описанной здесь связи и дал толчок настоящим исследованиям.<sup>3</sup>

### § 1.

#### Достаточные условия для параметрического представления.

<sup>1</sup>Для разрешимых уравнений параметрическое представление коэффициентов можно заменить представлением корней. Недавно Ф. Мертенс для некоторых групп 8-й степени дал наиболее общие представления корней: «Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen», Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735. Как я заключаю из этой заметки, еще раньше Г. Бухт для всегда осуществимых нормальных форм уравнений 3-й и 4-й степеней и уравнений 8-й степени с упомянутыми группами указал наиболее общие выражения корней: «Über einige algebraische Körper achten Grades», Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30. [Добавление при корректуре.]

<sup>2</sup>Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich. Erlangen 1916.

<sup>3</sup>См. часть 2 предварительного сообщения о «Rationale Funktionenkörper», Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913.

1. Возможность свести построение уравнений с заданной группой к параметрическому представлению следует из теоремы Гильберта о неприводимости, которая утверждает следующее. Пусть уравнение

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0 \quad (1)$$

– где  $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$  обозначают рациональные функции независимых параметров  $\lambda_1 \cdots \lambda_r$  с коэффициентами из числового поля<sup>4</sup>  $\Omega$  – имеет относительно поля  $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$  всех рациональных функций от  $\lambda_1 \cdots \lambda_r$  с коэффициентами из  $\Omega$  группу  $\Gamma$ . Тогда параметры  $\lambda$  можно заменить бесконечно многими рациональными числами так, что возникающее числовое уравнение

$$g(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n = 0 \quad (2)$$

относительно  $\Omega$  имеет именно группу  $\Gamma$ . Такое  $g(x)$  точнее будем обозначать через  $g_\Gamma$ .

Теперь спрашивается, можно ли *задать такое параметрическое представление (1), чтобы возникающее числовое уравнение (2) пробежало всю совокупность всех  $g_\Gamma$ , когда  $\lambda_1 \cdots \lambda_r$  пробегают все величины из  $\Omega$* , – за исключением тех величин из  $\Omega$ , которые вызывают редукцию группы.<sup>5</sup> Иными словами: нелинейная система уравнений

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \quad \cdots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n \quad (3)$$

должна для каждой системы значений  $a_1 \cdots a_n$ , соответствующей некоторому  $g_\Gamma$ , иметь решение, причем в величинах  $\lambda_1 \cdots \lambda_r$  из  $\Omega$ . Так как система (3) нелинейна, в требовании получить всю совокупность  $g_\Gamma$  посредством параметрического представления с самого начала приходится сделать ограничение. Именно, в таких нелинейных системах всегда могут возникать сингулярные системы значений  $a_1 \cdots a_n$ , удовлетворяющие алгебраическому соотношению  $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ , для которых не существует решения;<sup>6</sup> тогда параметрическое представление (1) отказывает и необходимо дополнительное представление. Однако в данном случае эти сингулярные значения  $a_1 \cdots a_n$ , как будет видно, можно просто охарактеризовать.

2. Чтобы получить такое параметрическое представление, мы предъявляем более сильное требование:  $\lambda_i$  должны быть *естественными иррациональностями, принадлежащими группе, тождественно по корням, рассматриваемым как неизвестные*. Под этим мы понимаем следующее. Если в (1) заменить параметры  $\lambda_1 \cdots \lambda_r$  надлежаще выбранными *рациональными* функциями  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$  от неизвестных  $x_1 \cdots x_n$  – с коэффициентами из  $\Omega$  –, то (1) должно перейти в

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x), \quad (4)$$

где  $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$  обозначают элементарные симметрические функции от  $x_1 \cdots x_n$ ; и  $h(x)$  относительно области рациональности  $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$ , возникающей при этом из  $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ , должно иметь группу  $\Gamma$ . В силу независимости параметров функции  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$  также должны быть алгебраически независимыми.

Чтобы уточнить это требование, надо выяснить связь  $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$  с группой  $\Gamma$ . Для этого сначала определим самую общую область рациональности  $K$ , относительно которой  $h(x)$  становится  $h_\Gamma$ . Пусть  $\mathfrak{L}_\Gamma$  обозначает поле всех рациональных функций с рационально-числовыми коэффициентами от  $x_1 \cdots x_n$ , допускающих  $\Gamma$ , – его также называют лагранжевым родовым доменом, принадлежащим  $\Gamma$ , или инвариантным полем  $\Gamma$ ; а  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$  – соответствующее поле, получающееся присоединением  $\mathfrak{L}_\Gamma$  к  $\Omega$ . Итак,  $\mathfrak{L}_\Gamma$  является подполем поля  $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$  всех рациональных функций с рационально-числовыми коэффициентами от  $x_1 \cdots x_n$ . Тогда по определению группы самая общая область  $K$  задается как *любое поле, которое содержит  $\mathfrak{L}_\Gamma$  как подполе и пересечение которого с  $\mathfrak{R}(x_1 \cdots x_n)$  равно точно  $\mathfrak{L}_\Gamma$* . Соответственно, для всякой области  $K$ , содержащей  $\Omega$ , ее пересечение с  $\Omega(x_1 \cdots x_n)$  задается полем  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ . Поэтому, в частности, так как по нашему требованию  $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$  должно быть областью  $K$ , пересечение  $\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$  с  $\Omega(x_1 \cdots x_n)$  задается полем  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ ; а так как, с другой стороны,

<sup>4</sup>Вместо числового поля могла бы фигурировать и общая область рациональности.

<sup>5</sup>Сюда следует отнести также появление кратного корня у  $g(x) = 0$ .

<sup>6</sup>Это вскоре будет в общем виде выполнено в работе об «альтернативе в нелинейных системах уравнений».

$\Omega(\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x))$  является подполем  $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ , оно оказывается в точности равным  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ . Следовательно, требование означает, что *лагранжев родовый домен*  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$  должен возникать присоединением к  $\Omega$  алгебраически независимых функций  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ ; при этом необходимо  $r = n$ , потому что  $\mathfrak{L}_\Gamma$  содержит  $n$  алгебраически независимых элементарных функций, тогда как более чем  $n$  функций не могут быть алгебраически независимыми. Функции  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ , как мы еще будем говорить, образуют *минимальную базу*  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ ; или же  $\mathfrak{L}_\Gamma$  обладает минимальной базой с коэффициентами из  $\Omega$ .

3. Теперь существенно, что все это рассмотрение можно обратить; и так оно действительно приводит к достаточным условиям<sup>7</sup> для искомого параметрического представления. Итак, предположим, что  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$  является минимальной базой  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ ; и пусть  $\Omega$  будет наименьшим полем, содержащим коэффициенты  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ . Тогда  $\Omega$  необходимо является алгебраическим числовым полем и, в частности, может быть полем  $\mathfrak{R}$  всех рациональных чисел. Так как  $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$  принадлежат  $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ , существуют тождества по  $x_1 \cdots x_n$  — где  $F_i$  обозначают рациональные функции своих аргументов:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad \dots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)); \quad (5)$$

тогда как, наоборот,  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$ , а следовательно и  $\varphi(x) = \mu_1 \varphi_1(x) + \cdots + \mu_n \varphi_n(x)$ , алгебраически зависят от  $\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)$  посредством уравнения, неприводимого относительно  $\Omega(\sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x))$ :

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x) \cdots \sigma_n(x)) = 0, \quad (6)$$

которое снова является тождеством по  $x$ .

В силу (5) это тождество (6) переходит в

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1 \cdots \varphi_n); \dots; F_n(\varphi_1 \cdots \varphi_n)) = H(\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)) = 0; \quad (7)$$

и вследствие алгебраической независимости  $\varphi_1(x) \cdots \varphi_n(x)$  равенство (7) выполнено не только тождественно по  $x$ , но и тождественно по  $\varphi_i$ ; то есть тождественно в независимых параметрах  $\lambda$  имеем

$$H(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = G(\mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n; F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n); \dots; F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n)) = 0. \quad (8)$$

Из тождества (8) следует, что уравнение

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n)x^{n-2} \cdots \pm F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = 0 \quad (9)$$

относительно  $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$  имеет группу  $\Gamma$ . Действительно, это тождество показывает, что рационально известное  $\lambda = \mu_1 \lambda_1 + \cdots + \mu_n \lambda_n$  есть функция корней, принадлежащая  $\Gamma$ ; но никакая дальнейшая функция, принадлежащая подгруппе  $\Gamma$ , не может быть рационально известной, как показывает подстановка  $\lambda_i = \varphi_i(x)$ ; и при той же подстановке  $\lambda$  также отличается от всех своих сопряженных. Если, кроме того,  $\Omega^*$  есть произвольное числовое поле, содержащее  $\Omega$ , то  $f(x)$  имеет группу  $\Gamma$  относительно  $\Omega^*(\lambda_1 \cdots \lambda_n)$ ; ибо по пункту 2 группа не редуцируется при подстановке  $\lambda_i = \varphi_i(x)$  даже после присоединения  $\Omega^*$ .

Остается доказать, что в модифицированном в пункте 1 смысле  $f(x)$  действительно пробегает всю совокупность всех  $g_\Gamma$ . Для этого заметим, что в силу (5) функции  $F_i(\lambda)$  являются алгебраически независимыми функциями своих аргументов  $\lambda$ . Поэтому система уравнений

$$F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = a_2; \quad \dots; \quad F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_n) = \pm a_n \quad (10)$$

имеет решения для каждой произвольной системы значений  $a_1 \cdots a_n$  — за исключением еще подлежащих указанию сингулярных. Для каждой системы значений  $a_1 \cdots a_n$ , соответствующей некоторому  $g_\Gamma$  относительно  $\Omega^*$ , соответствующие  $\lambda_i$  как естественные иррациональности, принадлежащие группе,<sup>8</sup> становятся величинами из  $\Omega^*$ . Таким образом, когда  $\lambda_1 \cdots \lambda_n$  пробегает

<sup>7</sup>Требование в пункте 2 было расширено по сравнению с пунктом 1, так что условия не обязаны быть необходимыми.

<sup>8</sup>См. также ниже!

все системы значений,  $g(x)$  пробегает всю совокупность уравнений в модифицированном смысле; эта совокупность содержит всю совокупность  $g_\Gamma$ , которым соответствуют значения из  $\Omega^*$ . А так как, обратно, по теореме Гильберта о неприводимости значениям  $\lambda$  из  $\Omega^*$  «вообще говоря» также соответствуют уравнения  $g_\Gamma$ , то в модифицированном в пункте 1 смысле посредством параметрического представления (9) действительно получается вся совокупность всех  $g_\Gamma$  относительно  $\Omega^*$ .

Теперь остается определить сингулярные системы значений, для которых параметрическое представление отказывает. Пусть функции минимальной базы, разделенные на числитель и знаменатель, заданы как

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Подставляя это в тождества (5), предположим, что они без сокращения переходят в

$$\sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{или} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x), \quad (11)$$

так что произведение всех  $H_k(x)$  делится на произведение всех знаменателей  $\chi_i(x)$ . Для всех систем корней  $\alpha_1 \cdots \alpha_n$ , для которых произведение

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

и, следовательно, ни один знаменатель  $\chi_i(\alpha)$  также не обращается в нуль, можно в (11) разделить на  $H_k(\alpha)$  и получить

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots; \varphi_n(\alpha)), \quad (12)$$

причем  $\varphi_i(\alpha)$  вследствие необращения знаменателей в нуль принимают конечные значения, а для уравнений  $g_\Gamma$  становятся величинами из  $\Omega^*$ . Уравнение (12) задает систему решений для (10), как только  $\alpha_1 \cdots \alpha_n$  определены так, что  $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ .<sup>9</sup>

Сингулярными могут, следовательно, стать только такие системы коэффициентов  $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ , для которых

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

то есть для которых (11) вместо представления переходит в  $0 = 0$ . Тогда необходимо специальное исследование, содержатся ли среди так определенных сингулярных  $a_1 \cdots a_n$  и такие, которым соответствуют уравнения  $g_\Gamma$ , и для каких числовых полей.<sup>10</sup> В итоге получаем следующую

*Теорему. Если лагранжес родовой домен, принадлежащий группе  $\Gamma$ , обладает минимальной базой<sup>11</sup> с коэффициентами из  $\Omega$ , то для каждого числового поля  $\Omega^*$ , содержащего  $\Omega$ , вся совокупность уравнений с заданной группой  $\Gamma$  относительно  $\Omega^*$  может быть рационально построена параметрическим представлением (2), возможно, за исключением сингулярных относительно этого параметрического представления уравнений, которые можно указать отдельно. При этом параметры должны пробегать все значения из  $\Omega^*$ , не вызывающие редукции группы. Построение возможно для всякого произвольного числового поля, если область коэффициентов  $\Omega$  минимальной базы равна полю  $\mathfrak{A}$  всех рациональных чисел.*

Так как по теореме Гильберта о неприводимости параметрическое многообразие не понижается исключением тех значений из  $\Omega^*$ , которые вызывают редукцию группы, то справедливо также: из

<sup>9</sup>Тем самым решение уравнения сведено к решению системы независимых функций:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

<sup>10</sup>Например, как показал Ф. Зейдельман в указанном месте, только для альтернирующей группы уравнений 3-й и 4-й степеней возникают такие уравнения, соответствующие сингулярным системам значений, и притом только для тех числовых полей  $\Omega^*$ , которые содержат поле третьих корней из единицы. В каждом случае можно указать простое дополнительное представление.

<sup>11</sup>Из существования одной минимальной базы сразу следует существование сколь угодно многих, выводимых из исходной обратимыми рациональными преобразованиями.

существования минимальной базы следует, что многообразие уравнений с группой  $\Gamma$  относительно  $\Omega^*$  равно многообразию уравнений без аффлекта; аффлект не понижает многообразия.

## § 2.

### Применение к специальным уравнениям.

Теперь докажем существование минимальной базы для всех групп, возникающих у уравнений 3-й и 4-й степеней; для этого сначала совершенно общо покажем, что для уравнений  $n$ -й степени задачу можно свести к задаче от  $n - 2$  неизвестных. Первая редукция соответствует линейному преобразованию Чирнгауза для удаления второго по старшинству члена. В качестве первой базисной функции берем  $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ ; далее замечаем, что  $\mathfrak{L}_\Gamma$  рационально выводится из всех однородных форм от  $x_1 \cdots x_n$ , допускающих  $\Gamma$ . Пусть  $p(x_1 \cdots x_n)$  – такая форма; тогда также

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \dots; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i)$$

принадлежит  $\mathfrak{L}_\Gamma$ , поскольку она допускает  $\Gamma$ , и кроме того имеем

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

или

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

с  $p_1(x)$ , принадлежащим  $\mathfrak{L}_\Gamma$  и имеющим меньшую степень, чем  $p(x)$ . Продолжение этого приема показывает, что все однородные формы из  $\mathfrak{L}_\Gamma$ , а следовательно вообще все рациональные функции из  $\mathfrak{L}_\Gamma$ , рационально выражаются через  $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$  и через однородные формы

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

Но между этими величинами  $y_i$  существует линейное соотношение  $\sum y_i = 0$ ; следовательно,  $q(x)$  зависят только от  $(n - 1)$  аргументов.

Вторая редукция основана на том, что  $q(x)$  являются однородными формами своих аргументов. В качестве второй базисной функции берем

$$\begin{aligned}\varphi_2(x) &= \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}, \\ \tau_3(x) &= \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i), \\ \tau_2(x) &= \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i).\end{aligned}$$

то есть  $\varphi_2(x)$  является однородно-дробной функцией первой степени от  $(n - 1)$  аргументов, именно от  $y_i$  при  $\sum y_i = 0$ . С помощью  $\varphi_2(x)$  все  $q(x)$  можно рационально выразить через функции

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x) \cdot \tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i) \cdot \sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

также принадлежащие  $\mathfrak{L}_\Gamma$ , где  $\lambda$  обозначает степень  $q(x)$ . Тогда  $r(x)$  становится однородной функцией нулевой степени, а значит зависит только от  $(n - 2)$  аргументов, то есть от отношений  $y_1 : y_2 : \dots : y_n$  при  $\sum y_i = 0$ . Следовательно,  $\mathfrak{L}_\Gamma$  рационально выражается через

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$$

и через поле всех функций  $r(x)$  из  $\mathfrak{L}_\Gamma$ , зависящих от этих  $(n - 2)$  аргументов,<sup>12</sup> чем и выполнена желаемая редукция.

Для уравнений 3-й и 4-й степеней это, в частности, дает редукцию к функциональным полям от одного и соответственно двух аргументов. Но для них минимальная база всегда существует по теоремам Люрота и Кастельнуово.<sup>13</sup> В случае одного неизвестного минимальную базу можно вывести рациональными операциями, и потому специально для  $\mathfrak{L}_\Gamma$  она содержит только рационально-числовые коэффициенты. В случае двух неизвестных по Кастельнуово еще могла бы идти речь о базе с коэффициентами из алгебраического числового поля  $\Omega$ ; фактическое исследование (см. Ф. Зейдельман, цит. место) показывает, что и здесь для каждого  $\mathfrak{L}_\Gamma$  получается база с рационально-числовыми коэффициентами. Это почти без вычисления видно уже из того, что для четверной группы можно выбрать такую рационально-числовую базу, а именно

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{u \cdot w}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u \cdot v}{w},$$

где

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

так что альтернирующая группа переходит в циклическую группу трех базисных функций  $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ , а каждая группа восьмого порядка – в симметрическую группу двух из этих функций; тем самым осуществляется редукция к группам уравнений 3-й и 2-й степеней. Для циклической группы рационально-числовая база уже известна от Абеля, хотя и не была сформулирована именно так.<sup>14</sup> Итак, доказано: *вся совокупность уравнений 3-й и 4-й степеней с заданной группой – возможно, за исключением сингулярных относительно параметрического представления – может быть рационально построена параметрическим представлением для любой заданной области рациональности; их многообразие равно многообразию уравнений без аффекта.*

Фактическое исследование показывает (см. Ф. Зейдельман, цит. место), что дополнительное представление требуется только для альтернирующей группы относительно областей рациональности, содержащих поле третьих корней из единицы; во всех остальных случаях параметрическое представление дает всю совокупность без оговорок.

Следует еще отметить, что минимальная база известна и для всех абелевых групп.<sup>15</sup> Однако здесь речь идет о базе с коэффициентами из циклотомического поля, выводимого из характеров группы. Поэтому для построения уравнений с заданной группой в этом случае не удастся получить новых результатов.

Гёттинген, июль 1916 г.

<sup>12</sup>Для уравнения  $n$ -й степени без второго члена

$$f(x) = x^n + a_2 x^{n-2} + a_3 x^{n-3} + \dots + a_n = 0$$

этой второй редукции соответствует подстановка, всегда возможная при  $a_2 \neq 0, a_3 \neq 0$ ,

$$y = \frac{x \cdot a_2}{a_3},$$

посредством которой  $f(x)$ , с точностью до множителя, переходит в

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^3} y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^3} y^{n-3} + \frac{a_4 \cdot a_2^4}{a_3^4} y^{n-4} + \dots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

то есть в уравнение, содержащее только  $n - 2$  параметра:

$$g(y) = y^n + c \cdot y^{n-2} + c \cdot y^{n-3} + c_4 y^{n-4} + \dots + c_n = 0.$$

<sup>13</sup>J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875); G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). То, что для полей более чем от двух неизвестных минимальная база может не существовать, Ф. Энрикес показал на контрпримере, Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21 Jan. 1912.

<sup>14</sup>См. Weber Algebra (малое издание), § 93, формула (12).

<sup>15</sup>E. Fischer: Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen. Gött. Nachr. 1915, и Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen. Math. Ann. 77 (1915).



## 12. Инварианты произвольных дифференциальных выражений

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, с. 37–44

Представлено на заседании 25 января 1918 года Ф. Клейном.

Под дифференциальным выражением я понимаю функцию

$$f(x, dx) = f(x_1, \dots, x_n; dx_1, \dots, dx_n)$$

от  $n$  переменных  $x_1, \dots, x_n$  и их дифференциалов  $dx_1, \dots, dx_n$ , которая предполагается аналитической в обеих системах по  $n$  аргументов, но не обязательно вещественной. Теперь за основу я беру группу всех аналитических преобразований переменных, которой соответствует группа всех линейных преобразований дифференциалов:

$$x_i = x_i(y_1, \dots, y_n); \quad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \delta y_k, \quad (1)$$

при этом  $f(x, dx)$  пусть переходит в  $g(y, dy)$ . Под инвариантом  $f(x, dx)$  я понимаю инвариант относительно этой группы и относительно индуцированной ею группы для высших дифференциалов  $d^2x, ddx, \dots$  и для производных от  $f(x, dx)$ ; то есть такую аналитическую функцию  $J$ , что для произвольного  $f$  и в силу (1) тождественно по переменным и всем входящим дифференциалам выполняется

$$\begin{aligned} J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \cdots dx, \delta x, d^2x, \dots\right) \\ = J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \cdots dy, \delta y, d^2y, \dots\right).^1 \end{aligned}$$

Совершенно соответственно определяется инвариант одновременной системы дифференциальных выражений. Если такой инвариант, в частности, содержит только первые дифференциалы  $dx, \delta x$  и только производные по этим дифференциалам, а не по переменным, то появление переменных в функциях и линейное преобразование дифференциалов не принимаются во внимание; эти специальные инварианты являются инвариантами относительно группы всех линейных преобразований дифференциалов  $dx, \delta x$  с неопределенными коэффициентами и далее будут называться проективными инвариантами одновременной системы.

Для квадратичных однородных дифференциальных форм Кристоффель (Crelle 70) и Риччи (Math. Annalen 54) построили такую систему инвариантных образований, что все инварианты становятся проективными инвариантами этой одновременной системы; тем самым вопросы о всей совокупности инвариантов и об эквивалентности сводятся к вопросам линейной теории инвариантов. Это я хотела бы назвать «теоремой редукции». Полная система состоит из счетно бесконечного множества форм; но для инвариантов каждого конечного порядка  $\rho$ , то есть таких, которые не содержат производных по переменным выше  $\rho$ -го порядка, она содержит только конечное число форм.

Ниже я показываю справедливость «теоремы редукции» для произвольных дифференциальных выражений; и здесь снова речь идет о полной системе счетно бесконечного множества

<sup>1</sup>  $\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$  всюду употребляется сокращенно для

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \cdots \partial dx_{k_\sigma}},$$

где индексы означают какие-либо из чисел от 1 до  $n$ .

инвариантных образований, но для каждого конечного порядка только о конечном их числе. Однако, тогда как Кристоффель и Риччи для порождения инвариантов и доказательства теоремы редукции опираются на трудно обозримые элиминации, я порождаю инварианты непосредственно инвариантными процессами дифференцирования и варьирования; последние просто можно понимать как процессы дифференцирования по другим параметрам. Алгоритм этих инвариантных процессов дифференцирования, в связи с Лагранжем (*Mécanique analytique*, 2-я часть, разд. IV), развили Риман (*Werke XXII*) и Липшиц (*Crelle 70, 72*) для квадратичных дифференциальных форм, однако не дойдя до теоремы редукции. Вспомогательное средство для доказательства теоремы редукции дают введенные Риманом для квадратичных форм «нормальные координаты» (*Werke XIII*), которые преобразуют экстремали соответствующей вариационной задачи, исходящие из одной точки, в прямые; но они существуют только для однородных дифференциальных выражений  $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)^2$ . Неоднородный случай, однако, сводится к этому.

### I. Порождение инвариантов.

Последовательность проективных инвариантов  $f(x, dx)$ , вообще говоря не обрывающаяся, дается полярами. Из-за линейности преобразования дифференциалов из  $f(x, dx) = g(y, dy)$  также следует  $f(x, dx + \lambda \delta x) = g(y, dy + \lambda \delta y)$ ; а отсюда, разлагая по  $\lambda$ , получаются характерные для инвариантности соотношения:

$$\begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ f_\delta &= \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx} \delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy} \delta y, \\ &\vdots \\ f_{\delta^\sigma} &= \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \end{aligned} \tag{2}$$

Каждая поляра через применение вариационного процесса  $\bar{\delta}$  дает основание для необрывающейся последовательности общих инвариантов:

$$\begin{aligned} \bar{\delta}^\rho f(x, dx) &= \bar{\delta}^\rho g(y, dy), \\ &\vdots \\ \bar{\delta}^\rho f_{\delta^\sigma} &= \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \\ &(\rho = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \tag{3}$$

Соотношения (2) и (3) в силу (1) позволяют считать законы преобразования для производных от  $f(x, dx)$ , но далее это не понадобится. Из инвариантов (3) теперь линейной комбинацией можно получить «нормальную форму  $\rho$ -й вариации», которая при  $\rho = 1$  встречается у Лагранжа, а при  $\rho = 2$  у Римана; она характеризуется тем, что смешанные дифференциалы порядка  $\rho + 1$ :  $d^\rho \delta$ ,  $d^{\rho-1} \delta^2$ , ..., элиминированы. Для нее получаем:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 &= \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ &\vdots \\ \Omega_\rho &= \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2} \delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \dots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!} d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ &\vdots \end{aligned} \tag{4}$$

<sup>2</sup>Легко видеть, что  $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$ , где  $c$  обозначает произвольную вещественную или комплексную величину.

Из инвариантов (4), обобщая подход Римана, можно перейти к инвариантам, содержащим только первые дифференциалы; такие инварианты будут называться «основными функциями». А именно, если в  $\Omega_1$  заменить дифференциалы дифференциальными отношениями, то  $\Omega_1 = 0$ , тождественно по  $\delta x$ , дает ровно лагранжевы уравнения вариационной задачи, принадлежащей

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Теперь я ставлю инвариантное условие, что направление  $(d + \lambda\delta)$  удовлетворяет этим лагранжевым уравнениям:

$$\Omega_1(d + \lambda\delta) = \bar{\delta}f(dx + \lambda\delta x) - (d + \lambda\delta)f_{\bar{\delta}}(dx + \lambda\delta x) = 0 \quad (\text{тождественно по } \delta x), \quad (5)$$

откуда подстановкой  $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$  для однородного  $f(dx)$  еще следует

$$(d + \lambda\delta)f(dx + \lambda\delta x) = 0, \quad (6)$$

за исключением случая однородности первого порядка. В последнем случае (6) следует добавить как новое условие, поскольку тогда система уравнений (5) представляет только  $(n - 1)$  независимых условий. Если в (5), соответственно в (5) и (6), приравнять к нулю коэффициенты при нулевой, первой и второй степенях  $\lambda$ , то получаются три инвариантные системы уравнений  $\varphi = 0$ ,  $\psi = 0$ ,  $\chi = 0$ , тождественно по  $\delta x$ , посредством которых  $d^2x, ddx, \delta^2x$  можно выразить через первые дифференциалы. Дальнейшие инвариантные системы уравнений

$$\begin{aligned} d^\sigma \varphi = 0, \quad d^\sigma \psi = 0, \quad d^\sigma \chi = 0, \quad d^{\sigma-1} \delta \chi = 0, \\ d^{\sigma-2} \delta^2 \chi = 0, \dots, \delta^\sigma \chi = 0 \quad (\sigma = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned} \quad (7)$$

тогда как раз достаточны, чтобы выразить все высшие дифференциалы через первые.<sup>3</sup> Следовательно, функции (4), соединенные с инвариантной системой уравнений (7), ведут к основным функциям  $[\Omega_\rho]$ , содержащим только первые дифференциалы; при этом  $[\Omega_1]$  тождественно исчезает.

Так же из дифференциала  $\delta h(dx, \delta x)$  основной функции  $h$  посредством (7) снова можно получить основную функцию, которую следует назвать «ковариантной производной»  $[h^{(1)}]$  от  $h$ ; вообще  $[h^{(\nu)}]$  будет обозначать ковариантную производную от  $[h^{(\nu-1)}]$ . Эти два процесса таким образом ведут к дважды бесконечной последовательности основных функций:

$$\begin{array}{ccccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}], & \dots, & [\Omega_2^{(\nu)}], & \dots \\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \dots, & \dots, & [\Omega_\rho^{(\nu)}], & \dots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array} \quad (8)$$

Далее оказывается, что левые части уравнений, выражающих высшие дифференциалы через первые, когреддиентны первым дифференциалам, то есть подчиняются тем же линейным преобразованиям. Поэтому, если вместо высших дифференциалов ввести эти левые части  $p, q, r, \dots$  как аргументы инварианта, то, кроме производных, он зависит только от взаимно когреддиентных величин. Указанное выше образование функций (8) просто сводится к введению этих новых величин; каждый инвариант тем самым переходит в сумму инвариантов, и из нее выбирается тот, который содержит именно  $dx, \delta x$ , но не содержит  $p, q, r, \dots$

Ниже показывается, что при предположении однородности

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$$

основные функции (8) исчерпывают искомую полную систему.

<sup>3</sup>Только линейная форма  $\sum A_i dx_i$  требует особого рассмотрения, поскольку здесь система уравнений (5) не содержит вторых дифференциалов.

## II. Нормальные координаты, эквивалентность и теорема редукции.

К нормальным координатам я прихожу интегрированием вариационной задачи, принадлежащей  $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$ :

$$\begin{aligned}\Omega_1 &= \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt}f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{тождественно по } \delta x), \\ \frac{d}{dt}f\left(\frac{dx}{dt}\right) &= 0 \quad (\text{как следствие или дополнительное условие}).\end{aligned}\tag{9}$$

Из-за предполагаемой однородности  $f(dx)$  эта система уравнений переходит в себя при подстановке параметра  $t = \varkappa \cdot \tau$ ; следовательно, если в силу (9) выразить  $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$  как функцию  $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$  первых производных, то  $\varphi_\rho^{(i)}$  становится однородной  $\rho$ -го порядка:

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right).\tag{10}$$

Если теперь при интегрировании (9) для  $t = t_0$  задать начальные значения

$$x = (x)_0, \quad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

и положить

$$u_i = (t - t_0) \left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0,\tag{11}$$

где параметр  $(t - t_0)$  в силу  $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$  становится пропорциональным «длине экстремали», то разложение по степеням  $(t - t_0)$  в силу (10) дает

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \dots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \dots.\tag{12}$$

Это разложение можно рассматривать как преобразование переменных  $x_i = x_i(u)$ , где величины  $u$  как раз являются римановыми нормальными координатами. Значит, по (11) и (12) эти координаты преобразуют экстремали, проходящие через  $(x)_0$ , в прямые. Кроме того, произвольному преобразованию переменных  $x = x(y)$  по (11) соответствует линейное преобразование  $u = u(v)$  соответствующих нормальных координат, причем коэффициенты зависят только от произвольной системы значений  $(x)_0$ ; следовательно, дифференциалы  $du, \delta u$  подчиняются тому же преобразованию, что и сами  $u$ .

В силу (12) пусть  $f(x, dx)$  переходит в  $F(u, du)$ , или, разложенная по степеням  $u$ ,

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \dots + F_\rho(u, du) + \dots\tag{13}$$

где  $F_\rho(u, du)$  обозначает однородную форму  $\rho$ -й размерности по  $u$ . Из-за линейности преобразования  $u = u(v)$  из  $F(u, du) = G(v, dv)$  отдельные однородные составные части также переходят в соответствующие:

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv).\tag{14}$$

Итак, если взять для  $(x)_0$  какую-нибудь фиксированную постоянную систему значений, то (13) и (14) показывают, что эквивалентность  $f(dx)$  с  $g(dy)$  равносильна эквивалентности соответствующих систем функций  $F_\rho(u, du)$  относительно линейного преобразования. Кроме того,  $F_\rho(u, du)$ , или соответствующие  $F_\rho(\delta u, du)$ , представляют инварианты  $f(dx)$ , взятые в точке  $x = (x)_0$ , и именно они образуют полную систему основных функций для этой точки  $x = (x)_0$ . А именно, имеем

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!} \sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} \delta u^\rho; \quad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho}\right)_0,$$

и эта последняя производная в силу (12) выражается через производные от  $f(dx)$ , взятые при  $x = (x)_0$ , совершенно так же, как соответственно образованная производная от  $G(dv)$  выражается через производные от  $g(dy)$ . Поскольку

$$\left( \frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^\rho \partial du^\sigma} \right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma}$$

каждый инвариант  $f(dx) = F(du)$ , взятый в точке  $x = (x)_0$ , становится проективным инвариантом  $F_\rho(\delta u, du)$ , как только высшие дифференциалы заменены на  $p, q, r, \dots$ , когреддиентные к  $dx, \delta x$ . Но  $(x)_0$  можно рассматривать как параметр; каждому инварианту в точке  $x = (x)_0$  соответствует инвариант  $f(dx)$ , если только снова заменить  $(x)_0$  на  $x$ . Следовательно, если  $F_\rho(\delta u, du)$  становятся инвариантами  $\Psi_\rho(\delta x, dx)$ , взятыми при  $x = (x)_0$ , ибо при  $x = (x)_0$  величины  $du, \delta u$  переходят в  $dx, \delta x$ , то сами  $\Psi_\rho$  образуют основные функции полной системы. Остается выразить эту систему основных функций через явные инварианты  $f(dx)$ , а именно через функции (8). Возможность этого показывает их порождение процессами дифференцирования. Для членов высшего порядка эти процессы переходят в простые процессы поляризации, и преобразование, аналогичное разложению в ряд Клебша–Гордана, вместе с индукционным выводом относительно отброшенных членов доказывает утверждение. Если речь идет об инвариантах одновременной системы, то к основным функциям (8) нужно еще добавить ковариантные производные остальных дифференциальных выражений, как показывает введение в эти выражения нормальных координат, принадлежащих  $f(dx)$ .

Эквивалентность  $f(dx)$  с  $g(dy)$ , которая была сведена к (14), следовательно, также равносильна эквивалентности  $\Psi_\rho$ , или равным образом функций (8), относительно линейного преобразования дифференциалов, без необходимости в особых условиях интегрируемости, как следует из возможности сведения к (14). Тем самым теорема редукции доказана во всех частях. В частности, тождественное исчезновение функциональной последовательности  $[\Omega_2], [\Omega_3], \dots, [\Omega_\rho], \dots$  необходимо и достаточно для того, чтобы  $f(dx)$  можно было преобразовать в выражение с постоянными коэффициентами.

Наконец, если вместо группы всех аналитических преобразований положить в основу подгруппу, то и группа соответствующих линейных преобразований  $u$  переходит в подгруппу проективной группы; инварианты  $f(dx)$  снова становятся инвариантами функций (8) относительно линейного преобразования, но теперь относительно этой подгруппы. Так, посредством однороднения, случай неоднородных функций  $f(dx)$  сводится к аффинной группе; полную систему здесь можно вывести из функций (8), образованных для одной дополнительной переменной.

Из теоремы редукции получается специальный случай квадратичных форм, более общо форм  $p$ -й размерности: здесь система функций обрывается на  $[\Omega_2]$ , более общо на  $[\Omega_p]$  и ее ковариантных производных, поскольку все последующие основные функции становятся их проективными инвариантами. Этим объясняется выдающееся положение римановой формы кривизны  $[\Omega_2]$  при квадратичных формах. Вопрос об эквивалентности квадратичных форм, соответственно форм  $p$ -й размерности, именно сводится к эквивалентности  $[\Omega_2]$ , соответственно  $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ , и их ковариантных производных относительно линейного преобразования; а тождественное исчезновение  $[\Omega_2]$ , соответственно  $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ , необходимо и достаточно для преобразования в формы с постоянными коэффициентами, чем для квадратичных форм высказан один из наиболее известных результатов.

Более подробное изложение должно вскоре появиться в Math. Annalen.

### 13. Инвариантные вариационные задачи

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, с. 235–257

Представлено Ф. Клейном на заседании 26 июля 1918 года.<sup>1</sup>

Речь идет о вариационных задачах, которые допускают непрерывную группу в смысле Ли; вытекающие отсюда следствия для соответствующих дифференциальных уравнений получают свое наиболее общее выражение в теоремах, сформулированных в §1 и доказанных в следующих параграфах. Об этих дифференциальных уравнениях, возникающих из вариационных задач, можно делать гораздо более точные утверждения, чем о произвольных дифференциальных уравнениях, допускающих группу и составляющих предмет исследований Ли. Следовательно, дальнейшее основано на соединении методов формального вариационного исчисления с методами теории групп Ли. Для специальных групп и вариационных задач такое соединение методов не ново; я упомяну Гамеля и Герглотца для специальных конечных групп, Лоренца и его учеников (например, Фоккера), Вейля и Клейна для специальных бесконечных групп.<sup>2</sup> В частности, вторая заметка Клейна и настоящее изложение взаимно повлияли друг на друга; по этому поводу я могу сослаться на заключительные замечания заметки Клейна.

#### §1. Предварительные замечания и формулировка теорем

Все встречающиеся ниже функции следует считать аналитическими или по крайней мере непрерывными и конечное число раз непрерывно дифференцируемыми, а в рассматриваемой области однозначными.

Под «группой преобразований», как известно, понимают такую систему преобразований, что для каждого преобразования существует содержащееся в системе обратное преобразование, и что композиция любых двух преобразований системы снова принадлежит системе. Группа называется конечной непрерывной  $\mathfrak{G}_\rho$ , если ее преобразования содержатся в наиболее общем преобразовании, аналитически зависящем от  $\rho$  существенных параметров  $\varepsilon$  (то есть эти  $\rho$  параметров не должны представляться как  $\rho$  функций от меньшего числа параметров). Соответственно под бесконечной непрерывной  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$  понимают группу, наиболее общие преобразования которой аналитически или по крайней мере непрерывно и конечное число раз непрерывно дифференцируемо зависят от  $\rho$  существенных произвольных функций  $p(x)$  и их производных. Промежуточным звеном между ними является группа, зависящая от бесконечного числа параметров, но не от произвольных функций. Наконец, смешанной группой называют такую, которая зависит и от произвольных функций, и от параметров.<sup>3</sup>

Пусть  $x_1, \dots, x_n$  являются независимыми переменными, а  $u_1(x), \dots, u_\mu(x)$  зависящими от них функциями. Если подчинить  $x$  и  $u$  преобразованиям некоторой группы, то вследствие предполагаемой обратимости преобразований среди преобразованных величин снова должно содержаться ровно  $n$  независимых —  $y_1, \dots, y_n$ ; остальные зависящие от них величины обозначим

<sup>1</sup>Окончательная редакция рукописи была подана лишь в конце сентября.

<sup>2</sup>Гамель: *Math. Ann.* т. 59 и *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* т. 50. Герглотц: *Ann. d. Phys.* (4) т. 36, особенно §9, с. 511. Фоккер, *Verslag d. Amsterdamer Akad.*, 27.01.1917. О дальнейшей литературе см. вторую заметку Клейна: *Göttinger Nachrichten*, 19 июля 1918. В только что вышедшей работе Кнезера (*Math. Zeitschrift* т. 2) речь идет о построении инвариантов сходным методом.

<sup>3</sup>Ли в *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) определяет бесконечную непрерывную группу как группу преобразований, преобразования которой задаются наиболее общими решениями системы частных дифференциальных уравнений, если эти решения зависят не только от конечного числа параметров. Тем самым получается один из указанных выше типов, отличных от конечной группы; тогда как, наоборот, предельный случай бесконечного числа параметров не обязан удовлетворять системе дифференциальных уравнений.

$v_1(y), \dots, v_\mu(y)$ . В преобразованиях могут также появляться производные  $u$  по  $x$ , то есть  $\partial u / \partial x, \partial^2 u / \partial x^2, \dots$ <sup>4</sup> Функция называется инвариантом группы, если существует соотношение:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right).$$

В частности, интеграл  $I$  является инвариантом группы, если существует соотношение:

$$\begin{aligned} I &= \int \dots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) dx \\ &= \int \dots \int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) dy, \end{aligned} \quad (1)$$

интегрируемое по произвольной действительной  $x$ -области и соответствующей  $y$ -области.<sup>5</sup>

С другой стороны, для произвольного, не обязательно инвариантного интеграла  $I$  я образуя первую вариацию  $\delta I$  и преобразую ее по правилам вариационного исчисления частным интегрированием. Как известно, если  $\delta u$  вместе со всеми встречающимися производными считать исчезающей на границе, а в остальном произвольной, получается:

$$\delta I = \int \dots \int \delta f dx = \int \dots \int \left( \sum_i \psi_i \left( x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) \delta u_i \right) dx, \quad (2)$$

где  $\psi$  обозначают лагранжевы выражения, то есть левые части уравнений Лагранжа соответствующей вариационной задачи  $\delta I = 0$ . Этому интегральному соотношению соответствует безинтегральное тождество по  $\delta u$  и ее производным, возникающее, если явно записать граничные члены. Как показывает частное интегрирование, эти граничные члены являются интегралами от дивергенций, то есть от выражений

$$\text{Div } A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

где  $A$  линейно по  $\delta u$  и ее производным. Поэтому получается:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f + \text{Div } A. \quad (3)$$

Если, в частности,  $f$  содержит только первые производные  $u$ , то для простого интеграла тождество (3) совпадает с так называемым «центральным уравнением Лагранжа»:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{d}{dx} \left( \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \delta u_i \right), \quad \left( u'_i = \frac{du_i}{dx} \right), \quad (4)$$

а для  $n$ -кратного интеграла (3) переходит в:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1} \left( \sum_i \frac{\partial f}{\partial \left( \frac{\partial u_i}{\partial x_1} \right)} \delta u_i \right) - \dots - \frac{\partial}{\partial x_n} \left( \sum_i \frac{\partial f}{\partial \left( \frac{\partial u_i}{\partial x_n} \right)} \delta u_i \right). \quad (5)$$

<sup>4</sup>Я, насколько возможно и при суммированиях, опускаю индексы; например, пишу  $\partial^2 u / \partial x^2$  для  $\partial^2 u_{\nu} / \partial x_i \partial x_k$  и т. д.

<sup>5</sup>Сокращенно пишу  $dx, dy$  для  $dx_1 \dots dx_n, dy_1 \dots dy_n$ . Все аргументы  $x, u, \varepsilon, p(x)$ , входящие в преобразования, следует считать действительными, тогда как коэффициенты могут быть комплексными. Но так как в окончательных результатах речь идет о тождествах по  $x, u$ , параметрам и произвольным функциям, они справедливы и для комплексных значений, если только все встречающиеся функции считать аналитическими. Впрочем, значительная часть результатов может быть обоснована без интегралов, так что ограничение действительным не необходимо и при обосновании. Напротив, рассуждения в конце §2 и начале §5, по-видимому, нельзя провести без интегралов.

Для простого интеграла и  $\kappa$  производных от  $u$  (3) задается формулой:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \delta u_i = & \delta f - \frac{d}{dx} \left\{ \sum_i \left[ \binom{1}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}} \delta u_i + \binom{2}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i^{(1)} + \dots + \binom{\kappa}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-1)} \right] \right\} \\ & + \frac{d^2}{dx^2} \left\{ \sum_i \left[ \binom{2}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i + \binom{3}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}} \delta u_i^{(1)} + \dots + \binom{\kappa}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-2)} \right] \right\} \\ & + \dots + (-1)^\kappa \frac{d^\kappa}{dx^\kappa} \left\{ \sum_i \binom{\kappa}{\kappa} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

Соответствующее тождество имеет место и для  $n$ -кратного интеграла;  $A$ , в частности, содержит  $\delta u$  вплоть до  $(\kappa - 1)$ -й производной. То, что формулами (4), (5), (6) действительно определены лагранжевы выражения  $\psi_i$ , следует из того, что комбинациями правых частей устранены все высшие производные от  $\delta u$ , тогда как выполнено соотношение (2), к которому частное интегрирование приводит однозначно.

В дальнейшем речь идет о двух теоремах:

I. Если интеграл  $I$  инвариантен относительно  $\mathfrak{G}_\rho$ , то  $\rho$  линейно независимых комбинаций лагранжевых выражений становятся дивергенциями; обратно, отсюда следует инвариантность  $I$  относительно  $\mathfrak{G}_\rho$ . Теорема остается верной и в предельном случае бесконечного числа параметров.

II. Если интеграл  $I$  инвариантен относительно  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ , в которой произвольные функции входят вплоть до  $\sigma$ -й производной, то существуют  $\rho$  тождественных соотношений между лагранжевыми выражениями и их производными вплоть до  $\sigma$ -го порядка; и здесь также справедливо обратное.<sup>6</sup>

Для смешанных групп справедливы утверждения обеих теорем; следовательно, появляются как зависимости, так и независимые от них дивергентные соотношения.

Если от этих тождеств перейти к соответствующей вариационной задаче, то есть положить  $\psi = 0$ ,<sup>7</sup> то теорема I в одномерном случае, где дивергенция переходит в полный дифференциал, утверждает существование  $\rho$  первых интегралов, между которыми, однако, могут существовать нелинейные зависимости;<sup>8</sup> в многомерном случае получаются дивергентные уравнения, которые в последнее время часто называют «законами сохранения»; теорема II утверждает, что  $\rho$  уравнений Лагранжа являются следствием остальных.

Простейший пример к теореме II, без обратного утверждения, дает параметрическое представление Вейерштрасса; здесь интеграл при однородности первого порядка, как известно, инвариантен, если независимую переменную  $x$  заменить произвольной функцией от  $x$ , оставляя  $u$  неизменными ( $y = p(x)$ ;  $v_i(y) = u_i(x)$ ). Значит, входит одна произвольная функция, но без производных; этому соответствует известное линейное соотношение между самими лагранжевыми выражениями:

$$\sum_i \psi_i \frac{du_i}{dx} = 0.$$

Другой пример дает «общая теория относительности» физиков; здесь речь идет о группе всех преобразований  $x$ :  $y_i = p_i(x)$ , тогда как  $u$  (обозначенные как  $g_{\mu\nu}$  и  $q$ ) подчиняются индуцированным этим преобразованиям коэффициентов квадратичной и линейной дифференциальной формы, то есть преобразованиям, содержащим первые производные произвольных функций  $p(x)$ . Этому соответствуют известные  $n$  зависимостей между лагранжевыми выражениями и их первыми производными.<sup>9</sup>

Если, в частности, специализировать группу так, что в преобразованиях не допускаются производные  $u(x)$ , а преобразованные независимые величины зависят только от  $x$ , а не от  $u$ , то из инвариантности  $I$  следует (как будет показано в §5) относительная инвариантность  $\sum_i \psi_i \delta u_i$ ,<sup>10</sup> а также дивергенций, встречающихся в теореме I, как только параметры подчинены

<sup>6</sup>О некоторых тривиальных исключительных случаях см. §2, второе примечание.

<sup>7</sup>Несколько более общо можно также положить  $\psi_i = T_i$ , ср. §3, первое примечание.

<sup>8</sup>См. конец §3.

<sup>9</sup>См., например, изложение Клейна.

<sup>10</sup>То есть  $\sum_i \psi_i \delta u_i$  при преобразовании приобретает множитель.



подходящим преобразованиям. Отсюда еще следует, что указанные выше первые интегралы также допускают группу. Для теоремы II так же получается относительная инвариантность левых частей зависимостей, собранных с помощью произвольных функций; и как следствие еще функция, дивергенция которой тождественно исчезает и которая допускает группу, та самая, что в теории относительности физиков посредствует связь между зависимостями и законом энергии.<sup>11</sup> Наконец, теорема II дает в группово-теоретической форме доказательство связанного с этим утверждения Гильберта об отказе собственных законов энергии при «общей относительности». С этими дополнительными замечаниями теорема I содержит все известные в механике и т. д. теоремы о первых интегралах, тогда как теорему II можно назвать максимально возможным группово-теоретическим обобщением «общей теории относительности».

## §2. Дивергентные соотношения и зависимости

Пусть  $\mathfrak{G}$  есть конечная или бесконечная непрерывная группа; тогда всегда можно добиться того, чтобы тождественному преобразованию соответствовали нулевые значения параметров  $\varepsilon$ , соответственно произвольных функций  $p(x)$ .<sup>12</sup> Наиболее общее преобразование поэтому имеет вид:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \dots, \quad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \dots,$$

где  $\Delta x_i, \Delta u_i$  обозначают члены наименьшей размерности относительно  $\varepsilon$ , соответственно относительно  $p(x)$  и ее производных; причем они будут считаться линейными относительно этих величин. Как выяснится позднее, это не ограничивает общности.

Пусть теперь интеграл  $I$  является инвариантом относительно  $\mathfrak{G}$ , то есть выполнено соотношение (1). В частности, тогда  $I$  инвариантен и относительно содержащегося в  $\mathfrak{G}$  инфинитезимального преобразования:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \quad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

для него соотношение (1) переходит в:

$$0 = \Delta I = \int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy - \int \dots \int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx. \quad (7)$$

Первый интеграл следует брать по области  $x + \Delta x$ , соответствующей  $x$ -области. Но это интегрирование можно также превратить в интегрирование по  $x$ -области с помощью преобразования, справедливого для инфинитезимальных  $\Delta x$ :

$$\int \dots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy = \int \dots \int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) dx + \int \dots \int \text{Div}(f \cdot \Delta x) dx. \quad (8)$$

Следовательно, если вместо инфинитезимального преобразования  $\Delta u$  ввести вариацию

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} \Delta x_{\lambda}, \quad (9)$$

то (7) и (8) переходят в:

$$0 = \int \dots \int \{\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x)\} dx. \quad (10)$$

<sup>11</sup>См. вторую заметку Клейна.

<sup>12</sup>См., например, Ли: *Grundlagen*, с. 331. Если речь идет о произвольных функциях, специальные значения  $a^{\sigma}$  параметров следует заменить фиксированными функциями  $p^{\sigma}$ ,  $\partial p^{\sigma} / \partial x, \dots$ ; соответственно значения  $a^{\sigma} + \varepsilon$  заменяются на  $p^{\sigma} + p(x)$ ,  $\partial p^{\sigma} / \partial x + \partial p / \partial x$  и т. д.

Так как соотношение (10) выполнено при интегрировании по всякой произвольной области, интегрант должен тождественно исчезать; следовательно, дифференциальные уравнения Ли для инвариантности  $I$  переходят в соотношение:

$$\bar{\delta}f + \text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \quad (11)$$

Если здесь по (3) выразить  $\bar{\delta}f$  через лагранжевы выражения, получается:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \text{Div } B, \quad (B = A - f \cdot \Delta x), \quad (12)$$

и это соотношение, следовательно, для каждого инвариантного интеграла  $I$  является тождеством по всем встречающимся аргументам; это искомая форма дифференциальных уравнений Ли для  $I$ .<sup>13</sup>

Пусть сначала  $\mathfrak{G}$  считается конечной непрерывной группой  $\mathfrak{G}_\rho$ . Так как, по предположению,  $\Delta u$  и  $\Delta x$  линейны по параметрам  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\rho$ , то по (9) то же верно для  $\bar{\delta}u$  и ее производных; следовательно,  $A$  и  $B$  линейны по  $\varepsilon$ . Поэтому, если положить

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \dots + B^{(\rho)}\varepsilon_\rho, \quad \bar{\delta}u = \bar{\delta}u^{(1)}\varepsilon_1 + \dots + \bar{\delta}u^{(\rho)}\varepsilon_\rho,$$

где  $\bar{\delta}u^{(1)}, \dots$  являются функциями от  $x, u, \partial u/\partial x, \dots$ , то из (12) следуют искомые дивергентные соотношения:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(1)} = \text{Div } B^{(1)}, \dots, \quad \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i^{(\rho)} = \text{Div } B^{(\rho)}. \quad (13)$$

Тем самым  $\rho$  линейно независимых комбинаций лагранжевых выражений становятся дивергенциями; линейная независимость следует из того, что по (9) из  $\bar{\delta}u = 0$ ,  $\Delta x = 0$  следовало бы и  $\Delta u = 0$ ,  $\Delta x = 0$ , то есть зависимость между инфинитезимальными преобразованиями. Но такая зависимость, по предположению, не выполняется ни при каком значении параметра; иначе  $\mathfrak{G}_\rho$ , вновь возникающая из инфинитезимальных преобразований интегрированием, зависела бы менее чем от  $\rho$  существенных параметров. Дальнейшая возможность  $\bar{\delta}u = 0$ ,  $\text{Div}(f\Delta x) = 0$  была исключена. Эти выводы остаются верными и в предельном случае бесконечного числа параметров.

Пусть теперь  $\mathfrak{G}$  есть бесконечная непрерывная группа  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ . Тогда  $\bar{\delta}u$  и ее производные, а значит и  $B$ , снова линейны по произвольным функциям  $p(x)$  и их производным;<sup>14</sup> пусть после подстановки значений  $\bar{\delta}u$ , еще независимо от (12), имеем:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i &= \sum_{\lambda, i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) p^{(\lambda)}(x) \right. \\ &\quad \left. + b_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}. \end{aligned}$$

Теперь, аналогично формуле частного интегрирования, по тождеству

$$\varphi(x, u, \dots) \frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau} p(x) \quad \text{mod дивергенций}$$

производные от  $p$  можно заменить самой  $p$  и дивергенциями, линейными по  $p$  и ее производным; следовательно:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} + \text{Div } \Gamma, \quad (14)$$

<sup>13</sup>(12) переходит в  $0 = 0$  в тривиальном случае, который может возникнуть только тогда, когда  $\Delta x, \Delta u$  также зависят от производных  $u$ , именно когда  $\text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$ ,  $\bar{\delta}u = 0$ ; такие инфинитезимальные преобразования всегда нужно отделять от групп, и при формулировке теорем считать только число остальных параметров или произвольных функций. Образуют ли остальные инфинитезимальные преобразования еще всегда группу, должно остаться открытым.

<sup>14</sup>То, что не является ограничением считать  $p$  свободными от  $u, \partial u/\partial x, \dots$ , показывает обратное утверждение.

с суммированием по  $i$  в фигурной скобке. Вместе с (12) это дает:

$$\sum_{\lambda} \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^{\sigma} \frac{\partial^{\sigma}}{\partial x^{\sigma}} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} = \text{Div}(B - \Gamma). \quad (15)$$

Я теперь образу  $n$ -кратный интеграл от (15) по какой-нибудь области и выбираю  $p(x)$  так, чтобы они вместе со всеми производными, встречающимися в  $B - \Gamma$ , исчезали на границе. Так как интеграл от дивергенции сводится к граничному интегралу, исчезает и интеграл от левой части (15) для произвольных  $p(x)$ , исчезающих только на границе вместе с достаточно многими производными; отсюда по известным рассуждениям следует исчезновение интегранда для каждой  $p(x)$ , то есть  $\rho$  соотношений:

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^{\sigma} \frac{\partial^{\sigma}}{\partial x^{\sigma}} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (16)$$

Это и есть искомые зависимости между лагранжевыми выражениями и их производными при инвариантности  $I$  относительно  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ ; линейная независимость видна так же, как выше, поскольку обратное утверждение возвращает к (12), и потому что от инфинитезимальных преобразований снова можно заключить к конечным, как подробнее изложено в §4. Следовательно, при  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$  уже в инфинитезимальных преобразованиях всегда появляются  $\rho$  произвольных преобразований. Из (15) и (16) еще следует  $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$ .

Если соответственно «смешанной группе» положить  $\Delta x$  и  $\Delta u$  линейными по  $\varepsilon$  и  $p(x)$ , то, полагая один раз  $p(x)$  нулем, а другой раз  $\varepsilon$  нулем, видно, что существуют как дивергентные соотношения (13), так и зависимости (16).

### §3. Обратное утверждение в случае конечной группы

Чтобы показать обратное утверждение, нужно сначала в существенном пройти предыдущие рассуждения в обратном порядке. Из существования (13) умножением на  $\varepsilon$  и сложением следует существование (12); а посредством тождества (3) отсюда следует соотношение

$$\bar{\delta}f + \text{Div}(A - B) = 0.$$

Если положить  $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$ , то тем самым мы пришли к (11); отсюда интегрированием наконец следует (7):  $\Delta I = 0$ , то есть инвариантность  $I$  относительно инфинитезимального преобразования, определенного  $\Delta x$ ,  $\Delta u$ , причем  $\Delta u$  определяется из  $\Delta x$  и  $\bar{\delta}u$  по (9), а  $\Delta x$  и  $\Delta u$  становятся линейными по параметрам. Но  $\Delta I = 0$  известным образом влечет инвариантность  $I$  относительно конечных преобразований, возникающих интегрированием одновременной системы:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{при } t = 0. \quad (17)$$

Эти конечные преобразования содержат  $\rho$  параметров  $a_1, \dots, a_{\rho}$ , а именно комбинации  $t\varepsilon_1, \dots, t\varepsilon_{\rho}$ . Из предположения, что должно быть  $\rho$  и только  $\rho$  линейно независимых дивергентных соотношений (13), далее следует, что конечные преобразования, если они не содержат производных  $\partial u / \partial x$ , всегда образуют группу. В противном случае по крайней мере одно инфинитезимальное преобразование, возникающее через процесс скобок Ли, не было бы линейной комбинацией остальных  $\rho$ ; а так как  $I$  допускает и это преобразование, существовало бы более чем  $\rho$  линейно независимых дивергентных соотношений; или же это инфинитезимальное преобразование имело бы специальный вид  $\bar{\delta}u = 0$ ,  $\text{Div}(f\Delta x) = 0$ . Но тогда  $\Delta x$  или  $\Delta u$  зависели бы от производных вопреки предположению. Может ли этот случай наступить, когда производные входят в  $\Delta x$  или  $\Delta u$ , должно остаться открытым; тогда к определенному выше  $\Delta x$  нужно еще добавить все функции  $\Delta x$ , для которых  $\text{Div}(f\Delta x) = 0$ , чтобы снова получить групповое свойство; добавляющиеся этим параметры по соглашению не должны считаться. Этим обратное утверждение доказано.

Из этого обратного утверждения еще следует, что  $\Delta x$  и  $\Delta u$  действительно можно считать линейными по параметрам. Ведь если бы  $\Delta u$  и  $\Delta x$  были формами более высокой степени по  $\varepsilon$ , то из-за линейной независимости степенных произведений  $\varepsilon$  следовали бы вполне соответствующие соотношения (13), только в большем числе; из них по обратному утверждению следует инвариантность  $I$  относительно группы, инфинитезимальные преобразования которой содержат параметры линейно. Если эта группа должна содержать ровно  $\rho$  параметров, то между дивергентными соотношениями, первоначально полученными из членов высших степеней по  $\varepsilon$ , должны существовать линейные зависимости.

Заметим еще, что в случае, когда  $\Delta x$  и  $\Delta u$  содержат также производные  $u$ , конечные преобразования могут зависеть от бесконечного числа производных  $u$ ; ибо интегрирование (17) в этом случае при определении

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2}, \quad \frac{d^2 u_i}{dt^2}$$

приводит к

$$\Delta \left( \frac{\partial u}{\partial x_\lambda} \right) = \frac{\partial \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

так что число производных  $u$  вообще возрастает на каждом шаге. Примером служит, например:

$$f = \frac{1}{2} u'^2, \quad \psi = -u'', \quad \psi \cdot x = \frac{d}{dx} \{ (u - u'x) \}, \quad \bar{\delta} u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'} \varepsilon, \quad \Delta u = \left( x - \frac{2u}{u'} \right) \varepsilon.$$

Так как лагранжевы выражения дивергенции тождественно исчезают, обратное утверждение наконец показывает еще следующее: если  $I$  допускает  $\mathfrak{G}_\rho$ , то всякий интеграл, отличающийся от  $I$  только граничным интегралом, то есть интегралом от дивергенции, также допускает  $\mathfrak{G}_\rho$  с теми же  $\bar{\delta} u$ , инфинитезимальные преобразования которой вообще будут содержать производные  $u$ . Так, в соответствии с приведенным выше примером,

$$f^* = \frac{1}{2} \left\{ u'^2 - \frac{d}{dx} \left( \frac{u^2}{x} \right) \right\}$$

допускает инфинитезимальное преобразование  $\Delta u = x\varepsilon$ ,  $\Delta x = 0$ , тогда как в инфинитезимальных преобразованиях, соответствующих  $f$ , появляются производные  $u$ .

Если перейти к вариационной задаче, то есть положить  $\psi_i = 0$ ,<sup>15</sup> то (13) переходит в уравнения:

$$\text{Div } B^{(1)} = 0, \dots, \quad \text{Div } B^{(\rho)} = 0,$$

которые часто называют «законами сохранения». В одномерном случае отсюда следует:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \quad B^{(\rho)} = \text{const.};$$

при этом  $B$  содержат самое большее  $(2\kappa - 1)$ -е производные  $u$  (по (6)), если  $\Delta u$  и  $\Delta x$  не содержат более высоких производных, чем входящие в  $f$   $\kappa$ -е. Так как в  $\psi$  вообще входят  $2\kappa$ -е производные,<sup>16</sup> мы имеем существование  $\rho$  первых интегралов. То, что между ними могут быть нелинейные зависимости, снова показывает приведенное выше  $f$ . Линейно независимым  $\Delta u = \varepsilon_1$ ,  $\Delta x = \varepsilon_2$  соответствуют линейно независимые соотношения:

$$u'' = \frac{d}{dx} u', \quad u'' u' = \frac{1}{2} \frac{d}{dx} (u')^2;$$

тогда как между первыми интегралами  $u' = \text{const.}$ ,  $u'^2 = \text{const.}$  существует нелинейная зависимость. Здесь речь идет об элементарном случае, когда  $\Delta u$ ,  $\Delta x$  не содержат производных  $u$ .<sup>17</sup>

<sup>15</sup>  $\psi_i = 0$ , или несколько более общо  $\psi_i = T_i$ , где  $T_i$  являются вновь добавленными функциями, в физике называются «полевыми уравнениями». В случае  $\psi_i = T_i$  тождества (13) переходят в уравнения  $\text{Div } B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)}$ , которые в физике также называют законами сохранения.

<sup>16</sup> Если  $f$  нелинейна по  $\kappa$ -м производным.

<sup>17</sup> Иначе имеются еще  $u'' u'^{\lambda-1} = \text{const.}$  для каждого  $\lambda$ , соответственно

$$u'' (u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda} \frac{d}{dx} (u')^\lambda.$$

## §4. Обратное утверждение в случае бесконечной группы

Сначала покажем, что предположение линейности  $\Delta x$  и  $\Delta u$  не представляет ограничения; здесь это следует уже без обратного утверждения из того факта, что  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$  формально зависит от  $\rho$  и только  $\rho$  произвольных функций. А именно оказывается, что в нелинейном случае при композиции преобразований, когда члены наименьшего порядка складываются, число произвольных функций увеличилось бы. В самом деле, пусть, например,

$$y = A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ = x + \sum a(x, u, \dots)p^\nu + b(x, u, \dots)p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + c p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots,$$

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \dots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

и соответственно

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

Тогда при композиции с

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right)$$

для членов наименьшего порядка получается:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1}\frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots.$$

Если здесь какой-либо отличный от  $a$  и  $b$  коэффициент не равен нулю, то есть действительно встречается член

$$p^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\sigma + q^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^\sigma$$

при  $\sigma > 1$ , то его нельзя записать как дифференциальное частное одной функции или степенное произведение такого частного; следовательно, число произвольных функций возросло вопреки предположению. Если все коэффициенты, отличные от  $a$  и  $b$ , исчезают, то в зависимости от значений показателей  $\nu_1, \dots, \nu_\rho$  второй член становится дифференциальным частным первого (как, например, всегда для  $\mathfrak{G}_{\infty 1}$ ), так что фактически наступает линейность; либо число произвольных функций увеличивается и здесь. Поэтому инфинитезимальные преобразования вследствие линейности по  $p(x)$  удовлетворяют системе линейных частных дифференциальных уравнений; и так как групповое свойство выполнено, они образуют «бесконечную группу инфинитезимальных преобразований» по определению Ли (*Grundlagen*, §10).

Обратное утверждение получается теперь подобно случаю конечной группы. Существование зависимостей (16) умножением на  $p^{(\lambda)}(x)$  и сложением посредством тождественного преобразования (14) приводит к

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } \Gamma;$$

и отсюда, как в §3, следует определение  $\Delta x$  и  $\Delta u$  и инвариантность  $I$  относительно этих инфинитезимальных преобразований, которые действительно линейно зависят от  $\rho$  произвольных функций и их производных вплоть до  $\sigma$ -го порядка. То, что эти инфинитезимальные преобразования, если они не содержат производных  $\partial u/\partial x, \dots$ , наверняка образуют группу, следует, как в §3, из того, что иначе при композиции появилось бы больше произвольных функций, тогда как по предположению должно быть только  $\rho$  зависимостей (16); значит, они образуют «бесконечную группу инфинитезимальных преобразований». Такая группа (*Grundlagen*, теорема

VII, с. 391) состоит из наиболее общих инфинитезимальных преобразований некоторой тем самым определенной в смысле Ли «бесконечной группы  $\mathfrak{G}$  конечных преобразований». Каждое конечное преобразование при этом порождается из инфинитезимальных (*Grundlagen*, §7),<sup>18</sup> то есть возникает интегрированием одновременной системы:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v \end{array} \right\} \quad \text{при } t = 0,$$

причем может быть необходимо считать произвольные  $p(x)$  еще зависящими от  $t$ . Следовательно,  $\mathfrak{G}$  действительно зависит от  $\rho$  произвольных функций; если, в частности, достаточно считать  $p(x)$  независимыми от  $t$ , то эта зависимость является аналитической по произвольным функциям  $q(x) = t \cdot p(x)$ .<sup>19</sup> Если появляются производные  $\partial u / \partial x, \dots$ , то может быть необходимо еще добавить инфинитезимальные преобразования  $\bar{\delta}u = 0$ ,  $\text{Div}(f \Delta x) = 0$ , прежде чем делать те же выводы.

В связи с примером Ли (*Grundlagen*, §7) укажем еще довольно общий случай, где можно дойти до явных формул, одновременно показывающих, что производные произвольных функций входят вплоть до  $\sigma$ -го порядка; здесь обратное утверждение тем самым полно. Это такие группы инфинитезимальных преобразований, которым соответствует группа всех преобразований  $x$  и тем самым «индуцированных» преобразований  $u$ , то есть таких преобразований  $u$ , при которых  $\Delta u$ , а следовательно и  $u$ , зависят только от произвольных функций, входящих в  $\Delta x$ ; при этом еще предполагается, что производные  $\partial u / \partial x, \dots$  в  $\Delta u$  не входят. Итак:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x), \quad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^n \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u) p^{(\lambda)} + b_i^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Так как инфинитезимальное преобразование  $\Delta x = p(x)$  порождает всякое преобразование  $x = y + g(y)$  с произвольным  $g(y)$ , можно, в частности, определить  $p(x)$  зависящей от  $t$  так, чтобы порождалась однопараметрическая группа:

$$x_i = y_i + t g_i(y), \quad (18)$$

которая при  $t = 0$  переходит в тождество, а при  $t = 1$  в искомое  $x = y + g(y)$ . Дифференцированием (18) действительно получается:

$$\frac{dx_i}{dt} = g_i(y) = p^{(i)}(x, t), \quad (19)$$

где  $p(x, t)$  определяется из  $g(y)$  обращением (18); и обратно, (18) возникает из (19) посредством побочного условия  $x_i = y_i$  при  $t = 0$ , которым интеграл однозначно фиксируется. Посредством (18) в  $\Delta u$  можно заменить  $x$  интеграционными постоянными  $y$  и  $t$ ; при этом  $g(y)$  входят точно вплоть до  $\sigma$ -й производной, поскольку в

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x}$$

$\partial y / \partial x$  выражаются через  $\partial x / \partial y$ , а вообще  $\partial^\sigma p / \partial x^\sigma$  заменяется своим значением в

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \dots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

Для определения  $u$  получается поэтому система уравнений:

$$\frac{du_i}{dt} = F_i \left( g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t \right), \quad (u_i = v_i \text{ при } t = 0),$$

<sup>18</sup>Отсюда, в частности, следует, что группа  $\mathfrak{G}$ , порожденная инфинитезимальными преобразованиями  $\Delta x, \Delta u$  группы  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ , снова приводит к  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ . Ведь  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$  не содержит инфинитезимальных преобразований, зависящих от произвольных функций и отличных от  $\Delta x, \Delta u$ , и не может содержать независимых от них, зависящих от параметров, иначе она была бы смешанной группой. Но, согласно сказанному выше, конечные преобразования определены инфинитезимальными.

<sup>19</sup>Вопрос, всегда ли наступает этот последний случай, был поставлен Ли в другой формулировке (*Grundlagen*, §7 и конец §13).

в которой переменными являются только  $t$  и  $u$ , а  $g(y), \dots$  принадлежат области коэффициентов, так что интегрирование дает:

$$u_i = v_i + B_i \left( v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t \right)_{t=1},$$

то есть преобразования, зависящие ровно от  $\sigma$  производных произвольных функций. Тожество содержится в них по (18) при  $g(y) = 0$ ; а групповое свойство следует из того, что указанная процедура дает всякое преобразование  $x = y + g(y)$ , благодаря чему индуцированное преобразование  $u$  однозначно фиксируется и группа  $\mathfrak{G}$  исчерпывается.

Из обратного утверждения попутно следует еще, что не является ограничением считать произвольные функции зависящими только от  $x$ , а не от  $u, \partial u / \partial x, \dots$ . В последнем случае в тождественном преобразовании (14), а значит и в (15), кроме  $p^{(\lambda)}$ , появились бы еще  $\partial p^{(\lambda)} / \partial u, \partial p^{(\lambda)} / \partial (\partial u / \partial x), \dots$ . Если теперь последовательно брать  $p^{(\lambda)}$  как функции нулевой, первой,  $\dots$ , степени по  $u, \partial u / \partial x, \dots$ , с произвольными функциями от  $x$  в качестве коэффициентов, снова получаются зависимости (16), только в большем числе; но они по приведенному выше обратному утверждению путем объединения с произвольными функциями, зависящими только от  $x$ , возвращают к прежнему случаю. Так же показывают, что одновременному появлению зависимостей и независимых от них дивергентных соотношений соответствуют смешанные группы.<sup>20</sup>

## §5. Инвариантность отдельных составных частей соотношений

Если специализировать группу  $\mathfrak{G}$  к простейшему, обычно рассматриваемому случаю так, что в преобразованиях не допускаются производные  $u$ , а преобразованные независимые переменные зависят только от  $x$ , а не от  $u$ , то можно делать выводы об инвариантности отдельных составных частей в формулах. Сначала по известным рассуждениям получается инвариантность

$$\int \dots \int \left( \sum_i \psi_i \delta u_i \right) dx,$$

то есть относительная инвариантность  $\sum_i \psi_i \delta u_i$ , где под  $\delta$  понимается какая-либо вариация. В самом деле, с одной стороны:

$$\delta I = \int \dots \int \delta f \left( x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx = \int \dots \int \delta f \left( y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots \right) dy,$$

<sup>20</sup>Как в §3, из обратного утверждения и здесь следует, что наряду с  $I$  всякий интеграл  $I^*$ , отличающийся на интеграл от дивергенции, также допускает бесконечную группу с теми же  $\delta u$ , причем  $\Delta x$  и  $\Delta u$  вообще будут содержать производные  $u$ . Такой интеграл  $I^*$  Эйнштейн ввел в общую теорию относительности, чтобы получить более простую форму законов энергии; я указываю инфинитезимальные преобразования, которые допускает этот  $I^*$ , точно придерживаясь обозначений второй заметки Клейна. Интеграл  $I = \int \dots \int K d\omega = \int \dots \int \mathfrak{R} dS$  допускает группу всех преобразований  $w$  и индуцированную ею группу для  $g_{\mu\nu}$ ; этому соответствуют зависимости ((30) у Клейна):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} + 2 \sum \frac{\partial g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} \mathfrak{R}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Теперь  $I^* = \int \dots \int \mathfrak{R}^* dS$ , где  $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \text{Div}$ , и следовательно  $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^* = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ , где  $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$  каждый раз обозначают лагранжевы выражения. Указанные зависимости поэтому являются также зависимостями для  $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*$ ; и после умножения на  $p^\tau$  и сложения обратными преобразованиями дифференцирования произведения получается:

$$\begin{aligned} \sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2 \text{Div} \left( \sum g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau \right) &= 0, \\ \delta \mathfrak{R}^* + \text{Div} \left( \sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right) &= 0. \end{aligned}$$

Сравнением с дифференциальным уравнением Ли  $\delta \mathfrak{R}^* + \text{Div}(\mathfrak{R}^* \Delta w) = 0$  отсюда следует:

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{R}^*} \left( \sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right), \quad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g_{\sigma}^{\mu\nu} \Delta w^\sigma,$$

как инфинитезимальные преобразования, допускаемые  $I^*$ . Эти инфинитезимальные преобразования, следовательно, зависят от первых и вторых производных  $g^{\mu\nu}$  и содержат произвольные  $p$  вплоть до первой производной.

с другой стороны, для исчезающих на границе  $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$ , которым вследствие линейного однородного преобразования  $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$  соответствуют также исчезающие на границе  $\delta v, \delta(\partial v/\partial y), \dots$ :

$$\begin{aligned}\int \cdots \int \delta f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx, \\ \int \cdots \int \delta f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) dy;\end{aligned}$$

следовательно, для исчезающих на границе  $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$ :

$$\begin{aligned}\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) dy \\ &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right| dx.\end{aligned}$$

Если в третьем интеграле выразить  $y, v, \delta v$  через  $x, u, \delta u$  и приравнять его первому, получаем соотношение

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \chi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx = 0$$

для исчезающей на границе, а в остальном произвольной  $\delta u$ ; отсюда, как известно, следует исчезновение интегранда для произвольной  $\delta u$ . Значит, тождественно по  $\delta u$  справедливо соотношение:

$$\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i = \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right| \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right),$$

которое выражает относительную инвариантность  $\sum_i \psi_i \delta u_i$  и, следовательно, инвариантность

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i\right) dx.$$

21

Чтобы применить это к выведенным дивергентным соотношениям и зависимостям, нужно сначала доказать, что  $\bar{\delta}u$ , полученное из  $\Delta u, \Delta x$ , действительно удовлетворяет законам преобразования для вариации  $\delta u$ , если только параметры, соответственно произвольные функции в  $\bar{\delta}v$ , определены так, как они соответствуют подобной группе инфинитезимальных преобразований в  $y, v$ . Обозначим через  $T_q$  преобразование, переводящее  $x, u$  в  $y, v$ , через  $T_p$  — инфинитезимальное в  $x, u$ ; тогда подобное ему в  $y, v$  задается  $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$ , где параметры, соответственно произвольные функции  $r$ , определяются из  $p$  и  $q$ . В формулах это выражается так:

$$\begin{aligned}T_p : \xi &= x + \Delta x(x, p), & u^* &= u + \Delta u(x, u, p); \\ T_q : y &= A(x, q), & v &= B(x, u, q);\end{aligned}$$

<sup>21</sup>Эти выводы не работают, если  $y$  также зависит от  $u$ , потому что тогда  $\delta f(y, v, \partial v/\partial y, \dots)$  содержит и члены  $\sum (\partial f/\partial y) \delta y$ , так что дивергентное преобразование не приводит к лагранжевым выражениям; так же если допустить производные  $u$ , поскольку тогда  $\delta v$  становятся линейными комбинациями  $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$  и лишь после еще одного дивергентного преобразования приводят к тождеству  $\int \cdots \int (\sum \chi_i(u, \dots) \delta u_i) dx = 0$ , так что справа снова не появляются лагранжевы выражения. Вопрос, можно ли из инвариантности  $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$  уже заключить о существовании дивергентных соотношений, по обратному утверждению равносильно вопросу, можно ли отсюда заключить об инвариантности  $I$  относительно группы, которая не обязательно приводит к тем же  $\Delta u, \Delta x$ , но приводит к тем же  $\bar{\delta}u$ . В специальном случае простого интеграла и только первых производных в  $f$ , для конечной группы из инвариантности лагранжевых выражений можно заключить о существовании первых интегралов (см., например, Энгель, Gött. Nachr. 1916, с. 270).



$$T_q T_p : \eta = A(x + \Delta x(x, p), q), \quad v^* = B(x + \Delta x(p), u + \Delta u(p), q).$$

Но отсюда возникает  $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$ , то есть

$$\eta = y + \Delta y(r), \quad v^* = v + \Delta v(r),$$

если посредством обращения  $T_q$  рассматривать  $x$  как функции от  $y$  и учитывать только инфинитезимальные члены; следовательно, имеем тождество:

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x, q)}{\partial x} \Delta x(p), \quad (20a)$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \Delta u(p). \quad (20b)$$

Если в этих формулах заменить  $\xi = x + \Delta x$  на  $\xi - \Delta \xi$ , так что  $\xi$  снова переходит в  $x$ , а значит  $\Delta x$  исчезает, то по первой формуле (20) и  $\eta$  снова переходит в  $y = \eta - \Delta \eta$ ; если этой подстановкой  $\Delta u(p)$  переходит в  $\bar{\delta} u(p)$ , то и  $\Delta v(r)$  переходит в  $\bar{\delta} v(r)$ , и вторая формула (20) дает:

$$v + \bar{\delta} v(y, v, \dots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \bar{\delta} u(p),$$

$$\bar{\delta} v(y, v, \dots, r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\kappa} \bar{\delta} u_\kappa(x, u, p),$$

так что действительно выполнены формулы преобразования для вариаций, если только  $\bar{\delta} v$  считать зависящим от параметров, соответственно произвольных функций  $r$ .<sup>22</sup>

Следовательно, в частности, получается относительная инвариантность  $\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i$ ; поэтому также по (12), так как дивергентные соотношения выполнены и в  $y, v$ , относительная инвариантность  $\text{Div } B$ ; и далее по (14) и (13) относительная инвариантность  $\text{Div } \Gamma$  и левых частей зависимостей, собранных с помощью  $p^{(\lambda)}$ , причем в преобразованных формулах произвольные  $p(x)$  (соответственно параметры) всегда нужно заменять на  $r$ . Отсюда еще получается относительная инвариантность  $\text{Div}(B - \Gamma)$ , то есть дивергенции нетождественно исчезающей системы функций  $B - \Gamma$ , дивергенция которой тождественно исчезает.

Из относительной инвариантности  $\text{Div } B$  в одномерном случае и при конечной группе можно еще заключить об инвариантности первых интегралов. Соответствующее инфинитезимальному преобразованию преобразование параметров по (20) становится линейным и однородным; а вследствие обратимости всех преобразований и  $\varepsilon$  становятся линейными и однородными по преобразованным параметрам  $\varepsilon^*$ . Эта обратимость надежно сохраняется, если положить  $\psi = 0$ , потому что в (20) не входят производные  $u$ . Приравнявая коэффициенты при  $\varepsilon^*$  в

$$\text{Div } B(x, u, \dots, \varepsilon) = \frac{dy}{dx} \text{Div } B(y, v, \dots, \varepsilon^*)$$

получаем, что и  $\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots)$  являются линейными однородными функциями от  $\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots)$ ; так что из

$$\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots) = 0 \quad \text{или} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

следует также:

$$\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots) = 0 \quad \text{или} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$$

Следовательно,  $\rho$  первых интегралов, соответствующих  $\mathfrak{G}_\rho$ , каждый допускает группу, так что дальнейшее интегрирование также упрощается. Простейший пример здесь состоит в том, что  $f$  свободна от  $x$  или от некоторого  $u$ , чему соответствуют инфинитезимальные преобразования  $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$  соответственно  $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$ . Тогда  $\bar{\delta} u = -\varepsilon du/dx$  соответственно  $\varepsilon$ , и так как  $B$  выводится из  $f$  и  $\bar{\delta} u$  дифференцированием и рациональными соединениями, оно также свободно от  $x$  соответственно  $u$  и допускает соответствующие группы.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Снова видно, что для справедливости выводов нужно считать  $y$  независимым от  $u$  и т. д. В качестве примера можно назвать указанные Клейном  $\delta g^{\mu\nu}$  и  $\delta q_\sigma$ , которые удовлетворяют преобразованиям для вариаций, если  $p$  подчинены векторному преобразованию.

<sup>23</sup>В тех случаях, где уже из инвариантности  $\int (\sum \psi_i \bar{\delta} u_i) dx$  следует существование первых интегралов, эти интегралы не

## §6. Утверждение Гильберта

Из предыдущего наконец получается доказательство утверждения Гильберта о связи отказа собственных законов энергии с «общей относительностью» (первая заметка Клейна, Göttinger Nachr. 1917, ответ, 1-й абзац), причем в обобщенной группово-теоретической форме.

Пусть интеграл  $I$  допускает  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ , а  $\mathfrak{G}_\sigma$  есть какая-либо конечная группа, возникающая специализацией произвольных функций, то есть подгруппа  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ . Бесконечной группе  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$  тогда соответствуют зависимости (16), конечной  $\mathfrak{G}_\sigma$  — дивергентные соотношения (13); и наоборот, из существования каких-либо дивергентных соотношений следует инвариантность  $I$  относительно конечной группы, которая тогда и только тогда совпадает с  $\mathfrak{G}_\sigma$ , когда  $\bar{\delta}u$  являются линейными комбинациями тех, что получаются из  $\mathfrak{G}_\sigma$ . Инвариантность относительно  $\mathfrak{G}_\sigma$ , следовательно, не может вести ни к каким дивергентным соотношениям, отличным от (13). Но так как из существования (16) следует инвариантность  $I$  относительно инфинитезимальных преобразований  $\Delta u, \Delta x$  группы  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$  при произвольном  $p(x)$ , отсюда, в частности, уже следует инвариантность относительно возникающих специализацией инфинитезимальных преобразований  $\mathfrak{G}_\sigma$ , а значит и относительно  $\mathfrak{G}_\sigma$ . Поэтому дивергентные соотношения

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)} = \text{Div } B^{(\lambda)}$$

должны быть следствиями зависимостей (16), которые можно также записать как

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \text{Div } \chi^{(\lambda)},$$

где  $\chi^{(\lambda)}$  являются линейными комбинациями лагранжевых выражений и их производных. Так как  $\psi$  входят линейно и в (13), и в (16), дивергентные соотношения, следовательно, в частности должны быть линейными комбинациями зависимостей (16); поэтому

$$\text{Div } B^{(\lambda)} = \text{Div} \left( \sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)} \right);$$

а сами  $B^{(\lambda)}$  поэтому линейно составляются из  $\chi$ , то есть из лагранжевых выражений и их производных, и из функций, дивергенция которых тождественно исчезает, как, например, появляющиеся в конце §2  $B - \Gamma$ , для которых  $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$  и где дивергенция одновременно обладает свойством инвариантности. Дивергентные соотношения, в которых  $B^{(\lambda)}$  можно составить из лагранжевых выражений и их производных указанным образом, я буду называть «несобственными», а все остальные — «собственными».

Обратно, если дивергентные соотношения являются линейными комбинациями зависимостей (16), то есть «несобственными», то инвариантность относительно  $\mathfrak{G}_\sigma$  следует из инвариантности относительно  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ ;  $\mathfrak{G}_\sigma$  становится подгруппой  $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ . Следовательно, соответствующие конечной группе  $\mathfrak{G}_\sigma$  дивергентные соотношения становятся несобственными тогда и только тогда, когда  $\mathfrak{G}_\sigma$  является подгруппой бесконечной группы, относительно которой  $I$  инвариантен.

Специализацией групп отсюда получается первоначальное утверждение Гильберта. Под «группой сдвигов» будем понимать конечную группу:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \quad v_i(y) = u_i(x);$$

то есть:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \quad \Delta u_i = 0, \quad \bar{\delta} u_i = - \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \varepsilon_\lambda.$$

допускают полной группы  $\mathfrak{G}_\rho$ ; например,  $\int (u'' \delta u) dx$  допускает инфинитезимальное преобразование  $\Delta x = \varepsilon_2, \Delta u = \varepsilon_1 + x \varepsilon_3$ , тогда как первый интеграл  $u - u'x = \text{const.}$ , соответствующий  $\Delta x = 0, \Delta u = x \varepsilon_3$ , не допускает двух других инфинитезимальных преобразований, поскольку явно содержит  $u$ , и  $x$ . Этому первому интегралу как раз соответствуют инфинитезимальные преобразования для  $f$ , содержащие производные. Поэтому видно, что инвариантность  $\int \dots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$  во всяком случае дает меньше, чем инвариантность  $I$ , что следует отметить по поводу вопроса, поставленного в предыдущем примечании.

Инвариантность относительно группы сдвигов, как известно, означает, что в

$$I = \int \cdots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx$$

$x$  не входят явно в  $f$ . Соответствующие  $n$  дивергентных соотношений

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \text{Div } B^{(\lambda)} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

будем называть «энергетическими соотношениями», поскольку соответствующие вариационной задаче «законы сохранения»  $\text{Div } B^{(\lambda)} = 0$  соответствуют «законам энергии», а  $B^{(\lambda)}$  — «энергетическим компонентам». Итак: если  $I$  допускает группу сдвигов, то энергетические соотношения становятся несобственными тогда и только тогда, когда  $I$  инвариантен относительно бесконечной группы, содержащей группу сдвигов как подгруппу.<sup>24</sup>

Пример таких бесконечных групп дается группой всех преобразований  $x$  и таких индуцированных преобразований  $u(x)$ , в которых входят только производные произвольных функций  $p(x)$ ; группа сдвигов возникает специализацией  $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$ . Однако должно остаться нерешенным, заданы ли этим, вместе с группами, возникающими при изменении  $I$  на граничный интеграл, уже наиболее общие такие группы. Индуцированные преобразования указанного типа возникают, например, если подчинить  $u$  преобразованиям коэффициентов «тотальной дифференциальной формы», то есть формы

$$\sum a \, d^2 x_i + \sum b \, dx_i dx_k + \cdots,$$

которая кроме  $dx$  содержит еще высшие дифференциалы; более специальные индуцированные преобразования, где  $p(x)$  входят только в первой производной, задаются преобразованиями коэффициентов обыкновенных дифференциальных форм  $\sum c \, dx_{i_1} \cdots dx_{i_\lambda}$ , и именно их обычно рассматривали.

Еще одна группа указанного типа, которая из-за присутствия логарифмического члена не может быть преобразованием коэффициентов, например следующая:

$$\begin{aligned} y &= x + p(x), & v_i &= u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{dy}{dx}; \\ \Delta x &= p(x), & \Delta u_i &= p'(x), & \bar{\delta} u_i &= p'(x) - u'_i p(x). \end{aligned}$$

Зависимости (16) здесь становятся:

$$\sum_i \left( \psi_i u'_i + \frac{d\psi_i}{dx} \right) = 0,$$

а несобственные энергетические соотношения:

$$\sum_i \left( \psi_i u'_i + \frac{d(\psi_i + \text{const.})}{dx} \right) = 0.$$

Простейший инвариантный интеграл группы:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u'_1 - u'_2} dx.$$

Наиболее общий  $I$  определяется интегрированием дифференциального уравнения Ли (11):

$$\bar{\delta} f + \frac{d}{dx}(f \cdot \Delta x) = 0,$$

<sup>24</sup>Законы энергии классической механики, а также старой «теории относительности» (где  $\sum dx^2$  переходит в себя), являются «собственными», поскольку здесь не появляются бесконечные группы.

которое после подстановки значений для  $\Delta x$  и  $\bar{\delta}u$ , если считать  $f$  зависящей только от первых производных  $u$ , переходит в

$$\frac{\partial f}{\partial x}p(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} u'_i + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \right\} p''(x) = 0$$

(тождественно по  $p(x), p'(x), p''(x)$ ). Эта система уравнений уже для двух функций  $u(x)$  имеет решения, действительно содержащие производные, именно:

$$f = (u'_1 - u'_2) \Phi \left( u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u'_1 - u'_2} \right),$$

где  $\Phi$  обозначает произвольную функцию указанных аргументов.

Гильберт формулирует свое утверждение так: отказ собственных законов энергии является характерным признаком «общей теории относительности». Чтобы это утверждение было буквально верным, название «общая относительность» следует понимать шире, чем обычно, и распространять также на предшествующие группы, зависящие от  $n$  произвольных функций.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Этим снова подтверждается правильность замечания Клейна, что обычное в физике название «относительность» следует заменить на «инвариантность относительно группы». (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* т. 19, с. 287, 1910; перепечатано в *Phys. Zeitschrift.*)

## 14. Арифметическая теория алгебраических функций одной переменной в её связи с остальными теориями и с теорией числовых полей

*Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* 38 (1919), с. 182–203

Следующий обзор возник из желания иметь связующее звено между отдельными теориями алгебраических функций; вместе с тем его можно рассматривать как дополнение к обзору Брилля–Нётер<sup>1</sup>, в котором рассмотрение арифметической теории по существу отсутствует.<sup>2</sup>

Помимо Брилля–Нётер, при обзоре отдельных теорий следует учитывать следующие энциклопедические статьи вместе с указанной там литературой:

для теории Римана: Виртингер (II В 2), № 1–19;

для теории Вейерштрасса: Виртингер (II В 2), № 23, 32, 33, 34;

для алгебраико-геометрической теории Брилля–Нётер: Виртингер (II В 2), № 21–31; Берцолари (III С 4), № 23–38;

для арифметической теории Дедекинда–Вебера и Гензеля–Ландсберга: Гензель (II С 5), [далее цитируется как Гензель]<sup>3</sup>;

в более общем виде, для арифметической теории алгебраических элементов: Ландсберг (I С 5), а для арифметической теории алгебраических функций нескольких переменных: Юнг (II С 6).

Для теории числовых полей ср. «Zahlbericht» Гильберта<sup>4</sup> и лекции по теории чисел Дирихле–Дедекинда [далее цитируется как Дедекинд–теория чисел].<sup>5</sup>

### Содержание

1. Основания различных теорий.
2. Параллелизм между алгебраическими числами и алгебраическими функциями (сопряжённые элементы, теоремы о базисе, понятие модуля).
3. Параллелизм и различия в теории идеалов алгебраических чисел и функций.
4. Связь арифметического обоснования разложения в ряды с теорией идеалов.
5. Сравнение арифметической теории алгебраических функций с геометрической теорией. Различное понятие инвариантности.
6. Продолжение сравнения. Особые точки.
7. Сравнение между теоремой об остатке и теоремами теории идеалов.
8. Трансцендентные вопросы для алгебраических функций и алгебраических чисел.

### 1. Основания различных теорий

Теория Римана является единственной чисто трансцендентной теорией, основанной на теоремах существования (принцип Дирихле, методы Шварца–Неймана). Интегралы алгебраических функций здесь первичны, сами алгебраические функции вторичны. Функции на римановой поверхности характеризуются своими нулями и полюсами; это соответствует полигонам (соответственно дивизорам) арифметической теории, тогда как Вейерштрасс говорит также о самих функциях

<sup>1</sup>*Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* т. 3 (1894) [далее цитируется как Бриль–Нётер].

<sup>2</sup>За исключением обсуждения исследования Кронекера о дискриминанте. (*J. f. M.* т. 91.)

<sup>3</sup>Части, относящиеся к Дедекинду–Веберу, принадлежат А. Островскому.

<sup>4</sup>*Die Theorie der algebraischen Zahlkörper. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* т. 4 (1894/95).

<sup>5</sup>Брауншвейг, Vieweg, 4-е изд., 1894.

вместе с их нулями и полюсами. Главная задача, помимо теорем существования, состоит в построении всех функций с заданными полюсами; это выполняется с помощью интегралов первого и второго рода. Далее возникает вопрос о числе произвольных постоянных, которые ещё входят при заданных бесконечных точках. На этот последний вопрос отвечает теорема Римана–Роха; в арифметической теории ему соответствует вопрос о размерности класса полигонов (соответственно класса дивизоров), а в алгебраико-геометрической теории — вопрос о размерности полной линейной системы, ответ на который также даёт теорема Римана–Роха. В арифметической теории фактическое построение функций осуществляется посредством теорем о базисе; в алгебраико-геометрической теории — посредством теоремы об остатке. В частности, нулям подынтегральных функций первого рода соответствует дифференциальный класс в арифметической теории, а в алгебраико-геометрической теории — учение о специальных группах, то есть о системе групп точек, высеканной адьюнктными кривыми порядка  $(n - 3)$ ,  $\varphi$ -кривыми.

Как риманова теория исторически предшествовала остальным теориям, хотя строгое доказательство теорем существования было получено лишь позднее, так и позднее с помощью её трансцендентных средств были решены алгебраические вопросы, которые до сих пор недоступны чисто алгебраическому или арифметическому рассмотрению; прежде всего здесь следует упомянуть теорию особых соответствий Гурвица.<sup>6</sup>

Аналогии с трансцендентными постановками вопросов в теории алгебраических числовых полей обсуждаются в последнем пункте.

Для остальных теорий первичны алгебраические функции, а интегралы вторичны. При этом теория Вейерштрасса опирается на трансцендентные основания разложения в степенные ряды и теоремы о вычетах; затем, однако, она развивается алгебраически, через явное указание всех рассматриваемых функций.

Арифметическая теория в изложении Гензеля–Ландсберга также использует трансцендентные основания разложения в ряды. Но, сопоставляя на этой основе отдельным точкам дивизоры, она затем идёт чисто арифметическим путём и потому может рассматриваться как слияние Вейерштрасса и Дедекинда–Вебера. В отличие от последних, она одновременно даёт методы фактического построения всех рассматриваемых базисных функций. В деталях она имеет ряд упрощений по сравнению с Дедекиндом–Вебером, главным образом за счёт введения «дробных» дивизоров. Недавно Гензель<sup>7</sup> арифметически обосновал теорию разложения в ряды (за исключением метода мажорант для доказательства сходимости), благодаря чему теория стала почти чисто арифметической.

Алгебраико-геометрическая теория Бриллю–Нётер предполагает лишь понятие «бесконечно близких точек» одной ветви, которое сводится к разложению в ряд в обыкновенной точке<sup>8</sup> и соответствует вейерштрассову понятию элемента; затем она работает алгебраико-рациональными методами, по существу методами тернарной теории исключения, и также доходит до явных представлений.

Первоначальная, чисто арифметическая теория Дедекинда–Вебера<sup>9</sup> родственна римановой постольку, поскольку её утверждения снова имеют характер доказательств существования; она сохраняет полную чистоту метода.<sup>10</sup> Арифметическое обоснование теории, где переменные играют лишь роль неопределённых, идёт параллельно теории алгебраических чисел, как будет подробнее объяснено в п. 2.<sup>11</sup> Это обоснование даёт средство арифметически ввести понятие точки (ср.

<sup>6</sup>A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* т. 28. (Ср. Бриллю–Нётер, раздел 10.)

<sup>7</sup>*Mathematische Zeitschrift* т. 4; это обоснование положено также в основу его обзора.

<sup>8</sup>Для бесконечно близких «особых» точек ср. Бриллю–Нётер, раздел 6, особенно № 10 и 11. Обыкновенные бесконечно близкие точки — это, например, точки пересечения касательной с кривой или точки касания более высокого порядка (точки ветвления).

<sup>9</sup>*J. f. M.* 92 (цитируется как Д.–В.).

<sup>10</sup>По этой причине она также более пригодна для сравнения с остальными теориями, чем, например, теория Гензеля–Ландсберга, которая лишь изредка будет появляться в следующих сравнениях. — Теория абелевых интегралов и их обращения, однако, насколько она предполагает непрерывность, у Д.–В. и также в дальнейшем развитии алгебраической теории (M. Noether, *Ann.* 37) не рассматривается.

<sup>11</sup>Сравнение теории Гензеля–Ландсберга с теорией чисел, в частности с теорией  $p$ -адических чисел, имеется у Гензеля.

Гензель, № 10a) и тем самым построить понятие абсолютной римановой поверхности без каких-либо соображений непрерывности. Теория вследствие этого получает формальный характер; например, понятие дифференциала также вводится чисто формально. На основании, полученном через понятие точки, можно установить близкое родство с методами и понятиями алгебраико-геометрической теории, которая, если не считать понятия элемента, также свободна от трансцендентных средств; это будет сделано в следующих пунктах.

## 2. Параллелизм между алгебраическими числами и алгебраическими функциями. (Сопряжённые элементы, теоремы о базисе, понятие модуля)

Алгебраическое числовое поле определяется как поле  $n$ -й степени над полем  $R$  рациональных чисел; поле алгебраических функций одной переменной — как поле  $n$ -й степени над полем  $K(z)$  всех рациональных функций одной неопределённой  $z$  с произвольными комплексными коэффициентами. Следовательно, для обоих полей совместно верны все теоремы, полностью отвлекающиеся от специальной природы основного поля; это теоремы о базисе, нормах, следах и дискриминантах.<sup>12</sup> Все эти понятия у Дедекинда–Вебера вводятся без использования сопряжённых элементов. Однако следует заметить, что понятие сопряжённого поля можно определить совершенно формально, как показал Штейниц, опираясь на Кронекера.<sup>13</sup> Действительно, если  $K$  — произвольное поле, а  $\varphi(x)$  — неприводимый над  $K$  многочлен от  $x$ , то система классов вычетов по модулю  $\varphi(x)$  образует поле. Если классу вычетов  $x$  поставить в соответствие элемент  $\xi$ , то при изоморфном сопоставлении классу вычетов, представленному многочленом  $f(x)$ , соответствует элемент  $f(\xi)$ . Поскольку все многочлены, делящиеся на  $\varphi(x)$ , представляют нулевой класс вычетов,  $\varphi(\xi)$  сопоставляется нулевому классу; следовательно, элемент  $\xi$  можно символически рассматривать как корень уравнения  $\varphi(x) = 0$ , и он порождает алгебраическое поле  $K(\xi)$ . Повторение процедуры приводит к  $n$  сопряжённым полям  $K(\xi), K(\xi'), \dots, K(\xi^{(n-1)})$ . Значит, в частности и для алгебраических функций можно говорить о сопряжённых элементах, не покидая чисто арифметической теории.

Два основных поля  $R$  и  $K(z)$  обладают общим свойством: в них определена система всех целых элементов, соответственно целых рациональных чисел и целых рациональных функций одной неопределённой. Эти целые элементы имеют характерное свойство: любые два  $a$  и  $b$  имеют наибольший общий делитель  $d$ , представимый в форме  $ma + nb$ , где  $d, m, n$  также являются целыми элементами из  $R$  соответственно  $K(z)$ ; при этом  $d$  есть абсолютно наименьшее число соответственно многочлен наименьшей степени, представимый в такой форме. Только на этом свойстве, влекущем единственность разложения на простые множители для целых рациональных чисел соответственно функций одной неопределённой, основаны теоремы о целых элементах алгебраического поля или надполя. Рассуждение, доказывающее существование наибольшего общего делителя, даёт также существование фундаментальной системы, или базиса, целых элементов алгебраического поля. В самом деле, если рассматривать только такие базисы поля, которые состоят из целых элементов, то их дискриминант является целым рациональным числом соответственно целой рациональной функцией одной неопределённой. Каждый базис, отвечающий абсолютно наименьшему числу или функции наименьшей степени, образует фундаментальную систему.

Более точное понимание вопросов базиса, также для более общих полей, даёт введение понятия модуля, которое следует сформулировать так, чтобы оно охватывало различные определения, встречающиеся в литературе в зависимости от природы элементов. Модулем — относительно основной области целостности  $\mathfrak{S}$  — называется система элементов такая, что разность двух элементов снова принадлежит системе, равно как и произведение элемента на произвольный элемент из  $\mathfrak{S}$ . (Если  $\mathfrak{S}$  состоит из целых рациональных чисел, то второе требование следует из первого.)<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Д.–В., § 1 и 2; Гензель, № 4 (с примечанием 5).

<sup>13</sup> Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*. (*J. f. M.* 137, § 6 и 8.)

<sup>14</sup> Понятие модуля восходит к Дедекинду, который впервые ввёл числовой модуль ( $\mathfrak{S}$  = целые рациональные числа) во 2-м изд. «Теории чисел»; модуль из целочисленных линейных форм здесь также содержится неявно. У Дедекинда–Вебера

Каждый модуль, имеющий базис из конечного числа элементов, через которые каждый элемент линейно представим с коэффициентами из  $\mathfrak{S}$ , называется конечным (конечнопорождённым); в частности, каждый однопорождённый модуль имеет вид  $s \cdot \alpha$ , где  $\alpha$  обозначает базисный элемент, а  $s$  пробегает все элементы из  $\mathfrak{S}$ . Модуль, элементы которого сами принадлежат  $\mathfrak{S}$ , называется идеалом в  $\mathfrak{S}$ ; отсюда следует понятие конечного идеала, в частности однопорождённого (главного идеала).

Все теоремы о базисе для целых элементов и идеалов основаны на следующей теореме:

*Если  $M$  — модуль относительно  $\mathfrak{S}$ , элементы которого являются линейными формами от  $n$  неопределённых с коэффициентами из  $\mathfrak{S}$ , и если каждый идеал в  $\mathfrak{S}$  конечен, то  $M$  также конечный модуль. Если, в частности, каждый идеал в  $\mathfrak{S}$  главный, то  $M$  имеет базис из линейно независимых форм.<sup>15</sup>*

В самом деле, если элементы  $M$  заданы как  $l(x) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$ , то совокупность коэффициентов  $a_1$  пробегает идеал в  $\mathfrak{S}$ , который по предположению имеет вид  $b_1a^{(1)} + \dots + b_\rho a^{(\rho)}$ . Принадлежащая  $M$  линейная форма

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \dots - b_\rho l^{(\rho)}(x)$$

поэтому зависит только от  $(n - 1)$  неопределённых; отсюда конечным повторением следует утверждение. Если каждый раз  $\rho = 1$ , то базис состоит из  $n$  форм соответственно от  $n, n - 1, \dots, 1$  неопределённых, что даёт линейную независимость ненулевых форм.

Теорема о фундаментальной системе выводится отсюда в различных случаях следующим образом.

Пусть алгебраическое поле получается присоединением целого алгебраического элемента  $\delta$  к основному полю, и пусть  $\mathfrak{S}$  обозначает совокупность всех целых элементов основного поля. Тогда каждый целый элемент надполя допускает представление (ср., например, Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \dots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

где  $a_i$  — элементы из  $\mathfrak{S}$ , а  $\Delta(\delta)$  обозначает дискриминант  $\delta$ . Посредством подстановки

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

модуль всех целых элементов переходит в модуль линейных форм; следовательно, существование фундаментальной системы получается во всех случаях, когда каждый идеал в  $\mathfrak{S}$  конечен. То же рассуждение показывает, что в более общем виде каждый идеал в области целых элементов надполя конечен. В частности, для целых рациональных чисел соответственно функций одной неопределённой каждый идеал является главным; отсюда следует, что фундаментальные системы в алгебраических числовых полях соответственно в полях алгебраических функций одной переменной состоят ровно из  $n$  элементов, если  $n$  обозначает степень. И поскольку в этих полях, как сказано выше, каждый идеал конечен, отсюда одновременно получается фундаментальная система для относительных полей, которая в общем случае будет состоять из большего числа элементов, чем указывает относительная степень.<sup>16</sup> Далее, если  $\mathfrak{S}$  обозначает область всех многочленов от нескольких неопределённых, то в  $\mathfrak{S}$  каждый идеал также конечен;<sup>17</sup> значит, существование фундаментальной системы получается и для полей алгебраических функций нескольких неопределённых; она снова будет состоять из большего числа элементов, чем указывает степень.

появляются «модули функций», элементы которых состоят из алгебраических функций, тогда как  $\mathfrak{S}$  состоит из всех целых рациональных функций одной неопределённой. — Модуль из однородных форм от  $n$  неопределённых, в более общем виде из многочленов, впервые появляется у Гильберта (Annalen 36);  $\mathfrak{S}$  состоит из всех многочленов, и, поскольку сами элементы также являются многочленами, этот модуль подпадает под наше определение идеала. Кронекеровы «модульные системы» из многочленов исходят из базиса, а не из абстрактного определения.

<sup>15</sup>В литературе эта теорема появляется отдельно для различных областей коэффициентов  $\mathfrak{S}$ . Для целых рациональных чисел ср., например, Гильберт, Zahlbericht § 3 и 4; для многочленов от нескольких неопределённых: Гильберт, Über die vollen Invariantensysteme: конец § 2 (Math. Ann. 42).

<sup>16</sup>По исследованиям Штейница о модулях из линейных форм, где  $\mathfrak{S}$  состоит из целых чисел (конечного) алгебраического числового поля, достаточно  $\nu + 1$  базисных элементов, если  $\nu$  обозначает относительную степень (Math. Ann. 71, § 4).

<sup>17</sup>По гильбертовой теореме о базисе модуля (Math. Ann. 36). Модули из многочленов, которые здесь ради



### 3. Параллелизм и различия в теории идеалов алгебраических чисел и функций

Доказательство основной теоремы теории идеалов, что каждый идеал однозначно представим как произведение степеней простых идеалов, можно вести совместно для алгебраических чисел и функций, опираясь только на свойство, что для целых рациональных чисел соответственно функций одной неопределённой каждый идеал становится главным.<sup>18</sup> Главный пункт доказательства состоит в установлении того, что из делимости идеала  $c$  на идеал  $a$  (то есть каждый элемент  $c$  содержится в  $a$ ) следует произведительное представление  $c = ab$ .<sup>19</sup> У Гурвица это доказательство опирается на «расширенную теорему Гаусса», утверждающую, что если целый элемент  $\omega$ , который делит каждый коэффициент произведения двух многочленов  $\varphi$  и  $\psi$ , то он делит также произведение всех коэффициентов  $\varphi$  и  $\psi$ ; у Дедекинда — на эквивалентную ей модульную теорему.<sup>20</sup>

Далее совместно можно определить понятие комплементарного модуля (Гензель, № 12) и из него — идеал ветвления (основной идеал, дифференту)  $\mathfrak{D}$  (норма которого становится дискриминантом поля  $D$ ); и верна основная теорема, что идеал ветвления  $\mathfrak{D}$  есть *наибольший общий делитель всех главных идеалов*  $F'(\delta)$ , где  $\delta$  пробегает все целые элементы поля, а  $F(\delta) = 0$  каждый раз обозначает соответствующее неприводимое уравнение. Отсюда следует, что *дискриминант поля содержит все и только те рациональные простые числа соответственно линейные множители по  $z$ , которые делятся на квадрат простого идеала*. Для самого  $F'(\delta)$  получается представление

$$F'(\delta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D},$$

и при взятии норм

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

здесь  $\mathfrak{f}$  обозначает проводник кольца (порядка, области целостности), выведенного из  $\delta$ , то есть  $\mathfrak{f}$  состоит из совокупности (целых) элементов, которые после умножения на каждый целый элемент делятся на модуль  $[1, \delta, \dots, \delta^{n-1}]$ .  $R^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}$  представляет квадрат детерминанта подстановки, переводящей базис  $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$  в базис целых элементов.<sup>21</sup>

Различия в дальнейшем развитии обусловлены специальными свойствами основных полей. Так, в случае алгебраических чисел тот факт, что *элементы основного поля одновременно являются показателями*, приводит к тому, что идеал ветвления может делиться на степень простого идеала  $\mathfrak{p}$ , более высокую, чем  $(e - 1)$ -я, если  $\mathfrak{p}$  входит в  $p$  в  $e$ -й степени (именно когда  $e$  делится на  $p$ ); это ведёт к дальнейшим понятиям поля инерции и поля ветвления,<sup>22</sup> которые не имеют аналога в теории алгебраических функций. Но прежде всего вследствие *существования бесконечно многих постоянных* в основном поле для алгебраических функций отпадает конечность числа классов идеалов, а вместе с ней все вопросы, связанные с определением числа классов. Впрочем, в известном смысле область всех (трансцендентных) прайм-форм<sup>23</sup> можно

---

последовательности называются идеалами, обычно называются «модулями форм» или просто «модулями». И гильбертова теорема, что такой модуль  $N$  конечен, также сводится к теореме о линейных формах. Пусть  $f$  — многочлен  $n$ -й степени от  $r + 1$  неопределённых  $x_1, \dots, x_r, x_{r+1}$ , содержащийся в  $N$  и имеющий член  $x_{r+1}^n$  (этого всегда можно достичь линейным преобразованием). Тогда все многочлены из  $N$  по модулю  $f$  сравнимы с теми, которые представимы в виде  $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \dots + a_n(x)$ ; следовательно, посредством  $x_{r+1}^{n-i} = X_i$  они образуют модуль линейных форм, для которого каждый идеал в области от  $r$  неопределённых можно считать конечным, так как это известно для одной неопределённой.

<sup>18</sup>Ср. замечание во введении Гурвица: *Über die Theorie der Ideale (Gött. Nachr. 1894)*. В учебнике алгебры Вебера доказательство, в связи с Кронекером и посредством введения функционалов, проведено параллельно для обоих полей. [Связь между кронекеровой теорией и теорией идеалов обеспечивает «расширенная теорема Гаусса»; Гурвиц, там же.]

<sup>19</sup>Особенно подчеркнуто у Дедекинда (Теория чисел); Supplement XI, Satz VII, § 177; ср. примечание на с. 554. Теорема использует тот факт, что речь идёт об алгебраических полях; она уже не верна для идеалов (модулей) из многочленов, где на место произведения становится наименьшее общее кратное.

<sup>20</sup>Теория чисел, Suppl. XI; Satz VI, § 173. На эквивалентность двух теорем указывает Дедекинд (*Über die Begründung der Idealtheorie, Göttinger Nachr. 1895*).

<sup>21</sup>Dedekind, *Über die Diskriminante endlicher Körper (Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch. т. 29, 1882)*. Данные там для алгебраических чисел определения непосредственно переносятся на алгебраические функции; доказательства также переносятся почти дословно. Порядок доказательств у Д.—В. иной: см. ниже. Для указанных теорем ср. также *Zahlbericht*, § 31 и 32. ( $F'(\delta)$  там называется «дифферентой» целого числа  $\delta$ .)

<sup>22</sup>Ср. *Zahlbericht*, § 39–45.

<sup>23</sup>Klein, *Zur Theorie der Abelschen Funktionen (Ann. 36, 1890)*.

рассматривать как трансцендентный аналог поля классов, поскольку здесь каждая точка порождается одной-единственной формой, главным идеалом.

С другой стороны, существование бесконечно многих постоянных в основном поле  $K(z)$  для алгебраических функций ведёт к теоремам и постановкам вопросов, не имеющим аналога для алгебраических чисел. Сначала отсюда получается некоторое упрощение в построении доказательств; например, в данном Д.–В. доказательстве единственности разложения идеалов на простые идеалы можно обойти «расширенную теорему Гаусса» или эквивалентную ей теорему, используя тот факт, что каждая линейная форма  $(z - c)$  имеет бесконечно много классов вычетов, а именно все постоянные (тогда как число классов вычетов по модулю простого числа конечно).<sup>24</sup>

К действительно новым результатам ведёт дальнейший факт: каждый многочлен с коэффициентами, являющимися целыми рациональными функциями от  $z$ , по модулю  $(z - \alpha)$  распадается на линейные множители (чего не происходит для целочисленного многочлена по модулю  $p$ ); этот факт сохраняется даже тогда, когда вместо всех постоянных берутся только все алгебраические числа.<sup>25</sup> Отсюда следует, что каждый простой идеал есть идеал первой степени;<sup>26</sup> далее следует, что дискриминант поля  $D$  становится пересечением всех дискриминантов  $\Delta(\delta)$ , где  $\delta$  пробегает все целые элементы;<sup>27</sup> оба утверждения находятся в противоположности к случаю алгебраических чисел. Затем отсюда снова следует, что идеал ветвления становится пересечением всех главных идеалов  $F'(\delta)$ .

Дальнейшие различия обусловлены тем, что для алгебраических чисел основное поле  $R$  рациональных чисел является абсолютно выделенным, а именно простым полем, содержащимся в данном поле (то есть полем, выведенным из единицы); тогда как основное поле  $K(z)$  относительно. Каждую непостоянную функцию  $\xi$  можно выбрать как независимую переменную; тогда поле становится алгебраическим полем над  $K(\xi)$ . Теорема, что каждый простой идеал  $\mathfrak{p}$  есть идеал первой степени, то есть каждая функция по модулю  $\mathfrak{p}$  сравнима с постоянной, вместе с возможностью взять произвольную функцию в качестве независимой переменной ведёт к важнейшему понятию, выходящему за пределы алгебраических чисел: к понятию точки в чисто арифметической форме. (Ср. Гензель, 10а.) «Каждая точка при этом представлена полем постоянных, изоморфным функциональному полю.»<sup>28</sup> Совокупность так определённых точек образует «абсолютную риманову поверхность». Это определение точки зависит только от поля, а не от специальной переменной. Напротив, доказательство существования проводится с выделением какой-либо функции в качестве независимой переменной  $z$ ; точка  $P$  порождается простым идеалом  $\mathfrak{p}$ , когда каждой функции сопоставляется её постоянный вычет по модулю  $\mathfrak{p}$ . Следовательно, в частности, функции, делящиеся на  $\mathfrak{p}$ , исчезают в  $P$ , и наоборот. Когда  $\mathfrak{p}$  пробегает все простые идеалы по  $z$ , тем самым получают все точки, в которых  $z$  конечна; остальные точки возникают через введение независимой переменной  $\xi = 1/z$  и соответствуют простым идеалам, входящим в главный идеал  $\xi$ . Естественно, понятия, примыкающие к понятию точки, также не могут иметь аналога у алгебраических чисел: например понятие полигона, класса полигонов, размерности класса полигонов и т. д.

Следует ещё заметить, что свободный выбор независимой переменной даёт дальнейшее толкование разложения  $F'(\vartheta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D}$ . Если рассматривать  $\vartheta$  как независимую переменную, то соответственно получается

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a},$$

поскольку кольцо, выведенное из  $\vartheta$ , было определено симметрично относительно  $z$  и  $\vartheta$ ; и  $\mathfrak{f}$  становится наибольшим общим делителем двух главных идеалов  $\frac{\partial F}{\partial z}$  и  $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$ . Проводник  $\mathfrak{f}$  одновременно становится «идеалом двойных точек» относительно  $\vartheta, z$ .<sup>29</sup>

<sup>24</sup> Д.–В., § 9. Ср. примечания на с. 212 и 213.

<sup>25</sup> Д.–В. во введении замечают, что в этом случае вся теория сохраняется.

<sup>26</sup> Д.–В., § 9, № 7.

<sup>27</sup> Д.–В., с. 224.

<sup>28</sup> Два поля, как известно, называются «изоморфными», если они могут быть взаимно однозначно сопоставлены так, что также соответствуют сумма, разность, произведение и частное.

<sup>29</sup> Д.–В., с. 263.

#### 4. Связь арифметического обоснования разложения в ряды с теорией идеалов

У Гензеля–Ландсберга на место теории идеалов становится трансцендентное вспомогательное средство разложения в ряды и заимствованное из теории функций понятие точки. Недавнее арифметическое обоснование разложения в ряды для алгебраических чисел и функций, данное Гензелем,<sup>30</sup> поэтому можно рассматривать как эквивалент теории идеалов. В действительности это арифметическое обоснование сводится к тому, чтобы для каждого простого идеала перейти к такому (трансцендентному) полю расширения, где этот простой идеал становится главным, так что выполняются обычные теоремы разложения; достаточно провести это рассуждение для всех простых идеалов, входящих в простое число  $p$  соответственно в линейную функцию  $z - a$ .

Сначала речь идёт о введении трансцендентного поля расширения, образованного всеми разложениями в ряды по целым степеням  $z - a$  соответственно  $p$  ( $p$ -адическими числами), каждый раз с не более чем конечным числом отрицательных степеней. В этом поле неприводимое уравнение, определяющее алгебраическое числовое или функциональное поле, распадается в произведение  $p$  неприводимых множителей; это соответствует разложению  $p$  соответственно  $z - a$  в произведение  $p$  «первичных» идеалов  $q_1, \dots, q_p$ . Дальнейшему представлению каждого первичного идеала как степени простого идеала

$$q_i = p_i^{\ell_i},$$

у Гензеля соответствует введение ещё одного поля, алгебраического относительно трансцендентного поля расширения. В случае алгебраических функций оно может быть определено чистым уравнением; в случае алгебраических чисел — в более общем виде алгебраически разрешимым уравнением. Упрощение для алгебраических функций объясняется тем, что здесь не появляются поля инерции и ветвления (ср. п. 3).

Появляющийся в этих исследованиях «обрывающийся ряд» по простому элементу  $\pi$ <sup>31</sup> (который ещё не требует трансцендентного доказательства сходимости)

$$v = c_0 + c_1\pi + \dots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma\pi^\sigma,$$

где  $c_0, \dots, c_{\sigma-1}$  обозначают постоянные, а  $v_\sigma$  — целый элемент поля, находится совершенно соответственно у Д.–В.<sup>32</sup> Там он выводится из теории идеалов и даёт основу для определения порядка исчезновения (соответственно обращения в бесконечность) функции в точке.

#### 5. Сравнение арифметической теории алгебраических функций с геометрической теорией. Различное понятие инвариантности

«Инвариантным» является всякое понятие, характеризуемое одним только полем. В арифметической теории эта инвариантность вообще уже дана в определении, которое формулируется относительно всех элементов поля, а не относительно какого-либо базиса или выделенной переменной; примером служит указанное выше понятие точки. Напротив, остальные теории исходят из какой-либо специальной переменной или базиса и затем доказывают независимость понятия от этого специального выбора; инвариантность здесь становится инвариантностью относительно бирационального преобразования.

Пусть, например, поле с одной стороны получается присоединением алгебраического элемента  $s$  к  $K(z)$ , а с другой — присоединением  $\sigma$  к  $K(\xi)$ , причём  $f(z, s) = 0$  соответственно  $F(\xi, \sigma) = 0$  обозначают неприводимые уравнения для  $s$  соответственно  $\sigma$ ; или ещё более общо — присоединением конечного числа элементов к  $K(\eta)$ , с соответствующими неприводимыми уравнениями

$$g_1(\eta, \tau_1) = 0, \quad g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$$

<sup>30</sup> Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen (Math. Zeitschr. т. 2, 1918) и Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen (Math. Zeitschr. т. 4, 1919). Для более подробного изложения ср. Гензель, № 44 и далее.

<sup>31</sup> Neue Begründung ..., формула (11).

<sup>32</sup> Д.–В., с. 231 и § 15.

Тогда по определению все элементы рационально выражаются через  $z$  и  $s$ , равно как через  $\xi$  и  $\sigma$ , а также через  $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ . В частности,  $z$  и  $s$  рационально выражаются через  $\xi$  и  $\sigma$ , и наоборот; так же  $z$  и  $s$  рационально выражаются через  $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ , и наоборот. Следовательно, плоская кривая  $f(z, s) = 0$  переходит посредством «бirationального преобразования» в плоскую кривую  $F(\xi, \sigma) = 0$  или также в кривую в пространстве переменных  $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ , определённую уравнениями  $g_1(\eta, \tau_1) = 0; g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$ . Инвариантность проявляется так: определение, сформулированное для специальной кривой, сохраняется для всех кривых, возникающих из неё бирациональным преобразованием (в пространстве любого числа измерений), то есть для всех кривых «класса» по Риману. «Точка» здесь определяется как согласованная система значений  $z = a, s = b$ , так что  $f(a, b) = 0$ ; эта точка при бирациональном преобразовании вообще снова переходит в согласованную систему значений  $\alpha, \beta$  на  $F(\xi, \sigma) = 0$ , но в особых случаях, когда  $a, b$  была «особой» точкой, может соответствовать нескольким «точкам» на  $F(\xi, \sigma) = 0$ . Всегда можно указать кривые, на которых «особая» точка  $f(z, s) = 0$  соответствует конечному числу простых, раздельных или соседних точек (разрешение особенностей).<sup>33</sup> Точно так же группа точек снова переходит в группу точек; число её точек инвариантно, если особую точку считать столькими точками, скольким простым точкам она соответствует при подходящем преобразовании. Так как каждую кривую можно бирационально преобразовать в такую, которая имеет «обыкновенные кратные» точки,<sup>33</sup> геометрическая теория развивает свои понятия только для таких специальных кривых и затем доказывает инвариантность относительно всякого бирационального преобразования, в том числе такого, которое ведёт к самым общим особым точкам.

В частности, как выделенную кривую «класса» — за исключением гиперэллиптического случая — можно ввести так называемую «нормальную кривую  $\varphi$ » в пространстве  $(p - 1)$  измерений, не имеющую особых точек; здесь  $\varphi$  — это  $p$  «адьюнктных кривых порядка  $(n - 3)$ » для однородной  $f(z, s) = 0$ . Бирациональному преобразованию  $f(z, s) = 0$  в  $F(\xi, \sigma) = 0$  соответствует линейное преобразование  $\varphi$ , так что здесь речь идёт об инвариантности в проективном смысле. Представление всех функций поля как рациональных функций от  $\varphi$  в геометрической теории называется «инвариантным представлением».<sup>34</sup>

Итак, линейная система  $\varphi$ , или также высекаемые ими «специальные группы», при каждом бирациональном преобразовании переходит в себя, а значит, характеризуется одним только полем. Ей соответствует дифференциальный класс в арифметической теории, где инвариантность снова непосредственно видна из определения, данного через свойства относительно каждой функции поля как независимой переменной.

## 6. Продолжение сравнения. Особые точки

С различным пониманием понятия точки связано то, что «особые точки» кривых, создающие особые трудности в алгебраико-геометрической теории, в обосновании арифметической теории вообще не появляются; поэтому и «адьюнктные функции» не требуются для построения арифметической теории, как это имеет место в геометрической теории, а принадлежат к специальным более высоким частям теории. С другой стороны, в основании геометрической теории не появляются точки ветвления; фактически они исчезают и при представлении интегралов в аронгольдовой нормальной форме (Гензель, № 27, формула 80).

Данное в п. 5 определение особой точки можно сформулировать так:  $f(z, s) = 0$  (соответственно кривая в пространстве более высокой размерности) имеет в  $z = a, s = b$  (соответственно  $z = a; s_i = b_i$ ) особую точку, если эту систему значений принимает более чем одна точка абсолютной римановой поверхности (точка в арифметическом смысле), или если она принимается в одной или нескольких точках в более высоком порядке. В последнем случае речь идёт о точке полигона ветвления как для  $z$ , так и для  $s$ ; это соответствует «бесконечно близким точкам» геометрической теории; точка становится (высшей) точкой возврата кривой  $f(z, s) = 0$  (соответственно кривой в пространстве более высокой размерности).

<sup>33</sup> Ср., например, Бриллюэ-Нётер, раздел 6. Подробнее об «особых» точках в следующем пункте.

<sup>34</sup> Ср., например, Бриллюэ-Нётер, раздел 8. Для алгебраических функций нескольких переменных вопрос, можно ли свести инвариантность к инвариантности относительно линейного преобразования, не рассматривается.

Поскольку каждая произвольная функция  $\eta$  поля по предположению рационально выражается через  $z$  и  $s$ , каждая точка абсолютной римановой поверхности, где  $z = a, s = b$ , в силу изоморфизма возникает так: каждой функции  $\eta$ , представленной через  $z$  и  $s$ , сопоставляется её значение при  $z = a, s = b$ . Чтобы точка была особой, должна существовать по меньшей мере одна функция  $\eta$ , которая при  $z = a, s = b$  принимает несколько значений или несколько раз одну систему значений. А вследствие рациональной выразимости через  $z$  и  $s$  это возможно только тогда, когда в таком представлении при  $z = a, s = b$  числитель и знаменатель одновременно обращаются в нуль. Отсюда следует, что приведённое определение тождественно обычному, по которому

$$f, \quad \frac{\partial f}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial s}$$

обращаются в нуль при  $z = a, s = b$ . Ибо в этом случае

$$\eta = \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial s}}$$

является функцией указанного типа, многозначной при  $z = a, s = b$ , тогда как в противоположном случае всякая функция, даже если она становится  $0/0$ , принимает только одно значение.

При арифметическом понятии точки особая точка не может появиться, поскольку две точки считаются различными, как только хотя бы одной функции соответствуют разные системы значений. Но и в теории идеалов, служащей для обоснования арифметического понятия точки, понятие особой точки не возникает, поскольку всегда одновременно рассматривается совокупность всех целых элементов поля. Все лежащие в конечной части особые точки  $F(z, \delta) = 0$ , где  $\delta$  алгебраически цела относительно  $z$ , порождаются (по второму определению и концу п. 3) «идеалом двойных точек»  $\mathfrak{f}$ . Так как по основной теореме идеал ветвления  $\mathfrak{D}$  является наибольшим общим делителем всех главных идеалов  $F'(\delta)$ , для каждого простого идеала  $\mathfrak{p}$  можно указать такое  $\delta$ , что соответствующий  $\mathfrak{f}$  не делится на  $\mathfrak{p}$ ; следовательно, поскольку  $\mathfrak{f}$  является наибольшим общим делителем  $F'(\delta)$  и  $F'(z)$ , по меньшей мере один из двух главных идеалов  $F'(\delta)$  и  $F'(z)$  не делится на  $\mathfrak{p}$ . Поэтому *не существует системы значений, для которой одновременно обращаются в нуль все  $F'(\delta)$  и  $F'(z)$* , и, следовательно, система значений  $z = a, \delta_i = b_i$  принимается только в одной точке абсолютной римановой поверхности; *совокупность целых алгебраических функций поля* (которую можно толковать как кривую в пространстве бесконечно многих измерений) *не имеет особой точки в конечной части*; в теории идеалов же рассматриваются только конечные значения.

Но и базисные функции  $\omega_1, \dots, \omega_n$  всех целых элементов не имеют особых точек в конечной части. По сказанному выше, каждая точка в арифметическом смысле уже однозначно определена системой постоянных, изоморфно сопоставленной всем целым функциям. Если, следовательно, «пространственная кривая», определённая какими-либо целыми функциями  $s_i$ , имеет особую точку в конечной части при  $s_i = \alpha_i$ , то должна существовать по меньшей мере одна целая функция  $\eta$ , принимающая при  $s_i = \alpha_i$  несколько систем значений. Если теперь  $\omega_1, \dots, \omega_n$  обозначает базис всех целых элементов, то вследствие  $\delta = a_1\omega_1 + \dots + a_n\omega_n$  с целыми рациональными  $a_i$  каждой системе значений  $\omega$  соответствует только одна система значений  $\delta$ ; значит, пространственная кривая, определённая  $\omega_1, \dots, \omega_n$ , не может иметь особой точки в конечной части. И *каждая точка абсолютной римановой поверхности, в которой  $z$  конечна, уже однозначно определена системой постоянных, изоморфно сопоставленной  $\omega$* . Базисные функции суть именно функции  $\eta$ , которые становятся многозначными при  $s_i = \alpha_i$ . Значит, введением базиса целых элементов, например вместо базиса  $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ , обходится трудность особых точек.

В геометрической теории задача однозначного порождения всех точек абсолютной римановой поверхности — в более общем виде построения всех функций, которые становятся бесконечными в заданных точках, — выполняется посредством адьюнктных форм и их частных. Форма  $\psi$  называется адьюнктной, если  $\psi = 0$  в каждой  $i$ -кратной точке основной кривой  $f(z, s) = 0$  имеет по меньшей мере  $(i - 1)$ -кратную точку; более высокую особую точку при этом сначала надо разрешить в обыкновенные кратные точки. Выше было показано, что для самой общей функции  $\eta = \frac{\psi}{\chi}$  в особой точке  $f(z, s) = 0$  числитель и знаменатель вообще должны обращаться в нуль; что

они должны быть адьюнктными, показывает рассмотрение всюду конечных дифференциалов. Что, наоборот, условия адьюнктности достаточны для построения самой общей функции, показывает «теорема об остатке», к которой мы ещё вернёмся подробнее. Следовательно, адьюнктные функции занимают место базисных функций арифметической теории.

Арифметически адьюнктной форме соответствует числитель функции поля, делящейся на «идеал двойных точек»  $\mathfrak{f}$ , как только особые точки — чего всегда можно достичь преобразованием — считаются все лежащими в конечной части. Отсюда формально видно представление базисных элементов  $\omega_1, \dots, \omega_n$  как частных адьюнктных форм, а тем самым и связь различных способов их представления:

Пусть  $R(z)$  обозначает детерминант подстановки базиса  $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$  в базис  $\omega_1, \dots, \omega_n$ . Тогда, наоборот, всякое  $\omega$  выражается как частное целой функции от  $z$  и  $\delta$  на  $R(z)$ :

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Так как  $R(z)\omega_i$  принадлежит кольцу, выведенному из  $\delta$ , то по определению проводника  $R(z)$  делится на  $\mathfrak{f}$  [из  $(R(z))^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}$  эта делимость следует только для  $(R(z))^2$ ]. Поскольку же  $\omega_i$ , как целая функция, остаётся конечной для всех конечных  $z$ , числительная функция  $G_i(z, \delta)$  также должна делиться на  $\mathfrak{f}$ ; числители и знаменатели всех  $\omega_i$  поэтому адьюнктны. Из этого представления  $\omega$  следует представление всех функций поля частными адьюнктными.

Согласно предыдущему, геометрическую теорию можно охарактеризовать как *теорию кольца, выведенного из элемента  $\delta$*  (порядка), в противоположность арифметической теории, одновременно рассматривающей *все целые элементы*. Поэтому ясно, что проводник кольца — особые точки — играет решающую роль. Можно указать и дальнейшие аналогии между арифметической теорией колец (порядков) и геометрической теорией. Так, геометрическая теория при пересечении с адьюнктными кривыми нигде не считает точки пересечения, попадающие в особые точки, а рассматривает только отличные от них группы точек. Этому соответствует то, что Дедекин<sup>35</sup> рассматривает только такие идеалы кольца, которые взаимно просты с идеалом-проводником  $\mathfrak{f}$ , и для этой области идеалов устанавливает все законы делимости, включая единственность разложения на простые идеалы.

Также лежащая в основании геометрической теории «основная теорема алгебраических функций»<sup>36</sup>, или по крайней мере непосредственное следствие из неё, в известном смысле имеет аналог в арифметической теории колец. Эта теорема даёт условия представимости

$$\psi(z, s) = A(z, s)f(z, s) + B(z, s)\varphi(z, s),$$

где все входящие величины целы рационально по  $s, z$  (в более общем виде целы и однородны по  $x_1, x_2, x_3$ ). Из этих условий следует,<sup>37</sup> что в силу  $f(z, s) = 0$  частное  $\frac{\psi}{\varphi}$  всегда равно целой рациональной функции  $B(z, s)$ , если оно адьюнктно к  $f$ . Этому соответствует теорема из п. 3, лежащая в основании всех этих сравнений: проводник  $\mathfrak{f}$  кольца, выведенного из  $\delta$ , равен идеалу двойных точек кривой  $f(z, \delta) = 0$ . Ибо по определению проводника всякий алгебраически целый элемент, делящийся на  $\mathfrak{f}$ , принадлежит кольцу и потому цел и рационально представим через  $z$  и  $\delta$ ; тогда как упомянутая теорема утверждает, что такой элемент является адьюнктной функцией.<sup>38</sup>

## 7. Сравнение между теоремой об остатке и теоремами теории идеалов

Только что упомянутое следствие «основной теоремы алгебраических функций» в геометрической теории ведёт прямо к «теореме об остатке», а тем самым к основанию, на котором строится вся

<sup>35</sup>Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Теоремы, сформулированные в этих параграфах для алгебраических чисел, дословно верны для алгебраических функций одной переменной.)

<sup>36</sup>M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* т. 6 (1873).

<sup>37</sup>Брилль–Нётер, № 55.

<sup>38</sup>Здесь, следуя Дедекину, всюду предполагается, что  $\delta$  является целым алгебраическим элементом (чего всегда можно добиться преобразованием). Случай, более точно соответствующий геометрии,  $f(z, s) = 0$ , где  $s$  может также алгебраически дробно зависеть от  $z$ , рассматривают Гензель–Ландсберг; ср. Гензель, № 26 и 29.

геометрическая теория. В известном отношении, однако, теорема об остатке снова имеет более элементарный характер, чем остальные основания, поскольку её можно арифметически сформулировать как прямое следствие единственности разложения идеалов на простые идеалы, или скорее фактов, лежащих в основе этой теоремы разложения; значит, она не опирается на высшую теорию колец. К такой арифметической формулировке приходят следующим образом.

Пусть основная кривая  $f(z, \delta) = 0$  выбрана так — чего всегда можно достичь линейно-дробным преобразованием переменных, — что особые точки, как и конечное число рассматриваемых групп точек, лежат в конечной части; и пусть далее  $\delta$  алгебраически цела над  $z$ , чего всегда можно добиться последующим линейным преобразованием, целым по переменным. Тогда простому идеалу  $\mathfrak{p}$ , порождающему точку  $P$  абсолютной римановой поверхности, где  $z = a, \delta = b$ , соответствует точка  $z = a, \delta = b$  кривой  $f(z, \delta) = 0$ ; в более общем виде идеал  $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_\rho^{e_\rho}$  порождает группу точек, состоящую из точек  $z = a_i, \delta = b_i$  с соответствующей кратностью; и так порождаются все точки  $f(z, \delta) = 0$ , лежащие в конечной части. Поскольку в точке  $P$  все функции  $g_1, g_2, \dots$ , делящиеся на  $\mathfrak{p}$ , обращаются в нуль, и поскольку, наоборот, эта совокупность функций  $g$  порождает идеал  $\mathfrak{p}$ , соответствующая точка на  $f$  является пересечением

$$g_1(z, \delta) = 0, \quad g_2(z, \delta) = 0, \dots$$

с  $f = 0$ ; то же верно для группы точек, соответствующей идеалу  $\mathfrak{a}$ . Более того, по теореме, что каждый идеал является наибольшим общим делителем двух главных идеалов, всегда достаточно двух таких кривых, чтобы высечь группу точек. В частности, группа точек, соответствующая главному идеалу, отсекается кривой  $g(z, \delta) = 0$ , и наоборот; главный идеал соответствует полному пересечению.

Две группы точек  $A$  и  $B$  в геометрической теории называются *корезидуальными*, если их можно дополнить одной и той же группой точек  $R$  до полного пересечения. Если эти группы точек соответственно порождаются идеалами  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{r}$ , то между этими идеалами имеется отношение

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{r} = (\alpha), \quad \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{r} = (\beta),$$

которое показывает, что идеалы  $\mathfrak{a}$  и  $\mathfrak{b}$  эквивалентны. Обратно, из эквивалентности двух идеалов,  $\mathfrak{a} = \eta \mathfrak{b}$ , это отношение всегда следует на основании теоремы, что каждый идеал умножением на другой можно превратить в главный идеал;<sup>39</sup> следовательно, эквивалентные идеалы и корезидуальные группы точек являются тождественными понятиями.

Теперь теорема об остатке утверждает: *если  $A$  и  $B$  корезидуальны, то их можно высечь адьюнктными кривыми с одним и тем же остатком (вне особых точек)*. Поскольку нули и полюсы функции всегда корезидуальны, тем самым одновременно доказано, что самые общие функции поля представимы как частные адьюнктных форм. На языке теории идеалов теорема об остатке просто сводится к тому, что наряду с  $\mathfrak{a}$  и  $\mathfrak{b}$  также  $\mathfrak{a}\mathfrak{f}$  и  $\mathfrak{b}\mathfrak{f}$  эквивалентны, где  $\mathfrak{f}$  обозначает идеал двойных точек. Ибо тогда, по сказанному выше, всегда существует идеал  $\mathfrak{m}$  такой, что

$$\mathfrak{a}\mathfrak{f}\mathfrak{m} = (\alpha), \quad \mathfrak{b}\mathfrak{f}\mathfrak{m} = (\beta)$$

становятся главными идеалами;  $\alpha = 0$  и  $\beta = 0$  — это адьюнктные кривые, отсекающие группы точек  $A$  и  $B$ , соответственно их подгруппы  $A'$  и  $B'$ , отличные от особых точек.<sup>40</sup> Поэтому доказательство теоремы об остатке арифметически содержится в возможности сопоставлять точки простым идеалам и в доказательстве, что эквивалентные идеалы можно умножением на один и тот же идеал превратить в главные.

Корезидуальные группы точек не обязаны состоять из одинакового числа точек, так же как эквивалентные идеалы не обязаны иметь одинаковую степень. Например, все главные идеалы

<sup>39</sup>Ср. Дедекин, Теория чисел § 181; если  $\mathfrak{r}$  выбрано так, что  $\mathfrak{a}\mathfrak{r}$  становится главным идеалом  $(\alpha)$ , то  $\mathfrak{b}\mathfrak{r} = \eta^{-1} \cdot (\alpha)$ ; и поскольку  $\mathfrak{b}\mathfrak{r}$  содержит только целые элементы, то же верно для  $\eta^{-1} \cdot (\alpha)$ , который поэтому также становится главным идеалом  $(\beta)$ .

<sup>40</sup>Если  $\mathfrak{a} = \mathfrak{f}\mathfrak{a}_1$ ,  $\mathfrak{b} = \mathfrak{f}\mathfrak{b}_1$ ,  $\mathfrak{r} = \mathfrak{f}\mathfrak{r}_1$ , где  $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{r}_1$  взаимно просты, то уже  $\mathfrak{a}_1\mathfrak{f}\mathfrak{r}_1$ ,  $\mathfrak{b}_1\mathfrak{f}\mathfrak{r}_1$  становятся главными идеалами, где  $\mathfrak{p}$  взаимно прост с  $\mathfrak{f}$ . Ибо каждый идеал можно превратить в главный умножением на идеал, взаимно простой с данным (Д.-В., с. 214; или Теория чисел, § 178, теорема XI).

эквивалентны, и все группы точек, порождённые полным пересечением, корезидуальны. Это различие с эквивалентными полигонами (дивизорами)<sup>41</sup> объясняется тем, что точки, в которых  $z$  становится бесконечной, не порождаются простыми идеалами по  $z$ . В представлении функции как идеальной дроби  $\eta = \frac{a}{b}$ , выражающем эквивалентность  $a$  и  $b$ , нули или полюсы  $\eta$ , где  $z$  становится бесконечной, следовательно, не появляются. Так, например, главный идеал  $(\alpha)$  становится произведением простых идеалов, соответствующих нулям целой функции  $\alpha$ ; полюсы  $\alpha$  не входят, поскольку  $\alpha$  становится бесконечной только в точках, где  $z$  становится бесконечной. В этом отношении теория идеалов является точным аналогом теории форм в геометрической теории, где также есть только нули и нет полюсов.

Переход от форм к функциям геометрически совершается посредством образования частных форм одного порядка; арифметически этому соответствует переход от классов идеалов к инвариантно определённым классам полигонов (дивизоров). Поскольку здесь больше не выделена никакая переменная, представление функции полигональными частными даёт все нули и полюсы. Отношение класса идеалов (класса корезидуальных групп точек) к классу полигонов таково. Пусть  $\mathcal{A}$  и  $\mathcal{B}$  — полигоны, порождённые идеалами  $a$  и  $b$ , а  $\mathcal{N}$  — полигон точек, в которых  $z$  становится бесконечной (полигон знаменателя  $z$  и целых функций от  $z$ ). Тогда из эквивалентности  $a$  и  $b$  следует эквивалентность  $\mathcal{A}$  и  $\mathcal{B}$  тогда и только тогда, когда  $a$  и  $b$  имеют одинаковую степень; вообще же отсюда следует только эквивалентность  $\mathcal{A}\mathcal{N}^\nu$  с  $\mathcal{B}\mathcal{N}^{\nu'}$  при  $(\nu \neq \nu')$ . Поэтому разбиение идеалов (соответственно корезидуальных групп точек) на классы есть объединение бесконечно многих классов полигонов в один класс; его можно также понимать как разбиение полигонов на классы по модулю степени  $\mathcal{N}$ .<sup>42</sup>

Теорема об остатке для случая корезидуальных групп точек, состоящих из разного числа точек, появляется только в чисто геометрических вопросах. В применении к алгебраическим функциям фактически появляется только случай, соответствующий классам полигонов, то есть случай корезидуальных групп точек одинакового числа. «Полная линейная система», порождённая группой точек, то есть совокупность групп точек, корезидуальных этой группе и с тем же числом точек, точно соответствует классу полигонов, порождённому соответствующим полигоном; совпадают также понятия «сумма двух полных систем» и «произведение двух классов полигонов». То, что такая полная система содержит лишь конечное число линейно независимых групп точек, является прямым следствием теоремы об остатке, которая сводит размерность системы (число линейно независимых групп точек) к размерности всех адьюнктных кривых произвольного, но фиксированного порядка, проходящих через остаточную группу. Чтобы прийти к фактическому определению этой размерности, теореме Римана–Роха, геометрическая теория сначала выводит из теоремы об остатке «теорему редукции» (теорему о неподвижных точках);<sup>43</sup> а из неё — теорему Римана–Роха.

Совершенно соответственно арифметическая теория показывает, что каждый класс полигонов имеет конечную размерность, и определяет её с помощью специального базиса целых элементов, нормального базиса, определённого посредством комплементарного модуля; так она получает теорему Римана–Роха как следствие связи комплементарного модуля с полигоном ветвления. При этом в изложении Д.–В. также появляется теорема редукции,<sup>44</sup> хотя и не как основание, как в геометрической теории. Вследствие упомянутого в п. 6 соответствия между базисом и адьюнктными функциями и здесь можно установить некоторое соответствие вспомогательных средств в двух теориях. В итоге можно сказать, что образования понятий в двух теориях по существу совпадают, хотя, помимо формулировки, они различаются своим расположением. Обе теории возникли независимо друг от друга; геометрическая — примерно на десятилетие раньше.

<sup>41</sup> Полигон  $A$  состоит из конечного числа точек абсолютной римановой поверхности; два полигона  $A$  и  $B$  называются эквивалентными, если они являются нулями и полюсами некоторой функции  $\eta$ ; тогда  $\eta$  допускает представление полигональными частными  $\eta = \frac{A}{B}$ . (Д.–В., § 17 и 18.)

<sup>42</sup> Гензель–Ландсберг, 25-я лекция, с. 438. — Если представить две переменные  $z$  и  $s$  полигональными частными, это можно понимать как бинарную гомогенизацию каждой из этих переменных; если, в частности, выбрать  $z$  и  $s$  так, чтобы они имели один и тот же полигон знаменателя, возникает обычная в геометрии тернарная гомогенизация.

<sup>43</sup> Брилли–Нётер, № 58.

<sup>44</sup> Д.–В., § 30, № 2.



Следует ещё заметить, что теорема Римана–Роха первоначально, у Римана и Роха, а также у Вейерштрасса, появляется как теорема о ранге: речь идёт о ранге матрицы  $(\varphi_i(x_j))$ , где  $\varphi$  пробегает  $p$  адьюнктных кривых порядка  $n - 3$ , а  $x$  — точки остаточной группы.

## 8. Трансцендентные вопросы для алгебраических функций и алгебраических чисел

На аналогии между трансцендентными вопросами для алгебраических функций и для алгебраических чисел особенно указывал Гильберт;<sup>45</sup> по существу это вопросы существования. Так, римановой постановке вопроса о существовании алгебраической функции при заданной римановой поверхности (следовательно, также при заданных точках ветвления) соответствует вопрос о существовании алгебраических числовых полей с заданной группой и дискриминантом.<sup>46</sup> Но тогда как в случае алгебраических функций доказательство существования можно провести в общем виде, в области алгебраических числовых полей оно удалось только для специальных основных полей (рациональных чисел, квадратичных числовых полей) и только для абелевых групп.<sup>47</sup> Речь идёт о теореме Кронекера, что всякое абелево числовое поле над рациональными числами может быть составлено из полей корней из единицы, и о соответствующих теоремах Фютера<sup>48</sup> и Гекке<sup>49</sup> для относительно абелевых числовых полей. Значит, искомые числовые поля фактически даются трансцендентным средством — экспоненциальной функцией, модулярными функциями, — в противоположность чистому доказательству существования для алгебраических функций.

Доказательству существования алгебраических функций предшествует существование всюду конечных интегралов. Аналогом этого является существование «особых первичных чисел» алгебраического числового поля, определённых относительно простого числа  $\ell$ , чьи  $\ell$ -е корни относительно неразветвлены и дают первые строительные блоки для поля классов.<sup>50</sup> Это доказательство существования проводится с существенной помощью теоремы, что в числовом поле всегда существуют простые идеалы с заданными вычетными характеристиками; поэтому эту теорему можно считать аналогом краевой задачи, на которой основано существование всюду конечных интегралов.

Всюду конечные интегралы дают трансцендентный критерий для определения того, принадлежат ли два полигона одному классу (две группы точек одинакового числа корезидуальны), а именно через теорему Абеля, которая утверждает, что интегралы первого рода, распространённые на «корезидуальные пути», исчезают; или через соответствующую дифференциальную теорему вместе с её обращением.<sup>51</sup>

Аналогом теоремы Абеля для алгебраических числовых полей следует считать «закон взаимности для  $\ell$ -х степенных вычетов», который для самого поля или по меньшей мере для подходящего надполя даёт критерий того, что два идеала принадлежат одному классу. Его содержание можно сформулировать и так: в этом надполе особые первичные числа имеют один и тот же вычетный характер относительно всех идеалов одного класса. Последний факт верен и в самом поле, но там он не совпадает с законом взаимности.<sup>52</sup>

Наконец, теория  $p$ -адических чисел Гензеля даёт аналог разложения алгебраических функций в

<sup>45</sup> *Mathematische Probleme*, проблема 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

<sup>46</sup> Подсказанное этим рассмотрение алгебраических функций, исходя из группы, Р. Кёниг провёл как специальный случай более общих вопросов; ср. особенно: *Riemannsche Funktionen- und Differentialssysteme in der Ebene* (*J. f. M.* т. 148) и *Math. Ann.* 78, 79. На месте алгебраического поля у Кёнига стоит специальный конечный модуль относительно  $K(z)$ : имеется только «свойство класса».

<sup>47</sup> Только простой случай групп, возникающих в уравнениях третьей и четвёртой степени, и несколько вполне специальных групп в уравнениях 8-й степени можно обработать для произвольных основных полей: G. Bucht, *Über einige algebraische Körper* 8. Grades (*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, т. 6, № 30.) Ср. также E. Noether, *Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe* и цитированную там диссертацию Зайдельмана. (*Math. Ann.* 78).

<sup>48</sup> *Math. Ann.* 75.

<sup>49</sup> *Math. Ann.* 76.

<sup>50</sup> Furtwängler, *Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern*. *Math. Ann.* 67 и 72.

<sup>51</sup> Ср., например, формулировку у M. Noether (*Ann.* 37). Поскольку теорема об остатке исторически выросла из теоремы Абеля, геометрическая теория говорит о «сумме» групп точек и линейных систем, следуя интегральным суммам; в противоположность «произведению» классов в арифметической теории.

<sup>52</sup> Фуртвенглер, там же.

степенные ряды; по этому поводу см. обзор Гензеля.

## 15. Конечность системы целочисленных инвариантов бинарных форм

*Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen* 1919, с. 138–156

Представлено Ф. Клейном на заседании 27 марта 1919 года.

Ниже, как расширение известной теоремы о конечности, доказывается следующая теорема: *все целые целочисленные инварианты бинарной системы основных форм являются целыми рациональными целочисленными функциями конечного числа из них*. При этом, как обычно, под «инвариантом» всегда следует понимать целый рациональный инвариант основной формы или системы основных форм, а именно инвариант относительно преобразования коэффициентов, индуцированного группой всех линейных преобразований.

Доказательство опирается на целочисленное уточнение доказательства конечности Мертенса–Гильберта.<sup>1</sup> Это доказательство конечности можно охарактеризовать так. Основные формы разлагают на их линейные множители, точнее: каждой основной форме сопоставляют произведение линейных форм, вследствие чего каждый инвариант  $I$  переходит в инвариант этих линейных форм, значит в функцию однороденных корней. Эта функция должна удовлетворять трем условиям: 1) условию инвариантности, 2) условиям веса, 3) условиям симметрии. Условия 2) и 3) необходимы для того, чтобы  $I$  стала целой и рациональной по коэффициентам основных форм. Условие 1) удовлетворяется тем, что  $I$  представляют как целую рациональную функцию от определителей линейных форм; условие 2) тем, что вместо отдельных определителей берут в качестве новых аргументов некоторые произведения их степеней. Условие 3) теперь просто говорит, что  $I$  становится целой рациональной симметрической функцией рядов величин, и что, обратно, всякая такая симметрическая функция рядов величин становится инвариантом основных форм. Следовательно, элементарные симметрические функции этих рядов величин дают полную систему.

Если теперь рассматривать только целочисленные инварианты, то условие 1) можно удовлетворить так же, как выше, как только для инвариантов линейных форм доказана более сильная теорема: *все целочисленные инварианты бинарных линейных форм являются целыми целочисленными функциями определителей этих линейных форм*. Что это действительно так, я показываю в § 3, причем в формулировке, что совокупность всех соотношений между этими определителями по модулю любого простого числа совпадает с совокупностью всех тождественных соотношений; то есть модуль, соответствующий этим соотношениям, остается простым модулем по модулю каждого простого числа. Это доказывается нормированием классов вычетов относительно модуля квадратичных форм, соответствующих квадратичным соотношениям между определителями; эти квадратичные формы при этом оказываются целочисленным базисом модуля, притом по модулю каждого простого числа, тогда как прежде они были известны как базис модуля лишь без учета целочисленности.

Для удовлетворения условия 2) не требуется никакого изменения, поскольку введение произведений степеней не влияет на числовые коэффициенты. Условие 3) теперь говорит, что  $n_1! \cdots n_\mu! I$  (где  $n_1, \dots, n_\mu$  означают степени отдельных основных форм) становится целочисленной симметрической функцией рядов величин, и что, обратно, всякая целочисленная симметрическая функция этих рядов становится целочисленным инвариантом. Но, как легко показать, эти целочисленные симметрические функции рядов имеют целочисленный базис, для которого одних элементарных функций уже недостаточно. Применение гильбертовой теоремы о целочисленном базисе модуля дает отсюда также целочисленный базис для самих  $I$ .

В § 1 собраны специальные теоремы конечности, соответствующие условиям 1), 2), 3); из них затем в § 2 следует доказательство конечности. Специальные теоремы конечности, соответствующие условию 3), одновременно дают конечность целочисленных инвариантов конечных групп целочисленных или алгебраически-целых подстановок, как кратко показано в § 4.

<sup>1</sup>F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* т. 33 (1889) [датировано мартом 1888]. Оба доказательства, возникшие независимо друг от друга вслед за Mertens, Crelle т. 100, совпадают по содержанию.

## § 1. Специальные теоремы конечности

Сначала приведу следующие специальные теоремы конечности; они будут служить для удовлетворения упомянутых во введении условий инвариантности, веса и симметрии.

**I.** Каждый целочисленный инвариант системы бинарных линейных форм является целой рациональной целочисленной функцией определителей этих линейных форм (доказательство будет дано в § 3).

**II.** Каждая система  $\mathfrak{S}$  произведений степеней от  $n$  переменных с неотрицательными показателями, которая вместе с любыми двумя произведениями степеней  $f$  и  $g$  содержит также их частное, если это частное является целым по переменным, имеет конечный мультипликативный базис  $f_1, \dots, f_k$  из функций из  $\mathfrak{S}$ , такой что для всякого  $f$  из  $\mathfrak{S}$  имеется представление

$$f = f_1^{\lambda_1} \cdots f_k^{\lambda_k},$$

с неотрицательными показателями  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ .

Действительно, по гильбертовой теореме о базисе модуля существует конечное число функций из  $\mathfrak{S}$ ,  $f_1, \dots, f_k$ , каждая из которых действительно содержит  $x$ , такое что всякое непостоянное  $f$  из  $\mathfrak{S}$  принадлежит порожденному ими модулю:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \dots, f_k)}.$$

Отсюда следует, что для каждого  $f = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$  существует по крайней мере одно  $f_\nu = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}$ , такое что  $\nu_1 \leq i_1, \dots, \nu_n \leq i_n$ . В представлении

$$f = x_1^{i_1 - \nu_1} \cdots x_n^{i_n - \nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

множитель  $A$  по предположению принадлежит  $\mathfrak{S}$ , но имеет меньшую степень по переменным, чем  $f$ , так что конечное повторение этого рассуждения дает утверждение. Чтобы представление сохранялось и для  $f = 1$ , нужно лишь положить все показатели  $\lambda$  равными нулю.<sup>2</sup>

**III.** Все целые целочисленные симметрические функции от  $n$  рядов величин являются целыми целочисленными функциями конечного числа из них.

Пусть  $\tau_1(x), \dots, \tau_n(x)$  обозначают элементарные симметрические функции неопределенных  $x_1, \dots, x_n$ . Тогда для каждого показателя  $k$  имеется тождество

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \cdots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

где  $G_0^{(k)}, \dots, G_{n-1}^{(k)}$  означают целые целочисленные функции от  $\tau(x)$ . Пусть  $x_i, y_i, \dots, z_i$  — элементы  $i$ -го ряда; тогда посредством этих тождеств и соответствующих тождеств для  $y, \dots, z$  все специальные (однорядные) симметрические функции

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \cdots z_i^c$$

становятся целыми целочисленными функциями конечного числа функций

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \cdots z_i^c \quad (0 \leq a < n, 0 \leq b < n, \dots, 0 \leq c < n)$$

<sup>2</sup>Это представление можно доказать и непосредственно, а из него обратно снова следует гильбертова теорема: ср. Р. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Другое прямое доказательство этого представления, из которого затем также выводится теорема II, см. у А. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, Math. Ann. 78 (1916), § 2,1 и § 3,2. Специальный случай теоремы II, используемый в § 2, где показатели пробегают все неотрицательные решения системы диофантовых уравнений, уже содержится у Gordan–Kerschensteiner, Vorlesungen über Invariantentheorie, т. I, с. 199.

и элементарных симметрических функций  $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$ .<sup>3</sup> Если имеется случай наиболее общих симметрических функций  $n$  рядов, который ниже не встречается, то так же видно, что функции

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \dots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \dots z_{i_2}^{c_2} \dots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \dots z_{i_n}^{c_n} \\ (0 \leq a_\nu < n, 0 \leq b_\nu < n, \dots, 0 \leq c_\nu < n),$$

где  $i_1, i_2, \dots, i_n$  пробегает все перестановки, вместе с  $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$  образуют целочисленный базис.

**IV.** Пусть  $F_1(x), \dots, F_k(x)$  являются целыми целочисленными функциями от  $x_1, \dots, x_n$ , а  $a$  — фиксированное целое число. Тогда все функции

$$\frac{G(F)}{a},$$

где  $G$  означает целую целочисленную функцию, которые становятся целочисленными по  $x$ , являются целыми целочисленными функциями конечного числа из них.

Действительно, по гильбертовой теореме о целочисленном базисе модуля для каждого такого  $G(F)/a$  имеется представление

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \dots F_k) \frac{G_1(F)}{a} + \dots + A_\rho(F_1 \dots F_k) \frac{G_\rho(F)}{a},$$

где  $A_1, \dots, A_\rho$  означают целые целочисленные функции от  $F$ , а

$$\frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

принадлежат системе. Поэтому функции

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \dots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

образуют требуемый базис.

## § 2. Конечность целочисленных бинарных инвариантов

Пусть  $x, y$  — бинарные переменные, подвергаемые преобразованию с неопределенными коэффициентами

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \quad y = s_{21}x' + s_{22}y', \quad (1)$$

и пусть  $f$  — бинарная основная форма, коэффициенты которой являются неопределенными. Тогда из (1)

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \dots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \dots + a'_ny'^n. \quad (2)$$

Под целочисленным инвариантом  $f$ , как известно, понимают целую целочисленную функцию  $I(a)$ , такую что

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \quad (\text{тождественно по } a, s_{ik}); \quad (3)$$

соответственно определяются целочисленные инварианты системы основных форм, причем в определение можно включить также однородность по коэффициентам отдельных основных форм, поскольку из таких по отдельности однородных инвариантов остальные составляются целочисленно-линейно.

<sup>3</sup>Hilbert в указанном месте включает в базис вместо  $\tau(x), \dots, \tau(z)$  степенные суммы; благодаря этому базис также состоит только из однородных функций, но целочисленность представления теряется.

Наряду с (2) рассмотрим теперь еще специальную бинарную форму  $g$ , а именно произведение  $n$  линейных форм, коэффициенты которых снова являются неопределенными:<sup>4</sup>

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1 x + \beta_1 y)(\alpha_2 x + \beta_2 y) \cdots (\alpha_n x + \beta_n y) \\ &= \sigma_0(\alpha, \beta)x^n + \sigma_1(\alpha, \beta)x^{n-1}y + \cdots + \sigma_n(\alpha, \beta)y^n \\ &= (\alpha'_1 x' + \beta'_1 y')(\alpha'_2 x' + \beta'_2 y') \cdots (\alpha'_n x' + \beta'_n y') \\ &= \sigma'_0 x'^n + \sigma'_1 x'^{n-1}y' + \cdots + \sigma'_n y'^n, \end{aligned} \quad (4)$$

где  $\sigma_0(\alpha, \beta), \sigma_1(\alpha, \beta), \dots, \sigma_n(\alpha, \beta)$  обозначают однородные элементарные симметрические функции, а преобразованные коэффициенты  $\sigma'_i$  равны  $\sigma_i(\alpha', \beta')$ .

В силу алгебраической независимости этих элементарных функций каждому соотношению

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta] \quad (5)$$

соответствует еще одно:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad [\text{тождественно по } \sigma_0, \dots, \sigma_n], \quad (6)$$

и тем самым для неопределенных  $a_0, \dots, a_n$ :

$$G(a_0, a_1, \dots, a_n) = 0 \quad [\text{тождественно по } a_0, \dots, a_n]. \quad (7)$$

Теперь каждому целочисленному инварианту  $I(a)$  формы  $f$ , посредством подстановки  $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$ , соответствует целочисленный инвариант  $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$  формы  $g$ , где  $H$  становится целочисленной функцией от  $\alpha, \beta$ . Для этого инварианта соотношение (3) переходит в

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{тождественно по } \sigma, s_{ik}], \quad (8)$$

а из  $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$  по (8) следует

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta; s_{ik}]; \quad (9)$$

следовательно,  $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$  становится целочисленным инвариантом  $n$  линейных форм  $(\alpha_i x + \beta_i y)$ . Пусть, обратно,  $H(\alpha, \beta)$  – целочисленный инвариант этих  $n$  линейных форм, то есть удовлетворяет (9), и вместе с тем  $H(\alpha, \beta)$  равна целочисленной функции  $I(\sigma)$  от  $\sigma$ . Так как тогда также

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

то (9) можно записать и в виде

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta; s_{ik}], \quad (9a)$$

и отсюда по (5) и (6) следует также (8), а по (7) также (3). Поэтому каждому целочисленному инварианту  $I(a)$  соответствует целочисленный инвариант  $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$   $n$  линейных форм, и наоборот. Кроме того, если  $I_1(a), \dots, I_k(a)$  обозначают целочисленный базис всех  $I(a)$ , то  $H_1(\alpha, \beta), \dots, H_k(\alpha, \beta)$  становится целочисленным базисом всех  $H(\alpha, \beta)$ , которые вместе с тем являются целочисленными функциями  $I(\sigma)$ ; и здесь также по (5), (6), (7) имеет место обратное утверждение. Значит, для доказательства существования целочисленного базиса всех  $I(a)$  достаточно доказать его для всех целочисленных инвариантов  $H(\alpha, \beta)$ , которые одновременно являются целочисленными функциями  $I(\sigma)$ ; а базис

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \dots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

<sup>4</sup>Если, как часто принято в теории инвариантов, записывать  $f$  с биномиальными коэффициентами:  $f = b_0 x^n + \binom{n}{1} b_1 x^{n-1} y + \cdots + b_n y^n$ , то область всех целочисленных инвариантов  $I(b)$  расширяется по сравнению с областью  $I(a)$ , и используемые здесь выводы о конечности перестают действовать;  $I(b)$  уже не будет целочисленной функцией корней.

дает для  $I(a)$  базис  $I_1(a), \dots, I_k(a)$ .

Пусть теперь  $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$  пробегает совокупность всех целочисленных инвариантов (4). Поскольку по (3) всякий инвариант становится однородным по  $\sigma$ , а по (4) каждая  $\sigma$  однородна и линейна по коэффициентам каждой линейной формы,  $H(\alpha, \beta)$  однородна по каждому ряду  $\alpha_i, \beta_i$  и в каждом ряду имеет одинаковую размерность; кроме того, она, конечно, является симметрической функцией  $n$  рядов. Обратно, всякая целочисленная симметрическая функция  $H(\alpha, \beta)$   $n$  рядов, по отдельности однородная и одинаковой размерности в каждом ряду, по основной теореме о симметрических функциях является целой целочисленной функцией от  $\sigma$ ; следовательно, по сказанному выше она является инвариантом  $I(\sigma)$ , как только  $H(\alpha, \beta)$  инвариантна. Поэтому совокупность целочисленных инвариантов (4) характеризуется как совокупность целочисленных функций  $H(\alpha, \beta)$  со следующими свойствами:

- 1) целочисленный инвариант  $n$  линейных форм  $\alpha_i x + \beta_i y$ ;
- 2) по отдельности однородна и одинаковой размерности в каждом из  $n$  рядов  $\alpha_i, \beta_i$ ;
- 3) симметрична в рядах  $\alpha_i, \beta_i$ .

По специальной теореме конечности I, ввиду 1),  $H(\alpha, \beta)$  становится целой целочисленной функцией определителей

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

следовательно

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

В этом представлении симметрию можно выразить и формально, применив к  $G((ik))$  все перестановки  $n$  рядов:

$$n! H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \dots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \quad (10)$$

Значит,  $G^*$  вместе с каждым произведением степеней  $P$  от  $(ik)$  содержит также сумму  $Q = P^{(1)} + \dots + P^{(n!)}$  по всем перестановкам  $P$ ; причем  $G^*$  становится целочисленной линейной комбинацией конечного числа  $Q$ ,  $G^* = \sum cQ$ . Поскольку  $Q$  удовлетворяют условиям 1), 2), 3), то есть сами становятся инвариантами, достаточно рассматривать  $Q$  вместо  $G^*((ik))$ .

Пусть теперь  $P$  пробегает систему  $\mathfrak{S}$  всех произведений степеней от  $(ik)$ , встречающихся в  $Q$ , то есть удовлетворяющих условию 2). Если частное двух  $P$  является целым по  $(ik)$ , то оно также удовлетворяет условию 2), значит принадлежит  $\mathfrak{S}$ . По теореме II существует конечное число таких  $P$ , скажем  $P_1, \dots, P_\rho$ , такое что каждое  $P$  можно представить в форме

$$P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

с неотрицательными показателями  $\lambda$ . Применение всех перестановок дает отсюда

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \dots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \dots + P_1^{(n!)\lambda_1} \dots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

Следовательно,  $Q$  становится целочисленной симметрической функцией  $n!$  рядов величин, в каждом из которых  $\rho$  элементов:

$$P_1^{(1)} \dots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \dots P_\rho^{(2)}; \quad \dots; \quad P_1^{(n!)} \dots P_\rho^{(n!)};$$

поэтому по теореме III она является целой целочисленной функцией конечного числа симметрических функций этих рядов. Эти базисные функции сами являются величинами  $Q$  или элементарными симметрическими функциями  $n!$  элементов  $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \dots, P_i^{(n!)}$ , следовательно удовлетворяют условиям 1) 2) 3) и становятся целочисленными инвариантами

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma). \quad (11)$$

По (10), ввиду  $G^* = \sum cQ$ , каждый  $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$  имеет форму

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!} \Phi(I_1, \dots, I_l),$$

где  $\Phi$  означает целую целочисленную функцию; и обратно,  $\frac{1}{m!}\Phi$  становится целочисленным инвариантом, как только он становится целым по  $\alpha, \beta$ . Поэтому по теореме IV к инвариантам (11) можно добавить еще конечное число  $I_{l+1}(\sigma), \dots, I_k(\sigma)$  так, что

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \dots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

образуют целочисленный базис всех инвариантов  $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ , чем теорема для случая одной основной формы доказана.

Если речь идет о системе основных форм, то, как замечено выше, можно предполагать однородность инвариантов по коэффициентам каждой основной формы. Общие основные формы снова заменяют такими, которые соответственно являются произведениями линейных форм. Их инварианты тогда становятся: 1) инвариантами этих линейных форм; 2) по отдельности однородными по рядам, образованным из коэффициентов линейных форм, и одинаковой размерности в рядах каждой отдельной основной формы; 3) симметричными в рядах каждой отдельной основной формы. Обратно, каждому целочисленному инварианту всех линейных форм, удовлетворяющему этим условиям, снова соответствует целочисленный инвариант системы основных форм. Доказательство идет совершенно параллельно приведенному: к каждому произведению степеней  $P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$  отдельных определителей, удовлетворяющему условиям веса (теоремы I и II), надо применить все  $N = n_1!n_2! \dots n_\mu!$  перестановок, где  $n_1, \dots, n_\mu$  означают степени основных форм. Тем самым  $N \cdot I$  переходит в целочисленную симметрическую функцию  $N$  рядов, каждый из которых имеет  $\rho$  элементов; отсюда получается целочисленный базис для всех  $N \cdot I$ , а следовательно, по теореме IV, целочисленный базис для всех  $I$ .

### § 3. Базис целочисленных инвариантов бинарных линейных форм

Теперь остается добавить доказательство специальной теоремы конечности I. По известной теореме, впервые доказанной Clebsch, все целые рациональные инварианты  $n$  линейных форм  $\alpha_i x + \beta_i y$  являются целыми рациональными функциями определителей  $(ik)$ . В частности, все целочисленные инварианты этих линейных форм становятся целыми рациональными, но не обязательно целочисленными функциями этих определителей.

Ниже будет показано, что благодаря тождественным соотношениям между  $(ik)$  это представление всегда возможно сделать целочисленным.

В формулах и на языке теории модулей это выражается так. Пусть  $\xi_{ik}$ , где  $i < k$ , — неопределенные; тогда совокупность всех целочисленных многочленов  $F(\xi_{ik})$  со свойством, что  $F((ik))$  тождественно обращается в нуль по  $\alpha, \beta$ , образует модуль  $\mathfrak{M}$ , поскольку сумма двух таких  $F$ , а также произведение такого  $F$  с произвольным целочисленным многочленом от  $\xi_{ik}$ , снова принадлежит этой совокупности. В формулах: из

$$F((ik)) = 0 \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta]$$

следует

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}],$$

и наоборот.

Я теперь покажу, что совершенно аналогично имеет место следующее. Из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta]$$

$$\text{следует} \quad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}], \quad (1)$$

и обратно, причем для каждого простого числа  $p$ . Тем самым  $\mathfrak{M}$  также тождественен модулю  $\mathfrak{M}_p$ , соответствующему совокупности всех соотношений между  $(ik)$  по модулю  $p$ ; этот модуль состоит из всех целочисленных многочленов  $F(\xi_{ik})$ , для которых  $F((ik))$  по модулю  $p$  тождественно обращается в нуль по  $\alpha, \beta$ .



Что (1) означает целочисленную представимость, видно так. (1) можно записать и в форме: из  $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$  [тождественно по  $\alpha, \beta$ ] следует

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}],$$

а значит, по определению  $\mathfrak{M}$ ,

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta].$$

<sup>5</sup> Следовательно,  $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$ , или

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Если, стало быть, дано представление

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

где  $p_1, \dots, p_\rho$  означают простые числа, то отсюда также следует

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1-1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik)),$$

и через конечное повторение получается целочисленность представления.

Для доказательства (1) обозначим через

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \quad i < k < r < s$$

формы от неопределенных  $\xi_{ik}$ , соответствующие квадратичным соотношениям между  $(ik)$ :

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0,$$

а через  $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$  – порожденный ими модуль целочисленных многочленов. Из

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{следует значит:} \quad F((ik)) = 0 \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta],$$

$$\begin{aligned} \text{из } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{следует } F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta]. \end{aligned} \quad (2)$$

Я теперь покажу, посредством нормирования классов вычетов относительно  $\mathfrak{N}$ , что имеет место и обратное к (2); тогда будет доказано  $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ , а вместе с тем и (1). При этом  $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$  получается как специальный случай  $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$  для  $p = 0$ ; случай  $p = 0$  всегда включен в дальнейшие рассуждения. Иначе говоря:  $f_{ik,rs}$  образуют целочисленный базис модуля  $\mathfrak{M}_p$ , в частности также  $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$ .

#### а) Случай двух или трех рядов $\alpha_i, \beta_i$

Поскольку еще не встречаются четыре различных индекса,  $\mathfrak{N}$  является нулевым модулем. Поэтому надо показать, что из

$$\begin{aligned} F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta] \\ \implies F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}], \end{aligned} \quad (3)$$

чем (1) будет доказано при  $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$ .

Поскольку условие  $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$  должно выполняться отдельно для компонент, однородных в отдельных рядах, достаточно всюду предполагать, что  $F((ik))$  однороден в каждом отдельном ряду, а значит  $F(\xi_{ik})$  однороден в каждом индексе. В случае двух рядов имеется только

<sup>5</sup>Этот последний вывод одновременно доказывает обратное направление (1).

один определитель (12) и соответствующая неопределенная  $\xi_{12}$ . Из принятой однородности получаем  $F = c \xi_{12}^\nu$ . Из

$$c(12)^\nu \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta]$$

ввиду (12)  $\not\equiv 0 \pmod{p}$  [тождественно по  $\alpha, \beta$ ] всегда следует  $c \equiv 0 \pmod{p}$ ; значит

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}],$$

чем доказано (3), а значит и (1).

В случае трех рядов имеются определители (12), (13), (23), которым соответствуют неопределенные  $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$ ; поэтому

$$F = \sum c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Пусть  $F$  имеет соответственно степени  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$  в индексах 1, 2, 3; тогда имеется система уравнений

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \quad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \quad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23}$$

с единственным обратным решением:

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3);$$

следовательно, каждый по отдельности однородный  $F$  содержит не более одного члена,

$$F = c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

откуда, как выше, следует выполнение (3), а значит и (1).

#### б) Случай 4 рядов $\alpha_i, \beta_i$

Возникают шесть неопределенных  $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$  и соответствующие определители; и  $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$ . В силу

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}} \quad (4)$$

каждое произведение степеней от  $\xi_{ik}$  по модулю  $\mathfrak{N}$  конгруэнтно линейной целочисленной комбинации таких произведений степеней, в которых произведение  $\xi_{14}\xi_{23}$  не встречается. Поэтому для каждого многочлена  $F(\xi_{ik})$  имеем

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (5)$$

где  $F_0$  не содержит произведения  $\xi_{14}\xi_{23}$ ;  $F_0$  будем называть нормированным многочленом класса вычета  $F$ . При этом по отдельности однородному  $F$ , поскольку (4) по отдельности однородно, снова соответствует по отдельности однородный  $F_0$ .

Положу теперь

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34} F_1(\xi_{ik}), \quad (6)$$

где  $G$  не содержит произведения степеней, делимого на  $\xi_{34}$ , и далее

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \quad (7)$$

Из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta]$$

теперь по (5), с учетом (2), следует

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta]; \quad (8)$$

а отсюда через специализацию  $\alpha_4 = \alpha_3$ ,  $\beta_4 = \beta_3$ , по (6) и (7),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta].$$

Поэтому по доказанному в пункте а)

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}],$$

и отсюда следует, как еще будет показано ниже,

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}].$$

Значит по (6)

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}],$$

а ввиду (34)  $\not\equiv 0 \pmod{p}$  [тождественно по  $\alpha, \beta$ ] из (8) также следует

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta],$$

где  $F_1(\xi_{ik})$  снова нормирован и имеет меньшую степень по  $\xi_{34}$ . Конечное повторение процедуры приводит к

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

где  $F_\lambda$  имеет нулевую степень по  $\xi_{34}$ , значит по только что доказанному обращается в нуль по модулю  $p$ . Таким образом получаем

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}], \quad \text{или} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}], \end{aligned} \quad (9)$$

чем доказано обратное к (2), а значит и (1); одновременно в более сильном утверждении для  $F_0(\xi_{ik})$ .<sup>6</sup>

Остается добавить, что из  $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$  следует также  $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ ; то есть из  $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$  следует и  $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ . Только для этой части индукционного шага нужно нормирование. Поскольку при подстановке  $\xi_{14} = \xi_{13}$  отдельные произведения степеней из  $G$  не исчезают, обращение  $K$  в нуль могло бы произойти лишь потому, что различным произведениям степеней в  $G$  соответствуют одинаковые в  $K$ ; а это, в свою очередь, возможно только если эти произведения степеней различаются лишь перестановкой индексов 3 и 4. Пусть такое, по предположению нормированное, произведение степеней, например, имеет вид

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

В силу предполагаемой отдельной однородности по каждому индексу замене 3 на 4 в одном  $\xi_{ik}$  должна соответствовать замена 4 на 3 в другом; соответствующий член содержал бы вместо  $\xi_{13}\xi_{24}$  произведение  $\xi_{14}\xi_{23}$ , что исключено нормированием. Совершенно так же против

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

мог бы сократиться лишь член, содержащий множитель  $\xi_{14}\xi_{23}$ , что снова исключено нормированием. Следовательно, из  $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$  следует также  $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ .

### с) Случай $n$ рядов $\alpha_i, \beta_i$

Случай  $n$  рядов  $\alpha_i, \beta_i$  теперь устраняется полной индукцией, в точном обобщении только что рассмотренного случая четырех рядов.<sup>7</sup> Сначала я снова покажу, что для каждого многочлена  $F$  имеет место конгруэнция

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}], \quad (10)$$

<sup>6</sup>Это более сильное утверждение означает, что каждый класс вычетов содержит только один нормированный многочлен.

<sup>7</sup>Доказательство остается верным и для  $n = 3$ .

где  $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$  и где  $F_0(\xi_{ik})$  нормирован. Нормирование должно состоять в следующем: если  $i, k, r, s$  – четыре различных индекса и  $i < k < r < s$ , то  $F_0$  не должен содержать произведение  $\xi_{is}\xi_{kr}$ ; то есть индексы одного  $\xi$  не должны оба лежать между индексами другого. Это нормирование еще не накладывает ограничения в случае двух и трех рядов, где каждый многочлен нормирован; и в случае четырех рядов, как показано, для каждого класса вычетов существует нормированный многочлен. Поэтому существование нормированного многочлена для каждого класса вычетов можно считать доказанным для  $(n-1)$  рядов.

Произвольное произведение степеней из  $F$  запишем в форме

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P,$$

где  $P$  уже не содержит индекс  $n$ . По предположению  $P$  конгруэнтно по модулю  $\mathfrak{N}$  некоторому целочисленному нормированному многочлену  $P_0$ :

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Если теперь  $P_0$  не содержит такого  $\xi_{rs}$ , что хотя бы для одного индекса  $i_\lambda$  эти  $r, s$  лежат между  $i_\lambda$  и  $n$  ( $i_\lambda < r < s < n$ ), то нормирование уже достигнуто, поскольку для произведения любых двух  $\xi$  из  $P_0$  условия выполнены. В противном случае пусть  $i_\lambda$  – такой индекс, что  $i_\lambda < r < s < n$ , а  $P_0^*$  – произведение степеней из  $P_0$ , содержащее  $\xi_{rs}$ ; из-за

$$\xi_{i_\lambda n} \xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s} \xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r} \xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

получаем

$$\begin{aligned} & \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\ & \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\ & \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}}, \end{aligned}$$

где  $Q_0$  и  $R_0$  снова обозначают нормированные многочлены классов вычетов  $Q$  и  $R$ ;  $Q_0$  и  $R_0$  существуют по предположению, так как  $Q$  и  $R$  не содержат индекс  $n$ , и они заведомо являются целочисленными многочленами, поскольку  $Q$  и  $R$  – просто произведения степеней. Из  $i_\lambda < r < s < n$  следует также

$$((n - i_1) + \cdots + (n - r) + \cdots + (n - i_\nu)) < ((n - i_1) + \cdots + (n - i_\lambda) + \cdots + (n - i_\nu)),$$

$$((n - i_1) + \cdots + (n - s) + \cdots + (n - i_\nu)) < ((n - i_1) + \cdots + (n - i_\lambda) + \cdots + (n - i_\nu)).$$

Таким образом, при переходе от  $P_0^*$  к  $Q_0, R_0$  эта сумма разностей уменьшилась; а так как эта сумма необходимо  $\geq \sigma$ , процедура для каждого произведения степеней  $P_0^*$  должна завершиться после конечного числа шагов. Следовательно,

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n} \cdots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

где целочисленный многочлен  $F_0(\xi_{ik})$  необходимо нормирован, поскольку иначе сумму разностей можно было бы еще уменьшить; этим доказано (10). Далее, так как по предположению при  $(n-1)$  индексах каждому по отдельности однородному  $F$  соответствует по отдельности однородный нормированный  $F_0$ , указанная процедура показывает, что это верно и для  $n$  индексов; поэтому ниже речь идет только о по отдельности однородных многочленах.

Положу теперь, аналогично пункту b),

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}), \quad (11)$$

<sup>8</sup> где  $G$  не содержит произведения степеней, делимого на  $\xi_{n-1,n}$ , и далее

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i,n-1}} = K(\xi_{ik}); \quad (12)$$

как показывает определение нормирования, наряду с  $G$  нормирован и  $K$ .

Тогда между  $G$  и  $K$  снова имеется взаимно однозначное соответствие; ведь только таким различным произведениям степеней из  $G$  могут соответствовать одинаковые в  $K$ , которые отличаются лишь перестановкой индексов  $n$  и  $(n-1)$ . Пусть, например,  $G$  имеет степень  $\rho$  по индексу  $(n-1)$ , степень  $\sigma$  по индексу  $n$ , и пусть

$$\chi_1 \leq \chi_2, \dots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \dots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

являются индексами, соединенными в одном произведении степеней из  $G$  с  $(n-1)$  и  $n$ ; их число должно быть  $\rho + \sigma$ , поскольку по (11) неопределенная  $\xi_{n-1,n}$  в  $G$  не встречается. Тогда благодаря нормированию произведение степеней имеет вид

$$\xi_{\chi_1, n-1} \cdots \xi_{\chi_\rho, n-1} \xi_{\chi_{\rho+1}, n} \cdots \xi_{\chi_{\rho+\sigma}, n} P(\xi_{ik}),$$

где  $P(\xi_{ik})$  уже не содержит индексов  $n$  и  $(n-1)$ . Всякая перестановка  $n$  с  $(n-1)$  дает при  $i \neq j$  множитель  $\xi_{in}\xi_{j,n-1}$  с  $i < j$ ; значит  $j, n-1$  лежит между  $i$  и  $n$ , и член не был бы нормирован. Поэтому при фиксированных  $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_{\rho+\sigma}$  и фиксированном  $P$  многочлен  $G$  содержит только одно произведение степеней; тем самым показано, что различным произведениям степеней из  $G$  соответствуют различные в  $K$ .

$$\text{Из } K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ следует поэтому } G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \quad (13)$$

Из

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta]$$

теперь по (10), с учетом (2), следует

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta], \quad (14)$$

а отсюда через специализацию  $\alpha_n = \alpha_{n-1}$ ,  $\beta_n = \beta_{n-1}$ , по (11) и (12),

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta]. \quad (15)$$

Так как  $K(\xi_{ik})$  нормирован и содержит только  $(n-1)$  индексов, по доказанному в пункте а) и в пункте б) (9), ввиду (15), можно предположить

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}],$$

и отсюда по (13) следует

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}].$$

По (11) получаем

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}],$$

---

<sup>8</sup>Тождество, соответствующее (10) и (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1, n) \cdot F_1((ik)),$$

является аналогом разложения Клебша–Гордана в ряд, если два ряда  $(n-1)$  и  $(n)$  заменить рядами переменных  $x, y$ , то есть  $(n-1, n)$  заменить на  $(xy)$ . Но тогда как у Клебша–Гордана речь идет о разложении по полярам, нормирование  $F_0$  соответствует «начальным членам» полярных, и тем самым позволяет добиться целочисленности, которой у Клебша–Гордана нет. Известное доказательство того, что без учета целочисленности  $f_{ik,rs}$  образуют базис  $\mathfrak{M}$ , проводится именно посредством разложения Клебша–Гордана в ряд (Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, с. 132).

а ввиду  $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$  [тождественно по  $\alpha, \beta$ ] из (14) также следует

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \alpha, \beta],$$

где  $F_1(\xi_{ik})$  снова нормирован и имеет меньшую степень по  $\xi_{n-1,n}$ , чем  $F_0$ . Конечное повторение процедуры приводит к

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

где  $F_\lambda$  имеет нулевую степень по  $\xi_{n-1,n}$ , значит по только что доказанному обращается в нуль по модулю  $p$ . Таким образом получаем

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}] \quad \text{или} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{P}, p)} \quad [\text{тождественно по } \xi_{ik}]. \end{aligned} \quad (16)$$

Этим доказано обратное к (2), а следовательно и (1); одновременно для  $F_0(\xi_{ik})$  доказано более сильное утверждение, использованное в индукционном шаге, и в случае  $n$  индексов, то есть вообще.

## § 4. Конечность целочисленных инвариантов конечных групп

Элементарное доказательство конечности, данное в моей заметке «Теорема конечности инвариантов конечных групп»,<sup>9</sup> посредством специальных теорем конечности III и IV из § 1 допускает уточнение до целочисленности; тогда как обычное доказательство, опирающееся на гильбертову теорему о базисе модуля, этой целочисленности не дает. Даже привлечение целочисленного базиса модуля дает только представление, в знаменателе которого появляется сколь угодно высокая степень целого числа  $h$ , порядка группы.

Я всюду пользуюсь обозначениями указанной заметки. Пусть конечная группа  $\mathfrak{H}$  состоит из  $h$  линейных преобразований (с ненулевым определителем)<sup>10</sup>  $A_1, \dots, A_h$ , причем  $A_k$  задает линейное преобразование

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \dots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

или сокращенно  $(x^{(k)}) = A_k(x)$ . Итак, группа  $\mathfrak{H}$  переводит ряд  $(x)$  с элементами  $x_1, \dots, x_n$  в ряды  $(x^{(k)})$  с элементами  $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ . При этом коэффициенты  $a_{i\nu}^{(k)}$  предполагаются алгебраическими целыми числами; это не ограничивает общности, поскольку по теореме J. Schur<sup>11</sup> всякая конечная группа линейных преобразований подобна такой, для которой  $a_{i\nu}^{(k)}$  становятся алгебраическими целыми числами.

Под целочисленным (абсолютным) инвариантом группы будем понимать такую целую рациональную функцию от  $x_1, \dots, x_n$ , с коэффициентами в целых числах алгебраического числового поля  $\mathfrak{K}$ , порожденного  $a_{i\nu}^{(k)}$ , которая при применении  $A_1, \dots, A_h$  остается тождественно неизменной; для такого инварианта  $f(x)$  имеем

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

Обратно, всякая целочисленная симметрическая функция  $h$  рядов величин  $(x^{(k)})$  также становится целочисленным инвариантом группы.

<sup>9</sup>Math. Ann. 77, с. 89 (1915).

<sup>10</sup>Достаточно было бы предположить, что  $\mathfrak{H}$  просто изоморфна абстрактной конечной группе; то есть если определитель преобразования одного из  $A$  обращается в нуль, то  $\mathfrak{H}$  должна быть подобна группе  $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , где определители подстановок из  $\mathfrak{S}$  не обращаются в нуль. Инварианты  $\mathfrak{H}$  в этом случае совпадают с инвариантами  $\mathfrak{S}$ , так что условие ненулевости определителей фактически не ограничивает общности.

<sup>11</sup>Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. Math. Ann. 71, с. 555 (1912).

Пусть  $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\rho$  обозначает базис всех целых чисел из  $\mathfrak{A}$ , так что каждый инвариант можно представить как

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \dots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

где  $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$  имеют рационально-целые коэффициенты. По (1) получаем

$$h f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^h f_1(x^{(k)}) + \dots + \omega_\rho \sum_{k=1}^h f_\rho(x^{(k)}).$$

Здесь отдельные суммы являются симметрическими функциями  $h$  рядов величин  $(x^{(k)})$ , причем с рационально-целыми коэффициентами; значит по теореме III они выражимы цело и рационально, с рационально-целыми коэффициентами, через конечное число целорационально-числовых симметрических функций этих рядов. Эти базисные функции  $I_1(x), \dots, I_\sigma(x)$  при этом, по сказанному выше, становятся целочисленными инвариантами группы, вообще говоря с алгебраически-целыми коэффициентами, поскольку  $\mathfrak{H}$  вместе с  $A$  не обязана содержать все алгебраически сопряженные преобразования.

Следовательно, существует представление

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \dots + \omega_\rho G_\rho(I), \quad (2)$$

где  $G_1, \dots, G_\rho$  имеют рационально-целые коэффициенты.

Пусть теперь  $w_1, \dots, w_\rho$  — неопределенные, и пусть

$$L = w_1 G_1(I) + \dots + w_\rho G_\rho(I)$$

пробегает все линейные формы от  $w$ , которым при подстановке  $w_i = \omega_i/h$  соответствуют инварианты  $f(x)$  в представлении (2). Тогда по гильбертовой теореме о целочисленном базисе модуля получаем

$$L = A_1(I) L_1 + \dots + A_\tau(I) L_\tau, \quad (3)$$

где  $A_i$  имеют рационально-целые коэффициенты и где, ввиду линейности всех  $L$  по  $w$ , функции  $A_i$  уже не содержат  $w$ . Если теперь при подстановке  $\omega_i = w_i/h$  формам  $L_1, \dots, L_\tau$  соответствуют инварианты  $\mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$ , то (3) при этой подстановке переходит в

$$f(x) = A_1(I) \mathfrak{I}_1(x) + \dots + A_\tau(I) \mathfrak{I}_\tau(x). \quad (4)$$

Это представление (4) показывает, что

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

образуют базис всех целочисленных инвариантов группы  $\mathfrak{H}$ , такой что каждый инвариант можно цело и рационально, с рационально-целыми коэффициентами, представить через это конечное число инвариантов.

Если группа  $\mathfrak{H}$ , в частности, обладает свойством, что вместе с каждым преобразованием  $A$  она содержит также все  $A', A'', \dots$  с алгебраически сопряженными числовыми коэффициентами, то целорационально-числовые симметрические функции  $h$  рядов  $(x^{(k)})$  становятся функциями от  $x$  с рационально-целыми коэффициентами; это, в частности, верно и для базисных функций симметрических функций. Если поэтому ограничиться инвариантами  $f(x)$  с рационально-целыми коэффициентами, то и базисные функции

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

имеют рационально-целые коэффициенты. Следовательно, при этом специальном предположении, которое вообще для групп  $\mathfrak{H}$  не выполняется, целочисленная конечность имеет место также для подобласти инвариантов с рационально-целыми коэффициентами.

## 16. К разложениям в ряды в теории форм

*Mathematische Annalen* 81 (1920), с. 25–30

Под «разложением в ряды в теории форм», как известно, понимают, с одной стороны, обобщение разложения Клебша–Гордана: то есть разложения формы, содержащей два бинарных ряда, по степеням определителя этих рядов, где коэффициенты являются полярами форм только от одного ряда переменных, или, что то же самое, обращаются в нуль при применении  $\Omega$ -процесса. Это обобщается на формы от произвольно многих серий по  $n$  переменных. С другой стороны, как обобщение нормальных форм, возникающих для «комплексных координат»  $t_{ik}$ , имеется в виду разложение по нормальным формам для форм, которые одновременно содержат величины различных уровней  $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$ . Но этот второй вид разложения можно получить из первого посредством инвариантных процессов дифференцирования, как это прежде всего выполнили Мертенс и Дерейтс.<sup>1</sup>

Различные разложения первого вида все возникают, как это кратко намечено, например, в *Math. Ann.* 77, цит. место III, как следствия разложения формы от  $n$  рядов по  $n$  переменных по степеням определителя этих рядов, причем коэффициенты являются полярами форм только от  $(n - 1)$  рядов и сами выводятся из исходной формы образованием поляра и  $\Omega$ -процессом.<sup>2</sup> Первоначальное разложение Клебша–Гордана ( $n = 2$ ) шло еще на шаг дальше: специальные возникающие там полярные процессы заданы явно, даже вместе с числовыми коэффициентами.

То, что я теперь хочу добавить к указанной заметке, где разложение в ряды понимается скорее понятийно, как задача о линейных пучках форм, есть явное, с точностью до числовых коэффициентов, представление, получаемое специализацией исследований Э. Фишера<sup>3</sup> об общих модульных системах.

К такому включению приводит истолкование нормальной формы в  $t_{ik}$ . Именно, если заменить «комплексные координаты»  $t_{ik}$  «линейными координатами»

$$p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i),$$

то из-за тождественных соотношений между  $p_{ik}$  представление формы  $F(p_{ik})$  уже не является однозначным. Однозначности можно добиться, если требовать, чтобы между коэффициентами  $F$  выполнялись те же линейные соотношения, что и между произведениями степеней  $p_{ik}$ , входящими в  $F$ .<sup>4</sup> Поэтому для этой нормальной формы  $\Phi$  имеем:

$$\begin{aligned} F(p_{ik}) &= \Phi(p_{ik}) \quad [\text{тождественно по } x, y], \quad \text{или} \\ F(t_{ik}) &\equiv \Phi(t_{ik}) \pmod{M}, \end{aligned} \tag{1}$$

где  $M$  обозначает модуль всех тождественных соотношений между  $p_{ik}$ , то есть состоит из всех форм  $G(t_{ik})$ , для которых  $G(p_{ik})$  тождественно по  $x, y$  обращается в нуль.  $\Phi(t_{ik})$  есть «нормальная форма» в комплексных координатах, тогда как базисные функции модуля  $M$  становятся квадратичными формами в  $t_{ik}$ . Итерируя этот процесс относительно множителей этих базисных функций, получают полное разложение в ряды. Соответствующие рассуждения применимы и при одновременном появлении  $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$

К аналогичной схеме сводится разложение по полярам. Если, например, в форме  $F(x, y, z)$  заменить три тернарных ряда  $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$  такими рядами  $\xi, \eta, \zeta$ , которые линейно составлены только из двух из них, например  $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$ , то представление  $F(\xi, \eta, \zeta)$

<sup>1</sup>F. Mertens, Über invariante Gebilde quaternärer Formen (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)) для кватернарного случая. Общие нормальные формы имеются у J. Deruyts: Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques, Bulletins de l'Ac. R. de Belgique 24 (1892). Не зная этой работы, я, точно следуя Мертенсу, дала общее разложение по нормальным формам в § 7 работы: Zur Invariantentheorie der Formen von  $n$  Variabeln, J. f. M. 139 (1910).

<sup>2</sup>Ср. библиографические указания в цитированном месте. С тех пор появилась также основанная на формальном методе работа: Schouten, Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillende graad, Verslag Ak. Amsterdam 27 (1919), с. 1481.

<sup>3</sup>E. Fischer, Über die Differentiationsprozesse der Algebra, J. f. M. 148 (1917).

<sup>4</sup>Ср. Clebsch, Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872).



снова не является однозначным. И здесь можно предписать для коэффициентов те же линейные соотношения, что и для произведений степеней  $\xi, \eta, \zeta$ , входящих в  $F$ . Так как здесь модуль  $M$  всех тождественных соотношений имеет в качестве базисной функции определитель  $\Delta = (xyz)$  трех рядов (цит. место III, вспомогательная лемма а)), вместо [1] получается:

$$\begin{aligned} F(\xi, \eta, \zeta) &= \Phi(\xi, \eta, \zeta) \quad [\text{тождественно по } x, y], \quad \text{или} \\ F(x, y, z) &\equiv \Phi(x, y, z) \pmod{\Delta}. \end{aligned} \quad (2)$$

Оказывается, что  $\Phi$  возникает образованием поляр (ср. формулу (2) в цитированном месте); полное разложение в ряды снова получается итерацией.

Итак, образование нормальных форм  $\Phi$  в обоих случаях подчиняется следующей задаче. Если в  $F(z)$  неизвестные  $z_i$  заменить многочленами  $f_i(\xi)$  от параметров  $\xi$ , так что представление  $F(f_i(\xi))$  уже не является однозначным, то однозначность должна быть закреплена требованием, чтобы между коэффициентами выполнялись те же линейные соотношения, что и между произведениями степеней  $f_i(\xi)$ , входящими в  $F$ . Значит,

$$\begin{aligned} F(f_i(\xi)) &= \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{тождественно по } \xi], \quad \text{или} \\ F(z) &\equiv \Phi(z) \pmod{M}, \end{aligned} \quad (3)$$

где  $M$  обозначает модуль всех тождественных соотношений между  $f_i(\xi)$ .

Для этой нормальной формы  $\Phi(z)$  Э. Фишер в § 11, I своей цитированной работы дал явное, с точностью до числовых коэффициентов, разложение, а именно посредством линейных операций. Одновременно во введении III и в § 6 II он дал для разности  $F - \Phi$ , принадлежащей  $M$ , при условии знания базиса модуля, явное выражение в том же смысле; и, соединяя эти разложения в § 11 II, тем самым заменил формулу [3] явным представлением. При этом все еще открытый вопрос о числовых коэффициентах, согласно § 12 той же работы, тождественен нахождению собственных значений и собственных функций линейных операций (формула 82).

Теперь в пункте 1 я специализирую формулы Фишера на случай разложения в ряды по полярам и получаю из них путем итерации разложение в ряды. Операция для определения  $\Phi$  при этом переходит в определенные полярные процессы, что существенно точнее приведенной выше, до сих пор известной формулировки. В операции для определения  $F - \Phi$  смешанно выступают умножение на определитель  $\Delta$  и  $\Omega$ -процесс. Чтобы получить обычную, неявную форму, нужно еще заметить, что  $\Omega\Delta$  выражается через полярные процессы.

Здесь следует добавить еще одно исправление. В указанной работе (с. 101, строка 6 сверху) я по ошибке приняла тождественное преобразование

$$\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi),$$

которое справедливо только в бинарной области, за общезначимое и тем самым сделала переход от фундаментальной формулы (2), дающей выражение для нормальной формы  $\Phi$  в [2], к разложению в ряды (3). Поэтому приведенные там рассуждения дают лишь формулу (2) и, как ее специальный случай, редукционную теорему (1); но, поскольку отсутствует явное выражение для разности  $F - \Phi$ , они недостаточны для обоснования разложения в ряды.

В пункте 2 я точно так же, специализацией, получаю нормальную форму  $\Phi(t_{ik})$  из [1]; более общо, нормальную форму  $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$ , что приводит к известным явным формулам. Но поскольку построение полного разложения в ряды требует знания базиса модуля  $M$ , здесь предпочтителен инвариантно-теоретический путь (ср. указанную литературу), который этого знания не требует, а напротив, посредством разложения в ряды сам дает базис модуля.

1. По Фишеру, § 11 (формула (19) и следующие строки), нормальная форма  $\Phi(z)$  из [3], там обозначенная  $N(\zeta)$ , задается так:

$$\Phi(z) = (a_1S + a_2S^2 + \dots + a_rS^r)F(z), \quad (4)$$

где постоянные  $a_1, \dots, a_r$  принадлежат области коэффициентов  $f(\xi)$  и зависят только от степени

$F(z)$ ; оператор  $S$  определен формулами

$$\begin{aligned} S &= AB; \quad BF(z) = F(f(\xi)); \\ AF(f(\xi)) &= \left\{ \sum z_i f_i \left( \frac{\partial}{\partial \xi} \right) \right\}^p F(f(\xi))^5. \end{aligned} \quad (5)$$

Если в [2] рассматривать  $F$  как форму  $p$ -го измерения только по  $z$ , то  $f_i(\xi)$  специализируется в  $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$ ; следовательно, получается:

$$\begin{aligned} BF &= F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y), \\ SF &= \left\{ \sum z_i \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_i} \right) \right\}^p F(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y), \end{aligned}$$

или, в записи полярными процессами (ср. цит. место II, 2 и 3; также о сокращенном обозначении),

$$SF(x, y, z) = \frac{1}{p!} \left[ z \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p \left[ (\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p F(x, y, z). \quad (6)$$

Формулами [4] и [6] дано нужное явное выражение для  $\Phi(x, y, z)$ ; вместе с тем  $\Phi(x, y, z)$  подчиняется общей форме, упомянутой в начале ( $\sum PH$  в (2), цит. место): полярным выражений, зависящих только от двух рядов и получаемых из  $F$  полярными процессами. Остаточные неопределенными коэффициенты  $a_i$  являются рациональными числами, поскольку здесь  $f_i(\xi)$  имеют целые рациональные числовые коэффициенты. Если записать [2] в форме

$$F = \Phi + \Delta F_1, \quad (2a)$$

то специализацией формулы, данной Фишером во введении III и в § 6 II (с. 41), получается

$$F_1 = (c_1 \Omega + c_2 \Omega \Delta \Omega + \dots + c_i \Omega \Delta \Omega \dots \Delta \Omega) F^6, \quad \left[ \Omega = \left( \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \right) \right], \quad (7)$$

где  $c_i$  снова рациональные числа, зависящие только от степени  $F$ .

Итерация приводит к

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \dots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \dots,$$

где всякий раз  $\Phi_i$  являются нормальными формами, соответствующими  $F_i$ . Так как  $F_i$  имеет по  $z$  степень  $(p - i)$ , из [4] и [6] получается:

$$\begin{aligned} \Phi_i &= (a_{i1} S_i + a_{i2} S_i^2 + \dots) F_i, \\ S_i F_i &= \frac{1}{(p - i)!} \left[ z \left( \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^{p-i} \left[ (\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^{p-i} F_i. \end{aligned} \quad (8)$$

Формуле [7] соответствует

$$F_i = (\alpha_{i1} \Omega + \alpha_{i2} \Omega \Delta \Omega + \dots) F_{i-1}, \quad \text{и через итерацию}$$

$$F_i = (\beta_1 \Omega^i + \beta_2 \Omega^i \Delta \Omega + \dots + \beta_\rho \Omega^{k_1} \Delta \Omega^{k_2} \dots \Delta \Omega^{k_\lambda} + \dots) F, \quad (k_1 + k_2 + \dots + k_\lambda - \lambda + 1 = i). \quad (9)$$

Посредством [8] и [9] в разложении

$$F = \Phi + \Delta \Phi_1 + \Delta^2 \Phi_2 + \dots + \Delta^i \Phi_i + \dots + \Delta^p \Phi_p$$

достигнуто явное представление в указанном смысле.

<sup>5</sup>Ср. формулу (75). В случае [3] сумма  $\alpha$  пробегает все произведения степеней  $p$ -го измерения, и поэтому (75) специализируется в [5].

<sup>6</sup>Эту специализированную формулу Керим использует в своей скоро выходящей эрлангенской диссертации в применении к «формам инерции».

Если применить к [7] тождественное преобразование  $\Omega\Delta F = PF$ , где  $P$  означает полярные процессы,<sup>7</sup> то из-за перестановочности этих процессов с  $\Omega$ -процессом получается известная формула

$$F_1 = P\Omega F; \quad \dots; \quad F_i = P\Omega^i F;$$

и отсюда вместе с [8] или с рассуждениями в цитированном месте следует известная форма разложения в ряды, как, например, в (3) в цитированном месте. Если речь идет о  $n$  рядах по  $n$  переменных,  $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(n-1)}, z$ , то соответственно

$$f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \dots + \lambda_{n-1} x_i^{(n-1)};$$

и точно так же  $\Delta$  и  $\Omega$  нужно определить для  $n$  рядов.

2. Для нормальной формы  $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots)$  функции  $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \dots$  заданы одно-, двух-, вплоть до  $(n-1)$ -рядными определителями

$$\xi_i^{(1)}, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \quad \dots, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)}\dots\xi^{(n-1)})_{i_1 i_2 \dots i_{n-1}}.$$

Тем самым, как специализация [5], получается:

$$S = AB; \quad BF = F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \dots),$$

$$ABF = \left( \sum t_i \frac{\partial}{\partial \xi_i^{(1)}} \right)^{\lambda_1} \left( \sum t_{ik} \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \right)_{ik} \right)^{\lambda_2} \dots F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \dots),$$

где  $\lambda_1, \lambda_2, \dots$  обозначают степени по  $t_i, t_{ik}, \dots$

Из инвариантно-теоретических соображений, а именно из того, что все инварианты  $F$ , линейные по коэффициентам, можно линейно составить из  $\Phi$  и из форм из  $M$ , следовательно в частности и не принадлежащее  $M$  выражение  $SF$ ,<sup>8</sup> здесь следует конгруэнция  $\Phi \equiv a_1 SF \pmod{M}$ ; и в силу свойства нормальной формы отсюда вместо [4] получается простое соотношение

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \quad (10)$$

Второе равенство справедливо потому, что применение  $S$  обращает в нуль всякую форму из  $M$ . Формула [10] показывает, что сама нормальная форма  $\Phi$  одновременно является собственной функцией; и действительно, по приведенному выше инвариантному рассуждению нет других собственных функций, которые одновременно были бы инвариантами  $F$  (ср. к [10] Дерейтс, формулы (10) и (10')).

### Исправления.

1. В работе «Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen» (*Math. Ann.* 77) на с. 121, строка 8 сверху, строка 9 сверху и строка 11 снизу, поле  $(H, Y)$  нужно заменить на «поле  $(H, Y, Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)})$ , где  $Y', \dots, Y^{(\lambda_0-1)}$  обозначают сопряженные с  $Y$  относительно  $H$ ». Соответственно на с. 120, строка 5 сверху, и с. 121, строка 9 сверху,  $(H, y)$  нужно заменить на  $(H, y, y', \dots, y^{(\lambda_0-1)})$ .

2. В работе «Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe» (*Math. Ann.* 78) в формулировке теоремы Гильберта о неприводимости, с. 222, строка 3 снизу, вместо «числовое поле  $\Omega$ » точнее должно стоять: «конечное алгебраическое числовое поле  $\Omega$ », на что мне указывает господин Островский. Действительно, например, относительно поля всех алгебраических чисел группа всякого уравнения с алгебраическими числовыми коэффициентами является тождественной группой. Соответственно во введении под «произвольной областью рациональности» следует понимать конечное алгебраическое числовое поле, к которому еще можно присоединить конечное число параметров, или одну из возникающих таким образом промежуточных областей.

(Принято в сентябре 1919 г.)

<sup>7</sup>Ср., например, F. Mertens, Über ganze Funktionen von  $m$  Systemen von je  $n$  Unbestimmten, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, формула (5).

<sup>8</sup>Это следует, например, из § 6 и § 7, 2 моей цитированной работы «Zur Invariantentheorie der Formen von  $n$  Variabeln».

## 17. Совместно с В. Шмайдлером: модули в некоммутативных областях, в особенности из разностных выражений

*Mathematische Zeitschrift* 8 (1920), с. 1–35

### Содержание.

Введение.

- § 1. Формальные сведения о дифференциальных и разностных выражениях.
- § 2. Общая полиномиальная область.
- § 3. Односторонние модули и их группы остатков.
- § 4. Приводимость групп остатков к двум подгруппам и их связи с модулем.
- § 5. Вычисления с единицами и приводимость к  $k$  подгруппам.
- § 6. Теоремы конечности.
- § 7. Один случай однозначного разложения.
- § 8. Аддитивное разложение вполне приводимых групп на простые группы. Теорема об изоморфизме.
- § 9. Связь между понятиями «изоморфный» и «того же вида».
- § 10. Существование бесконечно многих разложений группы.
- § 11. Связи с системами дифференциальных уравнений и их интегралами.
- § 12. Примеры.

### Введение.

Формальная теория дифференциальных выражений от одной переменной приводит к разложению на неприводимые множители, которое в некотором смысле однозначно.<sup>1</sup> Но тогда как соответствующую теорему в алгебре можно перенести на многочлены от нескольких переменных, для частных дифференциальных выражений это уже не удастся.<sup>2</sup> При дифференциальных выражениях от одной переменной, однако, наряду с представлением в виде произведения имеется еще представление как наименьшее общее кратное, причем действуют сходные законы; именно, при двух различных разложениях отдельные составные части можно попарно сопоставить друг другу: они «того же вида».<sup>3</sup>

Это понятие наименьшего общего кратного теперь можно истолковать как модульное понятие и тем самым перенести на  $n$  переменных; в настоящей работе это дает естественное обобщение названных теорем. Кроме того, мы еще замечаем, что от дифференциальных выражений используется только то, что их можно понимать как многочлены с некоммутативным умножением, для которых степень произведения равна сумме степеней множителей. Эти условия выполняются, например, и для разностных выражений, так что теоремы справедливы и для них, где до сих пор они также были известны только для одной переменной.<sup>4</sup>

Поэтому мы развиваем в общем виде теорию модулей, элементы которых являются многочленами с некоммутативным умножением, и при этом сводим рассмотрение модулей к рассмотрению классов остатков.<sup>5</sup> В отличие от коммутативного специального случая здесь можно говорить о сумме классов остатков, но не об их произведении; можно говорить только о произведении класса остатков на многочлен. Поэтому понятие «группы остатков» должно быть модифицировано по сравнению с коммутативным случаем. В специальном случае многочленов от

<sup>1</sup>Ср. E. Landau, *Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren*, *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 124 (1902), с. 115–120, и вслед за этим A. Loewy, *Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 56 (1903), с. 549–584.

<sup>2</sup>Ср. контрпример Ландау, опубликованный в H. Blumberg, *Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken*, диссертация, Göttingen 1912, 52 с., с. 51–52.

<sup>3</sup>Ср., кроме названных работ, A. Loewy, *Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen*, *Mathematische Annalen* 62 (1906), с. 89–117; далее цитируется как Loewy.

<sup>4</sup>Ср. G. Wallenberg–A. Guldberg, *Theorie der linearen Differenzengleichungen*, Leipzig und Berlin 1911.

<sup>5</sup>Для случая коммутативных областей ср. W. Schmeidler, *Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen*, *Mathematische Zeitschrift* 3 (1919), с. 29–42.

одной переменной группа остатков, кроме того, «конечна», то есть имеет лишь конечное число линейно независимых классов остатков. В общем случае такого конечного «порядка» не существует; группы «бесконечны». Для наших методов, однако, это различие не существенно.

Представлению модуля как наименьшего общего кратного взаимно простых модулей, как и в коммутативном случае, соответствует более простой процесс аддитивного разложения группы остатков. При этом существенной оказывается изоморфия групп остатков, которая при специализации к дифференциальным выражениям от одной переменной переходит в понятие того же вида для соответствующих модулей, а при специализации к коммутативным модулям переходит в тождественность. Впрочем, понятие того же вида также можно перенести на  $n$  переменных и доказать его совпадение с понятием изоморфии. То, что в аддитивном разложении группы остатков всегда возникает лишь конечное число слагаемых, следует путем переноса гильбертовой теоремы о базисе модуля, основанной на методе доказательства Гордана; первоначальный метод доказательства Гильберта потребовал бы ограничений на законы умножения (в формуле (6) справа  $a$  вместо  $a_i$ , что выполняется для дифференциальных, но не для разностных выражений).

Чтобы теперь прийти к теореме единственности, мы должны специализировать модули, как это делает и Лёви, до «вполне приводимых», то есть до таких, которые представимы как наименьшее общее кратное простых модулей. При двух различных разложениях составные части тогда либо попарно тождественны, либо по крайней мере каждой составной части одного разложения соответствует изоморфная составная часть другого разложения, и наоборот; вместе с тем каждое разложение тогда содержит по меньшей мере две изоморфные составные части. Далее, из появления двух изоморфных составных частей в одном и том же разложении следует существование бесконечно многих разложений, и это справедливо даже без ограничения на простые модули, что до сих пор не было известно даже в специальном случае дифференциальных выражений от одной переменной.

Наконец, для модулей из дифференциальных выражений мы переходим к связи с интегралами и показываем, что при конечных группах остатков порядок равен наибольшему числу линейно независимых интегралов; следовательно, произвольные функции возникают в общем интеграле тогда и только тогда, когда группа остатков не конечна. Понятие того же вида для двух модулей, кроме того, означает, как и в случае одной переменной, «бирациональное» родство интегралов. Завершают работу несколько примеров.

Первый толчок к настоящей работе был дан несколько лет назад вопросом Э. Ландау к Э. Нётер об обобщении теоремы о произведении. Тогда Э. Нётер лишь заметила, что речь идет о вопросе теории модулей в некоммутативной полиномиальной области, но подступиться к нему еще не удавалось. Известные тогда ласкерovy теоремы о модулях нельзя было непосредственно перенести на эту область, потому что метод доказательства Ласкера основан на теореме, что многочлен однозначно разлагается на неприводимые множители.<sup>6</sup> Только методы Шмайдлера дали возможность переноса, который мы затем осуществили совместно. В частности, следует еще упомянуть, что обобщение группы остатков, перенос и применение гильбертовой теоремы конечности и существование бесконечно многих разложений принадлежат Э. Нётер, а обобщение лёвиевского понятия полной приводимости, понятие изоморфии и его связь с понятием того же вида принадлежат В. Шмайдлеру.

## § 1. Формальные сведения о дифференциальных и разностных выражениях.

1. Для дифференциальных выражений от одной переменной было введено символическое обозначение произведения. Пусть

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x) y = A(y),$$

$$b_0(x) \frac{d^m y}{dx^m} + b_1(x) \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \cdots + b_m(x) y = B(y).$$

<sup>6</sup> Недавно Э. Нётер заметила, что и ласкерovy теоремы можно обосновать без использования этой теоремы, методами, родственными применяемым здесь.

Тогда символическое произведение  $AB(y)$  определяется как дифференциальное выражение

$$a_0(x) \frac{d^n B(y)}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} B(y)}{dx^{n-1}} + \cdots + a_n(x) B(y).$$

Это образование произведения в действительности есть умножение двух операторов; проще всего его записывать, заменяя, как обычно,  $\frac{d^n}{dx^n}$  на  $\left(\frac{d}{dx}\right)^n$ . Тогда  $AB$  переходит в

$$\left(a_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^n + \cdots + a_n\right) \left(b_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^m + \cdots + b_m\right) y,$$

причем при выполнении произведения действуют обычные правила дифференцирования сумм и произведений. Каждый такой оператор теперь можно рассматривать как многочлен от одной переменной  $\frac{d}{dx} = \xi$ : функцию, к которой применяется оператор, явно не записывают, а для переменной  $\xi$  фиксируют те правила умножения, которые соответствуют дифференцированию произведения:

$$\frac{d}{dx}(a(x)y) = a(x) \frac{d}{dx}(y) + a'(x)y,$$

или, в нашей записи ( $n = 1, m = 0$ ),

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \quad (1)$$

Совершенно так же поступают с линейными частными дифференциальными выражениями

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}\right) y$$

от функции  $y$ . Для  $n$  операторов  $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$  вводим переменные  $\xi_1, \dots, \xi_n$  и тем самым получаем многочлен

$$\sum a_{\alpha_1 \dots \alpha_n}(x_1, \dots, x_n) \xi_1^{\alpha_1} \dots \xi_n^{\alpha_n}.$$

Произведение двух многочленов тогда вычисляется по законам

$$\xi_i a = a \xi_i + a_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (2)$$

где  $a_i$  означает частную производную  $a$  по  $x_i$ ; произведения  $\xi$  между собой коммутативны. Кроме коммутативного закона умножения, для так определенных многочленов действуют все законы сложения и умножения, как в обычной алгебре. В частности, для произведения двух таких многочленов общая степень и степень по каждой отдельной переменной равны сумме соответствующих степеней двух множителей.

2. Для разностных выражений (ср. Wallenberg, цит. место) вида

$$a_x^{(0)} y_{x+n} + a_x^{(1)} y_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)} y_x = A_x,$$

$$b_x^{(0)} y_{x+m} + b_x^{(1)} y_{x+m-1} + \cdots + b_x^{(m)} y_x = B_x$$

имеется соответствующее определение произведения

$$(AB)_x = a_x^{(0)} B_{x+n} + a_x^{(1)} B_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)} B_x,$$

которое можно выполнить с помощью правила умножения

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1} y_{x+1}.$$

Если для перехода от  $x$  к  $x+1$  ввести оператор  $\xi$ , то получаем  $\xi\{ay\} = a^* \xi\{y\}$ , где  $a^* = a_{x+1}$ . Но и здесь можно снова опустить функцию  $y$ , к которой применяется оператор, и получить закон

$$\xi a = a^* \xi, \quad (3)$$

где наряду с  $a$  также  $a^*$  не обращается тождественно в нуль. Совершенно так же для  $n$  переменных имеем

$$\xi_i a = a_i \xi_i \quad (i = 1, \dots, n), \quad (4)$$

где  $\xi_i$  соответствует переходу от  $x_i$  к  $x_i + 1$ , а  $a_i$  обозначает функцию, полученную из  $a$  заменой  $x_i$  на  $x_i + 1$ , следовательно не обращающуюся тождественно в нуль, если это верно для  $a$ . При этих соглашениях, за исключением коммутативного закона, также действуют все правила сложения и умножения, включая правило о степени произведения.

Оба случая в следующем параграфе будут подчинены вполне общо определенной полиномиальной области с произвольными коэффициентами.

## § 2. Общая полиномиальная область.

Мы исходим из произвольно абстрактно определенного поля  $P$  (элементы которого обозначаем малыми латинскими буквами), для которого действуют все правила алгебры, в частности также коммутативный закон умножения с однозначным обращением. К этому полю присоединяем  $n$  неизвестных  $\xi_1, \dots, \xi_n$ , то есть рассматриваем область целостности  $J$ , состоящую из произведений  $a \xi_1^{\nu_1} \xi_2^{\nu_2} \dots \xi_n^{\nu_n}$  и их конечных сумм, причем должны действовать все законы сложения и умножения, за исключением коммутативного закона умножения. В частности, конечные суммы вида

$$F(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \dots \nu_n} \xi_1^{\nu_1} \dots \xi_n^{\nu_n}$$

называем «многочленами» (которые всюду будем обозначать большими латинскими буквами). Теперь вместо коммутативного закона мы подчиняем величины из  $J$  таким законам произведения, чтобы *произведение двух многочленов снова было многочленом*; тем самым область всех многочленов из  $J$  уже исчерпывает область  $J$ . Для этого, очевидно, необходимо и достаточно, чтобы для величин  $\xi_1, \dots, \xi_n$  и произвольной величины  $a$  из  $P$  действовали правила произведения вида

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \dots, \xi_n) \quad (i = 1, \dots, n), \quad (5)$$

где  $F_i(\xi_1, \dots, \xi_n)$  означает некоторый, естественно зависящий от  $\xi_i$  и  $a$ , многочлен. (В частности, правила (2) и (4) для дифференциальных и соответственно разностных выражений имеют именно этот вид.) Действительно, поскольку  $\xi_i a$  само по себе не является многочленом, но по предположению принадлежит области, это равенство необходимо. С другой стороны, конечным повторным применением формулы (5) всякую величину области  $J$  можно превратить в многочлен.

Для единицы поля, которую мы обозначаем через 1, далее должно выполняться  $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$ . Кроме того, установим, что умножение  $\xi_1, \dots, \xi_n$  между собой коммутативно.<sup>7</sup> Тогда каждый многочлен в  $J$  записывается как обычный многочлен от  $\xi_1, \dots, \xi_n$  с коэффициентами из  $P$ , и два многочлена совпадают только тогда, когда совпадают все их коэффициенты.

Более специально, далее мы будем требовать,<sup>8</sup> чтобы вместо (5) действовало правило

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

Сюда, в частности, также входят законы (2) и (4). Тогда степень произведения равна сумме степеней множителей, причем это верно как для общей степени, так и для степени по каждой отдельной переменной; следовательно, произведение двух многочленов, не обращающихся тождественно в нуль, также отлично от 0.

<sup>7</sup>Это понадобится только начиная с § 6 для теоремы конечности и ее следствий.

<sup>8</sup>Это также понадобится только начиная с § 6.

### § 3. Односторонние модули и их группы остатков.

Для нашей области  $J$ , ввиду некоммутативности умножения, можно различать следующие виды модулей<sup>9,10</sup>:

1. *Правосторонний модуль*, который вместе с  $M$  содержит также  $FM$  для произвольного многочлена  $F$ , а вместе с  $M_1$  и  $M_2$  также  $M_1 + M_2$ .

2. *Левосторонний модуль*, который вместе с  $M$  содержит также  $MF$ , а вместе с  $M_1$  и  $M_2$  также  $M_1 + M_2$ .

Эти два вида мы называем общим именем *односторонних модулей*; модули, которые являются одновременно правосторонними и левосторонними, будем называть *двусторонними*. В дальнейшем мы ограничиваемся правосторонними модулями и замечаем, что теория левосторонних строится совершенно аналогично.

Назовем два многочлена  $F$  и  $G$  конгруэнтными по модулю  $\mathfrak{M}$ , в обозначениях  $F \equiv G(\mathfrak{M})$ , если их разность делится на  $\mathfrak{M}$ , то есть принадлежит  $\mathfrak{M}$ . Совокупность всех многочленов, конгруэнтных данному многочлену, образует *класс остатков* по модулю  $\mathfrak{M}$ . (Классы остатков будем обозначать малыми готическими буквами.) Так как из

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \quad \text{и} \quad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

следует конгруэнция  $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2(\mathfrak{M})$ , сумма двух классов остатков  $\mathfrak{x}$  и  $\mathfrak{y}$  определена и снова является классом остатков  $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$ . Напротив, из-за односторонности модуля нельзя говорить о произведении двух классов остатков; действительно, из

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = G_2 + M_2$$

хотя и следует

$$F_1 G_1 = F_2 G_2 + F_2 M_2 + M_1 G_2 + M_1 M_2,$$

но поскольку  $M_1 G_2$  не обязан принадлежать  $\mathfrak{M}$ , когда  $M_1$  принадлежит  $\mathfrak{M}$ , вообще говоря,  $F_1 G_1$  и  $F_2 G_2$  не обязаны быть конгруэнтными. Зато при  $M_1 = 0$ , то есть  $F_1 = F_2 = F$ , видно, что из  $G_1 \equiv G_2$  следует и  $FG_1 \equiv FG_2$ ; значит, произвольный класс остатков  $\mathfrak{y}$  можно умножать спереди на многочлен  $F$ , получая тем самым вполне определенный класс остатков  $F\mathfrak{y} = \mathfrak{z}$ .

Для вычислений с классами остатков действуют коммутативный и ассоциативный законы, а также закон однозначной обратимости сложения; кроме того, для умножения классов остатков на многочлены и для сложения действует дистрибутивный закон  $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F\mathfrak{y}_1 + F\mathfrak{y}_2$ , что непосредственно следует из вычислений с многочленами по модулю  $\mathfrak{M}$ .

Класс остатков, которому принадлежит единица, будем называть *единичным классом*, или *единицей*, и обозначать  $\mathfrak{e}$ . Тогда  $F\mathfrak{e} = \mathfrak{x}$  есть класс остатков, которому принадлежит многочлен  $F$ . В отличие от общих классов остатков, здесь также произведение  $\mathfrak{x}\mathfrak{e}$  вполне определено и равно  $\mathfrak{x}$ ; ибо из

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = 1 + M_2$$

вследствие  $M_1 \cdot 1 = M_1$  следует также

$$F_1 G_1 = F_2 + M.$$

Совокупность классов остатков по модулю  $\mathfrak{M}$  мы называем *группой остатков модуля  $\mathfrak{M}$* . Следовательно, группа остатков имеет следующие свойства: 1. Вместе с каждым классом остатков  $\mathfrak{x}$  и для произвольного многочлена  $F$  она содержит также класс остатков  $F\mathfrak{x}$ , а вместе с классами остатков  $\mathfrak{x}_1$  и  $\mathfrak{x}_2$  также класс остатков  $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$ .<sup>11</sup> 2. Она обладает единицей  $\mathfrak{e}$ , так что  $F\mathfrak{e}$  для каждого многочлена  $F$  представляет класс остатков  $\mathfrak{x}$  многочлена  $F$ . *Итак, когда  $F$  пробегает все многочлены,  $F\mathfrak{e}$  пробегает всю группу остатков.*

<sup>9</sup>Модули мы обозначаем большими готическими буквами.

<sup>10</sup>Односторонние идеалы уже рассматривал А. Гурвиц; ср. *Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen* (Berlin, Springer 1919), лекция 6. Однако там по существу речь идет о главных идеалах; то же относится к работам Дю Паскье, цитированным там в примечании 1.

<sup>11</sup>Это свойство в более общем смысле можно было бы назвать «модульным свойством» группы остатков.



#### § 4. Приводимость группы остатков к двум подгруппам и ее связи с модулем.

Для односторонних модулей понятия *делимости*, *наибольшего общего делителя* и *наименьшего общего кратного* сохраняются так же, как в двустороннем случае; это показывают следующие определения:

Модуль  $\mathfrak{M}$  называется делимым на другой модуль  $\mathfrak{N}$ , если из  $M \equiv 0(\mathfrak{M})$  следует также  $M \equiv 0(\mathfrak{N})$ .

Для двух модулей  $\mathfrak{M}$  и  $\mathfrak{N}$  *наибольший общий делитель*  $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$  определяется как совокупность всех многочленов, представимых в виде  $M + N$ , где  $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ ,  $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ ; это снова модуль. Соответствующее определение действует и для нескольких модулей.

Совокупность всех многочленов, делимых и на  $\mathfrak{M}$ , и на  $\mathfrak{N}$ , образует модуль  $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$ , *наименьшее общее кратное* модулей  $\mathfrak{M}$  и  $\mathfrak{N}$ . Это определение также соответственно применяется к нескольким модулям, даже к множеству модулей произвольной мощности.

Два модуля называются взаимно простыми, если их наибольший общий делитель есть единичный модуль, то есть состоит из совокупности всех многочленов.

Теперь исходим из модуля  $\mathfrak{M}$ , который представим как наименьшее общее кратное двух взаимно простых модулей  $\mathfrak{N}$  и  $\mathfrak{L}$ , причем оба предполагаются собственными делителями:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \quad (7)$$

Исследуем группу остатков  $\mathfrak{G}$  модуля  $\mathfrak{M}$ . По предположению

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \quad (8)$$

для двух многочленов  $N \equiv 0(\mathfrak{N})$  и  $L \equiv 0(\mathfrak{L})$ . Отсюда покажем

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \quad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \quad (9)$$

где, например, под  $(\mathfrak{M}, L)$  следует понимать модуль, состоящий из всех многочленов вида  $M + FL$ . В самом деле, во-первых,  $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$ . С другой стороны, из (8) для произвольного многочлена  $F$  следует

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \quad (10)$$

Если теперь  $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ , то  $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$ , значит также  $\equiv 0(\mathfrak{M})$ , и, следовательно,  $F \equiv FL(\mathfrak{M})$ . Соответственно доказывается  $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$ . Отсюда, кроме того, следует: поскольку  $\mathfrak{N}$  и  $\mathfrak{L}$  являются собственными делителями  $\mathfrak{M}$ , ни  $L \equiv 0(\mathfrak{M})$ , ни  $N \equiv 0(\mathfrak{M})$  не может иметь места.

Пусть теперь  $\mathfrak{a}$  есть класс остатков многочлена  $N$  по модулю  $\mathfrak{M}$ ,  $\mathfrak{b}$  – класс остатков многочлена  $L$  по модулю  $\mathfrak{M}$ . Тогда по (8)

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0).$$

Так как каждый класс остатков имеет вид  $F\mathfrak{e}$ , то по дистрибутивному закону для каждого класса остатков получается

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \quad (\mathfrak{a} \neq 0, \mathfrak{b} \neq 0). \quad (11)$$

Однако это представление произвольного класса остатков как суммы двух классов остатков вида  $G\mathfrak{a}$  и  $H\mathfrak{b}$  является *единственным*. Действительно, из соотношения  $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$ , если  $K$  есть многочлен из класса остатков  $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$ , очевидно имеем  $K \equiv GN(\mathfrak{M})$ ,  $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$ , следовательно  $K \equiv 0(\mathfrak{N})$ ,  $K \equiv 0(\mathfrak{L})$  и потому  $K \equiv 0(\mathfrak{M})$ , то есть  $G\mathfrak{a} = 0$ ,  $H\mathfrak{b} = 0$ .

Пусть, обратно, соотношение (11) выполнено для каждого многочлена  $F$ , причем *единственно* в указанном выше смысле. Пусть  $N$  будет многочленом из  $\mathfrak{a}$ , а  $L$  – многочленом из  $\mathfrak{b}$ . Образует два модуля (9) и утверждаем (7) и (8). Последнее следует из (11) при  $F = 1$ . Далее, по определению  $\mathfrak{N}$  и  $\mathfrak{L}$ ,  $\mathfrak{M}$  является общим кратным этих двух модулей, притом наименьшим. Действительно, из  $F \equiv 0(\mathfrak{L})$  и  $F \equiv 0(\mathfrak{N})$  следует  $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$ , значит  $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$ ,  $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$ , а потому, в силу единственности представления,  $G\mathfrak{a} = 0$ ,  $H\mathfrak{b} = 0$ ,  $F \equiv 0(\mathfrak{M})$ . Тем самым показано, что *представление модуля  $\mathfrak{M}$  как наименьшего общего кратного двух взаимно простых модулей равносильно единственному аддитивному разложению группы остатков  $\mathfrak{G}$  модуля  $\mathfrak{M}$ , как оно задается формулой (11)*.

Теперь рассмотрим систему  $\mathfrak{A}$  классов остатков вида  $F\mathfrak{a}$ , которую хотим связать с группой остатков  $\bar{\mathfrak{A}}$  модуля  $\mathfrak{L}$ . По (11) каждый многочлен  $F$  из  $\mathfrak{L}$  принадлежит классу остатков  $F\mathfrak{a}$ , если  $\bar{\mathfrak{a}}$  есть класс остатков  $N$  по модулю  $\mathfrak{L}$ , то есть единичный класс  $\bar{\mathfrak{A}}$ . Если теперь сопоставить друг другу классы остатков  $F\mathfrak{a}$  в  $\mathfrak{A}$  и  $F\bar{\mathfrak{a}}$  в  $\bar{\mathfrak{A}}$ , то каждому классу остатков из  $\mathfrak{A}$  сопоставляется класс остатков из  $\bar{\mathfrak{A}}$ , причем сумме двух классов остатков из  $\mathfrak{A}$  соответствует сумма соответствующих классов остатков из  $\bar{\mathfrak{A}}$ , а произведению класса остатков из  $\mathfrak{A}$  на многочлен соответствует произведение соответствующего класса остатков из  $\bar{\mathfrak{A}}$  на тот же многочлен. Это сопоставление, кроме того, взаимно однозначно: из  $F\mathfrak{a} = 0$  по (11) следует  $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ , значит  $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$ ; обратно,  $F\bar{\mathfrak{a}} = 0$ , то есть  $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ , по (10) означает также  $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$ , значит  $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$ , то есть  $F\mathfrak{a} = 0$ .

Тем самым мы приходим к фундаментальному понятию, которое определяем следующим образом:

*Взаимно однозначное сопоставление между двумя системами  $\mathfrak{A}$  и  $\bar{\mathfrak{A}}$  классов остатков называется изоморфным, если сумме двух классов остатков из  $\mathfrak{A}$  сопоставлена сумма соответствующих классов остатков из  $\bar{\mathfrak{A}}$ , а произведению произвольного класса остатков из  $\mathfrak{A}$  на многочлен – произведение соответствующего класса остатков из  $\bar{\mathfrak{A}}$  на тот же многочлен.*

Подсистема  $\mathfrak{A}$  классов остатков в  $\mathfrak{G}$ , изоморфная группе остатков некоторого модуля, называется *подгруппой  $\mathfrak{G}$* . Как показывает приведенное выше доказательство, здесь сопоставление специально устроено так, что каждый класс остатков из  $\mathfrak{A}$  возникает из соответствующего класса остатков из  $\bar{\mathfrak{A}}$  присоединением некоторых многочленов, а именно всех многочленов, принадлежащих  $\mathfrak{L}$ , но не принадлежащих  $\mathfrak{M}$ .

Соответственно можно показать, что совокупность всех классов остатков вида  $F\mathfrak{b}$  образует подгруппу  $\mathfrak{B}$  группы  $\mathfrak{G}$ , изоморфную группе остатков  $\bar{\mathfrak{B}}$  модуля  $\mathfrak{N}$ .

Группа остатков  $\mathfrak{G}$ , классы остатков которой допускают единственное аддитивное разложение (11), будет называться *приводимой* к двум подгруппам  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{B}$ , в обозначениях  $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ ; группа, не являющаяся приводимой, называется *неприводимой*. Соответствующие модули мы также иногда называем приводимыми или неприводимыми. Итак, имеет место следующая теорема.

**Теорема 1.<sup>11</sup>** *Модуль  $\mathfrak{M}$  тогда и только тогда представим как наименьшее общее кратное двух взаимно простых собственных делителей  $\mathfrak{L}$  и  $\mathfrak{N}$ , когда его группа остатков  $\mathfrak{G}$  приводима к двум подгруппам  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{B}$ . При этом  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{B}$  соответственно изоморфны группам остатков модулей  $\mathfrak{L}$  и  $\mathfrak{N}$ .*

---

<sup>11</sup>Ср. Schmeidler, там же, с. 39.

## § 5. Вычисления с единицами и приводимость на $k$ подгрупп.

Классы остатков  $a$  и  $b$  группы  $\mathfrak{G}$  имеют с единицей  $e$  общее свойство: произведение произвольного класса остатков  $\mathfrak{x}$  с  $a$  и с  $b$  определено; поэтому  $a$  и  $b$  мы также будем называть единицами группы  $\mathfrak{G}$ . Действительно, из (11) при  $F = M$  следует

$$0 = Me = Ma + Mb,$$

и потому, в силу единственности,  $Ma = 0$ ,  $Mb = 0$ , а значит

$$(F + M)a = Fa = \mathfrak{x}a,$$

где  $\mathfrak{x}$  означает класс остатков полинома  $F$ . Поэтому вместо отношения (11) можно записать равносильное отношение между классами:

$$\mathfrak{x}e = \mathfrak{x}a + \mathfrak{x}b.$$

В частности, подставляя  $\mathfrak{x} = a$ , получаем

$$a = a^2 + ab,$$

а отсюда в силу единственности  $a^2 = a$ ,  $ab = 0$ . Точно так же получается  $b^2 = b$ ,  $ba = 0$ .

Соответственно представлению группы остатков как суммы двух составляющих можно теперь определить и такое представление как сумму  $k$  составляющих. Пусть задано единственное представление

$$Fe = Fa_1 + Fa_2 + \dots + Fa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0),$$

причем из  $0 = G_1a_1 + \dots + G_ka_k$  также следует  $G_ia_i = 0$ . Тогда, в частности при  $F = M$ , получается отношение  $Ma_i = 0$ , так что представление можно записать и в форме<sup>12</sup>

$$\mathfrak{x}e = \mathfrak{x}a_1 + \dots + \mathfrak{x}a_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0). \quad (12)$$

Это представление можно также понимать как возникшее из последовательного разложения на две составляющие. Если его можно продолжать неограниченно, причем все  $a_i \neq 0$ , то мы говорим о сумме бесконечно многих составляющих.

Подставляя в (12)  $\mathfrak{x} = a_i$ , получаем

$$a_i^2 = a_i, \quad a_ia_j = 0 \quad (i \neq j), \quad i, j = 1, \dots, k, \quad (13)$$

где  $a_i \neq 0$ . Пусть теперь, наоборот, в  $\mathfrak{G}$  имеется система классов остатков  $a_1, \dots, a_k$ , для которых выполнены условия ортогональности (13) и для которых

$$e = a_1 + \dots + a_k \quad (14)$$

имеет место. Мы покажем, что отсюда получается представление группы как суммы  $k$  составляющих. Прежде всего из предположения для каждого полинома  $A_i$  из класса  $a_i$ , так как  $A_ia_i = (A_i + M)a_i$ , следует  $Ma_i = 0$ ; следовательно,  $a_i$  можно умножать на любой класс. Поэтому из (14) следует представление (12), и оно единственно. В самом деле, если бы  $0 = \mathfrak{x}_1a_1 + \dots + \mathfrak{x}_ka_k$ , то умножением справа на  $a_i$ , по (13), получили бы  $0 = \mathfrak{x}_ia_i$ . Тем самым доказаны единственность и само утверждение. Классы остатков  $a_1, \dots, a_k$ , возникающие при разложении единичного класса, мы называем единицами, принадлежащими этому разложению; они, таким образом, также задаются ортогональными соотношениями (13) и условием (14). Все дальнейшее развитие по существу сведется к вычислению с единицами.

Теперь остается установить связь между аддитивным разложением группы на  $k$  составляющих и соответствующим разложением модуля. Как и в случае  $k = 2$ , получится представление модуля как наименьшего общего кратного  $k$  взаимно простых модулей; доказывается это индукцией.

<sup>12</sup>Для аддитивного разложения групп остатков выполняются коммутативный и ассоциативный законы; однако, в отличие от коммутативного случая, из  $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_3$  не следует  $\mathfrak{U}_2 = \mathfrak{U}_3$ ; ср. пример 1 в § 12.

Пусть дано разложение (12), которое мы запишем в виде

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{b} + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k, \quad (15)$$

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_{k-1}. \quad (16)$$

Из (15) по Теореме I следует, что классы остатков  $\mathfrak{x}\bar{\mathfrak{b}}$  изоморфны группе остатков модуля

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \quad (17)$$

Для их классов остатков  $\mathfrak{x}\bar{\mathfrak{b}}$  поэтому также выполняется представление, соответствующее (16):

$$\mathfrak{x}\bar{\mathfrak{b}} = \mathfrak{x}\bar{\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\bar{\mathfrak{a}}_{k-1}. \quad (18)$$

Предположим, что уже доказано

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \quad (19)$$

где

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \vdots \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}). \end{cases} \quad (20)$$

Для двух слагаемых это утверждение совпадает с нашим прежним результатом. Кроме того, полиномы  $A_i$  можно здесь выбрать именно как такие полиномы из  $\bar{\mathfrak{a}}_i$ , которые одновременно содержатся в  $\mathfrak{a}_i$ , поскольку по § 4 полиномы последнего класса остатков содержатся в первом. Тогда по (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \quad (21)$$

где

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

Из (19) и (21) следует

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

по определению наименьшего общего кратного; а из (17) и (20) получается

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Отсюда следует

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k),$$

ибо последний модуль, в силу (13), содержит также полином

$$A_k = A_k(A_2 + \cdots + A_k) \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Соответствующие выражения получаются для  $\mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$ . Кроме того, модули  $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$  взаимно просты, поскольку по (14)

$$\frac{1}{k-1} \left( (A_2 + \cdots + A_k) + (A_1 + A_3 + \cdots + A_k) + \cdots + (A_1 + \cdots + A_{k-1}) \right) \equiv 1 \pmod{\mathfrak{M}}.$$

Более того, они образуют тотально взаимно простую систему, то есть наименьшее общее кратное любых из них взаимно просто с наименьшим общим кратным остальных.<sup>13</sup> Это следует непосредственно, если в формуле (12) сгруппировать слагаемые в две подходящие группы.

<sup>13</sup> Это обобщение понятия, введенного Лёви.

Тем самым показано, что разложению группы остатков на  $k$  слагаемых соответствует представление модуля как наименьшего общего кратного  $k$  модулей, образующих тотально взаимно простую систему. Теперь докажем обратное утверждение, также индукцией.

Пусть

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

где  $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$  образуют тотально взаимно простую систему. В сочетании с Теоремой I отсюда для группы остатков следует представление (15). Модули  $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_{k-1}$  также образуют тотально взаимно простую систему. Ибо если бы при каком-нибудь разбиении модулей этой системы на две группы наименьшее общее кратное одной группы и наименьшее общее кратное другой имели общий делитель, то этот делитель сохранился бы и тогда, когда к одной из групп добавить еще модуль  $\mathfrak{M}_k$  и затем образовать наименьшее общее кратное.<sup>14</sup> Для  $k = 2$  «тотально взаимно простые» означает то же, что и «взаимно простые»; поэтому наше утверждение можно считать доказанным до  $k - 1$ . Следовательно, для класса остатков  $\mathfrak{R}$  имеет место единственное представление (18), а в силу изоморфизма также (16), что и доказывает утверждение.

**Теорема II.** *Модуль  $\mathfrak{M}$  тогда и только тогда представим как наименьшее общее кратное  $k$  модулей  $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$ , образующих тотально взаимно простую систему, когда его группа остатков  $\mathfrak{G}$  приводима на  $k$  подгрупп  $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$ . При подходящем обозначении  $\mathfrak{U}_i$  изоморфна группе остатков модуля  $\mathfrak{M}_i$ .*

---

<sup>14</sup>Продолжая это рассуждение, получаем, что среди модулей  $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$  каждые два взаимно просты; обратное утверждение, будто отсюда следует, что  $\mathfrak{M}_1, \dots, \mathfrak{M}_k$  образуют тотально взаимно простую систему, вообще верно только в коммутативном случае; ср. контрпример 1 в § 12.

## § 6. Теоремы конечности.

В этом параграфе нужно показать, что каждую группу остатков можно представить как сумму конечного числа неприводимых составляющих. Для этого сначала перенесем гильбертову теорему о базисе модуля.

С этого места мы используем более специальные предположения, сформулированные в § 2: умножение  $\xi_1, \dots, \xi_n$  между собой коммутативно, а закон умножения полиномов имеет вид

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i, \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n). \quad (6)$$

Достаточно провести доказательство только для модулей. Действительно, если  $\mathfrak{S}$  – какая-нибудь система полиномов, то мы образуем производный от нее модуль  $\mathfrak{M}$ , присоединяя к  $\mathfrak{S}$  все полиномы, которые можно составить из конечного числа полиномов  $G_1, \dots, G_k$  из  $\mathfrak{S}$  в виде  $A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$ . Если теперь  $F_1, \dots, F_l$  является базисом модуля  $\mathfrak{M}$  и

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \quad (i = 1, \dots, l),$$

то конечное число полиномов  $G_j$ , входящих в эти представления, образует базис системы  $\mathfrak{S}$ .

Доказательство теоремы о базисе модуля мы проводим вслед за Горданом (*Göttinger Nachrichten* 1899). Оно распадается на две части. Первая относится к системе  $\mathfrak{P}$  из бесконечно многих степенных произведений и, благодаря коммутативности  $\xi_1, \dots, \xi_n$ , по существу сохраняется. Степенные произведения

$$P = \xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n},$$

каждое из которых вносится в систему только один раз, упорядочим по возрастающей степени, а внутри одной степени – каким-нибудь фиксированным образом. Рассмотрим теперь ту подсистему  $\mathfrak{Q}$  системы  $\mathfrak{P}$ , которая содержит все такие степенные произведения  $P = Q$ , не делящиеся ни на какое предшествующее  $P$ . Тогда и никакое  $Q$  не делится на более позднее  $Q$ , поскольку более поздние либо имеют большую степень, либо при той же степени отличаются от прежних. С другой стороны, каждое  $P$  из  $\mathfrak{P}$  делится хотя бы на одно  $Q$ . В самом деле, если бы, напротив,  $P_m$  было первым  $P$ , не делящимся ни на какое  $Q$ , то  $P_m$  само не могло бы быть  $Q$ ; значит, оно делилось бы хотя бы на одно предшествующее  $P$ , а это последнее по предположению делится на некоторое  $Q$ . Следовательно, и само  $P_m$  делилось бы на  $Q$ , что дает противоречие.

Теперь утверждаем, что число  $Q$  конечно. Действительно, пусть

$$Q_0 = \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n}$$

есть первое  $Q$ . Так как произвольное  $Q_\lambda = \xi_1^{h_{1\lambda}} \dots \xi_n^{h_{n\lambda}}$  не делится на  $Q_0$ , то для каждого  $Q$  должен быть хотя бы один  $h_{\rho\lambda} < h_\rho$ ; пусть  $\lambda$  всякий раз обозначает наименьший индекс, для которого это выполнено. Объединим все  $Q$ , для которых  $h_{\rho\lambda}$  имеет одно и то же фиксированное значение  $c_\lambda$ , в один класс  $K(c_\lambda)$ . Число этих классов конечно, поскольку  $c_\lambda < h_\lambda$ . Но и в каждом классе содержится лишь конечное число элементов. В самом деле, если положить  $Q$  из класса  $K(c_\lambda)$  равным  $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$ , то  $Q'$  также образуют систему степенных произведений, ни одно из которых не делится на другое, и содержат только  $n - 1$  переменных. При  $n = 2$  произведения  $Q'$  содержат только одну переменную; тогда их число равно 1, следовательно конечно. Поэтому число можно считать конечным и для  $n - 1$  переменных, что доказывает утверждение.

Во-вторых, пусть  $\mathfrak{M}$  – модуль из полиномов, члены которых лексикографически упорядочены. Пусть  $\mathfrak{P}$  – система степенных произведений, встречающихся каждый раз в старшем члене, каждое записанное только один раз. Тогда системе  $\mathfrak{Q} = (Q_1, \dots, Q_\rho)$  соответствует система конечного числа полиномов  $F_1, \dots, F_\rho$ : каждому  $Q_i$  сопоставляется какой-нибудь полином из  $\mathfrak{M}$ , старший член которого равен  $b_i Q_i$ , так что можно написать  $F_i = b_i Q_i + \dots$  с более низкими членами.

Пусть теперь  $F = bP + \dots$  – произвольный полином из  $\mathfrak{M}$ , где  $P = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i$ . образуем произведение

$$\xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \dots) = c \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \dots = cP + \dots$$

Здесь  $c \neq 0$  по (6), а все последующие члены являются более низкими членами лексикографического порядка, поскольку умножение, что касается показателей, коммутативно с точностью до более низких членов.<sup>15</sup> Разность

$$F - \frac{b}{c} \xi_1^{\beta_1} \dots \xi_n^{\beta_n} F_i$$

содержит тогда только более низкие члены и снова принадлежит  $\mathfrak{M}$ . Поэтому процесс обрывается через конечное число шагов, и  $F_1, \dots, F_p$  являются базисом модуля.

**Теорема III.** *Каждая система  $\mathfrak{S}$  из бесконечно многих полиномов имеет конечный базис модуля  $G_1, \dots, G_k$ , так что каждый полином  $G$  из  $\mathfrak{S}$  допускает представление  $G = A_1 G_1 + \dots + A_k G_k$ .*

Отсюда непосредственно следует

**Следствие.** *Каждая система  $\mathfrak{S}$  из бесконечно многих классов остатков по модулю  $\mathfrak{M}$  имеет базис  $\mathfrak{x}_1, \dots, \mathfrak{x}_k$ , так что каждый  $\mathfrak{x}$  из  $\mathfrak{S}$  представим в форме  $\mathfrak{x} = A_1 \mathfrak{x}_1 + \dots + A_k \mathfrak{x}_k$ .*

А именно, каждому классу остатков поставим в соответствие какой-нибудь представитель и рассмотрим систему этих представителей вместе со всеми полиномами из  $\mathfrak{M}$ .

Теперь перейдем к доказательству следующей теоремы.

**Теорема IV.** *Каждая группа остатков представима как сумма конечного числа неприводимых составляющих; следовательно, по Теореме II каждый модуль представим как наименьшее общее кратное конечного числа неприводимых модулей, образующих тотально взаимно простую систему.*

Действительно, предположим противное: пусть  $\mathfrak{S}$  есть сумма бесконечно многих составляющих  $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots$  (ср. § 5), и пусть  $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$  – соответствующие единицы, которые по определению все отличны от 0. Тогда образуем систему  $\mathfrak{S}$  всех этих единиц; по следствию из Теоремы III она имеет конечный базис  $\mathfrak{a}_{i_1}, \dots, \mathfrak{a}_{i_v}$  с  $i_1 < \dots < i_v$ . Пусть теперь  $\mu > i_v$ . Тогда имеем

$$\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1 \mathfrak{a}_{i_1} + \dots + \mathfrak{x}_v \mathfrak{a}_{i_v}.$$

Это линейное отношение между единицами, которое по определению исключено. Поэтому при каждом аддитивном разложении группы остатков после конечного числа шагов появляется неприводимая составляющая; вследствие коммутативности разложения ее можно поставить в начало. Следовательно, без ограничения общности сами  $\mathfrak{U}_i$  можно считать неприводимыми. Но по приведенному выше рассуждению может появиться лишь конечное число составляющих  $\mathfrak{U}_i$ , и тем самым утверждение доказано.

<sup>15</sup> Отсюда видно, что вместо закона (6) можно было бы взять и несколько менее ограничительный закон

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \dots + a_{i,n} \xi_n + b_i \quad (a_i \neq 0)$$

при некоторой фиксированной нумерации  $\xi$ .

## § 7. Случай единственности разложения.

Пусть

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

есть группа остатков, составляющие которой  $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k, \mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$  неприводимы. Тогда имеем

$$\mathfrak{r}\mathfrak{e} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_l, \quad (22)$$

где  $\mathfrak{a}_\chi$  есть класс остатков в  $\mathfrak{G}$ , изоморфно соответствующий единичному классу  $\mathfrak{U}_\chi$ , а  $\mathfrak{b}_\lambda$  – класс остатков в  $\mathfrak{G}$ , изоморфно соответствующий единичному классу  $\mathfrak{B}_\lambda$ . Если теперь заменить  $\mathfrak{r}$  на  $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$ , где  $\lambda$  – фиксированный индекс из ряда  $1, \dots, l$ , то получаем

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k. \quad (23)$$

Это представление группы  $\mathfrak{B}_\lambda$  единственно, но не является аддитивным разложением  $\mathfrak{B}_\lambda$ , поскольку отдельные классы остатков в правой части не обязаны принадлежать  $\mathfrak{B}_\lambda$ . Так как  $\mathfrak{b}_\lambda$  не обращается в нуль, не все произведения  $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$  могут быть нулевыми. Поэтому без ограничения общности пусть

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho \neq 0, \quad \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \dots, \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_k = 0.$$

Тогда

$$\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\rho.$$

Теперь при фиксированном  $\chi$  из ряда  $1, \dots, \rho$  рассмотрим совокупность тех классов остатков  $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$ , которые не равны нулю и для которых также  $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ . Эти две системы,  $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda$  и  $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ , изоморфны. Действительно, во-первых, соответствие взаимно однозначно: из  $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$  по предположению следует  $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda = 0$ , а из последнего, в силу единственности представления (23), следует  $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$ . Кроме того, сумме соответствует сумма, а произведению с произвольным полиномом – соответствующее произведение. При фиксированном  $\chi$  можно провести то же рассуждение для каждого  $\lambda$ , для которого  $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ . Для каждого  $\mathfrak{a}_\chi$  должно существовать по крайней мере одно такое  $\mathfrak{b}_\lambda$ , поскольку

$$\mathfrak{a}_\chi = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l) \mathfrak{a}_\chi \neq 0.$$

Сначала предположим, что для каждого  $\chi$  существует только одно  $\lambda$ , и для каждого  $\lambda$  только одно  $\chi$ , такое что  $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ .

Из этого соответствия следует  $k = l$ . Далее обозначения можно выбрать так, что  $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi \neq 0$  и  $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$  при  $\lambda \neq \chi$ . Тогда будем говорить, что произведения  $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$  образуют диагональную схему. В этом случае по (23) единица  $\mathfrak{b}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi$ , а из

$$\mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_1 \mathfrak{a}_\chi + \cdots + \mathfrak{b}_l \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\chi \quad (24)$$

вообще следует  $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$ . Значит, имеет место единственность разложения, и произведения  $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$  также образуют диагональную схему.

В частности, если для классов остатков  $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$  выполняется коммутативный закон, то указанное выше предположение всегда выполнено. Действительно, в (23) каждая составляющая  $\mathfrak{r}\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$  тогда содержится в  $\mathfrak{B}_\lambda$ , так что (23) задает аддитивное разложение группы  $\mathfrak{B}_\lambda$ . В силу неприводимости  $\mathfrak{B}_\lambda$  каждое  $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$ , кроме одного, равно 0. Кроме того, по (24), при фиксированном  $\chi$  соответственно только одно  $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$  отлично от нуля, поскольку иначе (24), в силу перестановочности  $\mathfrak{a}_\chi$  и  $\mathfrak{b}_\lambda$ , давало бы аддитивное разложение  $\mathfrak{U}_\chi$ , которая должна была быть неприводимой.<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Соответствующее утверждение верно в некоммутативном двустороннем случае, рассмотренном у *Schmeidler* в цитированной работе, где произведение каждого класса остатков одной подгруппы с каждым классом остатков другой подгруппы обращается в нуль. Тогда из

$$\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_l$$

и из  $\mathfrak{b}_\lambda (\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\mu) = 0$  при  $\lambda \neq \mu$  следует также  $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda$ , то есть это произведение содержится в  $\mathfrak{B}_\lambda$ . Поэтому из неприводимости  $\mathfrak{B}_\lambda$  следует, что только для одного  $\chi$ , то есть ровно для одного  $\chi$ , произведение  $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi \neq 0$ . Так же показывают, что для каждого  $\mathfrak{a}_\chi$  существует один и только один такой  $\mathfrak{b}_\lambda$ , что  $\mathfrak{a}_\chi \mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ , откуда следует  $k = l$ . Следовательно,  $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi$  образуют диагональную схему, чем и доказана установленная там единственность.



Те же рассуждения применимы и в случае, когда не для всех, а только для части  $\mathfrak{b}_\lambda$ , а именно для  $\lambda = 1, \dots, \sigma$ , выполнены условия  $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\lambda \neq 0$ ,  $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\chi = 0$  при  $\lambda \neq \chi$ ,  $\chi = 1, \dots, k$ , и также для каждого  $\mu = 1, \dots, l$  условия  $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\chi = 0$ ,  $\mathfrak{b}_\mu \mathfrak{a}_\mu \neq 0$ ,  $\chi = 1, \dots, \sigma$ . Тогда получаем  $\mathfrak{U}_\chi = \mathfrak{B}_\chi$  для  $\chi = 1, \dots, \sigma$ , а если положить

$$\mathfrak{U}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{U}, \quad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \dots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B},$$

то и для единиц  $\mathfrak{a}$  и  $\mathfrak{b}$  групп  $\mathfrak{U}$  и  $\mathfrak{B}$  выполнено условие  $\mathfrak{b}\mathfrak{a}_\chi = 0$ ,  $\mathfrak{b}_\chi \mathfrak{a} = 0$  для  $\chi = 1, \dots, \sigma$ , а также  $\mathfrak{b}\mathfrak{a} \neq 0$ , откуда следует  $\mathfrak{U} = \mathfrak{B}$ .

## § 8. Аддитивное разложение вполне приводимых групп на простые группы. Теорема об изоморфизме.

Теперь рассмотрим другой случай: единственности в нем, правда, нет, зато есть изоморфизм различных разложений. Здесь речь идет об обобщении случая, рассмотренного Лёви.

**Определение.** Модуль называется простым модулем, если он не имеет других делителей, кроме самого себя и единичного модуля, содержащего все многочлены. Группа остатков простого модуля называется простой группой.

Всякая простая группа а fortiori неприводима. Существуют также бесконечные простые группы (см. определение § 11 и пример § 12, 2).

Пусть теперь данная группа остатков  $\mathfrak{G}$  двумя способами представима как сумма (в каждом случае конечного числа) простых групп  $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k$  соответственно  $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_l$ . Группу остатков, допускающую хотя бы одно такое представление как сумму простых групп, и соответствующий ей модуль  $\mathfrak{M}$  мы, следуя обозначению Лёви, будем называть вполне приводимыми.

Теперь рассмотрим произведения  $a_\chi b_\lambda$ , где  $\chi = 1, \dots, k$ ,  $\lambda = 1, \dots, l$ , и покажем, что либо  $a_\chi b_\lambda = 0$ , либо  $\mathfrak{r}a_\chi b_\lambda$  пробегает всю группу  $\mathfrak{B}_\lambda$ , когда  $\mathfrak{r}$  пробегает все классы остатков  $\mathfrak{G}$ . Действительно, модуль, принадлежащий  $\mathfrak{B}_\lambda$ ,

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{M}_{b_\lambda},$$

который получается из  $\mathfrak{M}$  присоединением всех многочленов класса остатков  $b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l$ , имеет делитель

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l, a_\chi b_\lambda).$$

Но так как модуль  $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$  по предположению является простым модулем, этот делитель либо равен  $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ , либо является единичным модулем. В первом случае  $a_\chi b_\lambda$  принадлежит  $\mathfrak{M}_{b_\lambda}$ ; значит, существует соотношение

$$a_\chi b_\lambda = \mathfrak{r}(b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l),$$

откуда следует  $a_\chi b_\lambda = 0$ . В другом случае существуют два класса  $\mathfrak{r}_0$  и  $\mathfrak{r}_1$ , такие что

$$\mathfrak{r}_0 a_\chi b_\lambda + \mathfrak{r}_1 (b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l) = \mathfrak{e} = b_1 + \dots + b_{\lambda-1} + b_{\lambda+1} + \dots + b_l + b_\lambda,$$

и потому, в силу единственности,  $\mathfrak{r}_0 a_\chi b_\lambda = b_\lambda$ . Следовательно,  $F\mathfrak{r}_0 a_\chi b_\lambda$ , а значит и  $\mathfrak{r}a_\chi b_\lambda$ , пробегает всю группу  $\mathfrak{B}_\lambda$ , когда  $F$  соответственно  $\mathfrak{r}$  пробегает все многочлены соответственно все классы остатков  $\mathfrak{G}$ . Тем самым утверждение доказано.

Кроме того, если  $a_\chi b_\lambda \neq 0$ , то  $\mathfrak{U}_\chi$  изоморфна  $\mathfrak{B}_\lambda$ . Действительно, совокупность всех классов  $\mathfrak{r}a_\chi \neq 0$ , для которых также  $\mathfrak{r}a_\chi b_\lambda \neq 0$ , по § 7 изоморфна системе классов  $\mathfrak{r}a_\chi b_\lambda$ ; но эти классы исчерпывают подгруппу  $\mathfrak{B}_\lambda$ . Остается лишь показать, что названные классы  $\mathfrak{r}a_\chi$  исчерпывают группу  $\mathfrak{U}_\chi$ . Для этого рассмотрим все классы остатков  $\mathfrak{r}a_\chi$ , для которых  $\mathfrak{r}a_\chi b_\lambda = 0$ . Эта система обладает свойством, что сумма двух ее классов и произведение с произвольным многочленом снова принадлежат системе. Поэтому, если присоединить все эти классы остатков к модулю  $\mathfrak{M}_{a_\chi}$ , снова возникает модуль, являющийся делителем  $\mathfrak{M}_{a_\chi}$ , то есть либо равный  $\mathfrak{M}_{a_\chi}$ , либо являющийся единичным модулем. Но в последнем случае сама  $a_\chi$  содержалась бы в нем, так что  $a_\chi b_\lambda = 0$ , вопреки предположению. Следовательно, нет таких классов  $\mathfrak{r}a_\chi \neq 0$ , для которых  $\mathfrak{r}a_\chi b_\lambda = 0$ , и изоморфизм  $\mathfrak{U}_\chi \simeq \mathfrak{B}_\lambda$  доказана.

Пусть теперь для некоторого  $\chi$ , например,

$$a_\chi b_{\lambda_1} \neq 0, \dots, a_\chi b_{\lambda_i} \neq 0 \quad (i > 1).$$

Тогда  $\mathfrak{U}_\chi$  изоморфна группам  $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \dots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$ , следовательно, эти группы изоморфны между собой.

Теперь покажем, что тогда и по меньшей мере две из групп  $\mathfrak{U}$  изоморфны. Действительно, если бы в произведениях  $b_\lambda a_\chi$  каждой  $b_\lambda$  соответствовала только одна  $a_\chi$ , так что  $b_\lambda a_\chi \neq 0$ , то есть если бы  $b_\lambda = b_\lambda a_\chi$ , то было бы  $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{U}_\chi$ , поскольку  $\mathfrak{U}_\chi$  как простая группа не может содержать собственной

подгруппы. Тогда было бы  $k = l$ , и при правильной нумерации  $a_\chi = b_\chi$ . Но тогда и схема  $a_\chi b_\chi$  была бы диагональной схемой, чего нет. Тем самым доказана следующая теорема:

**Теорема V.** *Если вполне приводимая группа  $\mathfrak{G}$  двумя способами представлена как сумма простых групп:*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 + \cdots + \mathfrak{U}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l,$$

*то каждая группа  $\mathfrak{U}$  изоморфна по меньшей мере одной группе  $\mathfrak{B}$ , и наоборот. Если каждая  $\mathfrak{U}$  изоморфна ровно одной  $\mathfrak{B}$ , то разложения тождественны. В противном случае по меньшей мере две группы  $\mathfrak{U}$  изоморфны между собой, и точно так же по меньшей мере две группы  $\mathfrak{B}$  изоморфны между собой.*

## § 9. Связь между понятиями «изоморфный» и «того же вида».

В этом параграфе мы показываем, что известное для дифференциальных выражений от одной переменной понятие «того же вида», если его естественно обобщить, приводит к изоморфии соответствующих групп остатков.

**Определение.**<sup>17</sup> Два модуля  $\mathfrak{M}$  и  $\mathfrak{N}$  называются модулями того же вида, если существуют два полинома  $P$  и  $Q$ , причем  $P$  взаимно прост с  $\mathfrak{M}$ , а  $Q$  взаимно прост с  $\mathfrak{N}$ , такие, что для всякого  $M \equiv 0(\mathfrak{M})$  и  $N \equiv 0(\mathfrak{N})$

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \quad (25)$$

$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \quad (26)$$

имеет место. Взаимная простота здесь означает существование двух полиномов  $X$  и  $Y$ , таких что

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \quad (27)$$

$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \quad (28)$$

имеет место.

Теперь справедлива следующая

**Теорема VI.** Два модуля тогда и только тогда имеют тот же вид, когда их группы остатков изоморфны.

1. Пусть  $\mathfrak{A}$  есть группа остатков модуля  $\mathfrak{M}$ ,  $\mathfrak{B}$  – группа остатков модуля  $\mathfrak{N}$ , и пусть  $\mathfrak{A}$  изоморфна  $\mathfrak{B}$ ; пусть  $\mathfrak{a}$  и  $\mathfrak{b}$  – единичные классы в  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{B}$ . Далее пусть  $Q\mathfrak{b}$  есть класс в  $\mathfrak{B}$ , соответствующий единице  $\mathfrak{a}$  в  $\mathfrak{A}$ , и так же  $P\mathfrak{a}$  – класс в  $\mathfrak{A}$ , соответствующий единице  $\mathfrak{b}$  в  $\mathfrak{B}$ . Это соответствие запишем в виде

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \quad (29)$$

$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \quad (30)$$

Отсюда следует

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}, \quad \text{т. е.} \quad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

чем доказано (25). Аналогично имеем

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \quad \text{т. е.} \quad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

то есть соотношение (26). Далее, по (29),  $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$ , а так как по (30) было предположено  $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$ , то из единственности соответствия следует  $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$ , следовательно  $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$  и соответственно  $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$ . Тем самым (27) и (28) доказаны при  $X = Q$ ,  $Y = P$ .

2. Пусть, наоборот,  $\mathfrak{M}$  и  $\mathfrak{N}$  имеют тот же вид, так что выполнены соотношения (25)–(28). Тогда произвольному классу  $F\mathfrak{a}$  из  $\mathfrak{A}$  сопоставим класс  $FQ\mathfrak{b}$  из  $\mathfrak{B}$ . При этом каждому классу в  $\mathfrak{A}$  соответствует только один класс в  $\mathfrak{B}$ : действительно, из  $F\mathfrak{a} = 0$ , то есть  $F = M$ , по (25) следует  $FQ\mathfrak{b} = 0$ . Кроме того, это соответствие исчерпывает всю группу  $\mathfrak{B}$ , потому что специальному классу  $Y\mathfrak{a}$  соответствует класс  $YQ\mathfrak{b}$ , равный  $\mathfrak{b}$  по (27). Итак, мы имеем однозначно определенное отображение  $\Phi$  из  $\mathfrak{A}$  на  $\mathfrak{B}$ , но еще не доказано, что оно взаимно однозначно. Точно так же из равенств (26) и (28) следует однозначно определенное отображение  $\Psi$  из  $\mathfrak{B}$  на  $\mathfrak{A}$ , которое также еще не доказано взаимно однозначным.

Если одно из этих двух отображений взаимно однозначно, то изоморфия доказана, поскольку требования относительно суммы и произведения выполнены. Но если бы оба отображения  $\Phi$  и  $\Psi$  не были взаимно однозначными, то существовали бы, например, в  $\mathfrak{A}$  классы  $G\mathfrak{a}$ , которым в  $\mathfrak{B}$  соответствует класс  $GQ\mathfrak{b} = 0$ . Классы  $FQ\mathfrak{b}$ , соответствующие всем остальным классам остатков  $F\mathfrak{a}$ , тогда уже исчерпывали бы группу  $\mathfrak{B}$ , и потому отображение  $\Psi$  возвращало бы в классах  $FQPa$  всю группу  $\mathfrak{A}$ . Как мы знаем, существуют также в  $\mathfrak{B}$  отличные от нуля классы, которым посредством  $\Psi$  соответствует нулевой класс в  $\mathfrak{A}$ ; обозначим через  $G_1\mathfrak{a}$  все те классы, для которых

<sup>17</sup>Для дифференциальных выражений от одной переменной ср. формальное определение Блумберга, там же, с. 25.

$G_1\mathfrak{a} \neq 0$ , но  $G_1QP\mathfrak{a} = 0$ . Все остальные полиномы  $F$  обладают свойством, что  $FQP\mathfrak{a}$  исчерпывает группу  $\mathfrak{A}$ . Те полиномы  $F$ , для которых  $FQP\mathfrak{a} = G_1\mathfrak{a}$ , обозначим через  $G_2$ ; такие полиномы всегда существуют, как только существуют полиномы  $G_1$ . Для каждого  $G_2$  далее имеем  $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$ , зато  $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$ . Соответственно для каждого целого  $\nu$  существуют классы  $G_\nu\mathfrak{a}$ , такие что  $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$ , но  $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$ .

Теперь рассмотрим систему  $\mathfrak{S}$ , состоящую из всех полиномов  $G_1, G_2, \dots$ . Она имеет конечный базис модуля  $G_{\lambda_1}, \dots, G_{\lambda_e}$ . Теперь выберем  $\nu$  больше наибольшего из индексов  $\lambda_1, \dots, \lambda_e$ , который обозначим через  $\lambda$ . Тогда

$$G_\nu = A_1G_{\lambda_1} + \dots + A_eG_{\lambda_e}.$$

Умножая это на  $(QP)^\lambda$ , получаем

$$G_\nu(QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

что противоречит нашему предположению. Следовательно, получается изоморфия, а значит, по пункту 1 справедливы и более сильные соотношения (27), (28) при  $X = Q, Y = P$ .

В силу Теоремы VI Теорему V можно также сформулировать следующим образом:

**Теорема VII.**<sup>18</sup> *Если вполне приводимый модуль  $\mathfrak{M}$  двумя способами представим как наименьшее общее кратное простых модулей  $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$  соответственно  $\mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_l$ , каждый раз образующих тотально взаимно простую систему, то каждый  $\mathfrak{P}$  имеет тот же вид по меньшей мере с одним  $\mathfrak{D}$ , и наоборот. Если каждый  $\mathfrak{P}$  имеет тот же вид ровно с одним  $\mathfrak{D}$ , то разложения тождественны. В противном случае по меньшей мере два из модулей  $\mathfrak{P}$  имеют тот же вид между собой, и точно так же по меньшей мере два из модулей  $\mathfrak{D}$  имеют тот же вид между собой.*

---

<sup>18</sup>Ср. Loewy, с. 100–101.

## § 10. Существование бесконечно многих разложений группы.

Если представление вполне приводимой группы в виде суммы не единственно, то по Теореме V в каждом представлении существуют по меньшей мере две изоморфные между собой подгруппы. Рассмотрим теперь подгруппу, образованную такой системой изоморфных подгрупп,

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

где, следовательно,  $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\alpha$  все изоморфны, и утверждаем, что  $\mathfrak{H}$  тогда допускает бесконечно много различных таких разложений, если только в области рациональности  $P$  содержится бесконечно много “констант”, то есть величин  $a$ , для которых  $\xi_i a = a \xi_i$ . Эта теорема справедлива даже тогда, когда о группах  $\mathfrak{A}_i$  больше ничего не предполагается, даже неприводимость. Итак, имеет место

**Теорема VIII.** *Если  $\mathfrak{G}$  представима как сумма конечного числа попарно изоморфных подгрупп, то такое представление возможно бесконечно многими различными способами, как только область рациональности  $P$  содержит бесконечно много констант. При этом под константами следует понимать такие величины  $a$  области, для которых  $\xi_i a = a \xi_i$ .*

**Доказательство.** Пусть, значит,

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \dots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

и  $\mathfrak{A}_i$  изоморфна  $\mathfrak{A}_\kappa$  для  $i, \kappa = 1, \dots, \alpha$  ( $\alpha \geq 2$ ). Чтобы задать определенное изоморфное соответствие, сначала выделим одну подгруппу, например  $\mathfrak{A}_1$ . Пусть изоморфия между  $\mathfrak{A}_1$  и  $\mathfrak{A}_i$  задана соотношениями

$$a_1 \sim t_{1i} a_i, \quad a_i \sim t_{i1} a_1, \quad t_{11} a_1 = a_1 \quad (i, \kappa = 1, \dots, \alpha), \quad (31)$$

где, следовательно, в группе  $\mathfrak{A}_1$  каждый класс остатков сопоставлен самому себе. Так как  $Ma_1 = 0$ ,  $Ma_i = 0$ , отсюда следует  $Mt_{1i} a_i = 0$ ,  $Mt_{i1} a_1 = 0$ ; поэтому классы  $t_{1i} a_i$ ,  $t_{i1} a_1$ , подобно единицам, допускают умножение не только на многочлены, но и на классы. Из определения изоморфии тогда следует, что для двух соответствующих классов  $\eta$  и  $\bar{\eta}$ , допускающих это умножение классов, классы  $\eta\bar{\eta}$  и  $\bar{\eta}\eta$  снова соответствуют друг другу. Поэтому соотношения  $a_r a_s = 0$  ( $r \neq s$ ) ( $r = 1, \dots, \alpha$ ;  $s = 1, \dots, \alpha$ ) при  $s = 1$  дают

$$\begin{cases} a_r t_{1\kappa} a_\kappa = 0 & (\kappa = 1, \dots, \alpha, r \neq 1), \\ \text{а при } s > 1 & a_r t_{s1} a_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{следовательно также} & t_{1i} a_i = a_1 t_{i1} a_i, \quad t_{i1} a_1 = a_i t_{1i} a_1. \end{cases} \quad (32)$$

Далее из (31), как обобщение (27) и (28), из единственности соответствия следует

$$t_{1i} t_{i1} a_1 = a_1, \quad t_{\kappa 1} t_{1\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (33)$$

В качестве изоморфии между  $\mathfrak{A}_i$  и  $\mathfrak{A}_\kappa$  теперь зафиксируем отношение, возникающее композицией (31); такая фиксация необходима, поскольку отдельные группы могут допускать изоморфии в себя. Из (31), (32) и (33) поэтому получаем

$$a_i \sim t_{i1} t_{1\kappa} a_\kappa = t_{i\kappa} a_\kappa, \quad t_{i\kappa} a_i = a_i, \quad a_r t_{s\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq s), \quad (34)$$

где положено  $t_{i1} t_{1\kappa} = t_{i\kappa}$ . Из (33) и (34) далее следует

$$t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{i1} t_{1\kappa} t_{\kappa 1} t_{1l} a_l = t_{i1} t_{1l} a_l = t_{il} a_l;$$

тем самым выделение группы  $\mathfrak{A}_1$  снова устранено. Изоморфное отношение между  $\mathfrak{A}_i$  и  $\mathfrak{A}_\kappa$  остается тем же самым, какая бы группа  $\mathfrak{A}_\kappa$  ни использовалась вместо  $\mathfrak{A}_1$  для определения. Значит,  $t_{i\kappa}$  являются классами, которые вместе удовлетворяют соотношениям

$$Mt_{i\kappa} a_\kappa = 0; \quad a_r t_{i\kappa} a_\kappa = 0 \quad (r \neq i); \quad t_{i\kappa} t_{\kappa l} a_l = t_{il} a_l; \quad t_{\kappa i} a_i = t_{\kappa i} t_{i\kappa} a_\kappa = a_\kappa. \quad (35)$$

Эти соотношения говорят в точности о том, что модули  $\mathfrak{M}_i$  и  $\mathfrak{M}_\kappa$ , принадлежащие  $\mathfrak{A}_i$  и  $\mathfrak{A}_\kappa$ , имеют тот же вид (ср. определение § 9); вместо тамошних  $P$  и  $Q$  здесь стоят классы  $t_{i\kappa}$  соответственно

$t_{\varkappa i}$ , а первые два соотношения (35), взятые вместе, соответствуют формуле (25) соответственно (26). Обратно, из этих соотношений по Теореме VI следует изоморфия.<sup>20</sup>

Из классов  $t_{i\varkappa}a_{\varkappa}$  теперь можно составить классы  $b_{\rho}$ , которые снова окажутся единицами групп  $\mathfrak{B}_{\rho}$ , откуда будет следовать представление

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_{\alpha}.$$

Пусть именно  $\lambda_{i\varkappa}$  являются константами, определитель которых  $|\lambda_{i\varkappa}| \neq 0$ , а  $\lambda^{\varkappa r}$  — соответствующие миноры, деленные на  $|\lambda_{i\varkappa}|$ , так что выполнены соотношения

$$\begin{cases} \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri} \lambda^{r\varkappa} = \delta_{i\varkappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \varkappa, \\ 1, & i = \varkappa, \end{cases} \\ \sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir} \lambda^{r\varkappa} = \delta_{i\varkappa}. \end{cases} \quad (36)$$

Тогда определим

$$b_{\rho} = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\varkappa} t_{i\varkappa} a_{\varkappa} \quad (\rho = 1, \dots, \alpha). \quad (37)$$

Из (35), (36) и (37) следует  $Mb_{\rho} = 0$  и

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} b_{\rho} = \sum_{i,\varkappa,\rho} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\varkappa} t_{i\varkappa} a_{\varkappa} = \sum_{i,\varkappa} \delta_{i\varkappa} t_{i\varkappa} a_{\varkappa} = \sum_i t_{ii} a_i = \sum_i a_i = e, \quad (38)$$

а также

$$\begin{aligned} b_{\rho} b_{\sigma} &= \sum_{\substack{i,\varkappa \\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\varkappa} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma\nu} t_{i\varkappa} a_{\varkappa} t_{\mu\nu} a_{\nu} \\ &= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} \lambda_{\sigma \mu} \lambda^{\sigma\nu} t_{i\nu} a_{\nu} = \delta_{\rho\sigma} \sum_{i,\nu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\sigma\nu} t_{i\nu} a_{\nu} = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma), \\ b_{\rho} & (\rho = \sigma), \end{cases} \end{aligned}$$

$(\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha)$ . Следовательно, представление  $\mathfrak{e} = \mathfrak{e}b_1 + \cdots + \mathfrak{e}b_{\alpha}$  является аддитивным разложением группы  $\mathfrak{G}$ . При этом группы  $\mathfrak{B}_{\rho}$  отличаются от групп  $\mathfrak{A}_{\sigma}$ , как только  $\lambda_{i\varkappa}$  не образуют одну лишь диагональную матрицу. Действительно, если образовать  $a_{\sigma}b_{\rho}$ , то по (35) получается:

$$a_{\sigma}b_{\rho} = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\varkappa} a_{\sigma} t_{i\varkappa} a_{\varkappa} = \lambda_{\rho\sigma} \sum_{\varkappa} \lambda^{\rho\varkappa} t_{\sigma\varkappa} a_{\varkappa} \neq 0 \quad \text{для } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

ибо иначе в последней сумме должен был бы исчезать каждый отдельный член, чего нет. Значит, если при фиксированном  $\sigma$  существуют по меньшей мере два  $\rho$ , для которых  $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$ , то  $\mathfrak{A}_{\sigma}$  не может быть тождественна никакой  $\mathfrak{B}_{\rho}$ .

Но группы  $\mathfrak{B}_{\rho}$  также изоморфны между собой и группам  $\mathfrak{A}_{\sigma}$ . Для этого сначала покажем существование классов  $r_{\rho\sigma}a_{\sigma}$  и  $r^{\sigma\rho}b_{\rho}$ , которые осуществляют изоморфию  $\mathfrak{A}_{\sigma}$  и  $\mathfrak{B}_{\rho}$  ( $\rho, \sigma = 1, \dots, \alpha$ ). Именно, мы докажем, что для классов

$$r_{\rho\sigma}a_{\sigma} = \sum_i \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma}, \quad r^{\sigma\rho} = \sum_{\varkappa} \lambda^{\rho\varkappa} t_{\sigma\varkappa} a_{\varkappa} = r^{\sigma\rho}b_{\rho}$$

выполнены соотношения “того же вида” между модулями

$$(\mathfrak{M}, b_1 + \cdots + b_{\rho-1} + b_{\rho+1} + \cdots + b_{\alpha})$$

и

$$(\mathfrak{M}, a_1 + \cdots + a_{\sigma-1} + a_{\sigma+1} + \cdots + a_{\alpha}) :$$

<sup>20</sup>Причем без применения теоремы конечности, так как формулы уже каждый раз задают отображение  $\varphi_{i\varkappa}$  и обратное к нему  $\varphi_{\varkappa i}$ . Действительно, из  $ra_i = ra_i t_{i\varkappa} a_{\varkappa} t_{\varkappa i} a_i$  следует, что из  $ra_i \neq 0$  также  $ra_i t_{i\varkappa} a_{\varkappa} \neq 0$ .

$$\begin{cases} b_{\varkappa} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = 0 & (\varkappa \neq \rho), \quad r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = a_{\sigma}, \\ a_{\varkappa} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = 0 & (\varkappa \neq \sigma), \quad r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = b_{\rho}, \end{cases} \quad (39)$$

откуда, как и при (35), изоморфия следует посредством соответствия

$$b_{\rho} \sim r_{\rho\sigma} a_{\sigma}, \quad a_{\sigma} \sim r^{\sigma\rho} b_{\rho}. \quad (40)$$

В самом деле, получается:

$$\begin{aligned} b_{\varkappa} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} &= \sum_{\mu, \nu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\nu\mu} t_{\mu\nu} a_{\nu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \\ &= \sum_{\mu, i} \lambda_{\varkappa\mu} \lambda^{\mu i} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varkappa\rho} \sum_{\mu} \lambda_{\varkappa\mu} t_{\mu\sigma} a_{\sigma} = \delta_{\varkappa\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = 0 \quad (\varkappa \neq \rho), \end{aligned}$$

далее

$$r^{\sigma\rho} r_{\rho\sigma} a_{\sigma} = \sum_{\nu, i} \lambda^{\rho\nu} t_{\sigma\nu} a_{\nu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} = \sum_i \lambda^{\rho i} \lambda_{\rho i} a_{\sigma} = a_{\sigma}.$$

Точно так же в обратную сторону находим

$$a_{\varkappa} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = a_{\varkappa} \sum_{\mu} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_{\mu} = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

и далее

$$r_{\rho\sigma} r^{\sigma\rho} b_{\rho} = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \lambda^{\rho\mu} t_{\sigma\mu} a_{\mu} = \sum_{i, \mu} \lambda_{\rho i} \lambda^{\rho\mu} t_{i\mu} a_{\mu} = b_{\rho}.$$

Из доказанных здесь соотношений того же вида теперь следует (опять без теоремы конечности) изоморфия  $\mathfrak{A}_{\sigma}$  и  $\mathfrak{B}_{\rho}$ . Изоморфия между  $\mathfrak{B}_{\rho}$  и  $\mathfrak{B}_{\tau}$  находится отсюда композицией; соответствующие формулы мы еще укажем. Положим

$$\ell_{\rho\tau} b_{\tau} = r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_{\tau} = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} t_{i\sigma} a_{\sigma} \lambda^{\tau j} t_{\sigma j} a_j = \sum_{i, j} \lambda_{\rho i} \lambda^{\tau j} t_{ij} a_j;$$

тогда соответствие имеет вид  $b_{\rho} \sim \ell_{\rho\tau} b_{\tau}$ . И здесь соотношения того же вида снова можно формально проверить;  $\ell_{\rho\tau}$ , поставленные на место  $t_{i\kappa}$ , удовлетворяют соотношениям (35). В самом деле,

$$b_{\sigma} \ell_{\rho\tau} b_{\tau} = b_{\sigma} r_{\rho\sigma} r^{\sigma\tau} b_{\tau} = 0 \quad (\sigma \neq \rho),$$

$$\ell_{\rho\sigma} \ell_{\sigma\tau} b_{\tau} = r_{\rho\varkappa} r^{\varkappa\sigma} r_{\sigma\lambda} r^{\lambda\tau} b_{\tau} = r_{\rho\varkappa} a_{\varkappa} r^{\varkappa\tau} b_{\tau} = \ell_{\rho\tau} b_{\tau}.$$

Тем самым Теорема VIII доказана, так как нужно лишь выбирать  $\lambda_{i\kappa}$  бесконечно многими способами так, чтобы они не образовывали диагональную матрицу и не могли быть преобразованы друг в друга диагональной матрицей.

Следствием Теоремы VIII, вместе с Теоремой V соответственно VII, является

**Теорема IX.**<sup>21</sup> Пусть модуль  $\mathfrak{M}$  вполне приводим и является наименьшим общим кратным простых модулей  $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$ , образующих тотально взаимно простую систему, и пусть область рациональности  $P$  содержит бесконечно много констант. Тогда необходимое и достаточное условие того, что  $\mathfrak{M}$  можно бесконечно многими различными способами представить как наименьшее общее кратное простых модулей, состоит в том, что по меньшей мере два из модулей  $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$  имеют тот же вид.

Теперь выведем общие критерии того, что модуль  $\mathfrak{M}$  делится на бесконечно много простых модулей, и для этого сначала докажем следующую

**Лемма.**<sup>22</sup> Если вполне приводимый модуль  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k]$  делится на простой модуль  $\mathfrak{P}'$ , отличный от всех  $\mathfrak{P}_i$ , то по меньшей мере два из  $\mathfrak{P}_i$  имеют тот же вид.

<sup>21</sup>Ср. Loewy, с. 106–107.

<sup>22</sup>Ср. Loewy, с. 96.



Сначала выберем из  $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$  totally взаимно простую систему, последовательно вычеркивая каждый из этих простых модулей, который входит в наименьшее общее кратное еще не вычеркнутых. Поэтому теперь предположим, что  $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_k$  сами образуют totally взаимно простую систему. Пусть  $a'$  есть класс  $\mathfrak{M}$ , сопоставленный единичному классу  $\bmod \mathfrak{P}'$ . Тогда

$$Fa' = Fa'a_1 + \dots + Fa'a_k$$

для каждого многочлена  $F$ . Среди произведений  $a'a_i$  по меньшей мере два отличны от нуля, например  $a'a_1$  и  $a'a_2$ ; в самом деле, если бы, например, только  $a'a_1 \neq 0$ , то было бы  $Fa' = Fa'a_1$ , и классы остатков  $Fa'$  образовывали бы подгруппу  $\mathfrak{A}_1$ , а значит, так как  $\mathfrak{A}_1$  есть простая группа, совпадали бы с  $\mathfrak{A}_1$ , так что и модули  $\mathfrak{P}'$  и  $\mathfrak{P}_1$  совпадали бы. По способу рассуждения из § 8 отсюда следует изоморфия  $\mathfrak{A}'$  с  $\mathfrak{A}_1$  и  $\mathfrak{A}_2$ .

Пусть теперь  $\mathfrak{M}$  — произвольный модуль. Тогда рассмотрим наименьшее общее кратное  $\mathfrak{N}$  всех простых модулей, на которые делится  $\mathfrak{M}$ .<sup>23</sup> Тогда возможны два случая. Либо  $\mathfrak{N}$  не представим как наименьшее общее кратное конечного числа простых модулей; в этом случае  $\mathfrak{N}$ , а значит и  $\mathfrak{M}$ , имеет бесконечно много простых модулей в качестве делителей. Либо  $\mathfrak{N}$  представим как наименьшее общее кратное конечного числа простых модулей; тогда  $\mathfrak{N}$  называется наибольшим вполне приводимым модулем модуля  $\mathfrak{M}$  (по аналогии с соответствующим построением у Loewy). Если среди этих конечных простых модулей два имеют тот же вид, то по Теореме IX модуль  $\mathfrak{N}$ , а следовательно и  $\mathfrak{M}$ , делится на бесконечно много простых модулей. Если же, наоборот, имеет место последнее, то существует по меньшей мере один простой делитель  $\mathfrak{N}$ , отличный от всех тех конечных, как наименьшее общее кратное которых представим  $\mathfrak{N}$ . По лемме тогда  $\mathfrak{N}$ , а следовательно и  $\mathfrak{M}$ , имеет два простых делителя того же вида. Тем самым доказана следующая теорема:

**Теорема X.** *Если область рациональности  $P$  содержит бесконечно много констант, то необходимое и достаточное условие того, что модуль делится на бесконечно много различных простых модулей, состоит в том, что либо не существует наибольшего вполне приводимого модуля, либо, если такой существует, он делится по меньшей мере на два различных простых модуля того же вида.*

<sup>23</sup>Если их бесконечно много, то этому представлению по Теореме IV не может соответствовать никакое аддитивное разложение группы остатков. Ср. также пример § 12, 4.

## § 11. Связи с системами дифференциальных уравнений и их интегралами.

В силу теоремы конечности каждому модулю дифференциальных выражений можно сопоставить систему конечного числа дифференциальных выражений в качестве базиса так, что совокупность одновременных интегралов всех дифференциальных уравнений, возникающих при приравнивании к нулю дифференциального выражения модуля, совпадает с совокупностью интегралов конечной системы дифференциальных уравнений, получающейся при приравнивании к нулю базисных дифференциальных выражений. Тем самым дана связь с теорией систем линейных уравнений в частных производных; мы проследим эту связь еще немного в случае, когда группа остатков модуля является “конечной”.

**Определение.** *Группа остатков называется конечной, если существует число  $\mu$ , порядок группы, такое, что между любыми  $\mu + 1$  классами остатков существует линейное соотношение с коэффициентами из  $P$ , тогда как существует по меньшей мере одна система из  $\mu$  классов остатков, между которыми соотношения нет и которую мы будем называть линейным базисом группы остатков. В противном случае группа остатков называется бесконечной.*

Сумма двух конечных групп остатков имеет конечный порядок, а именно сумму их порядков. Сумма двух бесконечных групп или одной конечной и одной бесконечной группы есть бесконечная группа. Примеры конечных групп дают все группы остатков модулей от одной переменной; но и для нескольких переменных порядок может стать конечным, например для модуля с базисом  $\xi_1^2, \xi_2^2$ , где все классы остатков можно линейно составить из классов  $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$ . Примеры бесконечных групп см. в § 12.

Теперь имеет место следующая теорема.

**Теорема XI.** *Если модуль имеет конечную группу остатков, то всякая система дифференциальных уравнений, возникающая при приравнивании к нулю базиса модуля, допускает ровно столько линейно независимых интегралов, сколько указывает порядок ее группы остатков. Обратно, для данной системы конечного числа линейных уравнений в частных производных, имеющих лишь конечное число линейно независимых интегралов, это число равно порядку группы остатков модуля, порожденного дифференциальными выражениями.*

Область рациональности  $P$  состоит здесь из аналитических функций от  $n$  переменных  $x_1, \dots, x_n$ , у которых встречающиеся особенности внутри некоторой  $n$ -мерной области образуют не более чем многообразия меньших размерностей, так что существует сколь угодно много точек с регулярной  $n$ -мерной окрестностью.

Пусть теперь  $\mathfrak{M}$  есть модуль с конечной группой остатков. Тогда покажем, что существует линейный базис из степенных произведений с тем свойством, что при выражении произвольного класса остатков через этот базис в знаменателе могут встречаться только степени конечного числа различных величин из  $P$ .

Для этой цели упорядочим все степенные произведения  $\xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}$  лексикографически и возьмем в качестве представителей  $Q_1, \dots, Q_m$  классов остатков все те, которые линейно независимы от предшествующих по модулю  $\mathfrak{M}$ . По предположению таких только конечное число. Все остальные линейно выражаются через них.

Пусть  $\mathfrak{S}$  есть система всех степенных произведений, не включенных в линейный базис. Тогда, по первой части доказательства Теоремы III,  $\mathfrak{S}$  имеет конечную подсистему  $\mathfrak{T}$  таких степенных произведений, что каждое степенное произведение из  $\mathfrak{S}$  делится по меньшей мере на одно из  $\mathfrak{T}$ . Пусть  $P_1, \dots, P_r$  будут степенными произведениями из  $\mathfrak{T}$ , а  $M_1 = 0, \dots, M_r = 0$  ( $\mathfrak{M}$ ) – соотношениями, посредством которых  $P_1, \dots, P_r$  соответственно выражаются по модулю  $\mathfrak{M}$  линейной комбинацией более низких степенных произведений; например,

$$M_i = b_i P_i + \text{низшие члены.}$$

Если  $P$  есть произвольное степенное произведение из  $\mathfrak{S}$ , то есть имеет вид

$$\xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i,$$

то отсюда следует

$$\begin{aligned}\xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \dots \xi_n^{h_n} P_i + \text{низшие члены} \\ &= b_i P + \text{низшие члены}.\end{aligned}$$

Предположим теперь, что для всех более низких, чем  $P$ , степенных произведений в знаменателе встречаются только степени  $b_1, \dots, b_p$ , тогда как числители образованы из коэффициентов  $M_i$  сложением, умножением и дифференцированием; тогда это же утверждение верно и для самого  $P$ . Такое предположение допустимо, поскольку оно выполнено для  $P_1$ , первого элемента из  $\mathfrak{S}$  и  $\mathfrak{T}$ .

Далее, по Теореме III,  $M_1, \dots, M_p$  является базисом модуля  $\mathfrak{M}$ . Рассмотрим теперь такую систему значений  $\beta_1, \dots, \beta_n$  для  $x_1, \dots, x_n$ , для которой  $b_1 \neq 0, \dots, b_p \neq 0$ , а остальные коэффициенты  $M_i$  регулярны, то есть регулярную точку системы дифференциальных уравнений  $M_1 = 0, \dots, M_p = 0$ . Степенным произведениям  $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \dots \xi_n^{h_{in}}$  ( $i = 1, \dots, m$ ) тогда соответствуют частные производные

$$\frac{\partial^{h_{i1} + \dots + h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \dots \partial x_n^{h_{in}}} y,$$

для которых мы задаем произвольные постоянные значения  $(\gamma_1, \dots, \gamma_m)$  в точке  $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ . Тогда дифференциальные уравнения  $M_i = 0$  однозначно определяют значения всех высших производных  $y$  как конечные значения в этой точке, поскольку в знаменателе встречаются только  $b_i$ , и, как известно, отсюда доказывается существование  $m$  линейно независимых аналитических интегралов.

С другой стороны, при наших предположениях не может существовать больше чем  $m$  линейно независимых интегралов, ибо иначе, как известно, в регулярной точке можно было бы произвольно задать значения  $m + 1$  подходящим образом выбранных производных, что противоречило бы тому, что между любыми  $m + 1$  степенными произведениями должны существовать линейные зависимости по модулю  $\mathfrak{M}$ .

Если, обратно, модуль имеет бесконечную группу остатков, то тем же путем показывают, что существует бесконечно много линейно независимых интегралов; следовательно, в случае лишь  $m$  линейно независимых интегралов группа остатков конечна, а ее порядок по сказанному выше равен  $m$ .

В заключение этого параграфа покажем, что понятие изоморфизма или, что то же самое, того же вида для двух модулей дифференциальных выражений имеет для интегралов соответствующих систем дифференциальных уравнений то же значение, что и использованное Пуанкаре понятие вида для одной переменной (ср. Блумберг, цит. соч., Приложение I).

**Теорема XII.** Если два модуля  $\mathfrak{M}$  и  $\mathfrak{N}$  дифференциальных выражений имеют один и тот же вид, то существуют два дифференциальных выражения  $P$  и  $Q$ , такие что  $P(y)$  и  $Q(z)$  пробегают все интегралы  $\mathfrak{N}$  и  $\mathfrak{M}$ , когда  $y$  пробегает все интегралы  $\mathfrak{M}$ , а  $z$  — все интегралы  $\mathfrak{N}$ .

Действительно, по предположению (по § 9) для двух подходящим образом выбранных многочленов  $P$  и  $Q$  существуют соотношения

$$MQ = 0(\mathfrak{N}), \quad PQ = 1(\mathfrak{N}),$$

$$NP = 0(\mathfrak{M}), \quad QP = 1(\mathfrak{M}).$$

Поэтому ввиду  $NP(y) = 0$  функция  $P(y)$  является интегралом  $\mathfrak{N}$ . Точно так же  $Q(z)$  является интегралом  $\mathfrak{M}$ . Ввиду  $PQ(z) = z$  и  $QP(y) = y$  функция  $P(y)$  пробегает все интегралы  $\mathfrak{N}$ , а  $Q(z)$  — все интегралы  $\mathfrak{M}$ . При этом каждому отличному от нуля  $y$  соответствует также отличное от нуля  $z$ , и обратно.

## § 12. Примеры.

1. В качестве первого примера рассмотрим обыкновенное линейное дифференциальное уравнение 2-го порядка, коэффициенты которого представлены как симметрические функции интегралов. Область рациональности  $P$  состоит здесь из всех рациональных функций от интегралов и их производных, причем мы ограничиваемся достаточно малой окрестностью регулярной точки дифференциального уравнения. Модуль  $\mathfrak{M}$  мы определяем как совокупность всех дифференциальных выражений, которые имеют  $y_1$  и  $y_2$  интегралами; для них мы снова пишем многочлены от одной неопределенной  $\xi$ . Базис модуля тогда одноэлементен, а именно задается многочленом

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y''_1 & y''_2 \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y'_1 & y'_2 \\ y''_1 & y''_2 \end{vmatrix},$$

который, с точностью до множителя из  $P$ , определен однозначно. Теперь

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \quad (41)$$

где  $\mathfrak{M}_i$  состоит из всех дифференциальных выражений, имеющих интеграл  $y_i$ , а его базис, с точностью до множителя из  $P$ , определяется через

$$M_i = y_i \xi - y'_i \quad (i = 1, 2).$$

В самом деле,  $\mathfrak{M}$  делится на  $\mathfrak{M}_1$  и  $\mathfrak{M}_2$ , поскольку он обращается в нуль для интегралов  $y_1$  и  $y_2$ , следовательно, делится на  $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ ; а так как порядок базисного многочлена для  $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$  должен быть по меньшей мере 2, то  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ . Кроме того,  $\mathfrak{M}_1$  и  $\mathfrak{M}_2$  взаимно просты, поскольку

$$\frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1) - \frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) = 1, \quad D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix}. \quad (42)$$

К тому же они являются простыми модулями, так как их группа остатков имеет порядок 1.

Но  $\mathfrak{M}$ , помимо  $y_1$  и  $y_2$ , имеет также все интегралы

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \quad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \quad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

и потому тождественен наименьшему общему кратному двух взаимно простых модулей  $\mathfrak{N}_1$  и  $\mathfrak{N}_2$ , которые соответственно имеют интегралы  $z_1$  и  $z_2$ ; их базисные многочлены заданы формулами

$$N_i = z_i \xi - z'_i = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y'_1 + \alpha_{i2}y'_2).$$

Итак,  $\mathfrak{M}$  допускает бесконечно много различных представлений как наименьшее общее кратное взаимно простых простых модулей, и по теореме VII оба модуля  $\mathfrak{N}_1$  и  $\mathfrak{N}_2$  между собой и со всеми  $\mathfrak{M}_1$  и  $\mathfrak{M}_2$  имеют один и тот же вид. В самом деле, группы остатков всех этих модулей имеют порядок 1, а потому изоморфны.

Теперь выпишем аддитивное разложение группы остатков  $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$ , соответствующее представлению (41). Для этого, как в § 4, исходим из соотношения (42), выражающего взаимную простоту  $\mathfrak{M}_1$  и  $\mathfrak{M}_2$ . Для единиц  $a_1$  и  $a_2$  получаем классы остатков, порожденные многочленами

$$-\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) \quad \text{и} \quad \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1)$$

соответственно. Отсюда

$$\mathfrak{M}_1 = \left( \mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1 \xi - y'_1) \right), \quad \mathfrak{M}_2 = \left( \mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2 \xi - y'_2) \right).$$

Если теперь так же образовать единицы  $b_1$  и  $b_2$ , соответствующие разложению  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ , заменяя  $y_i$  на  $z_i$ , то получается

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2 \xi - z'_2) = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y'_1 + \alpha_{22}y'_2)),$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1\xi - z'_1) = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y'_1 + \alpha_{12}y'_2)),$$

следовательно

$$\begin{cases} b_1 = \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1} \left( \frac{\alpha_{22}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2} \left( -\frac{\alpha_{21}}{A} \right) a_2 = \frac{z_1}{y_1} \alpha^{11} a_1 + \frac{z_1}{y_2} \alpha^{12} a_2, \\ b_2 = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1} \left( -\frac{\alpha_{12}}{A} \right) a_1 + \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2} \left( \frac{\alpha_{11}}{A} \right) a_2 = \frac{z_2}{y_1} \alpha^{21} a_1 + \frac{z_2}{y_2} \alpha^{22} a_2. \end{cases} \quad (43)$$

Здесь  $(\alpha^{ik})$  есть матрица, обратная к матрице  $(\alpha_{ik})$ .

Обратно, переставляя  $z_i$  с  $y_i$ , получаем

$$\begin{cases} a_1 = \frac{y_1}{z_1} \alpha_{11} b_1 + \frac{y_1}{z_2} \alpha_{12} b_2, \\ a_2 = \frac{y_2}{z_1} \alpha_{21} b_1 + \frac{y_2}{z_2} \alpha_{22} b_2. \end{cases} \quad (44)$$

Из этих формул видна изоморфия групп  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{B}$ . Действительно, согласно нашим общим рассуждениям при  $a_1 b_\sigma \neq 0$  соответствующее сопоставление имеет вид  $a_1 \sim a_1 b_\sigma$ , то есть по (44)

$$a_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma, \quad \text{если } \alpha_{1\sigma} \neq 0,$$

и по (43) также

$$b_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2, \quad \text{если } \alpha^{\sigma 2} \neq 0,$$

следовательно

$$\frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} b_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma} \alpha_{1\sigma} \frac{z_\sigma}{y_2} \alpha^{\sigma 2} a_2 = \frac{y_1}{y_2} \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} a_2.$$

Поэтому

$$a_1 \sim \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2 \quad \text{для } \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0, \quad \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1 \sim a_2,$$

что представляет обратное сопоставление. Если  $(\alpha_{ik})$  не является диагональной матрицей, то это условие  $\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \neq 0$  всегда выполнено для некоторого  $\sigma$ . Случай диагональной матрицы следует исключить, потому что тогда модули тождественны. Если, например, только  $\alpha_{12} = 0$ , то  $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$ , но не  $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ . Значит, из  $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$ ,  $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$  не следует  $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$  (ср. примечание 12). Три модуля  $\mathfrak{M}_1$ ,  $\mathfrak{M}_2$  и  $\mathfrak{N}_2$  тогда попарно взаимно просты, но не образуют totally взаимно простую систему, так как  $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$  делится на  $\mathfrak{N}_2$  (ср. примечание 15).

Далее, если положить

$$t_{12} = \alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2} \frac{y_1}{y_2} a_2, \quad t_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma} \alpha^{\sigma 2}} \frac{y_2}{y_1} a_1,$$

то соотношения (35), как подтверждается вычислением, выполнены.

2. Пример бесконечной группы дает каждый модуль от более чем одной переменной, базис которого состоит только из одного многочлена. Несколько сложнее следующий пример; он должен показать, что бесконечные группы могут возникать и у многоэлементных модулей, то есть у таких, чей базис модуля охватывает более одного многочлена.<sup>24</sup>

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \quad \left( \xi = \frac{\partial}{\partial x}, \eta = \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Правило умножения пусть будет правилом для дифференциальных выражений. Группа остатков здесь становится бесконечной, потому что группы остатков для  $(\xi + x\eta)$  и  $(\xi + 1)$  обе бесконечны, тогда как модули  $(\xi + x\eta)$  и  $(\xi + 1)$  взаимно просты ввиду

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

<sup>24</sup>Ср. пример Ландау, сообщенный Блумбергом (цит. соч., с. 51–52). Здесь и далее независимые переменные обозначаем через  $x$  и  $y$ .

Теперь очень легко показать, что  $\mathfrak{M}$  не содержит многочлена второй степени, положив

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

Отсюда получается  $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$ . Если далее искать многочлены третьей степени в  $\mathfrak{M}$ , то находятся два линейно независимых, например

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2+x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

и

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x-1)\eta)P.$$

Если бы теперь  $\mathfrak{M}$  был одноэлементным модулем, то оба должны были бы делиться на базисный многочлен; а так как  $\mathfrak{M}$  не содержит многочлена второй степени, они должны были бы делиться на многочлен третьей степени, то есть быть пропорциональными, чего нет. Многоэлементность  $\mathfrak{M}$  есть внутренняя причина отказа теорем Ландау о произведениях, действительных в случае одной переменной.

3. Еще один пример покажет, что бесконечные группы могут возникать и у простых модулей.<sup>25</sup> Пусть  $P$  будет областью всех рациональных функций от двух переменных  $x, y$ . Модуль  $\mathfrak{M}$  с базисом

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

имеет бесконечную группу, поскольку она содержит класс остатков каждой степени  $y$ ; с другой стороны,  $\mathfrak{M}$  является простым модулем. В самом деле, покажем, что каждый делитель

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

становится единичным модулем. Именно, каждый многочлен  $F(\xi, \eta)$  можно  $\text{mod}(\xi - a)$  представить многочленом  $G(\eta)$ :

$$F(\xi, \eta) = c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Без ограничения общности пусть  $c_0 = 1$ . Но ведь по закону умножения  $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$ ; следовательно, ввиду

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \quad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

где положено  $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu)$ , получаем

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Разлагая

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots,$$

и снова заменяя здесь  $\eta^\nu$  на  $F_1$ , получаем

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) - a(c_1\eta^{\nu-1} + \dots + c_\nu) + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

или

$$c_1\eta^{\nu-1}a + \frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1} + \dots - ac_1\eta^{\nu-1} + \dots + \nu \frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

или, наконец,

$$\left( \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} \right) \eta^{\nu-1} + \dots \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

<sup>25</sup>Наше определение “простого модуля” отличается от того, что в коммутативном случае называют простым модулем, поскольку там всегда существуют делители меньшей многообразности, кроме случая, когда многообразность = 0, то есть группа остатков конечна.

Слева теперь стоит многочлен от  $\eta$  точной степени  $\nu - 1$ , который не обращается тождественно в нуль; ведь старший коэффициент

$$\frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{\partial a}{\partial y} = \frac{\partial c_1}{\partial x} + \nu \frac{1}{x} \quad \text{есть} \neq 0,$$

так как иначе  $c_1 = -\nu \log x + \varphi(y)$  не был бы рациональным. Следовательно, процедуру можно продолжать, и она приводит к многочлену нулевой степени, не обращающемуся тождественно в нуль; этим показано, что и единица содержится в  $\mathfrak{M}_1$ .<sup>26</sup>

4. Если, с другой стороны, присоединить к области рациональности еще функцию  $\log x$ , то  $\mathfrak{M}$  имеет делители

$$\left( \xi - \frac{y}{x}, \eta - \log x + \varphi(y) \right),$$

где  $\varphi(y)$  пробегает все рациональные функции от  $y$ . Все эти делители различны между собой; для каждого выполнено условие интегрируемости, а соответствующий интеграл равен

$$y \log x - \int \varphi(y) dy + c.$$

Поэтому единица не может содержаться в модуле, так как иначе нулевая функция была бы единственно возможным интегралом. С другой стороны,  $\xi$  и  $\eta$  по отношению к модулю конгруэнтны некоторой величине из области; поэтому группа остатков конечна и имеет порядок 1. Кроме того, из бесконечно многих делителей любые два взаимно просты, а данный модуль  $\mathfrak{M}$  равен наименьшему общему кратному  $\mathfrak{N}$  всех этих делителей. В самом деле, он делится на все делители, следовательно, и на  $\mathfrak{N}$ . Если бы теперь  $\mathfrak{N}$  был собственным делителем  $\mathfrak{M}$ , то  $\mathfrak{N}$  должен был бы содержать еще по крайней мере один многочлен  $F$ , скажем степени  $\rho$ , зависящий только от  $\eta$ . Если теперь заставить  $\varphi(y)$  пробегать функции  $y, \dots, y^{\rho+1}$ , то между соответствующими интегралами

$$y \log x - \frac{y^{i+1}}{i+1} + c_i \quad (i = 1, \dots, \rho+1)$$

нет линейного соотношения с коэффициентами, не зависящими от  $y$ . Но дифференциальное уравнение  $\rho$ -го порядка  $F = 0$  не может иметь  $\rho + 1$  линейно независимых интегралов.

Модуль  $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$ , однако, не является вполне приводимым.<sup>27</sup> Иначе он был бы наименьшим общим кратным конечного числа этих простых модулей, а его группа остатков имела бы конечный порядок; между тем группа остатков для  $\xi - \frac{y}{x}$  содержит классы остатков всех степеней  $\eta$ , следовательно, бесконечна.

Гёттинген, 1 августа 1919 г.

(Поступила 4 августа 1919 г.)

<sup>26</sup>Эта процедура сводится к доказательству того, что необходимые для системы дифференциальных уравнений условия интегрируемости не выполнены.

<sup>27</sup>Тем самым мы имеем пример для первого случая теоремы X.

## 18. О работе погибшего на войне К. Генцельта по теории элиминации

J. Ber. d. DMV 30 (1921), с. 101

11-е заседание, пятница, 23 сентября 1921 года, 11 часов утра.

(Председательствует Леви.)

### 1. Э. Нётер: О работе погибшего на войне К. Генцельта по теории элиминации.

Курт Генцельт с октября 1914 года числится пропавшим без вести под Диксмейде, и его следует отнести к погибшим. Существеннейшие части его эрлангенской диссертации, которую он оставил построенной без пробелов, но изложенной почти непонятно, я намерена вскоре опубликовать в свободной переработке в *Mathematische Annalen*.

Речь идет об общей задаче **теории элиминации**: определить общие нули всех полиномов идеала  $\mathfrak{M}$ , состоящего из полиномов. Если предварительно подвергнуть переменные линейному преобразованию с неопределенными коэффициентами, то главный результат можно сформулировать так:

Идеалу  $\mathfrak{M}$  можно единственным образом сопоставить результирующую форму

$$R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(m)}(x_n) = 0(\mathfrak{M}),$$

такую, что  $R_{\mathfrak{M}}$  обращается в нуль на всех нулях  $\mathfrak{M}$  и только на них. Если  $\mathfrak{N}$  является делителем  $\mathfrak{M}$ , а  $R_{\mathfrak{N}}$  и  $R_{\mathfrak{M}}$  совпадают, то совпадают и сами  $\mathfrak{N}$  и  $\mathfrak{M}$ .

Вторая часть теоремы показывает, что результирующая форма дает нули с характеристической кратностью. Она опирается на то, что  $\mathfrak{M}$  можно рассматривать как модуль линейных форм от степенных произведений  $x_1, \dots, x_{i-1}$ ; тогда отдельные множители  $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$  формы  $R_{\mathfrak{M}}$  становятся нормами соответствующего “основного модуля” по этому модулю, когда  $x_{i+1}, \dots, x_n$  присоединены к области коэффициентов. Если привлечь абстрактную теорию идеалов, получается следующая интерпретация: если

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \dots, \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$$

есть разложение  $\mathfrak{M}$  на примарные идеалы  $\mathfrak{Q}_i$ , а  $\mathfrak{L}$  является дополнением к  $\mathfrak{Q}$ , то идеалу  $\mathfrak{Q}$  соответствует примарный множитель  $Q^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$  формы  $R^{(i)}(x_i, \dots, x_n)$ , который в указанном выше смысле представляет норму  $\mathfrak{L}$  по  $\mathfrak{Q}$ .



## 19. Теория идеалов в кольцевых областях

Math. Ann. 83 (1921), с. 24–66

### Содержание.

Введение.

- § 1. Кольцевая область, идеал, условие конечности.
- § 2. Представление идеала как наименьшего общего кратного конечного числа неразложимых идеалов.
- § 3. Равенство числа компонентов в двух различных разложениях на неразложимые идеалы.
- § 4. Примарные идеалы. Единственность ассоциированных простых идеалов в двух различных разложениях на неразложимые идеалы.
- § 5. Представление идеала как наименьшего общего кратного наибольших примарных идеалов. Единственность ассоциированных простых идеалов.
- § 6. Единственное представление идеала как наименьшего общего кратного относительно-просто неразложимых идеалов.
- § 7. Единственность изолированных идеалов.
- § 8. Единственное представление идеала как произведения взаимно-просто неразложимых идеалов.
- § 9. Распространение исследования на модули. Равенство числа компонентов в разложениях на неразложимые модули.
- § 10. Специальный случай области полиномов.
- § 11. Примеры из теории чисел и из теории дифференциальных выражений.
- § 12. Пример из теории элементарных делителей.

### Введение.

Содержание настоящей работы составляет *перенесение теорем о разложении целых рациональных чисел, соответственно идеалов в алгебраических числовых полях, на идеалы в произвольных областях целостности, а в более общем виде – в кольцевых областях*. Для понимания этого перенесения сначала сформулируем теоремы о разложении для целых рациональных чисел в форме, несколько отличающейся от обычной.

Если в

$$a = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_\sigma^{e_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

рассматривать степени простых чисел  $q_i$  как компоненты разложения, то этим компонентам присущи следующие характерные свойства:

1. Они *попарно взаимно просты*; однако ни одно  $q_i$  не представимо как произведение попарно взаимно простых чисел, то есть в этом смысле имеет место неразложимость. Из попарной взаимной простоты следует также, что произведение  $q_1 \cdots q_\sigma$  равно наименьшему общему кратному  $[q_1 \cdots q_\sigma]$ .
2. Любые две компоненты,  $q_i$  и  $q_k$ , *относительно просты*; то есть если  $bq_i$  делится на  $q_k$ , то  $b$  делится на  $q_k$ . И в этом смысле также имеет место неразложимость.
3. Каждое  $q$  является *примарным*; то есть если произведение  $b \cdot c$  делится на  $q$ , но  $b$  не делится, то некоторая степень<sup>1</sup>  $c$  делится. Кроме того, это представление есть представление через *наибольшие примарные компоненты*, поскольку произведение двух различных  $q$  уже не является примарным. Также относительно разложения на наибольшие примарные компоненты эти  $q$  неразложимы.
4. Каждое  $q$  *неразложимо* в том смысле, что его нельзя представить как наименьшее общее кратное двух собственных делителей.

Связь этих примарных чисел  $q$  с простыми числами  $p$  состоит в том, что для каждого  $q$  существует одно и, с точностью до знака, только одно  $p$ , которое является делителем  $q$  и некоторая степень которого делится на  $q$ : ассоциированное простое число. Если  $p^e$  есть наименьшая такая степень –  $e$  есть экспонента  $q$ , – то здесь, в частности,  $p^e$  равно  $q$ . Теорему единственности теперь можно сформулировать так:

---

<sup>1</sup>Если эта степень всегда первая, то, как известно, речь идет о простых числах.

*В двух различных разложениях целого рационального числа на неразложимые, наибольшие примарные компоненты  $q$  совпадают число компонентов, ассоциированные простые числа (с точностью до знака) и экспоненты. Поскольку  $p^e = q$ , отсюда следует также совпадение самих  $q$  (с точностью до знака).*

Неопределенность, задаваемая знаком, как известно, устраняется, если вместо чисел рассматривать выведенные из них идеалы (все числа, делящиеся на  $a$ ); тогда формулировка точно так же справедлива для единственного разложения идеалов конечных алгебраических числовых полей на степени простых идеалов.

Далее (§ 1) за основу берется общая кольцевая область, которая должна удовлетворять только условию конечности: каждый идеал области имеет конечный идеальный базис. Без такого условия конечности неразложимые и простые идеалы вообще могли бы не существовать, как показывает область всех целых алгебраических чисел, в которой нет разложения на простые идеалы.

Оказывается, что – соответственно четырем характерным свойствам компонентов  $q$  – в общем случае существуют четыре отдельные разложения, возникающие одно из другого последовательным расщеплением. При этом разложение на взаимно-просто неразложимые идеалы является представлением в виде произведения, а остальные три разложения являются приведенными (§ 2) представлениями как наименьшие общие кратные. Сохраняется также связь между примарным идеалом – неразложимые идеалы тоже примарны – и ассоциированным простым идеалом: для каждого примарного идеала  $\Omega$  однозначно определяется ассоциированный простой идеал  $\mathfrak{P}$ , который является делителем  $\Omega$  и некоторая степень которого делится на  $\Omega$ . Если  $\mathfrak{P}^e$  есть наименьшая такая степень –  $e$  есть экспонента  $\Omega$ , – то здесь  $\mathfrak{P}^e$  уже не обязано совпадать с  $\Omega$ . Теорема единственности выражается так:

Разложения 1 и 2 единственны; в двух различных разложениях 3 или 4 совпадают число компонентов и ассоциированные простые идеалы;<sup>2</sup> изолированные идеалы (§ 7), встречающиеся среди компонентов, определены однозначно.

Для доказательства теорем о разложении из условия конечности выводится впервые высказанная Дедекиндом для конечных числовых модулей “теорема о конечной цепи”, а из нее – представление 4 каждого идеала как наименьшего общего кратного конечного числа неразложимых идеалов. Преобразованием понятия разложимости компоненты отсюда получается основная теорема единственности для разложения 4 на неразложимые идеалы. Объединяя каждый раз конечное число компонентов, переходят к остальным разложениям, теоремы единственности которых получаются как следствие теоремы единственности 4.

Наконец показывается (§ 9), что представление конечным числом неразложимых компонентов имеет место и при более слабых предположениях; коммутативность кольцевой области не требуется, и достаточно вместо идеала рассматривать модуль относительно этой области. В этом более общем случае еще сохраняется равенство числа компонентов в двух различных разложениях, тогда как понятия простого и примарного связаны с коммутативностью и с понятием идеала; напротив, понятие взаимной простоты для идеалов в некоммутативных областях сохраняется.

Простейшая кольцевая область, в которой действительно возникают четыре отдельные разложения, – это область всех полиномов от  $n$  переменных с произвольными комплексными коэффициентами. Отдельные разложения здесь можно иррационально истолковать через поведение алгебраических образований, а теорема единственности для ассоциированных простых идеалов соответствует основной теореме теории элиминации об единственной разложимости алгебраических образований на неразложимые. Дальнейшие примеры дают все конечные области целостности из полиномов (§ 10). Но даже простая область всех четных чисел, более общо – всех чисел, делящихся на фиксированное число, уже дает пример частично разделенных разложений (§ 11). Пример теории идеалов в некоммутативных областях дает теория элементарных делителей (§ 12), где имеется единственное разложение на неразложимые идеалы, соответственно классы. Эти неразложимые классы полностью характеризуют неразложимые составляющие элементарных делителей и, возможно, для областей, где обычная теория элементарных делителей отказывает,

<sup>2</sup>Предположительно, сверх этого совпадают также экспоненты, а еще более общо – соответствующие компоненты изоморфны.

могут рассматриваться как ее эквивалент.

О существующей литературе следует заметить следующее: разложение на наибольшие примарные идеалы для области полиномов с произвольными комплексными, соответственно целыми, коэффициентами было дано Ласкером и в отдельных пунктах далее развито Маколеем.<sup>3</sup> Оба опираются на теорию элиминации, то есть используют тот факт, что полином можно единственным образом представить как произведение неразложимых полиномов. В действительности теоремы о разложении идеалов не зависят от этой предпосылки, как подсказывает теория идеалов в алгебраических числовых полях и как показывает настоящая работа. Примарный идеал у Ласкера и Маколея также определяется на основе понятий из теории элиминации.

Разложение на неразложимые идеалы и разложение на относительно-просто неразложимые, по-видимому, не были замечены в литературе даже для области полиномов; только у Маколея имеется замечание о единственности изолированных примарных идеалов.

Разложение на взаимно-просто неразложимые идеалы для области полиномов было дано Шмейдлером,<sup>4</sup> с использованием теории элиминации для доказательства конечности. Однако там теорема единственности сформулирована только для классов идеалов, а не для самих идеалов. Последняя теорема единственности содержится в совместной работе,<sup>5</sup> где речь идет об идеалах в некоммутативных областях полиномов. Там используется только конечный идеальный базис; следовательно, теоремы и методы остаются действительными для общих кольцевых областей и в настоящей работе уточняются относительно равенства числа (§ 11). Настоящие исследования являются сильным обобщением и дальнейшим развитием тех понятийных образований, которые лежали в основе обеих работ. Существенным в обеих работах является переход от представления как наименьшего общего кратного к аддитивному разложению системы классов вычетов. Здесь, ради простоты изложения, мы снова остаемся при наименьшем общем кратном; аддитивному разложению тогда соответствует преобразование понятия разложимости в свойство дополнения (§ 3). Однако рассуждениями, существенно соответствующими рассуждениям совместной работы, все приведенные теоремы можно также понимать как аддитивные теоремы разложения для системы классов вычетов и некоторых подсистем. Эта система классов вычетов образует кольцо той же общности, что и исходно взятое за основу; ведь каждое кольцо можно рассматривать как систему классов вычетов того идеала, который соответствует совокупности тождественных соотношений между элементами кольца; или также подсистемы этих соотношений, если остальные соотношения предполагаются выполненными уже в области.

Это замечание дает также место работам Френкеля.<sup>6</sup> Френкель рассматривает аддитивные разложения колец, на которые налагаются такие ограничительные условия (существование регулярных элементов, деление на них, условие разложимости), что для соответствующего идеала четыре разложения совпадают. Из-за этого совпадения и его условие конечности, согласно которому идеал должен иметь только конечное число собственных делителей, – от которого, впрочем, частично отступают, – не означает более сильного ограничения, чем наше. Исходный пункт Френкеля обусловлен иными, по существу алгебраическими, целями его работ; посредством алгебраического расширения он затем приходит к более общим кольцам с менее ограничительными условиями.

<sup>3</sup>E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), c. 20, Satz VII und XIII. – F. S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), c. 66.

<sup>4</sup>W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), c. 29.

<sup>5</sup>E. Noether–W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), c. 1.

<sup>6</sup>A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), c. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), c. 121.

## § 1. Кольцевая область, идеал, условие конечности.

1. Положенная в основу область  $\Sigma$  пусть будет (коммутативным) кольцом в абстрактном определении;<sup>6</sup> то есть  $\Sigma$  состоит из системы элементов  $a, b, c, \dots, f, g, h, \dots$ , в которой как равенство определено отношение, удовлетворяющее обычным условиям; и в которой посредством двух операций (видов соединения), сложения и умножения, из каждых двух элементов кольца  $a$  и  $b$  всегда однозначно получается третий элемент как сумма  $a + b$  и как произведение  $a \cdot b$ . Кольцо и эти вообще произвольные операции должны удовлетворять следующим законам:

1. Ассоциативный закон сложения:  $(a + b) + c = a + (b + c)$ .
2. Коммутативный закон сложения:  $a + b = b + a$ .
3. Ассоциативный закон умножения:  $(a \cdot b)c = a(b \cdot c)$ .
4. Коммутативный закон умножения:  $a \cdot b = b \cdot a$ .
5. Дистрибутивный закон:  $a(b + c) = ab + ac$ .
6. Закон неограниченного и однозначного вычитания. В  $\Sigma$  существует единственный элемент  $x$ , удовлетворяющий уравнению  $a + x = b$ . (Его обозначают  $x = b - a$ .)

Из этих свойств следует существование нуля; однако кольцо не обязано иметь единицу; и произведение двух элементов может обращаться в нуль, хотя ни один множитель не обращается в нуль. Кольца, для которых из обращения произведения в нуль всегда следует обращение в нуль одного из множителей и которые, кроме того, имеют единицу, называются собственными областями целостности. Для конечной суммы  $a + a + \dots + a$  введем обычное сокращенное обозначение  $na$ , где целые числа  $n$  рассматриваются лишь как сокращающие знаки, а не как элементы кольца, и где рекуррентно определены  $a = 1a$ ,  $na + a = (n + 1)a$ .

2. Под идеалом  $\mathfrak{M}$ <sup>7</sup> в  $\Sigma$  понимается система элементов из  $\Sigma$ , удовлетворяющая двум условиям:

1. Вместе с  $f$  идеал  $\mathfrak{M}$  содержит также  $a \cdot f$ , где  $a$  – произвольный элемент из  $\Sigma$ .
2. Вместе с  $f$  и  $g$  идеал  $\mathfrak{M}$  содержит также разность  $f - g$ ; следовательно, вместе с  $f$  он содержит также  $nf$  для всякого целого числа  $n$ .

Если  $f$  является элементом  $\mathfrak{M}$ , то, как обычно, мы выражаем это записью  $f \equiv 0(\mathfrak{M})$  и говорим, что  $f$  делится на  $\mathfrak{M}$ . Если каждый элемент  $\mathfrak{N}$  одновременно является элементом  $\mathfrak{M}$ , то есть делится на  $\mathfrak{M}$ , мы говорим:  $\mathfrak{N}$  делится на  $\mathfrak{M}$ ; в обозначениях:  $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$ .  $\mathfrak{M}$  называется собственным делителем  $\mathfrak{N}$ , если он содержит элементы, отличные от элементов  $\mathfrak{N}$ , то есть если обратно он не делится на  $\mathfrak{N}$ . Из  $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$ ,  $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$  следует  $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ .

И остальные известные понятия также сохраняются буквально. Под наибольшим общим делителем двух идеалов  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{B}$ , то есть  $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ , понимается совокупность элементов, представимых в форме  $a + b$ , где  $a$  пробегает все элементы из  $\mathfrak{A}$ , а  $b$  все элементы из  $\mathfrak{B}$ ;  $\mathfrak{D}$  снова является идеалом. Точно так же наибольший общий делитель бесконечно многих идеалов,

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_\nu, \dots),$$

определяется как совокупность элементов  $d$ , представимых в виде суммы элементов каждый раз лишь из конечного числа идеалов:

$$d = a_{i_1} + a_{i_2} + \dots + a_{i_n};$$

<sup>6</sup>Определение взято из габилюционной работы Френкеля, с опущением его ограничительных условий 6, I и II; зато пришлось включить коммутативный закон сложения. Итак, речь идет о законах, определяющих поле, с опущением обратимости умножения.

<sup>7</sup>Идеалы обозначаются большими немецкими буквами.  $\mathfrak{M}$  должно напоминать пример идеала из полиномов, который обычно называется “модулем” или модулем форм. Впрочем, §§ 1–3 используют только модульное свойство, а не свойство идеала; ср. § 9.

и здесь  $\mathfrak{D}$  снова является идеалом.

Если идеал  $\mathfrak{M}$ , в частности, содержит конечное число элементов  $f_1, f_2, \dots, f_\varrho$  так, что

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_\varrho), \quad f = a_1 f_1 + \dots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \dots + n_\varrho f_\varrho$$

для каждого  $f \in \mathfrak{M}$ , где  $a_i$  являются величинами кольцевой области, а  $n_i$  целыми числами, то  $\mathfrak{M}$  называется конечным идеалом;  $f_1, \dots, f_\varrho$  называются идеальным базисом.

Далее мы полагаем в основу только такие кольца  $\Sigma$ , которые удовлетворяют условию конечности: *каждый идеал в  $\Sigma$  конечен, то есть обладает идеальным базисом.*

**3.** Из условия конечности прямо следует лежащая в основе всех дальнейших рассуждений

**Теорема I (теорема о конечной цепи).**<sup>8</sup> Пусть  $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_\nu, \dots$  — счетно бесконечная система идеалов в  $\Sigma$ , каждый из которых делится на следующий. Тогда начиная с некоторого конечного индекса  $n$  все идеалы тождественны:

$$\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \dots$$

*Иными словами: если  $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_s, \dots$  образуют просто упорядоченную цепь идеалов так, что каждый идеал является собственным делителем непосредственно предыдущего, то цепь обрывается за конечное число шагов.*

Действительно, пусть

$$\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \dots, \mathfrak{M}_\nu, \dots)$$

есть наибольший общий делитель системы, а  $f_1, \dots, f_\varrho$  — базис  $\mathfrak{D}$ , всегда существующий вследствие условия конечности. Тогда из предположения о делимости следует, что каждый элемент  $\mathfrak{D}$  одновременно является элементом одного из идеалов цепи; ведь из

$$f = g + h, \quad g \in \mathfrak{M}_r, \quad h \in \mathfrak{M}_s, \quad (r < s)$$

следует  $g \in \mathfrak{M}_s$ , а значит  $f \in \mathfrak{M}_s$ . То же самое верно, если  $f$  является суммой большего числа слагаемых. Следовательно, существует и конечный индекс  $n$  такой, что

$$f_1 \in \mathfrak{M}_n, \quad f_2 \in \mathfrak{M}_n, \quad \dots, \quad f_\varrho \in \mathfrak{M}_n.$$

Поскольку, обратно,  $\mathfrak{M}_n \in \mathfrak{D}$ , получаем  $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$ ; а далее, поскольку  $\mathfrak{M}_n \in \mathfrak{D}$  и  $\mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \in \mathfrak{M}_r$ , получаем также  $\mathfrak{M}_r = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$  для каждого  $r > n$ , чем теорема доказана.

Отметим, что из этой теоремы, обратно, снова следует существование идеального базиса, так что условие конечности можно было бы сформулировать и в этой безбазисной форме.

<sup>8</sup>Впервые сформулирована для числовых модулей Дедекиндом: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, Satz VIII (4-е издание); наше доказательство и обозначение “цепь” заимствованы оттуда. Для идеалов из полиномов у Ласкера, цит. соч., с. 56 (вспомогательная теорема). Однако в обоих случаях теорема имеет лишь отдельные применения. Наши применения всюду опираются на постулат выбора.

## § 2. Представление идеала как наименьшего общего кратного конечного числа неразложимых идеалов.

Наименьшее общее кратное  $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k]$  идеалов  $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k$  определим, как обычно, как совокупность элементов, которые делятся как на  $\mathfrak{B}_1$ , так и на  $\mathfrak{B}_2, \dots$ , так и на  $\mathfrak{B}_k$ ; в обозначениях:

$$\text{из } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \dots, k), \quad \text{следует} \quad f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k]),$$

и обратно. Наименьшее общее кратное снова является идеалом; идеалы  $\mathfrak{B}_i$  мы также называем компонентами разложения.

**Определение I.** Представление  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k]$  называется редуцированным представлением, если ни один  $\mathfrak{B}_i$  не делит наименьшее общее кратное  $\mathfrak{U}_i$  остальных идеалов и если ни один  $\mathfrak{B}_i$  нельзя заменить собственным делителем.<sup>9</sup> Если эти условия выполнены только для идеала  $\mathfrak{B}_i$ , то представление называется редуцированным относительно  $\mathfrak{B}_i$ . Наименьшее общее кратное  $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \dots, \mathfrak{B}_k]$  называется дополнением  $\mathfrak{B}_i$ . Представления, в которых выполнено только первое условие, называются кратчайшими представлениями.

Итак, при представлении идеала как наименьшего общего кратного достаточно ограничиваться редуцированными представлениями, по следующей лемме.

**Лемма I.** Каждое представление идеала как наименьшего общего кратного конечного числа идеалов можно по меньшей мере одним способом заменить редуцированным представлением; такое представление, в частности, можно получить последовательным разложением.

Действительно, пусть  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k]$  есть произвольное представление  $\mathfrak{M}$ . Мы последовательно опускаем те  $\mathfrak{B}_i$ , которые делят наименьшее общее кратное оставленных идеалов. Поскольку остальные идеалы всё ещё дают  $\mathfrak{M}$ , в возникающем таким образом представлении

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$$

первое условие уже выполнено; значит, это кратчайшее представление, и это условие остаётся выполненным, если заменить какой-либо  $\mathfrak{B}_i$  собственным делителем. Второе условие, в свою очередь, всегда достижимо по теореме о конечной цепи (теорема I). В самом деле, пусть положено:

$$\mathfrak{B}_i \supset \mathfrak{B}'_i \supset \mathfrak{B}''_i \supset \dots \supset \mathfrak{B}_i^{(\nu)} \supset \dots, \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}'_i] = \dots = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}] = \dots,$$

где каждый  $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$  является собственным делителем непосредственно предшествующего идеала. Тогда по этой теореме цепь  $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}'_i, \dots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \dots$  должна оборваться за конечное число шагов; значит, в представлении  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}]$  идеал  $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$  уже нельзя заменить его собственным делителем. Тем более это остаётся верным, если  $\mathfrak{U}_i$  заменить собственным делителем. Применяя, следовательно, эту процедуру последовательно к каждому  $\mathfrak{B}_i$  и каждый раз образуя дополнение с уже редуцированными  $\mathfrak{B}$ , мы получаем редуцированное представление.<sup>10</sup>

Чтобы получить такое представление последовательно, надо показать, что из отдельных редуцированных представлений

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \quad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \dots, \quad \mathfrak{C}_{k-1} = [\mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$$

следует, что и возникающее из них представление  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_k, \mathfrak{C}_k]$  редуцировано. Для этого достаточно показать, что вместе с редуцированными представлениями

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}], \quad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

<sup>9</sup>Пример нередуцированного представления:  $(x, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$  для каждого показателя  $\lambda \geq 2$ ; соответствующее  $\lambda = 1$  представление  $[(x), (x^2, y)]$  является соответствующим редуцированным. Это представление сообщил мне погибший на войне К. Hentzelt как простейший пример неоднозначного разложения на примарные идеалы.

<sup>10</sup>Что такое представление не определяется данным представлением однозначно, показывает предыдущий пример. Для  $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ , где  $\lambda \geq 2$ , наряду с  $[(x), (x^2, y)]$  также  $[(x), (x^2, ux + y)]$  при произвольном  $u$  является редуцированным представлением.

редуцировано также  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ . В самом деле, здесь по предположению ни один  $\mathfrak{B}$  не делит своего дополнения. Если бы это имело место для некоторого  $\mathfrak{C}_i$ , то, вопреки предположению в первом представлении,  $\mathfrak{C}$  можно было бы заменить собственным делителем, поскольку в силу второго редуцированного представления  $\mathfrak{C}_1$  и  $\mathfrak{C}_2$  являются собственными делителями  $\mathfrak{C}$ . Значит, представление становится кратчайшим. Далее, по предположению ни один  $\mathfrak{B}$  нельзя заменить собственным делителем; если бы это было возможно для некоторого  $\mathfrak{C}_i$ , то это, вопреки предположению, соответствовало бы замене  $\mathfrak{C}$  собственным делителем, поскольку представление для  $\mathfrak{C}$  редуцировано. Тем самым лемма доказана.

**Определение II.** Идеал  $\mathfrak{M}$  называется разложимым, если он представим как наименьшее общее кратное двух собственных делителей; в противоположном случае  $\mathfrak{M}$  называется неразложимым.

Теперь, пользуясь редуцированным представлением, мы доказываем с помощью теоремы I о конечной цепи:

**Теорема II.** Каждый идеал представим как наименьшее общее кратное конечного числа неразложимых идеалов.<sup>11</sup>

Действительно, произвольный идеал  $\mathfrak{M}$  либо неразложим; тогда  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$  есть представление, которого требует теорема II. Либо же  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$ , где  $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$  являются собственными делителями  $\mathfrak{M}$ , и это представление по лемме I можно считать редуцированным. Для  $\mathfrak{C}_1$  действует та же альтернатива: либо он неразложим, либо существует редуцированное представление  $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$ .

Продолжая так, получаем ряд редуцированных представлений

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2] = \dots = [\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_n, \mathfrak{C}_n] = \dots \quad (1)$$

В цепи  $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \dots, \mathfrak{C}_n, \dots$  каждый  $\mathfrak{C}_n$  является собственным делителем непосредственно предшествующего идеала; следовательно, цепь обрывается за конечное число шагов. Поэтому существует индекс  $n$ , для которого  $\mathfrak{C}_n$  становится неразложимым. По лемме I представление  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$  также редуцировано; значит,  $\mathfrak{C}_n$  не может делить своё дополнение  $\mathfrak{U}_n$ , а в представлении  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_n, \mathfrak{C}_n]$  идеал  $\mathfrak{U}_n$  нельзя заменить никаким собственным делителем. Если при необходимости заменить  $\mathfrak{U}_n$  собственным делителем,<sup>12</sup> так, чтобы представление стало редуцированным, то тем самым показано, что каждый разложимый идеал допускает редуцированное представление как наименьшее общее кратное одного неразложимого и одного комплементарного ему идеала. Следовательно, в ряду (1) без ограничения общности все  $\mathfrak{B}_i$  можно считать неразложимыми; повторение приведённого выше рассуждения даёт существование неразложимого  $\mathfrak{C}_n$ , чем теорема II доказана.

<sup>11</sup>Что такое представление в общем случае не единственно, показывает предыдущий пример:  $(x^2, xy) = [(x), (x^2, ux + y)]$  при произвольном  $u$ . Обе компоненты при произвольном  $u$  неразложимы. Все делители  $(x)$  имеют вид  $(x, g(y))$ , где  $g(y)$  означает многочлен от  $y$ ; следовательно, наименьшее общее кратное двух таких идеалов тоже имеет этот вид и потому является собственным делителем  $(x)$ . Идеал  $(x^2, ux + y)$  имеет только один делитель  $(x, y)$ , значит, с необходимостью также является неразложимым.

<sup>12</sup>На самом деле это представление также редуцировано относительно  $\mathfrak{U}_n$ , как будет показано в § 3 (лемма IV) в качестве обращения леммы I.

### § 3. Равенство числа компонентов в двух различных разложениях на неразложимые идеалы.

Для доказательства равенства числа компонентов сначала надо выразить разложимость, соответственно неразложимость, идеала через свойства его дополнения по следующей теореме.

**Теорема III.**<sup>13</sup> Пусть кратчайшее представление  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$  редуцировано относительно  $\mathfrak{C}$ . Тогда необходимым и достаточным условием того, что  $\mathfrak{C}$  разложим, является существование двух идеалов  $\mathfrak{N}_1$  и  $\mathfrak{N}_2$ , которые являются собственными делителями  $\mathfrak{M}$ , таких, что

$$\mathfrak{N}_1 \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{M}), \quad \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{U}), \quad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \quad (2)$$

Отсюда ещё следует: если условия (2) выполнены, а  $\mathfrak{C}$  неразложим, то по меньшей мере один  $\mathfrak{N}_i$  не является собственным делителем  $\mathfrak{M}$ ; тогда  $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$ .

Пусть  $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ , где  $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$  являются собственными делителями  $\mathfrak{C}$ . Тогда получается

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_2]].$$

Здесь идеалы  $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$  являются собственными делителями  $\mathfrak{M}$ , иначе  $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$  не было бы редуцировано относительно  $\mathfrak{C}$ . Поскольку делимость на  $\mathfrak{U}$  также выполнена, необходимость условия (2) доказана. (Представление (2) не редуцировано, так как один из  $[\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_i]$  можно заменить на  $\mathfrak{C}_i$ .)

Пусть теперь, обратно, выполнено (2). Образует идеалы

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1), \quad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2), \quad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Тогда  $\mathfrak{C}$  делится как на  $\mathfrak{C}_1$ , так и на  $\mathfrak{C}_2$ , а значит, и на наименьшее общее кратное  $\mathfrak{C}^*$ . Чтобы показать делимость  $\mathfrak{C}^*$  на  $\mathfrak{C}$ , пусть

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2), \quad \text{или также} \quad f = c + n_1 = t + n_2,$$

где  $c, t, n_1, n_2$  суть величины из  $\mathfrak{C}, \mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$ ; в частности,  $n_1$  делится на  $\mathfrak{N}_1$ . Следовательно, разность

$$g = c - t = n_2 - n_1$$

делится как на  $\mathfrak{C}$ , так и на  $\mathfrak{U}$ , а значит, на  $\mathfrak{M}$ . В силу  $n_1 = n_2 + m$  далее  $n_1$  (так же как  $n_2$ ) делится как на  $\mathfrak{N}_1$ , так и на  $\mathfrak{N}_2$ , а значит, на  $\mathfrak{M}$ . Поэтому

$$f = c + m, \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}), \quad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

При этом  $\mathfrak{C}_1$  и  $\mathfrak{C}_2$  являются собственными делителями  $\mathfrak{C}$ . Ведь если бы  $\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1) = \mathfrak{C}$ , то  $\mathfrak{N}_1$  делился бы на  $\mathfrak{C}$ ; следовательно, из-за делимости на  $\mathfrak{U}$  он был бы равен  $\mathfrak{M}$ , вопреки предположению. Тем самым  $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$  распознан как разложимый; теорема III доказана.

Заметим, что почти то же рассуждение показывает ещё следующее:

**Лемма II.** Если в кратчайшем представлении  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}]$  идеал  $\mathfrak{C}$  можно заменить собственным делителем, то  $\mathfrak{C}$  разложим.

Итак, пусть

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{U}, \mathfrak{C}_1],$$

и пусть положено

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{U}, \mathfrak{C})].$$

Тогда  $\mathfrak{C}$  снова делится на  $\mathfrak{C}^*$ . Из  $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$  далее следует

$$f = c_1 = a + c.$$

Разность  $a = c_1 - c$  делится как на  $\mathfrak{U}$ , так и на  $\mathfrak{C}_1$ , следовательно, на  $\mathfrak{M}$ . Поэтому  $c_1 = c + m$ ,  $f \equiv 0(\mathfrak{C})$ ,  $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$ . Так как и  $\mathfrak{C}_1$ , и  $(\mathfrak{U}, \mathfrak{C})$  по предположению являются собственными делителями  $\mathfrak{C}$ , тем самым  $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$  распознан как разложимый.

<sup>13</sup>Теорема III соответствует переходу от модулей к фактор-группам в работах Шмейдлера и Нетер–Шмейдлера (ср. введение). Идеалу  $\mathfrak{C}$  соответствует фактор-группа, а  $\mathfrak{N}_1$  и  $\mathfrak{N}_2$  – подгруппы, на которые разлагается фактор-группа.



Неразложимый  $\mathfrak{C}$ , следовательно, нельзя заменить собственным делителем.

Пусть теперь заданы два различных кратчайших представления  $\mathfrak{M}$  как наименьшего общего кратного конечного числа неразложимых идеалов:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

По замечанию к лемме II эти представления одновременно редуцированы. Сначала докажем

**Лемма III.** Для каждого дополнения  $\mathfrak{U}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1} \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$  существует идеал  $\mathfrak{D}_j$  такой, что  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$ .

Действительно, полагая  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_i, \mathfrak{C}_1]$ ,  $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]$  и т. д., получаем

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_2]] = [\mathfrak{B}_i, [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], \mathfrak{C}_2].$$

Здесь для  $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1]$ ,  $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]$  выполнены условия (2) теоремы III, поскольку  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i]$  редуцировано относительно  $\mathfrak{B}_i$ , а представление является кратчайшим. Так как  $\mathfrak{B}_i$  был предположен неразложимым, необходимо один из этих  $\mathfrak{N}_i$  должен стать равным  $\mathfrak{M}$ .

Если  $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1] = \mathfrak{M}$ , лемма доказана. Если же  $[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2] = \mathfrak{M}$ , то соответственно получается  $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{C}_2]]$ , где по тому же выводу снова одна компонента должна стать равной  $\mathfrak{M}$ . Продолжая так, получаем либо  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_j]$ , где  $j < l$ , либо  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_1, \dots, \mathfrak{D}_{l-1}]$ ; поскольку  $\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{l-1} = \mathfrak{D}_l$ , лемма доказана.

Отсюда теперь следует

**Теорема IV.** В двух различных кратчайших представлениях идеала как наименьшего общего кратного неразложимых идеалов число компонентов одинаково.

Из леммы для  $i = 1$  действительно следует:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k].$$

Рассматривая теперь два разложения

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \dots, \mathfrak{D}_l],$$

и повторяя приведённый выше вывод относительно дополнения  $\mathfrak{U}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \dots, \mathfrak{B}_k]$  идеала  $\mathfrak{B}_2$ , получаем

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{B}_2] = [\mathfrak{U}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \mathfrak{B}_3, \dots, \mathfrak{B}_k],$$

а продолжение процедуры даёт

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \dots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Так как по предположению представление  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$  является кратчайшим, то есть никакой  $\mathfrak{D}$  нельзя опустить, различные среди  $\mathfrak{D}_{j_i}$  должны исчерпывать все  $\mathfrak{D}$ ; следовательно,  $k \geq l$ . Если в лемме и последующих выводах всюду поменять  $\mathfrak{B}$  с  $\mathfrak{D}$ , соответственно получаем  $l \geq k$ , а значит,  $k = l$ , чем равенство числа компонентов доказано. Отсюда ещё следует, что идеалы  $\mathfrak{D}_{j_i}$  все попарно различны, иначе в кратчайшем представлении через  $\mathfrak{D}_{j_i}$  появилось бы меньше чем  $k$  компонентов; значит, обозначения можно выбрать так, чтобы  $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$ . По той же причине все промежуточные представления  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_r}, \mathfrak{B}_{r+1}, \dots, \mathfrak{B}_k]$  также кратчайшие и, по замечанию к лемме II, тем самым редуцированные.

Равенство числа компонентов приводит к обращению леммы I:

**Лемма IV.** Если в редуцированном представлении объединить компоненты в группы и образовать их наименьшие общие кратные, то возникающее представление будет редуцировано. Иными словами: из редуцированного представления

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_1 \cdots \mathfrak{C}_k]$$

следует, что также  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$  редуцировано, если положено  $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{C}_1, \dots, \mathfrak{C}_h]$ ,  $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{C}_{h+1}, \dots, \mathfrak{C}_k]$ .

Сначала надо заметить, что  $\mathfrak{N}_1$  не может делить своё дополнение  $\mathfrak{N}_2$ , поскольку это не имеет места ни для одного из его делителей  $\mathfrak{C}_i$ ; следовательно, представление кратчайшее. Чтобы показать, что

$\mathfrak{N}_1$  нельзя заменить никаким собственным делителем, разложим  $\mathfrak{C}$  на их неразложимые идеалы  $\mathfrak{B}$ ,<sup>14</sup> так что возникают редуцированные (по лемме I) представления

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\lambda], \quad \mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{B}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{B}_\kappa].$$

Пусть теперь  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$  редуцировано относительно  $\mathfrak{N}_2$ , а  $\mathfrak{N}_1^*$  является собственным делителем  $\mathfrak{N}_1$ . По лемме II получается

$$\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{N}_1^*, (\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)],$$

и это представление необходимо редуцировано относительно  $\mathfrak{N}_1^*$ , поскольку иначе  $\mathfrak{N}_1$  можно было бы также заменить в  $\mathfrak{M}$  собственным делителем. Заменяем теперь при необходимости и  $(\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2)$  собственным делителем так, чтобы возникло редуцированное представление для  $\mathfrak{N}_1$ . Если теперь разложить обе компоненты  $\mathfrak{N}_1$  на неразложимые идеалы, то число  $\lambda$  неразложимых идеалов в  $\mathfrak{N}_1$  аддитивно складывается из чисел компонентов; следовательно, число неразложимых идеалов, соответствующих собственному делителю  $\mathfrak{N}_1^*$ , необходимо меньше  $\lambda$ . Но тогда и разложение  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1^*, \mathfrak{N}_2]$  на неразложимые идеалы приводит к менее чем  $\kappa$  идеалам, в противоречии с равенством числа компонентов. Как специальный случай  $\varrho = 2$  ещё следует, что представление  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$  также редуцировано относительно дополнения  $\mathfrak{N}_2$ .

---

<sup>14</sup>Под этим всегда следует понимать кратчайшее, значит редуцированное, представление через  $\mathfrak{B}$ .

#### § 4. Примарные идеалы. Единственность ассоциированных простых идеалов при двух различных разложениях на неразложимые идеалы.

В дальнейшем речь идет о связи между примарными и неразложимыми идеалами.

**Определение III.** Идеал  $\mathfrak{Q}$  называется примарным, если из  $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{Q})$ ,  $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$  необходимо следует  $b^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$ , где показатель  $\varkappa$  является конечным числом.

Это определение можно сформулировать и так: если произведение  $a \cdot b$  делится на  $\mathfrak{Q}$ , то либо один множитель делится на  $\mathfrak{Q}$ , либо некоторая степень каждого множителя делится на  $\mathfrak{Q}$ . Если, в частности,  $\varkappa$  всегда равно 1, то идеал называется простым идеалом.

Из определения примарного, соответственно простого, идеала благодаря существованию базисов следует формулировка, говорящая только о произведениях идеалов.<sup>15</sup>

**Определение IIIa.** Идеал  $\mathfrak{Q}$  называется примарным, если из  $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$ ,  $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$  необходимо следует  $\mathfrak{B}^{\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q})$ . Если  $\varkappa$  всегда равно 1, то идеал называется простым идеалом. Следовательно, для простого идеала  $\mathfrak{P}$  из  $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$ ,  $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$  всегда следует  $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$ .

Поскольку в IIIa при  $\mathfrak{A} = (a)$ ,  $\mathfrak{B} = (b)$  определение III содержится как частный случай, каждый идеал, примарный по IIIa, является примарным и по III. Обратно, пусть  $\mathfrak{Q}$  примарен по III, и пусть выполнена гипотеза IIIa:  $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$ . Тогда либо следует  $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$ , либо существует по меньшей мере одна величина  $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$  такая, что  $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$ ,  $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ . Если теперь  $b_1, \dots, b_s$  есть идеальный базис  $\mathfrak{B}$ , то по определению III, поскольку  $ab_i \equiv 0(\mathfrak{Q})$ , получается

$$b_i^{\varkappa_i} \equiv 0(\mathfrak{Q}) \quad (i = 1, \dots, s).$$

Ввиду

$$b = n_1 b_1 + \dots + n_s b_s + a_1 b_1 + \dots + a_s b_s$$

для  $\varkappa = \varkappa_1 + \dots + \varkappa_s$  произведение любых  $\varkappa$  величин  $b$  делится на  $\mathfrak{Q}$ . Тем самым для идеалов, примарных по III, доказано выполнение определения IIIa. Специально для простых идеалов  $\mathfrak{P}$  из  $a\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$ , а значит и  $ab \equiv 0(\mathfrak{P})$  для всякого  $b \equiv 0(\mathfrak{B})$ , и  $a \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ , следует  $b \equiv 0(\mathfrak{P})$ , а потому  $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$ . Тем самым показана эквивалентность двух определений.

Связь между примарными и простыми идеалами устанавливается замечанием, что совокупность  $\mathfrak{P}$  всех элементов  $p$ , обладающих тем свойством, что некоторая степень  $p$  делится на  $\mathfrak{Q}$ , образует простой идеал. Сначала ясно, что  $\mathfrak{P}$  есть идеал, поскольку вместе с  $p_1$  и  $p_2$  указанным свойством обладают также  $ap_1$  и  $p_1 - p_2$ . По тому же базисному рассуждению, которое применялось в определении IIIa, далее получается существование числа  $\lambda$  такого, что  $\mathfrak{P}^\lambda \equiv 0(\mathfrak{Q})$ .

Пусть теперь

$$ab \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad a \not\equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Тогда по определению  $\mathfrak{P}$  получается

$$a^\lambda b^\lambda \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad a^\lambda \not\equiv 0(\mathfrak{Q}),$$

а значит, по определению  $\mathfrak{Q}$ ,

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad \text{и следовательно} \quad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

чем  $\mathfrak{P}$  доказан как простой идеал.  $\mathfrak{P}$  определяется также как наибольший общий делитель всех идеалов  $\mathfrak{B}$ , обладающих тем свойством, что некоторая степень  $\mathfrak{B}$  делится на  $\mathfrak{Q}$ . Ведь каждый такой  $\mathfrak{B}$  делится на  $\mathfrak{P}$ ; значит, и наибольший общий делитель  $\mathfrak{D}$  этих  $\mathfrak{B}$  делится на  $\mathfrak{P}$ . Обратно, сам  $\mathfrak{P}$  является таким идеалом  $\mathfrak{B}$ , значит, он делится на  $\mathfrak{D}$ ; этим доказано  $\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$ . Итак,  $\mathfrak{P}$  есть простой идеал, являющийся делителем  $\mathfrak{Q}$ , и некоторая степень которого делится на  $\mathfrak{Q}$ ; этим свойством он определяется единственно. Действительно, из

$$\mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \mathfrak{P}^e \equiv 0(\mathfrak{Q}), \quad \mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\mathfrak{Q})$$

<sup>15</sup>Если  $\mathfrak{A} = (a_1, \dots, a_r)$ ,  $\mathfrak{B} = (b_1, \dots, b_s)$ , то под  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  следует понимать идеал, имеющий базисом произведения  $a_i b_k$ ; что эти и только эти элементы образуют идеал-произведение, следует из базисного представления ввиду коммутативности.

следует

$$\mathfrak{P}^e \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B}^\sigma \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

а потому по свойству простых идеалов

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{B}), \quad \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P}), \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{P}.$$

Итак, получаем:

**Теорема V.** Для каждого примарного идеала  $\Omega$  существует один и только один простой идеал  $\mathfrak{P}$ , который является делителем  $\Omega$  и некоторая степень которого делится на  $\Omega$ ;  $\mathfrak{P}$  будет называться “ассоциированным простым идеалом”.<sup>16</sup>  $\mathfrak{P}$  определяется как наибольший общий делитель всех идеалов  $\mathfrak{B}$ , обладающих тем свойством, что некоторая степень  $\mathfrak{B}$  делится на  $\Omega$ . Если  $\varrho$  есть наименьшее число такое, что  $\mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\Omega)$ , то  $\varrho$  называется экспонентой  $\Omega$ .<sup>17</sup>

Теперь докажем связь между примарностью и неразложимостью:

**Теорема VI.** Каждый непримарный идеал разложим; иначе говоря, каждый неразложимый идеал примарен.<sup>18</sup>

Пусть  $\mathfrak{K}$  есть непримарный идеал, так что по определению III существует по меньшей мере одна пара величин  $a, b$  такая, что

$$ab \equiv 0(\mathfrak{K}), \quad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}), \quad b^\kappa \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{для каждого } \kappa. \quad (3)$$

Образуем теперь два идеала

$$\mathfrak{K}_1 = (\mathfrak{K}, a), \quad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b),$$

которые по (3) являются собственными делителями  $\mathfrak{K}$  и для которых по (3) выполнено

$$\mathfrak{K}_1 \mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K}). \quad (4)$$

Для элементов  $f$  наименьшего общего кратного  $\mathfrak{K}_2 = [\mathfrak{K}_1, \mathfrak{N}_1]$  теперь имеет место альтернатива.

Либо из

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_1), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1), \quad \text{то есть} \quad f \equiv a_1 b \ (\mathfrak{K})$$

всегда следует представление

$$f \equiv l_1 b \ (\mathfrak{K}), \quad l_1 \equiv 0(\mathfrak{K}_1),$$

а значит, по (4)  $f \equiv 0(\mathfrak{K})$ . Поэтому  $\mathfrak{K}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$ , и ввиду  $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$  также  $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_2$ , чем  $\mathfrak{K}$  распознается как разложимый.

Либо существует по меньшей мере одно  $f \equiv 0(\mathfrak{K}_2)$ , для которого такого  $l_1$  не существует. Тогда с соответствующим этому  $f$  элементом  $a_1$  образуем

$$\mathfrak{K}_2 = (\mathfrak{K}, a, a_1), \quad \mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

Тогда вследствие  $a_1 b \equiv 0(\mathfrak{K}_1)$  по (4) также

$$\mathfrak{K}_2 \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K}), \quad (4')$$

и  $\mathfrak{K}_2$  является собственным делителем  $\mathfrak{K}_1$ .

Для элементов  $f$  из  $\mathfrak{K}_3 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{N}_2]$  имеет место та же альтернатива.

Либо из

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_2), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_2), \quad \text{то есть} \quad f \equiv a_2 b^2 \ (\mathfrak{K})$$

<sup>16</sup>Что обратное неверно, показывает пример  $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$ . Простой идеал  $(x)$  выполняет все условия, но  $\mathfrak{M}$  не является примарным.

<sup>17</sup>Что вообще не обязательно, как в области целых рациональных или алгебраических чисел, будет  $\mathfrak{P}^e = \Omega$ , показывает пример  $\Omega = (x^2, y)$ ;  $\mathfrak{P} = (x, y)$ ;  $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\Omega)$ ; но  $\Omega \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$ ; следовательно,  $\Omega$  отлично от  $\mathfrak{P}^2$ .

<sup>18</sup>Что здесь обратное неверно, показывает, например, пример  $\Omega = (x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$ , где  $\lambda \geq 2$ . Здесь  $\Omega$  примарен, но разложим. То, что  $\Omega$  примарен, следует из того, что он содержит все степенные произведения  $\lambda$ -го измерения от  $x, y$ ; значит, для всякого многочлена без постоянного члена некоторая степень делится на  $\Omega$ . Но если в  $ab \equiv 0(\Omega)$  многочлен  $b$  содержит постоянный член, то есть  $b^\kappa \not\equiv 0(\Omega)$  для каждого  $\kappa$ , то вследствие однородности базисных многочленов  $\Omega$  каждая однородная компонента  $ab$  делится на  $\Omega$ , и потому  $a$  должен делиться на  $\Omega$ .

всегда следует

$$f \equiv l_2 b^2 (\mathfrak{K}), \quad l_2 \equiv 0(\mathfrak{K}_2),$$

и тем самым по (4')  $f \equiv 0(\mathfrak{K})$ .

Либо для по меньшей мере одного  $f$  такого  $l_2$  нет; это приводит к образованию  $\mathfrak{K}_3 = (\mathfrak{K}, a, a_1, a_2)$  и  $\mathfrak{N}_3 = (\mathfrak{K}, b^3)$ , причем  $\mathfrak{K}_3 \mathfrak{N}_3 \equiv 0(\mathfrak{K})$ , где  $\mathfrak{K}_3$  является собственным делителем  $\mathfrak{K}_2$ . Продолжая так, определяем в общем виде:

$$\mathfrak{K}_n = (\mathfrak{K}, a, a_1, \dots, a_{n-1}), \quad \mathfrak{N}_n = (\mathfrak{K}, b^n),$$

$$\mathfrak{K}_n \mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K}),$$

где  $a_n$  определены тем, что существует  $f$  такое, что

$$f \equiv 0(\mathfrak{K}_n), \quad f \equiv 0(\mathfrak{N}_n), \quad f \equiv a_n b^n (\mathfrak{K}), \quad \text{но} \quad f \not\equiv l_n b^n (\mathfrak{K}), \quad l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n).$$

После этого в общем случае  $\mathfrak{K}_n \mathfrak{N}_n \equiv 0(\mathfrak{K})$ ,  $\mathfrak{N}_n$  по (3) является собственным делителем  $\mathfrak{K}$ , а  $\mathfrak{K}_n$  – собственным делителем  $\mathfrak{K}_{n-1}$ . По теореме I о конечной цепи цепь  $\mathfrak{K}_n$  должна оборваться за конечное число шагов, скажем на  $\mathfrak{K}_n$ . Для каждого  $f \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$ ,  $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$  тогда имеем  $f \equiv l_n b^n (\mathfrak{K})$  с  $l_n \equiv 0(\mathfrak{K}_n)$ , и, следовательно, по приведенному выше выводу получается  $\mathfrak{K} = [\mathfrak{K}_n, \mathfrak{N}_n]$ , чем  $\mathfrak{K}$  доказан разложимым.

Из только что доказанного *единственность ассоциированных простых идеалов* получается следующим образом.

Пусть

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

являются двумя кратчайшими, следовательно редуцированными, представлениями  $\mathfrak{M}$  как наименьшего общего кратного неразложимых идеалов, число которых по теореме IV совпадает. Тогда по этой теореме также возникающие там промежуточные представления (где, как там замечено, можно положить индекс  $j_i = i$ )

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{B}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1} \mathfrak{D}_i \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{U}_i, \mathfrak{D}_i]$$

являются кратчайшими представлениями. Поэтому

$$\mathfrak{U}_i \mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{U}_i \mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad \mathfrak{U}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Так как по теореме VI неразложимые идеалы  $\mathfrak{B}_i$  и  $\mathfrak{D}_i$  примарны, отсюда следует существование двух чисел  $\lambda_i$  и  $\mu_i$  таких, что

$$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \quad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i). \quad (5)$$

Обозначим через  $\mathfrak{P}_i$ , соответственно  $\bar{\mathfrak{P}}_i$ , ассоциированные простые идеалы  $\mathfrak{B}_i$ , соответственно  $\mathfrak{D}_i$ ; то есть  $\mathfrak{P}_i^{\rho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$ ,  $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$ . Тогда из (5) получается

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i \rho_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \quad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i \sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

и отсюда по свойству простых идеалов

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i), \quad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i), \quad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

Этим доказано:

**Теорема VII.** В двух различных кратчайших представлениях идеала как наименьшего общего кратного неразложимых идеалов ассоциированные простые идеалы совпадают; среди них могут встречаться и одинаковые<sup>19</sup>, причем в каждом разложении одинаково часто. Следовательно, сами идеалы можно по меньшей мере одним способом попарно сопоставить так, что всякий раз некоторая степень одного идеала  $\mathfrak{B}_i$  делится на сопоставленный  $\mathfrak{D}_i$ , и обратно. Их число совпадает по теореме IV.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Это показывает, например, пример из сноски 19:  $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$ , где  $\lambda \geq 2$ . Оба ассоциированных простых идеала здесь:  $(x, y)$ .

<sup>20</sup>О единственности “изолированных” идеалов, содержащихся среди неразложимых идеалов, ср. § 7.

## § 5. Представление идеала как наименьшего общего кратного наибольших примарных идеалов. Единственность ассоциированных простых идеалов.

**Определение IV.** Кратчайшее представление  $\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_\alpha]$  будем называть представлением как наименьшего общего кратного наибольших примарных идеалов, если все  $\Omega$  примарны, но наименьшее общее кратное двух  $\Omega$  уже не примарно.

То, что хотя бы одно такое представление всегда существует, следует из представления  $\mathfrak{M}$  как наименьшего общего кратного неразложимых идеалов. Эти идеалы примарны; либо уже имеется представление через наибольшие примарные идеалы, либо наименьшее общее кратное каких-либо двух идеалов снова становится примарным. Поскольку при этом число идеалов уменьшилось на единицу, повторение процедуры после конечного числа шагов приводит к желаемому представлению.

Это представление редуцировано по лемме IV. Обратно, каждое редуцированное представление через наибольшие примарные идеалы возникает именно таким образом, как показывает разложение  $\Omega$  на неразложимые идеалы.

Чтобы вывести здесь из теоремы VII соответствующую теорему единственности, нужно исследовать связь с ассоциированными простыми идеалами.

**Теорема VIII.** Если примарные идеалы  $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \dots, \mathfrak{N}_\lambda$  все имеют один и тот же ассоциированный простой идеал  $\mathfrak{P}$ , то их наименьшее общее кратное  $\Omega = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \dots, \mathfrak{N}_\lambda]$  также примарно и имеет  $\mathfrak{P}$  своим ассоциированным простым идеалом. Обратно, если  $\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$  является редуцированным представлением примарного идеала  $\Omega$ , то все  $\mathfrak{N}_i$  примарны и имеют в качестве ассоциированного простого идеала ассоциированный простой идеал  $\mathfrak{P}$  идеала  $\Omega$ .

Для доказательства первой части утверждения заметим сначала, что из  $\mathfrak{P}^{e_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$  для каждого  $i$  также следует  $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\Omega)$ , где  $\tau$  означает наибольший из индексов  $e_i$ . Так как  $\mathfrak{P}$  притом является делителем  $\Omega$ , то  $\mathfrak{P}$  необходимо является ассоциированным простым идеалом, если  $\Omega$  примарен. Из

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \equiv 0(\Omega), \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\Omega) \quad (\text{для каждого } k)$$

следует тем самым

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}); \quad \text{значит} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad (\text{для каждого } k),$$

и поэтому  $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ ; следовательно,  $\mathfrak{A} \equiv 0(\Omega)$ . Этим доказано, что  $\Omega$  примарен, а  $\mathfrak{P}$  является его ассоциированным простым идеалом.

Обратно, пусть сначала

$$\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{N}'_i]$$

есть кратчайшее представление  $\Omega$  примарными идеалами  $\mathfrak{N}_i$ , и пусть  $\mathfrak{P}_i$  каждый раз обозначает соответствующий ассоциированный простой идеал. Из

$$\mathfrak{N}_i \mathfrak{N}'_i \equiv 0(\Omega), \quad \mathfrak{N}'_i \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i)$$

(из-за кратчайшего представления) тогда получается

$$\mathfrak{N}'_i \not\equiv 0(\mathfrak{P}_i), \quad \text{но} \quad \mathfrak{N}'_i \equiv 0(\mathfrak{P}).$$

Поскольку  $\mathfrak{P}_i$  одновременно является делителем  $\Omega$ ,  $\mathfrak{P}_i$  для каждого  $i$  совпадает с ассоциированным простым идеалом  $\mathfrak{P}$  идеала  $\Omega$ .

Остается показать, что при каждом редуцированном представлении  $\Omega = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$  идеалы  $\mathfrak{N}_i$  примарны.<sup>21</sup> Для этого разложим  $\mathfrak{N}_i$  на их неразложимые идеалы  $\mathfrak{B}$ ; в возникающем таким образом кратчайшем представлении  $\Omega = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_s]$  каждый идеал примарен и, по только что доказанному, имеет  $\mathfrak{P}$  своим ассоциированным простым идеалом. Тогда по первой части теоремы, доказанной выше, то же самое верно для каждого  $\mathfrak{N}_i$ , чем теорема VIII полностью доказана.

<sup>21</sup>Что редуцированность представления здесь существенна, показывает пример нередуцированного представления:  $\Omega = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^\lambda, yz), (x, y^\lambda)]$ , где  $\lambda \geq 2$ . Здесь  $(x^2, xy, y^\lambda, yz) = [(x^2, y), (x, y^\lambda, z)]$  по только что доказанному не является примарным; ибо последнее представление является кратчайшим представлением примарными идеалами, но ассоциированные простые идеалы  $(x, y)$  и  $(x, y, z)$  различны. ( $\Omega$  примарен по сноске 19.)

**Дополнение.** Отсюда еще следует, что простой идеал необходимо неразложим. Ведь из редуцированного представления  $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$  по теореме VIII получается  $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$ ; значит, поскольку  $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$ , также  $\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$ , и точно так же  $\mathfrak{P} = \mathfrak{K}$ . Неразложимость  $\mathfrak{P}$  получается и непосредственно: из  $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{K}]$  следует  $\mathfrak{N}\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{P})$ ,  $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ ,  $\mathfrak{K} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ , что противоречит определяющему свойству простого идеала.

Пусть теперь

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha] = [\mathfrak{Q}'_1 \cdots \mathfrak{Q}'_\beta]$$

– два редуцированных представления  $\mathfrak{M}$  как наименьшего общего кратного наибольших примарных идеалов. Разлагая  $\mathfrak{Q}$  на их неразложимые идеалы  $\mathfrak{B}$ , а  $\mathfrak{Q}'$  соответственно на неразложимые идеалы  $\mathfrak{D}$ , получаем два редуцированных представления для  $\mathfrak{M}$  как наименьшего общего кратного неразложимых идеалов, у которых по теореме VII совпадают как число компонент, так и ассоциированные простые идеалы. По теореме VIII все неразложимые идеалы  $\mathfrak{B}$ , встречающиеся при фиксированном  $\mathfrak{Q}_i$ , имеют один и тот же ассоциированный простой идеал  $\mathfrak{P}_i$ ; тогда как принадлежащий  $\mathfrak{Q}_j$  идеал  $\mathfrak{P}_j$  необходимо отличен от него, потому что иначе по теореме VIII не было бы представления через наибольшие примарные идеалы. Следовательно, число  $\alpha$  идеалов  $\mathfrak{Q}$  равно числу различных ассоциированных простых идеалов  $\mathfrak{P}$  идеалов  $\mathfrak{B}$ ; эти различные  $\mathfrak{P}$  образуют ассоциированные простые идеалы идеалов  $\mathfrak{Q}$ . То же самое верно для  $\mathfrak{Q}'$  относительно их разложения на  $\mathfrak{D}$ . Поэтому из теоремы VII следует равенство числа  $\mathfrak{Q}$  и  $\mathfrak{Q}'$  и совпадение их ассоциированных простых идеалов. Вместе с тем видно, что указанное в начале параграфа объединение неразложимых идеалов в наибольшие примарные состоит в том, чтобы объединять все, и только те, которые имеют один и тот же ассоциированный простой идеал. Теорема VIII далее показывает свойство неразложимости наибольших примарных идеалов: они не допускают редуцированного представления как наименьшего общего кратного наибольших примарных идеалов.

Итак, доказано:

**Теорема IX.** В двух редуцированных представлениях идеала как наименьшего общего кратного наибольших примарных идеалов совпадают число компонент и ассоциированные простые идеалы, все попарно различные. Иными словами: каждому  $\mathfrak{Q}$  можно взаимно однозначно сопоставить один  $\mathfrak{Q}'$  так, что некоторая степень  $\mathfrak{Q}$  делится на  $\mathfrak{Q}'$ , и обратно.<sup>22</sup> – Идеалы  $\mathfrak{Q}$  и  $\mathfrak{Q}'$  имеют свойство неразложимости относительно разложения на наибольшие примарные идеалы.

**Дополнение.** Следует заметить, что теорема IX по существу сохраняется, если вместо редуцированного предполагать только кратчайшее представление. Если, например,

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_i^* \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$$

редуцировано относительно  $\mathfrak{Q}_i^*$ , и  $\mathfrak{Q}_i^*$  является собственным делителем  $\mathfrak{Q}_i$ , а  $\mathfrak{U}_i$  – дополнением  $\mathfrak{Q}_i$ , то по лемме IV получается

$$\mathfrak{Q}_i = [\mathfrak{Q}_i^*, (\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)],$$

и это представление редуцировано относительно  $\mathfrak{Q}_i^*$ . По теореме VIII, при применении которой при необходимости следует заменить  $(\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Q}_i)$  собственным делителем,  $\mathfrak{Q}_i^*$  поэтому примарен и имеет тот же ассоциированный простой идеал  $\mathfrak{P}_i$ , что и  $\mathfrak{Q}_i$ . Продолжение процедуры показывает, что каждому такому представлению можно поставить в соответствие редуцированное представление через наибольшие примарные идеалы так, что число компонент и ассоциированные простые идеалы совпадают. Следовательно, и при кратчайшем представлении верно, что в двух различных представлениях совпадают число компонент и ассоциированные простые идеалы.

Определенные таким образом однозначно ассоциированные, попарно различные простые идеалы будем кратко называть “ассоциированными простыми идеалами  $\mathfrak{M}$ ”.

<sup>22</sup>Пример различных представлений – пример, приведенный в сноске 12 к теореме II:  $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$  для произвольного  $\mu$ . Так как ассоциированные простые идеалы  $\mathfrak{P}_1 = (x)$ ;  $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$  различные, речь идет о наибольших примарных идеалах. – О единственности “изолированных” наибольших примарных идеалов ср. § 7.

## § 6. Единственное представление идеала как наименьшего общего кратного относительно-просто-неразложимых идеалов.

**Определение V.** Идеал  $\mathfrak{A}$  называется относительно простым к  $\mathfrak{S}$ , если из

$$\mathfrak{T}\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$$

необходимо следует  $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$ . Если  $\mathfrak{A}$  относительно прост к  $\mathfrak{S}$ , и  $\mathfrak{S}$  относительно прост к  $\mathfrak{A}$ , то  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$  называются взаимно относительно простыми.<sup>23</sup>

Идеал называется относительно-просто-неразложимым, если он не может быть представлен как наименьшее общее кратное взаимно относительно простых собственных делителей.

Если, в частности, вместо  $\mathfrak{T}$  взять наибольший общий делитель  $\mathfrak{T}_0$  всех  $\mathfrak{T}$ , для которых  $\mathfrak{T}\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$ , то также  $\mathfrak{T}_0\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$  и  $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$ . Итак,  $\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$ , если  $\mathfrak{A}$  относительно прост к  $\mathfrak{S}$ ; а  $\mathfrak{T}_0$  является собственным делителем  $\mathfrak{S}$ , если  $\mathfrak{A}$  не относительно прост к  $\mathfrak{S}$ .<sup>24</sup>

В основе доказательства единственности лежит:

**Теорема X. 1.** Если  $\mathfrak{A}$  относительно прост к идеалам  $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$ , то  $\mathfrak{A}$  относительно прост и к их наименьшему общему кратному  $\mathfrak{S}$ .

2. Если идеалы  $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$  относительно просты к  $\mathfrak{A}$ , то и их наименьшее общее кратное  $\mathfrak{S}$  относительно просто к  $\mathfrak{A}$ .

3. Если  $\mathfrak{A}$  относительно прост к  $\mathfrak{S}$  и  $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$  есть редуцированное представление  $\mathfrak{S}$ , то  $\mathfrak{A}$  относительно прост также к каждому  $\mathfrak{S}_i$ .

4. Если  $\mathfrak{S}$  относительно прост к  $\mathfrak{A}$ , то каждый делитель  $\mathfrak{S}_i$  идеала  $\mathfrak{S}$  также относительно прост к  $\mathfrak{A}$ .

1. Так как из  $\mathfrak{T}\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$  необходимо следует  $\mathfrak{T}\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ , то по предположению  $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ , а значит  $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$ .

2. Положим

$$\widehat{\mathfrak{S}}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda], \quad \dots, \quad \widehat{\mathfrak{S}}_{12\dots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Из  $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{A})$  тогда следует  $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_1\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{A})$ ; значит, по предположению,  $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_1 \equiv 0(\mathfrak{A})$ . Отсюда снова следует  $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_2\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{A})$ , значит  $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12} \equiv 0(\mathfrak{A})$ , и наконец  $\mathfrak{T}\widehat{\mathfrak{S}}_{12\dots\lambda-1} = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{A})$ ; следовательно,  $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{A})$ .

3. Пусть  $\widehat{\mathfrak{S}}_i$  обозначает дополнение  $\mathfrak{S}_i$ . Из  $\mathfrak{T}_0\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$  тогда, вследствие  $\widehat{\mathfrak{S}}_i\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ , следует также

$$[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S}).$$

Если бы теперь  $\mathfrak{T}_0$  был собственным делителем  $\mathfrak{S}_i$ , то из-за редуцированного представления  $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$  и  $[\mathfrak{T}_0, \widehat{\mathfrak{S}}_i]$  был бы собственным делителем  $\mathfrak{S}$ , вопреки предположению.

4. Из  $\mathfrak{T}\mathfrak{S}_i \equiv 0(\mathfrak{A})$ , где  $\mathfrak{T}$  является собственным делителем  $\mathfrak{A}$ , следует также  $\mathfrak{T}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{A})$ ; значит,  $\mathfrak{T}$  был бы собственным делителем  $\mathfrak{A}$ , вопреки предположению.

Определение V, в частности, показывает, что каждый идеал относительно прост к единичному идеалу  $\mathfrak{D}$ , состоящему из всех элементов  $\Sigma$ ;<sup>25</sup> однако следующие теоремы справедливы только для идеалов, отличных от  $\mathfrak{D}$ .

Из только что доказанной теоремы X прежде всего получается:

**Лемма V.** Всякое представление идеала как наименьшего общего кратного взаимно относительно простых идеалов, отличных от  $\mathfrak{D}$ , является редуцированным.

Пусть

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_\sigma] = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{L}_i]$$

<sup>23</sup>Условие относительной простоты не симметрично. Например,  $\mathfrak{A} = (x^2, y)$  относительно прост к  $\mathfrak{S} = (x)$ ; но  $\mathfrak{S}$  не относительно прост к  $\mathfrak{A}$ , так как  $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{A})$ , но  $\mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{A})$ .

<sup>24</sup>Так определенный  $\mathfrak{T}_0$  совпадает с “остаточным модулем” Ласкера; а в его расширении на числовые модули вместо идеалов – с “частным” двух модулей у Дедекинда. Lasker, а. а. О. S. 49, Dedekind (Zahlentheorie), S. 504.

<sup>25</sup> $\mathfrak{D}$  играет роль единицы только относительно делимости и наименьшего общего кратного, но не относительно образования произведений. Например,  $\mathfrak{D} = (x)$  для области всех целочисленных полиномов от  $x$  без постоянного члена;  $\mathfrak{D} = (2)$  для области всех четных чисел.



есть такое представление. По теореме X, 2 тогда и  $\mathcal{L}_i$  относительно прост к  $\mathfrak{R}_i$ ; значит,  $\mathfrak{R}_i$  не может входить в  $\mathcal{L}_i$ , и представление кратчайшее. Ведь из  $\mathcal{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ , когда  $\mathcal{L}_i$  относительно прост к  $\mathfrak{R}_i$ , вследствие  $\mathfrak{D}\mathcal{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$  также следовало бы  $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ ; значит,  $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{D}$ , что исключено предположением.

Пусть теперь  $\mathfrak{R}_i$  можно заменить собственным делителем  $\mathfrak{R}_i^*$ . Тогда по лемме II  $\mathfrak{R}_i$  разложим и получается

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathcal{L}_i)].$$

Если здесь при необходимости заменить  $(\mathfrak{R}_i, \mathcal{L}_i)$  собственным делителем  $(\mathfrak{R}_i, \mathcal{L}_i)^*$ , а также  $\mathfrak{R}_i^*$  собственным делителем так, чтобы возникло редуцированное представление для  $\mathfrak{R}_i$ , то теорема X, 3 показывает, что  $\mathcal{L}_i$  также становится относительно простым к  $(\mathfrak{R}_i, \mathcal{L}_i)^*$ , а этот идеал вследствие кратчайшего представления отличен от  $\mathfrak{D}$ . Но так как  $(\mathfrak{R}_i, \mathcal{L}_i)^*$  входит в  $(\mathfrak{R}_i, \mathcal{L}_i)$ , а  $(\mathfrak{R}_i, \mathcal{L}_i)$  входит в  $\mathcal{L}_i$ , этим доказано противоречие.

Из теоремы X далее получается теорема, передающая связь с ассоциированными простыми идеалами:

**Теорема XI.** Если  $\mathfrak{R}$  относительно прост к  $\mathfrak{S}$  и  $\mathfrak{S}$  отличен от  $\mathfrak{D}$ , то ни один ассоциированный простой идеал идеала  $\mathfrak{R}^{26}$  не делится на ассоциированный простой идеал идеала  $\mathfrak{S}$ . Обратно, если такой делимости нет, то  $\mathfrak{R}$  относительно прост к  $\mathfrak{S}$ , и, конечно,  $\mathfrak{S}$  отличен от  $\mathfrak{D}$ .

Пусть

$$\mathfrak{R} = [\Omega_1 \cdots \Omega_\alpha], \quad \mathfrak{S} = [\Omega_1^* \cdots \Omega_\beta^*]$$

– редуцированные представления  $\mathfrak{R}$  и  $\mathfrak{S}$  через наибольшие примарные идеалы, а  $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$  и  $\mathfrak{P}_1^*, \dots, \mathfrak{P}_\beta^*$  – соответствующие ассоциированные простые идеалы. Докажем утверждение в форме: если некоторый  $\mathfrak{P}$  делится на некоторый  $\mathfrak{P}^*$ , то  $\mathfrak{R}$  не может быть относительно прост к  $\mathfrak{S}$ , и обратно.

Итак, пусть  $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$ , а потому также  $\Omega_\mu^e \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$ . Из определения  $\mathfrak{P}_\nu^*$  отсюда следует  $\Omega_\mu^e \equiv 0(\Omega_\nu^*)$ , значит также  $\mathfrak{R}^e \equiv 0(\Omega_\nu^*)$ . Пусть  $\mathfrak{R}^\tau$  – наименьшая степень  $\mathfrak{R}$ , делящаяся на  $\Omega_\nu^*$ . При  $\tau = 1$  идеал  $\mathfrak{R}$  делится на  $\Omega_\nu^*$ ; но так как по предположению  $\mathfrak{S}$  отличен от  $\mathfrak{D}$ , то  $\mathfrak{R}$  не относительно прост к  $\Omega_\nu^*$ . При  $\tau \geq 2$  имеем  $\mathfrak{R}^{\tau-1}\mathfrak{R} \equiv 0(\Omega_\nu^*)$ ,  $\mathfrak{R}^{\tau-1} \not\equiv 0(\Omega_\nu^*)$ , значит  $\mathfrak{R}$  не относительно прост к  $\Omega_\nu^*$ ;<sup>27</sup> следовательно, в обоих случаях по теореме X, 3 и  $\mathfrak{R}$  не относительно прост к  $\mathfrak{S}$ .

Обратно, если  $\mathfrak{R}$  не относительно прост к  $\mathfrak{S}$ , то по теореме X, 1  $\mathfrak{R}$  не относительно прост хотя бы к одному  $\Omega_\nu^*$ . Поэтому

$$\mathfrak{I}_0\mathfrak{R} \equiv 0(\Omega_\nu^*), \quad \mathfrak{I}_0 \not\equiv 0(\Omega_\nu^*)$$

и отсюда, так как  $\Omega_\nu^*$  примарен,

$$\mathfrak{R}^e \equiv 0(\Omega_\nu^*), \quad \text{значит также} \quad \Omega_1^e \cdots \Omega_\alpha^e \equiv 0(\Omega_\nu^*).$$

Но отсюда для ассоциированных простых идеалов следует

$$\mathfrak{P}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{P}_\alpha^{e_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*),$$

и по свойству простых идеалов  $\mathfrak{P}_\nu^*$  тем самым входит по меньшей мере в один  $\mathfrak{P}$ . Этим теорема XI доказана.

Из теорем X и XI теперь следуют существование<sup>28</sup> и единственность разложения на относительно-просто-неразложимые идеалы.

Пусть  $\mathfrak{M} = [\Omega_1 \cdots \Omega_\alpha]$  – редуцированное или по меньшей мере кратчайшее представление  $\mathfrak{M}$  через наибольшие примарные идеалы, а  $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$  – ассоциированные простые идеалы. Объединим  $\mathfrak{P}$  в группы так, чтобы никакой идеал одной группы не делился на идеал другой группы, тогда как отдельная группа не могла бы распасться на две подгруппы, для обеих из которых выполнялось бы это свойство.

<sup>26</sup>Определение ассоциированных простых идеалов идеала  $\mathfrak{R}$  в конце § 5.

<sup>27</sup> $\mathfrak{R}^0$  не определен, поскольку  $\Sigma$  не обязана содержать единицу; поэтому случай  $\tau = 1$  пришлось рассмотреть заранее.  $\tau = 0$  также в случае, когда  $\Sigma$  содержит единицу, исключается предположением о  $\mathfrak{S}$ .

<sup>28</sup>Существование разложения можно доказать и непосредственно, в точной аналогии с доказанным в § 2 существованием разложения на конечное число неразложимых идеалов.

Чтобы построить такое разбиение на группы, заметим, что по определению отдельная группа  $G$  вместе с каждым идеалом  $\mathfrak{P}$  должна содержать также все его делители и кратные, встречающиеся среди  $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$  (то есть делящиеся на  $\mathfrak{P}$ ). Пусть, например,  $\mathfrak{P}_j^{(i)}$  – все кратные  $\mathfrak{P}$ ,  $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$  – все делители  $\mathfrak{P}_j^{(i)}$ ,  $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$  – все кратные  $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$  и так далее; вообще  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$  – все кратные  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$ , а  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$  – все делители  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$ . Так как всего имеется только конечное число идеалов  $\mathfrak{P}$ , процедура должна оборваться после конечного числа шагов, то есть уже не дать идеала, отличного от всех предыдущих. Полученная таким образом совокупность идеалов  $\mathfrak{P}$  действительно образует группу  $G$  с требуемыми свойствами.

Действительно, по определению  $G$  вместе с каждым  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$  содержит все кратные  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ , а вместе с каждым  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$  также все делители  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ . Среди них, однако, содержатся и все делители  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$ , тогда как кратные самих  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$  снова являются  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ . Поэтому идеалы, не содержащиеся в  $G$ , не могут быть ни делителями, ни кратными содержащихся в  $G$ .

Но  $G$  удовлетворяет и условию неразложимости. Ведь если имеется разбиение на две подгруппы  $G^{(1)}$  и  $G^{(2)}$ , и  $G^{(1)}$  содержит, например,  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$  или  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ , то она содержит и все предшествующие, так как они попеременно являются кратными и делителями или делителями и кратными; следовательно, она содержит также  $\mathfrak{P}$ , а тем самым всю группу  $G$ . Если поступать аналогично с идеалами, не содержащимися в  $G$ , то получается разбиение на группы  $G_1, \dots, G_\sigma$  всех  $\mathfrak{P}$ , обладающее требуемыми свойствами. Такое разбиение на группы единственно: ведь если  $G'_1, \dots, G'_\tau$  – второе разбиение, а  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$  или  $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$  является элементом  $G'_i$ , то по сказанному выше  $G'_i$  содержит всю группу  $G$  и потому в силу свойства неразложимости совпадает с  $G$ .

Пусть теперь  $\mathfrak{Q}_{i\mu}$ , где  $\mu$  пробегает от 1 до  $\lambda_i$ , обозначают идеалы  $\mathfrak{Q}$ , объединенные в одну группу  $G_i$ . Так как все  $\mathfrak{P}$  попарно различны, примарные идеалы  $\mathfrak{Q}_{i\mu}$ , соответствующие кратчайшему представлению, определены однозначно. Положим

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \cdots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}], \quad \text{тогда получается} \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\sigma].$$

Покажем, что этим достигнуто разложение  $\mathfrak{M}$  на относительно-просто-неразложимые идеалы. Сначала заметим, что теорема XI остается применимой и тогда, когда  $\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \cdots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}]$  является только кратчайшим представлением, поскольку по дополнению к теореме IX ассоциированные простые идеалы уже этим однозначно определены. Так как никакой ассоциированный простой идеал  $\mathfrak{P}_{i\mu}$  идеала  $\mathfrak{R}_i$  не делится на ассоциированный простой идеал  $\mathfrak{P}_{j\nu}$  идеала  $\mathfrak{R}_j$ , и наоборот, то по теореме XI  $\mathfrak{R}_i$  и  $\mathfrak{R}_j$  взаимно относительно просты; а каждый отдельный  $\mathfrak{R}_i$  по теореме XI, вследствие свойства неразложимости группы  $G_i$ , относительно-просто-неразложим, потому что при разложимости всегда рассматриваются идеалы, отличные от  $\mathfrak{D}$ . По лемме V, кроме того, речь идет о редуцированном представлении, даже если первоначально исходили только из кратчайшего представления через  $\mathfrak{Q}$ . Обратно, по теореме XI всякое разложение на относительно-просто-неразложимые идеалы приводит к указанному разбиению  $\mathfrak{P}_{i\mu}$  на группы.

Пусть теперь

$$\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{R}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{R}}_\tau]$$

– второе представление  $\mathfrak{M}$  через относительно-просто-неразложимые идеалы, которое по лемме V редуцировано. Тогда, как показывает разложение  $\mathfrak{R}$  на наибольшие примарные идеалы, ассоциированные простые идеалы совпадают; следовательно, совпадают и разбиения этих простых идеалов на группы, единственность которых доказана выше. Значит,  $\tau = \sigma$ ; и обозначения можно выбрать так, что  $\mathfrak{R}_i$  и  $\bar{\mathfrak{R}}_i$  принадлежат одной и той же группе. Пусть тогда

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i] = [\bar{\mathfrak{R}}_i, \bar{\mathfrak{L}}_i]$$

– представление через идеал и дополнение. Поскольку  $\bar{\mathfrak{R}}_i$  отнесен к той же группе, что и  $\mathfrak{R}_i$ , по теореме XI и  $\mathfrak{L}_i$  относительно прост к  $\bar{\mathfrak{R}}_i$ , а  $\bar{\mathfrak{L}}_i$  относительно прост к  $\mathfrak{R}_i$ . Из

$$\mathfrak{R}_i \mathfrak{L}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \quad \bar{\mathfrak{R}}_i \bar{\mathfrak{L}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

получается

$$\mathfrak{R}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \quad \bar{\mathfrak{R}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i), \quad \mathfrak{R}_i = \bar{\mathfrak{R}}_i.$$

Тем самым доказано:

**Теорема XII.** *Каждый идеал можно единственным образом представить как наименьшее общее кратное конечного числа взаимно относительно простых и относительно-просто-неразложимых идеалов.*

## § 7. Единственность изолированных идеалов.

**Определение VI.** Если кратчайшее представление  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$  редуцировано относительно  $\mathfrak{L}$ , то  $\mathfrak{R}$  называется изолированным идеалом, если ни один ассоциированный простой идеал идеала  $\mathfrak{R}$  не входит в ассоциированный простой идеал идеала  $\mathfrak{L}$ , иначе говоря, если  $\mathfrak{L}$  относительно прост к  $\mathfrak{R}$ .

Согласно этому представлению  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$  удовлетворяет условиям представления  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$  в лемме V, и леммой V доказано:

**Лемма VI.** Если  $\mathfrak{R}$  является изолированным идеалом кратчайшего представления  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ , редуцированного относительно  $\mathfrak{L}$ , то это представление редуцировано также относительно  $\mathfrak{R}$ .

Итак, поскольку для изолированных идеалов речь идет о редуцированном представлении, ассоциированные простые идеалы, возникающие при разложении  $\mathfrak{R}$  и  $\mathfrak{L}$  на неразложимые идеалы, дополняют друг друга до однозначно определенных ассоциированных простых идеалов, возникающих при соответствующем разложении  $\mathfrak{M}$ . Поэтому никакой ассоциированный простой идеал идеала  $\mathfrak{R}$ , относящийся к разложению на неразложимые идеалы, не входит в остальные ассоциированные простые идеалы, относящиеся к соответствующему разложению  $\mathfrak{M}$ . Обратно, если это условие выполнено и  $\mathfrak{R}$  встречается хотя бы в одном представлении  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ , редуцированном относительно  $\mathfrak{R}$ , а значит и в редуцированном представлении  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$ , то  $\mathfrak{R}$  по определению VI изолирован. Отсюда получается не зависящее от специального дополнения  $\mathfrak{L}$  определение:

**Определение VIa.**  $\mathfrak{R}$  называется изолированным идеалом, если ассоциированные с разложением на неразложимые идеалы простые идеалы идеала  $\mathfrak{R}$  не входят в остальные простые идеалы, ассоциированные с соответствующим разложением  $\mathfrak{M}$ , и если  $\mathfrak{R}$  встречается хотя бы в одном представлении  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ , редуцированном относительно  $\mathfrak{R}$ .<sup>29</sup>

Пусть теперь

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

– два представления  $\mathfrak{M}$  через изолированные идеалы  $\mathfrak{R}$  и  $\bar{\mathfrak{R}}$  и дополнения  $\mathfrak{L}$  и  $\bar{\mathfrak{L}}$ , такие, что ассоциированные простые идеалы идеалов  $\mathfrak{R}$  и  $\bar{\mathfrak{R}}$  совпадают. Если заменить  $\mathfrak{L}$  и  $\bar{\mathfrak{L}}$  такими делителями  $\mathfrak{L}^*$  и  $\bar{\mathfrak{L}}^*$ , чтобы представления стали редуцированными, то совпадают также ассоциированные простые идеалы от  $\mathfrak{L}^*$  и  $\bar{\mathfrak{L}}^*$ ; по теореме XI, следовательно,  $\mathfrak{L}^*$  относительно прост к  $\bar{\mathfrak{R}}$ , а  $\bar{\mathfrak{L}}^*$  относительно прост к  $\mathfrak{R}$ . Вследствие

$$\mathfrak{R}\mathfrak{L}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \quad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\mathfrak{R})$$

получается

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}), \quad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}), \quad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}};$$

таким образом, изолированные идеалы однозначно определены своими ассоциированными простыми идеалами. Это, в частности, дает усиление теорем VII и IX о разложении на неразложимые, соответственно наибольшие примарные, идеалы; при этом по дополнению к теореме IX достаточно предполагать лишь кратчайшее представление. В итоге получается:

**Теорема XIII.** В каждом кратчайшем представлении идеала как наименьшего общего кратного неразложимых, соответственно наибольших примарных, идеалов изолированные неразложимые, соответственно наибольшие примарные, идеалы однозначно определены; неоднозначность относится только к неизолрированным неразложимым, соответственно наибольшим примарным, идеалам.<sup>30</sup> Вообще изолированные идеалы однозначно определены своими ассоциированными простыми идеалами.

Если в таком кратчайшем представлении через неразложимые, соответственно наибольшие примарные, идеалы  $\mathfrak{B}_i$ , соответственно  $\mathfrak{Q}_j$ , неизолрированы, то по определению дополнения  $\mathfrak{L}_i$ ,

<sup>29</sup>Если бы вводились обычные ассоциированные простые идеалы (конец § 5), то как особое условие надо было бы добавить, что все простые идеалы от  $\mathfrak{L}$  отличны от простых идеалов от  $\mathfrak{R}$ . По определению VIa, следовательно, уже не надо предполагать, что представление редуцировано относительно дополнения.

<sup>30</sup>Эта теорема для идеалов из полиномов в случае разложения на наибольшие примарные идеалы уже сообщалась без доказательства у Maccallau; его определение изолированных и неизолрированных (imbedded) примарных идеалов можно рассматривать как иррациональную формулировку сообщаемой ниже.

соответственно  $\mathfrak{L}_j$ , делятся на  $\mathfrak{P}_i$ , соответственно на  $\mathfrak{P}_j$ . Поэтому получается

$$\mathfrak{U}_i^{\mathfrak{L}_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \quad \text{соответственно} \quad \mathfrak{L}_j^{\sigma_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

Из выполнения этих соотношений, обратно, следует, что  $\mathfrak{P}_i$ , соответственно  $\mathfrak{P}_j$ , входит по меньшей мере в один ассоциированный простой идеал дополнения, а значит, по дополнению к теореме IX, также в ассоциированный простой идеал того делителя  $\mathfrak{L}_j^*$  идеала  $\mathfrak{L}_j$ , который дает представление, редуцированное относительно  $\mathfrak{L}_j^*$ ; поэтому  $\mathfrak{B}_i$ , соответственно  $\mathfrak{Q}_j$ , неизолированы. В частности, неразложимые идеалы  $\mathfrak{B}_i$ , ассоциированный простой идеал которых встречается более одного раза при разложении  $\mathfrak{M}$ , всегда неизолированы. *Неизолированные примарные идеалы, следовательно, характеризуются также тем, что некоторая степень каждого дополнения становится делимой на них; изолированные примарные – тем, что это не может выполняться.*

## § 8. Единственное представление идеала как произведения взаимно-просто-неразложимых идеалов.

Если лежащая в основе кольцевая область  $\Sigma$  обладает единицей, то есть элементом  $\varepsilon$ , таким что  $\varepsilon a = a$  для каждого элемента из  $\Sigma$ ,<sup>31</sup> то взаимно простые идеалы можно определить так:

**Определение VIII.** Два идеала  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$  называются взаимно простыми, если их наибольший общий делитель равен единичному идеалу  $\mathfrak{D} = (\varepsilon)$ , состоящему из всех элементов  $\Sigma$ . Идеал называется взаимно-просто-неразложимым, если его нельзя представить как наименьшее общее кратное попарно взаимно простых идеалов.

Отметим, что два взаимно простых идеала всегда взаимно относительно просты. В самом деле, по определению существуют два элемента  $r \equiv 0(\mathfrak{A})$ ,  $s \equiv 0(\mathfrak{S})$ , такие что  $\varepsilon = r + s$ . Из  $\mathfrak{A}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{S})$  следует  $\mathfrak{A}r \equiv 0(\mathfrak{S})$ , следовательно  $\mathfrak{A}\varepsilon = \mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{S})$ ; и соответственно из  $\mathfrak{A}\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{A})$  также получается  $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{A})$ .<sup>32</sup> Следовательно, из леммы V следует, что всякое представление через попарно взаимно простые идеалы одновременно редуцировано.

В основе доказательства единственности лежит теорема, соответствующая теореме X:

**Теорема XIV.** Если  $\mathfrak{A}$  взаимно прост с каждым из идеалов  $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$ , то  $\mathfrak{A}$  взаимно прост также с  $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ . Обратно, из взаимной простоты  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$  следует также взаимная простота  $\mathfrak{A}$  с каждым  $\mathfrak{S}_j$ . Если  $\mathfrak{A} = [\mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_\mu]$  и каждый  $\mathfrak{A}_i$  взаимно прост с каждым  $\mathfrak{S}_j$ , то  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$  взаимно просты; и здесь также справедливо обратное.

В самом деле, если  $\mathfrak{A}$  взаимно прост с каждым  $\mathfrak{S}_j$ , то существуют элементы  $s_j$ , такие что

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j), \quad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{A}).$$

Следовательно, получается

$$s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}), \quad s_1 s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{A}), \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

Но так как  $(\mathfrak{A}, \mathfrak{S})$  делится на каждый  $(\mathfrak{A}, \mathfrak{S}_j)$ , справедливо и обратное. Многократное применение этого рассуждения дает вторую часть утверждения. В самом деле, если  $\mathfrak{A}_i$  при фиксированном  $i$  взаимно прост с  $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_\lambda$ , то  $\mathfrak{A}_i$  взаимно прост с  $\mathfrak{S}$ . Если это выполняется для каждого  $i$ , то, поскольку понятие взаимной простоты является взаимным,  $\mathfrak{S}$  взаимно прост с  $\mathfrak{A}$ . Обратно, из взаимной простоты  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$  следует взаимная простота  $\mathfrak{S}$  с  $\mathfrak{A}_i$ , а следовательно и  $\mathfrak{A}_i$  с  $\mathfrak{S}$ .

Доказательство существования и единственности<sup>33</sup> разложения на взаимно-просто-неразложимые идеалы, как и соответствующее доказательство для относительно простых идеалов, сводится к единственному разбиению на группы. Но поскольку относительно-просто-неразложимые идеалы  $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_\sigma$  идеала  $\mathfrak{M}$  по теореме XII однозначно определены, здесь не нужно возвращаться к ассоциированным простым идеалам.

Объединим однозначно определенные относительно-просто-неразложимые идеалы  $\mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_\sigma$  идеала  $\mathfrak{M}$  в группы так, что каждый идеал одной группы взаимно прост с каждым идеалом любой другой группы, тогда как отдельная группа не может быть разбита на две подгруппы так, чтобы каждый идеал одной подгруппы был взаимно прост с каждым идеалом другой подгруппы. Такое разбиение на группы получается следующим образом: по определению отдельная группа  $G$  вместе с каждым идеалом  $\mathfrak{A}$  должна содержать также все идеалы, не взаимно простые с  $\mathfrak{A}$ . Пусть они, скажем, заданы как  $\mathfrak{A}_{i_1}$ ; с ними не взаимно просты  $\mathfrak{A}_{i_1 i_2}$ ; вообще пусть  $\mathfrak{A}_{i_1 \dots i_\lambda}$  не взаимно прост с  $\mathfrak{A}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}$ . Так как всего имеется лишь конечное число идеалов, процедура после конечного числа шагов должна оборваться, то есть уже не давать идеалов, отличных от всех предыдущих; полученная таким образом совокупность идеалов образует группу  $G$  с требуемыми свойствами. Действительно, все идеалы, не содержащиеся в  $G$ , по построению  $G$  взаимно просты со всеми идеалами, содержащимися в  $G$ . Если далее имеется разбиение на две подгруппы  $G^{(1)}$  и  $G^{(2)}$ , и

<sup>31</sup>Как известно, ввиду коммутативности умножения  $\Sigma$  не может иметь более одной единицы, ибо для любых двух единиц  $\varepsilon_1$  и  $\varepsilon_2$  имеем:  $\varepsilon_1 \varepsilon_2 = \varepsilon_2 = \varepsilon_1$ .

<sup>32</sup>Обратное, однако, неверно; например, идеалы  $\mathfrak{A} = (x)$ ,  $\mathfrak{S} = (y)$  взаимно относительно просты, но не взаимно просты.

<sup>33</sup>Существование разложения снова можно доказать непосредственно по аналогии с § 2; доказательство единственности также можно провести непосредственно (ср. сказанное во введении о Schmeidler и Noether–Schmeidler). Данное здесь доказательство вместе с тем дает представление о структуре взаимно-просто-неразложимых идеалов.

пусть, например,  $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$  является элементом  $G^{(1)}$ . Поскольку свойство взаимной простоты является взаимным,  $G^{(1)}$  тогда должна содержать также  $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_{\lambda-1}}, \dots, \mathfrak{R}_{i_1}$ , следовательно также  $\mathfrak{R}$  и потому всю группу  $G$ . Тем самым неразложимость доказана. Прodelывая то же с группами, не содержащимися в  $G$ , получаем разбиение на группы  $G_1, \dots, G_\tau$  всех  $\mathfrak{R}$ .

Это разбиение на группы единственно. Действительно, пусть  $G'_1, \dots, G'_\tau$  есть второе разбиение и  $\mathfrak{R}_{i_1 \dots i_\lambda}$  является элементом  $G'_i$ . Тогда  $G'_i$  содержит также  $\mathfrak{R}$ , а следовательно  $G_1$ , и ввиду условия неразложимости не может содержать элементов, отличных от элементов  $G_1$ ; поэтому  $G'_i$  равна  $G_1$ .

Пусть теперь  $\mathfrak{T}_i$  есть наименьшее общее кратное идеалов  $\mathfrak{R}$ , объединенных в одной группе  $G_i$ . Покажем, что

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \dots \mathfrak{T}_\tau]$$

становится представлением  $\mathfrak{M}$  через взаимно-просто-неразложимые идеалы. Прежде всего разложение  $\mathfrak{T}$  на  $\mathfrak{R}$  показывает, что  $[\mathfrak{T}_1 \dots \mathfrak{T}_\tau]$  действительно представляет  $\mathfrak{M}$ . Далее, по теореме XIV, идеалы  $\mathfrak{T}$  попарно взаимно просты, и каждый  $\mathfrak{T}$  взаимно-просто-неразложим. Тем самым существование такого представления доказано.

Для доказательства единственности пусть  $\bar{\mathfrak{M}} = [\bar{\mathfrak{T}}_1 \dots \bar{\mathfrak{T}}_\tau]$  есть второе такое представление. Если разложить  $\bar{\mathfrak{T}}$  на их относительно-просто-неразложимые идеалы  $\mathfrak{R}$ , то возникающие при разных  $\bar{\mathfrak{T}}$  идеалы  $\mathfrak{R}$  по теореме XIV взаимно просты друг с другом, следовательно также взаимно относительно просты; значит, они совпадают с однозначно определенными относительно-просто-неразложимыми идеалами  $\mathfrak{R}$  идеала  $\mathfrak{M}$ . Кроме того, по теореме XIV идеалы  $\bar{\mathfrak{T}}_i$  порождают разбиение  $G'_i$  идеалов  $\mathfrak{R}$  на группы с указанными свойствами. Но так как это разбиение на группы единственно и каждый  $\bar{\mathfrak{T}}_i$  однозначно определяется группой  $G'_i = G_i$ , получается  $\bar{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$ , чем единственность доказана.

Для попарно взаимно простых идеалов, далее, наименьшее общее кратное равно произведению. В самом деле, по теореме XIV для  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \dots \mathfrak{T}_\tau]$  дополнение  $\mathfrak{L}_i$  также взаимно просто с  $\mathfrak{T}_i$ ; поэтому существуют элементы

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i), \quad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i), \quad \varepsilon = t_i + l_i.$$

Из  $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$ ,  $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$  поэтому, ввиду

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i \quad \text{также} \quad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i).$$

Так как, обратно,  $\mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$  делится на  $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$ , получаем  $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i\mathfrak{T}_i$ ; и, продолжая процедуру на  $\mathfrak{L}_i$ , в конце концов:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \dots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1\mathfrak{T}_2 \dots \mathfrak{T}_\tau.$$

Тем самым доказано:

**Теорема XV.** Каждый идеал единственным образом представляется как произведение конечного числа попарно взаимно простых и взаимно-просто-неразложимых идеалов.

## § 9. Распространение исследования на модули. Равенство числа компонентов при разложениях на неразложимые модули.

Покажем теперь, что содержание первых трех параграфов, относящееся к неразложимым, а не к примарным и простым идеалам, сохраняется при более слабых предположениях. Эти параграфы действительно не используют коммутативный закон умножения и опираются только на то свойство идеалов, что они являются модулями; следовательно, они сохраняются для модулей относительно некоммутативных областей, которые теперь надо определить. В основу определения модулей следует положить двойную область  $(\Sigma, T)$  со следующими свойствами:

$\Sigma$  есть абстрактно определенное некоммутативное кольцо, то есть  $\Sigma$  есть система элементов  $a, b, c, \dots$ , для которых определены два вида операций, кольцевое сложение  $(+)$  и кольцевое умножение  $(\times)$ , удовлетворяющие законам, установленным в § 1, за исключением коммутативного закона 4 для кольцевого умножения.

$T$  есть система элементов  $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ , для которой в связи с  $\Sigma$  также определены две операции: сложение, которое из любых двух элементов  $\alpha, \beta$  однозначно образует третий  $\alpha + \beta$ ; умножение элемента  $\alpha$  из  $T$  на элемент  $c$  из  $\Sigma$ , которое однозначно образует элемент  $c\alpha$  из  $T$ .<sup>34</sup>

Для этих операций выполняются следующие законы:

1. Ассоциативный закон сложения:  $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$ .
2. Коммутативный закон сложения:  $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ .
3. Закон неограниченного и однозначного вычитания: в  $T$  существует один и только один элемент  $\xi$ , удовлетворяющий уравнению  $\alpha + \xi = \beta$  (обозначают  $\xi = \beta - \alpha$ ).
4. Ассоциативный закон умножения:  $a(b\gamma) = (a \times b)\gamma$ .
5. Дистрибутивный закон:

$$(a + b)\gamma = a\gamma + b\gamma, \quad c(\alpha + \beta) = c\alpha + c\beta.$$

Из этих условий, как известно, следует существование нулевого элемента, а также справедливость дистрибутивного закона для соединения вычитания и умножения:

$$(a - b)\gamma = a\gamma - b\gamma, \quad c(\alpha - \beta) = c\alpha - c\beta,$$

где  $(-)$  означает вычитание в  $\Sigma$ . Если  $\Sigma$  содержит единицу  $\varepsilon$ , то должно выполняться  $\varepsilon\alpha = \alpha$  для каждого элемента  $\alpha$  из  $T$ .

Под модулем  $M$  в  $(\Sigma, T)$  будем понимать систему элементов из  $T$ , удовлетворяющую двум условиям:

1.  $M$  вместе с  $\alpha$  содержит также  $c\alpha$ , где  $c$  есть произвольный элемент из  $\Sigma$ .
2.  $M$  вместе с  $\alpha$  и  $\beta$  содержит также разность  $\alpha - \beta$ , следовательно вместе с  $\alpha$  также  $n\alpha$  для всякого целого числа  $n$ .<sup>35</sup>

По этому определению само  $T$  образует модуль в  $(\Sigma, T)$ . Если, в частности, область  $T$  и заданные там операции совпадают с областью  $\Sigma$  и действующими там операциями, то модуль  $M$  переходит в правосторонний идеал  $M$  в  $\Sigma$ . Если  $\Sigma$  еще предположить коммутативной, то получается обычное понятие идеала, которое тем самым оказывается частным случаем понятия модуля.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Итак, здесь речь идет о “правостороннем” умножении, о “правосторонней” области  $T$  и, следовательно, о “правосторонних” модулях и идеалах. Если бы для  $T$  было положено в основу левостороннее умножение  $\alpha c$ , то получилась бы соответствующая теория левосторонних модулей и идеалов;  $M$  вместе с  $\alpha$  содержит также  $\alpha c$ . Ассоциативный закон здесь имел бы вид  $(\gamma b)a = \gamma(b \times a)$ .

<sup>35</sup>Целые числа снова следует рассматривать как сокращающие знаки, а не как элементы кольца.

<sup>36</sup>Простейший пример модуля дает модуль целочисленных линейных форм:  $\Sigma$  состоит здесь из всех целых рациональных чисел,  $T$  – из всех целочисленных линейных форм. Несколько более общий модуль получается, если в  $\Sigma$  и  $T$  брать целые



Для модулей сохраняются все определения из § 1. Так,  $\alpha \equiv 0(M)$ , соответственно  $N \equiv 0(M)$ , означает, что  $\alpha$ , соответственно каждый элемент  $N$ , является элементом  $M$ ; иначе говоря,  $\alpha$ , соответственно  $N$ , делится на  $M$ .  $M$  становится собственным делителем  $N$ , если  $M$  содержит элементы, отличные от элементов  $N$ ; из  $N \equiv 0(M)$ ,  $M \equiv 0(N)$  следует  $M = N$ . Определения наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного также дословно сохраняются. Если модуль  $M$ , в частности, содержит конечное число элементов  $\alpha_1, \dots, \alpha_\rho$ , таких что

$$M = (\alpha_1, \dots, \alpha_\rho),$$

то есть

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \dots + c_\rho\alpha_\rho + n_1\alpha_1 + \dots + n_\rho\alpha_\rho$$

для каждого  $\alpha \equiv 0(M)$ , причем  $c_i$  – величины из  $\Sigma$ , а  $n_i$  – целые числа, то  $M$  называется конечным модулем, а  $\alpha_1, \dots, \alpha_\rho$  – базисом модуля.

В дальнейшем, аналогично § 1, мы полагаем в основу только такие области  $(\Sigma, T)$ , которые удовлетворяют условию конечности: каждый модуль в  $(\Sigma, T)$  конечен, то есть обладает базисом модуля.

Тогда для этой области  $(\Sigma, T)$  теорема I о конечной цепи справедлива также для модулей, как показывает приведенное там доказательство, и тем самым выполнены все предпосылки для §§ 2 и 3. Определение I и лемму I о кратчайшем и редуцированном представлении можно перенести непосредственно; так же и теорему II о представимости каждого модуля как наименьшего общего кратного конечного числа неразложимых модулей, причем лемма II показывает, что всякое такое кратчайшее представление одновременно редуцировано. Далее сохраняется теорема III, выражающая разложимость модуля через свойства его дополнения; из нее следует лемма III и, наконец, теорема IV, утверждающая равенство числа компонентов в двух различных кратчайших представлениях модуля как наименьшего общего кратного неразложимых модулей. Теорема IV дает еще лемму IV как обращение леммы I о редуцированном представлении.

*Дополнение.* То же рассуждение показывает, что все эти теоремы и определения сохраняются, если для двусторонних областей  $T$ , то есть таких, которые являются как правосторонними, так и левосторонними, под модулем всюду понимать двусторонний модуль, то есть такой, который вместе с  $\alpha$  содержит также  $s\alpha$  и  $\alpha s$ , а вместе с  $\alpha$  и  $\beta$  также  $\alpha - \beta$ .

В то время как все эти теоремы опираются только на понятие делимости и наименьшего общего кратного, дальнейшие теоремы единственности существенно основаны на понятии произведения и поэтому не допускают непосредственного переноса. Так, определение примарного и простого идеала нельзя перенести на модули, поскольку произведение двух величин из  $T$  не определено. Формально возможный перенос на некоммутативные кольца также теряет смысл, поскольку здесь не удастся доказать существование ассоциированного простого идеала<sup>37</sup> и не работает также доказательство того, что неразложимый идеал примарен. Эти два факта, однако, образуют основу следующих теорем единственности. Зато, если некоммутативное кольцо обладает единицей, можно определить взаимно простые и взаимно-просто-неразложимые идеалы, и рассуждения, использованные при доказательстве теоремы II, показывают, что каждый идеал можно представить как наименьшее общее кратное конечного числа попарно взаимно простых и взаимно-просто-неразложимых идеалов.<sup>38</sup>

Наконец, упомянем еще достаточный критерий того, что в  $(\Sigma, T)$  выполняется условие конечности: если  $\Sigma$  содержит единицу и удовлетворяет условию конечности, а само  $T$  является конечным модулем в  $(\Sigma, T)$ , то каждый модуль в  $(\Sigma, T)$  конечен.

алгебраические числа вместо целых рациональных чисел, или, например, все четные числа. Если вместо линейных форм каждый раз рассматривать комплекс всех коэффициентов как один элемент, то операции в  $\Sigma$  и  $T$  действительно различны. Идеалы в некоммутативных кольцевых областях из полиномов составляют предмет совместной работы Noether–Schmeidler. Об идеалах в других специальных некоммутативных областях говорится в лекциях Hurwitz о теории чисел кватернионов (Berlin, Springer 1919) и в цитированных там работах Du Pasquier.

<sup>37</sup>В самом деле, из  $p_1^\rho \equiv 0(\Omega)$ ,  $p_2^\sigma \equiv 0(\Omega)$  здесь не следует  $(p_1 - p_2)^{\rho+\sigma} \equiv 0(\Omega)$ , и точно так же из  $(ab)^\rho \equiv 0(\Omega)$  не следует  $a^\rho b^\rho \equiv 0(\Omega)$ . Поэтому  $\mathfrak{P}$  нельзя установить ни как идеал, ни как обладающий свойством простого идеала. Для двусторонних идеалов  $\mathfrak{P}$  хотя и можно установить как идеал, но не как простой идеал.

<sup>38</sup>Для специальных, “вполне редуцируемых” идеалов можно и здесь установить теоремы единственности; ср. совместную работу Noether–Schmeidler.

В самом деле, из существования единицы в  $\Sigma$  для

$$\mathfrak{M} = (f_1, \dots, f_e), \quad f = \bar{b}_1 f_1 + \dots + \bar{b}_e f_e + n_1 f_1 + \dots + n_e f_e,$$

где  $\bar{b}_i$  – элементы из  $\Sigma$ , а  $n_i$  – целые числа, следует также представление

$$f = b_1 f_1 + \dots + b_e f_e,$$

где  $b_i$  – элементы из  $\Sigma$ . Ведь ввиду  $f_i = \varepsilon f_i$  получаем  $n_i f_i = n_i \varepsilon f_i$ , а так как  $n_i \varepsilon = (\varepsilon + \dots + \varepsilon)$  принадлежит  $\Sigma$ , величина  $b_i = \bar{b}_i + n_i \varepsilon$  является элементом из  $\Sigma$ . Предположение о  $T$  теперь говорит, что каждый элемент  $\alpha$  из  $T$  допускает представление

$$\alpha = \bar{a}_1 \tau_1 + \dots + \bar{a}_k \tau_k + n_1 \tau_1 + \dots + n_k \tau_k,$$

и, следовательно,

$$\alpha = a_1 \tau_1 + \dots + a_k \tau_k,$$

где второе представление ввиду  $\varepsilon \tau_i = \tau_i$  получается из первого так же, как выше.

Когда теперь  $\alpha$  пробегает элементы модуля  $M$  из  $(\Sigma, T)$ , коэффициенты  $a_k$  при  $\tau_k$  пробегает идеал  $\mathfrak{M}_k$  из  $\Sigma$ ; следовательно, по сказанному выше, для каждого  $a_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_k}$  также

$$a_k = b_1 a_k^{(1)} + \dots + b_e a_k^{(e)}.$$

Если  $\alpha^{(i)}$  обозначает элемент из  $M$ , у которого коэффициент при  $\tau_k$  равен  $a_k^{(i)}$ , то  $\alpha - b_1 \alpha^{(1)} - \dots - b_e \alpha^{(e)}$  становится принадлежащим  $M$  элементом, зависящим только от  $\tau_1, \dots, \tau_{k-1}$ . К совокупности этих уже не содержащих  $\tau_k$  элементов, образующих модуль  $M'$ , можно снова применить процедуру; поэтому конечным числом повторений утверждение доказано.

## § 10. Специальный случай полиномиальной области.

1. Пусть лежащая в основе кольцевая область  $\Sigma$  состоит из всех полиномов от  $x_1, \dots, x_n$  с произвольными комплексными коэффициентами; для нее, по теореме Гильберта о базисе модулей (Ann. 36), выполнено условие конечности. Речь идет о связи наших теорем с известными теоремами теории элиминации и теории модулей.

Эта связь устанавливается следующим специальным случаем известной теоремы Гильберта:<sup>39</sup>

Если  $f$  обращается в нуль при каждой конечной системе значений  $x_1, \dots, x_n$ , которая является нулевой точкой всех полиномов простого идеала  $\mathfrak{P}$  (нулевой точкой  $\mathfrak{P}$ ), то  $f$  делится на  $\mathfrak{P}$ . Иными словами: простой идеал  $\mathfrak{P}$  состоит из всей совокупности полиномов, которые обращаются в нуль в его нулевых точках.<sup>40</sup>

Следовательно, если произведение  $fg$  обращается в нуль во всех нулевых точках  $\mathfrak{P}$ , то  $g$  обращается в нуль по крайней мере один множитель; нулевые точки образуют неприводимое алгебраическое многообразие. Если, наоборот, положить это определение неприводимого многообразия в основу, то оказывается, что совокупность всех полиномов, обращающихся в нуль на неприводимом многообразии, образует простой идеал; тем самым простой идеал и неприводимое многообразие взаимно однозначно соответствуют друг другу. В силу  $\mathfrak{P}^p \equiv 0(\Omega)$ ,  $\Omega \equiv 0(\mathfrak{P})$  нулевые точки примарного идеала совпадают с нулевыми точками его соответствующего простого идеала.<sup>41</sup> Представление идеала как наименьшего общего кратного наибольших примарных идеалов тем самым дает разрешение всех нулевых точек идеала на неприводимые многообразия; и, как показал Lasker, верно также обратное. Доказательство единственности соответствующих простых идеалов здесь соответствует основной теореме теории элиминации об однозначной разложимости алгебраического многообразия на неприводимые многообразия; для специальных полиномиальных областей, где нет однозначного произведенного представления полиномов через неприводимые полиномы области, а следовательно нет и теории элиминации, его можно считать эквивалентом этой теоремы элиминации.

Неприводимые многообразия, соответствующие изолированным примарным идеалам, суть ровно те, которые появляются в “минимальной резольвенте”;<sup>42</sup> ведь нулевые точки каждого неизолированного наибольшего примарного идеала одновременно являются нулевыми точками по крайней мере одного изолированного, а именно такого, соответствующий простой идеал которого делится на простой идеал неизолированного идеала. Поэтому единственность изолированных примарных идеалов дает в показателях новые инвариантные числа кратности. Также теоремы единственности при разрешении примарных идеалов на неприводимые можно рассматривать как дополнение теории элиминации в смысле кратности.

После этих замечаний различные разложения можно истолковать по их поведению относительно алгебраических многообразий. Попарно взаимно простым идеалам соответствуют такие многообразия, которые не имеют общей нулевой точки; при взаимно относительно простых идеалах ни одно неприводимое многообразие одного идеала одновременно не является общей нулевой точкой; наибольшие примарные идеалы обращаются в нуль только на неприводимых многообразиях, все различающихся между собой; при разложении на неприводимые идеалы одни и

<sup>39</sup>О полных системах инвариантов. Math. Ann. 42 (1893), § 3, с. 313.

<sup>40</sup>Как показал Lasker [Math. Ann. 60 (1905), с. 607], этот специальный случай для однородных форм можно доказать и непосредственно; обратно, отсюда снова следует теорема Гильберта в однородном и неоднородном случаях, которую можно сформулировать так: если идеал  $\mathfrak{A}$  обращается в нуль во всех нулевых точках  $M$ , то некоторая степень  $\mathfrak{A}$  делится на  $M$ . Однако эта теорема, как и специальный случай, справедлива только тогда, когда область значений  $x$  алгебраически замкнута; поэтому она не может следовать только из наших теорем, а должна использовать существование корней, например в том месте, что идеал, нулевые точки которого состоят только из  $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ , содержит все степенные произведения  $x$ , начиная с некоторой степени. Остальное доказательство, с использованием наших теорем, можно несколько упростить по сравнению с Lasker. Ведь Lasker должен привлекать теорему Гильберта также для доказательства разложения идеала на наибольшие примарные.

<sup>41</sup>Это свойство примарного идеала, а именно обладать неприводимым многообразием, Macaulay (ср. Введение) берет за определение, тогда как Lasker включает в определение только понятие многообразия образования, а в остальном определяет абстрактно. Примарные идеалы, обращающиеся в нуль только при  $x_1 = 0, \dots, x_n = 0$ , у Lasker занимают особое положение.

<sup>42</sup>Ср., например, J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), с. 235.

те же неприводимые многообразия могут появляться и многократно.

Следует еще заметить, что вместо общей полиномиальной области можно положить в основу и область всех однородных форм, поскольку легко убедиться, что и при действующих там операциях – сложение определено только для форм одинаковой степени – общие теоремы сохраняются.<sup>43</sup>

Самый простой пример четырех различных разложений – формулы для него приведены ниже – по сказанному выше можно задать прямой и двумя скрещивающимися с ней прямыми, которые пересекаются между собой, причем одна из них содержит, отличную от точки пересечения, точку с большей кратностью. Разложению на взаимно простые неприводимые идеалы соответствует разложение на прямую и скрещивающуюся с ней многообразие; это многообразие при разложении на относительно простые неприводимые идеалы распадается на две прямые; разложению на наибольшие примарные идеалы соответствует отделение точки большей кратности, тогда как разложение на неприводимые идеалы требует разрешения этой точки.

Если взять эту точку за начало координат, проходящую через нее прямую за ось  $y$ , прямую, пересекающую ее, параллельной оси  $x$ , а скрещивающуюся с ней прямую параллельной оси  $z$ , то такая конфигурация, например, представляется следующими неприводимыми идеалами:<sup>44</sup>

$$\mathfrak{B}_1 = (x - 1, y), \quad \mathfrak{B}_2 = (y - 1, z), \quad \mathfrak{B}_3 = (x, z), \quad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z), \quad \mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Соответствующие простые идеалы будут:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Наибольшие примарные идеалы будут:

$$\Omega_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \Omega_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \Omega_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \Omega_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Относительно простые неприводимые идеалы будут:

$$\mathfrak{R}_1 = \Omega_1, \quad \mathfrak{R}_2 = \Omega_2, \quad \mathfrak{R}_3 = [\Omega_3, \Omega_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Взаимно простые неприводимые идеалы будут:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y - 1)x^3, (y - 1)x^2y, (y - 1)xy^2, z).$$

Отсюда получается полный идеал:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &= [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1\mathfrak{S}_2 \\ &= ((x - 1)(y - 1)x^3, (y - 1)x^2y, (y - 1)xy^2, (x - 1)z, y(y - 1)x^3, yz), \end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned} 1 &= -(y - 1)x^3 + (y - 1)(x^3 - 1) + y, \\ (y - 1)(x^3 - 1) + y &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{S}_1}, \quad -(y - 1)x^3 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{S}_2}. \end{aligned}$$

При этом идеалы  $\mathfrak{B}_1$ ,  $\mathfrak{B}_2$ ,  $\mathfrak{B}_3$  изолированы, а потому и в разложениях на неприводимые и на наибольшие примарные идеалы определены однозначно. Идеалы  $\mathfrak{B}_4$  и  $\mathfrak{B}_5$ , соответственно  $\Omega_4$ , неизолированы; они определены не однозначно, а, например, могут быть заменены на

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \quad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z),$$

так же  $\Omega_4$  заменим на

$$\overline{\Omega}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

<sup>43</sup>Что здесь, однако, в случае неоднозначности рядом с однородными могут существовать и неоднородные разложения, показывает пример  $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y), (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^3), (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$ .

<sup>44</sup>Из них первые три неприводимы как простые идеалы;  $\mathfrak{B}_4$  – потому что имеет только делители  $(x^2, y, z)$  и  $(x, y, z)$ ;  $\mathfrak{B}_5$  – потому что каждый делитель содержит полином  $xy$ .

2. Так же как общая (и целочисленная) полиномиальная область, каждая конечная область целостности из полиномов – как показывает теорема Гильберта о базисе модулей – тоже удовлетворяет условию конечности,<sup>45</sup> причем коэффициенты можно брать из произвольного поля. Приведем еще пример для области всех четных полиномов как простейшей области, где из-за  $x^2y^2 = (xy)^2$  не существует однозначного произведенного представления полиномов через неприводимые полиномы области. Речь идет о той же конфигурации, что и в примере выше; теперь она задается неприводимыми идеалами:

$$\begin{aligned}\mathfrak{B}_1 &= (x^2 - 1, xy, y^2, yz), & \mathfrak{B}_2 &= (y^2 - 1, xz, yz, z^2), \\ \mathfrak{B}_3 &= (x^2, xy, xz, yz, z^2), & \mathfrak{B}_4 &= (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2), \\ & & \mathfrak{B}_5 &= (x^2, y^2, xz, yz, z^2).\end{aligned}$$

Соответствующие простые идеалы будут:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

То, что  $\mathfrak{P}_1$  становится простым идеалом, следует из того, что каждый полином области имеет вид

$$f = \varphi(z^2) + xz\psi(z^2) \pmod{\mathfrak{P}_1}.$$

Итак, пусть

$$f_1 = \varphi_1(z^2) + xz\psi_1(z^2), \quad f_2 = \varphi_2(z^2) + xz\psi_2(z^2),$$

тогда из  $f_1f_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$  следует выполнение равенств

$$\varphi_1\varphi_2 + z^2\psi_1\psi_2 = 0, \quad \varphi_2\psi_1 + \varphi_1\psi_2 = 0,$$

и отсюда  $f_1 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$  или  $f_2 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{P}_1}$ . Совершенно так же показывается, что  $\mathfrak{P}_2$  становится простым идеалом;  $\mathfrak{P}_3$  становится простым идеалом, поскольку каждый полином области по модулю  $\mathfrak{P}_3$  конгруэнтен некоторому полиному от  $y^2$ ;  $\mathfrak{P}_4$  состоит из всех полиномов области. Тем самым  $\mathfrak{B}_1$ ,  $\mathfrak{B}_2$  и  $\mathfrak{B}_3$  как простые идеалы тоже неприводимы; но  $\mathfrak{B}_4$  и  $\mathfrak{B}_5$  имеют каждый только единственный собственный делитель  $\mathfrak{P}_4$ , а потому необходимо неприводимы.

Из неприводимых идеалов получаются наибольшие примарные:

$$\Omega_1 = \mathfrak{B}_1, \quad \Omega_2 = \mathfrak{B}_2, \quad \Omega_3 = \mathfrak{B}_3, \quad \Omega_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2),$$

относительно простые неприводимые идеалы:

$$\mathfrak{K}_1 = \Omega_1, \quad \mathfrak{K}_2 = \Omega_2, \quad \mathfrak{K}_3 = [\Omega_3, \Omega_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

взаимно простые неприводимые идеалы:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{K}_1, \quad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{K}_2, \mathfrak{K}_3] = ((y^2 - 1)x^4, (y^2 - 1)x^3y, (y^2 - 1)x^2y^2, (y^2 - 1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Как и в первом примере, будет:

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5], \quad [\Omega_3, \Omega_4] = [\Omega_3, \overline{\Omega}_4],$$

где

$$\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \dots), \quad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \dots), \quad \lambda\mu \neq 1,$$

и

$$\overline{\Omega}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \dots).$$

Остальные неприводимые, соответственно наибольшие примарные, идеалы  $\mathfrak{B}_1$ ,  $\mathfrak{B}_2$ ,  $\mathfrak{B}_3$  как изолированные идеалы определены однозначно.

<sup>45</sup>Обратно, если для полиномиальной области выполнено условие конечности и каждый полином допускает по крайней мере одно представление, где множители имеют меньшую степень по  $x$ , то область является конечной областью целостности.

## § 11. Примеры из теории чисел и теории дифференциальных выражений.

1. Пусть лежащая в основе область  $\Sigma$  состоит из всех четных целых рациональных чисел. Тогда  $\Sigma$  можно взаимно однозначно сопоставить с областью всех целых рациональных чисел, ставя каждому числу  $2a$  из  $\Sigma$  в соответствие число  $a$ . Отсюда сразу следует, что каждый идеал в  $\Sigma$  является главным идеалом  $(2a)$ ; при этом в базисном представлении  $2c = n \cdot 2a$  для каждого элемента  $2c$  идеала нечетные  $n$  означают лишь сокращенные записи конечных сумм.

Простые идеалы области задаются как  $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (2)$  и  $\mathfrak{P} = (2p)$ , где  $p$  означает нечетное простое число; следовательно, каждый простой идеал делится на  $\mathfrak{P}_0$ , но не делится ни на какой другой простой идеал. Примарные идеалы задаются как

$$\mathfrak{Q}_0 = (2 \cdot 2^{e_0}) \quad \text{и} \quad \mathfrak{Q}_p = (2p^e);$$

они одновременно являются неразложимыми идеалами, и, согласно сказанному о простых идеалах, любые два, принадлежащие различным нечетным простым числам, взаимно относительно просты, но никакой  $\mathfrak{Q}$  не является относительно простым ни с каким  $\mathfrak{Q}_0$ .<sup>46</sup> Таким образом,  $\mathfrak{Q}_0$  являются единственными неизолрованными примарными идеалами. Единственному разложению  $a$  на степени простых чисел соответствует единственное представление идеала  $(2a)$  через наибольшие примарные, одновременно неразложимые идеалы:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{e_0}), (2p_1^{e_1}), \dots, (2p_\mu^{e_\mu})].$$

Следовательно, здесь, в отличие от примеров из полиномиальной области, однозначно определены и неизолрованные наибольшие примарные идеалы. При  $e_0 = 0$  это одновременно представление через взаимно относительно простые идеалы, тогда как при  $e_0 > 0$  идеал относительно-просто-неразложим.

Итак, тогда как в области всех целых чисел четыре различных разложения совпадают, здесь это имеет место лишь, с одной стороны, для двух разложений на наибольшие примарные и неразложимые идеалы, а при  $e_0 > 0$  – с другой стороны, для взаимно-просто-неразложимых (каждый идеал взаимно-просто-неразложим, так как область не имеет единицы) и относительно-просто-неразложимых; при  $e_0 = 0$ , напротив, взаимно-просто-неразложимые и относительно-просто-неразложимые разложения становятся различными. Вместе с тем здесь уже имеется пример того, что один простой идеал может делиться на другой, не будучи с ним тождественным; более общо, пример того, что из делимости не следует представление в виде произведения. Последнее – следствие того, что область не содержит единицы, – является также причиной того, что не существует единственного представления чисел области через неразложимые числа области в виде произведения, хотя каждый идеал становится главным; введение наименьшего общего кратного оказывается здесь необходимым. Заметим еще, что соотношения остаются в точности теми же, если вместо всех четных чисел взять за основу все числа, делимые на фиксированное простое число или степень простого числа.

Напротив, неразложимые и примарные идеалы также становятся различными, если  $\Sigma$  состоит из всех чисел, делимых на составное число  $g = p_1^{\nu_1} \cdots p_s^{\nu_s}$ . Снова каждый идеал становится главным идеалом  $(g \cdot a)$ , а простые идеалы снова задаются как  $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{D} = (g)$ ;  $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$ , где  $p$  означает простое число, отличное от входящих в  $g$  простых чисел. Напротив, неразложимые идеалы задаются как  $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot p_i^{\lambda_i})$  и  $\mathfrak{B}_e = (g \cdot p^e)$ , а примарные идеалы – как  $\mathfrak{Q}_e = \mathfrak{B}_e$  и как отличные от неразложимых

$$\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \dots \lambda_s} = (g \cdot p_1^{\lambda_1} \cdots p_s^{\lambda_s}),$$

причем все  $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$  и  $\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \dots \lambda_s}$  имеют один и тот же ассоциированный простой идеал  $\mathfrak{P}_0 = (g)$ . Здесь также существует единственность разложения на неразложимые идеалы, а следовательно и для разложения на наибольшие примарные идеалы; тем самым вновь однозначно определены и неизолрованные идеалы.

2. Пример некоммутативной кольцевой области дает теория идеалов в некоммутативных полиномиальных областях, рассмотренная в работе Нетер–Шмейдлера. Речь идет в частности о

<sup>46</sup> Действительно, из  $2b \cdot 2p_1^{e_1} \equiv 0 (2p_2^{e_2})$  для нечетных  $p_1 \neq p_2$  всегда следует  $2b \equiv 0 (2p_2^{e_2})$ ; из  $2b \cdot 2p^e \equiv 0 (2 \cdot 2^{e_0})$  же следует только  $2b = 2 \cdot 2^{e_0-1} \pmod{2 \cdot 2^{e_0}}$ .

“вполне редуцируемых” идеалах, то есть таких, у которых компоненты разложения попарно взаимно просты и не имеют собственных делителей; следовательно, компоненты тем более неразложимы. Тем самым, в дополнение к доказанному там изоморфизму по § 9, получается еще равенство числа компонентов при двух различных разложениях. Благодаря этому для разложения систем частных или обыкновенных линейных дифференциальных выражений, возникающего как специальный случай указанной работы, получен результат, который, по-видимому, не был замечен даже в известном случае обыкновенного линейного дифференциального выражения.

Вместе с тем система  $T$  всех классов вычетов фиксированного идеала  $M$  вместе с некоммутативной полиномиальной областью  $\Sigma$  дает двойную область  $(\Sigma, T)$ , где  $T$  обладает свойством модуля относительно  $\Sigma$ . Действительно, разность двух классов вычетов снова является классом вычетов, равно как и произведение класса вычетов на произвольный полином, тогда как произведения двух классов вычетов не существует (ук. соч., § 3). Поэтому системы классов вычетов, обозначенные там как “подгруппы”, образуют примеры модулей в двойных областях  $(\Sigma, T)$ , где лежащая в основе кольцевая область  $\Sigma$  некоммутативна.

## § 12. Пример из теории элементарных делителей.

Речь идет о таком понимании теории элементарных делителей, которое обусловлено общими разработками, но само предполагается известным.

Пусть  $\Sigma$  есть область всех целочисленных матриц из  $n^2$  элементов, для которых сложение и умножение определены в обычном для матриц смысле. Тогда  $\Sigma$  становится некоммутативной кольцевой областью; следовательно, идеалы вообще являются односторонними, а двусторонние содержатся среди них лишь как специальный случай.<sup>47</sup>

Сначала покажем, что каждый идеал становится главным идеалом. Для этого каждой матрице  $A = (a_{ik})$  в случае правосторонних идеалов сопоставим модуль

$$A = (a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1n}\xi_n, \dots, a_{n1}\xi_1 + \dots + a_{nn}\xi_n)$$

из целочисленных линейных форм. Обратно, этому модулю соответствует каждая матрица, задающая базис  $A$ , то есть, наряду с  $A$ , также  $UA$ , где  $U$  унимодулярна. Более общо, произведению  $PA$  соответствует модуль  $B$ , который становится кратным  $A$ . Отдельная линейная форма из  $A$  задается такими  $P$ , которые имеют только одну ненулевую строку.

Пусть теперь  $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$  – все элементы идеала  $\mathfrak{M}$ ; пусть  $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$  – сопоставленные им модули,  $A$  – их наибольший общий делитель, а  $UA$  – самая общая матрица, сопоставленная этому модулю  $A$ . Тогда каждой отдельной линейной форме из  $A$ , по определению наибольшего общего делителя, соответствует матрица  $P_1 A_{i_1} + \dots + P_\sigma A_{i_\sigma}$ , где, по сказанному выше,  $P$  имеют только одну ненулевую строку. Отсюда следует, что и матрица  $A$ , соответствующая базису  $A$ , допускает такое представление, теперь уже с общим  $P$ , а значит становится элементом  $\mathfrak{M}$ . Так как, кроме того, каждый модуль  $A_i$  делится на  $A$ , каждая матрица  $A_i$  делится на  $A$ ;  $A$  и, вообще,  $UA$  образует базис  $\mathfrak{M}$ . Если речь идет о левосторонних идеалах, то соответственно столбцы каждой матрицы следует рассматривать как базис модуля; каждый идеал становится главным идеалом, для которого, наряду с  $A$ , также  $AV$  является базисом, где под  $V$  понимается произвольная унимодулярная матрица.

Далее, для связи с теорией элементарных делителей, мы полагаем в основу двусторонние идеалы; для них, в частности, наряду с  $A$ , также  $PAQ$  принадлежит идеалу. Тогда самый общий базис такого идеала, по сказанному выше, имеет вид  $UAV$ , где  $U$  и  $V$  унимодулярны. Следовательно, базисные элементы исчерпывают класс эквивалентных матриц,<sup>48</sup> и существует взаимно однозначная связь между идеалом и классом, а следовательно также между идеалом и системой элементарных делителей  $(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n)$  класса, где  $a_i$ , как известно, являются неотрицательными целыми числами, каждое из которых делит следующее. Матрицу класса, появляющуюся в нормальной форме, обусловленной элементарными делителями, тем самым можно рассматривать как специальный базис идеала; из делимости идеалов, соответственно классов, следует делимость элементарных делителей, и обратно.

Однако Du Pasquier в указанном месте, § 11, показал, что для каждого двустороннего идеала ранг равен  $n$  и все элементарные делители совпадают. Поэтому, чтобы рассматривать случай общих элементарных делителей, мы должны исходить не из идеалов, а непосредственно из двусторонних классов (которые также будут обозначаться большими готическими буквами). Класс  $\mathfrak{A} = UAV$  при этом делится на другой класс  $\mathfrak{B}$ , если  $A = PBQ$ .

В общем случае справедливо: *наименьшее общее кратное (наибольший общий делитель) двух классов получается образованием наименьшего общего кратного (наибольшего общего делителя) соответствующих систем элементарных делителей.*<sup>49</sup> Действительно, пусть

$$(a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_n), \quad (b_1 \mid b_2 \mid \dots \mid b_n), \quad (c_1 \mid c_2 \mid \dots \mid c_n),$$

<sup>47</sup>Теория идеалов этих областей составляет предмет работ Du Pasquier: *Zahlentheorie der Tettarionen*, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906); *Zur Theorie der Tettarionideale*, ibid., 52 (1907). Содержание второй работы состоит в доказательстве того, что каждый идеал становится главным идеалом.

<sup>48</sup>Базисным элементам односторонних идеалов соответствуют правые, соответственно левые, классы.

<sup>49</sup>В работе *Zur Theorie der Moduln*, Math. Ann. 52 (1899), S. 1, E. Steinitz определяет наименьшее общее кратное (наибольший общий делитель) классов через наименьшие общие кратные и наибольшие общие делители элементарных систем. Независимо от этого наименьшее общее кратное классов встречается как “Kongruenzkomposition” у H. Brandt, *Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform*, J. f. M. 150 (1919), S. 1.



где  $c_i = [a_i, b_i]$ , суть системы элементарных делителей классов  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}^*$ , и пусть  $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$ . Тогда  $\mathfrak{C}^*$  делится на  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{B}$ , а значит делится на  $\mathfrak{C}$ ; обратно, элементарные делители  $\mathfrak{C}$  делятся на элементарные делители  $\mathfrak{C}^*$ , следовательно  $\mathfrak{C}$  делится на  $\mathfrak{C}^*$ , и потому  $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ . Соответственно получается доказательство для наибольшего общего делителя.

Итак, единственному представлению элементарных делителей  $a_i$  как наименьшего общего кратного степеней простых чисел соответствует представление  $\mathfrak{A}$  как наименьшего общего кратного классов  $\mathfrak{Q}$ , элементарные делители которых заданы степенями одного простого числа, в символах

$$\mathfrak{Q} \sim (p^{r_1} \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_\rho} \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \quad r_1 \leq r_2 \leq \cdots \leq r_\rho.$$

В частности, если ранг  $\rho$  равен  $n$ , то здесь имеется разложение на взаимно простые и взаимно-просто-неразложимые классы, которое, несмотря на некоммутативность области, единственно.

Классы  $\mathfrak{Q}$  далее можно разложить на классы, соответствующие системе элементарных делителей:

$$\begin{aligned} \mathfrak{B}_1 &\sim (p^{r_1} \mid \cdots \mid p^{r_1}), & \mathfrak{B}_2 &\sim (1 \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_2}), & \dots, \\ \mathfrak{B}_\nu &\sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu}), & \mathfrak{B}_{\rho+1} &\sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid 0 \mid \cdots \mid 0), \end{aligned}$$

где в  $\mathfrak{B}_\nu$  каждый раз число 1 встречается  $(\nu - 1)$  раз. Если, например,  $r_1 = r_2 = \cdots = r_\mu = 0$ , то  $\mathfrak{B}_1, \dots, \mathfrak{B}_\mu$  равны единичному классу и, следовательно, при разложении должны быть опущены; то же относится к  $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ , если  $\rho = n$ . Если, далее, например,  $r_\nu = r_{\nu+1} = \cdots = r_{\nu+\lambda}$ , то  $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \dots, \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$  являются собственными делителями  $\mathfrak{B}_\nu$ , а потому также должны быть исключены. Обозначим через  $\mathfrak{B}_{i_1}, \dots, \mathfrak{B}_{i_k}$  оставшиеся, которые теперь дают кратчайшее представление; тогда

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_{i_1}, \dots, \mathfrak{B}_{i_k}]$$

есть единственное разложение  $\mathfrak{Q}$  на неразложимые классы. Действительно, пусть

$$\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu})$$

представима как наименьшее общее кратное

$$\mathfrak{C} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{s_\nu} \mid \cdots \mid p^{s_i}) \quad \text{и} \quad \mathfrak{D} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{t_\nu} \mid \cdots \mid p^{t_i}).$$

Тогда в системе элементарных делителей  $\mathfrak{C}$  и  $\mathfrak{D}$  на первых  $(\nu - 1)$  местах должно стоять число 1; на  $\nu$ -м месте показатель  $s_\nu$  или  $t_\nu$ , скажем  $s_\nu$ , должен стать равным  $r_\nu$ . Но так как

$$r_\nu = s_\nu \leq s_{\nu+1} \leq \cdots \leq s_i \leq r_\nu$$

то получается  $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$ , следовательно  $\mathfrak{B}_\nu$  неразложим.<sup>50</sup> То же справедливо для  $\mathfrak{B}_{\rho+1}$ , где  $p$  следует заменить на 0. Каждый из этих неразложимых классов, как показывает образование наименьшего общего кратного, задает определенный показатель и место, где этот показатель впервые появляется в системе элементарных делителей  $\mathfrak{Q}$ , соответственно  $\mathfrak{A}$ , тогда как  $\mathfrak{B}_{\rho+1}$  задает ранг. Так как эти числа однозначно определены системой элементарных делителей  $\mathfrak{Q}$ , соответственно  $\mathfrak{A}$ , и так как связь между элементарными делителями и классом взаимно однозначна, разложение  $\mathfrak{Q}$ , а равно и произвольного класса, на неразложимые классы единственно.

<sup>50</sup>Напротив,  $\mathfrak{B}$  еще разложимы на односторонние классы; здесь уже нет взаимно однозначной связи между элементарными делителями и классом, а тем самым нет и единственного разложения на неразложимые односторонние классы. Это показывает, например, сообщенный мне Н. Brandt следующий пример разложения на правосторонние классы (где классы представлены базисной матрицей, соответственно соответствующим модулем):

$$\begin{aligned} \mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2], \quad \mathfrak{B} &\sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ \mathfrak{D}_1 &\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ p-1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

В самом деле, модули  $(\xi, p\eta)$ ;  $(p\xi, \eta)$ ;  $(p\xi, (p-1)\xi + \eta)$  каждый имеют в качестве собственного делителя только модуль  $(\xi, \eta)$ , поэтому они неразложимы и, кроме того, различны между собой.

В итоге можно сказать: *каждый двусторонний класс  $\mathfrak{A}$  из целочисленных матриц с ограниченным числом элементов единственным образом представляется как наименьшее общее кратное конечного числа неразложимых двусторонних классов. Каждый неразложимый класс при этом представляет фиксированный простой делитель системы элементарных делителей  $\mathfrak{A}$ , соответствующий показатель и место, где этот показатель впервые появляется. Неразложимый класс, соответствующий делителю 0, задает ранг  $\mathfrak{A}$ .*

Эрланген, октябрь 1920.

(Поступила 16. 10. 1920.)

## 20. Алгебраический критерий абсолютной неприводимости

Math. Ann. 85 (1922), с. 26–33

Многочлен – с коэффициентами из произвольного, абстрактно определенного поля – называется *абсолютно неприводимым*, если он остается неприводимым в алгебраически замкнутом поле, до которого можно расширить область коэффициентов.<sup>1</sup> Ниже я покажу, что абсолютную неприводимость, в отличие от неприводимости относительно заданного поля, можно выразить алгебраически; точнее, справедлива следующая теорема:

*Каждому многочлену от  $n \geq 2$  переменных с неопределенными коэффициентами можно сопоставить целую рациональную функцию с целочисленными коэффициентами от этих коэффициентов и дополнительных неопределенных, форму приводимости, так что для каждого специального многочлена той же степени необходимое и достаточное условие абсолютной неприводимости дается ненулеватостью формы приводимости. Иными словами: для каждой специальной системы значений коэффициентов, для которой форма приводимости тождественно по неопределенным обращается в нуль и которая не вызывает понижения степени, специальный многочлен приводим, и обратно.*

Если вместо многочленов рассматривать однородные формы еще от одной переменной, то условие о степени заменяется более простым условием: система коэффициентов не должна тождественно обращаться в нуль.

Как прямое следствие теоремы получается также утверждение, впервые сформулированное А. Ostrowski<sup>2</sup>:

*Каждый абсолютно неприводимый многочлен с алгебраическими числами в качестве коэффициентов остается неприводимым по модулю каждого простого идеала конечного алгебраического поля  $\Omega$ , содержащего область коэффициентов, за исключением не более чем конечного числа простых идеалов из  $\Omega$ . В частности,  $\Omega$  может быть также полем рациональных чисел.*

К дальнейшим применениям к теории относительно целых функций<sup>3</sup> я намерен вернуться в другом месте.

1. Сначала покажем, что *каждый многочлен от  $n \geq 2$  переменных с неопределенными коэффициентами абсолютно неприводим*. Именно, положим:

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n} & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m), \end{aligned} \quad (1)$$

где  $A$  и  $B$  обозначают неопределенные, а  $C(A, B)$  становятся целочисленными билинейными комбинациями  $A$  и  $B$ . Поэтому частные

$$D = C(A, B)/C_{0 \dots 0}(A, B)$$

являются рациональными функциями частных  $A/A_{0 \dots 0}$  и  $B/B_{0 \dots 0}$ ; но число этих функций больше числа их аргументов, ибо эти числа соответственно равны

$$\binom{l+m+n}{n} - 1, \quad \binom{l+n}{n} - 1, \quad \binom{m+n}{n} - 1,$$

<sup>1</sup>Что каждое поле, причем по существу единственным образом, можно расширить до алгебраически замкнутого поля, т. е. до такого, в котором каждый многочлен от одной переменной разлагается на линейные множители, показал Е. Steinitz в своей *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), с. 167); тем самым он дал рациональный эквивалент основной теоремы алгебры.

<sup>2</sup>*Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen*. Gött. Nachr. 1919, с. 279 (вспомогательная лемма, с. 296). Для случая полей, состоящих из обычных чисел, Ostrowski, насколько мне известно, также пришел к приведенной выше основной теореме; свои относящиеся к этому исследования он вскоре опубликует. То, что при моей организации доказательства основная теорема верна для произвольных, абстрактно определенных полей, основано на том, что форма приводимости, построенная для неопределенных, имеет числовые коэффициенты, не зависящие от специально положенного в основу поля.

<sup>3</sup>D. Hilbert, *Mathematische Probleme*. Gött. Nachr. 1900, с. 253, задача 14.

и

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{для } n \geq 2, l > 0, m > 0.$$

Следовательно, существует по меньшей мере *одно* алгебраическое соотношение между  $D(A, B)$ , а потому также между  $C(A, B)$ :

$$\Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{тождественно по } Z_{k_1 \dots k_n}], \quad \Phi(C(A, B)) = 0 \quad [\text{тождественно по } A, B], \quad (2)$$

где  $\Phi$  обозначает целочисленный многочлен.

Следовательно, многочлен с неопределенными  $Z$  в качестве коэффициентов

$$E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m) \quad (3)$$

при  $n \geq 2$  необходимо абсолютно неприводим.<sup>4</sup>

2. Совокупность тех многочленов  $\Phi(Z)$ , которые при подстановке  $Z = C(A, B)$  тождественно по  $A, B$  обращаются в нуль, образует *идеал многочленов*,<sup>5</sup> точнее простой идеал  $\mathfrak{P}$ ; ведь если в силу подстановки обращается в нуль произведение  $\Phi_1 \Phi_2$ , то обращается в нуль по меньшей мере один множитель. Так как (2) выполнено тождественно по  $A, B$ , оно сохраняется для каждой специальной системы значений  $A, B$ , где  $A, B$  и, следовательно, также  $\Gamma = C(A, B)$  обозначают величины некоторого поля. *Коэффициенты  $\Gamma$  каждого многочлена, приводимого в поле расширения, удовлетворяют условиям  $\Phi(\Gamma) = 0$ , то есть являются нулями  $\mathfrak{P}$* , или также нулями конечного числа базисных многочленов  $\mathfrak{P}$ ; теперь требуется доказать обратное.

Для этого нужно заметить, что все соотношения между  $A, B, C$  сохраняются, если многочлены (1), введя новую переменную  $y$ , превратить в однородные формы  $F(x, y), G(x, y), H(x, y)$  степеней  $l, m, l + m$ . Поэтому нулями  $\mathfrak{P}$  становятся и такие коэффициенты  $\Gamma$ , при которых, например,  $F(x, y)$ <sup>6</sup> становится степенью  $y$ ; для них переход к неоднородным многочленам вызывает понижение степени  $\bar{H}(x)$ , а не разложение. Будет показано, что, за исключением этого понижения степени, обратное всегда верно; в частности, что для *однородных форм обратное верно без исключений, если только не все  $\Gamma$  обращаются в нуль; другими словами, каждый нуль  $\mathfrak{P}$  задается параметрическим представлением  $\Gamma = C(A, B)$  с величинами  $A, B$  из некоторого поля расширения*.<sup>7</sup>

Это доказательство я проведу прямым построением конечного числа функций  $\Phi(Z)$ ; именно посредством подстановки Kronecker'a

$$x_i = \xi^{d^{n-i}}$$

я сопоставляю многочленам (1) многочлены от *одной* переменной; показываю, что здесь возникают пробелы в показателях, и через образование нормы соответствующих коэффициентов прихожу к функциям  $\Phi(Z)$  и к искомому критерию.

3. Положим:<sup>8</sup>

$$\begin{aligned} d &= l + m + 1, \\ i &= i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \dots + i_n, \quad j = j_1 d^{n-1} + \dots + j_n, \quad k = k_1 d^{n-1} + \dots + k_n. \end{aligned} \quad (4)$$

<sup>4</sup>Ибо неопределенные  $Z$ , в терминологии пункта 2, не являются нулями  $\mathfrak{P}$ .

<sup>5</sup>Такие совокупности обычно называют модулями; фактически же характеризующее их свойство – вместе с  $\Phi_1$  и  $\Phi_2$  они содержат также  $\Phi_1 - \Phi_2$ , а вместе с  $\Phi$  также  $\Psi\Phi$ , где  $\Psi$  означает произвольный целочисленный многочлен от  $Z$ , – является свойством идеала.

<sup>6</sup>Многочлены и формы, возникающие при замене неопределенных в  $F, G, \dots, f, g, \dots$  специальными системами значений, я всюду обозначаю чертой сверху:  $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$

<sup>7</sup>То, что “вообще” нули  $\mathfrak{P}$  задаются параметрическим представлением, следует из свойства простого идеала  $\mathfrak{P}$  определять неприводимое алгебраическое многообразие. Но, как известно, отсюда не следует – этого я первоначально не заметила, и на это А. Ostrowski уже давно обратил мое внимание, – что параметрическое представление не может отказать ни для какой специальной системы значений. Данное здесь доказательство опирается на более элементарные понятия.

<sup>8</sup>*Festschrift*, с. 11.

Тогда по подстановке Kronecker'a многочленам  $F, G, H$  из (1) соответственно отвечают многочлены

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^i & (i_1 + \dots + i_n \leq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^j & (j_1 + \dots + j_n \leq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \dots k_n} (A, B) \xi^k & (k_1 + \dots + k_n \leq l + m). \end{aligned} \quad (5)$$

Это соответствие, как известно, взаимно однозначно, поскольку для всех встречающихся в (5) индуцированных показателей из  $k = 0$  следует также  $k_1 = 0, \dots, k_n = 0$ ; и потому из  $i + j = i' + j'$  следует также  $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \dots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$ . Значит, различные произведения  $\xi^i \xi^j$  могут давать один и тот же показатель  $\xi^k$  лишь тогда, когда и соответствующие произведения  $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \dots x_n^{j_n}$  приводят к тому же показателю. Поэтому получается:

$$h(\xi) = f(\xi)g(\xi), \quad (6)$$

и из выполнения соотношения (6) такого рода, что в  $f(\xi)$  и  $g(\xi)$  не встречаются никакие показатели, отличные от индуцированных, в обратную сторону следует

$$H(x) = F(x)G(x). \quad (7)$$

При этом среди индуцированных показателей в  $f(\xi)$  и  $g(\xi)$  действительно имеются пробелы. В самом деле, наибольший показатель в  $f(\xi)$  равен  $ld^{n-1}$ , следующий по величине равен  $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$ ; разность равна  $d^{n-2}(d-1) > 1$ , так как  $d = l + m + 1 \geq 3, n \geq 2$ ; то же верно и для  $g(\xi)$ .

Соотношения (6) и (7), справедливые для неопределенных  $A, B$ , сохраняются для каждой специальной системы значений  $A, B$ . Чтобы при этом сохранялись степени, я однородизую (6) и (7) посредством переменных  $\eta$  и  $y$ . Итак, однородная форма  $H(x, y)$  разлагается в алгебраическом поле расширения тогда и только тогда, когда в этом поле соответствующую бинарную форму  $h(\xi, \eta)$  можно разложить на два множителя так, что в множителях не возникают никакие показатели, отличные от индуцированных.

4. Чтобы выполнить образование нормы, упомянутое в конце пункта 2, пусть

$$a_1, b_1; \dots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \dots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

обозначают новые неопределенные. Положим

$$\begin{aligned} \varphi(\xi, \eta) &= (a_1\xi + b_1\eta) \dots (a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \dots + r_0\eta^p, \\ \psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta) \dots (a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \dots + s_0\eta^q, \\ \chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta)\psi(\xi, \eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \dots + t_0\eta^{p+q}, \end{aligned} \quad (8)$$

где  $r, s, t$  каждый раз обозначают однородизированные элементарные симметрические функции, то есть те симметрические функции строк  $a, b$ , линейные в каждой отдельной строке, из которых все целые симметрические функции, однородные и одинаковой степени в каждой отдельной строке, составляются целым образом и с целочисленными коэффициентами — причем только одним способом.

Теперь с дальнейшими неопределенными  $u_{\mu\nu}$  образуем линейную форму

$$\zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu, \quad (9)$$

где суммирование распространяется на заданные индексы  $\mu$  и  $\nu$ . Произведение  $\zeta(u)$  со всеми его сопряженными, возникающими из перестановок строк  $a, b$ , отличными от  $\zeta(u)$  и друг от друга, — норма  $N(\zeta(u))$  элемента  $\zeta(u)$  относительно поля  $t(a, b)$ , если  $\zeta(u)$  рассматривается как функция поля  $r_\mu(a, b)$  и  $s_\nu(a, b)$ , — тогда становится целочисленной симметрической функцией всех строк  $a, b$ , однородной и одинаковой степени в каждой строке; следовательно, по сказанному выше, это однозначно определенная целая целочисленная функция от  $t(a, b)$  и  $u_{\mu\nu}$ :

$$N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \quad [\text{тождественно по } a, b, u]. \quad (10)$$

То же рассуждение показывает, что также

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u)z^{\delta-1} + \dots + T(t, u) \quad [\text{тождественно по } a, b, u, z]$$

где все  $T$  обозначают целые целочисленные функции от  $t$  и  $u$ . Обе части этого тождества обращаются в нуль при  $z = \zeta(u)$ ; именно, вследствие алгебраической независимости элементарных симметрических функций  $r(a, b)$  и  $s(a, b)$  они обращаются в нуль тождественно по  $r, s$ , если  $t(a, b)$  согласно (8) положить равным целочисленной билинейной комбинации  $w(r, s)$  от  $r$  и  $s$ , а  $\zeta(u)$  рассматривать как функцию от  $r$  и  $s$ . Поэтому получается

$$\zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \dots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{тождественно по } r, s, u]. \quad (11)$$

9

Тождества (10) и (11) сохраняются для всех специальных систем значений  $\alpha, \beta$  величин  $a, b$ , соответственно  $\varrho, \sigma$  величин  $r, s$ . Если  $\varrho, \sigma$ , в частности, выбраны так, что все произведения  $\varrho_\mu \sigma_\nu$  обращаются в нуль – где  $\mu, \nu$  обозначают индексы, встречающиеся в (9), – так что  $\zeta(u)$  при подстановке обращается в нуль, то, полагая  $w(\varrho, \sigma) = \tau$ , из (11) получаем:

$$T(\tau, u) = 0 \quad [\text{тождественно по } u]. \quad (12)$$

Обратно, пусть  $\tau_0, \dots, \tau_{p+q}$  – такие системы значений, не все нулевые, для которых выполнено (12). Так как в алгебраическом поле расширения существует разложение

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \dots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta) \cdots (\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta), \quad (12')$$

где ни в одном множителе  $\alpha$  и  $\beta$  не обращаются одновременно в нуль,<sup>10</sup> хотя некоторые  $\alpha$  или  $\beta$  могут обращаться в нуль, имеем  $\tau = t(\alpha, \beta)$ . Подстановка этих значений в (10) с учетом (12) показывает, что  $\zeta(u, \alpha, \beta)$  или один из сопряженных множителей тождественно по  $u$  обращается в нуль. Следовательно, после подходящей нумерации  $\alpha, \beta$ , полагая  $r(\alpha, \beta) = \varrho$ ,  $s(\alpha, \beta) = \sigma$ , мы утверждаем тем самым, что  $\bar{\chi}(\xi, \eta)$  допускает по меньшей мере одно разложение

$$\bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta)\bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_\mu \xi^\mu \eta^{p-\mu} \cdot \sum \sigma_\nu \xi^\nu \eta^{q-\nu}, \quad (13)$$

такое, что все произведения  $\varrho_\mu \sigma_\nu$ , встречающиеся в  $\zeta(u)$ , обращаются в нуль, но не все  $\varrho$  или  $\sigma$  обращаются в нуль.

5. Пусть теперь степени  $p, q$  в (8) равны  $ld^{n-1}$  и  $md^{n-1}$ , то есть степеням  $f(\xi)$  и  $g(\xi)$  в (5). Индексы  $\mu, \nu$  разделяются на  $\mu^{(1)}, \mu^{(2)}$ ; при этом  $\mu^{(1)}$  пробегает все показатели, отсутствующие в  $f(\xi)$ ,  $\mu^{(2)}$  – все показатели  $\xi$  в  $\psi(\xi, \eta)$ ; соответственно  $\nu^{(2)}$  пробегает все показатели, отсутствующие в  $g(\xi)$ , а  $\mu^{(2)}$  – все показатели  $\xi$  в  $\varphi(\xi, \eta)$ . Далее пусть

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} \xi^{k_1 + \dots + k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m)$$

обозначает многочлен от одной переменной, соответствующий многочлену (3), и пусть

$$S(Z, u)$$

обозначает целочисленный многочлен от  $Z$  и  $u$ , возникающий из  $T(t, u)$  – однозначно определенной правой части (10), где суммирование в (9) распространяется на указанные индексы  $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ , – посредством замены  $t$  коэффициентами  $Z$  и соответствующими нулями  $e(\xi)$ .

Если теперь заменить  $r, s$  коэффициентами  $A, B$  и соответствующими нулями  $f(\xi)$  и  $g(\xi)$ , то при указанном суммировании  $\zeta(u)$  обращается в нуль этой подстановкой. Далее  $t = w(r, s)$  переходит

<sup>9</sup>Если суммирование в (9) распространяется на все индексы, то (11) представляет расширение Kronecker'a теоремы Gauss'a, по существу в Kronecker'овой организации доказательства (*Zur Theorie der Formen höherer Stufen*, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, с. 417).

<sup>10</sup>Эта (рациональная) “основная теорема алгебры” является теоремой существования, на которой основана безысключительная справедливость обратного утверждения, высказанного в конце пункта 2.

в коэффициенты  $C(A, B)$  и соответствующие нули  $h(\xi)$ ; значит,  $T(t, u)$  переходит в  $S(C(A, B), u)$ . Поэтому из тождества (11) получаем

$$S(C(A, B), u) = 0 \quad [\text{тождественно по } A, B, u]. \quad (14)$$

Так как (14) сохраняется для каждой специальной системы значений, коэффициенты  $\Gamma = C(A, B)$  таких специальных  $H(x)$  или общих  $H(x, y)$ , которые в поле расширения разлагаются на два множителя, удовлетворяют условию

$$S(\Gamma, u) = 0 \quad [\text{тождественно по } u]. \quad (15)$$

Если, обратно, для коэффициентов  $\Gamma$  многочлена  $\bar{H}(x)$ , соответственно формы  $\bar{H}(x, y)$ , не все из которых обращаются в нуль, выполнено условие (15), то по сказанному выше это равносильно  $T(\tau, u) = 0$ , где под  $\tau$  понимаются все коэффициенты  $\bar{h}(\xi, \eta)$ . Следовательно, по (13) в поле расширения  $\Gamma$  существует разложение:

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

где в  $\bar{f}$  и  $\bar{g}$  из-за заданного суммирования не встречается никаких показателей, отличных от индуцированных; следовательно, имеется соотношение

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

Отсюда, как только при  $y = 1$  ни один множитель не становится степени нуль, в частности если  $\Gamma$  не вызывают понижения степени  $H(x)$ , следует также соотношение

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

*Итак, условие (15) необходимо и достаточно для того, чтобы  $\bar{H}(x, y)$ , а при исключении понижения степени также  $\bar{H}(x)$ , разлагалась в поле расширения на два множителя.*

Отсюда еще следует, что  $S(Z, u)$  не может тождественно по  $Z$  и  $u$  обращаться в нуль, поскольку в пункте 1 показано, что при  $n \geq 2$  многочлены с неопределенными в качестве коэффициентов, а следовательно и соответствующие однородные формы еще от одной переменной, абсолютно неприводимы. Поэтому, понимая под  $U$  степенные произведения  $u$ , получаем

$$S(Z, u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

где  $\Phi_\lambda(Z)$  по (14) становятся многочленами из  $\mathfrak{P}$ . Тем самым показано, что  $\mathfrak{P}$  не имеет иных нулей, кроме заданных параметрическим представлением  $\Gamma = C(A, B)$ , где  $A$  и  $B$  принадлежат алгебраическому полю расширения  $\Gamma$ . Обратное утверждение, высказанное в конце пункта 2, тем самым доказано.

6. *Условие абсолютной неприводимости* теперь можно сформулировать непосредственно. Для этого нужно лишь степень  $E(x)$  в (3) всеми возможными способами разложить на два положительных слагаемых  $l + m$  и для каждого такого разложения образовать форму  $S(Z, u)$ . Произведение по этим формам

$$R(Z, u) = \prod S(Z, u) \quad (16)$$

тогда образует форму приводимости для  $E(x)$ ; ибо по сказанному выше каждому разложению  $E(x)$ , соответственно  $E(x, y)$ , соответствует обращение в нуль одного множителя из (16), и обратно. Тем самым доказана основная теорема, сформулированная во введении, и одновременно показано, как форму приводимости действительно можно построить за конечное число шагов.

7. Из существования формы приводимости (16) непосредственно следует упомянутая во введении теорема Ostrowski. Пусть

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \dots + k_n \leq v)$$

есть абсолютно неприводимый многочлен с целыми алгебраическими числами  $\Gamma$  в качестве коэффициентов; пусть  $\Omega$  обозначает конечное алгебраическое числовое поле, содержащее все  $\Gamma$ , а  $\mathfrak{p}$  – простой идеал из  $\Omega$ .

Тогда форма приводимости  $R(Z, u)$ , построенная для точной степени  $\bar{E}(x)$ , при подстановке  $Z = \Gamma$  остается отличной от нуля; имеем

$$R(\Gamma, u) = \sum P_{\lambda} U_{\lambda} \neq 0 \quad [\text{тождественно по } u].$$

Значит, идеал  $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \dots)$  делится лишь на конечное число простых идеалов из  $\Omega$ . Если поэтому  $\mathfrak{p}$  отличается от этих конечных, то  $R(\Gamma, u)$  по модулю  $\mathfrak{p}$  не обращается тождественно в нуль; а так как классы вычетов по модулю  $\mathfrak{p}$  снова образуют поле, следует, что  $\bar{E}(x)$  по модулю  $\mathfrak{p}$  неприводим, точнее абсолютно неприводим. То же верно для  $\bar{E}(x, y)$ , так что и понижения степени по модулю  $\mathfrak{p}$  не происходит.

Если коэффициенты  $\bar{E}(x)$  являются алгебраически дробными числами, то  $\mathfrak{p}$  нужно также брать отличным от конечного числа простых идеалов, входящих в общий знаменатель  $\Lambda$ ; по модулю всех остальных простых идеалов  $E(x)$  можно заменить на  $\Lambda \bar{E}(x)$ , так что приведенные выше предпосылки выполнены. Тем самым теорема доказана.

Erlangen, август 1921.

(Поступило 28. 8. 1921.)



## 21. Формальное вариационное исчисление и дифференциальные инварианты

Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), с. 68–71 (в: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

### 28. Формальное вариационное исчисление и дифференциальные инварианты.<sup>149</sup>

Порождение всех дифференциальных инвариантов и вывод основных теорем можно наиболее единообразно провести формальными методами вариационного исчисления. Этот принцип восходит к Riemann<sup>72)</sup> и получил свою главную формотеоретическую разработку у Lipschitz<sup>73)</sup>.

Если исходить из вариационной задачи, принадлежащей однородной форме  $f(dx)$ , где

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \partial dx_k} \right| \neq 0$$

предполагается, а именно

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} f(x') dt = 0, \quad \left( x'_i = \frac{dx_i}{dt} \right), \quad (140)$$

то интегрирование по частям приводит к инвариантной системе уравнений

$$2\psi_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'_i} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

где выражения Лагранжа  $\psi_i$  контрагredientны к  $dx$ . Формально это проще всего видно, если определить  $\psi_i$  свободным от интегралов формальным тождеством, соответствующим интегрированию по частям (центральное уравнение Лагранжа<sup>150</sup>)

$$\delta f - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d, d) \delta x_i, \quad \left( f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i} \delta x_i \right),$$

где как  $f$ , так и  $df_\delta$  являются инвариантами, а значит, инвариантна и правая часть. В частности, для квадратичной формы получается

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) \delta x_\mu.$$

Если заменить здесь  $d$  когredientным  $(d + \lambda\delta)$  и сравнить степени по  $\lambda$ , то получается соответствующая система тождеств:

$$\begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i Dx_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) Dx_\mu, \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i Dx_k - d \sum g_{ik} \delta x_i Dx_k = -2 \sum \psi_\mu(d, \delta) Dx_\mu, \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i Dx_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta, \delta) Dx_\mu. \end{cases} \quad (141)$$

Отсюда  $\psi_\mu(d, \delta)$ , а следовательно, в частности также  $\psi_\mu(d, d)$  и  $\psi_\mu(\delta, \delta)$ , оказываются контрагredientными векторами. Из (141) вычисляется

$$\psi_\mu(d, \delta) = \sum g_{i\mu} d\delta x_i + \sum \left[ \begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix} \right] dx_i \delta x_k,$$

и отсюда получается когredientный вектор

$$p^\sigma(d, \delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \left\{ \begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix} \right\} dx_i \delta x_k. \quad (142)$$

Если положить  $p'(d, d) = 0$ , то это, очевидно, дает уравнения геодезических линий.

<sup>149</sup>Этот номер принадлежит E. Noether.

<sup>150</sup>Для специального  $f$  обозначение принадлежит Neun; см. его статью IV, 1 11, p. 447.

Знание когреддиентного вектора  $p^\sigma(d, \delta)$  непосредственно приводит к ковариантной производной (ср. № 19). Пусть, например,  $h(d, \delta)$  есть форма двух рядов  $dx$  и  $\delta x$ ; тогда выражение

$$h^{(1)}(dx, \delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma} p^\sigma(d, \delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma} p^\sigma(\delta, \delta) \quad (143)$$

само является инвариантом как разность инвариантов и образовано так, что вторые дифференциалы взаимно уничтожаются. Поэтому  $h^{(1)}(dx, dx)$  представляет форму только с первыми дифференциалами: ковариантную производную от  $h$ . Соответствующее утверждение верно, если  $h$  содержит больше рядов  $d^{(1)}x, \dots, d^{(\lambda)}x$ .<sup>151</sup>

На том же принципе основано образование формы кривизны у Riemann и Lipschitz. От  $\delta^2 f$  переходят к “нормальной форме второй вариации”

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \quad (144)$$

которая, как совокупность инвариантов, сама снова является инвариантом и в которой теперь, в обобщение центрального уравнения Лагранжа, устранены третьи дифференциалы. Устранение вторых дифференциалов происходит, по аналогии с ковариантным дифференцированием, путем образования разности

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}, \quad (145)$$

что можно также записать как<sup>152</sup>

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} K &= d \sum \psi_\sigma(d, \delta) \delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d) \delta x_\sigma \\ &\quad - \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}. \end{aligned} \quad (146)$$

Закон образования  $K$  можно выразить и так: в  $\Omega$  вторые дифференциалы устраняются приравниванием к нулю  $p(d, \delta)$  и  $p(\delta, \delta)$ , соответственно правых частей (141). Это определение формы кривизны по Riemann (ср. № 21), причем, однако, следует явно заметить – что особенно ясно показывает (146), – что это приравнивание к нулю может происходить только после выполненного дифференцирования; формальный способ образования Lipschitz обходит эту трудность. Соответственно ковариантную производную  $h^{(1)}$  (143) можно было бы также определить так: в  $\delta h$  вторые дифференциалы устранены приравниванием  $p(d, \delta), \dots$  к нулю.

Из формы кривизны последовательным образованием ковариантных производных получается ряд форм  $[\Phi_4, \Phi_5, \dots]$  у Christoffel, проективные инварианты которого, после присоединения  $f$ , по Christoffel и Ricci исчерпывают совокупность дифференциальных инвариантов квадратичной формы, а эквивалентность этого ряда относительно линейных преобразований без какого-либо дальнейшего условия интегрируемости выражает эквивалентность двух квадратичных дифференциальных форм (ср. № 22). Внутреннее основание этой теоремы редукции состоит в существовании римановых нормальных координат, возникающих из вариационной задачи (140) (ср. № 20): они переводят геодезические линии, проходящие через точку, в прямые и потому при произвольном преобразовании  $x$  преобразуются линейно. Тем самым образование всех инвариантов и вопрос эквивалентности сведены к соответствующему вопросу для отдельных однородных составляющих в разложении  $f$  по нормальным координатам, и показывается, что эти составляющие линейно составляются из  $f, \Phi_4, \Phi_5, \dots$ . Для квадратичных форм это подробно проведено у Vermeil<sup>92)</sup> в связи с заметкой Е. Noether<sup>93)</sup>. Согласно этой заметке, теоремы и методы остаются справедливыми, если в основу положить произвольное дифференциальное выражение (ср. № 22 и 23); тем самым выявляется область действия методов формального вариационного исчисления по сравнению с методами чистой теории элиминации.<sup>153</sup>

<sup>151</sup> Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

<sup>152</sup> Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

<sup>153</sup> Ср. относительно этих изложений и дальнейших геометрических толкований семинарские доклады F. Klein, приведенные в разделе “Литература”.

Приравнивание  $p(d, \delta)$  к нулю Levi-Civita<sup>134)</sup> геометрически истолковал как “параллельное перенесение вектора” (ср. также Hessenberg<sup>133)</sup>). Это понятие, аксиоматически сформулированное Weyl, по существу ограничено квадратичными формами, но допускает обобщение другого рода. Оно сохраняется при расширении группы (умножении  $g_{ik}$  на произвольную функцию), как только, кроме квадратичной формы, в основу кладется еще и линейная форма. Тогда  $p(d, \delta)$  определен однозначно, можно проводить образования инвариантов, соответствующие указанным выше, и определять геодезические координаты; но  $p(d, d) = 0$  теперь уже не возникает из вариационной задачи!<sup>154</sup> Вопросы о теореме редукции и эквивалентности здесь еще не были рассмотрены в общем виде; только для инвариантов низшего порядка R. Weitzenböck дал теорему редукции.<sup>155</sup>

Наконец, следует указать на общие “инвариантные вариационные задачи”, т. е. на такие, в которых простой или кратный интеграл  $J$  инвариантен относительно некоторой группы в смысле Lie. Специальными физически интересными случаями занимаются работы Hamel<sup>156</sup>, Herglotz<sup>157</sup>, Lorentz<sup>158</sup>, Fokker<sup>159</sup>, Weyl<sup>160</sup> и Klein<sup>161</sup>. Принципиальная формулировка у E. Noether<sup>162</sup> показывает, что инвариантности  $J$  относительно  $G_\rho$  (конечной группы с  $\rho$  существенными параметрами) соответствуют  $\rho$  линейно независимых дивергенций; инвариантности относительно бесконечной группы, содержащей  $\rho$  произвольных функций вплоть до  $\sigma$ -й производной, соответствуют  $\rho$  зависимостей между выражениями Лагранжа и их производными вплоть до порядка  $\sigma$ . В обоих случаях верно обратное. Так как выражения Лагранжа становятся относительными инвариантами группы, тем самым имеется и процесс, порождающий инварианты.

(Завершено в марте 1921.)

<sup>154</sup>H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384–411, и Raum, Zeit, Materie (3-е и 4-е изд.).

<sup>155</sup>Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 и 697.

<sup>156</sup>Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.

<sup>157</sup>Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, особенно § 9.

<sup>158</sup>Verslag der Amsterd. Akad., апрель, сентябрь 1916, октябрь 1916, май 1917.

<sup>159</sup>Там же, январь 1917.

<sup>160</sup>Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

<sup>161</sup>Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; там же 1918, p. 171–189.

<sup>162</sup>Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

## 22. Обработка К. Hentzelt: к теории полиномиальных идеалов и результатов

Math. Ann. 88 (1923), с. 53–79

В дальнейшем речь идет об *общей задаче теории исключения*: *определить общие нули всех полиномов идеала полиномов*; или, что то же самое, нули любого конечного числа полиномов, образующих базис идеала; при этом одновременно получится понятийное истолкование возникающих кратностей. Коэффициенты полиномов могут быть отнесены к произвольному полю; тогда нули принадлежат полученному из него алгебраически замкнутому полю. Кроме того, без ограничения общности идеал можно считать преобразованным (§ 3). Тогда существенный результат таков:

*Каждому идеалу  $\mathfrak{m}$  из полиномов можно сопоставить результатантную форму:*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1, \dots, x_n) \cdots R^{(i)}(x_i, \dots, x_n) \cdots R^{(n)}(x_n) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}},$$

*такую, что  $R_{\mathfrak{m}}$  обращается в нуль для всех нулей  $\mathfrak{m}$  и только для них. Если  $\mathfrak{n}$  есть делитель  $\mathfrak{m}$ , а результатантные формы  $R_{\mathfrak{n}}$  и  $R_{\mathfrak{m}}$  совпадают, то совпадают и идеалы  $\mathfrak{n}$  и  $\mathfrak{m}$ .*<sup>1</sup>

Вторая часть главной теоремы показывает, что результатантная форма дает нули с характеристической кратностью. Эта вторая часть аналогична тому факту, что два идеала алгебраического числового поля, один из которых является делителем другого, совпадают тогда и только тогда, когда совпадают их *нормы*; внутренняя причина обеих теорем также одна и та же.

А именно,  $\mathfrak{m}$  можно рассматривать как модуль линейных форм  $\mathfrak{M}_{i-1}$ , если каждый полином рассматривать как линейную форму от степенных произведений  $x_1, \dots, x_{i-1}$  и присоединить  $x_{i+1}, \dots, x_n$  к области коэффициентов. Тогда результатантный множитель  $R^{(i)}$  становится равным *норме* соответствующего основного модуля (§ 1)  $\mathfrak{G}_{i-1}$  относительно  $\mathfrak{M}_{i-1}$ ; отсюда сразу получается и *истолкование кратности* – *произведения степени и показателя множителя  $R^{(i)}$*  – *через число линейно независимых классов вычетов*<sup>2</sup>, факт, до сих пор известный только в специальном случае, когда результатант можно определить для неопределенных коэффициентов<sup>3</sup>.

Для вывода этих результатов в § 1 и § 2 даются теоремы о модулях из линейных форм, коэффициенты которых суть целые рациональные числа или полиномы от одной неизвестной. Связь с идеалами из полиномов, введенными в § 3, устанавливает теорема изоморфизма § 4. § 5 дает вышеупомянутую вторую часть главной теоремы, § 7 – теорему о нулях, которой в § 6 предшествует общая теория исключения. Там же, при введении новых неизвестных, доказывается разложение резольвенты на линейные формы от этих неизвестных; тем самым для данного здесь исключения получается безупречное доказательство одного утверждения Kronecker<sup>4</sup>.

### § 1. Модули из линейных форм.

Под целыми величинами  $a, b, c, \dots$  в первых двух параграфах понимаются целые рациональные числа или полиномы от одной неизвестной с коэффициентами из произвольного, абстрактно заданного поля

<sup>1</sup>Kurt Hentzelt с октября 1914 года числится пропавшим без вести под Dixmuiden и должен быть причислен к погибшим. Данная работа представляет собой совершенно свободную переработку наиболее существенной части его диссертации “Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten”, с которой он летом 1914 года получил степень доктора у E. Fischer в Erlangen. Эта диссертация, написанная целиком на основе его собственных идей, построена без пробелов; но лемма следует за леммой, все понятия описаны формулами с четырьмя и пятью индексами, текст почти полностью отсутствует, так что понимание встречает величайшие трудности. До запланированной переработки он сам уже не дошел. Я излагаю работу в чисто понятийной форме, благодаря чему достигается большое упрощение доказательств, основные мысли которых повсюду восходят к Hentzelt, и, как я надеюсь, становится явной красота работы. – Части диссертации, которые – при заданном базисе – относятся к вопросу построения возникающих функций конечным числом шагов, должны быть оставлены для отдельной публикации. (E. N.)

<sup>2</sup>Эти последние результаты проявляют свое настоящее значение, если привлечь разложение идеалов на первичные; кратность, соответствующая первичному идеалу, тогда определяется как число линейно независимых классов вычетов дополнения по этому идеалу; это будет рассмотрено в другом месте. (E. N.)

<sup>3</sup>Ср. Macaulay, *The algebraic theory of modular systems*, Cambridge Tracts 19 (Cambridge University Press, 1916), No. 67; также Lasker, *Zur Theorie der Moduln und Ideale*, Math. Ann. 60 (1905), с. 20–116; с. 98. Что в этом случае результатант и результатантная форма совпадают, показано в еще не опубликованных теоремах Hentzelt, упомянутых в примечании 1). (E. N.)

<sup>4</sup>Попытка доказательства у König, *Algebraische Größen* (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 – для кронекеровской теории исключения – как известно, не удалась. Что и для кратностей, введенных König в кронекеровскую теорию исключения, вторая часть главной теоремы Hentzelt не имеет силы, показывает Macaulay, loc. cit., с. 23; там далее показано, что кронекеровская теория исключения не соответствует разложению на первичные идеалы. (E. N.)

$P$ ; под линейными формами  $a(\xi), b(\xi), \dots$  понимаются такие формы от конечного числа неизвестных  $\xi_1, \dots, \xi_k$  с целыми величинами в качестве коэффициентов.

Модуль  $\mathfrak{A}$  из линейных форм определяется условиями: вместе с  $a(\xi)$  и  $b(\xi)$  модуль  $\mathfrak{A}$  содержит также разность  $a(\xi) - b(\xi)$ ; вместе с  $a(\xi)$  он содержит также  $c \cdot a(\xi)$ , где под  $c$  понимается произвольная целая величина.

Под рангом  $\mathfrak{A}$  мы, как обычно, понимаем максимальное число линейно независимых линейных форм из  $\mathfrak{A}$ ; под  $\lambda$ -м детерминантным делителем  $d_\lambda$  модуля  $\mathfrak{A}$  – наибольший общий делитель всех детерминантов порядка  $\lambda$  из  $\mathfrak{A}$  (то есть всех детерминантов порядка  $\lambda$ , которые можно образовать из матрицы коэффициентов любых  $\lambda$  линейных форм из  $\mathfrak{A}$ ). Если  $\rho$  есть ранг  $\mathfrak{A}$ , так что  $d_1, \dots, d_\rho$  являются ненулевыми детерминантными делителями, то элементарные делители модуля  $\mathfrak{A}$  определяются формулами  $e_1 = d_1, e_2 = d_2/d_1, \dots, e_\rho = d_\rho/d_{\rho-1}, e_{\rho+i} = 0$ . Как известно,  $\mathfrak{A}$  есть конечный модуль, имеющий модульный базис ровно из  $\rho$  линейных форм  $a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi)$ ; через них каждая линейная форма из  $\mathfrak{A}$  представляется линейно, с целыми величинами в качестве коэффициентов:  $\mathfrak{A} = (a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$ . Если  $A$  обозначает матрицу коэффициентов этих линейных форм, то детерминантные и элементарные делители  $\mathfrak{A}$  совпадают с соответствующими делителями  $A$ ; отсюда прежде всего следует, что каждый элементарный делитель  $e_i$  делит следующий  $e_{i+1}$ . Матричное равенство, даваемое теорией элементарных делителей,

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & & 0 \\ & e_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e_\rho \end{pmatrix}$$

далее показывает – если унимодулярным преобразованием  $\xi = Q(\eta)$  ввести новые неизвестные  $\eta_1, \dots, \eta_k$  – что имеет место равенство модулей:

$$\mathfrak{A} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \dots, e_\rho\eta_\rho). \quad (1)$$

Самое существенное для дальнейшего понятие – это понятие основного модуля<sup>5</sup>, согласно следующему

**Определение I.** Модуль  $\mathfrak{G}$  называется основным модулем, если он не имеет собственного делителя того же ранга<sup>6</sup>.

Итак,  $\mathfrak{G}$  является основным модулем тогда и только тогда, когда из

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0 \quad \text{всегда следует:} \quad g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}. \quad (2)$$

Связь между произвольным модулем и основным модулем задается следующей

**Теорема I.** Каждый модуль  $\mathfrak{A}$  делится на один и только один основной модуль  $\mathfrak{G}$  того же ранга;  $\mathfrak{G}$  определяется как наименьший делитель  $\mathfrak{A}$  того же ранга и представляется в виде

$$\mathfrak{G} = (\eta_1, \dots, \eta_\rho); \quad (3)$$

$\mathfrak{G}$  будет называться основным модулем модуля  $\mathfrak{A}$ .

Условие, что  $\mathfrak{G}$  должен быть наименьшим делителем того же ранга, выражается так:  $\mathfrak{G}$  содержит все и только те линейные формы  $g(\xi)$ , которые удовлетворяют соотношению

$$b \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b \neq 0. \quad (4)$$

Отсюда прежде всего следует, что  $\mathfrak{G}$  есть модуль, поскольку наряду с

$$b_1 g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 \neq 0; \quad b_2 g_2(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_2 \neq 0$$

<sup>5</sup>Ср. Steinitz, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), с. 297–345, No. 36. Впрочем, Hentzelt, по-видимому, во всяком случае независимо от Steinitz – с которым и в других местах имеются точки соприкосновения – пришел для своего более простого случая к этому понятию в форме формулы (4). (E. N.)

<sup>6</sup>Делитель понимается в модульном смысле:  $\mathfrak{A}$  делится на  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}$ , если каждый элемент из  $\mathfrak{A}$  содержится в  $\mathfrak{B}$ ;  $\mathfrak{B}$  называется собственным делителем, если он содержит элементы, отличные от элементов  $\mathfrak{A}$ .

выполняется также

$$b_1 b_2 (g_1(\xi) - g_2(\xi)) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad b_1 b_2 \neq 0,$$

и, конечно, также  $b_1 \cdot c g_1(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ . Но  $\mathfrak{G}$  является и основным модулем; действительно, из

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}; \quad c \neq 0$$

по (4) следует

$$bcg(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad bc \neq 0,$$

а значит, снова по (4), также  $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$ .

Кроме того, не существует основного модуля  $\mathfrak{G}_1$ , отличного от наименьшего делителя  $\mathfrak{G}$  того же ранга, который удовлетворял бы этим условиям. Ведь  $\mathfrak{G}_1$  должен был бы делиться на  $\mathfrak{G}$ , но как основной модуль он не имеет собственного делителя того же ранга, а потому совпадает с  $\mathfrak{G}$ . Наконец, модуль, представленный правой частью (3), является основным модулем, так как всякий собственный делитель должен был бы содержать еще одну неизвестную  $\eta$ , а значит имел бы больший ранг. Тем самым (3) дает однозначно определенный основной модуль модуля  $\mathfrak{A}$ , и *Теорема I доказана во всех частях*.

Еще одно существенное для дальнейшего понятие – дедекендово понятие частного двух модулей<sup>7</sup>, именно:

**Определение II.** Частное  $\mathfrak{c} = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$  двух модулей из линейных форм определяется как совокупность целых величин  $c$ , удовлетворяющих условию

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{c}$  представляет собой идеал из целых величин, следовательно главный идеал. Соответственно, частное  $\mathfrak{c} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$  модуля  $\mathfrak{A}$  из линейных форм на идеал  $\mathfrak{b}$  из целых величин определяется как совокупность линейных форм  $c(\xi)$ , удовлетворяющих условию

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

$\mathfrak{c}$  снова представляет собой модуль из линейных форм, а именно, как только  $\mathfrak{b}$  отличен от нулевого идеала, модуль того же ранга, что и  $\mathfrak{A}$ .

Здесь нужно лишь заметить, что из определения ясно: частное каждый раз обладает модульным свойством; системы целых величин с модульным свойством суть идеалы.

Понятие частного приводит к связи между основным модулем и высшим элементарным делителем:

**Теорема II.** Между основным модулем и высшим элементарным делителем модуля  $\mathfrak{A}$  существует взаимное соотношение

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\rho), \quad (5)$$

где  $(e_\rho)$  означает главный идеал, порожденный  $e_\rho$ .

Действительно, поскольку каждый элементарный делитель делит  $e_\rho$ , из (1) и (3) получаем

$$e_\rho \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{и следовательно} \quad (e_\rho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad (6)$$

значит,  $(e_\rho)$  делится на частное  $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$ . Но верно и обратное; ведь из

$$b\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{следует} \quad b\eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad \text{и потому} \quad b \equiv 0 \pmod{(e_\rho)},$$

чем доказана первая формула (5)<sup>8</sup>. Формула (6) далее показывает, что  $\mathfrak{G}$  делится на частное  $\mathfrak{A}/(e_\rho)$ ; это частное является делителем  $\mathfrak{A}$  того же ранга, значит, по определению основного модуля  $\mathfrak{A}$ , наоборот, делится на  $\mathfrak{G}$ . Тем самым доказана и вторая формула (5).

<sup>7</sup>У Dedekind речь идет о числовых модулях, для которых также определено умножение, так что дедекендово частное не совпадает с частным, определенным здесь. (E. N.)

<sup>8</sup>Если положить  $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\rho, \dots, \eta_{\rho-\lambda+1})$ , где каждый  $\mathfrak{A}_i$  имеет высший элементарный делитель  $e_{\rho-i}$ , то теми же рассуждениями получается:

$$(e_\rho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \dots, (e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \dots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\rho-1}/\mathfrak{A}_\rho.$$

Пусть  $d$  обозначает какой-нибудь не тождественно нулевой детерминант порядка  $\rho$  из  $\mathfrak{A}$ . Тогда  $d$  делится на  $\rho$ -й детерминантный делитель  $d_\rho$ , а следовательно и на  $e_\rho$ ; значит,  $d\mathfrak{G} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ , и по приведенному выше выводу получается  $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$ . Для дальнейшего, однако, существенно, что это последнее представление  $\mathfrak{G}$  как частного можно доказать и без возврата к элементарным делителям, а потому оно имеет более общую силу:

**Теорема III.** *Если под целыми величинами понимать полиномы от нескольких неизвестных<sup>9</sup>, то сохраняется представление частным*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \quad (7)$$

где под  $d$  понимается какой-нибудь не тождественно нулевой детерминант порядка  $\rho$  из  $\mathfrak{A}$ .

Прежде всего ясно, что понятия ранга, основного модуля и модульного частного – которое теперь уже не обязательно является главным идеалом – сохраняются при этом расширении; сохраняется и Теорема I, за исключением базисного представления.

Пусть теперь

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1k}\xi_k, \dots, a_\rho(\xi) = a_{\rho 1}\xi_1 + \dots + a_{\rho k}\xi_k$$

суть  $\rho$  линейно независимых линейных форм из  $\mathfrak{A}$ , которые вообще не будут образовывать модульный базис; обозначим неизвестные  $\xi$  так, что

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \quad i, j = 1, 2, \dots, \rho.$$

Отсюда следует, что  $\rho$  линейных форм специального вида принадлежат  $\mathfrak{A}$ :

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda, \rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{\lambda, k}\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (8)$$

Но  $\mathfrak{A}$  не может содержать линейную форму  $c_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + c_k\xi_k$ , зависящую только от  $\xi_{\rho+1}, \dots, \xi_k$ , поскольку иначе по меньшей мере один детерминант порядка  $\rho + 1$ , а именно  $d \cdot c_\alpha$ , был бы отличен от нуля.

Теперь частное  $\mathfrak{A}/(d)$ , как делитель  $\mathfrak{A}$  того же ранга, делится на  $\mathfrak{G}$ ; но верно и обратное. Действительно, для каждого  $g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{G}}$  по определению имеем

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad c \neq 0 \quad \text{и следовательно} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

По (8), однако,

$$d \cdot g(\xi) = g_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + g_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}},$$

следовательно,

$$cg_{\rho+1}\xi_{\rho+1} + \dots + cg_k\xi_k \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}.$$

Из только что замеченного следует  $c \cdot g_{\rho+1} = 0, \dots, c \cdot g_k = 0$ , а потому, ввиду  $c \neq 0$ , также  $g_{\rho+1} = 0, \dots, g_k = 0$ ; значит,  $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ , чем доказана (7).

Заметим, что  $d \cdot g(\xi) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$  следует и непосредственно из того, что оба модуля  $(a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$  и  $(g(\xi), a_1(\xi), \dots, a_\rho(\xi))$  имеют тот же ранг  $\rho$ ; значит, если положить  $g(\xi) =$

<sup>9</sup>Более общо, пусть положено  $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1}\eta_1 + \dots + b_{\lambda \lambda}\eta_\lambda$ , пусть  $(b_{\lambda \lambda}, e_\lambda) = 1$ , и пусть

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \dots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\rho, \dots, \zeta_{\rho-\lambda+1}).$$

Тогда и  $\mathfrak{B}_\lambda$  имеет высший элементарный делитель  $e_{\rho-\lambda}$ , и поэтому

$$(e_{\rho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda / \mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

<sup>9</sup>На самом деле используется лишь то, что целые величины воспроизводятся сложением, вычитанием и умножением при сохранении обычных правил вычисления, то есть образуют кольцо; и далее то, что в этом кольце произведение обращается в нуль только тогда, когда обращается в нуль один из множителей, так что кольцо можно расширить до поля образованием частных (присоединением пар элементов). Напротив, базисное представление модуля не используется; следовательно, (7) справедлива, например, и для области всех целых алгебраических чисел в качестве коэффициентов. (E. N.)

$c_1\xi_1 + \dots + c_k\xi_k$ , то детерминант порядка  $\rho + 1$

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\rho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\rho(\xi) & a_{\rho 1} & \cdots & a_{\rho\rho} \\ g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\rho \end{vmatrix}$$

обращается в нуль. Но приведенное выше доказательство снова встретится в § 4 после формулы (30).

## § 2. Теоремы о разложении норм и модулей.

Теперь снова речь идет о модулях линейных форм относительно целых рациональных чисел или полиномов от одной неизвестной с коэффициентами из  $P$ .

**Определение III.** Если, как обычно, все линейные формы от  $\xi$ , конгруэнтные между собой по модулю  $\mathfrak{A}$ , объединить в один класс вычетов, то символ  $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$  будет обозначать систему классов вычетов модуля  $\mathfrak{G}$  по модулю  $\mathfrak{A}$ , то есть систему всех тех классов вычетов по  $\mathfrak{A}$ , которые состоят из элементов  $\mathfrak{G}$ . Норма  $\mathfrak{G}$  относительно  $\mathfrak{A}$  – в обозначении  $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$  – определяется как детерминант переходного преобразования от  $\mathfrak{G}$  к  $\mathfrak{A}$ , то есть как детерминант преобразования, выражающего какой-нибудь линейно независимый модульный базис  $\mathfrak{A}$  через такой же базис основного модуля  $\mathfrak{G}$  модуля  $\mathfrak{A}$ .

Из (1) и (3), соответственно из замечания к Теореме II, получаем:

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\rho = d_\rho; \quad \mathfrak{G} = \mathfrak{A} / (N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})). \quad (9)$$

Из (1), (3) и (9) обычным образом следует, что в случае целых рациональных чисел  $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$  представляет число классов вычетов  $\mathfrak{G}$  по  $\mathfrak{A}$ , тогда как в случае полиномов от одной неизвестной – где число классов вычетов вообще становится бесконечным – степень  $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$  равна числу линейно независимых относительно  $P$  классов вычетов. Если  $\mathfrak{B}$  является делителем  $\mathfrak{A}$  того же ранга, то вместе с представителем любого такого класса вычетов  $\mathfrak{B}$  содержит и все элементы этого класса; значит,  $\mathfrak{B}$  получается из  $\mathfrak{A}$  добавлением конечного числа классов вычетов, соответственно их линейных комбинаций. Отсюда сразу следует:

**Теорема IV.** Если  $\mathfrak{B}$  является делителем  $\mathfrak{A}$  того же ранга, так что основные модули совпадают, и если, кроме того,  $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ , то также  $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$ .

О связи между разложением норм и модулей справедливо следующее утверждение.

**Теорема V.** Пусть

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = r \cdot s, \quad (r, s) = 1; \quad (10)$$

тогда существует один и только один модуль  $\mathfrak{R}$ , а также один и только один модуль  $\mathfrak{S}$ , оба делители  $\mathfrak{A}$  того же ранга, такие, что

$$r = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}), \quad s = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S})$$

выполняется.  $\mathfrak{R}$  и  $\mathfrak{S}$  задаются как

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s); \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r),$$

и  $\mathfrak{A}$  равен наименьшему общему кратному  $\mathfrak{R}$  и  $\mathfrak{S}$ .<sup>10</sup> Если положить  $r_\rho = (r, e_\rho)$ ,  $s_\rho = (s, e_\rho)$ , то имеют место соотношения взаимности

$$(s_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{R}; \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A} / (s_\rho); \quad (r_\rho) = \mathfrak{A} / \mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A} / (r_\rho). \quad (11)$$

<sup>10</sup>Наименьшее общее кратное  $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$  здесь понимается в модульном смысле: как совокупность линейных форм, принадлежащих и  $\mathfrak{R}$ , и  $\mathfrak{S}$ . Соответственно, наибольший общий делитель  $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$  в модульном смысле понимается как совокупность линейных форм, которые можно представить в виде суммы элемента из  $\mathfrak{R}$  и элемента из  $\mathfrak{S}$ .



Действительно, если вообще положить  $r_i = (r, e_i)$ ,  $s_i = (s, e_i)$ , то из (9) и (10) получаем:

$$(r_i, s_i) = 1; \quad e_i = r_i s_i; \quad r = r_1 \cdots r_\rho; \quad s = s_1 \cdots s_\rho,$$

и каждый  $r_i$ , соответственно  $s_i$ , делит следующий  $r_{i+1}$ , соответственно  $s_{i+1}$ . Итак, если положить

$$\mathfrak{R} = (r_1 \eta_1, \dots, r_\rho \eta_\rho); \quad \mathfrak{S} = (s_1 \eta_1, \dots, s_\rho \eta_\rho),$$

то  $\mathfrak{R}$  и  $\mathfrak{S}$  являются делителями  $\mathfrak{A}$  того же ранга; вследствие взаимной простоты  $r_i$  и  $s_i$  модуль  $\mathfrak{A}$  равен наименьшему общему кратному  $\mathfrak{R}$  и  $\mathfrak{S}$ , и, кроме того,

$$N(\mathfrak{S} \mid \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\rho = r; \quad N(\mathfrak{S} \mid \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\rho = s.$$

Далее имеем

$$s_\rho \mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}; \quad r_\rho \mathfrak{S} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}};$$

из  $c\mathfrak{R} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$  следует  $c r_\rho \eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ , значит  $c \equiv 0 \pmod{(s_\rho)}$ , чем доказано  $(s_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}$  и, соответственно,  $(r_\rho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}$ . Из

$$b(\eta) = b_1 \eta_1 + \cdots + b_\rho \eta_\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}/(s_\rho)}$$

далее следует, поскольку все  $r_i$  взаимно просты с  $s_\rho$ , что  $b_i \equiv 0 \pmod{(r_i)}$ ; значит,  $\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\rho)$  и соответственно  $\mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\rho)$ . Тем самым доказаны соотношения взаимности (11), которые в специальном случае  $r = 1$  переходят в (5).

Остается доказать *единственность*  $\mathfrak{R}$  и  $\mathfrak{S}$ . Пусть  $\bar{\mathfrak{R}}$  и  $\bar{\mathfrak{S}}$  – модули, удовлетворяющие условиям Теоремы V, а  $\bar{r}_i$  и  $\bar{s}_i$  – их элементарные делители. Так как  $\bar{r}_i$  и  $\bar{s}_i$  являются делителями  $e_i$ , то из

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\rho, \quad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\rho, \quad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

следует также

$$e_i = \bar{r}_i \bar{s}_i, \quad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \quad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i.$$

Следовательно,  $\bar{\mathfrak{R}}$  и  $\bar{\mathfrak{S}}$  совпадают с  $\mathfrak{R}$  и  $\mathfrak{S}$  по элементарным делителям и основному модулю. Поэтому, если с помощью унимодулярного преобразования  $\eta = Q(\xi)$  ввести новые неизвестные  $\xi$ , то получаем

$$\bar{\mathfrak{R}} = (r_1 \xi_1, \dots, r_\rho \xi_\rho);$$

$$\mathfrak{A} = (r_1 s_1 (q_{11} \xi_1 + \cdots + q_{1\rho} \xi_\rho), \dots, r_\rho s_\rho (q_{\rho 1} \xi_1 + \cdots + q_{\rho\rho} \xi_\rho)).$$

Из  $\mathfrak{A} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$  отсюда получаем

$$r_i s_i (q_{i1} \xi_1 + \cdots + q_{i\rho} \xi_\rho) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}};$$

значит,  $r_i s_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$ . Поскольку  $(r, s) = 1$ , это дает  $r_i q_{ij} \equiv 0 \pmod{(r_i)}$ , то есть  $\bar{\mathfrak{R}} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{R}}$ . Но поскольку  $N(\mathfrak{S} \mid \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{S} \mid \bar{\mathfrak{R}})$ , Теорема IV дает  $\mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}}$  и соответственно  $\mathfrak{S} = \bar{\mathfrak{S}}$ . Тем самым Теорема V доказана во всех частях.

### § 3. Идеалы из полиномов.

Пусть  $\bar{\mathfrak{m}}$  есть идеал из полиномов от  $n$  неопределенных  $y_1, \dots, y_n$  с коэффициентами из произвольного, абстрактно заданного поля  $P$ ; то есть вместе с  $\Phi_1(y)$  и  $\Phi_2(y)$  идеал  $\bar{\mathfrak{m}}$  содержит также разность  $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$ , а вместе с  $\Phi(y)$  содержит также  $A(y) \cdot \Phi(y)$ , где под  $A(y)$  понимается произвольный полином с коэффициентами из  $P$ <sup>11</sup>.

<sup>11</sup>Само понятие приводит здесь к названию "идеал" вместо ранее общепринятых названий "модуль" или "модуль форм"; уже здесь это оказывается необходимым, чтобы отличать такие объекты от модулей из линейных форм. (Е. Н.)

Пусть  $y$  подвергнута преобразованию с неопределенными в качестве коэффициентов,

$$y = U(x); \quad \text{например} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \dots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \quad (12)$$

и пусть неопределенные  $u_{\mu\nu}$  присоединены к области коэффициентов полиномов, которая тем самым переходит в поле  $P(u)$ . При этом присоединении  $\bar{m}$  переходит в  $\bar{m}_{(u)}$ ; следовательно,  $\bar{m}_{(u)}$  содержит, кроме полиномов  $\Phi_\lambda(y)$  из  $\bar{m}$ , также все линейные комбинации  $\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)$  конечного числа  $\Phi_\lambda$ , где под  $\alpha_\lambda(u)$  понимаются рациональные функции от  $u_{\mu\nu}$  с коэффициентами из  $P$ . Умножением на подходящий полином от  $u$  функции  $\alpha_\lambda(u)$  без ограничения общности можно считать степенными произведениями от  $u$ . Итак, имеем:

$$\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\bar{m}_{(u)}}; \quad \Phi_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\bar{m}} \quad \text{и обратно.} \quad (13)$$

Посредством (12)  $\bar{m}_{(u)}$  переходит в идеал  $\mathfrak{m}$  из полиномов от  $x_1, \dots, x_n$  с коэффициентами из  $P(u)$ :

$$\bar{m}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{посредством} \quad y = U(x). \quad (14)$$

Совмещение соотношений (14) и (13) означает следующее:

$$\begin{aligned} \text{Из } F(x) &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \\ F(x) &= \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \\ &= \sum \alpha_\lambda(u)F_\lambda(x) \quad \text{следует } F_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{aligned} \quad (15)$$

а из (14) и (15) в обратном направлении снова получается (13).

**Определение IV.** Идеалы  $\mathfrak{m}$  из полиномов от  $x_1, \dots, x_n$  с коэффициентами из  $P(u)$ , удовлетворяющие соотношениям (15), то есть возникающие из  $\bar{m}_{(u)}$  посредством  $y = U(x)$ , будем называть преобразованными идеалами.

Преобразованные идеалы выделяются существованием регулярных полиномов; полином степени  $r$  называется регулярным относительно  $x_i$ , если он содержит член  $x_i^r$  с ненулевым коэффициентом. Видно, что полиномы  $F_i(x)$  регулярны относительно  $x_1$ . Далее существенно будет рассматривать эти преобразованные идеалы как модули из линейных форм по некоторым степенным произведениям от  $x$ . Для этого надо зафиксировать понятие основного идеала, которое позднее перейдет в основной модуль. Сначала введем обозначение, которого далее будем всюду придерживаться:

**Обозначение.** Под  $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \dots$  далее всюду понимаются полиномы от  $x$ , свободные от  $x_1, \dots, x_{i-1}$ .

**Определение V.** Для каждого идеала  $\mathfrak{m}$  определены  $n$  основных идеалов  $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$  следующим условием: основной идеал  $(i-1)$ -й степени  $\mathfrak{g}_{i-1}$  содержит все и только те полиномы  $G(x)$ , для которых существует полином  $b^{(i)}$  – вообще говоря, меняющийся вместе с  $G(x)$ , – такой, что

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \quad b^{(i)} \neq 0. \quad (16)$$

То, что  $\mathfrak{g}$  действительно являются идеалами, точно соответствует доказательству модульного свойства для  $\mathfrak{G}$  после формулы (4), где (16) служит аналогом. Идеал  $\mathfrak{g}_i$  делится на  $\mathfrak{g}_{i-1}$ , поскольку каждый полином  $b^{(i+1)}$  одновременно является полиномом  $b^{(i)}$ .

Для основных идеалов верно следующее:

**Теорема VI.** Основные идеалы преобразованных идеалов сами являются преобразованными идеалами<sup>12</sup>.

<sup>12</sup>Теорема VI используется только в § 7.

Доказательство опирается на известную теорему Дедекинда–Мертенса<sup>13</sup>: пусть  $a$  и  $b$  являются неопределенными и положено

$$\sum a_{i_1, \dots, i_s} z_1^{i_1} \cdots z_s^{i_s} \cdot \sum b_{j_1, \dots, j_s} z_1^{j_1} \cdots z_s^{j_s} = \sum c_{k_1, \dots, k_s} z_1^{k_1} \cdots z_s^{k_s},$$

$$\sum i \leq \nu, \quad \sum j \leq \mu, \quad \sum k \leq \nu + \mu;$$

далее пусть  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$  обозначают модули, соответственно выведенные из  $a, b, c$  при помощи целых рациональных чисел. Тогда существует показатель  $q$  такой, что имеет место тождество

$$\mathfrak{A}^q \mathfrak{B} = \mathfrak{A}^{q-1} \mathfrak{C}. \quad (17)$$

Здесь  $\mathfrak{A}^q$  состоит из степенных произведений  $q$ -й степени от  $a$  и их целочисленных линейных комбинаций.

Для доказательства Теоремы VI положим теперь:

$$\begin{cases} G(x) = \Gamma(y) = \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u) G_\lambda(x), \\ b^{(i)}(x) = \varphi(y) = \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y), \end{cases} \quad (18)$$

где  $\alpha_\lambda(u)$  и  $\beta_\mu(u)$  обозначают степенные произведения от  $u$ . Тогда по (16), (14) и (18) имеем:

$$\sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \cdot \sum \alpha_\lambda(u) \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}}; \quad \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \neq 0. \quad (19)$$

Слева стоит произведение двух полиномов от  $u$ , коэффициентами которых являются полиномы  $\varphi_\mu(y)$  и  $\Gamma_\lambda(y)$ ; коэффициенты полинома-произведения от  $u$  по правой части (19) являются полиномами из  $\overline{\mathfrak{m}}$ . Если, следовательно, в (17) заменить  $a, b, c$  этими полиномами от  $y$ , то получаем

$$\left\{ \sum \beta_\mu(u) \varphi_\mu(y) \right\}^q \cdot \Gamma_\lambda(y) \equiv 0 \pmod{\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}},$$

что по (18) равносильно:

$$b^{(i)}(x)^q \cdot G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}; \quad G_\lambda(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_{i-1}}. \quad (20)$$

Соотношения (16), (18) и (20) показывают, что *основные идеалы  $\mathfrak{g}_{i-1}$  действительно являются преобразованными идеалами.*

## 22. Обработка К. Hentzelt: к теории полиномиальных идеалов и результатов (продолжение)

Math. Ann. 88 (1923), с. 53–79

### § 4. Связь между идеалами из полиномов и модулями из линейных форм.

Чтобы идеал  $\mathfrak{m}$  из полиномов, который далее всегда предполагается преобразованным, рассматривать как модуль  $\mathfrak{M}_{i-1}$  ( $i = 1, \dots, n$ ) из линейных форм, отдельные полиномы  $F(x)$  надо рассматривать как линейные формы от степенных произведений  $\xi_\lambda$  переменных  $x_1 \dots x_{i-1}$ :

$$F(x) = \sum a_\lambda^{(i)} \xi_\lambda,$$

где, согласно обозначениям § 3, под  $a_\lambda^{(i)}$  понимаются полиномы от  $x_i \dots x_n$ . Из определения идеала сразу следует, что  $\mathfrak{M}_{i-1}$  обладает модульным свойством относительно этих целых величин

<sup>13</sup> Dedekind: *Über einen arithmetischen Satz von Gauß*, Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag 1892. F. Mertens: *Über einen algebraischen Satz*, Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien 101 (1892), с. 1560–1566. – Расширение Кронекером теоремы Гаусса на полиномы с неопределенными коэффициентами является непосредственным следствием этой теоремы.

$a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$ ; а так как бесконечно многие степенные произведения  $\xi$  от  $x_1 \dots x_{i-1}$  входят только линейно, то в силу своей линейной независимости они играют для  $\mathfrak{M}_{i-1}$  роль неопределенных. Каждый модуль  $\mathfrak{M}_{i-1}$  содержит бесконечно много неопределенных  $\xi$ , но в каждой отдельной линейной форме встречается лишь конечное число неопределенных. Точно так же каждый основной идеал  $\mathfrak{g}_{i-1}$  следует рассматривать как модуль линейных форм  $\mathfrak{G}_{i-1}$ , где неопределенными снова служат степенные произведения от  $x_1 \dots x_{i-1}$ . При  $i = 1$  речь идет только об одной неопределенной  $\xi_0$ , соответствующей единице.

Теперь можно, и на этом основывается все дальнейшее, несмотря на эти бесконечно многие неопределенные  $\xi$ , ограничиться модулями линейных форм от конечного числа неопределенных, согласно следующей теореме.

**Теорема VII.** Система классов вычетов  $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$  изоморфна системе классов вычетов  $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ , где  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$  есть модуль от конечного числа неопределенных, а  $\mathfrak{G}_{i-1}^*$  означает его основной модуль. Модуль  $\mathfrak{M}_{i-1}$  после присоединения  $x_{i+1} \dots x_n$  к  $P(u)$  имеет лишь конечное число элементарных делителей, отличных от 1, а именно те элементарные делители  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ , которые отличны от 1.

При этом элементарные делители  $\mathfrak{M}_{i-1}$  надо определять так, как в примечании 8). Изоморфизм, входящий в Теорему VII, основывается на следующем определении.

**Определение V.** Две системы классов вычетов называются изоморфными, если их можно поставить во взаимно однозначное соответствие так, что разности двух классов соответствует разность соответствующих классов, а произведению класса на целую величину соответствует произведение соответствующего класса на ту же целую величину.

Доказательство Теоремы VII получается полной индукцией. Для  $i = 1$  Теорема VII очевидна:  $\mathfrak{M}_0$  есть модуль линейных форм от одной неопределенной  $\xi_0$ , соответствующей степенному произведению нулевой степени от  $x$ , то есть единице; целыми величинами являются все полиномы от  $x_1 \dots x_n$ . Основной идеал  $\mathfrak{g}_0$  равен единичному идеалу, состоящему из всех полиномов от  $x_1 \dots x_n$ , следовательно  $\mathfrak{G}_0$  равен модулю  $(\xi_0)$ , основному модулю  $\mathfrak{M}_0$ , так что здесь  $\mathfrak{G}_0^* \mid \mathfrak{M}_0^*$  совпадает с  $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ . Наконец, поскольку  $\mathfrak{M}_0$  имеет ранг 1, он может иметь не более одного элементарного делителя, отличного от 1.

Сначала перейдем от  $i = 1$  к  $i = 2$ , чтобы с помощью полученного здесь понимания строения  $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$  провести общий индукционный шаг. Для этого прежде всего покажем, что для  $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$  можно взять систему представителей, ограниченную по  $x_1$ ; вследствие делимости  $\mathfrak{g}_1$  на  $\mathfrak{g}_0$  это затем приведет к конечному числу неопределенных модуля  $\mathfrak{G}_1^*$ .

По § 3 преобразованный идеал  $\mathfrak{m}$  имеет по крайней мере один полином  $C^{(1)}(x)$ , регулярный по  $x_1$ , скажем степени  $k$ ; значит,  $\mathfrak{M}_0$  содержит линейную форму  $C^{(1)}\xi_0$ . Благодаря регулярности  $C^{(1)}(x)$  каждый полином  $H(x)$  допускает представление

$$H(x) = b_0^{(2)} + b_1^{(2)}x_1 + \dots + b_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \quad (21)$$

поэтому, ввиду принадлежности  $C^{(1)}\xi_0$  к  $\mathfrak{M}_0$ , для  $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$  действительно можно выбрать систему представителей, которая не достигает  $k$ -й степени по  $x_1$ .

Если теперь, в частности, для полиномов  $G(x)$  из  $\mathfrak{g}_1$  и  $F(x)$  из  $\mathfrak{m}$  положить:

$$\begin{cases} G(x) = g_0^{(2)} + g_1^{(2)}x_1 + \dots + g_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \\ F(x) = a_0^{(2)} + a_1^{(2)}x_1 + \dots + a_{k-1}^{(2)}x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \end{cases} \quad (22)$$

а через  $\mathfrak{G}_1^*$  обозначить систему всех линейных форм  $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \dots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$ , и соответственно через  $\mathfrak{M}_1^*$  систему линейных форм  $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \dots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$ , то из свойства идеала для  $\mathfrak{g}_1$  и  $\mathfrak{m}$  следует, что  $\mathfrak{G}_1^*$  и  $\mathfrak{M}_1^*$  являются модулями из линейных форм от  $\xi_0 \dots \xi_{k-1}$  относительно целых величин  $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$ . Точно так же главный идеал, выведенный из  $C^{(1)}(x)$ , дает модуль относительно этих целых величин:

$$\mathfrak{G}_1 = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots),$$

где положено  $\xi_r = x_1^r C^{(1)}(x)$ . Элементы  $\xi_r$  линейно независимы относительно этих целых величин  $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$  как между собой, так и от конечного числа  $\xi$ . Из делимости  $\mathfrak{G}_1$  на  $\mathfrak{M}_1$  и, следовательно, на  $\mathfrak{G}_1$  следует, что также  $\mathfrak{G}_1^*$  делится на  $\mathfrak{G}_1$ , соответственно  $\mathfrak{M}_1^*$  делится на  $\mathfrak{M}_1$ . С учетом (22) получаем:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}_1^*, \mathfrak{G}_1), \quad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}_1^*, \mathfrak{G}_1). \quad (23)$$

Из (23) и линейной независимости  $\xi$  и  $\xi$  Теорема VII для  $i = 2$  следует так. Благодаря делимости  $\mathfrak{G}_1$  на  $\mathfrak{M}_1$  прежде всего имеем  $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1$ . Чтобы доказать изоморфизм с  $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$ , пусть некоторые линейные формы  $g^*(\xi)$  из  $\mathfrak{G}_1^*$  задают систему представителей  $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$ . Из линейной независимости  $\xi$  и  $\xi$  из  $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$  следует также  $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$ ; значит, формы  $g^*(\xi)$  остаются неконгруэнтными и по модулю  $\mathfrak{M}_1$ , образуют систему представителей  $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ , а соответствие от  $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$  к  $\mathfrak{G}_1^* \mid \mathfrak{M}_1^*$ , задаваемое этой системой представителей, изоморфно в смысле Определения V.

Совершенно так же получаем: из  $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ ,  $b^{(2)} \neq 0$ , следует  $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1^*)$ ,  $b^{(2)} \neq 0$ . Так как это выполнено для всех  $g(\xi)$  из  $\mathfrak{G}_1^*$  и только для них – ведь по (23)  $\mathfrak{G}_1^*$  состоит из всех полиномов основного идеала  $\mathfrak{g}_1$ , которые одновременно являются линейными формами от  $\xi$  – то  $\mathfrak{G}_1^*$  тем самым характеризуется как основной модуль  $\mathfrak{M}_1^*$ .

Наконец, присоединяя  $x_3 \dots x_n$  к  $P(u)$ , получаем:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1, \dots, \eta_\rho), & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \dots, e_\rho\eta_\rho), \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho, \dots, \eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \dots, e_1\eta_1, \xi_0, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \quad (24)$$

и значит:

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho), \quad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{и т. д.}$$

Тем самым, учитывая примечание 8),  $e_\rho, e_{\rho-1}, \dots, e_1, 1, \dots, 1, \dots$  распознаются как элементарные делители  $\mathfrak{M}_1$ . Итак, для  $i = 2$  Теорема VII доказана во всех частях.

Заметим, что (22) и (23) используют только регулярность  $C^{(1)}(x)$  по  $x_1$ . Поэтому эти формулы и связанные с ними рассуждения, ведущие к Теореме VII, сохраняются, если вместо (12) взять в основу специальное преобразование

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \dots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \quad (25)$$

которое при составлении с

$$\begin{cases} z = U_1(x) \quad \text{или} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \dots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \quad (26)$$

снова дает (12). Если  $\tilde{\mathfrak{m}}_{(u)}$  посредством (25) переходит в  $\tilde{\mathfrak{m}}$ , а  $\tilde{\mathfrak{g}}_1, \tilde{\mathfrak{G}}_1, \dots$  имеют для  $\tilde{\mathfrak{m}}$  такое же значение, как  $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1, \dots$  для  $\mathfrak{m}$ , то имеем:

$$\tilde{\mathfrak{G}}_1 = (\tilde{\mathfrak{G}}_1^*, \tilde{\mathfrak{G}}_1), \quad \tilde{\mathfrak{M}}_1 = (\tilde{\mathfrak{M}}_1^*, \tilde{\mathfrak{G}}_1). \quad (27)$$

При этом (27) возникает из (23) просто посредством обращения (26). Это очевидно для  $\mathfrak{m}$  и  $C^{(1)}(x)$ , значит также для  $\mathfrak{G}_1$  и  $\mathfrak{M}_1$ . Но это верно и для  $\mathfrak{g}_1$ , ибо

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \quad \tilde{b}^{(2)}(z)\tilde{G}(x, z) \equiv 0(\tilde{\mathfrak{m}}), \quad \tilde{b}^{(2)} \neq 0$$

взаимно обуславливают друг друга через  $z = U_1(x)$ . Поэтому  $\tilde{\mathfrak{g}}_1 = \mathfrak{g}_1$  посредством (26); следовательно, также  $\tilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$ , и по определению  $\mathfrak{G}_1^*$  и  $\mathfrak{M}_1^*$  через (22) то же самое верно для  $\tilde{\mathfrak{G}}_1^*$  и  $\tilde{\mathfrak{M}}_1^*$ , а значит для всего представления (27).

Для общего индукционного шага пусть выполнены предположения:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1}), \\ \mathfrak{G}_{i-1} = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_r, \dots), \end{cases} \quad (28)$$

где  $\mathfrak{G}_{i-1}^*$  и  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$  означают модули – относительно целых величин  $b^{(i)}, c^{(i)}, \dots$  – из линейных форм от конечного числа неопределенных  $\xi$ , некоторых степенных произведений от  $x_1, \dots, x_{i-1}$ ; и где  $\xi$  линейно независимы как между собой, так и от  $\xi$  относительно этих целых величин. Представление, соответствующее (28), и линейная независимость  $\xi$  и  $\xi$  должны выполняться также тогда, когда вместо (12) в основу берется специальное преобразование

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1; \quad \dots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \dots + x_{i-1}; \\ y_i &= u_{i,1}x_1 + \dots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \dots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \dots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n \end{aligned} \quad (29)$$

которое составляется в (12) посредством

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{или} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \dots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n,$$

и притом это специальное представление должно возникать из (28) просто посредством обращения  $z = U_{i-1}(x)$ .

Из предположений (28) и линейной независимости  $\xi$  и  $\xi$  изоморфизм  $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$  с  $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$  следует через соответствие той же системе представителей, точно теми же рассуждениями, которые выше опирались на (23). Точно так же получается, что  $\mathfrak{G}_{i-1}^*$  становится основным модулем  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$  и что  $\mathfrak{M}_{i-1}$  имеет лишь конечное число элементарных делителей, отличных от 1, а именно те элементарные делители  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ , которые отличны от 1.

Для выполнения индукционного шага прежде всего опять надо показать, что для  $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ , а значит и для  $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ , можно взять систему представителей, ограниченную по  $x_i$ . Это следует из представления частного, доказанного в (7), Теорема III:

$$\mathfrak{G}_{i-1}^* = \mathfrak{M}_{i-1}^* / (C^{(i)}), \quad (30)$$

где под  $C^{(i)}$  понимается любой не тождественно нулевой определитель  $\rho$ -го порядка из  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ , а  $\rho$  означает ранг  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ . Из той части предположений, которая относится к специальному преобразованию (29), следует, что  $C^{(i)}$  всегда можно считать регулярным по  $x_i$ . Действительно, модуль  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ , соответствующий  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ , имеет тот же ранг; если  $\widetilde{C}^{(i)}$  означает любой не тождественно нулевой определитель  $\rho$ -го порядка из  $\widetilde{\mathfrak{M}}_{i-1}^*$ , который через  $z = U_{i-1}(x)$  переходит в регулярный  $C^{(i)}$ , то по предположению  $C^{(i)}$  становится определителем  $\rho$ -го порядка из  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ .

Из существования  $C^{(i)}$ , как в (8), при подходящей нумерации  $\xi$  следует принадлежность к  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$  таких  $\rho$  линейных форм специального вида:

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c_{\lambda,1}^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + c_{\lambda,s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (\lambda = 1 \dots \rho).$$

Теперь каждую линейную форму от  $\xi$  можно привести к виду:

$$\begin{aligned} H(\xi) &= a_1^{(i)}\xi_1 + \dots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho \\ &\quad + b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \quad (L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi)), \end{aligned} \quad (31)$$

где  $a_1^{(i)} \dots a_\rho^{(i)}$  ограничены по  $x_i$  и не достигают степени  $k$  полинома  $C^{(i)}$ . Это представление единственно: действительно, из

$$a_1^{(i)}\xi_1 + \dots + a_\rho^{(i)}\xi_\rho + b_1^{(i)}\xi_{\rho+1} + \dots + b_{s-\rho}^{(i)}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \dots, L_\rho(\xi))$$

сравнение коэффициентов при  $\xi_1 \dots \xi_\rho$  с учетом степеней по  $x_i$  дает тождественное исчезновение всех  $a^{(i)}$  и  $b^{(i)}$ .

Пусть теперь, в частности,

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}_{i-1}^*); \quad \text{следовательно} \quad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*) \quad \text{по (30)}.$$

Отсюда, как в доказательстве Теоремы III, получаем

$$C^{(i)}H(\xi) - \sum_{\tau=1}^{s-\rho} \{C^{(i)}b_\tau^{(i)} - \sum_{\lambda} a_\lambda^{(i)}c_{\lambda,\tau}^{(i)}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

и значит, поскольку, как в Теореме III, коэффициенты при  $\xi_{\rho+1} \dots \xi_s$  должны исчезать,

$$C^{(i)} b_{\tau}^{(i)} = \sum_{\lambda} a_{\lambda}^{(i)} c_{\lambda, \tau}^{(i)} \quad (\tau = 1 \dots s - \rho),$$

откуда следует, что и  $b_{\tau}^{(i)}$  ограничены и не достигают максимальной степени  $c_{\lambda, \tau}^{(i)}$ . Тем самым доказано существование системы представителей для  $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ , то есть для  $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ , ограниченной по  $x_i$  и не достигающей некоторой фиксированной степени  $r$ .

Обозначим теперь через  $\vartheta_1 \dots \vartheta_t$  конечное число степенных произведений

$$x_i^{\alpha} \xi_{\lambda} \quad (\alpha = 0, 1, \dots, k-1; \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \quad x_i^{\beta} \xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0, 1, \dots, r-1; \tau = 1, 2, \dots, s-\rho)$$

и расположим счетно бесконечное множество выражений

$$x_i^{\gamma} L_{\lambda} \quad (\gamma = 0, 1, \dots \text{ до бесконечности}; \lambda = 1, 2, \dots, \rho), \\ x_i^{\gamma} \xi_{\nu} \quad (\gamma, \nu = 0, 1, \dots \text{ до бесконечности}).$$

в простую бесконечную последовательность  $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{\mu}, \dots$ . Тогда  $\vartheta$  и  $\omega$  линейно независимы как каждые между собой, так и друг от друга, относительно целых величин  $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}, \dots$ . Действительно, из

$$\sum c_{\alpha}^{(i+1)} x_i^{\alpha} \xi_{\lambda} + \sum c_{\beta}^{(i+1)} x_i^{\beta} \xi_{\rho+\tau} + \sum d_{\gamma}^{(i+1)} x_i^{\gamma} L_{\lambda}(\xi) + \sum e_{\gamma\nu}^{(i+1)} x_i^{\gamma} \xi_{\nu} = 0,$$

где каждая сумма распространяется лишь на конечное число членов, в силу предполагаемой линейной независимости  $\xi$  и  $\xi$ , а также  $\xi$  между собой относительно целых величин  $b^{(i)}$ , следует исчезновение всех  $e_{\gamma\nu}^{(i+1)}$ . Из единственности представления (31) далее следует исчезновение  $c_{\alpha}^{(i+1)}$  и  $c_{\beta}^{(i+1)}$ , а отсюда, наконец, в силу линейной независимости  $L_{\lambda}(\xi)$  – исчезновение  $d_{\gamma}^{(i+1)}$ .

Если теперь модуль  $(\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi), \dots, L_{\rho}(\xi))$  рассматривать как модуль  $\mathfrak{G}_i$  относительно целых величин  $b^{(i+1)}$ , то  $\mathfrak{G}_i$  делится на  $\mathfrak{M}_i$  благодаря делимости  $\mathfrak{G}_{i-1}, L_1(\xi) \dots L_{\rho}(\xi)$  на  $\mathfrak{M}_{i-1}$ , и получается

$$\mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{\mu}, \dots).$$

Для каждого  $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$  из (28), (31) и только что доказанного имеем:

$$H(x) = b_1^{(i+1)} \vartheta_1 + \dots + b_t^{(i+1)} \vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i)$$

как модульное равенство относительно целых величин  $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$ . Но  $\mathfrak{g}_i$  делится на  $\mathfrak{g}_{i-1}$ , а  $\mathfrak{m}$  делится на  $\mathfrak{g}_i$ ; следовательно, если теперь, в частности, для каждого  $G(x)$  из  $\mathfrak{G}_i$  и каждого  $F(x)$  из  $\mathfrak{M}_i$  положить

$$G(x) = g_1^{(i+1)} \vartheta_1 + \dots + g_t^{(i+1)} \vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i), \quad F(x) = a_1^{(i+1)} \vartheta_1 + \dots + a_t^{(i+1)} \vartheta_t \quad (\mathfrak{G}_i),$$

и обозначить модуль, состоящий из всех  $g(\vartheta)$ , через  $\mathfrak{G}_i^*$ , а модуль, состоящий из всех  $a(\vartheta)$ , через  $\mathfrak{M}_i^*$ , то точно те же рассуждения, которые привели к (23), дают:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{G}_i), \quad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{G}_i), \quad \mathfrak{G}_i = (\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{\mu}, \dots). \quad (32)$$

При выводе (32) снова использовалась только регулярность  $C^{(i)}$  по  $x_i$ , поэтому все рассуждение сохраняется, если взять в основу специальное преобразование (29) для индекса на единицу больше. Тогда те же рассуждения, которые опираются на (27), показывают, что это специальное представление возникает из (32) просто посредством обращения  $z = U_i(x)$ .

Тем самым все предположения (28) и т. д. общего индукционного шага доказаны для индекса на единицу больше; а поскольку из этих предположений, как показано выше, непосредственно следует Теорема VII, Теорема VII доказана в общем виде. Одновременно показано, что произвол пары  $(\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{M}_{i-1}^*)$ , обусловленный произволом выбора  $C^{(i)}$ , снова устраняется изоморфизмом системы классов вычетов  $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ .

В частности, если поле  $P$ , положенное в § 3 в качестве области коэффициентов, имеет характеристику нуль – то есть если простое поле, содержащееся в  $P$  и выводимое из единицы, имеет тип рациональных чисел –, то неопределенные  $u_{\mu\nu}$  можно специализировать до величин  $\bar{u}_{\mu\nu}$  из  $P$  так, что для  $i = 1 \dots n$  соответственно каждое  $C^{(i)}$  остается регулярным по  $x_i$ . Приведенные рассуждения показывают, что Теорема VII сохраняется и при этой специализации.<sup>14</sup> Основной модуль и элементарные делители при этом, однако, не обязаны возникать из общего случая посредством специализации  $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$ .<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Hentzelt вместо произвольного  $P$  берет только поле всех комплексных чисел и рассматривает главным образом этот последний случай, тогда как неопределенные он кладет в основу только в собственно теории элиминации. Далее Hentzelt показывает, причем существенно теми же рассуждениями, что приведены здесь, что для образования результантной формы достаточно в каждом  $\mathfrak{M}_{i-1}$  доходить лишь до некоторой конечной степени по  $x$ , превышающей фиксированную границу. Но отсутствует данный в Теореме VII изоморфизм  $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$  с  $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ , который объясняет независимость от чисел степеней. (Е. Н.)

<sup>15</sup>Для  $\mathfrak{m} = (x^2, ux + y)$  имеем  $\mathfrak{g}_0 = (1)$ ,  $\mathfrak{g}_1 = (1)$ . Если выбрать  $C^{(1)} = x^2$ , то  $\mathfrak{G}_1^* = (1, x)$ ,  $\mathfrak{M}_1^* = (ux + y, xy)$ , причем  $\mathfrak{M}_1^*$  имеет элементарные делители  $y^2$  и 1, а  $C^{(2)} = y^2$  можно выбрать. При  $u = 0$  полиномы  $C^{(1)}$  и  $C^{(2)}$  остаются регулярными соответственно по  $x$  и  $y$ ; но  $\mathfrak{M}_1^* = (y, xy)$  имеет элементарные делители  $y, y$ . Значит,  $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$  также становится изоморфной системе классов вычетов конечного модуля, но не изоморфной  $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ . Если бы, напротив, было выбрано  $C^{(1)} = ux + y$  и специализация была проведена так, чтобы  $C^{(1)}$  оставался регулярным, то изоморфизм также сохранился бы. (Е. Н.)



## § 5. Результантная форма и форма элементарных делителей идеала из полиномов.

Пусть  $x_{i+1} \dots x_n$  присоединены к  $P(u)$ , так что  $\mathfrak{G}_{i-1}$  и  $\mathfrak{M}_{i-1}$ , а следовательно также  $\mathfrak{G}_{i-1}^*$  и  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ , переходят в модули линейных форм, где целые величины можно рассматривать как полиномы от *одной* неопределенной  $x_i$ . По Теореме VII в этом случае элементарные делители  $\mathfrak{M}_{i-1}$ , отличные от 1, и самое большее конечное число элементарных делителей 1 модуля  $\mathfrak{M}_{i-1}$  совпадают с соответствующими делителями  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ . Произведение этих элементарных делителей,  $\rho$ -й детерминантный делитель  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ , было равно детерминанту переходного преобразования от  $\mathfrak{G}_{i-1}^*$  к  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ , то есть по Определению III равно  $N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^*)$ . По (24), соответственно по аналогичной формуле для общего  $i$ , вытекающей из (28), видно, что произведение этих элементарных делителей также равно детерминанту переходного преобразования от  $\mathfrak{G}_{i-1}$  к  $\mathfrak{M}_{i-1}$ ; следовательно, его надо обозначать  $N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1})$ . Поэтому получается

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} | \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* | \mathfrak{M}_{i-1}^*) = R^{(i)}(x),$$

где полином  $R^{(i)}(x)$ , то есть наибольший общий делитель в полиномиальном смысле всех  $\rho$ -рядных детерминантов из  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ , можно считать целым и примитивным по  $x_{i+1} \dots x_n$  и потому, как делитель  $C^{(i)}$ , регулярным по  $x_i$ . Точно так же высший элементарный делитель  $E^{(i)}(x)$  модуля  $\mathfrak{M}_{i-1}$ , соответственно  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ , можно считать целым и примитивным по  $x_{i+1} \dots x_n$  и потому регулярным по  $x_i$ . Это приводит к следующему определению.

**Определение VI.** Полином  $R^{(i)}(x)$  называется *результантом  $i$ -го уровня идеала  $\mathfrak{m}$* , а  $E^{(i)}(x)$  – *элементарным делителем  $i$ -го уровня*. Следовательно, *результант  $i$ -го уровня есть норма основного идеала  $\mathfrak{g}_{i-1}$  относительно  $\mathfrak{m}$ , истолкованная как норма модуля  $\mathfrak{G}_{i-1}$  относительно  $\mathfrak{M}_{i-1}$ , причем  $x_{i+1} \dots x_n$  присоединены к  $P(u)$ ; точно так же  $E^{(i)}(x)$  при том же присоединении становится равным частному  $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$ . Результантной формой, соответственно формой элементарных делителей, идеала  $\mathfrak{m}$  называются произведения*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}R^{(2)} \dots R^{(n)}, \quad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}E^{(2)} \dots E^{(n)}.$$

Для результатной формы и формы элементарных делителей имеет место следующее утверждение.

**Теорема VIII.** *Результантная форма делится на форму элементарных делителей; обратно, некоторая степень  $E_{\mathfrak{m}}$  делится на  $R_{\mathfrak{m}}$ . Формы  $E_{\mathfrak{m}}$  и  $R_{\mathfrak{m}}$  делятся на  $\mathfrak{m}$ ; более общо,  $E^{(i)} \dots E^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$  и, следовательно,  $R^{(i)} \dots R^{(n)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m})$ .*

Действительно, поскольку норма делится на высший элементарный делитель и, обратно, некоторая степень этого высшего элементарного делителя делится на норму, эта делимость для  $R^{(i)}(x)$  и  $E^{(i)}(x)$  следует после присоединения  $x_{i+1} \dots x_n$ . Но  $R^{(i)}(x)$  и  $E^{(i)}(x)$  предполагаются примитивными полиномами относительно  $x_{i+1} \dots x_n$ , поэтому делимость имеет место относительно всех неопределенных  $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$ . Тем самым, по определению этих выражений относительно всех неопределенных  $x$ ,  $R_{\mathfrak{m}}$  делится на  $E_{\mathfrak{m}}$ , а некоторая степень  $E_{\mathfrak{m}}$  делится на  $R_{\mathfrak{m}}$ .

Далее, по Теоремам VII и II, после присоединения  $x_{i+1} \dots x_n$  высший элементарный делитель  $E^{(i)}(x)$  определяется как частное  $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$ . Следовательно, если снова перейти к полиномам от всех неопределенных  $x$ , для каждого

$$G(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \quad \text{существует} \quad b^{(i+1)} \neq 0, \quad \text{такое что} \quad b^{(i+1)} E^{(i)}(x) G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}). \quad (33)$$

В частности,  $\mathfrak{g}_0$  равен единичному идеалу, поэтому получается

$$b^{(2)} E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0, \quad \text{и следовательно} \quad E^{(1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

В общем случае по (33), примененной к

$$E^{(1)}(x) \dots E^{(i-1)}(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}),$$

существует  $b^{(i+1)} \neq 0$  такое, что  $b^{(i+1)} E^{(1)} \dots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{m})$ ; следовательно,  $E^{(1)} \dots E^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{g}_i)$ . Так как  $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$ , отсюда получается

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} \dots E^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{и следовательно} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} \dots R^{(n)} \equiv 0(\mathfrak{m}). \quad (34)$$

Пусть  $G(x)$  в (33) пробегает конечное число полиномов некоторого базиса идеала  $\mathfrak{g}_{i-1}$ , а  $c^{(i+1)}(x)$  обозначает произведение соответствующих им  $b^{(i+1)}(x)$ . Тогда получается

$$c^{(i+1)} E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad c^{(i+1)} \neq 0 \quad \text{и поэтому} \quad E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i),$$

и отсюда, как выше, конечным числом повторений:

$$E^{(n)}(x) \dots E^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

а следовательно также

$$R^{(n)}(x) \dots R^{(i)}(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}).$$

Тем самым Теорема VIII доказана во всех частях.

Теорема VIII существенно опирается на свойства формы элементарных делителей; но характеристическое значение результантной формы для  $\mathfrak{m}$  показывает следующая теорема.

**Теорема IX.** Если  $\mathfrak{n}$  является делителем  $\mathfrak{m}$  – делителем в идеальном смысле – и результантные формы  $R_{\mathfrak{n}}$  и  $R_{\mathfrak{m}}$  совпадают, то идеалы  $\mathfrak{n}$  и  $\mathfrak{m}$  совпадают.

Действительно, пусть  $\mathfrak{g}_0 \dots \mathfrak{g}_{n-1}$ ,  $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{m}$  и  $\mathfrak{h}_0 \dots \mathfrak{h}_{n-1}$ ,  $\mathfrak{h}_n = \mathfrak{n}$  обозначают основные идеалы  $\mathfrak{m}$  и  $\mathfrak{n}$ . Сначала  $\mathfrak{g}_0$  и  $\mathfrak{h}_0$  оба равны единичному идеалу, значит  $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{h}_0$ . Предположим теперь, что  $\mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{h}_{i-1}$ , так что  $\mathfrak{M}_{i-1}$  и  $\mathfrak{N}_{i-1}$  имеют один и тот же основной модуль  $\mathfrak{G}_{i-1}$ . Тогда предположение  $R_{\mathfrak{n}} = R_{\mathfrak{m}}$  после присоединения  $x_{i+1} \dots x_n$  можно записать в виде

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{N}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) \quad \text{или также} \quad N(\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{N}_{i-1}^*) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*),$$

где, соответственно (32), положено  $\mathfrak{N}_{i-1} = (\mathfrak{N}_{i-1}^*, \mathfrak{G}_{i-1})$ , так что  $\mathfrak{N}_{i-1}^*$  также становится модулем линейных форм от  $\xi$ , а  $\mathfrak{G}_{i-1}^*$  является его основным модулем. Из делимости  $\mathfrak{M}_{i-1}$  на  $\mathfrak{N}_{i-1}$ , которая влечет делимость  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$  на  $\mathfrak{N}_{i-1}^*$ , по Теореме IV следует, что при этом присоединении модули  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$  и  $\mathfrak{N}_{i-1}^*$ , а следовательно также  $\mathfrak{N}_{i-1}$  и  $\mathfrak{M}_{i-1}$ , совпадают. Но присоединение  $x_{i+1} \dots x_n$  означает, что к  $\mathfrak{M}_{i-1}$ , соответственно к  $\mathfrak{m}$ , добавляются все такие полиномы  $G(x)$ , для которых

$$b^{(i+1)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(i+1)} \neq 0.$$

То есть вследствие присоединения  $\mathfrak{M}_{i-1}$ , соответственно  $\mathfrak{m}$ , переходит в  $\mathfrak{g}_i$ , а соответственно  $\mathfrak{n}$  переходит в  $\mathfrak{h}_i$ ; следовательно,  $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{h}_i$  и потому  $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{h}_n$ , то есть  $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}$ .

Наконец, тот же принцип переноса, примененный к Теореме V, дает еще следующее.

**Теорема X.** Пусть  $R^{(i)} = S^{(i)}T^{(i)}$  есть разложение  $R^{(i)}$  на взаимно простые – в полиномиальном смысле – полиномы  $S^{(i)}$  и  $T^{(i)}$ . Тогда существует один и только один идеал  $\mathfrak{j}$ , а также один и только один идеал  $\mathfrak{t}$ , причем оба являются делителями  $\mathfrak{m}$  с тем же основным идеалом  $(i-1)$ -го уровня  $\mathfrak{g}_{i-1}$ , так что  $S^{(i)}$  равно  $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{S}_{i-1})$ , а  $T^{(i)}$  равно  $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{T}_{i-1})$ . Идеалы  $\mathfrak{j}$  и  $\mathfrak{t}$  определяются как совокупность полиномов  $S(x)$ , соответственно  $T(x)$ , таких что

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad s^{(i+1)} \neq 0,$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad t^{(i+1)} \neq 0,$$

и  $\mathfrak{g}_i$  равен наименьшему общему кратному  $\mathfrak{j}$  и  $\mathfrak{t}$ ,

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}, \mathfrak{t}].$$

Здесь надо лишь заметить, что  $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$  для  $\mathfrak{j}$  и  $\mathfrak{t}$  можно выбрать фиксированно, как произведение тех  $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$ , которые соответствуют базисным элементам  $\mathfrak{j}$ , соответственно  $\mathfrak{t}$ ; и что, как отмечено выше, при присоединении  $x_{i+1} \dots x_n$  идеал  $\mathfrak{m}$  преобразуется в  $\mathfrak{g}_i$ . В частности, разложение  $R^{(i)}$  можно продолжать вплоть до степеней неприводимых полиномов – первичных множителей; это влечет соответствующее представление  $\mathfrak{g}_i$  как наименьшего общего кратного.

## § 6. Собственно теория исключения.

По Теореме VIII, соответственно по формуле (34), результатная форма и форма элементарных делителей делятся на  $\mathfrak{m}$ , следовательно обращаются в нуль во всех нулях  $\mathfrak{m}$ ; при этом под “нулями  $\mathfrak{m}$ ” понимаются такие – принадлежащие алгебраически замкнутому полю, полученному из  $P(u; x_{i+1} \dots x_n)^{16}$  – системы значений  $x_1 \dots x_i$ , что для этих систем значений обращается в нуль каждый полином из  $\mathfrak{m}$ , причем  $x_{i+1} \dots x_n$  мыслятся присоединенными к области коэффициентов ( $i = 1, \dots, n$ ). Эти присоединенные  $x_{i+1} \dots x_n$ , как будет показано, можно также заменить величинами из  $P(u)$ . Содержание теории исключения, наоборот, состоит в выведении нулей  $\mathfrak{m}$  из нулей результатной формы. Это обращение опирается на последовательное исключение, которое будет развито в этом параграфе; когда в следующем параграфе будет доказана делимость возникающей при этом формы  $D^{(i)}(x)$  на  $E^{(i)}(x)$ , то из делимости некоторой степени  $E^{(i)}(x)$  на  $R^{(i)}(x)$  получится требуемое обращение.

Теория последовательного исключения, которую надо здесь дать, основана на следующем.

**Теорема XI.** Пусть  $\mathfrak{b}$  означает идеал из полиномов от одной неопределенной  $t$  с коэффициентами из  $P$ , то есть главный идеал; пусть  $h(t)$  есть полином из  $\mathfrak{b}$  степени  $k$ , а  $\mathfrak{B}$  – модуль линейных форм от  $1, t, \dots, t^{k-1}$ , в который  $\mathfrak{b}$  переходит по модулю  $h(t)$ . Тогда  $\mathfrak{B}$  имеет ранг  $k - p$ , если  $p$  означает степень базисного полинома  $f(t)$  идеала  $\mathfrak{b}$ .

По предположению  $h(t) = h_1(t)f(t)$ , где  $h_1(t)$  имеет степень  $k - p$ . Поэтому классы вычетов идеала  $\mathfrak{b}$  по модулю  $h(t)$ , представленные полиномами  $f(t), tf(t), \dots, t^{k-p-1}f(t)$ , линейно независимы; и каждый класс вычетов идеала  $\mathfrak{b}$  по модулю  $h(t)$  линейно, с коэффициентами из  $P$ , выражается через эти  $k - p$  специальных классов. Но  $\mathfrak{b}$  по модулю  $h(t)$  переходит в модуль линейных форм от  $1, t, \dots, t^{k-1}$ , ранг которого тем самым равен ровно  $k - p$ .

Пусть теперь  $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$  есть преобразованный идеал из полиномов,  $A^{(1)}(x)$  – полином из  $\mathfrak{a}_1$ , регулярный по  $x_1$ , степени  $k_1$ , а  $\mathfrak{A}_1$  – модуль линейных форм от  $1, x_1, \dots, x_1^{k_1-1}$ , с полиномами  $a^{(2)}(x)$  в качестве коэффициентов, в который  $\mathfrak{a}_1$  переходит по модулю  $A^{(1)}(x)$ . Далее пусть  $\mathfrak{a}_2$  означает идеал от  $x_2 \dots x_n$ , полученный из всех  $k_1$ -рядных детерминантов из  $\mathfrak{A}_1$ . По Теореме XI  $\mathfrak{a}_2$  тогда и только тогда равен нулевому идеалу, когда полиномы из  $\mathfrak{a}_1$  имеют общий делитель – делитель в полиномиальном смысле – степени  $p_1 > 0$  по  $x_1$ . Если  $\mathfrak{a}_2$  отличен от нулевого идеала, то, поскольку  $\mathfrak{a}$  предполагался преобразованным идеалом, он содержит полином  $A^{(2)}(x)$  степени  $k_2$ , регулярный по  $x_2$ , как это видно непосредственно из составления преобразования (12) из специальных преобразований (25) и (26). Пусть снова  $\mathfrak{A}_2$  означает модуль линейных форм от  $1, x_2, \dots, x_2^{k_2-1}$ , в который  $\mathfrak{a}_2$  переходит по модулю  $A^{(2)}(x)$ , а  $\mathfrak{a}_3$  – идеал от  $x_3 \dots x_n$ , полученный из всех  $k_2$ -рядных детерминантов из  $\mathfrak{A}_2$ , который должен содержать полином  $A^{(3)}(x)$ , регулярный по  $x_3$ .

Таким образом продолжают процедуру, пока не придут к нулевому идеалу или пока  $\mathfrak{a}_{n+1}$  не станет единичным идеалом; поскольку  $\mathfrak{a}_{n+1}$  свободен от  $x$ , он может быть только нулевым или единичным идеалом. Оказывается, что идеалы  $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$  однозначно определены идеалом  $\mathfrak{a}$  и не зависят от положенных в основу полиномов  $A^{(\lambda)}(x)$ . Это ясно для  $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$ , значит можно предполагать это для  $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$ . Если теперь  $\mathfrak{a}_i$  по модулю  $A^{(i)}(x)$  переходит в модуль линейных форм  $\mathfrak{A}_i$ , то  $\mathfrak{A}_i$  можно также охарактеризовать как совокупность полиномов из  $\mathfrak{a}_i$ , которые по  $x_i$  не достигают степени  $k_i$ ; следовательно  $\mathfrak{A}_i$  зависит только от степени  $k_i$  полинома  $A^{(i)}(x)$ . Пусть теперь  $\bar{A}^{(i)}(x)$  есть полином из  $\mathfrak{a}_i$ , регулярный по  $x_i$ , степени  $\bar{k}_i > k_i$ ,  $\bar{\mathfrak{A}}_i$  – соответствующий модуль линейных форм, а  $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1}$  – идеал, полученный из  $k_i$ -рядных детерминантов из  $\bar{\mathfrak{A}}_i$ . Тогда имеет место модульное равенство

$$\bar{\mathfrak{A}}_i = (\mathfrak{A}_i, A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots, x_i^{\bar{k}_i - k_i - 1} A^{(i)}).$$

Так как из-за регулярности  $A^{(i)}(x)$  по  $x_i$  полиномы  $A^{(i)}, x_i A^{(i)}, \dots$  можно ввести как новые неопределенные линейных форм, отсюда следует совпадение  $k_i$ -рядных детерминантов из  $\mathfrak{A}_i$  с  $\bar{k}_i$ -рядными из  $\bar{\mathfrak{A}}_i$ ; следовательно  $\bar{\mathfrak{a}}_{i+1} = \mathfrak{a}_{i+1}$ .<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Что каждое поле, и притом по существу единственным образом, можно расширить до алгебраически замкнутого, показал Steinitz в своей *Algebraische Theorie der Körper* (J. f. M. 137 (1910), с. 167–309) и тем самым дал рациональный эквивалент основной теоремы алгебры. Фактически для каждого  $i = 1, \dots, n$  речь идет о конечном расширении поля  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ . (Е. Н.)

<sup>17</sup>В принципе это тот же самый вывод, на котором покоился изоморфизм  $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^* \mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ .

Кроме того,  $\mathfrak{a}_{i+1}$  всегда делится на  $\mathfrak{a}_i$ . Это ясно, когда  $\mathfrak{a}_{i+1}$  есть нулевой идеал; в противоположном случае  $\mathfrak{A}_i$  имеет ранг  $k_i$ , следовательно  $\mathfrak{a}_{i+1}$  есть по определению идеал, состоящий из  $k_i$ -рядных детерминантов из  $\mathfrak{A}_i$  и делящийся на  $\mathfrak{A}_i$ , а потому и на  $\mathfrak{a}_i$ . Тем самым каждый  $\mathfrak{a}_{i+1}$  делится на  $\mathfrak{a}$ ; значит, если  $\mathfrak{a}_{n+1}$  становится единичным идеалом, то и  $\mathfrak{a}$  есть единичный идеал.

Пусть теперь  $\mathfrak{a}$  отличен от единичного идеала;  $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$ ;  $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ . Пусть  $D^{(i)}(x)$  есть наибольший общий делитель – делитель понимается в полиномиальном смысле – всех полиномов из  $\mathfrak{a}_i$ , существующий по Теореме XI; как делитель  $A^{(i)}(x)$  сам  $D^{(i)}(x)$  регулярен по  $x_i$  и имеет степень  $p_i > 0$ . Присоединим  $x_{i+1} \dots x_n$  к  $P(u)$ ; тогда  $D^{(i)}(x)$  в алгебраическом расширении поля  $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$  допускает разложение на  $p_i$  линейных множителей. Пусть  $x_i - \bar{x}_i$  есть один такой линейный множитель, так что при  $x_i = \bar{x}_i$  все полиномы из  $\mathfrak{a}_i$  обращаются в нуль, и следовательно по Теореме XI полиномы из  $\mathfrak{a}_{i-1}$  при этой специализации получают наибольший общий делитель  $D^{(i-1)}(x)$ . Как делитель  $A^{(i-1)}(x)$  сам  $D^{(i-1)}(x)$  снова регулярен по  $x_{i-1}$  и имеет степень  $p_{i-1} > 0$ ; в частности он не может обращаться в нуль тождественно и в расширении поля  $P(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$  допускает разложение на  $p_{i-1}$  линейных множителей. Если  $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$  есть такой линейный множитель, то ему соответствует наибольший общий делитель из  $\mathfrak{a}_{i-2}$ . Продолжая так, приходят к конечному числу общих нулей  $\mathfrak{a}$ , лежащих в алгебраическом расширении поля  $P(u; x_{i+1} \dots x_n)$ . Обратно, из-за делимости  $\mathfrak{a}_i$  на  $\mathfrak{a}$  каждый нуль  $\mathfrak{a}$  является также нулем  $\mathfrak{a}_i$ . Если, в частности,  $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$  есть нуль  $\mathfrak{a}$ , то отсюда следует  $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ ; и полиномы из  $\mathfrak{a}_i$  получают наибольший общий делитель с линейным множителем  $x_i - \bar{x}_i$ . В итоге получается:

**Теорема XII.** Пусть  $\mathfrak{a}$  отличен от единичного идеала,  $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \dots, \mathfrak{a}_i \neq 0$ ;  $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$ ; тогда при присоединении  $x_{i+1} \dots x_n$  к  $P(u)$  существует конечное число связанных систем значений  $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i$ , лежащих в алгебраическом расширении поля  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ , таких, что все полиномы из  $\mathfrak{a}$  обращаются в нуль при  $x_1 = \bar{x}_1, \dots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \dots, x_n = x_n$ . Обратно, если имеется такой нуль  $\mathfrak{a}$ , то отсюда следует  $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$  и появление общего делителя  $D^{(i)}(x)$  всех полиномов из  $\mathfrak{a}_i$ , имеющего линейный множитель  $x_i - \bar{x}_i$ .

Теорема XII показывает, в частности, что каждый идеал  $\mathfrak{a}$ , не имеющий нуля, становится единичным идеалом.

Чтобы провести разложение, которое также явно показывает связанность систем значений, вводят новые неопределенные  $v$ , которые можно присоединить к  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ . Положим:

$$z_i = -v_1 x_1 - \dots - v_{i-1} x_{i-1} + x_i, \quad (35)$$

так что составление (12) с (35) снова дает подстановку типа (12), где теперь только  $u_{ik}$  заменены на  $w_{ik} = u_{ik} - v_k$ , а в общем случае  $u_{i+h,k}$  – на  $w_{i+h,k} = u_{i+h,k} - u_{i+h,i} v_k$ . Следовательно, если подстановка (35) переводит по предположению преобразованный идеал  $\mathfrak{a}$  в  $\mathfrak{b}$ , то  $\mathfrak{b}$  просто получается из  $\mathfrak{a}$  заменой  $u_{\mu\nu}$  на  $w_{\mu\nu}$  и присоединением  $v$ ; и тем же процессом идеалы  $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \dots$ , определенные посредством  $\mathfrak{b}$ , получаются из  $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots$ . Обратно,  $\mathfrak{a}_i$  получается из  $\mathfrak{b}_i$  посредством  $v = 0$ ; следовательно идеалы  $\mathfrak{a}_i$  и  $\mathfrak{b}_i$  одновременно являются нулевыми идеалами или одновременно отличны от нулевого идеала.

Пусть теперь снова  $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$ ; следовательно также  $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \dots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$ ; пусть  $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$  есть связанная система нулей  $\mathfrak{a}$ . Если определить  $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}$ , то  $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$  посредством (35) становится нулем  $\mathfrak{b}$ . Итак, если  $H^{(i)}(z, x)$  означает наибольший общий делитель всех полиномов из  $\mathfrak{b}_i$ , который можно предполагать целым и примитивным по  $v$ , то по последней части Теоремы XII  $H^{(i)}(z, x)$  имеет множитель

$$z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1}),$$

и каждому нулю  $\mathfrak{a}$ , возникающему при присоединении  $x_{i+1} \dots x_n$ , соответствует такой множитель. Надо показать, что этим разложение  $H^{(i)}(z, x)$  исчерпано, то есть что из  $H^{(i)}$  нельзя отделить никакого множителя  $H_1^{(i)}$ , который не разлагается на линейные множители по  $z$  и  $v$ . Пусть это возможно. Тогда из-за предполагаемой примитивности по  $v$  полином  $H^{(i)}$  содержит по меньшей мере один линейный множитель  $z_i - \bar{z}_i$ , где  $\bar{z}_i$  принадлежит алгебраическому расширению поля  $P(u, v, x_{i+1}, \dots, x_n)$ . Если  $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \dots x_n$  есть соответствующий нуль  $\mathfrak{b}$ , то он должен

совпасть с одним из конечного числа нулей  $\mathfrak{a}$ , возникающих при присоединении  $x_{i+1} \dots x_n$ , а значит быть независимым от  $v$ . Тем самым  $\bar{z}_i$  необходимо содержит  $v$  линейно, а не алгебраически или рационально-нелинейно; вопреки предположению, из  $H_1^{(i)}$  можно отделить еще один линейный множитель  $z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})$  по  $z$  и  $v$ . Следовательно, получается явное разложение:

$$H^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}.$$

Так как степень  $H^{(i)}$  и отдельные показатели  $\alpha_\lambda$  должны совпадать с соответствующими для  $D^{(i)}(x)$  – ведь  $H^{(i)}$  возникает из  $D^{(i)}$  при специализации  $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$ , а  $D^{(i)}$  из  $H^{(i)}$  при специализации  $v = 0$  –, то это разложение еще показывает, что вследствие присоединения неопределенных  $u_{\mu\nu}$  к  $R$  и при исключении, исходящем из  $\mathfrak{a}$ , каждому нулю  $\bar{x}_i$  полинома  $D^{(i)}$  соответствует соответственно линейный наибольший общий делитель из  $\mathfrak{a}_{i-1} \dots \mathfrak{a}_1$  или степень такого; значит, каждый раз получается лишь одна связанная система нулей  $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$  идеала  $\mathfrak{a}$ .<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Следует указать, что данное здесь последовательное исключение – в отличие от метода Кронекера – зависит только от данного идеала  $\mathfrak{a}$  и не зависит ни от какого базиса идеала; в частности, это относится также к показателям  $\alpha_\lambda$ . Полное проведение исключения этим методом, по Гентцельту, потребовало бы продолжения процедуры на частном  $\mathfrak{a}/D^{(i)}$ , что можно опустить ввиду следующего параграфа. (Е. N.)

## § 7. Результантная форма и теория исключения.

Для установления связи между результатной формой и теорией исключения применим последовательное исключение из § 6 специально к частному  $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$  идеала по основному идеалу  $(i-1)$ -го уровня. Сначала надо показать, что это частное представляет собой преобразованный идеал. Поскольку  $\mathfrak{m}$  преобразован, то по Теореме VI из § 3 преобразован и  $\mathfrak{g}_{i-1}$ . Из

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad H(x) = \overline{H}(y) = \sum \alpha_i(u) \overline{H}_i(y) = \sum \alpha_i(u) H_i(x)$$

следовательно получается:

$$\overline{H}(y) \overline{\mathfrak{g}}_{i-1,(u)} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \text{а значит также} \quad \overline{H}(y) \overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

или

$$\overline{H}_i(y) \overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}), \quad \text{а значит} \quad H_i(x) \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

чем доказана делимость  $H_i(x)$  на  $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$  и тем самым доказано, что этот идеал преобразован, так что метод исключения из § 6 применим.

Но (30), с учетом (28) – § 4 – показывает, что  $C^{(i)}(x)$  делится на  $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ ; здесь под  $C^{(i)}(x)$  понимается любой не тождественно исчезающий  $\rho$ -рядный детерминант из  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ . Так как для  $i > 1$  этот  $C^{(i)}$  имеет нулевую степень по  $x_1$ , то модуль  $\mathfrak{A}_1$ , соответствующий идеалу  $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ , содержит полиномы  $C^{(i)}, x_1 C^{(i)}, \dots, x_1^{k_1-1} C^{(i)}$ , и потому  $(C^{(i)})^{k_1}$  делится на  $\mathfrak{a}_2$ ; точно так же  $(C^{(i)})^{k_1 k_2}$  делится на  $\mathfrak{a}_3$ , и наконец  $(C^{(i)})^{k_1 k_2 \dots k_{i-1}}$  делится на  $\mathfrak{a}_i$ . Следовательно,  $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_i$  отличны от нулевого идеала, что верно также при  $i = 1$ . Пусть теперь  $D^{(i)}(x)$  есть наибольший общий делитель всех полиномов из  $\mathfrak{a}_i$ , то есть имеет степень  $p_i > 0$  только тогда, когда  $\mathfrak{a}_{i+1}$  равен нулевому идеалу. По определению  $D^{(i)}(x)$ , с учетом делимости  $\mathfrak{a}_i$  на  $\mathfrak{a}$ , имеем:

$$d^{(i+1)} D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \quad d^{(i+1)} \neq 0;$$

следовательно  $d^{(i+1)} D^{(i)}$  становится полиномом из  $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ , свободным от  $x_1 \dots x_{i-1}$ . Но  $E^{(i)}(x)$  был определен как наивысший элементарный делитель  $\mathfrak{M}_{i-1}$ , соответственно  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ , (Теорема II и § 4) как наибольший общий делитель – в полиномиальном смысле – всех свободных от  $x_1 \dots x_{i-1}$  полиномов из  $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ . Поэтому  $d^{(i+1)} D^{(i)}$ , а вследствие регулярности  $E^{(i)}(x)$  по  $x_i$  также и  $D^{(i)}(x)$ , делится на  $E^{(i)}(x)$ .

То же рассуждение можно провести, если с самого начала преобразование (12) было составлено с (35), то есть если неопределенные  $u_{\mu\nu}$  были заменены на  $w_{\mu\nu}$ ; это дает делимость  $H^{(i)}(z, x)$  на соответствующий  $\bar{E}^{(i)}(z, x)$ . Так как, подобно тому как  $D^{(i)}(x)$  и  $H^{(i)}(z, x)$  переходят друг в друга специализацией, так же переходят друг в друга  $E^{(i)}(x)$  и  $\bar{E}^{(i)}(z, x)$ , а также  $R^{(i)}(x)$  и  $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ , то и числа кратности при разложении на линейные множители должны взаимно совпадать. Учитывая еще, что некоторая степень  $E^{(i)}(x)$  делится на  $R^{(i)}(x)$ , получаем в итоге следующее.

**Теорема XIII.** Если  $R^{(i)}(x)$  разложить в алгебраическом расширении поля  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$  на линейные множители  $x_i - \bar{x}_i$ , то  $\bar{x}_i$  можно одним и только одним способом дополнить до связанной системы значений  $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ , которая является нулем  $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$  и, следовательно, нулем  $\mathfrak{m}$ . Конечное число нулей  $\mathfrak{m}$ , возникающих таким образом из линейных множителей  $R^{(i)}$  – конечное число после присоединения  $x_{i+1} \dots x_n$  – объединяется явным разложением:

$$\bar{R}^{(i)}(z, x) = \prod \{z_i - (\bar{x}_i + v_1 \bar{x}_1 + \dots + v_{i-1} \bar{x}_{i-1})\}^{\alpha_\lambda}. \quad (36)$$

Благодаря регулярности  $\bar{R}^{(i)}(z, x)$  по  $z_i$  это разложение сохраняется, если присоединенные к  $P(u)$  величины  $x_{i+1} \dots x_n$  заменить произвольными специальными системами значений  $\bar{x}_{i+1} \dots \bar{x}_n$  из  $P(u)$  или из полученного из него алгебраически замкнутого поля.

Тем самым проведено также разделение нулей  $\mathfrak{m}$  по отдельным множителям результатной формы; число неопределенных  $x$ , присоединенных к  $P(u)$ , называется также размерностью соответствующего алгебраического образования.

Если в разложении  $\bar{R}^{(i)}(z, x)$  или в соответствующем разложении  $R^{(i)}(x)$  объединить множители, сопряженные относительно  $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$ , которые при общем  $P$  могут быть полностью или частично тождественными, то получается разложение  $R^{(i)}(x)$  на степени полиномов, неприводимых относительно  $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$ :

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \dots S_\nu^{(i)}(x)^{\beta_\nu}.$$

Этому разложению по Теореме X соответствует представление  $\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{j}_1 \dots \mathfrak{j}_\nu]$  такое, что  $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$  равно норме  $\mathfrak{g}_{i-1}$  относительно идеала  $\mathfrak{j}_\mu$ , соответственно норме модуля  $\mathfrak{G}_{i-1}$  относительно модуля, соответствующего  $\mathfrak{j}_\mu$ . Тем самым проясняется и значение показателей  $\beta_\mu$ ; в частности, если  $\gamma_\mu$  означает степень  $S_\mu^{(i)}$ , то кратность  $\beta_\mu \gamma_\mu$  равна числу линейно независимых относительно  $P(u, x_{i+1} \dots x_n)$  классов вычетов  $\mathfrak{g}_{i-1}$  по  $\mathfrak{j}_\mu$ .

Рассмотрим еще кратко специальный случай, когда  $P$  имеет характеристику нуль. Если здесь специализировать  $u_{\mu\nu}$  в величины  $\bar{u}_{\mu\nu}$  из  $P$  так, чтобы все  $n$  детерминантов  $C^{(i)}(x)$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) оставались регулярными по  $x_i$ ,<sup>19</sup> то регулярность  $R^{(i)}$  также сохраняется. При этой специализации  $R^{(i)}$ , а также  $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ , становится общим делителем всех  $\rho$ -рядных детерминантов из  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ , но не обязательно наибольшим общим делителем. Однако специализацию всегда можно выбрать так, чтобы сохранилось и это последнее свойство. Ведь  $R^{(i)}(z, x)$  можно – как показывает существование базиса модуля – также охарактеризовать как наибольший общий делитель конечного числа  $\rho$ -рядных детерминантов из  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ . Разложение так специализированного  $\bar{R}^{(i)}(z, x)$  тогда получается просто заменой  $u_{\mu\nu}$  на  $\bar{u}_{\mu\nu}$  в (36), так что вся теория исключения сохраняется.

(Поступила 17.3.1922.)

<sup>19</sup>Гентцель с самого начала выполняет эту специализацию для  $u_{\mu\nu}$  и поэтому для доказательства разложимости  $H^{(i)}(z, x)$ , соответственно  $\bar{R}^{(i)}(z, x)$ , на линейные множители по  $z$  и  $v$  должен привлекать гораздо более сложные рассуждения. Возникающие при этом показатели не обязательно совпадают с приведенными выше. (Е. Н.)

## 23. Алгебраические и дифференциальные инварианты

J. Ber. d. DMV 32 (1923), с. 177–184

Если мне нужно дать обзор развития алгебраических и дифференциальных инвариантов, то в обеих областях я хотела бы ограничиться критическим периодом, который, по замечанию Hilbert, следует за наивным и формальным периодом. Этот критический период для алгебраических инвариантов характеризуется именем самого Hilbert, для дифференциальных инвариантов — именем Riemann; или, по существу: для алгебраических инвариантов — арифметическими методами алгебры, которые существенно развились вокруг этих вопросов и здесь смогли проявить всю свою остроту; для дифференциальных инвариантов — методами формального вариационного исчисления. Поэтому я хотела бы говорить об арифметических методах с их значением за пределами специального предмета, тогда как во второй части могу ограничиться подчинением дифференциальных инвариантов алгебраическим; именно это и осуществляется в связи с методами вариационного исчисления.

1. В основе *алгебраических инвариантов*, как известно, лежит *общая линейная группа* в  $x_1, \dots, x_n$ :

$$x_i = \sum_k s_{ik} x'_k \quad \text{или кратко:} \quad x = S(x'), \quad (1)$$

где  $s_{ik}$  обозначают неопределенные, так что  $\Delta = |s_{ik}|$  отлично от нуля. Пусть теперь  $f(a, x)$ ,  $g(b, x), \dots$  — формы по  $x$  степеней  $\alpha, \beta, \dots$  с неопределенными  $a, b, \dots$  в качестве коэффициентов. Тогда посредством (1) возникает *индуцированное преобразование* для  $a, b, \dots$ ; действительно, из

$$\begin{aligned} f(a, x) &= \sum a_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \dots j_n} x_1'^{j_1} \dots x_n'^{j_n} = f(a', x'), \\ g(b, x) &= \sum b_{r_1 \dots r_n} x_1^{r_1} \dots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \dots s_n} x_1'^{s_1} \dots x_n'^{s_n} = g(b', x') \end{aligned}$$

следует, что  $a', b', \dots$  становятся линейными однородными функциями от  $a, b, \dots$ , коэффициенты которых имеют степени  $\alpha, \beta, \dots$  по  $s_{ik}$ :

$$a' = A_\alpha(a); \quad b' = B_\beta(b) \dots \quad (2)$$

Под *инвариантом* здесь понимают инвариант относительно преобразований (1) и (2), то есть целую рациональную функцию от неопределенных  $a, b, \dots, x, y, \dots$  — где также  $y = S(y')$  —, которая при применении преобразований воспроизводится с точностью до множителя, степени детерминанта подстановки:

$$I(a', b', \dots, x', y', \dots) = \Delta^\rho I(a, b, \dots, x, y, \dots). \quad (3)$$

Коэффициенты  $I$  можно считать рациональными или даже целыми рациональными числами, поскольку всякий инвариант с коэффициентами из произвольного числового поля  $P$  линейно, с коэффициентами из  $P$ , выражается через конечное число таких специальных инвариантов. Точно так же не является ограничением считать  $I$  отдельно однородным в каждом ряду, поскольку и здесь всякий инвариант составляется как сумма конечного числа таких специальных инвариантов.

Отметим, что требование (3), наоборот, снова определяет (1) и (2). Как недавно показали Ostrowski и Schur,<sup>1</sup> индуцированные преобразования можно также охарактеризовать как совокупность линейных преобразований, разделенных в каждом отдельном ряду, которые — за исключением некоторых указуемых исключений — допускают произвольный инвариант  $I$ , свободный от  $x, y, \dots$

Произведение двух инвариантов снова является инвариантом, а сумма является им тогда и только тогда, когда совпадает вес — показатель  $\rho$  в (3). Если же ограничиться преобразованиями с детерминантом единица, то и произвольная сумма снова является инвариантом и при этом исчерпывает все инварианты относительно так ограниченной группы. Поэтому получается область целостности, а именно *однородная область целостности*, то есть область, в которой принадлежность

<sup>1</sup> A. Ostrowski и I. Schur, *Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form*, Math. Zeitschr. 15 (1922), и связанные с этим, еще не опубликованные работы Ostrowski.



полинома влечет отдельную принадлежность его однородных составляющих; здесь это снова сводится к отдельно однородным инвариантам согласно (3).

Здесь возникает фундаментальная проблема, на которой развивались теория инвариантов и вообще арифметическая алгебра: *является ли эта область целостности конечной*, то есть обладает ли она *конечным интегральным базисом*  $I_1, \dots, I_k$  таким, что всякий инвариант можно представить целой рациональной функцией от  $I_1, \dots, I_k$ ,  $I = G(I_1, \dots, I_k)$ ? Решение этой проблемы у Hilbert — доказательство Gordan для бинарного случая не допускает расширения из-за необозримых символических вычислений, а доказательство Mertens–Hilbert не допускает его из-за использования разложения бинарной формы на линейные формы — основано на сведении вопроса об интегральном базисе к вопросу об идеальном базисе. Я хотела бы здесь кратко набросать ход мысли, подчеркивая основные арифметические идеи, а затем перейти еще к трем связанным кругам вопросов: фактическому построению базиса конечным числом шагов, вопросам конечности для подгрупп, вопросам конечности с учетом целочисленности.

2. Напомню *определение идеала* для конечных алгебраических числовых полей. Система  $\mathfrak{a}$  чисел поля называется идеалом, если

1.  $\mathfrak{a}$  принадлежит области  $\mathfrak{o}$  всех целых чисел поля,
2. вместе с  $\alpha$  и  $\beta$  к  $\mathfrak{a}$  принадлежит также разность  $\alpha - \beta$ ,
3. вместе с  $\alpha$  к  $\mathfrak{a}$  принадлежит также  $\lambda\alpha$ , где под  $\lambda$  понимается произвольный элемент из  $\mathfrak{o}$ .

И, как известно, имеет место теорема, что каждый идеал имеет *идеальный базис*:  $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ ; то есть существует конечное число элементов  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  из  $\mathfrak{a}$  такое, что посредством 2. и 3. вся  $\mathfrak{a}$  выводится из  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ ; следовательно,  $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_k\alpha_k$  исчерпывает все элементы из  $\mathfrak{a}$ .<sup>2</sup>

Это определение идеала опирается только на то, что  $\mathfrak{o}$  образует область целостности; поэтому понятие идеала, равно как и понятие идеального базиса, буквально сохраняется, если  $\mathfrak{o}$  заменить произвольной областью целостности.

Теперь доказательство конечности у Hilbert распадается на три утверждения:

1. В области всех полиномов от  $n$  неопределенных с коэффициентами из области рациональности теорема об идеальном базисе имеет место для каждого идеала — а следовательно, и для всякой произвольной системы  $\mathfrak{S}$ .
2. Однородная область целостности  $\mathfrak{J}$  из полиномов конечна тогда и только тогда, когда в  $\mathfrak{J}$  имеет место теорема об идеальном базисе.
3. Для области инвариантов  $\mathfrak{J}$  теорема об идеальном базисе имеет место в усиленной форме: каждый идеальный базис, образованный относительно области всех полиномов, одновременно является идеальным базисом в  $\mathfrak{J}$ , так что наряду с

$$I = A_1 I_1 + \dots + A_k I_k \quad \text{всегда выполняется} \quad I = i_1 I_1 + \dots + i_k I_k,$$

где  $A$  обозначают полиномы от  $a, b, \dots, x, y, \dots$ , а  $i$  — инварианты.

При этом доказательство 1. в принципе опирается на те же рассуждения, что и в алгебраическом числовом поле; в обоих случаях существование идеального базиса получается как прямое следствие общей теоремы о модулях из линейных форм.<sup>3</sup> Из 1. прямо следует существование идеального базиса для каждой конечной области целостности из полиномов; для однородных областей легко видеть и обратное. Только в 3. используются специальные свойства инвариантов; у Hilbert 3. получается как следствие известной теоремы об  $\Omega$ -процессе, тогда как недавно E. Fischer показал, что 3. — при опоре на другие общие теоремы — можно уже получить из свойства общей линейной группы содержать вместе с каждым преобразованием также контраградиентное к нему, соответственно его сопряженно-комплексное.<sup>4</sup>

3. *Фактическое построение базиса* опирается на дальнейшее арифметическое переформулирование понятия конечности с привлечением теории *полей функций*. Имеет место

<sup>2</sup>То, что  $k$  можно уменьшить до двух, для дальнейшего несущественно.

<sup>3</sup>Ср. мой сравнительный обзор арифметической теории алгебраических функций. Jahresber. 28 (1920), с. 187 и прим. 2), с. 188.

<sup>4</sup>E. Fischer, *Über die Endlichkeit der Invarianten*. Göttinger Nachrichten 1915, и лейпцигский доклад.

следующее:

4. Область целостности  $\mathfrak{J}$  из полиномов конечна тогда и только тогда, когда в  $\mathfrak{J}$  содержится конечная подобласть  $\mathfrak{J}'$  такая, что  $\mathfrak{J}$  является алгебраически целой над  $\mathfrak{J}'$ ; тогда каждый интегральный базис  $\mathfrak{J}'$  дополняется фундаментальной системой этих алгебраически целых величин до базиса  $\mathfrak{J}$ .

<sup>5</sup> Если, в частности, как в случае инвариантов, речь идет об однородных областях  $\mathfrak{J}$ , для которых теорема об идеальном базисе имеет место в более сильной форме 3., то такая область  $\mathfrak{J}'$  выводится из каких-либо, всегда существующих, конечного числа полиномов  $I_1, \dots, I_s$  как интегрального базиса, из обращения которых в нуль следует обращение в нуль всех полиномов из  $\mathfrak{J}$ . Этот факт снова основан на общей теореме идеальной теории:

5. Каждому идеалу  $\mathfrak{a}$  из полиномов соответствует целое рациональное число  $r$  такое, что для каждого идеала  $\mathfrak{b}$ , который обращается в нуль во всех нулях  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}^r$  становится делимым на  $\mathfrak{a}$ .

В случае инвариантов можно определить *верхнюю границу для степеней*  $I_1, \dots, I_s$ , а тем самым и для их числа  $s$ , зависящую только от степеней положенных в основу основных форм. И в этом месте снова привлекаются специальные свойства инвариантов; речь идет о теореме, что численно специализированная система основных форм тогда и только тогда имеет отличный от нуля инвариант, когда  $\Delta = |s_{ik}|$  является алгебраически целой над преобразованными коэффициентами.

Из этой верхней границы К. Hentzelt<sup>6</sup> определил *верхнюю границу для степеней инвариантов интегрального базиса*, снова зависящую только от степеней основных форм. Ему это удастся потому, что для показателя  $r$  в 5. он задает верхнюю границу, которая зависит только от числа и наибольшей степени полиномов идеального базиса  $\mathfrak{a}$ , не зависит от коэффициентов этих полиномов и вычисляется из указанных чисел конечным числом шагов. В принципе поставленная проблема тем самым полностью решена; правда, указанная граница весьма высока: например, для тернарной квадратичной формы, где дискриминант, то есть инвариант третьей степени, уже образует базис всех свободных от  $x$  инвариантов, по Hilbert и Hentzelt доходят далеко до миллионов.

4. В вопросе конечности инвариантов *подгрупп* общей линейной группы пока получены только частичные результаты. Метод почти исключительно опирается на сведение инвариантов подгрупп к симультанным инвариантам общей линейной группы, по процедуре, примененной Study для ортогональной группы. Это осуществили Weitzenböck для инвариантов движений и аффинных инвариантов, Deruyts — для семиинвариантов и инвариантов сдвига;<sup>7</sup> вопрос о пределах применимости этого метода еще не решен. Упомянутое в конце 2. замечание Fischer также решает проблему конечности для ряда подгрупп; в частности, тем самым дано простейшее доказательство для ортогональной группы. Однако пример семиинвариантов показывает — на что недавно указал Fischer<sup>8</sup> —, что для подгрупп, несмотря на конечность, более сильная форма 3. для идеального базиса может не выполняться.

Если понимать имеющийся здесь вопрос конечности в смысле теории полей, он ведет к гильбертовой постановке вопроса об *относительно целых функциях*, то есть к вопросу, всегда ли конечны такие области целостности, которые состоят из совокупности полиномов некоторого поля рациональных функций. В этом направлении лежит элементарно доказуемый факт, что для инвариантов конечных групп выделенный интегральный базис можно указать непосредственно — систему коэффициентов резольвенты Galois.<sup>9</sup>

5. Вопрос о том, можно ли усилить теорему конечности инвариантов относительно *целочисленности*, также в общем виде еще не решен. Правда, как показал Hilbert, теорема

<sup>5</sup>Hilbert показывает (*Über die vollen Invariantensysteme*, Math. Annalen 42 (1893), §§ 1 и 2), что эти факты следуют из предполагаемой конечности; наоборот, то, что из алгебраически-целой зависимости следует конечность, вытекает из существования рационального базиса (E. Noether, *Körper und Systeme rationaler Funktionen*, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

<sup>6</sup>Я вскоре издам эту работу из наследия.

<sup>7</sup>Литературные указания см. в энциклопедической статье Weitzenböck по теории инвариантов; III E 1.

<sup>8</sup>Лейпцигский доклад и Math. Zeitschrift.

<sup>9</sup>E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916).

об идеальном базисе имеет место и для области всех целочисленных полиномов; точно так же сохраняется связь 2. между идеальным базисом и интегральным базисом;<sup>10</sup> но доказательство для — не обязательной — более сильной формы 3. отказывает. Для случая бинарных инвариантов целочисленную конечность можно доказать;<sup>11</sup> это доказательство, представляющее собой целочисленное усиление бинарного доказательства конечности Mertens–Hilbert, использует наряду с теоремой о целочисленном идеальном базисе также разложение бинарных форм на линейные формы и тем самым не допускает переноса на большее число неопределенных. Напротив, на сходных основаниях получается целочисленная конечность для инвариантов конечных групп как усиление указанного выше доказательства, хотя теперь снова возникает только доказательство существования, а не фактическое указание базиса.<sup>12</sup> И здесь, вероятно, только дальнейшее развитие теории полей функций и общей идеальной теории приведет к цели.

6. Теперь я перехожу к *дифференциальным инвариантам* и к поставленному во введении вопросу об их сведении к теории алгебраических инвариантов. Положенная в основу группа здесь, как известно, посредством  $x_i = x_i(y)$  определяется как:

$$dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad d\delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} d\delta y_k + \sum_{k,l} \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l} dy_k \delta y_l; \dots \quad (4)$$

Чтобы перейти к преобразованиям, индуцированным (4), можно положить в основу произвольную функцию  $f(x, dx) = \varphi(y, dy)$ ; требуя инвариантности  $\delta f, \delta^2 f, \dots$  относительно (4), получают преобразования для производных  $f$  по  $x$  и  $dx$ . Если, например, ограничиться формами, однородными по  $dx$ :

$$f(x, dx) = \sum a_{i_1 \dots i_n}(x) dx_1^{i_1} \dots dx_n^{i_n} = \sum a'_{i_1 \dots i_n}(y) dy_1^{i_1} \dots dy_n^{i_n} = \varphi(y, dy),$$

то  $a'$  линейны по  $a$ ,  $\frac{\partial a'}{\partial y}$  линейны по  $a$  и  $\frac{\partial a}{\partial x}$  и т. д.:

$$a' = A_0(a), \quad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \quad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \dots \quad (5)$$

и речь идет об инвариантности относительно преобразований (4) и (5). При этом все встречающиеся величины

$$a, \frac{\partial a}{\partial x}, \dots, dx, \delta x, d\delta x, \dots, \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \dots$$

следует рассматривать как неопределенные, поэтому детерминант каждого отдельного преобразования заведомо отличен от нуля. Только при применении формально готовой теории к специальным функциям возникает вопрос об ограничении на такие функции, чтобы преобразования в некоторой области оставались однозначно обратимыми и существовало достаточное число производных, совершенно так же, как в алгебраическом случае при численной специализации нужно предполагать, что детерминант  $|s_{ik}|$  отличен от нуля.

При таком рассмотрении всех встречающихся аргументов как неопределенных речь, следовательно, идет о специальной линейной группе, непосредственно недоступной обычным алгебраическим методам, в которой преобразования  $dx$  и  $a' = A_0(a)$  совпадают с (1) и индуцированным (2). Возникает вопрос, нельзя ли, быть может в общем виде, посредством *введения новых аргументов* свести преобразования (4) и (5) к общей линейной группе (1) и тем самым *индуцированным* преобразованиям (2).

Это действительно так. Высшие дифференциалы  $d^2 x, \delta dx, \dots$  нужно заменить лагранжевыми производными, возникающими из вариационной задачи, принадлежащей  $f(x, dx)$ , и дальнейшими комбинациями, образованными из них поляризацией (переносами по Weyl и Schouten), все из которых когреддиентны с  $dx$ , так что их преобразование задается общей линейной группой (1). А  $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \dots$  (или, более общо, производные однородно предполагаемой  $f$  по  $x$  и  $dx$ ) нужно

<sup>10</sup> Из этой связи, в частности, следует, что для всех конечных областей целостности имеют место теоремы разложения общей идеальной теории, как я развила их в Math. Ann. 83 (1921).

<sup>11</sup> E. Noether, *Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen*. Göttinger Nachrichten 1919.

<sup>12</sup> § 4 работы, цитированной под 11).

заменить коэффициентами некоторых форм, возникающих из "нормальных форм высших вариаций" посредством указанного выше исключения  $d^2x, \delta dx, \dots$ , и их "ковариантных производных"

$$[\Omega_i], [\Omega_i^{(1)}], [\Omega_i^{(2)}], \dots \quad (i = 1, 2, \dots);$$

и поскольку  $[\Omega_i^{(k)}]$  являются инвариантами относительно (4) и (5), зависящими только от  $dx$  и  $\delta x$ , эти коэффициенты удовлетворяют алгебраически индуцированным преобразованиям (2).<sup>13</sup> Посредством этой *теоремы редукции* теория дифференциальных инвариантов подчиняется алгебраической теории инвариантов.

Ряд  $[\Omega_i]$  обрывается на  $[\Omega_\alpha]$ , если  $f(x, dx)$  является однородной формой  $\alpha$ -й степени по  $dx$ . Для квадратичных форм  $[\Omega_2]$  совпадает с римановой формой кривизны, а указанный здесь процесс построения в точности тот, который Riemann дал в латинской конкурсной работе и который независимо от него, в связи с габилюционной лекцией Riemann, развил также Lipschitz.<sup>14</sup> Доказательство теоремы редукции, которое Christoffel и Ricci провели вычислительно для квадратичных дифференциальных форм, опирается на введение "римановых нормальных координат", преобразующих экстремали, исходящие из одной точки, в прямые; поскольку благодаря этому произвольному преобразованию  $x$  соответствует линейное преобразование нормальных координат, они и обуславливают переход к общей линейной группе.

Возникает вопрос, существует ли такая теорема редукции и тогда, когда, следуя Weyl и Schouten, для определения группы в основу кладется не вариационная задача, а только перенос; то есть когда, соответственно лагранжевым производным, задаются выражения  $\psi_i(d\delta x, dx, \delta x)$ , посредством которых достигается исключение высших дифференциалов, причем по аналогии с квадратичными дифференциальными формами добавляется само по себе ненужное ограничение, что  $\psi_i$  должны быть линейны по  $dx$  (для произвольной однородной  $f(x, dx)$  поляризованные лагранжевы производные являются однородными только первого порядка по  $dx$ ). Требование когреддиентности  $\psi$  с  $dx$  индуцируется преобразование их коэффициентов и тем самым, по аналогии с (5), фиксируется группа. Для инвариантов низших порядков Weitzenböck вычислительно подтвердил теорему редукции в случае Weyl; общего подхода еще нет.<sup>15</sup>

(Поступило 26. 10. 22.)

<sup>13</sup>Е. Noether, *Invarianten beliebiger Differentialausdrücke*. Göttinger Nachrichten 1918.

<sup>14</sup>Ср. также мое изложение Riemann и Lipschitz в № 28 второй части энциклопедической статьи Weitzenböck, упомянутой под 7).

<sup>15</sup>Ср. по этому поводу: Weyl, *Raum, Zeit, Materie*; Schouten, *Math. Zeitschr.* 13 (1922); Weitzenböck, *Sitzungsber. d. Wiener Akademie*, 1920 и 1921.

## 24. Теория исключения и общая теория идеалов

Math. Ann. 90 (1923), с. 229–261

Далее речь идет о включении теории исключения — в той арифметической форме, которую я придала изложению Hentzelt<sup>1</sup> и которую можно назвать теорией идеалов в полиномиальной области, — в общую теорию идеалов,<sup>2</sup> а одновременно о новом обосновании частей, относящихся к нулям. Основные понятия обеих теорий кратко собраны в § 1, как и понятия теории полей,<sup>3</sup> так что здесь я могу на них ссылаться.

Это включение и новое обоснование группируются вокруг четырех вопросов: арифметическая формулировка понятия размерности; теория нулей; связь теорем о разложении для норм и элементарных делителей с соответствующими теоремами общей теории идеалов; характеристика простых идеалов и первичных идеалов нормой и формой элементарных делителей.

Арифметическая формулировка *понятия размерности* (§ 4) дается цепями простых идеалов; это арифметический эквивалент того факта, что на поверхностях есть кривые, а на кривых есть точки. Эта арифметическая формулировка, которая будет доказана тождественной параметрическому определению теории исключения, с небольшой модификацией переносится на произвольные кольцевые области и там, вместе с переносом некоторых частей остальных вопросов, дает точное понимание строения идеалов, как я покажу в другом месте.

В Н.-Н. вопрос о *нулях*, как обычно, прямо рассматривается для заданного идеала, а именно путем возвращения к последовательному исключению, причем характер проверки не вполне устраняется. В противоположность этому стоит путь, всегда применяемый для полиномов одной переменной: заданный полином представляют как произведение степеней простых функций (первичных функций) и для каждой отдельной простой функции строят поле нулей как поле, изоморфное полю классов вычетов. Степень простой функции дает степень этого поля; степень же первичной функции, нули которой совпадают с нулями простой функции, дает степень кольца классов вычетов по этой первичной функции. Если для каждой простой функции перейти к полю Galois, получается разложение на линейные множители; и тем самым для исходного полинома вопрос о нулях, разложении на линейные множители и кратности решен. Совершенно соответственно здесь (§ 3) система классов вычетов по простому идеалу через образование частных расширяется до поля классов вычетов, и строится изоморфное ему поле нулей. Это поле нулей содержит подполе, порожденное присоединением неопределенных, скажем  $x_{i+1}, \dots, x_n$ ; степень нормы дает степень относительно этого подполя; вместе с тем при переходе к полю Galois получается разложение формы элементарных делителей, а значит и нормы, на линейные множители. Для соответствующего первичного идеала нули те же; разложение также уже дано, поскольку норма становится степенью формы элементарных делителей простого идеала (§ 2); степень нормы дает степень кольца классов вычетов по первичному идеалу относительно подполя, выведенного из неопределенных.

Тем самым вопрос о нулях произвольного идеала сводится к связи теорем о разложении для норм и элементарных делителей с теоремами общей теории идеалов (§ 5). Тому факту, что нули идеала составляются из нулей его отдельных ассоциированных простых идеалов, соответствует разложение нормы на наибольшие первичные множители, которые становятся равными степеням формы элементарных делителей отдельных ассоциированных простых идеалов;<sup>4</sup> тем самым разложение нормы на линейные множители выполнено в общем случае. Кратность же в Н.-Н. получает свое истолкование посредством основных идеалов и их компонент: степень наибольшего первичного множителя нормы приравнивается числу линейно независимых классов вычетов — после присоединения  $x_{i+1}, \dots, x_n$  — основного идеала  $(i - 1)$ -й степени по модулю компоненты основного идеала  $i$ -й степени. Затем основной идеал  $(i - 1)$ -й степени доказывается тождественным изолированной компоненте разложения, однозначно определенной всеми простыми идеалами размерности выше  $(n - i)$ -й; а компонента основного идеала  $i$ -й

<sup>1</sup> Hentzelt, Kurt: Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten. Обработано E. Noether. Math. Ann. 88 (1922), с. 53–79; цитируется как Н.-Н.

<sup>2</sup> Noether, E.: Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. 83 (1921), с. 24–66; цитируется как Idealtheorie.

<sup>3</sup> Steinitz, E.: Algebraische Theorie der Körper, J. f. M. 137 (1910), с. 167–309; цитируется как Steinitz.

<sup>4</sup> Этот параллелизм теории исключения с общей теорией идеалов в кронекеровской теории исключения не выполняется; ср. Н.-Н., прим. \*).

ступени — тождественной изолированной компоненте разложения, определенной простым идеалом, соответствующим множителю нормы, и всеми простыми идеалами большей размерности. Степень соответствующего множителя нормы — после присоединения  $x_{i+1}, \dots, x_n$  — равна степени того подкольца классов вычетов этой компоненты, которое состоит только из классов основного идеала  $(i - 1)$ -й ступени.

Характеристика простых идеалов и собственных первичных идеалов (§ 6) получается как прямое следствие рассмотрения полей классов вычетов. Если исходная область коэффициентов является совершенным полем, то простым идеалам как норма и форма элементарных делителей соответствуют простые функции, собственным первичным идеалам — собственные первичные функции, и наоборот. Если область коэффициентов является несовершенным полем, можно указать только условия, которые либо необходимы, либо достаточны; как показывают примеры, норма простого идеала может стать собственно первичной, а форма элементарных делителей собственного первичного идеала — простой функцией. Точнее, при характеристике  $p$  норма простого идеала становится  $p^f$ -й степенью ( $f > 0$ ) его формы элементарных делителей; тогда как для собственных первичных идеалов, форма элементарных делителей которых является простой функцией, норма может стать произвольной степенью, как снова показывают примеры. Наконец, рассматриваются еще абсолютные простые идеалы (§ 7), то есть такие, которые остаются простыми идеалами при расширении области коэффициентов до алгебраически замкнутого поля. Для абсолютных простых идеалов с коэффициентами из (конечного) алгебраического числового поля характеристика приводит к переносу теоремы, впервые установленной А. Ostrowski для абсолютных простых функций: свойство быть простым идеалом сохраняется по модулю каждого простого идеала числового поля, за исключением, самое большее, конечного числа исключений.

Укажем еще на аналогию последнего вопроса с теорией идеалов в алгебраических числовых полях. Формой элементарных делителей такого идеала следует считать наименьшее целое рациональное число, делимое этим идеалом (прим. 10); поэтому для простого идеала оно всегда становится простым числом, тогда как, наоборот, идеал становится простым идеалом, как только его норма является простым числом; доказательства также идут совершенно параллельно. Приведенные выше примеры, таким образом, показывают, что над несовершенным полем возникает аналог простых идеалов высшей степени и идеалов ветвления, тогда как над совершенным полем имеются только простые идеалы первой степени и нет идеалов ветвления.

## § 1. Основные понятия теории исключения, общей теории идеалов и теории полей

**1. Область.** Пусть  $\mathfrak{S}$  обозначает область целостности всех полиномов от  $y_1, \dots, y_n$  с коэффициентами из абстрактно заданного поля  $P$ . Пусть  $y$  подвергаются преобразованию с неопределенными  $u_{\mu\nu}$  в качестве коэффициентов:<sup>5</sup>

$$y_1 = u_{11}x_1 + \dots + u_{1n}x_n, \quad \dots, \quad y_n = u_{n1}x_1 + \dots + u_{nn}x_n, \quad (1)$$

с обратным преобразованием

$$x_1 = t_{11}y_1 + \dots + t_{n1}y_n, \quad \dots, \quad x_n = t_{1n}y_1 + \dots + t_{nn}y_n, \quad (1')$$

и пусть  $u_{\mu\nu}$ , или — что ввиду взаимной рациональной выразимости равносильно —  $t_{\mu\nu}$  присоединены к  $P$ , так что возникает область коэффициентов  $P(u) = P(t)$ ; через  $\mathfrak{S}'$  обозначим область целостности всех полиномов от  $x_1, \dots, x_n$  с коэффициентами из  $P(u)$ . Области  $\mathfrak{S}$  и  $\mathfrak{S}'$  лежат в основе теории исключения; рассматриваются идеалы  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \dots$  в  $\mathfrak{S}$  и  $\mathfrak{a}', \mathfrak{b}', \dots$  в  $\mathfrak{S}'$ . Идеал в произвольном кольце здесь, как обычно, определяется тем, что вместе с  $\alpha$  и  $\beta$  он содержит также  $\alpha - \beta$ , а вместе с  $\alpha$  также  $\lambda\alpha$ , где  $\lambda$  понимается как произвольный элемент кольца;  $\mathfrak{o}$  всегда обозначает единичный идеал, состоящий из всех элементов.

**2. Преобразованные идеалы.** Идеал  $\mathfrak{m}$  в  $\mathfrak{S}'$  называется преобразованным, если он возникает из идеала  $\bar{\mathfrak{m}}$  в  $\mathfrak{S}$  посредством (1) при присоединении  $u_{\mu\nu}$  или  $t_{\mu\nu}$ . Следовательно, если  $\bar{f}(y)$  или  $\bar{g}(y)$

<sup>5</sup>Это преобразование, с учетом § 3 и далее, несколько более общее, чем у Н.-Н.; тем самым все результаты отсюда тем более сохраняются.

пробегают все полиномы из  $\bar{m}$ , то  $m$  состоит из всех линейных комбинаций

$$f(x) = \sum U_i(u) \bar{f}_i(y) = \sum U_i(u) f_i(x)$$

или также

$$g(x) = \sum T_i(t) \bar{g}_i(y) = \sum T_i(t) g_i(x);$$

в частности, в нем содержатся все  $f_i(x) = \bar{f}_i(y)$ , или, что то же самое, все  $g_i(x) = \bar{g}_i(y)$ . Так как  $f(x)$  соответственно  $g(x)$  определены только с точностью до величин из  $P(u) = P(t)$ , то  $U_i, T_i$  можно без ограничения общности считать степенными произведениями от  $u$  соответственно  $t$ . Полиномы  $f(x), g(x)$  снова переходят в полиномы из  $m$ , если  $U, T$  заменить любыми другими степенными произведениями, в частности при перестановке столбцов в (1) соответственно строк в (1'); следовательно, вместе с каким-либо полиномом  $m$  содержит и все полиномы, возникающие из него перестановкой  $x$ , если только в зависящих от  $u$  соответственно  $t$  коэффициентах произведены соответствующие перестановки. Все идеалы, встречающиеся далее, — если прямо не сказано обратное — следует считать преобразованными. Непреобразованные идеалы при составлении (1) с

$$x_i = v_{i1}z_1 + \dots + v_{in}z_n$$

переходят в преобразованные идеалы в полиномиальной области переменных  $z$  с коэффициентами из  $P(u, v)$ , тогда как для преобразованных идеалов это составление сводится лишь к замене  $u_{\mu\nu}$  билинейными комбинациями от  $u, v$ .

**3. Обозначение.** Под  $f^{(i)}, g^{(i)}, \dots, a^{(i)}, b^{(i)}, \dots$  далее всегда понимаются полиномы в  $\mathfrak{S}'$ , свободные от  $x_i, \dots, x_{i-1}$ .

**4. Основные идеалы.** Каждому идеалу  $m$  сопоставляются  $n$  основных идеалов  $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{n-1}$  следующим условием: основной идеал  $(i-1)$ -й ступени  $\mathfrak{g}_{i-1}$  содержит все и только те полиномы  $G(x)$ , для которых существует полином  $b^{(i)} \neq 0$  — вообще говоря, меняющийся вместе с  $G(x)$ , — такой, что  $b^{(i)}G(x) \equiv 0 \pmod{m}$ . Из существования идеального базиса отсюда также следует существование по крайней мере одного фиксированного для всех  $G(x)$  полинома  $B^{(i)}$ , так что

$$B^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{m}, \quad B^{(i)} \neq 0. \quad (2)$$

Основные идеалы преобразованных идеалов сами становятся преобразованными идеалами (Н.-Н., теорема VI). Основной идеал  $i$ -й ступени  $\mathfrak{g}_i$  также определяется как идеал, в который  $m$  переходит при присоединении  $x_{i+1}, \dots, x_n$  к  $P(u)$ , если ограничиться — что тогда не означает ограничения общности — полиномами, целыми по  $x_{i+1}, \dots, x_n$ ;  $\mathfrak{g}_0$  всегда равен единичному идеалу  $o$ .

**5. Модульное представление идеалов, элементарные делители и отдельные нормы.** Если каждый полином  $f(x)$  рассматривать как линейную форму от степенных произведений  $\xi$  переменных  $x_1, \dots, x_{i-1}$  с полиномами  $a^{(i)}$  в качестве коэффициентов, то идеал  $m$  переходит в модуль  $\mathfrak{M}_{i-1}$  линейных форм относительно области  $a^{(i)}$ ; то есть  $\mathfrak{M}_{i-1}$  вместе с любыми двумя линейными формами содержит также их разность, а вместе с линейной формой  $l(\xi)$  также  $a^{(i)}l(\xi)$  при произвольном  $a^{(i)}$ . Основным модулем такого модуля  $\mathfrak{M}$  называется совокупность линейных форм  $g(\xi)$ , для которых  $b^{(i)}g(\xi) \equiv 0 \pmod{m}$ ,  $b^{(i)} \neq 0$ ; следовательно, основной идеал  $\mathfrak{g}_{i-1}$  при модульном представлении переходит в основной модуль  $\mathfrak{G}_{i-1}$  модуля  $\mathfrak{M}_{i-1}$ .  $\mathfrak{M}_{i-1}$  и  $\mathfrak{G}_{i-1}$  зависят от бесконечно многих неопределенных  $\xi$  так, что в каждой отдельной линейной форме встречается лишь конечное число этих неопределенных.  $\mathfrak{M}_{i-1}$  обладает характеристическим свойством: после присоединения  $x_{i+1}, \dots, x_n$  к  $P(u)$  он имеет лишь конечное число элементарных делителей, отличных от единицы; то есть после такого присоединения  $\mathfrak{G}_{i-1}$  и  $\mathfrak{M}_{i-1}$  допускают базисное представление — где  $\zeta$  обозначают новые неопределенные, связанные с  $\xi$  обратимыми линейными, целыми по  $x_i$  преобразованиями так, что в  $\zeta_i = r_i(\xi)$  всякий раз встречается лишь конечное число этих неопределенных, —

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_{i-1} &= (\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \dots, \zeta_{\sigma+\nu}, \dots), \\ \mathfrak{M}_{i-1} &= (E_0^{(i)}\zeta_0, E_1^{(i)}\zeta_1, \dots, E_\sigma^{(i)}\zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \dots, \zeta_{\sigma+\nu}, \dots), \end{aligned} \quad (3)$$

где каждый  $E_\mu^{(i)}$  делит предыдущий (Н.-Н. (24) и (28)).

Наивысший элементарный делитель  $E^{(i)}$  также определяется как наибольший общий делитель — в полиномиальном смысле — всех  $B^{(i)}$ , встречающихся в (2); его можно считать целым и примитивным по  $x_{i+1}, \dots, x_n$ , и тогда он регулярен по  $x_i$ , то есть  $E^{(i)}$  содержит член  $x_i^\lambda$  с ненулевым коэффициентом, если имеет степень  $\lambda$  по  $x$ .

Произведение  $R^{(i)}$  всех элементарных делителей, встречающихся в (3), называется нормой  $\mathfrak{G}_{i-1}$  относительно  $\mathfrak{M}_{i-1}$ , или также отдельной нормой идеала  $\mathfrak{m}$ ; в символах, с учетом того, что  $\mathfrak{m}$  при присоединении  $x_{i+1}, \dots, x_n$  переходит в  $\mathfrak{g}_i$ :

$$R^{(i)} = E_0^{(i)} E_1^{(i)} \dots E_\sigma^{(i)} = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i). \quad (5)$$

Как показывает (3), при присоединении  $x_{i+1}, \dots, x_n$  величина  $R^{(i)}$  становится равной детерминанту переходной подстановки от  $\mathfrak{G}_{i-1}$  к  $\mathfrak{M}_{i-1}$ , а степень  $R^{(i)}$  дает число линейно независимых относительно  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$  классов вычетов  $\mathfrak{G}_{i-1}$  по модулю  $\mathfrak{M}_{i-1}$ , следовательно  $\mathfrak{g}_{i-1}$  по модулю  $\mathfrak{g}_i$ ;  $R^{(i)}$  можно считать целым и примитивным по  $x_{i+1}, \dots, x_n$ , и тогда он регулярен по  $x_i$ .  $R^{(i)}$  можно вычислить как наибольший общий делитель — в полиномиальном смысле — всех  $\varrho$ -рядных детерминантов некоторого всегда существующего модуля  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$  ранга  $\varrho$ , обладающего тем свойством, что система классов вычетов  $\mathfrak{G}_{i-1}^*/\mathfrak{M}_{i-1}^*$  изоморфна  $\mathfrak{G}_{i-1}/\mathfrak{M}_{i-1}$ , где под  $\mathfrak{G}_{i-1}^*$  понимается основной модуль  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$  (Н.-Н., теорема VII и § 5).

**6. Форма элементарных делителей и норма (результантная форма) идеалов.** Произведение  $E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)} E^{(2)} \dots E^{(n)}$  всех наивысших элементарных делителей называется формой элементарных делителей, а произведение  $R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)} R^{(2)} \dots R^{(n)}$  всех отдельных норм — нормой (результантной формой)<sup>6</sup> идеала  $\mathfrak{m}$ . Форма элементарных делителей и норма делятся идеалом; норма делится формой элементарных делителей, а некоторая степень последней делится нормой. Более общо имеем еще:

$$\begin{aligned} E^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, & E^{(n)} \dots E^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \\ R^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{g}_i}, & R^{(n)} \dots R^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1} &\equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \end{aligned} \quad (4)$$

(Н.-Н., теорема VIII), а далее: если  $\mathfrak{m}$  делится  $\mathfrak{n}$  и нормы  $R_{\mathfrak{m}}$  и  $R_{\mathfrak{n}}$  совпадают, то совпадают и идеалы  $\mathfrak{m}$  и  $\mathfrak{n}$  (Н.-Н., теорема IX). Учитывая, что для делителя  $\mathfrak{m}$  из совпадения  $R^{(1)}, R^{(2)}, \dots$  следует совпадение основных идеалов  $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \dots$ , и что всегда  $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{o}$ , получаем соответственно: если  $\mathfrak{n}$  есть собственный делитель  $\mathfrak{m}$ , то первая отдельная норма  $\mathfrak{n}$ , отличная от соответствующей нормы  $\mathfrak{m}$ , становится собственным делителем.<sup>7</sup> Если  $\mathfrak{m}$  содержит полином  $G^{(i)} \neq 0$ , то по определению  $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \dots, \mathfrak{g}_{i-1}$  равны единичному идеалу; следовательно, по свойству отдельных норм, указанному в 5., а именно определять число линейно независимых классов вычетов,  $R^{(1)}, \dots, R^{(i-1)}$  равны единице; значит, и  $E^{(1)}, \dots, E^{(i-1)}$  равны единице.

**7. Разложение отдельных норм и элементарных делителей; компоненты основных идеалов.** Под простой функцией понимается полином, неприводимый относительно  $P(u)$ ; под первичной функцией — степень простой функции. Собственная первичная функция есть такая, которая не является одновременно простой функцией, то есть речь идет о степени выше первой. Разложение полинома на наибольшие первичные множители есть такое разложение, где каждый множитель является первичной функцией, но произведение любых двух множителей уже не является первичным.<sup>8</sup> Разложению отдельной нормы  $R^{(i)} = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i)$  на наибольшие первичные множители  $Q_\nu^{(i)}$  соответствует представление  $\mathfrak{g}_i$  как наименьшего общего кратного

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2, \dots, \mathfrak{r}_s],$$

такое, что  $Q_\nu^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{r}_\nu}$ ; при этом  $\mathfrak{r}_\nu$  имеет  $\mathfrak{g}_{i-1}$  своим основным идеалом  $(i-1)$ -й степени и совпадает со своим основным идеалом  $i$ -й степени;  $\mathfrak{r}_\nu$  называются компонентами основных идеалов.

<sup>6</sup>В Н.-Н. употребляется только название результатантная форма; название норма соответствует арифметическим свойствам.

<sup>7</sup>Зато более поздние множители  $R_{\mathfrak{n}}$  могут становиться кратными соответствующих множителей  $R_{\mathfrak{m}}$ ; например, всегда тогда, когда  $\mathfrak{m}$  является простым идеалом, а  $\mathfrak{n}$  не является единичным идеалом.

<sup>8</sup>Определение простой функции и первичной функции можно было бы также сформулировать в точной аналогии с 11., заменив только слово идеал словом полином. Наибольшие первичные множители являются аналогом наибольших первичных компонент разложения в 12.



Наивысший элементарный делитель  $\tau_\nu$  равен наибольшему общему делителю — в полиномиальном смысле —  $Q_\nu^{(i)}$  и  $E^{(i)}$ , следовательно равен наибольшему первичному множителю  $E^{(i)}$ .  $\tau_\nu$  однозначно определены своим указанным выше поведением относительно основных идеалов и требованием, чтобы либо отдельная норма, либо наивысший элементарный делитель стал наибольшим первичным множителем  $R^{(i)}$  соответственно  $E^{(i)}$  (Н.-Н., теорема X).

**8. Понятие размерности.** Идеалу  $\mathfrak{m}$  приписывается наивысшая размерность  $n - i$ , если  $R^{(i)}$  является первой отдельной нормой, отличной от единицы, — или, что по 6. равносильно, если  $\mathfrak{g}_i$  является первым основным идеалом, отличным от единичного идеала; единичному идеалу  $\mathfrak{o}$  приписывается размерность  $-1$ . Если имеется только одна отдельная норма  $R^{(i)}$ , отличная от единицы, то есть  $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = \mathfrak{m}$ , то наивысшая размерность называется также просто размерностью  $\mathfrak{m}$ . Если  $\mathfrak{m}$  содержит полином  $G^{(i)} \neq 0$ , то он имеет наивысшую размерность не больше  $n - i$ , как показывает замечание в конце 6. Если  $\mathfrak{m}$  имеет наивысшую размерность  $n - i$ , а  $\mathfrak{n}$  является делителем  $\mathfrak{m}$ , то  $\mathfrak{n}$  также имеет наивысшую размерность не больше  $n - i$ .

**9. Норма (результантная форма) и нули.** Под нулями идеала  $\mathfrak{m}$  понимаются все системы значений  $x_1, \dots, x_i$  из подходящего алгебраического расширения поля  $P(u; x_{i+1}, \dots, x_n)$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), для которых — при присоединении  $x_{i+1}, \dots, x_n$  к области коэффициентов — все полиномы из  $\mathfrak{m}$  обращаются в нуль. Каждому множителю  $R^{(i)}$  нормы (результантной формы) при этом присоединении соответствует столько нулей  $\mathfrak{m}$ , сколько указывает степень  $R^{(i)}$ ; и  $R^{(i)}$ , записанная в билинейных комбинациях  $w_{\mu\nu}$  от  $u_{\mu\nu}$  и дальнейших неопределенных  $v_{\mu\nu}$ , допускает явное разложение:

$$R^{(i)} = \prod_{\nu} (z_i - z_i^{(\nu)}) = \prod_{\nu} (v_{i1}x_1 + \dots + v_{in}x_n - z_i^{(\nu)}), \quad (5)$$

где  $x_1^{(\nu)}, \dots, x_i^{(\nu)}$  каждый раз обозначает систему связанных нулей (Н.-Н., теорема XIII; новое обоснование будет дано в § 3). Следовательно, среди нулей идеала наивысшей размерности  $n - i$  есть такие, которые зависят от  $(n - i)$  параметров, но нет таких, которые зависят от большего числа параметров; тем самым показано совпадение понятия размерности, данного в 8., с обычно употребляемой формулировкой.

**10. Кольцевая область общей теории идеалов.** Основной областью пусть будет коммутативное кольцо, в котором справедлива теорема о конечной цепи: каждая цепь идеалов  $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \dots, \mathfrak{a}_k, \dots$ , где каждый  $\mathfrak{a}_i$  является собственным делителем — делителем в идеальном смысле — непосредственно предыдущего, обрывается после конечного числа шагов. Это требование эквивалентно другому, а именно что каждый идеал имеет идеальный базис (Idealtheorie, теорема I), и поэтому в частности выполняется для полиномиальной области. В следующих пунктах 11., 12., 13. предполагается именно такая общая кольцевая область.

**11. Простые идеалы и первичные идеалы.** Идеал  $\mathfrak{p}$  называется простым идеалом, если из делимости произведения на  $\mathfrak{p}$  следует делимость по крайней мере одного множителя;  $\mathfrak{q}$  называется первичным идеалом — или первичным, — если из делимости произведения на  $\mathfrak{q}$  следует делимость одного множителя или некоторой степени каждого множителя. В символах:

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}} \text{ влечет } ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}};$$

$$a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}, \quad b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}} \text{ для каждой степени } x \text{ влечет } ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}.$$

К каждому первичному идеалу  $\mathfrak{q}$  существует один и только один ассоциированный простой идеал  $\mathfrak{p}$ , который является делителем  $\mathfrak{q}$  и некоторая степень которого делится  $\mathfrak{q}$ ,  $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ ,  $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ ; при этом  $\mathfrak{p}$  состоит из всех элементов кольца, некоторая степень которых делится  $\mathfrak{q}$ . Как показывает определение, каждый простой идеал одновременно является первичным идеалом; под собственными первичными идеалами понимаются такие, которые не являются одновременно простыми идеалами, то есть для которых  $\rho > 1$ .

**12. Теорема о разложении.** Представление  $\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$  идеала как наименьшего общего кратного называется кратчайшим, если ни один  $\mathfrak{q}$  не входит в наименьшее общее кратное остальных — в свое дополнение; оно называется представлением через наибольшие первичные компоненты,

если каждый  $q$  первичен, но наименьшее общее кратное любых двух  $q$  не первично. Каждый идеал допускает кратчайшее представление через конечное число наибольших первичных компонент; для двух разных таких представлений совпадают число компонент и ассоциированные простые идеалы, все взаимно различные. Так однозначно определенные простые идеалы будут называться простыми идеалами, или ассоциированными простыми идеалами, данного идеала (Idealtheorie, теорема IX).

**13. Изолированные компоненты разложения.** Идеал  $\mathfrak{r} = [q_1, \dots, q_i]$  называется изолированной компонентой разложения  $\mathfrak{a}$ , если  $q_i$  встречаются хотя бы в одном кратчайшем представлении  $\mathfrak{a}$  через наибольшие первичные компоненты и удовлетворяют условию, что ни один из их ассоциированных простых идеалов не входит в один из остальных простых идеалов  $\mathfrak{a}$ . Изолированные компоненты разложения однозначно определены своими простыми идеалами; в частности, изолированные наибольшие первичные компоненты также однозначно определены (Idealtheorie, теорема XIII).

**14. Характеристика, совершенные и несовершенные поля, расширение первого рода.** Поле  $\Omega$  имеет характеристику нуль, если простое поле, содержащееся в  $\Omega$  и выведенное из единицы, имеет тип поля рациональных чисел; оно имеет характеристику  $p$ , если это простое поле имеет тип системы классов вычетов по простому числу  $p$ . Поле  $\Omega$  называется совершенным, если каждая простая функция с коэффициентами из  $\Omega$  в подходящем поле расширения разлагается на различные линейные множители; в противном случае оно называется несовершенным. Каждое поле характеристики нуль совершенно; поле характеристики  $p$  совершенно тогда и только тогда, когда вместе с каждым элементом оно содержит также его  $p$ -й корень. Простая функция в несовершенном поле является целой функцией степени  $r$  от  $x^{p^f}$  и в подходящем поле расширения разлагается на  $p^f$ -е степени  $r$  различных линейных множителей;  $f$  называется экспонентой. Простая функция называется функцией первого рода, если она в подходящем поле расширения разлагается на различные линейные множители, то есть если экспонента  $f$  равна нулю; расширение называется расширением первого рода, если каждый его элемент первого рода, то есть является нулем простой функции первого рода. Каждое расширение, возникающее присоединением элемента первого рода, является расширением первого рода; над совершенными полями существуют только расширения первого рода (Steinitz, § 11 и § 13).

**15. Приведенная степень и экспонента конечного расширения.** Если  $\mathcal{K}$  является конечным расширением несовершенного поля  $\Omega$ , то в  $\mathcal{K}$  содержится подполе  $\mathcal{K}_0$  степени  $r$ , которое является первого рода относительно  $\Omega$  и состоит из всех и только тех элементов  $\mathcal{K}$ , которые являются первого рода.  $p^f$ -я степень каждого элемента из  $\mathcal{K}$  принадлежит  $\mathcal{K}_0$ , и в  $\mathcal{K}$  имеются элементы, которые имеют точно степень  $rp^f$ .  $r$  называется приведенной степенью,  $f$  — экспонентой конечного расширения (Steinitz, § 14, 1 и § 14, 5).

## § 2. Форма элементарных делителей и норма простых идеалов и первичных идеалов. Делители простых идеалов

С этого места речь всюду идет о полиномиальной области, определенной в § 1, 1. Сначала нужно показать, что и для простых идеалов и первичных идеалов можно ограничиваться преобразованными идеалами, согласно следующему утверждению.

**Лемма I.** Преобразованный идеал  $\mathfrak{p}$  простого идеала  $\bar{\mathfrak{p}}$  в  $\mathfrak{S}$  становится простым идеалом, а преобразованный идеал  $\mathfrak{q}$  первичного идеала  $\bar{\mathfrak{q}}$  в  $\mathfrak{S}$  становится первичным идеалом. Иными словами, свойство быть простым идеалом или первичным идеалом сохраняется при присоединении  $u_{\mu\nu}$  к  $P$ .

В самом деле, пусть предположено, что  $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ ,  $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ , где  $a$  и  $b$  не обязательно должны быть преобразованными идеалами; пусть, например,  $a(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ ,  $b(x) \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ , где  $a(x)$  и  $b(x)$  означают полиномы из  $\mathfrak{a}$  и  $\mathfrak{b}$ . Обращением (1) по (1') получаем — понимая под  $T$  без ограничения общности степенные произведения  $t_{\mu\nu}$  —

$$a(x) = \sum T_i a_i(y), \quad b(x) = \sum T'_i b_i(y),$$

и по крайней мере один  $a_i(y)$  и один  $b_i(y)$  не должны делиться на  $\bar{\mathfrak{p}}$ . Пусть, скажем,  $a_h(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$ ,  $b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$  являются соответствующими старшими членами при некотором лексикографическом порядке на  $T$ ; тогда также  $a_h(y)b_k(y) \not\equiv 0 \pmod{\bar{\mathfrak{p}}}$ , а следовательно  $a(x)b(x) \not\equiv$

$0 \pmod{p}$  и поэтому  $ab \not\equiv 0 \pmod{p}$ . Тем самым доказано, что  $p$  прост. Доказательство, очевидно, опирается на то, что система классов вычетов по простому идеалу образует кольцо без делителей нуля; это свойство сохраняется при присоединении неопределенных.

Соответственно пусть  $a \not\equiv 0 \pmod{q}$ ,  $b^x \not\equiv 0 \pmod{q}$  для каждого показателя  $x$ ; тогда из существования идеального базиса следует, что должны существовать  $a(x)$  из  $a$  и  $b(x)$  из  $b$  такие, что  $a(x) \not\equiv 0 \pmod{q}$ ,  $b(x)^x \not\equiv 0 \pmod{q}$  для каждого показателя  $x$ : ибо при противоположном предположении некоторая степень  $b$  делилась бы на  $q$ .

Положив  $a(x)b(x) = c(x)$ , пусть  $a^*, b^*, c^*$  означают идеалы, соответственно полученные из коэффициентов  $a_i(y), b_j(y), c_k(y)$  полиномов  $a(x), b(x), c(x)$ . Тогда  $b^{*x} \not\equiv 0 \pmod{q}$  для каждого показателя  $x$ , так как иначе  $b(x)^x$  делился бы на  $q$ ; ввиду  $a^* \not\equiv 0 \pmod{q}$  поэтому должно также выполняться  $a^* b^{*\lambda} \not\equiv 0 \pmod{q}$  для каждого показателя  $\lambda$ . Но по теореме Дедекинда–Мертенса<sup>9</sup> существует показатель  $\lambda$  такой, что  $a^* b^{*\lambda} \equiv c^* b^{*\lambda-1}$ ; следовательно, должно быть  $c^* \not\equiv 0 \pmod{q}$ . Отсюда следует  $c(x) \not\equiv 0 \pmod{q}$ , а значит  $ab \not\equiv 0 \pmod{q}$ . Тем самым доказано, что  $q$  первичен.

Также при представлении идеала как наименьшего общего кратного можно ограничиваться преобразованными идеалами, согласно следующему утверждению.

**Лемма II.** Из представления  $\bar{m} = [c_1, \dots, c_s]$  в  $\mathfrak{S}$  следует представление  $m = [c'_1, \dots, c'_s]$  в  $\mathfrak{S}'$ , где  $c'_i$  означают преобразованные идеалы  $c_i$ . В частности, в каждом кратчайшем представлении через наибольшие первичные компоненты эти компоненты можно считать преобразованными.

В самом деле,  $m$  делится на  $[c'_1, \dots, c'_s]$ , поскольку каждый полином  $f(x)$  из  $m$  — возможно, после умножения на подходящую степень  $U(u)$  — имеет вид  $\sum U_i(u)f_i(y)$ , где каждый  $f_i(y)$  как полином из  $\bar{m}$  по предположению делится на все  $c_i$ . Обратно, если  $f(x)$  делится на каждый  $c'_i$ , то он имеет указанный выше вид и поэтому делится на  $m$ . Следовательно, если исходить из разложения на наибольшие первичные компоненты в  $\mathfrak{S}$ , получается разложение  $m = [q'_1, \dots, q'_s]$  в  $\mathfrak{S}'$ ; здесь  $q'_i$  как преобразованные идеалы первичных идеалов первичны по лемме I, причем речь идет о наибольших первичных компонентах, поскольку различным ассоциированным простым идеалам  $\bar{p}$  в  $\mathfrak{S}$  соответствуют также различные  $p$  в  $\mathfrak{S}'$ .

Теперь речь идет о первой характеристике простых идеалов и первичных идеалов посредством формы элементарных делителей и нормы, еще без полного разделения простого и первичного; именно в точной аналогии с теорией идеалов в алгебраических числовых полях<sup>10</sup> имеет место:

**Теорема I.** Форма элементарных делителей простого идеала равна простой функции, а норма — степени этой простой функции. Для первичных идеалов форма элементарных делителей и норма равны первичным функциям, а именно степеням одной и той же простой функции, которая сама является формой элементарных делителей ассоциированного простого идеала. Для простых идеалов и первичных идеалов наивысшая размерность совпадает с размерностью в собственном смысле; эта размерность одинакова для первичного идеала и его ассоциированного простого идеала.

Теорема I очевидно выполняется для единичного идеала, форма элементарных делителей и норма которого равны единице. Пусть теперь простой идеал  $p$  имеет наивысшую размерность  $(n - i)$ ; по (4), § 1, 6. получаем

$$E^{(i)}g_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad \text{но} \quad E^{(i)}g_i \equiv 0 \pmod{p},$$

так как иначе  $p$  по § 1, 8. имел бы наивысшую размерность не больше  $n - i - 1$ . Поэтому  $g_i \equiv 0 \pmod{p}$ , то есть  $p$  совпадает со своим основным идеалом  $i$ -й ступени и, следовательно, также с  $g_{i+1}, g_{i+2}, \dots$ . Значит,  $R^{(i+1)}, \dots, R^{(n)}$  равны единице, а следовательно и  $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \dots$  как делители  $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \dots$ . Поэтому форма элементарных делителей равна  $E^{(i)}$ , которое должно быть простой функцией  $P^{(i)}$ . Действительно, по § 1, 5. и с учетом того, что  $g_{i-1}$  становится единичным идеалом,  $E^{(i)}$  определено как наибольший общий делитель — в полиномиальном смысле — всех  $B^{(i)}$ , делящихся на  $p$ ; из  $E^{(i)} = E_1^{(i)}E_2^{(i)} \equiv 0 \pmod{p}$  следовало бы, что уже один

<sup>9</sup>Ср. Н.-Н., с. 63 и прим. 10).

<sup>10</sup>В качестве наивысшего элементарного делителя идеалов в алгебраических числовых полях следует рассматривать наименьшее целое рациональное число, делящееся на этот идеал, то есть в частности простое число, делящееся на простой идеал, или степень простого числа, делящуюся на первичный идеал (степень простого идеала). В самом деле, каждый идеал  $a^*$  одновременно является модулем  $A^*$  линейных форм от элементов  $\omega_1, \dots, \omega_n$  базиса поля, а  $(\omega_1, \dots, \omega_n)$  является основным модулем  $A^*$ ; наименьшее целое рациональное число, делящееся на  $a^*$ , следовательно становится наивысшим элементарным делителем этого модуля  $A^*$ , тогда как норма  $a^*$  становится произведением всех элементарных делителей  $A^*$ .

из множителей  $E_1^{(i)}$  или  $E_2^{(i)}$  должен обращаться в нуль по модулю  $p$ . Поскольку же некоторая степень  $E^{(i)}$  делится на  $R^{(i)}$ ,  $R^{(i)}$  равна степени — возможно, первой — этой простой функции  $P^{(i)}$ ; одновременно  $R^{(i)}$  является нормой  $p$ . Так как встречается только одна отдельная норма, отличная от единицы, наивысшая размерность  $p$  в итоге совпадает с размерностью в собственном смысле.

Соответственно пусть первичный идеал  $q$  имеет наивысшую размерность  $n - i$ ; тогда, как выше,

$$(E^{(i)}g_{i-1})^x \not\equiv 0 \pmod{q}, \quad \text{но} \quad (E^{(i)}g_i)^x \equiv 0 \pmod{q}$$

для каждого показателя  $x$ ; следовательно, как выше,  $q = g_i$ , его форма элементарных делителей равна  $E^{(i)}$ , его норма равна  $R^{(i)}$ , а наивысшая размерность равна размерности в собственном смысле. Эта размерность совпадает с размерностью ассоциированного простого идеала; ибо из  $p^p \equiv 0 \pmod{q}$ ,  $q \equiv 0 \pmod{p}$  следует, что размерность  $(n - i)$  идеала  $p$  не больше размерности  $q$ , а размерность  $q$  не больше размерности  $p^p$ ; из  $(P^{(i)})^p \equiv 0 \pmod{p^p}$ , где  $P^{(i)}$  означает форму элементарных делителей  $p$ , получается, что последняя наивысшая размерность не больше  $n - i$ , и потому  $n - i$  является размерностью  $p$  и  $q$ . Из  $(P^{(i)})^p \equiv 0 \pmod{q}$  далее следует, что  $E^{(i)}$  — как наибольший общий делитель всех  $B^{(i)}$  из  $q$  — становится степенью  $P^{(i)}$ , возможно также первой, и что то же верно для  $R^{(i)}$ . Тем самым теорема I доказана во всех частях.

Характеризация простых идеалов посредством понятия размерности дается следующим утверждением.

**Теорема II.** Простой идеал не имеет собственного делителя той же наивысшей размерности; и обратно, каждый идеал с этим свойством является простым идеалом.

Доказательство опирается на следующую лемму.

**Лемма III.** Если простой идеал  $p$  из полиномов с коэффициентами из поля  $\Omega$  имеет только конечное число классов вычетов, линейно независимых относительно  $\Omega$ , то  $p$  не имеет собственного делителя, отличного от единичного идеала; иными словами, система классов вычетов по  $p$  образует поле.

Предположение означает, что существует конечное число  $k$  такое, что между любыми  $(k + 1)$  классами вычетов имеется линейная зависимость с коэффициентами из  $\Omega$  — точнее, с коэффициентами из поля классов вычетов ( $\Omega$ ), представленного всеми элементами  $\Omega$ , — но что существует по крайней мере одна система из  $k$  классов вычетов, линейно независимых относительно  $\Omega$ ; отсюда немедленно следует, что все классы вычетов можно линейно выразить через любую систему из  $k$  линейно независимых классов. Пусть теперь  $a$  является собственным делителем  $p$ , а  $a(z) \not\equiv 0 \pmod{p}$  — полиномом из  $a$ ; тогда из  $c_1 f_1(z) + \dots + c_k f_k(z) \equiv 0 \pmod{p}$  следует также

$$c_1 a(z) f_1(z) + \dots + c_k a(z) f_k(z) \equiv 0 \pmod{p};$$

это означает, что наряду с классами вычетов  $f_1, \dots, f_k$  также классы вычетов  $a f_1, \dots, a f_k$  образуют систему из  $k$  линейно независимых классов, через которые, в частности, можно линейно представить единичный класс. Следовательно,  $a$  равен единичному идеалу; иначе говоря, система классов вычетов образует поле, так как для  $a(z) \not\equiv 0 \pmod{p}$  всегда существует  $f(z)$  такое, что  $1 \equiv a(z) f(z) \pmod{p}$ .

Для доказательства первой части теоремы II остается лишь заметить, что каждый простой идеал размерности  $(n - i)$  — более общо, каждый идеал наивысшей размерности  $(n - i)$  — имеет только конечное число классов вычетов, линейно независимых относительно  $P(u; x_{i+1}, \dots, x_n)$ , а именно (§ 1, 5.) столько, сколько указывает степень  $R^{(i)}$ , поскольку здесь  $g_{i-1}$  становится единичным идеалом. Поэтому каждый собственный делитель  $a$  идеала  $p$  при присоединении  $x_{i+1}, \dots, x_n$  к  $P(u)$  переходит в единичный идеал; иначе говоря, основной идеал  $i$ -й ступени идеала  $a$  становится единичным идеалом. Это означает, что наивысшая размерность  $a$  не больше  $n - i - 1$ . Чтобы утверждение выполнялось также для непреобразованного идеала  $a$  как делителя, достаточно по § 1, 2. перейти к новой преобразованной области.

Пусть теперь, обратно,  $p$  не имеет собственного делителя той же наивысшей размерности  $n - i$ ; и пусть  $a \not\equiv 0 \pmod{p}$ ,  $b \not\equiv 0 \pmod{p}$ , где  $a$  и  $b$  снова предполагаются преобразованными идеалами. Тогда по предположению, поскольку  $(a, p)$  и  $(b, p)$  как наибольшие общие делители — в идеальном

смысле — становятся собственными делителями  $\mathfrak{p}$ , имеем

$$E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})}, \quad E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})}.$$

Отсюда получается

$$E^{(n)} \dots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{ab}, \mathfrak{p})},$$

и поэтому необходимо  $\mathfrak{ab} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ , так как иначе  $\mathfrak{p}$  имел бы меньшую наивысшую размерность, чем  $n - i$ . Поскольку  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  являются преобразованными идеалами, отсюда следует, что  $\mathfrak{p}$ , а по лемме I также  $\bar{\mathfrak{p}}$ , является простым идеалом. Тем самым теорема II доказана.

### § 3. Нули простых идеалов и примарных идеалов

Переход к непосредственному обоснованию теории нулей (§ 1, 9), сначала для простых идеалов, дает следующая лемма, представляющая расширение леммы III и верная для простых идеалов в произвольных кольцах.

**Лемма IV.** Систему классов вычетов по каждому простому идеалу, отличному от единичного идеала, можно образованием частных расширить до поля, поля классов вычетов простого идеала.

Система классов вычетов по произвольному идеалу образует кольцо, поскольку сумма, разность и произведение снова принадлежат этой системе, а ассоциативный, коммутативный и дистрибутивный законы сохраняются при переходе к классам вычетов. Если речь специально идет о простых идеалах, то это кольцо не имеет делителей нуля; действительно, определение простых идеалов (§ 1, 11) утверждает, что произведение ненулевых классов вычетов также не обращается в нуль. Если простой идеал отличен от единичного идеала, то это кольцо содержит по меньшей мере один элемент, отличный от нулевого элемента, и потому может быть расширено образованием частных — присоединением пар элементов — до поля;<sup>11</sup> таким образом поле классов вычетов определено.

Для дальнейшего сначала зафиксируем обозначение, которое будет всюду сохраняться.

**Обозначение.** Классы вычетов вообще будем обозначать, заключая в скобки какой-либо элемент класса:  $(x), \dots, (a(x)), \dots$ ; так же поля из классов вычетов будем обозначать скобками. В частности,  $(P), (P(u)), (P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$  обозначают поля классов вычетов, состоящие из всех и только тех классов вычетов, которые могут быть представлены элементами из  $P, P(u), P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ .

Сначала напомним также следующее. Поле  $\mathcal{R}$  называется полем алгебраического ранга (степени трансцендентности)  $k$  относительно основного поля  $\Omega$ , если  $\mathcal{R}$  содержит по меньшей мере одну систему из  $k$  величин, алгебраически независимых относительно  $\Omega$ , — трансцендентных величин, — но любые  $k + 1$  величин из  $\mathcal{R}$  алгебраически зависимы относительно  $\Omega$ . Если  $\mathcal{R}$  можно представить как алгебраическое расширение подполя  $\Omega(z_1, \dots, z_s)$ , где  $z$  алгебраически независимы — трансцендентны — относительно  $\Omega$ , то необходимо  $s = k$ ;<sup>12</sup> точно так же алгебраический ранг  $\mathcal{R}(u)$  относительно  $\Omega(u)$  равен  $k$ , если  $u$  означает неопределенные, не содержащиеся в  $\mathcal{R}$ .

Построение поля нулей теперь идет в полной аналогии с обычным путем для простых функций одной неопределенной<sup>13</sup>, согласно следующей теореме.

**Теорема III.** Полю классов вычетов  $(\mathcal{R})$  простого идеала  $\mathfrak{p}$  размерности  $n - i$  можно изоморфно поставить в соответствие поле нулей  $R$  идеала  $\mathfrak{p}$ , которое имеет алгебраический ранг  $n - i$  — зависит от  $n - i$  параметров — и, в частности, может рассматриваться как конечное расширение поля  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ . Изоморфизм между  $(\mathcal{R})$  и  $R$  охватывает изоморфизм между  $(P)$  и  $P$ , между  $(P(u))$  и  $P(u)$ , а при принятии  $x_{i+1}, \dots, x_n$  за параметры также между  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$  и  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$ . Обратно, всякое поле нулей алгебраического ранга  $n - i$  — зависящее от  $n - i$  параметров — изоморфно полю классов вычетов  $(\mathcal{R})$ .

<sup>11</sup>Steinitz, § 3. Предположения о ненулевом элементе в первоначальной области целостности достаточно, поскольку тогда существование единицы обеспечивается образованием частных, и тем самым первоначальная область становится подобластью поля; Steinitz предполагает существование единицы в области целостности.

<sup>12</sup>Доказательство этого известного факта, верное при произвольной характеристике, см. у Steinitz, § 22, 9. — При присоединении  $u$  алгебраический ранг не может возрасти, поскольку речь идет о рациональных комбинациях первоначальных элементов с коэффициентами из  $\Omega(u)$ ; он не может и убывать, поскольку всякое соотношение между элементами из  $\mathcal{R}$  с коэффициентами из  $\Omega(u)$  распадается на конечное число соотношений с коэффициентами из  $\Omega$ .

<sup>13</sup>Steinitz, § 6.

Из теоремы III как следствие получается известная теорема: если идеал  $\mathfrak{a}$  обращается в нуль во всех нулях простого идеала  $\mathfrak{p}$ , то  $\mathfrak{a}$  делится на  $\mathfrak{p}$ .

Для доказательства прежде всего заметим, что поле классов вычетов  $(\mathcal{R})$  имеет алгебраический ранг  $n - i$  относительно  $(P(u))$ . Действительно, классы  $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$  алгебраически независимы относительно  $(P(u))$ , поскольку  $\mathfrak{p}$ , будучи размерности  $n - i$ , не содержит полинома, свободного от  $x_1, \dots, x_i$ ; всякий дальнейший класс, однако, зависит от них. Ибо из принадлежности формы элементарных делителей  $P^{(i)}$  к  $\mathfrak{p}$  по § 1, 2 также для  $\lambda = 1, 2, \dots, i$  следует принадлежность полиномов, соответственно зависящих от  $x_\lambda, x_{i+1}, \dots, x_n$ . Поэтому  $(\mathcal{R})$  становится конечным расширением поля  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ ; степень относительно этого подполя по § 1, 5 – с учетом того, что  $\mathfrak{g}_{i-1}$  равен единичному идеалу, а  $\mathfrak{g}_i$  по теореме I становится равным  $\mathfrak{p}$  – равна степени нормы.

Чтобы перейти к изоморфному полю нулей, нужно далее заметить, что  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$  и  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$  изоморфно соотносены тем, что каждому элементу из  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$  сопоставляется класс вычетов, представленный этим элементом. Действительно, сначала при этом сопоставлении области целостности, состоящие из полиномов в  $u, x_{i+1}, \dots, x_n$  соответственно в  $(u), (x_{i+1}), \dots, (x_n)$ , соответствуют друг другу изоморфно, поскольку  $\mathfrak{p}$  не содержит полинома, свободного от  $x_1, \dots, x_i$ , а значит различным полиномам из  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$  соответствуют и различные классы; из изоморфных областей целостности, однако, образованием частных возникают изоморфные поля. Изоморфное отношение между  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$  и  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$  охватывает отношение между  $P$  и  $(P)$ , между  $P(u)$  и  $(P(u))$ . Чтобы расширить этот изоморфизм до изоморфизма между  $(\mathcal{R})$  и полем нулей  $R$ , пусть классам  $(x_1), \dots, (x_i)$  изоморфно сопоставлены некоторые новые элементы  $\xi_1, \dots, \xi_i$ ; то есть каждому полиному  $(a(x))$  соответствует полином  $a(\xi_1, \dots, \xi_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ , а сумме и произведению соответствуют сумма и произведение. Образованием частных – причем можно ограничиться знаменателями из подполя  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$  соответственно  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$  – полю классов вычетов  $(\mathcal{R})$  тогда соответствует поле  $R$ , которое становится конечным расширением  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$  степени нормы и которое можно назвать полем нулей; ибо это сопоставление утверждает, что  $f(\xi_1, \dots, \xi_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$  обращается в нуль, как только  $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ . Вместо  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$  во всем рассуждении могло бы фигурировать и любое другое подполе  $(\mathcal{R})$ , возникающее присоединением  $n - i$  алгебраически независимых величин.

Обратно, легко показать, что всякое поле нулей  $R$  алгебраического ранга  $n - i$  становится изоморфным полю классов вычетов. Поскольку  $R$  рационально, с коэффициентами из  $P(u)$ , выводится из величин  $\xi_1, \dots, \xi_i$ , среди этих величин должны содержаться  $n - i$  алгебраически независимых, следовательно трансцендентных относительно  $P(u)$ , элементов. В частности, это должно выполняться для  $\xi_{i+1}, \dots, \xi_n$ , поскольку из  $P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ , как выше, следует, что  $R$  становится алгебраическим расширением поля  $P(u, \xi_{i+1}, \dots, \xi_n)$ . Поскольку по предположению  $f(\xi)$  обращается в нуль для всякого полинома  $f(x)$  из  $\mathfrak{p}$ , каждому классу полиномиальной области элементов  $(x)$ , содержащейся в  $(\mathcal{R})$ , соответствует один и только один элемент из  $R$ , являющийся полиномом от  $\xi$ ; и сумме и произведению соответствуют сумма и произведение. Но различным классам соответствуют и различные элементы из  $R$ ; иначе некоторому ненулевому классу, а значит после подходящего умножения также классу из  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ , представленному полиномом, соответствовал бы нулевой элемент в  $R$ , и между величинами  $\xi_{i+1}, \dots, \xi_n$  вопреки предположению существовала бы алгебраическая зависимость. Это сопоставление исчерпывает все полиномы от  $\xi$ , содержащиеся в  $R$ ; а образованием частных – причем снова можно ограничиться знаменателями из  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$  соответственно  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$  – из этих изоморфных областей целостности возникают изоморфные поля.

Пусть теперь идеал  $\mathfrak{a}$  обращается в нуль во всех нулях  $\mathfrak{p}$ , следовательно в частности и во всех нулях, зависящих от  $n - i$  параметров. Если тогда  $a(x)$  есть произвольный полином из  $\mathfrak{a}$ , то  $a(\xi)$  обращается в нуль; вследствие изоморфизма между  $R$  и  $(\mathcal{R})$  класс  $(a(x))$  тем самым становится нулевым классом, а  $a(x)$  и, значит,  $\mathfrak{a}$  делится на  $\mathfrak{p}$ . Этим доказаны теорема III и следствие.

Чтобы перейти от теоремы III к разложению, данному в § 1, 9, сначала для простых идеалов, и чтобы иметь возможность делать более точные утверждения об экспонентах, требуется дальнейшее исследование формы элементарных делителей, согласно следующей лемме.

**Лемма V.** Если при характеристике  $p$  форма элементарных делителей  $E^{(i)}$  простого идеала

или примарного идеала – более общо, идеала  $\mathfrak{a}$ , для которого наивысшая размерность совпадает с размерностью в собственном смысле, – имеет экспоненту  $f$  относительно  $x_i$ , то есть является целой функцией от  $x_i^{p^f}$ , то она имеет также экспоненту  $f$  относительно  $x_{i+1}, \dots, x_n$  и относительно неопределенных  $u_{\mu\nu}$  соответственно  $t_{\mu\nu}$ , входящих в  $E^{(i)}$ . В частности, когда областью коэффициентов является совершенное поле, форма элементарных делителей  $P^{(i)}$  простого идеала всегда имеет экспоненту нуль относительно  $x_i$ , то есть является простой функцией первого рода.

Для этого надо заметить, что  $P(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$  становится несовершенным, как только  $P$  является совершенным полем характеристики  $p$ , так что из § 1, 14 не следует прямо, что  $P^{(i)}$  становится функцией первого рода. Пусть теперь  $E^{(i)}$  имеет экспоненту  $f$  относительно  $x_i$ , но содержит другую неопределенную  $x_{i+1}$  с экспонентой  $f'$ . Тогда – перестановкой  $u_{\mu\nu}$  соответственно  $t_{\mu\nu}$  – по § 1, 2 существует также ненулевой полином  $G^{(i)}$ , делящийся на идеал, который является целой функцией от  $x_{i+1}^{p^{f'}}$  и который по определению формы элементарных делителей делится на  $E^{(i)}$ . Но поскольку  $G^{(i)}$  имеет ту же степень, что и  $E^{(i)}$ , он должен совпадать с  $E^{(i)}$  с точностью до множителя из  $P(u)$ , и потому необходимо  $f' = f$ . Следовательно,  $E^{(i)}$  – которую можно считать целой и примитивной по  $t_{\mu\nu}$  – имеет вид

$$E^{(i)} = \sum c_\rho(t) x_i^{\alpha_\rho p^f} x_{i+1}^{\beta_\rho p^f} \cdots x_n^{\gamma_\rho p^f} = \sum c_\rho(t) X_\rho^{p^f},$$

где  $X_\rho$  означают степенные произведения от  $x$ , и  $X_\rho$  делятся на  $\mathfrak{a}$ . Поэтому получается полином, также принадлежащий  $\mathfrak{a}$ , если в  $X_\rho$  каждый показатель отдельных  $t$  заменить на наибольшее кратное  $p^f$ , содержащееся в нем; как видно из приведенного представления, это сводится к тому, чтобы в  $c_\rho(t)$  каждый показатель  $t$  заменить на наибольшее кратное  $p^f$ , содержащееся в нем. При этой подстановке  $E^{(i)}$  переходит в полином от  $x_i^{p^f}, \dots, x_n^{p^f}$ , который по определению делится на  $E^{(i)}$ , причем из-за предположенной примитивности также относительно  $t$ ; значит, он должен быть тождественным с  $E^{(i)}$ , поскольку степень не возросла ни в одном аргументе. В частности, если  $P$  является совершенным полем, то  $E^{(i)}$  как целая функция от  $x_i^{p^f}$  становится  $p^f$ -й степенью; если же речь идет о простом идеале, то необходимо  $f = 0$ , и форма элементарных делителей  $P^{(i)}$  становится простой функцией первого рода.

Разложение теперь дает следующая теорема.

**Теорема IV.** Форма элементарных делителей  $P^{(i)}$  простого идеала допускает в поле Галуа, выведенном из поля нулей, явное разложение:

$$\begin{aligned} P^{(i)} &= \prod_\nu (x_i - t_{i+1} x_{i+1}^{(\nu)} - \cdots - t_n x_n^{(\nu)})^e \\ &= \prod_\nu (t_i (y_i - y_i^{(\nu)}) + \cdots + t_n (y_n - y_n^{(\nu)}))^e, \end{aligned}$$

где  $y_1^{(\nu)}, \dots, y_n^{(\nu)}$  каждый раз задают соответствующую систему нулей первоначальных неопределенных  $y$ , независимую от  $t_i, \dots, t_n$ , различным  $\nu$  соответствуют различные линейные множители, а экспонента  $e$  для совершенного поля  $P$  имеет значение один, для несовершенного – значение  $p^f$  ( $f > 0$ ). Тем самым при присоединении новых неопределенных  $v$  также определяется разложение формы элементарных делителей, записанной в билинейных комбинациях  $u$  и  $v$  вместо  $u_{\mu\nu}$ :

$$\begin{aligned} P^{(i)}(w) &= \prod_\nu (z_i - z_i^{(\nu)})^e \\ &= \prod_\nu (v_{i1} (y_1 - y_1^{(\nu)}) + \cdots + v_{in} (y_n - y_n^{(\nu)}))^e, \end{aligned}$$

где  $e$  имеет то же значение, что и выше. Так же этим дано разложение нормы простого идеала или примарного идеала с  $p$  как ассоциированным простым идеалом – как степени  $P^{(i)}$ .

Как следствие из теоремы IV получается еще: если два простых идеала совпадают по своей форме элементарных делителей  $P^{(i)}$ , то они тождественны.

Доказательство теоремы IV сведется к установлению, что форма элементарных делителей  $P^{(i)}$  тождественна фундаментальному уравнению поля расширения  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n), (x_i))$  над

$(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ . Сначала – чтобы получить представление о зависимости от неопределенных  $u_{\mu\nu}$  соответственно  $t_{\mu\nu}$  – перейдем к полю классов вычетов  $(S)$  идеала  $\mathfrak{p}$ , которое по сказанному при определении алгебраического ранга должно иметь алгебраический ранг  $n - i$  относительно  $(P)$ , где  $(P)$  означает подполе, представленное элементами из  $P$ . Ведь  $(S)$  возникает присоединением неопределенных  $u$  соответственно  $t$  к подполю, изоморфному некоторому  $(\mathcal{R})$ , которое получается образованием частных из всех и только тех классов, которые могут быть представлены полиномами из  $\mathfrak{S}$ , причем  $(P)$  и  $(P)$  соответствуют друг другу. Поэтому алгебраический ранг  $(S)$  относительно  $(P(u))$  равен рангу этого подполя относительно  $(P)$ , и значит, по изоморфизму, равен рангу  $(\mathcal{R})$  относительно  $(P)$ . Поскольку  $(S)$  рационально, с коэффициентами из  $(P)$ , выводится из классов  $(y_1), \dots, (y_n)$ , среди этих классов должны быть  $n - i$  алгебраически независимых, и  $(S)$  возникает как конечное алгебраическое расширение подполя, порожденного присоединением этих  $n - i$  классов к  $(P)$ .<sup>14</sup>

Если присоединить только неопределенные  $t_{\mu\nu}$ , входящие в  $x_{i+1}, \dots, x_n$ , то снова возникает поле классов вычетов, которое содержит классы  $(y_1), \dots, (y_n)$  и  $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$  и становится конечным алгебраическим расширением поля  $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$ ; при этом речь идет о полях, изоморфных подполям  $(S)$ , а не тождественных с ними, поскольку при различных неопределенных классы вычетов хотя и представлены одними и теми же элементами, но не тождественны, так как не содержат тех же элементов. Значит, в зависимость классов  $(y)$  от  $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$  входят только неопределенные  $t_{\mu\nu}$ . Теперь образуем, присоединив  $t_{i1}, \dots, t_{in}$ , класс  $(x_i) = (t_{i1}y_1 + \dots + t_{in}y_n)$ ; и пусть  $(x_{i\nu}) = (t_{i1}y_{1\nu} + \dots + t_{in}y_{n\nu})$  будут  $r$  различных сопряженных значений, лежащих в поле Галуа относительно  $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$ . Тогда – смотря по тому, идет ли речь о расширениях первого рода или нет, – произведение по множителям  $x_i - (x_{i\nu})$  или по их  $p^f$ -м степеням является простой функцией  $(G)$  относительно  $(P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n))$ ; ибо, поскольку существуют элементы степени  $r \cdot p^f$  (§ 1, 15), необходимо, чтобы  $(x_i)$  был таким элементом, так как всякий элемент возникает специализацией  $t_{\mu\nu}$ ; но  $(x_i)$  является нулем  $(G)$ . Переходя к изоморфному полю нулей идеала  $\mathfrak{p}$  и к выведенному из него полю Галуа, получаем, что  $G$  допускает разложение на линейные множители  $x_i - t_{i1}y_{1\nu} - \dots - t_{in}y_{n\nu}$  соответственно на их  $p^f$ -е степени. Но поскольку  $(G)$  обращается в нуль при  $x_i = (x_i)$ , то  $G(x_i)$  делится на  $\mathfrak{p}$  и тем самым на  $P^{(i)}$ ; а как простая функция относительно  $P(t_{\mu\nu}, x_{i+1}, \dots, x_n)$  и как примитивная относительно  $x_i$ ,  $G$  должна совпадать с  $P^{(i)}$ . Тем самым первое разложение теоремы IV доказано.

Чтобы перейти ко второму разложению, надо заметить, что свойство быть или не быть расширением первого рода сохраняется при присоединении неопределенных. Поэтому после присоединения  $v_1, \dots, v_n$  и всех  $t_{\mu\nu}$  образуем класс  $(z) = (v_1x_1 + \dots + v_nx_n)$  и сопряженные классы  $(z_\nu) = (v_1x_{1\nu} + \dots + v_nx_{n\nu})$ . Тогда произведение по всем  $z - (z_\nu)$  соответственно по их  $p^f$ -м степеням снова является простой функцией  $(H)$ , обращающейся в нуль при  $z = (z)$ . Следовательно,  $H$ , как и выше, представима в виде произведения линейных множителей и тождественна форме элементарных делителей простого идеала, выведенного из  $\mathfrak{p}$  композицией преобразования (1) с  $z = v_1x_1 + \dots + v_nx_n$ ; эта форма элементарных делителей, однако, – из-за взаимной специализации – получается из  $P^{(i)}$  заменой  $u_{\mu\nu}$  некоторыми билинейными комбинациями  $u$  и  $v$ .<sup>15</sup> С этими разложениями дано также разложение нормы как степени  $P^{(i)}$ ,<sup>16</sup> а также разложение нормы и формы элементарных делителей примарного идеала с  $\mathfrak{p}$  как ассоциированным простым идеалом.

Наконец, если два простых идеала совпадают по форме элементарных делителей  $P^{(i)}$ , то вследствие приведенного разложения они совпадают по своим нулям; значит, они взаимно делятся друг на друга и потому тождественны.

<sup>14</sup>Это замечание показывает, что теорему III со следствием можно было бы прямо сформулировать и доказать для поля нулей  $R$  идеала  $\mathfrak{p}$ . Но только переход к преобразованному идеалу обеспечивает, что в наибольших примарных компонентах одинаковой размерности произвольного идеала при нулях появляются одни и те же параметры; и только тем самым получается связь с нормой и формой элементарных делителей произвольного идеала.

<sup>15</sup>Н.-Н., § 7.

<sup>16</sup>Для расширений первого рода, следовательно в частности над совершенными полями, речь идет о первой степени; над несовершенными полями – о  $p^f$ -й степени, как будет показано в § 6, теоремах XIII и XIV.



#### § 4. Арифметическая формулировка понятия размерности.

Первая формулировка понятия размерности, независимая от введения преобразованных идеалов, дается следующей теоремой.

**Теорема V.** *Размерность простого идеала задается алгебраическим рангом его поля классов вычетов. Наивысшая размерность идеала равна наибольшему из чисел размерности его ассоциированных простых идеалов.*

Первая часть теоремы V была доказана в первом замечании к теореме IV, где было показано, что алгебраический ранг поля классов вычетов  $(\mathcal{R})$  идеала  $\mathfrak{p}$  равен размерности  $\mathfrak{p}$ , в согласии с § 1, 8. Для доказательства второй части пусть  $\mathfrak{m} = [q_1, \dots, q_a]$  будет кратчайшим представлением через наибольшие первичные компоненты; тогда прежде всего ни один  $q$ , как делитель  $\mathfrak{m}$ , не может иметь более высокой размерности, чем  $\mathfrak{m}$ . Но произведение всех  $q$  делится на  $\mathfrak{m}$ , а следовательно, и произведение всех форм элементарных делителей отдельных  $q$ ; если поэтому  $n-i$  есть наибольшее из чисел размерности  $q$ , то  $\mathfrak{m}$  содержит полином  $G^{(i)} \neq 0$ , а значит, не может иметь размерность выше  $n-i$ . Числа размерности  $q$  по теореме I совпадают с числами размерности их ассоциированных простых идеалов. Если без введения преобразованных идеалов определить размерность простого идеала через алгебраический ранг поля классов вычетов, то вторая часть теоремы V дает определение наивысшей размерности произвольного идеала.

Чтобы, с другой стороны, охватить понятие размерности цепочками простых идеалов, что снова не зависит от введения преобразованных идеалов, нужно в дополнение к теореме II показать следующее.

**Теорема VI.** *Каждый простой идеал, отличный от единичного идеала, имеет — после возможного присоединения неопределенных — по крайней мере один простой идеал в качестве делителя, размерность которого уменьшилась ровно на единицу.*

Действительно, если  $\mathfrak{p}$  имеет размерность  $(n-i) > 0$  и  $v$  обозначает новую неопределенную, то

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}, x_i - v)$$

является идеалом требуемого свойства. Это следует из изоморфного сопоставления; имеем  $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}^*, x_i - v)$ , где  $\mathfrak{p}^*$  получается из  $\mathfrak{p}$  тем, что  $x_i$  заменяется неопределенной  $v$ , а  $v$  присоединяется к области коэффициентов; точно так же классы вычетов получают заменой класса  $(x_i)$  классом  $(v)$ . Но  $\mathfrak{p}$  переходит в себя, когда  $x_i$  присоединяется к  $P(u)$ ; из

$$h(x_i)f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}, \quad h(x_i) \neq 0$$

необходимо следует  $f(x) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ ; ведь если бы  $\mathfrak{p}$  содержал полином, зависящий только от  $x_i$ , то он содержал бы и полином, зависящий только от  $x_n$ , а потому вопреки предположению имел бы размерность не выше нуля. При соответствии  $v \sim x_i$  нулевому классу по  $\mathfrak{c}$  поэтому необходимо соответствует нулевой класс по  $\mathfrak{p}$ , и, конечно, верно также обратное. Следовательно, получается изоморфное сопоставление между системой классов вычетов по  $\mathfrak{p}$  и по  $\mathfrak{c}$ ; последняя не имеет делителей нуля, так что  $\mathfrak{c}$  становится простым идеалом. В силу этого изоморфного сопоставления алгебраической зависимости между  $(x_i)$  и  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$  соответствует соотношение между  $(x_{i+1}), \dots, (x_n)$  относительно  $(P(u, v))$ , тогда как для  $\lambda = 1, \dots, i-1$  зависимости между  $(x_\lambda)$  и  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$  сохраняются как таковые и потому дальше не понижают алгебраический ранг; алгебраический ранг уменьшился ровно на единицу. Если  $\mathfrak{p}$  имел размерность нуль, то  $\mathfrak{c}$  становится единичным идеалом; таким образом, приведенный результат сохраняется. Поэтому в исходной области  $\tilde{\mathfrak{S}}$

$$\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1 y_1 + \dots + v_n y_n),$$

где  $v_\lambda$  положено равным  $-t_{i\lambda}$ , является идеалом требуемого свойства. Если, в частности,  $P$  содержит бесконечно много элементов, то  $v, v_1, \dots, v_n$  всегда можно специализировать до элементов из  $P$  так, чтобы норма и форма элементарных делителей, а следовательно, и размерность  $\bar{\mathfrak{a}}$  стали равны соответствующим данным специализированного идеала  $\mathfrak{b}$ ; <sup>17</sup> правда, форма элементарных делителей при этом не обязана оставаться простой функцией. Однако по теореме V идеал  $\mathfrak{b}$  имеет по

<sup>17</sup>Ср. H.-N., последний абзац § 7.

крайней мере один ассоциированный простой идеал требуемой размерности; возвращаясь снова к  $\bar{\mathfrak{S}}$ , получаем, что здесь теорема VI верна без присоединения каких-либо неопределенных.

Теоремы II и VI непосредственно дают желаемую формулировку в виде следующей теоремы.

**Теорема VII.** *Простой идеал  $\mathfrak{p}$  имеет размерность  $n - i$ , если — после возможного присоединения неопределенных — существует по крайней мере одна цепочка из  $1 + (n - i) + 1$  простых идеалов*

$$\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p}; \quad \mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_{n-i}; \quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

*каждый из которых является собственным делителем непосредственно предшествующего, но не существует такой цепочки с большим числом членов. Это определение верно также в исходной области, причем без введения каких-либо неопределенных, если  $P$  содержит бесконечно много элементов.*<sup>18</sup>

Прежде всего ясно, что последний элемент цепочки должен быть равен единичному идеалу — который удовлетворяет определению простого идеала, — так как иначе цепочку можно было бы продолжить добавлением  $\mathfrak{o}$ ; для самого  $\mathfrak{o}$  по теореме VII получается размерность  $-1$ , в согласии с § 1, 8. Пусть теперь  $\mathfrak{p}$  отличен от  $\mathfrak{o}$  и имеет размерность  $n - i$ ; тогда число членов цепочки может быть не больше  $1 + (n - i) + 1$ , поскольку по теореме II не могут встречаться два простых идеала одинаковой размерности. Но по теореме VI — после возможного присоединения новых неопределенных — существует по крайней мере одна цепочка с таким числом членов, так как размерность на каждом члене цепочки уменьшилась ровно на единицу. Если положить теорему VII в основу как определение размерности — определение, которое, очевидно, точно так же можно сформулировать в исходной области и при котором по теореме VI введение неопределенных становится ненужным, когда  $P$  содержит бесконечно много элементов, — то определение наивысшей размерности произвольного идеала снова дается второй частью теоремы V.

## § 5. Включение основных идеалов и их компонент в общую теорию идеалов. Нули идеалов.

Речь идет о характеристике основных идеалов и их компонент (§ 1, 7.) через изолированные компоненты разложения (§ 1, 13.) в смысле общей теории идеалов. Эта характеристика покажет параллельность теорем о разложении норм теоремам общей теории идеалов и позволит сформулировать теорию нулей, данную в § 3 для простых и первичных идеалов, для произвольных идеалов. Для основных идеалов справедливо следующее.

**Теорема VIII.** *Основные идеалы  $i$ -й ступени  $\mathfrak{g}_i$  являются изолированными компонентами разложения, однозначно определенными совокупностью ассоциированных простых идеалов размерностей  $n - 1, n - 2, \dots, n - i$ . Если все ассоциированные простые идеалы имеют одну и ту же размерность, то и идеал имеет эту размерность; то есть в норме появляется только один множитель  $R^{(i)}$ . В общем случае норма имеет столько отличных от единицы множителей  $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}, \dots$ , сколько различных чисел размерности встречается среди ассоциированных простых идеалов.*

Доказательству предпошлим следующую лемму.

**Лемма VI.** *Если идеал представлен как наименьшее общее кратное,  $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_a]$ , то его основной идеал  $\mathfrak{g}_i$  является наименьшим общим кратным основных идеалов  $i$ -й ступени  $\mathfrak{h}_i$  идеалов  $\mathfrak{a}$ .*

Действительно, из

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad b^{(i+1)} \neq 0$$

следует

$$b^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \quad b^{(i+1)} \neq 0;$$

<sup>18</sup> Это цепочное определение размерности в случае алгебраического числового поля дает размерность нуль для обычных простых идеалов, размерность  $-1$  для единичного идеала и размерность  $1$  для нулевого идеала; действительно, последний также удовлетворяет определению простых идеалов — в поле произведение ненулевых величин всегда отлично от нуля. Теорема II при этом определении размерности сохраняется в алгебраическом числовом поле.

следовательно,  $\mathfrak{g}_i$  делится на  $[\mathfrak{h}_{i1}, \dots, \mathfrak{h}_{ia}]$ . Обратно, из

$$c_\lambda^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_\lambda}, \quad c_\lambda^{(i+1)} \neq 0$$

также следует

$$c_1^{(i+1)} \dots c_a^{(i+1)} f \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}, \quad c_1^{(i+1)} \dots c_a^{(i+1)} \neq 0,$$

а отсюда обратная делимость, чем лемма доказана.

Пусть теперь ассоциированные простые идеалы  $\mathfrak{m}$  упорядочены по размерности (при этом, конечно, некоторые размерности могут и отсутствовать,  $j_\lambda = 0$ ):

$$\mathfrak{p}_{1,1}, \dots, \mathfrak{p}_{1,j_1}; \quad \mathfrak{p}_{2,1}, \dots, \mathfrak{p}_{2,j_2}; \quad \dots; \quad \mathfrak{p}_{n,1}, \dots, \mathfrak{p}_{n,j_n},$$

где вообще  $\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}$  обозначает простой идеал размерности  $n - \lambda$ ; пусть  $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$  будет соответствующий первичный идеал, входящий в некоторое фиксированное данное разложение  $\mathfrak{m}$ . Тогда основной идеал  $i$ -й ступени по определению равен единичному идеалу для всех  $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ , для которых  $\lambda > i$ ; для  $\lambda \leq i$  же по теореме I этот основной идеал равен  $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ . Поэтому по лемме VI получаем:

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{q}_{1,1}, \dots, \mathfrak{q}_{1,j_1}; \dots; \mathfrak{q}_{i,1}, \dots, \mathfrak{q}_{i,j_i}], \quad (5)$$

и это представление распознает  $\mathfrak{g}_i$  как изолированную компоненту разложения, поскольку ни один из простых идеалов, ассоциированных с  $\mathfrak{g}_i$ , не может входить в один из остальных простых идеалов, все из которых имеют меньшую размерность.

Если специально среди ассоциированных простых идеалов встречаются только идеалы размерности  $n - i$ , то по (5)  $\mathfrak{g}_0, \dots, \mathfrak{g}_{i-1}$  равны единичному идеалу, а  $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = \mathfrak{m}$ ; следовательно,  $R_{\mathfrak{m}} = R^{(i)}$ . Если же имеются простые идеалы различных размерностей, например  $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \dots$  отличны от нуля, то по (5):

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \dots,$$

но

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \dots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \quad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \dots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \dots,$$

и потому множители  $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$  и только они отличны от единицы.<sup>19</sup>

Посредством теоремы VIII теорему I можно усилить следующим образом.

**Теорема IX.** *Идеал является первичным тогда и только тогда, когда его форма элементарных делителей — и, следовательно, его норма — является первичной функцией.*

То, что условие выполнено для первичных идеалов, было показано в теореме I. Пусть теперь, наоборот, форма элементарных делителей  $\mathfrak{m}$  задана как  $Q^{(i)} = (P^{(i)})^\rho$ , где  $P^{(i)}$  означает простую функцию. Тогда по теореме VIII все простые идеалы  $\mathfrak{m}$  имеют одну и ту же размерность  $n - i$ . Из  $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_a]$  получается:

$$Q^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}; \quad \text{следовательно} \quad (P^{(i)})^\rho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda} \quad \text{и потому} \quad P^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_\lambda}.$$

Так как все  $\mathfrak{p}_\lambda$  имеют размерность  $n - i$ , а  $P^{(i)}$  означает простую функцию, то  $P^{(i)}$  становится формой элементарных делителей каждого  $\mathfrak{p}_\lambda$ . Следовательно, по следствию к теореме IV все  $\mathfrak{p}_\lambda$  совпадают; поэтому, поскольку речь идет о наибольших первичных компонентах, может появиться только один  $\mathfrak{p}$ ;  $\mathfrak{m}$  становится первичным, причем при  $\rho = 1$  специальный случай простого идеала не исключается. Теоремы VIII и IX приводят к включению компонент основных идеалов в следующей форме.

**Теорема X.** *Компонента  $\mathfrak{r}_\lambda$  основного идеала  $\mathfrak{g}_i$ , соответствующая наибольшему первичному множителю  $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$  нормы  $R^{(i)}$ , задается изолированной компонентой разложения, однозначно определенной ассоциированными простыми идеалами размерностей  $n - 1, \dots, n - i + 1$*

<sup>19</sup>Из теоремы VIII снова следует, с учетом леммы II, что основные идеалы — как наименьшие общие кратные преобразованных идеалов — становятся преобразованными идеалами. Так как теорема VIII опирается только на теоремы из Н.-Н., где этот факт не используется, тем самым получается новое доказательство, одновременно раскрывающее внутреннюю причину. В Н.-Н. эта теорема используется только в теории нулей, которая здесь развита заново.

и тем простым идеалом размерности  $n - i$ , форма элементарных делителей которого равна  $P_\lambda^{(i)}$ . Ассоциированные простые идеалы и наибольшие первичные множители нормы взаимно однозначно соответствуют друг другу.

По § 1, 7. идеалы  $\mathfrak{r}_\lambda$  совпадают со своим основным идеалом  $i$ -й ступени и имеют  $\mathfrak{g}_{i-1}$  как основной идеал  $(i - 1)$ -й ступени; следовательно, по теореме VIII, соответственно по (5), они допускают кратчайшее представление:

$$\mathfrak{r}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \dots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}],$$

где все  $\mathfrak{q}$  имеют размерность  $n - i$  и принадлежат различным простым идеалам. По определению  $Q_\lambda^{(i)}$  — с учетом того, что  $\mathfrak{r}_\lambda$  совпадает со своим основным идеалом  $i$ -й ступени, — получается:

$$Q_\lambda^{(i)} \mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}, \quad (\kappa = 1, \dots, t_\lambda)$$

и следовательно

$$(Q_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda} \mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}}; \quad \text{следовательно} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda} \mathfrak{r}_\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$$

и потому  $P_\lambda^{(i)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}}$ ; отсюда, как в доказательстве теоремы IX, следует, что в представлении  $\mathfrak{r}_\lambda$  может появиться только один  $\mathfrak{q}_\lambda$  и соответствующий  $\mathfrak{p}_\lambda$  размерности  $n - i$ , а форма элементарных делителей  $\mathfrak{p}_\lambda$  задается через  $P_\lambda^{(i)}$ . Нужно доказать, что  $\mathfrak{p}_\lambda$  является ассоциированным простым идеалом  $\mathfrak{m}$ , и показать, что  $\mathfrak{q}_\lambda$  действительно входит по крайней мере в одно представление  $\mathfrak{m}$  через наибольшие первичные компоненты; тогда  $\mathfrak{r}_\lambda$  тем самым распознана как изолированная компонента разложения, поскольку никакой простой идеал не может входить в идеал той же или меньшей размерности, а именно как компонента, определенная  $\mathfrak{p}_\lambda$  и всеми ассоциированными простыми идеалами большей размерности. Для этого нужно лишь показать, что  $\mathfrak{q}_\lambda$  входит в кратчайшее представление  $\mathfrak{g}_i$ , так как такое представление по теореме VIII всегда можно дополнить до кратчайшего представления  $\mathfrak{m}$ ; следовательно, нужно только показать, что представление

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_a] = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_a]$$

является кратчайшим. Если бы, скажем,  $\mathfrak{q}_\lambda$  входил в свой комплемет, то есть если бы  $\mathfrak{g}_{i-1} \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{\lambda-1} \mathfrak{q}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{q}_a$  делился на  $\mathfrak{q}_\lambda$ , то из-за  $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}_\lambda}$  отсюда следовала бы делимость некоторой степени  $\mathfrak{q}_\mu$  на  $\mathfrak{q}_\lambda$  для  $\mu \neq \lambda$ ; тогда, поскольку ассоциированные простые идеалы  $\mathfrak{p}_\mu$  и  $\mathfrak{p}_\lambda$  имеют одинаковую размерность, эти простые идеалы по теореме II совпадали бы. Но это невозможно, так как их формы элементарных делителей  $P_\mu^{(i)}$  и  $P_\lambda^{(i)}$  по определению различны. Представление  $\mathfrak{g}_i$ , которому по теореме VIII соответствуют все ассоциированные простые идеалы размерности  $n - i$ , далее показывает, что каждому такому простому идеалу действительно соответствует и наибольший первичный множитель нормы; тем самым взаимно однозначное соответствие доказано.

Теорема X непосредственно дает перенос теоремы IV в следующем виде.

**Теорема XI.** Отдельные наибольшие первичные множители  $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$  нормы допускают представление произведением:

$$\begin{aligned} Q_\lambda^{(i)} &= \prod (x_i - t_{1i} \bar{y}_{1\nu} - \dots - t_{ni} \bar{y}_{n\nu})^{\delta_\lambda \rho_\lambda} \\ &= \prod (t_{1i} (y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \dots + t_{ni} (y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta_\lambda \rho_\lambda}, \end{aligned}$$

где  $\bar{y}_{1\nu}, \dots, \bar{y}_{n\nu}$  каждый раз задают соответствующую систему нулей ассоциированного простого идеала  $\mathfrak{p}_\lambda$  в исходных неопределенных  $y$ , независимую от  $t_{1i}, \dots, t_{ni}$ , а  $\delta_\lambda$  имеет значение единица или  $p^{f_\lambda}$ ; тем самым полностью задано разложение нормы на линейные множители. Степень  $Q_\lambda^{(i)}$  задает степень подкольца классов вычетов по изолированной компоненте  $\mathfrak{r}_\lambda$ , представленного классами вычетов из  $\mathfrak{g}_{i-1}$ , а именно относительно подполя классов вычетов  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ , полученного образованием частных; для первичных идеалов, следовательно, речь идет о кольце всех классов вычетов. При присоединении новых неопределенных  $v$  получается еще разложение

$$Q_\lambda^{(i)}(u, v) = \prod (z - v_1 \bar{x}_{1\nu} - \dots - v_i \bar{x}_{i\nu})^{\delta_\lambda \rho_\lambda}.$$

Поскольку  $P_\lambda^{(i)}$  по теореме X распознана как форма элементарных делителей  $p_\lambda$ , здесь фактически речь идет лишь о подстановке разложения из теоремы IV; замечание о степени есть только иная формулировка сказанного в § 1, 5. и 7.<sup>20</sup>

## § 6. Характеризация простых идеалов и собственных первичных идеалов через форму элементарных делителей и норму.

В теореме IX первичные идеалы были охарактеризованы через форму элементарных делителей и норму, но только так, что простой случай рассматривался как специальный случай первичного. Теперь нужно отделить простые идеалы от собственных первичных идеалов; рассуждение будет идти параллельно § 3. Условия, которые являются либо необходимыми, либо достаточными, легко записываются в следующем виде.

**Теорема XII.** *Необходимым условием для простого идеала является то, что его форма элементарных делителей является простой функцией; достаточным условием является то, что его норма является простой функцией. Иными словами, форма элементарных делителей простого идеала всегда является простой функцией, а норма собственного первичного идеала всегда является собственной первичной функцией.*

То, что форма элементарных делителей простого идеала становится простой функцией, уже было показано в теореме I. Пусть теперь норма  $R_q$  равна простой функции; нужно показать, что при этом всякий собственный делитель  $\alpha$  идеала  $q$  имеет меньшую наивысшую размерность, так что  $q$  по теореме II распознается как простой идеал. Действительно, по § 1, 6. первый множитель нормы  $R_\alpha$ , отличный от соответствующего множителя  $R_q$ , становится собственным делителем; ввиду  $R_q = P^{(i)}$  множитель  $R^{(i)}$  нормы  $R_\alpha$  должен быть равен собственному делителю  $P^{(i)}$ , то есть единице; поэтому  $\alpha$  имеет меньшую наивысшую размерность.

Второе простое доказательство опирается на следующую лемму, которая лежит также в основе следующей теоремы.

**Лемма VII.** *Система классов вычетов, представленная многочленами  $H^{(i)}$ , по модулю формы элементарных делителей  $E^{(i)}$  первичного идеала — более общо, идеала, имеющего только ассоциированные простые идеалы размерности  $n - i$ , — изоморфна подсистеме классов вычетов по этому идеалу. Степень формы элементарных делителей задает степень этой системы классов вычетов относительно поля частных  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ .*

Действительно, можно установить соответствие, сопоставляя классы, представленные теми же многочленами  $H^{(i)}$ ; сумма и произведение при этом соответствуют сумме и произведению. Это соответствие также взаимно однозначно: ведь все многочлены  $H^{(i)}$ , принадлежащие нулевому классу по идеалу, по определению делятся на  $E^{(i)}$ ; следовательно, нулевому классу соответствует нулевой класс по  $E^{(i)}$ , и, конечно, наоборот.

Пусть теперь норма идеала является простой функцией  $P^{(i)}$ , то есть совпадает с формой элементарных делителей. Тогда степени систем классов вычетов по форме элементарных делителей  $P^{(i)}$  и по  $q$  относительно  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$  совпадают; значит, подсистема, изоморфная системе классов вычетов по  $P^{(i)}$ , исчерпывает классы вычетов по  $q$ ; а так как эта система не может иметь делителей нуля,  $q$  является простым идеалом.

В общем случае теорему XII нельзя усилить до необходимых и достаточных условий, как будет показано ниже на примерах. Зато это возможно, когда область коэффициентов  $P$  является совершенным полем (§ 1, 14.), по следующей теореме.

**Теорема XIII.** *Если область коэффициентов  $P$  является совершенным полем, то норма и форма элементарных делителей простого идеала становятся простыми функциями и, следовательно, совпадают; норма и форма элементарных делителей собственного первичного идеала становятся собственными первичными функциями. Следовательно, над совершенным полем условие, что форма элементарных делителей является простой функцией, является необходимым и достаточным для*

<sup>20</sup>Точно так же и упомянутая в прим. 2) у Н.-Н. формулировка кратности является непосредственным следствием теоремы X. Ведь система классов вычетов  $g_{i-1} \mid r_\lambda$  — при присоединении  $x_{i+1}, \dots, x_n$  — изоморфна  $t_\lambda \mid r_\lambda$ , где положено  $t_\lambda = [g_{i-1}, r_1, \dots, r_{\lambda-1}, r_{\lambda+1}, \dots, r_a]$ , как непосредственно показывает возвращение к модулям из линейных форм (Н.-Н., теорема V) с учетом взаимной простоты  $Q_\mu^{(i)}$ ;  $t_\lambda \mid r_\lambda$  становится изоморфной  $t_\lambda \mid q_\lambda$ . При этом  $t_\lambda$  возникает из комплемента  $q_\lambda$  при присоединении  $x_{i+1}, \dots, x_n$ .

простого идеала; вместо формы элементарных делителей в этом условии может также стоять норма.

С учетом теоремы XII теорема XIII будет доказана, если показать, что над совершенным полем идеал становится простым, как только его форма элементарных делителей является простой функцией, и что тогда норма равна этой простой функции. В лемме V, § 3, было показано, что над совершенным полем форма элементарных делителей становится простой функцией первого рода, как только она вообще является простой функцией. Поэтому пусть  $(\mathcal{R})$  обозначает поле классов вычетов, возникающее при присоединении  $(x_i)$  к  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ , то есть  $(P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$  по  $P^{(i)}$ . Тогда  $(x_i)$  является нулем простой функции первого рода  $(P^{(i)})$ , и поэтому, как показывает, например, формула Лагранжа,  $(y_1), \dots, (y_n)$  содержатся в  $(\mathcal{R})$ . Подсистема классов вычетов по рассматриваемому идеалу  $\mathfrak{q}$ , изоморфная по лемме VII системе  $(\mathcal{R})$  — причем речь идет только о появлении знаменателей из  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ , — содержит классы вычетов  $(y_1), \dots, (y_n)$  и потому исчерпывает систему классов вычетов по  $\mathfrak{q}$ ; но поскольку как система, изоморфная  $(\mathcal{R})$ , она не может иметь делителей нуля,  $\mathfrak{q}$  становится простым идеалом. Степень этого поля классов вычетов  $(\mathcal{R})$  идеала  $\mathfrak{q}$  относительно  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$  равна степени нормы  $\mathfrak{q}$ ; с другой стороны, благодаря изоморфизму с  $(\mathcal{R})$  она равна степени формы элементарных делителей  $P^{(i)}$ ; значит, норма и форма элементарных делителей должны совпадать.

Для несовершенных областей коэффициентов теорема XII все же допускает следующее усиление.

**Теорема XIV.** Если область коэффициентов  $P$  является несовершенным полем характеристики  $p$ , то норма простого идеала становится  $p^g$ -й степенью формы элементарных делителей; при этом  $0 \leq g \leq (i-1)f$ , где  $f$  обозначает экспоненту формы элементарных делителей, а  $n-i$  — размерность простого идеала.

Теорема XIV сводится к утверждению, что поле классов вычетов  $(\mathcal{R})$  идеала  $\mathfrak{p}$  имеет степень  $p^g$  ( $g \geq 0$ ) относительно подполя  $(\mathcal{R}') = (P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$ , изоморфного  $(\mathcal{R})$ . Это непосредственно следует из теорем Штейница, приведенных в § 1, 15., точнее из следующего утверждения.

**Лемма VIII.** Пусть  $\Lambda$  есть конечное расширение несовершенного поля  $\Omega$  редуцированной степени  $r$  и экспоненты  $f$ ,  $\Lambda_0$  — поле первого рода, содержащееся в  $\Lambda$ , а  $M$  — промежуточное поле между  $\Lambda_0$  и  $\Lambda$ . Тогда степень каждого элемента из  $\Lambda$  относительно  $M$  является степенью  $p$ , где  $p$  обозначает характеристику  $\Omega$ .

Ибо  $p^{f'}$ -я степень ( $f' \leq f$ ) каждого элемента  $z$  из  $\Lambda$  принадлежит  $\Lambda_0$ ; следовательно,  $z$  является нулем простой функции  $G(t) = (t-z)^{p^{f'}}$  с коэффициентами из  $\Lambda_0$ . Пусть  $H(t) = (t-z)^\delta$  является простой функцией в  $M$  с нулем  $z$ ; тогда  $H(t)$  имеет также коэффициенты из  $\Lambda_0(z)$ , а значит коэффициенты  $H(t)$  принадлежат полю пересечения  $M$  и  $\Lambda_0(z)$ , то есть промежуточному полю между  $\Lambda_0$  и  $\Lambda_0(z)$ . Поэтому степень  $z$  относительно  $M$  равна степени относительно этого промежуточного поля и, как делитель  $p^{f'}$ , является степенью  $p$ .

Для доказательства теоремы XIV остается только заметить, что поле  $(\mathcal{R}) = (P(u, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n))$  должно иметь степень  $r \cdot p^f$  относительно  $(P(u, x_{i+1}, \dots, x_n))$ , если  $r$  обозначает редуцированную степень, а  $f$  — экспоненту  $(\mathcal{R})$ ; и что поэтому поле первого рода  $(\mathcal{R}_0)$ , содержащееся в  $(\mathcal{R})$ , должно быть подполем  $(\mathcal{R}')$ . Ведь, поскольку в  $(\mathcal{R})$  существуют элементы степени  $r \cdot p^f$  (§ 1, 15.), необходимо, чтобы  $(x_i)$  имел именно эту степень, потому что все элементы из  $(\mathcal{R})$  возникают специализацией  $t_{\mu\nu}$  в  $(x_i)$ ; экспонента  $(\mathcal{R})$  совпадает с экспонентой формы элементарных делителей, и  $(x_i)^{p^f}$  имеет степень  $r$  и принадлежит  $(\mathcal{R}_0)$ , следовательно является примитивным элементом  $(\mathcal{R}_0)$ . Так как  $(\mathcal{R})$  возникает присоединением конечного числа элементов — скажем,  $(x_1), \dots, (x_{i-1})$  — к  $(\mathcal{R}')$ , конечное многократное применение леммы VIII дает требуемое доказательство и одновременно оценку для  $g$ .<sup>21</sup>

Теперь добавим примеры, которые показывают, что теорему XII в общем случае нельзя усилить сверх теоремы XIV. Речь идет о простом идеале, норма которого равна квадрату формы элементарных делителей ( $g > 0$ ), и о собственных первичных идеалах, форма элементарных делителей которых является простой функцией; последний пример одновременно показывает, что здесь нет аналога теоремы XIV, а норма может стать произвольной степенью формы элементарных делителей.

<sup>21</sup> Ср. параллельные рассуждения у А. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, с. 279–298; в частности с. 288, где соответствующая теорема сформулирована без доказательства.

Пусть область коэффициентов  $P$  получается присоединением двух неопределенных  $\lambda, \mu$  к полю классов вычетов по модулю 2, то есть является несовершенным полем характеристики два. Рассмотрим идеал

$$\bar{p} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \mu),$$

который должен быть простым идеалом, потому что система классов вычетов  $(\mathcal{R})$  изоморфна полю  $P(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$ .  $(\mathcal{R})$  имеет четвертую степень относительно  $(P)$ , редуцированную степень  $r = 1$ , экспоненту  $f = 2$ ; поэтому форма элементарных делителей  $P^{(2)}$  имеет вторую степень, а норма — четвертую степень и, следовательно, является квадратом  $P^{(2)}$ , что также легко проверить по модульному представлению (3), § 1, 5.; получаем

$$P^{(2)} = (u_{11}u_{22} + u_{12}u_{21})^2 x_2^2 + (u_{11}^2 \mu + u_{21}^2 \lambda)$$

или, после соответствующего умножения,

$$x_2^2 + (t_{12}^2 \lambda + t_{22}^2 \mu).$$

Пусть теперь  $P$  получается присоединением одной неопределенной  $\lambda$  к полю классов вычетов по модулю 2, и пусть взят идеал

$$\bar{q} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \lambda) = (y_1^2 + \lambda, (y_1 + y_2)^2).$$

В качестве формы элементарных делителей, через специализацию  $\mu = \lambda$  в приведенной выше формуле, получается

$$P^{(2)} = x_2^2 + \lambda(t_{12}^2 + t_{22}^2),$$

следовательно простая функция, потому что  $t_{12} = (0)$ ,  $t_{22} = (1)$  приводит к простой функции  $x_2^2 + \lambda$ . Но  $\bar{q}$  является собственным первичным идеалом, потому что он содержит  $(y_1 + y_2)^2$ , но не содержит  $(y_1 + y_2)$ . Норма должна быть равна квадрату, то есть  $p$ -й степени,  $P^{(2)}$ , потому что число линейно независимых относительно  $P$  классов вычетов по  $\bar{q}$  равно четырем.

Что этот последний аналог теоремы XIV не всегда выполняется, показывает следующий пример. Пусть  $P$  получается присоединением неопределенной  $\lambda$  к полю классов вычетов по модулю 3, и пусть

$$q = (y_1^3 + \lambda, (y_1 - y_2)^2)$$

так что, как и выше, речь идет о собственном первичном идеале. Форма элементарных делителей становится — с учетом того, что также  $y_2^3 + \lambda$  делится на  $q$ , —

$$P^{(2)} = x_2^3 + \lambda(t_{12} + t_{22})^3,$$

следовательно простой функцией; но норма равна квадрату  $P^{(2)}$ , потому что имеется шесть линейно независимых классов вычетов по  $q$ . Следовательно, здесь не возникает  $p^g$ -я степень формы элементарных делителей.

Первый пример показывает, что при несовершенном поле как области коэффициентов, так же как и в алгебраических числовых полях, могут встречаться простые идеалы степени выше первой, где  $p^g$  следует называть степенью простого идеала. Дальнейшие примеры следует понимать как аналоги идеалов разветвления: простое число может делиться на более высокую степень простого идеала, то есть на первичный идеал; ведь, как показано в примечании 10), форма элементарных делителей соответствует наименьшему целому рациональному числу, делящемуся на идеал в алгебраическом числовом поле.

## § 7. Абсолютные простые идеалы.

Простой идеал с коэффициентами из  $P$  называется *абсолютным простым идеалом*, если он остается простым идеалом в алгебраически замкнутом поле  $A$ , до которого можно расширить

$P$ .<sup>22</sup> Соответственно простая функция  $P$  с коэффициентами из  $P$  называется *абсолютной простой функцией* — абсолютно неприводимым полиномом, — если  $P$  остается простой функцией в  $A$ . Характеризация абсолютных простых идеалов дается следующей теоремой.

**Теорема XV.** *Необходимое и достаточное условие для абсолютного простого идеала состоит в том, что его форма элементарных делителей — которую можно считать целой и примитивной по  $u$  — становится абсолютной простой функцией как полином от  $x$  и  $u$ . Форма элементарных делителей становится тождественной норме, так что условие можно сформулировать также для нормы.*

Для доказательства сначала заметим, что в общем случае норма и форма элементарных делителей сохраняются при алгебраическом расширении области коэффициентов. Ведь отдельные множители  $R^{(i)}$  соответственно  $E^{(i)}$  определены как наибольшие общие делители в полиномиальном смысле, а это свойство сохраняется при алгебраическом расширении области коэффициентов. Следовательно,  $P^{(i)}$  остается формой элементарных делителей  $p$  при переходе от  $P$  к  $A$ , то есть при переходе к совершенному полю как области коэффициентов; ведь каждое алгебраически замкнутое поле, как непосредственно показывает определение, совершенно. По теореме XIII необходимое и достаточное условие для того, чтобы  $p$  был абсолютным простым идеалом, состоит в том, что  $P^{(i)}$  становится простой функцией относительно  $A(u)$ ; то есть абсолютной простой функцией как полином от  $x$  и  $u$ , если  $P^{(i)}$  считается целым и примитивным по  $u$ . Одновременно по теореме XIII  $P^{(i)}$  становится также тождественным норме  $p$ , как только  $A$  берется в качестве области коэффициентов; значит, по сказанному выше то же самое верно и при исходной области  $P$ . Теорема XV доказана.

Для абсолютных простых функций  $P$  с коэффициентами из (конечного) алгебраического числового поля  $\mathfrak{K}$  теперь имеется теорема,<sup>23</sup> что  $P$  остается простой функцией, точнее абсолютной простой функцией, по модулю каждого простого идеала из  $\mathfrak{K}$ , самое большее за исключением конечного числа простых идеалов из  $\mathfrak{K}$ . Перенос этой теоремы на абсолютные простые идеалы опирается на следующее.

**Теорема XVI.** *Если в качестве области коэффициентов вместо поля взять кольцо  $\mathfrak{o}^*$  всех целых алгебраических чисел (конечного) алгебраического числового поля  $\mathfrak{K}$ , то норма и форма элементарных делителей полиномиального идеала сохраняются как норма и форма элементарных делителей по модулю каждого простого идеала из  $\mathfrak{K}$ , самое большее за исключением конечного числа простых идеалов из  $\mathfrak{K}$ .*

Для доказательства надо модифицировать лежащую в основе полиномиальную область по сравнению с § 1, 1. Пусть  $\mathfrak{S}$  состоит из всех полиномов от  $y_1, \dots, y_n$  с коэффициентами из  $\mathfrak{o}^*$ , то есть из целых алгебраических чисел из  $\mathfrak{K}$ ; областью коэффициентов для  $\mathfrak{S}$  пусть будет  $\mathfrak{o}^*[u]$ , то есть все полиномы от  $u$  с коэффициентами из  $\mathfrak{o}^*$ . Если  $\mathfrak{m}$  есть идеал в  $\mathfrak{S}$ , то посредством (1) он переходит в преобразованный идеал  $\mathfrak{m}$  в  $\mathfrak{S}$ . Нужно показать, что при образовании нормы в знаменателе появляется только конечное число полиномов из  $\mathfrak{o}^*[u]$ ; отсюда теорема XVI будет следовать непосредственно.

Для этого сначала заметим, что модульное представление (3) из § 1, 5. для образования отдельной нормы сводится к редукции степеней  $x_{i-1}$  по модулю полинома, регулярного по  $x_{i-1}$ ,

$$C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^{e_{i-1}} + \text{младшие члены};$$

<sup>24</sup> при этом все коэффициенты  $C^{(i-1)}$ , в частности  $U_{i-1}$ , можно считать величинами из  $\mathfrak{o}^*[u]$ . Так как речь идет о последовательной редукции  $x_1, \dots, x_{i-1}$ , модульное представление, целое по  $x$ , является также целым по  $\mathfrak{o}^*[u]$  с точностью до произведений степеней

$$U_1^{\lambda_1} \dots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$$

в знаменателе. Произведение  $U_1 U_2 \dots U_n$ , рассматриваемое как полином от  $u$ , задает своими коэффициентами идеал  $\mathfrak{t}^*$  из  $\mathfrak{K}$ , который поэтому делится только на конечное число простых идеалов

<sup>22</sup> Алгебраически замкнутое поле, как известно, есть такое поле, в котором каждый полином одной неопределенной разлагается на линейные множители. О существовании и существенной единственности алгебраически замкнутого поля, принадлежащего произвольному полю, см. у Steinitz.

<sup>23</sup> A. Ostrowski: там же (прим. 21); лемма, с. 296. — Более простое доказательство см. E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), с. 26–33, № 7.

<sup>24</sup> Cp. H.-N. § 4.



из  $\mathfrak{K}$ . Если взять  $\mathfrak{p}^*$  отличным от этих конечных простых идеалов и положить в качестве области коэффициентов поле классов вычетов по  $\mathfrak{p}^*$ , то исходное модульное представление сохраняется: каждое число из  $\mathfrak{o}^*$  только заменяется своим классом вычета по  $\mathfrak{p}^*$ .

Далее, поскольку норма и форма элементарных делителей определены только с точностью до множителей из  $\mathfrak{o}^*[u]$ , их также можно, относительно  $\mathfrak{o}^*[u]$ , считать делящимися на  $m$ . Пусть при таком предположении, например,

$$R^{(i)} = V_i(u)x_i^{e_i} + \text{младшие члены},$$

так что при делимости всех детерминантов порядка  $\rho$  модуля  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$  ранга  $\rho$ , определенного через  $C^{(i-1)}$ , в знаменателе, кроме  $U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$ , появляются только степени  $V_i$ . Если поэтому выбрать  $\mathfrak{p}^*$  еще и отличным от конечного числа простых идеалов из  $\mathfrak{K}$ , делящих идеал, определенный произведением  $V_1 V_2 \cdots V_n$ , то  $R^{(i)}$  остается общим делителем этих детерминантов, когда в качестве области коэффициентов берется поле классов вычетов по  $\mathfrak{p}^*$ ; ранг  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$  также сохраняется, поскольку  $C^{(i)}$  был детерминантом порядка  $\rho$  из  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ .

Наконец  $\mathfrak{p}^*$  надо выбрать еще так, чтобы  $R^{(i)}$  каждый раз оставался наибольшим общим делителем. Пусть  $D^{(i)}$  пробегает все детерминанты порядка  $\rho$  из  $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ , так что по предположению получается

$$U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^\rho D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)},$$

где  $T^{(i)}$  не имеют общего делителя, содержащего  $x$ , в полиномиальном смысле. Следовательно, идеал, выведенный из всех  $T^{(i)}$ , содержит полином

$$G^{(i+1)} = W_i(u)x_{i+1}^{m_i} + \text{младшие члены}, \quad W_i \neq 0;$$

что при этом  $G^{(i+1)}$  можно считать регулярным по  $x_{i+1}$ , показывает составление преобразования (1) с таким преобразованием  $x_{i+1}, \dots, x_n$ , где коэффициентами служат новые неопределенные. Если, значит, выбрать  $\mathfrak{p}^*$  еще и отличным от конечного числа простых идеалов, делящих идеал из  $\mathfrak{K}$ , определенный произведением  $W_1 W_2 \cdots W_n$ , то при взятии поля классов вычетов по  $\mathfrak{p}^*$  в качестве области коэффициентов  $R_m$  действительно сохраняется как норма. Совершенно соответственно  $\mathfrak{p}^*$  можно выбрать еще и так, чтобы  $E_m$  также сохранялась как форма элементарных делителей. Теорема XVI доказана.

Из теорем XV и XVI, как обобщение теоремы об абсолютных простых функциях и с использованием этой теоремы, следует следующее.

**Теорема XVII.** *Если  $\mathfrak{p}$  является абсолютным простым идеалом с целыми алгебраическими числами из (конечного) алгебраического числового поля  $\mathfrak{K}$  в качестве коэффициентов, то  $\mathfrak{p}$  остается простым идеалом, точнее абсолютным простым идеалом, по модулю каждого простого идеала из  $\mathfrak{K}$ , самое большее за исключением конечного числа простых идеалов из  $\mathfrak{K}$ .*

Для доказательства пусть норма  $R_p$  идеала  $\mathfrak{p}$ , как в теореме XVI, выбрана так, что она также относительно  $\mathfrak{o}^*[u]$  делится на  $\mathfrak{p}$ . Тогда

$$R_p = T(u)P^{(i)}(x),$$

где  $P^{(i)}(x)$  можно считать целым и примитивным по  $u$ . Поэтому  $P^{(i)}$ , по теореме XV, если рассматривать его как полином от  $u$  и  $x$  с коэффициентами из  $\mathfrak{K}$ , становится абсолютной простой функцией. По теореме об абсолютных простых функциях он сохраняет это свойство по модулю каждого простого идеала из  $\mathfrak{K}$ , самое большее за исключением конечного числа простых идеалов из  $\mathfrak{K}$ . Если поэтому выбрать  $\mathfrak{p}^*$  отличным от этих конечных простых идеалов и, по теореме XVI, еще отличным от конечного числа дальнейших простых идеалов из  $\mathfrak{K}$ , то  $P^{(i)}$  — коэффициенты которого из  $\mathfrak{o}^*$  надо заменить соответствующими классами вычетов по  $\mathfrak{p}^*$  — становится нормой  $\mathfrak{p}$ , когда в качестве области коэффициентов  $P$  берется поле классов вычетов по  $\mathfrak{p}^*$ , и эта норма становится абсолютной простой функцией. Следовательно, при взятии  $P$  в качестве области коэффициентов  $\mathfrak{p}$  по теореме XV остается абсолютным простым идеалом. Теорема XVII доказана.

Гёттинген, 8 мая 1923 г.

(Поступила 9. 3. 1923.)

## 25. Теория элиминации и теория идеалов

J. Ber. d. DMV 33 (1924), с. 116–120

В дальнейшем я хотела бы показать, как теорию элиминации можно построить вполне параллельно теории нулей для полиномов от одной переменной; это построение основано на соединении теории элиминации, данной Hentzelt, с методами теории полей, как их развил Steinitz, и теории идеалов, как я сама ее разработала.<sup>1</sup>

Сначала я набросаю постановку вопроса в случае полиномов от одной переменной. В качестве области коэффициентов раз и навсегда положим фиксированное поле  $P$ , к которому относятся понятия простой функции и т. д. При этом  $P$  можно считать абстрактно определенным в смысле Steinitz; но, разумеется, в специальном случае оно может совпадать с полем рациональных чисел или с полем всех комплексных чисел — согласно предположению, ранее общепринятому в теории элиминации. Теория нулей для полиномов от одной переменной теперь распадается на четыре шага: 1. *Теорема о разложении*, которая позволяет свести вопрос к вопросу о простых функциях — полиномах, неприводимых в  $P$ . Ибо из

$$a(x) = p_1(x)^{q_1} \cdots p_r(x)^{q_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

— где  $p(x)$  обозначают различные простые функции, а  $q(x)$ , следовательно, ”наибольшие первичные функции”, — следует, что  $a(x)$  обращается в нуль во всех и только в нулях простых функций  $p(x)$ .

2. *Построение поля нулей для простой функции  $p(x)$* . Такое поле нулей  $\mathfrak{N} = P(\alpha)$  — где  $\alpha$  обозначает нуль  $p(x)$  — по Steinitz всегда можно построить как поле расширения поля  $P$ , изоморфное полю классов вычетов ( $\mathfrak{N}$ ) по  $p(x)$ . Обратно, всякое поле нулей, лежащее в поле расширения поля  $P$ , изоморфно полю классов вычетов ( $\mathfrak{N}$ ); поэтому поле нулей и поле классов вычетов абстрактно тождественны.

3. *Разложение  $p(x)$  на линейные множители в поле Galois, определенном  $p(x)$* . Повторяя построение, данное в пункте 2, приходят к существенно однозначно определенному полю Galois  $P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ , которого как раз достаточно, чтобы  $p(x)$  разложилось на линейные множители.

4. *Значение кратности для исходного полинома  $a(x)$* . По пунктам 1, 2, 3 для произвольного полинома  $a(x)$  вопрос о нулях и соответствующее разложение на линейные множители решены. Кратностью при этом можно считать степень отдельной первичной функции  $q(x)$  — то есть число линейно независимых относительно  $P$  классов вычетов по  $q(x)$ ; ибо в случае алгебраически замкнутой области коэффициентов  $P$ , где  $p(x)$  становятся линейными, это число как раз и дает кратность нулей.

Теперь я перехожу к общей теории элиминации, то есть беру за основу область  $\mathfrak{S}$  всех полиномов от  $x_1, \dots, x_n$  с коэффициентами из  $P$ ; тогда теорию элиминации можно определить как *теорию нулей идеала* из этой полиномиальной области. Под идеалом  $\mathfrak{a}$  я понимаю, как обычно, такую систему полиномов, что вместе с  $f$  и  $g$  к  $\mathfrak{a}$  принадлежит также  $f - g$ , а вместе с  $f$  также  $Af$ , где  $A$  понимается как произвольный полином из  $\mathfrak{S}$ . Под нулем  $\mathfrak{a}$  я понимаю всякую систему значений  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , принадлежащую полю расширения поля  $P$ , такую, что  $f(\alpha)$  обращается в нуль для каждого полинома  $f$ , принадлежащего идеалу. Если  $f_1, \dots, f_t$  обозначает всегда существующий базис идеала  $\mathfrak{a}$  — то есть  $f = A_1 f_1 + \dots + A_t f_t$  для каждого  $f$  из  $\mathfrak{a}$  —, то нули  $\mathfrak{a}$ , очевидно, тождественны нулям  $f_1, \dots, f_t$ ; а так как, обратно, всякую конечную систему полиномов можно рассматривать как базис порожденного ею идеала, то данное выше определение нулей для теории элиминации тождественно обычно употребляемому, но избегает трудности, заключенной в произвольном выделении базиса. Для полиномов от одной переменной, где речь идет только о главных идеалах, эта трудность не возникает, поскольку базисный полином определен однозначно с точностью до единицы — множителя из  $P$ ; однако и там идеальная точка зрения даст более точное понимание.

Теория элиминации теперь, соответственно случаю одной переменной, распадается на четыре шага:

1. *Теорема о разложении* — представление идеала через наибольшие первичные компоненты, — которая позволяет свести вопрос к вопросу о простых идеалах. Идеал называется простым, если он

<sup>1</sup> Подробное изложение и библиографические указания: Math. Ann. 90 и работа, которая вскоре появится.

делит произведение лишь тогда, когда делит по крайней мере один из множителей; первичным, если он делит по крайней мере один из множителей или некоторую степень каждого множителя. Каждому первичному идеалу  $q$  принадлежит один и только один ассоциированный простой идеал  $p$ , который является делителем  $q$  и некоторая степень которого делится на  $q$ . Имеет место представление как наименьшее общее кратное:

$$a = [q_1, \dots, q_r]; \quad p_1^{\sigma_1} \cdots p_r^{\sigma_r} \equiv 0 \pmod{a}.$$

Здесь  $q$  являются наибольшими первичными компонентами; то есть каждое  $q$  первично, но наименьшее общее кратное любых двух  $q$  не первично. Кроме того, без ограничения общности можно предполагать, что ни одно  $q$  не делит наименьшее общее кратное остальных, так что ни одно  $q$  нельзя просто опустить;  $p$  являются ассоциированными простыми идеалами соответствующих  $q$ . Итак, не сами  $q$ , но — и в этом состоит аналог случая одной переменной — их ассоциированные простые идеалы  $p$  однозначно определены идеалом  $a$ ; и так как каждое  $p$  является делителем  $a$ , а обратно произведение степеней  $p$  делится на  $a$ , то нули идеала совпадают с нулями его ассоциированных простых идеалов.

II. *Построение поля нулей для простого идеала  $p$ .* Классы вычетов по простому идеалу по определению образуют кольцо без делителей нуля, содержащее по крайней мере один элемент, отличный от нулевого, как только  $p$  отличается от единичного идеала; образованием частных это кольцо, следовательно, можно расширить до поля классов вычетов ( $\mathfrak{A}$ ) идеала  $p$ . Всегда можно построить поле расширения  $\mathfrak{A}$  поля  $P$ , изоморфное ( $\mathfrak{A}$ ), которое становится полем нулей  $p$ ; то есть  $\mathfrak{A} = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ , где  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  обозначает нуль  $p$ . При этом  $\mathfrak{A}$  имеет степень трансцендентности  $k$  ( $0 \leq k < n$ ) относительно  $P$ , следовательно содержит  $k$  алгебраически независимых относительно  $P$  элементов, тогда как любые  $(k+1)$  элемента становятся алгебраически зависимыми относительно  $P$ . Обратно, всякое поле нулей степени трансцендентности  $k$ , лежащее в поле расширения поля  $P$ , изоморфно полю классов вычетов ( $\mathfrak{A}$ ); поэтому поле нулей степени трансцендентности  $k$  и поле классов вычетов абстрактно тождественны.

III. *Разложение нормы  $p$  на линейные множители в поле Galois, определенном  $p$ .* Если считать переменные  $x_1, \dots, x_n$  полученными из исходных переменных  $y_1, \dots, y_n$  линейным преобразованием с неопределенными в качестве коэффициентов, то поле нулей  $\mathfrak{A}$  степени трансцендентности  $k$  можно рассматривать как конечное алгебраическое поле расширения поля  $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$  ( $k = n - i$ ). Поэтому можно перейти к полю Galois  $\mathfrak{A}$  относительно  $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ , в котором простая функция  $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$  с нулем  $\alpha_i$  разлагается на линейные множители. Эта простая функция  $P^{(i)}$ , если вернуться к исходным переменным  $y$ , играет роль фундаментального уравнения; ибо  $\alpha_i$  становится равным фундаментальной форме  $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$ , где  $\beta$  обозначает систему нулей в переменных  $y$ , алгебраически зависящую от параметров  $x_{i+1}, \dots, x_n$ ; следовательно, разложение на линейные множители дает произведение по всем нулям. Но простую функцию  $P^{(i)}$  или ее степень можно также рассматривать как норму  $N(p)$  идеала  $p$ , если рассматривать  $p$  как модуль из линейных форм в степенных произведениях  $x_1, \dots, x_{i-1}$ , взять  $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$  вместо  $P$  в качестве области коэффициентов и определить норму как произведение по всем элементарным делителям — из которых только конечное число отлично от единицы. При совершенном поле  $P$  в качестве области коэффициентов всегда имеем  $N(p) = P^{(i)}$ ; при несовершенном поле нормой может оказаться степень  $P^{(i)}$ .

IV. *Норма исходного идеала и значение кратности.* Если соответственно последовательно рассматривать идеал  $a$  как модуль из линейных форм в степенных произведениях  $x_1, \dots, x_{i-1}$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ), то можно показать, что при взятии за основу  $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$  этот модуль каждый раз имеет только конечное число элементарных делителей, отличных от единицы; это условие конечности следует из существования базиса идеала. Произведение по этим каждый раз конечным элементарным делителям дает отдельные нормы; норма  $N(a)$  определяется как произведение всех отдельных норм. Наибольшие первичные множители  $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$  нормы  $N(a)$  взаимно однозначно соответствуют ассоциированным простым идеалам  $p$  идеала  $a$  так, что  $Q^{(i)}$  становится степенью  $P^{(i)}$ , где  $P^{(i)}$  (или, если нужно, степень  $P^{(i)}$ ) обозначает норму  $N(p)$  идеала  $p$ . Тем самым получается разложение

$$N(a) = N(p_1)^{e_1} \cdots N(p_r)^{e_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

— где, если нужно,  $N(p)$  следует заменить наивысшим элементарным делителем  $E(p) = P^{(i)}$ , — и тем самым по I, II, III для всех нулей  $\alpha$  выполнено разложение нормы на линейные множители. Кратностью нулей, соответствующих отдельному простому идеалу  $p$  идеала  $\alpha$ , можно считать степень  $Q^{(i)}$ , которую можно истолковать как число классов вычетов, линейно независимых относительно  $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ . А именно речь идет о классах вычетов некоторых изолированных компонент разложения, однозначно определенных  $p$  и простыми идеалами большей размерности: о классах вычетов основного идеала  $(i-1)$ -й степени по компоненте основного идеала  $i$ -й степени, определенной  $p$ ; последняя компонента имеет  $p$  и все простые идеалы большей размерности как ассоциированные простые идеалы, первая же имеет только простые идеалы большей размерности.

Полное включение случая одной переменной получается, если и здесь перейти к главному идеалу. Разложение, данное в пункте 1, тогда — смотря по тому, рассматривается ли  $a(x)$  как базисный полином или как норма, — распадается на два отдельных разложения: на представление главного идеала как наименьшего общего кратного наибольших первичных компонент по I, что здесь сводится к представлению как произведения степеней простых идеалов; или на разложение нормы как произведения степеней норм отдельных простых идеалов по IV. В построении поля нулей по пункту 2 на самом деле речь идет о поле нулей простого идеала, определенного  $p(x)$ , тогда как в пункте 3 на линейные множители разлагается норма. Определение кратности по пункту 4 подчиняется данному в IV, поскольку основной идеал нулевой степени равен единичному идеалу, а основной идеал первой степени при одной переменной уже равен самому идеалу.

Включение в обычную теорию элиминации задается тем, что норма идеала имеет значение результата; при таком понимании старая проблема теории элиминации становится частью теории идеалов полиномиальной области, а именно той частью, которая наряду с теоремами о разложении идеалов также рассматривает разложение их норм и связь обоих разложений.

(Поступило 19. 10. 1923.)

## 26. Абстрактное построение теории идеалов в алгебраическом числовом поле

J. Ber. d. DMV 33 (1924), с. 102

4. E. Noether, Гёттинген: Абстрактное построение теории идеалов в алгебраическом числовом поле.

Были указаны абстрактные свойства, вполне эквивалентные теории идеалов в алгебраическом числовом поле и тем самым характеризующие все кольца, обладающие такой теорией идеалов. Это кольца с единицей и без делителей нуля, в которых выполняется условие двойной цепи: каждая цепь идеалов по делимости обрывается за конечное число шагов, и так же каждая цепь кратных по модулю каждого идеала, отличного от нулевого идеала; кроме того, эти кольца интегрально замкнуты относительно своего поля частных. Если отбросить последнее предположение, то получаются утверждения о теории идеалов в конечном порядке, которые отчасти уже встречаются без доказательства у Dedekind (3-е изд.).

Подробное изложение появится в Mathematische Annalen.

## 27. Гильбертовы числа в теории идеалов

J. Ber. d. DMV 34 (1925), с. 101

Е. Noether: Гильбертовы числа в теории идеалов. Под гильбертовыми числами вообще понимаются такие числа, которые относятся к подсчёту классов вычетов идеалов. Сам Гильберт в своей «характеристической функции» задал функцию, которая для идеалов полиномиальной области, начиная с некоторой границы, даёт точное число линейно независимых классов вычетов. Для меньших значений степени Маколей дополнил эту функцию производящей функцией, которую Островский смог явно вычислить. Но Маколей указал также числа другого типа, которые оказались наиболее существенными для общей теории идеалов, поскольку их можно сформулировать абстрактно. В соответствии с общими теоремами о разложении достаточно дать определение для первичных идеалов  $q$ . Речь идёт о числе линейно независимых классов вычетов относительно поля классов вычетов ассоциированного простого идеала  $p$ . Эти числа распадаются на подсистемы, каждая из которых задаётся числом неприводимых компонент идеалов  $q, q/p, q/p^2, \dots$ . Число  $i$ -й подсистемы также характеризуется числом членов композиционного ряда, который идёт от  $q/p^i$  к  $q/p^{i-1}$ . Полный композиционный ряд и его гильбертовы числа образуют эквивалент представления первичных идеалов как степеней простых идеалов, которое в общем случае – например, в конечных порядках алгебраического числового поля – уже не действительно.

## 28. Характеры групп и теория идеалов

J. Ber. d. DMV 34 (1925), с. 144

3. E. Noether, Гёттинген: Характеры групп и теория идеалов.

Фробениусова теория характеров групп – то есть представлений конечных групп – понимается как теория идеалов вполне приводимого кольца, группового кольца. Поэтому в общем виде развиваются теоремы об изоморфизме при аддитивном разложении вполне приводимого кольца; представление в виде прямой суммы прямо неразложимых простых идеалов единственно с точностью до изоморфизма, а неразложимые односторонние идеалы, принадлежащие одному и тому же двустороннему идеалу, изоморфны между собой. Следовательно, если изоморфные идеалы объединить в один класс, то различных классов неразложимых идеалов столько же, сколько неразложимых двусторонних идеалов.

При специализации на вполне приводимые системы гиперкомплексных величин – в частности на групповое кольцо – классы неразложимых идеалов и неприводимые классы представлений взаимно однозначно соответствуют друг другу. Далее, двусторонние неразложимые идеалы соответствуют характерам; и число аддитивных неразложимых компонент двустороннего идеала равно рангу неразложимых идеалов. Тем самым фробениусова теория включена в эту схему.

Подробное изложение должно появиться в Math. Ann.

## 29. Теорема конечности для инвариантов конечных линейных групп характеристики $p$

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, с. 28–35

Представлено R. Courant на заседании 30 июля 1926 года.

Ниже я показываю, что известная теорема конечности для инвариантов конечных групп линейных подстановок<sup>1</sup> сохраняется, если в качестве области коэффициентов вместо обычного числового поля положить в основу произвольное поле, следовательно, в частности поле характеристики  $p$ .<sup>2</sup> Однако известные доказательства конечности перестают работать, как только порядок группы делится на  $p$ ; приходится привлекать более глубокие арифметические факты, а именно следующий критерий, до сих пор известный лишь для характеристики нуля:

**Критерий конечности**<sup>3</sup>: область целостности  $\mathfrak{S}$  из полиномов – более обще, из рациональных функций – с коэффициентами из поля конечна тогда и только тогда, когда в  $\mathfrak{S}$  содержится конечное подкольцо  $\mathfrak{A}$  такое, что все элементы  $\mathfrak{S}$  алгебраически целы над  $\mathfrak{A}$ . Тогда каждый интегральный базис  $\mathfrak{A}$  дополняется модульным базисом  $\mathfrak{S}$  относительно некоторого подкольца  $\mathfrak{A}$  до интегрального базиса  $\mathfrak{S}$ .

Этот критерий, сам по себе представляющий самостоятельный интерес, опирается на существование рационального базиса и на тот факт, что теорема о цепях делителей сохраняется при переходе к целым элементам конечного расширения. Эта вторая теорема в предыдущей заметке Artin и van der Waerden доказана для произвольной характеристики лишь при некотором предположении конечности для исходной области, которое выполнено в случае конечных групп (кольцо корней представляет конечное расширение). Для существования рационального базиса я даю доказательство, действительное для произвольных полей как областей коэффициентов; тем самым я могу доказать критерий конечности при указанном выше ограничении.

То, что для инвариантов конечных групп критерий конечности выполнен, опирается на принцип симметрических функций. Но если в характеристике нуля коэффициенты резольвенты Galois уже дают интегральный базис, то в общем случае они порождают лишь конечное подкольцо, требуемое в критерии конечности. Из существования этого конечного подкольца теми же рассуждениями следует конечность «относительных» инвариантов и «модулярных» инвариантов.

К рассматриваемым здесь инвариантам как специальные случаи относятся «проективные инварианты mod  $p$ », изучавшиеся Dickson и его школой.<sup>4</sup> Здесь теорема конечности была известна для модулярных инвариантов, но не для общих «формальных» инвариантов.

### § 1. Критерий конечности

1. **Теорема о существовании рационального базиса.** Первая формулировка: всякая система  $S$  рациональных функций от  $n$  неопределенных с коэффициентами из поля  $P$  имеет конечный рациональный базис; то есть существует конечное число функций системы такое, что всякую функцию системы можно рационально, с коэффициентами из  $P$ , выразить через эти конечные функции.

Вторая формулировка: пусть  $\mathfrak{K}$  – промежуточное поле между  $P$  и  $P(x_1, \dots, x_n)$ , где  $x_1, \dots, x_n$  обозначают неопределенные, степени трансцендентности  $t \leq n$ ; пусть  $y_1, \dots, y_t$  – неприводимая система<sup>5</sup> из  $\mathfrak{K}$ . Тогда  $\mathfrak{K}$  является конечным алгебраическим расширением  $P(y_1, \dots, y_t)$ .

<sup>1</sup>Элементарное доказательство конечности см.: E. Noether, *Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen*. Math. Ann. 77 (1916), с. 89–92.

<sup>2</sup>О понятиях теории полей см.: E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*. J. f. M. 137 (1910), с. 167–309. Характеристика в § 4, поле корней в § 12, поле частных в § 3.

<sup>3</sup>Ср.: E. Noether, *Algebraische und Differentialinvarianten*. Jahresber. d. d. Math.-Ver. 32 (1923), с. 177–184, № 3, теорема 4, и указанную там литературу. В последнем предложении критерия там ошибочно стоит «модульный базис относительно  $\mathfrak{A}$ » (фундаментальная система целых величин) вместо «относительно некоторого подкольца  $\mathfrak{A}$ ».

<sup>4</sup>Ср.: Dickson, *On Invariants and the theory of Numbers*. The Madison Colloquium 1913. Новейшая литература содержится в томах Transactions of the American Mathematical Society, вышедших с тех пор.

<sup>5</sup>По Steinitz система называется неприводимой, если она состоит из алгебраически независимых функций. Говорят,



Обе формулировки фактически эквивалентны. Достаточно доказать существование рационального базиса для всех промежуточных полей; ведь поле, полученное из системы  $S$ , становится таким промежуточным полем  $\mathfrak{K}$ , рациональный базис которого непосредственно дает рациональный базис  $S$ , поскольку каждый элемент  $\mathfrak{K}$  становится рациональной комбинацией конечного числа функций из  $S$ . Из второй формулировки, в свою очередь, следует, что произвольная неприводимая система  $y_1, \dots, y_t$  из  $\mathfrak{K}$ , дополненная конечным числом функций, характеризующих  $\mathfrak{K}$  как конечное расширение  $P(y_1, \dots, y_t)$ , дает такой рациональный базис. Обратно, если по первой формулировке задан рациональный базис  $\mathfrak{K}$ , то по определению степени трансцендентности каждый элемент базиса должен быть алгебраически зависим над  $P(y_1, \dots, y_t)$ ; следовательно, этим  $\mathfrak{K}$  характеризуется как конечное алгебраическое расширение  $P(y_1, \dots, y_t)$ .

Теорема будет доказана во второй формулировке. Сначала пусть  $\mathfrak{K}$  имеет ту же степень трансцендентности  $n$ , что и  $P(x_1, \dots, x_n)$ ; пусть  $y_1, \dots, y_n$  — неприводимая система из  $\mathfrak{K}$ , а следовательно и из  $P(x_1, \dots, x_n)$ . В силу степени трансцендентности  $n$  системы  $y_1, \dots, y_n$  каждое  $x_i$  становится алгебраическим над  $P(y_1, \dots, y_n)$ ; значит,  $P(x_1, \dots, x_n)$ , а вместе с ним и промежуточное поле  $\mathfrak{K}$ , становится конечным алгебраическим расширением  $P(y_1, \dots, y_n)$ .

Теперь пусть  $t < n$ ; нумерация  $x$  выбрана так, что  $y_1, \dots, y_t, x_{t+1}, \dots, x_n$  образуют неприводимую систему из  $P(x_1, \dots, x_n)$ . Тогда  $x_{t+1}, \dots, x_n$  неприводимы относительно  $P(y_1, \dots, y_t)$  и потому, по транзитивному закону алгебраической зависимости, также неприводимы относительно  $\mathfrak{K}$  и относительно всякого промежуточного поля  $\mathfrak{M}$  между  $P(y_1, \dots, y_t)$  и  $\mathfrak{K}$ . Это означает, что  $\bar{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ , соответственно  $\bar{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \dots, x_n)$ , является чисто трансцендентным расширением  $\mathfrak{K}$ , соответственно  $\mathfrak{M}$ ; следовательно, всякий элемент  $\bar{\mathfrak{K}}$ , не принадлежащий  $\mathfrak{K}$ , трансцендентен относительно  $\mathfrak{K}$ , и точно так же всякий элемент  $\bar{\mathfrak{M}}$ , не принадлежащий  $\mathfrak{M}$ , трансцендентен относительно  $\mathfrak{M}$ . Аналогично положим  $\bar{P}$  равным чисто трансцендентному расширению  $P(x_{t+1}, \dots, x_n)$ ; тогда  $y_1, \dots, y_t$  неприводимы относительно  $\bar{P}$ .

Теперь доказательство сводится к уже разобранным случаям, если взять  $\bar{P}$  в качестве области коэффициентов. Из

$$P < \mathfrak{K} < P(x_1, \dots, x_t, x_{t+1}, \dots, x_n)$$

<sup>6</sup> следует

$$\bar{P} < \bar{\mathfrak{K}} < \bar{P}(x_1, \dots, x_t),$$

причем  $\bar{\mathfrak{K}}$  имеет ту же степень трансцендентности  $t$  относительно  $\bar{P}$ , что и  $\bar{P}(x_1, \dots, x_t)$ . Следовательно,  $\bar{\mathfrak{K}}$  имеет конечный рациональный базис относительно  $\bar{P}$  как области коэффициентов, скажем  $y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s$ . При этом  $z$  можно выбрать из  $\mathfrak{K}$ , так как  $\bar{\mathfrak{K}}$  есть поле, порожденное  $\mathfrak{K}$  и  $\bar{P}$ . Остается показать, что  $\mathfrak{K}$  равно  $\mathfrak{M} = P(y_1, \dots, y_t; z_1, \dots, z_s)$ . Поле  $\mathfrak{M}$  является промежуточным между  $P(y_1, \dots, y_t)$  и  $\mathfrak{K}$ ; поэтому каждый элемент  $\mathfrak{K}$  алгебраичен над  $\mathfrak{M}$ . С другой стороны,  $\bar{\mathfrak{M}}$  равно  $\bar{\mathfrak{K}}$ , а значит  $\mathfrak{K}$  содержится в  $\bar{\mathfrak{M}}$ . Поэтому  $\mathfrak{K}$  является промежуточным полем между  $\mathfrak{M}$  и  $\bar{\mathfrak{M}}$ ; поскольку каждый элемент  $\bar{\mathfrak{M}}$ , не принадлежащий  $\mathfrak{M}$ , трансцендентен относительно  $\mathfrak{M}$ , необходимо  $\mathfrak{K}$  совпадает с  $\mathfrak{M}$ .

Следствие: если  $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$  и  $\mathfrak{L}$  алгебраично над  $\mathfrak{K}$ , то  $\mathfrak{L}$  является конечным алгебраическим расширением  $\mathfrak{K}$ . Ведь каждый элемент рационального базиса  $\mathfrak{L}$  тогда алгебраичен над  $\mathfrak{K}$ ; следовательно,  $\mathfrak{L}$  характеризуется как конечное расширение  $\mathfrak{K}$ .

**2. Доказательство критерия конечности.** Условие явно необходимо: если  $\mathfrak{S}$  является конечной областью целостности, то саму  $\mathfrak{S}$  можно рассматривать как конечное подкольцо  $\mathfrak{K}$ , фигурирующее в критерии.

Условие достаточно при предположении, что поле корней  $P^{1/p}$  является конечным расширением поля коэффициентов<sup>7</sup>, как только последнее имеет характеристику  $p$ ; для характеристики нуль никакого ограничительного предположения не нужно. Для доказательства надо показать, что  $\mathfrak{S}$  имеет конечный модульный базис относительно некоторого подкольца  $\mathfrak{K}$ .

что система имеет степень трансцендентности  $t$ , если она содержит по крайней мере одну неприводимую систему из  $t$  элементов, но не содержит такой системы из большего числа элементов. Простые теоремы о неприводимых системах, используемые ниже, см. у Steinitz, § 22.

<sup>6</sup>  $P < \mathfrak{K}$  означает:  $P$  содержится в  $\mathfrak{K}$ , то есть является подполем  $\mathfrak{K}$ .

<sup>7</sup> См. с. 28, прим. 2.

Пусть  $\mathfrak{K}$  обозначает поле частных<sup>8</sup> кольца  $\mathfrak{R}$ , а  $\mathfrak{L}$  – поле частных кольца  $\mathfrak{S}$ . Эти поля частных существуют, поскольку речь идет о кольцах без делителей нуля; имеем  $P < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < P(x_1, \dots, x_n)$ . Следовательно, по следствию из п. 1 поле  $\mathfrak{L}$  является конечным алгебраическим расширением  $\mathfrak{K}$ ; далее, по предположению, каждый элемент  $\mathfrak{S}$  цел над  $\mathfrak{R}$ , и тем самым  $\mathfrak{S}$  становится подкольцом кольца  $\mathfrak{S}'$ , состоящего из всех элементов  $\mathfrak{L}$ , целых над  $\mathfrak{R}$ . Но поскольку ничего не предполагается об интегральной замкнутости  $\mathfrak{R}$  в  $\mathfrak{K}$ , факт, что теорема о цепях делителей сохраняется при конечном расширении, нельзя применить непосредственно. Сначала надо перейти к также конечному подкольцу  $\mathfrak{T}$  кольца  $\mathfrak{R}$ , для которого эта интегральная замкнутость выполнена.

Сначала предположим, что область коэффициентов  $P$  содержит бесконечно много элементов. Тогда из  $\mathfrak{R}$  можно выбрать неприводимую систему  $g_1(x), \dots, g_t(x)$  так, что  $\mathfrak{R}$ , а значит и  $\mathfrak{S}$ , цела над  $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$ . Действительно, пусть  $f_1(x), \dots, f_k(x)$  – интегральный базис  $\mathfrak{R}$ , существующий по предположению; если он не образует неприводимой системы, то после возможной перенумерации индексов пусть

$$F(f_k; f_1, \dots, f_{k-1}) = 0$$

будет соотношением, которому удовлетворяет  $f_k$ . Если заменить  $f_1, \dots, f_{k-1}$  на

$$f_1 + t_1 f_k, \dots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k,$$

то  $f_k$ , а следовательно и  $f_1, \dots, f_{k-1}$ , целы над этими новыми функциями, когда  $t_i$  выбраны как неопределенные. Так как  $P$  имеет бесконечно много элементов,  $t_i$  можно специализировать к элементам  $P$  так, чтобы эта целая зависимость сохранилась. После конечного числа шагов, с учетом транзитивного закона целой зависимости, получаем искомое кольцо  $\mathfrak{T} = P[g_1(x), \dots, g_t(x)]$ . Тогда  $\mathfrak{L}$  является конечным расширением поля частных  $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$  кольца  $\mathfrak{T}$ , а кольцо  $\mathfrak{S}'$ , состоящее из всех элементов  $\mathfrak{L}$ , целых над  $\mathfrak{R}$ , совпадает с кольцом всех элементов  $\mathfrak{L}$ , целых над  $\mathfrak{T}$ .

В  $\mathfrak{T}$  выполняется теорема о цепях делителей для системы всех идеалов, и  $\mathfrak{T}$  интегрально замкнуто в своем поле частных; оба утверждения следуют из того, что  $\mathfrak{T}$  изоморфно полиномиальной области от  $t$  неопределенных. Из предположения, что  $P^{1/p}$  конечно над  $P$ , далее следует, что  $\mathfrak{T}^{1/p}$  конечно над  $\mathfrak{T}$ .<sup>9,10</sup> Следовательно, в  $\mathfrak{S}'$  теорема о цепях делителей выполняется для системы всех  $\mathfrak{T}$ -модулей; в частности,  $\mathfrak{S}$ , как подкольцо  $\mathfrak{S}'$ , содержащее  $\mathfrak{T}$ , имеет конечный  $\mathfrak{T}$ -модульный базис. Существование конечного  $\mathfrak{T}$ -модульного базиса для  $\mathfrak{S}$  далее остается верным без какого-либо ограничительного предположения об области коэффициентов  $P$ , если  $\mathfrak{L}$  является расширением первого рода поля  $P(g_1(x), \dots, g_t(x))$ , следовательно, в частности, всегда когда  $P$  имеет характеристику нуль.<sup>11</sup>

Пусть  $h_1(x), \dots, h_s(x)$  –  $\mathfrak{T}$ -модульный базис  $\mathfrak{S}$ . Тогда представление

$$f(x) = A_1(g)h_1(x) + \dots + A_s(g)h_s(x)$$

для произвольного  $f(x)$  из  $\mathfrak{S}$ , где  $A$ , как элементы  $\mathfrak{T}$ , обозначают полиномы от  $g$ , показывает, что  $g_1(x), \dots, g_t(x), h_1(x), \dots, h_s(x)$  образуют искомый интегральный базис.

Если поле  $P$  содержит лишь конечное число элементов, то поле  $P(u)$ , полученное присоединением неопределенной  $u$ , то есть элемента, трансцендентного относительно  $\mathfrak{S}$ , содержит бесконечно много элементов. Поэтому кольцо  $\mathfrak{S}(u)$  имеет конечный интегральный базис относительно  $P(u)$  как области коэффициентов; и поскольку  $\mathfrak{S}(u)$  является кольцом, порожденным  $\mathfrak{S}$  и  $P(u)$ , этот базис можно выбрать из  $\mathfrak{S}$ , разложив по степеням  $u$ , хотя базисные элементы  $g_i$  из  $\mathfrak{S}$  теперь уже не будут образовывать неприводимую систему. Тем самым каждый полином  $f(x)$  из  $\mathfrak{S}$  допускает представление  $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$ , где  $C(u)$  обозначает ненулевой полином из  $P[u]$ , а  $G$  является целым полиномом по  $u, g_i, h_i$ . Сравнение коэффициентов при подходящей степени  $u$  показывает, что  $g_i(x)$  и  $h_i(x)$  дают интегральный базис  $\mathfrak{S}$ . Тем самым **критерий конечности доказан в полной общности.**

<sup>8</sup>См. с. 28, прим. 2.

<sup>9</sup>Ср.: Hilbert, *Über die vollen Invariantensysteme*, § 1. Math. Ann. 42 (1893), с. 313–373.

<sup>10</sup>Ср. заметку Artin–van der Waerden, цитированную во введении.

<sup>11</sup>Ср., например: E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, § 3. Math. Ann. 96 (1926), с. 26–61.

## § 2. Конечность инвариантов

1. Под **конечной линейной группой характеристики  $p$**  понимается группа  $\mathfrak{H}$  из  $h$  линейных подстановок  $A_1, \dots, A_h$  (с ненулевым детерминантом) с коэффициентами из поля  $P$  характеристики  $p$ . При этом  $A_k$  задается линейной подстановкой

$$\begin{aligned} x_1^{(k)} &= a_{11}^{(k)} x_1 + \dots + a_{1n}^{(k)} x_n, \\ &\dots, \\ x_n^{(k)} &= a_{n1}^{(k)} x_1 + \dots + a_{nn}^{(k)} x_n, \end{aligned}$$

или сокращенно:  $(x^{(k)}) = A_k(x)$ . Следовательно, группа  $\mathfrak{H}$  переводит ряд  $(x)$  с элементами  $x_1, \dots, x_n$  в ряды  $(x^{(k)})$  с элементами  $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ . Так как среди  $A_1, \dots, A_h$  должна содержаться тождественная подстановка, среди рядов  $(x^{(k)})$  содержится также ряд  $(x)$ .

Под **целым рациональным (абсолютным) инвариантом группы** понимается такая целая рациональная функция от  $x_1, \dots, x_n$  с коэффициентами из  $P^{12}$ , которая при применении  $A_1, \dots, A_h$  тождественно остается неизменной. Следовательно, к этим инвариантам относятся все симметрические функции, с коэффициентами из  $P$ , от рядов  $(x^{(k)})$ . Обратно, для каждого такого инварианта имеем

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) \quad \text{или} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \dots + f(x^{(h)}).$$

Отсюда следует, что в случае, когда порядок  $h$  группы не делится на характеристику, в частности в случае характеристики нуль, симметрические функции рядов  $(x^{(k)})$  с коэффициентами из  $P$  исчерпывают всю совокупность инвариантов. Так как эти симметрические функции имеют конечный интегральный базис, доказательство конечности в этом случае завершено; одновременно интегральный базис получается как система  $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$  коэффициентов резольвенты Galois<sup>13</sup>:

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z - u_1 x_1^{(k)} - \dots - u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h). \end{aligned}$$

2. В случае, когда  $h$  делится на  $p$ , не обязательно каждый инвариант группы является симметрической функцией рядов  $(x^{(k)})$ , поскольку теперь из  $h \cdot f(x)$  уже нельзя заключать о  $f(x)$ . Но кольцо  $\mathfrak{A}$ , полученное из конечного числа инвариантов  $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ , то есть из коэффициентов резольвенты Galois, образует конечное подкольцо системы  $\mathfrak{S}$  всех инвариантов, и надо показать, что  $\mathfrak{S}$  относительно  $\mathfrak{A}$  удовлетворяет предпосылкам критерия конечности.

Сначала без ограничения общности<sup>14</sup> в качестве области коэффициентов можно взять подполе  $\bar{P}$  поля  $P$ , полученное из всех коэффициентов подстановок  $a_{\mu\nu}^{(k)}$ . Это поле, полученное из конечного числа элементов, возникает присоединением конечного числа алгебраических или трансцендентных элементов к простому полю; а поскольку простое поле совершенно, отсюда следует, что  $\bar{P}^{1/p}$  конечно относительно  $\bar{P}$ .<sup>15</sup>

Далее надо показать, что  $\mathfrak{S}$  алгебраически цела над  $\mathfrak{A}$ . По п. 1 среди  $h$  рядов  $x^{(k)}$  встречается также исходный ряд  $x_1, \dots, x_n$ ; значит, резольвента Galois  $\Phi(z, u)$  для  $z = u_1 x_1 + \dots + u_n x_n$  тождественно обращается в нуль по  $u$ . Если каждый раз специализировать все  $u$  в нуль, кроме  $u_i$ , которое полагается равным единице, получаем соотношение

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 0 \dots \alpha_i \dots 0}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h; \alpha + \alpha_i = h),$$

<sup>12</sup>Это не ограничивает общности, поскольку каждый инвариант с коэффициентами из поля характеристики  $p$ , которое должно иметь с  $P$  общее надполе, чтобы инварианты были определены, можно линейно разложить через конечное число инвариантов с коэффициентами из  $P$ . В общем случае надо лишь выразить коэффициенты через такие, которые линейно независимы над  $P$ ; тогда свойство инвариантности выполнено тождественно по этим независимым коэффициентам.

<sup>13</sup>См. с. 28, прим. 1.

<sup>14</sup>См. с. 33, примечание.

<sup>15</sup>См. с. 32, прим. 2.

показывающее, что каждое  $x_i$  алгебраически цело над  $\mathfrak{A}$ . Тогда то же верно для любого полинома от  $x$ ; в частности,  $\mathfrak{S}$  алгебраически цела над  $\mathfrak{A}$ . Тем самым предпосылки критерия конечности выполнены, и **конечность инвариантов доказана**.

3. Отметим, что те же рассуждения дают **конечность относительных и модулярных инвариантов**. Полином  $f(x)$  называется **относительным инвариантом** группы, если все  $f(x^{(k)})$  отличаются от  $f(x)$  лишь ненулевым множителем из  $P$ . Система абсолютных инвариантов, в частности кольцо  $\mathfrak{A}$ , полученное из  $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ , образует конечное подкольцо кольца, полученного из всех относительных инвариантов; и, как выше, предпосылки критерия конечности относительно  $\mathfrak{A}$  выполнены.

Полином  $f(x)$  называется **модулярным инвариантом** группы, если  $f(x)$  становится равным  $f(x^{(k)})$  для каждой специальной системы значений  $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$  из  $P$ . Каждый абсолютный инвариант одновременно является модулярным инвариантом; однако если  $P$  содержит лишь конечное число элементов, то обратное утверждение не обязано быть верным. Здесь тоже предпосылки критерия конечности выполнены относительно подкольца  $\mathfrak{A}$ , полученного из  $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ .

## 30. Абстрактное построение теории идеалов в алгебраических числовых полях и полях функций

*Math. Ann.* 96 (1927), с. 26–61

Далее дается абстрактная характеристика всех тех колец, теория идеалов которых совпадает с теорией идеалов всех целых элементов алгебраического числового поля, то есть таких колец, идеалы которых однозначно представляются как произведения степеней простых идеалов. К наиболее известным примерам таких колец относится также кольцо всех целых элементов алгебраического поля функций от одной неопределенной; более обще, от нескольких неопределенных, если, вслед за Kronecker, ограничиваться идеалами наибольшей размерности, то есть переходить к некоторому кольцу частных, функциональной области.

Аксиомы, полностью эквивалентные этой теории идеалов для положенного в основу коммутативного кольца, таковы:<sup>1</sup>

**I. Условие цепей делителей.** Всякая цепь идеалов, в которой каждый идеал является собственным делителем предыдущего, обрывается за конечное число шагов; иначе говоря, в каждой цепи делителей идеалов существует индекс, начиная с которого все идеалы равны.

**II. Условие цепей кратных по модулю каждого ненулевого идеала.** Всякая цепь идеалов, все члены которой являются делителями фиксированного идеала, отличного от нулевого, и в которой каждый идеал является собственным кратным предыдущего, обрывается за конечное число шагов.

**III.** Существование единичного элемента для умножения.

**IV.** Кольцо без делителей нуля.

**V. Интегральная замкнутость в поле частных.** Каждый элемент поля частных, целый над данным кольцом, принадлежит самому кольцу.

Из этих аксиом я шаг за шагом развиваю все более ограниченную теорию идеалов вплоть до аксиомы; и, обратно, показываю, что в ней все аксиомы действительно выполнены.

Из условия цепей делителей I следует, как я показала (*Теория идеалов*, §4), представление идеала как наименьшего общего кратного конечного числа первичных идеалов, принадлежащих различным простым идеалам. Я кратко повторяю здесь это доказательство (§6), поскольку его можно упростить, используя понятие частного идеалов, и поскольку я хочу исправить недосмотр: первоначальное доказательство в одном месте использует не предположенное существование единичного элемента умножения.<sup>2</sup>

Предположение условия цепей кратных приводит (§7) к тому, что в кольце классов вычетов по каждому идеалу, отличному от нулевого, простой идеал не может иметь собственного делителя, кроме единичного идеала, содержащего все элементы. Поэтому первичные компоненты этих идеалов определяются однозначно, за исключением тех, которые принадлежат единичному идеалу. В несколько менее точной форме этот результат уже имеется у Masazo Sono;<sup>3</sup> его предположение о существовании композиционного ряда в кольце классов вычетов эквивалентно «двойному условию

<sup>1</sup>Для определения основных понятий теории идеалов ср., например: E. Noether, *Idealtheorie in Ringbereichen*, Math. Ann. 83 (1921), с. 24–66 (далее цитируется как *Теория идеалов*). Кстати, наиболее существенные понятия кратко формулируются и в настоящей работе, особенно в §§1, 4 и 5. Ради полноты включено также кое-что такое, что не требуется для непосредственных целей этой работы.

<sup>2</sup>На этот недосмотр мне указал P. Urysohn; мое собственное изменение доказательства было несколько более громоздким, чем приведенное здесь, принадлежащее E. Artin. Он уже раньше самостоятельно заполнил этот пробел и также независимо от меня продумал упрощение с помощью частного идеалов. – Еще одно упрощение, которое избегает введения «редуцированного представления», я беру из родственной постановки вопроса у W. Krull: *Algebraische Theorie der Ringe III*, Math. Ann. 92 (1924), с. 181–213, теорема I.

<sup>3</sup>Masazo Sono, *On the Reduction of Ideals*, Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A, 7 (1924), с. 191–204.

цепей» в этом кольце, как я кратко показываю в конце (§10). Под двойным условием цепей я понимаю действие условий цепей делителей и кратных без ограничения идеалами, отличными от нулевого.

Если выполнена еще и аксиома III, то есть существует единичный элемент, единичный идеал не возникает как принадлежащий простой идеал; значит, первичные компоненты определяются однозначно, они попарно взаимно просты, а их наименьшее общее кратное равно их произведению. Аксиомы I, II, III выполнены для всех конечных порядков алгебраического числового поля; здесь уже Dedekind (Dirichlet–Dedekind, *Zahlentheorie*, 3-е изд., 11-е дополнение, §172), не давая доказательства во всех деталях, высказал однозначное представление идеала как произведения попарно взаимно простых однотипных идеалов (первичных компонент).

Из предположения IV, то есть отсутствия делителей нуля, следует, что различные степени идеала, отличного от нулевого и единичного идеалов, все различны, а также что существует поле частных. Если наконец выполнена еще и аксиома V интегральной замкнутости в поле частных, то первичные идеалы, однозначно определенные благодаря IV, становятся степенями простых идеалов; тем самым получается обычная теорема разложения (§8). Это последнее доказательство опирается на следствие интегральной замкнутости, которое в случае числового поля уже вывел Dedekind (3-е изд., §172): истинно дробный элемент можно представить как частное целых элементов так, что даже квадрат числителя не делится на знаменатель. В более поздних изложениях вместо этого следствия, также как следствие интегральной замкнутости, появляется гораздо менее прозрачная обобщенная теорема Gauss или соответствующие, несколько более сильные модульные теоремы; все эти теоремы при применении предполагают базисные элементы, тогда как здесь работа ведется с самими идеалами.

В обратном направлении §9 аксиомы, отличные от V, следуют почти непосредственно; сама V следует из доказательства того, что истинно дробный элемент всегда можно представить так, что никакая степень числителя не делится на знаменатель, а это является усилением следствия, первоначально полученного из V. Это доказательство удастся лишь после того, как из представления идеалов выводятся обычные следствия: представление главными идеалами по модулю фиксированного идеала и теория дробных идеалов, то есть частных идеалов в поле. Факт, что интегральная замкнутость следует из представления степенями простых идеалов, также уже был известен Dedekind, как показывает замечание (3-е изд., §172, с. 522, внизу).

Аксиомы I–V дают, что четыре вообще различные разложения – на наименьшие попарно взаимно простые идеалы, на взаимно простые идеалы, на наибольшие первичные компоненты и на неприводимые идеалы – совпадают; и, обратно, из этого совпадения и аксиом I–IV следует интегральная замкнутость. Для колец с делителями нуля выполнение остальных аксиом, причем V следует определить как интегральную замкнутость в кольце частных, не обязательно влечет совпадение разложений; это показывает пример кольца классов вычетов по некоторым идеалам конечного порядка §9.

В §1 я набрасываю теорию элементов, целых над кольцом, вплоть до следствия Dedekind из интегральной замкнутости. В §2 я показываю, как условия цепей переносятся с кольца на модули из линейных форм, для которых это кольцо служит областью коэффициентов и множителей.<sup>4</sup> Отсюда я вывожу (§3), что при переходе к целым элементам алгебраического расширения поля первого рода аксиомы I–IV сохраняются для каждого порядка, тогда как для порядка, состоящего из всех целых элементов, выполнена также V. Этот факт, для алгебраического числового поля, конечно, известный, позволяет подчинить упомянутые в начале поля функций; в частности, простое доказательство того, что функциональная область, выведенная из целочисленных многочленов от нескольких неопределенных, удовлетворяет аксиомам, полностью включает сюда и теорию идеалов Kronecker.<sup>5</sup>

Теория идеалов, развиваемая далее, не предполагает этих §§2 и 3, служащих только для включения примеров. В §§4 и 5 даются основания, независимые от аксиом I–V; благодаря этому яснее, чем в первоначальном обосновании, видно, какие части теории не зависят от предположений конечности.

<sup>4</sup>Эта форма модульных теорем принадлежит Prüfer (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, §2, Math. Ann. 94 (1924), с. 198–243) и прозрачнее обычного переноса базисных теорем.

<sup>5</sup>Различие, следовательно, появляется лишь в теоремах о дискриминантах, поскольку кольцо классов вычетов функциональной области по простому числу становится несовершенным полем, и потому могут возникать расширения второго рода.

## § 1. Теория целых элементов

Пусть задано коммутативное кольцо<sup>6</sup>  $T$  без делителей нуля, с единичным элементом  $e$  для умножения (аксиомы  $III$  и  $IV$ ); в  $T$  выделено фиксированное подкольцо  $R$ , содержащее единичный элемент. Понятия модуля, порядка и целостности всюду относятся к этому фиксированному кольцу  $R$ ; далее, ради краткости, это будет опускаться в обозначениях.<sup>7</sup> Элементы из  $R$  будем обозначать латинскими буквами, а элементы из  $T$  вообще – греческими.

1. Система  $M$  элементов из  $T$  называется, как обычно,  $R$ -модулем, или кратко модулем, если вместе с двумя элементами  $\alpha$  и  $\beta$  она содержит и их разность, а вместе с  $\alpha$  также  $r\alpha$ , где  $r$  – произвольный элемент из  $R$ . Говорят, что  $M$  делится на  $N$ ,

$$M \equiv 0 \pmod{N},$$

а также что  $M$  является кратным, а  $N$  делителем, если каждый элемент из  $M$  содержится также в  $N$ .  $R$ -модули, все элементы которых принадлежат  $R$ , называются идеалами в  $R$ .

Очевидно, пересечение – наименьшее общее кратное  $[\dots, M_i, \dots]$  – произвольного числа модулей из  $T$  снова является модулем; так же и  $T$  является модулем. Поэтому для произвольной системы  $\Sigma$  элементов из  $T$  однозначно существует порожденный ею модуль: это пересечение всех модулей, содержащих  $\Sigma$ . Сумма – наибольший общий делитель  $(\dots, M_i, \dots)$  – произвольной системы модулей есть модуль, порожденный их объединением. Произведение  $MN$  двух модулей определяется как модуль, порожденный элементами  $\mu\nu$ , где  $\mu$  пробегает все элементы из  $M$ , а  $\nu$  все элементы из  $N$ . Поэтому произведение удовлетворяет ассоциативному и коммутативному законам, поскольку они выполняются для элементов кольца. Из дистрибутивного закона в  $T$  далее следует дистрибутивный закон для модулей:

$$(\dots, M_i, \dots)N = (\dots, M_iN, \dots),$$

так как по тому же самому закону в  $T$  правая и левая части являются модулем, порожденным всеми элементами  $\mu_i\nu$ .

Так как само  $R$  является модулем, условие, что  $R$  есть область множителей, можно записать как  $RM \equiv 0 \pmod{M}$ . А так как по предположению  $R$  содержит единичный элемент, имеем также  $M \equiv 0 \pmod{RM}$ , и потому  $M = RM$ .

Модуль  $M$  называется конечным, то есть конечно порожденным, если существует хотя бы одна система  $\Sigma$  из конечного числа элементов, порождающая  $M$ ; элементы  $\mu_1, \dots, \mu_n$  из  $\Sigma$  называются модульным базисом для

$$M = (\mu_1, \dots, \mu_n).$$

Сумма и произведение двух, а значит и конечного числа, конечных модулей снова конечны, поскольку они порождаются соответственно объединением или произведениями базисных элементов. Последнее следует из представления  $r_1\mu_1 + \dots + r_n\mu_n$  всех элементов  $\mu$  из  $M$  через базис и из коммутативного закона умножения в  $T$ .

2. Расширяющее кольцо  $R$  в  $T$ , то есть кольцо в  $T$ , содержащее все элементы из  $R$ , называется  $R$ -порядком, или кратко порядком. Пересечение произвольного числа порядков из  $T$  снова является порядком; так же и  $T$  является порядком. Следовательно, для произвольной системы  $\Sigma$  элементов из

<sup>6</sup>Кольцо, как известно, определено, если на множестве задано отношение равенства, а также две операции, сложение и умножение, удовлетворяющие обычным законам: сложение ассоциативно, коммутативно и однозначно обратимо; умножение ассоциативно – и коммутативно, когда речь идет о коммутативном кольце, – и дистрибутивно относительно сложения. Если лежащее в основе определение равенства не является теоретико-множественным тождеством, то, чтобы в каждой подсистеме сохранялось то же определение равенства, такая подсистема (подкольцо, модуль, идеал) вместе с любым элементом должна содержать и все элементы, равные ему. Точно так же при каждом расширении нужно предполагать, что новое определение равенства включает старое. Все понятия вроде «конечно много элементов», «однозначное соответствие» и т. п. понимаются в смысле этого определения равенства; например, «существует один и только один элемент» означает, что существует только один элемент с точностью до равенства. Впрочем, от равенства всегда можно перейти к теоретико-множественному тождеству, объединяя равные элементы в один класс и вводя эти классы как новые элементы. Приведенные здесь замечания об определении равенства принадлежат R. Hölzer.

<sup>7</sup>Теория целых элементов сохраняется, если допустить делители нуля и вместо этого предположить в  $R$  условие цепей делителей; по §2 это также дает доказательство леммы. Так как эта форма теории целых элементов далее не используется, на нее будет указано только в примечаниях. Все рассматриваемые определения сохраняются при наличии делителей нуля; большинство из них, как известно и легко видно, требует еще более слабых предположений. Не сохраняется лишь дедекиндовская формулировка: «Число является целым, если оно имеет оболочку». Ибо при появлении делителей нуля частное двух конечных модулей не обязано оставаться конечным; поэтому здесь порядок определяется непосредственно, а не как частное модулей.

$T$  однозначно существует порожденный ею порядок. Суммы и произведения порядков определяются соответственно так же, как для модулей; в частности  $O^2 = O$  для каждого порядка.

Каждый порядок одновременно является  $R$ -модулем; порядок называется конечным, если он является конечным модулем. Так как сумма и произведение возникают путем образования модульной суммы и модульного произведения, по пункту 1 суммы и произведения конечных порядков снова являются конечными порядками. Кроме того, выполняется транзитивный закон: если  $A$  – конечный  $R$ -порядок, а  $B$  – конечный  $A$ -порядок, то  $B$  является также конечным  $R$ -порядком. Действительно,  $B$  одновременно становится  $R$ -порядком, значит  $R$ -модулем. Если же  $\alpha_1, \dots, \alpha_m$  образуют модульный базис  $A$  относительно  $R$ , а  $\beta_1, \dots, \beta_n$  такой же базис  $B$  относительно  $A$ , то произведения  $\alpha_i \beta_j$ , очевидно, образуют модульный базис  $B$  относительно  $R$ .

3. Элемент  $\alpha$  из  $T$  называется целым над  $R$ , или кратко целым, если порядок  $R_\alpha$ , порожденный  $\alpha$ , конечен; иначе говоря, если цепь делителей модулей

$$U_n = (\alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1})$$

обрывается за конечное число шагов,  $U_n = U_{n+1} = \dots$ .

Определение допускает и вторую форму, которая будет использована в пункте 4: элемент  $\alpha$  из  $T$  называется целым, если существует хотя бы один главный модуль  $C$ , отличный от нулевого модуля, то есть  $C$  порожден элементом  $\gamma \neq 0$ , такой, что произведение порядка  $R_\alpha$  с  $C$  является конечным модулем; иначе говоря, что цепь модулей  $CU_n$  обрывается за конечное число шагов.<sup>8</sup>

Наконец, это определение тождественно и обычной форме: элемент  $\alpha$  из  $T$  называется целым, если он удовлетворяет хотя бы одному уравнению

$$\alpha^n + r_1 \alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0,$$

где все  $r$  являются элементами из  $R$ .

Эти разные определения действительно тождественны. Поскольку  $R_\alpha$  совпадает с модулем, порожденным всеми степенями  $\alpha$ , для конечного  $R_\alpha$  всегда можно выбрать модульный базис из этих степеней. Если такой базис, например, имеет вид  $e = \alpha^0, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ , это означает, что цепь  $U_n$  обрывается на  $U_n$ ; и обратно, из  $U_n = U_{n+1} = \dots$  получается этот базис. Но обрывание цепи  $U_n$  тождественно также существованию уравнения

$$\alpha^n + r_1 \alpha^{n-1} + \dots + r_n = 0.$$

Если  $R_\alpha$  конечен, то конечен и  $CR_\alpha$ , значит цепь  $CU_n$  обрывается. Обратно, из конечности  $CR_\alpha$ , то есть из обрывания  $CU_n$ , следует также обрывание  $U_n$  и тем самым конечность  $R_\alpha$ . Действительно, поскольку  $C$  предполагается главным модулем, отличным от нулевого модуля, из  $CU_n = CU_{n+1}$  следует также  $U_n = U_{n+1}$ .

Кольцевое свойство целых элементов и транзитивный закон целостности опираются на следующую лемму.

**Лемма.** Пусть  $O$  – конечный порядок в  $T$ , а  $\alpha$  – произвольный элемент из  $O$ . Тогда порядок  $R_\alpha$ , порожденный  $\alpha$ , конечен; другими словами, все элементы конечного порядка являются целыми.

Доказательство получается обычными рассуждениями. Пусть  $\omega_1, \dots, \omega_n$  – модульный базис  $O$ . Из кольцевого свойства  $\alpha \omega_i$  также принадлежит  $O$ . Поэтому

$$\alpha \omega_i = r_{i1} \omega_1 + \dots + r_{in} \omega_n,$$

и отсюда

$$\det(r_{ij} - e_{ij} \alpha) = 0,$$

где  $e_{ij} = 0$  при  $i \neq j$ , а  $e_{ii} = e$ ; этим доказано, что  $\alpha$  целый. Для зануления определителя используется предположение, что  $T$ , а следовательно и  $O$ , не имеет делителей нуля.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Если в  $R$  допускаются делители нуля, нужно требовать существования регулярного главного модуля; то есть  $\gamma$  следует предполагать неделителем нуля, регулярным элементом, что для колец без делителей нуля сводится к  $\gamma \neq 0$ .

<sup>9</sup>Если в  $R$  предполагается условие цепей делителей, но допускаются делители нуля, то лемма становится непосредственным следствием модульной теоремы из §2, согласно которой условие цепей переносится на модули из  $O$ . Это доказательство для числового поля также принадлежит Dedekind (4-е изд., §173, II) и является первым применением условий цепей в литературе. В следствиях, которые будут даны в пункте 4, Dedekind вместо этого использует более специальный факт, что число классов вычетов по идеалу в алгебраическом числовом поле конечно.



Система  $G$  всех целых элементов из  $T$  образует порядок. Она содержит  $R$ , ибо элементы из  $R$  целые:  $R$  является конечным  $R$ -модулем с единичным элементом как базисом. Но  $G$  имеет и кольцевое свойство: порядок  $R_{\alpha, \beta}$ , порожденный двумя произвольными целыми элементами  $\alpha, \beta$ , равен произведению  $R_\alpha R_\beta$  и поэтому конечен. Следовательно, по лемме,  $\alpha + \beta$  и  $\alpha\beta$  целые как элементы конечного порядка.

**Транзитивный закон целости.** Если  $O$  – порядок, состоящий из целых элементов, то каждый элемент из  $T$ , целый над  $O$ , является также целым над  $R$ . По определению  $\alpha$  удовлетворяет уравнению

$$\alpha^m + \omega_1 \alpha^{m-1} + \dots + \omega_m = 0,$$

а значит также целый над порядком  $O' = R_{\omega_1, \dots, \omega_m}$ , порожденным  $\omega_1, \dots, \omega_m$ ; этот порядок конечен как произведение  $R_{\omega_1} \dots R_{\omega_m}$ . По транзитивному закону из пункта 2 порожденный  $\alpha$  конечный  $O'$ -порядок  $O'_\alpha$  поэтому является также конечным  $R$ -порядком, и  $\alpha$  целый как элемент конечного порядка, по лемме.

**4.** Кольцо  $R$  называется интегрально замкнутым в  $T$ , если каждый элемент из  $T$ , целый над  $R$ , принадлежит  $R$ . По второй форме определения целых элементов в пункте 3 элемент  $\alpha$  из  $T$  принадлежит  $R$  тогда и только тогда, когда существует хотя бы один главный модуль  $C$ , отличный от нулевого модуля, такой, что  $CR_\alpha$  является конечным модулем.<sup>10</sup>

Из понятия интегрально замкнутого кольца Dedekind (3-е изд., §172) вывел два важных следствия, позволяющих использовать это понятие в теории идеалов.

**Следствие Dedekind I.** Пусть  $R$  интегрально замкнуто в  $T$ , и пусть, как дополнительное предположение, в  $R$  выполнено условие цепей делителей для идеалов (аксиома I). Если  $\beta$  – нецелый элемент из  $T$ , а  $c \neq 0$  – элемент из  $R$ , то существует показатель  $\rho > 0$  такой, что в ряду элементов

$$c, c\beta, \dots, c\beta^\nu, \dots$$

элементы  $c, \dots, c\beta^\rho$  целые, а все последующие – нецелые.

Если бы все элементы  $c\beta^\nu$  были целыми, то из-за интегральной замкнутости  $R$  они принадлежали бы  $R$ . Тогда цепь модулей  $C, CB_1, \dots, CB_\nu, \dots$ , где  $C$  обозначает модуль, порожденный  $c$ , а  $B_\nu$  модуль, порожденный  $1, \beta, \dots, \beta^\nu$ , перешла бы в цепь идеалов  $C_\nu = (c, c\beta, \dots, c\beta^\nu)$ , которая по предположению обрывается за конечное число шагов. Но тогда, вопреки предположению,  $R_\beta$  был бы конечен, а  $\beta$  целым. Следовательно, среди элементов  $c\beta^\nu$  есть нецелые. Далее, вместе с любым нецелым элементом нецелыми являются и все последующие: ибо если  $c\beta^r$  целый, а значит принадлежит  $R$ , то при  $\rho < r$  элемент  $c\beta^\rho$  удовлетворяет уравнению

$$(c\beta^\rho)^r - c^{r-\rho}(c\beta^r)^\rho = 0$$

и поэтому тоже целый. Следовательно, если  $c\beta^{\rho+1}$  – первый нецелый элемент, то, поскольку  $c$  целый,  $\rho > 0$ , и это искомый показатель.

Если специализировать расширяющее кольцо  $T$  до поля частных кольца  $R$ , то есть до поля, возникающего присоединением всех пар элементов,<sup>11</sup> то отсюда следует:

**Следствие Dedekind II.** Пусть  $R$  интегрально замкнуто в своем поле частных  $K$ , и пусть в  $R$  выполнено условие цепей делителей для идеалов. Если  $\beta$  – нецелый элемент из  $K$ , то  $\beta$  допускает представление в виде частного элементов из  $R$ ,

$$\beta = m/n,$$

такое, что  $m^2/n$  тоже нецелый.

<sup>10</sup>Если в  $R$  допускаются делители нуля, то  $C$  снова нужно предполагать регулярным главным модулем; точно так же элемент  $c$  в следствии I нужно предполагать регулярным.

<sup>11</sup>В известной формулировке Steinitz, J. f. M. 137. Если в  $R$  допускаются делители нуля, то вместо поля частных нужно брать кольцо частных, присоединяя все пары частных, у которых знаменатель является регулярным элементом из  $R$ . Здесь следствие Dedekind II уже не выполняется, ибо  $n$  вообще не будет регулярным элементом.

Положим  $\beta = b/c$  при  $c \neq 0$ . Тогда в ряду  $c, c\beta = b, c\beta^2, \dots$  первые два элемента наверняка целые, следовательно  $\rho > 1$ , где  $\rho$  – показатель из следствия I. Если положить

$$m = c\beta^\rho, \quad n = c\beta^{\rho-1},$$

то  $m/n = \beta$ , а  $m^2/n = c\beta^{\rho+1}$  нецелый.

Транзитивный закон интегральной замкнутости имеет следующую форму: если  $R$  – произвольное кольцо в  $T$ , а  $G$  обозначает систему всех элементов из  $T$ , целых над  $R$ , то  $G$  состоит также из всех элементов из  $T$ , целых над  $G$ . Ибо каждый элемент, целый над  $G$ , по транзитивному закону из пункта 3 является также целым над  $R$ , а значит принадлежит  $G$ .

## § 2. Условия цепей в конечных модульных областях

Модульная теорема, согласно которой переносятся условия цепей, в применении, рассматриваемом здесь, появляется только для модулей расширяющего кольца. Но так как доказательство в случае общей модульной области остается тем же самым, положим в основу именно такую область.

Система  $M$  элементов  $\alpha, \beta, \dots$  называется модульной областью относительно кольца  $R$ , если в  $M$  заданы две операции, однозначно приводящие к элементам из  $M$ : аддитивное соединение элементов и умножение элементов на элементы из  $R$ ; если относительно сложения  $M$  образует абелеву группу, тогда как для умножения выполнен ассоциативный закон; и если дистрибутивный закон выполнен в обеих формах.<sup>12</sup>

Для модульной области, очевидно, сохраняются все определения модулей из §1, 1, которые не относятся к умножению. В частности,  $M$  называется конечной модульной областью, если существует конечное число элементов  $\xi_1, \dots, \xi_k$  из  $M$  таких, что  $M$  равен модулю, порожденному  $\xi_1, \dots, \xi_k$ , то есть системе всех линейных форм  $r_1\xi_1 + \dots + r_k\xi_k$ , когда в  $R$  существует единичный элемент, тогда как в противном случае добавляются еще дополнительные члены  $n_i\xi_i$ .

**Модульная теорема.** Пусть  $M$  – конечная модульная область относительно коммутативного кольца  $R$  с единичным элементом, и пусть в  $R$  выполнено условие цепей делителей соответственно условие цепей кратных для идеалов. Тогда в  $M$  выполнено условие цепей делителей соответственно условие цепей кратных для модулей.

Доказательство опирается на то, что каждому модулю из  $M$  однозначно ставится в соответствие система конечного числа идеалов из  $R$  так, что каждому собственному делителю соответственно собственному кратному модуля каждый раз соответствует по меньшей мере один собственный делитель соответственно собственное кратное среди идеалов.

Элемент из  $M$  называется элементом длины  $i$ , если он допускает по меньшей мере одно представление как линейная форма от  $\xi_1, \dots, \xi_i$ , но не допускает представления как линейная форма от  $\xi_1, \dots, \xi_{i-1}$ . Произвольному модулю  $W$  из  $M$  теперь поставим в соответствие  $k$  идеалов  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  из  $R$ : под  $W_i$  будем понимать модуль всех элементов из  $W$  длины  $\leq i$ , а  $\alpha_i$  будет обозначать систему всех коэффициентов при  $\xi_i$  в  $W_i$ . Сначала получается следующее.

Если  $B$  – собственный делитель  $W$ , а  $b_1, \dots, b_k$  – идеалы, поставленные в соответствие  $B$ , то среди  $b_i$  имеется по меньшей мере один собственный делитель соответствующего  $\alpha_i$ . Действительно, из  $B \equiv 0 \pmod{W}$  следует  $B_i \equiv 0 \pmod{W_i}$ , а значит  $b_i \equiv 0 \pmod{\alpha_i}$  для  $i = 1, 2, \dots, k$ . По предположению в  $B$  должны существовать элементы, не содержащиеся в  $W$ , а значит и такие элементы наименьшей длины  $\ell$ . Тогда  $b_\ell$  является собственным делителем  $\alpha_\ell$ , ибо  $b_\ell \equiv 0 \pmod{\alpha_\ell}$ , если

$$\beta = b_1\xi_1 + \dots + b_\ell\xi_\ell$$

есть такой элемент наименьшей длины из  $B$ . Из  $b_\ell = \alpha_\ell$  действительно следует существование элемента

$$\alpha = \alpha_\ell\xi_\ell + \dots + \alpha_1\xi_1 \equiv 0 \pmod{W},$$

а тем самым существование элемента  $\beta - \alpha \in B$ ,  $\beta - \alpha \notin W$ , меньшей длины, чем  $\ell$ .

Пусть теперь дана цепь делителей соответственно кратных

$$W^{(1)}, W^{(2)}, \dots, W^{(\nu)}, \dots$$

и пусть в  $R$  выполнено условие цепей делителей соответственно кратных. Если  $\alpha_{1\nu}, \dots, \alpha_{k\nu}$  обозначают идеалы, поставленные в соответствие  $W^{(\nu)}$ , то ряды

$$\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots$$

образуют цепи делителей соответственно кратных для  $i = 1, \dots, k$ . Следовательно, по предположению существует индекс  $\nu_0$  такой, что идеал  $\alpha_{i\nu_0}$  равен всем последующим для каждого  $i$ . Но тогда модуль  $W^{(\nu_0)}$  по доказанному выше равен всем последующим модулям; тем самым условия цепей перенесены.

<sup>12</sup>Ср. *Idealtheorie*, §9.

Отсюда непосредственно получается следующее.

**Следствие модульной теоремы.** Если в  $R$  выполнено условие цепей кратных по модулю каждого идеала, отличного от нулевого идеала, то в  $M$  выполнено условие цепей кратных по модулю каждого модуля  $C$ , все поставленные в соответствие которому идеалы  $\mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{c}_k$  отличны от нулевого идеала. Действительно, при этих предположениях цепи кратных  $\mathfrak{a}_{i1}, \dots, \mathfrak{a}_{i\nu}, \dots$  обрываются за конечное число шагов.

**Дополнительное замечание.** Если  $R$  – кольцо без единичного элемента, то все еще переносится условие цепей делителей и условие цепей кратных по модулю идеалов, отличных от нулевого идеала. Именно, вместо  $M$  рассматривают систему  $M'$  всех элементов вида

$$a_1\xi_1 + \dots + a_k\xi_k + n_1\xi_1 + \dots + n_k\xi_k,$$

которая снова переходит в  $M$ , если дополнительные целые кратные  $n_i\xi_i$  заменить элементами из  $M$ . Такому  $M'$  можно, соответственно сказанному выше, поставить в соответствие  $2k$  идеалов, причем  $\mathfrak{a}_i$  означают идеалы из  $R$ , а  $\mathfrak{n}_i$  – идеалы в целых числах. Так как для  $\mathfrak{n}_i$  выполнено условие цепей делителей и условие цепей кратных по модулю каждого идеала, отличного от нулевого, доказательство условия цепей делителей сохраняется для  $M'$  и тем самым для  $M$ ; для условия цепей кратных, однако, нужно требовать, чтобы все  $2k$  идеалов, поставленные в соответствие  $C$  соответственно  $C'$ , были отличны от нулевого идеала.

### § 3. Переход к конечным расширениям полей

Для включения числовых полей и полей функций нужно показать, как аксиомы  $I-V$ , сформулированные во введении, переносятся при переходе к конечным расширениям полей.

1. Пусть в  $\mathfrak{K}$  выполнены все аксиомы  $I-V$ , кроме аксиомы  $II$  – условия цепей кратных. Пусть  $\mathfrak{K}$  обозначает поле частных  $\mathfrak{K}$ , а  $\mathfrak{L}$  – конечное расширение поля  $\mathfrak{K}$  первого рода.<sup>13</sup> Тогда в системе  $\mathfrak{S}$  всех элементов из  $\mathfrak{L}$ , целых над  $\mathfrak{K}$ , выполнены те же аксиомы; в каждом порядке, содержащемся в  $\mathfrak{S}$ , также выполнены все эти аксиомы, кроме интегральной замкнутости.

По §1, 3 система  $\mathfrak{S}$  образует кольцо, для которого выполнены аксиомы  $III$  и  $IV$  – существование единичного элемента и отсутствие делителей нуля. По заключению §1, 4 система  $\mathfrak{S}$  интегрально замкнута в  $\mathfrak{L}$ ; одновременно  $\mathfrak{L}$  становится полем частных  $\mathfrak{S}$ , поскольку каждый элемент из  $\mathfrak{L}$  после умножения на подходящий элемент из  $\mathfrak{K}$  переходит в элемент из  $\mathfrak{S}$ . Значит, аксиома  $V$  выполнена.

Доказательство  $I$  получается из обычных рассуждений. Как расширение первого рода,  $\mathfrak{L}$  получается присоединением к  $\mathfrak{K}$  одного элемента  $\alpha$ , который, по предыдущему, можно считать целым над  $\mathfrak{K}$ . Наряду с  $\alpha$  целыми являются и сопряженные элементы  $\alpha', \alpha'', \dots$ , содержащиеся в галуаовом поле  $\mathfrak{L}$  над  $\mathfrak{K}$ ; следовательно, целым является и произведение их разностей, а также квадрат  $D$  этого произведения разностей. Так как  $\alpha, \alpha', \dots$  все различны,  $D$  является ненулевым элементом из  $\mathfrak{K}$ , а значит, по интегральной замкнутости  $\mathfrak{K}$  в  $\mathfrak{K}$ , элементом из  $\mathfrak{K}$ . По обычному рассуждению, в силу интегральной замкнутости  $\mathfrak{K}$  система  $\mathfrak{S}$  содержится в конечной  $\mathfrak{K}$ -модульной области  $M$ , порожденной элементами  $\xi_i = \alpha^i/D$ ; для этого нужно лишь в представлении элемента из  $\mathfrak{S}$  через  $\xi_i$  перейти к сопряженным элементам и решить линейную систему уравнений для коэффициентов представления. По модульной теореме из §2 условие цепей делителей выполнено для всех  $\mathfrak{K}$ -модулей из  $M$ , в частности для всех идеалов из  $\mathfrak{S}$ . Точно так же условие цепей делителей выполнено для идеалов любого порядка из  $\mathfrak{S}$ , поскольку и здесь речь идет об  $\mathfrak{K}$ -модулях в  $M$ ; для каждого порядка, кроме того, выполнены аксиомы  $III$  и  $IV$ .

2. Если в  $\mathfrak{K}$  выполнены все аксиомы  $I-V$ , то то же самое выполнено и в  $\mathfrak{S}$ . В каждом порядке из  $\mathfrak{S}$  также выполнены все аксиомы, кроме интегральной замкнутости.

С учетом 1 остается доказать только выполнение аксиомы  $II$ . По следствию модульной теоремы из §2 достаточно следующего доказательства: если ненулевой идеал из  $\mathfrak{S}$  рассматривать как  $\mathfrak{K}$ -модуль  $\mathfrak{C}$  в  $M$ , то связанные с  $\mathfrak{C}$  идеалы  $c_i$  из  $\mathfrak{K}$  все отличны от нулевого идеала. Действительно,  $\mathfrak{C}$  имеет тот же конечный линейный ранг над  $\mathfrak{K}$ , что и  $M$ , поскольку вместе с любым элементом  $\gamma$  модуль  $\mathfrak{C}$  содержит также  $\gamma\alpha^i$ . Поэтому для каждого  $\xi_i$  существует элемент  $c_i \neq 0$  из  $\mathfrak{K}$  такой, что  $c_i\xi_i$  принадлежит  $\mathfrak{C}$ ; из-за единственности представления через  $\xi_i$  – индекс должен пробегать только значения, меньшие степени поля, –  $c_i$  принадлежит  $c_i$ , и потому  $c_i$  отличен от нулевого идеала. Это рассуждение сохраняется для всех порядков того же ранга, что и  $M$ ; для порядка меньшего ранга переходят к его полю частных, которое как промежуточное поле между  $\mathfrak{K}$  и  $\mathfrak{L}$  также является первым родом, и степень которого над  $\mathfrak{K}$  совпадает с линейным рангом порядка; значит, те же рассуждения сохраняются. Наконец отметим, что порядок в  $\mathfrak{S}$ , отличный от самой  $\mathfrak{S}$ , никогда не является интегрально замкнутым: ведь каждый порядок содержит также  $\mathfrak{K}$ , и при интегральной замкнутости должен был бы содержать и  $\mathfrak{S}$ .

Для подчинения числовых полей и полей функций, следовательно, достаточно проверить выполнение аксиом  $I-V$  для основных областей: целых чисел, многочленов от одной неопределенной и функциональной области многочленов от нескольких неопределенных.

3. Для кольца  $\mathfrak{K}$  целых рациональных чисел, соответственно многочленов от одной неопределенной с коэффициентами из поля, выполнены аксиомы  $I-V$ . Здесь  $I$  и  $II$  следуют либо из того, что по модулю каждого ненулевого числа, соответственно такого многочлена от одной неопределенной, существует лишь конечное число, соответственно конечное число линейно независимых, классов вычетов; либо также из того факта, что каждый идеал является главным. Ведь отсюда следует единственное разложение идеалов в произведение степеней простых идеалов, и поэтому ненулевой идеал делится лишь на конечное число идеалов. Аксиомы  $III$  и  $IV$  очевидно выполнены, причем последняя является следствием определения равенства. Интегральная

<sup>13</sup> Алгебраическое расширение поля, по Steinitz, называется «первого рода», если каждый элемент является нулем простой функции, которая в подходящем расширении поля распадается на попарно различные линейные множители.

замкнутость  $V$  следует из того, что благодаря единственному разложению элементов из  $\mathfrak{A}$  на неприводимые с точностью до единиц – делителей единицы – каждый элемент поля частных, не содержащийся в  $\mathfrak{A}$ , можно представить как частное двух взаимно простых элементов из  $\mathfrak{A}$ ; значит, никакая степень числителя не делится на знаменатель. Такой элемент, следовательно, не может удовлетворять никакому уравнению, характеризующему его как целый над  $\mathfrak{A}$ .

4. Пусть теперь  $\mathfrak{A}$  обозначает кольцо всех многочленов от нескольких неопределенных с коэффициентами из поля или с целыми рациональными коэффициентами. Тогда аксиомы  $III$ ,  $IV$ ,  $V$  выполнены так же, как в 3, потому что и здесь имеет место единственное разложение элементов на неприводимые с точностью до единиц. То, что условие цепей делителей  $I$  выполнено, является непосредственным следствием теоремы Hilbert о существовании базиса идеала; условие цепей кратных  $II$  здесь, однако, не выполнено.

Однако переходом к функциональной области, что соответствует ограничению на идеалы наибольшей размерности, можно получить также действие аксиомы  $II$ ; действие  $I$  тогда можно доказать как в 3, без привлечения теоремы Hilbert. Именно, присоединим к  $\mathfrak{A}$  неопределенную  $u$  и рассмотрим кольцо  $\mathfrak{A}^*$  всех многочленов от  $u$  с коэффициентами из  $\mathfrak{A}$ , причем равенство определяется как равенство коэффициентов. Как обычно, многочлен из  $\mathfrak{A}^*$  называется примитивным относительно  $\mathfrak{A}$ , если наибольший общий делитель его коэффициентов – делитель в смысле многочлена из  $\mathfrak{A}$ , а не делитель-идеал – является единицей из  $\mathfrak{A}$ . Тогда каждый многочлен из  $\mathfrak{A}^*$  является произведением элемента из  $\mathfrak{A}$  и примитивного многочлена из  $\mathfrak{A}^*$ , а произведение примитивных многочленов из  $\mathfrak{A}^*$  снова примитивно.

Итак, совокупность элементов поля частных  $\mathfrak{A}^*$ , знаменатели которых являются примитивными многочленами из  $\mathfrak{A}^*$ , образует кольцо, функциональную область  $\mathfrak{F}$  кольца  $\mathfrak{A}$ . В этой функциональной области  $\mathfrak{F}$  единицами являются все и только те элементы, числитель и знаменатель которых являются примитивными многочленами из  $\mathfrak{A}^*$ ; значит, каждый элемент из  $\mathfrak{F}$  единственным образом представляется как произведение элемента из  $\mathfrak{A}$  и единицы из  $\mathfrak{F}$ . Поэтому теорема о разложении элементов из  $\mathfrak{A}$  переносится на элементы из  $\mathfrak{F}$ ; для  $\mathfrak{F}$ , следовательно, наряду с аксиомами  $III$  и  $IV$  также выполнена  $V$ , как в 3.

Кроме того, в  $\mathfrak{F}$  каждый идеал является главным. Идеал вместе с любым элементом из  $\mathfrak{F}$  содержит также полученный из него умножением на единицу элемент из  $\mathfrak{A}$ ; а вместе с любыми двумя элементами из  $\mathfrak{A}$  содержит и их наибольший общий делитель. Ведь вместе с  $f(x) = t(x)\bar{f}(x)$  и  $g(x) = t(x)\bar{g}(x)$  идеалу принадлежит также  $t(x)(\bar{f}(x) + u\bar{g}(x))$ , а значит и  $t(x)$ , если  $\bar{f}$  и  $\bar{g}$  взаимно просты и их линейная комбинация поэтому является единицей. Если, следовательно, начать с произвольного элемента  $f(x)$  идеала и если в идеале есть элемент  $g(x)$ , который на него не делится, то наибольший общий делитель  $t(x)$  также принадлежит идеалу и является собственным делителем  $f(x)$ ; поэтому конечное повторение приводит к базисному элементу идеала, и идеал распознается как главный. Следовательно, в  $\mathfrak{F}$  имеет место единственное разложение идеалов в произведения степеней простых идеалов, соответствующее разложению элементов из  $\mathfrak{A}$ ; отсюда, как в 3, следует выполнение аксиом  $I$  и  $II$ . Рассматриваемые здесь расширения поля частных  $\mathfrak{F}$  являются только такими, которые можно породить присоединением элемента из  $\mathfrak{S}$ .<sup>14</sup> С учетом 1 и 2 этим доказано действие аксиом  $I-V$  для числовых полей и полей функций.

<sup>14</sup> Систему элементов, целых над  $\mathfrak{F}$ , в этих расширениях полей получают также, переходя от  $\mathfrak{S}$  к соответствующей функциональной области так же, как от  $\mathfrak{A}$  к  $\mathfrak{F}$ . Ср., например, J. König, *Algebraische Größen*, Leipzig 1903, с. 468/69.

#### § 4. Теоремы об изоморфизме. Прямые суммы

Далее предполагается только свойство кольца, соответственно свойство модуля, но никакая другая аксиома.

1. Пусть  $M$  и  $\overline{M}$  являются модульными областями относительно  $\mathfrak{R}$  (§2). Тогда  $M$  называется гомоморфным  $\overline{M}$  (точнее: модульно-гомоморфным),  $M \sim \overline{M}$ , если каждому элементу из  $M$  соответствует один и только один элемент из  $\overline{M}$  так, что этим исчерпывается  $\overline{M}$ ;<sup>15</sup> и если при этом соответствии разность и умножение на один и тот же элемент из  $\mathfrak{R}$  соответствуют друг другу. То есть из  $\beta \sim \overline{\beta}$  и  $\gamma \sim \overline{\gamma}$  всегда следует:

$$(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma}), \quad r\beta \sim r\overline{\beta}.$$

Следовательно,  $\mathfrak{R}$ -модулю  $\mathfrak{B}$  из  $M$  гомоморфно соответствует  $\mathfrak{R}$ -модуль  $\overline{\mathfrak{B}}$  из  $\overline{M}$ ; а совокупность  $\mathfrak{C}^*$  элементов из  $M$ , которым соответствуют элементы  $\mathfrak{C}$  из  $\overline{M}$ , образует в  $M$  однозначно определенный по  $\mathfrak{C}$  модуль  $\mathfrak{C}^*$ , ассоциированный с  $\mathfrak{C}$ , причем  $\mathfrak{C}^* \sim \mathfrak{C}$ . Если, в частности,  $\mathfrak{A}$  есть модуль, ассоциированный с нулевым элементом из  $\overline{M}$ , то  $\mathfrak{C}^*$  является делителем  $\mathfrak{A}$  и распадается на классы элементов из  $M$ , сравнимых по модулю  $\mathfrak{A}$ , так что эти классы взаимно однозначно соответствуют элементам из  $\mathfrak{C}$ . Если перейти от  $\mathfrak{B}$  в  $M$  к  $\overline{\mathfrak{B}}$  в  $\overline{M}$ , а затем обратно к  $\mathfrak{B}^*$ , то получается  $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$ , то есть наибольший общий делитель  $\mathfrak{B}$  и  $\mathfrak{A}$ ; следовательно,  $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$ , если  $\mathfrak{B}$  является делителем  $\mathfrak{A}$ .

Если соответствие между элементами из  $M$  и  $\overline{M}$  обратимо однозначно, то эти области называются изоморфными (точнее: модульно-изоморфными),  $M \cong \overline{M}$ .

Пусть  $\mathfrak{A}$  является произвольным  $\mathfrak{R}$ -модулем из  $M$ . Тогда модульная область  $\overline{M}$ , гомоморфная  $M$ , а именно модуль классов вычетов  $M \mid \mathfrak{A}$ , возникает, если сравнимость по модулю  $\mathfrak{A}$  принять за новое отношение равенства. Каждому элементу из  $M$  при этом сопоставляются все и только те элементы, которые равны ему в  $\overline{M}$ . Переход в  $\overline{M}$  от определения равенства к тождеству означает, что все равные в  $\overline{M}$  элементы объединяют в один класс – класс вычетов – и рассматривают эти классы вычетов как новые элементы  $\overline{M}$ .

Каждый гомоморфизм порождается переходом к модулю классов вычетов; действительно, если  $M \sim \overline{M}$ , а  $\mathfrak{A}$  есть модуль, ассоциированный с нулевым элементом из  $\overline{M}$ , то, как показано выше,  $\overline{M}$  изоморфен модулю классов вычетов  $M \mid \mathfrak{A}$ .

2. **Первая теорема об изоморфизме.** Пусть  $\overline{M}$  обозначает модуль классов вычетов  $M \mid \mathfrak{A}$ , и пусть  $\mathfrak{C}$  является делителем  $\mathfrak{A}$ . Тогда имеет место изоморфизм

$$\overline{M} \mid \mathfrak{C} \cong M \mid \mathfrak{C}.$$

Действительно, сравнимость по модулю  $\mathfrak{A}$  одновременно является сравнимостью по модулю  $\mathfrak{C}$ ; элементы, равные по модулю  $\mathfrak{A}$ , остаются равными по модулю  $\mathfrak{C}$ . Поэтому можно образовать модуль классов вычетов  $M \mid \mathfrak{C}$  – то есть равенство по модулю  $\mathfrak{C}$  – так: сначала отождествить элементы по модулю  $\mathfrak{A}$ , то есть перейти к  $\overline{M}$ , а затем среди них объединить те, которые равны по модулю  $\mathfrak{C}$ ; в  $\overline{M}$  это соответствует отождествлению по модулю  $\mathfrak{C}$ , то есть образованию  $\overline{M} \mid \mathfrak{C}$ .

**Вторая теорема об изоморфизме.** Если  $\mathfrak{B}$  и  $\mathfrak{A}$  являются модулями из  $M$ , то имеет место изоморфизм

$$(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \cong \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}].$$

Действительно, по 1.  $\mathfrak{B}$  становится гомоморфным  $\overline{\mathfrak{B}}$ , если положить  $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} = \overline{\mathfrak{B}}$ ; а так как при этом нулевому элементу в  $\overline{\mathfrak{B}}$  соответствуют все элементы из  $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$  и только они, то указанный изоморфизм снова следует из 1.

3. Пусть  $\mathfrak{R}$  и  $\overline{\mathfrak{R}}$  являются (коммутативными) кольцами. Тогда  $\mathfrak{R}$  называется гомоморфным  $\overline{\mathfrak{R}}$  (точнее: кольцо-гомоморфным),  $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$ , если каждому элементу из  $\mathfrak{R}$  соответствует один и только один элемент из  $\overline{\mathfrak{R}}$  так, что этим исчерпывается  $\overline{\mathfrak{R}}$ , и если при этом соответствии разности и произведения соответствуют друг другу. Если соответствие элементов обратимо однозначно, то кольца называются изоморфными (точнее: кольцо-изоморфными),  $\mathfrak{R} \cong \overline{\mathfrak{R}}$ .

<sup>15</sup>Все в смысле определения равенства, действующего в  $\overline{M}$ ; ср. примечание 6.

Все рассуждения из 1. и 2. сохраняются, если модули заменить идеалами в  $\mathfrak{A}$ ,<sup>16</sup> а понятие модульного гомоморфизма и модульного изоморфизма заменить гомоморфизмом и изоморфизмом колец. В частности, если  $\mathfrak{c}$  является делителем  $\mathfrak{a}$ , то кольцо классов вычетов  $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$  возникает введением сравнимости по модулю  $\mathfrak{a}$  как нового отношения равенства; при этом нужно учитывать, что теперь определены также произведения классов вычетов.

Тогда  $\mathfrak{c}$  гомоморфен  $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$ ; каждый гомоморфизм порождается таким способом, и теоремы об изоморфизме имеют силу так же, как в 2:

**Первая теорема об изоморфизме.** Если  $\bar{\mathfrak{A}}$  обозначает кольцо классов вычетов  $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{a}$ , а  $\mathfrak{c}$  является делителем  $\mathfrak{a}$ , то  $\bar{\mathfrak{A}} \mid \bar{\mathfrak{c}} \cong \mathfrak{A} \mid \mathfrak{c}$  в смысле изоморфизма колец.

**Вторая теорема об изоморфизме.** Если  $\mathfrak{b}$  и  $\mathfrak{a}$  являются идеалами из  $\mathfrak{A}$ , то имеет место изоморфизм колец:

$$(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) \mid \mathfrak{a} \cong \mathfrak{b} \mid [\mathfrak{b}, \mathfrak{a}].$$

17

4. Далее будут собраны правила вычисления для взаимно простых идеалов,<sup>18</sup> из которых в 5. будут следовать теоремы о прямых суммах. В коммутативном кольце  $\mathfrak{A}$  предполагается существование единичного элемента  $e$  умножения. Следовательно, для каждого идеала из  $\mathfrak{A}$  имеем  $\mathfrak{a} = o\mathfrak{a}$ , где под  $o$  понимается единичный идеал. Два идеала  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  называются взаимно простыми, если их наибольший общий делитель  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$  равен  $o$ .

4α. Если  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = o$ , то  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{c})$ . Действительно,

$$(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \cdot (\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}^2, \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$$

делится на  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$  и обратно. Отсюда следует:

4β. Из  $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$  и  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = o$  следует  $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ . Действительно,  $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$  равносильно  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$ ; следовательно, из-за  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = o$  получается также  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$ , или  $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ . Далее:

4γ. Если каждый из идеалов  $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$  взаимно прост с каждым из идеалов  $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_s$ , то произведение  $\mathfrak{a}_i$  взаимно просто с произведением  $\mathfrak{b}_i$ . Действительно, из  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = o$  и  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = o$  получается  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = o$ , а конечное повторение дает утверждение.

Из 4α и 4γ получаем:

4δ. Если идеалы  $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r$  попарно взаимно просты, то есть  $(\mathfrak{b}_i, \mathfrak{b}_k) = o$  при  $i \neq k$ , то их наименьшее общее кратное равно их произведению. Пусть  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = o$ ,  $\mathfrak{v} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$ . Тогда

$$\mathfrak{v} = o\mathfrak{v} = (\mathfrak{a}\mathfrak{v}, \mathfrak{b}\mathfrak{v}) = o(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

так как  $\mathfrak{a}\mathfrak{b} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{v}}$ , отсюда следует  $\mathfrak{v} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ , а конечное повторение с учетом 4γ дает утверждение.

4ε. Пусть идеалы  $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r$  попарно взаимно просты, и пусть

$$\mathfrak{a}_i = [\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_{i-1}, \mathfrak{b}_{i+1}, \dots, \mathfrak{b}_r] = \mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_{i-1} \mathfrak{b}_{i+1} \cdots \mathfrak{b}_r.$$

Тогда  $(\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{b}_i$ , а следовательно  $(\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r) = o$ . Действительно, по дистрибутивному закону

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r (\mathfrak{b}_2, \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{b}_3 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

и поэтому

$$(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r (\mathfrak{b}_3, \mathfrak{b}_1 \mathfrak{b}_2) = \mathfrak{b}_4 \cdots \mathfrak{b}_r,$$

откуда конечным повторением при подходящей нумерации следует утверждение.

Идеал  $\mathfrak{a}_i$  называется **комплементом**  $\mathfrak{b}_i$  в представлении  $\mathfrak{m} = [\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r]$ .

<sup>16</sup>Для некоммутативных колец в основу должны быть положены двусторонние идеалы.

<sup>17</sup>Эти теоремы об изоморфизме, известные из теории групп, для модулей в несколько более специальной форме впервые встречаются у Dedekind (ср. 3-е изд., с. 484). Приведенная выше форма для идеалов есть у Masazo Sono: *On Congruences. I, II, III, IV*, Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University, 2 (1917), 3 (1918, 1919), ср. 2, с. 215. В каждом случае явно сформулирована только вторая теорема об изоморфизме.

<sup>18</sup>Именно в форме, восходящей к Dedekind (4-е изд., §178, III–VIII). Вычисления с единичным элементом, повсеместно встречающиеся в более новых изложениях, значительно громоздче.



5. В коммутативном кольце  $\mathfrak{A}$  снова предполагается существование единичного элемента умножения. Кольцо  $\mathfrak{A}$  называется прямой суммой идеалов  $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$  – в обозначении

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \dots + \mathfrak{a}_r,$$

если каждый элемент  $c$  из  $\mathfrak{A}$  можно одним и только одним способом представить в виде  $c = a_1 + a_2 + \dots + a_r$ , где каждый  $a_i$  является элементом из  $\mathfrak{a}_i$ .

Если нулевой идеал является наименьшим общим кратным попарно взаимно простых идеалов  $\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{b}_r$ , а  $\mathfrak{a}_i$  является компонентом  $\mathfrak{b}_i$ , то  $\mathfrak{A}$  является прямой суммой идеалов  $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r$ . Действительно, из-за  $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_r)$  каждый элемент из  $\mathfrak{A}$  имеет по меньшей мере одно аддитивное представление через  $\mathfrak{a}_i$ ; из-за  $[\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i] = (0)$  это представление единственно, поскольку из  $0 = a_1 + a_2 + \dots + a_r = a_i + b_i$  следует  $a_i = 0$ . По второй теореме об изоморфизме идеалы  $\mathfrak{a}_i$  изоморфны кольцам классов вычетов  $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{b}_i$ . Имеют место "ортогональные соотношения"  $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$  при  $i \neq k$  и  $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$ ; последнее – из-за  $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o} \mathfrak{a}_i$ .

Наоборот, если существует представление  $\mathfrak{A}$  как прямой суммы,

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \dots + \mathfrak{a}_r,$$

и если положить

$$\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \dots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \dots + \mathfrak{a}_r,$$

то  $\mathfrak{b}_i$  попарно взаимно просты, а их наименьшее общее кратное равно нулевому идеалу. Действительно, из  $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$  следует  $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$  при  $k \neq i$ , так как  $\mathfrak{b}_k$  является делителем  $\mathfrak{a}_i$ . Пусть далее  $c$  делится на все  $\mathfrak{b}_i$ . Тогда

$$c = a_2^{(1)} + \dots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \dots + a_r^{(2)} = \dots = a_1^{(r)} + \dots + a_{r-1}^{(r)},$$

где каждый раз  $a_i^{(\lambda)} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$ . Из единственности представления, поскольку каждый раз одна компонента равна нулю, следует  $0 = a_1^{(\lambda)}, \dots, 0 = a_r^{(\lambda)}$  для каждого  $\lambda$ , а значит  $c = 0$ .<sup>19</sup>

<sup>19</sup>Теоремы, приведенные в 5., являются специальными случаями общей теоремы о связи между прямой суммой и прямым пересечением. Ср. H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. 20 (1924), с. 165–187, §6. Приведенные там рассуждения остаются верными и при такой общей постановке понятия группы, что модули и идеалы подчиняются ей как специальные случаи.

## § 5. Простые идеалы и первичные идеалы

Пусть снова  $\mathfrak{A}$  будет коммутативным кольцом, для которого не предполагается никакая дальнейшая аксиома – даже существование единичного элемента. Соберем основные факты о простых идеалах и первичных идеалах.<sup>20</sup>

1. Идеал  $\mathfrak{p}$  из  $\mathfrak{A}$  называется *слабым простым идеалом*, если кольцо классов вычетов  $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{p}$  есть кольцо без делителей нуля; то есть если из  $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$  и  $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$  всегда следует  $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ . Идеал  $\mathfrak{p}^*$  из  $\mathfrak{A}$  называется *сильным простым идеалом*, если кольцо классов вычетов  $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{p}^*$  есть кольцо без идеалов-делителей нуля; то есть если из  $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$  и  $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$  всегда следует  $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^*}$ .

Каждый сильный простой идеал одновременно является слабым простым идеалом, как показывает специализация  $a, b$  до главных идеалов. Обратно, каждый слабый простой идеал также является сильным простым идеалом; поэтому можно говорить просто о простых идеалах. В самом деле, пусть  $\mathfrak{p}$  – слабый простой идеал; пусть  $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$  и  $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ ; выберем элементы  $a$  и  $b$  из  $\mathfrak{A}$  и  $b$  так, что  $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$  и  $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ . Тогда  $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ , а потому  $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ ; значит,  $\mathfrak{p}$  также является сильным простым идеалом.

2. Идеал  $\mathfrak{q}$  из  $\mathfrak{A}$  называется *слабым первичным идеалом*, если в кольце классов вычетов  $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{q}$  некоторая степень каждого делителя нуля обращается в нуль; то есть если из  $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$  и  $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$  для каждого  $x$  всегда следует  $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ . Система  $\mathfrak{p}$  всех элементов из  $\mathfrak{A}$ , которые становятся делителями нуля в  $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{q}$ , образует идеал, причем простой идеал; он является делителем  $\mathfrak{q}$  и называется ассоциированным простым идеалом. В самом деле, вместе с  $a$  делителем нуля становится и  $ra$ , вместе с  $a$  и  $b$  также  $a - b$ ; последнее потому, что вместе с  $a^x$  и  $b^\lambda$  элемент  $(a - b)^{x+\lambda}$  всегда становится делимым на  $\mathfrak{q}$ . Если, кроме того,  $a$  не является делителем нуля, то по определению никакая степень  $a$  также не является делителем нуля; из  $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$  и  $b \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$  поэтому следует  $a^x b^\lambda = (ab)^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ , а значит,  $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ .

Идеал  $\mathfrak{q}^*$  из  $\mathfrak{A}$  называется *сильным первичным идеалом*, если в кольце классов вычетов  $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{q}^*$  некоторая степень каждого идеала-делителя нуля обращается в нуль; то есть если из  $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$  и  $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$  для каждого  $x$  всегда следует  $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}^*}$ . Как и для слабых первичных идеалов, показывают: наибольший общий делитель всех идеалов из  $\mathfrak{A}$ , которые становятся идеалами-делителями нуля в  $\mathfrak{A} \mid \mathfrak{q}^*$ , образует простой идеал, являющийся делителем  $\mathfrak{q}^*$ , то есть ассоциированный простой идеал. Обратно, обо всех первичных идеалах, имеющих один и тот же ассоциированный простой идеал  $\mathfrak{p}$ , говорят, что они ”принадлежат  $\mathfrak{p}$ ”.

Каждый сильный первичный идеал одновременно является слабым первичным идеалом, как показывает специализация  $a, b$  до главных идеалов. В общем случае, однако, обратное неверно.<sup>21</sup> Если же в  $\mathfrak{A}$  предполагается аксиома I условия цепей делителей, то каждый слабый первичный идеал одновременно становится сильным первичным идеалом; поэтому можно говорить просто о первичных идеалах. Пусть  $\mathfrak{q}$  – слабый первичный идеал; пусть  $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$  и  $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$  для каждого  $x$ . Тогда существуют элементы  $a$  из  $\mathfrak{A}$  и  $b$  из  $\mathfrak{A}$  такие, что  $a \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$  и  $b^x \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$  для каждого  $x$ ; следовательно,  $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ , а потому  $ab \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ . Ведь если для каждого  $b$  из  $\mathfrak{A}$  существовал бы показатель  $\lambda$ , для которого  $b^\lambda \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ , то  $b^{\lambda_1 + \dots + \lambda_r} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ , где  $\lambda_1, \dots, \lambda_r$  означают показатели конечного числа базисных элементов.<sup>22</sup> Последнее рассуждение показывает еще и следующее: существует (наименьший) показатель  $\varrho$ , для которого  $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ , где  $\mathfrak{p}$  означает ассоциированный простой идеал;  $\varrho$  называется *экспонентой*  $\mathfrak{q}$ .

3. Далее условие цепей делителей снова не предполагается. Наименьшее общее кратное

<sup>20</sup> В *Idealtheorie*, § 4, предполагается аксиома I, условие цепей делителей; поэтому там не выявлено резко, какие свойства простых и первичных идеалов не зависят от этой аксиомы.

<sup>21</sup> Это показывает следующий пример, сообщенный мне R. Hölzer. Пусть  $\mathfrak{A}$  – полиномиальная область от счетно многих неопределенных  $x_i$  с коэффициентами из поля, и пусть

$$\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^2, \dots, x_{\nu}^{\nu+1}, \dots, x_i x_k [i \neq k] \dots).$$

Делителями нуля в кольце классов вычетов являются все и только те полиномы, которые делятся на  $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \dots, x_{\nu}, \dots)$ , и каждый раз некоторая степень такого делителя нуля делится на  $\mathfrak{q}$ ; следовательно,  $\mathfrak{q}$  является слабым первичным идеалом с ассоциированным простым идеалом  $\mathfrak{p}$ . Напротив,  $\mathfrak{q}$  не является сильным первичным идеалом: если положить  $a = (x_1, x_3, x_5, \dots, x_{2\nu+1}, \dots)$  и  $b = (x_2, x_4, \dots, x_{2\nu}, \dots)$ , то  $ab \equiv 0 \pmod{\mathfrak{q}}$ , но никакая степень  $a$  или  $b$  не делится на  $\mathfrak{q}$ .

<sup>22</sup> Чтобы из аксиомы I вывести существование конечного базиса идеала, надо положить в основу фиксированный хороший порядок в  $\mathfrak{A}$  (ср. § 6).

$[a_1, \dots, a_r]$  конечного числа идеалов называется *кратчайшим представлением*, если никакой  $a_i$  не содержится в наименьшем общем кратном остальных, то есть если никакой  $a_i$  нельзя опустить.

Наименьшее общее кратное конечного числа слабых, соответственно сильных, первичных идеалов, принадлежащих одному и тому же простому идеалу  $p$ , снова является слабым первичным идеалом с  $p$  как ассоциированным простым идеалом. Кратчайшее представление конечным числом слабых, соответственно сильных, первичных идеалов, принадлежащих различным простым идеалам, не является слабым, соответственно сильным, первичным идеалом. Пусть  $f = [q_1, \dots, q_r]$ , а  $p$  – ассоциированный простой идеал слабых первичных идеалов  $q_i$ ; тогда  $p$  состоит также из совокупности элементов, некоторая степень которых делится на  $f$ . Поэтому из  $a \not\equiv 0 \pmod{f}$  и  $b^x \not\equiv 0 \pmod{f}$  для каждого  $x$  следует, что  $b \not\equiv 0 \pmod{p}$  и  $a \not\equiv 0 \pmod{q_i}$  по крайней мере для одного индекса  $i$ ; значит,  $ab \not\equiv 0 \pmod{q_i}$ , а потому  $ab \not\equiv 0 \pmod{f}$ . Если всюду заменить элементы идеалами, то уже нельзя вывести  $b \not\equiv 0 \pmod{p}$ .

Пусть теперь  $m = [q_1, \dots, q_r]$  с  $p_i \neq p_k$  при  $i \neq k$  есть кратчайшее представление слабыми первичными идеалами, и пусть  $r \geq 2$ . Тогда существует по крайней мере один ассоциированный простой идеал, скажем  $p_1$ , который не содержится ни в одном из остальных; действительно, всякая собственная цепь кратных среди  $p$  должна оборваться не позднее чем через  $r$  шагов. Поэтому существуют элементы  $a_i$  из  $p_i$  такие, что  $a_i^{q_i} \equiv 0 \pmod{q_i}$  и  $a_2 \not\equiv 0 \pmod{p_1}, \dots, a_r \not\equiv 0 \pmod{p_1}$ . Если далее  $q_1 \not\equiv 0 \pmod{m}$  есть элемент из  $q_1$ , то  $q_1 a_2^{q_2} \dots a_r^{q_r} \equiv 0 \pmod{m}$ , но никакая степень  $a_2^{q_2} \dots a_r^{q_r}$  не делится на  $m$ , поскольку иначе следовала бы делимость на  $p_1$ ; значит,  $m$  не является слабым первичным идеалом. Если всюду заменить элементы идеалами, то есть  $q_1$  заменить на  $q_1$ , а  $a_i$  – на идеалы  $a_i$  с

$$a_i \not\equiv 0 \pmod{p_1}, \quad a_i^{q_i} \equiv 0 \pmod{q_i},$$

получается доказательство для сильных первичных идеалов.<sup>23</sup>

4. *Частное модулей и частное идеалов.* Пусть  $\mathfrak{T}$  – кольцо-расширение  $\mathfrak{R}$ , и пусть  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \dots$  –  $\mathfrak{R}$ -модули в  $\mathfrak{T}$ . Частное  $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$  определяется как модуль, удовлетворяющий условиям  $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ , и из  $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$  следует  $\mathfrak{D} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{C}}$ ; таким образом,  $\mathfrak{C}$  есть “наименьший” модуль, для которого  $\mathfrak{C}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ . Тем самым частное однозначно определяется как наибольший общий делитель всех модулей  $\mathfrak{D}$ , для которых  $\mathfrak{D}\mathfrak{B} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}}$ ; такие  $\mathfrak{D}$  существуют, поскольку нулевой модуль заведомо является одним из них.

Из определения следует: если  $\mathfrak{B}$  есть кратное  $\overline{\mathfrak{B}}$ , то  $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$  есть кратное  $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ . Если  $\mathfrak{A}$  есть кратное  $\overline{\mathfrak{A}}$ , то  $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$  есть кратное  $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$ . Имеем

$$\mathfrak{A} : \mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}.$$

Если кольцо-расширение  $\mathfrak{T}$  совпадает с  $\mathfrak{R}$ , то частное модулей переходит в частное идеалов  $a : b$ ; значит, и для него верны приведенные выше правила вычисления. Из  $ab \equiv 0 \pmod{a}$  здесь еще следует  $a \equiv 0 \pmod{a : b}$ .

5. *Если  $a : b = a$ , то  $b$  называется простым относительно  $a$ .* Итак, идеал  $b$  прост относительно  $a$  тогда и только тогда, когда из  $db \equiv 0 \pmod{a}$  всегда следует  $d \equiv 0 \pmod{a}$ . Из правил вычисления в пункте 4 следует: если  $b$  и  $c$  просты относительно  $a$ , то их произведение и их наименьшее общее кратное также просты относительно  $a$ . Если  $b$  прост относительно  $a$  и  $a$  прост относительно  $b$ , то  $a$  и  $b$  называются взаимно простыми в этом смысле. Из § 4, 4β, следует: если  $a$  и  $b$  взаимно просты как делители, то они также взаимно просты в этом смысле.

<sup>23</sup>Этой модификацией моего первоначального доказательства, благодаря которой условие цепей делителей становится ненужным, я обязана B. L. van der Waerden.

## § 6. Теория идеалов при условии цепей делителей

В основе пусть лежит (коммутативное) кольцо  $\mathfrak{A}$ , для которого выполнена аксиома I условия цепей делителей; далее всюду будем считать заданным фиксированный хороший порядок всех элементов из  $\mathfrak{A}$ . Тем самым задан и хороший порядок всех идеалов из  $\mathfrak{A}$ . Действительно, эти две предпосылки сразу дают, что каждый идеал из  $\mathfrak{A}$  имеет базис идеала, состоящий из конечного числа элементов. Поэтому если от хорошего порядка элементов из  $\mathfrak{A}$  перейти к квазилексикографическому порядку всех конечных подмножеств  $\mathfrak{A}$ ,<sup>26</sup> и сопоставить каждому идеалу как выделенный базис первый среди различных возможных базисов в хорошем порядке конечных подмножеств, то вместе с конечными подмножествами хорошо упорядочены и идеалы.

**Теорема I.** *При условии цепей делителей каждый идеал из  $\mathfrak{A}$  допускает представление как наименьшее общее кратное конечного числа неразложимых идеалов, т.е. идеалов, которые нельзя представить как наименьшее общее кратное двух собственных делителей.*

Для доказательства надо показать: если теорема I не выполнена для идеала  $\mathfrak{m}$ , то  $\mathfrak{m}$  имеет собственный делитель, для которого теорема I также не выполнена; отсюда, вопреки предполагаемому условию цепей делителей, можно построить цепь делителей, не обрывающуюся за конечное число шагов. В самом деле,  $\mathfrak{m}$  должен быть разложимым, иначе  $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$  уже давало бы нужное представление. Если  $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$ , то теорема I не может одновременно выполняться для  $\mathfrak{a}$  и  $\mathfrak{b}$ , поскольку тогда соответствующее представление следовало бы для  $\mathfrak{m}$ . Значит, существуют собственные делители  $\mathfrak{m}$ , для которых теорема I не выполнена; пусть  $\mathfrak{a}_1$  будет первым из них в хорошем порядке идеалов. Строя тем же образом для  $\mathfrak{a}_1$  собственный делитель  $\mathfrak{a}_2$ , и вообще для  $\mathfrak{a}_i$  собственный делитель  $\mathfrak{a}_{i+1}$ , получаем вполне определенную цепь делителей, не обрывающуюся за конечное число шагов, вопреки предположению.<sup>27</sup>

Из-за предполагаемого условия цепей делителей по § 5, 2 можно говорить просто о первичных идеалах. Связь между первичностью и неразложимостью дает следующая теорема:

**Теорема II.** *При условии цепей делителей каждый неразложимый идеал является первичным; иначе говоря, каждый непервичный идеал разложим.*

Так как при переходе к кольцу классов вычетов  $\mathfrak{A}/\mathfrak{m}$  условие цепей делителей сохраняется благодаря гомоморфизму; так как представлению  $\mathfrak{m}$  как наименьшего общего кратного соответствует представление нулевого идеала; и так как по первой теореме об изоморфизме (§ 4, 3) первичным делителям  $\mathfrak{m}$  снова соответствуют такие же в  $\mathfrak{A}/\mathfrak{m}$  и обратно, можно ограничиться разложением нулевого идеала в кольце классов вычетов. Поскольку это снова кольцо той же общности, можно с самого начала считать разлагаемый идеал нулевым идеалом в  $\mathfrak{A}$ .

Пусть, таким образом, нулевой идеал из  $\mathfrak{A}$  не первичен, так что существует по меньшей мере одна пара идеалов  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ , причем  $\mathfrak{b}$  еще можно считать главным идеалом, такая, что

$$\mathfrak{a} \neq (0), \quad \mathfrak{b}^x \neq (0) \ (x = 1, 2, \dots), \quad \mathfrak{a}\mathfrak{b} = (0).$$

Образуем цепь делителей частных идеалов, которая по предположению обрывается за конечное число шагов:

$$\mathfrak{a}, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \dots, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\nu, \dots;$$

пусть, например,  $\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^m = \dots$  равно всем последующим идеалам этой цепи; значит,  $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$ , или  $\mathfrak{b}$  прост относительно  $\mathfrak{t}$ . Далее  $\mathfrak{t}$  как делитель  $\mathfrak{a}$  отличен от нулевого идеала, и точно так же  $\mathfrak{b}^x$  отлично от нуля для каждого показателя  $x$ . Поэтому для доказательства теоремы II достаточно установить представление

$$(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}].$$

<sup>26</sup>Это следует понимать так: элементы  $a_1, \dots, a_n$  конечного подмножества  $\mathfrak{M}$  обозначены так, что порядок индексов совпадает с хорошим порядком, заданным в  $\mathfrak{A}$ . Каждое подмножество с  $n$  элементами предшествует такому подмножеству с  $m > n$  элементами. Если два подмножества равномощны, то первое считается более ранним, когда первый элемент, в котором они различаются, предшествует соответствующему элементу другого подмножества в хорошем порядке. Тем самым каждой системе конечных подмножеств сопоставлен первый элемент. При заданном хорошем порядке на  $\mathfrak{A}$  не требуется никакого дополнительного постулата выбора; в частности, если  $\mathfrak{A}$  счетно, как в случае алгебраического числового поля, то вообще никакой постулат выбора не лежит в основе.

<sup>27</sup>Теорема I, очевидно, точно так же верна для областей модулей, если условие цепей делителей предполагается для системы всех модулей. Она имеет чисто теоретико-множественный характер; вместе с тем это единственная теорема, в доказательстве которой используется хороший порядок идеалов.

По определению

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}, \quad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

следовательно, остается лишь показать:

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}] \equiv 0 \pmod{\mathfrak{b}^m\mathfrak{t}}.$$

Это следует из предположений, что  $\mathfrak{b}$  является главным идеалом и прост относительно  $\mathfrak{t}$ . Каждый элемент  $c$  из  $\mathfrak{c}$ , вследствие делимости на  $\mathfrak{b}^{m+1}$ , допускает представление, где под  $n$  понимается символ целого числа,

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

где  $r$  теперь снова означает элемент из  $\mathfrak{A}$ . Из  $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$  поэтому следует  $rb^m \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}}$ , а значит  $r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}}$ . Тем самым  $c \equiv 0 \pmod{\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m}$ , и теорема II доказана.

**Теорема III.** *При условии цепей делителей каждый идеал допускает кратчайшее представление как наименьшее общее кратное конечного числа наибольших первичных компонент, принадлежащих различным простым идеалам.*

Чтобы получить такое представление, надо только, где это возможно, заменить существующее по теореме I представление через неразложимые, а значит по теореме II первичные идеалы, кратчайшим представлением. Если объединить первичные идеалы, принадлежащие одинаковым простым идеалам, то по § 5, 3 получается искомое представление. Первичные компоненты можно называть наибольшими, поскольку наименьшее общее кратное любых из них уже не является первичным.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>При этом соответствующие простые идеалы и изолированные компоненты определены однозначно. Ср. *Idealtheorie* или W. Krull, Math. Ann. 90 (1923), S. 55–64.

## § 7. Теория идеалов при двойном условии цепей

Упрощения по сравнению с теорией, развитой до сих пор, основаны на вспомогательных утверждениях, которые будут даны в пунктах 1 и 2.

1. Если в коммутативном кольце без делителей нуля выполнено условие цепей кратных, то это кольцо одновременно является полем. Надо показать, что при  $a \neq 0$  уравнение  $ax = b$  всегда имеет решение в кольце. То, что оно не может иметь более одного решения, следует из предположения, что кольцо не имеет делителей нуля.

Пусть  $a$  – главный идеал, порожденный  $a$ . По предположению ряд степеней обрывается за конечное число шагов; пусть, например,  $a^m$  равно всем последующим степеням. Если  $b$  обозначает главный идеал, порожденный  $b$ , то получаем

$$a^m b = a^{m+1} b, \quad a^{m+1} b = (a^{m+1} b).$$

Отсюда, в частности, для элемента  $a^m b$  получается представление, где под  $n$  понимается символ целого числа,

$$a^m b = ka^{m+1} b + na^{m+1} b = a^{m+1} c,$$

где  $c$  снова является элементом из  $\mathfrak{A}$ . Поскольку по предположению делителей нуля нет, отсюда следует  $b = ac$ , чем доказано свойство поля.

2. Из пункта 1 непосредственно следует вспомогательное утверждение: если в коммутативном кольце выполнено условие цепей кратных, то простой идеал не имеет собственного делителя, отличного от 0.

Так же получается дополнение: если выполнена только аксиома II, то есть условие цепей кратных по модулю каждого идеала, отличного от нулевого идеала, то каждый простой идеал, отличный от нулевого идеала, не имеет собственного делителя, отличного от 0.

Действительно, кольцо классов вычетов по простому идеалу  $p$  по определению становится кольцом без делителей нуля; а поскольку благодаря гомоморфизму здесь также выполнено условие цепей кратных, то по пункту 1 оно является полем. Поэтому из взаимно однозначного соответствия между делителями  $p$  и идеалами в кольце классов вычетов следует, что  $p$  не имеет собственного делителя, отличного от 0.<sup>29</sup>

**Теорема IV.** Если в коммутативном кольце выполнено двойное условие цепей, то в каждом кратчайшем представлении идеала однозначно определены те первичные компоненты, которые не принадлежат единичному идеалу 0.

*Дополнение.* При предположении аксиом I и II теорема IV верна для каждого идеала, отличного от нулевого идеала.

Пусть

$$m = [q, q_1, \dots, q_r] = [\bar{q}, \bar{q}_1, \dots, \bar{q}_s]$$

суть кратчайшие представления  $m$  через наибольшие первичные компоненты, и пусть  $0, p_1, \dots, p_r$  соответственно  $0, \bar{p}_1, \dots, \bar{p}_s$  – соответствующие простые идеалы. При этом  $q$  соответственно  $\bar{q}$  следует опустить, если не появляется первичный идеал, принадлежащий 0. Из

$$0p_1 \cdots p_r \equiv 0 \pmod{m}$$

следует, что каждый  $p_i$  должен содержаться в некотором  $\bar{p}_j$ , а значит по вспомогательному утверждению быть с ним тождественным. Соответственно совпадают и простые идеалы, возникающие в обратном направлении. Далее простота остальных множителей дает взаимную делимость соответствующих первичных компонент. Наконец, если 0-компонента действительно появляется, то это должно происходить в обоих кратчайших представлениях. Тем самым доказана однозначность; доказательство одновременно показывает, что всякое представление без первичной компоненты, принадлежащей 0, уже является кратчайшим.

3. Если к предположению двойного условия цепей добавить еще существование единичного элемента, то теорема IV усиливается до теоремы V.

<sup>29</sup>При этом в  $\mathfrak{A}$ , а значит и в 0, единичном идеале, состоящем из всех элементов  $\mathfrak{A}$ , не обязан существовать единичный элемент, хотя по пункту 1 в кольце классов вычетов есть единичный класс.

**Теорема V.** *Если в коммутативном кольце с единичным элементом выполнено двойное условие цепей, то каждый идеал можно однозначно представить как произведение конечного числа попарно взаимно простых первичных идеалов.*

*Дополнение.* При предположении аксиом I, II, III теорема V верна для каждого идеала, отличного от нулевого идеала.

Из-за существования единичного элемента имеем  $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$ , и тем самым каждый первичный идеал, принадлежащий  $\mathfrak{o}$ , равен  $\mathfrak{o}$ , а значит не может появляться в кратчайшем представлении идеала, отличного от  $\mathfrak{o}$ . Следовательно, по теореме IV первичные компоненты однозначно определены. Одновременно всякое представление после опускания  $\mathfrak{o}$  становится кратчайшим. Два различных простых идеала по вспомогательному утверждению из пункта 2 всегда взаимно просты; значит, то же верно для первичных компонент, и наименьшее общее кратное становится произведением.

Из этих предположений далее следует: *в коммутативном кольце с единичным элементом и двойным условием цепей, кроме единичного идеала, простыми относительно идеала  $\mathfrak{m}$  являются все и только те простые идеалы, которые не содержатся в  $\mathfrak{m}$ . Понятия простоты относительно и взаимной простоты совпадают.*

Если  $\mathfrak{p}$  не содержится в  $\mathfrak{m}$ , то он отличен от всех простых идеалов, принадлежащих  $\mathfrak{m}$ , и потому прост относительно каждой первичной компоненты и относительно  $\mathfrak{m}$ ; одновременно он взаимно прост с каждой первичной компонентой, а значит и с  $\mathfrak{m}$ . Если же, напротив,  $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$  содержится в  $\mathfrak{m}$ , то он должен совпадать с одним из соответствующих простых идеалов. Если он принадлежит компоненте  $\mathfrak{q}$ , то  $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$  становится собственным делителем  $\mathfrak{q}$ ; благодаря однозначной разложимости тогда и произведение, делимое на  $\mathfrak{m} : \mathfrak{p}$ , становится собственным делителем  $\mathfrak{m}$ . Следовательно,  $\mathfrak{p}$  не прост относительно  $\mathfrak{m}$ .

## § 8. Теория идеалов при интегральной замкнутости в поле частных

Развитая до сих пор теория идеалов теперь должна быть усилена до обычной формы добавлением двух последних аксиом.

1. *Вспомогательное утверждение.* Пусть  $\mathfrak{A}$  – коммутативное кольцо без делителей нуля с единичным элементом, и пусть в  $\mathfrak{A}$  предполагается условие цепей делителей (аксиомы I, III, IV). Тогда из  $a = ab$  и  $a \neq (0)$  всегда следует  $b = o$ . Следовательно,

$$c \neq ct$$

для всех идеалов, отличных от нулевого и единичного идеалов.<sup>30</sup> Доказательство получается так же, как во вспомогательном утверждении §1, 3, поскольку  $ab$  можно рассматривать как конечный модуль относительно  $b$ . Если  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  обозначает базис идеала  $a$ , существующий благодаря I, то из  $a = ab$  получается система уравнений

$$\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \dots + b_{in}\alpha_n, \quad b_{ij} \equiv 0 \pmod{b}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Так как  $\mathfrak{A}$  предполагается без делителей нуля, отсюда следует  $|b_{ij} - e_{ij}| = 0$ , где  $e_{ij} = 0$  при  $i \neq j$ , а  $e_{ii} = e$ . Из уравнения

$$e - b_{11} - \dots \equiv 0 \pmod{b}$$

следует  $e \equiv 0 \pmod{b}$ , а значит  $b = o$ .

2. Теперь остается только показать, что после добавления предположения интегральной замкнутости в поле частных (аксиома V) к аксиомам I–IV каждый первичный идеал, отличный от нулевого, становится степенью своего соответствующего простого идеала. Единственность представления

$$m = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$$

для всех идеалов, отличных от нулевого, уже доказана теоремой V и вспомогательным утверждением из пункта 1; одновременно показано, что эти простые идеалы не имеют собственного делителя, отличного от единичного идеала. Доказательство будет проведено сначала для показателя два с использованием следствия Dedekind II (§1, 4), а в общем случае – полной индукцией.

*Вспомогательное утверждение.* При предположении аксиом I–V нет других первичных идеалов показателя два, кроме  $q = p^2$ .

Нужно показать, что из

$$p^2 \equiv 0 \pmod{q}, \quad q \equiv 0 \pmod{p}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^2}$$

необходимо следует  $q = p^2$ . Итак, пусть

$$c \equiv 0 \pmod{q}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p^2}.$$

Тогда из вспомогательного утверждения §7, 3 следует, что  $c : p$  становится собственным делителем  $c$ . Значит, существует элемент  $b$  такой, что

$$bp \equiv 0 \pmod{c} \equiv 0 \pmod{q}, \quad b \not\equiv 0 \pmod{c}.$$

Следовательно,  $y = b/c$  не является целым, то есть  $y$  принадлежит полю частных, но не  $\mathfrak{A}$ . Нужно доказать  $b \not\equiv 0 \pmod{p}$ ; отсюда, поскольку  $q$  первичен и принадлежит  $p$ , следует  $p \equiv 0 \pmod{q}$ .

По следствию Dedekind II существуют элементы  $m, n$  из  $\mathfrak{A}$  такие, что

$$y = b/c = m/n$$

и также  $m^2/n$  не является целым, то есть

$$bn = mc, \quad m \not\equiv 0 \pmod{n}, \quad m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}.$$

<sup>30</sup>Напротив, при тех же предположениях из  $ab = ac$  нельзя заключать  $b = c$ . В качестве примера можно взять кольцо многочленов  $K[x, y]$ :  $a = (xy)$ ,  $b = (x^3, xy, y^2)$ ,  $c = (x^2, y^2)$ ; действительно,  $ab = ac = a^2$ , но  $b \neq c$ .



Умножение  $bp$  на  $m$  дает

$$mbp \equiv 0 \pmod{nc}, \quad \text{следовательно} \quad mp \equiv 0 \pmod{n},$$

последнее потому, что речь идет о кольце без делителей нуля. Отсюда следует

$$m \not\equiv 0 \pmod{p},$$

так как  $m^2 \not\equiv 0 \pmod{n}$  и  $n \not\equiv 0 \pmod{p}$ ; последнее снова следует из вспомогательного утверждения §7, 3, поскольку  $n : p$  является собственным делителем  $n$ . Четыре соотношения

$$m \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad n \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad bn = mc$$

дают  $b \not\equiv 0 \pmod{p}$ . Действительно, поскольку  $p^2$  первичен, сначала получается  $mc \not\equiv 0 \pmod{p^2}$ , и тогда из  $bn = mc$  следует  $b \not\equiv 0 \pmod{p}$ . Тем самым вспомогательное утверждение доказано.

3. *Вспомогательное утверждение. При предположении аксиом I–V нет других первичных идеалов показателя  $\varrho$ , кроме  $q = p^e$ .*<sup>31</sup> Это вспомогательное утверждение следует из вспомогательного утверждения из пункта 2 без дальнейшего применения аксиом. Для доказательства сначала нужно показать:

$$\text{если } c \equiv 0 \pmod{p}, \quad c \not\equiv 0 \pmod{p^2}, \quad \text{то } p^e = (c^e, p^{e+1})$$

для каждого  $\varrho$ . По вспомогательному утверждению из пункта 2 имеем  $p = (c, p^2)$ . Поэтому если предположить

$$p^{e-1} = (c^{e-1}, p^e),$$

то после умножения на  $p$  по дистрибутивному закону получается

$$p^e = (c^e, p^{e+1}).$$

Доказываемое вспомогательное утверждение можно привести к следующей второй форме:

$$q \equiv 0 \pmod{p^e}, \quad q \not\equiv 0 \pmod{p^{e+1}}, \quad p^{e+1} \equiv 0 \pmod{q}, \quad \varrho \geq 1$$

влечет

$$p^e \equiv 0 \pmod{q}.$$

Действительно, из  $q \equiv 0 \pmod{p^e}$  и  $p^e \not\equiv p^{e+1}$  по вспомогательному утверждению из пункта 1 выполнено второе условие. Конечное повторное применение этой второй формы дает  $p^e \equiv 0 \pmod{q}$ , а значит  $q = p^e$ .

Из предположения второй формы с учетом представления  $p^e$  для каждого элемента  $q$  из  $q$  получаем:

$$q = bc^e + p^{e+1}, \quad b \equiv 0 \pmod{p},$$

или, что то же самое,

$$bc^e \equiv 0 \pmod{q, p^{e+1}}.$$

Так как  $(q, p^{e+1})$  первичен, отсюда следует

$$c^e \equiv 0 \pmod{q, p^{e+1}} \quad \text{или} \quad c^{e+1} \equiv 0 \pmod{q, p^{e+2}},$$

а потому  $p^e \equiv 0 \pmod{q}$ .

4. Подводя итог, получаем:

**Теорема VI.** *Если в коммутативном кольце выполнены аксиомы I–V, то каждый идеал, отличный от нулевого и единичного идеалов, можно однозначно представить как произведение степеней конечного числа простых идеалов, отличных от нулевого и единичного идеалов; эти простые идеалы не имеют собственного делителя, отличного от единичного идеала.*

<sup>31</sup>Доказательство вспомогательного утверждения 3 при предположении справедливости вспомогательного утверждения 2 содержится у Masazo Sono, *On Congruences II*, §§9 и 10.

## § 9. Аксиомы как следствие предполагаемого разложения

Чтобы из существования обычного разложения идеалов, которое по теореме VI следует из аксиом I–V, также в обратном направлении вывести эти аксиомы, разложение нужно предположить в следующей форме.

*Предположение.* В коммутативном кольце  $\mathfrak{A}$  каждый идеал, не порожденный нулевым или единичным элементом, однозначно представим как произведение степеней простых идеалов. Эти простые идеалы являются элементарными идеалами, не порожденными единичным элементом, то есть они не имеют собственного делителя, отличного от  $\mathfrak{o}$ ; обратно, все элементарные идеалы являются простыми идеалами. Единственность должна выполняться в точной форме:

$$\mathfrak{a}^{\varrho} \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$$

для каждого идеала, не порожденного нулевым или единичным элементом.

Существование единичного элемента при этом не предполагается. Если единичного элемента нет, то условие «не порожденный единичным элементом» не является ограничением.

1. *Доказательство аксиомы III.* Пусть аксиома III не выполнена. Нужно показать, что  $\mathfrak{o}^2$  становится элементарным идеалом, не будучи простым идеалом. По предположению точной единственности имеем  $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$ ; значит,  $\mathfrak{o} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$ , но  $\mathfrak{o}^2 \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}^2}$ , а следовательно,  $\mathfrak{o}^2$  не является простым идеалом. Но  $\mathfrak{o}^2$  элементарен:  $\mathfrak{o}^2$  не может делиться ни на какой простой идеал, отличный от  $\mathfrak{o}$ , и потому из-за предполагаемого произведенного представления не имеет делителей, отличных от  $\mathfrak{o}$  и  $\mathfrak{o}^2$ .

2. *Доказательство аксиомы IV.* Если  $a$  есть делитель нуля, то есть  $ab = 0$ , но  $a \neq 0$  и  $b \neq 0$ , то умножение представлений главных идеалов, порожденных  $a$  и  $b$ , дает

$$(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r},$$

где  $\mathfrak{p}_i$  отличны от нулевого и единичного идеалов. Представление считается кратчайшим в том смысле, что удаление любого фактора дает собственный делитель нуля. Если в этом представлении входит только один простой идеал, то

$$(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1},$$

вопреки точному требованию единственности. Если же входит больше одного простого идеала, то получается

$$\begin{aligned} \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} &= (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}) \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \\ &= \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}, \end{aligned}$$

поскольку из существования единичного элемента  $\mathfrak{p}_1$  взаимно прост со всеми остальными простыми идеалами. Следовательно, и здесь получается противоречие точному требованию единственности.

3. *Доказательство аксиом I и II.* Предположения дают для каждого идеала, отличного от нулевого: из делимости следует произведенное представление. Если

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$$

и  $a$  является делителем  $\mathfrak{m}$ , то в произведенном представлении  $a$  встречаются только такие простые идеалы, которые совпадают с  $\mathfrak{p}_i$ , а показатели лежат между 0 и  $\varrho_i$ . Поэтому имеется лишь конечное число делителей  $\mathfrak{m}$ , соответствующих комбинациям  $0 \leq \sigma_i \leq \varrho_i$ . Значит, в кольце классов вычетов по  $\mathfrak{m}$  выполняется двойное условие цепей. Тем самым аксиомы I и II доказаны; условие цепей делителей выполняется и в самой  $\mathfrak{A}$ , поскольку каждый собственный делитель нулевого идеала отличен от нулевого идеала.

4. *Кольцо классов вычетов по каждому идеалу, отличному от нулевого идеала, является кольцом главных идеалов.* Идеал можно считать отличным от единичного идеала. Если идеал первичен,  $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$ , и если  $\mathfrak{c} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ , но  $\mathfrak{c} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$ , то из пункта 3 следует, что  $\mathfrak{c} = \mathfrak{p}a$  с  $(a, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$ . Следовательно,

$$\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{c}^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) \quad (\sigma < \varrho),$$

и потому в кольце классов вычетов по первичному идеалу каждый идеал является главным. В общем случае, при

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$$

и соответствующем представлении кольца классов вычетов как прямой суммы

$$\mathfrak{R}/\mathfrak{m} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r,$$

$\mathfrak{a}_i$  изоморфен  $\mathfrak{R}/\mathfrak{q}_i$ , а значит, каждый идеал из  $\mathfrak{a}_i$  является главным. Если  $\mathfrak{c}$  – произвольный идеал кольца классов вычетов, то  $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}$  является главным идеалом  $\mathfrak{a}_i c_i$ ; получается

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{a}_1 c_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r c_r = \mathfrak{o}c, \quad c = c_1 + \cdots + c_r.$$

Действительно, вследствие  $\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = (0)$  и вследствие  $c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}_i}$  главные идеалы  $\mathfrak{a}_i \mathfrak{o}c_i$  и  $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}$  из  $\mathfrak{a}_i$  совпадают.

Эта теорема допускает еще следующую формулировку: если  $\mathfrak{c}$  – произвольный идеал, то его можно превратить в главный идеал умножением на идеал, взаимно простой с заданным идеалом  $\mathfrak{b}$ . В самом деле, положив  $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$ , получаем, что  $\mathfrak{c}$  по модулю  $\mathfrak{m}$  становится главным идеалом, то есть

$$\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b});$$

значит,  $\mathfrak{o}c = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$  и  $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ .

5. *Теория дробных идеалов.* Дробным идеалом называется каждый конечный  $\mathfrak{R}$ -модуль в поле частных  $\mathfrak{K}$ .

*Отличные от нулевого модуля конечные  $\mathfrak{R}$ -модули из  $\mathfrak{K}$  образуют относительно умножения абелеву группу.*

Произведение двух конечных  $\mathfrak{R}$ -модулей снова является конечным  $\mathfrak{R}$ -модулем; умножение ассоциативно и коммутативно; поскольку  $\mathfrak{K} = \mathfrak{o}\mathfrak{K}$ , единичный идеал является единичным элементом системы. Следовательно, остается только показать, что уравнение

$$\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$$

всегда имеет решение в системе конечных  $\mathfrak{R}$ -модулей.

Предварительное замечание. Если уравнение  $\mathfrak{A}T = \mathfrak{B}$  имеет одно и только одно решение, то  $T$  равно частному модулей  $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$  (§5, 4). В самом деле,

$$T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B} : \mathfrak{A}}, \quad \mathfrak{B} = \mathfrak{A}T \equiv 0 \pmod{\mathfrak{A}(\mathfrak{B} : \mathfrak{A})} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{B}}.$$

Пусть сначала  $\mathfrak{A}$  – главный модуль,  $\mathfrak{A} = (\alpha)$ ; тогда  $X = (e/\alpha)$  является решением  $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$ , и  $X$  снова конечный  $\mathfrak{R}$ -модуль. Отсюда следует: каждый конечный  $\mathfrak{R}$ -модуль является частным модулей двух идеалов из  $\mathfrak{R}$ , чем оправдывается название дробного идеала. Действительно, пусть  $t_1, \dots, t_n$  – базис модуля  $T$ , пусть  $t_i = \tau_i/\alpha$ , и пусть  $\mathfrak{t}$  – идеал в  $\mathfrak{R}$ , порожденный  $\tau_i$ . Тогда  $\mathfrak{o}\alpha T = \mathfrak{t}$ , откуда по предварительному замечанию следует  $T = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}\alpha)$ .

Решение  $\mathfrak{A}X = \mathfrak{o}$  теперь можно указать в общем виде. Пусть  $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}c$ , и пусть  $\mathfrak{b}$  выбрано так, что  $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$  равно главному идеалу  $\mathfrak{o}a$ . Тогда

$$\mathfrak{A}\mathfrak{o}c = \mathfrak{a}, \quad \mathfrak{A}\mathfrak{b}\mathfrak{o}c = \mathfrak{o}a, \quad \mathfrak{A}(\mathfrak{b}\mathfrak{o}c : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}.$$

При этом  $X$ , как частное идеала на главный идеал, снова является конечным  $\mathfrak{R}$ -модулем. Из группового свойства еще следует, что частное модулей любых двух идеалов  $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$ , как решение уравнения  $\mathfrak{b}X = \mathfrak{a}$ , является конечным  $\mathfrak{R}$ -модулем.

6. Из группового свойства следуют дальнейшие выводы.

6 $\alpha$ . Можно сокращать; из  $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$  следует  $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ , и обратно.

6 $\beta$ . Каждый дробный идеал допускает представление  $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$ , где  $\mathfrak{a}$  и  $\mathfrak{b}$  взаимно просты; этим условием  $\mathfrak{a}$  и  $\mathfrak{b}$  определены однозначно.

6γ. Каждый главный модуль  $\mathfrak{o}n$ , порожденный нецелым элементом, допускает представление как частное главных идеалов так, что никакая степень числителя не делится на знаменатель. Пусть в сокращенном представлении  $\mathfrak{o}n = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$ , где  $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ ; пусть  $\mathfrak{o}b = \mathfrak{b}a$  и  $(a, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ . Тогда

$$\mathfrak{o}n = a\mathfrak{b} : a\mathfrak{c} = \mathfrak{o}b : a\mathfrak{c},$$

и поскольку  $a\mathfrak{c}$  также становится главным идеалом, получаем

$$\mathfrak{o}n = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}c.$$

Но никакая степень  $b$  не делится на  $c$ .

7. *Доказательство аксиомы V.* Из 6γ следует, что каждый нецелый элемент из  $\mathfrak{K}$  допускает представление частным

$$\eta = a/c$$

так, что в  $\mathfrak{K}$  никакая степень числителя не делится на знаменатель. Следовательно, такой элемент не может удовлетворять никакому уравнению, которое характеризует его как целый относительно  $\mathfrak{K}$ ; ведь из

$$\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \dots + r_n = 0$$

следует  $a^n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{o}c}$  в  $\mathfrak{K}$ .

8. *Следствие.* Если в коммутативном кольце  $\mathfrak{K}$  выполнены аксиомы I–IV и каждый первичный идеал неразложим, то выполнена и аксиома V. В силу аксиом I–III каждая степень простого идеала  $\mathfrak{p}^e$  одновременно является первичным идеалом; в частности, это верно для  $\mathfrak{p}^2$ , и по предположению он неразложим. Отсюда нужно доказать

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2);$$

ибо тогда по вспомогательному утверждению §8, 3 следует, что каждый первичный идеал становится степенью простого идеала, а это вместе с остальными предположениями по пункту 7 влечет интегральную замкнутость.

В силу условия цепей делителей получаем

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \dots, \mathfrak{o}c_n),$$

причем в качестве множителей для  $c_i$  рассматриваются только классы вычетов по  $\mathfrak{p}$ , и  $c_i$  можно считать линейно независимыми над полем классов вычетов по  $\mathfrak{p}$ . Но из этой линейной независимости при  $n > 1$  следует представление

$$\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2], \quad \mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2), \quad \mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \dots, \mathfrak{o}c_n, \mathfrak{p}^2),$$

так что  $\mathfrak{q}_1$  и  $\mathfrak{q}_2$  становятся собственными делителями  $\mathfrak{p}^2$ . Это противоречит неразложимости. Следовательно,  $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$  доказано.

9. Если в кольце допускаются делители нуля, то из аксиом I–III и интегральной замкнутости в кольце частных не следует, что каждый первичный идеал неразложим.<sup>32</sup> Пусть  $\mathfrak{T}$  – кольцо, в котором выполнены все аксиомы I–IV, но не интегральная замкнутость. По следствию 8 в  $\mathfrak{T}$  существуют разложимые первичные идеалы  $\mathfrak{q}$ ; пусть  $\mathfrak{p}^e$  означает собственное кратное  $\mathfrak{q}$ , а  $\mathfrak{K}$  – кольцо классов вычетов  $\mathfrak{T}/\mathfrak{p}^e$ . В  $\mathfrak{K}$  выполнены аксиомы I–III, и одновременно выполнена интегральная замкнутость в кольце частных. Действительно, каждый элемент, не делящийся на  $\mathfrak{p}$ , становится взаимно простым с  $\mathfrak{p}^e$ , так что в  $\mathfrak{K}$  все регулярные элементы являются единицами. Следовательно,  $\mathfrak{K}$  совпадает со своим кольцом частных.

<sup>32</sup>Ср. примечание, приведенное в оригинале.

## § 10. Двойное условие цепей и композиционный ряд

Далее будет показано, что для произвольных модульных областей, предполагаемых хорошо упорядоченными, предположение о выполнении двойного условия цепей, то есть о том, что каждая цепь делителей и каждая цепь кратных модулей обрывается за конечное число шагов, равносильно предположению о существовании композиционного ряда.<sup>33</sup> Специализация модульной области до коммутативного кольца дает соответствующие факты для системы всех идеалов кольца; при этом в пункте 2 всюду нужно заменить изоморфизм модулей изоморфизмом колец.

Модульная область  $\mathfrak{G}$  называется простой, если в  $\mathfrak{G}$  нет других  $\mathfrak{A}$ -модулей, кроме самой  $\mathfrak{G}$  и нулевого модуля  $\mathfrak{E}$ . Модуль  $\mathfrak{A}$  называется простым в  $\mathfrak{G}$ , если  $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$  прост. Цепь кратных

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

называется композиционным рядом  $\mathfrak{G}$  длины  $r$ , если все модули цепи различны и каждый модуль прост в предыдущем.

1. Если в  $\mathfrak{G}$  предполагается выполнение двойного условия цепей, то в  $\mathfrak{G}$  существует композиционный ряд. Из предполагаемого хорошего порядка и условия цепей делителей, как в §6, получается существование хотя бы одного модуля, простого в  $\mathfrak{G}$ . Действительно, пусть  $\mathfrak{G}_1$  – первый в хорошем порядке собственный делитель  $\mathfrak{G}$ , а вообще  $\mathfrak{G}_i$  – первый собственный делитель  $\mathfrak{G}_{i-1}$ ; тогда вполне определенная цепь

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{G}_1, \dots, \mathfrak{G}_i, \dots$$

обрывается за конечное число шагов и необходимо приводит к простому модулю. Повторяя этот шаг, получаем цепь кратных

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_i,$$

которая обрывается по условию цепей кратных и дает композиционный ряд.

2. Если в  $\mathfrak{G}$  предполагается существование композиционного ряда, то в  $\mathfrak{G}$  выполняется двойное условие цепей. Доказательство идет полной индукцией; в ходе индукционного перехода одновременно получается теорема Jordan–Hölder.<sup>34</sup>

Пусть сначала  $\mathfrak{G}$  проста; тогда обычные утверждения выполняются непосредственно: через каждый простой модуль проходит композиционный ряд; все композиционные ряды имеют одинаковую длину и изоморфные фактор-группы с точностью до порядка; через каждый собственный модуль проходит композиционный ряд; условия цепей кратных и делителей выполняются.

Теперь эти утверждения доказываются для композиционного ряда

$$\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \dots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$$

длины  $r + 1$ , если они выполнены для более коротких рядов. Если  $\mathfrak{B}$  – еще один модуль, простой в  $\mathfrak{G}$ , и  $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$ , то  $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{E}$ . Положив  $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$ , по второй теореме об изоморфизме получаем

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B} \cong \mathfrak{A}/\mathfrak{M}, \quad \mathfrak{G}/\mathfrak{A} \cong \mathfrak{B}/\mathfrak{M}.$$

Отсюда следует существование композиционного ряда, проходящего через  $\mathfrak{B}$ ; сравнение полученных таким образом рядов обмена дает теорему Jordan–Hölder.

Для произвольного модуля  $\mathfrak{H}$ , отличного от  $\mathfrak{G}$ , из фиксированного композиционного ряда образуем ряд

$$\mathfrak{G}, (\mathfrak{A}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{H}), \dots, (\mathfrak{A}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}.$$

По второй теореме об изоморфизме различные члены этого ряда последовательно просты, то есть образуют композиционный ряд от  $\mathfrak{G}$  до  $\mathfrak{H}$ . Отсюда следует возможность проводить композиционные ряды через каждый собственный модуль. Наконец, каждая цепь кратных после перехода к такому

<sup>33</sup> Модули области являются абелевыми группами относительно сложения, а именно обобщенными абелевыми группами, поскольку область делителей состоит из элементов из  $\mathfrak{A}$ . Утверждения этого параграфа остаются верными, если под «модулями» понимать совокупность нормальных делителей некоммукативной группы.

<sup>34</sup> Ср. Masazo Sono, *On Congruences I*, §§11–13, для случая колец; далее Dedekind, *Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe*, Math. Ann. 53 (1900), S. 371–403.

модулю обрывается по индукции, и точно так же каждая цепь делителей после перехода к модулю классов вычетов. Эквивалентность предположений – композиционного ряда или двойного условия цепей – тем самым доказана.

*Поступило 13. 8. 1925.*

## 31. Теорема о дискриминанте для порядков алгебраического числового или функционального поля

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), с. 82–104

Теорема Dedekind о дискриминанте, как известно, утверждает: простое число входит в дискриминант поля тогда и только тогда, когда главный идеал, порожденный этим числом, делится по крайней мере на квадрат простого идеала.

Ниже я показываю, что эта теорема сохраняется для всех конечных порядков конечного алгебраического числового поля, то есть для всех таких колец целых чисел, которые содержат кольцо всех целых рациональных чисел, в следующей форме: простое число  $p$  входит в дискриминант порядка тогда и только тогда, когда в действующем для этого порядка разложении главного идеала  $(p)$  на наибольшие первичные компоненты<sup>1</sup> появляется по крайней мере один собственный первичный идеал, то есть такой, который не является простым идеалом.

Поскольку для главного порядка, системы всех целых чисел поля, нет других первичных идеалов, кроме степеней простых идеалов, теорема Dedekind получается специализацией.

Доказательство теоремы посредством перехода к кольцу классов вычетов порядка по модулю  $(p)$  сводится к теории разложения тех колец, которые имеют конечный ранг относительно поля, содержащегося в самом кольце; значит, они образуют коммутативную систему гиперкомплексных величин с главной единицей и коэффициентами из того же поля. Здесь специально в качестве поля коэффициентов выступает поле классов вычетов целых рациональных чисел по модулю  $p$ , а разложению  $(p)$  в кольце классов вычетов соответствует разложение нулевого идеала.

Итак, если такое кольцо конечного ранга назвать вполне приводимым, когда его нулевой идеал можно представить как наименьшее общее кратное конечного числа простых идеалов, то речь идет о критериях полной приводимости. Первый такой критерий таков: если область коэффициентов является совершенным полем, то кольцо вполне приводимо тогда и только тогда, когда его кольцо расширения с алгебраически замкнутой областью коэффициентов вполне приводимо. Для этого кольца расширения, однако, ненулевость дискриминанта очень просто распознается как необходимый и достаточный критерий полной приводимости;<sup>2</sup> а так как дискриминант порядка по модулю каждого простого числа переходит в дискриминант кольца классов вычетов, тем самым теорема о дискриминанте доказана.<sup>3</sup>

Если вместо числовых полей рассматривать функциональные поля, то порядок теперь должен содержать основную область всех целых рациональных функций, соответственно, для алгебраических функций от нескольких неопределенных или для целых алгебраических функций, основную область всех целых функционалов с целорациональными коэффициентами. Тогда в кольце классов вычетов может возникать и случай несовершенной области коэффициентов, например, когда в случае целочисленной функциональной области рассматривается кольцо классов вычетов по простому числу. Для несовершенного поля как области коэффициентов нужно различать простые идеалы первого и второго рода, в зависимости от того, является ли поле классов вычетов по простому идеалу полем расширения первого или второго рода,<sup>4</sup> и соответственно различать полную приводимость первого и второго рода. Все указанные выше критерии относятся к полной приводимости первого рода, которая одна только встречается в совершенном случае; следовательно, в самом общем случае теорема о дискриминанте утверждает, что простой элемент основной области входит в дискриминант порядка тогда и только тогда, когда в разложении идеала  $(p)$  появляется по крайней мере одна собственно первичная компонента или простой идеал второго рода.

Для главного порядка этот факт впервые был замечен на примерах Kronecker после того, как в Festschrift еще ошибочно была дана формулировка, верная для главного порядка числового поля, хотя

<sup>1</sup>Ср. E. Noether, *Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern*, Math. Ann. 96 (1926), с. 26–61. Во всех определениях я ссылаюсь на эту работу, ниже цитируемую как "Idealtheorie". В дальнейшем под "порядком" всегда понимается "конечный порядок", а под "кольцом" – коммутативное кольцо.

<sup>2</sup>В одном специальном случае Hilbert рассуждает сходно: Zur Theorie der aus  $n$  Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen, Gött. Nachr. 1896.

<sup>3</sup>Родственные исследования, также в некоммутативном случае, но ограниченные главным порядком (максимальной областью) и предполагающие целые рациональные числовые коэффициенты, содержатся в только что опубликованной работе A. Speiser: *Allgemeine Zahlen-theorie*. Naturf. Gesellschaft Zürich 71 (1926), с. 8–48. Ср. также указанную там американскую литературу.

<sup>4</sup>В известной формулировке Steinitz, J. f. M. 137. Ср. примечание к §2, 4 этой работы.

и без полного доказательства. Для главного порядка Ostrowski<sup>5</sup> дал доказательство приведенной выше теоремы о дискриминанте и связанные с ней дальнейшие теоремы разветвления; там же содержится подробный обзор литературы. Наконец, как прямое следствие получается теорема о дискриминанте для всех порядков относительных полей, а именно путем перехода к кольцу частных относительно каждого простого идеала основной области. Идею этого перехода, известную в специальном случае, принципиально подчеркнул W. Krull;<sup>6</sup> систематическую теорию кольца частных в рамках более общих исследований дает H. Grell.<sup>7</sup>

Данное здесь единое рассмотрение всех порядков, а также совершенной и несовершенной области коэффициентов, опирается, помимо знания теории идеалов, на то, что с самого начала за основу взята теория колец конечного ранга, а значит, общее понятие конечного расширения, а не понятие расширения, порожденного примитивным элементом. Поэтому модульная база порядка вместе с отношениями между ее элементами заменяет степени примитивного элемента поля и определяющее уравнение,<sup>8</sup> соответственно степени фундаментальной формы и фундаментальное уравнение.

Такая модульная база по модулю каждого простого элемента основной области переходит в базу кольца классов вычетов, тогда как даже для главного порядка это не обязательно верно для базы, состоящей из степеней примитивного элемента; точно так же это может не быть верно и для базы из степеней фундаментальной формы, как только речь идет о целых алгебраических функциях нескольких неопределенных.<sup>9</sup> Иными словами: кольцо классов вычетов полиномиальной области одной неопределенной с коэффициентами из основной области по произвольному определяющему уравнению или даже по фундаментальному уравнению может по модулю  $p$  не быть изоморфным кольцу классов вычетов главного порядка по  $(p)$ , и главные трудности обычных изложений заключены именно в этом прекращении изоморфизма. Поскольку эта вспомогательная полиномиальная область здесь не возникает, эти трудности тем самым автоматически обходятся; одновременно аддитивную теорию разложения кольца классов вычетов можно понимать как эквивалент мультипликативного разложения уравнения, которому и здесь, при разложении на взаимно простые множители, соответствует аддитивное разложение в полиномиальном кольце классов вычетов.

Отметим, что теорема о дискриминанте может быть только первой теоремой общей теории разветвления порядков, подобно тому как в главном порядке рядом с теоремой о дискриминанте стоит более тонкая теория идеала разветвления, позволяющая там точнее определять показатели. Это определение показателей, основанное на представлении первичных множителей уравнений степенями, можно истолковать как определение длины композиционного ряда от  $p$  до  $q = p^t$ ; вероятно, именно в этой форме оно появится в общей теории разветвления.

<sup>5</sup>A. Ostrowski: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

<sup>6</sup>Ср. его данцигский доклад: Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, с. 121.

<sup>7</sup>*Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe* (должна появиться в Math. Annalen).

<sup>8</sup>Эта точка зрения близко соприкасается с представлением Dedekind о высших комплексных числах: Zur Theorie der aus  $n$  Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

<sup>9</sup>Ср. Ostrowski, a.a.O. "Irregularität erster Art".



## § 1. Кольца расширения полей

1. Сначала приведем несколько замечаний о произвольных кольцах. Если  $T$  – кольцо, а  $S$  – система элементов из  $T$ , то под "кольцом, выведенным из  $S$  в  $T$ " понимается пересечение всех колец из  $T$ , которые содержат  $S$ . Соответственно определяется "идеал, выведенный из  $S$  в  $T$ ", или " $P$ -модуль, выведенный из  $S$  в  $T$ ", если  $P$  является подкольцом  $T$ .<sup>10</sup>

Если  $R$  является подкольцом  $T$ , а  $S$  – системой элементов из  $T$ , то кольцо, выведенное из  $R$  и  $S$  в  $T$ , обозначается как кольцо  $R[S]$ , возникающее присоединением  $S$  к  $R$  как кольцу. Это кольцо состоит из всех полиномов от элементов из  $S$  с коэффициентами из  $R$ , причем отношения равенства и операционные отношения задаются отношениями равенства и операционными отношениями в  $T$ . В силу этих уже заданных отношений равенства и операций в специальном случае достаточно образовать лишь подсистему всех полиномов, например только все линейные формы от  $S$  с коэффициентами из  $R$ . Такой специальный случай имеет место, например (ср. 2.), когда  $R$  – кольцо с единичным элементом, а  $S$  – поле с тем же единичным элементом; все линейные комбинации  $\sum c_i \gamma_i$ , где  $c_i$  принадлежат  $S$ , а  $\gamma_i$  принадлежат  $R$ , образуют кольцо  $R[S]$ .

Но можно также, если задано только кольцо  $R$  и, кроме того, система  $S$  элементов, не содержащихся в  $R$ , с отношениями равенства или также взаимными операционными отношениями, сконструировать кольцо расширения  $R[S]$ , возникающее присоединением  $S$  к  $R$ . Для этого показывают, что всегда существует кольцо, содержащее  $R$  и  $S$ , а именно формально образованное из всех полиномов от  $S$  с коэффициентами из  $R$  с фиксированными обычными правилами операций. Для определения равенства, помимо правил операций, здесь возможна полная свобода, за исключением ограничения, что должны быть включены определения равенства, действующие в  $R$  и  $S$ . Значит, необходимо отождествлять только те полиномы, которые, в силу равенства в  $R$  и  $S$  и в силу операций, можно одинаковым образом образовать из равных элементов  $R$  и  $S$ . Сконструированное таким образом кольцо  $T$ , содержащее  $R$  и  $S$ , тогда совпадает с кольцом, выведенным из  $R$  и  $S$  в  $T$ .<sup>11</sup>

2. Кольца расширения полей. Начиная отсюда предполагаются кольца  $\mathfrak{A}$  с единичным элементом, содержащие поле  $P$  как подкольцо, то есть надкольца полей. Единичный элемент  $e$  кольца  $\mathfrak{A}$  тогда одновременно является единичным элементом поля  $P$ ; и кольцо становится  $P$ -модулем.

Пусть  $\bar{P}$  – надполе поля  $P$ . Кольцо расширения  $\bar{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\bar{P}]$ , возникающее присоединением  $\bar{P}$  к  $\mathfrak{A}$  как кольцу, определяется следующим образом.

Предполагается, что теоретико-множественное пересечение  $[\mathfrak{A}, \bar{P}]$  колец  $\mathfrak{A}$  и  $\bar{P}$  равно  $P$ , и далее, что между элементами  $\mathfrak{A}$  и  $\bar{P}$ , не принадлежащими  $P$ , нет операционных отношений. Этого предположения всегда можно добиться, заменив  $\bar{P}$  эквивалентным полем расширения поля  $P$ , или также заменив  $\mathfrak{A}$  эквивалентным кольцом расширения.<sup>12</sup>

Элементами  $\bar{\mathfrak{A}}$  объявляются все формально образованные линейные соединения

$$\bar{c}_1 \gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_s \gamma_{i_s},$$

где  $\bar{c}_i$  пробегает все элементы  $\bar{P}$ , а  $\gamma_i$  – все элементы  $\mathfrak{A}$ .<sup>13</sup> Определение должно быть однозначным: то есть если  $\gamma$  заменяются равными им в  $\mathfrak{A}$ , а  $\bar{c}$  – равными им в  $\bar{P}$ , то и элемент в  $\bar{\mathfrak{A}}$  объявляется равным.

Сумма определяется однозначно, то есть так, что замена слагаемого в подлежащем фиксации определении равенства равным ему дает тот же результат:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i + \sum \bar{d}_i \gamma_i = \sum (\bar{c}_i + \bar{d}_i) \gamma_i.$$

Среди  $\bar{c}$  и  $\bar{d}$  могут встречаться нули, благодаря чему формально появляются те же  $\gamma_i$ .

Произведение определяется однозначно в том же смысле:

$$\sum \bar{c}_i \gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k \gamma_k = \sum \bar{c}_i \bar{d}_k \gamma_i \gamma_k.$$

<sup>10</sup>Ср. об этом Idealtheorie §1.

<sup>11</sup>Ср. конструкцию Steinitz поля частных.

<sup>12</sup>Два поля расширения поля  $P$  по Steinitz называются "эквивалентными", если между ними можно установить изоморфизм так, что каждый элемент  $P$  соответствует самому себе; соответственно следует определять эквивалентные кольца расширения поля  $P$ . Введением новых символов всегда можно породить эквивалентные расширения; эта свобода в использовании эквивалентных расширений существенна для дальнейшего.

<sup>13</sup>В общем случае элементы из  $\mathfrak{A}$  или  $\bar{\mathfrak{A}}$  обозначаются греческими буквами, а элементы из  $P$  или  $\bar{P}$  – латинскими.

Для определения равенства устанавливается: если  $\gamma_{i_1}, \dots, \gamma_{i_s}$  линейно независимы относительно  $P$ , то два элемента

$$\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \dots + \bar{c}_{i_s}\gamma_{i_s} \quad \text{и} \quad \bar{d}_{i_1}\gamma_{i_1} + \dots + \bar{d}_{i_s}\gamma_{i_s}$$

равны тогда и только тогда, когда  $\bar{c}_{i_k}$  равен  $\bar{d}_{i_k}$  в  $\bar{P}$ . Иными словами: элементы из  $\mathfrak{A}$ , линейно независимые относительно  $P$ , объявляются линейно независимыми относительно  $\bar{P}$ .

В силу определений суммы и произведения тем самым задано определение равенства для всех элементов  $\mathfrak{A}$ ; действительно, отсюда следует их выразимость через линейно независимые элементы из  $\mathfrak{A}$ . Ведь из отношения

$$\mu = c_1\gamma_1 + \dots + c_s\gamma_s \quad \text{в } \mathfrak{A}$$

умножением на  $\bar{b} = \bar{b}e$  по определению произведения получаем

$$\bar{b}\mu = \bar{b}e \cdot (c_1\gamma_1 + \dots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \dots + \bar{b}c_s\gamma_s,$$

и потому, по определению суммы, выразимость всех элементов через линейно независимые элементы из  $\mathfrak{A}$ .

Следовательно, когда все элементы выражены через линейно независимые элементы из  $\mathfrak{A}$ , определение равенства становится равенством коэффициентов в  $\bar{P}$ . Поэтому для элементов, одновременно принадлежащих  $\mathfrak{A}$  и  $\bar{\mathfrak{A}}$  или  $\bar{P}$  и  $\bar{\mathfrak{A}}$ , оно совпадает с действующим там равенством; тогда как для остальных элементов из  $\bar{\mathfrak{A}}$  равенство, действующее в  $\mathfrak{A}$  и  $\bar{P}$ , не утверждает ничего сверх однозначности, требуемой при определении этих элементов, ввиду предположения о пересечении и дальнейшего условия.<sup>14</sup> Точно так же и требование однозначности суммы и произведения не влечет никаких дальнейших отношений, поскольку равные элементы можно считать равными по коэффициентно, и потому формально они дают те же выражения сумм и произведений.

Теперь сразу проверяется, что все аксиомы кольцевых операций выполнены; следовательно, кольцо расширения  $\mathfrak{A}[\bar{P}]$ , порожденное присоединением кольца, всегда существует.

<sup>14</sup>Без этого предположения существовал бы по крайней мере один элемент  $\bar{c}$  из  $\bar{P}$ , не принадлежащий  $P$ , для которого  $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ . Тогда, по определению равенства в  $\mathfrak{A}$ , элементы  $e$  и  $\gamma$  были бы линейно независимы относительно  $P$ , но зависимы относительно  $\bar{P}$ . Из-за отношений между элементами  $\bar{P}$  и  $\mathfrak{A}$  приведенное выше определение равенства тогда было бы невозможно; можно вспомнить, например, понижение степени конечного поля расширения, когда основное поле заменяется промежуточным полем. Напротив, приведенное выше расширение характеризуется возможностью появления новых делителей нуля; так, например, кольцо классов вычетов полиномиальной области с рациональными коэффициентами  $P$  по модулю  $x^2 + 1$  является кольцом без делителей нуля, изоморфным полю  $P(\sqrt{-1})$ , тогда как при переходе к полиномиальной области с коэффициентами из  $P(\sqrt{-1})$  появляются делители нуля, соответственно тому, что  $(x+i)(x-i) = x^2 + 1$ , но ни один множитель не делится на  $x^2 + 1$ . Соответствующее утверждение верно, например, для каждого конечного числового поля; это именно та точка зрения, которую Dedekind впервые высказал для высших комплексных чисел. Ср. об этом §6, 4, конец.

**3. Идеалы в  $\mathfrak{A}$  и  $\overline{\mathfrak{A}}$ .** Если  $\mathfrak{a}$  – идеал в  $\mathfrak{A}$ , то модульное произведение  $\overline{\mathfrak{A}}\mathfrak{a}$  становится идеалом  $\overline{\mathfrak{a}}$  в  $\overline{\mathfrak{A}}$ , идеалом расширения идеала  $\mathfrak{a}$ . Одновременно  $\overline{\mathfrak{a}}$  является идеалом, выведенным из  $\mathfrak{a}$  в  $\overline{\mathfrak{A}}$ ; он состоит из всех линейных соединений  $\sum \bar{c}_i a_i$ , где сумма каждый раз берется по конечному числу элементов, причем  $a_i$  пробегает все элементы из  $\mathfrak{a}$ , а  $\bar{c}_i$  – все элементы из  $\overline{P}$ .

Если  $\overline{\mathfrak{b}}$  – идеал в  $\overline{\mathfrak{A}}$ , то пересечение  $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{A}]$  становится идеалом  $\mathfrak{b}$  в  $\mathfrak{A}$ , идеалом сужения идеала  $\overline{\mathfrak{b}}$ .<sup>15</sup> Каждый идеал  $\mathfrak{a}$  из  $\mathfrak{A}$  является идеалом сужения, а именно своего идеала расширения  $\overline{\mathfrak{a}}$ . Действительно, каждый элемент  $a$  из  $[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$  имеет вид  $\sum \bar{c}_i a_i$ , где  $a_i$  можно считать линейно независимыми относительно  $P$  или  $\overline{P}$ . Значит, элементы  $a, a_i$  становятся линейно зависимыми в  $\overline{\mathfrak{A}}$ , а потому, по определению равенства, также в  $\mathfrak{A}$ ; следовательно,  $a$  принадлежит  $\mathfrak{a}$ . Так как верно и обратное включение, получаем  $\mathfrak{a} = [\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$ .

Если  $\overline{\mathfrak{p}}$  – простой идеал в  $\overline{\mathfrak{A}}$ , то  $\mathfrak{p} = [\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}}]$  является простым идеалом в  $\mathfrak{A}$ . Ведь по второй теореме об изоморфизме<sup>16</sup> кольцо классов вычетов  $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$  изоморфно подкольцу кольца  $\overline{\mathfrak{A}}/\overline{\mathfrak{p}}$ , а значит, является кольцом без делителей нуля. Именно, имеет место изоморфизм колец

$$(\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}})/\overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{A}/[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}}],$$

где под  $(\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}})$  понимается сумма, то есть наибольший общий делитель, модулей  $\mathfrak{A}$  и  $\overline{\mathfrak{p}}$ .

<sup>15</sup>В обозначении Н. Grell (в работе, цитированной в примечании 6, с. 83).

<sup>16</sup>Idealtheorie, §4, 3. Там теорема сформулирована только для идеалов одного и того же кольца; однако то же рассуждение показывает ее справедливость в приведенной выше форме для произвольных идеалов  $\overline{\mathfrak{a}}$  из  $\overline{\mathfrak{A}}$ . Действительно, кольцевой гомоморфизм  $\overline{\mathfrak{A}} \sim \overline{\mathfrak{A}}/\overline{\mathfrak{a}}$  индуцирует для подкольца  $\mathfrak{A}$  кольца  $\overline{\mathfrak{A}}$  кольцевой гомоморфизм  $\mathfrak{A} \sim (\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}}$ . При этом гомоморфизме нулевому элементу соответствуют все и только элементы из  $[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$ , и потому получается изоморфизм колец:  $(\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}})/\overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{A}/[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{a}}]$ . Классы справа и слева можно представлять теми же элементами из  $\mathfrak{A}$ , поскольку на каждом шаге доказательства элементам сопоставляются представляемые ими классы.

## §2. Кольца конечного ранга. Представление в виде прямой суммы

**1. Кольца конечного ранга.** Если  $\mathfrak{A}$  является конечным  $P$ -модулем, то  $\mathfrak{A}$  имеет конечный ранг, скажем  $k$ , относительно  $P$ , то есть в  $\mathfrak{A}$  существует  $k$  и не больше линейно независимых относительно  $P$  элементов, и всякая система из  $k$  линейно независимых относительно  $P$  элементов из  $\mathfrak{A}$  тем самым образует модульную базу  $\mathfrak{A}$ . Если  $P$ -модуль  $\mathfrak{B}$  конечного ранга имеет своим делителем другой  $\mathfrak{A}$  того же конечного ранга,  $\mathfrak{B} = O(\mathfrak{A})$ , то они, следовательно, тождественны.

Отныне будем предполагать, что  $\mathfrak{A}$  имеет конечный ранг  $n$  относительно  $P$ . Тогда каждый  $P$ -модуль из  $\mathfrak{A}$  имеет конечный ранг; значит, в каждой собственной цепи делителей или кратных  $P$ -модулей из  $\mathfrak{A}$  ранг каждого модуля должен быть больше, соответственно меньше, чем ранг непосредственно предыдущего; цепи обрываются за конечное число шагов. В частности, для системы всех идеалов из  $\mathfrak{A}$  выполняется "теорема о двойной цепи".

Отсюда следует,<sup>17</sup> что простой идеал  $\mathfrak{p}$  из  $\mathfrak{A}$  не имеет никакого собственного делителя, отличного от единичного идеала; следовательно, кольцо классов вычетов  $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$  по простому идеалу, отличному от единичного, становится полем. Если  $\mathfrak{q}$  – первичный идеал, принадлежащий  $\mathfrak{p}$ , то есть  $\mathfrak{q} = O(\mathfrak{p})$  и  $\mathfrak{p}^\rho = O(\mathfrak{q})$ , то кольцо классов вычетов  $\mathfrak{A}/\mathfrak{q}$  становится первичным кольцом, то есть кольцом, в котором некоторая степень (здесь во всяком случае уже  $\rho$ -я) каждого делителя нуля обращается в нуль, и  $\mathfrak{A}/\mathfrak{q}$  содержит только делители нуля и единицы. Последнее непосредственно следует из того, что каждый идеал, не делящийся на  $\mathfrak{p}$ , становится взаимно простым с  $\mathfrak{p}$ , а значит и с  $\mathfrak{q}$ .

Из теоремы о двойной цепи и существования единичного элемента далее следует,<sup>18</sup> что каждый идеал  $\mathfrak{a}$  из  $\mathfrak{A}$  единственным образом представляется как произведение конечного числа попарно взаимно простых первичных идеалов. В силу взаимной простоты это произведение равно наименьшему общему кратному и соответствует представлению кольца классов вычетов  $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$  в виде прямой суммы первичных колец,<sup>19</sup> то есть  $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$  становится наибольшим общим делителем этих колец, и представление каждого элемента из  $\mathfrak{A}/\mathfrak{a}$  в виде суммы единственно.

---

<sup>17</sup>Idealtheorie, §7, 2.

<sup>18</sup>Idealtheorie, §7, 3. Теорема V.

<sup>19</sup>Idealtheorie, §4, 5. То, что добавлено в настоящем сведении, во многих местах рассеяно по литературе.

**2. Представление колец конечного ранга в виде прямой суммы первичных колец.** Пусть представление нулевого идеала кольца  $\mathfrak{R}$  задано формулой

$$(0) = q_1 q_2 \cdots q_r = [q_1, q_2, \dots, q_r];$$

и пусть соответствующее представление в виде прямой суммы имеет вид

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \quad \mathfrak{R}_i \mathfrak{R}_k = (0) \quad \text{для } i \neq k, \quad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \quad \mathfrak{R} \mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

Тогда  $\mathfrak{R}_i$  становится идеалом из  $\mathfrak{R}$ , а именно

$$\mathfrak{R}_i = q_1 \cdots q_{i-1} q_{i+1} \cdots q_r = [q_1, \dots, q_{i-1}, q_{i+1}, \dots, q_r],$$

$$q_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

и  $\mathfrak{R}_i$  становится изоморфным кольцу классов вычетов  $\mathfrak{R}/q_i$ ; при этом каждому элементу  $\gamma_i$  из  $\mathfrak{R}_i$  соответствует класс в  $\mathfrak{R}/q_i$ , представленный элементом  $\gamma_i$ .<sup>20</sup> Если  $\mathfrak{a}$  – произвольный идеал из  $\mathfrak{R}$ , то по дистрибутивному закону получаем

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R} \mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1 \mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r \mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

здесь, поскольку  $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{a} = \mathfrak{R} \mathfrak{a}_i$ , компоненты  $\mathfrak{a}_i$  являются идеалами как в  $\mathfrak{R}_i$ , так и в  $\mathfrak{R}$ . Как идеалы,  $\mathfrak{a}_i$ , подобно самим  $\mathfrak{R}_i$ , являются конечными  $P$ -модулями; из-за прямой суммы их ранги складываются в ранг  $\mathfrak{a}$ , соответственно  $\mathfrak{R}$ .

Если представление единичного элемента в виде суммы задано формулами

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \quad \varepsilon_i \varepsilon_k = 0 \quad \text{для } i \neq k, \quad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \equiv e \pmod{q_i},$$

то представление каждого произвольного элемента  $\gamma$  из  $\mathfrak{R}$  получается единственным образом:

$$\gamma = \gamma e = \gamma \varepsilon_1 + \cdots + \gamma \varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

где, следовательно, компонента  $\gamma_i = \gamma \varepsilon_i$  является элементом из  $\mathfrak{R}_i$ ; одновременно следует  $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R} \varepsilon_i$ . Из "соотношений ортогональности" получается:

$$\gamma \delta = (\gamma_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \varepsilon_r)(\delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \delta_r \varepsilon_r) = \gamma_1 \delta_1 \varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r \delta_r \varepsilon_r;$$

значит,  $\gamma_i \delta_i$  становится  $i$ -й компонентой произведения, и точно так же  $\gamma_i + \delta_i$  становится  $i$ -й компонентой суммы; эти факты следуют также из гомоморфизма из  $\mathfrak{R}$  в  $\mathfrak{R}_i$ .

Кольцо  $\mathfrak{R}_i$  содержит подполе  $P_i = P \varepsilon_i$ , изоморфное  $P$ , и имеет конечный ранг относительно  $P_i$ ; этот ранг равен рангу, которым  $\mathfrak{R}_i$  обладает как  $P$ -модуль. Действительно, для каждого элемента  $c$  из  $P$  имеем  $c \varepsilon_i \equiv c e \equiv c \pmod{q_i}$ ; значит,  $c \varepsilon_i \neq 0$ , как только  $c \neq 0$ ; гомоморфизм между  $P$  и  $P_i$  становится изоморфизмом. Далее, всякая линейная зависимость относительно  $P$  между элементами из  $\mathfrak{R}_i$  посредством умножения на  $\varepsilon_i$  переходит в такую же зависимость относительно  $P_i$ ; и обратно, поскольку  $P_i = P \varepsilon_i$ , всякое соотношение относительно  $P_i$  одновременно представляет собой соотношение относительно  $P$ . Поэтому ранги относительно  $P$  и  $P_i$  совпадают.

<sup>20</sup>Idealtheorie, §4, 5.

### 3. Представление колец расширения в виде прямых сумм. Если

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \dots + \mathfrak{R}_r,$$

то для  $\overline{\mathfrak{R}}$  имеет место представление

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \dots + \overline{\mathfrak{R}}_r,$$

где  $\overline{\mathfrak{R}}_i$  означает идеал расширения  $\mathfrak{R}_i$  в  $\overline{\mathfrak{R}}$  и одновременно кольцо, выведенное из  $\mathfrak{R}_i$  в  $\overline{\mathfrak{R}}$ . Действительно, из  $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$  умножением на  $\overline{\mathfrak{R}}$  получается представление в виде произведения:  $(0) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$ , где, следовательно,  $\overline{\mathfrak{q}}_i$  снова становятся попарно взаимно простыми. Поэтому для  $\overline{\mathfrak{R}}$  получается представление в виде прямой суммы; а так как  $i$ -я компонента этого представления задается произведением

$$\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1} \overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r,$$

она равна идеалу расширения  $\mathfrak{R}_i$ . Но этот идеал расширения, по §1, 3, тождествен кольцу расширения  $\mathfrak{R}_i[\overline{P}_i]$ , образованному из  $\mathfrak{R}_i$  относительно  $\overline{P}_i = \overline{P}\varepsilon_i$ ; следовательно, при расширениях достаточно расширять отдельные компоненты. При этом  $\overline{\mathfrak{R}}_i$  вообще уже не будет первичным кольцом.

**4. Простые идеалы первого и второго рода.** По пункту 1 кольцо классов вычетов  $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$  по любому простому идеалу, отличному от единичного идеала, является полем; это поле имеет подполе, изоморфное  $P$ ,

$$(P) = (P, \mathfrak{p})/\mathfrak{p} = P/[P, \mathfrak{p}] \simeq P,$$

так как  $\mathfrak{p}$  не может содержать никакого ненулевого элемента из  $P$ . Следовательно,  $(P)$  состоит из всех и только тех классов, которые можно представить элементами из  $P$ .<sup>21</sup> Кольцо  $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$  имеет конечный ранг относительно  $(P)$ , то есть является конечным алгебраическим расширением поля  $(P)$ . В зависимости от того, является ли это расширение расширением первого или второго рода,<sup>22</sup> идеал  $\mathfrak{p}$  будем называть простым идеалом первого или второго рода.

---

<sup>21</sup>Ср. примечание к §1, 3 о второй теореме об изоморфизме.

<sup>22</sup>В известной терминологии Штейница: алгебраическое расширение называется расширением первого рода, если каждый его элемент является нулем неприводимого многочлена, который в подходящем поле расширения распадается на различные линейные множители; иначе оно является расширением второго рода.

### §3. Вполне приводимые кольца

1. Кольцо  $\mathfrak{A}$  называется *вполне приводимым*, если в представлении его нулевого идеала в виде произведения (§2, 2) все первичные компоненты становятся простыми идеалами; или, что по §2, 1 и 2 равносильно этому, если  $\mathfrak{A}$  можно представить в виде прямой суммы конечного числа полей. Вполне приводимое кольцо называется *вполне приводимым первого рода*, если все простые идеалы являются идеалами первого рода (§2, 4); в противоположном случае — *вполне приводимым второго рода*.

Если  $P$  является совершенным полем, то возможна только вполне приводимость первого рода; в частности, это всегда так для алгебраически замкнутого поля. В дальнейшем  $\overline{P}$  специально будет обозначать алгебраически замкнутое поле, выведенное из  $P$ , а  $\overline{\mathfrak{A}}$  будет равно  $\mathfrak{A}[\overline{P}]$ .



2. **Теорема.** Кольцо  $\mathfrak{A}$  является вполне приводимым первого рода тогда и только тогда, когда кольцо расширения  $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$  с алгебраически замкнутым  $\overline{P}$  вполне приводимо.

Доказательство состоит из трех шагов.

2а. Из полной приводимости  $\overline{\mathfrak{A}}$  — а в более общем виде из полной приводимости любого кольца расширения — следует полная приводимость (первого или второго рода) кольца  $\mathfrak{A}$ . Действительно, по предположению для нулевого идеала  $\overline{\mathfrak{A}}$  имеется представление как наименьшее общее кратное простых идеалов,

$$(0) = [\overline{\mathfrak{p}}_1, \dots, \overline{\mathfrak{p}}_s].$$

Взятием пересечений получается в  $\mathfrak{A}$  представление нулевого идеала

$$(0) = [[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}}_1], \dots, [\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}}_s]],$$

а идеалы  $[\mathfrak{A}, \overline{\mathfrak{p}}_i]$  по §1, 3 являются простыми идеалами.

2b. Из полной приводимости первого рода кольца  $\mathfrak{A}$  следует полная приводимость первого рода кольца  $\overline{\mathfrak{A}}$ ; в более общем виде — полная приводимость первого рода каждого промежуточного кольца между  $\mathfrak{A}$  и  $\overline{\mathfrak{A}}$ .

Так как по §2, 3 представлению  $\mathfrak{A}$  в виде прямой суммы соответствует такое представление  $\overline{\mathfrak{A}}$ , что каждая компонента  $\overline{\mathfrak{A}}_i$  становится кольцом расширения  $\mathfrak{A}_i[\overline{P}_i]$  — где  $\overline{P}_i$  является изоморфным  $\overline{P}$  полем расширения подполя  $P_i$  компоненты  $\mathfrak{A}_i$ , изоморфного  $P$ , — достаточно рассмотреть отдельную компоненту  $\mathfrak{A}_i$ . Поэтому без ограничения общности можно считать, что  $\mathfrak{A}$  является полем, а именно конечным полем расширения первого рода своего подполя  $P$ . Тогда  $\mathfrak{A}$  порождается присоединением к  $P$  примитивного элемента первого рода; иначе говоря,  $\mathfrak{A}$  изоморфно кольцу классов вычетов  $P[x]/f(x)$ , где  $f(x)$  означает неприводимый многочлен первого рода в полиномиальной области  $P[x]$  одной неопределенной  $x$ . Если  $Q$  — поле расширения  $P$ , то  $Q[x]/f(x)$  изоморфно  $\mathfrak{A}[Q]$ ; действительно, при переходе от  $P[x]$  к  $Q[x]$  ранг кольца классов вычетов сохраняется и равен степени  $f(x)$ , так что речь идет ровно о конструкции кольца расширения, указанной в §1, 2. В  $Q[x]$  многочлен  $f(x)$  распадается на попарно взаимно простые неприводимые многочлены первого рода, каждый из которых порождает простой идеал в  $Q[x]$ ; это означает, что  $Q[x]/f(x)$ , а из-за изоморфизма также  $\mathfrak{A}[Q]$ , становится вполне приводимым первого рода. Так как это верно для каждого поля расширения  $Q$ , в частности и для алгебраически замкнутого поля  $\overline{P}$ , тем самым 2b доказано.

2с. Если  $\mathfrak{A}$  вполне приводимо второго рода, то  $\overline{\mathfrak{A}}$  не является вполне приводимым.

Как и в 2b, достаточно считать, что  $\mathfrak{A}$  является полем, а именно конечным полем расширения второго рода над  $P$ . Нужно показать, что в представлении  $\overline{\mathfrak{A}}$  в виде прямой суммы первичных колец возникает по крайней мере одна собственно первичная компонента. Для этого достаточно предъявить ненулевой элемент из  $\overline{\mathfrak{A}}$ , некоторая степень которого обращается в нуль. Действительно, если  $\bar{\beta} \neq 0$ , то хотя бы одна компонента  $\bar{\beta}_i \neq 0$ ; если  $\bar{\beta}^p = 0$ , то  $\bar{\beta}_i^p = 0$  (§2, 2, гомоморфизм из  $\overline{\mathfrak{A}}$  в  $\mathfrak{A}_i$ ), а значит  $\mathfrak{A}_i$  не является полем.

Пусть  $\gamma$  — элемент второго рода из  $\mathfrak{A}$ , экспоненты  $f \geq 1$ ; пусть

$$F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1 \gamma^{(k-1)p^f} + \dots + c_k = 0$$

есть уравнение наименьшей степени, которому  $\gamma$  удовлетворяет относительно  $P$ , где  $p$  обозначает характеристику  $P$ . Тогда элементы

$$e, \gamma, \gamma^2, \dots, \gamma^{kp^f-1}$$

из  $\mathfrak{A}$  линейно независимы относительно  $P$  и поэтому по определению равенства остаются линейно независимыми относительно  $\overline{P}$  также в  $\overline{\mathfrak{A}}$ . Следовательно, если положить

$$G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1} \gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \dots + \sqrt[p]{c_k},$$

то  $G(\gamma)$  является ненулевым элементом из  $\overline{\mathfrak{A}}$ ; поскольку при  $p > 1$  и  $f \geq 1$  число  $kp^{f-1}$  всегда меньше  $kp^f$ , никакой зависимости между степенями  $\gamma$ , входящими в  $G(\gamma)$ , быть не может. Но  $G(\gamma)^p = F(\gamma)$  и потому обращается в нуль; тем самым 2с доказано.

Из 2а и 2с следует, что полная приводимость первого рода  $\overline{\mathfrak{A}}$  влечет полную приводимость первого рода  $\mathfrak{A}$ ; из 2b следует обратное. Тем самым теорема доказана.

3. **Следствие.** Если  $\mathfrak{R}$  вполне приводимо первого рода, то  $\overline{\mathfrak{R}}$  становится прямой суммой колец ранга один, следовательно полей, изоморфных  $\overline{P}$ . Такое разложение на кольца ранга один существует уже в кольце  $\mathfrak{R}[Q]$ , где  $Q$  является конечным полем расширения  $P$ .

Действительно, по 2b кольцо  $\overline{\mathfrak{R}}$  становится прямой суммой полей, которые как конечные расширения подполей, изоморфных  $\overline{P}$ , вследствие алгебраической замкнутости  $\overline{P}$  совпадают с этими подполями. Поэтому получаем

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{P}\bar{e}_1 + \cdots + \overline{P}\bar{e}_n, \quad e = \bar{e}_1 + \cdots + \bar{e}_n;$$

компоненты  $\bar{e}_i$  элемента  $e$  одновременно образуют линейно независимую модульную базу  $\overline{\mathfrak{R}}$ .

Если  $\bar{e}_i$  по §1, 2 представить как линейные комбинации элементов  $\gamma$  из  $\mathfrak{R}$  с коэффициентами из  $\overline{P}$ , то система всех коэффициентов определяет конечное поле расширения  $Q$  поля  $P$ ; следовательно,  $\bar{e}_i$  принадлежат  $\mathfrak{R}[Q]$ , и из свойства модульной базы получается

$$\mathfrak{R}[Q] = Q\bar{e}_1 + \cdots + Q\bar{e}_n.$$

Тем самым уже в  $\mathfrak{R}[Q]$  существует разложение на кольца ранга один, а в каждом промежуточном кольце между  $\mathfrak{R}[Q]$  и  $\mathfrak{R}$  неразложимые компоненты возникают как кольца расширения колец  $Q\bar{e}_i$ .<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Наименьшее такое поле расширения  $Q$  можно охарактеризовать как композит всех полей Галуа, определенных компонентами  $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}e_i$  кольца  $\mathfrak{R}$ . А именно, если  $f_i(x)$  выбрано по 2b так, что  $P[x]/f_i(x)$  соответственно изоморфно компоненте  $\mathfrak{R}_i$ , и если  $Q^{(i)}$  является полем расширения Галуа, лежащим в  $\overline{P}$  и ровно достаточным для разложения  $f_i(x)$  на линейные множители, то  $Q$  есть композит всех  $Q^{(i)}$ . Разложению  $f_i(x)$  на линейные множители соответствует представление  $Q^{(i)}[x]/f_i(x)$  в виде прямой суммы полей ранга один; при этом  $Q^{(i)}$  является наименьшим полем расширения, в котором это происходит. В силу изоморфизма то же верно для  $\mathfrak{R}_i[Q^{(i)}\bar{e}_i]$ , а следовательно для  $\mathfrak{R}[Q]$ .

#### §4. Матричные представления, следы и дискриминанты для колец конечного ранга

В этом и следующем параграфах предположения об основном кольце будут немного более общими, чем раньше, чтобы охватить также порядки в числовых и функциональных полях. Речь идет об общей и единообразной формулировке по существу известных фактов.

*Предположение.* Пусть  $\mathfrak{A}$  является кольцом расширения области целостности  $\mathfrak{Z}$ ; единичный элемент кольца  $\mathfrak{A}$  уже лежит в  $\mathfrak{Z}$ . Для каждого  $\mathfrak{Z}$ -модуля из  $\mathfrak{A}$  – в частности для самого  $\mathfrak{A}$  – существует хотя бы одна конечная модульная база, состоящая из элементов, линейно независимых над  $\mathfrak{Z}$ . Помимо  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ , элементы  $\beta_1, \dots, \beta_s$  тогда и только тогда образуют линейно независимую модульную базу того же  $\mathfrak{Z}$ -модуля, когда определитель преобразования является единицей в  $\mathfrak{Z}$ .

Это предположение, очевидно, выполнено для рассмотренных до сих пор колец конечного ранга, где  $\mathfrak{Z}$  становится полем  $P$ . Оно также выполнено для порядков в числовых и функциональных полях, где  $\mathfrak{Z}$  является соответственно кольцом рациональных целых чисел или функциональной областью.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>См. *Идеальная теория*, §3. Элементы из  $\mathfrak{Z}$  обозначаются латинскими буквами.

1. *Матричные кольца, гомоморфные к  $\mathfrak{A}$* . Пусть  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  – линейно независимая  $\mathfrak{Z}$ -модульная база идеала  $\mathfrak{a}$ , и пусть  $\gamma$  – произвольный элемент из  $\mathfrak{A}$ . Тогда  $\gamma\alpha_i$  также принадлежит  $\mathfrak{a}$ , и имеются равенства с коэффициентами из  $\mathfrak{Z}$ :

$$\gamma\alpha_i = c_{i1}\alpha_1 + \dots + c_{is}\alpha_s, \quad i = 1, \dots, s.$$

Или в матричной форме, если всякий раз  $(\tau_1, \dots, \tau_s)$  означает однострочную матрицу, составленную из этих элементов:

$$(\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \dots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)C.$$

Когда  $\gamma$  пробегает все элементы из  $\mathfrak{A}$ , совокупность матриц  $C$ , сопоставленных посредством базы  $\alpha_i$ , образует гомоморфное кольцо  $R_{\mathfrak{a}}$ ; при этом  $R_{\mathfrak{a}}$  изоморфно кольцу классов вычетов  $\mathfrak{A}/((0) : \mathfrak{a})$ , где  $(0) : \mathfrak{a}$  означает частное нулевого идеала по  $\mathfrak{a}$ . Действительно, разности  $\beta - \gamma$  сопоставляется разность  $B - C$ , и то же верно для произведения, поскольку

$$(\beta\gamma\alpha_1, \dots, \beta\gamma\alpha_s) = (\gamma\alpha_1, \dots, \gamma\alpha_s)B = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CB.$$

Элементом  $c$  из  $\mathfrak{Z}$  в частности сопоставляются диагональные матрицы  $cE$ . Всем и только тем элементам  $\gamma$ , для которых  $\gamma\mathfrak{a}$  равен нулевому идеалу, сопоставляется нулевая матрица.

Другая база  $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$  того же идеала порождает матричное кольцо, изоморфное  $R_{\mathfrak{a}}$ , причем эквивалентное ему:

$$R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P.$$

Действительно, пусть  $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s$  — еще одна линейно независимая  $\mathfrak{Z}$ -модульная база; следовательно,  $(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$ , где определитель матрицы  $P$  является единицей из  $\mathfrak{Z}$ . Тогда

$$\begin{aligned} (\gamma\bar{\alpha}_1, \dots, \gamma\bar{\alpha}_s) &= (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CP \\ &= (\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_s)P^{-1}CP, \end{aligned}$$

то есть  $R_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$ .

**2. Классы идеалов и классы представлений.** Два идеала  $\mathfrak{a}$  и  $\mathfrak{b}$  из  $\mathfrak{A}$  принадлежат одному и тому же классу идеалов, если они изоморфны как  $\mathfrak{A}$ -модули; то есть если их элементы можно взаимно однозначно сопоставить так, чтобы разность и умножение на один и тот же элемент из  $\mathfrak{A}$  соответствовали друг другу. Следовательно, из  $\alpha \simeq \beta$  всегда следует  $\gamma\alpha \simeq \gamma\beta$  для произвольного  $\gamma$  из  $\mathfrak{A}$ .

Два кольца  $R_{\mathfrak{a}}$  и  $R_{\mathfrak{b}}$ , порожденные матричным представлением по 1, принадлежат одному и тому же классу представлений, если они эквивалентны, то есть если существует унимодулярная матрица  $P$  такая, что

$$R_{\mathfrak{b}} = P^{-1}R_{\mathfrak{a}}P$$

выполняется.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Вопрос, решенный в отдельных случаях, можно ли каждое гомоморфное матричное кольцо породить идеалом из  $\mathfrak{A}$  по 1 – возможно, допуская линейно зависимые базы, – здесь не затрагивается. Классы представлений по определению состоят только из матричных колец, порожденных идеалами из  $\mathfrak{A}$  по 1.



Классы идеалов и классы представлений взаимно однозначно соответствуют друг другу. В пункте 1 было показано, что различные модульные базы одного и того же идеала порождают кольца  $R_\alpha, R_{\bar{\alpha}}$ , принадлежащие одному и тому же классу представлений; далее, различные идеалы  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  одного и того же класса идеалов также порождают кольца одного и того же класса представлений. Действительно, пусть  $\beta_1, \dots, \beta_s$  есть база  $\mathfrak{b}$ , поставленная посредством изоморфизма в соответствие базе  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  идеала  $\mathfrak{a}$ . Тогда друг другу соответствуют  $\gamma\alpha_i$  и  $\gamma\beta_i$ , а также  $c_{1i}\alpha_1 + \dots + c_{si}\alpha_s$  и  $c_{1i}\beta_1 + \dots + c_{si}\beta_s$ ; следовательно, кольца  $R_\alpha$  и  $R_\beta$  совпадают.

Обратно, если  $R_\alpha$  и  $R_{\bar{\beta}}$  принадлежат одному и тому же классу представлений, то есть если

$$R_{\bar{\beta}} = P^{-1}R_\alpha P,$$

где  $\alpha_i$  образуют базу  $\mathfrak{a}$ , а  $\bar{\beta}_i$  образуют базу  $\mathfrak{b}$ , то

$$(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_s)P^{-1}$$

также образует базу  $\mathfrak{b}$ , и получается  $R_\beta = PR_{\bar{\beta}}P^{-1} = R_\alpha$ . Если теперь каждому элементу  $a = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$  из  $\mathfrak{a}$  сопоставить элемент  $b = c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$  из  $\mathfrak{b}$ , то это соответствие взаимно однозначно, а сумма и разность сохраняются. Из равенства  $R_\alpha = R_\beta$  далее следует,<sup>26</sup> что  $\gamma\alpha_i$  и  $\gamma\beta_i$  соответствуют друг другу, поскольку они выражаются одними и теми же линейными формами через  $\alpha_i$ , соответственно через  $\beta_i$ ; следовательно, в общем случае соответствуют друг другу  $\gamma a$  и  $\gamma b$ . Поэтому идеалы  $\mathfrak{a}$  и  $\mathfrak{b}$  принадлежат одному и тому же классу идеалов. Главным классом называется класс единичного идеала; следовательно, всякая база  $\mathfrak{A}$  дает в качестве класса представлений главный класс.

<sup>26</sup>Запись устроена так, чтобы она сохранялась для некоммутативных колец  $\mathfrak{A}$ , для которых  $\Sigma$  предполагается коммутирующей со всеми элементами.

**3. След элемента относительно класса.** Пусть  $C$  есть матрица, сопоставленная элементу  $\gamma$  из  $\mathfrak{A}$  в  $R_a$ . Переход от  $R_a$  к эквивалентному кольцу показывает, что детерминант  $|C|$ , а в более общем виде  $|tE - C|$ , где  $t$  означает неопределенную, является инвариантом класса представлений. Следовательно, по пункту 2 это одновременно инвариант класса идеалов, то есть, коротко говоря, классовый инвариант. Поэтому отдельные коэффициенты по  $t$  в  $|tE - C|$  являются классовыми инвариантами; в частности, коэффициент при  $(-t^{s-1})$  будем называть следом  $\gamma$  относительно класса; в обозначениях:

$$S_{(a)}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \cdots + c_{ss}.$$

Свободный от  $t$  коэффициент  $\pm|C|$  будем называть нормой  $\gamma$  относительно класса.

Следы  $S_{(a)}(\gamma)$  относительно фиксированного класса  $(a)$  образуют  $\mathfrak{Z}$ -модуль, в который  $\mathfrak{A}$ , рассматриваемое как  $\mathfrak{Z}$ -модуль, гомоморфно отображается. Действительно, по доказанному в пункте 1 гомоморфизму колец из  $\mathfrak{A}$  в  $R_a$  получается:  $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$  и  $c\beta \sim cEB = cB$ . Отсюда для следов следует:

$$S_{(a)}(\beta - \gamma) = S_{(a)}(\beta) - S_{(a)}(\gamma), \quad S_{(a)}(c\beta) = cS_{(a)}(\beta).$$

Следовательно, получаем модульное свойство и гомоморфизм.

*Замечание.* Если  $\mathfrak{A}$  является кольцом без делителей нуля, то след элемента определяется независимо от класса; значит, можно говорить просто о следе; то же верно для нормы. Ведь когда речь идет о кольцах без делителей нуля, всякий идеал, отличный от нулевого идеала, имеет ранг кольца; поэтому всякая база идеала одновременно является базой единичного идеала в поле частных. Все следы и нормы тем самым одновременно порождаются в поле частных единичным идеалом и потому не зависят от класса в  $\mathfrak{A}$ .

**4. Дискриминант идеала относительно класса.** Инвариантом идеала и класса оказывается не сам дискриминант, а лишь выведенный из него в  $\mathfrak{Z}$  главный идеал.

Действительно, пусть  $\omega_1, \dots, \omega_s$  и  $\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_s$  — две линейно независимые  $\mathfrak{Z}$ -модульные базы идеала  $\mathfrak{t}$  из  $\mathfrak{A}$ . Детерминанты

$$|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)|, \quad |S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)|$$

отличаются только квадратом единицы из  $\mathfrak{Z}$  в качестве множителя. Это действительно верно для двух детерминантов  $|(\omega_i \omega_j)|$  и  $|(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)|$ , которые отличаются квадратом определителя преобразования между  $\omega$  и  $\bar{\omega}$ . Благодаря модульному гомоморфизму, доказанному в пункте 3, между  $S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)$  и  $S_{(\mathfrak{a})}(\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j)$  имеются те же линейные соотношения, что и между  $\omega_i \omega_j$  и  $\bar{\omega}_i \bar{\omega}_j$ ; следовательно, вследствие когredientного преобразования детерминант принимает тот же множитель.

Дискриминантом  $\mathfrak{t}$  относительно класса  $(\mathfrak{a})$ , определенным с точностью до квадрата единицы, называется каждый детерминант  $|S_{(\mathfrak{a})}(\omega_i \omega_j)|$ ; дискриминантным идеалом — выведенный из него в  $\mathfrak{Z}$  главный идеал.

*Замечание.* Если  $\mathfrak{A}$  является кольцом без делителей нуля, то дискриминант идеала не зависит от положенного в основу класса. Действительно, по пункту 3 эта независимость выполнена для каждого отдельного элемента детерминанта.

## §5. Прямые суммы классов

**1. Прямая сумма класса идеалов или класса представлений.** Если идеал  $\mathfrak{a}$  является прямой суммой,  $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$ , то из изоморфизма следует, что каждый идеал этого класса также становится прямой суммой,  $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$ . При этом соответственно  $\bar{\mathfrak{b}}$  изоморфен  $\mathfrak{b}$ , а  $\bar{\mathfrak{c}} = \mathfrak{c}$ , если идеалы рассматривать как  $\mathfrak{A}$ -модули; следовательно, можно говорить о прямой сумме класса идеалов и о компонентных классах.

Если кольцо  $R_{\mathfrak{a}}$  некоторого класса представлений является прямой суммой подколец, которые одновременно являются идеалами в  $R_{\mathfrak{a}}$ , то благодаря изоморфизму то же верно для каждого кольца  $R_{\mathfrak{b}}$  этого класса представлений, причем компоненты становятся эквивалентными кольцами. Следовательно, можно говорить о прямой сумме класса представлений и о компонентных классах.

Прямой сумме класса идеалов соответствует прямая сумма класса представлений; именно в этом смысле будем говорить о прямой сумме класса.<sup>27</sup> Пусть  $\beta_1, \dots, \beta_m$  есть база  $\mathfrak{b}$ , а  $\gamma_1, \dots, \gamma_n$  — база  $\mathfrak{c}$ ; так как сумма прямая,  $\beta$  и  $\gamma$  вместе образуют линейно независимую базу  $\mathfrak{a}$ . Если  $R_{\mathfrak{a}}$  есть матричное кольцо, порожденное посредством этой базы, то матрица из  $R_{\mathfrak{a}}$ , сопоставленная произвольному элементу  $\delta$  из  $\mathfrak{A}$ , имеет вид

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix}.$$

Поэтому определим  $R^{\mathfrak{b}}$  как систему всех матриц

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

и соответственно определим  $R^{\mathfrak{c}}$ . Нужно показать, что  $R^{\mathfrak{b}}$  и  $R^{\mathfrak{c}}$  образуют подкольца в  $R_{\mathfrak{a}}$  и что  $R_{\mathfrak{a}}$  является их прямой суммой; одновременно  $R^{\mathfrak{b}}$  и  $R^{\mathfrak{c}}$  становятся изоморфными кольцам  $R_{\mathfrak{b}}$  и  $R_{\mathfrak{c}}$ , порожденным соответственно из  $\mathfrak{b}$  и  $\mathfrak{c}$ .

Действительно, через гомоморфизм  $R^{\mathfrak{b}}$  соответствует всем таким элементам  $\delta$  из  $\mathfrak{A}$ , для которых  $\delta\mathfrak{c}$  обращается в нуль, то есть которые принадлежат частному нулевого идеала по  $\mathfrak{c}$ ,  $(0) : \mathfrak{c}$ ; благодаря гомоморфизму  $R^{\mathfrak{b}}$  тем самым является идеалом в  $R_{\mathfrak{a}}$ , и то же верно для  $R^{\mathfrak{c}}$ . Кольцо  $R_{\mathfrak{a}}$  является суммой этих идеалов, причем прямой суммой, потому что произведение  $R^{\mathfrak{b}}R^{\mathfrak{c}}$  двух колец обращается в нуль. Наконец, соответствие, которое матрице  $D^{\mathfrak{b}}$  ставит в соответствие матрицу из  $R^{\mathfrak{b}}$ , содержащую  $D^{\mathfrak{b}}$  и нули, дает изоморфизм между  $R^{\mathfrak{b}}$  и  $R_{\mathfrak{b}}$ ; в этом смысле компонентным классам  $(\mathfrak{b})$  и  $(\mathfrak{c})$  класса идеалов  $\mathfrak{a}$  соответствуют компонентные классы кольца  $R_{\mathfrak{a}}$ .

<sup>27</sup>Вопрос, в какой мере все прямые суммы классов представлений могут быть порождены прямыми суммами классов идеалов, здесь снова не рассматривается.

**2. Поведение следа и дискриминанта при прямой сумме классов.** Пусть  $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$ . Если для определения следа  $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$  положить в основу блочную матрицу

$$\begin{pmatrix} D^{\mathfrak{b}} & 0 \\ 0 & D^{\mathfrak{c}} \end{pmatrix},$$

то с учетом пункта 1 непосредственно читаем: след элемента, взятый относительно класса, равен сумме следов, взятых относительно компонентных классов.

Ввиду обращения произведения  $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$  в нуль далее получаем: если  $\beta$  есть элемент из  $\mathfrak{b}$ , то

$$S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta);$$

след  $\beta$ , взятый относительно класса  $(\mathfrak{a})$ , равен следу, взятому относительно класса  $(\mathfrak{b})$ .

Отсюда, с учетом §4, 4, далее следует: дискриминантный идеал компонентного идеала  $\mathfrak{b}$ , взятый относительно класса  $(\mathfrak{a})$ , равен дискриминантному идеалу  $\mathfrak{b}$ , взятому относительно компонентного класса  $(\mathfrak{b})$ .

И наконец получаем: дискриминантный идеал  $\mathfrak{a}$ , взятый относительно класса  $(\mathfrak{a})$ , равен произведению дискриминантных идеалов компонент, взятых относительно компонентных классов. Действительно, если и для построения дискриминанта, и для построения следа положить в основу базу  $\beta, \gamma$ , соответствующую прямой сумме, то база дискриминантного идеала  $\mathfrak{a}$ , взятого относительно  $(\mathfrak{a})$ , задается через

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i \beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu \gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i \beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu \gamma_\nu) \end{vmatrix}, \quad \begin{matrix} i, k = 1, \dots, l, \\ \mu, \nu = 1, \dots, m. \end{matrix}$$

**3. Переход к кольцам расширения.** Пусть  $\mathfrak{X}$  является кольцом расширения кольца  $\mathfrak{Z}$  и не имеет делителей нуля, причем пересечение  $[\mathfrak{A}, \mathfrak{X}]$  равно  $\mathfrak{Z}$ ; пусть кольцо расширения  $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\mathfrak{X}]$ , возникшее присоединением  $\mathfrak{X}$ , определено, как в § 1, 2, как кольцо того же ранга.

Если  $\mathfrak{a}$  и  $\mathfrak{t}$  являются идеалами в  $\mathfrak{A}$ , а  $\overline{\mathfrak{a}}$  и  $\overline{\mathfrak{t}}$  — их идеалами расширения в  $\overline{\mathfrak{A}}$ , то дискриминантный идеал  $\overline{\mathfrak{t}}$ , взятый относительно  $(\overline{\mathfrak{a}})$ , также является идеалом расширения в  $\mathfrak{X}$  того дискриминантного идеала  $\mathfrak{t}$ , который взят относительно  $(\mathfrak{a})$ . Ведь всякая база  $\mathfrak{a}$  или  $\mathfrak{t}$  является также  $\mathfrak{X}$ -модульной базой  $\overline{\mathfrak{a}}$  или  $\overline{\mathfrak{t}}$ ; поэтому для построения дискриминанта  $\overline{\mathfrak{t}}$  относительно  $(\overline{\mathfrak{a}})$  можно положить в основу базу  $\mathfrak{a}$  и  $\mathfrak{t}$ .

В частности, дискриминантный идеал  $\overline{\mathfrak{A}}$  относительно главного класса  $(\overline{\mathfrak{A}})$  является идеалом расширения того дискриминантного идеала  $\mathfrak{A}$ , который взят относительно главного класса  $(\mathfrak{A})$ ; этот так определенный идеал в  $\mathfrak{Z}$ , соответственно в  $\mathfrak{X}$ , будем кратко называть дискриминантным идеалом кольца.

## § 6. Дискриминантный критерий полной приводимости первого рода

С этого момента снова предполагается, что  $\mathfrak{A}$  является кольцом расширения поля  $P$ , а  $\overline{P}$  является полем расширения  $P$ . Необходимым и достаточным условием полной приводимости первого рода окажется ненулевость дискриминанта. По § 5, 3 дискриминантный идеал  $\mathfrak{A}$  можно определить посредством кольца расширения  $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$ ; причем, по § 5, 2, достаточно ограничиться первичными кольцами, из которых  $\overline{\mathfrak{A}}$  аддитивно составлено. Поэтому прежде всего следует рассмотреть дискриминантные идеалы первичных колец.



**1. Специальные  $P$ -модульные базисы.** Пусть  $\mathfrak{a}$  и  $\mathfrak{t}$  являются идеалами из  $\mathfrak{A}$ , и пусть  $\mathfrak{a}$  делится на  $\mathfrak{t}$ . Тогда всякий базис  $a_1, \dots, a_s$  идеала  $\mathfrak{a}$  можно, добавив элементы  $\tau_{s+1}, \dots, \tau_t$ , дополнить до линейно независимого  $P$ -модульного базиса идеала  $\mathfrak{t}$ .<sup>27</sup> Это является непосредственным следствием предполагаемого конечного ранга относительно поля  $P$ .

Пусть теперь  $\mathfrak{A}$  предполагается первичным кольцом; пусть  $\mathfrak{p}$  – простой идеал, ассоциированный с нулевым идеалом, а  $\rho$  – его показатель, то есть  $\mathfrak{p}^\rho = (0)$  и  $\mathfrak{p}^{\rho-1} \neq (0)$ . Тогда специальный  $P$ -модульный базис  $\mathfrak{A}$  получается так: последовательно дополняют базис  $\mathfrak{p}^{\rho-1}$  до базиса  $\mathfrak{p}^{\rho-2}$  и, вообще, базис  $\mathfrak{p}^i$  до базиса  $\mathfrak{p}^{i-1}$ , причем  $\mathfrak{A}$  считается как  $\mathfrak{p}^0$ . С помощью такого базиса можно показать: если  $\mathfrak{A}$  является первичным кольцом, то след, взятый относительно главного класса (§ 4, 2), всякого элемента, делящегося на соответствующий простой идеал  $\mathfrak{p}$ , равен нулю. Действительно, пусть

$$\pi_{0,1}, \dots, \pi_{0,i_0}; \quad \pi_{1,1}, \dots, \pi_{1,i_1}; \quad \dots; \quad \pi_{\rho-1,1}, \dots, \pi_{\rho-1,i_{\rho-1}}$$

есть такой специальный  $P$ -модульный базис с

$$\pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^\lambda}, \quad \pi_{\lambda,j} \not\equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}.$$

Из  $\pi \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$  следует  $\pi \pi_{\lambda,j} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda+1}}$ ; следовательно, матрица, соответствующая  $\pi$  по этому базису, имеет на диагонали только нули, и след  $\pi$  равен нулю.

---

<sup>27</sup>Матричное представление произвольного элемента  $\gamma$ , задаваемое этим базисом, тогда имеет вид  $\begin{pmatrix} C_a & 0 \\ C_1 & C_2 \end{pmatrix}$ ; и обратно, из такого матричного представления, заданного через  $\mathfrak{t}$ , следует существование идеала  $\mathfrak{a}$ , кратного  $\mathfrak{t}$ . Так как при полной приводимости неразложимые компоненты не имеют идеала, отличного от нулевого и единичного, в классе представления этих компонентных идеалов такое представление не может появиться. Если добавить данную в § 5, 1 связь между прямой суммой классов, то получается обычное в литературе определение полной приводимости.

**2. Дискриминантные идеалы первичных колец с алгебраически замкнутым подкольцом  $P$ .**

Если нулевой идеал кольца  $\mathfrak{A}$  является простым идеалом, а  $P$  алгебраически замкнуто, то  $\mathfrak{A}$  имеет ранг один, следовательно совпадает с  $P$  (§ 3, 3); единичный элемент  $e$  можно взять в качестве модульного базиса. Поэтому получаем

$$S_{(\mathfrak{A})}(e^2) = S_{(\mathfrak{A})}(e) = e,$$

и дискриминантный идеал равен единичному идеалу.

Далее можно показать, что дискриминантный идеал собственно первичного кольца с алгебраически замкнутым подкольцом  $P$  равен нулевому идеалу. Если для  $\mathfrak{A}$  положить в основу специальный модульный базис, данный в пункте 1, или лишь дополнить произвольный базис  $\mathfrak{p}$  до базиса  $\mathfrak{A}$ , то  $i_0$  равно единице, поскольку факторкольцо  $\mathfrak{A}/\mathfrak{p}$  становится кольцом ранга один; в качестве  $\pi_{0,1}$  можно, например, взять единичный элемент  $e$ . Тогда все базисные произведения, отличные от  $e^2$ , делятся на  $\mathfrak{p}$ , и их след, взятый относительно главного класса, равен нулю. Следовательно, равен нулю и дискриминант как определитель порядка не менее двух, поскольку  $\mathfrak{A}$  предполагалось собственно первичным и потому должно иметь по меньшей мере один базисный элемент, отличный от  $e$ ; в этом определителе все элементы, отличные от  $S_{(\mathfrak{A})}(e^2)$ , равны нулю.

**3. Теорема.** *Кольцо  $\mathfrak{A}$  конечного ранга относительно подполя  $P$  является вполне приводимым первого рода тогда и только тогда, когда его дискриминантный идеал является единичным идеалом в  $P$ ; другими словами, когда дискриминант, определенный с точностью до квадрата единицы, отличен от нуля.*

Полная приводимость первого рода по § 3, 2 равносильна тому, что кольцо расширения  $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}[\overline{P}]$  является вполне приводимым, то есть его неразложимые компоненты становятся полями, изоморфными  $\overline{P}$ . По § 5, 3 дискриминантный идеал  $\mathfrak{A}$ , а одновременно и  $\overline{\mathfrak{A}}$ , является нулевым или единичным идеалом; а по § 5, 2 дискриминантный идеал  $\overline{\mathfrak{A}}$  является произведением дискриминантных идеалов компонент, взятых относительно этих компонент. Эти отдельные дискриминантные идеалы возникают из рассмотренных в пункте 2, где компоненты выступают как кольца сами по себе, а не как идеалы  $\overline{\mathfrak{A}}$ , если каждый раз поле  $P_i = \overline{P}e_i$ , изоморфное  $\overline{P}$ , заменить самим  $\overline{P}$ . Отсюда следует, что при полной приводимости  $\overline{\mathfrak{A}}$  дискриминантный идеал как произведение единичных идеалов сам является единичным идеалом; напротив, если  $\overline{\mathfrak{A}}$  не является вполне приводимым, то по меньшей мере для одной компоненты дискриминантный идеал равен нулевому идеалу, откуда и для дискриминантного идеала  $\overline{\mathfrak{A}}$  получается нулевой идеал. Тем самым теорема доказана.

4. *Представление следа, нормы и дискриминанта посредством сопряженных элементов в случае полной приводимости первого рода.* Пусть по § 3, 3 при полной приводимости первого рода

$$\mathfrak{A}[Q] = Qe_1 + \cdots + Qe_n$$

имеется представление в виде прямой суммы колец ранга один, то есть полей, изоморфных  $Q$ , и пусть  $Q$  является наименьшим полем расширения, в котором такое представление возможно. Пусть  $n$  компонент кольца  $\mathfrak{A}$  заданы как  $K_i e_i$ , где каждое  $K_i$  является подполем  $Q$  и  $\mathfrak{A}$  гомоморфно отображается в  $K_i$ ; нужно выразить след, норму и дискриминант (относительно главного класса) через элементы из  $K_i$ .

Если взять  $e_1, \dots, e_n$  в качестве модульной базы, то каждому элементу

$$\gamma = c_1 e_1 + \dots + c_n e_n$$

ставится в соответствие диагональная матрица с диагональю  $c_1, \dots, c_n$ ; при этом, если  $\gamma$  принадлежит  $\mathfrak{K}$ , то  $c_i$  лежит в  $K_i$ . Следовательно,

$$S(\gamma) = c_1 + \dots + c_n, \quad N(\gamma) = c_1 \dots c_n,$$

где под  $S(\gamma)$  понимается след, а под  $N(\gamma)$  норма относительно главного класса. Пусть далее  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  — модульная база  $\mathfrak{K}$ , состоящая из элементов  $\mathfrak{K}$ ; тогда дискриминант  $|S(\alpha_i \alpha_j)|$  нужно выразить через элементы из всех  $K_k$ . Если

$$\alpha_j = \alpha_j^{(1)} e_1 + \dots + \alpha_j^{(n)} e_n,$$

то получается

$$|S(\alpha_i \alpha_j)| = \left| \sum_{k=1}^n \alpha_i^{(k)} \alpha_j^{(k)} \right| = \left| \alpha_i^{(k)} \right|^2.$$

То есть дискриминант представляется как квадрат определителя сопряженных базисных элементов. В частности, если  $\mathfrak{K}$  само является полем, то есть полем расширения первого рода подполя  $P$ , то гомоморфизмы из  $\mathfrak{K}$  в  $K_i$  переходят в изоморфизмы; при этом элементы из  $P$  соответствуют самим себе, поскольку компонента  $P$  задана как  $P e_i$ . Поэтому  $K_i$ , так как все они лежат в общем объемлющем поле  $Q$ , являются сопряженными относительно  $P$  полями; причем эти  $n$  изоморфизмов попарно различны, как показывает приведенное выше детерминантное представление ненулевого дискриминанта. Если  $\mathfrak{K}$  является полем, то представление в виде прямой суммы в  $K_1, \dots, K_n$  дает  $n$  сопряженных полей расширения  $n$ -й степени над  $P$ , лежащих в поле расширения Галуа и изоморфных  $\mathfrak{K}$ . Тогда представление следа, нормы и дискриминанта переходит в известное представление посредством сопряженных элементов. Следует еще раз подчеркнуть, что  $\mathfrak{K}$  предполагается только как поле, эквивалентное  $K_i$ , а не как поле, само уже лежащее в поле расширения Галуа  $Q$ .

## §7. Теорема о дискриминанте для порядков алгебраического числового поля или функционального поля

1. Рассматриваемые числовые и функциональные поля – причем для алгебраических функций от более чем одной неопределенной и для целых алгебраических функций речь идет о расширении функциональной области – все подчиняются следующему типу поля с фиксированным понятием целых элементов. Пусть  $\mathfrak{o}$  – кольцо главных идеалов без делителей нуля и с единицей (кольцо целых рациональных чисел, область многочленов от одной неопределенной с коэффициентами из поля, функциональная область), а  $\Omega$  – его поле частных. Пусть  $K$  – конечное расширение первого рода поля  $\Omega$ , а  $\mathfrak{O}$  – кольцо всех элементов из  $K$ , целых относительно  $\mathfrak{o}$ . Всякое подкольцо  $\mathfrak{O}$ , содержащее  $\mathfrak{o}$ , называется порядком; само  $\mathfrak{O}$  называется главным порядком.

Всякий  $\mathfrak{o}$ -модуль в  $\mathfrak{O}$ , в частности все идеалы порядка и сам порядок, имеет линейно независимую модульную базу относительно  $\mathfrak{o}$ . Если  $K$  имеет степень  $n$  над  $\Omega$ , то достаточно ограничиться порядками ранга  $n$  относительно  $\mathfrak{o}$ , поскольку всякий порядок меньшего ранга посредством образования частных порождает промежуточное поле между  $K$  и  $\Omega$  именно этой степени, и для него все предположения сохраняются. Следовательно, всякий порядок  $\mathfrak{T}$  является кольцом, для которого выполняются предположения §4 и §5, а именно кольцом без делителей нуля; поэтому дискриминант  $D_{\mathfrak{T}}$  порядка однозначно определен с точностью до множителя, являющегося квадратом единицы из  $\mathfrak{o}$ . Этот дискриминант одновременно, с точностью до множителя-единицы из  $\Omega$ , совпадает с дискриминантом поля  $K$ , рассматриваемого как  $\Omega$ -модуль, и потому отличен от нуля, так как  $K$  предполагалось расширением первого рода (§6, 3). Дискриминант одновременно допускает данное в §6, 4 представление через квадрат определителя сопряженных базисных элементов.



Теория идеалов в  $\mathfrak{I}$  задается следующей теоремой:<sup>29</sup> в  $\mathfrak{I}$  каждый идеал, отличный от нулевого идеала, единственным образом представляется как произведение конечного числа попарно взаимно простых первичных идеалов, чьи соответствующие простые идеалы не имеют собственного делителя, отличного от единичного идеала.

---

<sup>29</sup>Idealtheorie, §7, 3.

2. *Переход от порядка к кольцам конечного ранга относительно поля.* Пусть  $p$  – простой элемент из  $\mathfrak{o}$ , то есть главный идеал  $\mathfrak{o}p$ , выведенный из  $p$  в  $\mathfrak{o}$ , является простым идеалом из  $\mathfrak{o}$ , отличным от нулевого и единичного идеалов; соответственно обозначим через  $\mathfrak{T}p$  главный идеал, выведенный из  $p$  в  $\mathfrak{T}$ . Кольцо классов вычетов

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$$

становится кольцом ранга  $n$  относительно подполя  $P$ , изоморфного полю  $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ ; порядок  $\mathfrak{T}$  гомоморфно отображается на  $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ . Это гомоморфное отображение является обычным переходом к кольцу классов вычетов.

То, что  $\mathfrak{R}$  содержит подполе, изоморфное  $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ , следует из второй теоремы об изоморфизме: подкольцо  $(\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$  изоморфно  $\mathfrak{o}/[\mathfrak{o}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$ . Пусть  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  является линейно независимым модульным базисом  $\mathfrak{T}$  относительно  $\mathfrak{o}$ , и пусть  $(\alpha_i)$  – классы вычетов по  $\mathfrak{T}p$ , определенные элементами  $\alpha_i$ . Всякая линейная зависимость между  $(\alpha_i)$  относительно  $P$  возникла бы из конгруэнции

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p},$$

а значит, из равенства  $c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n = py$  с  $y \in \mathfrak{T}$ . Из представимости  $y$  через базис  $\alpha_i$  и единственности такого представления следует, что каждое  $c_i$  делится на  $p$ ; тем самым элемент  $(c_i)$  из  $P$  обращается в нуль. Следовательно,  $(\alpha_i)$  образуют базис  $\mathfrak{R}$  над  $P$ .

При гомоморфизме дискриминант  $D_{\mathfrak{T}}$  порядка  $\mathfrak{T}$  переходит в дискриминант  $\mathfrak{R}$ , а разложение идеала  $\mathfrak{T}p$  – в разложение нулевого идеала  $\mathfrak{R}$ . Действительно, в силу только что доказанной линейной независимости  $(\alpha_i)$  дискриминант  $\mathfrak{R}$  можно построить по этому базису как  $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$ ; следовательно, при гомоморфизме он возникает из дискриминанта  $|S(\alpha_i \alpha_k)|$  порядка  $\mathfrak{T}$ , построенного по базису  $\alpha_i$ . При определении следа здесь положено в основу матричное представление, а не представление через сопряженные элементы, справедливое для  $\mathfrak{T}$ , но не обязательно для  $\mathfrak{R}$ ; поэтому след, а вместе с ним и дискриминант, возникает через кольцевые операции из элементов кольца.

Если

$$\mathfrak{T}p = q_1 \cdots q_s = [q_1, \dots, q_s]$$

есть представление  $\mathfrak{T}p$  в  $\mathfrak{T}$ , то при гомоморфизме оно переходит в

$$(0) = [(q_1), \dots, (q_s)]$$

в  $\mathfrak{R}$ . По первой теореме об изоморфизме  $\mathfrak{R}/(q_i)$  изоморфно  $\mathfrak{T}/q_i$ ; следовательно,  $q_i$  и  $(q_i)$  одновременно являются собственно первичными идеалами или простыми идеалами, и в силу гомоморфизма  $(q_i)$  попарно взаимно просты.

**3. Теорема о дискриминанте.** *Простой элемент  $p$  из  $\mathfrak{o}$  входит в дискриминант  $D_{\mathfrak{T}}$  порядка  $\mathfrak{T}$  тогда и только тогда, когда в разложении главного идеала  $\mathfrak{T}p$  на попарно взаимно простые первичные компоненты из  $\mathfrak{T}$  появляется по крайней мере одна собственно первичная компонента или по крайней мере один простой идеал второго рода.*<sup>29</sup>

<sup>29</sup>Пример появления простых идеалов второго рода таков: пусть  $\mathfrak{o}$  будет функциональной областью, выведенной из всех многочленов по  $x$  с целыми рациональными коэффициентами,  $\Omega$  – ее полем частных, а  $K$  – полем расширения, возникающим присоединением  $\sqrt{x}$ . Рассматривается порядок  $\mathfrak{T}$  с модульным базисом  $1, \sqrt{x}$  относительно  $\mathfrak{o}$ ; как показывает подстановка  $x = y^2$ , речь идет о главном порядке. Дискриминант равен  $\begin{vmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{vmatrix}^2 = 2^2x$ . Главный идеал  $\mathfrak{T}2$  остается простым идеалом в  $\mathfrak{T}$ , но второго рода. Действительно, порядок  $\mathfrak{T}$  в силу модульного базиса  $1, \sqrt{x}$  изоморфен кольцу классов вычетов  $F[t]/(t^2 - x)$ , где  $t$  означает новую неопределенную; тем самым  $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$  изоморфно  $P[t]/(t^2 - x)$ , где  $P$  означает поле всех рациональных функций от  $x$  и от неопределенной  $t$ , встречающейся в функциональной области, с коэффициентами по модулю 2. Так как  $t^2 - x$  является неприводимым многочленом в  $P[t]$ , причем неприводимым многочленом второго рода,  $\mathfrak{R}$  становится полем, а именно полем расширения второго рода над  $P$ ; значит,  $\mathfrak{T}2$  становится простым идеалом второго рода. Напротив,  $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$  является собственно первичным. То, что  $\mathfrak{R}$  порождается над  $P$  присоединением одного элемента, вообще говоря, неверно: достаточно заменить одну неопределенную  $x$  на  $x$  и  $y$ , чтобы в порядке, выведенном из  $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$ , который снова является главным порядком, распознать главный идеал  $\mathfrak{T}2$  как простой идеал второго рода, для которого  $\mathfrak{R}$  порождается над  $P$  только после присоединения двух элементов; ср. о примерах Ostrowski, а. а. О.

Если поле классов вычетов  $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$  является совершенным полем, то каждый простой элемент  $p$ , входящий в  $D_{\mathfrak{T}}$ , и только такой элемент имеет по крайней мере одну собственно первичную компоненту. Если  $\mathfrak{o}/\mathfrak{o}p$  совершенно и для  $\mathfrak{T}$  выбран главный порядок  $\mathfrak{O}$ , то  $p$  входит в дискриминант тогда и только тогда, когда  $p$  делится по крайней мере на квадрат простого идеала из  $\mathfrak{O}$ .

Действительно, из-за соответствия между разложением идеала  $\mathfrak{T}p$  в  $\mathfrak{T}$  и разложением нулевого идеала в  $\mathfrak{K} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$  появление собственно первичной компоненты или простого идеала второго рода в  $\mathfrak{T}p$  означает, что  $\mathfrak{K}$  не является вполне приводимым первого рода. А по §6, 3 это имеет место тогда и только тогда, когда дискриминант  $\mathfrak{K}$  обращается в нуль; ввиду гомоморфизма из пункта 2 это как раз выражает делимость  $D_{\mathfrak{T}}$  на  $p$ .

## §8. Теорема о дискриминанте для порядков относительных полей

Если вместо кольца главных идеалов  $\mathfrak{o}$  уже взять в качестве исходного кольца главный порядок числового или функционального поля — более общо, мультипликативное кольцо<sup>30</sup>, то есть кольцо, в котором действует теория идеалов главного порядка, — то на место дискриминанта  $D_{\mathfrak{T}}$  становится дискриминантный идеал порядка  $\mathfrak{T}$  относительно  $\mathfrak{o}$ ;<sup>31</sup> теорема о дискриминанте полностью переносится посредством следующих соображений.

1. Пусть  $\mathfrak{o}$  — мультипликативное кольцо, то есть кольцо без делителей нуля и с единицей, в котором каждый идеал, отличный от нулевого и единичного, однозначно представляется как произведение степеней простых идеалов, и где эти простые идеалы не имеют собственного делителя, отличного от единичного идеала.<sup>32</sup> Пусть далее  $\Omega, K, \mathfrak{O}, \mathfrak{T}$  определены как в §7, 1; тогда в  $\mathfrak{T}$  действует указанная там теория идеалов.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Краткое название “мультипликативное кольцо” я беру из заметки W. Krull: *Über Multiplikationsringe*. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, Nr. 3. Впрочем, Krull называет встречающиеся здесь кольца без делителей нуля “регулярными мультипликативными кольцами”.

<sup>31</sup>В литературе в случае “относительных числовых полей” выступает только дискриминантный идеал главного порядка, “относительный дискриминант”. Ср. Hilbert, *Zahlbericht*, §14, и Hecke, *Theorie der algebraischen Zahlen*, §38.

<sup>32</sup>Об аксиоматике мультипликативных колец ср. *Idealtheorie*, например введение.

<sup>33</sup>*Idealtheorie*, §3, 2 и §7, 3.

В частности, если мультипликативное кольцо  $\mathfrak{o}$  имеет только один простой идеал, отличный от нулевого и единичного идеалов, то  $\mathfrak{o}$  является кольцом главных идеалов. В самом деле, если выбрать элемент  $p$ , главный идеал которого делится ровно на первую степень этого простого идеала, то  $p$  порождает сам этот простой идеал; тогда из представления в виде произведения степеней следует, что и все остальные идеалы являются главными.

2. *След и дискриминантный идеал.* След каждого элемента  $\gamma$  из  $\mathfrak{T}$  определяется как след  $\gamma$  в  $K$ , где  $K$  рассматривается как  $\Omega$ -модуль. Любую систему из  $n$  линейно независимых над  $\Omega$  элементов из  $K$  можно выбрать в качестве базиса для построения следа. Если  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  является такой системой, то, поскольку  $K$  предполагается расширением первого рода,

$$|S(\alpha_i \alpha_j)|$$

является ненулевым элементом из  $\Omega$ , а именно квадратом определителя сопряженных базисных элементов (§6, 4). Из целой замкнутости  $\mathfrak{o}$  в  $\Omega$ <sup>34</sup> следует, что этот определитель является элементом из  $\mathfrak{o}$ , как только все  $\alpha_i$  принадлежат  $\mathfrak{O}$ .

---

<sup>34</sup>*Idealtheorie*, §9, 7.



*Дискриминантный идеал.* Пусть  $\tau_1, \dots, \tau_n$  пробегают все системы из  $n$  элементов из  $\mathfrak{T}$ ; для каждой такой системы образуется определитель  $|S(\tau_i \tau_j)|$ . Следовательно, он является элементом из  $\mathfrak{o}$ , причем ненулевым, как только  $\tau_1, \dots, \tau_n$  линейно независимы. Идеал в  $\mathfrak{o}$ , выведенный из совокупности этих определителей, называется дискриминантным идеалом порядка  $\mathfrak{T}$  относительно  $\mathfrak{o}$ ; следовательно, он отличен от нулевого идеала.

Пусть далее  $\beta_1, \dots, \beta_m$  при  $m \geq n$  является (всегда существующим)<sup>35</sup>  $\mathfrak{o}$ -модульным базисом  $\mathfrak{T}$ . Тогда конечное число определителей, соответствующих выбору любых  $n$  элементов среди  $\beta_1, \dots, \beta_m$ , образует базис этого дискриминантного идеала. Это следует из модульной гомоморфности от  $\mathfrak{T}$  к системе следов из  $\mathfrak{T}$  (§4, 3). Действительно, определители, образованные из произведений  $\tau_i \tau_j$ , линейно выражаются с коэффициентами из  $\mathfrak{o}$  через конечное число определителей  $|S(\beta_i \beta_j)|$ , соответствующих  $n$  элементам  $\beta$ ; поэтому то же верно для  $|S(\tau_i \tau_j)|$  относительно  $|S(\beta_i \beta_j)|$ . Если, в частности, порядок имеет линейно независимый модульный базис  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ , то определитель  $|S(\alpha_i \alpha_j)|$  можно взять как базис дискриминантного идеала; определение совпадает с определением в §7, 1.

---

<sup>35</sup>*Idealtheorie*, §9 и §3, 1.

3. *Переход к кольцу частных.*<sup>36</sup> Пусть  $\mathfrak{a}$  – произвольный идеал из  $\mathfrak{o}$ . Кольцо частных  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$  определяется как совокупность элементов поля частных  $\mathfrak{T}$ , имеющих в знаменателе элемент из  $\mathfrak{T}$ , простой к  $\mathfrak{a}$ .<sup>37</sup> Помимо нулевого и единичного идеалов, кольцо  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$  не имеет других простых идеалов, кроме идеалов расширения простых идеалов, принадлежащих  $\mathfrak{a}$ . Существует взаимно однозначное соответствие и изоморфизм колец классов вычетов между всеми идеалами из  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{a}}$ , отличными от нулевого и единичного, и теми идеалами из  $\mathfrak{T}$ , чьи соответствующие простые идеалы содержатся среди простых идеалов, принадлежащих  $\mathfrak{a}$ ; кроме того, нулевой и единичный идеалы взаимно однозначно соответствуют друг другу.

---

<sup>36</sup> Доказательства всех утверждений, приведенных в этом пункте, см. у Н. Grell (в работе, цитированной в примечании 6, с. 83).

<sup>37</sup> Так как простые идеалы из  $\mathfrak{T}$  не имеют собственных делителей, отличных от единичного идеала, здесь "простой к" совпадает с "взаимно простой" – в смысле идеалов.

Те же рассуждения применимы и к мультипликативному кольцу  $\mathfrak{o}$ . В частности, если  $\mathfrak{p}$  – простой идеал, то  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$  имеет только один простой идеал, отличный от нулевого и единичного идеалов; благодаря изоморфизму колец классов вычетов кольцо  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ , как и  $\mathfrak{o}$ , является мультипликативным кольцом, а по пункту 1 поэтому  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$  является кольцом главных идеалов. Элемент, порождающий простой идеал, выведенный из  $\mathfrak{p}$ , становится простым элементом  $p$  из  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ . Идеал расширения произвольного идеала  $\mathfrak{c}$  из  $\mathfrak{o}$  порождается первичной компонентой  $\mathfrak{c}$ , принадлежащей  $\mathfrak{p}$ ; значит, он равен  $(p)^{\alpha}$  или единичному идеалу в зависимости от того, входит ли  $\mathfrak{p}$  в  $\mathfrak{c}$  – именно в  $\alpha$ -й степени – или не входит в  $\mathfrak{c}$ . Отсюда еще следует: если расширения двух идеалов  $\mathfrak{b}$  и  $\mathfrak{c}$  из  $\mathfrak{o}$  совпадают во всех кольцах частных  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ , то  $\mathfrak{b}$  и  $\mathfrak{c}$  тождественны, поскольку они делятся одними и теми же простыми идеалами  $\mathfrak{p}$  и в одинаковых степенях.

4. *Дискриминантный идеал при переходе к кольцу частных.* Пусть  $\mathfrak{p}$  – простой идеал из  $\mathfrak{o}$ , и обозначим через  $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$  идеал расширения в  $\mathfrak{T}$ . Кольцо частных  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$  обладает модульным базисом из линейно независимых элементов относительно кольца главных идеалов  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ ; одновременно  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$  является конечным  $\mathfrak{p}$ -порядком в поле расширения  $K$  поля частных кольца  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ .<sup>38</sup> Поэтому в  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$  относительно  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$  выполнена дискриминантная теорема (§7, 3).

---

<sup>38</sup>Для доказательства ср. H. Grell.

Дискриминант  $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}}$  при этом является базисом идеала расширения в  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$  дискриминантного идеала порядка  $\mathfrak{T}$  относительно  $\mathfrak{o}$ . Действительно, что всегда возможно, выберем элементы  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  из  $\mathfrak{T}$  как  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ -модульный базис  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{P}}$ ; тогда  $|S(\alpha_i \alpha_k)|$  принадлежит дискриминантному идеалу, и по пункту 1 каждый определитель  $|S(\tau_i \tau_k)|$  в  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$  делится на  $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ .<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Отсюда следует – когда  $\mathfrak{o}$  является главным порядком алгебраического числового поля – согласие с относительным дискриминантом по Hilbert (который, как известно, совпадает с определением Нёке). Действительно, пусть  $\omega_1, \dots, \omega_m$  является  $\mathfrak{o}$ -модульным базисом главного порядка относительного поля – Hilbert, в частности, выбирает модульный базис относительно кольца целых рациональных чисел. Тогда по Hilbert образуют все определители из каждых  $n$  базисных элементов и их сопряженных; ”относительный дискриминант” есть идеал в  $\mathfrak{o}$ , выведенный из произведений каждых двух, одинаковых или различных, из этих определителей. Поэтому относительный дискриминант в  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$  переходит в квадрат определителя базиса  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  и его сопряженных элементов, то есть в  $|S(\alpha_i \alpha_k)|$ . Значит, расширения относительного дискриминанта и дискриминантного идеала (относительного главного порядка) совпадают во всех кольцах частных  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{P}}$ ; по заключению пункта 3 эти два идеала тождественны.

**5. Общая теорема о дискриминанте.** *Простой идеал  $\mathfrak{p}$  из мультипликативного кольца  $\mathfrak{o}$  входит в дискриминантный идеал порядка  $n$  относительно  $\mathfrak{o}$  тогда и только тогда, когда в разложении идеала  $\mathfrak{T}\mathfrak{p}$  на попарно взаимно простые первичные компоненты из  $\mathfrak{T}$  появляется по крайней мере одна собственно первичная компонента или по крайней мере один простой идеал второго рода.*

Из пунктов 3 и 4 следует, что простой идеал  $\mathfrak{p}$  из  $\mathfrak{o}$  входит в дискриминантный идеал порядка  $\mathfrak{T}$  тогда и только тогда, когда простой элемент  $p$  из  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$  входит в дискриминант  $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}}$ . Но это тождественно тому, что кольцо классов вычетов  $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}p$  не является вполне приводимым первого рода; поскольку по пункту 3 это кольцо классов вычетов изоморфно  $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ , тем самым общая теорема о дискриминанте доказана.

В качестве специализации к относительным дискриминантам числовых полей получается: простой идеал  $\mathfrak{p}$  главного порядка числового поля входит в относительный дискриминант поля расширения тогда и только тогда, когда  $\mathfrak{p}$  в главном порядке поля расширения делится на квадрат простого идеала.

Гёттинген, 30 марта 1926 г.



**32. Совместно с Р. Брауэром: О минимальных полях расщепления неприводимых представлений**

*Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, с. 221–228.*

*(Представлено г-ном Шуром.)*

Вопрос о числовых полях наименьшей степени над основным полем  $P$ , в которых неприводимое над  $P$  представление конечной группы распадается на абсолютно неприводимые составляющие, впервые рассмотрел И. Шур.<sup>1</sup> Пусть, например,  $P$  содержит характер такой составляющей. Тогда И. Шур показал, что степень этих полей над  $P$  – индекс – совпадает с числом тех абсолютно неприводимых составляющих, которые все принадлежат одному и тому же классу; что, следовательно, то же самое поле уже определяется требованием выделить одну абсолютно неприводимую составляющую; далее, что степень всякого поля над  $P$ , в котором происходит такой распад, является кратной индексу. Все эти поля будем называть полями расщепления, также и в случае, когда  $P$  не содержит характера. На примере И. Шур показал, что поля расщепления наименьшей степени не обязаны быть изоморфными. Если  $P$  не содержало соответствующего неприводимого характера, то поля расщепления должны содержать поле такого характера и его сопряженные относительно  $P$ ; абсолютно неприводимые представления, принадлежащие различным сопряженным характерам, хотя и сопряжены, но, очевидно, принадлежат различным классам. Для выделения системы абсолютно неприводимых представлений одного класса и здесь достаточно поля соответствующего характера и одного из соответствующих полей расщепления.

---

<sup>1</sup> *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen*, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, с. 164. *Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, с. 159. Во второй работе результаты перенесены на вполне приводимые гиперкомплексные системы. В один класс объединяется представление со всеми его преобразованными (подобными).

В дальнейшем вопрос о полях расщепления будет прослежен дальше. Поля расщепления наименьшей степени можно характеризовать посредством соответствующих некоммутативных тел; общие поля расщепления – посредством двусторонне простых колец, инвариантно связанных с этими некоммутативными телами. Далее на примере тела кватернионов будет показано, что степени минимальных полей расщепления не ограничены; при этом поле расщепления называется минимальным, если ни одно из его собственных подполей не является полем расщепления. Эта неограниченность существенно следует из теоретико-числовой теоремы существования, доказательство которой дано Г. Хассе в непосредственно следующей заметке. Однако пример также разбирается элементарно-вычислительно – скорее в проверочном плане; тем самым без привлечения общей теории и теоретико-числовой теоремы существования неограниченность степеней показывается путем элементарного доказательства менее сильной, но достаточной теоремы существования.<sup>1</sup> Следует еще заметить, что и в этом примере речь идет о полях расщепления конечной группы, а именно группы кватернионов, лежащей также в основе примера Шура. Указанные там представления являются одновременно (изоморфными) представлениями тела кватернионов.

---

<sup>1</sup>Этот пример принадлежит Э. Нётер; он основан на модификации примера Р. Брауэра, в котором вообще было показано существование минимального поля расщепления, степень которого превышает индекс. Элементарная обработка примера принадлежит Р. Брауэру. Характеризация полей расщепления восходит к исследованиям авторов, которые в остальном преследуют отдельные цели. У Э. Нётер речь идет о построении теории представлений на основе теории модулей и идеалов при общих предположениях конечности; у Р. Брауэра – о построении некоммутативных тел конечной степени над заданным коммутативным совершенным основным полем с помощью фактор-систем. К характеристике полей расщепления наименьшей степени авторы пришли независимо: Р. Брауэр для совершенного основного поля, Э. Нётер без этого ограничения. Характеризацию общих полей расщепления Р. Брауэр нашел в связи с вопросом Э. Нётер о возможности некоммутативного вложения; Э. Нётер и здесь смогла снять ограничение на совершенную основную область.

## 1. Характеризация полей расщепления.

Прежде всего кратко сведем основные понятия. Пусть  $\mathfrak{S}$  обозначает гиперкомплексную систему над полем  $P_0$ . Под представлением  $\Gamma$  системы  $\mathfrak{S}$  – над  $P$  – понимается система матриц с элементами из  $P$  такая, что  $\Gamma$  становится гомоморфным образом  $\mathfrak{S}$  и что элементам  $p_0$  из  $P_0$  сопоставлены диагональные матрицы  $p_0 E$ ; следовательно,  $P$  должно содержать  $P_0$ . Представление  $\Gamma$  вместе со всеми своими преобразованными  $P^{-1}\Gamma P$  образует класс представлений. В так определенные представления входят также представления конечных групп  $G$ ; соответствующая гиперкомплексная система  $\mathfrak{S}$ , “групповое кольцо”, состоит из всех “групповых чисел”, то есть из всех линейных комбинаций элементов группы с коэффициентами из  $P_0$ , причем исходные элементы группы рассматриваются как линейно независимые, а умножение задается групповым умножением и правилами вычисления. Понятия “приводимых”, “неприводимых”, “вполне приводимых”, “абсолютно неприводимых” представлений определяются обычным образом; эту терминологию распространяем и на классы представлений. Система  $\mathfrak{S}$  называется “вполне приводимой над  $P$ ”, если все ее классы представлений над  $P$  вполне приводимы.

Пусть теперь  $\mathfrak{S}$  предполагается вполне приводимой над  $P_0$ ; пусть  $P_0$  считается совершенным полем, так что то же верно для каждого алгебраического расширения  $P$  поля  $P_0$ . Классы представлений при каждом расширении  $P$  поля  $P_0$  остаются вполне приводимыми.<sup>1</sup> Центр  $\mathfrak{S}$  является прямой суммой конечного числа полей; всякое расширение  $P$  поля  $P_0$ , изоморфное такому полю  $K$ , становится полем одного (простого) характера. Если расширить  $P_0$  до изоморфного  $K$  поля  $P$ , от  $\mathfrak{S}$  отделяется двусторонне простое кольцо, которому соответствует абсолютно неприводимый класс представлений этого характера. Это кольцо – по теореме Веддерберна – является прямым произведением матричного кольца над  $P$  и некоммутативного тела  $\mathfrak{A}$ , однозначно определенного с точностью до изоморфизма; центр  $\mathfrak{A}$  равен  $P$ , а его степень над  $P$  равна  $m^2$ , где  $m$  обозначает индекс Шура, принадлежащий этому характеру. Всякое поле расщепления  $\mathfrak{S}$  – относительно представления, принадлежащего этому характеру – одновременно является таким для  $\mathfrak{A}$  относительно представлений над  $P$ , и наоборот. Сопряженные представления  $\mathfrak{S}$  получают, исходя из соответствующего двусторонне простого кольца над  $P_0$ ; его соответствующее тело  $\mathfrak{A}_0$  становится изоморфным  $\mathfrak{A}$  и имеет центр  $K$ . Тем самым задача о полях расщепления полностью сведена к задаче о соответствующем некоммутативном теле  $\mathfrak{A}$  и его расщеплениях.<sup>2</sup> В частности, имеет место теорема:

Все максимальные коммутативные подтела  $\mathfrak{A}$  имеют одну и ту же степень  $m$  над  $P$ , где  $m$  означает индекс Шура. Все эти максимальные коммутативные подтела являются полями расщепления наименьшей степени, и каждое поле расщепления наименьшей степени содержится среди них. Степень каждого поля расщепления кратна  $m$ . У  $\mathfrak{A}$  имеется лишь один абсолютно неприводимый класс представлений, а также лишь один неприводимый класс представлений над  $P$ .

---

<sup>1</sup>Если  $P_0$  не является совершенным, полная приводимость сохраняется тогда и только тогда, когда компоненты  $K$  центра становятся “расширениями первого рода” поля  $P_0$ . При этом условии остаются верны все дальнейшие следствия текста.

<sup>2</sup>Это соответствует шуровскому сведению к системе матриц над  $P$ , перестановочных с неприводимым представлением  $\mathfrak{S}$  над  $P$ . Транспонированные этих матриц дают представление  $\mathfrak{A}$  над  $P$ .

Для характеристики общих полей расщепления обозначим через  $\mathfrak{A}_r$  прямое произведение  $\mathfrak{A}$  с матричным кольцом степени  $r^2$  над  $P$  (системой всех  $r$ -рядных матриц с элементами из  $P$ ). Тогда  $\mathfrak{A}_r$  является двусторонне простым, с  $\mathfrak{A}$  как соответствующим некоммутативным телом; и всякое двусторонне простое кольцо, гиперкомплексное над  $P$ , которому соответствует  $\mathfrak{A}$ , получается именно так.  $\mathfrak{A}_r$  также характеризуется как система всех  $r$ -рядных матриц с элементами из  $\mathfrak{A}$ .

Всякое поле расщепления  $\mathfrak{A}$  степени  $mr$  – если такое существует – изоморфно одному из максимальных коммутативных подтел  $\mathfrak{A}_r$ . Обратно, все максимальные коммутативные подтела  $\mathfrak{A}_r$  являются полями расщепления, каждое степени  $ms$ , где  $s$  является делителем  $r$ . В регулярном случае все максимальные коммутативные подтела  $\mathfrak{A}_r$  имеют степень  $mr$ . При этом под регулярным случаем понимается следующее: основное поле  $P$  обладает тем свойством, что для всякого коммутативного поля  $\Sigma$  над  $P$ , конечного над  $P$ , существуют еще коммутативные расширения над  $\Sigma$  произвольной степени.<sup>1</sup>

Встречаются ли среди этих полей расщепления при  $r > 1$  также минимальные, само вложение в  $\mathfrak{A}_r$  еще не решает. То, что это действительно может происходить для бесконечно многих  $r$ , показывает следующий пример.

## 2. Неограниченность степеней минимальных полей расщепления

---

<sup>1</sup>Так, например, регулярного случая нет, когда  $P$  является полем всех действительных чисел.

Для этой неограниченности теперь возьмем в качестве примера тело кватернионов, рассматриваемое как гиперкомплексная система относительно поля  $P$  рациональных чисел; с базисными элементами  $i, j, k$  помимо единицы 1 и с известными соотношениями:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \quad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Окажется, что полями расщепления являются все и только те алгебраические числовые поля, при присоединении которых существует идемпотентный элемент  $r$ , то есть такой, что  $r^2 = r$ , причем  $r$  отличен и от нулевого, и от единичного элемента. Эти числовые поля можно также охарактеризовать как те, в которых  $(-1)$  представима как сумма трех квадратов, а следовательно и как сумма двух квадратов.<sup>1</sup> Действительно, если положить

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k,$$

то

$$r^2 = \left( \alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2 \right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

и потому условие  $r^2 = r$  равносильно системе

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

а значит, поскольку  $\beta, \gamma, \delta$  не должны обращаться в нуль одновременно, равносильно условию

$$(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2.$$

---

<sup>1</sup>То, что из представимости  $(-1)$  как суммы трех квадратов всегда следует представимость как суммы двух квадратов, показывает тождество

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

которое, например, получается из теоремы о произведении норм для кватернионов. Вместо того чтобы требовать существования идемпотентного элемента, для расщепления было бы достаточно требовать элемент нулевой нормы.

То, что каждый такой идемпотентный элемент порождает расщепление, и что существование такого идемпотентного элемента необходимо для расщепления, следует из следующих фактов. Всякое неприводимое представление полностью приводимой системы порождается односторонне простым идеалом, точнее соответствующим классом идеалов, и каждый такой класс идеалов порождает представление. Все эти односторонне простые идеалы возникают при одностороннем прямом разложении в сумму, и это разложение определяет «примитивные» идемпотентные элементы, которые становятся компонентами единицы. Обратно, каждый идемпотентный элемент дает разложение в сумму

$$\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S},$$

где  $e$  обозначает единицу; «примитивные» дают отделение простых идеалов.<sup>1</sup> Некоммутативное тело, рассматриваемое как гиперкомплексная система относительно своего центра, после расширения до гиперкомплексной системы относительно поля расщепления становится прямой суммой  $m$  абсолютно простых односторонних идеалов, где  $m$  есть индекс Шура.

В случае тела кватернионов  $m$  равно двум; следовательно, каждый идемпотентный элемент  $\neq 0$  и  $\neq 1$  уже порождает разложение на абсолютно простые идеалы, которому соответствует расщепление на абсолютно неприводимые классы представлений. Тем самым указанные поля охарактеризованы как поля расщепления.

---

<sup>1</sup>Связь между примитивными идемпотентными элементами и неприводимыми представлениями имеется уже в диссертации М. Герцбергер о системах гиперкомплексных величин, глава 4, Берлин, 1923. То, что простые идеалы порождают неприводимые представления, для коммутативного случая можно найти, например, у Э. Нетер, теорема о дискриминанте для порядков, Crelle 157 (1926); для некоммутативного случая – у В. Крулля, теория и применение обобщенных абелевых групп, Heidelberg Berichte 1926. Ср. также заключительное слово групповой теории Шпайзера. Если  $a_1, \dots, a_m$  есть базис идеала относительно поля расщепления, а  $c$  – произвольный элемент кольца, так что

$$a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \dots + \gamma_{im} a_m,$$

то  $(\gamma_{ik})$  есть матрица, соответствующая  $c$ ; утверждение, что все неприводимые представления порождаются идеалами, является более глубоким фактом.



Далее следует: *все циклические поля  $\Omega_n$  степени  $2^n$  над полем рациональных чисел, в которых  $(-1)$  представляется как сумма двух квадратов, являются минимальными полями расщепления тела кватернионов.* Действительно, поле расщепления не может быть вещественным, поскольку в нем  $(-1)$  представим как сумма квадратов; с другой стороны, подполе степени  $2^{n-1}$  поля  $\Omega_n$  — а значит и всякое собственное подполе  $\Omega_n$  — необходимо вещественно, как пересечение  $\Omega_n$  с полем всех вещественных алгебраических чисел. Именно,  $\Omega_n$  является галуа-полем степени два относительно этого пересечения, которое поэтому необходимо совпадает с подполем степени  $2^{n-1}$ .

По доказанной Г. Хассе теореме существования<sup>1</sup> *такие поля  $\Omega_n$  существуют для каждого  $n$ ; степени минимальных полей расщепления не ограничены. Здесь даже каждая степень индекса появляется как степень минимального поля расщепления.*<sup>2</sup>

### 3. Элементарное рассмотрение полей расщепления тела кватернионов.

<sup>1</sup>Существование  $\Omega_n$  можно уже усмотреть из параметрического представления циклических полей 4-й степени, как оно, например, дано у Weber, *Kleines Lehrbuch der Algebra*, § 93.

<sup>2</sup>Впоследствии Р. Брауер смог еще показать, что существуют даже минимальные поля расщепления тела кватернионов любой четной степени, то есть всех степеней, вообще возможных для полей расщепления. Такое поле  $P(\Theta)$  можно для каждого  $n \geq 2$  задать уравнением

$$f(\Theta) = \Theta^{2n} + a^2 p^2 \Theta^2 + b^2 p^2 \beta^2 = 0; \quad \text{то есть} \quad -1 = \left( \frac{ap}{\Theta^{n-1}} \right)^2 + \left( \frac{bp\beta}{\Theta^n} \right)^2,$$

где подходящим выбором  $a, b, p, \beta$  можно добиться, что 1.  $f(x)$  при каждом  $n$  становится неприводимым; 2.  $P(\Theta)$  имеет только единственное отличное от  $P$  подполе  $P(\Theta^2)$ ; 3. среди сопряженных к  $P(\Theta^2)$  имеются и вещественные, так что оно не может быть полем расщепления. Один возможный выбор  $a, b, p, \beta$ , например, таков:

$$f(x) = x^{2n} + (2^5 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Доказательство основано на модификации метода Фуртвенглера для построения примитивных уравнений (Math. Ann. 85, с. 34, § 3), но в деталях оно довольно трудоемко.

Пусть  $\mathfrak{D}$  обозначает представление группы кватернионов, образованное следующими 8 матрицами:<sup>1</sup>

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Групповое кольцо, порожденное  $\mathfrak{D}$ , есть как раз представление тела кватернионов, рассматриваемого как гиперкомплексная система; мы элементарно покажем, что  $\mathfrak{D}$  реализуемо над полем  $K$  тогда и только тогда, когда  $-1$  в  $K$  представим как сумма двух квадратов.

а) Пусть  $\mathfrak{D}^* = T^{-1}\mathfrak{D}T$  есть представление, рациональное над полем  $K$ , и пусть  $I^* = T^{-1}IT$ ,  $J^* = T^{-1}JT$ . Поскольку  $J$  и  $J^*$  являются двумя подобными матрицами, рациональными над  $K$ , существует также рациональное над  $K$  преобразование  $R$ , переводящее  $J^*$  в  $J$ ,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Если с самого начала заменить  $\mathfrak{D}^*$  также рациональным над  $K$  представлением  $R^{-1}\mathfrak{D}^*R$ , то видно, что без ограничения общности можно считать  $J^* = J$ . Пусть

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (a, b, c, d \text{ числа из } K).$$

Из  $IJ = -JI$  следует  $I^*J^* = -J^*I^*$ , а ввиду  $J^* = J$  это дает

$$a = -d, \quad b = c.$$

Из  $I^2 = -E$  следует  $I^{*2} = -E$ , то есть

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & a^2 + b^2 \end{pmatrix},$$

следовательно,  $a^2 + b^2 = -1$ , и потому  $-1$  действительно представим в  $K$  как сумма двух квадратов.

б) Пусть в поле  $K$  число  $-1$  представимо как сумма двух квадратов. Тогда, если, например,  $-1 = a^2 + b^2$ , положим

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad K^* = I^*J^*.$$

Как легко проверить, тогда  $\pm E, \pm I^*, \pm J^*, \pm K^*$  образуют рациональную над  $K$  группу, подобную  $\mathfrak{D}$ .<sup>2</sup>

<sup>1</sup>См. Sylvester, *Math. Papers* Vol. III, с. 647; Vol. IV, с. 122.

<sup>2</sup>Характеризацию полей расщепления можно легко получить также с помощью фактор-систем.

Далее следует показать, что для бесконечно многих  $n$  существуют циклические поля степени  $2^n$ , являющиеся минимальными полями расщепления группы кватернионов.

Пусть  $p$  – рациональное простое число, для которого при некотором  $r > 0$

$$(*) \quad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

выполняется; пусть  $2^n$  есть наивысшая степень числа 2, делящая  $p - 1$ .

Сначала покажем, что для бесконечно многих значений  $n$  существуют простые числа  $p$ . Для этого пусть  $k$  – произвольное положительное целое рациональное число, а  $p$  – простой делитель числа  $2^{2^k} + 1$ . Тогда требуемая для  $p$  конгруэнция выполнена при  $r = 2^k$ . Кроме того,  $2 \pmod{p}$  имеет порядок  $2^{k+1}$ , и поэтому для наивысшей степени  $2^n$  числа 2, делящей  $p - 1$ , число  $n$  больше  $k$ . Во всяком случае, значит, существуют сколь угодно большие  $n$ , которым соответствуют простые числа  $p$ .

Пусть  $\varepsilon$  – первообразный  $p$ -й корень из единицы. Теперь покажем, что в  $P(\varepsilon)$  число  $-1$  представляется как сумма двух квадратов

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \quad (a, b \text{ числа из } P(\varepsilon)).$$

Это равносильно тому, что в поле  $(4p)$ -х корней из единицы  $P(\varepsilon, i) = P(\varepsilon \cdot i)$  существуют числа, относительная норма которых относительно  $P(\varepsilon)$  равна как раз  $-1$ .

Число  $1 + i\varepsilon^\nu$  ( $\nu = 1, 2, \dots, p-1$ ) имеет относительную норму  $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$ ; следовательно, все числа  $1 + \varepsilon^\nu$  ( $\nu = 1, 2, \dots, p-1$ ) являются относительными нормами чисел из  $P(\varepsilon i)$  относительно  $P(\varepsilon)$  как основного поля. Поэтому то же самое верно и для

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \cdots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r-1} \varepsilon^\lambda.$$

Если к  $\Pi$  добавить еще  $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$  (в силу  $(*)$ ), то  $\Pi + \varepsilon^{p-1}$  становится суммой целых частей выражения  $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \cdots + \varepsilon^{p-1} = 0$ , и потому

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

Теперь  $i\varepsilon$  является относительной нормой числа из  $P(\varepsilon i)$ , а именно числа  $\varepsilon^{(p+1)/2}$ . Следовательно, аналогичное верно для

$$\Pi\varepsilon = -1.$$

Поэтому  $-1$  в  $P(\varepsilon)$  представим как сумма двух квадратов;<sup>1</sup> значит,  $P(\varepsilon)$  является полем расщепления для группы кватернионов.

Пусть  $K$  – циклическое поле степени  $2^n$ , содержащееся в  $P(\varepsilon)$ ; мы утверждаем, что и  $K$  является полем расщепления.<sup>2</sup> Пусть  $m$  – индекс тела кватернионов относительно  $K$  как основного поля; тогда  $m = 1$  или  $m = 2$ . Но поскольку существует поле расщепления  $P(\varepsilon)$  нечетной относительной степени  $(p-1)/2^n$  относительно  $K$ , второй случай невозможен; значит,  $m = 1$ . Это и означает, что  $K$  является полем расщепления.

Итак, для бесконечно многих  $n$  существуют циклические поля степени  $2^n$ , являющиеся минимальными полями расщепления.

<sup>1</sup>Для простых чисел вида  $8n \pm 3$  это рассуждение уже имеется у Е. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62, с. 272–285.

<sup>2</sup>Выбор циклического поля расщепления степени  $2^n$  как подполя поля деления круга повторяет пример Хассе.

### 33. Гиперкомплексные величины и теория представлений в арифметическом понимании

*Atti Congresso Bologna 2 (1928), с. 71–73.*

Эмми НЁТЕР (Гёттинген – Германия)

#### ГИПЕРКОМПЛЕКСНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И ТЕОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В АРИФМЕТИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ<sup>1</sup>

##### Введение

Я хочу показать, как теорию представлений – в частности, представления групп – можно понимать как теорию классов модулей и идеалов; и как последние, в свою очередь, подчиняются обобщенному понятию группы, а именно группам с операторами.<sup>2</sup>

Под *представлением группы* – в заданном поле  $P$  –, как известно, понимают следующее: элементам  $a, b, \dots$  группы  $G$  сопоставляются матрицы  $A, B, \dots$  с коэффициентами из  $P$  так, что произведению  $ab$  соответствует произведение  $AB$ ; система матриц становится гомоморфным образом группы. Вместе с этим представлением дано также представление «группового кольца», которое состоит из всех «групповых чисел», то есть всех линейных комбинаций  $a\alpha + b\beta + \dots + c\gamma$ , где  $a, b, \dots, c$  пробегают все комбинации из конечного числа элементов группы, а  $\alpha, \beta, \dots, \gamma$  соответственно – из конечного числа элементов из  $P$ ; при этом  $a, b, \dots, c$  рассматриваются как линейно независимые, а умножение задается групповым умножением и правилами вычисления. Представление группового кольца одновременно гомоморфно относительно сложения; тем самым представления групп подчиняются общей задаче *представления колец*, где требуется гомоморфность относительно сложения и умножения.

Здесь существенны две задачи. Первая – это *редукция заданного* представления и вопрос об однозначности возникающих при этом неприводимых составляющих. Вторая состоит в вопросе о совокупности всех возможных представлений – быть может, только неприводимых – заданного кольца в заданном, не обязательно коммутативном теле.

Первая задача намного проще; это видно уже из того, что ни для представляемого кольца, ни для – вообще говоря, некоммутативного – тела представления не нужны никакие специальные предположения. Сам факт, что представление задается матрицами фиксированной степени, дает все необходимые предположения конечности. Задача полностью решается посредством теории групп с операторами, на которой я поэтому кратко останавлиюсь.

Группа  $\mathfrak{M}$  называется *группой с областью операторов*, если одновременно задана система символов  $\Theta, H, \dots$  – операторов – такая, что выражения  $\Theta(a), H(a), \dots$  для каждого  $a$  из  $\mathfrak{M}$  однозначно определены, дают элемент из  $\mathfrak{M}$  и удовлетворяют дистрибутивному закону:  $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$ . Две группы с одной и той же областью операторов называются операторно-изоморфными, если они изоморфны в обычном смысле и, кроме того, из соответствия  $a$  и  $\bar{a}$  следует также соответствие  $\Theta(a)$  и  $\Theta(\bar{a})$ ,  $H(a)$  и  $H(\bar{a})$  и так далее. Если затем в качестве подгрупп допускаются только такие, которые сами допускают область операторов, так что группа называется простой, если у нее нет допустимого собственного нормального делителя, кроме единицы, то теорема Жордана–Гёльдера о композиционном ряде сохраняется в форме: если группа с областью операторов вообще имеет композиционный ряд, то система фактор-групп в смысле операторного изоморфизма однозначно определена с точностью до порядка. При том же предположении верна и теорема о разложении, однозначном в смысле операторного изоморфизма, на прямо неразложимые факторы.

Связь с задачей представлений состоит в том, что к группам с операторами относятся, в частности, идеалы и модули: они рассматриваются как абелевы группы относительно сложения, тогда как

<sup>1</sup>Подробное изложение должно появиться в *Math. Zeitschr.*; в продолжении там будет рассмотрена также некоммутативная теория Галуа. Ср. также о «полях расщепления»: R. Brauer и E. Noether, *Ber. Berl. Ak.* 1927, а об общих структурных теоремах – доклад G. Köthe в этих *Atti*.

<sup>2</sup>Группы с операторами восходят к W. Krull (*Math. Zeitschr.* 23) и O. Schmidt (*Math. Zeitschr.* 29). Приведенная здесь трактовка задачи редукции заданного представления также принадлежит – в ограничении на коммутативные тела представления – W. Krull (*Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Heidelberger Ber. 1926).

операторы задаются умножением на элементы кольца. Всякое представление порождается модулем представления, то есть модулем относительно кольца и тела представления. Точнее, всякий класс модулей, то есть класс операторно-изоморфных между собой модулей представления, порождает одно и то же представление. Тем самым вопрос об однозначности редукции представления решается теоремой о композиционном ряде и теоремой о прямом произведении. Композиционный ряд, примененный к модулю представления, дает для каждой матрицы редукцию вида

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & \cdots & B_r \end{pmatrix},$$

где диагональные матрицы, соответствующие фактор-группам, порождают «неприводимое» представление, то есть такое, которое само уже не допускает такой редукции.

Но поскольку классы этих фактор-групп однозначно определены, то же верно для диагональных представлений, однозначно в смысле эквивалентности представлений. Аналогично теорема о прямом произведении дает однозначность «распада» на «неразложимые» составляющие:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

причем каждый  $C_i$  еще может быть однозначно редуцирован по теореме о композиционном ряде.

*Вторую задачу* я хотел бы наметить для случая представлений гиперкомплексных систем, более общо – колец, удовлетворяющих двойному условию цепей. Результат таков: всякий неприводимый (простой) класс модулей является классом идеалов; следовательно, композиционные ряды из односторонних идеалов уже через свои фактор-группы дают все неприводимые представления. Точнее, достаточно композиционных рядов в кольце классов вычетов по радикалу, которое становится «вполне приводимым» кольцом. Тем самым задача сведена к исследованию структуры вполне приводимых колец; и потому оказывается соответствующим задаче брать в качестве исходного пункта представления в телах автоморфизмов. Это надо понимать следующим образом. Все простые правые идеалы двусторонне простой компоненты такого кольца принадлежат одному и тому же классу и потому имеют одно и то же кольцо автоморфизмов; в силу простоты идеалов оно становится телом и одновременно является кольцом автоморфизмов простых левых идеалов. Само простое кольцо становится изоморфным системе всех матриц над телом автоморфизмов; и из этого представления возникают все представления относительно подтела, в частности относительно области коэффициентов гиперкомплексной системы, если сами элементы тела автоморфизмов заменить соответствующими матрицами. Так известная для гиперкомплексных систем структурная теорема Веддерберна здесь переосмысливается через понятие тела автоморфизмов, происходящее из общей теории групп, и одновременно распознается как источник теории представлений гиперкомплексных систем. Возникают новые вопросы теории Галуа некоммутативных тел, тесно связанные с вопросом о «полях расщепления». Вместе с тем открывается перспектива структурных теорем для более общих, не вполне приводимых колец посредством колец автоморфизмов неразложимых идеалов. Теория групп, в своем расширении на самые общие группы с операторами, и здесь снова оказывается упорядочивающим принципом.

## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

*Math. Zs.* 30 (1929), с. 641–692.

### Введение

Важнейшие общие теоремы о гиперкомплексных системах восходят к Молиену (*Math. Annalen*, т. 41, и дорпатские отчеты 1897 г.). По существу независимо от этого Фробениус вскоре затем развил теорию гиперкомплексных систем и их представлений, в частности теорию представлений конечных групп, как единую теорию. Основу составляет восходящее к Дедекинду понятие группового детерминанта, а в более общем виде – детерминанта произвольной гиперкомплексной системы. Фробениус показывает, что различным неприводимым множителям этого детерминанта (областью коэффициентов всегда считается поле всех комплексных чисел) соответствуют различные классы неприводимых представлений, и что таким образом исчерпываются все классы неприводимых представлений. Такой класс представлений полностью характеризуется своей “системой характеров”; в случае конечных групп эта система характеров возникает путем разложения детерминанта той коммутативной гиперкомплексной системы, которая выводится из классов сопряженных элементов группы. Этот детерминант разлагается на линейные множители, с характерами в качестве коэффициентов, то есть является прямым обобщением результата, впервые полученного Дедекиндом: групповой детерминант конечной абелевой группы разлагается на линейные множители, коэффициентами которых служат различные характеры абелевой группы (переписка с Фробениусом).<sup>1</sup>

Однако эти понятийно простые и прозрачные результаты у Фробениуса получаются посредством трудоемкого вычисления. Дальнейшее развитие было направлено на упрощенный вывод этих результатов и одновременно на их распространение при выборе произвольного тела в качестве области коэффициентов. Это дальнейшее развитие для гиперкомплексных систем и для теории представлений пошло совершенно раздельными путями. Гиперкомплексные системы получили арифметическую трактовку у Веддерберна: всякая гиперкомплексная система единственным образом является прямой суммой двусторонне прямо неразложимых колец; для систем без радикала эти неразложимые кольца становятся изоморфными системе всех  $n$ -рядных матриц с элементами из присоединенного, не обязательно коммутативного тела, определенного по существу единственным образом.<sup>2</sup> Теория представлений получила элементарное обоснование у Бернсайда и И. Шура, которые, независимо от гиперкомплексной системы, исходили непосредственно из заданного представления и оперировали матричными теоремами. В частности, Шур рассмотрел вопрос о числовых полях наименьшей степени, в которых представление, неприводимое над заданным телом, абсолютно разлагается. Эти абсолютно неприводимые составляющие принадлежат конечному числу сопряженных классов представлений. Степень искомых числовых полей равна произведению числа этих классов на индекс (число составляющих в каждом из сопряженных классов). Главным вспомогательным средством теории Шура служит система всех матриц, перестановочных с неприводимым представлением.<sup>3</sup>

В следующем чисто арифметическом обосновании гиперкомплексные величины и теория представлений снова выступают как единое целое: как специальный случай общей теории некоммутативных колец, удовлетворяющих лишь некоторым условиям конечности. А именно, речь идет о теории классов модулей и идеалов относительно этих колец с главным результатом, что неприводимые классы модулей уже исчерпываются соответствующими классами идеалов; в частности, для колец без радикала все классы модулей распадаются на неприводимые (становятся вполне приводимыми). Это арифметический эквивалент результата Фробениуса о том, что неприводимые множители регулярного группового (соответственно системного) детерминанта уже исчерпывают совокупность классов неприводимых представлений, и что для систем без радикала

<sup>1</sup> Дальнейший текст представляет собой свободную разработку моей лекции зимнего семестра 1927/28 г., подготовленную Б. Л. ван дер Варденом. Текст к печати мы готовили совместно. Я также обязана Б. Л. ван дер Вардену благодарностью за ряд критических замечаний.

<sup>2</sup> Ср. библиографические указания у Dickson, *Algebras and their Arithmetics* (немецкое издание: *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927).

<sup>3</sup> Ср. библиографические указания в 10-й главе теории групп Шпайзера.

имеет место полная приводимость представлений. Рассмотрение системного детерминанта и его разложения можно именно понимать как переход к норме, тогда как здесь непосредственно рассматриваются разложение идеалов в прямую сумму и их композиционные ряды. Теория представлений же, благодаря понятию модуля представления, становится теорией классов модулей.

Введение классов модулей и идеалов имеет чисто группово-теоретическое обоснование. Модули и идеалы рассматриваются как абелевы группы относительно сложения, ограниченные тем, что они допускают некоторые умножения на элементы кольца: они образуют “группы с операторами” (§1). Для таких групп вместо обычного изоморфизма появляется “операторный изоморфизм” (§2); группы, операторно-изоморфные между собой (в пределах фиксированной области), объединяются в один класс – понятие класса, которое, например, в случае идеалов числового поля совпадает с обычным. Теория групп с операторами восходит к W. Krull и O. Schmidt (ср. прим. 6); в главе I она развивается систематически. Теоремы, остающиеся справедливыми и здесь, о композиционных рядах, прямом произведении (соответственно сумме) и вполне приводимых группах – теоремы единственности в смысле упомянутого выше деления на классы – образуют основу всего дальнейшего.

Сначала они дают общие теоремы единственности неприводимых диагональных составляющих при произвольных представлениях (глава III, §16), на основании факта взаимно однозначного соответствия классов представлений классам модулей представления, то есть классам групп с операторами. Дальнейший вопрос о совокупности представлений требует более точного изучения структуры представляемых колец, следовательно, в специальном случае, гиперкомплексных систем. В главе II результаты Веддерберна получаются заново и развиваются дальше на основе группово-теоретического понимания, согласно которому на переднем плане стоит рассмотрение односторонних идеалов. При этом оказывается, что “теорема о множественных цепях” для правых идеалов, или тождественное с ней “минимальное условие” (в каждом множестве правых идеалов имеется по меньшей мере один минимальный элемент внутри этого множества), достаточна как условие конечности.<sup>4</sup> Получается тождество колец без радикала, удовлетворяющих минимальному условию, с (право) вполне приводимыми кольцами с единицей. В таких кольцах все простые правые идеалы двусторонне неразложимого кольца принадлежат одному и тому же классу и потому, как группы с операторами, имеют одно и то же кольцо автоморфизмов, которое из-за простоты идеалов становится телом. Это тело автоморфизмов класса и есть то, что осуществляет матричное представление, найденное Веддерберном.

Это матричное представление в теле автоморфизмов одновременно решает задачу представления во вполне приводимом случае, как только требуется представление относительно тела автоморфизмов или его подполей, в частности относительно области коэффициентов гиперкомплексной системы. Не существует, и это прямое следствие теоремы о сведении классов модулей к классам идеалов, никаких иных неприводимых представлений, кроме веддерберновского и тех, которые возникают из него, когда элементы тела автоморфизмов естественным образом заменяются матрицами над подполем.

Итак, во вполне приводимом случае существует столько различных классов неприводимых представлений, сколько классов идеалов; их число совпадает с числом различных двусторонне неразложимых, то есть простых, колец. Это число, наконец, снова тождественно числу неразложимых компонент центра, которые становятся коммутативными полями. В случае гиперкомплексных систем с алгебраически замкнутой областью коэффициентов эти последние полностью определяются различными гомоморфизмами колец (неприводимыми представлениями) центра; а это, с точностью до числового множителя, и есть характеры.

Полученные результаты одновременно дают обзор неприводимых представлений систем с радикалом, поскольку они сводятся к представлениям кольца классов вычетов по радикалу, которое становится системой без радикала.

Как будет показано позднее, для гиперкомплексных систем без радикала из тела автоморфизмов следует также теория “полей разложения”, то есть коммутативных расширений области коэффициентов, в которых представления распадаются на абсолютно неприводимые; иначе

<sup>4</sup>Методы доказательства Веддерберна переносятся, если предполагается “двойное условие цепей”. Ср. E. Artin, *Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen*, Hamb. Abh. 1927. Ср. также A. Suschkewitsch, *Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit*, Math. Annalen 99 (1928), с. 30–50, где для (конечных) областей только с одной ассоциативной, необратимой операцией развиваются параллельные структурные теоремы. Расщепление “ядра” у Сушкевича на правые и левые группы соответствует представлению двусторонне простого кольца с единицей в виде суммы правых и левых идеалов.

говоря, в которых имеет место разложение в прямую сумму абсолютно простых правых идеалов. Поля разложения тождественны полям разложения тела автоморфизмов, и все поля разложения наименьшей степени изоморфны максимальным коммутативным подполям тела автоморфизмов. Связь с упомянутыми выше исследованиями Шура устанавливается тем, что транспонированные матрицы, перестановочные с представлением, как раз дают представление тела автоморфизмов.<sup>5</sup> Эти теоремы должны быть систематически развиты в рамках теории Галуа некоммутативных тел.

Положенные в основу понятия – операторный гомоморфизм и кольцо автоморфизмов – дают также структуру общих колец с радикалом, удовлетворяющих лишь минимальному условию; это будет изложено в другом месте.

---

<sup>5</sup>Ср. R. Brauer–E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, с. 221.



# Глава I. Группово-теоретические основания

## § 1. Группы с операторами

Пусть  $\mathfrak{G}$  – группа (конечная или бесконечная), с элементами  $a, b, \dots$ . Под областью операторов  $\Omega$  для группы  $\mathfrak{G}$  понимается множество новых символов  $H, \Theta, \dots$  такое, что каждому  $a$  из  $\mathfrak{G}$  и каждому  $\Theta$  из  $\Omega$  однозначно сопоставлен элемент  $\Theta a$  из  $\mathfrak{G}$ , и выполнен дистрибутивный закон:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Следовательно, каждый оператор определяет гомоморфизм группы в себя, причем группа отображается либо на себя, либо на подгруппу. Единичный элемент переходит в единичный элемент, обратный – в обратный.

Область операторов называется *абсолютной*, если различные операторы определяют также различные гомоморфизмы. Из произвольной области операторов получают абсолютную, отождествляя все элементы, порождающие один и тот же гомоморфизм. Абсолютная область операторов является взаимно однозначным образом подмножества множества всех гомоморфизмов группы в себя.

*Допустимая подгруппа*  $\mathfrak{H}$  группы  $\mathfrak{G}$  – относительно фиксированной области операторов  $\Omega$  – это такая подгруппа, которая допускает эту область операторов, то есть  $\Theta a$  лежит в  $\mathfrak{H}$  для каждого  $a$  из  $\mathfrak{H}$  и каждого  $\Theta$  из  $\Omega$ .

*Примеры.* 1. Пусть операторами являются внутренние автоморфизмы:  $\Theta a = c^{-1}ac$ . Допустимые подгруппы суть нормальные делители.

2. Пусть операторами являются все автоморфизмы. Допустимые подгруппы суть “характеристические подгруппы”, переходящие в себя при всех автоморфизмах.<sup>6</sup>

3. Пусть  $\mathfrak{G}$  – кольцо, то есть абелева группа относительно сложения, в которой также определено умножение со свойствами

$$r(a + b) = ra + rb, \quad (a + b)r = ar + br, \quad ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Каждый элемент  $r$  одновременно определяет два оператора: операторы  $rx$  и  $xr$ . Допущенными подгруппами являются “идеалы”  $\mathfrak{a}$ , а именно: левые, допускающие операции  $rx$ :  $ra \subseteq \mathfrak{a}$ ; правые, допускающие операции  $xr$ :  $ar \subseteq \mathfrak{a}$ ; двусторонние, допускающие обе операции. Все идеалы становятся тривиальными ( $= \{0\}$  или  $= \mathfrak{G}$ ), если кольцо  $\mathfrak{G}$  является телом, то есть если  $\mathfrak{G} - \{0\}$  является группой относительно умножения.<sup>7</sup>

4. *Модули относительно кольца*  $\mathfrak{o}$ . Пусть  $\mathfrak{o}$  – кольцо, а  $\mathfrak{M}$  – абелева группа, записанная аддитивно. Пусть задано умножение  $r \cdot a$  элементов из  $\mathfrak{o}$  на элементы из  $\mathfrak{M}$ ; произведение снова должно содержаться в  $\mathfrak{M}$ . Требуется:

$$\left. \begin{aligned} r(a + b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r + s)a &= ra + sa, \end{aligned} \right\} \quad r, s \in \mathfrak{o}, \quad a, b \in \mathfrak{M}.$$

Тогда  $\mathfrak{M}$  называется  $\mathfrak{o}$ -модулем; точнее, поскольку множители из  $\mathfrak{o}$  пишутся слева, левым  $\mathfrak{o}$ -модулем. Кольцо  $\mathfrak{o}$  одновременно является областью операторов. Если она абсолютна, то есть если различные элементы кольца дают также различные операции, говорят об *абсолютной области множителей* для модуля  $\mathfrak{M}$ .

Как и выше, от произвольной области множителей можно перейти к абсолютной, отождествляя элементы, порождающие одну и ту же операцию. Абсолютная область множителей снова является кольцом. Допустимые подгруппы модуля  $\mathfrak{M}$  называются *подмодулями*. Если специально  $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$ , то мы возвращаемся к левым идеалам.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Объясняемые здесь понятия восходят к W. Krull, *Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen*, Math. Zeitschr. 23 (1925), с. 161–196, и O. Schmidt, *Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette*, Math. Zeitschr. 29 (1928), с. 34–41.

<sup>7</sup>Следовательно, ни для колец, ни для тел не предполагается коммутативный закон умножения.

<sup>8</sup>Точно так же для правых модулей требуют:

$$(a + b)r = ar + br, \quad a \cdot rs = ar \cdot s, \quad a(r + s) = ar + as.$$

5. *Бимодули.* Если  $\mathfrak{M}$  одновременно является левым  $\mathfrak{o}$ -модулем и правым  $\mathfrak{o}'$ -модулем, и, кроме того, для  $a$  в  $\mathfrak{o}$ ,  $\alpha$  в  $\mathfrak{M}$ ,  $a'$  в  $\mathfrak{o}'$  всегда

$$a \cdot \alpha a' = a \alpha \cdot a',$$

то  $\mathfrak{M}$  называется бимодулем.

6. *Кольцо автоморфизмов абелевой группы.*<sup>9</sup> Для гомоморфизмов в себя абелевой группы (записанной аддитивно) можно определить сложение и умножение формулами

$$(H + \Theta)a = Ha + \Theta a, \quad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Определенные таким образом операции, очевидно, снова представляют собой гомоморфизмы и потому снова принадлежат этой системе. Система образует кольцо, и абелеву группу, согласно 4, можно рассматривать как модуль относительно этого кольца.

Под “подгруппами” ниже всегда понимаются допустимые подгруппы. Пересечение  $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$  двух допустимых подгрупп снова является допустимой подгруппой. Так же и произведение  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ , если по меньшей мере одна из двух подгрупп  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$  является нормальным делителем.

---

<sup>9</sup>Ср. А. Châtelet, *Les Groupes Abéliens finis*, Paris, Gauthier-Villars, 1925, p. 99.

## § 2. Теоремы об изоморфизме

Отображение группы  $\mathfrak{G}$  на группу  $\overline{\mathfrak{G}}$  – причем  $\mathfrak{G}$  и  $\overline{\mathfrak{G}}$  должны иметь одну и ту же область операторов – называется операторным гомоморфизмом, если, во-первых, оно является гомоморфизмом в обычном смысле ( $ab \mapsto \overline{a}\overline{b}$ ), и если, во-вторых, как только  $a$  отображается в  $\overline{a}$ , элемент  $\Theta a$  отображается в  $\Theta \overline{a}$ .<sup>10</sup> Обозначение:  $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$ . Если соответствие взаимно однозначно, оно называется операторным изоморфизмом. Обозначение:  $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$ . Как и для обычных групп, доказывается теорема о гомоморфизме:

*Если  $\overline{\mathfrak{G}}$  является операторно-гомоморфным образом  $\mathfrak{G}$ , то  $\overline{\mathfrak{G}}$  операторно изоморфна фактор-группе  $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$ , где  $\mathfrak{N}$  – допустимый нормальный делитель, состоящий из всех элементов  $\mathfrak{G}$ , которым соответствует единица в  $\overline{\mathfrak{G}}$ . Обратно, каждый допустимый нормальный делитель  $\mathfrak{N}$  определяет фактор-группу  $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$ , которая допускает область операторов  $\mathfrak{G}$  и является операторно-гомоморфным образом  $\mathfrak{G}$ .*

Группа называется *простой*, если она не имеет нормальных делителей, кроме самой себя и единичной группы. Каждый гомоморфизм простой группы либо является изоморфизмом, либо сопоставляет каждому элементу единичный элемент.

*Первая теорема об изоморфизме.* Пусть  $\overline{\mathfrak{G}}$  – гомоморфный образ  $\mathfrak{G}$ , пусть  $\overline{\mathfrak{A}}$  – нормальный делитель в  $\overline{\mathfrak{G}}$ , а  $\mathfrak{A}$  – совокупность элементов  $\mathfrak{G}$ , которым соответствуют элементы из  $\overline{\mathfrak{A}}$ . Тогда  $\mathfrak{A}$  снова является нормальным делителем, и

$$\overline{\mathfrak{G}/\mathfrak{A}} \simeq \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}. \quad (1)$$

*Доказательство.*  $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$ ,  $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ , значит  $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ . Поэтому  $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$  изоморфна фактор-группе в  $\mathfrak{G}$ ; соответствующий нормальный делитель есть совокупность элементов, которым соответствует единица в  $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ ; это как раз  $\mathfrak{A}$ .

*Дополнение.* Если по теореме о гомоморфизме положить  $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$ , то  $\mathfrak{A}$  непременно содержит  $\mathfrak{N}$ . Из  $\mathfrak{A}$  можно восстановить  $\overline{\mathfrak{A}}$ :  $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$ . Соответствие  $\mathfrak{A} \leftrightarrow \overline{\mathfrak{A}}$  взаимно однозначно. Формулу (1) можно записать также так:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

*Вторая теорема об изоморфизме.* Пусть  $\mathfrak{A}$  – подгруппа, а  $\mathfrak{B}$  – нормальный делитель в  $\mathfrak{G}$ . Тогда  $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$  является нормальным делителем в  $\mathfrak{A}$ , и

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/(\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}).$$

*Доказательство.* При гомоморфизме  $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$  элементам  $a$  из  $\mathfrak{A}$  в частности сопоставляются некоторые классы смежности  $a\mathfrak{B}$ , которые вместе составляют группу  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$ . Следовательно,  $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}\mathfrak{B}/\mathfrak{B}$ , откуда утверждение следует из теоремы о гомоморфизме.

Операторно-гомоморфное отображение группы  $\mathfrak{G}$  на саму себя или на подгруппу называется эндоморфизмом группы  $\mathfrak{G}$ . Если  $\mathfrak{G}$  специально является абелевой группой (с операторами), записанной аддитивно, и если сумма и произведение гомоморфизмов определяются, как выше (§1, пример 6), то операторные гомоморфизмы группы в себя образуют кольцо, кольцо автоморфизмов.

*Кольцо автоморфизмов простой абелевой группы (с операторами) является телом.*

*Доказательство.* Каждый гомоморфизм отображает группу либо на саму себя, либо на нулевую группу (так как других допустимых подгрупп нет). Гомоморфизмы, которые не отображают всё в нуль, согласно сказанному выше о простых группах являются изоморфизмами, а изоморфные отображения группы на себя образуют группу. Значит, после удаления нулевого оператора кольцо становится группой, а потому само кольцо является телом.

Если специально  $\mathfrak{G}$  является левым  $\sigma$ -модулем и операторные гомоморфизмы записываются как правые операторы, то  $\mathfrak{G}$  становится *бимодулем относительно  $\sigma$  слева и кольца автоморфизмов справа*. Действительно, тот факт, что новые операторы  $\Gamma$  были выбраны как гомоморфизмы, выражается формулами

$$(a + b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \quad ra \cdot \Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

<sup>10</sup> Понятие операторного гомоморфизма можно расширить так, чтобы группы  $\mathfrak{G}$ ,  $\overline{\mathfrak{G}}$  имели отдельные области операторов; тогда гомоморфизм отображает не только  $\mathfrak{G}$  на  $\overline{\mathfrak{G}}$ , но и области операторов друг на друга так, что если  $a$  отображается в  $\overline{a}$ , а  $\Theta -$  в  $\overline{\Theta}$ , то  $\Theta \overline{a}$  является образом  $\Theta a$ . В такой общей форме понятие операторного гомоморфизма включает также понятие гомоморфизма колец; ср. §8.

которые (вместе с остальными, уже истолкованными раньше) характеризуют бимодуль.

Обратно, если задан бимодуль, то те же самые формулы выражают, что каждый элемент правой области множителей индуцирует операторный гомоморфизм относительно левых операторов, и наоборот.

### § 3. Композиционные ряды

Если в  $\mathfrak{G}$  имеется конечный ряд допустимых подгрупп

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \dots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \quad (2)$$

( $\mathfrak{E}$  есть группа, состоящая только из единицы  $e$ ), такой, что каждая  $\mathfrak{A}_i$  является нормальным делителем в предыдущем члене, и между двумя последовательными членами ряда уже невозможно вставить еще один член с тем же свойством, то этот ряд называется композиционным рядом.

Фактор-группы  $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$  называются композиционными факторами. Они являются простыми группами, то есть не имеют допустимых нормальных делителей, кроме самих себя и единичной группы.

Если среди операторов взять, в частности, все внутренние автоморфизмы, то ряд (2) состоит только из нормальных делителей и называется главным рядом. Если взять все автоморфизмы, он называется характеристическим рядом. В дальнейших примерах §1 речь шла бы о композиционных рядах идеалов в  $\mathfrak{o}$ , соответственно о композиционных рядах модулей или бимодулей.

*Теорема Жордана–Гельдера. Если для группы  $\mathfrak{G}$  существуют два различных композиционных ряда:*

$$\mathfrak{G} > \mathfrak{A}_1 > \mathfrak{A}_2 > \dots > \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \quad \mathfrak{G} > \mathfrak{B}_1 > \mathfrak{B}_2 > \dots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

*то они имеют одну и ту же длину:  $r = s$ , и композиционные факторы*

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \dots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

*изоморфны в некотором порядке*

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

Доказательство см., например, у E. Noether, *Abstrakter Aufbau* и т. д., Math. Annalen 96 (1926), §10, с. 57. Там одновременно доказывается:

*Если в  $\mathfrak{G}$  имеется композиционный ряд, то через каждый нормальный делитель  $\mathfrak{H}$  группы  $\mathfrak{G}$  можно провести композиционный ряд.*

Существование композиционного ряда ясно для конечных групп, а в более общем виде для тех групп, в которых выполняются условие максимальности и условие минимальности:

*Условие максимальности* означает, что в каждом множестве подгрупп существует максимальная подгруппа, то есть такая, которая уже не содержится ни в какой другой подгруппе этого множества. Эквивалентно этому: всякая возрастающая цепь подгрупп  $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \dots$  обрывается после конечного числа членов.

*Условие минимальности* означает, что в каждом множестве подгрупп существует минимальная подгруппа, которая уже не содержит никакой другой подгруппы этого множества; или, что то же самое, всякая убывающая цепь  $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \dots$  обрывается после конечного числа членов.

*Если в качестве подгрупп допускаются только нормальные делители (например, для абелевых групп), то из существования композиционного ряда, обратно, следуют условие максимальности и условие минимальности.*

*Доказательство.* Каждый нормальный делитель обладает композиционным рядом; его длина называется длиной нормального делителя. Если  $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$ , то длина  $\mathfrak{A}$  меньше длины  $\mathfrak{B}$ , поскольку через  $\mathfrak{A}$  можно провести композиционный ряд для  $\mathfrak{B}$ . Следовательно, всякая подгруппа наименьшей длины одновременно минимальна, а всякая подгруппа наибольшей длины одновременно максимальна.

## § 4. Прямые произведения и пересечения

Группа  $\mathfrak{G}$  называется прямым произведением двух факторов,  $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ , если

1.  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$  являются нормальными делителями в  $\mathfrak{G}$ ,
2.  $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$ ,
3.  $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$ .

Это определение, очевидно, эквивалентно следующему: каждый элемент  $g$  группы  $\mathfrak{G}$  однозначно представляется в виде  $g = ab$ , где  $a$  принадлежит  $\mathfrak{A}$ ,  $b$  принадлежит  $\mathfrak{B}$ , и элементы  $\mathfrak{A}$  коммутируют с элементами  $\mathfrak{B}$ :  $ab = ba$ .

Группа  $\mathfrak{G}$  называется прямым произведением  $n$  факторов,  $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n$ , если, положив  $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_{i-1} \mathfrak{A}_{i+1} \cdots \mathfrak{A}_n$ , имеем, что  $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$  является прямым произведением для каждого  $i$ .

Определение снова эквивалентно следующему: каждый  $g$  из  $\mathfrak{G}$  однозначно представляется как

$$g = a_1 a_2 \cdots a_n, \quad a_i \in \mathfrak{A}_i,$$

и элементы  $\mathfrak{A}_i$  коммутируют с элементами  $\mathfrak{A}_k$ .

Часто используются следующие факты:

1. Если  $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{R}$  и  $\mathfrak{R} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$ , то  $\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$ .
2. Если  $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \cdots \times \mathfrak{C}_n$  и  $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$ , то  $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$ . (Это следует из представления элементов  $\mathfrak{A}_i$  через  $\mathfrak{C}_j$ .)
3. Если  $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$  и  $\mathfrak{R} \supseteq \mathfrak{A}$ , то  $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$ . (Это следует из представления элементов  $\mathfrak{R}$  в форме  $ab$ , где второй множитель принадлежит как  $\mathfrak{R}$ , так и  $\mathfrak{B}$ .)
4. Если  $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ , то  $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$  и  $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$  (вторая теорема об изоморфизме). Отсюда далее следует:
5. Если  $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$ , а  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{B}$  имеют композиционные ряды длин  $m$  и  $n$ , то  $\mathfrak{G}$  имеет композиционный ряд длины  $m + n$ .
6. Если  $\mathfrak{A} \sim \overline{\mathfrak{A}}$  и  $\mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{B}}$ , то  $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \sim \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$ .

Группа называется прямо неразложимой, если ее нельзя представить как прямое произведение факторов, отличных от  $\mathfrak{E}$ .

Ясно, что каждая группа с условием минимальности является прямым произведением конечного числа прямо неразложимых групп.<sup>11</sup>

Если соответствующие группы записывать аддитивно, то понятия произведения и прямого произведения переходят в сумму и прямую сумму. Обозначение: для суммы групп  $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \dots)$ , для прямой суммы  $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \cdots$ .

Понятие "прямого пересечения" далее хотя и не используется, но следующие теоремы о связи между прямым пересечением и прямым произведением показывают, как теорию идеалов следующих глав можно формулировать также через пересечения вместо сумм; тем самым устанавливается связь с известными коммутативными теориями.

Группа  $\mathfrak{D}$  называется прямым пересечением двух групп  $\mathfrak{R}$  и  $\mathfrak{S}$  относительно  $\mathfrak{G}$ , если

1.  $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$  являются нормальными делителями в  $\mathfrak{G}$ ,
2.  $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$ ,
3.  $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$ .

Точно так же  $\mathfrak{D}$  называется прямым пересечением  $n$  групп  $\mathfrak{S}_1, \dots, \mathfrak{S}_n$ , если, положив  $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \cdots \cap \mathfrak{S}_n$ , имеем, что  $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$  является прямым для каждого  $i$ .

<sup>11</sup> Как показали W. Krull в коммутативном случае и O. Schmidt в общем случае (ср. прим. 6), при условии максимальности и минимальности представление единственно с точностью до изоморфизма. Так как, не изменяя понятия прямой неразложимости, можно включить все внутренние автоморфизмы в область операторов, достаточно требовать условий конечности для нормальных делителей или существования главного ряда.

Из определения следует, что  $\mathfrak{D}$  должен быть нормальным делителем в  $\mathfrak{G}$ . Если  $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{S}_n$  является прямым и при гомоморфизме  $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$  группы  $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$  переходят в  $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \mathfrak{E}$ , то  $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \dots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$  становится прямым. Обратно, от каждого такого представления  $\mathfrak{E} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \dots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$  возвращаются к прямому представлению  $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{S}_n$ . Благодаря этому соответствию теоремы о прямых пересечениях при произвольном  $\mathfrak{D}$  сводятся к специальному случаю  $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ .

В случае  $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$  и двух факторов условия для прямого произведения и прямого пересечения совпадают. Для  $n$  факторов существует следующее взаимно однозначное соответствие между прямым произведением и пересечением:

*I. Если  $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \dots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ , то  $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$  является прямым и  $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$ .*

*II. Если  $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$  является прямым, то  $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \dots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$  и  $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$ .*

*Доказательство I.* Пусть  $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$ ; тогда  $\mathfrak{C}_i \supseteq \mathfrak{A}_i$ . Покажем, что  $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$ . Пусть, например,  $c$  принадлежит  $\mathfrak{C}_1$ ; тогда  $c$  принадлежит  $\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_n$ , поэтому представление по компонентам относительно  $\mathfrak{A}$  дает:

$$c = a_1 a_2 \dots a_n = a_1 e a_3 \dots a_n = a_1 a_2 e \dots a_n = \dots = a_1 \dots a_{n-1} e.$$

Так как произведение всех  $\mathfrak{A}_i$  является прямым, эти представления совпадают; на каждом месте, кроме первого, один раз стоит  $e$ , следовательно  $c = a_1$ , или  $\mathfrak{C}_1 \subseteq \mathfrak{A}_1$ , то есть  $\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{A}_1$ , и соответственно  $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$ . Отсюда  $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$ ;  $\mathfrak{B}_i \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$ , следовательно, пересечение прямое.

*Доказательство II.* Пусть  $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \dots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i$ ; тогда  $\mathfrak{T}_i \subseteq \mathfrak{S}_i$ . Покажем, что  $\mathfrak{S}_i \subseteq \mathfrak{T}_i$ . Пусть, например,  $s$  принадлежит  $\mathfrak{S}_1$ ; тогда, в силу  $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$ ,

$$s = s_1 e = s_2 r_2 = \dots = s_n r_n.$$

Образуем  $t_1 = e r_2 \dots r_n = t_i r_i$ ; тогда, учитывая поэлементную коммутативность  $\mathfrak{R}_i$  и  $\mathfrak{S}_i$ , получаем

$$s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1},$$

то есть элемент всех  $\mathfrak{S}_i$ , а потому равный  $e$ . Поэтому  $\mathfrak{S}_1 \subseteq \mathfrak{T}_1$ , или  $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$ , и соответственно  $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$ . Отсюда  $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$  и  $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$ ; следовательно,  $\mathfrak{G}$  является прямым произведением  $\mathfrak{R}_i$ .

## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

### § 5. Вполне приводимые группы

Группа называется *вполне приводимой*, если она является прямым произведением конечного числа простых групп:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n.$$

В этом случае группы

$$\mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \cdots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \cdots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

образуют композиционный ряд. Его длина равна  $n$ , а композиционные факторы суть

$$\sim \mathfrak{A}_n, \mathfrak{A}_{n-1}, \dots, \mathfrak{A}_1.$$

*Если  $\mathfrak{G}$  вполне приводима, то каждый нормальный делитель является прямым фактором, а другой фактор можно выбрать как произведение тех простых групп, которые входят в заданное разложение  $\mathfrak{G}$  в произведение. Нормальный делитель  $\mathfrak{H}$  также вполне приводим.*

*Доказательство.* Имеем

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \mathfrak{A}_1 \mathfrak{A}_2 \cdots \mathfrak{A}_n. \quad (3)$$

Положим  $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H} \mathfrak{A}_1 \cdots \mathfrak{A}_i$ ; тогда  $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i \mathfrak{A}_{i+1}$ . Либо  $\mathfrak{A}_{i+1} \leq \mathfrak{H}_i$ , следовательно  $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$ ; тогда в (3) опускаем фактор  $\mathfrak{A}_{i+1}$ . Либо  $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$  является собственным нормальным делителем в  $\mathfrak{A}_{i+1}$ , следовательно равен  $\mathfrak{E}$ , и потому  $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$  является прямым произведением. После удаления лишних факторов (3) принимает вид

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

следовательно  $\mathfrak{H}$  является прямым фактором. Далее имеем

$$\mathfrak{H} \sim \mathfrak{G} / (\mathfrak{A}_{i_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{i_r}) \sim \mathfrak{A}_{j_1} \times \cdots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

где  $\mathfrak{A}_{j_1}, \dots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$  являются остальными группами  $\mathfrak{A}_i$ ; следовательно  $\mathfrak{H}$  вполне приводим.

*Следствие.* Всякое разложение вполне приводимой группы на прямо неразложимые факторы является разложением на простые факторы и, следовательно, дает композиционный ряд; отсюда следует однозначная определенность факторов с точностью до изоморфизма.



## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

### § 6. Модули относительно тела. Гиперкомплексные системы

Почти тривиальный пример вполне приводимых групп с операторами дают модули с конечной базой относительно (не обязательно коммутативного) тела.

Пусть  $\mathfrak{G}$  является правым  $K$ -модулем, и пусть единичный элемент  $e$  тела  $K$  одновременно является единичным оператором:  $ae = a$  для  $a$  из  $\mathfrak{G}$ . Каждый подмодуль  $aK$ , порожденный элементом  $a$ , прост, а именно равен модулю, порожденному любым его ненулевым элементом. Следовательно, если  $\mathfrak{H}$  является подмодулем, порожденным некоторыми элементами, а  $a$  – элемент, не принадлежащий  $\mathfrak{H}$ , то  $\mathfrak{H} \cap aK = \mathfrak{E}$ , и потому  $\mathfrak{H} + aK$  является прямой суммой. Так, начиная с любого базисного элемента  $a_1$ , можно всякий раз присоединять новые базисные элементы  $a_2, a_3, \dots$  и получить  $\mathfrak{G}$  как прямую сумму

$$\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \dots + a_nK.$$

Следовательно,  $\mathfrak{G}$  вполне приводим.

Число  $n$ , то есть длина композиционного ряда, называется *рангом*  $\mathfrak{G}$  относительно  $K$ . База  $a_1, \dots, a_n$  линейно независима в силу единственности представления элементов  $\mathfrak{G}$  (и потому, что  $e$  был предположен единичным оператором).

Каждый подмодуль  $\mathfrak{H}$  является прямым слагаемым:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{K} = (h_1K + \dots + h_sK) + (r_1K + \dots + r_{n-s}K),$$

или: *каждую линейно независимую базу  $\mathfrak{H}$  можно дополнить до линейно независимой базы  $\mathfrak{G}$* . Элементы  $r_i$  можно даже выбрать из исходных базисных элементов  $a_i$ .

Пусть  $(a_1, \dots, a_n)$  и  $(c_1, \dots, c_n)$  – линейно независимые базы. Тогда

$$c_k = \sum_i a_i \pi_{ik},$$

или, в матричной записи,

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P, \quad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \dots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \dots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Обратно,

$$(a_1, \dots, a_n) = (c_1, \dots, c_n)Q.$$

Отсюда следует

$$(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n)PQ, \quad (c_1, \dots, c_n) = (c_1, \dots, c_n)QP,$$

а значит, поскольку  $a_i$  и  $c_i$  линейно независимы,

$$PQ = QP = E.$$

Специальные  $K$ -модули, которые одновременно являются кольцами, суть “гиперкомплексные системы”.

Кольцо  $\mathfrak{o}$ , которое одновременно является правым модулем относительно коммутативного поля  $K$ , называется *гиперкомплексной системой относительно  $K$*  (в литературе также “алгеброй над  $K$ ”), если:

1. ранг конечен (пусть линейно независимой базой является  $u_1, \dots, u_n$ );

2.  $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$ . Это выражают так:  $K$  коммутативно связано с  $\mathfrak{o}$ ;
3. единичный элемент  $e$  поля  $K$  одновременно является единичным оператором:  $ae = a$  для  $a$  из  $\mathfrak{o}$ .

Поскольку

$$\left(\sum_i u_i \alpha_i\right) \left(\sum_k u_k \beta_k\right) = \sum_{i,k} (u_i u_k) (\alpha_i \beta_k),$$

система однозначно определена, как только, кроме  $K$ , задана *таблица умножения*, указывающая, как каждое произведение  $u_i u_k$  выражается через  $u_j$ :

$$u_i u_k = \sum_j u_j \gamma_{ik}^j.$$

Элементы  $\gamma_{ik}^j$  должны удовлетворять известным соотношениям, следующим из ассоциативного закона.

Если  $\mathfrak{o}$ , как мы часто будем предполагать, имеет единичный элемент  $e$  ( $ea = ae = a$  для всех  $a$ ), то элементы  $x$  поля  $K$  можно отождествить с  $ex$ , то есть рассматривать  $K$  как подполе в  $\mathfrak{o}$ . Тогда гиперкомплексную систему можно также описать как *кольцо конечного ранга относительно поля, лежащего в центре*.

Примером гиперкомплексной системы является *групповое кольцо* конечной группы: в качестве базисных элементов  $u_i$  берут элементы конечной группы, а в качестве умножения – групповое умножение. Поле  $K$  при этом произвольно.

---

<sup>12</sup>Условие 2 означает, что умножение на элемент из  $K$  задает гомоморфизм для  $\mathfrak{o}$ , когда  $\mathfrak{o}$  рассматривается и как левый  $\mathfrak{o}$ -модуль, и как правый  $\mathfrak{o}$ -модуль. В силу 3 эти гомоморфизмы даже являются изоморфизмами.

## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение: глава I, §§5–7, и глава II, §§8–14.

### § 7. Матрицы

Квадратные матрицы  $(\pi_{ik})$ , где  $\pi_{ik}$  принадлежат кольцу  $\mathfrak{o}$ , образуют кольцо относительно обычного матричного умножения  $\sum_j \pi_{ij} \rho_{jk} = \sigma_{ik}$  и сложения  $\pi_{ik} + \rho_{ik} = \sigma_{ik}$ .

Матрица с элементами из тела  $K$ , для которой существуют правая и левая обратные матрицы, называется *регулярной*.

В §6 мы видели: *матрица перехода между двумя линейно независимыми базами  $K$ -модуля регулярна*.

Для регулярности достаточно правой обратной. Действительно, образуем правый  $K$ -модуль с линейно независимой базой  $(a_1, \dots, a_n)$  (модуль линейных форм от неизвестных  $a_1, \dots, a_n$ ) и положим

$$(c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n)P.$$

Тогда

$$(c_1, \dots, c_n)P^{-1} = (a_1, \dots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \dots, a_n);$$

следовательно,  $(c_1, \dots, c_n)$  снова является базой, значит снова линейно независима; следовательно, матрица  $P$  регулярна. Кроме того, правая обратная равна левой обратной.

Точно так же достаточно левой обратной.

Если  $P$  имеет левую обратную, то  $P$  не является левым делителем нуля. Доказательство. Из  $PA = 0$  следует  $A = P^{-1}PA = 0$ .

Следовательно,  $P$  также имеет только одну правую обратную, которая по §6 совпадает с левой обратной.

Если, как обычно, под  $P_x$  понимать матрицу  $(\pi_{ikx})$ , а под  $C_{ik}$  — матрицу, у которой на месте  $ik$  стоит единичный элемент, а всюду в остальных местах нули, то

$$(\pi_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik} \pi_{ik};$$

следовательно, матрицы над  $K$  образуют  $K$ -модуль ранга  $n^2$ . Матрицы  $C_{ik}$  удовлетворяют соотношениям

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \quad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Тем самым матрицы над  $K$  образуют конечный  $K$ -модуль и, если  $K$  коммутативно, гиперкомплексную систему.

## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение: глава II, §§8–14.

### Глава II. Некоммутативная теория идеалов

#### § 8. Теорема о гомоморфизме для колец

Если  $\mathfrak{a}$  является двусторонним идеалом в  $\mathfrak{o}$ , то область классов вычетов  $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$  является не только  $\mathfrak{o}$ -модулем, но и кольцом, как легко видеть. Каждый гомоморфный образ  $\mathfrak{o}$  снова является кольцом и изоморфен кольцу классов вычетов  $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ , где  $\mathfrak{a}$  является двусторонним идеалом. Доказательство такое же, как для групп.

В частности, если  $\mathfrak{o}$  является телом, то нет других идеалов, кроме  $(0)$  и  $\mathfrak{o}$ ; следовательно, здесь гомоморфизм либо является изоморфизмом, либо сопоставляет каждому элементу нуль.

В частности, пусть кольцо  $\mathfrak{o}$  является правым  $K$ -модулем, где  $K$  должно быть кольцом, поэлементно перестановочным с  $\mathfrak{o}$ :

$$ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$$

(например, когда речь идет о гиперкомплексном теле относительно коммутативного тела  $K$ ). Тогда допустимыми (правыми, левыми или двусторонними) идеалами считаются только те, которые одновременно являются  $K$ -модулями, и, кроме гомоморфизма колец, требуется также операторный гомоморфизм относительно умножения на  $K$ . Допустимые идеалы становятся бимодулями относительно  $\mathfrak{o}$  и  $K$ . (В гиперкомплексных системах под “идеалами” без дальнейших уточнений всегда понимают только те, которые допустимы относительно лежащего в основе тела коэффициентов  $K$ .) И при этом расширение приведенная выше теорема о гомоморфизме остается верной.

Примером гомоморфизма колец служит переход от области множителей  $\mathfrak{o}$  к абсолютной области множителей (§1, пример 4). Следовательно, абсолютная область множителей изоморфна кольцу классов вычетов  $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$ , где  $\mathfrak{d}$  является двусторонним идеалом элементов из  $\mathfrak{o}$ , аннулирующих  $\mathfrak{M}$ .

Из справедливости теоремы о гомоморфизме, как и в §2, следуют первая и вторая теоремы об изоморфизме для изоморфизма колец и операторного изоморфизма.

Все произведения  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  подмножеств  $\mathfrak{o}$  следует понимать как модульные произведения:  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$  есть совокупность всех сумм  $\sum ab$ , где  $a$  принадлежит  $\mathfrak{A}$ ,  $b$  принадлежит  $\mathfrak{B}$ , а  $a\mathfrak{B}$  есть совокупность всех сумм  $\sum ab$ , где  $b$  принадлежит  $\mathfrak{B}$ . Если  $\mathfrak{B}$  является правым модулем относительно некоторого кольца как области операторов, то и произведение  $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ , соответственно  $a\mathfrak{B}$ , является правым модулем. (В частности: правым идеалом, допустимым идеалом относительно области коэффициентов  $K$  и т. д.) Если  $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$  обозначает сумму модулей  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ , то имеют место правила вычисления

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B}\mathfrak{C},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{A}\mathfrak{B}, \mathfrak{A}\mathfrak{C}), \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{A}\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\mathfrak{C}).$$

Прямая сумма обозначается через  $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$  (§4).

Далее мы часто будем рассматривать кольца, удовлетворяющие условию максимальности или минимальности (§3) для правых идеалов. К ним относятся, в частности, гиперкомплексные системы, поскольку по принятому выше соглашению в качестве идеалов допускаются только  $K$ -модули, а значит их ранг остается ограниченным (§6).

## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение: глава II, §§8–14.

### Глава II. Некоммутативная теория идеалов

#### § 9. Идемпотентные элементы. Прямое разложение на правые идеалы

Пусть  $\mathfrak{o}$  является кольцом с единичным элементом.

Если  $\mathfrak{r}$  является правым идеалом, то  $\mathfrak{r}\mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}$ , а из-за наличия единичного элемента даже  $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}$ . Соответственно для левых идеалов:  $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$ .

Элемент  $c$  называется идемпотентным, если  $c^2 = c$ .

Если  $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$  является разложением на правые идеалы и при этом

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \quad e_i \in \mathfrak{r}_i,$$

то

$$e_i^2 = e_i, \quad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{“соотношения ортогональности”}),$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}.$$

*Доказательство.* Пусть  $r$  является элементом  $\mathfrak{r}_1$ . Тогда

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r, \quad e_i r \in \mathfrak{r}_i,$$

но также

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

следовательно,

$$e_1 r = r, \quad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

Из первой формулы следует  $\mathfrak{r}_1 \subseteq e_1 \mathfrak{o}$ ; с другой стороны,  $e_1 \mathfrak{o} \subseteq \mathfrak{r}_1$ , значит  $e_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$ . При специализации  $r = e_1$  получаем

$$e_1^2 = e_1, \quad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

То же самое имеет место, если индекс 1 заменить на  $k$ .

Обратно, если  $e = \sum e_i$ ,  $e_i e_k = 0$  ( $i \neq k$ ),  $e_i^2 = e_i$  и положить  $\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}$ , то  $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ .

*Доказательство.* Каждый элемент  $r$  из  $\mathfrak{o}$  имеет вид

$$r = er = e_1 r + \cdots + e_n r,$$

поэтому

$$\mathfrak{o} = (e_1 \mathfrak{o}, \dots, e_n \mathfrak{o}).$$

Но это представление единственно: действительно, из

$$0 = e_1 a_1 + \cdots + e_n a_n$$

после умножения на  $e_i$  следует

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.$$

Из правого представления

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}$$

тем самым следует левое представление

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Если  $\mathfrak{r}_i$  прямо неразложимы, то такими же являются и  $\mathfrak{l}_i$ ; ведь разложение, скажем,  $\mathfrak{l}_1$ , означало бы

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o}e_1 = \mathfrak{o}e'_1 + \mathfrak{o}e''_1, \quad \mathfrak{o} = \mathfrak{o}e'_1 + \mathfrak{o}e''_1 + \mathfrak{o}e_2 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Отсюда возникло бы правое разложение

$$\mathfrak{o} = e'_1\mathfrak{o} + e''_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o} = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1 + \mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2 + \cdots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}'_1 + \mathfrak{r}''_1,$$

то есть  $\mathfrak{r}_1$  был бы разложимым.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Имеет место еще одно обращение: если  $e_ie_k = 0$ ,  $e_i^2 = e_i$ ,  $c = \sum e_i$ , то  $c$  является левой единицей для кольца  $e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$ . То, что сумма является прямой, видно совершенно так же, как выше.

## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение: глава II, §§8–14.

### Глава II. Некоммутативная теория идеалов

#### § 10. Разложение на двусторонние идеалы

Пусть  $\mathfrak{o}$  снова является кольцом с единичным элементом, и пусть

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n \quad (1)$$

есть разложение  $\mathfrak{o}$  на двусторонние идеалы. Тогда соотношения ортогональности имеют место и для идеалов:

$$\mathfrak{a}_i \mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \quad (2)$$

*Доказательство.* Пусть  $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \cdots + \mathfrak{a}_n$ ,  $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$ ; тогда  $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 \leq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$ , значит  $\mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1 = 0$ , и тем более

$$\begin{aligned} \mathfrak{a}_1 \mathfrak{a}_i &= 0 \quad (i \neq 1); \\ \mathfrak{a}_1 &= \mathfrak{a}_1 \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 (\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1 \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2. \end{aligned}$$

Обратно: из (1) и (2) следует, что модули  $\mathfrak{a}_i$  являются двусторонними идеалами. *Доказательство.*

$$\mathfrak{o} \mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n) \mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \quad \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i.$$

*Правые идеалы в кольце  $\mathfrak{a}_i$  являются правыми идеалами в  $\mathfrak{o}$ . Доказательство.*

$$\mathfrak{r} \mathfrak{o} = \mathfrak{r} (\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i, \mathfrak{r} \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}.$$

Если  $\mathfrak{r}$  является правым идеалом в  $\mathfrak{o}$ , то  $\mathfrak{r}$  является прямой суммой правых идеалов  $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$ . *Доказательство.*  $\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{o} = (\mathfrak{r} \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n)$ , и  $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$ , значит  $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i$  являются правыми идеалами, содержащимися в  $\mathfrak{r}$ . Далее,  $\mathfrak{r} \mathfrak{a}_i \leq \mathfrak{a}_i$ , поэтому сумма прямая:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r} \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{r} \mathfrak{a}_n.$$

В частности, если  $\mathfrak{r}$  прямо неразложим, то  $\mathfrak{r}$  может иметь только одну компоненту; следовательно,  $\mathfrak{r}$  должен лежать в одном из  $\mathfrak{a}_i$ .

На основании этих теорем теория идеалов в  $\mathfrak{o}$  становится управляемой, как только известна теория идеалов отдельных  $\mathfrak{a}_i$ . Поэтому мы в основном ограничиваемся двусторонне неразложимыми кольцами.

*Два правых идеала, содержащиеся в различных  $\mathfrak{a}_i$ , никогда не могут быть операторно изоморфны. Доказательство.* Идеал, лежащий в  $\mathfrak{a}_1$ , аннулируется всеми остальными  $\mathfrak{a}_k$ , но не аннулируется  $\mathfrak{a}_1$ . Напротив, идеал, лежащий в  $\mathfrak{a}_2$ , аннулируется  $\mathfrak{a}_1$ .

Итак, если кольцо  $\mathfrak{o}$  можно разложить на двусторонне неразложимые идеалы  $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$ , и каждое  $\mathfrak{a}_i$  снова разложить на односторонне неразложимые правые идеалы  $\mathfrak{r}'_i + \mathfrak{r}''_i + \cdots$ , то операторно изоморфные  $\mathfrak{r}$  надо искать среди тех, которые принадлежат одному и тому же  $\mathfrak{a}_i$ . Но бывает, что в одном и том же  $\mathfrak{a}_i$  есть еще различные классы  $\mathfrak{r}$  – то есть классы, не операторно изоморфные, – как показывает следующий пример.

Пусть  $K$  есть поле рациональных чисел,

$$\mathfrak{o} = e_1 K + e_2 K + u K$$

гиперкомплексная система, причем  $e_i$  и  $u$  коммутируют с числами из  $K$ , а таблица умножения имеет вид

|       | $e_1$ | $e_2$ | $u$ |
|-------|-------|-------|-----|
| $e_1$ | $e_1$ | 0     | $u$ |
| $e_2$ | 0     | $e_2$ | 0   |
| $u$   | 0     | $u$   | 0   |

Единичным элементом является  $e = e_1 + e_2$ . Элементы  $e_i$  удовлетворяют соотношениям ортогональности. Следовательно, правое разложение есть

$$\mathfrak{o} = e_1 \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2),$$

а левое разложение есть

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1) + (e_2, u).$$

Так как  $e_2 \mathfrak{o}$  и  $\mathfrak{o}e_1$  явно неразложимы, то  $\mathfrak{o}e_2$  и  $e_1 \mathfrak{o}$  также должны быть неразложимы.

Двустороннее разложение невозможно; ведь тогда одна компонента должна была бы содержать  $e_1 \mathfrak{o}$ , а другая —  $e_2 \mathfrak{o}$ ; первая тогда содержала бы  $u$ , но и вторая содержала бы  $ue_2 = u$ .

Однако  $e_1 \mathfrak{o}$  и  $e_2 \mathfrak{o}$  не операторно изоморфны, поскольку они имеют разный ранг относительно  $K$ .

Пусть  $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$ , и пусть  $\mathfrak{a}_i$  двусторонне неразложимы. Тогда они определены однозначно.

*Доказательство.* Пусть, кроме того,  $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \cdots + \mathfrak{c}_n$ , то есть

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i \mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_1, \dots, \mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_n).$$

Последняя сумма прямая, потому что  $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_k \leq \mathfrak{c}_k$  и  $\leq \mathfrak{a}_i$ ; но так как  $\mathfrak{a}_i$  неразложимы, все  $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_k$  должны быть нулевыми, кроме одного:  $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_{j_i}$ . Следовательно,

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_{j_i}.$$

Точно так же:

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o} \mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1 \mathfrak{c}_{j_i} + \cdots + \mathfrak{a}_n \mathfrak{c}_{j_i},$$

и  $\mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$ , следовательно все остальные слагаемые равны 0,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i \mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

что и требовалось доказать.



## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение: глава II, §§8–14.

### Глава II. Некоммутативная теория идеалов

#### § 11. Центр

Центр  $\mathfrak{Z}$  кольца  $\mathfrak{o}$  есть совокупность всех  $z$ , которые коммутируют со всеми элементами кольца ( $za = az$  для всех  $a$ ).  $\mathfrak{Z}$  является коммутативным кольцом.

Каждый односторонний идеал  $\mathfrak{a}$  в  $\mathfrak{o}$  имеет в  $\mathfrak{Z}$  “идеал сужения”  $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ . Действительно, так как и  $\mathfrak{a}$ , и  $\mathfrak{Z}$  являются  $\mathfrak{Z}$ -модулями, то  $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$  также является  $\mathfrak{Z}$ -модулем.

Каждый идеал  $\mathfrak{A}$  в  $\mathfrak{Z}$  имеет идеал расширения: идеал  $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$ , порожденный  $\mathfrak{A}$  в  $\mathfrak{o}$ . Он двусторонний, поскольку

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{a}.$$

Если в  $\mathfrak{o}$  предполагается единичный элемент, то можно писать  $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$ . В этом случае справедлива следующая теорема:

*Каждому разложению  $\mathfrak{o}$  на двусторонние идеалы взаимно однозначно соответствует разложение центра: из*

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n, \quad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \quad (1)$$

*следует*

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i, \quad (2)$$

*и обратно.*

*Доказательство.* Пусть  $z$  является центральным элементом, и пусть

$$z = z_1 + \cdots + z_n \quad (3)$$

есть его разложение согласно (1). Тогда  $z_i$  являются центральными элементами; в самом деле,

$$za = z_1a + \cdots + z_na = az = az_1 + \cdots + az_n;$$

из прямоты суммы и из того, что  $\mathfrak{a}_i$  двусторонний, получаем

$$z_ia = az_i.$$

Следовательно,  $z_i$  лежит в  $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$ , и потому (3) дает утверждаемое разложение в сумму. В частности,  $e = \sum e_i$ ; следовательно,  $e_i$  являются центральными элементами. Наконец,

$$z = ze_1 + \cdots + ze_n,$$

а значит,

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Обратно, если  $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_n$  есть разложение центра, то по §9

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \quad e_i^2 = e_i, \quad e_ie_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Значит, по соотношениям ортогональности §9

$$\begin{aligned} \mathfrak{o} &= \mathfrak{o}e = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n. \end{aligned}$$

Если теперь положить  $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_i$ , то из первой части утверждения известно, что

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}'_1 + \cdots + \mathfrak{A}'_n \quad \text{прямо.}$$

Но  $\mathfrak{A}'_i \supseteq \mathfrak{A}_i$ , следовательно  $\mathfrak{A}'_i = \mathfrak{A}_i$  по §4, 2.

*Следствие.*  $\mathfrak{a}_i$  и  $\mathfrak{A}_i$  одновременно двусторонне прямо разложимы или нет.

## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение: глава II, §§8–14.

### Глава II. Некоммутативная теория идеалов

#### § 12. Нильпотентные идеалы

Идеал  $\mathfrak{c}$  называется *нильпотентным*, если  $\mathfrak{c}^\rho = 0$ .

*Пример.* Идеал  $(u)$  в §10.

Если в  $\mathfrak{o}$  существует нильпотентный правый идеал  $\mathfrak{r}$ , то существует также нильпотентный левый идеал (даже двусторонний идеал).

*Доказательство.* Пусть  $\mathfrak{r}^\rho = 0$ . Тогда  $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$  является левым идеалом; соответственно, если  $\mathfrak{o}$  не содержит единичного элемента и  $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$  мог бы быть нулем, левым идеалом является  $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$ , и

$$(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^\rho = \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{o}\mathfrak{r} \cdots \mathfrak{o}\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{r} \cdots \mathfrak{r} = \mathfrak{o}\mathfrak{r}^\rho = 0.$$

Сумма двух нильпотентных правых идеалов снова является нильпотентным правым идеалом.

*Доказательство.* Пусть  $\mathfrak{c}^\rho = 0$ ,  $\mathfrak{d}^\sigma = 0$ . В

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = (\dots, \mathfrak{d}\mathfrak{c} \cdots \mathfrak{d} \cdots \mathfrak{c}, \dots)$$

каждый член содержит либо по меньшей мере  $\rho$  множителей  $\mathfrak{c}$ , либо по меньшей мере  $\sigma$  множителей  $\mathfrak{d}$ . В первом случае имеем

$$\mathfrak{d}\mathfrak{c} \cdots \mathfrak{d} \cdots \mathfrak{c} \cdots \subseteq \mathfrak{d}\mathfrak{c}\mathfrak{c} \cdots \mathfrak{c} = \mathfrak{d}\mathfrak{c}^\rho = 0;$$

во втором случае соответственно для множителей  $\mathfrak{d}$ . Следовательно,

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\rho+\sigma-1} = 0.$$

Если теперь в  $\mathfrak{o}$  выполнено условие максимальности для правых идеалов, то существует максимальный нильпотентный правый идеал. Он содержит все остальные нильпотентные правые идеалы, поскольку иначе можно было бы образовать сумму с таким идеалом. Обозначим его через  $\mathfrak{c}$ . Так как  $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$  также является нильпотентным правым идеалом, имеем  $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}$ , значит  $\mathfrak{c}$  является левым идеалом. Каждый нильпотентный левый идеал  $\mathfrak{d}$  также содержится в  $\mathfrak{c}$ . Действительно,  $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$  является нильпотентным правым идеалом, значит  $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$ . Итак, существует максимальный (двусторонний) нильпотентный идеал  $\mathfrak{c}$ , или “радикал”, содержащий все остальные (правые и левые).

В примере §10 идеал  $(u)$  является максимальным нильпотентным идеалом.

Если радикал является нулевым идеалом, то говорят о “кольце без радикала” (“полупростом кольце”, “системе Дедекинда”). Кольцо классов вычетов по радикалу всегда является кольцом без радикала.

Если  $\mathfrak{Z}$  есть центр  $\mathfrak{o}$ , а  $\mathfrak{c}$  – радикал  $\mathfrak{o}$ , то  $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$  есть радикал  $\mathfrak{Z}$ .

*Доказательство.* Ясно, что  $\mathfrak{C}$  нильпотентен. Если бы в  $\mathfrak{Z}$  существовал еще больший нильпотентный идеал  $\bar{\mathfrak{C}}$ , то его можно было бы расширить до нильпотентного идеала  $\bar{\mathfrak{c}}$ , не целиком содержащегося в  $\mathfrak{c}$ , поскольку

$$(\bar{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \bar{\mathfrak{C}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0.$$

*Следствие.* Если  $\mathfrak{o}$  является кольцом без радикала, то и  $\mathfrak{Z}$  тоже. Обратное, однако, неверно, как показывает наш пример в §10. Центр  $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$  содержит кольцо, изоморфное  $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$ ; но оно может быть собственным подкольцом (пример в §10).

## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение: глава II, §§8–14.

### Глава II. Некоммутативная теория идеалов

#### § 13. Вполне приводимые кольца

Согласно §5, кольцо называется справа вполне приводимым, если оно является прямой суммой конечного числа простых правых идеалов.

*Справа вполне приводимое кольцо с единичным элементом не имеет нильпотентного идеала  $\neq (0)$ , а значит, не имеет радикала.*

*Доказательство.* Каждый правый идеал  $\mathfrak{r}$  является прямым слагаемым (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} = e_1 \mathfrak{o} + e_2 \mathfrak{o}.$$

Так как  $e_2^2 = e_2$ , то также  $e_2^p = e_2$ . Если бы  $\mathfrak{r}$  был нильпотентным, то было бы  $e_2^p = 0$ , значит  $e_2 = 0$ , значит  $\mathfrak{r} = 0$ , q.e.d.

Теперь докажем оба обратных утверждения. Во-первых: *кольцо без радикала, удовлетворяющее условию минимальности для правых идеалов, вполне приводимо относительно правых идеалов.*

*Доказательство.* Пусть  $\mathfrak{t}$  – минимальный правый идеал  $\neq 0$ . Мы хотим показать, что  $\mathfrak{t}$  содержит идемпотентный элемент.

Так как  $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$  и  $\mathfrak{t}^2 \neq 0$ , следует  $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$ , поскольку  $\mathfrak{t}^2$  является правым идеалом. Следовательно, существует  $a$  в  $\mathfrak{t}$  такое, что  $a\mathfrak{t} \neq 0$ . Но тогда должно быть  $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$ , поскольку  $a\mathfrak{t}$  является правым идеалом.

Совокупность всех  $b$  в  $\mathfrak{t}$ , аннулируемых элементом  $a$  ( $ab = 0$ ), является правым идеалом и не равна  $\mathfrak{t}$ , следовательно равна 0. Итак, из  $ab = 0$  следует  $b = 0$ .

Из  $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$  следует, что  $a$  можно представить в виде  $ac$ :  $a = ac$ ,  $c \neq 0$ . Отсюда

$$ac = ac^2, \quad a(c - c^2) = 0, \quad c - c^2 = 0, \quad c^2 = c.$$

Далее покажем, что  $\mathfrak{t}$  является прямым слагаемым.  $c\mathfrak{o}$  есть правый идеал  $\subseteq \mathfrak{t}$ ,  $\neq 0$ , так как  $c^2 = c$  принадлежит  $c\mathfrak{o}$ ; значит,  $c\mathfrak{o} = \mathfrak{t}$ . Каждый элемент  $r$  из  $\mathfrak{o}$  допускает представление

$$r = cr + (r - cr) \quad (\text{одностороннее разложение Пирса}).$$

Элементы  $cr$  образуют идеал  $\mathfrak{t}$ ; элементы  $r - cr$  образуют другой правый идеал  $\mathfrak{r}$ , который аннулируется элементом  $c$ :  $c\mathfrak{r} = 0$ . Поэтому

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \mathfrak{r}).$$

Так как элементы из  $\mathfrak{t}$  не аннулируются элементом  $c$ , эта сумма прямая:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}. \quad (1)$$

Если теперь на основании условия минимальности представить  $\mathfrak{o}$  как прямую сумму прямо неразложимых идеалов:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n,$$

то идеалы  $\mathfrak{r}_i$  должны быть простыми (= минимальными). Действительно, если бы, например,  $\mathfrak{r}_1$  не был простым, а  $\mathfrak{t}$  был минимальным идеалом в  $\mathfrak{r}_1$ , то из (1) имели бы

$$\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} \cap \mathfrak{r}_1 \quad \S 4, 3;$$

значит,  $\mathfrak{r}_1$  был бы разложим, что невозможно. Следовательно,  $\mathfrak{o}$  вполне приводимо.

Во-вторых: *кольцо без радикала с условием минимальности имеет единичный элемент.*

Чтобы сначала показать существование левой единицы, достаточно доказать следующее: *если правый идеал  $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$  имеет левую единицу  $c_1$ , то существует правый идеал  $\mathfrak{c}$  большей длины, который также имеет левую единицу  $c$* . Поскольку полная приводимость, то есть ограниченность всех длин, уже доказана, этим за конечное число шагов приходим к левой единице для самого  $\mathfrak{o}$ .

Пусть, следовательно,  $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$  и  $c_1^2 = c_1$ . Формула

$$r = c_1r + (r - c_1r)$$

дает, как выше, разложение Пирса  $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$ . Пусть, как выше,  $c_2$  – идемпотентный элемент из  $\mathfrak{r}$ , то есть  $c_2^2 = c_2$ ,  $c_1c_2 = 0$  (так как  $c_1$  аннулирует все элементы из  $\mathfrak{r}$ ). Положив  $e_1 = c_1$ ,  $e_2 = c_2 - c_2c_1$ , получаем

$$e_1^2 = e_1, \quad e_1e_2 = 0, \quad e_2e_1 = 0, \quad e_2c_2 = e_2, \quad e_2 \neq 0, \quad e_2^2 = e_2.$$

По замечанию, сделанному в примечании, отсюда  $c = e_1 + e_2$  становится левой единицей для кольца

$$c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o},$$

которое, поскольку  $e_2^2 = e_2 \neq 0$ , как правый идеал имеет большую длину, чем  $\mathfrak{a}$ .

Чтобы показать, что построенная левая единица  $e$  является также правой единицей, выполним разложение Пирса в левые идеалы:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Имеем  $\mathfrak{l}e = 0$ ,  $\mathfrak{l} = e\mathfrak{l}$ , значит  $\mathfrak{l}^2 = \mathfrak{l}e\mathfrak{l} = 0$ , значит, поскольку по предположению нильпотентного левого идеала существовать не может,  $\mathfrak{l} = 0$ . Следовательно,  $e$  является также правой единицей, а тем самым единицей вообще.

*Теорема. Из правосторонней полной приводимости и существования единицы следует двусторонняя:*

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \dots + \mathfrak{d}_s, \quad \mathfrak{d}_i \text{ двусторонне просты.}$$

Как и в предыдущем доказательстве, достаточно показать, что каждый минимальный (двусторонний) идеал  $\mathfrak{a}$  является прямым слагаемым. Как правый идеал  $\mathfrak{a}$  является прямым слагаемым:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Соответствующее левое разложение имеет вид

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Следует

$$\mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \leq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, \quad \mathfrak{l}\mathfrak{a} = \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0,$$

$$(\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 = \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, \quad \text{значит } \mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0;$$

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, \quad \mathfrak{l} = \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}.$$

Итак,  $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$ , значит  $\mathfrak{r}$  двусторонний; следовательно,  $\mathfrak{a}$  является двусторонним прямым слагаемым. Далее доказательство идет так же, как доказательство односторонней полной приводимости.

Идеалы  $\mathfrak{d}_i$  также двусторонне просты как кольца, поскольку все идеалы в  $\mathfrak{d}_i$  являются идеалами в  $\mathfrak{o}$ . Теперь исследуем их структуру.

## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение: глава II, §§8–14.

### Глава II. Некоммутативная теория идеалов

#### § 14. Двусторонне простые вполне приводимые кольца с единичным элементом

Пусть  $\mathfrak{o}$  – такое кольцо:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1 \mathfrak{o} + \cdots + e_n \mathfrak{o}, \quad \mathfrak{r}_i \text{ простые.}$$

Тогда следует

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n, \quad \mathfrak{l}_i \text{ прямо неразложимы §9.}$$

$\mathfrak{l}_i \mathfrak{r}_i$  является двусторонним идеалом  $\neq 0$  (так как  $e_i^2$  лежит в  $\mathfrak{l}_i \mathfrak{r}_i$ ), значит, равен  $\mathfrak{o}$ .

Положив  $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_k$ , получаем прямую сумму

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \dots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_n) = (\dots, \mathfrak{A}_{ij}, \dots).$$

Действительно, если  $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$ , то, так как  $a_{ij}$  лежит в  $\mathfrak{r}_i$ , а  $\sum \mathfrak{r}_i$  является прямой суммой,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

и далее, поскольку  $a_{ij}$  лежит в  $\mathfrak{l}_j$ ,

$$0 = a_{ij}.$$

Далее:  $\mathfrak{A}_{ij} \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_j \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$ , значит  $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$ . Пусть  $a_{ij} \neq 0$  лежит в  $\mathfrak{A}_{ij}$ . Тогда

$$a_{ij} \mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \quad a_{ij} \mathfrak{r}_j \neq 0, \text{ так как } a_{ij} e_j = a_{ij},$$

следовательно

$$a_{ij} \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Если для каждого  $r_j$  из  $\mathfrak{r}_j$  положить

$$a_{ij} r_j = r_i,$$

то отображение  $r_j \mapsto r_i$  является операторным гомоморфизмом из  $\mathfrak{r}_j$  в  $\mathfrak{r}_i$ . Элементы, которым сопоставляется нуль, образуют идеал  $\subseteq \mathfrak{r}_j$ , значит нулевой идеал; следовательно, это *изоморфизм*. Тем самым:

*Любые два простых правых идеала  $\mathfrak{r}_i$  и  $\mathfrak{r}_j$ , встречающиеся в одном представлении  $\mathfrak{o}$ , операторно изоморфны; изоморфизмы осуществляются элементами из  $\mathfrak{A}_{ij}$ . Так как любые два различных простых правых идеала  $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$  всегда встречаются вместе хотя бы в одном представлении  $\mathfrak{o}$ , то любые два таких идеала также изоморфны.*

*Все гомоморфизмы из  $\mathfrak{r}_j$  в  $\mathfrak{r}_i$  осуществляются элементами из  $\mathfrak{A}_{ij}$ .*

*Доказательство.* Если  $e_j \mapsto a_{ij}$ , то из  $e_j^2 \mapsto a_{ij} e_j$  следует, что  $a_{ij} = a_{ij} e_j$  лежит в  $\mathfrak{r}_i \mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$ ; далее

$$\mathfrak{r}_j = e_j \mathfrak{r}_j \mapsto a_{ij} \mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

*В частности, гомоморфизмы  $\mathfrak{r}_i$  в себя осуществляются через  $\mathfrak{A}_{ii}$ .*

Произведению двух элементов из  $\mathfrak{A}_{ii}$  соответствует произведение гомоморфизмов, а сумме – сумма. (Определение см. §1, 6.) Различные  $a_{ii}$  дают различные автоморфизмы, поскольку  $e_i$  переходит в  $a_{ii} e_i = a_{ii}$ . Следовательно, кольцо  $\mathfrak{A}_{ii}$  изоморфно кольцу автоморфизмов  $\mathfrak{r}_i$ .

Но кольцо автоморфизмов простого идеала является телом (§2), значит  $\mathfrak{A}_{ii}$  является телом. Так как далее все  $\mathfrak{r}_i$  операторно изоморфны, то и их кольца автоморфизмов изоморфны как кольца:  $\mathfrak{A}_{ii}$

однозначно определяется кольцом  $\mathfrak{o}$  с точностью до изоморфизма колец. Различные возможные  $\mathfrak{A}_{ii}$  являются лишь различными конкретными реализациями абстрактно определенного кольца автоморфизмов простых правых идеалов.

*Основная теорема. Каждое вполне приводимое двусторонне простое кольцо  $\mathfrak{o}$  с единичным элементом изоморфно кольцу матриц  $n$ -й степени над телом  $K$ . (Тело  $K$  изоморфно телу автоморфизмов правых идеалов кольца  $\mathfrak{o}$ .)*

*Доказательство. Построение матричных единиц  $c_{ik}$ .* Пусть  $\Gamma_{11}$  – тождественный автоморфизм  $\mathfrak{r}_1$ , а  $\Gamma_{i1}$  – произвольный изоморфизм  $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$ ; наконец положим

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Тогда вообще

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Если  $\Gamma_{ik}$  осуществляется элементом  $c_{ik}$  из  $\mathfrak{A}_{ik}$ , то далее следует:

$$c_{ik} = e_i c_{ik} = c_{ik} e_k, \quad c_{ik} c_{kl} e_l = c_{il} e_l,$$

значит

$$c_{ik} c_{kl} = c_{il}, \quad c_{ij} c_{kl} = c_{ij} e_j e_k c_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Следовательно,  $c_{ik}$  являются матричными единицами (§7).

*Построение  $K$ . Соответствие*

$$a_{ij} = c_{i1} a_{11} c_{1i}$$

ставит каждому  $a_{11}$  из  $\mathfrak{A}_{11}$  в соответствие “сопряженный элемент”  $a_{ii}$  из  $\mathfrak{A}_{ii}$ .

Это соответствие является изоморфизмом колец, поскольку изоморфизмы  $\Delta, \Gamma$ , соответствующие  $a$  и  $c$ , связаны формулой

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1} \Delta_{11} \Gamma_{i1}^{-1},$$

а такое соотношение, как известно, задает изоморфизм колец. Теперь образуем элементы

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn} = a_{11} + c_{21} a_{11} c_{12} + \cdots + c_{n1} a_{11} c_{1n}.$$

Каждому  $a_{11}$  соответствует единственный  $\alpha$  (взаимно однозначно, поскольку сумма прямая). Совокупность всех  $\alpha$  является телом  $K \sim \mathfrak{A}_{11}$ , ибо из

$$\alpha = a_{11} + \cdots + a_{nn}, \quad \beta = b_{11} + \cdots + b_{nn},$$

следует

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \cdots + (a_{nn} + b_{nn}), \quad \alpha\beta = a_{11}b_{11} + \cdots + a_{nn}b_{nn};$$

значит, соответствие  $a_{11} \mapsto \alpha$  является изоморфизмом.

Далее

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

следовательно, каждое  $\alpha$  перестановочно со всеми  $c_{ik}$ .

Наконец, из тех же формул следует

$$c_{ik}K = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

а значит

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K.$$

---

<sup>0</sup> Недавно Б. Л. ван дер Варден нашел более простое доказательство, работающее непосредственно с абстрактным телом автоморфизмов; оно должно быть приведено в его книге по алгебре (Grundlehren d. Math. Wiss., Berlin: Julius Springer). [11. 6. 29.]

*Соответствие.* Если каждый элемент  $\mathfrak{o}$  представить в виде  $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$  и сопоставить этому элементу матрицу  $(\alpha_{ik})$ , то соответствие становится изоморфизмом, что сразу следует из определения умножения матриц. Тем самым основная теорема доказана.

*Обратное утверждение.* Кольцо матриц  $n$ -й степени над телом  $A$  является двусторонне простым и вполне приводимым;  $A$  изоморфно кольцу автоморфизмов правых идеалов, а  $Ae$  есть то  $K$ , которое построено в предыдущей теореме.

*Доказательство.* Пусть матричные единицы (§7) равны  $c_{ik}$ . Положим

$$\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik}A.$$

Тогда очевидно  $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_n$ . Идеалы  $\mathfrak{r}_i$  являются простыми правыми идеалами, поскольку каждый ненулевой элемент  $\sum c_{ik}\alpha_k$  порождает весь  $\mathfrak{r}_i$ . Действительно, если  $\alpha_j \neq 0$ , то

$$\left(\sum c_{ik}\alpha_k\right) \cdot (c_{jl}\alpha_j^{-1}) = c_{il},$$

и  $\sum c_{il}\beta_l$  пробегает все элементы  $\mathfrak{r}_i$ .

Идеалы  $\mathfrak{r}_i$  операторно изоморфны:  $\mathfrak{r}_i = c_{ik}\mathfrak{r}_k$ .

Отсюда следует:  $\mathfrak{o}$  двусторонне неразложимо, следовательно, по теореме §13 и на основании уже доказанной полной приводимости, а также поскольку существует единичный элемент, оно двусторонне просто (это видно и из того, что любой  $\sum \sum c_{ik}\alpha_{ik} \neq 0$  порождает весь двусторонний идеал  $\mathfrak{o}$ ).

Далее

$$\begin{aligned}\mathfrak{r}_i &= c_{ii}\mathfrak{o}, & \mathfrak{l}_i &= \mathfrak{o}c_{ii}, \\ e &= \sum c_{ii}, & c_{ii} &= e_i, \\ \mathfrak{A}_{ii} &= \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii}A \sim A.\end{aligned}$$

Наконец, положив  $a_{11} = c_{11}\lambda$ , получаем

$$\alpha = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \dots = c_{11}\lambda + c_{22}\lambda + \dots = e\lambda,$$

что и доказывает все утверждение.

*Центр  $\mathfrak{o}$  является центром  $K$ , а значит телом.*

*Доказательство.*  $\mathfrak{Z}(K)$  состоит из всех  $\zeta$ , перестановочных со всеми  $x$ . Но они перестановочны также со всеми  $c_{ik}$ , а значит и с суммами  $\sum c_{ik}a_{ik}$ . Следовательно:

$$\mathfrak{Z}(K) \subseteq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Обратно, пусть  $z$  лежит в  $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$ :

$$\begin{aligned}z &= \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu\nu} \gamma_{\mu\nu}. \\ zc_{ik} &= c_{ik}z, & \sum_{\mu} c_{\mu k} \gamma_{\mu i} &= \sum_{\nu} c_{i\nu} \gamma_{k\nu}.\end{aligned}$$

Значит,

$$\begin{aligned}\gamma_{\mu i} &= 0 \quad (\mu \neq i), & c_{ik}\gamma_{ii} &= c_{ik}\gamma_{kk}, & \gamma_{ii} &= \gamma_{kk} = \gamma; \\ z &= \sum c_{ii}\gamma = e\gamma = \gamma.\end{aligned}$$

Итак,  $z$  лежит в  $K$  и перестановочен со всеми  $x$ , значит  $z$  лежит в  $\mathfrak{Z}(K)$ .

Поскольку матричное кольцо, конечно, также вполне приводимо слева, а каждое справа вполне приводимое кольцо с единичным элементом является прямой суммой матричных колец, следует:

*Каждое справа вполне приводимое кольцо с единичным элементом является также слева вполне приводимым, и наоборот.*

И еще: центр вполне приводимого кольца с единичным элементом является прямой суммой коммутативных тел, соответствующих двусторонне простым матричным кольцам.

Остается следующая теорема:

Любые два различных разложения  $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}K$ ,  $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik}K'$  переходят друг в друга посредством внутренних автоморфизмов  $\alpha' \mapsto x^{-1}\alpha'x$ ,  $c'_{ik} \mapsto x^{-1}c_{ik}x$ .

Доказательство. Пусть

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \cdots + \mathfrak{r}'_n,$$

и пусть  $a, b$  – элементы, осуществляющие два взаимно обратных изоморфизма идеалов  $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$ :

$$\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1, \quad \mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1, \quad ab = c_{11}, \quad ba = c'_{11}.$$

Положим

$$x = \sum_i c_{i1}ac'_{1i}, \quad y = \sum_i c'_{i1}bc_{1i}.$$

Тогда

$$xy = e, \quad y = x^{-1}, \quad x^{-1}c_{ik}x = c'_{ik}, \quad x^{-1}\alpha x = \alpha'.$$



## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

*Продолжение и завершение: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.*

### Глава III. Теория модулей и представлений

#### § 15. Представления и модули представлений

Пусть  $\mathfrak{o}$  – кольцо, а  $K$  – кольцо с единичным элементом. (В последующих приложениях  $K$  всегда является телом.)

Представлением  $n$ -й степени кольца  $\mathfrak{o}$  в  $K$  называется гомоморфия

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

где  $\mathfrak{D}$  есть кольцо матриц  $n$ -й степени над  $K$ .

Под модулем представления кольца  $\mathfrak{o}$  относительно  $K$  понимается бимодуль  $\mathfrak{M}$  (§1, 5), который является левым  $\mathfrak{o}$ -модулем и правым  $K$ -модулем:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}, \quad \mathfrak{M}K \subseteq \mathfrak{M},$$

и который, далее, является прямой суммой конечного числа однопорожждённых  $K$ -модулей:

$$\mathfrak{M} = x_1K + \cdots + x_nK;$$

причём единичный элемент  $K$  является единичным оператором.

Каждый модуль представления приводит к представлению. Пусть  $c$  принадлежит  $\mathfrak{o}$  и

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik},$$

или

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C, \quad C = (\gamma_{ik}).$$

Тогда матрицы  $C$  образуют представление элемента  $c$ , ибо

$$(b+c)x_k = \sum_i x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik}),$$

$$\begin{aligned} bcx_k &= b \sum_j x_j \gamma_{jk} = \sum_j bx_j \gamma_{jk} = \sum_j \sum_i x_i \beta_{ij} \gamma_{jk} \\ &= \sum_i x_i \left( \sum_j \beta_{ij} \gamma_{jk} \right), \end{aligned}$$

или

$$bc(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)BC.$$

Обратно: каждое представление  $\mathfrak{D}$  кольца  $\mathfrak{o}$  принадлежит модулю представления, а именно некоторому определённом базису этого модуля. А именно, под  $\mathfrak{M}$  понимается совокупность формальных линейных форм от  $x_1, \dots, x_n$ ,

$$y = \sum_i x_i \alpha_i.$$

Тогда  $\mathfrak{M}$  является правым  $K$ -модулем. Далее, если элементу  $c$  поставлена в соответствие матрица  $C = (\gamma_{ik})$ , положим

$$cx_k = \sum_i x_i \gamma_{ik}, \quad c \left( \sum_k x_k \alpha_k \right) = \sum_i x_i \sum_k \gamma_{ik} \alpha_k.$$

Из гомоморфных соотношений

$$c + d \sim C + D, \quad cd \sim CD$$

следует

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i, \quad cd x_i = c(dx_i),$$

и то же самое для сумм  $\sum_i x_i \alpha_i$ . Остальные свойства бимодуля

$$c(y + z) = cy + cz, \quad c(y\alpha) = (cy)\alpha$$

тривиальны. Следовательно,  $\mathfrak{M}$  есть модуль представления, который по самой конструкции точно принадлежит представлению  $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ .

Пусть теперь  $(y_1, \dots, y_n)$  – другой базис того же модуля представления:

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P, \quad (x_1, \dots, x_n) = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}.$$

Если  $b \sim B$  относительно базиса  $x$ , то

$$b(y_1, \dots, y_n) = b(x_1, \dots, x_n)P = (x_1, \dots, x_n)BP = (y_1, \dots, y_n)P^{-1}BP.$$

Представления  $b \sim B$  и  $b \sim P^{-1}BP$  называются эквивалентными и относятся к одному и тому же классу представлений. Так как всякая регулярная матрица  $P$  снова переводит базис  $\mathfrak{M}$  в базис, доказано:

*Каждый модуль представления однозначно приводит к определённому классу представлений.* <sup>15a)</sup>

15) Модули представлений относительно коммутативных тел впервые встречаются у В. Крулля, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1-я работа.

15a) Добавлено при корректуре (14 апреля 1929 г.). Как сообщил мне Б. Л. ван дер Варден, связь, не зависящую от специального выбора базиса, то есть инвариантную связь, можно получить непосредственно путём разделения понятий: линейное преобразование и матрица. Линейное преобразование есть гомоморфизм двух модулей линейных форм; матрица есть выражение, то есть представление, этого гомоморфизма при определённом выборе базиса. I. Каждый модуль представления однозначно сопоставляет области мультипликаторов  $\mathfrak{o}$  гомоморфную систему линейных преобразований модуля в себя. Действительно, по концу §2 левые мультипликаторы бимодуля  $\mathfrak{M}$  порождают операторные гомоморфизмы  $\mathfrak{M}$  в себя относительно правых операторов (здесь умножения на  $K$ ), и это сопоставление гомоморфно. II. Каждая гомоморфная  $\mathfrak{o}$  система линейных преобразований модуля линейных форм в себя приводит к модулю представления.

Ясно: двум операторно изоморфным модулям представлений соответствует один и тот же класс представлений. Но и обратно: если два модуля представлений  $(x_1, \dots, x_n)$  и  $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)$  порождают одно и то же представление, то соответствие

$$x_i \mapsto \bar{x}_i, \quad \sum_i x_i \alpha_i \mapsto \sum_i \bar{x}_i \alpha_i$$

задаёт изоморфизм. Ведь правило умножения полностью определяется матрицами  $C$ .

Специальный случай: если два базиса  $\mathfrak{M}$  порождают одно и то же представление, то они переходят друг в друга через операторный изоморфизм  $\mathfrak{M}$  на себя.

Или: если  $C = PCP^{-1}$  для всех  $C$  и фиксированного  $P$ , то соответствие

$$y_i \mapsto x_i, \quad y_i = \sum_k x_k \pi_{ik},$$

является изоморфизмом  $\mathfrak{M}$  на себя. Обратно: каждый изоморфизм  $y_i \mapsto x_i$  бимодуля  $\mathfrak{M}$  на себя осуществляется матрицей  $P$ , перестановочной со всеми  $C$ .

Понятие представления можно распространить и на такие кольца, которые ещё коммутативно связаны с коммутативной областью мультипликаторов  $P$  (§8). В этом случае берут только такие кольца-носители представлений  $K$ , которые содержат  $P$  в своём центре, и требуют от представления не только того, чтобы оно было гомоморфизмом колец  $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ , но даже того, чтобы оно было операторным гомоморфизмом: из  $a \sim A$  должно следовать

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P).$$

Для модулей представлений это требование означает дополнительное правило вычисления

$$at \cdot \rho = a(m\rho) = a\rho \cdot t.$$

Модуль и кольцо тогда, как говорят, “коммутативно связаны с  $P$ ”.

## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение и завершение: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

### Глава III. Теория модулей и представлений

#### § 16. Приводимые представления

Если  $\mathfrak{U}$  является подмодулем модуля представления  $\mathfrak{M}$  и если можно выбрать базис для  $\mathfrak{M}$ , состоящий из базиса  $z_1, \dots, z_t$  модуля  $\mathfrak{U}$ , дополненного элементами  $y_1, \dots, y_r$ , то есть

$$\mathfrak{M} = y_1 K + \dots + y_r K + z_1 K + \dots + z_t K,^{16)}$$

то представления имеют вид

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

где матрицы  $T$  сами по себе образуют представление  $t$ -й степени, порождённое  $\mathfrak{U}$ , а матрицы  $R$  образуют представление  $r$ -й степени, порождённое  $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$ .

Доказательство. Имеем

$$(cy_1, \dots, cy_r, cz_1, \dots, cz_t) = (y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_t)C.$$

Так как  $cz_i$ , будучи элементами  $\mathfrak{U}$ , выражаются только через  $z_i$ , в матрице  $C$  справа сверху стоит нуль. Если остальные части  $C$  в указанном порядке назвать  $R, S, T$ , то, в частности,

$$(cz_1, \dots, cz_t) = (z_1, \dots, z_t)T;$$

следовательно,  $T$  образуют представление, осуществлённое через  $\mathfrak{U}$ . Далее

$$(cy_1, \dots, cy_r) \equiv (y_1, \dots, y_r)R \pmod{\mathfrak{U}},$$

между тем как  $y_i$  образуют базис, линейно независимый по модулю  $\mathfrak{U}$ . Следовательно,  $R$  образуют представление, порождённое  $\mathfrak{M}/\mathfrak{U}$ .

Обратно, если дано “приводимое” представление

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

где  $R$  и  $T$  квадратные матрицы, то в соответствующем модуле представления произведения каждого  $c$  с последними  $t$  базисными элементами  $z_1, \dots, z_t$  выражаются только через них, то есть  $\mathfrak{U} = (z_1, \dots, z_t)$  является подмодулем.

<sup>16)</sup> Иначе говоря: когда  $\mathfrak{U}$  как  $K$ -модуль является прямым слагаемым. Если  $K$  является телом, это предположение всегда выполнено.

Следствие. Пусть

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \dots \supset \mathfrak{U}_e = 0$$

есть композиционный ряд для  $\mathfrak{M}$ , и пусть каждое  $\mathfrak{U}_i$  в предыдущем является прямым слагаемым как  $K$ -модуль, так что можно выбрать базис

$$z_{11}, \dots, z_{1r_1}, z_{21}, \dots, z_{2r_2}, \dots, z_{e1}, \dots, z_{er_e}$$

так, что  $z_{ik}$  с  $i > \nu$  образуют базис для  $\mathfrak{U}_\nu$ . Тогда представления, осуществлённые через  $\mathfrak{M}$ , имеют вид

$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{1e} & R_{2e} & \cdots & R_{ee} \end{pmatrix}, \quad (2)$$

и  $R_{\nu\nu}$  образуют представления, осуществлённые через композиционные факторы  $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_{\nu}$ .

Отдельные представления  $R_{\nu\nu}$  неприводимы, так как композиционные факторы  $\mathfrak{U}_{\nu-1}/\mathfrak{U}_{\nu}$  просты. Если предположить, что  $K$  является телом, то и обратно всякое представление, максимально приведённое к виду (2), приводит к композиционному ряду. По теореме Жордана–Гёльдера композиционные факторы однозначны с точностью до операторного изоморфизма; значит,  $R_{\nu\nu}$  однозначно определены с точностью до эквивалентных представлений и до порядка.

Если  $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$  есть прямая сумма двух модулей представления  $\mathfrak{A} = (y_1, \dots, y_r)$ ,  $\mathfrak{B} = (z_1, \dots, z_s)$ , то представление, осуществлённое через базис  $(y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_s)$ , очевидно имеет вид

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

где  $R$  означает представление элемента  $c$ , осуществлённое через  $\mathfrak{A}$ , а  $S$  – представление, осуществлённое через  $\mathfrak{B}$ , и обратно. Если сначала представить модуль  $\mathfrak{M}$  как прямую сумму прямо неразложимых составляющих и для них построить композиционные ряды, как выше, то при подходящем выборе базиса представление имеет соответствующий блочный вид. Если снова  $K$  является телом, то и обратно всякое максимально приведённое представление приводит к представлению модуля через прямо неразложимые слагаемые и композиционные факторы внутри них. По теореме Крулля и Отто Шмидта классы прямо неразложимых составляющих представления однозначно определены с точностью до порядка.

Если модуль  $\mathfrak{M}$  вполне приводим, то все блоки состоят из одного неприводимого представления, и представление называется вполне приводимым.

## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

*Продолжение и завершение: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.*

### Глава III. Теория модулей и представлений

#### § 17. Прямое разложение модулей представлений для колец с единицей

Пусть  $\mathfrak{M}$  является  $\mathfrak{o}$ -модулем, а  $\mathfrak{o}$  – кольцом с единицей. Тогда

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0,$$

где на  $\mathfrak{M}_e$  единица является единичным оператором, а на  $\mathfrak{M}_0$  – нулевым оператором. ( $\mathfrak{M}_e$  и  $\mathfrak{M}_0$  также являются правыми  $K$ -модулями, если  $\mathfrak{M}$  им является.)

Доказательство. Всякое  $m$  из  $\mathfrak{M}$  представимо в виде

$$m = em + (m - em).$$

Множество элементов  $em$  обозначим через  $\mathfrak{M}_e$ , а множество элементов  $m - em$  – через  $\mathfrak{M}_0$ . Тогда  $\mathfrak{M}_e$  и  $\mathfrak{M}_0$ , очевидно, являются аддитивными группами и правыми  $K$ -модулями, если  $\mathfrak{M}$  им является. Далее

$$rem = erm,$$

так что  $\mathfrak{M}_e$  также является  $\mathfrak{o}$ -модулем; аналогично

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

так что  $\mathfrak{M}_0$  является  $\mathfrak{o}$ -модулем. Для элементов  $em$  элемент  $e$  является единичным оператором, а для элементов  $(m - em)$  – нулевым оператором. Поэтому только нуль принадлежит одновременно  $\mathfrak{M}_e$  и  $\mathfrak{M}_0$ ; сумма  $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$  прямая.

Если речь идет о модулях представлений, то  $\mathfrak{M}_0$  порождает тривиальное представление, в котором каждому элементу сопоставляется нуль. Отщепив слагаемое  $\mathfrak{M}_0$ , получаем представление, осуществленное через  $\mathfrak{M}_e$ , в котором единичному элементу сопоставлена единичная матрица. Поэтому на таких представлениях мы отныне можем и будем ограничиваться.

Пусть

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

есть прямая сумма двусторонних идеалов,

$$e = e_1 + \cdots + e_s$$

– разложение  $e$ , и пусть  $\mathfrak{M}$  является  $\mathfrak{o}$ -модулем, где  $e$  является единичным оператором. Тогда

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{M} + \cdots + \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}$$

прямо. В самом деле, очевидно

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \dots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}).$$

Положив  $\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \widehat{\mathfrak{a}_i} + \cdots + \mathfrak{a}_s$ , получаем

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

и эта сумма прямая, поскольку  $e_i$  является единичным оператором на  $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$  и нулевым оператором на  $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$ .

На основании этой теоремы мы обычно ограничиваемся представлениями двусторонне неразложимых колец.

## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Продолжение и завершение: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.

### Глава III. Теория модулей и представлений

#### § 18. Теория модулей и представлений вполне приводимых колец

Пусть  $\mathfrak{o}$  является вполне приводимым и двусторонне простым, а  $\mathfrak{M}$  – конечным  $\mathfrak{o}$ -модулем, для которого единичный элемент  $\mathfrak{o}$  является единичным оператором. Тогда  $\mathfrak{M}$  вполне приводим, а простые составляющие операторно изоморфны простым левым идеалам  $\mathfrak{l}_i$ .

Доказательство. Пусть

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \dots, \mathfrak{o}m_k),$$

следовательно,

$$\mathfrak{M} = (\dots, \mathfrak{l}_i m_k, \dots). \quad (4)$$

Те  $\mathfrak{l}_i m_k$ , которые отличны от нуля, изоморфны  $\mathfrak{l}_i$ , поскольку отображение  $a \mapsto am_k$  является операторным изоморфизмом. Следовательно,  $\mathfrak{l}_i m_k$  просты. Если из выражения (4) опустить те  $\mathfrak{l}_i m_k$ , которые уже содержатся в сумме предыдущих, то сумма становится прямой.

Следствие. Если, кроме того,  $\mathfrak{M}$  прямо неразложим, то  $\mathfrak{M}$  прост и изоморфен некоторому  $\mathfrak{l}_i$ .

Пусть теперь  $\Delta$  – тело автоморфизмов этого простого  $\mathfrak{M}$ , а  $\Lambda$  – тело автоморфизмов  $\mathfrak{l}_i$ ; тогда на основании операторного изоморфизма между  $\mathfrak{M}$  и  $\mathfrak{l}_i$  имеем изоморфизм колец  $\Delta \simeq \Lambda$ . По §1 можно рассматривать  $\mathfrak{M}$  и  $\mathfrak{l}_i$  как бимодули с  $\Delta$  соответственно  $\Lambda$  в качестве правой области скаляров, причем эти бимодули также являются модулями представлений. Представления, осуществляемые через них, переходят друг в друга посредством изоморфизма колец  $\Delta \simeq \Lambda$ . Поэтому для изучения этого класса представлений можно ограничиться представлением, осуществляемым через  $\mathfrak{l}_i$  в его теле автоморфизмов.

Специально для  $\mathfrak{l}_1$  положим в основу базис из матричных единиц

$$\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \dots, c_{n1})$$

и в качестве реализации тела автоморфизмов  $\Lambda$  возьмем ранее (§14) обозначенное через  $K$  подтело  $\mathfrak{o}$ . При этом по сравнению с прежними рассуждениями правые идеалы следует заменить левыми, а автоморфизмы соответственно записывать справа. Если представить

$$c = \sum_{i,k} c_{ik} \alpha_{ik},$$

то получаем

$$(cc_{11}, \dots, cc_{n1}) = (c_{11}, \dots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

**Восстановленный первоначальный конец §18.** Если затем представить каждый элемент  $a$  кольца  $\mathfrak{o}$  в виде

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik},$$

то  $a \mapsto (\alpha_{ik})$  есть представление в  $K$ , осуществляемое через  $\mathfrak{l}_1$ .

Пусть  $\Gamma$  – подтело  $K$ , такое что  $K$  имеет конечный ранг  $t$  относительно  $\Gamma$ :

$$K = \chi_1 \Gamma + \cdots + \chi_t \Gamma.$$

Тогда  $K$  становится собственным модулем представления относительно  $\Gamma$ . Элементы  $\beta$  из  $K$  представляются матрицами  $B$  над  $\Gamma$ , которые получают так:

$$\beta \chi_j = \sum_i \chi_i \beta_{ij}, \quad B = (\beta_{ij}).$$

Если теперь рассматривать  $l_1$  как модуль представления относительно подтела  $\Gamma$ , то получаем:

*Представление  $\sigma$  в  $\Gamma$ , осуществляемое через  $l_1$ , получают так: в указанном выше представлении  $\sigma$  в  $K$*

$$a \mapsto (\alpha_{ik})$$

*элементы  $\alpha_{ik}$  заменяют матрицами  $A_{ik}$ , соответствующими им в представлении  $K$  в  $\Gamma$ .*

Доказательство.

$$l_1 = \sum_i c_{i1} K = \sum_i \sum_j c_{i1} \chi_j \Gamma.$$

Посредством базиса  $(\dots, c_{i1} \chi_j, \dots)$  элемент  $c_{ik}$  представляется блочной матрицей, которая в  $(i, k)$ -м блоке содержит единичную матрицу  $E_t$ , а во всех остальных блоках – нулевые матрицы  $0$  степени  $t$ . Точно так же элемент  $\alpha$  из  $K$  представляется блочно-диагональной матрицей с соответствующими  $t$ -рядными матрицами  $A$ . Следовательно, элементу

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

соответствует блочная матрица  $(A_{ik})$ . Переход к произвольному  $\mathfrak{M}$  снова дает изоморфизм колец для представления.

Замечание. Изучаемые здесь представления в теле автоморфизмов левых идеалов и в его конечных подтелах, с точностью до изоморфизма, являются единственными, которые могут осуществляться простыми  $\sigma$ -модулями или левыми идеалами. Действительно, согласно сделанному ранее (§2) замечанию, если рассматривать  $\sigma$ -модуль  $\mathfrak{M}$  как бимодуль относительно какого-либо тела  $K$ , то элементы  $K$  порождают гомоморфизмы модулей. Следовательно, тело  $K$  необходимо должно гомоморфно отображаться в подтело тела автоморфизмов этого  $\sigma$ -модуля. Этот гомоморфизм, поскольку единичный элемент является единичным оператором, является изоморфизмом, а всё тело автоморфизмов должно иметь конечную степень относительно соответствующего подтела; иначе и модуль представления имел бы бесконечный ранг, что невозможно.

В заключение отметим еще, что рассматриваемые здесь неприводимые представления еще не исчерпывают всех неприводимых представлений, а являются только теми, которые осуществляются простыми  $\sigma$ -модулями. Вообще существуют еще модули представления, например тело  $\Omega$ , рассматриваемое как бимодуль относительно подтела  $\Omega_0$  как левой области и самого себя как правой области; они как  $\sigma$ -модули приводимы, но как бимодули неприводимы, и поэтому всё же приводят к неприводимым представлениям.

## § 19. Простые композиционные факторы в модулях и модулях представления

Пусть  $\sigma$  – кольцо с условием максимальности и условием минимальности для левых идеалов, а  $c$  – максимальный нильпотентный идеал. Тогда:

*Каждый простой  $\sigma$ -модуль  $\mathfrak{M}$  либо аннулируется  $c$ , либо изоморфен простому левому идеалу  $l$  из кольца без радикала  $\sigma/c$ . В последнем случае модуль аннулируется всеми теми двусторонними идеалами из  $\sigma/c$ , которые не содержат  $l$ , а абсолютная область множителей (§1) изоморфна двусторонне простому кольцу, содержащему  $l$ .*

Доказательство. Пусть  $c^\rho = 0$ . Должно быть  $c\mathfrak{M} = 0$ ; ведь иначе было бы  $c\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$ , значит  $c^\rho \mathfrak{M} = \mathfrak{M}$ , откуда из  $c^\rho = 0$  следовало бы противоречие  $\mathfrak{M} = 0$ . Поэтому  $\mathfrak{M}$  можно также рассматривать как  $\sigma/c$ -модуль: все элементы одного класса вычетов по  $c$  дают одно и то же при умножении на элемент из  $\mathfrak{M}$ .

Как кольцо без радикала,  $\sigma/c$  обладает единичным элементом. Поэтому  $\mathfrak{M}$  является прямой суммой модуля, аннулируемого  $\sigma/c$ , и модуля, для которого единичный элемент становится единичным оператором (§17). Так как  $\mathfrak{M}$  прост, может появиться только одно из этих двух слагаемых. Если единичный элемент является единичным оператором, то, как в §18, следует изоморфность простому левому идеалу. Действительно, если  $m \neq 0$  – элемент из  $\mathfrak{M}$ , то  $(\sigma/c)m \neq 0$ ; следовательно,  $lm \neq 0$  для по крайней мере одного простого левого идеала  $l$  из  $\sigma/c$ , и поэтому он должен исчерпывать  $\mathfrak{M}$ . Остальные утверждения для таких левых идеалов ясны и немедленно переносятся на все изоморфные им модули.

Следствие. Если  $\mathfrak{M}$  –  $\mathfrak{o}$ -модуль, обладающий композиционным рядом, то простые композиционные факторы либо аннулируются  $\mathfrak{s}$ , либо изоморфны простым левым идеалам из  $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$ .

Если  $P$  – кольцо, коммутативно связанное с  $\mathfrak{o}$ , то все результаты сохраняются. Нужно лишь вместо модулей рассматривать бимодули относительно  $P$  справа и  $\mathfrak{o}$  слева, удовлетворяющие условию

$$(am)\rho = a(m\rho) = (a\rho)t \quad (\S 15).$$

Кроме того, единичный элемент  $P$  также должен быть единичным оператором. В качестве подмодулей всегда рассматриваются только такие, которые допускают умножение на  $P$ , как в случае идеалов. Построенные в наших доказательствах подмодули  $\mathfrak{s}\mathfrak{M}, \mathfrak{s}^2\mathfrak{M}, \dots$  удовлетворяют этому условию.

В частности, если  $P$  является телом, а  $\mathfrak{M}$  –  $P$ -модулем конечного ранга, то  $\mathfrak{M}$  одновременно является модулем представления. Представление, осуществляемое через  $\mathfrak{M}$ , является не только гомоморфизмом колец, но и операторным гомоморфизмом относительно  $P$  (§15). Все представления в  $P$  с этим свойством доставляются такими модулями. Неприводимые представления принадлежат простым модулям, и наоборот. Поэтому теоремы этого параграфа сразу можно толковать как теоремы о представлениях  $\mathfrak{o}$  в  $P$ : все неприводимые представления, кроме нулевых, осуществляются простыми левыми идеалами  $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$ . Поэтому если произвольное представление по §16 редуцировать с помощью композиционного ряда, то на главной диагонали, кроме нулей, появляются только такие представления, которые эквивалентны представлениям, осуществляемым простыми левыми идеалами  $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$ .

Замечание. При предположениях, сделанных относительно  $\mathfrak{o}$  и  $P$ , для  $\mathfrak{o}$  не нужно предполагать никакого условия конечности. Действительно, все представления одновременно являются изоморфными представлениями абсолютной области множителей, а она, как изоморфный прообраз кольца матриц конечной степени, сама является  $P$ -модулем конечного ранга. Так как по определению допустимыми идеалами считаются только  $P$ -модули, условие максимальности и условие минимальности для этой абсолютной области множителей выполнены.

Эта абсолютная область множителей становится гиперкомплексной системой относительно  $P$ , если  $P$  предполагается коммутативным телом. Это предположение всегда выполнено, как только на главной диагонали появляются не только нули. Тогда ведь  $P$ , по замечанию в §18, изоморфно подтелу тела автоморфизмов  $I$ , которое при реализации через подтело  $K$  кольца  $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$  (§14), вследствие коммутативной связанности, должно лежать в центре  $K$ .



## 34. Гиперкомплексные величины и теория представлений

*Продолжение и завершение: глава III, §§15–19, и глава IV, §§20–26.*

### Глава IV. Представления групп и гиперкомплексных систем

#### § 20. Встраивание гиперкомплексных систем в теорию

Рассматриваем гиперкомплексные системы  $\mathfrak{o}$  над коммутативным полем  $P$ . Так как, по соглашению, идеалами в  $\mathfrak{o}$  считаются только  $P$ -модули, для левых и правых идеалов выполняются условие максимальности и условие минимальности (ср. §8). Следовательно, применима вся теория колец, изложенная в главе II.

Под представлениями гиперкомплексной системы  $\mathfrak{o}$  далее всегда понимаются представления в поле  $P$ , причем такие, для которых из  $a \sim A$  следует

$$a\rho \sim A\rho \quad (\rho \in P),$$

то есть модульная гомоморфность относительно  $P$ . Для модулей представления это означает

$$(a\rho)m = a(m\rho)$$

(ср. конец §15). Поэтому для модулей представления действуют теоремы §19; из них следует, что все неприводимые представления осуществляются простыми левыми идеалами кольца

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{o}/\mathfrak{c},$$

и, следовательно, имеется столько неэквивалентных неприводимых представлений, сколько двусторонне простых слагаемых  $\mathfrak{a}_\nu$  встречается в разложении

$$\mathfrak{o}_0 = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s.$$

Чтобы действительно определить представление  $\mathfrak{o}$ , задаваемое таким левым идеалом  $\mathfrak{l}_\nu$ , сначала переходят от элементов  $\mathfrak{o}$  к соответствующим классам вычетов в  $\mathfrak{o}_0$ . Так как умножение на элемент  $P$  задает изоморфизм для всех идеалов в  $\mathfrak{o}_0$ , поле  $P$  гомоморфно подполю  $e^{(\nu)}P$  тела автоморфизмов  $K_\nu$  каждого простого левого идеала, а поскольку единичный элемент является единичным оператором, это даже изоморфизм. Представление над  $P$ , осуществляемое простым левым идеалом  $\mathfrak{l}_\nu$ , можно получить так: сначала исследовать представление, осуществляемое  $\mathfrak{l}_\nu$  над этим подполем  $e^{(\nu)}P$ , а затем посредством изоморфизма  $e^{(\nu)}P \simeq P$  перейти к  $P$ . Тело автоморфизмов  $K_\nu$  имеет конечный ранг относительно  $P$ ; значит, речь идет о представлении в подполе конечной степени тела автоморфизмов  $\mathfrak{l}_\nu$ .

Итак, чтобы получить искомое представление, сначала представим каждый элемент  $c$  из  $\mathfrak{o}_0$  через его двусторонние компоненты:

$$c = c_1 + \cdots + c_s.$$

Теперь надо найти только представляющую матрицу для  $c_\nu$ , поскольку остальные  $c_i$  аннулируют идеал  $\mathfrak{l}_\nu$  и потому представляются нулевой матрицей. По §18 эта матрица находится так: представляют  $c_\nu$  через матричные единицы  $\alpha_{ik}^{(\nu)}$  из  $\mathfrak{a}_\nu$ :

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)}$$

и в матрице  $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$  заменяют каждый элемент  $\alpha_{ik}^{(\nu)}$  матрицей  $A_{ik}^{(\nu)}$ , которая соответствует ему в представлении тела  $K_\nu$  над  $P$ , осуществляемом самим  $K_\nu$ .

Замечание. Тело  $K_\nu$  имеет конечный ранг относительно  $P$ . Каждый элемент  $x$  удовлетворяет уравнению  $f(x) = 0$  с коэффициентами из  $e^{(\nu)}P$ , так как между степенями  $x$  заведомо есть линейная зависимость. Если, в частности,  $P$  алгебраически замкнуто, это уравнение распадается на линейные

множители; поскольку  $K_\nu$  является телом,  $x$  уже является корнем одного из линейных множителей и, следовательно, принадлежит  $e^{(\nu)}P$ . То есть  $K_\nu = e^{(\nu)}P$ . В этом случае сами матрицы  $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$  образуют неприводимое представление.

Из этого замечания вместе с концом §19 получается "теорема Бернсайда":

Пусть  $P$  алгебраически замкнуто и коммутативно связано с кольцом  $\mathfrak{o}$ . Тогда каждое неприводимое представление  $n$ -й степени над  $P$  содержит ровно  $n^2$  линейно независимых матриц.<sup>1</sup>

Из этой формулировки сразу следует обычная: "Система матриц  $n$ -й степени над  $P$ , которая вместе с каждыми двумя матрицами содержит и их произведение, неприводима тогда и только тогда, когда не существует нетривиального однородного линейного соотношения

$$\sum \alpha_{ik} x_{ik} = 0$$

с коэффициентами из  $P$ , которому удовлетворяют элементы  $x_{ik}$  каждой матрицы системы." Действительно, из всякой такой системы матриц, присоединив все линейные комбинации, можно получить кольцо и  $P$ -модуль и рассматривать это кольцо как его собственное представление.

Доказательство. По §19 абсолютная область множителей  $\mathfrak{D}$  изоморфна двусторонне простому и вполне приводимому кольцу  $\mathfrak{o}_0$  с единичным элементом; такое кольцо является полным матричным кольцом (например, кольцом всех матриц  $m$ -й степени) относительно тела автоморфизмов его левых идеалов, которое из-за алгебраической замкнутости совпадает с  $P$ . Каждое неприводимое представление  $\mathfrak{D}$ , а значит и данное представление, порождается простым левым идеалом. Левый идеал имеет ранг  $m$ , представление имеет степень  $n$ , откуда  $m = n$ ; следовательно, в  $\mathfrak{o}_0$ , а значит и в  $\mathfrak{D}$ , имеется ровно  $n^2$  линейно независимых элементов.

Так же легко следует "обобщенная теорема Бернсайда":<sup>2</sup>

Пусть при тех же предположениях  $\mathfrak{D}$  является вполне приводимым представлением  $\mathfrak{o}$ , распадающимся на попарно неэквивалентные составляющие степеней

$$n_1, n_2, \dots, n_s;$$

тогда  $\mathfrak{D}$  имеет ранг

$$n_1^2 + \dots + n_s^2$$

относительно  $P$ .

Доказательство. Пусть снова  $\mathfrak{o}$  является абсолютной областью множителей, которая необходимо есть гиперкомплексная система. Различные неэквивалентные представления порождаются левыми идеалами  $\mathfrak{l}_1, \dots, \mathfrak{l}_s$ , принадлежащими различным двусторонне простым компонентам  $\mathfrak{a}_i$  кольца  $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$ , где  $\mathfrak{s}$  есть радикал. Поэтому данное представление порождается  $\mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_s$  и имеет  $\mathfrak{a}_1 + \dots + \mathfrak{a}_s$  в качестве абсолютной области множителей. Отсюда с помощью тех же рассуждений о ранге, что и выше, следует утверждение.

Пусть теперь  $\mathfrak{o}$  является гиперкомплексной системой без радикала над произвольным полем. По §13,  $\mathfrak{o}$  вполне приводима и имеет единичный элемент. Из теорем §17 и §18 следует: каждое представление  $\mathfrak{o}$  вполне приводимо.

Обратно, каждое вполне приводимое представление кольца  $\mathfrak{o}$ , коммутативно связанного с  $P$ , имеет в качестве абсолютной области множителей гиперкомплексную систему без радикала.

Доказательство. Абсолютная область множителей  $\mathfrak{D}$  изоморфна кольцу и  $P$ -модулю, состоящему из матриц над  $P$ , то есть является гиперкомплексной системой. Элементы радикала  $\mathfrak{s}$  по §19 представляются нулем в каждом неприводимом представлении, а значит и во всем представлении; поэтому  $\mathfrak{s} = 0$ .

(Если в представлении встречаются только эквивалентные составляющие, то есть все они осуществляются одним левым идеалом  $\mathfrak{l}$ , абсолютная область множителей становится двусторонне простой.)

Регулярным представлением гиперкомплексной системы  $\mathfrak{o}$  называют представление, осуществляемое самим единичным идеалом  $\mathfrak{o}$ . (В случае группового кольца в качестве базиса

<sup>1</sup> Тем самым  $\mathfrak{o}$  не предполагается гиперкомплексной системой и может, например, быть групповым кольцом, состоящим из всех линейных комбинаций конечного числа элементов бесконечной группы.

<sup>2</sup> G. Frobenius und I. Schur, *Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen*, Sitzungsber. Berlin 1906.

специально берут групповые элементы  $u_1, \dots, u_h$ ; ср. §6.) Так как в  $\mathfrak{o}$  в качестве композиционных факторов присутствуют все левые идеалы из  $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$ , все неприводимые представления уже содержатся в регулярном представлении как диагональные матрицы  $R_{ii}$ , если представить, что регулярное представление по формуле (2) §16 посредством композиционного ряда преобразовано к подходящему базису.

Представление известно, когда известны представляющие матрицы базисных элементов  $u_1, \dots, u_h$ . Если речь специально идет о групповом кольце, где  $u_1, \dots, u_h$  являются элементами группы, то всякое гомоморфное матричное представление группы порождает также представление группового кольца; значит, задача представления группы является частным случаем задачи представления гиперкомплексных систем.

## Э. Нётер. Гиперкомплексные величины и теория представлений

Источник-точный перевод §21 с немецкого скан-свидетеля

### § 21. Расширение основного поля. Представления центра

Пусть

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

есть гиперкомплексная система, а  $\Omega$  — поле расширения основного поля  $P$ . Тогда можно образовать

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$$

со старыми правилами умножения для базисных элементов  $a_i$ .<sup>18a)</sup> Система  $\mathfrak{o}\Omega$  снова гиперкомплексна относительно  $\Omega$ .

Каждое представление  $\mathfrak{o}$  приводит к представлению  $\mathfrak{o}\Omega$ , потому что представление всех элементов известно, как только известны представления базисных элементов  $a_i$ .<sup>19)</sup>

18a) Точнее: вводятся новые символы  $a_i$  со старыми правилами умножения;  $a_1\Omega + \cdots + a_h\Omega$  тогда содержит подкольцо, изоморфное  $\mathfrak{o}$ , так что затем эти  $a_i$  можно отождествить со старыми.

19) Конечно, здесь опять рассматриваются только такие представления, которые являются  $P$ -модульными гомоморфизмами: из  $a \sim A$  должно следовать  $a\rho \sim A\rho$  для  $\rho \in P$ , и соответственно для  $\Omega$ .

Идеал или модуль представления, а также соответствующее представление, называются абсолютно неприводимыми, если они остаются неприводимыми после перехода к алгебраически замкнутому полю.

Если  $\mathfrak{o}\Omega$  не имеет радикала, то и  $\mathfrak{o}$  его не имеет; ведь нильпотентный идеал  $\mathfrak{c}$  в  $\mathfrak{o}$  дал бы расширенный идеал  $\mathfrak{c}\Omega$  в  $\mathfrak{o}\Omega$ . Обратное неверно, как мы увидим ниже.

Центр  $\mathfrak{o}\Omega$  равен расширенному центру  $\mathfrak{Z}\Omega$ . Если  $\mathfrak{o}$  вполне приводима, то  $\mathfrak{Z}$  является прямой суммой полей:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

Если  $\mathfrak{o}$  при переходе к  $\mathfrak{o}\Omega$  остается вполне приводимой, то есть если не добавляется никакого нильпотентного идеала, то новый центр распадается:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

снова в прямую сумму полей над  $\Omega$ ; когда  $\Omega$  алгебраически замкнуто, эти поля, по замечанию в §20, имеют ранг 1 относительно  $\Omega$  и изоморфны  $\Omega$ .

Для представлений центра  $\mathfrak{Z}$  справедливы следующие теоремы.

Всякое неприводимое представление коммутативной гиперкомплексной системы  $\mathfrak{Z}$  в алгебраически замкнутом поле  $\Omega$  имеет первую степень; иначе говоря, неприводимые представления тождественны гомоморфизмам из  $\mathfrak{Z}$  в  $\Omega$ .

Доказательство. Каждое неприводимое представление  $\mathfrak{Z}$  дает такое же представление  $\mathfrak{Z}\Omega$ , а значит и представление  $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ , где  $\mathfrak{c}$  — радикал  $\mathfrak{Z}\Omega$ . Кольцо  $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$  является коммутативной системой без радикала, следовательно, по концу §14, прямой суммой полей. Эти поля имеют первую степень, поскольку  $\Omega$  предполагается алгебраически замкнутым, и они порождают все неприводимые представления (§20).

Вместе с тем, так как эквивалентные представления первой степени необходимо становятся равными ( $A^{-1}\alpha A = \alpha$ ), число различных гомоморфизмов из  $\mathfrak{Z}$  в  $\Omega$  равно рангу  $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ .

Последнее замечание дает для специального случая, когда  $\mathfrak{Z}$  является полем над  $P$ , такую теорему.

Коммутативное поле  $\mathfrak{Z}$  тогда и только тогда вполне приводимо, то есть не имеет радикала, когда  $\mathfrak{Z}$  является расширением первого рода поля  $P$ .

Действительно, для поля гомоморфизмы становятся изоморфизмами. Их число равно рангу  $\mathfrak{Z}\Omega/\mathfrak{c}$ , а значит равно степени поля, то есть  $\mathfrak{Z}$  является расширением первого рода, тогда и только тогда, когда  $\mathfrak{c} = 0$ .

Если  $\mathfrak{Z}$  вполне приводим,

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

то в каждом представлении отдельные поля  $\mathfrak{Z}_i$  также отображаются гомоморфно; в неприводимом представлении одно из этих полей отображается изоморфно, а остальные — нулем (§19).

Применение этих теорем к гиперкомплексным системам прежде всего дает для систем без радикала следующее.

Если  $\mathfrak{o}\Omega$ , а следовательно и  $\mathfrak{o}$ , является системой без радикала, то во всяком абсолютно неприводимом представлении  $\mathfrak{o}$  элементы центра  $z$  представляются диагональными матрицами  $E\xi$ , и  $z \mapsto \xi$  является представлением первой степени  $\mathfrak{Z}$  в  $\Omega$ . Полученная так связь между классами абсолютно неприводимых представлений  $\mathfrak{o}$  и классами представлений  $\mathfrak{Z}$  взаимно однозначна. Поэтому число этих классов представлений равно рангу центра.<sup>20)</sup>

20) Соответствующие теоремы справедливы не только для представлений в алгебраически замкнутом поле  $\Omega$ , но и для представлений в отдельных телах автоморфизмов; это будет изложено в другом месте.

Доказательство. Разложению на двусторонне неразложимые идеалы

$$\mathfrak{o}\Omega = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

взаимно однозначно соответствует разложение центра на поля:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s,$$

где  $\mathfrak{Z}_i$  есть центр  $\mathfrak{a}_i$ . При неприводимом представлении  $\mathfrak{o}$  один  $\mathfrak{a}_i$  отображается изоморфно, остальные — нулем, и класс представления однозначно определяется этим  $\mathfrak{a}_i$ . Идеал  $\mathfrak{a}_i$  представляется полным матричным кольцом, а центр такого полного матричного кольца состоит из диагональных матриц  $E\xi$ . Соответствие  $z \mapsto \xi$  является гомоморфизмом  $\mathfrak{Z}$ : одно  $\mathfrak{Z}_i$  отображается изоморфно, остальные — нулем. Тем самым все доказано.

Для вопроса, когда системе  $\mathfrak{o}$  без радикала соответствует такая же система  $\mathfrak{o}\Omega$ , получаем еще следующее.

Если  $\mathfrak{Z}$  имеет компоненту  $\mathfrak{Z}_i$ , являющуюся расширением второго рода поля  $P$ , то  $\mathfrak{o}\Omega$  заведомо имеет радикал.<sup>21)</sup> Ведь  $\mathfrak{Z}_i\Omega$  в этом случае уже имеет радикал.

21) Если  $\mathfrak{Z}$  имеет только компоненты первого рода, то  $\mathfrak{o}\Omega$  не имеет радикала; это также будет доказано позднее. Для характеристики нуля И. Шур уже доказал эквивалентную теорему: неприводимые представления над  $P$  остаются вполне приводимыми при каждом расширении области коэффициентов (*Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen*, Transact. Am. Math. Soc. 15 (1909), S. 159).

## Эмми Нётер: гиперкомплексные величины и теория представлений

Работа 34, §22. Источниково-точный перевод со сканированного немецкого свидетеля.

### § 22. Применение к абелевым группам

Пусть

$$G = G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_r$$

есть конечная абелева группа, разложенная в прямое произведение циклических групп  $G_i$  порядков  $h_i$ . Ее элементы имеют вид

$$a = a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}.$$

Пусть  $P$  — поле, характеристика которого не делит порядок группы

$$h = h_1 h_2 \cdots h_r.$$

Групповое кольцо  $\mathfrak{Z}$  состоит из всех сумм

$$\sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_r} A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} a_1^{\alpha_1} \cdots a_r^{\alpha_r}, \quad A_{\alpha_1 \dots \alpha_r} \in P,$$

и является гомоморфным образом кольца многочленов  $P[x_1, \dots, x_r]$  при отображении  $x_i \mapsto a_i$ . Поэтому

$$\mathfrak{Z} \simeq P[x_1, \dots, x_r]/\mathfrak{m}, \quad \mathfrak{m} = (x_1^{h_1} - e, \dots, x_r^{h_r} - e).$$

В поле расширения  $\Omega$  многочлены  $x_i^{h_i} - e$  распадаются на попарно различные множители  $x_i - \xi_i$ ; поэтому  $\mathfrak{m}$  становится произведением (или пересечением) попарно различных простых идеалов

$$(x_1 - \xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, x_r - \xi_r^{(\alpha_r)}),$$

каждому из которых соответствует единственный нуль

$$(\xi_1^{(\alpha_1)}, \dots, \xi_r^{(\alpha_r)}).$$

Образованию пересечения соответствует прямое суммарное разложение (§ 4):

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

где каждый раз  $\mathfrak{Z}_i \sim \Omega$ ; следовательно, получаем представление

$$a_i \mapsto \xi_i^{(\alpha_i)}, \quad \text{или более общо} \quad a \mapsto \chi^{(\alpha)}(a).$$

Эти представления являются характерами. Их число равно

$$h_1 h_2 \cdots h_r = h,$$

как и должно быть по общей теории.

## Эмми Нётер: гиперкомплексные величины и теория представлений

Работа 34, §23. Источниково-точный перевод со сканированного немецкого свидетеля.

### § 23. Определитель гиперкомплексной системы

Пусть

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

есть гиперкомплексная система. Присоединим к  $P$   $h$  неопределенных  $x_1, \dots, x_h$  и образуем

$$\mathfrak{o}^* = a_1 P(x) + \cdots + a_h P(x).$$

Неопределенные  $x_i$  должны перестановочно умножаться с  $a_i$ ; этим уже задаются правила вычислений в  $\mathfrak{o}^*$ .

В  $\mathfrak{o}^*$  лежит «общий элемент» системы  $\mathfrak{o}$ :

$$w = a_1 x_1 + \cdots + a_h x_h.$$

Если в некотором представлении  $a_i \mapsto A_i$ , то элементу  $w$  соответствует

$$W = A_1 x_1 + \cdots + A_h x_h.$$

$W$  называется системной матрицей, принадлежащей этому представлению; в частности, если  $a_i$  образуют группу, а  $\mathfrak{o}$  поэтому является групповым кольцом, это групповая матрица. В случае регулярного представления имеем регулярную системную матрицу.

Элементы  $w_{ij}$  матрицы  $W$  являются линейными формами от  $x_i$ . Поэтому системный определитель  $|W|$  имеет степень  $n$ , если речь идет о представлениях  $n$ -й степени. В частности регулярный системный определитель имеет степень  $h$ .

Системный определитель не меняется при переходе к эквивалентным представлениям, поскольку

$$|PWP^{-1}| = |P| |W| |P^{-1}| = |W|.$$

При переходе от базиса  $(a_1, \dots, a_h)$  к новому базису  $(b_1, \dots, b_h)$  и от  $w = \sum a_i x_i$  к  $w = \sum b_j y_j$  новые элементы  $W$ , а значит и новый определитель, получают из старых подстановкой

$$x_i = \sum_j \rho_{ij} y_j$$

с регулярной матрицей подстановки.

Если задан композиционный ряд модуля представления, то при подходящем выборе базиса матрица  $W$  имеет вид

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & 0 & \cdots & 0 \\ * & W_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & W_s \end{pmatrix}.$$

Среди определителей  $|W_i|$  произвольного представления не встречается ничего иного, чем в регулярном представлении системы  $\mathfrak{o}$ , или даже системы  $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ , где  $\mathfrak{c}$  — радикал.

Если  $P$  алгебраически замкнуто, то определитель  $|W_i|$ , принадлежащий неприводимому представлению, является неприводимой функцией от  $x_i$ , а неэквивалентным представлениям соответствуют различные неприводимые множители.

Доказательство. Так как все неприводимые представления  $\mathfrak{o}$  являются также представлениями  $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ , можно ограничиться кольцом без радикала  $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ . В нем возьмем за базис матричные единицы  $c_{ik}^{(\nu)}$ ; тогда общий элемент имеет вид

$$w = \sum_{\nu, i, k} c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Матрицы неприводимых представлений имеют вид

$$W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)}).$$

Функции  $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$  заведомо неприводимы и очевидно различны.

Чтобы вычислить  $|W_i|$ , можно разложить регулярную системную матрицу  $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$  на ее неприводимые множители. Каждый неприводимый множитель появляется столько раз, какова степень соответствующего неприводимого представления, потому что соответствующий идеал столько раз встречается в композиционном ряду.

Можно также исходить из регулярной системной матрицы  $\mathfrak{o}$ , но тогда каждый неприводимый множитель получается чаще, а именно столько раз, сколько соответствующий простой идеал встречается как композиционный множитель среди левых идеалов. В этом регулярном представлении  $\mathfrak{o}$  рассматривалась как левый идеал; если рассматривать  $\mathfrak{o}$  как правый идеал, появляется вторая регулярная системная матрица, «антистроговая матрица» у Фробениуса. Она содержит те же неприводимые множители, а именно системные определители всех неприводимых представлений, но, возможно, с другими показателями; см. пример в § 10.

Системный определитель коммутативной системы распадается на линейные множители, потому что все неприводимые представления имеют первую степень. Эти линейные множители сами являются неприводимыми представлениями, а значит для абелевых групп дают характеры. Этот факт был исходным пунктом Дедекинда в исследовании группового определителя неабелевых групп.



# Эмми Нётер: гиперкомплексные величины и теория представлений

Работа 34, §24. Источниково-точный перевод со сканированного немецкого свидетеля.

## § 24. Следы и характеры

Если в представлении  $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$  гиперкомплексной системы  $\mathfrak{o}$  элементу  $a$  сопоставлена матрица  $A$ , то полагают

$$\mathrm{Sp}_D(a) = \mathrm{Sp} A.$$

Следы являются линейными функциями:

$$\mathrm{Sp}(c + d) = \mathrm{Sp}(c) + \mathrm{Sp}(d), \quad \mathrm{Sp}(c\alpha) = \alpha \mathrm{Sp}(c).$$

Эквивалентные представления имеют одни и те же следы.

След в приводимом представлении равен сумме следов в представлениях, задаваемых композиционными факторами.

Доказательство. При подходящем выборе базиса матрица имеет блочный вид

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ * & A_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \cdots & A_{ss} \end{pmatrix},$$

так что ее след равен

$$\mathrm{Sp}(A_{11}) + \mathrm{Sp}(A_{22}) + \cdots + \mathrm{Sp}(A_{ss}).$$

Главным следом называется след в регулярном представлении. Приведенным следом называется сумма следов в различных неприводимых представлениях.

Если  $c$  является элементом максимального нильпотентного идеала  $\mathfrak{s}$ , то  $\mathrm{Sp}(c) = 0$  для любого представления.

Доказательство. Достаточно рассматривать представления через простые левые идеалы  $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$ , потому что в каждом другом представлении встречаются только эти композиционные факторы, а след составляется аддитивно. Но  $c$  аннулирует все элементы  $\mathfrak{o}/\mathfrak{s}$ ; значит, каждому  $c$  из  $\mathfrak{s}$  сопоставляется нулевая матрица, поэтому  $\mathrm{Sp}(c) = 0$ .

Если  $\mathfrak{o}$  двусторонне проста, а  $P$  алгебраически замкнуто, то есть  $\mathfrak{o}$  является матричным кольцом

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik} P,$$

то в неприводимом представлении  $\mathfrak{o}$  элементу

$$a = \sum c_{ik} \alpha_{ik}$$

сопоставляется матрица  $(\alpha_{ik})$ . Следовательно,

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = \sum_i \alpha_{ii}, \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(a) = n \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(a) = n \sum_i \alpha_{ii}.$$

В частности,

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{red}}(c_{ii}) = e,$$

а также

$$\mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ik}) = 0 \quad (i \neq k), \quad \mathrm{Sp}_{\mathrm{pr}}(c_{ii}) = ne.$$

При переходе от  $P$  к алгебраически замкнутому полю  $\Omega$  главный след не меняется, поскольку он вычисляется по тому же базису. Для приведенного следа это уже неверно.

Следы элементов  $a$  системы без радикала в абсолютно неприводимых представлениях называются характерами и обозначаются  $\chi(a)$  или, если нужно указать конкретное представление,  $\chi^{(\nu)}(a)$ .

В неприводимом представлении степени  $n_\nu$  элементы центра, согласно §21, представляются диагональными матрицами  $E\theta^{(\nu)}$ , где  $z \mapsto \theta^{(\nu)}(z)$  есть представление первой степени центра, или гомоморфизм центра в  $\Omega$ . Поэтому след имеет значение  $n_\nu\theta^{(\nu)}(z)$ . Следовательно, гомоморфизмы  $\theta$  центра связаны с характерами  $\chi$  соотношением

$$\chi^{(\nu)}(z) = n_\nu\theta^{(\nu)}(z). \quad (1)$$

В коммутативном случае  $n_\nu = 1$ , и сами характеры дают гомоморфизмы (ср. §22).

Если поле  $\Omega$  имеет характеристику нуль, что мы всюду будем предполагать в дальнейшем, то (1) можно разделить на  $n_\nu$ :

$$\theta^{(\nu)}(z) = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu}.$$

Свойство гомоморфизма для  $\theta^{(\nu)}$  выражается формулами

$$\frac{\chi^{(\nu)}(z + z')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} + \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu},$$

$$\frac{\chi^{(\nu)}(zz')}{n_\nu} = \frac{\chi^{(\nu)}(z)}{n_\nu} \frac{\chi^{(\nu)}(z')}{n_\nu}.$$

Класс представлений уже однозначно определяется одними только следами матриц. Чтобы знать следы всех матриц, конечно, достаточно знать следы базисных элементов в данном представлении.

Доказательство. Модуль представления  $R$  известен, если известно, сколько раз каждый неприводимый модуль представления  $\mathfrak{M}_\nu$  встречается в нем как прямое слагаемое. Если это число равно  $\mu_\nu$ , то след  $e^{(\nu)}$  в представлении равен  $\mu_\nu n_\nu$ , где  $n_\nu$  есть степень неприводимого представления. Следовательно,

$$\mu_\nu = \frac{\text{Sp}(e^{(\nu)})}{n_\nu}.$$

## Эмми Нётер: гиперкомплексные величины и теория представлений

Работа 34, §25. Источниково-точный перевод со сканированного немецкого свидетеля с R124plus-коррекцией P34.

### § 25. Дискриминанты

Пусть

$$\mathfrak{o} = a_1 P + \cdots + a_h P$$

есть гиперкомплексная система. Дискриминантной матрицей называется матрица, элементы которой являются главными следами  $\text{Sp}(a_i a_j)$ . Приведенная дискриминантная матрица — это то же самое для приведенных следов, построенное в алгебраически замкнутом поле. Определитель этой матрицы называется дискриминантом, соответственно приведенным дискриминантом.

Дискриминант не меняется при расширении основного поля. При переходе к другому базису он умножается на квадрат определителя преобразования.

Доказательство. Пусть

$$(b_1, \dots, b_h) = (a_1, \dots, a_h)P.$$

Тогда

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = (\text{Sp}(a_i b_j))P. \quad (1)$$

Так же, если  $P^t$  — транспонированная матрица,

$$(\text{Sp}(a_i b_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j)). \quad (1a)$$

Из (1) и (1a) следует

$$(\text{Sp}(a_i a_j)) = P^t(\text{Sp}(b_i b_j))P.$$

Переход к определителям дает утверждение.

Следовательно, определитель задан лишь с точностью до квадрата из  $P$ ; но его обращение или необращение в нуль является инвариантным свойством. Из (1) также следует, что дискриминант, с точностью до ненулевого множителя, можно вычислять по двум различным базисам, а именно как  $|\text{Sp}(a_i b_j)|$ .

Дискриминант обращается в нуль, если  $\mathfrak{o}$  имеет нильпотентный идеал  $\mathfrak{s}$ .

Доказательство. В качестве базисных элементов для  $\mathfrak{o}$  выберем

$$c_1, \dots, c_r, d_1, \dots, d_s,$$

где  $c_1, \dots, c_r$  образуют базис  $\mathfrak{s}$ . Тогда дискриминантная матрица имеет вид

$$\begin{pmatrix} \text{Sp}(c_i c_j) & \text{Sp}(c_i d_j) \\ \text{Sp}(d_i c_j) & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \text{Sp}(d_i d_j) \end{pmatrix}.$$

(То же верно и для приведенного дискриминанта.) Поэтому определитель равен нулю.

Следствие. Дискриминант обращается в нуль и тогда, когда нильпотентный идеал появляется после перехода к алгебраически замкнутому полю.

Пусть

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_s$$

является прямой двусторонней суммой, и пусть  $M, M_1, \dots, M_s$  — дискриминантные матрицы колец  $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$ . Тогда

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & M_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & M_s \end{pmatrix},$$

откуда  $|M| = |M_1| \cdots |M_s|$ .

Доказательство. Выберем базис для  $\mathfrak{o}$ , составленный из базисов для  $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_s$ . Если  $a \in \mathfrak{a}_i$ , то

$$\mathrm{Sp}_{\mathfrak{o}}(a) = \mathrm{Sp}_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

где оба раза имеются в виду главные следы, но соответственно в кольцах  $\mathfrak{o}$  и  $\mathfrak{a}_i$ . Далее, если множители лежат в различных двусторонних компонентах, то  $a_i a a_j = 0$ ; значит, исчезают и смешанные следы. Отсюда следует утверждение; тем же образом оно следует и для приведенного дискриминанта.

Чтобы построить дискриминант матричного кольца  $\sum c_{ik} P$ , выбирают два различных базиса: элементы  $c_{ik}$  один раз упорядочивают по первым индексам, другой раз по вторым индексам. Таблица умножения имеет вид

|          |                                                                     | $\overbrace{c_{11} \dots c_{1n}}^{r_1}$ | $\overbrace{c_{21} \dots c_{2n}}^{r_2}$ | $\dots$    |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| $c_{11}$ | $\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n1} \end{array} \right\} l_1$ | $(c_{ik})$                              | 0                                       | 0          |
| $\vdots$ |                                                                     |                                         |                                         |            |
| $c_{n1}$ |                                                                     |                                         |                                         |            |
| $c_{12}$ | $\left. \begin{array}{c} \vdots \\ c_{n2} \end{array} \right\} l_2$ | 0                                       | $(c_{ik})$                              | 0          |
| $\vdots$ |                                                                     |                                         |                                         |            |
| $c_{n2}$ |                                                                     |                                         |                                         |            |
| $\vdots$ |                                                                     | 0                                       | 0                                       | $(c_{ik})$ |

Дискриминант равен

$$D = \begin{vmatrix} \mathrm{Sp}(c_{11}) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \mathrm{Sp}(c_{22}) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \mathrm{Sp}(c_{nn}) \end{vmatrix}^n = \begin{cases} e, & \text{для приведенных следов,} \\ n^{n^2} \cdot e, & \text{для главных следов.} \end{cases}$$

Следствие. Если над алгебраически замкнутым полем расширения  $\mathfrak{o}$  распадается на матричные кольца степеней  $n_1, \dots, n_s$ , то дискриминант равен

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \dots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

и приведенный дискриминант равен

$$D_{\mathrm{red}} = e.$$

Следовательно, приведенный дискриминант для систем без радикала всегда ненулевой; другой дискриминант ненулевой лишь тогда, когда ни одно  $n_i$  не делится на характеристику поля. Поэтому:

*Ненулевость приведенного дискриминанта необходима и достаточна для систем без радикала после алгебраического замыкания поля  $P$ .*

*Ненулевость дискриминанта в случае характеристики нуль необходима и достаточна для невозникновения радикала после алгебраического замыкания поля  $P$ .*<sup>22)</sup>

22) Для коммутативных систем ср. E. Noether, *Diskriminantensatz für Ordnungen ...*, J. f. M. 157 (1927), с. 82–104, §§4–6. Метод доказательства там тот же, но в деталях сложнее; переход от одного базиса к другому (§4, 4 там) следует заменить данным здесь в начале этого параграфа, потому что возникающий там определитель обращается в нуль.

## Эмми Нётер: гиперкомплексные величины и теория представлений

Работа 34, §26. Источниково-точный перевод со сканированного немецкого свидетеля с R124plus-контролем.

### § 26. Включение группового кольца

Пусть  $a_1, \dots, a_h$  — элементы конечной группы, и образуем групповое кольцо над полем, характеристика которого не делит  $h$ . Тогда дискриминант  $D \neq 0$ , а значит групповое кольцо — это кольцо без радикала.

Доказательство. Сначала покажем, что далее  $\text{Sp}$  означает главный след:

$$\text{Sp}(e) = he, \quad \text{Sp}(a_i) = 0 \quad (a_i \neq e).$$

В регулярном представлении имеем

$$e \mapsto \begin{pmatrix} e & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e \end{pmatrix}, \quad \text{Sp}(e) = he.$$

Для  $a_i \neq e$  произведения  $a_i a_1, \dots, a_i a_h$  дают перестановку базисных элементов без неподвижной точки; соответствующая матрица имеет на главной диагонали только нули, поэтому  $\text{Sp}(a_i) = 0$ .

Теперь возьмем базисы  $a_1, \dots, a_h$  и  $a_1^{-1}, \dots, a_h^{-1}$ . Матрица  $(\text{Sp}(a_i a_j^{-1}))$  диагональна с  $he$  на главной диагонали, следовательно

$$D = h^h e \neq 0.$$

Классом элемента группы называется сумма, образованная в групповом кольце,

$$K_a = \sum_s s^{-1} a s, \quad (1)$$

где суммирование ведется только по различным элементам  $s^{-1} a s$ . Классы  $K_a$  являются центральными элементами, так как они коммутируют со всеми элементами группы. Они порождают центр: если элемент  $\sum_i \alpha_i a_i$  группового кольца коммутирует со всеми  $s$ , то

$$\sum_i \alpha_i a_i = s^{-1} \left( \sum_i \alpha_i a_i \right) s = \sum_i \alpha_i (s^{-1} a_i s),$$

и значит коэффициенты постоянны на каждом классе сопряженности.

Следовательно, ранг центра равен числу классов сопряженных элементов группы, а потому и число абсолютно неприводимых представлений равно этому числу классов. Матрицы  $A$  и  $S^{-1} A S$  имеют один и тот же след; значит элементы группы  $a$  и  $s^{-1} a s$  имеют один и тот же след. Беря след в обеих частях (1), получаем

$$\chi(K_a) = h_a \chi(a),$$

где  $h_a$  — число элементов класса  $K_a$ . Иными словами: характер элемента группы равен характеру класса, деленному на число элементов этого класса.

(Поступила 12 августа 1928 г.)

## 35. О максимальных областях целочисленных функций

*Res. Soc. Math. Moscou 36 (1929), с. 65–72. Источнико-верный перевод по исправленному немецкому свидетелю R124+P40/MathNet600.*

Следующие исследования близко соприкасаются с гильбертовой проблемой относительно целых функций<sup>1</sup>; они восходят к случайному вопросу Э. Гекке, который смог прямо вычислительно разобрать специальный случай, нужный ему как лемма<sup>2</sup>.

Постановка вопроса такова. Под *максимальной областью* целочисленных функций от  $x_1, \dots, x_n$ , то есть многочленов, степенных рядов или частных таких, внутри данной области  $\mathfrak{Z}$ , я понимаю такую область, которую уже нельзя расширить присоединением целочисленных знаменателей: если  $a \cdot g(x)$  принадлежит ей, где  $g(x) \in \mathfrak{Z}$ , то всегда принадлежит и  $g(x)$ ; здесь  $a$  означает ненулевое целое рациональное число. Каждая область целостности  $\mathfrak{I}$  в  $\mathfrak{Z}$  однозначно порождает максимальную область  $M(\mathfrak{I})$ , состоящую из всех функций  $g(x)$  из  $\mathfrak{Z}$ , для которых существует хотя бы одно  $a \neq 0$  такое, что  $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ .

Вопрос состоит в том, что можно сказать о знаменателях  $a$  этой максимальной области  $M(\mathfrak{I})$ , когда исходная область целостности  $\mathfrak{I}$  была конечной, то есть состояла из всех целочисленных многочленов от конечного числа функций  $f_1(x), \dots, f_r(x)$  из  $\mathfrak{Z}$ . При этом в качестве  $\mathfrak{Z}$  следует брать все целочисленные многочлены или степенные ряды от  $x_1, \dots, x_n$ , соответственно такие частные, которые не содержат никаких знаменателей, кроме уже встречающихся в  $f(x)$ , и их степеней.

Я показываю, что при дополнительном предположении для степенных рядов или их частных, а именно что между  $f(x)$  имеются только алгебраические зависимости, числа  $a$  всегда можно выбирать так, что в них входит лишь конечное число различных простых чисел, хотя вообще говоря в произвольных степенях.

Последнее непосредственно ясно: если  $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ , но  $a^e g(x)$  не принадлежит  $\mathfrak{I}$  ни для какого показателя  $e$ , то возникают все степени  $a^e$ ; например, при  $\mathfrak{I} = [2x]$  имеем  $x = (2x)/2$ ,  $x^2 = (2x)^2/2^2$ .

Вопрос об ограниченности можно сформулировать только так: можно ли указать, вообще говоря бесконечную, систему образующих для  $M(\mathfrak{I})$ , такую что в соответствующих знаменателях показатели простых чисел остаются ограниченными? Так как речь идет лишь о конечном числе простых, этот вопрос по известным рассуждениям<sup>3</sup> тождествен вопросу о конечности  $M(\mathfrak{I})$ , то есть гильбертовой проблеме относительно целых функций в целочисленной форме. Этого вопроса применяемыми здесь методами я решить не могу<sup>4</sup>.

Доказательство того, что в знаменателях  $a$  встречается лишь конечное число различных простых  $p$ , основано на том, что каждому такому  $p$  соответствует по крайней мере одно соотношение по модулю  $p$  между функциями  $f(x)$ , порождающими  $\mathfrak{I}$ , причем это соотношение с целочисленными коэффициентами не выполняется тождественно по  $x$ . Иначе говоря: если  $\mathfrak{o}$  обозначает область целочисленных многочленов от неопределенных  $u_1, \dots, u_r$ , то  $\mathfrak{I}$  посредством соответствия  $u_i \mapsto f_i(x)$  является гомоморфным образом  $\mathfrak{o}$ ; этот гомоморфизм опосредуется простым идеалом  $\mathfrak{a}$  из  $\mathfrak{o}$ , то есть  $\mathfrak{I}$  изоморфна кольцу классов  $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ . Соответственно  $\mathfrak{I}_p$  является гомоморфным образом  $\mathfrak{o}_p$ , где индекс обозначает переход к классам вычетов по модулю  $p$ , возможный за исключением конечного числа простых, входящих в знаменатели  $\mathfrak{I}$ . Этот гомоморфизм снова опосредуется простым идеалом  $\mathfrak{c}_p$  из  $\mathfrak{o}_p$ , содержащим  $\mathfrak{a}_p$ . Тогда и только тогда  $p$  входит в знаменатель  $M(\mathfrak{I})$ , когда  $\mathfrak{c}_p$  становится собственным надидеалом  $\mathfrak{a}_p$ . Это может произойти только если либо степень трансцендентности  $\mathfrak{I}_p$

<sup>1</sup>D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gött. Nachr. 1900, с. 253–297), проблема 14.

<sup>2</sup>E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variablen (Math. Ann. 74 (1913), с. 465–510), §2. У Гекке конечная область целостности  $\mathfrak{I}$  порождается тремя частными степенных рядов от двух переменных, между которыми имеется алгебраическое соотношение.

<sup>3</sup>Ср. Hilbert, там же, или более подробное изложение у E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, с. 138–156), §5.

<sup>4</sup>Так, например, в случае целочисленных (проективных) инвариантов основной системы форм показано, что они выражаются через полную систему инвариантов в обычном смысле, причем в знаменателях встречается лишь конечное число различных простых чисел. Этот результат не следует из обычного метода  $\Omega$ -процесса. Но о самой целочисленной конечности здесь ничего не сказано; до сих пор она известна только для бинарных основных форм. Ср. заметку, цитированную в примечании 3.

по сравнению с  $\mathfrak{I}$  уменьшается, либо  $\mathfrak{a}_p$  теряет свойство быть простым идеалом<sup>5</sup>. Что это происходит лишь для конечного числа  $p$ , следует из того, что и по модулю  $p$  алгебраическая зависимость влечет обращение функционального определителя в нуль (§1), а также из того, что  $\mathfrak{a}$  оказывается абсолютным простым идеалом и поэтому теряет простоту только по модулю конечного числа  $p^6$ .

Заметим еще, что все рассуждения с незначительными изменениями сохраняются, если вместо целых рациональных чисел взять целые числа конечного алгебраического числового поля и его простые идеалы (§4).

## § 1. Функциональные определители над областями коэффициентов характеристики $p$ .

**1.** Пусть  $f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_t(x_1, \dots, x_n)$  являются рациональными функциями или, более общо, формально заданными степенными рядами либо частными таких с коэффициентами из поля  $P$  характеристики  $p$ . Производные  $\partial f_i / \partial x_k$  также должны быть формально заданы, причем сохраняются все обычные правила вычисления. Пусть  $\Omega$  обозначает алгебраически замкнутое расширение поля  $P$ .

Тогда, как и в характеристике нуль, верно:

**Теорема.** Если между  $f(x)$  имеется алгебраическая зависимость с коэффициентами из  $\Omega$ , то ранг функциональной матрицы  $(\partial f_i / \partial x_k)$ ,  $i = 1, \dots, t$ ,  $k = 1, \dots, n$ , меньше  $t^7$ .

*Доказательство.* В многочленной области  $\Omega[u_1, \dots, u_t]$  пусть  $\mathfrak{m}$  обозначает простой идеал всех многочленов  $G(u)$ , для которых  $G(f) = 0$  тождественно по  $x$ . По предположению  $\mathfrak{m}$  не является нулевым идеалом; пусть  $G(u) \neq 0$  и, следовательно,  $G(u) \neq \text{const.}$  является многочленом наименьшей степени из  $\mathfrak{m}$ . Отсюда, в частности, следует, что  $G(u)$  неприводим. Тогда, как обычно, получается

$$\frac{\partial G}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial G}{\partial u_t} \cdot \frac{\partial f_t}{\partial x_k} = 0 \quad (k = 1, \dots, n),$$

откуда следует, что либо ранг функциональной матрицы меньше  $t$ , либо все  $\partial G / \partial u_i$  исчезают. Но так как  $G(u)$  был выбран многочленом наименьшей степени, отсюда следует исчезновение всех  $\partial G / \partial u_i$ .

Итак,  $G(u) = H(u^p, \dots, u^p)$ ; а так как область коэффициентов  $\Omega$  была алгебраически замкнутой, следовательно совершенным полем, далее  $G(u) = H(u)^p = (H(u))^p$ , что противоречит выбору  $G(u)$ . Доказательство, конечно, годится и для характеристики нуль, где последний шаг отпадает.

**2. Следствие.** Пусть  $F_1(x_1, \dots, x_n), \dots, F_t(x_1, \dots, x_n)$  являются целочисленными функциями, то есть многочленами, степенными рядами или частными таких, с функциональной матрицей ранга ровно  $t$ . Пусть простое  $p$  выбрано так, что оно не входит ни в знаменатели  $F(x)$ , ни во все  $t$ -рядные определители функциональной матрицы.

Тогда  $F_1(x), \dots, F_t(x)$  остаются алгебраически независимыми и по модулю  $p$ .

*Доказательство.* Пусть  $\bar{P}$  обозначает поле вычетов по  $p$ , а  $f_1(x), \dots, f_t(x)$  — функции над  $\bar{P}$ , которые получаются из  $F_1(x), \dots, F_t(x)$  заменой целочисленных коэффициентов их классами вычетов по  $p$ . Функции  $f_i(x)$  определены, так как  $p$  не входило в знаменатели  $F_i(x)$ . Их

<sup>5</sup>Под "степенью трансцендентности" системы, как известно, понимается инвариантное число алгебраически независимых функций, от которых система алгебраически зависит; система, состоящая из алгебраически независимых функций, называется неприводимой. Под степенью трансцендентности, или размерностью, простого идеала понимается степень трансцендентности его поля вычетов. Простой идеал не имеет собственного простого делителя той же степени трансцендентности; ср. B. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), с. 183–208.

<sup>6</sup>E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), с. 229–261, §7. Утверждение следует с помощью теории исключения из более простой теоремы: абсолютно неприводимый многочлен теряет это свойство только по модулю конечного числа простых; A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, с. 279–298, там с. 296. Более простое доказательство см. у E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), с. 26–33, §7. Если  $\mathfrak{I}$  имеет интегральный базис, содержащий ровно на одну функцию больше, чем его степень трансцендентности, как в случае Гекке, упомянутом в примечании 2, то  $\mathfrak{a}$  становится главным идеалом, и достаточно этой более простой теоремы без привлечения теории исключения. Вместо простых чисел всюду могут стоять простые идеалы конечного алгебраического числового поля. Утверждение, очевидно, верно и тогда, когда  $\mathfrak{a}$  является нулевым идеалом.

<sup>7</sup>В первоначальной формулировке я предполагала, что область коэффициентов  $P$  является совершенным полем. Распространением на произвольные, в том числе несовершенные, поля через переход от  $P$  к  $\Omega$  я обязана B. L. van der Waerden. Что обратное утверждение в характеристике  $p$  даже для совершенного  $P$  неверно, показывает пример  $f = x^p$ ,  $\partial f / \partial x = 0$ .

функциональная матрица  $(\partial f_i / \partial x_k)$  также получается из  $(\partial F_i / \partial x_k)$  заменой целочисленных коэффициентов классами вычетов по  $p$ ; в  $(\partial F_i / \partial x_k)$  не входят другие знаменатели, кроме тех, что уже есть в  $F(x)$ . Благодаря выбору  $p$  матрица  $(\partial f_i / \partial x_k)$  сохраняет ранг  $t$ ; значит,  $f(x)$  алгебраически независимы в  $\Omega$ , а тем более в  $\bar{P}$ .

## § 2. Формулировка теоремы.

1. Как во введении, пусть  $\mathcal{I}$  обозначает область целостности, то есть кольцо без делителей нуля, из целочисленных функций от  $x_1, \dots, x_n$ : многочленов или степенных рядов с целыми рациональными коэффициентами либо частных таких. В случае степенных рядов они могут быть формально заданными или сходящимися в некоторой области; используется только то, что возникающие функции образуют область целостности.

Пусть  $\Omega$  обозначает поле частных  $\mathcal{I}$ , а  $\mathcal{Z}$  — область целостности между  $\mathcal{I}$  и  $\Omega$ . Как выше,  $M$  называется *максимальной* в  $\mathcal{Z}$ , если из принадлежности  $a \cdot g(x)$ , где  $a \neq 0$  целое и  $g(x) \in \mathcal{Z}$ , всегда следует принадлежность  $g(x)$ . Для  $\mathcal{I}$  существует единственная максимальная область  $M(\mathcal{I})$ , порожденная  $\mathcal{I}$  в  $\mathcal{Z}$ , как пересечение всех максимальных областей в  $\mathcal{Z}$ , содержащих  $\mathcal{I}$ : ведь сама  $\mathcal{Z}$  такова, а пересечение любого числа таких областей снова максимально и содержит  $\mathcal{I}$ .  $M(\mathcal{I})$  состоит из всех функций  $g(x)$  из  $\mathcal{Z}$ , для которых существует хотя бы одно  $a \neq 0$  с  $a \cdot g(x) \in \mathcal{I}$ .

Действительно, эти  $g(x)$  образуют содержащую  $\mathcal{I}$  максимальную область  $N$  в  $\mathcal{Z}$ , потому что из  $b \cdot h(x) \in \mathcal{I}$ ,  $b \neq 0$ ,  $h(x) \in \mathcal{Z}$ , следует  $ab \cdot h(x) \in \mathcal{I}$  и  $ab \neq 0$ , значит  $h(x) \in N$ . Любая максимальная область  $M$  в  $\mathcal{Z}$ , содержащая  $\mathcal{I}$ , содержит и  $N$ : если  $a \cdot g(x) \in \mathcal{I}$ , то  $a \cdot g(x) \in M$ , так как  $\mathcal{I} \subset M$ , следовательно  $g(x) \in M$ .

2. Теперь предположим, что  $\mathcal{I}$  является конечной областью целостности с единицей, с интегральным базисом  $f_1(x), \dots, f_r(x)$ , то есть  $\mathcal{I}$  состоит из всех целочисленных многочленов от  $f_i(x)$ . Далее, пусть  $\mathcal{Z}$  состоит из всех целочисленных многочленов или степенных рядов от  $x$ , соответственно из таких частных, которые содержат только знаменатели, встречающиеся в конечном числе  $f_i(x)$ , конечно, в любых степенях.

Предположим также, что хотя бы в одной  $f_i(x)$ , а вообще говоря во всех, переменные  $x$  действительно входят; иначе  $\mathcal{I}$  и  $\mathcal{Z}$  просто состоят из всех целочисленных многочленов от дробного числа  $1/e$ , и доказывать нечего.

Если речь идет о многочленах или рациональных функциях, то поле частных  $\Omega$  имеет степень трансцендентности  $t$ ,  $1 \leq t \leq r$ , над полем  $K$  рациональных чисел. Если, например,  $f_1(x), \dots, f_t(x)$  образуют неприводимую систему<sup>8</sup>, то  $\Omega$  является конечным алгебраическим расширением чисто трансцендентного поля  $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ . При этом функциональная матрица  $f_1(x), \dots, f_r(x)$ , а также функциональная матрица  $f_1(x), \dots, f_t(x)$ , имеет ранг ровно  $t^9$ .

Чтобы и в случае степенных рядов или их частных эта структура  $\Omega$  сохранялась, нужно сделать дополнительное предположение: если  $t$  является рангом функциональной матрицы  $f_i(x)$  и одновременно, скажем, рангом функциональной матрицы  $f_1(x), \dots, f_t(x)$ , так что они по §1, 1 образуют неприводимую систему, то  $\Omega$  снова должно быть конечным алгебраическим расширением чисто трансцендентного  $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ . То есть  $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$  должны быть алгебраическими над  $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ <sup>10</sup>. При этом снова  $t \geq 1$ , так как в характеристике нуль не все  $\partial f_i / \partial x_k$  исчезают.

Одновременно условие следует для всякой системы из  $t$  функций интегрального базиса, функциональная матрица которых имеет ранг ровно  $t$ : они образуют неприводимую систему, от которой остальные функции алгебраически зависят.

3. Пусть теперь  $\mathcal{O}$  обозначает область целочисленных многочленов от неопределенных  $u_1, \dots, u_r$ .

<sup>8</sup>Под "неприводимой системой", как известно, понимается система из алгебраически независимых функций.

<sup>9</sup>Это дополнительное условие выполнено, когда, как в рассмотренном Гекке случае, речь идет об аналитических функциях,  $f_1(x), \dots, f_t(x)$  аналитически независимы, а  $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$  алгебраически зависят от них. Но условие намеренно сформулировано формально — ранг функциональной матрицы, — чтобы оно имело ясный смысл и для формально заданных степенных рядов. Тем самым все рассуждения остаются чисто формально-алгебраическими, а теоремы об аналитических функциях нужны только для проверки условия в специальном случае.

<sup>10</sup>Это дополнительное условие выполнено, когда, как в случае Гекке, речь идет об аналитических функциях,  $f_1(x), \dots, f_t(x)$  аналитически независимы, а  $f_{t+1}(x), \dots, f_r(x)$  алгебраически зависят от них.



Тогда  $\mathfrak{I}$  является кольцо-гомоморфным образом  $\mathfrak{o}$ , что непосредственно видно из соответствия  $u_i \mapsto f_i(x)$ . Значит,  $\mathfrak{I}$  кольцо изоморфно  $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ , где  $\mathfrak{a}$  — простой идеал, так как  $\mathfrak{I}$  кольцо без делителей нуля;  $\mathfrak{a}$  состоит из всех многочленов  $G(u)$ , для которых  $G(f)$  тождественно исчезает по  $x$ .

Как уже сказано во введении, речь идет о следующей теореме.

**Теорема.** При дополнительном условии из пункта 2 пусть  $\mathfrak{o}_p, \mathfrak{a}_p, \mathfrak{I}_p$  обозначают области, возникающие из  $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}, \mathfrak{I}$  заменой целочисленных коэффициентов их классами вычетов по модулю  $p$ . Тогда, за исключением не более чем конечного числа простых чисел, включая входящие в знаменатели  $f(x)$ , чтобы  $\mathfrak{I}_p$  была определена, гомоморфизм из  $\mathfrak{o}_p$  в  $\mathfrak{I}_p$  опосредуется  $\mathfrak{a}_p$ . Следовательно,  $\mathfrak{I}_p$  кольцо изоморфно  $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ , а тем самым  $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ .

Из теоремы факт о конечном числе простых в знаменателях  $\mathfrak{a}$  области  $M(\mathfrak{I})$  получается посредством следующего следствия.

**Следствие.** Если  $p$  выбрано так, что  $\mathfrak{I}_p$  изоморфна  $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ , то из  $p \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$  и  $g(x) \in \mathfrak{Z}$  всегда следует  $g(x) \in \mathfrak{I}$ .

Иначе говоря,  $\mathfrak{I}$  максимальна в  $\mathfrak{Z}$  относительно всех простых, кроме конечного числа исключительных простых.

Имеем  $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p \simeq \mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ . Действительно, по определению  $\mathfrak{o}_p = \mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$ , соответственно  $\mathfrak{a}_p = (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$ . Значит, по первой теореме об изоморфизме  $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ , а по предположению и  $\mathfrak{I}_p$ , изоморфны  $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ .

Это означает: из  $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$  в  $\mathfrak{I}$  следует  $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$  в  $\mathfrak{o}$ .

Это можно преобразовать так: из  $H(f(x)) = p \cdot g(x)$ , где  $H(f(x)) \in \mathfrak{I}$  и  $g(x) \in \mathfrak{Z}$ , следует  $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$ , а потому также  $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$  и, значит,  $g(x) = F(f_i(x))$ . Следовательно,  $g(x) \in \mathfrak{I}$ .

Наконец, конечное повторение дает: если  $\mathfrak{a}$  не делится ни на одно из исключительных простых, то из  $\mathfrak{a} \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$  и  $g(x) \in \mathfrak{Z}$  всегда следует  $g(x) \in \mathfrak{I}$ . Следствие доказано.

### § 3. Доказательство теоремы.

**1. Лемма.** Простой идеал  $\mathfrak{a}$ , опосредующий гомоморфизм между  $\mathfrak{I}$  и  $\mathfrak{o}$  (§2, 3), является абсолютным простым идеалом.

Пусть  $\mathfrak{o}^*$  обозначает многочленную область от  $u_1, \dots, u_r$  с произвольными, в том числе дробными, алгебраическими числами в качестве коэффициентов, а  $\mathfrak{a}^*$  — идеал в  $\mathfrak{o}^*$ , порожденный  $\mathfrak{a}$ . Значит,  $\mathfrak{a}^*$  состоит из всех линейных комбинаций  $a_1 G_1(u) + \dots + a_s G_s(u)$ , где  $a_i$  — произвольные алгебраические числа, а  $G_i(u)$  — многочлены из  $\mathfrak{a}$ . Нужно доказать, что  $\mathfrak{a}^*$  является простым идеалом.

Это будет доказано, если показать, что  $\mathfrak{a}^*$  опосредует гомоморфизм из  $\mathfrak{o}^*$  в  $\mathfrak{I}^*$ , где под  $\mathfrak{I}^*$  понимается область целостности всех многочленов от  $f_i(x)$  с произвольными алгебраическими коэффициентами. То есть надо показать, что  $H(u) \in \mathfrak{a}^*$ , если  $H(u) \in \mathfrak{o}^*$  и  $H(f_i(x))$  исчезает.

Пусть  $\omega_1, \dots, \omega_s$  является линейно независимым базисом конечного числового поля, порожденного конечным числом коэффициентов  $H(u)$ . Тогда

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \dots + \omega_s H_s(u),$$

где  $H_i(u) \in \mathfrak{o}$ , а  $a \neq 0$  — целое рациональное число. Из  $H(f) = 0$  следует  $\omega_1 H_1(f) + \dots + \omega_s H_s(f) = 0$ , а значит  $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$ . Поэтому  $H_1(u), \dots, H_s(u)$  принадлежат  $\mathfrak{a}$ , и, следовательно,  $H(u) \in \mathfrak{a}^*$ .

**2.** Доказательство теоремы теперь можно провести в следующей форме.

Если  $p$  выбрано так, что

I.  $\mathfrak{I}_p$  определена,

II.  $\mathfrak{a}_p$  остается простым, притом абсолютным, идеалом,

III. степень трансцендентности  $\mathfrak{I}_p$  по сравнению со степенью трансцендентности  $\mathfrak{I}$  не уменьшилась,

то гомоморфизм из  $\mathfrak{o}_p$  в  $\mathfrak{I}_p$  опосредуется  $\mathfrak{a}_p$ . Эти условия, за исключением не более чем конечного числа исключительных простых, выполнены для всех простых чисел.

То, что относительно условий I, II, III имеется лишь конечное число исключительных простых, непосредственно следует из предыдущего. I ясно: исключительными являются лишь конечное число простых, входящих в знаменатели  $f_i(x)$ . II следует из того, что  $\mathfrak{a}$  по лемме является абсолютным простым идеалом и потому сохраняет это свойство по модулю всех простых, за исключением не более чем конечного числа. III показано в следствии §1, 2, поскольку функциональная матрица  $f_1(x), \dots, f_t(x)$  по §2, 2 имеет ранг ровно  $t$ .

Теперь пусть  $p$  выбрано отличным от этих исключительных простых. Гомоморфизм из  $\mathfrak{o}_p$  в  $\mathfrak{I}_p$  опосредуется идеалом  $\mathfrak{c}_p$ , который является простым, так как  $\mathfrak{I}_p$  также кольцо без делителей нуля, и степень трансцендентности которого задается степенью трансцендентности  $\mathfrak{I}_p$ , следовательно не меньше  $t$ . Ведь  $\mathfrak{I}_p \simeq \mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$ , поэтому поле вычетов  $\mathfrak{c}_p$  изоморфно полю частных  $\mathfrak{I}_p$ .

Так как  $\mathfrak{a}_p$  также простой идеал и кратен, то есть является подидеалом,  $\mathfrak{c}_p$ , то  $\mathfrak{a}_p$  и  $\mathfrak{c}_p$  совпадают тогда и только тогда, когда совпадают их степени трансцендентности<sup>11</sup>. Степень трансцендентности  $\mathfrak{a}_p$ , как кратного  $\mathfrak{c}_p$ , также не меньше  $t$ ; классы  $u_1, \dots, u_t$  по модулю  $\mathfrak{a}_p$  образуют неприводимую систему. Нужно показать, что эта степень трансцендентности в точности равна  $t$ , чем все будет доказано.

Здесь в случае степенных рядов или их частных используется дополнительное предположение о структуре поля частных  $\Omega$  области  $\mathfrak{I}$  (§2, 2). По нему простой идеал  $\mathfrak{a}$  во всяком случае имел степень трансцендентности  $t$ , и нумерация была выбрана так, что классы  $u_1, \dots, u_t$  по модулю  $\mathfrak{a}$  образовывали неприводимую систему, от которой классы  $u_{t+1}, \dots, u_r$  алгебраически зависели. Следовательно, в  $\mathfrak{a}$  содержались целочисленные и примитивные многочлены

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}(u_r; u_1, \dots, u_t), \quad (1)$$

переходящие в многочлены

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \dots, u_t), \dots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \dots, u_t), \quad (2)$$

из  $\mathfrak{a}_p$ , не исчезающие благодаря примитивности. Но в каждом  $G_j^*$  соответствующая переменная  $u_{t+j}$  действительно должна входить, иначе, вопреки выбору  $p$ , имелась бы алгебраическая зависимость между классами  $u_1, \dots, u_t$  по модулю  $\mathfrak{a}_p$ . Тем самым показано, что  $\mathfrak{a}_p$  имеет степень трансцендентности  $t$ , поэтому совпадает с  $\mathfrak{c}_p$  и опосредует гомоморфизм. Теорема доказана.

#### § 4. Распространение на целые алгебраические коэффициенты.

Как уже отмечено в конце введения, все рассуждения с небольшими изменениями сохраняются, если вместо целых рациональных чисел взять целые числа конечного алгебраического числового поля  $K$ , а вместо простых чисел  $p$  — простые идеалы  $\mathfrak{p}$  этого числового поля. При этом §1 полностью сохраняется, как и рассуждения, ведущие к формулировке теоремы в §2; в доказательстве (§3, 2) и в следствии из §2, 3 нужны некоторые добавления.

1. В §3, 2 к исключительным простым идеалам надо добавить еще конечное число тех, которые входят в многочлены  $G_1(u), \dots, G_{r-t}(u)$  из §3, 2, (1), потому что теперь их уже нельзя считать примитивными. Тем самым обеспечивается ненулевость многочленов  $G_1^*(u), \dots, G_{r-t}^*(u)$  из §3, 2, (2); это является усилением условия III. Условие II сохраняется, поскольку теорема об абсолютной неприводимости не меняется; равно как, конечно, сохраняется и I.

2. Следствие из §2, 3, представляющее конечный результат, согласно тамошней окончательной формулировке следует сформулировать так.

**Следствие.** Если целое число  $a$  из  $K$  не делится ни на один из конечного числа исключительных простых идеалов, то из  $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$  и  $g(x) \in \mathfrak{J}$  всегда следует  $g(x) \in \mathfrak{I}$ .

Если  $\lambda_1, \lambda_2, \dots$  — целые числа из  $K$ , выбранные так, что каждое из них делится на один исключительный простой идеал, но не на его квадрат и не на остальные, то в качестве знаменателей  $a$  достаточно брать произведения степеней этих  $\lambda$ .

<sup>11</sup>Ср., например, В. L. van der Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), с. 183–208, §3.

Доказательство. Пусть

$$(a) = \mathfrak{p}_1^{\alpha_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{\alpha_g}$$

есть разложение  $(a)$  на простые идеалы, причем  $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$  отличны от исключительных простых идеалов; тогда  $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$  изоморфна  $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$  для каждого  $\mathfrak{p}_i$ . От кольца всех целых чисел из  $K$  переходим к кольцу частных  $R_a$ , определенному идеалом  $(a)$ , присоединяя к знаменателям все и только те целые числа, которые взаимно просты с  $(a)$ , то есть не делятся ни на один из идеалов  $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$ . В  $R_a$  идеалы  $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_g$  остаются простыми, но становятся главными; все остальные становятся единичным идеалом; разложение  $(a)$  остается тем же<sup>12</sup>. Поэтому при переходе к  $R_a$  как области коэффициентов следствие и его доказательство сохраняются в точной форме §2, 3.

Это означает: если  $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$ , то  $g(x) = F(f_i(x))$ , где многочлен  $F(u)$  имеет коэффициенты из  $R_a$ . Если  $d$  — общий знаменатель этих коэффициентов, то есть  $d$  взаимно прост с  $a$ , то это можно сформулировать и так: из  $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$  следует  $d \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$  с  $d$ , взаимно простым с  $a$ . Значит,  $(d, a)$  является единичным идеалом, и поэтому из  $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$  следует  $g(x) \in \mathfrak{I}$ . Первая часть следствия доказана.

Для доказательства второй части пусть  $R^*$  — кольцо частных в  $K$ , определенное конечным числом исключительных простых идеалов, а  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$  — базисные элементы этих простых идеалов в  $R^*$ , которые можно считать целыми числами. В  $R^*$  каждое  $a$  с точностью до единицы из  $R^*$  является произведением степеней  $\lambda$ . Возвращаясь к целым числам, получаем

$$\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s},$$

где  $\gamma$  и  $\beta$  не делятся ни на один исключительный простой идеал. Поэтому из  $a \cdot g(x) \in \mathfrak{I}$  следует, что  $\beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$ , а значит, по первой части следствия, и  $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_s^{\alpha_s} g(x)$ , лежит в  $\mathfrak{I}$ .

(Поступила 11 ноября 1931 г.)

---

**Аннотация** (переведена по русскому резюме оригинала):

Каждая область целостности  $\mathfrak{I}$  определяет некоторую максимальную область  $M(\mathfrak{I})$  того же типа, состоящую из всех функций  $g(x)$ , для которых существует хотя бы одно  $a \neq 0$  такое, что  $a \cdot g(x)$  содержится в  $\mathfrak{I}$ .

В этой работе исследуется вопрос о "знаменателях" а этой максимальной области  $M(\mathfrak{I})$  при предположении, что область  $\mathfrak{I}$  была конечной. Доказано, что эти  $a$  всегда можно выбирать так, чтобы в них в совокупности входило лишь конечное число простых чисел как множителей.

При этом в случае, когда  $g(x)$  являются степенными рядами или частными таких рядов, предполагается, что функции  $f_i(x)$ , задающие область  $\mathfrak{I}$ , могут быть связаны между собой только алгебраическими соотношениями.

Доказательство основано на сведении задачи к некоторым вопросам общей теории идеалов. Это сведение осуществляется через рассмотрение появления простого числа  $p$  в знаменателе  $a$  как соотношения по модулю  $p$  между функциями  $f_i$ .

---

<sup>12</sup>Ср., например, H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), с. 524–558, §2, 1.

### 36. Дифференцирование идеалов и дифферента

*J. Ber. d. DMV39 (1930), c. 17*

Э. Нётер, Гёттинген: Дифференцирование идеалов и дифферента.

Показано, как дифференту алгебраического числового поля можно понимать как *дифференциальное частное* определяющего идеала. То, что это определение совпадает с обычным, следует из структурных теорем, интересных самих по себе, которые в аналогичном смысле дают обобщение интерполяционной формулы Лагранжа.

Подробное изложение должно появиться в *Mathematische Annalen*.

## 37. Нормальный базис в полях без высшего ветвления

*Journal f. d. reine u. angew. Math.* 167 (1932), с. 147–152

Von Emmy Noether in Göttingen.

Под нормальным базисом числового поля Галуа  $K/k$  понимают базис максимального порядка  $\Omega$  поля  $K$  относительно максимального порядка  $\mathfrak{o}$  поля  $k$ , состоящий из сопряженных элементов. Необходимым условием существования такого базиса, как известно<sup>1</sup>, является то, что в  $K/k$  не возникают высшие поля ветвления. Это остается верным и тогда, когда ограничиваются одним местом, то есть переходят к  $p$ -адическому расширению  $k_p$  поля  $k$  и соответствующему  $K_p$  поля  $K$ . Ниже я доказываю обратное утверждение:

*Для всех мест  $p$ , где  $p$  не делит степень  $K/k$ , существует нормальный базис. В частности: если  $K/k$  не имеет высшего ветвления, то в каждом разветвленном месте существует нормальный базис; дискриминант там становится квадратом группового определителя.*

К этому последнему утверждению надо добавить, что, вопреки предположению Э. Артина, переход к его проводникам<sup>2</sup> требует еще дальнейших соображений: разложение группового определителя по неприводимым характерам дает обобщенные корневые числа; подходящее объединение дает разложение в основном поле, расширенном характерами. В простейших случаях я могу отождествить эти новые множители с проводниками Артина посредством идеал-теоретического разложения корневых чисел.<sup>3</sup> Далее замечу, что и в общем случае, когда нормального базиса не существует, расщепление на обобщенные корневые числа всегда возможно посредством “композиционного ряда по модулям Галуа”; и что отсюда, аналогично сказанному выше, получается разложение в расширенном основном поле; здесь снова начинаются идеал-теоретические вопросы.

Доказательство существования нормального базиса при указанных предположениях основано на том, что  $\Omega/\mathfrak{o}$ , рассматриваемое как модуль Галуа, то есть как  $\mathfrak{o}$ -модуль с подстановками группы Галуа как областью операторов, становится операторно изоморфным одностороннему идеалу целочисленного группового кольца, расширенного с помощью  $\mathfrak{o}$ . Это кольцо во всех обычных местах ветвления является максимальным порядком; но идеалы в максимальных порядках  $p$ -адических полупростых систем являются главными идеалами<sup>4</sup>, и потому здесь они возникают из одного элемента подстановками группы или группового кольца. Возвращаясь отсюда к модулю Галуа, получаем как раз существование нормального базиса. В местах высшего ветвления целочисленное групповое кольцо переходит в немаксимальный порядок, а идеал, соответствующий  $\Omega/\mathfrak{o}$ , переходит в неглавный идеал.

Все эти рассуждения, очевидно, сохраняются и для функциональных полей одной переменной, если характеристика поля констант не делит степень  $K/k$ .

### §1. $p$ -адически расширенное целочисленное групповое кольцо

Пусть  $\Omega$  и соответственно  $\mathfrak{o}_p$  обозначают максимальные порядки алгебраического числового поля  $k$  и его  $p$ -адического расширения  $k_p$ , где  $p$  есть простой идеал из  $k$ . Далее пусть  $(\mathfrak{G})$  обозначает

<sup>1</sup>Ср. A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), с. 546–562.

<sup>2</sup>E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), с. 1–11.

<sup>3</sup>[6. 10. 31.] Что и вообще еще будут необходимы идеал-теоретические соображения, показывает следующий, сообщенный мне М. Дойрингом и произвольно варьируемый, пример немаксимального порядка, дискриминант которого представляется квадратом группового определителя, тогда как сопряженным характерам соответствуют различные идеальные множители. Пусть  $k$  есть поле пятых корней из единицы,  $K = k(\sqrt[5]{2})$ . Рассматривается порядок  $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$ , именно в месте (2), где он по рассуждениям этой заметки имеет нормальный базис. Разложение по характерам дает для соответствующего группового определителя именно приведенные выше элементы базиса как множители. Поэтому “проводники”, кроме 1, становятся:  $2\sqrt[5]{2}/\sqrt[5]{2^4}, \sqrt[5]{2^2}/\sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^3}/\sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^4}/(2\sqrt[5]{2})$ , то есть 4, 2, 2, 4, и потому различны для сопряженных характеров.

<sup>4</sup>Ср. H. Hasse, Über  $p$ -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlensysteme, теоремы 46 и 47. Math. Ann. 104 (1931), с. 495–534. Для коммутативных систем свойство главных идеалов выполняется уже при переходе к кольцу частных по  $p$  в  $k$ ; следовательно, для определения места можно ограничиться этим более слабым расширением, если речь идет об абелевых группах и полях.

рациональное, а  $[\mathfrak{G}]$  целочисленное групповое кольцо группы  $\mathfrak{G}$  с числом элементов  $n$ . Под  $(\mathfrak{G})_k$  и соответственно  $(\mathfrak{G})_{k_p}$  понимается групповое кольцо с коэффициентами из  $k$  и соответственно из  $k_p$ ; аналогично под  $[\mathfrak{G}]_o$  и  $[\mathfrak{G}]_{o_p}$  понимается расширение целочисленного группового кольца до такого с коэффициентами из  $o$  и соответственно из  $o_p$ .

Следовательно,  $(\mathfrak{G})_k$  и  $(\mathfrak{G})_{k_p}$  являются системами без радикала, то есть полупростыми системами, а  $[\mathfrak{G}]_o$  и  $[\mathfrak{G}]_{o_p}$  являются порядками в  $(\mathfrak{G})_k$  и соответственно в  $(\mathfrak{G})_{k_p}$ .

**Теорема 1.** Если простой идеал  $p$  не делит число элементов  $n$  группы  $\mathfrak{G}$ , то  $[\mathfrak{G}]_{o_p}$  становится максимальным порядком в  $(\mathfrak{G})_{k_p}$ ; если же  $p$  делит  $n$ , то  $[\mathfrak{G}]_{o_p}$  не является максимальным.

Дискриминант целочисленного группового кольца, а значит также  $[\mathfrak{G}]_o$  и  $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ , равен степени числа элементов  $n$ .<sup>5</sup> Поэтому если  $p$  не делит  $n$ , то дискриминант  $[\mathfrak{G}]_{o_p}$  является единицей. Это означает, что  $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ , при фиксированном  $o_p$ , нельзя расширить до большего порядка: такому расширению соответствовало бы отделение квадратного неединичного множителя от дискриминанта. Но  $o_p$  уже предполагался максимальным порядком, то есть максимальным в  $k_p$ . Тем самым первая часть теоремы 1, единственная используемая далее, доказана.

Если же  $p$  делит  $n$ , то прямая сумма, соответствующая единичному представлению,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{o_p} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{o_p}, \quad E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{S \in \mathfrak{G}} S,$$

является собственным расширением  $[\mathfrak{G}]_{o_p}$ . Действительно, вследствие  $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$  порядок  $\mathfrak{C}$  становится собственным расширением;  $\mathfrak{C}$  есть порядок с зависимыми образующими  $E^{(1)}, (1 - E^{(1)})S$  при  $S \in \mathfrak{G}$ , причем  $E^{(1)}S = E^{(1)}$ .

**Теорема 2.** Если  $p$  не делит  $n$ , то каждый целый или дробный идеал относительно  $[\mathfrak{G}]_{o_p}$  является главным идеалом.

Ибо по теореме 1  $[\mathfrak{G}]_{o_p}$  является максимальным порядком  $p$ -адической полупростой системы; следовательно, его идеалы являются главными идеалами.<sup>6</sup>

## §2. Модули Галуа, операторная изоморфность, нормальный базис

Пусть  $K/k$  есть расширение Галуа, а  $\mathfrak{G}$  его группа; пусть  $z^S$  обозначает элемент  $K$ , возникающий из  $z$  подстановкой  $S$  из  $\mathfrak{G}$ . Подстановки из  $\mathfrak{G}$  порождают на  $K/k$ , рассматриваемом как  $k$ -модуль, то есть как аддитивная абелева группа с  $k$  как областью операторов, операторные автоморфизмы. Поэтому  $K/k$  можно определить как модуль относительно  $(\mathfrak{G})_k$  правилом

$$z \left( \sum_i S_i c_i \right) = \sum_i z^{S_i} c_i, \quad z \in K, S_i \in \mathfrak{G}, c_i \in k.$$

**Определение.** Каждый  $(\mathfrak{G})_k$ -модуль из  $K/k$  называется рациональным модулем Галуа. Аналогично  $[\mathfrak{G}]_o$ -модули из  $K/k$  называются целыми модулями Галуа; в частности,  $\mathfrak{D}/o$  является целым модулем Галуа.

**Теорема 3.** Как рациональный модуль Галуа,  $K/k$  операторно изоморфен  $(\mathfrak{G})_k$ .

<sup>5</sup>Ср., например, E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), с. 641–692.

<sup>6</sup>Hasse, цит. соч. Свойство главных идеалов там доказано только для простых систем, но известными рассуждениями отсюда оно следует и для полупростых. Действительно, компоненты максимального порядка снова максимальны; компоненты рассматриваемого идеала поэтому являются главными идеалами, скажем с базисами  $a_i$ . Тогда  $a = \sum a_i$  является базисом исходного идеала. Для абелевых групп см. также примечание 3.

Это следует из того, что  $K/k$  всегда имеет нормальный базис поля, то есть  $k$ -базис из сопряженных элементов  $z^S$ .<sup>7</sup> Соответствие

$$S \mapsto z^S, \quad \sum_i S_i c_i \mapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{то есть } ST \mapsto z^{ST},$$

дает операторный гомоморфизм, который из-за одинакового ранга над  $k$  становится изоморфизмом.

**Теорема 4.** Как целый модуль Галуа,  $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$  операторно изоморфен некоторому  $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модулю из  $(\mathfrak{G})_k$  максимального ранга  $n$ . Аналогично  $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$  операторно изоморфен  $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -модулю ранга  $n$  из  $(\mathfrak{G})_{k_p}$ .

Указанный в теореме 3  $(\mathfrak{G})_k$ -изоморфизм  $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$  сопоставляет  $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модулю  $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$   $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модуль ранга  $n$  в  $(\mathfrak{G})_k$ . Далее этот  $(\mathfrak{G})_k$ -изоморфизм можно расширить до  $(\mathfrak{G})_{k_p}$ -изоморфизма от  $K_p/k_p$  к  $(\mathfrak{G})_{k_p}$ , просто позволяя коэффициентам  $c_i$  в соответствии из теоремы 3 пробегать все элементы  $k_p$ . Этот изоморфизм тогда индуцирует  $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -изоморфизм  $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ . Здесь  $K_p/k_p$  следует рассматривать как гиперкомплексную систему над  $k_p$ . Оно возникает из  $K/k$  расширением коэффициентов и вообще становится системой с делителями нуля, а именно суммой изоморфных полей, то есть полупростой системой.

**Теорема 5.** В каждом месте  $p$ , которое не делит степень  $n$  расширения  $K/k$ , модуль  $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$  имеет нормальный базис.<sup>8</sup>

Действительно, по теореме 1  $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$  там является максимальным порядком;  $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -модули ранга  $n$  из  $(\mathfrak{G})_{k_p}$  поэтому становятся целыми или дробными идеалами, причем главными идеалами по теореме 2. Если значит идеал, соответствующий  $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ , равен  $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ , то он имеет  $\mathfrak{o}_p$ -базис  $W S_i$ ; операторный изоморфизм говорит, что  $w^{S_i}$  является  $\mathfrak{o}_p$ -базисом  $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ , если  $w$  обозначает элемент из  $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ , соответствующий  $W$ . Следовательно,  $n$  сопряженных элементов  $w^{S_i}$  образуют нормальный базис  $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ .

Если  $p$  делит  $n$ , то модуль, соответствующий  $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ , не может быть главным модулем, поскольку в этом случае нормальный базис не может существовать.

**Дополнительное замечание к теореме 3.** Из доказанной в теореме 3 операторной изоморфности  $(\mathfrak{G})_k$  с  $K/k$ <sup>9</sup> следуют результаты Шпайзера о проблеме форм Клейна,<sup>10</sup> которые можно сформулировать так:

Каждое неприводимое над  $k$  представление группы Галуа  $\mathfrak{G}$  расширения  $K/k$  порождается неприводимым рациональным модулем Галуа из  $K/k$ ; каждое абсолютно неприводимое порождается модулем Галуа из  $K_Z/Z$ .

Здесь  $Z$  обозначает поле разложения, содержащее  $k$ , для соответствующей компоненты группового кольца;  $K_Z/Z$  следует рассматривать как гиперкомплексную систему над  $Z$ , возникающую из  $K/k$  расширением коэффициентов. В частности,  $K_Z$  остается полем, если  $Z$  можно выбрать взаимно простым с  $K$  относительно  $k$ , то есть если  $K_Z/Z$  становится аксессуарным расширением, как в случае, рассмотренном Шпайзером.

Само утверждение следует посредством операторной изоморфности из соответствующего утверждения для  $(\mathfrak{G})_k$  или  $(\mathfrak{G})_Z$ , где неприводимые идеалы порождают представление.

<sup>7</sup> Действительно, если  $a_1, \dots, a_n$  есть базис  $K/k$ , а  $u_i$  обозначают неопределенные, то  $\sum u_i a_i^S$  линейно независимы, когда  $S$  пробегает элементы  $\mathfrak{G}$ ; следовательно,  $u_i$  можно специализировать до элементов из  $k$  так, чтобы линейная независимость сохранялась.

<sup>8</sup> В случае абелевых полей место при этом, по примечаниям 3 и 5, можно определять также кольцом частных.

<sup>9</sup> Доказательство, очевидно, предполагает только, что  $K$  является расширением Галуа первого рода над  $k$ , и что  $k$  имеет бесконечно много элементов. Последнее ограничение не нужно: М. Дойринг нашел доказательство теоремы 3, действительное также для полей с конечным числом элементов; из него, наоборот, следует существование нормального базиса поля. Одновременно так получается доказательство существования примитивного элемента, одинаково работающее для полей с конечным и бесконечным числом элементов.

<sup>10</sup> Цит. соч. Понятие модуля Галуа абстрагировано отсюда. Если характеристика  $k$  делит  $n$ , то речь идет о композиционных рядах по модулям Галуа и их неприводимых факторах.

Если  $v_1, \dots, v_t$  есть базис такого модуля Галуа, а  $S \mapsto \bar{S}$  соответствующее представление, то

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

Это и есть формулировка Клейна и Шпайзера.

### §3. Дискриминант как групповой определитель в полях без высшего ветвления

Для разложения дискриминанта, как известно, достаточно рассматривать разложение в отдельных местах ветвления; в полях без высшего ветвления, следовательно, речь идет только о местах с нормальным базисом.

**Теорема 6.** *Для полей Галуа  $K/k$  без высшего ветвления дискриминант в каждом месте ветвления равен квадрату группового определителя группы Галуа, когда неопределенные заменены нормальным базисом. Соответственно неприводимым представлениям групповой определитель разлагается на обобщенные корневые числа; дискриминант разлагается на идеалы основного поля, расширенного характеристиками, причем комплексно-сопряженным характеристам соответствуют одни и те же идеалы.*

Действительно, с  $w^S$  как нормальным базисом дискриминант  $\Delta$  равен квадрату

$$D = |w^{ST^{-1}}|, \quad S, T \in \mathfrak{G}.$$

А  $D$  есть групповой определитель с  $w^S$  вместо неопределенных  $x_S$ .

Разложение на корневые числа получается из рассуждений Шпайзера, цит. соч. Пусть

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \quad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

есть разложение группового определителя, соответственно групповой матрицы, по абсолютно неприводимым представлениям. Если  $S \mapsto \bar{S}$  обозначает представление, соответствующее  $M_\lambda$ , где  $\bar{S}$  лежат в расширенном основном поле, то получается

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R} \bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

и при переходе к определителю

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Тем самым  $D_\lambda$  распознаются как обобщенные корневые числа;  $\varepsilon_T$ , как определитель  $\bar{T}$ , является корнем из единицы, то есть неприводимым представлением фактор-группы  $\mathfrak{G}$  по коммутаторной группе. В случае циклических групп  $D_\lambda$  являются просто корневыми числами Лагранжа  $\sum w^S \chi_\lambda(S)$ .

Вообще  $D_\lambda$  лежат в гиперкомплексной системе, возникающей из  $K_p/k_p$  расширением области коэффициентов  $k_p$  соответствующим характером; при этом речь идет о *целых* величинах этой системы. Действительно, определитель, образованный с неопределенными  $x_S$ , имеет коэффициенты, являющиеся целыми числами из поля характера; а  $w^S$  являются целыми элементами из  $K_p$ .

Чтобы перейти от разложения группового определителя к разложению дискриминанта, каждое представление объединяется с сопряженным к нему. Если  $\lambda, \bar{\lambda}$  обозначают сопряженные представления, то одновременно

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

вместе с тем определители, образованные для неопределенных  $x_S$  и принадлежащие  $\lambda, \bar{\lambda}$ , комплексно сопряжены, тогда как вообще сопряженным характеристам при неопределенных  $x_S$  соответствуют сопряженные определители.



Итак, если положить  $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$ , то надо присоединить только вещественное подполе  $\lambda$ -го характера, и

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \quad \text{для всех } T \text{ из } \mathfrak{G};$$

отсюда<sup>11</sup>  $\Delta_\lambda$  лежит в основном поле, расширенном вещественным подполем  $\lambda$ -го характера.

Следовательно, разложение дискриминанта

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \dots \Delta_t^{f_t}$$

является таким разложением в основном поле, расширенном вещественными подполями характеров, причем комплексно-сопряженным характерам соответствуют одни и те же множители. Для остальных сопряженных характеров без дополнительных доводов ничего не следует [ср. 2а)].

Тем самым теорема 6 доказана во всех частях. Если удастся доказать, что идеалы, порожденные  $\Delta_\lambda$ , на самом деле уже лежат в основном поле  $k$  и становятся равными для сопряженных характеров, то они совпадают с проводниками Артина, как только составным характерам сопоставляются соответствующие произведения степеней  $\Delta_\lambda$ . Действительно, выполняется как функциональное уравнение, так и факт, непосредственно следующий из нормального базиса (ср. Шпайзер, цит. соч.): единичным представлениям подгрупп соответствуют дискриминанты соответствующих подполей. Из совпадения в каждом месте следует совпадение полных идеалов. Если ограничиться рационально неприводимыми характерами, то приведенные факты дают это совпадение. Для абсолютно неприводимых характеров совпадение будет еще прямо подтверждено в самом простом случае:

**Теорема 7.** Пусть  $k$  есть поле рациональных чисел, а  $K/k$  циклично простой степени  $l$ , взаимно простой с дискриминантом, то есть без высшего ветвления. Тогда идеалы, порожденные  $\Delta_\lambda$  для неединичных представлений, попарно равны и совпадают с проводником  $K/k$ .

Это следует из известного разложения корневых чисел.<sup>12</sup> В разветвленном месте  $\mathfrak{p}$  расширения  $K/k$ , а именно для  $k_\varepsilon$ , поля  $l$ -х корней из единицы, и для  $K_\varepsilon$ , имеем ( $K_\varepsilon$  остается полем, поскольку  $k_\varepsilon$  взаимно просто с  $K$ , а  $\mathfrak{p}$ -адическое расширение по примечанию 7 здесь излишне):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

где  $\mathfrak{p}_i$  лежит в  $k_\varepsilon$ , а  $\mathfrak{P}_i$  в  $K_\varepsilon$ . Далее для корневых чисел

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \dots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \dots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

где  $r_1, \dots, r_{l-1}$  является перестановкой чисел  $1, \dots, l-1$ . Но корневые числа  $\Omega_\lambda$  здесь тождественны множителям  $D_\lambda$  группового определителя; поэтому

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \dots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

то есть получается совпадение с проводником  $K/k$ .

Поступило 24 августа 1931 г.

<sup>11</sup>Поскольку речь идет о гиперкомплексном расширении коэффициентов поля, обычный вывод теории Галуа надо модифицировать. Пусть  $P$  есть рассматриваемое поле расширения поля  $k_{\mathfrak{p}}$ , а

$$(K_{\mathfrak{p}})_P = (K_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{P}} e^{S_1} + \dots + (K_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{P}} e^{S_r}$$

прямое разложение на поля. Тогда  $(K_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{P}} e^{S_i} / P e^{S_i}$  является расширением Галуа; группа является подгруппой группы разложения одного простого множителя  $\mathfrak{p}$ , а  $e^{S_i}$  сопряжены относительно смежных классов. Из  $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$  сначала следует, что  $i$ -я компонента  $\Delta_\lambda$  лежит в  $P e^{S_i}$ , то есть равна, скажем,  $\gamma_i e^{S_i}$  с  $\gamma_i \in P$ . Далее из сопряженности  $e^{S_i}$  следует, что все  $\gamma_i$  равны, значит на самом деле  $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$  лежит в  $P$ .

<sup>12</sup>Hilbert, Zahlbericht, § 108. Поскольку по теореме 5 существование нормального базиса установлено, а место по примечанию 7 здесь можно просто определить кольцом частных, нет необходимости привлекать использованный в Zahlbericht факт, что абсолютно циклические поля являются круговыми полями.

## 38. Совместно с Р. Брауэром и Г. Гассе: доказательство главной теоремы в теории алгебр

*Journal f. d. reine u. angew. Math.* 167 (1932), с. 399–404

### Доказательство главной теоремы в теории алгебр.

Р. Брауэр, Кёнигсберг; Г. Гассе, Марбург; Э. Нётер, Гёттинген<sup>1</sup>.

Наконец нашими совместными усилиями удалось доказать справедливость следующей теоремы, имеющей основное значение для структурной теории алгебр над алгебраическими числовыми полями, а также и за ее пределами:

**Главная теорема.** *Всякая нормальная алгебра с делением над алгебраическим числовым полем циклическа (или, как также говорят, имеет тип Диксона).*

Для нас особая радость представить этот результат, как успех, существенно обязанный  $p$ -адическому методу, господину Курту Хензелю, основателю этого метода, к его семидесятилетию.

Наше доказательство состоит из трех редукций; каждый из нас внес одну из них.<sup>2</sup>

1. Первую редукцию дал Г. Гассе на основании недавно развитой им теории циклических алгебр над алгебраическими числовыми полями.<sup>3</sup>

**Редукция 1.** Главная теорема доказана, если показано:

I. Всякая всюду расщепленная алгебра над  $\Omega$  есть  $\sim \Omega$ .

Для краткости здесь и ниже выражение “алгебра  $A$  над  $\Omega$ ” всегда означает “нормальная простая алгебра  $A$  над алгебраическим числовым полем  $\Omega$ ”, то есть простая гиперкомплексная система с центром  $\Omega$ . Далее,  $A \sim \Omega$  означает, что  $A$  является полной матричной алгеброй над  $\Omega$ , то есть принадлежит специальному классу подобия, определенному самим  $\Omega$  как алгеброй с делением над  $\Omega$ . Наконец, под всюду расщепленной алгеброй над  $\Omega$  понимается такая алгебра, у которой для каждого простого места  $p$  поля  $\Omega$   $p$ -адическое расширение, то есть алгебра, возникающая при расширении поля коэффициентов  $\Omega$  до соответствующего  $p$ -адического поля  $\Omega_p$ , расщепляется:

$$A_p \sim \Omega_p.$$

**Доказательство.** Пусть  $D$  есть алгебра с делением над  $\Omega$ . Если  $Z$  есть циклическое поле над  $\Omega$  такое, что для каждого простого места  $p$  поля  $\Omega$   $p$ -степень поля  $Z$  кратна  $p$ -индексу  $D$ , то для соответствующих простых делителей  $\mathfrak{P}$  в  $Z$  каждое  $\mathfrak{P}$ -адическое поле  $Z_{\mathfrak{P}}$  является полем разложения для  $D_p$  [Н, 18.1]. Отсюда получается, что алгебра  $D_Z$ , возникающая из  $D$  расширением поля коэффициентов до  $Z$ , всюду расщепляется над  $Z$ . Если I уже установлено для всякого  $\Omega$ , то следует  $D_Z \sim Z$ . Это означает, что  $D$  имеет циклическое поле разложения  $Z$ , следовательно допускает циклическое представление [Н, 5]. Тогда  $D$  имеет и такое циклическое поле разложения, степень которого совпадает со степенью самой  $D$ ; то есть  $D$  циклическа [Н, 6, теорема 6]. Итак, при предположении I главная теорема доказана.

<sup>1</sup>Составление этой заметки взял на себя Г. Гассе.

<sup>2</sup>Они приводятся в порядке их возникновения, противоположном систематическому порядку.

<sup>3</sup>Н. Hasse, *Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper*, Gött. Nachr. 1931. Подробное изложение доказательств, где в частности развивается также теория полей разложения и скрещенных произведений, развитая Э. Нётер в лекции и здесь, как и там, основная, вскоре появится в Trans. Amer. Math. Soc. под названием *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*. Ниже эта работа цитируется как Н. Н, 1–6 составляют, за исключением языка, первую заметку.

2. Для второй редукции решающий толчок дал Р. Брауэр, когда письменно сообщил Г. Гассе, как родственный вопрос о точном значении экспоненты алгебры с делением (который, впрочем, также решается главной теоремой, см. ниже) с помощью силовской теоремы о группах сводится к случаю разрешимого поля разложения. Затем эту мысль удалось использовать и для соответствующей дальнейшей редукции вопроса цикличности.

**Редукция 2.** Утверждение I доказано, если показано:

II. Всякая всюду расщепленная алгебра с разрешимым полем разложения над  $\Omega$  есть  $\sim \Omega$ .

**Доказательство.** Пусть  $A$  есть всюду расщепленная алгебра над  $\Omega$ . Пусть далее  $K$  есть галуа-поле разложения для  $A$ ,  $p$  произвольное простое число, а  $\Sigma$  одно из силовских полей поля  $K$  над  $\Omega$ , относящихся к  $p$  (то есть поле инвариантов силовской  $p$ -подгруппы группы Галуа). Тогда  $A_\Sigma$  есть также всюду расщепленная алгебра над  $\Sigma$ , имеющая разрешимое поле разложения  $K$ . Если II уже установлено для всякого  $\Omega$ , то следует  $A_\Sigma \sim \Sigma$ . Это означает, что  $A$  имеет поле разложения  $\Sigma$ , степень которого взаимно проста с  $p$ . Поэтому индекс  $A$ , как делитель этой степени, взаимно прост с  $p$ . Так как это верно для каждого простого  $p$ , индекс равен 1, то есть  $A \sim \Omega$ . Итак, при предположении II доказано I.<sup>4</sup>

3. Третью редукцию, которая затем, как понял Г. Гассе, уже располагая первыми двумя редукциями, ведет к окончательному доказательству, дала Э. Нётер, побужденная сообщением Г. Гассе; в нем главная теорема была доказана для специального случая абелева поля разложения, именно с помощью общей редукции 1 и формульной редукции соответствующей фактор-системы. Ее ядро Э. Нётер и выделила как третью редукцию. Независимо от Э. Нётер эту третью редукцию, впрочем, уже обдумал и Р. Брауэр.

**Редукция 3.** Утверждение II доказано, если показано:

III. Всякая всюду расщепленная алгебра с циклическим полем разложения простой степени над  $\Omega$  есть  $\sim \Omega$ .

**Доказательство.** Пусть  $A$  есть всюду расщепленная алгебра с разрешимым полем разложения  $K$  над  $\Omega$ . Пусть

$$K = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \dots > \Lambda_r = \Omega$$

есть цепочка полей между  $K$  и  $\Omega$ , такая что каждое  $\Lambda_i$  над  $\Lambda_{i+1}$  циклично простой степени. Тогда сначала  $A_{\Lambda_1}$  является также всюду расщепленной алгеброй над  $\Lambda_1$ , имеющей циклическое поле

<sup>4</sup>Идея редукции к разрешимому полю разложения с помощью силовской теоремы была уже раньше применена Р. Брауэром, а именно для доказательства того, что каждый простой делитель индекса встречается также в экспоненте (*Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, Berl. Akad.-Ber. 1926). Недавно А. А. Альберт для этой идеи, а также вообще для ряда общих теорем теории Р. Брауэра и Э. Нётер разработал простые доказательства, независимые от теории представлений: 1. *On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices*; 2. *On direct products*; обе работы в Trans. Amer. Math. Soc. 33 (1931); для рассматриваемой здесь редукции см. особенно теорему 23 в 2.

*Добавление во время печати.* Кроме того, А. А. Альберт, располагая письмом Г. Гассе о том, что главная теорема доказана им для абелевых алгебр (см. далее в тексте), непосредственно и независимо от нас вывел из этого следующие факты:

а) главную теорему для степеней вида  $2^e$ ,  
 б) следующую ниже теорему 1 (экспонента = индекс),  
 в) помимо основной мысли редукции 2, также и мысль последующей редукции 3, естественно без отношения к редукции 1, и соответственно с результатом: для алгебр с делением  $D$  степени  $p^e$ , равной степени простого числа, над  $\Omega$  существует расширение  $\Omega'$  степени, взаимно простой с  $p$ , над  $\Omega$ , такое что  $D_{\Omega'}$  циклическа.

Все три результата, разумеется, перекрыты нашим тем временем полученным доказательством главной теоремы. Однако они показывают, что А. А. Альберту также принадлежит независимая доля в доказательстве главной теоремы. Наконец, А. А. Альберт (после знакомства с нашим доказательством главной теоремы) еще заметил, что наша центральная теорема I выводится в несколько строк из теорем 13, 10, 9 его находящейся в печати работы (Bull. Amer. Math. Soc. 37 (1931)). Доказательство этих теорем по существу основано на тех же рассуждениях, что и наши редукции 2 и 3.

разложения простой степени  $K = \Lambda_0$ . Если III уже установлено для всякого  $\Omega$ , то следует  $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$ . Это означает, что  $\Lambda_1$  есть поле разложения для  $A$ . Теперь, исходя из  $\Lambda_1$  вместо  $\Lambda_0$ , точно так же доказывают  $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$ , и так далее, пока наконец  $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$ , то есть  $A \sim \Omega$ . Итак, при предположении III доказано II.

4. Но III уже установлено по результатам Г. Гассе [Н, 24]. Поэтому, проходя назад через редукции 3, 2, 1, получаем справедливость главной теоремы.

Э. Нётер при этом еще указывает на следующее. Справедливость III, более общо для циклических полей разложения произвольной степени, сводится к норменной теореме Гассе<sup>5</sup>. Для редукции 3 нужен, однако, только специальный случай простой степени, то есть первоначальная норменная теорема Гильберта–Фуртвенглера<sup>6</sup>. Тем самым редукция III дает новое простое доказательство норменной теоремы Гассе. Это доказательство шло бы так:

Пусть  $Z$  есть циклическое поле над  $\Omega$ , а  $\alpha$  число из  $\Omega$ , для которого символ норменного вычета

$$\left( \frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}} \right) = 1$$

для каждого простого места  $\mathfrak{p}$  поля  $\Omega$ . Тогда всякая циклическая алгебра

$$A = (\alpha, Z)$$

<sup>7</sup> всюду расщепляется [Н, 17.7]. По редукции 3, следовательно, используя только норменную теорему Гильберта–Фуртвенглера, получаем  $A \sim \Omega$ . Но тогда  $\alpha$  есть норма некоторого элемента из  $Z$  [Н, 15.4].

В связи с норменной теоремой заметим далее, что теорему I следует рассматривать как ее правильное обобщение на высшие, в том числе неабелевы, случаи, тогда как буквальное обобщение, как показал Г. Гассе<sup>5</sup>, вообще неверно.

5. Из главной теоремы сразу следует ответ на вопрос, к которому первоначально относилась вторая редукционная мысль:

**Теорема 1.** Экспонента нормальной простой алгебры над алгебраическим числовым полем равна ее индексу.

Далее из теоремы I получается примечательный факт:

**Теорема 2.** Основной идеал собственной нормальной алгебры с делением над  $\Omega$  делится по меньшей мере на одно простое место  $\Omega$ , и даже по меньшей мере на два.

При этом основной идеал можно определить как (приведенную) норму (приведенной) дифференты.<sup>8</sup> Кроме того, бесконечное простое место включается в основной идеал тогда и только тогда, когда алгебра для него сводится к кватернионной алгебре, а не к действительному или комплексному числовому полю.

<sup>5</sup>Указано в Н, 3.11; доказано в: Н. Hasse, *Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol*, Gött. Nachr. 1931.

<sup>6</sup>См. Н. Hasse, *Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II*, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. 6 (1930), § 8, а также указанную там литературу.

<sup>7</sup>В обозначении Н, 1. Указание связанного с  $\alpha$  автоморфизма  $S$  поля  $Z$  здесь опущено как несущественное.

<sup>8</sup>В специальном случае рациональных кватернионных алгебр это сводится к введенному Г. Брандтом понятию “основного числа” (*Idealtheorie in Quaternionenalgebren*, Math. Ann. 99 (1928)). Так как здесь речь идет не о числе, а об идеале, надо было сказать “основной идеал”; это не следует смешивать с дедекундовым обозначением “основной идеал” и “основное число” для дифференты и дискриминанта, которое именно по указанной причине оказывается непригодным для относительных полей. О дефиниции (приведенной) дифференты см. следующую сноску. (Приведенную) норму идеала Э. Нётер также определяет “по простым местам”, а именно, в соответствии с тем фактом, что для отдельных простых мест всякий идеал главный, просто образованием (приведенных) числовых норм чисел базиса главного идеала для отдельных простых мест.

**Доказательство.** По результатам Г. Гассе<sup>9</sup> простое место  $\mathfrak{p}$  поля  $\Omega$  входит в основной идеал тогда и только тогда, когда  $\mathfrak{p}$ -индекс отличен от 1. Если бы все  $\mathfrak{p}$ -индексы были равны 1, то алгебра всюду расщеплялась бы, и по теореме I не было бы собственной алгебры с делением. (То, что и единственный  $\mathfrak{p}$ -индекс не может быть отличен от 1, следует из того, что для символов норменного вычета, порядки которых суть  $\mathfrak{p}$ -индексы [Н, 17.7], действует теорема о произведении, то есть закон взаимности [Н, 3.8].)

6. Кроме того, теорема I позволяет определить (арифметически охарактеризовать) все поля разложения  $K$ , принадлежащие алгебре  $A$  над  $\Omega$ . В точном обобщении обстоятельства, уже установленного Г. Гассе в специальном случае циклических  $A, K$  [Н, 6, теорема 2], получается:

**Теорема 3.** Для алгебры  $A$  над  $\Omega$  алгебраическое числовое поле  $K$  над  $\Omega$  является полем разложения тогда и только тогда, когда для всех простых делителей  $\mathfrak{P}_i$  в  $K$  всех простых мест  $\mathfrak{p}$  поля  $\Omega$  соответствующая  $\mathfrak{P}_i$ -степень  $n_{\mathfrak{P}_i}$  поля  $K$  кратна  $\mathfrak{p}$ -индексу  $m_{\mathfrak{p}}$  алгебры  $A$ .

При этом  $\mathfrak{P}_i$ -степень поля  $K$  есть степень соответствующего  $\mathfrak{P}_i$ -адического поля  $K_{\mathfrak{P}_i}$  над  $\mathfrak{p}$ -адическим полем  $\Omega_{\mathfrak{p}}$ , то есть, если

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \quad N_{K/\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}},$$

есть разложение  $\mathfrak{p}$  в  $K$ , это произведение степени  $f_{\mathfrak{P}_i}$  и порядка ветвления  $e_{\mathfrak{P}_i}$  делителя  $\mathfrak{P}_i$  относительно  $\mathfrak{p}$ ,  $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$  [Н, 4]. А  $\mathfrak{p}$ -индекс  $A$  есть индекс  $m_{\mathfrak{p}}$   $\mathfrak{p}$ -адического расширения  $A_{\mathfrak{p}}$  [Н, 6].

**Доказательство.** То, что  $K$  есть поле разложения для  $A$ , то есть  $A_K \sim K$ , по теореме I равносильно тому, что  $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$  для каждого  $\mathfrak{P}_i$ .

Для конечного простого места  $\mathfrak{p}$  пусть

$$A_{\mathfrak{p}} \sim (\pi, W_{\mathfrak{p}})$$

есть арифметически выделенное циклическое представление  $A_{\mathfrak{p}}$  [Н, 16; кроме того, л. с.<sup>9</sup>, теорема 38], то есть  $W_{\mathfrak{p}}$  есть неразветвленное поле степени  $m_{\mathfrak{p}}$  над  $\Omega_{\mathfrak{p}}$ , а  $\pi$  число из  $\Omega_{\mathfrak{p}}$ , точно делящееся на  $\mathfrak{p}^1$ . Далее пусть  $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$  есть композит, а

$$\Delta_{\mathfrak{P}_i} = K_{\mathfrak{P}_i} \cap W_{\mathfrak{p}}$$

пересечение  $W_{\mathfrak{p}}$  и  $K_{\mathfrak{P}_i}$ . Так как наибольшее неразветвленное подполе, содержащееся в  $K_{\mathfrak{P}_i}$ , имеет степень  $f_{\mathfrak{P}_i}$  над  $\Omega_{\mathfrak{p}}$ , и так как над  $\Omega_{\mathfrak{p}}$  для каждой степени существует только одно неразветвленное поле, то  $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$

имеет степень  $d_{\mathfrak{P}_i} = (m_{\mathfrak{p}}, f_{\mathfrak{P}_i})$  над  $\Omega_{\mathfrak{p}}$ .

Поэтому  $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$  имеет степень  $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$  над  $K_{\mathfrak{P}_i}$ , причем неразветвлено.

Теперь

$$A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_{\mathfrak{p}})_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}})$$

[Н, 15.5]. Поэтому  $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$  равносильно тому, что  $\pi$  является нормой из  $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$  относительно  $K_{\mathfrak{P}_i}$ . Но ввиду неразветвленности  $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$  над  $K_{\mathfrak{P}_i}$  это имеет место тогда и только тогда, когда показатель  $e_{\mathfrak{P}_i}$  числа  $\pi$  в  $\mathfrak{P}_i$  кратен степени  $m_{\mathfrak{p}}/d_{\mathfrak{P}_i}$  поля  $K_{\mathfrak{P}_i} W_{\mathfrak{p}}$  над  $K_{\mathfrak{P}_i}$ , или, что ввиду

$$\left( \frac{m_{\mathfrak{p}}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} \right) = 1$$

сводится к тому же, когда

$$\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$$

<sup>9</sup>Н. Hasse, *Über p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, Math. Ann. 104 (1931); см. там теоремы 42, 59.

кратно  $m_p/d_{\mathfrak{P}_i}$ , то есть когда  $n_{\mathfrak{P}_i}$  кратно  $m_p$ , как и утверждалось.

Если  $p$  есть бесконечное простое место и не имеет места тривиальный случай  $m_p = 1$ , то  $m_p = 2$ , а  $A_p$  есть кватернионная алгебра над действительным числовым полем  $\Omega_p$ . То, что  $A_{K_{\mathfrak{P}_i}} = (A_p)_{K_{\mathfrak{P}_i}} \sim K_{\mathfrak{P}_i}$ , тогда равносильно тому, что  $K_{\mathfrak{P}_i}$  есть комплексное числовое поле, то есть  $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_p$  (здесь  $e_{\mathfrak{P}_i}$  не появляется), что снова дает утверждение ( $n_{\mathfrak{P}_i}$ , как и  $m_p$ , может принимать только значения 1 или 2).

7. К значительным результатам приходят, если вопрос, решенный в теореме 3, обо всех полях разложения  $K$  фиксированной алгебры  $A$  обратить: при фиксированном алгебраическом поле  $K$  над  $\Omega$  рассмотреть совокупность алгебр  $A$  над  $\Omega$ , расщепляемых полем  $K$ . Эти алгебры  $A$  образуют определенную  $K$  подгруппу  $\mathfrak{K}$  группы Р. Брауэра  $\mathfrak{A}$  всех алгебр (точнее, всех классов подобных алгебр) над  $\Omega$ .<sup>10</sup> Если предположить, что  $K$  галуа над  $\Omega$ , то приходят к теоремам, которые следует рассматривать как обобщение главных теорем теории классов полей (теории относительно-абелевых числовых полей) на общие относительно-галуа числовые поля:

**Теорема 4.** (*Теорема разложения*). Относительная степень  $f$  простых делителей в  $K$  простого идеала  $p$  поля  $\Omega$ , не входящего в относительный дискриминант  $K$ , равна наименьшей экспоненте, для которой

$$A_p^f \sim \Omega_p$$

становится верным для всех алгебр  $A$  из группы  $\mathfrak{K}$ , сопоставленной  $K$ .

**Доказательство.** Так как  $f$  есть  $p$ -степень поля  $K$ , одинаковая для всех простых делителей  $p$  в  $K$ , а с другой стороны  $p$ -индекс  $A$  равен индексу, то есть экспоненте,  $A_p$ , то по теореме 3  $f$  во всяком случае кратно указанной наименьшей экспоненте; для доказательства остается показать, что в группе  $\mathfrak{K}$  существуют алгебры  $A$  с точным  $p$ -индексом  $f$ .

По теореме Фробениуса о плотности наверняка существует еще один простой идеал  $p'$  в  $\Omega$ , не входящий в относительный дискриминант  $K$ , простые делители которого в  $K$  имеют относительную степень  $f$ . Пусть  $Z$  есть циклическое поле над  $\Omega$ , у которого  $p$ -степень и  $p'$ -степень имеют значение  $f$ . Далее пусть  $\alpha$  есть число в  $\Omega$ , для которого символы норменного вычета

$$\left( \frac{\alpha, Z}{p} \right) \quad \text{и} \quad \left( \frac{\alpha, Z}{p'} \right)$$

имеют взаимно обратные значения порядка  $f$ , тогда как для всех остальных делителей  $q$  проводника  $Z$

$$\left( \frac{\alpha, Z}{q} \right) = 1.$$

По обобщенной теореме об арифметической прогрессии  $\alpha$  можно к тому же выбрать так, чтобы, кроме, возможно,  $p, p'$  и  $q$ , оно содержало еще только один простой идеал  $r$  поля  $\Omega$ , причем точно в первой степени. Для него тогда по теореме о произведении для символа норменного вычета (закону взаимности) также

$$\left( \frac{\alpha, Z}{r} \right) = 1$$

[Н, 3.8–10]. Всякая алгебра

$$(\alpha, Z) = A$$

тогда имеет  $p$ -индекс и  $p'$ -индекс  $f$ , а для всех других простых мест  $\Omega$  индекс 1 [Н, 17.7]. Из теоремы 3, ввиду предположения о  $p$  и выбора  $p'$ , следует, что  $K$  есть поле разложения для  $A$ . Тем самым в группе  $\mathfrak{K}$  действительно обнаружены алгебры  $A$  с  $p$ -индексом  $f$ .

**Теорема 5.** (*Теорема единственности и упорядочения*). Если  $K \leq K'$ , то  $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$ , и обратно.

В частности, сопоставление групп алгебр  $\mathfrak{K}$  галуа-полям  $K$  взаимно однозначно.

<sup>10</sup>R. Brauer, *Über Systeme hyperkomplexer Größen*, Jahresber. d. D. M.-V. 38 (1929), с. 47/48. См. также Н, 13.1.

**Доказательство.** а) Из  $K \leq K'$  тривиально следует  $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$ , ибо всякая алгебра  $A$ , расщепленная  $K$ , а fortiori является алгеброй, расщепленной  $K'$ .

б) Пусть обратно  $\mathfrak{K} \leq \mathfrak{K}'$ . Тогда по теореме разложения для каждого неделителя  $p$  относительного дискриминанта имеем  $f_p \mid f'_p$ . В частности,  $f_p = 1$  для почти всех  $p$  с  $f'_p = 1$ . Отсюда по обычному аналитическому способу вывода<sup>11</sup> следует  $K \leq K'$ .

**8.** Наконец, отметим еще, что главная теорема существенно продвигает вопрос, рассмотренный И. Шуром<sup>12</sup>, о числовых полях, в которых возможны абсолютно неприводимые представления конечной группы:

**Теорема 6.** Все абсолютно неприводимые представления конечной группы  $\mathfrak{G}$  возможны в круговых полях; например, всегда во всяком случае в поле  $n^h$ -х корней из единицы, если  $n$  есть порядок  $\mathfrak{G}$ , а  $h$  достаточно велико.

**Доказательство.** Переходя к рациональному групповому кольцу  $G$  группы  $\mathfrak{G}$ , абсолютно неприводимые представления  $\Gamma_i$  группы  $\mathfrak{G}$  становятся абсолютно неприводимыми представлениями простых составляющих  $G_i$  полупростой алгебры  $G$ , а их центры суть соответствующие поля  $\Omega_i$  характеров,<sup>13</sup> следовательно, из-за конечности  $\mathfrak{G}$ , во всяком случае круговые поля, причем заведомо подполя поля  $n$ -х корней из единицы.

По теореме 3 циклическое поле  $Z_i$  над  $\Omega_i$  является полем разложения для  $G_i$ , если для каждого простого места  $p$  поля  $\Omega_i$  его  $p$ -степень  $n_{ip}$  кратна  $p$ -индексу  $m_{ip}$  алгебры  $G_i$ .  $m_{ip}$  отличен от 1 только для простых делителей основного идеала  $G_i$  относительно  $\Omega_i$ , значит заведомо только для простых делителей абсолютного дискриминанта  $G_i$ ; поскольку тот делит  $n^n$ , а  $n^n$  есть дискриминант одного (немаксимального) порядка в  $G^{14}$ , это возможно самое большее для простых делителей  $p$  числа  $n$ . Чтобы сделать  $n_{ip}$  для этих  $p$  кратным  $m_{ip}$ , достаточно предписать, чтобы рассматриваемые  $p$  в  $Z_i$  разветвлялись с порядком, каждый раз кратным  $m_{ip}$ . Как легко видеть, это обеспечивает поле  $n^h$ -х корней из единицы при достаточно большом  $h$ .

В последней теореме указанной работы И. Шур устанавливает, что во всех до сих пор известных случаях уже достаточно поля  $n$ -х корней из единицы. Всегда ли это так и достаточны ли развитые здесь методы, чтобы решить этот вопрос, остается предметом дальнейших исследований.

Поступило 11 ноября 1931 г.

<sup>11</sup>См. об этом, например, H. Hasse [I. с. прим. 6], § 25, III.

<sup>12</sup>I. Schur, *Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen*, Berl. Akad.-Ber. 1906.

<sup>13</sup>См. об этом: а) R. Brauer und E. Noether, *Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen*, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. б) R. Brauer, *Über Systeme hyperkomplexer Zahlen*, Math. Zeitschr. 30 (1929); теорема 3. в) E. Noether, *Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie*, Math. Zeitschr. 30 (1929); §§ 21, 24, 26.

<sup>14</sup>См. E. Noether [I. с. прим. 12с], § 26.

## 39. Гиперкомплексные системы в их связях с коммутативной алгеброй и теорией чисел

*Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), c. 189–194*

Эмми НЁТЕР, ГЁТТИНГЕН

1. Теория гиперкомплексных систем, то есть алгебр, за последние годы сильно оживилась; но только совсем недавно стало ясно значение этой теории для коммутативных вопросов. Об этом значении некоммутативного для коммутативного я сегодня хочу сообщить, а именно проследить его подробно на двух классических вопросах, восходящих к Гауссу: на теореме о главном роде и тесно связанной с ней норменной теореме. Эти вопросы с течением времени снова и снова меняли свою формулировку: у Гаусса они выступают как завершение его теории квадратичных форм; затем играют существенную роль в характеристике относительно циклических и абелевых числовых полей посредством теории полей классов; наконец, их можно высказать как теоремы об автоморфизмах и о расщеплении алгебр, и эта последняя формулировка вместе с тем дает перенос теорем на произвольные относительно галуа-числовые поля.

Этим очерком, который я позднее разверну, я одновременно хочу пояснить *принцип* применения некоммутативного к коммутативному: *посредством теории алгебр ищут инвариантные и простые формулировки для известных фактов о квадратичных формах или циклических полях, то есть такие формулировки, которые зависят только от структурных свойств алгебр. Если эти инвариантные формулировки уже доказаны – а именно так обстоит дело в указанных выше примерах –, то тем самым автоматически получен перенос этих фактов на произвольные галуа-поля.*

2. Прежде чем перейти к подробному изложению, я хочу дать еще общий обзор различных методов и дальнейших результатов. Прежде всего нужно отметить, что главная трудность состоит в нахождении формулировки для общих галуа-полей; без гиперкомплексного метода для этого вообще не было исходной точки. В приведенных примерах лежащий в основе переход к некоммутативному получен через *одновременное рассмотрение поля и группы* посредством “скрещенного произведения” и его мультипликативных постоянных, “фактор-систем” (см. 3). Так получают нормальную простую алгебру над основным полем, и всякая такая алгебра, по существу, порождается именно так. Такие скрещенные произведения впервые рассматривал Диксон,<sup>1</sup> тогда как теория фактор-систем развивалась у Шпайзера, Шура и Р. Брауэра<sup>2</sup> из совсем другой исходной точки, а именно из вопроса об абсолютно неприводимых представлениях. Только слияние обеих теорий дало достаточно простое и широкое построение, чтобы с его помощью можно было подступиться к коммутативным вопросам.<sup>3</sup>

При этом для известных фактов одновременно возникают новые прозрачные доказательства. Я хочу указать здесь на гиперкомплексное доказательство закона взаимности для циклических полей, которое Г. Гассе дал и которое вскоре появится в *Math. Ann.*,<sup>4</sup> посредством инвариантной формулировки своего символа норменного вычета, основанной на теории скрещенного произведения. Далее – на гиперкомплексное обоснование локальной теории полей классов, тоже на той же основе, которое недавно дал К. Шевалле; при этом, однако, пришлось разработать еще новые алгебраические теоремы о фактор-системах.<sup>5</sup> Вместе с тем я должна сделать ограничение: метод скрещенных произведений сам по себе, по-видимому, *не дает полной теории галуа-числовых полей*. Это следует из новых, еще неопубликованных результатов Артина, которые продолжают приведенное выше

<sup>1</sup>См. его книгу *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34.

<sup>2</sup>См., например, R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, и приведенную там в прим. 2 литературу, *Math. Z.* 28 (1928).

<sup>3</sup>Это построение я впервые развила в лекции зимой 1929/30 г.; оно воспроизведено в гл. 2 работы H. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, *Trans. Amer. Math. Soc.* 34 (1932). Во всей области, рассматриваемой в докладе, ориентирует обзор М. Дойринга о гиперкомплексных числах и числово-теоретических приложениях, который должен выйти в серии *Ergebnisse der Mathematik*.

<sup>4</sup>H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*, *Math. Ann.* 107 (1932/33).

<sup>5</sup>C. Chevalley, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; должно появиться в *J. f. Math.* 169.



доказательство Гассе в духе указанного принципа, но дают только равенства чисел вместо полных теорем об изоморфизме.

Методы, дающие полный изоморфизм – правда, операторный изоморфизм, – теперь уже имеются в самой алгебре. Речь идет о продолжении подходов А. Шпайзера,<sup>6</sup> а именно о понимании галуа-поля как “галуа-модуля”, то есть как модуля над основным полем, допускающего подстановки галуа-группы в качестве операторов. И существует операторный изоморфизм между полем и групповым кольцом (групповой алгеброй) в том смысле, что между элементами имеется взаимно однозначное соответствие так, что линейные формы над основным полем соответствуют друг другу, а подстановкам галуа-группы в поле соответствует умножение в групповом кольце. Эту сформулированную мной теорему<sup>7</sup> доказал М. Дойринг,<sup>8</sup> и на ней он основал доказательство теории Галуа, где операторный изоморфизм реализует соответствие между группой и полем. Дальнейшие структурные теоремы – также Дойринга – параллельны формальным фактам об  $L$ -рядах Артина и дают структурный подход к проводникам Артина. Эти  $L$ -ряды и проводники Артина,<sup>9</sup> образованные с общими характеристиками групп, наряду со Шпайзером<sup>6</sup> составляют первую связь между теорией чисел и теорией представлений, первый выход за пределы абелевых полей. Они дали всему развитию сильный импульс; в частности, теория галуа-модулей ориентировалась именно на них.

3. Теперь я хочу подробно проследить поставленные в начале вопросы: норменную теорему и теорему о главном роде. Сначала – *определение скрещенного произведения*. Пусть  $K/k$  есть галуа-поле  $n$ -й степени, а  $\mathfrak{G}$  – его группа. Скрещенное произведение означает одновременное вложение  $K$  и  $\mathfrak{G}$  в алгебру  $A$  так, что автоморфизмы  $K$  становятся внутренними. Пусть  $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$  обозначают символы, соответствующие  $n$  элементам группы; тогда сначала задают  $A$  как модуль линейных форм ранга  $n$  над  $K$ :

$$A = u_{S_1}K + \dots + u_{S_n}K$$

(то есть  $A$  состоит из всех линейных форм

$$u_{S_1}a_1 + \dots + u_{S_n}a_n, \text{ где } a_i \text{ произвольны в } K).$$

В силу требования внутреннего автоморфизма – порожденного  $u_S$ , а в общем виде  $u_SK^{*10}$  –  $A$  становится кольцом, то есть алгеброй ранга  $n^2$  над  $k$ . Это требование выражается равенствами

$$u_S^{-1}zu_S = z^S, \quad \text{или} \quad zu_S = u_Sz^S \quad (2)$$

для всякого  $z \in K$ ,<sup>11</sup> и равенством

$$u_Su_T = u_STa_{S,T} \quad \text{с } a_{S,T} \text{ в } K^*. \quad (3)$$

Наконец,

$$a_{ST,R}a_{S,T}^R = a_{S,TR}a_{T,R}$$

(ассоциативный закон из  $[u_Su_T]u_R = u_S[u_Tu_R]$ ). (4)

$A$  называется скрещенным произведением  $K$  с  $\mathfrak{G}$  при фактор-системе  $a_{S,T}$ . Доказывается, что  $A$  становится нормальной простой алгеброй над  $k$ , то есть матричным кольцом  $r$ -й степени  $D_r$  над соответствующей алгеброй с делением  $D$ , и что  $K$  становится максимальным коммутативным подполем, следовательно полем разложения (то есть расширение поля коэффициентов  $k$  полем, изоморфным  $K$ , дает расщепленную алгебру, полное матричное кольцо над центром). Обратно,

<sup>6</sup>A. Speiser, *Gruppensystem und Körperdiskriminante*. Math. Ann. 77 (1916).

<sup>7</sup>E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, Satz 3, J. f. Math. 167 (1932) (доказательство содержит пробел).

<sup>8</sup>M. Deuring, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*. Math. Ann. 107 (1932).

<sup>9</sup>E. Artin, *Über eine neue Art von L-Reihen*, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, там же 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. f. M. 164 (1931).

<sup>10</sup> $K^*$  получается из  $K$  удалением нуля; это обозначение употребляется вообще.

<sup>11</sup> $z^S$ , как обычно, означает элемент, получающийся из  $z$  подстановкой  $S$ .

для заданной алгебры с делением  $D$  всегда существуют матричные кольца  $D_r$ , которые могут быть порождены указанным способом как скрещенное произведение.

Если перейти от  $u_S$  к  $v_S = u_S c_S$ , где  $c_S \in K^*$ , что порождает тот же автоморфизм, то возникают “ассоциированные” фактор-системы:

$$a'_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \quad (5)$$

Ассоциированные фактор-системы объединяются в класс  $(a)$ , а все алгебры, подобные  $A$ , – в алгебровый класс  $\mathfrak{A}$ . Эти классы соответствуют друг другу взаимно однозначно. Классы  $\mathfrak{A}$  с фиксированным полем разложения  $K$  образуют относительно прямого произведения абелеву группу, изоморфную покомпонентному произведению классов фактор-систем. Единичный элемент есть класс расщепленных алгебр, соответственно фактор-системы из всех величин преобразования  $c_S^T c_T / c_{ST}$ .

4. Теперь через *специализацию к циклическим полям разложения* я хочу перейти к связи с *понятием нормы*, а тем самым – к формулировке обобщенной *норменной теоремы* согласно принципу, изложенному в начале. Если  $Z$  циклично, а  $S$  – порождающая подстановка его группы, то соответствующая алгебра называется циклической. Тогда степеням  $S$  можно поставить в соответствие степени  $u$ , то есть

$$A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z, \\ zu = uz^S, \quad u^n = a, \quad a \in k^*,$$

и при  $v = uc$

$$a' = a N(c).$$

Следовательно, всякая фактор-система состоит из одного-единственного элемента  $a \in k^*$ , и пишут

$$A = (a, Z).$$

Единичный класс фактор-систем задается нормами из  $Z^*$ , а группа классов алгебр изоморфна  $k^*/N(Z^*)$ . Поэтому циклическая алгебра  $(a, Z)$  расщепляется тогда и только тогда, когда  $a$  есть норма некоторого элемента из  $Z$ .

Эта связь между нормой и расщеплением дает формулировку “норменной теоремы”, а именно *теоремы о расщепленных алгебрах*: *если алгебра расщепляется в каждом месте, то она расщепляется безусловно*. Здесь “место”, как обычно в теории чисел, определяется тем, что основное поле  $k$  заменяется его  $p$ -адическим расширением  $k_p$ , где  $p$  есть простой идеал из  $k$ ; соответственно конечному числу бесконечных мест,  $k$  и его сопряженные расширяются полем вещественных чисел.

Действительно, в этом содержится норменная теорема для циклических полей. Ибо для циклических алгебр  $(a, Z)$ , по сказанному выше, эта теорема равносильна утверждению: если  $a$  в каждом (конечном или бесконечном) месте является  $p$ -адической нормой, то  $a$  есть норма числа из  $Z$ ; или, без перехода к  $p$ -адическому, *если  $a$  есть норменный вычет по каждому простому идеалу  $\mathfrak{p}$  из  $k$  (и удовлетворяет некоторым условиям знаков), то  $a$  есть норма числа из  $Z$* . Последняя форма и есть норменная теорема, доказываемая в теории полей классов с использованием известных аналитических средств. А доказательство общей теоремы о расщепленных алгебрах можно получить из этого циклического специального случая чисто алгебраико-арифметическими рассуждениями.<sup>12</sup> Первое важное следствие отсюда вывел Гассе: *всякая нормальная простая алгебра над алгебраическим числовым полем циклична*. В поиске доказательства этого давно предполагаемого факта и возникла общая формулировка.

<sup>12</sup>R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. f. M. 167 (1932).

5. Второе следствие из теоремы о расщепленных алгебрах – опять чисто алгебраико-арифметическими рассуждениями – это поставленная в начале теорема о главном роде.<sup>13</sup> Ее инвариантная формулировка основана на том факте, что соотношения (2)–(5), определяющие скрещенное произведение, чисто мультипликативны и поэтому сохраняют смысл, если  $K^*$  заменить абелевой группой  $\mathfrak{J}$ , удовлетворяющей только условию: ее группа автоморфизмов содержит подгруппу, изоморфную  $\mathfrak{G}$ . Вместо (1) тогда возникает “расширение  $\mathfrak{G}$  посредством  $\mathfrak{J}$ ” в смысле теории групп. Если взять за  $\mathfrak{J}$  группу всех идеалов из  $K$ , то фактор-системы становятся системами идеалов; разбиение на классы в  $\mathfrak{J}$  индуцирует разбиение на классы для фактор-систем, и вообще это более тонкое разбиение на идеальные классы, чем исходное. Ведь требование, чтобы умножение  $u_S$  с (абсолютными) идеальными классами было однозначным, говорит только, что величины преобразования  $c_S^T c_T / c_{ST}$  – единичный класс элементарных фактор-систем – лежат в единичном классе идеальных фактор-систем. В действительности же, как показывает специализация к известным случаям, достаточно уже несколько менее тонкого разбиения. Я определяю: *к единичному классу фактор-систем относятся те элементы  $a_{S,T}$ , которые во всех (конечных и бесконечных) местах ветвления  $K$  порождают расщепленные алгебры.*

Возникающее таким образом расширение  $\mathfrak{G}$  обозначим  $\mathfrak{G}^*$ ; пусть  $(c)$  означает абсолютный идеальный класс  $c$ . Тогда

*инвариантная формулировка теоремы о главном роде такова: если при определенном так разбиении на классы подстановка  $v_S = u_S(c_S)$  порождает автоморфизм  $\mathfrak{G}^*$  – все эти  $(c_S)$  образуют главный род –, то этот автоморфизм внутренний и порождается некоторым идеальным классом  $(b)$ .*

Известные специальные случаи следуют из равносильной, несколько более явной формулировки: *если величины преобразования  $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$ , образованные из идеальных классов  $(c_S)$ , принадлежат единичному идеальному классу фактор-систем, то существует идеальный класс  $(b)$  такой, что  $(c_S)$  становятся символическими  $(1 - S)$ -ми степенями:  $(c_S) = (b)/(b^S)$  для всех  $S$  из  $\mathfrak{G}$ .* Ибо предположение как раз выражает свойство автоморфизма; а то, что он внутренний, выражается равенством  $v_S = (b)^{-1}u_S(b) = u_S(b)^{1-S} = u_S(c_S)$ .

Специализация к циклическому случаю дает, с учетом нормировки: если  $N([c])$  лежит в единичном идеальном классе фактор-систем, то  $(c)$  становится символической  $(1 - S)$ -й степенью:

$$(c) = (b)^{1-S}.$$

6. Чтобы отсюда перейти к известной форме для циклических полей и квадратичных форм, прежде всего замечу, что теорема высказана для полных идеальных классов, но ее содержание не меняется, если, как обычно, ограничиться идеалами, взаимно простыми с местами ветвления.

Тогда определенный здесь главный род для квадратичных полей переходит в гауссов. Действительно, идеальным классам соответствуют квадратичные формы, а нормам классов – числа, представимые этими формами. То, что единичный класс порождает алгебры, расщепленные в местах ветвления  $K$ , означает, что эти представимые числа становятся квадратичными вычетами в местах ветвления; следовательно, соответствующие формы имеют полный характер главной формы, то есть образуют гауссов главный род. Известно, что символическая  $(1 - S)$ -я степень переходит в дубликацию.

Для циклических полей формулировка переходит в следующую: главный род состоит из всех идеальных классов, нормы которых в (конечных и бесконечных) местах ветвления становятся норменными вычетами. Но это, как известно, равносильно условию “норменный вычет по проводнику”, и тем самым обычная теорема возникает как специализация.

Кстати, и в общем случае произвольных галуа-полей можно ввести проводник, составленный только из мест ветвления, так, что при нормировке фактор-систем для каждого из этих мест луч содержит только элементы единичного класса.

Здесь возникает вопрос о связи с проводниками Артина, упомянутыми в обзоре 2, ведь они составлены из тех же простых идеалов; а вместе с этим – вопрос о связи с теорией галуа-модулей,

<sup>13</sup> Доказательство должно появиться в Math. Ann.

вторым гиперкомплексным методом. Насколько далеко будут простираются эти два метода, покажет только будущее.

## 40. Некоммутативные алгебры

*Math. Zs. 37 (1933), 514–541*

### Некоммутативная алгебра.

Автор

Эмми Нётер, Гёттинген.

Главные теоремы коммутативной алгебры, как известно, содержатся в теории Галуа; ей предшествует теория полей отщепления и полей разложения, то есть полей, достаточных для того, чтобы заданный многочлен отщеплял линейный множитель или, соответственно, полностью разлагался на линейные множители.

Соответствующие части алгебры я развиваю здесь в некоммутативной, в частности гиперкомплексной, постановке. При этом я принципиально работаю некоммутативными методами, а именно представлениями в некоммутативных телах. В заключение я показываю, как названные выше теоремы коммутативной алгебры можно обосновать совершенно параллельно с помощью представлений в коммутативных полях.

Лежащая в основе теория представлений, которой предшествует краткая теория автоморфизмов (§1), есть дальнейшее развитие теории, основанной на модулях представлений.<sup>1</sup> В частности, наряду с прямым представлением я рассматриваю реципрокное, причем одно сводится к другому; теперь оно порождается посредством реципрокного модуля представления. Преимущество состоит в том, что реципрокный модуль представления, то есть бимодуль, можно также понимать как односторонний модуль над кольцом расширения (§2). Тем самым представление в некоммутативных телах сводится к теории идеалов в кольце расширения; неприводимые классы представлений соответствуют неприводимым идеальным классам кольца расширения, в точной аналогии с фактами, которые при представлении гиперкомплексных систем в их коммутативной области коэффициентов имеют место для самой системы (§3 и 4).

Отсюда получаются структурные теоремы для матричных колец над некоммутативными телами благодаря замечанию (§5), что *каждое подкольцо означает представление этим телом, соответственно реципрокное представление реципрокно изоморфным телом*. Это реципрокно изоморфное тело является первым аналогом минимального поля отщепления и поля разложения в коммутативном случае: оно осуществляет все реципрокные представления первой степени и, при конечном ранге над центром, который до сих пор не предполагался, также дает полное разложение в прямую сумму слагаемых ранга 1. Отсюда получается теория Галуа для тел (§6) и одновременно выражается факт (§7), что реципрокно изоморфные алгебры с делением, то есть тела конечного ранга над центром, порождают обратные классы в группе классов алгебр Р. Брауэра.

Второе обоснование теории Галуа, более общее для простых систем, является почти непосредственным следствием теоремы о коммутирующих подкольцах, которая сама почти прямо примыкает к предварительному рассмотрению автоморфизмов.

До этого места рассуждения идут чисто некоммутативно. Но и вопрос о *коммутативных* полях разложения рассматривается некоммутативно, посредством представления поля разложения алгеброй с делением согласно замечанию, подготовленному в §5 (§7). Завершение составляет упомянутый выше перенос на коммутативный случай (§8) и теория полей разложения для произвольных систем (§9), что одновременно дает связь с обычной теорией представлений в коммутативном случае.

На этой теории представлений в коммутативном случае, а также на “иррациональных” фактор-системах Р. Брауэр основал теорию полей разложения.<sup>2</sup> Из-за этого коммутативного обоснования

<sup>1</sup>E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 641–692; далее цит. как Darstellungstheorie. Ср. изложение у van der Waerden, Moderne Algebra II.

<sup>2</sup>Ср. нашу совместную заметку: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. Примечание на с. 222 содержит своего рода отчет о положении дел. Главные теоремы возникли независимо и почти одновременно. Ср. далее R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, §3. Math. Zeitschr. 30 (1929), S. 79–107. А. А. Albert позднее независимо вновь нашел эти теоремы.

он, так же как позднее Альберт, должен предполагать центр совершенным полем, что с точки зрения некоммутативного обоснования является ненужным ограничением. С тем же ограничением, также посредством теории представлений в коммутативном случае, Р. Брауэр и К. Шода, уже зная мою теорию Галуа для некоммутативных тел, развили теорию дальше: Р. Брауэр дал упомянутую выше теорему о коммутирующих подкольцах, а К. Шода независимо дал полную теорию также для полупростых систем.<sup>3</sup>

Наконец следует упомянуть, что для случая тел краткое изложение имеется у van der Waerden II (§128), в связи с моей лекцией лета 1928 г., когда я впервые докладывала об этих вопросах. Изложение van der Waerden содержит ряд упрощений по сравнению с этой лекцией; часть их я переняла во второй лекции (зима 1929/30),<sup>4</sup> а часть только здесь приняла и продолжила. В частности, перенос гиперкомплексного метода доказательства теории Галуа на коммутативный случай (§8) происходит лишь из второй лекции, где некоммутативное доказательство (§6, 3.) было существенно упрощено по сравнению с первой лекцией. Теорема о коммутирующих подкольцах (§5) и основанный на ней второй метод доказательства некоммутативной теории Галуа (§6, 1 и 2) добавились только после второй лекции, после ознакомления с Р. Брауэром (прим. 3) и van der Waerden §128; в §5, 3, однако, сделаны существенно более слабые предположения конечности, чем там.

Некоторые ходы первой лекции, а именно метод образования пересечений идеалов разностей, хотя и более сложны, имеют то преимущество, что переносятся на системы бесконечного ранга и на целочисленные системы.<sup>5</sup> Для коммутативных целочисленных систем так приходят к связи между дифференцированием идеалов и дифферентой,<sup>6</sup> к чему я при случае вернусь подробнее.

Главное применение теории полей разложения находит в теории скрещенных произведений и их фактор-систем, которые, в свою очередь, дают основу теоретико-числовых приложений; здесь мы больше к этому не обращаемся.<sup>7</sup>

## §1. Автоморфизмы, модули и бимодули

Теория представлений, основанная на модулях представлений, опирается на теорию кольца автоморфизмов абелевых групп с операторами или без них. Неявно лежащие при этом в основе рассуждения, то есть отношения между отображением и законами вычисления, будут, во избежание повторений, сформулированы в нескольких простых утверждениях.

**1. Мультипликативное отображение. Закон ассоциативности.** Пусть сначала  $\mathfrak{G}$  есть группа без операторов, а  $\mathfrak{A}$  ее абсолютная область автоморфизмов, то есть система всех гомоморфизмов  $\mathfrak{G}$  в себя.  $\mathfrak{A}$  мультипликативно замкнута, потому что произведение  $\sigma\tau$  определено через

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau, \quad g \in \mathfrak{G}, \quad \sigma, \tau \in \mathfrak{A} \quad (1)$$

и, очевидно, удовлетворяет закону ассоциативности.

$\mathfrak{G}$ , как известно, становится группой с операторами, если задано множество  $\mathfrak{B}$  символов  $O, H, \dots$  так, что сочетания  $gO, gH, \dots$  дают однозначно определенные элементы из  $\mathfrak{G}$  и порождают гомоморфизмы  $\mathfrak{G}$  в себя:

$$(gh)O = gO \cdot hO.$$

<sup>3</sup>R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, §2. Journ. f. Math. 166 (1932), S. 241–252. K. Shoda, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. 107 (1932), S. 252–258. Эти результаты также развил J. Levitzki.

<sup>4</sup>Первую лекцию обработал G. Köthe, вторую M. Deuring.

<sup>5</sup>Метод по существу воспроизведен у G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum §5, Math. Ann. 105 (1931), S. 15–39. Ср. также прим. 10. Этот метод пересечений теперь заменен почти тривиальным фактом (§4, 1), впервые замеченным van der Waerden, что двусторонние идеалы принадлежат инвариантным модулям. Благодаря этому все можно обосновать более простым разложением в прямую сумму, что, однако, не работает при бесконечном ранге и в целочисленном случае.

<sup>6</sup>Ср. доклад в Poggendorff, Jahresber. d. Deutsch. Math. Ver. 39 (1930), S. 17 (косая пагинация).

<sup>7</sup>Теория скрещенных произведений развита во второй лекции; она, с малыми изменениями, чтобы не предполагать данную здесь теорию, воспроизведена у H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Chap. II. Transactions of the Amer. Math. Soc. 34 (1932), S. 171–214. Изложение, теснее связанное с лекцией, должно появиться в обзоре M. Deuring in Ergebnisse der Mathematik.

Если область операторов  $\mathfrak{B}$  мультипликативно замкнута, то однозначное отображение  $\mathfrak{B}$  на соответствующую часть области автоморфизмов является мультипликативно-гомоморфным тогда и только тогда, когда выполнено ассоциативное соотношение

$$g(OH) = (gO)H, \quad g \in \mathfrak{G}, O, H \in \mathfrak{B}, \quad (1a)$$

Соответственно определяется реципрокный гомоморфизм, когда речь идет о левых операторах.

Действительно, отображение  $\mathfrak{B}$  на  $\overline{\mathfrak{B}}$  задается равенством  $g\Theta = g\sigma$  для всех  $g$  из  $\mathfrak{G}$ , а значит также равенством

$$(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau),$$

так что (1a) становится необходимым и достаточным условием мультипликативной гомоморфности. То, что левые операторы порождают реципрокный гомоморфизм, происходит оттого, что записанные слева автоморфизмы  $\sigma^*g, \tau^*\sigma^*g$  следует читать справа налево:  $\tau^*\sigma^*g = g\sigma\tau$ , тогда как операторы всегда читаются слева направо.

**2. Операторно-гомоморфное отображение.** Если  $\mathfrak{G}$  есть группа с операторами, то операторная гомоморфность определяется равенством

$$(gO)\sigma = (g\sigma)O, \quad (2)$$

а для левых операторов соответственно

$$(Og)\sigma = O(g\sigma). \quad (2^*)$$

то есть коммутативной связанностью или сквозным законом ассоциативности. Из рассуждения пункта 1, то есть из отображения на область автоморфизмов, для двух различных областей операторов получается:

Если заданы две области операторов  $\mathfrak{B}$  и  $\mathfrak{C}$ , то элементы  $\mathfrak{C}$  порождают  $\mathfrak{B}$ -автоморфизмы и одновременно элементы  $\mathfrak{B}$  порождают  $\mathfrak{C}$ -автоморфизмы тогда и только тогда, когда эти области коммутативно связаны с  $\mathfrak{G}$ , соответственно когда выполняется сквозной закон ассоциативности:

$$(gO)H = (gH)O, \quad (2a)$$

соответственно

$$(OH)g = O(Hg). \quad (2a^*)$$

**3. Модули и бимодули над кольцами.** Правый модуль  $\mathfrak{M}$  над кольцом  $\mathfrak{R}$  есть аддитивная абелева группа с элементами из  $\mathfrak{R}$  в качестве правых операторов, причем помимо ассоциативного соотношения (1a) выполнены также дистрибутивные соотношения:

$$(g + h)\rho = g\rho + h\rho, \quad g(\rho + \sigma) = g\rho + g\sigma. \quad (3a)$$

Соответствующее верно для левых модулей.

Среди бимодулей нужно различать два вида. Правые модули над двумя кольцами  $\mathfrak{R}$  и  $\mathfrak{S}$  называются бимодулями, если кроме связей, действующих отдельно для  $\mathfrak{R}$  и  $\mathfrak{S}$ , еще выполнено

$$(m\rho)\sigma = (m\sigma)\rho.$$

$\mathfrak{R}$ -левые,  $\mathfrak{S}$ -правые модули называются бимодулями, если добавляется сквозной закон ассоциативности

$$\rho(m\sigma) = (\rho m)\sigma.$$

Значение этих связей вытекает из того, что в случае абелевых групп абсолютная область автоморфизмов образует кольцо, абсолютное кольцо автоморфизмов<sup>8</sup>. В частности, рассуждение через отображение дает:

<sup>8</sup>Для неабелевых групп речь идет об “обобщенном” кольце; ср. работу Н. Fitting, которая должна появиться в Math. Annalen. [Math. Annalen 107, S. 514–542.]

Если область операторов  $\mathfrak{A}$  аддитивно записанной абелевой группы  $\mathfrak{M}$  есть кольцо, то однозначное отображение  $\mathfrak{A}$  на подмножество  $\overline{\mathfrak{A}}$  абсолютного кольца автоморфизмов является кольцевым гомоморфизмом тогда и только тогда, когда  $\mathfrak{M}$  есть правый модуль над  $\mathfrak{A}$ , то есть когда выполнены (1а) и (3а); для левых модулей получается реципрокная кольцевая гомоморфность.

Если  $\mathfrak{M}$  есть правый модуль над кольцами  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$ , то  $\mathfrak{M}$  становится бимодулем, то есть выполняется (2а), тогда и только тогда, когда  $\mathfrak{A}$  можно кольцево-гомоморфно отобразить на подкольцо кольца  $\mathfrak{S}$ -автоморфизмов и одновременно  $\mathfrak{S}$  на подкольцо кольца  $\mathfrak{A}$ -автоморфизмов. Если  $\mathfrak{M}$  есть правый модуль над  $\mathfrak{S}$  и левый модуль над  $\mathfrak{A}$ , то бимодуль, то есть (2а\*), означает гомоморфное отображение  $\mathfrak{S}$  на подкольцо кольца  $\mathfrak{A}$ -автоморфизмов и реципрокно гомоморфное отображение  $\mathfrak{A}$  на подкольцо кольца  $\mathfrak{S}$ -автоморфизмов.

Отсюда, в частности, следует:

1) Если  $\mathfrak{A}$  есть кольцо с единицей, то  $\mathfrak{A}$  прямо изоморфно своему кольцу автоморфизмов как  $\mathfrak{A}$ -левый модуль и реципрокно изоморфно своему кольцу автоморфизмов как  $\mathfrak{A}$ -правый модуль.

2) Если  $\mathfrak{A}$  есть полное матричное кольцо над вообще говоря некоммутативным телом  $A$ ,

$$\mathfrak{A} = \sum c_{ik}A = \sum A c_{ik},$$

то  $A$  становится реципрокно изоморфным телу автоморфизмов простых правых идеалов и прямо изоморфным телу автоморфизмов простых левых идеалов.

**4. Переход от правого бимодуля к одностороннему модулю над кольцом произведения.** На этом переходе существенно основано значение правого бимодуля.

**Теорема.** Если  $\mathfrak{M}$  есть правый модуль над кольцом  $\mathfrak{T}$ , содержащим два поэлементно коммутирующих подкольца  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$ , то  $\mathfrak{M}$  можно также рассматривать как бимодуль над  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$ . Обратно, если задан бимодуль над  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$  и существует кольцо произведения  $\mathfrak{T}$ , в котором  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$  поэлементно коммутируют, то  $\mathfrak{M}$  можно также рассматривать как правый модуль над  $\mathfrak{T}$ , причем  $\mathfrak{T}$ -связь продолжает данные  $\mathfrak{A}$ - и  $\mathfrak{S}$ -связи.

Первое утверждение следует из того, что  $\mathfrak{T}$  по определению можно гомоморфно отобразить на подкольцо  $\overline{\mathfrak{T}}$  абсолютного кольца автоморфизмов, причем  $\mathfrak{A}, \mathfrak{S}$  переходят в поэлементно коммутирующие подкольца  $\overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mathfrak{S}}$ . Но это как раз означает соотношение (2а), характеризующее бимодуль.

Обратно, если  $\mathfrak{M}$  задан как  $\mathfrak{A}, \mathfrak{S}$ -бимодуль, то есть как правый модуль, то  $\mathfrak{A}, \mathfrak{S}$  снова можно гомоморфно отобразить на поэлементно коммутирующие подкольца  $\overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mathfrak{S}}$  абсолютного кольца автоморфизмов. В абсолютном кольце автоморфизмов для  $\overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mathfrak{S}}$  существует кольцо произведения<sup>9</sup>  $\overline{\mathfrak{T}}$ , которое из-за поэлементной коммутативности состоит из всех элементов вида

$$\sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

(если  $\overline{\mathfrak{A}}, \overline{\mathfrak{S}}$  имеют единицы, то добавочные члены  $\bar{r}, \bar{s}$  отпадают). Если теперь существует также кольцо произведения  $\mathfrak{T}$ , в котором  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$  поэлементно коммутируют, то оно соответственно состоит из всех элементов вида  $\sum_i r_i s_i + r + s$ . Гомоморфизмы

$$\mathfrak{A} \rightarrow \overline{\mathfrak{A}}, \quad \mathfrak{S} \rightarrow \overline{\mathfrak{S}}$$

можно, следовательно, через соответствие

$$\sum_i r_i s_i + r + s \mapsto \sum_i \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

<sup>9</sup>Кольцо произведения здесь означает лишь кольцо, порожденное двумя кольцами с общим надкольцом; произведение не обязано быть прямым. То, что при заданном пересечении кольцо произведения не всегда обязано существовать, показывает следующий пример. Пусть  $\mathfrak{o}$  есть кольцо целых чисел и положено  $\mathfrak{A} = \mathfrak{o}[x]$ ,  $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$  с  $2x - 1 = 0$ ,  $2y - 1 = 0$ , так что  $\mathfrak{o}$  есть пересечение  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$ , если между  $x$  и  $y$  не задана никакая связь. Но если  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$  лежат в общем надкольце, то получается  $(2x - 1)y - x(2y - 1) = 0$ , значит  $x = y$ . Следовательно, кольца произведения с пересечением  $\mathfrak{o}$  не существует.



дополнить до гомоморфизма  $\mathfrak{T} \rightarrow \overline{\mathfrak{T}}$ ; поэтому связь

$$m\left(\sum_i r_i s_i + r + s\right) = \sum_i (mr_i)s_i + mr + ms$$

однозначна и определяет по §1, 3  $\mathfrak{T}$ -модуль, охватывающий данный  $\mathfrak{R}$ ,  $\mathfrak{S}$ -модуль.

## §2. Реципрокное и прямое представление

**1. Модули линейных форм.** Переход от теории, развитой в §1, к теории представлений основан на специализации тамошных модулей к модулям линейных форм и на рассмотрении их колец автоморфизмов.

$\mathfrak{S}$ -правый модуль  $\mathfrak{M}$ , где  $\mathfrak{S}$  есть кольцо с единицей, называется модулем линейных форм в  $\mathfrak{S}$ , если  $\mathfrak{M}$  есть прямая сумма  $n$  одночленных  $\mathfrak{S}$ -модулей:

$$\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{S} + \dots + m_n\mathfrak{S},$$

так что  $m_i\mathfrak{S}$  операторно изоморфен  $\mathfrak{S}$ , то есть из  $m_i s = 0$  всегда следует  $s = 0$ . Отсюда получается, что  $\mathfrak{S}$  можно отобразить на подкольцо абсолютного кольца автоморфизмов не только гомоморфно, но и изоморфно.

**Теорема 1.** Если  $\mathfrak{M}$  есть модуль линейных форм в  $\mathfrak{S}$ , то кольцо  $\mathfrak{S}$ -автоморфизмов  $\mathfrak{A}$  модуля  $\mathfrak{M}$  реципрокно изоморфно, не только гомоморфно, кольцу  $\overline{\mathfrak{A}}$  всех  $n$ -рядных матриц над  $\mathfrak{S}$ .

Произвольный  $\mathfrak{S}$ -автоморфизм  $\alpha$  модуля  $\mathfrak{M}$  полностью описывается соответствием

$$m_i \mapsto \overline{m}_i = m_i \alpha;$$

потому что из этого по определению следует

$$\sum m_i s_i \mapsto \sum \overline{m}_i s_i = \sum (m_i \alpha) s_i = \sum (m_i s_i) \alpha.$$

Если теперь в матрической записи

$$(m_1 \alpha, \dots, m_n \alpha) = (m_1, \dots, m_n) A,$$

то, когда  $\alpha$  пробегает все автоморфизмы, соответствие  $\alpha \mapsto A$  дает взаимно однозначную связь между  $\mathfrak{A}$  и  $\overline{\mathfrak{A}}$ . Ведь, поскольку  $\mathfrak{M}$  предположен модулем линейных форм,  $A$  однозначно определяется через  $\alpha$ , и каждая матрица  $A$   $n$ -й степени в  $\mathfrak{S}$  порождает автоморфизм. Далее следует:

$$\alpha + \beta \mapsto A + B, \quad \alpha\beta \mapsto BA.$$

Последнее следует из

$$(m_1 \alpha\beta, \dots, m_n \alpha\beta) = (m_1, \dots, m_n) AB = (m_1, \dots, m_n) BA$$

в силу  $ms\beta = m\beta s$ .

**2. Представление и модуль представления.** Если под реципрокным, соответственно прямым, представлением  $n$ -й степени кольца  $\mathfrak{R}$  в  $\mathfrak{S}$  понимать реципрокный, соответственно прямой, кольцевой гомоморфизм  $\mathfrak{R}$  в подкольцо кольца всех  $n$ -рядных матриц над  $\mathfrak{S}$ , то теорему 1 можно сформулировать также так:

**Теорема 1'.** Кольцо автоморфизмов  $\mathfrak{A}$  модуля линейных форм  $n$ -й степени в  $\mathfrak{S}$  допускает изоморфное, то есть точное, реципрокное представление полным матричным кольцом  $\overline{\mathfrak{A}}$  всех  $n$ -рядных матриц над  $\mathfrak{S}$ .

Отсюда обычные теоремы для прямых представлений получают также формулировки для реципрокных.

**Определение.** Модуль линейных форм  $\mathcal{M}$  в  $\mathcal{S}$  называется реципрокным модулем представления  $\mathcal{R}$  в  $\mathcal{S}$ , если  $\mathcal{M}$  есть бимодуль над  $\mathcal{R}$  и  $\mathcal{S}$  и одновременно  $\mathcal{R}$ - и  $\mathcal{S}$ -правый модуль. Он называется прямым модулем представления, если  $\mathcal{M}$  есть бимодуль и одновременно  $\mathcal{R}$ -левый,  $\mathcal{S}$ -правый модуль.

**Теорема 2.** Каждый реципрокный, соответственно прямой, модуль представления порождает класс эквивалентных реципрокных, соответственно прямых, представлений  $\mathcal{R}$  в  $\mathcal{S}$ , и все реципрокные, соответственно прямые, представления порождаются так.

Сначала пусть  $\mathcal{M}$  есть реципрокный модуль представления. Тогда по §1, 3  $\mathcal{R}$  прямо гомоморфно отображается на подкольцо  $\overline{\mathcal{R}}$  кольца  $\mathcal{S}$ -автоморфизмов модуля  $\mathcal{M}$ ; по §2, теорема 1',  $\overline{\mathcal{R}}$  допускает реципрокное, точное, представление, которое тем самым становится и реципрокным представлением  $\mathcal{R}$ . Обратно, если дано реципрокное представление  $\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}^*$ , то его композиция с реципрокным изоморфизмом  $\mathcal{R}^*$  к подкольцу  $\mathcal{R}$  кольца  $\mathcal{S}$ -автоморфизмов дает прямой гомоморфизм  $\mathcal{R}$  на  $\mathcal{R}$ ; следовательно,  $\mathcal{M}$  становится  $\mathcal{R}$ -модулем, именно бимодулем, то есть модулем представления по §1, 3. Переход к другим  $\mathcal{S}$ -базисам дает класс эквивалентных представлений.

Если речь идет о прямом модуле представления, то  $\mathcal{R}$  реципрокно гомоморфно отображается на  $\overline{\mathcal{R}}$ . Композиция с реципрокным представлением  $\overline{\mathcal{R}}$  поэтому дает прямое представление  $\mathcal{R}$ . Обратно, из прямого представления следует реципрокно гомоморфное отображение на  $\overline{\mathcal{R}}$ ; после этого  $\mathcal{M}$  становится прямым модулем представления по §1, 3.

**Замечание.** Разумеется, оба вида представлений можно сводить друг к другу: прямое представление  $\mathcal{R}$  есть реципрокное представление кольца, реципрокного к  $\mathcal{R}$ , и обратно. Другое сведение состоит в переходе от  $\mathcal{S}$  к реципрокному кольцу и замене матриц транспонированными. Это соответствует переходу от  $\mathcal{R}$ -левого,  $\mathcal{S}$ -правого модуля к  $\mathcal{R}$ - и  $\mathcal{S}$ -левому модулю.

**3. Переход от реципрокного модуля представления к модулю над кольцом расширения.** Преимущество реципрокного модуля представления основано прежде всего на возможном по §1, 4 переходе к кольцу расширения. Для настоящего специального случая, где  $\mathcal{M}$  есть модуль линейных форм над  $\mathcal{S}$ , речь, следовательно, идет о теореме перехода для модулей представлений:

*Если  $\mathcal{M}$  есть правый модуль над кольцом  $\mathcal{T}$ , содержащим два поэлементно коммутирующих подкольца  $\mathcal{R}$  и  $\mathcal{S}$  так, что  $\mathcal{M}$  становится модулем линейных форм над  $\mathcal{S}$ , то  $\mathcal{M}$  можно также рассматривать как реципрокный модуль представления  $\mathcal{R}$  в  $\mathcal{S}$ .*

*Обратно, если задан реципрокный модуль представления  $\mathcal{R}$  в  $\mathcal{S}$  и существует кольцо произведения  $\mathcal{T}$ , в котором  $\mathcal{R}$  и  $\mathcal{S}$  поэлементно коммутируют, то  $\mathcal{M}$  можно также рассматривать как  $\mathcal{T}$ -модуль так, что  $\mathcal{T}$ -связь является продолжением данных  $\mathcal{R}$ - и  $\mathcal{S}$ -связей.*

В теории представлений существенно используется следующее

**Следствие из теоремы перехода для модулей представлений.** Если  $\mathcal{M}$  есть реципрокный модуль представления  $\mathcal{R}$  в  $\mathcal{S}$  и одновременно  $\mathcal{T}$ -модуль с  $\mathcal{T}$  как кольцом произведения, то  $\mathcal{R}$ -,  $\mathcal{S}$ -изоморфизм  $\mathcal{M}$  с модулем  $\mathcal{N}$  равносителен  $\mathcal{T}$ -изоморфизму. Следовательно, каждому классу изоморфных  $\mathcal{T}$ -модулей соответствует класс реципрокных представлений  $\mathcal{R}$  в  $\mathcal{S}$ , и обратно.

Связь этих теорем с §1, 2 и 3 дает основной для дальнейшего ход связь между матрицами, коммутирующими с данным представлением, и  $\mathcal{R}$ -,  $\mathcal{S}$ -автоморфизмами.

**Теорема о коммутирующих матрицах.** Если  $\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}^*$  есть реципрокное представление  $n$ -й степени кольца  $\mathcal{R}$  в  $\mathcal{S}$ , а  $\mathcal{B}^*$  обозначает кольцо всех матриц  $n$ -й степени над  $\mathcal{S}$ , поэлементно коммутирующих с  $\mathcal{R}^*$ , то  $\mathcal{B}^*$  дает реципрокно-изоморфное представление  $\mathcal{R}$ -,  $\mathcal{S}$ -автоморфизмов, то есть тех  $\mathcal{S}$ -автоморфизмов, которые одновременно являются  $\mathcal{R}$ -автоморфизмами, порождающего модуля представления или также, если существует кольцо произведения  $\mathcal{T}$ ,  $\mathcal{T}$ -автоморфизмов.

Пусть  $\mathcal{B}$  есть кольцо всех  $\mathcal{R}$ -,  $\mathcal{S}$ -автоморфизмов модуля  $\mathcal{M}$ . Как подкольцо кольца  $\mathcal{S}$ -автоморфизмов  $\mathcal{A}$ ,  $\mathcal{B}$  допускает реципрокно изоморфное представление в  $\mathcal{S}$ . По §1, 2 и 3  $\mathcal{B}$  состоит из всех таких автоморфизмов из  $\mathcal{A}$ , которые коммутативно связаны с  $\mathcal{R}$ , то есть

удовлетворяют соотношению (2a). Следовательно,  $\mathfrak{B}$  состоит из совокупности тех автоморфизмов, которые поэлементно коммутируют с элементами  $\overline{\mathfrak{A}}$ , где  $\overline{\mathfrak{A}}$  обозначает образ  $\mathfrak{A}$  в  $\mathfrak{A}$ . Поскольку в представлении  $\mathfrak{B}$  и  $\overline{\mathfrak{A}}$  речь идет о реципрокном изоморфизме, а не только о гомоморфизме, это и есть утверждение, подлежащее доказательству.

**Замечание.**  $\mathfrak{A}$ -,  $\mathfrak{S}$ -автоморфизмы означают соответствие  $m_i \mapsto m'_i$  такое, что посредством  $m'_i$  возникает то же представление  $\mathfrak{A}^*$ ; при этом  $m'_i$  не обязательно должны давать  $\mathfrak{S}$ -базис модуля  $\mathfrak{M}$ , соответственно тому факту, что матрицы из  $\mathfrak{B}^*$  не обязательно обратимы. Если сумма  $\sum m'_i \mathfrak{S}$  уже не является прямой, “представление” следует понимать в переносном смысле:

$$(m'_1, m'_2, \dots, m'_n)a = (m'_1, \dots, m'_n)A$$

остается верным, но  $A$  уже не определяется однозначно через  $a$ .

Еще одно замечание к теореме перехода таково. Диагональные матрицы  $E \cdot s$  дают *прямо изоморфное* представление  $\mathfrak{S}$ , “тождественное” представление  $\mathfrak{S}$ . То, что здесь речь идет о *прямом* изоморфизме, следует из того, что кольцо  $\mathfrak{S}$ -автоморфизмов модуля  $\mathfrak{M}$  имеет подкольцо, реципрокно изоморфное  $\mathfrak{S}$ , и речь идет именно о его реципрокном представлении. Ведь каждый одночленный слагаемый  $m_i \mathfrak{S}$  модуля  $\mathfrak{M}$  операторно изоморфен  $\mathfrak{S}$  как правый модуль, значит его кольцо  $\mathfrak{S}$ -автоморфизмов реципрокно изоморфно  $\mathfrak{S}$  (§1, 3, следствие 1).

Соответствие от  $\mathfrak{T}$  к матрицам над  $\mathfrak{S}$ , однозначно определенное через  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$ , следовательно, является *не представлением кольца  $\mathfrak{T}$ , а продолжением реципрокного представления  $\mathfrak{A}$  до операторно-гомоморфного относительно  $\mathfrak{S}$ :*

$$\sum r_i s_i \mapsto \sum R_i s_i.$$

В частности, реципрокное представление  $\mathfrak{A}$  одновременно *операторно-гомоморфно относительно пересечения  $[\mathfrak{A}, \mathfrak{S}]$  колец  $\mathfrak{A}$  и  $\mathfrak{S}$ , лежащего в центре  $\mathfrak{A}$ .*

### §3. Модули относительно тела

Далее речь будет идти только о представлениях в вообще говоря некоммутативных телах. Поэтому нужно собрать несколько простых теорем о модулях линейных форм над телом.

**1. Нормальный базис подмодуля относительно заданного базиса полного модуля.** Пусть  $A$  есть тело и

$$\mathfrak{N} = x_1 A + \dots + x_n A$$

есть модуль линейных форм ранга  $n$ ; далее пусть

$$\mathfrak{L} = z_1 A + \dots + z_\ell A$$

есть подмодуль ранга  $\ell \leq n$ .  $z_i$  называются нормальным базисом относительно  $x$ , если они имеют вид

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1} \alpha_{i, \ell+1} + \dots + x_n \alpha_{i, n}), \quad i = 1, \dots, \ell.$$

Каждый модуль  $\mathfrak{L}$  после подходящей нумерации  $x_i$  имеет нормальный базис. Действительно, после подходящей нумерации получается

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{\ell+1} A + \dots + x_n A,$$

то есть

$$x_i \equiv x_{\ell+1} \alpha_{i, \ell+1} + \dots + x_n \alpha_{i, n} \pmod{\mathfrak{L}}, \quad i = 1, \dots, \ell,$$

и потому соответствующие

$$z_i = x_i - (x_{\ell+1} \alpha_{i, \ell+1} + \dots + x_n \alpha_{i, n})$$

лежат в  $\mathfrak{L}$  и исчерпывают  $\mathfrak{L}$ .

**2. Модуль расширения.** Снова пусть  $A$  есть тело,  $P$  подтело.  $A$ -модуль  $N$  ранга  $n$  называется модулем расширения  $P$ -модуля  $M$ ,  $N = M_A$ , если  $M$  есть подмодуль того же ранга в  $N$ . Если

$$M = y_1 P + \cdots + y_n P,$$

то, следовательно,

$$N = M_A = y_1 A + \cdots + y_n A.$$

Обратно, для каждого  $P$ -модуля  $M = y_1 P + \cdots + y_n P$  с точностью до изоморфии модулей однозначно существует модуль расширения  $M_A$ . Ведь модуль  $y_1 A + \cdots + y_n A$  содержит подмодуль, изоморфный  $M$ , который можно отождествить с  $M$ .

**Следствие а).** Если  $z_1, \dots, z_s$  являются линейно независимыми относительно  $P$  элементами из  $M$ , то они также линейно независимы над  $A$  в  $N = M_A$ , потому что их можно дополнить до базиса  $M$ , а тем самым и до базиса  $N$ . Каждый  $P$ -модуль

$$T = z_1 P + \cdots + z_s P$$

из  $M$  порождает, следовательно, модуль расширения

$$T_A = z_1 A + \cdots + z_s A \subset M_A.$$

**Следствие б).** Каждый  $P$ -модуль  $T = z_1 P + \cdots + z_s P$  из  $M$  является модулем сужения, то есть пересечением своего модуля расширения  $T_A$  с  $M$ :

$$T = T_A \cap M.$$

Ведь  $T \subseteq T_A \cap M$ ; обратно, если  $a$  лежит в  $T_A \cap M$ , то

$$a = \sum z_i \alpha_i,$$

значит элементы  $M$   $a, z_1, \dots, z_s$  зависимы над  $A$ , а потому по следствию а) также зависимы над  $P$ ; следовательно,  $a$  лежит в  $T$ .

**3. Теорема об инвариантных модулях.** Снова пусть  $N = M_A$  есть модуль расширения  $P$ -модуля  $M$  ранга  $n$ , а  $P$  есть полное тело инвариантов относительно группы  $\mathfrak{G}$  кольцевых автоморфизмов  $A$ . Группа  $\mathfrak{G}$  определяется как область операторов модуля  $N = M_A$  условиями

$$Gm = m \quad \text{для } m \text{ из } M \text{ и } G \text{ из } \mathfrak{G}$$

и

$$G \sum m_i \alpha_i = \sum m_i G(\alpha_i) \quad \text{для } m_i \text{ из } M \text{ и } \alpha_i \text{ из } A.$$

**Лемма.** При этих условиях  $M$  состоит из всей совокупности элементов из  $N$ , остающихся неподвижными при  $\mathfrak{G}$ . Ведь если  $x_1, \dots, x_n$  есть  $P$ -базис  $M$ , то есть  $w = x_1 \alpha_1 + \cdots + x_n \alpha_n$ , то из  $G(w) = w$  для каждого  $G$  из  $\mathfrak{G}$  следует, что также  $G(\alpha_i) = \alpha_i$ , а значит по предположению  $\alpha_i$  лежит в  $P$ .

**Теорема.** Модули расширения  $L_A$  подмодулей  $L$  модуля  $M$ , и только они, являются допустимыми подмодулями относительно  $\mathfrak{G}$  как области операторов.

Первая половина ясна. Обратно, пусть  $L$  допустим относительно  $\mathfrak{G}$ , и пусть  $z_1, \dots, z_\ell$  есть нормальный базис  $L$  (ср. 1) относительно  $x_1, \dots, x_n$ , где  $x_1, \dots, x_n$  выбран как  $P$ -базис  $M$ , так что  $\mathfrak{G}$  поэлементно его допускает. По предположению

$$G(z_i) = x_i - (x_{\ell+1} G(\alpha_{i,\ell+1}) + \cdots + x_n G(\alpha_{i,n}))$$

есть элемент  $L$  для каждого  $G$  из  $\mathfrak{G}$ , значит при фиксированном  $G$  он линейно выражается через  $z$ , и поэтому, как видно из сравнения коэффициентов при  $x_1, \dots, x_n$ , имеем  $G(z_i) = z_i$  для каждого  $G$  из  $\mathfrak{G}$ . Следовательно, по лемме,  $z$  лежат в  $M$ , и  $L$  является расширением  $P$ -модуля

$$T = z_1 P + \dots + z_\ell P$$

из  $M$ , причем  $T = L \cap M$  (по 2).<sup>10</sup>

#### §4. Гиперкомплексные системы и их классы представлений

**1. Теорема расширения.** Теперь мы соединяем теоремы о представлениях из §2 с модульными теоремами из §3. Вместо общих колец  $\mathfrak{A}$  рассматриваем гиперкомплексные системы с единицей,  $S, T, \dots$ , над коммутативным полем  $P$ , то есть

$$S = x_1 P + \dots + x_n P;$$

вместо произвольных колец представления  $\mathfrak{G}$  берем только тела  $A, B, \dots$ , и, если не оговорено иное, такие, что имеют центр  $P$ . В этом случае всегда существует кольцо произведения, в котором  $S$  и  $A$  поэлементно коммутируют, с пересечением  $P$ ; речь именно о прямом произведении  $S \times A$ , которое одновременно становится модулем расширения  $S_A$  системы  $S$  в смысле §3,

$$S_A = x_1 A + \dots + x_n A,$$

и поэтому также называется кольцом расширения.

При этой специализации теорема об инвариантных модулях (§3, 3) переходит в

**Теорема расширения.** Каждый двусторонний идеал из  $S_A$  есть идеал расширения некоторого идеала из  $S$ , а именно расширение своего пересечения с  $S$ .

Действительно, если положенная в основу группа  $\mathfrak{G}$  есть группа внутренних автоморфизмов  $A$ , то  $P$  как центр  $A$  становится полным телом инвариантов, тогда как поэлементная коммутативность  $A$  с  $S$  означает, что  $\mathfrak{G}$  по §3, 3 продолжена на  $S_A$  так, что  $S$  становится полной областью инвариантов. Каждый двусторонний идеал  $\mathfrak{a}$  из  $S_A$  является допустимой подгруппой, поскольку  $\alpha^{-1} \mathfrak{a} \alpha \subseteq \mathfrak{a}$ , а значит по §3, 3 есть расширение своего модуля пересечения  $\mathfrak{a} \cap S$ , который становится идеалом в  $S$ .

Добавление: если  $S$  коммутативна, то  $S$  становится центром  $S_A$ . Ведь  $S$  лежит в центре и является полной областью инвариантов относительно внутренних автоморфизмов, порожденных  $A$ . Более общо, центр  $S$  также становится центром  $S_A$ .

Обозначение: под  $A_r, B_n, \dots$  всегда будем понимать матричные кольца указанной степени над  $A, B, \dots$ , то есть

$$A_r = \sum A c_{ik} = \sum c_{ik} A.$$

В дальнейшем существенно используется одно следствие, теорема расширения для простых систем: если  $S$  простая система<sup>11</sup>, то  $S_A$  также проста:

$$S_A = \sum B c_{ik} = \sum c_{ik} B = B_t$$

с соответствующим телом  $B$ , центр которого содержит  $P$ . При этом  $A$ , а значит и  $B$ , может иметь бесконечный ранг над  $P$ ; только  $S$  предполагается гиперкомплексной. Если  $S$  и  $A$  имеют общий центр  $P$ , то  $P$  также становится центром  $S_A$ .

Более общо еще верно: если  $S$  простая гиперкомплексная система, то прямое произведение  $S \times A_r$  также просто. Ведь  $S \times A_r$  совпадает с  $S_A \times P_r$ , а потому равно  $B_{tr}$ , если  $S_A = B_t$ .

<sup>10</sup>Теоремы этого параграфа благодаря простым рассуждениям с хорошим упорядочением остаются верными и тогда, когда ранг  $M$  над  $P$  становится бесконечным; ср. G. Köthe, Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung §1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207.

<sup>11</sup>Простая система означает, как обычно, “двусторонне простая”.

**2. Классы представлений.** Под реципрокным или прямым представлением гиперкомплексной системы будем, как обычно, понимать такое представление, которое операторно-гомоморфно относительно области коэффициентов  $P$  (§2, конец) и отлично от нулевого представления. Соединение теоремы перехода и ее следствия (§2, 3) с теоремой расширения из пункта 1 дает

**Теорема о классах представлений.** Если  $S$  гиперкомплексна с единицей, с  $P$  как областью коэффициентов, а  $A$  тело с центром  $P$ , то  $S$  имеет столько различных неприводимых реципрокных классов представлений в  $A$ , сколько есть классов простых правых идеалов в фактор-кольце  $S_A$  по его радикалу. Если  $S$  простая система, то она имеет ровно один неприводимый реципрокный и один неприводимый прямой класс представлений в  $A$ .<sup>12</sup>

Действительно, по следствию из теоремы перехода (§2, 3) простые реципрокные классы представлений и простые модульные классы над  $S_A$  взаимно однозначно соответствуют друг другу. Поскольку  $S_A$  имеет конечный ранг над телом  $A$ , оно удовлетворяет максимальному и минимальному условиям для односторонних идеалов; следовательно, первая часть утверждения непосредственно вытекает из Darstellungstheorie, §19. Если  $S$  проста, то по теореме расширения  $S_A$  также проста. Благодаря максимальному и минимальному условиям она одновременно вполне приводима, значит имеет лишь один простой класс односторонних идеалов; то есть  $S$  имеет лишь один неприводимый реципрокный класс представлений в  $A$ . Вместе с  $S$  простой является и реципрокно изоморфная ей система, имеющая лишь один неприводимый реципрокный класс представлений; следовательно,  $S$  имеет также лишь один простой прямой класс представлений.

**3. Ранговое соотношение.** Факт, что, когда  $S$  проста,

$$S_A = \sum Bc_{ik}$$

имеет конечный ранг как над  $A$ , так и над  $B$ , дает ранговое соотношение:

$$\begin{aligned} n &= rt, & n &= (S : P), & t^2 &= (S_A : B), \\ r &= \text{степень неприводимого реципрокного представления.} \end{aligned} \quad (1)$$

Ведь  $S_A$  само является реципрокным модулем представления для  $S$  в  $A$  (представление уже лежит в  $P$ ). Как матричное кольцо над  $B$ ,  $S_A$  распадается на  $t$  простых правых идеалов, то есть  $S_A$ -модулей, ранг которых над  $A$  равен степени  $r$  неприводимого реципрокного представления. Поскольку  $n$  одновременно есть ранг  $S_A$  над  $A$ , получается ранговое соотношение.

**4. Усиление рангового соотношения, когда  $A$  имеет конечный ранг над  $P$ .** В этом случае выполняются три соотношения:

$$(S : P) = n = rt, \quad (1)$$

$$(B : P)t = (A : P)r, \quad (2)$$

$$(S : P)(B : P) = (A : P)r^2. \quad (3)$$

Здесь (2) означает ранг над  $P$  простого правого идеала из  $S_A$ , выраженный по пункту 3 через ранг над  $B$ , соответственно над  $A$ , а (3) означает ранг простого правого идеала в матричном кольце  $B_n$  и получается из (2) умножением на  $r$  согласно (1).

## §5. Применение теорем о представлениях к матричным кольцам

Реципрокное представление  $S$  в  $A$ , рассмотренное в §4, можно также понимать как прямой гомоморфизм  $S$  в подкольцо  $A_r$ , где  $\bar{A}$  обозначает тело, реципрокно изоморфное  $A$ . Принцип следующих параграфов состоит в том, чтобы, наоборот, сводить исследование матричных колец  $A_r$  к теории представлений в реципрокно изоморфном теле  $A$ .

<sup>12</sup>Ср. Darstellungstheorie, прим. 20, для случая, когда  $A$  является соответствующим телом автоморфизмов  $S$ .

**1. Приводимое и неприводимое вложение в  $A_r$ .** Пусть  $A$  и  $\bar{A}$  являются реципрокно-изоморфными телами конечного или бесконечного ранга над своим центром  $P$ .<sup>13</sup> Простая система  $S$  над  $P$  называется неприводимо, соответственно приводимо, вложимой в  $A_r$ , если  $S$  имеет неприводимое, соответственно приводимое, реципрокное представление  $r$ -й степени в  $A$ . Если  $S$  неприводимо вложима в  $A_r$ , то она приводимо вложима во все матричные кольца  $A_{rs}$  с  $s > 1$ , потому что она имеет приводимые представления именно этих и только этих степеней (§4, 2). Следовательно,  $S$  прямо изоморфна некоторым подкольцам  $A_r$  и  $A_{rs}$ . Изоморфизм является продолжением тождественного на  $P$ ;<sup>14</sup> по §4, 3 при этом  $r$  является делителем ранга  $n$  системы  $S$  над  $P$ .

Таким образом получаются все простые подкольца конечного ранга над  $P$ , содержащие  $P$ , в различных  $A_f$  ( $f = 1, 2, \dots$ ); ведь каждое такое подкольцо реципрокно-изоморфно подкольцу  $\bar{A}_f$ , а значит допускает приводимое или неприводимое реципрокное представление в  $A$ .

**2. Теорема о внутренних автоморфизмах.** Если  $S^{(1)}$  и  $S^{(2)}$  два простых подкольца  $A_f$ , содержащих  $P$  и имеющих конечный ранг над  $P$ , и если  $S^{(1)}$  и  $S^{(2)}$  изоморфны над  $P$ , то этот изоморфизм порождается внутренним автоморфизмом  $A_f$ .

Ведь  $S^{(1)}$  и  $S^{(2)}$  означают, вообще говоря приводимые, вложения простой системы  $S$  в  $A_f$ , то есть прямые представления  $f$ -й степени в  $A$ ; поэтому они принадлежат одному и тому же приводимому прямому классу представлений в  $A$ , и переводящая матрица порождает автоморфизм.

Если  $A$  само имеет конечный ранг над  $P$ , то есть гиперкомплексно, то теорема переходит в известную: две простые подсистемы  $A_f$ , содержащие центр  $P$  и изоморфные над  $P$ , переводятся друг в друга внутренним автоморфизмом  $A_f$ . В частности, каждый автоморфизм  $A_f$  внутренний.<sup>15</sup>

**3. Теорема о поэлементно коммутирующих подкольцах.** Эта теорема снова следует из теоремы о коммутирующих матрицах из §2, 3 по принципу, упомянутому в начале параграфа:

Если  $S$  есть простая система из  $A_f$ , содержащая  $P$ , и  $R$  обозначает совокупность всех элементов  $A_f$ , поэлементно коммутирующих с  $S$ , то  $R$  также является матричным кольцом:  $R = \bar{B}_S$ . Соответствующие тела  $B$  для  $S_A$  и  $\bar{B}$  для  $R$  реципрокно изоморфны. Пересечение  $R$  и  $S$  становится центром  $S$ .  $R$  является телом тогда и только тогда, когда  $S$  вложено в  $A_f$  неприводимо.

Ведь по §2, 3  $R$  прямо изоморфно кольцу автоморфизмов реципрокного модуля представления  $\mathcal{M}$  системы  $S$  в  $A$ ; но это кольцо автоморфизмов  $\mathcal{M}$ , рассматриваемого как  $S_A$ -модуль. Если  $\mathcal{M}$  распадается на  $s$  простых  $S_A$ -модулей и, как в §4, 1, положено  $S_A = \sum Bc_{ik}$ , то  $R$  изоморфно  $\sum \bar{B}c_{ik}$ , где  $B$  и  $\bar{B}$  реципрокно изоморфны (поскольку  $B$  реципрокно изоморфно телу автоморфизмов простых правых идеалов из  $S_A$ , то есть простых  $S_A$ -модулей, по концу §1, 3).  $R$  становится телом, то есть  $R = \bar{B}$ , тогда и только тогда, когда  $s = 1$ , то есть когда  $S$  вложено неприводимо. То, что пересечение  $R$  и  $S$  есть центр  $S$ , непосредственно следует из определения  $R$ .

**4. Усиленная теорема о коммутантах в гиперкомплексном матричном кольце.** В этом случае ранговые соотношения из §4, 4 дают следующее усиление:

Простые подсистемы  $A_f$ , содержащие  $P$ , где  $A$  имеет конечный ранг над своим центром  $P$ , распадаются на пары  $S, \bar{S}$  так, что  $\bar{S}$  состоит из всей совокупности элементов, поэлементно коммутирующих с  $S$ , и обратно. Соответствующие тела для  $S_A$  и  $\bar{S}$  реципрокно изоморфны, так же как соответствующие тела для  $S$  и  $\bar{S}_A$ . Пересечение  $S$  и  $\bar{S}$  равно общему центру. Одно подкольцо является телом тогда и только тогда, когда другое вложено неприводимо. Произведение ранговых чисел над  $P$  систем  $S$  и  $\bar{S}$  равно рангу  $A_f$ . Если  $f = rs = \bar{r}\bar{s}$ , где  $S$  неприводимо вкладывается в  $A_r$ , а  $\bar{S}$  неприводимо вкладывается в  $A_{\bar{r}}$ , то соответствующие тела для  $S$  и  $\bar{S}$  изоморфны паре коммутирующих подколец из  $A_g$  с  $f = gs\bar{s}$ .

По существу нужно доказать только утверждение о произведении ранговых чисел. Сначала пусть  $S$  вложено неприводимо, так что  $\bar{S}$  есть тело и реципрокно изоморфно  $B$ , где  $S_A = B_t$ . Тогда

<sup>13</sup>Вообще реципрокные тела или системы будут обозначаться соответствующими греческими и латинскими буквами.

<sup>14</sup>Как уже для представлений, во всех далее встречающихся изоморфизмах речь всегда идет о таких, которые являются продолжением тождественного на  $P$ , то есть изоморфны над  $P$ , даже если это не оговаривается каждый раз отдельно.

<sup>15</sup>Это уже неверно, когда  $A$  имеет бесконечный ранг над  $P$ ; ср. Köthe в работе, цитированной в прим. 5.

ранговое соотношение (3) из §4, 4 дает утверждение о произведении, потому что теперь  $f = r$ , а ранг  $\bar{S}$  равен рангу  $B$ . Если  $S$  вложено приводимо, то есть  $\bar{S} = B_s$ , то  $f = rs$ , и умножение (3) на  $s^2$  дает утверждение. Отсюда непосредственно следует, что  $\bar{S}$  состоит из всей совокупности элементов, поэлементно коммутирующих с  $S$ , и затем все дальнейшее из пункта 3, кроме последнего утверждения. Последнее получается двукратным переходом к неприводимому вложению. В  $A_r$ , где  $f = rs$ , система  $S$  вложена неприводимо, и  $S$  и  $R$  становятся попарно коммутирующими системами, причем  $R$  изоморфно телу  $B$ . Далее, вследствие реципрокности  $S$  и  $\bar{S}$ ,  $S$  равно  $\bar{B}_s$ , где  $\bar{B}$  имеет для  $\bar{S}$  то же значение, что  $B$  для  $S$ ; значит  $R$  приводимо вложено в  $A_r$ , но неприводимо в  $A_g$  с  $r = g\bar{s}$ . Здесь попарно коммутирующие системы становятся изоморфными  $B$  и  $\bar{B}$ .

## §6. Теория Галуа простых систем

Усиленная теорема о коммутантах из §5, 4 выражает теорию Галуа простых систем относительно центра как основной области. Сначала рассмотрим тела, затем общие простые системы.

**1. Теория Галуа тел конечного ранга над центром.** Группа Галуа  $\mathcal{G}$  тела  $A$  определяется как группа всех автоморфизмов, являющихся продолжением тождественного автоморфизма центра  $P$ , то есть по §5, 2 как группа всех внутренних автоморфизмов. Следовательно,

$$\mathcal{G} \simeq A^*/P^*,$$

где  $A^*$ , соответственно  $P^*$ , обозначают мультипликативную группу ненулевых элементов из  $A$ , соответственно из  $P$ . Подгруппам  $\mathfrak{H}$  группы  $\mathcal{G}$  поэтому взаимно однозначно соответствуют подгруппы  $H^*$  группы  $A^*$ , содержащие  $P^*$ , посредством

$$\mathfrak{H} \sim H^*/P^*.$$

Подгруппа  $\mathfrak{H}$  группы  $\mathcal{G}$  называется замкнутой, если  $H^*$  после добавления нуля переходит в тело  $H$ . Факт, что  $C$  допускает группу  $\mathfrak{H}$ , равносильно тому, что  $C$  поэлементно коммутирует с  $H$ . Тем самым теорема о коммутантах §5, 4 переходит в

**Главная теорема теории Галуа некоммутативных тел.** Тела  $C$  между  $P$  и  $A$  и замкнутые подгруппы  $\mathfrak{H}$  группы  $\mathcal{G}$  взаимно однозначно соответствуют друг другу так, что  $C$  становится полным телом инвариантов для  $\mathfrak{H}$ , а  $\mathfrak{H}$  полной группой инвариантов для  $C$ .

**2. Теория Галуа простых систем.** Если  $A_f$  есть простая система с центром  $P$ , то группа Галуа  $\mathcal{G}$  снова является группой внутренних автоморфизмов, то есть изоморфна

$$A_f^*/P^*,$$

где теперь  $A_f^*$  обозначает мультипликативную группу регулярных элементов из  $A_f$ . Подгруппа  $\mathfrak{H} \sim H^*/P^*$  группы  $\mathcal{G}$  называется просто-замкнутой, если подкольцо  $H$ , порожденное  $H^*$ , есть простая система и если  $H^*$  состоит из всей совокупности регулярных элементов  $H$ . Переход от теоремы о коммутантах к теории Галуа здесь дается следующей

**Лемма.** Каждая простая система из  $A_f$ , содержащая  $P$ , порождается группой  $H^*$  своих регулярных элементов. Это ясно, если  $P$  имеет бесконечно много элементов; ведь “общий элемент”, образованный с неопределенными, регулярен, и подходящей специализацией можно образовать регулярные базисные элементы над  $P$ . Но по Шоду лемма верна вообще.<sup>16</sup>

Благодаря лемме коммутативность  $S$  с простой системой  $\mathfrak{S}$  снова равносильна тому, что  $S$  допускает автоморфизмы, индуцированные регулярными элементами  $\mathfrak{S}$ . Следовательно, и здесь теорема о коммутантах §5, 4 переходит в

<sup>16</sup>Работа Shoda, цитированная в прим. 3. Там введение неопределенных избегается.



**Главная теорема теории Галуа простых систем.** Простые системы  $S$  из  $A_f$ , содержащие  $P$ , и просто-замкнутые подгруппы  $\mathfrak{H}$  группы  $\mathcal{G}$  взаимно однозначно соответствуют друг другу так, что  $S$  становится полной областью инвариантов для  $\mathfrak{H}$ , а  $\mathfrak{H}$  полной группой инвариантов для  $S$ .

**3. Доказательство посредством принципа продолжения.** Для случая тела я даю еще второе доказательство главной теоремы, основанное на принципе продолжения изоморфизмов, то есть представлений первой степени, и, поскольку оно обходится без подсчета рангов, оно требует меньше предположений конечности. В частности, так видно, в каком направлении будет возможен перенос на тела  $S$  бесконечного ранга. Доказательство также не использует факта, что существует лишь один неприводимый реципрокный класс представлений, и потому так же верно в коммутативном случае; ср. §8, 2. Сначала я привожу несколько лемм.

**Предположения.** Пусть простая система  $S$  над  $P$  допускает реципрокное представление первой степени в  $A$ , то есть является телом; при этом  $A$  может иметь конечный или бесконечный ранг над своим центром  $P$ . Пусть разложение  $S_A$  на  $n$  простых, операторно изоморфных правых идеалов по §4, 3 задано через

$$S_A = r_1 + \cdots + r_n = e_1 S_A + \cdots + e_n S_A = e_1 A + \cdots + e_n A;$$

реципрокное представление, порожденное  $e_i$ , следовательно, определяется через

$$e_i \sigma = e_i \sigma_i.$$

**Лемма 1.**  $n$  реципрокных представлений, порожденных  $e_1, \dots, e_n$ , различны, следовательно это разные представления одного и того же класса представлений. Поэтому  $S$  имеет по меньшей мере столько разных представлений, каков ее ранг.

Для доказательства продолжим представления из  $S$  по концу §2 до соответствий из  $S_A$ , операторно-гомоморфных над  $A$ . Эти соответствия здесь определены через

$$e_i w = e_i \omega$$

с  $\omega \in A$  для каждого  $w \in S_A$ . Если бы  $e_i$  и  $e_j$ ,  $i \neq j$ , порождали одно и то же представление, то должно было бы быть  $e_i w = e_j w$  для каждого  $w \in S_A$ . Это невозможно из-за  $e_i e_i = e_i$  и  $e_j e_i = 0$ .

**Лемма 2.** Если  $T$  есть тело между  $P$  и  $S$ , а  $s$  ранг  $S$  над  $T$ , то каждый реципрокный изоморфизм  $T$  в  $A$  допускает по меньшей мере  $s$  различных продолжений.

Пусть реципрокный изоморфизм, то есть реципрокное представление  $T$  в  $A$ , осуществляется разложением

$$T_A = E_1 T_A + \cdots + E_h T_A = E_1 A + \cdots + E_h A, \quad E_i t = E_i \tau,$$

где  $E_i$  идемпотенты. Это не ограничивает общности, потому что представление, порожденное базисным элементом  $E_i \alpha$ , порождается также  $\alpha^{-1} E_i \alpha$ , то есть идемпотентом. Правое умножение на  $S$  дает

$$S_A = E_1 S_A + \cdots + E_h S_A.$$

При этом все  $E_i S_A$  имеют ранг  $s$  над  $A$ . Ведь ранг  $E_i S_A$  не превосходит  $s$ , как показывает подстановка  $T$ -базиса в  $S$  благодаря коммутативности  $S$  и  $A$ :

$$S = T w_1 + \cdots + T w_s,$$

$$E_i S_A = E_i T_A w_1 + \cdots + E_i T_A w_s = E_i w_1 A + \cdots + E_i w_s A.$$

Поскольку сумма  $S_A$  имеет ранг  $n = hs$ , каждое  $E_i S_A$  имеет точно ранг  $s$ . Следовательно,

$$E_i S_A = r_{i1} + \cdots + r_{is} = e_{i1} A + \cdots + e_{is} A,$$

где  $s$  представлений, порожденных  $e_{i1}, \dots, e_{is}$ , по лемме 1 все различны. Все они являются продолжениями представления  $T$ , порожденного  $E_i$ ; ведь из  $E_i t = E_i \tau$  следует

$$(e_{i1} + \dots + e_{is})t = (e_{i1} + \dots + e_{is})\tau$$

и тем самым  $e_{ij}t = e_{ij}\tau$  из-за разложения в прямую сумму.

**Определение.** Разбиение на классы  $\mathcal{I}_T$  реципрокных изоморфизмов  $\mathcal{I}$  системы  $S$  на  $A$ , индуцированное  $T$ , определяется так: все и только те изоморфизмы из  $\mathcal{I}$  считаются эквивалентными, которые на  $T$  индуцируют один и тот же изоморфизм.

**Главная теорема.** Если  $\mathcal{I}_T$  есть разбиение на классы, индуцированное  $T$ , то  $T$  является максимальным подтелом относительно этого разбиения.

Ведь если  $Z$  есть промежуточное тело между  $T$  и  $S$ , степени  $l$  над  $T$ , то по лемме 2 каждый класс из  $\mathcal{I}_T$  распадается по меньшей мере на  $l$  классов из  $\mathcal{I}_Z$ . Переход от этой формулировки главной теоремы к обычной возникает так: множество изоморфизмов  $\mathcal{I}$ , после умножения его элементов на обратный к какому-нибудь фиксированному элементу, переходит в группу автоморфизмов, причем класс из  $\mathcal{I}_T$  переходит в группу инвариантов  $T$ . Утверждение, что замкнутые подгруппы являются полными группами инвариантов, содержится здесь; нужно только для  $\mathcal{H} \sim H^*/P^*$  взять тело  $H$  как промежуточное тело  $T$ .

## §7. Класс подобных алгебр. Поля разложения

С этого момента речь идет только о телах  $A, \bar{A}$  и матричных кольцах  $A_f$ , имеющих конечный ранг над своим центром  $P$ ; то есть о простых нормальных алгебрах над  $P$ , которые кратко будем называть алгебрами над  $P$  или просто алгебрами. Тогда  $A, \bar{A}$  являются алгебрами с делением. В один класс подобных алгебр  $A, A_f$  объединяются все  $A_f$  с одним и тем же соответствующим  $A$ . Изоморфные  $A$  при этом отождествляются.

**1. Группа классов алгебр.** Если  $A, B$  алгебры над  $P$ , то то же верно для их произведения, прямого произведения над  $P$ ; ведь по концу §3 получается

$$A_r \times_P B_s = C_t,$$

где  $C$  есть с точностью до изоморфизма однозначно определенная алгебра с делением с центром  $P$ . Умножение  $A_r, B_s$  на матричные кольца над  $P$  показывает, что это умножение однозначно определено для классов, которые тем самым образуют мультипликативно замкнутую коммутативную систему. Кроме того верна

**Теорема Р. Брауэра.** Классы подобных алгебр относительно прямого произведения образуют абелеву группу.

Действительно, система имеет единичный класс, состоящий из матричных колец над  $P$ , то есть алгебр, подобных  $P$ . Она имеет также для каждого класса  $(A)$  обратный  $(A)^{-1}$ , состоящий из алгебр, подобных  $\bar{A}$ , где  $\bar{A}$  реципрокно изоморфна  $A$ . Это следует из теоремы о коммутантах §5, 3 через специализацию  $S = A$ . Ведь  $A$  можно неприводимо вложить в саму  $A$ ; тогда получается  $B = P$  и  $A_A = P_t$ .<sup>17</sup>

**2. Поле разложения класса алгебр.** Теория полей разложения снова полностью основана на принципе, высказанном в начале §5: коммутативные поля расширения представляются в  $A$ , соответственно в  $\bar{A}$ . Предварительно приведем

<sup>17</sup>Более тонкие теоремы о группе классов алгебр используют теорию фактор-систем; здесь мы на этом не останавливаемся. Отметим, что до этого места не возникало никаких соображений о коммутативных полях; например, тот факт, что ранг  $(A : P)$  есть квадрат, нигде не использовался и не доказывался.

**Лемма.** Если  $A$  тело с центром  $P$ , а  $Z$  конечное коммутативное поле расширения  $P$ , то  $A_Z$  просто с центром  $Z$ . Ведь это по §4, 1 верно для системы  $Z_{\bar{A}}$ , реципрочно изоморфной  $A_Z$ . Для каждого класса  $(A)$  алгебр над  $P$ , подобных  $A$ , поле  $Z$  поэтому порождает класс расширения  $(A)_Z$  простых алгебр над  $Z$ , подобных  $A_Z$ .

Соответствующая алгебра с делением  $D$  класса расширения немедленно получается из теоремы о коммутантах §5, 3:

**Теорема о соответствующей алгебре с делением класса расширения.** Пусть  $(A)_Z$  есть класс расширения, а  $Z$  обозначает неприводимое вложение, то есть представление,  $Z$  в  $A_f$ . Тогда

$$(A)_Z = (D),$$

где  $D$  состоит из всей совокупности элементов  $A_f$ , поэлементно коммутирующих с  $Z$ . Нужно лишь в §5, 3 заменить тамошнюю простую систему  $S$  на  $Z$ , учитывая, что  $Z_A$  и  $A_Z$  реципрочно изоморфны. Если речь идет о приводимом вложении  $Z$ , то совокупность элементов, поэлементно коммутирующих с  $Z$ , дает матричное кольцо над  $D$ .

Коммутативное поле расширения  $Z$  поля  $P$ , как известно, называется полем разложения класса  $(A)$ , если класс расширения  $(A)_Z$  полностью расщепляется, то есть становится равным единичному классу над  $Z$ , классу всех матричных колец над  $Z$ .

**Теорема о характеристике полей разложения.** Конечное коммутативное поле расширения  $Z$  поля  $P$  является полем разложения класса  $(A)$  тогда и только тогда, когда его неприводимое вложение в  $A_f$  дает максимальное коммутативное подтело  $A_f$ .

Ведь свойство  $Z$  быть полем разложения для  $(A)$  равносильно  $(D) = (Z)$ . Следовательно, по теореме о соответствующей алгебре с делением неприводимое вложение  $Z$  должно быть максимальным коммутативным подтелом. Если это условие выполнено, то необходимо  $D = Z$ , потому что каждый  $a$  из  $D$ , присоединенный к  $Z$ , порождает коммутативное поле расширения.

**Замечания.** 1. Отсюда одновременно следует, что максимальное коммутативное подтело  $Z$  при неприводимом вложении порождает максимальное коммутативное подкольцо. Ведь совокупность элементов, поэлементно коммутирующих с  $Z$ , образует тело.

2. Теорема одновременно дает существование полей разложения; ведь соответствующая алгебра с делением  $A$  наверняка имеет максимальные коммутативные подтела.

**3. Ранговые соотношения, индекс, бесконечные коммутативные расширения.** Ранговое утверждение из §5, 4 сначала дает известный факт, что ранг простой алгебры над центром есть квадрат. Ведь если  $Z$  максимально коммутативно в  $A$ , то, поскольку в  $A$  каждое вложение неприводимо, получается

$$(Z : P)(Z : P) = (A : P),$$

следовательно

$$(A : P) = m^2, \quad (Z : P) = m,$$

где  $m$  есть индекс Шура, который одновременно равен степени всех полей разложения, вложимых в саму алгебру с делением  $A$ . Далее для степени  $n$  общего поля разложения получаем

$$n = mr,$$

например из-за  $(A_r : P) = m^2 r^2$ , или также по ранговому соотношению §4, 3; последнее потому, что индекс  $m$  также равен числу простых компонент  $A_Z$ , которое становится матричным кольцом над  $Z$  ранга  $m^2$ . Более общо, если  $A_L \sim D$ ,  $L$  есть неприводимое вложение  $A$  в  $A_r$ , а  $d^2$  есть ранг  $(D : L)$  алгебры с делением  $D$  над ее центром  $L$ , то

$$ld = mr.$$

Ведь по §5, 4 и теореме о соответствующей алгебре с делением из пункта 2 имеем

$$(A_r : P) = (L : P)(D : P),$$

следовательно

$$m^2 r^2 = l^2 d^2.$$

Из существования полей разложения для бесконечных коммутативных, алгебраических или трансцендентных, полей расширения  $\Omega$  поля  $P$  следуют факты: класс расширения  $(A)_\Omega$  есть класс простых алгебр с центром  $\Omega$ . В частности, если  $\Omega$  алгебраически замкнуто, то  $A_\Omega$  становится матричным кольцом степени  $m$ . Следовательно, индекс равен “абсолютному числу компонент”. Ведь если  $Z$  поле разложения  $A$ , а  $\Omega'$  композитум  $\Omega$  и  $Z$ , то  $A_{\Omega'}$  есть матричное кольцо над  $\Omega'$ , то есть без радикала и с центром  $\Omega'$ . Поэтому также  $A_\Omega$  не имеет радикала и имеет центр  $\Omega$ , потому что элемент  $A_\Omega$ , отличный от  $\Omega$ , лежал бы в центре  $A_{\Omega'}$ , а значит был бы телом. Следовательно,  $A_\Omega$  есть простая алгебра над  $\Omega$ , наверняка матричное кольцо над  $\Omega$ , когда  $\Omega$  алгебраически замкнуто.<sup>18</sup>

**4. Существование сепарабельных полей разложения.** Каждый класс  $(A)$  имеет сепарабельные поля разложения, даже такие, которые вкладываются в саму  $A$ .<sup>19</sup>

Пусть основное поле  $P$  имеет характеристику  $p$ , а индекс

$$m = sp^f$$

с  $s$ , взаимно простым с  $p$ . Если тогда  $Z$  есть поле разложения  $A$  степени  $m$ , а  $Z_0$  содержащееся в нем расширение первого рода, то есть

$$(Z : Z_0) = p^f,$$

то индекс  $A_{Z_0} \sim D$  равен  $p^f$ . Нужно доказать существование сепарабельного поля расширения  $Z_1$  поля  $Z_0$ , такого, что индекс  $D_{Z_1}$  становится собственным делителем  $p^f$ . Но  $D_\Omega$  с алгебраически замкнутым  $\Omega$  по пункту 3 не имеет радикала; следовательно, приведенная дискриминанта  $D$  не исчезает. Поэтому существует по крайней мере один элемент  $d$  из  $D$  с ненулевым приведенным следом; при этом  $d$  не может уже лежать в основном поле  $Z_0$ , потому что след каждого элемента  $\alpha$  из  $Z_0$  равен  $p^f \alpha$ , а значит исчезает. Поэтому  $Z_1 = Z_0(d)$  есть собственное, и притом сепарабельное, поле расширения; индекс  $D_{Z_1}$  становится собственным делителем  $p^f$ . Конечное повторение приводит к сепарабельному полю разложения класса  $(A)$ , степень которого  $m$  совпадает с индексом  $A$ .

## §8. Поля разложения, поля отщепления и теория Галуа в коммутативном случае

Чтобы перейти от полей разложения систем, простых над своим центром, к полям разложения произвольных простых систем, нужно еще развить теорию разложения центра и добавить параллельную §6, 3 теорию Галуа. Все поля и системы, встречающиеся в этом параграфе, коммутативны.

**1. Поля разложения и поля отщепления коммутативных простых систем.** Пусть коммутативная система  $Z$  проста над  $P$ , то есть является полем, а  $\Omega$  алгебраически замкнутое поле расширения  $P$ . Тогда, как известно,  $Z_\Omega$  остается системой без радикала тогда и только тогда, когда  $Z$  сепарабельно, то есть является расширением первого рода, над  $P$ . Ведь тогда и только тогда оно имеет столько изоморфных отображений первой степени в  $\Omega$ , каков его ранг над  $P$ , а значит столько же различных представлений, которые здесь совпадают с классами представлений.

Факт, что в  $Z_\Omega$  может появиться радикал, то есть не обязательно происходит разложение в прямую сумму абсолютно простых компонент, приводит к следующим определениям. Поле расширения  $\Lambda$  поля  $P$  называется полем разложения, если  $Z_\Lambda$  распадается на композиционные факторы первой

<sup>18</sup>Вообще существуют также “минимальные” поля разложения, то есть такие, для которых никакое собственное подполе не является полем разложения, всех возможных степеней. Ср. Brauer–Noether, работу, цитированную в прим. 2.

<sup>19</sup>Ср. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. 166 (1932), S. 182–184. Приведенное здесь значительно более простое доказательство восходит к замечанию M. Zorn.

степени; другими словами, если все абсолютно неприводимые представления уже лежат в  $\Lambda$ . Поле расширения  $T$  поля  $P$  называется полем отщепления, если  $Z_T$  отщепляет по крайней мере один композиционный фактор первой степени; другими словами, если существует по крайней мере одно абсолютно неприводимое представление  $Z$  в  $T$ .

Поля разложения и поля отщепления характеризуются следующей

**Теорема.** Поле  $T$  является полем отщепления тогда и только тогда, когда оно содержит подполе  $Z'$ , изоморфное  $Z$ ; поле  $\Lambda$  является полем разложения тогда и только тогда, когда оно содержит подполе  $\Gamma$ , изоморфное полю Галуа, принадлежащему  $Z$ .

Это прямо следует из определения полей разложения и отщепления через абсолютно неприводимые представления. В частности, по аналогии с некоммутативным случаем получается следствие: поле  $Z'$  является минимальным полем отщепления, то есть никакое собственное подполе не является полем отщепления, тогда и только тогда, когда оно изоморфно  $Z$ . Минимальное поле отщепления является одновременно полем разложения тогда и только тогда, когда  $Z$  нормально, то есть является полем Галуа над  $P$ .

В этом причина называть простую алгебру нормальной над ее центром. Факт, что внутри фиксированного алгебраически замкнутого  $\Omega$  над  $P$  существует лишь одно минимальное поле разложения, именно поле Галуа, принадлежащее  $Z$ , в отличие от вообще говоря бесконечно многих неизоморфных в некоммутативном случае,<sup>20</sup> имеет свою причину в единственном разложении в прямую сумму в коммутативном случае, в отличие от разложения, единственного лишь с точностью до операторной изоморфии в некоммутативном случае; или, что то же самое, в лишь конечном числе различных абсолютно неприводимых представлений вместо бесконечно многих различных в некоммутативном случае, которые, однако, принадлежат одному и тому же классу.

**2. Гиперкомплексное обоснование теории Галуа в случае сепарабельных полей  $Z/P$ .** В точной аналогии с §6, 3 здесь теория изоморфизмов действует для произвольных  $Z$ , сепарабельных над  $P$ ; в случае поля Галуа  $Z$  можно затем перейти к обычной группе автоморфизмов.

**Предположения.** Пусть простая система  $Z$  над  $P$  есть конечное сепарабельное поле расширения,  $\Omega$  обозначает конечное или бесконечное поле разложения над  $P$ ,  $Z' = Z^{(1)}$  подполе, изоморфное  $Z$ , а  $\Gamma$  соответствующее поле Галуа. По пункту 1 имеем прямое разложение

$$Z_\Omega = r^{(1)} + \dots + r^{(n)} = e^{(1)}Z_\Omega + \dots + e^{(n)}Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \dots + e^{(n)}\Omega.$$

Представление  $Z \rightarrow Z^{(i)}$  с  $Z^{(i)} \subseteq \Gamma$ , порожденное  $e^{(i)}$ , следовательно, определяется через

$$e^{(i)}z = e^{(i)}z^{(i)}.$$

**Лемма 1.**  $n$  представлений, порожденных  $e^{(1)}, \dots, e^{(n)}$ , все различны. Доказательство такое же, как в §6, 3, или также по пункту 1; ведь они принадлежат различным классам представлений.

**Лемма 2.** Если  $T$  есть промежуточное поле между  $P$  и  $Z$ , а  $s$  ранг  $Z$  над  $T$ , то каждый изоморфизм  $T$  в  $\Omega$  допускает по меньшей мере, а потому ровно,  $s$  продолжений.

Доказательство такое же, как в §6, 3. То, что здесь “по меньшей мере” усиливается до “ровно”, следует из однозначного разложения  $Z_\Omega$ , по которому  $Z$  имеет в  $\Omega$  не по меньшей мере, а ровно  $n$  изоморфизмов.

Как в §6, 3, теперь определяют разбиение на классы  $\mathfrak{I}_T$ , индуцированное  $T$ , конечного множества  $\mathfrak{I}$  изоморфизмов  $Z$ : все и только те изоморфизмы из  $\mathfrak{I}$  считаются эквивалентными в  $\mathfrak{I}_T$ , которые на  $T$  индуцируют один и тот же изоморфизм. Доказывается

<sup>20</sup>R. Brauer–E. Noether, указанная работа.

**Главная теорема.** Если  $\mathfrak{I}_T$  есть разбиение на классы, индуцированное  $T$ , то  $T$  является максимальным подполем относительно этого разбиения.

Отсюда для случая поля Галуа  $Z$  можно, как в §6, 3, перейти композицией с рецiproкным к одному изоморфизму к группе автоморфизмов и обычной формулировке. Соответствующее утверждение для подгрупп вытекает из рассмотрения идемпотентов, которое интересно само по себе.

**3. Идемпотенты  $Z_\Omega$ .** Пусть  $S$  пробегает  $n$  подстановок, переводящих  $Z$  в отдельные  $Z^{(i)}$ , то есть композицию изоморфизмов  $Z \rightarrow Z_1$  и  $Z \rightarrow Z^{(i)}$ , где первый означает изоморфизм, рецiproкный к  $Z \rightarrow Z_1$ .  $Z$  не обязано быть полем Галуа. Для элементов  $a$  из  $Z_\Omega$  подстановки  $S$  определяются как операторы условием, что они индуцируют тождественность на  $Z$ ; для каждого  $a$  тем самым определен сопряженный элемент  $a^S$ , лежащий в  $Z_{(i)}$ . При этих условиях верна

**Теорема.**  $n$  идемпотентов  $e^{(i)}$  из  $Z_\Omega$  сопряжены:

$$e^{(i)} = e^S, \quad e = e^{(1)};$$

они лежат в  $n$  сопряженных системах расширения  $Z_\Omega$ .

Действительно, применение  $S$  переводит определяющие соотношения

$$ez = ez^{(1)}, \quad e^2 = e$$

в

$$e^S z = e^S z^{(i)}, \quad (e^S)^2 = e^S.$$

Из-за однозначности разложения идемпотенты также однозначно определены; следовательно,  $e^S = e^{(i)}$ . Кроме того, поскольку  $Z$  есть поле отщепления, то есть уже осуществляет представление  $ez = ez^{(1)}$ ,  $e$  уже лежит в  $Z_\Omega$ , а тем самым  $e^S$  лежит в  $Z^S_\Omega$ .

Если специально  $Z$  есть поле Галуа, то отсюда непосредственно следует часть главной теоремы теории Галуа, касающаяся подгрупп. Ведь если  $\mathfrak{H}$  есть подгруппа группы Галуа  $\mathcal{G}$ , то, из-за однозначной определенности компонент прямой суммы, элемент

$$\sum_{H \in \mathfrak{H}} e^H$$

допускает все подстановки из  $\mathfrak{H}$ , но никакие другие. Поскольку группа  $\mathcal{G}$  была определена для  $Z$ , речь идет о теории Галуа  $Z$ ; благодаря изоморфии одновременно закончен и случай для  $Z'$ .

**4. Связь идемпотентов с комплементарными базисами.**  $Z$  снова не обязательно предполагается полем Галуа.

**Теорема.** Пусть  $a_1, \dots, a_n$  есть базис  $Z$  над  $P$ , и пусть идемпотент задан как

$$e = a_1 \beta_1 + \dots + a_n \beta_n$$

то есть

$$e^S = a_1 \beta_1^S + \dots + a_n \beta_n^S,$$

Тогда

$$\beta_1^S, \dots, \beta_n^S$$

является образом комплементарного базиса  $b_1, \dots, b_n$  к  $a_1, \dots, a_n$  в отображении, осуществленном  $e^S$ .

Действительно, для отображения, осуществленного  $e^S$ ,  $e^S z = e^S \zeta^S$ , в частности  $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$ , благодаря

$$e^S e^S = e^S, \quad e^S e^R = 0 \quad (S \neq R)$$

действуют соответствия  $e^S \mapsto 1$ ,  $e^R \mapsto 0$ . Следовательно, получается

$$1 = \alpha_1^S \beta_1^S + \cdots + \alpha_n^S \beta_n^S, \quad 0 = \alpha_1^S \beta_1^R + \cdots + \alpha_n^S \beta_n^R \quad (S \neq R).$$

В матрической записи это есть определяющее уравнение комплементарных базисов:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \\ \alpha_1^S & \cdots & \alpha_n^S \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \cdots & \beta_1^R & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \beta_n & \cdots & \beta_n^R & \cdots \end{pmatrix} = E.$$

Переход к определению следа следует из того, что для

$$a_i = \sum_S e^S \alpha_i^S, \quad b_i = \sum_S e^S \beta_i^S$$

матричное соотношение после перестановки строк переходит в

$$\text{Sp}(a_i b_i) = 1, \quad \text{Sp}(a_i b_k) = 0 \quad \text{для } i \neq k,$$

причем  $a_i$  и  $b_i$  лежат в  $Z$ , потому что они допускают все подстановки  $S$ .<sup>2122</sup>

Контрагredientность комплементарных базисов здесь следует из того факта, что идемпотенты  $e^S$  являются инвариантами  $Z$ , не зависящими от положенного в основу базиса, то есть что все

$$a_1 \beta_1^S + \cdots + a_n \beta_n^S$$

переходят в себя при переходе к другому базису

$$a'_1, \dots, a'_n$$

поля  $Z/P$ .

## §9. Поля разложения и поля отщепления произвольных систем

**1. Определения и сведение к простому случаю.** Данным в §8 определениям в общем случае соответствуют следующие определения. Пусть  $S$  гиперкомплексна над  $P$ . Коммутативное поле расширения  $\Lambda$  поля  $P$  называется полем разложения  $S$ , если  $S_\Lambda$  по композиционному ряду из односторонних идеалов распадается на абсолютно простые композиционные факторы; другими словами, если все неприводимые представления  $S$  в  $\Lambda$  уже абсолютно неприводимы. Поле расширения  $T$  поля  $P$  называется полем отщепления, если  $S_T$  отщепляет по крайней мере один абсолютно простой композиционный фактор, то есть если по крайней мере одно представление, неприводимое в  $T$ , уже абсолютно неприводимо.

Эти определения, очевидно, содержат в себе определения, данные в §8 для коммутативного случая и в §7 для простых алгебр; последнее потому, что здесь  $A_\Lambda$  при каждом коммутативном расширении центра вполне приводимо, и потому композиционные факторы совпадают с компонентами прямого разложения. Полные матричные кольца над центром, и только они, здесь дают абсолютно простые компоненты, а значит и абсолютно неприводимые представления. Поскольку далее  $A_\Lambda$  двусторонне просто, то есть распадается на операторно изоморфные компоненты, отщепление абсолютно простой компоненты уже дает полное расщепление: поля отщепления и поля разложения совпадают.

Из определений непосредственно следуют факты: поля разложения  $S$  задаются как поля объединения по одному полю разложения для каждого представления, неприводимого в  $P$ ; полем отщепления  $S$  является каждое поле отщепления одного представления, неприводимого в  $P$ . Благодаря взаимно однозначному соответствию между простыми системами, компонентами фактор-кольца по радикалу, и представлениями, неприводимыми в  $P$ , достаточно рассматривать простые системы. Здесь результаты будут получены комбинированием §7 и §8.

<sup>21</sup>Ср. Darstellungstheorie §25.

<sup>22</sup>Связи между комплементарными базисами и идемпотентами впервые встречаются у Dedekind, Zur Theorie der aus  $n$  Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen; ср. Bd. II der Gesammelten Werke, S. 4–5.

**2. Поля разложения и поля отщепления простых систем.** Сначала рассмотрим случай простой системы  $A$  с сепарабельным центром  $Z$  над  $P$ . Из §8, 1 и §8, 3 получается: двустороннее разложение  $A_\Omega$ , соответствующее прямому разложению  $Z_\Omega$ , где  $\Omega$  обозначает поле разложения  $Z$ , дает  $n$  сопряженных, изоморфных  $A$ , компонент

$$e^S A_\Omega$$

системы  $A_\Omega$ , которые становятся простыми алгебрами над своим центром

$$e^S Z_\Omega = e^S Z.$$

При этом подстановки  $S$  определяются как операторы для  $A_\Omega$  условием, что они индуцируют тождественность на  $A$ .

Действительно, по §8, 3 идемпотенты сопряжены; поэтому то же по определению подстановок для  $A$  верно для компонент  $e^S A_\Omega$ . Поскольку  $A$  двусторонне проста,  $e^S A_\Omega$  кольцо изоморфно  $A$ . При этом  $e^S A_\Omega = e^S A_{Z^S}$ , поскольку  $e^S Z_\Omega = e^S Z$ ; значит центр совпадает с областью коэффициентов, и компоненты являются нормальными алгебрами.

Результаты §7, 2 далее дают: если  $A$  есть простая система над  $P$  с сепарабельным центром  $Z$  над  $P$ , то  $A_\Omega$  также не имеет радикала, то есть вполне приводимо; при этом  $\Omega$  может обозначать любое конечное или бесконечное поле расширения. Ведь по §7, 2  $e^S A_\Omega$  остается простым при каждом расширении коэффициентов, то есть без радикала. Следовательно, то же верно для прямой суммы; она и есть  $A_\Omega$ , или, если  $\Omega$  не является полем разложения  $Z$ , возникает из  $A_\Omega$  расширением коэффициентов.

Далее из §7, 2 следует

**Характеристика полей отщепления и полей разложения.** Если  $A$  есть алгебра с делением с сепарабельным центром  $Z$ , то неприводимые вложения полей отщепления задаются всеми и только теми максимальными коммутативными подтелами  $A_f$ , которые содержат  $Z$ ; поля разложения суть все и только поля объединения поля отщепления с полем разложения центра, в частности с полем Галуа, принадлежащим центру. Минимальное поле отщепления может быть полем разложения даже тогда, когда центр не является полем Галуа.

Ведь поле отщепления должно содержать поле, изоморфное  $Z$ ; утверждение о вложении для полей отщепления теперь следует из предыдущих фактов и из §7, 2. Далее поле разложения должно содержать поле разложения  $\Omega$  для  $Z$ . Но каждое поле отщепления над  $\Omega$  одновременно является полем разложения, поскольку компоненты  $e^S A_\Omega$  просты и имеют центр, изоморфный  $\Omega$ . Если  $Z$  есть поле Галуа, то минимальные поля отщепления и разложения совпадают. Но и в негалуа-случае, в отличие от коммутативного, могут существовать минимальные поля отщепления, которые одновременно являются полями разложения, а именно как только такое минимальное поле отщепления содержит поле Галуа, принадлежащее  $Z$ . Пример: тело кватернионов с центром, изоморфным  $P(\sqrt[3]{2})$ , где  $P$  есть поле рациональных чисел; поле Галуа, принадлежащее  $P(\sqrt[3]{2})$ , является минимальным полем отщепления и разложения.

Если, наконец, речь идет о несепарабельном центре, то  $Z_\Omega$ , а с ним и  $A_\Omega$ , становится системой с радикалом. Пусть, например,  $\mathfrak{C}$  радикал  $Z_\Omega$ , а  $\mathfrak{c}$  идеал расширения в  $A_\Omega$ . Тогда для  $Z_\Omega/\mathfrak{C}$  существует прямое разложение на сопряженные компоненты, в точной аналогии с §8, 2; это, как выше, дает прямое разложение  $A_\Omega/\mathfrak{c}$  так, что компоненты  $\bar{e}^{(i)} A$  изоморфны  $A$  с центром  $\bar{e}^{(i)} Z^{(i)}$ . Следовательно, теоремы о полях отщепления и разложения остаются верными. Далее подсчет рангов показывает, что композиционные факторы, соответствующие композиционному ряду  $\mathfrak{c}$ , становятся операторно изоморфными  $A_\Omega/\mathfrak{c}$ , а не только гомоморфными.

В терминах неприводимых представлений итог таков: если задано представление гиперкомплексной системы, неприводимое в  $P$ , то оно становится абсолютно вполне приводимым тогда и только тогда, когда соответствующий центр сепарабелен над  $P$ . В каждом случае поля разложения и отщепления представления можно охарактеризовать через вложение в соответствующую простую систему, как выше. В частности, наименьшая степень поля отщепления равна произведению степени центра на индекс соответствующего класса алгебр над центром; степень каждого поля отщепления кратна этому числу. Представление, в смысле композиционных



рядов, распадается на столько различных, но сопряженных, абсолютно неприводимых классов представлений, какова степень наибольшего сепарабельного поля, содержащегося в центре. Каждый класс встречается столько раз, каково произведение индекса и степени центра над этим сепарабельным расширением.

Для совершенного основного поля, где существуют только сепарабельные поля расширения, мы так возвращаемся к известным результатам И. Шура, добавляя характеристику через вложение, которая уже встречается у Р. Брауэра.

(Поступило 8 июня 1932 г.)

## 41. Теорема о главном роде для относительно галуаовых числовых полей

*Math. Ann.* 108 (1933), S. 411–419

В последнее время выяснилось, что некоммутативные методы, в особенности теория алгебр, дают возможность формулировать и доказывать известные теоремы об относительно циклических и относительно абелевых числовых полях для произвольных относительно галуаовых полей.<sup>1</sup> Я прежде всего напому теорему норм, которая в общем виде выражается как теорема о расщепляющихся алгебрах. Ниже я показываю, что соответственно и теорему о главном роде можно в общем гиперкомплексно сформулировать как теорему о внутренних автоморфизмах или также о скрещенных представлениях. Доказательство получается из названной теоремы о расщепляющихся алгебрах чисто алгебро-арифметическими соображениями, тогда как в первой теореме трансцендентным ядром остается теорема норм в циклическом случае, уже для простой степени.

Для лучшего понимания формулировки я сначала привожу теорему о главном роде в минимальном смысле, которая ниже не используется,<sup>2</sup> элементарную алгебраическую теорему,<sup>3</sup> которая в циклическом специальном случае переходит в известную теорему 90 из гильбертова *Zahlbericht*:  $N(a)$  тогда и только тогда равно единице, когда  $a = b^{1-S}$ . И уже эту теорему я высказываю как теорему о внутренних автоморфизмах или о скрещенных представлениях и доказываю ее посредством общих теорем о внутренних автоморфизмах и скрещенном произведенном представлении алгебр.

В собственно теореме о главном роде вместо последней конструкции выступает скрещенное произведение группы идеальных классов и группы Галуа, но с более тонким индуцированным разбиением фактор-систем на идеальные классы; тем самым охватывается аналог разбиения на лучевые классы из теории полей классов. Так как общих теорем об автоморфизмах и представлениях здесь еще нет, теорему о главном роде можно понимать как первый шаг в этом направлении. Поэтому, как сказано выше, я даю сведение посредством теоремы о расщепляющихся алгебрах. Тем самым теорема сводится к соответствующей теореме для идеалов вместо идеальных классов; здесь теоремы Брандта о связи максимальных порядков алгебры<sup>4</sup> можно рассматривать как эквивалент теорем об автоморфизмах. Вместе с рассмотрениями максимальных порядков скрещенных произведений<sup>5</sup> они дают доказательство, существенно параллельное минимальному доказательству, хотя и более сложное из-за возвращения к отдельным местам. Поэтому я предпочитаю почти тривиальное доказательство, указанное Э. Артином; здесь оно является еще более простым аналогом доказательства Шпайзера.

### §1. Теорема о главном роде в минимальном случае

В этом параграфе  $k$  обозначает произвольное коммутативное поле, не обязательно числовое;  $K/k$  есть сепарабельное галуаово расширение  $n$ -й степени, а  $\mathfrak{G}$  – соответствующая группа Галуа.

Сначала соберем известные факты о скрещенных произведениях.<sup>6</sup> Скрещенное произведение означает одновременное вложение  $K$  и  $\mathfrak{G}$  в алгебру  $A$  так, что автоморфизмы  $K$  становятся внутренними. Если  $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$  – символы, соответствующие  $n$  элементам группы, то сначала полагают  $A$ , как модуль линейных форм ранга  $n$  над  $K$ , равным

$$A = u_{S_1}K + \dots + u_{S_n}K. \quad (1)$$

<sup>1</sup>Ср. мой цюрихский доклад, *Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie*, Verhandlungen des Internationalen Mathematiker-Kongresses Zürich 1932, Bd. I. Для теоремы о расщепляющихся алгебрах ср. также Н. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe*, *Math. Ann.* 107 (1932).

<sup>2</sup>Я говорю “в минимальном смысле”, поскольку речь идет об алгебраическом аналоге теоремы о главном роде в произвольных полях, тогда как “в малом” уже имеет значение переход к  $p$ -адическому основному полю.

<sup>3</sup>Теорема имеется у А. Speiser, *Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie*, *Math. Z.* 5 (1919), S. 1–6; там она уже высказана как теорема о скрещенных представлениях.

<sup>4</sup>Теория Брандта о максимальных порядках изложена и заново обоснована у Н. Hasse, *Über  $p$ -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme*, *Math. Ann.* 104 (1931).

<sup>5</sup>Было объявлено по одной заметке С. Chevalley, Н. Hasse и Е. Noether; две последние – в томе памяти Herbrand.

<sup>6</sup>Эта теория, в связи с моей лекцией (1929/30), изложена у Н. Hasse, *Theory of cyclic algebras*, *Trans. Amer. Math. Soc.* 34 (1932), Chap. 2; ср. также М. Deuring о гиперкомплексных числах.

В силу требования внутреннего автоморфизма, порожденного  $u_S$ , более общо  $u_S K^*$ ,  $A$  становится кольцом, следовательно алгеброй ранга  $n^2$  над  $k$ . Требование выражается соотношениями

$$u_S^{-1} z u_S = z^S, \quad \text{или} \quad z u_S = u_S z^S, \quad (2)$$

для каждого  $z \in K$ , а также

$$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T}, \quad a_{S,T} \in K^*, \quad (3)$$

и законом ассоциативности

$$a_{S,T}^R a_{ST,R} = a_{S,TR} a_{T,R}. \quad (4)$$

Если произведение двух произвольных элементов определить формулой

$$\left( \sum_S u_S b_S \right) \left( \sum_T u_T c_T \right) = \sum_{S,T} u_{ST} a_{S,T} b_S^T c_T,$$

то  $A$  становится скрещенным произведением  $K$  с  $\mathfrak{G}$  при фактор-системе  $a_{S,T}$ ; обозначение

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G}).$$

Доказывают, что  $A$  является простой нормальной алгеброй над  $k$ , то есть матричным кольцом  $D_r$   $r$ -й степени над присоединенной алгеброй с делением  $D$ , и что  $K$  является максимальным коммутативным подполем, следовательно полем расщепления. Обратно, для каждой такой нормальной алгебры с делением  $D$  существуют матричные кольца  $D_r$ , которые таким образом порождаются как скрещенные произведения.

Если перейти от  $u_S$  к  $v_S = u_S c_S$ , где  $c_S \in K^*$ , возникают ассоциированные фактор-системы

$$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}. \quad (5)$$

В частности, по (5) фактор-системы

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

ассоциированы с единицей; эти величины называются трансформационными величинами. Ассоциированные фактор-системы объединяются в класс  $(a)$ . Классы  $(a)$  взаимно однозначно соответствуют прямым произведенным построениям одной абелевой группы; относительно прямого произведения они образуют абелеву группу, изоморфную покомпонентному произведению классов фактор-систем. Единичный элемент – это класс расщепляющихся алгебр, то есть система всех трансформационных величин. Речь идет о группе Р. Брауэра классов алгебр.

Для циклических алгебр получается специальный случай: если  $Z/k$  циклично и  $S$  – порождающая подстановка, то степеням  $S$  соответствуют степени  $u$ , и выходит

$$A = Z + uZ + \dots + u^{n-1}Z, \quad (1')$$

$$zu = uz^S, \quad u^n = \alpha, \quad (2'-3')$$

где

$$\alpha \in k^*, \quad \bar{\alpha} = \alpha N(c) \quad \text{для } v = uc. \quad (4'-5')$$

Каждая фактор-система здесь, таким образом, состоит из одного элемента основного поля; обозначение  $A = (\alpha, Z, S)$ . Единичный класс задается нормами из  $Z^*$ , а группа классов алгебр изоморфна  $k^*/N(Z^*)$ .

Формулировка теоремы о главном роде в минимальном случае использует тот факт, что соотношения (2)–(5) чисто мультипликативны и тем самым одновременно определяют группу расширения  $\mathfrak{G}^*$  группы  $\mathfrak{G}$ , состоящую из элементов  $n$  комплексов  $u_S K^*$ :

$$\mathfrak{G}^* = \{ u_{S_1} K^*, \dots, u_{S_n} K^* \}. \quad (6)$$

$\mathfrak{G}^*$  имеет  $K^*$  в качестве абелевой нормальной подгруппы, тогда как  $\mathfrak{G}^*/K^* \simeq \mathfrak{G}$ . Группа  $\mathfrak{G}^*$  состоит из всех регулярных элементов  $g^*$ , которые переводят  $K$  в себя, то есть  $g^{*-1} K g^* = K$ . Поэтому кольцевые автоморфизмы  $K$  порождаются всеми и только элементами  $\mathfrak{G}^*$ . Действительно, если  $v = uw$  порождает внутренний автоморфизм  $K$ , то  $w$  перестановочно со всеми элементами  $K$ , а значит лежит в  $K^*$ , поскольку  $K$  является максимальным коммутативным подкольцом.

**Теорема о главном роде в минимальном случае.** Первая формулировка: всякий групповой автоморфизм  $\mathfrak{G}^*$ , продолжающий тождественный автоморфизм  $K^*$ , является внутренним и порождается элементом из  $K^*$ . Другими словами: если трансформационные величины

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

все имеют значение единица, то  $c_S$  являются символическими  $(1 - S)$ -ми степенями,

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Третья формулировка: группа  $\mathfrak{G}$  имеет только один класс скрещенных представлений первой степени в  $K^*$ , принадлежащий фактор-системе единица.

Представление  $u_S \mapsto C_S$  называется скрещенным с фактор-системой  $a_{S,T}$ , если

$$C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$$

выполнено. Два представления принадлежат одному классу, если

$$C_S = B^{-S} D_S B.$$

Я доказываю первую формулировку, а затем показываю ее совпадение со второй и третьей. Доказательство основано на том, что всякий групповой автоморфизм указанного вида продолжается до кольцевого автоморфизма  $A$ , который, как известно, является внутренним автоморфизмом. Пусть при этом автоморфизме  $v_S$  – образы  $u_S$ . Тогда  $\sum v_S K$  снова образует скрещенное произведение  $\mathfrak{G}$  с  $K$  для той же фактор-системы, потому что по предположению все соотношения (2)–(4) сохраняются. Соответствие

$$\sum u_S b_S \mapsto \sum v_S b_S$$

задает кольцевой автоморфизм, при котором элементы  $K$  остаются неподвижными. Поэтому он порождается элементом из  $K^*$ .

Переход ко второй формулировке основан на том, что по (2) элементы  $v_S$  должны иметь вид  $v_S = u_S c_S$ ; поскольку фактор-системы также сохраняются, по (5) соответствующие трансформационные величины должны быть равны единице. Обратно, (2)–(5) показывают, что подстановка  $v_S = u_S c_S$  порождает автоморфизм указанного вида. Следовательно, из первой формулировки получаем

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S \frac{b}{b^S}, \quad c_S = b^{1-S}.$$

В циклическом случае предположение, в частности, означает  $N(c) = 1$ , и  $c = b^{1-S}$  есть известная теорема. Третья формулировка непосредственно равносильна второй, ибо предположение говорит, что  $u_S \mapsto c_S$  образует скрещенное представление первой степени с фактор-системой единица;  $c_S = b^{1-S}$  означает эквивалентность единичному представлению.

## §2. Теорема о главном роде

**Предварительные замечания о разбиении на классы.** В теореме о главном роде из теории полей классов для циклических относительных полей, как известно, встречаются два различных разбиения на классы: абсолютные идеальные классы в верхнем поле и лучевые классы в нижнем поле. В общем случае этому соответствует то, что разбиение идеалов верхнего поля на классы индуцирует более тонкое разбиение фактор-систем на идеальные классы.

Пусть сначала  $\mathfrak{I}$  обозначает группу всех идеалов из  $K$ . Так как  $\mathfrak{G}$  порождает автоморфизмы в  $\mathfrak{I}$ , расширение с  $\mathfrak{G}$  определяется соотношениями (2)–(5) и состоит из  $n$  комплексов  $\{\dots u_S \mathfrak{I} \dots\}$ . Если в  $\mathfrak{I}$  перейти посредством установления эквивалентности к группе абсолютных идеальных классов, то и теперь определены  $n$  комплексов  $u_S \bar{\mathfrak{I}}$ . Ведь  $\mathfrak{G}$  порождает также автоморфизмы группы классов, поскольку главный класс переходит в себя. Тем самым отношение эквивалентности, ведущее от  $\mathfrak{I}$  к

$\bar{J}$ , переносится с  $\{\dots u_S \bar{J} \dots\}$  на  $\{\dots u_S \bar{J} \dots\}$ . В частности,  $u_S$  эквивалентно всем произведениям  $u_S(c_S)$ , где  $(c_S)$  пробегает главные идеалы.

Если теперь потребовать, чтобы произведенные соотношения (3) были однозначными в смысле этой эквивалентности, то это значит, что все трансформационные величины из главных идеалов становятся однозначно эквивалентными. Иными словами:

В системе  $n$  комплексов  $\{\dots u_S \bar{J} \dots\}$ , где  $\bar{J}$  – группа абсолютных идеальных классов из  $K$ , а  $H$  в частности обозначает главный класс, произведенные соотношения (3) для  $u_S H$  тогда и только тогда однозначно определены, когда в индуцированном разбиении фактор-систем на идеальные классы главный класс содержит все трансформационные величины из главных идеалов.

**Определение.** Индуцированное разбиение фактор-систем на идеальные классы задается так: главный класс состоит из всех главных идеалов  $(a_{S,T})$ , для которых при по меньшей мере одной системе базисных элементов  $a_{S,T}$  алгебра

$$(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

расщепляется во всех разветвленных местах  $K$ .

Эти главные идеалы образуют группу относительно композиции фактор-систем; она содержит трансформационные величины

$$\frac{(c_S)^T(c_T)}{(c_{ST})},$$

ибо фактор-системы  $c_S^T c_T / c_{ST}$  порождают всюду расщепляющиеся алгебры.

**Формулировка теоремы о главном роде.** Теорема, соответственно минимальной теореме, высказывается в трех равносильных формах.

Первая формулировка: если при положенном в основу индуцированном разбиении фактор-систем на идеальные классы подстановка

$$v_S = u_S c_S$$

порождает автоморфизм  $n$  комплексов  $\{\dots u_S \bar{J} \dots\}$ , то есть для  $v_S$  в смысле этого разбиения на классы выполняются те же соотношения (3), то этот автоморфизм является внутренним и порождается идеальным классом  $b$ .

Вторая формулировка: если трансформационные величины, образованные из идеальных классов  $c_S$ ,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

все принадлежат главному классу индуцированного разбиения фактор-систем на классы, то векторы  $\{\dots c_S \dots\}$  из идеальных классов образуют главный род, а классы  $c_S$  являются символическими  $(1 - S)$ -ми степенями; то есть существует идеальный класс  $b$  такой, что

$$c_S = b^{1-S} = \frac{b}{b^S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Третья формулировка: при положенном в основу индуцированном разбиении фактор-систем на идеальные классы группа  $\mathfrak{G}$  имеет только один класс скрещенных представлений первой степени в группе идеальных классов, принадлежащий единичному классу фактор-систем.

Равносильность этих формулировок следует так же, как в §1. Переход от первой ко второй формулировке здесь даже проще, поскольку автоморфизм уже предполагается порожденным  $v_S = u_S c_S$ . Для третьей формулировки нужно лишь заметить, что представления в группе идеальных классов определены только мультипликативно; утверждение о представлениях первой степени от этого не получает никакого ограничения.

**Доказательство теоремы о главном роде.** Доказательство второй формулировки основано на двух вспомогательных теоремах.

**Вспомогательная теорема 1.** Если трансформационные величины, образованные из идеалов  $c_S$ ,

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

дают единичный идеал, то  $c_S$  являются символическими  $(1 - S)$ -ми степенями:

$$c_S = b^{1-S} \quad (S \in \mathfrak{G}).$$

Это равносильно первой формулировке, если там предположить, что автоморфизм порождается  $v_S = u_S c_S$ . Доказательство:  $b = \sum c_S$  имеет требуемое свойство, причем сумма есть модульная сумма, то есть наибольший общий делитель. Действительно,

$$b = \sum_S c_S, \quad b^T = \sum_S c_S^T, \quad b^T c_T = \sum_S c_S^T c_T = \sum_S c_{ST} = b,$$

следовательно  $c_T = b^{1-T}$ .

**Вспомогательная теорема 2.** Если алгебра

$$A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$$

расщепляется во всех конечных и бесконечных разветвленных местах  $K$ , а главные идеалы  $(a_{S,T})$  являются трансформационными величинами идеалов,

$$(a_{S,T}) = \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}},$$

то  $A$  расщепляется всюду, то есть абсолютно. Тогда  $(a_{S,T})$  становятся трансформационными величинами главных идеалов,

$$(a_{S,T}) = \frac{(d_S)^T (d_T)}{(d_{ST})}.$$

Обратно, всякая всюду расщепляющаяся алгебра удовлетворяет этому условию.

Доказательство основано на известном поведении  $A$  при  $p$ -адическом расширении. Пусть  $k_p$  обозначает  $p$ -адическое расширение  $k$ , соответственно  $K_{\mathfrak{P}} - \mathfrak{P}$ -адическое расширение  $K$ , где  $\mathfrak{P}$  есть простой идеал над  $p$ ; пусть  $A_p$  – расширение  $A$ , полученное переходом от  $k$  к  $k_p$ . Далее пусть  $\mathfrak{Z}$  – группа разложения при  $\mathfrak{P}$ , а  $a_{\mathfrak{Z}}$  – соответствующий срез фактор-системы. Тогда

$$A_p \sim (a_{\mathfrak{Z}}, K_{\mathfrak{P}}/k_p, \mathfrak{Z}).$$

Если  $p$ , в частности, неразветвлено, то есть  $\mathfrak{Z}$  циклична, то речь идет о выделенном представлении  $A_p$  посредством неразветвленного поля инерции  $K_{\mathfrak{P}}/k_p$ .

Нужно показать, что при предположении вспомогательной теоремы 2 алгебра  $A_p$  расщепляется и в этом неразветвленном случае. Для бесконечных мест здесь  $K_{\mathfrak{P}} = k_p$ , следовательно  $A_p$  расщепляется. Для конечного  $p$  сначала следует, что фактор-система  $a_{\mathfrak{Z}}$  ассоциирована с фактор-системой, состоящей из единиц. При переходе к нормированному циклическому представлению в  $A_p = (\alpha, K_{\mathfrak{P}}/k_p, R)$ , где  $R$  – порождающий элемент  $\mathfrak{Z}$ , фактор-система задается соотношениями

$$u_{\mathfrak{P}_i} u_{\mathfrak{P}_j} = u_{\mathfrak{P}_{i+j}} \varepsilon_{\mathfrak{P}_i, \mathfrak{P}_j}$$

Полагая  $u_R = u$ , получаем

$$u^i = u_R^i \varepsilon_R \varepsilon_{R^2} \cdots \varepsilon_{R^{i-1}},$$

и в частности  $u_E = \varepsilon_E$ , если  $E$  есть порядок  $\mathfrak{Z}$ . Так как в неразветвленном расширении  $K_{\mathfrak{P}}/k_p$  все единицы являются нормами, следует, что  $A_p$  расщепляется. Значит,  $A$  расщепляется всюду, а потому по теореме о расщепляющихся алгебрах – абсолютно.

Иными словами: из предположения следует, что  $a_{S,T}$  являются трансформационными величинами из элементов,

$$a_{S,T} = \frac{d_S^T d_T}{d_{ST}}, \quad d_S \in K^*.$$

В ослабленной форме это означает:  $(a_{S,T})$  становятся трансформационными величинами главных идеалов. Если, наоборот,  $A$  всюду расщепляется, то и главные идеалы  $(a_{S,T})$  становятся трансформационными величинами идеалов в каждом месте; и  $A$  действительно расщепляется по другой формулировке предположения теоремы о расщепляющихся алгебрах.

Из двух вспомогательных теорем непосредственно следует доказательство теоремы о главном роде. Пусть  $c_S$  означает некоторый идеал из класса  $c_S$ . По определению индуцированного разбиения на классы предположение говорит, что трансформационные величины  $c_S$  становятся главными идеалами  $(a_{S,T})$ , удовлетворяющими предположениям вспомогательной теоремы 2. Следовательно, существуют главные идеалы  $(d_S)$ , такие что

$$\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

посредством  $(d_S)$  становится единицей. Идеалы  $c_S/(d_S)$ , лежащие в тех же классах  $c_S$ , тем самым удовлетворяют предположению вспомогательной теоремы 1. Значит, существует идеальный класс  $b$

$$c_S = b^{1-S}.$$

Это означает, что классы  $c_S$  являются символическими  $(1 - S)$ -ми степенями класса  $b$ .

В циклическом случае теорема о главном роде переходит в известную теорему, как только главный класс индуцированного разбиения на классы при положенной в основу нормировке переходит в группу тех главных идеалов  $(\alpha)$ , для которых  $\alpha$  во всех разветвленных местах становится норменным вычетом.

(Поступила 27. 10. 1932.)

## 42. Расщепляющиеся скрещенные произведения и их максимальные порядки

*Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15*

В простейшем случае расщепляющихся скрещенных произведений,<sup>1</sup> то есть тех, которые дают расщепляющиеся алгебры и потому имеют фактор-системы, ассоциированные с единицей, соотношения можно проследить в значительной мере явно. Это остается верным и для негалуаовых полей расщепления, то есть максимальных коммутативных подполей. Относящиеся сюда простые алгебраические факты развиваются в §1. В §2, при алгебраическом числовом поле в качестве основного поля, я даю явные представления всех максимальных порядков и их идеалов посредством модулей и комплементарных модулей лежащего в основе поля расщепления  $k$ .<sup>2</sup>

Далее я даю разбиение на области: в одну область помещаются все такие максимальные порядки, которые имеют одно и то же пересечение с  $k$ . Тем самым области взаимно однозначно соответствуют порядкам из  $k$ ; главному порядку соответствует главная область. Максимальные порядки одной области преобразуются друг в друга идеалами, образованными из модулей соответствующего порядка; в частности, в главной области речь идет о расширениях идеалов из  $k$ . В §3 я перехожу к произвольным простым алгебрам. Уточнив разбиение на области так, что должны совпадать не только пересечение, но и  $p$ -адические компоненты максимальных порядков в местах ветвления, можно перенести теоремы, полученные в расщепляющемся случае. В частности, и тогда максимальные порядки главной области переходят друг в друга преобразованием с помощью расширений идеалов из  $k$ .

Теоремы о главной области имеются у Chevalley и Hasse;<sup>3</sup> Chevalley также показывает, что без уточненного разбиения, относящегося к местам ветвления, теоремы вообще уже не выполняются.

### §I. Матричные единицы расщепляющихся скрещенных произведений и комплементарные базы полей расщепления

В этом параграфе  $\Omega$  обозначает произвольное основное поле. Пусть  $k/\Omega$  – галуаово сепарабельное расширение  $n$ -й степени,  $\mathfrak{G}$  – группа Галуа с элементами  $S, T, \dots$ , а  $u_S, u_T, \dots$  – соответствующие операторы. Рассматриваются скрещенные произведения с фактор-системой единица, то есть расщепляющиеся алгебры

$$K = \mathfrak{G} \times k = u_{S_1} k + \dots + u_{S_n} k, \quad u_S u_T = u_{ST},$$

с

$$zu_S = u_S z^S \quad (z \in k).$$

Полагая

$$E_{\mathfrak{G}} = \sum_{S \in \mathfrak{G}} u_S,$$

из фактор-системы единица получаем соотношения

$$E_{\mathfrak{G}} u_S = u_S E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}}, \quad (1)$$

$$z E_{\mathfrak{G}} = \sum_S u_S z^S, \quad (2a)$$

<sup>1</sup>Теория скрещенных произведений, в связи с одной моей лекцией, изложена в разд. II работы Н. Hasse, *Theory of cyclic algebras over an algebraic number field*, Trans. Amer. Math. Soc. 34 (1932). Здесь я использую только первые основные понятия. Основания Брандта у Гассе и в последующих рамках обоснованы заново.

<sup>2</sup>Эти представления были мне давно известны; толчок к последующим рассуждениям дало сообщение одной теоремы Н. Hasse.

<sup>3</sup>С. Chevalley, *Sur certains idéaux d'une algèbre simple*, Abh. Math. Sem. Hamburg, 1934; Н. Hasse, *Über gewisse Ideale in einer einfachen Algebra*, работа, предшествующая настоящей.



и

$$E_{\mathfrak{G}} z E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} \sum_S u_S z^S = E_{\mathfrak{G}} \operatorname{Sp}(z), \quad (2b)$$

где  $\operatorname{Sp}(z)$  означает след  $z$  как элемента  $k/\Omega$ .

**Теорема.** Если  $a_1, \dots, a_n$  – база  $k/\Omega$ , а  $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$  – комплементарная к ней база, то

$$c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$$

задает систему матричных единиц в  $K$ . Алгебра  $K$  представляется как произведение модулей в форме

$$K = k E_{\mathfrak{G}} k = k \left( \sum_S u_S \right) k = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \Omega.$$

Действительно, по (2b) получаем

$$c_{ij} c_{hk} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_j \bar{a}_h E_{\mathfrak{G}} a_k = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k \operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h) = c_{ik} \operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h).$$

Это как раз свойство матричных единиц, ввиду определяющих равенств

$$\operatorname{Sp}(a_j \bar{a}_h) = \delta_{jh}$$

для комплементарных баз.

**Замечание 1.** Если  $Z$  – какое-либо коммутативное поле расширения поля  $\Omega$ , то все сохраняется, когда  $a_i$  означает базу  $k_Z/Z$ , а  $K_Z$  становится прямой суммой полей. Подстановки группы тогда определяются тем, что на  $Z$  они индуцируют тождество.

**Замечание 2.** То, что  $K = k E_{\mathfrak{G}} k$ , следует также непосредственно из того, что правая часть является ненулевым идеалом простой системы  $K$ .

Пусть теперь  $\Omega$  имеет характеристику нуль. Представление  $K = k E_{\mathfrak{G}} k$  расщепляющейся алгебры остается верным и тогда, когда  $k$  является негалуаовым полем расщепления для  $K/\Omega$ . Переходим к галуаову полю расщепления  $\bar{k}$ . Пусть  $\bar{k}$  – галуаово поле, соответствующее  $k$ ,  $\bar{\mathfrak{G}}$  – его группа,  $\bar{u}_S$  – соответствующие операторы, а  $\bar{K} = \bar{k} E_{\bar{\mathfrak{G}}} \bar{k}$  – расщепляющееся скрещенное произведение. Подполе  $k$  соответствует подгруппе  $\mathfrak{H}$  порядка  $h$ . Положим

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H} S_1 + \dots + \mathfrak{H} S_n = S_1^{-1} \mathfrak{H} + \dots + S_n^{-1} \mathfrak{H}, \quad E_{\mathfrak{H}} = \frac{1}{h} \sum_{H \in \mathfrak{H}} u_H,$$

и

$$E_{\mathfrak{G}} = \frac{1}{h} E_{\bar{\mathfrak{G}}} = \sum_i u_{S_i}, \quad u_{S_i} = E_{\mathfrak{H}} \bar{u}_{S_i}.$$

Тогда, в частности, идемпотент  $E_{\mathfrak{H}}$  порождает единичное представление  $\mathfrak{H}$ , а  $E_{\mathfrak{G}}$ , как и  $E_{\bar{\mathfrak{G}}}$ , порождает единичное представление  $\bar{\mathfrak{G}}$ . Для так определенных  $E_{\mathfrak{G}}$  и  $u_{S_i}$  соотношение (1) выполняется с одной стороны, а (2) – полностью. Именно, прежде всего

$$E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} = E_{\mathfrak{H}} E_{\mathfrak{G}} E_{\mathfrak{H}}, \quad (3)$$

$$z E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}} z, \quad (4)$$

и потому

$$z u_{S_i} = u_{S_i} z^{S_i}. \quad (5)$$

Из (5) суммированием следует (2a), затем (2b), а (1) следует с одной стороны:

$$E_{\mathfrak{G}} u_{S_i} = E_{\mathfrak{G}}.$$

Доказательство  $K = kE_{\mathfrak{G}}k$  теперь проходит точно так же, как выше. Как полное матричное кольцо над  $\Omega$ ,  $K$  содержит каждое поле  $n$ -й степени как подполе, следовательно, в частности, и  $k$ .

В связи с §3 заметим еще, что переход от  $K$  к  $\bar{K}$  возможен и тогда, когда  $K$  не расщепляется. Помимо  $k$ , поле  $\bar{k}$  тогда также является полем расщепления, следовательно  $K$  подобна  $\bar{K}$ , скрещенному произведению  $\bar{\mathfrak{G}}$  с  $\bar{k}$ . При этом, поскольку  $k$  является полем расщепления, подгруппе  $\mathfrak{H}$ , соответствующей  $k$ , соответствует фактор-система единица; значит, идемпотент  $E_{\mathfrak{H}}$  определен как выше. Отсюда в обратную сторону получается, что  $K$  изоморфна  $E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$ . Эта алгебра изоморфна кольцу автоморфизмов левого идеала  $\bar{K}E_{\mathfrak{H}}$ , а значит подобна  $\bar{K}$ ; ранг совпадает с рангом  $K$ . В расщепляющемся случае получаем

$$E_{\mathfrak{H}}\bar{K}E_{\mathfrak{H}} = E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\bar{\mathfrak{G}}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}} = (E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}})E_{\bar{\mathfrak{G}}}(E_{\mathfrak{H}}\bar{k}E_{\mathfrak{H}}) = kE_{\mathfrak{G}}k.$$

## §II. Максимальные порядки расщепляющихся скрещенных произведений и их разбиение на области

С этого момента пусть  $\Omega$  – конечное алгебраическое числовое поле,  $K$  – расщепляющаяся алгебра  $n$ -й степени над  $\Omega$ , а  $k$  – галуаово или негалуаово максимальное коммутативное подполе, так что  $K = kE_{\mathfrak{G}}k$ . Пусть  $a, \bar{a}$  обозначают пару комплементарных конечных  $\mathfrak{o}$ -модулей из  $k$ , где  $\mathfrak{o}$  – главный порядок поля  $\Omega$ , а  $\mathfrak{o}$  – главный порядок поля  $k$ . Структура максимальных порядков в  $K$  относительно  $k$  описывается следующими теоремами.

**Теорема 1.** Произведение модулей

$$\mathcal{O}_a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a$$

является максимальным порядком в  $K$ ; в частности,

$$\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\mathfrak{o}} = \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o}$$

является максимальным порядком.

**Теорема 2.** Преобразование  $\mathcal{O}$  в  $\mathcal{O}_a$  осуществляется левым идеалом

$$\mathcal{L} = \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}a$$

и взаимно обратным ему правым идеалом

$$\mathcal{R} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o}$$

относительно  $\mathcal{O}$ .

**Замечание.** Совпадение двух комплементарных модулей  $a, \bar{a}$  в произведении  $\mathcal{L}\mathcal{R}$  как раз благодаря образованию следа, вызванному  $E_{\mathfrak{G}}$ , приводит к взаимно обратному соотношению.

**Теорема 3.** Все левые и правые идеалы относительно  $\mathcal{O}$  исчерпываются указанными в теореме 2. Следовательно, максимальные порядки  $\mathcal{O}_a$  исчерпывают все максимальные порядки в  $K$ . Любые два максимальных порядка  $\mathcal{O}_a$  и  $\mathcal{O}_b$  переходят друг в друга преобразованием с помощью

$$\mathcal{L}_{ab} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}b, \quad \mathcal{R}_{ba} = \bar{b}E_{\mathfrak{G}}a$$

и эти  $\mathcal{L}_{ab}$  и  $\mathcal{R}_{ba}$  исчерпывают левые и правые идеалы относительно  $\mathcal{O}_a$ .

**Теорема 4.** Когда  $\mathcal{O}_a$  пробегает все максимальные порядки в  $K$ , пересечение

$$[\mathcal{O}_a, k]$$

пробегает все порядки в  $k$ ; это пересечение каждый раз равно порядку модуля  $a$ . Если объединить все максимальные порядки, принадлежащие одному и тому же порядку в  $k$ , в одну область, то преобразование внутри области осуществляется левыми идеалами  $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}b$  относительно  $\mathcal{O}_a$  и взаимно обратными правыми идеалами, где  $a$  и  $b$  являются модулями соответствующего порядка в  $k$ .

**Теорема 4а.** В частности, преобразование максимальных порядков главной области, то есть области всех максимальных порядков, содержащих главный порядок  $\mathfrak{o}$  поля  $k$ , осуществляется идеалами

$$aE_{\mathfrak{G}}b,$$

где  $a$  и  $b$  – идеалы из  $k$ . Иными словами: если  $\mathcal{L}$  – левый идеал максимального порядка главной области и  $\mathfrak{o}$  содержится в правом порядке  $\mathcal{L}$ , то  $\mathcal{L}$  является расширением  $\mathfrak{o}$ -идеала.

Доказательства основаны на переходе к отдельным местам. Достаточно каждый раз переходить к кольцу частных при  $p$ , где  $p$  пробегает все простые идеалы из  $\Omega$ . Если  $\mathcal{C}$  – произвольный  $\mathfrak{o}$ -модуль в  $K$ , то его компонентой  $\mathcal{C}_p$  будем называть расширенный модуль  $\mathcal{C}\mathfrak{o}_p$ . Тогда:

**Лемма.**  $\mathcal{C}$  является пересечением всех расширенных модулей  $\mathcal{C}_p$ . Действительно, если  $w \in \mathcal{C}_p$ , то существует не делящийся на  $p$  элемент  $\sigma \in \mathfrak{o}$ , такой что  $\sigma w \in \mathcal{C}$ . Если же  $w$  лежит в пересечении всех  $\mathcal{C}_p$ , и  $g$  обозначает идеал всех  $\sigma \in \mathfrak{o}$  с  $\sigma w \in \mathcal{C}$ , то  $g$  не может делиться ни на какой  $p$ ; следовательно,  $g = \mathfrak{o}$ . Лемма не предполагает максимального ранга модуля.

**Следствия.** Каждый модуль определяется своими компонентами. Если  $\mathcal{D}$  – собственный надмодуль  $\mathcal{C}$ , то по меньшей мере один  $\mathcal{D}_p$  является собственным надмодулем  $\mathcal{C}_p$ . В частности, если  $\mathcal{M}$  – порядок в  $K$ , а все его компоненты  $\mathcal{M}_p$  являются максимальными порядками над  $\mathfrak{o}_p$ , то  $\mathcal{M}$  тоже является максимальным порядком.

**Доказательство теоремы 1.**  $\mathcal{O}_a$  является порядком, поскольку  $\mathcal{O}_a$  – конечный  $\mathfrak{o}$ -модуль максимального ранга. Далее

$$\mathcal{O}_a^2 = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a \operatorname{Sp}(a\bar{a}) \subseteq \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a.$$

Чтобы показать максимальность, по следствию достаточно показать максимальность каждой компоненты. Так как  $\mathfrak{o}_p$  – кольцо главных идеалов,  $a_p$  и  $\bar{a}_p$  имеют независимые комплементарные базы  $a_1, \dots, a_n$  и  $\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n$ . Произведения  $\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$  по §1 образуют матричные единицы; значит,

$$\mathcal{O}_{a,p} = \sum_{i,k} (\bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k) \mathfrak{o}_p$$

максимален. Так как  $\mathcal{O}_a$  максимален, отсюда также следует  $\operatorname{Sp}(a\bar{a}) = \mathfrak{o}$ .

**Доказательство теоремы 2.** Из правила следа следует:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}\mathcal{L} &= \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}a = \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{L}, \\ \mathcal{R}\mathcal{O} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} = \mathcal{R}, \\ \mathcal{L}\mathcal{R} &= \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}a \bar{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} = \mathcal{O}, \\ \mathcal{R}\mathcal{L} &= \bar{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o} \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}a = \bar{a}E_{\mathfrak{G}}a = \mathcal{O}_a. \end{aligned}$$

**Доказательство теоремы 3.** Пусть  $\mathcal{L}$  – левый идеал относительно  $\mathcal{O}$ . Тогда, в частности,

$$\mathcal{L} = \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}\mathcal{L} = (\mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}l_1, \dots, \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}l_n)$$

с  $l_1, \dots, l_n$ , образующими  $\mathfrak{o}$ -базу  $\mathcal{L}$ . Полагая  $l_\mu = \sum_i u_{S_i} z_{i\mu}$ , получаем  $E_{\mathfrak{G}}l_\mu = E_{\mathfrak{G}}a_\mu$ , значит  $\mathcal{L} = \mathfrak{o}E_{\mathfrak{G}}a$ . Для регулярного  $\mathcal{L}$  модуль  $a$  должен иметь максимальный ранг  $n$ ; тогда  $\bar{a}E_{\mathfrak{G}}\mathfrak{o}$  является взаимно обратным правым идеалом. Общее утверждение следует композицией.

**Доказательство теоремы 4.** Пересечение  $t = [k, \mathcal{O}_a]$  является порядком. Как подмножество  $\mathcal{O}_a$ , оно является областью правых мультипликаторов и является наибольшим порядком из  $\mathcal{O}$ , удовлетворяющим этому условию; поэтому оно наверняка содержит порядок  $\mathcal{O}_a$  модуля  $a$ . Чтобы показать  $t = \mathcal{O}_a$ , достаточно равенства компонент. Если  $\tau \in t_p$ , то  $\tau c_{ik}$  для каждого  $c_{ik} = \bar{a}_i E_{\mathfrak{G}} a_k$  является линейной комбинацией  $c_{ij}$  с коэффициентами из  $\mathfrak{o}_p$ . С другой стороны,  $a_k \tau$  является линейной комбинацией  $a_j$  с коэффициентами из  $\mathfrak{o}_p$ . В силу единственности представления через  $c_{ij}$  эти коэффициенты должны лежать в  $\mathfrak{o}_p$ ; следовательно,  $\tau$  лежит в порядке модуля  $a_p$ . Тем самым  $t$  равен порядку  $a$ .

**Доказательство теоремы 4а.** Это специализация теоремы 4 на главную область. Если сначала  $\mathcal{O} = \mathcal{O} E_{\mathfrak{G}} \mathcal{O}$ , а  $\mathcal{O}$  также содержится в правом порядке  $\mathcal{L} = \mathcal{O} E_{\mathfrak{G}} a$ , то  $\bar{a} E_{\mathfrak{G}} a$  принадлежит главной области; значит,  $a$  является идеалом из  $k$ , и  $\mathcal{L} = \mathcal{O} a$ . Если исходить из  $\mathcal{O}_a$ , то соответственно  $\mathcal{L} = \bar{a} E_{\mathfrak{G}} b$ , а  $a^{-1}b$  является идеалом из  $k$ ; получается  $\mathcal{L} = \mathcal{O}_a a^{-1}b$ .

### §III. Максимальные порядки произвольных скрещенных произведений

Теоремы, выведенные для расщепляющихся скрещенных произведений, остаются в силе и в общем случае, как только разбиение на области уточняется. Факты о главной области тогда выполняются точно; остальные должны формулироваться как утверждения об отдельных местах. При этом место теперь следует понимать как  $p$ -адическое расширение.

**Определение.** Пусть  $K$  – простая нормальная алгебра над  $\Omega$ , а  $k$  – максимальное коммутативное подполе. В область относительно  $k$  зачисляются все максимальные порядки из  $K$ , которые имеют одно и то же пересечение с  $k$  и, кроме того, имеют одинаковые  $p$ -адические компоненты в местах ветвления  $K$ . Если пересечение с  $k$  есть главный порядок, то речь идет о главной области.

Для главных областей тогда:

**Теорема 1.** Максимальные порядки одной главной области переходят друг в друга преобразованием с помощью расширенных идеалов идеалов из  $k$ . Иными словами: левые идеалы максимальных порядков главной области, взаимно простые с дифферентой и содержащие  $\mathcal{O}$  в своем правом порядке, являются расширениями идеалов из  $k$ .

**Теорема 2.** Если  $K$  имеет простую степень, то существует только одна главная область; она переходит в себя под действием расширенных идеалов  $k$ -идеалов. Соответствующие идеалы фиксированного максимального порядка  $\mathcal{O}$  – это идеалы из  $k$ , расширенные двусторонними идеалами из  $\mathcal{O}$ .

**Доказательство.** Два максимальных порядка одной главной области отличаются лишь в конечном числе мест; по определению это места, в которых  $K$  расщепляется. Здесь же  $K$  имеет форму, рассмотренную в §§1–2. Это ясно, если  $k$  галуаово; если фактор-система ассоциирована с единицей, ее можно заменить системой единиц. По §1 это верно и в негалуаовом случае. Следовательно, в каждом таком месте и тем самым вообще речь идет о расширенных идеалах.

Если  $K$  имеет простую степень, то она либо расщепляется, либо является алгеброй с делением. Во втором случае она остается алгеброй с делением во всех местах ветвления и поэтому имеет только одну главную область, так что снова действует преобразование расширенными идеалами. Самое общее преобразование получается композицией расширенных идеалов с идеалами, которые преобразуют максимальный порядок в себя, то есть с двусторонними идеалами; как известно, от центральных идеалов они отличаются только в местах ветвления, следовательно, только расширенными идеалами.

Далее:

**Теорема 3.** Максимальные порядки произвольной области переходят друг в друга идеалами, взаимно простыми с дифферентой, которые в каждом месте составлены из модулей соответствующего порядка так, как указано в §2, теорема 3. Компоненты этих модулей при фиксированном идеале отличаются от порядка только в конечном числе мест.

Это непосредственно следует из §2; надо лишь учесть, что операторы  $u_S$  в отдельных местах должны быть заменены соответствующими эквивалентными операторами.

Вопрос о том, существуют ли и здесь для каждого порядка из  $k$  максимальные порядки, имеющие этот порядок пересечением, требует более подробного исследования в местах ветвления. Главная область всегда существует, как видно из скрещенного, возможно обобщенного, произведенного представления: оно приводит к порядку, содержащему  $o$ , как только фактор-системы взяты целыми.

Следующий вопрос состоит в том, в какой мере можно арифметическим разбиением на области характеризовать алгебраические поля расщепления. Иными словами: всегда ли различные поля расщепления порождают различные разбиения на области, или уже различные главные области? И исчерпывают ли, быть может, главные области всех полей расщепления всю совокупность максимальных порядков?

Что такая характеристика посредством одного-единственного максимального порядка заведомо невозможна, показывают простейшие примеры. Так, максимальный порядок

$$\left[ 1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2} \right]$$

кватернионного тела содержит, кроме главного порядка  $[1, i]$ , также главный порядок

$$\left[ 1, \frac{1+i+j+k}{2} \right]$$

поля третьих корней из единицы.

Göttingen, август 1932.

## 43. Дифференцирование идеалов и дифферента

*Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21*

### Введение

Главная теорема теории ветвления алгебраического числового поля, как известно, утверждает, что дифферента, то есть идеал ветвления, делится по крайней мере на  $(e - 1)$ -ю степень простого идеала, входящего в простое число  $p$  в  $e$ -й степени; ровно на  $(e - 1)$ -ю степень, если  $e$  не делится на  $p$ , и на более высокую степень, если  $e$  делится на  $p$ .

Эта теорема является аналогом того факта, что дифференциальное частное  $f'(x)$  многочлена  $f(x)$  делится по крайней мере на  $(e - 1)$ -ю степень линейного множителя, входящего в  $f(x)$  в  $e$ -й степени; ровно на  $(e - 1)$ -ю степень, если  $e$  не делится на характеристику области коэффициентов, и на более высокую степень, если  $e$  делится на эту характеристику.

Ниже я показываю, что здесь речь идет о большем, чем формальная аналогия. Дифференту можно понимать как дифференциальное частное определяющего идеала числового поля  $K$  в соответствующей целочисленной области многочленов от  $x_1, \dots, x_n$ , причем дифференциальное частное берется в точке  $x = \omega$ , то есть при  $x_1 = \omega_1, \dots, x_n = \omega_n$ , где  $\omega_1, \dots, \omega_n$  означает модульный базис системы целых чисел из  $K$ , главного порядка  $\mathfrak{o}$ . При этом определяющий идеал  $\mathfrak{M}$  соответствует совокупности соотношений между  $\omega_i$ , то есть состоит из всех целочисленных многочленов  $f(x)$ , для которых  $f(\omega)$  обращается в нуль. Дифференциальное частное  $\mathfrak{M}'[x \rightarrow \omega]$  определяется как разностное частное, взятое в точке  $x = \omega$ .

Именно, вследствие  $f(\omega) = 0$ , будем рассматривать идеал  $\mathfrak{M}$  как состоящий из всех разностей  $f(x) - f(\omega)$ . Далее образуем разностный идеал

$$\mathfrak{B} = (x_1 - \omega_1, \dots, x_n - \omega_n)$$

и разностное частное

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M} : \mathfrak{B},$$

где взятие частного означает обычное частное идеалов, взятое в области многочленов от  $x$  с целыми числами из  $K$ , то есть числами из  $\mathfrak{o}$ , в качестве коэффициентов. Тогда дифферента  $\mathfrak{D}$  определяется формулой

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \omega].$$

Расширение области коэффициентов необходимо уже для того, чтобы разностный идеал и разностное частное вообще были определены. Тем самым это прямое обобщение дифференциального частного многочлена от одной переменной,

$$f'(\xi) = \left. \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \right|_{x=\xi},$$

где и здесь область многочленов должна быть расширена присоединением  $\xi$ , чтобы разности были определены. В самом деле, идеальное дифференциальное частное переходит в многочленное дифференциальное частное, как только базис  $\omega_i$  состоит из степеней одного элемента.

Данное здесь определение дифферента непосредственно примыкает к известным фактам. Однако оно вводит неинвариантные промежуточные объекты, поскольку идеал  $\mathfrak{M}$  зависит от выбранного базиса. Равносильное, полностью инвариантное определение получается, если вместо целочисленной области многочленов ввести кольцо  $\mathfrak{O}$ , изоморфное главному порядку  $\mathfrak{o}$ , которое становится изоморфным кольцу классов вычетов по  $\mathfrak{M}$ , и расширить его область коэффициентов посредством  $\mathfrak{o}$  до  $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ . Здесь разностный идеал выводится из всех разностей  $(x - \xi)$ , где  $x$  и  $\xi$  соответствуют друг другу по изоморфизму от  $\mathfrak{O}$  к  $\mathfrak{o}$ ; разностное частное становится частным нулевого идеала по  $\mathfrak{B}$ ; дифферента получается из  $\mathfrak{A}$ , когда каждый раз  $x$  заменяется изоморфным ему  $\xi$ .

Это инвариантное определение ниже ставится в начало. Так непосредственно определяется дифферента произвольного коммутативного кольца относительно подкольца, причем должны

выполняться лишь некоторые предпосылки, касающиеся возможности расширения коэффициентов. Например, это всегда имеет место при существовании модульного базиса, возможно после перехода к подходящим кольцам частных. Тем самым, в частности, определяется и дифферента произвольного порядка числового поля, а также дифферента кольца классов вычетов порядка по степени простого числа, относительная дифферента и дифферента для алгебраических функций от нескольких переменных.

Совпадение дифференциального определения дифференты с обычным следует из точного структурного исследования галуаова кольца расширения, сопоставленного числовому полю посредством прямого произведения. Это исследование основано на разложении в прямую сумму. В специальном случае кольца классов вычетов по многочлену от одной переменной оно сводится к анализу интерполяционной формулы Лагранжа.

Точнее, вводится кольцо  $\mathfrak{K}$ , изоморфное числовому полю  $K$  и содержащее  $\mathfrak{o}$ ; его область коэффициентов, поле рациональных чисел, расширяется галуаовым полем  $F$  поля  $K$ . Эта расширенная система  $\mathfrak{K}_F$  становится прямой суммой  $n$  простых компонент, соответствующих  $n$  изоморфизмам  $K$ . Эти компоненты являются расширениями разностного частного и его сопряженных; одновременно нулевой идеал  $\mathfrak{K}_F$  является пересечением  $n$  идеалов, выведенных из разностного идеала и его сопряженных. Простые компоненты имеют вид  $Fe^{(i)}$ , где  $e^{(i)}$  означают компоненты единицы. Поскольку при  $x = \xi$  элемент  $e^{(i)}$  переходит в единицу, разностное частное становится равным  $\partial e^{(i)}$ , где под  $\partial$  понимается дифферента  $\mathfrak{o}$ . Дифферента  $\partial$  состоит из всех элементов поля, которые после умножения на  $e$  лежат в прямом произведении порядка с самим собой. То же справедливо для сопряженных.

Чтобы отсюда получить определение через дополнительный модуль, надо заметить, что  $e^{(i)}$  становится линейной формой в базисе  $x_1, \dots, x_n$ , соответствующем  $\omega$ ; коэффициенты при  $x$  в  $e^{(i)}$  как раз дают базис дополнительного модуля  $\mathfrak{o}$  и его сопряженных. Из того, что разностное частное имеет коэффициенты из  $\mathfrak{o}$ , сразу следует, что дифферента равна частному  $\mathfrak{o}$  по его дополнительному модулю; так получается дедекиндово определение. Рассуждения не ограничены главным порядком; они характеризуют дифференту каждого порядка как частное порядка по его дополнительному модулю.

В случае главного порядка совпадение дифференциального определения с определением через фундаментальное уравнение следует из указанного выше факта: идеальное дифференциальное частное переходит в многочленное дифференциальное частное, как только базис состоит из степеней одного элемента, фундаментальной формы. Тем самым задана и понятийная связь этого определения с дедекиндовым определением.

Если исходить из фундаментального уравнения, как известно, непосредственно следует главная теорема, упомянутая в начале. К точному определению показателей приводит рассмотрение дифференты  $\partial[p^t]$  кольца классов вычетов главного порядка по  $p^t$  при достаточно большом  $t$ ; достаточно  $t = n$ , что для полей второй степени также необходимо. Существенно, что дифферента  $\partial$ , рассматриваемая modulo  $p^t$ , точно переходит в  $\partial[p^t]$ . Тогда можно ограничиться кольцом классов вычетов по  $p^t$ . Оно изоморфно кольцу классов вычетов по многочлену от одной переменной с коэффициентами modulo  $p^t$ ; дифференцирование этого многочлена дает, как другим путем показал О. Оге, точный обзор возможных показателей при помощи дополнительных чисел.

Наконец, структурное исследование дает также известную теорему: дифферента надполя над  $K$  равна произведению относительной дифференты на дифференту  $K$ . Это следует из того, что то же мультипликативное свойство выполняется для единиц разложения в прямую сумму, а значит и для дополнительных модулей. Соответствующие факты справедливы и для относительных дифферент при переходе к кольцам частных, а также для алгебраических функциональных полей с полем коэффициентов характеристики нуль. При характеристике  $p$  и при целых алгебраических функциях структурные свойства, правда, сохраняются; но теория ветвления меняется из-за появления несепабельных полей расширения.

## §1. Расширение области коэффициентов кольца, или образование прямого произведения. Определяющий идеал

В этом параграфе рассматриваются общие кольца; коммутативность умножения не предполагается. Однако, если явно не указано обратное, предполагается существование единичного элемента.

**1. Определение прямого произведения.** Кольцо  $\mathfrak{D} \times_{\mathfrak{h}} \mathfrak{o}$ , или короче  $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$ , называется прямым произведением колец  $\mathfrak{D}$  и  $\mathfrak{o}$  относительно  $\mathfrak{h}$ , или кольцом, полученным из  $\mathfrak{D}$  расширением области коэффициентов  $\mathfrak{h}$  до  $\mathfrak{o}$ , если выполнены следующие условия:

1.  $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$  содержит  $\mathfrak{D}$  и  $\mathfrak{o}$  как подкольца и является произведением этих колец.
2. Пересечение  $\mathfrak{D}$  и  $\mathfrak{o}$  равно  $\mathfrak{h}$ ; при этом  $\mathfrak{h}$  содержит единичный элемент.
3.  $\mathfrak{D}$  и  $\mathfrak{o}$  поэлементно перестановочны. Поэтому  $\mathfrak{D}_{\mathfrak{o}}$  состоит из билинейных сочетаний

$$x_1 y_1 + \cdots + x_m y_m,$$

где  $x_i \in \mathfrak{D}$ ,  $y_i \in \mathfrak{o}$ .

4. Два элемента равны тогда и только тогда, когда они становятся формально равными вследствие соотношений в  $\mathfrak{D}$ , с одной стороны, и в  $\mathfrak{o}$ , с другой. Поэтому соотношение

$$\sum_i x_i y_i = 0$$

должно сводиться к соотношениям в обоих множителях путем добавления формально исчезающих сочетаний вида  $(yh)\delta - y(h\delta)$ .

Этими требованиями равенство, сложение и умножение однозначно определяются через соответствующие операции в множителях. Если  $\mathfrak{D}$ ,  $\mathfrak{o}$  и их пересечение изоморфны соответствующим кольцам, то и прямое произведение изоморфно. Каждое кольцо, являющееся произведением  $\mathfrak{D}$  и  $\mathfrak{o}$  и в котором они поэлементно перестановочны, является гомоморфным образом прямого произведения.

**2. Условие существования.** Если  $\mathfrak{D}$  и  $\mathfrak{o}$  являются кольцами с общим центральным подкольцом  $\mathfrak{h}$ , прямое произведение может не существовать. Например, пусть  $\mathfrak{h} = \mathbb{Z}$ ,  $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[x]$  с соотношением  $1 - 2x = 0$ , а  $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$  с соотношением  $1 - 2y = 0$ . Общего объемлющего кольца с пересечением  $\mathfrak{h}$  существовать не может, ибо в нем было бы

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x.$$

Необходимое и достаточное условие существования прямого произведения таково: должно существовать хотя бы одно кольцо  $R$ , объемлющее  $\mathfrak{D}$  и  $\mathfrak{o}$ , в котором их пересечение есть  $\mathfrak{h}$  и в котором они поэлементно перестановочны. Если прямое произведение существует, оно само является таким кольцом. Обратно, прямое произведение строится как совокупность формальных билинейных сочетаний с равенством, сложением и умножением, заданными в пункте 1. Кольцо вложения  $R$  тогда обеспечивает условие пересечения.

**3. Определяющий идеал.** Система  $S$  элементов  $z$  из  $\mathfrak{D}$  называется системой образующих  $\mathfrak{D}$  относительно  $\mathfrak{h}$ , если  $\mathfrak{D} = \mathfrak{h}[S]$ . Если  $\mathfrak{h}$  лежит в центре  $\mathfrak{D}$ , то  $\mathfrak{D}$  становится гомоморфным образом некоммутативной области многочленов  $\mathfrak{h}\{Z\}$ , где переменные  $Z$  соответствуют системе  $S$ . Имеем

$$\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M},$$

где  $\mathfrak{M}$  состоит из всех многочленов  $F(Z)$ , для которых  $F(z) = 0$  в  $\mathfrak{D}$ . Этот двусторонний идеал  $\mathfrak{M}$  называется определяющим идеалом. Если  $S$  состоит из одного элемента  $z$  и  $\mathfrak{M}$  является главным идеалом, то базисный многочлен  $G(Z)$  с  $G(z) = 0$  называется определяющим уравнением.



**4. Определяющий идеал прямого произведения.** Пусть  $\mathfrak{D} \simeq \mathfrak{h}\{Z\}/\mathfrak{M}$ . Наряду с  $\mathfrak{h}\{Z\}$  рассмотрим  $\mathfrak{o}\{Z\}$ . Идеал расширения  $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$  состоит из линейных сочетаний элементов  $\mathfrak{M}$  с коэффициентами из  $\mathfrak{o}$ . Если прямое произведение  $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$  существует, то

$$\mathfrak{D}_\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}\{Z\}/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}.$$

Следовательно, соотношения в прямом произведении суть ровно соотношения, возникающие из  $\mathfrak{M}$  расширением коэффициентов.

## §2. Кольца с независимым модульным базисом. Построение прямого произведения

**1. Построение.** Система  $T$  элементов  $t$  из  $\mathfrak{D}$  называется  $\mathfrak{h}$ -модульным базисом  $\mathfrak{D}$ , если  $\mathfrak{D}$  состоит из всех линейных сочетаний

$$h_1 t_1 + \cdots + h_m t_m, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Модульный базис называется независимым, если из  $\sum h_i t_i = 0$  всегда следует, что все  $h_i = 0$ . Если  $\mathfrak{D}$  обладает независимым модульным базисом, содержащим единичный элемент, то прямое произведение  $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$  существует для каждого кольца расширения  $\mathfrak{o}$  кольца  $\mathfrak{h}$ , чье теоретико-множественное пересечение с  $\mathfrak{D}$  равно  $\mathfrak{h}$  и элементы которого перестановочны с  $\mathfrak{D}$ . За элементы берутся все линейные сочетания

$$y_1 t_1 + \cdots + y_m t_m, \quad y_i \in \mathfrak{o},$$

с равенством коэффициентов в базисе  $T$ . Тем самым построено кольцо вложения; оно одновременно является прямым произведением. Базис  $T$  при этом становится  $\mathfrak{o}$ -базисом  $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ .

**2. Модули расширения и сужения.** Если  $\mathfrak{B}$  является  $\mathfrak{h}$ -модулем в  $\mathfrak{D}$ , то  $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$  обозначает порожденный им  $\mathfrak{o}$ -модуль в  $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ . Если  $\mathfrak{C}$  является  $\mathfrak{o}$ -модулем в  $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$ , то его модуль сужения  $[\mathfrak{C}, \mathfrak{D}]$  есть пересечение с  $\mathfrak{D}$ . Если  $\mathfrak{B}$  имеет независимый  $\mathfrak{h}$ -модульный базис, дополняемый до независимого  $\mathfrak{h}$ -модульного базиса  $\mathfrak{D}$ , то  $\mathfrak{B}$  является модулем сужения своего расширения:

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{B}_\mathfrak{o}, \mathfrak{D}].$$

Доказательство есть непосредственное сравнение коэффициентов в продолженном базисе.

**3. Достаточный критерий.** Если существует кольцо расширения  $\mathfrak{f}$  кольца  $\mathfrak{h}$ , такое что прямые произведения  $\mathfrak{D}_\mathfrak{f}$  и  $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$  относительно  $\mathfrak{h}$ , а затем и  $\mathfrak{D}_\mathfrak{f} \times_\mathfrak{f} \mathfrak{o}_\mathfrak{f}$  существуют, то существует  $\mathfrak{D} \times_\mathfrak{h} \mathfrak{o}$ . Ведь последнее прямое произведение дает кольцо вложения, и

$$[\mathfrak{D}, \mathfrak{o}] \subseteq [\mathfrak{D}_\mathfrak{f}, \mathfrak{o}_\mathfrak{f}] = \mathfrak{f}, \quad [\mathfrak{D}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}.$$

## §3. Дифферента кольца относительно подкольца. Дифференциальное частное определяющего идеала

С этого места все рассматриваемые кольца коммутативны. Кроме того, кольца  $\mathfrak{D}$  и  $\mathfrak{o}$  являются изоморфными, а именно эквивалентными, расширениями подкольца  $\mathfrak{h}$ , и предполагается прямое произведение  $\mathfrak{D}_\mathfrak{o}$  относительно  $\mathfrak{h}$ .

**1. Определение дифференты.** Пусть  $x$  пробегает все элементы  $\mathfrak{D}$ , а  $\xi$  каждый раз обозначает изоморфно соответствующий ему элемент из  $\mathfrak{o}$ . Идеал, порожденный всеми разностями  $x - \xi$ ,

$$\mathfrak{B} = \{\dots, x - \xi, \dots\}$$

называется разностным идеалом. Разностное частное есть частное нулевого идеала по  $\mathfrak{B}$ :

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}.$$

Дифферента  $\mathfrak{d}$  кольца  $\mathfrak{o}$  относительно  $\mathfrak{h}$  есть

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi],$$

а дифферента  $\mathfrak{D}$  кольца  $\mathfrak{O}$  соответственно есть  $\mathfrak{A}[\xi \rightarrow x]$ . Обе являются изоморфно соответствующими друг другу идеалами.

**2. Дифференциальное частное определяющего идеала.** Пусть  $\mathfrak{M}$  является определяющим идеалом  $\mathfrak{O}$  относительно  $\mathfrak{h}$ , соответствующим системе образующих  $z$ . Тогда в  $\mathfrak{o}[Z]$

$$\mathfrak{B}_Z = \{\dots, Z - \xi, \dots\}, \quad \mathfrak{C} = \mathfrak{M}_0 : \mathfrak{B}_Z.$$

Следовательно,

$$\mathfrak{C} = \{\dots, F(Z) - F(\xi), \dots\} : \{\dots, Z - \xi, \dots\}.$$

Дифференциальное частное  $\mathfrak{M}'$  есть  $\mathfrak{C}[\xi \rightarrow Z]$ . Оно содержит  $\mathfrak{M}$  и при  $Z \rightarrow z$ , соответственно  $Z \rightarrow \xi$ , переходит в дифференту  $\mathfrak{D}$ , соответственно  $\mathfrak{o}$ :

$$\mathfrak{M}'[Z \rightarrow z] = \mathfrak{D}, \quad \mathfrak{M}'[Z \rightarrow \xi] = \mathfrak{d}.$$

**3. Случай определяющего уравнения.** Пусть  $\mathfrak{O}$  имеет определяющее уравнение

$$G(z) = 0, \quad G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \dots + h_n, \quad h_i \in \mathfrak{h}.$$

Тогда дифферента определена и является главным идеалом с базисным элементом

$$G'(\xi) \text{ соответственно } G'(z),$$

где  $G'(Z)$  есть обычное многочленное дифференциальное частное. Идеальное дифференциальное частное есть

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)).$$

Действительно,  $1, z, \dots, z^{n-1}$  образуют независимый модульный базис. Далее

$$C(Z, \xi) = \frac{G(Z) - G(\xi)}{Z - \xi}$$

является базисом разностного частного; подстановкой  $\xi \rightarrow Z$  получается  $G'(Z)$ .

#### §4. Дифферента прямой суммы

Пусть

$$\mathfrak{O} = R_1 + \dots + R_r, \quad e = e_1 + \dots + e_r, \quad R_i R_j = 0 \ (i \neq j)$$

представлено как прямая сумма идеалов, где  $e_i$  являются компонентами единицы. Далее пусть каждое  $R_i$  имеет независимый  $\mathfrak{h}_i$ -модульный базис, содержащий  $e_i$ , где  $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$ , и пусть

$$[\mathfrak{h}, \mathfrak{O}_i] = 0$$

для соответствующих дополнительных слагаемых. Тогда и  $\mathfrak{O}$  имеет независимый  $\mathfrak{h}$ -модульный базис, образованный из базисов  $R_i$ , а дифферента  $\mathfrak{O}$  относительно  $\mathfrak{h}$  есть прямая сумма дифферентов  $R_i$  относительно  $\mathfrak{h}_i$ .

Точнее: пусть то же разложение выполнено для  $\mathfrak{o}$  с компонентами  $r_i$  и идемпотентами  $\varepsilon_i$ . Тогда в прямом произведении

$$\mathfrak{O}_0 = \sum_{i,j} R_i \varepsilon_j,$$

и разностный идеал разлагается так, что компонента  $R_i \varepsilon_i$  содержит разностный идеал прямого произведения  $R_i \times r_i$ . Разностное частное является прямой суммой соответствующих частных. Поэтому, обозначая через  $\mathfrak{A}$  разностное частное, а через  $\mathfrak{D}, \mathfrak{d}$  дифференты, получаем

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}_1 + \cdots + \mathfrak{D}_r, \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r.$$

Отдельные части доказательства состоят в сравнении коэффициентов в независимых базисах, проверке более сильных соотношений пересечения

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{D}_i] = 0,$$

изоморфизмов

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{o}e_i, \quad R_i \sim R_i \varepsilon_i, \quad \mathfrak{h}_i \sim \mathfrak{h}_i e_i,$$

и отождествления

$$\mathfrak{A}e_i \varepsilon_i = (0) : \mathfrak{B}e_i \varepsilon_i,$$

то есть разностного частного компоненты. Отсюда следует утвержденная форма дифференты как прямой суммы.

## §5. Галуаово кольцо расширения поля. Структурные теоремы

**1. Основные кольца.** Пусть  $K$  является сепарабельным полем  $n$ -й степени над основным полем  $P$ . Далее пусть  $F$  является соответствующим галуаовым полем, которое содержит  $n$  сопряженных полей

$$K^{(1)}, \dots, K^{(n)}, \quad K = K^{(1)},$$

и является их произведением. Пусть  $\mathfrak{K}$  обозначает изоморфное  $K$  эквивалентное расширение  $P$ , такое что  $[\mathfrak{K}, F] = P$ . Так как  $\mathfrak{K}$  имеет конечный независимый  $P$ -модульный базис, существуют прямые произведения

$$\mathfrak{K}_K, \quad \mathfrak{K}_F, \quad K_F.$$

Кольцо  $\mathfrak{K}_F$  называется галуаовым кольцом расширения  $\mathfrak{K}$ . Оно является произведением своих  $n$  подколец  $\mathfrak{K}_{K^{(i)}}$ .

Каждый идеал из  $\mathfrak{K}$  является идеалом сужения своего расширения в  $\mathfrak{K}_K$  или  $\mathfrak{K}_F$ ; каждый идеал из  $\mathfrak{K}_K$  является идеалом сужения своего расширения в  $\mathfrak{K}_F$ . Это следует из §2, поскольку над полями каждый модуль имеет дополняемый независимый базис.

Обозначим через

$$\mathfrak{B}^{(i)} = \{\dots, x - \xi^{(i)}, \dots\}$$

сопряженные разностные идеалы и через

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{B}^{(i)}$$

сопряженные разностные частные. Их расширения в  $\mathfrak{K}_F$  обозначаются  $\mathfrak{B}_F^{(i)}$  и  $\mathfrak{A}_F^{(i)}$ .

**2. Разложение в прямую сумму.** Структурная теорема гласит: нулевой идеал галуаова кольца расширения  $\mathfrak{K}_F$  является пересечением расширений  $n$  сопряженных разностных идеалов; само  $\mathfrak{K}_F$  является прямой суммой расширений  $n$  сопряженных разностных частных:

$$(0) = \bigcap_{i=1}^n \mathfrak{B}_F^{(i)}, \quad \mathfrak{K}_F = \mathfrak{A}_F^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_F^{(n)}.$$

В частности,

$$\mathfrak{K}_K = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$$

как прямая сумма, а его нулевой идеал есть пересечение соответствующего разностного идеала с разностным частным.

Доказательство основано на том, что кольцо классов вычетов по каждому  $\mathfrak{B}_F^{(i)}$  имеет ранг один над  $F$ , и что благодаря сепарабельности идеалы  $\mathfrak{B}_F^{(i)}$  попарно различны и взаимно просты. Отсюда следует единственное представление единицы в виде прямой суммы

$$e = e^{(1)} + \dots + e^{(n)},$$

где

$$e^{(i)} \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{B}_F^{(j)}, \quad e^{(i)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{B}_F^{(i)}}.$$

Соответствующие простые компоненты суть  $Fe^{(i)}$ .

### 3. Представление компонент через сопряженные элементы. Если

$$x = \xi^{(1)}e^{(1)} + \dots + \xi^{(n)}e^{(n)}$$

является компонентным представлением элемента  $x$  из  $\mathfrak{K}$ , то компоненты сопряжены. В частности,  $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$  суть  $n$  сопряженных значений, которые принимает  $x$  при изоморфизмах  $\mathfrak{K}$  в  $K^{(i)}$ .

Отсюда следует: если  $B$  является абсолютным модулем в  $\mathfrak{K}$ , а  $B^{(i)}$  его компоненты в  $\mathfrak{K}_F$ , то

$$B = [\mathfrak{K}, B^{(1)} + \dots + B^{(n)}].$$

**4. Дополнительные базисы.** Каждому  $P$ -базису  $t_1, \dots, t_n$  поля  $\mathfrak{K}$  соответствует дополнительный базис  $T_1, \dots, T_n$ . Изоморфные ему базисы  $A_1^{(i)}, \dots, A_n^{(i)}$  полей  $K^{(i)}$  определяются коэффициентами компонент единицы:

$$e^{(i)} = A_1^{(i)}t_1 + \dots + A_n^{(i)}t_n.$$

Если  $\alpha_1^{(i)}, \dots, \alpha_n^{(i)}$  являются сопряженными базисами, соответствующими  $t_j$ , то матрицы

$$(\alpha_j^{(i)})_{i,j} \quad \text{и} \quad (A_j^{(i)})_{i,j}$$

взаимно обратны:

$$(\alpha_j^{(i)})(A_j^{(i)})^t = E_n.$$

Дополнительный базис дополнительного базиса снова является исходным. Если два базиса связаны соотношением  $(s) = (t)P$ , то дополнительные связаны контраградиентным соотношением

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Если

$$c = C_1t_1 + \dots + C_nt_n = c_1T_1 + \dots + c_nT_n,$$

то при  $\text{Sp}$ , обозначающем след, то есть сумму сопряженных, имеем

$$C_i = \text{Sp}(cT_i), \quad c_i = \text{Sp}(ct_i).$$

**5. Определяющее уравнение.** Предусмотренное в рукописи изложение специального случая определяющего уравнения и интерполяционной формулы Лагранжа осталось незаполненным. Предыдущие теоремы дают инвариантную форму соответствующих утверждений.

## §6. Дифферента порядка

Теперь структурные теоремы для полей надо уточнить в смысле целостности. Пусть  $\mathfrak{h}$  является целозамкнутым подкольцом основного поля  $P$ , поле частных которого есть  $P$ . Далее пусть  $\mathfrak{O}$  является  $\mathfrak{h}$ -порядком в  $\mathfrak{K}$ , то есть подкольцом, содержащим  $\mathfrak{h}$ , имеющим поле частных  $\mathfrak{K}$  и обладающим конечным, не обязательно независимым,  $\mathfrak{h}$ -модульным базисом. Изоморфный порядок в  $K$  пусть будет  $\mathfrak{o}$ , его сопряженные —  $\mathfrak{o}^{(i)}$ ; кольцо в  $F$ , порожденное ими, пусть будет  $\mathfrak{g}$ .

Прямые произведения  $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$  и  $\mathfrak{O}_{\mathfrak{g}}$  существуют. Следовательно, дифферента  $\mathfrak{D}$ , соответственно  $\mathfrak{d}$ , относительно  $\mathfrak{h}$  определена. Обозначим через  $\mathfrak{B}$  разностный идеал, через  $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{B}$  разностное частное, а через

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \rightarrow x], \quad \mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \rightarrow \xi]$$

дифференты.

Структурная теорема для галуаова кольца расширения порядков гласит: разностный идеал и разностное частное порядка переходят при расширении в соответствующие идеалы полевого случая; разностное частное является сужением расширенного частного. Далее

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \quad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)},$$

и поэтому

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \dots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Итак, дифферента  $\mathfrak{d}$  состоит из всех элементов  $x$  из  $K$ , для которых  $xe^{(1)}$  лежит в  $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}$ . Она отлична от нулевого идеала.

**Дополнительный модуль.** Если  $\mathfrak{O}$  имеет независимый  $\mathfrak{h}$ -базис  $t_1, \dots, t_n$ , то дополнительные элементы  $T_1, \dots, T_n$  образуют базис  $\mathfrak{h}$ -модуля  $\mathfrak{C}$ , дополнительного модуля  $\mathfrak{O}$ . Тогда

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{C}.$$

Ибо, записав

$$e^{(1)} = A_1 t_1 + \dots + A_n t_n,$$

получаем, что  $\mathfrak{d}$  состоит из элементов  $d$ , для которых все  $dA_i$  лежат в  $\mathfrak{o}$ . В специальном случае регулярного порядка с базисом

$$1, z, \dots, z^{n-1}$$

имеем, следовательно,

$$\mathfrak{d} = (f'(z)).$$

Эквивалентно, дополнительный модуль  $\mathfrak{C}$  состоит из всех элементов  $c$  из  $\mathfrak{K}$ , для которых следы

$$\text{Sp}(co), \quad o \in \mathfrak{O},$$

целы, то есть лежат в  $\mathfrak{h}$ .

**Дополнение.** Если в порядке существует независимый  $\mathfrak{h}$ -модульный базис, то разностное частное  $\mathfrak{A}$  является пересечением всех сопряженных разностных идеалов, отличных от соответствующего разностного идеала:

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}}, \mathfrak{B}^{(2)} \cap \dots \cap \mathfrak{B}^{(n)}].$$

Это следует из того, что тогда и разностный идеал является идеалом сужения своего расширения.

**Фундаментальное уравнение.** Если существует фундаментальное уравнение, так что после присоединения переменных и перехода к кольцу частных порядок имеет базис  $1, u, \dots, u^{n-1}$ , то дифферента задается многочленным дифференциальным частным определяющего уравнения. Если

$$G(u) = 0,$$

то дифферента считывается из коэффициентов  $G'(u)$ . При целозамкнутости отсюда следует необходимое умножение содержаний коэффициентных идеалов; тем самым становится возможной теория ветвления посредством рассмотрения фундаментального уравнения modulo  $p^t$ .

## §7. Теория ветвления главного порядка modulo $p^t$

Пусть задано числовое поле, а  $\mathfrak{h}$  — его кольцо целых чисел; или относительное поле относительно кольца частных главного порядка по простому идеалу, где  $p$  означает базисный элемент этого простого идеала. После присоединения переменных  $u_1, \dots, u_n$  как главный порядок, так и кольцо классов вычетов по  $p^t$  имеют  $\mathfrak{h}$ -модульный базис

$$1, u, \dots, u^{n-1}.$$

В обоих случаях дифферента задается  $G'(u)$ . Дифферента главного порядка modulo  $p^t$  переходит в дифференту кольца классов вычетов по  $p^t$ .

Если

$$p = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r},$$

то кольцо классов вычетов по  $p^t$  является прямой суммой компонент, соответствующих кольцам классов вычетов по  $\mathfrak{p}_i^{te_i}$ :

$$R = Re_1 + \cdots + Re_r.$$

По §4 дифферента этой прямой суммы есть прямая сумма покомпонентных дифферент. Поэтому достаточно рассматривать кольцо классов вычетов по степени  $\mathfrak{p}^N$ .

Выберем  $\xi$  так, что

$$\varphi(\xi) \equiv 0 \pmod{p}, \quad \varphi(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p^2},$$

где  $\varphi(x)$  является простой функцией modulo  $p$  степени  $f$ . Для  $t \geq 2$  заменим  $\xi$  на  $\xi^* = \xi e_1$ , где  $e_1$  является первым идемпотентом разложения кольца классов вычетов modulo  $p^t$ . Тогда даже

$$\mathfrak{p} = (p, \varphi(\xi^*)).$$

Базис modulo  $p^t$  задается элементами

$$\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu, \quad \mu = 0, 1, \dots, f-1, \quad \nu = 0, 1, \dots, e-1.$$

Ибо из  $(\varphi(\xi), p) = \mathfrak{p}$  и  $(p) = \mathfrak{p}^e$  в кольце классов вычетов следует

$$\varphi(\xi) = pM(\xi), \quad M(\xi) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

так что более высокие степени можно последовательно выражать через более низкие. Определяющее уравнение относительно этого базиса имеет вид

$$F(x) = \varphi(x)^e + pM(x),$$

где  $M(x)$  modulo  $p$  не делится на  $\varphi(x)$ . Тем самым дифферента кольца классов вычетов задается многочленным дифференциальным частным  $F'(\xi)$ . Так определение показателей сводится к результатам О. Ore, в частности к дополнительным числам и утверждениям дедекиндово-гензелевского типа. Одновременно эти результаты переходом к кольцу частных распространяются на относительные дифференты; добавляется только выразимость дифференты надполя как произведения дифференты подполя и относительной дифференты.

Поступило 25 октября 1949.

# Алгебра гиперкомплексных величин

Лекция проф. Э. Нётер  
Зимний семестр 1929/30

Обработал проф. М. Дойринг

## Содержание

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Введение</b> .....                                                                                                            | 3  |
| <b>Глава I: Представления</b> .....                                                                                              | 3  |
| § 1. Определение прямого представления — определение реципрокного представления .....                                            | 3  |
| § 2. Классы представлений .....                                                                                                  | 4  |
| § 3. Модули представлений .....                                                                                                  | 4  |
| § 4. Связь между модулями представлений и представлениями .....                                                                  | 5  |
| <b>Глава II: Теория Галуа коммутативных полей</b> .....                                                                          | 7  |
| § 5. Расширение поля коэффициентов гиперкомплексных систем .....                                                                 | 7  |
| § 6. Неприводимые представления коммутативных систем .....                                                                       | 8  |
| § 7. Изоморфизмы поля .....                                                                                                      | 8  |
| § 8. Поле расщепления .....                                                                                                      | 9  |
| § 9. Изоморфизмы $Z_1$ на $Z_i$ .....                                                                                            | 9  |
| § 10. Группа Галуа .....                                                                                                         | 9  |
| § 11. Основная теорема теории Галуа .....                                                                                        | 9  |
| § 12. Формальное значение компонент $e_i$ .....                                                                                  | 11 |
| § 13. Общая теорема о продолжении .....                                                                                          | 12 |
| <b>Глава III: Абелевы группы</b> .....                                                                                           | 13 |
| § 14. Групповое кольцо .....                                                                                                     | 13 |
| § 15. Групповые кольца абелевых групп .....                                                                                      | 14 |
| § 16. Соотношения характеров .....                                                                                               | 15 |
| § 17. Теория Галуа абелевых групп .....                                                                                          | 15 |
| <b>Глава IV: Двусторонне простые кольца</b> .....                                                                                | 18 |
| § 18. Вспомогательная лемма .....                                                                                                | 18 |
| § 19. Представления двусторонне простых гиперкомплексных систем в некоммутативных телах, расширяющих их поля коэффициентов ..... | 19 |
| § 20. Некоммутативные тела .....                                                                                                 | 22 |
| § 21. Теория Галуа некоммутативных тел .....                                                                                     | 26 |

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Глава V: Фактор-системы</b> .....                                                                 | 29 |
| § 22. Группа тел с заданным центром .....                                                            | 29 |
| § 23. Фактор-системы .....                                                                           | 30 |
| § 24. Умножение фактор-систем .....                                                                  | 33 |
| § 25. Нормальное представление $\mathfrak{K}_r$ с максимальными коммутативными подполями Галуа ..... | 39 |
| § 26. Умножение скрещенных представлений .....                                                       | 43 |
| <b>Глава VI: Теория скрещенных произведений</b> .....                                                | 44 |
| § 27. Представления $\mathfrak{K}_r$ как скрещенные произведения .....                               | 44 |
| § 28. Теорема произведения для фактор-систем .....                                                   | 47 |
| § 29. Теорема о главном роде в минимальном .....                                                     | 50 |
| § 30. Специализация на циклические поля расщепления .....                                            | 50 |
| § 31. Приложения циклического специального случая .....                                              | 52 |



## Введение

Эта лекция посвящена общей теории представлений колец, которая возникла, с одной стороны, из теории представлений конечных групп, а с другой — из алгебраической и арифметической теории гиперкомплексных числовых систем. Это более общее понимание теории представлений имеет перед прежним подходом (Фробениус, Шур) следующие преимущества:

Поскольку рассматривается не сама группа, а её групповое кольцо, а в более общем случае — гиперкомплексная система или произвольное кольцо, можно применять теорию колец и идеалов; это освобождает теорию от многих громоздких вычислений. Применение общей теории колец и идеалов не только упрощает теорию, но и развивает её дальше — например, в вопросе о связях группы с её подгруппами — и открывает для неё новые области применения. С помощью общей теории представлений можно дать новое, весьма изящное обоснование теории Галуа и — что, быть может, ещё важнее — построить теорию Галуа некоммутативных тел.

Основные понятия теории групп, колец и идеалов и общие теоремы теории представлений изложены в работе госпожи Нётер *Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie*, *Mathematische Zeitschrift* 30, с. 641. Эту работу, далее цитируемую как M.Z., следует рассматривать как дополнение к настоящему изложению. Тот же материал, что и в M.Z., содержится также в записи лекции госпожи Нётер *Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere*, зимний семестр 1927/28.

Понятия представления и модуля представления здесь кратко разъяснены, чтобы ввести реципрокный модуль представления и реципрокные представления, которые являются новыми лишь формально.

## Глава I. Представления

Пусть  $\mathfrak{o}$  — кольцо, которое представляется, а  $T$  — другое кольцо, то, в котором осуществляется представление.

### § 1. Определение прямого представления

*Прямым представлением* степени  $n$  кольца  $\mathfrak{o}$  в  $T$  называется подкольцо  $\mathfrak{D}$  кольца  $T_n$  матриц степени  $n$  с элементами из  $T$ , на которое  $\mathfrak{o}$  отображается посредством гомоморфизма колец. В обозначениях

$$\mathfrak{o} \rightarrow \mathfrak{D} \subseteq T_n.$$

### Определение реципрокного представления

*Реципрокным представлением* степени  $n$  кольца  $\mathfrak{o}$  в  $T^*$  называется подкольцо  $\mathfrak{D}^*$  кольца  $T_n^*$  матриц степени  $n$  с элементами из  $T^*$ , на которое  $\mathfrak{o}$  отображается посредством реципрокного гомоморфизма колец. Реципрокная гомоморфность означает следующее: если элементам  $c, d$  кольца  $\mathfrak{o}$  соответствуют элементы  $c^*, d^*$  кольца  $\mathfrak{D}^*$ , то элементу  $cd$  кольца  $\mathfrak{o}$  должен соответствовать элемент  $d^* \cdot c^*$  кольца  $\mathfrak{D}^*$ , а элементу  $c + d$  кольца  $\mathfrak{o}$  — элемент  $c^* + d^*$  кольца  $\mathfrak{D}^*$ . В обозначениях

$$\mathfrak{o} \rightarrow \mathfrak{D}^* \subseteq T_n^*.$$

В качестве примера реципрокного гомоморфизма укажем следующее: если каждой матрице порядка  $n$  над коммутативным полем сопоставить транспонированную матрицу, то это соответствие является реципрокным изоморфизмом колец.

Вообще для любого кольца  $T$  можно построить реципрокно изоморфное ему кольцо  $T^*$  следующим образом.

Каждому элементу  $c$  кольца  $T$  сопоставим символ  $c^*$  и определим сложение этих символов равенством  $c^* + d^* = (c + d)^*$ , а умножение — равенством

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

Множество символов  $c^*$  образует кольцо  $T^*$ , реципрокно изоморфное  $T$ .

## § 2. Классы представлений

Прямое представление  $\mathfrak{D}$  кольца  $\mathfrak{o}$  в  $T$  можно преобразовать в изоморфное представление  $\mathfrak{D}'$ , поэлементно трансформируя его регулярной матрицей  $P$ , то есть сопоставляя элементу  $c$  кольца  $\mathfrak{o}$  вместо  $C \subseteq \mathfrak{D}$  матрицу  $P^{-1}CP \subseteq P^{-1}\mathfrak{D}P$ .

Два представления, преобразуемые друг в друга таким способом, называются *эквивалентными*.

Все представления, эквивалентные данному, образуют *класс представлений* (к. п.).

Совершенно так же определяется эквивалентность реципрокных представлений: два реципрокных представления называются эквивалентными, если одно получается из другого преобразованием с помощью регулярной матрицы. Все представления, эквивалентные фиксированному реципрокному представлению, образуют *класс реципрокных представлений*.

## § 3. Модули представлений

Определение *прямого модуля представления* (п. м. п.).

Прямым модулем представления кольца  $\mathfrak{o}$  относительно  $T$  называется любой  $\mathfrak{o}$ - $T$ -бимодуль  $\mathfrak{M}$  (то есть аддитивно записываемая абелева группа, являющаяся левым модулем относительно  $\mathfrak{o}$ , правым модулем относительно  $T$  и удовлетворяющая смешанному закону ассоциативности:  $c \in \mathfrak{o}, m \in \mathfrak{M}, \tau \in T; (cm)\tau = c(m\tau)$ ), который представим в виде прямой суммы конечного числа однопорожжденных  $T$ -модулей — причем из  $x_i\tau = 0$  следует  $\tau = 0$ , —

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot T + x_2 \cdot T + \dots + x_n \cdot T.$$

Определение *реципрокного модуля представления* (р. м. п.).

Реципрокным модулем представления кольца  $\mathfrak{o}$  относительно  $T^*$  называется любой левый  $\mathfrak{o}$ -модуль и левый  $T^*$ -модуль  $\mathfrak{M}^*$ , удовлетворяющий закону коммутирования (если  $c \in \mathfrak{o}, m \in \mathfrak{M}^*, \tau \in T^*$ , то  $c(\tau^*m^*) = \tau^*(cm)$ ) и представимый в виде прямой суммы конечного числа простых  $T^*$ -модулей — причем из  $\tau^* \cdot x_i^* = 0$  следует  $\tau^* = 0$ , —

$$\mathfrak{M}^* = T^* \cdot x_1 + \dots + T^* \cdot x_n.$$

## § 4. Связь между модулями представлений и представлениями

1. Каждый модуль представления однозначно определяет класс представлений (п. м. п. — п. к. п., р. м. п. — р. к. п.).

Именно следующим образом.

Умножение п. м. п.  $\mathfrak{M}$  на элемент  $c$  кольца  $\mathfrak{o}$  задает гомоморфизм  $\mathfrak{M}$  в себя, допускающий элементы  $T$  в качестве операторов ввиду закона ассоциативности  $(cm)\tau = c(m\tau)$ . Следовательно, это *линейное преобразование*  $\mathfrak{M}$  в себя, то есть соответствие  $m \mapsto cm = m'$  обладает свойством:

$$\text{Если } y_i \mapsto y'_i (= cy_i), \text{ то также } \sum y_i \tau_i \mapsto \sum y'_i \tau_i \left( = c \sum y_i \tau_i \right).$$

Определим сумму  $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$  двух линейных преобразований

$$\mathfrak{T}_1 : m \mapsto m' (= c_1 m) \quad \text{и} \quad \mathfrak{T}_2 : m \mapsto m'' (= c_2 m)$$

как преобразование  $m \mapsto m' + m'' (= (c_1 + c_2)m)$ , а их произведение  $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$  — как композицию преобразований  $m \mapsto (m'')' = c_1 c_2 m$ . Тогда множество различных линейных преобразований  $\mathfrak{M}$ , порождаемых элементами  $\mathfrak{o}$ , является гомоморфным образом  $\overline{\mathfrak{D}}$  кольца  $\mathfrak{o}$ .

Возьмем теперь произвольный базис  $x_1, \dots, x_n$  модуля  $\mathfrak{M}$ . Линейное преобразование  $\mathfrak{M}$ , порожденное элементом  $c$ , очевидно, уже полностью задано, если известно, как преобразуются базисные элементы  $x_i$ , то есть если известна матрица  $(\gamma_{ij}) = C$  системы равенств

$$x'_j = cx_j = \sum x_i \gamma_{ij}$$

Действительно, для остальных элементов  $x = \sum x_j \tau_j$  имеем просто  $x' = \sum x'_j \tau_j$ . Эти матрицы  $C$  однозначно соответствуют различным линейным преобразованиям (поскольку те и другие взаимно

определяют друг друга) и, как непосредственно видно, образуют кольцо, изоморфное  $\overline{\mathfrak{D}}$ , то есть гомоморфный образ кольца  $\mathfrak{o}$ , — представление степени  $n$  кольца  $\mathfrak{o}$ .

Изоморфизм между  $\overline{\mathfrak{D}}$  и представлением выражается следующими формулами. Пусть линейному преобразованию, порожденному  $c \in \mathfrak{o}$ , соответствует матрица  $C$ , то есть

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

и пусть аналогичным образом друг другу соответствуют  $d \in \mathfrak{o}$  и  $D \in T_n$ :

$$d(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)D$$

Тогда, очевидно,

$$\begin{aligned} (c + d)(x_1, \dots, x_n) &= (cx_1 + dx_1, \dots, cx_n + dx_n) \\ &= (x_1, \dots, x_n)(C + D) \end{aligned}$$

а также

$$\begin{aligned} cd(x_1, \dots, x_n) &= c(dx_1, \dots, dx_n) = c((x_1, \dots, x_n)D) \\ &= (cx_1, \dots, cx_n)D = (x_1, \dots, x_n)CD. \end{aligned}$$

Таким образом, линейные преобразования  $\mathfrak{M}$  в себя, порождаемые кольцом  $\mathfrak{o}$ , при их реализации посредством фиксированного базиса  $x_\nu$  модуля  $\mathfrak{M}$  дают представление степени  $n$  кольца  $\mathfrak{o}$  в  $T$ .

Если  $(y_1, \dots, y_n)$  — другой базис модуля  $\mathfrak{M}$ , то он получается из  $x_1, \dots, x_n$  умножением на регулярную матрицу:

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P$$

Если линейное преобразование  $\mathfrak{M}$  реализуется в базисе  $x_\nu$  матрицей  $C$ , то в базисе  $y_\nu$  оно реализуется матрицей  $P^{-1}CP$ . Действительно, если

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

то

$$\begin{aligned} c(y_1, \dots, y_n) &= c(x_1, \dots, x_n)P = ((x_1, \dots, x_n)C)P \\ &= (x_1, \dots, x_n)CP = ((y_1, \dots, y_n)P^{-1})CP \\ &= (y_1, \dots, y_n)P^{-1}CP. \end{aligned}$$

Отсюда непосредственно следует:

*Модуль  $\mathfrak{M}$  дает все представления одного класса, если для реализации индуцированных кольцом  $\mathfrak{o}$  линейных преобразований  $\mathfrak{M}$  использовать все базисы модуля  $\mathfrak{M}$ .*

2. Каждый класс представлений порождается модулем представления указанным в пункте 1 способом. (Мы вновь ограничиваемся прямыми представлениями.)

*Доказательство.* Возьмем определенное представление данного класса, заданное гомоморфным соответствием  $c \mapsto C$ . Если степень представления равна  $n$ , образуем из  $n$  неопределенных  $x_1, \dots, x_n$  правый  $T$ -модуль

$$\mathfrak{M} = x_1 T + \dots + x_n T$$

(с обычными правилами вычисления  $\sum x_i \tau_i + \sum x_i \bar{\tau}_i = \sum x_i (\tau_i + \bar{\tau}_i)$ ,  $\sum x_i \tau_i = \sum x_i \bar{\tau}_i$  тогда и только тогда, когда  $\tau_i = \bar{\tau}_i$  для всех  $i$ ,  $(\sum x_i \tau_i) \varrho = \sum x_i \tau_i \varrho$ ) и превратим его в левый  $\mathfrak{o}$ -модуль, полагая  $c \sum x_i \tau_i = \sum x'_i \tau_i$ , если  $(x'_1, \dots, x'_n) = (x_1, \dots, x_n)C$ , где через  $C$  обозначена матрица представления, сопоставленная элементу  $c$  кольца  $\mathfrak{o}$ .

В силу этого определения  $\mathfrak{M}$  становится  $\mathfrak{o}$ - $T$ -бимодулем. Во-первых, из соотношений гомоморфизма следует

$$c + d \mapsto C + D \quad \text{и} \quad cd \mapsto CD$$

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i$$

$$cd \cdot x_i = c \cdot dx_i, \quad \text{кроме того,} \quad c \left( \sum x_i \tau_i + \sum x_i \bar{\tau}_i \right) = c \sum x_i \tau_i + c \sum x_i \bar{\tau}_i,$$

то есть выполняются свойства левого модуля. Во-вторых, очевидно,

$$c \left( \sum x_i \tau_i \varrho \right) = \left( c \sum x_i \tau_i \right) \cdot \varrho,$$

что и есть смешанный закон ассоциативности.

Итак,  $\mathfrak{M}$  является модулем представления, и использованное представление порождается им способом, указанным в пункте 1, если для реализации его линейных преобразований взять базис  $x_1, \dots, x_n$ . Остальные базисы дают прочие представления того же класса.

Для рецiproчных представлений и модулей представлений все происходит точно так же. Получается, что модуль

$$\mathfrak{M}^* = T^* x_1^* + \dots + T^* x_n^*$$

порождает рецiproчное представление кольца  $\mathfrak{o}$  в  $T^*$ , если элементу  $c$  кольца  $\mathfrak{o}$  сопоставить матрицу  $C$  в равенстве

$$c \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Различные базисы снова дают различные представления одного класса.

## Глава II. Теория Галуа коммутативных полей

Развитой до сих пор теории представлений достаточно для обоснования теории Галуа. Преимущество этого обоснования перед обычным состоит в том, что оно не требует обращения к специальным системам образующих и к теоремам о многочленах от неопределенных.<sup>1</sup>

### § 5. Расширение поля коэффициентов гиперкомплексных систем

Сформулируем следующую общую теорему, доказательство которой оставим без подробностей, поскольку оно почти очевидно. Пусть  $\mathfrak{o} = c_1 P + \dots + c_n P$  — гиперкомплексная система над коммутативным полем  $P$ . Пусть  $\Omega$  — кольцо, расширяющее  $P$ , причем его центр содержит  $P$ . Определим *расширенную систему*  $\mathfrak{o}_\Omega$  как множество всех формальных сумм  $\sum c_i \omega_i$ ,  $\omega_i \in \Omega$ . Сначала посредством условий

$$\begin{aligned} \sum c_i \omega_i &= \sum c_i \omega'_i \quad \text{тогда и только тогда, когда} \quad \omega_i = \omega'_i \text{ для всех } i; \\ \sum c_i \omega_i + \sum c_i \omega'_i &= \sum c_i (\omega_i + \omega'_i); \\ \omega \sum c_i \omega_i &= \sum c_i \omega \omega_i; \quad \sum c_i \omega_i \cdot \omega = \sum c_i \omega_i \omega; \\ \sum c_i \omega_i &= \sum \omega_i c_i \end{aligned}$$

оно превращается в  $\Omega$ -модуль, коммутирующий с  $\Omega$ , а затем посредством дополнительного условия

$$\sum c_i \omega_i \cdot \sum c_j \omega_j = \sum_i \sum_j c_i c_j \omega_i \omega_j$$

<sup>1</sup>Ср. для дальнейшего М. З. §§ 15 — 20. В М. З. § 21 содержатся первые теоремы следующего раздела о теории Галуа. Определение гиперкомплексных систем см. в М. З. § 6.

— произведение  $c_i c_j$  уже определено как элемент  $\mathfrak{o}$  — в кольцо, расширяющее  $\mathfrak{o}$ . Система  $\mathfrak{o}_\Omega$  имеет ранг  $n$  над  $\Omega$ ; ее можно

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1 \Omega + \dots + c_n \Omega$$

записать в таком виде.

Система  $\mathfrak{o}_\Omega$  определена независимо от выбора базиса  $c_1, \dots, c_n$ . Если  $\Omega$  — коммутативное поле, то  $\mathfrak{o}_\Omega$  является гиперкомплексной системой над  $\Omega$ .

## § 6. Неприводимые представления коммутативных систем

Пусть  $\mathfrak{Z} = z_1 P + \dots + z_n P$  — коммутативная система над  $P$ . Найдем все неприводимые представления  $\mathfrak{Z}$  в алгебраически замкнутом поле  $\Omega$ , расширяющем  $P$ . Поскольку каждое представление  $\mathfrak{Z}$  в  $\Omega$  приводит к представлению  $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1 \Omega + \dots + z_n \Omega$  — ведь для задания всего представления достаточно представлений базисных элементов, уже содержащихся в  $P$ , — а каждое представление  $\mathfrak{Z}_\Omega$ , наоборот, содержит представление  $\mathfrak{Z}$ , можно искать также представления  $\mathfrak{Z}_\Omega$ . Согласно М. З. § 20, они содержатся в регулярном представлении  $\mathfrak{Z}_\Omega$ , то есть в представлении  $\mathfrak{Z}_\Omega$ , которое получается, если использовать саму  $\mathfrak{Z}_\Omega$  как модуль представления. Достаточно даже ограничиться модулем представления  $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ , где  $\mathfrak{C}$  обозначает радикал  $\mathfrak{Z}_\Omega$  (см. М. З. § 19).

Но  $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$  — вполне приводимая система, то есть прямая сумма полей конечной степени над  $\Omega$ . Поскольку  $\Omega$  алгебраически замкнуто, эти слагаемые изоморфны  $\Omega$ .

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1 \Omega + \dots + e_t \Omega.$$

Элементы  $e_\nu$  являются компонентами единицы. Следовательно:

Система  $\mathfrak{Z}_\Omega$  имеет ровно  $t$  различных неприводимых классов представлений в  $\Omega$ , и все они имеют степень один. При этом  $t$  — ранг  $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ , а значит, не превосходит  $n$ .

Каждый из этих классов содержит лишь одно представление, поскольку преобразование представления первой степени над коммутативным полем не изменяет его:  $\pi^{-1} \cdot \alpha \cdot \pi = \alpha$ .

Таким образом, существует ровно  $t$  различных гомоморфных отображений  $\Theta_1, \dots, \Theta_t$  системы  $\mathfrak{Z}_\Omega$  на подкольца поля  $\Omega$ .

## § 7. Изоморфизмы поля

Пусть теперь  $\mathfrak{Z}$  — поле. Каждый гомоморфизм  $\Theta_i$  системы  $\mathfrak{Z}_\Omega$  на подкольцо поля  $\Omega$  должен изоморфно отображать  $\mathfrak{Z}$  на некоторое подполе  $Z_i$  поля  $\Omega$ . Действительно, либо  $Z_i = 0$  — чего здесь нет, поскольку единице  $\mathfrak{Z}$  соответствует единица  $\Omega$ , — либо  $Z_i$  является изоморфным образом  $\mathfrak{Z}$ . Следовательно:

Если  $\mathfrak{Z}$  — конечное расширение поля  $P$  степени  $n$ , то в  $\Omega$  существует столько различных полей  $Z_i$ , изоморфных  $\mathfrak{Z}$ , сколько составляет ранг  $t$  системы  $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ . Поэтому число полей  $Z_i$  не превосходит  $n$ .

Поле  $\mathfrak{Z}$  называется полем первого рода над  $P$ , если число полей  $Z_i$  равно  $n$ , и полем второго рода, если это число меньше  $n$ .

Поле  $\mathfrak{Z}$  является полем первого рода над  $P$  тогда и только тогда, когда  $\mathfrak{Z}_\Omega$  вполне приводимо.

Здесь видно преимущество этого обоснования теории Галуа перед обычным. В обычной теории Галуа рассматривают изоморфизмы одного из полей  $Z_i$  на остальные. Здесь этой асимметрии удастся избежать. Чтобы показать, что число сопряженных с данным полем не превосходит его степени, обычно используют первообразный элемент. Здесь этот факт непосредственно следует из того, что все неприводимые представления  $\mathfrak{Z}_\Omega$  содержатся в регулярном представлении.

## § 8. Поле расщепления

Поля  $Z_i$  суть неприводимые представления  $\mathfrak{Z}$  в  $\Omega$ . Поэтому, если поле  $\Gamma$ , лежащее между  $P$  и  $\Omega$ ,  $P \subseteq \Gamma \subseteq \Omega$ , содержит все  $Z_i$ , то уже  $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$  должно распадаться в прямую сумму  $t$  полей степени один над  $\Gamma$ . Обратно, для того чтобы  $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$  распадалось в прямую сумму  $t$  полей, которые в таком случае являются неприводимыми представлениями первой степени системы  $\mathfrak{Z}_\Gamma$ , необходимо, чтобы все  $Z_i$

содержались в  $\Gamma$ . Если полем расщепления системы  $\mathfrak{Z}$  называть поле  $\Gamma$ , обладающее тем свойством, что  $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$  становится прямой суммой  $t$  полей, то получаем:

*Галуа-замыкание изоморфных  $\mathfrak{Z}$  полей  $Z_i$ , то есть их композит, является минимальным полем расщепления системы  $\mathfrak{Z}$ .*

## § 9. Изоморфизмы $Z_1$ на $Z_i$

Если ограничить  $\Theta_i$  на  $\mathfrak{Z}$ , то оно является изоморфным отображением  $\mathfrak{Z}$  на  $Z_i$ . Следовательно,  $S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$  есть изоморфное отображение  $Z_1$  на  $Z_i$ . Поскольку отображения  $\Theta_i$  различны, различны и отображения  $S_i$ . Это те самые изоморфизмы поля  $Z_1$  на сопряженные с ним поля, которые обычно рассматриваются в теории Галуа. Других  $S_i$  нет, поскольку нет других отображений  $\Theta_i$ .

## § 10. Группа Галуа

Если  $\mathfrak{Z}$  — поле Галуа, то есть если поля  $Z_i$  совпадают как множества элементов, то отображения  $S_i$  образуют группу всех изоморфизмов  $Z$  на себя, оставляющих  $P$  неподвижным. Действительно, каждое произведение  $S_i S_j$  является автоморфизмом  $Z$ , и, поскольку кроме  $S_i$  других автоморфизмов нет,  $S_i S_j$  равно некоторому  $S_k$ . Таким образом, отображения  $S_i$  образуют группу всех автоморфизмов  $Z$ , оставляющих каждый элемент  $P$  неподвижным; это и есть *группа Галуа поля  $Z$  относительно  $P$* .

## § 11. Основная теорема теории Галуа

Пусть теперь  $\mathfrak{Z}$  — расширение Галуа первого рода поля  $P$ . Докажем основную теорему теории Галуа:

*Поля  $\Gamma$ , лежащие между  $P$  и  $\mathfrak{Z}$ , можно взаимно однозначно сопоставить подгруппам  $\mathfrak{H}$  группы Галуа  $\mathfrak{G}$  поля  $Z$  относительно  $P$  так, что сопоставленная полю  $\Gamma$  группа  $\mathfrak{H}$  состоит из всех автоморфизмов поля  $Z$ , оставляющих каждый элемент  $\Gamma$  неподвижным, а  $\Gamma$  есть совокупность всех элементов поля  $Z$ , остающихся неподвижными при всех автоморфизмах, содержащихся в  $\mathfrak{H}$ .*

Кратко сформулируем это так:

1. Если  $\mathfrak{H}$  — группа инвариантов поля  $\Gamma$ , то  $\Gamma$  — поле инвариантов группы  $\mathfrak{H}$ .
2. Если  $\Gamma$  — поле инвариантов группы  $\mathfrak{H}$ , то  $\mathfrak{H}$  — группа инвариантов поля  $\Gamma$ .

**1 сводится к следующей вспомогательной теореме:** *Если  $P \subseteq \Sigma \subseteq T \subseteq Z$  и степень  $T$  над  $\Sigma$  равна  $t$ , то каждый изоморфизм  $\Sigma$  на сопряженное поле (необходимо содержащееся в  $Z$ ) продолжается до  $t$  различных изоморфизмов  $T$  на сопряженные поля.*

Действительно, предположим, что  $\mathfrak{H}$  — группа инвариантов поля  $\Sigma$ , а  $T$  — поле инвариантов группы  $\mathfrak{H}$ . Тогда элементы  $\mathfrak{H}$  являются продолжениями на все поле  $Z$  тождественного изоморфизма поля  $\Sigma$ . Если применить эти продолжения лишь к  $T$ , то из вспомогательной теоремы следует, что они распадаются на  $t$  классов: изоморфизмы одного класса тождественны на  $T$ , а изоморфизмы разных классов различны на  $T$ . Но поскольку  $T$  — поле инвариантов группы  $\mathfrak{H}$ , необходимо  $t = 1$ ,  $T = \Sigma$ , что и требовалось доказать.

Для доказательства вспомогательной теоремы вернемся к полям  $\mathfrak{S}$ ,  $\mathfrak{T}$ , лежащим между  $P$  и  $Z$ , которым посредством  $\Theta_1$  сопоставлены  $\Sigma$  и  $T$ . Нам нужно доказать:

*Каждый изоморфизм  $H_i$  поля  $\mathfrak{S}$  на некоторое  $\Sigma_i$  продолжается ровно  $t$  различными способами до изоморфизмов  $\mathfrak{T}$  на подполя  $T_i$  поля  $Z$ .*

Ввиду предположения, что  $\mathfrak{Z}$  является полем первого рода над  $P$ , система  $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$  совпадает с  $\mathfrak{Z}_\Omega$ , поэтому  $\mathfrak{S}_\Omega$  распадается в прямую сумму стольких полей, какова ее степень  $s$ :

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega.$$

Модули представления  $E_\nu\Omega$  порождают  $s$  изоморфизмов поля  $\mathfrak{S}$  на  $s$  подполей  $\Sigma_1, \dots, \Sigma_s$ . Чтобы найти изоморфизмы  $\mathfrak{T}$ , нам нужна система  $\mathfrak{T}_\Omega$ . Поскольку  $E_\nu\Omega$  являются идеалами системы  $\mathfrak{S}_\Omega$ , имеем  $E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu$ . Кроме того, очевидно,

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\Omega.$$

Следовательно,

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1 \mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s \mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1 \mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s \mathfrak{T}_\Omega.$$

Это разложение  $\mathfrak{T}_\Omega$  в прямую сумму идеалов. Идеал  $E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$  распадается в прямую сумму  $t$  простых идеалов. Действительно, имеют место соотношения степеней

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = t,$$

а поэтому, ввиду  $\mathfrak{S}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \simeq \Omega$ ,

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leq t,$$

и, поскольку сумма всех степеней  $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$  должна равняться  $s \cdot t$ ,

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \quad E_\nu \mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \cdots + e_\nu^{(t)} \Omega.$$

Каждый идеал  $e_\nu^{(i)} \Omega$  дает неприводимое представление системы  $\mathfrak{T}_\Omega$ . Остается *показать*, что все эти представления, будучи ограничены на  $\mathfrak{S}_\Omega$ , совпадают с представлением, порожденным идеалом  $E_\nu \cdot \Omega$ ; тогда доказательство будет завершено. Но это ясно, поскольку из

$$s \cdot E_\nu = E_\nu \sigma_\nu \quad (s \in \mathfrak{S}_\Omega \text{ при представлении соответствует } \sigma_\nu \text{ как образ})$$

следует

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

а значит, в силу единственности представления в виде суммы,

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

Таким образом, новые представления также сопоставляют элементу  $s$  элемент  $\sigma_\nu$ .

**2. Пусть  $T$  — поле инвариантов группы  $\mathfrak{H}$ .** Мы хотим установить, что  $\mathfrak{H}$  является группой инвариантов поля  $T$ . Для этого *достаточно* указать элемент поля  $T$ , который не остается неподвижным при некотором автоморфизме, не принадлежащем  $\mathfrak{H}$ .

Элементы  $S_i$  группы Галуа  $\mathfrak{G}$  поля  $Z$  суть автоморфизмы  $Z$ , оставляющие  $P$  неподвижным. Превратим их в автоморфизмы  $\mathfrak{Z}$ , полагая

$$S_i z = z, \quad \text{если } z \text{ принадлежит } \mathfrak{Z}.$$

Применение  $S_i$  к

$$\mathfrak{Z} Z = e_1 Z + \cdots + e_n Z$$

должно переставлять прямые слагаемые  $e_\nu Z$ , поскольку они определены однозначно; в частности,

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \quad \text{и} \quad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad \text{для } i \neq k$$

должно выполняться. Пусть  $S_1, \dots, S_h$  — элементы группы  $\mathfrak{H}$ . Выберем какое-либо  $e_\nu$ , обозначим его через  $e'$ , и рассмотрим все  $e_\nu$ , получаемые из него посредством  $S_i, i \leq h$ :

$$e_1 = S_1 e', \dots, e_h = S_h e'.$$

Поскольку для  $i \leq h, j \leq h$

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \quad \text{где } k \leq h$$

каждое  $S_i$  из  $\mathfrak{H}$  переставляет  $e_1, \dots, e_h$  между собой, поэтому

$$E_1 = e_1 + \cdots + e_h$$

является элементом  $\mathfrak{Z}$ , инвариантным при всех  $S_i \in \mathfrak{H}$ . Если представить  $E_1$  посредством базиса  $\mathfrak{Z}$ , то его коэффициенты должны быть элементами  $Z$ , инвариантными относительно  $\mathfrak{H}$ ; следовательно, они принадлежат  $T$ .

Элемент  $E_1$  не инвариантен ни при одном  $S_i$ , не принадлежащем  $\mathfrak{H}$ . Действительно, для такого  $S_i$  выражение

$$S_i e_1 = e_i + \cdots$$

содержит компоненту  $e_i$ , не входящую в число  $e_1, \dots, e_h$ , тогда как представление  $E_1$  в виде суммы единственно.

## § 12. Формальный смысл компонент $e_i$

Зафиксируем базис  $z_1, \dots, z_n$  поля  $\mathfrak{Z}$ .

$$\mathfrak{Z} = z_1 P + \dots + z_n P$$

(Теперь от  $\mathfrak{Z}$  требуется лишь, чтобы оно было полем первого рода.) Изоморфизм  $\Theta_i$  отображает систему  $z_1, \dots, z_n$  на базис  $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$  поля  $Z_i$ , причем это задается соотношениями

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

Обратно, компонента единицы  $e_j$  должна выражаться через  $z_\nu$  с коэффициентами из  $Z$ :

$$e_j = \sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} z_\nu.$$

Поэтому имеем

$$e_j = e_j^2 = \sum \varrho_\nu^{(j)} z_\nu e_j = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} \cdot e_j$$

и

$$0 = e_j e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot z_\nu \cdot e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} \cdot e_k,$$

следовательно,

$$\sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} = 1; \quad \sum_{\nu} \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} = 0, \quad \text{если } j \neq k.$$

Это означает, что матрицы

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \dots & \zeta_n^{(1)} \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \zeta_1^{(n)} & \dots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \dots & \varrho_1^{(n)} \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \varrho_n^{(1)} & \dots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

взаимно обратны. Иначе говоря,  $\varrho_1^{(i)}, \dots, \varrho_n^{(i)}$  является базисом, дополнительным к  $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$ . Этот базис играет роль в теории дифференты числового поля.

## § 13. Общая теорема о продолжении

Доказанную на странице 10 теорему о продолжении отображений  $H_i$  можно обобщить.

Пусть  $\mathfrak{Z} = z_1 P + \dots + z_n P$  — коммутативная, гиперкомплексная, вполне приводимая система. Пусть  $\mathfrak{S}$  и  $\mathfrak{T}$  — подсистемы  $\mathfrak{Z}$ , которые в этой ситуации также непременно вполне приводимы:

$$P \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{Z}.$$

Согласно М. З. § 13, каждая из трех систем имеет единицу. Однако эти три единицы вовсе не обязаны совпадать. (Они заведомо не совпадают, если  $\mathfrak{S}$  и  $\mathfrak{T}$  являются отличными от  $\mathfrak{Z}$  идеалами системы  $\mathfrak{Z}$ .)

Пусть  $E$  — единица системы  $\mathfrak{S}$ . Система  $\mathfrak{T} \cdot E$  является  $\mathfrak{S}$ -модулем конечного ранга:

$$E\mathfrak{T} = a_1 \mathfrak{S} + \dots + a_t \mathfrak{S}$$

(в общем случае не сама  $\mathfrak{T}$ !).

*Доказательство.* Система  $\mathfrak{S}$  есть прямая сумма полей:  $\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \dots + \mathfrak{K}_r$ . Ей соответствует разложение  $\mathfrak{T}E$  в прямую сумму. Каждое слагаемое  $\mathfrak{T}E$  должно содержать одно из полей  $\mathfrak{K}_i$ , иначе оно аннулировалось бы элементом  $E$ , тогда как  $E$  — единица системы  $\mathfrak{T}E$ . Следовательно,  $\mathfrak{T}E$  есть прямая сумма колец, расширяющих  $\mathfrak{K}_i$ , то есть прямая сумма вида

$$\mathfrak{T}E = a_{11} \mathfrak{K}_1 + \dots + a_{1p_1} \mathfrak{K}_1 + \dots + a_{rp_r} \mathfrak{K}_r,$$

или  $E\mathfrak{T} = a_{11} \mathfrak{S} + \dots + a_{rp_r} \mathfrak{S}$ , что и требовалось доказать.



Общая теорема о продолжении.

Каждое неприводимое представление системы  $\mathfrak{S}$  в  $\Omega$ , заданное гомоморфизмом  $H_i$ , продолжается ровно  $t$  различными способами до представлений системы  $\mathfrak{T}$ .

Доказательство проводится так же, как на страницах 10–11. Имеем

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_\Omega &= E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega, & E_\nu\Omega &= \mathfrak{S}_\Omega E_\nu, \\ \mathfrak{T}_\Omega \cdot E &= \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega, \\ \mathfrak{T}_\Omega \cdot E &= \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega, \\ [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] &= [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu \mathfrak{S}_\Omega] \leq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t, \\ \sum [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] &= st\end{aligned}$$

и потому

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

Следовательно,  $\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$  распадается в прямую сумму  $t$  идеалов, каждый из которых, являясь слагаемым  $\mathfrak{T}_\Omega E$ , а значит, и  $\mathfrak{T}_\Omega$ , дает представление системы  $\mathfrak{T}_\Omega$ . Как и на страницах 10–11, это представление оказывается продолжением представления, заданного посредством  $H_\nu$ . Остальные неприводимые представления  $\mathfrak{T}_\Omega$ , порожденные слагаемыми  $\mathfrak{T}_\Omega$ , не содержащимися в  $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$ , не могут быть продолжениями представлений  $\mathfrak{S}_\Omega$ , порожденных отображениями  $H_\nu$ , поскольку эти идеалы аннулируются посредством  $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$ , а тем более посредством  $\mathfrak{S}_\Omega$ .

## Глава III. Абелевы группы

### § 14. Групповое кольцо

Пусть  $\mathfrak{G}$  — конечная группа с элементами  $a_1, \dots, a_h$ , а  $P$  — коммутативное поле. Используя групповое умножение в качестве умножения, образуем гиперкомплексную систему

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1P + \cdots + a_hP$$

— групповое кольцо группы  $\mathfrak{G}$  над  $P$ . (М. З. § 6; Speiser, Theorie d. Gruppen end. Ord. § 48).

Нас интересуют представления  $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$  в  $P$  или в алгебраически замкнутом поле  $\Omega$ , расширяющем  $P$ . Как уже упоминалось, неприводимые представления порождаются простыми левыми идеалами кольца  $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$ . Поэтому, как и в теории Галуа, представляет интерес вопрос о том, когда  $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$  имеет радикал. Справедлива следующая общая теорема:

*Кольцо  $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$  вполне приводимо тогда и только тогда, когда порядок  $h$  группы  $\mathfrak{G}$  не делится на характеристику  $p$  поля  $P$ .*

Сначала докажем:

Из  $h \equiv 0(p)$  следует  $\mathfrak{C} \neq 0$ .

$$\mathfrak{a} = P(a_1 + \cdots + a_h)$$

есть двусторонний идеал кольца  $\mathfrak{o}$ . Действительно,

$$P \cdot (a_1 + \cdots + a_h)a = P \cdot (a_1a + \cdots + a_ha) = P(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

и

$$a \cdot P(a_1 + \cdots + a_h) = P(aa_1 + \cdots + aa_h) = P(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

в силу группового свойства элементов  $a_i$ . Идеал  $\mathfrak{a}$ , разумеется, отличен от нуля, но нильпотентен:

$$\left( \sum_i a_i \right)^2 = \sum_i \sum_j a_i a_j = h \sum_j a_j = 0.$$

Обратное утверждение

Из  $h \not\equiv 0(p)$  следует  $\mathfrak{C} = 0$ ,

мы пока докажем лишь для абелевых групп. (В М. З. § 26 эта часть теоремы доказана в общем случае.)

## § 15. Групповые кольца абелевых групп

Пусть  $\mathfrak{A} = \{a_1, \dots, a_h\}$  — абелева группа. Тогда  $\mathfrak{o}$  коммутативно, и мы можем применять общие теоремы о коммутативных гиперкомплексных системах.

*Если  $h$  не делится на характеристику  $p$  поля  $P$ , то  $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$  имеет ровно  $h$  различных неприводимых представлений в  $\Omega$ . (Они имеют степень один, поскольку  $\mathfrak{o}$  коммутативно.)*

Отсюда следует, что  $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$  имеет тот же ранг, что и  $\mathfrak{o}$ , а значит,  $\mathfrak{C} = 0$ . Тем самым доказана вторая, оставленная выше без доказательства часть теоремы для абелевых групп.

*Доказательство.* Группа  $\mathfrak{A}$  является прямым произведением циклических групп  $\mathfrak{Z}_i$  порядков  $h_i$ :

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}_1 \times \dots \times \mathfrak{Z}_t, \quad h = h_1 h_2 \dots h_t.$$

Если  $z_i$  — образующий элемент группы  $\mathfrak{Z}_i$ , то соответствующий ему элемент неприводимого представления (первой степени) должен быть корнем  $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$  степени  $h_i$  из единицы. С другой стороны, сопоставляя каждому  $z_i$  некоторый корень  $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$  степени  $h_i$  из единицы, мы получаем неприводимое представление кольца  $\mathfrak{o}$  в  $\Omega$ . Поскольку  $h \not\equiv 0(p)$ , а тем более  $h_i \not\equiv 0(p)$ , имеется ровно  $h_1 h_2 \dots h_t = h$  различных представлений кольца  $\mathfrak{o}$ , что и требовалось доказать.

(Легко видеть также, что если  $h = 0(p)$ , то есть  $h_i = 0(p)$  хотя бы для одного  $h_i$ , то существует не более  $h_i/p$  различных корней  $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$ , а значит, менее  $h$  представлений. Поэтому  $\mathfrak{o}_\Omega$  должно содержать ненулевой радикал. Однако отсюда еще не следует непосредственно ничего о радикале  $\mathfrak{o}$ .)

Обозначим через  $\Theta_1, \dots, \Theta_h$  эти  $h$  различных гомоморфных отображений кольца  $\mathfrak{o}_\Omega$  на подкольца  $\Omega$ . Каждому  $\Theta_i$  соответствует слагаемое  $e_i \Omega$  кольца  $\mathfrak{o}_\Omega$ , рассматриваемое как модуль представления. Иногда мы применяем  $\Theta_i$  только к  $\mathfrak{A}$  и тогда говорим о представлении группы  $\mathfrak{A}$ . Эти отображения  $\mathfrak{A}$  в группы корней из единицы суть  $h$  *характеров группы  $\mathfrak{A}$* . Особым характером является *главный характер*, сопоставляющий каждому элементу  $\mathfrak{A}$  число 1. Соответствующее отображение  $\Theta_i$  обозначим через  $\Theta_1$ .

Представление посредством главного характера возможно для всякой группы, а не только для абелевой. Поскольку это представление уже лежит в  $P$ , в случае, когда  $\mathfrak{o}$  вполне приводимо, кольцо  $\mathfrak{o}$  должно выделять в прямое слагаемое простой идеал  $E \cdot \mathfrak{o}$ , дающий это представление. Элемент  $E$  легко вычислить. Необходимо  $E = \sum x_i a_i$ . Во-первых,

$$aE = E \cdot 1 \quad \text{или} \quad \sum x_i a a_i = \sum x_i a_i$$

откуда для  $a = a_j a_i^{-1}$

$$x_1 a_j a_i^{-1} a_1 + \dots + x_i a_j + \dots + x_n a_j a_i^{-1} a_n = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n$$

и, следовательно,

$$x_i = x_j$$

Во-вторых,

$$E = E^2 = x^2 \left( \sum a_i \right)^2 = x^2 h \sum a_i = x h E.$$

В случае  $h = 0(p)$  отсюда следует  $E = 0$ , то есть кольцо  $\mathfrak{o}$  не содержит модуля представления главного характера и, следовательно, не могло быть вполне приводимым. Тем самым вновь доказана одна половина теоремы со страницы 13.

Если же  $h \not\equiv 0(p)$ , а значит,  $\mathfrak{o}$  вполне приводимо, то непосредственно получаем

$$x = \frac{1}{h}, \quad E = \frac{1}{h} (a_1 + \dots + a_h).$$

## § 16. Соотношения характеров

Тот факт, что  $E = (1/h) \cdot \sum a_i$  дает главный характер, непосредственно приводит к соотношениям характеров. Должно выполняться

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

и, следовательно,

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

или

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

В частности,

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

или, поскольку  $e_1 = (1/h) \sum a_i$ ,

$$\sum_{\nu} \Theta_i a_{\nu} = \begin{cases} h & i = 1, \\ 0 & i \neq 1, \end{cases}$$

Это известные соотношения характеров:

*Сумма значений характера по всем элементам группы равна нулю, за исключением главного характера, для которого она равна  $h$ .*

## § 17. Теория Галуа абелевых групп

Для групповых колец абелевых групп можно сформулировать теоремы, аналогичные теоремам теории Галуа коммутативных полей. В теории Галуа отображения  $\Theta_i \Theta_1^{-1}$  образовывали группу  $\mathfrak{G}$ . Основная теорема выражает взаимно однозначное соответствие, основанное на некоторых свойствах инвариантности, между подгруппами группы  $\mathfrak{G}$  и подполями поля  $Z$ .

Гомоморфизмы  $\Theta_i$  кольца  $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$  можно объединить в группу  $A$ , подгруппы которой связаны с подгруппами группы  $\mathfrak{A}$  аналогичным образом.

*Определим произведение  $\Theta_i \Theta_k = \Theta$  равенством*

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

*тогда совокупность отображений  $\Theta_i$  образует группу  $A$ , изоморфную  $\mathfrak{A}$ .*

*Доказательство.* Пусть  $\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$ . В силу равенств

$$\begin{aligned} \Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab \end{aligned}$$

полученное отображение является гомоморфизмом группы  $\mathfrak{A}$  в  $A$ . Поскольку кроме  $\Theta_i$  других гомоморфизмов группы  $\mathfrak{A}$  нет,  $\Theta$  совпадает с некоторым  $\Theta_j$ . Следовательно, отображения  $\Theta_i$  действительно образуют группу из  $h$  элементов.

Обозначим теперь через  $\varepsilon_{h_{\nu}}$  первообразный корень степени  $h_{\nu}$  из единицы. Тогда  $\Theta_i$  отображает образующий элемент  $z_{\nu}$  циклического множителя  $\mathfrak{Z}_{\nu}$  группы  $\mathfrak{A}$  в некоторую степень корня  $\varepsilon_{h_{\nu}}$ :

$$\Theta_i z_{\nu} = \varepsilon_{h_{\nu}}^{(i)}.$$

Сопоставим гомоморфизму  $\Theta_i$  элемент  $\prod_{\nu} z_{\nu}^{(i)}$  группы  $\mathfrak{A}$ . Это взаимно однозначное отображение группы  $A$  на группу  $\mathfrak{A}$ : поскольку  $\Theta_i$  определяется числами  $\varrho_{\nu}^{(i)}$ , различным отображениям  $\Theta_i$

соответствуют различные элементы  $\prod_{\nu} z_{\nu}^{\varrho_{\nu}^{(i)}}$ . Это отображение изоморфно. Действительно, с одной стороны,

$$\Theta_i \Theta_j z_{\nu} = \Theta_i z_{\nu} \cdot \Theta_j z_{\nu} = \varepsilon_{h_{\nu}}^{\varrho_{\nu}^{(i)} + \varrho_{\nu}^{(j)}},$$

а с другой стороны,

$$\prod_{\nu} z_{\nu}^{\varrho_{\nu}^{(i)}} \cdot \prod_{\nu} z_{\nu}^{\varrho_{\nu}^{(j)}} = \prod_{\nu} z_{\nu}^{\varrho_{\nu}^{(i)} + \varrho_{\nu}^{(j)}}, \quad \text{что и требовалось доказать.}$$

Определим теперь

*область инвариантов подгруппы В группы А:*

это подгруппа  $\mathfrak{B}$  элементов группы  $\mathfrak{A}$ , отображаемых каждым  $\Theta \in \mathbf{B}$  в 1.

*Группа инвариантов подгруппы  $\mathfrak{B}$  группы  $\mathfrak{A}$ :*

это подгруппа В элементов группы А, отображающих каждый  $a \in \mathfrak{B}$  в 1.

Теперь сформулируем основную теорему:

*Подгруппы  $\mathfrak{B}$  группы  $\mathfrak{A}$  и подгруппы В группы А можно взаимно однозначно сопоставить так, что для соответствующих друг другу  $\mathfrak{B}$  и В группа В является группой инвариантов  $\mathfrak{B}$ , а  $\mathfrak{B}$  — областью инвариантов В.*

Итак, нужно доказать:

1. Если В — группа инвариантов  $\mathfrak{B}$ , то  $\mathfrak{B}$  — область инвариантов В.
2. Если  $\mathfrak{B}$  — область инвариантов В, то В — группа инвариантов  $\mathfrak{B}$ .

**1.** Как и на странице 10, утверждение следует из общей теоремы о продолжении. Предположим, что В — группа инвариантов  $\mathfrak{B}$ , а  $\mathfrak{B}'$  — область инвариантов В; тогда  $\mathfrak{B}'$  содержит  $\mathfrak{B}$ . Элементы В являются продолжениями на всю группу  $\mathfrak{A}$  единственного гомоморфизма группы  $\mathfrak{B}$ , отображающего  $\mathfrak{B}$  в 1. Если применить эти продолжения только к  $\mathfrak{B}'$ , то из общей теоремы о продолжении следует, что они распадаются на  $t$  классов: гомоморфизмы одного класса тождественны, а гомоморфизмы разных классов различны на  $\mathfrak{B}'$ . Здесь  $t$  — степень кольца  $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$  над  $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ , то есть индекс  $\mathfrak{B}$  в  $\mathfrak{B}'$ , поскольку кольца  $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$  и  $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$  имеют один и тот же единичный элемент, а именно единицу всей группы  $\mathfrak{A}$ . Но поскольку  $\mathfrak{B}'$  является областью инвариантов группы В, необходимо  $t = 1$ , а значит,  $\mathfrak{B}' = \mathfrak{B}$ , что и требовалось доказать.

**2.** сведем к пункту 1.

Будем рассматривать элементы  $a$  группы  $\mathfrak{A}$  как гомоморфизмы группы А. Именно, положим  $a\Theta$  равным корню из единицы  $\Theta a$ , кратко:  $a\Theta = \Theta a$ . Тем самым  $a$  действительно определяется как гомоморфизм группы А, поскольку

$$a\Theta \cdot a\Theta' = \Theta a \cdot \Theta' a = \Theta \Theta' a = a\Theta \Theta'.$$

Произведение двух гомоморфизмов  $a, b$  есть обычное групповое произведение:

$$\begin{array}{ccccccc} ab\Theta & = & a\Theta \cdot b\Theta & = & \Theta a \cdot \Theta b = \Theta ab & = & ab\Theta \\ & & \text{произведение гомоморфизмов} & & \text{групповое произведение} & & \end{array}$$

Различные как элементы группы  $a, b$  различны и как гомоморфизмы. Если  $a\Theta = b\Theta$  для всех  $\Theta$ , то  $\Theta a = \Theta b$  для всех  $\Theta$ , или  $\Theta ab^{-1} = 1$  для всех  $\Theta$ . Таким образом,  $\Theta$  являются продолжениями на всю группу  $\mathfrak{A}$  тождественного гомоморфизма циклической подгруппы  $\mathfrak{Z}$  группы  $\mathfrak{A}$ , порожденной элементом  $ab^{-1}$ . Поэтому по теореме о продолжении индекс  $\mathfrak{Z}$  в  $\mathfrak{A}$  равен  $h$ , то есть  $\mathfrak{Z} = e$ ,  $a = b$ .

Теперь переведем утверждения, сделанные при новом понимании,

- а)  $\mathfrak{B}$  является группой инвариантов В.
- б) В является областью инвариантов  $\mathfrak{B}$ .

на прежний язык.

К пункту а). Группа  $\mathfrak{B}$  состоит из всех  $a \in \mathfrak{A}$ , для которых  $a\Theta = 1$  при всех  $\Theta \in \mathfrak{B}$ , то есть  $\mathfrak{B}$  состоит из всех  $a \in \mathfrak{A}$ , для которых  $\Theta \cdot a = 1$  при всех  $\Theta \in \mathfrak{B}$ . Поэтому перевод пункта а) имеет вид

а')  $\mathfrak{B}$  является областью инвариантов  $\mathfrak{B}$ .

Соответственно, перевод пункта б) имеет вид

б')  $\mathfrak{B}$  является группой инвариантов  $\mathfrak{B}$ .

Итак, перевод уже доказанного в пункте 1 утверждения если  $\mathfrak{B}$  — группа инвариантов  $\mathfrak{B}$ , то  $\mathfrak{B}$  — область инвариантов  $\mathfrak{B}$ , есть как раз утверждение, которое требуется доказать:

если  $\mathfrak{B}$  — область инвариантов  $\mathfrak{B}$ , то  $\mathfrak{B}$  — группа инвариантов  $\mathfrak{B}$ .

Если записать соотношения характеров со страницы 15 для  $\mathfrak{A}$  вместо  $\mathfrak{A}$ , то получим равенства

$$\sum_{i=1}^h \Theta_i a_{\nu} = \begin{cases} h & \nu = 1, \\ 0 & \nu \neq 1. \end{cases}$$

Сумма всех характеров на данном элементе группы равна нулю, кроме единичного элемента, для которого она равна  $h$ .

## Глава IV. Двусторонне простые кольца

### § 18. Вспомогательная теорема

Пусть  $K$  — тело, а  $\mathfrak{G}$  — группа автоморфизмов (изоморфных отображений на себя) тела  $K$ . Множество элементов тела  $K$ , остающихся неизменными при каждом автоморфизме из  $\mathfrak{G}$ , является подполем  $P$  тела  $K$ , называемым *полем инвариантов* группы  $\mathfrak{G}$ .

Если  $\tau \neq 0$  — произвольный элемент тела  $K$ , то, сопоставляя элементу  $\alpha$  тела  $K$  элемент  $\tau^{-1}\alpha\tau$ , мы получаем автоморфизм  $K$ . По аналогии с соответствующей терминологией теории групп такой автоморфизм будем называть *внутренним автоморфизмом*. Поле инвариантов  $P$  группы всех внутренних автоморфизмов тела  $K$  есть его центр.

Пусть теперь даны тело  $K$ , группа автоморфизмов  $\mathfrak{G}$  тела  $K$  и ее поле инвариантов  $P$ .

$$\mathfrak{M} = x_1 P + \cdots + x_n P$$

Пусть это  $P$ -модуль ранга  $n$ . Действие элемента  $\gamma$  группы  $\mathfrak{G}$  на элементах  $\mathfrak{M}$  определим равенствами

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \quad \text{то есть} \quad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

В результате  $\mathfrak{G}$  становится группой автоморфизмов расширенного модуля

$$\mathfrak{M}_K = x_1 K + \cdots + x_n K$$

а область инвариантов группы  $\mathfrak{G}$  в  $\mathfrak{M}_K$  совпадает с  $\mathfrak{M}$ . При этих предположениях справедлива теорема:

Если

$$\mathfrak{C} = z_1 K + \cdots + z_r K$$

— подмодуль модуля  $\mathfrak{M}_K$ , переводимый в себя каждым элементом  $\gamma$  группы  $\mathfrak{G}$  (не обязательно поэлементно), то  $\mathfrak{C}$  является расширением посредством  $K$  некоторого подмодуля  $\mathfrak{c}$  модуля  $\mathfrak{M}$ .

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_K.$$

*Доказательство.* 1. Предварительное замечание: необходимо  $\mathfrak{c} = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$ . Действительно, вообще

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M}.$$

Включение  $\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M}$  очевидно. Чтобы доказать  $\mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{c}$ , возьмем базис  $y_1, \dots, y_r$  модуля  $\mathfrak{c}$ :

$$\mathfrak{c} = y_1 P + \dots + y_r P,$$

тогда

$$\mathfrak{c}_K = y_1 K + \dots + y_r K.$$

Каждый элемент  $c$  пересечения  $\mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M}$  допускает базисное представление как элемент  $\mathfrak{c}_K$ :

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \chi_i$$

и базисное представление как элемент  $\mathfrak{M}$ :

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \varrho_i + \sum_{j=r+1}^n y_j \varrho_j$$

где  $y_{r+1}, \dots, y_n$  — такие элементы модуля  $\mathfrak{M}$ , которые дополняют  $y_1, \dots, y_r$  до базиса  $\mathfrak{M}$  (М. З. § 6).

Оба представления можно рассматривать как базисные представления в  $\mathfrak{M}_K$ , поэтому они совпадают:  $\chi_i = \varrho_i$  ( $i = 1, \dots, r$ ),  $\varrho_j = 0$  ( $j = r+1, \dots, n$ ). Следовательно,

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \varrho_i \quad \text{что и требовалось доказать.}$$

2. Для доказательства рассматриваемой теоремы построим базис  $z_1, \dots, z_r$  модуля  $\mathfrak{C}$ , все элементы  $z_i$  которого принадлежат  $\mathfrak{M}$ . Тогда, если положить

$$\mathfrak{c} = z_1 P + \dots + z_r P$$

действительно получится

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_K.$$

Возьмем произвольный базис  $y_1, \dots, y_r$  модуля  $\mathfrak{C}$  и дополним его до базиса  $\mathfrak{M}_K$  подходящими элементами  $x_{r+1}, \dots, x_n$  некоторого базиса  $x_1, \dots, x_n$  модуля  $\mathfrak{M}$ , который тем самым является также базисом  $\mathfrak{M}_K$ . Это возможно по М. З. § 5.

$$\mathfrak{M}_K = \mathfrak{C} + x_{r+1} K + \dots + x_n K.$$

Отсюда для первых  $r$  элементов  $x_1, \dots, x_r$  базиса  $\mathfrak{M}$  следуют равенства

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^n x_j \chi_j^{(i)}, \quad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \chi_j^{(i)} \in K.$$

Поскольку  $z_i$  вместе с  $x_{r+1}, \dots, x_n$ , очевидно, образуют базис  $\mathfrak{M}_K$ , они линейно независимы, и потому  $z_1, \dots, z_r$  — базис  $\mathfrak{C}$ . Базис  $z_1, \dots, z_r$  имеет искомый вид; элементы  $z_i$  принадлежат  $\mathfrak{M}$ .

Пусть  $\gamma$  — элемент группы  $\mathfrak{G}$ . Тогда, с одной стороны,

$$(1) \quad \gamma z_i = \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^n \gamma x_j \cdot \gamma \chi_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^n x_j \gamma \chi_j^{(i)}.$$

С другой стороны,

$$(2) \quad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^r z_\mu \sigma_\mu^{(i)}, \quad \sigma_\mu^{(i)} \in K,$$

поскольку  $\mathfrak{C}$  допускает все  $\gamma \in \mathfrak{G}$ . Равенство (2) можно записать также в виде

$$(3) \quad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^r x_\mu \sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^n x_j \sum_{\mu=1}^r \chi_j^{(\mu)} \sigma_\mu^{(i)}$$

Сравнение коэффициентов в (1) и (3) дает

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Следовательно,

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

Таким образом, элементы  $z_i$  принадлежат области инвариантов группы  $\mathfrak{S}$ , то есть модулю  $\mathfrak{M}$ , что и требовалось доказать.

## § 19. Представления двусторонне простых гиперкомплексных систем в некоммутативных телах, расширяющих их поля коэффициентов

$$\mathfrak{S} = x_1 P + \cdots + x_n P$$

— двусторонне простая, а значит, вполне приводимая гиперкомплексная система, и пусть  $K$  — тело с центром  $P$ .

**Теорема 1.** Система  $\mathfrak{S}_K$  двусторонне проста (и, следовательно, вполне приводима).

*Доказательство.* 1. Каждый двусторонний идеал  $\mathfrak{a}$  системы  $\mathfrak{S}_K$  инвариантен относительно группы  $\mathfrak{S}$  внутренних автоморфизмов тела  $K$ . Действительно, пусть  $\chi$  — ненулевой элемент  $K$ , и положим  $\chi^{-1} \mathfrak{a} \chi = \bar{\mathfrak{a}}$ . Тогда  $\bar{\mathfrak{a}} \subseteq \mathfrak{a}$  в силу свойства идеала  $\mathfrak{a}$ . Но рассматриваемый как  $K$ -модуль идеал  $\bar{\mathfrak{a}}$  имеет тот же ранг над  $K$ , что и  $\mathfrak{a}$ , поэтому необходимо  $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$ .

2. По только что доказанной вспомогательной теореме каждый двусторонний идеал  $\mathfrak{a}$  системы  $\mathfrak{S}_K$  должен быть расширением некоторого подмодуля  $\mathfrak{A}$  системы  $\mathfrak{S}$ :  $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}_K$ . При этом  $\mathfrak{A}$  — двусторонний идеал системы  $\mathfrak{S}$ , поскольку из  $\mathfrak{A} = \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}$  получаем

$$\mathfrak{S}\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{S}\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}\mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}.$$

Но  $\mathfrak{S}$  содержит лишь два двусторонних идеала:  $0$  и  $\mathfrak{S}$ . Поэтому и в  $\mathfrak{S}_K$  имеются лишь два двусторонних идеала:  $0$  и  $\mathfrak{S}_K$ , что и требовалось доказать.

Перейдем теперь к неприводимым представлениям  $\mathfrak{S}$  в  $K$ . Мы будем строить рецiproкные представления, поскольку это дает формальное преимущество. В конечном счете безразлично, брать ли прямые или рецiproкные представления: между ними имеется взаимно однозначное соответствие.

Пусть  $\mathfrak{M}$  — рецiproкный модуль представления системы  $\mathfrak{S}$  в  $K$ , то есть левый  $\mathfrak{S}$ -модуль и левый  $K$ -модуль конечного ранга,

$$\mathfrak{M} = K \cdot y_1 + \cdots + K \cdot y_r$$

с законом коммутирования

$$s(xm) = x(sm).$$

Докажем, что  $\mathfrak{M}$  можно рассматривать также как левый  $\mathfrak{S}_K$ -модуль. Прежде всего следует определить умножение элемента  $\mathfrak{S}_K$  на элемент  $\mathfrak{M}$ . Для  $s \in \mathfrak{S}$ ,  $x \in K$ ,  $m \in \mathfrak{M}$  положим

$$sx \cdot m = s \cdot (x \cdot m)$$

а для произвольного элемента  $\sum s_i x_i$  системы  $\mathfrak{S}_K$  соответственно положим

$$\sum s_i x_i \cdot m = \sum s_i \cdot (x_i \cdot m).$$

Убедимся, что это определение однозначно и не зависит от способа представления элемента  $\mathfrak{S}_K$  в виде суммы произведений  $s_i x_i$ .

Иными словами, из

$$(1) \quad \sum_{i=1}^p s_i x_i = 0$$

нужно вывести

$$\sum_{i=1}^p s_i (x_i m) = 0$$

Предположим, что  $s_1, \dots, s_q$  линейно независимы, а  $s_{q+1}, \dots, s_p$  выражаются через  $s_1, \dots, s_q$ :

$$s_j = \sum_{i=1}^q s_i \varrho_i^{(j)}, \quad j = q+1, \dots, p.$$

Коэффициенты должны лежать в  $\mathbb{P}$ , поскольку элемент  $s_j$  выражается единственным способом, а такое представление уже возможно в  $\mathfrak{S}$ . Из (1) следует

$$x_i + \sum_{j=q+1}^p \varrho_i^{(j)} x_j = 0, \quad i = 1, \dots, q.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^p s_i (x_i m) &= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) + \left( \sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)} \right) (x_{q+1} m) \\ &\quad + \dots + \left( \sum_i s_i \varrho_i^{(p)} \right) (x_p m) \\ &= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) \\ &\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(x_{q+1} m) + \dots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(x_{q+1} m) \quad \text{в силу свойства модуля} \\ &\quad + \dots \\ &\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(x_p m) + \dots + s_q \varrho_q^{(p)}(x_p m) \\ &= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) \\ &\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} m) + \dots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} x_{q+1} m) \\ &\quad + \dots \\ &\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} x_p m) + \dots + s_q(\varrho_q^{(p)} x_p m) \\ &\quad \text{в силу законов} \\ &\quad \text{ассоциативности } s'(sm) \\ &\quad = s' s \cdot m \text{ и} \\ &\quad x'(xm) = x' x \cdot m \\ &= s_1 \left( x_1 m + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} \cdot m + \dots + \varrho_1^{(p)} x_p \cdot m \right) + \dots \\ &= s_1 \left( \left( x_1 + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} + \dots + \varrho_1^{(p)} x_p \right) m \right) + \dots \\ &= 0. \end{aligned}$$

Из свойств  $\mathfrak{S}_K$ -модуля для  $\mathcal{M}$  дистрибутивные законы  $(S + S')m = Sm + S'm$ ,  $S(m + m') = Sm + Sm'$  очевидны. Остается проверить закон ассоциативности  $S(S'm) = SS' \cdot m$ . Поскольку дистрибутивные законы выполняются, достаточно рассмотреть случай

$$sx \cdot (s'x'm) = sx(s'x' \cdot m)$$

С одной стороны, по определению  $sx \cdot m$ ,



$$sx \cdot (s'x' \cdot m) = s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$$

а с другой стороны,

$$ss's'x' \cdot m = ss'xx' \cdot m = ss' \cdot (xx' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (x \cdot (x' \cdot m)))$$

В силу двух соотношений коммутирования это равно  $= s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$ :

$$x \cdot s' = s' \cdot x$$

$$s' \cdot (x \cdot m) = x \cdot (s' \cdot m)$$

Итак,  $\mathcal{M}$  действительно является левым  $\mathfrak{S}_K$ -модулем, разумеется, конечным. Обратно, каждый конечный левый  $\mathfrak{S}_K$ -модуль есть реципрокный модуль представления системы  $\mathfrak{S}$  в  $K$ , поскольку он, очевидно, является конечным  $K$ -модулем и ввиду

$$s(x \cdot m) = sx \cdot m = xs \cdot m = x(s \cdot m)$$

удовлетворяет также условию коммутирования. (Ср. также более простое доказательство в § 24.)

Согласно М.З. § 18, каждый конечный  $\mathfrak{S}_K$ -модуль является суммой простых модулей,  $\mathfrak{S}_K$ -операторно-изоморфных простым левым идеалам системы  $\mathfrak{S}_K$ . Обратно, каждый левый идеал системы  $\mathfrak{S}_K$  есть модуль представления системы  $\mathfrak{S}$  в  $K$ , и, поскольку все левые идеалы системы  $\mathfrak{S}_K$  операторно-изоморфны, справедлива

**Теорема 2.** *Единственный неприводимый класс реципрокных представлений системы  $\mathfrak{S}$  в  $K$  порождается любым простым левым идеалом системы  $\mathfrak{S}_K$ .*

Если это неприводимое представление имеет степень  $r$ , то степень любого представления кратна  $r$ . Соединяя неприводимые представления, можно, разумеется, для любого заданного кратного  $rs$  числа  $r$  построить представление степени  $rs$ ; этому соответствует образование модуля представления, являющегося прямой суммой  $s$  простых модулей.

Нам уже известно одно представление системы  $\mathfrak{S}$  в  $K$ , а именно представление, порожденное самой  $\mathfrak{S}$ , рассматриваемой как модуль представления (главное представление, М. З. § 20); оно уже лежит в  $P$ . Его степень равна  $n$ , поэтому  $n$  делится на  $r$ :

$$n = rt.$$

Частное  $t$  легко определить. Поскольку  $r$  — ранг одного левого идеала над  $K$ , а  $n$  — ранг всей системы  $\mathfrak{S}_K$ , число  $t$  равно числу левых идеалов системы  $\mathfrak{S}_K$ . Следовательно,  $t^2$  — ранг  $\mathfrak{S}_K$  над телом автоморфизмов ее простых идеалов.

Специализируем наши рассуждения на случай, когда  $\mathfrak{S}$  является коммутативным полем.

**Теорема 3.** *Если  $\mathfrak{S}$  — коммутативное поле, то  $\mathfrak{S}$  является центром системы  $\mathfrak{S}_K$ .*

*Доказательство.* Каждый элемент  $\mathfrak{S}$  коммутирует с любым элементом  $\mathfrak{S}$  и с любым элементом  $K$ , а значит, и с любым элементом  $\mathfrak{S}_K$ . Поэтому  $\mathfrak{S}$  содержится в центре  $\mathfrak{S}_K$ . Элемент  $\mathfrak{S}_K$  коммутирует со всеми элементами  $\mathfrak{S}_K$  лишь тогда, когда он коммутирует хотя бы со всеми элементами  $K$ , то есть когда его коэффициенты принадлежат центру тела  $K$ , а значит, полю  $P$ . Следовательно, он лежит в  $\mathfrak{S}$ , что и требовалось доказать.

Поскольку для коммутативных колец нет различия между реципрокным и прямым изоморфизмами, каждое реципрокное представление можно рассматривать и как прямое. Поэтому неприводимое представление системы  $\mathfrak{S}$  в  $K$  должно порождаться также прямым модулем представления. Этот прямой модуль представления является простым правым идеалом системы  $\mathfrak{S}_K$ . Действительно,  $\mathfrak{r}$  — конечный правый  $K$ -модуль ранга  $r$ , а ввиду  $\mathfrak{r}\mathfrak{S} = \mathfrak{S}\mathfrak{r}$  он является также левым  $\mathfrak{S}$ -модулем (разумеется, со смешанным законом ассоциативности), то есть прямым модулем представления ранга  $r$ . Поскольку существует лишь один неприводимый класс представлений, этот модуль должен порождать данное представление.

## § 20. Некоммутативные тела

Пусть теперь

$$\mathfrak{K} = y_1 P + \cdots + y_m P$$

— некоммутативное тело с центром  $P$ . Для  $\mathfrak{K}$  мы докажем ряд теорем, аналогичных теоремам о конечных алгебраических расширениях коммутативных полей.

Если  $Z = \xi_1 P + \cdots + \xi_n P$  — гиперкомплексная система над  $P$ , то две расширенные системы  $\mathfrak{K}_Z$  и  $Z_{\mathfrak{K}}$  совпадают. Действительно, для  $\mathfrak{K}_Z$  можно написать

$$\mathfrak{K}_Z = y_1 \xi_1 P + \cdots + y_m \xi_n P$$

а для  $Z_{\mathfrak{K}}$

$$Z_{\mathfrak{K}} = \xi_1 y_1 P + \cdots + \xi_n y_m P$$

оба выражения совпадают в силу  $y_i \xi_j = \xi_j y_i$ .

В дальнейшем  $Z$  всегда будет коммутативным полем, поэтому можно применять теоремы § 19. Согласно теореме 1 § 19, система  $\mathfrak{K}_Z$  всегда двусторонне проста.

**Теорема 1.** Пусть  $\Omega$  — алгебраически замкнутое поле, расширяющее  $P$ . Тогда центр  $\mathfrak{K}_{\Omega}$  равен  $\Omega$ .

*Доказательство.* Воспользуемся соответствующей теоремой 3 из § 19. Ясно, что  $\Omega$  содержится в центре  $\mathfrak{K}_{\Omega}$ . Если  $\alpha$  — некоторый элемент центра  $\mathfrak{K}_{\Omega}$ , то его коэффициенты принадлежат конечному алгебраическому расширению  $Z$  поля  $P$ , а именно полю, ими порожденному. Разумеется,  $\alpha$  должно принадлежать также центру  $\mathfrak{K}_Z$ . Но этот центр равен  $Z$ , следовательно,  $\alpha$  принадлежит  $Z$ , а тем самым и  $\Omega$ , что и требовалось доказать.

Совершенно аналогично докажем

**Теорема 2.** Система  $\mathfrak{K}_{\Omega}$  двусторонне проста.

*Доказательство.* Пусть  $\mathfrak{a} = z_1 \Omega + \cdots + z_r \Omega$  — двусторонний идеал. Коэффициенты элементов  $z_1, \dots, z_r$  принадлежат некоторому конечному расширению  $Z$  поля  $P$ . Тогда  $\mathfrak{a}' = z_1 Z + \cdots + z_r Z$  — двусторонний идеал системы  $\mathfrak{K}_Z$ . Поскольку  $\mathfrak{K}_Z$  двусторонне проста,  $\mathfrak{a}'$  равен либо нулю, либо  $\mathfrak{K}_Z$ ; следовательно,  $\mathfrak{a}$  равен либо 0, либо  $\mathfrak{K}_{\Omega}$ . Итак,  $\mathfrak{K}_{\Omega}$  двусторонне проста, что и требовалось доказать.

По этой теореме  $\mathfrak{K}_{\Omega}$  является матричным кольцом над телом, расширяющим его центр  $\Omega$ . Как подкольцо всей системы  $\mathfrak{K}_{\Omega}$ , это тело должно иметь конечную степень над  $\Omega$ , а значит, совпадать с  $\Omega$ :

**Теорема 3.** Система  $\mathfrak{K}_{\Omega}$  является матричным кольцом над  $\Omega$ ,

$$\mathfrak{K}_{\Omega} = \sum \Omega c_{ik}$$

поэтому степень  $\mathfrak{K}$  над его центром  $P$  есть квадрат  $m = t^2$ .

Число  $t$  правых (или левых) идеалов, на которые распадается  $\mathfrak{K}_{\Omega}$ , будем кратко называть абсолютным числом компонент тела  $\mathfrak{K}$ .

Свойством  $\Omega$ , состоящим в том, что  $\mathfrak{K}_{\Omega}$  распадается в прямую сумму  $t$  простых идеалов, обладают уже некоторые конечные расширения  $Z$  поля  $P$ , например поля  $Z$ , получаемые присоединением к  $P$  коэффициентов элементов  $c_{ik}$ . Теперь исследуем такие поля расщепления.

**Определение.** Конечное алгебраическое расширение  $Z$  поля  $P$  называется *полем расщепления* тела  $\mathfrak{K}$ , если число простых правых идеалов, на которые распадается  $\mathfrak{K}_Z$ , уже равно абсолютному числу компонент  $t^2$ .

**Теорема 4.** Если  $Z$  — поле расщепления тела  $\mathfrak{K}$ , то  $Z$  является телом автоморфизмов правых идеалов системы  $\mathfrak{K}_Z$ . Обратно, если тело автоморфизмов правых идеалов системы  $\mathfrak{K}_Z$  равно  $Z$ , то  $Z$  — поле расщепления.

*Доказательство.* 1. Пусть  $Z$  — поле расщепления, а  $\mathfrak{T}$  — тело автоморфизмов правых идеалов системы  $\mathfrak{K}_Z$ , то есть

<sup>2</sup>Ср. понятие поля расщепления на странице 9

$$\mathfrak{K}_Z = \sum \mathfrak{T}c_{ik}$$

Отсюда следует

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \mathfrak{T}_\Omega c_{ik}$$

Поэтому ранг  $\mathfrak{K}_\Omega$  над  $\Omega$  есть произведение  $t^2$  на ранг  $\mathfrak{T}_\Omega$ ; с другой стороны, он равен  $t^2$ . Следовательно, ранг  $\mathfrak{T}_\Omega$ , а значит, и ранг  $\mathfrak{T}$ , равен 1;  $\mathfrak{T} = Z$ , что и требовалось доказать.

2. Если  $Z$  — тело автоморфизмов простых идеалов системы  $\mathfrak{K}_Z$ , то

$$\mathfrak{K}_Z = \sum Zc_{ik}$$

и, следовательно,

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

Число элементов  $c_{ik}$  поэтому должно равняться  $t^2$ , что и требовалось доказать.

**Теорема 5.** *Неприводимое представление  $\mathfrak{Z}$  поля расщепления  $Z$  тела  $\mathfrak{K}$  в  $\mathfrak{K}$  — по теореме 2 на странице 22 имеется лишь один неприводимый класс представлений — является максимальным коммутативным подполем матричного кольца  $\mathfrak{K}_r$  (где  $r$  — степень неприводимого представления поля  $Z$ ).*

*Обратно, если неприводимое представление  $\mathfrak{Z}$  коммутативного расширения  $Z$  поля  $P$  является максимальным коммутативным подполем  $\mathfrak{K}_r$ , то  $Z$  является полем расщепления.*

*Доказательство.* 1. Если степень поля расщепления  $Z$  над  $P$  равна  $n$ , то степень  $r$  неприводимого представления  $\mathfrak{Z}$  поля  $Z$  равна  $n/t$  (страница 22). Пусть теперь  $\mathfrak{Z} \subseteq \mathfrak{Z}^* \subseteq \mathfrak{K}_r$ , где  $\mathfrak{Z}^*$  — максимальное коммутативное поле степени  $n^* \geq n$  над  $P$ . Требуется доказать  $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$ . Для этого достаточно показать  $n^* = n$ . Если  $r^*$  обозначает степень неприводимого представления расширения  $Z^*$  поля  $Z$ , изоморфного  $\mathfrak{Z}^*$ , то снова  $n^* = r^*t$ . С другой стороны,  $r$  делится на  $r^*$ , поскольку в  $\mathfrak{Z}^*$  имеется представление поля  $Z^*$  степени  $r$ ; следовательно,  $r^* \leq r$ . Из

$$n \leq n^* = r^*t \leq rt = n \quad \text{следует} \quad n^* = n.$$

2. Пусть неприводимое представление  $\mathfrak{Z}$  степени  $r$  коммутативного расширения  $Z$  поля  $P$  в  $\mathfrak{K}$  является максимальным коммутативным подполем  $\mathfrak{K}_r$ . Пусть  $\mathfrak{T}$  — тело автоморфизмов простых идеалов системы  $\mathfrak{K}_Z$ , то есть

$$\mathfrak{K}_Z = \sum_1^{t'} \mathfrak{T}c_{ik}.$$

Тело  $\mathfrak{T}$  содержит  $Z$ . Требуется доказать  $\mathfrak{T} = Z$ . Но простой правый идеал  $\mathfrak{r}$  кольца  $\mathfrak{K}_r$  является модулем представления не только поля  $Z$  в  $\mathfrak{K}$ , но и тела  $\mathfrak{T}$ , поскольку

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{T}c_{i1} + \dots + \mathfrak{T}c_{ik},$$

то есть  $\mathfrak{T}\mathfrak{r} = \mathfrak{r}$ ; следовательно,  $\mathfrak{r}$  — левый  $\mathfrak{T}$ -модуль и, конечно, правый  $\mathfrak{K}$ -модуль.

Таким образом, в  $\mathfrak{K}_r$  существует подполе  $\overline{\mathfrak{T}}$ , изоморфное  $\mathfrak{T}$  и содержащее  $\mathfrak{Z}$ . Если бы  $\mathfrak{T}$  отличалось от  $Z$ , а значит,  $\overline{\mathfrak{T}}$  от  $\mathfrak{Z}$ , то присоединение к  $\mathfrak{Z}$  элемента  $\alpha$  тела  $\overline{\mathfrak{T}}$ , не принадлежащего  $\mathfrak{Z}$ , дало бы собственное коммутативное расширение  $\mathfrak{Z}$  внутри  $\mathfrak{K}_r$ , что противоречит максимальной  $\mathfrak{Z}$ , что и требовалось доказать.

Из теоремы 5 непосредственно следует

**Теорема 6.** *Максимальные коммутативные подполя тела  $\mathfrak{K}$  имеют степень  $t$  над  $P$  и являются полями расщепления<sup>3</sup>.*

<sup>3</sup>Предположение, что всякое поле расщепления содержит также максимальное коммутативное подполе тела  $\mathfrak{K}$ , неверно: существуют поля расщепления, не обладающие этим свойством; соответствующее  $r$  заведомо больше 1. См.: R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen; Sitzungsberichte d. preuss. Akademie der Wissch. 1927 XXXII, Seite 221.

Теперь докажем теорему об изоморфизме подколец  $\mathfrak{K}_r$ , на которой основаны более точное знание структуры группы Галуа тела  $\mathfrak{K}$  и связанные с ним факты.

**Теорема 7.** Пусть  $\mathfrak{S}_1$  и  $\mathfrak{S}_2$  — двусторонние простые подкольца матричного кольца  $\mathfrak{K}_r$  над  $\mathfrak{K}$ , содержащие  $P$ , и пусть между ними существует изоморфизм  $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$ , оставляющий каждый элемент  $P$  неподвижным. Тогда этот изоморфизм является преобразованием посредством некоторого регулярного элемента  $\tau$  кольца  $\mathfrak{K}_r$ .

Если друг другу соответствуют  $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$  и  $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$ , то

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

*Доказательство.* Построим кольцо  $\Sigma$ , реципрочно изоморфное  $\mathfrak{S}_1$  и  $\mathfrak{S}_2$ , и отождествим его подполе, изоморфное  $P$ , с  $P$ . Тогда  $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$  являются двумя реципрочными представлениями одной и той же степени  $r$  кольца  $\Sigma$  в  $\mathfrak{K}$ . По теореме 2 на странице 22 существует лишь один неприводимый класс реципрочных представлений, а значит, и лишь один класс представлений каждой заданной степени кольца  $\Sigma$  в  $\mathfrak{K}$  (кратный неприводимому классу). Поэтому  $\mathfrak{S}_1$  и  $\mathfrak{S}_2$  принадлежат одному классу, то есть получаются друг из друга преобразованием, что и требовалось доказать.

Из теоремы 7 непосредственно следует

**Теорема 8.** Группа автоморфизмов тела  $\mathfrak{K}$ , оставляющих каждый элемент  $P$  неподвижным, — то есть группа Галуа  $\mathfrak{G}$  тела  $\mathfrak{K}$  относительно его центра — совпадает с группой внутренних автоморфизмов тела  $\mathfrak{K}$ .

Для этого достаточно положить в теореме 7  $r = 1$  и  $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$ .

Следующие две теоремы показывают применимость развитой общей теории к рассмотрению специальных вопросов.

**Теорема 9.** Единственным некоммутативным телом конечной степени с центром  $R$ , равным полю вещественных чисел, является тело кватернионов.

*Доказательство.* Пусть  $\mathfrak{K}$  — некоммутативное тело с центром  $R$  (конечного ранга над  $R$ ). По теореме 6 степень  $\mathfrak{K}$  над  $R$  равна квадрату степени  $t$  максимального коммутативного подполя  $\mathfrak{K}$ . Поскольку таким подполем может быть лишь поле, изоморфное полю комплексных чисел, имеем  $t = 2$ , и степень  $\mathfrak{K}$  над  $R$  равна 4. Пусть  $\mathfrak{Z}_1$  — максимальное коммутативное подполе  $\mathfrak{K}$ . Тогда можно положить  $\mathfrak{Z}_1 = R(i)$ , где  $i^2 = -1$ . Но  $\mathfrak{Z}_2 = R(-i)$  также является полем, совпадающим как множество с  $\mathfrak{Z}_1$  и изоморфным  $\mathfrak{Z}_1$ .

Этот изоморфизм задается соответствием  $i \mapsto -i$ . Поэтому по теореме 7 существует элемент  $j^* \in \mathfrak{K}$ , для которого

$$j^{*-1}ij^* = -i.$$

Ранг  $\mathfrak{Z}_1(j^*)$  над  $\mathfrak{Z}_1$  не меньше 2, поскольку  $j^*$  не может принадлежать  $\mathfrak{Z}_1$ . Следовательно, ранг  $\mathfrak{Z}_1(j^*)$  над  $R$  равен 4, то есть это поле равно  $\mathfrak{K}$ , и можно написать:

$$\mathfrak{K} = R + Ri + Rj^* + Rij^*.$$

В силу

$$\begin{aligned} j^{*-2}1j^{*2} &= 1, \\ j^{*-2}ij^{*2} &= i, \\ j^{*-2}j^*j^{*2} &= j^*, \\ j^{*-2}ij^*j^{*2} &= ij^* \end{aligned}$$

элемент  $j^{*2}$  коммутирует со всеми элементами  $\mathfrak{K}$ , поэтому принадлежит центру  $R$ ; таким образом,  $j^{*2}$  есть вещественное число  $r$ . Число  $r$  не может быть положительным, иначе многочлен  $x^2 - r$  имел бы в коммутативном поле  $R(j^*)$  четыре корня:  $+\sqrt{r}, -\sqrt{r}, +j^*$  и  $-j^*$ . Следовательно,  $j^{*2} = -m^2$ ,  $m \in R$ . Положим  $j = j^*m^{-1}$ ; тогда  $j^2 = -1$ , и  $1, i, j, k = ij$  являются единицами кватернионов, что и требовалось доказать.

Доказательство, очевидно, остается справедливым, если вместо  $R$  взять любое вещественно алгебраически замкнутое поле.

**Теорема 10 (теорема Веддербёрна).** *Всякое конечное тело коммутативно.*

*Доказательство.* Пусть  $\mathfrak{K}$  — тело с конечным числом элементов, а  $P$  — его центр. Пусть  $t^2$  — степень  $\mathfrak{K}$  над  $P$ . Все максимальные коммутативные подполя  $\mathfrak{K}$  имеют степень  $t$  над  $P$ , а значит, одинаковое число элементов. Поэтому по известной теореме о полях Галуа (теореме Мура) они изоморфны; поскольку всякое поле Галуа является расширением Галуа своего простого подполя, эти изоморфизмы можно выбрать так, чтобы каждый элемент  $P$  соответствовал самому себе. Согласно теореме 7, все максимальные коммутативные подполя  $\mathfrak{K}$  получаются преобразованиями одного из них, обозначенного  $\mathfrak{Z}$ . Но  $\mathfrak{K}$  совпадает с объединением всех своих максимальных коммутативных подполей. (Присоединение к  $P$  одного элемента порождает коммутативное поле.) Рассмотрим теперь лишь мультипликативную группу  $\mathfrak{K}^*$  тела  $\mathfrak{K}$  (то есть  $\mathfrak{K}$  без нуля). Получается, что  $\mathfrak{K}^*$  является объединением подгрупп, сопряженных с подгруппой  $\mathfrak{Z}^*$ . При  $t > 1$  это дает противоречие. Действительно, пусть  $\mathfrak{K}^*$  содержит  $M$  элементов,  $\mathfrak{Z}^*$  содержит  $N$  элементов, а  $L$  — индекс  $\mathfrak{Z}^*$  в  $\mathfrak{K}^*$ . Тогда  $M = NL$ , а число различных сопряженных подгрупп не превосходит  $L$ . Даже если бы это число равнялось  $L$ , для того чтобы сопряженные подгруппы вместе исчерпывали всю группу, любые две из них не должны были бы иметь общих элементов. Но все они содержат единичный элемент.

## § 21. Теория Галуа некоммутативных тел

Пусть  $G$  — группа Галуа тела  $\mathfrak{K}$  относительно его центра  $P$ . Согласно теореме 8,  $G$  изоморфна  $\overline{G} = \mathfrak{K}^*/P^*$ ; будем считать этот изоморфизм фиксированным. Подгруппу  $H$  группы  $G$  назовем *замкнутой*, если соответствующая ей при изоморфизме  $G \simeq \mathfrak{K}^*/P^*$  подгруппа  $\mathfrak{H}^*$  группы  $\mathfrak{K}^*$  после присоединения нуля становится телом.

**Теорема 11. Основная теорема теории Галуа.** *Между замкнутыми подгруппами  $H$  группы  $G$  и телами  $\mathfrak{S}$ , лежащими между  $P$  и  $\mathfrak{K}$ , имеется взаимно однозначное соответствие, при котором для соответствующих друг другу  $H$  и  $\mathfrak{S}$  группа  $H$  является группой инвариантов тела  $\mathfrak{S}$ , а  $\mathfrak{S}$  — телом инвариантов группы  $H$ .*

*Доказательство.* Разобьем утверждение на три части:

1. Группа инвариантов  $H$  тела  $\mathfrak{S}$  замкнута.
  2. Если тело  $\mathfrak{S}$  имеет группу инвариантов  $H$ , то  $\mathfrak{S}$  есть тело инвариантов группы  $H$ .
  3. Если  $H$  имеет тело инвариантов  $\mathfrak{S}$ , то  $H$  есть группа инвариантов тела  $\mathfrak{S}$ .
1. При изоморфизме  $G \simeq \mathfrak{K}^*/P^*$  группе инвариантов  $H$  тела  $\mathfrak{S}$  соответствует множество  $\mathfrak{H}^*$  всех ненулевых элементов  $\mathfrak{K}$ , коммутирующих с каждым элементом  $\mathfrak{S}$ . Вместе с 0 они, разумеется, образуют тело, то есть  $H$  замкнута.
  2. Третью часть сведем ко второй. Телу  $\mathfrak{S}$  соответствует подгруппа  $S$  группы  $G$ , а именно подгруппа  $G$ , отвечающая  $\mathfrak{S}^*/P^*$ . Аналогично группе  $H$  соответствует подтело  $\mathfrak{H}$  тела  $\mathfrak{K}$ , причем  $H \simeq \mathfrak{H}^*/P^*$ . Если  $\mathfrak{S}$  — тело инвариантов группы  $H$ , то  $\mathfrak{S}$  состоит из всех элементов  $\mathfrak{K}$ , коммутирующих с каждым элементом  $\mathfrak{H}$ ; иначе говоря,  $S$  есть группа инвариантов тела  $\mathfrak{H}$ . Соответственно, если  $H$  — группа инвариантов тела  $\mathfrak{S}$ , то  $\mathfrak{H}$  есть тело инвариантов группы  $S$ . Поэтому третью часть можно сформулировать также так:
  - 3'. Если тело  $\mathfrak{H}$  имеет группу инвариантов  $S$ , то  $\mathfrak{H}$  есть тело инвариантов группы  $S$ ; это в точности вторая часть, которую теперь остается доказать.
  3. Это доказательство, за небольшими отклонениями, проводится так же, как в коммутативном случае:

Построим тело  $K$ , реципрочно изоморфное  $\mathfrak{K}$ , и отождествим его центр с  $P$ . Вместо автоморфизмов тела  $\mathfrak{K}$  можно рассматривать реципрочные изоморфизмы тела  $\mathfrak{S}$  с  $K$ .

Снова докажем вспомогательную теорему, аналогичную теореме о продолжении, использованной в коммутативном случае.

Пусть  $\mathfrak{S}$  и  $\mathfrak{T}$  — тела, лежащие между  $\mathcal{P}$  и  $\mathfrak{K}$ ,

$$\mathcal{P} \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{K}.$$

Утверждается, что каждый реципрокный изоморфизм  $\mathfrak{S}$  на некоторое подтело  $K$  (реципрокное представление первой степени тела  $\mathfrak{S}$  в  $K$ ) продолжается до реципрокных изоморфизмов  $\mathfrak{T}$  по меньшей мере столькими способами, какова степень  $s$  тела  $\mathfrak{T}$  над  $\mathfrak{S}$ .

Расширим тела  $\mathcal{P}$ ,  $\mathfrak{S}$ ,  $\mathfrak{T}$ ,  $\mathfrak{K}$  посредством  $K$ :

$$K \subseteq \mathfrak{S}_K \subseteq \mathfrak{T}_K \subseteq \mathfrak{K}_K.$$

По теореме 1 на странице 20 каждое  $\mathfrak{S}_K$  двусторонне просто и вполне приводимо, а его простые левые идеалы, операторно-изоморфные между собой, являются модулями представления единственного неприводимого класса представлений тела  $\mathfrak{S}$  в  $K$ . Этот класс представлений имеет степень 1 — ведь по построению  $K$  в  $K$  имеются тела, реципрокно изоморфные  $\mathfrak{S}$ . Поэтому все простые левые идеалы имеют ранг 1, то есть получается сумма стольких левых идеалов, какова его степень над  $\mathcal{P}$ :

$$\mathfrak{S}_K = KE_1 + \cdots + KE_p, \quad KE_\nu = \mathfrak{S}_K E_\nu.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \mathfrak{T}_K &= \mathfrak{T} \cdot K = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_K, \\ \mathfrak{T}_K &= \mathfrak{T} \mathfrak{S}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T} \mathfrak{S}_K E_p = \mathfrak{T}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_K E_p. \end{aligned}$$

Каждый идеал  $\mathfrak{T}_K \cdot E_\nu$  распадается в прямую сумму  $s$  простых идеалов, поскольку

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : KE_\nu] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : \mathfrak{S}_K E_\nu] \leq [\mathfrak{T}_K : \mathfrak{S}_K] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

и

$$\sum [\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = sp$$

следовательно,

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = s, \quad \mathfrak{T}_K E_\nu = Ke_1^{(\nu)} + \cdots + Ke_s^{(\nu)}.$$

Представление  $\mathfrak{T}$ , порожденное идеалом  $Ke_i^{(\nu)}$ , является продолжением представления  $\mathfrak{S}$ , заданного идеалом  $KE_\nu$ . Действительно, если  $\alpha \in \mathfrak{S}$ , то

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \quad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \quad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

Остается доказать лишь, что все представления, порожденные идеалами  $Ke_i^{(\nu)}$ , различны. В коммутативном случае это было ясно, поскольку они принадлежали разным классам представлений. Здесь, напротив, все они принадлежат одному классу представлений, поэтому нужно рассмотреть сами представления. Рассмотрим порожденные идеалами  $Ke_i^{(\nu)}$   $K$ -гомоморфные отображения всей системы  $\mathfrak{T}_K$ . Они полностью определены уже тогда, когда известны представления тела  $\mathfrak{T}$ , поскольку для задания всего отображения достаточно знать, как представляются базисные элементы. Поэтому достаточно показать, что полученные посредством  $Ke_i^{(\nu)}$  отображения  $\mathfrak{T}_K$  попарно различны. Если представить  $e_i^{(\nu)}$  один раз посредством модуля представления  $Ke_i^{(\nu)}$ , а другой раз посредством  $Ke_j^{(\nu)}$ , то ввиду

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)}$$

в первом случае представляющим элементом  $e_i^{(\nu)}$  будет 1, тогда как ввиду

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0$$

во втором случае им будет 0. Таким образом, два представления действительно различны. (Те же рассуждения применимы и в коммутативном случае, но там они излишни.)

Далее рассуждаем точно так же, как на страницах 10 и 16. Пусть  $H$  — группа инвариантов тела  $\mathfrak{S}$ , а  $\mathfrak{T}$  — тело инвариантов группы  $H$ . Элементы  $H$  являются всеми продолжениями тождественного автоморфизма тела  $\mathfrak{S}$  на все тело  $\mathfrak{K}$ . По только что доказанной вспомогательной теореме среди них существует по меньшей мере  $s$  продолжений, различных на  $\mathfrak{T}$ . Поэтому необходимо  $s = 1$ ,  $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$ , что и требовалось доказать.

## Глава V. Фактор-системы

### § 22. Группа тел с заданным центром

Зафиксируем в качестве основы наших исследований коммутативное поле  $P$ . Совокупность всех матричных колец  $\mathfrak{K}_r$ , тела автоморфизмов  $\mathfrak{K}$  которых имеют конечный ранг над  $P$  и центр, равный самому  $P$ , образует мультипликативно замкнутую систему относительно «прямого произведения». Прямое произведение двух таких колец  $\mathfrak{K}_r$  и  $\mathfrak{L}_s$  есть просто кольцо  $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$ , полученное из  $\mathfrak{K}_r$  расширением основного тела до  $\mathfrak{L}_s$ :

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s.$$

Согласно замечанию на странице 22, это прямое произведение коммутативно:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r.$$

Утверждение о мультипликативной замкнутости системы всех  $\mathfrak{K}_r$  означает лишь, что  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \mathfrak{L}_s$  снова является матричным кольцом, тело автоморфизмов  $\mathfrak{M}$  которого имеет центр  $P$ ; конечность ранга над  $P$  очевидна. По теореме 1 на странице 20 кольцо  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$  двусторонне просто и вполне приводимо, а значит, является матричным кольцом над телом  $\mathfrak{M}$ , расширяющим  $P$ . Равенство центра  $\mathfrak{M}$  полю  $P$  непосредственно следует из того, что, во-первых,  $P$  заведомо содержится в этом центре, а во-вторых, центр должен содержаться в центре  $P$  тела  $\mathfrak{K}$  (или тела  $\mathfrak{L}$ ). Умножение  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ , очевидно, ассоциативно. Кольца  $\mathfrak{K}_r$  образуют мультипликативно замкнутую систему, но не группу: если  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$ , то непременно  $m \geq rs$ , поэтому при  $r > m$  невозможно найти  $\mathfrak{L}_s$ , удовлетворяющее равенству  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$ .

Объединим теперь все  $\mathfrak{K}_r$  с одним и тем же  $\mathfrak{K}$  в класс  $\{\mathfrak{K}\}$ . Тогда справедливо следующее: если  $\mathfrak{K}_r$  и  $\mathfrak{K}_{r'}$  принадлежат одному классу  $\{\mathfrak{K}\}$ , а  $\mathfrak{L}_s$  и  $\mathfrak{L}_{s'}$  — одному классу  $\{\mathfrak{L}\}$ , то  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$  и  $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$  также принадлежат одному классу. Достаточно показать, что  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$  принадлежит тому же классу, что и  $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$ , то есть что из  $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$  следует:  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$  есть матричное кольцо над  $\mathfrak{M}$ . Это легко видеть:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left( \sum_1^r \mathfrak{K} c_{ik} \right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K} \mathfrak{L} c_{ik} = \sum_1^r \mathfrak{M}_m c_{ik}.$$

Это матричное кольцо степени  $r$  над  $\mathfrak{M}_m$ , а значит, конечно, матричное кольцо степени  $mr$  над  $\mathfrak{M}$ . Далее точно так же получаем

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \left( \sum_1^s \mathfrak{L} d_{ik} \right)_{\mathfrak{K}_r} = \sum_1^s \mathfrak{L}_{\mathfrak{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathfrak{M}_{mr} d_{ik} = \mathfrak{M}_{mrs}$$

что доказывает утверждение. Запомним, что из  $\mathfrak{L} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{M}_m$  следует  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_{mrs}$ .

Из доказанного следует, что если определить произведение двух классов  $\{\mathfrak{K}\}$  и  $\{\mathfrak{L}\}$  как класс произведения некоторого представителя  $\{\mathfrak{K}\}$  с некоторым представителем  $\{\mathfrak{L}\}$ , то это определение не зависит от выбора представителей.

Таким образом, отображение  $\mathfrak{K}_r \mapsto \{\mathfrak{K}\}$  является гомоморфизмом системы всех  $\mathfrak{K}_r$  на множество всех классов  $\{\mathfrak{K}\}$ ; следовательно, множество  $\mathcal{K}$  классов  $\{\mathfrak{K}\}$  представляет собой мультипликативно замкнутую систему. Докажем, что  $\mathcal{K}$  — группа. Единичным элементом, как непосредственно видно, является класс  $\{P\}$ , поскольку  $\mathfrak{K}_r \times P = \mathfrak{K}_r$ .

Остается доказать существование для каждого класса  $\{\mathfrak{K}\}$  обратного класса  $\{\mathfrak{K}\}^{-1}$ . Оказывается, необходимо положить  $\{\mathfrak{K}\}^{-1} = \{\bar{\mathfrak{K}}\}$ , где  $\{\bar{\mathfrak{K}}\}$  обозначает тело, реципрочно изоморфное  $\mathfrak{K}$ . Иначе говоря,  $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$  должно быть матричным кольцом над  $P$ , или, если  $\mathfrak{K}$  имеет ранг  $t^2$ , а  $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$  — ранг  $t^4$  над  $P$ , то  $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$  должно распадаться в прямую сумму  $t^2$  простых левых идеалов. Это следует из того, что простой левый идеал системы  $\mathfrak{K} \times \bar{\mathfrak{K}}$ , рассматриваемый как модуль неприводимого реципрочного представления тела  $\bar{\mathfrak{K}}$  в  $\mathfrak{K}$ , имеющего степень 1, обладает рангом 1 над  $\bar{\mathfrak{K}}$ , то есть рангом  $t^2$  над  $P$ .

Назовем  $\mathfrak{K}$  *простым телом*, если между  $P$  и  $\mathfrak{K}$  нет тела, центр которого также равен  $P$ .

**Теорема.** Всякое тело  $\mathfrak{K}$  является прямым произведением простых подтел  $\mathfrak{K}^{(i)}$ ,

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \cdots \times \mathfrak{K}^{(p)}.$$

*Доказательство.* Достаточно показать, что если  $\mathfrak{K}^{(1)}$  — подтело тела  $\mathfrak{K}$  с центром  $P$ , то существует подтело  $\mathfrak{S}$  тела  $\mathfrak{K}$  с центром  $P$ , удовлетворяющее равенству

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{K}$$

Во всяком случае существует класс  $\{\mathfrak{S}\}$ , обладающий свойством

$$\{\mathfrak{K}^{(1)}\} \times \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{K}\}$$

а именно

$$\{\mathfrak{S}\} = \{\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}\} \times \{\mathfrak{K}\}. \quad \text{Пусть} \quad \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Тогда

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{K}^{(1)} \times \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = P_{t^2} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{K}_{t^2}, \quad t^2 = \text{ранг } \mathfrak{K}^{(1)}.$$

Но  $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda$  является матричным кольцом степени, не меньшей  $\lambda$ , поэтому  $\lambda \leq t^2$ . Система  $\mathfrak{S}_\lambda = \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K}$  должна распадаться в простые идеалы ранга 1 над  $\mathfrak{K}$ , поскольку  $\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}$  допускает реципрокные представления первой степени в  $\mathfrak{K}$ . Следовательно,  $\lambda \geq t^2$ ,  $\lambda = t^2$ ,

$$\mathfrak{K}_{t^2} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2}.$$

Поэтому само  $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$  должно быть телом и

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2} = (\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S})_{t^2} = \mathfrak{K}_{t^2}.$$

Тело  $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$  является телом автоморфизмов простых левых идеалов одного разложения  $\mathfrak{K}_{t^2}$ , а  $\mathfrak{K}$  — телом автоморфизмов простых левых идеалов другого разложения  $\mathfrak{K}_{t^2}$ . Поскольку любые два различных левых идеала  $\mathfrak{K}_{t^2}$  можно включить в одно разложение, тела  $\mathfrak{K}$  и  $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$  изоморфны; этот изоморфизм можно выбрать так, чтобы он оставлял каждый элемент  $P$  неподвижным. Поэтому по теореме 7 на странице 25 этот изоморфизм порождается внутренним автоморфизмом кольца  $\mathfrak{K}_{t^2}$ :

$$\mathfrak{K} = \lambda^{-1}(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S})\lambda = \lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda \times \lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda, \quad \lambda \in \mathfrak{K}_{t^2}.$$

Тело  $\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda$  есть подтело  $\mathfrak{K}$ , изоморфное  $\mathfrak{K}^{(1)}$ . Поэтому по теореме 7 на странице 25 для подходящего  $\mu$  из  $\mathfrak{K}$  имеем

$$\mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda\mu = \mathfrak{K}^{(1)}$$

а значит,

$$\mu^{-1}\mathfrak{K}\mu = \mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda\mu,$$

что и требовалось доказать.

## § 23. Фактор-системы

В последующих исследованиях предполагается, что основное поле  $P$  совершенно. Вместо этого можно принять более общее предположение: рассматриваются лишь такие некоммутативные тела  $\mathfrak{K}$  с центром  $P$ , для которых каждое  $\mathfrak{K}_r$  содержит максимальное коммутативное подполе первого рода над  $P$ . (Как тем временем показал Кёте, это верно для всякого  $\mathfrak{K}$ .)

Пусть  $Z$  — поле расщепления некоммутативного тела  $\mathfrak{K}$  с центром  $P$ , а неприводимое представление  $\mathfrak{Z}$  поля  $Z$  в  $\mathfrak{K}$  имеет степень  $r$ ; тогда оно является максимальным коммутативным подполем  $\mathfrak{K}_r$ . Пусть  $\Gamma$  — галуа-замыкание поля  $Z$ , то есть

$$\mathfrak{Z}_\Gamma = e_1\Gamma + \cdots + e_n\Gamma \quad (\text{страница 9})$$

где  $n$  — степень  $Z$  над  $P$ . Для кольца  $\mathfrak{K}_r$ , расширенного посредством  $\Gamma$ , получается также разложение

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_r\Gamma e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_r\Gamma e_n$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_r\Gamma e_i.$$



Идеалы  $\mathfrak{l}_i$ , очевидно, левые. Более того, это простые левые идеалы: поскольку  $Z$  — поле расщепления,  $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$  является матричным кольцом степени  $r \cdot t = n$  над  $\Gamma$ . (Теорема 4, страница 23;  $n = rt$  на странице 22.) Полученное разложение  $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$  в простые левые идеалы особенно хорошо согласовано с алгебраическими свойствами  $\mathfrak{K}$  и  $Z$ . Действительно, определим, как на странице 18, действие подстановки  $S$  группы Галуа  $\mathfrak{G}$  расширения  $\Gamma/\mathbb{P}$  на всех элементах  $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ , полагая для каждого элемента  $z$  кольца  $\mathfrak{K}_r$

$$S(z) = z$$

Тогда идеалы  $\mathfrak{l}_i$  сопряжены, то есть применение  $S$  к  $\mathfrak{l}_j$  дает некоторый другой идеал:

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

поскольку каждая неразложимая компонента  $e_j$  единицы должна перейти в другую компоненту  $e_i$ . (См. также страницу 11.)

Модуль представления  $e_i\Gamma$  отображает  $\mathfrak{Z}$  на подполе  $Z_i$  поля  $\Gamma$ . Элемент  $e_i$  уже лежит в  $\mathfrak{Z}_{Z_i}$ , поскольку представление  $Z_i$  системы  $\mathfrak{Z}$  уже содержится в  $Z_i$ , а значит,  $\mathfrak{Z}_{Z_i}$  должно выделять модуль представления  $e_i Z_i$  в прямое слагаемое. Обозначим через  $\{Z_i, Z_k\}$  композит полей  $Z_i$  и  $Z_k$ . Кольцо  $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$  выделяет два левых идеала

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}} e_i, \quad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}} e_k$$

которые просты, поскольку  $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} \bar{\mathfrak{l}}_i$ . Поэтому

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \sum_{\lambda=1}^m \{Z_i, Z_k\} c_{\lambda i}^{(ik)}, \quad \bar{\mathfrak{l}}_k = \sum_{\lambda} \{Z_i, Z_k\} c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

При этом  $c_{\lambda \rho}^{(ik)}$  — система матричных единиц кольца  $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$ .

Каждый изоморфизм  $a_i \mapsto a_k$  идеала  $\bar{\mathfrak{l}}_i$  на  $\bar{\mathfrak{l}}_k$  с кольцом операторов  $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$  определяется элементом  $p_{ik}$  при  $e_i \mapsto p_{ik}$ , поскольку тогда  $a_i = a_i e_i \mapsto a_i p_{ik}$ , то есть  $\bar{\mathfrak{l}}_i \cdot p_{ik} = \bar{\mathfrak{l}}_k$ . Все возможные элементы  $p_{ik}$ , очевидно, имеют вид

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)} \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{из} \quad \{Z_i, Z_k\}.$$

Соответствие  $a_i \mapsto a_i p_{ik}$  задает также операторный изоморфизм  $\mathfrak{l}_i$  на  $\mathfrak{l}_k$ . Теперь выберем определенные системы таких элементов  $p_{ik}$ , наложив на них условие сопряженности.

Действие  $S$  на индекс  $i$  определим равенством

$$S(i) = k, \quad \text{если} \quad S(Z_i) = Z_k.$$

Для каждой пары индексов  $(\nu, \mu)$  существует по меньшей мере одна сопряженная пара  $S(\nu, \mu)$  вида  $S(\nu, \mu) = (1, k)$ . В каждом классе сопряженных пар индексов выберем фиксированную пару  $(1, k)$  и для этой пары  $(1, k)$  положим

$$p_{1k} = c_{1k}^{(1k)} \gamma_{1k}, \quad \gamma_{1k} \neq 0 \quad \text{из} \quad \{Z_1, Z_k\},$$

выбирая его в остальном произвольно; затем, если  $S(1, k) = (\nu, \mu)$ , положим

$$p_{\nu\mu} = S(p_{1k}).$$

Тогда  $p_{\nu\mu}$  действительно имеет вид

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)} \gamma_{\nu\mu}, \quad \gamma_{\nu\mu} \neq 0 \quad \text{из} \quad \{Z_\nu, Z_\mu\}.$$

Действительно, применение  $S$  к изоморфизму

$$a_1 \mapsto a_1 p_{1k}, \quad \text{в частности} \quad e_1 \mapsto p_{1k} \quad \text{из} \quad \bar{\mathfrak{l}}_1 \text{ на } \bar{\mathfrak{l}}_k$$

дает изоморфизм

$$a_\nu \mapsto a_\nu p_{\nu\mu}, \quad \text{в частности} \quad e_\nu \mapsto p_{\nu\mu} \quad \text{из} \quad \bar{\mathfrak{l}}_\nu \text{ на } \bar{\mathfrak{l}}_\mu.$$

Пусть  $c_{\lambda\rho}$  — система матричных единиц кольца  $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ . Ясно, что  $p_{\nu\mu}$  можно записать также в виде

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu} \bar{\gamma}_{\nu\mu}$$

Поэтому соотношения

$$c_{ij}c_{1k} = 0, \quad \text{если } j \neq 1, \quad c_{ij}c_{jk} = c_{ik}$$

влекут соотношения

$$\begin{aligned} p_{ij}p_{1k} &= 0, & \text{если } j \neq 1, \\ p_{ij}p_{jk} &= \alpha_{ik}^{(j)} p_{ik}, & \alpha_{ik}^{(j)} \text{ из } \Gamma \text{ (точнее, из } \{Z_i, Z_j, Z_k\}) \end{aligned}$$

Величины  $\alpha$ , числом  $n^3$ , образуют *фактор-систему тела  $\mathfrak{K}$  относительно поля  $Z$* , соответствующую системе  $p_{ik}$  «псевдматричных единиц».

Величины  $\alpha$  сопряжены: из  $S(i, k, j) = (\nu, \mu, \tau)$  следует

$$S(\alpha_{ik}^{(j)}) = \alpha_{\nu\mu}^\tau.$$

Каждая система  $p_{ik}^*$  псевдматричных единиц получается из системы  $p_{ik}$ , если умножить исходные элементы  $p_{ik}$  на произвольные  $\delta_{ik} \neq 0$  из  $\{Z_i, Z_k\}$ :

$$p_{1k}^* = p_{1k} \delta_{1k}$$

и затем, если  $S(1, k) = (\nu, \mu)$ , снова положить

$$p_{\nu\mu}^* = S(p_{1k}^*)$$

Таким образом,

$$p_{\nu\mu}^* = p_{\nu\mu} \delta_{\nu\mu}$$

с  $\delta_{\nu\mu}$  из  $\{Z_\nu, Z_\mu\}$ . Величины  $\delta_{\nu\mu}$  сопряжены: из  $S(i, k) = (\nu, \mu)$  следует  $S(\delta_{ik}) = \delta_{\nu\mu}$ . Если  $\alpha^*$  — фактор-система, соответствующая  $p_{ik}^*$ , то

$$\alpha_{ik}^{(j)*} = \frac{\delta_{ij}\delta_{jk}}{\delta_{ik}} \alpha_{ik}^{(j)}.$$

Фактор-системы  $\alpha^*$  и  $\alpha$  называются *ассоциированными* (как и  $p_{ik}^*$  и  $p_{ik}$ ); все фактор-системы тела  $\mathfrak{K}$  относительно поля  $Z$  образуют класс  $\{\alpha\}$  ассоциированных фактор-систем.

Класс  $\{\alpha\}$  не зависит от того, какое представление  $\mathfrak{Z}$  поля  $Z$  в  $\mathfrak{K}_r$  положено в основу его определения. Действительно, переход от одного  $\mathfrak{Z}$  к другому можно выполнить преобразованием посредством элемента  $\lambda$  кольца  $\mathfrak{K}_r$ , инвариантного относительно  $\mathfrak{G}$ . Поэтому из системы  $p_{ik}$ , соответствующей  $\mathfrak{Z}$ , получается система

$$p'_{ik} = \lambda^{-1} p_{ik} \lambda,$$

соответствующая  $\mathfrak{Z}'$ ; фактор-системы для  $p_{ik}$  и  $p'_{ik}$ , однако, совпадают.

Фактор-система есть не что иное, как таблица умножения кольца  $\mathfrak{K}_{n\Gamma}$ , согласованная с особыми алгебраическими свойствами тела  $\mathfrak{K}$ .

## § 24. Умножение фактор-систем

Вместо поля расщепления некоммутативного тела  $\mathfrak{K}$  мы говорим также о поле расщепления класса  $\{\mathfrak{K}\}$ . Это имеет смысл, поскольку вместе с  $\mathfrak{K}_Z$  каждое кольцо  $\mathfrak{K}_{rZ}$  распадается на абсолютно неприводимые компоненты, и обратно.

Любые два тела  $\mathfrak{K}$ ,  $\mathfrak{E}$  с центром  $P$  имеют общие поля расщепления, например композит поля расщепления тела  $\mathfrak{K}$  и поля расщепления тела  $\mathfrak{E}$ .

**Теорема 1.** *Классы  $\{\mathfrak{K}\}$ , для которых поле  $Z$  является полем расщепления, образуют подгруппу  $\mathcal{H}_Z$  группы  $\mathcal{H}$  всех классов  $\{\mathfrak{K}\}$ .*

*Доказательство.* Если  $Z$  — поле расщепления тел  $\mathfrak{K}$  и  $\mathfrak{S}$ , то  $\mathfrak{K}_Z$  и  $\mathfrak{S}_Z$ , а значит, также  $(\mathfrak{K} \times \mathfrak{S})_Z$ , распадаются на абсолютно неприводимые компоненты. Следовательно,  $Z$  — поле расщепления класса  $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$  (теорема 4 на странице 23).

Реципрокно изоморфные тела имеют одни и те же поля расщепления.

Проведем вспомогательное рассуждение. Пусть

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{L}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r, \quad P_m = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_m$$

— разложения  $\mathfrak{K}_r, P_m$  в простые левые идеалы. Тогда

$$\mathfrak{K}_{rm} = \mathfrak{K}_r \times P_m = \mathfrak{L}_1 \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_i \mathfrak{z}_j + \cdots + \mathfrak{L}_r \mathfrak{z}_m$$

есть разложение  $\mathfrak{K}_{rm}$  в  $rm$  ненулевых, а значит, простых левых идеалов. Поэтому каждый левый идеал  $A$  длины  $r$  кольца  $\mathfrak{K}_{rm}$  связан внутренним автоморфизмом  $\mathfrak{K}_r$  с левым идеалом длины  $r$

$$\mathfrak{L}_1 \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r \mathfrak{z}_1 = \mathfrak{K}_r \mathfrak{z}_1$$

$$A = \tau^{-1} \mathfrak{K}_r \tau \cdot \tau^{-1} \mathfrak{z}_1 \tau = \mathfrak{K}'_r \cdot \mathfrak{z}'_1.$$

Пусть  $\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$  — разложение  $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$  в сопряженные левые идеалы, соответствующее некоторому  $\mathfrak{z}$  в  $\mathfrak{K}_r$ , причем  $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i$ . Тогда ввиду

$$S(\tau^{-1} \mathfrak{l}_i \tau \cdot \mathfrak{z}'_1) = S(\tau^{-1} \mathfrak{l}_i \tau) \mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1} (S \mathfrak{l}_i) \tau \cdot \mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1} \mathfrak{l}_k \tau \cdot \mathfrak{z}'_1$$

получаем в

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}'_1 \mathfrak{z}'_1 + \cdots + \mathfrak{l}'_n \mathfrak{z}'_1 \quad (1)$$

разложение  $A_\Gamma$  в сопряженные левые идеалы. Здесь

$$\mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{K}_{rm\Gamma} \cdot e'_i E',$$

если положить  $\tau^{-1} e_i \tau = e'_i$  и обозначить через  $E'$  единицу идеала  $\mathfrak{z}'_1$ .

Всякое другое разложение

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n, \quad S \mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_k \quad \text{если} \quad S \mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{l}'_k \mathfrak{z}'_1 \quad (2)$$

в сопряженные левые идеалы получается из (1) преобразованием посредством некоторого элемента  $\lambda$  кольца  $\mathfrak{K}_{rm}$ :

$$\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1} \mathfrak{l}'_i \mathfrak{z}'_1 \lambda, \quad \text{то есть, если } e_i^* \text{ — единица } \mathfrak{q}_i, \quad e_i^* = \lambda^{-1} e'_i E' \lambda.$$

Доказательство непосредственно следует из следующей вспомогательной теоремы.

**Вспомогательная теорема.** Пусть  $A$  — левый идеал кольца  $\mathfrak{K}_n$ , и пусть

$$A = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n$$

— существующее по предположению разложение в сопряженные левые идеалы; без ограничения общности идеалы  $\mathfrak{l}_i$  можно считать сопряженными.

Пусть  $\mathfrak{z}$  операторно-изоморфен  $A$ , и пусть выполнены те же предположения:

$$\mathfrak{z} = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1^* + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n^*$$

(то есть  $\mathfrak{q}_i$  и  $e_i^*$  сопряжены). Тогда существует регулярный элемент  $\lambda$  кольца  $\mathfrak{K}_n$ , такой что  $\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1} \mathfrak{l}_i \lambda$ .

*Доказательство.* 1. То, что элементы  $e_i$  можно считать сопряженными, следует так. Если  $e_1$  — произвольный порождающий идемпотент идеала  $\mathfrak{l}_1$ , то есть  $\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1$ , то применение автоморфизма поля  $\Gamma$  дает  $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_i$ , где  $e_i$ , сопряженный с  $e_1$ , снова является порождающим идемпотентом.

2. Каждый идеал  $\mathfrak{l}$  изоморфен каждому идеалу  $\mathfrak{q}$ . Действительно, все сопряженные идеалы  $\mathfrak{l}$  имеют одинаковую абсолютную длину, число идеалов  $\mathfrak{l}$  равно числу идеалов  $\mathfrak{q}$ , а  $\mathfrak{z}$  и  $A$  по предположению изоморфны.

3. Зафиксируем изоморфизм между  $\mathfrak{l}_1$  и  $\mathfrak{q}_1$  и обратный к нему посредством соответствий

$$e_1 \mapsto s_1 = e_1 s_1; \quad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^* t_1; \quad s_1 t_1 = e_1; \quad t_1 s_1 = e_1^* \quad (3)$$

Применение всех автоморфизмов переводит (3) в

$$e_i \mapsto s_i = e_i s_i; \quad e_i^* \mapsto t_i = e_i^* t_i; \quad s_i t_i = e_i; \quad t_i s_i = e_i^*,$$

что задает изоморфизмы  $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s_i$  и  $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t_i$ .

4. Положим теперь

$$s = s_1 + \cdots + s_n; \quad t = t_1 + \cdots + t_n;$$

Тогда

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s; \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t; \quad st = e_1 + \cdots + e_n = \xi; \quad ts = e_1^* + \cdots + e_n^* = \xi^*,$$

причем  $\xi$  и  $\xi^*$  лежат в  $\mathfrak{K}_n$ , и

$$A\xi = A, \quad \mathfrak{z}\xi^* = \mathfrak{z} \quad (\text{поскольку } \mathfrak{l}_i \xi = \mathfrak{l}_i \mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \quad \xi^{*2} = \xi^*.$$

Если теперь положить  $e = \overline{E} + E = \overline{E}^* + E^*$ , а вместе с этим

$$\mathfrak{K}_n = \overline{A} + A = \mathfrak{K}_n \overline{\xi} + \mathfrak{K}_n \xi = \overline{\mathfrak{z}} + \mathfrak{z} = \mathfrak{K}_n \overline{\xi}^* + \mathfrak{K}_n \xi^*,$$

то  $\overline{A}$  и  $\overline{\mathfrak{z}}$  также изоморфны. Пусть

$$\overline{E} \mapsto \overline{s} = \overline{E} \overline{s} \quad \text{и} \quad \overline{E}^* \mapsto \overline{t} = \overline{E}^* \overline{t}$$

— взаимно обратные изоморфизмы, и положим

$$\lambda = s + \overline{s}, \quad \mu = t + \overline{t},$$

Тогда

$$\lambda \mu = \mu \lambda = e, \quad \mathfrak{l}_i \lambda = \mathfrak{q}_i, \quad \lambda^{-1} \mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_i \quad (\lambda^{-1} \mathfrak{q}_i \subseteq \mathfrak{q}_i = \lambda \cdot \lambda^{-1} \mathfrak{q}_i \subseteq \lambda^{-1} \mathfrak{q}_i)$$

и, следовательно,

$$\lambda^{-1} \mathfrak{l}_i \lambda = \mathfrak{q}_i, \quad \text{что и требовалось доказать.}$$

Для разложения (1) снова можно определить элементы

$$r_{ik} = c_{ik}^{(ik)} \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ik} \in \{Z_i, Z_k\},$$

которые посредством  $e_i' E' \mapsto r_{ik}$  задают операторные изоморфизмы между идеалами  $\mathfrak{l}_i' \mathfrak{z}_1'$  и  $\mathfrak{l}_k' \mathfrak{z}_1'$  и удовлетворяют условию сопряженности  $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$ , если  $S(i, k) = (\nu, \mu)$ . Равенства

$$r_{ij} r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)} r_{ik}$$

определяют фактор-систему  $\alpha$  идеала  $A_\Gamma$ . Существенно, что для определения фактор-систем  $A_\Gamma$  можно использовать также произвольное разложение (2). Действительно, заменим систему  $r_{ik}$ , соответствующую (1), системой  $r_{ik}' = \lambda^{-1} r_{ik} \lambda$ . Тогда  $e_i^* \mapsto r_{ik}'$  задает операторный изоморфизм  $\mathfrak{q}_i$  на  $\mathfrak{q}_k$ ; элементы  $r_{ik}'$  удовлетворяют условию сопряженности, поскольку  $\lambda$  инвариантен относительно  $\mathfrak{q}$ , и элементы  $r_{ik}'$  имеют ту же фактор-систему, что и  $r_{ik}$ .

Если  $p_{ik}$  — система псевдматричных единиц тела  $\mathfrak{K}$ , то

$$r_{ik} = \tau^{-1} p_{ik} \tau \cdot E'$$

есть система элементов  $r_{ik}$  идеала  $A_\Gamma$  с той же фактор-системой. Итак, доказана вспомогательная теорема:

**Теорема.** Фактор-системы идеала  $A_\Gamma$ , построенные при помощи любого разложения

$$A_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n$$

идеала  $A_\Gamma$  в сопряженные левые идеалы, совпадают с фактор-системами кольца  $\mathfrak{K}_r$ .

Следующая теорема показывает: если  $\alpha_{ik}^{(j)}, \beta_{ik}^{(j)}$  — фактор-системы классов  $\{\mathfrak{K}\}, \{\mathfrak{S}\}$  относительно поля  $Z$ , то  $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \cdot \beta_{ik}^{(j)}$  есть фактор-система класса  $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$  относительно  $Z$ . Поэтому имеет смысл определить произведение  $\{\alpha\} \times \{\beta\}$  двух классов ассоциированных фактор-систем  $\{\alpha\}, \{\beta\}$  как класс  $\{\alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}\}$ .

**Теорема 2.** Пусть классу  $\{\mathfrak{K}\}$  относительно  $Z$  соответствует класс  $\{\alpha\}$  ассоциированных фактор-систем. Классы  $\{\alpha\}$  всех классов  $\{\mathfrak{K}\}$  с полем расщепления  $Z$  образуют группу, изоморфную  $\mathcal{K}_Z$  при отображении  $\{\mathfrak{K}\} \mapsto \{\alpha\}$ .

Для доказательства нужно установить два утверждения:

1. Если класс  $\{\mathfrak{K}\}$  имеет фактор-систему  $\alpha_{ik}^{(j)}$ , а класс  $\{\mathfrak{S}\}$  — фактор-систему  $\beta_{ik}^{(j)}$ , то  $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$  есть фактор-система класса  $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$ .
2. Если класс  $\{\mathfrak{K}\}$  имеет фактор-систему  $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$ , то  $\mathfrak{K} = \mathfrak{P}$ .

1. Пусть степени неприводимых представлений поля  $Z$  в  $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$  равны  $r, s$ , а

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{S}_{s\Gamma} = \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{m}_n$$

— разложения в сопряженные идеалы, где  $\mathfrak{l}_i$  и  $\mathfrak{m}_i$  должны быть соответствующими друг другу идеалами (полученными из соответствующих компонент  $\mathfrak{Z}_r$  и  $\mathfrak{Z}'_r$ ). Тогда

$$(\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s)_\Gamma = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_i \mathfrak{m}_j + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n$$

есть разложение в  $n^2$  ненулевых, а значит, простых идеалов. Следовательно,

$$A_1 = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2 \mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n$$

— идеал абсолютной длины  $n$ . Идеал  $A_1$  инвариантен при всех  $S$ , поскольку идеалы  $\mathfrak{m}_i$  преобразуются так же, как  $\mathfrak{l}_i$ . Поэтому существует идеал  $A$  кольца  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$ , для которого

$$A_1 = A_\Gamma$$

(вспомогательная теорема, страница 18).

Пусть  $u$  — степень неприводимого представления  $\mathfrak{Z}$  в теле автоморфизмов  $\mathfrak{M}$  простых идеалов системы  $\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}$ . Тогда  $A$  распадается в прямую сумму  $u$  простых идеалов (поскольку его абсолютная длина равна  $n$ ). Следовательно, по нашей вспомогательной теореме фактор-системы идеала  $A$  являются также фактор-системами тела  $\mathfrak{M}$ .

Разложением  $A_\Gamma$  в сопряженные идеалы является использованное при определении разложение

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2 \mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n. \quad (3)$$

Если  $\alpha_{ik}^{(j)}, \beta_{ik}^{(j)}$  соответствуют псевдматричным единицам  $p_{ik}, q_{ik}$  тел  $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$ , то, очевидно,  $r_{ik} = p_{ik} q_{ik}$  есть система псевдматричных единиц идеала  $A_\Gamma$  для разложения (3). Соответствующая фактор-система  $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$  является тем самым также фактор-системой тела  $\mathfrak{M}$ .

2. Пусть класс  $\{\mathfrak{K}\}$  имеет фактор-систему  $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$  с соответствующими псевдматричными единицами  $p_{ik}$  и разложением

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

в сопряженные идеалы. Нужно доказать  $\mathfrak{K} = \mathfrak{P}$ , или  $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{P}_r$ , или существование левого идеала  $\mathfrak{l}$  длины  $n$  в  $\mathfrak{K}_r$ : ведь простой левый идеал кольца  $\mathfrak{K}_r$  имеет ранг  $t^2 r$ , поэтому должно выполняться  $n = t^2 r h$  с целым  $h$ , либо  $t = 1$ .

Идеал кольца  $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$

$$\Omega = \mathfrak{l}_1(p_{11} + \cdots + p_{1n})$$

ненулевой —  $e_1 \sum_i p_{1i} \neq 0$  — и простой, следовательно, имеет ранг  $n$ . Идеал  $\Omega$  инвариантен относительно  $\mathfrak{G}$ :

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i \sum_{\nu} S p_{1\nu} = \mathfrak{l}_i \sum_{\mu} p_{i\mu} = \mathfrak{l}_i \sum_{\mu} p_{i1} p_{1\mu}$$

ввиду  $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$ . Поэтому

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i p_{i1} \sum_{\mu} p_{1\mu} = \mathfrak{l}_1 \sum_{\mu} p_{1\mu} = \Omega.$$

Следовательно,  $\Omega = \mathfrak{l}_{\Gamma}$ , где  $\mathfrak{l}$  — идеал кольца  $\mathfrak{R}_{\Gamma}$  ранга  $n$ .

**Теорема 3.** Каждый элемент  $\{\mathfrak{R}\}$  группы  $\mathcal{K}$  имеет конечный порядок  $\lambda$ , делящий абсолютное число компонент  $t$  тела  $\mathfrak{K}$ .

*Первое доказательство (Брауэр).* Возьмем два разложения  $\mathfrak{R}_{r\Gamma}$  в сопряженные левые идеалы:

$$\mathfrak{R}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{z}_1 + \dots + \mathfrak{z}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{R}_{r\Gamma} e_i, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{R}_{r\Gamma} e_i^*.$$

Пусть соответствие  $a_i \mapsto a_i r_{ik}$ , и в частности  $e_i \mapsto r_{ik}$ , задает операторный изоморфизм  $\mathfrak{l}_i$  на  $\mathfrak{z}_k$ . При обратном изоморфизме  $e_k^*$  переходит в некоторый элемент  $s_{ki}$  идеала  $\mathfrak{l}_i$ , причем  $s_{ki} \cdot r_{ik} = e_k^*$ . Если выбрать элементы  $r_{ik}$  сопряженными,

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{если} \quad S(i, k) = (\nu, \mu),$$

то элементы  $s_{ik}$  также сопряжены:

$$S(s_{ki})S(r_{ik}) = S(s_{ki}r_{ik}) = S(e_k^*) = e_{\mu}^* = s_{\mu\nu}r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu}S(r_{ik}),$$

то есть  $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$ . Поскольку соответствие  $e_i \mapsto e_i r_{ij} s_{jk}$  задает операторный изоморфизм  $\mathfrak{l}_i$  на  $\mathfrak{l}_k$ , необходимо

$$r_{ij} s_{jk} = p_{ik} \xi_{ik}^{(j)}, \quad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma$$

Поскольку элементы  $r, s, p$  сопряжены, сопряжены и  $\xi$ : из  $S(i, j, k) = (\nu, \tau, \mu)$  следует

$$S(\xi_{ik}^{(j)}) = \xi_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Из

$$r_{i\lambda} s_{\lambda j} r_{j\lambda} s_{\lambda k} = r_{i\lambda} e_{\lambda}^* s_{\lambda k} = r_{i\lambda} s_{\lambda k}$$

следует

$$p_{ij} \xi_{ij}^{(\lambda)} \cdot p_{jk} \xi_{jk}^{(\lambda)} = p_{ik} \xi_{ik}^{(\lambda)}$$

или, поскольку  $p_{ij} p_{jk} = p_{ik} \alpha_{ik}^{(j)}$ ,

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)} \xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

Положим  $\delta_{\nu\mu} = \prod_{\lambda} \xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$ . Тогда  $\delta_{\nu\mu}$  инвариантно при всех  $S$ , оставляющих  $\nu$  и  $\mu$  неподвижными, и потому лежит в  $\{Z_{\nu}, Z_{\mu}\}$ . Кроме того, величины  $\delta_{\nu\mu}$  сопряжены, поскольку сопряжены  $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$ . Так как

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\prod_{\lambda} \xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_{\lambda} \xi_{ij}^{(\lambda)} \prod_{\lambda} \xi_{jk}^{(\lambda)}} = \frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij} \delta_{jk}}$$

из формулы для ассоциированных фактор-систем (страница 32) следует, что  $\alpha_{ik}^{(j)n}$  ассоциировано с системой  $\beta_{ik}^{(j)} = 1$ . Поскольку порядок  $\{\mathfrak{R}\}$  равен порядку  $\{\alpha\}$ , порядок  $\{\mathfrak{R}\}$  делит  $n$ . Если специально выбрать  $\mathfrak{Z}$  максимальным коммутативным подполем  $\mathfrak{K}$ , то  $n = t$ , поэтому  $\lambda$  делит  $t$ .

*Второе доказательство (Шур).* Оно основано на представлении элементов  $p_{ik}$  регулярными матрицами  $P_{ik}$  порядка  $n$  над  $\Gamma$ , удовлетворяющими тем же условиям сопряженности, что и  $p_{ik}$ . Матрица  $P_{ik}$  лежит в  $\{Z_i, Z_k\}$ ; если  $p_{ik}$  соответствует  $P_{ik}$ , то  $S(p_{ik})$  соответствует  $S(P_{ik})$ . Это

представление гомоморфно: если  $P_{ik}$  соответствует  $p_{ik}$ , а  $P_{kj}$  — элементу  $p_{kj}$ , то  $P_{ik}P_{kj}$  соответствует  $p_{ik}p_{kj}$ , то есть

$$P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)} P_{ij}$$

(равенство  $(P_{ik_1}P_{k_2j} = 0$  при  $k_1 \neq k_2$  невозможно). Получив такое представление элементов  $p_{ik}$ , рассуждаем следующим образом. Переход к определителям дает

$$|P_{ik}| \cdot |P_{kj}| = \alpha_{ij}^{(k)n} \cdot |P_{ij}|,$$

поэтому, поскольку матрицы  $P_{ik}$  регулярны,  $|P_{\nu\mu}| \neq 0$ ,

$$\alpha_{ij}^{(k)n} = \frac{\delta_{ik}\delta_{kj}}{\delta_{ik}},$$

где положено  $|P_{\nu\mu}| = \delta_{\nu\mu}$ . Далее рассуждаем как в доказательстве Брауэра.

*Представление элементов  $p_{ik}$  матрицами  $P_{ik}$ :*

Идеалы  $\mathfrak{l}_i$  разложения

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n$$

являются реципрокными модулями представления кольца  $\mathfrak{K}_r$  в  $\Gamma$  (теорема 2 на странице 32). Зафиксируем базис  $k_1, \dots, k_n$  кольца  $\mathfrak{K}_r$  относительно  $\mathfrak{Z}$ . Тогда

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = k_1\mathfrak{Z}_r + \dots + k_n\mathfrak{Z}_r,$$

и потому

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i = k_1\mathfrak{Z}_re_i + \dots + k_n\mathfrak{Z}_re_i = k_1e_i\Gamma + \dots + k_ne_i\Gamma.$$

Отсюда следует

$$\mathfrak{l}_k = \mathfrak{l}_ip_{ik} = k_1p_{ik}\Gamma + \dots + k_np_{ik}\Gamma.$$

Два базиса  $(k_1e_i, \dots, k_ne_i)$  и  $(k_1p_{ik}, \dots, k_np_{ik})$  идеала  $\mathfrak{l}_k$  можно перевести друг в друга умножением на регулярную матрицу  $P_{ik}$ :

$$P_{ik} \cdot \begin{pmatrix} k_1e_i \\ \vdots \\ k_ne_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1p_{ik} \\ \vdots \\ k_np_{ik} \end{pmatrix}, \quad \text{короче} \quad P_{ik}(k_oe_i) = (k_op_{ik}).$$

Отсюда следует сопряженность матриц  $P_{ik}$ :

$$S(P_{ik})(k_oS(e_k)) = (k_oS(p_{ik})) \quad \text{или} \quad S(P_{ik})(k_oe_\mu) = (k_op_{\nu\mu}) = P_{\nu\mu}(k_oe_\mu),$$

то есть

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{если} \quad S(i, k) = (\nu, \mu).$$

Из этого, в свою очередь, следует, что  $P_{ik}$  лежит в  $\{Z_i, Z_k\}$ , то есть в поле инвариантов тех  $S$ , которые оставляют  $i$  и  $k$  неподвижными. Гомоморфность также легко проверяется:

$$\begin{aligned} P_{ik}P_{kj}(k_oe_j) &= P_{ik}(k_op_{kj}) = (k_op_{ik}p_{kj}) \\ &= \alpha_{ij}^{(k)}(k_op_{ij}) = \alpha_{ij}P_{ij}(k_oe_j), \quad \text{следовательно} \\ \cdot P_{ik}P_{kj} &= \alpha_{ij}^{(k)} P_{ij}, \quad \text{что и требовалось доказать.} \end{aligned}$$

Теорему 3 можно усилить:

**Теорема 4.** Если  $p$  — простой делитель абсолютного числа компонент  $t$  тела  $\mathfrak{K}$ , то  $p$  делит также порядок  $\lambda$  класса  $\{\mathfrak{K}\}$ . (Брауэр)

*Доказательство.* Пусть  $p^\sigma$  — наивысшая степень  $p$ , делящая степень  $n$  поля расщепления  $Z$ , пусть  $\mathfrak{H}$  — подгруппа порядка  $p^\sigma$  группы  $\mathfrak{G}$  (она существует по теореме Силова, Speiser, 1-е изд., § 19, страница 42, теорема 43), а  $T$  — поле инвариантов группы  $\mathfrak{H}$ .

Тогда  $[\Gamma : T] = p^\sigma$ , а  $[T : P] = n/p^\sigma$  не делится на  $p$ , и тем более не делится на  $t$ . Поэтому  $T$  не является полем расщепления, и тело автоморфизмов  $\mathfrak{S}$  кольца  $\mathfrak{K}_T = \mathfrak{S}_m$  отлично от  $P$ . Но  $\mathfrak{S}$  имеет поле расщепления  $\Gamma$ , степень которого над центром  $T$  тела  $\mathfrak{S}$  равна  $p^\sigma$ . Поэтому абсолютное число компонент тела  $\mathfrak{S}$  есть степень  $p^\beta > 1$ , и, следовательно, по теореме 3 порядок класса  $\{\mathfrak{S}\}$  есть степень  $p^\alpha > 1$  числа  $p$ . Из

$$\{\mathfrak{K}\}^\lambda = \{P\}, \quad \{\mathfrak{K}_T\}^\lambda = \{T\}$$

следует  $\lambda \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$ , что и требовалось доказать. (Брауэр привел примеры, показывающие, что равенство  $\lambda = t$  не обязательно<sup>4</sup>).

**Теорема 5.** Пусть разложение  $t$  на простые множители имеет вид  $t = \prod_i p_i^{\varrho_i}$ , где  $\varrho_i \geq 1$ ,  $p_i \neq p_j$  при  $i \neq j$ . Тогда  $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{K}^{(2)} \times \dots$ , где  $\mathfrak{K}^{(i)}$  — тело с абсолютным числом компонент  $p_i^{\varrho_i}$ .

*Доказательство.* По теоремам 3 и 4 порядок  $\lambda$  класса  $\{\mathfrak{K}\}$  равен

$$\lambda = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \quad 1 \leq \alpha_i \leq \varrho_i.$$

Циклическая подгруппа  $\mathfrak{Z}$  группы  $\mathcal{K}$ , порожденная классом  $\{\mathfrak{K}\}$ , является прямым произведением подгрупп  $\mathfrak{Z}_i$  порядков  $p_i^{\alpha_i}$ ; следовательно,

$$\{\mathfrak{K}\} = \prod_i \{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

откуда следует, что каждое поле расщепления  $Z$  тела  $\mathfrak{K}$  является также полем расщепления тела  $\mathfrak{K}^{(i)}$ . Поэтому абсолютное число компонент  $p_i^{\sigma_i}$  тела  $\mathfrak{K}^{(i)}$  делит  $t$ , так что  $\sigma_i \leq \varrho_i$ . Пусть  $\prod_i \mathfrak{K}^{(i)} = \mathfrak{K}_m$ . Тогда

$$\prod_i p_i^{\varrho_i} = \prod_i p_i^{\sigma_i} \cdot m, \quad \sigma_i \geq \varrho_i,$$

и потому

$$\sigma_i = \varrho_i, \quad m = 1, \quad \mathfrak{K} = \prod_i \mathfrak{K}^{(i)}, \quad \text{что и требовалось доказать.}$$

## § 25. Нормальное представление $\mathfrak{K}_r$ с максимальным коммутативным подполем Галуа<sup>5</sup>

Пусть максимальное коммутативное подполе  $\mathfrak{Z}$  кольца  $\mathfrak{K}_r$  является полем Галуа. По теореме 7 на странице 25 его  $n$  автоморфизмов  $H_i$  поля  $\mathfrak{Z}/P$  являются внутренними автоморфизмами  $\mathfrak{K}_r$ , то есть существуют элементы  $u_i$ , для которых

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{для всех } z \text{ из } \mathfrak{Z}.$$

Каждый  $u_i$  определен с точностью до ненулевого множителя  $y$  из  $\mathfrak{Z}$ . Действительно, если  $u^{-1} z u = u'^{-1} z u'$  для всех  $z$  из  $\mathfrak{Z}$ , то  $(u^{-1} u')^{-1} z (u^{-1} u') = z$  для всех  $z \in \mathfrak{Z}$ . Поэтому присоединение  $u^{-1} u'$  к  $\mathfrak{Z}$  дает коммутативное подполе  $\mathfrak{K}_r$ , которое ввиду максимальной  $\mathfrak{Z}$  совпадает с  $\mathfrak{Z}$ . Следовательно,  $u^{-1} u'$  лежит в  $\mathfrak{Z}$ .

Докажем следующее равенство:

$$\mathfrak{K}_r = u_1 \mathfrak{Z} + \dots + u_n \mathfrak{Z}.$$

Для этого, очевидно, достаточно линейной независимости элементов  $u_i$  над  $\mathfrak{Z}$ . Докажем ее, непосредственно задав  $u_i$ . Пусть

$$\mathfrak{Z}_Z = e_1 Z + \dots + e_n Z, \quad \mathfrak{K}_r Z = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_r Z e_i$$

и пусть  $p_{ik}$  — система псевдматричных единиц для этого разложения. На странице 8 мы обозначили через  $\Theta_i$  изоморфизм  $\mathfrak{Z}$  на  $Z$ , порожденный модулем представления  $e_i Z$ , так что

$$S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$$

<sup>4</sup>Brauer: Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen II. Math. Zeitschr. 31, S. 733 § 5, (1930).

<sup>5</sup>Более простое обоснование — начиная с § 27.



являются  $n$  автоморфизмами поля  $Z$  (но лишь при их применении к самому  $Z$ , а не при используемом здесь действии  $S_i$  на всю систему  $\mathfrak{K}_r Z$ !). Для простоты в равенстве  $S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$  вместо  $\Theta_i$  будем писать  $\Theta_{S_i}$ , а в индексах  $p_{ik}$  заменим  $i, k$  соответствующими автоморфизмами  $S$ :

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

Автоморфизмы  $\mathfrak{Z}$ , числом  $n$ , имеют вид ( $E$  — тождественная подстановка)

$$H = \Theta_E^{-1} \Theta.$$

Теперь нумерацию автоморфизмов  $H$  выберем так:

$$H_S = \Theta_E^{-1} \Theta_{S^{-1}}.$$

При этих условиях можно положить

$$u_T = \sum_S p_{S, ST} = \sum_S S(p_{E, T})$$

Действительно:

1. Элемент  $u_T^{-1}$  существует:

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST, S} \frac{1}{\alpha_{S, S}^{ST} \bar{\gamma}_{S, ST} \bar{\gamma}_{ST, S}}$$

(Значение  $\bar{\gamma}$  см. на странице 32.)

2. Элемент  $u_T$  принадлежит  $\mathfrak{K}_r$ , поскольку он инвариантен относительно  $\mathfrak{G}$ :

$$R(u_T) = \sum_S R S(p_{E, T}) = \sum_{S'} S'(p_{E, T}) = u_T.$$

3. Элемент  $u_T$  порождает  $H_T$ , то есть если  $z \in \mathfrak{Z}$ , то  $u_T^{-1} z u_T = H_T(z)$ , или

$$z u_T = u_T H_T(z).$$

Действительно,

$$z = \sum_S \Theta_S(z) e_S, \quad u_T = \sum_S S(e_E p_{E, T}) = \sum_S e_S S(p_{E, T})$$

поэтому

$$z u_T = \sum_{S, S'} \Theta_S(z) e_S e_{S'} S(p_{E, T}) = \sum_S \Theta_S(z) S(p_{E, T}).$$

С другой стороны,

$$u_T = \sum_S S(p_{E, T} e_T) = \sum_S S(p_{E, T}) e_{ST}$$

а на элементах  $\mathfrak{Z}$  справедливо равенство

$$\Theta_S H_T = \Theta_S \Theta_E^{-1} \Theta_{T^{-1}} = S \Theta_{T^{-1}} = S T^{-1} \Theta_E = \Theta_{S T^{-1}}$$

следовательно,

$$H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_S H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_{S T^{-1}}(z)$$

То есть

$$\begin{aligned}
u_T H_T(z) &= \sum_{S, S'} S(p_{E,T}) e_{ST} \cdot e_{S'} \Theta_{S'T^{-1}}(z) \\
&= \sum_S S(p_{E,T}) \Theta_S(z)
\end{aligned}$$

Таким образом,

$$z \cdot u_T = u_T \cdot H_T(z).$$

4. Элементы  $u_S$  линейно независимы над  $\mathfrak{Z}$ .

Из

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

ввиду  $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$  следует

$$\sum_{T, S, L} \Theta_S(z_T) e_{SPL, LT} = \sum_{S, T} \Theta_S(z_T) p_{S, ST} \quad \text{то есть} \quad \Theta_S(z_T) = 0,$$

а значит,  $z_T = 0$ .

Отныне вместо  $H_S(z)$  будем писать  $z^S$  — «символическую степень». Для элементов  $u_S$  должны выполняться соотношения вида

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R, T}, \quad a_{R, T} \neq 0 \quad \text{из } \mathfrak{Z}.$$

Поскольку

$$\begin{aligned}
u_R u_T &= \sum_{S, S'} S(p_{E,R}) S'(p_{E,T}) = \sum_S p_{S, SR} p_{SR, SRT} \\
&= \sum_S p_{S, SRT} \alpha_{S, SRT}^{(SR)} = \sum_S p_{S, SRT} \alpha_{S, SRT}^{(SR)} e_{SRT}
\end{aligned}$$

и

$$a_{R, T} = \sum_S e_{SRT} \Theta_{SRT}(a_{R, T}),$$

то

$$u_{RT} a_{R, T} = \sum_S p_{S, SRT} \Theta_{SRT}(a_{R, T})$$

и, следовательно,

$$\Theta_{SRT}(a_{R, T}) = \alpha_{S, SRT}^{(SR)}, \quad a_{R, T} = \sum_S e_{SRT} \alpha_{S, SRT}^{(SR)} = \sum_L e_L \alpha_{LT^{-1}R^{-1}, L}^{(LT^{-1})}.$$

Систему элементов  $a_{R, T}$  будем называть малой фактор-системой кольца  $\mathfrak{K}_r$ . Большая фактор-система  $\alpha_{BC}^{(A)}$  и малая фактор-система  $a_{R, T}$  взаимно определяют друг друга. Произведению  $\varepsilon_{BC}^{(A)} = \alpha_{BC}^{(A)} \beta_{BC}^{(A)}$  двух больших фактор-систем соответствует произведение  $f_{R, T} = a_{R, T} b_{R, T}$  малых фактор-систем  $a_{R, T}, b_{R, T}$ , соответствующих  $\alpha_{BC}^{(A)}, \beta_{BC}^{(A)}$ ; это непосредственно следует из приведенных формул. Большой единичной фактор-системе  $\alpha_{BC}^{(A)} = 1$  соответствует малая единичная фактор-система  $a_{R, T} = 1$ , и обратно.

Можно заменить  $u_S$  на  $u'_S = u_{srS}$ , где  $r_S \neq 0$  выбирается произвольно из  $\mathfrak{Z}$ . Элементам  $u'_S$  соответствует малая фактор-система  $a'_{R, T}$ :

$$(1) \quad u'_R u'_T = u'_{RT} a'_{R, T}$$

Будем говорить, что  $a'_{R, T}$  ассоциирована с  $a_{R, T}$ . Имеем

$$u_R r_R u_T r_T^T = u_R r_R r_T^T a'_{R,T} = u_R u_T r_R^T r_T^T = u_R r_T a_{R,T} r_R^T$$

откуда

$$(2) \quad a'_{R,T} = a_{R,T} \frac{r_R^T r_T^T}{r_{RT}}$$

следует.

Элементом  $u'_S = u_S r_S$  соответствует следующая система псевдматричных единиц:

$$p'_{S,ST} = p_{S,ST} r_T^T$$

Поэтому малая фактор-система  $a'_{R,T}$  соответствует большой фактор-системе  $\alpha_{BC}^{(A)'}$ , ассоциированной с фактор-системой  $\alpha_{BC}^{(A)}$ , которая соответствует  $a_{R,T}$ . Ассоциированным малым фактор-системам соответствуют ассоциированные большие фактор-системы, и наоборот. Соответствие между классами  $\{\alpha\}$  ассоциированных больших фактор-систем и соответствующими классами  $\{a\}$  ассоциированных малых фактор-систем является изоморфизмом групп.

Перейдем теперь к представлению элементов  $u_S$  матрицами порядка  $n$  над  $\mathfrak{Z}$ , существенно отличающемуся от рассмотренных до сих пор представлений.

Рассмотрим базис над  $\mathfrak{Z}$

$$(I) \quad k_{S_1}, \dots, k_{S_n}$$

кольца  $\mathfrak{K}_r$  и умножим его справа на  $u_S$ . Получим

$$(II) \quad k_{S_1} u_S, \dots, k_{S_n} u_S.$$

Регулярную матрицу  $A_S$ , переводящую (I) в (II),

$$(III) \quad (k_{S_1} u_S, \dots, k_{S_n} u_S) = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_S$$

будем называть матрицей, представляющей  $u_S$ . Представление должно быть определено на всех элементах  $\mathfrak{K}_r$ , которые, подобно  $u_S$ , порождают автоморфизм  $\mathfrak{Z}/P$ , то есть на всех элементах  $u_S r_S$ , где  $r_S \neq 0$  произвольно выбирается из  $\mathfrak{Z}$ . Все эти элементы образуют группу  $\mathfrak{G}^*$ , содержащую в качестве нормального делителя мультипликативную группу  $\mathfrak{Z}^*$  поля  $\mathfrak{Z}$ . Фактор-группа  $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$  изоморфна группе Галуа  $\mathfrak{G}$  расширения  $\mathfrak{Z}/P$ : каждый элемент класса смежности  $\mathfrak{G}^*$  по  $\mathfrak{Z}^*$  порождает соответствующий этому классу автоморфизм  $\mathfrak{Z}$ . Указанным способом представляется группа  $\mathfrak{G}^*$ :

$$u_S \mapsto A_S$$

Однако это представление не является ни гомоморфным, ни реципрокно гомоморфным. Из

$$u_S \mapsto A_S, u_T \mapsto A_T$$

следует не  $u_S u_T \mapsto A_S A_T$ , а, ввиду

$$\begin{aligned} (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) u_S u_T &= (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_S u_T = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) u_T A_S^T \\ &= (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_T A_S^T : u_S u_T \mapsto A_T A_S^T. \end{aligned}$$

Это представление группы  $\mathfrak{G}^*$  будем называть скрещенным представлением. Пусть  $h_{S_1}, \dots, h_{S_n}$  — другой базис  $\mathfrak{K}_r$  над  $\mathfrak{Z}$  и

$$(IV) \quad (h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) M$$

Тогда из (III) и (IV) получается

$$(h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) u_S = (h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) M^{-1} A_S M^S,$$

то есть если  $u_S$  представляется в базисе  $k$  матрицей  $A_S$ , то в базисе  $h$  он представляется матрицей  $M^{-1} A_S M^S$ , где  $M$  — матрица перехода от базиса  $k$  к базису  $h$ .

Формула (III), определяющая скрещенное представление, показывает, что скрещенное представление связано с кольцом  $\mathfrak{K}_r$  примерно так же, как обычное реципрокное представление (записанное, однако, справа, а не слева) связано со своим модулем представления. Различие возникает потому, что вместо соотношения коммутирования

$$(m^* \tau^*)c = (m^* c) \tau^*$$

(см. страницу 5),

выполняющегося в реципрокном модуле представления, здесь имеется соотношение

$$(kz)u_S = (ku_S)z^S \quad k \text{ принадлежит } \mathfrak{K}_r, \quad z \text{ принадлежит } \mathfrak{Z}$$

Именно оно заменяет прежнее соотношение.

Скрещенное представление группы  $\mathfrak{G}^*$  можно построить также посредством базиса правого идеала  $\mathfrak{r}$  кольца  $\mathfrak{K}_r$ . Каждый правый идеал  $\mathfrak{K}_r$  порождает таким образом класс эквивалентных представлений. Представления  $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$  называются эквивалентными, если существует матрица  $M$ , для которой  $B_S = M^{-1}A_S M^S$ .

Вместо того чтобы ограничиваться представлениями группы  $\mathfrak{G}^*$  в  $\mathfrak{Z}$ , порождаемыми правыми идеалами кольца  $\mathfrak{K}_r$ , можно теперь определить скрещенное представление степени  $m$  группы  $\mathfrak{G}^*$  в  $\mathfrak{Z}$  в общем виде:

1. Каждому  $u_S$  соответствует матрица  $A_S$  порядка  $m$  над  $\mathfrak{Z}$ .
2. Из  $u_S \mapsto A_S, u_T \mapsto A_T$  следует  $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$ .

Возьмем правый  $\mathfrak{Z}$ -модуль ранга  $m$ :

$$\mathfrak{M} = x_1 \mathfrak{Z} + \dots + x_m \mathfrak{Z}$$

и посредством равенств

$$(x_1 u_S, \dots, x_m u_S) = (x_1, \dots, x_m) A_S$$

превратим его в правый  $\mathfrak{G}^*$ -модуль с соотношением коммутирования

$$(mz)u_S = (mu_S)z^S$$

совершенно аналогично построению модуля представления по заданному представлению на странице 5. Теперь, как на странице 20, покажем, что  $\mathfrak{M}$  становится конечным правым  $\mathfrak{K}_r$ -модулем, если положить

$$m \cdot zu_S = mz \cdot u_S = mu_S \cdot z^S$$

и в общем случае

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum m z_S \cdot u_S = \sum m u_S \cdot z_S^S.$$

Здесь не требуется никакого вычисления, аналогичного вычислению на странице 20, поскольку в нашем определении использован фиксированный базис.

Но согласно М.З. § 18 каждый конечный простой  $\mathfrak{K}_r$ -модуль  $\mathfrak{M}$  операторно-изоморфен простому правому идеалу кольца  $\mathfrak{K}_r$ . Поэтому, как в теореме 2 на странице 22, заключаем, что существует лишь один неприводимый класс скрещенных представлений группы  $\mathfrak{G}^*$  в  $\mathfrak{Z}$ , а именно класс, соответствующий простым правым идеалам.

Степень этого неприводимого представления равна  $t$ , где  $t$  — индекс (абсолютное число показателя) тела  $\mathfrak{K}$ . Это следует из простого подсчета рангов. Действительно, степень равна рангу ( $\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}$ ) простого правого идеала над  $\mathfrak{Z}$ . На странице 22 установлено:

$$(\mathfrak{Z} : P) = n = rt; \quad (\mathfrak{K}_r : P) = n^2; \quad (\mathfrak{r} : P) = n \cdot t$$

Последнее равенство следует из  $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_r$ .

Из

$$(\mathfrak{r} : P) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : P)$$

или  $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$  следует  $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$ .

## § 26. Умножение скрещенных представлений

До сих пор мы всегда рассматривали скрещенное представление как представление группы  $\mathfrak{G}^*$ . Но его можно рассматривать и как представление группы Галуа  $\mathfrak{G}$  расширения  $\mathfrak{Z}/P$ : каждому элементу  $S$  группы  $\mathfrak{G}$  сопоставляется матрица  $A_S$ , представляющая некоторый элемент  $u_S$  кольца  $\mathfrak{K}_r$ , который посредством преобразования  $u_S^{-1}zu_S = z^S$  порождает автоморфизм  $S$ .

Чтобы охарактеризовать такое представление  $S \mapsto A_S$ <sup>6</sup>, нужно указать, в каком  $\mathfrak{K}_r$  оно взято, какие  $u_S$  и какие  $k_{S_1}, \dots, k_{S_n}$  базиса  $\mathfrak{K}$  над  $\mathfrak{Z}$  используются. Замена базиса даст эквивалентное представление, а замена элементов  $u$  — ассоциированные фактор-системы  $a_{S,T}$ . Существенны, таким образом, кольца  $\mathfrak{K}_r$ , в которых взято представление, то есть класс  $\{a_{S,T}\}$  ассоциированных фактор-систем.

Пусть теперь даны два таких представления группы  $\mathfrak{G}$ :

$$\begin{aligned} S \mapsto u_S \mapsto A_S & \text{ соответствующая малая фактор-система } a_{R,T}, \\ S \mapsto v_S \mapsto B_S & \text{ соответствующая малая фактор-система } b_{R,T}. \end{aligned}$$

Под кронекеровым произведением  $A \times B$  двух матриц  $A = (a_{ik})$ ,  $B = (b_{\mu\nu})$  понимается матрица  $A \times B = (a_{ik}b_{\mu\nu})$ .

**Утверждение.** Соответствие  $S \mapsto A_S \times B_S$  также является скрещенным представлением группы  $\mathfrak{G}$ ; оно соответствует произведению  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$ , если  $A_S$  происходит из  $\mathfrak{K}_r$ , а  $B_S$  — из  $\mathfrak{S}_s$ .

*Доказательство.* Соответствие  $S \mapsto A_S \times B_S$  является скрещенным представлением. Пусть

$$S \mapsto A_S \times B_S, \quad T \mapsto A_T \times B_T$$

и

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1},$$

Следовательно, нужно доказать

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

Это вытекает из следующего рассуждения.

Представим матрицы  $A$  и  $B$  посредством матричных единиц  $c_{ik}$  и  $d_{\mu\nu}$  (не имеющих ничего общего с матричными единицами колец  $\mathfrak{K}_r$  и  $\mathfrak{S}_s$ ):

$$A = \sum c_{ik} \alpha_{ik}; \quad B = \sum d_{\mu\nu} \beta_{\mu\nu}, \quad \text{тогда}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik} d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

Это матрица относительно новых матричных единиц  $c_{ik}d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu}c_{ik}$ . Поэтому умножение матриц  $A$  и  $B$  взаимно однозначно соответствует умножению элементов в прямом произведении двух матричных колец:

$$\sum c_{ik} \mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu} \mathfrak{Z}.$$

Следовательно, каждая матрица  $A$  коммутирует с каждой матрицей  $B$  (но матрицы  $A$  между собой и матрицы  $B$  между собой вообще не коммутируют). Именно эта коммутативность каждой матрицы  $A$  с каждой матрицей  $B$ , после умножения на  $a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}$ , и дает требуемое соотношение.

<sup>6</sup>Именно такое представление (независимо от гиперкомплексных систем)

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

(или транспонированное) послужило Шпайзеру (Math. Zschr. 5) исходной точкой для определения фактор-систем  $a_{S,T}$ . Тем самым эти фактор-системы совпадают с введенными здесь на иной основе.

## Глава VI. Теория скрещенных произведений

### § 27. Представление колец $\mathfrak{K}_r$ как скрещенных произведений

Теперь независимо обоснуем заново теорию скрещенных произведений, развитую в § 24 из фактор-систем. Значение этих скрещенных произведений состоит в том, что поле Галуа и его группы описываются в  $\mathfrak{K}_r$  совместно.

**Теорема 1.** Если  $\mathfrak{Z}$  — поле Галуа, являющееся полем расщепления кольца  $\mathfrak{K}_r$ , а значит, его максимальным коммутативным подполем, и если  $\mathfrak{G}$  — его группа Галуа, то  $\mathfrak{K}_r$  совпадает со скрещенным произведением  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ . Обратно, каждое скрещенное произведение  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  порождает кольцо  $\mathfrak{K}_r$  такого вида.

**Доказательство и определения.** **Определение 1.** Пусть  $\mathfrak{G} = \{E, S, \dots, T\}$  — группа Галуа поля  $\mathfrak{Z}$ . Равенство  $\mathfrak{K}_r$  скрещенному произведению означает

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$$

при  $zu_S = u_S z^S$  и  $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$ , где элементы  $a_{S,T}$  поля  $\mathfrak{Z}$  образуют малую фактор-систему.

**Определение 2.** Порождающая группа  $\mathfrak{G}^*$  определяется как совокупность регулярных элементов  $g$  кольца  $\mathfrak{K}_r$ , которые преобразованием переводят  $\mathfrak{Z}$  в себя как целое. Имеем  $g^{-1} \mathfrak{Z} g = \mathfrak{Z}$ , то есть  $g^{-1} z g = z^S$  для некоторого  $S$  из  $\mathfrak{G}$ . Поэтому  $\mathfrak{G}$  является гомоморфным образом группы  $\mathfrak{G}^*$ , поскольку каждый автоморфизм  $\mathfrak{Z}$  порождается некоторым  $g$ :  $\mathfrak{G}^* \rightarrow \mathfrak{G}$ , и далее

$$\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^* / \mathfrak{I}^* \quad \text{при} \quad \mathfrak{I}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*,$$

(равенство  $\mathfrak{I}^* = \mathfrak{Z}^*$  будет доказано ниже; еще не установлено, что  $\mathfrak{Z}$  является также максимальным коммутативным подкольцом. Это можно доказать и независимо).

**1. Доказательство представления в виде скрещенного произведения.** Пусть  $u_E, u_S, \dots, u_T$  — элементы  $\mathfrak{K}_r$ , порождающие автоморфизмы  $E, \dots, T$ , то есть  $zu_S = u_S z^S$ ; в частности,  $u_E = e$  в силу пункта 2. Нужно показать, что сумма

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \dots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

является прямой и равна  $\mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$ ; тогда по совпадению рангов она равна  $\mathfrak{K}_r$ . Это следует так (Шварц).

Модуль  $\mathfrak{M}$  является левым и правым  $\mathfrak{Z}$ -модулем, а значит, модулем представления  $\mathfrak{Z}$  в  $\mathfrak{Z}$ . При этом  $\mathfrak{M}$  порождает  $n$  различных представлений. Поскольку  $\mathfrak{Z}$  — коммутативное поле первого рода, ранг  $\mathfrak{M}$  не меньше  $n$ ; остальная часть доказательства проводится точно так же.

**2.** Имеем  $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^* / \mathfrak{I}^*$ , то есть  $\mathfrak{I}^* = \mathfrak{Z}^*$ : лишь элементы  $\mathfrak{Z}$  индуцируют тождественное преобразование на  $\mathfrak{Z}$ .

Действительно, пусть  $tz = zt$  для каждого  $z$  из  $\mathfrak{Z}$ , и положим

$$t = z_0 + z_1 u_S + \dots + z_{n-1} u_T,$$

Тогда

$$zt = zz_0 + \dots + zz_{n-1} u_T$$

и

$$tz = z_0 z + \dots + z_{n-1} u_T z = z_0 z + z^{S^{-1}} z_1 u_S + \dots + z^{T^{-1}} z_{n-1} u_T,$$

В силу прямоты суммы отсюда следует

$$(z - z^{S^{-1}}) z_1 u_S = 0, \dots, (z - z^{T^{-1}}) z_{n-1} u_T = 0$$

а поскольку элементы  $u_S, \dots$  регулярны,

$$(z - z^{S^{-1}}) z_1 = 0, \dots, (z - z^{T^{-1}}) z_{n-1} = 0, \quad \text{для каждого } z.$$

(То же следует из равенства ранга  $n$ .) Но для каждого  $S, \dots$  (все они отличны от  $E$ ) по определению существует хотя бы один  $z$ , для которого  $z - z^{S^{-1}} \neq 0$ ; существует  $\bar{z}$ , для которого  $\bar{z} - \bar{z}^{T^{-1}} \neq 0$ . Поэтому  $z_i = 0, i = 1, \dots, (n-1)$ , и, следовательно,  $t = z_0$  принадлежит  $\mathfrak{Z}^*$ , что и требовалось доказать.

**3.** Элементы  $u$  удовлетворяют законам умножения  $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$ , причем элементы  $a_{S,T}$  удовлетворяют скрещенным законам ассоциативности

$$a_{R,S} \cdot a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot a_{R,ST}$$

(элементы  $a_{S,T}$  образуют малую фактор-систему).

Действительно, из пункта 2 следует

$$\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST};$$

поэтому

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

где  $a_{S,T}$  принадлежит  $\mathfrak{Z}^*$ , а значит,  $\mathfrak{Z}$ , и  $\neq 0$ . Из  $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$  далее получаем

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} &= a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_R u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} a_{R,ST} u_{RST} \\ &= a_{R,S} u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S} a_{RS,T} u_{RST}, \end{aligned}$$

что и дает указанные законы умножения.

**4. Обратное утверждение:** скрещенное произведение  $= \mathfrak{K}_r$ . Объявим прямую сумму

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z} u_E + \dots + \mathfrak{Z} u_T$$

кольцом посредством соотношений  $z u_S = u_S z^S$ ,  $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$ , где  $a_{S,T}$  удовлетворяют скрещенным соотношениям ассоциативности, так что  $u_R u_S u_T$  определяется однозначно:

1.  $z_1 \cdot z_2 u_S = z_1 z_2 \cdot u_S$ ;
2.  $z u_S \cdot u_T = z \cdot u_S u_T$

Тем самым  $\mathfrak{M}$  становится ассоциативным кольцом.

**Обратная теорема 2.** Скрещенное произведение  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  двусторонне просто и имеет центр  $P$  (по идеям Р. Брауэра). Доказательство основано на следующих вспомогательных теоремах.

**Вспомогательная теорема 1.** Каждый элемент, коммутирующий с каждым элементом  $\mathfrak{Z}$ , принадлежит  $\mathfrak{Z}$ .

*Доказательство.* Пусть  $w = \sum_S c_{\lambda_S} u_S$ , где  $c_{\lambda_S}$  принадлежат  $\mathfrak{Z}$ , и предположим, что  $wz = zw$  для каждого  $z$  из  $\mathfrak{Z}$ . Тогда

$$\sum_S z c_{\lambda_S} u_S = \sum_S c_{\lambda_S} u_S z = \sum_S c_{\lambda_S} z^{S^{-1}} u_S$$

то есть  $z c_{\lambda_S} = c_{\lambda_S} z^{S^{-1}}$ , или  $c_{\lambda_S} (z - z^{S^{-1}}) = 0$ , для каждого  $z$  и  $S$  (ввиду линейной независимости элементов  $u$ !). Отсюда  $c_{\lambda_S} = 0$  при  $S \neq E$ , поскольку для каждого такого  $S$  существует хотя бы один  $z$ , для которого  $z - z^{S^{-1}} \neq 0$ . Следовательно,  $w$  принадлежит  $\mathfrak{Z}$ .

**Вспомогательная теорема 2.** Каждый  $\mathfrak{Z}$ -бимодуль  $\mathfrak{A}$ , изоморфный как бимодуль модулю  $\mathfrak{Z} u_S = u_S \mathfrak{Z}$  (при  $\mathfrak{Z}$  как кольце левых и правых операторов), совпадает с  $\mathfrak{Z} u_S$ .

*Доказательство пункта 2.* Модуль  $\mathfrak{A}$  изоморфен  $\mathfrak{Z} u_S$  как левый модуль. Поэтому если  $u_S \mapsto a$ , где этот элемент принадлежит  $\mathfrak{A}$ , то  $\mathfrak{Z} u_S \mapsto \mathfrak{Z} a$ , то есть  $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} a$ . Из изоморфизма бимодулей следует (1)  $za = az^S$  (поскольку  $u_S z \mapsto az$ ), а отсюда  $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} u_S$ . Действительно, положим  $a = u_S u_S^{-1} a = u_S w$ . Тогда  $za = zu_S w = u_S z^S w$ , но по (1)  $za = u_S w z^S$ . После умножения на  $u_S$  получаем  $z^S w = w z^S$  для каждого  $z$  из  $\mathfrak{Z}$ . Поскольку  $z^S$  также пробегает все  $\mathfrak{Z}$ , элемент  $w$  коммутирует с каждым элементом  $\mathfrak{Z}$  и потому по пункту 1 принадлежит  $\mathfrak{Z}$ .

**Вспомогательная теорема 3.** Каждый  $\mathfrak{Z}$ -бимодуль в  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  имеет вид  $\mathfrak{Z} u_{S_1} + \dots + \mathfrak{Z} u_{S_k}$ , где  $u_{S_i}$  обозначают любые  $k$  различных элементов из  $u_S, \dots, u_T$ .

*Доказательство.* Скрещенное произведение  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  вполне приводимо как  $\mathfrak{Z}$ -бимодуль, поскольку каждое слагаемое  $\mathfrak{Z} u_S$  имеет ранг 1. Кроме того, все слагаемые как бимодули принадлежат различным классам,

то есть не изоморфны как бимодули. Поэтому каждый  $\mathfrak{Z}$ -бимодуль  $\mathfrak{M}$  ввиду полной приводимости является прямым слагаемым и сам вполне приводим. Имеем  $\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{A}_{S_i}$ , где  $\mathfrak{A}_{S_i}$  изоморфен  $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ , а значит, по пункту 2 совпадает с  $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ . (Все  $\mathfrak{A}_{S_i}$  принадлежат разным классам.)

**Вспомогательная теорема 4.** Каждое подкольцо  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ , содержащее  $\mathfrak{Z}$ , и в частности само  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ , двусторонне просто. Подкольца, содержащие  $\mathfrak{Z}$ , взаимно однозначно соответствуют подгруппам  $\mathfrak{G}$ .

*Доказательство.* Каждое кольцо  $\mathfrak{o}$ , содержащее  $\mathfrak{Z}$ , является  $\mathfrak{Z}$ -бимодулем и потому по пункту 3 имеет вид  $\sum \mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$ . Поскольку  $\mathfrak{o}$  — кольцо, произведение любых двух элементов  $u_{S_i}$  снова принадлежит  $\mathfrak{o}$ , как и соответствующий  $\mathfrak{Z}$ -модуль. Поэтому элементы  $u_{S_i}$ , с точностью до фактор-системы, образуют группу, поскольку их конечное число. Следовательно,  $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$ , где  $\mathfrak{H}$  — подгруппа  $\mathfrak{G}$ . (Точнее, модули  $\mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$  образуют мультипликативную систему.) Пусть теперь  $\mathfrak{a}$  — произвольный двусторонний идеал  $\neq 0$  кольца  $\mathfrak{o}$ . Тогда он является  $\mathfrak{o}$ -бимодулем, следовательно, также  $\mathfrak{Z}$ -бимодулем и подмодулем  $\mathfrak{o}$ . Вместе с некоторым  $\mathfrak{Z}u_{S_i}$  он поэтому содержит всю группу  $\mathfrak{H}$ , а значит, совпадает с  $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$ .

**Вспомогательная теорема 5.** Поле  $P$  является центром  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ .

*Доказательство.* Если  $w$  коммутирует с каждым элементом  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ , то он, в частности, коммутирует с  $\mathfrak{Z}$ , а значит, по пункту 1 принадлежит  $\mathfrak{Z}$ . Из  $wu_S = u_S w^S$  при условии коммутативности следует  $w = w^S$ . Поэтому  $w$  принадлежит  $P$ .

*Замечание 1.* Доказательство показывает, что теорема остается справедливой и тогда, когда  $\mathfrak{Z}$  — бесконечное алгебраическое расширение Галуа поля  $P$ . Действительно, теоремы о полной приводимости сохраняются (Krull, Zahlringe, Math. Ann. 99). При этом  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  есть система всех конечных сумм  $\sum_{S_\lambda} u_{S_\lambda} \cdot c_{S_\lambda}$ .

Лишь в пункте 4 для  $\mathfrak{o}$  следует предположить  $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$ ; для полного произведения  $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  это условие выполнено. Дело в том, что если  $\mathfrak{o}$  бесконечномерно над  $\mathfrak{Z}$ , то из принадлежности  $u_{S_i} u_{S_k}$  уже нельзя заключить, что рассматриваемая система является группой.

*Замечание 2.* При прямом обосновании сюда следует присоединить развитую в §§ 25/26 теорию скрещенного матричного представления. Далее, в конце § 28, используется тот факт, что неприводимое скрещенное представление имеет степень  $t$ , где  $t$  — абсолютное число компонент (индекс) тела  $\mathfrak{K}$ . Еще раз подчеркнем: эта теория представлений устанавливает совпадение введенных здесь как константы умножения фактор-систем с обычным в литературе понятием.

## § 28. Теорема о произведении фактор-систем

Пусть

$$\begin{aligned}\mathfrak{K}_r &= \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T, & u_S u_T &= u_S t a_{S,T}, \\ \bar{\mathfrak{K}}_r &= \bar{\mathfrak{Z}} \bar{\mathfrak{G}} = \bar{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E + \cdots + \bar{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T, & \bar{u}_S \bar{u}_T &= \bar{u}_S t \bar{b}_{S,T},\end{aligned}$$

( $\mathfrak{Z}$  и  $\bar{\mathfrak{Z}}$  — изоморфные поля Галуа, а  $\mathfrak{G}$ ,  $\bar{\mathfrak{G}}$  — их группы). Тогда

$$\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r = \tilde{\mathfrak{Z}} \tilde{\mathfrak{G}} \times P_n = \mathfrak{A}_f \times P_n = \mathfrak{A}_j$$

с  $\tilde{u}_S \tilde{u}_T = \tilde{u}_S t \tilde{c}_{S,T}$  (поле  $\tilde{\mathfrak{Z}}$  изоморфно  $\mathfrak{Z}$  и  $\bar{\mathfrak{Z}}$ ). Это следует из подсчёта рангов и из того, что  $\mathfrak{Z}$  также является полем расщепления.

**Утверждение.** Имеем  $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T} \tilde{b}_{S,T}$ , где  $\tilde{a}, \tilde{b}$  — элементы поля  $\tilde{\mathfrak{Z}}$ , изоморфно соответствующие  $a$  и  $\bar{b}$ .

Доказательство основано на том, что кольцо эндоморфизмов любого левого идеала из  $\mathfrak{A}_j$ , имеющего абсолютную длину  $n$ , изоморфно  $\mathfrak{A}_f = \tilde{\mathfrak{Z}} \tilde{\mathfrak{G}}$ , и что это кольцо эндоморфизмов можно непосредственно определить для подходящего левого идеала из  $\mathfrak{A}_j$ . В более общем виде, а именно при  $s$  вместо  $n$ , справедлива следующая теорема, сформулированная для удобства в терминах  $\mathfrak{K}_r$ .

**1. Теорема 1.** Кольцо эндоморфизмов левого идеала  $\mathfrak{l}$  абсолютной длины  $n$  из  $\mathfrak{K}_{r,s} = \mathfrak{K}_r \times P_s$  изоморфно  $\mathfrak{K}_r$ .

Доказательство следует из приведённых ниже вспомогательных лемм.

**Вспомогательная лемма 1.** Все левые идеалы абсолютной длины  $n$  из  $\mathfrak{K}_{r,s}$  операторно изоморфны. Следовательно, их кольца эндоморфизмов изоморфны как кольца. В частности,  $\mathfrak{l} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$  имеет абсолютную длину  $n$ , где  $\mathfrak{b}$  обозначает простой идеал из  $P_s$ .



*Доказательство.* То, что левые идеалы имеют абсолютную длину  $n$ , то есть разлагаются в  $n$  абсолютно неразложимых простых идеалов, влечёт их одинаковую длину в  $\mathfrak{K}_{rs}$ , иначе говоря, одинаковое число простых идеальных слагаемых в  $\mathfrak{K}_{rs}$ . Отсюда следует их операторный изоморфизм, а вместе с ним изоморфизм их колец эндоморфизмов. Далее,  $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  имеет абсолютную длину  $n$ , то есть ранг  $n^2$ ; следовательно,  $\mathfrak{K}_r \times P_s$  имеет абсолютную длину  $n \cdot s$ , а потому  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$  имеет абсолютную длину  $n$ .

**Вспомогательная лемма 2.** Если  $\mathfrak{o}$  — кольцо с единицей, а  $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$  — левый идеал и прямое слагаемое, так что  $e_1$  идемпотентен, то кольцо эндоморфизмов  $\mathfrak{l}$  изоморфно  $e_1\mathfrak{o}e_1$ .

*Доказательство.* Умножение на элемент  $e_1re_1$  задаёт операторный гомоморфизм  $\mathfrak{l}$  в себя. Различные элементы  $e_1re_1$  задают различные гомоморфизмы, поскольку при этом элементу  $e_1$  сопоставляются различные элементы; и каждый гомоморфизм возникает таким образом:  $e_1 \mapsto re_1$ , причём  $re_1 = e_1re_1$  вследствие  $e_1e_1 = e_1$ . Сложение и умножение в  $e_1\mathfrak{o}e_1$  соответствуют сложению и композиции сопоставленных гомоморфизмов.

**Вспомогательная лемма 3.** Если положить  $P_s = \sum_1^s c_{ik}P$ , где  $c_{ik}$  — матричные единицы, и  $\mathfrak{b} = c_{11}P + \dots + c_{s1}P$ , то кольцом эндоморфизмов  $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$  является кольцо  $\mathfrak{K}_rc_{11}$ , изоморфное  $\mathfrak{K}_r$ .

*Доказательство.* Действительно,  $c_{11}$  поэлементно перестановочен с  $\mathfrak{K}_r$ , и никакой элемент из  $\mathfrak{K}_r$  не аннулируется, поскольку  $c_{11}$  — порождающий идемпотент  $\mathfrak{K}_r \times P_s$ , и

$$c_{11} \cdot \mathfrak{K}_r \times P_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11}P_sc_{11} = \mathfrak{K}_rc_{11}.$$

Из этих вспомогательных лемм непосредственно следует теорема 1.

**2. Определение и разложение  $\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r$  в левые идеалы абсолютной длины  $n$ .** По определению

$$\mathfrak{A}_f = \mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{Z}} \cdot \bar{\mathfrak{G}},$$

причём элементы с чертой и без черты поэлементно перестановочны. Поэтому

$$\mathfrak{A}_f = (\mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}}) \cdot (\mathfrak{Z} \times \bar{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}} \cdot (\mathfrak{Z}e_1 + \dots + \mathfrak{Z}e_n)$$

где  $\mathfrak{Z}e_i = \bar{\mathfrak{Z}}e_i$  (умножение поля Галуа на себя). Поскольку все слагаемые имеют одинаковый ранг относительно  $\mathfrak{Z}$ , а значит, и одинаковую абсолютную длину, тогда как абсолютная длина  $\mathfrak{A}_f$  равна  $n^2$ , каждое слагаемое имеет абсолютную длину  $n$ . В дальнейшем положим в основу

$$\mathfrak{l} = (\mathfrak{G} \times \bar{\mathfrak{G}})\mathfrak{Z}e_1,$$

где равенство  $ze_1 = e_1\bar{z}$  фиксирует определённый изоморфизм между  $\mathfrak{Z}$  и  $\bar{\mathfrak{Z}}$ .

**3. Скрещённое представление  $e_1\mathfrak{A}_fe_1$  и тем самым доказательство теоремы о произведении.** — По пунктам 1 и 2 фактор-системы произведения  $\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r$  изоморфны фактор-системам скрещённого представления  $e_1\mathfrak{A}_fe_1 = \mathfrak{A}$ .

**Теорема 2.** Имеем  $\mathfrak{A} = \tilde{\mathfrak{Z}} \cdot \tilde{\mathfrak{G}}$ , где  $\tilde{\mathfrak{Z}} = \mathfrak{Z}e_1 = \bar{\mathfrak{Z}}e_1$ ,  $\tilde{\mathfrak{G}} = \{\dots, e_1u_S\bar{u}_{Se_1}, \dots\}$  и

$$e_1u_S\bar{u}_{Se_1} \cdot e_1u_T\bar{u}_{Te_1} = e_1u_{ST}\bar{u}_{STe_1} \cdot a_{S,Te_1}\bar{b}_{S,Te_1},$$

так что при  $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,Te_1}$  и  $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,Te_1}$  теорема о произведении доказана; здесь  $\tilde{a}$  и  $\tilde{b}$  лежат в одном поле  $\tilde{\mathfrak{Z}}$ .

*Доказательство.* Элемент  $e_1$  становится единицей кольца; поэтому элементы, сопряжённые с  $\tilde{z} = ze_1$ , задаются посредством  $\tilde{z}^S e_1$ . Требуется показать, что элементы  $u_S\bar{u}_{Se_1}$  индуцируют эти подстановки; тем самым будет доказано скрещённое представление.

**Вспомогательная лемма 1.**  $e_1u_S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_{Se_1}$ , а значит,  $= e_1u_S\bar{u}_{Se_1}$ .

*Доказательство.* Положим  $u_S^{-1}e_1u_S = e^{S7}$  или  $e_1u_S = u_S e^S$ . Тогда  $e^S$  пробегают сопряжённые элементы  $e_1, e_2, \dots, e_n$ . Далее справедливо равенство (1)<sup>8</sup>

$$e_1\bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R-1}.$$

<sup>7</sup>При этом соглашении  $e_1 = e^E$ .

<sup>8</sup>Поскольку  $\sum a_i \bar{A}_i \bar{u}_R = \sum a_i \bar{u}_R \bar{A}_i^R = \bar{u}_R \sum (a_i^R)^{R-1} \bar{A}_i^{-R}$ .

Действительно,  $e_1 = \sum a_i \bar{A}_i = \sum a_i^R \bar{A}_i^R$ , где  $a_i$  пробегает некоторый базис поля  $\mathfrak{Z}$ , а  $\bar{A}_i$  — дополнительный к нему базис поля  $\bar{\mathfrak{Z}}$ ; следовательно, то же верно для  $a_i^R$  и  $\bar{A}_i^R$ . Итак,  $e_1 \bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R-1}$ , чем доказано (1). Из (1) следует

$$e_1 u_S \bar{u}_S = u_S e^S \bar{u}_S = u_S \bar{u}_S \cdot e^{SS^{-1}} = u_S \bar{u}_S e_1,$$

что доказывает вспомогательную лемму 1.

**Вспомогательная лемма 2.**  $ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1$ .

*Доказательство.* Действительно,

$$ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = zu_S \bar{u}_S e_1 \quad (\text{вспомогательная лемма 1}) = u_S z^S \bar{u}_S e_1 = u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1 = b = e_1 b,$$

( $z$  перестановочно с  $\bar{u}$  и  $e_1$ ). — Пусть  $u' = u_S \bar{u}_S e_1$ . Вспомогательная лемма 2 утверждает, что  $u'$  индуцирует подстановки поля  $\mathfrak{Z}_{e_1}$ , так что указанное в теореме скрёщённое представление имеет место.

**Вспомогательная лемма 3.** *Фактор-система равна  $a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1$ .*

*Доказательство.*

$$\begin{aligned} e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 &= u_S \bar{u}_S \cdot u_T \bar{u}_T e_1 = u_{ST} a_{S,T} \cdot \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T} e_1 \\ &= u_{ST} \bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T} \bar{b}_{S,T} e_1 = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1. \end{aligned}$$

Вместе с пунктом 2 это доказывает теорему, а следовательно, и теорему о произведении фактор-систем.

**4. Теорема о произведении классов ассоциированных фактор-систем:**

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

Она непосредственно следует из пункта 3, поскольку переход к новым порождающим  $v$  и  $\bar{v}$  означает также соответствующий переход к  $v\bar{v}e_1$ : ведь из  $u = vc$  и  $\bar{u} = \bar{v}\bar{d}$  следует

$$u\bar{u}e_1 = vc \cdot \bar{v}\bar{d}e_1 = v\bar{v} \cdot c\bar{d}e_1 = v\bar{v}e_1 \cdot c\bar{d}e_1.$$

**5.** Если  $\{a\}$  — фактор-система класса  $\{\mathfrak{K}\}$ , а  $t$  — индекс  $\{\mathfrak{K}\}$ , то  $\{a\}^t$  является единичным классом. Это следует из того, что неприводимое скрёщённое представление группы  $\mathfrak{G}$  имеет степень  $t$ , точно так же, как в доказательстве Шура после представления  $p_{ik}$  (§ 24, с. 37).

**6.** Имеется изоморфизм между группой  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$  классов  $\{\mathfrak{K}\}$ , относящихся к  $\mathfrak{Z}$ , то есть имеющих  $\mathfrak{Z}$  полем расщепления, и группой классов  $\{a_{S,T}\}$  ассоциированных фактор-систем. По построению в § 27 существует взаимно однозначное соответствие между  $\{\mathfrak{K}\}$  и  $\{a_{S,T}\}$ ; по пункту 4 это соответствие гомоморфно, а значит, имеет место изоморфизм. В частности, единичные классы соответствуют друг другу:

*Скрёщённое произведение равно  $P$ , то есть является матричным кольцом над центром, тогда и только тогда, когда фактор-система ассоциирована с единичной системой.*

## § 29. Теорема о главном роде в минимальном случае

Пусть  $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$  — скрёщённое произведение, а  $\mathfrak{G}^*$  — группа всех элементов, посредством внутренних автоморфизмов переводящих  $\mathfrak{Z}$  как целое в себя ( $\mathfrak{Z}^* u_E, \mathfrak{Z}^* u_S$ , — в записи через смежные классы).

**Определение.** «Главный род в минимальном случае»  $\mathcal{H}$  состоит из всех автоморфизмов группы  $\mathfrak{G}^*$ , продолжающих тождественное отображение  $\mathfrak{Z}^*$ . Основание для этого названия становится ясным при специализации на циклические поля. См. § 30.

**Теорема.** *Каждый автоморфизм главного рода имеет вид  $u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} = u_S b^{S-1}$ , где  $b$  принадлежит  $\mathfrak{Z}$ , и, обратно, каждое такое соответствие задаёт автоморфизм главного рода.*

*Доказательство.* Пусть при групповом автоморфизме  $u_S \mapsto v_S, z \mapsto z$  для каждого  $z$  из  $\mathfrak{Z}$ , причём произведения переходят в соответствующие произведения. Тогда этот автоморфизм можно продолжить до автоморфизма кольца  $\mathfrak{K}_r$  посредством соответствия

$$\sum u_S c_{\lambda_S} \mapsto \sum v_S c_{\lambda_S},$$

где  $c_{\lambda_S}$  принадлежат  $\mathfrak{Z}$ . Но, как известно, каждый такой автоморфизм внутренний.

Пусть  $b$  — элемент, осуществляющий этот внутренний автоморфизм, так что  $v_S = bu_Sb^{-1}$ ,  $z = bz^{-1}$ . Поскольку  $b$  перестановочен со всеми  $z$ , он принадлежит  $\mathfrak{Z}$ , и потому

$$v_S = bu_Sb^{-1} = u_Sb^Sb^{-1}.$$

Обратно, если положить  $v_S = u_Sb^Sb^{-1}$ , где  $b$  принадлежит  $\mathfrak{Z}$ , то  $v_S = bu_Sb^{-1}$ . Следовательно, речь идёт об автоморфизме  $\mathfrak{K}_r$ , который поэлементно оставляет  $\mathfrak{Z}$  на месте, а тем самым, по определению, переводит  $\mathfrak{G}^*$  как целое в себя; значит, это автоморфизм главного рода.

### § 30. Специализация на циклические поля расщепления

Если образовать скрещённое произведение специально с циклическим полем  $\mathfrak{Z}$ , то получаются интерпретации известных теорем о нормах. Прежде всего справедлива следующая теорема.

**Теорема 1.** *Группа  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$  классов  $\{\mathfrak{K}\}$  с фиксированным циклическим полем расщепления  $\mathfrak{Z}$  над  $P$  изоморфна группе  $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ , где  $N\mathfrak{Z}^*$  — группа всех норм  $Nz$  элементов  $z \neq 0$  поля  $\mathfrak{Z}$ .*

*Доказательство.* Доказательство основано на нормировке скрещённого представления и нескольких относящихся к ней вспомогательных леммах.

**Определение.** Циклическое скрещённое представление называется *нормированным*, если оно имеет вид

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \dots + \mathfrak{Z}u^{n-1},$$

где  $zu = uz^S$ ,  $u^n = a$ , а  $S$  — порождающий элемент группы  $\mathfrak{G}$  (то есть если полагается  $u_{S^r} = u^r$ ,  $r = 0, \dots, n-1$ , вместо более общего  $u_{S^r} = b_ru^r \cdot b_r$  в  $\mathfrak{Z}$ ).

**Вспомогательная лемма 1.** *Циклическое скрещённое представление всегда можно считать нормированным. При этом  $a$  принадлежит  $P$ , и каждое  $a$  из  $P$  задаёт такое представление.*

*Доказательство.* Первая часть ясна: из  $u^{-1}zu = z^S$  следует  $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$ , то есть  $u^r$  порождает подстановку  $z \mapsto z^{S^r}$ . Далее, поскольку  $u^n$  индуцирует тождественную подстановку  $z \mapsto z^{S^n}$ , имеем  $u^n = a$  с  $a$  в  $\mathfrak{Z}$ . Но  $u^n$  перестановочно со всеми  $u^r$ ; значит, то же верно для  $a$ , откуда  $a^{S^r} = a$ , то есть  $a$  принадлежит  $P$ .

Итак,  $a$  является единственной существенной константой умножения. Поэтому условия ассоциативности становятся пустыми: каждое  $a$  из  $P$  задаёт ассоциативную систему, а тем самым и  $\mathfrak{K}_r$ .

**Вспомогательная лемма 2.** *Вместо полного класса  $\{a_{S,T}\}$  ассоциированных фактор-систем достаточно рассматривать содержащиеся в нём нормированные фактор-системы, то есть возникающие из нормированных представлений. Это подмножество класса будем называть нормированным классом. Группа полных классов  $\{a_{S,T}\}$  изоморфна группе нормированных классов.*

*Доказательство.* По вспомогательной лемме 1 ни один нормированный класс не пуст, поэтому соответствие взаимно однозначно. Операция остаётся прежней, поскольку она определяется по любому представителю.

**Вспомогательная лемма 3.** *Группа нормированных фактор-систем изоморфна мультипликативной группе  $P^*$ , а группа нормированных классов изоморфна  $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ .*

*Доказательство.* Из вспомогательной леммы 1 следует, что каждая нормированная фактор-система имеет вид  $[1, 1, \dots, a, a, \dots]$ , поскольку

$$u^\nu \cdot u^\mu = u^{\nu+\mu} \quad (\nu + \mu < n), \quad u^\nu \cdot u^\mu = au^\varrho \quad (\nu + \mu = n + \varrho, \quad 0 \leq \varrho \leq n-2).$$

Соответствие

$$\begin{aligned} [1, \dots, a, a, \dots] &\mapsto a, & [1, 1, \dots, b, b, \dots] &\mapsto b, \\ [1, \dots, ab, \dots] &\mapsto ab, \end{aligned}$$

является групповым изоморфизмом на  $P^*$ , поскольку, опять же по вспомогательной лемме 1,  $a$  пробегает все элементы  $P^*$ . — Две ассоциированные нормированные фактор-системы получаются одна из другой преобразованием  $v = uc$  ( $c$  принадлежит  $\mathfrak{Z}$ ). Оно даёт

$$v = uc, \quad v^2 = u^2 \cdot c^S \cdot c;$$

$$v^r = u^r c^{S^{r-1}} c^{S^{r-2}} \dots c; \quad v^n = u^n N(c).$$

Таким образом, из  $u^n = a$  следует  $v^n = aN(c)$ . Следовательно, нормированный класс состоит из фактор-систем  $[1, \dots, aN(c), aN(c), \dots]$ , где  $c$  пробегает все элементы  $\neq 0$  поля  $\mathfrak{Z}$ . Этим доказана вторая часть вспомогательной леммы.

Из вспомогательных лемм 2 и 3, с учётом изоморфизма встречающихся в теореме классов  $\{\mathfrak{K}\}$  с классами  $\{a_{S,T}\}$ , следует сформулированная выше теорема 1.

**Теорема 2.** *Группа главного рода в минимальном случае изоморфна группе тех элементов  $c$  поля  $\mathfrak{Z}$ , для которых  $N(c) = 1$ . Следовательно, из  $N(c) = 1$  вытекает существование  $b \neq 0$  в  $\mathfrak{Z}$ , такого что  $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$  (символическая  $S - 1$ -я степень).*

*Доказательство.* При доказательстве вспомогательной леммы 3 было получено: условие  $N(c) = 1$  равносильно тому, что преобразование  $v = uc$  задаёт автоморфизм главного рода; различным  $c$  соответствуют различные автоморфизмы и обратно, а произведению — произведение.

**Замечание.** Теорема 2 оправдывает название «главный род». Соответственно фактор-группу

$$\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \quad (\mathcal{H} = \text{главный род}) \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$$

можно назвать группой родов в минимальном случае. Она изоморфна  $N(\mathfrak{Z}^*)$ , а потому, в связи с теоремой 1,

$$\begin{aligned} \text{группа родов в минимальном случае} &= \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*) \\ &= \text{группа классов } \{\mathfrak{K}\}, \text{ относящихся к } \mathfrak{Z} = \mathcal{K}_3 \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*). \end{aligned}$$

## § 31. Применения циклического частного случая

Циклическое скрещённое представление даёт новые доказательства теорем, доказанных в § 20: всякое конечное тело коммутативно, и, кроме кватернионов, не существует собственных некоммутативных расширений тела действительных чисел. — Эти доказательства можно было бы назвать доказательствами теории полей классов в минимальном случае.

### 1. Всякое конечное тело коммутативно (теорема 10 § 20).

Доказательство основано на двух известных фактах о коммутативных конечных телах (полях Галуа).

1. Поля Галуа циклически над каждым своим подполем.

2. Если  $\mathfrak{Z}$  — поле Галуа, то есть поле  $\mathfrak{Z}$  циклично над  $P$ , то каждый элемент  $P$  является нормой некоторого элемента  $\mathfrak{Z}$ .  $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$ .

Пусть теперь  $\mathfrak{K}$  конечно,  $P$  — его центр, а  $\mathfrak{Z}$  — циклическое поле расщепления. Тогда согласно заключению § 30 и пункту 1 группа  $\mathcal{K}_3$  классов  $\{\mathfrak{K}\}$ , относящихся к  $\mathfrak{Z}$ , изоморфна  $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ , а значит, по пункту 2 равна единичному классу  $\{P\}$ . Но это означает, что не существует отличного от  $P$  тела с центром  $P$ :  $\mathfrak{K} = P$ .

### 2. Единственным собственным некоммутативным расширением тела $P$ действительных чисел является тело кватернионов (теорема 9 § 20).

*Доказательство.* Поле  $P$  должно быть центром, поскольку  $P$  имеет лишь одно коммутативное расширение — поле  $\mathfrak{Z}$  комплексных чисел, а над алгебраически замкнутым  $\mathfrak{Z}$  как центром не существует некоммутативных расширений тела. Вместе с тем в качестве поля расщепления может выступать только  $\mathfrak{Z}$ , и  $\mathfrak{Z}$  циклично над  $P$ . Далее, каждое положительное число является нормой, так что группа  $P^*/N\mathfrak{Z}^*$  имеет порядок 2; следовательно, кроме  $\{P\}$ , существует лишь один класс  $\{\mathfrak{K}\}$ , а именно кватернионы. Одновременно получается и нормальная форма, если в качестве нормированной фактор-системы ассоциированного класса взять  $-1$ . Тогда  $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$ , где  $u^2 = -1$ . Таким образом,  $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$ , где  $i^2 = -1$ ,  $u^2 = -1$ .

**Замечание к 1.** Известный факт 2 также можно доказать на основании заключения § 30: имеем  $\mathcal{H} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/P^*$ , поскольку все и только элементы  $P^*$  порождают тождественный автоморфизм главного рода, или, что то же, переходят в единицу при применении  $S - 1$ . Поэтому при конечном  $\mathfrak{Z}$  число элементов  $\mathcal{H}$  равно индексу  $P^*$  в  $\mathfrak{Z}^*$ . Следовательно, число элементов  $\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$  равно числу элементов  $P^*$ ; то же верно для  $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$ , а потому  $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$ . (Ср.: число родов = число неоднозначных классов. Однако к этой теоретико-числовой формулировке всегда следует добавлять «в минимальном случае».)

**3.** Если  $P$  —  $p$ -адическое основное поле, а  $\mathfrak{Z}$  — циклическое расширение  $P$  степени  $n$ , то группа  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$  классов  $\{\mathfrak{K}\}$ , относящихся к  $\mathfrak{Z}$ , изоморфна группе Галуа поля  $\mathfrak{Z}$ .

В силу заключения § 30 это является непосредственным следствием «локальной теории полей классов», утверждающей, что

$$P^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{G}.$$

**Замечание к 3.** Отсюда следует, что порядок элементов группы  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ , то есть экспонента класса  $\{\mathfrak{K}\}$ , равен его индексу. Действительно, экспонента порождающего элемента  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$  задаётся равенством  $= n$ ; значит, индекс, будучи делителем  $n$  и кратным экспоненты, также равен ей. Таким образом,  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$  содержит только классы, индексы которых делят  $n$  и для которых  $\mathfrak{Z}$  является полем расщепления. Более того, Х. Хассе показал в Math. Ann. 104, что  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$  состоит из всех классов  $\{\mathfrak{K}\}$ , индексы которых делят  $n$ . Следовательно, каждое циклическое поле расщепления  $\mathfrak{Z}$   $n$ -й степени над  $p$ -адическим  $P$  приводит к одной и той же группе  $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$  классов тел  $\{\mathfrak{K}\}$ .

Два факта:

1. группа всех классов  $\{\mathfrak{K}\}$  над  $P$ , индексы которых делят  $n$ , циклична и имеет порядок  $n$ .
  2. Каждое циклическое поле расщепления степени  $n$  над  $P$  порождает полную группу классов  $\{\mathfrak{K}\}$ .
- можно считать существенным содержанием обратной теоремы локальной теории полей классов.

# Часть III    Статья Капферера — Нётер

## Необходимые и достаточные условия кратности для основной теоремы Нётер

### об алгебраических функциях

Г. Капферер

(с дополнением, совместно с Э. Нётер)

Math. Ann. 97 (1927), S. 559–567

Нижеследующее представляет собой усиление основной теоремы Нётер в форме необходимых и достаточных условий кратности<sup>1)</sup>. Комплекс фактов основной теоремы Нётер я, опираясь на идеально-теоретическое понимание этой теоремы<sup>2)</sup>, но не пользуясь здесь и далее идеально-теоретическими понятиями и теоремами, свожу к следующим двум отдельным утверждениям<sup>3)</sup>:

**Теорема Ia.** Для каждой общей нулевой точки  $x = a, y = b$  двух взаимно простых полиномов  $\varphi, \psi$  от  $x, y$  с произвольными комплексными коэффициентами существует наименьшее целое рациональное положительное число  $\varrho$  такое, что модуль  $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$  означает в точности ту же совокупность полиномов, что и модуль  $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\sigma)$ , где  $\mathfrak{p} = (x - a, y - b)$ , а  $\sigma$  означает произвольное целое рациональное число, большее  $\varrho$ <sup>4)</sup>.

**Теорема Ib.** Если эту понятийно однозначно определенную совокупность полиномов обозначить через  $\mathfrak{q}$ , соответственно через  $\mathfrak{q}_\nu$ , когда речь идет о  $\nu$ -й из  $s$  различных нулевых точек, то есть о  $x = a_\nu, y = b_\nu$ , то имеет место следующее:

Необходимо и достаточно для того, чтобы заданный полином  $K$  от  $x, y$  обладал свойством делимости  $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ , чтобы одновременно выполнялись следующие  $s$  конгруэнций

$$K \equiv 0(\mathfrak{q}_1), \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_2), \quad \dots, \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_s).$$

Исторически, ср. введение к основополагающей работе Макса Нётер об этом предмете<sup>5)</sup>, основная теорема возникла из попыток решить следующую фундаментальную задачу: для каждого заданного полинома  $K$  от  $x, y$  надо уметь установить, делится ли он на  $(\varphi, \psi)$  или нет, то есть также существуют ли два других полинома  $A$  и  $B$  от  $x, y$  такие, что равенство

$$K = A\varphi + B\psi$$

становится тождеством по  $x, y$ .

Эта задача теоремой Нётер не решается; скорее последнюю следует понимать лишь как, хотя и фундаментальное, сведение<sup>6)</sup> поставленной задачи к более простой, а именно к вопросу о необходимых и достаточных условиях существования отдельных конгруэнций  $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ . Когда же имеет место  $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ ? Только после ответа на этот последний вопрос решена и исходная постановка задачи М. Нётер. Именно это является целью настоящей статьи, и эта цель действительно достигается: указываются конечное число условий кратности, практически также легко проверяемых, которые необходимы и достаточны для  $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ . Одно достаточное условие для  $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ , которое, однако, не является одновременно необходимым условием, известно и часто применяется и цитируется в литературе, например в такой форме:

*Для существования конгруэнции  $K \equiv 0(\varphi, \psi)$  достаточно, чтобы каждая точка пересечения  $\varphi = 0, \psi = 0$  входила в полином  $K$  с “достаточно” высокой кратностью.*

Эта теорема содержится в теореме I как специальный случай; ведь  $\varrho$ -кратная точка в  $K$  равносильна  $K \equiv 0(\mathfrak{p}^\varrho)$ ; тогда тем более  $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$ , то есть также  $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ . Но обратное неверно.

<sup>1)</sup> За подробным изложением я отсылаю к моей работе того же названия в специальном выпуске отчетов Гейдельбергской академии 1927 года “Beiträge zur Algebra”, подготовленном по инициативе A. Loewy, Freiburg i. Br., который содержит работы разных авторов.

<sup>2)</sup> Ср., например, B. L. van der Waerden, “Zur Nullstellentheorie der Polynomideale”. Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

<sup>3)</sup> В § 1 цитированной работы я доказал оба утверждения отдельно и непосредственно, то есть без идеально-теоретических понятий.

<sup>4)</sup> Буквы  $\mathfrak{p}$  и  $\mathfrak{q}$  выбраны для того, чтобы напомнить о содержательном совпадении обозначаемого с понятиями простого идеала  $\mathfrak{p}$  и примарного идеала  $\mathfrak{q}$ , обычными в новейшей литературе.

<sup>5)</sup> Max Noether, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen”, Math. Annalen 6 (1872).

<sup>6)</sup> Указанное сведение приблизительно сравнимо с тем, которое каждый знает из элементарной теории чисел: свойство делимости натурального числа  $A$  на такое же  $B$  эквивалентно свойству делимости  $A$  на  $p_1^{e_1}$ , на  $p_2^{e_2}$ , ..., на  $p_s^{e_s}$ , где  $p_1, p_2, \dots, p_s$  означают различные простые делители  $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_s^{e_s}$ . Именно понятие “примарный идеал”, в тексте обозначенное через  $\mathfrak{q}$ , надо рассматривать как аналог степени простого числа. [Ср. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), введение.]

## Главная теорема

Обещанное решение задачи можно коротко охарактеризовать так: каждому отдельному  $q$  можно сопоставить систему из  $t$  положительных целых рациональных чисел  $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$ , а модулю  $(K, q)$  — столько же целых рациональных положительных или отрицательных чисел  $(K_1), (K_2), \dots, (K_t)$ , так что имеет место следующая **главная теорема**:

**Теорема 1** (Главная теорема). *Необходимо и достаточно для  $K \equiv 0(q)$ , чтобы одновременно выполнялись  $t$  условий*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \dots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

При этом

$$t \leq \mu,$$

где  $\mu$  означает соответствующую  $q$  кратность пересечения, определенную результатом.

В доказательстве, без ограничения общности, будем считать  $x = 0, y = 0$  нулевой точкой пары  $(\varphi, \psi)$ , соответствующей  $q$ . Далее вообще, если  $A(x, y)$  есть некоторый полином<sup>7)</sup> от  $x, y$ , символ  $(A)$  будет означать число, показывающее, сколько раз  $y$  входит множителем в  $A(0, y)$ ; если же  $A(0, y)$  тождественно обращается в нуль, то  $(A)$  полагается равным  $\infty$ . Числа  $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$ , соответствующие  $q$ , определяются следующей системой уравнений, которая образует методическую основу процедуры:

$$\begin{aligned} \varphi &= g_1 \cdot f_1(x, y) + h_1, & h_1 &\equiv 0(y^{(g_1)}), \\ f_1 &= g_2 \cdot f_2(x, y) + h_2, & h_2 &\equiv 0(y^{(g_2)}), \\ &\vdots & \\ f_{t-1} &= g_t \cdot f_t(x, y) + h_t, & h_t &\equiv 0(y^{(g_t)}), \\ f_t &= g_{t+1} \cdot f_{t+1}(x, y) + h_{t+1}, & h_{t+1} &\not\equiv 0(y). \end{aligned} \tag{1}$$

Она строится только из заданной пары полиномов  $\varphi, \psi$ : полиномы  $f_i, g_i$  сначала определяются как тождественные с  $\varphi, \psi$ , возможно после перестановки; порядок должен быть таким, чтобы  $(f_1) \geq (g_1)$ . При этой фиксации, и только тогда,  $K_i$  будет целорациональным.

Полиномы  $f_i, g_i$  определяются как тождественные с  $h_{i-1}, g_{i-1}$  при дополнительном условии  $(f_i) \geq (g_i)$ . В общем случае пара полиномов  $f_i, g_i$  определяется как тождественная с  $h_{i-1}, g_{i-1}$  при дополнительном условии  $(f_i) \geq (g_i)$ .

Систему уравнений (1) действительно можно продолжать бесконечно указанным способом; но главная теорема требует построить только первые  $t$  уравнений системы, где  $t$  определяется следующим фактом:

**Лемма I.** Существует натуральное число  $t$  [причем  $t \leq \mu$ , где под  $\mu$  понимается кратность пересечения, с которой точка  $x = 0, y = 0$  входит в  $\varphi = 0, \psi = 0$ ] такое, что первые  $t$  чисел, определенных посредством (1), а именно  $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$ , все больше нуля, тогда как одновременно  $(g_{t+1})$  и все следующие равны нулю.

Действительно, с учетом теоремы о произведении результатов кратность пересечения в точке  $x = 0, y = 0$  для  $f_i = 0, g_i = 0$  равна

$$(g_1) + (g_2) + \dots + (g_i) + (g_{i+1}) \cdot \mu_{i+1},$$

откуда следует обрыв не более чем через  $\mu$  шагов. Отсюда одновременно получается факт

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \dots + (g_t), \tag{2}$$

формула, замечательная тем, что в общем случае она дает рациональный и практически легко выполнимый метод определения кратности пересечения, как только известна соответствующая нулевая точка.



Когда числа  $(g_i)$  уже известны, числа  $(K_i)$  определяются следующей системой уравнений, соответствующей (1):

$$\begin{aligned} K &= g_1 \cdot K_1(x, y) + L_1, & L_1 &\equiv 0(y^{(K_1)}), \\ K_1 &= g_2 \cdot K_2(x, y) + L_2, & L_2 &\equiv 0(y^{(K_2)}), \\ &\vdots \\ K_{t-1} &= g_t \cdot K_t(x, y) + L_t, & L_t &\equiv 0(y^{(K_t)}). \end{aligned} \quad (3)$$

$K_0$  определяется как тождественный с  $K$ . Очевидно,  $K_i$  будет целорациональным тогда и только тогда, когда  $(K_i) \geq (g_i)$ . Если последнее выполнено, далее следует:  $K_{i+1}$  будет целорациональным тогда и только тогда, когда  $(K_i) \geq (g_i)$ . В общем случае, если  $K_i$  уже целорационален,  $K_{i+1}$  будет целорациональным тогда и только тогда, когда  $(K_i) \geq (g_i)$ .

Доказательство главной теоремы (теоремы 1) теперь основано на следующей

**Лемме II.** Если положить  $(f_i, g_i, p^{2^i})$  равным  $q^{(i)}$ , то для каждого  $\nu$  из ряда целых чисел  $1, 2, \dots$  in inf. имеет место утверждение:

Для конгруэнции

$$K \cdot f_\nu \equiv 0(q^{(\nu)})$$

необходимо и достаточно одновременное выполнение двух условий:

$$(K) \geq (g_\nu) \quad \text{и} \quad K_{\nu+1} \equiv 0(q^{(\nu+1)}).$$

Доказательство<sup>8)</sup> леммы получается комбинацией систем уравнений (1) и (3). Если учесть, что  $g_{t+1}$  согласно лемме I уже не обращается в нуль в нулевой точке, то есть что модуль  $q^{(t+1)}$  состоит из всех полиномов (является единственным идеалом), и потому  $K_{t+1} \equiv 0(q^{(t+1)})$  становится тривиальным, то  $\mu$ -кратное применение леммы II дает доказательство главной теоремы.

Без доказательств, доказательства находятся в моей цитированной выше работе, я добавляю еще два дополнения к главной теореме:

**Дополнение 1 (I).** Число  $t$  главной теоремы тождественно с наименьшим<sup>9)</sup> положительным числом  $\nu$  такого рода, что  $x^\nu \equiv 0(q)$ .

**Дополнение 2 (II).** Системы уравнений (1) и (3), а также возникающие из них перестановкой  $x$  и  $y$ , при подходящей комбинации дают рациональный метод точного численного определения “принадлежащего”  $q$  показателя  $\varrho$ <sup>10)</sup>, то есть того минимального показателя  $\varrho$  из теоремы Ia.

Э. Бертини<sup>10)</sup> дал общую формулу для  $\varrho$ . Что эта формула, однако, не всегда дает минимальное значение  $\varrho$ , показано в цитированной работе на примере  $\varphi = x^3 + y^4$ ,  $\psi = x^2 - y^5$ . Наконец заметим, что и сама формула Бертини может быть по-новому обоснована нашей главной теоремой.

<sup>7)</sup> Если для  $A(x, y)$  допустить также дробно-рациональные функции  $C(x, y) : D(x, y)$ , то  $(A) = (C) - (D)$ ; в последнем случае  $(A)$  поэтому может принимать и отрицательные значения.

<sup>8)</sup> Ср. также доказательство в замечании I “Дополнения”.

<sup>9)</sup> Здесь, следовательно, получаются точные показатели в отличие от оценок фрейлейн Грете Герман [“Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale” (с использованием посмертных теорем К. Гентцельга), Math. Annalen 95 (1926)], где, правда, при гораздо более общей постановке задачи, указываются только верхние границы.

<sup>10)</sup> E. Bertini, Math. Annalen 34 (1889).

## Теорема III и дополнение

Интересная специализация главной теоремы следует из ограничительного предположения, что нулевая точка соответствующего  $q = (\varphi, \psi, p^q)$  является простой точкой по крайней мере на одной из двух кривых  $\varphi = 0$ ,  $\psi = 0$ . Если, например, она является простой точкой на  $\psi$ , то можно показать, что число  $t$  главной теоремы точно равно  $\mu$  и что  $t$  неравенств главной теоремы можно заменить одним-единственным условием кратности. Это приводит к следующей общей теореме:

**Теорема 2** (Теорема III). *Если все точки пересечения  $\varphi = 0$ ,  $\psi = 0$  являются простыми точками на  $\psi$ , то, при условии что  $K$  взаимно прост с  $\psi$ , для существования конгруэнции  $K \equiv 0(\varphi, \psi)$  необходимо и достаточно, чтобы  $K$  обращался в нуль во всех этих точках, причем так, чтобы кратность пересечения в паре кривых  $K = 0$ ,  $\psi = 0$  в каждой из них была не меньше, чем в паре кривых  $\varphi = 0$ ,  $\psi = 0$ .*

Эта теорема III замечательна еще по особой причине: требуемое ею условие кратности является таким, что его выполнение или невыполнение можно установить конечным числом дифференцирований, независимо от формулы (2), основанной на (1). Это сразу становится ясным, если процитировать следующую “теорему”, которую я сформулировал в 1923 году<sup>11)</sup>:

*Если  $A$  и  $B$  — какие-либо два взаимно простых полинома от  $x, y$ , а  $P$  — их общая точка, являющаяся простой точкой для  $B$ , то кратность этой точки как точки пересечения тогда и только тогда равна числу  $\mu$ , когда кратность той же точки в паре кривых  $A' = 0$ ,  $B = 0$  в точности равна  $\mu - 1$ ; при этом*

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Наконец заметим еще, что главная теорема (теорема 1) с небольшой модификацией может быть перенесена и на однородные полиномы от 3 переменных  $x, y, z$ . Такой перенос в указанном выше специальном случае удается особенно элегантно. А именно можно показать:

**Дополнение 3** (к теореме III). *Теорема 2 остается совершенно неизменной, даже по формулировке, если под  $\varphi, \psi, K$  понимать однородные полиномы от трех переменных<sup>12)</sup>.*

---

<sup>11)</sup> Н. Kapferer, “Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven”. Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

<sup>12)</sup> Вопрос об условиях существования однородной конгруэнции от трех переменных  $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ , хотя и при сильно специализированных предположениях, является также центральным вопросом исследования А. Ostrowski, “Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen”, Jahresb. der D.M.-V. 33 (1925). В этой заметке предполагается:  $\varphi$  распадается только на линейные множители;  $\varphi$  и  $K$  имеют один и тот же порядок;  $\psi = x^2 + y^2 + z^2$ . Поскольку здесь  $\psi$  совершенно свободен от особенностей, главную теорему заметки Островского можно рассматривать как специальный случай нашей теоремы III.

## Дополнение, совместно с Э. Нётер<sup>13)</sup>

Система уравнений (1) одновременно дает рациональный метод определения полной системы вычетов по  $q$ , под чем следует понимать полную систему представителей конечного числа линейно независимых относительно области коэффициентов  $P$  классов вычетов modulo  $q$ . Тем самым отдельные шаги в доказательстве главной теоремы становятся очень прозрачными; вместе с тем в качестве побочного результата получается факт, что результатная кратность  $\mu$  совпадает с длиной идеала  $q$ ;

<sup>13)</sup> Идеально-теоретическое истолкование принадлежит Э. Нётер, а лежащее в основе доказательство (5) и (6) — Г. Капфереру.

<sup>14)</sup> Поле  $P$  без ограничения общности предполагается алгебраически замкнутым; в этом объеме действительно справедливы все предыдущие теоремы, за исключением условия дифференцирования. Длина  $q$  определяется также как длина композиционного ряда из идеалов, идущего от  $p$  к  $q$ . Ср. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (косая пагинация); подробнее у H. Grell, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Имеющиеся в литературе доказательства совпадения обоих чисел кратности (для  $n$  переменных) очень сложны; самым простым является еще не опубликованное посмертное доказательство Гентцельта.

то есть с рангом кольца классов вычетов или с числом линейно независимых относительно  $P$  классов вычетов<sup>14)</sup>.

Полная система вычетов, в обозначениях (1) и леммы II, характеризуется следующей

**Теорема 3** (Теорема IV). *Полная система вычетов по  $q$  задается полиномами*

$$h_\nu \cdot y^\lambda, \quad \nu = 1, \dots, t; \quad \lambda = 0, 1, \dots, (g_\nu) - 1.$$

При этом каждый раз  $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$  дают полную систему вычетов от  $q^{(\nu)}$  до  $q^{(\nu+1)}$ .

Из определения непосредственно следует:  $q^{(\nu+1)} = (q^{(\nu)}, h_\nu)$ , значит  $q^{(\nu)} \supseteq q^{(\nu+1)}$ . Теорема 3 будет доказана, если показать:

$$h_\nu \equiv 0(q), \tag{4}$$

$$h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)}) \tag{5}$$

и

$$a_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)}) \quad \text{влечет} \quad F(y) \equiv 0(y). \tag{6}$$

Соотношения (4) и (5) именно утверждают, что линейные комбинации  $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$  исчерпывают классы вычетов от  $q^{(\nu+1)}$  до  $q^{(\nu)}$ , тогда как (6) выражает линейную независимость. Так как  $q^{(t+1)}$  становится единичным идеалом, что теперь следует из конечной длины  $q$ , отсюда получается доказательство теоремы 3 и одновременно факт, что длина  $q$  равна  $(g_1) + \dots + (g_t)$ , то есть по (2) совпадает с результатной кратностью.

Первое из соотношений (4) считывается из (1); второе получается следующим образом:

Имеем  $h_\nu g_\nu \equiv 0(q)$ ; следовательно, ввиду первого соотношения (4), также  $h_\nu g_\nu(0, y) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$ , или  $h_\nu y^{(g_\nu)}(g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)}) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$ , откуда  $h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)})$  вследствие  $g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)} \not\equiv 0(y)$ .

Перед доказательством (6) заметим то, что непосредственно считывается из (1):  $f_i$  и  $g_i$  могут иметь общим делителем только не делящийся на  $y$  полином  $d_i(y)$  от  $y$ :  $f_i = d_i(y)\bar{f}_i$ ,  $g_i = d_i(y)\bar{g}_i$ , причем  $\bar{f}_i$  и  $\bar{g}_i$  взаимно просты. Так как  $d_i(y) \not\equiv 0(p)$ , то  $q^{(\nu)}$  также равно  $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^{2^i})$ ; при этом оно равно  $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^e)$  для каждого  $e \geq e_i$ , как делитель  $q$  для каждого такого  $e$ ; следовательно,  $q$  есть примарная компонента  $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$ , соответствующая нулевой точке.

Пусть  $\gamma_1, \delta_1; \dots; \gamma_r, \delta_r$  — отличные от  $x = 0, y = 0$  нулевые точки  $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$ , и пусть  $\tau_1, \dots, \tau_r$  — показатели соответствующих примарных компонент  $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$ ; далее в произведении  $P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \dots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$  неопределенную  $u$  выберем как элемент из  $P$  так, чтобы сохранилось  $P \not\equiv 0(p)$ . Положив  $G(x, y)$  равным произведению специализированного  $P$  с  $d_i(y)$ , получаем  $G(x, y) \not\equiv 0(p)$  и  $q^{(\nu)} \cdot G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$ .

Из предположения  $h_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)})$  следует  $h_\nu F(y)G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$ , или, вместе с (1), в форме тождеств:

$$h_\nu F(y)G = A\bar{f}_i + B\bar{g}_i, \quad \bar{g}_i(0, y) = y^{(g_\nu)}, \quad \bar{f}_i(0, y) = h_\nu.$$

А это дает

$$\bar{f}_i(zA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \quad H = G(x, y) \cdot g_i(0, y) : y^\nu \neq 0(p).$$

Из взаимной простоты  $\bar{f}_i$  и  $\bar{g}_i$  далее следует

$$zA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i); \quad \text{следовательно } F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, z) \equiv 0(\bar{g}_i, z, p^2) \equiv (y, z),$$

и потому  $F(y) \equiv 0(y)$ . Тем самым доказано (6), а значит и теорема 3.

**Замечание I.** Соотношения (4) и (5) вместе с леммой II можно записать как взаимно обратные соотношения между частными идеалов<sup>15)</sup>; при этом доказательство второго соотношения одновременно дает доказательство леммы II:

$$q^{(\nu)} : x = (q^{(\nu+1)}, y) = (y, h_\nu); \quad q^{(\nu)} : (q^{(\nu+1)}, y) = (x, h_\nu). \quad (7)$$

Первое соотношение является объединением (4) и (5); по поводу второго надо заметить: в (4) было доказано  $x \cdot q^{(\nu+1)} \equiv 0(q^{(\nu)})$ ; обратное получается аналогично (6). Из  $xM \equiv 0(q^{(\nu)})$  как выше следует:

$$xMG \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i); \quad \text{следовательно } xM \cdot G \cdot g_i(0, y) : y^\nu \equiv 0(xh_\nu, \bar{g}_i).$$

Так как  $g_i \equiv 0(x)$  по определению, именно  $(f_i) \geq (g_i)$ , отсюда получается  $M \cdot (G \cdot g_i(0, y) : y^\nu) \equiv 0(h_\nu, \bar{g}_i) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$ , то есть  $M \equiv 0(q^{(\nu+1)})$ .

Необходимость условия леммы II теперь следует так:  $K_\nu \equiv 0(q_\nu)$  дает  $K_\nu(0, y) \equiv 0(y^{(g_\nu)}, x)$ ; значит  $(K_\nu) \geq (g_\nu)$ , и тем самым, по (3),  $x \cdot K_{\nu+1} \equiv 0(q)$ ; следовательно, по второму соотношению (7),  $K_{\nu+1} \equiv 0(q^{(\nu+1)})$ .

Достаточность условия считывается непосредственно; конечное многократное применение леммы II дает главную теорему. Точно так же итерация второго соотношения (7) дает дополнение I, а именно  $q : x^t = q^{(t+1)}$ , то есть единичный идеал; причем  $t$  является наименьшей такой степенью, так как  $q : x^{t-1} = q^{(t)}$ .

**Замечание II.** Для полинома  $K$ , не делящегося на  $q$ , можно еще утверждать: если  $K \equiv 0(q^{(\nu+1)})$ ,  $\neq 0(q^{(\nu)})$ , то  $(K, q^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, q^{(\nu)})$ . Ведь по теореме 3  $K \equiv h_\nu y^\lambda c(y) \text{ modulo } (q^{(\nu)})$  с  $c(y) \neq 0(y)$ ; следовательно

$$(K, q^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, q^{(\nu)}).$$

При этом  $y^\lambda \cdot K \equiv 0(q)$ , и именно это по (6) является наименьшей такой степенью. По лемме II эта наименьшая степень равна  $(g_\nu) - (K)$ ; значит  $\lambda$  равно  $(K)$ .

(Поступила 24. 10. 1926.)

<sup>15)</sup> Под частным  $a : b$ , как известно, понимают совокупность полиномов  $c(x, y)$  таких, что  $bc \equiv 0(a)$ .

<sup>16)</sup> Из этих двух взаимно обратных соотношений одно влечет другое по общей теории неприводимых идеалов; ср. Macaulay, *Modular Systems*, Nr. 72 и 73. Cambridge Tracts 19 (1916).

# Часть IV Библиография

## Библиография

1. Об образовании системы форм тернарной биквадратичной формы.  
Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen **39** (1907), S. 176–179
2. Об образовании системы форм тернарной биквадратичной формы.  
J. Reine Angew. Math. **134** (1908), S. 23–90 и одна таблица
3. К теории инвариантов форм от  $n$  переменных.  
J. Ber. d. DMV **19** (1910), S. 101–104
4. К теории инвариантов форм от  $n$  переменных.  
J. Reine Angew. Math. **139** (1911), S. 118–154
5. Рациональные поля функций.  
J. Ber. d. DMV **22** (1913), S. 316–319
6. Поля и системы рациональных функций.  
Math. Ann. **76** (1915), S. 161–196
7. Теорема конечности инвариантов конечных групп.  
Math. Ann. **77** (1916), S. 89–92
8. О целочисленном рациональном представлении инвариантов системы произвольно многих основных форм.  
Math. Ann. **77** (1916), S. 93–102. (См. также № 16)
9. Наиболее общие области из целых трансцендентных чисел.  
Math. Ann. **77** (1916), S. 103–128. (См. также № 16)
10. Функциональные уравнения изоморфного отображения.  
Math. Ann. **77** (1916), S. 536–545
11. Уравнения с предписанной группой.  
Math. Ann. **78** (1918), S. 221–229. (См. также № 16)
12. Инварианты произвольных дифференциальных выражений.  
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 37–44
13. Инвариантные вариационные задачи.  
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1918**, S. 235–257
14. Арифметическая теория алгебраических функций одной переменной в ее отношении к остальным теориям и к теории числовых полей.  
J. Ber. d. DMV **28** (1919), S. 182–203
15. Конечность системы целочисленных инвариантов бинарных форм.  
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1919**, S. 138–156
16. К разложению в ряды в теории форм.  
Math. Ann. **81** (1920), S. 25–30
17. Совместно с W. Schmeidler: модули в некоммутативных областях, в частности из дифференциальных и разностных выражений.  
Math. Z. **8** (1920), S. 1–35
18. О работе К. Hentzelt, погибшего на войне, по теории элиминации.  
J. Ber. d. DMV **30** (1921), S. 48

19. Теория идеалов в кольцевых областях.  
Math. Ann. **83** (1921), S. 24–66
20. Алгебраический критерий абсолютной неприводимости.  
Math. Ann. **85** (1922), S. 26–33
21. Формальное вариационное исчисление и дифференциальные инварианты.  
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), S. 68–71 (в: R. Weitzenböck, *Дифференциальные инварианты*)
22. Обработка К. Hentzelt: к теории полиномиальных идеалов и результатов.  
Math. Ann. **88** (1923), S. 53–79
23. Алгебраические и дифференциальные варианты.  
J. Ber. d. DMV **32** (1923), S. 177–184
24. Теория элиминации и общая теория идеалов.  
Math. Ann. **90** (1923), S. 229–261
25. Теория элиминации и теория идеалов.  
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 116–120
26. Абстрактное построение теории идеалов в алгебраическом числовом поле.  
J. Ber. d. DMV **33** (1924), S. 102
27. Гильбертовы функции в теории идеалов.  
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 101
28. Характеры групп и теория идеалов.  
J. Ber. d. DMV **34** (1925), S. 144
29. Теорема конечности инвариантов конечных линейных групп характеристики  $p$ .  
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen **1926**, S. 28–35
30. Абстрактное построение теории идеалов в алгебраических числовых и функциональных полях.  
Math. Ann. **96** (1927), S. 26–61
31. Теорема о дискриминанте для порядков алгебраического числового или функционального поля.  
J. Reine Angew. Math. **157** (1927), S. 82–104
32. Совместно с R. Brauer: о минимальных полях расщепления неприводимых представлений.  
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. **1927**, S. 221–228
33. Гиперкомплексные величины и теория представлений в арифметическом понимании.  
Atti Congresso Bologna **2** (1928), S. 71–73
34. Гиперкомплексные величины и теория представлений.  
Math. Z. **30** (1929), S. 641–692
35. О максимальных областях из целочисленных функций.  
Rec. Soc. Math. Moscou **36** (1929), S. 65–72
36. Дифференцирование идеалов и дифферента.  
J. Ber. d. DMV **39** (1930), S. 17
37. Нормальный базис в полях без высшего ветвления.  
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 147–152
38. Совместно с R. Brauer и H. Hasse: доказательство главной теоремы в теории алгебр.  
J. Reine Angew. Math. **167** (1932), S. 399–404
39. Гиперкомплексные системы в их отношениях к коммутативной алгебре и теории чисел.  
Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich **1** (1932), S. 189–194

- 40. Некоммутативные алгебры.  
Math. Z. **37** (1933), S. 514–541
  - 41. Главная теорема о родах для относительно галуаовых числовых полей.  
Math. Ann. **108** (1933), S. 411–419
  - 42. Расщепляющиеся скрещенные произведения и их максимальные порядки.  
Actualités scientifiques et industrielles **148** (1934) (15 S.)
  - 43. Дифференцирование идеалов и дифферента.  
J. Reine Angew. Math. **188** (1950), S. 1–21
- 

**Необходимые и достаточные условия кратности к нётеровой  
фундаментальной теореме алгебраических функций: Н. Kapferer  
(с добавлением, совместно с Е. Noether).**  
Math. Ann. **97** (1927), S. 559–567

## Список коротких сообщений и рецензий Emmy Noether

### Короткие сообщения, опубликованные в ежегодниках Немецкого математического общества

- Об инвариантах произвольных дифференциальных выражений, 27, часть II, (1918), S. 28
- Инвариантные вариационные задачи, 27, часть I, (1918), S. 47
- Конечность целочисленных бинарных инвариантов, 26, часть II, (1919), S. 29
- О целочисленных полиномах и степенных рядах, 28, часть II, (1919), S. 29–30
- Теоремы разложения теории модулей, 29, часть II, (1920), S. 54
- Элементарные делители и общая теория идеалов, 30, часть II, (1921), S. 32
- Указание на формулу Lipschitz, 30, часть II, (1921), S. 48
- Аналог гильбертовой теоремы в общей теории идеалов, 32, часть II, (1923), S. 202
- Теоретико-групповые замечания к проблеме аксиоматики, 33, часть I, (1924), S. 120
- Теория Галуа в произвольных полях, 33, часть II, (1925), S. 120
- Гильбертовы функции в теории идеалов, 34, часть II, (1926), S. 101
- Дифференциальные частные идеалов и теория ветвления, 38, часть II, (1929), S. 61

### Рецензии, опубликованные в ежегодниках Немецкого математического общества

- E. Study, *Введение в теорию инвариантов линейных преобразований на основе векторного исчисления*. Первая часть. (Die Wissenschaft, Bd. 71) Braunschweig 1923, Vieweg. 36, часть II, (1927), S. 71
- Сочинения Leopold Kronecker, т. 4. Под редакцией K. Hensel. VI и 509 с. Leipzig и Berlin 1929, B. G. Teubner. 40, часть II, (1931), S. 112
- Сочинения Leopold Kronecker, т. 5. Под редакцией K. Hensel. 527 с. Leipzig и Berlin 1930, B. G. Teubner. 41, часть I, (1932), S. 17
- Сочинения Leopold Kronecker, т. III. 2. Под редакцией K. Hensel. 215 с. Leipzig и Berlin 1931, B. G. Teubner. 42, часть I, (1933), S. 38–39
- D. E. Rutherford, *Модулярные инварианты*. Cambridge Tracts No. 27. Cambridge 1932, VII и 84 с. 43, часть II, (1934), S. 94–95



## Книги, созданные при участии Emmy Noether

- R. Dedekind, *Собрание сочинений* I–III. Под редакцией R. Fricke, E. Noether, O. Ore. Vieweg, Braunschweig 1930–1932  
(т. I 1930; т. II 1931; т. III 1932)
- G. Cantor, *Переписка с R. Dedekind*. Под редакцией Emmy Noether и J. Cavaillès, 60 страниц. Actualités scient. et ind. 581, Paris 1937

---

*Конец избранных математических работ*

*Emmy Noether*

*(1882–1935)*