

Erster Band.

Einleitung.

Wir setzen bei unseren Betrachtungen die natürlichen Zahlen $1, 2, 3, \dots$ und die Regeln, nach denen mit diesen Zahlen gerechnet wird, als bekannt und gegeben voraus. Die fundamentalen Rechenarten, die sogenannten vier Species, sind die Addition, die Multiplication, zu der als Wiederholung das Potenziren gehört, die Subtraction und die Division. Die beiden ersten heissen die directen Rechenoperationen; sie sind dadurch ausgezeichnet, dass sie im Reiche der natürlichen Zahlen unbegrenzt ausgeführt werden können. Die erste der indirecten oder inversen Operationen, die Subtraction, lässt sich nur dann ausführen, wenn der Minuend grösser ist als der Subtrahend.

Die Aufgabe der Division kann man auf zwei Arten auffassen. Bei der ersten elementaren Auffassung wird gefragt, wie oft der Divisor im Dividenten enthalten ist. Eine Zahl ist nicht in einer kleineren enthalten. Ist aber der Divident gleich oder grösser als der Divisor, so giebt die Beantwortung der Frage einen Quotienten und in den meisten Fällen einen Rest, der kleiner als der Divisor ist. Wenn kein Rest bleibt, so sagt man, die Division geht auf, oder der Divident ist durch den Divisor theilbar, oder der Divisor ist ein Factor oder Theiler der Zahl, die den Dividenten bildet.

Diese Aufgabe, die sich schon auf den ersten Stufen der Rechenkunst einstellt, führt zu einer tiefer liegenden Unterscheidung der Zahlen, die das Fundament aller Zahlentheorie ist.

Da ein Factor nie grösser sein kann als die Zahl, deren Factor sie ist, so hat jede Zahl nur eine endliche Anzahl von Factoren. Jede Zahl ist durch 1 und durch sich selbst theilbar, und eine Zahl, die sonst keinen Theiler hat, heisst eine Primzahl. Die Zahl 1 selbst pflegt man aus Zweckmässigkeitsgründen nicht als Primzahl zu bezeichnen. Sind zwei Zahlen durch eine dritte theilbar, so ist auch die Summe und die Differenz der beiden ersten durch die dritte theilbar; und ist eine Zahl durch eine zweite, diese durch eine dritte theilbar, so ist auch die erste durch die dritte theilbar.

Zwei Zahlen haben immer den gemeinsamen Theiler 1. Wenn sie keinen anderen gemeinsamen Theiler haben, wie z. B. die Zahlenpaare 5 und 7 oder 21 und 38, so heissen die beiden Zahlen relative Primzahlen oder auch theilerfremde Zahlen.

Unter den gemeinsamen Theilern von irgend zwei gegebenen Zahlen wird einer der grösste sein und es ist eine sehr wichtige Aufgabe, diesen grössten gemeinschaftlichen Theiler zu finden. Dazu führt ein Verfahren, das unter dem Namen Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers bekannt ist und sich schon bei Euklid findet.¹

Sind a, a_1 die beiden Zahlen, so nehme man die grössere von ihnen, die a sei, als Dividenten, die kleinere a_1 als Divisor, und bestimme den Quotienten q_1 ; und wenn die Division nicht aufgeht, den Rest a_2 , also

$$a = q_1 a_1 + a_2,$$

so dass $a_2 < a_1$ ist. Jeder gemeinschaftliche Theiler von a und a_1 ist dann auch gemeinschaftlicher Theiler von a_1 und a_2 und umgekehrt. Verfährt man mit a_1, a_2 ebenso wie mit a und a_1 und setzt, wenn die Division nicht aufgeht,

$$a_1 = q_2 a_2 + a_3,$$

so ist wieder $a_3 < a_2$, und jeder gemeinschaftliche Theiler von a_1 und a_2 ist auch gemeinschaftlicher Theiler von a_2 und a_3 und umgekehrt. Führt man auf diese Weise fort zu dividiren, so muss, da die Zahlen $a, a_1, a_2, a_3, \dots$ immer abnehmen, nothwendiger Weise die Division nach einer endlichen Anzahl von Schritten aufgehen, und es muss also zuletzt ein Paar von Gleichungen

$$a_{\nu-2} = q_{\nu-1} a_{\nu-1} + a_{\nu}, \quad a_{\nu-1} = q_{\nu} a_{\nu},$$

auftreten. Dann ist a_{ν} ein gemeinschaftlicher Theiler aller vorausgehenden a , also auch von a und a_1 , und jeder gemeinschaftliche Theiler von a und a_1 ist Theiler von a_{ν} . Also ist a_{ν} der grösste

¹Elemente, Buch VII, 11, Bd. II der Heiberg'schen Ausgabe.

gemeinschaftliche Theiler von a und a_1 , und wir sind zugleich zu dem Satze gelangt, dass jeder gemeinschaftliche Theiler zweier Zahlen in ihrem grössten gemeinschaftlichen Theiler aufgehen muss.

Sind a und a_1 relative Primzahlen, so ist der letzte Divisor $a_\nu = 1$. Multiplicirt man unter dieser Voraussetzung die vorstehenden Gleichungen mit irgend einer Zahl b , so folgt, dass b der grösste gemeinschaftliche Theiler von ab und a_1b ist, und dass also jeder gemeinschaftliche Theiler von ab und a_1 oder von a und a_1b Theiler von b sein muss. Ist also a_1 relativ prim zu a und zu b , so ist es auch relativ prim zu ab , und aus der speciellen Annahme, dass a_1 eine Primzahl sei, ergibt sich, dass ein Product nur dann durch eine Primzahl theilbar sein kann, wenn wenigstens einer der Factoren durch sie theilbar ist. Ist also das Product ab durch a_1 theilbar und ist a_1 relativ prim zu a , so muss b durch a_1 theilbar sein.

Sind a, b irgend zwei Zahlen mit dem grössten gemeinschaftlichen Theiler d und ist $a = da'$, $b = db'$, so sind a' und b' relativ prim zu einander. Jede Zahl m , die zugleich ein Vielfaches von a und von b ist, hat die Form $m = am' = da'm'$ und darin muss $a'm'$ ein Vielfaches von b' sein, also muss auch m' ein Vielfaches von b' sein, d. h. jede Zahl, die zugleich ein Vielfaches von a und von b ist, ist durch $a'b'd$ theilbar. Diese Zahl $a'b'd$, die selbst ein gemeinschaftliches Vielfaches von a und b ist, heisst daher das kleinste gemeinschaftliche Vielfache von a und b .

Wenn eine Zahl durch zwei relative Primzahlen theilbar ist, so ist sie auch durch ihr Product theilbar, und wenn also eine Zahl m durch mehrere Zahlen theilbar ist, von denen je zwei zu einander relativ prim sind, so ist sie auch durch das Product aller dieser Zahlen theilbar.

Hierauf gründet sich der Beweis des wichtigen Satzes, dass eine Zahl m immer und nur auf eine einzige Weise als ein Product von Primzahlen dargestellt werden kann. Denn da der Theiler nicht grösser sein kann als der Dividend, so kann m sicher nur durch eine endliche Anzahl von Primzahlen theilbar sein. Ist a eine von diesen Primzahlen und a^α die höchste Potenz von a , die in m aufgeht, so ist auch α eine bestimmte Zahl. Es seien nun ebenso $b^\beta, c^\gamma, \dots$ die höchsten Potenzen der übrigen in m aufgehenden Primzahlen $b, c, \dots$, durch die sich m theilen lässt, dann muss, da je zwei der Zahlen $a^\alpha, b^\beta, c^\gamma, \dots$ relativ prim sind, m auch durch das Product $a^\alpha b^\beta c^\gamma \dots$ theilbar sein, und es muss m diesem Producte gleich sein, da sonst noch eine andere Primzahl oder eine höhere Potenz einer der Primzahlen $a, b, c, \dots$ in m aufgehen müsste.

Wir geben nun einen Ueberblick über die in der Mathematik nothwendigen und allmählich eingeführten Erweiterungen des Zahlenbegriffes.

Wir verstehen unter einer Mannigfaltigkeit oder Menge, oder dem abkürzenden Zeichen M , ein System von Objecten oder Elementen irgend welcher Art, das so in sich abgegrenzt und vollendet ist, dass von jedem beliebigen Object vollkommen bestimmt ist, ob es zu dem System gehört oder nicht, gleichviel, ob wir im Stande sind, in jedem besonderen Falle die Entscheidung wirklich zu treffen oder nicht.

Eine Menge heisst geordnet, wenn von irgend zwei unterschiedenen ihrer Elemente immer ein in sich vollkommen bestimmtes als das grössere gilt, und zwar so, dass aus $a > b$, $b > c$ stets $a > c$ folgt. Ist $a > b$ und $b > c$ oder $a < b$ und $b < c$, so sagen wir, dass b zwischen a und c liegt.

Die natürlichen Zahlen bilden eine geordnete Menge; zwischen zwei auf einander folgenden ihrer Elemente liegt kein weiteres Element. Eine solche Mannigfaltigkeit heisst eine discrete. Eine geordnete Menge von der Eigenschaft, dass zwischen je zwei Elementen immer noch andere Elemente gefunden werden, heisst dicht. Eine dichte Menge kann man bilden, wenn man die natürlichen Zahlen in Paaren zusammenfasst, und diese Paare als Elemente einer Menge auffasst. Diese Paare sollen Brüche genannt und mit $m : n$ oder m/n bezeichnet werden, und zwei solche Brüche $m : n$ und $m' : n'$ werden einander gleich gesetzt, wenn $mn' = nm'$ ist. Fasst man alle unter einander gleichen Brüche zu einem Element zusammen, so erhält man eine Mannigfaltigkeit, die geordnet ist, wenn man noch festsetzt, dass $m : n$ grösser als $m' : n'$ ist, wenn $mn' > nm'$ ist. Dass diese Mannigfaltigkeit dicht ist, sieht man so ein: sind $\mu = m : n$, $\mu' = m' : n'$ zwei Brüche und $\mu > \mu'$,

so kann man, wenn h eine willkürliche Zahl ist,

$$\frac{hmn'}{hnn'}, \quad \frac{hm'n}{hnn'}$$

setzen, und darin ist $hmn' > hm'n$. Man kann h immer so annehmen, dass zwischen hmn' und $hm'n$ noch Zahlen liegen, und wenn p eine solche Zahl ist, so liegt $p : hnn'$ zwischen μ und μ' .

Die Punkte einer geraden Linie kann man auch als eine geordnete Menge auffassen, wenn man unter grösser und kleiner irgend eine Ortsbezeichnung, z. B. weiter rechts und weiter links oder höher und tiefer versteht.

Eine Eintheilung einer geordneten Menge M in zwei Theile A, B der Art, dass jedes Element a von A kleiner ist als jedes Element b von B , wird ein Schnitt in M genannt und wird passend durch (A, B) bezeichnet. Ein solcher Schnitt entsteht, wenn man irgend ein Element μ von M herausgreift, alle kleineren Elemente zu A , alle grösseren zu B und μ selbst nach Belieben zu A oder zu B rechnet. Es entstehen, genau gesagt, je nachdem man das eine oder das andere thut, zwei Schnitte, die wir aber immer als gleich betrachten wollen. Wenn in einem Schnitt (A, B) entweder A ein grösstes oder B ein kleinstes Element μ enthält, so sagen wir, dass μ den Schnitt (A, B) erzeugt. Es kann aber auch der Fall vorkommen, dass weder A ein grösstes noch B ein kleinstes Element besitzt.

Wenn jeder Schnitt in einer dichten Menge durch ein bestimmtes Element μ erzeugt wird, so heisst die Menge stetig.

Stetigkeit sowohl als Dichtigkeit sind Eigenschaften, die der Natur der Sache nach unserer Sinneswahrnehmung unzugänglich sind; sie lassen sich daher auch an Dingen der Aussenwelt, an Raumgrössen, Zeiträumen, Massen niemals mit Strenge nachweisen, wie sehr sie uns auch im Wesen unserer Anschauung zu liegen scheinen. Es lassen sich aber sehr wohl reine Begriffssysteme construiren, denen die Dichtigkeit ohne die Stetigkeit oder auch Dichtigkeit und Stetigkeit zukommen.²

Diese sehr abstracte Betrachtungsweise giebt uns die Sicherheit, dass die Annahme einer stetigen Menge keinen Widerspruch enthält, dass solche Mengen wenigstens im Reiche der Gedanken existiren. Die Geometrie wie die Analysis, die immer gern an die geometrische Anschauung anknüpft, hat lange stillschweigend die Existenz stetiger Mengen, z. B. bei den Punkten einer geraden Linie oder irgend eines anderen zusammenhängenden Linienzuges, als eine Art von Axiom angenommen. Auch der Unterschied zwischen dichter und stetiger Menge, der der Unterscheidung commensurabler und incommensurabler Strecken zu Grunde liegt, ist den Alten nicht entgangen.³

Auch wir wollen in der Folge nicht auf das Hülfsmittel der geometrischen Anschauung verzichten, und z. B. die Punkte einer geraden Linie unbedenklich als eine stetige Menge betrachten.

Eine geordnete Menge M heisst messbar unter folgenden Voraussetzungen. Addition und Vervielfältigung sind in M allgemein ausführbar, ebenso Subtraction eines kleineren von einem grösseren Element, d. h. aus irgend zwei Elementen a, b (die auch identisch sein können) kann nach einer bestimmten Vorschrift ein neues Element $a + b$ von M abgeleitet werden, so dass $a + b$ grösser als a und als b ist, und dass die bekannten, in den Formeln

$$a + b = b + a, \quad (a + b) + c = a + (b + c)$$

ausgedrückten Regeln der Addition gelten. Und zu zwei Elementen a, c , von denen das zweite grösser ist, kann ein drittes Element b gefunden werden, so dass $a + b = c$ ist, was auch durch das Zeichen der Subtraction $b = c - a$ ausgedrückt wird. Zwei ungleiche Elemente von M haben also immer eine bestimmte Differenz. Aus diesen Voraussetzungen folgt, dass eine Summe grösser wird, wenn einer

²Dies ist von Dedekind nachgewiesen, dem wir überhaupt die oben gegebene Definition der Stetigkeit verdanken. Vgl. die Schriften von Dedekind, "Stetigkeit und irrationale Zahlen", Braunschweig 1872, 1892. "Was sind und was sollen die Zahlen?", Braunschweig 1888, 1893. Andere Mannigfaltigkeiten, denen die Stetigkeit zukommt, sind von Weierstrass und G. Cantor gebildet.

³Euklid, Elemente, Buch X.

der Summanden sich vergrössert. Die wiederholte, etwa m -malige Addition desselben Elementes a heisst Vervielfältigung und ihr Ergebniss wird mit ma bezeichnet.

Es kommt endlich noch eine Voraussetzung hinzu, nämlich die, dass bei jedem gegebenen a ein hinlänglich hohes Vielfaches ma grösser ist als ein beliebig gegebenes anderes Element b . Unter den Elementen einer messbaren Menge giebt es also kein grösstes.

In einer dichten messbaren Menge giebt es auch kein kleinstes Element. Denn wäre a das kleinste und b ein beliebiges Element, so könnten zwischen b und $b + a$ keine Elemente liegen; denn wenn $b < c < b + a$ wäre, so würde aus der Definition der Messbarkeit folgen, dass $a' = c - b$ kleiner als a wäre. Es folgt auch umgekehrt, dass eine messbare Menge, in der kein kleinstes Element vorkommt, dicht ist. Denn sind a und $a + b$ irgend zwei Elemente, so braucht man ja zu a nur ein Element zu addiren, was kleiner als b ist, um ein Element zwischen a und $a + b$ zu erhalten.

Ist eine Menge stetig, so lassen sich die Voraussetzungen für die Messbarkeit noch vereinfachen, weil dann die Subtraction eine Folge der Addition ist. Sind nämlich a und c zwei Elemente einer stetigen geordneten Menge M , in der die Addition besteht, und ist $c > a$, so erhält man einen Schnitt (A, B) in M , wenn man alle Elemente x , für die $a + x < c$ ist, nach A , und für die $a + x > c$ ist, nach B verweist. Dieser Schnitt wird durch ein Element b erzeugt, für das $a + b = c$ sein muss.

Die natürlichen Zahlen bilden nach unserer Definition eine messbare Menge, in der ein kleinstes Element, nämlich 1, vorkommt. Die Mannigfaltigkeit der rationalen Brüche wird ebenfalls messbar, wenn man Addition und Subtraction nach den bekannten Regeln der Bruchrechnung erklärt. Besonders wichtig und gleichsam typisch für die messbaren Mengen ist die Mannigfaltigkeit der geradlinigen Strecken oder Längen einer Linie, die einfach durch Aneinanderlegen addirt werden. Auch Stoffmengen, durch die Wage verglichen, und Zeiträume, mit der Uhr gemessen, liefern Beispiele messbarer Mengen. Die Art des Messens liegt nicht in der Natur der Mannigfaltigkeit selbst, sondern wird durch den denkenden Beobachter hineingelegt; so würde es z. B. ebenso gut zulässig sein, unter der Summe $a + b$ zweier Strecken a und b die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Katheten a, b zu verstehen, statt, wie es gewöhnlich angenommen wird, die aus a und b durch Aneinanderlegen zusammengesetzte Strecke.

Um die stetige Menge B der Schnitte in der Mannigfaltigkeit der rationalen Brüche R zu einer messbaren zu machen, beachte man zunächst Folgendes. Ist $\alpha = (A, B)$ ein Element in B und μ ein beliebig gegebener rationaler Bruch, so kann man immer ein Element a' in A so bestimmen, dass $a' + \mu = b'$ in B enthalten ist. Denn wählt man zwei beliebige Elemente a, b , so kann man die natürliche Zahl m bestimmen, dass $m\mu > b - a$ ist, so dass $a + m\mu$ in B enthalten ist. Ist dann h die kleinste ganze Zahl, für die $a + h\mu$ in B enthalten ist, so ist $a + (h - 1)\mu = a'$ in A und also $a' + \mu = b'$ in B .

Wir verstehen nun unter der Summe $(A, B) + (A', B') = (A'', B'')$ oder $\alpha + \alpha' = \alpha''$ den Schnitt in R , den man erhält, wenn man einen rationalen Bruch α'' nur dann nach A'' verweist, wenn ein a in A und ein a' in A' existirt von der Beschaffenheit, dass $\alpha'' \leq a + a'$ ist. In der That ist (A'', B'') ein Schnitt. Denn ist α'' in A'' enthalten, so gilt dasselbe von jedem kleineren Bruch, und es giebt Brüche, die in A'' , und Brüche, die nicht in A'' enthalten sind, nämlich die Brüche von der Form $a + a'$ und $b + b'$. Es ist ferner α'' grösser als α und α' . Denn A'' enthält zunächst alle A , und wenn a' ein beliebiger Bruch in A' ist, so kann man a in A so wählen, dass das Element $a + a'$ von A' in B enthalten ist; also ist A'' umfassender als A . Die durch rationale Brüche μ, μ' erzeugten Schnitte ergeben durch Addition den durch $\mu + \mu'$ erzeugten Schnitt.

Wir gehen nun über zu der Definition der Verhältnisse, die von Alters her als Grundlage der Zahlenlehre betrachtet werden, und folgen dabei zunächst Euklid.⁴

Wenn man die Elemente einer messbaren Menge M zu Paaren verbindet, und diese Paare an sich als Elemente betrachtet, so entsteht eine neue Mannigfaltigkeit; wir bezeichnen ein solches Paar mit $a : b$, oder auch mit a/b , unterscheiden aber, wenn a und b verschiedene Elemente sind, $a : b$ von $b : a$, und nennen a den Zähler und b den Nenner von $a : b$. Diese Paare wollen wir Verhältnisse nennen und wollen diese neue Menge nun ordnen und messbar machen.

⁴Elemente, Buch V.

Nehmen wir zunächst an, dass zwei ganze Zahlen m, n existieren, so dass $na = mb$ wird, wie es z. B. immer der Fall ist, wenn M das System der natürlichen Zahlen ist, oder wenn a, b zwei commensurable Strecken sind; dann ist, wenn p, q zwei andere ganze Zahlen sind, $qa = pb$ dann und nur dann, wenn $mq = np$ ist. Das Zahlenpaar p, q ist durch diese Forderung vollständig bestimmt, wenn noch die Bedingung hinzukommt, dass p, q relative Primzahlen sein sollen. Dann kann, wenn h eine beliebige ganze Zahl ist, $m = hp, n = hq$ sein. In diesem Falle nennen wir das Verhältniss $a : b$ ein rationales und setzen es gleich dem rationalen Bruch $m : n$ oder $p : q$. Diese rationalen Brüche können hiernach als Verhältnisse ganzer Zahlen aufgefasst werden.

Alle unter einander gleichen rationalen Verhältnisse bilden eine rationale Zahl, und die rationalen Zahlen bilden, wie die rationalen Brüche, eine geordnete, dichte und messbare Mannigfaltigkeit. In die Mannigfaltigkeit der rationalen Zahlen ordnen sich die natürlichen Zahlen selbst mit ein, wenn man unter einer natürlichen Zahl m das Verhältniss $m : 1$ versteht.

Wir kehren jetzt zu irgend einer messbaren Mannigfaltigkeit M zurück und nehmen aus ihr irgend zwei Elemente a und b . Wählt man, was immer möglich ist, zwei natürliche Zahlen m, n , so dass $na > mb$, so heisst das Verhältniss $a : b$ grösser als das rationale Verhältniss $m : n$ oder

$$\frac{a}{b} > \frac{m}{n},$$

und wenn $m : n = p : q$, so ist auch $a : b > p : q$. Ebenso folgt, wenn $n'a < m'b$ ist,

$$\frac{a}{b} < \frac{m'}{n'}.$$

Ist $a : b > m : n$, so kann man eine und folglich auch beliebig viele rationale Zahlen $m_1 : n_1$ finden, so dass

$$\frac{a}{b} > \frac{m_1}{n_1} > \frac{m}{n}$$

ist. Um dies zu zeigen, wähle man eine beliebige ganze Zahl k und bestimme die ganze Zahl h so, dass $h(na - mb) > kb$ wird, was immer möglich ist; dann ist

$$\frac{a}{b} > \frac{hm + k}{hn} > \frac{m}{n}.$$

Und ebenso folgt, wenn $n'a < m'b$, $h'(m'b - n'a) > k'a$ ist,

$$\frac{a}{b} < \frac{h'm'}{h'n' + k'} < \frac{m'}{n'}.$$

Wenn nun $a : b$ und $\alpha : \beta$ irgend zwei Verhältnisse sind, die wir der Kürze wegen auch mit ϵ, ϵ' bezeichnen wollen, deren Elemente derselben oder auch verschiedenen Mannigfaltigkeiten angehören, so sind zwei Fälle möglich: 1) Es liegt kein rationales Verhältniss μ zwischen ϵ und ϵ' , oder 2) es liegt ein rationales Verhältniss zwischen ϵ und ϵ' .

Im Falle 1) heissen die beiden Verhältnisse ϵ und ϵ' einander gleich, und man sieht, dass zwei Verhältnisse, die einem dritten gleich sind, auch unter einander gleich sind. Im Falle 2) heissen die Verhältnisse ϵ, ϵ' ungleich. Es kann also entweder $\epsilon < \mu < \epsilon'$ oder $\epsilon > \mu' > \epsilon'$ sein, und diese beiden Fälle schliessen sich aus. Die Grössenbeziehung bleibt auch bestehen, wenn ϵ oder ϵ' durch ein ihm gleiches Element ersetzt wird. Im ersten Falle heisst ϵ kleiner als ϵ' , im zweiten grösser als ϵ' . Zwischen zwei ungleichen Verhältnissen kann man eine beliebige Anzahl rationaler Verhältnisse einschieben.

Wenn wir nun alle unter einander gleichen Verhältnisse zusammenfassen, so erhalten wir einen Gattungsbegriff, den wir als Zahl im allgemeinen Sinne des Wortes bezeichnen. Die Zahl ist also ein Name oder Zeichen für eine gewisse Mannigfaltigkeit, deren Elemente eben die mit einem unter ihnen gleichen Verhältnisse sind.⁵ Unter diesem Zahlbegriff sind die rationalen Verhältnisse

⁵Auf den Gattungsbegriff lassen sich auch die natürlichen Zahlen in einfacher und folgerichtiger Weise zurückführen.

und folglich auch die natürlichen Zahlen als die Verhältnisse $m : 1$ mit enthalten und bilden die rationalen Zahlen. Zahlen, die nicht aus rationalen Verhältnissen entspringen, heissen irrationale Zahlen. Nach dem, was bis jetzt ausgeführt ist, bilden die Zahlen eine geordnete Menge, und man kann ihre Ordnung feststellen, wenn für jede Zahl irgend eines der darunter enthaltenen Verhältnisse als Repräsentant gewählt wird.

Von zwei Verhältnissen mit demselben Nenner und ungleichen Zählern ist das grössere, dessen Zähler grösser ist, und von zwei Verhältnissen mit demselben Zähler und ungleichen Nennern ist das kleinere, dessen Nenner grösser ist. Sind nämlich a, a', b beliebige Elemente einer messbaren Menge und $a' > a$, so wähle man zunächst eine ganze Zahl n so, dass $na > b$ und $n(a' - a) > b$. Hierauf nehme man die kleinste ganze Zahl m , die der Bedingung $mb > na$ genügt; dann ist $na < mb$, aber $mb < na'$. Dann ist

$$\frac{a}{b} < \frac{m}{n} < \frac{a'}{b},$$

also $a : b < a' : b$. Ganz ebenso kann man beweisen, dass, wenn $b' > b$ ist, $a : b > a : b'$ wird. Man drückt diesen Satz auch so aus, dass ein Verhältniss zugleich mit dem Zähler wächst und mit wachsendem Nenner abnimmt.

Hieraus ergibt sich auch leicht der folgende Satz: Sind a, b, c, d Elemente derselben messbaren Menge und ist $a : b = c : d$, so ist auch $a : c = b : d$. Denn angenommen, es wäre $a : c < b : d$, so müsste es zwei ganze Zahlen m, n geben, so dass

$$na < mc, \quad nb > md.$$

Dann aber wäre nach dem eben bewiesenen Satze $na : nb < mc : md$, also auch $a : b < c : d$, entgegen der Voraussetzung.

Hieran schliesst sich nun folgender Hauptsatz. Wenn von den vier Grössen a, b, c, d irgend drei aus einer stetigen messbaren Menge beliebig gegeben sind, so lässt sich das vierte in derselben Menge so bestimmen, dass $a : b = c : d$ ist.

Der Satz ist eine unmittelbare Folge der vorausgesetzten Stetigkeit. Denn wenn man z. B. ein Element x von M in A oder in B aufnimmt, je nachdem $x : b$ kleiner oder grösser als $c : d$ ist, so erhält man einen Schnitt, der durch ein Element a erzeugt wird, das der Bedingung $a : b = c : d$ genügt. Es gilt aber dieser Satz auch in gewissen nicht stetigen Mengen, z. B. für die rationalen Brüche.

Hieraus folgt, dass man als Repräsentanten zweier Zahlen immer zwei Verhältnisse wählen kann, deren Elemente derselben Mannigfaltigkeit angehören, und die denselben beliebig zu wählenden Nenner haben. Die Addition wird dann so erklärt, dass

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

ist. Diese Regel umfasst als speciellen Fall die Addition der rationalen Brüche. Es bleibt zu zeigen, dass, wenn $a : c = a' : c'$ und $b : c = b' : c'$ ist, auch $(a+b) : c = (a'+b') : c'$ sein muss. Der Beweis geschieht dadurch, dass aus $a : c = a' : c'$ und $(a+b) : c > (a'+b') : c'$ auch $b : c > b' : c'$ folgt. Ist nämlich

$$\frac{a+b}{c} > \frac{m}{n} > \frac{a'+b'}{c'},$$

so ist $n(a+b) > mc$, und daher

$$\frac{b}{c} > \frac{mc - na}{nc}.$$

Andererseits folgt aus $a : c = a' : c'$ leicht

$$\frac{mc - na}{nc} = \frac{mc' - na'}{nc'},$$

und also $b : c > b' : c'$, w. z. b. w.

Hiermit ist also nachgewiesen, dass auch die Zahlen, wie wir sie definirt haben, eine messbare Menge bilden. Sind a und c einer stetigen Mannigfaltigkeit entnommen, so bilden auch bei feststehendem c die Verhältnisse $a : c$ eine stetige Menge, und es folgt also, da es überhaupt stetige Mengen giebt, dass auch die Zahlen eine stetige Menge bilden.

Sind $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ jetzt Zahlen, so kann man aus der Proportion $\alpha : \beta = \gamma : \delta$ eine beliebige der vier Zahlen durch die drei anderen gegebenen bestimmen. Setzt man $\delta = 1$ und sucht α , so erhält man die Multiplication $\alpha = \beta\gamma$, und die Vertauschbarkeit der Factoren ist eine Folge des Satzes, dass $\alpha : \gamma = \beta : \delta$ aus $\alpha : \beta = \gamma : \delta$ folgt. Sucht man γ , so erhält man die Division; und aus der oben gegebenen Definition der Addition folgt die Grundformel $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$. Die vier Grundrechnungsarten sind also in dem Gebiete der Zahlen ausführbar mit der einzigen Beschränkung, dass bei der Subtraction der Subtrahend kleiner sein muss als der Minuend.

Die Construction eines Schnittes in der Reihe der Zahlen liefert stets den Beweis für die Existenz einer Zahl, die bestimmten Anforderungen genügt. So erhält man einen Schnitt (A, B) , wenn man alle und nur die Zahlen, deren Quadrat kleiner als eine bestimmte Zahl α ist, in A aufnimmt; diesem Schnitt entspricht eine bestimmte Zahl, deren Quadrat gleich α ist und die mit $\sqrt{\alpha}$ bezeichnet wird, und dadurch wird die Existenz der Quadratwurzeln nachgewiesen.

Auf die Schnitte lassen sich auch die von G. Cantor zur Definition der Irrationalzahlen eingeführten Zahlenreihen zurückführen.⁶

Nach Cantor ist unter einer Zahlenreihe irgend ein unbegrenztes, in bestimmter Weise geordnetes System von Zahlen zu verstehen

$$S = x_1, x_2, x_3, x_4, \dots$$

von der Beschaffenheit, dass es eine bestimmte Zahl g giebt, unter die keine der Zahlen S heruntersinkt, und dass, wenn δ eine beliebig gewählte Zahl ist, und x_n, x_m verschiedene Elemente aus S sind, $x_n - x_m$ oder $x_m - x_n$ immer kleiner bleibt als δ , wenn m und n eine hinlänglich grosse Zahl überschritten haben.

Es giebt immer Zahlen, die von den Zahlen einer solchen Reihe nicht überschritten werden; denn hat man δ gewählt und n passend bestimmt, so überschreitet x_m , welchen Werth auch m haben mag, niemals die grösste der Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_n, x_n + \delta$. Man erhält nun einen Schnitt (A, B) , wenn man die Zahlen nach B wirft, die, wenn n einen hinlänglich hohen Werth hat, von keinem x_n mehr überschritten werden, und alle anderen Zahlen (die also von unendlich vielen x_n überschritten werden) nach A . Wird dieser Schnitt durch die Zahl α erzeugt, so giebt es, wie klein auch ε sei, immer unendlich viele Zahlen x_n zwischen $\alpha - \varepsilon$ und α , und man kann sagen, dass diese durch S vollkommen bestimmte Zahl α durch die Zahlenreihe S erzeugt wird. Nach Cantor ist die Zahlenreihe S geradezu die Definition der Zahl α . Selbstverständlich kann eine und dieselbe Zahl α durch sehr verschiedene Zahlenreihen erzeugt werden. Diese Zahlenreihen sind aber alle als unter einander gleich zu betrachten. Man kann unter Anderem die Zahlen von S alle als rationale Brüche annehmen. Es lässt sich auch umgekehrt leicht nachweisen, dass man zu jeder gegebenen Zahl α immer Zahlenreihen S angeben kann, durch die α erzeugt wird, so dass also die Gesamtheit der Zahlenreihen S gleichfalls eine stetige Menge bildet.

Bei der Erklärung der Grundrechnungsarten hat sich bei der Subtraction eine unbequeme Beschränkung ergeben, von der wir uns frei machen, indem wir die negativen Zahlen einführen.

Es möge x jedes Element des bisher definirten Zahlensystems bedeuten, das wir jetzt als das System der positiven Zahlen bezeichnen wollen. Wir nehmen dies Zahlensystem ein zweites Mal und bezeichnen zum Unterschied in diesem zweiten System, das als das System der negativen Zahlen bezeichnet werden soll, jedes Element mit $-x$. Das zweite System ordnen wir nun dem ersten gerade entgegengesetzt, so dass überall, wo in dem System x "grösser" steht, in dem System $-x$ "kleiner" gesetzt wird, und umgekehrt. Addition und Subtraction werden in $-x$ ebenso erklärt wie in x , so dass $(-x) + (-y) = -(x + y)$, $(-x) - (-y) = -(x - y)$ sein soll.

⁶Cantor, Ueber die Ausdehnung eines Satzes aus der Theorie der trigonometrischen Reihen. Mathematische Annalen, Bd. 5 (1872); vergl. auch Heine, Elemente der Functionenlehre. Journal für Mathematik, Bd. 74 (1872).

Wir wollen aber diese beiden Zahlensysteme in der Weise zusammenordnen, dass jedes $-x$ kleiner sein soll als jedes x . Wir erhalten so eine geordnete Menge, in der kein grösstes und kein kleinstes Element vorhanden ist. Dieses System ist auch im Allgemeinen stetig, nur der einzige Schnitt $(-x, x)$ wird durch kein Element erzeugt, und hier, wo beide Systeme zusammenstossen, ist also noch eine Verletzung der Stetigkeit vorhanden. Um die Stetigkeit herzustellen, müssen wir also dem Schnitt $(-x, x)$ entsprechend noch eine Zahl Null oder 0 hinzufügen, die eben durch diesen Schnitt definirt ist. Dann haben wir eine geordnete stetige, beiderseits unbegrenzte Menge, die vollständige Reihe der reellen Zahlen.

In dem so erweiterten Zahlenbereiche erklären wir nun die Addition allgemein, indem wir definitionsweise setzen:

$$\begin{aligned} x + (-x) &= 0, & x + 0 &= x, \\ x + (-y) &= x - y \quad (x > y), & x + (-y) &= -(y - x) \quad (y > x). \end{aligned}$$

Bei dieser Erklärung der Addition gelten, wenn z_1, z_2, z_3 irgend drei Zahlen des ganzen Zahlenbereiches sind, die Gesetze

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1, \quad (z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3),$$

die man das commutative und das associative Gesetz nennt. Man bildet die Summe aus einer beliebigen Anzahl von Summanden, indem man nach Belieben der Reihe nach je zwei Summanden zu einer Summe vereinigt. Die Subtraction braucht nicht mehr besonders berücksichtigt zu werden, wenn man $z_1 - z_2$ durch $z_1 + (-z_2)$ erklärt und $-(-z) = z$ setzt.

Man stellt die Zahlenreihe anschaulich durch Punkte dar, indem man von einem festen mit 0 bezeichneten Punkte einer geraden Linie die positiven Zahlen als Strecken nach der einen, etwa der rechten, die negativen Zahlen nach der anderen, linken Seite aufträgt. Das Bild der Summe zweier Strecken $z_1 + z_2$ erhält man, wenn man von dem Punkte z_1 aus die Strecke von der Länge $+z_2$ nach der rechten oder nach der linken Seite abträgt, je nachdem z_2 positiv oder negativ ist.

Die Multiplication und Division wird in den erweiterten Zahlenbereich durch die Gleichungen

$$x(-y) = (-x)y = -xy, \quad (-x)(-y) = xy, \quad 0x = 0$$

erklärt. Die Division als die Umkehrung der Multiplication ist immer möglich, ausser wenn der Divisor Null ist.

Eine fernere Erweiterung des Zahlbegriffes besteht in der Einführung der complexen Grössen. Wir combiniren je zwei Zahlen der gesammten Zahlenreihe zu Paaren (x, y) , und betrachten zwei solche Paare (x, y) und (a, b) nur dann als gleich, wenn $x = a, y = b$ ist. Diese Zahlenpaare bilden eine Mannigfaltigkeit, deren Elemente zwar nicht geordnet werden, mit denen aber die Rechenoperationen der Addition, Subtraction, Multiplication und Division vorgenommen werden sollen, nach folgenden Regeln:

$$(x, y) + (a, b) = (x + a, y + b),$$

$$(x, y)(a, b) = (xa - yb, xb + ya).$$

Wir setzen ausserdem fest, dass $(x, 0) = x$ sei, was diesen Gleichungen nicht widerspricht. Es ist (x, y) nur dann $= 0$, wenn x und y beide gleich Null sind. Ferner bezeichnen wir zur Abkürzung $(0, 1)$ mit i . Dann ergeben obige Gleichungen die Folgerungen:

$$(x, 0)(0, 1) = (0, x) = ix, \quad (x, 0) + (0, y) = (x, y) = x + yi,$$

$$x + yi + a + bi = (x + a) + (y + b)i,$$

und die Umkehrung der Addition

$$x + yi - (a + bi) = (x - a) + i(y - b),$$

ferner die Multiplication

$$(x + yi)(a + bi) = xa - yb + i(xb + ya), \quad i^2 = -1,$$

$$(x + yi)(x - yi) = x^2 + y^2,$$

$$\frac{x + yi}{a + bi} = \frac{ax + by + i(ay - bx)}{a^2 + b^2},$$

wodurch die Division erklärt ist, ausser wenn $a + bi = 0$ ist.

Zahlen von der Form ix heissen rein imaginäre Zahlen und i die imaginäre Einheit. Die Zahlen $a + bi$ heissen imaginär oder complex. Das System der reellen und der rein imaginären Zahlen sind darunter als Specialfälle enthalten. Es sind also in dem Gebiete der complexen Zahlen $x + yi$ die Grundrechnungsarten unbegrenzt auszuführen (mit Ausnahme der Division durch Null), und die Rechnung mit den reellen Zahlen ist ein Specialfall davon.

Man stellt die complexen Zahlen $z = x + yi$ nach Gauss geometrisch durch die Punkte einer Ebene dar, indem man ein rechtwinkliges Coordinatensystem zu Grunde legt und den Punkt mit den Coordinaten x, y als Bild des Zahlwerthes z betrachtet. Die Punkte der x -Axe stellen in der oben besprochenen Weise die reellen Zahlen x dar. Die Punkte der y -Axe sind die Bilder der rein imaginären Zahlen yi . Der Coordinatenanfangspunkt ist das Bild der Zahl 0. Der Radiusvector vom Nullpunkte nach dem Punkte z hat den Zahlwerth $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, der der absolute Werth oder der Betrag oder, nach älterer Ausdrucksweise, der Modulus der complexen Zahl z genannt wird.

Die einzige Zahl 0 hat den absoluten Werth 0. Jede positive Zahl kommt bei unendlich vielen complexen Zahlen als absoluter Werth vor und die Bildpunkte aller Zahlen mit demselben absoluten Werthe liegen auf einem Kreise, dessen Mittelpunkt im Coordinatenanfangspunkte liegt.

Zwei imaginäre Zahlen, die sich nur durch das Vorzeichen von i unterscheiden, also $x + yi$ und $x - yi$, heissen conjugirt imaginär. Ihr Product ist das Quadrat des absoluten Werthes von jeder von ihnen. Wenn von zwei conjugirten imaginären Zahlen die eine gleich Null ist, so ist auch die andere gleich Null, und man kann also in jeder richtigen Zahlengleichung i durch $-i$ ersetzen, ohne dass die Richtigkeit gestört wird.

Wir wollen noch den oft angewandten Satz anführen, dass der absolute Werth einer Summe zweier von Null verschiedener complexer Zahlen niemals grösser ist, als die Summe der absoluten Werthe der Summanden, und nur dann gleich, wenn das Verhältniss (der Quotient) beider Summanden reell und positiv ist. Sei nämlich

$$z = x + yi, \quad c = a + bi, \quad Z = z + c = (x + a) + (y + b)i,$$

$$\rho^2 = x^2 + y^2, \quad r^2 = a^2 + b^2, \quad R^2 = (x + a)^2 + (y + b)^2.$$

Dann ist

$$(\rho + r - R)(\rho + r + R) = (\rho + r)^2 - R^2 = 2(\rho r - ax - by),$$

was sicher positiv ist, wenn $ax + by < \rho r$ ist. Wenn aber $ax + by > \rho r$ ist, so folgt aus

$$\rho^2 r^2 - (ax + by)^2 = (ay - bx)^2,$$

dass $\rho r \geq ax + by$ und nur dann gleich, wenn $ay - bx = 0$. Daraus also ergiebt sich, dass $\rho + r \geq R$ ist und nur in dem besonderen Falle $\rho + r = R$, wenn $ay - bx = 0$, $ax + by > 0$, woraus das Gesagte folgt.

Bei der geometrischen Darstellung ist dieser Satz ein Ausdruck dafür, dass in einem Dreieck eine Seite kleiner ist als die Summe der beiden anderen. Der Satz hat noch die andere Folge, dass der absolute Werth einer Summe nicht kleiner sein kann als die Differenz der absoluten Werthe der Summanden. Denn wenden wir den vorigen Satz auf die Summe $c = Z - z$ an, so folgt $r \leq R + \rho$ oder

$$R \geq r - \rho.$$

Die Gleichheit findet hier nur dann statt, wenn der Quotient $z : c$ reell und negativ ist.

Es ist noch ein Wort über das wichtigste Hilfsmittel der Algebra, die Buchstabenrechnung, zu sagen. Die Anwendung dieses Hilfsmittels ist so allgemein, dass man bisweilen das Wort Buchstabenrechnung geradezu synonym mit Algebra gebraucht. Die Regeln, wie mit solchen Buchstabenausdrücken gerechnet wird, setzen wir als bekannt voraus. Gleichungen zwischen Buchstabenausdrücken können von zweierlei Art sein: entweder es sind sogenannte Identitäten, d. h. die zwei einander gleich gesetzten Ausdrücke können durch Anwendung der Rechenregeln so umgeformt werden, dass beide Ausdrücke genau übereinstimmen. Man erhält dann aus solchen Buchstabengleichungen richtige Zahlengleichungen, wenn die Buchstaben durch irgend welche, sei es reelle, sei es complexe Zahlen ersetzt werden, vorausgesetzt, dass dabei nicht die Forderung der Division durch Null auftritt. Die Buchstaben in solchen Gleichungen werden oft auch als Variable bezeichnet, weil man sich vorstellen kann, ohne je zu einem Widerspruch zu gelangen, dass für die Buchstaben nach und nach andere und andere Zahlwerthe gesetzt werden.

Eine andere Art von Gleichungen zwischen Buchstabenausdrücken haben nicht diesen Charakter der Identität. Sie enthalten vielmehr eine Forderung, die an die Zahlen gestellt werden, die man ohne einen Fehler zu begehen für die Buchstaben einsetzen darf. Die Algebra hat die Aufgabe, Zahlwerthe zu ermitteln, die einer solchen Forderung genügen, die Gleichung zu lösen. In diesen Gleichungen werden die Buchstaben auch als "Unbekannte" bezeichnet. Es kommen sehr häufig in ein und derselben Gleichung Buchstaben von zwei Arten vor, solche, für die beliebige Zahlwerthe gesetzt werden sollen, und andere, deren Zahlwerth erst ermittelt werden soll.

Erster Abschnitt. Rationale Functionen.

§ 1. Ganze Functionen.

Nächster Gegenstand der Betrachtung sind ganze rationale oder auch kurz ganze Functionen einer Veränderlichen. Wir verstehen darunter Ausdrücke von folgender Form:

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n, \quad (1)$$

worin n ein ganzzahliger Exponent, der Grad der Function $f(x)$ ist. Der Grad ist eine natürliche Zahl. Bisweilen ist aber auch nützlich, von ganzen rationalen Functionen 0ten Grades zu sprechen, worunter eine Constante verstanden wird. x heisst die Veränderliche, $a_0, a_1, a_2 \dots a_{n-1}, a_n$ die Coefficienten. Sowohl x als $a_0, a_1, \dots, a_n$ sind Symbole für unbestimmte Grössen, mit denen nach den Regeln der Buchstabenrechnung verfahren wird, für die auch unter Umständen bestimmte Zahlwerthe gesetzt werden können (vgl. die Einleitung).

Wenn die Function $f(x)$ in der Weise wie in (1) geschrieben ist, so nennen wir sie nach absteigenden Potenzen von x geordnet. Die Summanden können in jeder beliebigen anderen Reihenfolge angeordnet, also z. B. auch nach aufsteigenden Potenzen von x geordnet sein:

$$f(x) = a_n + a_{n-1}x + \cdots + a_1x^{n-1} + a_0x^n.$$

Durch Addition (Subtraction) und Multiplication ganzer rationaler Functionen entstehen wieder ganze rationale Functionen. Die Vorschriften der Buchstabenrechnung geben unmittelbar die Bildungsgesetze dieser neuen Functionen.

Bei der Addition ist der Coefficient irgend einer Potenz x^ν in der Summe gleich der Summe der Coefficienten von x^ν in den einzelnen Summanden. Der Grad der entstandenen Function ist gleich dem höchsten der Grade der Summanden und kann sich nur in dem besonderen Falle erniedrigen, wenn der höchste Grad in mehreren Summanden vorkommt und die Summe der Coefficienten der höchsten Potenzen gleich Null ist.

Bei der Multiplication zweier oder mehrerer ganzer rationaler Functionen entsteht eine Function, deren Grad gleich der Summe der Grade der Factoren ist.

Um für das Product das Bildungsgesetz der Coefficienten zu übersehen, setzen wir

$$\begin{aligned} A(x) &= a_0x^m + a_1x^{m-1} + a_2x^{m-2} + \cdots, \\ B(x) &= b_0x^n + b_1x^{n-1} + b_2x^{n-2} + \cdots, \end{aligned} \quad (2)$$

$$A(x)B(x) = C(x) = c_0x^{m+n} + c_1x^{m+n-1} + c_2x^{m+n-2} + \cdots \quad (3)$$

und erhalten

$$\begin{aligned} c_0 &= a_0b_0, \\ c_1 &= a_0b_1 + a_1b_0, \\ c_2 &= a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0, \\ &\cdots, \end{aligned}$$

oder in allgemeinen Zeichen, wenn ν eine der Zahlen $0, 1, 2, \dots, m+n$ bedeutet:

$$c_\nu = a_0b_\nu + a_1b_{\nu-1} + a_2b_{\nu-2} + \cdots + a_{\nu-1}b_1 + a_\nu b_0, \quad (4)$$

worin alle a , deren Index grösser als m , und alle b , deren Index grösser als n ist, gleich Null zu setzen sind. Denn c_ν ist der Coefficient von $x^{m+n-\nu}$, und es entsteht also $c_\nu x^{m+n-\nu}$ durch Multiplication aller Glieder von der Form $a_\mu x^{m-\mu}$ mit allen Gliedern der Form $b_{\nu-\mu} x^{n-\nu+\mu}$ und darauf folgende Addition. Sind a_0 und $b_0 = 1$, so ist auch $c_0 = 1$.

Hat in allen Factoren eines solchen Products die höchste Potenz von x den Coefficienten 1, so ist auch im Product der Coefficient der höchsten Potenz = 1.

Aus diesen Vorschriften für die Rechnung mit ganzen Functionen folgt, dass die Regeln des Rechnens, die sich in Formeln wie $ab = ba$, $(ab)c = a(bc)$, $(a + b)c = ac + bc$ und ähnlichen aussprechen, auch wenn a, b, c ganze Functionen von x sind, gelten, und zwar in dem Sinne, dass ganze Functionen nur dann als gleich gelten, wenn gleich hohe Potenzen gleiche Coefficienten haben.

Unter ganzen Functionen mehrerer Veränderlichen verstehen wir Summen von Producten von ganzen, positiven Potenzen der Veränderlichen $x, y, z \dots$ mit irgend welchen Coefficienten, die als constant gelten. Man kann sich diese Functionen entstanden denken aus den Functionen einer Veränderlichen x , wenn man darin die Coefficienten $a_0, a_1 \dots a_n$ selbst wieder als ganze rationale Functionen von anderen Veränderlichen $y, z \dots$ auffasst. So entstehen Functionen von m Veränderlichen aus Functionen von $m - 1$ Veränderlichen. Alle Glieder einer solchen Function sind von der Form $x^r y^s z^t \dots$, multiplicirt mit einem Coefficienten, und wenn die Function gehörig zusammengefasst ist, so kommt jede Combination der Exponenten $r, s, t \dots$ nur einmal vor. Zwei so geordnete ganze Functionen gelten nur dann als einander gleich, wenn sie dieselben Producte $x^r y^s z^t \dots$ mit denselben Coefficienten enthalten.

§ 2. Ein Satz von Gauss.

Wir wollen sogleich eine Anwendung der Multiplicationsregel zweier ganzer rationaler Functionen machen zum Beweise eines Satzes von Gauss, der uns später noch nützlich sein wird, hier aber zur Einführung in die Rechnungsweise und als Beispiel dienen soll.⁷

Wir betrachten hier den Fall, dass die Coefficienten in den Functionen $A(x), B(x)$ ganze Zahlen sind, so dass nach (4) auch die Coefficienten von $C(x) = A(x)B(x)$ ganze Zahlen sind.

Wenn die sämtlichen ganzzahligen Coefficienten $a_0, a_1, \dots, a_m$ einer Function $A(x)$ keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, so heisst die Function $A(x)$ eine ursprüngliche oder primitive Function und der Satz, den wir beweisen wollen, lautet:

Wenn $A(x)$ und $B(x)$ ursprüngliche Functionen sind, so ist auch ihr Product $C(x)$ eine ursprüngliche Function.

Der Beweis ergibt sich fast unmittelbar aus dem Anblick der Formel (4).

Wenn nämlich die sämtlichen Coefficienten $c_0, c_1, c_2 \dots c_{m+n}$, wie sie in (4) angegeben sind, einen gemeinschaftlichen Theiler haben, der grösser als 1 ist, so muss es auch wenigstens eine Primzahl geben, die in allen diesen Coefficienten aufgeht. Es sei p eine solche Primzahl; diese kann nach der Voraussetzung, dass $A(x), B(x)$ ursprünglich seien, weder in allen $a_0, a_1 \dots a_m$, noch in allen $b_0, b_1 \dots b_n$ aufgehen.

Es möge nun p aufgehen in

$$a_0, a_1 \dots a_{r-1}, \quad \text{aber nicht in } a_r,$$

in

$$b_0, b_1 \dots b_{s-1}, \quad \text{aber nicht in } b_s,$$

dann ist nach Voraussetzung $r \leq m$ und kann auch gleich Null sein, wenn p schon in a_0 nicht aufgeht. Ebenso ist $s \leq n$.

Bilden wir nun nach (4) c_{r+s} und ordnen es in folgender Weise

$$\begin{aligned} c_{r+s} = & a_r b_s + a_{r-1} b_{s+1} + a_{r-2} b_{s+2} + \dots \\ & + a_{r+1} b_{s-1} + a_{r+2} b_{s-2} + \dots, \end{aligned} \tag{1}$$

so sieht man unmittelbar, dass c_{r+s} nicht durch p theilbar sein kann, wie doch angenommen war; denn das erste Glied $a_r b_s$ ist durch p nicht theilbar, während alle anderen Glieder, da sie mit einem

⁷Gauss, *Disquisitiones arithmeticae*, Art. 42.

der Coefficienten $a_0, a_1 \dots a_{r-1}, b_0, b_1 \dots b_{s-1}$ multiplicirt sind, durch p theilbar sind. Die Annahme also, dass $C(x)$ nicht ursprünglich sei, während es $A(x)$ und $B(x)$ sind, führt zu einem Widerspruch.

Dieser Satz lässt sich übertragen auf Functionen von mehreren Veränderlichen. Wir nennen eine ganze rationale Function von m Veränderlichen mit ganzzahligen Coefficienten ursprünglich oder primitiv, wenn die Coefficienten keinen gemeinsamen Theiler haben, und wir sprechen den Satz aus, dass das Product von zwei ursprünglichen Functionen wieder eine ursprüngliche Function ist.

Um seine Wahrheit einzusehen, brauchen wir nur in der oben durchgeführten Betrachtung die Coefficienten $a_0, a_1, a_2 \dots, b_0, b_1, b_2 \dots$ nicht als ganze Zahlen, sondern als ganze rationale Functionen von $m-1$ Veränderlichen $y, z \dots$ anzunehmen und eine solche Function durch eine Primzahl p theilbar zu nennen, wenn alle ihre Coefficienten durch p theilbar sind. Setzen wir dann voraus, der zu beweisende Satz sei bereits für Functionen von $m-1$ Variablen bewiesen, dann ergibt die Formel (1) seine Richtigkeit für Functionen von m Variablen, also seine allgemeine Gültigkeit durch den Schluss der vollständigen Induction oder den Schluss von $m-1$ auf m .

Eine imprimitive Function ist eine solche, deren ganzzahlige Coefficienten alle einen gemeinsamen Theiler haben. Diesen Theiler nennen wir den Theiler der Function. Dann können wir den bewiesenen Satz auch so aussprechen:

Der Theiler eines Productes zweier ganzer Functionen ist gleich dem Product der Theiler beider Functionen.

Denn sind PA und QB zwei ganze Functionen mit den Theilern P und Q , so sind A und B ursprüngliche Functionen. Also ist auch $AB = C$ eine ursprüngliche Function und PQ ist der Theiler der Function $PA \cdot QB = PQC$.

Wir können dem Satze, insofern er sich auf Functionen einer Veränderlichen bezieht, ohne seinen Inhalt wesentlich zu ändern, folgende Fassung geben, in der er besonders nützlich ist. Sind

$$\varphi(x) = x^m + \alpha_1 x^{m-1} + \alpha_2 x^{m-2} + \dots + \alpha_m,$$

$$\psi(x) = x^n + \beta_1 x^{n-1} + \beta_2 x^{n-2} + \dots + \beta_n$$

zwei ganze rationale Functionen, in denen die höchsten Potenzen von x den Coefficienten 1 haben, während die übrigen Coefficienten rationale Zahlen sind, so können in dem Product

$$\varphi(x)\psi(x) = x^{m+n} + \gamma_1 x^{m+n-1} + \gamma_2 x^{m+n-2} + \dots + \gamma_{m+n}$$

die Coefficienten γ nicht alle ganze Zahlen sein, wenn die Coefficienten α, β in $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ nicht alle ganze Zahlen sind.

Denn bezeichnen wir den kleinsten Hauptnenner der Coefficienten α von φ mit a_0 , der Coefficienten β von ψ mit b_0 , so sind $a_0\varphi(x) = A(x)$, $b_0\psi(x) = B(x)$ primitive Functionen von x . Ihr Product $a_0b_0\varphi(x)\psi(x)$ hätte, wenn die Coefficienten γ ganze Zahlen wären, den Theiler a_0b_0 und wäre also, wenn a_0 und b_0 nicht beide gleich 1 wären, nicht primitiv; dies aber wäre ein Widerspruch mit dem oben bewiesenen Satze.

§ 3. Division.

Es seien, wie bisher,

$$\begin{aligned} A &= A(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \dots, \\ B &= B(x) = b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \dots \end{aligned} \tag{1}$$

zwei ganze rationale Functionen von x ; es soll aber jetzt vorausgesetzt werden, dass $m \geq n$ sei und dass a_0 und b_0 von Null verschieden sind. Dann ist die Differenz

$$A - \frac{a_0}{b_0} x^{m-n} B \tag{2}$$

auch eine ganze rationale Function von x , deren Grad aber kleiner ist als m , da die höchste Potenz in beiden Gliedern der Differenz denselben Coefficienten hat und also herausfällt. Wir setzen diese Differenz:

$$A' = A'(x) = a'_0 x^{m'} + a'_1 x^{m'-1} + \dots, \quad m' < m. \quad (3)$$

Ist nun m' noch $\geq n$, so können wir in (2) A' an Stelle von A setzen und dieselbe Schlussweise wiederholen.

So ergibt sich eine Kette von Gleichungen:

$$\begin{aligned} A - \frac{a_0}{b_0} x^{m-n} B &= A', \\ A' - \frac{a'_0}{b_0} x^{m'-n} B &= A'', \\ A'' - \frac{a''_0}{b_0} x^{m''-n} B &= A''', \\ &\dots, \end{aligned} \quad (4)$$

und diese Kette lässt sich so lange fortsetzen, bis der Grad der entstandenen Function kleiner als n geworden ist. Da nun in der Reihe der Functionen $A, A', A'' \dots$ der Grad jeder folgenden mindestens um eine Einheit erniedrigt ist, so besteht die Kette der Gleichungen (4) höchstens aus $m - n + 1$ Gliedern; sie kann aber auch weniger Glieder enthalten, wenn sich gleichzeitig mehrere Potenzen herausheben. Addiren wir die sämtlichen Gleichungen (4), bezeichnen die letzte der Functionen $A, A' \dots$ mit C und setzen zur Abkürzung

$$Q = \frac{a_0}{b_0} x^{m-n} + \frac{a'_0}{b_0} x^{m'-n} + \dots, \quad (5)$$

so dass auch Q eine ganze rationale Function von x ist, so folgt

$$A = QB + C. \quad (6)$$

Die hier geschilderte Operation, durch die aus A, B die Functionen Q, C gefunden werden, heisst Division. A ist der Dividendus, B der Divisor, C der Rest und Q der Quotient. Der Grad des Restes ist immer niedriger als der Grad des Divisors.

Die Coefficienten der Functionen Q und C sind aus den Coefficienten a und b durch Addition, Subtraction, Multiplication und Theilung zusammengesetzt. Im Nenner kommen aber nur Potenzen von b_0 vor, und wenn also $b_0 = 1$ ist, so sind die Coefficienten von Q und C ganze Functionen der a und b . Die höchste Potenz von b_0 , die im Nenner auftreten kann, ist die $(m - n + 1)$ te, da in der Kette (4) in jeder folgenden Gleichung im Nenner einmal der Factor b_0 hinzukommt. Es kann aber in besonderen Fällen die höchste Potenz von b_0 in allen Nennern eine niedrigere sein.

Nehmen wir z. B. für A eine Function dritten Grades

$$f(x) = a_0 x^3 + a_1 x^2 + a_2 x + a_3 \quad (7)$$

und für B die sogenannte erste Derivirte von $f(x)$, die vom zweiten Grade ist,

$$f'(x) = 3a_0 x^2 + 2a_1 x + a_2, \quad (8)$$

so erhält man:

$$Q = \frac{1}{3}x + \frac{a_1}{9a_0}, \quad (9)$$

$$C = \frac{6a_0 a_2 - 2a_1^2}{9a_0} x + \frac{9a_0 a_3 - a_1 a_2}{9a_0}. \quad (10)$$

Wie man die in den Gleichungen (4) vorgeschriebene Rechnung zweckmässig anordnet, darf hier aus den Elementen als bekannt vorausgesetzt werden. Wir machen auf die Analogie aufmerksam,

die zwischen dieser Rechnung und der Division im dekadischen Zahlssystem besteht. Eine Function $f(x)$ stellt eine dekadisch geschriebene Zahl dar, wenn die Coefficienten $a_0, a_1 \dots$ ganze Zahlen zwischen Null (einschliesslich) und 10 (ausschliesslich) sind, und $x = 10$ gesetzt wird. Lässt man in den Coefficienten auch Zahlen zu, die grösser als 10 sind, so kann man eine Zahl auf verschiedene Arten durch $f(x)$ darstellen. Man wendet dies bei dem Divisionsverfahren an, um auf die einfachste Weise in den Resultaten gebrochene und negative Coefficienten zu vermeiden.

§ 4. Theilung durch eine lineare Function.

Wir wollen die allgemeine Vorschrift für die Division noch auf einen besonderen Fall anwenden. Es sei der Dividend

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n \quad (1)$$

beliebig, dagegen der Divisor vom ersten Grade oder, wie man auch sagt, linear. Wir wollen auch den Coefficienten der ersten Potenz von x im Divisor = 1 voraussetzen und also den Divisor in der einfachen Form $(x - \alpha)$ annehmen, worin α beliebig bleibt. Der Quotient Q ist in diesem Falle vom $(n - 1)$ ten Grade und der Rest C vom 0ten Grade, d. h. von x unabhängig. Setzen wir also

$$f(x) = (x - \alpha)Q + C, \quad (2)$$

so enthält C das x nicht mehr, und wenn wir

$$Q = q_0x^{n-1} + q_1x^{n-2} + \dots + q_{n-2}x + q_{n-1} \quad (3)$$

setzen, so folgt aus (2):

$$\begin{aligned} f(x) &= q_0x^n + q_1x^{n-1} + \dots + q_{n-2}x^2 + q_{n-1}x + C \\ &\quad - \alpha q_0x^{n-1} - \dots - \alpha q_{n-3}x^2 - \alpha q_{n-2}x - \alpha q_{n-1}, \end{aligned} \quad (4)$$

und aus der Vergleichung mit (1):

$$\begin{aligned} q_0 &= a_0, \\ q_1 - \alpha q_0 &= a_1, \\ q_2 - \alpha q_1 &= a_2, \\ &\dots, \\ q_{n-1} - \alpha q_{n-2} &= a_{n-1}, \\ C - \alpha q_{n-1} &= a_n. \end{aligned} \quad (5)$$

Daraus erhält man

$$\begin{aligned} q_0 &= a_0, \\ q_1 &= a_0\alpha + a_1, \\ q_2 &= a_0\alpha^2 + a_1\alpha + a_2, \\ &\dots, \\ q_{n-1} &= a_0\alpha^{n-1} + a_1\alpha^{n-2} + \dots + a_{n-1}, \\ C &= a_0\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \dots + a_{n-1}\alpha + a_n = f(\alpha). \end{aligned} \quad (6)$$

C entsteht aus $f(x)$, wenn man $x = \alpha$ setzt, und kann also auch mit $f(\alpha)$ bezeichnet werden.

Demnach haben wir auch die Formel

$$\frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha} = Q(x), \quad (7)$$

worin $Q(x)$ eine ganze Function vom Grade $n - 1$ ist.

Wenn wir in den Ausdrücken (6) an Stelle der unbestimmten Grösse α das Zeichen x setzen, so entsteht daraus eine Reihe von ganzen rationalen Functionen von x , die wir, wenn wir der Einfachheit halber $a_0 = 1$ setzen, so schreiben:

$$\begin{aligned} f_0 &= 1, \\ f_1 &= x + a_1, \\ f_2 &= x^2 + a_1x + a_2, \\ &\dots, \\ f_{n-1} &= x^{n-1} + a_1x^{n-2} + a_2x^{n-3} + \dots + a_{n-1}. \end{aligned} \tag{8}$$

Diese Functionen $f_0, f_1 \dots f_{n-1}$ werden uns später noch gute Dienste leisten. Für jetzt fügen wir noch folgende Bemerkungen bei.

Man kann nach (8) die Potenzen $1, x, x^2 \dots x^{n-1}$ von x linear ausdrücken durch die Functionen $f_0, f_1 \dots f_{n-1}$ und zwar so, dass in den Coefficienten nur ganze rationale Verbindungen der a vorkommen, z. B.

$$\begin{aligned} 1 &= f_0, \\ x &= f_1 - a_1f_0, \\ x^2 &= f_2 - a_1f_1 + (a_1^2 - a_2)f_0, \\ &\dots, \end{aligned}$$

und daraus folgt, dass man jede ganze rationale Function von x , deren Grad nicht grösser als $n - 1$ ist, gleichfalls linear durch $f_0, f_1, \dots, f_{n-1}$ ausdrücken kann in der Form

$$y_0f_0 + y_1f_1 + \dots + y_{n-1}f_{n-1}, \tag{9}$$

worin die Coefficienten $y_0, y_1 \dots y_{n-1}$ von x unabhängig sind.

Ist also $F(x)$ eine beliebige ganze rationale Function von x , so kann man nach § 3, indem man $f(x)$ als Divisor betrachtet,

$$F(x) = Qf(x) + y_0f_0 + y_1f_1 + \dots + y_{n-1}f_{n-1} \tag{10}$$

setzen, worin auch Q eine ganze rationale Function von x ist.

Zur recurrenten Berechnung der Functionen $f_r(x)$ ergibt sich aus (8) die Relation:

$$f_r(x) - xf_{r-1}(x) = a_r. \tag{11}$$

§ 5. Gebrochene Functionen; Theilbarkeit.

Wenn $F(x)$ und $f(x)$ zwei ganze rationale Functionen von x sind, so heisst der Bruch

$$\frac{F(x)}{f(x)} \quad (1)$$

eine *gebrochene rationale* oder auch kurz *gebrochene* oder *rationale Function* von x .

Ist der Grad des Zählers niedriger als der Grad des Nenners, so heisst die Function *echt gebrochen*, im entgegengesetzten Falle *unecht gebrochen*.

Nach § 3 lassen sich die ganzen rationalen Functionen Q und $\varphi(x)$ so bestimmen, dass

$$F(x) = Qf(x) + \varphi(x) \quad (2)$$

und der Grad von $\varphi(x)$ kleiner als der Grad von $f(x)$ ist; demnach ist

$$\frac{F(x)}{f(x)} = Q + \frac{\varphi(x)}{f(x)} \quad (3)$$

und daraus der Satz:

Jede gebrochene Function kann in die Summe aus einer ganzen und einer echt gebrochenen Function zerlegt werden.

Ist n der Grad von $f(x)$, so ist der Grad von $\varphi(x)$ höchstens $n - 1$, er kann aber auch niedriger sein; insbesondere kann auch der Fall eintreten, dass $\varphi(x)$ identisch verschwindet.

In diesem Falle heisst die Function $F(x)$ durch $f(x)$ theilbar. Die Function

$$\frac{F(x)}{f(x)}$$

ist in diesem Falle nur scheinbar gebrochen, in Wirklichkeit der ganzen Function Q gleich.

Die Formel

$$\frac{x^m - 1}{x - 1} = x^{m-1} + x^{m-2} + x^{m-3} + \cdots + 1$$

giebt hierfür ein einfaches Beispiel.

Für die Theilbarkeit von Functionen gelten dieselben Gesetze, wie für die Theilbarkeit der Zahlen, insbesondere die folgenden:

1. Wenn die Function $F(x)$ durch die Function $f(x)$, $f(x)$ durch eine dritte Function $\varphi(x)$ theilbar ist, so ist auch $F(x)$ durch $\varphi(x)$ theilbar.

Denn ist

$$F = Qf, \quad f = q\varphi,$$

worin Q und q ganze rationale Functionen sind, so ist

$$F = Qq\varphi,$$

und da Qq eine ganze rationale Function ist, F durch φ theilbar.

2. Ist $F(x)$ durch $f(x)$ theilbar und Q eine beliebige ganze rationale Function, so ist auch $QF(x)$ durch $f(x)$ theilbar.

3. Ist $F(x)$ und $f(x)$ durch $\varphi(x)$ theilbar, so ist auch $F(x) \pm f(x)$ durch $\varphi(x)$ theilbar, oder allgemeiner:

4. Sind $F_1, F_2 \dots$ durch $f(x)$ theilbar und $Q_1, Q_2 \dots$ beliebige ganze rationale Functionen, so ist auch

$$Q_1F_1 + Q_2F_2 + \cdots$$

durch $f(x)$ theilbar.

Der letzte Satz umfasst die beiden vorhergehenden und wird einfach so bewiesen.

Sind $F_1, F_2 \dots$ durch f theilbar, so kann man die ganzen rationalen Functionen $\Phi_1, \Phi_2 \dots$ so bestimmen, dass

$$F_1 = \Phi_1 f, \quad F_2 = \Phi_2 f, \dots$$

und folglich

$$Q_1 F_1 + Q_2 F_2 + \dots = (Q_1 \Phi_1 + Q_2 \Phi_2 + \dots) f.$$

Da nun $Q_1 \Phi_1 + Q_2 \Phi_2 + \dots$ eine ganze rationale Function ist, so ist der Satz bewiesen.

5. Jede Function ist durch sich selbst theilbar.

In Bezug auf die Theilbarkeit oder Untheilbarkeit von Functionen wird nichts geändert, wenn die Functionen mit beliebigen, von x unabhängigen Factoren multiplicirt werden.

Eine von x unabhängige, von Null verschiedene Grösse kann als Function nullten Grades aufgefasst werden. Nennen wir eine solche Grösse eine Constante, so können wir sagen:

6. Jede Function ist durch jede Constante theilbar.

Wenn eine Function durch eine andere theilbar ist, so ist der Grad des Quotienten gleich der Differenz des Grades des Dividenden und des Grades des Divisors. Ersterer kann also nicht kleiner sein als letzterer. Sind die Grade gleich, so ist der Quotient eine Constante, und daraus folgt:

7. Wenn von zwei ganzen rationalen Functionen gleichen Grades die eine durch die andere theilbar ist, so unterscheiden sie sich nur durch einen constanten Factor von einander, und es ist auch die zweite durch die erste theilbar.

8. Nach § 4 ist die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die Function $f(x)$ durch die lineare Function $x - \alpha$ theilbar ist, die dass $f(\alpha) = 0$ sei.

§ 6. Grösster gemeinschaftlicher Theiler.

Es ist eine Aufgabe von fundamentaler Bedeutung, zu entscheiden, ob zwei ganze rationale Functionen ausser den Constanten noch einen anderen gemeinschaftlichen Theiler haben. Man findet die Lösung durch den Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers ganz in derselben Weise, wie die entsprechende Frage in Bezug auf die Theilbarkeit ganzer Zahlen beantwortet wird. (S. die Einleitung.)

Es seien

$$f(x) = A, \quad \varphi(x) = A' \tag{1}$$

zwei gegebene Functionen; der Grad von $\varphi(x)$ möge niedriger oder wenigstens nicht höher als der von $f(x)$ sein.

Wir dividiren A durch A' und bezeichnen den Rest, dessen Grad niedriger ist als der Grad von A' , mit A'' , also:

$$A = Q' A' + A'';$$

nun dividiren wir A' durch A'' und bezeichnen den Rest mit A''' , und fahren so fort in der Bildung der Functionenreihe

$$A, A', A'', A''', \dots, \tag{2}$$

deren Grade $n, n', n'', n''' \dots$ immer abnehmen und folglich nach einer endlichen Anzahl von Divisionen auf Null heruntergehen. Der letzte Rest vom Grade Null, der also eine Constante ist, sei $A^{(\nu)}$. Dann haben wir die Kette der Gleichungen:

$$\begin{aligned} A &= Q' A' + A'', \\ A' &= Q'' A'' + A''', \\ &\dots \\ A^{(\nu-3)} &= Q^{(\nu-2)} A^{(\nu-2)} + A^{(\nu-1)}, \\ A^{(\nu-2)} &= Q^{(\nu-1)} A^{(\nu-1)} + A^{(\nu)}, \end{aligned} \tag{3}$$

worin $A^{(\nu)}$ eine Constante ist.

Wenn nun A, A' irgend einen gemeinsamen Theiler haben, so ist dieser nach den Sätzen des vorigen Paragraphen, wie der Anblick der Gleichungen (3) lehrt, auch Theiler von A'', A''', A'''' u. s. f. bis $A^{(\nu)}$. Ist $A^{(\nu)}$ eine von Null verschiedene Constante, so kann also kein von x abhängiger Theiler von $f(x)$ und $\varphi(x)$ existiren. Solche Functionen heissen *theilerfremd* oder *relativ prim*. Man sagt auch, indem man nur die von x abhängigen Theiler berücksichtigt, die Functionen haben keinen gemeinsamen Theiler.

Die Bedingung, dass die beiden Functionen einen gemeinsamen Theiler haben, ist also:

$$A^{(\nu)} = 0. \quad (4)$$

In diesem Falle ist $A^{(\nu-1)}$ Theiler von $A^{(\nu-2)}$, wie die letzte Gleichung (3) zeigt, und nach der vorletzten dieser Gleichungen Theiler von $A^{(\nu-3)}$ u. s. f., also auch Theiler von A und A' , d. h. von f und φ . Und da umgekehrt jeder gemeinsame Theiler von A, A' auch Theiler von $A^{(\nu-1)}$ ist, so heisst $A^{(\nu-1)}$ der grösste gemeinsame Theiler von f und φ . Der Algorithmus (3) zeigt, dass man $A^{(\nu)}$ oder $A^{(\nu-1)}$ aus den Coefficienten von f und φ durch die rationalen Rechenoperationen ableiten kann, und zwar so, dass immer nur durch die Coefficienten der höchsten Potenzen von x in den Functionen $A, A', A'', \dots$, die von Null verschieden sind, dividirt wird.

Wir wollen diese Betrachtungen auf zwei Beispiele anwenden.

Es seien zunächst:

$$\begin{aligned} A &= a_0x^2 + a_1x + a_2, \\ B &= b_0x^2 + b_1x + b_2 \end{aligned} \quad (5)$$

zwei Functionen zweiten Grades, also a_0, b_0 von Null verschieden.

Der erste Schritt ist die Bildung der Gleichung

$$A = \frac{a_0}{b_0}B + C, \quad (6)$$

worin

$$C = c_0x + c_1 \quad (7)$$

und

$$c_0 = \frac{a_1b_0 - b_1a_0}{b_0}, \quad c_1 = \frac{a_2b_0 - b_2a_0}{b_0}. \quad (8)$$

Ist $c_0 = 0$, also C constant, so haben A, B nur dann einen gemeinsamen Factor, wenn auch $c_1 = 0$ ist, und dann ist A durch B theilbar, d. h. A und B unterscheiden sich nur durch einen constanten Factor. Ist aber c_0 von Null verschieden, so setzen wir die Rechnung fort, indem wir

$$B = QC + D$$

setzen, worin (nach § 4, wenn dort $\alpha = -c_1 : c_0$ gesetzt wird)

$$D = \frac{b_0c_1^2 - b_1c_0c_1 + b_2c_0^2}{c_0^2}. \quad (9)$$

Ist D von Null verschieden, so sind A, B ohne gemeinschaftlichen Theiler. Ist aber $D = 0$, so ist C der grösste gemeinschaftliche Factor von A und B .

Setzt man die Werthe c_0, c_1 aus (8) in (9) ein, so erhält man mit Weglassung des Nenners $b_0c_0^2$ die Bedingung für die Existenz eines gemeinsamen Theilers C von A und B in der Form

$$\begin{aligned} a_0^2b_2^2 + a_2^2b_0^2 - 2a_0a_2b_0b_2 - a_1a_2b_0b_1 - a_0a_1b_1b_2 \\ + a_0a_2b_1^2 + a_1^2b_0b_2 = 0 \end{aligned} \quad (10)$$

oder

$$(a_0b_2 - b_0a_2)^2 + (a_0b_1 - a_1b_0)(a_2b_1 - a_1b_2) = 0. \quad (11)$$

Diese Bedingung ist auch erfüllt, wenn c_0 und c_1 gleich Null sind, und ist also die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass A, B einen gemeinsamen Theiler haben.

Die linke Seite von (10) oder (11) heisst die *Resultante* der Functionen A und B .

Als zweites Beispiel nehmen wir das schon im § 3 gewählte. Setzen wir

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = A, \\ f'(x) &= 3a_0x^2 + 2a_1x + a_2 = B, \end{aligned} \quad (12)$$

und setzen a_0 von Null verschieden voraus, so haben wir nach § 3:

$$A = QB + C, \quad (13)$$

$$C = c_0x + c_1, \quad (14)$$

worin

$$c_0 = \frac{6a_0a_2 - 2a_1^2}{9a_0}, \quad c_1 = \frac{9a_0a_3 - a_1a_2}{9a_0}. \quad (15)$$

Wenn c_0 gleich Null ist, so ist hiermit der Algorithmus schon geschlossen; wenn c_1 von Null verschieden ist, dann haben A und B keinen gemeinsamen Theiler; ist aber c_1 auch gleich Null, so ist B selbst der grösste gemeinsame Theiler von A und B , d. h. A ist durch B theilbar. Die Bedingungen hierfür sind also:

$$3a_0a_2 - a_1^2 = 0, \quad 9a_0a_3 - a_1a_2 = 0. \quad (16)$$

Ist c_0 nicht gleich Null, so gehen wir einen Schritt weiter und setzen:

$$B = PC + D, \quad (17)$$

worin D constant wird und den Ausdruck erhält:

$$D = \frac{a_2c_0^2 - 2a_1c_0c_1 + 3a_0c_1^2}{c_0^2}. \quad (18)$$

Ist dieser Ausdruck von Null verschieden, so sind A und B theilerfremd, ist er gleich Null, so haben A und B den grössten gemeinschaftlichen Theiler C . Setzen wir für c_0, c_1 die Werthe (15) ein, lassen den Nenner weg, heben noch den Null verschwindenden Factor $9a_0$ heraus und kehren das Vorzeichen um, so erhält diese Bedingung nach einfacher Rechnung die Gestalt:

$$a_1^2a_2^2 + 18a_0a_1a_2a_3 - 4a_0a_2^3 - 4a_1^3a_3 - 27a_0^2a_3^2 = 0. \quad (19)$$

Sie ist, wie man leicht durch Rechnung oder auch aus (18) sieht, auch dann erfüllt, wenn die Bedingungen (16) bestehen, und ist also die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass $f(x)$ und $f'(x)$ einen gemeinsamen Theiler haben. Die linke Seite von (19), die eine ganze rationale und homogene Function der Coefficienten von $f(x)$ ist, heisst die *Discriminante* der Function $f(x)$.

Wir leiten noch einen Satz aus dem Algorithmus (3) her, der oft angewandt wird.

Aus der ersten dieser Gleichungen folgt:

$$A'' = A - Q'A', \quad (20)$$

und wenn man diesen Werth von A'' in die folgende Gleichung einsetzt:

$$A''' = (1 + Q'Q'')A' - Q''A,$$

also, wenn mit p, p' ganze rationale Functionen bezeichnet werden:

$$A''' = pA + p'A'. \quad (21)$$

Setzt man die Ausdrücke (20), (21) in die dritte Gleichung (3) ein, so ergibt sich für A''' wieder ein Ausdruck von der Form (21) und so kann man fortfahren, und erhält schliesslich:

$$A^{(\nu)} = PA + P'A', \quad (22)$$

worin P, P' ganze rationale Functionen sind, deren Coefficienten durch rationale Rechenoperationen aus den Coefficienten von A und A' zusammengesetzt sind.

In der Formel (22) ist $A^{(\nu)}$ eine Constante. Besonders wichtig ist dieser Satz in dem Falle, wo $A^{(\nu)}$ von Null verschieden, also A, A' relativ prim sind. Setzen wir in diesem Falle

$$P = A^{(\nu)}F(x), \quad P' = A^{(\nu)}\Phi(x),$$

so können wir nach Weglassung des Factors $A^{(\nu)}$ dem Satz folgenden Ausdruck geben:

I. Sind $f(x)$ und $\psi(x)$ zwei ganze Functionen ohne gemeinsamen Theiler, so kann man zwei andere ganze Functionen $F(x)$ und $\Phi(x)$ bestimmen, die der Gleichung

$$F(x)f(x) + \Phi(x)\psi(x) = 1 \quad (23)$$

identisch genügen.

Der Satz lässt sich noch verallgemeinern. Multipliciren wir die Gleichung (23) mit einer beliebigen ganzen Function $\chi(x)$, so folgt:

$$F(x)\chi(x)f(x) + \Phi(x)\chi(x)\psi(x) = \chi(x), \quad (24)$$

und nach § 3 können wir

$$\Phi(x)\chi(x) = Q(x)f(x) + \varphi(x) \quad (25)$$

setzen, so dass $Q(x), \varphi(x)$ ganze rationale Functionen von x sind und der Grad von $\varphi(x)$ kleiner ist als der von $f(x)$. Setzen wir dies in (24) ein und setzen an Stelle von $F(x)\chi(x) + Q(x)\psi(x)$ wieder $F(x)$, so erhalten wir:

$$F(x)f(x) + \varphi(x)\psi(x) = \chi(x).$$

Wir können daher den vorigen Satz so verallgemeinern:

II. Sind $f(x), \psi(x), \chi(x)$ gegebene ganze rationale Functionen, und $f(x)$ und $\psi(x)$ ohne gemeinsamen Theiler, so lassen sich die ganzen rationalen Functionen $F(x), \varphi(x)$ und zwar $\varphi(x)$ von niedrigerem Grade als $f(x)$ so bestimmen, dass die Gleichung

$$F(x)f(x) + \varphi(x)\psi(x) = \chi(x) \quad (26)$$

identisch befriedigt ist.

§ 7. Producte linearer Factoren.

Nach § 1 erhalten wir durch Multiplication ganzer Functionen ebensolche Functionen von höherem Grade, und zwar bestimmt sich der Grad des Productes durch die Summe der Grade der einzelnen Factoren.

Wenn wir also n lineare Factoren mit einander multipliciren, so entsteht eine Function n ten Grades, deren Bildungsweise wir etwas genauer untersuchen müssen.

Wir wollen die linearen Factoren in der einfachen Form $x - \alpha_1, x - \alpha_2, \dots, x - \alpha_n$ annehmen, und setzen, da der Coefficient der höchsten Potenz (nach § 1) = 1 ist,

$$\begin{aligned} f(x) &= (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n) \\ &= x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n. \end{aligned} \quad (1)$$

Eine leichte Ueberlegung lässt folgendes Bildungsgesetz der Coefficienten $a_1, a_2 \dots a_n$ erkennen:

Es ist $-a_1$ gleich der Summe der α , a_2 gleich der Summe der Producte von je zweien der α , $-a_3$ die Summe der Producte von je dreien der α , allgemein $(-1)^\nu a_\nu$ die Summe der Producte von je ν der Grössen α , oder in Formeln ausgedrückt:

$$\begin{aligned} -a_1 &= \sum \alpha_1, \\ +a_2 &= \sum \alpha_1 \alpha_2, \\ &\dots \\ (-1)^\nu a_\nu &= \sum \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_\nu, \\ &\dots \\ (-1)^n a_n &= \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n. \end{aligned} \tag{2}$$

Um aber noch deutlicher die Richtigkeit dieses Bildungsgesetzes einzusehen, bedient man sich der vollständigen Induction.

Man bestätigt die Richtigkeit zunächst in den ersten Fällen durch wirkliche Ausführung der Multiplication

$$\begin{aligned} (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) &= x^2 - (\alpha_1 + \alpha_2)x + \alpha_1 \alpha_2, \\ (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3) &= x^3 - (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3)x^2 \\ &\quad + (\alpha_1 \alpha_2 + \alpha_1 \alpha_3 + \alpha_2 \alpha_3)x - \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3. \end{aligned}$$

Nehmen wir die Richtigkeit unseres Bildungsgesetzes bei $n - 1$ Factoren als bewiesen an und setzen

$$(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_{n-1}) = x^{n-1} + a'_1 x^{n-2} + \cdots + a'_{n-1},$$

so findet man durch Multiplication mit $x - \alpha_n$:

$$\begin{aligned} a_1 &= a'_1 - \alpha_n, \\ a_2 &= a'_2 - \alpha_n a'_1, \\ a_3 &= a'_3 - \alpha_n a'_2, \\ &\dots \\ a_\nu &= a'_\nu - \alpha_n a'_{\nu-1}, \\ &\dots \\ a_n &= -\alpha_n a'_{n-1}, \end{aligned} \tag{3}$$

und daraus ist die Richtigkeit der Formeln (2) unmittelbar ersichtlich.

Es ist von Wichtigkeit, die Anzahl der Glieder zu bestimmen, die in jeder der Summen (2) vorkommen. Wir bezeichnen die Anzahl der Terme, die in der Summe $(-1)^\nu a_\nu$ vorkommen, mit $B_\nu^{(n)}$; es ist die Anzahl der Combinationen ohne Wiederholung von n Elementen zur ν ten Classe (d. h. von je ν verschiedenen der n Elemente). Um sie zu bestimmen, denke man sich zunächst die $B_{\nu-1}^{(n)}$ Combinationen zur $(\nu - 1)$ ten Classe gebildet. Aus jeder dieser Combinationen kann man durch Hinzufügung je eines der fehlenden $n - \nu + 1$ Elemente $n - \nu + 1$ Combinationen zur ν ten Classe ableiten. Auf diese Art aber wird jede Combination ν mal, nämlich durch Hinzufügung jedes ihrer Elemente gebildet, so dass man die Relation

$$B_\nu^{(n)} = B_{\nu-1}^{(n)} \frac{n - \nu + 1}{\nu} \tag{4}$$

erhält, während $B_1^{(n)}$ offenbar den Werth n hat. Wenn man also die aus (4) folgenden Gleichungen

$$\begin{aligned} B_1^{(n)} &= n, \\ B_2^{(n)} &= B_1^{(n)} \frac{n - 1}{2}, \\ &\dots \\ B_\nu^{(n)} &= B_{\nu-1}^{(n)} \frac{n - \nu + 1}{\nu} \end{aligned} \tag{5}$$

multiplicirt, so folgt:

$$B_\nu^{(n)} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-\nu+1)}{1\cdot 2\cdot 3\cdots \nu}. \quad (6)$$

Wir werden in der Folge oft, wenn m eine beliebige positive ganze Zahl ist, das Zeichen

$$\Pi(m) = 1\cdot 2\cdot 3\cdots m, \quad \Pi(0) = 1 \quad (7)$$

benutzen, so dass

$$\Pi(m) = m\Pi(m-1). \quad (8)$$

Mit Hülfe dieses Zeichens lässt sich der Ausdruck für $B_\nu^{(n)}$ übersichtlicher so darstellen:

$$B_\nu^{(n)} = B_{n-\nu}^{(n)} = \frac{\Pi(n)}{\Pi(\nu)\Pi(n-\nu)}, \quad (9)$$

der, wenn $B_0^{(n)} = 1$ gesetzt wird, auch noch für $\nu = 0$ und $\nu = n$ gilt, und die Unveränderlichkeit von $B_\nu^{(n)}$ bei der Vertauschung von ν mit $n - \nu$ erkennen lässt.

Die Ableitung der Formel (4), die wir soeben nach den Vorschriften der Combinationslehre gegeben haben, ist zwar vollkommen richtig und einleuchtend, erfordert aber zur genauen Begründung einige Ueberlegung, die sich nicht gut in kurze Worte fassen lässt. Wir wollen daher nachträglich noch durch das Mittel der vollständigen Induction die Richtigkeit beweisen.

Die Formeln (3) geben nämlich die folgenden Recursionsformeln

$$\begin{aligned} B_1^{(n)} &= B_1^{(n-1)} + 1, \\ B_2^{(n)} &= B_2^{(n-1)} + B_1^{(n-1)}, \\ &\dots \\ B_\nu^{(n)} &= B_\nu^{(n-1)} + B_{\nu-1}^{(n-1)}, \\ &\dots \\ B_n^{(n)} &= B_{n-1}^{(n-1)}. \end{aligned} \quad (10)$$

Nun lässt sich die Formel (6) für die ersten Werthe von n sehr leicht durch Abzählen bestätigen. Nimmt man sie für $n - 1$ als richtig an, so ergibt (10):

$$B_\nu^{(n)} = \frac{\Pi(n-1)}{\Pi(\nu)\Pi(n-\nu-1)} + \frac{\Pi(n-1)}{\Pi(\nu-1)\Pi(n-\nu)},$$

woraus nach (8)

$$B_\nu^{(n)} = \frac{\Pi(n)}{\Pi(\nu)\Pi(n-\nu)},$$

und hierdurch ist die Allgemeingültigkeit der Formel (9) bewiesen.

Aus der Bedeutung von $B_\nu^{(n)}$ ergibt sich, und wird auch aus den Formeln (10) durch vollständige Induction bewiesen, dass es die $B_\nu^{(n)}$ positive ganze Zahlen sind.

§ 8. Der binomische Lehrsatz.

Wenn wir in der Formel (1) des vorigen Paragraphen die bisher willkürlichen Grössen $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n$ einander gleich setzen, so erhalten wir den binomischen Lehrsatz, der in nichts Anderem besteht, als in der Ordnung der n ten Potenz eines Binomiums $x + y$ nach Potenzen von x . Wenn wir nämlich

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = -y$$

setzen, so ergibt die Formel (2):

$$a_\nu = (-1)^\nu \sum \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_\nu = y^\nu B_\nu^{(n)},$$

worin nach der Definition des vorigen Paragraphen $B_\nu^{(n)}$ die Anzahl der Terme der Summe bedeutet, die alle einander gleich und gleich $(-1)^\nu y^\nu$ werden.

Demnach ergibt sich:

$$(x + y)^n = x^n + B_1^{(n)} x^{n-1} y + B_2^{(n)} x^{n-2} y^2 + \cdots + B_n^{(n)} y^n, \quad (1)$$

oder entwickelt geschrieben:

$$\begin{aligned} (x + y)^n &= x^n + nx^{n-1}y + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} x^{n-2}y^2 + \cdots + y^n \\ &= \Pi(n) \sum \frac{x^{n-\nu} y^\nu}{\Pi(n-\nu)\Pi(\nu)} = \Pi(n) \sum \frac{x^\alpha y^\beta}{\Pi(\alpha)\Pi(\beta)}, \end{aligned}$$

die letzte Summe über alle nicht negativen ganzzahligen Werthe α, β erstreckt, die der Bedingung $\alpha + \beta = n$ genügen.

Hiernach heissen die Coefficienten $B_\nu^{(n)}$ die Binomialcoefficienten.

Wir setzen der Uebersicht wegen eine kleine Tabelle der ersten Werthe der Binomialcoefficienten hierher:

$n = 1$	1	1							
$n = 2$	1	2	1						
$n = 3$	1	3	3	1					
$n = 4$	1	4	6	4	1				
$n = 5$	1	5	10	10	5	1			
$n = 6$	1	6	15	20	15	6	1		
$n = 7$	1	7	21	35	35	21	7	1	

Wir wollen unter den verschiedenen Eigenschaften der Binomialcoefficienten zwei ableiten, von denen wir nachher eine interessante Anwendung machen werden.

Aus (1) ergeben sich, wenn man x, y durch $1, x$ ersetzt, und $n = 0, 1, 2, 3 \dots$ nimmt, die Formeln

$$\begin{aligned} 1 &= B_0^{(0)}, \\ 1 + x &= B_0^{(1)} + B_1^{(1)}x, \\ (1 + x)^2 &= B_0^{(2)} + B_1^{(2)}x + B_2^{(2)}x^2, \\ &\dots \\ (1 + x)^n &= B_0^{(n)} + B_1^{(n)}x + B_2^{(n)}x^2 + \cdots + B_n^{(n)}x^n. \end{aligned} \quad (2)$$

Wir machen nun von der bekannten Summenformel der geometrischen Reihe Gebrauch:

$$1 + (1 + x) + (1 + x)^2 + \cdots + (1 + x)^n = \frac{(1 + x)^{n+1} - 1}{x},$$

worin, wenn man $(1 + x)^{n+1}$ wieder nach der Binomialformel entwickelt, indem man in der letzten Formel (2) n in $n + 1$ verwandelt und $B_0^{(n+1)} = 1$ setzt:

$$\frac{(1 + x)^{n+1} - 1}{x} = B_1^{(n+1)} + B_2^{(n+1)}x + \cdots + B_{n+1}^{(n+1)}x^n. \quad (3)$$

Vergleicht man dies mit der Summe der rechten Seiten von (2) und setzt den Vorschriften des § 1 gemäss die Coefficienten entsprechender Potenzen von x einander gleich, so folgt:

$$\begin{aligned} B_0^{(0)} + B_0^{(1)} + B_0^{(2)} + \cdots + B_0^{(n)} &= B_1^{(n+1)}, \\ B_1^{(1)} + B_1^{(2)} + \cdots + B_1^{(n)} &= B_2^{(n+1)}, \\ &\dots \\ B_n^{(n)} &= B_{n+1}^{(n+1)}, \end{aligned} \quad (4)$$

oder allgemein

$$B_{\nu}^{(\nu)} + B_{\nu}^{(\nu+1)} + \dots + B_{\nu}^{(n)} = B_{\nu+1}^{(n+1)}. \quad (5)$$

Wenn man aber die Gleichungen (2) der Reihe nach mit

$$B_0^{(n)}, \quad -B_1^{(n)}, \quad +B_2^{(n)}, \dots, \quad \pm B_n^{(n)}$$

multiplicirt (wo das obere Zeichen bei geradem, das untere bei ungeradem n gilt), so ergibt die Summe der linken Seiten:

$$B_0^{(n)} - B_1^{(n)}(1+x) + B_2^{(n)}(1+x)^2 - \dots \pm B_n^{(n)}(1+x)^n = [1 - (1+x)]^n = (-x)^n$$

und die Gleichsetzung der Coefficienten gleich hoher Potenzen auf der rechten und linken Seite liefert das Formelsystem

$$\begin{aligned} 0 &= B_0^{(0)} B_0^{(n)} - B_0^{(1)} B_1^{(n)} + B_0^{(2)} B_2^{(n)} - \dots \pm B_0^{(n)} B_n^{(n)}, \\ 0 &= -B_1^{(1)} B_1^{(n)} + B_1^{(2)} B_2^{(n)} - \dots \pm B_1^{(n)} B_n^{(n)}, \\ &\dots \\ \pm 1 &= \pm B_n^{(n)} B_n^{(n)}, \end{aligned} \quad (6)$$

und dies Formelsystem lässt sich in umgekehrter Reihenfolge mit Benutzung der Relation $B_{\nu}^{(n)} = B_{n-\nu}^{(n)}$ auch so darstellen:

$$\begin{aligned} 1 &= B_0^{(n)} B_0^{(n)}, \\ 0 &= B_1^{(n)} B_0^{(n)} - B_0^{(n-1)} B_1^{(n)}, \\ 0 &= B_2^{(n)} B_0^{(n)} - B_1^{(n-1)} B_1^{(n)} + B_0^{(n-2)} B_2^{(n)}, \\ &\dots \\ 0 &= B_n^{(n)} B_0^{(n)} - B_{n-1}^{(n-1)} B_1^{(n)} + B_{n-2}^{(n-2)} B_2^{(n)} - \dots \pm B_0^{(0)} B_n^{(n)}, \end{aligned} \quad (7)$$

oder auch in zusammenfassender Bezeichnung:

$$\sum_{\nu=0}^{\mu} (-1)^{\nu} B_{\mu-\nu}^{(n-\nu)} B_{\nu}^{(n)} = \begin{cases} 1, & \mu = 0, \\ 0, & \mu = 1, 2, \dots, n. \end{cases} \quad (8)$$

Band I. Erster Abschnitt. Rationale Functionen.

§ 9. Interpolation.

Wir wollen von den zuletzt gewonnenen Formeln eine Anwendung machen auf eine Aufgabe aus der Theorie der Interpolation.

Es soll eine ganze rationale Function n ten Grades bestimmt werden, die für $n + 1$ gegebene Werthe der Veränderlichen x vorgeschriebene Werthe hat.

Es handelt sich also um die Bestimmung der $n + 1$ Coefficienten $a_0, a_1, \dots, a_n$ in

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n \quad (1)$$

aus den $n + 1$ Gleichungen

$$f(\alpha_0) = A_0, \quad f(\alpha_1) = A_1, \quad \dots, \quad f(\alpha_n) = A_n, \quad (2)$$

wenn $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ die gegebenen Werthe von x , und $A_0, A_1, \dots, A_n$ die entsprechenden Werthe von $f(x)$ sind.

Die Gleichungen (2) sind ein System von Gleichungen ersten Grades für die Unbekannten $a_0, a_1, \dots, a_n$, um die sich im Allgemeinen durch Determinanten auflösen lassen, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden. Wir kommen später auf diese Aufgabe zurück, behandeln sie aber jetzt unter der besonderen Voraussetzung, dass die gegebenen Werthe von x die $n + 1$ ersten ganzen Zahlen $0, 1, 2, \dots, n$ seien.

Die Binomialcoefficienten $B_\nu^{(x)}$, wie sie durch § 7, (6) definirt sind, behalten ihren guten Sinn, auch wenn x keine ganze Zahl ist, wie bisher vorausgesetzt war, sondern eine beliebige veränderliche Grösse. Es ist dann

$$B_\nu^{(x)} = \frac{x(x-1) \cdots (x-\nu+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu} \quad (3)$$

eine ganze rationale Function ν ten Grades von x .⁸ Der Coefficient von x^ν ist von Null verschieden und daher kann auch x^ν ausgedrückt werden durch $B_\nu^{(x)}$ und durch niedrigere Potenzen von x . Es lässt sich also auch jede ganze Function n ten Grades $f(x)$ von x linear ausdrücken durch $B_0^{(x)}, B_1^{(x)}, \dots, B_n^{(x)}$ in der Form

$$f(x) = M_0 B_0^{(x)} + M_1 B_1^{(x)} + \dots + M_n B_n^{(x)}, \quad (4)$$

worin $M_0, M_1, \dots, M_n$ Constanten sind, und die Function $f(x)$ ist bestimmt, wenn diese Constanten bestimmt sind.

Es sei nun nach unserer Voraussetzung $f(0), f(1), f(2), \dots, f(n)$ gegeben; da nach (3) $B_\nu^{(x)}$ immer verschwindet, wenn x einen der Werthe $0, 1, 2, \dots, \nu - 1$ hat, so ergeben sich aus (4) die folgenden linearen Gleichungen für die Unbekannten M :

$$\begin{aligned} f(0) &= M_0 B_0^{(0)}, \\ f(1) &= M_0 B_0^{(1)} + M_1 B_1^{(1)}, \\ f(2) &= M_0 B_0^{(2)} + M_1 B_1^{(2)} + M_2 B_2^{(2)}, \\ &\dots \\ f(n) &= M_0 B_0^{(n)} + M_1 B_1^{(n)} + \dots + M_n B_n^{(n)}. \end{aligned} \quad (5)$$

Diese Gleichungen sind nun in Bezug auf $M_0, M_1, \dots, M_n$ aufzulösen, was sehr leicht mit Hülfe der Schlussgleichungen (8) des vorigen Paragraphen geschieht. Die erste Gleichung (5) ergiebt nämlich direct

$$M_0 = f(0). \quad (6)$$

⁸Die Bedeutung dieser verallgemeinerten Binomialcoefficienten für die Entwicklung der Potenzen des Binoms gehört nicht hierher, sondern in die Analysis.

Multiplicirt man die erste Gleichung (5) mit $B_0^{(1)}$, die zweite mit $-B_1^{(1)}$ und addirt, so erhält man nach dem erwähnten Formelsystem (auf $n = 1$ angewandt)

$$-M_1 = B_0^{(1)} f(0) - B_1^{(1)} f(1),$$

und so allgemein, indem man die ν ersten Gleichungen (5) der Reihe nach mit

$$B_0^{(\nu)}, \quad -B_1^{(\nu)}, \quad +B_2^{(\nu)}, \quad \dots, \quad \pm B_\nu^{(\nu)}$$

multiplicirt und addirt,

$$\pm M_\nu = B_0^{(\nu)} f(0) - B_1^{(\nu)} f(1) + B_2^{(\nu)} f(2) - \dots \pm B_\nu^{(\nu)} f(\nu), \quad (7)$$

wodurch nach (4) die Function $f(x)$ bestimmt und die Aufgabe gelöst ist. Es ist klar, dass, so lange wir über die Werthe $f(0), f(1), \dots, f(n)$ keine besondere Voraussetzung machen, in dieser Form jede beliebige ganze rationale Function von x dargestellt werden kann.

§ 10. Lösung des Interpolationsproblems durch die Differenzen.

Die Definition der ganzen rationalen Function

$$B_\nu^{(x)} = \frac{x(x-1) \cdots (x-\nu+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots \nu} \quad (1)$$

giebt die früher schon für den speciellen Fall eines ganzen positiven x bewiesene Relation

$$B_\nu^{(x+1)} = B_\nu^{(x)} + B_{\nu-1}^{(x)}, \quad B_0^{(x+1)} = B_0^{(x)} = 1. \quad (2)$$

Daraus erhalten wir für die Coefficienten $M_0, M_1, \dots, M_n$ eine Bestimmungsweise, die für die praktische Rechnung viel bequemer ist, als die Anwendung der Formeln des vorigen Paragraphen.

Es ist nämlich nach den Formeln (4) und (6), § 9

$$f(x) = f(0) + M_1 B_1^{(x)} + M_2 B_2^{(x)} + \dots + M_n B_n^{(x)}, \quad (3)$$

und wenn wir darin x durch $x+1$ ersetzen und die Differenz

$$\Delta_x = f(x+1) - f(x) \quad (4)$$

bilden, mit Rücksicht auf (2),

$$\Delta_x = M_1 + M_2 B_1^{(x)} + M_3 B_2^{(x)} + \dots + M_n B_{n-1}^{(x)}, \quad (5)$$

woraus sich ergibt (da (5) eine Gleichung von derselben Art wie (3) ist, nur dass $n-1$ an Stelle von n getreten ist):

$$M_1 = \Delta_0 = f(1) - f(0).$$

Setzen wir

$$\Delta'_x = \Delta_{x+1} - \Delta_x, \quad \Delta''_x = \Delta'_{x+1} - \Delta'_x, \quad \dots, \quad (6)$$

so wird also hiernach

$$M_0 = f(0), \quad M_1 = \Delta_0, \quad M_2 = \Delta'_0, \quad \dots, \quad M_n = \Delta_0^{(n-1)},$$

und die Formel (3) ergibt

$$f(x) = f(0) + \Delta_0 B_1^{(x)} + \Delta'_0 B_2^{(x)} + \Delta''_0 B_3^{(x)} + \dots + \Delta_0^{(n-1)} B_n^{(x)}. \quad (7)$$

und ebenso kann man die Functionen $\Delta_x, \Delta'_x, \Delta''_x, \dots$ ausdrücken:

$$\begin{aligned}\Delta_x &= \Delta_0 + \Delta'_0 B_1^{(x)} + \Delta''_0 B_2^{(x)} + \dots + \Delta_0^{(n-1)} B_{n-1}^{(x)}, \\ \Delta'_x &= \Delta'_0 + \Delta''_0 B_1^{(x)} + \dots + \Delta_0^{(n-1)} B_{n-2}^{(x)}.\end{aligned}\tag{8}$$

Die $\Delta_x, \Delta'_x, \Delta''_x, \dots, \Delta_x^{(n-1)}$ sind ganze rationale Functionen der Grade $n-1, n-2, \dots, 0$, die letzte von ihnen also constant. Um sie alle darzustellen, braucht man nur die Werthe

$$f(0), \quad \Delta_0, \quad \Delta'_0, \quad \Delta''_0, \quad \dots, \quad \Delta_0^{(n-1)},$$

die man am leichtesten berechnet, wenn man eine Tabelle anlegt, die für den Fall $n = 3$ z. B. folgende Form haben würde:

$$\begin{array}{cccc} f(0) & & & \\ f(1) & \Delta_0 & & \\ f(2) & \Delta_1 & \Delta'_0 & \\ f(3) & \Delta_2 & \Delta'_1 & \Delta''_0 \end{array}$$

§ 11. Arithmetische Reihen höherer Ordnung.

Die vorstehenden Betrachtungen lassen sich noch in einer anderen Form aussprechen, die uns später von Nutzen sein wird. Ist

$$u_0, u_1, u_2, \dots \tag{1}$$

eine Reihe von Grössen, so nennen wir

$$\Delta_0 = u_1 - u_0, \Delta_1 = u_2 - u_1, \Delta_2 = u_3 - u_2, \dots \tag{2}$$

die Reihe ihrer Differenzen, mit

$$\Delta'_0 = \Delta_1 - \Delta_0, \Delta'_1 = \Delta_2 - \Delta_1, \dots \tag{3}$$

die Reihe ihrer zweiten Differenzen u. s. f.

Es ist klar, dass die Reihe (1) vollständig bestimmt ist, wenn ihr erstes Glied und die Reihe ihrer ersten Differenzen gegeben ist; denn es ist

$$u_1 = u_0 + \Delta_0, \quad u_2 = u_0 + \Delta_0 + \Delta_1, \quad \dots,$$

$$u_m = u_0 + \Delta_0 + \Delta_1 + \dots + \Delta_{m-1}.$$

Ebenso ist die Reihe (1) völlig bestimmt, wenn die beiden ersten Glieder und die Reihe ihrer zweiten Differenzen gegeben ist u. s. f. Die Reihe (1) wird eine arithmetische Reihe n ter Ordnung genannt, wenn die Reihe ihrer n ten Differenzen constant ist, also die Reihe der $(n+1)$ ten Differenzen aus lauter Nullen besteht.

Man erhält eine arithmetische Reihe n ter Ordnung, wenn man in einer ganzen Function n ten Grades $f(x)$ für x die Zahlen $0, 1, 2, 3, \dots$ einsetzt. Denn setzt man

$$\Delta_x = f(x+1) - f(x), \quad \Delta_x^{(n-1)} = \Delta_{x+1}^{(n-2)} - \Delta_x^{(n-2)},$$

so ist Δ_x vom $(n-1)$ ten, Δ'_x vom $(n-2)$ ten Grade in Bezug auf x und also $\Delta_x^{(n-1)}$ constant.

Ist nun

$$u_0, u_1, u_2, \dots$$

eine arithmetische Reihe n ter Ordnung, so ist die ganze Reihe vollständig bestimmt, wenn die n Werthe $u_0, u_1, u_2, \dots, u_{n-1}$ und ausserdem die constante n te Differenz gegeben sind. Diese letztere

ist aber bestimmt, wenn auch noch das $(n+1)$ te Glied u_n gegeben ist. Wir können also den Satz aussprechen:

Eine arithmetische Reihe n ter Ordnung ist vollständig bestimmt, wenn ihre $n+1$ ersten Glieder gegeben sind.

Da nun eine Function $f(x)$ vom n ten Grade gleichfalls durch die willkürlich gegebenen Werthe

$$f(0), f(1), f(2), \dots, f(n)$$

völlig bestimmt ist, so folgt, dass aus den ganzen rationalen Functionen n ten Grades $f(x)$ alle arithmetischen Reihen n ter Ordnung erzeugt werden, wenn man darin für x die Reihe der natürlichen Zahlen setzt.

Der Ausdruck des allgemeinen Gliedes ist dann durch die Formel (7) des vorigen Paragraphen gegeben.

Die Summen der $m+1$ ersten Glieder einer arithmetischen Reihe n ter Ordnung

$$s_m = u_0 + u_1 + \dots + u_m$$

bilden eine arithmetische Reihe $(n+1)$ ter Ordnung, da ihre ersten Differenzen

$$s_{m+1} - s_m = u_{m+1}$$

eine arithmetische Reihe n ter Ordnung bilden.

Es lässt sich also mit Hülfe der Formel (7) des § 10 die Summe s_m allgemein bestimmen, wenn man $s_0, s_1, \dots, s_{n+1}$ als bekannt annimmt.

Um die erzeugende Function $F(x)$ von s_m zu finden, wenn $f(x)$ die erzeugende Function von u_m ist, setzt man

$$F(0) = f(0), \quad F(1) = f(0) + f(1), \quad F(2) = f(0) + f(1) + f(2), \dots$$

und hat dann in der Formel (7), § 10,

$$F(x) = F(0) + D_0 B_1^{(x)} + D'_0 B_2^{(x)} + \dots$$

zu setzen

$$\begin{aligned} D_0 &= F(1) - F(0) = f(1), & D'_0 &= f(2) - f(1) = \Delta_1, \\ D_1 &= F(2) - F(1) = f(2), & D'_1 &= f(3) - f(2) = \Delta_2, \\ D_2 &= F(3) - F(2) = f(3), & D''_0 &= \Delta_2 - \Delta_1 = \Delta'_1. \end{aligned}$$

So erhält man

$$F(x) = f(0) + f(1)B_1^{(x)} + \Delta_1 B_2^{(x)} + \Delta'_1 B_3^{(x)} + \dots \quad (4)$$

Nehmen wir z. B. $f(x) = x^2$, so giebt uns $F(m)$ die Summe der m ersten Quadratzahlen. Es ist

$$\Delta_x = 2x + 1, \quad \Delta'_x = 2,$$

also

$$F(x) = x + 3 \frac{x(x-1)}{1 \cdot 2} + 2 \frac{x(x-1)(x-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{x(x+1)(2x+1)}{6}.$$

Für $f(x) = x^3$ ergibt dieselbe Rechnung

$$F(x) = \left(\frac{x(x+1)}{2} \right)^2.$$

Die Summe der m ersten Cuben ist also gleich dem Quadrat der m ten Trigonalzahl.

§ 12. Der polynomische Lehrsatz.

Im § 8 ist für den binomischen Lehrsatz die Form abgeleitet:

$$(x + y)^n = \Pi(n) \sum^{\alpha, \beta} \frac{x^\alpha y^\beta}{\Pi(\alpha)\Pi(\beta)}, \quad (1)$$

in der sich die Summe auf alle Combinationen zweier Zahlen α, β erstreckt, deren keine negativ ist und die der Bedingung

$$\alpha + \beta = n \quad (2)$$

genügen.

Diese Form gestattet, zunächst durch Induction, eine Verallgemeinerung auf die n te Potenz eines Polynoms:

$$(x + y + z + \dots)^n = \Pi(n) \sum^{\alpha, \beta, \gamma, \dots} \frac{x^\alpha y^\beta z^\gamma \dots}{\Pi(\alpha)\Pi(\beta)\Pi(\gamma) \dots}, \quad (3)$$

mit der Bestimmung, dass $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ alle positiven oder verschwindenden ganzzahligen Werthe durchlaufen, die der Bedingung

$$\alpha + \beta + \gamma + \dots = n \quad (4)$$

genügen. Um aber die Richtigkeit dieser Formel allgemein zu beweisen, nehmen wir an, sie sei bewiesen, wenn das Polynom ein Glied weniger enthält, wie sie es in der That ist, wenn das Polynom nur zwei Glieder enthält.

Wir setzen dann

$$u = y + z + \dots \quad (5)$$

und wenden auf $(x + u)$ die Formel (1) an, aus der sich ergibt:

$$(x + y + z + \dots)^n = \Pi(n) \sum^{\alpha, \nu} \frac{x^\alpha u^\nu}{\Pi(\alpha)\Pi(\nu)}, \quad (6)$$

mit der Beschränkung

$$\alpha + \nu = n. \quad (7)$$

Nun ist aber nach der Annahme schon bewiesen:

$$u^\nu = \Pi(\nu) \sum^{\beta, \gamma, \dots} \frac{y^\beta z^\gamma \dots}{\Pi(\beta)\Pi(\gamma) \dots}, \quad (8)$$

$$\beta + \gamma + \dots = \nu, \quad (9)$$

und wenn dies in (6) eingesetzt wird, so ergibt sich unmittelbar die Formel (3), und (7) geht in (4) über.

Die Coefficienten

$$P_{\alpha, \beta, \gamma, \dots}^{(n)} = \frac{\Pi(n)}{\Pi(\alpha)\Pi(\beta)\Pi(\gamma) \dots}, \quad (10)$$

die ihrer Bedeutung nach ganze Zahlen sind, heissen die Polynomialcoefficienten.

Beispielsweise erhält man für die dritte Potenz des Trinoms:

$$\begin{aligned} (x + y + z)^3 &= x^3 + y^3 + z^3 + 3x^2y + 3xy^2 + 3x^2z + 3xz^2 \\ &\quad + 3y^2z + 3yz^2 + 6xyz. \end{aligned} \quad (11)$$

Band I. Erster Abschnitt. Rationale Functionen.

§ 13. Derivirte Functionen.

Es sei

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n \quad (1)$$

eine ganze rationale Function n ter Ordnung.

Wenn wir darin x durch ein Binom $x + y$ ersetzen, so können wir auf jedes einzelne Glied den binomischen Lehrsatz anwenden, und können das Ergebniss nach fallenden oder nach steigenden Potenzen von x oder von y ordnen. Wir wollen die Ordnung nach steigenden Potenzen von y ausführen. Die höchste Potenz von y , die vorkommt, ist die n te, und der Coefficient der nullten Potenz von y ist die Function $f(x)$ selbst, wie man erkennt, wenn man $y = 0$ setzt. Wir setzen also, indem wir die anderen Coefficienten mit

$$f'(x), \quad \frac{f''(x)}{\Pi(2)}, \quad \frac{f'''(x)}{\Pi(3)}, \dots$$

bezeichnen:

$$f(x + y) = f(x) + yf'(x) + \frac{y^2}{1 \cdot 2}f''(x) + \cdots = \sum_{0, n}^{\nu} \frac{y^{\nu}}{\Pi(\nu)} f^{(\nu)}(x). \quad (2)$$

Die Functionen $f'(x), f''(x), f'''(x), \dots$ heissen die erste, zweite, dritte, ... Derivirte oder Abgeleitete von $f(x)$. Es sind ganze Functionen von x und $f^{(\nu)}(x)$ kann den Grad $n - \nu$ nicht übersteigen, da die Summe der Exponenten von x und y in keinem Gliede den Grad n übersteigt.

Die erste Derivirte, die also der Coefficient der ersten Potenz von y in der Entwicklung von $f(x + y)$ nach steigenden Potenzen von y ist, erhält man durch Anwendung des binomischen Lehrsatzes auf (1):

$$f'(x) = na_0x^{n-1} + (n-1)a_1x^{n-2} + (n-2)a_2x^{n-3} + \cdots. \quad (3)$$

Der Hauptsatz über die derivirten Functionen ergibt sich aus (2), wenn wir x in $x + z$ oder y in $y + z$ verwandeln:

$$f(x + y + z) = \sum_{0, n}^{\nu} \frac{y^{\nu}}{\Pi(\nu)} f^{(\nu)}(x + z) = \sum_{0, n}^{\nu} \frac{(y + z)^{\nu}}{\Pi(\nu)} f^{(\nu)}(x). \quad (4)$$

Bezeichnen wir mit $f^{(\nu, \mu)}(x)$ die μ te Derivirte von $f^{(\nu)}(x)$, so ist nach (2):

$$f^{(\nu)}(x + z) = \sum_{0, n-\nu}^{\mu} \frac{z^{\mu}}{\Pi(\mu)} f^{(\nu, \mu)}(x) \quad (5)$$

und nach dem binomischen Satz:

$$\frac{(y + z)^{\nu}}{\Pi(\nu)} = \sum_{\beta, \gamma}^{\beta, \gamma} \frac{y^{\beta} z^{\gamma}}{\Pi(\beta) \Pi(\gamma)}, \quad \beta + \gamma = \nu. \quad (6)$$

Setzen wir dies in (4) ein, so folgt:

$$\sum_{0, n}^{\nu} \sum_{0, n-\nu}^{\mu} \frac{y^{\nu} z^{\mu}}{\Pi(\nu) \Pi(\mu)} f^{(\nu, \mu)}(x) = \sum_{\beta, \gamma}^{\beta, \gamma} \frac{y^{\beta} z^{\gamma}}{\Pi(\beta) \Pi(\gamma)} f^{(\beta + \gamma)}(x). \quad (7)$$

Die letzte Summe ist über alle nicht negativen Zahlen β, γ zu erstrecken, deren Summe den Grad n von $f(x)$ nicht übersteigt. Dieselben Zahlencombinationen durchlaufen aber auch die Exponenten

ν, μ auf der linken Seite, und die Vergleichung der Coefficienten gleicher Potenzen und Producte ergiebt (nach § 1):

$$f^{(\nu, \mu)}(x) = f^{(\nu + \mu)}(x), \quad (8)$$

also den Satz:

Die μ te Derivirte von der ν ten Derivirten ist die $(\nu + \mu)$ te Derivirte der ursprünglichen Function.

Man erhält also die sämmtlichen höheren Derivirten, indem man nach der Regel (3) aus jeder vorangehenden die erste Derivirte bildet:

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} + \dots, \\ f'(x) &= na_0x^{n-1} + (n-1)a_1x^{n-2} + (n-2)a_2x^{n-3} + \dots, \\ f''(x) &= n(n-1)a_0x^{n-2} + (n-1)(n-2)a_1x^{n-3} + \dots. \end{aligned} \quad (9)$$

Eine etwas einfachere Form nehmen diese Derivirten an, wenn man sich einer anderen Bezeichnungsweise bedient, die häufig im Gebrauch und für gewisse Zwecke fast unentbehrlich ist, die wir im Anschluss hieran besprechen wollen.

Es liegt wegen der Unbestimmtheit der Coefficienten $a_0, a_1, \dots, a_n$ offenbar keine Beschränkung darin, wenn wir eine ganze rationale Function n ten Grades so darstellen:

$$f(x) = a_0x^n + B_1^{(n)}a_1x^{n-1} + B_2^{(n)}a_2x^{n-2} + \dots + a_n, \quad (10)$$

oder ausführlich:

$$f(x) = a_0x^n + na_1x^{n-1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}a_2x^{n-2} + \dots. \quad (11)$$

Wenn eine Function $f(x)$ so dargestellt ist, werden wir sagen, sie sei "mit den Binomialcoefficienten geschrieben".

Grössere Uebereinstimmung zeigen hierdurch bereits die Formeln (9), die dann so lauten:

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0x^n + na_1x^{n-1} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}a_2x^{n-2} + \dots, \\ \frac{1}{n}f'(x) &= a_0x^{n-1} + (n-1)a_1x^{n-2} + \frac{(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2}a_2x^{n-3} + \dots, \\ \frac{1}{n(n-1)}f''(x) &= a_0x^{n-2} + (n-2)a_1x^{n-3} + \frac{(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2}a_2x^{n-4} + \dots, \end{aligned} \quad (12)$$

worin die rechten Seiten alle auch mit den Binomialcoefficienten geschrieben erscheinen. Wir werden später den Nutzen dieser Bezeichnungsweise noch weiter kennen lernen, müssen aber schon hier hervorheben, dass die Wahl der einen oder anderen Darstellungsweise doch nicht ganz gleichgültig ist, die erste oft auch den Vorzug verdient. Besonders in den Fällen, wo die Coefficienten Zahlen sind und es auf das zahlentheoretische Verhalten dieser Coefficienten ankommt, darf man nicht ausser Acht lassen, dass durch die Binomialcoefficienten ein der Sache fremdes numerisches Element eingeführt wird. Dass Gauss in der Theorie der quadratischen Formen (in den Disq. ar.) die Schreibweise mit den Binomialcoefficienten anwendet, wenn er die quadratischen Formen durch $ax^2 + 2bxy + cy^2$ darstellt, und dass diese Bezeichnung allgemein Eingang gefunden hat, hat in der Zahlentheorie zu einer unnöthigen und sehr bedauerlichen Complication geführt.

§ 14. Derivirte eines Productes.

Die derivirten Functionen, die wir hier betrachtet haben, sind keine anderen als die aus der Differentialrechnung bekannten Differentialquotienten; wir haben den Begriff aber hier, wo es sich um ganze rationale Functionen handelt, ohne Anwendung der Infinitesimalrechnung gewonnen aus

den Entwicklungscoefficienten der Potenzen von y in der Function $f(x + y)$. Bezeichnen wir die ν te Ableitung von $f(x)$ mit $D_\nu f$, so ist nach (2), § 13:

$$f(x + y) = f(x) + yD_1f + \frac{y^2}{1 \cdot 2}D_2f + \frac{y^3}{1 \cdot 2 \cdot 3}D_3f + \cdots, \quad (1)$$

und daraus ergeben sich sofort die beiden Grundsätze, die sich in den Formeln

$$D_\nu(Cf) = CD_\nu f; \quad (2)$$

$$D_\nu(f + \varphi) = D_\nu f + D_\nu \varphi \quad (3)$$

ausdrücken, worin C eine Constante, φ eine zweite ganze rationale Function von x ist.

Eine Verallgemeinerung der Formel (2) giebt die Darstellung der Derivirten des Productes $f\varphi$. Setzt man nämlich nach (1) abkürzend

$$\begin{aligned} f(x + y) &= u_0 + yu_1 + y^2u_2 + \cdots + y^nu_n, \\ \varphi(x + y) &= v_0 + yv_1 + y^2v_2 + \cdots + y^mv_m, \end{aligned} \quad (4)$$

also

$$u_\nu = \frac{D_\nu f}{\Pi(\nu)}, \quad v_\nu = \frac{D_\nu \varphi}{\Pi(\nu)}, \quad (5)$$

so ergibt die Ausführung der Multiplication der beiden Formeln (4), wenn man in dem Product den Coefficienten von y^ν aufsucht:

$$\frac{D_\nu(f\varphi)}{\Pi(\nu)} = u_\nu v_0 + u_{\nu-1}v_1 + u_{\nu-2}v_2 + \cdots + u_0v_\nu, \quad (6)$$

oder

$$D_\nu(f\varphi) = \varphi D_\nu f + B_1^{(\nu)} D_{\nu-1} f D_1 \varphi + B_2^{(\nu)} D_{\nu-2} f D_2 \varphi + \cdots, \quad (7)$$

worin $B_1^{(\nu)}, B_2^{(\nu)}, \dots$ die Binomialcoefficienten sind. In ähnlicher Weise kann man unter Anwendung der Polynomialcoefficienten die Derivirten eines Productes von mehr als zwei Factoren bilden.

Wir wollen die erste Derivirte, die wir jetzt mit D statt mit D_1 bezeichnen, für ein Product von n Factoren danach bilden. Für zwei Factoren erhalten wir nach (7):

$$D(f\varphi) = \varphi Df + f D\varphi = \varphi f'(x) + f\varphi'(x)$$

und allgemein, wenn wir die Factoren mit $u_1, u_2, \dots, u_n$, die Derivirten mit $u'_1, u'_2, \dots, u'_n$ bezeichnen:

$$D(u_1 u_2 \cdots u_n) = u'_1 u_2 \cdots u_n + u_1 u'_2 \cdots u_n + \cdots + u_1 u_2 \cdots u'_n, \quad (8)$$

oder kürzer:

$$\frac{D(u_1 u_2 \cdots u_n)}{u_1 u_2 \cdots u_n} = \sum \frac{Du_\nu}{u_\nu}.$$

Wenn wir also ein Product aus linearen Factoren

$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n) \quad (9)$$

betrachten, so erhalten wir, da die ersten Derivirten von $x - \alpha_1, x - \alpha_2, \dots, x - \alpha_n$ sämmtlich gleich 1 sind,

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x - \alpha_2)(x - \alpha_3) \cdots (x - \alpha_n) \\ &\quad + (x - \alpha_1)(x - \alpha_3) \cdots (x - \alpha_n) + \cdots \\ &\quad + (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_{n-1}), \end{aligned} \quad (10)$$

wofür man auch setzen kann:

$$f'(x) = \frac{f(x)}{x - \alpha_1} + \frac{f(x)}{x - \alpha_2} + \cdots + \frac{f(x)}{x - \alpha_n}. \quad (11)$$

Ein sehr wichtiges Resultat ergibt sich hieraus, wenn x gleich einem der Werthe $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ gesetzt wird, nämlich

$$\begin{aligned} f'(\alpha_1) &= (\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_1 - \alpha_3) \cdots (\alpha_1 - \alpha_n), \\ f'(\alpha_2) &= (\alpha_2 - \alpha_1)(\alpha_2 - \alpha_3) \cdots (\alpha_2 - \alpha_n), \\ &\dots \\ f'(\alpha_n) &= (\alpha_n - \alpha_1)(\alpha_n - \alpha_2) \cdots (\alpha_n - \alpha_{n-1}). \end{aligned} \quad (12)$$

§ 15. Ganze Functionen mehrerer Veränderlichen: Formen.

Wir haben bisher vorzugsweise die ganzen rationalen Functionen von einer Veränderlichen betrachtet; wir können uns aber nicht immer darauf beschränken und haben ja auch schon oben Functionen mehrerer Veränderlichen benutzt. Unter einer ganzen rationalen Function n ten Grades mehrerer Veränderlichen $F(x, y, z, \dots)$ verstehen wir eine Summe von Gliedern:

$$\sum A_{\alpha, \beta, \gamma, \dots} x^\alpha y^\beta z^\gamma \cdots,$$

worin $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ ganzzahlige nicht negative Exponenten sind, deren Summe $\alpha + \beta + \gamma + \cdots$ den Werth n nicht übersteigt, und wenigstens in einem Gliede auch wirklich erreicht. Der Grad wird also bestimmt durch den grössten Werth, den die Summe $\alpha + \beta + \gamma + \cdots$ annimmt.

Wenn die Summe der Exponenten $\alpha + \beta + \gamma + \cdots$ in allen Gliedern denselben Werth hat, so heisst die Function homogen.

Eine fundamentale Eigenschaft der homogenen Functionen n ten Grades ist die, dass, wenn alle Variablen mit demselben Factor vervielfältigt werden, der Erfolg derselbe ist, wie wenn die Function mit der n ten Potenz vervielfältigt wird; in Zeichen, wenn t eine beliebige Veränderliche bedeutet:

$$F(tx, ty, tz, \dots) = t^n F(x, y, z, \dots); \quad (1)$$

denn ersetzt man in dem Product $x^\alpha y^\beta z^\gamma \cdots$ die Variablen durch $tx, ty, tz, \dots$, so erhält es den Factor

$$t^{\alpha + \beta + \gamma + \cdots};$$

hat nun $\alpha + \beta + \gamma + \cdots$ in allen Gliedern denselben Werth n , so kann der Factor t^n vor die Summe herausgenommen werden. Hat aber die Summe $\alpha + \beta + \gamma + \cdots$ in den einzelnen Gliedern verschiedene Werthe, so kann ein solcher gemeinschaftlicher Factor nicht herausgenommen werden, wenigstens nicht, ohne dass noch verschiedene Potenzen von t in den einzelnen Gliedern bleiben.

Durch Vermehrung der Veränderlichen kann man jede nicht homogene Function in eine homogene von gleichem Grade verwandeln. Ist nämlich $m - 1$ die Anzahl der Variablen in einer nicht homogenen Function n ten Grades, so setzen wir

$$x = \frac{x_1}{x_m}, \quad y = \frac{x_2}{x_m}, \quad z = \frac{x_3}{x_m}, \dots,$$

und erhalten in

$$x_m^n F\left(\frac{x_1}{x_m}, \frac{x_2}{x_m}, \frac{x_3}{x_m}, \dots\right)$$

eine ganze homogene Function n ten Grades der Variablen $x_1, x_2, \dots, x_m$, die wir mit

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_m)$$

bezeichnen.

Es empfiehlt sich bisweilen, die homogenen Functionen mehrerer Variablen mit den Polynomial-coefficienten zu schreiben. Wir setzen daher

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum \frac{\Pi(n)}{\Pi(\alpha_1)\Pi(\alpha_2) \cdots \Pi(\alpha_m)} A_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_m^{\alpha_m}, \quad (2)$$

wo sich die Summe auf alle nicht negativen, der Bedingung

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m = n \quad (3)$$

genügenden Zahlen erstreckt. Diese Bezeichnungsweise, ohne die Beschränkung (3), ist auch auf nicht homogene Functionen anwendbar.

Man kann aber die homogene Function auch so darstellen:

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum A_{\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n} x_{\nu_1} x_{\nu_2} \cdots x_{\nu_n}, \quad (4)$$

worin jeder der Indices $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n$ von den übrigen unabhängig die Werthreihe $1, 2, \dots, m$ zu durchlaufen hat. Die Summe (4) besteht also aus m^n Gliedern, die aber nicht alle von einander verschieden sind. Das Product $x_{\nu_1} x_{\nu_2} \cdots x_{\nu_n}$ bleibt nämlich ungeändert, wenn die Indices $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n$ beliebig unter einander permutirt werden. Die Anzahl der Permutationen von n Elementen beträgt aber $\Pi(n)$. Sind unter diesen Elementen je $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ einander gleich, so reducirt sich die Zahl der Permutationen auf

$$\frac{\Pi(n)}{\Pi(\alpha_1)\Pi(\alpha_2)\cdots},$$

woraus sich ergibt, dass in (4) irgend ein Product $x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots$ genau

$$\frac{\Pi(n)}{\Pi(\alpha_1)\Pi(\alpha_2)\cdots}$$

mal vorkommt. Setzt man also noch fest, dass $A_{\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n}$ sich nicht ändern soll, wenn die Indices beliebig permutirt werden, so erweisen sich die Bezeichnungsweisen (2) und (4) als identisch, wenn durch Zusammenfassen gleicher Factoren

$$x_{\nu_1} x_{\nu_2} \cdots x_{\nu_n} = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_m^{\alpha_m}$$

und

$$A_{\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n} = A_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m}$$

gesetzt wird.

Bezeichnen wir die Anzahl der Glieder, die in der Function Φ [nach (2)] auftreten, mit (m, n) , so findet man, indem man zunächst die Glieder zählt, die den Factor x_1 haben und dann die übrigen, die eine homogene Function n ter Ordnung von den übrigen $m - 1$ Variablen bilden, die Recursionsformel

$$(m, n) = (m, n - 1) + (m - 1, n), \quad (5)$$

mit deren Hülfe man durch vollständige Induction den Ausdruck

$$(m, n) = \frac{m(m+1) \cdots (m+n-1)}{1 \cdot 2 \cdots n} = \frac{\Pi(m+n-1)}{\Pi(n)\Pi(m-1)} \quad (6)$$

als richtig erweist.

Die ganzen homogenen Functionen werden auch Formen genannt. Man unterscheidet nach der Anzahl der Variablen unäre (einfache Potenzen), binäre, ternäre, quaternäre Formen. Die binären Formen sind es, die uns hier besonders interessiren, deren Theorie im Wesentlichen identisch ist mit der Theorie der ganzen rationalen Functionen einer Veränderlichen. Man gelangt von den binären Formen zu diesen Functionen zurück, wenn man eine der homogenen Variablen als constant ansieht, z. B. ihr den Werth 1 giebt.

§ 16. Die Derivirten von Functionen mehrerer Variablen.

Wir haben im § 13 die derivirten Functionen einer ganzen rationalen Function einer Veränderlichen definirt. Der Begriff lässt sich unmittelbar übertragen auf Functionen mehrerer Variablen, indem man die Ableitungen in Bezug auf jede Variable für sich, als ob sie die einzige wäre, bildet. So erhält man, wenn man etwa wie in § 15

$$F(x, y, z, \dots) = \sum A_{\alpha, \beta, \gamma, \dots} x^\alpha y^\beta z^\gamma \dots \quad (1)$$

setzt, die erste Derivirte nach x :

$$F'(x) = \sum \alpha A_{\alpha, \beta, \gamma, \dots} x^{\alpha-1} y^\beta z^\gamma \dots, \quad (2)$$

oder nach y :

$$F'(y) = \sum \beta A_{\alpha, \beta, \gamma, \dots} x^\alpha y^{\beta-1} z^\gamma \dots \quad (3)$$

u. s. f. Aus diesen Functionen kann man nach denselben Regeln wieder die Ableitungen nach den verschiedenen Variablen bilden und erhält so die höheren Ableitungen.

Um die Resultate übersichtlicher darzustellen, sei $\Phi(x_1, x_2, \dots, x_m)$ eine ganze rationale Function n ter Ordnung der m Veränderlichen $x_1, x_2, \dots, x_m$. Wir ersetzen diese Veränderlichen durch Binome:

$$x_1 + \xi_1, \quad x_2 + \xi_2, \dots, \quad x_m + \xi_m$$

und entwickeln in jedem Gliede der Function

$$\Phi(x_1 + \xi_1, x_2 + \xi_2, \dots, x_m + \xi_m) = \Phi(x + \xi)$$

durch Ausführung der Multiplication

$$(x_1 + \xi_1)^{\mu_1} (x_2 + \xi_2)^{\mu_2} \dots (x_m + \xi_m)^{\mu_m}$$

nach Potenzen von $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$. Fassen wir gleiche Potenzen und Producte der Variablen ξ je in ein Glied zusammen, so ergibt sich in der Bezeichnung (2) § 15 für $\Phi(x + \xi)$ eine Darstellung, die in der Differentialrechnung die Taylor'sche Entwicklung heisst:

$$\Phi(x + \xi) = \sum \frac{\xi_1^{\alpha_1} \xi_2^{\alpha_2} \dots \xi_m^{\alpha_m}}{\Pi(\alpha_1) \Pi(\alpha_2) \dots \Pi(\alpha_m)} D_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m} \Phi. \quad (4)$$

Die Coefficienten, die wir mit

$$D_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m} \Phi$$

bezeichnen, sind Functionen der Variablen x und heissen, wenn

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m = \nu$$

ist, die Derivirten ν ter Ordnung der Function Φ .

Man stellt sie auch nach der in der Differentialrechnung gebräuchlichen Bezeichnungsweise so dar:

$$D_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m} \Phi = \frac{\partial^\nu \Phi}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_m^{\alpha_m}}. \quad (5)$$

Das Bildungsgesetz der Derivirten lässt sich in folgende Sätze zusammenfassen, wobei wir der Kürze wegen die Indices bei dem Zeichen D weglassen.

I. Ist C eine Constante, so ist

$$D(C\Phi) = CD\Phi.$$

II. Sind Φ und Ψ irgend zwei Functionen, so ist

$$D(\Phi + \Psi) = D\Phi + D\Psi.$$

Beides folgt unmittelbar aus (4).

Wir können also leicht die derivirten Functionen allgemein bilden, wenn wir sie für den speciellen Fall kennen, in dem Φ ein Product von Potenzen ist, also wenn wir

$$D_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m}(x_1^{\mu_1} x_2^{\mu_2} \cdots x_m^{\mu_m})$$

kennen, worin die μ beliebige, nicht negative Exponenten sind.

Nun ist aber

$$(x_1 + \xi_1)^{\mu_1} = \sum_{\alpha_1}^{\mu_1} \frac{\Pi(\mu_1)}{\Pi(\alpha_1)\Pi(\mu_1 - \alpha_1)} \xi_1^{\alpha_1} x_1^{\mu_1 - \alpha_1}$$

und folglich:

$$\begin{aligned} & (x_1 + \xi_1)^{\mu_1} \cdots (x_m + \xi_m)^{\mu_m} \\ &= \sum_{\alpha_1 \dots \alpha_m} \frac{\Pi(\mu_1) \cdots \Pi(\mu_m) x_1^{\mu_1 - \alpha_1} \cdots x_m^{\mu_m - \alpha_m}}{\Pi(\mu_1 - \alpha_1) \cdots \Pi(\mu_m - \alpha_m) \Pi(\alpha_1) \cdots \Pi(\alpha_m)} \xi_1^{\alpha_1} \cdots \xi_m^{\alpha_m}. \end{aligned} \quad (6)$$

und es ergibt also die Vergleichung mit (4) und (6)

$$\begin{aligned} & D_{\alpha_1, \dots, \alpha_m}(x_1^{\mu_1} \cdots x_m^{\mu_m}) \\ &= \frac{\Pi(\mu_1) \cdots \Pi(\mu_m)}{\Pi(\mu_1 - \alpha_1) \cdots \Pi(\mu_m - \alpha_m)} x_1^{\mu_1 - \alpha_1} \cdots x_m^{\mu_m - \alpha_m}, \end{aligned} \quad (7)$$

so lange $\alpha_1 \leq \mu_1, \dots, \alpha_m \leq \mu_m$. Dagegen ist

$$D_{\alpha_1, \dots, \alpha_m}(x_1^{\mu_1} \cdots x_m^{\mu_m}) = 0, \quad (8)$$

sobald einer der Indices α grösser ist als der entsprechende Exponent μ .

Bezeichnen wir nun mit $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ ein zweites System von Indices, und bilden von der Function (7) die Ableitung $D_{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m}$, so ergibt sich durch nochmalige Anwendung derselben Formeln (7) und (8):

$$D_{\beta_1, \dots, \beta_m} D_{\alpha_1, \dots, \alpha_m}(x_1^{\mu_1} \cdots x_m^{\mu_m}) = D_{\beta_1 + \alpha_1, \dots, \beta_m + \alpha_m}(x_1^{\mu_1} \cdots x_m^{\mu_m}), \quad (9)$$

und daraus folgt nach II. die allgemeine Gültigkeit des Satzes

$$\text{III.} \quad D_{\beta_1, \dots, \beta_m} D_{\alpha_1, \dots, \alpha_m} \Phi = D_{\beta_1 + \alpha_1, \dots, \beta_m + \alpha_m} \Phi,$$

was eine Verallgemeinerung des Satzes (8), § 13 ist, und man kann also die höheren Derivirten durch fortgesetzte Ableitung der niederen bilden.

Für die ersten Derivirten einer Function Φ

$$D_{1,0,\dots,0}\Phi, \quad D_{0,1,\dots,0}\Phi, \dots, D_{0,0,\dots,1}\Phi$$

brauchen wir auch die kürzeren Zeichen

$$\Phi'(x_1), \quad \Phi'(x_2), \dots, \Phi'(x_m),$$

ebenso für die zweiten

$$D_{2,0,\dots,0}, \quad D_{1,1,\dots,0}, \dots$$

die Zeichen

$$\Phi''(x_1, x_1), \quad \Phi''(x_1, x_2) = \Phi''(x_2, x_1), \dots$$

Auch diese Bezeichnung lässt sich verallgemeinern und würde zu einem der Formel (4), § 15 entsprechenden Ausdruck führen.

Wir erwähnen des häufigen Gebrauches wegen die Formeln für die quadratischen Formen besonders. Setzen wir

$$\Phi(x) = \sum a_{i,k} x_i x_k, \quad (10)$$

worin i, k von einander unabhängig die Reihe der Zahlen $1, 2, \dots, m$ durchlaufen und $a_{i,k} = a_{k,i}$ ist, so ist:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \Phi'(x_1) &= a_{1,1} x_1 + a_{1,2} x_2 + \dots + a_{1,m} x_m, \\ \frac{1}{2} \Phi'(x_2) &= a_{2,1} x_1 + a_{2,2} x_2 + \dots + a_{2,m} x_m, \\ &\dots \\ \frac{1}{2} \Phi'(x_m) &= a_{m,1} x_1 + a_{m,2} x_2 + \dots + a_{m,m} x_m, \end{aligned} \quad (11)$$

und wir setzen noch

$$\Phi(x, \xi) = \Phi(\xi, x) = \sum \xi_i \Phi'(x_i) = \sum x_i \Phi'(\xi_i). \quad (12)$$

Dann ist

$$\Phi(x + \xi) = \Phi(x) + \Phi(x, \xi) + \Phi(\xi). \quad (13)$$

Die Function $\Phi(x, \xi)$ wird die Polare von Φ genannt. Sie ist linear und homogen sowohl in Beziehung auf die x , wie in Beziehung auf die ξ .

Sie kann ausgedrückt werden durch

$$\Phi(x, \xi) = 2 \sum a_{ik} \xi_i x_k \quad (14)$$

und genügt der Bedingung

$$\Phi(x, x) = 2\Phi(x). \quad (15)$$

§ 17. Das Euler'sche Theorem über homogene Functionen.

Aus den vorstehenden Entwicklungen lässt sich mit Leichtigkeit ein Fundamentalsatz über homogene Functionen herleiten, der von Euler entdeckt und nach ihm benannt ist.

Wir erhalten ihn am einfachsten aus der Formel (4) des vorigen Paragraphen, wenn wir mit t eine beliebige Veränderliche bezeichnen,

$$\xi_1 = tx_1, \quad \xi_2 = tx_2, \dots, \quad \xi_m = tx_m \quad (1)$$

setzen und dann die Fundamentalformel § 15 (1) für die homogenen Functionen anwenden. Wir erhalten so zunächst:

$$(1+t)^n \Phi(x) = \sum \frac{(tx_1)^{\alpha_1} (tx_2)^{\alpha_2} \dots (tx_m)^{\alpha_m}}{\Pi(\alpha_1) \Pi(\alpha_2) \dots \Pi(\alpha_m)} D_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m} \Phi. \quad (2)$$

Wendet man auf der linken Seite von (2) den binomischen Satz an, und setzt dann die Coefficienten gleich hoher Potenzen von t beiderseits einander gleich, so ergibt sich für jedes $\nu = 1, 2, \dots, n$:

$$\frac{\Pi(n)}{\Pi(n-\nu)} \Phi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum \frac{\Pi(\nu)}{\Pi(\alpha_1) \Pi(\alpha_2) \dots \Pi(\alpha_m)} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \dots x_m^{\alpha_m} D_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m} \Phi, \quad (3)$$

worin sich die Summe auf alle der Bedingung

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m = \nu \quad (4)$$

genügenden Werthsysteme der α erstreckt.

In dieser Form ist das zu erweisende Theorem in seiner Allgemeinheit enthalten. Für den besonderen Fall $\nu = 1$ erhalten wir die Formel

$$n\Phi(x_1, x_2, \dots, x_m) = x_1 \Phi'(x_1) + x_2 \Phi'(x_2) + \dots + x_m \Phi'(x_m), \quad (5)$$

wovon die Formel (15) des vorigen Paragraphen ein specieller Fall ist, und für $\nu = 2$:

$$n(n-1)\Phi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum_{i,k}^m x_i x_k \Phi''(x_i, x_k), \quad (6)$$

worin die Summe von $i = 1$ bis $i = m$ und von $k = 1$ bis $k = m$ zu erstrecken ist, so dass jedes Glied mit ungleichen i, k zweimal in der Summe auftritt.

Setzen wir, wenn die α der Bedingung (4) unterworfen sind,

$$\Phi_\nu(\xi, x) = \sum \frac{\xi_1^{\alpha_1} \xi_2^{\alpha_2} \dots \xi_m^{\alpha_m}}{\Pi(\alpha_1) \Pi(\alpha_2) \dots \Pi(\alpha_m)} D_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m} \Phi, \quad (7)$$

so ist nach (4) des § 16:

$$\Phi(x + \xi) = \Phi(x) + \Phi_1(x, \xi) + \Phi_2(x, \xi) + \dots + \Phi_n(x, \xi), \quad (8)$$

und da die linke Seite ungeändert bleibt, wenn x mit ξ vertauscht wird, so ergibt sich die Relation:

$$\Phi_{n-\nu}(x, \xi) = \Phi_\nu(\xi, x), \quad (9)$$

also insbesondere

$$\Phi_n(x, \xi) = \Phi(\xi). \quad (10)$$

Die Function $\Phi_\nu(x, \xi)$ wird, als Function von x betrachtet, die ν te Polare der Function Φ für das Werthsystem ξ genannt.

Wir wollen die Formel (3) noch für den Fall einer binären Form ($m = 2$) specialisiren. Wir bezeichnen die Variablen mit x, y und setzen zur Abkürzung:

$$\Phi(x, y) = u, \quad D_{h, \nu-h} \Phi = u_h$$

und erhalten aus (4):

$$\frac{\Pi(n)}{\Pi(n-\nu)} u = \sum_{0, \nu}^h \frac{\Pi(\nu)}{\Pi(h) \Pi(\nu-h)} u_h x^h y^{\nu-h}, \quad (9)$$

worin ν jeden beliebigen Werth, der nicht grösser als n ist, annehmen kann.

Zweiter Abschnitt.
Determinanten.

§ 18. Permutationen von n Elementen.

Wir betrachten ein System von n unterschiedenen Elementen irgend welcher Art, z. B. die n Ziffern

$$1, 2, 3, \dots, n,$$

deren Complex in dieser bestimmten Anordnung wir mit $\mathfrak{A}$ bezeichnen wollen. Die Elemente von $\mathfrak{A}$ lassen sich auf verschiedene Arten anordnen, z. B.

$$2, 1, 3, \dots, n.$$

Der Uebergang von einer Anordnung zu einer anderen heisst eine Permutation.

Bezeichnen wir die Anzahl der verschiedenen Anordnungen, die nur von der Anzahl n der Elemente abhängen kann, mit $\Pi(n)$, so ergibt sich zunächst

$$\Pi(1) = 1, \quad \Pi(2) = 2,$$

und um die Zahl allgemein zu bestimmen, denken wir uns zu $n - 1$ Elementen ein n tes hinzugefügt. In jeder Anordnung der $n - 1$ Elemente kann nun das n te Element an n verschiedene Stellen gesetzt werden, nämlich vor das erste, zwischen das erste und zweite, zwischen das zweite und dritte u. s. f., endlich nach dem $(n - 1)$ ten, und alle die so entstandenen Anordnungen sind von einander verschieden. Daraus folgt:

$$\Pi(n) = n\Pi(n - 1), \tag{1}$$

woraus sich durch vollständige Induction

$$\Pi(n) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n \tag{2}$$

ergibt, so dass das Zeichen $\Pi(n)$ hier dieselbe Bedeutung hat, wie im ersten Abschnitt (§ 7).

Irgend eine Anordnung des Systems $\mathfrak{A}$ bezeichnen wir mit $\mathfrak{A}'$, oder ausführlicher, wenn $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ die Ziffern $1, 2, \dots, n$ in irgend einer Reihenfolge bedeuten, mit

$$\mathfrak{A}' = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n. \tag{3}$$

Man kann auf sehr verschiedene Arten aus einer Anordnung eine beliebige andere ableiten, d. h. eine Permutation ausführen. Unter den verschiedenen Möglichkeiten sind für uns die durch sogenannte Transpositionen, d. h. durch successive Vertauschung von nur zwei Elementen ausgeführten, von besonderem Interesse. Durch mehrere, nach einander ausgeführte Transpositionen lässt sich aus jeder Anordnung, z. B. aus $\mathfrak{A}$, jede andere $\mathfrak{A}'$ herleiten. Man kann zu diesem Zweck etwa so verfahren, dass man in $\mathfrak{A}$ zunächst das Element 1 mit dem, was in $\mathfrak{A}'$ an erster Stelle steht, also mit α_1 , vertauscht (falls nicht $\alpha_1 = 1$ ist), dann, wenn α_2 nicht schon $= 2$ ist, 2 mit α_2 u. s. f.

Um z. B. von $(1, 2, 3, 4)$ zu $(4, 3, 2, 1)$ zu gelangen, bildet man die Anordnungen

$$(1, 2, 3, 4), \quad (4, 2, 3, 1), \quad (4, 3, 2, 1).$$

Bezeichnen wir eine Transposition kurz durch die beiden vertauschten Ziffern, also die Vertauschung von 1 mit 2 durch $(1, 2)$, so haben wir hier nach einander die Transpositionen

$$(1, 4), \quad (2, 3)$$

ausgeführt.

Es ist zu bemerken, dass der Uebergang von einer Anordnung zu einer bestimmten anderen auf unendlich viele verschiedene Arten durch auf einander folgende Transpositionen erreicht werden kann. So geht die Anordnung $(1, 2, 3, 4)$ auch durch die Transpositionen

$$(1, 2), \quad (1, 3), \quad (2, 4), \quad (1, 2)$$

in $(4, 3, 2, 1)$ über.

§ 19. Permutationen erster und zweiter Art.

Die $\Pi(n)$ Anordnungen von n Elementen lassen sich nach folgendem Gesichtspunkte in zwei Arten zerlegen.

Aus den n Elementen unseres Systems lassen sich

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

und nicht mehr Paare bilden. Wir wollen nun den n Elementen $1, 2, \dots, n$ in bestimmter Weise n reelle Zahlwerthe $a_1, a_2, \dots, a_n$ zuordnen, und aus diesen Zahlwerthen die $\frac{n(n-1)}{2}$ Differenzen

$$a_1 - a_2, \quad a_1 - a_3, \dots$$

bilden, wobei der niedrigere Index dem Minuenden angehören soll. Das Differenzenproduct

$$P = (a_1 - a_2)(a_1 - a_3) \cdots (a_1 - a_n)(a_2 - a_3) \cdots (a_2 - a_n) \cdots (a_{n-1} - a_n) \quad (1)$$

wird, wenn die $a_1, a_2, \dots, a_n$ von einander verschiedene Zahlwerthe sind, einen von Null verschiedenen Werth haben, z. B. einen positiven, wenn $a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n$ angenommen war.

Wenn wir nun die Indices $1, 2, 3, \dots, n$ irgendwie unter einander vertauschen, also etwa von $\mathfrak{A}$ zu $\mathfrak{A}'$ übergehen, so geht P in

$$\begin{aligned} P' = & (a_{\alpha_1} - a_{\alpha_2})(a_{\alpha_1} - a_{\alpha_3}) \cdots (a_{\alpha_1} - a_{\alpha_n}) \\ & \cdot (a_{\alpha_2} - a_{\alpha_3}) \cdots (a_{\alpha_2} - a_{\alpha_n}) \cdots (a_{\alpha_{n-1}} - a_{\alpha_n}) \end{aligned} \quad (2)$$

über, und dies Product besteht, abgesehen vom Vorzeichen, aus denselben Factoren wie P , d. h. es ist P' entweder gleich P oder entgegengesetzt zu P .

I. Wir rechnen nun die Anordnung $\mathfrak{A}'$ und also auch die Permutation, die $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{A}'$ verwandelt, zur ersten oder zur zweiten Art, je nachdem P mit P' gleich oder entgegengesetzt ist, so dass $\mathfrak{A}$ selbst zur ersten Art gehört.

II. Durch eine einfache Transposition (h, k) , worin h, k irgend zwei der Ziffern $1, 2, \dots, n$ bezeichnen, ändert sowohl P als P' sein Vorzeichen.

Denn die Factoren, die h und k gar nicht enthalten, werden durch diese Transposition nicht berührt; dann haben wir in P und P' den Factor $\pm(a_h - a_k)$ und die Factorenpaare

$$\pm(a_h - a_\nu)(a_k - a_\nu),$$

wo ν die Reihe der Zahlen $1, 2, \dots, n$, mit Ausnahme von h, k , durchläuft. Der erstere Factor ändert aber sein Zeichen, während das Factorenpaar ungeändert bleibt bei der Transposition (h, k) . Daraus folgt:

III. Die Permutationen der ersten Art sind aus einer geraden Anzahl von Transpositionen zusammengesetzt, und die der zweiten Art aus einer ungeraden Anzahl.

Zu der ersten Art ist dann auch die sogenannte identische Permutation zu rechnen, die $\mathfrak{A}$ ungeändert lässt.

Daraus ergibt sich noch die Folgerung: Auf wie verschiedenen Wegen man auch $\mathfrak{A}'$ aus $\mathfrak{A}$ durch Transpositionen ableiten mag, die Anzahl dieser Transpositionen ist bei allen diesen Arten übereinstimmend gerade oder ungerade (je nachdem $\mathfrak{A}'$ zur ersten oder zur zweiten Art gehört).

Wenn wir in den sämtlichen Anordnungen

$$\mathfrak{A}, \mathfrak{A}', \mathfrak{A}'', \dots$$

der n Elemente eine Transposition, etwa $(1, 2)$, vornehmen, so geht jede dieser Anordnungen in eine bestimmte andere über, etwa $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A}'$ in $\mathfrak{B}'$, $\mathfrak{A}''$ in $\mathfrak{B}''$, und wenn wir dieselbe Transposition noch einmal wiederholen, so geht $\mathfrak{B}$ wieder in $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}'$ wieder in $\mathfrak{A}'$ u. s. f. über. Daraus folgt, dass die

Anordnungen $\mathfrak{B}, \mathfrak{B}', \mathfrak{B}'', \dots$ alle von einander verschieden sind und folglich in ihrer Gesamtheit mit der Gesamtheit der $\mathfrak{A}$ übereinstimmen. Da nun, wie wir oben gesehen haben, die sämtlichen Differenzenproducte

$$P, P', P'', \dots$$

die aus P mit den verschiedenen Anordnungen $\mathfrak{A}, \mathfrak{A}', \mathfrak{A}'', \dots$ gebildet sind, durch eine Transposition das Zeichen ändern, so folgt, dass jedem $\mathfrak{A}$ der ersten Art ein $\mathfrak{B}$ der zweiten Art entspricht und jedem $\mathfrak{A}$ der zweiten Art ein $\mathfrak{B}$ der ersten Art.

IV. Hiernach ist die Anzahl der Anordnungen der ersten Art ebenso gross, wie die Anzahl der Anordnungen der zweiten Art, nämlich

$$\frac{1}{2}\Pi(n).$$

Für $n = 3$ haben wir die folgenden sechs Anordnungen, von denen die erste Horizontalreihe die erste Art bildet:

$$\begin{array}{lll} (1, 2, 3), & (2, 3, 1), & (3, 1, 2), \\ (3, 2, 1), & (2, 1, 3), & (1, 3, 2). \end{array}$$

Diese Sätze sind hier aus der Betrachtung des Productes P , also einer Zahlgrösse, gewonnen. Wie man ohne Benutzung einer solchen Function zu denselben Ergebnissen gelangen kann, werden wir im XIV. Abschnitt sehen.

§ 20. Determinanten.

Wir betrachten jetzt ein System von n^2 beliebigen Grössen, mit denen die rationalen Rechenoperationen ausgeführt werden können. Zu einer einfachen Bezeichnung dieser Grössen wählen wir einen Buchstaben mit einem doppelten Index $a_i^{(k)}$, worin i sowohl als k die Reihe der Ziffern $1, 2, 3, \dots, n$ durchlaufen soll. Zur besseren Uebersicht ordnen wir diese Grössen in ein Quadrat, so dass alle a mit demselben oberen Index in einer Horizontalreihe, alle a mit demselben unteren Index in einer Verticalreihe stehen, und bezeichnen dies Quadrat mit Δ , also:

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & a_3^{(1)} & \cdots & a_n^{(1)} \\ a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & a_3^{(2)} & \cdots & a_n^{(2)} \\ a_1^{(3)} & a_2^{(3)} & a_3^{(3)} & \cdots & a_n^{(3)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{(n)} & a_2^{(n)} & a_3^{(n)} & \cdots & a_n^{(n)} \end{vmatrix}. \quad (1)$$

Der Kürze halber nennt man die Horizontalreihen Zeilen, die Verticalreihen Columnen.

Wir wollen aber unter dem zwischen verticalen Strichen eingeschlossenen Quadrat nicht nur den Complex der Grössen a verstehen, sondern eine bestimmte arithmetische Verbindung dieser Grössen, die sich ausrechnen lässt, sobald die a numerisch gegeben sind, und die wir jetzt beschreiben wollen.

Man bilde das Product der in der von links oben nach rechts unten gehenden Diagonale stehenden Glieder:

$$M = a_1^{(1)} a_2^{(2)} a_3^{(3)} \cdots a_n^{(n)}; \quad (2)$$

leite daraus $\Pi(n)$ Producte $M, M', M'', \dots$ her, indem man die unteren Indices permutirt, und gebe jedem so entstandenen Product das positive oder negative Zeichen, je nachdem die angewandte Permutation zur ersten oder zur zweiten Art gehört, also nach der Bezeichnung des vorigen Paragraphen

$$M' = \pm a_{\alpha_1}^{(1)} a_{\alpha_2}^{(2)} \cdots a_{\alpha_n}^{(n)}. \quad (3)$$

Die Summe aus diesen Producten soll Δ sein. Δ wird die Determinante der n^2 Elemente $a_i^{(k)}$ genannt, und zwar, wenn die Unterscheidung nothwendig ist, eine n -reihige Determinante (auch

Determinante n ten Grades oder n ter Ordnung). Das Glied M dieser Summe, d. h. also das Product aller in der Diagonale des Quadrats stehenden Elemente, wird das Hauptglied genannt.

Nehmen wir z. B. $n = 2$, so erhalten wir

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} \\ a_1^{(2)} & a_2^{(2)} \end{vmatrix} = a_1^{(1)} a_2^{(2)} - a_2^{(1)} a_1^{(2)}, \quad (4)$$

und für $n = 3$:

$$\begin{aligned} \Delta = & a_1^{(1)} a_2^{(2)} a_3^{(3)} + a_2^{(1)} a_3^{(2)} a_1^{(3)} + a_3^{(1)} a_1^{(2)} a_2^{(3)} \\ & - a_1^{(1)} a_3^{(2)} a_2^{(3)} - a_2^{(1)} a_1^{(2)} a_3^{(3)} - a_3^{(1)} a_2^{(2)} a_1^{(3)}. \end{aligned} \quad (5)$$

Oder in anderer Bezeichnung:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix} = ab'c'' + bc'a'' + ca'b'' - ac'b'' - ba'c'' - cb'a''. \quad (6)$$

§ 21. Hauptsätze über Determinanten.

Aus dem Begriff der Determinante ergeben sich leicht die ersten Sätze, die für die Anwendung geeignet sind.

Wenn wir in dem Product

$$M' = \pm a_{\alpha_1}^{(1)} a_{\alpha_2}^{(2)} \cdots a_{\alpha_n}^{(n)} \quad (1)$$

die Factoren umstellen, so ändert sich sein Werth nicht. Wir können also die Factoren auch so anordnen, dass die unteren Indices in ihrer natürlichen Reihenfolge $1, 2, \dots, n$ erscheinen. Dabei werden dann die oberen Indices in einer gewissen Weise permutirt erscheinen, also M' die Form erhalten:

$$\pm a_1^{(\beta_1)} a_2^{(\beta_2)} \cdots a_n^{(\beta_n)}, \quad (2)$$

worin

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = \mathfrak{B}$$

ebenso wie $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ eine Anordnung der Ziffern $1, 2, \dots, n$ bedeutet. Man kann die Anordnung $\mathfrak{B}$ dadurch erhalten, dass man in den Factoren von M' die Transpositionen, die zu $\mathfrak{A}$ geführt haben, von der letzten anfangend, rückgängig macht, um in der Reihe der unteren Indices wieder die ursprüngliche Anordnung zu erhalten. Die dabei sich ergebende Reihenfolge der oberen Indices ist dann die Anordnung $\mathfrak{B}$. Es folgt daraus, dass $\mathfrak{B}$ zur ersten oder zur zweiten Art gehört, je nachdem $\mathfrak{A}$ zur ersten oder zur zweiten Art gehört, da beide durch die gleiche Anzahl von Transpositionen entstehen. Die Gesammtheit der $\mathfrak{B}$ stellt ebenso wie die Gesammtheit der $\mathfrak{A}$ alle Permutationen der n Elemente dar, da zwei verschiedene $\mathfrak{A}$ niemals zu demselben $\mathfrak{B}$ führen können. Damit ist bewiesen:

I. Die Determinante Δ kann auch dadurch gebildet werden, dass man in dem Hauptglied $a_1^{(1)} a_2^{(2)} \cdots a_n^{(n)}$ die oberen Indices auf alle möglichen Arten permutirt, jedem der so gebildeten Producte das positive oder negative Zeichen giebt, je nachdem die angewandte Permutation zur ersten oder zweiten Art gehört, und dann die Summe aller dieser Producte nimmt.

In der Darstellung von Δ werden durch die oberen Indices die Zeilen, durch die unteren Indices die Colonnen gekennzeichnet, und demnach können wir diesem Satze auch den folgenden Ausdruck geben:

II. Eine Determinante ändert sich nicht, wenn die Zeilen zu Colonnen und die Colonnen zu Zeilen gemacht werden.

Wenn wir in den sämtlichen Anordnungen $\mathfrak{A}, \mathfrak{A}', \mathfrak{A}'', \dots$ der n Elemente irgend zwei Elemente mit einander vertauschen, so bleibt die Gesammtheit dieser Anordnungen ungeändert, aber es

geht jede Anordnung erster Art in eine Anordnung zweiter Art über und umgekehrt. Wenn wir also in den Gliedern $M, M', M'', \dots$, aus denen Δ zusammengesetzt ist, irgend zwei untere Indices vertauschen, so geht jedes Glied mit positivem Zeichen in ein anderes über, das in Δ mit dem negativen Zeichen behaftet war und umgekehrt, also es ändert Δ sein Vorzeichen. Daraus folgt mit Hülfe von II. der Satz:

III. Wenn man in Δ zwei untere oder zwei obere Indices mit einander vertauscht, so ändert die Determinante nur ihr Vorzeichen.

Etwas anders ausgedrückt: wenn man zwei Zeilen oder zwei Columnen mit einander vertauscht, so ändert die Determinante nur ihr Vorzeichen; und daraus allgemeiner:

IV. Wenn in einer Determinante die Zeilen oder die Columnen permutirt werden, so ändert sich der absolute Werth nicht, und das Vorzeichen ändert sich nicht oder geht in das entgegengesetzte über, je nachdem die angewandte Permutation zur ersten oder zweiten Art gehört.

Aus III. erhält man den folgenden Fundamentalsatz:

V. Wenn in zwei Zeilen oder in zwei Columnen die an gleicher Stelle stehenden Glieder einander gleich sind (kürzer ausgedrückt: wenn zwei Reihen einander gleich sind), so hat die Determinante den Werth Null.

Denn die Vertauschung der zwei Reihen ändert nach III. das Zeichen, kann aber andererseits, da beide Reihen identisch sind, nichts ändern, so dass für Δ nur der Werth Null übrig bleibt.

Man drückt den Satz V. nur anders aus, wenn man sagt:

VI. Man erhält eine verschwindende Determinante, wenn man die Elemente einer Reihe durch die entsprechenden Elemente einer anderen Reihe, oder, kurz gesagt, wenn man einen unteren oder oberen Index durch einen anderen ersetzt.

§ 22. Unterdeterminanten.

In jedem Gliede der entwickelten Determinante

$$\sum \pm a_{\alpha_1}^{(1)} a_{\alpha_2}^{(2)} \cdots a_{\alpha_n}^{(n)},$$

deren Werth wir jetzt mit A bezeichnen wollen, kommt jede der Zahlen $1, 2, \dots, n$ ein und nur einmal als unterer Index vor. Es wird also ein gewisser Complex von Gliedern den Factor $a_1^{(1)}$ enthalten, ein anderer Complex den Factor $a_1^{(2)}$ u. s. f., endlich ein Complex den Factor $a_1^{(n)}$; jedes Glied der Determinante kommt in einem und nur in einem dieser Complexe vor.

Bezeichnen wir also den ersten dieser Complexe mit $a_1^{(1)} A_1^{(1)}$, den zweiten mit $a_1^{(2)} A_1^{(2)}$, den letzten mit $a_1^{(n)} A_1^{(n)}$, so können wir die Determinante folgendermaassen darstellen:

$$A = a_1^{(1)} A_1^{(1)} + a_1^{(2)} A_1^{(2)} + \cdots + a_1^{(n)} A_1^{(n)}. \quad (1)$$

An Stelle des unteren Index 1 hätten wir ebenso gut jeden anderen, r , herausgreifen und daher

$$A = a_r^{(1)} A_r^{(1)} + a_r^{(2)} A_r^{(2)} + \cdots + a_r^{(n)} A_r^{(n)} \quad (2)$$

setzen können. Darin bedeutet das Product $a_r^{(\nu)} A_r^{(\nu)}$ den Complex aller Glieder der Determinante, die den Factor $a_r^{(\nu)}$ enthalten.

Da dieselben Regeln wie für die unteren so auch für die oberen Indices gelten, so kann man die Determinante auch noch in der folgenden Weise schreiben:

$$A = a_1^{(\mu)} A_1^{(\mu)} + a_2^{(\mu)} A_2^{(\mu)} + \cdots + a_n^{(\mu)} A_n^{(\mu)}, \quad (3)$$

worin μ gleichfalls jeden der Indices $1, 2, \dots, n$ bedeuten kann.

Die hierdurch vollständig definirten Grössen $A_r^{(\nu)}$ heissen die Unterdeterminanten der Determinante A . Um ihre Bildungsweise genau kennen zu lernen, betrachten wir zunächst den Complex $a_1^{(1)} A_1^{(1)}$. Man erhält ihn, wenn man in dem Product

$$a_1^{(1)} a_2^{(2)} \cdots a_n^{(n)}$$

den unteren Index 1 ungeändert lässt und nur die übrigen Indices $2, 3, \dots, n$ auf alle Arten permutirt und die Summe der entstandenen Glieder mit Rücksicht auf die Zeichenregel bildet, d. h. es ist $A_1^{(1)}$ die $(n-1)$ -reihige Determinante:

$$A_1^{(1)} = \begin{vmatrix} a_2^{(2)} & a_3^{(2)} & \cdots & a_n^{(2)} \\ a_2^{(3)} & a_3^{(3)} & \cdots & a_n^{(3)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2^{(n)} & a_3^{(n)} & \cdots & a_n^{(n)} \end{vmatrix}, \quad (4)$$

oder die Determinante, die man aus A erhält, wenn man in dem A darstellenden Quadrat die erste Zeile und die erste Column weglässt.

Daraus ergibt sich leicht die Bedeutung von $A_\mu^{(\nu)}$: man kann, indem man $\nu-1$ Zeilenvertauschungen vornimmt, die ν te Zeile zur ersten machen, und wenn man noch $\mu-1$ Vertauschungen der Columnen hinzunimmt, die μ te Column zur ersten; im Uebrigen bleiben die Reihen in ihrer Aufeinanderfolge ungeändert. Die Determinante selbst hat den Factor $(-1)^{\mu+\nu}$ angenommen und ist dem absoluten Werthe nach ungeändert geblieben. In der so umgeänderten Reihenfolge ist aber das Element $a_\mu^{(\nu)}$ an die Stelle des Elementes $a_1^{(1)}$ getreten, und daraus schliesst man auf folgendes Bildungsgesetz:

Man erhält die Unterdeterminante $A_\mu^{(\nu)}$ dadurch, dass man in dem die Determinante darstellenden Quadrat die beiden Reihen weglässt, die sich in $a_\mu^{(\nu)}$ kreuzen, und den Factor $(-1)^{\mu+\nu}$ hinzufügt.

So erhält man z. B. für die dreireihige Determinante die folgende Darstellung:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix} = a(b'c'' - c'b'') + b(c'a'' - a'c'') + c(a'b'' - b'a''). \quad (5)$$

Da der untere Index ν in $A_\mu^{(\nu)}$ gar nicht vorkommt, so ändert sich $A_\mu^{(\nu)}$ nicht, wenn der untere Index ν durch einen anderen ersetzt wird. Dann aber verschwindet nach § 21, VI. die Determinante. Wir erhalten demnach aus (2) die folgende wichtige Relation, in der μ, ν irgend zwei von einander verschiedene Ziffern $1, 2, \dots, n$ sein können:

$$0 = a_1^{(\mu)} A_1^{(\nu)} + a_2^{(\mu)} A_2^{(\nu)} + \cdots + a_n^{(\mu)} A_n^{(\nu)}, \quad (6)$$

und ebenso bekommt man aus (3):

$$0 = a_\mu^{(1)} A_\nu^{(1)} + a_\mu^{(2)} A_\nu^{(2)} + \cdots + a_\mu^{(n)} A_\nu^{(n)}. \quad (7)$$

Beispielsweise ergibt sich aus (5), wenn a, b, c durch a', b', c' ersetzt werden:

$$a'(b'c'' - c'b'') + b'(c'a'' - a'c'') + c'(a'b'' - b'a'') = 0, \quad (8)$$

eine Formel, von deren Richtigkeit man sich durch die einfachste Rechnung überzeugt.

Wenn wir die Relation (6) mit einem beliebigen Factor λ multipliciren und zu (2) addiren, so erhalten wir die Formel:

$$\begin{aligned} A &= (a_r^{(1)} + \lambda a_s^{(1)}) A_r^{(1)} + (a_r^{(2)} + \lambda a_s^{(2)}) A_r^{(2)} \\ &\quad + \cdots + (a_r^{(n)} + \lambda a_s^{(n)}) A_r^{(n)}, \end{aligned} \quad (9)$$

die uns den folgenden Satz ausdrückt:

VII. Die Determinante ändert ihren Werth nicht, wenn man zu den Elementen einer Zeile, die mit einem beliebigen gemeinschaftlichen Factor multiplicirten entsprechenden Elemente einer anderen Zeile addirt.

Derselbe Satz gilt auch von den Columnen. Er wird zur Vereinfachung und numerischen Berechnung von Determinanten oft mit Nutzen verwendet. Wir fügen noch folgende Sätze bei, die sich aus den Darstellungen (2), (3) sofort ablesen lassen.

VIII. Wenn alle Elemente einer Zeile oder einer Columnne einen gemeinschaftlichen Factor haben, so kann dieser weggelassen und als Factor vor die Determinante gesetzt werden.

Denn es ist nach (2):

$$pa_r^{(1)} A_r^{(1)} + pa_r^{(2)} A_r^{(2)} + \cdots + pa_r^{(n)} A_r^{(n)} = pA.$$

IX. Wenn in einer Zeile oder in einer Columnne alle Elemente bis auf eines verschwinden, so reducirt sich die Determinante auf das Product dieses einen Elementes mit der entsprechenden Unterdeterminante.

Denn wenn $a_r^{(1)}, a_r^{(2)}, \dots, a_r^{(n)}$ mit Ausnahme von $a_r^{(\nu)}$ verschwinden, so ist nach (2):

$$A = a_r^{(\nu)} A_r^{(\nu)}.$$

Der Werth von A ist dann von den $a_1^{(\nu)}, a_2^{(\nu)}, \dots, a_n^{(\nu)}$ (mit Ausnahme von $a_r^{(\nu)}$) ganz unabhängig.

Um von diesen Sätzen eine Anwendung zu machen, wollen wir den Werth der Determinante

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$$

bestimmen, worin a, b, c beliebige Grössen seien. Multipliciren wir die zweite Columnne mit a und subtrahiren sie von der dritten, darauf die erste mit a und subtrahiren sie von der zweiten, so folgt nach VII:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & b-a & b(b-a) \\ 1 & c-a & c(c-a) \end{vmatrix},$$

und nach IX. und VIII.:

$$\Delta = (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & b \\ 1 & c \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b). \quad (10)$$

Auf die gleiche Weise kann man auch die n -reihige Determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

behandeln und findet ihren Werth gleich

$$(a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \cdots (a_n - a_1)(a_3 - a_2) \cdots (a_n - a_2) \cdots (a_n - a_{n-1}). \quad (11)$$

Ordnet man die Columnen in umgekehrter Reihenfolge, so sind dazu, je nachdem n gerade oder ungerade ist,

$$\frac{n}{2}(n-1) \quad \text{oder} \quad \frac{n-1}{2}n$$

Vertauschungen erforderlich, so dass sich die so geordnete Determinante von Δ durch den Factor

$$(-1)^{n(n-1)/2}$$

unterscheidet. Es kommt auf dasselbe hinaus, wenn man den $\frac{n(n-1)}{2}$ Factoren des Productes (11) das entgegengesetzte Vorzeichen giebt. Es besteht also zugleich mit (11) die Gleichung:

$$\begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_1^{n-2} & \cdots & a_1 & 1 \\ a_2^{n-1} & a_2^{n-2} & \cdots & a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_n^{n-1} & a_n^{n-2} & \cdots & a_n & 1 \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < k \leq n} (a_i - a_k). \quad (12)$$

Wir wollen hier noch eine Bezeichnungsweise der Unterdeterminanten erwähnen, die der Differentialrechnung entnommen ist und oft mit Nutzen verwendet wird, besonders wenn es sich um die Bildung von Derivirten handelt. Wenn die Grössen $a_\mu^{(\nu)}$ als unabhängige Variable betrachtet werden, so ist die Determinante A in Bezug auf jede von ihnen nur vom ersten Grade. Die nach $a_\mu^{(\nu)}$ genommene Ableitung oder der Differentialquotient ist also gleich dem Coefficienten von $a_\mu^{(\nu)}$, also:

$$\frac{\partial A}{\partial a_\mu^{(\nu)}} = A_\mu^{(\nu)}.$$

Wenn demnach z. B. die $a_\mu^{(\nu)}$ Functionen einer Variablen t sind, so ist auch A eine Function von t , und man erhält nach den ersten Regeln der Differentialrechnung die Ableitung von A in Bezug auf t in der Form

$$A'(t) = \sum A_\mu^{(\nu)} \frac{\partial a_\mu^{(\nu)}}{\partial t},$$

wenn $\partial a_\mu^{(\nu)} / \partial t$ die Ableitung von $a_\mu^{(\nu)}$ nach t bedeutet.

§ 23. Die Unterdeterminanten im weiteren Sinne

Wir können nun die Betrachtungen des vorigen Paragraphen in folgender Weise verallgemeinern. Wie wir vorhin von der Aufgabe ausgegangen sind, alle Glieder in der entwickelten Determinante A aufzusuchen, die den Factor $a_1^{(1)}$ enthalten, so wollen wir jetzt alle die Glieder aufsuchen, die den Factor

$$a_1^{(1)} a_2^{(2)} \cdots a_\nu^{(\nu)}$$

enthalten, worin ν eine beliebige Zahl unter n sein kann. Diese Glieder erhalten wir aus dem Hauptgliede

$$a_1^{(1)} a_2^{(2)} \cdots a_\nu^{(\nu)} a_{\nu+1}^{(\nu+1)} \cdots a_n^{(n)},$$

wenn wir bei der Permutation der unteren Indices $1, 2, \dots, \nu$ unverändert lassen und nur $\nu+1, \dots, n$ auf alle Arten permutieren, unter Berücksichtigung der Vorzeichenregel. Demnach ist der Inbegriff der gesuchten Glieder

$$a_1^{(1)} a_2^{(2)} \cdots a_\nu^{(\nu)} \begin{vmatrix} a_{\nu+1}^{(\nu+1)} & \cdots & a_n^{(\nu+1)} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{\nu+1}^{(n)} & \cdots & a_n^{(n)} \end{vmatrix}. \quad (1)$$

I. Die hier als Factor auftretende Determinante von $n - \nu$ Reihen, die wir mit

$$A_{1,2,\dots,\nu}^{1,2,\dots,\nu}$$

bezeichnen, entsteht aus A durch Weglassen der ν ersten Zeilen und Kolonnen.

Dieses Resultat wollen wir nun verallgemeinern. Wir wählen irgend ν Elemente

$$a_{\alpha_1}^{(\beta_1)}, a_{\alpha_2}^{(\beta_2)}, \dots, a_{\alpha_\nu}^{(\beta_\nu)}, \quad (3)$$

jedoch so, daß nicht zwei Elemente in derselben Zeile oder in derselben Kolonne vorkommen. Den Inbegriff der Glieder der Determinante, die das Produkt dieser Elemente als Faktor enthalten, bezeichnen wir mit

$$A_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu}. \quad (2)$$

Man kann durch Umstellen von Zeilen und Kolonnen, wodurch höchstens das Zeichen der Determinante geändert wird, immer erreichen, daß die Elemente (3) an die Stelle von $a_1^{(1)}, a_2^{(2)}, \dots, a_\nu^{(\nu)}$ gelangen. Dann läßt sich Regel I anwenden und es ergibt sich:

II. Man erhält, vom Vorzeichen abgesehen, $A_{\alpha_1, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu}$ als $(n - \nu)$ -reihige Determinante, wenn man in A alle Zeilen und Kolonnen wegläßt, die sich in einem der Elemente (3) schneiden, und die übrig bleibenden Zeilen und Kolonnen in ihrer Reihenfolge stehen läßt.

Für die Zeichenbestimmung ordne man die unteren und die oberen Indices $1, 2, \dots, n$ in der Weise

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_\nu, \alpha_{\nu+1}, \dots, \alpha_n, \quad (4)$$

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_\nu, \beta_{\nu+1}, \dots, \beta_n, \quad (5)$$

indem man die fehlenden Indices der Größe nach aufeinander folgen läßt.

III. Die in II beschriebene $(n - \nu)$ -reihige Determinante erhält das positive oder negative Zeichen, je nachdem die beiden Anordnungen (4), (5) der Ziffern $1, 2, \dots, n$ beide zu derselben oder zu verschiedenen Arten gehören.

Die so definierten Größen heißen die ν -ten Unterdeterminanten oder Unterdeterminanten ν -ter Ordnung. Sie sind dargestellt durch $(n - \nu)$ -reihige Determinanten. Es folgt:

IV. Die Unterdeterminante $A_{\alpha_1, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu}$ ändert nur ihr Vorzeichen, wenn zwei ihrer unteren oder zwei ihrer oberen Indices vertauscht werden; dem absoluten Werte nach bleibt sie ungeändert.

Bezeichnen wir mit einer überstrichenen Folge irgend eine Anordnung der Indices, so enthält die Determinante auch die Glieder

$$\pm a_{\bar{\alpha}_1}^{(\beta_1)} a_{\bar{\alpha}_2}^{(\beta_2)} \dots a_{\bar{\alpha}_\nu}^{(\beta_\nu)} A_{\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu}.$$

Die hierbei auftretende ν -reihige Determinante wird die complementäre Unterdeterminante genannt und mit

$$B_{\alpha_1, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu}$$

bezeichnet. Der betreffende Complex der Glieder ist also

$$A_{\alpha_1, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu} B_{\alpha_1, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu}. \quad (7)$$

Daraus folgt der Satz von Laplace:

$$A = \sum A_{\alpha_1, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu} B_{\alpha_1, \dots, \alpha_\nu}^{\beta_1, \dots, \beta_\nu}. \quad (8)$$

Eine andere Darstellung von A durch erste und zweite Unterdeterminanten ist

$$A = a_\nu^{(\mu)} A_\nu^{(\mu)} + \sum a_\nu^{(i)} a_k^{(\mu)} A_{\nu k}^{\mu i}, \quad (9)$$

oder, nach der Vorzeichenregel,

$$A = a_\nu^{(\mu)} A_\nu^{(\mu)} - \sum a_\nu^{(i)} a_k^{(\mu)} A_{\nu k}^{\mu i}. \quad (10)$$

Für die geränderte Determinante

$$U = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \cdots & a_n^{(1)} & u_1 \\ a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & \cdots & a_n^{(2)} & u_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^{(n)} & a_2^{(n)} & \cdots & a_n^{(n)} & u_n \\ v_1 & v_2 & \cdots & v_n & q \end{vmatrix} \quad (11)$$

ergibt sich

$$U = qA - \sum u_i v_k A_k^{(i)}. \quad (12)$$

Auch bei höheren Unterdeterminanten ist die Bezeichnung durch Differentialquotienten zweckmäßig, z.B.

$$A_{\nu k}^{\mu i} = \frac{\partial^2 A}{\partial a_{\nu}^{(\mu)} \partial a_k^{(i)}}. \quad (13)$$

§ 24. Lineare homogene Gleichungen

Die hauptsächlichste Anwendung der Determinanten, der die ganze Theorie ihren Ursprung verdankt, ist die Auflösung linearer Gleichungen. Wir betrachten ein System von m Gleichungen ersten Grades, in denen n Unbekannte $x_1, x_2, \dots, x_n$ homogen vorkommen:

$$\begin{aligned} a_1^{(1)} x_1 + a_2^{(1)} x_2 + \cdots + a_n^{(1)} x_n &= 0, \\ a_1^{(2)} x_1 + a_2^{(2)} x_2 + \cdots + a_n^{(2)} x_n &= 0, \\ &\vdots \\ a_1^{(m)} x_1 + a_2^{(m)} x_2 + \cdots + a_n^{(m)} x_n &= 0. \end{aligned} \quad (1)$$

Eine Lösung ist stets

$$x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0. \quad (2)$$

Das System der Coefficienten schreiben wir als Matrix

$$\begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \cdots & a_n^{(1)} \\ a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & \cdots & a_n^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{(m)} & a_2^{(m)} & \cdots & a_n^{(m)} \end{vmatrix}. \quad (3)$$

Unter den aus der Matrix hervorgehenden Determinanten sei wenigstens eine ν -reihige von Null verschieden, während alle $(\nu + 1)$ -reihigen verschwinden. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei

$$A = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \cdots & a_{\nu}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{(\nu)} & a_2^{(\nu)} & \cdots & a_{\nu}^{(\nu)} \end{vmatrix} \neq 0. \quad (4)$$

I. Ist zunächst $\nu = n$, so haben die Gleichungen keine andere Lösung als (2). Insbesondere gilt: Wenn ein System von n linearen homogenen Gleichungen mit n Unbekannten eine von Null verschiedene Determinante hat, so sind sämtliche Unbekannte Null; hat es eine Lösung, bei der nicht alle Unbekannten verschwinden, so verschwindet die Determinante des Systems.

Ist $\nu < n$, so werden die ersten ν Gleichungen in die Form

$$\begin{aligned} a_1^{(1)} x_1 + \cdots + a_{\nu}^{(1)} x_{\nu} &= -a_{\nu+1}^{(1)} x_{\nu+1} - \cdots - a_n^{(1)} x_n, \\ &\vdots \\ a_1^{(\nu)} x_1 + \cdots + a_{\nu}^{(\nu)} x_{\nu} &= -a_{\nu+1}^{(\nu)} x_{\nu+1} - \cdots - a_n^{(\nu)} x_n \end{aligned} \quad (6)$$

geschrieben. Dann folgt

$$Ax_\mu = - \sum_{h=\nu+1}^n C_{\mu h} x_h, \quad (7)$$

wo

$$C_{\mu h} = \sum_{i=1}^{\nu} a_h^{(i)} A_\mu^{(i)}. \quad (8)$$

Hierdurch sind $x_1, \dots, x_\nu$ linear durch $x_{\nu+1}, \dots, x_n$ ausgedrückt.

III. Durch die Ausdrücke (7) sind die Gleichungen (1) befriedigt, welche Werte auch $x_{\nu+1}, \dots, x_n$ haben mögen. Also bleiben $n - \nu$ Unbekannte willkürlich.

Für $m = n - 1$, $\nu = n - 1$, sind die Verhältnisse der Unbekannten völlig bestimmt:

$$x_1 : x_2 : \dots : x_n = A_1 : A_2 : \dots : A_n. \quad (16)$$

Für $n = 3$ erhält man aus

$$ax + by + cz = 0, \quad a'x + b'y + c'z = 0 \quad (17)$$

die Lösung

$$x : y : z = bc' - cb' : ca' - ac' : ab' - ba'. \quad (18)$$

§ 25. Elimination aus linearen Gleichungen

Es kommt bisweilen vor, daß es sich bei einem gegebenen System linearer Gleichungen nicht um die wirkliche Ermittlung der Unbekannten handelt, sondern um die Beurteilung der Möglichkeit ihrer Lösung. Die Aufstellung der Bedingungsgleichungen heißt Elimination.

Für ein System von m linearen homogenen Gleichungen mit n Unbekannten ist, wenn $n \leq m$, die notwendige und hinreichende Bedingung für eine nicht verschwindende Lösung die, daß alle n -reihigen Determinanten der Matrix verschwinden. Die Anzahl dieser Determinanten ist

$$\frac{m(m-1) \cdots (m-n+1)}{1 \cdot 2 \cdots n}.$$

Um unabhängige Bedingungen zu erhalten, fragen wir danach, wann ν Unbekannte durch die übrigen $n - \nu$ bestimmt werden. Ist

$$A = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \cdots & a_\nu^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{(\nu)} & a_2^{(\nu)} & \cdots & a_\nu^{(\nu)} \end{vmatrix} \neq 0, \quad (1)$$

so lauten die Bedingungen

$$\begin{vmatrix} a_1^{(1)} & \cdots & a_\nu^{(1)} & a_h^{(1)} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_1^{(\nu)} & \cdots & a_\nu^{(\nu)} & a_h^{(\nu)} \\ a_1^{(k)} & \cdots & a_\nu^{(k)} & a_h^{(k)} \end{vmatrix} = 0, \quad (2)$$

oder

$$Aa_h^{(k)} - \sum_{i=1}^{\nu} \sum_{\mu=1}^{\nu} a_h^{(i)} a_\mu^{(k)} A_\mu^{(i)} = 0, \quad (3)$$

für $h = \nu + 1, \dots, n$, $k = \nu + 1, \dots, m$. Ihre Anzahl ist

$$(n - \nu)(m - \nu), \quad (5)$$

und sie sind voneinander unabhängig.

§ 26. Unhomogene lineare Gleichungen

Wir betrachten ein System

$$\begin{aligned} a_1^{(1)}x_1 + a_2^{(1)}x_2 + \cdots + a_n^{(1)}x_n &= y_1, \\ &\vdots \\ a_1^{(n)}x_1 + a_2^{(n)}x_2 + \cdots + a_n^{(n)}x_n &= y_n. \end{aligned} \quad (1)$$

Sei

$$A = \sum \pm a_1^{(1)} a_2^{(2)} \cdots a_n^{(n)} \quad (2)$$

die Determinante des Systems. Dann ist

$$Ax_\mu = \sum_{k=1}^n y_k A_\mu^{(k)}. \quad (4)$$

Ist $A \neq 0$, so sind die Unbekannten eindeutig bestimmt. Setzt man $A_\mu^{(k)} = A_{k\mu}$, so erhält man

$$\begin{aligned} Ax_1 &= A_{11}y_1 + A_{12}y_2 + \cdots + A_{1n}y_n, \\ &\vdots \\ Ax_n &= A_{n1}y_1 + A_{n2}y_2 + \cdots + A_{nn}y_n. \end{aligned} \quad (5)$$

Wenn $A = 0$, ergeben sich Bedingungen für die y . Sei

$$B = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \cdots & a_\nu^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{(\nu)} & a_2^{(\nu)} & \cdots & a_\nu^{(\nu)} \end{vmatrix} \neq 0, \quad (6)$$

und seien alle $(\nu + 1)$ -reihigen Unterdeterminanten Null. Dann ist

$$Bx_\mu = \sum_{i=1}^{\nu} B_\mu^{(i)} y_i - \sum_{h=\nu+1}^n x_h \sum_{i=1}^{\nu} B_\mu^{(i)} a_h^{(i)}. \quad (7)$$

Die Lösbarkeitsbedingungen sind

$$By_\lambda = \sum_{i=1}^{\nu} \sum_{\mu=1}^{\nu} B_\mu^{(i)} a_\mu^{(\lambda)} y_i, \quad \lambda = \nu + 1, \dots, n. \quad (10)$$

Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, so hat das System keine Lösung. Wird (1) als lineare Substitution aufgefaßt, so ist die Determinante A die Substitutionsdeterminante; nur für $A \neq 0$ sind die y unabhängige Variable und (5) gibt die inverse Substitution.

§ 27. Multiplication von Determinanten.

Der Satz, den wir jetzt noch beweisen wollen, lehrt, wie man das Product zweier Determinanten von gleich viel Reihen durch eine einzige Determinante von ebenso viel Reihen darstellen kann. Man wird am einfachsten darauf geführt, wenn man die Auflösung von zwei Systemen linearer Gleichungen betrachtet.

Es seien jetzt die Coefficienten $a_i^{(k)}, b_h^{(k)}$, wenn i, h die Reihe der Zahlen $1, 2, \dots, n$ durchlaufen, beliebige veränderliche Grössen, ebenso die Grössen x_i, y_i, z_i , die nur an die Relationen gebunden

sind:

$$\sum_i a_i^{(k)} x_i = y_k, \quad (1)$$

$$\sum_k b_h^{(k)} y_k = z_h. \quad (2)$$

Wenn nun die Aufgabe gestellt wird, die Variablen x durch die Variablen z zu bestimmen, so kann diese Aufgabe auf doppelte Art gelöst werden. Man kann nach § 26, (4) die Gleichungen (1) in Bezug auf x , die Gleichungen (2) in Bezug auf y auflösen, und die letzteren Ausdrücke in die ersteren einsetzen. Bezeichnen wir mit A, B die Determinanten der beiden Gleichungssysteme, also

$$A = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \cdots & a_n^{(1)} \\ a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & \cdots & a_n^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1^{(n)} & a_2^{(n)} & \cdots & a_n^{(n)} \end{vmatrix}, \quad B = \begin{vmatrix} b_1^{(1)} & b_2^{(1)} & \cdots & b_n^{(1)} \\ b_1^{(2)} & b_2^{(2)} & \cdots & b_n^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_1^{(n)} & b_2^{(n)} & \cdots & b_n^{(n)} \end{vmatrix},$$

und mit $A_i^{(k)}, B_i^{(k)}$ die ersten Unterdeterminanten, so erhält man

$$Ax_k = \sum_i A_k^{(i)} y_i, \quad (3)$$

$$By_i = \sum_h B_i^{(h)} z_h, \quad (4)$$

und durch Substitution von (4) in (3):

$$ABx_k = \sum_h z_h \sum_i A_k^{(i)} B_i^{(h)}. \quad (5)$$

Man kann aber auch so verfahren, dass man aus (1) die Ausdrücke für y in (2) einsetzt, wodurch man, wenn

$$c_i^{(h)} = \sum_s a_i^{(s)} b_h^{(s)} \quad (6)$$

gesetzt wird, erhält:

$$\sum_i c_i^{(h)} x_i = z_h. \quad (7)$$

Wenn man nun

$$C = \begin{vmatrix} c_1^{(1)} & c_2^{(1)} & \cdots & c_n^{(1)} \\ c_1^{(2)} & c_2^{(2)} & \cdots & c_n^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_1^{(n)} & c_2^{(n)} & \cdots & c_n^{(n)} \end{vmatrix} \quad (8)$$

setzt, und mit $C_i^{(k)}$ die Unterdeterminanten von C bezeichnet, so ergibt die Auflösung von (7):

$$Cx_k = \sum_h z_h C_k^{(h)}, \quad (9)$$

und die Vergleichung von (5) mit (9) ergibt:

$$AB = C, \quad (10)$$

und für die Unterdeterminanten:

$$C_k^{(h)} = \sum_i A_k^{(i)} B_i^{(h)}. \quad (11)$$

In dieser Schlussweise ist aber noch eine Lücke, bedingt durch den Zweifel, ob sich (5) von (9) nicht durch einen beiden Seiten gemeinschaftlichen Factor unterscheiden könnte. Um diesem Zweifel zu begegnen, wollen wir die Gleichung (10) direct beweisen, woraus dann die Richtigkeit von (11) folgt.

Wir wollen das Hauptglied der Determinante C nach (6) bilden, indem wir mit $s_1, s_2, \dots, s_n$ von einander unabhängige Summationsbuchstaben bezeichnen, die von 1 bis n laufen:

$$\begin{aligned} c_1^{(1)} c_2^{(2)} \dots c_n^{(n)} &= \sum_{s_1} a_1^{(s_1)} b_1^{(s_1)} \sum_{s_2} a_2^{(s_2)} b_2^{(s_2)} \dots \sum_{s_n} a_n^{(s_n)} b_n^{(s_n)} \\ &= \sum_{s_1, s_2, \dots, s_n} a_1^{(s_1)} a_2^{(s_2)} \dots a_n^{(s_n)} b_1^{(s_1)} b_2^{(s_2)} \dots b_n^{(s_n)}. \end{aligned} \quad (12)$$

Die Permutation der unteren Indices der c entspricht der Permutation der unteren Indices der a , und wenn man also mit Rücksicht auf die Vorzeichenregel die Determinante C bildet, so erhält man

$$\sum \pm c_1^{(1)} c_2^{(2)} \dots c_n^{(n)} = \sum_{s_1, s_2, \dots, s_n} b_1^{(s_1)} b_2^{(s_2)} \dots b_n^{(s_n)} \sum \pm a_1^{(s_1)} a_2^{(s_2)} \dots a_n^{(s_n)}. \quad (13)$$

Nun ist

$$\sum \pm a_1^{(s_1)} a_2^{(s_2)} \dots a_n^{(s_n)}$$

nach § 21, VI. immer dann gleich Null, wenn unter den $s_1, s_2, \dots, s_n$ zweimal dieselbe Ziffer vorkommt; es behalten also nur die Glieder in (13) einen von Null verschiedenen Werth, in denen $s_1, s_2, \dots, s_n$ eine Anordnung der Indices $1, 2, \dots, n$ ist, und zwar ist dieser Werth $+A$ oder $-A$, je nachdem diese Anordnung zur ersten oder zur zweiten Art gehört (§ 21, IV).

Demnach wird die rechte Seite von (13):

$$A \sum_{s_1, s_2, \dots, s_n} \pm b_1^{(s_1)} b_2^{(s_2)} \dots b_n^{(s_n)},$$

die Summe erstreckt über alle Permutationen $s_1, s_2, \dots, s_n$. Diese Summe ist aber gerade die Determinante B und daher die Formel

$$C = AB$$

bewiesen.

Das in der Formel (6) enthaltene Bildungsgesetz der Elemente $c_i^{(h)}$ können wir in Worten so ausdrücken: Um die Elemente der Determinante C , die das Product der beiden Determinanten A, B ist, zu erhalten, multiplicirt man die Elemente je einer Colonne von A mit den entsprechenden Elementen einer Colonne von B und addirt die Producte.

Nach den Sätzen über die Determinanten kann man die Form von C in mannigfacher Weise abändern. Wir wollen darüber Folgendes bemerken. Wenn man zwei Colonnen in A oder in B vertauscht, so ändern sich die Elemente $c_i^{(h)}$ nicht, sondern vertauschen sich nur unter einander. Wenn man aber zwei Zeilen in A oder in B vertauscht, so ändern sich die $c_i^{(h)}$, indem die Factoren in den einzelnen Producten der Summe anders zusammengefasst werden; wenn man aber entsprechende Vertauschungen in den Zeilen von A und von B gleichzeitig vornimmt, so bleiben die $c_i^{(h)}$ ungeändert, weil dadurch nur die einzelnen Glieder der Summe vertauscht werden.

Indem man in A oder in B oder in beiden zugleich die Zeilen zu Colonnen macht, erhält man noch drei verschiedene Arten für die Bildung des Products zweier Determinanten in Determinantenform. Letzteres kann man auch so ausdrücken: Um das Product zweier Determinanten zu bilden, kann man die Elemente der einzelnen Zeilen oder Colonnen des einen Factors mit den entsprechenden Elementen der Zeilen oder der Colonnen des anderen Factors multipliciren und die Producte addiren, und diese Productsummen als Elemente einer neuen Determinante auffassen.

Auf ein Product zweier Determinanten mit verschiedener Elementenzahl lässt sich die Multiplicationsregel dadurch anwenden, dass man die Determinante mit geringerer Reihenzahl durch den Satz § 22, IX. in eine andere mit mehr Reihen verwandelt.

§ 28. Determinanten der Unterdeterminanten.

Wir machen hier gleich eine Anwendung von dem Multiplicationsgesetz der Determinanten. Es sei wie bisher

$$A = \begin{vmatrix} a_1^{(1)} & a_2^{(1)} & \cdots & a_n^{(1)} \\ a_1^{(2)} & a_2^{(2)} & \cdots & a_n^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1^{(n)} & a_2^{(n)} & \cdots & a_n^{(n)} \end{vmatrix}, \quad (1)$$

und

$$\begin{vmatrix} A_1^{(1)} & A_2^{(1)} & \cdots & A_n^{(1)} \\ A_1^{(2)} & A_2^{(2)} & \cdots & A_n^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_1^{(n)} & A_2^{(n)} & \cdots & A_n^{(n)} \end{vmatrix} \quad (2)$$

das System der Unterdeterminanten. Bilden wir aus (2) die Determinante, die wir mit Δ bezeichnen wollen, so können wir auf das Product $A\Delta$ die Multiplicationsregel anwenden. Dies giebt aber nach § 22, (3) und (7):

$$A\Delta = \begin{vmatrix} A & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & A \end{vmatrix} = A^n,$$

und daraus durch Division mit A

$$\Delta = A^{n-1}. \quad (3)$$

Es ist also Δ die $(n-1)$ te Potenz von A . Bei dieser Ableitung ist allerdings zunächst vorausgesetzt, dass A von Null verschieden sei. Da aber (3) in Bezug auf die Elemente $a_i^{(h)}$ eine Identität ist, d. h. auch dann gilt, wenn diese Grössen unabhängige Variable sind, so folgt, dass auch noch in diesem Ausnahmefall die Formel (3) gilt, d. h. dass, wenn A verschwindet, auch Δ verschwindet.

Dies Ergebniss ist ein specieller Fall eines allgemeineren Satzes, nach dem jede beliebige Determinante der Matrix (2) gebildet werden kann. Betrachten wir die ν -reihige Unterdeterminante

$$\Delta_\nu = \begin{vmatrix} A_1^{(1)} & A_2^{(1)} & \cdots & A_\nu^{(1)} \\ A_1^{(2)} & A_2^{(2)} & \cdots & A_\nu^{(2)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_1^{(\nu)} & A_2^{(\nu)} & \cdots & A_\nu^{(\nu)} \end{vmatrix}, \quad (4)$$

aus der man durch Permutation der oberen und unteren Indices alle anderen ν -reihigen Unterdeterminanten ableiten kann, so kann man die Multiplicationsregel anwenden, indem man Δ_ν nach der Schlussbemerkung des letzten Paragraphen in eine n -reihige Determinante verwandelt.

Setzt man

$$\Delta_\nu = \begin{vmatrix} A_1^{(1)} & \cdots & A_\nu^{(1)} & A_{\nu+1}^{(1)} & \cdots & A_n^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_1^{(\nu)} & \cdots & A_\nu^{(\nu)} & A_{\nu+1}^{(\nu)} & \cdots & A_n^{(\nu)} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}, \quad (5)$$

wobei $n-\nu$ Zeilen und Columnen beigelegt sind, von denen die ersteren ausser in den Diagonalgliedern lauter Nullen haben. Bildet man jetzt das Product $A\Delta_\nu$, so folgt

$$A\Delta_\nu = A^\nu \begin{vmatrix} a_{\nu+1}^{(\nu+1)} & \cdots & a_n^{(\nu+1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{\nu+1}^{(n)} & \cdots & a_n^{(n)} \end{vmatrix}, \quad (6)$$

und dies ist nach dem Satz IX, § 22. Dividirt man hier durch A und wendet die Bezeichnung des § 23 an, so folgt

$$\Delta_\nu = A^{\nu-1} A_{1,2,\dots,\nu}^{1,2,\dots,\nu}. \quad (7)$$

Für $\nu = 2$ ergibt sich das specielle Resultat

$$A_1^{(1)} A_2^{(2)} - A_1^{(2)} A_2^{(1)} = A A_{1,2}^{1,2}. \quad (8)$$

Die Formel (8) werden wir später öfter benutzen. In der Bezeichnung durch die Differentialquotienten lässt sie sich so darstellen

$$A \frac{\partial^2 A}{\partial a_1^{(1)} \partial a_2^{(2)}} = \frac{\partial A}{\partial a_1^{(1)}} \frac{\partial A}{\partial a_2^{(2)}} - \frac{\partial A}{\partial a_1^{(2)}} \frac{\partial A}{\partial a_2^{(1)}}. \quad (9)$$

Besonders wichtig ist sie in dem Fall, wo A eine symmetrische Determinante ist, wo also $a_i^{(k)} = a_k^{(i)}$ ist; dann ist auch

$$\frac{\partial A}{\partial a_1^{(2)}} = \frac{\partial A}{\partial a_2^{(1)}},$$

worin bei der Differentiation nicht Rücksicht genommen ist auf die Abhängigkeit $a_i^{(k)} = a_k^{(i)}$, dann wird die Formel (9)

$$A \frac{\partial^2 A}{\partial a_1^{(1)} \partial a_2^{(2)}} = \frac{\partial A}{\partial a_1^{(1)}} \frac{\partial A}{\partial a_2^{(2)}} - \left(\frac{\partial A}{\partial a_1^{(2)}} \right)^2. \quad (10)$$

§ 29. Interpolation.

Wir haben schon in § 9 unter einer besonderen Voraussetzung die Aufgabe gelöst, eine ganze rationale Function zu bestimmen, die für eine genügende Anzahl vorgeschriebener Werthe des Arguments gegebene Werthe annimmt. Wir wollen nun durch Anwendung der Determinanten diese Aufgabe allgemein lösen. Wir wollen aber folgende Bemerkungen vorausschicken.

Im § 22, (12) ist der Werth der Determinante

$$\begin{vmatrix} \alpha_1^{n-1} & \alpha_1^{n-2} & \cdots & \alpha_1 & 1 \\ \alpha_2^{n-1} & \alpha_2^{n-2} & \cdots & \alpha_2 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \alpha_n^{n-1} & \alpha_n^{n-2} & \cdots & \alpha_n & 1 \end{vmatrix}$$

gleich dem Differenzenproduct

$$(\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_1 - \alpha_3) \cdots (\alpha_1 - \alpha_n)(\alpha_2 - \alpha_3) \cdots (\alpha_2 - \alpha_n) \cdots (\alpha_{n-1} - \alpha_n) \quad (1)$$

gefunden, und wir wollen jetzt zur Abkürzung dieses Differenzenproduct mit

$$[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n] \quad (2)$$

bezeichnen, so dass die Grösse $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n]$ ihr Vorzeichen ändert, wenn zwei der Elemente $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ vertauscht werden.

Wir definiren ferner eine ganze rationale Function n ten Grades $f(x)$ der Veränderlichen x durch die Gleichung

$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n), \quad (3)$$

so dass nach § 13

$$\begin{aligned} f'(\alpha_1) &= (\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_1 - \alpha_3) \cdots (\alpha_1 - \alpha_n), \\ f'(\alpha_2) &= (\alpha_2 - \alpha_1)(\alpha_2 - \alpha_3) \cdots (\alpha_2 - \alpha_n), \\ &\vdots \\ f'(\alpha_n) &= (\alpha_n - \alpha_1)(\alpha_n - \alpha_2) \cdots (\alpha_n - \alpha_{n-1}). \end{aligned} \quad (4)$$

In dem Product aller dieser Ausdrücke kommt jeder Factor des Productes (1) zweimal mit entgegengesetztem Zeichen vor, so dass wir, da die Anzahl der Factoren von (1) gleich $\frac{n(n-1)}{2}$ ist, die Gleichung erhalten

$$f'(\alpha_1)f'(\alpha_2)\cdots f'(\alpha_n) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]^2. \quad (5)$$

Wir können unser Product (1) aber auch mit Hülfe der Relationen (4) folgendermaassen darstellen:

$$\begin{aligned} [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] &= f'(\alpha_1)[\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n] \\ &= -f'(\alpha_2)[\alpha_1, \alpha_3, \dots, \alpha_n] \\ &= \dots = (-1)^{n-1}f'(\alpha_n)[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}], \end{aligned} \quad (6)$$

wo auf der rechten Seite jeder der Klammerausdrücke ein Element weniger enthält als der Klammerausdruck auf der linken Seite.

Es soll also jetzt die Aufgabe gestellt sein, eine ganze rationale Function $(n-1)$ ten Grades $\varphi(x)$ zu bestimmen, die für die Argumentwerthe $x = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ der Reihe nach die vorgeschriebenen Werthe $\varphi(\alpha_1), \varphi(\alpha_2), \dots, \varphi(\alpha_n)$ annimmt.

Setzt man

$$\varphi(x) = a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n, \quad (7)$$

so sind die n unbekannten Coefficienten $a_1, a_2, \dots, a_n$ aus den linearen Gleichungen

$$\begin{aligned} \varphi(\alpha_1) &= a_1\alpha_1^{n-1} + a_2\alpha_1^{n-2} + \dots + a_{n-1}\alpha_1 + a_n, \\ \varphi(\alpha_2) &= a_1\alpha_2^{n-1} + a_2\alpha_2^{n-2} + \dots + a_{n-1}\alpha_2 + a_n, \\ &\vdots \\ \varphi(\alpha_n) &= a_1\alpha_n^{n-1} + a_2\alpha_n^{n-2} + \dots + a_{n-1}\alpha_n + a_n \end{aligned} \quad (8)$$

zu bestimmen. Die Determinante dieses Systems ist aber genau die Grösse (2), und die Aufgabe ist also nach § 26 immer lösbar, wenn diese Grösse von Null verschieden ist, d. h. wenn von den n Grössen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ keine zwei einander gleich sind.

Statt aber die Gleichungen (8) nach § 26 aufzulösen und die gefundenen Ausdrücke in (7) einzusetzen, ist es vorzuziehen, nach § 24, II. die homogenen Grössen $1, a_1, a_2, \dots, a_n$ aus den $n+1$ Gleichungen (7) und (8) zu eliminiren, wodurch man die Determinantengleichung erhält

$$\begin{vmatrix} \varphi(x) & x^{n-1} & x^{n-2} & \dots & x & 1 \\ \varphi(\alpha_1) & \alpha_1^{n-1} & \alpha_1^{n-2} & \dots & \alpha_1 & 1 \\ \dots & \dots & \dots & & \dots & \dots \\ \varphi(\alpha_n) & \alpha_n^{n-1} & \alpha_n^{n-2} & \dots & \alpha_n & 1 \end{vmatrix} = 0. \quad (9)$$

Diese Determinante entwickeln wir nun nach den Elementen der ersten Colonne. Für die dabei auftretenden Unterdeterminanten können wir dann die Bezeichnung (2) anwenden und erhalten so

$$\begin{aligned} &\varphi(x)[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] - \varphi(\alpha_1)[x, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n] + \varphi(\alpha_2)[x, \alpha_1, \alpha_3, \dots, \alpha_n] \\ &+ \dots + (-1)^n \varphi(\alpha_n)[x, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}] = 0. \end{aligned} \quad (10)$$

Nun ist nach (1)

$$[x, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n] = (x - \alpha_2)(x - \alpha_3) \cdots (x - \alpha_n)[\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n],$$

und wenn man also (10) durch $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ dividirt, und die verschiedenen Ausdrücke (6) dabei berücksichtigt, so erhält man schliesslich

$$\varphi(x) = f(x) \left\{ \frac{\varphi(\alpha_1)}{(x - \alpha_1)f'(\alpha_1)} + \frac{\varphi(\alpha_2)}{(x - \alpha_2)f'(\alpha_2)} + \dots + \frac{\varphi(\alpha_n)}{(x - \alpha_n)f'(\alpha_n)} \right\}. \quad (11)$$

wodurch die Function $\varphi(x)$ völlig bestimmt ist. Dieser Ausdruck für $\varphi(x)$ heisst die Interpolationsformel von Lagrange. Dass sie die gestellten Forderungen erfüllt, lässt sich nachträglich sehr leicht verificiren, wenn man $x = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ setzt. Die Nenner $x - \alpha_1, \dots, x - \alpha_n$ sind nur scheinbar darin enthalten.

Dritter Abschnitt. Die Wurzeln algebraischer Gleichungen.

§ 30. Begriff der Wurzeln. Mehrfache Wurzeln.

Nachdem in den beiden ersten Abschnitten die algebraischen Grössen mehr von der formalen Seite betrachtet waren, wobei es sich um identische Umformungen von Buchstabenausdrücken handelte, in denen die Buchstaben durchweg als Symbole für variable Grössen aufgefasst werden konnten, treten nun die Zahlengrössen mehr in den Vordergrund.

Wir verstehen hier unter Zahlen, gemäss dem in der Einleitung Festgesetzten, reelle oder imaginäre Grössen von der Form $a + bi$, und stellen die reellen Grössen zur Veranschaulichung durch die Punkte einer geraden Linie, die imaginären durch die Punkte einer Ebene dar. Unter dem absoluten Werth einer imaginären Grösse $a + bi$ verstehen wir $\sqrt{a^2 + b^2}$ und bezeichnen ihn nach Weierstrass mit

$$|a + bi|.$$

Es sei nun

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n \quad (1)$$

eine ganze Function von x , worin die Coefficienten irgend welche reelle oder imaginäre Zahlen sind, und der erste, a_0 , von Null verschieden vorausgesetzt wird. Wenn α eine Zahl ist, die für x gesetzt die Function $f(x)$ zu Null macht, die also der Bedingung $f(\alpha) = 0$ genügt, so heisst α eine Wurzel der Gleichung

$$f(x) = 0.$$

Wir sagen auch kurz, α ist eine Wurzel von $f(x)$. Nach § 4 lässt sich dann $f(x)$ durch $x - \alpha$ ohne Rest theilen, so dass man

$$f(x) = (x - \alpha)f_1(x) \quad (2)$$

setzen kann, worin $f_1(x)$ nur vom $(n - 1)$ ten Grad ist, und denselben ersten Coefficienten a_0 hat, wie $f(x)$, also

$$f_1(x) = a_0x^{n-1} + \cdots.$$

Die Coefficienten von $f_1(x)$ sind in § 4, (6) angegeben.

Jede Wurzel von $f_1(x)$ ist also zugleich Wurzel von $f(x)$; und umgekehrt ist jede Wurzel von $f(x)$ entweder $= \alpha$ oder eine Wurzel von $f_1(x)$. Wenn eine Wurzel α von $f(x)$ bekannt ist, so ist die Aufgabe, die übrigen zu finden, auf die Lösung einer Gleichung $(n - 1)$ ten Grades zurückgeführt.

Das Ziel der Betrachtungen dieses Abschnittes besteht in dem Nachweis, dass jede Function $f(x)$ vom n ten Grad wenigstens eine Wurzel hat. Dieser Satz heisst der Fundamentalsatz der Algebra. Zunächst ziehen wir aus (2) die wichtige Folgerung:

I. Eine Gleichung n ten Grades kann nicht mehr als n Wurzeln haben.

Denn hätte $f(x)$ mehr als n Wurzeln, so hätte $f_1(x)$, was nur vom $(n - 1)$ ten Grade ist, mehr als $n - 1$ Wurzeln. Eine Gleichung ersten Grades hat aber nicht mehr als eine Wurzel, woraus die Richtigkeit unseres Satzes durch vollständige Induction folgt.

Man giebt ihm bisweilen auch den Ausdruck:

II. Wenn eine Function n ten Grades $f(x)$ mehr als n Wurzeln hat, so müssen alle ihre Coefficienten Null sein.

Ist β eine Wurzel von $f_1(x)$, so lässt sich ebenso setzen

$$f_1(x) = (x - \beta)f_2(x),$$

worin $f_2(x) = a_0x^{n-2} + \cdots$ nur vom $(n - 2)$ ten Grade ist. Nimmt man also an, dass jede der Functionen, die man durch diese Division erhält, $f_1(x), f_2(x), \dots$, wenigstens eine Wurzel habe, so erhält man schliesslich

$$f(x) = a_0(x - \alpha)(x - \beta) \cdots (x - \nu), \quad (3)$$

und wir können also den Satz, den wir vorhin als das Ziel unserer Betrachtungen bezeichnet haben, auch so aussprechen: Es soll bewiesen werden:

Eine Function n ten Grades lässt sich in n lineare Factoren zerlegen.

Die Grössen $\alpha, \beta, \dots, \nu$ sind dann alle Wurzeln von $f(x)$ und ihre Zahl ist also n . Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass unter den $\alpha, \beta, \dots, \nu$ dieselbe Zahl mehrmals vorkommt. Dann würde $f(x)$ weniger als n Wurzeln haben, während doch der Satz bestehen bleibt, dass $f(x)$ in n lineare Factoren zerlegbar ist. Um die Übereinstimmung herzustellen, ist man übereingekommen, wenn $x - \alpha$ mehrmals in $f(x)$ aufgeht, α unter den Wurzeln mehrfach zu zählen und also von einfachen, zweifachen, dreifachen etc. Wurzeln zu sprechen.

Nach dem Begriff der derivirten Functionen [§ 13, (2)] ist, wenn α eine beliebige Grösse ist,

$$f(x) = f(\alpha) + (x - \alpha)f'(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^2}{1 \cdot 2}f''(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^3}{1 \cdot 2 \cdot 3}f'''(\alpha) + \dots \quad (4)$$

Wird also nun wieder angenommen, dass $f(\alpha)$ verschwindet, so ergibt sich

$$f_1(x) = f'(\alpha) + \frac{x - \alpha}{1 \cdot 2}f''(\alpha) + \frac{(x - \alpha)^2}{1 \cdot 2 \cdot 3}f'''(\alpha) + \dots,$$

also

$$f_1(\alpha) = f'(\alpha).$$

Es ist also α eine Doppelwurzel von $f(x)$, wenn mit $f(\alpha)$ gleichzeitig $f'(\alpha)$ verschwindet. Auch die Formel (4) zeigt, dass nur unter dieser Voraussetzung $f(x)$ durch $(x - \alpha)^2$ theilbar ist. Diese Schlussweise lässt sich weiter ausdehnen und führt zu dem Satze:

III. Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass α eine m -fache Wurzel von $f(x)$ ist, ist die, dass $f(\alpha), f'(\alpha), f''(\alpha), \dots, f^{(m-1)}(\alpha)$ verschwinden, $f^{(m)}(\alpha)$ nicht verschwindet.

§ 31. Stetigkeit ganzer Functionen.

Wenn, wie bisher,

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$$

eine ganze Function von x ist, so beweisen wir zunächst folgenden Satz:

IV. $f(x)$ wird zugleich mit x unendlich gross.

Das will sagen, wenn C eine beliebig gegebene positive Zahl ist, so kann man die positive Zahl R so wählen, dass

$$|f(x)| > C$$

wird, sobald der absolute Werth von x grösser als R wird; oder geometrisch ausgedrückt: man kann in der x -Ebene einen Kreis um den Nullpunkt so beschreiben, dass ausserhalb dieses Kreises der absolute Werth von $f(x)$ nicht mehr unter C herabsinkt, wie gross auch C angenommen ist. Der Satz ist einleuchtend für den Fall einer einfachen Potenz x^n ; denn ist r der absolute Werth von x , so ist r^n der absolute Werth von x^n , und r^n ist, sobald r grösser als 1 geworden ist, grösser als r und wächst also mit r ins Unendliche.

Um den Satz allgemein zu beweisen, bezeichnen wir die absoluten Werthe von $x, a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ mit $r, c_0, c_1, c_2, \dots, c_n$. Dann ist

$$|f(x)| = r^n \left| a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \dots + \frac{a_n}{x^n} \right|, \quad (2)$$

und, weil nach den in der Einleitung bewiesenen Sätzen der absolute Werth einer Summe nicht kleiner als die Differenz und nicht grösser als die Summe der absoluten Werthe der Summanden sein kann,

$$\left| a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \cdots + \frac{a_n}{x^n} \right| \geq c_0 - \left| \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \cdots + \frac{a_n}{x^n} \right| \geq c_0 - \frac{c_1}{r} - \frac{c_2}{r^2} - \cdots - \frac{c_n}{r^n}.$$

Da die $c_0, c_1, \dots, c_n$ fest gegebene Constanten sind, so kann man R so gross wählen, dass, sobald $r > R$ ist,

$$\frac{c_1}{r} + \frac{c_2}{r^2} + \cdots + \frac{c_n}{r^n}$$

beliebig klein, z. B. kleiner als $\frac{1}{2}c_0$ wird; dann ist

$$\left| a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \cdots + \frac{a_n}{x^n} \right| > \frac{1}{2}c_0,$$

und also nach (2)

$$|f(x)| > \frac{1}{2}c_0 R^n,$$

also, wenn man

$$R^n > \frac{2C}{c_0} \quad (3)$$

annimmt,

$$|f(x)| > C.$$

Hieran schliesst sich der Satz:

V. $f(x)$ ist eine stetige Function von x .

Damit soll folgendes gesagt sein: Ist der absolute Werth von x kleiner als eine beliebige endliche Grösse R , so kann man, wie klein auch die positive Grösse ω angenommen wird, eine positive Grösse ε derart finden, dass

$$|f(x+h) - f(x)| < \omega \quad (4)$$

wird, so lange der absolute Werth ρ von h kleiner als ε bleibt, und zwar so, dass ε nur von der Wahl von ω , nicht aber von x abhängig ist.

Nach § 13, (2) ist

$$f(x+h) - f(x) = hf'(x) + \frac{h^2}{1 \cdot 2} f''(x) + \cdots + h^n a_0. \quad (5)$$

Nehmen wir nun den absoluten Werth von h kleiner als 1 an, so ist der absolute Werth der in der Klammer stehenden Grösse

$$f'(x) + \frac{h}{1 \cdot 2} f''(x) + \cdots + h^{n-1} a_0 \quad (6)$$

kleiner als eine bestimmte von Null verschiedene Zahl K , die man erhält, wenn man in (6) h durch 1, die Coefficienten $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ durch ihre absoluten Werthe und x durch R ersetzt, weil dadurch jedes einzelne Glied der Summe (6) durch seinen absoluten Werth oder durch eine grössere Zahl ersetzt wird. Wählt man ε so klein, dass

$$\varepsilon K < \omega,$$

so ist wegen (5) die Forderung (4) erfüllt, so lange $\rho < \varepsilon$ bleibt.

Wir können dem Satze von der Stetigkeit der Function $f(x)$ noch einen etwas anderen Ausdruck geben, der uns für die Folge wichtig ist. Nach dem Satze, dass der absolute Werth einer Summe von zwei Gliedern der Grösse nach zwischen der Summe und der Differenz der absoluten Werthe der Glieder liegt (vgl. Einleitung, S. 19), erhalten wir aus (5), wenn wir

$$\varphi(h) = hf'(x) + \frac{h^2}{1 \cdot 2} f''(x) + \cdots + h^n a_0$$

setzen,

$$|f(x)| - |\varphi(h)| < |f(x+h)| < |f(x)| + |\varphi(h)|,$$

oder

$$-|\varphi(h)| < |f(x+h)| - |f(x)| < |\varphi(h)|.$$

Nun ist, wenn $\rho < \varepsilon$ ist, $|\varphi(h)| < \omega$, und wir können also auch sagen:

VI. Der absolute Werth der Differenz

$$|f(x+h)| - |f(x)|$$

ist kleiner als eine beliebig gegebene Grösse ω , sobald der absolute Werth von h kleiner als ein genügend kleines ε ist.

Daraus können wir noch schliessen, wenn wir $x = y + iz$ setzen, und h entweder reell oder rein imaginär annehmen, dass $|f(y + zi)|$ bei feststehendem z eine stetige Function von y und bei feststehendem y eine stetige Function von z ist.

Sind die Coefficienten $a_0, a_1, \dots, a_n$ und die Variable x reell, so kann man x dem absoluten Werthe nach so gross wählen, dass das Vorzeichen von $f(x)$ mit dem Vorzeichen des ersten Gliedes $a_0 x^n$ übereinstimmt, also bei positivem a_0 und geradem n positiv, bei ungeradem n für negative x negativ und für positive x positiv wird.

Denn man kann in

$$f(x) = x^n \left(a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \dots + \frac{a_n}{x^n} \right)$$

x dem absoluten Werthe nach so gross wählen, dass der absolute Werth von

$$\frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \dots + \frac{a_n}{x^n}$$

unter den von a_0 heruntersinkt und also der Klammerausdruck

$$a_0 + \frac{a_1}{x} + \frac{a_2}{x^2} + \dots + \frac{a_n}{x^n}$$

das Vorzeichen von a_0 hat, was es dann für jedes absolut grössere x beibehält.

§ 32. Vorzeichenwechsel von $f(x)$. Wurzeln von Gleichungen ungeraden Grades und von reinen Gleichungen.

Auf Grund der Sätze des vorigen Paragraphen können wir das folgende wichtige Theorem beweisen.

VIII. Sind die Coefficienten von $f(x)$ reell und existiren zwei reelle Werthe a, b von x , so dass $f(a)$ und $f(b)$ entgegengesetzte Vorzeichen haben, so giebt es zwischen a und b wenigstens eine Wurzel ξ der Gleichung $f(x) = 0$.

Wir wollen annehmen, es sei $a < b$ und $f(a)$ negativ, $f(b)$ positiv. Wir theilen die Zahlen zwischen a und b so in zwei Theile $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, dass eine Zahl α zu $\mathfrak{A}$ gehört, wenn zwischen α und a , die Grenzen eingerechnet, kein x liegt, wofür $f(x)$ positiv wird, und eine Zahl β zu $\mathfrak{B}$, wenn zwischen β und a wenigstens ein Werth von x liegt, für den $f(x)$ positiv wird. Ein drittes ist offenbar nicht möglich und jede Zahl zwischen a und b ist also in $\mathfrak{A}$ oder in $\mathfrak{B}$ untergebracht. Wir rechnen noch die Zahlen, die kleiner als a sind, zu $\mathfrak{A}$, und die grösser als b sind, zu $\mathfrak{B}$.

Gehört α zu $\mathfrak{A}$, so gehört auch jedes x , was kleiner ist als α , zu $\mathfrak{A}$, und gehört β zu $\mathfrak{B}$, so gehört jedes grössere x zu $\mathfrak{B}$. Es ist also jedes β grösser als jedes α und die beiden Zahlengebiete $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ bilden einen Schnitt (Einleitung, S. 5) der durch eine Zahl ξ erzeugt wird, so dass jede Zahl α , die kleiner als ξ ist, zu $\mathfrak{A}$ gehört, jede Zahl β , die grösser als ξ ist, zu $\mathfrak{B}$.

Ist nun für irgend eine Zahl x_0 der Werth von $f(x_0)$ negativ oder positiv, so lässt sich nach V. des vorigen Paragraphen eine positive Grösse ε so bestimmen, dass für jedes x zwischen $x_0 - \varepsilon$ und $x_0 + \varepsilon$ die Werthe von $f(x)$ immer negativ oder immer positiv sind. Daraus ergibt sich, dass $f(\xi)$ weder negativ noch positiv sein kann und also Null sein muss. Denn wäre $f(\xi)$ negativ, so wäre auch $f(x)$ zwischen ξ und $\xi + \varepsilon$ negativ; diese Werthe würden also zu $\mathfrak{A}$ gehören, während sie doch grösser als ξ sind; und wäre $f(\xi)$ positiv, so wäre $f(x)$ positiv, so lange x zwischen $\xi - \varepsilon$ und ξ liegt; diese Werthe würden also, obwohl sie kleiner als ξ sind, zu $\mathfrak{B}$ gehören, und beides ist nach der Definition von ξ unmöglich. Ganz ähnlich kann geschlossen werden, wenn $f(a)$ positiv und $f(b)$ negativ ist, und unser Satz ist also erwiesen.

Hieraus ziehen wir zwei wichtige Folgerungen. Wenn $f(\xi)$ verschwindet, so lässt sich ein Intervall

$$\xi - \varepsilon < x < \xi + \varepsilon$$

so bestimmen, dass $f(x)$ ausser für $x = \xi$ in diesem Intervall nicht verschwindet. Es sind dann vier Fälle in Bezug auf die Vorzeichen von $f(x)$ in den beiden Intervallen $\xi - \varepsilon < x < \xi$ und $\xi < x < \xi + \varepsilon$ möglich, die im folgenden Schema zusammengestellt sind:

	$\xi - \varepsilon < x < \xi$	$\xi < x < \xi + \varepsilon$
1.	+	—
2.	—	+
3.	+	+
4.	—	—

Ist $f^{(\nu)}(x)$ die erste unter den Derivirten von $f(x)$, die für $x = \xi$ von Null verschieden ist, so zeigt die Formel [§ 13, (2)]

$$f(\xi + h) = \frac{h^\nu}{\Pi(\nu)} f^{(\nu)}(\xi) + \dots,$$

dass diese vier Fälle durch folgende Kennzeichen unterschieden sind:

1. ν ungerade, $f^{(\nu)}(\xi) < 0$,
2. ν ungerade, $f^{(\nu)}(\xi) > 0$,
3. ν gerade, $f^{(\nu)}(\xi) > 0$,
4. ν gerade, $f^{(\nu)}(\xi) < 0$.

Wir sagen, dass im ersten Falle $f(x)$ abnehmend, im zweiten wachsend durch Null geht. Im Falle 3 ist $f(\xi) = 0$ ein Minimum, im Falle 4 ein Maximum.

Wenn insbesondere $f'(\xi)$ von Null verschieden, ξ also eine einfache Wurzel ist, so ist das positive oder negative Vorzeichen von $f'(\xi)$ das Kennzeichen für das Wachsen oder Abnehmen der Function $f(x)$ beim Durchgang von x durch ξ .

Wir beweisen mit diesen Hilfsmitteln noch zwei weitere wichtige Sätze.

IX. Die Gleichung

$$x^n - a = 0$$

hat, wenn a eine positive Zahl ist, eine und nur eine positive Wurzel.

Denn setzen wir

$$f(x) = x^n - a, \tag{1}$$

so ist $f(x)$ nach § 31, VII. für ein hinlänglich grosses positives x positiv, und für $x = 0$ negativ; also giebt es einen positiven Werth von x , den man mit $\sqrt[n]{a}$ bezeichnet, für den $f(x)$ verschwindet. Dass es aber nur einen solchen Werth geben kann, folgt daraus, dass x^n , so lange x positiv bleibt, mit x fortwährend wächst.

Ist n ungerade, so existirt auch für negative a eine und nur eine negative Wurzel von (1), was ebenso bewiesen wird.

X. Eine Gleichung ungeraden Grades mit reellen Coefficienten hat immer wenigstens eine reelle Wurzel.

Denn nach Satz VII. kann $f(x)$, wenn der Grad ungerade ist, sowohl positiv als negativ werden und $f(x) = 0$ hat also nach VIII. eine Wurzel.

Wir beweisen endlich noch:

XI. Eine reine Gleichung hat immer eine Wurzel.

Unter einer reinen Gleichung verstehen wir eine Gleichung von der Form

$$x^n - a = 0, \quad (2)$$

wo a eine beliebige complexe Grösse ist. Dass diese Gleichung für ein reelles positives a immer eine Wurzel hat, ist oben schon bewiesen, und für $a = 0$ wird sie offenbar durch $x = 0$ befriedigt.

Der allgemeine Beweis kann in zwei Theile zerlegt werden; es genügt nämlich, wenn wir zunächst $n = 2$, dann n ungerade voraussetzen. Denn existirt die Grösse $\sqrt{a}$ und $\sqrt[n]{a}$ oder $\sqrt[n]{a}$ für jedes a , so ist also auch die Existenz von $\sqrt[n]{a}$ für jedes beliebige n sichergestellt. Es würde sogar genügen, die Existenz von $\sqrt[n]{a}$ für den Fall zu beweisen, dass n eine Primzahl ist. Daraus ist aber zunächst kein besonderer Vortheil zu ziehen.

Wir bezeichnen die complexe Grösse a mit $b + ci$ und setzen, da x im Allgemeinen auch complex sein wird,

$$x = y + iz.$$

Dann haben wir zunächst zu zeigen, dass

$$(y + iz)^2 = b + ic, \quad (3)$$

welche reellen Werthe auch b, c haben mögen, durch reelle y, z befriedigt werden kann. Die Gleichung (3) ist aber erfüllt, wenn

$$y^2 - z^2 = b, \quad 2yz = c, \quad (4)$$

also

$$(y^2 + z^2)^2 = b^2 + c^2$$

und folglich

$$y^2 + z^2 = \sqrt{b^2 + c^2}. \quad (5)$$

Nach IX. existirt immer eine positive Quadratwurzel $\sqrt{b^2 + c^2}$. Aus (4) und (5) folgt nun

$$y^2 = \frac{b + \sqrt{b^2 + c^2}}{2}, \quad z^2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 + c^2}}{2},$$

und die beiden Grössen $\pm b + \sqrt{b^2 + c^2}$ sind offenbar positiv, da $b^2 + c^2 > b^2$, also auch $\sqrt{b^2 + c^2} > \sqrt{b^2}$. Wir erhalten daraus

$$y = \pm \sqrt{\frac{b + \sqrt{b^2 + c^2}}{2}}, \quad z = \pm \sqrt{\frac{-b + \sqrt{b^2 + c^2}}{2}},$$

worin aber das eine Vorzeichen durch das andere bestimmt ist durch die Bedingung

$$2yz = c;$$

eines der beiden Vorzeichen aber bleibt willkürlich, so dass wir nicht nur eine, sondern zwei (entgegengesetzte) Lösungen von (3) erhalten.

Es sei ferner n ungerade; wir nehmen die zu lösende Gleichung in der Form an:

$$(y + iz)^n = b + ci. \quad (6)$$

Ist $c = 0$, also a reell, so können wir $z = 0$ setzen und erhalten nach IX. einen reellen Werth von x . Nehmen wir aber c von Null verschieden an, so folgt aus (6) (Einleitung, S. 19)

$$(y - iz)^n = b - ci. \quad (7)$$

Multiplizieren wir die beiden Gleichungen (6), (7) mit einander, so folgt

$$(y^2 + z^2)^n = b^2 + c^2,$$

und daraus (nach IX.)

$$y^2 + z^2 = \sqrt[n]{b^2 + c^2}, \quad (8)$$

wodurch der absolute Werth von x bestimmt ist. Es ergibt sich ferner aus (6) und (7):

$$\varphi(y, z) = (y - iz)^n(b + ic) - (y + iz)^n(b - ci) = 0. \quad (9)$$

Nun ist $\varphi(y, z)$ eine ganze homogene Function n ten Grades der beiden Veränderlichen y, z , und zwar mit reellen Coefficienten (da die Vertauschung von i mit $-i$ in $\varphi(y, z)$ nichts ändert), und wenn wir nach absteigenden Potenzen von y ordnen, so ist das erste Glied $2ciy^n$, also nach Voraussetzung von Null verschieden. Setzen wir nun

$$y = \lambda z,$$

so erhalten wir aus (9)

$$\varphi(\lambda, 1) = 0, \quad (10)$$

also eine Gleichung n ten Grades für λ , die nach X. gewiss eine Wurzel hat. Ist λ bestimmt, so folgt aus (8)

$$y = \lambda \sqrt[n]{\frac{b^2 + c^2}{1 + \lambda^2}}, \quad z = \sqrt[n]{\frac{b^2 + c^2}{1 + \lambda^2}}. \quad (11)$$

Hierdurch sind die Gleichungen (8), (9) thatsächlich befriedigt; aus (9) aber folgt

$$\frac{(y + iz)^n}{b + ic} = \frac{(y - iz)^n}{b - ci},$$

und aus (8), dass der gemeinsame Werth dieser beiden Brüche $+1$ ist. Wir haben daher

$$(y + iz)^n = \pm(b + ci), \quad (y - iz)^n = \pm(b - ci),$$

und es kann also das Vorzeichen der Quadratwurzel in (11) so bestimmt werden, dass die Gleichungen (6) und (7) erfüllt sind.

§ 33. Lösung reiner Gleichungen durch trigonometrische Functionen.

Weit vollständiger und einfacher kann die Auflösbarkeit einer reinen Gleichung dargethan werden, wenn man die trigonometrischen Functionen und ihre einfachsten Eigenschaften als bekannt voraussetzt. Freilich sind diese Functionen der eigentlichen Algebra fremd und darum ist es befriedigender, die principiellen Fragen, so wie es im Vorhergehenden geschehen ist und auch noch später geschehen soll, ohne ihre Hülfe zu beantworten. Für die Anwendung und eine bequemere Anschauung wollen wir aber dieses Hilfsmittel doch nicht entbehren.

Setzen wir, wenn b, c reelle Zahlen sind,

$$b = r \cos \varphi, \quad c = r \sin \varphi, \quad (1)$$

so ist, wenn wir r positiv annehmen, der Winkel φ hierdurch bis auf ein Vielfaches von 2π bestimmt. Er wird völlig bestimmt sein, wenn wir ein Intervall von der Grösse 2π festsetzen, in dem er liegen soll, z. B.

$$-\pi < \varphi \leq \pi.$$

In geometrischer Auffassung sind r, φ die Polarcoordinaten des Punktes, dessen rechtwinklige Coordinaten b, c sind. r ist der absolute Werth der complexen Grösse $a = b + ci$ und φ wollen wir die Phase dieser complexen Grösse nennen.

Das Product zweier complexen Grössen

$$a = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad a' = r'(\cos \varphi' + i \sin \varphi')$$

ergiebt sich in der Form

$$aa' = rr'[\cos(\varphi + \varphi') + i \sin(\varphi + \varphi')], \quad (3)$$

und daraus erhält man, wenn n eine beliebige ganze positive (oder selbst negative) Zahl ist, den nach Moivre benannten Lehrsatz

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi, \quad (4)$$

der dazu geführt hat, die Grösse $\cos \varphi + i \sin \varphi$ als Exponentialfunction mit imaginärem Exponenten zu betrachten, und demnach

$$\cos \varphi + i \sin \varphi = e^{i\varphi}$$

zu setzen. Dadurch erhalten die Formeln (3) und (4) die Gestalt

$$e^{i\varphi} e^{i\varphi'} = e^{i(\varphi + \varphi')}, \quad (e^{i\varphi})^n = e^{in\varphi}. \quad (5)$$

Wenn wir demnach

$$a = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \quad (6)$$

setzen und unter $\sqrt[n]{r}$ den nach § 32, IX. existirenden und völlig bestimmten positiven Werth verstehen, dessen n te Potenz $= r$ ist, so ist

$$x = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi}{n} + i \sin \frac{\varphi}{n} \right) \quad (7)$$

eine Grösse, deren n te Potenz $= a$ ist, also eine Wurzel der Gleichung

$$x^n = a, \quad (8)$$

wenn unter n eine beliebige positive ganze Zahl verstanden wird. Derselben Forderung genügt aber auch jeder der Werthe

$$x_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right), \quad (9)$$

wenn k eine beliebige ganze Zahl ist. In (9) sind aber nicht mehr als n verschiedene Werthe enthalten, die man erhält, wenn man

$$k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad (10)$$

setzt; denn vermehrt man k um ein Vielfaches von n , so ändert (9) seinen Werth nicht, während die n Werthe (10) lauter verschiedene Werthe von x ergeben, weil sie verschiedene Phasen haben.

Die Gleichung (8) hat demnach nicht nur eine, sondern n verschiedene Wurzeln. Die geometrischen Bilder der Werthe x_k liegen alle auf einem Kreise mit dem Radius $\sqrt[n]{r}$, und zwar um den Winkel $\frac{2\pi}{n}$ von einander entfernt. Man erhält den ersten dieser Punkte dadurch, dass man den gegebenen Winkel φ in n gleiche Theile theilt. Der Radius $\sqrt[n]{r}$ ist kleiner oder grösser als r , je nachdem r kleiner oder grösser als 1 ist. Die beistehende Figur zeigt diese Verhältnisse für $n = 3$ unter der Voraussetzung, dass $r > 1$ ist.




Fig. 1.

Man kann die verschiedenen Werthe von x_k dadurch erhalten, dass man den ersten von ihnen

$$x_0 = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi}{n} + i \sin \frac{\varphi}{n} \right)$$

mit den verschiedenen Werthen von

$$\xi_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n} \quad (11)$$

multiplicirt. Die Grössen ξ_k ,

$$\xi_k^n = 1, \quad (12)$$

sind Wurzeln der Gleichung $x^n = 1$, und heissen die n ten Einheitswurzeln. Es sind ihrer n und nur n verschiedene Werthe, von denen bei ungeradem n nur einer (für $k = 0$), bei geradem n zwei (für $k = 0$ und $k = \frac{n}{2}$) reell sind. Die geometrischen Bilder der n ten Einheitswurzeln sind die Eckpunkte eines dem Kreise mit dem Radius 1 einbeschriebenen regelmässigen n -Ecks. Ihre algebraische Bestimmung ist Gegenstand der Kreistheilungslehre. Bezeichnen wir den Werth von ξ_k für $k = 1$ mit ε , setzen also

$$\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n},$$

so ist nach dem Moivre'schen Satze

$$\xi_k = \varepsilon^k,$$

so dass alle n ten Einheitswurzeln als Potenzen von einer unter ihnen dargestellt sind.

§ 34. Befreiung einer Gleichung vom zweiten Gliede.

Die Gewissheit der Existenz der Wurzeln reiner Gleichungen setzt uns in den Stand, die Wurzelexistenz bei den Gleichungen zweiten, dritten und vierten Grades oder, wie man auch sagt, bei den quadratischen, cubischen und biquadratischen Gleichungen, nachzuweisen, indem wir die Bestimmung ihrer Wurzeln auf die Lösung reiner Gleichungen zurückführen. Wir werden auf diese Frage später von verschiedenen allgemeineren Standpunkten zurückkommen, besprechen aber hier in der Kürze die älteren Methoden der Auflösung, die, wenn sie auch wenig Einblick in den allgemeinen Zusammenhang dieser Frage gewähren, doch in der Anwendung sehr einfach sind. Sie erwecken den Schein, als ob es sich um eine der Verallgemeinerung auf höhere Gleichungen fähige Methode handle, was aber nicht der Fall ist. Zunächst folgende allgemeine Bemerkung.

Nehmen wir der Einfachheit halber in der Function

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n \quad (1)$$

den Coefficienten von x^n gleich 1 an, was man im Allgemeinen durch Division mit dem Coefficienten von x^n erreicht, so können wir durch eine einfache Substitution

$$x = y - \frac{a_1}{n}, \quad (2)$$

$f(x)$ in eine andere Function n ten Grades $\varphi(y)$ transformiren, in der das zweite Glied y^{n-1} nicht vorkommt; denn es ist nach dem binomischen Lehrsatz

$$\begin{aligned} x^n &= y^n - a_1 y^{n-1} + \frac{n-1}{2n} a_1^2 y^{n-2} + \dots, \\ x^{n-1} &= y^{n-1} - \frac{n-1}{n} a_1 y^{n-2} + \dots, \quad x^{n-2} = y^{n-2} - \dots, \end{aligned}$$

also

$$f(x) = y^n + \left(a_2 - \frac{n-1}{2n} a_1^2 \right) y^{n-2} + \dots.$$

Wenn wir die Transformation für die Fälle $n = 2, 3, 4$ wirklich ausführen, so erhalten wir

$$\begin{aligned} n = 2, \quad \varphi(y) &= y^2 + a, \\ n = 3, \quad \varphi(y) &= y^3 + ay + b, \\ n = 4, \quad \varphi(y) &= y^4 + ay^2 + by + c, \end{aligned} \quad (3)$$

wenn wir setzen

$$\begin{aligned} \text{für } n = 2: \quad a &= -\frac{a_1^2}{4} + a_2, \\ \text{für } n = 3: \quad a &= -\frac{a_1^2}{3} + a_2, \\ b &= \frac{2a_1^3}{27} - \frac{a_1a_2}{3} + a_3, \\ \text{für } n = 4: \quad a &= -\frac{3a_1^2}{8} + a_2, \\ b &= \frac{a_1^3}{8} - \frac{a_1a_2}{2} + a_3, \\ c &= -\frac{3a_1^4}{256} + \frac{a_1^2a_2}{16} - \frac{a_1a_3}{4} + a_4. \end{aligned} \quad (4)$$

und die Lösung der Gleichung $f(x) = 0$ ist durch (2) auf die Lösung von $\varphi(y) = 0$ zurückgeführt. Diese ergibt zunächst für $n = 2$

$$y = \pm\sqrt{-a},$$

und folglich

$$x = -\frac{a_1}{2} \pm \sqrt{\frac{a_1^2}{4} - a_2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2}.$$

Wir haben also zwei Wurzeln

$$\alpha = \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2}, \quad \beta = \frac{-a_1 - \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2}. \quad (5)$$

§ 35. Cubische Gleichungen. Cardanische Formel.

Die Gleichung dritten Grades nehmen wir in der reducirten Form an

$$y^3 + ay + b = 0 \quad (1)$$

und führen zwei neue Unbekannte u, v ein, indem wir

$$y = u + v \quad (2)$$

setzen. Dies in (1) eingesetzt, ergibt

$$u^3 + v^3 + (3uv + a)(u + v) + b = 0. \quad (3)$$

Wir bestimmen eine der beiden Größen u, v durch die andere nach der Gleichung

$$3uv = -a, \quad (4)$$

und erhalten aus (3)

$$u^3 + v^3 = -b. \quad (5)$$

Aus (4) und (5) aber lassen sich u^3 und v^3 durch eine Quadratwurzel bestimmen. Man erhält nämlich

$$(u^3 - v^3)^2 = (u^3 + v^3)^2 - 4u^3v^3 = b^2 + \frac{4a^3}{27}. \quad (6)$$

Setzen wir zur Abkürzung

$$R = \frac{b^2}{4} + \frac{a^3}{27}, \quad (7)$$

so findet sich

$$u^3 - v^3 = 2\sqrt{R}.$$

Wir geben der $\sqrt{R}$ eines der beiden Zeichen und erhalten nach (5)

$$\begin{aligned} u^3 &= -\frac{b}{2} + \sqrt{R}, & v^3 &= -\frac{b}{2} - \sqrt{R}, \\ u &= \sqrt[3]{-\frac{b}{2} + \sqrt{R}}, & v &= \sqrt[3]{-\frac{b}{2} - \sqrt{R}}, \end{aligned} \quad (8)$$

und also

$$y = \sqrt[3]{-\frac{b}{2} + \sqrt{R}} + \sqrt[3]{-\frac{b}{2} - \sqrt{R}}. \quad (9)$$

Die Multiplication der beiden Ausdrücke (8) ergibt

$$u^3 v^3 = -\frac{a^3}{27}$$

und zeigt, dass, wenn für u ein bestimmter unter den drei Werthen der Cubikwurzel genommen wird,

$$v = -\frac{a}{3u} = -\frac{a}{3\sqrt[3]{-\frac{b}{2} + \sqrt{R}}} \quad (10)$$

jedenfalls einer der drei Werthe von $\sqrt[3]{-\frac{b}{2} - \sqrt{R}}$ ist. Aus (4) folgt aber, dass, nur wenn wir diesen Werth für v nehmen, die Gleichung (1) durch $y = u + v$ befriedigt ist. Wir erhalten so, den drei Werthen von u entsprechend, drei Wurzeln der Gleichung (1). Aus der Existenz einer Wurzel der cubischen Gleichung ergibt sich aber auch daraus schon die Existenz von dreien, dass bereits nachgewiesen ist, dass die quadratische Gleichung zwei Wurzeln hat.

Um aus der einen Wurzel (9) die beiden anderen abzuleiten, setzen wir

$$\alpha = u + v$$

und dividiren $y^3 + ay + b$ durch $y - \alpha$. Der Quotient, dessen Wurzeln die beiden anderen Wurzeln β, γ der cubischen Gleichung (1) sind, ist

$$y^2 + \alpha y + \alpha^2 + a = 0,$$

woraus man nach (4) des vorigen Paragraphen

$$y = \frac{-\alpha \pm \sqrt{-3\alpha^2 - 4a}}{2}$$

findet. Setzt man hierin $\alpha = u + v$, und nach (4) $a = -3uv$, so folgt

$$y = \frac{-(u+v) \pm \sqrt{-3(u+v)^2 + 12uv}}{2} = \frac{-(u+v) \pm \sqrt{-3}(u-v)}{2}.$$

Setzen wir also

$$\varepsilon = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}, \quad (11)$$

woraus

$$\varepsilon^3 = 1, \quad \varepsilon^2 + \varepsilon + 1 = 0, \quad \varepsilon^2 = \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} \quad (12)$$

folgt, so erhält man die drei Wurzeln der cubischen Gleichung (1)

$$\begin{aligned}\alpha &= u + v, \\ \beta &= \varepsilon u + \varepsilon^2 v, \\ \gamma &= \varepsilon^2 u + \varepsilon v.\end{aligned}\tag{13}$$

Darin ist ε eine von 1 verschiedene dritte Einheitswurzel, die hier ohne die trigonometrischen Functionen algebraisch ausgedrückt ist. Setzt man εu oder $\varepsilon^2 u$ für u , also $\varepsilon^2 v$, εv für v , so vertauschen sich die drei Grössen α, β, γ unter einander.

Der Ausdruck (9) für die Wurzel einer cubischen Gleichung wird die Cardanische Formel genannt.

§ 36. Der Cayley'sche Ausdruck der Cardanischen Formel.

Jede Cubikwurzel hat, wie wir gesehen haben, drei verschiedene Werthe, die man aus einem von ihnen erhält durch Multiplication mit $1, \varepsilon, \varepsilon^2$. So hat also auch jede der beiden Grössen u, v , wie sie durch (8), § 35 definirt sind, drei Werthe und die Summe $u + v$ hat also, wenn man nur die Bedingungen (8) berücksichtigt, neun verschiedene Werthe; von diesen geben aber nur drei Lösungen der cubischen Gleichung, und erst durch Zuziehung der Relation (4), § 35

$$3uv = -a\tag{1}$$

werden unter den neun Werthen die brauchbaren ausgesondert. Dies ist ein Mangel der Cardanischen Formel, die hiernach für sich noch nicht genügt, um die Wurzeln der cubischen Gleichung eindeutig zu geben. Diesem Mangel hat Cayley durch die folgende Darstellung abgeholfen. Man definire zwei neue Grössen ξ, η durch die Gleichungen

$$u = \xi^2 \eta, \quad v = \xi \eta^2,\tag{2}$$

woraus sich durch Multiplication mit Benutzung von (1)

$$\xi \eta = \sqrt[3]{-\frac{a}{3}}\tag{3}$$

ergiebt; folglich ist, wenn dieser Werth in (2) eingesetzt und für u, v ihre Ausdrücke § 35, (8) substituirt werden,

$$\xi = \sqrt[3]{\frac{3b}{2a} + \sqrt{\frac{9b^2}{4a^2} + \frac{a}{3}}}, \quad \eta = \sqrt[3]{\frac{3b}{2a} - \sqrt{\frac{9b^2}{4a^2} + \frac{a}{3}}},\tag{4}$$

und wenn man also jetzt die Wurzel y der cubischen Gleichung in die Form

$$y = \xi \eta (\xi + \eta)\tag{5}$$

setzt, so erhält man einen Ausdruck, der, wenn man, von einander unabhängig, ξ durch $\xi, \varepsilon \xi, \varepsilon^2 \xi$, und η durch $\eta, \varepsilon \eta, \varepsilon^2 \eta$ ersetzt, nicht neun sondern nur die drei Werthe

$$\begin{aligned}\xi^2 \eta + \xi \eta^2, \\ \varepsilon \xi^2 \eta + \varepsilon^2 \xi \eta^2, \\ \varepsilon^2 \xi^2 \eta + \varepsilon \xi \eta^2\end{aligned}$$

annimmt.⁹

⁹Cayley, Phil. Mag. vol. XXI, 1861. Collected mathematical papers vol. V, Nr. 310.

§ 37. Die biquadratische Gleichung.

Ein ähnlicher Weg, wie bei der Lösung der cubischen Gleichung durch die Cardanische Formel, lässt sich zur Lösung der Gleichung vierten Grades

$$y^4 + ay^2 + by + c = 0 \quad (1)$$

einschlagen. Wir setzen

$$2y = u + v + w$$

und erhalten, wenn wir zur Abkürzung

$$s = u^2 + v^2 + w^2, \quad t = v^2w^2 + w^2u^2 + u^2v^2 \quad (2)$$

setzen,

$$\begin{aligned} 4y^2 &= s + 2(vw + wu + uv), \\ 16y^4 &= s^2 + 4s(vw + wu + uv) + 4t + 8uvw(u + v + w). \end{aligned}$$

Wenn man dies in (1) einsetzt, so findet sich

$$s^2 + 4t + 4as + 16c + 8(uvw + b)(u + v + w) + 4(s + 2a)(vw + wu + uv) = 0.$$

Diese Gleichung wird aber durch die Annahme befriedigt

$$s + 2a = 0, \quad uvw + b = 0, \quad s^2 + 4t + 4as + 16c = 0.$$

Mit Hülfe der ersten dieser drei Gleichungen wird die dritte

$$t = a^2 - 4c,$$

und, wenn man für s, t die Werthe (2) zurücksetzt,

$$\begin{aligned} u^2 + v^2 + w^2 &= -2a, \\ v^2w^2 + w^2u^2 + u^2v^2 &= a^2 - 4c, \\ uvw &= -b. \end{aligned} \quad (3)$$

Nach § 7 sind diese Gleichungen dann und nur dann befriedigt, wenn u^2, v^2, w^2 die Wurzeln der cubischen Gleichung

$$z^3 + 2az^2 + (a^2 - 4c)z - b^2 = 0 \quad (4)$$

sind, und wenn die Vorzeichen von u, v, w so bestimmt werden, dass die letzte der Gleichungen (3) befriedigt ist. Diese letztere Bedingung lässt noch vier verschiedene Vorzeichenbestimmungen zu, so dass man die vier Wurzeln der biquadratischen Gleichung in folgender Weise erhält:

$$\begin{aligned} 2\alpha &= u + v + w, \\ 2\beta &= u - v - w, \\ 2\gamma &= -u + v - w, \\ 2\delta &= -u - v + w. \end{aligned} \quad (5)$$

Die Lösung der biquadratischen Gleichung ist damit auf die der cubischen Gleichung (4) zurückgeführt.

Diese Gleichung heisst eine cubische Resolvente der biquadratischen Gleichung.

§ 38. Beweis des Fundamentalsatzes.

Wir gehen nun an den Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra, dass jede Gleichung $f(x) = 0$ wenigstens eine Wurzel hat. Wir schicken einige allgemeine Sätze voraus:

1. Wenn S ein beliebiges System reeller Zahlen bedeutet, die alle grösser sind als eine bestimmte positive oder negative Zahl C (d. h. ein System, das keine unendlichen negativen Zahlen enthält), so existirt eine untere Grenze für die Zahlen S .

Unter einer unteren Grenze g ist eine solche Zahl zu verstehen, die von keiner Zahl des Systems S unterschritten wird, aber so beschaffen, dass, wenn d eine beliebig gegebene positive Grösse ist, zwischen g und $g + d$ (mit Einschluss der Grenzen) immer noch wenigstens eine Zahl des Systems S liegt, wie klein auch d sein mag.

Der Beweis ergibt sich unmittelbar aus der Möglichkeit eines Schnittes ($\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$), den man so construirt, dass man eine Zahl α nach $\mathfrak{A}$ wirft, wenn sie von keiner Zahl des Systems S unterschritten wird, und eine Zahl β nach $\mathfrak{B}$, wenn sie wenigstens von einer Zahl in S unterschritten wird. Die durch diesen Schnitt bestimmte Zahl g wird von keiner Zahl in S unterschritten, denn sonst gäbe es auch Zahlen, die kleiner als g sind, und also zu $\mathfrak{A}$ gehören, und die doch von Zahlen in S unterschritten werden, während andererseits jede noch so wenig über g liegende Zahl β zu $\mathfrak{B}$ gehört und also von einer Zahl in S unterschritten wird. Das sind aber die charakteristischen Merkmale der unteren Grenze.

2. Ist S' ein Theil von S , so haben auch die Zahlen S' eine untere Grenze g' , und diese ist entweder gleich g oder grösser als g .

Denn kleiner als g kann sie nicht sein, da sonst Zahlen in S' und folglich auch in S vorkämen, die unter g liegen.

Es sei nun $f(x)$ eine reelle Function von x , die in dem Intervall

$$a \leq x \leq b \quad (1)$$

nur endliche Werthe hat, und die ausserdem in diesem Intervall stetig ist; das will, in Uebereinstimmung mit §31, V und VI, besagen, dass

$$f(x \pm h) - f(x) \quad (2)$$

dem absoluten Werthe nach in dem ganzen Intervall unter einer beliebig gegebenen Zahl η liegt, wenn das positive h kleiner als eine gewisse Zahl ε ist. Für $x = a$ nehmen wir in (2) nur das obere, für $x = b$ nur das untere Zeichen, um mit $x \pm h$ nicht aus dem Intervall herauszukommen.

Für die Werthe einer solchen Function in dem Intervall giebt es nach 1. eine untere Grenze g , und wir beweisen nun den Satz:

3. Dass die Function $f(x)$ den Werth g für irgend einen Werth ξ des Intervalles annimmt, wonach die untere Grenze zu einem Minimum der Function $f(x)$ in dem Intervall wird.

Der Beweis ist folgender. Die untere Grenze der Functionswerthe in einem Theil des Intervalles (1) ist nach 2. entweder gleich oder grösser als g .

Wenn nun $f(a) = g$ ist, so ist das zu Beweisende richtig; ist aber $f(a) > g$, so kann man wegen der Stetigkeit von $f(x)$ ein Intervall $a \leq x \leq a + h$ angeben, in dem $f(x) > g$ bleibt und also die untere Grenze von $f(x)$ grösser als g ist.

Wir construiren nun in dem Intervall (1) einen Schnitt ($\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$) der Art, dass wir einen Werth α des Intervalles (1) zu $\mathfrak{A}$ rechnen, wenn die untere Grenze von $f(x)$ in dem Intervall $a \leq x \leq \alpha$ grösser als g ist, und einen Werth β zu $\mathfrak{B}$, wenn die untere Grenze im Intervall $a \leq x \leq \beta$ gleich g ist.

$\mathfrak{B}$ kann möglicherweise aus dem einzigen Werthe b bestehen; dann aber muss $f(b) = g$ sein, und unsere Behauptung ist für $x = b$ erfüllt. Denn wäre $f(b) > g$, so könnte man eine Grösse g' zwischen $f(b)$ und g und wegen der Stetigkeit ein Intervall $b - h \leq x \leq b$ so annehmen, dass in diesem Intervall alle Functionswerthe $f(x)$ grösser als g' , ihre untere Grenze also gleich oder grösser

als g' und daher sicher grösser als g wäre. Da aber $b - h$ zu $\mathfrak{A}$ gehört, so ist auch in dem Intervall $a \leq x \leq b - h$ und folglich in dem ganzen Intervall (1) die untere Grenze grösser als g , gegen die Annahme.

Ist also $f(b) > g$, so definirt der Schnitt $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ eine Zahl ξ im Inneren des Intervalles (1), von der wir nun zeigen können, dass

$$f(\xi) = g \quad (3)$$

sein muss.

Ist $f(\xi) > g$ und $f(\xi) > g' > g$, so können wir wegen der Stetigkeit von $f(x)$ ein Intervall

$$\xi - h \leq x \leq \xi + h$$

bestimmen, in dem alle Functionswerthe $f(x)$ grösser als g' und also ihre untere Grenze grösser als g ist. Da aber $\xi - h$ zu $\mathfrak{A}$ gehört, so ist auch in dem ganzen Intervall $a \leq x \leq \xi + h$ die untere Grenze von $f(x)$ grösser als g , während doch $\xi + h$ zu $\mathfrak{B}$ gehört, worin der Widerspruch liegt.

Es sei jetzt $f(x)$ eine ganze rationale Function mit beliebigen complexen oder reellen Coefficienten, und die Variable x soll gleichfalls complexe Werthe haben können.

Nach §31, IV kann, wenn C ein beliebiger positiver Werth ist, die positive Grösse R so angenommen werden, dass

$$|f(x)| > C \quad (4)$$

ist, sobald

$$|x| \geq R \quad (5)$$

wird. Zur Veranschaulichung stellen wir das durch die Ungleichung

$$|x| < R$$

begrenzte Gebiet (R) für die Variable $x = y + iz$ durch eine Kreisfläche vom Radius R in der Ebene der Variablen $x = y + iz$ dar.

Wenn wir C grösser annehmen, als irgend einen Werth von $|f(x)|$ im Inneren des Gebietes (R) , zum Beispiel grösser als $|f(0)|$, so wird $|f(x)|$ gewiss im Inneren des Gebietes (R) kleiner werden als an der Begrenzung. Da nun im ganzen Inneren von (R) die Function $|f(x)|$, die wir zur Abkürzung jetzt mit X bezeichnen wollen, nicht negativ wird, so giebt es für die Werthe von X eine untere Grenze g , und wir haben den Satz zu beweisen:

4. Es existirt ein Werth ξ von x im Inneren des Gebietes (R) , so dass

$$|f(\xi)| = g \quad (6)$$

wird, dass also die untere Grenze auch hier ein Minimum ist.


Die untere Grenze von X in irgend einem Theile des Bereiches ist entweder gleich g oder grösser als g .

Ein Grössengebiet, das durch die Ungleichheitsbedingungen

$$|x| \leq R, \quad -R \leq y \leq \alpha \quad (7)$$

bestimmt ist, wird in unserer Fig. 2 durch das Segment $(PQ\alpha Q')$, das wir das Segment (P, α) nennen wollen, dargestellt.

Fig. 2.



Wir bestimmen nun zunächst einen Werth η von y durch einen Schnitt ($\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$) folgendermassen: Eine Zahl α zwischen $-R$ und $+R$ wird in $\mathfrak{A}$ aufgenommen, wenn die untere Grenze von X in dem Segment (P, α) grösser als g ist, und ein Werth β wird in $\mathfrak{B}$ aufgenommen, wenn die untere Grenze von X in dem Segment (P, β) gleich g ist. Dieser Schnitt ($\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$) definiert eine Zahl η von der Eigenschaft, dass die untere Grenze von X in dem Bereich (P, γ) , wenn $\gamma < \eta$ ist, grösser als g , und wenn $\gamma > \eta$ ist, gleich g ist.

Nun ist nach §31, VI

$$|f(\eta + iz)|$$

eine stetige Function von z in dem Intervall

$$-\sqrt{R^2 - \eta^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - \eta^2}, \quad (8)$$

was in der Fig. 2 durch M, M' bezeichnet ist.

Diese Function erhält also nach 3. für irgend einen Werth ζ von z in diesem Intervall einen Minimumwerth γ , so dass, wenn

$$\xi = \eta + i\zeta$$

gesetzt wird,

$$|f(\xi)| = \gamma \quad (9)$$

wird.

Es ist nun ferner leicht einzusehen, dass $\gamma = g$ sein muss, denn da g die untere Grenze aller Werthe von X innerhalb (R) ist, so kann γ zunächst nicht kleiner als g sein.

Es kann aber γ auch nicht grösser als g sein; denn alle Werthe, die X auf der Strecke MM' annimmt, sind $\geq \gamma$; ist aber $\gamma > g$, so kann man eine Grösse g' so annehmen, dass $\gamma > g' > g$ ist, und wegen der in §31, VI bewiesenen Stetigkeit von X lassen sich die Zahlen α, β so bestimmen, dass

$$\alpha < \eta < \beta$$

und dass in dem ganzen Bereich $(P, \beta) - (P, \alpha) = (\alpha, \beta)$ ($QNN'Q'$ in der Fig. 2) X grösser als g' bleibt. Folglich ist die untere Grenze von X in (α, β) grösser als g . Da nun die untere Grenze von X in (P, α) grösser als g ist, so ist sie auch in (P, β) , was aus (P, α) und (α, β) zusammengesetzt ist, grösser als g ; β gehört aber zu $\mathfrak{B}$, woraus ein Widerspruch mit der Definition von $\mathfrak{B}$ folgen würde.

Es bleibt also nur übrig, dass $\gamma = g$ ist, und der Satz 4. ist damit nachgewiesen, nämlich, dass es einen Werth ξ im Inneren von (R) giebt, für den

$$|f(\xi)| = g$$

ist, dass also $|f(x)|$ einen Minimumwerth erreicht. Wir beweisen nun:

5. Wenn α irgend ein Werth von x ist, für den $f(\alpha)$ von Null verschieden ist, so lässt sich h so annehmen, dass

$$|f(\alpha + h)| < |f(\alpha)| \quad (10)$$

ausfällt.

Daraus folgt dann, dass, wenn $f(\xi)$ von Null verschieden wäre, g nicht das Minimum der Function $|f(x)|$ sein könnte; da dies aber bewiesen ist, so muss

$$f(\xi) = 0 \quad (11)$$

sein, und ξ ist eine Wurzel der Gleichung $f(x) = 0$. Der Fundamentalsatz wird also dann bewiesen sein.

Beim Beweise von 5. machen wir Gebrauch von dem schon bewiesenen Satz (§ 32), dass eine reine Gleichung immer eine Wurzel hat.

Von den derivirten Functionen $f'(\alpha), f''(\alpha), \dots$ können einige verschwinden; die letzte $f^{(n)}(\alpha)$, die gleich $\Pi(n)a_0$ ist, ist aber von Null verschieden; es mögen also $f'(\alpha), f''(\alpha), \dots, f^{(m-1)}(\alpha)$ verschwinden, $f^{(m)}(\alpha)$ nicht verschwinden. Wir haben dann nach § 13

$$f(\alpha + h) = f(\alpha) + \frac{h^m}{\Pi(m)} f^{(m)}(\alpha) + \frac{h^{m+1}}{\Pi(m+1)} f^{(m+1)}(\alpha) + \dots \quad (12)$$

Wir wählen, was nach § 31, V stets möglich ist, eine positive Zahl ε so, dass

$$\left| \frac{h}{m+1} \frac{f^{(m+1)}(\alpha)}{f^{(m)}(\alpha)} + \frac{h^2}{(m+1)(m+2)} \frac{f^{(m+2)}(\alpha)}{f^{(m)}(\alpha)} + \dots \right| < 1 \quad (13)$$

ist, sobald

$$|h| < \varepsilon, \quad (14)$$

und einen positiven echten Bruch δ so, dass

$$\delta |f(\alpha)| < \left| \frac{\varepsilon^m f^{(m)}(\alpha)}{\Pi(m)} \right|, \quad (15)$$

was, wenn $f(\alpha)$ nicht verschwindet, gleichfalls möglich ist. Dann bestimmen wir (auf Grund von § 32) h aus der Gleichung

$$\frac{h^m f^{(m)}(\alpha)}{\Pi(m)} = -\delta f(\alpha), \quad (16)$$

woraus nach (15)

$$|h| < \varepsilon$$

folgt. Aus (12) ergibt sich jetzt, wenn man für h^m den Werth aus (16) setzt,

$$f(\alpha + h) = (1 - \delta)f(\alpha) - \delta f(\alpha) \left(\frac{h}{m+1} \frac{f^{(m+1)}(\alpha)}{f^{(m)}(\alpha)} + \frac{h^2}{(m+1)(m+2)} \frac{f^{(m+2)}(\alpha)}{f^{(m)}(\alpha)} + \dots \right),$$

also

$$\begin{aligned} |f(\alpha + h)| &\leq |f(\alpha)|(1 - \delta) \\ &\quad + \delta |f(\alpha)| \left| \frac{h}{m+1} \frac{f^{(m+1)}(\alpha)}{f^{(m)}(\alpha)} + \frac{h^2}{(m+1)(m+2)} \frac{f^{(m+2)}(\alpha)}{f^{(m)}(\alpha)} + \dots \right|. \end{aligned} \quad (17)$$

und wegen (13)

$$|f(\alpha + h)| < |f(\alpha)|. \quad (18)$$

Damit ist also der Beweis des Fundamentalsatzes beendet.

§ 39. Algorithmus zur Berechnung der Wurzeln.

Der im vorigen Paragraphen gegebene Beweis für die Existenz einer Wurzel einer algebraischen Gleichung lässt zwar an Bündigkeit nichts zu wünschen übrig, er hat aber noch den Mangel, dass er nicht die Schritte erkennen lässt, wie man eine Wurzel durch ein convergentes Rechnungsverfahren berechnen kann. Wir fügen also noch die folgenden Betrachtungen hinzu, die diesem Mangel, wenn auch nur theoretisch, abzuhelpen bestimmt sind. Sie geben noch einen zweiten Beweis des Fundamentalsatzes, der in der Hauptsache von Lipschitz herrührt (Lehrbuch der Analysis, Bd. I, § 61 ff.; eine Vereinfachung verdanke ich einer Mittheilung von Dedekind).

Wenn die beiden ganzen rationalen Functionen $f(x)$ und $f'(x)$ einen gemeinsamen Theiler haben, so kann dieser nach § 6 durch rationale Operationen gefunden und beseitigt werden. Wir dürfen also voraussetzen, dass $f(x)$ und $f'(x)$ keinen gemeinsamen Theiler haben, dass sie also für keinen Werth von x beide zugleich verschwinden.

Wir setzen nun voraus, dass die Wurzelberechnung für eine Function $(n-1)$ ten Grades schon gelungen sei, und nehmen demnach $f'(x)$ in lineare Factoren zerlegt an. Demnach sei, wenn

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots, \quad (1)$$

ist,

$$f'(x) = nx^{n-1} + (n-1)a_1 x^{n-2} + \dots = n(x - \beta_1)(x - \beta_2) \cdots (x - \beta_{n-1}), \quad (2)$$

worin die $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-1}$ als bekannte Zahlen angesehen werden, die auch theilweise identisch sein können. Nach unserer Voraussetzung werden die absoluten Werthe

$$|f(\beta_1)|, |f(\beta_2)|, \dots, |f(\beta_{n-1})|, \quad (3)$$

die wir mit

$$b_1, b_2, \dots, b_{n-1} \quad (4)$$

bezeichnen, alle von Null verschieden sein; wir wollen die Bezeichnung so gewählt annehmen, dass b_1 der kleinste unter ihnen sei, oder wenigstens keinen der anderen an Grösse übertrifft. Nach dem Satz 5., § 38 lässt sich dann ein Werth α von x so bestimmen, dass der absolute Werth a von $f(\alpha)$ kleiner als b_1 wird, also:

$$a < b_1, b_2, \dots, b_{n-1}. \quad (5)$$

Wir begrenzen nun ein Gebiet G für die Variable x derart, dass ausserhalb dieses Gebietes der absolute Werth von $f(x)$ immer grösser als a ist, so dass G alle Punkte x enthält, in denen $|f(x)| < a$ ist (aber auch noch andere Punkte). Dies ist nach § 31, IV dadurch möglich, dass wir vom Nullpunkt als Mittelpunkt einen die Punkte $\alpha, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-1}$ einschliessenden Kreis (R) von hinlänglich grossem Radius R legen und die Punkte $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-1}$, in denen $|f(x)|$ ja grösser als a ist, durch kreisförmige Hüllen von so kleinen aber nicht verschwindenden Radien $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_{n-1}$ von diesem Kreise ausscheiden, dass im Inneren aller dieser Kreise $(\rho_1), (\rho_2), \dots, (\rho_{n-1})$ der absolute Werth $|f(x)|$ grösser als a bleibt (§ 31, V). Dann umschliesst keiner dieser Kreise den Punkt α , in dem $|f(x)| = a$ ist. Das von den Kreisen $(R), (\rho_1), \dots, (\rho_{n-1})$ begrenzte zusammenhängende Flächenstück ist das Gebiet G .

Wir bestimmen nun eine Zahlenreihe

$$\alpha, \alpha', \alpha'', \alpha''', \dots$$

derart, dass die absoluten Werthe von $f(\alpha), f(\alpha'), f(\alpha''), \dots$, die wir mit

$$a, a', a'', a''', \dots$$

bezeichnen, immer abnehmen. Die so bestimmten Punkte $\alpha, \alpha', \alpha''$ bleiben alle im Inneren des Gebietes G , weil ja in ihnen $|f(x)| < a$ ist.

Wir bedienen uns dazu eines Verfahrens, ganz ähnlich dem zum Beweis des Satzes 5., §38 angewandten, nur dadurch vereinfacht, dass $f'(\alpha)$ schon von Null verschieden ist. Wir setzen, indem wir unter δ einen noch näher zu bestimmenden, positiven, echten Bruch verstehen, in der Entwicklung

$$f(\alpha + h) = f(\alpha) + hf'(\alpha) + \frac{h^2}{1 \cdot 2} f''(\alpha) + \dots \quad (6)$$

$$h = -\delta \frac{f(\alpha)}{f'(\alpha)} \quad (7)$$

und erhalten

$$f(\alpha + h) = (1 - \delta)f(\alpha) + \frac{\delta^2 f(\alpha)^2 f''(\alpha)}{1 \cdot 2 f'(\alpha)^2} - \frac{\delta^3 f(\alpha)^3 f'''(\alpha)}{1 \cdot 2 \cdot 3 f'(\alpha)^3} + \dots \quad (8)$$

Nun ist nach (2)

$$f'(\alpha) = n(\alpha - \beta_1)(\alpha - \beta_2) \cdots (\alpha - \beta_{n-1}),$$

also, wenn wir die absoluten Werthe von $(\alpha - \beta_1), (\alpha - \beta_2), \dots, (\alpha - \beta_{n-1})$ durch $r_1, r_2, \dots, r_{n-1}$ bezeichnen,

$$|f'(\alpha)| = nr_1 r_2 \cdots r_{n-1}.$$

Da nun α ausserhalb des um β_i beschriebenen Kreises ρ_i liegt, so ist $r_1 > \rho_1, r_2 > \rho_2, \dots$, und folglich

$$|f'(\alpha)| > n\rho_1 \rho_2 \cdots \rho_{n-1},$$

also $|f'(\alpha)|$ grösser als eine von der Lage von α innerhalb G unabhängige positive Zahl k . Daraus ergibt sich, dass man eine hinlänglich grosse positive Zahl Q , die gleichfalls von der Lage von α und von dem echten Bruch δ unabhängig ist, so wählen kann, dass

$$\left| \frac{f(\alpha)^2 f''(\alpha)}{1 \cdot 2 f'(\alpha)^2} - \delta \frac{f(\alpha)^3 f'''(\alpha)}{1 \cdot 2 \cdot 3 f'(\alpha)^3} + \dots \right| < Q \quad (9)$$

ist.

Man kann Q erhalten, wenn man auf der linken Seite von (9) in den Nennern $f'(\alpha)$ durch k , δ durch 1 und sonst alle Glieder durch ihre absoluten Werthe und endlich den absoluten Werth von α durch den grösseren Werth R ersetzt, und die so gewonnene Zahl noch beliebig grösser macht. Dann ergibt sich aber aus (8)

$$|f(\alpha + h)| < (1 - \delta)|f(\alpha)| + \delta^2 Q. \quad (10)$$

Nehmen wir nun Q so gewählt an, dass für jedes α innerhalb G

$$2Q > |f(\alpha)| = a$$

ist, was mit der obigen Bestimmung offenbar verträglich ist, so können wir

$$\delta = \frac{a}{2Q}, \quad h = -\frac{af(\alpha)}{2Qf'(\alpha)} \quad (11)$$

setzen und erhalten, wenn wir $\alpha + h$ mit α' bezeichnen, und wenn wir $|f(\alpha')|$ mit a' bezeichnen, nach (10)

$$a' < a \left(1 - \frac{a}{4Q}\right). \quad (12)$$

Wir leiten nun durch dasselbe Verfahren aus α', a' ein zweites Grössensystem α'', a'' ab, dann aus α'', a'' ein drittes α''', a''' u. s. f., und erhalten so für die Reihe abnehmender positiver Zahlen $a, a', a'', \dots$ die Ungleichungen

$$a' < a \left(1 - \frac{a}{4Q}\right), \quad a'' < a' \left(1 - \frac{a'}{4Q}\right), \quad a''' < a'' \left(1 - \frac{a''}{4Q}\right), \dots \quad (13)$$

und beweisen nun, dass diese Zahlenreihe sich der Grenze Null nähert. Wäre dies nicht der Fall, so würde sich eine positive Zahl ω so angeben lassen, dass alle $a^{(\nu)}$ über ω bleiben; dann wären die Differenzen $a^{(\nu)}/4Q$ alle grösser als der positive echte Bruch $\omega/4Q$, und aus (13) würde folgen

$$a' < a\theta, \quad a'' < a'\theta, \quad a''' < a''\theta, \quad \dots,$$

woraus durch Multiplication

$$a^{(\nu)} < a\theta^\nu. \quad (14)$$

Darin aber liegt ein Widerspruch, da θ^ν mit unendlich wachsendem ν unendlich klein wird. Das so gewonnene Resultat drücken wir in der Gleichung aus

$$\lim a^{(\nu)} = 0. \quad (15)$$

Wenn wir die Ungleichungen (13) so schreiben

$$a - a' > \frac{a^2}{4Q}, \quad a' - a'' > \frac{a'^2}{4Q}, \quad \dots,$$

und sie dann von der $(\mu + 1)$ ten bis zur $(\nu + 1)$ ten addiren, so folgt

$$(a^{(\mu)})^2 + (a^{(\mu+1)})^2 + \dots + (a^{(\nu)})^2 < 4Q(a^{(\mu)} - a^{(\nu+1)}),$$

also, wenn μ und ν zwei ins Unendliche wachsende Zahlen bedeuten,

$$\lim((a^{(\mu)})^2 + (a^{(\mu+1)})^2 + \dots + (a^{(\nu)})^2) = 0. \quad (16)$$

Für die Reihe der Zahlen $\alpha, \alpha', \alpha'', \dots$ ergibt sich aus (11) das Bildungsgesetz

$$\begin{aligned} \alpha' &= \alpha - \frac{af(\alpha)}{2Qf'(\alpha)}, \\ \alpha'' &= \alpha' - \frac{a'f(\alpha')}{2Qf'(\alpha')}, \\ &\vdots \\ \alpha^{(\nu)} &= \alpha^{(\nu-1)} - \frac{a^{(\nu-1)}f(\alpha^{(\nu-1)})}{2Qf'(\alpha^{(\nu-1)})}. \end{aligned} \quad (17)$$

Wenn man eine beliebige Anzahl dieser Gleichungen von der $(\mu + 1)$ ten bis zur $(\nu + 1)$ ten addirt, so folgt

$$\alpha^{(\mu)} - \alpha^{(\nu+1)} = \sum_{r=\mu}^{\nu} \frac{a^{(r)}f(\alpha^{(r)})}{2Qf'(\alpha^{(r)})}. \quad (18)$$

Daraus ergibt sich, da die sämmtlichen $|f'(\alpha^{(r)})| \geq k$ sind, für den absoluten Werth dieser Differenz

$$|\alpha^{(\mu)} - \alpha^{(\nu+1)}| < \frac{(a^{(\mu)})^2 + (a^{(\mu+1)})^2 + \dots + (a^{(\nu)})^2}{2Qk}, \quad (19)$$

also mit Hülfe von (16)

$$\lim |\alpha^{(\mu)} - \alpha^{(\nu+1)}| = 0. \quad (20)$$

Damit ist ausgedrückt (nach dem in der Einleitung erklärten Begriff der Zahlenreihe, S. 15), dass sich die Zahlen $\alpha, \alpha', \alpha'', \dots$ einer bestimmten Grenze nähern, die wir mit ξ bezeichnen wollen. Aus der Stetigkeit der Function $f(x)$ folgt aber dann leicht, dass $f(\xi) = 0$ sein muss; denn wäre $|f(\xi)| > 0$, so könnten, da die $\alpha^{(\nu)}$ dem Werthe ξ beliebig nahe kommen, die absoluten Werthe $a^{(\nu)}$ von $f(\alpha^{(\nu)})$ nicht unter jeden positiven Werth herunter sinken, was wir doch von ihnen nachgewiesen haben.

§ 40. Stetigkeit der Wurzeln.

Wir beschliessen diesen Abschnitt mit dem Beweis des Satzes:

Die Wurzeln einer algebraischen Gleichung sind stetige Functionen der Coefficienten.

Wir haben zunächst die Bedeutung dieses Satzes zu erklären.

Es sei

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots \quad (1)$$

eine ganze rationale Function von x vom n ten Grade. Nach dem, was in den vorangegangenen Paragraphen bewiesen ist, lässt sich $f(x)$ in n lineare Factoren zerlegen, die zum Theil einander gleich sein können. Wir setzen, indem wir gleiche Factoren zusammenfassen und die Wurzeln mit $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ bezeichnen,

$$f(x) = (x - \alpha)^a (x - \beta)^b (x - \gamma)^c \dots, \quad (2)$$

worin $a, b, c, \dots$ ganze positive Zahlen sind, deren Summe gleich n ist.

Die Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ werden sich mit den Coefficienten $a_1, a_2, a_3, \dots$ ändern, auch der Grad ihrer Vielfachheit kann ein anderer werden.

Wir bezeichnen die Aenderungen von $a_1, a_2, \dots$ mit $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ und setzen

$$\varphi(x) = \varepsilon_1x^{n-1} + \varepsilon_2x^{n-2} + \dots, \quad (3)$$

$$f(x) + \varphi(x) = f_1(x). \quad (4)$$

Wir umgeben die Punkte $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ mit Gebieten von beliebiger Kleinheit, jedoch so, dass diese Gebiete sich gegenseitig ausschliessen, etwa dadurch, dass wir die Punkte $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ durch Kreisperipherien mit den Radien $\rho, \rho', \rho'', \dots$ einschliessen, und bezeichnen diese Gebiete durch $(\rho), (\rho'), (\rho''), \dots$

Wenn die absoluten Werthe von $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ unter hinlänglich kleinen Werthen liegen, so können wir von der Function $f_1(x)$ zunächst beweisen,

dass sie keine Wurzeln ausserhalb der Gebiete $(\rho), (\rho'), (\rho''), \dots$ hat,


und zweitens,

dass die Anzahl der Wurzeln von $f_1(x)$ innerhalb (ρ) genau a , innerhalb (ρ') genau b , innerhalb (ρ'') genau c u. s. f. beträgt.

Bei dem letzten Theil des Satzes ist aber zu beachten, dass, wenn $f_1(x)$ mehrfache Wurzeln hat, diese nach ihrer Vielfachheit gezählt werden müssen.

Wir construiren nach §31, IV in der Ebene x einen Kreis mit dem Radius R und dem Nullpunkt als Mittelpunkt, der die Gebiete $(\rho), (\rho'), (\rho''), \dots$ einschliesst, so dass ausserhalb dieses Kreises keine Wurzeln von $f_1(x)$ mehr liegen, und bezeichnen das innerhalb dieses Kreises, aber ausserhalb $(\rho), (\rho'), (\rho''), \dots$ liegende Gebiet mit G . Es ist dazu noch zu bemerken, dass R von den $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ unabhängig angenommen werden kann, so lange für die absoluten Werthe dieser Grössen eine bestimmte obere Grenze festgesetzt wird.

Fig. 4.



Ist nun x ein Punkt des Gebietes G , so ist der absolute Werth von $x - \alpha$ grösser als ρ , und mithin nach (2)

$$|f(x)| > \rho^a \rho'^b \rho''^c \dots \quad (5)$$

Ist nun α_1 eine Wurzel von $f_1(x)$, so folgt aus (4)

$$f(\alpha_1) = -\varphi(\alpha_1), \quad (6)$$

und α_1 kann daher nicht in dem Gebiete G liegen, wenn man dafür sorgt, dass innerhalb G überall

$$|\varphi(x)| < \rho^a \rho'^b \rho''^c \dots, \quad (7)$$

was durch genügende Verkleinerung der oberen Grenze von $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ immer möglich ist. Hiermit ist der erste Theil unserer Behauptung erwiesen, dass, wenn die Ungleichung (7) befriedigt ist, keine Wurzeln von $f_1(x)$ ausserhalb der Gebiete $(\rho), (\rho'), (\rho'') \dots$ liegen.

Um den zweiten Theil zu beweisen, setzen wir

$$f(x) = \psi(x)(x - \alpha)^a, \quad (8)$$

$$\psi(x) = (x - \beta)^b (x - \gamma)^c \dots \quad (9)$$

Wir wählen nun eine positive Zahl A , die aber von ρ unabhängig sein soll, so dass, so lange x im Inneren oder an der Peripherie des Gebietes (ρ) liegt,

$$|\psi(x)| > A \quad (\text{für } |x - \alpha| \leq \rho) \quad (10)$$

bleibt. Eine solche Zahl erhalten wir z. B., wenn wir l gleich der Hälfte des kleinsten unter den Abständen $(\alpha, \beta), (\alpha, \gamma), \dots$ annehmen und

$$A = l^{b+c+\dots}$$

setzen; dann ist die in (10) ausgedrückte Forderung wenigstens so lange erfüllt, als ρ kleiner als l ist. Ist nur ein einziger Punkt α vorhanden, so ist $\psi(x) = 1$ zu setzen, und für A kann jeder beliebige echte Bruch gesetzt werden.

Es seien nun $\alpha_1, \alpha_2, \dots$ die Wurzeln von $f_1(x)$ innerhalb (ρ) , und $a_1, a_2, \dots$ die Grade ihrer Vielfachheit, und $\beta_1, \beta_2, \dots, b_1, b_2, \dots, \gamma_1, \gamma_2, \dots, c_1, c_2, \dots$ sollen dieselbe Bedeutung für die Gebiete $(\rho'), (\rho''), \dots$ haben; es ist dann

$$n = a_1 + a_2 + \dots + b_1 + b_2 + \dots + c_1 + c_2 + \dots, \quad (11)$$

da die Gesamtzahl aller Wurzeln gleich n sein muss. Die Function $f_1(x)$ lässt sich dann so darstellen:

$$f_1(x) = \psi_1(x)(x - \alpha_1)^{a_1}(x - \alpha_2)^{a_2} \dots, \quad (12)$$

worin

$$\psi_1(x) = (x - \beta_1)^{b_1}(x - \beta_2)^{b_2} \dots (x - \gamma_1)^{c_1}(x - \gamma_2)^{c_2} \dots \quad (13)$$

Nun können wir eine von ρ, ρ', ρ'' unabhängige positive Zahl B bestimmen, so dass, so lange x innerhalb oder an der Grenze von (ρ) bleibt,

$$|\psi_1(x)| < B \quad (\text{für } |x - \alpha| \leq \rho). \quad (14)$$

Wir können z. B. eine Grösse L wählen, die grösser ist als die doppelte Entfernung des Punktes α von einem der Punkte $\beta, \gamma, \dots$ und jedenfalls grösser als 1 und dann

$$B > L^n$$

annehmen.

Nun folgt aus (4)

$$|f(x)| < |f_1(x)| + |\varphi(x)|, \quad (15)$$

also nach (8) und (12)

$$|\psi(x)| |x - \alpha|^a < |\psi_1(x)| |x - \alpha_1|^{a_1} |x - \alpha_2|^{a_2} \cdots + |\varphi(x)|, \quad (16)$$

und wenn wir nun x auf der Peripherie von ρ annehmen, also

$$|x - \alpha| = \rho$$

setzen, so ist

$$|x - \alpha_1| < 2\rho, \quad |x - \alpha_2| < 2\rho, \dots$$

folglich nach (10) und (16)

$$\rho^a A < (2\rho)^{a_1+a_2+\dots} B + |\varphi(x)|. \quad (17)$$

Wir wollen nun die oberen Grenzen für die Coefficienten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ von φ so klein annehmen, dass

$$|\varphi(x)| < \rho^a A'$$

wird, worin A' eine Zahl bedeutet, die kleiner als A ist; dann folgt aus (17)

$$A - A' < 2^a \rho^{-a+a_1+a_2+\dots} B. \quad (18)$$

Dies aber würde für ein hinreichend kleines ρ nicht mehr möglich sein, wenn a grösser als die Summe $a_1 + a_2 + \dots$ wäre. Es folgt also

$$a \leq a_1 + a_2 + \dots. \quad (19)$$

Ebenso lässt sich beweisen, dass

$$b \leq b_1 + b_2 + \dots, \quad c \leq c_1 + c_2 + \dots, \quad \dots \quad (20)$$

sein muss. Da aber die Summen der linken Seiten sowohl als der rechten in den Ungleichungen (19), (20) gleich n sein müssen, so können nur die Gleichheitszeichen bestehen, also:

$$a = a_1 + a_2 + \dots, \quad b = b_1 + b_2 + \dots, \quad c = c_1 + c_2 + \dots, \quad \dots,$$

wodurch auch der zweite Theil unseres Satzes bewiesen ist.

Wir wollen dem bewiesenen Satze noch folgende, auf den Fall mehrfacher Wurzeln bezügliche Bemerkung beifügen.

Die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass $f(x) = 0$ überhaupt mehrfache Wurzeln habe, ist die, dass $f(x)$ und $f'(x)$ einen gemeinsamen Factor haben. Wenn man also nach den im ersten Abschnitt entwickelten Principien den Algorithmus des grössten gemeinsamen Theilers auf diese beiden Functionen anwendet, so erhält man die Bedingung gemeinsamer Factoren daraus, dass man den letzten constanten Rest gleich Null setzt in Gestalt einer Gleichung zwischen den Coefficienten:

$$F(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0,$$

worin F eine ganze rationale Function der Argumente $a_1, a_2, \dots, a_n$ ist, die die Discriminante von f heisst, deren Eigenschaften und Bildungsweise im nächsten Abschnitt noch eingehender behandelt werden soll; jedenfalls kann, da es überhaupt Gleichungen n ten Grades ohne mehrfache Wurzeln giebt, F nicht identisch verschwinden.

Betrachten wir also jetzt

$$F(a_1 + \varepsilon_1, a_2 + \varepsilon_2, \dots, a_n + \varepsilon_n),$$

so wird auch diese Function, wenn die $a_1, a_2, \dots, a_n$ bestimmte, die $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ aber unbestimmte Zahlen sind, nicht identisch verschwinden, und man kann über die ε so verfügen, dass ihr Werth

von Null verschieden ausfällt, auch dann noch, wenn für die absoluten Werthe der ε eine beliebige obere Grenze festgesetzt ist.¹⁰

Man sieht also aus diesen Betrachtungen, wie eine a -fache Wurzel α von $f(x)$ bei stetiger Veränderung der Coefficienten in a einfache Wurzeln auseinander strahlt, so dass man auch von diesem Gesichtspunkte berechtigt ist, die a -fache Wurzel als durch das Zusammenfallen von a einfachen Wurzeln entstanden zu betrachten.

Nehmen wir den Coefficienten der höchsten Potenz von x nicht gleich 1 an, untersuchen also die Gleichung in der Form

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0, \quad (21)$$

so sind, wenn $a_n = 0$ ist, eine oder mehrere der Wurzeln gleich Null, und die Gleichung (21) lässt sich durch x oder eine höhere Potenz von x dividiren, wodurch eine Gleichung von entsprechend niedrigerem Grade entsteht, in der das letzte Glied von Null verschieden ist. Wir wollen also von vornherein a_n von Null verschieden annehmen und nun in (21)

$$x = \frac{1}{y} \quad (22)$$

setzen. Durch Multiplication mit y^n und Division mit a_n geht dann (21) über in

$$y^n + \frac{a_{n-1}}{a_n}y^{n-1} + \cdots + \frac{a_1}{a_n}y + \frac{a_0}{a_n} = 0, \quad (23)$$

und wir können auf die Wurzeln dieser Gleichung den vorhin ausgesprochenen Satz anwenden, indem wir $a_0 = 0$ annehmen, so dass eine der Wurzeln von (23) verschwindet. Wir erlangen so den Satz:

Man kann in der Gleichung (21) a_0 so klein annehmen, dass eine ihrer Wurzeln über alle Grenzen gross wird, während die anderen sich beliebig wenig von den Wurzeln der Gleichung $(n-1)$ ten Grades

$$a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0$$

unterscheiden.

Man drückt das auch so aus, dass mit verschwindendem a_0 eine der Wurzeln von (21) unendlich wird.

Wenn auch noch a_1 oder a_1 und a_2 u. s. f. verschwinden, so werden zwei oder drei Wurzeln unendlich.

Es rechtfertigt sich hierdurch der bisweilen gebrauchte Ausdruck, dass eine Gleichung n ten Grades durch Unendlichwerden einer Wurzel in eine Gleichung $(n-1)$ ten Grades übergehe.

Vierter Abschnitt. Symmetrische Functionen.

§ 41. Begriff der symmetrischen Functionen. Symmetrische Grundfunctionen.

Wir betrachten in diesem Abschnitt ganze Functionen beliebigen Grades von einer beliebigen Anzahl n von Veränderlichen

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n.$$

Eine solche Function heisst symmetrisch, wenn sie ungeändert bleibt, wenn die Variablen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ einer beliebigen Permutation unterworfen werden, und solche symmetrische Functionen sind es, deren Eigenschaften und Bildungsgesetze wir jetzt genauer kennen lernen müssen.

¹⁰Dies wird erst später streng begründet werden. Wir setzen es bei diesen vorläufigen Bemerkungen, auf die weiter keine Schlüsse gegründet werden, einstweilen voraus.

Damit eine Function $\Phi(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ symmetrisch sei, ist es genügend, dass sie sich bei der Vertauschung von je zweien der Argumente $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ nicht ändere, weil nach §18 alle Permutationen durch eine Reihe von Transpositionen gebildet werden können.

Die Function Φ wird im Allgemeinen nicht homogen sein, sondern Glieder verschiedener Dimension enthalten; wenn man aber alle Glieder gleicher Dimension zusammenfasst, so lässt sich jedes Φ durch eine Summe homogener Functionen verschiedener Grade darstellen, und wenn Φ symmetrisch sein soll, so muss jeder homogene Bestandteil eines bestimmten Grades für sich symmetrisch sein, da durch die Permutationen der Variablen die Dimensionen der Glieder nicht geändert werden.

Wir können uns hiernach auf die Betrachtung homogener symmetrischer Functionen beschränken, aus denen alle anderen sich zusammensetzen lassen.

Hiernach ist es leicht, die allgemeine Form einer symmetrischen Function anzugeben. Wir erhalten sie, wenn wir in einem Gliede einer solchen Function

$$\alpha_1^{\nu_1} \alpha_2^{\nu_2} \cdots \alpha_n^{\nu_n}$$

(ähnlich wie bei der Bildung der Determinanten) die unteren Indices auf alle mögliche Art permutiren und die Summe aller so gebildeten Glieder nehmen. Eine solche Function können wir einen Elementarbestandteil einer symmetrischen Function nennen. Nehmen wir mehrere solche Elementarbestandteile, multipliciren sie mit beliebigen, von den α unabhängigen Factoren und addiren sie, so erhalten wir die allgemeinste symmetrische Function. Die Anzahl der Glieder eines dieser Elementarbestandteile ist, wenn die Exponenten $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n$ alle von einander verschieden sind, $n!$; wenn aber ein und derselbe Exponent ν mehrmals vorkommt, so hat man die Permutationen, die keine verschiedenen Glieder geben, wegzulassen. Es ist z. B. bei drei Veränderlichen, wenn ν_1, ν_2, ν_3 verschieden sind, ein Elementarbestandteil:

$$\alpha_1^{\nu_1} \alpha_2^{\nu_2} \alpha_3^{\nu_3} + \alpha_1^{\nu_1} \alpha_2^{\nu_3} \alpha_3^{\nu_2} + \alpha_1^{\nu_2} \alpha_2^{\nu_1} \alpha_3^{\nu_3} + \alpha_1^{\nu_2} \alpha_2^{\nu_3} \alpha_3^{\nu_1} + \alpha_1^{\nu_3} \alpha_2^{\nu_1} \alpha_3^{\nu_2} + \alpha_1^{\nu_3} \alpha_2^{\nu_2} \alpha_3^{\nu_1},$$

wenn aber $\nu_2 = \nu_3$ ist,

$$\alpha_1^{\nu_1} \alpha_2^{\nu_2} \alpha_3^{\nu_2} + \alpha_1^{\nu_2} \alpha_2^{\nu_1} \alpha_3^{\nu_2} + \alpha_1^{\nu_2} \alpha_2^{\nu_2} \alpha_3^{\nu_1}.$$

Das einfachste Beispiel einer symmetrischen Function ist die Summe der Variablen

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \cdots + \alpha_n.$$

Ebenso gehört das Product

$$\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n$$

dazu.

Diese beiden sind die extremen Fälle einer Reihe von symmetrischen Functionen, die wir die symmetrischen Grundfunctionen nennen und folgendermaassen erhalten.

Das Product

$$f(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n) \quad (1)$$

ist, was auch x sein mag, wenn nur x von den α unabhängig ist, eine symmetrische Function von $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Wenn wir also die Multiplication der einzelnen Factoren ausführen und nach Potenzen von x ordnen, so sind die Coefficienten der einzelnen Potenzen von x gleichfalls symmetrische Functionen. Denn sie ändern sich bei der Vertauschung der α ebenso wenig wie die Function $f(x)$ (§1). Wir setzen

$$f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} x + a_n. \quad (2)$$

Die Functionen $a_1, a_2, \dots, a_n$ sind die Coefficienten der algebraischen Gleichung, deren Wurzeln $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sind. Sie werden die symmetrischen Grundfunctionen genannt. Diese symmetrischen Grundfunctionen haben wir schon im §7 gebildet; es ist, wie wir uns erinnern, a_1 die mit negativem Zeichen genommene Summe der α , a_2 die Summe der Producte zu zweien, a_3 die mit negativem

Zeichen genommene Summe der Producte zu dreien u. s. f., endlich a_n das Product sämtlicher α , mit positivem oder negativem Zeichen, je nachdem n gerade oder ungerade ist. Wir setzen abkürzend

$$\begin{aligned} a_1 &= -\sum \alpha_1, \\ a_2 &= +\sum \alpha_1 \alpha_2, \\ a_3 &= -\sum \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3, \\ &\vdots \\ a_n &= \pm \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n. \end{aligned} \tag{3}$$

Das Ziel unserer Betrachtungen ist der Beweis des Hauptsatzes, dass alle symmetrischen Functionen der α sich rational durch die Grundfunctionen ausdrücken lassen.

§ 42. Die Potenzsummen.

Wir beschäftigen uns zunächst mit einer anderen speciellen Art symmetrischer Functionen, den Potenzsummen. Bedeutet nämlich ν irgend einen ganzzahligen positiven Exponenten, so gehört

$$s_\nu = \alpha_1^\nu + \alpha_2^\nu + \cdots + \alpha_n^\nu \tag{1}$$

offenbar zu den symmetrischen Functionen, und s_ν wird die ν te Potenzsumme genannt. Wir wollen Formeln ableiten, nach denen die Potenzsummen durch die Grundfunctionen ausdrückbar sind.

Wir bezeichnen in der Folge immer, wenn $\varphi(x)$ irgend eine Function von x ist, mit

$$S[\varphi(\alpha)]$$

die Summe, die wir erhalten, wenn x in $\varphi(x)$ durch jede der Variablen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ersetzt und die so gebildeten Functionen addirt werden, also

$$S[\varphi(\alpha)] = \varphi(\alpha_1) + \varphi(\alpha_2) + \cdots + \varphi(\alpha_n).$$

Hiernach ist z. B.

$$S[\alpha^\nu] = s_\nu$$

die ν te Potenzsumme.

Wir dividiren nun $f(x)$ nach § 4 durch eine beliebige lineare Function $x - \alpha$ und erhalten

$$\frac{f(x) - f(\alpha)}{x - \alpha} = x^{n-1} + f_1(\alpha)x^{n-2} + f_2(\alpha)x^{n-3} + \cdots + f_{n-1}(\alpha), \tag{2}$$

worin nach § 4, (8):

$$\begin{aligned} f_1(\alpha) &= \alpha + a_1, \\ f_2(\alpha) &= \alpha^2 + a_1\alpha + a_2, \\ &\vdots \\ f_{n-1}(\alpha) &= \alpha^{n-1} + a_1\alpha^{n-2} + \cdots + a_{n-1}. \end{aligned} \tag{3}$$

Wir setzen in (2) für α jede der Grössen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, wodurch $f(\alpha) = 0$ wird, und bilden die Summe S . Die linke Seite ergibt dann nach § 14, (11)

$$nx^{n-1} + (n-1)a_1x^{n-2} + (n-2)a_2x^{n-3} + \cdots + a_{n-1}, \tag{4}$$

während die rechte Seite

$$nx^{n-1} + x^{n-2}S[f_1(\alpha)] + x^{n-3}S[f_2(\alpha)] + \cdots + S[f_{n-1}(\alpha)] \tag{5}$$

wird, und die Vergleichung der Coefficienten gleicher Potenzen von x in (4) und (5) ergibt

$$\begin{aligned} S[f_1(\alpha)] &= (n-1)a_1, \\ S[f_2(\alpha)] &= (n-2)a_2, \\ &\vdots \\ S[f_{n-1}(\alpha)] &= a_{n-1}. \end{aligned} \tag{6}$$

Es ist aber nach (1) und (3)

$$\begin{aligned} S[f_1(\alpha)] &= s_1 + na_1, \\ S[f_2(\alpha)] &= s_2 + a_1s_1 + na_2, \\ &\vdots \\ S[f_{n-1}(\alpha)] &= s_{n-1} + a_1s_{n-2} + a_2s_{n-3} + \cdots + na_{n-1}. \end{aligned}$$

und demnach erhält man aus (6) das folgende von Newton herrührende Formelsystem:

$$\begin{aligned} 0 &= s_1 + a_1, \\ 0 &= s_2 + a_1s_1 + 2a_2, \\ 0 &= s_3 + a_1s_2 + a_2s_1 + 3a_3, \\ &\vdots \\ 0 &= s_{n-1} + a_1s_{n-2} + a_2s_{n-3} + \cdots + (n-1)a_{n-1}. \end{aligned} \tag{7}$$

Dies Formelsystem lässt sich aber noch weiter fortsetzen; denn da

$$S[f(\alpha)] = 0, \quad S[\alpha f(\alpha)] = 0, \quad S[\alpha^2 f(\alpha)] = 0, \dots$$

ist, so folgt

$$\begin{aligned} 0 &= s_n + a_1s_{n-1} + a_2s_{n-2} + \cdots + a_n, \\ 0 &= s_{n+1} + a_1s_n + a_2s_{n-1} + \cdots + a_ns_1, \\ 0 &= s_{n+2} + a_1s_{n+1} + a_2s_n + \cdots + a_ns_2, \quad \dots \end{aligned} \tag{8}$$

Durch die Formeln (7), (8) ist nun die Aufgabe gelöst, der Reihe nach die Functionen $s_1, s_2, \dots$ bis zu beliebiger Höhe als ganze rationale Functionen der symmetrischen Grundfunctionen darzustellen, z. B.

$$\begin{aligned} s_1 &= -a_1, \\ s_2 &= a_1^2 - 2a_2, \\ s_3 &= -a_1^3 + 3a_1a_2 - 3a_3, \\ s_4 &= a_1^4 - 4a_1^2a_2 + 4a_1a_3 + 2a_2^2 - 4a_4. \end{aligned} \tag{9}$$

und die Bildungsweise dieser Ausdrücke zeigt, dass die Coefficienten in diesen Darstellungen ganze Zahlen sind.

Man kann auch umgekehrt mittelst der Formeln (7) und (8) die symmetrischen Grundfunctionen $a_1, a_2, a_3, \dots$ rational durch die Potenzsummen $s_1, s_2, s_3, \dots$ ausdrücken. Diese Darstellung ist aber insofern weit weniger einfach, als die Coefficienten nicht ganze, sondern gebrochene Zahlen sind, z. B.

$$a_1 = -s_1, \quad 2a_2 = s_1^2 - s_2, \quad 6a_3 = -s_1^3 + 3s_1s_2 - 2s_3. \tag{10}$$

Man kann das Formelsystem (8) auch nach der entgegengesetzten Richtung fortsetzen, wenn man die Gleichungen

$$S[\alpha^{-1}f(\alpha)] = 0, \quad S[\alpha^{-2}f(\alpha)] = 0, \dots$$

bildet. Man erhält dadurch ein Mittel, um die Potenzsummen s_ν auch für negative Exponenten ν durch die Grundfunctionen auszudrücken. Diese Summen der negativen Potenzen gehören gleichfalls zu den symmetrischen Functionen, wenn auch nicht mehr zu den ganzen, sondern zu den gebrochenen. Sie gehen erst durch Multiplication mit Potenzen des Productes $\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_n$ in ganze Functionen über. Der Vollständigkeit wegen setzen wir die zwei ersten dieser Formeln hierher:

$$\begin{aligned} 0 &= a_{n-1} + a_n s_{-1}, \\ 0 &= 2a_{n-2} + a_{n-1}s_{-1} + a_n s_{-2}. \end{aligned} \quad (11)$$

§ 43. Beweis des Hauptsatzes für zwei Variable.

Wir gehen nunmehr zum Beweis des Fundamentalsatzes der Theorie der symmetrischen Functionen über, dass sie alle rational durch die symmetrischen Grundfunctionen ausdrückbar sind. Da wir die vollständige Induction als Beweismittel anwenden, so leiten wir den Satz zunächst unter der Voraussetzung ab, dass nur zwei unabhängige Veränderliche α, β gegeben seien, aber auf einem Wege, der zugleich für den allgemeinen Beweis den leitenden Gedanken hervortreten lassen wird.

Wir bezeichnen die symmetrischen Grundfunctionen mit

$$a = -(\alpha + \beta), \quad b = \alpha\beta \quad (1)$$

und setzen demgemäss

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta) = x^2 + ax + b. \quad (2)$$

Es sei nun $S(\alpha, \beta)$ irgend eine ganze rationale und symmetrische Function von α und β . Wir können für β aus (1) den Werth $-(\alpha + a)$ einsetzen, und erhalten, wenn wir nach Potenzen von α ordnen,

$$S(\alpha, \beta) = S(\alpha, -\alpha - a) = A_0\alpha^m + A_1\alpha^{m-1} + \cdots + A_m, \quad (3)$$

worin die Coefficienten $A_0, A_1, \dots, A_m$ nur von a und von den in S noch vorkommenden Coefficienten abhängen. Wir bemerken aber ausdrücklich, dass, wenn in $S(\alpha, \beta)$ keine gebrochenen Zahlencoefficienten vorkommen, auch in den Coefficienten $A_0, A_1, \dots, A_m$ keine Brüche auftreten.

Wir setzen nun

$$\Phi(x) = A_0x^m + A_1x^{m-1} + \cdots + A_{m-1}x + A_m \quad (4)$$

und dividiren $\Phi(x)$ durch $f(x)$ (nach § 3) und erhalten einen Quotienten Q und einen Rest, der in Bezug auf x höchstens vom ersten Grade ist, also:

$$\Phi(x) = Qf(x) + A + Bx. \quad (5)$$

Hierin sind nun A und B ganze Functionen von a und b , und auch sie enthalten keinerlei gebrochene Zahlencoefficienten, wenn in S keine solche vorkommen. Wenn wir nun $x = \alpha$ setzen, so ergibt sich aus (5) und (3), da $f(\alpha)$ verschwindet,

$$S(\alpha, \beta) = A + B\alpha. \quad (6)$$

Da aber $S(\alpha, \beta)$ und ebenso A, B symmetrisch sind, so folgt durch Vertauschung von α und β

$$S(\alpha, \beta) = A + B\beta. \quad (7)$$

Hieraus schliesst man, da α und β von einander unabhängige Variable sind, dass $B = 0$ und folglich

$$S(\alpha, \beta) = A \quad (8)$$

sein muss, womit der Fundamentalsatz für diesen Fall bewiesen ist.

§ 44. Allgemeiner Beweis des Hauptsatzes.

Wir setzen nun voraus, der Fundamentalsatz sei bewiesen für symmetrische Functionen von $n - 1$ Veränderlichen und leiten ihn durch ein Verfahren, was dem in § 43 angewandten ganz analog ist, für n Variable her.

Es sei wieder

$$S = S(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \quad (1)$$

eine ganze symmetrische Function der n Veränderlichen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Wenn wir sie nach Potenzen von α_1 ordnen und demgemäss setzen

$$S = S_0\alpha_1^\mu + S_1\alpha_1^{\mu-1} + \dots + S_{\mu-1}\alpha_1 + S_\mu, \quad (2)$$

so sind die Coefficienten $S_0, S_1, \dots, S_\mu$ ganze symmetrische Functionen der $n - 1$ Veränderlichen $\alpha_2, \dots, \alpha_n$.

Bezeichnen wir die symmetrischen Grundfunctionen dieser letzteren Variablen mit

$$a'_1, a'_2, \dots, a'_{n-1},$$

so können wir die Coefficienten $S_0, S_1, \dots, S_\mu$ nach unserer Voraussetzung rational durch diese ausdrücken. Es ist aber nach § 42, (2) und (3)

$$\begin{aligned} a'_1 &= f_1(\alpha_1) = \alpha_1 + a_1, \\ a'_2 &= f_2(\alpha_1) = \alpha_1^2 + a_1\alpha_1 + a_2, \\ a'_3 &= f_3(\alpha_1) = \alpha_1^3 + a_1\alpha_1^2 + a_2\alpha_1 + a_3, \end{aligned}$$

d. h. die Coefficienten $S_0, S_1, \dots, S_\mu$ können ganz und rational durch

$$\alpha_1, a_1, a_2, \dots, a_n$$

ausgedrückt werden. Wenn wir also, nachdem diese Ausdrücke eingeführt sind, in (2) aufs Neue nach Potenzen von α_1 ordnen, so erhalten wir

$$S = A_0\alpha_1^m + A_1\alpha_1^{m-1} + \dots + A_{m-1}\alpha_1 + A_m, \quad (3)$$

worin im Allgemeinen m ein von μ verschiedener Exponent sein wird, und die Coefficienten $A_0, A_1, \dots, A_m$ ganz und rational von $a_1, a_2, \dots, a_n$ abhängen. Wir setzen wieder

$$\Phi(x) = A_0x^m + A_1x^{m-1} + \dots + A_{m-1}x + A_m \quad (4)$$

und dividiren $\Phi(x)$ durch

$$\begin{aligned} f(x) &= x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n \\ &= (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n). \end{aligned}$$

Es ergibt sich ein Quotient und ein Rest, der in Bezug auf x höchstens vom Grade $n - 1$ ist. Wir setzen also

$$\Phi(x) = Qf(x) + \psi(x), \quad (5)$$

$$\psi(x) = C_0x^{n-1} + C_1x^{n-2} + \dots + C_{n-2}x + C_{n-1}, \quad (6)$$

und hierin sind $C_0, C_1, \dots, C_{n-1}$ ganze rationale Functionen von $a_1, a_2, \dots, a_n$, in denen, wenn S in seiner ursprünglichen Form keine gebrochenen Coefficienten enthält, auch keine Brüche vorkommen.

Nun ist aber, da $f(\alpha_1)$ verschwindet, und $S = \Phi(\alpha_1)$ ist, nach (5)

$$S = \psi(\alpha_1) \quad (7)$$

und hierin kann, da S symmetrisch ist, α_1 durch $\alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$ ersetzt werden. Hieraus ergeben sich die folgenden n Gleichungen:

$$\begin{aligned} C_0\alpha_1^{n-1} + C_1\alpha_1^{n-2} + \dots + C_{n-2}\alpha_1 + (C_{n-1} - S) &= 0, \\ C_0\alpha_2^{n-1} + C_1\alpha_2^{n-2} + \dots + C_{n-2}\alpha_2 + (C_{n-1} - S) &= 0, \\ &\vdots \\ C_0\alpha_n^{n-1} + C_1\alpha_n^{n-2} + \dots + C_{n-2}\alpha_n + (C_{n-1} - S) &= 0. \end{aligned} \tag{8}$$

Betrachten wir dies System als ein System homogener linearer Gleichungen mit den n Unbekannten

$$C_0, C_1, \dots, C_{n-2}, C_{n-1} - S,$$

so ist seine Determinante

$$\begin{vmatrix} \alpha_1^{n-1} & \alpha_1^{n-2} & \dots & \alpha_1 & 1 \\ \alpha_2^{n-1} & \alpha_2^{n-2} & \dots & \alpha_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \alpha_n^{n-1} & \alpha_n^{n-2} & \dots & \alpha_n & 1 \end{vmatrix},$$

die nach § 22, Formel (12) gleich dem Product aller Differenzen $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3, \dots$ ist, von Null verschieden, und folglich ist nach dem Satz II in § 24:

$$C_0 = 0, \quad C_1 = 0, \dots, \quad C_{n-2} = 0$$

und

$$S = C_{n-1}, \tag{9}$$

worin der zu beweisende Fundamentalsatz enthalten ist.

Zu demselben Resultat gelangt man auch durch den Satz II, § 30; denn da die Function $(n-1)$ -ten Grades von x

$$C_0x^{n-1} + C_1x^{n-2} + \dots + C_{n-2}x + C_{n-1} - S$$

für $x = \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, also für mehr als $n-1$ Werthe verschwindet, so müssen ihre Coefficienten alle Null sein.

Der Beweis, den wir hier für das Fundamentaltheorem im Anschluss an Cauchy¹¹ gegeben haben, bietet zugleich ein Mittel, in besonderen Fällen den Ausdruck einer symmetrischen Function durch die Grundfunctionen wirklich zu berechnen. Dieselbe Möglichkeit bieten auch die anderen Beweise, die für das Theorem bekannt sind. Wir wollen noch einen zweiten Beweis hier mittheilen, der zu einer oft einfacheren Berechnungsart führt.¹²

§ 45. Zweiter Beweis des Satzes von den symmetrischen Functionen.

Es sei S eine ganze symmetrische Function der Variablen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. Die einzelnen Glieder dieser Function sind alle von der Form

$$M\alpha_1^{\nu_1}\alpha_2^{\nu_2}\dots\alpha_n^{\nu_n},$$

worin M ein von den α unabhängiger Coefficient ist. Diese Glieder sollen nun in bestimmter Weise angeordnet werden. Es soll, nachdem die Reihenfolge der Variablen $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ festgesetzt ist, von zwei Gliedern

$$A = M\alpha_1^{\nu_1}\alpha_2^{\nu_2}\dots\alpha_n^{\nu_n}, \quad A' = M'\alpha_1^{\nu'_1}\alpha_2^{\nu'_2}\dots\alpha_n^{\nu'_n}$$

¹¹Cauchy, *Exercices de mathématiques*, 4^{ème} année.

¹²Waring, *Meditationes algebraicae*. Gauss, *Demonstratio nova altera theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse*. Werke, Bd. III, S. 36.

A das höhere genannt werden, wenn die erste der Differenzen

$$\nu_1 - \nu'_1, \quad \nu_2 - \nu'_2, \dots, \nu_n - \nu'_n$$

die von Null verschieden ist, einen positiven Werth hat, wenn also entweder $\nu_1 > \nu'_1$ oder $\nu_1 = \nu'_1, \nu_2 > \nu'_2$ oder $\nu_1 = \nu'_1, \nu_2 = \nu'_2, \nu_3 > \nu'_3$ etc.

Da wir alle Glieder, in denen sämtliche Exponenten $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n$ übereinstimmen, in ein Glied vereinigt voraussetzen, so ist hiernach von je zwei Gliedern entschieden, welches das höhere ist, und wenn A höher als A' , A' höher als A'' ist, so ist auch A höher als A'' .

Ist nun nach dieser Anordnung

$$A = M\alpha_1^{\nu_1}\alpha_2^{\nu_2}\cdots\alpha_n^{\nu_n}$$

das höchste Glied unserer Function S , so folgt, dass

$$\nu_1 \geq \nu_2$$

sein muss; denn wäre $\nu_1 < \nu_2$, so würde das Glied

$$M\alpha_1^{\nu_2}\alpha_2^{\nu_1}\cdots\alpha_n^{\nu_n},$$

das wegen der Symmetrie auch in S vorkommen muss, in der Ordnung höher stehen als A , gegen die Voraussetzung. Ebenso folgt, dass $\nu_2 \geq \nu_3$ sein muss, denn wäre $\nu_2 < \nu_3$, so würde

$$M\alpha_1^{\nu_1}\alpha_2^{\nu_3}\alpha_3^{\nu_2}\cdots\alpha_n^{\nu_n}$$

höher stehen als A u. s. f. Wir schliessen also, dass die Exponenten in A ,

$$\nu_1, \nu_2, \nu_3, \dots, \nu_n,$$

eine abnehmende oder wenigstens niemals wachsende Zahlenreihe bilden, oder dass die Differenzen

$$\nu_1 - \nu_2, \quad \nu_2 - \nu_3, \dots, \nu_{n-1} - \nu_n$$

alle positiv oder wenigstens nicht negativ sind.

Wir schliessen zweitens, dass in keinem Gliede der Function S ein höherer Exponent als ν_1 vorkommen kann; denn sonst würde auch ein Glied vorkommen, in dem α_1 diesen höheren Exponenten hätte, und dies wäre gegen die Voraussetzung von höherer Ordnung als A . Es sind also die Glieder, die in einer symmetrischen Function überhaupt vorkommen können, von den Coefficienten abgesehen, durch das höchste Glied vollkommen bestimmt, und die Anzahl der möglichen Glieder ist bei gegebenem höchsten Glied nur eine endliche.

Wir können die Ordnung der symmetrischen Function durch die Exponentenreihe ihres höchsten Gliedes

$$(\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n)$$

bezeichnen. Von dem Fall abgesehen, in dem alle Exponenten Null sind, also die Function eine Constante ist, ist die möglichst niedrige Ordnung

$$(1, 0, \dots, 0),$$

der die einzige symmetrische Function

$$M(\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n) = -Ma_1$$

entspricht. Die nächst höhere Ordnung ist

$$(1, 1, 0, \dots, 0),$$

der die symmetrische Function

$$Ma_1 + M'a_2$$

entspricht, und so erhalten wir in den n ersten Ordnungen die Grundfunctionen selbst und ihre linearen Verbindungen, und keine anderen.

Die nächstfolgende Ordnung ist charakterisirt durch

$$(2, 0, 0, \dots, 0)$$

und enthält die linearen Verbindungen der Grundfunctionen mit der Summe der Quadrate.

In allen diesen Fällen ist die Darstellbarkeit der symmetrischen Functionen bereits bewiesen, und wir werden also jetzt den allgemeinen Beweis dadurch führen, dass wir die Darstellung der Function S von der Ordnung $(\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n)$ durch die Grundfunctionen unter der Voraussetzung ableiten, dass sie für die Functionen niedrigerer Ordnung schon bekannt sei, also durch das Schlussverfahren der vollständigen Induction.

Wir bemerken hierzu, dass durch die Multiplication zweier symmetrischer Functionen S und S' , deren höchste Glieder

$$A = M\alpha_1^{\nu_1}\alpha_2^{\nu_2}\dots\alpha_n^{\nu_n}, \quad A' = M'\alpha_1^{\nu'_1}\alpha_2^{\nu'_2}\dots\alpha_n^{\nu'_n}$$

sind, eine symmetrische Function entsteht, deren höchstes Glied das Product

$$AA' = MM'\alpha_1^{\nu_1+\nu'_1}\alpha_2^{\nu_2+\nu'_2}\dots\alpha_n^{\nu_n+\nu'_n}$$

ist. Denn nehmen wir an, es gebe in SS' ein höheres Glied als AA' , das aus der Multiplication der beiden Glieder

$$B = N\alpha_1^{\mu_1}\alpha_2^{\mu_2}\dots\alpha_n^{\mu_n}, \quad B' = N'\alpha_1^{\mu'_1}\alpha_2^{\mu'_2}\dots\alpha_n^{\mu'_n}$$

entsteht, also

$$BB' = NN'\alpha_1^{\mu_1+\mu'_1}\alpha_2^{\mu_2+\mu'_2}\dots\alpha_n^{\mu_n+\mu'_n},$$

und es sei nicht gleichzeitig $B = A$ und $B' = A'$, so wäre die erste der Differenzen

$$\mu_1 - \nu_1 + \mu'_1 - \nu'_1, \quad \mu_2 - \nu_2 + \mu'_2 - \nu'_2, \dots, \quad \mu_n - \nu_n + \mu'_n - \nu'_n,$$

die von Null verschieden ist, positiv, was unmöglich ist, da die erste nicht verschwindende unter den Differenzen

$$\mu_1 - \nu_1, \quad \mu_2 - \nu_2, \dots, \mu_n - \nu_n$$

und unter den Differenzen

$$\mu'_1 - \nu'_1, \quad \mu'_2 - \nu'_2, \dots, \mu'_n - \nu'_n$$

nach der Voraussetzung negativ ist. Durch Wiederholung dieses Schlusses ergibt sich der allgemeinere Satz, dass man das höchste Glied eines Productes aus mehreren Factoren erhält, wenn man die höchsten Glieder der einzelnen Factoren multiplicirt.

Die höchsten Glieder der symmetrischen Grundfunctionen

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$$

sind nun, abgesehen vom Vorzeichen,

$$\alpha_1, \quad \alpha_1\alpha_2, \quad \alpha_1\alpha_2\alpha_3, \dots, \alpha_1\alpha_2\alpha_3\dots\alpha_n,$$

und wenn wir also das Product bilden

$$P = \pm Ma_1^{\nu_1-\nu_2}a_2^{\nu_2-\nu_3}\dots a_{n-1}^{\nu_{n-1}-\nu_n}a_n^{\nu_n},$$

so erhalten wir eine symmetrische Function, deren höchstes Glied gleichfalls A ist, wie in S .

Die Differenz

$$S - P = S'$$

ist also wieder eine symmetrische Function, deren höchstes Glied niedriger ist als das von S , und die wir nach der Voraussetzung rational durch die Grundfunctionen darstellen können. Da P ebenso dargestellt ist, so ist das Ziel erreicht. Es erhellt auch hier wieder, dass durch die Darstellung mittelst der Grundfunctionen keine Brüche eingeführt werden, wenn ursprünglich in S keine enthalten sind.

Diese Methode der Berechnung symmetrischer Functionen giebt uns zugleich Aufschluss über den Grad der ganzen rationalen Function von $a_1, a_2, \dots, a_n$, durch die eine bestimmte symmetrische Function der $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ausgedrückt wird. Wenn nämlich $(\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n)$ die Ordnung der symmetrischen Function ist, so ist ν_1 der Grad von P in Bezug auf sämtliche $a_1, a_2, \dots, a_n$, und in dem entwickelten Ausdruck für S kann kein Glied höheren Grades vorkommen; auch kann das Glied P durch keines der folgenden Glieder zerstört werden, da P durch die Ordnung von S völlig bestimmt ist, und die Ordnung von S' und aller folgenden symmetrischen Functionen niedriger ist, als die Ordnung von S .

Setzen wir also an Stelle von $a_1, a_2, \dots, a_n$:

$$\frac{a_1}{a_0}, \quad \frac{a_2}{a_0}, \dots, \frac{a_n}{a_0},$$

so ist $a_0^{\nu_1} S$ eine ganze homogene Function ν_1 -ten Grades von $a_0, a_1, \dots, a_n$, und man kann S nicht durch Multiplication mit einer niedrigeren Potenz von a_0 in eine ganze Function der a verwandeln.

§ 46. Discriminanten.

Die im Vorhergehenden gewonnenen Sätze lehren, symmetrische Functionen der Wurzeln einer Gleichung rational durch die Coefficienten der Gleichung auszudrücken; die Resultate sind zunächst abgeleitet unter der Voraussetzung, dass die Wurzeln, oder, was nach dem dritten Abschnitt damit gleichbedeutend ist, die Coefficienten unabhängige Variable waren; sie können aber nicht falsch werden, wenn dafür bestimmte numerische Werthe gesetzt werden, da wenigstens bei den ganzen symmetrischen Functionen keine Nenner vorkommen, die verschwinden können.

Wir machen zunächst einige Anwendungen auf besondere symmetrische Functionen, die für die Folge wichtig sind. Schon im § 19 ist bemerkt worden, dass das Differenzenproduct

$$P = (\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_1 - \alpha_3) \cdots (\alpha_1 - \alpha_n)(\alpha_2 - \alpha_3) \cdots (\alpha_2 - \alpha_n) \cdots (\alpha_{n-1} - \alpha_n) \quad (1)$$

durch Umstellung zweier Elemente nur das Vorzeichen ändert. Das Quadrat dieses Productes wird also bei allen Vertauschungen zweier der Variablen α und demnach auch bei allen Permutationen ungeändert bleiben, d. h. eine symmetrische Function der Variablen sein. Die Ordnung dieser symmetrischen Function ist, wie man aus (1) sieht, gleich

$$(2n - 2, 2n - 4, \dots, 2, 0).$$

Wenn wir also die Function $f(x)$, deren Wurzeln die $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sind, in der Form annehmen

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \cdots + a_{n-1} x + a_n,$$

so dass die höchste Potenz von x nicht gerade den Coefficienten 1 hat, so ist P^2 eine ganze rationale Function von

$$\frac{a_1}{a_0}, \quad \frac{a_2}{a_0}, \dots, \frac{a_n}{a_0}, \quad (2)$$

die durch Multiplication mit a_0^{2n-2} in eine homogene Function von $a_0, a_1, \dots, a_n$ übergeht. Wir nennen diese homogene Function, die also durch

$$a_0^{2n-2} P^2 = D \quad (3)$$

definiert ist, die Discriminante der Function $f(x)$. Setzen wir $a_0 = 1$, so erhalten wir die unhomogene Form der Discriminante.¹³

Das Verschwinden der Discriminante ist die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass zwei der Werthe $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ einander gleich werden.

Wir können für die Discriminante noch einen zweiten Ausdruck aufstellen. Es ist nach § 29, (4)

$$\begin{aligned} f'(\alpha_1) &= a_0(\alpha_1 - \alpha_2)(\alpha_1 - \alpha_3) \cdots (\alpha_1 - \alpha_n), \\ f'(\alpha_2) &= a_0(\alpha_2 - \alpha_1)(\alpha_2 - \alpha_3) \cdots (\alpha_2 - \alpha_n), \\ &\vdots \\ f'(\alpha_n) &= a_0(\alpha_n - \alpha_1)(\alpha_n - \alpha_2) \cdots (\alpha_n - \alpha_{n-1}), \end{aligned}$$

folglich, da hier jeder Factor $(\alpha_h - \alpha_k)$ zweimal mit entgegengesetzten Zeichen vorkommt,

$$D = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_0^{n-2} f'(\alpha_1) f'(\alpha_2) \cdots f'(\alpha_n). \quad (5)$$

Um die Discriminante wirklich darzustellen, haben wir zunächst ein allgemeines Mittel. Es war nach § 22

$$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} P = \begin{vmatrix} 1 & \alpha_1 & \alpha_1^2 & \cdots & \alpha_1^{n-1} \\ 1 & \alpha_2 & \alpha_2^2 & \cdots & \alpha_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \alpha_n & \alpha_n^2 & \cdots & \alpha_n^{n-1} \end{vmatrix}, \quad (6)$$

und wenn wir nach § 27 das Quadrat dieser Determinante durch Multiplication nach Verticalreihen als eine neue Determinante darstellen und

$$s_m = \alpha_1^m + \alpha_2^m + \cdots + \alpha_n^m$$

setzen, so wird

$$D = a_0^{2n-2} \begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-2} \end{vmatrix}. \quad (7)$$

Die Grössen s_m sind aber die Potenzsummen, die wir schon im § 42 durch die Coefficienten ausgedrückt haben; nur sind an Stelle der $a_1, a_2, \dots, a_n$ die Quotienten (2) zu setzen.

So finden wir z. B. für $n = 2$

$$D = a_0^2(s_0 s_2 - s_1^2) = a_1^2 - 4a_0 a_2 \quad (8)$$

und für $n = 3$

$$D = a_0^4(s_0 s_2 s_4 - s_0 s_3^2 + 2s_1 s_2 s_3 - s_1^2 s_4 - s_2^3). \quad (9)$$

§ 46. Discriminanten

Hierin ist nach § 42 zu setzen

$$\begin{aligned} s_0 &= 3, & a_0 s_1 &= -a_1, \\ a_0^2 s_2 &= a_1^2 - 2a_0 a_2, \\ a_0^3 s_3 &= -a_1^3 + 3a_0 a_1 a_2 - 3a_0^2 a_3, \\ a_0^4 s_4 &= a_1^4 - 4a_0 a_1^2 a_2 + 4a_0^2 a_1 a_3 + 2a_0^2 a_2^2, \end{aligned}$$

wodurch man erhält

$$D = a_1^2 a_2^2 + 18a_0 a_1 a_2 a_3 - 4a_0 a_2^3 - 4a_1^3 a_3 - 27a_0^2 a_3^2. \quad (10)$$

¹³Die Discriminante ist, vom Factor $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_0^{n-2}$ abgesehen, dasselbe, was Gauss die Determinante der Function nennt (l. c., art. 6).

§ 47. Discriminanten der Formen dritter und vierter Ordnung

Bei den Functionen dritter und vierter Ordnung haben wir zur Berechnung der Discriminanten in den Auflösungen der Gleichungen dieser beiden Grade (§ 35, 37) ein einfaches Mittel.

Was zunächst die Gleichung dritter Ordnung betrifft, so waren die drei Wurzeln von

$$x^3 + ax + b = 0 \quad (1)$$

in der Form dargestellt:

$$\begin{aligned} \alpha &= u + v, \\ \beta &= \varepsilon u + \varepsilon^2 v, \\ \gamma &= \varepsilon^2 u + \varepsilon v, \end{aligned} \quad (2)$$

worin

$$\varepsilon = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}, \quad \varepsilon^2 = \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2} \quad (3)$$

die complexen dritten Einheitswurzeln sind und u, v durch § 35, (8) bestimmt sind. Aus (3) folgt

$$\varepsilon - \varepsilon^2 = \sqrt{-3}, \quad 1 - \varepsilon = \varepsilon^2 \sqrt{-3}, \quad 1 - \varepsilon^2 = -\varepsilon \sqrt{-3}, \quad (4)$$

und aus (2)

$$\begin{aligned} \alpha - \beta &= \sqrt{-3}(\varepsilon^2 u - \varepsilon v), \\ \alpha - \gamma &= -\sqrt{-3}(\varepsilon u - \varepsilon^2 v), \\ \beta - \gamma &= \sqrt{-3}(u - v). \end{aligned}$$

Hieraus durch Multiplication

$$(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)(\beta - \gamma) = 3\sqrt{-3}(u^3 - v^3). \quad (5)$$

Erhebt man ins Quadrat, so erhält man für die Discriminante der cubischen Gleichung (1) nach § 35, (6)

$$D = -(27b^2 + 4a^3). \quad (6)$$

Hieraus erhält man die Discriminante der allgemeinen Function

$$a_0 x^3 + a_1 x^2 + a_2 x + a_3, \quad (7)$$

wenn man für a und b die Ausdrücke § 34, (4) einsetzt, in denen man a_1, a_2, a_3 durch

$$\frac{a_1}{a_0}, \quad \frac{a_2}{a_0}, \quad \frac{a_3}{a_0}$$

ersetzt und [§ 46, (3)] mit a_0^4 multiplicirt. Man erhält so

$$a = \frac{3a_0 a_2 - a_1^2}{3a_0^2}, \quad b = \frac{2a_1^3 - 9a_0 a_1 a_2 + 27a_0^2 a_3}{27a_0^3},$$

und folglich

$$D = -\frac{1}{27a_0^2} \left\{ (2a_1^3 - 9a_0 a_1 a_2 + 27a_0^2 a_3)^2 + 4(3a_0 a_2 - a_1^2)^3 \right\}. \quad (8)$$

Wenn man das Quadrat und den Cubus ausrechnet, so kommt man zu der Formel (10) des vorigen Paragraphen zurück; es ist aber bemerkenswerth, dass die Formel (8) scheinbar den Nenner $27a_0^2$ enthält, der sich beim Ausrechnen forthebt.

Ebenso können wir bei den biquadratischen Gleichungen verfahren. Wir erhalten, wenn $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ die Wurzeln der biquadratischen Gleichung

$$x^4 + ax^2 + bx + c = 0 \quad (9)$$

sind, nach § 37, (5)

$$\begin{aligned}\alpha - \beta &= v + w, & \gamma - \delta &= v - w, \\ \alpha - \gamma &= w + u, & \delta - \beta &= w - u, \\ \alpha - \delta &= u + v, & \beta - \gamma &= -u + v.\end{aligned}\tag{10}$$

Danach wird die Discriminante der Gleichung (9)

$$D = (v^2 - w^2)^2(w^2 - u^2)^2(u^2 - v^2)^2,$$

d. h. es ist D gleich der Discriminante der cubischen Resolvente § 37, (4)

$$z^3 + 2az^2 + (a^2 - 4c)z - b^2 = 0,\tag{11}$$

deren Wurzeln u^2, v^2, w^2 sind.

Wenn man diese Discriminante aber nach der Formel (10), § 46 bildet, indem man

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 2a, \quad a_2 = a^2 - 4c, \quad a_3 = -b^2$$

setzt, so folgt

$$D = -4a^3b^2 + 144acb^2 + 16a^4c - 128a^2c^2 + 256c^3 - 27b^4.\tag{12}$$

Wenn man dagegen zur Bildung der Discriminante der cubischen Gleichung (11) die Formel (8) anwendet, so erhält man

$$27D = 4(a^2 + 12c)^3 - (2a^3 - 72ac + 27b^2)^2.\tag{13}$$

Man leitet hieraus die Discriminante der allgemeinen Function vierten Grades

$$f(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4\tag{14}$$

ab, indem man nach § 34, (4) a, b, c durch

$$-\frac{3a_1^2}{8} + a_2, \quad \frac{a_1^3}{8} - \frac{a_1a_2}{2} + a_3, \quad -\frac{3a_1^4}{256} + \frac{a_1^2a_2}{16} - \frac{a_1a_3}{4} + a_4$$

ausdrückt, dann a_1, a_2, a_3, a_4 durch

$$\frac{a_1}{a_0}, \quad \frac{a_2}{a_0}, \quad \frac{a_3}{a_0}, \quad \frac{a_4}{a_0}$$

ersetzt und mit a_0^6 multiplicirt. Setzt man nach Ausführung dieser einfachen Rechnung zur Abkürzung

$$A = a_2^2 - 3a_1a_3 + 12a_0a_4,\tag{15}$$

$$B = 27a_1^2a_4 + 27a_0a_3^2 + 2a_2^3 - 72a_0a_2a_4 - 9a_1a_2a_3,\tag{16}$$

so erhält man aus (13)

$$27D = 4A^3 - B^2.\tag{17}$$

Die Grössen A und B , die uns im nächsten Abschnitt noch beschäftigen werden, heissen die erste und zweite Invariante der biquadratischen Function f . Man kann also nach (17) die Discriminante rational durch diese Grössen ausdrücken, jedoch nicht so, dass die Coefficienten ganzzahlig werden; führt man die in (17) vorgeschriebene Rechnung aus, um D durch die Coefficienten a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 selbst darzustellen, so muss sich der Factor 27 noch fortheben lassen. Wir wollen den langen Ausdruck, dessen Berechnung keinerlei Schwierigkeit bietet, nicht hierher setzen.

§ 48. Resultanten

Eine andere Anwendung der Theorie der symmetrischen Functionen, die übrigens die Discriminantenbildung als speciellen Fall enthält, ist die Bildung der Resultanten.

Es seien

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n, \quad (1)$$

$$\varphi(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + b_2x^{m-2} + \cdots + b_m \quad (2)$$

zwei ganze rationale Functionen vom n ten und m ten Grade und $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ seien die Wurzeln der ersten, so dass auch

$$f(x) = a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n) \quad (3)$$

gesetzt werden kann. Nun ist das Product

$$\varphi(\alpha_1)\varphi(\alpha_2) \cdots \varphi(\alpha_n)$$

eine symmetrische Function der Wurzeln von $f(x)$ und kann also ganz und rational durch

$$\frac{a_1}{a_0}, \quad \frac{a_2}{a_0}, \dots, \frac{a_n}{a_0}$$

ausgedrückt werden. Die Ordnung dieser symmetrischen Function ist $(m, m \dots m)$ (§ 45) und daher ist

$$R = a_0^m \varphi(\alpha_1)\varphi(\alpha_2) \cdots \varphi(\alpha_n) \quad (4)$$

eine ganze rationale und homogene Function m ter Ordnung von $a_0, a_1, \dots, a_n$. Sie ist auch, wie ihr Ausdruck zeigt, eine ganze homogene Function n ter Ordnung von $b_0, b_1, \dots, b_m$. Sie wird die Resultante der beiden Functionen $f(x)$ und $\varphi(x)$ genannt. Diese Bezeichnung rechtfertigt sich durch eine zweite Darstellung.

Bezeichnen wir die Wurzeln von $\varphi(x)$ mit $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$, setzen also

$$\varphi(x) = b_0(x - \beta_1)(x - \beta_2) \cdots (x - \beta_m), \quad (5)$$

so wird nach (4)

$$R = a_0^m b_0^n \prod_{i,k} (\alpha_i - \beta_k), \quad (6)$$

worin das Productzeichen $\prod$ sich auf alle Indices $i = 1, 2, \dots, n, k = 1, 2, \dots, m$ bezieht.

Dieser Ausdruck zeigt nun, dass R , abgesehen von dem Factor $(-1)^{mn}$, in der gleichen Weise von $\varphi(x)$ abhängt, wie von $f(x)$, und dass wir also auch setzen können

$$(-1)^{mn} R = b_0^n f(\beta_1)f(\beta_2) \cdots f(\beta_m). \quad (7)$$

Die Discriminanten sind hiernach ein specieller Fall der Resultanten, den man erhält, wenn man für $\varphi(x)$ die Derivirte $f'(x)$ nimmt.

Das Verschwinden der Resultante von $f(x)$ und $\varphi(x)$ ist die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die beiden Gleichungen

$$f(x) = 0 \quad \text{und} \quad \varphi(x) = 0$$

eine gemeinsame Wurzel haben.

Die Gleichung, die durch Nullsetzen der Resultante entsteht, wird auch die Endgleichung aus $f(x) = 0$ und $\varphi(x) = 0$ genannt und die Aufstellung der Endgleichung die Elimination von x .

Zur Berechnung der Resultanten kann man den Algorithmus des grössten gemeinsamen Theilers anwenden (§ 6). Ist nämlich $m \leq n$, so kann man eine ganze Function Q und eine ebensolche Function $\psi(x)$, deren Grad kleiner ist als m , so bestimmen, dass

$$f(x) = Q\varphi(x) + \psi(x),$$

also, wenn man für x eine der Wurzeln β_i setzt,

$$f(\beta_i) = \psi(\beta_i),$$

also

$$b_0^n \prod_i f(\beta_i) = b_0^n \prod_i \psi(\beta_i); \quad (8)$$

ist m' der Grad von $\psi(x)$, so ist

$$b_0^{m'} \prod_i \psi(\beta_i) = R' \quad (9)$$

die Resultante von $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ und daher

$$R = b_0^{n-m'} R'. \quad (10)$$

Die Bildung der Resultante R ist hierdurch auf die Bildung von R' zurückgeführt. Man kann nun $\varphi(x)$ wieder durch $\psi(x)$ theilen, und führt so die Bildung von R' auf die Bildung einer Resultante von Functionen immer niedrigeren Grades zurück, bis man schliesslich auf eine Constante, d. h. eine Function der Coefficienten a, b kommt, die mit der gesuchten Resultante identisch sein muss.

Die Berechnung der Resultanten ist meist sehr weitläufig. Wir wollen nur das einfachste Beispiel der Resultante zweier quadratischer Functionen anführen:

$$f(x) = a_0x^2 + a_1x + a_2, \quad \varphi(x) = b_0x^2 + b_1x + b_2.$$

Man kann hier direct das Product

$$R = a_0^2(b_0\alpha_1^2 + b_1\alpha_1 + b_2)(b_0\alpha_2^2 + b_1\alpha_2 + b_2)$$

berechnen, und erhält, wenn man

$$-a_0(\alpha_1 + \alpha_2) = a_1, \quad a_0\alpha_1\alpha_2 = a_2$$

setzt,

$$R = a_0^2b_2^2 + a_2^2b_0^2 - b_0b_1a_1a_2 - a_0a_1b_1b_2 + b_0b_2a_1^2 + a_0a_2b_1^2 - 2a_0b_0a_2b_2, \quad (11)$$

oder was damit identisch ist

$$R = (a_0b_2 - a_2b_0)^2 - (a_0b_1 - a_1b_0)(a_1b_2 - a_2b_1). \quad (12)$$

Die einzelnen Glieder der Resultante der zwei Functionen $f(x)$ und $\varphi(x)$ vom n ten und m ten Grade haben, von einem numerischen (ganzzahligen) Factor abgesehen, die Gestalt

$$a_0^{\nu_0} a_1^{\nu_1} \cdots a_n^{\nu_n} b_0^{\mu_0} b_1^{\mu_1} \cdots b_m^{\mu_m}, \quad (13)$$

worin, wie aus den oben bestimmten Graden hervorgeht,

$$\nu_0 + \nu_1 + \cdots + \nu_n = m, \quad \mu_0 + \mu_1 + \cdots + \mu_m = n. \quad (14)$$

Wir können aber noch eine andere Relation zwischen diesen Exponenten angeben. Da nämlich [nach (6)] R eine homogene Function nm ten Grades von den $n + m$ Variablen α, β ist, da ferner a_0 vom nullten, a_1 vom ersten, a_2 vom zweiten etc. Grade in den α , allgemein a_k und b_k vom k ten Grade in diesen Variablen sind, so folgt

$$\nu_1 + 2\nu_2 + 3\nu_3 + \cdots + n\nu_n + \mu_1 + 2\mu_2 + 3\mu_3 + \cdots + m\mu_m = nm, \quad (15)$$

eine Relation, aus der sich ein wichtiger Schluss ziehen lässt, den wir im folgenden Paragraphen etwas ausführlicher besprechen wollen.

§ 49. Elimination. Theorem von Bezout

Wenn in den beiden Functionen

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n, \\ \varphi(x) &= b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m \end{aligned} \quad (1)$$

die Coefficienten a, b selbst wieder ganze rationale Functionen einer Grösse y sind, so wird auch die Resultante eine ganze rationale Function von y werden, die wir mit $F(y)$ bezeichnen wollen. Die Bildung dieser Gleichung ist die Elimination von x aus den beiden Gleichungen (1).

Die Gleichung

$$F(y) = 0 \quad (2)$$

hat alle die Werthe von y zu Wurzeln, wofür die beiden Gleichungen

$$f(x) = 0, \quad \varphi(x) = 0 \quad (3)$$

eine gemeinsame Wurzel haben. Ist die Bedingung (2) befriedigt, so findet man die Werthe von x , die den zwei Gleichungen (3) genügen, indem man den grössten gemeinschaftlichen Theiler von $f(x)$ und $\varphi(x)$ aufsucht. Dieser gemeinschaftliche Theiler ist vom ersten Grade und bestimmt also x rational, wenn nur eine solche gemeinschaftliche Wurzel vorhanden ist; im anderen Falle wird er von entsprechend höherem Grade, und die Bestimmung von x erfordert noch die Lösung einer Gleichung höheren Grades.

Gehört zu jeder Wurzel der Resultante nur eine gemeinschaftliche Wurzel x , so ist die Zahl der Werthe paare x, y , die den Gleichungen (3) genügen, gleich dem Grade der Resultante in Bezug auf y . Sind also die Coefficienten a vom Grade ν , b vom Grade μ in Bezug auf y , so ist nach der Gradbestimmung des vorigen Paragraphen der Grad der Resultante

$$n\nu + m\mu; \quad (5)$$

so gross ist also die Anzahl der gemeinsamen Wurzelpaare. Diese Zahl kann aber noch dadurch modificirt werden, dass möglicherweise die Coefficienten so beschaffen sein können, dass die höchste Potenz von y aus der Endgleichung wegfällt. Man würde dann die Uebereinstimmung der Zahl mit (5) nur durch die willkürliche Hinzufügung unendlich vieler Wurzeln retten können. Auch mehrfache Wurzeln geben zu Bedenken Anlass. Man begegnet diesen Uebelständen theilweise dadurch, dass man die homogene Form der Gleichungen zu Grunde legt, eine Form, in der sich das Eliminationsproblem besonders in der Geometrie einstellt.

Wenn nämlich die Function $f(x)$ aus einer homogenen Function n ter Ordnung der drei Variablen x, y, z (einer ternären Form) durch Ordnen nach Potenzen von x hervorgegangen ist, so sind die Coefficienten $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ homogene Formen der beiden Variablen y, z , von dem Grade, den der Index angiebt, also a_0 eine Constante, a_1 eine lineare, a_2 eine quadratische Form u. s. f., und Entsprechendes gilt von den Coefficienten $b_0, b_1, \dots, b_m$ der Function $\varphi(x)$.

Bedeutet x, y, z Dreieckscoordinaten in der Ebene, so sind $f(x) = 0, \varphi(x) = 0$ die Gleichungen einer Curve n ter und m ter Ordnung, und die gemeinsamen Wurzeln dieser beiden Gleichungen (die Verhältnisse $x : y : z$) bedeuten die Schnittpunkte der beiden Curven. Die Endgleichung, die man durch Elimination von x erhält, ist eine homogene Gleichung, deren Grad sich aus (15), § 48 gleich mn ergibt.

Eine Verminderung des Grades kann hier nicht stattfinden; immer ist die Endgleichung eine homogene Gleichung des nmt en Grades für die beiden Unbekannten y, z . Die einzige Ausnahme, auf die wir zu achten ist, ist die, dass die Resultante identisch (für alle y, z) verschwindet, dass also unendlich viele gemeinsame Wurzeln vorhanden sind. Dieser Fall hat in der Geometrie die Bedeutung, dass die beiden Curven einen Curventheil und nicht bloss einzelne Punkte gemein haben.

Wenn die Gleichungen $f = 0$, $\varphi = 0$ nur eine endliche Anzahl gemeinsamer Wurzeln haben, so können wir in den Ausdrücken

$$y_1 = y + \beta x, \quad z_1 = z + \gamma x$$

die Constanten β, γ so einrichten, dass, wenn einem Werth des Verhältnisses $y : z$ mehrere verschiedene der Gleichungen (1) genügende Werthe von x entsprechen, die zugehörigen Werthe von $y_1 : z_1$ von einander verschieden ausfallen.

Wir können dann f und φ auch als homogene Functionen vom Grade m und n der Veränderlichen x, y_1, z_1 ansehen, und die Resultante wird dann eine homogene Function m ten Grades $R(y_1, z_1)$ von y_1 und z_1 . Setzen wir darin

$$y_1 = b' + b\lambda, \quad z_1 = c' + c\lambda,$$

so erhalten wir eine Gleichung m ten Grades in λ , und wir können, wenn $R(y_1, z_1)$ nicht identisch verschwindet, die Constanten b, b', c, c' so annehmen, dass der Coefficient der höchsten Potenz von λ , nämlich $R(b, c)$, von Null verschieden ist. Dann entspricht jeder Wurzel der Resultante nur ein Werthsystem des Verhältnisses $x : y : z$, und die Anzahl der gemeinschaftlichen Wurzeln von f und φ ist also höchstens gleich mn . Um den Satz aussprechen zu können, dass die Zahl der gemeinsamen Wurzeln immer gleich mn ist, muss man noch ein Uebereinkommen treffen, wonach gewisse Werthepaare mehrfach zu zählen sind.

Der Satz, der, in geometrischem Gewande, besagt, dass sich zwei Curven m ter und n ter Ordnung in mn Punkten schneiden, wird das Bezout'sche Theorem genannt.

§ 50. Elimination aus mehreren Gleichungen

Die Principien der Elimination, die wir im Vorhergehenden auf zwei Gleichungen angewandt haben, lassen sich ohne Schwierigkeit auf mehrere Gleichungen mit einer entsprechenden Anzahl von Unbekannten ausdehnen.

Nehmen wir zunächst die Gleichungen

$$f(x) = 0, \quad \varphi(x) = 0, \quad \psi(x) = 0, \quad (1)$$

der Grade m, n, p , deren Coefficienten a_i, b_i, c_i zunächst als unabhängige Veränderliche betrachtet werden sollen.

Wir wenden auf zwei von ihnen, etwa auf $f(x), \varphi(x)$, den Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers an und erhalten einen letzten Rest, der eine rationale Function der a und b ist und der, von Nennern befreit, mit der Resultante R von $f(x)$ und $\varphi(x)$ übereinstimmt, und einen vorletzten, der eine lineare Function von x ist. Die Bedingung für das Vorhandensein einer gemeinsamen Wurzel von $f = 0$ und $\varphi = 0$ ist das Verschwinden der Resultante, und der vorletzte Rest giebt unter dieser Voraussetzung für die gemeinsame Wurzel einen rationalen Ausdruck durch die Coefficienten.

Setzt man diesen Ausdruck in $\psi(x)$ ein, so erhält man, wenn man alle Nenner fortschafft, eine ganze rationale Function der Coefficienten a, b, c , die wir mit S bezeichnen wollen, und deren Verschwinden in Verbindung mit $R = 0$ die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür enthält, dass die drei Gleichungen (1) eine gemeinsame Wurzel haben.

Ersetzen wir nun die Coefficienten a, b, c der Functionen (1) durch ganze rationale Functionen einer zweiten Unbekannten y , deren Coefficienten mit α, β, γ bezeichnet und vorläufig als unabhängige Veränderliche betrachtet werden mögen. R und S werden dann ganze rationale Functionen von α, β, γ und y , und wenn wir also die Gleichungen

$$R = 0, \quad S = 0 \quad (2)$$

als Gleichungen für y betrachten, so können wir nach den Regeln des vorigen Paragraphen ihre Resultante T bilden, die, wenn sie nicht identisch verschwindet, eine ganze rationale Function der Coefficienten α, β, γ sein wird, und die Gleichung

$$T = 0 \quad (3)$$

ist die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass das Gleichungssystem (1) durch ein oder mehrere Werthepaare x, y befriedigt werden kann. T heisst die Resultante des Systems (1). Man kann also aus den drei Gleichungen (1) durch Elimination der Unbekannten x und y eine Endgleichung für z bilden.

Ersetzt man nun die α, β, γ wieder durch ganze rationale Functionen einer dritten Unbekannten z , so geht T in eine Gleichung für z über. Die Functionen f, φ, ψ werden Functionen der drei Unbekannten x, y, z . Der Grad der Gleichung (3) giebt die Anzahl der Werthsysteme x, y, z , für die die drei Gleichungen (1) zugleich befriedigt sind.

Sind aber die Coefficienten so beschaffen, dass T identisch (für alle Werthe von z) verschwindet, so giebt es unendlich viele Werthsysteme x, y, z , die den Gleichungen (1) zugleich genügen. Betrachtet man x, y, z als Cartesische Coordinaten, so stellen die Gleichungen (1), jede für sich, eine Oberfläche dar. Der Grad der Endgleichung $T = 0$ in Bezug auf z giebt die Anzahl der Schnittpunkte dieser drei Oberflächen an. Ist aber T identisch Null, so haben die drei Flächen entweder einen Flächentheil oder eine Curve gemeinschaftlich.

Den Grad der Endgleichung können wir auf folgendem Wege bestimmen, der gar keine weitläufigen Betrachtungen über die Grade der Functionen R, S, T erfordert. Wir führen, um uns von Ausnahmefällen unabhängig zu machen, homogene Variable ein, indem wir eine vierte, u , hinzufügen, und also drei homogene quaternäre Gleichungen

$$F(x, y, z, u) = 0, \quad \Phi(x, y, z, u) = 0, \quad \Psi(x, y, z, u) = 0 \quad (4)$$

von den Ordnungen m, n, p betrachten.

Nehmen wir den besonderen Fall an, dass jede dieser drei Functionen in lauter lineare Factoren zerfällt, so ist klar, dass, wenn die Anzahl der gemeinsamen Lösungen nicht unendlich ist, ihre Anzahl gleich dem Product mnp sein muss; denn wir können je einen linearen Factor von F, Φ, Ψ gleichzeitig Null setzen und erhalten so mnp Systeme von je drei linearen Gleichungen, die, wenn sie von einander unabhängig sind, ebenso viele Werthsysteme für die Verhältnisse $x : y : z : u$ ergeben.

Der Schluss, dass im allgemeinen Fall der Grad der Endgleichung von (4) ebenso gross ist, ist auf den ersten Blick bedenklich. Das Bedenken kann aber nach einer Bemerkung von F. Klein durch folgende einfache Ueberlegung vollständig beseitigt werden.

Denken wir uns die Endgleichung aus den Gleichungen (4) zunächst unter der Voraussetzung gebildet, dass die Coefficienten in den Gleichungen (4) von einander unabhängige Variable sind, so wird die Resultante, die sich nach Elimination von x, y ergibt, gewiss nicht identisch Null, da sie schon für specielle Coefficientensysteme, z. B. wenn F, Φ, Ψ in lineare Factoren zerfallen, nicht identisch verschwindet, und wir erhalten eine homogene Endgleichung für die zwei Unbekannten z, u von einem gewissen Grade, der zu ermitteln ist.

Specialisirt man die Coefficienten irgend wie, so kann zwar möglicherweise die Endgleichung identisch befriedigt werden; wenn aber dieser Fall nicht eintritt, so kann ihre Ordnung nicht geändert werden (da ja alle Glieder von derselben Ordnung sind). Da nun durch die oben angenommene Specialisirung, die sich in dem Zerfallen der Functionen F, Φ, Ψ ausspricht, das identische Verschwinden nicht stattfindet, sondern eine Endgleichung von der Ordnung mnp auftritt, so muss dies auch der Grad der Endgleichung im allgemeinen Falle sein.

Hiermit ist das Bezout'sche Theorem für den Fall von drei homogenen quaternären Gleichungen bewiesen.

Dass wir uns hier auf drei Gleichungen beschränkt haben, ist lediglich im Interesse der Einfachheit geschehen. Die Erweiterung, die für den Fall von n Gleichungen mit $n + 1$ homogenen Unbekannten erforderlich ist, ergibt sich von selbst, und kann dem Leser überlassen bleiben.

Für unsere allgemeine Aufgabe wollen wir nur noch bemerken, dass sich aus diesen Betrachtungen ergibt, dass das Problem der Algebra, sofern es sich auf die Lösung irgend welcher algebraischer Gleichungen bezieht, damit zurückgeführt ist auf die Behandlung einer Kette von Gleichungen mit je einer Unbekannten.

§ 51. Zerlegbare und unzerlegbare Functionen

Unter den ganzen rationalen Functionen mehrerer Veränderlichen müssen zerlegbare und unzerlegbare unterschieden werden.

Eine ganze rationale Function von irgend welchen Veränderlichen heisst zerlegbar, wenn sie als Product von wenigstens zwei ganzen rationalen Functionen derselben Veränderlichen darstellbar ist; ist sie nicht als ein solches Product darstellbar, so heisst sie unzerlegbar.

Wenn eine Function zerlegbar ist, so ist der Grad jedes der Factoren niedriger als der Grad der Function selbst. Eine lineare Function ist also immer unzerlegbar, und jede ganze rationale Function lässt sich in eine endliche Anzahl unzerlegbarer Functionen zerlegen.

Wir nennen eine ganze Function W durch eine andere w theilbar, wenn eine dritte ganze Function w' existirt, so dass

$$W = ww'$$

ist. Daraus folgt dann, dass, wenn U eine durch w theilbare und V eine beliebige ganze Function ist, auch das Product UV durch w theilbar ist, und dass, wenn $U, U', U'', \dots$ durch w theilbare, $V, V', V'', \dots$ beliebige ganze rationale Functionen sind, auch $UV + U'V' + U''V'' + \dots$ durch w theilbar ist.

Ist W durch w theilbar, so sagt man auch, w geht in W auf.

Zwei ganze rationale Functionen U, V , die nicht durch eine und dieselbe ganze rationale Function theilbar sind, heissen relativ prim oder theilerfremd.

Wir beweisen den Satz:

- I. Sind U, V, v ganze rationale Functionen irgend welcher Veränderlichen, sind U und v relativ prim und UV durch v theilbar, so ist V durch v theilbar.

Dieser Satz entspricht genau einem bekannten Fundamentalsatz aus der Lehre von den ganzen Zahlen, dass nämlich, wenn ein Product von zwei ganzen Zahlen durch eine dritte ganze Zahl theilbar ist, die zu dem einen Factor theilerfremd ist, der andere Factor durch diese Zahl theilbar sein muss.

Wir beweisen ihn durch vollständige Induction. Sind U, V, v nur von einer Veränderlichen x abhängig, so ist der Satz richtig; denn nach § 6 (Satz I) kann man in diesem Falle, wenn U und v relativ prim sind, zwei andere ganze Functionen P und p von x so bestimmen, dass

$$PU + pv = 1,$$

woraus durch Multiplication mit V

$$PUV + pVv = V$$

folgt, und daraus ersieht man, dass, wenn UV durch v theilbar ist, auch V durch v theilbar sein muss.

Wir nehmen also an, der Satz, den wir beweisen wollen, sei für Functionen von n und weniger Veränderlichen bewiesen, und wir leiten daraus seine Richtigkeit für Functionen von $n + 1$ Veränderlichen ab.

Dazu ist erforderlich, dass wir aus dem als richtig vorausgesetzten Theorem I einige Folgerungen ziehen, als deren Schluss sich dann die Gültigkeit des Theorems für die nächst höhere Variablenzahl ergibt.

Ist v eine unzerlegbare Function, so ist eine andere Function U derselben Veränderlichen entweder relativ prim zu v oder durch v theilbar. Daraus folgt nach I., dass ein Product von zwei Functionen UV nur dann durch v theilbar sein kann, wenn einer der beiden Factoren durch v theilbar ist. Dasselbe gilt für ein Product von mehreren Functionen, und so folgt aus I. das Theorem:

- II. Ein Product aus mehreren ganzen rationalen Functionen ist nur dann durch eine unzerlegbare Function v theilbar, wenn wenigstens einer der Factoren des Productes durch v theilbar ist.

Wenn eine ganze rationale Function U auf zwei Arten in unzerlegbare Factoren zerlegt ist,

$$U = vv'v'' \cdots = ww'w'' \cdots ,$$

so muss nach II. wenigstens einer der Factoren $v, v', v'', \dots$ durch w theilbar sein, also etwa v . Dann aber kann, da auch v unzerlegbar ist, v von w nur durch einen constanten Factor verschieden sein.

Demnach ist, wenn c dieser constante Factor ist,

$$cv'v'' \cdots = w'w'' \cdots ,$$

woraus folgt, dass eine der Functionen $v', v'', \dots$, etwa v' , durch w' theilbar ist, und sich also von w' nur durch einen constanten Factor unterscheidet.

Wir erhalten also als zweite Folgerung aus dem Theorem I:

- III. Eine ganze rationale Function kann, von constanten Factoren abgesehen, nur auf eine Art in unzerlegbare Factoren zerlegt werden.

Hieraus ergibt sich der Begriff des grössten gemeinschaftlichen Theilers von zwei oder mehr ganzen rationalen Functionen $U, V, \dots$. Man versteht darunter das Product aller unzerlegbaren Factoren, die in den Zerlegungen jeder der Functionen $U, V, \dots$ vorkommen, oder die Function möglichst hohen Grades, die in allen Functionen $U, V, \dots$ aufgeht. Nach III. ist diese Function, von einem constanten Factor abgesehen, für jedes Functionensystem $U, V, \dots$ vollständig bestimmt.

Mehrere Functionen $U, V, W, \dots$ heissen relativ prim, wenn keine zwei von ihnen einen gemeinsamen Theiler haben.

Alle diese Definitionen und Sätze sind genau analog mit sehr bekannten Sätzen der elementaren Zahlenlehre, die dort als Folgerungen des Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers auftreten, nur dass hier die unzerlegbaren Functionen die Rolle der Primzahlen übernehmen.

Wir führen noch einen solchen Satz an:

- IV. Sind u, v relativ prim und Uu, Uv durch w theilbar, so ist U durch w theilbar.

Denn zerlegt man die ganzen rationalen Functionen U, u, v, w in ihre unzerlegbaren Factoren, so muss irgend ein Factor von w , da er nicht in u und v zugleich vorkommen kann, in U aufgehen. Hebt man ihn aus U und w weg, so kann man ebenso für einen nächsten Factor von w schliessen u. s. f.

Wir betrachten nun ganze rationale Functionen einer Veränderlichen t

$$f(t) = u_0 t^m + u_1 t^{m-1} + \cdots + u_{m-1} t + u_m,$$

deren Coefficienten ganze rationale Functionen von n Veränderlichen x sind, von denen t unabhängig ist.

Sind die Coefficienten $u_0, u_1, \dots, u_m$ ohne gemeinsamen Theiler, so heisst $f(t)$ primitiv, im anderen Falle wird der grösste gemeinschaftliche Theiler der Coefficienten $u_0, u_1, \dots, u_m$ der Theiler der Function $f(t)$ genannt (vgl. § 2).

Wir schliessen, immer unter Voraussetzung der Gültigkeit von I:

V. Das Product von zwei primitiven Functionen $f(t)$ und $\varphi(t)$ ist wieder eine primitive Function und der Theiler eines Productes zweier imprimitiver Functionen ist gleich dem Product der Theiler beider Factoren.

Der Beweis ist ganz so wie für den entsprechenden Satz in § 2.

Es seien

$$\begin{aligned} f(t) &= u_0 t^m + u_1 t^{m-1} + \cdots + u_m, \\ \varphi(t) &= v_0 t^\mu + v_1 t^{\mu-1} + \cdots + v_\mu \end{aligned} \quad (1)$$

zwei primitive Functionen und

$$F(t) = U_0 t^{m+\mu} + U_1 t^{m+\mu-1} + \cdots + U_{m+\mu} \quad (2)$$

ihr Product. Es ist dann, wenn r und s irgend zwei Ziffern aus den Reihen $0, 1, \dots, m$ und $0, 1, 2, \dots, \mu$ bedeuten (§ 2),

$$U_{r+s} = u_r v_s + u_{r-1} v_{s+1} + \cdots + u_{r+1} v_{s-1} + \cdots. \quad (3)$$

Wenn nun w irgend eine unzerlegbare Function ist, die weder in allen u_r noch in allen v_s aufgeht, so wählen wir in (3) r und s so, dass u_r das erste nicht durch w theilbare u ist, also $u_{r-1}, u_{r-2}, \dots$ durch w theilbar sind, und dass ebenso v_s das erste, nicht durch w theilbare v wird. Dann kann auch U_{r+s} nicht durch w theilbar sein, weil alle Glieder, mit Ausnahme des ersten, durch w theilbar sind, d. h. $F(t)$ ist primitiv.

Daraus folgt unmittelbar, wenn p und q irgend welche ganze rationale Functionen der x sind, dass pq der Theiler des Productes der beiden imprimitiven Functionen $pf(t), q\varphi(t)$ ist, also der zweite Theil des Satzes V. Daraus folgt weiter:

VI. Wenn eine ganze rationale Function $F(t)$ der $n+1$ Variablen x und t in zwei Factoren zerlegbar ist, die in Bezug auf t ganz, in Bezug auf die x wenigstens rational sind, so ist sie auch in zwei Functionen zerlegbar, die in x und t ganz und rational sind.

Denn nach der Voraussetzung giebt es eine ganze rationale Function w der x allein und zwei ganze rationale Functionen der x und t , $f_1(t), \varphi_1(t)$, so dass

$$wF(t) = f_1(t)\varphi_1(t),$$

und nach (V) muss w in dem Product der Theiler von $f_1(t)$ und $\varphi_1(t)$ aufgehen, so dass wir auch

$$F(t) = f(t)\varphi(t)$$

erhalten, worin $f(t), \varphi(t)$ gleichfalls ganze rationale Functionen von x und t und zwar in Bezug auf t von demselben Grade wie $f_1(t)$ und $\varphi_1(t)$ sind, w. z. b. w.

Hieraus schliessen wir weiter, dass zwei Functionen $F(t), f(t)$, die als ganze rationale Functionen der $n+1$ Veränderlichen x und t betrachtet, in dem oben definirten Sinne relativ prim sind, sich auch, als Functionen von t allein betrachtet, und nach dem Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers behandelt (§ 6), als relativ prim erweisen müssen. Denn wenn sie einen gemeinsamen Theiler hätten, der in Bezug auf t ganz, in Bezug auf die x gebrochen wäre, so liesse sich eine ganze Function T von x und t und eine ganze Function P der x allein so bestimmen, dass

$$PF(t) = TF_1(t), \quad Pf(t) = Tf_1(t)$$

wäre, worin F_1, f_1 ganze Functionen ohne gemeinsamen Theiler sind. Nach IV müsste also P im Theiler von T aufgehen, und es könnten $F(t)$ und $f(t)$ nicht relativ prim sein. Es lassen sich also nach § 6 zwei ganze rationale Functionen Q, q von x und t und eine ganze rationale Function X von den x allein so bestimmen, dass die Identität

$$QF(t) + qf(t) = X \quad (4)$$

besteht.

Ist nun $\Phi(t)$ eine weitere ganze rationale Function von x und t , so folgt aus (4) durch Multiplication mit $\Phi(t)$

$$Q\Phi(t)F(t) + q\Phi(t)f(t) = X\Phi(t),$$

und wenn also $\Phi(t)F(t)$ durch $f(t)$ theilbar ist, so ist hiernach auch $X\Phi(t)$ durch $f(t)$ theilbar.

Demnach können wir, wenn $\varphi(t)$ und $\psi(t)$ wieder zwei ganze Functionen von x und t bedeuten, setzen

$$\begin{aligned} X\Phi(t) &= \varphi(t)f(t), \\ F(t)\Phi(t) &= \psi(t)f(t). \end{aligned} \tag{5}$$

Multiplicirt man die zweite dieser Gleichungen mit X und setzt aus der ersten für $X\Phi(t)$ den Ausdruck $\varphi(t)f(t)$ ein, so lässt sich $f(t)$ wegheben und es folgt

$$\varphi(t)F(t) = X\psi(t).$$

Nach IV. muss also X sowohl im Theiler von $\varphi(t)f(t)$ als im Theiler von $\varphi(t)F(t)$ aufgehen, und da die Functionen $f(t)$ und $F(t)$ und mithin auch ihre Theiler relativ prim sind, so muss X im Theiler von $\varphi(t)$ aufgehen. Setzen wir also demnach

$$\varphi(t) = X\varphi_1(t),$$

so folgt aus (5)

$$\Phi(t) = \varphi_1(t)f(t),$$

d. h. $\Phi(t)$ ist durch $f(t)$ theilbar, also:

VII. Sind $F(t)$ und $f(t)$ relativ prim und $\Phi(t)F(t)$ durch $f(t)$ theilbar, so ist $\Phi(t)$ durch $f(t)$ theilbar.

Dies aber ist nichts Anderes als das Theorem I für Functionen von $n + 1$ Variablen, und I. ist somit allgemein bewiesen.

§ 52. Tschirnhausen-Transformation

Wir machen von der Theorie der symmetrischen Functionen und der Resultantenbildung noch eine wichtige Anwendung auf die von Tschirnhausen¹⁴ herrührende Transformation algebraischer Gleichungen.

Es sei

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n \tag{1}$$

irgend eine Function n ten Grades, und

$$y = \frac{\chi(x)}{\psi(x)} \tag{2}$$

irgend eine (ganze oder gebrochene) rationale Function von x , bei der wir nur die eine Voraussetzung machen, dass $f(x)$ und $\psi(x)$ keinen gemeinsamen Theiler haben sollen. Nach dem Schlussatz von §6 können wir dann die Functionen $F(x)$ und $\varphi(x)$, letztere höchstens vom Grade $n - 1$, so bestimmen, dass

$$\chi(x) = F(x)f(x) + \varphi(x)\psi(x) \tag{3}$$

wird, so dass, sobald für x eine Wurzel der Gleichung

$$f(x) = 0 \tag{4}$$

¹⁴Acta eruditorum, Leipzig 1683.

gesetzt wird,

$$\frac{\chi(x)}{\psi(x)} = \varphi(x)$$

wird. Da wir nun die Werthe von y nur für solche Werthe von x , die Wurzeln von (4) sind, betrachten werden, so verlieren wir nichts an Allgemeinheit, wenn wir von vornherein

$$y = \varphi(x),$$

also gleich einer ganzen Function $(n-1)$ ten Grades setzen. Es sei also

$$y = \varphi(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \cdots + \alpha_{n-1} x^{n-1}, \quad (5)$$

worin die Coefficienten α vorläufig noch ganz unbestimmt bleiben.

Bezeichnen wir mit

$$x_1, x_2, \dots, x_n \quad (6)$$

die Wurzeln der Gleichung (4), so ergeben sich aus (5) die entsprechenden Werthe von y :

$$y_1 = \varphi(x_1), \quad y_2 = \varphi(x_2), \dots, y_n = \varphi(x_n), \quad (7)$$

und das Product

$$\Phi(y) = (y - y_1)(y - y_2) \cdots (y - y_n) \quad (8)$$

ist eine symmetrische Function der Grössen (6), die sich also rational durch die Coefficienten von $f(x)$ ausdrücken lässt.

In dieser Weise dargestellt, möge $\Phi(y)$ den Ausdruck haben

$$\Phi(y) = y^n + b_1 y^{n-1} + b_2 y^{n-2} + \cdots + b_{n-1} y + b_n. \quad (9)$$

Die Coefficienten b_ν werden nach § 7 durch die y_i bestimmt mittelst der Formeln

$$b_1 = -\sum y_1, \quad b_2 = \sum y_1 y_2, \quad b_3 = -\sum y_1 y_2 y_3, \dots,$$

woraus sich ergibt, dass b_ν eine ganze rationale und homogene Function ν ten Grades von den Variablen $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ ist.

$\Phi(y)$ ist nichts Anderes als die Resultante der beiden Gleichungen

$$f(x) = 0, \quad \varphi(x) - y = 0, \quad (10)$$

und nach § 49 kann man auch umgekehrt die gemeinsame Wurzel dieser beiden Gleichungen (10), wenn y einem der Werthe $y_1, y_2, \dots, y_n$ gleich wird, rational durch die Coefficienten von (10), d. h. rational durch a_i, α_i, y ausdrücken, vorausgesetzt, dass nur eine solche gemeinsame Wurzel vorhanden ist.

Dies wird dann eintreten, wenn die n Werthe $y_1, y_2, \dots, y_n$ von einander verschieden sind. Dann erhält man einen Ausdruck

$$x = \beta_0 + \beta_1 y + \beta_2 y^2 + \cdots + \beta_{n-1} y^{n-1},$$

der gültig ist, wenn für x einer der Werthe (6) und für y der zugehörige Werth (7) gesetzt wird. Die Grössen β_i sind aus den a_i und α_i rational zusammengesetzt.

Kommen aber unter den Werthen $y_1, y_2, \dots, y_n$ mehrere gleiche vor, so erfordert die Bestimmung der zugehörigen Werthe der x noch die Auflösung einer Gleichung des entsprechenden Grades. Dieser Grad ist aber immer kleiner als n , da die Function $\varphi(x)$ höchstens für $n-1$ Werthe von x denselben Werth y erhalten kann. Wenn also die Gleichung

$$\Phi(y) = 0 \quad (11)$$

vollständig gelöst ist, so ist damit auch die Gleichung (1) vollständig gelöst [wenn (11) n verschiedene Wurzeln hat] oder wenigstens auf die Lösung einer Gleichung niederen Grades zurückgeführt [wenn (11) gleiche Wurzeln hat].

Demnach betrachten wir (11) als eine Umformung der Gleichung (1), und die Bildung von (11) aus (1) heisst die Tschirnhausen-Transformation der Gleichung (1).

Der Zweck einer solchen Transformation ist, die Coefficienten α_i so zu bestimmen, dass $\Phi(y)$ eine einfachere Gestalt erhält als $f(x)$.

Man kann die Coefficienten b_ν bilden, wenn man die Potenzsummen der y_i kennt (§ 42).

Bezeichnen wir die Summen der m ten Potenzen der x_i mit s_m , der y_i mit σ_m , also

$$s_m = Sx_i^m, \quad \sigma_m = Sy_i^m,$$

so können wir σ_m durch die s_m auf folgende Art bilden. Wir entwickeln zunächst y^m nach dem polynomischen Lehrsatz (§ 12), setzen also

$$y^m = \sum \frac{\Pi(m)}{\Pi(\nu_0)\Pi(\nu_1)\cdots\Pi(\nu_{n-1})} \alpha_0^{\nu_0} \alpha_1^{\nu_1} \cdots \alpha_{n-1}^{\nu_{n-1}} x^{\nu_1+2\nu_2+\cdots+(n-1)\nu_{n-1}}, \quad (12)$$

worin die Summe sich auf alle nicht negativen ganzzahligen Werthe von $\nu_0, \nu_1, \dots, \nu_{n-1}$ erstreckt, die der Bedingung

$$\nu_0 + \nu_1 + \cdots + \nu_{n-1} = m \quad (13)$$

genügen. Setzen wir dann in (12) $x_1, x_2, \dots, x_n$ für x und bilden die Summe der so erhaltenen Werthe von $y_1^m, y_2^m, \dots, y_n^m$, so folgt

$$\sigma_m = \sum \frac{\Pi(m)}{\Pi(\nu_0)\Pi(\nu_1)\cdots\Pi(\nu_{n-1})} s_{\nu_1+2\nu_2+\cdots+(n-1)\nu_{n-1}} \alpha_0^{\nu_0} \alpha_1^{\nu_1} \cdots \alpha_{n-1}^{\nu_{n-1}}. \quad (14)$$

Hierdurch ist σ_m als ganze homogene Function m ter Ordnung der $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ dargestellt. Eine etwas vereinfachte Schreibweise erhält man nach der zweiten Darstellung von Formen (§ 15). Lassen wir $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m$ unabhängig von einander die Reihe der Zahlen $0, 1, \dots, n-1$ durchlaufen, so wird, wenn in einer Combination ν_0 mal der Index 0, ν_1 mal der Index 1, ν_2 mal der Index 2, $\dots$, ν_{n-1} mal der Index $n-1$ vorkommt,

$$\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_m = \nu_1 + 2\nu_2 + \cdots + (n-1)\nu_{n-1},$$

und danach kann der Ausdruck für σ_m so dargestellt werden:

$$\sigma_m = \sum_{\mu} s_{\mu_1+\mu_2+\cdots+\mu_m} \alpha_{\mu_1} \alpha_{\mu_2} \cdots \alpha_{\mu_m}. \quad (15)$$

Beispielsweise wird

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \alpha_0 s_0 + \alpha_1 s_1 + \cdots + \alpha_{n-1} s_{n-1}, \\ \sigma_2 &= \sum_{i,k} s_{i+k} \alpha_i \alpha_k, \\ \sigma_3 &= \sum_{h,i,k} s_{h+i+k} \alpha_h \alpha_i \alpha_k, \end{aligned} \quad (16)$$

worin h, i, k die Reihe der Zahlen $0, 1, 2, \dots, n-1$ durchlaufen.

§ 53. Anwendung auf die cubischen und biquadratischen Gleichungen

Das Ziel, das schon Tschirnhausen bei dieser Transformation im Auge gehabt hat, bestand darin, durch Bestimmung der Substitutionscoefficienten $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}$ in der umgeformten Gleichung

$\Phi(y) = 0$ so viele Glieder zum Verschwinden zu bringen, dass die Gleichung lösbar wird. Es gelingt dies leicht bei den Gleichungen dritten und vierten Grades, wenn es auch nicht einfach ist, und nicht ohne weitläufige Rechnungen möglich scheint, die sonst bekannten Formeln auf diesem Wege abzuleiten.

Nehmen wir zunächst die cubische Gleichung

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0, \quad (1)$$

die wir durch die Substitution

$$y = \alpha + \beta x + \gamma x^2 \quad (2)$$

umformen. Um die Gleichung für y

$$y^3 + Ay^2 + By + C = 0 \quad (3)$$

auf eine reine cubische Gleichung zurückzuführen, haben wir die Verhältnisse $\alpha : \beta : \gamma$ aus den beiden Gleichungen

$$A = 0, \quad B = 0 \quad (4)$$

zu bestimmen, von denen die erste linear, die zweite quadratisch ist.

Die Gleichungen (4) sind gleichbedeutend mit

$$\sigma_1 = 0, \quad \sigma_2 = 0 \quad (5)$$

und ergeben also nach (16) des vorigen Paragraphen

$$\alpha s_0 + \beta s_1 + \gamma s_2 = 0,$$

$$\alpha^2 s_0 + 2\alpha\beta s_1 + 2\alpha\gamma s_2 + \beta^2 s_2 + 2\beta\gamma s_3 + \gamma^2 s_4 = 0,$$

worin $s_0 = 3$ ist. Multiplicirt man die letztere Gleichung mit s_0 und zieht das Quadrat der ersten davon ab, so folgt

$$\beta^2(s_0 s_2 - s_1^2) + 2\beta\gamma(s_0 s_3 - s_1 s_2) + \gamma^2(s_0 s_4 - s_2^2) = 0. \quad (6)$$

Die Discriminante dieser quadratischen Gleichung

$$(s_0 s_3 - s_1 s_2)^2 - (s_0 s_2 - s_1^2)(s_0 s_4 - s_2^2)$$

giebt entwickelt

$$-s_0(s_0 s_2 s_4 - s_0 s_3^2 - s_1^2 s_4 - s_2^3 + 2s_1 s_2 s_3),$$

ist also, wenn D die Discriminante der cubischen Gleichung (1) bedeutet [§ 46, (9)], gleich $-3D$, und die Auflösung von (6) giebt also

$$\frac{\beta}{\gamma} = \frac{-(s_0 s_3 - s_1 s_2) + \sqrt{-3D}}{s_0 s_2 - s_1^2}. \quad (7)$$

Damit ist die Gleichung (3) auf eine reine Gleichung zurückgeführt, die zu ihrer Lösung nur noch das Ziehen einer Cubikwurzel erfordert. Welches Vorzeichen wir der in (7) vorkommenden Quadratwurzel geben wollen, steht in unserem Belieben.

Um die Tschirnhausen-Transformation für die biquadratische Gleichung zu benutzen, kann man etwa so verfahren, dass man in der umgeformten Gleichung

$$y^4 + b_1 y^3 + b_2 y^2 + b_3 y + b_4 = 0 \quad (8)$$

die $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ so bestimmt, dass

$$b_1 = 0, \quad b_3 = 0 \quad (9)$$

wird, wodurch (8) in eine quadratische Gleichung für y^2 übergeht, aus deren Wurzeln noch die Quadratwurzeln gezogen werden müssen, so dass, nachdem die Gleichungen (9) gelöst sind, noch zweimal eine Quadratwurzel gezogen werden muss.

Wenn man mittelst der ersten Gleichung (9) aus der zweiten α_0 eliminirt, so entsteht eine homogene cubische Gleichung zwischen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. Man kann daher eines von den beiden Verhältnissen $\alpha_1 : \alpha_2 : \alpha_3$ beliebig annehmen, z. B. $\alpha_3 = 0$ setzen, und erhält zur Bestimmung des anderen eine cubische Gleichung. Dadurch ist dann die Lösung der biquadratischen Gleichung auf die einer cubischen und auf Quadratwurzeln zurückgeführt.

§ 54. Die Tschirnhausen-Transformation der Gleichung fünften Grades

Will man auf die Gleichung fünften Grades

$$x^5 + a_1x^4 + a_2x^3 + a_3x^2 + a_4x + a_5 = 0 \quad (1)$$

die Tschirnhausen-Transformation anwenden, so hat man

$$y = \alpha_0 + \alpha_1x + \alpha_2x^2 + \alpha_3x^3 + \alpha_4x^4 \quad (2)$$

zu setzen, und erhält die Transformirte

$$y^5 + b_1y^4 + b_2y^3 + b_3y^2 + b_4y + b_5 = 0. \quad (3)$$

Der nächstliegende Gedanke wäre nun, die Verhältnisse der fünf Unbekannten α so zu bestimmen, dass

$$b_1 = 0, \quad b_2 = 0, \quad b_3 = 0, \quad b_4 = 0 \quad (4)$$

würde, wodurch (3) auf eine reine Gleichung zurück käme, und dies war wohl auch das Ziel, das Tschirnhausen im Auge hatte. Aber von den vier Gleichungen (4) ist die erste linear, die zweite quadratisch, die dritte vom dritten und die vierte vom vierten Grade. Die Endgleichung, die man daraus ableiten kann, wird daher (nach § 50) vom Grade $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$, und daher kann daraus für die Lösung der Gleichung fünften Grades kein Nutzen gezogen werden. Man sucht daher zunächst nur den beiden Gleichungen zu genügen

$$b_1 = 0, \quad b_2 = 0, \quad (5)$$

wodurch die Gleichung (3) in eine Form übergeht, die nach F. Klein (Vorlesungen über das Ikosaeder) eine Hauptgleichung fünften Grades genannt wird.

Zur Befriedigung der beiden Gleichungen (5) haben wir die Verfügung über die vier Verhältnisse $\alpha_1 : \alpha_2 : \alpha_3 : \alpha_4$, und wir können diese Grössen noch auf mannigfaltige Art zur Vereinfachung der Gleichung fünften Grades benutzen.

Wir kommen in einem späteren Abschnitt ausführlicher auf diesen Gegenstand zurück und beschränken uns hier darauf, die Ziele im Allgemeinen zu bezeichnen. Der Anschaulichkeit wegen bedienen wir uns einer geometrischen Einkleidung, die übrigens zum Verständniss der algebraischen Theorie, wie sie später gegeben werden soll, durchaus nicht wesentlich ist.

Wenn wir mit Hülfe der linearen Gleichung $b_1 = 0$ von den fünf Grössen α die eine, etwa α_0 , durch die übrigen ausdrücken, so können wir die vier übrigen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ als homogene Coordinaten eines Raumpunktes betrachten. Die Gleichung $b_2 = 0$ stellt dann eine Fläche zweiter Ordnung dar, $b_3 = 0$ eine Fläche dritter Ordnung, $b_4 = 0$ eine Fläche vierter Ordnung, $b_5 = 0$ eine Fläche fünfter Ordnung.

Wollte man also b_2, b_3, b_4 zugleich zu Null machen und dadurch die gegebene Gleichung auf eine reine reduciren, so müsste man einen der 24 Schnittpunkte von drei Flächen zweiter, dritter, vierter Ordnung bestimmen, der von einer Gleichung 24ten Grades abhängt.

Statt nun so zu verfahren, sucht man auf der Fläche $b_2 = 0$ eine gerade Linie zu bestimmen. Solcher gerader Linien giebt es auf jeder Fläche zweiter Ordnung eine oder zwei Schaaren (reell oder imaginär), und man kann eine dieser Geraden durch Quadratwurzeln bestimmen, wie weiter unten ausgeführt werden soll. Die Ermittlung eines Schnittpunktes einer dieser geraden Linien mit der Fläche $b_3 = 0$ führt dann auf eine Gleichung dritten Grades, und wenn man noch durch Bestimmung eines gemeinsamen Factors der α den Coefficienten $b_4 = 1$ macht, so erhält die Gleichung für y die Gestalt

$$y^5 + y + b = 0, \quad (6)$$

wodurch y als Function einer Variablen b bestimmt ist.

Diese Gleichungsform wird gewöhnlich nach dem englischen Mathematiker Jerrard genannt, der sie im Jahre 1834 bekannt machte. Sie ist aber schon viel früher (1786) von E. J. Bring in Lund publicirt worden.¹⁵ Wir nennen sie daher die Bring-Jerrard'sche Form.

Ebensogut könnte man durch eine Gleichung vierten Grades $b_4 = 0$ machen, und würde eine zweite Normalform der Gleichung fünften Grades erhalten:

$$y^5 + y^2 + b = 0, \quad (7)$$

die die gleiche Berechtigung hat, wie die Bring-Jerrard'sche Form.

Für die Lösung der Gleichung fünften Grades freilich wird durch diese Betrachtungen nichts gewonnen. Ihr Nutzen besteht darin, dass die Gleichung fünften Grades auf eine Normalform zurückgeführt wird, die nur von einem veränderlichen Coefficienten abhängt. Dies kann auf unendlich viele verschiedene Arten erreicht werden und gelingt am einfachsten, nämlich ohne Lösung einer Gleichung dritten oder vierten Grades, wenn man die Gleichung fünften Grades $b_5 = 0$ selbst als eine Umformung der gegebenen Gleichung fünften Grades betrachtet. Hat man nämlich die Gleichung $b_5 = 0$ gelöst, so wird einer der fünf Werthe von y gleich 0, und die gegebene Gleichung fünften Grades ist damit zugleich gelöst.

§ 55. Einführung der linearen Transformation

Wenn wir in irgend welchen Functionen, die von den m Veränderlichen $x_1, x_2, \dots, x_m$ abhängen, für diese Veränderlichen lineare Ausdrücke einsetzen, die von m neuen Veränderlichen $x'_1, x'_2, \dots, x'_m$ abhängen,

$$\begin{aligned} x_1 &= \alpha_1^{(1)} x'_1 + \alpha_1^{(2)} x'_2 + \dots + \alpha_1^{(m)} x'_m, \\ x_2 &= \alpha_2^{(1)} x'_1 + \alpha_2^{(2)} x'_2 + \dots + \alpha_2^{(m)} x'_m, \\ &\dots \\ x_m &= \alpha_m^{(1)} x'_1 + \alpha_m^{(2)} x'_2 + \dots + \alpha_m^{(m)} x'_m, \end{aligned} \quad (1)$$

so nennen wir dies eine lineare Substitution, und das Ergebniss eine lineare Transformation.

Die Grösse

$$r = \begin{vmatrix} \alpha_1^{(1)} & \alpha_1^{(2)} & \dots & \alpha_1^{(m)} \\ \alpha_2^{(1)} & \alpha_2^{(2)} & \dots & \alpha_2^{(m)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_m^{(1)} & \alpha_m^{(2)} & \dots & \alpha_m^{(m)} \end{vmatrix} \quad (2)$$

heisst die Substitutionsdeterminante. Sie muss immer von Null verschieden sein, da sonst durch (1) eine Abhängigkeit zwischen den Variablen $x_1, x_2, \dots, x_m$ ausgedrückt wäre.

Durch eine lineare Substitution geht jede homogene Function der Variablen x in eine homogene Function desselben Grades der Variablen x' über.

¹⁵Vgl. F. Klein, Vorlesungen über das Ikosaëder, S. 143.

So geht beispielsweise jede lineare Function

$$y = \sum_i a_i x_i$$

in eine ebensolche Function

$$y = \sum_i a'_i x'_i$$

über, worin

$$a'_k = \sum_i a_i \alpha_i^{(k)}. \quad (3)$$

Betrachten wir m solcher linearer Functionen

$$y_\nu = \sum_i a_{\nu,i} x_i \quad \nu = 1, 2, \dots, m,$$

so erhalten wir m transformirte Functionen

$$y_\nu = \sum_i a'_{\nu,i} x'_i \quad \nu = 1, 2, \dots, m.$$

Die Determinanten der Systeme y_ν, y'_ν

$$\Delta = \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{m,m}, \quad \Delta' = \sum \pm a'_{1,1} a'_{2,2} \cdots a'_{m,m}$$

stehen nach dem Multiplicationsgesetz der Determinanten in der Abhängigkeit

$$\Delta' = r \Delta, \quad (4)$$

so dass die eine nicht ohne die andere verschwindet.

§ 56. Quadratische Formen

Von besonderer Wichtigkeit ist die Transformation der homogenen Functionen zweiten Grades oder der quadratischen Formen. Wir bezeichnen sie, wie schon im ersten Abschnitt, so:

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum_{i,k} a_{i,k} x_i x_k, \quad a_{i,k} = a_{k,i}. \quad (1)$$

Durch die Substitution § 55, (1) geht φ über in

$$\Phi(x'_1, x'_2, \dots, x'_m) = \sum_{i,k} a'_{i,k} x'_i x'_k. \quad (2)$$

Setzen wir $x + \xi$ für x und ebenso $x' + \xi'$ für x' , so dass die ξ' mit den ξ in derselben Abhängigkeit stehen wie die x' mit den x , so erhalten wir, wenn wir zur Abkürzung

$$\frac{1}{2} \varphi'(x_i) = u_i, \quad \frac{1}{2} \Phi'(x'_i) = u'_i$$

setzen, durch Vergleichung der Glieder der ersten Dimension (§ 16):

$$\sum \xi_i u_i = \sum \xi'_i u'_i, \quad (3)$$

also, wie in § 55, (3),

$$u'_k = \sum_i \alpha_i^{(k)} u_i. \quad (4)$$

Nun ist

$$u_k = \sum_i a_{k,i} x_i, \quad u'_k = \sum_i a'_{k,i} x'_i, \quad (5)$$

und demnach giebt uns (4) die Transformation von m linearen Functionen. Die Coefficienten des gegebenen Systems sind $a'_{k,h}$ und des transformirten, die man durch Einsetzen des ersten Systems (5) in (4) erhält,

$$b_{k,h} = \sum_i \alpha_i^{(k)} a_{i,h}. \quad (6)$$

Die Determinante des ersteren Systems

$$H' = \sum \pm a'_{1,1} a'_{2,2} \cdots a'_{m,m}$$

ist nach § 55, (4)

$$= r \sum \pm b_{1,1} b_{2,2} \cdots b_{m,m},$$

und nach (6) ist die Determinante der $b_{k,h}$

$$= r \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{m,m}.$$

Wenn wir also

$$H = \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{m,m} \quad (7)$$

setzen, so haben wir den wichtigen Satz

$$H' = r^2 H. \quad (8)$$

Die Determinante H wird die Determinante der Form $\varphi(x)$ genannt.

Sie ändert sich also bei der linearen Transformation der Function φ nur um den Factor r^2 , und sie kann bei der transformirten Form nicht verschwinden, wenn sie es bei der ursprünglichen nicht thut.

Das Verschwinden der Determinante H hat die Bedeutung, dass die Function $\varphi(x)$ sich auffassen lässt als eine Function von weniger als m Veränderlichen, die lineare Functionen der x sind.

Denn wenn erstens durch eine lineare Transformation $\varphi(x)$ in die Function $\Phi(x')$ übergeht, die von einer der Veränderlichen, etwa von x'_1 , unabhängig ist, so verschwindet H' , da die Elemente in einer der Zeilen und Columnen alle verschwinden, und also ist wegen (8) auch $H = 0$.

Zweitens aber ist H die Determinante des Systems linearer Gleichungen

$$\varphi'(x_i) = 0 \quad i = 1, 2, \dots, m, \quad (9)$$

und wenn diese Determinante verschwindet, so giebt es (§ 24, III) ein Grössensystem

$$x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_m^{(0)}, \quad (10)$$

dessen Elemente nicht alle verschwinden, und die, für die x eingesetzt, den Gleichungen (9) genügen.

Nun hat man aber, wenn x_i, x'_i irgend zwei Grössensysteme sind, und λ ebenfalls eine willkürliche Grösse bedeutet, die identischen Gleichungen

$$\begin{aligned} \varphi(x + \lambda x') &= \varphi(x) + \lambda \sum x_i \varphi'(x'_i) + \lambda^2 \varphi(x'), \\ \varphi(x') &= \frac{1}{2} \sum x'_i \varphi'(x'_i), \end{aligned} \quad (11)$$

[§ 16, (12) bis (15)], so dass, wenn für x'_i die Werthe $x_i^{(0)}$ gesetzt werden,

$$\varphi(x_i + \lambda x_i^{(0)}) = \varphi(x), \quad (12)$$

ganz unabhängig von λ wird. Wenn wir nun annehmen, es sei $x_1^{(0)}$ von Null verschieden und wir setzen

$$\lambda = -\frac{x_1}{x_1^{(0)}},$$

ferner

$$\begin{aligned} y_2 &= x_2 x_1^{(0)} - x_1 x_2^{(0)}, \\ y_3 &= x_3 x_1^{(0)} - x_1 x_3^{(0)}, \\ &\dots \\ y_m &= x_m x_1^{(0)} - x_1 x_m^{(0)}, \end{aligned} \tag{13}$$

so folgt

$$x_1^{(0)2} \varphi(x) = \varphi(0, y_2, y_3, \dots, y_m), \tag{14}$$

wodurch $\varphi(x)$ durch die $m - 1$ Veränderlichen $y_2, y_3, \dots, y_m$ ausgedrückt ist.

§ 57. Transformation der quadratischen Formen in eine Summe von Quadraten

Wir machen von dem zuletzt bewiesenen Satze sogleich eine wichtige Anwendung auf die Discriminante der Function (11), als Function zweiten Grades von λ betrachtet, wobei nicht mehr vorausgesetzt wird, dass die Determinante der Function φ verschwindet. Diese Discriminante ist

$$\psi(x) = \left[\sum x_i \varphi'(x'_i) \right]^2 - 4\varphi(x)\varphi(x'). \tag{1}$$

Setzen wir in ihr $x_i + \lambda x'_i$ an Stelle von x_i , so ergibt sich, wenn man für $\varphi(x + \lambda x')$ den Ausdruck § 56, (11) substituirt und $\sum x'_i \varphi'(x'_i) = 2\varphi(x')$ setzt,

$$\psi(x + \lambda x') = \psi(x),$$

woraus hervorgeht, dass $\psi(x)$ nur von $m - 1$ linearen Verbindungen der m Veränderlichen abhängt. Setzt man für $x'_1, x'_2,$

ldots, x'_m beliebige specielle Werthe, für die $\varphi(x')$ nicht verschwindet, und nimmt x'_1 von Null verschieden an, so wird

$$x_1'^2 \psi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \psi(0, x_2 x'_1 - x_1 x'_2, \dots, x_m x'_1 - x_1 x'_m),$$

also eine Function der $m - 1$ Veränderlichen

$$y_2 = x_2 x'_1 - x_1 x'_2, \dots, y_m = x_m x'_1 - x_1 x'_m.$$

Man kann dies auch dadurch bestätigen, dass

$$\psi'(x_1), \psi'(x_2), \dots, \psi'(x_m)$$

für $x_1, x_2, \dots, x_m = x'_1, x'_2, \dots, x'_m$ alle zugleich verschwinden, dass also die Determinante der Function ψ verschwinden muss.

Die Formel (1) enthält nun ein sehr wichtiges Resultat, das sich am besten übersehen lässt, wenn wir dieser Formel folgende Gestalt geben. Wir setzen

$$\psi(x) = -4\varphi(x')\chi(y_2, \dots, y_m), \quad \sum x_i \varphi'(x'_i) = 2\sqrt{\varphi(x')} Y_1, \tag{2}$$

und erhalten

$$\varphi(x) = Y_1^2 + \chi(y_2, y_3, \dots, y_m), \tag{3}$$

wodurch $\varphi(x)$ dargestellt ist als Summe aus einem Quadrat einer linearen Function Y_1 und einer Function χ von $m - 1$ Variablen.

Daraus aber folgt der wichtige Satz: Eine quadratische Form von m Veränderlichen lässt sich immer darstellen als eine Summe von Quadraten von m oder weniger linearen Functionen.

Dieser Satz ist offenbar richtig für eine Function von einer Variablen, die ja selbst ein Quadrat ist. Aus (3) folgt aber die Richtigkeit des Satzes für eine Function von m Veränderlichen, wenn seine Richtigkeit für eine Function von $m - 1$ Veränderlichen vorausgesetzt wird.

Die Darstellung ist, wie (2) zeigt, auf unendlich viele verschiedene Arten möglich, da die ganz willkürlichen Grössen x' noch in dieser Formel vorkommen.

Eine Darstellung durch weniger als m Quadrate ist nur dann möglich, wenn die Determinante der Function φ verschwindet.

Da in dem Ausdruck (2) für Y_1 eine Quadratwurzel vorkommt, so kann Y_1 reell oder imaginär sein, selbst wenn die Coefficienten von φ und die x und x' reell vorausgesetzt werden. Setzen wir aber in dem Falle, wo Y_1 imaginär ist, iY_1 an Stelle von Y_1 , so können wir unseren Satz auch so aussprechen:

Eine reelle quadratische Form von m Veränderlichen lässt sich als Summe von höchstens m positiven oder negativen Quadraten reeller linearer Functionen der x darstellen.¹⁶

§ 58. Trägheitsgesetz der quadratischen Formen

Für die Zerlegung einer quadratischen Form in Quadrate gilt nun der folgende Satz, der von Sylvester den Namen des Gesetzes der Trägheit der quadratischen Formen erhalten hat (Philos. Mag. 1852).

Wie man auch eine reelle quadratische Form $\varphi(x)$ in die Summe von positiven und negativen Quadraten linearer Functionen zerlegen mag, die Anzahl der positiven und negativen dieser Quadrate, und also auch ihre Gesamtzahl, ist immer dieselbe, vorausgesetzt, dass zwischen diesen linearen Functionen keine lineare Abhängigkeit besteht.

Der Beweis dieses wichtigen Satzes ist sehr einfach.

Es seien

$$\begin{aligned}\varphi(x) &= Y_1^2 + Y_2^2 + \cdots + Y_\nu^2 - Y_1'^2 - Y_2'^2 - \cdots - Y_{\nu'}'^2 \\ &= Z_1^2 + Z_2^2 + \cdots + Z_\mu^2 - Z_1'^2 - Z_2'^2 - \cdots - Z_{\mu'}'^2\end{aligned}\tag{1}$$

zwei Zerlegungen von $\varphi(x)$ in Quadrate. Es seien also $Y_1, Y_2, \dots, Y_\nu, Y_1', Y_2', \dots, Y_{\nu'}'$ homogene lineare Functionen von x , zwischen denen keine lineare Relation mit constanten Coefficienten besteht, und also $\nu + \nu' \leq m$; dieselben Voraussetzungen werden über die Functionen $Z_1, Z_2, \dots, Z_\mu, Z_1', Z_2', \dots, Z_{\mu'}'$ gemacht, so dass auch $\mu + \mu' \leq m$ ist.

Angenommen, es sei

$$\nu < \mu,$$

dann können wir die Variablen x den linearen Gleichungen

$$\begin{aligned}Y_1 &= 0, & Y_2 &= 0, \dots, Y_\nu &= 0, \\ Z_1' &= 0, & Z_2' &= 0, \dots, Z_{\mu'}' &= 0\end{aligned}\tag{2}$$

unterwerfen, deren Anzahl $\nu + \mu'$ kleiner als m ist.

Wenn nun die sämtlichen Functionen $Z_1, Z_2, \dots, Z_\mu$ linear abhängig wären von den Functionen $Y_1, Y_2, \dots, Y_\nu, Z_1', Z_2', \dots, Z_{\mu'}'$, so könnte man aus diesen μ Gleichungen durch Elimination der ν

¹⁶Für die allgemeine Theorie der linearen Transformation der Formen zweiten Grades sind ausser den Untersuchungen von Jacobi und Hesse (Hesse, „Vorlesungen über analytische Geometrie des Raumes“, dritte Auflage, besorgt von Gundelfinger, Leipzig 1876) besonders die Arbeiten von Weierstrass und Kronecker (Monatsberichte der Berliner Akademie 1868, 1874) von Bedeutung. Eingehende historische Darlegung der Entwicklung der Frage in dem „Bericht über den gegenwärtigen Stand der Invariantentheorie“ von Franz Meyer (erster Jahresbericht der deutschen Mathematiker-Vereinigung, Berlin 1892).

Variablen $Y_1, Y_2, \dots, Y_\nu$ eine lineare Gleichung zwischen den $Z_1, Z_2, \dots, Z_\mu, Z'_1, \dots, Z'_{\mu'}$ herleiten, die nach Voraussetzung nicht bestehen soll. Es ist also das Verschwinden sämtlicher $Z_1, Z_2, \dots, Z_\mu$ nicht eine nothwendige Folge der Gleichungen (2), und wir können zu den Gleichungen (2) noch eine nicht homogene hinzufügen, etwa

$$Z_1 = 1,$$

dann haben wir für die m Unbekannten x ein System von m oder weniger Gleichungen, die von einander unabhängig sind, sich also nicht widersprechen.

Dann ergibt aber die zweite Darstellung (1) für $\varphi(x)$ einen positiven Werth, während die erste einen negativen oder verschwindenden Werth giebt, worin ein Widerspruch liegt. Es folgt also

$$\nu \geq \mu,$$

und da man ebenso schliesst

$$\mu \geq \nu,$$

so bleibt nur $\nu = \mu$ übrig. In gleicher Weise kann man beweisen, dass $\nu' = \mu'$ ist, wodurch unser Satz vollständig bewiesen ist.

§ 59. Transformation von Formen n ten Grades

Wenn eine Form n ten Grades von m Veränderlichen, $F(x)$, durch eine lineare Substitution [§ 55, (1)] transformirt wird in $\Phi(x')$, so wird gleichzeitig die lineare Function der Veränderlichen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$

$$\sum_i \xi_i F'(x_i) \quad (1)$$

durch dieselbe auf ξ_i angewandte Substitution in

$$\sum_i \xi'_i \Phi'(x'_i) \quad (2)$$

transformirt, weil beide Ausdrücke den Coefficienten der ersten Potenz von t in der Entwicklung von

$$F(x_i + t\xi_i) = \Phi(x'_i + t\xi'_i)$$

nach Potenzen von t darstellen (§ 16). Desgleichen wird die quadratische Function

$$\sum_{i,k} \xi_i \xi_k F''(x_i x_k) \quad (3)$$

in

$$\sum_{i,k} \xi'_i \xi'_k \Phi''(x'_i x'_k) \quad (4)$$

transformirt.

Wenden wir das erste Resultat auf ein System von m Functionen $F_1(x), F_2(x), \dots, F_m(x)$ von beliebigen Graden an und bezeichnen mit Δ die Determinante

$$\Delta = \begin{vmatrix} F'_1(x_1) & F'_1(x_2) & \cdots & F'_1(x_m) \\ F'_2(x_1) & F'_2(x_2) & \cdots & F'_2(x_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ F'_m(x_1) & F'_m(x_2) & \cdots & F'_m(x_m) \end{vmatrix},$$

während wir mit Δ' die entsprechende, aus den Functionen $\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_m$ gebildete Determinante bezeichnen, so erhalten wir nach § 55, (4), wenn wir wieder mit r die Substitutionsdeterminante bezeichnen,

$$\Delta' = r\Delta. \quad (5)$$

Die Function Δ heisst die Functional-Determinante der m Functionen $F_1, F_2, \dots, F_m$.

Desgleichen erhalten wir aus der Transformation (3), (4), wenn wir mit H die Determinante

$$H = \begin{vmatrix} F''(x_1, x_1) & F''(x_1, x_2) & \cdots & F''(x_1, x_m) \\ F''(x_2, x_1) & F''(x_2, x_2) & \cdots & F''(x_2, x_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ F''(x_m, x_1) & F''(x_m, x_2) & \cdots & F''(x_m, x_m) \end{vmatrix}$$

und mit H' die entsprechende Determinante für die transformirte Function Φ bezeichnen, nach § 56, (8)

$$H' = r^2 H. \quad (6)$$

H heisst die Hesse'sche Determinante¹⁷ der Function F . In beiden Formeln (5) und (6) bedeutet r die Substitutionsdeterminante.

§ 60. Invarianten und Covarianten

Bei der linearen Transformation der homogenen Functionen treten immer gewisse Functionen der Coefficienten auf, die, wenn man die Coefficienten der gegebenen Form durch die Coefficienten der transformirten Form ersetzt, sich nicht anders ändern, als dass sie einen Factor annehmen, der eine Potenz der Substitutionsdeterminante ist. Auch bei gleichzeitiger (simultaner) Transformation eines Systems von mehreren Formen kommen solche Functionen vor, die von den Coefficienten aller Formen des Systems abhängen. Solche Functionen sind z. B. bei einem System von n linearen Formen die Determinante des Systems, und bei einer quadratischen Form die Determinante dieser Form.

Man nennt diese Functionen Invarianten der Form, oder wenn sie von mehreren Formen abhängen, simultane Invarianten des Systems.

Wenn also $I(a)$ eine Function der Coefficienten a einer Form $F(x)$ ist und wenn a' die Coefficienten der transformirten Form $\Phi(x')$ sind, so heisst $I(a)$ eine Invariante, wenn die identische Relation

$$I(a') = r^\lambda I(a) \quad (1)$$

besteht. Den Exponenten λ wollen wir das Gewicht der Invariante nennen. Ist dieser Exponent Null, so heisst I eine absolute Invariante.

Man betrachtet meist nur ganze rationale Invarianten, d. h. solche Functionen I , die von den Coefficienten a rational abhängen und überdies ganze homogene Functionen von ihnen sind. Die simultanen Invarianten sollen in Bezug auf die Coefficienten einer jeden der Formen, von denen sie abhängen, homogen sein.

Ausser den Invarianten giebt es auch Functionen, die neben den Coefficienten die Variablen selbst noch enthalten, im Uebrigen aber dieselben Eigenschaften wie die Invarianten (1), „die Invarianteneigenschaft“ haben; also, wenn $C(x, a)$ eine solche Function ist,

$$C(x', a') = r^\lambda C(x, a). \quad (2)$$

Solche Functionen heissen Covarianten der Form $F(x)$. Die Functional-determinante ist eine simultane Covariante eines Systems von m Functionen und die Hesse'sche Determinante einer Function von höherem als dem zweiten Grade ist eine Covariante einer einzelnen Form. Auch unter den Covarianten betrachtet man vorzugsweise ganze rationale und homogene Functionen von x .

Ist m die Anzahl der Variablen x , n der Grad der Function $F(x)$, ν und μ die Grade von $C(x, a)$ in Bezug auf die x und a , so besteht zwischen den Zahlen λ, μ, ν, m, n die Relation

$$n\mu = m\lambda + \nu, \quad (3)$$

¹⁷Genannt nach Hesse, der in geometrischen Untersuchungen, namentlich in der Theorie der Curven dritter Ordnung und in Eliminationsproblemen diese Determinante vielfach anwandte und ihre Bedeutung erkannte.

die man dadurch beweist, dass man den Grad der rechten und linken Seite von (2) in Bezug auf die Substitutionscoefficienten vergleicht. Die a' sind nämlich in den Substitutionscoefficienten vom n ten Grade, r vom m ten Grade, x vom ersten Grade, woraus sich (3) ergibt. Die entsprechende Formel für die Invarianten erhält man, wenn man $\nu = 0$ setzt, wie denn überhaupt die Invarianten als specieller Fall der Covarianten betrachtet werden können.

Ein allgemeines Gesetz zur Bildung von Invarianten und Covarianten, das wir in den besonderen Fällen des § 59 schon gebraucht haben, wollen wir kurz besprechen.

Wenn wir nach § 16, (4) die Function

$$F(x_1 + t\xi_1, x_2 + t\xi_2, \dots, x_m + t\xi_m)$$

nach Potenzen von t ordnen, so erhalten wir für den Coefficienten von t^ν

$$F_\nu(x, \xi) = \frac{1}{\Pi(\nu)} \sum_{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m = \nu} \frac{\Pi(\nu)}{\Pi(\alpha_1) \cdots \Pi(\alpha_m)} \xi_1^{\alpha_1} \xi_2^{\alpha_2} \cdots \xi_m^{\alpha_m} D_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m}(F). \quad (4)$$

Wenn wir auf die Variablen ξ und x gleichzeitig die lineare Transformation (1), § 55 anwenden, so geht $F_\nu(x, \xi)$ in $\Phi_\nu(x', \xi')$ über, was man aus F_ν erhält, wenn man gleichzeitig alle Buchstaben x, ξ, a durch x', ξ', a' und F durch Φ ersetzt. Daraus folgt:

I. Betrachtet man $F_\nu(x, \xi)$ als Form ν ten Grades von ξ und bildet eine Invariante dieser Form, deren Coefficienten also noch von den x abhängen, so erhält man eine Covariante der Form F .

Und da die Variablen x und ξ derselben Transformation unterliegen, so ergibt sich ebenso:

II. Bildet man eine Covariante der Function $F_\nu(x, \xi)$, als Function von ξ betrachtet, und ersetzt darin die ξ durch die x , so erhält man eine Covariante der ursprünglichen Function $F(x)$.

Die gleichen Sätze gelten auch für simultane Invarianten und Covarianten.

Von den Functionen $F_\nu(x, \xi)$ gilt der Satz

$$F_\nu(x, \xi) = F_{n-\nu}(\xi, x), \quad (5)$$

der sich durch die Vergleichung entsprechender Potenzen von t auf beiden Seiten der Identität

$$F(x_1 + t\xi_1, \dots, x_m + t\xi_m) = t^n F(t^{-1}x_1 + \xi_1, \dots, t^{-1}x_m + \xi_m)$$

ergibt.

Die Functionen

$$P_\nu(x, \xi) = \frac{\Pi(\nu)\Pi(n-\nu)}{\Pi(n)} F_\nu(x, \xi)$$

werden die Polaren der Function $F(x)$ genannt, und zwar heisst $P_\nu(x, \xi)$ die ν te Polare. Auch von ihnen gilt der Satz

$$P_\nu(x, \xi) = P_{n-\nu}(\xi, x).$$

Der constante Factor $\Pi(\nu)\Pi(n-\nu) : \Pi(n)$ ist zugesetzt, damit, wenn die Form $F(x)$ mit den Polynomialcoefficienten geschrieben ist, die Functionen P_ν möglichst einfache Coefficienten erhalten.

Für die binäre Form $f(x, y)$, auf die wir im Folgenden diese Definitionen hauptsächlich anwenden werden, ergeben sich für die Polaren folgende Ausdrücke:

$$P_1(x, \xi) = \frac{1}{n} \{ \xi f'(x) + \eta f'(y) \},$$

$$P_2(x, \xi) = \frac{1}{n(n-1)} \{ \xi^2 f''(x, x) + 2\xi\eta f''(x, y) + \eta^2 f''(y, y) \},$$

und allgemein

$$\begin{aligned} & n(n-1) \cdots (n-\nu+1) P_\nu(x, \xi) \\ &= \xi^\nu \frac{\partial^\nu f}{\partial x^\nu} + \nu \xi^{\nu-1} \eta \frac{\partial^\nu f}{\partial x^{\nu-1} \partial y} + \cdots + \eta^\nu \frac{\partial^\nu f}{\partial y^\nu}. \end{aligned}$$

§ 61. Lineare Transformation binärer Formen

Eine ganze rationale Function n ten Grades von x

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n \quad (1)$$

wird in eine binäre Form verwandelt, wenn man x durch $x : y$ ersetzt und mit y^n multiplicirt:

$$f(x, y) = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + a_2x^{n-2}y^2 + \cdots + a_ny^n. \quad (2)$$

Wenn man die Wurzeln von $f(x)$ kennt, so kann man $f(x)$ in n lineare Factoren zerlegen:

$$f(x) = a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n), \quad (3)$$

und daraus ergibt sich

$$f(x, y) = a_0(x - \alpha_1y)(x - \alpha_2y) \cdots (x - \alpha_ny). \quad (4)$$

Ersetzt man aber auch $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ durch Verhältnisse $\alpha_1 : \beta_1, \alpha_2 : \beta_2, \dots, \alpha_n : \beta_n$, so erhält man

$$f(x, y) = A(x\beta_1 - y\alpha_1)(x\beta_2 - y\alpha_2) \cdots (x\beta_n - y\alpha_n), \quad (5)$$

wenn

$$a_0 = A\beta_1\beta_2 \cdots \beta_n$$

gesetzt wird.

Für die Factoren von $f(x, y)$, die uns jetzt öfter begegnen, führen wir als Abkürzung das Zeichen ein

$$x\beta_1 - y\alpha_1 = (x\beta_1). \quad (6)$$

Ebenso werden wir setzen

$$x_1y_2 - x_2y_1 = (x_1y_2), \quad (7)$$

worin x_1, y_1 und x_2, y_2 zwei beliebige Variablenpaare sind. Wenn wir die inhomogene Darstellung anwenden, so setzen wir noch kürzer

$$\begin{aligned} x - \alpha_1 &= (0, 1), & x - \alpha_2 &= (0, 2), \dots, x - \alpha_n = (0, n), \\ \alpha_1 - \alpha_2 &= (1, 2), \dots, \alpha_i - \alpha_k = (i, k). \end{aligned} \quad (8)$$

Machen wir in der Form (2) eine lineare Substitution

$$x = \alpha x' + \beta y', \quad y = \gamma x' + \delta y' \quad (9)$$

mit der von Null verschiedenen Determinante

$$r = \alpha\delta - \beta\gamma, \quad (10)$$

so geht die Form $f(x, y)$ in eine Form n ten Grades $F(x', y')$ über, und es ist

$$F(x', y') = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + a'_2x'^{n-2}y'^2 + \cdots + a'_ny'^n. \quad (11)$$

Die Coefficienten $a'_0, a'_1, \dots, a'_n$ der transformirten Form erhält man als lineare und homogene Ausdrücke in den Coefficienten $a_0, a_1, \dots, a_n$ und als homogene Ausdrücke n ten Grades in den Substitutionscoefficienten $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Man erhält so, wenn man $x' = 1, y' = 0$ oder $x' = 0, y' = 1$ setzt,

$$a'_0 = f(\alpha, \gamma), \quad a'_n = f(\beta, \delta). \quad (12)$$

Die übrigen Coefficienten a' kann man durch die Derivirten der Function $f(x, y)$ ausdrücken, z. B.

$$(n-1)a'_1 = \beta f'(\alpha) + \delta f'(\gamma),$$

was wir nicht weiter ausführen.

Wenn wir auf die beiden Variablenpaare x, y und α_k, β_k gleichzeitig die Transformation (9) anwenden, so erhalten wir die linearen Factoren von $f(x, y)$ transformirt, nämlich

$$(x' \beta'_k) = r(x \beta_k), \quad (13)$$

wie man aus der Multiplicationsregel der Determinanten oder auch durch directes Ausrechnen findet. Diese Factoren $(x \beta_k)$ sind also auch Covarianten von $f(x, y)$, freilich aber irrationale, da sie nicht rational von den Coefficienten von $f(x)$ abhängen. Ebenso ergibt sich

$$(\alpha'_h \beta'_k) = r(\alpha_h \beta_k), \quad (14)$$

wonach die Determinanten $(\alpha_h \beta_k)$ als irrationale Invarianten zu betrachten sind. Wir wollen nun darlegen, wie man daraus rationale Invarianten und Covarianten bilden kann.

Wir betrachten zu diesem Zweck am besten die lineare Transformation in der nicht homogenen Gestalt

$$x = \frac{\alpha x' + \beta}{\gamma x' + \delta} \quad (15)$$

und wenden diese auf die Function $f(x)$ in (1) an. Es folgt dann, wenn

$$F(x') = a'_0 x'^n + a'_1 x'^{n-1} + a'_2 x'^{n-2} + \cdots + a'_n$$

gesetzt wird,

$$F(x') = (\gamma x' + \delta)^n f(x). \quad (16)$$

Diese Gleichung schreiben wir auch so

$$F(x') = (\alpha x' + \beta)^n \left(a_0 + a_1 \frac{1}{x} + a_2 \frac{1}{x^2} + \cdots \right),$$

woraus, wenn man $x' = -\delta : \gamma$, also $x = \infty$ setzt,

$$r^n a_0 = (-\gamma)^n F \left(-\frac{\delta}{\gamma} \right)$$

oder, wenn $\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_n$ ebenso von $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ abhängen, wie x' von x , also

$$F(x') = a'_0 (x' - \alpha'_1)(x' - \alpha'_2) \cdots (x' - \alpha'_n)$$

gesetzt wird,

$$r^n a_0 = a'_0 (\gamma \alpha'_1 + \delta)(\gamma \alpha'_2 + \delta) \cdots (\gamma \alpha'_n + \delta) \quad (17)$$

folgt.

Nun ist nach der Transformation (15)

$$\begin{aligned} x - \alpha_i &= \frac{r(x' - \alpha'_i)}{(\gamma x' + \delta)(\gamma \alpha'_i + \delta)}, \\ \alpha_i - \alpha_k &= \frac{r(\alpha'_i - \alpha'_k)}{(\gamma \alpha'_i + \delta)(\gamma \alpha'_k + \delta)}. \end{aligned} \quad (18)$$

Wir bilden nun ein Product P aus irgend welchen der Factoren

$$\begin{aligned} (0, 1), (0, 2), \dots, (0, n), \\ (1, 2), (1, 3), \dots, (n-1, n), \end{aligned}$$

jedoch so, dass darin jede der Ziffern $1, 2, \dots, n$ im Ganzen gleich oft, etwa μ mal vorkommt. Der Index 0, d. h. die Variable x , möge ν mal vorkommen, und die Gesamtanzahl der Factoren soll q betragen. Es ist dann, da jeder Factor zwei Indices enthält,

$$\nu + n\mu = 2q. \quad (19)$$

Dann ergibt sich aus (17) und (18), wenn P' aus P durch Vertauschung von x, α_i mit x', α'_i hervorgeht,

$$a_0'^\mu P' = a_0^\mu r^{n\mu-q} (\gamma x' + \delta)^\nu P. \quad (20)$$

Wir bilden nun

$$C(x, y, a) = a_0^\mu y^\nu \sum P \left(\frac{x}{y} \right), \quad (21)$$

die Summe genommen über alle Werthe, die man aus P erhält, wenn man die Indices $1, 2, 3, \dots, n$ auf alle mögliche Arten mit einander vertauscht. Diese Summe ist dann eine symmetrische Function der Wurzeln von (1) und lässt sich also als ganze rationale Function der Verhältnisse $a_1 : a_0, a_2 : a_0, \dots, a_n : a_0$ ausdrücken, so dass kein Glied die μ te Ordnung übersteigt. Die Function $C(x, y, a)$ ist also eine ganze homogene Function von $a_0, a_1, \dots, a_n$ von der μ ten Ordnung und eine ganze homogene Function von x, y von der ν ten Ordnung. Da sie nach (19), (20) der Bedingung

$$C(x', y', a') = r^\lambda C(x, y, a), \quad (22)$$

$$\lambda = n\mu - q, \quad 2\lambda = n\mu - \nu \quad (23)$$

genügt, so ist sie eine Covariante und in dem besonderen Falle, wo $\nu = 0$ ist, eine Invariante.

Das Gewicht λ ist, wie der zweite Ausdruck zeigt, immer positiv oder Null, da $n\mu$ mindestens gleich ν ist. Der äusserste Werth $n\mu = \nu$ oder $\lambda = 0$ kommt nur dann vor, wenn in P jeder der Indices $1, 2, 3, \dots, n$ nur mit 0 verbunden vorkommt, also P eine Potenz von $f(x)$ selbst ist.

§ 62. Binäre cubische Formen

Eine binäre quadratische Form giebt keine anderen invarianten Bildungen als die Discriminante. Mit diesen befassen wir uns daher nicht und gehen gleich zur Betrachtung der cubischen Formen

$$f(x, y) = a_0x^3 + a_1x^2y + a_2xy^2 + a_3y^3 \quad (1)$$

über. Hier bilden wir als erste quadratische Covariante die Hesse'sche Determinante. Wir wollen hier immer die Regel befolgen, dass wir die Formen mit ganzzahligen Zahlencoefficienten ohne gemeinsamen Factor schreiben. Dann müssen wir in der aus den zweiten Ableitungen von (1) gebildeten Determinante den Factor 4 abwerfen und erhalten als erste Covariante

$$H = \begin{vmatrix} 3a_0x + a_1y & a_1x + a_2y \\ a_1x + a_2y & a_2x + 3a_3y \end{vmatrix},$$

oder

$$H = A_0x^2 + A_1xy + A_2y^2, \quad (2)$$

wenn zur Abkürzung

$$A_0 = 3a_0a_2 - a_1^2, \quad A_1 = 9a_0a_3 - a_1a_2, \quad A_2 = 3a_1a_3 - a_2^2 \quad (3)$$

gesetzt ist.

Die Discriminante dieser quadratischen Form ist eine Invariante der gegebenen cubischen Form. Sie enthält aber den Factor 3 in allen numerischen Coefficienten und demnach setzen wir

$$3D = 4A_0A_2 - A_1^2, \quad (4)$$

und dann stimmt D mit der Discriminante der cubischen Form [§ 46, (10)] überein:

$$D = a_1^2a_2^2 + 18a_0a_1a_2a_3 - 4a_0a_2^3 - 4a_1^3a_3 - 27a_0^2a_3^2. \quad (5)$$

Eine weitere cubische Covariante erhalten wir, wenn wir die Functionaldeterminante von $f(x, y)$ und $H(x, y)$ bilden:

$$Q(x, y) = f'(x)H'(y) - f'(y)H'(x), \quad (6)$$

oder

$$Q = \begin{vmatrix} 3a_0x^2 + 2a_1xy + a_2y^2 & 2A_0x + A_1y \\ a_1x^2 + 2a_2xy + 3a_3y^2 & A_1x + 2A_2y \end{vmatrix}, \quad (7)$$

in der sich kein numerischer Factor wegheben lässt. Wir setzen die ausgerechneten Coefficienten von x^3, x^2y, xy^2, y^3 , deren Bildung keine Schwierigkeit macht, der Reihe nach hierher:

$$\begin{aligned} & 27a_0^2a_3 - 9a_0a_1a_2 + 2a_1^3, \\ & 27a_0a_1a_3 - 18a_0a_2^2 + 3a_1^2a_2, \\ & -27a_0a_2a_3 + 18a_1^2a_3 - 3a_1a_2^2, \\ & -27a_0a_3^2 + 9a_1a_2a_3 - 2a_2^3. \end{aligned}$$

Das Verhalten von H, D, Q bei linearer Transformation ergibt sich aus § 60, (2), (3); sind H', D', Q' die entsprechenden Bildungen für eine transformirte Form, so hat man

$$H' = r^2H, \quad D' = r^6D, \quad Q' = r^3Q. \quad (8)$$

Die Covarianten können wir benutzen, um die cubische Form auf eine Normalform zu transformiren, die zugleich die Lösung der cubischen Gleichung giebt. Wir wählen die Normalform

$$f(x, y) = F(\xi, \eta) = \xi^3 + \eta^3, \quad (9)$$

worin ξ, η lineare Functionen von x, y sind; eine Form, die, wie sich gleich ergeben wird, immer hergestellt werden kann, wenn D nicht verschwindet, also die Gleichung $f = 0$ nicht zwei gleiche Wurzeln hat. Die Lösungen von $f = 0$ ergeben sich dann aus den linearen Gleichungen

$$\xi + \varepsilon \eta = 0, \quad \xi + \varepsilon \eta = 0, \quad \xi + \varepsilon^2 \eta = 0,$$

worin ε eine dritte Einheitswurzel ist.

Um für die Normalform (9) die Formen H', D', Q' zu bilden, haben wir $a'_0 = a'_3 = 1, a'_1 = a'_2 = 0$ zu setzen und erhalten

$$H' = 9\xi\eta, \quad D' = -27, \quad Q' = 27(\xi^3 - \eta^3).$$

Wenn die Normalform (9) durch lineare Transformation aus der allgemeinen Form $f(x, y)$ abgeleitet ist, so ergibt sich nach (8)

$$\begin{aligned} 9\xi\eta &= r^2 H, & -27 &= r^6 D, \\ 27(\xi^3 - \eta^3) &= r^3 Q, & \xi^3 + \eta^3 &= f. \end{aligned} \tag{10}$$

Daraus folgt

$$r^6 = -\frac{27}{D}, \quad 2\xi^3 = \frac{r^3 Q}{27} + f, \quad 2\eta^3 = -\frac{r^3 Q}{27} + f,$$

also, wenn für r^3 aus der ersten Gleichung der Werth $-9 : \sqrt{-3D}$ gesetzt wird,

$$\begin{aligned} 6\xi^3 \sqrt{-3D} &= Q + 3\sqrt{-3D} f, \\ 6\eta^3 \sqrt{-3D} &= -Q + 3\sqrt{-3D} f, \end{aligned} \tag{11}$$

woraus ξ und η durch zwei Cubikwurzeln bestimmt sind, von denen nach der ersten Gleichung (10) die eine durch die andere bestimmt ist.

Darin liegt auch der Beweis, dass, wenn D von Null verschieden ist, die Normalform durch lineare Transformation hergestellt werden kann. Denn unter dieser Voraussetzung zerfällt H in zwei von einander verschiedene lineare Factoren, und wenn man diese, von constanten Factoren abgesehen, für die neuen Variablen ξ, η einer linearen Transformation wählt, so wird $A'_0 = 0, A'_2 = 0$; es folgt aber aus den identischen Relationen

$$3a'_1 A'_0 + a'_0 A'_1 = a'_0 A'_0 + 3a'_0 A'_2 = a'_1 A'_1,$$

wenn nicht zugleich $A'_1 = 0$, was durch das nicht verschwindende D ausgeschlossen ist, $a'_1 = 0, a'_2 = 0$, d. h. die transformirte Form von f enthält nur die Cuben von ξ und η .

Erhebt man die erste Gleichung (10) in den Cubus, und eliminirt ξ^3, η^3, r^6 mittelst (11) und der zweiten Gleichung (10), so erhält man zwischen den Covarianten folgende identische Relation

$$4H^3 + Q^2 + 27Df^2 = 0. \tag{12}$$

Um die Transformation in die Normalform auszuführen, d. h. die Functionen ξ, η wirklich zu finden, zerlegt man die Function H in ihre linearen Factoren

$$4A_0 H = (2A_0 x + A_1 y + \sqrt{-3D} y)(2A_0 x + A_1 y - \sqrt{-3D} y).$$

Dann unterscheiden sich ξ, η von diesen beiden Factoren von H nur um je einen constanten Factor. Wir setzen also, wenn wir zwei constante Factoren mit h, k bezeichnen,

$$\begin{aligned} 2\xi &= h(2A_0 x + A_1 y + \sqrt{-3D} y), \\ 2\eta &= k(2A_0 x + A_1 y + \sqrt{-3D} y), \end{aligned} \tag{13}$$

woraus sich durch Multiplication mit Rücksicht auf die beiden ersten Gleichungen (10) ergibt

$$3hkA_0\sqrt[3]{-D} = 1, \quad (14)$$

und die Gleichungen (11) geben durch Vergleichung der Coefficienten von x^3

$$\begin{aligned} 6h^3A_0^3\sqrt{-3D} &= q_0 + 3\sqrt{-3D}a_0, \\ 6k^3A_0^3\sqrt{-3D} &= -q_0 + 3\sqrt{-3D}a_0, \end{aligned} \quad (15)$$

wo q_0 der Coefficient von x^3 in Q , also

$$q_0 = 27a_0^2a_3 - 9a_0a_1a_2 + 2a_1^3 \quad (16)$$

ist. Dass die Vorzeichen von $\sqrt{-3D}$ mit Rücksicht auf die Vorzeichen in (11) so zu nehmen sind, wie es in den Formeln (13) geschehen ist, ergibt sich am einfachsten, wenn man die Rechnung für den besonderen Fall $a_0 = 0, a_3 = 0$ durchführt.

§ 63. Das volle Formensystem der binären cubischen Form

Wir wollen noch nachweisen, dass die Invarianten und Covarianten der cubischen Form durch die Functionen D, f, H, Q erschöpft sind, d. h. dass alle Invarianten und Covarianten einer cubischen Form sich rational durch diese vier Formen ausdrücken lassen.

Sei also

$$C = C(x, y, a)$$

eine Covariante vom Grade ν in den Variablen und vom Grade μ in den Coefficienten, von der wir voraussetzen wollen, dass sie nur ganzzahlige numerische Coefficienten hat. Es ist dann für irgend eine transformirte Form

$$C' = C(\xi, \eta, a') = r^\lambda C(x, y, a), \quad (1)$$

$$\lambda = \frac{3\mu - \nu}{2}. \quad (2)$$

Wir verstehen jetzt unter ξ, η die Variablen unserer oben betrachteten Normalform. Bezeichnet dann ε eine dritte Einheitswurzel, so ist

$$\xi = \varepsilon\xi', \quad \eta = \varepsilon^2\eta'$$

eine lineare Substitution mit der Determinante 1, durch die die Normalform § 62, (9) in sich selbst übergeht. Es folgt also, dass C sich nicht ändern kann, wenn ξ, η durch $\varepsilon\xi, \varepsilon^2\eta$ ersetzt werden; es kann also C nur von $\xi\eta, \xi^3, \eta^3$ rational abhängen.

Die Vertauschung von ξ mit η entspricht einer Substitution mit der Determinante -1 ; dadurch bleibt also C ungeändert oder ändert sein Zeichen, je nachdem λ gerade oder ungerade ist. Es besteht daher C' aus einer Summe von Gliedern der Form

$$M(\xi\eta)^\alpha(\xi^{3\beta} \pm \eta^{3\beta}),$$

worin M ein ganzzahliger Factor ist und das obere oder untere Zeichen gilt, je nachdem λ gerade oder ungerade ist. Im letzteren Falle ist dieser Ausdruck durch $\xi^3 - \eta^3$ theilbar und der Quotient ist durch $\xi^3 + \eta^3$ und $\xi\eta$ rational und ganzzahlig ausdrückbar. Setzen wir also $\rho = 0$ oder $= 1$, je nachdem λ gerade oder ungerade ist, so ergibt sich für C' ein Ausdruck von der Form

$$C'(\xi, \eta) = (\xi^3 - \eta^3)^\rho \sum M(\xi\eta)^\alpha(\xi^3 + \eta^3)^\beta,$$

worin die M ganzzahlige Coefficienten sind und α, β eine Reihe positiver ganzer Zahlen durchlaufen, die der Bedingung

$$3\rho + 3\beta + 2\alpha = \nu \quad (3)$$

genügen. Aus (1) ergibt sich also, wenn wir mit einer hinlänglich hohen Potenz von 3 multipliciren und $\xi\eta$, $\xi^3 + \eta^3$, $\xi^3 - \eta^3$ nach § 62, (10) durch H, f, Q und r durch D ausdrücken,

$$3^\sigma C = Q^\rho \sum MD^\gamma H^\alpha f^\beta, \quad (4)$$

worin

$$6\gamma = \lambda - 3\rho - 2\alpha, \quad (5)$$

und worin die M gleichfalls ganzzahlige Factoren sind. Zu jedem Werth von γ gehört nach (5) ein bestimmter Werth von α und nach (3) ein bestimmter Werth von β ; ebenso sind durch einen Werth von α oder von β jedesmal die beiden übrigen Zahlen bestimmt, so dass in (4) jeder Exponent von D, H oder f nur einmal vorkommt.

Dass γ eine ganze Zahl ist, folgt leicht aus (2), (3), (5); denn da nach der Definition $\lambda - 3\rho$ eine gerade Zahl ist, so ist zunächst 3γ eine ganze Zahl, und da ferner nach (3)

$$\lambda - 2\alpha = \frac{1}{2}(3\mu - \nu) - 2\alpha = \frac{1}{2}(3\mu - 2\alpha - 3\beta - 3\rho) - 2\alpha,$$

so ist 6γ und mithin 3γ durch 3 theilbar. Hieraus folgt, dass auch γ eine ganze Zahl ist.

Dass aber γ auch positiv sein muss, sehen wir so ein. Angenommen, auf der rechten Seite von (4) kommen auch negative Potenzen von D vor, so multipliciren wir diese Gleichung beiderseits mit einer so hohen Potenz von D , dass rechts keine negativen Potenzen von D mehr auftreten, dass aber auch die rechte Seite nicht den Factor D erhält. Setzen wir in der so gewonnenen Gleichung

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 0, \quad a_3 = 0, \quad (6)$$

so wird

$$D = 0, \quad H = -x^2, \quad f = x^2y, \quad Q = 2x^3. \quad (7)$$

Es würde also die linke Seite verschwinden, während die rechte Seite nicht verschwindet, worin ein Widerspruch liegt.

Wir können aber endlich auch noch beweisen, dass auf der linken Seite von (4) keine Potenz von 3 auftreten kann, die nicht in allen Factoren M enthalten ist, und sich also fortheben lässt. Wir haben in § 2 den Satz bewiesen, dass das Product zweier primitiver ganzer rationaler Functionen von beliebigen Variablen wieder eine primitive Function ist. Dabei ist unter einer primitiven Function eine solche verstanden, deren Coefficienten ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind. Es handelt sich nun hier darum, nachzuweisen, dass eine Summe der Form

$$\sum MD^\gamma H^\alpha f^\beta,$$

worin die M ganze Zahlen ohne gemeinsamen Theiler sind, nicht imprimitiv werden, und speciell den Factor 3 erhalten kann, wenn für Q, D, H, f ihre Ausdrücke in den a, x, y gesetzt werden. Nach dem erwähnten Satze genügt es, da Q eine primitive Function ist, dies nachzuweisen für die Form

$$\sum MD^\gamma H^\alpha f^\beta. \quad (8)$$

Hierin können wir überdies alle Glieder weglassen, deren M den Factor 3 schon hat, und endlich können wir wieder nach dem erwähnten Satze annehmen, dass der Ausdruck nicht durch D theilbar sei, dass er also ein Glied mit $\gamma = 0$ enthält. Nehmen wir also an, es habe unter diesen Voraussetzungen der entwickelte Ausdruck (8) den Theiler 3, und substituiren nun die besonderen Werthe (6), (7), d. h. setzen wir $D = 0$, $H = -x^2$, $f = x^2y$, so reducirt sich der Ausdruck auf das einzige Glied, in dem $\gamma = 0$, $2\alpha = \lambda$ ist, und es würde also folgen, dass dieses M den Theiler 3 haben müsste, was gegen die Voraussetzung ist.

Damit ist also bewiesen: Jede ganzzahlige Covariante der cubischen Form kann ganz und rational und mit ganzzahligen Coefficienten dargestellt werden durch einen der beiden Ausdrücke

$$\sum MD^\gamma H^\alpha f^\beta, \quad Q \sum MD^\gamma H^\alpha f^\beta.$$

Die Invarianten sind als Specialfall unter den Covarianten enthalten und sind sämmtlich Potenzen von D .

§ 64. Biquadratische Formen

Wir gehen nun zur Betrachtung der biquadratischen Form

$$f(x, y) = a_0x^4 + a_1x^3y + a_2x^2y^2 + a_3xy^3 + a_4y^4 \quad (1)$$

über. Wir haben zunächst die Hesse'sche Determinante als Covariante vierter Ordnung, die wir, um sie von einem Zahlenfactor zu befreien, durch 3 theilen:

$$H = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 12a_0x^2 + 6a_1xy + 2a_2y^2 & 3a_1x^2 + 4a_2xy + 3a_3y^2 \\ 3a_1x^2 + 4a_2xy + 3a_3y^2 & 2a_2x^2 + 6a_3xy + 12a_4y^2 \end{vmatrix}, \quad (2)$$

oder

$$H = A_0x^4 + A_1x^3y + A_2x^2y^2 + A_3xy^3 + A_4y^4,$$

worin

$$\begin{aligned} A_0 &= 8a_0a_2 - 3a_1^2, & A_4 &= 8a_2a_4 - 3a_3^2, \\ A_1 &= 24a_0a_3 - 4a_1a_2, & A_3 &= 24a_1a_4 - 4a_2a_3, \\ A_2 &= 48a_0a_4 + 6a_1a_3 - 4a_2^2, \end{aligned}$$

und eine Covariante sechsten Grades

$$T = \frac{1}{12} \begin{vmatrix} f'(x) & f'(y) \\ H'(x) & H'(y) \end{vmatrix}. \quad (3)$$

Die Invarianten der biquadratischen Form bilden wir am einfachsten nach § 61 aus den Wurzel-differenzen. Wir erhalten so eine Invariante von der zweiten und eine von der dritten Ordnung in den Coefficienten:

$$A = \frac{1}{2}a_0^2((12)^2(34)^2 + (13)^2(24)^2 + (14)^2(23)^2), \quad (4)$$

$$B = a_0^3 \sum (12)^2(34)^2(13)(42). \quad (5)$$

Ausdrücke, die sich übersichtlicher schreiben lassen, wenn man

$$U = (12)(34), \quad V = (13)(42), \quad W = (14)(23) \quad (6)$$

setzt, nämlich

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2}a_0^2(U^2 + V^2 + W^2), \\ B &= a_0^3\{U^2(V - W) + V^2(W - U) + W^2(U - V)\} \\ &= a_0^3(W - V)(U - W)(V - U). \end{aligned} \quad (7)$$

Zur Berechnung dieser Grössen sind die nöthigen Formeln schon in § 47 entwickelt. Nach den dortigen Formeln (10) ergibt sich

$$U = v^2 - w^2, \quad V = w^2 - u^2, \quad W = u^2 - v^2,$$

wenn u^2, v^2, w^2 die Wurzeln der cubischen Resolvente

$$z^3 + 2az^2 + (a^2 - 4c)z - b^2 = 0$$

sind, und es folgt daraus

$$\begin{aligned} A &= a_0^2\{(u^2 + v^2 + w^2)^2 - 3(v^2w^2 + w^2u^2 + u^2v^2)\} \\ &= a_0^2(a^2 + 12c), \\ B &= a_0^3(2u^2 - v^2 - w^2)(2v^2 - w^2 - u^2)(2w^2 - u^2 - v^2) \\ &= a_0^3(3u^2 + 2a)(3v^2 + 2a)(3w^2 + 2a) \\ &= a_0^3(2a^3 - 72ac + 27b^2), \end{aligned}$$

so dass A, B dieselbe Bedeutung haben, wie in § 47 und durch die Coefficienten a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 ausgedrückt, so dargestellt sind:

$$A = a_2^2 - 3a_1a_3 + 12a_0a_4, \quad (8)$$

$$B = 27a_1^2a_4 + 27a_0a_3^2 + 2a_2^3 - 72a_0a_2a_4 - 9a_1a_2a_3. \quad (9)$$

Auch die Discriminante der biquadratischen Gleichung als eine dritte, aber von A und B abhängige Invariante

$$D = a_0^6 U^2 V^2 W^2 \quad (10)$$

haben wir an der erwähnten Stelle schon gebildet und gefunden

$$27D = 4A^3 - B^2. \quad (11)$$

Nach der Formel des § 67, $2\lambda = n\mu - \nu$, erhalten wir für die bis jetzt gefundenen invarianten Bildungen, die wir für eine transformirte Form mit Accenten bezeichnen, folgende Relationen

$$H' = r^2 H, \quad T' = r^3 T, \quad A' = r^4 A, \quad B' = r^6 B, \quad D' = r^{12} D. \quad (12)$$

§ 65. Auflösung der biquadratischen Gleichung

Wir wollen eine Normalform durch eine lineare Substitution mit der Determinante 1 herstellen, zu deren Ableitung wir die gegebene biquadratische Form in lineare Factoren zerlegt annehmen:

$$f(x, y) = a_0(x - \alpha y)(x - \beta y)(x - \gamma y)(x - \delta y). \quad (1)$$

Wir setzen

$$x\sqrt{\alpha - \beta} = \beta\xi - \alpha\eta, \quad y\sqrt{\alpha - \beta} = \xi - \eta, \quad r = 1, \quad (2)$$

also

$$\begin{aligned} x - \alpha y &= -\sqrt{\alpha - \beta}\xi, & x - \beta y &= -\sqrt{\alpha - \beta}\eta, \\ (x - \gamma y)\sqrt{\alpha - \beta} &= (\beta - \gamma)\xi - (\alpha - \gamma)\eta, \\ (x - \delta y)\sqrt{\alpha - \beta} &= (\beta - \delta)\xi - (\alpha - \delta)\eta, \end{aligned} \quad (3)$$

und dadurch geht $f(x, y)$ über in

$$F(\xi, \eta) = a'_1 \xi^3 \eta + a'_2 \xi^2 \eta^2 + a'_3 \xi \eta^3. \quad (4)$$

Die Coefficienten a'_1, a'_2, a'_3 sind nach (3) leicht durch die $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ auszudrücken:

$$\begin{aligned} a'_1 &= a_0(\beta - \gamma)(\beta - \delta), \\ a'_3 &= a_0(\alpha - \gamma)(\alpha - \delta), \\ a'_2 &= -a_0\{(\alpha - \gamma)(\beta - \delta) + (\alpha - \delta)(\beta - \gamma)\}. \end{aligned} \quad (5)$$

Durch Vertauschung der Wurzeln können wir die Normalform (4) auf sechs verschiedene Arten herstellen, die aber nur drei verschiedene Werthe von a'_2 liefern. Diese drei Werthe sind, wenn wie oben

$$U = (\alpha - \beta)(\gamma - \delta), \quad V = (\alpha - \gamma)(\delta - \beta), \quad W = (\alpha - \delta)(\beta - \gamma), \quad U + V + W = 0 \quad (6)$$

gesetzt wird,

$$a'_2 = a_0(V - W), \quad a''_2 = a_0(W - U), \quad a'''_2 = a_0(U - V). \quad (7)$$

Kennt man die a'_2, a''_2, a'''_2 , so kann man auch die U, V, W bestimmen durch

$$3a_0U = a'''_2 - a''_2, \quad 3a_0V = a'_2 - a'''_2, \quad 3a_0W = a''_2 - a'_2, \quad (8)$$

woraus hervorgeht, dass, wenn von den drei Grössen a'_2, a''_2, a'''_2 zwei einander gleich sind, eine der Grössen U, V, W verschwindet, also zwei der Wurzeln der biquadratischen Gleichung einander gleich sind, und folglich ihre Discriminante verschwindet.

Setzen wir noch

$$\alpha\beta + \gamma\delta = u, \quad \alpha\gamma + \delta\beta = v, \quad \alpha\delta + \beta\gamma = w, \quad (9)$$

so ist

$$a_0(u + v + w) = a_2$$

[die Summe der Producte der Wurzeln von $f(x, y)$ zu je zweien], und

$$U = v - w, \quad V = w - u, \quad W = u - v,$$

also

$$3a_0u = a_2 - a'_2, \quad 3a_0v = a_2 - a''_2, \quad 3a_0w = a_2 - a'''_2. \quad (10)$$

Es sind also mit den Grössen a'_2, a''_2, a'''_2 zugleich die u, v, w bekannt. Wenn man aber die Grössen u, v, w kennt, so ist die Lösung der biquadratischen Gleichung auf Quadratwurzeln zurückgeführt. Denn es ist

$$\alpha\beta + \gamma\delta = u, \quad a_0\alpha\beta\gamma\delta = a_4,$$

und daraus

$$2\alpha\beta = v_1 + \sqrt{\frac{a_0u^2 - 4a_4}{a_0}}, \quad 2\gamma\delta = v_1 - \sqrt{\frac{a_0u^2 - 4a_4}{a_0}}.$$

Da man nun ebenso die Producte $\alpha\gamma, \alpha\delta, \beta\gamma, \beta\delta$ bestimmen kann, so kann daraus α^2 etwa aus

$$\alpha^2 = \frac{\alpha\beta \cdot \alpha\gamma}{\beta\gamma}$$

berechnet werden.

Es kommt also jetzt noch darauf an, die cubische Gleichung zu bilden, deren Wurzeln a'_2, a''_2, a'''_2 sind. Diese erhält man aber sofort aus den Invarianten. Wenn man die Invarianten A', B' aus der transformirten Form (4) bildet, so ergibt sich nach § 64, (8), (9), (12), da $r = 1$ ist,

$$A = a'^2_2 - 3a'_1a'_3, \quad B = 2a'^3_2 - 9a'_1a'_2a'_3, \quad D = a'^2_1a'^2_2a'^2_3 - 4a'_1a'^3_3, \quad (11)$$

und daraus durch Elimination von $a'_1a'_3$

$$a'^3_2 - 3Aa'_2 + B = 0.$$

Daher sind a'_2, a''_2, a'''_2 die Wurzeln der für z cubischen Gleichung

$$z^3 - 3Az + B = 0. \quad (12)$$

Dies ist wohl die einfachste Form, die man der cubischen Resolvente der biquadratischen Gleichung geben kann.

§ 66. Die Covarianten

Wenn wir die Covariante H , nach § 64, (2) für die transformirte Form

$$f(x, y) = F(\xi, \eta) = a'_1\xi^3\eta + a'_2\xi^2\eta^2 + a'_3\xi\eta^3 \quad (1)$$

bilden, so erhalten wir

$$-H = 3a'^2_1\xi^4 + 4a'_1a'_2\xi^3\eta - (6a'_1a'_3 - 4a'^2_2)\xi^2\eta^2 + 4a'_2a'_3\xi\eta^3 + 3a'^2_3\eta^4, \quad (2)$$

und daraus folgt

$$H + 4a'_2 f = -3(a'_1 \xi^2 - a'_3 \eta^2)^2. \quad (3)$$

Es ist also diese Verbindung, von dem Factor -3 abgesehen, das Quadrat einer quadratischen Form, und dasselbe gilt, wenn wir a'_2 durch a''_2, a'''_2 ersetzen. Wir setzen also zur Abkürzung

$$H + 4a'_2 f = -3\psi_1^2, \quad H + 4a''_2 f = -3\psi_2^2, \quad H + 4a'''_2 f = -3\psi_3^2. \quad (4)$$

Von den drei Functionen ψ_1, ψ_2, ψ_3 können keine zwei einen gemeinschaftlichen Theiler haben, wenn die Discriminante D von Null verschieden vorausgesetzt wird. Denn dann sind auch die drei Grössen a'_2, a''_2, a'''_2 von einander verschieden. Wenn also ψ_1 und ψ_2 verschwinden, so müssen H und f verschwinden, d. h. ein gemeinsamer Theiler von ψ_1 und ψ_2 müsste gemeinsamer Theiler von H und f sein. Nun war aber ξ ein beliebiger Lineartheiler von f . Dieser kann nach (2) nur dann Theiler von H sein, wenn $a'_3 = 0$ ist, also wieder, wenn die Discriminante D verschwindet [§ 65, (11)].

Nun ist die Functionaldeterminante T von f und H identisch mit der Functionaldeterminante von f und $H + \lambda f$, was auch λ sein mag, und daraus ergibt sich, wenn $\lambda = 4a'_2$ gesetzt wird,

$$T = -\frac{1}{2}\psi_1\{F'(\xi)\psi'_1(\eta) - F'(\eta)\psi'_1(\xi)\}.$$

Es ist also T theilbar durch ψ_1 , und aus gleichen Gründen durch ψ_2 und ψ_3 , und folglich ist T bis auf einen von ξ, η unabhängigen Factor identisch mit dem Product $\psi_1\psi_2\psi_3$.

Bilden wir demnach das Product der drei Gleichungen (4), so folgt mit Rücksicht auf die cubische Gleichung § 65, (12), der die Grössen a'_2, a''_2, a'''_2 genügen:

$$H^3 - 48AHf^2 - 64Bf^3 = cT^2,$$

wo c eine noch zu bestimmende Constante ist. Nach § 64, (12) bleibt c bei einer linearen Transformation ungeändert, und man findet also seinen Werth, wenn man aus der Normalform (1), (2) die Glieder mit der höchsten Potenz von ξ beiderseits einander gleich setzt, $c = -27$. Wir haben also zwischen den Invarianten und Covarianten die folgende identische Relation

$$H^3 - 48AHf^2 - 64Bf^3 = -27T^2. \quad (5)$$

Die Functionen ψ_1, ψ_2, ψ_3 sind gleichfalls Covarianten, freilich mit Coefficienten, die in den Coefficienten von f nicht rational sind. Wir können sie leicht durch die Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ von $f = 0$ ausdrücken. Setzt man zur Vereinfachung $y = 1$, so folgt nach § 65, (3) und (5)

$$\begin{aligned} \frac{\psi_1}{a_0} &= (\gamma - \beta)(x - \alpha)(x - \delta) - (\alpha - \delta)(x - \beta)(x - \gamma) \\ &= (\delta - \beta)(x - \alpha)(x - \gamma) - (\alpha - \gamma)(x - \beta)(x - \delta), \\ \frac{\psi_2}{a_0} &= (\delta - \gamma)(x - \alpha)(x - \beta) - (\alpha - \beta)(x - \gamma)(x - \delta) \\ &= (\beta - \gamma)(x - \alpha)(x - \delta) - (\alpha - \delta)(x - \gamma)(x - \beta), \\ \frac{\psi_3}{a_0} &= (\beta - \delta)(x - \alpha)(x - \gamma) - (\alpha - \gamma)(x - \delta)(x - \beta) \\ &= (\gamma - \delta)(x - \alpha)(x - \beta) - (\alpha - \beta)(x - \delta)(x - \gamma). \end{aligned} \quad (6)$$

Die Grössen $\psi_1^2, \psi_2^2, \psi_3^2$ kann man auffassen als die Wurzeln einer cubischen Gleichung, deren Coefficienten Covarianten sind. Man erhält diese Gleichung leicht aus (4) in der Form

$$\left(z + \frac{H + 4a'_2 f}{3}\right) \left(z + \frac{H + 4a''_2 f}{3}\right) \left(z + \frac{H + 4a'''_2 f}{3}\right) = 0.$$

Diese Gleichung ergibt nach § 65, (12) und mit Benutzung des Ausdrucks (5) für T^2

$$z^3 + Hz^2 + \frac{1}{3}(H^2 - 16Af^2)z - T^2 = 0. \quad (7)$$

Es ist noch von Interesse, die Discriminante dieser Gleichung zu bilden. Man erhält sie am einfachsten aus dem Ausdruck

$$\Delta = (\psi_1^2 - \psi_2^2)^2(\psi_1^2 - \psi_3^2)^2(\psi_2^2 - \psi_3^2)^2,$$

wenn man die Ausdrücke (4) einsetzt und dann für $(a'_2 - a''_2)^2(a'_2 - a'''_2)^2(a''_2 - a'''_2)^2$ die Discriminante der Gleichung § 65, (12),

$$27(4A^3 - B^2) = 3^6 D,$$

setzt, wo dann D die Discriminante von f ist. Man erhält so

$$\Delta = 2^{12} D f^6. \quad (8)$$

§ 67. Das volle Invariantensystem der binären biquadratischen Form

Wir wollen noch beweisen, dass mit den Bildungen A, B das System der unabhängigen Invarianten der binären, biquadratischen Form erschöpft ist. Während man sich aber gewöhnlich mit dem Nachweis begnügt, dass jede Invariante eine ganze rationale Function von A, B ist, wollen wir, wie wir es schon in § 63 für die Covarianten der cubischen Form gethan haben, auch die Frage nach den numerischen Coefficienten berühren, und hier zeigt sich eine neue Erscheinung.

Die Invariante z. B. D ist zwar nach § 64, (11) rational durch A, B ausgedrückt. Aber die Zahlencoefficienten sind nicht ganze Zahlen, sondern haben den Nenner 27, obwohl die Coefficienten in der entwickelten Function D alle ganze Zahlen sind.

Wir betrachten also jetzt als ganze Invarianten ganze rationale homogene Functionen μ ten Grades der fünf Veränderlichen a_0, a_1, a_2, a_3, a_4

$$I(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4) = I(a), \quad (1)$$

deren Coefficienten ganze Zahlen sind, und denen die Invarianteneigenschaft

$$I' = r^\lambda I \quad (2)$$

zukommt, wenn I' oder $I(a')$ dieselbe Function der Coefficienten einer transformirten Function ist.

Solche Invarianten sind A, B, D , zwischen denen die Relation besteht

$$27D = 4A^3 - B^2, \quad (3)$$

und unser Ziel ist, zu beweisen, dass alle ganzen Invarianten ganze und ganzzahlige rationale Functionen von diesen dreien sind.

Wenn wir die Function I in der Normalform (4) des § 65 bilden, so erhalten wir zunächst aus (2), da $r = 1$ ist,

$$I(a) = I(0, a'_1, a'_2, a'_3, 0).$$

Diese Function I kann nur von $a'_1 a'_3$ und a'_2 abhängen; denn die Substitution

$$\xi' = \lambda \xi, \quad \eta' = \lambda^{-1} \eta,$$

deren Determinante = 1 ist, lässt die Normalform § 65, (4) und in ihr a'_2 ungeändert, während a'_1, a'_3 in $\lambda^{-2} a'_1, \lambda^2 a'_3$ übergehen, und darin ist λ eine willkürliche Grösse.

Wenn wir also

$$a'_2 = z$$

setzen, so ist

$$I = \varphi(a'_1 a'_3, z), \quad (4)$$

wenn φ eine ganze, rationale, ganzzahlige Function der beiden Argumente $a'_1 a'_3$ und z ist.

Nun ist aber nach § 65, (11)

$$3a'_1 a'_3 = z^2 - A,$$

und wenn wir also (4) mit einer geeigneten Potenz von 3, etwa 3^ν , multipliciren, so erhalten wir

$$3^\nu I = \chi(A, z), \quad (5)$$

worin χ wieder eine ganzzahlige Function von A und z ist. Nach § 65, (12) ist aber

$$z^3 = 3Az - B,$$

und hiernach können wir alle höheren Potenzen von z durch die erste und zweite ausdrücken, erhalten also

$$3^\nu I = \chi(A, B, z), \quad (6)$$

worin χ in Bezug auf z höchstens vom zweiten Grade ist. Die linke Seite von (6) bleibt aber ungeändert, wenn z durch a'_2, a''_2, a'''_2 , also durch drei verschiedene Werthe, ersetzt wird, und folglich kann die Function χ die Variable z überhaupt nicht mehr enthalten (§ 30, II). Es ist daher

$$3^\nu I = \chi(A, B), \quad (7)$$

worin χ eine ganzzahlige, ganze, rationale Function ist.

Wenn wir in (7) nach (3)

$$B^2 = 4A^3 - 27D$$

setzen, so folgt, dass (7) eine der beiden folgenden Formen hat

$$3^\nu I = \Phi(A, D), \quad 3^\nu I = B\Phi(A, D), \quad (8)$$

je nachdem der Grad von I gerade oder ungerade ist.

Ist I eine ursprüngliche Function der a , d. h. eine solche, deren Zahlencoefficienten keinen gemeinsamen Theiler haben, so können die Coefficienten der Functionen Φ jedenfalls keinen anderen gemeinschaftlichen Theiler haben, als eine Potenz von 3. Was uns zu beweisen obliegt, ist, dass sie alle durch 3^ν theilbar sind, oder was dasselbe ist, dass, wenn wir $\Phi(A, D)$ als ursprüngliche Function voraussetzen, $\nu = 0$ sein muss.

Es ist also die Frage: Können aus der ursprünglichen Function $\Phi(A, D)$ oder $B\Phi(A, D)$ Functionen mit dem Theiler 3 entstehen, wenn man die A, B, D durch ihre Ausdrücke in den a ersetzt? Da B ursprünglich ist, so kann nach § 2 die in den a ausgedrückte Function $B\Phi(A, D)$ nur dann den Theiler 3 haben, wenn ihn $\Phi(A, D)$ hat. Also ist die Frage darauf zurückgeführt: Kann die ursprüngliche Function $\Phi(A, D)$ den Theiler 3 erhalten, wenn A, D durch ihre Ausdrücke ersetzt werden?

Dass diese Frage verneint werden muss, können wir leicht so einsehen. Wir denken uns zunächst in $\Phi(A, D)$ alle die Glieder beseitigt, deren Coefficienten durch 3 theilbar sind; denn offenbar müssen auch die übrigen Glieder noch dieselbe Eigenschaft behalten, durch Substitution der Ausdrücke für A, D den Theiler 3 zu erhalten. Wir können zweitens annehmen, dass $\Phi(A, D)$ nicht den Factor D hat, denn durch Weglassen dieses Factors würde nach dem schon erwähnten Satze (§ 2) die fragliche Eigenschaft nicht aufgehoben.

Dann aber müsste aus $\Phi(A, D)$ eine durch 3 theilbare Zahl entstehen, wenn alle a , mit Ausnahme von a_2 , gleich Null, $a_2 = 1$ gesetzt werden. Dadurch wird $D = 0$, $A = 1$, und es müsste also $\Phi(1, 0)$ eine durch 3 theilbare Zahl sein; dies ist aber der Coefficient der höchsten Potenz von A in $\Phi(A, D)$, der nach Voraussetzung nicht durch 3 theilbar ist. Damit haben wir also bewiesen:

Jede ganzzahlige Invariante der biquadratischen Form lässt sich rational und ganzzahlig durch A, D, B darstellen, und zwar in einer der beiden Formen

$$\Phi(A, D), \quad B\Phi(A, D).$$

Dass auch umgekehrt jeder solche Ausdruck, wenn er in den Coefficienten a homogen ist, eine ganzzahlige Invariante darstellt, ist von selbst klar.

Sechster Abschnitt. Tschirnhausen-Transformation.

§ 68. Die Hermite'sche Form der Tschirnhausen-Transformation

Wir haben im vierten Abschnitt den Grundgedanken der Tschirnhausen-Transformation schon kennen gelernt. Die Aufgabe war die, eine algebraische Gleichung n ten Grades

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0 \quad (1)$$

durch eine Substitution $(n-1)$ ten Grades

$$y = \alpha_0 + \alpha_1x + \alpha_2x^2 + \cdots + \alpha_{n-1}x^{n-1} \quad (2)$$

umzuformen, um in den willkürlichen Coefficienten α Mittel zu gewinnen, die Gleichung zu vereinfachen.

Hermite hat dadurch, dass er der Substitution (2) eine besondere Form gab, diese Aufgabe sehr vereinfacht und mit der Invariantentheorie in Verbindung gebracht. Wir haben in § 4 eine Reihe von Functionen kennen gelernt, $f_0, f_1, f_2,$

ldots, f_{n-1} , durch die sich die Potenzen von x bis zur $(n-1)$ ten rational ausdrücken lassen, und diese Functionen sind es, die Hermite zur Darstellung der Substitution (2) verwendet.

Wir bezeichnen hier mit x eine Wurzel der Gleichung (1), während unter t eine unbestimmte Veränderliche verstanden sein soll. Dann ist nach § 4

$$x^\nu = t^{\nu-1}f_0(x) + t^{\nu-2}f_1(x) + \cdots + f_{\nu-1}(x) \quad (3)$$

und

$$\begin{aligned} f_0(x) &= a_0x + a_1, \\ f_1(x) &= a_0x^2 + a_1x + a_2, \\ &\vdots \\ f_{n-1}(x) &= a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n. \end{aligned} \quad (4)$$

Wir nehmen nun die Substitution (2) in der Form an

$$y = t_{n-1}f_0(x) + t_{n-2}f_1(x) + \cdots + t_1f_{n-2}(x) + t_0f_{n-1}(x), \quad (5)$$

worin die $t_{n-1}, t_{n-2}, \dots, t_1, t_0$ an Stelle der α getretenen unbestimmten Grössen und nicht mit den Potenzen von t zu verwechseln sind. Es geht aber y aus dem Ausdruck (3) hervor, wenn t^k durch t_k ersetzt wird.

Bezeichnen wir, wie im § 42, durch das vor eine Function gesetzte Zeichen S , dass die Summe über sämmtliche Wurzeln x der Gleichung (1) zu nehmen ist, so haben wir

$$S[f_0(x)] = (n-1)a_1, \quad S[f_1(x)] = (n-2)a_2, \quad \dots, \quad S[f_{n-1}(x)] = a_{n-1}, \quad (6)$$

also

$$S(y) = na_0t_{n-1} + (n-1)a_1t_{n-2} + \cdots + 2a_{n-2}t_1 + a_{n-1}t_0, \quad (7)$$

ein Ausdruck, der sich aus $f'(t)$ ergibt, wenn t^k durch t_k ersetzt wird.

Eliminiren wir mit Hülfe von (7) die Variable t_{n-1} aus (5), so folgt

$$y - \frac{1}{n}S(y) = t_{n-2}F_0(x) + t_{n-3}F_1(x) + \cdots + t_0F_{n-2}(x), \quad (8)$$

wenn

$$F_\nu(x) = f_\nu(x) - \frac{n - \nu - 1}{na_0}a_{\nu+1}f_0(x) \quad (9)$$

gesetzt wird, so dass

$$S[F_0(x)] = S[F_1(x)] = \cdots = S[F_{n-2}(x)] = 0. \quad (10)$$

Setzen wir nach (3)

$$F(t, x) = \frac{f(t)}{t - x} - \frac{1}{n}f'(t), \quad (11)$$

so geht die rechte Seite von (8) aus $F(t, x)$ hervor durch die Ersetzung von t^k durch t_k .

Nehmen wir von vornherein y in der Form

$$y = t_{n-2}F_0(x) + t_{n-3}F_1(x) + \cdots + t_0F_{n-2}(x) \quad (12)$$

an, so ist die Gleichung

$$S(y) = 0 \quad (13)$$

identisch befriedigt. Welchen Nutzen diese Form der Substitution gewährt, werden die nächsten Betrachtungen zeigen.

§ 69. Invarianteneigenschaft der Tschirnhausen-Transformation

Es ist jetzt der Einfluss zu untersuchen, den eine lineare Transformation, der wir die Function $f(x)$ unterwerfen, auf die Tschirnhausen-Transformation hat. Wir machen in $f(x)$ die lineare Substitution

$$x = \frac{\alpha\xi + \beta}{\gamma\xi + \delta}, \quad \alpha\delta - \beta\gamma = r, \quad (1)$$

wodurch wir erhalten

$$\varphi(\xi) = (\gamma\xi + \delta)^n f\left(\frac{\alpha\xi + \beta}{\gamma\xi + \delta}\right), \quad (2)$$

so dass $\varphi(\xi)$ eine ganze rationale Function n ten Grades und $\varphi(\xi) = 0$ die durch (1) transformirte Gleichung $f(x) = 0$ ist.

Wir leiten nun eine Function $H(\tau, \xi)$ ganz in derselben Weise aus $\varphi(\xi)$ ab, wie wir im vorigen Paragraphen $F(t, x)$ aus $f(x)$ abgeleitet haben, nämlich

$$H(\tau, \xi) = \frac{\varphi(\tau)}{\tau - \xi} - \frac{1}{n}\varphi'(\tau), \quad (3)$$

wobei τ ebenso wie t eine Variable ist.

Wenn wir nun andererseits in $F(t, x)$ gleichzeitig mit der Substitution (1) die Substitution

$$t = \frac{\alpha\tau + \beta}{\gamma\tau + \delta} \quad (4)$$

ausführen, so erhalten wir

$$(\gamma\tau + \delta)^n f(t) = \varphi(\tau), \quad (5)$$

$$(\gamma\xi + \delta)(\gamma\tau + \delta)(t - x) = r(\tau - \xi), \quad (6)$$

und, indem wir von (5) die Ableitung bilden,

$$r(\gamma\tau + \delta)^{n-1}f'(t) = (\gamma\tau + \delta)\varphi'(\tau) - n\gamma\varphi(\tau). \quad (7)$$

Aus (5), (6) und (7) folgt durch Subtraction

$$r(\gamma\tau + \delta)^{n-2}F(t, x) = H(\tau, \xi). \quad (8)$$

Ausführlicher geschrieben ist dies

$$\begin{aligned} H(\tau, \xi) \\ = r\{(\alpha\tau + \beta)^{n-2}F_0 + (\alpha\tau + \beta)^{n-3}(\gamma\tau + \delta)F_1 + \cdots + (\gamma\tau + \delta)^{n-2}F_{n-2}\}. \end{aligned} \quad (9)$$

Wir setzen nun, indem wir in $F(t, x)$ die Potenzen t^k durch beliebige Variable t_k ersetzen und ebenso in $H(\tau, \xi)$ τ^k durch τ_k ,

$$Y(t, x) = t_{n-2}F_0 + t_{n-3}F_1 + \cdots + t_0F_{n-2}, \quad (10)$$

so dass die Substitutionen der Tschirnhausen-Transformation

$$y = Y(t, x), \quad \eta = H(\tau, \xi) \quad (11)$$

lauten [§ 68, (12)]. Die Gleichung (9), die in Bezug auf τ identisch ist, bleibt aber auch richtig, wenn nach Ausführung der angedeuteten Potenzirung rechts τ^k durch τ_k ersetzt wird, und sie lehrt also, dass zwischen den Functionen $Y(t, x)$, $H(\tau, \xi)$ die Relation besteht

$$H(\tau, \xi) = rY(t, x), \quad (12)$$

wenn wir die t von den τ in folgender Weise abhängen lassen: Man setze

$$t_{n-2} = (\alpha\tau + \beta)^{n-2}, \quad t_{n-3} = (\alpha\tau + \beta)^{n-3}(\gamma\tau + \delta), \quad \dots, \quad t_0 = (\gamma\tau + \delta)^{n-2}, \quad (13)$$

und ersetze nach Ausführung der Potenzen τ^k durch τ_k .

Es sei nun z eine beliebige Veränderliche. Multiplicirt man, ehe man die Potenzen in (13) ausführt, diese Gleichungen der Reihe nach mit den Coefficienten der symbolischen Form

$$T(z) = t_{n-2}z^{n-2} - (n-2)t_{n-3}z^{n-3} + \frac{(n-2)(n-3)}{2}t_{n-4}z^{n-4} - \cdots + t_0, \quad (14)$$

so bekommt man eine ganze rationale Function von z vom $(n-2)$ ten Grade. Die rechte Seite wird nach dem binomischen Satz umgeformt. Wenn

$$\Theta(z) = \tau_{n-2}z^{n-2} - (n-2)\tau_{n-3}z^{n-3} + \frac{(n-2)(n-3)}{2}\tau_{n-4}z^{n-4} - \cdots + \tau_0 \quad (15)$$

gesetzt wird, erhalten wir die identische Umformung

$$(\gamma z + \delta)^{n-2}T\left(\frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}\right) = r^{n-2}\Theta(z), \quad (16)$$

worin der Zusammenhang zwischen den Coefficienten t und τ durch die symbolischen Gleichungen (13) ausgedrückt ist.

Es ist also hiernach $r^{n-2}\Theta(z)$ die Umformung der Function $(\gamma z + \delta)^{n-2}T(z)$ durch dieselbe lineare Substitution, durch die $(\gamma z + \delta)^n f(z)$ in $\varphi(z)$ übergeht. Bezeichnen wir die Coefficienten dieser umgeformten Function, also die Grössen $r^{n-2}\tau_i$, mit t'_i , so ergibt die Gleichung (12), die in Bezug auf r linear ist,

$$H(t', \xi) = r^{n-1}Y(t, x). \quad (17)$$

Aus $Y(t, x)$ gehen nun n Functionen hervor, wenn man für x die n Wurzeln von $f(x)$ setzt. Jede homogene, rationale, symmetrische Function dieser n Functionen ist rational durch die Coefficienten von $f(x)$ ausdrückbar, und wenn wir also eine solche Function mit $K(t, a)$ bezeichnen, so ergibt die Gleichung (17), wenn wir die Coefficienten von $\varphi(\xi)$ mit a' bezeichnen,

$$K(t', a') = r^{\nu(n-1)} K(t, a), \quad (18)$$

wenn ν den Grad der symmetrischen Function bedeutet. Damit ist der Satz von Hermite bewiesen:

Die Coefficienten in der durch die Tschirnhausen-Transformation

$$y = Y(t, x)$$

umgeformten Gleichung $f(x) = 0$ und alle symmetrischen Functionen der n Werthe y_i sind simultane Invarianten der beiden Functionen f und T .

§ 70. Ausführungen über den Hermite'schen Satz

Durch die Betrachtungen des letzten Paragraphen hat sich ergeben, dass, wenn wir

$$y = t_{n-2}F_0(x) + t_{n-3}F_1(x) + \cdots + t_0F_{n-2}(x) \quad (1)$$

setzen, die symmetrischen Functionen der n Werthe $y_1, y_2, \dots, y_n$, die man aus y erhält, wenn man für x die n Wurzeln von $f(x) = 0$ setzt, simultane Invarianten von zwei Formen n ten und $(n-2)$ ten Grades, $f(z), T(z)$ sind.

Eine solche ganze rationale und homogene symmetrische Function ν ter Ordnung

$$P(y_1, y_2, \dots, y_n)$$

ist wegen (1) offenbar eine homogene Function ν ter Ordnung der Variablen t . Sie ist ebenso eine homogene Function ν ter Ordnung in den a , da der Ausdruck (1), wie er die a explicite enthält, linear ist, und da die symmetrischen Functionen der x nur von den Verhältnissen $a_1 : a_0, a_2 : a_0, \dots, a_n : a_0$ abhängen. Bei dem Ausdruck von P durch die a könnte aber möglicherweise eine Potenz von a_0 im Nenner bleiben, und wir haben noch nachzuweisen, dass dies nicht eintritt.

Setzen wir

$$P(y_1, y_2, \dots, y_n) = K(t, a)$$

und bestimmen die Potenz a_0^λ so, dass $K(t, a)$ eine ganze Function der a ist, aber für $a_0 = 0$ nicht mehr verschwindet, so wird folgen, dass $\lambda = 0$ sein muss, wenn wir nachweisen, dass für $a_0 = 0$ die sämtlichen y endliche Werthe behalten.

Wenn wir $a_0 = 0$ werden lassen, während die übrigen a ungeändert bleiben, so wird eine der Wurzeln x , wie wir im § 40 gesehen haben, unendlich wachsen. Dass aber das zugehörige y gleichwohl endlich bleibt, ergibt sich aus der in Bezug auf t identischen Gleichung § 68, (11)

$$F(t, x) = \frac{f(t)}{t-x} - \frac{1}{n}f'(t) = t^{n-2}F_0(x) + t^{n-3}F_1(x) + \cdots + F_{n-2}(x), \quad (2)$$

aus der zu ersehen ist, dass, wenn $a_0 = 0$ und x unendlich wird, die Functionen

$$F_0(x), F_1(x), \dots, F_{n-2}(x)$$

gleich den Coefficienten von $f'(t)$, also gleich

$$\frac{n-1}{n}a_1, \frac{n-2}{n}a_2, \dots, \frac{1}{n}a_{n-1}$$

werden. Es bleiben also auch die y endlich, und $P(y_1, y_2, \dots, y_n)$ ist gleich einer ganzen rationalen Invariante vom Grade ν sowohl in den t als in den a .

Wenn wir also die Gleichung für y in der Form annehmen

$$y^n + p_2 y^{n-2} + p_3 y^{n-3} + \cdots + p_n = 0, \quad (3)$$

so ist p_ν eine solche Invariante ν ten Grades. Eine Invariante vom Grade $n(n-1)$ ist auch die Discriminante Δ der Gleichung (3), oder das Quadrat des Differenzenproductes

$$\Pi = (y_1 - y_2)(y_1 - y_3) \cdots (y_2 - y_3) \cdots (y_{n-1} - y_n). \quad (4)$$

Um über die Bildung dieser Grösse näheren Aufschluss zu bekommen, erinnern wir uns, dass wir y erhalten, wenn wir in

$$\frac{f(t)}{t-x}$$

t^k durch t_k ersetzen. Wir erhalten also $y_i - y_k$ aus der Formel

$$y_i - y_k = (x_i - x_k) \left(\frac{f(t)}{(t-x_i)(t-x_k)} \right)_t, \quad (5)$$

wenn wir dieselbe Vertauschung machen. Der Quotient

$$\frac{f(t)}{(t-x_i)(t-x_k)}$$

ist eine ganze rationale Function von t vom Grade $n-2$. Ersetzen wir darin t^k durch t_k , so möge er in θ_{ik} übergehen; wir haben dann

$$y_i - y_k = (x_i - x_k) \theta_{ik}. \quad (6)$$

Wenn wir also

$$\Theta = \theta_{12} \theta_{13} \cdots \theta_{1n} \theta_{23} \cdots \theta_{2n} \cdots \theta_{n-1,n} \quad (7)$$

setzen, so ist Θ eine homogene ganze Function vom Grade $\frac{1}{2}n(n-1)$ in Bezug auf die t , und sie ist ausserdem als symmetrische Function der x rational durch die Coefficienten a darstellbar. Aus (6) folgt aber, wenn D , wie im § 46, (3) die Discriminante von $f(x)$ bedeutet,

$$\Delta = D\Theta^2, \quad (8)$$

woraus zu schliessen ist, dass Θ eine Invariante ist, die den Nenner a_0 nicht mehr enthält. Δ ist in den Coefficienten a vom Grade $n(n-1)$, während D nach § 46 vom Grade $2n-2$ ist; daraus folgt, dass Θ vom Grade $\frac{1}{2}(n-1)(n-2)$ in den Coefficienten a ist.

Θ ist eine sogenannte zerlegbare Form $\frac{1}{2}n(n-1)$ ten Grades in den Variablen t ; denn sie lässt sich nach (7) in lauter lineare Factoren zerlegen, die freilich nicht rational in den a sind.

Wir haben schon im § 52 darauf hingewiesen, dass bei der Tschirnhausen-Transformation auch x rational durch y ausdrückbar ist; und dasselbe gilt also auch für jede rationale Function von x . Betrachten wir irgend eine solche Function $\varphi(x)$, die auch noch die Coefficienten a und t enthalten kann, aber immer für beide Arten von Variablen ganz und homogen vorausgesetzt sei, so können wir setzen

$$\varphi(x) = C_0 + C_1 y + C_2 y^2 + \cdots + C_{n-1} y^{n-1}, \quad (9)$$

worin die $C_0, C_1, \dots, C_{n-1}$ rational in a und in t ausdrückbar sind. Stellen wir die Gleichung (9) für $x = x_1, x_2, \dots, x_n$, $y = y_1, y_2, \dots, y_n$ auf, so erhalten wir für die Bestimmung der C ein System linearer Gleichungen, dessen Determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & y_1 & y_1^2 & \cdots & y_1^{n-1} \\ 1 & y_2 & y_2^2 & \cdots & y_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & y_n & y_n^2 & \cdots & y_n^{n-1} \end{vmatrix} \quad (10)$$

also gleich $\sqrt{\Delta}$ ist. Der Zähler des Ausdruckes für C_ν geht aus der Determinante (10) hervor, indem man die Elemente der $(\nu + 1)$ ten Colonne durch $\varphi(x_1), \varphi(x_2), \dots, \varphi(x_n)$ ersetzt, und folglich hat der Zähler, wenn man Alles durch die x_i ausdrückt, den Factor $\sqrt{D}$, weil er verschwindet, wenn zwei x_i einander gleich werden. Wir können also setzen

$$C_\nu = \frac{Q_\nu}{\Theta},$$

worin Q_ν eine ganze rationale Function der t und der a ist, die höchstens noch eine Potenz von a_0 im Nenner enthalten kann. Wir bekommen dann

$$\Theta\varphi(x) = Q_0 + Q_1y + Q_2y^2 + \dots + Q_{n-1}y^{n-1}. \quad (11)$$

Die Coefficienten Q_ν sind aber keine Invarianten und ihre Berechnung ist in den meisten Fällen schwierig.

§ 71. Transformation der cubischen Gleichung

Der Hermite'sche Satz (§ 69) reicht für die cubische Gleichung aus, die Transformation ohne weitere Rechnung auszuführen. Wir haben dazu, wenn wir homogene Variable z_1, z_2 anwenden, simultane Invarianten der cubischen Form

$$f(z_1, z_2) = a_0z_1^3 + a_1z_1^2z_2 + a_2z_1z_2^2 + a_3z_2^3 \quad (1)$$

und der Linearform

$$T = -t_0z_1 + t_1z_2 \quad (2)$$

zu bilden. Wenn wir aber die lineare Substitution

$$z_1 = \alpha z'_1 + \beta z'_2, \quad z_2 = \gamma z'_1 + \delta z'_2$$

auf T anwenden, so ergibt sich

$$T = -t'_0z'_1 + t'_1z'_2,$$

wenn

$$t'_0 = \alpha t_0 - \gamma t_1, \quad t'_1 = -\beta t_0 + \delta t_1. \quad (3)$$

Diese Substitution geht aber aus derjenigen für die Variablen hervor, wenn man z_1, z_2 durch t_1, t_0 ersetzt. Wenn nun $I(a, t_0, t_1)$ eine simultane Invariante von f und T ist, homogen und vom v ten Grade in t_0, t_1 und vom Gewicht λ , also

$$I(a', t'_0, t'_1) = r^\lambda I(a, t_0, t_1), \quad (4)$$

so folgt durch diese Vertauschung

$$I(a', z'_1, z'_2) = r^{\lambda-v} I(a, z_1, z_2),$$

d. h. es ist $I(a, z_1, z_2)$ eine Covariante von f .

Man erhält also alle simultanen Invarianten von f und T aus den Covarianten von f , wenn man darin z_1, z_2 durch t_1, t_0 ersetzt. Die Covarianten von f haben wir aber in § 62, 63 vollständig kennen gelernt.

Danach ist es leicht, die cubische Gleichung zu bilden, die sich aus der Substitution § 68, (12)

$$y = t_1(a_0x + \frac{1}{3}a_1) + t_0\left(\frac{2}{3}a_1x^2 + \frac{1}{3}a_2x + \frac{1}{3}a_3\right) \quad (5)$$

für y ergibt. Schreiben wir die Gleichung in der Form

$$y^3 + P_2y + P_3 = 0,$$

so sind P_2, P_3 Covarianten von f , und zwar P_2 von der zweiten, P_3 von der dritten Ordnung, sowohl in t als in a .

Da nun P_2 und P_3 Covarianten der cubischen Form sind, so können sie sich nach § 62 und 63 von den beiden dort definirten Functionen

$$H(t_1, t_0), \quad Q(t_1, t_0)$$

nur um constante, d. h. numerische Factoren unterscheiden. Diese constanten Factoren lassen sich durch irgend eine specielle Annahme bestimmen. Wir können z. B. annehmen

$$t_1 = 1, \quad t_0 = 0, \quad a_0 = 1, \quad a_1 = 0,$$

dann wird $y = x$, also $P_2 = a_2$, $P_3 = a_3$. Andererseits ergibt sich aber nach den im § 62 gegebenen Formeln (2), (3), (7) für diese besondere Annahme

$$H(1, 0) = 3a_2, \quad Q(1, 0) = 27a_3,$$

woraus man allgemein schliesst

$$P_2 = \frac{1}{3}H(t_1, t_0), \quad P_3 = \frac{1}{27}Q(t_1, t_0),$$

so dass wir für y die cubische Gleichung erhalten

$$y^3 + \frac{1}{3}H(t_1, t_0)y + \frac{1}{27}Q(t_1, t_0) = 0. \quad (6)$$

Die Discriminante Δ dieser cubischen Gleichung ist

$$\Delta = -4 \left(\frac{1}{3}H \right)^3 - 27 \left(\frac{1}{27}Q \right)^2,$$

also mit Anwendung der Relation § 62, (12)

$$4H^3 + Q^2 + 27Df^2 = 0, \quad (7)$$

$$\Delta = Df(t_1, t_0)^2, \quad (8)$$

wenn D die Discriminante der gegebenen cubischen Gleichung ist, in Uebereinstimmung mit den allgemeinen Resultaten des vorigen Paragraphen.

Wollen wir hierauf die Auflösung der cubischen Gleichung gründen, so müssen wir zunächst nach den Vorschriften des vorigen Paragraphen x rational durch y darstellen. Wir setzen

$$a_0f(t_1, t_0)x = Q_0 + Q_1y + Q_2y^2. \quad (9)$$

Die Berechnung der Coefficienten Q ist leicht auszuführen, wenn man diese Gleichung für x_1, x_2, x_3 und entsprechend y_1, y_2, y_3 aufstellt. Wir wollen über den Gang der Rechnung, die nur die Darstellung symmetrischer Functionen der Wurzeln einer cubischen Gleichung durch die Coefficienten nach den Vorschriften des vierten Abschnittes (§ 42, 45) erfordert, einige Andeutungen machen.

Nimmt man zunächst die Summe der drei Gleichungen (9), so erhält man nach (6)

$$Q_0 = 0,$$

so dass also nur noch Q_1 und Q_2 berechnet zu werden brauchen. Diese findet man, wenn man die für $x = x_1$ gebildete Gleichung (9) mit

$$y_2 - y_3 = a_0(x_2 - x_3)(x_2 + x_3 + t)$$

und mit

$$y_2^2 - y_3^2 = -a_0(x_2 - x_3)(x_2^2 + x_3^2 + tx_2 + tx_3)$$

multipliziert und die drei durch cyklische Vertauschung der Indices 1, 2, 3 gebildeten analogen Gleichungen addirt. Man hat dann nur Gebrauch zu machen von den beiden Formeln

$$a_0^2 \sum x_1(x_2 - x_3) = -\sqrt{D}, \quad a_0^2 \sum x_1^2(x_2 - x_3) = \sqrt{D} a_1,$$

und findet so

$$Q_1 = \frac{1}{2}a_0t^2 + \frac{1}{3}a_1t + \frac{1}{2}a_2, \quad Q_2 = -t.$$

Setzen wir zur Vereinfachung $t_1 = t$, $t_0 = 1$, gehen also zu den inhomogenen Ausdrücken über, so ergibt sich

$$(3a_0x + a_1)f(t) = -tH(t) + yf'(t) - 3y^2, \quad (10)$$

während die Gleichung für y lautet

$$y^3 + \frac{1}{3}H(t)y + \frac{1}{27}Q(t) = 0, \quad (11)$$

wenn wir $H(t)$, $Q(t)$ für $H(t, 1)$, $Q(t, 1)$ setzen.

Um nun die cubische Gleichung zu lösen, bestimmen wir t aus der quadratischen Gleichung

$$H(t) = 0.$$

Wir wollen für den Augenblick zur Abkürzung

$$\Omega = \sqrt{-3D} \quad (12)$$

setzen; dann folgt aus (7)

$$Q(t) = 3\Omega f(t), \quad (13)$$

und aus (11)

$$y = -\frac{1}{3}\sqrt[3]{Q(t)}. \quad (14)$$

Der Ausdruck (10) ergibt

$$(3a_0x + a_1)f(t) = yf'(t) - 3y^2. \quad (15)$$

Um die Uebereinstimmung dieses Resultats mit der Cardanischen Formel herzuleiten, gehen wir auf den § 62 zurück und setzen in den dortigen Formeln $x = t$, $y = 1$. Wegen (13) wird, nach § 62, (11), (13)

$$\eta = 0, \quad \xi = -h^{-1}Q,$$

und nach § 62, (10)

$$f(t) = r^3 f(t) = \eta^3 + \xi^3,$$

worin $\xi' = hA_0$ nach § 62 die Ableitung von ξ nach t ist. Danach folgt aus (14) und (15)

$$3a_0x + a_1 = A - (\xi + \eta), \quad (16)$$

wenn nach § 62, (15)

$$A = \frac{q_0}{2A_0^3}.$$

Nehmen wir $a_0 = 1$, $a_1 = 0$ an, so erhalten wir aus (16) die Cardanische Formel

$$x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}. \quad (17)$$

§ 72. Allgemeine Ausführung der Transformation

In der allgemeinen Durchführung der Tschirnhausen-Transformation in der Hermite'schen Form können wir noch einen bedeutenden Schritt weiter gehen. Wir betrachten zunächst die allgemeine Substitution § 68, (5)

$$y = t_{n-1}f_0 + t_{n-2}f_1 + t_{n-3}f_2 + \cdots + t_0f_{n-1}, \quad (1)$$

aus der wir die speciellere Form § 68, (12) erhalten, wenn wir die Variablen t an die eine lineare Bedingung

$$S(y) = na_0t_{n-1} + (n-1)a_1t_{n-2} + \cdots + a_{n-1}t_0 = 0 \quad (2)$$

binden, was aber fürs Erste noch nicht geschehen soll.

Durch die Functionen $f_0, f_1, f_2, \dots, f_{n-1}$ lassen sich nach § 68, (4) alle Potenzen von x und also auch alle rationalen Functionen von x linear und homogen darstellen. Wenn wir diese Darstellung für die verschiedenen Potenzen von y finden können, so lässt sich durch Elimination der f_i die Gleichung n ten Grades für y bilden.

Denselben Zweck erreichen wir aber noch einfacher, wenn wir die n Producte yf_s linear durch die f darstellen. Denn wenn wir die Gleichungen haben

$$yf_s = E_{0,s}f_0 + E_{1,s}f_1 + E_{2,s}f_2 + \cdots + E_{n-1,s}f_{n-1} \quad (s = 0, 1, \dots, n-1), \quad (3)$$

so erhalten wir durch Elimination von $f_0, f_1, \dots, f_{n-1}$ aus dem System (3)

$$\begin{vmatrix} E_{0,0} - y & E_{1,0} & E_{2,0} & \cdots & E_{n-1,0} \\ E_{0,1} & E_{1,1} - y & E_{2,1} & \cdots & E_{n-1,1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ E_{0,n-1} & E_{1,n-1} & E_{2,n-1} & \cdots & E_{n-1,n-1} - y \end{vmatrix} = 0, \quad (4)$$

also eine Gleichung n ten Grades für y , die die gesuchte transformirte Gleichung ist. Alles ist daher zurückgeführt auf die Bestimmung der Coefficienten $E_{r,s}$; diese sind, wie aus (1) hervorgeht, jedenfalls lineare Functionen der Variablen t . Insbesondere ist

$$E_{0,0} = t_{n-1}, \quad E_{1,0} = t_{n-2}, \quad \dots, \quad E_{n-1,0} = t_0. \quad (5)$$

Um die übrigen E zu berechnen, bemerken wir, dass nach der Definition § 68, (4) zwischen den Functionen f die folgenden Relationen bestehen:

$$\begin{aligned} xf_0 &= f_1 - a_1, \\ xf_1 &= f_2 - a_2, \\ &\vdots \\ xf_{n-2} &= f_{n-1} - a_{n-1}, \\ xf_{n-1} &= -a_n, \end{aligned} \quad (6)$$

von denen die letzte eine Folge der Gleichung $f(x) = 0$ ist.

Wenn wir nun die Reihe der Variablen $t_0, t_1, \dots, t_{n-1}$ fortsetzen, indem wir die neuen Variablen $t_n, t_{n+1}, t_{n+2}, \dots$ durch folgende Gleichungen definiren

$$\begin{aligned} a_0t_n + a_1t_{n-1} + a_2t_{n-2} + \cdots + a_nt_0 &= 0, \\ a_0t_{n+1} + a_1t_n + a_2t_{n-1} + \cdots + a_nt_1 &= 0, \\ a_0t_{n+2} + a_1t_{n+1} + a_2t_n + \cdots + a_nt_2 &= 0, \end{aligned} \quad (7)$$

so erhalten wir, wenn wir die Gleichungen (6) der Reihe nach mit $t_{n-1}, t_{n-2}, \dots, t_0$ multipliciren und addiren,

$$xy = t_nf_0 + t_{n-1}f_1 + \cdots + t_1f_{n-1},$$

und wenn wir nun (6) ebenso mit $t_n, t_{n-1}, \dots, t_1$ multipliciren,

$$x^2y = t_{n+1}f_0 + t_nf_1 + \dots + t_2f_{n-1}.$$

So ergibt sich das folgende System

$$\begin{aligned} y &= t_{n-1}f_0 + t_{n-2}f_1 + \dots + t_0f_{n-1}, \\ xy &= t_nf_0 + t_{n-1}f_1 + \dots + t_1f_{n-1}, \\ x^2y &= t_{n+1}f_0 + t_nf_1 + \dots + t_2f_{n-1}, \\ &\vdots \\ x^sy &= t_{n+s-1}f_0 + t_{n+s-2}f_1 + \dots + t_sf_{n-1}. \end{aligned} \tag{8}$$

Wenn wir diese Gleichungen wieder mit $a_s, a_{s-1}, \dots, a_0$ multipliciren und addiren, so folgt der gesuchte Ausdruck

$$yf_s = E_{0,s}f_0 + E_{1,s}f_1 + \dots + E_{n-1,s}f_{n-1},$$

worin nach (7)

$$\begin{aligned} E_{0,s} &= a_0t_{n+s-1} + a_1t_{n+s-2} + \dots + a_st_{n-1} \\ &= -a_{s+1}t_{n-2} - \dots - a_nt_{s-1}, \\ E_{1,s} &= a_0t_{n+s-2} + a_1t_{n+s-3} + \dots + a_st_{n-2} \\ &= -a_{s+1}t_{n-3} - \dots - a_nt_{s-2}, \\ &\vdots \\ E_{s-1,s} &= a_0t_n + a_1t_{n-1} + \dots + a_st_{n-s} \\ &= -a_{s+1}t_{n-s-1} - \dots - a_nt_0, \\ E_{s,s} &= a_0t_{n-1} + a_1t_{n-2} + \dots + a_st_{n-s-1}, \\ E_{s+1,s} &= a_0t_{n-2} + a_1t_{n-3} + \dots + a_st_{n-s-2}, \\ &\vdots \\ E_{n-1,s} &= a_0t_s + a_1t_{s-1} + \dots + a_st_0. \end{aligned} \tag{9}$$

Hierzu ist noch zu bemerken, dass die überzählig eingeführten Variablen $t_n, t_{n+1}, \dots$ in der zweiten Form von $E_{0,s}, E_{1,s}, \dots, E_{s-1,s}$ bereits wieder eliminirt sind, und dass die Variable t_{n-1} nur in $E_{s,s}$ vorkommt.

§ 73. Die Bezoutiante

Die Gleichung (4) des vorigen Paragraphen wird, entwickelt, die Gestalt haben

$$y^n + P_1y^{n-1} + P_2y^{n-2} + \dots + P_n = 0,$$

oder wenn wir t_{n-1} so bestimmen, dass $S(y) = 0$ wird,

$$y^n + P_2y^{n-2} + \dots + P_n = 0; \tag{1}$$

darin ist dann

$$-2P_2 = S(y^2)$$

eine Function zweiten Grades in Bezug auf die t und in Bezug auf die a . Diese Function ist für viele Anwendungen besonders wichtig und hat von Sylvester den Namen Bezoutiante der Function $f(x)$ erhalten, zu Ehren des französischen Mathematikers Bezout, der schon im vorigen Jahrhundert die ersten richtigen Ausführungen über Elimination gegeben hat.

Nach den Formeln des letzten Paragraphen lässt sich diese Function verhältnissmässig einfach berechnen. Wir führen zunächst neben den Variablen $t_{n-1}, t_{n-2}, \dots, t_0$ noch ein zweites System davon unabhängiger Variablen $\tau_{n-1}, \tau_{n-2}, \dots, \tau_0$ ein und setzen

$$\begin{aligned} y &= t_{n-1}f_0 + t_{n-2}f_1 + \dots + t_0f_{n-1}, \\ z &= \tau_{n-1}f_0 + \tau_{n-2}f_1 + \dots + \tau_0f_{n-1}. \end{aligned} \quad (2)$$

Statt nun $S(y^2)$ zu bilden, berechnen wir zunächst $S(yz)$, woraus dann $S(y^2)$ hervorgeht, wenn man die τ gleich den t setzt.

Wenn man die Formel (3) des vorigen Paragraphen

$$yf_s = E_{0,s}f_0 + E_{1,s}f_1 + \dots + E_{n-1,s}f_{n-1} \quad (3)$$

mit τ_{n-s-1} multiplicirt und dann in Bezug auf s von 0 bis $n-1$ summirt, so findet man

$$yz = f_0 \sum_{s=0}^{n-1} E_{0,s}\tau_{n-s-1} + f_1 \sum_{s=0}^{n-1} E_{1,s}\tau_{n-s-1} + \dots + f_{n-1} \sum_{s=0}^{n-1} E_{n-1,s}\tau_{n-s-1}. \quad (4)$$

Nun ist nach § 68, (6)

$$Sf_0 = na_0, \quad Sf_1 = (n-1)a_1, \quad \dots, \quad Sf_{n-1} = a_{n-1},$$

so dass man erhält

$$\begin{aligned} S(yz) &= na_0 \sum_{s=0}^{n-1} E_{0,s}\tau_{n-s-1} + (n-1)a_1 \sum_{s=0}^{n-1} E_{1,s}\tau_{n-s-1} \\ &\quad + \dots + a_{n-1} \sum_{s=0}^{n-1} E_{n-1,s}\tau_{n-s-1}. \end{aligned}$$

Hierin ist nun der Coefficient von τ_{n-1}

$$na_0E_{0,0} + (n-1)a_1E_{1,0} + \dots + a_{n-1}E_{n-1,0},$$

also nach (3)

$$= a_0S(y).$$

Da nun $S(z)$ mit dem Gliede $na_0\tau_{n-1}$ anfängt, so wird in der Differenz

$$S(yz) - \frac{1}{n}S(y)S(z) \quad (5)$$

kein Glied vorkommen, das mit τ_{n-1} multiplicirt ist. Da dieser Ausdruck aber ausserdem in Bezug auf t und τ symmetrisch ist, so enthält er auch nicht t_{n-1} , und wir können bei seiner Bildung einfach t_{n-1} und $\tau_{n-1} = 0$ annehmen.

Wir setzen nun

$$S(y) = na_0t_{n-1} + \varphi(t),$$

worin

$$\varphi(t) = (n-1)a_1t_{n-2} + (n-2)a_2t_{n-3} + \dots + a_{n-1}t_0. \quad (6)$$

Dann wird

$$\begin{aligned} S(yz) - \frac{1}{n}S(y)S(z) &= na_0 \sum_{s=1}^{n-1} E_{0,s}\tau_{n-s-1} + (n-1)a_1 \sum_{s=1}^{n-1} E_{1,s}\tau_{n-s-1} \\ &\quad + \dots + a_{n-1} \sum_{s=1}^{n-1} E_{n-1,s}\tau_{n-s-1} - \frac{1}{n}\varphi(t)\varphi(\tau), \end{aligned} \quad (7)$$

wobei jedoch zu bemerken ist, dass $t_{n-1} = 0$ anzunehmen, also

$$E_{s,s} = a_1 t_{n-2} + \cdots + a_s t_{n-s-1}$$

zu setzen ist, während die übrigen E durch die Formeln (9) des vorigen Paragraphen bestimmt sind.

Der Ausdruck auf der rechten Seite von (7) ist eine bilineare Function der t und τ ; er möge entwickelt die Form haben

$$\sum_{h=0}^{n-2} \sum_{k=0}^{n-2} B_{h,k} t_h \tau_k,$$

mit der Bedingung $B_{i,k} = B_{k,i}$. Die Bezoutiante ergibt sich dann, wenn man $\tau = t$ setzt, also

$$B = \sum_{h=0}^{n-2} \sum_{k=0}^{n-2} B_{h,k} t_h t_k, \quad (8)$$

worin die Coefficienten $B_{i,k}$ quadratische Functionen der a sind; und aus (7) folgt

$$S(yz) - \frac{1}{n} S(y) S(z) = \sum_{h=0}^{n-2} \sum_{k=0}^{n-2} B_{h,k} t_h \tau_k, \quad (9)$$

$$S(y^2) = \frac{1}{n} [S(y)]^2 + B. \quad (10)$$

Nach der Formel (8), § 68 ist

$$\begin{aligned} y - \frac{1}{n} S(y) &= t_{n-2} F_0 + t_{n-3} F_1 + \cdots + t_0 F_{n-2}, \\ z - \frac{1}{n} S(z) &= \tau_{n-2} F_0 + \tau_{n-3} F_1 + \cdots + \tau_0 F_{n-2}, \end{aligned}$$

und wenn wir beides multipliciren,

$$yz - \frac{1}{n} [yS(z) + zS(y)] + \frac{1}{n^2} S(y) S(z) = \sum_{h,k=0}^{n-2} \tau_h t_k F_{n-h-2} F_{n-k-2}.$$

Summiren wir diese Formel über alle Wurzeln x , d. h. nehmen wir die mit S bezeichnete Summe, so folgt

$$S(yz) - \frac{1}{n} S(y) S(z) = \sum_{h,k=0}^{n-2} \tau_h t_k S(F_{n-h-2} F_{n-k-2}),$$

und die Vergleichung mit (9) lehrt

$$B_{h,k} = S(F_{n-h-2} F_{n-k-2}). \quad (11)$$

Wir bezeichnen mit Δ die Determinante der Function B , setzen also

$$\Delta = \sum \pm B_{0,0} B_{1,1} \cdots B_{n-2,n-2}.$$

Nach dem Multiplicationssatz der Determinanten und mit Rücksicht auf die Formeln

$$SF_0 = 0, \quad SF_1 = 0, \quad \dots, \quad SF_{n-2} = 0$$

ist aber, wenn wir

$$\Phi = \begin{vmatrix} 1 & F_0(x_1) & F_1(x_1) & \cdots & F_{n-2}(x_1) \\ 1 & F_0(x_2) & F_1(x_2) & \cdots & F_{n-2}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & F_0(x_n) & F_1(x_n) & \cdots & F_{n-2}(x_n) \end{vmatrix}$$

setzen, nach (11)

$$\Phi^2 = n\Delta. \quad (12)$$

Beachtet man nun die Ausdrücke (9) in § 68 für die Functionen $F_0, F_1, \dots, F_{n-2}$, so ergibt sich leicht nach dem Satze, dass man in einer Determinante eine mit einem beliebigen Factor multiplicirte Colonne zu einer anderen Colonne addiren kann (§ 22, VII), für Φ der Ausdruck

$$a_0^{n-1} \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix},$$

dessen Quadrat nach § 46 die Discriminante von $f(x)$ ist. Hiernach haben wir also nach (12) den wichtigen Satz:

Die Determinante der Bezoutiante von $f(x)$ ist der n te Theil der Discriminante von $f(x)$.

Die Berechnung der Bezoutiante hat nach unseren Formeln gar keine Schwierigkeit mehr und gestaltet sich ziemlich einfach. Für $n = 3$ erhält man das schon aus den Formeln des § 71 zu schliessende Resultat

$$B = -\frac{2}{3}H(t_1, t_0). \quad (13)$$

Für die Berechnung der Bezoutiante der biquadratischen Form wollen wir zur Veranschaulichung des Vorhergehenden das Formelsystem vollständig aufführen, indem wir die Durchführung der wenig längeren Rechnung für die Form fünften Grades dem Leser überlassen. Es ist für die Form vierten Grades nach (7) und § 72, (9)

$$f(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4,$$

$E_{0,1} =$	$-a_2t_2 - a_3t_1 - a_4t_0$	$4a_0t_2$
$E_{1,1} =$	a_1t_2	$3a_1t_2$
$E_{2,1} =$	$a_0t_2 + a_1t_1$	$2a_2t_2$
$E_{3,1} =$	$a_0t_1 + a_1t_0$	a_3t_2
$E_{0,2} =$	$-a_3t_2 - a_4t_1$	$4a_0t_1$
$E_{1,2} =$	$-a_3t_1 - a_4t_0$	$3a_1t_1$
$E_{2,2} =$	$a_1t_2 + a_2t_1$	$2a_2t_1$
$E_{3,2} =$	$a_0t_2 + a_1t_1 + a_2t_0$	a_3t_1
$E_{0,3} =$	$-a_4t_2$	$4a_0t_0$
$E_{1,3} =$	$-a_4t_1$	$3a_1t_0$
$E_{2,3} =$	$-a_4t_0$	$2a_2t_0$
$E_{3,3} =$	$a_1t_2 + a_2t_1 + a_3t_0$	a_3t_0

Man hat diese Ausdrücke mit den rechts daneben gesetzten Factoren zu multipliciren und zu addiren, dann noch

$$-\frac{1}{4}\varphi(t)\varphi(\tau) = -\frac{1}{4}(3a_1t_2 + 2a_2t_1 + a_3t_0)(3a_1\tau_2 + 2a_2\tau_1 + a_3\tau_0)$$

hinzuzufügen und die Coefficienten von $\tau_h t_k$ aufzusuchen. So ergibt sich

$$\begin{aligned} B_{2,2} &= -\frac{1}{4}(8a_0a_2 - 3a_1^2), & B_{0,1} &= -\frac{1}{2}(6a_1a_4 - a_2a_3), \\ B_{1,1} &= -4a_0a_4 - 2a_1a_3 + a_2^2, & B_{1,2} &= -\frac{1}{2}(6a_0a_3 - a_1a_2), \\ B_{0,0} &= -\frac{1}{4}(8a_2a_4 - 3a_3^2), & B_{0,2} &= -\frac{1}{4}(16a_0a_4 - a_1a_3). \end{aligned} \quad (14)$$

Auf dieselbe Weise kann man bei einer Form fünften Grades verfahren, und findet für die Coefficienten der Bezoutiante folgende Ausdrücke

$$\begin{aligned}
 5B_{0,0} &= 4a_4^2 - 10a_3a_5, & 5B_{0,1} &= 3a_3a_4 - 15a_2a_5, \\
 5B_{1,1} &= 6a_3^2 - 10a_2a_4 - 20a_1a_5, & 5B_{0,2} &= 2a_2a_4 - 20a_1a_5, \\
 5B_{2,2} &= 6a_2^2 - 10a_1a_3 - 20a_0a_4, & 5B_{0,3} &= a_1a_4 - 25a_0a_5, \\
 5B_{3,3} &= 4a_1^2 - 10a_0a_2, & 5B_{1,2} &= 4a_2a_3 - 15a_1a_4 - 25a_0a_5, \\
 & & 5B_{1,3} &= 2a_1a_3 - 20a_0a_4, \\
 & & 5B_{2,3} &= 3a_1a_2 - 15a_0a_3.
 \end{aligned}$$

§ 74. Transformation der Gleichung fünften Grades

Diese Entwicklungen sollen nun angewandt werden, um die Transformation der Gleichung fünften Grades, wie wir sie im § 54 skizzirt haben, durchzuführen.

Es lässt sich auf unendlich viele Arten ein Werthsystem t_0, t_1, t_2, t_3 so bestimmen, dass die Bezoutiante B verschwindet; im Allgemeinen ist dazu die Auflösung einer quadratischen Gleichung erforderlich. Wir können z. B.

$$t_2 = 0, \quad t_3 = 0$$

setzen und das Verhältniss $t_0 : t_1$ aus der quadratischen Gleichung

$$B_{0,0}t_0^2 + 2B_{0,1}t_0t_1 + B_{1,1}t_1^2 = 0$$

bestimmen. Diese Werthe von t enthalten dann die Quadratwurzel

$$\sqrt{B_{0,1}^2 - B_{0,0}B_{1,1}}.$$

Statt dessen kann man aber auch andere Bestimmungen treffen und bekommt andere und andere Quadratwurzeln. In der Auswahl dieser Quadratwurzel liegt etwas Willkürliches und Unbestimmtes.

Wir greifen unter diesen verschiedenen Bestimmungsweisen eine heraus und transformiren damit die gegebene Gleichung fünften Grades in eine Hauptgleichung, d. h. in eine solche, in der die dritte und vierte Potenz der Unbekannten nicht vorkommt, oder wir nehmen an, nach F. Klein's Vorgang, die zu transformirende Gleichung sei von Haus aus eine Hauptgleichung

$$f(x) = a_0x^5 + a_3x^2 + a_4x + a_5 = 0. \quad (1)$$

Wir wollen aber noch ausdrücklich hervorheben, dass nach § 70, (8) durch diese vorläufige Tschirnhausen-Transformation die Discriminante der gegebenen Gleichung nur um einen Factor Θ^2 geändert wird, worin Θ rational von den angewandten t , also auch von der zu ihrer Bestimmung benutzten Quadratwurzel abhängt.

Unter der Voraussetzung (1) werden nun die Coefficienten der Bezoutiante nach den Formeln des vorigen Paragraphen folgende:

$$\begin{aligned}
 5B_{0,0} &= 4a_4^2 - 10a_3a_5, & 5B_{0,1} &= 3a_3a_4, \\
 5B_{1,1} &= 6a_3^2, & 5B_{0,2} &= 0, \\
 5B_{2,2} &= -20a_0a_4, & 5B_{0,3} &= -25a_0a_5, \\
 5B_{3,3} &= 0, & 5B_{1,2} &= -25a_0a_5, \\
 5B_{1,3} &= -20a_0a_4, & 5B_{2,3} &= -15a_0a_3.
 \end{aligned} \quad (2)$$

Wenn man hieraus die Determinante berechnet, so erhält man ohne Schwierigkeit nach § 73, (12) für die Discriminante der Hauptgleichung fünften Grades

$$\begin{aligned}
 D &= a_0^5(5^5a_0^3a_5^4 + 2^8a_0a_4^5 + 2250a_0a_3^2a_4a_5^2 \\
 &\quad - 1600a_0a_3a_4^3a_5 + 108a_3^5a_5 - 27a_3^4a_4^2).
 \end{aligned} \quad (3)$$

Da nun hier $B_{3,3} = 0$ ist, so haben wir ein Werthsystem der t , wofür die Bezoutiante verschwindet, nämlich

$$t_0 = 0, \quad t_1 = 0, \quad t_2 = 0.$$

Wir nehmen nun unsere Tschirnhausen-Substitution in folgender Form [§ 68, (12)]

$$y = t_3 F_0 + t_2 (\alpha_2 F_1 + \alpha_1 F_2 + \alpha_0 F_3) \quad (4)$$

und wollen über die $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ so verfügen, dass die Gleichung fünften Grades für y unabhängig von t_3, t_2 zu einer Hauptgleichung wird, dass also $S(y^2)$ identisch für alle t_2, t_3 verschwindet.

Da $S(F_0^2) = B_{3,3}$ hier verschwindet, so geschieht dieser Forderung nach § 73, (11) genüge, wenn wir $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ so bestimmen, dass

$$\alpha_0^2 B_{0,0} + \alpha_1^2 B_{1,1} + \alpha_2^2 B_{2,2} + 2\alpha_0 \alpha_1 B_{0,1} + 2\alpha_0 \alpha_2 B_{0,2} + 2\alpha_1 \alpha_2 B_{1,2} = 0, \quad (5)$$

$$\alpha_0 B_{0,3} + \alpha_1 B_{1,3} + \alpha_2 B_{2,3} = 0. \quad (6)$$

Diese Gleichungen führen durch Elimination von einer der drei Grössen α auf eine quadratische Gleichung für das Verhältniss der beiden anderen. An sich ist es nicht nothwendig, irgend einen besonderen Fall auszuschliessen, auch nicht den, dass $B_{0,3}, B_{1,3}, B_{2,3}$ alle drei verschwinden; man hätte dann nur für die α irgend eine Lösung der Gleichung (5) zu nehmen.

Um aber nicht weitläufig zu sein, wollen wir annehmen, dass $B_{0,3}$ von Null verschieden sei, weil die hierdurch ausgeschlossenen Fälle, in denen eine Wurzel der gegebenen Gleichung Null oder unendlich wird, hier eigentlich kein Interesse bieten, weil sie auf eine Gleichung niedrigeren Grades zurückkommen. Die Behandlung bleibt übrigens ganz dieselbe, wenn wir annehmen, dass eine andere von den drei Grössen $B_{0,3}, B_{1,3}, B_{2,3}$ von Null verschieden ist.

Um nun die Gleichungen (5), (6) in symmetrischer Weise zu behandeln und namentlich zu erkennen, welche Quadratwurzel zu ihrer Lösung erfordert wird, verfahren wir so. Wir setzen zur Abkürzung

$$\begin{aligned} B_0 &= \alpha_0 B_{0,0} + \alpha_1 B_{0,1} + \alpha_2 B_{0,2}, \\ B_1 &= \alpha_0 B_{1,0} + \alpha_1 B_{1,1} + \alpha_2 B_{1,2}, \\ B_2 &= \alpha_0 B_{2,0} + \alpha_1 B_{2,1} + \alpha_2 B_{2,2}. \end{aligned} \quad (7)$$

Dann können wir die Gleichungen (5) und (6) so darstellen:

$$\begin{aligned} \alpha_0 B_0 + \alpha_1 B_1 + \alpha_2 B_2 &= 0, \\ \alpha_0 B_{0,3} + \alpha_1 B_{1,3} + \alpha_2 B_{2,3} &= 0. \end{aligned} \quad (8)$$

Wir multipliciren die zweite mit einem unbestimmten Factor α_3 und addiren sie zur ersten, wodurch wir erhalten

$$\alpha_0 (B_0 + \alpha_3 B_{0,3}) + \alpha_1 (B_1 + \alpha_3 B_{1,3}) + \alpha_2 (B_2 + \alpha_3 B_{2,3}) = 0, \quad (9)$$

eine Gleichung, die erfüllt ist, wenn wir setzen

$$B_0 + \alpha_3 B_{0,3} = 0, \quad B_1 + \alpha_3 B_{1,3} = \sigma \alpha_2, \quad B_2 + \alpha_3 B_{2,3} = -\sigma \alpha_1. \quad (10)$$

Aus diesen drei Gleichungen, in Verbindung mit der Gleichung (6), haben wir die Unbekannten $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \sigma$ zu bestimmen. Wir setzen die Gleichungen zunächst ausführlich hierher

$$\begin{aligned} \alpha_0 B_{0,0} + \alpha_1 B_{0,1} + \alpha_2 B_{0,2} + \alpha_3 B_{0,3} &= 0, \\ \alpha_0 B_{1,0} + \alpha_1 B_{1,1} + \alpha_2 (B_{1,2} - \sigma) + \alpha_3 B_{1,3} &= 0, \\ \alpha_0 B_{2,0} + \alpha_1 (B_{2,1} + \sigma) + \alpha_2 B_{2,2} + \alpha_3 B_{2,3} &= 0, \\ \alpha_0 B_{3,0} + \alpha_1 B_{3,1} + \alpha_2 B_{3,2} &= 0, \end{aligned} \quad (11)$$

und wenn wir hieraus $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ eliminiren, so ergibt sich eine quadratische Gleichung für σ , nach deren Lösung man die Verhältnisse $\alpha_0 : \alpha_1 : \alpha_2 : \alpha_3$ aus linearen Gleichungen bestimmen kann.

Die quadratische Gleichung für σ aber lautet in Determinantenform

$$\begin{vmatrix} B_{0,0} & B_{0,1} & B_{0,2} & B_{0,3} \\ B_{1,0} & B_{1,1} & B_{1,2} - \sigma & B_{1,3} \\ B_{2,0} & B_{2,1} + \sigma & B_{2,2} & B_{2,3} \\ B_{3,0} & B_{3,1} & B_{3,2} & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Da sich die linke Seite durch Vertauschung von σ mit $-\sigma$ nicht ändert, so ist es eine reine quadratische Gleichung und sie giebt mit Rücksicht auf § 73, (12)

$$B_{0,3}^2 \sigma^2 - 5D = 0,$$

wenn D die Discriminante der gegebenen Gleichung ist. Wir bekommen also nach (2)

$$5a_0a_5\sigma = \sqrt{5D}, \quad (12)$$

worin das Vorzeichen beliebig ist.

§ 75. Normalform der Gleichung fünften Grades

Wie schon früher bemerkt, ist das hauptsächlichste Ziel dieser Betrachtungen, eine Normalform der Gleichung fünften Grades herzustellen, die nur von einem unbestimmten Coefficienten, einem Parameter, abhängt. Eine solche Normalform ist die Bring-Jerrard'sche Form. Um diese zu erhalten, haben wir nach (4) des vorigen Paragraphen

$$y = t_3 F_0 + t_2(\alpha_2 F_1 + \alpha_1 F_2 + \alpha_0 F_3) \quad (1)$$

zu setzen, so dass identisch

$$S(y) = 0, \quad S(y^2) = 0$$

wird, und dann ist das Verhältniss $t_3 : t_2$ aus der cubischen Gleichung

$$S(y^3) = 0$$

zu bilden. Diese cubische Gleichung lässt sich wirklich bilden, wenn auch ihr Ausdruck lang wird. Die hierzu nöthigen Formeln sind von Cayley berechnet.

Es ist das Ergebniss einer merkwürdigen Untersuchung von Gordan, dass man eine andere, die Briochi'sche Normalform ohne neue Irrationalität erhalten kann, und wir wollen zum Beschluss dieser Betrachtungen über die Tschirnhausen-Transformation dies Resultat noch ableiten.

Wir halten an den Voraussetzungen des vorigen Paragraphen fest und setzen für den Augenblick zur Abkürzung

$$u = F_0, \quad v = \alpha_2 F_1 + \alpha_1 F_2 + \alpha_0 F_3, \quad (2)$$

worin $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ die im vorigen Paragraphen bestimmten Werthe haben sollen.

Nach der Formel § 73, (4) lassen sich die drei Functionen

$$u^2, \quad uv, \quad v^2$$

linear und homogen durch f_0, f_1, f_2, f_3, f_4 darstellen, und weil

$$S(u^2) = 0, \quad S(uv) = 0, \quad S(v^2) = 0 \quad (3)$$

ist, so werden diese Ausdrücke auch in F_0, F_1, F_2, F_3 linear und homogen.

Die Rechnung ist nach den Formeln der §§ 72, 73 leicht auszuführen, soll aber hier nicht weiter verfolgt werden, da es uns nur auf die Darlegung des Grundgedankens ankommt. Wir wollen nur bemerken, dass die Coefficienten in den Ausdrücken für u^2, uv, v^2 linear in den Coefficienten der

ursprünglichen Gleichung fünften Grades und quadratisch in den $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ sind. Wenn wir nun aus diesen Ausdrücken mit Hülfe von (2) die Functionen F_0, F_1, F_2, F_3 eliminiren, so erhalten wir eine Relation von der Form

$$pu^2 + 2quv + rv^2 = au + bv, \quad (4)$$

worin die p, q, r, a, b von den Coefficienten a_i und α_i rational abhängen und jedenfalls nicht alle zugleich verschwinden.

Setzen wir für den Augenblick

$$pu^2 + 2quv + rv^2 = \varphi(u, v),$$

so ist nach § 57

$$4\varphi(u', v')\varphi(u, v) - [u'\varphi'(u) + v'\varphi'(v)]^2$$

das Quadrat einer linearen Function von u, v , so dass dadurch $\varphi(u, v)$ in die Summe von zwei Quadraten zerlegt wird. Wählen wir $u' = b, v' = -a$, so folgt

$$\varphi(b, -a)\varphi(u, v) = [b(pu + qv) - a(qu + rv)]^2 + (pr - q^2)(au + bv)^2,$$

oder wenn man zur Abkürzung

$$\begin{aligned} pb^2 - 2qab + ra^2 &= m, \\ bp - aq &= a', \\ bq - ar &= b', \\ q^2 - pr &= c \end{aligned} \quad (5)$$

setzt,

$$m(pu^2 + 2quv + rv^2) = (a'u + b'v)^2 - c(au + bv)^2, \quad (6)$$

und nach (4) kann diese Gleichung auch so dargestellt werden:

$$m(au + bv) = (a'u + b'v)^2 - c(au + bv)^2. \quad (7)$$

Man setze nun

$$y = \frac{a'u + b'v}{au + bv}, \quad (8)$$

und bilde die Gleichung fünften Grades, deren Wurzeln die fünf Werthe von y sind:

$$y^5 + c_1y^4 + c_2y^3 + c_3y^2 + c_4y + c_5 = 0; \quad (9)$$

darin lassen sich die Coefficienten c auf folgende Weise näher bestimmen.

Aus (8) leiten wir ab

$$y + \sqrt{c} = \frac{a'u + b'v + \sqrt{c}(au + bv)}{au + bv}$$

und daraus nach (7)

$$y + \sqrt{c} = \frac{m}{a'u + b'v - \sqrt{c}(au + bv)}, \quad \frac{m}{y + \sqrt{c}} = a'u + b'v - \sqrt{c}(au + bv).$$

Daraus folgt aber nach (3)

$$S\left(\frac{1}{y + \sqrt{c}}\right) = 0, \quad S\left(\frac{1}{(y + \sqrt{c})^2}\right) = 0.$$

Wenn wir also aus (9) die Gleichung ableiten, deren Wurzeln die Werthe

$$\xi = -\frac{1}{y + \sqrt{c}}$$

sind, also

$$y = \frac{1 - \xi\sqrt{c}}{\xi}$$

setzen, so muss eine Gleichung für ξ entstehen, in der die Coefficienten von ξ^4 und ξ^3 verschwinden, und zwar welches Zeichen wir auch der Quadratwurzel $\sqrt{c}$ geben. Dadurch erhält man vier Gleichungen zwischen den Coefficienten c_ν der Gleichung (9).

Die Gleichung für ξ wird nämlich

$$(1 - \xi\sqrt{c})^5 + c_1\xi(1 - \xi\sqrt{c})^4 + c_2\xi^2(1 - \xi\sqrt{c})^3 + c_3\xi^3(1 - \xi\sqrt{c})^2 + c_4\xi^4(1 - \xi\sqrt{c}) + c_5\xi^5 = 0.$$

Setzt man hierin die Coefficienten von ξ^4 und ξ^3 gleich 0, so folgt

$$\begin{aligned} 5\sqrt{c}^4 - 4c_1\sqrt{c}^3 + 3c_2\sqrt{c}^2 - 2c_3\sqrt{c} + c_4 &= 0, \\ -10\sqrt{c}^3 + 6c_1\sqrt{c}^2 - 3c_2\sqrt{c} + c_3 &= 0, \end{aligned}$$

und diese Gleichungen zerfallen wegen des doppelten Zeichens von $\sqrt{c}$ in die vier

$$\begin{aligned} 5c^2 + 3c_2c + c_4 &= 0, \\ 4c_1c + 2c_3 &= 0, \\ 10c + 3c_2 &= 0, \\ 6c_1c + c_3 &= 0. \end{aligned}$$

Aus der zweiten und vierten dieser Gleichungen folgt

$$c_1 = 0, \quad c_3 = 0,$$

und dann aus der dritten und ersten

$$c_2 = -\frac{10}{3}c, \quad c_4 = -5c^2,$$

so dass also die Gleichung für y die Gestalt erhält

$$y^5 - \frac{10}{3}cy^3 + 5c^2y + c_5 = 0. \quad (10)$$

Diese Gleichung hängt noch von den beiden Parametern c_5 und c ab; man kann sie auf eine Gleichung mit einem Parameter reduciren durch die Substitution

$$y = \sqrt{\frac{c}{3}}z, \quad \gamma = c_5\sqrt{\frac{3^5}{c^5}}, \quad (11)$$

wodurch sie die einfache und elegante Form erhält

$$z^5 - 10z^3 + 45z + \gamma = 0. \quad (12)$$

Dies ist die Briochi'sche Normalform. Die Substitution (11) leidet aber an dem Uebelstande, dass sie noch eine Quadratwurzel enthält; während in den Formeln (8) und (10) nur die zwei im vorigen Paragraphen besprochenen Quadratwurzeln vorkommen. Man kann aber auch nach einer Bemerkung von Klein auf rationalem Wege aus (10) zu einer Normalform kommen, die nur einen Parameter enthält.

Setzt man z. B.

$$y = \frac{3c_5}{c^2} \frac{1}{z}, \quad \gamma = \frac{9c_5^2}{c^5}, \quad (13)$$

so erhält man aus (10) die Gleichung

$$z^5 + 15z^4 - 10\gamma z^2 + 3\gamma^2 = 0. \quad (14)$$

Es ist bei dieser Transformation stillschweigend die Voraussetzung gemacht, dass die in (5) mit m und c bezeichneten Grössen nicht Null seien.

Ist $m = 0$, so ist in der Formel (4) $pu^2 + 2quv + rv^2$ durch $au + bv$ theilbar, es muss dann also wenigstens für einige der Wurzeln die Gleichung

$$au + bv = 0,$$

d. h. eine Gleichung von nicht höherem als dem vierten Grade bestehen.

Ist $c = 0$, also $pu^2 + 2quv + rv^2$ ein Quadrat einer linearen Function, so ergibt sich aus (7), dass, wenn

$$y = a'u + b'v$$

gesetzt wird

$$S(y) = 0, \quad S(y^2) = 0, \quad S(y^3) = 0$$

ist, dass also die Bring-Jerrard'sche Form in rationaler Weise herstellbar ist.

Wir können schliesslich die Resultate dieser Betrachtungen dahin zusammenfassen:

Die Hauptgleichung fünften Grades lässt sich durch eine Transformation, die als einzige Irrationalität die Quadratwurzel aus der Discriminante enthält, auf eine Normalform mit einem Parameter transformiren.

ZWEITES BUCH.

DIE WURZELN.

Siebenter Abschnitt.
Realität der Wurzeln.

§ 76. Allgemeines über Realität von Gleichungswurzeln und über die Discriminante

In diesem Abschnitt werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie viele Wurzeln einer algebraischen Gleichung reell sind. Die Coefficienten der Gleichung werden dabei als reelle Zahlen vorausgesetzt. Wir wollen solche Gleichungen kurz reelle Gleichungen nennen und beginnen mit einigen allgemeinen Betrachtungen.

Die reelle Gleichung n ten Grades

$$f(x) = 0$$

hat, wie wir im dritten Abschnitt gesehen haben, n Wurzeln, die entweder reell oder imaginär, d. h. von der Form $\xi + i\eta$ sind, mit reellen ξ, η . Die Zahl von n Wurzeln ergibt sich aber nur dann allgemein, wenn wir unter Umständen eine Wurzel mehrfach zählen, nämlich $(m+1)$ fach, wenn mit $f(x)$ zugleich die m ersten Derivirten von $f(x)$ verschwinden. Da nun ein complexer Ausdruck von der Form $X + iY$ nur dann gleich Null ist, wenn die beiden reellen Bestandtheile X und Y einzeln verschwinden, wenn also mit $X + iY$ zugleich $X - iY$ verschwindet, und da ferner bei reellen Coefficienten, wenn $f(\xi + i\eta) = X + iY$ ist, sich $f(\xi - i\eta) = X - iY$ ergibt, so folgt aus $f(\xi + i\eta) = 0$, dass zugleich $f(\xi - i\eta) = 0$ sein muss, dass also zu jeder imaginären Wurzel $\xi + i\eta$ eine zweite davon verschiedene imaginäre $\xi - i\eta$, d. h. die conjugirt imaginäre Wurzel gehört. Da mit den Derivirten $f'(\xi + i\eta), f''(\xi + i\eta), \dots$ zugleich die conjugirten Grössen $f'(\xi - i\eta), f''(\xi - i\eta), \dots$ verschwinden, so folgt, dass conjugirt imaginäre Wurzeln denselben Grad der Vielfachheit haben.

Daraus folgt, dass die imaginären Wurzeln immer in gerader Zahl vorkommen, und dass eine Gleichung ungeraden Grades immer mindestens eine reelle Wurzel haben muss.

Unser nächstes Ziel wird das sein, die Zahl der reellen Wurzeln, ohne die Gleichung aufzulösen, direct aus den Werthen gewisser rationaler Functionen der Coefficienten der Gleichung zu bestimmen.

Eine sehr wichtige Rolle spielt hierbei die Discriminante, auf deren Bedeutung für unsere Frage wir zunächst eingehen müssen.

Wir haben in § 46 die Discriminante erklärt als das Product aus den Quadraten der sämtlichen Wurzeldifferenzen

$$(x_1 - x_2)^2(x_1 - x_3)^2 \cdots (x_{n-1} - x_n)^2,$$

noch multiplicirt mit a_0^{2n-2} , wenn a_0 der Coefficient der höchsten Potenz der Unbekannten in der gegebenen Gleichung ist, und wir haben dort gezeigt, wie die Discriminante als rationale Function der Coefficienten berechnet werden kann. Der Factor a_0^{2n-2} ist immer positiv und könnte hier ohne wesentliche Beschränkung der Allgemeinheit auch gleich 1 vorausgesetzt werden. Wir wollen, wie schon früher, für die Discriminante das Zeichen D gebrauchen.

Die Discriminante verschwindet dann und nur dann, wenn unter den Wurzeln zwei gleiche vorkommen.

Nehmen wir an, dass $f(x)$ durch Absonderung des grössten gemeinschaftlichen Theilers von $f(x)$ und $f'(x)$, was durch rationale Rechnung geschieht, von mehrfachen Factoren befreit sei, so wird also D nicht verschwinden.

Sind x_1 und x_2 reell, so ist $(x_1 - x_2)^2$ positiv. Ist x_1 reell und x_2 imaginär, so giebt es eine zu x_2 conjugirte Wurzel x'_2 , und das Product

$$(x_1 - x_2)(x_1 - x'_2)$$

ist als Product zweier conjugirt imaginärer Grössen positiv, also auch sein Quadrat.

Sind x_1 und x_2 beide imaginär, aber nicht conjugirt, so ist das Product

$$(x_1 - x_2)(x'_1 - x'_2)$$

und sein Quadrat positiv.

Sind aber endlich x_1 und x_2 conjugirt imaginär, so ist ihre Differenz rein imaginär und deren Quadrat negativ.

Es kommen also in dem Product, durch das wir die Discriminante erklärt haben, genau so viel negative Factoren vor, als es Paare conjugirt imaginärer Wurzeln giebt, und wir schliessen daraus auf den wichtigen Fundamentalsatz:

Ist $f(x) = 0$ eine reelle Gleichung ohne mehrfache Wurzeln, so ist die Discriminante positiv oder negativ, je nachdem die Anzahl der Paare conjugirt imaginärer Wurzeln gerade oder ungerade ist.

Der Fall, wo nur reelle Wurzeln vorhanden sind, gehört zu denen, wo die Discriminante positiv ist.

Für die Fälle der quadratischen und cubischen Gleichungen, in denen nur ein Paar imaginärer Wurzeln auftreten kann, ist durch diesen Hauptsatz bereits die Unterscheidung der verschiedenen Fälle, die in Bezug auf die Wurzelrealität möglich sind, die Determination, vollendet.

§ 77. Discussion der quadratischen und cubischen Gleichung

Für die quadratische Gleichung

$$a_0x^2 + a_1x + a_2 = 0$$

haben wir (§ 46)

$$D = a_1^2 - 4a_0a_2 \begin{cases} > 0, & \text{reelle Wurzeln,} \\ < 0, & \text{imaginäre Wurzeln.} \end{cases}$$

Für die cubische Gleichung

$$a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$$

ist

$$D = a_1^2a_2^2 + 18a_0a_1a_2a_3 - 4a_0a_2^3 - 4a_1^3a_3 - 27a_0^2a_3^2,$$

und

$$\begin{aligned} D > 0, & \text{ drei reelle Wurzeln,} \\ D < 0, & \text{ eine reelle, zwei imaginäre Wurzeln.} \end{aligned}$$

Auch der Fall $D = 0$ giebt hier zu keinen weiteren Unterscheidungen Anlass; denn in diesem Falle sind die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung einander gleich und reell, von den drei Wurzeln der cubischen Gleichung zwei einander gleich und alle drei reell; denn eine imaginäre Wurzel kann hier nicht doppelt vorkommen, weil sonst auch die conjugirte doppelt vorkommen würde, und ebenso wenig kann die einzelne Wurzel imaginär sein, weil sonst eine zweite vorhanden sein müsste.

Es kann sich bei der cubischen Gleichung nur noch darum handeln, die Bedingung dafür aufzusuchen, dass alle drei Wurzeln einander gleich sind.

In diesem Falle muss die linke Seite der cubischen Gleichung ein vollständiger Cubus sein, also

$$a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = a_0(x - \alpha)^3.$$

Die Vergleichung beider Seiten dieser identischen Gleichung giebt

$$a_1 = -3a_0\alpha, \quad a_2 = 3a_0\alpha^2, \quad a_3 = -a_0\alpha^3,$$

woraus man durch Elimination von α erhält

$$a_1^2 - 3a_0a_2 = 0, \quad a_1a_2 - 9a_0a_3 = 0. \quad (1)$$

Daraus ergibt sich als Folge, indem man die erste dieser Gleichungen mit a_2 , die zweite mit a_1 multiplicirt und subtrahirt,

$$a_2^2 - 3a_1a_3 = 0;$$

und wenn diese Bedingungen erfüllt sind, so folgt daraus umgekehrt

$$f(x) = a_0 \left(x + \frac{a_1}{3a_0} \right)^3,$$

d. h. die Gleichheit aller drei Wurzeln.

Bei der cubischen Gleichung

$$x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$$

können wir ausser über die Realität auch noch über die Vorzeichen der Wurzeln vollständig entscheiden.

Bezeichnen wir nämlich mit α, β, γ die drei Wurzeln, so ist

$$a_1 = -(\alpha + \beta + \gamma), \quad a_2 = \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma, \quad a_3 = -\alpha\beta\gamma. \quad (2)$$

Ist nun $D < 0$, also nur eine Wurzel, etwa α , reell, so ist $\beta\gamma$ positiv und α wird negativ oder positiv sein, je nachdem a_3 positiv oder negativ ist. Ist aber D positiv, also sind alle drei Wurzeln reell, so ist, wenn α, β, γ positiv sind, nach (2)

$$a_1 < 0, \quad a_2 > 0, \quad a_3 < 0; \quad (3)$$

diese Bedingungen sind nothwendig dafür, dass alle drei Wurzeln positiv sind. Sie sind aber auch hinreichend; denn wenn eine oder drei Wurzeln negativ sind, so ist $a_3 > 0$. Sind aber zwei Wurzeln, etwa β, γ , negativ, so ist entweder

$$a_1 \geq 0 \quad \text{oder} \quad \alpha > -(\beta + \gamma).$$

In letzterem Falle aber folgt

$$a_2 < \beta\gamma - (\beta + \gamma)^2 = -\beta^2 - \beta\gamma - \gamma^2,$$

also a_2 negativ.

Ist endlich eine Wurzel gleich 0, so muss nothwendig a_3 verschwinden.

Indem man x durch $-x$ ersetzt, schliesst man, dass für drei negative Wurzeln die nothwendige und hinreichende Bedingung die ist

$$a_1 > 0, \quad a_2 > 0, \quad a_3 > 0. \quad (4)$$

Wir erhalten daher unter Voraussetzung einer positiven Discriminante folgende Tabelle:

a_1	a_2	a_3	Zahl der positiven Wurzeln
—	+	—	3
—	—	—	1
+	+	—	1
+	—	—	1
+	+	+	0
—	—	+	2
—	+	+	2
+	—	+	2

wo in der letzten Columne die Zahl der positiven Wurzeln angegeben ist. Wir können das Resultat dieser Betrachtung so aussprechen:

Bei positiver Discriminante ist die Anzahl der positiven Wurzeln der cubischen Gleichung gleich der Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe

$$1, a_1, a_2, a_3,$$

wenn wir unter einem Zeichenwechsel die Aufeinanderfolge einer positiven und einer negativen oder einer negativen und einer positiven Grösse verstehen.

Wenn eine der beiden Grössen a_1, a_2 verschwindet, so haben wir, da dann nicht alle Wurzeln von gleichem Zeichen sein können, eine oder zwei positive Wurzeln.

Wenn $a_3 = 0$ ist, so reducirt sich die Discriminante auf

$$a_2^2(a_1^2 - 4a_2),$$

und wenn diese positiv ist, so hat die cubische Gleichung eine verschwindende und noch zwei andere reelle Wurzeln. Diese sind positiv, wenn

$$a_1 < 0, \quad a_2 > 0,$$

negativ, wenn

$$a_1 > 0, \quad a_2 > 0,$$

und es ist eine von ihnen positiv und eine negativ, wenn

$$a_1 \geq 0, \quad a_2 < 0$$

ist.

§ 78. Discussion der biquadratischen Gleichung

Bei den Gleichungen vierten und fünften Grades existiren entweder keine oder zwei oder vier imaginäre Wurzeln. Ist die Discriminante negativ, so hat man zwei imaginäre Wurzeln. Bei positiver Discriminante können entweder vier oder keine imaginären Wurzeln vorhanden sein. Diese beiden Fälle zu unterscheiden, wird weiterhin unsere Aufgabe sein. Wir wenden uns aber zunächst zu einer elementaren Betrachtung der biquadratischen Gleichung, die wir der Einfachheit halber in der verkürzten Form

$$x^4 + ax^2 + bx + c = 0 \tag{1}$$

annehmen wollen, von der wir leicht zur allgemeinen Form zurückkehren können.

Bezeichnen wir die Wurzeln mit $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ und setzen, wie in § 47,

$$\begin{aligned} \alpha - \beta &= v + w, & \gamma - \delta &= v - w, \\ \alpha - \gamma &= w + u, & \delta - \beta &= w - u, \\ \alpha - \delta &= u + v, & \beta - \gamma &= u - v, \end{aligned} \tag{2}$$

so sind u^2, v^2, w^2 die Wurzeln der cubischen Resolvente

$$y^3 + 2ay^2 + (a^2 - 4c)y - b^2 = 0, \tag{3}$$

und die Discriminante D dieser cubischen Gleichung, die durch

$$27D = 4(a^2 + 12c)^3 - (2a^3 - 72ac + 27b^2)^2 \tag{4}$$

bestimmt ist, ist zugleich die Discriminante der biquadratischen Gleichung (1), und die Vorzeichen der Grössen u, v, w sind durch die Bedingung

$$uvw = -b \tag{5}$$

beschränkt [§ 37, (3)].

Wenn die Discriminante negativ ist, so hat die Gleichung (3) ebenso wie (1) zwei conjugirt imaginäre Wurzeln.

Ist D positiv und alle vier Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ reell, so werden auch u, v, w reell und also ihre Quadrate, d. h. die Wurzeln von (3), positiv.

Sind alle vier Wurzeln imaginär, etwa α mit β und γ mit δ conjugirt, so folgt aus (2), dass v und w rein imaginär, u reell ist; also hat in diesem Falle die Gleichung (3) eine positive und zwei negative Wurzeln.

In beiden Fällen kann aber auch, wenn b verschwindet, eine der Grössen u, v, w gleich Null sein.

Mit Rücksicht auf die Ergebnisse des letzten Paragraphen über die cubische Gleichung kommen wir also zu folgendem Resultat:

Die nothwendige und hinreichende Bedingung für die Existenz von vier verschiedenen reellen Wurzeln ist

$$D > 0, \quad a < 0, \quad a^2 - 4c > 0. \quad (6)$$

In allen anderen Fällen, wo D positiv ist, hat die Gleichung vier imaginäre Wurzeln.

Wir können auch für $D = 0$, also im Falle der Gleichheit zweier Wurzeln, die Discussion vollständig durchführen.

Nehmen wir $\gamma = \delta$ an, so folgt aus (2), da wir die Annahme $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 0$ gemacht haben,

$$2v = 2w = \alpha - \beta, \quad 2u = \alpha + \beta - 2\gamma = 2(\alpha + \beta),$$

und daraus nach (3)

$$\begin{aligned} -4a &= 2(\alpha + \beta)^2 + (\alpha - \beta)^2, \\ 16(a^2 - 4c) &= (\alpha - \beta)^2[8(\alpha + \beta)^2 + (\alpha - \beta)^2]. \end{aligned} \quad (7)$$

Um zunächst den Fall zu erledigen, dass auch $\alpha = \beta$ ist, so erhalten wir aus (7) dafür die Bedingung $a^2 - 4c = 0$, und die erste Gleichung (7) zeigt, dass a negativ ist, wenn α und γ reell, dagegen positiv, wenn α und γ conjugirt (und dann wegen $\alpha + \gamma = 0$ rein imaginär) sind. Daraus folgt:

Die biquadratische Gleichung hat zwei Paare gleicher, reeller Wurzeln, wenn

$$D = 0, \quad a < 0, \quad a^2 - 4c = 0 \quad (8)$$

und zwei Paare gleicher imaginärer Wurzeln, wenn

$$D = 0, \quad a > 0, \quad a^2 - 4c = 0. \quad (9)$$

Ist aber α von β verschieden, so muss γ reell sein und (7) zeigt, dass, wenn α und β reell sind, a negativ und $a^2 - 4c$ positiv ist, dass dagegen, wenn α und β conjugirt imaginär sind, entweder a positiv oder $a^2 - 4c$ negativ sein muss, da in diesem Falle $(\alpha - \beta)^2$ negativ ist, und wenn $2(\alpha + \beta)^2 + (\alpha - \beta)^2$ positiv ist, jedenfalls auch $8(\alpha + \beta)^2 + (\alpha - \beta)^2$ positiv sein muss.

Wir können also (6) dahin ergänzen, dass wir sagen:

Die nothwendige und hinreichende Bedingung für die Existenz von vier reellen Wurzeln, von denen auch zwei (aber nicht mehr) einander gleich sein können, ist

$$D \geq 0, \quad a < 0, \quad a^2 - 4c > 0. \quad (10)$$

Die nothwendige und hinreichende Bedingung für drei gleiche Wurzeln, die nothwendig alle reell sind, ist nach (2)

$$u^2 = v^2 = w^2,$$

es muss also die cubische Resolvente (3) drei gleiche Wurzeln haben, und dafür sind nach § 77 (1) die nothwendigen und hinreichenden Bedingungen

$$a^2 + 12c = 0, \quad 2a^3 - 8ac + 9b^2 = 0. \quad (11)$$

Nach § 47, (15), (16) sind die beiden Invarianten A und B der biquadratischen Gleichung

$$A = a^2 + 12c, \quad B = 2a^3 - 72ac + 27b^2.$$

Also können wir die Gleichungen (11) auch so schreiben

$$A = 0, \quad B + 4aA = 0,$$

so dass (11) gleichbedeutend ist mit

$$A = 0, \quad B = 0.$$

Durch Elimination von c kann man aus (11) auch noch die Gleichung ableiten:

$$8a^3 + 27b^2 = 0. \quad (12)$$

Endlich ist noch die Bedingung für die Gleichheit aller vier Wurzeln

$$a = 0, \quad b = 0, \quad c = 0. \quad (13)$$

Man kann diese Verhältnisse sehr anschaulich machen durch eine geometrische Deutung, und wenn auch geometrische Betrachtungen nicht eigentlich in unserem Plane liegen, so wollen wir doch nicht unterlassen, den Leser darauf gelegentlich hinzuweisen.

Deutet man a, b, c als rechtwinklige Coordinaten im Raume, so ist jeder Raumpunkt als Träger einer gewissen biquadratischen Gleichung von der Form (1), $f(x) = 0$, zu betrachten; alle Gleichungen, die eine bestimmte Zahl x zur Wurzel haben, werden durch Punkte einer Ebene $[f(x) = 0]$ repräsentirt. Die Gleichung $D = 0$ ist die Gleichung einer krummen Oberfläche (fünften Grades), der Discriminantenfläche, die von den Schnittlinien der Ebenen $f(x) = 0$, $f'(x) = 0$ erzeugt wird, und also eine abwickelbare Fläche ist. Sie ist die Einhüllende aller Ebenen $f(x) = 0$.

Die Fläche hat eine aus zwei Zweigen bestehende Rückkehrkante, die durch die Gleichungen (11), (12) dargestellt ist, und eine Doppellinie, die durch die Gleichungen $b = 0$, $a^2 - 4c = 0$ bestimmt ist und also die Gestalt einer Parabel hat. Auf der Seite der negativen a durchsetzt sich in dieser Parabel die Fläche selbst. Auf der Seite der positiven a setzt sich die Parabel als isolirte Linie fort.

Die Discriminantenfläche theilt den ganzen Raum in drei Fächer, von denen zwei nur längs der Doppelparabel zusammenhängen, und diese Fächer enthalten die Punkte, denen keine, zwei und vier reelle Wurzeln entsprechen. Nennen wir für den Augenblick diese drei Fächer $[0]$, $[2]$, $[4]$, so grenzt $[0]$ an $[4]$ nur längs der Doppelparabel, während $[0]$ sowohl als $[4]$ längs der Flächentheile an $[2]$ grenzen. Wir wollen mit $[0, 2]$ und $[4, 2]$ die Grenzflächen von $[0]$, $[2]$ und von $[0]$, $[4]$ bezeichnen. Der isolirte Theil der Parabel setzt sich in das Innere von $[0]$ fort. Die Rückkehrkanten liegen auf dem Theil der Fläche, der $[4]$ von $[2]$ scheidet.

Im Coordinatenanfang stossen die drei Raumtheile und ihre Grenzflächen und Grenzlinien zusammen. Die Punkte der Flächentheile $[0, 2]$ stellen Gleichungen mit zwei gleichen und zwei imaginären Wurzeln dar, die Punkte von $[2, 4]$ Gleichungen mit zwei gleichen und zwei davon verschiedenen reellen Wurzeln.

Auf der Doppelparabel finden zweimal zwei gleiche Wurzeln statt, und zwar auf dem Theil, in dem $[0]$ an $[4]$ grenzt, reelle, in dem isolirten Theil imaginäre.




Fig. 5.

Die Punkte der Rückkehranten repräsentiren Gleichungen mit drei gleichen Wurzeln und der Coordinaten-Anfangspunkt die Gleichung mit vier gleichen Wurzeln.

Auf die Discriminantenfläche und ihre Bedeutung für die Discussion der biquadratischen Gleichung hat zuerst Kronecker hingewiesen. Ein Modell der Fläche ist von Kerschensteiner construiert.

Der analytische Ausdruck für die Bedingungen der Realität der Wurzeln lässt sich in eine Gestalt bringen, in der nur die Covarianten der biquadratischen Form vorkommen.

Den Ausgangspunkt dazu bilden die Ausdrücke für die Functionen ψ_1, ψ_2, ψ_3 , die § 66, (6) gegeben sind. Wenn wir in jenen Ausdrücken α mit β vertauschen, so gehen ψ_1, ψ_2, ψ_3 in $\psi_1, -\psi_3, -\psi_2$ über, und wenn wir gleichzeitig α mit β und γ mit δ vertauschen, ψ_1, ψ_2, ψ_3 in $\psi_1, -\psi_2, -\psi_3$. Daraus ergibt sich Folgendes:

Setzt man für die Variable x einen beliebigen reellen Werth und sind die Wurzeln $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ der biquadratischen Form alle reell, so sind auch ψ_1, ψ_2, ψ_3 reell.

Sind α, β conjugirt imaginär, γ, δ reell, so ist die Vertauschung von α und β gleichbedeutend mit der Vertauschung von i mit $-i$. Es sind also in diesem Falle ψ_1 reell, ψ_2, ψ_3 conjugirt imaginär.

Sind endlich α, β und γ, δ zwei Paare conjugirt imaginärer Wurzeln, so werden α mit β und γ mit δ vertauscht, wenn i in $-i$ übergeht; also sind in diesem Falle ψ_1 reell, ψ_2, ψ_3 rein imaginär.

Sind vier Wurzeln reell, so werden $\psi_1^2, \psi_2^2, \psi_3^2$ reell und positiv. Sind zwei Wurzeln reell, so ist ψ_1^2 reell und positiv, ψ_2^2, ψ_3^2 sind conjugirt imaginär. Sind vier Wurzeln imaginär, so ist ψ_1^2 positiv, ψ_2^2, ψ_3^2 sind reell und negativ.

Nun haben wir im § 66, (7) die cubische Gleichung aufgestellt, deren Wurzeln $\psi_1^2, \psi_2^2, \psi_3^2$ sind, und haben auch ihre Discriminante gebildet. Im vorigen Paragraphen haben wir ein Kennzeichen für die Anzahl der positiven Wurzeln einer cubischen Gleichung kennen gelernt, woraus sich folgendes Resultat ergibt:

Ist $D < 0$, so hat die biquadratische Gleichung zwei reelle und zwei imaginäre Wurzeln.

Ist $D > 0$, so müssen, wenn vier reelle Wurzeln vorhanden sein sollen, in der Reihe

$$1, \quad H, \quad H^2 - 16Af^2, \quad -I^2$$

drei Zeichenwechsel vorkommen, d. h. es muss

$$H < 0, \quad H^2 - 16Af^2 > 0$$

sein. Bei den drei anderen noch möglichen Zeichencombinationen sind alle vier Wurzeln imaginär. Hierbei aber kann für x ein beliebiger reeller Werth gesetzt werden.

§ 79. Die Bezoutiante und ihre Bedeutung für die Wurzelrealität

Für die Untersuchung der Realität der Wurzeln einer beliebigen reellen Gleichung in allgemeineren Fällen kann die Function mit Nutzen angewandt werden, die wir im § 73 als Bezoutiante der Gleichung bezeichnet haben.

Ist

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n = 0 \quad (1)$$

irgend eine reelle Gleichung n ten Grades, so war die Bezoutiante folgendermaassen definirt. Man setze

$$y = t_{n-1}f_0(x) + t_{n-2}f_1(x) + \cdots + t_0f_{n-1}(x), \quad (2)$$

worin die $t_0, t_1, \dots, t_{n-1}$ unbestimmte Variable bedeuten und

$$f_0(x) = 1, \quad f_1(x) = x + a_1, \quad f_2(x) = x^2 + a_1x + a_2, \quad \dots$$

Es ist dann [§ 73, (10)]

$$S(y^2) = \frac{1}{n}[S(y)]^2 + B, \quad (3)$$

wo B eine quadratische Form der $n - 1$ Variablen $t_0, t_1, \dots, t_{n-2}$ ist mit Coefficienten, die rational aus den Coefficienten a_i zusammengesetzt sind. Diese Function B haben wir als Bezoutiante definirt und für die Fälle $n = 4$ und $n = 5$ wirklich gebildet.

Nun sind in der Summe auf der linken Seite von (3)

$$y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 \quad (4)$$

die $y_1, y_2, \dots, y_n$ lineare Functionen der Variablen $t_0, t_1, \dots, t_{n-1}$, und wir haben also in der Formel (3) eine Transformation der quadratischen Form

$$\frac{1}{n}[S(y)]^2 + B = \Phi(t_0, t_1, \dots, t_{n-1}) \quad (5)$$

auf eine Summe von n Quadraten.

Wir machen fürs erste keinerlei beschränkende Voraussetzungen über Gleichheit oder Verschiedenheit der Wurzeln von $f(x)$ und müssen nun zunächst untersuchen, inwieweit die linearen Functionen $y_1, y_2, \dots, y_n$ von einander unabhängig sind. In dieser Beziehung gilt der Satz:

Sind $x_1, x_2, \dots, x_\nu$ von einander verschiedene Wurzeln der Gleichung (1), so sind $y_1, y_2, \dots, y_\nu$ linear unabhängig.

Denn angenommen, es existire zwischen $y_1, y_2, \dots, y_\nu$ eine in Bezug auf t identische lineare Relation

$$\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_\nu y_\nu = 0,$$

deren Coefficienten α von den t unabhängig und nicht alle gleich Null sind, so würde diese in die folgenden Gleichungen zerfallen

$$\begin{aligned} \alpha_1 f_0(x_1) + \alpha_2 f_0(x_2) + \dots + \alpha_\nu f_0(x_\nu) &= 0, \\ \alpha_1 f_1(x_1) + \alpha_2 f_1(x_2) + \dots + \alpha_\nu f_1(x_\nu) &= 0, \\ &\dots \\ \alpha_1 f_{n-1}(x_1) + \alpha_2 f_{n-1}(x_2) + \dots + \alpha_\nu f_{n-1}(x_\nu) &= 0. \end{aligned}$$

Da nun $\nu \leq n$ ist, so muss die Determinante der ν ersten von diesen Gleichungen verschwinden, also

$$\begin{vmatrix} f_0(x_1) & f_1(x_1) & \dots & f_{\nu-1}(x_1) \\ f_0(x_2) & f_1(x_2) & \dots & f_{\nu-1}(x_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_0(x_\nu) & f_1(x_\nu) & \dots & f_{\nu-1}(x_\nu) \end{vmatrix} = 0,$$

oder

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 + a_1 & x_1^2 + a_1 x_1 + a_2 & \dots \\ 1 & x_2 + a_1 & x_2^2 + a_1 x_2 + a_2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ 1 & x_\nu + a_1 & x_\nu^2 + a_1 x_\nu + a_2 & \dots \end{vmatrix} = 0.$$

Diese Determinante lässt sich aber durch wiederholte Anwendung des Satzes von der Addition der Columnen § 22, (VII) auf die Form bringen

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{\nu-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{\nu-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_\nu & x_\nu^2 & \dots & x_\nu^{\nu-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq r < s \leq \nu} (x_r - x_s),$$

und kann also nicht verschwinden, wenn, wie vorausgesetzt war, die $x_1, x_2, \dots, x_\nu$ verschieden sind.

Wenn wir daher in der Summe (4) alle unter einander gleichen Glieder zusammenfassen, so bleiben so viele Quadrate linear unabhängiger Functionen übrig, als die Gleichung (1) verschiedene Wurzeln hat.

Wenn nun x_1 eine reelle Wurzel von (1) ist, so ist y_1^2 ein positives Quadrat in der Summe (4). Sind aber x_1 und x_2 conjugirt imaginär, so zerfallen auch y_1 und y_2 in zwei conjugirt imaginäre Bestandtheile

$$y_1 = u + vi, \quad y_2 = u - vi,$$

wo u und v lineare reelle Functionen von den t sind. Demnach wird

$$y_1^2 + y_2^2 = 2u^2 - 2v^2.$$

Es ist also durch (4) die durch (5) definirte Function $\Phi(t)$ in eine Summe von Quadraten zerlegt, deren Anzahl gleich der Zahl der verschiedenen Wurzeln von $f(x) = 0$ ist, und unter denen so viele negative sind, als unter diesen von einander verschiedenen Wurzeln Paare imaginärer Wurzeln vorkommen.

Diese Anzahlen bleiben aber nach dem Trägheitsgesetz der quadratischen Formen (§ 58) bei jeder anderen linearen reellen Transformation der quadratischen Form in eine Summe von Quadraten dieselben. Nun ist $S(y)$ eine reelle lineare Function der t , und B enthält die Variable t_{n-1} nicht mehr; hiernach ergibt sich aus der Formel (5) der Satz:

I. Wenn die Bezoutiante B durch reelle lineare Transformation in eine Summe von π positiven und ν negativen Quadraten, die nicht auf eine kleinere Zahl reducirt werden können, zerlegt ist, so ist $\pi + \nu + 1$ die Zahl der verschiedenen Wurzeln von $f(x) = 0$; und ν ist die Anzahl der darunter enthaltenen Paare conjugirt imaginärer Wurzeln, $\pi - \nu + 1$ die der reellen.

Ist die Determinante von B , also auch die Discriminante von $f(x)$ (§ 73) von Null verschieden, so ist $\pi + \nu + 1 = n$ und ν ist kleiner oder höchstens gleich $\frac{1}{2}n$.

Die Bezoutiante ist also eine quadratische Form von einer besonderen Natur, die sich eben darin ausspricht, dass unter den Quadraten, in die sie sich zerlegen lässt, höchstens $\frac{1}{2}n$ negative vorkommen können.

§ 80. Die Trägheit der Formen zweiten Grades

Durch den Satz des vorigen Paragraphen sind wir auf die Untersuchung der homogenen Functionen zweiten Grades mit reellen Coefficienten hingewiesen. Ueber diese Functionen haben wir in § 58 unter dem Namen des Trägheitsgesetzes einen Satz kennen gelernt, der für das Folgende die Grundlage bildet. Der Satz bestand darin, dass, wie man auch eine quadratische Form von m Veränderlichen in eine Summe von positiven und negativen Quadraten von linear unabhängigen linearen Functionen transformiren mag, was auf unendlich viele verschiedene Arten möglich ist, die Anzahl der positiven und ebenso die der negativen Quadrate immer dieselbe ist.

Bezeichnen wir mit π die Anzahl der positiven und mit ν die Anzahl der negativen Quadrate, so ist $\pi + \nu$ höchstens gleich m .

Wenn wir den Unterschied $m - \pi - \nu$ mit ρ bezeichnen, so kann, wenn wir die allgemeine quadratische Form von m Variablen als Summe von m Quadraten darstellen, ρ als die Anzahl der Quadrate mit verschwindenden Coefficienten bezeichnet werden.

Die drei Zahlen π, ν, ρ , von denen keine negativ sein kann und deren Summe gleich der Anzahl der Variablen ist,

$$\pi + \nu + \rho = m, \tag{1}$$

sind also für eine bestimmte quadratische Form unveränderlich.

Wir haben nach Mitteln zu suchen, um aus den Coefficienten der quadratischen Form die Zahlen π, ν, ρ zu ermitteln. Wenden wir diese Mittel auf die Bezoutiante an, so erhalten wir Kennzeichen, um aus den Coefficienten einer Gleichung auf die Anzahl ihrer reellen Wurzeln zu schliessen.

Es sei also jetzt, wie in § 56,

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \sum_1^m a_{i,k} x_i x_k, \quad a_{i,k} = a_{k,i}, \tag{2}$$

eine quadratische Form von m Veränderlichen mit reellen Coefficienten $a_{i,k}$.

Die Determinante

$$R = \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{m,m} \quad (3)$$

zeigt durch ihr Verschwinden an, dass φ durch lineare Transformation in eine Function von weniger als m Variablen transformirt werden kann, dass also ρ grösser als Null ist.

Die Determinante R ist eine symmetrische Determinante. Unter ihren Unterdeterminanten verschiedener Ordnung kommen gewisse vor, die wieder symmetrische Determinanten sind, nämlich die, die man aus R erhält, wenn man Zeilen und Columnen, die sich in Diagonalgliedern schneiden, austreicht, die also, wenn $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ irgend welche unter den Indices $1, 2, \dots, m$ bedeuten, durch

$$\sum \pm a_{\alpha,\alpha} a_{\beta,\beta} a_{\gamma,\gamma} \cdots \quad (4)$$

zu bezeichnen sind. Diese wollen wir die Haupt-Unterdeterminanten von R nennen.

Wir wollen die Anzahl der Haupt-Unterdeterminanten bestimmen.

Die Anzahl der μ -reihigen Haupt-Unterdeterminanten ist gleich der Anzahl der Arten, wie man aus der Reihe der Indices $1, 2, 3, \dots, m$ Gruppen von μ verschiedenen auswählen kann, also gleich der Anzahl der Combinationen von m Elementen zu je μ , und diese Zahl ist gleich dem Binomialcoefficienten B_μ^m . Die Anzahl aller Haupt-Unterdeterminanten ist also, wenn wir die Determinante R selbst und ausserdem noch die Einheit als eine nullreihige Determinante mitzählen,

$$1 + m + \frac{m(m-1)}{1 \cdot 2} + \cdots + m + 1 = 2^m.$$

Es ist aber meist nur ein kleiner Theil von diesen wirklich zu berücksichtigen.

Die Indices $1, 2, 3, \dots, m$ lassen sich auf $\Pi(m) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m$ verschiedene Arten anordnen; wenn wir mit irgend einer dieser Anordnungen die Determinante bilden

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & \cdots & a_{2,m} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & \cdots & a_{3,m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & a_{m,3} & \cdots & a_{m,m} \end{vmatrix},$$

so lässt sich eine Reihe von Haupt-Unterdeterminanten daraus ableiten, wie es durch die Striche angedeutet ist, d. h. so, dass man jede vorhergehende aus der nachfolgenden erhält, indem man die letzte Zeile und Columnen weglässt; es ist also

$$R_0 = 1, \quad R_1 = a_{1,1}, \quad R_2 = a_{1,1} a_{2,2} - a_{1,2}^2,$$

$$R_3 = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{vmatrix}, \quad \dots, \quad R_m = R.$$

Ein solches System soll, wenn es in absteigender Reihe

$$R_m, R_{m-1}, \dots, R_1, R_0$$

geordnet ist, eine Kette von Haupt-Unterdeterminanten heissen. Solcher Ketten lassen sich $\Pi(m)$ verschiedene bilden, in denen allen das erste Glied R , das letzte Glied 1 ist.

§ 81. Quadratische Formen mit verschwindender Determinante

Wenn die in (3), § 80 definirte Determinante R der quadratischen Form $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m)$ verschwindet, so lässt sich, wie wir schon im § 57 gesehen haben, φ durch weniger als m von einander

unabhängige lineare Functionen von x ausdrücken. Wenn wir mit $m - \rho$ die kleinste Zahl von Variablen bezeichnen, durch die sich φ ausdrücken lässt, so hat ρ dieselbe Bedeutung, wie im vorigen Paragraphen.

Wenn sich nun unter den Haupt-Unterdeterminanten von R eine k -reihige findet, die von Null verschieden ist, etwa

$$R_k = \sum \pm a_{1,1} a_{2,2} \cdots a_{k,k},$$

so ist, wenn wir

$$x_{k+1} = 0, \quad x_{k+2} = 0, \quad \dots \quad x_m = 0$$

setzen,

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_k, 0, 0, 0)$$

eine quadratische Form von k Variablen $x_1, x_2, \dots, x_k$, deren Determinante R_k von Null verschieden ist, die sich sonach nicht durch weniger als k Variable ausdrücken lässt. Um so weniger kann also bei unbeschränkt veränderlichen $x_1, x_2, \dots, x_m$ die Function φ von weniger als k Variablen abhängen, und es folgt

$$\rho \leq m - k. \quad (1)$$

Wir nehmen nun an, die Form $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m)$ lasse sich durch k von einander unabhängige lineare Formen von x ausdrücken, die wir mit

$$\begin{aligned} \xi_1 &= \beta_1^{(1)} x_1 + \beta_2^{(1)} x_2 + \cdots + \beta_k^{(1)} x_k + \beta_{k+1}^{(1)} x_{k+1} + \cdots + \beta_m^{(1)} x_m, \\ &\dots \\ \xi_k &= \beta_1^{(k)} x_1 + \beta_2^{(k)} x_2 + \cdots + \beta_k^{(k)} x_k + \beta_{k+1}^{(k)} x_{k+1} + \cdots + \beta_m^{(k)} x_m \end{aligned} \quad (2)$$

bezeichnen wollen.

Da $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ von einander linear unabhängig sein sollen, so muss unter den aus der Matrix

$$\begin{array}{cccc} \beta_1^{(1)} & \beta_2^{(1)} & \cdots & \beta_m^{(1)} \\ \dots & \dots & & \dots \\ \beta_1^{(k)} & \beta_2^{(k)} & \cdots & \beta_m^{(k)} \end{array}$$

zu bildenden k -reihigen Determinanten wenigstens eine von Null verschieden sein. Denn wären sie alle gleich Null, so liessen sich die Unbekannten $h_1, h_2, \dots, h_k$, die nicht alle verschwinden sollen, aus den Gleichungen

$$h_1 \beta_s^{(1)} + h_2 \beta_s^{(2)} + \cdots + h_k \beta_s^{(k)} = 0, \quad s = 1, 2, 3, \dots, m,$$

bestimmen (§ 24), und die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ würden einer Gleichung

$$h_1 \xi_1 + h_2 \xi_2 + \cdots + h_k \xi_k = 0$$

genügen, also nicht unabhängig sein.

Wir können aber, ohne die Allgemeinheit zu beschränken, annehmen, dass die Determinante

$$\sum \pm \beta_1^{(1)} \beta_2^{(2)} \cdots \beta_k^{(k)}$$

von Null verschieden sei, und dann können wir die Gleichungen (2) in Bezug auf die Variablen $x_1, x_2, \dots, x_k$ auflösen.

Diesen Auflösungen geben wir die Form

$$\begin{aligned} x_1 &= y_1 + \alpha_{k+1}^{(1)} x_{k+1} + \cdots + \alpha_m^{(1)} x_m, \\ x_2 &= y_2 + \alpha_{k+1}^{(2)} x_{k+1} + \cdots + \alpha_m^{(2)} x_m, \\ &\dots \\ x_k &= y_k + \alpha_{k+1}^{(k)} x_{k+1} + \cdots + \alpha_m^{(k)} x_m, \end{aligned} \quad (3)$$

worin die y_s lineare homogene Verbindungen der ξ_s sind, die aus den Gleichungen

$$\begin{aligned}\beta_1^{(1)}y_1 + \beta_2^{(1)}y_2 + \cdots + \beta_k^{(1)}y_k &= \xi_1, \\ \beta_1^{(2)}y_1 + \beta_2^{(2)}y_2 + \cdots + \beta_k^{(2)}y_k &= \xi_2, \\ &\dots \\ \beta_1^{(k)}y_1 + \beta_2^{(k)}y_2 + \cdots + \beta_k^{(k)}y_k &= \xi_k\end{aligned}$$

bestimmt werden, während die α neue Coefficienten sind, die in einer leicht zu übersehenden Weise aus den β abgeleitet werden, auf deren Bildung es uns hier nicht weiter ankommt.

Nun lässt sich nach der Voraussetzung die Function $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m)$ durch $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$, also auch durch $y_1, y_2, \dots, y_k$ allein ausdrücken. Bezeichnen wir diesen Ausdruck mit $\Phi(y_1, y_2, \dots, y_k)$, so haben wir durch Vermittelung von (3) die Identität

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_k, x_{k+1}, \dots, x_m) = \Phi(y_1, y_2, \dots, y_k), \quad (4)$$

und wenn wir darin $x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_m = 0$ setzen,

$$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_k) = \varphi(x_1, x_2, \dots, x_k, 0, 0, \dots, 0), \quad (5)$$

wodurch, da es auf die Bezeichnung der Variablen nicht ankommt, Φ vollständig bestimmt ist; wir können daher setzen

$$\begin{aligned}\Phi(y_1, y_2, \dots, y_k) &= \varphi(y_1, y_2, \dots, y_k, 0, 0, \dots, 0) \\ &= \varphi(x_1, x_2, \dots, x_m)',\end{aligned} \quad (6)$$

Φ entsteht also aus φ dadurch, dass man die $m - k$ letzten Variablen (bei der hier gewählten Anordnung) gleich Null setzt:

$$\Phi(x_1, \dots, x_k) = \sum_1^k a_{r,s} x_r x_s. \quad (7)$$

Die Determinante von Φ ist eine der Haupt-Unterdeterminanten von R , und zwar erhält man sie, indem man in R die $m - k$ letzten Zeilen und Columnen wegstreicht.

Nehmen wir an, dass φ sich nicht durch noch weniger als k Variable ausdrücken lässt, dass also $k = m - \rho$ sei, so kann die Determinante dieser Function Φ nicht verschwinden.

Hieraus und aus dem zuvor Bewiesenen ergibt sich nun der Satz:

II. Wenn alle Haupt-Unterdeterminanten von R von mehr als k Reihen verschwinden, während unter den Haupt-Unterdeterminanten von k Reihen wenigstens eine von Null verschieden ist, so ist

$$\rho = m - k.$$

Denn aus (7) folgt, dass, wenn $\rho = m - k$ ist, wenigstens eine k -reihige Haupt-Unterdeterminante von Null verschieden sein muss, und aus (1), dass, wenn auch noch eine Haupt-Unterdeterminante von mehr als k Reihen von Null verschieden ist,

$$\rho < m - k$$

ist.

Sind π, ν, ρ die Anzahl der positiven, negativen, verschwindenden Quadrate, in die sich φ zerlegen lässt, so sind π, ν die Anzahlen der positiven und negativen Quadrate, in die sich die durch (7) bestimmte Form Φ zerlegen lässt, und die Bestimmung der Zahlen π, ν braucht also nur noch für letztere Function, deren Determinante von Null verschieden ist, durchgeführt zu werden.

§ 82. Quadratische Formen mit nicht verschwindender Determinante

Bei der Untersuchung der Formen $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m)$ mit nicht verschwindender Determinante machen wir von einem Determinantensatz Gebrauch, den wir am Schluss des § 28 bewiesen haben, und an den wir hier erinnern wollen.

Ist A eine Determinante von m Reihen, und sind $A_i^{(k)}$ ihre ersten, $A_{i,k}^{h,l}$ ihre zweiten Unterdeterminanten, so ist

$$A_1^{(1)} A_i^{(i)} - A_1^{(i)} A_i^{(1)} = A A_{1,i}^{1,i}. \quad (1)$$

Ist A eine von Null verschiedene symmetrische Determinante, so ist $A_1^{(i)} = A_i^{(1)}$, und wir können die Formel (1) so schreiben:

$$A_1^{(1)} A_i^{(i)} - (A_1^{(i)})^2 = A A_{1,i}^{1,i}. \quad (2)$$

Darin kann i jeden der Indices $2, 3, \dots, m$ bedeuten. Wenn $A_1^{(1)} = 0$ und $A_{1,i}^{1,i} = 0$ ist, so folgt hieraus, dass auch $A_1^{(i)} = 0$ sein muss, und daraus schliessen wir, dass nicht zugleich

$$A_1^{(1)}, \quad A_{1,2}^{1,2}, \quad A_{1,3}^{1,3}, \dots, A_{1,m}^{1,m}$$

verschwinden können, da sonst auch

$$A_1^{(2)}, \quad A_1^{(3)}, \dots, A_1^{(m)},$$

also auch, gegen die Voraussetzung, A verschwinden würde (§ 22).

Wenden wir dies auf die jetzt von Null verschieden angenommene Determinante $R = R_m$ unserer Function φ an, so folgt, dass zwar die erste Haupt-Unterdeterminante R_{m-1} , dann aber nicht alle zweiten Haupt-Unterdeterminanten R_{m-2} verschwinden können. Dieselbe Schlussweise lässt sich anwenden, wenn wir R durch ein nicht verschwindendes $R_{m-1}, R_{m-2}, \dots$ ersetzen, und wir gelangen also zu folgendem wichtigen Satz:

III. Man kann, wenn R von Null verschieden ist, die Indices $1, 2, \dots, m$ so anordnen, dass in der Kette der Haupt-Unterdeterminanten

$$R_m, R_{m-1}, \dots, R_1, R_0 \quad (3)$$

nicht zwei auf einander folgende Glieder verschwinden.

Die Determinantenrelation (2) ergibt, wenn man

$$A = R_{k+1}, \quad (k = 1, 2, \dots, m-1)$$

setzt, eine Gleichung zwischen drei auf einander folgenden Gliedern der Kette (3), die wir so schreiben können:

$$R_k S_k - T_k^2 = R_{k-1} R_{k+1}, \quad (4)$$

worin S_k und T_k gewisse Unterdeterminanten von R , also ganze rationale Functionen der Coefficienten $a_{i,k}$ sind.

Näher bezeichnet, sind R_k, S_k, T_k erste Unterdeterminanten von R_{k+1} , und zwar ist

$$R_k = \frac{\partial R_{k+1}}{\partial a_{k+1,k+1}}, \quad S_k = \frac{\partial R_{k+1}}{\partial a_{k,k}}, \quad T_k = \frac{\partial R_{k+1}}{\partial a_{k,k+1}}.$$

Eine dem Satz (3) entsprechende Anordnung der Indices wollen wir für die Folge als gewählt voraussetzen. Dann ist, wenn R_k verschwindet, R_{k-1} und R_{k+1} von Null verschieden, und (4) zeigt, dass sie entgegengesetzte Vorzeichen haben, also:

IV. Wenn ein inneres Glied einer Kette von Haupt-Unterdeterminanten verschwindet, so haben die beiden angrenzenden Glieder entgegengesetzte Vorzeichen.

§ 83. Anzahl der positiven und negativen Quadrate

Um die Anzahl der positiven und negativen Quadrate einer Form mit nicht verschwindender Determinante zu bestimmen, nehmen wir zunächst an, dass in der Kette der Haupt-Unterdeterminanten

$$R_m, R_{m-1}, R_{m-2}, \dots, R_1, R_0 = 1$$

kein Glied verschwinde. Wir können dann den Coefficienten λ so bestimmen, dass die Determinante der Form

$$\psi = \varphi(x_1, x_2, x_3, \dots, x_m) - \lambda x_m^2 \quad (1)$$

verschwindet. Die Determinante ist nämlich

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,m} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,m} \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,m} - \lambda \end{vmatrix} = R_m - \lambda R_{m-1},$$

und sie verschwindet, wenn

$$\lambda = \frac{R_m}{R_{m-1}}$$

gesetzt wird.

Die Function ψ lässt sich dann durch $m - 1$ Variable y ausdrücken, und man erhält nach der Formel (6), § 81,

$$\psi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \psi(y_1, y_2, \dots, y_{m-1}, 0),$$

oder nach (1)

$$\varphi(x_1, x_2, \dots, x_m) = \frac{R_m}{R_{m-1}} x_m^2 + \varphi(y_1, y_2, \dots, y_{m-1}, 0), \quad (2)$$

und die Untersuchung der Function φ von m Variablen ist dadurch auf die Untersuchung von

$$\varphi_1(y) = \varphi(y_1, y_2, \dots, y_{m-1}, 0)$$

von $m - 1$ Variablen zurückgeführt, deren Determinante gleich R_{m-1} , also von Null verschieden ist. Je nachdem $R_m : R_{m-1}$ positiv oder negativ ist, wird die Function $\varphi(x)$ ein positives oder ein negatives Quadrat mehr haben als $\varphi_1(y)$.

Durch Anwendung des gleichen Verfahrens auf $\varphi_1(y)$ und die folgenden Functionen ergibt sich der Satz:

Die Anzahl der positiven und negativen Glieder der Reihe

$$\frac{R_m}{R_{m-1}}, \quad \frac{R_{m-1}}{R_{m-2}}, \quad \dots, \quad \frac{R_1}{R_0} \quad (3)$$

stimmt überein mit der Anzahl der positiven und negativen Quadrate, in die sich die Function $\varphi(x)$ zerlegen lässt.

Wir wollen diesem Satze noch einen etwas anderen Ausdruck geben, schicken aber folgende Erklärung voraus. Wenn eine Reihe von Null verschiedener reeller Zahlen in bestimmter Anordnung vorliegt, so können die Vorzeichen dieser Grössen in mannigfaltiger Weise wechseln; folgen zwei Grössen von gleichem Zeichen auf einander, so findet eine Zeichenfolge (Permanenz) statt, folgt aber auf eine Grösse eine andere von entgegengesetztem Zeichen, so haben wir einen Zeichenwechsel (Variation).

Betrachten wir nun von diesem Gesichtspunkte die Reihe der Grössen

$$R_m, R_{m-1}, R_{m-2}, \dots, R_1, R_0,$$

so findet beim Uebergang von R_k zu R_{k-1} eine Zeichenfolge oder ein Zeichenwechsel statt, je nachdem der Quotient $R_k : R_{k-1}$ positiv oder negativ ist.

Wir können also auch den folgenden Satz aussprechen:

V. Ist π die Anzahl der positiven, ν die der negativen Quadrate von φ , so ist π gleich der Anzahl der Zeichenfolgen, ν gleich der Anzahl der Zeichenwechsel in der Kette

$$R_m, R_{m-1}, R_{m-2}, \dots, R_1, R_0. \quad (4)$$

Diese Fassung des Satzes hat den Vorzug, dass sie sich auf den Fall übertragen lässt, dass in der Reihe (4) einzelne innere Glieder verschwinden, wenn nur nicht zwei auf einander folgende Glieder Null sind (was nach § 82, III. immer angenommen werden kann). Wenn nämlich $R_k = 0$, R_{k+1} und R_{k-1} von Null verschieden sind, so haben nach § 82, Satz IV, R_{k-1} und R_{k+1} verschiedene Vorzeichen. In der Reihe

$$R_{k+1}, \quad R_k, \quad R_{k-1}$$

findet also ein Zeichenwechsel und eine Zeichenfolge statt, gleichviel ob wir das verschwindende R_k durch eine positive oder eine negative Grösse ersetzen.

Wenn wir nun die Kette (4)

$$R_m, R_{m-1}, \dots, R_1, R_0,$$

in der einzelne Glieder verschwinden, durch eine andere ersetzen,

$$R'_m, R'_{m-1}, \dots, R'_1, R'_0, \quad (5)$$

in der kein Glied verschwindet, und in der den nicht verschwindenden Gliedern der Reihe (4) Glieder von demselben Vorzeichen entsprechen, so haben die Reihen (4) und (5) gleich viele Zeichenwechsel, welches Zeichen auch die den verschwindenden R entsprechenden R' haben mögen.

Es sei nun $\psi(x)$ eine zweite beliebige quadratische Form der Variablen x , mit der wir die Form

$$\varphi' = \varphi + \varepsilon\psi \quad (6)$$

bilden, worin ε ein noch unbestimmter Coefficient ist. Wir werden nun sogleich zeigen, dass wir ε so wählen können, dass φ' und φ dieselbe Zahl von positiven und negativen Quadraten haben, dass aber in der Kette der Haupt-Unterdeterminanten R'_k der Form φ' keine verschwindenden Glieder vorkommen, und dass endlich einem nicht verschwindenden R_k ein R'_k von demselben Vorzeichen entspricht. Dann können die Zahlen π, ν für φ und für φ' sowohl aus der Reihe (4), als auch aus der Reihe (5) ermittelt werden, und die Anzahl der Zeichenwechsel, die in beiden gleich ist, giebt die Anzahl ν der negativen Quadrate.

Um nun den Nachweis zu führen, dass der Coefficient ε in der angegebenen Weise bestimmt werden kann, nehmen wir an, es sei φ irgendwie in eine Summe von Quadraten verwandelt,

$$\varphi = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_m y_m^2,$$

und ψ , in den Variablen $y_1, y_2, \dots, y_m$ dargestellt, habe den Ausdruck

$$\psi = \sum \beta_{i,k} y_i y_k.$$

Die Zahlen π, u für die Function φ' werden dann aus der Kette der Haupt-Unterdeterminanten von

$$\begin{vmatrix} \lambda_1 + \varepsilon\beta_{1,1} & \varepsilon\beta_{1,2} & \dots & \varepsilon\beta_{1,m} \\ \varepsilon\beta_{2,1} & \lambda_2 + \varepsilon\beta_{2,2} & \dots & \varepsilon\beta_{2,m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \varepsilon\beta_{m,1} & \varepsilon\beta_{m,2} & \dots & \lambda_m + \varepsilon\beta_{m,m} \end{vmatrix}$$

nach dem Satze V bestimmt.

Nun kann man aber ε so klein annehmen, dass diese Haupt-Unterdeterminanten dem Zeichen nach übereinstimmen mit

$$\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \cdots \lambda_m, \quad \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \cdots \lambda_{m-1}, \quad \dots, \quad \lambda_1 \lambda_2, \quad \lambda_1, \quad 1,$$

und dann ist die Anzahl der positiven und negativen Quadrate von φ' gleich der Anzahl der positiven und negativen unter den Coefficienten λ , von denen keiner verschwindet, d. h. die Zahlen π und ν sind für φ und φ' dieselben.

Sind nun die Coefficienten von ψ , in den ursprünglichen Variablen ausgedrückt, $b_{i,k}$, also

$$\psi = \sum b_{i,k} x_i x_k,$$

so ist eine der Haupt-Unterdeterminanten von φ'

$$R'_k = \begin{vmatrix} a_{1,1} + \varepsilon b_{1,1} & \cdots & a_{1,k} + \varepsilon b_{1,k} \\ \cdots & & \cdots \\ a_{k,1} + \varepsilon b_{k,1} & \cdots & a_{k,k} + \varepsilon b_{k,k} \end{vmatrix}$$

und ist also eine ganze rationale Function k ten Grades von ε ,

$$R'_k = R_k + \varepsilon M_1 + \varepsilon^2 M_2 + \cdots + \varepsilon^k M_k,$$

worin die $M_1, M_2, \dots, M_k$ rational von den $a_{i,k}, b_{i,k}$ abhängen. Insbesondere ist

$$M_k = \sum \pm b_{1,1} b_{2,2} \cdots b_{k,k},$$

und man kann die $b_{i,k}$ immer so annehmen, dass M_k von Null verschieden ist. Nach § 31 kann man also ε so annehmen, dass, wenn R_k von Null verschieden ist, R'_k dasselbe Zeichen hat wie R_k , und wenn R_k verschwindet, R'_k nicht verschwindet.

Wir können das hierdurch Bewiesene mit den Ergebnissen des § 81 in eine allgemeine Regel zur Bestimmung der Anzahl der negativen Quadrate, auch für den Fall verschwindender Determinante, zusammenfassen.

VI. Um die Zahlen π, ν, ρ der Function $\varphi(x)$ zu bestimmen, ordne man die Variablen $x_1, x_2, \dots, x_m$ so an, dass in der Kette der Haupt-Unterdeterminanten

$$R_m, R_{m-1}, \dots, R_1, R_0 \tag{7}$$

eine möglichst kleine Anzahl von Anfangsgliedern verschwindet, und dass von den folgenden Gliedern nicht zwei neben einander stehende verschwinden; ρ ist dann die Anzahl der verschwindenden Anfangsglieder, ν die Anzahl der Zeichenwechsel und

$$\pi = m - \nu - \rho.$$

Schliesslich sei noch bemerkt, dass man die Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe (7) auch von rechts nach links abzählen kann, d. h. dass man dieselbe Anzahl von Zeichenwechseln findet, wenn man die Reihe in umgekehrter Ordnung schreibt.

§ 84. Anwendung auf die Bezoutiante

Die genaue Discussion der Trägheit der quadratischen Formen hatte für uns nur den Zweck, die Anzahl der reellen und imaginären Wurzeln einer algebraischen Gleichung durch Abzählung der positiven und negativen Quadrate der Bezoutiante zu bestimmen. Ist n der Grad der Gleichung, so ist ihre Bezoutiante eine quadratische Form von $n - 1$ Veränderlichen, und im § 73 haben wir sie für $n = 3, 4, 5$ vollständig gebildet und die Wege kennen gelernt, wie man auch in anderen Fällen zu ihrer Berechnung gelangen kann.

Wir haben schon früher bemerkt, dass die Bezoutiante nicht eine allgemeine quadratische Form ist, sondern dass sie die besondere Eigenthümlichkeit hat, dass die Anzahl ν ihrer negativen Quadrate niemals grösser als $\frac{1}{2}n$ werden kann. Diese Eigenthümlichkeit muss in gewissen Ungleichheitsbedingungen zwischen den Coefficienten ihren Ausdruck finden, die aber zur Zeit noch nicht bekannt sind. Nur in dem Falle $n = 3$ können wir den algebraischen Charakter dieser Beschränkung vollständig angeben.

Für die cubische Gleichung

$$f(x) = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$$

ist die Bezoutiante nach § 73, (13) nichts Anderes, als die Hesse'sche Covariante

$$-\frac{2}{3}H(t_1, t_0) = -\frac{2}{3}(A_0t_1^2 + A_1t_1t_0 + A_2t_0^2).$$

Es besteht aber, wenn D die Discriminante, also

$$3D = 4A_0A_2 - A_1^2$$

ist, die Relation [§ 62, (4), (12)]

$$4H^3 + Q^2 + 27Df^2 = 0,$$

mithin, wenn wir darin $t_0 = 0$ setzen,

$$-4A_0^3 + q_0^2 + 27Da_0^2 = 0, \quad (1)$$

wenn

$$q_0 = 27a_0^2a_3 - 9a_0a_1a_2 + 2a_1^3$$

ist. Diese Relation zeigt, dass A_0 und D nicht zugleich positiv sein können, und dass also die Form $-H$ nicht in zwei negative Quadrate zerlegbar ist.

Wir wollen den allgemeinen Satz des vorigen Paragraphen noch auf die biquadratische Gleichung anwenden, die wir der Einfachheit halber in der Form

$$x^4 + ax^2 + bx + c = 0 \quad (2)$$

annehmen. Um die Coefficienten der Bezoutiante zu bilden, haben wir in den Formeln § 73, (14)

$$a_0, a_1, a_2, a_3, a_4$$

durch

$$1, 0, a, b, c$$

zu ersetzen. Wir erhalten so

$$\begin{aligned} B_{2,2} &= -2a, & B_{1,1} &= a^2 - 4c, & B_{0,0} &= -\frac{1}{4}(8ac - 3b^2), \\ B_{0,1} &= \frac{1}{2}ab, & B_{2,0} &= -4c, & B_{1,2} &= -3b. \end{aligned}$$

Wir ordnen die Determinante so an:

$$\begin{vmatrix} -2a & -3b & -4c \\ -3b & a^2 - 4c & \frac{1}{2}ab \\ -4c & \frac{1}{2}ab & -\frac{1}{4}(8ac - 3b^2) \end{vmatrix}$$

und erhalten die Kette der Haupt-Unterdeterminanten

$$D, \quad -2a^3 + 8ac - 9b^2, \quad -2a, \quad 1, \quad (3)$$

wenn D die Discriminante bedeutet, die nach § 64, (11) bestimmt ist durch

$$27D = 4(a^2 + 12c)^3 - (2a^3 - 72ac + 27b^2)^2. \quad (4)$$

Das Kennzeichen dafür, dass alle vier Wurzeln reell sind, ist hiernach

$$D > 0, \quad -2a^3 + 8ac - 9b^2 > 0, \quad -2a > 0. \quad (5)$$

Dies Kennzeichen ist scheinbar verschieden und jedenfalls weniger einfach, als das in § 78 aufgestellte

$$D > 0, \quad a < 0, \quad a^2 - 4c > 0. \quad (6)$$

Wir wollen aber nun noch nachweisen, dass beides genau dasselbe besagt.

Zunächst ist sofort zu übersehen, dass (6) erfüllt sein muss, wenn (5) erfüllt ist, denn

$$-2a(a^2 - 4c) - 9b^2$$

kann nicht positiv sein, wenn a und $a^2 - 4c$ negativ sind; um aber umgekehrt einzusehen, dass aus (6) die Bedingungen (5) folgen, müssen wir den Werth von D in Betracht ziehen.

Wir setzen zur Abkürzung

$$\alpha = -2a, \quad \beta = -6a^3 + 24ac - 27b^2, \quad \gamma = 3a^2 - 12c, \quad (7)$$

so dass die Bedingungen (5)

$$\alpha > 0, \quad \beta > 0, \quad D > 0,$$

die Bedingungen (6)

$$\alpha > 0, \quad \gamma > 0, \quad D > 0$$

lauten; dann ist nachzuweisen, dass, wenn α, γ und D positiv sind, auch β positiv sein muss. Hierzu drücken wir D in (4) nach (7) durch α, β, γ aus und erhalten

$$27D = 4(\alpha^2 - \gamma)^3 - [2\alpha(\alpha^2 - \gamma) - \beta]^2.$$

Wenn D positiv ist, so muss hiernach gewiss $\alpha^2 - \gamma$ positiv sein. Setzen wir also

$$\alpha^2 - \gamma = \delta^2,$$

so ist $\alpha^2 > \delta^2$, also, wenn δ positiv genommen wird,

$$\alpha > \delta$$

und

$$27D = 4\delta^6 - (2\alpha\delta^2 - \beta)^2.$$

Hiernach kann D bei negativem β nicht positiv sein; denn ist β negativ, so ist

$$2\alpha\delta^2 - \beta > 2\alpha\delta^2 > 2\delta^3,$$

also $4\delta^6 - (2\alpha\delta^2 - \beta)^2$ negativ.

Es ist hiermit direct nachgewiesen, dass die Kriterien (5) und (6) genau dasselbe besagen.

Nach der im § 78 gegebenen geometrischen Interpretation bedeutet $\beta = 0$ eine Fläche dritter Ordnung, die durch die Parabel $b = 0, \gamma = 0$ hindurchgeht, und die, soweit negative Werthe von a in Betracht kommen, ganz in dem Raumtheil verläuft, in dem D negativ ist.

Um für die Gleichung fünften Grades ein Beispiel vor Augen zu haben, betrachten wir die Gleichung

$$x^5 + x^2 + a = 0.$$

Wir haben also in unseren allgemeinen Ausdrücken § 73 oder auch § 74, (2), (3) zu setzen

$$a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 = 1, 0, 0, 1, 0, a,$$

und wir erhalten für die Determinante der Bezoutiante

$$\begin{vmatrix} -2a & 0 & 0 & -5a \\ 0 & \frac{6}{5} & -5a & 0 \\ 0 & -5a & 0 & -3 \\ -5a & 0 & -3 & 0 \end{vmatrix}$$

und für die Discriminante

$$D = 108a + 3125a^4.$$

Eine Kette von Haupt-Unterdeterminanten ist

$$D, \quad 50a^3, \quad \frac{-12a}{5}, \quad -2a, \quad 1. \quad (8)$$

Die Discriminante ist negativ, wenn

$$0 < -a < \sqrt[3]{\frac{108}{3125}}, \quad (9)$$

sonst positiv, besonders also für alle positiven a positiv. Man sieht, dass bei positiver Discriminante in (8) immer zwei Zeichenwechsel, bei negativer Discriminante, wo auch a negativ ist, ein Zeichenwechsel stattfindet.

Unsere Gleichung hat also, so lange a in dem Intervall (9) liegt, zwei imaginäre Wurzeln, wenn es ausserhalb dieses Intervalles liegt, vier imaginäre Wurzeln, niemals vier reelle Wurzeln.

Ein rein numerisches Beispiel bietet die der complexen Multiplication der elliptischen Functionen entnommene Gleichung

$$x^5 - x^3 - 2x^2 - 2x - 1 = 0.$$

Für die Determinante der Bezoutiante erhalten wir aus § 73

$$\begin{vmatrix} -\frac{4}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} & 5 \\ -\frac{3}{5} & \frac{4}{5} & \frac{33}{5} & 8 \\ \frac{4}{5} & \frac{33}{5} & \frac{46}{5} & 6 \\ 5 & 8 & 6 & 2 \end{vmatrix}$$

die Kette der Haupt-Unterdeterminanten

$$\frac{47^2}{5}, \quad \frac{94}{5}, \quad -1, \quad -\frac{4}{5}, \quad 1,$$

so dass die Discriminante unserer Gleichung 47^2 ist. Die Gleichung hat also zwei Paar imaginäre und eine reelle Wurzel. Das zweite Glied dieser Kette $94 : 5$ braucht man, wenn man die Discriminante kennt, nicht zu berechnen, ja es genügt schon die Kenntniss des negativen Vorzeichens im vorletzten Gliede, um die vorstehende Entscheidung über die Realität der Wurzeln zu treffen.

Achter Abschnitt.
Der Sturm'sche Lehrsatz.

§ 85. Das Sturm'sche Problem

Die im vorigen Abschnitt behandelte Frage nach der Anzahl der reellen Wurzeln einer Gleichung ist ein specieller Fall eines allgemeineren Problems, das den Gegenstand dieses Abschnittes ausmachen soll, und das die Grundlage ist für alle Methoden der genäherten numerischen Berechnung von Gleichungswurzeln.

Es handelt sich um die Frage: wie viele reelle Wurzeln einer reellen numerischen Gleichung liegen zwischen zwei gegebenen reellen Zahlwerthen a und b ?

Ist dies entschieden, so handelt es sich weiter darum, die Grenzen a, b so weit einzuengen, dass nur noch eine Wurzel der gegebenen Gleichung zwischen ihnen liegt, und sie endlich einander so weit zu nähern, dass jede von ihnen als ein genäherter Werth dieser Wurzel betrachtet werden kann.

Nehmen wir $a = -\infty, b = +\infty$, oder doch a negativ, b positiv so gross an, dass jenseits dieser Grenzen keine Wurzeln mehr liegen können, so fällt diese Aufgabe mit der im vorigen Abschnitt behandelten, die Anzahl aller reellen Wurzeln zu bestimmen, zusammen.

Wir wollen zunächst zeigen, wie sich das allgemeine Problem auf das specielle zurückführen lässt, wie also unsere jetzt aufgeworfene Frage, im Princip wenigstens, durch die Betrachtungen des vorigen Abschnittes beantwortet ist. Es möge sich zunächst darum handeln, die Anzahl der positiven Wurzeln einer Gleichung $f(x) = 0$ zu ermitteln. Setzen wir $x = y^2$, so wird jedem reellen Werth von y ein positiver Werth von x entsprechen, und umgekehrt entsprechen jedem positiven Werth von x zwei reelle, entgegengesetzte Werthe von y . Die Anzahl der positiven Wurzeln von $f(x) = 0$ ist also halb so gross, als die Anzahl der reellen Wurzeln von $f(y^2) = 0$.

Setzen wir ferner

$$y = \frac{x - a}{b - x},$$

so wird, während x von a bis b geht, y durch positive Werthe von 0 bis Unendlich gehen, und wenn wir durch diese Substitution $f(x)$ in $F(y)$ transformiren, so wird $f(x) = 0$ ebenso viele Wurzeln zwischen a und b haben, als $F(y) = 0$ positive Wurzeln hat, mithin halb so viel als $F(z^2) = 0$ reelle Wurzeln hat. Unsere Aufgabe ist also dadurch in der That auf die Ermittlung der Anzahl der reellen Wurzeln einer gewissen anderen Gleichung zurückgeführt, deren Grad doppelt so gross ist, als der Grad der gegebenen Gleichung. Diese Zurückführung des Problems giebt aber seine Lösung nicht in der einfachsten Form, und wir müssen nach einer einfacheren Beantwortung der Frage suchen.

§ 86. Die Sturm'schen Ketten

Zu einer Lösung des Problems, das wir uns im vorigen Paragraphen gestellt haben, führt uns folgende Betrachtung.

Es seien α und β irgend zwei reelle Zahlen und $\alpha < \beta$. Es sei ferner $f(x)$ eine gegebene ganze rationale Function von x , von der ermittelt werden soll, wie viele ihrer Wurzeln in dem Intervall Δ

$$\alpha < x < \beta$$

liegen. Wir nehmen an, dass α, β nicht selbst zu den Wurzeln von $f(x) = 0$ gehören, dass also $f(\alpha)$ und $f(\beta)$ von Null verschieden sind. Ausserdem wollen wir noch fürs erste annehmen, dass $f(x)$, wenigstens in dem Intervall Δ , keine mehrfache Wurzel habe, dass also für keinen Werth des Intervalls $f(x)$ und $f'(x)$ zugleich verschwinden sollen.

Wir nehmen an, dass wir auf irgend eine Weise eine Reihe von $m + 1$ stetigen Functionen herstellen können

$$f(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x), \quad (1)$$

denen folgende Eigenschaften zukommen:

1. Von den Functionen f_ν sollen im Intervall Δ nicht zwei auf einander folgende zugleich verschwinden.
2. Die letzte von ihnen, $f_m(x)$, soll im Intervall Δ überhaupt nicht verschwinden, also ein unveränderliches Zeichen behalten.
3. Wenn ein mittleres Glied, etwa $f_\nu(x)$, für irgend ein x im Intervall Δ verschwindet, so sollen für dieses x die beiden angrenzenden Functionen $f_{\nu-1}(x)$ und $f_{\nu+1}(x)$ entgegengesetztes Vorzeichen haben.
4. Wenn $f(x)$ im Intervall Δ verschwindet, so soll $f_1(x)$ für diesen Werth von x dasselbe Vorzeichen haben wie $f'(x)$.

Eine solche Functionenreihe (1) wollen wir eine Sturm'sche Kette nennen. Wie man sie bilden kann, werden wir später sehen; zunächst sollen aus der Definition Folgerungen gezogen werden.

Für jeden Werth von x , für den keine der Functionen von (1) verschwindet, hat jede dieser Functionen ein bestimmtes Vorzeichen. Wir zählen einen Zeichenwechsel, so oft beim Durchlaufen der Kette von links nach rechts auf ein positives Glied ein negatives oder auf ein negatives Glied ein positives folgt. Die Anzahl der so gezählten Zeichenwechsel (Variationen) für einen bestimmten Werth von x wollen wir mit $V(x)$ bezeichnen. Wenn ein mittleres Glied $f_\nu(x)$ verschwindet, so haben wir nach 3. beim Uebergang von $f_{\nu-1}(x)$ zu $f_{\nu+1}(x)$ einen Zeichenwechsel zu zählen.

Sind α, β zwei Werthe, für die keine der Functionen f_ν verschwindet, und lassen wir nun x stetig wachsen von α bis β , so wird eine Aenderung in der Zahl der Zeichenwechsel nur dann eintreten können, wenn eine der Functionen von (1) ihr Zeichen wechselt, also durch den Werth Null hindurchgeht (wegen der vorausgesetzten Stetigkeit).

Ist dies aber eine mittlere Function, so ändert sich die Zahl der Zeichenwechsel nicht (nach 3). Denn in

$$f_{\nu-1}, \quad f_\nu, \quad f_{\nu+1}$$

findet vor und nach dem Durchgang von f_ν durch Null immer ein Zeichenwechsel statt, weil $f_{\nu+1}$ und $f_{\nu-1}$ entgegengesetzte Zeichen haben.

Wenn aber $f(x)$ durch Null geht, so geht beim Durchgang durch x wegen 4. ein Zeichenwechsel verloren. Denn geht $f(x)$ von negativen zu positiven Werthen, so ist (vgl. § 32) $f'(x)$ und mithin $f_1(x)$ positiv und die Vorzeichen ändern sich so:

$$\begin{array}{cc} f(x) & f_1(x) \\ - & + \\ + & + \end{array}$$

und wenn $f(x)$ von positiven zu negativen Werthen übergeht, so ist $f'(x)$ und $f_1(x)$ negativ, also die Zeichen so:

$$\begin{array}{cc} f(x) & f_1(x) \\ + & - \\ - & - \end{array}$$

mithin ist in beiden Fällen ein Zeichenwechsel verloren gegangen.

Da nun $f_m(x)$ nach 2. sein Zeichen nicht wechselt, so folgt, dass $V(\alpha) - V(\beta)$ gleich der Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln von $f(x) = 0$ ist, oder:

Die Anzahl der Wurzeln von $f(x) = 0$ zwischen α und β ist gleich dem Ueberschuss der Anzahl der Zeichenwechsel der Kette für $x = \alpha$ über die Anzahl der Zeichenwechsel für $x = \beta$.

Wenn für $x = \alpha$ oder $x = \beta$ eine oder einige der mittleren Functionen von (1) verschwinden sollten, so ist es wegen 3. gleichgültig, ob wir diesen verschwindenden Werth durch einen positiven oder einen negativen ersetzen.

§ 87. Erstes Beispiel: Kugelfunctionen

Ehe wir nun zu den allgemeinen Methoden übergehen, nach denen Sturm'sche Ketten zu bilden sind, wollen wir einige Beispiele betrachten, in denen sich durch besondere Umstände solche Ketten darbieten.

Wir betrachten zunächst die sogenannten Kugelfunctionen, die in der mathematischen Physik und Mechanik vielfach gebraucht werden.

Unter Kugelfunctionen versteht man ein System ganzer rationaler Functionen von steigendem Grade, das folgendermassen definiert ist:

$$\begin{aligned} P_0(x) &= 1, \\ P_1(x) &= x, \\ P_2(x) &= \frac{3}{2} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right), \\ P_3(x) &= \frac{5}{2} \left(x^3 - \frac{3}{5}x \right), \\ &\dots \\ P_n(x) &= \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{1 \cdot 2 \cdots n} \left(x^n - \frac{n(n-1)}{2(2n-1)}x^{n-2} + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{2 \cdot 4(2n-1)(2n-3)}x^{n-4} - \dots \right). \end{aligned}$$

So ist $P_n(x)$ eine ganze rationale Function n ten Grades, und, je nachdem n gerade oder ungerade ist, nur die geraden oder nur die ungeraden Potenzen enthält. Durch Anwendung des Zeichens $\Pi(n)$ kann man den allgemeinen Ausdruck für die Kugelfunctionen auch so darstellen:

$$P_n(x) = \sum_{\mu} \frac{(-1)^{\mu}}{2^n} \frac{\Pi(2n-2\mu)x^{n-2\mu}}{\Pi(\mu)\Pi(n-2\mu)\Pi(n-\mu)}, \quad (1)$$

worin die Summe in Bezug auf μ von $\mu = 0$ an so weit zu erstrecken ist, als $n - 2\mu$ nicht negativ wird.

Zwischen diesen Functionen bestehen die folgenden Relationen, die sich nach Einsetzen des Ausdruckes (1) durch einfache Vergleichung der Coefficienten gleicher Potenzen von x verificiren lassen,

$$\begin{aligned} nP_n(x) - (2n-1)xP_{n-1}(x) + (n-1)P_{n-2}(x) &= 0, \\ P_1(x) - xP_0(x) &= 0, \end{aligned} \quad (2)$$

$$(1-x^2)P'_n(x) + nP_n(x) - nP_{n-1}(x) = 0. \quad (3)$$

Aus der letzten Gleichung folgt für $x = \pm 1$

$$\pm P_n(\pm 1) = P_{n-1}(\pm 1),$$

also

$$P_n(1) = 1, \quad P_n(-1) = (-1)^n. \quad (4)$$

Aus (2) und (3) folgt nun, dass die Functionen P_n , von einem beliebigen m an abwärts geordnet,

$$P_m, \quad P_{m-1}, \quad P_{m-2}, \dots, P_0 \quad (5)$$

in dem Intervall von -1 bis $+1$ die Eigenschaften einer Sturm'schen Kette haben. Denn wenn P_n und P_{n-1} für irgend ein x zugleich verschwänden, so müsste nach (2) auch P_{n-2} , folglich P_{n-3} etc.

bis P_0 verschwinden, was unmöglich ist, da $P_0 = 1$ ist. Demnach ist auch die Bedingung § 86, 2. für jedes beliebige Intervall befriedigt.

Ist $P_{n-1} = 0$, so ist nach (2) P_n und P_{n-2} von entgegengesetztem Vorzeichen, wie die Bedingung § 86, 3. fordert. Aus (3) folgt, dass niemals $P_n(x)$ und $P'_n(x)$ zugleich verschwinden, da sonst auch $P_{n-1}(x)$ verschwinden müsste, und endlich ergibt sich aus (3), dass, wenn $P_n(x)$ verschwindet und $-1 < x < 1$ ist, $P'_n(x)$ und $P_{n-1}(x)$ dasselbe Vorzeichen haben.

Setzen wir nun in (5) für x die Werthe $-1, +1$ ein, so folgt aus (4), dass für $x = -1$ in (5) lauter Zeichenwechsel stattfinden, für $x = +1$ gar kein Zeichenwechsel; und daraus folgt:

Die Gleichung $P_m(x) = 0$ hat m reelle Wurzeln zwischen $x = -1$ und $x = +1$, und da P_m vom m ten Grade ist, so sind dies alle Wurzeln.

Wir können aber einen noch etwas weiter gehenden Schluss ziehen. Nehmen wir ein Intervall $\Delta = (\alpha, \beta)$, in dem zwei und nicht mehr Wurzeln ξ, η von $P_m = 0$ enthalten sind, so gehen beim Uebergang von α zu β in der Kette (5) zwei Zeichenwechsel verloren. Wir nehmen α so nahe an ξ , β so nahe an η , dass $P_{m-1}(\alpha)$ mit $P_{m-1}(\xi)$ und $P_{m-1}(\beta)$ mit $P_{m-1}(\eta)$ von gleichem Vorzeichen ist. Wenn P_m beim Durchgang durch ξ vom Negativen zum Positiven geht, so geht es beim Durchgang durch η vom Positiven zum Negativen; es ist also $P'_m(\xi)$ und folglich $P_{m-1}(\xi)$ und $P_{m-1}(\alpha)$ positiv, $P'_m(\eta)$ und folglich $P_{m-1}(\eta)$ und $P_{m-1}(\beta)$ negativ, und das Umgekehrte findet statt, wenn P_m beim Durchgang durch ξ vom Positiven zum Negativen geht. Man sieht also daraus, dass beim Uebergang von α zu β in

$$P_m, \quad P_{m-1}$$

ein Zeichenwechsel verloren geht, also muss bei dem gleichen Uebergang, und folglich auch bei dem Uebergang von ξ zu η , in der Kette

$$P_{m-1}, \quad P_{m-2}, \dots, P_0$$

gleichfalls ein Zeichenwechsel verloren gehen; daraus schliessen wir auf den Satz:

Zwischen zwei auf einander folgenden Wurzeln von $P_m = 0$ liegt eine und nur eine Wurzel von $P_{m-1} = 0$.

§ 88. Zweites Beispiel

Als zweites Beispiel betrachten wir eine Gleichung, die wir der Kürze wegen die Säcular-Gleichung nennen wollen, weil die Untersuchung der säcularen Störungen der Planeten zuerst auf sie geführt hat.¹⁸ Sie ist auch sonst wohl unter diesem Namen bekannt, kommt aber auch in vielen anderen Untersuchungen vor, z. B. bei der Bestimmung der Haupttaxen einer Fläche zweiten Grades, in der Theorie der kleinen Schwingungen; ihre allgemeine analytische Bedeutung liegt darin, dass sie eine besondere, die sogenannte orthogonale Transformation einer quadratischen Form in eine Summe von Quadraten liefert. Wir wollen hier die Gleichung nehmen, wie sie vorliegt, ohne Beziehung auf irgend eine Anwendung, und wollen sie nach unseren allgemeinen Sätzen discutiren.

Es sei $a_{i,k}$, wenn i und k die Reihe der Indices $1, 2, 3, \dots, n$ durchlaufen, irgend ein System reeller Grössen und

$$a_{i,k} = a_{k,i} \tag{1}$$

vorausgesetzt. Wir betrachten die symmetrische Determinante

$$L_n(x) = \begin{vmatrix} a_{1,1} - x & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} - x & \cdots & a_{2,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} - x \end{vmatrix}, \tag{2}$$

¹⁸Laplace, Histoire de l'Académie des Sciences 1772. Von neueren Werken kann man darüber vergleichen Dziobek, Theorie der Planetenbewegung, Leipzig 1888.

die eine ganze rationale Function n ten Grades von x ist, in der x^n den Coefficienten $(-1)^n$ hat. Die Gleichung $L_n(x) = 0$ soll der Gegenstand unserer Betrachtung sein.

Wir bilden die mit abwechselnden Zeichen genommene Kette der Haupt-Unterdeterminanten

$$L_n(x), \quad -L_{n-1}(x), \quad L_{n-2}(x), \dots, \quad (-1)^{n-1}L_1(x), \quad (-1)^n, \quad (3)$$

und wollen nun nachweisen, dass, wenn wir die Voraussetzung hinzufügen, dass von den Grössen (3) keine zwei auf einander folgende zugleich verschwinden, wir eine Sturm'sche Kette vor uns haben.

Es ist dies eine einfache Folgerung aus der Formel, die wir schon im § 82 zu einem ähnlichen Zwecke benutzt haben, und die wir so darstellen können:

$$L_k S_k - T_k^2 = L_{k-1} L_{k+1}, \quad (4)$$

worin S_k und T_k ganze rationale Functionen von x sind.

Wir haben nur zu zeigen, dass die Forderungen § 86, 1. bis 4. befriedigt sind. Davon ist aber 1. in die Voraussetzung aufgenommen, 2. ist erfüllt, da das letzte Element gleich ± 1 ist. Aus der Formel (4) folgt, dass, wenn $L_k = 0$ ist, L_{k-1} und L_{k+1} entgegengesetzte Zeichen haben, dass also die Bedingung 3. erfüllt ist.

Es bleibt nur noch die Bedingung 4. übrig. Wenden wir aber die Formel (4) auf $k = n - 1$ an, so lautet sie

$$\frac{\partial L_n}{\partial a_{n,n}} \frac{\partial L_n}{\partial a_{n-1,n-1}} - \left(\frac{\partial L_n}{\partial a_{n,n-1}} \right)^2 = L_n L_{n-2},$$

und daraus folgt, dass, wenn $L_n = 0$ ist,

$$\frac{\partial L_n}{\partial a_{n,n}}, \quad \frac{\partial L_n}{\partial a_{n-1,n-1}}$$

gleiche Zeichen haben; und ebenso kann man schliessen, dass alle Haupt-Unterdeterminanten von L_n

$$\frac{\partial L_n}{\partial a_{i,i}}$$

dasselbe Zeichen haben.

Nun ist aber die Derivirte von L_n (vgl. § 22)

$$L'_n(x) = - \sum_{i=1}^n \frac{\partial L_n}{\partial a_{i,i}},$$

und hat also für einen Werth x , für den $L_n(x)$ verschwindet, das entgegengesetzte Zeichen wie L_{n-1} , was eben die Forderung 4. verlangt. Daraus folgt der Satz:

I. Sind α, β zwei reelle Werthe, $\alpha < \beta$, so ist die Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln von $L_n(x)$ gleich dem Ueberschuss der Anzahl der Zeichenwechsel der Kette (3) für $x = \alpha$ über die Anzahl der Zeichenwechsel für $x = \beta$.

Die höchste Potenz von x , die in $L_k(x)$ vorkommt, ist, wie schon oben bemerkt,

$$(-1)^k x^k,$$

und wenn der absolute Werth von x hinlänglich gross ist, so wird das Vorzeichen dieses Gliedes über das Vorzeichen von $L_k(x)$ entscheiden. Nehmen wir also für α einen genügend grossen negativen, für β einen genügend grossen positiven Werth, so finden in (3) für $x = \alpha$ lauter Zeichenwechsel, für $x = \beta$ lauter Zeichenfolgen statt. Es werden also n Wurzeln zwischen α und β liegen, und daraus folgt der Satz:

II. Die Gleichung $L_n(x) = 0$ hat lauter reelle Wurzeln.

Diese beiden Sätze sind aber nur von beschränkter Anwendbarkeit, so lange wir uns nicht von der Voraussetzung frei machen können, dass in der Kette der L_k nicht zwei auf einander folgende

Glieder zugleich verschwinden sollen. Von dieser Beschränkung können wir den Satz aber durch folgende einfache Ueberlegung befreien.

Nehmen wir an, für irgend einen Werth von x verschwinde L_k , aber nicht L_{k-1} ; wir können dann Grössen $a_{k+1,i}$, die in L_k nicht vorkommen, so bestimmen, dass L_{k+1} für diesen Werth von x nicht verschwindet; denn es kann L_{k+1} nicht identisch für alle $a_{k+1,i}$ verschwinden, weil es das Glied

$$-a_{k+1,k}^2 L_{k-1}$$

enthält [§ 23, (12)].

Hiernach können wir, wenn in der Kette

$$L_n, \quad -L_{n-1}, \quad L_{n-2}, \dots, \quad \pm L_1, \quad \mp 1 \quad (5)$$

einige auf einander folgende Glieder für irgend einen Werth von x verschwinden, durch Abänderung der $a_{i,k}$ eine andere Reihe

$$L'_n, \quad -L'_{n-1}, \quad L'_{n-2}, \dots, \quad \pm L'_1, \quad \mp 1 \quad (6)$$

ableiten, in der keine zwei auf einander folgenden Glieder für irgend einen Werth x (des Intervalles $\alpha \dots \beta$) verschwinden.

Zugleich können die $a'_{i,k}$, von denen die L' abhängen, so angenommen werden, dass sie sich von den $a_{i,k}$ um weniger als eine beliebig gegebene Grösse ω unterscheiden.

Wenn nun die Zahlen α, β so angenommen sind, dass in der Reihe (5) kein Glied für $x = \alpha$ oder $x = \beta$ verschwindet, so können wir ω so klein annehmen, dass entsprechende Glieder von (5) und (6) dasselbe Vorzeichen haben. Durch unseren Satz ist aber die Anzahl der Wurzeln von $L'_n = 0$ zwischen α und β durch die Zeichen der Reihe (6) bestimmt.

Nun lässt sich andererseits wieder ω so klein annehmen, dass die Wurzeln von $L'_n = 0$ von denen von $L_n = 0$ beliebig wenig unterschieden sind (§ 40).

Es kann zwar eine Doppelwurzel von $L_n = 0$ in zwei einfache Wurzeln von $L'_n = 0$ übergehen; aber da $L'_n = 0$ keine imaginären Wurzeln hat, so sind diese reell; und dasselbe findet statt, wenn $L_n = 0$ mehrfache Wurzeln hat.

Hiernach behalten die Sätze I, II ihre Gültigkeit, wenn die Voraussetzung aufgegeben wird, dass in der Kette der L_k keine auf einander folgenden Glieder verschwinden; nur müssen die mehrfachen Wurzeln dabei nach ihrer Vielfachheit gezählt werden.

§ 89. Die Sturm'schen Functionen

Nach diesen besonderen Beispielen wenden wir uns zur Betrachtung des Verfahrens, durch das man in allen Fällen eine Sturm'sche Kette erhält.¹⁹ Die Bildungsweise dieser Functionen ist principiell ausserordentlich einfach, wenn auch in der praktischen Ausführung meist nicht durchführbar.

Wir beschränken uns hier auf die Betrachtung von Gleichungen ohne mehrfache Wurzeln, oder wir nehmen an, dass vor der Anwendung $f(x)$ von jedem gemeinschaftlichen Factor mit seiner Derivirten $f'(x)$ befreit sei.

Wenn wir dann

$$f_1(x) = f'(x) \quad (1)$$

annehmen, so ist sicher die Bedingung § 86, 4. befriedigt. Nun verfahren wir so, als ob es sich um die Aufsuchung des grössten gemeinschaftlichen Theilers von $f(x)$ und $f_1(x)$ handle, indem wir

¹⁹Sturm, Mém. sur la résolution des équations numériques. Mém. de l'Académie de Paris. Sav. étrang. VI, 1835. Auszug in Bull. de Ferussac XI, 1829.

dabei jedesmal das Vorzeichen des Restes umkehren; wir bilden also durch Division die Gleichungen

$$\begin{aligned} f &= q_1 f_1 - f_2, \\ f_1 &= q_2 f_2 - f_3, \\ &\dots \\ f_{m-2} &= q_{m-1} f_{m-1} - f_m, \end{aligned} \tag{2}$$

worin die $q_1, q_2, \dots, q_{m-1}$ und ebenso die $f_1, f_2, \dots, f_m$ ganze rationale Functionen von x sind; die Grade der Functionen $f, f_1, f_2, \dots, f_m$ nehmen ab, und man kann daher die Operation so weit fortsetzen, dass f_m constant ist, oder wenigstens in dem betrachteten Intervall nicht mehr verschwindet. Dass f_m nicht Null werden kann, ist eine Folge der Voraussetzung, dass f und f_1 ohne gemeinsamen Theiler sind.

Dass man dann in der Reihe

$$f, \quad f_1, \quad f_2, \dots, \quad f_m \tag{3}$$

wirklich eine Sturm'sche Kette hat, ergibt sich unmittelbar, wenn man die Kriterien § 86, 1. bis 4. durchgeht. Denn wenn zwei auf einander folgende der Functionen (3) zugleich verschwinden, so verschwinden nach (2) auch alle nachfolgenden, dies ist aber unmöglich, weil f_m von Null verschieden ist.

Ist aber $f_\nu(x) = 0$, so folgt aus (2)

$$f_{\nu-1}(x) = -f_{\nu+1}(x),$$

womit alle die Forderungen des § 86 befriedigt sind.

Es ist, wie sich von selbst versteht, gestattet, die Functionen der Reihe (3) mit positiven, z. B. constanten Factoren zu multipliciren, ohne dass sie aufhören, eine Sturm'sche Kette zu bilden.

Für $n = 2$ können wir demnach als die Sturm'schen Functionen folgende nehmen:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + ax + b, \\ f_1(x) &= 2x + a, \\ f_2(x) &= a^2 - 4b. \end{aligned}$$

§ 90. Hermite's Lösung des Sturm'schen Problems

Ein anderer Weg zur Lösung des Sturm'schen Problems, der zu einfacheren Resultaten führt, wenigstens was die Durchführung der Rechnung im Einzelnen betrifft, ist von Hermite eingeschlagen, der an das Trägheitsgesetz der quadratischen Formen und die Tschirnhausen-Transformation anknüpft.²⁰

Es sei

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0 \quad (1)$$

die vorgelegte Gleichung und

$$x_1, x_2, \dots, x_n \quad (2)$$

ihre Wurzeln, die wir von einander verschieden annehmen. Wir benutzen die in § 68 definirten Functionen

$$f_0(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_{n-1}(x) \quad (3)$$

und setzen wie dort, indem wir unter $t_0, t_1, \dots, t_{n-1}$ unabhängige Variable verstehen,

$$y = t_{n-1}f_0(x) + t_{n-2}f_1(x) + \cdots + t_1f_{n-2}(x) + t_0f_{n-1}(x). \quad (4)$$

Es mögen $y_1, y_2, \dots, y_n$ die Werthe sein, die y für $x = x_1, x_2, \dots, x_n$ annimmt.

Ist nun α ein beliebiger reeller Werth, so setzen wir

$$H_\alpha = (x_1 - \alpha)y_1^2 + (x_2 - \alpha)y_2^2 + \cdots + (x_n - \alpha)y_n^2. \quad (5)$$

Dies ist eine quadratische Form der n Variablen t , und wir wollen zunächst die Zahl ihrer negativen und positiven Glieder bestimmen. Ist x_1 eine reelle Wurzel, also auch y_1 reell, so ist das Quadrat $(x_1 - \alpha)y_1^2$ positiv oder negativ, je nachdem x_1 grösser oder kleiner als α ist. Bilden aber x_1, x_2 ein imaginäres Paar, so sind auch y_1, y_2 conjugirt imaginär, und

$$(x_1 - \alpha)y_1^2 + (x_2 - \alpha)y_2^2$$

zerlegt sich in ein positives und ein negatives Quadrat. Dies ergibt sich wie im § 79, wenn man

$$y_1\sqrt{x_1 - \alpha} = u + iv, \quad y_2\sqrt{x_2 - \alpha} = u - iv$$

setzt.

Daraus folgt, dass die Anzahl N_α der negativen Quadrate in H_α gleich ist der Anzahl der imaginären Paare, vermehrt um die Anzahl der reellen Wurzeln, die kleiner als α sind. Nehmen wir also eine zweite reelle Zahl $\beta > \alpha$, bilden die Function H_β und bezeichnen mit N_β die Anzahl ihrer negativen Quadrate, so ist die Differenz

$$N_\beta - N_\alpha$$

gleich der Anzahl der reellen Wurzeln zwischen α und β .

Man erhält also ein Mittel zur Bestimmung dieser Zahl, d. h. zur Lösung des Sturm'schen Problems, wenn man die Coefficienten der Function H_α als Functionen der Coefficienten von $f(x)$ und von α darstellt, und dann die Zahl N_α untersucht.

§ 91. Bestimmung der Hermite'schen Form H

Zur Bestimmung der Hermite'schen Form H können wir die Mittel anwenden, die wir im VI. Abschnitt kennen gelernt haben. Wir haben im § 72 die Formel abgeleitet:

$$yf_s = E_{0,s}f_0 + E_{1,s}f_1 + \cdots + E_{n-1,s}f_{n-1}. \quad (1)$$

²⁰Hermite, Remarques sur le théorème de M. Sturm. Comptes rendus der Pariser Akademie, T. 36 (1853).

Mit Benutzung der Relationen

$$xf_0 = f_1 - a_1, \quad xf_1 = f_2 - a_2, \quad \dots, \quad xf_{n-1} = -a_n,$$

folgt hieraus

$$xyf_s = E_{0,s}f_1 + E_{1,s}f_2 + \dots + E_{n-2,s}f_{n-1} - a_1E_{0,s} - a_2E_{1,s} - \dots - a_nE_{n-1,s}. \quad (2)$$

Wir bestimmen also noch eine Functionenreihe $E_{-1,s}$ durch die Gleichung

$$a_0E_{-1,s} + a_1E_{0,s} + a_2E_{1,s} + \dots + a_nE_{n-1,s} = 0 \quad (3)$$

und erhalten dann aus (1) und (2)

$$\begin{aligned} (x - \alpha)yf_s &= (E_{-1,s} - \alpha E_{0,s})f_0 + (E_{0,s} - \alpha E_{1,s})f_1 + \dots \\ &\quad + (E_{n-2,s} - \alpha E_{n-1,s})f_{n-1}. \end{aligned} \quad (4)$$

Die Function $E_{-1,s}$ lässt sich aber durch die Relation [§ 72, (7)]

$$a_0t_{n+s} + a_1t_{n+s-1} + \dots + a_nt_s = 0$$

ganz in der gleichen Weise ausdrücken, wie die übrigen E , so dass wir folgendes System von Formeln erhalten [§ 72, (9)]:

$$\begin{aligned} E_{-1,s} &= a_0t_{n+s} + a_1t_{n+s-1} + \dots + a_st_n = -a_{s+1}t_{n-1} - \dots - a_nt_s, \\ E_{0,s} &= a_0t_{n+s-1} + a_1t_{n+s-2} + \dots + a_st_{n-1} = -a_{s+1}t_{n-2} - \dots - a_nt_{s-1}, \\ E_{1,s} &= a_0t_{n+s-2} + a_1t_{n+s-3} + \dots + a_st_{n-2} = -a_{s+1}t_{n-3} - \dots - a_nt_{s-2}, \\ &\dots \\ E_{s-1,s} &= a_0t_n + a_1t_{n-1} + \dots + a_st_{n-s} = -a_{s+1}t_{n-s-1} - \dots - a_nt_0, \\ E_{s,s} &= a_0t_{n-1} + a_1t_{n-2} + \dots + a_st_{n-s-1}, \\ E_{s+1,s} &= a_0t_{n-2} + a_1t_{n-3} + \dots + a_st_{n-s-2}, \\ &\dots \\ E_{n-1,s} &= a_0t_s + a_1t_{s-1} + \dots + a_st_0. \end{aligned} \quad (5)$$

Führen wir ein zweites System von Variablen τ ein und setzen

$$z = \tau_{n-1}f_0 + \tau_{n-2}f_1 + \dots + \tau_0f_{n-1},$$

so ergibt sich aus (4) mit Benutzung der Formeln [§ 68, (6)]

$$S(f_s) = (n-s)a_s, otag \quad (1)$$

$$S[(x - \alpha)yz] = na_0 \sum_{s=0}^{n-1} (E_{-1,s} - \alpha E_{0,s})\tau_{n-s-1} otag \quad (2)$$

$$+ (n-1)a_1 \sum_{s=0}^{n-2} (E_{0,s} - \alpha E_{1,s})\tau_{n-s-1} otag \quad (3)$$

$$+ \dots + a_{n-1} \sum_{s=0}^0 (E_{n-2,s} - \alpha E_{n-1,s})\tau_{n-s-1}. \quad (6)$$

Dies geht geradezu in die Function H über, wenn wir $z = y$ setzen.

Nehmen wir als Beispiel den Fall $n = 3$, so ergeben sich

$$\begin{aligned} E_{-1,0} &= -a_1t_2 - a_2t_1 - a_3t_0, & E_{0,0} &= a_0t_2, \\ E_{-1,1} &= -a_2t_2 - a_3t_1, & E_{0,1} &= -a_2t_1 - a_3t_0, \\ E_{-1,2} &= -a_3t_2, & E_{0,2} &= -a_3t_1, \\ E_{1,0} &= a_0t_1, & E_{2,0} &= a_0t_0, \\ E_{1,1} &= a_0t_2 + a_1t_1, & E_{2,1} &= a_0t_1 + a_1t_0, \\ E_{1,2} &= -a_3t_0, & E_{2,2} &= a_0t_2 + a_1t_1 + a_2t_0, \end{aligned}$$

und hieraus kann man die Coefficienten der Form H nach (6) leicht berechnen:

$$\begin{aligned} H_{2,2} &= -a_0(a_1 + 3a_0\alpha), \\ H_{1,1} &= -3a_0a_3 - a_1a_2 - 2(a_1^2 - a_0a_2)\alpha, \\ H_{0,0} &= -a_2a_3 + (2a_1a_3 - a_2^2)\alpha, \\ H_{1,0} &= -2a_1a_3 + (3a_0a_3 - a_1a_2)\alpha, \\ H_{2,1} &= -2a_0(a_2 + a_1\alpha), \\ H_{0,2} &= -a_0(3a_3 + a_2\alpha). \end{aligned}$$

§ 92. Die Determinante der Hermite'schen Form

Für die Frage nach der Anzahl der negativen Quadrate der Form H ist die Kenntniss ihrer Determinante von Wichtigkeit. Diese Determinante lässt sich allgemein auf folgende Art berechnen.

Setzen wir

$$H = \sum_{i,k=0}^{n-1} h_{i,k} t_i t_k,$$

so sind die Coefficienten $h_{i,k}$, deren Determinante gebildet werden soll, durch die Formel § 91, (6) gegeben. Es ist $h_{i,k}$ der Coefficient von $t_i t_k$ in jener Formel, also

$$h_{i,k} = S((x - \alpha)f_{n-i-1}f_{n-k-1}).$$

Die Determinante aus diesen n^2 Grössen lässt sich aber nach dem Multiplicationssatz in die Form setzen

$$\Delta = \begin{vmatrix} (x_1 - \alpha)f_0(x_1) & (x_1 - \alpha)f_1(x_1) & \cdots & (x_1 - \alpha)f_{n-1}(x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (x_n - \alpha)f_0(x_n) & (x_n - \alpha)f_1(x_n) & \cdots & (x_n - \alpha)f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix} \begin{vmatrix} f_0(x_1) & \cdots & f_0(x_n) \\ f_1(x_1) & \cdots & f_1(x_n) \\ \vdots & & \vdots \\ f_{n-1}(x_1) & \cdots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}.$$

Da

$$a_0(x_1 - \alpha)(x_2 - \alpha) \cdots (x_n - \alpha) = (-1)^n f(\alpha)$$

ist, und da die noch vorkommende Determinante der $f_i(x_k)$ das Product zweier Determinanten ist, deren Quadrat gleich $a_0^{2n-2}D$ ist, wenn D die Discriminante der Function $f(x)$ bedeutet (§ 46), so ergibt sich

$$\Delta = (-1)^n a_0 f(\alpha) D. \quad (1)$$

Da nach der Voraussetzung D nicht verschwinden soll, so wird Δ nur dann verschwinden, wenn für α eine der Wurzeln von $f(x) = 0$ gesetzt wird, und dies soll auch ausgeschlossen sein.

Bezeichnen wir eine Kette von Haupt-Unterdeterminanten von Δ , mit der niedrigsten angefangen, mit

$$\Delta_1(\alpha), \Delta_2(\alpha), \dots, \Delta_n(\alpha),$$

so ist nach § 83, V. die Anzahl der Zeichenwechsel in

$$1, \Delta_1(\alpha), \Delta_2(\alpha), \dots, \Delta_n(\alpha) \quad (2)$$

gleich der Anzahl N_α der negativen Quadrate in H , und wenn wir also die entsprechende Zahl N_β in

$$1, \Delta_1(\beta), \Delta_2(\beta), \dots, \Delta_n(\beta)$$

abzählen, so ist $N_\beta - N_\alpha$ die Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln von $f(x)$.

Für die cubische Gleichung ergeben sich die Ausdrücke aus dem Schluss des vorigen Paragraphen. Wir bilden die Kette

$$a_0, \quad -H_{2,2}, \quad -\frac{H_{2,2}H_{1,1} - H_{1,2}^2}{a_0}, \quad -\Delta,$$

die offenbar dieselbe Anzahl von Zeichenwechseln hat wie (2), und erhalten so die vier Functionen

$$\begin{aligned} & a_0, \\ & -3a_0\alpha - a_1, \\ & 2a_2a_0\alpha^2 + \alpha(2a_1a_2 - 9a_0a_3 - a_1^2) - 3a_0a_3 - a_1a_2, \\ & f(\alpha)D. \end{aligned}$$

Nehmen wir zur Probe $\alpha = -\infty$, $\beta = +\infty$, so erhalten wir, wenn noch $a_0 = 1$ gesetzt wird, die Zeichenbestimmung

$$\begin{array}{cccc} 1, & +1, & a_1^2 - 3a_2, & D, \\ 1, & -1, & a_1^2 - 3a_2, & -D. \end{array}$$

Man muss bei der Abzählung beachten, dass, wenn D positiv ist, $a_1^2 - 3a_2$ nicht negativ sein kann [§ 47, (8)].

§ 93. Grundzüge der Charakteristikentheorie

Die Sturm'schen Sätze werden in ausserordentlicher Weise durch die Charakteristikentheorie von Kronecker verallgemeinert, die dasselbe Ziel wie der Sturm'sche Satz für Gleichungssysteme mit beliebig vielen Veränderlichen verfolgt. Wir beschränken uns hier auf die Betrachtung des einfachsten Falles, den wir zur Einschliessung der complexen Wurzeln einer Gleichung anwenden wollen; auch bedienen wir uns hier uneingeschränkt der geometrischen Anschauung und der Bezeichnungsweise der Differentialrechnung.²¹

Wir betrachten zunächst zwei reelle Functionen $\varphi(x, y)$, $\psi(x, y)$, und deuten die reellen Variablen x, y als rechtwinklige Coordinaten in einer Ebene. Die Gleichungen

$$\varphi(x, y) = 0, \quad \psi(x, y) = 0 \tag{1}$$

stellen dann zwei Curven dar, die wir kurz die Curve φ und die Curve ψ nennen. Wir nehmen zunächst an, diese Curven seien geschlossen und erstrecken sich nicht ins Unendliche. Wir nehmen ausserdem an, φ sei im Inneren der Curve φ negativ, im Aeusseren positiv; ebenso sei ψ im Inneren von ψ negativ, im Aeusseren positiv.

Bezeichnen wir, wie die Fig. 6 zeigt, den Winkel, den die Normale n in irgend einem Punkte von φ , in der Richtung, in der φ wächst, also nach aussen gezogen, mit der Richtung der positiven x -Axe bildet, mit ϑ , so ist, wenn $\varphi'(x)$ und $\varphi'(y)$ die partiellen Ableitungen von φ sind, und die Quadratwurzel positiv genommen ist,

$$\cos \vartheta = \frac{\varphi'(x)}{\sqrt{\varphi'(x)^2 + \varphi'(y)^2}}, \quad \sin \vartheta = \frac{\varphi'(y)}{\sqrt{\varphi'(x)^2 + \varphi'(y)^2}}.$$

Ziehen wir die Tangente t so, dass sie zu der eben bezeichneten Normale n so liegt, wie die positive y -Axe zur positiven x -Axe, und bezeichnen den Winkel, den sie mit der positiven x -Axe bildet, mit ξ , so ist

$$\cos \xi = \frac{-\varphi'(y)}{\sqrt{\varphi'(x)^2 + \varphi'(y)^2}}, \quad \sin \xi = \frac{\varphi'(x)}{\sqrt{\varphi'(x)^2 + \varphi'(y)^2}}.$$

Bezeichnen wir den Fortschritt auf φ in der Richtung t als den positiven und sind dx, dy die Projectionen dieses Fortschrittes, so sind dx und dy proportional und im Zeichen übereinstimmend mit $-\varphi'(y)$, $\varphi'(x)$; ist θ eine beliebige andere Function, so ist

$$d\theta = \theta'(x)dx + \theta'(y)dy$$

im Vorzeichen übereinstimmend mit der Functionaldeterminante

$$[\varphi, \theta] = \varphi'(x)\theta'(y) - \varphi'(y)\theta'(x). \tag{2}$$

²¹Monatsberichte der Berliner Akademie, März und August 1869, Februar 1873, Februar 1878.

Bei der üblichen Annahme über die Coordinatenrichtung ist die positive Fortschrittsrichtung die, bei der das Innere der Fläche zur Linken liegt.




Fig. 6.




Fig. 7.

Wenn nun die positive Fortschrittsrichtung auf φ an einem der Durchschnittspunkte der Curven φ, ψ in das Innere von ψ hineinführt, so ist $d\psi$, also auch die Functionaldeterminante $[\varphi, \psi]$ negativ, und im entgegengesetzten Falle positiv (Fig. 7). Wir nennen einen Schnittpunkt von φ und ψ einen Austrittspunkt $A(\varphi, \psi)$ oder einen Eintrittspunkt $E(\varphi, \psi)$, je nachdem die positive Fortschrittsrichtung von φ aus dem Inneren von ψ ins Aeussere oder vom Aeusseren ins Innere führt, und haben also den Satz:

$$\begin{array}{ll} \text{an einem } A(\varphi, \psi) & \text{ist } [\varphi, \psi] > 0, \\ \text{an einem } E(\varphi, \psi) & \text{ist } [\varphi, \psi] < 0. \end{array} \quad (4)$$

Die Anzahl der $A(\varphi, \psi)$ ist ebenso gross wie die der $E(\varphi, \psi)$; und wenn wir φ mit ψ vertauschen, so gehen die $A(\varphi, \psi)$, $E(\varphi, \psi)$ in $E(\psi, \varphi)$ und $A(\psi, \varphi)$ über.

Die zwei Functionen φ, ψ bestimmen in eindeutiger Weise einen Flächenraum, der dadurch charakterisirt ist, dass in ihm das Product $\varphi\psi$ negativ ist. Wir wollen ihn den Binnenraum (φ, ψ) oder (ψ, φ) nennen. In unserer Fig. 7 ist es die schraffierte Fläche.

§ 94. Charakteristik eines Systems von drei Functionen

Wir nehmen nun zu den beiden Functionen φ, ψ eine dritte $f(x, y)$ hinzu. Die durch die Gleichung $f = 0$ dargestellte Curve, oder die Curve f , soll gleichfalls im Endlichen geschlossen sein, und wir wollen ausserdem noch annehmen, dass sie durch keinen der Schnittpunkte von φ und ψ hindurchgeht.

Wir geben diesen drei Functionen eine bestimmte cyklische Reihenfolge

$$f, \quad \varphi, \quad \psi,$$

so dass auf ψ wieder f folgen soll, und verbinden mit dieser Reihenfolge eine bestimmte, etwa die positive Fortschrittsrichtung auf jeder der drei Curven. Wir wollen festsetzen, dass mit der umgekehrten Reihenfolge

$$f, \quad \psi, \quad \varphi$$

auf jeder der drei Curven die entgegengesetzte, also die negative Fortschrittsrichtung verbunden sei.

Wir durchlaufen nun, bei der ersten Reihenfolge, die Curve f in positivem Sinne, und achten auf die Schnittpunkte von f und φ . Ein solcher soll ein Austrittspunkt $A(f; \varphi, \psi)$ genannt werden, wenn die positive Richtung von f aus dem Inneren des Binnenraumes (φ, ψ) in das Aeussere, und ein Eintrittspunkt $E(f; \varphi, \psi)$, wenn er aus dem Aeusseren in das Innere führt.




Fig. 8.

In der Fig. 8 sind die Punkte a die Austrittspunkte, der Punkt e ein Eintrittspunkt. Die Gesamtanzahl der Ein- und Austrittspunkte stimmt überein mit der Anzahl der Schnittpunkte von f und φ , und ist also, da beide Curven geschlossen sind, eine gerade Zahl. Ist a die Anzahl der Punkte $A(f; \varphi, \psi)$, e die Anzahl der Punkte $E(f; \varphi, \psi)$, so ist also auch $e - a$ eine gerade Zahl und

$$\frac{1}{2}(e - a) = k$$

eine ganze Zahl, die nach Kronecker die Charakteristik des Functionensystems f, φ, ψ heisst. Im Falle der Fig. 8 ist sie gleich -1 .

Wenn wir die Functionen f, φ, ψ cyklich vertauschen, so erhalten wir drei Bestimmungen für die Charakteristik, und wenn wir die Reihenfolge umkehren und dabei nach der getroffenen Vereinbarung auch die positiven Richtungen durch die negativen ersetzen, drei weitere. Diese Bestimmungen sind, wenn wir jetzt die Symbole $A(f; \varphi, \psi)$, $E(f; \varphi, \psi)$ zugleich als Bezeichnung für die Anzahlen der betreffenden Punkte brauchen,

1. $\frac{1}{2} [E(f; \varphi, \psi) - A(f; \varphi, \psi)],$
2. $\frac{1}{2} [E(\varphi; \psi, f) - A(\varphi; \psi, f)],$
3. $\frac{1}{2} [E(\psi; f, \varphi) - A(\psi; f, \varphi)],$
4. $\frac{1}{2} [E(f; \psi, \varphi) - A(f; \psi, \varphi)],$
5. $\frac{1}{2} [E(\psi; \varphi, f) - A(\psi; \varphi, f)],$
6. $\frac{1}{2} [E(\varphi; f, \psi) - A(\varphi; f, \psi)].$

Es gilt nun der fundamentale Satz, dass diese sechs Bestimmungen dieselbe Zahl ergeben.

Um ihn zu beweisen, durchlaufen wir die Curve f in positivem Sinne und achten auf die sämtlichen Schnittpunkte mit φ und ψ . Der Weg längs der Curve f wird dabei ebenso oft in den Binnenraum (φ, ψ) eintreten müssen, wie er aus ihm austritt, weil er wieder in seinen Ausgangspunkt zurückkehren muss. Die Curve f tritt aber ein in den Punkten $E(f; \varphi, \psi)$ und $A(f; \psi, \varphi)$ und tritt aus in den Punkten $A(f; \varphi, \psi)$ und $E(f; \psi, \varphi)$. Also ist

$$E(f; \varphi, \psi) + A(f; \psi, \varphi) = A(f; \varphi, \psi) + E(f; \psi, \varphi),$$

wodurch die Uebereinstimmung von 1. und 4. nachgewiesen ist.




Fig. 9.

Wenn wir nun zweitens die Curve φ in negativem Sinne durchlaufen und auf ihre Schnittpunkte mit f achten, so ergibt sich, dass jeder Punkt $E(f; \varphi, \psi)$ zugleich ein Punkt $E(\varphi; f, \psi)$, und jeder Punkt $A(f; \varphi, \psi)$ ein Punkt $A(\varphi; f, \psi)$ ist. Denn in der Fig. 9, worin der Punkt a irgend einen der Schnittpunkte von f und φ darstellt, ist dieser Punkt ein $E(f; \varphi, \psi)$ und ein $E(\varphi; f, \psi)$, wenn ψ in a positiv ist, und ein $A(f; \varphi, \psi)$ und ein $A(\varphi; f, \psi)$, wenn ψ in a negativ ist.

Daraus folgt die Uebereinstimmung von 1. mit 6. Es folgt ferner durch nochmalige Anwendung des ersten Schlusses die Uebereinstimmung von 6. mit 2. und dann durch Anwendung des zweiten Schlusses die von 2. mit 5. und endlich des ersten die von 5. mit 3., also die Uebereinstimmung aller sechs Ausdrücke. Man ist daher berechtigt, die so bestimmte Zahl schlechtweg als die Charakteristik des Functionensystems (f, φ, ψ) zu bezeichnen.

§ 95. Beziehung der Charakteristik zu den Schnittpunkten

Man hat nun zu beachten, dass die Bezeichnung der Schnittpunkte zweier Curven als Ein- oder Austrittsstellen in § 93 wesentlich verschieden ist von der in § 94. Dort kam nur die Beziehung der Punkte zu den beiden sich schneidenden Curven in Betracht, während in § 94 noch die Beziehung zu einer dritten Curve in Frage kam; dies ist in den gewählten Bezeichnungen $E(\varphi, \psi)$, $A(\varphi, \psi)$ und $E(f; \varphi, \psi)$, $A(f; \varphi, \psi)$ vollständig ausgedrückt. Nun müssen wir aber genauer untersuchen, wie sich die beiden Bezeichnungsweisen zu einander verhalten.

Wir wählen der Deutlichkeit halber eine etwas einfachere Figur als oben, die zugleich alle möglichen Verhältnisse veranschaulicht (Fig. 10).




Fig. 10.

In einem Punkte $E(\varphi, \psi)$ tritt die φ -Curve in die Fläche der Curve ψ ein, d. h. es geht ψ von positiven zu negativen Werthen. Ist dann zugleich f positiv, so ist dieser Punkt ein $E(\varphi; \psi, f)$, wie der Punkt 1 in unserer Figur, ist aber f negativ, so ist es ein $A(\varphi; \psi, f)$, wie der Punkt 3. So haben wir:

Ein Punkt $E(\varphi, \psi)$ ist ein	$E(\varphi; \psi, f)$,	wenn $f > 0$,	(Punkt 1 der Fig. 10),
	$A(\varphi; \psi, f)$,	wenn $f < 0$,	(Punkt 3 der Fig. 10),
Ein Punkt $A(\varphi, \psi)$ ist ein	$E(\varphi; \psi, f)$,	wenn $f < 0$,	(Punkt 2 der Fig. 10),
	$A(\varphi; \psi, f)$,	wenn $f > 0$,	(Punkt 4 der Fig. 10).

Nun ist in den Punkten $E(\varphi, \psi)$ die Functionaldeterminante $[\varphi, \psi]$ negativ, in $A(\varphi, \psi)$ positiv (§ 93), und wir können also das Bewiesene so zusammenfassen: Es ist $E(\varphi; \psi, f)$ die Anzahl der Schnittpunkte von φ, ψ , in denen $[\varphi, \psi]f < 0$, und $A(\varphi; \psi, f)$ die Anzahl der Schnittpunkte von φ, ψ , in denen $[\varphi, \psi]f > 0$; also ist die Charakteristik gleich dem halben Ueberschuss der ersten Zahl über die zweite.

Diesem Satz können wir folgenden Ausdruck geben, wobei er von Grössenverhältnissen gänzlich unabhängig erscheint und nur von den Lagenverhältnissen der Curven und ihrer Schnittpunkte abhängt. Unterscheiden wir die Schnittpunkte von φ, ψ , je nachdem sie Austrittspunkte $A(\varphi, \psi)$ oder Eintrittspunkte $E(\varphi, \psi)$ sind, durch das Zeichen α und ε , ebenso, je nachdem sie äussere oder innere Punkte zu der Curve f sind, durch a und ϵ , geben dann den Punkten $\alpha\epsilon, \varepsilon a$ den Charakter $+1$, den Punkten αa und $\varepsilon\epsilon$ den Charakter -1 , so ist die Charakteristik des Functionensystems (f, φ, ψ) gleich der halben Summe der Charaktere der sämtlichen Schnittpunkte von φ, ψ .²²

Die Sätze und Begriffsbestimmungen, die wir hier gegeben haben, bleiben unverändert bestehen, auch wenn die betrachteten Curven aus mehreren in sich geschlossenen Zügen bestehen; auch können Doppelpunkte bei den Curven vorhanden sein; es muss nur von jeder Fortschrittsrichtung auf einer der Curven völlig bestimmt sein, ob sie als positiv oder als negativ zu betrachten ist, d. h. es muss jedes Stück einer Curve f oder φ oder ψ Flächentheile von einander trennen, in denen die Functionen f oder φ oder ψ entgegengesetzte Vorzeichen haben.

Auszuschliessen sind nur die Fälle, in denen eine der Curven durch einen Doppelpunkt der anderen hindurchgeht, oder in denen die Curven einander berühren, oder in denen die drei Curven f, φ, ψ durch einen Punkt gehen; denn in diesen Fällen würde die Bestimmung eines Punktes als

²²Kronecker versteht unter Charakter eines Punktes etwas Anderes.

Eintrittspunkt oder Austrittspunkt zweifelhaft werden. Erstrecken sich die Curven ins Unendliche, so muss man sie, um unsere Sätze anwendbar zu machen, durch willkürlich hinzugefügte Curvenstücke abschliessen, wie wir im nächsten Paragraphen sehen werden.

§ 96. Anwendung der Charakteristiken auf die Eingrenzung der complexen Wurzeln einer Gleichung

Es sei jetzt

$$z = x + yi$$

eine complexe Veränderliche und

$$F(z) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y) \quad (1)$$

eine ganze rationale Function von z mit reellen oder complexen Coefficienten, und darin $\varphi(x, y)$, $\psi(x, y)$ reelle Functionen der reellen Veränderlichen x, y . Wir setzen voraus, dass $F(z)$ und $F'(z)$ nicht zugleich verschwinden. $F(z)$ verschwindet nur in den Schnittpunkten der beiden Curven φ und ψ . Die Ableitung von (1) ergibt

$$F'(z) = \varphi'(x) + i\psi'(x) = -i\varphi'(y) + \psi'(y),$$

also

$$\psi'(y) = \varphi'(x), \quad \varphi'(y) = -\psi'(x),$$

und daher

$$[\varphi, \psi] = \varphi'(x)\psi'(y) - \varphi'(y)\psi'(x) = \varphi'(x)^2 + \varphi'(y)^2.$$

Hieraus ergibt sich, dass die Functionaldeterminante $[\varphi, \psi]$ niemals negativ wird und nur da verschwindet, wo $\varphi'(x)$ und $\varphi'(y)$, also auch $\psi'(x)$ und $\psi'(y)$ zugleich verschwinden.

Dies tritt aber nie in einem Schnittpunkte von φ und ψ ein, da sonst hier $F(z)$ und $F'(z)$ zugleich verschwinden würden. Die positive Fortschrittsrichtung ist in jedem Theil der Curve φ oder ψ völlig bestimmt durch das Vorzeichen der Function in den angrenzenden Flächentheilen; auch etwaige Doppelpunkte, in denen φ , $\varphi'(x)$ und $\varphi'(y)$ zugleich verschwinden, machen dabei keine Ausnahme.

Da die Functionaldeterminante $[\varphi, \psi]$ in allen Schnittpunkten der Curven φ, ψ positiv ist, so sind alle diese Punkte Austrittspunkte $A(\varphi, \psi)$, und daraus folgt, dass die Curven φ und ψ nicht geschlossen sein können, sondern sich ins Unendliche erstrecken müssen, da sonst auf eine Austrittsstelle nothwendig eine Eintrittsstelle folgen müsste. Im Uebrigen bestimmen auch hier die Curven φ, ψ einen Binnenraum, in dem das Product $\varphi\psi$ negativ ist.

Wir fügen nun zu den beiden Functionen φ, ψ eine dritte Function f hinzu, die, gleich Null gesetzt, eine geschlossene Curve darstellt, und bestimmen die Charakteristik des Functionensystems ganz in der früheren Weise, indem wir längs der Curve f fortschreiten:

$$k = \frac{1}{2}[E(f; \varphi, \psi) - A(f; \varphi, \psi)] = \frac{1}{2}[E(f; \psi, \varphi) - A(f; \psi, \varphi)]. \quad (1)$$

So ist z. B. in der Fig. 11 die Charakteristik $k = 2$.




Fig. 11.




Fig. 12.

Um unsere Sätze anwenden zu können, müssen wir die Curven φ, ψ irgendwie durch willkürlich hergestellte Verbindungen, die aber alle ausserhalb f verlaufen sollen, zu geschlossenen machen. Die Charakteristik dieses Systems ist dann gleichfalls durch (1) bestimmt. Als Beispiel ergänzen wir die Fig. 11 durch Fig. 12, in der diese abschliessenden Verbindungen gezeichnet sind. Die so hinzugefügten Schnittpunkte können theils Austrittspunkte $A(\varphi, \psi)$, theils Eintrittspunkte $E(\varphi, \psi)$ sein. Wir wollen ihre Anzahlen mit

$$A'(\varphi, \psi), \quad E'(\varphi, \psi)$$

bezeichnen, während $A(\varphi, \psi)$ die Zahl der ursprünglich vorhandenen Schnittpunkte bedeutet. Immer muss jetzt

$$A(\varphi, \psi) + A'(\varphi, \psi) = E'(\varphi, \psi) \quad (2)$$

sein. Wir theilen die Punkte $A(\varphi, \psi)$ in zwei Gruppen $A_a(\varphi, \psi)$, $A_\epsilon(\varphi, \psi)$, von denen die ersten ausserhalb, die anderen innerhalb von f liegen sollen. Dann haben wir folgende Charaktere der Schnittpunkte:

$$\begin{aligned} A_a(\varphi, \psi) &: -1, \\ A_\epsilon(\varphi, \psi) &: +1, \\ A'(\varphi, \psi) &: -1, \\ E'(\varphi, \psi) &: +1. \end{aligned}$$

Der doppelte Werth der Charakteristik ist dann, wenn wir der Einfachheit halber die Bezeichnung (φ, ψ) weglassen (§ 95),

$$-A_a + A_\epsilon - A' + E' = 2k; \quad (3)$$

dazu die Gleichung (2) addirt, ergibt

$$k = A_\epsilon. \quad (4)$$

D. h. die Charakteristik ist gleich der Anzahl der im Inneren von f gelegenen Schnittpunkte von φ, ψ .

Damit haben wir also ein Mittel gefunden, um die Anzahl der Wurzeln der Gleichung

$$F(z) = 0,$$

deren geometrische Bilder im Inneren einer beliebig gegebenen Curve liegen, aus der Charakteristik zu bestimmen. Die willkürlich hinzugefügten äusseren Verbindungen spielen hierbei gar keine Rolle mehr und können vollständig unterdrückt werden.

§ 97. Bestimmung der Charakteristik

Um den im Vorigen bewiesenen Satz anwendbar zu machen, müssen wir noch zeigen, wie wir die Charakteristiken wirklich bestimmen können. Denken wir uns zu diesem Zweck die Curve f so in Theilstrecken getheilt, dass in einer von ihnen nur ein Schnittpunkt mit der Curve φ oder ein Schnittpunkt mit der Curve ψ liegt, und bezeichnen wir mit a (Fig. 13) den Anfang, mit b das Ende einer solchen Strecke, mit ξ den in ihr liegenden Schnittpunkt von f mit φ , so wird der Punkt ξ ein Punkt $E(f; \varphi, \psi)$ sein, wenn das Product $\varphi\psi$ in a positiv ist, und ein Punkt $A(f; \varphi, \psi)$, wenn $\varphi\psi$ in a negativ ist; und damit ist die Möglichkeit gegeben, aus den Vorzeichen der Functionen φ, ψ in den Theilpunkten der Strecken die Charakteristik vollständig zu bestimmen.




Fig. 13.

Wie wir aber die Curve f in solche Theilstrecken eintheilen, das lehrt uns der Sturm'sche Lehrsatz. Wir denken uns zu diesem Zweck x und y als Functionen einer Variablen t dargestellt, die längs der Curve f alle reellen Werthe von $-\infty$ bis $+\infty$ (oder auch nur die Werthe eines endlichen Intervalles) durchläuft. Dadurch gehen φ und ψ auch in Functionen der Variablen t über und man hat die Lage ihrer Wurzeln nur nach dem Sturm'schen Lehrsatz zu untersuchen.

Ist z. B. wie in Fig. 14 die Curve f ein Kreis mit der Gleichung

$$(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = \rho^2,$$

so können wir setzen:

$$x - \alpha = \rho \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad y - \beta = \rho \frac{2t}{1 + t^2},$$

und t durchläuft einfach alle Werthe von $-\infty$ bis $+\infty$, während der Punkt x, y sich über den ganzen Kreis in positivem Sinne bewegt. φ und ψ gehen, mit einer geeigneten Potenz von $1 + t^2$ multiplicirt, in ganze rationale Functionen von t über, die die Anwendung des Sturm'schen Satzes gestatten.




Fig. 14.

§ 98. Gauss' erster Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra

Gauss hat für den Hauptsatz der Algebra, dass eine Gleichung n ten Grades n Wurzeln hat, drei verschiedene Beweise gegeben. Der erste von diesen, der sich in seiner Doctordissertation findet, und den er später noch weiter ausgeführt und anders dargestellt hat, beruht, wenn auch in anderer Einkleidung, auf dem Gedanken, der dem Charakteristikenbegriff zu Grunde liegt.²³ Wir schliessen daher diesen Abschnitt passend mit einer Darlegung dieses Beweises.

Es sei also $z = x + yi$ und

$$F(z) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y) \quad (1)$$

eine ganze rationale Function von z vom n ten Grade mit reellen oder complexen Coefficienten, in der z^n den Coefficienten 1 hat, also

$$F(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \cdots + a_n. \quad (2)$$

Wir setzen wieder voraus, dass $F(z)$ und $F'(z)$ keinen gemeinsamen Theiler haben, und der Beweis, dass $F(z)$ für n Werthe von z verschwindet, beruht nun darauf, dass, wenn wir für f einen Kreis von hinlänglich grossem Radius wählen, die Charakteristik des Functionensystems f, φ, ψ direct bestimmt werden kann und sich gleich n findet. Dann folgt nach § 96, dass in dem so gewählten Kreise n Punkte z liegen, in denen $F(z)$ verschwindet.

Wir bedienen uns der Polarcoordinaten, und setzen, da $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ auch complex sein können,

$$a_1 = p_1 e^{iq_1}, \quad a_2 = p_2 e^{iq_2}, \quad \dots, \quad a_n = p_n e^{iq_n}, \quad z = R e^{i\vartheta},$$

²³Gauss, *Demonstratio nova theorematum omnium functionum algebraicarum rationalium integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse* (1799); Beiträge zur Theorie der algebraischen Gleichungen (1849). Kronecker, Monatsberichte der Berliner Akademie, 21. Februar 1878.

worin $p_1, p_2, \dots, p_n$ positiv sind und die Winkel $q_1, q_2, \dots, q_n, \vartheta$ in irgend einem Intervall vom Umfang 2π gewählt werden können. Hierdurch wird

$$\begin{aligned}\varphi(x, y) &= R^n \cos n\vartheta + p_1 R^{n-1} \cos[(n-1)\vartheta + q_1] + \dots + p_n \cos q_n, \\ \psi(x, y) &= R^n \sin n\vartheta + p_1 R^{n-1} \sin[(n-1)\vartheta + q_1] + \dots + p_n \sin q_n,\end{aligned}\quad (3)$$

und wir bilden auch noch die nach ϑ genommenen Ableitungen

$$\begin{aligned}\frac{d\varphi}{d\vartheta} &= -nR^n \sin n\vartheta - (n-1)p_1 R^{n-1} \sin[(n-1)\vartheta + q_1] - \dots - p_{n-1} \sin(\vartheta + q_{n-1}), \\ \frac{d\psi}{d\vartheta} &= nR^n \cos n\vartheta + (n-1)p_1 R^{n-1} \cos[(n-1)\vartheta + q_1] + \dots + p_{n-1} \cos(\vartheta + q_{n-1}).\end{aligned}\quad (4)$$

Wir theilen jetzt die Kreisperipherie mit dem Radius R in $4n$ Theile ein von der Winkelgrösse

$$2\omega = 2\frac{\pi}{4n},$$

indem wir bei $\vartheta = -\omega$ anfangen. Die Theilpunkte sind also

$$-\omega, \quad \omega, \quad 3\omega, \quad 5\omega, \dots, (8n-3)\omega,$$

und die Intervalle mögen der Reihe nach mit $1, 2, 3, \dots, 4n$ bezeichnet sein. Die Fig. 15 zeigt diese Eintheilung für $n = 3$.




Fig. 15.

In den Intervallen

$$1, 3, 5, \dots, (4n-1)$$

ist $\cos n\vartheta$, absolut genommen, grösser als $1 : \sqrt{2}$, und abwechselnd von positivem und negativem Vorzeichen. In den Intervallen

$$2, 4, 6, \dots, 4n$$

ist $\sin n\vartheta$ absolut grösser als $1 : \sqrt{2}$ und gleichfalls abwechselnd von positivem und negativem Vorzeichen.

Man kann aber R so gross annehmen, dass in den Intervallen $1, 3, 5, \dots, (4n-1)$ das Vorzeichen von φ und $\frac{d\psi}{d\vartheta}$ mit dem von $\cos n\vartheta$, und in den Intervallen $2, 4, 6, \dots, 4n$ das Vorzeichen von ψ und $\frac{d\varphi}{d\vartheta}$ mit dem von $\sin n\vartheta$ übereinstimmt. Da also φ in den Intervallen $2, 4, 6, \dots, 4n$ sein Zeichen ändert, so muss es in jedem dieser Intervalle durch Null gehen, und da die Abgeleitete $\frac{d\varphi}{d\vartheta}$ ihr Zeichen nicht ändert, so kann es nur einmal in jedem durch Null gehen.

Ebenso ist zu schliessen, dass ψ in jedem der Intervalle $1, 3, 5, \dots, 4n-1$ einmal und nur einmal durch Null geht. Wir haben also eine Eintheilung der Kreisperipherie, wie sie im vorigen Paragraphen zur Bestimmung der Charakteristik verlangt wurde, und da in den Theilpunkten $\omega, 5\omega, 9\omega, \dots, (4n-3)\omega$ das Product $\varphi\psi$ positiv ist, so kommen auf der Kreisperipherie nur Punkte $E(f; \varphi, \psi)$ vor und ihre Anzahl ist $2n$; die Anzahl der Wurzeln von $F(z)$ ist also gleich n , was zu beweisen war.

Neunter Abschnitt.
Abschätzung der Wurzeln.

§ 99. Das Budan-Fourier'sche Theorem

Die Functionen der Sturm'schen Ketten lösen zwar vollständig und ausnahmslos das Problem der Bestimmung der Anzahl der Wurzeln einer Gleichung zwischen gegebenen Grenzen; aber ihre wirkliche Berechnung ist meist schwierig und oft unausführbar. Man kennt eine Reihe von Sätzen zur Abschätzung der Zahl der Wurzeln zwischen gegebenen Grenzen, die viel einfachere Regeln liefern, aber freilich auch die Frage nicht vollständig beantworten, sondern nur eine Maximalzahl geben, worüber die Anzahl der Wurzeln nicht hinausgehen kann. Diese Regeln sind oft für die Anwendung sehr nützlich und ausreichend, und sie dürfen daher hier nicht fehlen.

Wir betrachten zunächst ein Verfahren, das von Budan herrührt, dann aber von Fourier benutzt und erweitert wurde.²⁴ Betrachten wir an Stelle einer Sturm'schen Kette die Reihe der Ableitungen einer reellen Function $f(x)$ vom n ten Grade

$$f(x), \quad f'(x), \quad f''(x), \dots, \quad f^{(n)}(x), \quad (1)$$

worin also $f^{(n)}(x)$ eine Constante ist, die wir von Null verschieden und positiv voraussetzen. Sie ist, von einem positiven Zahlenfactor abgesehen, der Coefficient von x^n in $f(x)$.

Es seien wieder α und $\beta > \alpha$ zwei reelle Zahlen, die das Intervall (α, β) bestimmen, in dem die Anzahl der reellen Wurzeln von $f(x)$ gezählt werden sollen. Wir wollen zunächst annehmen, dass in dem Intervall (α, β) nicht zwei Glieder der Reihe (1) zugleich verschwinden, und dass für $x = \alpha$, $x = \beta$ kein Glied der Reihe verschwindet.

Lassen wir nun x von α bis β stetig wachsen, so kann in der Vorzeichenfolge der Reihe (1) nur dann eine Aenderung eintreten, wenn eine der Functionen durch Null geht. Wenn $f^{(\nu)}(x)$ für $x = \xi$ durch Null geht, so geht $f^{(\nu)}(x)$, je nachdem $f^{(\nu+1)}(\xi)$ positiv oder negativ ist, von negativen zu positiven oder von positiven zu negativen Werthen über, und es geht also zwischen $f^{(\nu)}$ und $f^{(\nu+1)}$ beim Durchgang durch ξ ein Zeichenwechsel verloren. Dies gilt auch, wenn $f^{(\nu)}$ die Function $f(x)$ selbst ist. Wenn aber $f^{(\nu)}$ eine der Derivirten ist, so geht ihr eine Function $f^{(\nu-1)}$ voran, und da $f^{(\nu-1)}$ nach Voraussetzung für $x = \xi$ nicht Null ist, und $f^{(\nu)}$ beim Durchgang durch ξ sein Zeichen wechselt, so findet zwischen $f^{(\nu-1)}$ und $f^{(\nu)}$ beim Durchgang durch ξ entweder ein Verlust oder ein Gewinn von einem Zeichenwechsel statt. Wenn also ein inneres Glied der Reihe (1) durch Null geht, so bleibt die Anzahl der Zeichenwechsel unverändert, oder es gehen zwei Zeichenwechsel verloren. Geht aber $f(x)$ selbst durch Null, so geht ein Zeichenwechsel verloren.

Daraus folgt das Theorem:

- I.** Die Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln von $f(x)$ ist höchstens so gross wie die Zahl der zwischen α und β verlorenen Zeichenwechsel, und wenn sie kleiner ist, so ist der Unterschied eine gerade Zahl.

Mit Benutzung einer Formel können wir auch sagen: Ist $V(x)$ die Anzahl der Zeichenwechsel (Variationen), die die Reihe (1) für irgend einen Werth x darbietet, so ist die Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln von $f(x)$

$$V(\alpha) - V(\beta) - 2h, \quad (2)$$

worin h eine nicht negative ganze Zahl ist.

²⁴Budan, *Nouvelle méthode pour la résolution des équations numériques*, 1803 der Pariser Akademie vorgelegt. Fourier, *Analyse des équations déterminées*. Paris 1831. Ueber das Geschichtliche dieser Frage vergleiche man Lagrange, *Traité de la résolution des équations*, Note VIII (Werke Bd. 8).

Der Beweis des Satzes I bedarf noch einer Ergänzung für den Fall, dass in der Reihe (1) mehrere auf einander folgende Glieder zugleich verschwinden. Es mögen also für einen Werth ξ von x zwischen α und β in der Reihe

$$f^{(\nu)}(x), \quad f^{(\nu+1)}(x), \dots, f^{(\nu+\mu-1)}(x), \quad f^{(\nu+\mu)}(x) \quad (3)$$

alle Glieder, mit Ausnahme des letzten, verschwinden, und das letzte $f^{(\nu+\mu)}(\xi)$ möge etwa einen positiven Werth haben. Wir grenzen um ξ zwei Intervalle δ_1, δ_2 ab, so dass alle Werthe von x im Intervall δ_1 kleiner, im Intervall δ_2 grösser als ξ sind, und nehmen diese Intervalle so klein, dass die Functionen (3) ausser in ξ darin nicht verschwinden, also auch $f^{(\nu+\mu)}(x)$ positiv bleibt. Da nun, wenn $f^{(\nu+\mu)}(x)$ positiv ist, $f^{(\nu+\mu-1)}(x)$ mit x zugleich wächst, so ist $f^{(\nu+\mu-1)}(x)$ in δ_1 negativ, in δ_2 positiv. Daraus folgt, dass $f^{(\nu+\mu-2)}(x)$ in δ_1 abnimmt, in δ_2 wächst, also in beiden Intervallen positiv ist, und so schliessen wir weiter auf die Vorzeichenfolge in der Reihe (3):

	$f^{(\nu)}$	$f^{(\nu+1)}$	$f^{(\nu+2)}$	$\dots$	$f^{(\nu+\mu)}$
δ_1	$(-1)^\mu$	$(-1)^{\mu-1}$	$(-1)^{\mu-2}$	$\dots$	$+$
δ_2	$+$	$+$	$+$	$\dots$	$+$

(4)

d. h. in der Reihe (3) werden beim Durchgang durch ξ aus lauter Zeichenwechseln Zeichenfolgen, und es gehen in der Reihe (3) μ Zeichenwechsel verloren. Ist $f^{(\nu+\mu)}(\xi)$ negativ, so sind alle Zeichen in (4) die entgegengesetzten, und der Schluss bleibt sonst derselbe.

Wenn nun $\nu = 0$, d. h. $f^{(\nu)}(x)$ die ursprüngliche Function $f(x)$ selbst ist, die dann in ξ eine $(\mu + 1)$ fache Wurzel hat, so findet also beim Durchgang durch ξ auch in der Reihe (1) ein Verlust von μ Zeichenwechseln statt. Ist aber $\nu > 0$ und die dem $f^{(\nu)}(x)$ vorangehende Function $f^{(\nu-1)}(x)$ von Null verschieden, so haben wir folgende Zeichen. Bei geradem μ geht zwischen $f^{(\nu-1)}$ und $f^{(\nu)}$ kein Zeichenwechsel verloren; bei ungeradem μ geht ein Zeichenwechsel verloren, oder es wird einer gewonnen. Es ist also der Verlust an Zeichenwechseln beim Durchgang durch ξ in der Reihe

$$f^{(\nu-1)}, \quad f^{(\nu)}, \quad f^{(\nu+1)}, \dots, f^{(\nu+\mu)} \quad (5)$$

bei geradem μ gleich μ , bei ungeradem μ gleich $\mu + 1$ oder $\mu - 1$, also immer eine gerade Zahl und nie negativ.

Wir können diesen Ergebnissen einen übersichtlichen analytischen Ausdruck geben, der ihre Bedeutung besser erkennen lässt. Wir bezeichnen mit $V(x)$ wie früher die Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe (1) für einen bestimmten Werth von x , jedoch mit der näheren Bestimmung, dass, wenn für einen Werth von x einige der Glieder der Reihe verschwinden, diese bei Abzählung der Zeichenwechsel einfach übergangen werden. Wir können dann $V(x)$ als eine Function von x auffassen, die sich aber nur um ganze Zahlen ändern kann, also unstetig ist für die Werthe von x , für welche einige Glieder der Reihe (1) verschwinden. Wir wollen dann mit $V(x - 0)$ und $V(x + 0)$ die Werthe der Function $V(x)$ unmittelbar vor und unmittelbar nach einer solchen Stelle bezeichnen. Dann zeigt die Betrachtung von (4), dass in allen Fällen

$$V(\xi + 0) = V(\xi) \quad (6)$$

ist, und dass, wenn ξ eine μ -fache Wurzel von $f(x)$ ist,

$$V(\xi - 0) = V(\xi) + \mu + 2h, \quad (7)$$

worin h eine nicht negative ganze Zahl ist.

Daraus ergibt sich also, wenn wir zunächst daran festhalten, dass für $x = \alpha$ und $x = \beta$ keine der Functionen (1) verschwindet, dass $V(\alpha) - V(\beta)$ sich von der Summe aller Zahlen μ , d. h. von der Anzahl der im Intervall (α, β) gelegenen Wurzeln, jede nach dem Grade ihrer Vielfachheit gerechnet, um eine gerade, nicht negative Zahl unterscheidet, und damit ist also das Theorem I von seiner Beschränkung befreit.

Wir können aber auch noch die Voraussetzung aufgeben, dass für α und β keine der Functionen (1) verschwindet, wenn α und β nicht unter den Wurzeln von $f(x)$ vorkommen. Denn dann ist unser Theorem anwendbar auf zwei Werthe, von denen der erste etwas grösser als α , der andere etwas kleiner als β ist, und die dieselben Wurzeln einschliessen wie α und β ; d. h. es ist, wenn wir mit λ die Anzahl dieser Wurzeln bezeichnen,

$$V(\alpha + 0) - V(\beta - 0) = \lambda + 2h,$$

und da

$$V(\alpha + 0) = V(\alpha), \quad V(\beta - 0) = V(\beta) + 2h',$$

so folgt

$$V(\alpha) - V(\beta) = \lambda + 2(h + h'),$$

was wieder der Ausdruck unseres Theorems ist. Wenn aber α oder β selbst zu den Wurzeln von $f(x)$ gehört, dann ist unser Theorem nur dann richtig, wenn diese Grenzwerte nicht mit zum Intervall gezählt werden.

Das Budan-Fourier'sche Theorem giebt zwar nicht, wie der Sturm'sche Satz, eine vollständig sichere Entscheidung über die Zahl der Wurzeln in einem Intervall, es kann aber doch in manchen Fällen den Sturm'schen Satz ersetzen; denn hat man das Intervall (α, β) so weit eingeschränkt, dass kein oder nur ein Zeichenwechsel von α bis β verloren geht, so folgt mit Sicherheit, dass im ersten Falle keine, im zweiten eine und nur eine Wurzel im Intervall liegt. Die Abgrenzung der Wurzeln kann also durch die Budan'sche Reihe nur dann vollständig gegeben werden, wenn nicht beim Durchgang durch einen Werth ξ gleichzeitig mehrere Zeichenwechsel verloren gehen. Dies Verhalten kann, wie klein auch das Intervall (α, β) gewählt sein mag, nicht mit Sicherheit erkannt werden, und man wird also, wenn nach einer angemessenen Einengung des Intervalles die Abgrenzung nicht gelungen ist, doch zu einem anderen Verfahren, in letzter Instanz zum Sturm'schen Satze greifen müssen.

§ 100. Die Newton'sche Regel

Eine Ergänzung der vorstehenden Regel, die eine weitere Annäherung an die genaue Festsetzung der Grenzen der Wurzeln gestattet, giebt die jetzt zu besprechende, von Newton herrührende, aber erst von Sylvester bewiesene Vorschrift.²⁵

Es sei wieder

$$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0 \quad (1)$$

die zu untersuchende Gleichung. Wir setzen, indem wir mit $n(m)$ wie immer das Product $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m$ und mit $f^{(\nu)}(x)$ die ν te Derivirte bezeichnen,

$$f_\nu(x) = \frac{(n - \nu)!}{n!} f^{(\nu)}(x), \quad (2)$$

$$F_\nu(x) = f_\nu(x)^2 - f_{\nu-1}(x)f_{\nu+1}(x), \quad (3)$$

mit dem Zusatz, dass

$$F_0 = F_n = 1, \quad F_n = f_n^2, \quad (4)$$

also, worauf es wesentlich ankommt, positiv sein sollen. Für die Abgeleiteten der Functionen f_ν , F_ν erhalten wir aus (2) und (3)

$$f'_\nu(x) = (n - \nu)f_{\nu+1}(x), \quad (5)$$

$$F'_\nu(x) = (n - \nu + 1)(f_{\nu-1}F_{\nu+1} + F_{\nu-1}f_{\nu+1}), \quad (6)$$

²⁵Newton, *Arithmetica universalis*. Sylvester, *Transactions of the Royal Irish Academy*, t. 24 (1871); *Phil. Mag.*, 4. ser., t. 31. Vgl. auch Petersen, *Theorie der algebraischen Gleichungen*. Kopenhagen 1878.

bis auf positive Zahlenfactoren in der für die Zeichen allein wesentlichen Form. Da es auf die positiven Zahlenfactoren nicht ankommt, so können wir die Budan'sche Reihe durch die Reihe der Functionen

$$f_0, \quad f_1, \quad f_2, \dots, \quad f_n$$

ersetzen. Die Newton'sche Regel macht nun von der Doppelreihe Gebrauch:

$$\begin{array}{cccccc} f_0, & f_1, & f_2, & \dots, & f_{n-1}, & f_n, \\ F_0, & F_1, & F_2, & \dots, & F_{n-1}, & F_n. \end{array} \quad (7)$$

Wenn wir zwei auf einander folgende Glieder dieser Doppelreihe, wie

$$\begin{array}{cc} f_\nu, & f_{\nu+1} \\ F_\nu, & F_{\nu+1} \end{array}$$

für einen Werth von x betrachten, für den keine der vier Functionen verschwindet, so sind in Bezug auf die Zeichenfolge die nachstehenden Fälle möglich:

$$\begin{array}{l} a) \left| \begin{array}{cccc} ++ & ++ & -- & -- \\ ++ & -- & ++ & -- \end{array} \right| PP \\ b) \left| \begin{array}{cccc} +- & +- & -+ & -+ \\ +- & -+ & +- & -+ \end{array} \right| VV \\ c) \left| \begin{array}{cccc} ++ & ++ & -- & -- \\ +- & -+ & +- & -+ \end{array} \right| PV \\ d) \left| \begin{array}{cccc} +- & +- & -+ & -+ \\ ++ & -- & ++ & -- \end{array} \right| VP. \end{array}$$

Dies Verhalten bezeichnen wir mit folgenden Ausdrücken und Symbolen:

- a) Folge-Folge (Permanenz-Permanenz) PP ,
- b) Wechsel-Wechsel (Variation-Variation) VV ,
- c) Folge-Wechsel (Permanenz-Variation) PV ,
- d) Wechsel-Folge (Variation-Permanenz) VP .

Die zwei Sätze, die wir beweisen wollen, lauten:

II. Die Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln von $f(x)$ ist entweder genau so gross oder um eine gerade Zahl kleiner, als die Zahl der beim Uebergang von α zu β in der Doppelreihe (7) verlorenen Wechsel-Folgen.

III. Die Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln von $f(x)$ ist entweder genau so gross oder um eine gerade Zahl kleiner, als die Zahl der beim Uebergang von α zu β in der Doppelreihe (7) gewonnenen Folge-Folgen.

Von diesen beiden Sätzen, die nicht immer dieselbe obere Grenze für die Zahl der Wurzeln geben, wird man den anwenden, der die niedrigste Grenze giebt.

Wir machen beim Beweis dieses Satzes die folgenden Voraussetzungen, von denen wir uns zum Theil später wieder befreien werden.

1. $f(x)$ hat keine doppelten oder mehrfachen Wurzeln.
2. Von den Functionen $f_\nu(x)$ verschwinden nicht zwei benachbarte für denselben Werth von x .
3. Auch von den Functionen $F_\nu(x)$ verschwinden nicht zwei benachbarte für denselben Werth von x .
4. Eine Folge von 2. ist, nach Formel (3), dass nicht $f_\nu(x)$ und $F_\nu(x)$ für denselben Werth von x verschwinden.

5. Für $x = \alpha$ und $x = \beta$ selbst soll keine der Functionen f_ν , F_ν verschwinden.

Der Beweis der Sätze II und III ist nun folgender. Lassen wir x , stetig wachsend, von α bis β gehen, so kann eine Aenderung in der Zeichenfolge nur dann eintreten, wenn eine der Functionen f_ν oder F_ν durch Null hindurchgeht, und es kommt nur darauf an, den Effect zu untersuchen, den ein solcher Durchgang durch Null in den verschiedenen Fällen hervorruft.

Nehmen wir zunächst an, es gehe eine der mittleren Functionen f_ν durch Null, wobei also $0 < \nu < n$. Je nachdem $f_{\nu+1}$ positiv oder negativ ist, wird f_ν wachsen oder abnehmen. Es wird also im ersten Falle $f_\nu(x-0)$ negativ, $f_\nu(x+0)$ positiv sein, und im zweiten Falle umgekehrt; ausserdem folgt aus (3), dass, wenn $f_\nu = 0$ ist, $F_{\nu-1}$ und $F_{\nu+1}$ positiv sind, und dass F_ν das entgegengesetzte Vorzeichen von $f_{\nu-1}f_{\nu+1}$ hat. Wir stellen die hiernach bleibenden Möglichkeiten tabellarisch zusammen:

	$\nu-1$	ν	$\nu+1$		$\nu-1$	ν	$\nu+1$
$f(x-0)$	+	-	+	$f(x-0)$	-	-	+
$f(x+0)$	+	+	+	$f(x+0)$	-	+	+
F	+	-	+	F	+	+	+

In diesen Fällen ist also

$$\begin{array}{c|c} x-0 & VV, VV \\ x+0 & PV, PV \end{array} \quad \begin{array}{c|c} PP, VP \\ VP, PP \end{array}$$

Es wird also weder ein VP noch ein PP verloren oder gewonnen.

Wenn aber $f(x)$ selbst durch Null geht, so haben wir, wenn wir $f_1(x)$ positiv voraussetzen, was mit Rücksicht auf die vorher gemachte Bemerkung genügt,

	0	1
$f(x-0)$	-	+
$f(x+0)$	+	+
F	+	+

Es geht also hier ein VP in ein PP über, d. h. es wird ein VP verloren, ein PP gewonnen.

Wenn endlich F_ν durch Null geht, wo natürlich $0 < \nu < n$ sein muss, so ist das Verhalten folgendes. Wenn $F_\nu = 0$ ist, so müssen nothwendig $f_{\nu-1}$ und $f_{\nu+1}$ gleiche Vorzeichen haben, da sonst F_ν aus zwei positiven Gliedern bestehen würde und nicht verschwinden könnte. Es ist ferner $F'_\nu(x)$ nach (6) vom selben Vorzeichen wie das Product $f_{\nu-1}f_{\nu+1}$, und also hat $F_\nu(x-0)$ das entgegengesetzte, $F_\nu(x+0)$ das gleiche Vorzeichen, wie das Product.

Auch hier können wir in der Aufzählung die Fälle weglassen, die aus den aufgeführten durch gleichzeitige Zeichenänderung in allen drei Functionen $F_{\nu-1}$, F_ν , $F_{\nu+1}$ entstehen, und es bleiben also folgende Fälle:

	$\nu-1$	ν	$\nu+1$		$\nu-1$	ν	$\nu+1$
f	+	+	+	f	+	+	+
$F(x-0)$	+	-	+	$F(x-0)$	-	-	+
$F(x+0)$	+	+	+	$F(x+0)$	-	+	+

	$\nu-1$	ν	$\nu+1$		$\nu-1$	ν	$\nu+1$
f	+	-	+	f	+	-	+
$F(x-0)$	+	+	+	$F(x-0)$	-	+	+
$F(x+0)$	+	-	+	$F(x+0)$	-	-	+

Die Zeichenwechsel sind in diesen vier Fällen:

$$\begin{array}{c|c} x-0 & PV, PV \quad PP, PV \quad VP, VP \quad VV, VP \\ x+0 & PP, PP \quad PV, PP \quad VV, VV \quad VP, VV \end{array}$$

Im ersten Falle werden zwei PP gewonnen, im zweiten und vierten Falle tritt keine Aenderung ein, im dritten Falle gehen zwei VP verloren. Damit aber sind die Sätze II, III bewiesen.

Die Voraussetzungen 2., 3., dass von den Functionen f_ν und F_ν nicht zwei benachbarte für dasselbe x verschwinden sollen, können wir aufgeben. Denn wenn wir an der ersten Voraussetzung festhalten, dass keine mehrfachen Wurzeln vorhanden sind, so können wir dem Coefficienten a_ν so kleine Aenderungen ertheilen, dass erstens die Voraussetzungen 2., 3. befriedigt sind, und zweitens die zwischen α und β gelegenen Wurzeln sich so wenig ändern, dass keine von ihnen aus dem Intervall heraustritt. Da die Wurzeln nur einzeln vorkommen, so können dabei auch nicht reelle Wurzeln in imaginäre übergehen.

Ob der Satz bei richtiger Zählung der mehrfachen Wurzeln auch noch im Falle mehrfacher Wurzeln gültig bleibt, mag dahin gestellt bleiben.

§ 101. Der Cartesische Lehrsatz

Der Cartesische Lehrsatz, der auch nach Harriot²⁶ benannt wird, giebt eine Regel zur Abschätzung der Zahl der positiven Wurzeln. Wir können ihn einfach als speciellen Fall des Budan'schen Theorems betrachten, indem wir $\alpha = 0$ und $\beta = \infty$ oder wenigstens so gross annehmen, dass die Functionen

$$f(x), \quad f'(x), \quad f''(x), \dots, \quad f^{(n)}(x) \quad (1)$$

für $x > \beta$ alle dasselbe Zeichen haben. Dies Zeichen stimmt überein mit dem Zeichen des Coefficienten der höchsten Potenz von x in $f(x)$ und kann positiv angenommen werden.

Ist

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n,$$

so erhalten die Functionen (1), von positiven Zahlenfactoren abgesehen, für $x = 0$ die Werthe

$$a_n, \quad a_{n-1}, \quad a_{n-2}, \dots, \quad a_0. \quad (2)$$

Daraus ergibt sich also das Theorem:

IV. Die Anzahl der positiven Wurzeln der Gleichung $f(x) = 0$ ist gleich oder um eine gerade Zahl kleiner als die Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe der Coefficienten von $f(x)$, wobei etwa verschwindende Coefficienten einfach zu übergehen sind und die Wurzel $x = 0$, wenn sie vorhanden ist, nicht mitzählt.

Um auch die Anzahl der negativen Wurzeln abzuschätzen, kann man entweder das Budan-Fourier'sche Theorem auf das Intervall $(-\infty, 0)$ anwenden, oder man ersetzt x durch $-x$, d. h. man ändert die Vorzeichen von $a_1, a_3, a_5, \dots$ und wendet dann das Theorem IV an.

In ähnlicher Weise wollen wir das Newton'sche Kriterium des § 100 specialisiren. Wir bemerken dazu, dass

$$f_\nu(0) = \frac{(n-\nu)! \nu!}{n!} a_{n-\nu}$$

und folglich

$$F_\nu(0) = \frac{\nu!(\nu-1)!(n-\nu)!(n-\nu-1)!}{n!^2} \left\{ \nu(n-\nu)a_{n-\nu}^2 - (\nu+1)(n-\nu+1)a_{n-\nu-1}a_{n-\nu+1} \right\}$$

wird, dass ferner die Reihe der $f_\nu(x)$ für $x = +\infty$ nur Zeichenfolgen, für $x = -\infty$ nur Zeichenwechsel darbietet. Wenn wir also

$$A_\nu = \nu(n-\nu)a_\nu^2 - (\nu+1)(n-\nu+1)a_{\nu-1}a_{\nu+1}, \quad A_0 = 1, \quad A_n = 1, \quad (3)$$

²⁶Harriot, *Artis analyticae praxis ad aequationes algebraicas resolvendas*. 1631. Gauss' Werke, Bd. III, S. 67. Lagrange, l. c.

setzen, so dass A_ν , von einem positiven Factor abgesehen, mit $F_{n-\nu}(0)$ übereinstimmt, so folgt, dass für $x = 0$ die Doppelreihe (7), § 100, in umgekehrter Ordnung geschrieben, den Vorzeichen nach übereinstimmt mit

$$A_0, \quad A_1, \quad A_2, \dots, \quad A_n. \quad (4)$$

Beim Uebergang zu $x = +\infty$ sind in der Reihe $f(x), f_1(x), \dots, f_n(x)$ alle Zeichenwechsel, und beim Uebergang zu $x = -\infty$ alle Zeichenfolgen verloren gegangen, also in der Doppelreihe der f_ν, F_ν für $x = +\infty$ alle VP , für $x = -\infty$ alle PP . Danach können wir nach § 100, II, III folgende beiden Theoreme aussprechen:

V. Die Zahl der positiven Wurzeln von $f(x)$ ist so gross oder um eine gerade Zahl kleiner als die Zahl der Wechsel-Folgen in der Doppelreihe (4).

VI. Die Zahl der negativen Wurzeln von $f(x)$ ist so gross oder um eine gerade Zahl kleiner als die Zahl der Folge-Folgen in der Doppelreihe (4).

Die Summe der Anzahlen der VP und der PP ist aber gleich der Anzahl der Zeichenfolgen in der einfachen Reihe

$$A_0, \quad A_1, \quad A_2, \dots, \quad A_n, \quad (5)$$

und wir können also V. und VI. in den einen Satz zusammenfassen:

VII. Die Anzahl aller reellen Wurzeln von $f(x)$ ist so gross oder um eine gerade Zahl kleiner als die Zahl der Zeichenfolgen in der Reihe (5).

Die Gesamtanzahl der Zeichenwechsel und Zeichenfolgen in der Reihe (5) ist so gross wie die Zahl aller reellen und imaginären Wurzeln zusammengenommen, nämlich n . Denn der Fall, dass in der Reihe (5) einige Glieder verschwinden, ist hier auszunehmen. Da überdies das erste und letzte Glied der Reihe (5) dasselbe Vorzeichen haben, so ist die Anzahl der Zeichenwechsel in dieser Reihe eine gerade Zahl. Wir können also zu VII., ohne damit etwas Neues zu sagen, noch das Theorem hinzufügen:

VIII. Die Anzahl der imaginären Wurzeln von $f(x)$ ist mindestens gleich der Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe (5).

In der Fassung der beiden letzten Sätze ist es gleichgültig, ob einige der Coefficienten $a_1, a_2, \dots, a_n$ verschwinden, wenn nur keines der A_ν Null ist.

Bei der cubischen Gleichung

$$a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3 = 0$$

ist

$$A_1 = 2(a_1^2 - 3a_0a_2), \quad A_2 = 2(a_2^2 - 3a_1a_3).$$

In der Reihe 1, $A_1, A_2, 1$ kommen also zwei Zeichenwechsel vor, wenn von den beiden Grössen A_1, A_2 eine oder auch beide negativ sind, und in diesen Fällen hat also die Gleichung zwei imaginäre Wurzeln. Sind aber A_1 und A_2 positiv, so ist die Entscheidung aus diesem Satze allein nicht zu treffen; es ist dann nöthig, noch die Grösse

$$B = 9a_0a_3 - a_1a_2$$

in Betracht zu ziehen und das Zeichen von

$$D = A_1A_2 - B^2$$

zu untersuchen (§ 62).

Im Falle der biquadratischen Gleichungen hat man die drei Ausdrücke zu betrachten:

$$A_1 = 3a_1^2 - 8a_0a_2, \quad A_2 = 4a_2^2 - 9a_1a_3, \quad A_3 = 3a_3^2 - 8a_2a_4.$$

Sind die Zeichen der Reihe nach $+, -, +$, so hat man vier imaginäre Wurzeln. Sind die Zeichen alle drei positiv, so können vier oder zwei oder keine imaginäre Wurzeln vorhanden sein; in allen anderen Fällen hat man zwei oder vier imaginäre Wurzeln.

§ 102. Das Jacobi'sche Kriterium

Um die Anzahl der Wurzeln abzuschätzen, die zwischen zwei Grenzen α, β liegen, hat Jacobi ein Kriterium aus dem Cartesischen Lehrsatz abgeleitet.²⁷ Wenn nämlich

$$f(x) = 0 \tag{1}$$

die vorgelegte Gleichung n ten Grades ist, von der entschieden werden soll, wie viele Wurzeln sie zwischen den beiden Grenzen α, β hat, so setzt Jacobi

$$x = \frac{\alpha + \beta y}{1 + y} \tag{2}$$

und bildet nun die Gleichung

$$(1 + y)^n f\left(\frac{\alpha + \beta y}{1 + y}\right) = \varphi(y) = b_0 y^n + b_1 y^{n-1} + \dots + b_n, \tag{3}$$

worin die $b_0, b_1, \dots, b_n$ ganze homogene Functionen n ten Grades von α und β und lineare Functionen der Coefficienten von $f(x)$ sind. Wenn nun x von α bis β wächst, so geht y , gleichfalls wachsend, von 0 bis ∞ . So viele Wurzeln also $f(x)$ zwischen α und β hat, genau so viele positive Wurzeln hat $\varphi(y)$. Es folgt also aus dem Cartesischen Satz:

IX. Die Anzahl der Wurzeln von $f(x)$ zwischen α und β ist so gross oder um eine gerade Zahl kleiner wie die Anzahl der Zeichenwechsel in der Reihe

$$b_0, \quad b_1, \quad b_2, \dots, \quad b_n.$$

Während also bei dem Budan'schen Theorem die Vorzeichenwechsel in zwei Werthreihen abzuzählen und zu vergleichen sind, verlangt das Jacobi'sche Kriterium nur die Abzählung der Vorzeichenwechsel in einer Werthreihe. Auf dieselbe Weise lässt sich auch die Newton'sche Regel umgestalten, wenn man die Grössen

$$B_\nu = \nu(n - \nu)b_\nu^2 - (\nu + 1)(n - \nu + 1)b_{\nu-1}b_{\nu+1}$$

in Betracht zieht, und man erhält so den Satz:

X. Die Anzahl der Wurzeln von $f(x)$ zwischen α und β ist so gross oder um eine gerade Zahl kleiner wie die Zahl der Wechselfolgen in der Doppelreihe

$$b_0, \quad b_1, \quad b_2, \dots, \quad b_n; \quad B_0, \quad B_1, \quad B_2, \dots, \quad B_n.$$

²⁷Jacobi, *Observatiunculae ad theoriā aequationum algebraicarum pertinentes*. Crelle's Journal, Bd. 13. Gesammelte Werke, Bd. III.

§ 103. Geometrische Vergleichung der verschiedenen Kriterien

Um die Tragweite der verschiedenen Kriterien unter einander zu vergleichen, hat Klein eine geometrische Interpretation angewandt, die wir jetzt besprechen wollen. Wenn man nicht mit Räumen von mehr Dimensionen operiren und damit die geometrische Anschauung verlieren will, muss man sich hierbei auf die ersten Fälle beschränken, und wir beginnen also mit den quadratischen Gleichungen

$$x^2 + ax + b = 0. \quad (1)$$

Sehen wir a und b als rechtwinklige Coordinaten in einer Ebene an, so ist jeder Punkt dieser Ebene das Bild einer und nur einer quadratischen Gleichung, und umgekehrt hat jede quadratische Gleichung mit reellen Coefficienten einen Punkt der Ebene zum Bilde.

Die Gleichung

$$a^2 - 4b = 0 \quad (2)$$

stellt eine Parabel dar, auf der die Bilder der Gleichungen mit gleichen Wurzeln liegen. Die inneren Punkte, d. h. die in der Höhlung der Parabel liegenden, stellen die Gleichungen mit imaginären Wurzeln, die äusseren Punkte die Gleichungen mit reellen Wurzeln dar.

Wir bilden nun nach § 89 die Sturm'sche Kette

$$x^2 + ax + b, \quad 2x + a, \quad a^2 - 4b \quad (3)$$

und untersuchen die Zeichenwechsel. Ist x constant und a, b variabel, so ist

$$x^2 + ax + b = 0$$

die Gleichung der Parabeltangente in dem Punkte

$$a = -2x, \quad b = x^2,$$

und zwar ist $x^2 + ax + b$ positiv in dem Theil der Ebene, der zugleich die Parabel enthält. Durch diese Tangente und durch die Parabel wird die Ebene in vier Felder getheilt, in denen in der Reihe (3), wie in der Fig. 16 angedeutet ist, 0, 1, 2 Zeichenwechsel vorkommen.




Fig. 16.

Wenn man also $x = \alpha$ und $x = \beta$ setzt, so erhält man zwei solche Tangenten und eine Eintheilung der Ebene in vier Felder, worin die repräsentirenden Punkte für solche Gleichungen liegen, die zwischen α und β keine, eine oder zwei Wurzeln haben. In der Fig. 17 sind diese vier Felder durch die betreffenden Ziffern gekennzeichnet. Es ist der Unterschied zwischen solchen Punkten, von denen aus keine, eine oder zwei Tangenten an die Parabel gezogen werden können, die ihren Berührungspunkt zwischen α und β haben. Die Fig. 17 also giebt die genaue und vollständige Unterscheidung der verschiedenen Fälle.




Fig. 17.

Vergleichen wir nun hiermit den Budan'schen Satz, so haben wir die drei Functionen $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$, also

$$x^2 + ax + b, \quad 2x + a, \quad 1 \quad (4)$$

in Bezug auf die Zeichenwechsel zu untersuchen. Die beiden geraden Linien

$$x^2 + ax + b = 0, \quad 2x + a = 0$$

theilen die Ebene in drei Felder, in denen die Reihe (4) die in der Fig. 18 angedeuteten Zeichenwechsel bietet.




Fig. 18.

Nehmen wir wieder zwei Werthe $x = \alpha$ und $x = \beta$, so ergeben sich sechs Felder, in denen der Verlust an Zeichenwechseln in der Fig. 19 angegeben ist. In den mit 0 und 1 bezeichneten Feldern giebt also der Verlust an Zeichenwechseln die richtige Anzahl von Wurzeln. In dem Felde 2 dagegen ist die Entscheidung zwischen zwei und keiner Wurzel nicht getroffen.




Fig. 19.

Nehmen wir nun das Jacobi'sche Kriterium (§ 102). Danach müssen wir, um die Anzahl der zwischen α und β gelegenen Wurzeln abzuschätzen, die Gleichung (1) erst transformiren auf

$$(\alpha + \beta y)^2 + a(\alpha + \beta y)(1 + y) + b(1 + y)^2 = 0$$

oder

$$(\beta^2 + a\beta + b)y^2 + \{2\alpha\beta + a(\alpha + \beta) + 2b\}y + (\alpha^2 + a\alpha + b) = 0,$$

und es ist nun die Anzahl der Zeichenwechsel in den drei Functionen

$$\beta^2 + a\beta + b, \quad 2\alpha\beta + a(\alpha + \beta) + 2b, \quad \alpha^2 + a\alpha + b$$

abzuzählen. Der erste und der dritte dieser Ausdrücke stellen, gleich Null gesetzt, die beiden vorhin betrachteten Parabeltangenten dar. Der mittlere,

$$2\alpha\beta + a(\alpha + \beta) + 2b,$$

verschwindet für $a = -2\alpha$, $b = \alpha^2$ und für $a = -2\beta$, $b = \beta^2$, stellt also die Verbindungslinie der beiden Punkte α, β dar, und zwar so, dass er auf der Seite, die den Schnittpunkt der beiden Tangenten enthält, negativ wird; in diesem Schnittpunkte selbst ist er gleich $-(\beta - \alpha)^2$.

Wir erhalten hier fünf Felder mit keinem, einem oder zwei Zeichenwechseln, wie die Fig. 20 angiebt.




Fig. 20.

Man sieht hieraus, dass diese Figur die Unentschiedenheit auf einen viel kleineren Raum beschränkt als die vorige. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint es also nicht gerechtfertigt, wenn Jacobi dem Budan-Fourier'schen Kriterium vor dem seinigen so entschieden den Vorzug giebt.²⁸

§ 104. Bestimmung einer oberen Grenze für die Wurzeln

Wir haben schon im dritten Abschnitt von dem Satze Gebrauch gemacht, dass man immer eine positive Zahl finden kann, die grösser ist als die absoluten Werthe sämmtlicher Wurzeln einer gegebenen Gleichung. Es kommt aber jetzt darauf an, eine möglichst einfache und zugleich möglichst genaue Bestimmung einer solchen oberen Grenze zu geben.

Wir betrachten zunächst nur die reellen Wurzeln und suchen also eine positive Zahl, die grösser ist als die grösste positive Wurzel einer gegebenen Gleichung $f(x) = 0$. Eine solche Bestimmung giebt uns das Budan'sche Theorem. Nehmen wir den Coefficienten der höchsten Potenz von x in $f(x)$ gleich 1 (oder wenigstens positiv) an, so kann man die positive Zahl α immer so gross annehmen, dass

$$f(\alpha), \quad f'(\alpha), \quad f''(\alpha), \dots, \quad f^{(n)}(\alpha) \quad (1)$$

alle positiv werden. Dann geht in der Reihe der Functionen

$$f(x), \quad f'(x), \quad f''(x), \dots, \quad f^{(n)}(x)$$

zwischen $x = \alpha$ und $x = \infty$ kein Zeichenwechsel mehr verloren, und es kann also auch nach dem Theorem I keine Wurzel von $f(x)$ zwischen α und ∞ liegen.

Will man aus dem gleichen Satze für die negativen Wurzeln eine untere Grenze haben, so nehme man die positive Zahl β so an, dass

$$(-1)^n f(-\beta), \quad (-1)^{n-1} f'(-\beta), \dots, \quad f^{(n)}(-\beta) \quad (2)$$

alle positiv werden; dann hat die Gleichung $f(x) = 0$ sicher keine negative Wurzel unter $-\beta$.

Diese Bestimmung der Grenzen rührt schon von Newton her. Eine andere Bestimmung einer oberen Grenze, die für die Rechnung einfacher ist, hat Laguerre angegeben.²⁹ Er benutzt statt der Ableitungen $f(x), f'(x), f''(x), \dots$ die Functionen $f_0(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$, die uns schon mehrfach, besonders in der Tschirnhausen-Transformation, gute Dienste geleistet haben.

Wir haben diese Functionen in § 4 definirt durch

$$\begin{aligned} f_0(x) &= 1, \\ f_1(x) &= x + a_1, \\ f_2(x) &= x^2 + a_1x + a_2, \\ &\vdots \\ f_{n-1}(x) &= x^{n-1} + a_1x^{n-2} + a_2x^{n-3} + \dots + a_{n-1}, \\ f(x) = f_n(x) &= x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n, \end{aligned}$$

²⁸Vgl. F. Klein, *Geometrisches zur Abzählung der reellen Wurzeln einer algebraischen Gleichung*, in Dyck's Catalog mathematischer Modelle (München 1892).

²⁹Laguerre, *Nouvelles Annales de math.*, 2. ser., t. XIX, 1880; *Journal de math.*, 3. ser., t. IX, 1883.

und dafür die Recursionsformel aufgestellt

$$f_\nu(x) - xf_{\nu-1}(x) = a_\nu.$$

Man hat nun, wie schon an der angeführten Stelle gezeigt ist,

$$f(x) = (x - \alpha)\{x^{n-1}f_0(\alpha) + x^{n-2}f_1(\alpha) + \cdots + f_{n-1}(\alpha)\} + f(\alpha). \quad (3)$$

Der Anblick dieser Formel zeigt, dass, wenn α eine Zahl ist, die die Functionen

$$f_0(\alpha), \quad f_1(\alpha), \quad f_2(\alpha), \dots, \quad f_{n-1}(\alpha), \quad f(\alpha) \quad (4)$$

positiv macht, kein positives x grösser als α existiren kann, was $f(x)$ zu Null macht, da dann auf der rechten Seite von (3) lauter positive Glieder stehen. Wenn also ein positives α so bestimmt ist, dass die Functionen (4) alle positiv sind, so ist dies eine obere Grenze für die positiven Wurzeln von $f(x)$.

Ebenso erhält man eine untere Grenze $-\beta$ für die negativen Wurzeln, wenn man die positive Grösse β so bestimmt, dass

$$f_0(-\beta), \quad -f_1(-\beta), \quad f_2(-\beta), \dots, \quad (-1)^n f(-\beta) \quad (5)$$

alle positiv werden. Diese Bestimmung der Grenzen ist zwar in der Rechnung einfacher zu handhaben, giebt aber doch unter Umständen minder genaue Grenzen als die Newton'sche Bestimmung. Wenn man nämlich (3) fortgesetzt nach x differentiirt und dann $x = \alpha$ setzt, so erhält man unter der Voraussetzung, dass die Grössen (4) alle positiv sind, für die Derivirten $f'(x), f''(x), \dots$ Ausdrücke, die für $x = \alpha$ aus lauter positiven Gliedern bestehen. Wenn also die Ausdrücke (4) positiv sind, so sind nothwendiger Weise auch die Derivirten (1) alle positiv, während das Umgekehrte nicht nothwendig der Fall ist.

Um eine obere Grenze für den absoluten Werth der imaginären Wurzeln, der auch für den Fall complexer Coefficienten noch gültig ist, zu finden, betrachten wir die Function

$$f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_n,$$

worin die Coefficienten $a_1, a_2, \dots, a_n$ reell oder imaginär sind. Wir bezeichnen den absoluten Werth einer complexen Grösse a wie früher durch $|a|$ und haben dann, wenn wir annehmen, der absolute Werth von x sei grösser als 1,

$$\left| a_1 + \frac{a_2}{x} + \cdots + \frac{a_n}{x^{n-1}} \right| < |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n| = \alpha.$$

Nehmen wir also x so an, dass sein absoluter Werth grösser ist als jede der beiden Zahlen 1 und α , so kann der Ausdruck

$$x^{1-n}f(x) = x + a_1 + \frac{a_2}{x} + \cdots + \frac{a_n}{x^{n-1}}$$

nicht verschwinden, da der absolute Werth von x grösser ist als der absolute Werth der Summe aller übrigen Glieder der rechten Seite. Wenn wir also, je nachdem α grösser oder kleiner als 1 ist, einen Kreis mit dem Radius α oder 1 um den Nullpunkt als Mittelpunkt legen, so liegen ausserhalb dieses Kreises gewiss keine Wurzeln von $f(x)$ mehr.

§ 105. Abschätzung der imaginären Wurzeln

Wir haben im § 96 gesehen, wie wir aus der Charakteristik eines gewissen Curvensystems die genaue Anzahl der complexen Wurzeln einer Gleichung bestimmen können, die im Inneren einer geschlossenen Curve liegen. Auch dies Kennzeichen lässt sich vereinfachen, wenn man nicht mehr die genaue Anzahl der Wurzeln, sondern nur eine obere Grenze für diese Zahl finden will, was in vielen Fällen auch zur genauen Bestimmung ausreicht.

Es sei also wie in § 96

$$F(z) = \varphi(x, y) + i\psi(x, y) \quad (1)$$

eine reelle oder complexe Function des complexen Arguments $z = x + iy$; darin seien φ und ψ reelle Functionen von x und y , und es werde nun eine geschlossene Curve f gezeichnet. Wir haben dann den Satz:

XI. Wenn die Curve f durch die Curve φ in $2m$ Segmente getheilt wird, in denen φ abwechselnd positiv und negativ ist, so ist die Zahl der innerhalb f liegenden Wurzeln von $F(z)$ höchstens gleich m ; und dasselbe gilt auch, wenn f durch ψ in $2m$ solcher Segmente getheilt wird.

Der Satz ist eine unmittelbare Folge des Charakteristikensatzes II, § 96; denn danach ist

$$k = \frac{1}{2}\{E(f; \varphi, \psi) - A(f; \varphi, \psi)\},$$

und wenn nun die Curve f von der φ -Curve in $2m$ Punkten geschnitten wird, so ist

$$m = \frac{1}{2}\{E(f; \varphi, \psi) + A(f; \varphi, \psi)\},$$

also

$$k = m - A(f; \varphi, \psi).$$

Darin ist aber nach dem erwähnten Satze k gleich der Anzahl der im Inneren von f liegenden Wurzeln von F , und $A(f; \varphi, \psi)$ ist eine jedenfalls nicht negative Zahl. Ganz ebenso kann man mit der Formel

$$k = \frac{1}{2}\{E(f; \psi, \varphi) - A(f; \psi, \varphi)\}$$

verfahren.

§ 106. Das Theorem von Rolle

Wenn die Gleichung $f(x) = 0$ zwei reelle Wurzeln α und β hat, von denen die erste eine a -fache, die zweite eine b -fache ist, so können wir

$$f(x) = (x - \alpha)^a (x - \beta)^b f_1(x) \quad (1)$$

setzen. Ist nun $\alpha < \beta$ und liegt zwischen α und β keine Wurzel von $f(x) = 0$, so wird $f(x)$ und $f_1(x)$ in diesem ganzen Intervall ein unverändertes Vorzeichen haben. Bilden wir von (1) die Ableitung, so ergibt sich

$$\frac{(x - \alpha)(x - \beta)f'(x)}{f(x)} = a(x - \beta) + b(x - \alpha) + (x - \alpha)(x - \beta)\frac{f_1'(x)}{f_1(x)}. \quad (2)$$

Die rechte Seite dieses Ausdrucks wird für $x = \alpha$ negativ, nämlich $a(\alpha - \beta)$, und für $x = \beta$ positiv, nämlich $b(\beta - \alpha)$, und muss also, während x von α bis β geht, einmal oder allgemeiner eine ungerade Anzahl von Malen durch Null gehen. Auf der linken Seite von (2) haben $(x - \alpha)(x - \beta)$ und $f(x)$ ein unverändertes Vorzeichen, und also muss $f'(x)$ eine ungerade Anzahl von Malen durch Null gehen. Daraus folgt das Rolle'sche Theorem:

XII. Sind α und β zwei auf einander folgende Wurzeln von $f(x) = 0$, so liegen zwischen α und β (ohne die Grenzen mitzurechnen) Wurzeln von $f'(x) = 0$ in ungerader Anzahl, also mindestens eine.

Wichtige Folgerungen ergeben sich hieraus für den Fall, dass die Gleichung $f(x) = 0$ nur reelle Wurzeln hat. Sind diese der Grösse nach geordnet

$$\alpha, \beta, \gamma, \dots,$$

und ist α eine a -fache, β eine b -fache, γ eine c -fache Wurzel u. s. f., so hat $f'(x) = 0$ in α eine $(a-1)$ -fache, in β eine $(b-1)$ -fache, in γ eine $(c-1)$ -fache Wurzel und zwischen α und β , zwischen β und γ u. s. f. je mindestens eine reelle Wurzel. Die Gesamtzahl dieser Wurzeln ist aber

$$a + b + c + \dots - 1 = n - 1,$$

und da $f'(x)$ vom $(n-1)$ ten Grade ist, so wird diese Minimalzahl auch nicht überschritten. Daraus folgt der Satz:

XIII. Hat $f(x) = 0$ nur reelle Wurzeln, so hat auch $f'(x) = 0$ nur reelle Wurzeln, und von diesen sind die, die nicht mit mehrfachen Wurzeln von $f(x)$ zusammenfallen, einfache Wurzeln, die von den Wurzeln von $f(x)$ getrennt werden.

Wenn wir dies Theorem wiederholt anwenden, so können wir es folgendermassen verallgemeinern:

XIV. Hat $f(x) = 0$ nur reelle Wurzeln, so haben auch $f'(x), f''(x), f'''(x), \dots$ nur reelle Wurzeln. Hat eine dieser Functionen $f^{(\nu)}(x)$ eine a -fache Wurzel α , und ist $a > 1$, so ist α eine $(a + \nu)$ -fache Wurzel von $f(x)$.

Diese Sätze werden wesentlich verallgemeinert, wenn man eine lineare Transformation darauf anwendet.³⁰ Dies wird leichter ausgeführt, wenn man die homogene Schreibweise anwendet, also unter $f(x, y)$ eine ganze homogene Function n ten Grades versteht. Bildet man für einen beliebigen Werth $\xi : \eta$ die Polaren dieser Function (§60):

$$\begin{aligned} P_1(x, \xi) &= \frac{1}{n} \{ \xi f'(x) + \eta f'(y) \}, \\ P_2(x, \xi) &= \frac{1}{n(n-1)} \{ \xi^2 f''(x, x) + 2\xi\eta f''(x, y) + \eta^2 f''(y, y) \}, \\ P_3(x, \xi) &= \frac{1}{n(n-1)(n-2)} \{ \xi^3 f'''(x, x, x) + 3\xi^2\eta f'''(x, x, y) \\ &\quad + 3\xi\eta^2 f'''(x, y, y) + \eta^3 f'''(y, y, y) \}, \end{aligned} \quad (3)$$

so bleiben diese Functionen ungeändert, wenn man ξ, η und x, y gleichzeitig durch eine lineare Transformation umformt und für f und seine Ableitungen die entsprechenden transformirten Functionen setzt. In Bezug auf die Realität der Wurzeln wird durch eine reelle lineare Transformation nichts geändert. Nun lässt sich aber, wenn ξ, η reell sind, die reelle lineare Substitution so bestimmen, dass die transformirten Werthe $\xi' = 1, \eta' = 0$ werden, und dadurch gehen, wenn man noch $y = 1$ setzt, die Polaren in die Derivirten der Function $f(x)$ nach x über, abgesehen von Zahlenfactoren.

Daraus folgt, dass in den Sätzen XIII, XIV die Derivirten $f'(x), f''(x), \dots$ durch die Polaren $P_1(x, \xi), P_2(x, \xi), \dots$ für ein beliebiges, reelles ξ, η ersetzt werden können.

Wir machen hiervon die Anwendung auf die Gleichung, die man erhält, wenn man die $(n-2)$ te Polare gleich Null setzt:

$$x^2 f''(\xi, \xi) + 2xy f''(\xi, \eta) + y^2 f''(\eta, \eta) = 0. \quad (4)$$

Hat $f(x, y) = 0$, wie wir voraussetzen, nur reelle Wurzeln, so muss auch die quadratische Gleichung (4) reelle Wurzeln haben, d. h. es muss die Hesse'sche Determinante

$$f''(\xi, \xi) f''(\eta, \eta) - f''(\xi, \eta)^2 \quad (5)$$

³⁰Laguerre, Nouvelles Annales de Mathématiques, 2. sér., Vol. 19, 1880.

für alle reellen ξ, η negativ sein. Sie kann nur dann verschwinden, wenn (4) zwei gleiche Wurzeln hat, und dies ist nach XIV nur dann möglich, wenn $f(x, y)$ die n te Potenz einer linearen Function ist. In diesem Falle verschwindet die Determinante (5) identisch. Wenn wir also von diesem Falle absehen, so folgt, dass für eine Gleichung mit nur reellen Wurzeln die Gleichung, die man durch Nullsetzen der Hesse'schen Determinante erhält, nur imaginäre Wurzeln hat.

Wollen wir zur inhomogenen Darstellung zurückkehren, so können wir mit Benutzung des Euler'schen Satzes

$$\begin{aligned} xf'(x) + yf'(y) &= nf(x), \\ xf''(x, x) + yf''(x, y) &= (n-1)f'(x), \\ xf''(y, x) + yf''(y, y) &= (n-1)f'(y) \end{aligned} \quad (6)$$

setzen und damit $f'(y)$, $f''(x, y)$, $f''(y, y)$ eliminiren. Man erhält so, wenn man $y = 1$ setzt,

$$\begin{aligned} f'(y) &= nf(x) - xf'(x), \\ f''(x, y) &= (n-1)f'(x) - xf''(x), \\ f''(y, y) &= n(n-1)f(x) - 2(n-1)xf'(x) + x^2f''(x), \end{aligned} \quad (7)$$

also wenn

$$(n-1)H(x, y) = f''(x, x)f''(y, y) - f''(x, y)^2 \quad (8)$$

gesetzt wird,

$$H(x, y) = H(x) = nf(x)f''(x) - (n-1)f'(x)^2. \quad (9)$$

$H(x)$ ist in Bezug auf x höchstens vom Grade $2n-4$.

§ 107. Die Sätze von Laguerre für Gleichungen mit nur reellen Wurzeln

Von den zuletzt abgeleiteten Sätzen hat Laguerre eine Anwendung auf Gleichungen mit nur reellen Wurzeln gemacht, die wir noch kennen lernen wollen. Es sei $f(x) = 0$ eine Gleichung n ten Grades mit n reellen Wurzeln

$$\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots,$$

die wir von einander verschieden voraussetzen. Ist x eine veränderliche Grösse, so haben wir die schon mehrfach angewandte Formel (§ 14, (11)):

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \sum \frac{1}{x - \alpha}, \quad (1)$$

worin sich das Summenzeichen auf die verschiedenen Wurzeln $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ bezieht. Wenn wir hiervon nochmals die Ableitung nach x bilden, so folgt

$$\sum \frac{1}{(x - \alpha)^2} = \frac{f'(x)^2 - f(x)f''(x)}{f(x)^2}, \quad (2)$$

und wenn wir auf der rechten Seite die Function H (§ 106, (9)) einführen,

$$\sum \frac{1}{(x - \alpha)^2} = \frac{nf'(x)^2 - H(x)}{nf(x)^2}. \quad (3)$$

Wendet man auf diese Formel eine lineare Transformation an, bei der dem Werth $x = \infty$ ein beliebiger anderer reeller Werth der neuen Veränderlichen entspricht, so erhält man eine allgemeinere

Formel. Wir führen homogene Variable ein, indem wir x durch $x : y$ und α durch $\alpha : \beta$ ersetzen. Dadurch wird

$$\sum \frac{(x\beta - y\alpha)^{-2}}{nf(x, y)^2} = \frac{nf(x, y)^2 - H(x, y)}{nf(x, y)^2} \quad (4)$$

in der sinngemässen homogenen Schreibweise, genauer in der Form

$$\sum \frac{(x\eta - y\xi)^2}{(x\beta - y\alpha)^2} = \frac{(x\eta - y\xi)^2 \{nf'(x, y)^2 - H(x, y)\}}{nf(x, y)^2}.$$

Nun wenden wir eine beliebige lineare Transformation an:

$$\begin{aligned} x &= ax' + by', & \alpha &= a\alpha' + b\beta', \\ y &= cx' + dy', & \beta &= c\alpha' + d\beta', \end{aligned} \quad (5)$$

oder aufgelöst

$$rx' = dx - by, \quad ry' = -cx + ay, \quad r = ad - bc.$$

Wenn durch diese Transformation $f(x, y) = \varphi(x', y')$ wird, so wird

$$rf'(x) = d\varphi'(x') - c\varphi'(y'),$$

und wegen der Covarianteneigenschaft der Function H (§59), wenn H' ebenso aus φ abgeleitet ist wie H aus f , folgt aus (4)

$$\sum \left(\frac{c\alpha' + d\beta'}{x'\beta' - y'\alpha'} \right)^2 = \frac{[d\varphi'(x') - c\varphi'(y')]^2 - H'(x', y')}{n\varphi(x', y')^2}. \quad (6)$$

In dieser Formel können, da dies nur Sache der Bezeichnung ist, bei $x', y', \alpha', \beta', H'$ die Accente weggelassen und f an Stelle von φ gesetzt werden. Es bleiben die beiden willkürlichen Grössen c und d darin. Setzen wir der eleganteren Bezeichnung wegen noch $c = -\eta$, $d = \xi$, so erhalten wir also:

$$\sum \left(\frac{\xi\beta - \eta\alpha}{x\beta - y\alpha} \right)^2 = \frac{[\xi f'(x) + \eta f'(y)]^2 - H(x, y)}{nf(x, y)^2}. \quad (8)$$

In dieser Form bleibt sowohl die rechte als die linke Seite vollkommen ungeändert, wenn wir auf die Variablenpaare $x, y; \xi, \eta; \alpha, \beta$ gleichzeitig eine beliebige lineare Transformation anwenden.

Die Formel (8) ist eine identische; sie gilt für jede Function $f(x, y)$ und für alle Werthe der Variablen $x, y; \xi, \eta$. Jetzt aber machen wir die Voraussetzung, dass $f(x, y)$ nur reelle Wurzeln habe, dass also die α, β reell seien, und wir setzen auch ξ, η und x, y als reell voraus. Beide Seiten der Gleichung (8) sind dann wesentlich positiv. Wir bezeichnen ihren gemeinsamen Werth durch P , und bestimmen nun eine Grösse $X : Y$ durch die quadratische Gleichung

$$\frac{(X\eta - Y\xi)^2}{(Xy - Yx)^2} = P,$$

oder

$$\Omega = (Xy - Yx)^2 P - (X\eta - Y\xi)^2 = 0. \quad (9)$$

Diese Gleichung hat zwei reelle Wurzeln, die man aus

$$X\eta - Y\xi = \pm\sqrt{P}(Xy - Yx)$$

erhält.

Ueber die Lage der Wurzeln dieser Gleichung können wir aber Folgendes aussagen: Setzen wir $X = x$, $Y = y$, so wird Ω negativ. Setzen wir aber $X = \alpha$, $Y = \beta$, wenn $\alpha : \beta$ irgend eine der Wurzeln von $f = 0$ ist, so ist

$$\frac{X\eta - Y\xi}{Xy - Yx} = \frac{\alpha\eta - \beta\xi}{\alpha y - \beta x},$$

also gleich einem Gliede der Summe P und daher kleiner als P . Daraus folgt, dass Ω für $X : Y = \alpha : \beta$ positiv ist.

Wenn wir nun die Werthe der sämmtlichen $\alpha : \beta$ und $x : y$ der Grösse nach cyklisch ordnen, und den Werth $X : Y$ durch einen variablen Punkt dieses Kreises darstellen und die betreffenden Punkte mit α, x, X bezeichnen, so geht Ω durch Null, wenn X von x aus nach vorwärts oder nach rückwärts bis zu den nächst gelegenen Punkten, die wir mit α_1 und α_2 bezeichnen wollen, geht. Sind also X_1, X_2 die Wurzeln der Gleichung (9), so haben wir folgende Anordnung auf dem Kreise:

$$\alpha_1, \quad X_1, \quad x, \quad X_2, \quad \alpha_2. \quad (10)$$

(X_1, X_2) stellt also ein Intervall dar, in dem zwar der beliebig gewählte Punkt x , aber kein Wurzelpunkt der Gleichung $f = 0$ liegt. X_1 und X_2 sind also den beiden nächstgelegenen Wurzeln α_1, α_2 näher als der Ausgangswerth x .

Dies gilt, welche Lage auch der zweite willkürliche Punkt ξ haben mag. Es werden davon zwar die Punkte X_1, X_2 abhängig sein; immer aber werden sie in dem Intervall (α_1, x) und (x, α_2) liegen.

Es entsteht nun die Frage, wie der Punkt ξ zu wählen sei, damit X_1 möglichst nahe an α_1 oder X_2 möglichst nahe an α_2 liege, oder vielmehr, da es auf die Kenntniss von ξ selbst nicht ankommt, welches ist der möglichst nahe bei α_1 gelegene Punkt X_1 und der möglichst nahe bei α_2 gelegene Punkt X_2 ?

Denken wir uns den Punkt X gegeben, so ist (9) eine quadratische Gleichung für den Punkt ξ ; zu jeder Lage von X gehören also zwei Lagen von ξ . Aber nur solche Werthe von X_1 oder X_2 sind in (10) zulässig, für die diese quadratische Gleichung reelle Wurzeln ergibt. Also nur solche Werthe von X_1 und X_2 können vorkommen, bei denen die Discriminante von (9) in Bezug auf ξ positiv ist, und wir erhalten die Grenzlagen von X_1 und X_2 , wenn wir die Discriminante von (9) gleich Null setzen. Die Coefficienten von $\xi^2, 2\xi\eta, \eta^2$ in (9) sind aber

$$\begin{aligned} & \frac{f'(x)^2 - y^2 H}{nf^2} (Xy - Yx)^2 - Y^2, \\ & \frac{f'(x)f'(y) + xyH}{nf^2} (Xy - Yx)^2 + XY, \\ & \frac{f'(y)^2 - x^2 H}{nf^2} (Xy - Yx)^2 - X^2, \end{aligned}$$

und die Discriminante erhält man, wenn man von dem Quadrat des mittleren das Product der beiden äusseren abzieht, nämlich, mit Benutzung der Relation $xf'(x) + yf'(y) = nf$:

$$\frac{(Xy - Yx)^2}{nf^2} \left\{ (n-1)H(Xy - Yx)^2 + [Xf'(x) + Yf'(y)]^2 \right\}.$$

Man erhält also die Grenzwerte von $X : Y$ aus der Gleichung

$$[Xf'(x) + Yf'(y)]^2 + (n-1)(Xy - Yx)^2 H = 0, \quad (11)$$

die in Bezug auf $X : Y$ quadratisch ist. Da H negativ ist, hat diese Gleichung zwei reelle Wurzeln, die man aus

$$Xf'(x) + Yf'(y) = \pm (Xy - Yx) \sqrt{(1-n)H} \quad (12)$$

findet.

Diese Formel umfasst mehrere besondere Resultate, die man erhält, wenn man die homogene Form verlässt. Nehmen wir zunächst $y = 0$, also $x : y$ unendlich und setzen $Y = 1$, so ergeben sich zwei Werthe X_1, X_2 , zwischen denen die Gesammtheit aller Wurzeln von $f(x)$ enthalten sind. Setzen wir

$$f(x, y) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} y + a_2 x^{n-2} y^2 + \dots,$$

so wird

$$H = \{2na_0a_2 - (n-1)a_1^2\}x^{2n-4}, \quad (13)$$

und man erhält diese beiden Werthe aus

$$na_0X = -a_1 \pm \sqrt{(n-1)^2a_1^2 - 2n(n-1)a_0a_2}. \quad (14)$$

Lässt man aber $x : y$ unbestimmt, kehrt aber zur inhomogenen Form zurück, indem man $y = 1$, $Y = 1$ setzt und die Formeln (7) und (9) des §106 anwendet, so erhält man aus (12)

$$x - X = \frac{nf(x)}{f'(x) \pm \sqrt{(n-1)^2f'(x)^2 - n(n-1)f(x)f''(x)}}, \quad (15)$$

und diese Werthe haben folgende Bedeutung. Liegt x zwischen zwei Wurzeln α_1, α_2 von $f(x)$, so liegt von den beiden durch (15) dargestellten Werthen von X der eine näher an α_1 , der andere näher an α_2 , aber beide noch innerhalb des Intervalles (α_1, α_2) . Ist aber x grösser als die grösste oder kleiner als die kleinste Wurzel von $f(x)$, so liegen die sämtlichen Wurzeln zwischen den beiden Werthen von X , während x ausserhalb liegt. Liegt x nahe an einer Wurzel, so giebt einer der beiden Werthe von X einen noch genaueren Werth dieser Wurzel.

Ebenso wie durch X_1, X_2 ein Intervall bestimmt ist, in dem gar keine Wurzel der Gleichung liegt, so kann man auch ein Intervall bestimmen, in dem gewiss Wurzeln liegen. Auch hierbei geht man am besten von der homogenen Form aus und benutzt die lineare Transformation. Sei also wie vorher $f(x, y)$ eine Form n ten Grades mit lauter reellen Wurzeln; und seien ferner $x : y$, $\xi : \eta$, $\xi' : \eta'$ drei reelle Werthe, von denen zwei willkürlich sind, und von denen der dritte durch die Relation

$$[\xi f'(x) + \eta f'(y)][\xi' f'(x) + \eta' f'(y)] - H(\xi y - \eta x)(\xi' y - \eta' x) = 0 \quad (16)$$

von den anderen abhängig ist. Diese Gleichung (16) bleibt ungeändert, wenn wir die drei Grössenpaare x, y ; ξ, η ; ξ', η' gleichzeitig derselben linearen Transformation unterwerfen. Daher können alle Schlüsse, die wir aus einer speciellen Form dieser Gleichung ziehen, verallgemeinert werden.

Die lineare Substitution lässt sich so bestimmen, dass für die neuen Variablen $y = 0$, $\xi = 0$ wird; dann ergibt (16) für ξ', η' die Gleichung

$$a_1(na_0\xi' + a_1\eta') = \{2na_0a_2 - (n-1)a_1^2\}\eta',$$

oder also, wenn man $a_0 = 1$, $\eta' = 1$ annimmt,

$$\xi' = -\frac{a_1^2 - 2a_2}{a_1}.$$

Es ist aber, wenn wir wie oben mit α die Wurzeln von f bezeichnen,

$$a_1^2 - 2a_2 = \sum(\alpha^2), \quad a_1 = -\sum(\alpha);$$

also wird

$$\xi' = \frac{\sum(\alpha^2)}{\sum(\alpha)}.$$

Dafür lässt sich auch setzen:

$$\sum \alpha(\alpha - \xi') = 0.$$

Daraus ergibt sich, da alle α reell sein sollen, dass die Producte $\alpha(\alpha - \xi')$ weder alle positiv noch alle negativ sein können; oder mit anderen Worten, es muss ein Theil der Wurzeln zwischen 0 und ξ' , ein anderer Theil ausserhalb dieses Intervalles liegen.

Daraus folgt nun durch Anwendung der linearen Transformation allgemein, dass auf dem Kreise, der die Punkte α, x, ξ, ξ' trägt, wenn ξ, ξ' durch (16) verknüpft sind, in jedem der beiden Theile, in

die der Kreis durch ξ und ξ' getheilt wird, wenigstens eine der Wurzeln α liegt. Der Punkt x und einer der Punkte ξ, ξ' sind willkürlich; der dritte Punkt ist durch (16) bestimmt.

Wir wollen insbesondere die Annahme machen, dass der Punkt ξ' mit einem der beiden durch die Gleichung (12) bestimmten Punkte X zusammenfalle, also etwa

$$Xf'(x) + Yf'(y) + (Xy - Yx)\sqrt{(1-n)H} = 0 \quad (17)$$

setzen. Führen wir dies in (16) ein, indem wir $\xi', \eta' = X, Y$ setzen und dann den Factor $Xy - Yx$ wegheben, so ergibt sich

$$(n-1)[\xi f'(x) + \eta f'(y)] + (\xi y - \eta x)\sqrt{(1-n)H} = 0, \quad (18)$$

wodurch der Punkt ξ eindeutig bestimmt ist.

Gehen wir zur inhomogenen Form über, so erhalten wir (§ 106, (7) und (9)) aus (17) und (18)

$$x - X = \frac{nf(x)}{f'(x) + (n-1)\sqrt{f'(x)^2 - \frac{n}{n-1}f(x)f''(x)}}, \quad (19)$$

$$x - \xi = \frac{nf(x)}{f'(x) + \sqrt{f'(x)^2 - \frac{n}{n-1}f(x)f''(x)}}, \quad (20)$$

worin die Quadratwurzeln beide Zeichen haben können.

Die Lage der Punkte lässt sich dann so charakterisiren. Es giebt wenigstens eine Wurzel α , so dass

$$\xi, \quad \alpha, \quad X, \quad x \quad (21)$$

der Grösse nach auf einander folgen, und so, dass zwischen x und X keine Wurzel liegt. Wir können auch so auswählen, dass zwischen α und X keine weitere Wurzel liegt. Zwischen α und ξ können aber möglicherweise noch andere Wurzeln liegen.

Lassen wir aber nun x sich der Wurzel α annähern, so wird X sich derselben Wurzel nähern, und (20) zeigt, dass auch ξ derselben Grenze zustrebt. Es folgt also, dass, wenn x hinlänglich nahe an einer Wurzel liegt, diese nächste Wurzel in dem Intervall (ξ, X) liegt, in dem keine zweite Wurzel enthalten ist, und dass dies Intervall sich mehr und mehr um α schliesst.

Wir nehmen als Beispiel die Kugelfunctionen, von denen wir schon früher (§ 87) nachgewiesen haben, dass sie nur reelle Wurzeln haben, die alle zwischen -1 und $+1$ liegen. Die Function

$$P_n(x) = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n} \left(x^n - \frac{n(n-1)}{2(2n-1)} x^{n-2} + \dots \right)$$

hat die Eigenschaft, dass

$$P_n(1) = 1, \quad P'_n(1) = \frac{n(n+1)}{2}, \quad P''_n(1) = \frac{n(n-1)(n+1)(n+2)}{8}$$

ist. Man beweist dies leicht durch vollständige Induction, indem man in den ersten Fällen $n = 2, 3, \dots$ die Formeln direct nachweist und dann aus der Recursionsformel

$$(1-x^2)P'_n(x) + nxP_n(x) - nP_{n-1}(x) = 0$$

durch zweimalige Ableitung die Richtigkeit für den Index n nachweist, falls sie für den Index $n-1$ vorausgesetzt wird.

Wenn wir dann in (19) und (20) $x = 1$ setzen, so erhalten wir zwei Grenzen, zwischen denen die der 1 am nächsten kommende Wurzel liegt, nämlich

$$X = 1 - \frac{2}{n+1 + (n-1)\sqrt{\frac{n(n+1)}{2}}},$$

$$\xi = 1 - \frac{2}{n+1 + \sqrt{\frac{n(n+1)}{2}}}.$$

Für $n = 7$ z. B. ergibt sich

$$X = 0,94967\dots, \quad \xi = 0,84952\dots$$

Die genaueren Werthe der beiden der 1 am nächsten liegenden Wurzeln, die wir der Vergleichung wegen anführen, sind nach der Berechnung von Gauss (Gauss Werke, Bd. III, S. 195):

$$0,94911\dots; \quad 0,74153\dots$$

Es liegt also hier nur eine Wurzel zwischen X und ξ , und X zeigt erst in der vierten Decimale den Ueberschuss über den Werth dieser Wurzel.