

Hierin ist nach §. 42 zu setzen

$$\begin{aligned} s_0 &= 3, & a_0 s_1 &= -a_1 \\ a_0^2 s_2 &= a_1^2 - 2a_0 a_2 \\ a_0^3 s_3 &= -a_1^3 + 3a_0 a_1 a_2 - 3a_0^2 a_3 \\ a_0^4 s_4 &= a_1^4 - 4a_0 a_1^2 a_2 + 4a_0^2 a_1 a_3 + 2a_0^2 a_2^2, \end{aligned}$$

wodurch man erhält

$$(10) \quad D = a_1^2 a_2^2 + 18a_0 a_1 a_2 a_3 - 4a_0 a_2^3 - 4a_1^3 a_3 - 27a_0^2 a_3^2.$$

§. 47.

Discriminanten der Formen dritter und vierter Ordnung.

Bei den Functionen dritter und vierter Ordnung haben wir zur Berechnung der Discriminanten in den Auflösungen der Gleichungen dieser beiden Grade (§. 35, 37) ein einfaches Mittel.

Was zunächst die Gleichung dritter Ordnung betrifft, so waren die drei Wurzeln von

$$(1) \quad x^3 + ax + b = 0$$

in der Form dargestellt:

$$\begin{aligned} (2) \quad \alpha &= u + v \\ \beta &= \varepsilon u + \varepsilon^2 v \\ \gamma &= \varepsilon^2 u + \varepsilon v, \end{aligned}$$

worin

$$(3) \quad \varepsilon = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}, \quad \varepsilon^2 = \frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}$$

die complexen dritten Einheitswurzeln sind und u, v durch §. 35, (8) bestimmt sind.

Aus (3) folgt

$$(4) \quad \varepsilon - \varepsilon^2 = \sqrt{-3}, \quad 1 - \varepsilon = \varepsilon^2 \sqrt{-3}, \quad 1 - \varepsilon^2 = -\varepsilon \sqrt{-3}$$

und aus (2)

$$\begin{aligned} \alpha - \beta &= \sqrt{-3} (\varepsilon^2 u - \varepsilon v) \\ \alpha - \gamma &= -\sqrt{-3} (\varepsilon u - \varepsilon^2 v) \\ \beta - \gamma &= \sqrt{-3} (u - v). \end{aligned}$$

Hieraus durch Multiplication

$$(5) \quad (\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)(\beta - \gamma) = 3\sqrt{-3} (u^3 - v^3).$$

Erhebt man ins Quadrat, so erhält man für die Discriminante der cubischen Gleichung (1) nach §. 35, (6)

$$(6) \quad D = - (27 b^2 + 4 a^3).$$

Hieraus erhält man die Discriminante der allgemeinen Function

$$(7) \quad a_0 x^3 + a_1 x^2 + a_2 x + a_3,$$

wenn man für a und b die Ausdrücke §. 34, (4) einsetzt, in denen man a_1, a_2, a_3 durch

$$\frac{a_1}{a_0}, \quad \frac{a_2}{a_0}, \quad \frac{a_3}{a_0}$$

ersetzt und [§. 46, (3)] mit a_0^4 multiplicirt. Man erhält so

$$a = \frac{3 a_0 a_2 - a_1^2}{3 a_0^2},$$

$$b = \frac{2 a_1^3 - 9 a_0 a_1 a_2 + 27 a_0^2 a_3}{27 a_0^3},$$

und folglich

$$(8) \quad D = - \frac{1}{27 a_0^2} \left\{ (2 a_1^3 - 9 a_0 a_1 a_2 + 27 a_0^2 a_3)^2 + 4 (3 a_0 a_2 - a_1^2)^3 \right\}.$$

Wenn man das Quadrat und den Cubus ausrechnet, so kommt man zu der Formel (10) des vorigen Paragraphen zurück; es ist aber bemerkenswerth, dass die Formel (8) scheinbar den Nenner $27 a_0^2$ enthält, der sich beim Ausrechnen forthebt.

Ebenso können wir bei den biquadratischen Gleichungen verfahren. Wir erhalten, wenn $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ die Wurzeln der biquadratischen Gleichung

$$(9) \quad x^4 + a x^2 + b x + c = 0$$

sind, nach §. 37, (5)

$$(10) \quad \begin{aligned} \alpha - \beta &= v + w, & \gamma - \delta &= v - w, \\ \alpha - \gamma &= w + u, & \delta - \beta &= w - u, \\ \alpha - \delta &= u + v, & \beta - \gamma &= u - v. \end{aligned}$$

Danach wird die Discriminante der Gleichung (9)

$$D = (v^2 - w^2)^2 (w^2 - u^2)^2 (u^2 - v^2)^2,$$

d. h. es ist D gleich der Discriminante der cubischen Resolvente §. 37, (4)

$$(11) \quad z^3 + 2 a z^2 + (a^2 - 4 c) z - b^2 = 0,$$

deren Wurzeln u^2, v^2, w^2 sind.

Wenn man diese Discriminante aber nach der Formel (10), §. 46 bildet, indem man

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 2a, \quad a_2 = a^2 - 4c, \quad a_3 = -b^2$$

setzt, so folgt

$$(12) \quad D = -4a^3b^2 + 144acb^2 + 16a^4c \\ - 128a^2c^2 + 256c^3 - 27b^4.$$

Wenn man dagegen zur Bildung der Discriminante der cubischen Gleichung (11) die Formel (8) anwendet, so erhält man

$$(13) \quad 27D = 4(a^2 + 12c)^3 - (2a^3 - 72ac + 27b^2)^2.$$

Man leitet hieraus die Discriminante der allgemeinen Function vierten Grades

$$(14) \quad f(x) = a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$$

ab, indem man nach §. 34, (4) a, b, c durch

$$\begin{aligned} & -\frac{3a_1^2}{8} + a_2 \\ & \frac{a_1^3}{8} - \frac{a_1a_2}{2} + a_3 \\ & -\frac{3a_1^4}{256} + \frac{a_1^2a_2}{16} - \frac{a_1a_3}{4} + a_4 \end{aligned}$$

ausdrückt, dann a_1, a_2, a_3, a_4 durch

$$\frac{a_1}{a_0}, \quad \frac{a_2}{a_0}, \quad \frac{a_3}{a_0}, \quad \frac{a_4}{a_0}$$

ersetzt und mit a_0^6 multiplicirt.

Setzt man nach Ausführung dieser einfachen Rechnung zur Abkürzung

$$(15) \quad A = a_2^2 - 3a_1a_3 + 12a_0a_4,$$

$$(16) \quad B = 27a_1^2a_4 + 27a_0a_3^2 + 2a_2^3 - 72a_0a_2a_4 - 9a_1a_2a_3,$$

so erhält man aus (13)

$$(17) \quad 27D = 4A^3 - B^2.$$

Die Grössen A und B , die uns im nächsten Abschnitt noch beschäftigen werden, heissen die erste und zweite Invariante der biquadratischen Function f . Man kann also nach (17) die Discriminante rational durch diese Grössen ausdrücken, jedoch nicht so, dass die Coëfficienten ganzzahlig werden; führt man die in (17) vorgeschriebene Rechnung aus, um D durch die Coëfficienten a_0, a_1, a_2, a_3 selbst darzustellen, so muss sich der Factor 27 noch fortheben lassen. Wir wollen den langen Ausdruck, dessen Berechnung keinerlei Schwierigkeit bietet, nicht hierher setzen.

§. 48.

Resultanten.

Eine andere Anwendung der Theorie der symmetrischen Functionen, die übrigens die Discriminantenbildung als speciellen Fall enthält, ist die Bildung der Resultanten.

Es seien

$$(1) \quad f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_n,$$

$$(2) \quad \varphi(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + b_2 x^{m-2} + \dots + b_m$$

zwei ganze rationale Functionen vom n^{ten} und m^{ten} Grade und $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n$ seien die Wurzeln der ersten, so dass auch

$$(3) \quad f(x) = a_0 (x - \alpha_1) (x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n)$$

gesetzt werden kann.

Nun ist das Product

$$\varphi(\alpha_1) \varphi(\alpha_2) \dots \varphi(\alpha_n)$$

eine symmetrische Function der Wurzeln von $f(x)$ und kann also ganz und rational durch

$$\frac{a_1}{a_0}, \frac{a_2}{a_0} \dots \frac{a_n}{a_0}$$

ausgedrückt werden. Die Ordnung dieser symmetrischen Function ist $(m, m \dots m)$ (§. 45) und daher ist

$$(4) \quad R = a_0^m \varphi(\alpha_1) \varphi(\alpha_2) \dots \varphi(\alpha_n)$$

eine ganze rationale und homogene Function m^{ter} Ordnung von $a_0, a_1 \dots a_n$. Sie ist auch, wie ihr Ausdruck zeigt, eine ganze homogene Function n^{ter} Ordnung von $b_0, b_1 \dots b_m$. Sie wird die Resultante der beiden Functionen $f(x)$ und $\varphi(x)$ genannt. Diese Bezeichnung rechtfertigt sich durch eine zweite Darstellung.

Bezeichnen wir die Wurzeln von $\varphi(x)$ mit $\beta_1, \beta_2 \dots \beta_m$, setzen also

$$(5) \quad \varphi(x) = b_0 (x - \beta_1) (x - \beta_2) \dots (x - \beta_m),$$

so wird nach (4)

$$(6) \quad R = a_0^m b_0^n \prod^{i,k} (\alpha_i - \beta_k),$$

worin das Productzeichen $\prod$ sich auf alle Indices $i = 1, 2 \dots n$, $k = 1, 2 \dots m$ bezieht.

Dieser Ausdruck zeigt nun, dass R , abgesehen von dem Factor $(-1)^{mn}$, in der gleichen Weise von $\varphi(x)$ abhängt, wie von $f(x)$, und dass wir also auch setzen können

$$(7) \quad (-1)^{mn} R = b_0^n f(\beta_1) f(\beta_2) \dots f(\beta_m).$$

Die Discriminanten sind hiernach ein specieller Fall der Resultanten, den man erhält, wenn man für $\varphi(x)$ die Derivirte $f'(x)$ nimmt.

Das Verschwinden der Resultante von $f(x)$ und $\varphi(x)$ ist die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die beiden Gleichungen

$$f(x) = 0 \quad \text{und} \quad \varphi(x) = 0$$

eine gemeinsame Wurzel haben.

Die Gleichung, die durch Nullsetzen der Resultante entsteht, wird auch die Endgleichung aus $f(x) = 0$ und $\varphi(x) = 0$ genannt und die Aufstellung der Endgleichung die Elimination von x .

Zur Berechnung der Resultanten kann man den Algorithmus des grössten gemeinsamen Theilers anwenden (§. 6). Ist nämlich $m \geq n$, so kann man eine ganze Function Q und eine ebensolche Function $\psi(x)$, deren Grad kleiner ist als m , so bestimmen, dass

$$f(x) = Q \varphi(x) + \psi(x),$$

also, wenn man für x eine der Wurzeln β_i setzt,

$$f(\beta_i) = \psi(\beta_i),$$

also

$$(8) \quad b_0^n \Pi f(\beta_i) = b_0^n \Pi \psi(\beta_i);$$

ist m' der Grad von $\psi(x)$, so ist

$$(9) \quad b_0^{m'} \Pi \psi(\beta_i) = R'$$

die Resultante von $\varphi(x)$ und $\psi(x)$ und daher

$$(10) \quad R = b_0^{n-m'} R'.$$

Die Bildung der Resultante R ist hierdurch auf die Bildung von R' zurückgeführt. Man kann nun $\varphi(x)$ wieder durch $\psi(x)$ theilen, und führt so die Bildung von R' auf die Bildung einer Resultante von Functionen immer niedrigeren Grades zurück, bis man schliesslich auf eine Constante, d. h. eine Function der Coëfficienten a, b kommt, die mit der gesuchten Resultante identisch sein muss.

Die Berechnung der Resultanten ist meist sehr weitläufig. Wir wollen nur das einfachste Beispiel der Resultante zweier quadratischer Functionen anführen:

$$f(x) = a_0 x^2 + a_1 x + a_2$$

$$\varphi(x) = b_0 x^2 + b_1 x + b_2.$$

Man kann hier direct das Product

$$R = a_0^2 (b_0 \alpha_1^2 + b_1 \alpha_1 + b_2) (b_0 \alpha_2^2 + b_1 \alpha_2 + b_2)$$

berechnen, und erhält, wenn man

$$- a_0 (\alpha_1 + \alpha_2) = a_1, \quad a_0 \alpha_1 \alpha_2 = a_2$$

setzt,

$$(11) \quad R = a_0^2 b_2^2 + a_2^2 b_0^2 - b_0 b_1 a_1 a_2 - a_0 a_1 b_1 b_2 \\ + b_0 b_2 a_1^2 + a_0 a_2 b_1^2 - 2 a_0 b_0 a_2 b_2,$$

oder was damit identisch ist

$$(12) \quad R = (a_0 b_2 - a_2 b_0)^2 - (a_0 b_1 - a_1 b_0) (a_1 b_2 - a_2 b_1).$$

Die einzelnen Glieder der Resultante der zwei Functionen $f(x)$ und $\varphi(x)$ vom n^{ten} und m^{ten} Grade haben, von einem numerischen (ganzzahligen) Factor abgesehen, die Gestalt

$$(13) \quad a_0^{\nu_0} a_1^{\nu_1} \dots a_n^{\nu_n} b_0^{\mu_0} b_1^{\mu_1} \dots b_m^{\mu_m},$$

worin, wie aus den oben bestimmten Graden hervorgeht,

$$(14) \quad \begin{aligned} \nu_0 + \nu_1 + \dots + \nu_n &= n \\ \mu_0 + \mu_1 + \dots + \mu_m &= m. \end{aligned}$$

Wir können aber noch eine andere Relation zwischen diesen Exponenten angeben.

Da nämlich [nach (6)] R eine homogene Function $n m^{\text{ten}}$ Grades von den $n + m$ Variablen α, β ist, da ferner a_0 vom nullten, a_1 vom ersten, a_2 vom zweiten etc. Grade in den α , allgemein a_k und b_k vom k^{ten} Grade in diesen Variablen sind, so folgt

$$(15) \quad \begin{aligned} \nu_1 + 2 \nu_2 + 3 \nu_3 + \dots + n \nu_n \\ + \mu_1 + 2 \mu_2 + 3 \mu_3 + \dots + m \mu_m &= n m, \end{aligned}$$

eine Relation, aus der sich ein wichtiger Schluss ziehen lässt, den wir im folgenden Paragraphen etwas ausführlicher besprechen wollen.

§. 49.

Elimination. Theorem von Bezout.

Wenn in den beiden Functionen

$$(1) \quad \begin{aligned} f(x) &= a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n \\ \varphi(x) &= b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m \end{aligned}$$

die Coëfficienten a, b selbst wieder ganze rationale Functionen einer Grösse y sind, so wird auch die Resultante eine ganze rationale Function von y werden, die wir mit $F(y)$ bezeichnen wollen. Die Bildung dieser Gleichung ist die Elimination von x aus den beiden Gleichungen (1).

Die Gleichung

$$(2) \quad F(y) = 0$$

hat alle die Werthe von y zu Wurzeln, wofür die beiden Gleichungen

$$(3) \quad f(x) = 0, \quad \varphi(x) = 0$$

eine gemeinsame Wurzel haben. Ist die Bedingung (2) befriedigt, so findet man die Werthe von x , die den zwei Gleichungen (3) genügen, indem man den grössten gemeinschaftlichen Theiler von $f(x)$ und $\varphi(x)$ aufsucht. Dieser gemeinschaftliche Theiler ist vom ersten Grade und bestimmt also x rational, wenn nur eine solche gemeinschaftliche Wurzel vorhanden ist; im anderen Falle wird er von entsprechend höherem Grade, und die Bestimmung von x erfordert noch die Lösung einer Gleichung höheren Grades.

Gehört zu jeder Wurzel der Resultante nur eine gemeinschaftliche Wurzel x , so ist die Zahl der Werthepaare x, y , die den Gleichungen (3) genügen, gleich dem Grade der Resultante in Bezug auf y . Sind also die Coëfficienten a vom Grade ν , b vom Grade μ in Bezug auf y , so ist nach der Gradbestimmung des vorigen Paragraphen der Grad der Resultante

$$(5) \quad n\nu + m\mu;$$

so gross ist also die Anzahl der gemeinsamen Wurzelpaare. Diese Zahl kann aber noch dadurch modificirt werden, dass möglicherweise die Coëfficienten so beschaffen sein können, dass

die höchste Potenz von y aus der Endgleichung wegfällt. Man würde dann die Uebereinstimmung der Zahl mit (5) nur durch die willkürliche Hinzufügung unendlicher Wurzeln retten können. Auch mehrfache Wurzeln geben zu Bedenken Anlass. Man begegnet diesen Uebelständen theilweise dadurch, dass man die homogene Form der Gleichungen zu Grunde legt, eine Form, in der sich das Eliminationsproblem besonders in der Geometrie einstellt.

Wenn nämlich die Function $f(x)$ aus einer homogenen Function n^{ter} Ordnung der drei Variablen x, y, z (einer ternären Form) durch Ordnen nach Potenzen von x hervorgegangen ist, so sind die Coëfficienten $a_0, a_1, a_2 \dots a_n$ homogene Formen der beiden Variablen y, z von dem Grade, den der Index angiebt, also a_0 eine Constante, a_1 eine lineare, a_2 eine quadratische Form u. s. f., und Entsprechendes gilt von den Coëfficienten $b_0, b_1 \dots b_m$ der Function $\varphi(x)$.

Bedeutend x, y, z Dreieckscoordinaten in der Ebene, so sind $f(x) = 0, \varphi(x) = 0$ die Gleichungen einer Curve n^{ter} und m^{ter} Ordnung, und die gemeinsamen Wurzeln dieser beiden Gleichungen (die Verhältnisse $x:y:z$) bedeuten die Schnittpunkte der beiden Curven. Die Endgleichung, die man durch Elimination von x erhält, ist eine homogene Gleichung, deren Grad sich aus (15), §. 48 gleich nm ergibt.

Eine Verminderung des Grades kann hier nicht stattfinden; immer ist die Endgleichung eine homogene Gleichung des nm^{ten} Grades für die beiden Unbekannten y, z . Die einzige Ausnahme, auf die hier zu achten ist, ist die, dass die Resultante identisch (für alle y, z) verschwindet, dass also unendlich viele gemeinsame Wurzeln vorhanden sind. Dieser Fall hat in der Geometrie die Bedeutung, dass die beiden Curven einen Curventheil und nicht bloss einzelne Punkte gemein haben.

Wenn die Gleichungen $f = 0, \varphi = 0$ nur eine endliche Anzahl gemeinsamer Wurzeln haben, so können wir in den Ausdrücken

$$y_1 = y + \beta x, \quad z_1 = z + \gamma x$$

die Constanten β, γ so einrichten, dass, wenn einem Werth des Verhältnisses $y:z$ mehrere verschiedene der Gleichungen (1) genügende Werthe von x entsprechen, die zugehörigen Werthe von $y_1:z_1$ von einander verschieden ausfallen.

Wir können dann f und φ auch als homogene Functionen vom Grade m und n der Veränderlichen x, y_1, z_1 ansehen, und die Resultante wird dann eine homogene Function $m n^{\text{ten}}$ Grades $R(y_1, z_1)$ von y_1 und z_1 . Setzen wir darin

$$y_1 = b' + b\lambda, \quad z_1 = c' + c\lambda,$$

so erhalten wir eine Gleichung $m n^{\text{ten}}$ Grades in λ , und wir können, wenn $R(y_1, z_1)$ nicht identisch verschwindet, die Constanten b, b', c, c' so annehmen, dass der Coëfficient der höchsten Potenz von λ , nämlich $R(b, c)$, von Null verschieden ist. Dann entspricht jeder Wurzel der Resultante nur ein Werthsystem des Verhältnisses $x:y:z$, und die Anzahl der gemeinschaftlichen Wurzeln von f und φ ist also höchstens gleich mn . Um den Satz aussprechen zu können, dass die Zahl der gemeinsamen Wurzeln immer gleich mn ist, muss man noch ein Uebereinkommen treffen, wonach gewisse dieser Werthpaare mehrfach zu zählen sind.

Der Satz, der, in geometrischem Gewande, besagt, dass sich zwei Curven m^{ter} und n^{ter} Ordnung in mn Punkten schneiden, wird das Bezout'sche Theorem genannt.

§. 50.

Elimination aus mehreren Gleichungen.

Die Principien der Elimination, die wir im Vorhergehenden auf zwei Gleichungen angewandt haben, lassen sich ohne Schwierigkeit auf mehrere Gleichungen mit einer entsprechenden Anzahl von Unbekannten ausdehnen.

Nehmen wir zunächst die Gleichungen

$$(1) \quad f(x) = 0, \quad \varphi(x) = 0, \quad \psi(x) = 0,$$

der Grade m, n, p , deren Coëfficienten a_i, b_i, c_i zunächst als unabhängige Veränderliche betrachtet werden sollen.

Wir wenden auf zwei von ihnen, etwa auf $f(x), \varphi(x)$, den Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers an und erhalten einen letzten Rest, der eine rationale Function der a und b ist und der, von Nennern befreit, mit der Resultante R von $f(x)$ und $\varphi(x)$ übereinstimmt, und einen vorletzten, der eine lineare Function von x ist. Die Bedingung für das Vorhandensein einer gemeinsamen Wurzel von $f = 0$ und $\varphi = 0$ ist das Verschwinden der Resultante, und der vorletzte Rest

giebt unter dieser Voraussetzung für die gemeinsame Wurzel einen rationalen Ausdruck durch die Coëfficienten.

Setzt man diesen Ausdruck in $\psi(x)$ ein, so erhält man, wenn man alle Nenner fortschafft, eine ganze rationale Function der Coëfficienten a, b, c , die wir mit S bezeichnen wollen, und deren Verschwinden in Verbindung mit $R = 0$ die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür enthält, dass die drei Gleichungen (1) eine gemeinsame Wurzel haben.

Ersetzen wir nun die Coëfficienten a, b, c der Functionen (1) durch ganze rationale Functionen einer zweiten Unbekannten y , deren Coëfficienten mit α, β, γ bezeichnet und vorläufig als unabhängige Veränderliche betrachtet werden mögen.

R und S werden dann ganze rationale Functionen von α, β, γ und y und wenn wir also die Gleichungen

$$(2) \quad R = 0, \quad S = 0$$

als Gleichungen für y betrachten, so können wir nach den Regeln des vorigen Paragraphen ihre Resultante T bilden, die, wenn sie nicht identisch verschwindet, eine ganze rationale Function der Coëfficienten α, β, γ sein wird, und die Gleichung

$$(3) \quad T = 0$$

ist die nothwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass das Gleichungssystem (1) durch ein oder mehrere Werthepaare x, y befriedigt werden kann. T heisst die Resultante des Systems (1). Man kann also aus den drei Gleichungen (1) durch Elimination der Unbekannten x und y eine Endgleichung für x bilden.

Ersetzt man nun die α, β, γ wieder durch ganze rationale Functionen einer dritten Unbekannten z , so geht T in eine Gleichung für z über. Die Functionen f, φ, ψ werden Functionen der drei Unbekannten x, y, z . Der Grad der Gleichung (3) giebt die Anzahl der Werthsysteme x, y, z , für die die drei Gleichungen (1) zugleich befriedigt sind.

Sind aber die Coëfficienten so beschaffen, dass T identisch (für alle Werthe von z) verschwindet, so giebt es unendlich viele Werthsysteme x, y, z , die den Gleichungen (1) zugleich genügen.

Betrachtet man x, y, z als Cartesische Coordinaten, so stellen die Gleichungen (1), jede für sich, eine Oberfläche dar. Der Grad der Endgleichung $T = 0$ in Bezug auf z giebt die

Anzahl der Schnittpunkte dieser drei Oberflächen an. Ist aber T identisch Null, so haben die drei Flächen entweder einen Flächen-theil oder eine Curve gemeinschaftlich.

Den Grad der Endgleichung können wir auf folgendem Wege bestimmen, der gar keine weitläufigen Betrachtungen über die Grade der Functionen R, S, T erfordert. Wir führen, um uns von Ausnahmefällen unabhängig zu machen, homogene Variable ein, indem wir eine vierte, u , hinzufügen, und also drei homogene quaternäre Gleichungen

$$(4) \quad F(x, y, z, u) = 0, \quad \Phi(x, y, z, u) = 0, \quad \Psi(x, y, z, u) = 0$$

von den Ordnungen m, n, p betrachten.

Nehmen wir den besonderen Fall an, dass jede dieser drei Functionen in lauter lineare Factoren zerfällt, so ist klar, dass, wenn die Anzahl der gemeinsamen Lösungen nicht unendlich ist, ihre Anzahl gleich dem Product mnp sein muss; denn wir können je einen linearen Factor von F, Φ, Ψ gleichzeitig Null setzen und erhalten so mnp Systeme von je drei linearen Gleichungen, die, wenn sie von einander unabhängig sind, ebenso viele Werthsysteme für die Verhältnisse $x:y:z:u$ ergeben.

Der Schluss, dass im allgemeinen Fall der Grad der Endgleichung von (4) ebenso gross ist, ist auf den ersten Blick bedenklich. Das Bedenken kann aber nach einer Bemerkung von F. Klein durch folgende einfache Ueberlegung vollständig beseitigt werden.

Denken wir uns die Endgleichung aus den Gleichungen (4) zunächst unter der Voraussetzung gebildet, dass die Coëfficienten in den Gleichungen (4) von einander unabhängige Variable sind, so wird die Resultante, die sich nach Elimination von x, y ergibt, gewiss nicht identisch Null, da sie schon für specielle Coëfficientensysteme, z. B. wenn F, Φ, Ψ in lineare Factoren zerfallen, nicht identisch verschwindet, und wir erhalten eine homogene Endgleichung für die zwei Unbekannten z, u von einem gewissen Grade, der zu ermitteln ist.

Specialisirt man die Coëfficienten irgend wie, so kann zwar möglicherweise die Endgleichung identisch befriedigt werden; wenn aber dieser Fall nicht eintritt, so kann ihre Ordnung nicht geändert werden (da ja alle Glieder von derselben Ordnung sind). Da nun durch die oben angenommene Specialisirung, die sich in dem Zerfallen der Functionen F, Φ, Ψ ausspricht, das

identische Verschwinden nicht stattfindet, sondern eine Endgleichung von der Ordnung mnp auftritt, so muss dies auch der Grad der Endgleichung im allgemeinen Falle sein.

Hiermit ist das Bezout'sche Theorem für den Fall von drei homogenen quaternären Gleichungen bewiesen.

Dass wir uns hier auf drei Gleichungen beschränkt haben, ist lediglich im Interesse der Einfachheit geschehen. Die Erweiterung, die für den Fall von n Gleichungen mit $n + 1$ homogenen Unbekannten erforderlich ist, ergibt sich von selbst, und kann dem Leser überlassen bleiben.

Für unsere allgemeine Aufgabe wollen wir nur noch bemerken, dass sich aus diesen Betrachtungen ergibt, dass das Problem der Algebra, sofern es sich auf die Lösung irgend welcher algebraischer Gleichungen bezieht, damit zurückgeführt ist auf die Behandlung einer Kette von Gleichungen mit je einer Unbekannten.

§. 51.

Zerlegbare und unzerlegbare Functionen.

Unter den ganzen rationalen Functionen mehrerer Veränderlichen müssen zerlegbare und unzerlegbare unterschieden werden.

Eine ganze rationale Function von irgend welchen Veränderlichen heisst zerlegbar, wenn sie als Product von wenigstens zwei ganzen rationalen Functionen derselben Veränderlichen darstellbar ist; ist sie nicht als ein solches Product darstellbar, so heisst sie unzerlegbar.

Wenn eine Function zerlegbar ist, so ist der Grad jedes der Factoren niedriger als der Grad der Function selbst. Eine lineare Function ist also immer unzerlegbar, und jede ganze rationale Function lässt sich in eine endliche Anzahl unzerlegbarer Functionen zerlegen.

Wir nennen eine ganze Function W durch eine andere w theilbar, wenn eine dritte ganze Function w' existirt, so dass

$$W = ww'$$

ist. Daraus folgt dann, dass, wenn U eine durch w theilbare und V eine beliebige ganze Function ist, auch das Product UV

durch w theilbar ist, und dass, wenn $U, U', U'' \dots$ durch w theilbare, $V, V', V'' \dots$ beliebige ganze rationale Functionen sind, auch $UV + U'V' + U''V'' \dots$ durch w theilbar ist.

Ist W durch w theilbar, so sagt man auch, w geht in W auf.

Zwei ganze rationale Functionen U, V , die nicht durch eine und dieselbe ganze rationale Function theilbar sind, heissen relativ prim oder theilerfremd.

Wir beweisen den Satz:

- I. Sind U, V, v ganze rationale Functionen irgend welcher Veränderlichen, sind U und v relativ prim und UV durch v theilbar, so ist V durch v theilbar.

Dieser Satz entspricht genau einem bekannten Fundamentalsatz aus der Lehre von den ganzen Zahlen, dass nämlich, wenn ein Product von zwei ganzen Zahlen durch eine dritte ganze Zahl theilbar ist, die zu dem einen Factor theilerfremd ist, der andere Factor durch diese Zahl theilbar sein muss.

Wir beweisen ihn durch vollständige Induction. Sind U, V, v nur von einer Veränderlichen x abhängig, so ist der Satz richtig; denn nach §. 6 (Satz I) kann man in diesem Falle, wenn U und v relativ prim sind, zwei andere ganze Functionen P und p von x so bestimmen, dass

$$PU + pv = 1,$$

woraus durch Multiplication mit V

$$PUV + pVv = V$$

folgt, und daraus ersieht man, dass, wenn UV durch v theilbar ist, auch V durch v theilbar sein muss.

Wir nehmen also an, der Satz, den wir beweisen wollen, sei für Functionen von n und weniger Veränderlichen bewiesen, und wir leiten daraus seine Richtigkeit für Functionen von $n + 1$ Veränderlichen ab.

Dazu ist erforderlich, dass wir aus dem als richtig vorausgesetzten Theorem I einige Folgerungen ziehen, als deren Schluss sich dann die Gültigkeit des Theorems für die nächst höhere Variablenzahl ergibt.

Ist v eine unzerlegbare Function, so ist eine andere Function U derselben Veränderlichen entweder relativ prim zu v oder durch v theilbar. Daraus folgt nach I., dass ein Product von

zwei Functionen UV nur dann durch v theilbar sein kann, wenn einer der beiden Factoren durch v theilbar ist. Dasselbe gilt für ein Product von mehreren Functionen, und so folgt aus I. das Theorem:

- II. Ein Product aus mehreren ganzen rationalen Functionen ist nur dann durch eine unzerlegbare Function v theilbar, wenn wenigstens einer der Factoren des Productes durch v theilbar ist.

Wenn eine ganze rationale Function U auf zwei Arten in unzerlegbare Factoren zerlegt ist,

$$U = v v' v'' \dots = w w' w'' \dots,$$

so muss nach II. wenigstens einer der Factoren $v, v', v'' \dots$ durch w theilbar sein, also etwa v . Dann aber kann, da auch v unzerlegbar ist, v von w nur durch einen constanten Factor verschieden sein.

Demnach ist, wenn c dieser constante Factor ist,

$$c v' v'' \dots = w' w'' \dots,$$

woraus folgt, dass eine der Functionen $v', v'' \dots$, etwa v' , durch w' theilbar ist, und sich also von w' nur durch einen constanten Factor unterscheidet.

Wir erhalten also als zweite Folgerung aus dem Theorem I:

- III. Eine ganze rationale Function kann, von constanten Factoren abgesehen, nur auf eine Art in unzerlegbare Factoren zerlegt werden.

Hieraus ergibt sich der Begriff des grössten gemeinschaftlichen Theilers von zwei oder mehr ganzen rationalen Functionen $U, V \dots$. Man versteht darunter das Product aller unzerlegbaren Factoren, die in den Zerlegungen jeder der Functionen $U, V \dots$ vorkommen, oder die Function möglichst hohen Grades, die in allen Functionen $U, V \dots$ aufgeht. Nach III. ist diese Function, von einem constanten Factor abgesehen, für jedes Functionensystem $U, V \dots$ vollständig bestimmt.

Mehrere Functionen $U, V, W \dots$ heissen relativ prim, wenn keine zwei von ihnen einen gemeinsamen Theiler haben.

Alle diese Definitionen und Sätze sind genau analog mit sehr bekannten Sätzen der elementaren Zahlenlehre, die dort als Folgerungen des Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen

Theilers auftreten, nur dass hier die unzerlegbaren Functionen die Rolle der Primzahlen übernehmen.

Wir führen noch einen solchen Satz an:

IV. Sind u, v relativ prim und Uu, Uv durch w theilbar, so ist U durch w theilbar.

Denn zerlegt man die ganzen rationalen Functionen U, u, v, w in ihre unzerlegbaren Factoren, so muss irgend ein Factor von w , da er nicht in u und v zugleich vorkommen kann, in U aufgehen. Hebt man ihn aus U und w weg, so kann man ebenso für einen nächsten Factor von w schliessen u. s. f.

Wir betrachten nun ganze rationale Functionen einer Veränderlichen t

$$f(t) = u_0 t^m + u_1 t^{m-1} + \dots + u_{m-1} t + u_m,$$

deren Coëfficienten ganze rationale Functionen von n Veränderlichen x sind, von denen t unabhängig ist.

Sind die Coëfficienten $u_0, u_1 \dots u_m$ ohne gemeinsamen Theiler, so heisst $f(t)$ primitiv, im anderen Falle wird der grösste gemeinschaftliche Theiler der Coëfficienten $u_0, u_1 \dots u_m$ der Theiler der Function $f(t)$ genannt (vgl. §. 2).

Wir schliessen, immer unter Voraussetzung der Gültigkeit von I:

V. Das Product von zwei primitiven Functionen $f(t)$ und $\varphi(t)$ ist wieder eine primitive Function und der Theiler eines Productes zweier imprimitiver Functionen ist gleich dem Product der Theiler beider Factoren.

Der Beweis ist ganz so wie für den entsprechenden Satz in §. 2.

Es seien

$$(1) \quad \begin{aligned} f(t) &= u_0 t^m + u_1 t^{m-1} + \dots + u_m \\ \varphi(t) &= v_0 t^u + v_1 t^{u-1} + \dots + v_\mu \end{aligned}$$

zwei primitive Functionen und

$$(2) \quad F(t) = U_0 t^{m+u} + U_1 t^{m+u-1} + \dots + U_{m+\mu}$$

ihr Product. Es ist dann, wenn r und s irgend zwei Ziffern aus den Reihen $0, 1 \dots m$, und $0, 1, 2 \dots \mu$ bedeuten (§. 2)

$$(3) \quad \begin{aligned} U_{r+s} &= u_r v_s + u_{r-1} v_{s+1} + \dots \\ &\quad + u_{r+1} v_{s-1} + \dots \end{aligned}$$

Wenn nun w irgend eine unzerlegbare Function ist, die weder in allen u_r noch in allen v_s aufgeht, so wählen wir in (3) r und s so, dass u_r das erste nicht durch w theilbare u ist, also $u_{r-1}, u_{r-2} \dots$ durch w theilbar sind, und dass ebenso v_s das erste, nicht durch w theilbare v wird. Dann kann auch U_{r+s} nicht durch w theilbar sein, weil alle Glieder, mit Ausnahme des ersten, durch w theilbar sind, d. h. $F(t)$ ist primitiv.

Daraus folgt unmittelbar, wenn p und q irgend welche ganze rationale Functionen der x sind, dass pq der Theiler des Productes der beiden imprimitiven Functionen $pf(t)$, $q\varphi(t)$ ist, also der zweite Theil des Satzes V. Daraus folgt weiter:

VI. Wenn eine ganze rationale Function $F(t)$ der $n+1$ Variablen x und t in zwei Factoren zerlegbar ist, die in Bezug auf t ganz, in Bezug auf die x wenigstens rational sind, so ist sie auch in zwei Functionen zerlegbar, die in x und t ganz und rational sind.

Denn nach der Voraussetzung giebt es eine ganze rationale Function w der x allein und zwei ganze rationale Functionen der x und t , $f_1(t)$, $\varphi_1(t)$, so dass

$$wF(t) = f_1(t) \varphi_1(t),$$

und nach (V) muss w in dem Product der Theiler von $f_1(t)$ und $\varphi_1(t)$ aufgehen, so dass wir auch

$$F(t) = f(t) \varphi(t)$$

erhalten, worin $f(t)$, $\varphi(t)$ gleichfalls ganze rationale Functionen von x und t , und zwar in Bezug auf t von demselben Grade wie $f_1(t)$ und $\varphi_1(t)$ sind, w. z. b. w. — Hieraus schliessen wir weiter, dass zwei Functionen $F(t)$, $f(t)$, die als ganze rationale Functionen der $n+1$ Veränderlichen x und t betrachtet, in dem oben definirten Sinne relativ prim sind, sich auch, als Functionen von t allein betrachtet, und nach dem Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers behandelt (§. 6), als relativ prim erweisen müssen. Denn wenn sie einen gemeinsamen Theiler hätten, der in Bezug auf t ganz, in Bezug auf die x gebrochen wäre, so liesse sich eine ganze Function T von x und t und eine ganze Function P der x allein so bestimmen, dass

$$PF(t) = TF_1(t), \quad Pf(t) = Tf_1(t)$$

wäre, worin F_1, f_1 ganze Functionen ohne gemeinsamen Theiler

sind. Nach IV müsste also P im Theiler von T aufgehen, und es könnten $F(t)$ und $f(t)$ nicht relativ prim sein. Es lassen sich also nach §. 6 zwei ganze rationale Functionen Q, q von x und t und eine ganze rationale Function X von den x allein so bestimmen, dass die Identität

$$(4) \quad QF(t) + qf(t) = X$$

besteht.

Ist nun $\Phi(t)$ eine weitere ganze rationale Function von x und t , so folgt aus (4) durch Multiplication mit $\Phi(t)$

$$Q\Phi(t)F(t) + q\Phi(t)f(t) = X\Phi(t),$$

und wenn also $\Phi(t)F(t)$ durch $f(t)$ theilbar ist, so ist hiernach auch $X\Phi(t)$ durch $f(t)$ theilbar.

Demnach können wir, wenn $\varphi(t)$ und $\psi(t)$ wieder zwei ganze Functionen von x und t bedeuten, setzen

$$(5) \quad \begin{aligned} X\Phi(t) &= \varphi(t)f(t) \\ F(t)\Phi(t) &= \psi(t)f(t). \end{aligned}$$

Multiplicirt man die zweite dieser Gleichungen mit X und setzt aus der ersten für $X\Phi(t)$ den Ausdruck $\varphi(t)f(t)$ ein, so lässt sich $f(t)$ wegheben und es folgt

$$\varphi(t)F(t) = X\psi(t).$$

Nach IV. muss also X sowohl im Theiler von $\varphi(t)f(t)$ als im Theiler von $\varphi(t)F(t)$ aufgehen, und da die Functionen $f(t)$ und $F(t)$ und mithin auch ihre Theiler relativ prim sind, so muss X im Theiler von $\varphi(t)$ aufgehen. Setzen wir also demnach

$$\varphi(t) = X\varphi_1(t),$$

so folgt aus (5)

$$\Phi(t) = \varphi_1(t)f(t),$$

d. h. $\Phi(t)$ ist durch $f(t)$ theilbar, also:

VII. Sind $F(t)$ und $f(t)$ relativ prim und $\Phi(t)F(t)$ durch $f(t)$ theilbar, so ist $\Phi(t)$ durch $f(t)$ theilbar.

Dies aber ist nichts Anderes als das Theorem I für Functionen von $n + 1$ Variablen, und I. ist somit allgemein bewiesen.

§. 52.

Tschirnhausen-Transformation.

Wir machen von der Theorie der symmetrischen Functionen und der Resultantenbildung noch eine wichtige Anwendung auf die von Tschirnhausen¹⁾ herrührende Transformation algebraischer Gleichungen.

Es sei

(1) $f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n$
irgend eine Function n^{ten} Grades, und

(2) $y = \frac{\chi(x)}{\psi(x)}$

irgend eine (ganze oder gebrochene) rationale Function von x , bei der wir nur die eine Voraussetzung machen, dass $f(x)$ und $\psi(x)$ keinen gemeinsamen Theiler haben sollen. Nach dem Satzsatz von §. 6 können wir dann die Functionen $F(x)$ und $\varphi(x)$, letztere höchstens vom Grade $n-1$, so bestimmen, dass

(3) $\chi(x) = F(x) f(x) + \varphi(x) \psi(x)$

wird, so dass, sobald für x eine Wurzel der Gleichung

(4) $f(x) = 0$

gesetzt wird,

$$\frac{\chi(x)}{\psi(x)} = \varphi(x).$$

wird. Da wir nun die Werthe von y nur für solche Werthe von x , die Wurzeln von (4) sind, betrachten werden, so verlieren wir nichts an Allgemeinheit, wenn wir von vornherein

$$y = \varphi(x),$$

also gleich einer ganzen Function $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades setzen. Es sei also

(5) $y = \varphi(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1},$

worin die Coëfficienten α vorläufig noch ganz unbestimmt bleiben.

Bezeichnen wir mit

(6) $x_1, x_2 \dots x_n$

¹⁾ Acta eruditorum, Leipzig 1683.

die Wurzeln der Gleichung (4), so ergeben sich aus (5) die entsprechenden Werthe von y :

$$(7) \quad y_1 = \varphi(x_1), \quad y_2 = \varphi(x_2) \dots y_n = \varphi(x_n),$$

und das Product

$$(8) \quad \Phi(y) = (y - y_1)(y - y_2) \dots (y - y_n)$$

ist eine symmetrische Function der Grössen (6), die sich also rational durch die Coëfficienten von $f(x)$ ausdrücken lässt.

In dieser Weise dargestellt, möge $\Phi(y)$ den Ausdruck haben

$$(9) \quad \Phi(y) = y^n + b_1 y^{n-1} + b_2 y^{n-2} + \dots + b_{n-1} y + b_n.$$

Die Coëfficienten b_r werden nach §. 7 durch die y_i bestimmt mittelst der Formeln

$$b_1 = -\Sigma y_1, \quad b_2 = \Sigma y_1 y_2, \quad b_3 = -\Sigma y_1 y_2 y_3 \dots,$$

woraus sich ergibt, dass b_r eine ganze rationale und homogene Function r^{ten} Grades von den Variablen $\alpha_0, \alpha_1 \dots \alpha_{n-1}$ ist.

$\Phi(y)$ ist nichts Anderes als die Resultante der beiden Gleichungen

$$(10) \quad f(x) = 0, \quad \varphi(x) - y = 0,$$

und nach §. 49 kann man auch umgekehrt die gemeinsame Wurzel dieser beiden Gleichungen (10), wenn y einem der Werthe $y_1, y_2 \dots y_n$ gleich wird, rational durch die Coëfficienten von (10), d. h. rational durch α_i, α_i, y ausdrücken, vorausgesetzt, dass nur eine solche gemeinsame Wurzel vorhanden ist.

Dies wird dann eintreten, wenn die n Werthe $y_1, y_2 \dots y_n$ von einander verschieden sind. Dann erhält man einen Ausdruck

$$x = \beta_0 + \beta_1 y + \beta_2 y^2 + \dots + \beta_{n-1} y^{n-1},$$

der gültig ist, wenn für x einer der Werthe (6) und für y der zugehörige Werth (7) gesetzt wird. Die Grössen β_i sind aus den α_i und α_i rational zusammengesetzt.

Kommen aber unter den Werthen $y_1, y_2 \dots y_n$ mehrere gleiche vor, so erfordert die Bestimmung der zugehörigen Werthe der x noch die Auflösung einer Gleichung des entsprechenden Grades. Dieser Grad ist aber immer kleiner als n , da die Function $\varphi(x)$ höchstens für $n - 1$ Werthe von x denselben Werth y erhalten kann. Wenn also die Gleichung

$$(11) \quad \Phi(y) = 0$$

vollständig gelöst ist, so ist damit auch die Gleichung (1) vollständig gelöst [wenn (11) n verschiedene Wurzeln hat] oder wenigstens auf die Lösung einer Gleichung niederen Grades zurückgeführt [wenn (11) gleiche Wurzeln hat].

Demnach betrachten wir (11) als eine Umformung der Gleichung (1), und die Bildung von (11) aus (1) heisst die Tschirnhausen-Transformation der Gleichung (1).

Der Zweck einer solchen Transformation ist, die Coefficienten α_i so zu bestimmen, dass $\Phi(y)$ eine einfachere Gestalt erhält als $f(x)$.

Man kann die Coefficienten b_v bilden, wenn man die Potenzsummen der y_i kennt (§. 42).

Bezeichnen wir die Summen der m^{ten} Potenzen der x_i mit s_m , der y_i mit σ_m , also

$$s_m = Sx_i^m, \quad \sigma_m = Sy_i^m,$$

so können wir σ_m durch die s_m auf folgende Art bilden.

Wir entwickeln zunächst y^m nach dem polynomischen Lehrsatz (§. 12), setzen also

$$(12) \quad y^m = \sum_v \frac{\Pi(m)}{\Pi(v_0) \Pi(v_1) \dots \Pi(v_{n-1})} \alpha_0^{v_0} \alpha_1^{v_1} \dots \alpha_{n-1}^{v_{n-1}} x^{v_1 + 2v_2 + \dots + (n-1)v_{n-1}},$$

worin die Summe sich auf alle nicht negativen ganzzahligen Werthe von $v_0, v_1 \dots v_{n-1}$ erstreckt, die der Bedingung

$$(13) \quad v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1} = m$$

genügen. Setzen wir dann in (12) $x_1, x_2 \dots x_n$ für x und bilden die Summe der so erhaltenen Werthe von $y_1^m, y_2^m \dots y_n^m$, so folgt

$$(14) \quad \sigma_m = \sum_v \frac{\Pi(m)}{\Pi(v_0) \Pi(v_1) \dots \Pi(v_{n-1})} s_{v_1 + 2v_2 + \dots + (n-1)v_{n-1}} \alpha_0^{v_0} \alpha_1^{v_1} \dots \alpha_{n-1}^{v_{n-1}}.$$

Hierdurch ist σ_m als ganze homogene Function m^{ter} Ordnung der $\alpha_0, \alpha_1 \dots \alpha_{n-1}$ dargestellt. Eine etwas vereinfachte Schreibweise erhält man nach der zweiten Darstellung von Formen (§. 15). Lassen wir $\mu_1, \mu_2 \dots \mu_m$ unabhängig von einander die Reihe der Zahlen $0, 1 \dots n-1$ durchlaufen, so wird, wenn in einer Combination v_0 mal der Index 0, v_1 mal der Index 1, v_2 mal der Index 2, $\dots v_{n-1}$ mal der Index $n-1$ vorkommt,

$$v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_{n-1} = m$$

und

$\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_m = \nu_1 + 2\nu_2 + \dots + (n-1)\nu_{n-1}$,
und danach kann der Ausdruck für σ_m so dargestellt werden:

$$(15) \quad \sigma_m = \sum^{\mu} s_{\mu_1 + \mu_2 + \dots + \mu_m} \alpha_{\mu_1} \alpha_{\mu_2} \dots \alpha_{\mu_m}.$$

Beispielsweise wird

$$\sigma_1 = \alpha_0 s_0 + \alpha_1 s_1 + \dots + \alpha_{n-1} s_{n-1}$$

$$(16) \quad \sigma_2 = \sum^{i,k} s_{i+k} \alpha_i \alpha_k$$

$$\sigma_3 = \sum^{h,i,k} s_{h+i+k} \alpha_h \alpha_i \alpha_k,$$

worin h, i, k die Reihe der Zahlen $0, 1, 2 \dots n-1$ durchlaufen.

§. 53.

Anwendung auf die cubischen und biquadratischen Gleichungen.

Das Ziel, das schon Tschirnhausen bei dieser Transformation im Auge gehabt hat, bestand darin, durch Bestimmung der Substitutionscoefficienten $\alpha_0, \alpha_1 \dots \alpha_{n-1}$ in der umgeformten Gleichung $\Phi(y) = 0$ so viele Glieder zum Verschwinden zu bringen, dass die Gleichung lösbar wird. Es gelingt dies leicht bei den Gleichungen dritten und vierten Grades, wenn es auch nicht einfach ist, und nicht ohne weitläufige Rechnungen möglich scheint, die sonst bekannten Formeln auf diesem Wege abzuleiten.

Nehmen wir zunächst die cubische Gleichung

$$(1) \quad x^3 + ax^2 + bx + c = 0,$$

die wir durch die Substitution

$$(2) \quad y = x + \beta x + \gamma x^2$$

umformen. Um die Gleichung für y

$$(3) \quad y^3 + Ay^2 + By + C = 0$$

auf eine reine cubische Gleichung zurückzuführen, haben wir die Verhältnisse $\alpha:\beta:\gamma$ aus den beiden Gleichungen

$$(4) \quad A = 0, \quad B = 0$$

zu bestimmen, von denen die erste linear, die zweite quadratisch ist.

Die Gleichungen (4) sind gleichbedeutend mit

$$(5) \quad \sigma_1 = 0, \quad \sigma_2 = 0$$

und ergeben also nach (16) des vorigen Paragraphen

$$\alpha s_0 + \beta s_1 + \gamma s_2 = 0,$$

$\alpha^2 s_0 + 2 \alpha \beta s_1 + 2 \alpha \gamma s_2 + \beta^2 s_2 + 2 \beta \gamma s_3 + \gamma^2 s_4 = 0$,
worin $s_0 = 3$ ist. Multiplicirt man die letztere Gleichung mit s_0 und zieht das Quadrat der ersten davon ab, so folgt

$$(6) \quad \beta^2 (s_0 s_2 - s_1^2) + 2 \beta \gamma (s_0 s_3 - s_1 s_2) + \gamma^2 (s_0 s_4 - s_2^2) = 0.$$

Die Discriminante dieser quadratischen Gleichung

$$(s_0 s_3 - s_1 s_2)^2 - (s_0 s_2 - s_1^2) (s_0 s_4 - s_2^2)$$

giebt entwickelt

$$- s_0 (s_0 s_2 s_4 - s_0 s_3^2 - s_1^2 s_4 - s_2^3 + 2 s_1 s_2 s_3),$$

ist also, wenn D die Discriminante der cubischen Gleichung (1) bedeutet [§. 46, (9)], gleich $-3D$, und die Auflösung von (6) giebt also

$$(7) \quad \frac{\beta}{\gamma} = \frac{-(s_0 s_3 - s_1 s_2) + \sqrt{-3D}}{s_0 s_2 - s_1^2}.$$

Damit ist die Gleichung (3) auf eine reine Gleichung zurückgeführt, die zu ihrer Lösung nur noch das Ziehen einer Cubikwurzel erfordert. Welches Vorzeichen wir der in (7) vorkommenden Quadratwurzel geben wollen, steht in unserem Belieben.

Um die Tschirnhausen-Transformation für die biquadratische Gleichung zu benutzen, kann man etwa so verfahren, dass man in der umgeformten Gleichung

$$(8) \quad y^4 + b_1 y^3 + b_2 y^2 + b_3 y + b_4 = 0$$

die $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ so bestimmt, dass

$$(9) \quad b_1 = 0, \quad b_3 = 0$$

wird, wodurch (8) in eine quadratische Gleichung für y^2 übergeht, aus deren Wurzeln noch die Quadratwurzeln gezogen werden müssen, so dass, nachdem die Gleichungen (9) gelöst sind, noch zweimal eine Quadratwurzel gezogen werden muss.

Wenn man mittelst der ersten Gleichung (9) aus der zweiten α_0 eliminirt, so entsteht eine homogene cubische Gleichung zwischen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. Man kann daher eines von den beiden Verhältnissen $\alpha_1 : \alpha_2 : \alpha_3$ beliebig annehmen, z. B. $\alpha_3 = 0$ setzen, und erhält zur Bestimmung des anderen eine cubische Gleichung. Dadurch ist dann die Lösung der biquadratischen Gleichung auf die einer cubischen und auf Quadratwurzeln zurückgeführt.

§. 54.

Die Tschirnhausen-Transformation der Gleichung
fünften Grades.

Will man auf die Gleichung fünften Grades

$$(1) \quad x^5 + a_1 x^4 + a_2 x^3 + a_3 x^2 + a_4 x + a_5 = 0$$

die Tschirnhausen-Transformation anwenden, so hat man

$$(2) \quad y = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3 + \alpha_4 x^4$$

zu setzen, und erhält die Transformirte

$$(3) \quad y^5 + b_1 y^4 + b_2 y^3 + b_3 y^2 + b_4 y + b_5 = 0.$$

Der nächstliegende Gedanke wäre nun, die Verhältnisse der fünf Unbekannten α so zu bestimmen, dass

$$(4) \quad b_1 = 0, \quad b_2 = 0, \quad b_3 = 0, \quad b_4 = 0$$

würde, wodurch (3) auf eine reine Gleichung zurück käme, und dies war wohl auch das Ziel, das Tschirnhausen im Auge hatte. Aber von den vier Gleichungen (4) ist die erste linear, die zweite quadratisch, die dritte vom dritten und die vierte vom vierten Grade. Die Endgleichung, die man daraus ableiten kann, wird daher (nach §. 50) vom Grade $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$, und daher kann daraus für die Lösung der Gleichung fünften Grades kein Nutzen gezogen werden. Man sucht daher zunächst nur den beiden Gleichungen zu genügen

$$(5) \quad b_1 = 0, \quad b_2 = 0,$$

wodurch die Gleichung (3) in eine Form übergeht, die nach F. Klein (Vorlesungen über das Ikosaëder) eine Hauptgleichung fünften Grades genannt wird.

Zur Befriedigung der beiden Gleichungen (5) haben wir die Verfügung über die vier Verhältnisse $\alpha_0 : \alpha_1 : \alpha_2 : \alpha_3 : \alpha_4$, und wir können diese Grössen noch auf mannigfaltige Art zur Vereinfachung der Gleichung fünften Grades benutzen.

Wir kommen in einem späteren Abschnitt ausführlicher auf diesen Gegenstand zurück und beschränken uns hier darauf, die Ziele im Allgemeinen zu bezeichnen. Der Anschaulichkeit wegen bedienen wir uns einer geometrischen Einkleidung, die übrigens zum Verständniss der algebraischen Theorie, wie sie später gegeben werden soll, durchaus nicht wesentlich ist.

Wenn wir mit Hülfe der linearen Gleichung $b_1 = 0$ von den fünf Grössen α die eine, etwa α_0 , durch die übrigen ausdrücken, so können wir die vier übrigen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ als homogene Coordinaten eines Raumpunktes betrachten. Die Gleichung $b_2 = 0$ stellt dann eine Fläche zweiter Ordnung dar, $b_3 = 0$ eine Fläche dritter Ordnung, $b_4 = 0$ eine Fläche vierter Ordnung, $b_5 = 0$ eine Fläche fünfter Ordnung.

Wollte man also b_2, b_3, b_4 zugleich zu Null machen und dadurch die gegebene Gleichung auf eine reine reduciren, so müsste man einen der 24 Schnittpunkte von drei Flächen zweiter, dritter, vierter Ordnung bestimmen, der von einer Gleichung 24^{ten} Grades abhängt.

Statt nun so zu verfahren, sucht man auf der Fläche $b_2 = 0$ eine gerade Linie zu bestimmen. Solcher gerader Linien giebt es auf jeder Fläche zweiter Ordnung eine oder zwei Schaaren (reell oder imaginär), und man kann eine dieser Geraden durch Quadratwurzeln bestimmen, wie weiter unten ausgeführt werden soll. Die Ermittlung eines Schnittpunktes einer dieser geraden Linien mit der Fläche $b_3 = 0$ führt dann auf eine Gleichung dritten Grades, und wenn man noch durch Bestimmung eines gemeinsamen Factors der α den Coëfficienten $b_4 = 1$ macht, so erhält die Gleichung für y die Gestalt

$$(6) \quad y^5 + y + b = 0,$$

wodurch y als Function einer Variablen b bestimmt ist.

Diese Gleichungsform wird gewöhnlich nach dem englischen Mathematiker Jerrard genannt, der sie im Jahre 1834 bekannt machte. Sie ist aber schon viel früher (1786) von E. J. Bring in Lund publicirt worden¹⁾. Wir nennen sie daher die Bring-Jerrard'sche Form.

Ebensogut könnte man durch eine Gleichung vierten Grades $b_4 = 0$ machen, und würde eine zweite Normalform der Gleichung fünften Grades erhalten:

$$(7) \quad y^5 + y^2 + b = 0,$$

die die gleiche Berechtigung hat, wie die Bring-Jerrard'sche Form.

Für die Lösung der Gleichung fünften Grades freilich wird durch diese Betrachtungen nichts gewonnen. Ihr Nutzen besteht

¹⁾ Vgl. F. Klein, Vorlesungen über das Ikosaëder, S. 143.

darin, dass die Gleichung fünften Grades auf eine Normalform zurückgeführt wird, die nur von einem veränderlichen Coëfficienten abhängt. Dies kann auf unendlich viele verschiedene Arten erreicht werden und gelingt am einfachsten, nämlich ohne Lösung einer Gleichung dritten oder vierten Grades, wenn man die Gleichung fünften Grades $b_5 = 0$ selbst als eine Umformung der gegebenen Gleichung fünften Grades betrachtet. Hat man nämlich die Gleichung $b_5 = 0$ gelöst, so wird einer der fünf Werthe von y gleich 0, und die gegebene Gleichung fünften Grades ist damit zugleich gelöst.