

Über die Construction der Configurationen n_3 .

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doctorwürde

von der

hohen philosophischen Fakultät der Kgl. Universität Breslau

genehmigt

nebst den beigefügten Thesen

öffentlich zu verteidigen

am Sonnabend, den 17. März 1894

im Musiksaale der Universität

von


Ernst Steinitz

aus Breslau.

Opponenten:


Herr **Hans Räck**, cand. phil.

Herr **Reinhold Pyrkosch**, stud. phil.



Breslau, 1894.

Druck von Dr. R. Galle, Schuhbrücke No. 42.



Seinem hochverehrten Lehrer
Herrn Prof. Dr. Rosanes

gewidmet

vom Verfasser.

Die Konstruktion der Configurationen n_3 ist bisher nur für spezielle Fälle eingehend behandelt worden. Dass dieselbe im allgemeinen auf ein Problem zweiten Grades führt, also etwa auf die Aufgabe, die Doppelemente zweier incidenter Punktreihen zu ermitteln, wurde von Martinetti erkannt, welcher auch eine Andeutung über den hierzu führenden Weg gegeben hat.¹⁾ Dieser Gegenstand ist indessen interessant genug, um eine ausführlichere Behandlung zu verdienen. Im Folgenden soll eine solche gegeben werden. Es sollen sich hieran Methoden zur linearen Herstellung der Cff. n_3 anschliessen. Schroeter²⁾ hat zuerst für eine spezielle Klasse von Cff. ein derartiges Verfahren angegeben, welches auch bei vielen anderen Cff. angewendet werden kann. Wir werden sehen, dass bei den meisten Cff. n_3 eine lineare Konstruktion möglich ist. Die Konstruktionsmethoden, welche wir angeben werden, sind zwar nicht immer durchführbar, versagen aber nur in wenigen Fällen ihren Dienst.

§ 1. Definition: Eine ebene Configuration n_3 (Cf. n_3) ist ein ebenes geometrisches Gebilde, bestehend aus n Geraden und n Punkten, welche eine solche Lage zu einander haben,

¹⁾ Martinetti. „Sulle configurazioni piane μ_3 “. Abschn. 3. Annali di matematica pura ed applicata. Ser. II. Bd. 15.

²⁾ Schroeter. „Über lineare Konstruktionen zur Herstellung der Configurationen n_3 “ und „Über die Bildungsweise und geometrische Konstruktion der Configurationen 10_3 “. Nachrichten der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 1888 und 1889.

dass jede Gerade 3 Punkte enthält und durch jeden Punkt 3 Gerade hindurchgehen.

Wir bezeichnen die Punkte der Cf. mit n Zeichen z. B. den Ziffern 1, 2 . . . n und schreiben diese Ziffern in n Columnen, deren jede eine Gerade der Cf. darstellen soll, indem sie die drei Ziffern enthält, welche die auf der Geraden liegenden Punkte bezeichnen. Auf diese Weise gelangen wir zu einer schematischen Darstellung der Cf. Jede Cf. lässt sich in mannigfacher Weise bezeichnen. Abgesehen davon, dass es gleichgiltig ist, wie wir die Columnen des Schemas und wie wir die Elemente (Ziffern) innerhalb jeder einzelnen Columnne anordnen, ist auch die Reihenfolge, in welcher wir die Punkte der Cf. mit den Ziffern 1, 2 . . . n bezeichnen, willkürlich; wir werden daher zwei Cff. als gleich betrachten, wenn das Schema der einen durch eine Substitution der Zeichen 1, 2 . . . n in das der andern übergeht.

Aus der Definition der Cff. n_3 ergeben sich für ihre Bezeichnung folgende Eigenschaften:

1. Jede Columnne enthält 3 Elemente.
2. Jedes Element kommt in 3 Columnen vor.
3. Eine Columnne darf nicht ein und dasselbe Element mehrfach enthalten.
4. Zwei Columnen dürfen nicht in mehr als einem Element übereinstimmen.

Jede Gruppierung von n Elementen in n Columnen, welche diese vier Eigenschaften besitzt, wollen wir als Schema einer Cf. n_3 oder, wenn ein Missverständnis ausgeschlossen ist, kurzweg als eine Cf. n_3 , die Elemente auch als Cf.-Punkte, die Columnen als Cf.-Geraden bezeichnen, auch wenn das Schema seine Entstehung einer geometrischen Cf. nicht verdankt. Wir wollen jetzt umgekehrt, von irgend einem solchen Schema ausgehend, untersuchen, wie sich geometrische Cff. herstellen lassen, welche dem gegebenen Schema entsprechen.

§ 2. Zu einer für alle Cff. n_3 gültigen Konstruktion verhilft uns eine Eigenschaft, welche nicht nur diesen, son-

dern allen Cff. n_{μ}^1) zukommt; wir wollen daher das Vorhandensein dieser Eigenschaft allgemein für die Cff. n_{μ} nachweisen.

Lehrsatz: In dem Schema einer jeden Cf. n_{μ} lassen sich die Elemente innerhalb der Colonnen in der Weise anordnen, dass jede Horizontalreihe²⁾ jedes der Elemente 1, 2 . . . n einmal (und also auch nur einmal) enthält.

Um diesen Satz zu beweisen, zeigen wir zunächst, dass man die Punkte und Geraden der Cf. in der Weise einander zuordnen kann, dass je ein Punkt und eine durch diesen gehende Gerade einander entsprechen. Wir wollen annehmen, dass wir mit einer Anzahl von Punkten und Geraden eine solche Zuordnung bereits vorgenommen hätten, wir wollen den Complex dieser Geraden mit A, den der Punkte mit $\mathfrak{A}$, ferner den Complex der übrigen Geraden mit B, den der übrigen Punkte mit $\mathfrak{B}$ bezeichnen. Es entspricht dann jedem Punkte von $\mathfrak{A}$ eine durch ihn gehende Gerade von A, und unsere Aufgabe wird offenbar darin bestehen, den Complex A so zu erweitern, dass er alle Geraden der Cf. umfasst. Dann wird der Complex $\mathfrak{A}$ alle Punkte der Cf. enthalten, und die Complexe B und $\mathfrak{B}$ werden verschwinden.

Wenn eine Gerade b von B einen Punkt $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{B}$ enthält, so können wir b und $\mathfrak{b}$ einander zuordnen. Dadurch tritt der Punkt $\mathfrak{b}$ aus $\mathfrak{B}$ nach $\mathfrak{A}$ und die Gerade b aus B nach A über. Dieses Verfahren ist nicht anwendbar, wenn alle Geraden von B nur Punkte von $\mathfrak{A}$ enthalten.

Wir bezeichnen in diesem Falle alle Punkte von $\mathfrak{A}$, welche auf einer Geraden von B enthalten sind, mit α_0

1) Unter einer Cf. n_{μ} verstehen wir hier eine Gruppierung von n Elementen in n Colonnen, bei welcher jede Colonne (Gerade) μ Elemente (Punkte) enthält, jedes Element in μ Colonnen vorkommt, und welche auch der dritten und vierten der für die Cff. n_3 aufgestellten Bedingungen genügt.

2) Wir stellen uns vor, dass die Colonnen der Cf. in der Weise neben einander geschrieben sind, dass neben dem kten Element einer beliebigen Colonne das kte der nächstfolgenden zu stehen kommt.

(und, wenn eine Unterscheidung notwendig ist, hinzugefügtem zweiten Index), die zugehörigen Geraden, — welche alle in A enthalten sein müssen, — mit a_0 , die auf diesen Geraden enthaltenen Punkte des Complexes $\mathfrak{A}$, welche unter den Punkten a_0 nicht vorkommen, mit a_1 , die zugehörigen Geraden mit a_1 , die in diesen Geraden enthaltenen Punkte von $\mathfrak{A}$, welche unter den Punkten a_0 und a_1 sich nicht befinden, mit a_2 , die zugehörigen Geraden mit a_2 , u. s. f. Da n eine endliche Zahl ist, so müssen wir auf diese Weise schliesslich zu Punkten a_k gelangen, deren zugehörige Geraden a_k nur solche Punkte von $\mathfrak{A}$ enthalten, welche sämtlich unter den Punkten $a_0, a_1 \dots a_k$ bereits vorkommen. Wir teilen nun den Complex $\mathfrak{A}$ in zwei Complexe $\mathfrak{A}^0$ und $\mathfrak{A}'$, deren erster alle Punkte $a_0 \dots a_k$ enthält, während der andere aus den übrigen Punkten von $\mathfrak{A}$ sich zusammensetzt. Werden die den Punkten von $\mathfrak{A}^0$ zugehörigen Geraden einem Complex A^0 , die den Punkten von $\mathfrak{A}'$ zugehörigen Geraden einem Complex A' zugewiesen, so bilden A^0 und A' zusammen den Complex A .

Nehmen wir an, dass eine Gerade des Complexes A^0 z. B. a'_i ($i \leq k$) einen Punkt des Complexes $\mathfrak{B}$ z. B. b' enthielte. Ist a'_i der zu a'_i gehörige Punkt, so ist derselbe wenigstens in einer der Geraden a_{i-1} enthalten. Es sei a'_{i-1} eine solche Gerade, a'_{i-1} der zu ihr gehörige Punkt. Dann ist a'_{i-1} wenigstens in einer der Geraden a_{i-2} enthalten; es sei a'_{i-2} eine solche Gerade. In dieser Weise fortfahrend, gelangen wir zu einer Reihe von Punkten und Geraden

$$b' \ a'_i \ a'_i \ a'_{i-1} \ a'_{i-1} \ \dots \ a'_1 \ a'_1 \ a'_0 \ a'_0 \ b',$$

deren letzte b' eine der Geraden des Complexes $\mathfrak{B}$ ist, welche den Punkt a'_0 enthält. Diese Reihe hat folgende Eigenschaften. Jeder Punkt — mit Ausnahme von b' — ist der vorhergehenden Geraden zugeordnet und liegt auf dieser Geraden. Jeder Punkt liegt aber auch auf der folgenden Geraden. Wir können daher die Zuordnung in der Weise ändern, dass wir jedem Punkte die folgende Gerade entsprechen lassen. Hierbei bleiben die Punkte, welche vor-

her dem Complex $\mathfrak{A}$ angehörten, demselben erhalten, ebenso bleiben im Complex A alle die Geraden, welche vorher darin waren. Ferner aber tritt nun der Punkt b' , dem jetzt die Gerade a'_1 zugeordnet ist, aus $\mathfrak{B}$ nach $\mathfrak{A}$, und die Gerade b' , welcher der Punkt a'_0 zugehört, aus B nach A über.

Es ist jetzt nur noch der Fall zu untersuchen, dass keine Gerade des Complexes A^0 einen Punkt des Complexes $\mathfrak{B}$ enthält. Es können dann die Punkte des Complexes $\mathfrak{B}$, da sie auch in keiner Geraden von B enthalten sind, nur in den Geraden des Complexes A' auftreten. Dies ist aber ebenfalls unmöglich. Die Punkte des Complexes $\mathfrak{A}'$ nämlich, kommen, wie aus ihrer Definition unmittelbar hervorgeht, weder auf den Geraden von B noch auf denen von A^0 vor, sind also auf die Geraden von A' allein angewiesen. Da nun $\mathfrak{A}'$ ebenso viele Punkte enthält als A' Geraden, jeder Punkt aber in der Cf. μ mal vorkommt und jede Gerade μ Punkte enthält, so folgt, dass die Geraden von A' überhaupt nur die Punkte von $\mathfrak{A}'$ enthalten. Mithin ist der Complex $\mathfrak{B}$ und ebenso der Complex B überhaupt nicht mehr vorhanden, die gewünschte Zuordnung der Geraden und Punkte ist also bereits erreicht.

Wir wollen nun in jeder der Columnen, welche die Geraden der Cf. bezeichnen, dasjenige Element an die erste Stelle setzen, welches den der Geraden zugehörigen Punkt bezeichnet. Dann wird die erste Horizontalreihe des Cf.-Schemas jedes Element einmal enthalten. Das Schema, welches nach Entfernung dieser Reihe zurückbleibt, bezeichnet offenbar eine Cf. $n_{\mu-1}$, für welche der allgemein für Cf. n_{μ} bewiesene Satz ebenfalls gelten muss. Wir können daher innerhalb der Columnen des Schemas eine derartige Anordnung der Elemente treffen, dass die erste Horizontalreihe desselben — die zweite des ursprünglichen — jedes Element einmal enthält. Man ersieht sofort, dass man die Elemente der noch übrigen Horizontalreihen, welche stets eine Cf. bilden, so anordnen kann, dass auch jede dieser

Reihen jedes Element einmal enthält. Hiermit ist der oben ausgesprochene Satz vollständig bewiesen.

Wir wollen die oben angegebene Methode anwenden auf die

	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Cf. 20 ₃	3	4	8	9	11	15	5	15	7	12	7	10	7	8
	10	9	17	16	14	18	13	19	13	16	14	18	20	10
	6	8	9	11	11	12								
	14	12	17	15	16	13								
	19	19	20	20	17	18								

Ordnen wir den Geraden

1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	9	11	12
8	9	15	5	15	7	12	7	10	7	8	14	17	15	13
17	16	18	13	19	13	16	14	18	20	10	19	20	20	18

dieser Cf. bez. die Punkte

1	9	2	3	19	4	16	5	10	7	8	14	17	11	12
---	---	---	---	----	---	----	---	----	---	---	----	----	----	----

zu, so bilden diese Geraden den Complex A, die zugehörigen Punkte den Complex $\mathfrak{A}$. Der Complex B besteht aus den Geraden

1	1	2	8	11
3	4	11	12	16
10	9	14	19	17,

der Complex $\mathfrak{B}$ aus den Punkten

6	13	15	18	20.
---	----	----	----	-----

Alle auf den Geraden von B gelegenen Punkte gehören zu $\mathfrak{A}$, es sind dies die Punkte a_0 . Unter den Punkten a_1 sind jetzt die Punkte 5 und 7 zu verstehen.

Die zu $\mathfrak{B}$ gehörigen Punkte

13	18	15	6
----	----	----	---

liegen bez. auf den mit a_0 zu bezeichnenden Geraden

4	2	11	6
7	5	15	8
13	18	20	10.

Ordnen wir sie denselben zu und lassen dafür den Punkten

4	2	11	8
---	---	----	---

die Geraden

1 2 11 8
 4 11 16 12
 9 14 17 19

entsprechen, so enthält B nur noch die Gerade $\overset{1}{3}$, $\mathfrak{B}$ nur $\overset{1}{10}$

noch den Punkt 20. Es sind ferner zu bezeichnen mit

α_0 die Punkte 1 3 10 mit

α_1 „ „ 5 8 13 17 18 mit

α_2 „ „ 2 4 7 9 12 14 15 19 mit

α_3 „ „ 6 11 16.

Punkt 20 liegt auf der zum Punkt 17 gehörigen Geraden $\overset{9}{17}$
 $\overset{20}{20}$

„ 17 „ „ „ „ „ 1 „ „ „ $\overset{1}{8}$
 $\overset{17}{17}$

„ 1 „ „ „ zu B „ „ $\overset{1}{3}$
 $\overset{10}{10}$

Ordnen wir nun den Punkten

20 17 1

die Geraden

9 1 1

17 8 3

20 17 10

zu, so ist die gewünschte Zuordnung vollständig durchgeführt.

Setzen wir nun an die erste Stelle in einer jeden Colonne dasjenige Element, welches den der betreffenden Geraden zugeordneten Punkt bezeichnet, und lassen dann die erste Horizontalreihe des Schemas fort, so ergeben sich 3 Polygone:

1 9 17 16 2 15 3 10 8; 4 7 14 11 20 6 19 12; 5 13 18,
 welche die Cf. zusammensetzen.

Aus dieser Zerlegung der Cf. lassen sich leicht weitere Zerlegungen ableiten. Ordnen wir nämlich auch die zweite und dritte Horizontalreihe so an, dass jede alle Elemente enthält — und dies ist, wenn man solche Anordnungen als

gleich betrachtet, welche in einander durch Vertauschung von Columnen und Horizontalreihen übergeführt werden können, auf vierfache Weise möglich —, so ergeben sich nach Weglassung der zweiten oder dritten Horizontalreihe neue Darstellungen der Cf. als Cyklus von Polygonen. Die vier wesentlich verschiedenen möglichen Anordnungen sind

I.

4 20 11 9 18 19 1 6 17 13 5 2 15 7 14 8 16 3 12 10
 1 9 17 16 2 15 3 10 8 4 7 14 11 20 6 19 12 5 13 18
 9 17 16 2 15 3 10 8 1 7 14 11 20 6 19 12 4 13 18 5

II.

4 20 11 9 18 19 1 6 17 16 8 14 7 15 2 5 13 3 12 10
 1 9 17 16 2 15 3 10 8 4 12 19 6 20 11 14 7 5 13 18
 9 17 16 2 15 3 10 8 1 12 19 6 20 11 14 7 4 13 18 5

III.

4 20 11 9 18 19 1 6 17 16 8 14 7 15 2 5 13 10 12 3
 1 9 17 16 2 15 3 10 8 4 12 19 6 20 11 14 7 5 18 13
 9 17 16 2 15 3 10 8 1 12 19 6 20 11 14 7 4 18 13 5

IV.

4 20 11 9 18 19 1 6 17 13 5 2 15 7 14 8 16 10 12 3
 1 9 17 16 2 15 3 10 8 4 7 14 11 20 6 19 12 5 18 13
 9 17 16 2 15 3 10 8 1 7 14 11 20 6 19 12 4 18 13 5

Lassen wir in diesen Schemen der Reihe nach einmal die zweite, dann die dritte Horizontalreihe fort, so erhalten wir folgende 8 neue Zerlegungen der Cf. in Polygone:

- 1) 1 10 5 14 19 3 13 7 6 8 12 18 15 20 17; 2 11 16 4 9.
- 2) 1 3 5 7 20 9 16 12 13 4; 2 14 6 10 18; 8 19 5 11 17.
- 3) 1 10 5 7 20 17; 2 14 6 8 19 3 13 4 9; 11 16 12 18 15.
- 4) 1 3 5 14 19 15 20 9 16 4; 2 11 17 8 12 13 7 6 10 18.
- 5) 1 10 18 15 11 16 12 13 4 9 2 14 6 8 19 3 5 7 20 17.
- 6) 1 3 13 7 6 10 5 14 19 15 20 9 16 4; 2 11 17 8 12 18.
- 7) 1 10 18 15 20 17; 2 11 16 4 9; 3 5 14 19; 6 12 13 7.
- 8) 1 3 13 4; 2 14 6 10 5 7 20 9 16 12 18; 8 19 15 11 17.

Aus diesen können in derselben Weise noch weitere abgeleitet werden.

§ 3. Der soeben geführte Beweis ist allgemein gültig und umschliesst auch den Fall, dass die Cf. n_μ in mehrere Cff. zerfällt. Der letztere Fall tritt z. B. stets dann ein, wenn der Complex A' verschwindet.

Lassen wir aus der Cf. n_μ ν Horizontalreihen fort, so bleibt eine Cf. $n_{\mu-\nu}$ zurück, welche natürlich auch zerfallen kann. Für $\nu=\mu-2$ erhalten wir ein Polygon oder einen Cyklus von Polygonen, von denen jede Seite noch $\mu-2$ weitere Punkte der Cf. enthält, während durch jede Ecke noch $\mu-2$ Geraden hindurchgehen. Wir ersehen hieraus, dass sich jede Cf. n_μ in mehreren geschlossenen Zügen derartig durchlaufen lässt, dass jede Gerade als Seite und jeder Punkt als Eckpunkt einmal vorkommt.

Wenn die gegebene Cf. n_μ zerfällt, so muss auch jede in ihr enthaltene Cf. n_ν ($\nu < \mu$) zerfallen. Wir können diesen Satz aber nicht umkehren. Eine Cf. n_μ kann vollkommen geschlossen sein, so dass man also von jedem ihrer Punkte zu jedem andern, auf Cf.-Geraden fortschreitend, gelangen kann, und doch kann der Fall eintreten, dass jede in ihr enthaltene Cf. $n_{\mu-1}$ zerfällt. Solche Fälle treten auch schon bei den Cff. n_3 auf. Es lässt sich also nicht jede geschlossene Cf. n_3 in einem geschlossenen Zuge durchlaufen, man kann vielmehr für jede beliebige Zahl k Cff. n_3 bilden, die nicht zerfallen, und welche man doch nicht in weniger als in k Zügen durchlaufen kann.

§ 4. Für die folgenden Untersuchungen, in denen wir uns nur noch mit den Cff. n_3 beschäftigen, sei vorausgesetzt, dass dieselben nicht zerfallen.

Sind in dem Schema einer Cf. n_3 die Elemente in der Weise angeordnet, dass jede Horizontalreihe jedes Element enthält, so bleibt diese Eigenschaft erhalten, wenn wir die Horizontalreihen vertauschen; auch bezeichnet nach dieser Vertauschung das Schema dieselbe Cf. wie vorher. Wir setzen nun eine beliebig gewählte Horizontalreihe an die erste Stelle, die beiden anderen bezeichnen eine Anzahl von Polygonen. Um dies noch deutlicher hervortreten zu lassen, nehmen wir, indem wir die Reihenfolge der Elemente inner-

halb der Columnen beibehalten, folgende Anordnung der Columnen vor: Wir wählen als erste Columne eine beliebige und bestimmen die folgenden in der Weise, dass jedes zweite Element einer Columne mit dem dritten der vorhergehenden identisch ist. Dies Verfahren lässt sich solange fortsetzen, bis wir zu einer Columne gelangen, deren drittes Element mit dem zweiten der zuerst gewählten identisch ist. Wir bezeichnen die Gesamtheit der auf diese Weise erhaltenen Columnen oder Geraden als einen Complex der Cf. Umfasst der Complex noch nicht alle Columnen der Cf., so schreiten wir zur Bildung eines zweiten, indem wir aus den übrigen Columnen wieder eine beliebige herausgreifen und in derselben Weise wie bei der Bildung des ersten Complexes jede folgende bestimmen. Ist die Cf. mit diesem zweiten Complex noch nicht erschöpft, so bilden wir einen dritten, vierten u. s. f. Dass eine solche Bildungsweise möglich ist, erkennt man sofort aus dem Umstande, dass jede Horizontalreihe des Schemas jedes Element einmal enthält. Lassen wir die erste Horizontalreihe der Cf. fort, so bleibt von jedem Complex ein Polygon zurück, die zweite und ebenso die dritte Horizontalreihe des Complexes giebt zugleich die Reihenfolge an, in welcher die Ecken des Polygons auf einander folgen. Diese Eigenschaft bleibt erhalten, wenn wir die Columnen eines Complexes cyklisch mit einander vertauschen; eine andere Vertauschung ist unstatthaft.

Wir wollen nun die Complexe, deren Anzahl k sei, in folgender Weise anordnen: Wir bestimmen zunächst als letzten Complex einen beliebigen; er werde mit C_k , seine erste Horizontalreihe mit R_k , das durch die beiden andern Reihen dargestellte Polygon mit P_k bezeichnet. Besteht die Cf. nicht nur aus diesem Complex, so können nicht alle Elemente von P_k in R_k enthalten sein, wenigstens eins derselben muss in der ersten Reihe eines anderen Complexes auftreten. Andernfalls würde nämlich der Complex C_k schon für sich allein eine Cf. bilden. Wir stellen einen solchen Complex an die vorletzte Stelle und nehmen mit seinen Columnen eine cyklische Vertauschung in der Weise

vor, dass das erste Element der letzten Colonne zu den in P_k enthaltenen Elementen gehört. Der so bestimmte Complex heiße C_{k-1} , R_{k-1} sei seine erste Horizontalreihe, P_{k-1} das in ihm enthaltene Polygon der Cf. Ist $k > 2$, so können nicht alle Punkte von P_{k-1} und P_k in den Reihen R_{k-1} und R_k vertreten sein, vielmehr muss wenigstens einer derselben in der ersten Reihe eines anderen Complexes vorkommen. Wir wählen einen solchen Complex zum drittletzten C_{k-2} und bewirken durch cyklische Vertauschung seiner Colonnen, dass das in R_{k-2} enthaltene Element von P_{k-1} oder P_k das erste Element der letzten Colonne von C_{k-2} wird. Es ist klar, wie dieses Verfahren fortzusetzen ist, und dass wir durch dasselbe zu einer Reihe von Complexen $C_1, C_2, \dots, C_k$ mit den ersten Horizontalreihen $R_1, R_2, \dots, R_k$ und den Polygonen $P_1, P_2, \dots, P_k$ gelangen, welche die Eigenschaft besitzen, dass der letzte Punkt der Reihe R_i ($i < k$) als Punkt der zweiten und dritten Reihe erst in einem der folgenden Polygone $P_{i+1} \dots P_k$ auftritt.

§ 5. Nachdem die Colonnen der Cf. in dieser Weise angeordnet worden sind, wollen wir die Elemente der ersten Horizontalreihe des Schemas der Reihe nach durch die Zeichen $r_1, r_2, \dots, r_n$, die der zweiten durch die Zeichen $p_1, p_2, \dots, p_n$ ersetzen, jedes Element der dritten Reihe soll durch das Zeichen ersetzt werden, welches für dasselbe Element in der zweiten Reihe eintrat. Wir bezeichnen ferner mit r_i ($i=1, 2, \dots, n$) diejenige Colonne, deren erstes Element r_i , mit p_i diejenige Colonne, deren erstes Element den Punkt bezeichnet, welcher auch durch das Zeichen p_i dargestellt wird. Die für die Elemente und Colonnen eingeführte Bezeichnung werden wir auch für die Punkte und Geraden selbst gebrauchen. Es erhält also jeder Punkt und jede Gerade der Cf. auf diese Weise zwei Namen. Ist α_i ($i=1, 2, \dots, k$) die Anzahl der zum Complex C_i gehörigen Geraden, so haben wir folgendes Schema der Cf.

Cf. n_3

$$\begin{array}{cccccccccccc}
 r_1 & r_2 & \dots & r_{\alpha_1-1} & r_{\alpha_1} & r_{\alpha_1+1} & \dots & r_{\alpha_1+\alpha_2} \\
 p_1 & p_2 & \dots & p_{\alpha_1-1} & p_{\alpha_1} & p_{\alpha_1+1} & \dots & p_{\alpha_1+\alpha_2} \\
 p_2 & p_3 & \dots & p_{\alpha_1} & p_1 & p_{\alpha_1+2} & \dots & p_{\alpha_1+1} \\
 & & & & & & & \\
 & & & & & & & \\
 & & & & & & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc}
 r_{n-\alpha_k-\alpha_{k-1}+1} & \dots & r_{n-\alpha_k} & & r_{n-\alpha_k+1} & \dots & r_n \\
 p_{n-\alpha_k-\alpha_{k+1}+1} & \dots & p_{n-\alpha_k} & & p_{n-\alpha_k+1} & \dots & p_n \\
 p_{n-\alpha_k-\alpha_{k+1}+2} & \dots & p_{n-\alpha_k-\alpha_{k-1}+1} & p_{n-\alpha_k+2} & \dots & p_{n-\alpha_k+1}
 \end{array}$$

Wir setzen jetzt für die Punkte und Geraden der Cf. folgende normale Reihenfolge fest:

$$p_1 \ r_1 \ p_2 \ r_2 \ \dots \ p_{n-1} \ r_{n-1} \ p_n \ r_n.$$

Auf diese Reihenfolge ist stets Bezug genommen, wenn von zwei Elementen (Punkten, Geraden) der Cf. gesagt ist, dass das eine dem andern vorausgeht oder folgt. Ausdrücke wie „der erste Punkt“, „die letzte Gerade eines Polygons“ und ähnliche werden hiernach ebenfalls verständlich sein.

§ 6. Man kann die Cf. n_3 auffassen als eine Gruppierung von n Geraden $r_1, r_2 \dots r_n$ ($p_1, p_2, \dots p_n$) und n Punkten $p_1, p_2 \dots p_n$ ($r_1, r_2, \dots r_n$), welche dadurch zustande kommt, dass diese zunächst als willkürlich gedachten Elemente nach einander $3n$ Bedingungen (die nicht immer unabhängig sind) unterworfen werden, indem wir uns vorstellen, dass n Gerade und n Punkte in der Ebene so verschoben werden, dass sie die der Cf. entsprechende Lage erhalten. Wir suchen zunächst eine Figur herzustellen, bei welcher nur $3n-1$ von den $3n$ Bedingungen erfüllt sind: wir verzichten vorläufig darauf, dass die Gerade r_n den Punkt r_n enthalten soll. Es ist zu beachten, dass die fortgelassene Bedingung durch nichts vor den anderen ausgezeichnet ist. Da wir nämlich einen beliebigen Complex an die letzte Stelle setzten, und da mit den Geraden desselben jede cyklische Vertauschung vorgenommen werden durfte, so

kann jede Gerade der Cf. an die letzte Stelle treten, r_n ist also eine beliebige Gerade der Cf. Da ferner die Horizontalreihen des Schemas beliebig vertauscht werden durften, so ist r_n ein beliebiger Punkt der Geraden r_n .

Wir construieren nun die in Rede stehende Figur in der Weise, dass wir die Punkte und Geraden in der normalen Reihenfolge

$$p_1 \ r_1 \ p_2 \ r_2 \ . \ . \ . \ . \ . \ p_n \ r_n$$

bestimmen und dafür sorgen, dass die $3n-1$ noch bestehenden Bedingungen der Cf. erfüllt werden. Dass dies möglich ist, ersieht man leicht. Nehmen wir an, wir hätten die Elemente

$$p_1 \ r_1 \ p_2 \ r_2 \ . \ . \ . \ . \ . \ p_i \ r_i$$

bereits construirt. Es ist jetzt der Punkt p_{i+1} zu bestimmen. Wir unterscheiden nun zwei Fälle:

1. Ist p_{i+1} nicht der erste Punkt eines der Polygone $P_1, \dots, P_k$, so schreibt die Cf. dem Punkte vor auf den Geraden r_i, r_{i+1}, p_{i+1} zu liegen. Von diesen Geraden ist r_{i+1} noch nicht construirt, wohl aber r_i , bei p_{i+1} sind beide Fälle möglich. Je nachdem also p_{i+1} zu den schon construirtten Geraden gehört oder nicht, ist der Punkt p_{i+1} in den Schnittpunkt der Geraden p_{i+1} und r_i zu verlegen, oder als beliebiger Punkt von r_i anzunehmen.

2. Ist p_{i+1} der erste Punkt eines Polygons, p_j der letzte Punkt desselben Polygons, so muss p_{i+1} auf den Geraden r_{i+1}, r_j, p_{i+1} liegen, von denen höchstens p_{i+1} schon construirt ist. Je nachdem dies der Fall ist, oder nicht, ist p_{i+1} auf der Geraden p_{i+1} beliebig oder überhaupt beliebig anzunehmen.

Bei der Konstruktion der nun folgenden Geraden r_{i+1} sind ebenfalls zwei Fälle zu unterscheiden:

1. Ist r_{i+1} nicht die letzte Gerade eines Polygons, so müssen auf ihr die Punkte $p_{i+1}, p_{i+2}, r_{i+1}$ enthalten sein. Von diesen haben wir den ersten schon ermittelt, den zweiten noch nicht. Je nachdem nun der Punkt r_{i+1} zu den schon construirtten gehört oder nicht, muss r_{i+1} die Verbindungs-

gerade von p_{i+1} und r_{i+1} oder eine beliebige Gerade des ersteren Punktes sein.

2. Ist r_{i+1} die letzte Gerade eines der Polygone $P_1, P_2, \dots, P_{k-1}$, r_h die erste Gerade desselben Polygons, so muss r_{i+1} die Punkte p_h, r_{i+1}, p_{i+1} enthalten. Die Punkte p_h und p_{i+1} sind schon bestimmt worden, r_{i+1} dagegen noch nicht; denn bei unserer Anordnung der Cf.-Geraden müssen diejenigen Punkte, welche auf der letzten Geraden eines Polygons, aber auf dieser nicht als Ecke desselben, auftreten, Eckpunkte eines der folgenden Polygone sein. Wir haben also r_{i+1} als die Verbindungsgerade von p_h und p_{i+1} zu construieren.

Ist endlich p_m der erste Punkt des letzten Polygons und construieren wir r_n als die Verbindungsgerade $p_m p_n$, so wird die construierte Figur 3 $n-1$ Bedingungen der Cf. erfüllen.

§ 7. Um auch noch die letzte Bedingung der Cf. zu erfüllen, suchen wir in der Reihe der Elemente

$$p_1 r_1 p_2 r_2 \dots p_n r_n$$

das letzte derjenigen auf, welche nach erfolgter Konstruktion der vorangehenden Elemente (und unter Vernachlässigung der letzten Cf.-Bedingung) noch nicht vollständig bestimmt sind, und suchen über dieses Element so zu verfügen, dass auch diese Bedingung erfüllt wird, wenn wir nach dem in § 6 angegebenen Verfahren die Konstruktion der Cf. zu Ende führen. Es ist klar, dass das gesuchte Element dem letzten Polygon (als Ecke oder Seite) angehört; denn der erste Punkt dieses Polygons (p_m) ist durch die vorangehenden Elemente noch nicht vollständig bestimmt. Es kann nun das gesuchte Element durch die vorausgehenden teilweise bestimmt sein, d. h. es kann dasselbe, wenn es ein Punkt ist, gezwungen sein, auf einer schon construierten Geraden zu liegen, oder, wenn es eine Gerade ist, so kann diese Gerade gezwungen sein, durch einen schon construierten Punkt zu gehen; doch ist auch der Fall möglich, dass das Element nach Konstruktion der vorhergehenden

noch völlig unbestimmt ist. Diesen Fall, welcher, wie aus den Erörterungen des § 6 hervorgeht, nur eintreten kann, wenn p_m (der erste Punkt des letzten Polygons) das gesuchte Element ist, kann man aber vermeiden. Da nämlich der Punkt r_{m-1} eine Ecke des letzten Polygons sein muss, so kann man durch cyklische Vertauschung der Ecken und Seiten des letzteren bewirken, dass $p_m \equiv r_{m-1}$ wird. Es ist dann p_m auf der schon construierten Geraden r_{m-1} enthalten.

Es sei das gesuchte Element ein Punkt p_i und $i > m$. Construiren wir in der § 6 angegebenen Weise die Punkte und Geraden

$$p_1 r_1 p_2 r_2 \dots p_{i-1} r_{i-1},$$

deren Gesamtheit mit A bezeichnet sein möge, während die übrigen unter dem Zeichen B zusammengefasst werden sollen, so erkennt man leicht folgendes: Die Gerade p_i gehört zu B; denn der Punkt p_i liegt auf den Geraden r_{i-1} und p_i , von denen die erste zu A gehört; er wäre also wider die Voraussetzung völlig bestimmt, wenn auch p_i zu A gehörte. Ist nun

$$p_i \equiv r_k, \text{ so ist } p_i \equiv r_k$$

und es ist $k > i$. Die Elemente

$$r_i p_{i+1} r_{i+1} p_{i+2} \dots p_n r_n$$

gehören mit Ausnahme des Punktes r_k sämtlich zu A.

Man erkennt dies folgendermassen: Gehört ein von r_k verschiedener Punkt r_j ($j \geq i$) zu B, und ist $r_j \equiv p_1$, so ist $l > i$ ($l = i$ ist nicht möglich; denn aus $p_1 \equiv p_i$ würde folgen $r_j \equiv r_k$). Wäre nun $l > j$, so würde die Gerade r_j , welche die Punkte r_j , p_j , $p_{j+1}^{(1)}$ enthält, nach Construction aller vorangehenden Elemente

$$p_1 r_1 \dots p_j$$

noch nicht völlig bestimmt sein, dies ist aber nicht möglich,

¹⁾ r_j kann nicht $\equiv r_n$ sein, sonst wäre $p_1 (\equiv r_n)$, da er der Geraden $p_1 (\equiv r_n)$ vorausgeht, durch die vorangehenden Elemente nicht völlig bestimmt, gehörte also entweder zu A, oder wäre mit p_i identisch, während der Fall $p_i \equiv r_j$ ausgeschlossen wurde.

da p_i das letzte derartige Element sein sollte und r_j auf p_i folgt. Es bleibt also nur die Möglichkeit übrig, dass $j > l > i$ ist. ($j = l$ ist nicht möglich, weil $r_j \equiv p_l$ und p_j verschiedene Punkte der Geraden r_j sein sollen.) Da nun r_j zu B gehört und $r_j \equiv p_l$, $j > l > i$ ist, so folgt, dass in der Reihe der Elemente

$$r_i \ p_{i+1} \ r_{i+1} \ p_{i+2} \ . \ . \ . \ p_n \ r_n$$

schon vor r_j ein von r_k verschiedenes Element (nämlich p_l) enthalten ist, welches zu B gehört. In gleicher Weise können wir aus der Existenz einer in der Reihe

$$r_i \ p_{i+1} \ . \ . \ . \ p_n \ r_n$$

erhaltenen zu B gehörigen Geraden auf die Existenz eines ebensolchen (von r_k verschiedenen) Punktes schliessen, welcher in dieser Reihe vor der Geraden steht. Ist nämlich $p_j \equiv r_l$ die in Rede stehende Gerade, so gehen durch p_j die Geraden r_{j-1} , r_j , $p_j \equiv r_l$. Da nun $p_j \equiv r_l$ in der Reihe

$$r_i \ p_{i+1} \ . \ . \ . \ p_n \ r_n$$

enthalten sein und zu B gehören soll, so ergibt sich zunächst $j > i$, $l \geq i$. Da der Punkt p_j nach Konstruktion der vorangehenden Elemente bestimmt sein soll (weil $j > i$ ist), so muss die Gerade $p_j \equiv r_l$, auf welcher er liegen soll, ihm (in der normalen Reihenfolge) vorangehen. Es folgt hieraus $j > l$. Aus $j > l$ folgt, dass p_j zu B gehört, aus $j > l$, dass der Punkt $p_j \equiv r_l$ in der Reihe der Elemente

$$r_i \ p_{i+1} \ . \ . \ . \ p_n \ r_n$$

vor der Geraden p_j steht. Es kann endlich r_l nicht mit r_k identisch sein; denn aus $l = k$ würde folgen $j = i$, während $j > i$ sein muss.

Hieraus ersehen wir, dass jedem Elemente, welches

- 1) zu den Elementen $r_i \ p_{i+1} \ . \ . \ . \ p_n \ r_n$ gehört,
- 2) von r_k verschieden ist,
- 3) zu B gehört,

ein Element (nach der unter 1) angegebenen Reihenfolge) vorangehen muss, welches dieselben drei Eigenschaften be-

sitzt. Dies führt zu einem Widerspruch, da die in Betracht kommenden Elemente nur in endlicher Zahl existieren.“

Wenn wir nun auch die letzte Bedingung der Cf. berücksichtigen, so ergibt sich aus dem Vorstehenden, dass die Elemente

$$r_n \ p_n \ r_{n-1} \ p_{n-1} \ . \ . \ . \ . \ . \ p_{k+1}$$

in dieser Reihenfolge sich als Verbindungsgerade und Schnittpunkte vorher bestimmter Elemente ermitteln lassen. Wir erhalten nämlich:

$$\begin{aligned} p_m \ r_n &= r_n, (r_n, p_n) = p_n, p_n \ r_{n-1} = r_{n-1}, (r_{n-1}, \\ p_{n-1}) &= p_{n-1} \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ (r_{k+1}, p_{k+1}) = p_{k+1}. \end{aligned}$$

Andererseits erhalten wir, sobald p_i auf der Geraden r_{i-1} angenommen worden ist:

$$\begin{aligned} p_i \ r_i &= r_i, (r_i, p_{i+1}) = p_{i+1}, p_{i+1} \ r_{i+1} = r_{i+1}, \\ . \ . \ . \ . \ . \ . \ p_{k-1} \ r_{k-1} &= r_{k-1}, (r_{k-1}, p_k) = p_k. \end{aligned}$$

Die Cf. verlangt noch, dass die Punkte $r_k \equiv p_i, p_k, p_{k+1}$ (resp. r_n, p_n, p_m , falls $k = n$ ist) in einer Geraden liegen. Setzen wir zunächst die Verbindungsgerade

$$p_{k+1} \ p_k = r_k, \text{ den Schnittpunkt } (r_k, r_{i-1}) = p'_i,$$

so beschreibt, indem p_i die Gerade r_{i-1} durchläuft der Punkt p'_i eine projektive Punktreihe auf derselben Geraden. Damit alle Bedingungen der Cf. erfüllt sind, muss $p'_i \equiv p_i$ werden. So gelangen wir zu der Aufgabe, die Doppelpunkte zweier incidenter Punktreihen zu finden. Es giebt bekanntlich zwei solche Elemente, deren Ermittlung in der Regel eine quadratische Konstruktion erfordert.

In ganz ähnlicher Weise lassen sich die Fälle erledigen, dass p_i mit p_m identisch ist, oder dass das letzte durch die vorausgehenden Elemente noch nicht völlig bestimmte Element eine Gerade ist. Es kann daher auf eine Besprechung dieser Fälle verzichtet werden.

Lineare Konstruktionen.

§ 8. Wir haben gesehen, dass die Konstruktion einer jeden Cf. n_3 durch eine Anzahl linearer Operationen und eine einzige quadratische geleistet werden kann. In beson-

deren Fällen reduciert sich aber die Aufgabe, die Doppel-elemente zweier incidenter Punktreihen oder Strahlbüschel zu ermitteln, auf lineare Konstruktionen; wir sind dann imstande, die Cf. n_3 in allgemeinsten Weise linear zu construieren. Auch ist, wenn das in §§ 6—7 angegebene Verfahren eine quadratische Konstruktion unvermeidlich macht, nicht ausgeschlossen, dass ein anderes Verfahren nur lineare Operationen erfordert.

Ist eine allgemeine lineare Konstruktion der Cf. nicht möglich, so gelingt es doch in den meisten Fällen, durch lineare Konstruktion gewisse Arten der verlangten Cf. herzustellen. Derartige Konstruktionen hat Schroeter zuerst für diejenigen Cff. angegeben, die sich als Polygone auffassen lassen, bei welchen immer die erste, zweite und vierte Ecke in einer Geraden liegen. Das Schroetersche Verfahren ist auch bei vielen andern Cff. anwendbar und ist auch von Schroeter selbst zur Herstellung derjenigen Cff. 10_3 benutzt worden, bei denen eine allgemeine lineare Konstruktion nicht gelang. Im Folgenden soll, ohne dass eine besondere Voraussetzung über die zu behandelnden Cff. gemacht würde, ein Verfahren angegeben werden, nach welchem man zur linearen Herstellung derselben gelangt. Bei jeder Cf., auf welche wir dieses Verfahren anwenden wollen, bedarf es allerdings noch einer besonderen Untersuchung, da in gewissen Fällen das Verfahren illusorisch wird.

§ 9. Wir haben, um zu einer allgemeinen Konstruktion der Cf. n_3 zu gelangen, in der Reihe ihrer Elemente

$$p_1 \ r_1 \ p_2 \ r_2 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ p_n \ r_n$$

ein solches gesucht, welches durch die vorangehenden noch nicht vollständig bestimmt war, welches selbst aber im Verein mit diesen die folgenden Elemente bestimmte. Das gesuchte Element ist entweder ein Punkt p_i oder eine Gerade r_i ; wir wollen diese beiden Fälle vorläufig nicht unterscheiden und das Element mit ε_i bezeichnen. Der Fall, welchen wir früher vermieden, dass nämlich ε_i nach der Konstruktion der vorangehenden Elemente noch vollständig unbestimmt war, ist zwar für unseren gegenwärtigen Zweck

günstig, wir wollen ihn aber, da er sich nach der Betrachtung der übrigen Fälle leicht erledigen lässt, vorläufig ausschliessen.

Wir suchen nun in der Reihe der ε_i vorangehenden Elemente ein solches auf, welches durch die vorangehenden Elemente noch nicht völlig bestimmt ist, nach dessen Konstruktion aber die folgenden Elemente bis zu ε_i (mit Ausschluss von ε_i selbst) eindeutig bestimmt sind. Es ist klar, dass stets ein und nur ein solches Element vorhanden sein muss; wir wollen es ε_h nennen und durch die Zahl h ausdrücken, dass es mit p_h oder r_h identisch ist. ε_h kann nach der Konstruktion der vorausgegangenen Elemente noch völlig unbestimmt sein. Wir schliessen aber diesen Fall zunächst von der Betrachtung aus, da auch er sich später leicht erledigen lassen wird.

Das Element ε_i gehört stets dem letzten Polygon an, das Element ε_h entweder dem letzten oder dem vorletzten. Gehört es dem vorletzten an, so muss ε_i der erste Punkt des letzten Polygons sein. Diese Eigenschaft bleibt für die Cf. auch bestehen, wenn wir die Geraden des letzten Complexes cyklisch vertauschen. Wir wollen wieder eine derartige cyklische Vertauschung vornehmen, dass p_m (, der erste Punkt des letzten Polygons) identisch mit r_{m-1} wird.

Wir construieren nun die Elemente, welche ε_h vorangehen, nach dem in § 6 angegebenen Verfahren und wollen untersuchen, ob und wie es dann noch möglich ist, die Cf. mit alleiniger Anwendung des Lineals fertigzustellen. Wir bezeichnen die Gesamtheit der Elemente, welche ε_h vorausgehen:

$$p_1 \ r_1 \ p_2 \ r_2 \ . \ . \ . \ . \ . \ p_{h-1} \ r_{h-1} \ (p^h)$$

mit A, die der übrigen

$$(p_h) \ r_h \ p_{h+1} \ r_{h+1} \ . \ . \ . \ . \ . \ p_n \ r_n$$

mit B.

Nach unseren Annahmen ist ε_h mit einem und nur einem Element von A incident, die beiden andern Elemente, mit denen ε_h incidiert, gehören also zu B. Von diesen beiden ist stets das eine das auf ε_h unmittelbar folgende Element (ε_h kann nämlich nicht die letzte Gerade des Polygons

P_{k-1} sein, da diese durch die vorangehenden Elemente vollständig bestimmt ist), das andere wollen wir mit η^h bezeichnen. Von den mit ε_i incidenten Elementen muss eins und nur eins ε_i vorangehen, von den beiden andern folgt das eine unmittelbar auf ε_i , das andere wollen wir mit η^i bezeichnen.

Die Elemente $\varepsilon_h, \varepsilon_i, \eta^h, \eta^i$ treten in der Reihe

$$p_1 r_1 p_2 r_2 \dots p_n r_n$$

entweder in der Reihenfolge

$$\varepsilon_h \varepsilon_i \eta^h \eta^i \quad (\text{Fall I.})$$

oder in der Reihenfolge

$$\varepsilon_h \varepsilon_i \eta^i \eta^h \quad (\text{Fall II.})$$

oder in der Reihenfolge

$$\varepsilon_h \eta^h \varepsilon_i \eta^i \quad (\text{Fall III.})$$

auf.

Es wird sich zeigen, dass wir in den Fällen I und II die Cf. auf beliebig viele verschiedene Arten linear vervollständigen können, dass aber im Falle III keine lineare Lösung des Problems möglich ist.

Die letzte Gerade r_n enthält die drei Punkte r_n, p_n, p_m . Es kann der Fall eintreten, dass r_n mit einem der Elemente $\varepsilon_h, \varepsilon_i, p_m$ mit dem andern identisch ist; es ist dann $r_n \equiv \eta^h \equiv \eta^i$. Obwohl die Konstruktion der Cf. für diesen Fall keine Schwierigkeiten darbietet,¹⁾ wollen wir ihn doch für die Folge stets vermieden denken. Es ist zu zeigen, dass es stets möglich ist, ihn zu vermeiden. Wir führen den allgemeineren Nachweis, dass in allen Fällen, in denen — bei der vorliegenden Zerlegung in Complexe — die Cf. mehr als einen Complex enthält, durch blosse Aenderung in der Anordnung des letzten Complexes bewirkt werden kann, dass r_n von ε_h und ε_i verschieden ist und mithin, da der mit r_n identische Punkt p_s nach Konstruktion der vorangehenden Elemente nicht völlig bestimmt sein kann, zu A gehört. Ist nämlich die Anzahl k der Com-

¹⁾ Der Fall kann durch dieselben Betrachtungen erledigt werden, wie Fall II.

plexe grösser als 1, so muss mindestens ein Element von R_k — es werde mit $r \equiv p$ bezeichnet, — Ecke eines der vorangehenden Polygone sein, sonst würde C_k für sich allein eine Cf. bilden. Gehört ε_h dem letzten Polygone an, so gehört $p \equiv r$ zu A, und wir können durch cyklische Vertauschung der Colonnen von C_k bewirken, dass $p \equiv r$ der erste Punkt der letzten Geraden wird, dieser also zu A gehört. Eine solche Vertauschung ist nicht statthaft, wenn ε_h dem vorletzten Polygone angehört, da in diesem Falle die Anordnung der Colonnen des letzten Complexes so getroffen werden sollte, dass $\varepsilon_i \equiv p_m$ mit r_{m-1} identisch wurde. In diesem Falle kann r_n nicht mit ε_i identisch sein (da r_n die Punkte $r_n, p_n, p_m \equiv \varepsilon_i$ enthält), es ist also nur der Fall zu erledigen, dass $r_n \equiv \varepsilon_h$ wird. Tritt dies ein, so haben wir nur nötig, die zweite und dritte Horizontalreihe von C_k zu vertauschen und die Reihenfolge der Colonnen dieses Complexes umzukehren. Alsdann erhalten wir als P_k dasselbe Polygon wie früher nur mit umgekehrter Reihenfolge der Elemente. Bewirken wir nun durch eine cyklische Vertauschung der Colonnen des letzten Complexes, dass $\varepsilon_i \equiv p_m$ mit r_{m-1} identisch wird, so wird das nun mit ε_h zu bezeichnende Element, mit dem vorher so bezeichneten identisch, der nun mit r_n zu bezeichnende Punkt aber von dem vorher so bezeichneten verschieden sein. Es folgt daraus die Verschiedenheit der Elemente r_n und ε_h . Also gehört r_n zu A.

§ 10. Für alle Fälle gelten folgende Betrachtungen:

1. Die Elemente $\varepsilon_h, \varepsilon_i, \eta^h, \eta^i$ sind stets von einander verschieden; von den Elementen ε_h und η^h ist das eine ein Punkt, das andere eine Gerade, dasselbe gilt von den Elementen ε_i und η^i .

2. Jedes zu B gehörige, von $\varepsilon_h, \varepsilon_i, \eta^h, \eta^i$ verschiedene Element ist incident mit dem unmittelbar vorhergehenden (abgesehen von r_n auch mit dem unmittelbar folgenden) und einem zu A gehörigen Elemente:

Ist ε eins der in Rede stehenden Elemente, so ist zunächst klar, dass ε mit dem unmittelbar vorhergehenden

Element inciidiert. Denn diese Eigenschaft besitzt jedes Element der Cf., welches nicht erster Punkt eines Polygons ist. Dieser Fall kann aber von den zu B gehörigen Elementen nur ϵ_h und ϵ_i betreffen.

Da ϵ durch die vorangehenden Elemente vollständig bestimmt sein soll, so muss es mit zweien dieser Elemente incident sein. Das (der normalen Reihenfolge nach) erste Element, welches mit ϵ incident ist, bezeichnen wir mit ϵ' ; es liegt also zwischen ϵ' und ϵ noch ein mit ϵ incidentes Element, nämlich dasjenige, welches ϵ unmittelbar vorangeht. Es kann ϵ' mit keinem der Elemente ϵ_h und ϵ_i identisch sein, da das auf ϵ' folgende mit ϵ' incidente Element ϵ weder unmittelbar auf ϵ' folgt, noch mit η^h oder η^i identisch ist. ϵ' kann aber auch nicht identisch sein mit η^h oder η^i . Jedes dieser Elemente ist nämlich incident mit dem ihm unmittelbar folgenden Elemente und mit zweien, die ihm vorausgehen; diese Eigenschaft hat aber für das Element ϵ' nicht statt. Wir wollen nun zeigen, dass ϵ' zu A gehört. Gehörte das Element ϵ' zu B, so wäre es incident mit dem ihm unmittelbar vorausgehenden und — da es von r_n verschieden ist — auch mit dem ihm unmittelbar folgenden Elemente. Da ϵ' ausserdem mit ϵ incident ist, so würde sich ergeben, dass alle drei mit ϵ' incidenten Elemente zu B gehören. Hiermit ist folgendes erwiesen: Wenn unter den zu B gehörigen von ϵ_h , ϵ_i , η^h , η^i verschiedenen Elementen ein solches (ϵ) enthalten ist, welches mit keinem Element von A incident ist, so geht demselben ein Element (ϵ') voraus, welches ebenfalls zu B gehört, von ϵ_h , ϵ_i , η^h , η^i verschieden und mit keinem Element von A incident ist. Dies führt notwendig zu einem Widerspruch, da B nur eine endliche Anzahl von Elementen enthält. Hieraus ergibt sich, dass ϵ mit einem Elemente (ϵ') von A incident ist.

3. Das in der Reihe

$$p_1 \ r_1 \ p_2 \ r_2 \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ p_n \ r_n$$

zuletzt auftretende der Element ϵ_h , ϵ_i , η^h , η^i also η^h oder η^i kann mit r_n identisch sein. Es ist alsdann einer der

Punkte r_n und p_m mit einem der Elemente ε_h oder ε_i identisch und nach § 9 auch nur einer dieser Punkte. Ist also $p_m \equiv \varepsilon_h$ oder ε_i , so gehört r_n zu A; ist dagegen $r_n \equiv \varepsilon_h$ oder ε_i , so gehören ε_h und ε_i dem letzten Polygone an und sind von p_m verschieden; p_m gehört daher zu A.

Sind η^h und η^i von r_n verschieden, also etwa mit p_s oder r_s identisch, so geben uns die Cf.-Bedingungen (mit Einschluss der letzten, welche die Incidenz von r_n und r_n ausspricht) eine Vorschrift für die Konstruktion der auf η folgenden Elemente:

$$(r_s) p_{s+1} r_{s+1} \dots p_n r_n$$

Es müssen nämlich (§ 10,2) die Elemente

$$(r_s) p_{s+1} r_{s+1} \dots p_n r_n \text{ sowie } p_m$$

sämtlich zu A gehören; demnach erhalten wir als Schnittpunkte und Verbindungsgerade:

$$p_m r_n = r_n, (r_n, p_n) = p_n, p_n r_{n-1} = r_{n-1},$$

$$(r_{n-1}, p_{n-1}) = p_{n-1}, \dots p_{s+2} r_{s+1} = r_{s+1},$$

$$(r_{s+1}, p_{s+1}) = p_{s+1}, (p_{s+1} r_s = r_s).$$

Da den Bedingungen der Cf. zufolge p_{s+1} und r_s (oder r_s und p_s) incident sein sollen, so ergibt sich folgendes:

Nachdem die zu A gehörigen Elemente der Reihe nach konstruiert worden sind, sind, wenn auch die letzte Bedingung der Cf. berücksichtigt wird, alle auf η folgende Elemente mitbestimmt. Wir konstruieren diese Elemente und fassen alle bisher konstruierten Elemente unter dem Zeichen A', die übrigen unter dem Zeichen B' zusammen. Alsdann haben wir bei der Wahl von ε_h und ε_i dafür zu sorgen, dass das durch diese Elemente bestimmte Element η mit dem unmittelbar folgenden zu A' gehörigen incident ist. An die Stelle des letzteren Elementes tritt in dem Falle, dass η^h oder $\eta^i \equiv r_n$ ist, derjenige der Punkte r_n und p_m , welcher zu A gehört.

§ 11. Nehmen wir zunächst an, dass einer der Fälle I oder II (§ 9) vorliege. Wenn alsdann alle zu A' gehörige Elemente konstruiert worden sind, so können nach vollständig willkürlicher Wahl von η_i die übrigen Elemente noch so bestimmt werden, dass von allen Bedingungen der

Cf. nur eine unerfüllt bleibt. In den beiden angenommenen Fällen liegt nämlich zwischen ε_h und ε_i keines der Elemente η^h und η^i . Jedes zwischen ε_h und ε_i gelegene Element ist also (§ 10,2) incident mit dem unmittelbar vorhergehenden, dem unmittelbar folgenden und einem zu A gehörigen Elemente. Ist also ε_i gewählt, so erhält man in umgekehrter Reihenfolge die zwischen ε_h und ε_i gelegenen Elemente mit Einschluss von ε_h selbst, ein jedes als Schnittpunkt resp. Verbindungsgerade des folgenden, soeben construierten Elementes mit einem solchen von A. Jetzt sind aber auch, wie sich aus der Definition des Elementes ε_i ergibt, alle auf ε_i folgende Elemente bestimmt und können nach dem in § 6 angegebenen Verfahren erhalten werden. Von diesen Elementen sind die auf η folgenden schon construiert, construierten wir daher die noch übrigen Elemente bis zu η , so werden von den $3n$ Bedingungen der Cf. $3n-1$ erfüllt sein, eine aber nicht. Es wird nämlich bei willkürlicher Wahl von ε_i das Element η mit dem folgenden nicht incident sein. Damit auch diese Bedingung erfüllt sei, wird ε_i gezwungen sein Punkt oder Tangente einer Curve zu sein. Unsere Aufgabe wird es also sein, Punkte resp. Tangenten dieser Curve in beliebiger Zahl durch lineare Konstruktionen zu ermitteln.

Der Fall III (§ 9) ist von den beiden andern wesentlich verschieden, weil in diesem Falle das Element η^h zwischen ε_h und ε_i tritt und η^h mit keinem zu A' gehörigen Elemente incident ist.

Wir können, abgesehen von der Reihenfolge, in welcher die Elemente ε_h , ε_i , η^h , η^i auftreten, noch unterscheiden, welcher Art diese Elemente sind. Entweder nämlich ist

- a) $\varepsilon_h = p_h$, $\varepsilon_i = p_i$, η^h eine Gerade, η^i eine Gerade,
 - oder b) $\varepsilon_h = r_h$, $\varepsilon_i = r_i$, η^h ein Punkt, η^i ein Punkt
 - oder c) $\varepsilon_h = p_h$, $\varepsilon_i = r_i$, η^h eine Gerade, η^i ein Punkt
 - oder d) $\varepsilon_h = r_h$, $\varepsilon_i = p_i$, η^h ein Punkt, η^i eine Gerade.
- Hiernach sind im ganzen 12 Fälle zu unterscheiden, die wir mit

Ia,	Ib,	Ic,	Id;
IIa,	IIb,	IIc,	IId;
IIIa,	IIIb,	IIIc,	IIId

bezeichnen wollen.

Wir gehen zur Besprechung der einzelnen Fälle über.

§ 12.

Fall I.

In den Fällen I und II kann ϵ_h nicht der erste Punkt des vorletzten Polygons sein; sonst hätten wir $\eta^h = r_{m-1}$, $i = m$, $\epsilon_i = p_m$. Es träte also η^h zwischen ϵ_h und ϵ_i ; dies entspricht aber dem Falle III. Im Falle I kann ϵ_h auch nicht der erste Punkt des letzten Polygons sein, hieraus würde nämlich folgen $\eta^h = r_n = \eta$, und wir hätten den Fall II.

Um eine bestimmte Vorstellung vor Augen zu haben, erledigen wir zunächst den Fall Ia. Wir haben dann

$$\epsilon_h = p_h, \epsilon_i = p_i, \eta^h = p_h, \eta_i = p_i \\ (\text{oder, falls } i = m \text{ ist, } \eta^i = r_n).^1)$$

Es sei ferner

$$p_h \equiv r_j, p_i \equiv r_l, \text{ mithin } p_h \equiv r_j, p_i \equiv r_l \\ h < i < j < l.$$

Wir nehmen hier sowie in den später zu behandelnden Fällen an, dass die zu A' gehörigen Elemente schon konstruiert worden sind. Wie in § 11 gezeigt wurde, ist es möglich nach willkürlicher Wahl von p_i die übrigen Elemente von B' so zu konstruieren, dass von sämtlichen Bedingungen der Cf. nur die eine unerfüllt bleibt, welche die Incidenz der Elemente $p_i \equiv r_l$ und p_{i+1} vorschreibt. Statt dessen können wir aber bei dieser Konstruktion auch so verfahren, dass zwar die angegebene Bedingung erfüllt wird, dafür aber eine andere unberücksichtigt bleibt.

Nach § 10, 2 muss jedes der zu B gehörigen Elemente

$$r_h \ p_{h+1} \dots r_{i-1} \mid r_i \ p_{i+1} \dots p_j \mid p_{j+1} \ r_{j+1} \dots p_l$$

¹⁾ Wir führen hier und im Folgenden nur die Fälle näher aus, in denen ϵ_h und ϵ_i dem letzten Polygon angehören; die Art der Konstruktion ist in den andern Fällen genau dieselbe.

mit einem Element von A' incident sein. Es gehören demnach zu A' die Elemente

$$r_h p_{h+1} r_{h+1} p_{h+2} \dots r_{i-1} \mid r_i p_{i+1} \dots p_j \mid \\ p_{j+1} r_{j+1} \dots p_1;$$

ferner gehören zu A' die Elemente r_{h-1} und p_{i+1} . Ist daher der Punkt p_i gewählt, so können wir den Vorschriften der Cf. gemäss folgende Konstruktionen ausführen:

$$1. \quad p_i r_{i-1} = r_{i-1}, (r_{i-1}, p_{i-1}) = p_{i-1}, p_{i-1} r_{i-2} = r_{i-2} \dots p_{h+1} r_h = r_h, (r_h, r_{h-1}) = p_h.$$

$$2. \quad p_i r_i = r_i, (r_i, p_{i+1}) = p_{i+1}, \dots (r_{j-1}, p_j) = p_j.$$

$$3. \quad p_i p_{i+1} = p_i \equiv r_1, (r_1, p_1) = p_1, p_1 r_{i-1} = r_{i-1}, (r_{i-1}, p_{i-1}) = p_{i-1}, \dots (r_{j+1}, p_{j+1}) = p_{j+1}.$$

Bei willkürlicher Wahl von p_i wird jetzt nur eine Cf.-Bedingung unerfüllt bleiben. Es werden nämlich in der Regel nicht die Punkte

$$p_h \equiv r_j, p_j \text{ und } p_{j+1}$$

in einer Geraden (der Cf.-Geraden r_j) liegen.

Nun ersieht man aber leicht folgendes: Wenn der Punkt p_i sich in der Ebene bewegt, so werden die übrigen Elemente von B' ebenfalls sich bewegen. Insbesondere werden die Geraden

$p_i r_{i-1} = r_{i-1}$, $p_i r_i = r_i$ und $p_i p_{i+1} = p_i \equiv r_1$ sich um die festen Punkte r_{i-1} , r_i , p_{i+1} drehen, und es werden die Punkte

$$p_h \equiv r_j, p_j, p_{j+1}$$

die festen Geraden r_{h-1} , p_j , p_{j+1} durchlaufen.

Hierbei wird

der von r_{i+1} beschriebene Strahlbüchel auf die von p_h durchlaufene Punktreihe, der von r_i beschriebene Strahlbüchel auf die von p_j durchlaufene Punktreihe, der von r_1 beschriebene Strahlbüchel auf die von p_{j+1} durchlaufene Punktreihe projektiv bezogen sein. Da nun die Punkte p_h , p_j , p_{j+1} in einer Geraden liegen sollen, so werden wir zu folgender Aufgabe geführt:

Gegeben sind drei Punkte, Mittelpunkte dreier Strahlbüchel, und drei Gerade, Träger dreier Punktreihen. Jedem

Strahlbüschel ist eine Punktreihe projektiv zugeordnet. Durch jeden Punkt p der Ebene geht ein Strahl eines jeden Büschels, jedem dieser drei Strahlen entspricht in der zugeordneten Punktreihe ein Punkt. Verlangt wird, solche Punkte zu ermitteln, für welche die auf diese Weise gewonnenen Punkte in einer Geraden liegen. Jede Lösung dieser Aufgabe liefert zugleich eine Lösung der dual gegenüberstehenden; denn diese verlangt, in der Ebene Geraden von der Beschaffenheit zu ermitteln, dass die drei den Schnittpunkten dieser Geraden mit den drei gegebenen entsprechenden Strahlen sich in einem Punkte schneiden. Es ist ohne Weiteres einleuchtend, dass mit der Lösung dieser Aufgabe der Fall Ib erledigt ist, in welchem $\varepsilon_h = r_h$, $\varepsilon_i = r_i$ ist.

Aber auch die Fälle Ic und Id ergeben sich aus denselben Betrachtungen. Im ersten der genannten Fälle ist

$$\varepsilon_h = p_h, \varepsilon_i = r_i, \eta^h = p_h, \eta^i = r_i;$$

ist ferner

$p_h \equiv r_j, r_i \equiv p_1$ also $p_h \equiv r_j, r_i \equiv p_1$,
so bestehen die Ungleichungen $h \leq i < j < l$.

Man erkennt leicht, wie dieser Fall aus dem ersten (Ia) abzuleiten ist. Für p_i tritt die Gerade r_i , für die drei von p_i ausgehenden Geraden

$p_i r_{i-1} = r_{i-1}, p_i r_i = r_i, p_i p_{i+1} = r_1$
treten die drei auf r_i liegenden Punkte

$(r_i, p_i) = p_i, (r_i, p_{i+1}) = p_{i+1}, (r_i, r_1) = r_i = p_1$
ein; die Punkte p_h, p_j, p_{j+1} haben im vorliegenden Falle dieselbe Bedeutung wie im Falle Ia. Wenn wir nämlich die Gerade r_i in der Ebene sich bewegen lassen und für ihre jedesmalige Lage die noch fehlenden Elemente ermitteln, indem wir von den Bedingungen der Cf. nur die eine unberücksichtigt lassen, dass die Punkte p_h, p_j, p_{j+1} in einer Geraden liegen sollen, so zeigt sich, dass hierbei die Punkte p_i und p_h auf den Geraden p_i und r_{h-1} , die Punkte p_{i+1} und p_j auf den Geraden p_{i+1} und p_j , die Punkte p_1 und p_{j+1} auf den Geraden r_1 und p_{j+1} projektive Punktreihen durchlaufen.

Hiernach ist es klar, dass die Konstruktion der Cf. an die Lösung folgender Aufgabe geknüpft ist: Gegeben sind drei Gerade (p_i, p_{i+1}, r_1) , Träger dreier Punktreihen, ferner drei Gerade (r_{h-1}, p_j, p_{j+1}) , Träger dreier Punktreihen, deren jede einer der drei ersten projektiv zugeordnet ist. Gesucht werden solche Gerade, welche die drei ersten Geraden in Punkten schneiden, deren zugehörige wieder in einer Geraden liegen.

Auf die dual gegenüberstehende Aufgabe werden wir durch den Fall Id geführt.

§ 13. Fall II.

Wir behandeln zunächst den Fall IIa.

Wir haben

$$\varepsilon_h = p_h, \varepsilon_i = p_i, \eta^i = p_i, \eta^h = p_h.$$

Ist ferner

$$p_h \equiv r_j, p_i \equiv r_1, \text{ so wird } p_i \equiv r_1, p_h \equiv r_j$$

und es ist $h < i < l < j$.

Unter den Elementen von A' sind (§ 10, 2) die folgenden sämtlich enthalten:

$$\begin{array}{c} r_h \ p_{h+1} \ r_{h+1} \ \dots \ r_{i-1} \ | \ r_i \ p_{i+1} \ r_{i+1} \ \dots \ p_1 \ | \\ p_{i+1} \ r_{i+1} \ p_{i+2} \ \dots \ p_j \end{array}$$

ebenso die Gerade r_{h-1} und der Punkt p_{j+1} .

Wird der Punkt p_i beliebig in der Ebene angenommen, so werden durch ihn die noch nicht konstruierten Elemente der Cf. bestimmt. Wir erhalten nämlich:

$$\begin{aligned} 1. \ p_i \ r_{i-1} &= r_{i-1}, (r_{i-1}, p_{i-1}) = p_{i-1}, p_{i-1} \ r_{i-2} = \\ r_{i-2}, &\dots \dots \dots p_{h+1} \ r_h = r_h, (r_h, r_{h-1}) = p_h \equiv r_j, \\ r_j \ p_{j+1} &= r_j, (r_j, p_j) = p_j, p_j \ r_{j-1} = r_{j-1}, \dots \dots \dots \\ (r_{i+1}, p_{i+1}) &= p_{i+1}. \end{aligned}$$

$$2. \ p_i \ r_i = r_i, (r_i, p_{i+1}) = p_{i+1}, \dots (r_{i-1}, p_1) = p_1 \\ p_1 \ p_{i+1} = r_1.$$

Bei diesem Verfahren wird von allen Bedingungen der Cf. nur die eine vernachlässigt, welche vorschreibt, dass der Punkt $p_i \equiv r_1$ auf der Geraden r_1 liegen soll. Wenn sich der Punkt p_i in der Ebene bewegt, so verändern sich

auch die durch ihn bestimmten Elemente. Hierbei werden die Geraden r_{i-1} und r_i Strahlbüschel, die Punkte p_{i+1} und p_i Punktreihen beschreiben, welche zu jenen Strahlbüscheln bez. projektiv sind. Die Berücksichtigung der bisher noch nicht erfüllten Cf.-Bedingung führt uns demnach zu folgender Aufgabe:

Gegeben sind zwei Punkte (r_{i-1} und r_i), Mittelpunkte von Strahlbüscheln, und zwei Gerade (p_{i+1} und p_i), Träger von Punktreihen; jede Punktreihe ist auf eins der Strahlbüschel projectiv bezogen. Durch diese Beziehungen wird jedem Punkte der Ebene eine Gerade zugeordnet und umgekehrt dieser Geraden derselbe Punkt.¹⁾ Durch jeden Punkt nämlich geht ein Strahl eines jeden Büschels und jedem dieser Strahlen entspricht ein Punkt der projektiv zugeordneten Punktreihe. Die Verbindungsgerade der so erhaltenen Punkte ist die dem gegebenen Punkte zugeordnete Gerade. Gesucht werden solche Punkte, welche auf der ihnen zugehörigen Geraden liegen. Durch jede Lösung dieser Aufgabe ist zugleich eine Gerade gefunden, welche durch den ihr entsprechenden Punkt geht. Die Aufgabe, derartige Geraden zu ermitteln, steht der zuvor angegebenen dual gegenüber. Durch ihre Lösung findet der Fall II b seine Erledigung.

Vom Falle II a ist der Fall II d kaum verschieden. Wir haben hier

$$\epsilon_h = r_h, \epsilon_i = p_i, \eta^i = p_i, \eta^h = r_h, \\ r_h \equiv p_j, p_i \equiv r_l, p_i \equiv r_l, r_h \equiv p_j, h < i < l < j.$$

Die Elemente

$p_{h+1} r_{h+1} \dots r_{i-1} \mid r_i p_{i+1} \dots p_l \mid p_{l+1} r_{l+1} p_{l+2} \dots r_{j+1}$
gehören sämtlich zu A' , ebenso p_h und r_j . Führen wir die folgenden Konstruktionen aus:

$$1. p_i r_{i-1} = r_{i-1}, (r_{i-1}, p_{i-1}) = p_{i-1}, p_{i-1} r_{i-2} = r_{i-2}, \\ \dots (r_{h+1}, p_{h+1}) = p_{h+1}, p_{h+1} p_h = r_h \equiv p_j,$$

¹⁾ Diese Beziehung drückt eine reciproke Verwandtschaft 2 ten Grades aus.

$$(p_j, r_j) = p_j, p_j r_{j-1} = r_{j-1}, (r_{j-1}, p_{j-1}) = p_{j-1}, \\ \dots (r_{1+1}, p_{1+1}) = p_{1+1}.$$

$$2. p_i r_i = r_i, (r_i, p_{i+1}) = p_{i+1}, \dots (r_{1-1}, p_1) = p_1 \\ p_1 p_{1+1} = r_1,$$

so gelten für die Elemente

$$r_{i-1}, r_i, p_{1+1}, p_1, p_i, r_1$$

genau dieselben Betrachtungen wie im Falle II a, wir werden daher hier zu derselben Aufgabe geführt wie dort. Der Fall II c steht dem Falle II d dual gegenüber, er erfordert also keine neue Überlegung.

§ 14.

Fall III.

Wir behandeln den Fall III a. Es ist

$$\epsilon_h = p_h, \epsilon_i = p_i, \eta^h = p_h, \eta^i = p_i^1) \\ p_h = r_j, p_i = r_1, p_h = r_j, p_i = r_1 \quad h < j < i < 1.$$

Unter den in A' enthaltenen Elementen sind in unserem Falle auch die folgenden:

$$r_h p_{h+1} \dots p_j \mid p_{j+1} r_{j+1} \dots r_{i-1} \mid r_i p_{i+1} \dots p_1 \\ \text{ebenso } p_{1+1}.$$

Wir können nun folgende Konstruktionen ausführen:

1. Wir nehmen auf r_{h-1} den Punkt p_h beliebig an und ermitteln

$$p_h r_h = r_h, (r_h, p_{h+1}) = p_{h+1}, \dots (r_{j-1}, p_j) = p_j.$$

2. Wir nehmen auf p_{j+1} den Punkt p_{j+1} willkürlich an und ermitteln

$$p_{j+1} r_{j+1} = r_{j+1}, (r_{j+1}, p_{j+2}) = p_{j+2}, \dots p_{i-1} r_{i-1} = \\ r_{i-1}.$$

3. Wir legen durch r_i eine beliebige Gerade r_i und ermitteln

$$(r_i, p_{i+1}) = p_{i+1}, p_{i+1} r_{i+1} = r_{i+1} \dots (r_{1-1}, p_1) = \\ p_1, p_1 p_{1+1} = r_1.$$

Aus dieser Konstruktion ergibt sich:

1) Auf die unwesentlichen, die Art der Konstruktion in keiner Weise verändernden, Modifikationen, welche erforderlich sind, falls eines der Elemente ϵ_h und ϵ_i mit p_m identisch ist, gehen wir auch hier nicht näher ein.

Durchläuft p_h die Gerade r_{h-1} , so beschreibt p_j auf p_j eine projektive Punktreihe.

Durchläuft p_{j+1} die Gerade p_{j+1} , so beschreibt r_{i-1} einen projektiven Strahlbüschel um r_{i-1} .

Dreht sich r_i um den Punkt r_i , so beschreibt r_1 einen projektiven Strahlbüschel um p_{1+1} .

Berücksichtigen wir noch, dass die Punkte $p_h = r_j, p_j, p_{j+1}$ in einer Geraden (r_j) liegen, und dass die Geraden $r_{i+1}, r_i, r_1 = p_i$ durch einen Punkt (p_i) gehen sollen — die einzigen nach unseren Konstruktionen in der Regel nicht erfüllten Cf.-Bedingungen, — so werden wir zu folgender Aufgabe geführt:

Es sind gegeben zwei projektive Punktreihen, eine zu einem Strahlbüschel projektive Punktreihe und zwei projektive Strahlbüschel. Es wird gefordert, entsprechende Elementenpaare von der Beschaffenheit zu ermitteln, dass die drei Punkte in einer Geraden liegen und die drei Geraden durch einen Punkt gehen. Auf dieselbe Aufgabe führt der Fall IIIb.

Aus ähnlichen Betrachtungen ergibt sich, dass der Fall IIIc auf folgende Aufgabe führt:

Es sind drei Gradenpaare $a, a_1; b, b_1; c, c_1$ gegeben. Die Punkte von a sind auf die Punkte von a_1 , die Punkte von b auf die Punkte von b_1 , die Punkte von c auf die Punkte von c_1 projektiv bezogen. Es sollen Punkte $\alpha, \alpha_1; \beta, \beta_1; \gamma, \gamma_1$, welche bez. auf $a, a_1; b, b_1; c, c_1$ gelegen sind, ermittelt werden in der Weise, dass α und α_1, β und β_1, γ und γ_1 einander entsprechen und dass α, α_1 und β in einer Geraden, β_1, γ und γ_1 in einer zweiten Geraden liegen.

Der Fall IIId führt auf die dieser Aufgabe dual gegenüberstehende.

§ 15. Es bleibt uns noch die Besprechung der beiden in § 9 ausgeschlossenen Fälle übrig.

Ist das Element ϵ_i durch die vorangehenden Elemente noch garnicht bestimmt, so muss ($i = m$) $\epsilon_i = p_m$ sein. Der Punkt r_{m-1} muss mit einer Ecke des letzten Polygons

identisch sein. Bewirken wir durch eine cyklische Vertauschung der Geraden des letzten Complexes, dass diese Ecke die erste des letzten Polygons wird, und ändern wir die Bezeichnung der Ecken und Seiten dieses Polygons so um, wie es der neuen Anordnung entspricht, so wird der vorher mit p_m bezeichnete Punkt jetzt etwa das Zeichen $p_s \equiv r_t$ erhalten ($s > m$, $t \geq m$). Man erkennt leicht, dass nun $\epsilon_h = p_m \equiv r_{m-1}$, $\epsilon_i = p_s$ oder $= r_t$, $\eta^i = p_s$ oder $= r_t$, $\eta^h = r_n = \eta$ wird, woraus sich ergibt, dass wir einen der Fälle IIa oder IIc haben.

Ist das Element ϵ_h durch die vorhergehenden noch gar nicht bestimmt, so ist es erster Punkt des vorletzten oder letzten Polygons.

Es sei zunächst $\epsilon_h = p_h$ der erste Punkt des Polygons P_{k-1} , dann ist ($i = m$) $\epsilon_i = p_m$. Die Gerade p_h muss nun Seite eines der Polygone P_{k-1} oder P_k sein. Im ersteren Falle genügt es, eine Neuordnung der Complexes der Cf. in der Weise vorzunehmen, dass der Complex C_{k-1} an die letzte Stelle tritt — was immer möglich ist —; dann ist der vorliegende Fall auf den vorigen zurückgeführt.

Gehört die Gerade p_h dem letzten Complex an und ist $p_h \equiv r_s$, also $p_h \equiv r_s$ ($s > m$), so haben wir folgende zu $\mathfrak{A}'$ gehörige Elemente

$$r_h \ p_{h+1} \ r_{h+1} \ . \ . \ . \ p_{m-1} \mid r_m \ p_{m+1} \ . \ . \ . \ p_s \mid p_{s+1} \ r_{s+1} \\ \ . \ . \ . \ r_n.$$

Wir legen durch r_h die Gerade r_h beliebig hindurch und construieren folgende Elemente:

$$(r_h, p_{h+1}) = p_{h+1}, \ p_{h+1} \ r_{h+1} = r_{h+1}, \ . \ . \ . \ (r_{m-2}, p_{m-1}) \\ = p_{m-1}.$$

Wird nur der Punkt $r_{m-1} = p_m$ willkürlich gewählt, so ergibt sich weiter:

1. $p_m \ r_m = r_m$, $(r_m, p_{m+1}) = p_{m+1} \ . \ . \ . \ (r_{s-1}, p_s) = p_s$.
2. $p_m \ r_n = r_n$, $(r_n, p_n) = p_n$, $p_n \ r_{n-1} = r_{n-1}$, $\ . \ . \ . \ .$
 $(r_{s+1}, p_{s+1}) = p_{s+1}$.
3. $p_m \ p_{m-1} = r_{m-1}$, $(r_{m-1}, r_h) = p_h \equiv r_s$.

Sollen alle Bedingungen der Cf. erfüllt sein, so müssen noch die Punkte p_s , p_{s+1} , r_s in einer Geraden (r_s) liegen.

Man ersieht hieraus, dass dieser Fall zu derselben Aufgabe führt, wie der Fall I a.

Den Fall, dass ε_h erster Punkt des letzten Polygons und nach Construction der vorangegangenen Elemente noch ganz unbestimmt ist, wollen wir, um eine kurze Bezeichnung zu haben, „Fall IV“ benennen. Wir werden zeigen, dass dieser Fall sich stets durch cyklische Vertauschung der Geraden des letzten Complexes C_k auf einen der Fälle I oder II zurückführen lässt.

Jedes Element (Ecke, Seite) des letzten Polygons ist mit den beiden ihm benachbarten incident; dies gilt auch von dem ersten Punkt und der letzten Geraden des Polygons, wenn man diese Elemente als benachbarte auffasst. Es ist in unserem Falle das Element ε_h noch mit einem ihm nicht benachbarten Elemente incident, welches wir mit η_h bezeichnen; ebenso ist ε_i mit einem ihm nicht benachbarten Elemente η_i incident. Man erkennt leicht, dass von allen Ecken und Seiten des Polygons P_k nur die Elemente $\varepsilon_h, \varepsilon_i, \eta_h, \eta_i$ die Eigenschaft haben, auch mit einem nicht benachbarten Elemente von P_k incident zu sein. Die Elemente $\varepsilon_h, \varepsilon_i, \eta_h, \eta_i$ spielen daher eine ausgezeichnete Rolle, welche sie nicht verlieren, wenn die Geraden von C_k cyklisch vertauscht werden. Unter den Elementen $\varepsilon_h, \varepsilon_i, \eta_h, \eta_i$ sind zwei Punkte und zwei Gerade; wir bezeichnen die Punkte mit ε_1 und ε_2 , die durch ε_1 gehende nicht benachbarte Gerade mit η_1 , die durch ε_2 gehende nicht benachbarte Gerade mit η_2 . Die neu eingeführte Bezeichnung ist so zu verstehen, dass $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \eta_1, \eta_2$ immer diese ganz bestimmten Punkte und Geraden der Cf. angeben, unabhängig von der Stelle, welche dieselben infolge der Anordnung der Cf.-Elemente erhalten. Hingegen bezeichnen wir mit ε_h und ε_i (ohne den Indices h und i eine weitere Bedeutung beizulegen) bei den verschiedenen, durch cyklische Vertauschung der Geraden von C_k hervorgerufenen, Anordnungen das jedesmalige vorletzte resp. letzte Element, welches nach der Construction der vorangegangenen noch nicht bestimmt ist, ferner mit η_h und η_i die bez. mit ε_h

und ε_i incidenten aber nicht benachbarten Elemente. Aus der für die Elemente $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \eta_1, \eta_2$ charakteristischen Eigenschaft ergibt sich, dass dieselben mit den Elementen $\varepsilon_h, \varepsilon_i, \eta_h, \eta_i$ identisch sein müssen, nur wird die Reihenfolge, in welcher die Identitäten stattfinden, bei den cyklischen Vertauschungen sich verschieben. Doch kann diese Reihenfolge angegeben werden, sobald die Reihenfolge, in welcher die Elemente $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \eta_1, \eta_2$ auftreten, bekannt ist: Von diesen Elementen ist das zuerst auftretende mit ε_h , von den übrigen dasjenige mit demselben Index mit η_h , von den jetzt noch zurückbleibenden das vorausgehende mit ε_i , das folgende mit η_i identisch. Es ist auch leicht, jedesmal anzugeben, welcher Fall vorliegt: Wird einer der Punkte $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ erste Ecke des letzten Polygons, so haben wir den Fall IV, sonst tritt einer der Fälle I und II oder der Fall III ein, je nachdem die Indices der beiden zuerst auftretenden Elemente verschieden oder gleich sind.

Nehmen wir zunächst an, dass ε_1 und η_2 incident also auch benachbart sind, dann kann nicht zugleich ε_2 auf η_1 liegen, also können ε_2 und η_1 auch nicht benachbart sein. Bewirken wir durch eine cyklische Vertauschung, dass η_2 "die erste Seite von P_k wird, so ist ε_1 entweder die zweite Ecke von P_k , und wir haben einen der Fälle I und II, da ε_2 und η_2 nicht benachbart sind, oder ε_1 wird die erste Ecke von P_k . Im letzteren Falle können wir η_2 zur letzten Seite von P_k machen; dann wird ε_1 die letzte Ecke, die erste (η_2 benachbarte) Ecke muss von ε_2 verschieden sein. Diese Anordnung entspricht wieder einem der Fälle I und II.

Der Fall, dass der Punkt ε_2 auf der Geraden η_1 liegt, ist von dem eben behandelten nur durch die Bezeichnung verschieden.

Wenn weder ε_1 auf η_2 noch ε_2 auf η_1 liegt, so können nicht zwei der Elemente $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \eta_1, \eta_2$ benachbart sein. Es ist daher möglich, durch cyklische Vertauschung der Geraden von C_k die Elemente $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \eta_1, \eta_2$ aus der Reihenfolge, in welcher sie auftreten, in jede andere überzuführen, welche aus der bestehenden durch cyklische Vertauschung gewonnen

werden kann. Machen wir zuerst η_1 , dann η_2 zur ersten Seite von P_k , so ist beidemal der Fall IV ausgeschlossen. Dass wir bei beiden Anordnungen den Fall III erhalten, ist nur dann möglich, wenn die betrachteten Elemente in der Reihenfolge $\eta_1, \epsilon_1, \eta_2, \epsilon_2$ (resp. einer durch cyklische Vertauschung aus dieser abgeleiteten) auftreten. Machen wir jetzt aber z. B. ϵ_1 zum zweiten Punkt von P_k , so erhalten die Elemente die Reihenfolge $\epsilon_1, \eta_2, \epsilon_2, \eta_1$, und wir haben den Fall II.

Hiermit ist erwiesen, dass der Fall IV sich immer auf einen der Fälle I und II zurückführen lässt.

§ 16. Man erkennt leicht, dass in den Fällen I und II das gesuchte Element ϵ_i Punkt oder Tangente einer durch die vorangegangene Konstruktion bestimmten Kurve dritter Ordnung resp. Klasse sein muss.

Wir kommen zunächst auf die Aufgabe zurück, auf welche wir bei der Besprechung des Falles Ia geführt wurden, und wollen jetzt die Mittelpunkte (r_{i-1}, r_i, p_{i+1}) der drei Strahlbüschel mit $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$, die Träger der drei Punktreihen mit A, B, C bezeichnen so, dass

der Strahlbüschel $\mathfrak{A}$ auf die Punktreihe A ,

„ „ „ „ „ „ B ,

„ „ „ „ „ „ C

projektiv bezogen ist. Bezeichnet p einen in der Ebene variablen Punkt und wird

$$p \mathfrak{A} = a, p \mathfrak{B} = b, p \mathfrak{C} = c$$

gesetzt, sind endlich a, b, c die den Geraden a, b, c bez. auf den Punktreihen A, B, C zugeordneten Punkte, so sind diejenigen Punkte p zu ermitteln, für welche die Punkte a, b, c in einer Geraden liegen. Durchläuft nun p eine gerade Punktreihe, so beschreiben die Geraden a, b, c Strahlbüschel, die Punkte a, b, c Punktreihen, welche zu der von p beschriebenen also auch unter einander projektiv sind. Es werden also auf den Geraden A, B, C , deren Punkte projektiv auf einander bezogen sind, solche Tripel zugeordneter Punkte gesucht, die in einer Geraden liegen. Indem p die gerade Punktreihe durchläuft, bewegt sich die Gerade a b

so, dass sie fortwährend einen Kegelschnitt $\mathfrak{K}$, die Gerade a c so, dass sie einen Kegelschnitt $\mathfrak{K}'$ berührt. Wenn die Punkte a , b , c in einer Geraden liegen, so ist dieselbe gemeinsame Tangente der beiden Kegelschnitte. Nun haben $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{K}'$ ausser a im allgemeinen höchstens drei gemeinsame Tangenten. Hieraus folgt, dass die von p durchlaufene Gerade höchstens drei Punkte enthält, welchen die gewünschte Eigenschaft zukommt. Der geometrische Ort aller Punkte von der verlangten Beschaffenheit ist also eine Kurve dritter Ordnung. Nehmen wir an, wir hätten zwei Punkte p_1 und p_2 dieser Curve, so wird die Gerade $p_1 p_2$ noch einen dritten Punkt p_3 der Kurve enthalten, welcher linear construirt werden kann. Wie sich nämlich aus dem vorstehenden ergibt, kann diese Aufgabe zurückgeführt werden auf die Aufgabe: die vierte gemeinsame Tangente zweier algebraisch eindeutig bestimmter Kegelschnitte $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{K}'$ zu konstruieren, wenn drei gemeinsame Tangenten t_1, t_2, t_3 , bekannt sind. Zwei dieser Tangenten: t_1 und t_2 werden von den übrigen Tangenten des Kegelschnittes $\mathfrak{K}$ in projektiven Punktreihen geschnitten, ebenso von den Tangenten des Kegelschnittes $\mathfrak{K}'$. Hierdurch werden also die Punkte von t_2 in doppelter Weise projektiv auf die Punkte von t_1 bezogen. Wir haben daher auf t_1 zwei (incidente) projektive Punktreihen, ein Doppelpunkt derselben ist der Schnittpunkt (t_1, t_3) , der andere kann daher durch lineare Konstruktion ermittelt werden. Dem so gewonnenen Punkte entspricht auf t_2 ein und derselbe Punkt in doppelter Weise, und die Verbindungslinie der beiden Punkte ist die gesuchte vierte gemeinsame Tangente. Den Schnittpunkten a_3, b_3, c_3 dieser Tangente mit den Geraden A, B, C entsprechen in den Strahlbüscheln $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ bez. die Geraden a_3, b_3, c_3 , welche durch den gesuchten Punkt p_3 der Geraden p_1, p_2 hindurchgehen.

Zu jedem Punkte p der verlangten Art gehört eine Gerade $g = a b c$, und die Gesamtheit dieser Geraden umhüllt eine Kurve dritter Klasse. Wie aus zwei Punkten der Kurve dritter Ordnung der auf ihrer Verbindungsgeraden

gelegene dritte Punkt durch lineare Konstruktion gewonnen werden kann, so kann aus zwei Tangenten der Klassenkurve die dritte durch ihren Schnittpunkt gehende Tangente linear konstruiert werden. Diese liefert zugleich wieder einen neuen Punkt der Ordnungskurve.

Es ist unmittelbar ersichtlich, dass man in den Fällen I b, c, d durch ganz analoge Konstruktionen zu neuen Elementen der betreffenden Kurven geführt wird, aber auch der Fall II wird durch ähnliche Betrachtungen erledigt. Sind nämlich $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ die Mittelpunkte der beiden in Betracht kommenden Strahlbüschel, A und B die Träger der beiden Punktreihen, von denen die erste auf den ersten Strahlbüschel, die zweite auf den zweiten projektiv bezogen ist, ist ferner p ein in der Ebene veränderlicher Punkt,

$$p \mathfrak{A} = a, p \mathfrak{B} = b,$$

a der dem Strahle a zugeordnete Punkt der Geraden A, b der dem Strahle b zugeordnete Punkt der Geraden B, so ist $a b = g$ die dem Punkte p zugehörige Gerade. Beschreibt nun p eine gerade Punktreihe, so durchlaufen a und b projektive Punktreihen auf A und B. Es wird daher dreimal vorkommen, dass die Punkte p , a , b in einer Geraden liegen, oder dass die Gerade g durch p hindurchgeht, und wir können, sobald auf der von p durchlaufenen Geraden zwei Punkte bekannt sind, für welche g durch p geht, den dritten derartigen Punkt durch lineare Konstruktion ermitteln.

Eine andere Methode, zu neuen Elementen der Kurve zu gelangen, ist die, dass man in einem Punkte die Tangente konstruiert und ihren Schnittpunkt mit der Kurve ermittelt, oder dass man, wenn es sich um die Tangenten einer Klassenkurve handelt, den Berührungspunkt der Tangente und die von diesem Punkte noch ausgehende Tangente ermittelt.

Alle diese Konstruktionen setzen voraus, dass man bereits Elemente der Kurve kennt. Dies ist aber der Fall. So erkennt man leicht, dass z. B. im Falle Ia die Punkte

$\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ der gesuchten Kurve angehören. Im Falle II gilt von den Punkten $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ dasselbe, ein dritter Punkt lässt sich leicht angeben. Dem Schnittpunkte der Geraden A und B entspricht nämlich sowohl eine Gerade des Punktes $\mathfrak{A}$ als auch eine solche des Punktes $\mathfrak{B}$; diese schneiden sich in einem Punkte $\mathfrak{C}$ der gesuchten Kurve. Ebenso entspricht der Geraden $\mathfrak{A} \mathfrak{B}$ sowohl auf A als auch auf B ein Punkt; die Verbindungsgerade C dieser Punkte ist eine Tangente der Klassenkurve, deren Tangenten den Punkten der Ordnungskurve zugeordnet sind. Die dritten auf den Seiten des Dreiecks $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}$ gelegenen Punkte der Kurve dritter Ordnung sind die Schnittpunkte

$$(\mathfrak{B} \mathfrak{C}, A), (\mathfrak{C} \mathfrak{A}, B), (\mathfrak{A} \mathfrak{B}, C).$$

§ 17. Ganz anders liegen die Verhältnisse in den Fällen III. Die Betrachtung der Aufgabe, auf welche wir gelegentlich der Besprechung des Falles III c geführt wurden, lässt leicht erkennen, dass die Konstruktion von Punkten der verlangten Art allein mit Hilfe des Lineals im allgemeinen nicht möglich ist. Man erkennt dies schon daraus, dass es vorkommen kann, — und dieser Fall ist kein spezieller — dass ein reelles System von derartigen Punkten überhaupt nicht existiert. Wir nehmen die in § 14 eingeführte Bezeichnung wieder auf, verstehen aber unter a , a_1 ; b , b_1 , c , c_1 zunächst variable Paare zugeordneter Punkte auf den Geraden a , a_1 ; a , b_1 ; c , c_1 ; es ist dann leicht folgendes zu erkennen:

Die Gesamtheit der Geraden a a_1 umhüllt einen Kegelschnitt $\mathfrak{K}$, die Gesamtheit der Geraden c c_1 einen Kegelschnitt $\mathfrak{K}_1$. Wenn nun die Gerade b den Kegelschnitt $\mathfrak{K}$, die Gerade b_1 den Kegelschnitt $\mathfrak{K}_1$ in reellen Punkten schneidet, so zerfällt jede dieser Geraden in zwei Teile (b' b'' und b'_1 b''_1) derartig, dass von den Punkten des einen Theiles (b' , b'_1) reelle, von den Punkten des anderen Theiles (b'' , b''_1) imaginäre Tangenten an die zugehörigen Kegelschnitte gehen. Ist nun die projektive Zuordnung der Punkte von b und b_1 eine solche, dass der der Strecke b' entsprechende Teil von b_1 ganz in die Strecke b''_1 hineinfällt, so giebt es

kein Paar entsprechender Punkte b und b_1 , von denen der erste an den Kegelschnitt $\mathfrak{K}$, der zweite an den Kegelschnitt $\mathfrak{K}_1$ reelle Tangenten entsendet. Hieraus folgt die obige Behauptung ohne Weiteres. Ganz ebenso ist die Unmöglichkeit einer linearen Konstruktion in den Fällen III a, b, d zu erkennen.

§ 18. Wir haben gesehen, dass es möglich ist, jede beliebige Cf. n_3 (welche nicht zerfällt) mittelst linearer Konstruktion unter Hinzunahme von höchstens einer quadratischen zu construieren. Die angegebene Konstruktion ist eine ganz allgemeine, d. h.

1) jede durch eine solche Konstruktion erhaltene Figur ist eine Cf. der verlangten Art und

2) jede Cf. der verlangten Art ist unter den durch solche Konstruktion herstellbaren Figuren enthalten.

Soll auch die zweite Bedingung erfüllt sein, so ist die angegebene Konstruktion so zu verstehen, dass in allen Fällen, in denen zwei Gerade, deren Schnittpunkt ermittelt werden soll, zusammenfallen, an die Stelle des Schnittpunktes irgend ein Punkt dieser Geraden tritt und dass ebenso in allen Fällen, in denen zwei Punkte, deren Verbindungsgerade ermittelt werden soll, zusammenfallen, an die Stelle der Verbindungsgeraden eine beliebige durch diese Punkte gehende Gerade tritt.

Ueberhaupt dürfen bei der Konstruktion die speziellen Fälle nicht ausgeschlossen werden. Die Aufgabe, eine allgemeine Konstruktion anzugeben, welche alle Cff. der verlangten Art liefert, in denen nicht verschiedene Cf.-Punkte oder Cf.-Gerade zusammenfallen, ist von der von uns behandelten durchaus verschieden. Bei vielen Cff. zeigt es sich überdies, dass stets gewisse ihrer Geraden oder Punkte zusammenfallen müssen. Eine dieser Cff. ist die von Schroeter angegebene

$$\text{Cf. } 10_3 \left\{ \begin{array}{cccccccccc} 1 & 1 & 1 & 2 & 2 & 3 & 3 & 4 & 5 & 8 \\ 2 & 4 & 6 & 4 & 5 & 6 & 7 & 6 & 7 & 9 \\ 3 & 5 & 7 & 8 & 9 & 8 & 9 & 10 & 10 & 10. \end{array} \right.$$

Will man eine Cf. n_3 linear construieren, so hat man bei ihrer Zerlegung in Polygone und der Anordnung dieser

Polygone darauf zu achten, dass der Fall III vermieden wird, da dieser Fall es in der Regel unmöglich macht, die Konstruktion der Cf. allein mit Hilfe des Lineals zu Ende zu führen. Da es in vielfacher Weise möglich ist, die Elemente des Schemas der Cf. so anzuordnen, dass jede Horizontalreihe jedes Element einmal enthält, da es ferner beliebig ist, welche beiden Horizontalreihen zur Bildung der Polygone verwandt werden, da endlich auch die Reihenfolge der Polygone und der Geraden innerhalb derselben verschiedenartig festgesetzt werden kann, so wird es in den meisten Fällen möglich sein, einen der Fälle I und II herbeizuführen. Ob dies bei jeder Cf. möglich ist oder ob es auch solche Cff. giebt, bei denen jede Anordnung auf den Fall III führt, konnte bisher nicht entschieden werden.

Bei den meisten Cff. scheint es möglich zu sein, durch verschiedene Anordnung ihrer Elemente jeden beliebigen der Fälle I, II, III herbeizuführen. Ordnen wir in der § 2 behandelten Cf. 20₃ die Elemente in folgender Weise an:

10	3	12	7	14	8	16	13	5	2	15
18	5	13	20	6	19	12	4	7	14	11
5	13	18	6	19	12	4	7	14	11	20
19	1	6	17	4	20	11	9	18		
15	3	10	8	1	9	17	16	2		
3	10	8	1	9	17	16	2	15		

so ergibt sich.

$$\varepsilon_h = \begin{matrix} 17 \\ 18, \\ 1 \end{matrix} \varepsilon_i = \begin{matrix} 9 \\ 17, \\ 2 \end{matrix} \eta^h = \begin{matrix} 9 \\ 16 \\ 2 \end{matrix} \eta^i = \begin{matrix} 16 \\ 2 \end{matrix}$$

(Fall I).

Bei der folgenden Anordnung:

10	3	12	7	14	8	16	13	5	2	15
18	5	13	20	6	19	12	4	7	14	11
5	13	18	6	19	12	4	7	14	11	20
11	9	18	19	1	6	17	4	20		
17	16	2	15	3	10	8	1	9		
16	2	15	3	10	8	1	9	17		

ergiebt sich

$$\varepsilon_h = \frac{9}{2}, \quad \varepsilon_i = \frac{1}{10}, \quad \eta^i = 1, \quad \eta^h = 9$$

(Fall II).

Bei einer dritten Anordnung

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} 7 & 14 & 8 & 16 & 13 & 5 & 2 & 15 & 19 & 1 & 6 & 7 & 4 & 20 & 11 & 9 & 8 \\ 20 & 6 & 19 & 12 & 4 & 7 & 14 & 11 & 15 & 3 & 10 & 8 & 1 & 9 & 17 & 16 & 2 \\ 6 & 19 & 12 & 4 & 7 & 14 & 11 & 20 & 3 & 10 & 8 & 1 & 9 & 17 & 16 & 2 & 15 \\ & & & & & & & & 10 & 3 & 12 & & & & & & \\ & & & & & & & & 18 & 5 & 13 & & & & & & \\ & & & & & & & & 5 & 13 & 18 & & & & & & \end{array}$$

endlich wird:

$$\varepsilon_h = 9, \quad \eta^h = \frac{9}{2}, \quad \varepsilon_i = 18, \quad \eta^i = \frac{12}{18}$$

(Fall III).


Alle diese drei Anordnungsweisen gehen aus einer einzigen Zerlegung der Cf. hervor, nämlich aus der in § 2 zuerst ermittelten Zerlegung in die Polygone

$$1 \ 9 \ 17 \ 16 \ 2 \ 15 \ 3 \ 10 \ 8; \ 4 \ 7 \ 14 \ 11 \ 20 \ 6 \ 19 \ 12; \ 5 \ 13 \ 18.$$

Die Fälle I und II führten zu der Aufgabe, von einer eindeutig bestimmten Kurve dritter Ordnung, von welcher gewisse Punkte bekannt sind, weitere Punkte durch lineare Konstruktion zu ermitteln (sowie auf die dual gegenüberstehende Aufgabe). Im allgemeinen genügt es schon, einen Punkt der Kurve zu kennen, um aus demselben beliebig viele andere abzuleiten, welche die ganze Kurve oder einen Zweig derselben so überdecken, dass alle Entfernungen je zweier aufeinanderfolgender kleiner sind als eine beliebig klein gegebene Strecke. In besonderen Fällen ist es aber, selbst wenn drei Punkte einer eindeutig bestimmten Kurve ohne Doppelpunkt bekannt sind, unmöglich, durch lineare Konstruktionen irgend einen anderen Punkt der Kurve zu ermitteln. Es wird daher bei jeder Cf. die Anwendbarkeit der angegebenen Methoden zur linearen Herstellung noch einer besonderen Prüfung bedürfen.

Vita.

Natus sum, Ernestus Steinitz, in vico, qui appellatur Laurahuette, d. XIII Iunii a. h. s. L XXI, patre Sigismundo, quem morte mihi ereptum valde lugeo, matre Augusta e gente Cohn. Postquam per decem annos Vratislaviae gymnasium Friderici frequentavi, maturitatis testimonium (a. h. s. L XXXX) adeptus sum. Paulo post in ordinem philosophorum receptus per octo semestria studii praecipue mathematicis operam dedi primum Vratislaviae deinde Berolini, tum rursus Vratislaviae. Audivi viros illustrissimos: Baeumker, Dieterici, Hintze, Lipps, London, Meyer, Milch, Rosanes, Schmarsow, Schroeter (Vratislaviae); Aegidi, Delbrueck, Ebbinghaus, Frobenius, Fuchs, Grimm, Knoblauch, Kronøcker, Planck, Schwarz (Berolini). Quibus omnibus viris gratias ago quam maximas, imprimis Iacobo Rosanes, quem summa cum benevolentia studiis meis favisse pio animo confiteor.



Thesen.

1. Die Elemente der Zahlentheorie sollten schon auf der Schule gelehrt werden.
2. Die Wiedereinführung der lateinischen Sprache als Schriftsprache hätte für die mathematischen Wissenschaften viele Vorteile.
3. Die Geometrie von n Dimensionen hat als mathematische Disciplin nicht weniger Realität wie die Geometrie von drei Dimensionen.

