

Es kommt nun für den Beweis des Haupttheorems I. alles auf den Beweis der beiden Sätze an, die aus den Eigenschaften der Functionale φ und ε zu folgern sind:

A. Die Functionale φ_n gehören der Hauptclasse an.

Können wir dieses Lemma voraussetzen, so ist φ_n mit einer Zahl α_n associirt, und wir können die Formel (14) mit etwas veränderter Bedeutung von ε_n so darstellen:

$$(15) \quad \omega_n = \varepsilon_n \alpha_n^m \prod (r^{m_n}, \eta)^m.$$

In dieser Formel ist aber ε_n eine numerische Einheit des Körpers $\mathcal{Q}_m$, die dem Satze 9. genügt.

Können wir also aus dem Satze 9. noch das zweite Lemma beweisen:

B. Eine numerische Einheit ε_n des Körpers $\mathcal{Q}_m$, die dem Satze 9. genügt, ist die m^{te} Potenz einer Einheit in $\mathcal{Q}_m$, multiplicirt mit einer Potenz von r ;

so können wir in (15) die m^{te} Wurzel ziehen, und erhalten, wenn mit ϱ eine Einheitswurzel von möglicherweise höherem Grade als m und mit α eine Zahl des Körpers $\mathcal{Q}_m$ bezeichnet wird:

$$(16) \quad (r, x_0) = \varrho \alpha \prod (r^{m_n}, \eta),$$

wo nun rechts lauter Kreistheilungszahlen stehen und wodurch daher das Theorem I. erwiesen ist.

§. 182.

Beweis des ersten Hülfsatzes für ein ungerades m .

Wir haben im vorigen Paragraphen den Beweis des Theorems I. von zwei Hülfsätzen abhängig gemacht, deren Beweis nun ferner zu suchen ist.

Wir formuliren den ersten dieser Hülfsätze so:

a) Ist φ_n ein System von Null verschiedener conjugirter Functionale des Körpers $\mathcal{Q}_m$, von denen bekannt ist, dass

$$\varphi_n^m \text{ und } \varphi_n^{-1} \varphi_1^n$$

der Hauptclasse angehören, so gehören die Functionale φ selbst der Hauptclasse an.

Der Satz wird bewiesen sein, wenn von irgend einer Potenz φ^k von φ , deren Exponent nicht durch q theilbar ist, bewiesen werden kann, dass sie der Hauptclasse angehört. Denn sind α, β Zahlen in $\mathcal{Q}_m$ und ist

$$\varphi^m = \varepsilon' \alpha, \quad \varphi^k = \varepsilon'' \beta,$$

so können wir die ganzen rationalen Zahlen x, y so bestimmen, dass

$$mx + ky = 1$$

wird, und dann wird

$$\varphi = \varphi^{mx} \varphi^{ky} = \varepsilon''' \alpha^x \beta^y,$$

also ist auch, wenn $\varepsilon', \varepsilon'', \varepsilon'''$ Einheiten sind, φ selbst mit einer Zahl associirt.

Nach dem heutigen Stande der Sache ist der Beweis für ein gerades m auf einem ganz anderen Wege zu führen, als für ein ungerades, und wir beschäftigen uns also zunächst mit dem leichteren Falle des ungeraden m ¹⁾.

Die in a) über φ_n gemachten Voraussetzungen können wir, wenn α, β wieder irgend welche Zahlen des Körpers $\mathcal{Q}_m$ und ε Einheitsfunctionale bedeuten, durch die beiden Formeln ausdrücken:

$$(1) \quad \varphi_n^m = \varepsilon \beta,$$

$$(2) \quad \varphi_n = \varepsilon \alpha \varphi_1^n.$$

Wir werden nun die Aufgabe schrittweise lösen.

Ist zunächst, wie früher, σ der in q enthaltene Primfactor, der eine in $\mathcal{Q}_m$ existirende Zahl ist, und σ^k die in φ enthaltene Potenz von σ , so setzen wir

$$(3) \quad \varphi = \sigma^k \psi,$$

worin ψ ein zu q theilerfremdes Functional bedeutet, das denselben Bedingungen (1), (2) wie φ genügt, und wenn eines von beiden in die Hauptclasse gehört, so gilt das auch vom anderen. Der Satz a) braucht also nur noch unter der Voraussetzung bewiesen zu werden, dass φ theilerfremd zu q ist.

Es sei nun p eine von q verschiedene Primzahl, die in Primfactoren zerlegt den Ausdruck hat:

$$(4) \quad p = \prod \mathfrak{p}_i,$$

¹⁾ Vgl. übrigens den neuen Beweis von Hilbert, bei dem der Unterschied zwischen geradem und ungeradem m weit mehr zurücktritt (S. 648).

worin ξ die in §. 172 näher bestimmte Zahlenreihe durchläuft. Es möge $p_{\xi}^{k_{\xi}}$ die in φ enthaltene Potenz von p_{ξ} sein, so dass, wenn wir

$$\varphi = \chi \prod_{\xi} p_{\xi}^{k_{\xi}}$$

setzen, χ theilerfremd zu p und mit keinen anderen Primzahlen verwandt ist (s. den Schluss von §. 173), als φ selbst. Daraus ergibt sich

$$(5) \quad \varphi_n = \chi_n \prod_{\xi} p_{n\xi}^{k_{\xi}},$$

und hierin lassen wir n abermals die Reihe der Zahlen ξ durchlaufen. Setzen wir noch

$$\psi = \prod_{\xi} \chi_{\xi},$$

so ist auch ψ theilerfremd zu p und mit keinen anderen Primzahlen verwandt als φ , und wir erhalten aus (5) mit Benutzung von (4):

$$(6) \quad \prod_{\xi} \varphi_{\xi} = \psi p^{x_{k_{\xi}}},$$

und daraus ergibt sich, dass das Functional ψ denselben beiden Bedingungen (1), (2) genügt, wie φ .

Es zeigt sich ferner, dass, wenn die φ_{ξ} in der Hauptclasse liegen, auch ψ in der Hauptclasse enthalten ist.

Wenn aber $p - 1$ nicht durch q theilbar ist, so können wir auch das Umgekehrte schliessen.

Denn nach (2) ist φ_{ξ} äquivalent mit φ^{ξ} und folglich ist:

$$\prod_{\xi} \varphi_{\xi} \text{ äquivalent } \varphi^{x_{k_{\xi}}}, \\ \text{äquivalent } \psi,$$

und wenn ψ mit einer Zahl associirt ist, so gilt dasselbe von $\varphi^{x_{k_{\xi}}}$. Nach dem Satze §. 172 ist aber, wenn $p - 1$ nicht durch q theilbar ist, $\sum \xi$ auch nicht durch q theilbar, und folglich ist auch φ selbst in der Hauptclasse enthalten.

Diese Betrachtung können wir nun, wenn ψ noch mit weiteren Primzahlen, die nach dem Modul q nicht mit 1 congruent sind, verwandt ist, wiederholen, und kommen so zu dem Satze:

Der Satz a) ist allgemein bewiesen, wenn er unter der Voraussetzung bewiesen werden kann, dass φ nur mit solchen Primzahlen verwandt ist, die nach dem Modul q mit 1 congruent sind.

Machen wir diese Voraussetzung über die Functionale φ_n , so können wir das Kummer'sche Theorem in der Fassung des §. 174, 3. anwenden.

Wir bezeichnen in der Folge mit ε Einheitsfunctionale, auf deren genauere Kenntniss nichts ankommt, und setzen

$$(7) \quad \Phi_n = \prod \varphi_{n'}^t = \varepsilon \vartheta_n^m,$$

wenn t die durch q nicht theilbaren Reste von m , die kleiner als m sind, durchläuft, und t' durch $t t' \equiv 1 \pmod{m}$ bestimmt ist. Dann ist ϑ_n eine Kreistheilungszahl in einem höheren Körper, deren m^{te} Potenz in Ω_m enthalten ist und die der zweiten Bedingung genügt, dass

$$(8) \quad \vartheta_n^{-1} \vartheta_1^n = \alpha$$

eine Zahl des Körpers Ω_m ist.

Wir führen nun ein vielfach gebrauchtes Zeichen ein, indem wir unter $E(x)$ die grösste ganze Zahl verstehen, die in der reellen Zahl x enthalten ist, und unter (x) den Rest, der stets ein echter Bruch ist, und, wenn x selbst eine ganze Zahl sein sollte, gleich Null zu setzen ist. Dann ist

$$(9) \quad x = E(x) + (x).$$

Ist x eine ganze Zahl, so ist nach dieser Bezeichnungsweise

$$m \left(\frac{x}{m} \right)$$

auch eine ganze Zahl, und zwar der kleinste positive Rest der Theilung von x durch m .

In der Formel (7) ist der Index der Functionale φ nur nach dem Modul m bestimmt. Der Exponent aber ist auf seinen kleinsten Rest nach dem Modul m reducirt. Ersetzen wir also in (7) den Index t' durch $n' t'$, so muss t durch den Rest der Division von $n t$ durch m , d. h. [nach (9)] durch

$$m \left(\frac{n t}{m} \right) = n t - m E \left(\frac{n t}{m} \right)$$

ersetzt werden, und wir können setzen

$$\Phi_n = \prod \varphi_{n'}^{n t - m E \left(\frac{n t}{m} \right)} = \varepsilon \vartheta_n^m,$$

andererseits ist

$$\Phi_1 = \prod \varphi_{1'}^t = \varepsilon \vartheta_1^m,$$

also nach (8)

$$(10) \quad \Phi_1^n \Phi_n^{-1} = \prod \varphi_{t'}^{m E \left(\frac{n t}{m} \right)} = \varepsilon \alpha^m.$$

Hiernach ist der Quotient

$$\left(\frac{\prod \varphi_{t'}^{E \left(\frac{n t}{m} \right)}}{\alpha} \right)^m$$

ein Einheitsfunctional, und da er zugleich die m^{te} Potenz eines Functionals in $\mathcal{Q}_m$ ist, so ist die Basis dieser Potenz auch eine Einheit, d. h. es ist

$$\prod \varphi_{t'}^{E \left(\frac{n t}{m} \right)} = \varepsilon \alpha,$$

und es gehört dies Product der Hauptclasse an. Nun ist aber nach unserer Voraussetzung

$$\varphi_{t'} \text{ äquivalent mit } \varphi'',$$

und daher ist

$$\prod \varphi_{t'}^{E \left(\frac{n t}{m} \right)} \text{ äquivalent mit } \varphi^{\sum t' E \left(\frac{n t}{m} \right)},$$

und dies gilt für jedes beliebige durch q nicht theilbare n .

Können wir also nachweisen, dass sich n so bestimmen lässt, dass auch die Summe

$$S_n = \sum t' E \left(\frac{n t}{m} \right)$$

durch q nicht theilbar ist, so haben wir das Theorem a) bewiesen.

Wir wollen zunächst eine Umformung der Summe S_n vornehmen, durch die die Frage auf den weit einfacheren Fall zurückgeführt wird, in dem m eine Primzahl ist.

Wir setzen, wenn m eine höhere als die erste Potenz von q ist,

$$m = q m', \quad t = t_1 + q t_2, \quad \begin{array}{l} t_1 = 1, 2, \dots, q - 1 \\ t_2 = 0, 1, \dots, m' - 1. \end{array}$$

Darin ist m' noch eine Potenz von q , der Summationsbuchstabe t_1 durchläuft die Zahlenreihe $1, 2, \dots, q - 1$, und t_2 die Zahlenreihe $0, 1, 2, \dots, m' - 1$. Wir bestimmen t'_1 aus der Congruenz

$$t_1 t'_1 \equiv 1 \pmod{q}$$

und erhalten

$$t' \equiv t'_1 \pmod{q}.$$

Es ist dann

$$(11) \quad S_n = \sum^t t' E\left(\frac{tn}{m}\right) \equiv \sum^{t_1} t'_1 \sum^{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) \pmod{q}.$$

Wir nehmen jetzt $n < q$ an, also auch $nt_1 < m$, so dass $nt_1 : m$ ein echter Bruch ist. Dann ist

$$\begin{aligned} a) \quad E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) &\text{ entweder } = E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) \\ b) &\text{ oder } = E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1, \end{aligned}$$

und zwar tritt der Fall b) nur dann ein, wenn zwischen

$$\frac{nt_2}{m'} \text{ und } \frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}$$

eine ganze Zahl liegt. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn der Unterschied zwischen $nt_2 : m'$ und der nächst grösseren ganzen Zahl kleiner als $nt_1 : m$ ist, also wenn

$$(12) \quad E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1 - \frac{nt_2}{m'} < \frac{nt_1}{m}.$$

Lassen wir in dem Ausdrucke auf der linken Seite von (12)

$$(13) \quad E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + 1 - \frac{nt_2}{m'}$$

t_2 alle seine Werthe durchlaufen, so erhalten wir lauter positive, die Einheit nicht übersteigende rationale Brüche mit dem Nenner m' , von denen keine zwei einander gleich sind. Denn wären zwei der Werthe, die aus (13) durch Substitution von t'_2, t''_2 für t_2 entstehen, einander gleich, so müsste $\frac{n(t'_2 - t''_2)}{m'}$ eine ganze Zahl sein, was, da n relativ prim zu m' und $t'_2 - t''_2$ kleiner als m' ist, nicht sein kann. Die Ausdrücke (13) durchlaufen daher in irgend einer Reihenfolge die Zahlenwerthe

$$(14) \quad \frac{1}{m'}, \frac{2}{m'}, \dots, \frac{m'-1}{m'}, 1,$$

und wenn a einen beliebigen positiven Bruch bedeutet, so ist $E(m'a)$ die Anzahl der Zahlen der Reihe (14), die nicht grösser als a sind. Nach (12) ist daher die Anzahl der Werthe von t_2 , für die der Fall b) eintritt, gleich $E\left(\frac{nt_1}{q}\right)$, und es ergibt sich

$$\sum^{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'} + \frac{nt_1}{m}\right) = \sum^{t_2} E\left(\frac{nt_2}{m'}\right) + E\left(\frac{nt_1}{q}\right).$$

Um S_n zu bilden, multipliciren wir diese Gleichung mit t'_1 und summiren. Dadurch ergibt sich

$$S_n \equiv \sum t'_1 \sum E\left(\frac{n t_2}{m}\right) + \sum t'_1 E\left(\frac{n t_1}{q}\right) \pmod{q}.$$

Darin ist nun $\sum t'_1 = \sum t_1 \equiv 0 \pmod{q}$, weil die t_1 paarweise die Summe q ergeben, und es folgt:

$$(15) \quad S_n \equiv \sum t'_1 E\left(\frac{n t_1}{q}\right) \pmod{q}.$$

Die Summe, die hier auf der rechten Seite steht, ist ebenso gebildet, wie S_n selbst in dem Falle, wo m eine Primzahl ist. Für diesen Fall ergibt sich aber

$$\begin{aligned} \frac{n t_1}{q} &= E\left(\frac{n t_1}{q}\right) + \left(\frac{n t_1}{q}\right) \\ \frac{(q-n) t_1}{q} &= E\left(\frac{(q-n) t_1}{q}\right) + \left(\frac{(q-n) t_1}{q}\right), \end{aligned}$$

und daraus durch Addition

$$t_1 = E\left(\frac{n t_1}{q}\right) + E\left(\frac{(q-n) t_1}{q}\right) + \left(\frac{n t_1}{q}\right) + \left(\frac{(q-n) t_1}{q}\right),$$

und dabei kann die Summe der beiden positiven echten Brüche, die doch eine ganze Zahl sein muss, nur den Werth 1 haben. Es folgt also

$$E\left(\frac{n t_1}{q}\right) + E\left(\frac{(q-n) t_1}{q}\right) = t_1 - 1,$$

und daraus durch Multiplication mit t'_1 und Summation über alle Werthe von t_1 von 1 bis $q-1$

$$\sum t'_1 E\left(\frac{n t_1}{q}\right) + \sum t'_1 E\left(\frac{(q-n) t_1}{q}\right) \equiv -1 \pmod{q}.$$

Folglich können sicher nicht beide Summen auf der linken Seite durch q theilbar sein. Dann zeigt der Ausdruck (15), dass von den beiden Summen S_n und S_{q-n} gewiss eine durch q untheilbar ist.

Dies aber war zu beweisen.

§. 183.

Beweis des zweiten Hülfsatzes für ein ungerades m .

Das zweite Lemma, was nach §. 181 noch zu beweisen ist, ist folgendes:

2. Ist ε_n ein System conjugirter numerischer Einheiten des Körpers $\mathcal{Q}_m$, das der Bedingung genügt, dass

$$(1) \quad \varepsilon_n \varepsilon_1^{-n} = \mathcal{G}^m$$

die m^{te} Potenz einer Einheit in $\mathcal{Q}_m$ ist, so sind die ε_n selbst m^{te} Potenzen von Einheiten in $\mathcal{Q}_m$, multiplicirt mit einer Einheitswurzel der Form r^{nk} .

Auch dieser Beweis ist für den Fall eines ungeraden m ganz elementar. Wir betrachten daher hier zunächst diesen Fall.

Nach §. 178, 1. können wir jede Einheit des Körpers $\mathcal{Q}_m$ in der Form darstellen:

$$(2) \quad \varepsilon = \pm r^k \mathcal{G}(r), \quad \varepsilon_n = \pm r^{nk} \mathcal{G}(r^n),$$

worin $\mathcal{G}(r)$ eine reelle Einheit des Körpers $\mathcal{Q}_m$ ist. Es genügt also $\mathcal{G}(r)$ der Bedingung

$$(3) \quad \mathcal{G}(r) = \mathcal{G}(r^{-1}),$$

woraus sich nach (2) ergibt:

$$(4) \quad \varepsilon_1 \varepsilon_{-1} = \mathcal{G}(r)^2;$$

aus (1) aber findet sich, wenn man $n = -1$ setzt,

$$\varepsilon_1 \varepsilon_{-1} = \mathcal{G}^m,$$

d. h. die linke Seite von (4) ist die m^{te} Potenz einer Einheit in $\mathcal{Q}_m$, und es ist also auch

$$(5) \quad \mathcal{G}(r)^2 = \mathcal{G}^m$$

die m^{te} Potenz einer solchen Einheit.

Da nun m ungerade ist, so lässt sich die ganze rationale Zahl x so bestimmen, dass

$$(6) \quad 2x + m = 1$$

wird, und daraus folgt

$$\mathcal{G}(r) = \mathcal{G}(r)^{2x} \mathcal{G}(r)^m.$$

Wenn wir also nach (5)

$$\mathcal{G}^x \mathcal{G}(r) = e(r)$$

setzen, so folgt

$$(7) \quad \mathcal{G}(r) = e(r)^m.$$

Durch (7) ist aber der Satz 2. bewiesen und damit zugleich für ein ungerades m das ganze Theorem I.

Auch dieser Schluss versagt für ein gerades m , weil dann die Gleichung (6) nicht mehr lösbar ist.

§. 184.

Vorläufiges über den Fall eines geraden m .

Für den Fall, dass m eine Potenz von 2 ist, schlagen wir einen ganz anderen Weg ein, über den hier zunächst einige vorläufige Bemerkungen Platz finden mögen.

Wir haben schon im §. 182 gesehen, dass das erste Lemma bewiesen ist, wenn wir nachweisen können, dass irgend eine Potenz von φ , deren Exponent nicht durch q theilbar ist, zur Hauptklasse gehört. Dabei ist von den beiden Eigenschaften des Functionals φ nur die erste benutzt, dass die m^{te} Potenz von φ in der Hauptklasse enthalten ist.

Nun kennen wir nach den allgemeinen Sätzen in §. 154 in jedem Körper einen Exponenten h , nämlich die Anzahl der Idealclassen, für den φ^h zur Hauptklasse gehört, wenn φ ein beliebiges Functional in diesem Körper ist.

Wenn wir also beweisen können, dass die Classenzahl h im Körper $\mathcal{Q}_m$, wenn m eine Potenz von 2 ist, eine ungerade Zahl ist, so ist damit ohne alles Weitere das Lemma 1. bewiesen.

Dies soll das Ziel unserer Betrachtungen in den nächsten Abschnitten sein.

In Bezug auf das zweite Lemma liegt die Sache ähnlich. Hier kann man aus den Voraussetzungen in §. 183, 2. ganz wie oben die Formel §. 183, (5) herleiten, aus der aber nur zu schliessen ist, dass $\mathcal{G}(r)$ die $\frac{1}{2} m^{\text{te}}$ Potenz einer reellen Einheit $e(r)$ ist.

Nehmen wir also das erste Lemma als bewiesen an, so ergibt die Formel §. 181, (14):

$$(1) \quad (r^n, x_0) = \varrho_n \sqrt{e(r^n)} \alpha_n \Pi(r^{m_2 n}, \eta),$$

worin ϱ_n eine Einheitswurzel vom Grade m^n , und α_n eine Zahl in $\mathfrak{Q}_m$ ist, und es wäre noch zu beweisen, dass $e(r^n)$ das Quadrat einer Einheit in $\mathfrak{Q}_m$ ist.

Da $e(r)$ eine reelle Einheit ist, so ist

$$(2) \quad e(r^n) = e(r^{-n}),$$

und wir wollen noch festsetzen, dass das Vorzeichen der Wurzel so bestimmt sei (was wir bei passender Annahme über ϱ_n immer annehmen können), dass

$$(3) \quad \sqrt{e(r^n)} = \sqrt{e(r^{-n})}.$$

Das Product $(r^n, x_0) (r^{-n}, x_0)$ ist nach der Voraussetzung eine Zahl des Körpers $\mathfrak{Q}_m$, die sich durch die Substitution (r, r^{-1}) nicht ändert, d. h. eine reelle Zahl. Ferner ist nach §. 174, (5)

$$(r^{m_2 n}, \eta) (r^{-m_2 n}, \eta) = \pm p,$$

also gleichfalls reell. Ebenso ist $\alpha_n \alpha_{-n}$ reell, und daraus ergibt sich nach (1), dass

$$\varrho_n \varrho_{-n} = \frac{(r^n, x_0) (r^{-n}, x_0)}{e(r^n) \alpha_n \alpha_{-n} \Pi(r^{m_2 n}, \eta) (r^{-m_2 n}, \eta)}$$

eine reelle Zahl ist, die, weil sie eine Einheitswurzel ist, nur $= \pm 1$ sein kann.

Nun können wir in der hieraus für $n = 1$ sich ergebenden Gleichung

$$(r, x_0) (r^{-1}, x_0) = \pm e(r) \alpha_1 \alpha_{-1} \Pi(\pm p)$$

jede Substitution (r, r^n) ausführen, woraus hervorgeht, dass das Zeichen von $\varrho_n \varrho_{-n}$ von n unabhängig ist, dass also

$$(4) \quad \varrho_n \varrho_{-n} = \varrho_1 \varrho_{-1} = \pm 1$$

ist. Nun leiten wir aus (1) weiter her:

$$(5) \quad \varrho_n \varrho_1^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = \frac{(r^n, x_0) (r, x_0)^{-n}}{\alpha_n \alpha_1^{-1} \Pi(r^{m_2 n}, \eta) (r^{m_2}, \eta)^{-n}},$$

und die rechte Seite ist eine Zahl des Körpers $\mathfrak{Q}_m$. Die linke Seite zeigt aber, dass es eine Einheit ist, und wir können demnach, wenn $\mathcal{G}(r)$ eine reelle Einheit bedeutet,

$$(6) \quad \varrho_n \varrho_1^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = r^k \mathcal{G}(r)$$

setzen. Substituiren wir diesen Werth in die Formel (5) und machen die Substitution (r, r^{-1}) , so ergibt sich

$$(7) \quad \varrho_n \varrho_1^{-1} \sqrt{e(r^n)} \sqrt{e(r)}^{-n} = r^{-k} \mathcal{G}(r),$$

und durch Multiplication von (6) und (7) mit Rücksicht auf (4)

$$(8) \quad e(r^n) e(r)^{-n} = \mathcal{G}(r)^2.$$

In unseren Betrachtungen über die Classenzahl wird sich noch der Satz ergeben:

Eine Einheit $e(r)$ des reellen Körpers H_m , die mit allen ihren Conjugirten positiv ist, ist das Quadrat einer Einheit im Körper H_m .

Die Formel (8) zeigt aber, dass der Einheit $\pm e(r)$ diese Eigenschaft zukommt, und dass daher $e(r)$ (da auch $-1 = i^2$ das Quadrat einer Einheit ist) das Quadrat einer Einheit des Körpers $\mathcal{Q}_m$ ist.

Damit ist die Frage auf den Beweis der beiden erwähnten Sätze zurückgeführt, der sich als Schlussstein einer langen, aber an interessanten Beziehungen äusserst reichen Kette von Betrachtungen ergibt, denen die nächsten Abschnitte gewidmet sein sollen.

Dreiundzwanzigster Abschnitt.

Classenzahl.

§. 185.

Der Dirichlet'sche Satz über die Einheiten.

Die Untersuchungen über die Anzahl der Idealclassen in einem algebraischen Körper, die uns nun die nothwendigen Ergänzungen der Beweise des vorigen Abschnittes geben sollen, bedienen sich der Methoden, die Dirichlet in die Zahlentheorie eingeführt hat¹⁾.

Sie sind nicht mehr rein algebraisch, insofern dabei auch transcendente Functionen und Zahlen, wie der natürliche Logarithmus und die Zahl π vorkommen. Auch wird von Grenzübergängen, wie in der Integralrechnung, Gebrauch gemacht, aus denen wir schon in §. 156 ein schönes Resultat gezogen haben.

Die Untersuchungen, von denen wir zunächst zu handeln haben, sind ganz allgemein, d. h. sie gelten für jeden algebraischen Zahlkörper, und es bietet keinen Vortheil der Einfachheit, sie auf specielle Körper, wie etwa die Kreistheilungskörper, zu beschränken.

¹⁾ Dirichlet, Recherches sur diverses applications de l'analyse infinitésimale à la théorie des nombres. Crelle's Journal, Bd. 19, 21. Dirichlet's Werke, Bd. I (1839, 1840). (Hierher gehören übrigens auch die nachgelassenen Abhandlungen von Gauss, „De nexu inter multitudinem classium etc.“ Gauss' Werke, Bd. II.) Die Anwendung dieser Principien auf die Kreistheilungszahlen hat zuerst Kummer gemacht [Crelle's Journal, Bd. 35, 40 (1847, 1850); Liouville's Journal, Bd. 16 (1851)]. Die allgemeine Theorie der Einheiten ist gleichfalls von Dirichlet begründet [Dirichlet's Werke, Bd. I, S. 622, 633, 639 (1840, 1842, 1846)]. Die allgemeine Theorie der Einheiten und die Bestimmung der Classenzahlen hat Dedekind gegeben: Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie, 4. Auflage, §. 183 f. Minkowski, Geometrie der Zahlen.

Es sei also Ω ein Körper n^{ten} Grades, und

$$(1) \quad \Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_n$$

die conjugirten Körper. Die irreducible Gleichung n^{ten} Grades, deren Wurzeln uns diese conjugirten Körper bestimmen, wird im Allgemeinen sowohl reelle als imaginäre Wurzeln haben, von denen aber die letzteren immer paarweise vorkommen, so dass zu jedem imaginären Körper $\Omega^{(i)}$ ein anderer gehört, dessen Zahlen mit denen von $\Omega^{(i)}$ conjugirt imaginär sind, der also aus $\Omega^{(i)}$ durch die Substitution $(i, -i)$ hervorgeht.

Solche imaginäre Paare fassen wir zu einer Einheit zusammen und bezeichnen die Anzahl der reellen Körper und der Paare imaginärer Körper der Reihe (1) mit ν . Sind alle conjugirten Körper reell, so ist $n = \nu$; sind sie alle imaginär, so ist $n = 2\nu$.

Ausser im Falle des rationalen Körpers ist ν nur noch in dem Falle eines imaginären quadratischen Körpers $= 1$. Sonst ist ν immer grösser als 1.

Die Anzahl der imaginären Paare ist $n - \nu$, und die Anzahl der reellen Körper $2\nu - n$.

In der Determinante, durch die in §. 145 die Quadratwurzel aus der Grundzahl, $\sqrt{A}$, definirt ist, vertauschen sich durch die Substitution $(i, -i)$ je zwei conjugirt imaginäre Reihen, und $\sqrt{A}$ wechselt also sein Zeichen dann, wenn diese Zahl ungerade ist, sonst nicht. Im ersten Falle ist $\sqrt{A}$ imaginär, im zweiten reell. Daraus ergibt sich also, dass die Grundzahl A des Körpers Ω positiv oder negativ ist, je nachdem $n - \nu$ gerade oder ungerade ist.

Behalten wir von zwei conjugirt imaginären Körpern nur den einen bei, so ergibt sich die Reihe der conjugirten Körper

$$\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_\nu,$$

denen wir ein Zeichensystem

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_\nu,$$

mit der Bestimmung zuordnen, dass $\delta_s = 1$ sein soll, wenn Ω_s reell, und $= 2$, wenn Ω_s imaginär ist, also $\sum \delta_s = n$.

Es möge η eine von Null verschiedene Zahl des Körpers Ω bedeuten und

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$$

die conjugirten Zahlen. Diesem Zahlensysteme ordnen wir ein anderes Zahlensystem zu

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n,$$

das wir durch die Gleichung

$$(2) \quad \lambda_s = \delta_s \log |\eta_s|$$

definiren, worin $|\eta_s|$ den absoluten Werth von η_s und $\log |\eta_s|$ den reellen natürlichen Logarithmus der positiven Zahl $|\eta_s|$ bedeutet. Ist $\mathcal{Q}_s$ reell und das Zeichen $\pm$ so gewählt, dass $\pm \eta_s$ positiv ist, so ist

$$\lambda_s = \log (\pm \eta_s).$$

Ist aber η_s, η'_s ein imaginäres Paar, so ist

$$\lambda_s = \log \eta_s \eta'_s,$$

und zu η_s und η'_s gehört dasselbe λ_s , so dass die Anzahl der verschiedenen λ_s gleich ν ist. Aus dieser Bestimmung ergibt sich noch

$$(3) \quad \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_\nu = \log N_a(\eta),$$

wenn, wie früher, N_a die absolute Norm bedeutet.

Die Zahlen $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_\nu$ wollen wir die conjugirten Logarithmen der Zahl η nennen.

Wenn η eine ganze Zahl des Körpers $\mathcal{Q}$ ist, so ist die absolute Norm eine natürliche Zahl, die nur dann $= 1$ ist, wenn η eine Einheit ist, und daraus folgt nach (3):

1. Die Summe der conjugirten Logarithmen einer ganzen Zahl η ist positiv, und nur dann gleich Null, wenn η eine Einheit ist.

Bedeutet $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$ eine Basis der ganzen Zahlen in $\mathcal{Q}$ (eine Minimalbasis von $\mathcal{Q}$, §. 145), und $\omega_{1,s}, \omega_{2,s}, \dots, \omega_{n,s}$ für $s = 1, 2, \dots, n$ die conjugirten Zahlen, so lassen sich alle ganzen Zahlen des Körpers $\mathcal{Q}_s$ in der Form darstellen:

$$(4) \quad \eta_s = x_1 \omega_{1,s} + x_2 \omega_{2,s} + \dots + x_n \omega_{n,s},$$

mit ganzen rationalen Coëfficienten $x_1, x_2, \dots, x_n$. Die Determinante dieses Systemes

$$\Sigma \pm \omega_{1,1} \omega_{2,2} \dots \omega_{n,n} = \sqrt{A}$$

ist die Quadratwurzel aus der Discriminante A des Körpers, und demnach immer von Null verschieden. Demnach lässt sich das System (4) nach den Unbekannten $x_1, x_2, \dots, x_n$ auflösen, und wenn wir nun festsetzen, dass die absoluten Werthe der Zahlen η_s nicht über eine gewisse Grenze hinausgehen sollen, so ergeben sich aus diesen Auflösungen Grenzen für die ganzen rationalen Zahlen x_i .

Diese einfache Bemerkung liefert uns den folgenden wichtigen Satz:

2. Es giebt in einem algebraischen Körper Ω nur eine endliche Anzahl ganzer Zahlen η von der Beschaffenheit, dass die absoluten Werthe der conjugirten Zahlen η_s unter einer gegebenen Grenze liegen.

Wir machen jetzt von dem allgemeinen Satze §. 155, (25) Gebrauch, nach dem, wenn $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ irgend eine positive quadratische Form von n Variablen mit der Determinante D ist, die Variablen x_i sich als ganze rationale Zahlen, nicht alle verschwindend, so bestimmen lassen, dass

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) < n \sqrt[0,404]{D},$$

d. h. kleiner als eine von der Determinante D allein abhängige Zahl wird.

Diesen Satz wenden wir, wie im §. 156, auf die Form an:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{|\eta_1|^2}{c_1^2} + \frac{|\eta_2|^2}{c_2^2} + \dots + \frac{|\eta_n|^2}{c_n^2},$$

worin die η_s die Linearformen (4) sind, und im Falle eines reellen η_s

$$|\eta_s|^2 = (\eta_s)^2,$$

im Falle eines imaginären Paares η_s, η'_s

$$|\eta_s|^2 = |\eta'_s|^2 = \eta_s \eta'_s.$$

Im letzteren Falle ist $\eta_s \eta'_s$ die Summe zweier reeller Quadrate, und demnach ist, wenn die c_s reell angenommen werden, f eine positive Form. Wir wollen über die bis jetzt willkürlichen reellen Grössen c_s noch festsetzen, dass, wenn η_s, η'_s ein conjugirt imaginäres Paar bilden,

$$(5) \quad c_s = c'_s$$

sein soll; ausserdem wollen wir die c_s noch der Bedingung unterwerfen:

$$(6) \quad c_1 c_2 \dots c_n = 1.$$

Die Determinante der Function f bilden wir, wie im §. 156, dadurch, dass wir sie zunächst als Form der Variablen $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ auffassen, und die Determinante dieser Form ist wegen (6) gleich ± 1 . Die Determinante von f in Bezug auf die Variablen x_s ist also (Bd. I, §. 56), vom Vorzeichen abgesehen, gleich dem

Quadrate der Determinante der Linearformen η , d. h. der Grundzahl des Körpers $\mathcal{Q}$.

Daraus folgt, dass man eine von den c , unabhängige, nur durch den Körper $\mathcal{Q}$ bestimmte Zahl A finden kann, von der Art, dass, was auch die c , sein mögen, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ für ganzzahlige nicht verschwindende x unter A heruntersinkt. Da f die Summe von positiven Summanden ist, so gilt dasselbe von jedem dieser Summanden, und damit ist der folgende Satz bewiesen:

3. Ist c , ein beliebiges, den Bedingungen (5), (6) genügendes System reeller positiver Zahlen, so giebt es eine durch den Körper $\mathcal{Q}$ allein bestimmte reelle Zahl A von der Art, dass man immer eine ganze Zahl η des Körpers $\mathcal{Q}$ bestimmen kann, die mit ihren conjugirten Zahlen η_s den Bedingungen genügt

$$(7) \quad |\eta_s| < c_s A.$$

Beiläufig folgt hieraus, dass man in jedem algebraischen Körper $\mathcal{Q}$, ausgenommen dem rationalen und dem imaginären quadratischen, von Null verschiedene ganze Zahlen finden kann, deren absoluter Werth unter jede gegebene Grenze heruntersinkt.

Wir wollen den Ausdruck des Satzes 3. durch Einführung der conjugirten Logarithmen von η etwas umformen. Wir setzen $\log A = k$, so dass k eine durch $\mathcal{Q}$ bestimmte reelle Zahl ist, ferner

$$(8) \quad c_s = e^{\frac{\gamma_s u}{\delta_s}},$$

worin u eine beliebige reelle Grösse sein kann, und die Zahlen γ_s wegen (5) und (6) der Bedingung genügen:

$$(9) \quad \gamma_1 + \gamma_2 + \dots + \gamma_r = \sum_{i=1}^r \gamma_i = 0.$$

Da überdies

$$|\eta_s| = e^{\frac{\lambda_s}{\delta_s}}$$

ist, so folgt aus (7) und (8):

$$(10) \quad \lambda_s - \gamma_s u < k \delta_s.$$

Die Summe der v Ausdrücke auf der linken Seite dieser Ungleichung ist wegen (9) gleich $\sum \lambda_s$, also nach dem Satze 1. nicht negativ, und wir finden

$$0 \leq \sum^s (\lambda_s - \gamma_s u) < k n.$$

Daraus ergibt sich wegen (10), dass ein Glied dieser Summe, $\lambda_s - \gamma_s u$, nicht kleiner sein kann, als $-(n - \delta_s)k$, weil sonst die Gesamtsumme negativ wäre, und wenn wir der Einfachheit halber die untere Grenze noch etwas kleiner nehmen

$$(11) \quad -nk\delta_s < \lambda_s - \gamma_s u < k\delta_s.$$

Damit ist bewiesen, dass es für jedes gegebene System der Zahlen u, γ_s , wenn nur die Bedingung (9) erfüllt ist, eine ganze Zahl η des Körpers Ω giebt, die mit ihren conjugirten Zahlen den Grenzbedingungen (11) genügt.

Es sei nun ferner g_s ein System reeller Grössen, von dem wir nur verlangen, dass

$$\gamma_1 g_1 + \gamma_2 g_2 + \dots + \gamma_r g_r = \alpha$$

von Null verschieden sei. Damit ist [nach (9)] ausgeschlossen, dass alle g_s einander gleich sind; wenn sie aber das nicht sind, so werden sich zu jedem gegebenen Systeme der g_s unendlich viele Systeme γ_s bestimmen lassen, die der Forderung (9) genügen.

Wird nun $k \sum \delta_s g_s = g$ gesetzt, so ergibt sich aus (11) durch Multiplication mit g_s und Summation

$$(12) \quad -ng + \alpha u < \sum g_s \lambda_s < g + \alpha u.$$

Nach dieser Grenzbedingung bestimmen wir nun, bei festgehaltenen g_s und α , eine Reihe von ganzen Zahlen

$$(13) \quad \eta, \eta', \eta'', \eta''', \dots,$$

indem wir für u eine Reihe von Annahmen machen:

$$u, u', u'', u''', \dots,$$

die folgendermaassen näher bestimmt sind:

Wir wählen u zunächst so, dass

$$-ng + \alpha u = a, \quad g + \alpha u = a'$$

positiv werden; dann setzen wir

$$\delta = \frac{a' - a}{\alpha} = \frac{(n+1)g}{\alpha},$$

und setzen

$$\begin{aligned} u' &= u + \delta, & u'' &= u' + \delta, & u''' &= u'' + \delta, & \dots, \\ a + \alpha\delta &= a', & a' + \alpha\delta &= a'', & a'' + \alpha\delta &= a''', & \dots, \end{aligned}$$

und erhalten so aus (12), wenn $\lambda'_s, \lambda''_s, \dots$ die conjugirten Logarithmen von $\eta', \eta'', \dots$ sind:

$$(14) \quad \begin{aligned} a &< \Sigma g_s \lambda_s < a' \\ a' &< \Sigma g_s \lambda'_s < a'' \\ a'' &< \Sigma g_s \lambda''_s < a''' \\ &\dots \dots \dots \end{aligned}$$

und die Reihe dieser Ungleichungen lässt sich unbegrenzt fortsetzen.

Alle diese Zahlen $\eta, \eta', \eta'', \dots$ haben überdies nach (6) und (7) die Eigenschaft, dass ihre absoluten Normen $N, N', N'', \dots$ unter einer bestimmten endlichen Grenze e^{nk} bleiben.

Die Anzahl der möglichen Werthe von $N, N', N'', \dots$ ist also endlich, nämlich gewiss nicht grösser, als die grösste in e^{nk} enthaltene ganze Zahl. Ebenso ist die Anzahl aller möglichen Reste der Zahlen $x_1, x_2, \dots, x_n$ [in (4)] nach allen Moduln $N, N', N'', \dots$ nur eine endliche, und daraus folgt, dass, wenn wir die Reihe der Zahlen (13) nur weit genug fortsetzen, in der Reihe zwei verschiedene Zahlen $\eta^{(h)}, \eta^{(k)}$ auftreten müssen, in denen $N^{(h)} = N^{(k)}$ und die Reste von $x_1, x_2, \dots, x_n$ nach dem Modul $N^{(h)}$ genau dieselben sind.

Aus (14) aber folgt, wenn $h > k$ vorausgesetzt wird:

$$(15) \quad \Sigma g_s (\lambda_s^{(h)} - \lambda_s^{(k)}) > 0.$$

Ist N die absolute Norm dieser beiden Zahlen $\eta^{(h)}, \eta^{(k)}$, so ist wegen der Uebereinstimmung der Reste der x die Differenz $\eta^{(h)} - \eta^{(k)}$ durch N theilbar. Andererseits ist nach §. 138 (13) die Zahl N durch $\eta^{(h)}$ theilbar, und folglich ist auch $\eta^{(h)} - \eta^{(k)}$ durch $\eta^{(h)}$ theilbar. Daraus ergiebt sich, dass auch $\eta^{(k)}$ durch $\eta^{(h)}$ und ebenso $\eta^{(h)}$ durch $\eta^{(k)}$ theilbar ist. Beide Zahlen sind also associirt, und wenn wir

$$\frac{\eta^{(h)}}{\eta^{(k)}} = \varepsilon$$

setzen, so ist ε eine Einheit des Körpers Ω .

Setzen wir ausserdem, indem wir mit $|\varepsilon_s|$ den absoluten Werth von ε_s bezeichnen,

$$(16) \quad \delta_s \log |\varepsilon_s| = l_s,$$

so ergiebt sich aus (15):

$$(17) \quad g_1 l_1 + g_2 l_2 + \dots + g_r l_r > 0.$$

sei bewiesen für $s - 1$ und leiten ihn durch vollständige Induction allgemein her. Dazu ordnen wir die Determinante L , nach den Elementen der letzten Zeile, und schreiben sie so:

$$(2) \quad L_s = g_1 l_{s,1} + g_2 l_{s,2} + \dots + g_s l_{s,s},$$

worin $g_s = L_{s-1}$ ist, und daher nach der gemachten Voraussetzung von Null verschieden angenommen werden kann. Substituiren wir diese Werthe von g in die Formel des Satzes 4, §. 185, indem wir $g_{s+1} = 0, \dots, g_v = 0$ annehmen, während g_s nicht $= 0$ ist, so sind, so lange $s < v$ ist, gewiss nicht alle $g_1, g_2, \dots, g_s$ einander gleich, und es ergibt sich, dass sich l_s so annehmen lässt, dass L_s von Null verschieden ist, wie bewiesen werden sollte.

Auf $s = v$ ist diese Schlussweise nicht auszudehnen, und die Determinante L_v muss auch in der That immer Null sein, weil für jede Einheit $\sum_{i=1}^v l_i$ verschwindet.

Wir wollen jetzt für den Fall, dass $s = v - 1$ ist, die Determinante L_s so bezeichnen:

$$(3) \quad L_{v-1} = L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{v-1}),$$

und ein System von Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{v-1}$, für welches diese Determinante von Null verschieden ist, ein System unabhängiger Einheiten nennen.

Der absolute Werth L der Determinante $L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{v-1})$ heisst der Regulator des Systems $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{v-1}$ ¹⁾.

Wenn wir in der Determinante

$$(4) \quad \begin{vmatrix} l_{1,1} & l_{1,2} & \dots & l_{1,v} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ l_{v-1,1} & l_{v-1,2} & \dots & l_{v-1,v} \\ x_1 & x_2 & \dots & x_v \end{vmatrix},$$

in der die $x_1, x_2, \dots, x_v$ willkürliche Grössen sind, alle Colonnen zu der letzten addiren, so erhalten wir mit Rücksicht auf die Relationen $\sum_i l_{s,i} = 0$ ihren Werth gleich

$$\pm (x_1 + x_2 + \dots + x_v) L.$$

Wenn wir also alle x mit Ausnahme von einem beliebigen

¹⁾ Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie 4. Auflage, §. 183.

die Exponenten ξ_i auf nicht negative echte gebrochene Werthe beschränkt bleiben, und daraus ergibt sich nach der Definition der conjugirten Logarithmen eine obere Grenze für ε und seine Conjugirten.

Nach dem Satze 2., §. 185 gibt es aber in $\mathcal{Q}$ nur eine endliche Anzahl ganzer Zahlen, also um so mehr nur eine endliche Anzahl von Einheiten, die dem absoluten Werthe nach mit allen ihren Conjugirten unter einer endlichen Grenze liegen.

Wenn wir nun eine Einheit, deren Exponenten in den Grenzen 0 und 1 liegen, mit Einschluss der unteren und mit Ausschluss der oberen Grenze eine in Bezug auf das System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{v-1}$ reducirte Einheit nennen, so haben wir den Satz:

Es giebt nur eine endliche Anzahl von Einheiten in $\mathcal{Q}$, die in Bezug auf ein unabhängiges System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{v-1}$ reducirt sind.

2) Die Einheiten reproduciren sich durch Multiplication und Division. Sind

$$\begin{array}{c} \xi'_1, \xi'_2, \dots, \xi'_{v-1} \\ \xi''_1, \xi''_2, \dots, \xi''_{v-1} \end{array}$$

die Exponenten von zwei Einheiten $\varepsilon', \varepsilon''$, so sind die Summen und die Differenzen

$$\xi'_1 \pm \xi''_1, \xi'_2 \pm \xi''_2, \dots, \xi'_{v-1} \pm \xi''_{v-1}$$

die Exponenten der Einheiten $\varepsilon' \varepsilon''$ und $\varepsilon' : \varepsilon''$.

Dies ergibt sich unmittelbar aus dem Satze, dass der Logarithmus eines Productes oder eines Quotienten gleich der Summe oder der Differenz der Logarithmen der beiden Bestandtheile ist.

3) Die Einheiten $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ selbst haben die Exponenten $1, 0, \dots, 0; 0, 1, \dots, 0; \dots$, und daraus folgt nach 2), dass jedes System von ganzen Zahlen, für $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{v-1}$ gesetzt, das Exponentensystem einer Einheit giebt, die sich durch Multiplication von Potenzen der $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots$ bilden lässt.

4) Aus 2) und 3) ergibt sich, dass ein Exponentensystem $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{v-1}$ einer Einheit ein Exponentensystem bleibt, wenn alle seine Elemente mit einer und derselben ganzen Zahl multiplicirt werden, und dass es auch dann noch diesen Charakter behält, wenn seine Elemente ξ_i um beliebige ganze Zahlen vermehrt oder vermindert werden. Gebrauchen wir also das Zeichen (x) in dem Sinne, wie im §. 182, dass es den Ueber-

schuss der Zahl x über die grösste in x enthaltene ganze Zahl bedeutet, so ergibt sich Folgendes:

Ist $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{r-1}$ das Exponentensystem einer Einheit, und m eine ganze Zahl, so ist auch

$$(6) \quad (m\xi_1), (m\xi_2), \dots, (m\xi_{r-1})$$

das Exponentensystem einer Einheit.

Nun sind die Grössen $(m\xi_i)$, wenn sie nicht Null sind, positive echte Brüche, und nach 1) muss es sich also, wenn die Reihe der ganzen Zahlen hinlänglich weit fortgesetzt wird, ereignen, dass für zwei verschiedene Werthe m', m'' von m die Zahlenreihe (6) übereinstimmt. Da hiernach $m'\xi_i, m''\xi_i$ denselben Ueberschuss über eine ganze Zahl haben, so ist $(m' - m'')\xi_i$ selbst eine ganze Zahl, und es giebt also eine ganze rationale Zahl m , die höchstens gleich der Anzahl der Exponentensysteme reducirter Einheiten ist, von der Eigenschaft, dass

$$m\xi_1, m\xi_2, \dots, m\xi_{r-1}$$

ganze rationale Zahlen werden.

Diese Zahl m kann sich ändern, wenn die Einheit ε geändert wird. Da aber alle möglichen Werthe dieser Zahl unter einer endlichen Grenze liegen, so giebt es eine endliche Zahl, in der alle diese Werthe von m enthalten sind und die selbst für m genommen werden kann. Es giebt daher eine gewisse positive ganze Zahl m , die als Nenner aller der rationalen Zahlen genommen werden kann, die als Exponenten von Einheiten auftreten können. Damit ist der Satz 6. bewiesen.

§. 187.

Fundamentalsysteme von Einheiten.

Wir wählen jetzt an Stelle des Systemes unabhängiger Einheiten ε_i ein anderes, dessen conjugirte Logarithmen

$$(1) \quad \lambda_{i,1}, \lambda_{i,2}, \dots, \lambda_{i,r} \quad i = 1, 2, \dots, r-1$$

sein mögen. Nach §. 186, (5) ist

$$(2) \quad \lambda_{i,k} = \xi_{1,i}l_{1,k} + \xi_{2,i}l_{2,k} + \dots + \xi_{r-1,i}l_{r-1,k} \\ i = 1, 2, \dots, r-1; \quad k = 1, 2, \dots, r,$$

wenn $\xi_{1,i}, \xi_{2,i}, \dots, \xi_{r-1,i}$ die Exponenten einer der neuen Einheiten in Bezug auf das System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{r-1}$ bedeuten, die wir als rationale Zahlen mit dem gemeinsamen Nenner m annehmen können.

Es ist aber nach dem Multiplicationssatze der Determinanten

$$(3) \quad \begin{vmatrix} \lambda_{1,1}, & \dots, & \lambda_{v-1,1} \\ \dots & \dots & \dots \\ \lambda_{1,v-1}, & \dots, & \lambda_{v-1,v-1} \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} \xi_{1,1}, & \dots, & \xi_{1,v-1} \\ \dots & \dots & \dots \\ \xi_{v-1,1}, & \dots, & \xi_{v-1,v-1} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} l_{1,1}, & \dots, & l_{v-1,1} \\ \dots & \dots & \dots \\ l_{1,v-1}, & \dots, & l_{v-1,v-1} \end{vmatrix},$$

oder, wenn wir

$$A_{v-1} = \Sigma \pm \lambda_{1,1} \lambda_{2,2} \dots \lambda_{v-1,v-1}$$

setzen, und beachten, dass die Determinante

$$\Sigma \pm \xi_{1,1} \xi_{2,2} \dots \xi_{v-1,v-1}$$

eine rationale Zahl mit dem Nenner m^{v-1} ist:

$$(4) \quad A_{v-1} = \frac{a}{m^{v-1}} L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{v-1}),$$

worin a eine ganze rationale Zahl ist.

Daraus ergibt sich, dass die neu eingeführten Einheiten immer und nur dann ein unabhängiges System bilden, wenn die Determinante der $\xi_{i,k}$, d. h. die Zahl a , von Null verschieden ist.

Nun giebt es unter einer endlichen oder unendlichen Anzahl nicht verschwindender rationaler Brüche mit demselben Nenner immer einen dem absoluten Werthe nach kleinsten, und folglich können wir nach (4) das neue System unabhängiger Einheiten so wählen, dass sein Regulator $\pm A_{v-1}$ so klein als möglich wird. Ein solches System nennen wir ein Fundamentalsystem von Einheiten, und den Minimalwerth des Regulators selbst, also den Regulator eines Fundamentalsystemes, nennen wir den Regulator des Körpers. Wir nehmen jetzt an, dass unser System $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{v-1}$ selbst ein Fundamentalsystem sei.

Unter dieser Voraussetzung lässt sich beweisen, dass alle Exponenten von Einheiten ganze Zahlen sein müssen.

Wenn wir nämlich annehmen, es existire eine Einheit ε , deren nach den Formeln §. 186, (5) bestimmte Exponenten nicht alle ganze Zahlen sind, so giebt es nach §. 186, 4) auch eine Einheit ε_0 , deren Exponenten echte Brüche sind, die nicht alle verschwinden.

Verstehen wir unter $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{v-1}$ in den Formeln (5), §. 186 das System der conjugirten Logarithmen von ε_0 , so ergibt sich

$$L(\varepsilon_0, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{v-1}) = \xi_1 L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{v-1}),$$

und wenn wir also annehmen, was offenbar keine Beschränkung der Allgemeinheit ist, dass ξ_1 ein nicht verschwindender echter Bruch sei, so widerspricht diese Formel der Annahme, dass

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{v-1}$$

ein Fundamentalsystem sei, weil die Determinante L_{v-1} verkleinert würde, wenn ε_1 durch ε_0 ersetzt wird.

Haben wir ein Fundamentalsystem, so können wir ein beliebiges System ganzer rationaler Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{v-1}$ als Exponentensystem annehmen und eine Einheit ε mit diesen Exponenten bilden:

$$\varepsilon = \varepsilon_1^{\xi_1} \varepsilon_2^{\xi_2} \dots \varepsilon_{v-1}^{\xi_{v-1}}.$$

Es bleibt also noch die Frage zu beantworten, inwieweit eine Einheit durch das Exponentensystem bestimmt ist.

Nehmen wir an, es seien $\varepsilon', \varepsilon''$ zwei Einheiten mit demselben Exponentensysteme, dann besteht das Exponentensystem der Einheit $\varepsilon' : \varepsilon'' = \varrho$ aus lauter Nullen, und folglich sind die conjugirten Logarithmen von ϱ alle gleich Null; ϱ ist daher eine ganze Zahl von der Eigenschaft, dass die absoluten Werthe aller mit ϱ conjugirten Zahlen gleich 1 sind, und daher, wie im §. 175, 2. bewiesen ist, eine Einheitswurzel. Damit ist das folgende Theorem bewiesen:

- I. Es giebt im Körper $\mathcal{Q}$ ein System von $v-1$ fundamentalen Einheiten

$$(5) \quad \varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{v-1},$$

welches die Eigenschaft hat, dass in der Form

$$(6) \quad \varepsilon = \varrho \varepsilon_1^{\xi_1} \varepsilon_2^{\xi_2} \dots \varepsilon_{v-1}^{\xi_{v-1}}$$

alle Einheiten des Körpers, jede nur einmal, enthalten sind, wenn $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{v-1}$ alle ganzen rationalen Zahlen und ϱ alle in $\mathcal{Q}$ vorhandenen Einheitswurzeln durchläuft.

Es ist nun leicht, aus einem Fundamentalsysteme alle anderen abzuleiten, indem man in (6) für die Exponenten $\nu-1$ verschiedene Systeme ganzer Zahlen $\xi_{i,k}$ setzt, deren Determinante $= \pm 1$ ist. Denn setzt man

$$\varepsilon'_i = \varrho_i \varepsilon_1^{\xi_{1,i}} \varepsilon_2^{\xi_{2,i}} \dots \varepsilon_{v-1}^{\xi_{v-1,i}},$$

so folgt aus (3):

$$L(\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_{v-1}) = \pm L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{v-1}).$$

Beide Determinanten haben also den Minimalwerth, und beide Systeme sind Fundamentalsysteme.

Der Fall $\nu = 1$, den wir oben ausgeschlossen haben, tritt ausser im Falle des rationalen Körpers, in dem nur die beiden Einheiten ± 1 existiren, im Falle des imaginären quadratischen Körpers ein. In diesem Falle haben wir im zwanzigsten Abschnitte die ganzen Zahlen des Körpers in der Form

$$\frac{x + y \sqrt{-m}}{2}$$

dargestellt, worin $-m$ eine Stammdiscriminante bedeutet, so dass $m \equiv 0$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist, und x, y beide gerade oder beide ungerade sind. Die Einheiten erhalten wir, wenn wir die Gleichung

$$x^2 + my^2 = 4$$

auf alle mögliche Arten in ganzen rationalen Zahlen lösen. Diese Gleichung hat aber, wenn $m > 4$ ist, nur die zwei Lösungen $x = \pm 2, y = 0$, und es giebt also in diesen Fällen, wie im Körper der rationalen Zahlen, nur die zwei Einheiten ± 1 . Ist $m = 4$, so findet man die vier Einheiten $\pm 1, \pm i$, und ist endlich $m = 3$, die sechs Einheiten

$$\pm 1, \pm \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \pm \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}.$$

In dem nächst einfachen Falle, $n = 2, \nu = 2$, d. h. im reellen quadratischen Körper, fällt die Theorie der Einheiten zusammen mit der im §. 127 des ersten Bandes behandelten Theorie der Pell'schen Gleichung.

§. 188.

Reducirte Zahlen.

Ist α irgend eine von Null verschiedene ganze oder gebrochene Zahl des Körpers Ω , so betrachten wir, wie bei den Einheiten, das System der conjugirten Logarithmen von α , worunter wir, wie im §. 185, die reellen Zahlen

$$(1) \quad \lambda_1 = \delta_1 \log |\alpha_1|, \lambda_2 = \delta_2 \log |\alpha_2|, \dots, \lambda_r = \delta_r \log |\alpha_r|$$

verstehen, die wir auch mit $\lambda_s(\alpha)$ bezeichnen. Ziehen wir das Fundamentalsystem $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{r-1}$ von Einheiten zu Rathe, so