

SGA 7-I : Groupes de monodromie en géométrie algébrique

Reconstruction française source, pages 1–24 du scan original

Dirigé par A. Grothendieck, avec la collaboration de M. Raynaud et D. S. Rim.

Page de titre

Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, 1967–1969

Groupes de monodromie en géométrie algébrique (SGA 7 I)

Dirigé par A. Grothendieck
avec la collaboration de M. Raynaud et D. S. Rim.

Introduction

Soient S un schéma et $f : X \rightarrow S$ un morphisme de schémas. Si f est propre et lisse, et que le nombre premier ℓ est inversible sur S , les groupes de cohomologie ℓ -adique

$$H^i(X_{\bar{s}}, \mathbb{Z}_{\ell})$$

des fibres géométriques de f forment un système local ℓ -adique sur S . Pour f seulement supposé propre, ces groupes sont les fibres d'un faisceau ℓ -adique $R^i f_* \mathbb{Z}_{\ell}$ sur S . La théorie des cycles évanescents met en relation la ramification de ce faisceau sur S et les singularités de f .

Nous ne considérerons que le cas où S est un trait hensélien, spectre d'un anneau de valuation discrète hensélien. C'est en pratique le cas essentiel. On renvoie à (I 2.1) pour une description heuristique de la théorie. Soient $S = \text{Spec}(V)$, $k(\bar{\eta})$ une clôture algébrique du corps des fractions $k(\eta)$ de V , et $k(\bar{s})$ la clôture algébrique correspondante du corps résiduel $k(s)$; ainsi $k(\bar{s})$ est le corps résiduel du normalisé $\bar{V}$ de V dans $k(\bar{\eta})$. Dans le cas particulier où X est propre et plat sur S , de dimension relative n , et où f ne présente qu'un point de non-lissité $x \in X_s$, on définit des $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -modules Φ^i , de nature purement locale au voisinage de x , nuls pour $i \notin [0, n]$ (I 4.2), et on construit une suite exacte longue

$$\cdots \rightarrow H^i(X_s, \mathbb{Z}_{\ell}) \xrightarrow{\text{sp}} H^i(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}_{\ell}) \rightarrow \Phi^i \rightarrow H^{i+1}(X_s, \mathbb{Z}_{\ell}) \rightarrow \cdots.$$

Le $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ -module $H^i(X_s, \mathbb{Z}_{\ell})$ est regardé comme un $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ -module avec action triviale de l'inertie; sp est la flèche de spécialisation. On donne aussi des critères, valables pour l'instant seulement en caractéristique 0, pour que les Φ^i soient nuls pour i petits; par exemple, si X est de plus localement d'intersection complète, $\Phi^i = 0$ pour $i \neq n$ dans la situation de I 4.5.

Le théorème de monodromie affirme que l'action du sous-groupe d'inertie I de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ est quasi-unipotente: pour $T \in I$, il existe des entiers $N > 0$, $M > 0$ tels que

$$(T^M - I)^N$$

soit nul sur $H^i(X_{\bar{\eta}}, \mathbb{Z}_{\ell})$. On en donne deux démonstrations. La première (I 1.2), de nature arithmétique, s'applique dès que les groupes de cohomologie considérés ont des propriétés de finitude raisonnables. Le point clef est que, lorsque $k(s)$ est de type fini sur son sous-corps premier, l'action de I est quasi-unipotente pour toute représentation ℓ -adique de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$. La seconde démonstration, plus géométrique, requiert la pureté et la résolution des singularités; elle n'est pour l'instant valable qu'en caractéristique 0 ou pour H^1 . Elle apporte de précieuses

informations sur l'exposant de nilpotence N ($N \leq i + 1$ pour H^i) et se prête, sur $\mathbb{C}$, à la comparaison avec la théorie transcendante.

Ces résultats, appliqués au H^1 des variétés abéliennes, c'est-à-dire à leur module de Tate, permettent d'étudier la réduction modulo p de celles-ci. On donne ainsi deux démonstrations du théorème de réduction stable des variétés abéliennes: après ramification, la fibre spéciale connexe du modèle de Néron est extension d'une variété abélienne par un tore. La première (I 6) reprend la méthode arithmétique du théorème de monodromie. La seconde (IX 3.6) s'appuie sur une analyse beaucoup plus fine du modèle de Néron et de ses propriétés de polarisation.

Les exposés I à V de Grothendieck n'ont pas été rédigés. Ils ont été résumés dans un exposé I. Les résultats énoncés y sont démontrés de façon succincte, mais essentiellement complète. L'exposé II applique la méthode des pinceaux de Lefschetz et (I 5.3) à l'étude du groupe fondamental. Pour S une surface sur un corps algébriquement clos k , d'exposant caractéristique p , on montre que le groupe profini $\pi_1^{(p')}(S, s)$, complété en dehors de p , est de pro- (p') -présentation finie. Comme expliqué plus haut, les exposés III à V n'existent pas.

L'exposé VI contient, avec quelques compléments, la théorie des déformations de Schlessinger. On y prend soin de tenir compte des automorphismes infinitésimaux des objets qu'on classe et de ne pas passer trop brutalement au foncteur des classes d'isomorphie d'objets. On y donne aussi une nouvelle construction de

$$\mathrm{Ext}^1(L_{X/S}, -),$$

$L_{X/S}$ désignant le complexe cotangent relatif de X/S . Cet exposé sert dans le reste du séminaire surtout via l'étude des déformations des singularités quadratiques ordinaires.

Les exposés VII et VIII sont consacrés à la théorie des biextensions. Cette théorie joue un rôle essentiel dans l'exposé IX pour exprimer ce qu'il advient d'une polarisation quand on passe d'une variété abélienne à un modèle de Néron. L'exposé IX contient la démonstration du théorème de réduction stable des variétés abéliennes et diverses applications. La suite de ce séminaire, SGA 7 II, par P. Deligne et N. Katz, paraîtra ultérieurement.

Bures-sur-Yvette, mai 1972,
P. Deligne

Table des matières de SGA 7 I

Exposé I. Résumé des premiers exposés de A. Grothendieck, rédigé par P. Deligne	1
Exposé II. Propriétés de finitude du groupe fondamental, par Michèle Raynaud	25
Exposé VI. Formal deformation theory, par D. S. Rim	32
Exposé VII. Groupes de monodromie locaux, par A. Grothendieck	133
Exposé VIII. Compléments sur les biextensions. Propriétés générales des biextensions des schémas en groupes, par A. Grothendieck	218
Exposé IX. Modèles de Néron et monodromie, par A. Grothendieck	313

Exposé I. Résumé des premiers exposés de A. Grothendieck

rédigé par P. Deligne

Sommaire

0. Préliminaires. 1. Démonstration arithmétique du théorème de monodromie. 2. Cycles évanescents. 3. Démonstration géométrique du théorème de monodromie. 4. Critères de nullité pour les faisceaux de cycles évanescents. 5. Action de la monodromie sur les π_1 . 6. Appendice par P. Deligne: démonstration arithmétique du théorème de réduction stable.

0. Préliminaires

0.0. Terminologie

Rappelons les définitions suivantes. Un trait est le spectre d'un anneau de valuation discrète; on note souvent η et s ses points générique et fermé. Un anneau strictement local est un anneau local hensélien à corps résiduel séparablement clos; un schéma strictement local est le spectre d'un tel anneau. Un point géométrique de S est un morphisme $\bar{x} : \text{Spec}(k) \rightarrow S$ dont l'image est x et où k est une clôture séparable de $k(x)$. Pour un trait hensélien $S = \text{Spec}(V)$ on note souvent $\bar{\eta}$ un point géométrique générique; le corps résiduel de la clôture intégrale $\bar{V}$ de V dans $k(\bar{\eta})$ donne le point géométrique $\bar{s}$ localisé en s .

Le localisé strict de X en $\bar{x}$ est celui de SGA 4 VIII 4.4. Un S -schéma local, local hensélien ou strictement local est essentiellement de type fini sur S s'il est le spectre d'un anneau local, l'hensélisé d'un tel anneau, ou le localisé strict d'un schéma de type fini sur S . On note $F \mapsto F(n)$ le twist à la Tate. Un endomorphisme T d'un espace vectoriel de dimension finie est quasi-unipotent si ses valeurs propres sont des racines de l'unité, c'est-à-dire si $(T^N - 1)^M = 0$ pour des entiers $N, M \geq 1$.

0.1. Cohomologie ℓ -adique

Soit X un schéma de type fini sur un corps algébriquement clos k d'exposant caractéristique p , et soit ℓ un nombre premier premier à p . Les groupes de cohomologie ℓ -adique de X sont ceux de SGA 4 et SGA 5:

$$H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n), \quad H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) = \varprojlim_n H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n), \quad H^i(X, \mathbb{Q}_\ell) = H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell.$$

Les groupes à supports propres se définissent de même à partir des $H_c^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n)$ de SGA 4 XVII. Dans les cas de cohomologie à support propre, de X propre, de X lisse, de disponibilité de la résolution des singularités à la Hironaka en dimension convenable, et pour $i = 0, 1$, on dispose de propriétés raisonnables de finitude. On a notamment des suites exactes courtes scindées

$$0 \rightarrow H^i(X, \mathbb{Z}_\ell) \otimes \mathbb{Z}/\ell^n \rightarrow H^i(X, \mathbb{Z}/\ell^n) \rightarrow \text{Tor}_1(H^{i+1}(X, \mathbb{Z}_\ell), \mathbb{Z}/\ell^n) \rightarrow 0.$$

La preuve fournit aussi un théorème de constructibilité générique pour les $R^i f_* \mathbb{Z}/\ell^n$.

0.2–0.5. Rappels et désingularisation

Si k n'est pas algébriquement clos, on considère les groupes géométriques $H^i(X_{\bar{k}})$; par transport de structure, $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ agit sur eux, d'où, en $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie, des représentations continues dans $\text{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$.

Pour un trait hensélien S de points η, s , le groupe $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit sur $k(\bar{s})$ et l'on a le sous-groupe d'inertie I , puis son plus grand sous-groupe pro- p P . Le quotient I/P est l'inertie modérée:

$$I/P \simeq \varprojlim_{(n,p)=1} \mu_n(k(\bar{s})) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^{(p')}(1)(k(\bar{s})).$$

Abhyankar donne le même dévissage pour $\pi_1(S - D, \bar{\eta})$ lorsque S est strictement local régulier et D un diviseur régulier.

La désingularisation de Néron fournit le lemme suivant. Si $S \rightarrow S_1$ est un morphisme de traits henséliens, si une uniformisante de V_1 est aussi uniformisante de V , et si les extensions des corps résiduels et des corps de fractions sont séparables, alors V est limite inductive de V_1 -algèbres henséliennes lisses et essentiellement de type fini. Ceci permet de ramener les traits d'égale caractéristique ou complets d'inégale caractéristique à des traits essentiellement de type fini.

1. Démonstration arithmétique du théorème de monodromie

Proposition 1.1. Soient S un trait hensélien, ℓ premier à l'exposant caractéristique de $k(s)$, et ρ une représentation continue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ dans $\text{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$. Si aucune extension finie de $k(s)$ ne contient toutes les racines de l'unité d'ordre une puissance de ℓ , il existe un sous-groupe ouvert I_1 de I tel que $\rho(\sigma)$ soit unipotent pour $\sigma \in I_1$.

Théorème de monodromie 1.2. Sous les notations précédentes, pour X de type fini sur η et pour un espace de cohomologie de $X_{\bar{\eta}}$ à coefficients dans $\mathbb{Q}_\ell$, de l'un des types indiqués en 0.1, l'action d'un quelconque élément de I est quasi-unipotente.

Variante 1.3. La condition sur les racines de l'unité est superflue. La preuve utilise les résultats de passage à la limite de 0.5. Après extension finie du trait, la représentation provient d'un faisceau constant tordu sur un ouvert $S_i - D_i$, et les dévissages d'inertie donnent

$$\begin{array}{ccccccc} \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & & I/P \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}^{(p')}(1) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \parallel \\ \pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta}) & \longrightarrow & I_i & \longrightarrow & P_i & & I_i/P_i \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}^{(p')}(1). \end{array}$$

On applique alors la variante suivante.

Variante 1.4. Dans les notations de 0.4, si $\rho(P)$ est fini et si $k(s)$ vérifie l'hypothèse de 1.1, l'action de I est quasi-unipotente.

2. Cycles évanescents

Soit S un trait strictement local et $f : X \rightarrow S$ un schéma de type fini sur S . Le formalisme des cycles évanescents étudie la relation entre les cohomologies de X_s et de $X_{\bar{\eta}}$, ainsi que l'action de l'inertie sur cette dernière, à partir d'informations locales sur X et f .

Dans la théorie transcendante, pour un morphisme propre $X \rightarrow D$ vers un disque, on peut, après restriction, voir X comme fibré au-dessus de D^* . Les cycles évanescents mesurent la différence entre la fibre générale et la fibre spéciale, représentée par une contraction:

$$\begin{array}{ccc} X_t & \xrightarrow{\text{contraction}} & X_0 \\ & \searrow & \swarrow \\ & D & \end{array}$$

La théorie géométrique remplace t par $\bar{\eta}$ et la fibre générale par la fibre générique géométrique.

Proposition 2.3. Si $u : X' \rightarrow X$ est étale et si x' est un point géométrique de X' au-dessus de x , alors le morphisme induit $(R^i \Psi)_x \rightarrow (R^i \Psi)_{x'}$ est un isomorphisme.

Corollaire 2.4. La formation des Ψ^i et Φ^i commute à la localisation stricte. Pour f propre, la suite exacte des cycles évanescents donne

$$\cdots \rightarrow H^i(X_s, A) \rightarrow H^i(X_{\bar{\eta}}, A) \rightarrow H^i(X_s, R\Phi A) \rightarrow H^{i+1}(X_s, A) \rightarrow \cdots.$$

3. Démonstration géométrique du théorème de monodromie

Sous l'hypothèse de pureté, on décrit les revêtements modérés du complémentaire d'un diviseur à croisements normaux. Si, localement,

$$X_s = \sum_{i \in C} a_i D_i,$$

on introduit le complexe

$$K : \bigoplus_{i \in C} \mathbb{Z}(1) \xrightarrow{(a_i)} \mathbb{Z}(1).$$

Théorème 3.3. Sous l'hypothèse de pureté,

$$R^* \Psi_x \simeq H^*(K \otimes A) \otimes A[t], \quad \deg(t) = 2,$$

et l'action de l'inertie sur $R^1 \Psi_x$ est décrite par une action transitive sur un ensemble fini dont le cardinal est premier à p .

Corollaire 3.4. Si N est le plus petit commun multiple des multiplicités des composantes de la fibre spéciale, alors, pour T dans l'inertie modérée,

$$(T^N - 1)^{q'+1} = 0 \quad \text{sur } R^q \Psi.$$

Théorème 3.5. Pour une courbe projective lisse sur le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète, l'inertie agit sur $H^1(C_{\bar{\eta}}, \mathbb{Q}_\ell)$ par automorphismes quasi-unipotents d'échelon 2:

$$(T^N - 1)^2 = 0.$$

La même conclusion vaut pour les variétés abéliennes et, en caractéristique 0, la méthode donne $(T - 1)^{i+1} = 0$ sur H^i après passage à un sous-groupe ouvert.

4. Critères de nullité pour les faisceaux de cycles évanescents

Soit S un trait strictement local et $f : X \rightarrow S$ de type fini. Posons $n = \dim X_{\bar{\eta}}$. En remplaçant X par l'adhérence schématique de $X_{\bar{\eta}}$, on se ramène souvent au cas plat.

Théorème 4.2. On a $\Phi^i = 0$ pour $i > n$. Plus précisément, pour $x \in X_s$ dont l'adhérence est de dimension k ,

$$\Phi_{\bar{x}}^i = 0 \quad (i > n - k).$$

Corollaire 4.3. Si f est propre et plat et si la dimension du lieu de non-lissité dans X_s est $< d$, alors $H^i(X_s) \rightarrow H^i(X_{\bar{\eta}})$ est un isomorphisme pour $i > n + d + 1$ et un épimorphisme pour $i = n + d + 1$.

Théorème 4.5. En caractéristique 0, si x est un point fermé isolé de non-lissité et si X est de profondeur géométrique relative au moins n en x , alors

$$\Phi_{\bar{x}}^i = 0 \quad (i < n).$$

Corollaires 4.6–4.7. Pour une intersection complète relative de dimension n avec point isolé de non-lissité, $\Phi_x^i = 0$ pour $i \neq n$, et Φ_x^n est plat. Si l'on supprime l'hypothèse d'isolement et que Z est le lieu de non-lissité, on obtient encore $\Phi^i = 0$ pour $i < n - \dim Z$.

Proposition 4.10. Sous les hypothèses générales de 4.5, si les profondeurs étales des générisations de x dans $X_{\bar{\eta}}$ et de x dans X_s vérifient les inégalités indiquées, alors $\Phi_x^i = 0$ pour $i < n - 1$.

5. Action de la monodromie sur les π_1

Dans ce paragraphe, exposé de Grothendieck du 19/11/1968, on utilise le théorème de réduction semi-stable pour les courbes et la théorie de Schlessinger.

Soient k algébriquement clos, C une courbe projective sur k et $x_0, \dots, x_n$ des points fermés de C . On dit que $X = (C; x_0, \dots, x_n)$ est stable si C est réduite, à seuls points doubles ordinaires à tangentes distinctes, si les x_i sont des points lisses distincts, et si chaque composante rationnelle, respectivement elliptique, rencontre assez de points marqués ou singuliers. Cela équivaut à l'absence d'automorphismes infinitésimaux non triviaux et à l'amplitude de

$$\omega\left(\sum x_i\right).$$

Proposition 5.1.1. Si $X = (C; x_0, \dots, x_n)$ est stable sur le point générique d'un trait S , avec C_η lisse, il existe une extension finie séparable η'/η et une courbe stable X' sur le normalisé S' de S dans η' telle que $X' \otimes_{S'} \eta' = X \otimes_\eta \eta'$.

Pour X_η géométriquement connexe de type fini sur le corps des fractions d'un trait strictement local et pour ξ point géométrique de $X_{\bar{\eta}}$, on a

$$0 \rightarrow \pi_1(X_{\bar{\eta}}, \xi) \rightarrow \pi_1(X, \xi) \rightarrow \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \rightarrow 0. \quad (5.2.1)$$

On en déduit l'action extérieure

$$\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \rightarrow \text{Aut}_{\text{ext}}(\pi_1^{(p')}(\bar{X}_{\bar{\eta}})), \quad (5.2.2)$$

et, en présence d'un point rationnel x , une action

$$[x] : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \rightarrow \text{Aut}(\pi_1^{(p')}(\bar{X}_{\bar{\eta}}, \bar{x})). \quad (5.2.3)$$

Théorème 5.3. L'image de P par (5.2.2), ou par (5.2.3), est finie.

La preuve se réduit d'abord au cas où X_η est géométriquement normal et intègre. Après normalisation, passage aux composantes connexes et choix de classes de chemins premiers à p invariantes sous P , les formules de Van Kampen montrent qu'un sous-groupe d'indice fini de P agit trivialement sur le groupe fondamental premier à p . Puis, pour X_η normal et U ouvert, $\pi_1(U)$ s'envoie sur $\pi_1(X_\eta)$. On se ramène donc à X_η lisse affine, puis, par sections hyperplanes génériques et Bertini, au cas d'une courbe lisse géométriquement connexe. Après extension finie, on écrit X_η comme complément d'un nombre fini de points rationnels dans une courbe projective lisse, et la réduction semi-stable ramène au cas d'une courbe stable sur S . La suite du calcul commence à la page source suivante.

Théorème 5.4

Soient S un schéma strictement local, $f : \bar{X} \rightarrow S$ un morphisme propre et plat, de fibre spéciale une courbe dont les seuls points de non-lissité sont des points doubles ordinaires, et Y un

sous-schéma de $\bar{X}$, réunion d'un nombre fini de sections disjointes contenues dans l'ouvert de lissité. Posons

$$X = \bar{X} - Y.$$

Soit x un point rationnel de X . Soit U l'ouvert de S au-dessus duquel X est lisse, et soit ξ un point géométrique de U . Alors l'image de

$$\pi_1(U, \xi)$$

dans

$$\text{Aut}(\pi_1^{(p')}(X_\xi, x_\xi))$$

est abélienne et première à p .

On prendra garde qu'on ne peut faire agir $\pi_1(U, \xi)$ sur $\pi_1^{(p')}(X_\xi, x_\xi)$ que parce que les $\pi_1^{(p')}$ vérifient le théorème de spécialisation.

On se ramène au cas S complet, puis au cas universel où S est un schéma formel de modules pour la fibre spéciale, munie de ses sections. S est alors un anneau de séries formelles sur un anneau de Cohen,

$$S = \text{Spec } W[[t_1, \dots, t_n]],$$

et U est le complément d'un diviseur à croisements normaux d'équation

$$t_1 \cdots t_m = 0.$$

Dans ce cas universel, d'après le lemme d'Abhyankar, $\pi_1(U, \xi)$ est abélien et premier à p , d'où le théorème.

Remarque 5.5. On peut démontrer un résultat analogue à 5.4 en dimension relative quelconque en considérant une section plane générique de dimension un et en appliquant Bertini.

6. Appendice : démonstration arithmétique du théorème de réduction stable

par P. Deligne

Soient S un trait et A_η une variété abélienne sur $k(\eta)$, de dimension $d \neq 0$. Pour $S' \rightarrow S$ un morphisme local de traits, on note $A_{\eta'}$ la variété abélienne sur $k(\eta')$ déduite de A_η par extension des scalaires. Soient $\mathcal{A}_{S'}$ le modèle de Néron de $A_{\eta'}$ sur S' , $\mathcal{A}_{S',s'}$ sa fibre spéciale et $\mathcal{A}_{S',s'}^0$ la composante neutre de $\mathcal{A}_{S',s'}$. Le théorème de réduction stable est le suivant.

Théorème 6.1. Pour S' convenable, $A_{\eta'}$ a réduction stable, c'est-à-dire que $\mathcal{A}_{S',s'}^0$ est extension d'une variété abélienne par un tore.

Il résulte assez facilement de 6.1 qu'on peut prendre S' tel que $k(\eta')$ soit une extension séparable finie de $k(\eta)$. Supposons tout d'abord que le corps résiduel de S est de type fini sur le corps premier; le même argument marcherait pour $k(s)$ radiciel sur un tel corps.

Soient ℓ un nombre premier premier à l'exposant caractéristique résiduel p , $T_\ell(A)$ le module de Tate,

$$V_\ell(A) = T_\ell(A) \otimes \mathbb{Q}_\ell,$$

et

$$\rho : \text{Gal}(\bar{\eta}/\eta) \longrightarrow \text{GL}(T_\ell(A))$$

la représentation naturelle. Une extension des scalaires préliminaire nous ramène au cas où le groupe d'inertie I agit de façon unipotente, par 1.2, donc à travers son plus grand pro- ℓ -groupe

quotient $\mathbb{Z}_\ell(1)$, cf. 0.3. Soient T l'image dans $\mathrm{GL}(T_\ell(A))$ d'un générateur de $\mathbb{Z}_\ell(1)$ et r le plus grand entier ≥ 0 tel que $(T - 1)^r \neq 0$.

Lemme 6.2. L'application

$$\sigma \in I, \quad v \in V_\ell(A) \mapsto (\rho(\sigma) - 1)^r(v)$$

induit des morphismes et un isomorphisme

$$\begin{array}{ccc} V_\ell(A)_I \otimes \mathbb{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{M} & V_\ell(A)^I \\ \downarrow & & \uparrow \\ V_\ell(A)/\mathrm{Ker}(T - 1)^r \otimes \mathbb{Q}_\ell(r) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Im}(T - 1)^r \end{array} \quad (6.2.1)$$

Les modules $V_\ell(A)_I$ et $V_\ell(A)^I$ sont des $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ -modules, et M est galoisien.

6.3. On dit qu'une représentation ℓ -adique

$$\tau : \mathrm{Gal}(\bar{s}/s) \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$$

est de poids n ($n \in \mathbb{Z}$) si la condition suivante est vérifiée : pour un modèle convenable X de $k(s)$, où X est une variété irréductible de type fini sur le corps premier et $k(s) = k(X)$, τ se factorise par $\pi_1(X, \bar{s})$, et, pour x un point fermé de X , les valeurs propres de $\tau(F_x)$ sont des nombres algébriques dont les conjugués complexes sont tous de valeur absolue

$$|k(x)|^{n/2},$$

où F_x désigne le Frobenius géométrique Φ_x^{-1} .

Si V (resp. W) est de poids n (resp. m) et si $n \neq m$, on a

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(V, W) = 0.$$

6.4. Il résulte de la propriété universelle du modèle de Néron que

$$V_\ell(A)^I = V_\ell(\mathcal{A}_{S,s}^0).$$

Si a est la dimension du plus grand quotient abélien de $\mathcal{A}_{S,s}^0$ et m la dimension de la partie multiplicative de $\mathcal{A}_{S,s}^0$, d'après Weil $V_\ell(A)^I$ est donc extension d'une représentation de dimension $2a$ et poids -1 par une représentation de dimension m et poids -2 .

6.5. Soit A_η^* la variété abélienne duale de A_η . Rappelons que $V_\ell(A^*)$ et $V_\ell(A)$, donc $V_\ell(A^*)^I$ et $V_\ell(A)_I$, sont en dualité à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(1)$. Si a^* et m^* sont définis pour A^* comme a et m pour A , il résulte de 6.4 que $V_\ell(A)_I$ est extension d'une représentation de dimension m^* et de poids 0 par une représentation de dimension $2a^*$ et de poids -1 .

6.6. Le module galoisien $\mathbb{Q}_\ell(r)$ est de poids $-2r$. Puisque $\mathrm{Im}(T - 1)^r \neq 0$, on déduit de 6.4, 6.5 et de l'isomorphisme 6.2 que $r \leq 1$. Si $r = 0$, on a

$$\begin{cases} a + m \leq d, \\ 2a + m = 2d, \end{cases}$$

donc $m = 0$, $a = d$ et A_η a bonne réduction. Supposons que $r = 1$. On tire alors de 6.2 que $\mathrm{Im}(T - 1)$ est de poids -2 et que $V_\ell(A)/V_\ell(A)^I$ est de poids 0 ; ces espaces ont même dimension $m_1 \leq m$. On a alors

$$\dim V_\ell(A)^I = 2d - m_1 = 2a + m,$$

et

$$2 \dim \mathcal{A}_{S,s}^0 \geq 2(a+m) \geq 2a+m+m_1 = 2d = 2 \dim A_{S,s}.$$

De sorte que A_η a réduction stable, puisque $\dim \mathcal{A}_{S,s}^0 = a+m$. On a obtenu en même temps que $m_1 = m$, c'est-à-dire que

$$\mathrm{Im}(T-1) \subset V_\ell(A)^I \simeq V_\ell(\mathcal{A}_{S,s}^0)$$

est le V_ℓ de la partie multiplicative de $\mathcal{A}_{S,s}^0$.

6.7. Pour traiter le cas général, nous utiliserons 0.5, cf. 1.3. On se ramène à supposer que

- a) les conditions de 0.5.2 ou 0.5.3 sont vérifiées;
- b) $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit trivialement sur A_ℓ ;
- c) l'action de I sur $T_\ell(A)$ est unipotente.

Sous ces hypothèses, nous prouverons que A_η a réduction stable. L'hypothèse a) permet d'appliquer 0.5.1 pour avoir

$$S = \varprojlim S_i,$$

comme en 1.3, dont nous reprenons les notations. Soit s_i le point fermé de S_i . Pour i assez grand, la composante neutre $\mathcal{A}_S^0$ du modèle de Néron $\mathcal{A}_S$ provient d'un schéma en groupes lisse à fibres connexes $\mathcal{A}_i$ sur S_i , et $(\mathcal{A}_i)_\ell$ est constant sur $S_i - D_i$. Le groupe $\pi_1(S_i - D_i, \bar{\eta})$ agit sur $T_\ell(A)$ et agit trivialement sur

$$T_\ell(A)/\ell T_\ell(A) \simeq A_\ell.$$

Comme en 1.3, on voit que P_i agit trivialement. On a alors, par (1.3.1),

$$T_\ell(A)_I = T_\ell(A)_{I_i}, \quad T_\ell(\mathcal{A}_{i,s_i}) = T_\ell(\mathcal{A}_S^0) = T_\ell(A)^I = T_\ell(A^{I_i}),$$

et (6.2.1) est un diagramme de $\mathrm{Gal}(\bar{s}_i/s_i)$ -modules auquel on peut appliquer les arguments 6.4 à 6.6.

Bibliographie

- [1] M. Artin, *Algebraic approximation of structures over complete local rings*, Publ. Math. I.H.E.S. 36 (1969), 23–58.
- [2] M. Artin et G. Winters, *Degenerate fibres and reduction of curves*.
- [3] P. Deligne et D. Mumford, *The irreducibility of the space of curves of a given genus*, Publ. Math. I.H.E.S. 36 (1969), 75–110.
- [4] J.-P. Serre, *Corps locaux*, Publ. Math. Univ. Nancago–Hermann, 1962.
- [5] J.-P. Serre et J. Tate, *Good reduction of abelian varieties*, Ann. of Math. 88 (1968), 492–517.

Exposé II. Propriétés de finitude du groupe fondamental

par Michèle Raynaud

Soient k un corps séparablement clos de caractéristique $p \geq 0$, X un schéma connexe de type fini sur k et

$$\pi_1^{(p')}(X)$$

le plus grand quotient « premier à p » de $\pi_1(X)$. On montre, dans cet exposé, que, si X est une surface, $\pi_1^{(p')}(X)$ est topologiquement de présentation finie, et qu'il en est de même pour X quelconque si l'on admet la résolution des singularités.

Dans le cas d'une surface, la méthode de démonstration, due à J.-P. Murre, consiste à se ramener au cas où l'on a une fibration au-dessus de $\mathbb{P}^1$ ayant les propriétés (i), (ii), et (iii) de la proposition ci-dessous.

Proposition 2.1. Soient k un corps algébriquement clos et S une surface projective, irréductible, lisse sur k . Alors on peut trouver un éclatement

$$g : S' \longrightarrow S,$$

où S' est une surface régulière, munie d'une fibration

$$f : S' \longrightarrow \mathbb{P}^1,$$

tels que f ait une section σ , et que les conditions suivantes soient satisfaites :

- (i) f est lisse aux points de $\sigma(\mathbb{P}^1)$;
- (ii) les fibres de f sont des courbes géométriquement intègres n'ayant que des singularités ordinaires;
- (iii) il existe un ouvert non vide U de $\mathbb{P}^1$ tel que les fibres de f aux points de U soient lisses.

La proposition résulte de l'existence d'un plongement projectif $S \rightarrow \mathbb{P}^r$ tel qu'on puisse trouver un pinceau de Lefschetz par rapport à ce plongement. Soit en effet

$$D = \{H_t\}_{t \in \mathbb{P}^1}$$

un tel pinceau d'hyperplans; rappelons que l'axe Δ de D coupe transversalement S ; le sous-schéma fermé $\Delta \cap S$ est donc réduit et formé d'un ensemble fini de points fermés de S , $x_1, \dots, x_n$; il existe un ouvert non vide U de $\mathbb{P}^1$ tel que, pour tout point $t \in U$, H_t coupe transversalement S ; et, pour tout point $t \in \mathbb{P}^1 - U$, H_t coupe transversalement S sauf en un point qui est un point singulier quadratique ordinaire.

Par chaque point x de S n'appartenant pas à Δ passe un unique hyperplan H_t , et l'application qui, à x , associe $t \in \mathbb{P}^1$, est une application rationnelle a de S dans $\mathbb{P}^1$ de domaine de définition $S - (\Delta \cap S)$. On considère l'éclatement

$$g : S' \longrightarrow S$$

du sous-schéma fermé $S \cap \Delta$ de S . Le schéma S' est régulier et la fibre S'_{x_i} au-dessus d'un point x_i s'identifie au fibré projectif défini par l'espace tangent à S en x_i , donc est isomorphe à $\mathbb{P}^1$. De plus l'application rationnelle $f = ag$ est partout définie. Enfin, on peut associer à chaque point x_i la section de f qui, à un point $t \in \mathbb{P}^1$, fait correspondre le vecteur tangent en x_i à $H_t \cap S$.

Vérifions les conditions (i), (ii) et (iii). Pour chaque $t \in \mathbb{P}^1$, les courbes S'_t et $S_t = H_t \cap S$ sont isomorphes : le morphisme $S'_t \rightarrow S_t$ est en effet un isomorphisme sauf peut-être en les points x_i , points où S_t est régulière; comme de plus S'_t est intersection complète dans S' , S'_t est intègre, donc isomorphe à S_t . Les conditions (i) et (iii) ne sont autres que les conditions a) et b) du

pinceau; enfin f est lisse aux points de σ car f est plat et car les fibres S'_t sont géométriquement régulières aux points $\sigma(t)$.

Corollaire 2.2. Les notations étant celles de 2.1, soit Y un diviseur à croisements normaux dans S , et soit $Y' = Y \times_S S'$. Alors on peut choisir f, g, U tels que $Y' \times_{\mathbb{P}^1} U$ soit un diviseur à croisements normaux relativement à U .

On sait que, s'il existe un pinceau de Lefschetz pour un plongement $S \rightarrow \mathbb{P}^r$, les pinceaux de Lefschetz forment un ouvert de la variété des droites de $\mathbb{P}^r$. Il en est de même de l'ensemble des pinceaux de Lefschetz dont l'axe ne rencontre pas Y et tels qu'il existe un ouvert non vide U_1 de $\mathbb{P}^1$ tel que l'intersection de Y et H_t soit lisse si $t \in U_1$. Il suffit alors de construire f et g à partir d'un pinceau satisfaisant à ces deux conditions et de remplacer U par $U \cap U_1$.

2.3.0. Soit G un groupe profini. Rappelons que G est dit topologiquement de génération finie s'il existe un entier n tel que G soit isomorphe à un quotient du pro-groupe libre à n générateurs $F(n)$; soit $K = \text{Ker}(F(n) \rightarrow G)$. On dit que G est topologiquement de présentation finie si, de plus, on peut trouver un nombre fini d'éléments $k_1, \dots, k_r$ de K tels que le plus petit sous-groupe invariant fermé de K , contenant $k_1, \dots, k_r$, soit égal à K .

Théorème 2.3.1. Soient k un corps séparablement clos de caractéristique $p \geq 0$ et X un schéma connexe de type fini sur k . On suppose que les schémas de type fini et de dimension $\leq \dim(X)$ sur une clôture algébrique de k sont fortement désingularisables (SGA 5 I 3.1.5), condition réalisée si $\dim X = 2$ d'après [1] ou si $k = 0$ d'après [2]. Alors le groupe fondamental

$$\pi_1^{(p')}(X)$$

est topologiquement de présentation finie.

On peut supposer k algébriquement clos d'après SGA 1 IX 4.10.

1) *Réduction au cas où X est une surface régulière.* Si $f : X' \rightarrow X$ est un morphisme de type fini, on pose $X'' = X' \times_X X'$ et on note $(X'_a)_{a \in A}$ et $(X''_b)_{b \in B}$ l'ensemble des composantes connexes de X' et X'' respectivement. Lorsque f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, le groupe fondamental $\pi_1(X)$ peut se calculer explicitement en termes des groupes fondamentaux $\pi_1(X'_a)$ et $\pi_1(X''_b)$. Il en résulte (SGA 1 IX 5.2, 5.3) que, si les $\pi_1(X'_a)$ sont topologiquement de génération finie, il en est de même de $\pi_1(X)$; si les $\pi_1(X'_a)$ sont topologiquement de présentation finie et les $\pi_1(X''_b)$ topologiquement de génération finie, $\pi_1(X)$ est topologiquement de présentation finie.

Comme X est désingularisable, on peut trouver un schéma régulier X' et un morphisme propre birationnel $f : X' \rightarrow X$; comme f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, il suffit de prouver le théorème lorsqu'on fait l'hypothèse supplémentaire que X est régulier. On en déduit en effet que $\pi_1(X)$ est topologiquement de génération finie; sachant que $\pi_1(X')$ est topologiquement de présentation finie et les $\pi_1(X''_b)$ topologiquement de génération finie, on en déduit que $\pi_1(X)$ est topologiquement de présentation finie.

Soit maintenant $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de X par des ouverts affines et soit

$$f : \coprod_i U_i \longrightarrow X$$

le morphisme canonique. Comme f est un morphisme de descente effective pour la catégorie des revêtements étales, on voit qu'il suffit de prouver le théorème pour les U_i ; on est donc ramené au cas où X est affine et lisse.

On suppose désormais X affine, lisse sur k , et $\dim X > 2$. On peut alors appliquer le théorème de Lefschetz pour les schémas quasi-projectifs : si Y est une section hyperplane assez générale de X , on a un isomorphisme

$$\pi_1(Y) \simeq \pi_1(X).$$

Il suffit donc de prouver le théorème pour Y , ce qui nous ramène au cas où $\dim X = 2$.

2) *Cas où X est une surface lisse sur k .* D'après le théorème de désingularisation forte des surfaces, on peut trouver une surface S lisse, intègre, projective et une immersion ouverte $i : X \rightarrow S$ telle que le diviseur $Y = S - X$ soit à croisements normaux. On applique le corollaire 2.2 dont on reprend les notations.

Montrons qu'il suffit de prouver que le groupe fondamental de $X' = X \times_S S'$ est topologiquement de présentation finie. Comme X et X' sont réguliers et comme on a

$$\mathrm{codim} \left(X' - \bigcup_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}, X \right) \geq 2,$$

tout revêtement étale de X' induit sur $X - \bigcup_{1 \leq i \leq n} \{x_i\}$ un revêtement étale qui se prolonge de façon unique en un revêtement étale de X (SGA 2 1.11); ceci montre que l'on a un isomorphisme

$$\pi_1(X') \simeq \pi_1(X).$$

On considère le diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} X' & \longleftarrow & X'_U \\ \uparrow h & & \uparrow h_U \\ \mathbb{P}^1 & \longleftarrow & U \end{array}$$

où $h = f|_{X'}$. On note L l'ensemble des nombres premiers distincts de p et $\bar{\eta}$ un point géométrique au-dessus du point générique η de $\mathbb{P}^1$. Vérifions que les hypothèses de SGA 1 XIII 4.8 sont satisfaites. Le morphisme h a une section σ , car il en est ainsi de f . Prouvons la condition a) de SGA 1 XIII 4.7 : les fibres de h étant géométriquement intègres, le morphisme h est 0-acyclique et localement 0-acyclique; il reste à montrer que, pour tout faisceau d'ensembles localement constant F sur X' , (F, h) est cohomologiquement propre en dimension ≤ 0 . Si ξ est un point fermé de $\mathbb{P}^1$ et si Z désigne la fermeture intégrale de $\mathrm{Spec} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1, \xi}$ dans $\bar{\eta}$, le schéma $X'_Z = X' \times_{\mathbb{P}^1} Z$ vérifie la condition (S_2) aux points fermés de X' et est régulier en tout autre point, donc est normal. Par suite, un revêtement étale de X'_Z dont la restriction à $X'_{\bar{\eta}}$ est connexe est nécessairement connexe. Ceci démontre notre assertion, d'où a). Comme X'_U est le complémentaire dans S'_U d'un diviseur à croisements normaux relativement à U , h_U est localement 1-asphérique pour L (SGA 4 XV 2.1), et, pour tout faisceau de L -groupes constant fini F sur X'_U , (F, h_U) est cohomologiquement propre en dimension ≤ 1 (SGA 1 XIII 2.4), d'où la condition b). Comme $\mathbb{P}^1$ est normal et $T = \mathbb{P}^1 - U$ de codimension 1, on a

$$\mathrm{prof}_T^{\mathrm{et}}(S) \geq 2,$$

d'où la condition c). La condition

$$\mathrm{prof}_x^{\mathrm{top}}(X') \geq 3$$

est valable en tout point fermé de X' d'après le théorème de pureté, d'où la condition e). Enfin, pour tout point $t \in \mathbb{P}^1$, h est lisse en $\sigma(t)$, donc est localement 1-asphérique pour L en $\sigma(t)$, d'où la condition d).

D'après SGA 1 XIII 4.7, si a est un point géométrique de $X'_{\bar{\eta}}$, on a une suite exacte

$$1 \longrightarrow \pi_1^{(p')}(X'_{\bar{\eta}}, a) \longrightarrow \pi_1'(X'_U, a) \longrightarrow \pi_1(U, a) \longrightarrow 1,$$

et le choix de la section σ définit un scindage de cette suite exacte. Notons K l'image de $\pi_1(U, a)$ dans

$$\mathrm{Aut}(\pi_1^{(p')}(X'_{\bar{\eta}}, a)).$$

Le groupe des coinvariants sous K ,

$$\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)_K,$$

est le quotient de $\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)$ par le sous-groupe invariant fermé engendré par les éléments du type $x^{-1}q(x)$, où $x \in \pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)$ et $q \in K$. D'après loc. cit. 4.7.4, on a un isomorphisme

$$\pi_1^{(p')}(X', a) \simeq \pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)_K.$$

Soit

$$\mathbb{P}^1 - U = \coprod_{1 \leq i \leq n} \{t_i\},$$

et, pour chaque i , soit $\bar{T}_i$ le localisé strict de $\mathbb{P}^1$ en un point géométrique $\bar{t}_i$ au-dessus de t_i , et soit s_i le point générique de $\bar{T}_i$. Un revêtement étale de U , dont la restriction à chaque s_i est triviale, se prolonge en un revêtement étale de $\mathbb{P}^1$, donc est trivial. Pour chaque i , soit $\bar{k}(s_i)$ la clôture algébrique de $k(s_i)$; l'assertion ci-dessus revient à dire que $\pi_1(U, a)$ est égal au sous-groupe invariant fermé engendré par les images des groupes de Galois $\text{Gal}(\bar{k}(s_i), k(s_i))$ dans $\pi_1(U, a)$. D'après I 5.3, l'image K_i de $\text{Gal}(\bar{k}(s_i), k(s_i))$ dans $\text{Aut}(\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a))$ est finie. Comme K est le plus petit sous-groupe invariant fermé contenant tous les K_i , et comme $\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)$ est topologiquement de présentation finie (SGA 1 XIII 3.2), ceci prouve que $\pi_1^{(p')}(X'_\eta, a)_K$, donc aussi $\pi_1^{(p')}(X)$ qui lui est isomorphe, est topologiquement de présentation finie.

Remarque 2.3.2. La résolution des singularités n'est pas nécessaire pour démontrer le théorème 2.3.1 dans le cas où X est l'ouvert complémentaire d'un diviseur à croisements normaux d'un schéma projectif, lisse sur k .

Bibliographie de l'Exposé II

- [1] S. Abhyankar, *Local uniformization of algebraic surfaces over ground field of characteristic $p = 0$* , Amer. J. Math. 63 (1956).
- [2] H. Hironaka, *Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero*, Ann. of Math. 79 (1964).
- [3] M. Raynaud, *Théorème de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale*, thèse, à paraître.

SGA 7-I, Exposé VI

Théorie formelle des déformations

par D. S. Rim

1. Théorème d'existence formelle

Nous rappelons la notion de catégorie cofibrée (SGA 1, IV).

Soit C une catégorie fixée. Une catégorie cofibrée A au-dessus de C est, par définition, une catégorie A munie d'un foncteur

$$P : A \longrightarrow C$$

vérifiant les axiomes suivants.

Ax. 1. Pour toute flèche f de C et tout objet a de A tel que $P(a)$ soit la source de f , il existe un f -morphisme

$$\alpha : a \longrightarrow b$$

qui est cocartésien : pour tout f -morphisme $\alpha' : a \rightarrow b'$, il existe un unique T -morphisme $\tau : b \rightarrow b'$ dans A tel que

$$\alpha' = \tau\alpha,$$

où T est le but de f .

Ax. 2. Un composé de morphismes cocartésiens de A est encore cocartésien.

Les propriétés suivantes d'une catégorie cofibrée $P : A \rightarrow C$ résultent immédiatement des définitions.

Cancellation. Soient $\alpha, \beta : a \rightarrow a'$ deux flèches cocartésiennes telles que $P(\alpha) = P(\beta)$. S'il existe une flèche cocartésienne $\gamma : b \rightarrow a$ telle que $\alpha\gamma = \beta\gamma$, alors $\alpha = \beta$.

Factorisation. À partir de flèches cocartésiennes $\alpha : a \rightarrow a'$ et $\beta : a \rightarrow a''$, il existe une flèche cocartésienne $\gamma : a' \rightarrow a''$ telle que $\gamma\alpha = \beta$ si et seulement si il existe $f : P(a') \rightarrow P(a'')$ dans C tel que $fP(\alpha) = P(\beta)$. De plus, γ est unique.

Soit A une catégorie cofibrée au-dessus de C . Pour chaque objet S de C , on note $A(S)$ la sous-catégorie de A dont les objets sont les objets a de A tels que $P(a) = S$, et

$$\text{Hom}_{A(S)}(a, a') = \{\alpha \in \text{Hom}_A(a, a') \mid P(\alpha) = \text{id}_S\}.$$

Un groupoïde cofibré au-dessus de C est une catégorie cofibrée A au-dessus de C telle que $A(S)$ soit un groupoïde pour tout objet S de C . Rappelons qu'un groupoïde est une catégorie dans laquelle tout morphisme est un isomorphisme. Ainsi un groupoïde cofibré au-dessus de C est une catégorie cofibrée $P : A \rightarrow C$ telle que toute flèche de A soit cocartésienne. En outre, pour toute flèche α de A , α est un isomorphisme dans A si et seulement si $P(\alpha)$ est un isomorphisme.

Dans le reste de ce paragraphe, on fixe un anneau local noethérien complet Λ , de corps résiduel k , et l'on note $\mathcal{C}_\Lambda$ la catégorie des Λ -algèbres locales artiniennes ayant le même corps résiduel k , les flèches étant les homomorphismes locaux au-dessus de Λ . À partir de 1.2, un groupoïde cofibré A au-dessus de $\mathcal{C}_\Lambda$ sera toujours supposé vérifier $A(k) = \{e\}$, où $\{e\}$ désigne la catégorie dans laquelle $\text{Hom}_{\{e\}}(a, b)$ a un seul élément pour deux objets quelconques a, b . Une flèche $a' \xrightarrow{\alpha} a$ de A sera simplement appelée une $\mathcal{C}_\Lambda$ -flèche si $P(a') = P(a)$ et $P(\alpha) = 1_{P(a)}$. Elle sera dite surjective, par abus de langage, si $P(\alpha) : P(a') \rightarrow P(a)$ est surjective dans $\mathcal{C}_\Lambda$.

Exemple 1.1(a). Soit $F : C \rightarrow (\text{catégories})$ un foncteur. On définit la catégorie $\int F$ de la façon suivante. Un objet est un couple (S, a) , avec $S \in \text{ob}(C)$ et $a \in \text{ob } F(S)$; une flèche $(S, a) \rightarrow (S', a')$ est un couple (f, u') , où $f : S \rightarrow S'$ est une flèche de C et $u' : F(f)a \rightarrow a'$ une flèche de $F(S')$. La composition

$$(S, a) \xrightarrow{(f, u')} (S', a') \xrightarrow{(g, u'')} (S'', a'')$$

est donnée par

$$(gf, u'' \cdot F(g)u') : (S, a) \longrightarrow (S'', a'').$$

Avec le foncteur $P : \int F \rightarrow C$, $(S, a) \mapsto S$, la catégorie $\int F$ devient une catégorie cofibrée au-dessus de C . Si $F(S)$ est un groupoïde pour tout S , alors $\int F$ est un groupoïde cofibré au-dessus de C . En particulier, un foncteur $F : C \rightarrow (\text{groupes})$ donne un groupe cofibré, et un foncteur $F : C \rightarrow (\text{Ens})$ donne un groupoïde discret cofibré. Une transformation naturelle $\varphi : F \rightarrow G$ induit en outre un foncteur cocartésien $\varphi : \int F \rightarrow \int G$ au-dessus de C .

Exemple 1.1(b). Soient X, Y des schémas sur Λ , munis d'un isomorphisme fixé $X \otimes_{\Lambda} k \xrightarrow{\sim} Y \otimes_{\Lambda} k$. Le foncteur

$$\text{Isom}_{X,Y} : \mathcal{C}_{\Lambda} \longrightarrow (\text{groupoïdes})$$

qui à S associe les isomorphismes $X \otimes_{\Lambda} S \xrightarrow{\sim} Y \otimes_{\Lambda} S$ induisant l'isomorphisme fixé modulo k , définit un groupoïde cofibré $P : \int \text{Isom}_{X,Y} \rightarrow \mathcal{C}_{\Lambda}$.

Exemple 1.1(c). Soit X_0 un schéma fixé sur k , et soit M_{X_0} la catégorie des déformations de X_0 au-dessus de $\mathcal{C}_{\Lambda}$ (voir §4). Un objet de M_{X_0} est donc un couple (R, X) , avec $R \in \mathcal{C}_{\Lambda}$ et X une déformation de X_0 sur R . Le foncteur $P : M_{X_0} \rightarrow \mathcal{C}_{\Lambda}$, $(R, X) \mapsto R$, définit un groupoïde cofibré au-dessus de $\mathcal{C}_{\Lambda}$.

Exemple 1.1(d). Pour tout groupoïde X , on note $[X]$ le groupoïde discret formé des classes d'isomorphie d'objets de X . Si $P : F \rightarrow C$ est un groupoïde cofibré, on obtient un foncteur $[F] : C \rightarrow (\text{Ens})$, $[F](S) = [F(S)]$, puis un groupoïde discret cofibré, encore noté $[F]$ par abus de notation.

Définition 1.2. Un groupoïde cofibré A au-dessus de $\mathcal{C}_{\Lambda}$ est dit semi-homogène si les propriétés suivantes sont satisfaites.

- (1) Tout diagramme de flèches pleines de A , où $a' \rightarrow a$ est surjective, se complète en un diagramme commutatif contenant la flèche pointillée :

$$\begin{array}{ccc} a'' & \dashrightarrow & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a_1 & \longrightarrow & a. \end{array}$$

- (2) Si $R \times_k k[\varepsilon] \rightrightarrows R$ sont les projections et si $a' \rightrightarrows a$ est un couple de π_1 -, π_2 -flèches dans A , il existe une $\mathcal{C}_{\Lambda}$ -flèche $\gamma : a' \rightarrow a''$ telle que $\alpha = \beta\gamma$ si et seulement si $(\pi_1)_*(a') = (\pi_2)_*(a'')$.

Remarque 1.3. Les trois parties de la remarque 1.3 se traduisent exactement comme dans le texte original: la notion admet une reformulation 2-catégorique, elle peut remplacer 1.2(1) par la propriété au-dessus de $R_1 \leftarrow R' \rightarrow R_2$, et elle donne une structure canonique de k -espace vectoriel à $[A(k[\varepsilon])]$. Les diagrammes utilisés sont

$$\begin{array}{ccc} & a' & \\ a_1 \swarrow & & \searrow a_2 \\ & a & \end{array} \quad [A(R \times_k k[\varepsilon])] \rightarrow [A(R)] \times [A(k[\varepsilon])],$$

et le foncteur $W \mapsto k[W] = k \oplus W$, $w^2 = 0$, qui transforme les produits dans la catégorie des k -espaces vectoriels de dimension finie en produits fibrés au-dessus de k dans $\mathcal{C}_{\Lambda}$.

Définition 1.4. Une petite extension de $R \in \mathcal{C}_{\Lambda}$ est une surjection $R' \xrightarrow{f} R$ telle que $(\text{Ker } f)^2 = 0$ et $\text{Ker } f \simeq k$, autrement dit une suite exacte

$$0 \rightarrow k \xrightarrow{t} R' \xrightarrow{f} R \rightarrow 0, \quad t^2 = 0.$$

Si A est un groupoïde cofibré sur $\mathcal{C}_{\Lambda}$, une petite prolongation de a est une flèche $a' \rightarrow a$ dont l'image par P est une petite extension. Elle est verselle pour les petites prolongations de a si, pour toute petite prolongation $a_1 \rightarrow a$, il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} a' & \longrightarrow & a_1 \\ & \searrow & \swarrow \\ & a & \end{array} .$$

Proposition 1.5. Soit A un groupoïde cofibré semi-homogène au-dessus de $\mathcal{C}_\Lambda$.

- (1) Pour les projections $R \times_k k[\varepsilon] \rightrightarrows R$ et une flèche $a' \xrightarrow{\alpha} a$, il existe $\beta : a \rightarrow a'$ avec $\alpha\beta = 1_a$ si et seulement s'il existe une flèche $a \rightarrow (\pi_2)_* a'$.
- (2) Pour une petite extension $R' \xrightarrow{f} R$ et le diagramme

$$\begin{array}{ccc} R' \times_R R' & \longrightarrow & R' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ R' & \xrightarrow{f} & R \end{array} \quad \begin{array}{ccc} a'' & \longrightarrow & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a' & \longrightarrow & a, \end{array}$$

si $\mu(r_1, r_2) = r_1(0) + (r_2 - r_1)$ et s'il existe $a' \rightarrow \mu_* a''$, alors il existe $\gamma : a' \rightarrow a$ tel que $\alpha = a\gamma$.

La preuve est celle du texte original: le premier point utilise la section $h = 1 \times P(\varphi)$ de la première projection, puis 1.2(2); le second identifie $R' \times_R R'$ à $R' \times_k k[\text{Ker } f]$ et applique le premier point.

Corollaire 1.6. Sous les hypothèses de semi-homogénéité, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} a' & & a_1 \\ & \searrow \alpha & \swarrow \alpha_1 \\ & a & \end{array}$$

se relève en une flèche $a' \xrightarrow{\rho} a_1$ avec $\alpha = \alpha_1 \rho$ si et seulement si la condition correspondante existe au niveau de $P(a') \rightarrow P(a_1)$. La preuve utilise le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} & & a'' & & \\ & \swarrow \beta & & \searrow \beta_1 & \\ a' & & & & a_1 \\ & \searrow \alpha & & \swarrow \alpha_1 & \\ & & a & & \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} & & R' \times_R R' & & \\ & \swarrow & & \searrow & \\ R' & & & & R' \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & R & & \end{array}$$

Définition 1.7. Pour $R \in \mathcal{C}_\Lambda$, posons

$$\bar{\Omega}_R = M/(\mathfrak{m}_\Lambda R + M^2),$$

$\mathfrak{m}_\Lambda$ et M désignant les idéaux maximaux de Λ et de R . On obtient un foncteur $\bar{\Omega} : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow V$, et, par composition avec $P : A \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$, un foncteur encore noté $\bar{\Omega}$ sur A .

Proposition 1.8. Si A est semi-homogène et si a est versel pour les petites prolongations de e , il existe $a' \rightarrow a$ tel que a' soit versel pour les petites prolongations de a , que $P(a') \rightarrow P(a)$ soit surjective à noyau annulé par l'idéal maximal de $P(a)$, et que $\bar{\Omega}_{a'} \rightarrow \bar{\Omega}_a$ soit un isomorphisme. La construction part d'une suite exacte $0 \rightarrow J \rightarrow S \rightarrow R \rightarrow 0$, avec S anneau de séries formelles sur Λ , choisit un plus petit idéal J' entre J et MJ , puis utilise les diagrammes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & J/MJ & \longrightarrow & S/MJ & \longrightarrow & R \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow h & & \downarrow h_1 & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & k & \longrightarrow & R_1 & \xrightarrow{\pi_1} & R \longrightarrow 0 \end{array}$$

et

$$\begin{array}{ccc} S/J' & \xrightarrow{f} & R_1 \\ & \searrow \pi' & \downarrow \pi_1 \\ & & R, \end{array} \quad \begin{array}{ccc} a' & \xrightarrow{\rho} & a_1 \\ & \searrow & \downarrow \\ & & a. \end{array}$$

On passe ensuite aux pro-objets. Pour $P : A \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ cofibrée, on a

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & \text{pro}(A) \\ P \downarrow & & \downarrow \text{pro}(P) \\ \mathcal{C}_\Lambda & \longrightarrow & \text{pro}(\mathcal{C}_\Lambda) \end{array}$$

et les sous-catégories $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ et $\widehat{A}$ formées par les systèmes projectifs vérifiant la condition de stabilisation sur $\mathfrak{m}_i/(\mathfrak{m}_\Lambda + \mathfrak{m}_i^2)$, avec le carré

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & \widehat{A} \\ P \downarrow & & \downarrow \widehat{P} \\ \mathcal{C}_\Lambda & \hookrightarrow & \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda. \end{array}$$

La catégorie $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ est identifiée aux algèbres locales complètes de type formellement fini sur Λ avec corps résiduel k fixé.

Définition 1.9. Un objet ξ de $\widehat{A}$ est quasi-initial s'il existe une flèche $\xi \rightarrow a$ vers tout objet a de $\widehat{A}$. Il est minimal si

$$\xi(k[\varepsilon]) : \text{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, k[\varepsilon]) \rightarrow [A(k[\varepsilon])]$$

est bijective. Un objet ξ est un objet formel versel de A si toute surjection $a' \rightarrow a$ de A induit une surjection $\text{Hom}_{\widehat{A}}(\xi, a') \rightarrow \text{Hom}_{\widehat{A}}(\xi, a)$. Il est minimalement versel si la même application sur $k[\varepsilon]$ est bijective.

Proposition 1.10. Tout objet formel (minimalement) versel est quasi-initial (minimal). Si $\xi(k[\varepsilon])$ est injective, tout endomorphisme de ξ est un automorphisme; en particulier un objet quasi-initial minimal est unique à isomorphisme non canonique près. La preuve construit les morphismes $\xi \rightarrow a_n$ le long d'un système projectif $\cdots \rightarrow a_n \rightarrow a_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow a_0$, puis observe qu'un endomorphisme induit une surjection noethérienne $R \rightarrow R$, donc un automorphisme.

Théorème 1.11 (Schlessinger). Un groupoïde cofibré A au-dessus de $\mathcal{C}_\Lambda$ admet un objet formel minimalement versel si et seulement si A est semi-homogène et si $[A(k[\varepsilon])]$ est de dimension finie sur k .

La nécessité utilise l'objet quasi-initial ξ pour compléter les diagrammes de 1.2, puis la minimalité pour comparer les deux projections $S \times_k k[\varepsilon] \rightrightarrows S$. Pour la suffisance, on choisit une base $e_1, \dots, e_n$ de $[A(k[\varepsilon])]$, puis des objets $a_1, a_2, \dots$ tels que chaque a_i soit versel pour les petites prolongations de a_{i-1} et que les applications sur $\bar{\Omega}$ soient bijectives; alors

$$\xi = \lim_n a_n$$

est minimalement versel. Les diagrammes utilisés sont

$$\begin{array}{ccc} a'' & \dashrightarrow & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a_1 & \longrightarrow & a \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & & a' \\ & \nearrow & \downarrow q \\ \xi & \xrightarrow{h} & a \end{array} \quad \begin{array}{ccc} a'' & \longrightarrow & a' \\ q' \downarrow & & \downarrow q \\ a_n & \longrightarrow & a. \end{array}$$

Remarques 1.12–1.14. Une suite infinie $\cdots \rightarrow a_n \rightarrow \cdots \rightarrow a_1 \rightarrow e$ dont chaque terme est versel pour les petites prolongations du précédent et dont les $\bar{\Omega}$ se stabilisent donne un objet formel versel. Les propriétés de Schlessinger passent à $[A]$. Enfin, un invariant de $R = P(\xi)$ est un invariant de A ; on dit donc que A est formellement lisse, irréductible, etc., selon que R l'est. La dimension est

$$\dim_{\Lambda} A = \dim_k R,$$

et elle est compatible au changement de base $R \mapsto k \otimes_{\Lambda} R$.

1.15. Il reste à indiquer comment modifier la théorie pour permettre des extensions du corps résiduel. Soient Λ et K des anneaux locaux noethériens complets, K étant une Λ -algèbre. On suppose que $\Lambda \rightarrow K$ est local et que le corps résiduel K' de K est une extension de type fini du corps résiduel k de Λ . Le cas le plus important est $K = K'$, avec K/k finie inséparable.

On note $\hat{\mathcal{C}}_{\Lambda, K}$ la catégorie des anneaux locaux noethériens complets R munis d'une structure de Λ -algèbre et d'un épimorphisme $s : R \rightarrow K$. On note $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$ la sous-catégorie où $\text{Ker}(s)$ est de longueur finie comme R -module; elle s'identifie à une sous-catégorie pleine de $\text{pro}(\mathcal{C}_{\Lambda})$.

Pour tout K' -espace vectoriel V de dimension finie, on note $D_V(K)$ l'algèbre des nombres duaux sur K définie par V , dont les éléments sont $\kappa + v\varepsilon$, $\varepsilon^2 = 0$, et

$$(\kappa + v\varepsilon)(\kappa' + v'\varepsilon) = \kappa\kappa' + (\kappa v' + \kappa' v)\varepsilon.$$

La projection $e : D_V(K) \rightarrow K$ en fait un objet de $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$; le rôle de $k[\varepsilon]$ est désormais joué par $D_{K'}(K)$. Tout groupoïde cofibré A au-dessus de $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$ s'étend naturellement à un groupoïde cofibré $\hat{A}_K$ au-dessus de $\hat{\mathcal{C}}_{\Lambda, K}$, et les flèches dites surjectives sont celles qui induisent des homomorphismes surjectifs d'algèbres.

Suite de 1.15 : extensions du corps résiduel

On suppose que $A(K) = \{e\}$.

Définition 1.16. Un groupoïde cofibré A sur $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$ est dit *semi-homogène* si les propriétés suivantes sont vérifiées.

(I) Tout diagramme de flèches pleines dans A

$$\begin{array}{ccc} a'' & \dashrightarrow & a' \\ \downarrow & & \downarrow \\ a_1 & \longrightarrow & a \end{array}$$

où $a' \rightarrow a$ est surjectif peut être complété en un diagramme commutatif par les flèches pointillées.

(II) Pour tout R , l'application naturelle

$$[A(R \times_K D_{K'}(K))] \longrightarrow [A(R)] \times [A(D_{K'}(K))]$$

est bijective, le second membre étant le produit fibré correspondant des classes d'isomorphie.

Si A est semi-homogène, alors $[A]$ l'est aussi.

1.17. Considérons d'abord la restriction de A à la sous-catégorie pleine de $\mathcal{C}_{\Lambda, K}$ dont les objets sont les $D_V(K)$. Posons

$$\Omega = \Omega_{K/\Lambda}^1 \otimes_K K',$$

et notons $d : K \rightarrow \Omega$ la dérivation. Un morphisme $f : D_V(K) \rightarrow D_W(K)$ s'écrit

$$f(k + v\varepsilon) = k + (u(v) + D dk)\varepsilon,$$

avec $u \in \text{Hom}_{K'}(V, W)$ et $D \in \text{Hom}_{K'}(\Omega, W)$. Identifiant f au couple (u, D) , la loi de composition est

$$(u, D) \circ (u', D') = (uu', D + uD').$$

La condition (II) entraîne la condition suivante :

$$V \mapsto [A(D_V(K))] \quad (\text{II}')$$

commute aux produits, comme foncteur des K' -espaces vectoriels vers les ensembles.

Lemme 1.18. Supposons que A satisfasse (II'). Alors :

- (1) $[A(D_{K'}(K))]$ porte une unique structure de K' -espace vectoriel telle que, fonctoriellement en V ,

$$[A(D_V(K))] \simeq V \otimes_{K'} [A(D_{K'}(K))].$$

- (2) Il existe une application linéaire

$$\gamma : \text{Hom}_{K'}(\Omega, K') \longrightarrow [A(D_{K'}(K))]$$

telle que, pour tout $D \in \text{Hom}_{K'}(\Omega, K')$, l'endomorphisme induit par $(1, D) : D_{K'}(K) \rightarrow D_{K'}(K)$ soit

$$x \longmapsto x + \gamma(D).$$

- (3) Plus généralement, pour tout $(u, D) : D_V(K) \rightarrow D_W(K)$, l'application correspondante

$$[A(D_V(K))] \simeq V \otimes [A(D_{K'}(K))] \longrightarrow [A(D_W(K))] \simeq W \otimes [A(D_{K'}(K))]$$

est

$$x \longmapsto u(x) + \gamma(D).$$

Preuve. Posons

$$F(V) = [A(D_V(K))], \quad E = F(K').$$

La condition (II'), jointe au fait que K' est un objet-espace vectoriel dans la catégorie des K' -espaces vectoriels de dimension finie, donne la structure d'espace vectoriel sur $F(K')$ et l'identification fonctorielle $F(V) \simeq V \otimes E$.

Notons $F(u, D)$ l'application induite par (u, D) . Comme

$$(u, D) = (1, D) \circ (u, 0),$$

on a

$$F(u, D) = F(D) \circ (u \otimes 1_E).$$

La fonctorialité de F s'écrit

$$F(0) = \text{id}, \quad F(D) \circ F(D') = F(D + D'), \quad (u \otimes 1_E) \circ F(D) = F(uD) \circ (u \otimes 1_E).$$

En prenant $V = K'^m$ et en utilisant les applications $i : V \rightarrow V \oplus K'^m$ et $p : V \oplus K'^m \rightarrow K'^m$, Le diagramme commutatif utilisé dans cette réduction est

$$\begin{array}{ccccc} V \otimes E & \longrightarrow & (V \oplus K'^m) \otimes E & \longrightarrow & K'^m \otimes E \\ \downarrow F(D) & & \downarrow F(i, D) & & \parallel \\ V \otimes E & \longrightarrow & (V \oplus K'^m) \otimes E & \longrightarrow & K'^m \otimes E. \end{array}$$

on voit que $F(D)$ est une translation :

$$F(D)(y) = y + \alpha(D).$$

Les identités précédentes donnent

$$\alpha(D + D') = \alpha(D) + \alpha(D'), \quad \alpha(uD) = u \alpha(D),$$

d'où une unique application linéaire $\gamma : \text{Hom}(\Omega, K') \rightarrow E$. Cela prouve le lemme.

Définition 1.19. Soit ξ un objet formel de A .

- (1) L'objet ξ est dit *versel* si toute application surjective $a' \rightarrow a$ dans A induit une application surjective

$$\text{Hom}_A(\xi, a') \longrightarrow \text{Hom}_A(\xi, a).$$

- (2) Un objet formel versel ξ , d'image (R, ξ) , est dit *minimal* si, pour deux applications $\varphi, \psi : R \rightarrow D_V(K)$, l'isomorphisme de $\varphi(\xi)$ et $\psi(\xi)$ implique l'existence d'une dérivation $D : K \rightarrow V$ telle que

$$(\psi, D) \circ \xi = \xi,$$

ou encore $\psi = \varphi - D \circ d$.

Théorème 1.20. Si A est semi-homogène et si

$$\dim_{K'}[A(D_{K'}(K))] < \infty,$$

alors A admet un objet formel minimalement versel, et deux tels objets sont isomorphes.

Preuve. Avec les notations du lemme 1.18, soit H^* un sous-espace de $[A(D_{K'}(K))]$ supplémentaire à l'image de γ , et soit H son dual. Posons

$$R_1 = D_H(K).$$

Choisissons $\xi_1 \in A(R_1)$ dont l'image dans

$$[A(R_1)] = H^* \otimes [A(D_{K'}(K))] = \text{Hom}(H^*, [A(D_{K'}(K))])$$

soit l'inclusion de H^* dans $[A(D_{K'}(K))]$. Alors

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_{\Lambda, K}}(D_{K'}(K), D_V(K)) \longrightarrow [A(D_V(K))]$$

est surjective, et la condition de minimalité de la définition 1.19 vaut pour (R_1, ξ_1) .

Choisissons $S \in \widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda, K}$, formellement lisse sur Λ , et un épimorphisme

$$\pi : S \longrightarrow R_1$$

tel que $\text{Ker}(\pi) \cap \mathfrak{m}_S^2 = 0$. Si $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de S , on définit par récurrence, pour $n \geq 1$,

$$R_n = S/\mathfrak{m}^n, \quad \xi_n \in A(R_n),$$

en imposant que :

- (a) $\mathfrak{m}^n$ soit l'intersection des idéaux $I \supset \mathfrak{m}^n$ de S tels que ξ_n se prolonge en un objet de $A(S/I)$;
- (b) ξ_n prolonge ξ_{n-1} .

Alors, pour

$$R = \varprojlim R_n, \quad \xi = \varprojlim \xi_n,$$

on vérifie que (R, ξ) est un objet formel minimalement versel. La construction donne aussi l'unicité à isomorphisme près.

2. Groupoïdes cofibrés pro-représentables

Soit A un groupoïde cofibré sur $\mathcal{C}_\Lambda$, admettant un objet formel minimalement versel ξ . En général, ξ seul ne suffit pas à reconstruire A , à $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalence près.

Un certain nombre de groupoïdes cofibrés qui interviennent en pratique jouissent d'une propriété plus forte que la semi-homogénéité. Pour les étudier, il est commode de reformuler ce qui précède en termes de foncteurs lisses. Les notations et terminologies du paragraphe précédent restent en vigueur.

Définition 2.1. Soit

$$\varphi : A \longrightarrow B$$

un foncteur de groupoïdes cofibrés sur $\mathcal{C}_\Lambda$. On dit que φ est *lisse* si toute application surjective $\beta : b' \rightarrow \varphi(a)$ dans B peut être complétée en un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \varphi(a') & \longrightarrow & b' \\ \downarrow & & \downarrow \beta \\ \varphi(a) & \xlongequal{\quad} & \varphi(a) \end{array} \quad (*)$$

pour un certain $a' \rightarrow a$ dans A . On dit que φ est *minimalement lisse* si elle est lisse et si

$$[A(k[\varepsilon])] \longrightarrow [B(k[\varepsilon])]$$

est bijective.

Remarque 2.2.

- (a) La lissité de φ équivaut à demander que, dans le diagramme précédent, $\varphi(a') \rightarrow b'$ puisse être choisi $\mathcal{C}_\Lambda$ -isomorphe; il suffit aussi de le vérifier pour les petites prolongations.
- (b) Pour tout groupoïde cofibré A , le foncteur naturel $A \rightarrow [A]$ est minimalement lisse.
- (c) Si $R \in \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$, on pose

$$h_R(S) = \text{Hom}_{\Lambda\text{-alg}}(R, S).$$

Le foncteur $h_S \rightarrow h_R$ induit par $R \rightarrow S$ est lisse si et seulement si S est un anneau de séries formelles sur R .

- (d) Si $\xi \in A$, $P(\xi) = R$, le choix d'images cocartésiennes de ξ définit

$$\xi^* : h_R \longrightarrow A.$$

Ce foncteur est lisse exactement lorsque ξ est versel; il est minimalement lisse lorsque ξ est minimalement versel.

Proposition 2.3. Pour des foncteurs de groupoïdes cofibrés

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$$

sur $\mathcal{C}_\Lambda$:

- (a) si φ et ψ sont lisses, $\psi\varphi$ est lisse;
- (b) si ψ et $\psi\varphi$ sont lisses, φ est lisse;

(c) si $\psi\varphi$ est lisse et si φ est surjective sur les classes d'isomorphie d'objets, alors ψ est lisse.

Remarque 2.4. Si A admet un objet formel versel ξ , alors $\xi^* : h_R \rightarrow A$ est lisse, avec $R = P(\xi)$. Ainsi dire que A est formellement lisse sur $\mathcal{C}_\Lambda$ équivaut à dire que R est une algèbre de séries formelles sur Λ , ou encore que le foncteur structural $A \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ est lisse.

Définition 2.5. Un groupoïde cofibré A sur $\mathcal{C}_\Lambda$ est dit *homogène* si tout diagramme

$$\begin{array}{ccc} a' & \longrightarrow & a \\ \downarrow & & \downarrow \\ b' & \longrightarrow & b \end{array}$$

où $a' \rightarrow a$ est surjectif admet un produit fibré $a' \times_a b'$ dans A tel que

$$P(a' \times_a b') = P(a') \times_{P(a)} P(b').$$

Remarque 2.6.

- (a) L'homogénéité implique la semi-homogénéité.
- (b) Les produits fibrés de catégories doivent être compris au sens des 2-catégories : un objet est un triplet $(x, y; u)$, avec $u : \Phi(x) \simeq \Psi(y)$. Les morphismes font commuter le carré

$$\begin{array}{ccc} \Phi(x) & \xrightarrow{u} & \Psi(y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Phi(x') & \xrightarrow{u'} & \Psi(y'). \end{array}$$

Les notions de groupoïde homogène, semi-homogène et de foncteur lisse peuvent ainsi se reformuler comme des propriétés de produits fibrés de catégories.

- (c) Si A est homogène, alors

$$A(k[V \oplus W]) \longrightarrow A(k[V]) \times A(k[W])$$

est une équivalence pour tous V, W de dimension finie; en particulier $\text{Aut}(1_V)$ et $[A(k[\varepsilon])]$ portent des structures canoniques de k -espaces vectoriels.

- (d) Tout h_R est homogène. Si A est semi-homogène, $[A]$ l'est aussi; mais l'homogénéité de A n'implique pas en général celle de $[A]$.

Proposition 2.7. Soit A homogène sur $\mathcal{C}_\Lambda$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $[A]$ est homogène, c'est-à-dire

$$[A(R' \times_R S)] \longrightarrow [A(R')] \times_{[A(R)]} [A(S)]$$

est bijective pour toute petite extension $R' \rightarrow R$.

- (ii) Pour toute petite prolongation $a' \rightarrow a$, l'application

$$\text{Aut}_{A(R')}(a') \longrightarrow \text{Aut}_{A(R)}(a)$$

est surjective.

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) s'obtient en appliquant l'homogénéité de $[A]$ aux deux objets $a' \times_a a'$ et $a' \times_a a'_\tau$, où $\tau \in \text{Aut}_A(a)$. Réciproquement, deux objets au-dessus de $R' \times_R S$ dont les images sont isomorphes au-dessus de R' et de S deviennent isomorphes après avoir ajusté les isomorphismes par la surjectivité sur les automorphismes.

La comparaison est représentée schématiquement par le diagramme de flèches pleines

$$\begin{array}{ccccc}
 & a''_2 & & R' \times_R S & \\
 \swarrow & \downarrow & \searrow & \swarrow & \searrow \\
 a'_2 & a''_1 & b_1 \xrightarrow{\tau} b_2 & R' & S \\
 \swarrow & \searrow & & \searrow & \swarrow \\
 & a'_1 & a_1 & & R,
 \end{array}$$

avec la partie gauche dans A et le losange de droite dans $\mathcal{C}_\Lambda$.

Soit $R' \xrightarrow{f} R$ une petite extension. On dispose d'une application canonique

$$\text{Ker}(f) \longrightarrow R' \times_R R', \quad (r_1, r_2) \longmapsto r_1(0) + (r_2 - r_1),$$

et de l'isomorphisme correspondant

$$D_f : \text{Ker}(f) \longrightarrow R' \times_R R'[\text{Ker}(f)].$$

Pour deux f -flèches $a_i \rightarrow a$, $i = 1, 2$, on note

$$\tau(a_1, a_2) \in A(k[\text{Ker}(f)])$$

l'objet obtenu en transportant $a_1 \times_a a_2$ par cet isomorphisme. Alors

$$a_1 \times_a a_2 \simeq a_1 \times \tau(a_1, a_2).$$

Lemme 2.8. Soient A homogène et $a_i \rightarrow a$ deux f -flèches.

- (1) Il existe $p : a_1 \rightarrow a_2$ avec $a_2 p = a_1$ si et seulement si il existe une flèche $a_1 \rightarrow \tau(a_1, a_2)$.
- (2) Il existe un tel p avec $P(p) = \text{id}$ si et seulement si

$$\tau(a_1, a_2) = 0 \quad \text{dans } [A(k[\text{Ker}(f)])].$$

Preuve. C'est la traduction exacte de la description précédente du produit fibré.

Proposition 2.9. Soient

$$A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$$

des foncteurs de groupoïdes cofibrés sur $\mathcal{C}_\Lambda$.

- (a) Supposons B semi-homogène, ψ homogène, et

$$[A(k[\varepsilon])] \longrightarrow [C(k[\varepsilon])]$$

injective. Alors $\psi\varphi$ est lisse si et seulement si φ et ψ sont lisses.

- (b) Si $\varphi : A \rightarrow B$ est lisse et si A est semi-homogène, alors B est semi-homogène.

Preuve. On relève d'abord les petites prolongations après application de ψ , puis on utilise la semi-homogénéité de B et l'injectivité tangentielle pour supprimer l'obstruction.

Dans la preuve de la lissité, on complète par des flèches pointillées le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \varphi(a'_{n+1}) & \dashrightarrow & \varphi(a'_n) & & b'_{n+1} & \longrightarrow & b'_n \\ \downarrow & \searrow & \downarrow & & \downarrow \beta_{n+1} & & \downarrow \beta_n \\ \varphi(a_{n+1}) & \longrightarrow & \varphi(a_n) & & \varphi(a_{n+1}) & \longrightarrow & \varphi(a_n). \end{array}$$

Après usage de la semi-homogénéité de A , le diagramme correspondant dans B est un produit fibré; cela fournit le relèvement voulu.

L'autre sens est la stabilité de la lissité par composition; (b) se déduit directement de la définition.

Corollaire 2.10.

- (a) Si $\varphi : A \rightarrow B$ est lisse, si ξ est un objet formel versel de A , si η est minimalement versel dans B , et si B est homogène, alors, pour toute flèche

$$\beta : \eta \longrightarrow \varphi(\xi),$$

l'anneau $P(\xi)$ est une algèbre de séries formelles sur $P(\eta)$ via $P(\beta)$.

- (b) Si A est homogène et si ξ, η sont versels, avec η minimal, alors, pour toute flèche $\alpha : \eta \rightarrow \xi$, $P(\xi)$ est une algèbre de séries formelles sur $P(\eta)$.

Preuve. La flèche β donne le carré

$$\begin{array}{ccc} h_{P(\xi)} & \xrightarrow{\tilde{\beta}} & h_{P(\eta)} \\ \tilde{\xi} \downarrow & & \downarrow \tilde{\eta} \\ A & \xrightarrow{\varphi} & B. \end{array}$$

Comme $\tilde{\xi}$ et φ sont lisses, $\tilde{\eta}\tilde{\beta}$ l'est. La proposition 2.9 et la minimalité de η donnent la lissité de $\tilde{\beta}$, ce qui équivaut à l'assertion sur les séries formelles.

Soit maintenant C une catégorie. À tout $R \in C$ est associé

$$h_R(S) = \text{Hom}_C(R, S),$$

et le foncteur de Yoneda $h : C^\circ \rightarrow \text{Hom}(C, \text{Ens})$ est pleinement fidèle. Une *cocatégorie* dans C est un diagramme

$$h_{R_1} \times_{h_{R_0}} h_{R_1} \xrightarrow{c} h_{R_1} \begin{array}{c} \xrightarrow{s_1} \\ \xleftarrow{s_2} \end{array} h_{R_0}$$

ε

avec $s_i \varepsilon = \text{id}$, c associative et compatible aux s_i . Elle définit un foncteur $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ vers les catégories par

$$\text{Ob } h_{(R_0, R_1, \dots)}(S) = \text{Hom}_C(R_0, S), \quad \text{Fl } h_{(R_0, R_1, \dots)}(S) = \text{Hom}_C(R_1, S).$$

Une *cogroupoïde* est une cocatégorie pour laquelle ces catégories sont des groupoïdes.

Les cocatégories apparaissent naturellement ainsi. Soit $P : F \rightarrow C$ une catégorie cofibrée et $\xi \in F$, $R_0 = P(\xi)$. Le foncteur

$$X = (f_1, f_2) \longmapsto \text{Hom}_{F(S)}(\xi^\#(f_2), \xi^\#(f_1))$$

sur $(R_0 \amalg R_0, C)$ est parfois représentable par

$$X_0 = (R_0 \xrightleftharpoons[s_2]{s_1} R_1).$$

Alors R_1 définit une cocatégorie $(R_0, R_1, \dots)$, et le foncteur

$$h_{(R_0, R_1, \dots)} \longrightarrow F$$

est une C -équivalence si et seulement si ξ est quasi-initial au-dessus de C .

Définition et proposition 2.11. Un cogroupoïde $(R_0, R_1, \dots)$ dans $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ est dit *lisse* si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées :

- (i) R_1 est une algèbre de séries formelles sur R_0 via s_1 , et aussi via s_2 ;
- (ii) $h_{R_0} \rightarrow h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est lisse sur $\mathcal{C}_\Lambda$.

Il est dit *minimalement lisse*, ou *normalisé lisse*, s'il est lisse et si

$$h_{(R_0, R_1, \dots)}(k[\varepsilon])$$

est totalement déconnecté, c'est-à-dire $s_1(k[\varepsilon]) = s_2(k[\varepsilon])$.

Preuve. C'est exactement la traduction de la lissité de $\varepsilon : h_{R_0} \rightarrow h_{(R_0, R_1, \dots)}$ en lissité des morphismes $s_1, s_2 : h_{R_1} \rightarrow h_{R_0}$.

Proposition 2.12. Soit $(R_0, R_1, \dots)$ un cogroupoïde dans $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$.

- (a) S'il est lisse, alors $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est homogène.
- (b) Si $s_1(k[\varepsilon]) = s_2(k[\varepsilon])$, les conditions suivantes sont équivalentes :
 - (i) $(R_0, R_1, \dots)$ est lisse;
 - (ii) $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est homogène;
 - (iii) $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est semi-homogène.
- (c) Si $h_{(R_0, R_1, \dots)}$ est semi-homogène, il est équivalent à $h_{(S_0, S_1, \dots)}$ pour un cogroupoïde minimalement lisse S_* .

Preuve. Pour (a), on part d'un diagramme

$$\begin{array}{ccc} (S_1, f_1) & & (S_2, f_2) \\ & \searrow (h_1, u_1) \quad \swarrow (h_2, u_2) & \\ & (S, f) & \end{array}$$

avec h_2 surjectif. La lissité de s_1 permet de relever $u_1^{-1}u_2$ en $v \in h_{R_1}(S_2)$, $s_1(v) = f_2$. L'objet

$$(S_1 \times_S S_2, f_1 \times s_2(v))$$

donne alors le produit fibré, comme l'indique le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} & (S_1 \times_S S_2, f_1 \times s_2(v)) & & & \\ & \swarrow \pi_1 & & \searrow (\pi_2, v^{-1}) & \\ (S_1, f_1) & & & & (S_2, f_2) \\ & \searrow (h_1, u_1) & & \swarrow (h_2, u_2) & \\ & (S, f) & & & \end{array}$$

et cela prouve l'homogénéité. Pour (b), la semi-homogénéité donne un objet formel minimalement versel; l'objet $(R_0, 1_{R_0})$ est quasi-initial minimal, d'où la lissité de $h_{R_0} \rightarrow h_{(R_0, R_1, \dots)}$. Pour (c), l'objet minimalement versel (S_0, ξ_0) et le foncteur $\text{Isom}(\xi_0, \xi_0)$ fournissent, par passage à la limite, un S_1 pro-représentant et une équivalence avec $h_{(S_0, S_1, \dots)}$.

Définition 2.13. Un groupoïde cofibré A sur $\mathcal{C}_\Lambda$ est dit *pro-représentable* (resp. *minimalement pro-représentable*) s'il est $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalent à

$$h_{(R_0, R_1, \dots)}$$

pour un cogroupoïde (resp. un cogroupoïde normalisé) $(R_0, R_1, \dots)$ dans $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$.

Proposition 2.14. Si $(R_0, R_1, \dots)$ est un cogroupoïde normalisé dans $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$, alors tout homomorphisme

$$(\sigma_0, \sigma_1) : (R_0, R_1, \dots) \longrightarrow (R_0, R_1, \dots)$$

qui induit une $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalence

$$h_{(\sigma_0, \sigma_1)} : h_{(R_0, R_1, \dots)} \longrightarrow h_{(R_0, R_1, \dots)}$$

est un isomorphisme.

SGA 7-I — Exposé VI

Pages 71–96 du scan source : pro-représentabilité et faisceaux D^i

2. Groupoïdes pro-représentables, suite

Démonstration de la proposition 2.14. On conserve les notations de l'énoncé. Si un homomorphisme (σ_0, σ_1) d'un cogroupoïde normalisé induit une $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalence, le pro-objet de base est déjà déterminé par le foncteur induit sur les classes d'isomorphisme. Le diagramme de comparaison est

$$\begin{array}{ccccc} B_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{(R_0, R_1, \dots)}(x, e) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow h_{(\sigma_0, \sigma_1)} \\ B_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{R_0}(x, e) & \longrightarrow & h_{(R_0, R_1, \dots)}(x, e). \end{array}$$

Après passage à $k[\varepsilon]$, le groupoïde considéré est totalement déconnecté; l'application tangente est donc bijective. Ainsi $R_0 \rightarrow R_0$ est un endomorphisme surjectif d'un anneau local noethérien complet, donc un automorphisme. La description par produit fibré de R_1 donne alors que $R_1 \rightarrow R_1$ est aussi un automorphisme. Donc (σ_0, σ_1) est un isomorphisme.

Lemme 2.15. Soient A, B des groupoïdes discrets sur $\mathcal{C}_\Lambda$, et $\varphi : A \rightarrow B$ un foncteur minimalement lisse. Si A et B sont homogènes, alors φ est une $\mathcal{C}_\Lambda$ -équivalence.

Démonstration. On doit montrer que $\varphi(S)$ est bijective pour tout S . C'est vrai pour $S = k[\varepsilon]$, et la surjectivité est donnée par la lissité minimale. Pour une petite extension $S' \twoheadrightarrow S$, l'homogénéité donne

$$S' \times_S S' \simeq S' \times_k k[\text{Ker } f],$$

d'où

$$\begin{array}{ccc} A(S') \times_{A(S)} A(S') & \longrightarrow & A(S') \times A(k[\text{Ker } f]) \\ \varphi \times \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \times \varphi \\ B(S') \times_{B(S)} B(S') & \longrightarrow & B(S') \times B(k[\text{Ker } f]). \end{array}$$

Les ensembles $A(S')$ et $B(S')$ sont donc des espaces homogènes principaux sous des groupes tangents identifiés par φ . L'induction sur la longueur de S prouve la bijectivité. $\square$

Corollaire 2.16. Si A est homogène et possède un espace tangent de dimension finie, alors pour tout objet ξ , le foncteur

$$\text{Isom}_\xi : \mathcal{C}_\Lambda/R \rightarrow \text{Ens}, \quad R = P(\xi),$$

est pro-représentable. En effet, ce foncteur est homogène, et le théorème d'existence formelle lui fournit un objet formel minimalement lisse; le lemme 2.15 en fait une équivalence.

Théorème 2.17. Un groupoïde cofibré A sur $\mathcal{C}_\Lambda$ est pro-représentable par un cogroupoïde lisse normalisé si et seulement si

- (1) A est homogène;
- (2) $[A(k[\varepsilon])]$ et $\text{Aut}(1_{k[\varepsilon]})$ sont de dimension finie sur k .

La nécessité se lit sur les noyaux et conoyaux des espaces $\text{Hom}(R_i, k[\varepsilon])$. Pour la suffisance, on choisit un objet formel minimalement versel ξ , représenté par R_0 , puis l'on pro-représente le foncteur des isomorphismes entre les deux images réciproques de ξ au-dessus de $R_0 \hat{\otimes}_\Lambda R_0$ par R_1 . La composition des isomorphismes définit le cogroupoïde $(R_0, R_1, \dots)$, et le foncteur induit vers A est une équivalence par le lemme 2.15.

Corollaires 2.18–2.20 et remarques. Un foncteur d'ensembles sur $\mathcal{C}_\Lambda$ est pro-représentable exactement lorsqu'il est homogène et a un espace tangent de dimension finie. Tout cogroupoïde lisse peut être normalisé. Si $\bar{R}_1 = R_1/J$, où J est engendré par les $s_1(r) - s_2(r)$, alors $(R_0, \bar{R}_1, \dots)$ représente le groupe formel des automorphismes. La lissité formelle de ce groupe équivaut à la surjectivité des automorphismes le long des petites extensions et à la pro-représentation du foncteur des classes d'isomorphisme. Le passage à la fibre spéciale k se fait par changement de base, et une représentation lisse non normalisée diffère de la représentation normalisée par une extension formelle lisse.

3. Les faisceaux cohérents D^i

On rappelle maintenant la théorie d'obstruction élémentaire des extensions d'algèbres commutatives, formulée comme cohomologie de Grothendieck sur un site. Pour une R -algèbre A , $\mathcal{C}_{A|R}$ désigne la catégorie des flèches $B \rightarrow A$, munie de la topologie dont les recouvrements sont les surjections. Un faisceau F de A -modules vérifie, pour $B' \twoheadrightarrow B$,

$$0 \rightarrow F(B) \rightarrow F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B').$$

Un A -module M définit le faisceau additif $\text{Der}_R(-, M)$.

On note $\tilde{\mathcal{C}}_{A|R}$ la catégorie des faisceaux et $\hat{\mathcal{C}}_{A|R}$ celle des préfaisceaux. Les dérivés droits de l'inclusion sont notés $\mathcal{H}_{A|R}^q$, et

$$H^q(A|R, F) = [\mathcal{H}_{A|R}^q(F)](A).$$

Les fonctorialités de restriction et de changement d'anneau sont représentées par les carrés

$$\begin{array}{ccc} \hat{\mathcal{C}}_{B|R} & \longrightarrow & \hat{\mathcal{C}}_{A|R} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \tilde{\mathcal{C}}_{B|R} & \longrightarrow & \tilde{\mathcal{C}}_{A|R} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \hat{\mathcal{C}}_{A|S} & \longrightarrow & \hat{\mathcal{C}}_{A|R} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \tilde{\mathcal{C}}_{A|S} & \longrightarrow & \tilde{\mathcal{C}}_{A|R}. \end{array}$$

Les groupes de cohomologie de Čech d'un recouvrement $B' \rightarrow B$ proviennent du module semi-simplicial

$$F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B') \rightrightarrows F(B' \times_B B' \times_B B') \rightrightarrows \cdots.$$

Il y a une suite spectrale

$$H^p(A|R, \mathcal{H}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(A|R, F).$$

Lemme 3.2 et corollaire 3.3. Si $P \twoheadrightarrow B$ est un recouvrement par une algèbre polynomiale sur R , alors

$$H^n(\{P \rightarrow B\}, F) \simeq \mathcal{H}_{A|R}^n(F)(B).$$

Il en résulte que les faisceaux de type fini ont des $\mathcal{H}^n$ de type fini lorsque A est noethérien, que les algèbres polynomiales sont acycliques, et que l'exactitude se vérifie sur le sous-site polynomial.

Lemme 3.5. Pour un diagramme

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & C \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & A \end{array}$$

et une R -algèbre S , l'annulation de $\mathrm{Tor}_1^R(B, S)$ donne

$$(B' \times_B C) \otimes_R S \simeq (B' \otimes_R S) \times_{B \otimes_R S} (C \otimes_R S),$$

et les hypothèses d'annulation des Tor jusqu'au degré n se propagent à $B' \times_B C$. Le diagramme exact comparé est

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & J \otimes_R S & \longrightarrow & (B' \times_B C) \otimes_R S & \longrightarrow & C \otimes_R S \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & J \otimes_R S & \longrightarrow & (B' \otimes_R S) \times_{B \otimes_R S} (C \otimes_R S) & \longrightarrow & C \otimes_R S \longrightarrow 0. \end{array}$$

Corollaire 3.6 et proposition 3.7. Sous l'hypothèse $\mathrm{Tor}_1^R(A, S) = 0$,

$$H^n(A \otimes_R S|S, G) \simeq H^n(A|R, SG).$$

Si $\mathrm{Tor}_i^R(A, S) = 0$ pour $0 < i \leq n$, alors

$$\mathcal{H}^i(A \otimes_R S|S, F) \simeq \mathcal{H}^i(A|R, SF), \quad i \leq n.$$

Pour $S \rightarrow R \rightarrow A$ et un faisceau additif F , on a la suite exacte de transitivité

$$0 \rightarrow H^0(A|R, F_R) \rightarrow H^0(A|S, F) \rightarrow H^0(R|S, F) \rightarrow H^1(A|R, F_R) \rightarrow \cdots.$$

Corollaires 3.8–3.9. Si A et B sont Tor-indépendantes jusqu'au degré n , alors

$$H^i(A \otimes_R B|R, F) \simeq H^i(A|R, F) \oplus H^i(B|R, F), \quad i \leq n.$$

Le diagramme de scindage est

$$\begin{array}{ccc} H^i(A \otimes_R B|A, F_A) & \longrightarrow & H^i(A \otimes_R B|R, F) \\ \sim \downarrow & & \\ H^i(B|R, F_A) & \longrightarrow & H^i(B|R, F). \end{array}$$

La localisation par une partie multiplicative $S \subset A$ commute avec ces groupes, sous l'hypothèse d'additivité correspondante.

Pour un A -module M , on pose

$$D^i(A|R, M) = H^i(A|R, \text{Der}_R(-, M)).$$

Si $P \twoheadrightarrow A$ est polynomiale de noyau I , alors

$$D^1(A|R, M) = \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)),$$

$$D^2(A|R, M) = H^1(A|R, \mathcal{H}^1(\text{Der}_R(-, M))).$$

En choisissant un module libre $F \twoheadrightarrow I$ et le complexe de Koszul $K_\bullet$, on obtient aussi

$$D^2(A|R, M) = \text{Coker}(H^1(K_\bullet, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_\bullet), M)).$$

Théorème 3.12. Les groupes D^i possèdent une longue suite exacte en la variable M , une suite exacte de transitivité pour $S \rightarrow R \rightarrow A$, sont compatibles au changement de base Tor-indépendant, à la localisation, aux produits tensoriels Tor-indépendants, au tensorisation par un module plat, et sont de type fini lorsque R est noethérien, A essentiellement de type fini et M fini. Les formules basses sont

$$D^0(A|R, M) = \text{Der}_R(A, M),$$

$$D^1(A|R, M) = \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)) = \text{Exalcomm}(A|R, M),$$

$$D^2(A|R, M) = \text{Coker}(H^1(K_\bullet, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_\bullet), M)).$$

L'interprétation de D^1 en extensions d'algèbres est donnée par le push-out

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A \longrightarrow 0. \end{array}$$

Corollaire 3.13. Une R -algèbre A est formellement lisse si et seulement si $D^1(A|R, M) = 0$ pour tout M . Si R est noethérien et A de type fini, A est intersection complète relative si et seulement si $D^2(A|R, M) = 0$ pour tout M . La localisation commute à D^i . Enfin, si A est locale, essentiellement de type fini, et $\hat{A}$ sa complétion, alors

$$D^i(\hat{A}|R, \hat{A} \otimes_A E) \simeq \hat{A} \otimes_A D^i(A|R, E)$$

pour tout A -module fini E . La preuve finale utilise Artin–Rees et le diagramme exact

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \hat{E} & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \hat{E} & \longrightarrow & \hat{B} & \longrightarrow & \hat{A} \longrightarrow 0. \end{array}$$

Relevé des formules et diagrammes des pages 71–96

Ce relevé rassemble les affichages non textuels de la tranche, afin que le lecteur puisse les comparer directement au scan source.

$$\begin{array}{ccc} A(S') \times_{A(S)} A(S') & \longrightarrow & A(S') \times A(k[\text{Ker } f]) \\ \downarrow & & \downarrow \\ B(S') \times_{B(S)} B(S') & \longrightarrow & B(S') \times B(k[\text{Ker } f]) \end{array} \quad S' \times_S S' \simeq S' \times_k k[\text{Ker } f].$$

$$\begin{aligned} [A(k[\varepsilon])] &= \text{Coker}(\text{Hom}(R_1, k[\varepsilon]) \rightarrow \text{Hom}(R_0, k[\varepsilon])), \\ \text{Aut}_A(1_{k[\varepsilon]}) &= \text{Ker}(\text{Hom}(R_1, k[\varepsilon]) \rightarrow \text{Hom}(R_0, k[\varepsilon])). \end{aligned}$$

Pour les automorphismes :

$$R_0 \otimes_{\Lambda} R_0 \rightarrow R_1 \rightarrow R_0 \rightarrow k, \quad \overline{R}_1 = R_1 / (s_1(r) - s_2(r))_{r \in R_0},$$

avec représentants $\overline{R}_1$ et $k \widehat{\otimes}_{R_0} \overline{R}_1$.

Sur le site $\mathcal{C}_{A|R}$, le module de Cech associé à $B' \rightarrow B$ est

$$F(B') \rightrightarrows F(B' \times_B B') \rightrightarrows F(B' \times_B B' \times_B B') \rightrightarrows \cdots.$$

Les préfaisceaux dérivés sont

$$\mathcal{H}_{A|R}^q(F)(B) = \varinjlim_{\{B' \rightarrow B\} \in \text{Cov}(B)} H^q(\{B' \rightarrow B\}, F),$$

et

$$H^p(A|R, \mathcal{H}_{A|R}^q(F)) \Rightarrow H^{p+q}(A|R, F).$$

La suite exacte de transitivité est

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow H^0(A|R, F_R) \rightarrow H^0(A|S, F) \rightarrow H^0(R|S, F) \rightarrow H^1(A|R, F_R) \rightarrow H^1(A|S, F) \rightarrow H^1(R|S, F) \\ \rightarrow \cdots \rightarrow H^n(A|R, F_R) \rightarrow H^n(A|S, F) \rightarrow H^n(R|S, F) \rightarrow H^{n+1}(A|R, F_R) \rightarrow \cdots. \end{aligned}$$

Les comparaisons principales sont

$$\mathcal{H}^i(A \otimes_R S|S, F) \simeq \mathcal{H}^i(A|R, SF), \quad H^i(A \otimes_R B|R, F) \simeq H^i(A|R, F) \oplus H^i(B|R, F),$$

la seconde provenant du carré

$$\begin{array}{ccc} H^i(A \otimes_R B|A, F_A) & \longrightarrow & H^i(A \otimes_R B|R, F) \\ \sim \downarrow & & \\ H^i(B|R, F_A) & \longrightarrow & H^i(B|R, F). \end{array}$$

Pour $P \twoheadrightarrow A$, $I = \text{Ker}(P \rightarrow A)$, et $F \twoheadrightarrow I$ libre :

$$\begin{aligned} D^1(A|R, M) &= \text{Coker}(\text{Der}_R(P, M) \rightarrow \text{Hom}_A(I/I^2, M)), \\ D^2(A|R, M) &= \text{Coker}(H^1(K_{\bullet}, M) \rightarrow \text{Hom}_A(H_1(K_{\bullet}), M)). \end{aligned}$$

Le calcul des extensions utilise

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & P & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A \longrightarrow 0. \end{array}$$

La comparaison de complétion finale est

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \widehat{E} & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{E} & \longrightarrow & \widehat{B} & \longrightarrow & \widehat{A} \longrightarrow 0. \end{array}$$