

数书九章

Mathematical Treatise in Nine Sections

كِتَابُ التَّسْعِ فُصُولٍ فِي الْعُلُومِ الرَّيَاضِيَّةِ

قَيْن جِيُوشَاو 秦九韶 القرن الثاني عشر الميلادي

Fascicle I – 大衍類

الجزء الأول: فصل الطريقة الكبرى

大衍求一术、大衍总数术及九问

طريقة استخراج الوحدة، وطريقة جمع الأعداد الكبرى، والتسعة مسائل

By Qin Jiushao (秦九韶) لقين جِيُوشَاو

c. 1202–1261 CE 1202 1261 م حوالي عام

Presented in the 7th year of Chunyou (淳祐七年), 1247 CE

مقدمة في السنة السابعة من عهد شونيو، 1247 ميلادية

Chinese → Arabic Bilingual Translation Edition

طبعة ثنائية اللغة: الصينية والعربية

One of the greatest masterpieces of Chinese mathematics, containing the general Chinese Remainder Theorem (Dayan method), numerical solutions of polynomial equations, surveying problems, and commercial and financial mathematics.

من أعظم مؤلفات الرياضيات الصينية، يتضمن مبرهنة البواقي الصينية العامة [الطريقة الكبرى]

Typeset in L^AT_EX with XeTeX

Chinese Font: Noto Sans CJK SC • Arabic Font: Noto Naskh Arabic

Contents

1 Introduction

序说

The Shuxue Jiuzhang (数书九章, Mathematical Treatise in Nine Sections) is the magnum opus of the Song dynasty mathematician Qin Jiushao (秦九韶, c. 1202–1261). Completed in 1247 CE during the Chunyou era (淳祐七年), it stands as one of the greatest achievements in the history of Chinese mathematics and of world mathematics.

The work is organized into nine categories (类), each containing nine problems (问), for a total of eighty-one problems. The nine categories are:

1. **Dayan** (大衍) – The Great Derivation
2. **Tianshi** (天 时) – Astronomical phenomena
3. **Tianyu** (田域) – Land measurement
4. **Cewang** (测望) – Surveying
5. **Fuyi** (赋役) – Taxation
6. **Qian' gu** (钱谷) – Currency and grain
7. **Yingjian** (营建) – Construction
8. **Junlv** (军旅) – Military affairs
9. **Shiyi** (市易) – Market transactions

المقدمة

يُعَدُّ كِتَابُ 数書九章 شَوْ جُو جَانِغْ 秦九韶 的 最 大 成 就。 該 書 完 成 於 淳 祐 七 年 (1247 年)， 是 中 國 歷 史 上 最 大 的 數 學 著 作 之 一， 也 是 世 界 數 學 史 上 的 偉 大 成 就。 該 書 共 有 九 類 九 十 一 問， 每 類 九 問， 共 八 十 一 問。 九 類 是： 大 衍、 天 時、 田 域、 測 望、 賦 役、 錢 谷、 營 建、 軍 旅、 市 易。

يُنْقَسِمُ الْعَمَلُ إِلَى تِسْعِ فُصُولٍ 類， كُلُّ فَصْلٍ يَحْتَوِي عَلَى تِسْعِ مَسَائِلٍ 問، لِيَصِلَ الْمَجْمُوعُ إِلَى وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ مَسْأَلَةً. التَّسْعَةُ الْأَقْسَامُ هِيَ:

1. الطَّرِيقَةُ الْكُبْرَى 大衍 的 方 法
2. الظَّوَاهِرُ الْفَلَائِكِيَّةُ 天 時
3. قِيَاسُ الْأَرْضِ 田 域
4. الْمِسَاحَةُ وَالرُّصْدُ 測 望
5. الصَّرَائِبُ وَالْخِدْمَاتُ 賦 役
6. الْعُمَلَاتُ وَالْحُبُوبُ 錢 谷

hang again.

The nine problems of the Dayan category are:

1. 蓍卦发微 – Divination by Yarrow Stalks
2. 古历会积 – Ancient Calendar Accumulation
3. 推计土功 – Estimating Earthworks
4. 推库额钱 – Calculating Treasury Funds
5. 分粟推原 – Grain Distribution
6. 程行计地 – Journey Distance Calculation
7. 程行相及 – Catching Up on a Journey
8. 积尺寻源 – Finding Dimensions from Volume
9. 余米推数 – Calculating Rice Remainders

عَدَدُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى خَمْسُونَ، وَالْمَسْتَحْدَمُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ. إِقْسِمُهَا نِصْفَيْنِ لِثَمَثِلِ الْاِثْنَيْنِ، وَعَلَّقْ وَاجِدًا لِثَمَثِلِ الثَّلَاثَةِ، وَإِعْذُ بِأَرْبَعَةٍ لِثَمَثِلِ الْفُضُولِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَرْجِعِ الْبَاقِي لِثَمَثِلِ الشَّهْرِ الْكَبِيرِ. لِأَنَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ سِنَيْنِ شَهْرَيْنِ كَبِيرَيْنِ.

التَّسْعُ مَسَائِلُ فَضْلِ الطَّرِيقَةِ الْكُبْرَى هِيَ:

1. 〔微发卦蓍〕 كَشْفُ أَسْرَارِ الْكَشْفِ بِعِيدَانِ الْأَرِيكَةِ
2. 〔积会历古〕 تَرَاكُمُ التَّقْوِيمِ الْقَدِيمِ
3. 〔功土计推〕 تَقْدِيرُ أَعْمَالِ التَّرَابِ
4. 〔钱额库推〕 حِسَابُ أَمْوَالِ الْخَزِينَةِ
5. 〔原推粟分〕 تَوْزِيعُ الْحُبُوبِ
6. 〔地计行程〕 حِسَابُ مَسَافَةِ الرِّحْلَةِ
7. 〔及相行程〕 التَّقَابُلُ فِي الرِّحْلَةِ
8. 〔源寻尺积〕 اسْتِثْقَاءُ الْمَقَادِيرِ مِنَ الْحُجْمِ
9. 〔数推米余〕 تَعْيِينُ كَمِّيَّةِ الْأُرْزِّ الْبَاقِيَةِ

2 Preface (序)

序

Classical Chinese Preface by Qin Jiushao
(1247 CE)

周教六艺，数实成之。学士大夫所从事尚矣。其用本太虚生一，而周流无穷。大则可以通神明、顺性命，小则可以经世务、类万物，讵容以浅近窥哉？

若昔推策以迎日，定律而和气。髀距濬川，土圭度晷。天地之大，圉焉而不能外，况其间总总者乎？爰自河图洛书，闾发幽秘；八卦九畴，错综精微。极而至于大衍、皇极之用，而人事之变无不该，鬼神之情莫能隐矣。圣人神之言而遗其粗，常人昧之由而莫之觉。要其归，则数与道非二本也。

汉去古未远，有张苍、许商、马延年、耿寿昌、郑玄、张衡、刘洪之伦，或明天道而法传于后，或计功策而效验于时。后世学者自高鄙不之讲，此学殆绝。惟治历畴人能为乘除，而弗通于开方衍变。若官府会事，则府史一二累之，算家位置素所不识，上之人亦委而听焉。持算者惟若人，则鄙之也宜矣。

呜呼！乐有制氏，仅记铿锵之声，而谓与天地同和者止于是，可乎？今数术之书尚三十余家。天象历度谓之缀术，太乙壬甲谓之三式，皆曰内算，言其秘也。九章所载及周官九数，系于方圆者为专术，皆曰外算，对内而言也。其用相通，不可歧二。独大衍法不载九章，未有能推之者。历家演法颇用之，以为方程者，误也。

且天下之事多矣。古之人先事而计，计定而行。仰观俯察，人谋鬼谋，无所不用其谨，是以不愆于成。载籍章章可覆也。后世兴事造始，鲜能考度，悠悠乎天纪人事之殽缺矣，可不求其故哉？

九韶愚陋，不闲于艺。然早岁侍亲中都，因得访习于太史，又尝从隐君子受数学。时际兵难，历岁遥塞，不自意全于矢石之间。更险离忧，荏苒十稔，心槁气落。信知夫物莫不有数也，乃肆意其间，旁諏方能，探索杳眇，粗若有得焉。所谓通神明、顺性命，固肤末于见。若其小者，窃尝设为问答，以拟于用。积多而惜其弃，因取八十一题，厘为九类，立术具草，间以图发之。恐或可备博学多识君子之余观，曲艺可遂也，愿进之于道。傥曰艺成而下，是惟畴人府史流也，乌足尽天下之用，亦无瞽焉。

时淳祐七年九月，鲁郡秦九韶叙。

المقدمة

بقلم قين جيوشاو عام 1247 ميلادية

إنَّ عُلُومَ الْأُمَّةِ السَّتِّ فِي التَّعْلِيمِ الزَّمَكْشَفِي قَدْ أَكْمَلَتْهَا الرِّيَاضَةُ. وَقَدْ اِسْتَعْلَ بِهَا طُلَّابُ الْعِلْمِ وَالْعُظَمَاءُ مِنْذُ زَمَانٍ بَعِيدٍ. أَصْلُهَا: اللَّاشِيءُ يُنْشِئُ الْوَاحِدَ، فَتَدْوُرُ فِي مَجَالٍ لَا يَنْتَهِي. فِي الْكُبْرَى تَصِلُ إِلَى فَهْمِ الْأَلْهَةِ وَطَاعَةِ الْمَصِيرِ، وَفِي الصَّغَرَى تُدَبِّرُ شُؤُونَ الدُّنْيَا وَتُصَنَّفُ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ. فَكَيْفَ يُمَكِّنُ اِسْتِيعَابُهَا بِنَظَرَةٍ صَحْلَةٍ؟ فِي الْمَاضِي، كَانُوا يَسْتَحْدِمُونَ الْعِصْيَ لِاسْتِقْبَالِ الشَّمْسِ، وَيَضَعُونَ

3 The Nine Categories in Verse (九类赋)

九类赋

昆仑旁薄，道本虚一。圣有大衍，微寓于《易》。奇余取策，群数皆捐。衍而究之，探隐之原。

述大衍第一

数术之传，以实为体。其书九章，惟兹弗纪。历家虽用，用而不知。小试经世，姑推所为。

七精回穹，人事之纪。追缀而求，宵星昼晷。历久则疏，惟智能革。不寻天道，模袭何益。

述天时第二

魁隗粒民，甄度四海。苍姬井之，仁政攸在。代远庶蕃，垦菑日广。步度庀赋，版图是掌。方圆异状，表窳殊形。专术精微，孰究其真。差之毫厘，谬乃千里。公私共弊，盍谨其籍。

述田域第三

莫高匪山，莫濬匪川。神禹奠之，积矩攸传。智创巧述，重差夕桀。求之既详，揆之罔越。崇深广远，度则靡容。形格势禁，寇垒仇壙。欲知其数，先望以表。因差施术，坐悉微渺。

述测望第四

邦国之赋，以待百事。畦田经入，取之有度。未免力役，先商厥功。以衰以率，逸乃同功。汉犹近古，租税以算。调均钱谷，何菑之捍。惟仁隐民，犹己溺饥。赋役不均，宁得勿思。

述赋役第五

物等斂赋，式时府庾。粒粟寸丝，褐夫红女。商征边采，后世多端。立缘为欺，上下俱殫。我闻理财，如智治水。澄源濬流，惟其深矣。彼昧弗察，急于烦刑。去理益远，吁嗟不仁。

述钱谷第六

斯城斯池，乃栋乃宇。宅坐寄命，以保以聚。鸠功雉制，竹个本章。匪究匪度，财蠹力伤。围蔡而裁，如子西素。匠计露台，俾汉文惧。惟武图功，惟俭昭德。有国有家，兹焉取则。

述营建第七

天生五材，兵去未可。不教而战，维上之过。堂堂之阵，鹅鹳为行。营应规矩，其将莫当。师中之吉，惟智仁勇。夜算军书，先计攸重。我闻在昔，轻则寡谋。殄民以幸，亦孔之忧。

述军旅第八

日中而市，万民所资。贾贸埶鬻，利析铢铢。蹠财役贫，封君低首。豕未兼并，非国之厚。

述市易第九

مَقَالُ التَّسْعَةِ الْأَقْسَامِ

جِبَالُ كُونْلُونِ الشَّامِخَةِ، وَأَصْلُ الطَّرِيقِ هُوَ الْفَرَاغُ الْوَاحِدُ. أَتَى الْأَقْدَمُونَ بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى، فَتَجَلَّتْ فِي كِتَابِ التَّغْيِيرَاتِ. يَأْخُذُونَ الْعَصَا وَالْبَوَاقِي، فَتَنْصَرِفُ الْجُمْهُورَةُ. لِنَفَحَصِهَا وَتَبَحَثَ عَنْ أَصْلِ الْخَفَاءِ.

فَصُلِّ الطَّرِيقَةُ الْعُظْمَى □□ الْأَوَّلُ

تَنْقُلُ الرِّيَاضَةُ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ، وَجِسْمُهَا الْحَقِيقَةُ. كِتَابُ الْأَقْسَامِ التَّسْعَةِ لَمْ يَذْكُرْهَا. أَهْلُ التَّقَاوِيمِ اسْتَخْدَمُوهَا دُونَ فَهْمِهَا. لِنَجْرِبَ فِي إِدَارَةِ الدُّنْيَا وَنَسْتَنْبِطُ مَا يَنْبَغِي.

سَبْعَةُ كَوَاكِبَ تَدُورُ فِي الْفَضَاءِ، وَهِيَ قَاعِدَةُ شُؤْنِ الْبَشَرِ. تَتَّبِعُهَا
لَيْلًا وَنَهَارًا. مَرَّ الزَّمَانُ فَصَارَتْ غَيْرَ دَقِيقَةٍ، وَالْحِكْمَةُ وَحْدَهَا تُجَدِّدُهَا.

فَصُلِّ الْأَحْوَالِ السَّمَاوِيَّةِ □□ الثَّانِي

فَصُلِّ قِيَاسِ الْأَرْضِ □□ الثَّلَاثُ

فَصُلِّ الرُّصْدِ وَالْمَسَاحَةِ □□ الرَّابِعُ

فَصُلِّ الصَّرَائِبِ وَالْخِدْمَاتِ □□ الْخَامِسُ

فَصُلِّ الْعُمَّالِ وَالْحُبُوبِ □□ السَّادِسُ

فَصُلِّ الْبِنَاءِ □□ السَّابِعُ

فَصُلِّ الشُّؤْنِ الْعَسْكَرِيَّةِ □□ الثَّامِنُ

فَصُلِّ مُعَامَلَاتِ السُّوقِ □□ الثَّاسِعُ

2. 收数 收数 谓尾位见分厘者。假令冬至三百六十五日二十五刻，欲与甲子六十日为一会而求积日之类。

3. 通数 通数 谓诸数各有分子分母者。本门问一会积年是也。

4. 复数 复数 谓尾位见十或百及千以上者。本门筑堤并急足之类是也。

قَالَتْ طَرِيقَةُ جَمْعِ الْأَعْدَادِ الْعُظْمَى: صَغَ جَمِيعَ أَعْدَادِ الْمَسَائِلِ، وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَسْمَاءٍ.

1. 元数 元数 وهي التي يظهر في نهايتها صفرٌ واحدٌ. مثل أَعْدَادِ عِيدَانِ الْأَرْبَكَةِ، وَقَوَائِدِ الْخَمْرِ، وَكَيْلِ الْخُبُوبِ، وَتَرْصِيبِ الطُّوبِ، وَالْأَرْزُ الْمَفْقُودِ. وَهِيَ الْأَعْدَادُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَيْسَ لَهَا جُزْءٌ كَسْرِيٌّ.

2. 收数 收数 وهي التي يظهر في نهايتها أجزاء من عُشْرَةٍ أو من مِئَةٍ. مثل الدَّوَامَةِ الشَّتَائِيَّةِ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَخَمْسَةِ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَخَمْسَ وَعِشْرُونَ دَقِيقَةً. يُحَوَّلُ الْجُزْءُ الْكَسْرِيُّ إِلَى أَعْدَادٍ صَحِيحَةٍ بِإِيجَادِ مَقَامٍ مُشْتَرَكٍ.

3. 通数 通数 وهي الأَعْدَادُ الَّتِي لِكُلِّ مِنْهَا بَسْطٌ وَمَقَامٌ. يُضَارَعُ الْبَسْطُ فِي الْمَقَامِ لِيُعْطِيَ أَعْدَادًا صَحِيحَةً بِمَقَامٍ مُشْتَرَكٍ.

4. 复数 复数 وهي التي تنتهي بِعَشْرَاتٍ أو مِائَاتٍ أو أُلُوفٍ. تَحْتَاجُ إِلَى تَخْفِيزٍ خَاصٍّ لِاسْتِزْجَاعِ الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ.

4.3 Finding the Definitive Numbers (求定数)

استخراج الأعداد المُثَبَّتَةِ

元数者：先以两两连环求等，约奇弗约偶。或约得五而彼有十，乃约偶弗约奇。或元数俱偶，约毕可存一位见偶。或皆约而犹有类数存，姑置之，俟与其他约遍而后乃与姑置者求等约之。或诸数皆不可尽类，则以诸元数命曰定数，以复数格入之。

收数者：乃命尾位分厘作单零，以进所问之数，定位讫，用元数格入之。或如意立数为母，收进分厘以从所问，用通数格入之。

通数者：置问数通分纳子，互乘之，皆曰通数。求总等，不约一位，约众位，得各原法数，用元数格入之。或诸母数繁，就分从省通之者，皆不用元，各母仍求总等，存一位约众位，亦各得原法数，亦用元法数格入之。

复数者：问数尾位见十以上者，以诸数求总等，存一位约众位，始得元数。两两连环求等，约奇弗约偶，复乘偶；或约偶弗约奇，弗乘奇。

أَمَّا الْأَعْدَادُ الْأَصْلِيَّةُ: أَوَّلًا طَلَبَ الْمُشْتَرَكِ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ ثَنَائِيًّا، فَتَحَقَّقُ الْفَرْدِيَّةَ لَا الزَّوْجِيَّةَ. إِنْ حُقِّصَتْ إِلَى خَمْسَةٍ وَكَانَتْ هُنَاكَ عَشْرَةٌ، فَحَقَّقُ الزَّوْجِيَّ لَا الْفَرْدِيَّ. إِنْ كَانَتْ الْأَعْدَادُ الْأَصْلِيَّةُ كُلُّهَا زَوْجِيَّةً، فَبَعْدَ التَّخْفِيفِ يُمَكِّنُ الْإِبْقَاءَ عَلَى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ زَوْجِيٍّ. وَأَمَّا أَعْدَادُ الْجَمْعِ: فَأَمُرُ نَهَايَةَ الْأَجْزَاءِ مِنَ الْعَشْرَةِ أَوْ الْمِئَةِ أَنْ تُجْعَلَ صَفْرًا وَاحِدًا، فَيَتَقَدَّمُ عَدَدُ الْمَسْأَلَةِ. وَأَمَّا أَعْدَادُ الْعَبُورِ: ضَعُ أَعْدَادَ الْمَسَائِلِ فَأَجْرِ عَلَيْهَا عَمَلِيَّةَ جَمْعِ الْبَسْطِ فِي الْمَقَامِ، ثُمَّ اضْرِبْهَا بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، فَكُلُّهَا تُسَمَّى أَعْدَادَ الْعَبُورِ. وَأَمَّا أَعْدَادُ الْإِعَادَةِ: فَالْمَسَائِلُ الَّتِي تَنْتَهِي بِعَشْرَاتٍ فَصَاعِدًا، نَطْلُبُ الْمُشْتَرَكَ الْأَعْظَمَ لِجَمِيعِ الْأَعْدَادِ، فَنُبْقِي مَوْضِعًا وَاحِدًا وَنُخَفِّضُ الْبَاقِي، فَتُحْصَلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ.

4.4 Computing the Derivative Numbers (求衍数、奇数、乘率、用数)

استخراج الأعداد المشتقة والفرديات ومعدلات الضرب والأعداد المستخدمة

求定数勿使两位见偶，勿使见一太多。见一多则借用繁，不欲借则任得一。

以定相乘为衍母，以各定约衍母，得各衍数。或列各定数于右行，各立天元一为子于左行，以母互乘子，亦得衍数。

次以各定母满去衍数，各余名曰奇数。

用大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求数。

فِي اسْتِخْرَاجِ الْأَعْدَادِ الْمُثَبَّتَةِ: لَا تُجْعَلُ مَوْضِعَيْنِ زَوْجِيَّيْنِ، وَلَا تُجْعَلُ الْوَاحِدَ كَثِيرًا. فَإِنْ كَثُرَتِ الْوَاحِدُ تَعَقَّدَتِ الْعَمَلِيَّةُ. يُضْرَبُ الْمُثَبَّتُ فِي بَعْضِهِ لِيُعْطِيَ الْجَذْرَ الْمُشْتَرَكَ [母衍]. ثُمَّ يُقَسَّمُ كُلُّ مُثَبَّتٍ عَلَى الْجَذْرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَكُونُ الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ. أَوْ: ضَعُ الْمُثَبَّتَاتِ فِي الصَّفِّ الْأَيْمَنِ، وَضَعُ الْوَاحِدِ السَّمَاوِيِّ فِي الصَّفِّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ اضْرِبِ الْبَسَاطَ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ فَتَكُونُ الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ. ثُمَّ ثَمَلًا كُلُّ مُثَبَّتَاتٍ مِنَ الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ، فَيَتَبَقَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ عَدَدٌ يُسَمَّى الْعَدَدَ الْفَرْدِيَّ [数奇].

Chinese → Arabic Translation Edition

المباشِر. طَرِيقَتُهَا: صَعَّ الْعَدَدَ الْفَرْدِيَّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنَ، وَالْمُثَبَّتَ فِي
 الْأَسْفَلَ الْأَيْمَنَ، وَالْوَاحِدَ السَّمَاوِيَّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرَ.
 أَقْسِمَ الْأَعْلَى الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَسْفَلَ الْأَيْمَنَ فَتَحْصُلُ عَلَى نَاتِجِ الْقِسْمَةِ.
 إِضْرَبْ نَاتِجَ الْقِسْمَةِ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرَ فَتَدْخُلْ فِي الْأَسْفَلَ الْأَيْسَرَ. ثُمَّ
 إِقْسِمِ الْبَاقِيَ الْأَعْلَى الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَسْفَلَ الْأَيْمَنَ، فَيَكُونُ نَاتِجُ الْقِسْمَةِ،
 فَتَضْرِبُهُ فِي الْأَسْفَلَ الْأَيْسَرَ فَتَدْخُلْ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرَ. وَهَكَذَا تَتَعَاقَبُ
 الْقِسَمَاتُ عَلَى الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ، وَالضَّرْبُ عَلَى الْأَيْمَنَ وَالْأَيْسَرَ، حَتَّى
 يَكُونَ الْبَاقِي فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنَ وَاحِدًا.
 فَمَا يُحْصَلُ عَلَيْهِ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرَ هُوَ مُعَدَّلُ الضَّرْبِ. إِنْ كَانَ كَبِيرًا
 جِدًّا فَأَزِلْ الْمُثَبَّتَ مِنْهُ، فَمَا لَمْ يُمَلَأْ هُوَ مُعَدَّلُ الضَّرْبِ الصَّحِيحُ.
 هَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ طَرِيقَةُ الْكُسُورِ الْمُتَّصِلَةِ لِإِيجَادِ
 الْكُسُورِ الْمُتَقَرَّبَةِ، أَيْ أَنَّهَا تَغْمِيمٌ لِعَمَلِيَّةِ اقْتِسَامِ أَقْلِيدُسَ الْمُتَبَادِلِ. إِنَّ
 مَا يُسَمَّى فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ بِخَوَارِزْمِيَّةِ أَقْلِيدُسَ الْمُمَدَّدَةِ، أَصْلُهَا فِي
 الْحَقِيقَةِ مِنْ هُنَا. إِنَّ قَيْنَ جِيُوشَاوَ قَدْ اكْتَشَفَهَا بِنَفْسِهِ دُونَ مُعَلِّمٍ، فَيُمْكِنُ
 أَنْ تُوصَفَ بِأَنَّهَا إِلَهِيَّةٌ.

5 Problem 1: Shigua Fawei (蓍卦发微)

المَسْأَلَةُ الْأُولَى: كَشَفُ أَسْرَارِ الْكَشْفِ بِعِيدَانِ الْأَرِيكَةِ

問曰:

《易》曰：大衍之数五十，其用四十有九。又曰：分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。三变而成爻，十有八变而成卦。欲知所衍之术及其数各几何？

〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇: 〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇, 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
 〇〇〇〇. 〇〇 〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇: 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇, 〇〇〇〇〇〇, 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇
 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇.

المَسْأَلَةُ:

يَقُولُ كِتَابُ التَّغْيِيرَاتِ: 〇〇 عَدَدُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى خَمْسُونَ،
وَالْمُسْتَخْدَمُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ. 〇〇 وَيَقُولُ أَيْضًا: 〇〇 أَقْسِمُ الْعَدَدُ
نِصْفَيْنِ لِثَمَثِلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَعَلَّقَ وَاحِدًا لِثَمَثِلِ الثَّلَاثَةِ 〇 السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَالْإِنْسَانِ، وَاعْدُدْ بِأَرْبَعَةٍ لِثَمَثِلِ الْفُضُولِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَرْجِعْ
الْبَاقِي لِثَمَثِلِ الشَّهْرِ الْكَبِيرِ. 〇 ثَلَاثُ تَغْيِيرَاتٍ تُنْتِجُ خَطًا، وَتَمَانِي
عَشْرَةَ تَغْيِيرَةً تُنْتِجُ شَكْلًا سِدَاسِيًّا.
الْمَطْلُوبُ: مَا هِيَ طَرِيقَةُ الْحِسَابِ وَعَدَدُ كُلِّ وَاحِدٍ؟

答曰:

衍母十二，衍法三。

一元衍数二十四，二元衍数一十二，三元衍数八，四元衍数六。以上四位衍数，计五十一。

一揲用数一十二，二揲用数二十四，三揲用数四，四揲用数九。以上四位用数，计四十九。

الجواب:

الْجَذْرُ الْمُشْتَرَكُ 〇 母衍 〇 هُوَ اثْنَا عَشَرَ، وَقَاعِدَةُ الْإِشْتِقَاقِ ثَلَاثَةٌ.
عَدَدُ الْوَحْدَةِ الْأُولَى الْمُشْتَقَّةِ 24، وَعَدَدُ الْوَحْدَةِ الثَّانِيَةِ الْمُشْتَقَّةِ 12،
وَعَدَدُ الْوَحْدَةِ الثَّالِثَةِ الْمُشْتَقَّةِ 8، وَعَدَدُ الْوَحْدَةِ الرَّابِعَةِ الْمُشْتَقَّةِ 6.
مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَعْدَادٍ مُشْتَقَّةٍ هُوَ 51.
عَدَدُ الْإِسْتِخْدَامِ لِلْقِسْمَةِ الْأُولَى: 12، وَلِلثَّانِيَةِ: 24، وَلِلثَّالِثَةِ: 4،
وَلِلرَّابِعَةِ: 9. مَجْمُوعُ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَعْدَادٍ اسْتِخْدَامٍ هُوَ 49.
هَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: 〇〇 عَدَدُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى خَمْسُونَ،
وَالْمُسْتَخْدَمُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ. 〇〇

術曰:

置诸元数，两两连环求等，约奇弗约偶。遍约毕，乃变元数皆曰定母，列右行。各立天元一为子，列左行。以诸定母互乘左行之子，各得名曰衍数。

次以各定母满去衍数，各余名曰奇数。以奇数与定母用大衍术求一，得各乘率。以乘衍数，各得用数。

验次所揲余几何，以其余数乘诸用数，并之，名曰总数。满衍母去之，不满为所求数。以为实，易以三才为衍法，以法除实所得为象数。如实有余，或一或二，皆命作一，同为象数。

其象数得一为老阳，得二为少阴，得三为少阳，得四为老阴。得老阳画重爻，得少阴画拆爻，得少阳画单爻，得老阴画交爻。凡六画乃成卦。

الطريقة:

صَغِ جَمِيعَ الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ، وَاطْلُبِ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ ثَنَائِيًّا، فَحَقِّضِ الْفَرْدِيَّ لَا الرَّوْجِيَّ. إِذَا انْتَهَى التَّخْفِيفُ، فَحَوِّلِ الْأَعْدَادَ الْأَصْلِيَّةَ كُلَّهَا إِلَى أَعْدَادٍ مُثَبَّتَةٍ [母定] فِي الصَّفِّ الْأَيْمَنِ. أَقِمِ الْوَاحِدَ السَّمَائِيَّ فَرْدًا فِي الصَّفِّ الْأَيْسَرِ. ثُمَّ اضْرِبِ الْمُثَبَّتَاتِ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فِي أَبْنَاءِ الصَّفِّ الْأَيْسَرِ، فَيُسَمَّى كُلُّ مِنْهَا عَدَدًا مُشْتَقًّا [数衍].

ثُمَّ أزلْ كُلَّ مُثَبَّتٍ مِنْ عَدِيدِهِ الْمُشْتَقِّ، فَيَتَبَقَّى لِكُلِّ عَدَدٍ يُسَمَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيَّ [数奇]. بِالْعَدَدِ الْفَرْدِيَّ وَالْمُثَبَّتِ، ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لاسْتِخْرَاجِ الْوَاحِدَةِ، فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الصَّرْبِ. اضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَحْصُلْ عَلَى أَعْدَادٍ اسْتِخْدَامِ.

ثُمَّ صَغِ كُلَّ الْبَوَاقِي فَأَضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ، فَتَجْمَعُ فَتُسَمَّى جُمْلَةً. أزلِ الْجَذْرَ الْمُشْتَرَكَ مِنْهَا، فَمَا يَتَبَقَّى هُوَ الْمَطْلُوبُ.

عَدَدُ الصُّورَةِ: إِذَا حَصَلَتْ عَلَى الْوَاحِدِ فَهُوَ الْيَنَانِيُّ الْأَكْبَرُ [阳老]، وَالْإِثْنَانِ هِيَ الْيَنَانِيَّةُ الْأَصْغَرُ [阴少]، وَالثَلَاثَةُ هُوَ الْيَنَانِيُّ الْأَصْغَرُ [少]، وَالْأَرْبَعَةُ هِيَ الْيَنَانِيَّةُ الْأَكْبَرُ [阴老]. سِتَّةُ خُطُوطٍ تُكَوِّنُ شَكْلًا سِدَاسِيًّا.

6 Problem 2: Guli Huiji (古历会积)

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ: تَرَكَمُ التَّقْوِيمِ الْقَدِيمِ

問曰:

问古历会积，欲求积年。以历法积元为问，历过无考，但据近世演纪之法，推而上之。

假令治历演纪，上元甲子岁天正冬至十一月甲子日夜半，日月合璧，五星联珠，适为元会。欲求上元积年，其法以岁实、朔策、六十甲子、回归年、交点年诸周期，各以所余分秒推之。今设问数如后：

置岁实三百六十五日二十四刻二十五分（即 365.2425 日），朔策二十九日五十三刻六分（即 29.53059 日），甲子周期六十日，欲求积年之元会。

المَسْأَلَةُ:

المَسْأَلَةُ فِي تَرَكَمُ التَّقْوِيمِ الْقَدِيمِ، نُرِيدُ إِيجَادَ السَّنِينَ الْمُتَرَكَمَةِ. نَأْخُذُ تَرَكَمَ الدَّوَرَاتِ التَّقْوِيمِيَّةِ كَمَسْأَلَةٍ، وَالتَّقْوِيمُ السَّابِقُ لَيْسَ مَحْفُوظًا، لَكِنَّا نَسْتَنْبِطُهُ بِنَاءً عَلَى أُسْلُوبِ الْعُصُورِ الْحَدِيثَةِ.

لِنَفْرَضِ أَنَّ نُعَدَ التَّقْوِيمَ، فَإِنَّ لَحْظَةَ الْبِدَايَةِ [上元] فِي سَنَةِ جَا تَزْ [甲子] هِيَ لَحْظَةُ انْقِلَابِ الشِّتَاءِ فِي شَهْرِ تَشْرِينَ الثَّانِي [تَشْرِينَ الثَّانِي] عِنْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، حِينَ يَتَحَدَّدُ الْقَمَرُ وَالشَّمْسُ، وَيَتَصَافُ الْكَوَاكِبُ الْخَمْسَةُ، وَهَذِهِ هِيَ اللَّحْظَةُ الْبِدَايَةُ.

نُرِيدُ إِيجَادَ السَّنِينَ الْمُتَرَكَمَةِ مِنَ الْبِدَايَةِ. الطَّرِيقَةُ: بِالسَّنَةِ الشَّمْسِيَّةِ، وَشَهْرِ الْقَمَرِ، وَدَوْرَةِ السَّنِينَ جَا تَزْ، وَالسَّنَةِ الْإِسْتَوَائِيَّةِ، وَسَنَةِ التَّقَاطُعِ.

نَضَعُ السَّنَةَ الشَّمْسِيَّةَ: 365 يَوْمًا وَ2425 جُزْءًا [أي 365.2425 يَوْمًا]، وَشَهْرَ الْقَمَرِ: 29 يَوْمًا وَ53059 جُزْءًا [أي 29.53059 يَوْمًا]، وَدَوْرَةَ جَا تَزْ: 60 يَوْمًا. نُرِيدُ إِيجَادَ تَرَكَمِ السَّنِينَ.

答曰:

答曰：积年九千一百六十四万二千三百七十七年。

上元距治历之年（淳祐七年，1247 年），积年若干，以历元法推之，得所求积年。

الجواب:

الجَوَابُ: السَّنُونَ الْمُتَرَكَمَةُ هِيَ 91,642,377 سَنَةً.

الْمُدَّةُ مِنَ لَحْظَةِ الْبِدَايَةِ إِلَى سَنَةِ إِعْدَادِ التَّقْوِيمِ [السَّنَةِ السَّابِقَةِ] مِنَ عَهْدِ شُونْيُو، 1247 م [تُحَسَّبُ بِطَرِيقَةِ مِيلَادِ التَّقْوِيمِ] فَتَحْصُلُ عَلَى السَّنِينَ الْمُتَرَكَمَةِ.

术曰:

术曰：以大衍求之。置元历相关诸周期，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满足母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求积年。

الطريقة:

الطَّرِيقَةُ: طَلَبَهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. صَعَّ دَوَرَاتِ التَّقْوِيمِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَصْلِ، وَاطْلُبَ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَحَقَّقِ الْفَرْدِيَّ لَا الرُّوْجِيَّ، فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُتَبَتَّةِ. إِضْرِبِ الْمُتَبَتَّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ

المُشْتَرَك.

قَسَمَ كُلُّ مُتَبَّعٍ عَلَى الْجَذْرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَكُونُ الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ. أَزَلَّ
كُلُّ مُتَبَّعٍ مِنْ عَدْدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَى الْعَدَدُ الْفَرِيدِي. أُدْخِلَ فِي طَرِيقَةِ
الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لَاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلُ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ.
إِضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادَ اسْتِخْدَامِ.

ثُمَّ صَغِ الْبَوَاقِي فَأُضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتَصْبِحَ
جُمْلَةً. أَزَلَّ الْجَذَرَ الْمُشْتَرَكِ، فَمَا يَتَبَقَى هُوَ السَّنُونُ الْمُتَرَكَمَةُ الْمَطْلُوبَةُ.

7 Problem 3: Tuiji Tugong (推计土功)

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: تَقْدِيرُ أَعْمَالِ الثَّرَابِ

問曰:

問：四县（甲、乙、丙、丁）共同筑堤，根据各县的物力分配筑堤任务。

- 甲县物力：138,600 贯
- 乙县物力：146,300 贯
- 丙县物力：192,500 贯
- 丁县物力：184,800 贯

筑堤标准：每 770 贯物力分配一名劳动力，每人每天筑堤 60 平方尺。

进度情况：甲县和乙县已完成任务，丙县剩余 51 丈，丁县剩余 18 丈。

又知四县所筑堤段，皆取土方于近处。甲县取土处距堤 120 步，乙县 80 步，丙县 60 步，丁县 40 步。每夫日运土 90 尺，行 60 步。

欲求堤的总长度以及各县所筑长度各几何？

المَسْأَلَةُ:

المَسْأَلَةُ: أَرْبَعُ مَدِينٍ [ألف، بَاء، جِيم، دَال] تَبْنِي سَدًا مَشْتَرَكًا، وَتَوَزَّعَ الْمَهَامُ حَسَبَ الْمَوَادِّ الْمَادِّيَةِ لِكُلِّ مَدِينَةٍ.

- مَوَادُّ مَدِينَةِ أَلِف: 138,600 سِلْسِلَةً
- مَوَادُّ مَدِينَةِ بَاء: 146,300 سِلْسِلَةً
- مَوَادُّ مَدِينَةِ جِيم: 192,500 سِلْسِلَةً
- مَوَادُّ مَدِينَةِ دَال: 184,800 سِلْسِلَةً

مُعْيَارُ بِنَاءِ السَّدِّ: كُلُّ 770 سِلْسِلَةٍ مِنَ الْمَوَادِّ تُخَصَّصُ لِعَامِلٍ وَاحِدٍ، وَكُلُّ عَامِلٍ يَبْنِي 60 قَدَمًا مَرَبَعَةً يَوْمِيًّا.

حَالَةُ التَّقَدُّمِ: أَكْمَلَتْ مَدِينَتَا أَلِف وَبَاء مِهْمَتَهُمَا، وَبَقِيَث لِمَدِينَةِ جِيم 51 ذِرَاعًا، وَلِمَدِينَةِ دَال 18 ذِرَاعًا.

وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ كُلَّ الْمُدْنِ تَأْخُذُ الثَّرَابَ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ: مَدِينَةُ أَلِف عَلَى بُعْدِ 120 خُطْوَةٍ، وَبَاء 80 خُطْوَةٍ، وَجِيم 60 خُطْوَةٍ، وَدَال 40 خُطْوَةٍ. كُلُّ عَامِلٍ يَنْقُلُ 90 قَدَمًا يَوْمِيًّا عَلَى بُعْدِ 60 خُطْوَةٍ.

الْمَطْلُوبُ: مَا هُوَ الطُّوْلُ الْإِجْمَالِيُّ لِلْسَّدِّ وَطُولُ كُلِّ مَدِينَةٍ؟

答曰:

答曰：堤的总长度为 19 里 235 步 5 尺。

各县所筑长度：

- 甲县：7 里 280 步（计 1,260 丈）
- 乙县：5 里 120 步 5 尺 6 寸
- 丙县：4 里 328 步 5 尺 6 寸
- 丁县：与前三县相应，合总 19 里 235 步 5 尺

الجواب:

الجَوَابُ: الطُّولُ الإِجْمَالِيُّ لِلسَّدِّ هُوَ 19 لِيٍّ وَ235 خُطْوَةً وَ5 أَقْدَامَ طُولُ كُلِّ مَدِينَةٍ:

- مَدِينَةُ أَلِفٍ: 7 لِيٍّ وَ280 خُطْوَةً [أي 1,260 ذِرَاعًا]
- مَدِينَةُ بَاءٍ: 5 أَلْيَانٍ وَ120 خُطْوَةً وَ5 أَقْدَامَ وَ6 أَنْمَاطٍ
- مَدِينَةُ جِيمٍ: 4 أَلْيَانٍ وَ328 خُطْوَةً وَ5 أَقْدَامَ وَ6 أَنْمَاطٍ
- مَدِينَةُ دَالٍ: ثُنَايُسُ الثَّلَاثِ الْمُدُنِ الْأُخْرَى، وَالْمَجْمُوعُ 19 لِيًّا وَ235 خُطْوَةً وَ5 أَقْدَامَ

术曰:

术曰：以大衍求之。置各县物力，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各县余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求堤长。

الطريقة:

الطَّرِيقَةُ: طَلِبْهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. ضَعْ مَوَادَّ كُلِّ مَدِينَةٍ، وَاطْلُبِ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَخَفِّضِ الْفَرْدِيَّ لَا الرُّوْجِيَّ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُتَبَتِّةِ. إِصْرِبِ الْمُتَبَتِّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكُ. قَسِّمْ كُلَّ مُتَبَتِّ عَلَى الْجَذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ. أَزِلْ كُلَّ مُتَبَتِّ مِنْ عَدَدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيُّ. أَدْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الصَّرْبِ. إِصْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادُ اسْتِخْدَامِ. ثُمَّ ضَعْ بَوَاقِي كُلِّ مَدِينَةٍ فَأَصْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَاجْمَعْهَا فَتُصْبِحْ جُمْلَةً. أَزِلْ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكُ، فَمَا يَتَبَقَّى هُوَ طُولُ السَّدِّ الْمَطْلُوبِ.

8 Problem 4: Tuiku E Qian (推库额钱)

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: حِسَابُ أَمْوَالِ الْخَزِينَةِ

问曰:

问有外邑七库，日纳息足钱适等，递年成贯整纳。近缘见钱希少，听各库照当处市陌准解旧会。

其甲库有零钱一十文，丁、庚二库各零四文，戊库零六文，余库无零钱。甲库所在市陌一十二文，递减一文至庚库而止。

欲求诸库日息原纳足钱、展省及今纳旧会，并大小月分各几何？

المَسْأَلَةُ:

المَسْأَلَةُ فِي سَبْعِ خَزَائِنَ فِي مَدِينٍ خَارِجِيَّةٍ، كُلُّهَا تَجْمَعُ قَوَائِدَ يَوْمِيَّةً بِالْعُمْلَةِ الْكَامِلَةِ بِنَفْسِ الْمِقْدَارِ. فِي السَّنِينَ الْمُتَعاقِبَةِ تُدْفَعُ مِنْ غَيْرِ كَسْرِ. وَلِأَنَّ الْعُمْلَةَ الْمُتَدَاوِلَةَ قَلِيلَةٌ حَالِيًا، فَأُذِنَ لِكُلِّ خَزِينَةٍ أَنْ تُبَدَّلَ عُمَلَتُهَا حَسَبَ سِعْرِ السُّوقِ الْمَحَلِّيِّ.

خَزِينَةُ أَلْفٍ لَهَا فُلُوسٌ مُتَبَقِّيَّةٌ عَشْرَةٌ، وَخَزِينَتَا دَالٍ وَجِيمٍ لِكُلِّ مِئْتَيْهِمَا أَرْبَعَةٌ، وَخَزِينَةُ وَאוּ سِتَّةٌ، وَالْبَاقِي لَا يَتَبَقَّى لَهَا شَيْءٌ. سِعْرُ السُّوقِ فِي مَوْضِعِ خَزِينَةِ أَلْفٍ اثْنَا عَشَرَ نَصْفًا، يَنْقُصُ نَصْفًا وَاحِدًا حَتَّى خَزِينَةِ جِيمٍ. الْمَطْلُوبُ: مَا هُوَ الْمِقْدَارُ الْأَصْلِيُّ لِلْقَوَائِدِ الْيَوْمِيَّةِ، وَالْمَحَوَّلِ، وَمَا يُدْفَعُ الْيَوْمَ مِنَ الْأَوْرَاقِ الْقَدِيمَةِ؟

答曰:

答曰：诸库纳日息足钱二十贯九百五十文。

展省三十五贯文。

各库旧会：

- 甲库日息旧会：二百二十四贯五百一十文
- 乙库日息旧会：二百四十五贯文
- 丙库日息旧会：二百六十九贯五百文
- 丁库日息旧会：二百九十九贯四百四十文
- 戊库日息旧会：三百三十六贯七百五十文
- 己库日息旧会：三百八十五贯文
- 庚库日息旧会：四百四十九贯一百文

الجواب:

الجَوَابُ: قَوَائِدُ كُلِّ الْخَزَائِنِ الْيَوْمِيَّةِ بِالْعُمْلَةِ الْكَامِلَةِ هِيَ 20 سِلْسِلَةً وَ950 نَصْفًا.

المَحَوَّلُ: 35 سِلْسِلَةً.

أَوْرَاقُ كُلِّ خَزِينَةِ الْقَدِيمَةِ:

- خَزِينَةُ أَلْفٍ: 224 سِلْسِلَةً وَ510 نَصْفًا
- خَزِينَةُ بَاءٍ: 245 سِلْسِلَةً
- خَزِينَةُ جِيمٍ: 269 سِلْسِلَةً وَ500 نَصْفًا
- خَزِينَةُ دَالٍ: 299 سِلْسِلَةً وَ440 نَصْفًا
- خَزِينَةُ وَאוּ: 336 سِلْسِلَةً وَ750 نَصْفًا

- خَزِينَةُ هَاءٍ: 385 سِلْسِلَةً
- خَزِينَةُ جِيمٍ: 449 سِلْسِلَةً وَ 100 نُصْفًا

9 Problem 5: Fentiao Tuiyuan (分棗推原)

المَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: تَوَزِيعُ الْحُبُوبِ

問曰:

有兄弟三人，各将收获之米送往不同的地方：

- 甲将米送往官场棗卖，用官斛量之，余 3 斗 2 升
- 乙将米送往安吉乡棗卖，用安吉斛量之，余 7 斗
- 丙将米送往平江棗卖，用平江斛量之，余 3 斗

官斛每石八斗三升，安吉斛每石一石一斗，平江斛每石一石三斗五升。三人各不知米数，但知其共余之数。欲求三人共收获米数以及各自分米数几何？

المَسْأَلَةُ:

هَنَّاكَ ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ، كُلٌّ مِنْهُمْ يُرْسِلُ أَرْزَهُ الْمَحْصُودَ إِلَى مَكَانٍ مُخْتَلِفٍ:

- يُرْسِلُ أَلْفٌ أَرْزَهُ إِلَى السُّوقِ الرَّسْمِيِّ لِبَيْعِهِ، فَإِذَا قِيسَ بِالْكَيْلِ الرَّسْمِيِّ يَتَبَقَّى 3 أَرْطَالٍ وَ 2 لِثَرَيْنِ
- يُرْسِلُ بَاءٌ أَرْزَهُ إِلَى سُوْقٍ أُخْرَى لِبَيْعِهِ، فَإِذَا قِيسَ بِكَيْلِ أُخْرَى يَتَبَقَّى 7 أَرْطَالٍ
- يُرْسِلُ جِيمٌ أَرْزَهُ إِلَى سُوْقٍ بِنَجْيَانِجٍ لِبَيْعِهِ، فَإِذَا قِيسَ بِكَيْلِ بِنَجْيَانِجٍ يَتَبَقَّى 3 أَرْطَالٍ

الْكَيْلُ الرَّسْمِيُّ لِكُلِّ شِيكَارٍ 8 أَرْطَالٍ وَ 3 لِثَرَاتٍ، وَكَيْلُ أُخْرَى لِكُلِّ شِيكَارٍ 11 أَرْطَالًا، وَكَيْلُ بِنَجْيَانِجٍ لِكُلِّ شِيكَارٍ 13 أَرْطَالًا وَ 5 لِثَرَاتٍ. كُلُّ مَنْ الثَّلَاثَةِ لَا يَعْرِفُ كَمِّيَّةَ أَرْزِهِ، لَكِنَّهُ يَعْرِفُ الْبَاقِي. الْمَطْلُوبُ: كَمِّيَّةُ الْأَرْزِ الْمَحْصُودَةِ الْمُشْتَرَكَةِ وَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ؟

答曰:

答曰：三人共收获米 738 石。

各分米数：

- 甲：296 石，棗去 295 石余 3 斗 2 升
- 乙：223 石，棗去 222 石余 7 斗
- 丙：182 石，棗去 181 石余 3 斗

分米总数为 738 石。以三人各分之，各得 246 石为本分。以各斛量之，余数不同，乃以分米棗之，余数如题。

الجواب:

الجَوَابُ: مَجْمُوعُ الْأَرْزِ الْمَحْصُودِ 738 شِيكَارًا.

نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ:

- أَلْفٌ: 296 شِيكَارًا، بَاعَ 295 شِيكَارًا وَبَقِيَ 3 أَرْطَالٌ وَ 2 لِثَرَانِ
- بَاءٌ: 223 شِيكَارًا، بَاعَ 222 شِيكَارًا وَبَقِيَ 7 أَرْطَالٍ

جيم: 182 شيكارًا، باع 181 شيكارًا وَبَقِيَ 3 أَرْطَالُ •

مَجْمُوعُ الْأَرْزِ الْمَقْسَمِ هُوَ 738 شيكارًا. إِذَا افْتَسَمَهَا الثَّلَاثَةُ، فَكُلُّ مِنْهُمْ يَحْصُلُ عَلَى 246 شيكارًا كَتَصِيبِ أَصْلِيٍّ.

术曰:

术曰：以大衍求之。置各斛率（单位：升）：官斛 83 升，安吉斛 110 升，平江斛 135 升。连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求分米率数。以三人因之，得共米数。

الطريقة:

الطَّرِيقَةُ: طَلَبُهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. ضَعْ مَعَايِيرَ كُلِّ كَيْلٍ [بِوَحْدَةِ اللَّثَرِ]: الْكَيْلُ الرَّسْمِيُّ 83 لِثْرًا، وَكَيْلُ أَنْجِي 110 لِثْرًا، وَكَيْلُ بَنْجِيَانِج 135 لِثْرًا. اِطْلُبِ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَخَفِّضِ الْفَرْدِيَّ لَا الرُّوْجِيَّ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُثَبَّتَةِ. اضْرِبِ الْمُثَبَّتَاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكُ.

قَسِّمْ كُلَّ مُثَبَّتٍ عَلَى الْجَذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ. أزلْ كُلَّ مُثَبَّتٍ مِنْ عَدَدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيَّ. ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ. اضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادُ اسْتِخْدَامِ.

ثُمَّ ضَعِ الْبَوَاقِي فَأَضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتُصْبِحَ جُمْلَةً. أزلْ الْجَذَرَ الْمُشْتَرَكَ، فَمَا يَتَبَقَّى هُوَ عَدَدُ تَقْسِيمِ الْأَرْزِ الْمَطْلُوبِ. اضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَرْزِ.

10 Problem 6: Chengxing Jidi (程行计地)

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: حِسَابُ مَسَافَةِ الرُّحَلَةِ

问曰:

军师派遣三名急足（甲、乙、丙）分别前往都下报捷。

- 甲每天行 300 里
- 乙每天行 240 里
- 丙每天行 180 里

甲提前数日申未到，乙后数日未正到，丙今日辰未到。

欲知从军前到都下的距离以及三人各自行走的天数几何？

المسألة:

يُرْسِلُ الْقَائِدُ الْعَسْكَرِيُّ ثَلَاثَةَ سُعَاةٍ [] أَلْفَ، بَاءَ، جِيمَ [] إِلَى الْعَاصِمَةِ
لِنَشْرِ أَخْبَارِ النَّصْرِ.

- أَلْفٌ يَمْشِي 300 لِيًّا يَوْمِيًّا
- بَاءٌ يَمْشِي 240 لِيًّا يَوْمِيًّا
- جِيمٌ يَمْشِي 180 لِيًّا يَوْمِيًّا

أَلْفٌ وَصَلَ قَبْلَ بَضْعَةِ أَيَّامٍ، وَبَاءٌ وَصَلَ بَعْدَهُ بِأَيَّامٍ، وَجِيمٌ وَصَلَ الْيَوْمَ.
الْمَطْلُوبُ: مَا هِيَ الْمَسَافَةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ، وَكَمْ يَوْمًا مَشَى
كُلُّ وَاحِدٍ؟

答曰:

答曰：从军前到都下的距离为 3,300 里。

- 甲行 11 天
- 乙行 13 天 4 时（乙于未正到，后于甲 2 日 4 时）
- 丙行 18 天 2 时（丙于辰未到，后于甲 7 日 2 时）

الجواب:

الجواب: الْمَسَافَةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ هِيَ 3,300 لِيًّا.

- أَلْفٌ سَارَ 11 يَوْمًا
- بَاءٌ سَارَ 13 يَوْمًا وَ 4 سَاعَاتٍ [] وَصَلَ بَعْدَ أَلْفٍ بِثَمَانِيْنَ وَ 4 سَاعَاتٍ []
- جِيمٌ سَارَ 18 يَوْمًا وَ سَاعَتَيْنِ [] وَصَلَ بَعْدَ أَلْفٍ بِ 7 أَيَّامٍ وَ سَاعَتَيْنِ []

术曰:

术曰：以大衍求之。置三人日行里数，连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍

求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数（时差所当之里数）乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求距离。

الطريقة:

الطريقة: طَلَبَهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. صَغَ مَا يَمْشِيهِ الثَّلَاثَةُ يَوْمِيًا مِنْ
الْأَيَّانِ، وَأَطْلَبَ الْمُشْتَرَكِ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَحَقَّقُضَ الْفَرْدِيَّ لَا الرُّوْجِيَّ
فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُتَبَتَّةِ.

إِضْرَبِ الْمُتَبَتَّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكِ. قَسِّمْ كُلَّ مُتَبَّتٍ
عَلَى الْجَذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ. أَزِلْ كُلَّ مُتَبَّتٍ مِنْ
عَدْدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيُّ. أَدْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى
لَا سِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلُ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ. إِضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ
الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادَ اسْتِخْدَامِ.

ثُمَّ صَغَ الْبَوَاقِي [الَّتِي تُسَاوِي الْأَيَّانِ الْفَرْقِ الزَّمَانِيَّ] فَأَضْرِبْهَا فِي
أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتُصْبِحُ جُمْلَةً. أَزِلْ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكِ، فَمَا
يَتَبَقَّى هُوَ الْمَسَافَةُ الْمَطْلُوبَةُ.

11 Problem 7: Chengxing Xiangji (程行相及)

المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: التَّقَابُلُ فِي الرِّحْلَةِ

问曰:

问：甲、乙、丙三人同行赴都。甲日行 80 里，乙日行 70 里，丙日行 60 里。甲先至某驿，留停若干日，然后复行；乙后甲一日而发，丙又后乙一日而发。甲留停之日，恰等于乙丙后发之日数。三人适同时至都。

欲求军前至都之总里数，及甲留停之日数、乙丙后发之日数各几何？又三人各行之日数及所过驿数各几何？

المَسْأَلَةُ:

المَسْأَلَةُ: أَلْفَ وَبَاءَ وَجِيمٍ يُسَافِرُونَ مَعًا إِلَى الْعَاصِمَةِ. أَلْفٌ يَمْشِي 80 لِيًا يَوْمِيًّا، وَبَاءٌ يَمْشِي 70 لِيًا يَوْمِيًّا، وَجِيمٌ يَمْشِي 60 لِيًا يَوْمِيًّا. يَصِلُ أَلْفٌ أَوَّلًا إِلَى مَحْطَةٍ مَا، فَيَتَوَقَّفُ أَيَّامًا، ثُمَّ يَسْتَأْذِنُ. يَنْطَلِقُ بَاءٌ بَعْدَ أَلْفٍ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، وَجِيمٌ يَنْطَلِقُ بَعْدَ بَاءٍ بِيَوْمٍ. أَيَّامُ تَوَقُّفِ أَلْفٍ تُسَاوِي عَدَدَ أَيَّامِ تَأَخُّرِ بَاءٍ وَجِيمٍ. يَصِلُ الثَّلَاثَةُ إِلَى الْعَاصِمَةِ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ. الْمَطْلُوبُ: الْمَسَافَةُ الْإِجْمَالِيَّةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ، وَعَدَدُ أَيَّامِ تَوَقُّفِ أَلْفٍ، وَعَدَدُ أَيَّامِ تَأَخُّرِ بَاءٍ وَجِيمٍ. وَكَمْ يَوْمًا سَارَ كُلُّ وَاحِدٍ؟

答曰:

答曰：军前至都之总里数为 8,400 里。

甲留停之日数为 2 日，乙后发 1 日，丙后发 2

日。

三人各行之日数：

- 甲行 105 日，留停 2 日，共 107 日
- 乙行 120 日，共 120 日
- 丙行 140 日，共 140 日

الجواب:

الجَوَابُ: الْمَسَافَةُ الْإِجْمَالِيَّةُ مِنَ الْجَيْشِ إِلَى الْعَاصِمَةِ هِيَ 8,400 لِيًا. عَدَدُ أَيَّامِ تَوَقُّفِ أَلْفٍ يَوْمَانِ، وَبَاءٌ تَأَخَّرَ يَوْمًا وَاحِدًا، وَجِيمٌ تَأَخَّرَ يَوْمَيْنِ.

أَيَّامُ سَيْرِ كُلِّ وَاحِدٍ:

- أَلْفٌ سَارَ 105 أَيَّامًا، وَتَوَقَّفَ يَوْمَيْنِ، وَالْمَجْمُوعُ 107 أَيَّامًا
- بَاءٌ سَارَ 120 يَوْمًا، وَالْمَجْمُوعُ 120 يَوْمًا
- جِيمٌ سَارَ 140 يَوْمًا، وَالْمَجْمُوعُ 140 يَوْمًا

12 Problem 8: Jichi Xunyuan (积尺寻源)

المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: إِسْتِقْصَاءُ الْمَقَادِيرِ مِنَ الْحُجْمِ

问曰:

问欲砌基一段，见管大小方砖六门城砖四色。
令匠取便，或平或侧，只用一色砖砌，须要适足。
匠以砖量地计料，称用：

- 大方：广多六寸，深少六寸
- 小方：广多二寸，深少三寸
- 城砖：长广多三寸，深少一寸
- 六门砖：长广多三寸，深多一寸

皆不合匝，未免修破砖料裨补。其四色砖尺寸：

- 大方：方一尺三寸
- 小方：方一尺一寸
- 城砖：长一尺二寸，阔六寸，厚二寸五分
- 六门砖：长一尺，阔五寸，厚二寸

欲知基深广几何？

المَسْأَلَةُ:

يُرِيدُ أَحَدُنَا بِنَاءَ قَاعِدَةٍ، وَلَدَيْهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ مِنَ الطُّوبِ: طُوبٌ كَبِيرٌ مُرَبَّعٌ، وَطُوبٌ صَغِيرٌ مُرَبَّعٌ، وَطُوبٌ سُورٍ الْمَدِينَةِ ذُو سِتَّةِ أَبْوَابٍ، وَطُوبٌ أَرْبَعَةِ أَلْوَانٍ. يَأْمُرُ الْبِنَاءُ أَنْ يَسْتُخْدِمَ نَوْعًا وَاحِدًا مِنَ الطُّوبِ فَقَطْ، إِمَّا مُسَطَّحًا أَوْ عَلَى جَانِبِهِ، لِيَكُونَ كُلُّ شَيْءٍ مُنَاسِبًا. حِسَابَاتُ الْبِنَاءِ:

- الطُّوبُ الْكَبِيرُ: الْعَرْضُ يَزِيدُ 6 أَنْصَافًا، وَالْعُمُقُ يَنْقُصُ 6 أَنْصَافًا
- الطُّوبُ الصَّغِيرُ: الْعَرْضُ يَزِيدُ 2 أَنْصَافًا، وَالْعُمُقُ يَنْقُصُ 3 أَنْصَافًا
- طُوبُ السُّورِ: الطُّولُ وَالْعَرْضُ يَزِيدَانِ 3 أَنْصَافًا، وَالْعُمُقُ يَنْقُصُ نَمَطًا
- طُوبُ الْأَبْوَابِ: الطُّولُ وَالْعَرْضُ يَزِيدَانِ 3 أَنْصَافًا، وَالْعُمُقُ يَزِيدُ نَمَطًا

لَمْ يَكُنْ أَيُّ مِنْهَا مُنَاسِبًا، فَاخْتِجَ إِلَى كَسْرِ بَعْضِ الطُّوبِ لِلتَّعْدِيلِ.
أَبْعَادُ أَنْوَاعِ الطُّوبِ الْأَرْبَعَةِ:

- الطُّوبُ الْكَبِيرُ: مُرَبَّعٌ 13 نَمَطًا
- الطُّوبُ الصَّغِيرُ: مُرَبَّعٌ 11 نَمَطًا
- طُوبُ السُّورِ: طُولٌ 12 نَمَطًا، وَعَرْضٌ 6 أَنْصَافًا، وَسُمْكٌ 2.5 نَمَطًا
- طُوبُ الْأَبْوَابِ: طُولٌ 10 أَنْصَافًا، وَعَرْضٌ 5 أَنْصَافًا، وَسُمْكٌ 2 نَمَطَيْنِ

الْمَطْلُوبُ: مَا هُوَ عُمُقُ وَعَرْضُ الْقَاعِدَةِ؟

答曰:

答曰：深三丈七尺一寸，广一丈二尺三寸。
以四色砖量之皆合匝，无修破砖料之弊。

الجواب:

الجواب: العمق ثلاثة أَرْشِينَ وَسَبْعَةُ أَقْدَامٍ وَتَمَطُّ وَاحِدٌ [37.1] قَدَمًا []، وَالْعَرْضُ أَرْشَيْنِ وَقَدَمَانِ وَثَلَاثَةُ أَنْمَاطٍ [12.3] قَدَمًا [].
بِقِيَاسِ الْأَرْبَعَةِ أَنْوَاعِ الطُّوبِ كُلِّهَا مُنَاسِبَةً، وَلَيْسَ هُنَاكَ حَاجَةٌ لِكَسْرِ الطُّوبِ.

术曰:

术曰：以大衍求之。置四色砖尺寸及所余尺寸，
连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。
以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。
大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数（广多、深少之数）乘用数，并之
为总数。满衍母去之，不满为基之深广。

الطريقة:

الطريقة: طَلَبُهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. صَعَّ أُنْعَادَ أَنْوَاعِ الطُّوبِ
الْأَرْبَعَةِ وَالْبَوَاقِي، وَاطْلُبَ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَحَقَّقُصَ الْفَرْدِيَّ
لَا الزَّوْجِيَّ فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُتَبَتِّةِ.

إِضْرِبِ الْمُتَبَتِّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجُذُرُ الْمُشْتَرَكُ. قَسِّمْ كُلَّ مُتَبَّتٍ
عَلَى الْجُذُرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ. أَزِلْ كُلَّ مُتَبَّتٍ مِنْ
عَدَدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيَّ. ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى
لَا سِتْخَرَاكِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلُ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ.

ثُمَّ صَعَّ الْبَوَاقِي [] الزِّيَادَةَ فِي الْعَرْضِ، وَالثُّقْصَانِ فِي الْعُمُقِ []
فَأَضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتُصْبِحُ جُمْلَةً. أَزِلْ الْجُذُرَ
الْمُشْتَرَكِ، فَمَا يَتَبَقَّى هُوَ عُمُقٌ وَعَرْضٌ الْقَاعِدَةِ.

13 Problem 9: Yumi Tuishu (余米推数)

المَسْأَلَةُ الثَّاسِعَةُ: تَعْيِينُ كَمِّيَّةِ الْأُرْزِّ الْبَاقِيَّةِ

問曰:

問：有米不知总数，以三器量之，各余若干。今有米若干石，以甲器量之，每箩三石量之，余二石；以乙器量之，每箩五石量之，余三石；以丙器量之，每箩七石量之，余二石。

欲求米之总数几何？

المَسْأَلَةُ:

هُنَاكَ كَمِّيَّةُ أُرْزٍّ لَا نَعْرِفُ مَجْمُوعَهَا. نَقُومُ بِكَيْلِهَا بِثَلَاثَةِ مَكَايِيلَ، وَلِكُلِّ بَاقِيَّةٍ. نَأْخُذُ الْأُرْزَّ فَنَكِيلُهُ بِمَكْيَالِ أَلْفٍ: كُلُّ ثَلَاثَةِ أَشْكَارٍ يَبْقَى شِيكَارَانِ. وَبِمَكْيَالِ بَاءٍ: كُلُّ خَمْسَةِ أَشْكَارٍ يَبْقَى ثَلَاثَةٌ. وَبِمَكْيَالِ جِيمٍ: كُلُّ سَبْعَةِ أَشْكَارٍ يَبْقَى شِيكَارَانِ. الْمَطْلُوبُ: كَمِّيَّةُ الْأُرْزِّ الْإِجْمَالِيَّةِ؟

答曰:

答曰：米总数 23 石。

以三器量之：

- 每箩三石量之，余二石： $23 = 7 \times 3 + 2$
- 每箩五石量之，余三石： $23 = 4 \times 5 + 3$
- 每箩七石量之，余二石： $23 = 3 \times 7 + 2$

皆合题设之数。

الجواب:

الجواب: مَجْمُوعُ الْأُرْزِّ 23 شِيكَارًا.

بِالْكَيْلِ بِالثَّلَاثَةِ مَكَايِيلَ:

- $23 = 7 \times 3 + 2$ كُلُّ ثَلَاثَةِ أَشْكَارٍ نَكِيلُ فَيَبْقَى شِيكَارَانِ.
 - $23 = 4 \times 5 + 3$ كُلُّ خَمْسَةِ أَشْكَارٍ نَكِيلُ فَيَبْقَى ثَلَاثَةٌ.
 - $23 = 3 \times 7 + 2$ كُلُّ سَبْعَةِ أَشْكَارٍ نَكِيلُ فَيَبْقَى شِيكَارَانِ.
- كُلُّ ذَلِكَ يُطَابِقُ الْأَعْدَادَ الْمَطْلُوبَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ.

术曰:

术曰：以大衍求之。置各器容量为问数（元数）：三石、五石、七石。连环求等，约奇弗约偶，得定母。诸定相乘为衍母。以各定约衍母得衍数。各满定母去之，余为奇数。大衍求一入之，得乘率。以乘衍数为用数。

次置各余数乘用数，并之为总数。满衍母去之，不满为所求米数。

此问之数，即《孙子算经》所谓“物不知数”之问。秦氏大衍术能通其理而广其用，不特三、五、七，即百千万数亦可求之。

الطريقة:

الطَّرِيقَةُ: طَلَبُهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. صَعَّ سَعَةً كُلُّ مَكْيَالٍ كَعَدِّ الْمَسْأَلَةِ الْعَدْدُ الْأَصْلِيُّ: ثَلَاثَةُ أَشْكَارٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعَةٌ. إِطْلُبِ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَخَفِّضِ الْقَرْدِيَّ لَا الرَّوْجِيَّ فَتَحْصُلْ عَلَى

الأعداد المُنْبَتَّة. إضْرِبِ المُنْبَتَّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الجِذَرُ المَشْتَرَكُ.
 قَسِّمْ كُلَّ مُنْبَتٍّ عَلَى الجِذَرِ المَشْتَرَكِ فَتَحْصُلْ عَلَى الأَعْدَادِ المَشْتَقَّةِ.
 أزلْ كُلَّ مُنْبَتٍّ مِنْ عَدْدِهِ المَشْتَقِّ فَيَبْقَى العَدَدُ الفَرِيدِي. ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ
 الطَّرِيقَةِ العُظْمَى لاسْتِخْرَاجِ الوَحْدَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ.
 إضْرِبْهَا فِي الأَعْدَادِ المَشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادُ اسْتِخْدَامِ.
 ثُمَّ صُغِ البَوَاقِي فَأضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتُصْبِحْ
 جُمْلَةً. أزلِ الجِذَرَ المَشْتَرَكِ، فَمَا يَبْقَى هُوَ كَمِّيَّةُ الأَرَرِ المَطْلُوبَةُ.
 هَذِهِ المَسْأَلَةُ هِيَ نَفْسُهَا مَا يُسَمَّى فِي كِتَابِ 〓 〓 سُنْزِي سَوَانِ
 جِنْغِ 〓 〓 كِتَابِ حِسَابِ الجَدِّ 〓 〓 ب 〓 المَسْأَلَةُ الَّتِي لَا نَعْرِفُ فِيهَا عَدَدَ
 الأَجْسَامِ 〓 〓. إِنَّ طَرِيقَةَ قَيْنِ جِيُوشَاوِ العُظْمَى تَسْتَطِيعُ فَهَمَ مَبْدِئِهَا
 وَتَوْسِيعَ مَنَافِعِهَا، فَلَيْسَتْ مَحْصُورَةٌ فِي 3 وَ 5 وَ 7، بَلْ أَيْضًا مِائَاتِ الأَلْفِ
 وَالْأَرْقَامِ الكَبِيرَةِ يُمَكِّنُ إِيجَادَهَا.

Editorial Commentary on Problem 9

按：按余米推数之问，即《孙子算经》卷下第 26 问
 今有物不知其数 之问也。孙子设三、五、七
 为问，答以二十三，术曰：三三数之剩二，置一百
 四十；五五数之剩三，置六十三；七七数之剩二，
 置三十。并之得二百三十三，以二百一十减之即
 得。凡三三数之剩一，则置七十；五五数之剩一，
 则置二十一；七七数之剩一，则置十五。一百六以
 上，以一百五减之即得。

孙子之术，暗合大衍之理，然未能明言其立法
 之原。秦氏乃阐发其奥，著为大衍求一术、大衍总
 数术，使天下之物不知数者皆有定法可求。不特
 三、五、七，即元数之繁者、收数之细者、通数之
 分者、复数之巨者，皆可一以贯之。此秦氏之独造，
 非前人之所能及也。

其大衍求一术，置奇右上，定居右下，天元一
 于左上，递互除乘，使右上余一而止。此法与泰西
 之连分数法、扩展欧几里得算法本质相同，而秦氏
 早于西方数百年发之。可谓中国数学之瑰宝也。

تَغْلِيْقُ الْمُحَرَّرِ: مَسْأَلَةٌ تَعْيِينِ كَمِّيَّةِ الْأُرُرِّ الْبَاقِيَّةِ هِيَ نَفْسُ الْمَسْأَلَةِ رَقْمُ 26
 فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنْ كِتَابِ سُنْزِي سَوَانِ جَنْغٍ ۞ كِتَابِ حِسَابِ
 الْجَدِّ، الَّتِي تَنْصُ: ۞ لَدَيْنَا جِسْمٌ لَا نَعْرِفُ عَدَدَهُ ۞. وَضَعَ سُنْزِي
 الْأَرْقَامَ 3 وَ 5 وَ 7 كَمَسْأَلَةٍ، وَكَانَتْ الْإِجَابَةُ 23. وَقَالَتْ طَرِيقَتُهُ: إِذَا عُدَّ
 ثَلَاثًا ثَلَاثَةً وَبَقِيَ اثْنَانِ، فَضَعْ 140. وَإِذَا عُدَّ خَمْسًا خَمْسَةً وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ،
 فَضَعْ 63. وَإِذَا عُدَّ سَبْعَةً سَبْعَةً وَبَقِيَ اثْنَانِ، فَضَعْ 30. إِجْمَعُهَا فَتَكُونُ
 233، وَإِطْرَحْ مِنْهَا 210 فَتَحْصُلْ عَلَى الْمَطْلُوبِ.

طَرِيقَةُ سُنْزِي تُطَابِقُ مَبْدَأَ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى ضَمْنِيًّا، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ
 شَرْحَ أَصْلِ تَأْسِيسِهَا. فَقَبِلَ جِيُوشَاوُ هُوَ الَّذِي وَضَحَ أَسْرَارَهَا، وَأَلَّفَ
 مِنْهَا طَرِيقَةَ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى، وَطَرِيقَةَ جَمْعِ الْأَعْدَادِ
 الْكُلِّيَّةِ، حَتَّى صَارَتْ كُلُّ مَسَائِلِ ۞ الْأَجْسَامِ غَيْرِ الْمَعْلُومَةِ ۞ لَهَا طَرِيقَةُ
 مُحَدَّدَةٌ يُمَكِّنُ الْبَحْثَ بِهَا. وَلَيْسَتْ الْأَرْقَامُ 3 وَ 5 وَ 7 فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا
 الْأَعْدَادُ الْمُعَقَّدَةُ وَالْدَّقِيقَةُ وَالْكَسْرِيَّةُ وَالصَّخْمَةُ، جَمِيعُهَا يُمَكِّنُ جَلُّهَا.
 وَهَذَا إِخْتِرَاعٌ خَاصٌّ بِقَبِلَ جِيُوشَاوُ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ.

إِنَّ طَرِيقَتَهُ لَاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى: يُوضَعُ الْفَرْدِيُّ فِي
 الْأَعْلَى الْأَيْمَنِ، وَالْمُتَّبَثُ فِي الْأَسْفَلِ الْأَيْمَنِ، وَالْوَاحِدُ السَّمَائِيُّ فِي الْأَعْلَى
 الْأَيْسَرِ. ثُمَّ تَتَعَاقَبُ الْقِسَمَاتُ وَالضَّرَبَاتُ حَتَّى يَصِلَ الْبَاقِي فِي الْأَعْلَى
 الْأَيْمَنِ إِلَى الْوَاحِدِ. هَذِهِ الطَّرِيقَةُ فِي جَوَاهِرِهَا مُطَابِقَةٌ لَطَرِيقَةِ الْكُشُورِ
 الْمُتَّصِلَةِ فِي الْعَالَمِ الْغَرْبِيِّ وَخَوَارِزْمِيَّةِ أَفْلِيدَسِ الْمَمْدَدَةِ. وَقَدْ اكْتَشَفَهَا
 قَبِلَ جِيُوشَاوُ قَبْلَ الْغَرْبِ بِعُدَّةِ قُرُونٍ. فَهِيَ حَقًّا مِنْ جَوَاهِرِ الرِّيَاضِيَّاتِ
 الصِّينِيَّةِ.

14 Mathematical Analysis of the Dayan Method

التَحْلِيلُ الرَّيَاضِيُّ لِطَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى

14.1 The Chinese Remainder Theorem

مُبْزَهَنَةُ الْبَوَاقِي الصِّينِيَّةُ

نَحْنُ نَسْأَلُ عَنْ تَحْلِيلِ طَرِيقَةِ الْعُظْمَى فِي الْمَقَادِلَةِ التَّابَعِيَّةِ الْخَطِيَّةِ. فَإِذَا أُعْطِيََتْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْوَحْدَاتِ $m_1, m_2, \dots, m_n$ مُتَبَايِنَةٍ الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ وَبَوَاقِيهَا $r_1, r_2, \dots, r_n$ ، نَجِدُ N حَيْثُ:

$$N \equiv r_1 \pmod{m_1}$$

$$N \equiv r_2 \pmod{m_2}$$

$\vdots$

$$N \equiv r_n \pmod{m_n}$$

تَحْلُ طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى نِظَامَ الْمَعَادَلَاتِ التَّابَعِيَّةِ الْخَطِيَّةِ. فَإِذَا أُعْطِيََتْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْوَحْدَاتِ $m_1, m_2, \dots, m_n$ مُتَبَايِنَةٍ الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ وَبَوَاقِيهَا $r_1, r_2, \dots, r_n$ ، نَجِدُ N حَيْثُ:

$$N \equiv r_1 \pmod{m_1}$$

$$N \equiv r_2 \pmod{m_2}$$

$\vdots$

$$N \equiv r_n \pmod{m_n}$$

14.2 Qin Jiushao's Algorithm

خَوَازِمِيَّةُ قِيْنِ جِيُوشَاو

نَحْنُ نَسْأَلُ عَنْ تَحْلِيلِ طَرِيقَةِ الْعُظْمَى فِي الْمَقَادِلَةِ التَّابَعِيَّةِ الْخَطِيَّةِ. فَإِذَا أُعْطِيََتْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْوَحْدَاتِ $m_1, m_2, \dots, m_n$ مُتَبَايِنَةٍ الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ وَبَوَاقِيهَا $r_1, r_2, \dots, r_n$ ، نَجِدُ N حَيْثُ:

1: نَحْنُ نَسْأَلُ عَنْ تَحْلِيلِ طَرِيقَةِ الْعُظْمَى فِي الْمَقَادِلَةِ التَّابَعِيَّةِ الْخَطِيَّةِ. فَإِذَا أُعْطِيََتْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْوَحْدَاتِ $m_1, m_2, \dots, m_n$ مُتَبَايِنَةٍ الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ وَبَوَاقِيهَا $r_1, r_2, \dots, r_n$ ، نَجِدُ N حَيْثُ:

$$M = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n.$$

2: نَحْنُ نَسْأَلُ عَنْ تَحْلِيلِ طَرِيقَةِ الْعُظْمَى فِي الْمَقَادِلَةِ التَّابَعِيَّةِ الْخَطِيَّةِ. فَإِذَا أُعْطِيََتْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْوَحْدَاتِ $m_1, m_2, \dots, m_n$ مُتَبَايِنَةٍ الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ وَبَوَاقِيهَا $r_1, r_2, \dots, r_n$ ، نَجِدُ N حَيْثُ:

$$M_i = M / m_i \quad \text{وَمَا لَيْسَ بِهِ} \quad i.$$

3: نَحْنُ نَسْأَلُ عَنْ تَحْلِيلِ طَرِيقَةِ الْعُظْمَى فِي الْمَقَادِلَةِ التَّابَعِيَّةِ الْخَطِيَّةِ. فَإِذَا أُعْطِيََتْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْوَحْدَاتِ $m_1, m_2, \dots, m_n$ مُتَبَايِنَةٍ الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ وَبَوَاقِيهَا $r_1, r_2, \dots, r_n$ ، نَجِدُ N حَيْثُ:

$$g_i = M_i \bmod m_i.$$

4: نَحْنُ نَسْأَلُ عَنْ تَحْلِيلِ طَرِيقَةِ الْعُظْمَى فِي الْمَقَادِلَةِ التَّابَعِيَّةِ الْخَطِيَّةِ. فَإِذَا أُعْطِيََتْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْوَحْدَاتِ $m_1, m_2, \dots, m_n$ مُتَبَايِنَةٍ الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ وَبَوَاقِيهَا $r_1, r_2, \dots, r_n$ ، نَجِدُ N حَيْثُ:

$$k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

5: نَحْنُ نَسْأَلُ عَنْ تَحْلِيلِ طَرِيقَةِ الْعُظْمَى فِي الْمَقَادِلَةِ التَّابَعِيَّةِ الْخَطِيَّةِ. فَإِذَا أُعْطِيََتْ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الْوَحْدَاتِ $m_1, m_2, \dots, m_n$ مُتَبَايِنَةٍ الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ وَبَوَاقِيهَا $r_1, r_2, \dots, r_n$ ، نَجِدُ N حَيْثُ:

$$N \equiv r_1 \pmod{m_1}$$

$$N \equiv r_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$N \equiv r_n \pmod{m_n}$$

$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$
$$N = \sum_{i=1}^n r_i \cdot u_i \pmod{M}$$

1801

獨大衍法不載九章，未有能推之者。歷家演法頗用之，以為方程者，誤也。

獨大衍法不載九章，未有能推之者。歷家演法頗用之，以為方程者，誤也。

獨大衍法不載九章，未有能推之者。歷家演法頗用之，以為方程者，誤也。

سَبَقَتْ طَرِيقَةُ قَيْنِ جِيُوشَاوِ الْأَعْمَالِ الْأُورُوبِيَّةِ الْمَشَابِهَةَ بَعْدَهُ قُرُونٌ. إِنَّ خَوَارِزْمِيَّةَ إِيْجَادِ الْأَعْدَادِ الصَّدِّيَّةِ التَّمُودِجِيَّةِ 大衍求一術 هِيَ فِي جَوَاهِرِهَا خَوَارِزْمِيَّةُ أَفْلَيْدُسِ الْمُمَدَّدَةِ. وَقَدْ طُبِّقَتِ الطَّرِيقَةُ لَاجِقًا عَلَى يَدِ جُو شَوْشَنْجِ فِي عِلْمِ الْفَلَكِ، وَعَلَى يَدِ لِي يَه فِي عِلْمِ الْهِنْدَسَةِ، ثُمَّ نُقِلَتْ إِلَى أُورُوبَا حَيْثُ أَصْبَحَتْ مَعْرُوفَةً بِاسْمِ 二珠算 مَبْرَهَنَةِ الْبَوَاقِي الصِّينِيَّةِ.

أَعْطَى غَاوُسُ أَوَّلَ مُعَالَجَةٍ كَامِلَةٍ فِي أُورُوبَا فِي كِتَابِهِ 算學啟蒙 1801، وَسَمَّاها 二珠算 مَشْكِلَةً إِيْجَادِ عَدَدِ الَّذِي عِنْدَ قِسْمَتِهِ عَلَى أَعْدَادٍ مُعْطَاةٍ، يَثْرُكُ بَوَاقِي مُعْطَاةٍ. وَالْآنَ تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْمَبْرَهَنَةُ مِنَ النَّتَائِجِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي نَظَرِيَّةِ الْأَعْدَادِ.

وَحَدَّهَا طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لَمْ تُذَكَّرْ فِي كِتَابِ الْأَقْسَامِ التَّسْعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَطِيعُ اسْتِنْبَاطَهَا. أَهْلُ التَّقَاوِيمِ اسْتَحْدَمُوهَا كَثِيرًا فِي حِسَابَاتِهِمْ، لَكِنَّ مَنْ ظَنَّنَهَا مُعَادَلَاتٍ فَقَدْ أَخْطَأَ.

二珠算 قَيْنِ جِيُوشَاوِ، مُقَدِّمَةُ شَوْ شُو جُو جَانِغِ

About This Bilingual Edition

《九章算术》是中国古代数学的重要著作，其内容涵盖了算术、代数、几何、天文、历法等多个领域。本书旨在通过对比《九章算术》原文与现代数学知识，帮助读者理解中国古代数学的成就及其与现代数学的联系。本书采用中英对照的形式，方便读者查阅和对比。

本书在编排上，力求做到古今对照、中西合璧。在正文中，我们采用了“原文—译文—现代数学表述”的编排方式，以便读者在阅读原文的同时，也能了解其现代数学的含义。此外，我们还增加了大量的注释和附录，以进一步丰富读者的知识。

- 问：《九章算术》中关于“大衍类”的问题，其现代数学表述是什么？
- 答：《九章算术》中关于“大衍类”的问题，其现代数学表述是：求一个数，使其能被 9 整除，且其各位数字之和能被 9 整除。
- 术：《九章算术》中关于“大衍类”的术，其现代数学表述是：求一个数，使其能被 9 整除，且其各位数字之和能被 9 整除。
- 草：《九章算术》中关于“大衍类”的草，其现代数学表述是：求一个数，使其能被 9 整除，且其各位数字之和能被 9 整除。

《九章算术》中关于“大衍类”的问题，其现代数学表述是：求一个数，使其能被 9 整除，且其各位数字之和能被 9 整除。这个问题在现代数学中被称为“大衍类问题”，其求解方法在现代数学中被称为“大衍类术”。

《九章算术》中关于“大衍类”的术，其现代数学表述是：求一个数，使其能被 9 整除，且其各位数字之和能被 9 整除。这个问题在现代数学中被称为“大衍类问题”，其求解方法在现代数学中被称为“大衍类术”。

- 《大衍》 → الطَّرِيقَةُ الْكُبْرَى 大衍术
- 《求一术》 → طَرِيقَةُ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ 求一术
- 《定数》 → الْأَعْدَادُ الْمُثَبَّتَةُ 定数
- 《衍数》 → الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ 衍数
- 《衍母》 → الْجَذْرُ الْمُشْتَرَكُ 衍母
- 《奇数》 → الْأَعْدَادُ الْفَرْدِيَّةُ 奇数
- 《乘率》 → مُعَدَّلَاتُ الصَّرْبِ 乘率

- 用数 → أَعْدَادُ الإِسْتِخْدَامِ
- 问 → الْمَسْأَلَةُ
- 答 → الْجَوَابُ
- 术 → الطَّرِيقَةُ

四库全书
宜稼堂

تَقَدَّمَ هَذِهِ الطَّبَعَةُ الثَّنَائِيَّةُ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ شُو شُو جُو جَانِعِ
الْأَفْصَامِ التَّسَعَةِ فِي الْعُلُومِ الرَّيَاضِيَّةِ لِقَيْنِ جِيُوشَاو، وَهُوَ يُعْطِي
فَصْلَ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى 大衍类 مَعَ تِسْعِ مَسَائِلَ فِي مُبَرِّهَتِهِ الْبَوَاقِي
الصِّينِيَّةِ وَالتَّحْلِيلِ الْمُحَدَّدِ الْمَثَالِ.

هَذِهِ طَبَعَةُ ثَنَائِيَّةٌ وَجْهَةٌ بِوَجْهَةٍ: صِينِيَّةٌ وَعَرَبِيَّةٌ، تَحْفَظُ الْهَيْكَلَ
التَّقْلِيدِيَّ:

- الْمَسْأَلَةُ 问 نَصُّ الْمَسْأَلَةِ
- الْجَوَابُ 答 الإِجَابَةُ الرَّفْعِيَّةُ
- الطَّرِيقَةُ 术 الْأُسْلُوبُ الْعَامُّ
- الْعَمَلُ الْمُفَصَّلُ 草 الشَّرْحُ الْعَمَلِيُّ

الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ الشَّهِيرَةُ 余米推数 تَقَدَّمَ الْحَلَّ الْكَامِلَ لِمَسْأَلَةِ
الْعَدَدِ غَيْرِ الْمَعْلُومِ، الَّتِي ظَهَرَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فِي كِتَابِ سُنْزِي سُوَانِ
جِنَغٍ كِتَابِ جِسَابِ الْجَدِّ، حَوَالِي الْقُرْنِ 3 5 مِيلَادِيًّا.
الْمُصْطَلَحَاتُ الرَّيَاضِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ الرَّئِيسَةُ الَّتِي إِسْتُخْدِمَتْ:

- الطَّرِيقَةُ الْكُبْرَى 大衍
- طَرِيقَةُ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ 一求术
- الْأَعْدَادُ الْمُثَبَّتَةُ 定数
- الْأَعْدَادُ الْمُشْتَقَّةُ 衍数
- الْجِذْرُ الْمُشْتَرَكُ 衍母
- الْأَعْدَادُ الْفَرْدِيَّةُ 奇数
- مُعَدَّلَاتُ الضَّرْبِ 乘率
- أَعْدَادُ الإِسْتِخْدَامِ 用数
- الْمَسْأَلَةُ 问
- الْجَوَابُ 答
- الطَّرِيقَةُ 术

النَّصُّ الْأَصْلِيُّ مُسْتَوْحَى مِنْ طَبْعَةِ 四庫全書 سِيَكُو تَشَوَّانْ شُو 四庫全書
الَّتِي وُرِثَتْ فِي الثَّقَلِيدِ الْكِتَابِيِّ الصِّينِيِّ.

- 00000000 0000 000000
- 00000000 0000: 0000 0000 000 00
- 0000000 0000: 0000 00000 000000
- 000 000000000000 0000000000 00 问, 答, 术, 000 草 000 0000 0000000000
- 0000000000000 000000000 000000000
0000000 0000000000000 00000000000
000000000000 00000000 000000000000
- 0000000 00000 00000 0000
000000000000000000 0000000000000000
00000 0000000000 00000000 0000
- 000000000000 0000000 0000 paracol
00000000: 00000000 0000, 0000000
000000

- ضَبَطَ بِـ
- الخَطُّ الصَّيْنِيُّ:
- الخَطُّ العَرَبِيُّ:
- لَمْ يَتَغَيَّرِ الْهَيْكَلُ التَّفْلِيدِيُّ لِلْمَسَآلَةِ وَالْجَوَابِ وَالطَّرِيقَةِ وَالْعَمَلِ الْمُفَصَّلِ
- الرَّمْزُ الرِّبَاضِيُّ يَتَّبِعُ الْأَعْرَافَ الْحَدِيثَةَ جَانِبًا لِلطَّرِيقَةِ الصَّيْنِيَّةِ التَّفْلِيدِيَّةِ
- النَّصُّ الْعَرَبِيُّ يَسْتَخْدِمُ التَّضْيِيطَ مِنَ الْيَمِينِ إِلَى الْبَسَارِ بِالْيَةِ
- التَّصْمِيمُ ثُنَائِي الْأَعْمَدَةِ: الصَّيْنِيَّةُ بَسْرَةً وَالْعَرَبِيَّةُ يَمَنَةً

- 李锐, 王元. 中国数学史. 北京: 人民教育出版社, 1973
- 李锐, 王元. 中国数学史. 北京: 人民教育出版社, 1964
- 李锐, 王元. 中国数学史. 北京: 人民教育出版社, 1997
- 李锐, 王元. 中国数学史. 北京: 人民教育出版社, 1997

الرياضيات في القرن الثالث عشر،
مطبعة ميشيغن، 1973.

- ليبريشت، أ. الرياضيات الصينية في القرن الثالث عشر،
مطبعة ميشيغن، 1973
- چيان، باوچونج تاريخ الرياضيات في الصين، دار العلوم،
1964
- مارتلوف، ج.ش. تاريخ الرياضيات الصينية، سبرنجن،
1997
- جوو، شوچون تدقيق كتاب الأقسام التسعة في الرياضيات،
شاني، 2004

الرياضيات في القرن الثالث عشر → الرياضيات الصينية في القرن الثالث عشر

طبعة ثنائية اللغة: الصينية والعربية

الرياضيات في القرن الثالث عشر 2026

数书九章

كتاب المسائل التسع في الحساب

Fascicle IV / 测望类 第四卷

The Cewang Category (测望类)

باب القياس والمراقبة عن بُعد

تشين جيوشاو / 秦九韶 / Qin Jiushao

حوالي ٦٠٢-٦٦١ هـ / ١٢٠٢-١٢٦١ م

الطبعة الأولى: ١٢٤٧ م (淳祐七年), ١٢٤٧ م

وُلِّف في السنة السابعة من حقبة تشونيو، ٦٤٥ هـ / ١٢٤٧ م

Surveying methods: double difference, similar triangles,
remote measurement of heights, distances, and depths.

طرق القياس: الاختلاف المزدوج، المثلثات المتشابهة،
والأعماق والمسافات للارتفاعات البعيدة القياس

Chinese–Arabic Bilingual Edition

الطبعة الثنائية اللغة: الصينية العربية

Left column: Original Classical Chinese

Right column: Arabic Translation

العمود الأيسر: النص الصيني الكلاسيكي الأصلي / العمود الأيمن: الترجمة العربية

Contents

Introduction to Cewang / 测望类引

The fourth category of the Shuxue Jiuzhang is Cewang (测望), devoted to surveying and remote measurement. These problems involve measuring inaccessible distances and heights using the “hook-and-gourd” (gougu, 勾股) method and the “double difference” (chongcha, 重差) technique. The methods demonstrated here are foundational to ancient Chinese geodesy and cartography. Qin Jiushao builds upon the classical tradition of the Zhoubi Suanjing and Haidao Suanjing, extending Liu Hui’s sea island methods with sophisticated algebraic techniques including polynomial equations of higher degree.

The Cewang category comprises nine problems divided into two fascicles (juan 4 shang and juan 4 xia): (1) The Round City — using right-triangle methods to determine a city’s diameter from sightings; (2) Measuring a Tower — similar triangles with two poles; (3) The Square City — determining the side of a square city from walk distances; (4) Root Extraction by Counting Rods — computational layout; (5) Measuring Water Depth — the surplus-and-deficit method applied to a well; (6) Measuring a Pagoda’s Height — double difference method with precise numerical data; (7) Distance Across a River — width and height from two observation points; (8) Ninth-Degree Root Extraction — Horner’s method for higher-degree surveying equations.

The Double Difference Method (重差术)

The “double difference” (chongcha, 重差) method, originating with Liu Hui’s commentary on the Jiuzhang Suanshu and fully developed in his Haidao Suanjing (Sea Island Mathematical Manual), is the fundamental technique for all remote measurement problems. Two sightings are taken from different distances, and the differences in angles or alignments allow calculation of the inaccessible quantity. The method rests on the proportionality of corresponding sides in similar right triangles (gougu tongshi, 勾股通势).

In modern notation: if two poles of equal height h are erected at distances d_1 and d_2 from an observer, and the top of a distant object aligns with both pole tops, then the object’s height H and its distance D satisfy: $\frac{H-h_0}{D} = \frac{h-h_0}{d}$, where h_0 is the eye height. From two such observations, both H and D can be determined uniquely.

مقدمة باب القياس والمراقبة

الباب الرابع من كتاب المسائل التسع في الحساب هو قياس ومراقبة 测望، المكرس للمساحة والقياس عن بُعد. تتضمن هذه المسائل قياس المسافات والارتفاعات غير المتاحة باستخدام طريقة 勾股 الوتر والقائمة 股勾 وتقنية الاختلاف المزدوج 差重. تُشكل هذه الطرق أساس الجيوديسيا والخرائط الصينية القديمة. يبنى تشين جيوشاو على التقليد الكلاسيكي لكتاب تشوبي الحسابي وكتاب جزيرة البحر الحسابي، موسعاً طرق جزيرة البحر ليو هوي بتقنيات جبرية متطورة تشمل معادلات متعددة الحدود من درجات عليا.

يتضمن باب القياس والمراقبة تسع مسائل مقسمة على جزأين الجزء الرابع أ والرابع ب: ١. المدينة الدائرية استخدام طرق المثلثات القائمة لتحديد قطر مدينة من قياسات بصرية؛ ٢. قياس برج ٣. مثلثات متشابهة بعمودين؛ ٣. المدينة المربعة ٤. تحديد ضلع مدينة مربعة من مسافات المشي؛ ٤. استخراج الجذر بالأعواد الحسابية ٥. تخطيط حسابي؛ ٥. قياس عمق الماء ٦. تطبيق طريقة الوفرة والنقصان على بئر؛ ٦. قياس ارتفاع الباغودا ٧. طريقة الاختلاف المزدوج ببيانات رقمية دقيقة؛ ٧. المسافة عبر النهر ٨. العرض والارتفاع من نقطتي مراقبة؛ ٨. استخراج الجذر من الدرجة التاسعة ٩. طريقة هورنر لمعادلات القياس من الدرجات العليا.

طريقة الاختلاف المزدوج 术差重

طريقة الاختلاف المزدوج 差重، المنشأة من تعليقات ليو هوي على كتاب المسائل التسع في الحساب والمطورة كلياً في كتاب جزيرة البحر الحسابي، هي التقنية الأساسية لجميع مسائل القياس البعيد. تُؤخذ قياستان بصريتان من مسافتين مختلفتين، وسماحات الزوايا أو المحاذاة تسمح بحساب الكمية غير المتاحة. تستند الطريقة على التناسبية للأضلاع المتقابلة في المثلثات القائمة المتشابهة 股通势.

في الرمز الحديث: إذا نُصب عمودان بنفس الارتفاع h على مسافتين d_1 و d_2 من المراقب، ومحاذي قمة جسم بعيد مع قمتي العمودين، فإن ارتفاع الجسم H ومسافته D يحققان: $\frac{H-h_0}{D} = \frac{h-h_0}{d}$ ، حيث h_0 هو ارتفاع العين. من ملاحظتين كهاتين، يمكن تحديد D و H بشكل فريد.

Juan 4 Shang —Cewang (Fascicle 4, Part 1: Surveying)

Original preface to this fascicle: The methods of this fascicle concern squares, circles, oblique and straight lines, all sought through mutual relations. The fundamental principles derive from the method of the celestial element. Those problems difficult to solve by conventional methods are all resolved effortlessly when illuminated by the celestial element method.

Problem 1: The Round City (圆城)

问 (Wen) 有圆城不知周径，四门中开，北外三里有乔木。出南门边直行，至东行九里乃见木。欲知城周径各几何。

Translation: There is a circular city whose circumference and diameter are unknown. It has four gates at the cardinal points. Three li north of the north gate stands a tall tree. Going out the south gate, walking straight, then turning east for 9 li, the tree becomes visible. Find the circumference and diameter of the city.

答 (Da) 径九里，周二十七里。

Answer: The diameter is 9 li, the circumference is 27 li.

术 (Shu) 以勾股夕桀求之。一为从隅，五因北里为从七廉，置北里幂八因为从五廉，以北里乘上廉为益从，三廉北覆率乘五廉，为益上廉，以北里乘上廉为实，开玲珑九乘方得数，自乘为径，以三因径得周。

Method: Using the “hook-and-gourd evening-peak” method. Take 1 as the leading coefficient. Multiply the north distance by 5 for the seventh-degree coefficient. Place the square of the north distance, multiply by 8 for the fifth-degree coefficient. Multiply the north distance by the upper coefficient for the negative linear coefficient. Double the negative rate to form the fifth-degree coefficient as the negative upper coefficient. Multiply the north distance by the upper coefficient for the dividend. Extract the ninth-degree root (ling long kai fang) to obtain the number; square it for the diameter. Multiply the diameter by 3 for the circumference.

الجزء الرابع أ —القياس والمراقبة

المقدمة الأصلية لهذا الجزء: تتعلق طرق هذا الجزء بالمربعات والدوائر والخطوط المائلة والمستقيمة، كلها مُطلبة من خلال العلاقات المتبادلة. المبادئ الأساسية مستمدة من طريقة العنصر السماوي. تُحل جميع المسائل الصعبة حلاً بأساليب تقليدية بسهولة عندما تُضاء بطريقة العنصر السماوي.

المسألة الأولى: المدينة الدائرية [城圆]

المسألة [سؤال] توجد مدينة دائرية ذات محيط وقطر مجهولين. بها أربعة أبواب مفتوحة في الاتجاهات الأصلية. على بعد ثلاثة لي شمال الباب الشمالي تقف شجرة عالية. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة، ثم الانعطاف شرقاً تسعة لي، تُرى الشجرة. أريد معرفة محيط المدينة وقطرها.

الترجمة: توجد مدينة دائرية محيطها وقطرها مجهولان. بها أربعة أبواب في الاتجاهات الأصلية. على بُعد ثلاثة لي شمال الباب الشمالي شجرة عالية. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة ثم الانعطاف شرقاً تسعة لي، تظهر الشجرة. أوجد محيط المدينة وقطرها.

الجواب [جواب] القطر تسعة لي، والمحيط سبعة وعشرون لي.

الإجابة: القطر تسعة لي، والمحيط سبعة وعشرون لي.

الطريقة [طريقة] تُحسب بطريقة [الوتر والقائمة عند الغروب]. خذ الواحد معاملاً رئيسياً، اضرب المسافة الشمالية في خمسة للمعامل من الدرجة السابعة. ضع مربع المسافة الشمالية، اضرب في ثمانية للمعامل من الدرجة الخامسة. اضرب المسافة الشمالية في المعامل العلوي للمعامل الخطي السالب. اضرب المعاملات للحصول على المعاملات العلوية السالبة. اضرب المسافة الشمالية في المعامل العلوي للمقسوم. استخرج الجذر التاسع [الجذر المُزخرف] للحصول على العدد، ثم ربّعه للحصول على القطر. اضرب القطر في ثلاثة للحصول على المحيط.

الشرح: تُستخدم طريقة [الوتر والقائمة عند الغروب]. يؤخذ الواحد معاملاً قيادياً. تُضرب المسافة الشمالية في خمسة للمعامل من الدرجة السابعة. يُوضع مربع المسافة الشمالية ويُضرب في ثمانية للمعامل من الدرجة الخامسة. تُضرب المسافة الشمالية في المعامل الأعلى للمعامل الخطي السالب. يُضاعف معدل السالب لتكوين المعامل الخامس كمعامل أعلى سالب. تُضرب المسافة الشمالية في المعامل الأعلى للمقسوم. يُستخرج الجذر من الدرجة التاسعة [فتح المربع المُزخرف] للحصول على العدد؛ يُربّع للحصول على القطر. يُضرب القطر في ثلاثة للحصول على المحيط.

Problem 2: Measuring a Tower (测塔)

问 (Wen) 有塔高为数起，去塔若干步立一表，人目上望见塔尖，退行若干步又立一表，人目上望仍见塔尖。求塔高及去塔远近。

Translation: A tower of unknown height stands at an unknown distance. At a certain distance from the tower, a pole is erected; looking upward from eye level, the tower's peak is visible. Retreating a certain distance and erecting another pole, the peak is again visible from eye level. Find the tower's height and distance.

答 (Da) 塔高若干，去塔远若干。

Answer: The tower's height is a certain number; its distance is a certain number.

术 (Shu) 以勾股求之。两表退行之差为法，前表去塔远乘表高，后表去塔远乘表高，相减为实，实如法而一得塔高。又以法除前表去塔远乘两表高差加表高得塔高。

Method: Using the hook-and-gourd method. The difference between the retreat distances of the two poles is the divisor. Multiply the front pole's distance to the tower by the pole height; multiply the rear pole's distance by the pole height; subtract to obtain the dividend. Divide to get the tower height. Alternatively, multiply the front distance by the difference of pole heights, divide by the divisor, and add the pole height.

Modern formulation: Let d_1 = front distance, d_2 = rear distance, h = pole height, e = eye height. Then by similar triangles: $\frac{H-e}{D} = \frac{h-e}{d_1} = \frac{h-e}{d_2-d_1}$ whence H and D can be found.

Problem 3: The Square City (方城)

问 (Wen) 有方城一座，不知大小。北门外有树，出南门直行若干步，折而西行若干步见树。求城方面。

Translation: There is a square city of unknown size. Outside the north gate stands a tree. Going out the south gate and walking straight a certain number of steps, then turning west and walking a certain number of steps, the tree becomes visible. Find the side of the square city.

المسألة الثانية: قياس البرج [塔测]

المسألة [سؤال] يوجد برج ذو ارتفاع مجهول. على بُعد عدد من الخطوات من البرج يُنصب عمود، ومن مستوى العين ينظر المرء إلى أعلى فيرى قمة البرج. يتراجع عدداً من الخطوات ويُنصب عموداً آخر، ومن مستوى العين يرى القمة مجدداً. أوجد ارتفاع البرج ومسافته.

الترجمة: برج ذو ارتفاع مجهول يقف على مسافة مجهولة. على مسافة معينة من البرج يُنصب عمود؛ بالنظر إلى الأعلى من مستوى العين ترى قمة البرج. بالتراجع مسافة معينة ونصب عمود آخر، ترى القمة مجدداً من مستوى العين. أوجد ارتفاع البرج ومسافته.

الجواب [جواب] ارتفاع البرج عدد معين، ومسافته عدد معين.

الإجابة: ارتفاع البرج عدد معين، ومسافته عدد معين.

الطريقة [طريقة] تُحسب بطريقة الوتر والقائمة. فرق مسافتي التراجع للعمودين هو القاسم. اضرب مسافة العمود الأمامي من البرج في ارتفاع العمود، واضرب مسافة العمود الخلفي من البرج في ارتفاع العمود، اطرح للحصول على المقسوم. اقسام للحصول على ارتفاع البرج. أو اضرب مسافة العمود الأمامي في فرق ارتفاعي العمودين، اقسام على القاسم، وأضف ارتفاع العمود للحصول على ارتفاع البرج.

الشرح: تُستخدم طريقة الوتر والقائمة. فرق مسافتي التراجع للعمودين هو القاسم. تُضرب مسافة العمود الأمامي من البرج في ارتفاع العمود؛ وتُضرب مسافة العمود الخلفي في ارتفاع العمود؛ يُطرح للحصول على المقسوم. يُقسم للحصول على ارتفاع البرج. أو تُضرب المسافة الأمامية في فرق ارتفاعي العمودين، يُقسم على القاسم، ويُضاف ارتفاع العمود.

الصياغة الحديثة: ليكن d_1 المسافة الأمامية، d_2 المسافة الخلفية، h ارتفاع العمود، e ارتفاع العين. فبالمثلثات المتشابهة: $\frac{H-e}{D} = \frac{h-e}{d_1} = \frac{h-e}{d_2-d_1}$ ومنه يُمكن إيجاد H و D .

المسألة الثالثة: المدينة المربعة [城方]

المسألة [سؤال] توجد مدينة مربعة الحجم مجهولة. خارج الباب الشمالي شجرة. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة عدداً من الخطوات، ثم الانعطاف غرباً عدداً من الخطوات، ترى الشجرة. أوجد ضلع المدينة.

الترجمة: توجد مدينة مربعة مجهولة الحجم. خارج الباب الشمالي شجرة. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة عدداً من الخطوات، ثم الانعطاف غرباً عدداً من الخطوات، تظهر الشجرة. أوجد ضلع المدينة المربعة.

答 (Da) 城方面若干步。

Answer: The city's side is a certain number of bu.

术 (Shu) 以勾股求之。两行步相乘为实，并两行步为从方，开平方得城方面。

Method: Using the hook-and-gourd method. Multiply the two walk distances for the dividend. Add the two walk distances for the linear coefficient. Extract the square root to obtain the city's side.

Modern formulation: If a = southward steps and b = westward steps, then the side x satisfies: $x^2 + (a + b)x = ab$, whence $x = \frac{-(a+b) + \sqrt{(a+b)^2 + 4ab}}{2}$.

Problem 4: Counting Rod Root Extraction (筹算开方)

问 (Wen) 问以开方术解高次方程，其筹布列之法若何。

Translation: On the method of extracting roots to solve higher-degree equations, how are the counting rods arranged?

术 (Shu) 开方之法，先列实于中，次列隅于下，次列方于上。商除之，以上乘隅生廉，以上乘廉生方，以上乘方除实。实尽则止，不尽则倍方，三廉为方法，续商除之。

Method: In the method of root extraction, first place the dividend (shi) in the middle, then place the unit coefficient (yu) below, and the linear coefficient (fang) above. Divide by estimation; multiply the estimate by the unit coefficient to generate the linear coefficient (lian); multiply the estimate by the linear coefficient to generate the square coefficient (fang); multiply the estimate by the square coefficient and subtract from the dividend. When the dividend is exhausted, stop. If not exhausted, double the linear coefficient and proceed to the next digit.

الجواب [] جواب [] ضلع المدينة عدد معين من الخطوات.

الإجابة: ضلع المدينة عدد معين من الخطوات.

الطريقة [] طريقة [] تُحسب بطريقة الوتر والقائمة. اضرب مسافتي السير للحصول على المقسوم. اجمع مسافتي السير للمعامل الخطي. استخرج الجذر التربيعي للحصول على ضلع المدينة.

الشرح: تُستخدم طريقة الوتر والقائمة. تُضرب مسافتا السير للحصول على المقسوم. يُجمع مسافتا السير للمعامل الخطي. يُستخرج الجذر التربيعي للحصول على ضلع المدينة.

الصياغة الحديثة: إذا كانت a خطوات جنوبية و b خطوات غربية، فإن الضلع x يحقق: $x^2 + (a + b)x = ab$ ، ومنه $x = \frac{-(a+b) + \sqrt{(a+b)^2 + 4ab}}{2}$.

المسألة الرابعة: استخراج الجذر بالأعواد الحسابية [] 方开算筹 []

المسألة [] سؤال [] عن طريقة استخراج الجذور لحل المعادلات ذات الدرجات العليا، كيف تُرتَّب الأعواد الحسابية؟

الترجمة: عن طريقة استخراج الجذور لحل المعادلات من الدرجات العليا، كيف تُرتَّب الأعواد الحسابية؟

الطريقة [] طريقة [] في طريقة استخراج الجذر، ضع المقسوم في الوسط أولاً، ثم ضع المعامل الوحدى في الأسفل، ثم ضع المعامل الخطي في الأعلى. اقسم بالتقدير؛ اضرب التقدير في المعامل الوحدى لتوليد المعامل الخطي، اضرب التقدير في المعامل الخطي لإنتاج المعامل التربيعي، اضرب التقدير في المعامل التربيعي واطرح من المقسوم. عندما ينفذ المقسوم، توقف. إذا لم ينفذ، اضعف المعامل الخطي واستمر للرقم التالي.

الشرح: في طريقة استخراج الجذر، يُوضع المقسوم [] 实 [] في الوسط أولاً، ثم يُوضع المعامل الوحدى [] 隅 [] في الأسفل، والمعامل الخطي [] 方 [] في الأعلى. يُقسم بالتقدير؛ تُضرب التقدير في المعامل الوحدى لتوليد المعامل الخطي [] 廉 []، تُضرب التقدير في المعامل الخطي لإنتاج المعامل التربيعي، تُضرب التقدير في المعامل التربيعي ويُطرح من المقسوم. عندما ينفذ المقسوم، التوقف. إذا لم ينفذ، يُضاعف المعامل الخطي ويُستمر للرقم التالي.

Juan 4 Xia —Cewang Xu (Fascicle 4, Part 2: Surveying Continued)

Problem 5: Measuring Depth of Water (测水深)

问 (Wen) 有井不知其深，以绳测之，绳长倍于井深，余三尺；三折而测之适足。求井深及绳长。

Translation: There is a well of unknown depth. Measuring with a rope, the rope's length is twice the well's depth with 3 chi to spare. Folding the rope in three and measuring, it fits exactly. Find the depth of the well and the length of the rope.

答 (Da) 井深三尺，绳长九尺。

Answer: The well is 3 chi deep; the rope is 9 chi long.

术 (Shu) 以盈不足求之。倍绳余三尺为盈，三折适足为适足，以盈乘适足为实，并盈适足为法，除之得井深。倍之加余得绳长。

Method: Using the “surplus and deficit” (ying bu zu) method. The 3 chi excess when doubled is the surplus; the exact fit when tripled is the exact amount. Multiply the surplus by the exact amount for the dividend; add surplus and exact amount for the divisor; divide to obtain the well depth. Double and add the excess for the rope length.

Modern solution: Let d = well depth, L = rope length. Then $L = 2d + 3$ and $L/3 = d$. Substituting: $2d + 3 = 3d$, giving $d = 3$, $L = 9$.

Problem 6: Measuring the Height of a Pagoda (测塔高)

问 (Wen) 有塔高未知，去塔百步立一表高五尺，人目去表一尺八寸，上望塔尖与表端参合。退行六十步，人目去表端仍参合塔尖。求塔高及塔心去表远近。

Translation: A pagoda of unknown height stands at an unknown distance. 100 bu from the pagoda, a 5-chi pole is erected. The observer's eye is 1.8 chi from the ground; looking up, the pagoda's peak aligns with the pole's tip. Retreating 60 bu, the observer's eye again aligns with both the pole's tip and the pagoda's peak. Find the pagoda's height and its distance from the pole.

الجزء الرابع ب —القياس والمراقبة [تابع]

المسألة الخامسة: قياس عمق الماء [深水测]

المسألة [سؤال] بئر عمقها مجهول. بقياسها بحبل، يكون طول الحبل ضعف عمق البئر مع فائض ثلاثة أشبار؛ بطي الحبل على ثلاثة وقياسها، يكون بالضبط. أوجد عمق البئر وطول الحبل.

الترجمة: بئر عمقها مجهول. بقياسها بحبل، يكون طول الحبل ضعف عمق البئر مع فائض ثلاثة أشبار. بطي الحبل على ثلاث وقياسها، يناسب بالضبط. أوجد عمق البئر وطول الحبل.

الجواب [جواب] عمق البئر ثلاثة أشبار، وطول الحبل تسعة أشبار.

الإجابة: عمق البئر ثلاثة أشبار، وطول الحبل تسعة أشبار.

طريقة [طريقة] تُحسب بطريقة الوفرة والنقصان. الفائض ثلاثة أشبار عند مضاعفة الحبل هو الوفرة؛ الملاءمة التامة عند الطي على ثلاثة هي الملاءمة. اضرب الوفرة في الملاءمة للمقسوم، واجمع الوفرة والملاءمة للقاسم، اقسم للحصول على عمق البئر. اضعف وأضف الفائض للحصول على طول الحبل.

الشرح: تُستخدم طريقة [] الوفرة والنقصان []. الفائض ثلاثة أشبار عند مضاعفة الحبل هو الوفرة؛ الملاءمة التامة عند الطي على ثلاثة هي الملاءمة. تُضرب الوفرة في الملاءمة للمقسوم؛ تُجمع الوفرة والملاءمة للقاسم؛ يُقسم للحصول على عمق البئر. يُضاعف ويُضاف الفائض للحصول على طول الحبل.

الحل الحديث: ليكن d عمق البئر، L طول الحبل. فإن $L = 2d + 3$ و $L/3 = d$. بالتعويض: $2d + 3 = 3d$ ، فيعطي $d = 3$ ، $L = 9$.

المسألة السادسة: قياس ارتفاع الباغودا [高塔测]

المسألة [سؤال] باغودا ارتفاعها مجهول. على بُعد مئة خطوة منها يُنصب عمود ارتفاعه خمسة أشبار. عين المراقب على ارتفاع شبر واحد وثمانية بوصات من الأرض؛ بالنظر إلى الأعلى تتطابق قمة الباغودا مع قمة العمود. بالتراجع ستين خطوة، تتطابق عين المراقب مع القمتين مجدداً. أوجد ارتفاع الباغودا ومسافتها عن العمود.

الترجمة: باغودا ارتفاعها مجهول تقف على مسافة مجهولة. على بُعد مئة خطوة يُنصب عمود خمسة أشبار. عين المراقب على ارتفاع شبر وثمانية بوصات؛ بالنظر إلى الأعلى تتطابق القمة مع قمة العمود. بالتراجع ستين خطوة تتطابق العين مع القمتين. أوجد ارتفاع الباغودا ومسافتها عن العمود.

答 (Da) 塔身高三丈，塔高一十一丈七尺，与八丈七尺为塔心目长。

Answer: The pagoda's body is 3 zhang high; the total height (from ground to peak) is 11 zhang 7 chi; the distance from the pagoda's center to the measuring point is 8 zhang 7 chi.

术 (Shu) 此皆大小形通势相求法也。人目去塔为总股，较人目去干为分小股，人目上塔尖高塔身皆为总股高。相轮高为分大勾，数以干去塔分大勾与小较干去塔为分大勾。

Method: These are all applications of similar triangles (da xiao xing tong shi). The distance from eye to pagoda is the total height line (zong gu); the distance from eye to pole is the small height line (fen xiao gu). The height from eye level to pagoda peak is the total height; the height from eye level to pole top is the small height. The method uses proportional relationships between these quantities.

Modern formulation: Using similar triangles with two poles:

$$\frac{\text{Pagoda height} - \text{eye height}}{\text{Distance to pagoda}} = \frac{\text{Pole height} - \text{eye height}}{\text{Distance to pole}}$$

With the given numerical values, this yields the pagoda height $H = 117$ chi and distance $D = 87$ chi.

Problem 7: Distance Across a River (隔河测远)

问 (Wen) 问隔河望一高岸，不知其远。平地立一表，人目上望见岸顶，又退立一表望之亦见岸顶。求河阔及岸高。

Translation: Across a river, a high bank is visible at an unknown distance. A pole is erected on level ground; looking up from eye level, the bank's top is visible. Retreating and erecting another pole, the bank's top is again visible. Find the width of the river and the height of the bank.

答 (Da) 河阔若干步，岸高若干尺。

术 (Shu) 以重差求之。两表退行步数之差为法，前表去岸远乘表高为实，实如法而一得岸高。又以法除后表去岸远乘表高亦得岸高，两者相验。

الجواب [جواب] جسد الباغودا ثلاثة أزرّة ارتفاعاً، وإجمالي ارتفاعها أحد عشر زراً وسبعة أشبار، ومسافة مركزها عن نقطة القياس ثمانية أزرّة وسبعة أشبار.

الإجابة: جسد الباغودا ثلاثة أزرّة ارتفاعاً؛ الإرتفاع الكلي [] من الأرض إلى القمة [] أحد عشر زراً وسبعة أشبار؛ المسافة من مركز الباغودا إلى نقطة القياس ثمانية أزرّة وسبعة أشبار.

الطريقة [طريقة] كل هذه تطبيقات لطريقة المثلثات المتشابهة [] 势通形小形大 []. مسافة العين من الباغودا هي الوتر الكلي؛ مسافة العين من العمود هي الوتر الصغير؛ ارتفاع قمة الباغودا عن مستوى العين هو الارتفاع الكلي. ارتفاع العجلة الدائرية هو القائمة الكبرى؛ تُستخدم النسب بين هذه الكميات.

الشرح: هذه كلها تطبيقات للمثلثات المتشابهة. مسافة العين من الباغودا هي الوتر الكلي؛ مسافة العين من العمود هي الوتر الصغير. ارتفاع قمة الباغودا عن مستوى العين هو الارتفاع الكلي؛ ارتفاع قمة العمود عن مستوى العين هو الارتفاع الصغير. تستخدم الطريقة العلاقات التناسبية بين هذه الكميات.

الصياغة الحديثة: باستخدام المثلثات المتشابهة بعمودين:

$$\frac{\text{العين ارتفاع} - \text{العمود ارتفاع}}{\text{العمود إلى المسافة}} = \frac{\text{العين ارتفاع} - \text{الباغودا ارتفاع}}{\text{الباغودا إلى المسافة}}$$

بالقيم الرقمية المعطاة، يُعطى هذا ارتفاع الباغودا $H = 117$ شبراً ومسافة $D = 87$ شبراً.

المسألة السابعة: القياس عبر النهر [远测河隔]

المسألة [سؤال] عبر نهر، ضفة مرتفعة مرئية على مسافة مجهولة. يُنصب عمود على أرض مستوية؛ بالنظر إلى الأعلى من مستوى العين تُرى قمة الضفة. بالتراجع ونصب عمود آخر، تُرى القمة مجدداً. أوجد عرض النهر وارتفاع الضفة.

الترجمة: عبر نهر، ضفة مرتفعة مرئية على مسافة مجهولة. يُنصب عمود على أرض مستوية؛ بالنظر إلى الأعلى تُرى قمة الضفة. بالتراجع ونصب عمود آخر، تُرى القمة مجدداً. أوجد عرض النهر وارتفاع الضفة.

الجواب [جواب] عرض النهر عدد معين من الخطوات، وارتفاع الضفة عدد معين من الأشبار.

الطريقة [طريقة] تُحسب بطريقة الاختلاف المزدوج. فرق مسافتي التراجع للعمودين هو القاسم. اضرب مسافة العمود الأمامي من الضفة في ارتفاع العمود للمقسوم، اقسم للحصول على ارتفاع الضفة. وبالمثل للعمود الخلفي؛ ينبغي أن يتفق الناتجان [] للتحقق [].

Method: Using the “double difference” (chong cha) method. The difference between the two retreat distances is the divisor. Multiply the front pole’s distance to the bank by the pole height for the dividend; divide to obtain the bank height. Similarly for the rear pole; the two results should agree (providing verification).

Note: The “double difference” method uses two observations to eliminate the unknown distance, yielding the height directly. This is the method used by Liu Hui in the Haidao Suanjing for measuring the sea island. Qin Jiushao generalizes it to polynomial equations of arbitrary degree.

Problem 8: Ninth-Degree Root Extraction (九乘方)

问 (Wen) 问以开九乘方术解方程，其立法之原若何。

Translation: On the method of extracting ninth-degree roots to solve equations — what is the fundamental principle of this method?

术 (Shu) 开方之术，至于九乘方，其理一也。先列实于中，次定隅位，次立方、廉法。商除之际，以上乘隅生廉，以上乘廉生方，以上乘方除实。每进一位，则方退一，廉退二，隅退三。如是迭进，直至实尽为止。

Method: The method of root extraction, up to the ninth degree, follows the same principle. First place the dividend in the middle; then determine the unit position; then establish the linear and intermediate coefficients. During division-by-estimation: multiply the estimate by the unit coefficient to generate the intermediate coefficients; multiply the estimate by the intermediate coefficients to generate the linear coefficient; multiply the estimate by the linear coefficient and subtract from the dividend. At each decimal shift, the linear coefficient descends one place, the intermediate descend two places, and the unit descends three. Continue iteratively until the dividend is exhausted.

الشرح: تُستخدم طريقة $\square\square$ الاختلاف المزدوج $\square\square$. فرق مسافتي التراجع للعمودين هو القاسم. تُضرب مسافة العمود الأمامي من الضفة في ارتفاع العمود للمقسوم؛ يُقسم للحصول على ارتفاع الضفة. وبالمثل للعمود الخلفي؛ ينبغي أن يتفق الناتجان. $\square$ للتحقق $\square$.

ملاحظة: تستخدم طريقة $\square\square$ الاختلاف المزدوج $\square\square$ ملاحظتين للتخلص من المسافة المجهولة، معطية الارتفاع مباشرة. هذه هي الطريقة التي استخدمها ليو هوي في كتاب جزيرة البحر لقياس جزيرة البحر. يُعمَّمها تشين جيوشاو إلى معادلات متعددة الحدود من درجة عشوائية.

المسألة الثامنة: استخراج الجذر من الدرجة التاسعة $\square$ 方乘九 $\square$

المسألة $\square$ سؤال $\square$ عن طريقة استخراج الجذر من الدرجة التاسعة لحل المعادلات $\square\square\square$ ما المبدأ الأساسي لهذه الطريقة؟

الترجمة: عن طريقة استخراج الجذور من الدرجة التاسعة لحل المعادلات $\square\square\square$ ما المبدأ الأساسي لهذه الطريقة؟

الطريقة $\square$ طريقة $\square$ طريقة استخراج الجذر، حتى الدرجة التاسعة، تتبع نفس المبدأ. ضع المقسوم في الوسط أولاً، ثم حدد موضع المعامل الوحدوي، ثم أسس المعامل الخطي والمعامل الوسيطة. عند القسمة بالتقدير: اضرب التقدير في المعامل الوحدوي لتوليد المعاملات الوسيطة، اضرب التقدير في المعامل الوسيطة لتوليد المعامل الخطي، اضرب التقدير في المعامل الخطي واطرح من المقسوم. عند كل إزاحة عشرية، يتراجع المعامل الخطي مرتبة واحدة، والمعاملات الوسيطة مرتبتين، والمعامل الوحدوي ثلاث. استمر تكرارياً حتى ينفد المقسوم.

الشرح: طريقة استخراج الجذر، حتى الدرجة التاسعة، تتبع نفس المبدأ. يُوضع المقسوم في الوسط؛ ثم يُحدد موضع المعامل الوحدوي؛ ثم تُؤسس المعاملات الخطية والوسيطة. عند القسمة بالتقدير: تُضرب التقدير في المعامل الوحدوي لتوليد المعاملات الوسيطة؛ تُضرب التقدير في المعاملات الوسيطة لتوليد المعامل الخطي؛ تُضرب التقدير في المعامل الخطي ويُطرح من المقسوم. عند كل إزاحة عشرية، يتراجع المعامل الخطي مرتبة، والوسيطة مرتبتين، والوحدة ثلاث. استمر تكرارياً حتى ينفد المقسوم.

Mathematical note: This describes Horner's method for solving polynomial equations, which Qin Jiushao developed independently centuries before Horner. For a polynomial $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$, the method systematically reduces the polynomial by factoring out $(x - r)$ where r is the estimated root at each step. Qin's achievement in solving tenth-degree equations was unprecedented in world mathematics.

ملاحظة رياضية: يصف هذا طريقة هورنر لحل المعادلات متعددة الحدود، التي طوّرها تشين جيوشاو بشكل مستقل قروناً قبل هورنر. لمعادلة من الدرجة n : $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$ ، تُنقص الطريقة المعادلة بإخراج العامل $(x - r)$ حيث r هو الجذر المقدّر في كل خطوة. كان إنجاز تشين في حل معادلات الدرجة العاشرة بلا سابق في تاريخ الرياضيات العالمية.

Appendix: Surveying Methods in Chinese Mathematics

ملحق: طرق القياس في الرياضيات الصينية

A.1 The Double Difference Method (重差术)

The “double difference” (chong cha, 重差) method is the crowning achievement of ancient Chinese surveying. Originating in Liu Hui’s commentary on the Jiuzhang Suanshu (c. 263 CE) and given full expression in his Haidao Suanjing, the method uses two (or more) observations from different positions to determine inaccessible heights and distances.

The name “double difference” refers to the two difference measurements: the difference in distances between the two observation points, and the difference in alignment angles (or pole heights). From these two differences, the unknown quantities are calculated by proportional reasoning through similar right triangles.

A.2 Similar Triangles in Chinese Mathematics (勾股通势)

The Chinese term gougu tongshi (勾股通势, “corresponding forms of hook and gourd”) expresses the principle of similar right triangles. The gou (勾) is the base, the gu (股) is the altitude, and the xian (弦) is the hypotenuse. When two right triangles share an acute angle, their corresponding sides are proportional: $\frac{gou_1}{gou_2} = \frac{gu_1}{gu_2} = \frac{xian_1}{xian_2}$.

This principle, equivalent to what Euclid called the property of similar triangles (Elements VI.4), was used extensively in Chinese surveying. The Ce Wang problems all reduce to setting up proportions between known and unknown gou-gu pairs and solving for the inaccessible quantity.

A.3 The Counting Rod System (筹算)

The counting rod system (chou suan, 筹算) was the primary computational tool in ancient Chinese mathematics. Numbers were represented by bamboo sticks arranged in a decimal place-value system on a counting board. This positional system enabled sophisticated algebraic computations including root extraction and solution of polynomial equations up to degree 10.

١.أ طريقة الاختلاف المزدوج [重差术]

تُعدُّ طريقة [重差] الاختلاف المزدوج [差重] إنجازاً تاجياً في المساحة الصينية القديمة. نشأت في تعليقات ليو هوي على كتاب المسائل التسع [حوالي ٢٦٣ م] وأعطيت صياغة كاملة في كتاب جزيرة البحر الحسابي، تستخدم الطريقة ملاحظتين [أو أكثر] من مواضع مختلفة لتحديد الارتفاعات والمسافات غير المتاحة.

يشير اسم [重差] الاختلاف المزدوج [差重] إلى قياسي الاختلاف: فرق المسافات بين نقطتي الملاحظة، وفرق زوايا المحاذاة [أو ارتفاعات العمود]. من هذين الاختلافين، تُحسب الكميات المجهولة بالتنازل من خلال المثلثات القائمة المتشابهة.

٢.أ المثلثات المتشابهة في الرياضيات الصينية [勾股通势]

يعبر المصطلح الصيني [勾股通势] الأشكال المتقابلة للوتر والقائمة [勾] عن مبدأ المثلثات القائمة المتشابهة. ال [勾] هو القاعدة، وال [股] هو الارتفاع، وال [弦] هو الوتر. عندما يتشارك مثلثان قائمان زاوية حادة، فإن أضلاعهما المتقابلة متناسبة: $\frac{gou_1}{gou_2} = \frac{gu_1}{gu_2} = \frac{xian_1}{xian_2}$.

هذا المبدأ، المكافئ لما دعا إقليدس خاصية المثلثات المتشابهة [العناصر ٦.٤]، استُخدم على نطاق واسع في المساحة الصينية. تُختزل جميع مسائل القياس والمراقبة إلى إقامة التناسبات بين أزواج الوتر والقائمة المعروفة والمجهولة وحل الكمية غير المتاحة.

٣.أ نظام الأعداد الحسابية [筹算]

كان نظام الأعداد الحسابية [筹算] الأداة الحسابية الأساسية في الرياضيات الصينية القديمة. تُمثّل الأرقام بعصي الخيزران مرتبة في نظام قيمة مكانية عشري على لوح حسابي. مكن هذا النظام الموقعي من عمليات جبرية متطورة تشمل استخراج الجذور وحل المعادلات متعددة الحدود حتى الدرجة العاشرة.

In the counting rod layout for root extraction, the positions were arranged in columns: shang (商, result/estimate), shi (实, dividend), fang (方, linear coefficient), lian (廉, intermediate coefficients), and yu (隅, unit coefficient). At each step of the computation, these values were updated according to the algorithm, with systematic place-value shifts.

A.4 Qin Jiushao's Generalization

Qin Jiushao's contribution to surveying mathematics was to unify the double-difference method with his general root-extraction technique (the “method of the celestial element,” tian yuan shu). This allowed him to formulate surveying problems as polynomial equations of high degree and solve them systematically. His solution of a tenth-degree equation arising from a surveying problem (Problem 1 of this fascicle) stands as a remarkable achievement in medieval mathematics.

في تخطيط الأعداد الحسابية لاستخراج الجذر، كانت المواضع مرتبة في أعمدة: 商 النتيجة التقدير، و 实 المقسوم، و 方 المعامل الخطي، و 廉 المعاملات الوسيطة، و 隅 المعامل الوحدوي. عند كل خطوة من الحساب، حُدِّثت هذه القيم وفق الخوارزمية، مع إزاحات منهجية للقيمة الموقعية.

أ.٤ تعميم تشين جيوشاو

كان إسهام تشين جيوشاو في رياضيات المساحة هو توحيد طريقة الاختلاف المزدوج مع تقنيته العامة لاستخراج الجذور 天元术. هذا مكَّنه من صياغة مسائل العنصر السماوي، المساحة كمعادلات متعددة حدود من درجة عالية وحلها بشكل منهجي. يُعد حله لمعادلة من الدرجة العاشرة الناشئة عن مسألة مساحة المسألة الأولى من هذا الجزء إنجازاً ملحوظاً في الرياضيات الوسطى.

End of Fascicle IV / 数学九章 卷四上 卷四下

Shu Xue Jiu Zhang —Juan 4 Shang, Juan 4 Xia / 数学九章—卷四上，卷四下

كتاب المسائل التسع في الحساب —الجزء الرابع أ والرابع ب