

Variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini

PIERRE DELIGNE (Bures-sur-Yvette)

On donne une description terre à terre de la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini $\mathbf{F}_q$. Le résultat obtenu a été inspiré par Ihara [2] ch V (voir aussi [3]).

1. Soient p un nombre premier, $\mathbf{F}_p$ le corps $\mathbf{Z}/(p)$, $\overline{\mathbf{F}}_p$ une clôture algébrique de $\mathbf{F}_p$ et, pour toute puissance q de p , soit $\mathbf{F}_q$ le sous-corps à q éléments de $\overline{\mathbf{F}}_p$. Pour toute extension algébrique k de $\overline{\mathbf{F}}_p$, on désigne par $W_0(k)$ l'anneau de valuation discrète hensélien essentiellement de type fini sur $\mathbf{Z}$, absolument non ramifié, de corps résiduel k ; soient $W(k)$ l'anneau des vecteurs de Witt sur k , i.e. le complété de $W_0(k)$, $W = W(\overline{\mathbf{F}}_p)$ et φ un plongement de W dans le corps $\mathbf{C}$ des nombres complexes. On désigne par $\mathbf{Z}(1)$ le sous-groupe $2\pi i \mathbf{Z}$ de $\mathbf{C}$. L'application exponentielle définit un isomorphisme entre $\mathbf{Z}(1) \otimes \mathbf{Z}_l$ et $\mathbf{Z}_l(1)(\mathbf{C}) = \varprojlim \mu_{l^n}(\mathbf{C})$.

On désigne par A^* la variété abélienne duale d'une variété abélienne A . Pour tout corps k , on désigne par $\bar{k}$ une clôture algébrique de k .

2. Soit A une variété abélienne de dimension g , définie sur un corps k de caractéristique p . Rappelons que A est dite *ordinaire* si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées :

- (I) A a p^g points d'ordre divisant p à valeur dans $\bar{k}$.
- (II) La «matrice de Hasse-Witt» $F^*: H^1(A^{(p)}, \mathcal{O}_{A^{(p)}}) \rightarrow H^1(A, \mathcal{O}_A)$ est inversible.
- (III) La composante neutre du schéma en groupe A_p noyau de la multiplication par p est de type multiplicatif, (donc géométriquement isomorphe à une puissance de μ_p).

Si $k = \mathbf{F}_q$, si F est l'endomorphisme de Frobenius de A et $Pc_A(F; x)$ son polynôme caractéristique, ces conditions équivalent encore à

- (IV) La moitié au moins des racines de $Pc_A(F; x)$ dans $\overline{\mathbf{Q}}_p$ sont des unités p -adiques. En d'autres termes, si $n = \dim A$, la réduction modulo p du polynôme $Pc_A(F; x)$ n'est pas divisible par x^{n+1} .

3. Soit A une variété abélienne ordinaire sur $\overline{\mathbf{F}}_p$. On désigne par $\tilde{A}$ le relèvement canonique de Serre–Tate [4] de A sur W . Rappelons que $\tilde{A}$ dépend fonctoriellement de A et est caractérisé par le fait que le groupe p -divisible $T_p(\tilde{A})$ sur W attaché à $\tilde{A}$ [5] est le produit des groupes p -divisibles (uniquement déterminés d'après 2. (III)) relevant respectivement la composante neutre et le plus grand quotient étale de $T_p(A)$. Le relèvement canonique $\tilde{A}$ est encore l'unique relèvement de A tel que tout endomorphisme de A se relève à $\tilde{A}$. On désigne par $T(A)$ l'homologie entière de la variété abélienne complexe A_c déduite de $\tilde{A}$ et de φ par extension des scalaires de W à $\mathbf{C}$:

$$T(A) = H_1(\tilde{A} \otimes_W \mathbf{C}).$$

On sait que $\tilde{A}$ se descend de façon unique à $W_0(\overline{\mathbf{F}}_p)$, de sorte que A_c ne dépend que de A et de la restriction de φ à $W_0(\overline{\mathbf{F}}_p)$. Le $\mathbf{Z}$ -module libre $T(A)$ est de rang

2. $\dim(A)$; il est fonctoriel en A . De plus, si l est un nombre premier $\neq p$, on a fonctoriellement

$$(3.1) \quad T(A) \otimes \mathbf{Z}_l = T_l(A).$$

Le relèvement canonique de la variété abélienne A^* duale de A est la duale de $\tilde{A}$, de sorte que $(A_c)^* = \tilde{A}^*$ et que $T(A)$ et $T(A^*)$ sont en dualité parfaite à valeurs dans $\mathbf{Z}(1)$:

$$(3.2) \quad T(A) \otimes T(A^*) \longrightarrow \mathbf{Z}(1)$$

(il est indispensable d'utiliser $\mathbf{Z}(1)$ de préférence à $\mathbf{Z}$ pour obtenir une théorie invariante par conjugaison complexe). Les accouplements (3.2) sont compatibles, via (3.1), aux accouplements

$$T_l(A) \otimes T_l(A^*) \longrightarrow \mathbf{Z}_l(1);$$

un morphisme $\phi: A \rightarrow A^*$ définit une polarisation de A si et seulement si $\tilde{\phi}: \tilde{A} \rightarrow \tilde{A}^*$ définit une polarisation de A_c . Posons $T'_p(A) = \text{Hom}(\mathbf{Q}_p/\mathbf{Z}_p, A(\overline{\mathbf{F}}_p))$ et $T''_p(A) = \text{Hom}_{\mathbf{Z}_p}(T'_p(A^*), \mathbf{Z}(1) \otimes \mathbf{Z}_p)$. Ces $\mathbf{Z}_p$ -modules sont des foncteurs covariants de A .

Par définition du relèvement canonique, le groupe p -divisible $T_p(\tilde{A})$ est somme du groupe pro-étale constant $T'_p(A)$ et du dual de Cartier de $T'_p(A^*)$.¹ Pour tout morphisme $u: A \rightarrow B$, le morphisme induit $u: T_p(A) \rightarrow T_p(B)$ s'identifie à la somme de $u|_{T'_p(A)}: T'_p(A) \rightarrow T'_p(B)$ et du transposé de Cartier de ${}^t u|_{T'_p(B^*)}: T'_p(B^*) \rightarrow T'_p(A^*)$. Sur $\mathbf{C}$, on a canoniquement $\mathbf{Z}(1)/(p^n) \simeq \mu_{p^n}$, d'où un isomorphisme de foncteurs :

$$(3.3) \quad T_p(A) = T(A) \otimes \mathbf{Z}_p = T'_p(A) \oplus T''_p(A).$$

4. Rappelons que si $\varphi: X \rightarrow Y$ est une isogénie entre variétés abéliennes complexes, la suite exacte d'homotopie se réduit à une suite exacte courte

$$0 \longrightarrow H_1(X) \longrightarrow H_1(Y) \longrightarrow \text{Ker}(\varphi) \longrightarrow 0.$$

Les variétés abéliennes quotients de X par un sous-groupe fini, et ces sous-groupes finis de X , correspondent bijectivement aux sous-réseaux de $H_1(X) \otimes \mathbf{Q}$ contenant $H_1(X)$.

Soit A une variété abélienne ordinaire sur $\overline{\mathbf{F}}_p$. Si n est un entier premier à p , les sous-schémas en groupe finis d'ordre n de A , de $\tilde{A}$ et de A_c se correspondent bijectivement, et correspondent encore aux sur-réseaux R de $T(A)$ tels que $[R : T(A)] = n$.

Posons $V'_p = T'_p(A) \otimes \mathbf{Q}_p$ et $V''_p(A) = T''_p(A) \otimes \mathbf{Q}_p$. Les sous-schémas en groupes finis d'ordre p^k de A sont produits d'un sous-groupe étale et d'un sous-groupe infinitésimal. Les sous-groupes étales d'ordre p^k de A correspondent à ceux des sous-groupes d'ordre p^k de A_c tels que le sur-réseau R correspondant de $T(A)$ soit contenu dans $T'_p(A) + V''_p(A)$. Par dualité, les sous-groupes infinitésimaux de A correspondent aux sur-réseaux R de $T(A)$, p -isogènes à $T(A)$, i.e. tels que $[R : T(A)]$ soit une puissance de p , et contenus dans $T''_p(A) + V'_p(A)$.

Au total, les sous-groupes finis de A , ou les variétés abéliennes quotient de A , correspondent bijectivement aux sur-réseaux R de $T(A)$ tels que

$$(4.1) \quad R \otimes \mathbf{Z}_p = (R \otimes \mathbf{Z}_p \cap V'_p) + (R \otimes \mathbf{Z}_p \cap V''_p).$$

1. On désigne par T_p le module de Tate p -adique, et par T'_p la composante étale du groupe p -divisible.

5. En particulier, $A^{(p)}$, quotient de A par le plus grand sous-groupe infinitésimal de A tué par p (pour A ordinaire), est défini par le sur-réseau $T(A)^{(p)}$ de $T(A)$, p -isogène à $T(A)$, tel que

$$T(A)^{(p)} \otimes \mathbf{Z}_p = T'_p(A) + V''_p(A).$$

6. Soient A une variété abélienne sur $\mathbf{F}_q$ et $F: x \mapsto x^q$ son endomorphisme de Frobenius. Rappelons que A est uniquement déterminé par le couple $(\bar{A}, F)$ déduit de (A, F) par extension des scalaires de $\mathbf{F}_q$ à $\bar{\mathbf{F}}_q$; l'endomorphisme F de $\bar{A}$ se factorise par le Frobenius relatif $\text{Fr}(q): \bar{A} \rightarrow \bar{A}^{(q)}$ et un isomorphisme $F': \bar{A}^{(q)} \rightarrow \bar{A}$. Si A est ordinaire, on désignera par $T(A)$ le $\mathbf{Z}$ -module $T(\bar{A})$ muni de l'endomorphisme F induit par l'endomorphisme de Frobenius de $\bar{A}$. En vertu de 5., de ce qui précède, et de (3.3), les réseaux $T(A)$ et $F(T(A))$ sont p -isogènes et on a

$$(6.1) \quad F(T'_p(A)) = T'_p(A),$$

$$(6.2) \quad F(T''_p(A)) = q T''_p(A).$$

7.

Théorème 1. *Le foncteur $A \mapsto (T(A), F)$ est une équivalence de catégories entre la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur $\mathbf{F}_q$ et la catégorie des $\mathbf{Z}$ -modules libres de type fini T munis d'un endomorphisme F vérifiant les conditions suivantes*

- (a) *F est semi-simple, et ses valeurs propres sont de valeur absolue complexe $q^{\frac{1}{2}}$,*
- (b) *la moitié au moins des racines dans $\bar{\mathbf{Q}}_p$ du polynôme caractéristique de F sont des unités p -adiques; en d'autres termes, si T est de rang d , la réduction mod p du polynôme $P_{CT}(F; x)$ n'est pas divisible par $x^{[d/2]+1}$,*
- (c) *il existe un endomorphisme V de T tel que $FV = q$.*

Si la condition (a) est vérifiée, les conditions (b) et (c) équivalent à

- (d) *Le module $T \otimes \mathbf{Z}_p$ admet une décomposition, stable par F , en deux sous- $\mathbf{Z}_p$ -modules T'_p et T''_p de même dimension, tels que $F|_{T'_p}$ soit inversible et $F|_{T''_p}$ divisible par q .*

Démonstration. (A) Prouvons que (a) + (b) + (c) $\Rightarrow$ (d). Si α est une valeur propre complexe de F , $\bar{\alpha}$ en est une autre, de même multiplicité, et $\alpha\bar{\alpha} = q$. Si l'on excepte celles égales à $\pm q^{\frac{1}{2}}$, les valeurs propres de F dans $\mathbf{C}$, donc dans $\mathbf{Q}_p$, se rangent en paires de racines α et q/α . Les racines α et q/α ne pouvant être simultanément des unités p -adiques, il résulte de (b) que $\pm q^{\frac{1}{2}}$ n'est pas valeur propre de F , que la moitié des valeurs propres de F dans $\mathbf{Q}_p$ est formée d'unités p -adiques, soit $\alpha_1, \dots, \alpha_{d/2}$, et que l'autre moitié est formée de $\beta_1 = q/\alpha_1, \dots, \beta_{d/2} = q/\alpha_{d/2}$. Soient $T_p = T \otimes \mathbf{Z}_p$, $V_p = T \otimes \mathbf{Q}_p$, V'_p le sous-espace de V_p noyau de $\prod_i (F - \alpha_i)$ et V''_p le noyau de l'endomorphisme $\psi = \prod_i (F - \beta_i)$. On a $V_p = V'_p \oplus V''_p$. Soient T'_p la projection de T_p sur V'_p et $T''_p = T_p \cap V''_p$. Puisque ψ annule V''_p et respecte T , il envoie T_p dans $T_p \cap V''_p \subset T''_p$. Par ailleurs, $\det(\psi|_{V'_p}) = \prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j)$ est une unité p -adique, donc $\psi(T_p) = T_p$ et $T_p \cap V'_p = \psi(T_p)$, de sorte que $T_p = T'_p \oplus T''_p$.

(B) Pleine fidélité. Soient A et B deux variétés abéliennes sur $\mathbf{F}_q$, et soit ψ la flèche

$$\psi: \text{Hom}(A, B) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A), T(B)).$$

En vertu du théorème de Tate [7] et de (3.1), la flèche

$$\psi_l: \text{Hom}(A, B) \otimes \mathbf{Z}_l \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbf{Z}}(T(A), T(B)) \otimes \mathbf{Z}_l$$

est un isomorphisme pour $(l, p) = 1$, de sorte que $\psi \otimes \mathbf{Q}$ est un isomorphisme. On sait que $\text{Hom}(A, B)$ est sans torsion, donc ψ injectif. Soit $u: A \rightarrow B$ un morphisme tel que $T(u)$ soit divisible par n . Le morphisme induit $u_c: A_c \rightarrow B_c$ est alors divisible par n , donc aussi $\tilde{u}: \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ au point générique de W . Le noyau de la multiplication par n est plat sur W ; s'annule donc sur ce noyau, $\tilde{u}$ et u sont divisibles par n , et ψ est bijectif.

(C) Nécessité. Que $(T(A), F)$ vérifie (a) résulte de Weil; la condition (d), qui implique (b) et (c), résulte de 6.

(D) Isogénies. Soient (T_0, F) vérifiant (a)–(d) et T un réseau dans $T_0 \otimes \mathbf{Q}$, stable par F , vérifiant encore (d). Supposons que (T_0, F) soit l'image d'une variété abélienne $\bar{A}$ sur $\bar{\mathbf{F}}_q$ et prouvons que (T, F) provient d'une variété abélienne isogène. Remplaçant T par $\frac{1}{n}T$, qui lui est isomorphe, on peut supposer que $T \supset T_0$. La condition (d) implique que T vérifie (4.1) et T définit un sous-groupe H de $\bar{A}$, qui est défini sur $\mathbf{F}_q$, et $(T, F) = T(\bar{A}/H)$.

(E) Surjectivité. Le foncteur T induit un foncteur $T_{\mathbf{Q}}$ de la catégorie des variétés abéliennes ordinaires à isogénie près sur $\mathbf{F}_q$ dans la catégorie des $\mathbf{Q}$ -espaces vectoriels de rang fini, munis d'un automorphisme F vérifiant (a)–(b). En vertu de (D), il suffit de prouver que ce foncteur $T_{\mathbf{Q}}$ est essentiellement surjectif. Il suffit même de montrer que tout objet simple (V, F) de la catégorie image est atteint. D'après Honda [1] (voir aussi [6]), il existe une variété abélienne $\bar{A}$ sur $\bar{\mathbf{F}}_q$, telle que le polynôme caractéristique du Frobenius F_A de A soit une puissance de celui de F . La troisième caractérisation 1. des variétés abéliennes ordinaires montre que $\bar{A}$ est ordinaire. De plus, $(T(A) \otimes \mathbf{Q}, F)$ est somme de copies de (V, F) , donc, d'après (B), la variété abélienne à isogénie près $A \otimes \mathbf{Q}$ est somme de copies d'une variété abélienne B vérifiant $T(B) \otimes \mathbf{Q} = (V, F)$. $\square$

8. Soit (T, F) un couple vérifiant les hypothèses du théorème, $2g$ le rang de T . À la variété abélienne sur $\mathbf{F}_q$ correspondante et A_c la variété abélienne complexe qui s'en déduit (3.). On a

$$T = H_1(A_c)$$

de sorte que $T \otimes \mathbf{R}$ s'identifie à l'algèbre de Lie de A_c et est en tant que tel muni d'une structure complexe. Voici, d'après J.-P. Serre, comment reconstruire cette structure complexe en terme de T , F et de la restriction de φ à $W_0(\bar{\mathbf{F}}_p)$.

Proposition 2. *La structure complexe définie plus haut sur $T \otimes \mathbf{R}$ est caractérisée par les propriétés suivantes :*

- (I) *L'endomorphisme F est $\mathbf{C}$ -linéaire.*
- (II) *Si v est la valuation de la clôture algébrique $\bar{\mathbf{Q}}$ de $\mathbf{Q}$ dans $\mathbf{C}$ prolongeant la valuation de $W_0(\bar{\mathbf{F}}_p)$, les valuations des g valeurs propres de cet endomorphisme sont strictement positives.*

La condition (I) est évidente, et la condition (II) résulte de ce que l'action de F sur l'algèbre de Lie de $\tilde{A}$ est congrue à zéro mod p . L'unicité de la structure complexe vérifiant (I) et (II) résulte aisément de la condition (b) vérifiée par (T, F) .

Bibliographie

- [1] Honda, T. : Isogeny classes of abelian varieties over finite fields. J. Math. Soc. Jap. **20**, 83–95 (1968).

- [2] Ihara, Y. : On congruence monodromy problems, vol. I. University of Tokyo, 1968.
- [3] --- : The congruence monodromy problems. J. Math. Soc. Jap. **20**, 107–121 (1968).
- [4] Lubin, J., J.-P. Serre, and J. Tate : Elliptic curves and formal groups. Woods Hole Summer Institute 1964 (polycopié, tiré à un nombre restreint d'exemplaires).
- [5] Serre, J.-P. : Groupes p -divisibles (d'après J. Tate). Séminaire Bourbaki **318**, Novembre 1966.
- [6] Tate, J. : Classes d'isogénies de variétés abéliennes sur un corps fini (d'après T. Honda). Séminaire Bourbaki **352**, Novembre 1968.
- [7] --- : Endomorphisms of abelian varieties over finite fields. INVENTIONES MATH. **2**, 134–144 (1966).

PIERRE DELIGNE

I.H.E.S.

91, Bures-sur-Yvette, France

(Reçu le 3 juillet 1969)