

Comptage de faisceaux ℓ -adiques

par Pierre Deligne

à Gérard Laumon, à l'occasion de son soixantième anniversaire

1 Introduction

1.1

Soient X_0 une courbe projective, lisse, absolument connexe de genre g , sur un corps fini $\mathbb{F}_q$ de caractéristique p , et X celle qui s'en déduit par extension des scalaires à une clôture algébrique F de $\mathbb{F}_q$:

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(F) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q) \end{array} \quad (1.1.1)$$

L'endomorphisme de X_0 qui est l'identité sur l'espace topologique sous-jacent, et $f \mapsto f^q$ sur le faisceau structural, est un endomorphisme de $\mathbb{F}_q$ -schéma. Nous noterons Frob l'endomorphisme du F -schéma X qui s'en déduit par extension des scalaires. C'est l'endomorphisme de Frobenius de X . Fixons un nombre premier $\ell \neq p$, une clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ de $\mathbb{Q}_\ell$, et soit E l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur X . L'image inverse par Frob induit une permutation de E . Nous la noterons V .

1.2

Dans l'article [Dr], qui reste pour moi aussi mystérieux qu'il y a 31 ans, Drinfeld calcule le nombre de points fixes de $V : E \rightarrow E$.

Un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau $\mathcal{L}_0$ de rang un sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ est déterminé à isomorphisme près par l'unité λ de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ telle que le Frobenius géométrique $\mathrm{Fr} \in \mathrm{Gal}(F/\mathbb{F}_q)$ agisse par multiplication par λ sur la fibre de $\mathcal{L}_0$ au point géométrique $\mathrm{Spec}(F)$. La $\mathbb{F}_q$ -torsion de F_0 sur X_0 par $\mathcal{L}_0$ est le produit tensoriel avec l'image inverse de $\mathcal{L}_0$ sur X_0 . Par abus de langage, on dira aussi " $\mathbb{F}_q$ -torsion par λ ".

Drinfeld utilise que la classe d'isomorphie d'un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau lisse F sur X est fixe par Frob^* si et seulement si F est l'image inverse d'un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau F_0 sur X_0 , et que, si F est irréductible, F_0 est unique à $\mathbb{F}_q$ -torsion près. Le problème résolu par [Dr] devient celui de compter les $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses de rang 2 sur X_0 , pris à $\mathbb{F}_q$ -torsion près, et en ne considérant que ceux qui sont irréductibles et le restent après image inverse sur X .

En 1981, on disposait presque de la correspondance entre $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur X et représentations automorphes cuspidales partout non ramifiées pour $GL(2, k(X_0))$. Grâce à celle-ci, Drinfeld ramenait le problème à une application de la formule des traces pour $GL(2)$. Cette réduction montre que le nombre cherché est indépendant de ℓ . La formule obtenue par Drinfeld a les propriétés miraculeuses (A) et (B) suivantes.

Pour $n \geq 1$, soit N_n le nombre de points fixes de l'itéré n ième $V^n : E \rightarrow E$ de V . Calculer N_n est le problème ci-dessus, avec $X_0/\mathbb{F}_q$ remplacé par $(X_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^n})/\mathbb{F}_{q^n}$.

(A) La fonction $n \mapsto N_n$ a la forme

$$N_n = \sum_i a_i \beta_i^n \quad (1.2.1)$$

pour des entiers a_i et des nombres de Weil β_i convenables.

Les β_i sont des monômes en q et en les valeurs propres de l'endomorphisme Frob^* de $H^1(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$. Le genre g étant fixé, quels monômes β_i apparaissent et avec quelles multiplicités a_i ne dépend pas de la courbe considérée.

La formule des traces exprime N_n comme somme de plusieurs termes. Pris séparément, ces termes n'ont pas tous la forme (1.2.1).

Soit $\mathcal{P}$ une surface de Riemann compacte de genre g . Considérons les systèmes locaux d'espaces vectoriels complexes sur $\mathcal{P}$. Soit M l'espace de modules de ceux qui sont irréductibles de rang 2. L'espace M et l'ensemble E sont vides si $g = 0$ ou 1. Sinon, M est une variété symplectique complexe connexe. Sa dimension complexe est donc un entier pair $2N$.

(B) Dans (1.2.1), le terme dominant est q^N : un des β_i est q^N , sa multiplicité a_i est 1, et les autres β_i vérifient $|\beta_i| < q^N$.

1.3

La formule (1.2.1) est réminiscente d'une formule des traces de Lefschetz où, dans de bons cas, le nombre de points fixes des itérés T^n ($n \geq 1$) d'un endomorphisme T d'un espace S est

$$\text{Tr}(T^* | H^*(S)) := \sum_i (-1)^i \text{Tr}(T^* | H^i(S)). \quad (1.3.1)$$

Le “?” est là pour rappeler qu'il faut considérer une cohomologie avec conditions de support. Les conditions de support à imposer dépendent du comportement à l'infini de T . Par exemple, si pour une fonction d'exhaustion f sur S on a $f(T(x)) > f(x)$ (resp. $f(T(x)) < f(x)$) pour $f(x)$ assez grand, la cohomologie à considérer est la cohomologie à support compact (resp. ordinaire).

Supposons que $H^*(S)$ soit de dimension finie, pour que (1.3.1) ait un sens. Le membre de droite de (1.3.1) est alors de la forme (1.2.1) : c'est $\sum a(\beta)\beta^n$, où β parcourt les valeurs propres de T^* et où l'entier $a(\beta)$ est la somme alternée des multiplicités de β comme valeur propre des endomorphismes T^* des $H^i(S)$.

Je n'ai malheureusement aucune idée quant à comment considérer l'ensemble E des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur X comme un “espace” ayant une cohomologie $H^*(E)$ telle qu'on puisse espérer que le nombre de points fixes de V^n soit donné par une formule du type (1.3.1).

1.4

Même si on ne sait pas comment penser géométriquement à E , si $f \in E$ est la classe d'isomorphie de F , on sait ce que devrait être le complété formel $E_f^\wedge$ de E en f . Une $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -algèbre locale de dimension finie Λ est augmentée vers $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. Une déformation de F sur $\text{Spec}(\Lambda)$ est un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau lisse F_Λ sur X , muni d'une structure de Λ -module et d'un isomorphisme $F_\Lambda \otimes_\Lambda \overline{\mathbb{Q}}_\ell \xrightarrow{\sim} F$, tel qu'en un point x (et donc en tout point x de X), $(F_\Lambda)_x$ soit un Λ -module libre. Le foncteur en $\text{Spec}(\Lambda)$ des classes d'isomorphie de déformations de F sur $\text{Spec}(\Lambda)$ est proreprésentable. Notons R_F la $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -algèbre locale complète de corps résiduel $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ telle que $\text{Spf}(R_F)$ le proreprésente. Il n'y a pas d'obstruction aux déformations, et R_F est donc isomorphe à une algèbre de séries formelles $\overline{\mathbb{Q}}_\ell[[t_1, \dots, t_m]]$.

Parce que F est irréductible, ses seuls automorphismes sont les multiplications par un $\lambda \in \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$. Ils se prolongent à toute déformation. Si F et F' sont deux représentants de la classe d'isomorphie f , deux isomorphismes de F avec F' induisent donc le même isomorphisme entre R_F et $R_{F'}$: $E_f^\wedge := \text{Spf}(R_F)$ ne dépend, à isomorphisme unique près, que de f .

L'espace tangent de Zariski de $E_f^\wedge$ en f est $H^1(X, \text{End}(F))$. La forme bilinéaire symétrique $\text{Tr}(fg)$ sur $\text{End}(F)$ est une autodualité. Elle induit sur $H^1(X, \text{End}(F))$ une forme symplectique à

valeurs dans $H^2(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell) = \overline{\mathbb{Q}}_\ell(-1)$. La même construction donne sur M la structure symplectique de M . Le complété formel $E_f^\wedge$ est donc lisse de dimension paire, la même que celle de M .

Le foncteur d'image inverse par $\text{Frob} : X \rightarrow X$ transforme déformation de F en déformation de $\text{Frob}^* F$. Il induit donc un morphisme

$$V_f^\wedge : E_f^\wedge \longrightarrow E_{V(f)}^\wedge.$$

L'argument qui montre que, parce que Frob induit une équivalence de sites étales, V est bijectif, montre aussi que les $V_f^\wedge$ sont des isomorphismes. Autre preuve : soit ω la forme symplectique définie ci-dessus sur l'espace tangent en f . Si $[t] \in H^1(X, \text{End}(F))$ est la classe du vecteur tangent t en F , la classe de $dV_f^\wedge(t)$ dans $H^1(X, \text{End}(\text{Frob}^* F))$ est $\text{Frob}^*([t])$. Pour deux vecteurs tangents t et t' , $\omega(dV_f^\wedge(t), dV_f^\wedge(t'))$ est donc l'image inverse, par Frob^* , de $\omega(t_1, t_2) \in \overline{\mathbb{Q}}_\ell(-1)$, identifié à $H^2(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$. Parce que $\text{Frob} : X \rightarrow X$ est de degré q , l'endomorphisme Frob^* de $H^2(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$ est la multiplication par q , et

$$\omega(dV_f^\wedge(t_1), dV_f^\wedge(t_2)) = q \omega(t_1, t_2),$$

ce qui s'écrit aussi $(dV_f^\wedge)^* \omega = q \omega$. La différentielle $dV_f^\wedge$ est donc un isomorphisme.

L'application $dV_f^\wedge$ entre espaces tangents de Zariski s'identifie à

$$\text{Frob}^* : H^1(X, \text{End}(F)) \longrightarrow H^1(X, \text{End}(\text{Frob}^* F)).$$

Si f est un point fixe de V , F est l'image inverse de F_0 sur X_0 . On sait qu'on peut choisir F_0 pur, et $\text{End}(F_0)$ est donc pur de poids 0. Les valeurs propres de $dV_f^\wedge$ sur l'espace tangent de Zariski de $E_f^\wedge$ en f sont donc des nombres de Weil de poids 1. En particulier, aucune valeur propre de $dV_f^\wedge$ en f n'est égale à 1. C'est ce qui rend raisonnable qu'une formule à la Lefschetz (1.3.1) puisse compter les points fixes de V^n , tous pris avec la multiplicité un.

1.5

Si Y_0 est un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$, l'endomorphisme de Frobenius Frob de $Y := Y_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} F$ induit une permutation Frob de $Y(F)$. Ce qui précède montre que la nature de (E, V) est différente de celle de (Y, Frob) :

- (i) E est “sur $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ ”, donc un objet de caractéristique 0.
- (ii) Les $V_f^\wedge$ sont des isomorphismes. On aimerait dire que V est de “degré un”.
- (iii) Les points fixes de V sont isolés car les valeurs propres de $dV_f^\wedge$ en un point fixe sont des nombres de Weil de poids 1. Ceux de Frob sont isolés car $d\text{Frob} = 0$.
- (iv) Si E est de dimension $2N$, en ce sens que les $E_f^\wedge$ le sont, l'ordre de grandeur du nombre de points fixes de V^n est $(q^n)^N$, plutôt que $(q^n)^{2N}$.

1.6

L'espace de modules M est une variété algébrique complexe. Contrairement à ce qu'une analogie hâtive pourrait laisser croire, E n'est pas de façon naturelle l'espace des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -points d'une variété algébrique sur $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. Soit $x \in X(F)$. L'ensemble E s'identifie à l'ensemble des classes d'isomorphie de représentations continues irréductibles V de $\pi_1(X, x)$, de dimension 2 sur $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. Comme coordonnées sur E , on aimerait prendre les $\text{Tr}(\gamma, V)$ pour $\gamma \in \pi_1(X, x)$. Dans le cas complexe, cette construction fournit sur M sa structure “de Betti” de variété algébrique complexe. Ici, $\pi_1(X, x)$ étant un groupe profini, toute représentation V admet un réseau invariant, et les $\text{Tr}(\gamma, V)$ sont à valeurs dans l'anneau de valuation $\overline{\mathbb{Z}}_\ell$ du corps valué $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$.

Le point de vue “ E espace de représentations de $\pi_1(X, x)$ ” n'aide pas non plus à comprendre que le nombre de points fixes de V est indépendant de ℓ . Autre mystère : pourquoi, le genre

g étant fixé, le nombre de points fixes de V admet-il une description uniforme en terme de $H^1(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$, de sa structure symplectique à valeurs dans $\overline{\mathbb{Q}}_\ell(-1)$ et de son endomorphisme Frob^* , alors que $\pi_1(X, x)$ est un quotient du complété profini du π_1 topologique de $\mathcal{P}$, quel quotient dépendant de X .

1.7

Soit E_r l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang r sur X . Grâce à Lafforgue [L], le nombre de points fixes de la bijection $\text{Frob}^* : E_r \rightarrow E_r$ a une interprétation automorphe. Pour $S_0 \subset X_0$ un ensemble fini de points fermés de X_0 , et $S = S_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} F$, on peut aussi considérer des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles sur $X - S$, avec ramification prescrite en chaque $s \in S$. Dans tous les cas qui ont été calculés, les miracles (A) (B) découverts par Drinfeld persistent, mutatis mutandis. Le but de l'exposé est de donner un panorama de ce qui est connu.

2 Que compter ?

2.1

Fixons un entier $r \geq 1$, et soient $X_0, S_0/\mathbb{F}_q$ et $X, S/F$ comme en 1.1 et 1.7. Pour $s \in S$, soient $X_{(s)}$ l'hensélisé de X en s et $X_{(*s)} := X_{(s)} - \{s\}$. Supposons donné, pour chaque $s \in S$, un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau lisse de rang r $R(s)$ sur $X_{(*s)}$. Seule sa classe d'isomorphie importe. Le morphisme $\text{Frob} : X \rightarrow X$ induit un morphisme encore noté Frob de $X_{(*s)}$ dans $X_{(*\text{Frob}(s))}$. On suppose que, pour tout s dans S , $R(s)$ est isomorphe à l'image inverse de $R(\text{Frob}(s))$ par Frob :

$$R(s) \xrightarrow{\sim} \text{Frob}^*(R(\text{Frob}(s))). \quad (2.1.1)$$

Soit $R := (R(s))_{s \in S}$ la famille des $R(s)$ et notons $E(R)$ l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang r F sur $X - S$, tels que pour tout $s \in S$, l'image inverse $F|_{X_{(*s)}}$ de F sur $X_{(*s)}$ soit isomorphe à $R(s)$. L'hypothèse (2.1.1) assure que le foncteur image inverse par Frob induit une permutation de $E(R)$. Nous noterons V cette permutation.

Notre choix de “ V ”, première lettre de “Verschiebung” est dû à une analogie avec le cas de certaines variétés abéliennes, expliquée en 2.2 qui suit. Dans cette analogie, q est classiquement un nombre premier, plutôt qu'une puissance d'un nombre premier.

2.2

Pour tout schéma Y sur $\mathbb{F}_q$, notons Frob_Y l'endomorphisme du $\mathbb{F}_q$ -schéma Y qui est l'identité sur l'espace topologique sous-jacent, et qui est donné sur le faisceau structural par $\text{Frob}_Y^*(f) = f^q$. C'est l'endomorphisme de Frobenius de Y .

Prenons pour Y la variété abélienne $\text{Pic}^0(X_0)$ sur $\mathbb{F}_q$. On obtient

$$\text{Frob}_{\text{Pic}^0(X_0)} : \text{Pic}^0(X_0) \longrightarrow \text{Pic}^0(X_0). \quad (2.2.1)$$

La jacobienne $\text{Pic}^0(X_0)$ représente le foncteur suivant sur les $\mathbb{F}_q$ -schémas : le faisceau (pour la topologie de Zariski, ou pour la topologie étale, cela revient au même) associé au préfaisceau qui à S attache le groupe $\text{Pic}^0(S \times_{\mathbb{F}_q} X_0)$ des faisceaux inversibles sur $S \times_{\mathbb{F}_q} X_0$, de degré zéro sur chaque fibre de la projection sur S . Si $f : Y_0 \rightarrow X_0$ est un morphisme, l'image inverse de faisceaux inversibles par f définit un morphisme $f^* : \text{Pic}^0(X_0) \rightarrow \text{Pic}^0(Y_0)$. Prenons pour f l'endomorphisme Frob_{X_0} de X_0 . L'endomorphisme $\text{Frob}_{X_0}^*$ de $\text{Pic}^0(X_0)$ mérite d'être appelé V , car il vérifie

$$\text{Frob}_{X_0}^* \circ \text{Frob}_{\text{Pic}^0(X_0)} = \text{Frob}_{\text{Pic}^0(X_0)} \circ \text{Frob}_{X_0}^* = q. \quad (2.2.2)$$

Preuve de (2.2.2). Interprétons (2.2.2) comme deux égalités entre endomorphismes du foncteur représenté par $\text{Pic}^0(X_0)$. Pour tout foncteur contravariant G sur la catégorie des $\mathbb{F}_q$ -schémas, l'endomorphisme de Frobenius Frob_G de G est défini par $G \xrightarrow{\text{Frob}_G(S):G(S) \rightarrow G(S), \text{ est } G(\text{Frob}_S)} G$. Si G représente Y , Frob_G est induit par Frob_Y .

Prenons pour G le foncteur $S \mapsto \text{Pic}(S \times_{\mathbb{F}_q} X_0)$ des classes d'isomorphie de faisceaux inversibles sur $S \times_{\mathbb{F}_q} X_0$. L'endomorphisme $\text{Frob}_G(S)$ de $\text{Pic}(S \times_{\mathbb{F}_q} X_0)$ est l'image inverse de classes d'isomorphie de faisceaux inversibles par $\text{Frob}_S \times \text{Id} : S \times_{\mathbb{F}_q} X_0 \rightarrow S \times_{\mathbb{F}_q} X_0$.

Si on compose cette image inverse avec l'image inverse par Frob_{X_0} , on obtient l'image inverse par $\text{Frob}_{S \times_{\mathbb{F}_q} X_0}$, qui n'est autre que l'élévation à la puissance tensorielle q . Ne considérant que les faisceaux inversibles de degré zéro sur les fibres de la projection sur S , et passant du préfaisceau obtenu au faisceau associé, on obtient (2.2.2).

Si maintenant on étend les scalaires de $\mathbb{F}_q$ à F , Frob_{X_0} devient l'endomorphisme Frob de X , $\text{Pic}^0(X_0)$ devient $\text{Pic}^0(X)$ et l'endomorphisme $\text{Frob}_{X_0}^*$ de $\text{Pic}^0(X_0)$ devient l'endomorphisme de $\text{Pic}^0(X)$ "image inverse par Frob ".

2.3

Les questions que nous nous posons sont les suivantes.

- (i) Calculer, pour $n \geq 1$, le nombre $N_n(R)$ de points fixes de l'itéré n ème V^n de la permutation V de $E(R)$ (2.1). On notera que remplacer (X_0, S_0) par $(X_0, S_0) \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^n}$ remplace V par V^n .
- (ii) Déterminer si les miracles 1.2 (A) (B) subsistent.
- (iii) Si oui, pourquoi ?

2.4

Soit F un $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau lisse sur $X - S$. Comme en 1.2, on a

Lemme 2.1. (i) Pour que la classe d'isomorphie de F soit fixe sous Frob^* , il faut et il suffit que F soit isomorphe à l'image inverse sur X d'un $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau F_0 sur X_0 .

(ii) De plus, si F est irréductible, un tel F_0 est unique à $\mathbb{F}_q$ -torsion près, et

(iii) les $\mathbb{F}_q$ -tordus de F_0 par $\lambda \in \overline{\mathbb{Z}_\ell}^*$ (1.2) sont deux à deux non isomorphes.

D'après 2.4, le nombre de points fixes de la permutation V de $E(R)$ est le nombre de classes, modulo $\mathbb{F}_q$ -torsion, de $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceaux lisses de rang r F_0 sur $X_0 - S_0$, tels que

- (a) l'image inverse F de F_0 sur $X - S$ est irréductible ;
- (b) pour chaque $s \in S$, $F|_{X_{(*s)}}$ est isomorphe à $R(s)$.

Soit $D_0 = \sum n_i x_i$ un diviseur de degré un de $X_0 - S_0$. Regardons F_0 comme une représentation de Galois (voir 2.7), soit Fr_{x_i} un Frobenius en x_i , et posons

$$\langle D_0, F_0 \rangle_i := \det(\text{Fr}_{x_i}, F_0)^{n_i}.$$

Si F'_0 est le $\mathbb{F}_q$ -tordu de F_0 par λ , on a

$$\langle D_0, F'_0 \rangle = \lambda^{r \langle D_0, F_0 \rangle}.$$

D'après 2.4 (ii) et (iii), il revient donc au même de compter les F_0 vérifiant (a) et (b) à $\mathbb{F}_q$ -torsion près, ou de compter, à isomorphisme près, seulement ceux qui vérifient en outre $\langle D_0, F_0 \rangle = 1$, et de diviser par r . Pour une contrepartie automorphe, voir la remarque qui suit 2.6.

2.5

Posons $K := k(X_0)$. Pour chaque point fermé x de X_0 , soient $k(x)$ le corps résiduel de x , $\deg(x) := [k(x) : \mathbb{F}_q]$ son degré, K_x le complété de K en x , et $\mathcal{O}_x$ l'anneau de la valuation v_x de K_x . Soit $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de K . La somme $v := \sum \deg(x)v_x : \mathbb{A}^* \rightarrow \mathbb{Z}$ est triviale sur K^* . On a $|\mathbb{A}^*/K^*|_k = q^{-v(x)}$.

D'après Lafforgue, F_0 correspond à une représentation automorphe cuspidale π de $GL(r, \mathbb{A})$. Si F'_0 est le $\mathbb{F}_q$ -tordu de F_0 par λ , la représentation π' correspondante est la $\mathbb{F}_q$ -tordue de π par λ , définie comme suit. Comme représentation, c'est le produit tensoriel de π par la représentation de dimension un $g \mapsto \lambda^{v \det g}$. Comme espace de fonctions sur $GL(r, \mathbb{A})$, c'est l'espace des produits de f dans π par le caractère $g \mapsto \lambda^{v \det g}$.

Traduit dans le langage automorphe, le problème 2.3 (i) est celui de compter à $\mathbb{F}_q$ -torsion près les représentations automorphes cuspidales π de $GL(r, \mathbb{A})$, non ramifiées en dehors de S_0 , et telles que

(a') Pour tout $n \geq 1$, π reste cuspidale après changement de base de K à $K \otimes \mathbb{F}_{q^n}$.

Cette condition exprime l'irréductibilité 2.4 (a) de F . Il suffit de la vérifier pour n divisant r .

(b') Pour chaque $s \in S_0$ et $s' \in S$ au-dessus de s_0 , la composante locale π_{s_0} de π vérifie une condition dictée par $R(s)$ et par la correspondance de Langlands locale.

Lemme 2.2. *Si π automorphe cuspidale vérifie (a'), les $\mathbb{F}_q$ -tordues de π sont deux à deux distinctes.*

C'est la traduction de 2.4 (iii).

Si d est un idéal vérifiant $v(d) = 1$, il revient donc au même de compter à $\mathbb{F}_q$ -torsion près les π vérifiant (a') (b'), ou de ne compter que ceux dont le caractère central ω_π vérifie $\omega_\pi(d) = 1$, et de diviser par r .

En caractéristique finie, la notion de représentation automorphe est purement algébrique. Ceci permet de prendre les représentations automorphes π comme étant à coefficients dans $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$, plutôt que $\mathbb{C}$. Si on le fait, π_{s_0} est une $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -représentation admissible irréductible de $GL(r, K_{s_0})$, et la correspondance de Langlands locale lui associe une classe d'isomorphie de $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -représentations F -semi-simples continues de dimension r du groupe de Weil local $W(\overline{K}_{s_0}/K_{s_0})$. La condition (b') est que sa restriction au sous-groupe d'inertie soit donnée par $R(s)$ (cf 2.4 ci-dessous).

Presque tous les résultats connus sur la question 2.3 (i) sont obtenus via le dictionnaire 2.5.

2.6

Dans 2.1, nous avons employé le langage des $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceaux. Ceci nous a dispensé d'avoir à choisir des points base. Un langage équivalent est celui des représentations de Galois. Voici la traduction.

Soit $\overline{k(X)}$ une clôture algébrique du corps des fonctions rationnelles $k(X)$ de X , et $k(X)^{nr}$ la plus grande sous-extension non ramifiée en dehors de S . Le groupe de Galois $\text{Gal}(k(X)^{nr}/k(X))$ est le groupe fondamental de X en le point géométrique $\overline{\eta} := \text{Spec}(\overline{k(X)})$ de X : le foncteur "fibre en $\overline{\eta}$ " est une équivalence de catégories, des $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceaux lisses (resp. et irréductibles de rang r) sur $X - S$, vers les $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -représentations linéaires de $\text{Gal}(k(X)^{nr}/k(X))$ (resp. irréductibles de rang r).

Le schéma $X_{(*s)}$ est le spectre d'une extension $k(X_{(*s)})$ de $k(X)$. Si on choisit un plongement de cette extension dans $\overline{k(X)}$, le groupe d'inertie correspondant $I_s := \text{Gal}(\overline{k(X)}/k(X_{(*s)}))$ est de même le groupe fondamental de $X_{(*s)}$ en $\overline{\eta}$. Il s'envoie dans $\pi_1(X, \overline{\eta})$:

$$\pi_1(X_{(*s)}, \overline{\eta}) = I_s = \text{Gal}(\overline{k(X)}/k(X_{(*s)})) \hookrightarrow \text{Gal}(k(X)^{nr}/k(X)) = \pi_1(X, \overline{\eta}). \quad (2.7.1)$$

La fibre en $\overline{\eta}$ de $R(s)$ est une représentation ρ_s de I_s .

Soit F un $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau lisse sur $X - S$, d'image inverse $F|_{X_{(*)s}}$ sur $X_{(*)s}$. Les fibres au point géométrique $\bar{\eta}$ sont respectivement une représentation de $\pi_1(X - S, \bar{\eta}) = \text{Gal}(k(X)^{nr}/k(X))$ et sa restriction à $\pi_1(X_{(*)s}, \bar{\eta}) = I_s$ par (2.7.1). Que $F|_{X_{(*)s}}$ soit isomorphe à $R(s)$ équivaut à ce que cette restriction à I_s soit isomorphe à ρ_s .

La condition (2.1.1) équivaut à ce que les ρ_s , pour s au-dessus de s_0 , proviennent d'une représentation d'un groupe de décomposition $D_{s_0} \subset \text{Gal}(\overline{k(X)}/k(X_0))$ en s_0 . Elle implique que les représentations ρ_s sont quasi-unipotentes.

2.7

J'espère que le problème 2.3 (i) est plus maniable lorsqu'un $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau lisse F tel que $F|_{X_{(*)s}} \cong R(s)$ pour tout $s \in S$ est automatiquement irréductible. C'est le cas si la condition suivante est vérifiée. Considérons un entier $0 < r' < r$ et la donnée, pour chaque $s \in S$, d'un sous- $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau $R'(s)$ lisse de rang r' , de $R(s)$. Posons $R''(s) := R(s)/R'(s)$. La condition est que

Quels que soient r' et les $R'(s)$, ou bien il n'existe aucun $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau F' lisse de rang r' sur $X - S$ tel que $F'|_{X_{(*)s}} \cong R'(s)$ pour tout $s \in S$, ou bien il n'existe aucun $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau F'' lisse de rang $r - r'$ sur $X - S$ tel que $F''|_{X_{(*)s}} \cong R''(s)$ pour tout $s \in S$. (2.8)

La condition (2.8.1) est vérifiée si l'un des $R(s)$ est irréductible. Pour d'autres cas, voir 2.10.4, 2.11 et 2.12.

2.8

Pour tout corps k de caractéristique p ou 0, contenant toutes les racines de l'unité d'ordre premier à p , posons

$$\mathbb{Z}_{p'}(1)(k) := \varprojlim \mu_n(k). \quad (2.9.1)$$

La limite projective est prise selon l'ensemble ordonné par inclusion des sous-groupes $\mu_n(k)$ de k^* (n premier à p). Le morphisme de transition de $\mu_m(k)$ à $\mu_n(k)$ est $x \mapsto x^{m/n}$.

Si cela ne crée pas d'ambiguïté, on omettra " p " et la mention de k .

2.9

À cause de (c), on ne peut même pas espérer que Z provienne d'un champ algébrique $\mathcal{C}$ (c'est-à-dire que $Z(T)$ soit l'ensemble des classes d'isomorphie dans $\mathcal{C}(T)$).

Toutefois

- (d) Les groupes d'automorphismes sont des groupes algébriques connexes. Si $k' \subset k''$ sont des extensions finies de $\mathbb{F}_q$, ceci assure que

$$Z(k') \xrightarrow{\sim} Z(k'')^{\text{Gal}(k''/k')}.$$

- (e) Dans (b) ci-dessus, la fonction $t \mapsto \dim \text{End}(E_t, \alpha_t)$ est constructible ; dans (c), l'ensemble des t tels que (E_t, α_t) soit géométriquement indécomposable est constructible.

Les propriétés (d) et (e) permettent, en "découpant Z en morceaux" et en prenant les faisceaux (représentables) associés, d'obtenir Z tel que promis par (3.3.1).

2.10 Esquisse de preuve de 3.5 $\Rightarrow$ (3.3.1)

Pour tout schéma T sur $\mathbb{F}_q$, soient $X_T := X_0 \times_{\mathbb{F}_q} T$ et $S_T := S_0 \times_{\mathbb{F}_q} T$. Définissons $Z(T)$ comme étant l'ensemble de classes d'isomorphie de fibrés vectoriels de rang r sur X_T , munis

d'une structure parabolique le long de S_T , et tels que les conditions de 3.2 et 3.3 soient vérifiées sur chaque fibre géométrique de $X_T \rightarrow T$: degré d , type de la structure parabolique, indécomposabilité.

Naïvement, on aimerait prendre pour schéma Z de (3.3.1) un schéma qui représente le foncteur Z . Pour plusieurs raisons, ce foncteur n'est pas représentable :

- (a) Les objets considérés ayant des automorphismes non triviaux, par exemple les homothéties, ce foncteur n'est pas un faisceau, même pour la topologie de Zariski. Pour le foncteur Pic, on contourne le même problème en passant au faisceau associé. Ici, la situation est pire, car, pour (E_T, α_T) un fibré vectoriel à structure parabolique sur X_T , et pour (E, α) le fibré induit sur la fibre X_t de $X_T \rightarrow T$ en $t \in T$:
- (b) la dimension du groupe des automorphismes de (E_t, α_t) (égale à $\dim \text{End}(E_t, \alpha_t)$) n'est pas toujours localement constante en t .
- (c) L'ensemble des t pour lesquels (E_t, α_t) est géométriquement indécomposable n'est pas toujours localement fermé.

À cause de (c), on ne peut même pas espérer que Z provienne d'un champ algébrique $\mathcal{C}$ (c'est-à-dire que $Z(T)$ soit l'ensemble des classes d'isomorphie dans $\mathcal{C}(T)$).

Toutefois

- (d) Les groupes d'automorphismes sont des groupes algébriques connexes. Si $k' \subset k''$ sont des extensions finies de $\mathbb{F}_q$, ceci assure que

$$Z(k') \xrightarrow{\sim} Z(k'')^{\text{Gal}(k''/k')}.$$

- (e) Dans (b) ci-dessus, la fonction $t \mapsto \dim \text{End}(E_t, \alpha_t)$ est constructible ; dans (c), l'ensemble des t tels que (E_t, α_t) soit géométriquement indécomposable est constructible.

Les propriétés (d) et (e) permettent, en “découpant Z en morceaux” et en prenant les faisceaux (représentables) associés, d'obtenir Z tel que promis par (3.3.1).

2.11 Esquisse de preuve de 3.5 (pour $n = 1$)

On applique la stratégie 2.5. Il nous faut montrer que $|Z(\mathbb{F}_q)|$ est le nombre de représentations automorphes cuspidales π de $GL(r, \mathbb{A})$, comptées à $\mathbb{F}_q$ -torsion près, qui sont non ramifiées en dehors de S_0 et dont la composante locale π_{s_0} en $s \in S_0$ est du type suivant. Par la correspondance de Langlands locale, la représentation π_{s_0} de $GL(r, K_{s_0})$ correspond à une $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -représentation F -semi-simple ρ du groupe de Weil $W(\overline{K}_{s_0}/K_{s_0})$. On veut en premier lieu que ρ soit semi-simple (dans le langage du groupe de Weil-Deligne : $N = 0$; dans le langage d'Arthur : action triviale du $SL(2)$ ou $SU(2)$ local). Le groupe $W(\overline{K}_{s_0}/K_{s_0})^{ab}$ est $K_{s_0}^*$. Son groupe d'inertie $O_{s_0}^*$ admet pour quotient $k(s_0)^*$. On veut que la restriction de ρ au groupe d'inertie se factorise par la représentation de $k(s_0)^*$ somme des ε dans $R(s_0)$.

Soit $P[s_0] \subset GL(r, \mathcal{O}_{s_0})$ le sous-groupe parahorique image inverse du parabolique standard $\overline{P}[s_0]$ de $GL(r, k(s_0))$ de type $n(s_0)$. Le quotient réductif $L[s_0]$ de $\overline{P}[s_0]$ est $\prod_i GL(n[s_0](i), k(s_0))$. Notons $U[s_0]$ le noyau de $P[s_0] \rightarrow \overline{P}[s_0] \rightarrow L[s_0]$ et $\varepsilon[s_0]$ le caractère

$$\varepsilon[s_0] = \prod_i \varepsilon[s_0](i)(\det g_i) : P[s_0] \twoheadrightarrow \overline{P}[s_0] \twoheadrightarrow L[s_0] \twoheadrightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$$

du parahorique $P[s_0]$. Par construction, les $\varepsilon[s_0](i)$ sont deux à deux distincts.

Nous admettrons l'assertion suivante :

Assertion 3.8. Les représentations admissibles irréductibles de $GL(r, K_{s_0})$ du type défini en 3.7 sont celles qui admettent une droite stable par P sur laquelle P agit par le caractère $\varepsilon[s_0]$. Cette droite est unique.

2.12

Soit $\mathcal{A}'$ l'ensemble des représentations automorphes cuspidales π de $GL(r, \mathbb{A})$, admettant une droite $L(\pi)$ fixe par les $GL(r, \mathcal{O}_x)$ pour $x \notin S_0$, et stable par $P[s_0]$ pour $s_0 \in S_0$, l'action de $P[s_0]$ étant donnée par $\varepsilon[s_0]$. La droite $L(\pi)$ est unique si elle existe.

D'après Lafforgue [L] et 3.8, $N_1(R)$ est le nombre de classes modulo $\mathbb{F}_q$ -torsion dans $\mathcal{A}'$. Fixons un idèle d de valuation 1 et soit $\mathcal{A}$ l'ensemble des π dans $\mathcal{A}'$ dont le caractère central ω_π vaut 1 en d . Comme observé après 2.3.1, on a

$$N_1(R) = |\mathcal{A}' \bmod \mathbb{F}_q\text{-torsion}| = |\mathcal{A} \bmod \mathbb{F}_q\text{-torsion}| \cdot \frac{1}{r} = \frac{|\mathcal{A}|}{r}. \quad (3.9.1)$$

2.13

Soit $\mathcal{A}$ l'espace vectoriel des fonctions sur $GL(r, \mathbb{A})$ qui sont

- (a) invariantes à gauche par $GL(r, K) \cdot d^\mathbb{Z}$;
- (b) invariantes à droite sous $GL(r, \mathcal{O}_x)$, pour $x \notin S_0$;
- (c) se transforment par $\varepsilon[s_0]$ pour l'action à droite de $P[s_0]$, pour $s_0 \in S_0$.

Un point clé de la preuve de 3.5 est le lemme suivant.

Lemme 2.3. *L'espace vectoriel $\mathcal{A}$ est la somme directe des droites $L(\pi)$, pour π dans $\mathcal{A}$. Il est donc de dimension $rN_1(R)$.*

Ce lemme est la contrepartie automorphe, et une conséquence, de ce que l'irréductibilité des $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceaux F_0 considérés résulte des hypothèses locales faites.

Il s'agit de vérifier que les fonctions dans $\mathcal{A}$ sont automatiquement cuspidales. Ceci fait, si on écrit l'espace de fonctions cuspidales sur $GL(r, K) \cdot d^\mathbb{Z} \backslash GL(r, \mathbb{A})$ comme somme directe de représentations irréductibles π de $GL(r, \mathbb{A})$, les π dans $\mathcal{A}$ contribuent $L(\pi)$ à $\mathcal{A}$, les autres ne contribuent pas.

Que les fonctions dans $\mathcal{A}$ soient cuspidales résulte de ce que dans la décomposition spectrale des fonctions sur $GL(r, K) \cdot d^\mathbb{Z} \backslash GL(r, \mathbb{A})$, les représentations induites donnant lieu aux séries d'Eisenstein n'admettent pas de vecteur non nul vérifiant 3.10 (b) (c).

2.14

L'espace $\mathcal{A}$ somme des $L(\pi)$ pour $\pi \in \mathcal{A}$ s'identifie à l'espace des fonctions f sur

$$GL(r, K) d^\mathbb{Z} \backslash GL(r, \mathbb{A}) / \prod_{x \notin S_0} GL(r, \mathcal{O}_x) \prod_{s_0 \in S_0} U[s_0] \quad (3.12.1)$$

telles que, pour chaque $s \in S_0$ l'action à droite de $P[s_0]$ vérifie $f(gp) = \varepsilon[s_0](p)f(g)$.

Notons $\overline{\mathcal{A}}$ le quotient de $\mathcal{A}$ par l'action par $\mathbb{F}_q$ -torsion de $\mu_r(\overline{\mathbb{Q}_\ell})$, et pour chaque orbite B , soit V_B le sous-espace de $\mathcal{A}$ somme des $L(\pi)$ pour π dans B . D'après (2.3.1), on a $\dim(V_B) = r$.

Pour $m \in \mathbb{Z}/r$, notons $(3.12.1)_m$ la partie de (3.12.1) où $v \det = m$, φ_m sa fonction caractéristique et $L(\pi, m) = \varphi_m \cdot f$ pour $f \in L(\pi)$. La dimension de $L(\pi, m)$ est ≤ 1 . Pour chaque caractère η de $\mathbb{Z}/r$, si π' est le $\mathbb{F}_q$ -tordu de π par $\eta(1)$, la multiplication par η^v transforme $L(\pi)$ en $L(\pi')$. Pour $\pi \in B$, $L(\pi, m)$ est donc indépendant de π ; on pose $L(B, m) := L(\pi, m)$. L'espace V_B est stable par les multiplications par les η^v , donc par multiplication par les φ_m : pour $\pi \in B$,

$$V_B = \bigoplus_{m \in \mathbb{Z}/r} L(B, m).$$

Chaque $L(B, m)$ est donc de dimension un.

La somme $\overline{\mathcal{A}}$ des $L(B, m)$ est de dimension $|\mathcal{A}|/r = N_1(R)$. Elle s'identifie à l'espace des fonctions f_m sur (3.12.1) telles que, pour chaque $s \in S_0$, l'action à droite de $P[s_0]$ vérifie $f(gp) = \varepsilon[s_0](p)f(g)$.

Lemme 2.4. $N_1(R)$ est la dimension de l'espace, encore noté $\mathcal{A}_d$, des fonctions f sur

$$GL(r, K) \backslash GL(r, \mathbb{A})(d) / \prod_{x \notin S_0} GL(r, \mathcal{O}_x) \prod_{s_0 \in S_0} U[s_0] \quad (3.12.2)$$

qui, pour l'action à droite des $P[s_0]$ ($s \in S_0$) vérifient $f(gp) = \varepsilon[s_0](p)f(g)$.

2.15

L'ensemble (3.12.2) s'interprète comme l'ensemble des classes d'isomorphisme de triples (E_0, α, β) où E_0 est un fibré vectoriel de rang r et de degré d sur X_0 , et où α et β sont des structures des types suivants sur E_0 :

- (a) α est une structure parabolique de type $(n[s_0])_{s_0 \in S_0}$;
- (b) β est la donnée de bases des espaces vectoriels $\text{Gr}_{F(s_0)}(E_{s_0})$.

Nous identifierons une base comme en (b) avec un isomorphisme

$$\beta : \bigoplus_{s_0, i} k(s_0)^{n[s_0](i)} \xrightarrow{\sim} \text{Gr}_{F(s_0)}(E_{s_0}).$$

Avec cette interprétation, l'espace $\mathcal{A}_d$ de 3.13 devient l'espace des fonctions $f(E_0, \alpha, \beta)$, pour E_0, α, β comme ci-dessus, telles que

- (i) $f(E_0, \alpha, \beta)$ ne dépend que de la classe d'isomorphisme de (E_0, α, β) ;
- (ii) pour $s \in S_0$ et $g \in L[s_0] = \prod_i GL(n, k(s_0))$, on a

$$f(E_0, \alpha, \beta g) = \varepsilon[s_0](g)f(E_0, \alpha, \beta).$$

Pour T un automorphisme de (E_0, α) , notons $\text{Gr}_{F(s_0)}(T_{s_0})$ l'automorphisme de $\text{Gr}_{F(s_0)}(E_{s_0})$ induit par T , et posons

$$\chi(T) := \prod_{s_0} \prod_i \varepsilon[s_0](i)(\det \text{Gr}_{F(s_0)}(T_{s_0})). \quad (3.14.1)$$

Quel que soit β , l'hypothèse (i) donne que $f(E_0, \alpha, T(\beta)) = f(E_0, \alpha, \beta)$. L'hypothèse (ii) donne que $f(E_0, \alpha, T(\beta)) = \chi(T)f(E_0, \alpha, \beta)$. S'il existe un automorphisme T tel que $\chi(T) \neq 1$, on a donc $f(E_0, \alpha, \beta) = 0$. Par contre, si pour tout automorphisme T de (E_0, α) on a $\chi(T) = 1$, f peut être librement prescrit en un (E_0, α, β) , et la valeur en (E_0, α, β) détermine la valeur en les (E'_0, α, β') .

La dimension de $\mathcal{A}_d$ est donc le nombre de classes d'isomorphisme de (E_0, α) comme ci-dessus, tels que pour tout automorphisme T on ait $\chi(T) = 1$. Le théorème 3.5 résulte dès lors de la caractérisation (3.4.3) de l'indécomposabilité géométrique et de la proposition suivante.

Proposition 2.5. Soit E_0 un fibré vectoriel de rang r sur X_0 , muni d'une structure parabolique α de type $(n(s_0))_{s_0 \in S_0}$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) Le quotient de la $\mathbb{F}_q$ -algèbre $\text{End}(E_0, \alpha)$ par son radical est réduit à $\mathbb{F}_q$.
- (ii) Quel que soit l'automorphisme T de (E_0, α) , $\chi(T)$ défini par (3.14.1) vaut 1.

Nous déduirons que (i) implique (ii) de (3.2.2), et que la négation de (i) implique la négation de (ii) de l'hypothèse de position générale (2.10.3).

Preuve de (i) $\Rightarrow$ (ii). Si λ est l'image dans $\mathbb{F}_q^*$ de l'automorphisme $T \in \text{End}(E_0, \alpha)^*$, on a

$$\prod_i \varepsilon[s_0](i)(\det \text{Gr}_{F(s_0)}(T_{s_0})) = \prod_i \varepsilon(s_0)(i)^{n[s_0](i)(\lambda)},$$

de sorte que (3.2.2) implique que $\chi(T) = 1$.

Preuve de (ii) $\Rightarrow$ (i). Le quotient de la $\mathbb{F}_q$ -algèbre $\text{End}(E_0, \alpha)$ par son radical est un produit d'algèbres de matrices sur des extensions finies de $\mathbb{F}_q$. S'il n'est pas réduit à $\mathbb{F}_q$, il contient une $\mathbb{F}_q$ -algèbre commutative séparable de dimension > 1 . Cette algèbre admet un relèvement dans $\text{End}(E_0, \alpha)$.

Supposons donc que $\text{End}(E_0, \alpha)$ contienne une sous-algèbre commutative séparable k de dimension > 1 . Il nous faut montrer que le caractère (3.14.1) de $\text{End}(E_0, \alpha)^*$ est non trivial. Nous prouverons que sa restriction χ à k^* est non triviale.

Cas déployé. Supposons tout d'abord que k est un produit de copies de $\mathbb{F}_q$: $k \cong \mathbb{F}_q^I$, et que les points fermés $s \in S_0$ sont de degré 1 : $\mathbb{F}_q \xrightarrow{\sim} k(s_0)$. La structure de $\mathbb{F}_q^I$ -module de E_0 fournit une décomposition

$$E_0 = \bigoplus_{\iota \in I} E_0^\iota \quad (3.15.1)$$

telle que $(\lambda_\iota)_{\iota \in I} \in \mathbb{F}_q^I$ agisse sur E_0^ι par multiplication par λ_ι . La décomposition (3.15.1) est compatible à la structure parabolique. Pour $\iota \in I$, posons

$$n_\iota[s_0](i) = \dim \text{Gr}_{F(s_0)}((E_0^\iota)_{s_0}).$$

La somme sur ι des $n_\iota[s_0](i)$ est le rang du fibré E_0^ι . La restriction de χ au facteur d'indice ι de $(\mathbb{F}_q^I)^* = \prod_{\iota \in I} \mathbb{F}_q^*$ est

$$\lambda \mapsto \prod_{s_0 \in S_0} \prod_i \varepsilon[s_0](i)^{n_\iota[s_0](i)(\lambda)}. \quad (3.15.2)$$

Son composé avec le morphisme $\mathbb{Z}(1) \rightarrow \mathbb{F}_q^*$ de 3.1 est le caractère

$$\prod_{s \in S} \prod_i \varepsilon[s](i)^{n_\iota[s](i)}$$

de $\mathbb{Z}(1)$. L'hypothèse (2.10.3) assure que ce caractère est non trivial.

Réduction du cas général au cas déployé. Il suffit de montrer que la non-trivialité de χ est invariante par une extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à une extension finie $\mathbb{F}_{q^n}$. Par une telle extension des scalaires, X_0 devient une courbe X' sur $\mathbb{F}_{q^n}$, S_0 devient un diviseur S' de X' , et k devient $k' := k \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^n}$. Pour $s \in S'$ au-dessus de $s_0 \in S_0$, posons $n[s'] := n[s_0]$ et notons $\varepsilon[s](i)$ le composé de $\varepsilon[s'](i)$ avec la norme $N_{k(s')/k(s_0)}$. Le fibré E' sur X' image inverse de E_0 hérite d'une structure parabolique α' de type $(n(s'))_{s' \in S'}$. Si on répète pour E' sur $X'/\mathbb{F}_{q^n}$ la construction (3.14.1), on obtient un caractère χ' de k'^* . La courbe X/F , les entiers $n[s](i)$ et les caractères $\varepsilon[s](i)$ de $\mathbb{Z}(1)$ proviennent aussi bien de $X_0/\mathbb{F}_q$ que de $X'/\mathbb{F}_{q^n}$.

Pour prouver que la trivialité de χ équivaut à celle de χ' , il suffit de prouver que

$$\chi' = \chi \circ N_{k'/k}. \quad (3.15.3)$$

La norme $N_{k'/k}$ est en effet surjective. L'identité (3.15.3) résulte de l'identité (3.16.1) qui suit, appliquée à chaque $\text{Gr}_{F(s_0)}(E_{s_0})$, muni de sa structure de $(k, k(s_0))$ -bimodule.

Soient k_0 une extension finie de $\mathbb{F}_q$, N un k_0 -espace vectoriel de dimension finie, k un produit d'extensions finies de $\mathbb{F}_q$ et $\rho : k \rightarrow \text{End}_{k_0}(N)$. Le (k, k_0) -bimodule N définit un homomorphisme

$$[N] : k^* \longrightarrow k_0^* : \quad \lambda \mapsto \det(\rho(\lambda)).$$

Etendons les scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}_{q^n}$. On obtient k'_0 , k' et un (k', k'_0) -bimodule N' . Ce bimodule définit

$$[N'] : k'^* \longrightarrow k'_0^* : \quad \lambda \mapsto \det_{k'_0}(\rho(\lambda)).$$

Lemme 2.6. *Le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} k'^* & \xrightarrow{[N']} & k_0'^* \\ N_{k'/k} \downarrow & & \downarrow N_{k_0'/k_0} \\ k^* & \xrightarrow{[N]} & k_0^* \end{array} \quad (3.16.1)$$

est commutatif.

Preuve. Etendons les scalaires de $\mathbb{F}_q$ à F . Le diagramme (3.16.1) se plonge dans un diagramme (3.16.2) analogue, où k et k_0 sont remplacés par $k_F := k \otimes_{\mathbb{F}_q} F$, $k_{0F} := k_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} F$, où N' est remplacé par un (k_F, k_{0F}) -bimodule N , et où l'extension $\mathbb{F}_{q^n}$ de $\mathbb{F}_q$ est remplacée par un produit F^J de n copies de F .

$$\begin{array}{ccc} (k_F \otimes F^J)^* & \xrightarrow{[N_F]} & (k_{0F} \otimes F^J)^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ k_F^* & \xrightarrow{[N]} & k_{0F}^* \end{array} \quad (3.16.2)$$

On a $(k_F \otimes F^J)^* = (k_F^*)^J$, $(k_{0F} \otimes F^J)^* \cong (k_{0F}^*)^J$ et les applications verticales “norme” sont les applications produit. La première ligne horizontale est le produit de copies indexées par J de la seconde ligne horizontale. La commutativité de 3.16.2 en résulte.

3 Formule des traces

3.1

Dans [DF], le problème de comptage 2.3 (i) est résolu lorsque $|S_0| \geq 2$ et que les monodromies locales imposées sont unipotentes, avec un seul bloc de Jordan. Dans le langage automorphe, cela signifie qu'on demande aux composantes locales π_{s_0} ($s_0 \in S_0$) d'être de la forme

$$\text{représentation spéciale} \otimes \chi \det g, \quad (4.1.1)$$

pour χ un caractère non ramifié de $K_{s_0}^*$.

L'hypothèse $|S_0| \geq 2$ permet de passer des représentations automorphes pour $GL(r, K)$ aux représentations automorphes pour le groupe multiplicatif d'une algèbre à division D de dimension r^2 sur K . Il est rassurant de n'utiliser la formule des traces que dans un cas à quotient compact (modulo le centre), mais il devrait être possible d'utiliser plutôt la formule des traces pour $GL(n)$, pour une fonction test convenable, avec la simplification qu'apporte le fait qu'on veut détecter des représentations automorphes qui en deux places sont de la série discrète. Après tout, c'est ainsi qu'on relie $GL(r, K)$ et D^* . On simplifiera les explications qui suivent en restant avec $GL(r, K)$, mais en admettant que les seuls termes non nuls dans la formule des traces requise sont ceux associés aux classes de conjugaison d'éléments elliptiques d'ordre fini de $GL(r, K)$.

Choisissons un plongement $\mathbb{F}_{q^r} \hookrightarrow M_r(\mathbb{F}_q)$. Il définit un morphisme $\mathbb{F}_{q^r}^* \hookrightarrow GL(r, \mathbb{F}_q) \hookrightarrow GL(r, K)$, par lequel l'ensemble des orbites de $\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^r}/\mathbb{F}_q)$ dans $\mathbb{F}_{q^r}^*$ s'envoie bijectivement sur l'ensemble des classes de conjugaison à considérer.

Soit $T(\gamma)$ le terme de la formule des traces (donnant le nombre de points fixes de V) ainsi associé à γ dans $\mathbb{F}_{q^r}^*$. Il ne dépend que de la sous-extension $\mathbb{F}_{q^m}$ de $\mathbb{F}_q$ engendrée par γ . Posons $T(m) := T(\gamma)$. Le nombre c_m d'éléments de $\mathbb{F}_{q^m}^*$ qui engendrent l'extension $\mathbb{F}_{q^m}$ de $\mathbb{F}_q$ est

$$c_m = \sum_{a|m} \mu(a)(q^{m/a} - 1).$$

Le nombre de points fixes de V est

$$N_1 = \sum_{m|r} c_m T(m) = \sum_{m|r} \sum_{ab=m} \mu(a)(q^b - 1) T(ab) \quad (4.1.2)$$

$$= \sum_{b|ab|r} \sum_a \mu(a)(q^b - 1)T(ab).$$

Le nombre de points fixes de V^n ($n \geq 1$) est obtenu de même, après avoir étendu les scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}_{q^n}$.

Surprise 3.1. *Quand on laisse varier n , chaque $T(m)$ n'est en général pas, comme fonction de n , de la forme (1.2.1). Par contre, dans (4.1.2), chaque terme de la somme sur b est de cette forme.*

Je n'ai aucune explication, ni géométrique, ni automorphe, de 4.2, seulement une démonstration. Je n'ai pas non plus d'explication à la

Surprise 3.2. *Sous les hypothèses de 4.1, le nombre N_1 de points fixes de V est divisible par q .*

3.2

Si $r = 2$, la formule des traces est un peu moins effrayante. Drinfeld [Dr] l'a utilisée pour traiter du cas où S_0 est vide. Flicker (non publié) a traité du cas où $|S_0| = 1$ et où la monodromie locale en chaque $s \in S$ est unipotente avec un seul bloc de Jordan (c'est à dire, puisque $r = 2$, non triviale). Rassemblant les informations ainsi obtenues, on obtient la

Surprise 3.3. *Soit E l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur $X - S$, à monodromie locale unipotente (tant non triviale que triviale). Le nombre de points fixes de $V := \text{Frob}^*$ sur E ne dépend que de $X_0/\mathbb{F}_q$ et de $|S_0|$.*

C'est à cette surprise que 2.16 fait allusion. Si, comme dans [DF], on exige que la monodromie locale en chaque $s \in S$ soit unipotente avec un seul bloc de Jordan le nombre de points fixes dépend de X_0 , de S , et aussi de l'action de Frobenius sur S (vue comme classe de conjugaison dans le groupe symétrique $\mathfrak{S}_{|S_0|}$).

4 Exemples

4.1

Prenons $X_0 = \mathbf{P}^1$, $|S_0| = 4$, $r = 2$ et soit E l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles de rang 2 sur $X - S$, à monodromie locale en chaque $s \in S$ unipotente non triviale. Dans ce cas, le nombre de points fixes des itérés de la permutation $V = \text{Frob}^*$ de E (notations de 2.1) est donné par

$$N_n = q^n. \quad (5.1.1)$$

Si $|S_0| \geq 2$, (5.1.1) est une application du résultat principal de [DF]. Le curieux résultat suivant ([DF] §7) permet d'en déduire le cas où S_0 est réduit à un point fermé de degré 4.

Proposition 4.1. *Chaque permutation σ de type (2, 2) de S se prolonge en une projectivité de $\mathbf{P}^1$. L'action de cette projectivité sur E est triviale.*

La preuve est par réduction à un théorème analogue sur $\mathbb{C}$.

4.2

Il est naturel de compléter l'ensemble E de 5.1 en $\overline{E}$, l'ensemble des classes d'isomorphie à semi-simplification près de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses de rang 2 sur $X - S$, à monodromie locale unipotente en chaque $s \in S$. Parce que $X_0 = \mathbf{P}^1$ et que $|S_0| = 4$, cette complétion $\overline{E}$ ne diffère de E que par l'adjonction d'un point correspondant au $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau constant $\overline{\mathbb{Q}}_\ell^2$.

On note encore V la permutation de $\overline{E}$ induite par Frob^* . Le nombre $\overline{N}_n$ de points fixes de V^n agissant sur $\overline{E}$ est

$$\overline{N}_n = q^n + 1 \quad (\text{points fixes sur } \overline{E}). \quad (5.3.1)$$

4.3

L'analogue complexe de $\overline{E}$ est l'espace de modules $\overline{M}_{\mathbb{C}}$ des systèmes locaux complexes de rang 2 sur $\mathbf{P}^1 - S$, pour $|S| = 4$, à monodromie locale unipotente. Ces systèmes locaux sont pris à semi-simplification près. Si on choisit un point base $o \in \mathbf{P}^1 - S$, le foncteur $F \mapsto F_o$ est une équivalence de systèmes locaux vers les représentations de $\pi_1(\mathbf{P}^1 - S, o)$, et on peut prendre comme coordonnées sur $\overline{M}_{\mathbb{C}}$ les traces des éléments du π_1 . L'espace $\overline{M}_{\mathbb{C}}$ est affine, purement de dimension 2, avec un unique point singulier correspondant au système local constant $\mathbb{C}^2$.

La singularité est de type D_4 . Les nombres de Betti non nuls de $\overline{M}_{\mathbb{C}}$ sont

$$b_0 = 1, \quad b_2 = 1. \quad (5.4.1)$$

4.4

Je n'ai pas fait une vérification complète, mais la situation semble toute pareille pour $X_0 = \mathbf{P}^1$, $|S_0| = 3$, $r = 3$, monodromie locale unipotente. À nouveau, si une des monodromies locales n'est pas à un seul bloc de Jordan, le $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell}$ -faisceau est extension itérée de systèmes locaux constants $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell}$. L'analogue de 5.3 vaut pour σ une permutation cyclique des trois points de S . Le nombre de points fixes de V^n est encore $q^n + 1$ (avec "1" donné par les systèmes locaux à monodromie locale unipotente réductibles, tous de semi-simplifié un système local constant). L'unique point singulier de l'analogue complexe est de type E_6 .

4.5

Prenons $X_0 = \mathbf{P}^1$, $|S_0| = 4$, $r = 2$ et supposons que comme en 3.4 la monodromie locale imposée soit en chaque $s \in S_0$ donnée par deux caractères distincts $\alpha[s'_0], \alpha''[s_0]$ de $k(s_0)^*$. Supposons vérifié (3.2.2) et l'hypothèse de position générale (2.10.3). À l'aide de (3.5.1), on obtient

Proposition 4.2. *Sous les hypothèses de 5.6, on a*

$$N_1 = q + 1 + |S_0(\mathbb{F}_q)|. \quad (5.7.1)$$

Arinkin a vérifié que pour $X_0 = \mathbf{P}^1$ et $r = 2$, si un fibré E_0 de rang 2 sur X_0 avec structure parabolique α_0 en S_0 est indécomposable, alors $\text{End}(E_0, \alpha)$ est réduit aux scalaires.

Si on définit Z comme en 3.6, et qu'on passe au faisceau associé pour la topologie de Zariski, on obtient un foncteur représentable par un espace algébrique. Dans le cas $|S_0| = 4$, si on prend le degré $d = 1$, il est représenté par la somme de deux copies de X_0 , recollées le long de $X_0 - S_0$. Le nombre de points de ce schéma sur $\mathbb{F}_q$ est donc donné par (5.7.1).

4.6

Passons à l'analogue complexe. Sur $\mathbf{P}^1 - S$, avec $|S| = 4$, on considère l'espace de module des systèmes locaux complexes de rang 2 avec monodromie locale imposée en chaque $s \in S$. En $s \in S$, on demande que la monodromie locale soit conjuguée à $A_s = \text{diag}(a_s, b_s)$. On suppose $a_s b_s = 1$ et que si pour chaque s , c_s est l'un de a_s ou b_s , on n'a jamais $\prod_s c_s = 1$. Posons $A := (A_s)_{s \in S}$ et notons $M(A)$ l'espace de modules, comme en 2.10. Il est lisse purement de dimension 2. On peut regarder $M(A)$, pour A proche de 1, comme une déformation de $\overline{M}_{\mathbb{C}}$ considéré en 5.4. Dans cette déformation, l'espace des cycles évanescents est de dimension 4 (puisque la singularité de $\overline{M}_{\mathbb{C}}$ est de type D_4). À l'infini, la géométrie ne change pas et on a donc comme nombres de Betti non nuls

$$b_0 = 1, \quad b_2 = 5. \quad (5.8.1)$$

4.7

Prenons $X_0 = \mathbf{P}^1$, $|S_0| = 3$, $r = 3$ et supposons que comme en 3.4 la monodromie locale imposée soit en chaque $s \in S_0$ donnée par trois caractères distincts de $k(s_0)^*$. Supposons vérifié (3.2.2) et l'hypothèse de position générale 2.10.3. À l'aide de (3.5.1) on obtient ici que

$$N_1 = q + 1 + 2|S_0(\mathbb{F}_q)|. \quad (5.9.1)$$

Le faisceau associé à Z comme en 3.6 est en effet, pour $d = 1$, représenté par la somme de trois copies de X_0 , recollées le long de $X_0 - S_0$. Si S_0 consiste en trois points rationnels sur $\mathbb{F}_q$, (5.9.1) dit que $N_1 = (q + 1) + 6$, comme suggéré par la singularité E_6 de l'analogie complexe, pour une monodromie locale unipotente (cf 5.5).

5 Rang 1

5.1

Notons $E(1, \emptyset)$ l'ensemble $E(R)$ de 2.1 pour $r = 1$ et $S_0 = \emptyset$. Le produit tensoriel le munit d'une structure de groupe abélien. La théorie du corps de classe identifie $E(1, \emptyset)^V$ au groupe des caractères à valeurs dans $\overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$ du groupe fini $\text{Pic}^0(X_0)(\mathbb{F}_q)$. Cette théorie identifie en effet le groupe fondamental rendu abélien de X_0 au complété profini de $\text{Pic}(X_0)$. Le groupe $\text{Pic}(X_0)$ s'envoie sur $\mathbb{Z}$ par l'application degré, avec pour noyau le groupe fini $\text{Pic}^0(X_0)(\mathbb{F}_q)$ des $\mathbb{F}_q$ -points de la jacobienne $\text{Pic}^0(X_0)$. Les classes d'isomorphie de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux F_0 lisses de rang un sur X_0 s'identifient ainsi aux caractères χ de $\text{Pic}(X_0)$ à valeurs dans $\overline{\mathbb{Z}}_\ell^*$, la $\mathbb{F}_q$ -torsion par λ correspond au produit par le caractère λ^n de $\mathbb{Z}$, et, attachant à F_0 la restriction de χ à $\text{Pic}^0(X_0)(\mathbb{F}_q)$, on obtient une bijection entre classes de $\mathbb{F}_q$ -torsion de F_0 lisses de rang 1 sur X_0 et caractères de $\text{Pic}^0(X_0)(\mathbb{F}_q)$.

5.2

Quels que soient $r \geq 1$ et R comme en 2.1, le produit tensoriel induit une action du groupe abélien $E(1, \emptyset)$ sur $E(R)$, et de $E(1, \emptyset)^V$ sur $E(R)^V$. Si $r = 1$, et que R vérifie la compatibilité (2.10.1), le corps de classe montre que $E(R)^V$ est un espace principal homogène sous $E(1, \emptyset)^V$. On a donc

$$|E(R)^V| = |E(1, \emptyset)^V| = |\text{Pic}^0(X_0)(\mathbb{F}_q)| \quad (\text{si } r = 1 \text{ et (2.10.1)}). \quad (6.2.1)$$

Si $r > 1$, prendre la puissance extérieure $\bigwedge^r$ fournit une application

$$\det : E(R) \longrightarrow E(\bigwedge^r R)$$

telle que, pour l'action, notée $\otimes$, de $E(1, \emptyset)$, on ait

$$\det(\mathcal{L} \otimes F) = \mathcal{L}^r \otimes \det(F).$$

De même, après passage aux points fixes de $V = \text{Frob}^*$, pour $\det : E(R)^V \rightarrow E(\bigwedge^r R)^V$ et l'action de $E(1, \emptyset)^V$.

L'action de $E(1, \emptyset)^V$ sur $E(R)^V$ n'est pas nécessairement libre, et les fibres de

$$\det : E(R)^V \longrightarrow E(\bigwedge^r R)^V$$

n'ont pas nécessairement toutes le même nombre d'éléments. Néanmoins, dans tous les cas qui ont pu être calculés $|E(1, \emptyset)^V|$ divise $|E(R)^V|$. Comme fonction de n , $|\text{Pic}^0(X_0)(\mathbb{F}_{q^n})|$ est de la forme (2.15.1) :

$$|\text{Pic}^0(X_0)(\mathbb{F}_{q^n})| = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(\text{Frob}^*, H^i(\text{Pic}^0(X), \mathbb{Q}_{\ell'}))$$

$$= \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(\wedge^i \operatorname{Frob}^*, H^1(X, \mathbb{Q}_{\ell'})).$$

Je conjecture la forme précisée suivante de la conjecture 2.15 (i)

Conjecture 5.1. *Comme fonction de n , le nombre de points fixes $N_n(R)$ de V^n est de la forme*

$$N_n(R) = |\operatorname{Pic}^0(X_0)(\mathbb{F}_{q^n})| \cdot \sum_k c_k \gamma_k^n \quad (6.3.1)$$

pour des entiers c_k et des nombres γ_k convenables.

5.3

Voici un analogue de 6.3 en géométrie algébrique. Soient A_0 une variété abélienne sur $\mathbb{F}_q$ et $f_0 : X_0 \rightarrow A_0$ un morphisme propre et lisse. Bien que les fibres de $f : X_0(\mathbb{F}_{q^n}) \rightarrow A_0(\mathbb{F}_{q^n})$ n'aient pas nécessairement le même nombre d'éléments (exemple : $X_0 = A_0$ et $f =$ multiplication par un entier premier à p), $|A_0(\mathbb{F}_{q^n})|$ divise $|X_0(\mathbb{F}_{q^n})|$. En effet, les $R^i f_{0!} \mathbb{Q}_{\ell}$ sont des $\mathbb{Q}_{\ell}$ -faisceaux lisses sur A , et le groupe fondamental (abélien) de A agit sur ces faisceaux. On sait que cette action est semi-simple. Soit $(R^i f_{0!} \mathbb{Q}_{\ell})^0$ le sous-faisceau des invariants. Il provient d'un sous-faisceau $(R^i f_{0!} \mathbb{Q}_{\ell})^0$ de $R^i f_{0!} \mathbb{Q}_{\ell}$ sur A_0 , et ce dernier est l'image inverse sur A_0 d'un faisceau sur $\operatorname{Spec}(\mathbb{F}_q)$, que nous noterons $H^i(X_0/A_0)$. On sait que

$$H^i(A, (R^j f_{0!} \mathbb{Q}_{\ell})^0) \xrightarrow{\sim} H^i(A, R^j f_{0!} \mathbb{Q}_{\ell}). \quad (6.4.1)$$

La formule des traces de Grothendieck pour le nombre de $\mathbb{F}_q$ -points de X_0 peut donc se réécrire

$$|X_0(\mathbb{F}_{q^n})| = \operatorname{Tr}\left(\operatorname{Frob}^*, \sum_i (-1)^i H^i(A, \mathbb{Q}_{\ell'}) \otimes \sum_j (-1)^j H^j(X_0/A_0)\right). \quad (6.4.2)$$

Si les γ_k sont les valeurs propres de Frobenius sur les $H^j(X_0/A_0)$, et les c_k la somme alternée de leurs multiplicités, on déduit de (6.4.2) que

$$|X_0(\mathbb{F}_{q^n})| = |A_0(\mathbb{F}_{q^n})| \cdot \sum_k c_k \gamma_k^n. \quad (6.4.3)$$

La divisibilité promise de $|X_0(\mathbb{F}_{q^n})|$ par $|A_0(\mathbb{F}_{q^n})|$ résulte d'une formule analogue à (6.3.1). Les valeurs propres de Frobenius sur $H^j(X_0/A_0)$, contenu dans la cohomologie d'une fibre de $X_0 \rightarrow A_0$, sont des entiers algébriques.

5.4

Dans 6.4, le point crucial n'est pas que f_0 soit propre et lisse, mais que les $R^i f_{0!} \mathbb{Q}_{\ell}$ soient lisses. On peut éviter d'avoir à supposer que les $R^i f_{0!} \mathbb{Q}_{\ell}$ soient semi-simples en considérant, plutôt que le sous-faisceau des invariants pour l'action de $\pi_1(A)$, le plus grand sous-faisceau sur lequel l'action est unipotente.

Supposons qu'il existe une action de A_0 sur X_0 , et un entier r , tels que f_0 soit équivariant pour l'action de A_0 sur A_0 par $x : y \mapsto rx + y$. Sur cette hypothèse, les images inverses des $R^i f_{0!} \mathbb{Q}_{\ell}$ sur A par la multiplication par $r : A \rightarrow A$, sont des faisceaux constants. Ceci implique et leur lissité, et leur semi-simplicité.

5.5

Si $g \geq 1$, la conjecture 6.3 implique que dans l'expression conjecturale (2.15.1) pour $N_n(R)$, on a $\sum_i a_i = 0$.

Passons aux analogues complexes comme en 2.10. Soit $M(1, \emptyset)$ le groupe des classes d'isomorphie de système locaux complexes de rang 1 sur $\mathcal{P}$. Il est isomorphe à $\mathbb{C}^{*2g}$ et, si la compatibilité $\det R^*(s) = 1$ est vérifiée, $M(\det R^*)$ est un espace principal homogène sous $M(1, \emptyset)$. Le groupe $M(1, \emptyset)$ agit sur $M(R^*)$ et sur $M(\det R^*)$. Notons $\otimes$ l'action. L'application induite par $\bigwedge^r$:

$$\det : M(R^*) \longrightarrow M(\det R^*)$$

vérifie $\det(\mathcal{L} \otimes F) = \mathcal{L}^r \otimes \det(F)$. Ceci implique que $\det$ est une fibration, que les $R^i \det_! \mathbb{Z}$ sont localement constants, et que l'action de $\pi_1(M(\det R^*))$ sur les $R^i \det_! \mathbb{Z}$ se factorise par son quotient $\pi_1/r\pi_1 \cong (\mathbb{Z}/r\mathbb{Z})^{2g}$.

Si $g \geq 1$, on en déduit, par des arguments analogues à ceux de 6.4, que $\chi(M(R^*)) = 0$, en accord avec 2.15 (ii). Soit $(R^i \det_! \mathbb{Q})^0$ le sous-système local de $R^i \det_! \mathbb{Q}$ des invariants sous l'action de π_1 , et $\chi(M(R^*)/M(\det R^*))$ la somme alternée des rang des $(R^i \det_! \mathbb{Q})^0$.

Conjecture 5.2. *Avec les notations de 6.3 et de 6.6, on a*

$$c_k = \chi(M(R^*)/M(\det R^*)).$$

Bibliographie

- [DF] P. Deligne and Y. Z. Flicker. Counting local systems with principal unipotent local monodromy, *Annals of Math.* (to appear).
- [Dr] V. Drinfeld. The number of two dimensional irreducible representations of the fundamental group of a curve over a finite field, *Funk. anal. i Prilozhen.* 15 4 (1981), 75–76.
- [L] L. Lafforgue. Chtoucas de Drinfeld et correspondance de Langlands, *Inv. math.* 147 1 (2002), 1–241.