SEMINAIRE DE GEOMETRIE ALGEBRIQUE DU BOIS MARIE

1966-67

THEORIE DES INTERSECTIONS ET THEOREME DE RIEMANN-ROCH

(SGA 6)

un Séminaire dirigé par

P. BERTHELOT, A. GROTHENDIECK, L. ILLUSIE

avec la collaboration de

D. FERRAND, J.P. JOUANOLOU, O. JUSSILA,
S. KLEIMAN, M. RAYNAUD, J.P. SERRE

PREFACE

La présente édition du Séminaire de Géométrie Algébrique 6 reproduit à peu de chose près la première édition, distribuée par l'I.H.E.S. sous forme d'exposés multigraphiés. Les corrections effectuées portent essentiellement sur des fautes d'impression, sauf dans les exposés I et III, où de légères modifications ont été apportées par L. Illusie à quelques énoncés incorrects dans la version primitive. D'autre part, des notes ont été rajoutées en bas de page, en particulier dans l'exposé XIV par A. Grothendieck, afin de signaler des progrès récents dans des questions encore ouvertes lors du Séminaire. Signalons enfin que l'exposé XI, de D. Ferrand, concernant la théorie du déterminant pour les complexes parfaits, n'a pas été régigé, et ne sera donc pas publié ; pour éviter des erreurs de référence, nous avons gardé telle quelle la numérotation des exposés suivants.

Juin 1971

INTRODUCTION

Le but du présent Séminaire est de développer une théorie globale des intersections, et une formule de Riemann-Roch, pour des schémas quelconques. Le lecteur trouvera une description du programme du Séminaire dans l'exposé 0. La possibilité en principe d'une démonstration d'une formule de Riemann-Roch pour les schémas réguliers généraux, suivant les lignes du rapport bien connu de Borel-Serre en 1958, était claire dès ce moment, du moins pour un morphisme projectif. L'extension au cas général est moins évidente ; le programme dans lequel elle s'insère (et partiellement réalisé dans notre séminaire) remonte à 1960. Comme c'était également le cas pour la théorie de dualité des faisceaux cohérents (cf. R. Hartshorne, Residues and Duality, Lecture Notes in Mathematics n° 20, Springer), un outil essentiel pour formuler une théorie satisfaisante est la théorie des catégories dérivées de Verdier, dont la connaissance est indispensable pour la compréhension du Séminaire. A part cette théorie, l'étude du Séminaire n'exige guère qu'une connaissance générale des fondements de la Géométrie Algébrique, tels qu'ils sont exposés dans EGA, chapitres I,II,III ; nous n'aurons en plus que des références occasionnelles à faire à EGA IV, pour certains faits concernant les morphismes plats ou lisses, qui pour l'essentiel figurent également dans les premiers exposés de SGA 1. Enfin, pour développer certains résultats avec toute la généralité souhaitable pour les applications, nous faisons usage parfois de la notion de site annelé et de topos annelé, pour laquelle nous renvoyons à SGA 4, exposés I à IV. Le lecteur qui ignorerait le langage des sites et topos pourra remplacer partout lesdits objets par des espaces topologiques ordinaires, les objets du topos étant alors remplacés par des ouverts de ces espaces; mais nous lui conseillons néanmoins, de préférence, de s'assimiler le langage des topos, qui fournit un principe d'unification extrêment commode.

La notion fondamentale pour la théorie présentée ici est celle de complexe de Modules parfait, et ses diverses variantes, développées dans les exposés I,II,III . Il semble clair que ces notions, importantes également dans d'autres contextes en Géométrie Algébrique (notamment pour les formules de type Lefschetz-Verdier en cohomologie à coéfficients discrets (SGA 5) ou cohérents), auront aussi leur rôle à jouer en dehors de la Géométrie Algèbrique, notamment pour la formulation d'une variante analytique com-

plexe du théorème de Riemann-Roch présenté ici, ou de variantes convenables du théorème de l'index d'Atiyah-Singer. Quelques indications dans ce sens seront données dans Exp. II. Malheureusement, il manque encore à l'heure actuelle un énoncé, même heuristique, qui engloberait ces deux théorèmes (dont le premier pour l'instant reste conjectural). Il manque apparemment une idée nouvelle, comme il en manque aussi en Géométrie Algèbrique pour parvenir à une démonstration du théorème de Riemann-Roch en dehors d'hypothèses projectives (cf. Exp. XIV, n° 2).

Nous n'aurons à faire nul usage dans ce séminaire de la théorie locale des intersections, exposée dans J.P. Serre, Algèbre Locale.Multiplicités (Lectures Notes in Mathematics n° 11, Springer), et nous contenterons simplement de signaler ici que ce cours de Serre a eu une inflence évidente sur la genèse de la théorie en 1957. Nous n'utiliserons pas non plus la théorie de l'anneau de Chow développée dans Séminaire Chevalley 1958, exposés 2 et 3 (Ecole Normale Supérieure). Cette théorie est liée de façon essentielle à des hypothèses de non singularité, alors que le but de notre séminaire est au contraire de développer une théorie des intersections sur les schémas généraux (et même les topos localement annelés généraux) voir à ce sujet les commentaires dans Exp. XIV n°4 et n°8, donnant les relations entre notre théorie et celle de l'anneau de Chow, et posant la question d'une généralisation de cette dernière. Nous pouvons dire que le Séminaire présente une théorie des intersections cohérente et se suffisant à elle même, mais nullement exhaustive des différents points de vue utiles (voire indispensables) en théorie des intersections, et qu'il convient par suite de le compléter par les exposés cites de Serre et de Chevalley.

Nous avons joint au séminaire (en Appendice à Exp. O) le rapport Grothendieck de 1957 "classes de Faisceaux et théorème de Riemann-Roch", qui avait servi de base au séminaire de Borel et Serre à Princeton la même année, ainsi qu'à leur article déjà cité. Ce rapport esquisse deux démonstrations du théorème de Riemann-Roch pour les variétés quasi-projectives non singulières, dont la première, valable pour le moment seulement en caractéristique nulle, mais donnant en revanche un résultat un peu plus précis dans le cas d'une immersion, ne figure pas encore dans la littérature (sans exclure le travail de Borel-Serre ni le présent séminaire). La lecture de ce rapport ne présuppose bien entendu celle d'aucun autre exposé du séminaire, et peut même servir d'introduction à l'étude de ce dernier au même titre que l'exposé O, surtout pour un lecteur qui ne serait pas encore familier avec Borel-Serre. La démonstration à laquelle nous venons de faire allusion s'applique d'ailleurs essentiellement telle quelle au cas

d'un morphisme projectif d'espaces analytiques complexes, et s'appliquera sans doute également en caractéristique quelconque, une fois résolu le problème des opérations "puissances extérieures" dans la catégorie dérivée (cf. Exp. XIV, n°s 1,2,3). C'est l'absence d'une étude de cette question qui constitue sans doute la lacune la plus sérieuse dans ce Séminaire, dans l'optique même où nous nous y sommes placés.

On remarquera l'absence, dans la table des matières du présent Séminaire, de deux des participants mentionnés sur la page de garde. L'un, J.P. Jouanolou, avait pris une part active à l'élaboration technique de la première partie du séminaire, mais avait été empêché de prendre part aux exposés oraux ; on lui doit notamment l'assertion d'indépendance linéaire contenue dans l'important énoncé VI 1.1. donnant la structure de l'anneau K'des classes de Modules localement libres sur un fibré projectif (qui n'était prouvé auparavant que lorsqu'on supposait que le schéma de base admet un Module inversible ample). L'autre, J.P. Serre, avait fait deux exposés oraux, logiquement indépendants du reste du Séminaire, et qu'il a par suite préféré publier sous forme d'article séparé (cf. J.P. Serre, Groupes de Grothendieck des schémas en groupes réductifs déployés à paraître dans Publications Mathématiques, n° 34).

Comme dans les autres parties du Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie, les sigles SGA 1 à SGA 6 renvoient aux différentes parties dudit Séminaire, le chiffre romain suivant ce sigle indiquant le n° de l'exposé, et les chiffres arabes qui le suivent correspondant à la numérotation intérieure de l'exposé en question; pour les références intérieures au présent Séminaire, on omet le sigle SGA 6, en utilisant des références style I 4.9 (signifiant: exposé I, énoncé 4.9). Le sigle EGA réfère aux Eléments de Géométrie Algébrique de J. Dieudonné et A. Grothendieck.

TABLE DES MATIERES

EXPOSE 0
Esquisse d'un Programme pour une Théorie des Intersections sur les Schémas Généraux
par A. Grothendieck 1

Classes de Faisceaux et Théorème de Riemann-Roch
par A. Grothendieck 20

EXPOSE I
Généralités sur les Conditions de Finitude dans les Catégories Dérivées
par L. Illusie 78

EXPOSE II
Existence de Résolutions Globales
par L. Illusie 160

EXPOSE III
Conditions de Finitude Relatives
par L. Illusie 222

EXPOSE IV
Groupes de Grothendieck des Topos Annelés
par L. Illusie 274

EXPOSE V
Généralités sur les λ-Anneaux
par P. Berthelot 297

EXPOSE VI
Le K^* d'un Fibre Projectif: Calculs et Conséquences
par P. Berthelot 365

EXPOSE VII
Immersions Régulières et Calcul du K' d'un Schéma Eclaté
par P. Berthelot 416

EXPOSE VIII
Le Théorème de Riemann-Roch
par P. Berthelot 466

EXPOSE IX
Quelques Calculs de Groupes K.
par P. Berthelot 498

EXPOSE X
Formalisme des Intersections sur les Schémas Algébriques Propres
par O. Jussila
Avec un Appendice par A. Grothendieck
Spécialisation en Théorie des Intersections 519

EXPOSE XI - Non rédigé

EXPOSE XII
Un Théorème de Représentabilité Relative sur le Foncteur de Picard
par M. Raynaud (rédigé par S. Kleiman) 595

EXPOSE XIII
Les Théorèmes de Finitude pour le Foncteur de Picard
par S. Kleiman 616

EXPOSE XIV
Problèmes Ouverts en Théorie des Intersections
par A. Grothendieck 667

Index Terminologique 691

Index des Notations 696

Exposé 0

ESQUISSE D'UN PROGRAMME POUR UNE THEORIE DES INTERSECTIONS SUR LES SCHEMAS GENERAUX

par A. Grothendieck

Le présent exposé est de nature introductif, et sa lecture n'est pas logiquement indispensable pour l'étude du Séminaire. Il s'adresse plus particulièrement aux lecteurs au courant de la version provisoire du théorème de Riemann-Roch, telle qu'elle est exposée dans le rapport de Borel-Serre [2] ou dans le rapport de Grothendieck déjà mentionné dans l'Introduction (cité [RRR] par la suite), et qui est reproduit sous forme d'appendice à la fin du présent exposé.

1. Rappelons la formule de Riemann-Roch pour un morphisme propre

$$f: X \longrightarrow Y$$

de schémas quasi-projectifs et lisses sur un corps k, et un faisceau cohérent F sur X, dont la classe dans le groupe K(X) des classes de faisceaux cohérents sur X est notée par $c\mathcal{l}(F)$:

$$\text{(1.1)} \qquad \mathrm{Todd}(T_Y)\ \mathrm{ch}_Y(f_*(c\mathcal{l}(F))) = f_*(\mathrm{Todd}(T_X)\ \mathrm{ch}_X(F)) \quad .$$

Cette formule est valable dans $A(Y)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$, où A(Y) est l'anneau de Chow de Y, le f_* du second membre étant déduit par tensorisation par $\mathbb{Q}$ de l'homomorphisme "image directe de cycles"

$$f_*: A(X) \longrightarrow A(Y) \ ,$$

celui du premier étant la caractéristique d'Euler-Poincaré de F relativement à f :

$$f_*(c\mathcal{l}(F)) = \sum_i (-1)^i c\mathcal{l}(R^i f_*(F)) \ ;$$

ch_X , ch_Y désignent les caractères de Chern sur X resp. sur Y, et T_X, T_Y les fibrés tangents à X resp. à Y. Comme on sait, Todd(-) et ch(-) sont des polynômes universels à coéfficients dans $\mathbb{Q}$ en les classes de Chern de l'argument. Le terme constant de Todd(-) étant 1, c'est un élément inversible pour toute valeur de l'argument, de sorte que la formule (1.1) prend après multiplication par $\mathrm{Todd}(T_Y)^{-1}$ la forme équivalente, plus commode pour notre propos

$$\text{(1.2)} \qquad \mathrm{ch}_Y(f_*(c\mathcal{l}(F)) = f_*(\mathrm{Todd}(T_f).\mathrm{ch}_X(F)) \quad ,$$

où on a posé

$$\text{(1.3)} \qquad T_f = T_X - f^*(T_Y) \in K(X) \quad ,$$

de sorte que T_f joue le rôle d'un fibré tangent relatif virtuel de X sur Y. Dans le cas où le morphisme f est lisse (i.e. à application tangente partout surjective), on a simplement

$$T_f = T_{X/Y} \quad \text{(fibré tangent le long des fibres)},$$

tandis que dans le cas où $f: X \longrightarrow Y$ est une immersion, on trouve

$$T_f = - \check{N}_{X/Y} \quad ,$$

où $\check{N}_{X/Y}$ désigne le faisceau normal de X dans Y.

Un des buts principaux du Séminaire est de généraliser (1.2) simultanément dans deux directions :

a) Se débarasser de l'hypothèse de l'existence d'un corps de base k.

b) Remplacer les hypothèses de régularité sur Y,X par une hypothèse de "régularité locale" de f.

Enfin, chemin faisant nous nous occuperons également du problème :

c) Eliminer les hypothèses de quasi-projectivité qui, en l'absence d'un corps de base, s'expriment par l'existence de Modules inversibles amples sur X et sur Y.

2. Examinons d'abord la généralisation a), en gardant cependant les hypothèses de régularité et d'existence de Modules inversibles amples sur X et sur Y.

La définition de K(X),K(Y) et de l'homomorphisme $f_* : K(X) \longrightarrow K(Y)$ n'offre alors pas de nouveau problème, grâce au fait que X et Y sont réguliers. La voie la plus naturelle pour donner un sens à (1.2) semble donc consister en la définition d'anneaux de Chow A(X),A(Y) et d'un homomorphisme de groupes

$$f_* : A(X) \longrightarrow A(Y) \quad ,$$

en l'établissement d'une théorie des classes de Chern, fournissant des applications

$$c_i : K(X) \longrightarrow A(X) \quad ,$$

et de même pour Y, et enfin en la description d'un élément fibré tangent relatif virtuel

$$T_f \in K(X) \quad .$$

2.1 Pour ce qui est de cette dernière, une définition s'offre de façon assez évidente. On utilise le fait que le morphisme f, grâce à l'hypothèse d'existence d'un Module inversible ample sur X et sur Y, peut se factoriser en

$$X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y \quad , \tag{2.1}$$

où i est une immersion fermée, et f' un morphisme lisse ; par exemple on pourra prendre $X' = \mathbb{P}^r_Y$ pour r convenable. On posera alors

$$\check{T}_f = c\mathcal{I}\,(\underline{\Omega}^1_{X'/Y}) - c\mathcal{I}\,(\underline{N}_{X/X'}) \quad , \tag{2.2}$$

où $\underline{\Omega}^1_{X'/Y}$ est le Module localement libre des 1-différentielles relatives de X' sur Y (ou Module cotangent relatif de X' sur Y), et $\underline{N}_{X/X'}$ le Module conormal de X dans X', égal par définition à $\underline{J}/\underline{J}^2$, où $\underline{J}$ est l'Idéal sur X' définissant le sous-schémas fermé X ; comme X et X' sont réguliers, on en conclut d'ailleurs que $\underline{N}_{X/X'}$ est également localement libre. Enfin $\check{T}_f$ désigne le dual de T_f On vérifie sans peine (Exp VIII) que l'élément T_f défini par (2 1) ne dépend pas de la factorisation de f choisie

2 2 Quant à une définition, sous les conditions envisagées, d'un anneau de Chow et d'une théorie des classes de Chern correspondante, bien qu'il soit plausible qu'une telle théorie doive pouvoir se développer sur le modèle de celle déjà connue pour les schémas algébriques lisses et quasi-porjectifs, il semble que ce travail n'ait pas été fait à l'heure actuelle, et à fortiori il n'a pas été entrepris dans le Séminaire. On introduit par contre un autre anneau, qui jouera un rôle analogue à celui de l'anneau de Chow, et dont le produit tensoriel par Q est effectivement isomorphe à $A(X)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$ dans le cas où X est quasi-projectif et lisse sur un corps k. Cet anneau est l'anneau gradué associé à K(X), pour une filtration convenable de cet anneau. Une première filtration naturelle de K(X), qui est celle envisagée dans [RRR] , est la "filtration topologique" par la codimension du support des faisceaux cohérents, $\mathrm{Filt}^i_{top} K(X)$ étant engendré par les $c\mathcal{I}(F)$ avec F cohérent et $\mathrm{codim}(\mathrm{supp}F, X) \geqslant i$. Une première question est celle de la compatibilité de cette filtration avec la structure d'anneau, question résolue dans [RRR] , dans le cas X lisse sur un coprs k, grâce au "moving lemma" de Chow. Ce point admis, on trouve donc un anneau gradué associé, que nous noterons ici $Gr_{top}(X)$. Dans [RRR] on définit un homomorphisme d'anneaux surjectif

$$\phi : A(X) \longrightarrow Gr_{top}(X) \quad ,$$

(tranformant la classe d'un cycle premier Z en $c_i(\mathcal{O}_Z)$,) dont il s'avère ensuite (Exp XIV 4.2) que le noyau est un sous-groupe de torsion. De plus, on montre dans [RRR] comment les images dans $Gr^{\cdot}_{top}(X)$ des classes de Chern $c_i(F)$ peuvent se calculer directement en termes de $c_i(F) \in K(X)$ et des opérations λ^i de puissance extérieure dans K(X).

Ceci montre que, pour X schéma noethérien régulier muni d'un Module inversible ample, l'anneau $Gr^{\cdot}_{top}(X)$ est un substitut commode pour l'anneau de Chow hypothétique A(X) ; il a de plus l'avantage sur ce dernier que c'est directement dans cet anneau que se font certains calculs de [RRR] aboutissant à des formules importantes dans cet anneau, formules qui même pour X projectif et lisse sur un corps ne sont pas établies à l'heure actuelle dans A(X) lui-même (Exp. XIV, 4.3 et 4.4). Pour justifier entièrement ce point de vue, il faudrait cependant résoudre le problème signalé plus haut de la compatibilité de la filtration topologique de K(X) avec sa structure d'anneau, problème qui semble essentiellement lié au "moving lemma" de Chow, qui lui-même est l'ingrédient technique essentiel de la théorie de l'anneau de Chow que nous avons prétendu pouvoir éviter.

2.3 Pour éviter ce problème, on munit K(X) d'une deuxième filtration, plus fine que la filtration topologique, et qui peut se décrire en termes purement algébriques à partir de la structure de λ- anneau augmenté de K(X). La définition de cette filtration est suggérée par l'expression donnée dans [RRR] des classes de Chern d'un $x \in K(X)$ dans $Gr^{\cdot}_{top}(X)$,

$$c_i(x) = \gamma^i(x - \varepsilon(x)) \mod Filt^{i+1}_{top} K(X) \quad , \tag{2.3}$$

où γ^i désigne une certaine combinaison linéaire des λ^j $(j=i)$ explicitée dans loc. cit. , ε étant l'augmentation. On montre que $\gamma^i(x - \varepsilon(x))$ est bien de filtration topologique $\geq i$, ce qui donne un sens à la formule (2.3). On définit alors la λ-<u>filtration</u> de K(X) par les idéaux $Filt^i K(X)$, où $Filt^i K(X)$ est formé par les sommes d'expression de la forme

$$\gamma^{i_1}(x_1 - \varepsilon(x_1)) \ldots \gamma^{i_k}(x_k - \varepsilon(x_k)) \quad , \quad i_1 + \ldots + i_k \geq i \quad .$$

L'anneau gradué associé à cette filtration sera noté $Gr^{\cdot}(X)$, et c'est lui qui remplacera dans le Séminaire l'anneau de Chow de X. On peut d'ailleurs montrer que dans le cas envisagé ici l'homomorphisme canonique

$$Gr^{\cdot}(X) \longrightarrow Gr^{\cdot}_{top}(X) \tag{2.4}$$

est un isomorphisme modulo torsion, ce qui justifie le point de vue suivant lequel cet anneau tensorisé par Q peut jouer en tous points le même rôle que l'anneau de Chow tensorisé par Q D'autre part, on a fait exactement ce qu'il fallait pour que la formule (2.3) (où on remplace $Filt^i_{top}$ par $Filt^i$) définisse une théorie des classes de Chern à valeurs dans $Gr^\cdot(X)$, dont les classes de Chern dans $Gr^\cdot_{top}(X)$ se déduisent à l'aide de l'homomorphisme (2.4). On montre (Exp.V), grâce au fait (Exp.VI) que K(X) est un λ-anneau spécial au sens de [RRR] (i.e. un λ-anneau au sens de Exp.V) que cette notion de classe de Chern satisfait à toutes les propriétés formelles habituelles, passées en revue dans [RRR].

2.4. On notera un avantage très appréciable de la définition de $Gr^\cdot(X)$ sur celle de A(X) et $Gr^\cdot_{top}(X)$, c'est qu'elle garde un sens pour un schéma X absolument quelconque, et plus généralement pour un topos localement annelé quelconque X, en prenant alors pour K(X) le groupe de classes construit avec les Modules localement libres sur X, qui est encore un λ-anneau augmenté, donc muni d'une filtration correspondante, permettant de définir un gradué associé $Gr^\cdot(X)$. Comme prix de cette généralité, il faut cependant remarquer que lorsqu'on n'est pas disposé à négliger les phénomènes de torsion i.e. à tensoriser par Q, les propriétés de $Gr^\cdot(X)$ sont moins satisfaisantes à divers égards que celles de ses deux concurents (Exp.XIV nº 4). C'est ainsi que, supposant à nouveau que $f:X\longrightarrow Y$ est un morphisme propre de schémas noethériens réguliers munis de Modules inversibles amples, il n'est pas vrai en général que l'homomorphisme $f_* : K(X)\longrightarrow K(Y)$ applique $Filt^iK(X)$ dans $Filt^{i-d}K(Y)$, où d est la dimension relative de X sur Y, et définisse par suite par passage aux gradués associés un homomorphisme de degré -d de $Gr^\cdot(X)$ dans $Gr^\cdot(Y)$. Cependant, on peut prouver (Exp.VII) qu'il en est ainsi à condition de tensoriser par Q, de sorte qu'on obtient un homomorphisme de degré -d

$$f_* : Gr^\cdot(X)_Q \longrightarrow Gr^\cdot(Y)_Q \quad , \tag{2.5}$$

jouant le rôle de l'homomorphisme "image directe de cycles" $A(X)\longrightarrow A(Y)$.

Ceci posé, nous voyons donc que nous sommes en possession de tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) lorsqu'on ne postule pas l'existence d'un corps de base, $f:X\longrightarrow Y$ étant morphisme propre de schémas noethériens réguliers admettant des Modules inversibles amples.

3. Montrons maintenant comment on peut encore donner un sens à la formule (2.2) lorsqu'on abandonne l'hypothèse de régularité faite sur X,Y, en la remplaçant par une hypothèse de nature locale sur le morphisme f, que nous allons préciser.

3.1 Une première difficulté provient du fait que l'observation qui avait servie de point de départ à la théorie [RRR], savoir que le groupe K(X) des classes de faisceaux sur X est le même, qu'on le définisse en termes de faisceaux cohérents, ou en termes de faisceaux localement libres, est liée de façon essentielle à l'hypothèse de régularité sur X. Dans le cas où X est un schéma (disons noethérien, pour simplifier) général, il convient de distinguer entre ces deux groupes, que nous noterons respectivement K.(X) et K'(X), le premier ayant un caractère covariant en X pour les morphismes propres, le deuxième un caractère contravariant en X pour les morphismes quelconques. On notera que K'(X) est muni de façon naturelle d'une structure d'anneau (et même de λ-anneau augmenté), alors que sur K.(X) il n'y a plus en général une structure d'anneau, mais seulement une structure de module sur K'(X). L'homomorphisme $x \to x\, cl.(\underline{O}_X)$ (où $cl.(\underline{F})$ désigne la classe de $\underline{F}$ dans K.(X)) de K'(X) dans K.(X) n'est plus en général un isomorphisme. Pour notre formulation du théorème de Riemann-Roch généralisé, nous travaillerons exclusivement avec K'(X), K'(Y), à l'exclusion de K.(X), K.(Y). Comme nous avons signalé dans 2.3., ces λ-anneaux augmentés, munis de leur λ-filtration naturelle, donnent naissance à des anneaux gradués Gr'(X), Gr'(Y) , et des homomorphismes "classes de Chern"

$$c_i : K'(X) \to Gr'(X) ,$$

et de même pour Y. La difficulté vient cependant dans la définition d'un homomorphisme image directe

(3.1) $$f_* : K'(X) \to K'(Y) ,$$

qui ne peut plus être définie par la formule naïve

$$f_*(cl'(\underline{E})) = \sum_i (-1)^i\, cl'(R^i f_*(\underline{F})) ,$$

car même si $\underline{F}$ est localement libre, les Modules $R^i f_*(\underline{F})$ ne sont plus en général localement libres, ni même de tor-dimension finie, et la formule précédente perd son sens. Une solution de cette difficulté est fournie par le point de vue des catégories dérivées. En effet, alors que les $R^i f_*(\underline{F})$ sont en général des "mauvais" faisceaux, de tor-dimension infinie disons,

auxquels on ne saurait associer de classe dans K'(Y), cependant le complexe $Rf_*(\underline{F})$ sur Y, image directe de $\underline{F}$ au sens des catégories dérivées, dont les $R^if_*(\underline{F})$ sont des faisceaux de cohomologie, a tendance à être excellent. De façon précise, supposons que $\underline{F}$ soit de tor-dimension finie sur $\underline{O}_Y$, ce qui sera le cas si $\underline{O}_X$ est de tor-dimension finie sur $\underline{O}_Y$ et si de plus F est localement libre. Alors on montre (Exp. III) que le complexe $Rf_*(F)$ est "parfait", par quoi on entend ici: à faisceaux de cohomologie cohérents (ce qu'on savait déjà de toutes façons) et de tor-dimension globale finie ; ou encore : sur tout ouvert affine U de Y, ce complexe est isomorphe, dans la catégorie dérivée D(U), à un complexe à degrés bornés et localement libre de type fini en chaque degré. Du point de vue de l'Algèbre Homologique, les complexes parfaits sont "aussi bons" que les Modules localement libres, dont ils constituent la généralisation naturelle. Ils forment d'ailleurs une "sous-catégorie triangulée" de la catégorie dérivée D(Y), i.e. une sous-catégorie stable par les cônes (ou "mapping cylinders") de morphismes. D'autre part, à toute catégorie triangulée C on associe un groupe K(C) de classes, variante naturelle de la construction du groupe des classes d'une catégorie abélienne, en prenant le groupe libre engendré par les objets de C, divisé par les relations

$$cl(K) - cl(K') - cl(K'')$$

pour tout triangle distingué

$$K' \longrightarrow K \longrightarrow K'' \nwarrow \swarrow$$

Ce qui remplace alors l'observation fondamentale de [RRR] dans le cas actuel est le fait que, lorsque le schéma Y admet un Module inversible ample, tout complexe parfait L. sur Y est globalement (et non seulement localement) isomorphe dans D(Y) à un complexe L! à degrés bornés et localement libre de type fini en chaque degré (Exp II); d'où il résulte facilement (Exp.IV) que l'homomorphisme canonique

$$K'(X) \longrightarrow K(Parf(Y)) \quad ,$$

où Parf(Y) est la catégorie triangulée des complexes parfaits sur Y, est un isomorphisme. Donc à tout complexe parfait L. sur Y on peut associer une classe

$$cl'(L.) \in K'(Y) \quad ,$$

qui n'est d'ailleurs autre que

$$c\mathcal{Y}(L.) = \sum_i (-1)^i c\mathcal{Y}'(L'_i)$$

où L' est comme ci-dessus, de sorte que les L'_i sont bien des Modules localement libres sur Y dont on peut prendre les classes dans $K'(Y)$.

Ceci posé, on définit un homomorphisme (3.1) chaque fois que $f:X \longrightarrow Y$ est un morphisme propre de tor-dimension finie de schémas noethériens tels que Y admette un Module inversible ample, en posant simplement

(3.2) $$f_*(c\mathcal{Y}'(\underline{F})) = c\mathcal{Y}'(Rf_*(\underline{F}))$$

pour tout Module localement libre $\underline{F}$ sur X (de sorte que $Rf_*(\underline{F})$ est bien un complexe parfait sur Y, et le deuxième membre est défini). Lorsque X également admet un Module inversible ample, alors $K'(X)$ peut s'interpréter également comme $K(Parf(X))$, et l'homomorphisme (3.1) n'est autre que celui qui est associé, par fonctorialité, au foncteur exact de catégories triangulées induit par

$$Rf_*: Parf(X) \longrightarrow Parf(Y) \quad .$$

3.2. Pour donner un sens à (1.2), il reste encore à faire sur f une hypothèse permettant de donner un sens à l'homomorphisme (2.5)

(3.3) $$f_*: Gr'(X)_{\mathbb{Q}} \longrightarrow Gr'(Y)_{\mathbb{Q}} \quad ,$$

i.e. assurant que l'homomorphisme (3.1) qu'on vient de définir est (modulo un décalage et modulo torsion) compatible aux filtrations de ces anneaux ; et enfin à définir encore un élément "fibré tangent relatif virtuel"

$$T_f \in K'(X) \quad .$$

Pour ce dernier, reprenant la définition proposée dans 2.1, on voit qu'il y a lieu de faire une hypothèse assurant que (avec les notations de loc. cit.) le Module conormal $\underline{N}_{X/X'}$ soit localement libre. L'hypothèse la plus naturelle à cet effet est celle que i soit une "immersion régulière", i.e. identifie X à un sous-schémas de X' défini par un Idéal qui localement peut être défini par une suite $\underline{O}_{X'}$-régulière de sections de $\underline{O}_{X'}$. Cette hypothèse, de nature purement locale, ne dépend pas en fait du choix de la factorisation de f en une immersion suivie d'un morphisme lisse (Exp. VIII), et comme plus haut, il en est de même pour la classe T_f défini par la formule (2.1). Lorsque l'hypothèse qu'on vient d'envisager est vérifiée, on dit que le morphisme f est un morphisme "localement d'intersection complète"(*). Un tel morphisme est d'ailleurs localement de tor-dimension finie.

(*) On se permettra également de supprimer le vocable "localement" dans cette terminologie, ce qui ne risque d'entrainer aucune confusion.

Si f est un morphisme localement d'intersection complète, on introduit une notion naturelle de "dimension relative virtuelle" d(f) par la formule

$$d(f)(x) = \dim_x(f'^{-1}f(x)) - \operatorname{codim}_x(X,X')$$

C'est une fonction à valeurs entières localement constante en le point $x \in X$, donc constante si X est connexe, qui ne dépend d'ailleurs pas non plus du choix de la factorisation (2.1). Lorsque cette dimension relative virtuelle d est constante, que f est propre et que X et Y admettent des Modules inversibles amples, on peut montrer (Exp. VIII), encore que ce soit loin d'être un résultat trivial, que l'on a

$$(3\ 4) \qquad f_*(\mathrm{Filt}^i K'(X)_{\mathbb{Q}}) \subset \mathrm{Filt}^{i-d} K'(Y)_{\mathbb{Q}} \quad ,$$

d'où un homomorphisme (3.3) de degré -d.

3.3. Nous avons donc réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à la formule (1.2) dans le cas d'un morphisme propre et localement d'intersection complète de schémas noethériens X,Y admettant tous deux des Modules inversibles amples. Moyennant un peu de soin supplémentaire, cette formulation garde d'ailleurs un sens indépendamment de toute hypothèse noethérienne.

Sous cette forme générale, cette formule de Riemann-Roch sera prouvée dans Exp. VIII. Le lecteur constatera que la démonstration donnée dans ce Séminaire combine des éléments des deux démonstrations qui figurent dans [RRR] et dont il a été question dans l'Introduction. La nécessité de recourir aux méthodes de la première de ces démonstrations, impliquant plus de λ-formalisme que la deuxième (suivie dans Borel-Serre), est due à la nécessité d'une démonstration de l'inclusion (3.4), question qui ne se posait pas dans le cadre plus restreint de [RRR] et Borel-Serre [2], où on pouvait travailler avec l'anneau de Chow ou l'anneau $\mathrm{Gr}^{\cdot}_{\mathrm{top}}$. De la deuxième démonstration, nous conservons l'introduction du schéma éclaté de Y le long de X dans le cas où f est une immersion. Cet artifice technique disparaîtra sans doute, et la démonstration du cas d'une immersion s'étendra au cas où on ne postule plus l'existence d'un Module inversible ample sur Y, une fois résolue la question soulevée dans Exp. XIV n° 1 sur l'introduction d'opérations de puissances extérieures dans la catégorie dérivée $D^-(Y)$.

4. Il nous faut enfin donner quelques indications sur la façon dont on peut encore donner un sens à (1.2) en l'absence d'une hypothèse d'existence

de Modules inversibles amples sur X et Y.

4.1. Notons d'abord que pour un schéma X (ou plus généralement, un topos localement annelé) quelconque, il semble hors de doute que le "bon" invariant qui doit remplacer l'anneau K(X) de [RRR] n'est pas l'anneau K'(X) considéré précédemment, défini en termes de Modules localement libres sur X, mais bien le groupe K(Parf(X)), envisagé dans 3 1. , défini en termes de complexes parfaits sur X, groupe que nous noterons ici K'(X), et que nous distinguerons du groupe "naif" de 3.1, que nous notons $K'_{naif}(X)$. Ce point de vue est imposé par la nécessité de définir un homomorphisme (3.1) image directe pour un morphisme f:X⟶Y propre et de tor-dimension finie, de schémas noethériens disons (le cas non noethérien exigeant des propriétés de finitude locales un peu plus fortes sur f, cf. Exp. III). Avec la définition de K'(X) adopté maintenant, cet homomorphisme f_* se définit en effet de façon triviale par la formule (3 2), où maintenant F est un complexe parfait quelconque sur X, ce qui implique que $Rf_*(F)$ est également parfait.

4 2 Cette nouvelle définition de K'(X) soulève cependant un nouveau problème d'algèbre homologique, qui est celui d'une définition d'une λ-structure sur K'(X), compatible avec sa structure d'anneau naturelle provenant du produit tensoriel dans la catégorie dérivée. (NB Si L. et L! sont deux complexes parfaits, il en est de même de leur produit tensoriel total $L.\overset{\mathbb{L}}{\otimes}L!$). Plus précisement, il y aurait lieu de définir des opérations "puissances extérieures" dans la catégorie dérivée $D^-(X)$, transformant complexes parfaits en complexes parfaits. Cette question n'a pas encore été tiré au clair à l'heure actuelle, et comme il a été dit dans l'Introduction, elle constitue la lacune la plus sérieuse dans le Séminaire. Un fois cette question résolue, et procédant comme dans 2.3, on trouve une filtration naturelle sur K'(X), permettant de former l'anneau gradué associé Gr'(X), qui jouera le rôle de l'anneau de Chow, et de définir une théorie des classes de Chern

$$c_i : K'(X) \longrightarrow Gr'(X) \quad .$$

4 3 Pour donner un sens à la formule (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète f:X⟶Y de schémas noethériens, il faut encore inclure dans l'énoncé de cette formule les inclusions non triviales (3 4) (où d est la dimension relative virtuelle) pour permettre de définir (3.3), et de définir enfin la classe tangente relative virtuelle

$$T_f \in K^{\cdot}(X) \quad .$$

Lorsque f admet une factorisation (2.1) par une immersion dans un schéma relatif lisse, la définition de T_f n'offre pas de nouvelle difficulté. On peut d'ailleurs la reformuler dans ce cas, d'une façon plus conforme à l'esprit "catégories dérivées", en considérant l'homomorphisme canonique bien connu

$$(4\ 1) \qquad \underline{N}_{X/X'} \xrightarrow{d} \Omega^1_{X'/Y} \otimes_{\underline{O}_{X'}} \underline{O}_X$$

induit par la différentielle extérieure

$$d_{X'/X} : \underline{J} \subset \underline{O}_{X'} \to \Omega^1_{X'/Y} \quad ,$$

et le complexe de chaines

$$(4.2) \qquad L^{X/Y}_{\cdot} \in \mathrm{Ob}\ D(X)$$

défini grâce à (4.1) "en prolongeant par des zéros", complexe égal en degré 1 resp. 0 à la source resp. au but de l'homomorphisme (4.1). La formule (2.2) prend alors la forme plus sympathique

$$(4.3) \qquad \overset{\vee}{T}_f = c\ell^{\cdot}(L^{X/Y}_{\cdot}) \quad ,$$

formule qui a un sens dans $K^{\cdot}(X)$ lorsque f est un morphisme localement d'intersection complète, puisque dans ce cas le complexe $L^{X/Y}_{\cdot}$ est manifestement parfait. L'assertion d'invariance de T_f relativement à la factorisation choisie de f peut alors se préciser facilement en une assertion d'invariance pour le complexe $L^{X/Y}_{\cdot}$: modulo isomorphisme canonique dans la catégorie dérivée D(X), ce complexe est également indépendant de la factorisation choisie (Exp. VIII).

4.4. Lorsque $f : X \to Y$ est un morphisme quelconque de schémas, on peut encore construire un objet canonique $L^{X/Y}_{\cdot}$ de la catégorie dérivée D(X), défini à isomorphisme unique près, qui sur chaque ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y soit isomorphe au complexe construit suivant le principe exposé à l'alinéa précédent (où il convient cependant dans le cas général de remplacer "lisse" par "formellement lisse", de sorte que toute algèbre B sur un anneau A apparait comme quotient d'une algèbre formellement lisse, par exemple une algèbre de polynômes). Pour une telle définition il n'est pas possible de procéder par simple "recollement" à partir des constructions affines, car les objets de la catégorie dérivée D(X) sont de nature essen-

tiellement non recollables Voici une construction générale de $L^{X/Y}$, valable plus généralement pour tout morphisme $f:X \longrightarrow Y$ de topos (commutativement) annelés : Soit $B=\underline{O}_X, A=f^{-1}(\underline{O}_Y)$, de sorte que A est un Anneau sur l'espace X, et B une A-Algèbre. Soit $T \longrightarrow B$ un homomorphisme de faisceaux d'ensembles qui engendre B comme A-Algèbre, i.e. tel que l'homomorphisme de A-Algèbres

$$\phi : C = A[T] \longrightarrow B$$

correspondant soit un épimorphisme de faisceaux d'ensembles, où $A[T]$ désigne la A-Algèbre commutative libre engendrée par T (i.e. le faisceau associé au préfaisceau $U \longmapsto A(U)[T(U)] = A(U)$-algèbre commutative libre engendré par $T(U)$). Soit J le noyau de ϕ, et considérons comme dans 4 3 le complexe de chaines de longueur 1 défini par l'homomorphisme naturelle

$$J/J^2 \xrightarrow{d} \Omega^1_{C/A} \otimes_C B \quad .$$

Il n'est pas difficile de voir que, à isomorphisme canonique près dans la catégorie D(X), le complexe ainsi construit est indépendant du choix de T et de $T \longrightarrow B$, de sorte qu'il mérite la désignation de complexe cotangent relatif $L^{X/Y}$ de X sur Y. On vérifie également que pour tout ouvert affine de X au dessus d'un ouvert affine de Y, il est donné (à isomorphisme canonique près) par le procédé de 4 3.

Dans le cas où f est localement d'intersection complète, on voit de plus que l'on obtient même un complexe parfait, ce qui permet alors de définir encore un élément T_f dans $K^{\cdot}(X)$ par la formule (4.3). Signalons qu'ici encore, il n'aurait pas été possible en général de définir T_f comme un élément de $K^{\cdot}_{naif}(X)$, et rien ne permet de supposer que T_f soit globalement isomorphe dans D(X) à un complexe borné à composantes localement libres de type fini. Cela est donc une justification supplémentaire du point de vue avancé dans 4.1 en faveur du $K^{\cdot}(X)$ "sophistiqué", de préférence à $K^{\cdot}_{naif}(X)$.

4.5. Sous réserve de la question soulevée dans 4.2 , nous avons donc encore réuni tous les éléments de structure pour donner un sens à (1.2) pour un morphisme propre localement d'intersection complète de schémas quelconques (l'hypothèse noethérienne faite implicitement dans les sections qui précédent pouvant en fait s'éliminer sans difficulté essentielle). Cela ne signifie pas malheureusement que, même sous cette réserve, la formule en question soit établie, même dans le cas où Y est le spectre d'un corps

algébrique clos de caractéristique $p > 0$, et que X est un schéma algébrique propre et lisse de dimension 3 disons. Voir commentaires dans Exp. XIV n° 2.

5. Sous la forme présentée dans le n° 4, la formule de Riemann-Roch (1.2) a également un sens pour un morphisme propre localement d'intersection complète d'espaces analytiques complexes (ou d'espaces rigide-analytiques au sens de Tate). Mais bien sûr la démonstration donnée dans [RRR] ne s'applique à ce cas que lorsqu'on suppose de plus que le morphisme f est projectif, et comme dans le cas algébrique, il semble qu'il faille une idée essentiellement nouvelle pour traiter le cas général. La formule que nous envisageons ici est une formule à valeurs dans un "anneau de Chow analytique" $Gr^{\cdot}(X)$ ou plutôt $Gr^{\cdot}(X)_{\mathbb{Q}}$, construit suivant le principe expliqué dans 4.2 (la difficulté qui y est rencontrée s'évanouissant d'ailleurs du fait qu'on est en caractéristique nulle, comme on le signale dans Exp. XIV n° 1).

Lorsque X et Y sont non singuliers, il est possible de donner une autre version de la formule de Riemann-Roch en procédant comme suit. Soit d'abord X un espace analytique complexe quelconque, X^{top} le même espace muni du faisceau des fonctions complexes continues. On a donc un morphisme canonique d'espaces annelés

$$X^{top} \longrightarrow X \quad ,$$

qui définit, grâce au caractère contravariant évident du foncteur $K^{\cdot}(X)$ en l'espace annelé variable X, un homomorphisme d'anneaux

$$K^{\cdot}(X) \longrightarrow K^{\cdot}(X^{top}) \quad . \tag{5.1}$$

Supposons pour simplifier X^{top} compact ; alors, comme dans le cas (déjà signalé dans 3.1) d'un schéma admettant un module inversible ample, on voit (Exp. II) que tout complexe parfait sur X^{top} est globalement isomorphe à un complexe borné localement libre en chaque degré, i.e. à un complexe de fibrés vectoriels complexes sur X^{top}, et que par suite $K^{\cdot}(X^{top})$ est isomorphe canoniquement au groupe $K(X^{top})$ bien connu des topologues [1], défini en termes de fibrés vectoriels complexes sur l'espace compact X^{top}. On peut donc interpréter l'homomorphisme (5.1) comme étant un homomorphisme du $K^{\cdot}(X)$ défini en termes de la structure analytique, dans l'anneau bien connu $K(X^{top})$ des topologues. Si maintenant $f: X \longrightarrow Y$ est un morphisme d'espaces analytiques non singuliers compacts, on sait lui associer grâce à Atiyah-Hirzebruch

[1] un homomorphisme groupes

$$f_*^{top} : K^\cdot(X^{top}) \longrightarrow K^\cdot(Y^{top}) \quad . \tag{5.2}$$

Utilisant de même l'homomorphisme f_* de (3.1) défini par la formule (3.2) (qui utilise ici implicitement le théorème de finitude de Grauert [4] pour un morphisme propre d'espaces analytiques) on trouve un carré d'homomorphismes naturels, ne faisant intervenir que des groupes du type $K^\cdot$ (à l'exclusion d'anneaux du type anneaux de Chow ou de cohomologie) :

$$\begin{array}{ccc} K^\cdot(X) & \longrightarrow & K^\cdot(X^{top}) \\ \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow{\scriptstyle f_*^{top}} \\ K^\cdot(Y) & \longrightarrow & K^\cdot(Y^{top}) \end{array} \quad . \tag{5.3}$$

La formule de type Riemann-Roch à laquelle nous faisions allusion consiste à affirmer la commutativité de ce carré. On notera la différence de nature entre cette assertion (qui ne néglige pas les phénomènes de torsion, et se place dans un groupe $K^\cdot(Y^{top})$ de nature essentiellement discrète), et la formule de Riemann-Roch du type envisagé au n° 4, se plaçant dans un groupe du type "Chow" qui n'est plus de nature discrète, mais qu'on doit tensoriser en revanche par $\mathbb{Q}$. Notons que la formule (5.3) est démontrée en tous cas lorsque X et Y sont des variétés projectives non singulières [7], comme la formule du type envisagé au n° 4, qui est démontrée dans ce cas dans [RRR]. Il s'agit là d'une variante plausible du théorème de l'index de Atiyah-Singer (et de ses généralisations dues à Shih [7] et Atiyah), qui appelle évidemment une généralisation commune. Une fois prouvée la commutativité de (5.3), on en conclurait aussitôt, à l'aide du "théorème de Riemann-Roch différentiable" de Atiyah-Hirzebruch [1], une variante cohomologique de la formule de Riemann-Roch analytique complexe, savoir la commutativité du carré

$$\begin{array}{ccc} K^\cdot(X) & \xrightarrow{x \longrightarrow ch(x)Todd(T_X)} & H^{2\kappa}(X,\mathbb{Q}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K^\cdot(Y) & \xrightarrow{y \longrightarrow ch(y)Todd(T_Y)} & H^{2\kappa}(Y,\mathbb{Q}) \end{array} \quad , \tag{5.4}$$

où les flèches horizontales sont déduites des classes de Chern cohomologiques, déduites de l'homomorphisme (5.1) et de l'homomorphisme classe de Chern ordinaire

$$K^\cdot(X^{top}) \longrightarrow H^{2\kappa}(X,\mathbb{Z}) \quad ,$$

la première flèche verticale est la même que dans (5.3), et la deuxième est l'homomorphisme de Gysin en cohomologie rationelle.

6. Dans tout ceci, il n'a été guère question que de l'invariant contravariant $K^{\cdot}(X)$, à l'exclusion de l'invariant covariant $K_{\cdot}(X)$ dont l'existence a été signalé dans 3.1. Si on considère $K^{\cdot}(X)$ comme donnant un analogue de l'anneau de cohomologie entière d'un espace topologique, on doit considérer $K_{\cdot}(X)$ comme donnant un analogue de l'homologie entière, la structure de Module de $K_{\cdot}(X)$ sur $K^{\cdot}(X)$ correspondant alors à l'opération de cap-produit (*). Le fait que lorsque X est régulier, l'homomorphisme naturel $K^{\cdot}(X) \to K_{\cdot}(X)$ soit un isomorphisme, doit être regardé comme l'analogue du théorème de dualité de Poincaré sur les variétés topologiques orientées, affirmant que le cap-produit avec la classe d'homologie fondamentale définit un isomorphisme de la cohomologie sur l'homologie. Ces analogies suggèrent d'ailleurs l'opportunité de définir également, pour un polyèdre fini X mettons, un invariant $K_{\cdot}(X)$ de nature covariante, dont les relations à l'homologie entière (suite spectrale, homomorphisme de Chern...) seraient analogues à celles existant entre $K^{\cdot}(X)$ et la cohomologie entière ; et il ne semble pas non plus exclu qu'il puisse exister, en termes de ces groupes $K_{\cdot}(X)$, des variantes du théorème de Riemann-Roch différentiable, valable pour des espaces plus généraux que des variétés différentiables compactes.

Revenant au cas où X est un schéma noethérien quelconque, il convient de munir $K_{\cdot}(X)$ d'une filtration croissante, $\mathrm{Filt}_i K_{\cdot}(X)$ étant engendré par des classes $c\ell_{\cdot}(F)$, avec F faisceau cohérent sur X tel que $\dim \mathrm{supp}.F \leq i$. On prouvera (Exp. X) la compatibilité de cette filtration avec la structure de module et la filtration de $K^{\cdot}(X)$, i.e. la formule

$$\mathrm{Filt}^i K^{\cdot}(X) \,.\, \mathrm{Filt}_j(K_{\cdot}(X) \subset \mathrm{Filt}_{j-i} K_{\cdot}(X) \quad , \tag{6.1}$$

ce qui permet de munir le gradué associé au module filtré $K_{\cdot}(X)$, noté

$$\mathrm{Gr}_{\cdot}(X) \quad ,$$

d'une structure de module sur $\mathrm{Gr}^{\cdot}(X)$. Ses éléments peuvent d'ailleurs s'interpréter comme des classes de cycles algébriques sur X, (pour une relation d'équivalence moins fine que l'équivalence rationelle, lorsque X est de type fini sur un corps de base K). Si

(*) Cette analogie n'est d'ailleurs pas purement verbale, et peut se préciser, après passage aux gradués $\mathrm{Gr}^{\cdot}(X)$, $\mathrm{Gr}_{\cdot}(X)$ associés, par une relation de compatibilité explicite entre la structure de module sur $\mathrm{Gr}_{\cdot}(X)$ et l'opération "cap".

$$f: X \longrightarrow Y$$

est un morphisme propre de schémas noethériens, alors

(6.2) $$f_* : K.(X) \longrightarrow K.(Y)$$

est compatible avec les filtrations, et définit un homomorphisme de groupes gradués

(6.3) $$f_* : Gr.(X) \longrightarrow Gr.(Y) \quad ,$$

donnant lieu à une "formule de projection" i.e. qui est $Gr^{\cdot}(Y)$-linéaire, formule qui se réduit par passage aux gradués de la formule de projection analogue pour l'homomorphisme (6.2) (qui est $K^{\cdot}(Y)$-linéaire).

Dans le point de vue proposé dans le Séminaire, une théorie des intersections maniable, sur les schémas noethériens X pas nécessairement réguliers, doit consister en l'étude combinée des invariants contravariants $K^{\cdot}(X)$, $Gr^{\cdot}(X)$ et des invariants covariants $K.(X)$, $Gr.(X)$, qui jouent des rôles de nature essentiellement différente, et dont les propriétés se complètent mutuellement. C'est ainsi que les groupes covariants $K.(X)$, $Gr.(X)$ se calculent mieux pour certaines fibrations non propres, grâce à la "suite exacte d'homotopie" qu'on peut établir pour eux ([RRR] et Exp. IX) ; par exemple on prouve (Exp. IX) des isomorphismes canoniques tels que

$$K.(X[t]) \xrightarrow{\sim} K.(X) \quad , \quad Gr.(X[t]) \xrightarrow{\sim} Gr.(X),$$

qui tombent en défaut en général pour $K^{\cdot}$ lorsque X est un schéma non régulier. En revanche, $K^{\cdot}(X)$ et $Gr^{\cdot}(X)$ se prêtent bien aux calculs grâce à leur structure d'anneaux.

Lorsqu'on considère des schémas X propres sur un corps, la projection

$$f^X : X \longrightarrow (\text{point})$$

définit un homomorphisme "caractéristique d'Euler-Poincaré"

(6.4) $$\chi_X = f^X_* : K.(X) \longrightarrow K.(\text{point}) = \mathbb{Z} \quad ,$$

induisant sur le sous-groupe $Gr_o(X) = Filt_o K.(X)$ l'homomorphisme "degré des O-cycles"

(6.5) $$deg_X : Gr_o(X) \longrightarrow \mathbb{Z} .$$

L'homomorphisme de multiplication

$$Gr^i(X) \times Gr_i(X) \longrightarrow Gr_o(X) ,$$

composé avec l'homomorphisme degré (6.5), fournit alors un accouplement

(6.6) $$Gr^i(X) \times Gr_i(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \quad ,$$

qui explique qu'à certains égards $Gr^{\cdot}(X)$ et $Gr.(X)$ jouent des rôles duals,

tout comme la cohomologie et l'homologie. Ainsi, si $f: X \to Y$ est un morphisme de schémas algébriques propres, les deux homomorphismes

$$f^* : Gr^\cdot(Y) \to Gr^\cdot(X) \quad \text{et} \quad f_* : Gr.(X) \to Gr.(Y)$$

sont formellement transposés l'un de l'autre, au sens des accouplements (6.6).

Les homomorphismes (6.4) et (6.5) et l'accouplement (6.6) qu'on en déduit, peuvent être considérés comme la source des relations numériques en théorie des intersections sur les schémas algébriques propres sur un corps donné k. Ce point de vue sera développé avec quelques détails dans Exp. X, indépendant pour l'essentiel des Exp. VI,VII,VIII (centrés sur la démonstration du théorème de Riemann-Roch) et de Exp. IX. On y donnera également quelques notions sur le comportement de $K^\cdot(X)$, $Gr^\cdot(X)$ par spécialisation.

7. Comme dans toute théorie d'intersection, il importe de préciser la place que prend dans la théorie le groupe de Picard, (ou groupe des classes de diviseurs dans la terminologie classique). Moyennant une légère restriction, automatiquement satisfaite lorsque X est par exemple quasi-compact, on établit dans Exp. X un isomorphisme canonique

$$(7.1) \qquad c_1 : Pic(X) \xrightarrow{\sim} Gr^1(X) \quad ,$$

qui montre le rôle exact du groupe de Picard dans la théorie que nous proposons. Ce rôle justifie une étude plus détaillée de ce groupe de Picard dans les exposés XII, XIII, qui sont logiquement indépendants du texte du Séminaire. Une étude de l'équivalence numérique et de certains théorèmes de finitude pour le groupe de Picard (annoncés sans démonstration dans [6]) est faite par Kleiman dans Exp. XIII, en utilisant des techniques de nature purement numérique (n'utilisant pas la théorie du foncteur de Picard et de sa représentabilité), dues à lui-même et à Mumford, nettement plus simples que les démonstrations initiales de Grothendieck. Le seul résultat réfractaire aux méthodes de Kleiman (et dont il est obligé de faire usage) est [6, C-07 (i)] , dont la démonstration et certains raffinements (incluant certains théorèmes de représentabilité pour le foncteur de Picard) occupe l'exposé XII. Ce dernier relève d'ailleurs d'un esprit et d'une technique entièrement étrangers au reste du Séminaire, se rattachant à [5] ; cet ex-

posé est logiquement indépendant de tous les autres.

Enfin, dans Exp. XI, de nature nettement plus générale que XII et XIII et plus proche de l'esprit général du Séminaire, on étudie, sur un topos localement annelé quelconque, un foncteur remarquable appelé "foncteur déterminant" :

(7.2) $$\det^{*}: \underline{\mathrm{Parfis}}(X) \longrightarrow \underline{\mathrm{Inv}}(X)$$

de la catégorie des complexes parfaits sur X, les morphismes étant les seuls isomorphismes au sens de la catégorie dérivée D(X), dans la catégorie des Modules inversibles sur X. Ce foncteur est décrit à peu de choses près par l'exigence d'être de "nature locale", et d'être donné, pour un complexe L. borné et à composantes localement libres, par la formule

(7 3) $$\det^{*}(L.) \simeq \bigotimes_i \det(L_i)^{(-1)^i} \quad ,$$

où $\det(L_i)$ désigne la puissance extérieure de degré maximum du Module localement libre L_i . Bien que cet exposé aussi soit logiquement indépendant du reste du Séminaire à l'exception de l'exposé I, il constitue néanmoins un élément important du "yoga" général proposé dans le Séminaire, et développé pour l'essentiel dans les exposés I à XI.

BIBLIOGRAPHIE

[1] M. Atiyah et F. Hirzebruch, Vector bundles and homogeneous spaces, Symposia in Pure Mathematics, vol. 3, Différential Geometry p. 7-38, 1961.

[2] A. Borel et J.P. Serre, Le théorème de Riemann-Roch, Bull. Soc. math France, t.86, p. 97-136 (1958).

[3] H. Grauert, Ein Theorem der analytischen Garbentheorie, Pub. Math. n° 5, p. 5-64 (1960).

[4] A. Grothendieck, Classes de faisceaux et théorème de Riemann-Roch, notes miméographiées, Princeton 1957, (cité [RRR] et reproduit en Appendice à l'Exp. 0 du Séminaire).

[5] A. Grothendieck, Technique de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique, dans Fondements de la Géométrie Algébrique, Extraits du Séminaire Bourbaki 1957-1962, Secrétariat Mathématique, Paris.

[6] W. Shih, Séminaire de Topologie à l'IHES, 1966/67.

[7] M. Atiyah et F. Hirzebruch, The Riemann-Roch theorem for analytic embeddings, Topology, vol. 1, p. 151 - 166 (1962).

CLASSES DE FAISCEAUX ET THEOREME DE RIEMANN-ROCH

par A. GROTHENDIECK (*)

CHAP. I - λ-Anneaux (préliminaires formels)

1. Définitions..... 1
2. Exemples..... 4
3. Le λ-anneau défini par un anneau gradué..... 8
4. Les opérations $\lambda^P(N,x)$..... 13

CHAP. II - Classes de faisceaux algébriques cohérents et classes de Chern..... 18
1. La théorie de Chow..... 18
2. Définition des classes de Chern des faisceaux algébriques cohérents..... 22
3. Généralités fonctorielles sur K(X)..... 27
4. Quelques résultats techniques..... 34
5. Définition faisceautique des classes de Chern. Application à l'étude des morphismes d'injection..... 43
6. Le théorème de Riemann-Roch..... 49

Démonstration du théorème de Riemann-Roch (1er Novembre 1957).

(*) Ceci est la reproduction textuelle du rapport cité dans l'Introduction du présent Séminaire. Les notes de bas de page indiquées par des signes (*), (**) ont été rajoutées en Octobre 1967.

CHAPITRE I

λ-Anneaux (Préliminaires formels)

§ 1. Définitions

On appelle λ-anneau (*) un anneau commutatif K avec unité, muni d'une famille d'applications

(1.1) $$\lambda^i : K \longrightarrow K$$

(i entier ≥ 0) satisfaisant aux conditions suivantes :

(1.2) $$\lambda^0 x = 1,\ \lambda^1 x = x,\ \lambda^n(x+y) = \sum_{i=0}^{n} \lambda^i x . \lambda^{n-i} y \quad .$$

Posons, pour tout $x \in K$

(1.3) $$\lambda_t(x) = \sum_{n \geq 0} \lambda^n(x) t^n \in K[[t]] \quad ;$$

les relations précédentes expriment alors que $x \longmapsto \lambda_t(x)$ est un homomorphisme du groupe additif K dans le groupe multiplicatif $1 + K[[t]]^+$ des séries formelles dans K, d'augmentation 1, relevant l'homomorphisme canonique $1 + \sum_{i>0} x_i t^i \longrightarrow x_1$.

Ainsi, sur l'anneau $\mathbb{Z}$ existe une unique λ-structure compatible avec sa structure d'anneau et telle que

---

(*) Dans ce séminaire, nous disons plutôt pré-λ-anneau (V 2.1), réservant le nom de λ-anneau à ceux satisfaisant la condition supplémentaire de la page 3 (cf V 2.4).

(1.4) $\lambda_t(1) = 1 + t$.

On a alors

(1.5) $\lambda_t(n) = (1 + t)^n$,

d'où $\lambda^i(n) = \binom{n}{i}$.

La notion de λ-homomorphisme de λ-anneaux est claire ; un λ-anneau augmenté est un λ-anneau muni d'un λ-homomorphisme dans $\mathbb{Z}$.

Pour définir la notion de λ-anneau spécial, les considérations suivantes sont utiles. Soit k un anneau commutatif avec unité, soit $K = 1 + k[[t]]^+$ le groupe des séries formelles à coefficients dans k, d'augmentation 1; on va y introduire une loi de λ-anneau dont la structure additive soit la multiplication des séries formelles. La multiplication de cet anneau sera notée $f \circ g$. Elle est entièrement déterminée par la condition que les coefficients $c_n = c_n(f \circ g)$ de $f \circ g$ soient donnés par des polynômes universels à coefficients entiers en les coefficients $a_i = c_i(f)$ et $b_i = c_i(g)$ de f et g respectivement :

(1.6) $c_n = P_n(a_1,\ldots,a_n;b_1,\ldots,b_n)$,

qu'elle soit distributive par rapport à l' "addition" fg, et soit donnée pour des facteurs linéaires par :

(1.7) $(1 + at) \circ (1 + bt) = 1 + abt$.

Les P_n se calculent par des calculs de fonctions symétriques ; P_n est isobare de poids n en les a_i et isobare de poids n en les b_i (a_i et b_i étant de poids i) et d'ailleurs symétrique en $a = (a_i)$ et $b = (b_i)$. De même, les $\lambda^i(f)$ sont déterminés sans ambiguïté par la condition que

les coefficients $c_n(\lambda^i(f)) = c_n$ de $\lambda^i(f)$ se calculent au moyen de polynômes universels à coefficients entiers en les coefficients $c_n(f) = a_n$ de f:

(1.8) $$c_n = P_{i,n}(a_1,\dots,a_{in}) \quad ,$$

que les relations (1.2) soient vérifiées, et que, pour $i > 1$, on ait :

(1.9) $$\lambda^i(1 + at) = 1$$

(1 est l'élément nul de l'anneau $K = 1 + k[[t]]^+$). Les $P_{i,n}$ se calculent encore par des calculs de fonctions symétriques, et l'on constate que $P_{i,n}$ est un polynôme isobare de poids in en les a_i. Muni des opérations précédentes, K devient un λ-anneau, son élément nul est 1, son élément unité est 1 + t. Notons aussi la relation :

(1.7 bis) $$(1 + at) \circ f = f(at)$$

Soit maintenant K un λ-anneau quelconque. On dit que K est spécial si l'homomorphimse additif λ_t de K dans $1 + K[[t]]^+$ est un λ-homomorphisme. Cela signifie donc qu'on a les formules :

(1.10) $$\lambda_t(1) = 1 + t, \quad \lambda_t(xy) = \lambda_t(x) \circ \lambda_t(y), \quad \lambda_t(\lambda^i(x)) = \lambda^i(\lambda_t(x) \quad ,$$

ou encore, explicitement :

(1.11) $$\begin{cases} \lambda^i(1) = 0 & \text{si } i \geqslant 1 \\ \lambda^n(xy) = P_n(\lambda^1 x,\dots,\lambda^n x;\lambda^1 y,\dots,\lambda^n y) \\ \lambda^n(\lambda^i(x)) = P_{i,n}(\lambda^1 x,\dots,\lambda^n x) \quad , \end{cases}$$

où les P_n et les $P_{i,n}$ sont les polynômes universels envisagés plus haut. Il en résulte en particulier les formules (1.5). (On peut montrer que le λ-anneau $1 + k[[t]]^+$ construit avec un anneau commutatif k est spé-

cial ; mais nous n'aurons pas besoin de ce fait).

§ 2. Exemples

1) Soient G un groupe et k un anneau commutatif ; on considère le groupe $\underline{K}(G)$, quotient du groupe libre engendré par les classes de représentations de G dans des k-modules de type fini par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme $(\rho \oplus \rho') - (\rho) - (\rho')$ (on note $\oplus$ la somme directe). Le produit tensoriel et les puissances extérieures définissent dans $\underline{K}(G)$ une structure de λ-anneau. On peut aussi passer au quotient par les éléments de la forme $(\rho) - (\rho') - (\rho'')$ où ρ est une présentation extension de ρ' par ρ'', triviale comme extension de k-modules. On obtient le groupe $\underline{K}_r(G)$ des classes réduites de représentations de G, et l'on constate que la loi de λ-anneau passe au quotient.

Lorsque k est un corps algébriquement clos de caractéristique 0 (*), on peut montrer que $\underline{K}(G)$, et a fortiori $\underline{K}_r(G)$, est un λ-anneau spécial ; il n'en est plus de même si la caractéristique est $\neq 0$, mais cependant si k est algébriquement clos (*), $\underline{K}_r(G)$ est encore un λ-anneau spécial. Pour le prouver, on est ramené au cas où G est un produit $Gl(m,k) \times Gl(n,k)$ et où l'on ne considère que les représentations rationnelles de G ; notre assertion résulte de la détermination explicite de $\underline{K}_r(G)$ qui sera faite plus bas (exemple 3) ; enfin, lorsque k est de caractéristique 0, la complète réductibilité des représentations rationnelles de G montre que $\underline{K}(G) = \underline{K}_r(G)$.

(*) Il est inutile que k soit algébriquement clos, cf.(VI 3.3) pour un résultat encore plus général (englobant tous ceux qui seront utilisés dans le présent rapport).

Variantes de l'exemple précédent : G est un groupe algébrique défini sur k et l'on ne considère que les représentations rationnelles de G définies sur k ; on peut considérer le cas d'un groupe topologique, ou de Lie, et des représentations continues, etc ... ([1])

2) Soit X une variété algébrique, irréductible ou non, définie sur le corps k. On pourra considérer le groupe quotient du groupe libre engendré par les classes de fibrés vectoriels sur X (définis sur k), par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme $(E \oplus E') - (E) - (E')$, sur lequel les opérations de λ-anneau seront définies par le produit tensoriel et les puissances extérieures. Si X est complète, c'est un groupe libre engendré par les fibrés vectoriels indécomposables sur X (grâce à Krull-Remak-Schmidt) ; la connaissance de cet anneau et de sa base équivaut à la classification complète des fibrés vectoriels sur X et la connaissance des opérations tensorielles élémentaires sur ces fibrés. Si k est algébriquement clos de caractéristique 0, toutes les autres opérations tensorielles sur des classes de fibrés sont alors connues, à l'aide de ce qui va suivre dans 3). On peut faire un passage au quotient plus draconien, par le groupe engendré par les éléments $(E) - (E') - (E'')$ où E est un fibré vectoriel extension de E' par E" ; on trouve alors un λ-anneau, noté $\underline{K}(\xi(X))$, où $\xi(X)$ désigne la catégorie additive des fibrés vectoriels sur X, définis sur k. En utilisant les résultats de l'exemple 1), on montre que si k est algébriquement clos (*), le λ-anneau $\underline{K}(\xi(X))$ est spécial, et qu'il en est de même du

---

([1]) On peut construire d'autres exemples de λ-anneaux, par exemple l'ensemble des classes d'équivalence de formes quadratiques, l'ensemble des classes de représentations d'une algébre de Lie, etc... Nous promettons que nous n'aurons pas besoin de tous ces exemples pour traiter le théorème de Riemann-Roch !

(*) Condition inutile, cf. note de bas de page précédente.

premier λ-anneau défini ici, si la caractéristique de k est 0, mais non dans le cas général.

3) Détermination de $\underline{K}(G)$ et de $\underline{K}_r(G)$ dans certains cas importants : On suppose le corps k algébriquement clos, le groupe G algébrique affine connexe et "globalement réductif" (le radical de G est isomorphe à k^{*s}) et l'on ne considère que les représentations linéaires rationnelles. En caractéristique 0, la complète réductibilité des représentations linéaires rationnelles de G montre que $\underline{K}(G) = \underline{K}_r(G)$ est le groupe libre engendré par les classes des réprésentations rationnelles irréductibles. Or, si T est un tore maximal de G, on a $\underline{K}(T) = \underline{K}_r(T) = \mathbb{Z}(\hat{T})$, algébre du groupe $\hat{T}$ des caractères rationnels de T ; on a $\hat{T} \simeq \mathbb{Z}^r$ si r est le rang de G (ceci est indépendant de la caractéristique). Le groupe de Weyl W opère dans T, donc dans $\underline{K}(T)$, d'une manière qui ne dépend que des opérations de W dans le groupe libre $\hat{T}$. On a un homomorphisme évident de λ-anneaux, déduit de l'injection de T dans G :

$$\underline{K}_r(G) \longrightarrow \underline{K}_r(T)^W = \underline{K}(T)^W, \tag{1.13}$$

où $\underline{K}(T)^W$ dénote l'ensemble des points fixes de W dans $\underline{K}(T)$. La théorie des représentations linéaires de G (*) démontre alors le théorème suivant :

Théorème 1.1. L'homomorphisme (1.13) est un isomorphisme.

On voit donc que $\underline{K}_r(G)$, une fois connu le "type" de G (caractérisé par W opérant sur un groupe $\mathbb{Z}^r$), ne dépend pas de la caractéristique, et que c'est un λ-anneau spécial. On a une base canonique de $\underline{K}_r(G)$ correspondant aux orbites de W dans $\hat{T}$; une autre base s'obtient ainsi :

(*) Cf. Séminaire Chevalley 1956/58 Groupes de Lie albébriques (Ecole Normale Supérieure).

soient $(\rho_i)_{1\le i\le r'}$ les classes de représentation de G correspondant aux représentations fondamentales de G/rad G, et $(\sigma_i)_{1\le i\le r''}$ une base du groupe des homomorphismes rationnels de G dans k* ; on a donc $r' + r'' = r$ (rang de G).

Corollaire : L'anneau $\underline{K}_r(G)$ s'identifie au sous-anneau $\mathbb{Z}[\rho_1,..,\rho_{r'}; \sigma_1,...,\sigma_{r''};\sigma_1^{-1},...,\sigma_{r''}^{-1}]$ du corps des fonctions rationnelles en les ρ_i et les σ_j à coefficients dans $\mathbb{Q}$ (*).

En particulier, $\underline{K}_r(G)$ n'a pas de diviseurs de 0 ; si $G = \prod_i Gl(n_i,k)$, l'anneau $\underline{K}_r(G)$ s'explicite ainsi : soit ρ_i la représentation de G déduite de la représentation identique de $Gl(n_i,k)$; si l'on considère alors le corps des fonctions rationnelles sur $\mathbb{Q}$ en des indéterminées $\lambda^j(\rho_i)$ $(1\le j\le n_i)$, alors $\underline{K}_r(G)$ s'identifie au sous-anneau engendré par ces indéterminées et les inverses des $\lambda^{n_i}(\rho_i)$. Cela justifie notre assertion que, du moins en caractéristique 0, les opérations λ^i permettent de reconstituer toutes les opérations tensorielles sur les fibrés vectoriels ; ceci est encore vrai sur un corps algébriquement clos de caractéristique quelconque, pourvu qu'on prenne des classes réduites.

Remarques : a) Dans l'exemple 1), l'anneau $\underline{K}(G)$ est augmenté, l'augmentation étant définie par le degré des représentations, et par passage au quotient, cette augmentation définit une augmentation sur $\underline{K}_r(G)$. De même, les λ-anneaux envisagés dans l'exemple 2) sont augmentés lorsque X est k-irréductible ; dans $\underline{K}(\Xi(X))$, l'augmentation est définie par le rang d'un fibré vectoriel, c'est-à-dire la dimension de ses fibres.

(*) Il faut supposer le groupe dévisé G' de G simplement connexe pour que cet énoncé soit correct.

b) Lorsque le corps k n'est pas algébriquement clos, il est plausible que $\underline{K}(G)$ est un λ-anneau spécial en caractéristique 0, et de même pour $\underline{K}_r(G)$ en toutes caractéristiques.

c) En caractéristique non nulle, le théorème 1.1 m'a été gracieusement fourni par Chevalley.

§ 3. Le λ-anneau défini par un anneau gradué

Soit A un anneau gradué commutatif avec unité ; on supposera pour simplifier que les degrés de A sont positifs et que $A^0 = \mathbb{Z}$. On désigne par $\hat{A}$ le produit des A^i (c'est un anneau commutatif avec unité), par $\hat{A}^+$ le noyau de l'augmentation évidente $\hat{A} \longrightarrow A^0 = \mathbb{Z}$. Alors $1 + \hat{A}^+$ est un sous-groupe du groupe multiplicatif des éléments inversibles de $\hat{A}$. Considérons le groupe abélien

$$\tilde{A} = \mathbb{Z} \times (1 + \hat{A}^+) \quad , \tag{1.14}$$

dont les éléments seront notés $[n,x]$ avec $n \in \mathbb{Z}$ et $x = 1 + \sum_{i \geq 1} x_i^i \in 1 + \hat{A}^+$ $(x^i \in A^i)$. Nous écrirons ce groupe additivement, ainsi :

$$[n,x] + [n',x'] = [n + n', xx'] \quad . \tag{1.15}$$

L'élément nul de ce groupe est $[0,1]$. Nous allons y introduire une structure de λ-anneau augmenté, compatible avec sa strucutre additive, l'augmentation étant $\varepsilon:[n,x] \longrightarrow n$. Le produit $[m,x][n,y]$ est complètement caractérisé par le fait qu'il s'écrive $[\ mn,\ x^n y^m (x * y)]$, où $x * y$ est un élément de $1 + \hat{A}^+$ dont les composantes s'expriment comme polynômes universels à coefficients entiers en les x^i et les y^i :

$$(x * y)^i = Q_i(x^1,\ldots,x^i;y^1,\ldots,y^i) \qquad (i \geq 1) \tag{1.16}$$

le polynôme Q_i étant isobare de poids i. De plus, x * y doit être distributif par rapport à l' "addition" xy et pour des facteurs "linéaires" doit se réduire à ce qui suit :

(1.17) $$[1, 1 + x^1][1, 1 + y^1] = [1, 1 + x^1 + y^1] \quad .$$

Les polynômes Q_i s'évaluent par des calculs de fonctions symétriques élémentaires (il s'agit du calcul des classes de Chern d'un produit tensoriel de fibrés vectoriels à l'aide des classes de Chern x^i et y^i des facteurs et de leurs dimensions respectives m et n). De (1.17) on déduit :

(1.17 bis) $$(1 + x^1) * (1 + y^1) = (1 + x^1 + y^1)/(1 + x^1)(1 + y^1) \quad ,$$

et un produit x * y quelconque se calcule terme à terme en décomposant "formellement" x en un produit $\prod_{i=1}^{n} (1 + \alpha_i)$ et y en un produit $\prod_{i=1}^{n} (1 + \beta_i)$, où les α_i et les β_i sont de degré 1.

De cette manière, $\tilde{A}$ devient un anneau commutatif augmenté, avec une unité [1,1], et on peut l'interpréter comme l'anneau obtenu par adjonction d'une unité à l'anneau $1 + \hat{A}^+$. De plus, sur $\tilde{A}$, on définit une <u>filtration</u> en posant $\tilde{A}^0 = \tilde{A}$ et en notant $\tilde{A}^n$ l'ensemble des [0,x] avec $x^i = 0$ pour $1 \leq i < n$; cette filtration est compatible avec le produit, car on a

(1.18) $$(1 + \sum_{i \geq m} x^i) * (1 + \sum_{j \geq n} y^j) = 1 - \frac{(m + n - 1)!}{(m-1)!(n-1)!} x^m y^n + \ldots \quad ,$$

les termes non écrits étant de degré > m + n. Cette formule montre que l'anneau gradué $G(\tilde{A})$ associé à $\tilde{A}$ s'identifie à A au point de vue additif, mais non au point de vue multiplicatif ; on peut dire seulement que l'application η' de A dans $G(\tilde{A})$ définie par

(1.19) $\eta'(x^i) = (-1)^{i-1}(i-1)!\, x^i \qquad (x^i \in A^i)$

est un homomorphisme d'anneaux.

On introduit dans $\widetilde{A}$ des opérations λ^i vérifiant les axiomes des λ-anneaux (§ 1, formules (1.2)), bien déterminées par la condition que les composantes de $\lambda^i[0,x]$ se déduisent des composantes x^i de x par des polynômes universels à coefficients entiers

(1.20) $\lambda^i[0,x] = [0,\lambda^i x] \quad (\lambda^i x)^{(n)} = Q_{i,n}(x^1,\ldots,x^n)$

($Q_{i,n}$ est isobare de poids n), et que l'on ait

(1.21) $\lambda^i[1,\ 1+x^1] = 0 \qquad$ pour $i > 1$.

Les polynômes $Q_{i,n}$ s'évaluent par un calcul de fonctions symétriques élémentaires, qui est le calcul des classes de Chern des puissances extérieures d'un fibré vectoriel, à l'aide des classes de Chern et du rang de ce dernier. On constate alors que $\widetilde{A}$ est un λ-anneau spécial augmenté et que les $\widetilde{A}^i$ sont stables par les opérations λ^j.

Le λ-anneau augmenté $\widetilde{A}$ peut être considéré comme un foncteur en A ; par suite l'automorphisme principal $x = \sum_{i\geq 0} x^i \longrightarrow \check{x} = \sum_{i\geq 0} (-1)^i x^i$ de A définit un automorphisme de $\widetilde{A}$, noté par le même symbole $\check{}$.

Proposition 1.2. Pour $x \in \widetilde{A}$ de la forme $[n,\ 1+x^1+\ldots+x^n]$ (on a donc $x^i = 0$ pour $i > n$), on a $\lambda^i(x) = 0$ pour $i > n$, on a $\lambda^n(x) = [1,\ 1+x^1]$ et enfin

(1.22) $\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda^i(x) = [0,\ 1-(n-1)!x^n + \ldots\ ]$

De cette proposition et du fait que les $\widetilde{A}^i$ sont stables par les opérations λ^j, on déduit que la formule (1.22) est valable chaque fois que $\epsilon(x) = n$, que l'on ait ou non $x^i = 0$ pour $i > n$.

La formule (1.22) admet les généralisations suivantes : soit K un λ-anneau quelconque et par ailleurs arbitraire ; pour $x \in K$, on pose

(1.23) $$\gamma^n(x) = (-1)^n \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda^i(x + n) = \lambda^n(x + n - 1)$$

(l'identité des deux derniers membres résulte d'une récurrence immédiate). On a en particulier $\gamma^0(x) = 1$ et $\gamma^1(x) = x$; on pose ensuite :

(1.24) $$\gamma_t(x) = \sum_{n \geq 0} \gamma^n(x) t^n \quad \in K[[t]]$$

d'où l'on déduit la formule :

(1.25) $$\gamma_t(x) = \lambda_{t/(1-t)}(x) \quad ,$$

ce qui équivaut à

(1.25 bis) $$\lambda_s(x) = \gamma_{s/(1+s)}(x) \quad .$$

Ceci prouve que les λ^i s'expriment à l'aide des γ^i et que $\gamma_t(x + y) = \gamma_t(x)\ \gamma_t(y)$, et par suite que les applications γ^i définissent une nouvelle structure de λ-anneau sur K. La formule (1.22) montre alors que pour $K = \tilde{A}$ et tout $x \in \tilde{A}$, on a

(1.22 bis) $$\gamma^n(x - \varepsilon(x)) = [0,\ 1 + (-1)^{n-1}(n-1)!\, x^n + \ldots\ ]$$

et par suite, la <u>composante</u> x^n <u>s'obtient, au facteur</u> $(-1)^{n-1}(n-1)!$ <u>près, en réduisant modulo</u> $\tilde{A}^{n+1}$ <u>l'élément</u> $\gamma^n(x - \varepsilon(x))$ <u>de</u> $\tilde{A}^n$.

<u>L'homomorphisme de Chern</u> :

Pour tout anneau gradué A vérifiant les conditions précédentes, on va définir un homomorphisme d'anneaux augmentés :

(1.26) $$ch : \tilde{A} \longrightarrow \widehat{A \otimes \mathbb{Q}} \quad .$$

Cet homomorphisme est défini sans ambiguité par la condition d'être un homomorphisme additif, de transformer 1 en 1, d'être tel que les com-

posantes de ch(x) en degré > 0 soient données par des polynômes universels isobares à coefficients rationnels en les composantes de x, et que

$$(1.27) \qquad ch([1, 1 + x^1]) = \exp x^1 = \sum_{n\geq 0} (x^1)^n/n! \quad .$$

On obtient alors aussitôt l'expression explicite de ch : soit η l'endomorphisme additif de $\widehat{A \otimes \mathbb{Q}}$ défini pour x^i de degré i par

$$(1.28) \qquad \eta(x^i) = 1/(-1)^{i-1}(i-1)!\, x^i$$

on a alors

$$(1.29) \qquad ch([n, 1 + \sum_{i\geq 1} x^i]) = n + \eta(\log(1 + \sum_{i\geq 1} x^i)) \quad .$$

Comme on peut "inverser" cette formule, du moins si A n'a qu'un nombre fini de composantes homogènes, on voit que dans ce cas, on a un <u>isomorphisme</u> ch <u>de l'anneau</u> $\widetilde{A} \otimes \mathbb{Q}$ <u>sur l'anneau</u> $\widehat{A \otimes \mathbb{Q}}$ (ce qui élucide complètement la structure de $\widetilde{A} \otimes \mathbb{Q}$).

Rappelons que d'après Hirzebruch [1], une série formelle $f \in \mathbb{Q}[[t]]$ définit par des formules polynômiales universelles un homomorphisme additif $1 + \hat{A}^+ \longrightarrow 1 + (\widehat{A \otimes \mathbb{Q}})^+$, noté $\mathcal{C}_f$; lorsque $f(t) = t/(1 - \exp(-t))$, on pose simplement $\mathcal{C}_f = \mathcal{C}$ ($\mathcal{C}$ est l'initiale de Todd). On étend la définition de $\mathcal{C}(x)$ à $x \in \widetilde{A}$. **Ceci dit,** on a le résultat suivant :

<u>Proposition</u> 1.3. <u>Soit</u> $N \in \widetilde{A}$ <u>de la forme</u> $[q, 1 + N^1 + \ldots + N^q]$ (on a $N^i = 0$ pour $i > q$). <u>Si l'on pose</u> :

$$\lambda_{-1}(N) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i \lambda^i(N) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda^i(N) \quad ,$$

<u>on aura</u> :

$$(1.30) \qquad ch(\lambda_{-1}(N)) = (-1)^q N^q \mathcal{C}(\check{N})^{-1} \quad ,$$

ce qui équivaut à :

(1.30 bis) $$ch(\lambda_{-1}(\check{N})) = N^{q}\mathfrak{C}(N)^{-1} \quad .$$

§ 4. Les opérations $\lambda^p(N,x)$

Soit A l'anneau des séries formelles, à coefficients dans $\mathbb{Z}$, en deux suites infinies d'indéterminées, notées $\lambda^i N$ et $\lambda^i x$ $(i \geq 1)$. On pose $\lambda^1 N = N$ et $\lambda^1 x = x$, et l'on introduit sur A l'unique structure de λ-anneau spécial pour lequel on ait $\lambda^i(N) = \lambda^i N$ et $\lambda^i(x) = \lambda^i x$ et pour lequel les opérations λ^i soient "continues" (si l'on se bornait aux polynômes en des indéterminées $\lambda^i N$ et $\lambda^i x$, on aurait le "λ-anneau libre engendré par N et x" ; notre anneau A en est un complèté). On peut alors former

(1.31) $$\lambda_{-1}(N) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lambda^i N \quad ,$$

qui est une série formelle de terme constant 1, donc inversible ; on peut donc définir sans ambiguïté un élément $\lambda^p(N,x)$ de A en posant

(1.32) $$\lambda^p(N,x)\lambda_{-1}(N) = \lambda^p(x\lambda_{-1}(N))$$

Théorème 1.4. Soit J_q l'idéal fermé de A engendré par les $\lambda^i N$ avec $i > q$; identifions A/J_q à l'anneau des séries formelles en les $\lambda^i x$ et les $\lambda^j N$ $(1 \leq j \leq q)$. Alors $\lambda^p(N,x)$ réduit modulo J_q est un polynôme, isobare de poids p par rapport aux variables $\lambda^i x$.

Soient N et F deux espaces vectoriels de dimensions finies q,q' sur un corps k algébriquement clos de caractéristique 0 ; soit $N^{(p)}$ le noyau de l'application $(a_1,\ldots,a_p) \longrightarrow a_1 + \ldots + a_p$ de N^p dans N. On

fait opérer le groupe symétrique $\mathfrak{S}_p$ sur N^p, donc sur $N^{(p)}$ donc sur $\wedge(N^{(p)})$, puis sur $\overset{p}{\otimes} F$ et sur $\wedge(N^{(p)}) \otimes \overset{p}{\otimes} F$. Considérons cet espace vectoriel comme un module gradué sur $\mathfrak{S}_p \times Gl(N) \times Gl(F)$ et prenons sa "partie alternée" qui est un module gradué sur $Gl(N) \times Gl(F) = G$. On a alors

$$\lambda^p(N,F) = \underline{E}_G((\wedge(N^{(p)}) \otimes \overset{p}{\otimes} F)^{alt}) \quad . \tag{1.33}$$

N.B. Si M est un complexe de G-modules, on note $\underline{E}_G(M)$ la somme alternée dans $\underline{K}(G)$ des classes des composantes de M ; c'est la caractéristique d'Euler-Poincaré de M ; dans la formule (1.33), le premier membre $\lambda^p(N,F)$ désigne l'élément de l'anneau $\underline{K}(G)$ obtenu en substituant aux variables $\lambda^i N$ et $\lambda^i F$ les classes dans $\underline{K}(G)$ des G-modules $\wedge^i(N)$ et $\wedge^i(F)$ respectivement.

Démonstration : En développant le deuxième membre de (1.32) par la deuxième formule (1.11), on voit que la première assertion est prouvée si on prouve l'assertion analogue obtenue en faisant $x = 1$, i.e. si l'on prouve que dans le λ-anneau $\mathbb{Z}[\lambda^1 N, \ldots, \lambda^q N]$ où $\lambda^i N = 0$ pour $i > q$, l'élément $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ est divisible par $\lambda_{-1}(N)$. A priori, le quotient $\lambda^p(N,1) = \lambda^p(\lambda_{-1}(N))/\lambda_{-1}(N)$ est une série formelle contenue dans le corps des quotients K de l'anneau des séries formelles en les $\lambda^i N$ pour $1 \leq i \leq q$. D'autre part, désignons aussi par N un vectoriel de dimension q sur un corps algébriquement clos k de caractéristique 0 , et considérons l'élément $\ell^p(N) = \underline{E}_G((\wedge(N^{(p)})^{alt}) \in \underline{K}(G)$, où maintenant l'on a $G = Gl(N)$. On sait (§ 2, théorème 1.3) que $\underline{K}(G)$ s'identifie

au sous-anneau de K engendré par les $\lambda^i N$ pour $1 \leq i \leq q$ et par l'inverse de $\lambda^q N$. D'autre part, on vérifie facilement dans cet anneau que l'on a $\ell^P(N)\ \lambda_{-1}(N) = \lambda^P(\lambda_{-1}(N))$. Comme on est dans un grand corps K et que $\lambda_{-1}(N) \neq 0$, on en conclut $\ell^P(N) = \lambda^P(N,1)$; les deux membres sont dans l'intersection de $\underline{K}(G)$ et de l'anneau des séries formelles en les $\lambda^i N$, donc sont des polynômes en les $\lambda^i N$.

Pour prouver (1.33) dans le cas général, on vérifie que le deuxième membre satisfait dans $\underline{K}(G)$ à la formule analogue à (1.32), c'est-à-dire que son produit par $\lambda_{-1}(N)$ est $\lambda^P(F\ \lambda_{-1}(N))$. De même, le produit de $\lambda^P(N,F) \in \underline{K}(G)$ par $\lambda_{-1}(N)$ est $\lambda^P(F\ \lambda_{-1}(N))$, comme il résulte du fait que $\underline{K}(G)$ est spécial. Comme $\underline{K}(G)$ est intègre (cf § 2) et que $\lambda_{-1}(N) \neq 0$ (même référence), on a bien démontré la formule (1.33).

cqfd.

Remarques : a) Lorsque la dimension q' de F est $\geq p$, alors (1.33) caractérise le polynôme $\lambda^P(N,x)$ en les $\lambda^i N$ $(1 \leq i \leq q)$ et les $\lambda^j x$ $(1 \leq j \leq p)$.

b) Il est plausible que (1.33) est encore vérifiée si le corps k n'est pas algébriquement clos (*). Il faudrait résoudre cette question si l'on voulait prouver le théorème de Riemann-Roch sur un corps de caractéristique 0 non algébriquement clos par la méthode qu'on va exposer. Le passage d'un $\mathfrak{S}_p$-module à sa partie alternée n'a d'ailleurs de sens raisonnable que si le corps de base est de caractéristique 0.

Soit maintenant K un λ-anneau spécial quelconque et soit N un élé-

(*) Cela se prouve en effet par la même méthode.

ment de K tel que $\lambda^i N = 0$ pour i assez grand. On peut alors, pour tout $x \in K$ et tout entier $p \geq 1$, considérer les éléments $\lambda^p(N,x)$, qui s'expriment par des polynômes universels à coefficients entiers en les $\lambda^i N$ et les $\lambda^j x$. On a $\lambda^1(N,x) = x$ et l'on a la formule (1.32) dans K. Pour exprimer les propriétés des opérations $x \mapsto \lambda^p(N,x)$, il est commode d'introduite un nouvel λ-anneau noté K_N. En tant qu'anneau commutatif K_N s'obtient par adjonction d'une unité à l'anneau dont le groupe additif sous-jacent est K et dont la multiplication est donnée par

$$x \cdot_N y = xy\mu \qquad (\mu = \lambda_{-1}(N)) \quad . \tag{1.34}$$

L'application λ_t de K_N dans $K_N[[t]]$ est définie par :

$$\lambda_t(n,x) = (1+t)^n \sum_{p \geq 0} \lambda^p(N,x) t^p \quad , \tag{1.35}$$

où l'on a posé $\lambda^0(N,x) = (1,0)$ (élément unité de K_N). Je dis que, muni de ces opérations, K_N est un λ-anneau spécial. Il s'agit donc de vérifier les formules $\lambda_t(X+Y) = \lambda_t(X)\,\lambda_t(Y)$, $\lambda_t(XY) = \lambda_t(X).\lambda_t(Y)$, et $\lambda_t(\lambda^i(X)) = \lambda^i(\lambda_t(X))$ pour $X,Y \in K_N$. On peut se borner à vérifier ces formules lorsque X et Y sont dans K, et l'on constate qu'il suffit de le vérifier lorsque K est le λ-anneau spécial libre engendré par X,Y et N soumis aux relations $\lambda^i N = 0$ pour $i > q$. Mais l'homomorphisme de groupes

$$K_N \longrightarrow K \, , \tag{1.36}$$

qui transforme unité en unité et sur K se réduit à l'homomorphisme $x \longrightarrow x\mu$, est un homomorphisme compatible avec les structures d'anneaux et les applications λ^i, comme on le vérifie aussitôt. Dans le cas actuel,

sa restriction à K est injective ; comme K est un λ-anneau spécial, il en résulte facilement que les relations ci-dessus sont bien vérifiées pour X,Y ∈ K, et ceci achève de démontrer notre assertion.

D'après la formule (1.23), il est naturel, pour x ∈ K et n ≥ 1, de poser

$$\gamma^n(N,x) = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n-1}{i} \lambda^i(N,x) \quad , \tag{1.37}$$

en d'autres termes, on pose $\gamma^n(N,x) = \gamma^n(x_N)$, où x_N désigne x considéré comme élément du λ-anneau K_N .

Proposition 1.5. Soient A un anneau gradué commutatif avec unité, N un élément de $\tilde{A}$ de la forme $N = [q, 1 + N^1 + \ldots + N^q]$ et x un élément quelconque de $\tilde{A}$: $x = [\nu, 1 + \sum_{i\geq 1} x^i]$. Alors, pour tout entier $j \geq 0$, on a $\gamma^{q+j}(N,x) \in \tilde{A}^j$, et la composante de degré j de $\gamma^{q+j}(N,x)$ est de la forme

$$(\gamma^{q+j}(N,x))^{(j)} = (-1)^{j-1}(j-1)!\, G_{q,j}(\nu,x^1,..,x^j;N^1,..,N^j), \tag{1.38}$$

où $G_{q,j}$ est un polynôme universel à coefficients entiers caractérisé par la condition

$$G_{q,j}(\nu,x^1,..,N^j)\, N^q = (-1)^q (x * \lambda_{-1}(N))^{(q+j)} \quad . \tag{1.39}$$

Démonstration. On peut supposer que A est l'anneau des polynômes à coefficients entiers en des indéterminées x^i et N^j (avec $1 \leq j \leq q$). Comme on a évidemment, combinant (1.32) et (1.37)

$$\gamma^n(N,x)\lambda_{-1}(N) = \gamma^n(x\,\lambda_{-1}(N)) \quad , \tag{1.40}$$

et que, pour $n = q + j$, le deuxième membre est de filtration $\geq q + j$ (utiliser la formule (1.22 bis) en tenant compte de ce que $x\,\lambda_{-1}(N)$ est

d'augmentation nulle), tandis que $\lambda_{-1}(N)$ est de filtration q (formule (1.22)), il en résulte que $\gamma^n(N,x)$ est de filtration j, puisque en vertu de (1.18) le gradué associé à A est ici intègre. Utilisant les formules précédentes, on obtient immédiatement la forme indiquée pour $(\gamma^{q+j}(N,x))^{(j)}$.

cqfd.

CHAPITRE II

Classes de faisceaux algébriques cohérents et classes de Chern

§ 1 . La théorie de Chow

Dans tout ce chapitre, on suppose fixé un corps de base k qu'on supposera algébriquement clos, pour simplifier. Une grande partie de ce qui va suivre, et peut-être tout, est cependant valable sans cette restriction. Les espaces algébriques et les applications régulières considérés seront définis sur k.

Un espace algébrique est dit quasi-projectif s'il est isomorphe à une partie localement fermée d'un espace projectif.

Soit X une variété non singulière quasi-projective connexe de dimension n. On désigne par A(X) et l'on appelle anneau de Chow de X l'anneau gradué des classes de cycles sur X à équivalence rationnelle près. ($A^i(X)$ étant formé des classes de cycles de dimension n - i). Le fait que A(X)

soit bien un anneau gradué résulte du théorème suivant de Chow :

Théorème 2.1. (*) Tout cycle sur X est rationnellement équivalent à un cycle non singulier. Etant donnés des éléments de $A^i(X)$ et $A^j(X)$, on peut trouver des représentants non singuliers de ces éléments, soient Y^{n-i} et Z^{n-j}, qui se coupent partout transversalement.

(Un cycle est dit non singulier si ses composantes sont des sous-variétés non singulières. On dit que deux cycles se coupent partout transversalement si toute composante de l'un coupe partout transversalement toute composante de l'autre, i.e. si les deux variétés sécantes sont non singulières aux points d'intersections et si leurs variétés tangentes y sont en position générale ...)

Soit f un morphisme (i.e. une application régulière) de X dans Y (X et Y étant quasi-projectives et non singulières), alors f définit (en utilisant le théorème précédent) un homomorphisme d'anneaux gradués :

(2.1) $$f^* : A(Y) \longrightarrow A(X)$$

(image réciproque de classes de cycles). Ainsi A(X) devient un foncteur contravariant en X.

Soit f un morphisme propre de X^n dans Y^m (i.e. dans la terminologie de Weil, le graphe de f est complet au-dessus de Y, cf [3]). Alors f définit aussi un homomorphisme additif

(2.2) $$f_* : A(X^n) \longrightarrow A(Y^m)$$

conservant la dimension des cycles, donc augmentant le degré de m - n.

(*) Par suite d'un malentendu de la part de l'auteur, le théorème énonce plus qu'il n'est actuellement connu. En fait, on utilise seulement le "moving lemma" de Chow, disant qu'on peut bouger deux cycles dans leurs classes de sorte que leur intersection soit non excédentaire ; cf. Séminaire Chevalley 1958, Anneau de Chow et applications.

Ainsi, relativement aux morphismes propres, et faisant abstraction des structures multiplicatives et des graduations, A(X) est un foncteur covariant en X. Notons la formule classique

$$f_*(x.f^*(y)) = f_*(x).y \qquad (2.3)$$

Nous utiliserons aussi la théorie de Chow des classes de Chern. Elle consiste à attacher, à tout fibré vectoriel E sur X (toujours supposée quasi-projective non singulière) des <u>classes de Chern</u> $C^i(E) \in A^i(X)$, $(i \geq 1)$, de façon à satisfaire aux conditions suivantes ; on pose $C^o(E) = 1$ et

$$\widetilde{C}(E) = [\text{ rang } E, \sum_{i \geq 0} C^i(E)] \in \widetilde{A}(X) \qquad (2.4)$$

(voir chapitre I, § 3 pour la définition de $\widetilde{A}(X)$). Les conditions à vérifier par une théorie des classes de Chern s'expriment alors ainsi :

$$\widetilde{C}(E) = \widetilde{C}(E') + \widetilde{C}(E'') \qquad (2.5)$$

si le fibré vectoriel E est extension de E' par E" (si l'on pose $C(E) = \sum_{i \geq 0} C^i(E)$, cette condition s'exprime $C(E) = C(E').C(E")$). La formule (2.5) permet d'étendre $\widetilde{C}$ en un homomorphisme additif de $\underline{K}(\xi(X))$ (cf. Chap. I, § 2, exemple 2) dans $\widetilde{A}(X)$:

$$\widetilde{C} : \underline{K}(\xi(X)) \longrightarrow \widetilde{A}(X) \quad , \qquad (2.6)$$

et l'on veut que $\widetilde{C}$ soit un λ-<u>homomorphisme de</u> λ-<u>anneaux</u> ; cette dernière condition s'écrit aussi

$$\widetilde{C}(E \otimes F) = \widetilde{C}(E)\ \widetilde{C}(F) \qquad \widetilde{C}(\wedge^i E) = \lambda^i\ \widetilde{C}(E) \quad , \qquad (2.7)$$

pour deux fibrés vectoriels E et F (bien entendu, $\widetilde{C}$ est automatiquement compatible avec les augmentations). Soient D un diviseur sur X et L(D) le fibré vectoriel qu'il définit ; on veut

(2.8) $$C^1(L(D)) = \ell(D) \qquad C^i(L(D)) = 0 \qquad (i \geq 1)$$

(où pour un cycle quelconque Z, on note $\ell(Z)$ sa classe dans A(X)). Enfin, on impose que les C^i soient fonctoriels, i.e. que si f est un morphisme de X dans Y et E un fibré vectoriel sur Y, on ait

(2.9) $$C^i(f^!(E)) = f^*(C^i(E)) \quad ,$$

où $f^!(E)$ est l'image inverse de E sur X. On peut aussi écrire (2.9) sous la forme suivante : la notion d'image inverse de fibré définit un λ-homomorphisme de λ-anneaux augmentés

(2.10) $$f^! : \underline{K}(Y) \longrightarrow \underline{K}(X) \qquad (*)$$

(on écrit ici $\underline{K}(X)$ au lieu de $\underline{K}(X)$), et (2.9) signifie qu'on a commutativité dans le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} K(Y) & \xrightarrow{f^!} & K(X) \\ \downarrow{\scriptstyle \widetilde{C}_Y} & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{C}_X} \\ A(Y) & \xrightarrow{f^*} & A(X) \end{array} \quad .$$

(on a mis en indice au symbole $\widetilde{C}$ l'espace sur lequel on le considère.)

Théorème 2.2. *Il existe une théorie des classes de Chern satisfaisant aux conditions* (2.5), (2.7), (2.8) *et* (2.9).

Nous admettrons aussi la proposition suivante :

Proposition 2.3. *Soit* Y *une partie fermée de* X *et soit* U *son complémentaire ; si* x *est un élément de* A(X) *qui induit* O *sur* U, *il existe un représentant de* x *qui soit un cycle porté par* Y.

(*) La notation $f^!$ utilisée ici est en conflit avec celle utilisée en théorie de la dualité (cf par exemple R. Hartshorne, Residues and Duality, Lecture Notes in Math. n° 20, Springer, 1966). C'est pourquoi dans ce Séminaire nous la remplaçons par la notation f^*.

Corollaire. Soit p = dim X - dim Y. Alors, si i < p, l'homomorphisme $A^i(X) \longrightarrow A^i(U)$ est bijectif. Tout élément du noyau de $A^p(X) \longrightarrow A^p(U)$ est combinaisons linéaire de composantes de dimension n - p de Y (donc est proportionnel à $\ell(Y)$ si Y est irréductible)

§ 2. Définition des classes de Chern des faisceaux algébriques cohérents

Soit $\mathbb{C}$ une catégorie abélienne, et soit $\mathbb{C}_o$ une sous-classe de $\mathbb{C}$. On désigne par $K(\mathbb{C}_o)$ le groupe quotient du groupe libre engendré par les classes (à isomorphisme près) d'éléments de $\mathbb{C}_o$, par le sous-groupe engendré par les éléments de la forme (E) - (E') - (E"), où E est une extension de E' par E" ($E,E',E'' \in \mathbb{C}_o$). On doit supposer que les classes d'éléments de $\mathbb{C}_o$ pour la relation d'isomorphisme forment un ensemble. On désigne par $\gamma_{\mathbb{C}_o}(E)$ la classe d'un $E \in \mathbb{C}_o$ dans $K(\mathbb{C}_o)$ et l'on omet l'indice $\mathbb{C}_o$ quand il n'y a pas de risque de confusion. Le groupe $\underline{K}(\mathbb{C}_o)$ est solution d'un problème universel relatif aux fonctions $E \longrightarrow f(E)$ définies sur $\mathbb{C}_o$, à valeurs dans un groupe abélien arbitraire A, et qui sont additives en ce sens que f(E) = f(E') + f(E") chaque fois que E est extension de E' par E".

Soient F un foncteur additif de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}'$ et $\mathbb{C}'_o$ une sous-classe de $\mathbb{C}'$ satisfaisant à la même condition que $\mathbb{C}_o$, tels que pour tout $A \in \mathbb{C}_o$, les $R^qF(A)$ soient dans $\mathbb{C}'_o$ et nuls pour q assez grand (on suppose que dans $\mathbb{C}$ existent des résolutions injectives, de sorte que les foncteurs dérivés R^qF de F existent) ; alors F définit un homomorphisme de $\underline{K}(\mathbb{C}_o)$ dans $\underline{K}(\mathbb{C}'_o)$, noté encore F, par la formule

$$F(\gamma_{\mathbb{C}_o}(E)) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathbb{C}'_o}(R^iF(E)) \quad . \tag{2.11}$$

Plus généralement, si on a un foncteur cohomologique (F^i) de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}'$

tel que pour tout $E \in \mathcal{C}_o$ les $F^i(E)$ soient dans $\mathcal{C}'_o$ et nuls sauf un nombre fini, on en déduit un homomorphisme de $\underline{K}(\mathcal{C}_o)$ dans $\underline{K}(\mathcal{C}'_o)$. Ces remarques s'étendent aux multifoncteurs ; de plus, les suites spectrales "classiques" donnent des propriétés de transitivité que nous n'expliciterons pas.

En particulier, si F est un foncteur exact, la formule (2.11) se simplifie :

(2.11 bis) $$F(\gamma_{\mathcal{C}_o}(E)) = \gamma_{\mathcal{C}'_o}(F(E)) \quad .$$

Ceci s'applique en particulier si $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$, si F est le foncteur identique et si $\mathcal{C}_o \subset \mathcal{C}'_o$: on a un homomorphisme canonique de $\underline{K}(\mathcal{C}_o)$ dans $\underline{K}(\mathcal{C}'_o)$.

Théorème 2.3. *Soient $\mathcal{C}$ une catégorie abélienne et $\mathcal{C}_o \subset \mathcal{C}_1$ deux sous-classes telles que les classes (à isomorphisme près) d'objets de $\mathcal{C}_1$ forment un ensemble. On suppose les conditions suivantes satisfaites*

(i) *Pour toute suite exacte $0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$ dans $\mathcal{C}$ telle que A et A'' soient dans $\mathcal{C}_o$ (resp. $\mathcal{C}_1$), on a $A' \in \mathcal{C}_o$ (resp. $A' \in \mathcal{C}_1$).*

(ii) *Soient $u : A \longrightarrow B$ et $v : C \longrightarrow B$ avec $A, B, C \in \mathcal{C}_1$ et u surjectif ; alors il existe $L \in \mathcal{C}_o$ et des homomorphismes $u' : L \longrightarrow C$ et $v' : L \longrightarrow A$ tels que u' soit surjectif et $vu' = uv'$.*

(iii) *Pour tout $A \in \mathcal{C}_1$, il existe un entier $d = d(A)$ tel que pour toute résolution gauche L de A par des objets de $\mathcal{C}_o$, on ait $Z_d(L) \in \mathcal{C}_o$ (Z_d désigne les cycles de dimension d).*

Dans ces conditions, l'homomorphisme canonique de $K(\mathcal{C}_o)$ dans $K(\mathcal{C}_1)$ est un isomorphisme.

Principe de la démonstration : soit $A \in \mathcal{C}_1$; il existe en vertu de (ii) et (iii) une résolution finie L de A par des objets de $\mathcal{C}_o$; posons

alors $f(A) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}_o}(L^i)$. On montre que l'élément de $\underline{K}(\mathcal{C}_o)$ ainsi construit ne dépend pas de la résolution $\underline{L}$ choisie : si on a une deuxième résolution $\underline{L}'$, on "coiffe" $\underline{L}$ et $\underline{L}'$ par une troisième résolution $\underline{L}''$, avec des homomorphismes surjectifs de $\underline{L}''$ dans $\underline{L}$ et $\underline{L}'$ (ce qui est possible grâce à (i) et (ii) ; on est alors ramené à prouver $\underline{E}_{\mathcal{C}_o}(\underline{L}) = \underline{E}_{\mathcal{C}_o}(\underline{L}'')$. Or la différence des deux est $\underline{E}_{\mathcal{C}_o}(\underline{N})$ où $\underline{N}$ est le noyau de l'homomorphisme surjectif de $\underline{L}''$ sur $\underline{L}$, noyau qui est dans $\mathcal{C}_o$ d'après (i). Or $\underline{N}$ est un complexe acyclique en toutes dimensions, d'où $\underline{E}_{\mathcal{C}_o}(\underline{N}) = 0$, d'où la conclusion (N.B. $\underline{E}_{\mathcal{C}_o}(\underline{L})$, pour un complexe fini à valeurs dans $\mathcal{C}_o$, désigne la caractéristique d'Euler-Poincaré $\sum_{i\geq 0} (-1)^i \gamma_{\mathcal{C}_o}(L^i)$ de $\underline{L}$).

On prouve de façon analogue que la fonction $f : \mathcal{C}_1 \longrightarrow \underline{K}(\mathcal{C}_o)$ ainsi construite est additive, donc définit un homomorphisme de $\underline{K}(\mathcal{C}_1)$ dans $\underline{K}(\mathcal{C}_o)$, et il est immédiat que cet homomorphisme est inverse de l'homomorphisme canonique de $\underline{K}(\mathcal{C}_o)$ dans $\underline{K}(\mathcal{C}_1)$.

cqfd.

Remarque : Pour vérifier (ii), il suffit de vérifier que $\mathcal{C}_1$ est contenu dans une sous-classe $\mathcal{C}_2$ de $\mathcal{C}$ satisfaisant aux deux conditions

(ii a) Tout $A \in \mathcal{C}_2$ est isomorphe à un quotient d'un $L \in \mathcal{C}_o$.

(ii b) Si $u : A \longrightarrow B$, avec $A, B \in \mathcal{C}_2$, alors $\mathrm{Ker}\, u \in \mathcal{C}_2$.

Corollaire : Soit X un espace algébrique quasi-projectif. Soient $\mathcal{F}(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents sur X, $\mathcal{E}(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents localement libres (équivalente à la catégorie des fibrés vectoriels sur X), $\mathcal{F}_o(X)$ la catégorie des faisceaux algébriques cohérents F tels que pour tout $x \in X$, F_x soit un $\mathcal{O}_x$-module

de dimension cohomologique finie (on a donc $\xi(X) \subset \mathcal{F}_o(X) \subset \mathcal{F}(X)$). Alors l'homomorphisme canonique

(2.12) $$K(\xi(X)) \longrightarrow K(\mathcal{F}_o(X))$$

est un isomorphisme.

On va vérifier les conditions du théorème 2.3. Les conditions (i) et (iii) résultent de la définition de la dimension cohomologique et du fait qu'un module projectif de type fini sur l'anneau local noethérien O_x est libre. Pour vérifier (ii), on va démontrer que $\mathcal{C} = \mathcal{F}(X)$ satisfait aux conditions (ii a) et (ii b) de la remarque. La deuxième est triviale ; il reste donc à prouver le résultat suivant :

Proposition 2.4. (Serre). Soit $\mathcal{X}$ un espace algébrique quasi-projectif. Alors tout faisceau algébrique cohérent sur X est isomorphe au quotient d'un faisceau algébrique localement libre.

Cette proposition est vraie si X est une partie fermée de l'espace projectif en vertu de [2], puisque, pour n assez grand, F(n) est engendré par ses sections, ce qui signifie que F est un quotient de $O(-n)^k$. Dans le cas général, X est une partie ouverte d'une partie fermée d'un espace projectif, et il suffit d'utiliser le résultat suivant (dû à Cartier et Serre dans des cas particuliers) :

Proposition 2.5. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur une partie ouverte U d'un espace algébrique X. Alors F est isomorphe à la restriction d'un faisceau algébrique cohérent sur X.

En zornifiant sur les ouverts contenant U sur lesquels on peut prolonger F, on est ramené au cas où X est affine. Soit $\overline{F}$ le faisceau algé-

brique sur X dont les sections sur un ouvert V sont les sections de F sur $U \cap V$. On constate facilement que $\overline{F}$ est quasi-cohérent (i.e. défini sur tout ouvert affine V -- donc ici sur X tout entier -- par un module, de type fini ou non, sur l'anneau de coordonnées de l'ouvert en question). C'est immédiat si U est lui-même affine, car $\overline{F}$ est alors défini sur l'ouvert V par $\Gamma(U \cap V, F)$ considéré comme module sur $\Gamma(V, \underline{O}_X)$. Dans le cas général, U est réunion finie d'ouverts affines U_i, donc $\overline{F}$ est le noyau d'un homomorphisme évident de faisceaux quasi-cohérents :

$$\sum_i \overline{F \mid U_i} \longrightarrow \sum_{i,j} \overline{F \mid U_i \cap U_j}$$

donc est lui-même quasi-cohérent. Comme X est supposé affine, $\overline{F}$ est donc engendré par ses sections. Comme $\overline{F} \mid U = F$ est cohérent, il existe un nombre fini de sections de $\overline{F}$ qui engendrent $\overline{F} \mid U$. Ces sections engendrent un sous-faisceau cohérent de $\overline{F}$, dont la restriction à U est isomorphe à F.

cqfd.

Supposons maintenant X quasi-projective non singulière. Alors, en vertu du théorème des syzygies, on a, avec les notations du corollaire au théorème 2.3, $\mathfrak{F}_o(X) = \mathfrak{F}(X)$. Dans ce cas, on a donc :

(2.13) $$\underline{K}(\xi(X)) = \underline{K}(\mathfrak{F}(X)) \quad .$$

On peut exprimer ainsi cet isomorphisme :

Corollaire 2 au théorème 2.3. Soit X une variété quasi-projective non-singulière. Pour tout groupe abélien A, il y a correspondance biunivoque entre les fonctions addtives f de fibrés vectoriels sur X, à valeurs dans A, et les fonctions additives g de faisceaux algébriques cohérents sur X, à valeurs dans A. A toute f correspond l'unique g telle que l'on ait :

(2.14) $$f(E) = g(\underline{O}_X(E))$$

pour tout fibré vectoriel E sur X, en notant $\underline{O}_X(E)$ le faisceau des germes de sections régulières de E sur X.

Pour calculer g(F) pour un faisceau algébrique cohérent quelconque, on considère une résolution finie de F par des faisceaux de la forme $\underline{O}_X(E_i)$, et l'on a alors :

(2.14 bis) $$g(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i f(E_i) \quad .$$

En particulier, si X est connexe, on a envisagé au § 1 une fonction additive $\widetilde{C}(E)$ du fibré vectoriel E, à valeurs dans le groupe $\widetilde{A} = \widetilde{A}(X)$. On en déduit une fonction additive de faisceaux cohérents, soit $\widetilde{C}(F)$, et en passant aux composantes, des fonctions $F \longrightarrow C^i(F) \in A^i(X)$. Les $C^i(F)$ sont appelées les classes de Chern du faisceau cohérent F ; elles se calculent théoriquement à partir des classes de Chern des fibrés vectoriels par (2.14 bis) (mais où il faut passer au deuxième membre à l'écriture multiplicative). Quant à la composante de $\widetilde{C}(F)$ suivant $\mathbb{Z}$, c'est le rang du faisceau F, qui correspond au rang d'un module sur un anneau intègre : si X est affine (cas auquel on peut toujours se ramener), F est défini par un module de type fini sur l'anneau de coordonnées de X, et l'on prend le rang de ce module ....

§ 3. Généralités fonctorielles sur $\underline{K}(X)$

Si X est un espace algébrique, on pose pour abréger $\underline{K}(X) = \underline{K}(\mathcal{F}(X))$, et lorsque X est quasi-projectif non singulier, on identifie ce groupe à $\underline{K}(\xi(X))$ en vertu du corollaire 2 au théorème 2.3. Comme $\underline{K}(\xi(X))$ est

non seulement un groupe abélien, mais un λ-anneau, il s'ensuit par transport de structure que $\underline{K}(X)$ est aussi un λ-anneau, donc est muni d'une structure multiplicative et d'applications λ^i. Il importe de définir ces structures directement, sans passer aux fibrés vectoriels, ce qui sera fait ci-dessous.

Si E est un fibré vectoriel sur X, on désigne par $\gamma(E)$ sa classe dans $\underline{K}(X)$; si F est un faisceau algébrique cohérent sur X, $\gamma(F)$ désigne de même sa classe dans $\underline{K}(X)$. Si Y est une sous-variété irréductible de X, on pose $\gamma(Y) = \gamma(\underline{O}_Y)$, où $\underline{O}_Y$ désigne le faisceau des anneaux locaux de Y, considéré comme faisceau algébrique cohérent sur X. On définit par linéarité le symbole $\gamma(Y)$ lorsque Y est un cycle quelconque sur X. Quand il y aura des risques de confusion, on écrira γ_X pour γ .

Soit X un espace algébrique quelconque. On introduit sur $\underline{K}(X)$ une filtration, en désignant par $\underline{K}(X)^i$ le sous-groupe de $\underline{K}(X)$ engendré par les $\gamma(F)$ avec dim.supp. $F \leq n - i$ (où n est la dimension de X). Il résulte du "lemme de dévissage" de Serre, sous la forme donnée dans [3], le résultat suivant :

Proposition 2.6. Le groupe $\underline{K}(X)^i$ est engendré par les $\gamma(Y)$, où Y parcourt l'ensemble des sous-variétés de dimension $\leq n - i$ de X. Si X est irréductible, on a $G^o(\underline{K}(X)) = \mathbb{Z}$.

Ce dernier isomorphisme est donné par l'homomorphisme de $\underline{K}(X)$ dans $\mathbb{Z}$ défini à l'aide de la notion de rang d'un faisceau algébrique cohérent.

Supposons maintenant X non singulière. S'inspirant des développements

du début du § 2, on définit une multiplication dans $\underline{K}(X)$ en posant

$$\gamma(F)\,\gamma(G) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i\, \gamma\,(\underline{\mathrm{Tor}}_i(F,G)) \tag{2.15}$$

(les $\underline{\mathrm{Tor}}_i$ étant pris, bien entendu, par rapport aux anneaux locaux de X). La suite exacte des $\underline{\mathrm{Tor}}_i$ montre que la formule (2.15) définit bien une application biadditive de $\underline{K}(X)\times\underline{K}(X)$ dans $\underline{K}(X)$; l'associativité résulte de la suite spectrale des Tor multiples. On vérifie aussi de cette façon que l'on peut calculer le produit de plusieurs facteurs par la formule :

$$\gamma(F_1)....\gamma(F_p) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i \gamma(\underline{\mathrm{Tor}}_i(F_1,...,F_p)) \tag{2.16}$$

où, dans le deuxième membre, les $\underline{\mathrm{Tor}}_i$ sont des "$\underline{\mathrm{Tor}}$ simultanés", calculés par résolution projective simultanée des arguments F_i.

Si l'on suppose dans (2.15) que G est localement libre, on trouve :

$$\gamma(F)\,\gamma(G) = \gamma(F\otimes G)\ , \tag{2.15 bis}$$

ce qui montre en particulier que $\gamma(\underline{O}_X)$ est élément unité de $\underline{K}(X)$, et que l'homomorphisme canonique de $\underline{K}(\xi(X)$ dans $\underline{K}(X)$ est un homomorphisme d'anneaux.

La formule (2.15) est évidemment suggérée par la "formule des Tor" de Serre en théorie des intersections. Cette formule prouve la deuxième partie de la proposition suivante, la première résultant immédiatement de la formule (2.15) et d'un calcul de $\underline{\mathrm{Tor}}_i$ locaux :

Proposition 2.7. Soient X une variété non singulière, Y et Z deux cycles dans X. Si Y et Z se coupent partout transversalement, on a :

$$\gamma(Y)\,\gamma(Z) = \gamma(Y.Z)\ . \tag{2.17}$$

Si Y et Z sont homogènes et de dimension respective n - i et n - j, et s'ils se coupent sans composante excédentaire, on a alors :

(2.18) $\qquad \gamma(Y)\ \gamma(Z) = \gamma(Y.Z) \qquad \text{mod. } \underline{K}(X)^{i+j+1}$.

On fera attention à ce qu'on n'a pas en général égalité dans (2.18). On verra au § 4 que, si X est quasi-projective non singulière, la structure d'anneau de $\underline{K}(X)$ est compatible avec sa filtration et que l'anneau gradué associé $G(\underline{K}(X))$ s'identifie à un quotient de $A(X)$ par un sous-groupe de torsion (peut-être toujours réduit à 0 (*)).

Je ne sais définir directement les $\lambda^i(F)$ en termes de faisceaux que si le corps k est de caractéristique 0 (c'est la raison qui nous a empêché de démontrer le théorème de Riemann-Roch lorsque k n'est pas de caractéristique $\neq 0$). Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X sur lequel opère le groupe $\mathfrak{S}_p$ des permutations de p lettres ; on note alors $(F)^{alt}$ l'ensemble des $x \in F$ tels que $s.x = \varepsilon(s)x$ pour tout $s \in \mathfrak{S}_p$ ($\varepsilon(s)$ est la signature de s). C'est évidemment un sous-faisceau algébrique cohérent de F. Ceci dit, on a :

Théorème 2.8. Soit X une variété quasi-projective non singulière sur le corps k de caractéristique 0. Soit F un faisceau algébrique cohérent sur X ; on a alors :

(2.19) $\qquad \lambda^p(\gamma(F)) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i\ \gamma((\underline{Tor}_i(F,F,\ldots,F))^{alt})$

N.B. Il est clair que le groupe $\mathfrak{S}_p$ agit sur le faisceau $\underline{Tor}_i(F,..,F)$.

Principe de la démonstration : on considère une résolution finie $\underline{L}$ de F par des faisceaux localement libres L_i, et l'on utilise le lemme général suivant :

(*) Non ; pour un contre-exemple cf. ce Séminaire XIV 4.7.

Lemme 2.9. Soit $\underline{L} = (L_i)$ un faisceau algébrique cohérent localement libre gradué, ayant un nombre fini de composantes non nulles. On a dans $\underline{K}(X)$ la formule :

$$\underline{E}((\overset{p}{\otimes} \underline{L})^{alt}) = \wedge^p(\underline{E}(\underline{L})) \quad . \tag{2.20}$$

Dans cette formule, on considère $\overset{p}{\otimes} \underline{L}$ comme un faisceau où le groupe $\mathfrak{S}_p$ opère en tenant compte des graduations (qui introduisent donc des signes de façon bien connue, cf Cartan-Eilenberg) ; de plus, si $\underline{M}$ est un faisceau algébrique cohérent gradué sur X, on pose $\underline{E}(\underline{M}) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \gamma(M_i)$.

Pour prouver la formule (2.20), on est ramené à prouver la formule analogue dans $\underline{K}(G)$, G étant un groupe algébrique (un produit de groupes Gl(n,k) si l'on y tient) et $\underline{L}$ un G-module de dimension finie sur k (cf. Chap. I , § 2, exemple 2, pour la définition de $\underline{K}(G)$). Dans ce cas, cette formule a déjà été utilisée dans le théorème 1.4, pour montrer que le deuxième membre de (1.33) satisfait la même équation fonctionnelle que le premier membre ; la vérification en est élémentaire.

cqfd.

Soit f un morphisme de X dans Y, Y étant un espace algébrique. La notion d'image inverse de fibré vectoriel définit un homomorphisme $f^! : \underline{K}(\xi(Y)) \longrightarrow \underline{K}(\xi(X))$ de λ-anneaux. Identifiant les fibrés vectoriels à des faisceaux algébriques localement libres, la notion d'image réciproque de fibré vectoriel correspond à la notion d'image réciproque de faisceau algébrique (déjà utilisée dans [3, n° 8]). Dans le cas où Y est non singulière, on définit plus généralement un homomorphisme de groupes :

$$f^! : \underline{K}(Y) \longrightarrow \underline{K}(X) \tag{2.21}$$

par une formule faisant intervenir une somme alternée de Tor, inspirée par les développements du début du § 2, et que le lecteur explicitera. On a alors commutativité dans le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} \underline{K}(\xi(Y)) & \xrightarrow{f^{\cdot !}} & \underline{K}(\xi(X)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{K}(Y) & \xrightarrow{f^{!}} & \underline{K}(X) \end{array} ,$$

ce qui montre en particulier, lorsque X et Y sont toutes deux non singulières et quasi-projectives, que les deux définitions de $f^{\cdot !}$ coïncident moyennant l'identification de $\underline{K}(X)$ à $\underline{K}(\xi(X))$ et de $\underline{K}(Y)$ à $\underline{K}(\xi(Y))$.

Un autre cas où l'on peut définir un homomorphisme (2.21), sans que Y soit nécessairement non singulière, est celui où le foncteur $F \longrightarrow f^{\cdot !}(F)$ de $\mathcal{F}(Y)$ dans $\mathcal{F}(X)$ est exact, i.e. lorsque les anneaux locaux de X sont des modules plats sur les anneaux locaux de Y. Il suffit alors de poser $f^{\cdot !}(\gamma_Y(F)) = \gamma_X(f^{\cdot !}(F))$. Ce cas se rencontre en particulier lorsque X est un espace fibré localement trivial sur Y (pour le voir, on est ramené au cas d'un produit $X = T \times Y$). Notons qu'on vérifie aussi que dans ce cas, on a $f^{\cdot !}(\underline{O}_Z) = \underline{O}_{f^{-1}(Z)}$ si Z est une sous-variété irréductible de Y, d'où :

$$(2.22) \qquad f^{\cdot !}(\gamma_Y(Z)) = \gamma_X(f^{-1}(Z))$$

si X est "plat" sur Y. Sans cette dernière condition, la formule (2.22) devient inexacte en général, mais on a l'analogue suivant de la proposition 2.7 :

Proposition 2.8. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de variétés non singulières, et soit Z un cycle sur Y. Si Z est partout transversal à f, la formule

(2.22) est exacte ; si Z est homogène de codimension i et si $f^{-1}(Z)$ n'a pas de composante excédentaire, on a :

(2.23) $$f^!(\gamma_Y(Z)) \equiv \gamma_X(f^{-1}(Z)) \quad . \qquad \text{mod. } \underline{K}(X)^{i+1}$$

Démonstration analogue à celle de la proposition 2.7.

Signalons enfin qu'on verra au § 4 que, lorsque X et Y sont quasi-projectives et non singulières, alors $f^!$ est compatible avec les filtrations de $\underline{K}(X)$ et de $\underline{K}(Y)$.

Soient de nouveau X et Y deux espaces algébriques quelconques, et f un morphisme propre de X dans Y. Pour tout faisceau algébrique cohérent F sur X, le faisceau image directe $f_!(F)$ est algébrique cohérent, et il en est de même plus généralement des faisceaux $R^q f_!(F)$ (cf. [3]). Rappelons que, par définition, $R^q f_!(F)$ est le faisceau sur Y associé au préfaisceau qui à l'ouvert U fait correspondre le groupe $H^q(f^{-1}(U),F)$; on a en particulier :

(2.24) $$R^o f_!(F) = f_!(F), \quad R^q f_!(F) = 0 \qquad (q > \dim X) ,$$

de plus :

(2.25) $$\Gamma(U,R^q f_!(F)) = H^q(f^{-1}(U),F)$$

si l'ouvert U est affine. D'après le § 2, on définit un homomorphisme de $\underline{K}(X)$ dans $\underline{K}(Y)$, noté encore $f_!$, par la formule

(2.26) $$f_!(\gamma_X(F)) = \sum_{q\geq 0} (-1)^q \gamma_Y(R^q f_!(F)) \quad .$$

Ainsi $\underline{K}(X)$ devient un foncteur covariant en X, relativement aux morphismes propres. La relation $(fg)_! = f_! g_!$ (tout comme la relation $(fg)^! = g^! f^!$ qu'on a oubliée de signaler en son lieu) est un cas parti-

culier des relations de transitivité auxquelles nous avions fait allusion au § 2, et qui résultent des suites spectrales des foncteurs composés.

Notons la formule suivante, valable pour Y non singulière (et particulièrement aisée à vérifier lorsque Y est de plus quasi-projective, en prenant pour y la classe d'un fibré vectoriel sur Y) :

$$f_!(x.f^!(y)) = f_!(x).y \qquad (x. \in \underline{K}(X) \ , \ y \in \underline{K}(Y)) \ . \tag{2.27}$$

Dans le cas particulier où les images réciproques des points de Y par f sont finies, et contenues dans un ouvert affine (*), on constate que le foncteur $F \longrightarrow f_!(F)$ est exact et que $R^q f_!(F) = 0$ pour $q > 0$; dans ce cas, on a donc $f_!(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(f_!(F))$. En particulier, si X est un sous-espace algébrique de Y et si i est l'injection canonique de Y dans X, on a :

$$i_!(\gamma_X(F)) = \gamma_Y(F) \ , \tag{2.28}$$

où, dans le deuxième membre, F est considéré comme un faisceau sur Y nul en dehors de X.

§ 4. Quelques résultats techniques

Soit X un espace algébrique ; on a vu au § 3 que la projection p de $X \times k$ sur X définit un homomorphisme

$$p^! : \underline{K}(X) \longrightarrow \underline{K}(X \times k) \ . \tag{2.29}$$

Proposition 2.9. L'homomorphisme (2.29) est surjectif.

On raisonne par récurrence sur n = dim X ; l'assertion est triviale si $n < 0$; supposons $n \geq 0$; en vertu de la proposition 2.6, il suffit de

---

(*) Cette dernière condition est évidemment conséquence de la première (chose que l'auteur ignorait encore en 1957 !).

vérifier que pour toute partie fermée irréductible Y de $X \times k$, $\gamma(Y)$ est dans l'image de $p^!$. Il suffit de continuer le raisonnement en supposant X irréductible ; si $p(Y)$ n'est pas dense dans X, notre assertion résulte de l'hypothèse de récurrence ; sinon, on a $Y = X \times k$ et l'assertion est triviale, ou bien Y est une hypersurface dans $X \times k$. Soit alors U un ouvert affine de X formé de points non singuliers ; si D est le diviseur sur $U \times k$ induit par Y, on sait (algèbre commutative) qu'il est linéairement équivalent à un diviseur de la forme $D' \times k$, où D' est un diviseur sur U. Alors $\gamma_{U \times k}(D) - \gamma_{U \times k}(D' \times k)$ appartient à $\underline{K}(U \times k)^2$ (corollaire de la proposition 2.10), et d'après ce qu'on a déjà démontré, cet élément est de la forme $p^!(x')$ avec $x' \in \underline{K}(U)$. Donc $\gamma_{U \times k}(D) = p^!(y')$ avec $y' = x' + \gamma_U(D')$; mais y' est restriction d'un élément y de $\underline{K}(X)$ (prop. 2.10), et par suite la restriction de $\gamma_{X \times k}(D) - p^!(y)$ à $U \times k$ est nulle ; d'après la proposition 2.10, $\gamma_{X \times k}(D) - p^!(y))$ provient d'un élément de $\underline{K}(X \times k - U \times k) = \underline{K}(X' \times k)$ avec $X' = X - U$. La démonstration s'achève en appliquant de nouveau l'hypothèse de récurrence.

cqfd.

Corollaire : Soient X un espace algébrique et p la projection de $X \times k^n$ sur X ; alors l'homomorphisme $p^! : \underline{K}(X) \longrightarrow \underline{K}(X \times k^n)$ est surjectif ; il est même bijectif si X est non singulière.

Récurrence sur n pour la première assertion. Pour la deuxième, on pose $f(x) = (x,0)$ d'où $pf = \underline{1}$ et $f^! p^! = 1$, ce qui prouve que $p^!$ est injectif.

Proposition 2.10. Soient X un espace algébrique, U une partie ouverte de X et Y son complémentaire dans X. Alors la suite d'homomorphismes naturels :

(2.30) $\underline{K}(Y) \longrightarrow \underline{K}(X) \longrightarrow \underline{K}(U) \longrightarrow 0$

est exacte.

N.B. On comparera avec la proposition 2.3 .

Le fait que $\underline{K}(X) \longrightarrow \underline{K}(U)$ soit surjectif résulte aussitôt de la proposition 2.5 (où aussi de la proposition 2.6). Reste à prouver que si $x \in \underline{K}(X)$ a une restriction nulle à $\underline{K}(U)$, il est dans l'image de $\underline{K}(Y)$. Pour ceci, on revient à la définition explicite de $\underline{K}(X)$ et de $\underline{K}(U)$: on a deux faisceaux algébriques cohérents F et G sur X avec $x = \gamma_X(F) - \gamma_X(G)$ et $\gamma_U(F) - \gamma_U(G) = 0$; cette dernière relation signifie qu'on peut trouver des faisceaux cohérents P' et Q' sur U, munis de filtrations dont les facteurs soient deux à deux isomorphes sur U, et tels que l'on ait un isomorphisme sur U :

$$P = F + Q' \longrightarrow Q = G + P' \ .$$

En vertu de la proposition 2.5, les faisceaux P' et Q' sont des restrictions à U de faisceaux cohérents sur X (notés par les mêmes lettres) ; de même, leurs filtrations proviennent de filtrations sur les faisceaux correspondants sur X, en vertu du lemme 2.11 ci-dessous. On a alors :

$$\gamma_X(F) - \gamma_X(G) = (\gamma_X(P) - \gamma_X(Q)) + (\gamma_X(P') - \gamma_X(Q')) \ .$$

Introduisant les facteurs P'_i et Q'_j des filtrations de P' et Q' sur X, le dernier terme est la somme de termes $\gamma_X(P'_i) - \gamma_X(Q'_i)$, où $P'_i|U \simeq Q'_i|U$. On est ainsi ramené à prouver le cas particulier suivant : si R et S sont des faisceaux cohérents sur X tels que $R|U \simeq S|U$, alors $\gamma_X(R) - \gamma_X(S)$ est dans l'image de $\underline{K}(Y)$. Or soit T le graphe de l'isomorphisme donné de $R|U$ sur $S|U$; c'est un sous-faisceau cohérent de $(R \times S)|U$, donc en vertu du lemme 2.11, c'est la restriction à U d'un sous-faisceau cohérent,

noté encore T, de R x S. On a alors $\gamma_X(R) - \gamma_X(S) = (\gamma_X(R) - \gamma_X(T)) - (\gamma_X(S) - \gamma_X(T))$ et il suffit de prouver par exemple que le premier terme du second membre est dans l'image de $\underline{K}(Y)$. Or la projection $u : T \longrightarrow R$ est un isomorphisme sur U, donc $\gamma_X(R) - \gamma_X(T) = \gamma_X(\text{Coker } u) - \gamma_X(\text{Ker } u)$ et Ker u et Coker u ont leur support dans Y.

Il reste donc à prouver le lemme suivant :

Lemme 2.11. Soient X un espace algébrique, F un faisceau algébrique cohérent sur X, U une partie ouverte de X et G un sous-faisceau cohérent de $F|U$. **Alors** G est la restriction à U d'un sous-faisceau cohérent de F.

Soit $\overline{G}$ le sous-faisceau de F dont les sections sur l'ouvert V de X sont les sections de F sur V dont la restriction à $U \cap V$ est une section de V. Tout revient à prouver que ce faisceau $\overline{G}$ est cohérent. Pour ceci, on peut supposer X et U affines (car U est réunion d'ouverts affines U_i, et $\overline{G}$ est alors intersection des faisceaux analogues $\overline{G|U_i}$). Alors l'anneau de coordonnées de U est un anneau de fractions A_S de l'anneau de coordonnées A de X, et l'on vérifie aussitôt que si F est défini par le A-module M, alors $F|U$ est défini par le A_S-module $M_S = A_S \otimes_A M$. Le sous-faisceau G de $F|U$ est alors défini par un sous-module N' de M_S, et l'on voit que $\overline{G}$ est précisément défini par le sous-module N de M, image inverse de N' par l'homomorphisme canonique de M dans M_S.

cqfd.

Corollaire 1 à la proposition 2.10 : Soit $x \in \underline{K}(X)$. Pour que x soit de filtration $\leq i$, il faut et il suffit qu'il existe une partie fermée Y de X, de dimension $\leq n - i$, telle que la restriction de x à $X - Y$ soit nulle.

Corollaire 2. Supposons X connexe de dimension n, sans singularités en dimension n - 1. Si D et D' sont deux diviseurs linéairement équivalents sur X, on a $\gamma(D) \equiv \gamma(D') \mod \underline{K}(X)^2$.

En vertu du corollaire 1, on peut supposer X non singulière ; le corollaire résulte alors de la formule générale :

(2.31) $$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D)) \mod \underline{K}(X)^2 ,$$

où L(-D) désigne le fibré vectoriel de rang 1 défini par le diviseur - D. Pour vérifier (2.31), on l'écrit sous la forme :

(2.31 bis) $$\gamma(L(-D)) = 1 - \gamma(D) \mod \underline{K}(X)^2 ,$$

et l'on note que les deux membres sont des homomorphismes du groupe des diviseurs dans le groupe multiplicatif des éléments inversibles de l'anneau $\underline{K}(X)/\underline{K}(X)^2$ (noter que $\underline{K}(X)^1/\underline{K}(X)^2$ est de carré nul, ce qui se vérifie très facilement sur la formule explicite (2.15), en utilisant le corollaire 1). On est ainsi ramené au cas où D est une hypersurface irréductible. Plus généralement, si D est une hypersurface dont les composantes sont disjointes, on a l'égalité :

(2.32) $$\gamma(D) = 1 - \gamma(L(-D))$$

comme il résulte de la suite exacte de faisceaux

$$0 \longrightarrow \underline{O}_X(L(-D)) \longrightarrow \underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_D \longrightarrow 0 .$$

Théorème 2.12. Soient X une variété quasi-projective non singulière, Z et Z' deux cycles homogènes de codimension p sur X qui sont linéairement équivalents. On a alors :

(2.33) $$\gamma_X(Z) \equiv \gamma_X(Z') \mod \underline{K}(X)^{p+1} .$$

Par hypothèse, on peut trouver un cycle Y de dimension n - p + 1 sur

X Xk (n est la dimension de X), et deux points a,a'∈ k tels que l'on ait :

$$Z = f_a^{-1}(Y) , \qquad Z' = f_{a'}^{-1}(Y) ,$$

où l'on pose $f_u(x) = (x,u)$. En vertu de la formule (2.23), on a alors :

$$\gamma_X(Z) \equiv f_a^!(\gamma_{X\times k}(Y)) \qquad \text{mod } \underline{K}(X)^{p+1}$$

et une formule analogue pour $\gamma_X(Z')$. Il suffit alors de prouver que $f_a^! = f_a^!$, ce qui résulte aussitôt de la proposition 2.9.

cqfd.

Corollaire 1 : La filtration de $\underline{K}(X)$ est compatible avec sa structure d'anneau, i.e. on a $\underline{K}(X)^i\ \underline{K}(X)^j \subset \underline{K}(X)^{i+j}$ quels que soient les entiers $i,j \geq 0$. On a de plus un homomorphisme surjectif naturel d'anneaux gradués :

(2.34) $$\varphi: \quad A(X) \longrightarrow G(K(X))$$

(où le deuxième membre désigne l'anneau gradué associé à $\underline{K}(X)$ muni de la filtration $(\underline{K}(X)^i)_{i\geq 0}$) défini par la condition :

$$\varphi(Z^{n-p}) = \gamma(Z^{n-p}) \quad \text{mod } \underline{K}(X)^{p+1} .$$

Ce corollaire résulte immédiatement du théorème 2.12, des propositions 2.6 et 2.7 et du théorème de Chow 2.1, par récurrence sur l'entier $i + j$.

Corollaire 2 : Soient X et Y deux variétés quasi-projectives non singulières et f un morphisme de X dans Y. Alors l'homomorphisme $f^!$ de $\underline{K}(Y)$ dans $K(X)$ est compatible avec les filtrations, et l'on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} G(\underline{K}(Y)) & \xrightarrow{G(f^!)} & G(\underline{K}(X)) \\ \uparrow{\scriptstyle \varphi_Y} & & \uparrow{\scriptstyle \varphi_X} \\ A(Y) & \xrightarrow{f^*} & A(X) \end{array} .$$

Utilisant le graphe de f, on décompose f en produit d'une immersion de X dans $X \times Y$ et d'une projection de $X \times Y$ sur Y. Pour cette dernière le corollaire est trivial, et pour une immersion, on procède comme pour le corollaire 1, en utilisant la proposition 2.8 à la place de la proposition 2.7.

Proposition 2.13 ("décomposition cellulaire") : Soit P un espace algébrique (irréductible ou non), muni d'une famille croissante $P^0 \subset P^1 \subset \ldots \subset P^n = P$ de parties fermées, telles que pour tout i avec $0 \leq i \leq n$, les composantes connexes de $P^i - P^{i-1}$ soient des espaces algébriques $V_{i,\alpha}$ isomorphes à k^i (on pose $P^{-1} = \emptyset$). Alors :

a) Pour tout espace algébrique X, l'application naturelle de $\underline{K}(X) \otimes \underline{K}(P)$ dans $\underline{K}(X \times P)$ déduite du produit tensoriel de faisceaux sur X et P, est surjective.

b) Les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment un système de générateurs du groupe $\underline{K}(P)$.

La démonstration se fait par récurrence sur n, en utilisant le corollaire de la proposition 2.9 et la proposition 2.10. (N.B. Malheureusement, j'ignore si les $\gamma_P(V_{i,\alpha})$ forment une base de $\underline{K}(P)$ et si l'homomorphisme envisagé dans a) est bijectif. Nous n'aurons pas besoin de le savoir pour la suite).

Théorème 2.14. Soient x_i $(1 \leq i \leq q)$ et E_j $(1 \leq j \leq r)$ des lettres, n_j $(1 \leq j \leq r)$ des entiers > 0 ; considérons les symboles $\lambda^k(x_i)$ avec $k \geq 1$ et $\lambda^k(E_j)$ avec $1 \leq k \leq n_j$ comme des indéterminées et soit R un polynôme à coefficients entiers en ces indéterminées. On suppose que, pour tout anneau gradué A, lorsque l'on substitue dans R aux x_i des éléments ξ_i et aux E_j des éléments η_j de

$\widetilde{A}$ soumis aux restrictions $\epsilon(\xi_i) = 0$ et $\eta_j = [n_j, 1 + \eta_j^{(1)} + \ldots + \eta_j^{(nj)}]$ (donc $\eta_j^{(k)} = 0$ pour $k > n_j$), on ait :

$$R((\lambda^k(\xi_i)),(\lambda^k(\eta_j))) \in \widetilde{A}^p$$

Soit alors X une variété quasi-projective irréductible non singulière. Quels que soient les éléments x_i' de $K(X)^1$ et les fibrés vectoriels E_j' de dimension n_j sur X ($1 \leq i \leq q$, $1 \leq j \leq r$), on a

$$R((\lambda^k(x_i')),(\lambda^k(\gamma(E_j'))) \in K(X)^p \qquad (*) \ .$$

Démonstration : En vertu du § 2, les x_i' sont eux-mêmes des différences d'éléments de la forme $\gamma(E)$, E étant un fibré vectoriel. D'autre part, en supposant X localement fermé dans un espace projectif P, il résulte du § 2 et de la proposition 2.5 que, pour tout $F \in \mathcal{F}(X)$, le faisceau F(n) est engendré par ses sections pour n assez grand. Si F est défini par un fibré vectoriel E, cela prouve que E(n) est l'image réciproque du fibré vectoriel canonique sur une variété grasmanienne G par un morphisme de X dans G. Considérant le morphisme correspondant de X dans $P \times G$, on voit que E est l'image réciproque d'un fibré vectoriel sur $P \times G$. On voit donc, appliquant ceci à tous les fibrés vectoriels qui interviennent, et utilisant le corollaire 2 du théorème 2.12, qu'on est ramené au cas où X est un produit de grasmaniennes. Dans ce cas, la conclusion résultera du lemme suivant :

Lemme 2.15. Supposons que X soit un produit de grasmaniennes. Alors on peut trouver un λ-homomorphisme de K(X) dans un λ-anneau sans torsion de la forme

---

(*) On prouve facilement que, l'hypothèse faite implique si R est exprimé en termes des $\gamma^k(\xi_i)$, $\gamma^k(E_i - \epsilon(E_i))$, alors tous les termes de R sont de poids $\geq p$ (où γ^k est de poids k). Alors 2.14 est un cas particulier de X 1.3.2.

$\widetilde{A}$ (où A est un anneau gradué), compatible avec les filtrations, et tel que l'homomorphisme correspondant $G(K(X)) \longrightarrow G(A)$ soit injectif.

Pour le prouver le lemme, nous utiliserons la théorie de Chow des classes de Chern ; si l'on pouvait démontrer le lemme, ou le théorème 2.14 directement, on en déduirait une théorie purement "faisceautique" des classes de Chern (cf. § 5).

Nous considérerons l'homomorphisme $\widetilde{C}$ de $\underline{K}(X)$ dans $\widetilde{A}(X)$ et nous poserons $A = A(X)$; il faut prouver que l'homomorphisme $\psi = G(\widetilde{C})$ de $G(\underline{K}(X))$ dans $G(A(X)) \simeq A(X)$ est injectif. Le fait que $\widetilde{C}$ soit compatible avec les filtrations est vrai pour toute variété quasi-projective non singulière et résulte facilement du corollaire à la proposition 2.3. D'autre part comme X est un produit de grasmaniennes C_j, on a sur X des fibrés vectoriels E_j, images réciproques des fibrés canoniques sur les facteurs. Nous utiliserons les faits suivants (connus) :

a) Sur X, l'équivalence linéaire des cycles équivaut à l'équivalence numérique, et A(X) est un groupe de rang fini ;

b) Les $C^i(E_j)$ engendrent l'anneau A(X).

De a) résulte que $\varphi : A(X) \longrightarrow G(\underline{K}(X))$ est injective (donc bijective) en vertu du lemme suivant :

Lemme 2.15. Soient X^n une variété projective non singulière, Z^{n-p} un cycle sur X tel que $\varphi(Z) \in G^p(\underline{K}(X))$ soit nul ; alors Z^{n-p} est numériquement équivalent à zéro.

Pour démontrer ce lemme, il suffit d'utiliser la fonction additive $\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(X,F)$ et le fait que cette fonction est égale à

1 pour $F = \underline{O}_{(x)}$ pour tout $x \in X$.

Ainsi, $A(X)$ et $G(\underline{K}(X))$ ont dans le cas envisagé même rang fini en tout degré, et $G(\underline{K}(X))$ est sans torsion, puisqu'il en est ainsi de $A(X)$. De l'assertion b) ci-dessus résulte, de manière "formelle", que l'application $\widetilde{C}$ de $\underline{K}(X)$ dans $\widetilde{A(X)}$ est surjective, modulo des groupes finis. Il en résulte facilement, puisque $G(\underline{K}(X))$ et $A(X)$ ont même rang fini en tout degré, que l'homomorphisme $G(\widetilde{C})$ de $G(\underline{K}(X))$ dans $G(\widetilde{A(X)})$ est bijectif modulo des groupes finis en tout degré (on utilisera une récurrence sur le degré). Comme $G(\underline{K}(X))$ est sans torsion, cet homomorphisme $G(\widetilde{C})$ est donc injectif.

cqfd.

N.B. L'homomorphisme $\widetilde{C}$ n'est pas surjectif en général, même si X est un espace projectif de dimension 2.

§ 5. Définition faisceautique des classes de Chern. Application à l'étude des morphismes d'injection.

Théorème 2.16. Soit X une variété quasi-projective non singulière. Alors, pour tout $x \in K(X)$, et pour tout entier $i \geq 0$, l'élément $\gamma^i(x - \varepsilon(x))$ est de filtration $\geq i$. Soit $c^i(x) \in G^i(\underline{K}(X))$ la classe de cet élément modulo $\underline{K}(X)^{i+1}$; si l'on pose :

$$\widetilde{c}(x) = [\varepsilon(x),\ 1 + \sum_{i \geq 0} c^i(x)] \in \widetilde{G(\underline{K}(X))} \quad ,$$

alors $\widetilde{c}$ satisfait aux conditions analogues à celles du théorème 2.2.

La première assertion résulte du théorème 2.14, ainsi que le fait que $x \longrightarrow \widetilde{c}(x)$ soit un homomorphisme de λ-anneaux (la formule (1.25) implique $\gamma_t(x + y) = \gamma_t(x)\ \gamma_t(y)$, ce qui montre déjà que $\widetilde{c}$ est un homomorphisme additif). La "fonctorialité" de $\widetilde{c}$ se vérifie immédiatement, et

(2.8) résulte de (2.31).

cqfd

Corollaire 1 : On a $c^i(x) = \varphi(C^i(x))$.

Ceci résulte d'un théorème d'unicité pour les classes de Chern, qui se démontre comme chez Hirzebruch par passage aux variétés de drapeaux. On doit seulement montrer que si Y est une variété de drapeaux associée à un fibré vectoriel sur X, alors $G(\underline{K}(X)) \longrightarrow G(\underline{K}(Y))$ est injectif, ce qui se vérifie par la détermination explicité de $\underline{K}(Y)$ avec toutes ses structures à partir de $\underline{K}(X)$ (je ne donnerai pas les détails ici).

Corollaire 2 : Supposons que pour tout élément $Z \in A(X)$, il existe un morphisme f de X dans un produit X' de grasmaniennes tel que Z soit dans l'image de f^* . Alors les homomorphismes canoniques

$$\varphi : A(X) \longrightarrow G(\underline{K}(X)) , \qquad \psi : G(\underline{K}(X)) \longrightarrow A(X) ,$$

vérifient en dimension i les relations suivantes :

$$(2.35) \qquad \psi\,\varphi = (-1)^{i-1}(i-1)!\ \underline{1} , \quad \varphi\,\psi = (-1)^{i-1}(i-1)!\ \underline{1} .$$

Comme φ est surjective, il suffit évidemment de prouver la première formule, et pour celle-ci, on peut supposer que X est un produit de grasmaniennes. Comme alors φ est injective, il suffit de prouver la deuxième formule (2.35), qui en vertu du corollaire 1, s'écrit

$$\gamma^i(x - \varepsilon(X)) \equiv (-1)^{i-1}(i-1)!\ x \qquad \mod \underline{K}(X)^{i+1}$$

pour tout $x \in \underline{K}(X)^i$. Comme ψ est injective, il suffit de prouver la relation analogue pour $\widetilde{C}(x) \in A(X)^i$, et c'est alors une conséquence de (1.22 bis).

Remarque : Le corollaire 2 rend plausible la validité de (2.35) dans tous les cas ; il devrait en exister une démonstration directe. On prouve en

tout cas facilement la deuxième formule (2.35) modulo le sous-groupe de torsion de $G(\underline{K}(X))$, et en caractéristique 0, cette même formule est une conséquence du théorème de Riemann-Roch. L'intérêt de (2.35) (lorsqu'elle est vraie) tient à ce qu'elle montre que φ est injective modulo des groupes de torsion (peut-être toujours nuls ! (*)), de sorte qu'on "ne perd pas beaucoup" à définir les classes de Chern comme des éléments de $G(\underline{K}(X))$; si l'on fait le produit tensoriel par $\mathbb{Q}$, comme on le fera plus loin pour le théorème de Riemann-Roch, les deux définitions des classes de Chern seraient alors identiques.

Soit toujours X quasi-projective non singulière ; soit de plus Y une sous-variété non singulière de X et soit i l'injection de Y dans X. On a alors, pour $i^!$ et $i_!$ les formules suivantes :

$$\begin{cases} \text{(i) } i^! \text{ est un homomorphisme de } \lambda\text{-anneaux} \\ \text{(ii) } i_!(x.i^!(y)) = i_!(x).y \quad , \qquad \text{d'où en particulier} \\ \qquad i_!i^!(y) = \xi\, y \qquad \text{avec} \qquad \xi = i_!i^!(1) = \gamma_X(Y) \quad , \\ \text{(iii) } i^!(i_!(x)) = x.\lambda_{-1}(N) \quad , \quad \text{d'où en particulier} \\ \qquad i^!(\xi) = i^!i_!(1) = \lambda_{-1}(N) \, , \\ \text{(iv) } i_!(x)\, i_!(x') = i_!(xx'\, \lambda_{-1}(N)) \quad , \end{cases}$$

où, par définition, N est la classe dans $\underline{K}(Y)$ du fibré conormal à Y dans X. Les formules (i) et (ii) sont vraies pour des morphismes quelconques, non nécessairement des injections, et (iii) et (iv) se vérifient sur la définition (2.15) et la formule analogue pour les images inverses (en prenant pour x et x' des classes de fibrés vectoriels, et en se servant du fait que

$$\text{(2.36)} \qquad \operatorname{Tor}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y, \underline{O}_Y) = \underline{O}_Y(\wedge^i N) \, . \,)$$

(*) Non, cf. note de la page 30.

La formule (iv) exprime que $i_!$ est un homomorphisme d'anneaux si l'on introduit sur $\underline{K}(Y)$ une nouvelle structure multiplicative, par la définition $x_N x' = xx'\lambda_{-1}(N)$ (cf. Chapitre I, § 4). Elle se complète par la formule :

(v) $i_!(\lambda^p(N,x)) = \lambda^p(i_!(x))$ pour $p \geq 1$,

qui signifie que $i_!$ définit un λ-homomorphisme de $\underline{K}(Y)_N$ dans $\underline{K}(X)$. Cette formule (v), certainement vraie dans tous les cas, n'est démontrée pour l'instant qu'en caractéristique 0, car elle résulte de la conjonction des théorèmes 1.4 et 2.8.

On a des formules analogues pour i_* et i^* :

(i bis) i^* est un homomorphisme d'anneaux gradués.

(ii bis) $i_*(x.i^*(y)) = i_*(x).y$, d'où en particulier

$i_*(i^*(y)) = \xi' y$, avec $\xi' = i_*(1)$,

(iii bis) $i^*(i_*(x)) = x.(-1)^q N^q$, d'où en particulier

$i^*(\xi') = (-1)^q N^q$,

(iv bis) $i_*(x)\, i_*(x') = i_*(xx'\,(-1)^q N^q)$,

(v bis) i_* augmente les degrés de q unités.

Dans ces formules, q est la codimension de Y dans X, et l'on pose $N^i = C^i(N)$. Seules les formules (iii bis) et (iv bis) demandent une démonstration ; j'ignore si elles sont bien connues (et même si elles sont vraies !!!) et me borne à noter qu'elles résultent par réduction des formules (ii) et (iv), pourvu qu'on se place dans $G(\underline{K}(Y))$ et $G(\underline{K}(X))$ et non dans $A(Y)$ et $A(X)$. On utilise alors le fait que i_* et i^* proviennent par passage au quotient de $i_!$ et $i^!$, en notant que $i_!$ décale la filtration de q unités.

N.B. Toutes les formules "universelles" liant $i_!$ et $i^!$ (resp. i_* et i^*) sont conséquences formelles des précédentes, comme on peut s'en convaincre sans grande difficulté.

De la formule (v) résulte la formule

$$i_!(\gamma^p(N,x)) = \gamma^p(i_!(x)) \quad .$$

La conjonction du théorème 2.14 et de la proposition 1.5 montre que $\gamma^p(N,x)$ est, pour $p = q + j$, de filtration $\geq j$; si l'on note $G_p(N,x)$ sa classe dans $G^j(\underline{K}(Y))$, le théorème 2.16 montre que l'on a

$$i_*(G_p(N,x)) = c^p(i_!(x)) \quad .$$

Enfin, la proposition 1.5 jointe au théorème 2.14 permet d'exprimer $G_p(N,x)$ comme un polynôme à coefficients entiers en les $c^i(N)$, les $c^i(x)$ et $e(x)$; on en déduit le théorème :

Théorème 2.17. Supposons le corps k de caractéristique 0 et soit $i : Y \longrightarrow X$ un morphisme d'injection de variétés quasi-projectives non singulières. On a alors les formules (i) à (v), et de plus, pour tout entier $j \geq 0$, la formule :

$$(2.37) \qquad c^{q+j}(i_!(x)) = i_*\left(\frac{\widetilde{c}(x) * \lambda_{-1}(\widetilde{c}(N))}{(-1)^q N^q} \right)^{(j)} \quad .$$

Le deuxième membre de la formule (2.37) est une façon abrégée de désigner le polynôme en les composantes de $\widetilde{c}(x)$ et $\widetilde{c}(N)$ décrit dans la proposition 1.5.

Corollaire : Dans les conditions précédentes, on a :

$$(2.38) \qquad ch(\widetilde{c}(i_!(x))) = i_*(ch(\widetilde{c}(x)) \, \mathcal{C}(\check{N})^{-1})$$

où ch est l'homomorphisme de Chern défini par la formule (1.26).

Il suffit d'utiliser (2.37) écrit sous la forme :

(2.37 bis) $$\widetilde{c}(i_!(x)) = 1 + i_*\left(\frac{\widetilde{c}(x) * \lambda_{-1}(c(N)) - 1}{(-1)^q N^q}\right) ,$$

la formule explicite (1.29), la formule (iv bis) et enfin (1.30).

On peut écrire (2.38) sous la forme

(2.38 bis) $$ch_X(F) = i_*(ch_Y(F)\widetilde{c}(T_{X/Y})^{-1}) ,$$

où F est un faisceau algébrique cohérent sur Y (considéré au premier membre comme un faisceau sur X nul en dehors de Y), ch_X et ch_Y sont les homomorphismes de Chern pris respectivement sur X et Y, et $T_{X/Y}$ est le fibré normal à Y dans X.

Remarques : Contrairement à (2.38), la formule (2.37) est une "formule sans dénominateur". Elle n'a été démontrée (même en caractéristique 0) qu'en se plaçant dans $G(\underline{K}(X))$ et non dans A(X), ce qui n'est peut-être pas la même chose. Elle est certainement vraie en toute caractéristique et dans A(X). Notons que l'on vérifie tout de suite que les images des deux membres par i* sont les mêmes, d'où résulte en appliquant i_* que le produit de leur différence par N^q est nulle. Cela suggère une méthode de démonstration complètement différente, en essayant d'obtenir Y comme image réciproque transversale d'une sous-variété Y' dans une variété X', qui soit telle qu'en dimension $\leq n = \dim X$, la classe de Y' dans A(X') ne soit pas diviseur de 0.... Malheureusement on ne peut espérer que X' soit une grasmanienne ou quelque chose d'approchant.

On notera que, si l'on néglige les éléments de torsion, la formule (2.38) est équivalente à (2.37).

§ 6. Le théorème de Riemann-Roch

Son énoncé est le suivant : soit f un morphisme propre d'une variété quasi-projective non singulière Y dans une variété X de même espèce. Alors, on a :

(2.39) $$f_*(ch_Y(x)\mathfrak{T}(Y)) = ch_X(f_*(x))\mathfrak{T}(X) \quad .$$

(Les deux membres sont dans $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ et $\mathfrak{T}(X) = \mathfrak{T}(C(T_X))$.)

Il permet de calculer, aux éléments de torsion près, les classes de Chern de $f_!(x)$ connaissant les classes de Chern de x, celles de T_X et T_Y et l'homomorphisme f_*. Ou encore, il permet de déterminer l'homomorphisme $f_!$ de $\underline{K}(Y) \otimes \mathbb{Q}$ dans $\underline{K}(X) \otimes \mathbb{Q}$, lorsqu'on identifie au moyen des homomorphismes ch_Y et ch_X ces groupes respectivement à $A(Y) \otimes \mathbb{Q}$ et $A(X) \otimes \mathbb{Q}$ (si la formule (2.35) est vraie !), à l'aide de f_* et des classes de Chern de T_X et de T_Y .

Je ne sais démontrer la formule (2.39) qu'en caractéristique 0 (*), et comme égalité dans $G(\underline{K}(X)) \otimes \mathbb{Q}$. Pour ceci Y étant localement fermé dans un espace projectif P, on décompose f en le produit d'un morphisme d'injection de Y dans $P \times X$, et d'un morphisme de projection de $P \times X$ sur X, et l'on démontre (2.39) pour chacun de ces deux morphismes..

Pour un morphisme d'injection, on voit immédiatement que les formules (2.38) et (2.39) sont équivalentes (l'hypothèse de caractéristique 0 est intervenue uniquement par l'intermédiaire du théorème 2.8 qui permet d'exprimer les $\lambda^i(\gamma(F))$, pour un faisceau algébrique cohérent F, par des invariants cohomologiques locaux de F).

Pour un morphisme de projection $f : P \times X \longrightarrow X$, on peut, grâce à la proposition 2.13, supposer que x est de la forme $y \otimes z$, avec $y \in \underline{K}(P)$ et

(*) Voir plus bas une démonstration valable en toutes caractéristiques, basée sur un principe différent (p.51).

$z \in \underline{K}(X)$. Alors, la formule de Künneth donne $f_!(x) = \chi(y)z$, où pour un faisceau algébrique cohérent F sur P, l'on pose :

$$\chi(F) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim H^i(P,F) \quad .$$

On est alors aussitôt ramené à prouver la formule

$$\chi(F) = \varkappa_r(\mathrm{ch}_P(F)\mathfrak{T}(P)) \tag{2.40}$$

où $\varkappa_r$ désigne la composante de degré $r = \dim P$. En vertu de la proposition 2.13, on peut supposer que $F = \underline{O}_Q$, où Q est une sous-variété linéaire de P. Alors $\chi(F) = 1$, puisque c'est le genre arithmétique de Q ; reste à voir que le deuxième membre de la formule (2.40) vaut 1 .

Si en effet V est un hyperplan de P et si l'on pose $\xi = \gamma_P(\underline{O}_V)$ et $L = \mathcal{L}(V)$, on aura :

$$1 - \xi = \gamma_P(E(-L))$$

(où E(-L) est le fibré vectoriel défini par - L), d'où :

$$C_P(1 - \xi) = [1, 1 - L] \quad ,$$

et par suite

$$\mathrm{ch}_P(1 - \xi) = e^{-L} \quad , \quad \text{d'où } \mathrm{ch}_P(\xi) = 1 - e^{-L} \quad ,$$

et donc

$$\mathrm{ch}_P(\xi^P) = (1 - e^{-L})^P \quad .$$

Or si p est la dimension de Q dans P, on a $\xi^P = \gamma_P(Q)$; on en déduit

$$\mathrm{ch}_P(F)\mathfrak{T}(P) = (L/(1 - e^{-L}))^{r+1}(1 - e^{-L})^P$$

et il faut vérifier que le coefficient de L^r dans cette série formelle en L vaut 1, ce qui résulte de la propriété caractéristique de la série formelle $L/(1 - e^{-L})$, à savoir que le coefficient de L^q dans $(L/(1 - e^{-L}))^{q+1}$ vaut 1 (poser $q = r + 1 - p$) .

Références bibliographiques :

[1] Hirzebruch : Neue topologischen Methoden in der algebraischen Geometrie.

[2] Serre : Faisceaux algébriques cohérents, Ann. of Maths.

[3] Grothendieck : Sur les faisceaux algébriques cohérents, in Séminaire Cartan 1956/57.

Démonstration du théorème de Riemann-Roch

(Grothendieck, 1er Novembre 1957)

*** Rappel de notations**

[Ce sont celles du "rapport sur Riemann-Roch", cité R.R.R. dans ce qui suit.]

Toutes les variétés considérées sont non singulières et quasi-projectives (i.e. isomorphes à une sous-variété localement fermée d'un espace projectif). Le corps de base est algébriquement clos, de caractéristique quelconque.

Si X est une telle variété, on note K(X) le groupe abélien engendré par les classes de faisceaux cohérents sur X (modulo l'identification d'une extension à une somme) ; la somme alternée des Tor fait de K(X) un anneau. Si F est un faisceau (resp. un fibré E à fibre vectorielle, resp. une sous-

---

Les passages entre astériques * ... * sont des interpolations du copiste.

variété Y de X), on note $\gamma_X(\underline{F})$ (resp. $\gamma_X(E)$, resp. $\gamma_X(Y)$) l'élément de K(X) correspondant à $\underline{F}$ (resp. à $\underline{E}$, resp. à $\underline{O}_Y$). (En fait, on écrit souvent $\underline{F}$, E au lieu de $\gamma_X(\underline{F})$ ...).

On note A(X) l'anneau gradué des classes de cycles de X (pour l'équivalence rationnelle -cf. Chow) ; $A^i(X)$ est formé des cycles de **codimension i.**

Si E est un fibré à fibre vectoriel, on note $C(E) = \Sigma\, C^i(E)$, $C^i(E) \in A^i(X)$, sa classe de Chern (définie comme image réciproque des cycles de Schubert) ; on en déduit par linéarité les $C^i(y)$, pour tout $y \in K(X)$. Si $C(y) = \prod(1 + a_i)$, on pose suivant Hirzebruch :

$$ch(y) = \Sigma\, e^{a_i} \quad , \quad T(y) = \prod \frac{a_i}{1 - e^{-a_i}} \quad .$$

Ce sont des éléments de $A(X) \otimes \mathbb{Q}$.

Lorsque y est le fibré tangent à X, on écrit T(X) au lieu de T(y).

Si G est un fibré à fibre vectorielle, on note $\lambda^p G$ sa puissance extérieure p-ème, et on pose $\lambda_{-1}(G) = \Sigma(-1)^p \lambda^p(G)$; c'est un élément de K(X).

Si f est une application régulière propre d'une variété Y dans une variété X , on définit des homomorphismes (additifs) :

$$f^* : A(X) \longrightarrow A(Y) \quad \text{et} \quad f_* : A(Y) \longrightarrow A(X) \quad .$$

Le premier est homogène de degré 0 et multiplicatif. Le second est homogène de degré dim.X - dim.Y.

On définit également des homomorphismes :

$$f^! : K(X) \longrightarrow K(Y) \quad \text{et} \quad f_! : K(Y) \longrightarrow K(X).$$

Si $\underline{F}$ est un faisceau cohérent sur X, $f^!(\underline{F})$ est égal, par définition, à la somme alternée des $\mathrm{Tor}_p^{O_X}(\underline{O}_Y, \underline{F})$. Pour les fibrés à fibre vectorielle, c'est simplement l'opération d'image réciproque.

Si G est un faisceau cohérent sur Y, $f_*(\underline{G})$ est cohérent sur X. Si l'on note $R^p f_*$ le p-ème foncteur dérivé du foncteur f ainsi défini, on a, par définition, $f_!(\underline{G}) = \Sigma (-1)^p R^p f_*(\underline{G})$. *

THEOREME DE RIEMANN-ROCH. Soit f : Y ⟶ X un morphisme (* application régulière *) propre d'une variété quasi-projective non singulière Y dans une autre X, et soit $y \in K(Y)$. On a :

(1) $\quad f_*(ch(y)T(Y)) = ch(f_!(y))T(X)$ dans $A(X) \otimes \mathbb{Q}$.

Démonstration (* abrégée *).

LEMME 1. Considérons des morphismes propres de variétés $Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} X$. Si le théorème R.R. est vrai pour f et g, il l'est pour f∘g. S'il est vrai pour fg et g, il l'est pour f. Si f_* est injective, et si le théorème R.R. est vrai pour fg et f, il l'est pour g.

Trivial. (* En fait, lorsqu'on suppose R.R. vrai pour fg et g, il faut encore supposer que $g_!$ est surjectif pour pouvoir affirmer que R.R. est vrai pour f. *)

Un morphisme propre étant composé d'une injection et d'une projection $X \times P \longrightarrow X$ (où P est un espace projectif), on est ramené à traiter séparément ces deux cas. Le deuxième, on l'a vu, se ramène à du calcul standard, moyennant la proposition 2.13 ("décomposition cellulaire") de R.R.R. On va donc supposer $Y \subset X$, avec le morphisme d'injection i. La formule (1) devient alors :

(2) $\quad ch(i_!(y)) = i_*(ch(y)\ T(E)^{-1})$,

où $E = T_{X/Y}$ est le fibré normal à Y dans X.

LEMME 2. Supposons qu'il existe sur X un fibré C à fibre vectorielle de rang p = $\mathrm{codim}_X Y$, tel que :

$$(3) \qquad \gamma_X(Y) = i_!(1) = \lambda_{-1}(G) \quad ; \quad i^!(G) = \check{E} \quad ; \quad (-1)^p C^p(G) = Y \ .$$

Si alors on a :

$$(4) \qquad y = i^!(x) \quad , \quad \text{avec} \quad x \in K(X) \quad ,$$

la formule (2) est valable.

Démonstration immédiate, à partir du fait que ch est un homomorphisme d'anneaux, et que l'on a :

$$(5) \qquad \mathrm{ch}(\lambda_{-1}(G)) = (-1)^p \, C^p(G) \, T(\check{G})^{-1} \ .$$

COROLLAIRE. R.R. est vrai si Y est une hypersurface et si y est de la forme $i^!(x)$, avec $x \in K(X)$.

LEMME 3. Supposons que $X = Y \times P$, P étant un espace projectif, et que i soit l'injection $u \longrightarrow (u, v_o)$ $v_o \in P$. Alors i_* est injectif et R.R. est vrai.

C'est du pur calcul standard.

Supposons de nouveau X, Y, y quelconques (toujours avec $Y \subset X$). Soit X' la variété éclatée de X à l'aide de Y, et Y' l'hypersurface image réciproque de Y. On a un diagramme d'applications

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i} & X \\ g\uparrow & & \uparrow f \\ Y' & \xrightarrow{j} & X' \end{array}$$

canoniques (j étant l'application canonique). L'image réciproque de E dans Y' admet un sous-fibré de rang 1, dont le dual est noté L. D'ailleurs L^{-1} est aussi la restriction à Y' du fibré L(Y') défini sur X' par le diviseur Y'. On pose $F = E/L^{-1}$.

Des calculs élémentaires donnent le :

LEMME 4. On a les formules (où $p = \operatorname{codim}_X Y$) :

(6) $\quad f^! i_!(y) = j_!(\lambda_{-1}(\check{F})\, y).$

(7) $\quad \lambda_{-1}(\check{F}) \equiv \gamma^{p-1}(E)\, \lambda^p(\check{E}) \quad \text{mod.}(1-L) \quad (*)$.

(8) $\quad f_*(1) = 1$, d'où $f_* f^* = 1$.

(9) $\quad f^* i_*(\alpha) \equiv j_*(\alpha\, c^{p-1}(F)) \quad \text{mod. Ker } f_*$ pour tout $\alpha \in A(Y)$.

[Pour simplifier l'écriture, on a fait opérer K(Y) sur K(Y') et A(Y) sur A(Y') grâce aux homomorphismes $g^!$ et g^* . * Dans la formule (7), il semble que $\gamma^{p-1}(E)$ désigne $\lambda^{p-1}(E\ -2\ )$, c'est-à-dire $\Sigma_{i+j=p-1}\binom{-p}{j}\lambda^i(E)$; la congruence a lieu dans K(Y').*]

La formule (6) résulte de l'égalité :

(6 bis) $\quad \operatorname{Tor}_i^{\underline{O}_X(v)}(\underline{O}_Y(v), \underline{O}_{Y'}(v')) = \wedge^i \check{F}(v') \quad (v' \in Y' , v = g(v'))$.

La formule (7) résulte des formules

(10) $\quad g_!(L^{-i}) = 0$ pour $0 < i \leq p-1$, $g_!(1) = 1$,

elles-mêmes conséquences de Künneth et de la cohomologie des espaces projectifs.

La formule (8) est triviale, enfin (9) résulte de $g_*(c^{p-1}(F))=1$ qui se déduit, par exemple, des formules immédiates :

(10 bis) $\quad g_*(\xi^i) = 0$ si $0 \leq i < p-1$, $g_*(\xi^{p-1}) = 1$,

avec $\xi = c^1(L) \in A^1(Y')$.

[En fait, (9) est très vraisemblablement une identité, et pas seulement une congruence.]

(*) Cette formule inutilement compliquée peut se remplacer par exemple par VII 4.1.

De la formule (7) résulte aussitôt y $\lambda_{-1}(\check{F}) \in j'(K(X'))$ pourvu que l'on ait :

(11) $\qquad y\ \gamma^{p-1}(E)\ \lambda^{p}(\check{E}) \in i'(K(X))$.

Supposons cette condition (11) satisfaite. D'après le corollaire au lemme 2, R.R. est vrai pour $(Y', X', y\ \lambda_{-1}(\check{F}))$. D'autre part, pour prouver (2), il suffit, en vertu de la formule (8), de prouver que

(12) $\qquad f^*ch(i_!(y)) \equiv f^*(i_*(ch(y)\ T(E)^{-1}))$ mod.Ker f_* .

Or, cette dernière formule se vérifie aussitôt, utilisant (6), (9), R.R. pour $(Y', X', y\ \lambda_{-1}(F))$ et la formule :

(13) $\qquad ch(\lambda_{-1}(\check{F})) = c^{p-1}(F)\ T(F)^{-1}$ (cf. formule (5)).

Ainsi, R.R. est prouvé chaque fois que $y\ \gamma^{p-1}(E) = 0$, en particulier (puisque $\gamma^{p-1}(E)$ est de filtration $\geq p-1$ * dans K(Y) filtré par la codimension des supports *) chaque fois que $p-1 > \dim.Y$, i.e. chaque fois que $\dim.Y < \frac{\dim.X - 1}{2}$. Or, on se ramène à ce cas, en conjuguant le lemme 1 et le lemme 3 (prenant pour P un espace projectif de dimension r assez grande, par exemple $r > \dim.X + 1$). C.Q.F.D.

N.B. On s'est servi du fait que $\gamma^{p-1}(E)$ était de filtration $\geq p-1$. On peut prouver ce fait directement, sans passer par les grassmaniennes comme dans R.R.R. 2.16, par l'étude du fibré Y' en espaces projectifs associé à E. Cette méthode donne plus généralement le th. 2.14 de R.R.R.

Extrait d'une lettre de Grothendieck

..."moralement", la nouvelle méthode repose sur la détermination de K(X) et de A(X) lorsque X est, soit un fibré projectif associé à un fibré vectoriel, soit une variété obtenu par éclatement d'une sous-variété non

singulière. Dans ce deuxième cas, je n'ai pas fait la détermination complète, il manque un petit quelque chose. Avec les notations du petit papier, il faut prouver la formule (9) (mais comme égalité) :

$$(9) \qquad f^*(i_*(\alpha)) = j_*(\alpha\, c^{p-1}(F)) \quad , \quad \alpha \in A(Y) \ .$$

On constate que les deux membres ont même image par f_*, et même image par j^*, de sorte que la question est équivalente à :

$$(9\text{ bis}) \qquad \mathrm{Ker}\ f_* \cap \mathrm{Ker}\ j^* = 0 \ .$$

En tout cas, (9) est vraie en réduisant à G(K(X')) (ce qui détruit un peu de torsion, tout au plus), car elle résulte alors de (6) ; il n'y a donc guère de doute qu'elle ne soit vraie.

... Je te signale d'ailleurs que l'égalité (9) résulte très facilement de (6) sans passer par l'ennuyeuse (6 bis)...

p.c.c.J-P.S.

GÉNÉRALITÉS SUR LES CONDITIONS DE FINITUDE DANS LES CATÉGORIES DÉRIVÉES

par L. ILLUSIE

0. Introduction

L'objet des Exposés I à IV est de développer, avec la généralité qui convient dans ce Séminaire, le formalisme des conditions de finitude dans les catégories dérivées des topos annelés.

Comme il a été dit dans Exp. 0, c'est le besoin de définir sur des schémas arbitraires des "groupes de Grothendieck" possédant de bonnes propriétés de variance qui a obligé à généraliser et à assouplir les notions de finitude utilisées jusqu'à présent.

Une notion classique comme celle de faisceau cohérent sur un espace annelé $(X, \underline{O}_X)$ devient sans intérêt dès que $\underline{O}_X$ n'est plus cohérent. On pourrait songer à la remplacer par la notion de présentation finie, mais celle-ci présente l'inconvénient que le noyau d'un épimorphisme de Modules de présentation finie n'est plus en général de présentation finie. On arrive à une notion satisfaisante en remarquant que, si $\underline{O}_X$ est cohérent, un faisceau cohérent F est non seulement de présentation finie mais de n-présentation finie pour tout $n \in \mathbb{N}$, "n-présentation finie" voulant dire qu'il existe localement une suite exacte

$$L_n \longrightarrow L_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow L_o \longrightarrow F \longrightarrow 0 \quad ,$$

où les L_i sont libres de type fini. Le faisceau $\underline{O}_X$ n'étant plus supposé cohérent, disons qu'un $\underline{O}_X$-Module F est pseudo-cohérent s'il vérifie la condition précédente, i.e. est de n-présentation finie pour tout n. Alors, la notion de pseudo-cohérence possède, vis-à-vis des suites exactes courtes, la même propriété de stabilité que la notion de cohérence : si deux des termes d'une suite exacte courte de $\underline{O}_X$-Modules sont pseudo-cohérents, le troisième l'est aussi. On généralise aisément la notion précédente aux complexes de faisceaux. Un complexe F de $\underline{O}_X$-Modules est dit pseudo-cohérent s'il est n-pseudo-cohérent pour tout $n \in \mathbb{Z}$, "n-pseudo-cohérent" signifiant qu'il existe localement un quasi-isomorphisme $L \longrightarrow F$, où L est un complexe à degrés bornés supérieurement et à composantes libres de type fini en degré $\geqslant n$. Pour un complexe F réduit au degré 0, il revient au même de dire que F est pseudo-cohérent en tant que complexe ou en tant que Module. La notion de complexe pseudo-cohérent a d'excellentes vertus de stabilité, décrites dans Exp. I §§ 1 et 2. D'abord c'est une notion stable par isomorphisme dans la catégorie dérivée D(X) de la catégorie des $\underline{O}_X$-Modules; qui mieux est, si deux des objets d'un triangle distingué de D(X) sont pseudo-cohérents, le troisième l'est aussi : en d'autres termes, la sous-catégorie pleine $D(X)_{coh}$ de D(X) formée des complexes pseudo-cohérents est une sous-catégorie triangulée. En outre, la pseudo-cohérence se conserve par image inverse et produit tensoriel dérivés. Dans le cas où $\underline{O}_X$ est cohérent, dire qu'un complexe F est pseudo-cohérent signifie simplement que F est à cohomologie localement bornée supérieurement et que tous les $\underline{H}^i(F)$ sont cohérents.

Si $\underline{O}_X$ est un faisceau d'anneaux locaux réguliers, tout $\underline{O}_X$-Module

cohérent F admet localement une résolution finie gauche par des Modules libres de type fini, i.e. il existe localement une suite exacte

$$0 \longrightarrow L_n \longrightarrow \dots \longrightarrow L_o \longrightarrow F \longrightarrow 0 \quad ,$$

où les L_i sont libres de type fini. Il est donc naturel, quand $\underline{O}_X$ est un faisceau d'anneaux locaux quelconque, de s'intéresser aux Modules qui jouissent de la propriété précédente. De tels Modules sont appelés parfaits. Plus généralement, on dit qu'un complexe F de $\underline{O}_X$-Modules est parfait s'il existe localement un quasi-isomorphisme $L \longrightarrow F$, où L est un complexe à degrés bornés et à composantes libres de type fini. On montre dans Exp. I § 3 que la sous-catégorie pleine $D(X)_{parf}$ de D(X) formée des complexes parfaits, est, de même que $D(X)_{coh}$, une sous-catégorie triangulée, "stable" par image inverse et produit tensoriel dérivés. On a évidemment $D(X)_{parf} \subset D(X)_{coh}$, mais l'inclusion est stricte en général. La pseudo-cohérence peut se redéfinir "par passage à la limite" à partir de la perfection : un complexe F est pseudo-cohérent si et seulement si, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, F peut être "localement approché à l'ordre n par un complexe parfait", par quoi l'on entend qu'il existe localement un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & R & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ L & \longrightarrow & F \end{array} \quad ,$$

où L est parfait et R acyclique en degré $\geqslant n$. Inversement, la perfection se récupère à partir de la pseudo-cohérence grâce à une condition de régularité supplémentaire : un complexe est parfait si et seulement s'il est pseudo-cohérent et localement de tor-dimension finie (Exp. I § 5). On retrouve ainsi le fait que, si les anneaux locaux sont réguliers, tout faisceau cohérent est parfait, plus généralement tout complexe pseudo-cohérent à cohomologie localement bornée est parfait.

Pseudo-cohérence et perfection sont les deux notions de finitude fondamentales avec lesquelles nous travaillerons dans ce Séminaire. Les §§ 1 à 5 de l'Exposé I sont consacrés à leur définition et à l'établissement de leurs propriétés élémentaires de stabilité. Pour ceci, on utilise seulement deux ou trois propriétés locales de la catégorie des Modules libres de type fini vis-à-vis de la catégorie de tous les Modules. Aussi s'avère-t-il commode - et utile, notamment dans l'Exp. II - d'axiomatiser la situation, en introduisant une notion de pseudo-cohérence (resp. de perfection) dans une catégorie fibrée sur un site relativement à une sous-catégorie fibrée vérifiant des conditions convenables.

Les §§ 6 à 8 de l'Exp. I généralisent aux complexes parfaits un certain nombre de notions bien connues pour les faisceaux localement libres de type fini : rang, dualité, trace d'un endomorphisme.

Dans l'Exp. II, on examine le problème de "l'existence de résolutions globales" : à quelles conditions, sur un topos annelé $(X,\underline{O}_X)$, un complexe pseudo-cohérent (resp. parfait) est-il <u>globalement</u> isomorphe dans $D(X)$ à un complexe de Modules localement libres de type fini ? L'importance de cette question réside essentiellement dans le fait qu'on ne sait pas, pour le moment, généraliser aux complexes parfaits certaines constructions usuelles sur les Modules localement libres : puissances extérieures et symétriques, classes de Chern (pour plus de détails à ce sujet, voir Exp. XIV). C'est pourquoi il est commode d'avoir à sa disposition des critères suffisants maniables pour l'existence de résolutions globales, ce qui permet de ramener certaines questions sur les complexes pseudo-cohérents (resp. parfaits) à des questions analogues sur les faisceaux localement libres de type fini. De tels critères

sont donnés dans l'Exp. II. On montre en particulier qu'il existe des résolutions globales dans les cas suivants : X est le topos zariskien d'un schéma affine, ou plus généralement d'un schéma quasi-compact possédant un faisceau inversible ample, voire une famille ample de faisceaux inversibles au sens de Kleiman (par exemple un schéma régulier); ou encore X est le topos des faisceaux d'ensembles sur un espace topologique compact, $\underline{O}_X$ le faisceau des fonctions continues à valeurs complexes. A titre d'illustration - et pour mettre en évidence la souplesse des notions introduites - on donne en appendice une définition "purement faisceautique" de l'indice d'une famille d'opérateurs elliptiques.

L'Exp. III étudie la stabilité des conditions de finitude par image directe dérivée. Pour obtenir des énoncés raisonnables, il y a lieu de "relativiser" les notions de pseudo-cohérence et de perfection. On se place ici dans le cadre des schémas ordinaires, ce qui suffit pour le Séminaire, mais il ne fait pas de doute qu'il faudra tôt ou tard développer une théorie analogue pour les schémas ou espaces analytiques relatifs. Soit $p : X \to S$ un S-schéma localement de type fini et soit F un complexe de $\underline{O}_X$-Modules, on dit que F est <u>pseudo-cohérent</u> (<u>resp. parfait</u>) <u>relativement à</u> p si l'on peut localement plonger (par une immersion fermée) X dans un S-schéma lisse X' de manière que F prolongé par zéro sur X' soit pseudo-cohérent (resp. parfait). La notion de pseudo-cohérence relativement à p est surtout intéressante dans le cas où S n'est pas localement noethérien, car dans le cas contraire elle coïncide avec la notion de pseudo-cohérence ordinaire. D'autre part, comme on peut s'y attendre, dire que F est parfait rel. à p

équivaut à dire que F est pseudo-cohérent rel. à p et localement de tor-dimension finie rel. à p (i.e. rel. au faisceau d'anneaux $p^{-1}(\underline{O}_S)$). Le théorème central de l'Exp. III est le <u>théorème de finitude</u>, qui affirme (sous une forme un peu plus précise) que, si $f : X \longrightarrow Y$ est un morphisme <u>propre</u> de S-schémas localement de type fini, le foncteur Rf_* transforme complexes pseudo-cohérents rel. à S en complexes pseudo-cohérents rel. à S ; ce théorème est en réalité une conjecture, mais est prouvé néanmoins dans les deux cas particuliers suivants : a) S est localement noethérien

b) f est projectif; il semble malheureusement que l'extension au cas général soit du même ordre de difficulté que le théorème analogue en Géométrie Analytique ("théorème" de Grauert). Combinant le théorème de finitude avec une formule essentiellement triviale dite <u>formule de projection</u>, on obtient des critères maniables pour la stabilité de la perfection relative par image directe. On retrouve, en corollaire, les "théorèmes de continuité et de semi-continuité de Grauert" (EGA III 7.6).

L'Exp. IV traduit en langage de "groupes de Grothendieck" les résultats des Exp. I à III. Sur un topos annelé $(X,\underline{O}_X)$, on note $K^\bullet(X)$ (resp. $K.(X)$) le "groupe de Grothendieck" de la catégorie des complexes parfaits et de tor-dimension finie (resp. pseudo-cohérents et à cohomologie bornée). Le groupe $K^\bullet(X)$ est un anneau, et $K.(X)$ un module sur $K^\bullet(X)$. $K^\bullet$ est un foncteur contravariant (comme le suggère le point en haut), tandis que K. est un foncteur covariant pour les morphismes propres et pseudo-cohérents (de schémas ou d'espaces analytiques, et sous réserve que l'on dispose du théorème de finitude...). Il y a aussi des variances inhabituelles,

covariance de K^*, contravariance de K_*, pour des morphismes satisfaisant des hypothèses de régularité convenables. Enfin, les critères de globalisation de l'Exp. II permettent de faire le lien avec les "groupes de Grothendieck" définis naïvement à partir des faisceaux cohérents ou des faisceaux localement libres de type fini.

1. Définitions préliminaires

1.1. Catégories fibrées à fibres additives (resp. abéliennes, resp. triangulées)

1.1.1. Soit $\underline{S}$ une catégorie, et soit $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie fibrée (SGA 1 VI 6.1) à fibres des catégories additives (resp. triangulées). Nous dirons que $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie additive (resp. triangulée) (ou que $\underline{C}$ est additive (resp. triangulée) sur $\underline{S}$) si, pour toute flèche $f : X \longrightarrow Y$ de $\underline{S}$, le foncteur image inverse (déterminé à isomorphisme unique près) $f^* : \underline{C}_Y \longrightarrow \underline{C}_X$ est additif (resp. exact). Nous dirons que $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie abélienne si $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie additive à fibres abéliennes, et que $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie abelienne plate si en outre les foncteurs image inverse sont exacts.

1.1.2. Soit $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie triangulée. On définit, par exemple à l'aide d'un clivage de $\underline{C}$ (SGA 1 VI 7.1), une $\underline{S}$-catégorie fibrée $Tr(\underline{C})$ dont la fibre en chaque $X \in ob(\underline{S})$ est la catégorie $Tr(\underline{C}_X)$ des triangles distingués de $\underline{C}_X$.

1.1.3. Soient $\underline{C}$ et $\underline{C}'$ des $\underline{S}$-catégories additives (resp. triangulées) et $F : \underline{C} \longrightarrow \underline{C}'$ un foncteur. On dit que F est un $\underline{S}$-foncteur additif (resp. exact) si F est un $\underline{S}$-foncteur cartésien additif (resp. exact) sur chaque fibre.

Si $\underline{C}$ et $\underline{C}'$ sont des $\underline{S}$-catégories triangulées et si F est un $\underline{S}$-foncteur exact, alors F définit un $\underline{S}$-foncteur cartésien $Tr(\underline{C}) \longrightarrow Tr(\underline{C}')$.

1.1.4. Soit $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie triangulée, et soit $\underline{C}'$ une sous-$\underline{S}$-catégorie fibrée pleine de $\underline{C}$. On dit que $\underline{C}'$ est une sous-$\underline{S}$-catégorie triangulée de $\underline{C}$ si, pour tout $X \in ob\ \underline{S}$, $\underline{C}'_X$ est une sous-catégorie triangulée de $\underline{C}_X$ ([V] chap. I § 1 2.3).

1.1.5. Soit $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie additive. On définit (SGA 4 XVII 2.2, 2.4) une $\underline{S}$-catégorie additive (resp. triangulée) $C(\underline{C})$,(resp. $K(\underline{C})$), dont la fibre en $X \in ob\ \underline{S}$ est la catégorie $C(\underline{C}_X)$ (resp. $K(\underline{C}_X)$) des complexes ([1]) (resp. complexes "à homotopie près") de $\underline{C}_X$. Si $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate, on définit (loc. cit.) une $\underline{S}$-catégorie triangulée $D(\underline{C})$, dont la fibre en $X \in ob\ \underline{S}$ est la catégorie dérivée $D(\underline{C}_X)$; si $f : X \longrightarrow Y$ est une flèche de $\underline{S}$, nous noterons $f^* : D(\underline{C}_Y) \longrightarrow D(\underline{C}_X)$ le foncteur image inverse, qui se déduit de $f^* : K(\underline{C}_Y) \longrightarrow K(\underline{C}_X)$ par simple passage au quotient ([2]). On définit des sous-$\underline{S}$-catégories triangulées pleines $K^*(\underline{C})$ (resp. $D^*(\underline{C})$) ($* = +, -, b$) par les conditions habituelles de degré.

1.2. Terminologie. Soient $\underline{S}$ un site, $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate (1.1), $\underline{C}_o$ une sous-$\underline{S}$-catégorie fibrée strictement pleine.

Soit $F \in ob\ \underline{C}_X$, pour $X \in ob\ \underline{S}$. L'ensemble des $f : U \longrightarrow X$ de $\underline{S}/X$ tels qu'il existe un épimorphisme $E \longrightarrow f^*F$ avec $E \in ob\ \underline{C}_{oU}$ est un crible de X. Si celui-ci est couvrant, nous dirons que F est de $\underline{C}_o$-type fini (ou simplement de type fini s'il n'y a pas de confusion à redouter).

([1]) à différentielle de degré +1.

([2]) si $a \in ob\ D(\underline{C}_Y)$(resp. $F \in D(\underline{C}_Y)$), nous écrirons souvent, en abrégé, a_X au lieu de $f^*(a)$.

Nous dirons que $\underline{C}_o$ est <u>localement stable par noyau d'épimorphisme</u> si la condition suivante est réalisée : pour tout $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$ et tout épimorphisme $u : E \longrightarrow F$ de $\underline{C}_X$ avec E et $F \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oX}$, le noyau de u est localement dans $\underline{C}_o$ (i.e. l'ensemble des $f : U \longrightarrow X$ de $\underline{S}_{/X}$ tels que $f^*\mathrm{Ker}(u) \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oU}$ est un raffinement de X).

Par le procédé standard de décomposition d'une suite exacte longue en suites exactes courtes, on voit que la condition précédente équivaut à la condition (en apparence plus forte) que voici : pour tout $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$ et toute suite exacte de $\underline{C}_X$

$$(*) \qquad 0 \longrightarrow E^0 \longrightarrow E^1 \longrightarrow \ldots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0$$

avec $E^i \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oX}$ pour $1 \leqslant i \leqslant n$, E^0 est localement dans $\underline{C}_o$.

Nous dirons que $\underline{C}_o$ est <u>localement quasi-stable par noyau d'épimorphismes</u> si, pour toute suite exacte telle que (*), E^0 est de $\underline{C}_o$-type fini.

D'autre part, nous dirons que $\underline{C}_o$ est <u>localement relevable dans</u> $\underline{C}$ si, pour tout $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, tout épimorphisme $u : E \longrightarrow F$ de $\underline{C}_X$ avec $F \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oX}$ admet localement une section. Pour que $\underline{C}_o$ soit localement relevable dans $\underline{C}$, il faut et il suffit que, pour tout diagramme de $\underline{C}_X$ ($X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$)

$$\begin{array}{ccc} & & H \\ & & \downarrow \\ E & \xrightarrow{u} & F \end{array}$$

où u est un épimorphisme et $H \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_o$, l'ensemble des U au-dessus de X tel qu'il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} & \overset{u}{\swarrow} & H_U \\ & & \downarrow \\ E_U & \xrightarrow{U} & F_U \end{array}$$

soit un raffinement de X.

Nous dirons que $\underline{C}_o$ est <u>localement quasi-relevable dans</u> $\underline{C}$ si la condition plus faible suivante est réalisée : pour tout $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, et tout épimorphisme $u : E \longrightarrow F$ de $\underline{C}_X$ avec $F \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oX}$, l'ensemble des $f : U \longrightarrow X$ de $\underline{S}/X$ tels qu'il existe $v : F' \longrightarrow f^*E$ avec $F' \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oU}$ tel que $f^*(u)v$ soit un épimorphisme, est un raffinement de X.

Cette condition équivaut à la suivante : pour tout diagramme de $\underline{C}_X$

$$\begin{array}{ccc} & & H \\ & & \downarrow \\ E & \xrightarrow{u} & F \end{array} \quad ,$$

où u est un épimorphisme, et $H \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_o$, l'ensemble des U au-dessus de X tels qu'il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{v} & H_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_U & \xrightarrow{u_U} & F_U \end{array} \quad ,$$

avec $G \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_o$ et v un épimorphisme, est un raffinement de X.

Si $\underline{S}$ est un site chaotique, par exemple le site ponctuel (un objet, un morphisme), nous omettrons l'adverbe "localement" dans les définitions précédentes.

1.3. <u>Exemples</u>

a) Soient $\underline{S}$ un site ponctuel, A un anneau, $\underline{C}$ la catégorie des A-modules à gauche. La sous-catégorie pleine $\underline{C}_o$ de $\underline{C}$ formée des A-modules (à gauche) projectifs de type fini est stable par noyau d'épimorphisme et relevable dans $\underline{C}$; un A-module est de $\underline{C}_o$-type fini si et seulement s'il est de type fini au

sens ordinaire. La sous-catégorie pleine $\underline{C}_1$ de $\underline{C}$ formée des A-modules de type fini est quasi-relevable dans $\underline{C}$ (mais non relevable en général); si A est noethérien, $\underline{C}_1$ est stable par noyau d'épimorphisme. La sous-catégorie pleine $\underline{C}'_o$ de $\underline{C}$ formée des A-modules libres de type fini est relevable dans $\underline{C}$ et quasi-stable (non stable en général) par noyau d'épimorphisme.

b) Soient $(S,\underline{O}_S)$ un espace anneló en anneaux locaux, $\underline{S}$ le site des ouverts de S, $\underline{C}$ la $\underline{S}$-catégorie fibrée (et même scindée (SGA 1 VI 9)) définie par le foncteur $U \longmapsto$ (catégorie des $\underline{O}_U$-Modules à gauche); $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate (1.1). Soit $\underline{C}_o$ la sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ définie par $U \longmapsto$ (catégorie des $\underline{O}_U$-Modules libres de type fini). Un $\underline{O}_S$-Module M est localement de $\underline{C}_o$-type fini si et seulement si M est de type fini au sens ordinaire (EGA O_I 5.2). De (EGA O_I 5.2.7 et 5.4.9) résulte que $\underline{C}_o$ est localement stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\underline{C}$.

c) Soient G un groupe, $\underline{S}$ le topos des G-ensembles (SGA 4 V 3.11) k un corps (considéré comme Anneau constant de $\underline{S}$), $\underline{C}$ la $\underline{S}$-catégorie scindée définie par le foncteur $U \longmapsto$ (catégorie des k_U-Modules à gauche); $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate. Soit $\underline{C}_o$ la sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ définie par $U \longmapsto$ (catégorie des k_U-Modules libres de type fini). Comme la localisation dans $\underline{S}$ équivaut à l'oubli des opérations de G, il est clair qu'un G-k-module M est localement de $\underline{C}_o$-type fini si et seulement si M est de dimension finie comme espace vectoriel sur k, et que $\underline{C}_o$ est localement stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\underline{C}$.

On laisse au lecteur le soin de regarder la variante "galoisienne" de c) où G est un groupe profini et $\underline{S}$ le topos des ensembles où G opère continûment.

En fait, les exemples b) et c) sont des cas particuliers de l'exemple suivant :

d) Soient $(\underline{S},\underline{O}_{\underline{S}})$ un topos annelé (cf. SGA 4 IV 2.10)(*), et $\underline{C}$ la $\underline{S}$-catégorie scindée définie par $U \longmapsto$ (catégorie des $\underline{O}_U$-Modules à gauche); $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate. Soit $\underline{C}_0$ la sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ définie par $U \longmapsto$ (catégorie des $\underline{O}_U$-Modules libres de type fini). Un $\underline{O}_{\underline{S}}$-Module localement de $\underline{C}_0$-type fini sera dit simplement de **type fini**. La catégorie $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme et localement relevable dans $\underline{C}$, comme il résulte du

Lemme 1.3.1. *Soit P un $\underline{O}_{\underline{S}}$-Module, Conditions équivalentes :*

(i) *P est de type fini et le foncteur* $\underline{\mathrm{Hom}}(P,.)$ *est exact;*

(ii) *P est de type fini et tout épimorphisme* $M \longrightarrow P$ *admet localement une section;*

(iii) *P est localement facteur direct d'un Module libre de type fini.*

La preuve est immédiate et laissée en exercice au lecteur.

1.4. Un lemme de "prolongement" (cf. EGA O_{III} 11.9.1)

Proposition 1.4.1. *Soient S un site, C une S-catégorie abélienne plate (1.1), $\underline{C}_0$ une sous-S-catégorie additive (1.1) strictement pleine de C; on suppose $\underline{C}_0$ localement quasi-relevable dans C (1.2). Soient* $S \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, $u : E \longrightarrow F$ *un morphisme (de degré 0) de complexes de $\underline{C}_S$ (différentielles de degré +1), G le cône de u (cf. [V] chap. I § 1 2.1),* $n \in \mathbb{Z}$; *on suppose que* $H^n(G)$ *est*

(*) $\underline{O}_{\underline{S}}$ est ici un anneau de $\underline{S}$, à élément unité, mais non nécessairement commutatif.

de $\underline{C}_0$-type fini (1.2). Alors l'ensemble des $X \in \mathrm{ob}\, \underline{S}_{/S}$ vérifiant la propriété (P) ci-dessous est un raffinement de S.

(P) : il existe un objet M de $\underline{C}_{0X}$ et des flèches de $\underline{C}_X$

$$r : M \longrightarrow Z^{n+1}(E_X) = \mathrm{Ker}(E_X^{n+1} \xrightarrow{d^{n+1}} E_X^{n+2})$$

et $\quad s : M \longrightarrow F_X^n$

tels que le diagramme suivant de $\underline{C}_X$

$$\begin{array}{ccccccc}
\cdots \longrightarrow & E_X^{n-1} & \xrightarrow{\begin{pmatrix} d_{E_X}^{n-1} \\ 0 \end{pmatrix}} & E_X^n \oplus M & \xrightarrow{\left(d_{E_X}^n\,,\ r\right)} & E_X^{n+1} & \longrightarrow \cdots \\
& \downarrow{\scriptstyle u_X^{n-1}} & & \downarrow{\scriptstyle (u_X^n, s)} & & \downarrow{\scriptstyle u_X^{n+1}} & \\
\cdots \longrightarrow & F_X^{n-1} & \longrightarrow & F_X^n & \longrightarrow & F_X^{n+1} & \longrightarrow \cdots
\end{array}$$

soit un morphisme de complexes $u' : E' \longrightarrow F_X$ (i.e. $d_{F_X}^n\, s = u_X^{n+1}\, r$), et que

(i) $H^{n+1}(u')$ soit un monomorphisme, avec $\mathrm{Im}\, H^{n+1}(u') = \mathrm{Im}\, H^{n+1}(u_X)$,

(ii) $H^n(u')$ soit un épimorphisme.

De manière imagée, on peut dire que, quitte à modifier localement E et u, en degré n seulement, par l'addition à E^n d'un objet de $\underline{C}_0$, on peut localement rendre $H^{n+1}(u)$ injectif, sans changer son image, et $H^n(u)$ surjectif.

Démonstration. La marche est la suivante : on montre d'abord que l'on peut choisir localement r et s de manière à rendre $H^{n+1}(u)$ injectif; on vérifie

que l'hypothèse de finitude sur $H^n(G)$ est conservée; une nouvelle correction locale en degré n permet alors d'obtenir $H^n(u)$ surjectif.

La suite exacte de cohomologie

$$\longrightarrow H^n(G) \longrightarrow H^{n+1}(E) \longrightarrow H^{n+1}(F) \longrightarrow$$

montre que le noyau de $H^{n+1}(u)$ est de $\underline{C}_o$-type fini. En d'autres termes, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$M \longrightarrow H^{n+1}(E_X) \xrightarrow{H^{n+1}(u)} H^{n+1}(F_X) \quad ,$$

avec $M \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_{oX}$, est un raffinement de S. Comme $\underline{C}_o$ est localement quasi-relevable dans $\underline{C}$, on peut d'ailleurs imposer que la flèche $M \longrightarrow H^{n+1}(E_X)$ se factorise à travers $Z^{n+1}(E_X)$ en

$$M \xrightarrow{r} Z^{n+1}(E_X) \longrightarrow H^{n+1}(E_X) \quad .$$

La flèche composée

$$M \xrightarrow{u_X^{n+1} r} Z^{n+1}(F_X) \longrightarrow H^{n+1}(F_X)$$

étant nulle par construction, $u_X^{n+1} r$ se factorise à travers $B^{n+1}(F_X) = \mathrm{Im}(F_X^n \xrightarrow{d^n} F_X^{n+1})$. Appliquant à nouveau la quasi-relevabilité, on peut imposer que $u_X^{n+1} r$ se factorise à travers F_X^n en

$$M \xrightarrow{s} F_X^n \longrightarrow B^{n+1}(F_X) \longrightarrow Z^{n+1}(F_X) \quad .$$

On vérifie alors trivialement que u' , défini comme en (1.4.1), est un morphisme de complexes satisfaisant à (i).

Soit G' le cône de u' : $E' \longrightarrow F_X$. Montrons que $H^n(G')$ est de $\underline{C}_o$-type fini. On a, par construction, une suite exacte

$$0 \longrightarrow E_X \xrightarrow{v} E' \longrightarrow M[-n] \longrightarrow 0 \quad ,$$

avec $u' \ v = u_X$. Pour comparer G_X et G' , on peut, par exemple, former "l'octaèdre" de $K(\underline{C}_X)$



.

La suite exacte de cohomologie du triangle distingué (*) montre que $H^n(G_X) \longrightarrow H^n(G')$ est un épimorphisme, donc que $H^n(G')$ est bien de $\underline{C}_o$-type fini.

La correction précédente nous ramène donc au cas où $H^{n+1}(u)$ est un monomorphisme, ce que nous supposerons maintenant. La suite exacte de cohomologie de $E \longrightarrow F \longrightarrow G$ donne alors une suite exacte

$$(.) \qquad H^n(E) \xrightarrow{H^n(u)} H^n(F) \longrightarrow H^n(G) \longrightarrow 0 \quad .$$

Comme $H^n(G)$ est de $\underline{C}_o$-type fini, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un épimorphisme $M \longrightarrow H^n(G_X)$ avec $M \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oX}$ est, par définition, un raffinement de S. Utilisant la quasi-relevabilité de $\underline{C}_o$ dans $\underline{C}$, on peut imposer que cet épimorphisme se factorise à travers $Z^n(F_X)$ en

$$M \xrightarrow{s} Z^n(F_X) \longrightarrow H^n(F_X) \longrightarrow H^n(G_X) \quad .$$

Il est clair que u', défini comme en (1.4.1) avec (r = 0), est un morphisme de complexes et que $H^{n+1}(u') = H^{n+1}(u_X)$. D'autre part, il est immédiat, à partir de la suite exacte (.), que

$$H^n(u') : H^n(E_X) \oplus M \longrightarrow H^n(F_X)$$

est un épimorphisme. Cela termine la démonstration de (1.4.1).

Lemme 1.4.2. Soient C une catégorie abélienne, $u : E \longrightarrow F$ un morphisme de complexes de C (resp. une flèche de $D(\underline{C})$), G le cône de u. Conditions équivalentes pour $n \in \mathbb{Z}$ donné :

(i) $H^i(G) = 0$ pour $i \geqslant n$;

(ii) $H^i(u)$ est un isomorphisme pour $i > n$ et un épimorphisme pour $i = n$.

La preuve est immédiate à partir de la suite exacte de cohomologie.

Définition 1.4.3. Nous dirons que u est un n-quasi-isomorphisme (resp. un n-isomorphisme) si u vérifie les conditions équivalentes de (1.4.2).

Cela étant, on déduit aussitôt de (1.4.1) le

Corollaire 1.4.4. Soient $\underline{S}$, S, $\underline{C}$, $\underline{C}_0$ comme en (1.4.1). Soit $u : E \longrightarrow F$ un (n+1)-quasi-isomorphisme de complexes de $\underline{C}_S$ ($n \in \mathbb{Z}$ donné) tel que $H^n(G)$ soit de $\underline{C}_0$-type fini. Alors l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe (M, r, s) comme en (1.4.1) tels que u' soit un n-quasi-isomorphisme est un raffinement de S.

De manière imagée, on peut, moyennant la condition de finitude sur $H^n(G)$, localement "gagner un cran", i.e. modifier localement u en degré n par l'addition à E^n d'un objet de $\underline{C}_0$ de manière à faire de u un n-quasi-isomorphisme.

Corollaire 1.4.5. Soient $\underline{C}$ une catégorie abélienne, $n \in \mathbb{Z}$, et $u : E \longrightarrow F$ un n-quasi-isomorphisme de complexes de $\underline{C}$. Il existe un diagramme commutatif de $C(\underline{C})$



,

où u' est un quasi-isomorphisme et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geqslant n$ (i.e. tel que $E'^i = E^i$ et $v^i = Id(E^i)$ pour $i \geqslant n$).

Preuve. Appliquant (1.4.4) dans le cas où $\underline{S}$ est le site ponctuel et $\underline{C}_0 = \underline{C}$, on obtient un triangle commutatif de $C(\underline{C})$



,

où u'_{n-1} est un $(n-1)$-quasi-isomorphisme et v_{n-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geqslant n$. Itérant le procédé, on trouve, pour $i \leqslant n-1$, une suite de triangles commutatifs de $C(\underline{C})$



,

où u'_i est un i-quasi-isomorphisme et v_{i-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geqslant i$. Le corollaire s'en déduit par passage à la limite. De manière précise, notant d'_i la différentielle de E'_i, on définit E' par

$$E'^i = E^i \ , \ d'^i = d^i \quad \text{pour } i \geqslant n \ ,$$

et $$E'^i = (E'_i)^i \ , \ d'^i = (d'_i)^i \quad \text{pour } i < n \ ,$$

puis v et u' par

$$v^j = (v_i)^j \ , \ u'^j = (u'_i)^j \quad \text{pour } i \leqslant j \ ,$$

et l'on vérifie aussitôt que E', v, u' ainsi définis répondent à la question.

Autrement dit, en abrégé, on peut prolonger un n-quasi-isomorphisme en un quasi-isomorphisme "sans rien changer à ce qui est donné en degré $\geqslant n$".

2. Complexes pseudo-cohérents

2.0. Dans ce numéro, $\underline{S}$ désigne un site, S un objet de $\underline{S}$, $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate (1.1), $\underline{C}_o$ une sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$. On suppose que $\underline{C}_o$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (1.2) et localement quasi-relevable dans $\underline{C}$ (1.2).

Définition 2.1. *Soient* $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, E *un complexe de* $\underline{C}_X$, *et* $n \in \mathbb{Z}$. *Nous dirons que* E *est* strictement $\underline{C}_o$-n-pseudo-cohérent (resp. $\underline{C}_o$-pseudo-cohérent, resp. $\underline{C}_o$-parfait) *si* $E^i = 0$ *pour* i *assez grand et* $E^i \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oS}$ *pour* $i \geqslant n$ (*resp. pour tout* i, *resp. pour tout* i *et* $E^i = 0$ *pour presque tout* i).

Quand il n'y aura pas de confusion à craindre, nous dirons parfois "strictement n-pseudo-cohérent (resp...)" au lieu de "strictement $\underline{C}_o$-n-pseudo-cohérent (resp...)".

Lemme 2.1.1. *Soient* $E \in \mathrm{ob}\ C$ ($\underline{C}_S$) *et* $n \in \mathbb{Z}$. *Si* E *est strictement* n-pseudo-cohérent *et si* $H^i(E) = 0$ *pour* $i > n$, *alors* $H^n(E)$ *est de type fini.*

Preuve. La suite

$$0 \longrightarrow Z^n(E) \longrightarrow E^n \longrightarrow E^{n+1} \longrightarrow \ldots \longrightarrow 0$$

est exacte et $E^i \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_o$ pour $i \geqslant n$. Comme $\underline{C}_o$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme, il s'ensuit que $Z^n(E)$ est de type fini, donc aussi $H^n(E)$, qui en est un quotient.

Proposition 2.2. Soient $F \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Alors :

a) Si F est strictement n-pseudo-cohérent (relativement à $\underline{C}_0$) et si $u : E \longrightarrow F$ est un quasi-isomorphisme, l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $v : F' \longrightarrow E_X$ avec F' strictement n-pseudo-cohérent est un raffinement de S.

b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $u : E \longrightarrow F_X$ de $C(\underline{C}_X)$, avec E strictement n-pseudo-cohérent, est un raffinement de S ;

(i') même condition que (i), mais u étant un isomorphisme de $D(\underline{C}_X)$;

(ii) l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un n-quasi-isomorphisme (1.4.3) $u : E \longrightarrow F_X$ de $C(\underline{C}_X)$, avec E strictement parfait, est un raffinement de S ;

(ii') même condition que (ii), mais u étant un n-isomorphisme de $D(\underline{C}_X)$.

Démonstration. a) Il existe, pour un entier i assez grand, un i-quasi-isomorphisme $v_i : F'_i \longrightarrow E$, avec F'_i strictement n-pseudo-cohérent (prendre $F'_i = 0$). Montrons que, si $i > n$, il existe, quitte à raffiner S, un (i-1)-quasi-isomorphisme $v_{i-1} : F'_{i-1} \longrightarrow E$, avec F'_{i-1} strictement n-pseudo-cohérent.
D'après (1.4.4), il suffit de montrer que $H^{i-1}(M')$, où M' est le cône de v_i, est de $\underline{C}_0$-type fini. Or, si M" désigne le cône de uv_i, l'hypothèse que u est un quasi-isomorphisme et (1.4.2) impliquent que l'on a

$$H^j(M') \xrightarrow{\sim} H^j(M'') \qquad \text{pour tout } j$$

et $H^j(M') = 0$ pour $j \geqslant i$.

La formule du cône $M''^j = F'^{j+1}_i \oplus F^j$ montre d'autre part que M" est strictement (i-1)-pseudo-cohérent. Donc, en vertu de (2.1.1), $H^{i-1}(M'') = H^{i-1}(M')$ est de type fini, d'où notre assertion. On en déduit, par itération, et quitte à raffiner S, un n-quasi-isomorphisme $v_n : F'_n \longrightarrow E$, où F'_n est strictement n-pseudo-cohérent. Mais, d'après (1.4.5), on peut prolonger v_n en un quasi-isomorphisme $v : F' \longrightarrow E$ sans rien changer en degré $\geqslant n$, donc en particulier avec F' strictement n-pseudo-cohérent, ce qui prouve a).

b) L'équivalence des conditions (i) et (i') résulte aussitôt de a) et de la définition des isomorphismes de $D^-(\underline{C}_X)$. Si $E \in \mathrm{ob}\, D^-(\underline{C}_S)$ est strictement n-pseudo-cohérent, il existe une suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0 \quad ,$$

où E' est strictement parfait, et $E''^i = 0$ pour $i \geqslant n$; par suite $E' \longrightarrow E$ est un n-quasi-isomorphisme, d'où l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii). L'implication (ii) $\Rightarrow$ (ii') étant triviale, il reste à prouver (ii') $\Rightarrow$ (i). Soit donc $u : E \longrightarrow F$ un n-isomorphisme de $D^-(\underline{C}_S)$, avec E strictement parfait; u est donc défini par un diagramme de $C^-(\underline{C}_S)$



où s est un quasi-isomorphisme et u' un n-quasi-isomorphisme. En vertu de a), il existe, quitte à raffiner S, un quasi-isomorphisme $t : E'' \longrightarrow E'$, avec E" strictement n-pseudo-cohérent. On applique alors (1.4.5) pour prolonger $u't : E'' \longrightarrow F$ en un quasi-isomorphisme $E''' \longrightarrow F$ avec E"' strictement n-pseudo-cohérent, ce qui prouve (ii') $\Rightarrow$ (i) et achève la démonstration de (2.2).

Définition 2.3. Sous les hypothèses de (2.2), nous dirons que $F \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C}_S)$ est n-$\underline{C}_o$-pseudo-cohérent si F vérifie les conditions équivalentes b) de (2.2). Nous dirons que F est $\underline{C}_o$-pseudo-cohérent si F est n-$\underline{C}_o$-pseudo-cohérent pour tout n.

Quand cela ne pourra prêter à confusion, nous nous permettrons parfois de dire n-pseudo-cohérent, pseudo-cohérent, au lieu de n-$\underline{C}_o$-pseudo-cohérent, $\underline{C}_o$-pseudo-cohérent.

Remarque 2.3.1. Soit $F \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C}_S)$ un complexe pseudo-cohérent. L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $E \longrightarrow F_X$ avec E strictement pseudo-cohérent (2.1) n'est pas en général un raffinement de S. Toutefois, nous verrons plus tard (2.7. a) et Exp.II) des cas importants où il en est ainsi.

La démonstration de (2.2 a)) donne le résultat suivant :

Proposition 2.4. Soient $n,i \in \mathbb{Z}$, et soit $u : E \longrightarrow F$ un i-quasi-isomorphisme de $C(\underline{C}_S)$, avec F n-pseudo-cohérent et E strictement n-pseudo-cohérent. Alors, quitte à raffiner S, il existe un triangle commutatif de $C(\underline{C}_S)$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow_{u'} & \\ F & & \end{array} \quad ,$$

où E' est strictement n-pseudo-cohérent, u' un quasi-isomorphisme et v un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geqslant i$.

Proposition 2.5. a) Si $F \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C}_S)$ est n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent), $F[m]$ est $(n-m)$-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

b) Soit

(*)



un triangle distingué de $D(\underline{C}_S)$. Si E et G sont n-pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents), alors F est n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Preuve. a) Trivial à partir des définitions.

b) Il suffit bien entendu de démontrer l'assertion non respée.

Le triangle (*) peut encore s'écrire



.

D'après a), $G[-1]$ est (n+1)-pseudo-cohérent. On est donc ramené à prouver que, si E est (n+1)-pseudo-cohérent et F n-pseudo-cohérent, alors G est n-pseudo-cohérent. Quitte à se localiser, on peut supposer E (resp. F) strictement (n+1)-pseudo-cohérent (resp. n-pseudo-cohérent). La flèche $E \xrightarrow{u} F$ de $D^-(\underline{C}_S)$ est définie par un couple de flèches de $C^-(\underline{C}_S)$



,

où s est un quasi-isomorphisme. D'après (2.2 a)), il existe, quitte à localiser, un quasi-isomorphisme $t : E'' \longrightarrow E'$, où E" est strictement (n+1)-pseudo-cohérent. On est donc réduit au cas où u est définie par une

"vraie" flèche de $C^-(\underline{C}_S)$. L'assertion résulte alors des définitions et de la formule $C(u)^i = E^{i+1} \oplus F^i$, où $C(u)$ désigne le cône de u.

Scholie 2.6. Par "rotation" des triangles, on voit que des propriétés de pseudo-cohérence sur deux des objets du triangle (*) en impliquent une autre sur le troisième. On peut résumer les différents cas dans le tableau ci-dessous (les petites lettres désignent des degrés de pseudo-cohérence et chaque ligne correspond à une implication dont le but est souligné) :

E	F	G
n+1	n	<u>n</u>
n	<u>n</u>	n
<u>n</u>	n	n-1

.

Nous noterons $D(\underline{C})_{\underline{C}_o\text{-n-coh}}$ (resp. $D(\underline{C})_{\underline{C}_o\text{-coh}}$) la sous-catégorie fibrée strictement pleine de $D(\underline{C})$ dont la fibre en chaque $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$ est formée des objets de $D(\underline{C}_X)$ qui sont n-pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents) relativement à $\underline{C}_o$. La catégorie $D(\underline{C})_{\underline{C}_o\text{-coh}}$ est, en vertu de (2.5), une <u>sous-S-catégorie triangulée</u> de $D(\underline{C})$ (1.1).

<u>Proposition</u> 2.7 <u>Supposons que S soit un site ponctuel, donc</u> $\underline{C} = \underline{C}_S$, $\underline{C}_o = \underline{C}_{oS}$. <u>Alors</u> :

a) <u>Si</u> $F \in \mathrm{ob}\ D(\underline{C})$ <u>est pseudo-cohérent, il existe un quasi-isomorphisme</u> $E \longrightarrow F$, <u>avec E strictement pseudo-cohérent</u> (2.1).

b) <u>Désignons par</u> $K^{-,b}(\underline{C}_o)$ <u>la sous-catégorie triangulée pleine de</u> $K^-(\underline{C}_o)$ <u>formée des complexes acycliques. Le foncteur canonique</u>

$$K^-(\underline{C}_o)/K^{-,b}(\underline{C}_o) \longrightarrow D(\underline{C})$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(\underline{C})_{\underline{C}_o\text{-coh}}$.

Preuve. a) Soit $F \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C})_{\underline{C}_o\text{-coh}}$, et supposons construit un i-quasi-isomorphisme (de $C(\underline{C})$) $u_i : E_i \longrightarrow F$ avec E_i strictement pseudo-cohérent (c'est possible pour i assez grand avec $E_i = 0$). Soit G_i le cône de u_i. Il résulte de (1.4.2) et (2.1.1) que $H^{i-1}(G_i)$ est de $\underline{C}_o$-type fini. Donc, en vertu de (1.4.4), il existe un triangle commutatif de $C(\underline{C})$

$$\begin{array}{ccc} E_i & \xrightarrow{v_{i-1}} & E_{i-1} \\ {\scriptstyle u_i}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle u_{i-1}} & \\ F & & \end{array} \quad ,$$

où E_{i-1} est strictement pseudo-cohérent, u_{i-1} un (i-1)-quasi-isomorphisme, et v_{i-1} un monomorphisme induisant l'identité en degré $\geqslant i$. On en déduit par passage à la limite (cf. preuve de (1.4.5)) un quasi-isomorphisme $u : E \longrightarrow F$ avec E strictement pseudo-cohérent.

b) Appliquer le critère ([V] chap I § 2 4.2 b)(i)) et a).

Noter que la preuve de a) donne le résultat plus précis suivant, qui généralise (1.4.5) :

Proposition 2.7.1. Sous les hypothèses de (2.7), soit $u : E \longrightarrow F$ un n-quasi-isomorphisme de $C(\underline{C})$, avec F pseudo-cohérent et E strictement pseudo-cohérent. Il existe alors un triangle commutatif de $C(\underline{C})$

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{v} & E' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle u'} & \\ F & & \end{array} \quad ,$$

où E' est strictement pseudo-cohérent, u' un quasi-isomorphisme, et v un

monomorphisme induisant l'identité en degré $\geqslant n$.

Définition 2.8. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $F \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_S$. Nous dirons que F est de n-$\underline{C}_0$-présentation finie si l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$E^{-n} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^0 \longrightarrow F_X \longrightarrow 0 \quad ,$$

avec $E^i \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_{0X}$ pour $-n \leqslant i \leqslant 0$, est un raffinement de S. Nous dirons que F est d'∞-$\underline{C}_0$-présentation finie si F est de n-$\underline{C}_0$-présentation finie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Bien entendu, nous dirons parfois n-présentation finie tout court quand il n'y aura pas d'ambiguité possible sur $\underline{C}_0$.

Nous dirons "de présentation finie" pour "de 1-présentation finie", et "de type fini" pour "de 0-présentation finie", cette dernière notion coïncidant avec celle déjà introduite en (1.2).

Proposition 2.9. Soient $n \in \mathbb{N}$ et $F \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_S$. Conditions équivalentes :

(i) F est de n-présentation finie (resp. d'∞-présentation finie);

(ii) F est $(-n)$-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Dans le cas où S est un site ponctuel, F est pseudo-cohérent si et seulement s'il existe une suite exacte

$$\cdots \longrightarrow E^i \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^0 \longrightarrow F \longrightarrow 0 \quad ,$$

avec $E^i \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_0$ pour tout i.

Preuve. Pour l'équivalence (i)$\Leftrightarrow$(ii), il suffit évidemment de traiter le cas non respé. L'implication (i)$\Rightarrow$(ii) est immédiate sur les définitions, et

l'implication (ii)$\Rightarrow$(i) résulte aussitôt de (2.4) : la flèche $0 \longrightarrow F$ est un 1-quasi-isomorphisme, on en déduit (quitte à localiser) un quasi-isomorphisme $E \longrightarrow F$ avec E strictement n-pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geqslant 1$, i.e. une n-présentation finie de F. La deuxième assertion se démontre de manière analogue (utiliser (2.7.1)).

Proposition 2.10. a) Soient m, $n \in \mathbb{Z}$, avec $n \leqslant m$. Si $F \in \mathrm{ob}\, D^-(\underline{C}_S)$ est n-pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geqslant m$, il existe localement un quasi-isomorphisme $E \longrightarrow F$, avec E strictement n-pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geqslant m$. Si S est ponctuel, et F pseudo-cohérent et acyclique en degré $\geqslant m$, il existe un quasi-isomorphisme $E \longrightarrow F$ avec E strictement pseudo-cohérent et $E^i = 0$ pour $i \geqslant m$.

b) Soit $F \in \mathrm{ob}\, D^-(\underline{C}_S)$ acyclique en degré $> n$. Pour que F soit n-pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $H^n(F)$ soit de type fini.

Preuve. a) Comme F est acyclique en degré $\geqslant m$, la flèche $0 \longrightarrow F$ est un m-quasi-isomorphisme. L'assertion résulte de (2.4) et (2.7.1).

b) Il existe un triangle distingué de $D^-(\underline{C}_S)$:

$$F \xrightarrow{+1} F' \longrightarrow H^n(F)[-n] \quad ,$$

(pour le voir, commencer par tronquer F en remplaçant F^n par $Z^n(F)$ et F^i par 0 pour $i > n$). La suite exacte de cohomologie implique $H^i(F') = 0$ pour $i \geqslant n-1$, donc F' est (n-1)-pseudo-cohérent. On conclut grâce à (2.5) et (2.6).

Proposition 2.11. Soit $n \in \mathbb{Z}$.

a) Soit $F \in \mathrm{ob}\, C^-(\underline{C}_S)$. Si, pour tout $i \geqslant n$ (resp. pour tout i), F^i est de $(i-n)$-présentation finie (resp. d'∞-présentation finie), alors F est n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

b) Soit $F \in \mathrm{ob}\, D^-(\underline{C}_S)$. Si, pour tout $i \geqslant n$ (resp. pour tout i), $H^i(F)$ est de $(i-n)$-présentation finie (resp. d'∞-présentation finie), alors F est pseudo-cohérent.

Preuve. Il suffit de traiter les assertions non respées.

a) On raisonne par récurrence sur N tel que $F^i \neq 0$ pour $i > n+N$.

Si $N = 0$, l'assertion résulte aussitôt de (2.10 b)). Supposons $N \geqslant 1$. On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F^{n+N}[-n-N] \longrightarrow F \longrightarrow F' \longrightarrow 0 ,$$

Par hypothèse de récurrence, F' est n-pseudo-cohérent; d'autre part, $F^{n+N}[-n-N]$ est n-pseudo-cohérent par hypothèse (2.9 et 2.5.a)) ; donc, en vertu de (2.5.b)), F est n-pseudo-cohérent.

b) On raisonne par récurrence sur N tel que $H^i(F) = 0$ pour $i > n+N$.

Si $N = 0$, l'assertion résulte de (2.10 b)). Supposons $N \geqslant 1$. On a un triangle distingué de $D^-(\underline{C}_S)$ (cf. preuve de (2.10.b))):

$$\begin{array}{ccc} & & F' \\ & {\scriptstyle +1}\swarrow & \nwarrow \\ F & \longrightarrow & H^{n+N}(F)[-n-N] \end{array} .$$

La suite exacte de cohomologie implique

$$H^i(F') = 0 \text{ pour } i \geqslant n+N-1, \text{ i.e. } i > (n-1) + (N-1),$$

et $$H^i(F') \xrightarrow{\sim} H^{i+1}(F) \text{ pour } i < n+N-1 .$$

Par l'hypothèse de récurrence (appliquée pour n-1 au lieu de n), F' est donc (n-1)-pseudo-cohérent. D'autre part, $H^{n+N}(F)\ [-n-N]$ est n-pseudo-cohérent (2.9 et 2.5.a)). Donc, en vertu de (2.6), F est n-pseudo-cohérent.

Remarque 2.11.1. Si F est pseudo-cohérent, les F^i (resp. $H^i(F)$) ne sont pas en général pseudo-cohérents, ni même de type fini. Toutefois, nous verrons au paragraphe suivant, dans les sorites sur les notions de cohérence, des exemples importants où la pseudo-cohérence de F implique celle des $H^i(F)$.

Proposition 2.12. Soient F', F'' $\in$ ob $D(\underline{C}_S)$, et F = F' + F''. Pour que F soit n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) il faut et il suffit que F' et F'' soient n-pseudo-cohérents (resp. pseudo-cohérents).

Preuve. Il suffit de prouver l'assertion non respée. La suffisance est évidente, prouvons la nécessité. On peut supposer, par récurrence, qu'on a déjà démontré que F' et F'' sont (n+1)-pseudo-cohérents. Quitte à se localiser, on peut même supposer que F' et F'' sont strictement (n+1)-pseudo-cohérents et que F = F' + F'' dans $C^-(\underline{C}_S)$. Notons $F'_{>n}$ (resp. $F'_{\leq n}$) le complexe déduit de F' en remplaçant F'^i par 0 pour $i \leq n$ (resp. $i > n$), et de même $F''_{>n}$ (resp. $F''_{\leq n}$)... On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F'_{>n} + F''_{>n} \longrightarrow F \longrightarrow F'_{\leq n} + F''_{\leq n} \longrightarrow 0 .$$

$F'_{>n} + F''_{>n}$ est strictement parfait et F est n-pseudo-cohérent, donc (2.6) $F'_{\leq n} + F''_{\leq n}$ est n-pseudo-cohérent. Cela signifie, d'après (2.10 b)), que $H^n(F'_{\leq n} + F''_{\leq n})$ est de type fini. Mais on a

$$H^n(F'_{\leq n} + F''_{\leq n}) = H^n(F'_{\leq n}) + H^n(F''_{\leq n}) \quad ,$$

donc $H^n(F'_{\leq n})$ (resp. $H^n(F''_{\leq n})$) est de type fini, donc à nouveau grâce à (2.10.b)) $F'_{\leq n}$) (resp. $F''_{\leq n}$) est n-pseudo-cohérent. Appliquant (2.5) à la suite exacte

$$0 \longrightarrow F'_{>n} \longrightarrow F' \longrightarrow F'_{\leq n} \longrightarrow 0 \quad ,$$

(resp....), on en déduit que F' (resp. F") est n-pseudo-cohérent, cqfd.

Proposition 2.13. Soit $(\underline{S}', \underline{C}', \underline{C}'_o)$ un trio satisfaisant aux mêmes hypothèses (2.0) que $(\underline{S}, \underline{C}, \underline{C}_o)$. Soit $f : \underline{S}' \longrightarrow \underline{S}$ un morphisme de sites ([G] I 1.4), correspondant à un foncteur sous-jacent $f^{-1} : \underline{S} \longrightarrow \underline{S}'$, et soit $u : D^*(\underline{C}) \longrightarrow D^*(\underline{C}')$ $(* = +,-,\emptyset)$ un foncteur cartésien au-dessus de f, i.e. un $\underline{S}$-foncteur cartésien $D^*(\underline{C}')\ x_{\underline{S}',\underline{S}} \longleftarrow D^*(\underline{C})$. On suppose que u est exact sur chaque fibre et qu'il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que les conditions suivantes soient vérifiées pour tout $S \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$:

(i) si $E \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oS}$, u(E) est a-$\underline{C}'_o$-pseudo-cohérent (resp. $\underline{C}'_o$-pseudo-cohérent)

(ii) si $F \in \mathrm{ob}\ D^*(\underline{C}_S)$ est acyclique en degré > 0, u(F) est acyclique en degré $> b$.

Alors, si $F \in \mathrm{ob}\ D^*(\underline{C}_S)$ est m-pseudo-cohérent rel. à $\underline{C}_o$ et acyclique en degré $> n$, $u(F) \in \mathrm{ob}\ D^*(\underline{C}'_{S'})$ (où $S' = f^{-1}(S)$) est $\sup(m+b, n+a)$-pseudo-cohérent (rel. à $\underline{C}'_o$) (resp. (m+b)-pseudo-cohérent) et acyclique en degré $> n+b$.

En particulier, dans le cas respé, si $F \in \mathrm{ob}\ D^*(\underline{C}_S)$ est pseudo-cohérent (rel. à $\underline{C}_o$), u(F) est pseudo-cohérent (rel. à $\underline{C}'_o$).

Preuve. On peut se borner au cas non respé. Montrons d'abord que si $F \in \mathrm{ob}\ D^*(\underline{C}_S)$ est strictement parfait (2.1) et tel que $F^i = 0$ pour $i > n$, alors u(F) est (n+a)-$\underline{C}'_o$-pseudo-cohérent. Raisonnons par récurrence sur le nombre N d'indices i tels que $F^i \neq 0$. Si N = 1,

on a $F = F^{p}[-p]$ pour un $p \leqslant n$, donc $u(F)$ est $(p+a)$-$\underline{C}'_{o}$-pseudo-cohérent, donc a fortiori $(n+a)$-pseudo-cohérent. Si $N > 1$, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0 \quad ,$$

où F' et F'' sont strictement parfaits de longueur $\leqslant N-1$ et tels que $F'^{i} = F''^{i} = 0$ pour $i > n$. Appliquant (2.5.b)) au triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & & u(F'') \\ & {\scriptstyle +1}\swarrow & \nwarrow \\ u(F') & \longrightarrow & u(F) \end{array} \quad ,$$

on déduit de l'hypothèse de récurrence que $u(F)$ est $(n+a)$-pseudo-cohérent.

Passons maintenant au cas général : F m-$\underline{C}_{o}$-pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n$. Quitte à localiser, on peut, grâce à (2.10.a)), supposer F strictement m-pseudo-cohérent et tel que $F^{i} = 0$ pour $i > n$. On a alors une suite exacte

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0 \quad ,$$

où F'' est nul en degré $\geqslant m$ et F' strictement parfait et nul en degré $> n$. Dans le triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & & u(F'') \\ & {\scriptstyle +1}\swarrow & \nwarrow \\ u(F') & \longrightarrow & u(F) \end{array} \quad ,$$

$u(F'')$ est acyclique en degré $\geqslant m+b$, donc $(m+b)$-pseudo-cohérent, et $u(F')$ est $(n+a)$-pseudo-cohérent d'après ce qu'on a vu. On conclut par (2.5.b)).

Corollaire 2.14. Soit $\underline{C}_{1}$ une sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ telle que $\underline{C}_{o} \subset \underline{C}_{1} \subset \underline{C}$. On suppose que tout objet de $\underline{C}_{1}$ est $\underline{C}_{o}$-pseudo-cohérent.

Alors :

(i) $\underline{C}_1$ est localement quasi-relevable dans $\underline{C}$ (1.2) et localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (1.2).

(ii) Soient $S \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$ et $F \in \mathrm{ob}\ D(\underline{C}_S)$. Pour que F soit n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à $\underline{C}_1$, il faut et il suffit qu'il le soit relativement à $\underline{C}_0$.

Preuve. (i) Soit $E \longrightarrow F$ un épimorphisme de $\underline{C}_{S'}$ avec $F \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{1S}$. Comme F est $\underline{C}_0$-pseudo-cohérent (donc a fortiori de $\underline{C}_0$-type fini), il existe (quitte à localiser) un épimorphisme $E' \longrightarrow F$ avec $E' \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{0S}$. Utilisant la quasi-relevabilité de $\underline{C}_0$ dans $\underline{C}$, on peut supposer (quitte à localiser à nouveau) que celui-ci se factorise à travers E, d'où la quasi-relevabilité de $\underline{C}_1$. D'autre part, si $E \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_S$ admet une résolution droite finie par des objets de $\underline{C}_1$, E est $\underline{C}_0$-pseudo-cohérent en vertu de (2.11.a)), donc a fortiori de $\underline{C}_1$-type fini.

(ii) Il suffit de prouver la nécessité. On peut pour cela appliquer, au choix, (2.11.a)) ou (2.13) avec $\underline{S}' = \underline{S}$, $\underline{C}' = \underline{C}$, f = Identité, u = Identité, $\underline{C}'_0$ et $\underline{C}_0$ remplacées respectivement par $\underline{C}_0$ et $\underline{C}_1$).

Scholie 2.14.1. Il existe donc une plus grande sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ donnant la même notion de n-pseudo-cohérence (resp. pseudo-cohérence) que $\underline{C}_0$, à savoir la catégorie formée des objets $\underline{C}_0$-pseudo-cohérents. Cette dernière est localement stable par noyau d'épimorphisme.

Exemple 2.15. Soient $(\underline{S},A)$ un topos annelé et $\underline{C}$, $\underline{C}_0$ les $\underline{S}$-catégories envisagées en (1.3.d)). La catégorie fibrée $D(\underline{C})$ sera souvent notée $D(\underline{S},A)$, ou $D({}_A\underline{S})$ (pour

suggérer qu'il s'agit de A-Modules à gauche), ou même $D(\underline{S})$ s'il n'y a pas d'ambiguité sur A. On notera S l'objet final de $\underline{S}$ et posera $D(\underline{C}_S) = D({}_A S)$ (ou $D(S)$). Un objet de $D(\underline{S})$ sera dit n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) s'il est n-$\underline{C}_o$-pseudo-cohérent (resp. $\underline{C}_o$-pseudo-cohérent) (itou pour les notions strictes). La catégorie fibrée $D(\underline{C})_{n\text{-}\underline{C}_o\text{-coh}}$ (resp. $D(\underline{C})_{\underline{C}_o\text{-coh}}$) (2.6) sera notée $D({}_A\underline{S})_{n\text{-coh}}$ (resp. $D({}_A\underline{S})_{coh}$). On observera qu'en vertu de (2.14) on obtient la même notion de pseudo-cohérence si l'on remplace $\underline{C}_o$ par la $\underline{S}$-catégorie $\underline{C}_1$ définie par $U \longmapsto$ (catégorie des A_U-Modules à gauche localement facteurs directs de Modules libres de type fini). Si un A-Module M est facteur direct d'un A-Module libre de type fini, il ne s'ensuit pas, en général, que M est localement libre de type fini. On a cependant :

Lemme 2.15.1. Supposons que $\underline{S}$ vérifie l'une des deux hypothèses suivantes :

(i) $\underline{S}$ "a assez de points" (SGA 4 IV 6.4) et pour tout point s de $\underline{S}$ les A_s-modules (à gauche) projectifs de type fini sont libres, cette dernière condition étant réalisée par exemple (BOURBAKI Alg. Comm. chap. II § 3 n° 2 cor.2 de la prop. 5) si $A_s/\text{radical}(A_s)$ est un corps ou si $\text{radical}(A_s)$ est nilpotent.

(ii) $(\underline{S},A)$ est un topos "localement annelé" au sens de [1] , ce qui signifie que A est commutatif et que pour tout $X \in \text{ob } \underline{S}$ et tout $f \in \Gamma(X,A)$ on a $X = X_f \cup X_{1-f}$, où X_f (resp. X_{1-f}) désigne le plus grand sous-objet de X où f (resp. 1-f) est inversible.

Alors tout facteur direct d'un A-module (à gauche) libre de type fini est localement libre de type fini.

Preuve. Supposons (i). On remarque d'abord que si E et F sont deux A-Modules, E étant de présentation finie, la flèche canonique

$$\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)_s \longrightarrow \mathrm{Hom}(E_s,F_s)$$

est un isomorphisme pour tout point s de $\underline{S}$. Il en résulte que si E et F sont tous deux de présentation finie, et si $E_s \simeq F_s$ en un point s de $\underline{S}$, alors il existe un objet s-ponctué U de $\underline{S}$ (*) tel que $E|U \simeq F|U$. La conclusion en découle aussitôt.

Supposons (ii). Soit $n \in \mathbb{N}$, notons $\mathbb{D}^n$ le foncteur sur la catégorie des topos localement annelés (appartenant à un univers fixé...) défini par $T \longmapsto \Gamma(T,\underline{O}_T)^n$. On sait [1] que le foncteur $\underline{\mathrm{End}}_{\mathbb{D}}(\mathbb{D}^n)$ est représenté par $M_n = \mathrm{Spec}\mathbb{Z}[T_{ij}]$ $(1 \leqslant i \leqslant n,\ 1 \leqslant j \leqslant n)$ muni de l'endomorphisme U_n de $(\underline{O}_{M_n})^n$ défini par la matrice (T_{ij}). Soit maintenant $p : A^n \longrightarrow A^n$ un projecteur, montrons que $p(A^n)$ est localement libre de type fini. D'après ce qu'on vient de dire, il existe un morphisme $s : \underline{S} \longrightarrow M_n$ de topos localement annelés tel que $s^*(u_n) = p$. On peut interpréter s comme un point de M_n à valeurs dans $\Gamma(S,A)$, i.e. une matrice d'ordre n à coefficients dans $\Gamma(S,A)$; comme cette dernière est un projecteur, s se factorise à travers le sous-schéma fermé $i : P_n \longrightarrow M_n$ correspondant aux projecteurs en $\underline{S} \xrightarrow{s'} P_n \xrightarrow{i} M_n$. On a donc $p = s'^*\, i^*(u_n)$, et l'on gagne, car d'après l'assertion sous l'hypothèse (i), l'image de $i^*(u_n)$ est un faisceau localement libre de type fini.

Corollaire 2.16. Soit $f : (\underline{S}',A') \longrightarrow (\underline{S},A)$ un morphisme de topos annelés (défini par un foncteur $f^{-1} : \underline{S} \longrightarrow \underline{S}'$ et un morphisme de faisceaux d'anneaux $f^{-1}(A) \longrightarrow A'$). Notons $D(_{A'}\underline{S}'_A)$ la catégorie dérivée de celle des A'-A-biModules (à gauche sur A', à droite sur A), et

$$\overset{\mathbb{L}}{\otimes}_A : D^-(_{A'}\underline{S}'_A) \underset{\underline{S}'}{\times} D^-(_A\underline{S}) \longrightarrow D^-(_{A'}\underline{S}')$$

(*) i.e. tel que s se factorise à travers $\underline{S}_{/U}$.

I

le foncteur dérivé du produit tensoriel $(E',E) \longmapsto E' \otimes_{f^{-1}(A)} f^{-1}(E)$.

Soient $X \in$ ob $\underline{S}$, $X' = u(X)$, $E' \in$ ob $D^-({}_{A'}X'_A)$, $E \in$ ob $D^-({}_AX)$. Alors si E' est m'-pseudo-cohérent (comme objet de $D^-({}_{A'}\underline{S}')$) et acyclique en degré $> n'$ et si E est m-pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n$, $E' \overset{L}{\otimes}_A E$ est $\sup(m+n', m'+n)$-pseudo-cohérent et acyclique en degré $> n+n'$.

Preuve. Quitte à remplacer $\underline{S}$ par $\underline{S}_{/X}$, on peut supposer $X = S$, et l'on applique (2.13) avec $u = E' \overset{L}{\otimes}_A : D^-({}_A\underline{S}) \longrightarrow D^-({}_{A'}\underline{S}')$. Soient $U \in$ ob $\underline{S}$, $U' = f^{-1}(U)$, E un complexe de A_U-Module à gauche. Si E est acyclique en degré $> n$, $E' \overset{L}{\otimes}_A E$ est acyclique en degré $> n+n'$ (définition de $\overset{L}{\otimes}_A$) ; d'autre part si $E = (A_U)^p$, on a $E' \overset{L}{\otimes}_A E = (E'|U')^p$, qui est m'-pseudo-cohérent par hypothèse (et (2.12)). Les conditions de (2.13) sont donc bien vérifiées, avec $a = m'$, $b = n'$, d'où la conclusion.

En particulier :

Corollaire 2.16.1. Sous les hypothèses de (2.16), on a :

a) Le foncteur $\mathbb{L}f^* : D^-({}_A\underline{S}) \longrightarrow D^-({}_{A'}\underline{S}')$ (qui n'est autre que le foncteur $A' \overset{L}{\otimes}_A$) induit un foncteur

$$\mathbb{L}f^* : D^-({}_A\underline{S})_{coh} \longrightarrow D^-({}_{A'}\underline{S}')_{coh}$$

(notation de (2.6)).

b) Si A est commutatif, le foncteur $\overset{L}{\otimes}_A : D^-(\underline{S}) \times_{\underline{S}} D^-(\underline{S}) \longrightarrow D^-(\underline{S})$ induit un foncteur

$$\overset{L}{\otimes}_A : D^-(\underline{S})_{coh} \times_{\underline{S}} D^-(\underline{S})_{coh} \longrightarrow D^-(\underline{S})_{coh} \quad .$$

III

Exercice 2.16.2. Soient $\underline{S}$ un topos, et $A \longrightarrow A'$ un morphisme d'Anneaux de $\underline{S}$. On fait l'une des hypothèses suivantes :

(i) $A \longrightarrow A'$ est surjectif de noyau un Idéal nilpotent

(ii) le foncteur $A' \otimes_A -$ sur la catégorie des A-modules à gauche est exact et fidèle.

Montrer que $E \in \mathrm{ob}\, D^-(_A\underline{S})$ est n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) si et seulement si $A' \overset{L}{\otimes}_A E \in \mathrm{ob}\, D^-(_{A'}\underline{S})$ est n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent).

Indications : Montrer d'abord qu'un A-Module à gauche L est de type fini si et seulement si $A' \otimes_A L$ l'est (cf. Bourbaki, Alg. commutative, chap. I, § 3, prop. 11 et chap. II, § 3, prop. 4), puis se ramener à ce cas par troncature, en utilisant (2.5) et (2.10 b)).

3. Lien avec la notion classique de cohérence

3.0. Les hypothèses et les notations sont celles de (2.0), à cela près qu'on ne suppose plus $\underline{C}_o$ localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme.

Définition 3.1. Soit $F \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_S$. Nous dirons que F est précohérent (relativement à $\underline{C}_o$) (*) si, pour tout U au-dessus de S et tout morphisme $u : E \longrightarrow F|U$ où $E \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_{oU}$, $\mathrm{Ker}(u)$ est de $\underline{C}_o$-type fini (1.2). Nous dirons que F est cohérent (relativement à $\underline{C}_o$) si F est précohérent et de type fini.

Remarque 3.2. Soit $F \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_S$. Il est clair, sur les définitions, que si F est précohérent (resp. de type fini) alors tout sous-objet (resp. quotient) de F est précohérent (resp. de type fini).

Lemme 3.3 a) Soit

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H$$

(*) Nous introduisons cette notion ici à titre d'intermédiaire technique, la seule notion à retenir est celle de cohérence.

une suite exacte de $\underline{C}_S$. Si G est de type fini et H précohérent, F est de type fini.

b) Soit

$$F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\underline{C}_S$. Si F est de type fini et G précohérent, H est précohérent.

c) Soit

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\underline{C}_S$. Si F et H sont précohérents (resp. de type fini), G l'est aussi.

Preuve. a) Quitte à localiser, on a un épimorphisme $G' \longrightarrow G$ avec $G' \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_0$. D'où un diagramme commutatif dont les lignes sont exactes

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & H \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \mathrm{Id} \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H \end{array} .$$

F' est de type fini puisque H est précohérent, mais $F' \longrightarrow F$ est un épimorphisme, donc F est de type fini.

b) Soient U au-dessus de S, et $H' \xrightarrow{f} H|U$ un morphisme de $\underline{C}_U$ avec $H' \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{0U}$. Quitte à changer les notations, on peut supposer U = S. Grâce à la quasi-relevabilité de $\underline{C}_0$ dans $\underline{C}$, il existe (quitte à localiser) un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{p} & H' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ G & \longrightarrow & H \end{array} ,$$

où les flèches horizontales sont des épimorphismes et $G' \in \text{ob } \underline{C}_0$. Comme Ker(f) est quotient de Ker(fp), il suffit de démontrer que Ker(fp) est de type fini, donc on peut supposer que $H' = G'$. Les flèches $F \longrightarrow G$ et $H' \longrightarrow G$ définissent $g : F \oplus H' \longrightarrow G$. Posant $K = \text{Ker}(G \longrightarrow H)$, on a donc un diagramme commutatif, où les lignes sont exactes et q est un épimorphisme :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & F \oplus H' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & q \downarrow & & \downarrow g & & \downarrow f & & \\ 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0 \end{array} .$$

Le diagramme du serpent montre que $\text{Ker}(g) \longrightarrow \text{Ker}(f)$ est un épimorphisme. Mais, comme $F \oplus H'$ est de type fini et G précohérent, Ker(g) est de type fini d'après a), et l'on gagne.

c) Prouvons d'abord l'assertion non respée. A un changement de notation près, il s'agit de montrer que si $g : G' \longrightarrow G$ est un morphisme de $\underline{C}_S$ avec $G' \in \text{ob } \underline{C}_0$, Ker(g) est de type fini. Notant H' l'image de la flèche composée $G' \longrightarrow H$, on a un diagramme commutatif dont les lignes sont exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & f \downarrow & & \downarrow g & & \downarrow h & & \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0 \end{array} .$$

Comme h est un monomorphisme, le diagramme du serpent donne un isomorphisme $\text{Ker}(f) \xrightarrow{\sim} \text{Ker}(g)$. Mais F' est de type fini d'après a), donc (à nouveau grâce à a)) Ker(f) est de type fini, ce qui prouve l'assertion non respée. Passons à l'assertion respée (en toute rigueur on ne peut invoquer (2.5 b)) car on ne suppose pas que $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme). Quitte à localiser, il existe des épimorphismes $F' \xrightarrow{u} F$, $H' \xrightarrow{v} H$, avec

$F' \in \text{ob } \underline{C}_0$, $H' \in \text{ob } \underline{C}_0$. Quitte à localiser davantage, on peut supposer que v se factorise à travers G, d'où un diagramme commutatif à lignes exactes

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & F' \oplus H' & \longrightarrow & H' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow u & & \downarrow w & & \downarrow v & & \\ 0 & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 0 \end{array} .$$

Comme u et v sont des épimorphismes, w aussi, et l'on gagne. Cela termine la démonstration de (3.3).

On en déduit immédiatement le

Corollaire 3.4. La sous-catégorie (strictement) pleine de $\underline{C}_S$ formée des objets cohérents est stable par limites projectives (resp. inductives) finies. En particulier le noyau, le conoyau, l'image d'une flèche entre deux objets cohérents sont cohérents. Soit

$$E^0 \longrightarrow E^1 \longrightarrow E^2 \longrightarrow E^3 \longrightarrow E^4$$

une suite exacte de $\underline{C}_S$. Si E^0, E^1, E^3, E^4 sont cohérents, E^2 aussi.

Corollaire 3.5. Supposons que les objets de $\underline{C}_0$ sont $\underline{C}_0$-cohérents (ce qui implique en particulier que $\underline{C}_0$ est localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme, i.e. qu'on est sous les conditions de (2.0)).

a) Conditions équivalentes sur $F \in \text{ob } \underline{C}_S$:

(i) F est de présentation finie ;

(ii) F est cohérent ;

(iii) F est d'∞-présentation finie (2.8).

b) Soient $F \in \text{ob } D^-(\underline{C}_S)$, $n \in \mathbb{Z}$. On a :

F n-pseudo-cohérent $\iff$ $H^i(F)$ cohérent pour $i \geqslant n+1$,

et $H^n(F)$ de type fini .

En particulier, pour que F soit pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $H^n(F)$ soit cohérent pour tout n.

Preuve. L'assertion a) et l'implication $\Rightarrow$ de b) résultent trivialement de (3.4). L'implication $\Leftarrow$ de b) découle aussitôt de a) et (2.11.b)).

Exemples 3.6. Soient $(\underline{S},A)$ un topos annelé, $\underline{C}$, $\underline{C}_0$ les $\underline{S}$-catégories de (1.3.d)) (cf. aussi (2.15)). Pour que les objets de $\underline{C}_0$ soient cohérents, il faut et il suffit que A soit cohérent (i.e. précohérent). Voici des exemples où il en est ainsi :

- A est constant de valeur un anneau noethérien à gauche (SGA 4 IX 2.1).
- $\underline{S}$ est le topos des faisceaux d'ensembles (pour la topologie de Zariski) sur un schéma localement noethérien S (*), et $A = \underline{O}_S$.
- $\underline{S}$ est le topos des faisceaux d'ensembles sur un espace analytique complexe S, $A = \underline{O}_S$.

En revanche, le faisceau des fonctions continues complexes sur un espace topologique n'est en général pas cohérent.

Bien entendu, si $(\underline{S},A)$ est défini par un espace annelé, la notion de cohérence envisagée ici coïncide avec la notion usuelle de Serre (EGA O_I 5.3.1).

Proposition 3.7. a) Soit $f : (\underline{S}',A') \longrightarrow (\underline{S},A)$ un morphisme de topos annelés. On suppose f plat à droite, i.e. que le foncteur $f^* = A' \otimes_A .$ est exact. Il existe, pour $F \in \mathrm{ob}\, D(_AS)$, $G \in \mathrm{ob}\, D^+(_AS)$, une flèche canonique fonctorielle :

$$f^* \mathbf{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,G) \longrightarrow \mathbf{R}\underline{\mathrm{Hom}}(f^*(F), f^*(G)) \quad .$$

(*) Conformément aux nouvelles conventions, nous dirons "schéma" pour "préschéma", et "schéma séparé" pour "schéma".

Celle-ci est un isomorphisme lorsque F est pseudo-cohérent.

b) Supposons A commutatif et cohérent, et soient $F \in \mathrm{ob}\, D^-(S)$, $G \in \mathrm{ob}\, D^+(S)$. Si $\underline{H}^i(F)$ et $\underline{H}^i(G)$ sont cohérents pour tout i, il en est de même de $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F,G)$.

Preuve. a) Pour définir la flèche (cf. SGA 4 XVII), on peut supposer G à composantes injectives, et l'on prend la flèche composée

$$f^*\,\underline{\mathrm{Hom}}(F,G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(f^*F,f^*G) \longrightarrow \mathbb{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(f^*F,f^*G)\ .$$

Montrons qu'elle est un isomorphisme pour F pseudo-cohérent. Notons pour abréger T (resp. T') le foncteur $f^*\,\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(.,G)$ (resp. $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(f^*.,f^*G)$), et soit $a \in \mathbb{Z}$ tel que $H^i(G) = 0$ pour $i < a$. Il est clair que l'on a $TA \xrightarrow{\sim} T'A$, donc, par dévissage, $TF \xrightarrow{\sim} T'F$ pour F strictement parfait (2.1). D'autre part, si F est acyclique en degré $> n$, TF et T'F sont acycliques en degré $< a-n$. Pour vérifier que $TF \xrightarrow{\sim} T'F$ pour F pseudo-cohérent, on peut, la question étant locale, supposer F strictement n-pseudo-cohérent, i.e. que l'on a un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & F'' & \\ {\scriptstyle +1}\swarrow & & \nwarrow \\ F' & \longrightarrow & F \end{array}\ ,$$

avec F' strictement parfait et F'' acyclique en degré $> n-1$. On en déduit un morphisme de triangles distingués

$$\begin{array}{ccc} & TF'' & \\ {\scriptstyle -1}\nearrow & & \searrow \\ TF' & \longleftarrow & TF \end{array} \longrightarrow \begin{array}{ccc} & T'F'' & \\ {\scriptstyle -1}\nearrow & & \searrow \\ T'F' & \longleftarrow & T'F \end{array}\ .$$

Or $TF' \xrightarrow{\sim} T'F'$ puisque F' est strictement parfait, et TF'' et T'F'' sont

acycliques en degré $\leqslant a-n$; écrivant le morphisme induit sur les suites exactes de cohomologie des triangles précédents, on en déduit que $TF \longrightarrow T'F$ induit un isomorphisme $H^i(TF) \xrightarrow{\sim} H^i(T'F)$ pour $i \leqslant a-n$. Comme on peut choisir n arbitrairement grand négatif, on a gagné.

b) La démonstration est laissée en exercice au lecteur : voir par exemple ([H] II 3.3).

Remarque 3.7.1. On verra plus bas (7.1.2) un autre cas de "compatibilité" de $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}$ avec $\mathbb{L}f^*$.

Corollaire 3.7.2. (cf. EGA 0_I 5.2.7). Soient (S,A) un topos annelé, s un point de S (SGAA VIII 7.8), $E, F \in \mathrm{ob}\, D^b({}_AS)_{coh}$. Si $E_s \xrightarrow{\sim} F_s$, il existe un objet o-ponctué U de S tel que $E|U \xrightarrow{\sim} F|U$.

Preuve. Soient $\alpha : E_s \longrightarrow F_s$ et $\beta : F_s \longrightarrow E_s$ des isomorphismes réciproques. D'après (2.22 a)), on a

$$\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)_s \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E_s,F_s) \qquad (\text{resp. } \underline{\mathrm{Hom}}(F,E)_s \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(F_s,E_s)\ ).$$

Il existe donc un "voisinage" U de s et une section u (resp. v) de $\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)$ (resp. $\underline{\mathrm{Hom}}(F,E)$) au-dessus de U telle que $u_s = \alpha$ (resp. $v_s = \beta$). Les homomorphismes $vu : E|U \longrightarrow E|U$ et $uv : F|U \longrightarrow F|U$ induisent l'identité en s, donc sur un V convenable au-dessus de U, cqfd.

4. Complexes parfaits

4.0. Dans ce numéro, $\underline{S}$ désigne un site, S un objet de $\underline{S}$, $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate et $\underline{C}_o$ une sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ (1.1). Sauf mention du contraire, on suppose $\underline{C}_o$ localement relevable dans $\underline{C}$ et localement stable par noyau d'épimorphisme (1.2).

Lemme 4.1 (*). *Soit* $u : E \longrightarrow F$ *une flèche de* $C(\underline{C}_S)$. *Si* E *est strictement* $\underline{C}_o$*-parfait* (2.1) *et* F *acyclique, alors* u *est localement homotope à zéro.*

Preuve. Il s'agit de construire localement une homotopie k telle que $u = dk + kd$. Comme E est strictement parfait, il existe a, $b \in \mathbb{Z}$, avec $a \leqslant b$, tels que $E^i = 0$ pour $i \notin [a,b]$. On peut donc prendre $k^i = 0$ pour $i \notin [a,b]$. On construit ensuite k^i pour $i \geqslant a$ par récurrence descendante sur i. Supposons construit $k^i : E^i \longrightarrow F^{i-1}$, de manière que $u^i = k^{i+1}d_E^i + d_F^{i-1}k^i$ pour $i \geqslant n > a$, et montrons que, quitte à localiser, il existe $k^{n-1} : E^{n-1} \longrightarrow F^{n-2}$ tel que $u^{n-1} = k^n d_E^{n-1} + d_F^{n-2}k^{n-1}$. Par l'hypothèse de récurrence, la flèche

$$v^{n-1} = u^{n-1} - k^n d_E^{n-1} : E^{n-1} \longrightarrow F^{n-1}$$

se factorise à travers $Z^{n-1}(F)$. Mais $Z^{n-1}(F) = B^{n-1}(F)$ puisque F est acyclique. Comme $\underline{C}_o$ est localement relevable dans $\underline{C}$, il s'ensuit que, quitte à localiser, il existe $k^{n-1} : E^{n-1} \longrightarrow F^{n-2}$ tel que $v^{n-1} = d_F^{n-2}k^{n-1}$, cqfd.

Corollaire 4.2. *Soit*

$$\begin{array}{ccc} & & P \\ & & \downarrow v \\ E & \xrightarrow{f} & F \end{array}$$

(*) Ce lemme a été communiqué au rédacteur par D. Ferrand.

un diagramme de $C(\underline{C}_S)$, où P est strictement $\underline{C}_o$-parfait et f un quasi-isomorphisme. L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une flèche $u : P_X \longrightarrow E_X$ de $C(\underline{C}_X)$ telle que le diagramme



soit commutatif dans $K(\underline{C}_X)$ est un raffinement de S.

Preuve. Soit G le cône de f. On a la suite exacte

$$\longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\underline{C}_S)}(P,E) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\underline{C}_S)}(P,F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\underline{C}_S)}(P,G) \longrightarrow .$$

Comme G est acyclique, l'image de v dans $\mathrm{Hom}_{K(\underline{C}_S)}(P,G)$ est localement nulle d'après (4.1). Donc, quitte à localiser, il existe $u : P \longrightarrow E$ tel que $v = fu$ dans $K(\underline{C}_S)$, cqfd.

Corollaire 4.3. Soit $f : E \longrightarrow F$ un quasi-isomorphisme de $C(\underline{C}_S)$, avec F strictement parfait (relativement à $\underline{C}_o$). L'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme $g : F_X \longrightarrow E_X$ tel que $f_X g$ soit homotope à Id_{F_X} est un raffinement de S.

Preuve. C'est un cas particulier de (4.2).

Scholie 4.4. Soit F $\in$ ob $K(\underline{C}_S)$. On peut définir (par exemple à l'aide d'un clivage de $\underline{C}$ (SGA 1 VI 7.1)) une catégorie $(\underline{Qis}/F)$ fibrée sur $\underline{S}/S$, dont la fibre en X au-dessus de S est la catégorie $(Qis/F_X)^\circ$ (opposée de la catégorie des quasi-isomorphismes de but F_X). On peut alors exprimer (4.3) en disant que,

si F est strictement parfait, la flèche Id_F est localement cofinale dans (Qis/F).

Notation 4.5. Soit $\underline{M}$ une $\underline{S}$-catégorie fibrée. Soient $X \in ob\ \underline{S}$, et E, $F \in ob\ \underline{M}_X$. Nous noterons $\underline{Hom}_{\underline{M}}(E,F)$ le faisceau sur $\underline{S}/X$ associé au préfaisceau des $\underline{S}$-morphismes de E dans F dans $\underline{M}$ (pour la définition de ce préfaisceau, voir [G] I 2.6 ; on prendra garde que, même si $\underline{C}$ est un champ ([G]), le préfaisceau correspondant pour $\underline{M} = K(\underline{C})$ (ou $D(\underline{C})$) n'est pas en général un faisceau).

Corollaire 4.6. *Soient E, $F \in ob\ C(\underline{C}_S)$, E étant strictement parfait. La flèche canonique*

$$\underline{Hom}_{K(\underline{C})}(E,F) \longrightarrow \underline{Hom}_{D(\underline{C})}(E,F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. C'est une conséquence immédiate de (4.4) et de la formule

$$Hom_{D(\underline{C}_X)}(E_X,F_X) = \varinjlim_{(Qis/E_X)^o} Hom_{K(\underline{C}_X)}(\cdot\ ,\ F_X)$$

pour X au-dessus de S.

Définition 4.7. *Soit $F \in ob\ D(\underline{C}_S)$ et soient a, $b \in \mathbb{Z}$ tels que $a \leq b$. Nous dirons que F est d'amplitude $\underline{C}_0$-parfaite contenue dans l'intervalle $[a,b]$, et nous écrirons*

$$\underline{C}_0\text{-parf-amp}(F) \subset [a,b] \quad ,$$

si l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe un quasi-isomorphisme

$F' \longrightarrow F$ de $C(\underline{C}_X)$ avec F' strictement $\underline{C}_o$-parfait (2.1), et tel que $F'^i = 0$ pour $i \notin [a,b]$, est un raffinement de S. (En vertu de (4.3) cette condition équivaut à celle obtenue en remplaçant l'expression "quasi-isomorphisme de $C(\underline{C}_X)$" par "isomorphisme de $D(\underline{C}_X)$".) Nous dirons que F est d'amplitude $\underline{C}_o$-parfaite finie s'il existe des entiers a et b tels que $\underline{C}_o$-parf-amp$(F) \subset [a,b]$. Nous dirons que F est $\underline{C}_o$-parfait si F est localement d'amplitude $\underline{C}_o$-parfaite finie (*).

Exemple 4.8. Soient $(\underline{S},A)$ un topos annelé, $\underline{C}$ la $\underline{S}$-catégorie définie par $U \longmapsto$ (catégorie des A_U-Modules à gauche), $\underline{C}_o$ la sous-$\underline{S}$-catégorie définie par $U \longmapsto$ (catégorie des A_U-Modules à gauche facteurs directs de Modules libres de type fini). Le couple $(\underline{C},\underline{C}_o)$ satisfait, d'après (1.3.1), aux hypothèses (4.0). Un objet F de $D({}_A\underline{S})$ (cf.(2.15)) sera dit d'amplitude parfaite contenue dans $[a,b]$ (resp. d'amplitude parfaite finie, resp. parfait) si F est d'amplitude $\underline{C}_o$-parfaite contenue dans $[a,b]$ (resp....). Lorsque les facteurs directs de Modules libres de type fini sont localement libres (cf.(2.15.1)), dire que F est parfait signifie donc que F est localement isomorph (dans $D(\underline{S})$) à un complexe à degrés bornés et à composantes libres de type fini.

Notation 4.9. Nous désignerons par $D(\underline{C})_{\underline{C}_o\text{-parf}}$ ou $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o)$ la sous-$\underline{S}$-catégorie strictement pleine de $D(\underline{C})$ formée des objets $\underline{C}_o$-parfaits. Dans le cas de l'exemple (4.8), nous écrirons $D({}_A\underline{S})_{\mathrm{parf}}$, ou $\mathrm{Parf}({}_A\underline{S})$, ou même $\mathrm{Parf}(\underline{S})$ s'il n'y a pas d'ambiguité possible sur A.

(*) Bien entendu, quand cela ne pourra prêter à confusion, nous omettrons $\underline{C}_o$ dans les expressions précédentes.

Proposition 4.10 La catégorie $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)$ est une sous-$\underline{S}$-catégorie triangulée de $\underline{D}(\underline{C})$ (1.1.4). Le foncteur canonique

$$K^b(\underline{C}_0) \longrightarrow \mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)$$

(resp. $\mathrm{Tr}(K^b(\underline{C}_0)) \longrightarrow \mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0))$ (1.1.3))

induit une $\underline{S}$-équivalence sur les champs associés ([G] II 2.2.4), ce qui signifie :

(i) pour tout $X \in \mathrm{ob}\ S$ et tous $E,F \in \mathrm{ob}\ K^b(\underline{C}_{0X})$ (resp. $\mathrm{Tr}(K^b(\underline{C}_{0X}))$), la flèche canonique

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{K^b(\underline{C}_0)}(E,F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{D}(\underline{C})}(E,F)$$

(resp. $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Tr}(K^b(\underline{C}_0))}(E,F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Tr}(D(\underline{C}))}(E,F)$)

est un isomorphisme, et

(ii) tout objet de $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)$ (resp. $\mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0))$) est localement isomorphe dans $D(\underline{C})$ (resp. $\mathrm{Tr}(D(\underline{C}))$ à un objet de $K^b(\underline{C}_0)$ (resp. $\mathrm{Tr}(K^b(\underline{C}_0))$.

Preuve. L'assertion (i) non respée est un cas particulier de (4.6) et l'assertion (ii) non respée est vraie par définition ((4.7) et (4.9)). Il est clair d'autre part que $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)$ est stable par translation des degrés. Pour prouver que $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_0)$ est une sous-$\underline{S}$-catégorie triangulée de $\underline{D}(\underline{C})$, il suffit donc de montrer que si

(*)



est un triangle distingué de $\underline{D}(\underline{C})$ tel que E et F soient parfaits, alors G

est parfait. Quitte à localiser, on peut supposer que E et F sont objets de $K^b(\underline{C}_o)$. Quitte à localiser davantage, on peut supposer, d'après l'assertion (i) non respée, que u est une flèche de $K^b(\underline{C}_o)$; G est alors parfait car isomorphe au cône de u, qui est strictement parfait. Donc $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o)$ est bien une sous-$\underline{S}$-catégorie triangulée de $D(\underline{C})$. L'argument précédent prouve aussi, d'ailleurs, l'assertion (ii) respée. Reste à prouver l'assertion (i) respée. Soient donc $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, et $E = (E_1 \xrightarrow{a_1} E_2 \xrightarrow{a_2} E_3 \xrightarrow[+1]{a_3} E_1)$, $F = (F_1 \xrightarrow{b_1} F_2 \xrightarrow{b_2} F_3 \xrightarrow[+1]{b_3} F_1)$ des triangles distingués de $K^b(\underline{C}_{oX})$, montrons que la flèche

$$(**) \qquad \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Tr}(K^b(\underline{C}_o))}(E,F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathrm{Tr}(D(\underline{C}))}(E,F)$$

est un isomorphisme. D'après l'assertion (i) non respée, on sait déjà que (**) est injective. Soit $(u_i) : E \to F$ un morphisme de triangles dans $D(\underline{C})$. Quitte à localiser, on peut supposer, d'après l'assertion (i) non respée, que u_i $(1 \leqslant i \leqslant 3)$ est une flèche de $K^b(\underline{C}_o)$. La flèche $u_{i+1}a_i - b_iu_i$, pour $1 \leqslant i \leqslant 3$ (avec la convention $u_4 = u_1$), est nulle dans $D(\underline{C})$, donc localement nulle dans $K^b(\underline{C}_o)$ d'après l'assertion (i) non respée. En d'autres termes, (u_i) définit localement un morphisme de triangles dans $K^b(\underline{C}_o)$. Cela prouve que (**) est surjective et achève la démonstration de (4.10).

Remarque 4.10.1. On peut remplacer, dans (4.10), $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o)$ par $D^*(\underline{C})_{\underline{C}_o\text{-parf}} = D^*(\underline{C}) \cap \mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o)$ ($* = -$ ou b), il n'y a rien à changer à la démonstration.

Complément 4.11. On peut préciser la structure triangulée de $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o)$ en termes d'amplitude parfaite (4.7). Si $E \in \mathrm{ob}\ D(\underline{C})$ est d'amplitude parfaite contenue dans $[a,b]$, $E[n]$ est d'amplitude parfaite contenue dans $[a-n,b-n]$.

Soit



un triangle distingué de $D(\underline{C})$. On peut dresser un tableau analogue à (2.6), où les cases indiquent des amplitudes parfaites et chaque ligne correspond à une implication dont le but est souligné.

E	F	G
$[a+1,b+1]$	$[a,b]$	$\underline{[a,b]}$
$[a,b]$	$\underline{[a,b]}$	$[a,b]$
$\underline{[a,b]}$	$[a,b]$	$[a-1,b-1]$

.

De (4.10) on déduit aussitôt le

Corollaire 4.12. *Supposons que $\underline{S}$ soit un site ponctuel. Pour que $F \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C})$ soit d'amplitude parfaite (rel. à $\underline{C}_o$) contenue dans $[a,b]$, il faut et il suffit qu'il existe un quasi-isomorphisme $F' \longrightarrow F$, avec F' strictement parfait et tel que $F'^i = 0$ pour $i \notin [a,b]$. Les foncteurs canoniques*

$$K^b(\underline{C}_o) \longrightarrow \mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o)$$

et

$$\mathrm{Tr}(K^b(\underline{C}_o)) \longrightarrow \mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o))$$

sont des équivalences de catégories.

Remarque 4.12.1. Quand $\underline{S}$ est un site ponctuel, les objets de $\underline{C}_o$ sont projectifs. Lorsque $\underline{C}_o$ contient tous les objets projectifs de $\underline{C}$, on dit "amplitude projective" au lieu de "amplitude $\underline{C}_o$-parfaite".

Remarque 4.12.2. Soit $\underline{C}$ une catégorie abélienne (qu'on peut regarder comme fibrée sur un site ponctuel), et soit $\underline{C}_0$ une sous-catégorie additive strictement pleine. Supposons $\underline{C}_0$ stable par noyau d'épimorphisme et quasi-relevable dans $\underline{C}$. Alors un objet acyclique de $K^b(\underline{C}_0)$ n'est pas en général nul, donc il n'y a pas d'espoir que le foncteur $K^b(\underline{C}_0) \longrightarrow D(\underline{C})$ soit fidèle. Cependant, si $K^{b,\acute{}}(\underline{C}_0)$ désigne la sous-catégorie épaisse de $K^b(\underline{C}_0)$ formée des objets acycliques (dans $\underline{C}$), le foncteur canonique

$$K^b(\underline{C}_0)/K^{b,\acute{}}(\underline{C}_0) \longrightarrow D(\underline{C})$$

est pleinement fidèle.

Indications : On sait déjà (2.7) que le foncteur

$$K^-(\underline{C}_0)/K^{-,\acute{}}(\underline{C}_0) \longrightarrow D^-(\underline{C})$$

est pleinement fidèle. Montrer, par exemple à l'aide du critère ([V]4.2.b) (ii)'), que le foncteur

$$K^b(\underline{C}_0)K^{b,\acute{}}(\underline{C}_0) \longrightarrow K^-(\underline{C}_0)/K^{-,\acute{}}(\underline{C}_0)$$

est pleinement fidèle.

Lemme 4.13. Soient $F \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C}_S)$, $a, b, c \in \mathbb{Z}$ tels que $a \leqslant b$ et $a \leqslant c$. Si F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a,c]$ (4.7) et si $H^i(F) = 0$ pour $i > b$, alors F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a,d]$, où $d = \inf(b,c)$.

Preuve. On peut supposer $b \leqslant c$, et F strictement parfait tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [a,c]$. Alors F est isomorphe à son tronqué F' défini par

$F'^i = F^i$ pour $i < b$, $F'^b = Z^b(F)$, $F'^i = 0$ pour $i > b$. Mais $Z^b(F)$ admet une résolution finie droite par des objets de $\underline{C}_o$ donc est localement objet de $\underline{C}_o$, d'où l'assertion.

Corollaire 4.14. Soient $F \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_S$ et $n \in \mathbb{N}$. Conditions équivalentes :

(i) $\mathrm{parf.amp}(F) \subset [-n, 0]$;

(ii) F admet localement une résolution gauche de longueur n par des objets de $\underline{C}_o$, i.e. l'ensemble des X au-dessus de S tels qu'il existe une suite exacte

$$0 \longrightarrow L^{-n} \longrightarrow L^{-n+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow L^0 \longrightarrow F_X \longrightarrow 0 \ ,$$

avec $L^i \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oX}$ pour tout i, est un raffinement de S.

Preuve. C'est une conséquence immédiate de (4.7) et (4.13).

Définition 4.14.1. Nous dirons que F est de dimension parfaite $\leq n$, et nous écrirons $\mathrm{parf.dim}(F) \leq n$, si F vérifie les conditions équivalentes de (4.14). Nous appellerons dimension parfaite de F le plus petit entier n tel que $\mathrm{parf.dim}(F) \leq n$ (s'il n'existe pas un tel entier, nous dirons que F est de dimension parfaite infinie).

Quand S est le site ponctuel et que $\underline{C}_o$ est la sous-catégorie pleine de $\underline{C}$ formée des objets projectifs, la dimension parfaite n'est autre que la dimension projective usuelle.

Proposition 4.15. Soient a, b, $n \in \mathbb{Z}$ ($a \leq b$, $n \geq 0$), et soit $F \in \mathrm{ob}\ D(\underline{C})$ tel que $F^i = 0$ (resp. $H^i(F) = 0$) pour $i \notin [a,b]$. Si, pour tout $i \in [a,b]$, F^i (resp. $H^i(F)$) est de dimension parfaite $\leq n+(i-a)$, alors F est d'amplitude parfaite contenue dans $[a-n, b]$. Par suite, si pour tout $i \in [a,b]$, F^i (resp. $H^i(F)$) est parfait, F l'est aussi.

Preuve. Procéder par récurrence sur b (a et n fixés), en tronquant F et appliquant (4.11) (cf. preuve de (2.11)).

Lemme 4.16. Soient a, b $\in \mathbb{Z}$ ($a \leq b$), et $F \in$ ob $D(\underline{C})$ tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [a,b]$. On suppose que l'on a parf.amp$(F) \subset [a,b]$, et que $F^i \in$ ob $\underline{C}_o$ pour $i > a$. Alors F^a est localement objet de $\underline{C}_o$.

Preuve. On a une suite exacte (obtenue en tronquant F)

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F^a[-a] \longrightarrow 0 \quad ,$$

avec parf.amp$(F') \subset [a+1, b+1]$. De (4.11) et (4.13) on déduit que parf.dim$(F^a) = 0$, i.e. que F^a est localement objet de $\underline{C}_o$.

Proposition 4.17. Soient F', $F'' \in$ ob $D(\underline{C}_S)$, et a, b $\in \mathbb{Z}$, avec $a \leq b$. Considérons les conditions :

(i) parf.amp$(F') \subset [a,b]$ et parf.amp$(F'') \subset [a,b]$;

(ii) parf.amp$(F' + F'') \subset [a,b]$.

On a (i) $\Rightarrow$ (ii), et, si $\underline{C}_o$ est localement stable par facteurs directs (i.e. la relation $E' + E'' \in$ ob $\underline{C}_o$, pour E', $E'' \in$ ob $\underline{C}_X$ et $X \in$ ob $\underline{S}$, implique que localement E' et E'' sont objets de $\underline{C}_o$), alors on a (i) $\Leftrightarrow$ (ii).

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est un cas particulier de (4.11). Prouvons la réciproque. Posons $F = F' + F''$. Comme F est pseudo-cohérent, F' et F'' le sont aussi (2.12). D'autre part, la relation $H^i(F) = 0$ pour $i \notin [a,b]$ implique $H^i(F') = H^i(F'') = 0$ pour $i \notin [a,b]$. D'après (2.10 a)), on peut donc supposer (quitte à se localiser) que F'^i (resp. F''^i) $\in$ ob $\underline{C}_o$ pour $i \geq a+1$ et $F'^i = F''^i = 0$ pour $i > b$, puis, en tronquant, que

$F'^i = F''^i = 0$ pour $i < a$. Comme on a $\mathrm{parf.dim}(F) \subset [a,b]$, on déduit de (4.16) que F^a est localement objet de $\underline{C}_0$. Or $F^a = F'^a + F''^a$, donc F'^a et F''^a sont localement objets de $\underline{C}_0$ puisque $\underline{C}_0$ est localement stable par facteurs directs.

Proposition 4.18. *Soit* $(\underline{S}', \underline{C}', \underline{C}'_0)$ *un trio satisfaisant aux mêmes hypothèses* (4.0) *que* $(\underline{S}, \underline{C}, \underline{C}_0)$. *Soit* $f : \underline{S}' \longrightarrow \underline{S}$ *un morphisme de sites (défini par* $f^{-1} : \underline{S} \longrightarrow \underline{S}'$), *et soit* $u : D^*(\underline{C}) \longrightarrow D^*(\underline{C}')$ $(* = -, +, \emptyset)$ *un foncteur au-dessus de* f (cf. (2.13)). *Si* u *transforme les objets de* $\underline{C}_0$ *en complexes* $\underline{C}'_0$*-parfaits, alors* u *définit un foncteur* $D^*(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-parf}} \longrightarrow D^*(\underline{C}')_{\underline{C}'_0\text{-parf}}$.

Preuve. Soit $F \in \mathrm{ob}\, D^*(\underline{C})_{\underline{C}_0\text{-parf}}$, montrons que $u(F) \in \mathrm{ob}\, D^*(\underline{C}')_{\underline{C}'_0\text{-parf}}$. La question étant locale, on peut supposer F strictement parfait. Il n'y a plus qu'à dévisser, tenant compte du fait que $D^*(\underline{C}')_{\underline{C}'_0\text{-parf}}$ est une sous-catégorie triangulée de $D^*(\underline{C})$ (4.10).

Remarque 4.18.1. Supposons qu'il existe $m, n \in \mathbb{Z}$ $(m \leqslant n)$ tels que $F \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_0$ implique $\underline{C}'_0\text{-parf.amp}(u(F)) \subset [m,n]$. Alors, si $F \in \mathrm{ob}\, D^*(\underline{C})$, on a

$$\underline{C}_0\text{-parf.amp}(F) \subset [a,b] \Longrightarrow \underline{C}'_0\text{-parf.amp}(u(F)) \subset [a+m, b+n].$$

La preuve est laissée en exercice au lecteur (utiliser (4.11)).

Corollaire 4.19. *Sous les hypothèses de* (2.16), *si* $E' \in \mathrm{ob}\, D^-({}_{A'}\underline{S}'_A)$ *est parfait en tant qu'objet de* $D^-({}_{A'}\underline{S}')$ *et* $E \in \mathrm{ob}\, D^-({}_A\underline{S})$ *est parfait, alors* $E' \overset{L}{\otimes}_A E$ *est parfait.*

Preuve. On peut supposer que $E' \in \mathrm{ob}\, D^-({}_{A'}\underline{S}'_A)$ (S' = objet final de $\underline{S}'$), et l'on applique (4.18) à $u = E' \overset{L}{\otimes}_A : D^-({}_A\underline{S}) \longrightarrow D^-({}_{A'}\underline{S}')$.

En particulier :

Corollaire 4.19.1. a) Le foncteur $\mathbb{L}f^* : D^-({}_A\underline{S}) \longrightarrow D^-({}_{A'}\underline{S}')$ induit un foncteur

$$\mathbb{L}f^* : D^-({}_A\underline{S})_{parf} \longrightarrow D^-({}_{A'}\underline{S}')_{parf} \quad .$$

b) Si A est commutatif, le foncteur $\overset{\mathbb{L}}{\otimes}_A : D^-(\underline{S}) \times_{\underline{S}} D^-(\underline{S}) \longrightarrow D^-(\underline{S})$ induit un foncteur

$$\overset{\mathbb{L}}{\otimes}_A : D^-(\underline{S})_{parf} \times_{\underline{S}} D^-(\underline{S})_{parf} \longrightarrow D^-(\underline{S})_{parf} \quad .$$

Remarque 4.19.2. On peut préciser (4.19) en termes d'amplitude parfaite : $parf.amp(E) \subset [a,b]$ et $parf.amp(E') \subset [a',b'] \Rightarrow parf.amp(E' \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_A E) \subset [a+a', b+b']$. En particulier : $parf.amp(E) \subset [a,b] \Rightarrow parf.amp(\mathbb{L}f^*(E)) \subset [a,b]$.

5. Tor-dimension finie et perfection

5.0. Le lecteur se sera sûrement posé la question : que manque-t-il à un complexe pseudo-cohérent E pour être parfait ? Suffit-il, par exemple, que E soit à cohomologie bornée ? La réponse est non. Prenons en effet pour $\underline{C}$ la catégorie des modules sur un anneau commutatif noethérien A, et pour $\underline{C}_0$ la sous-catégorie pleine des A-modules projectifs de type fini. N'importe quel A-module de type fini E est pseudo-cohérent et à cohomologie bornée, mais E n'est parfait que si E est en outre de dimension projective finie (ou, ce qui revient au même, de tor-dimension finie). Cet exemple suggère que la différence entre un complexe pseudo-cohérent et un complexe parfait réside dans une question de dimension cohomologique. C'est ce que nous allons examiner maintenant

dans le cas de la catégorie des Modules d'un topos annelé (cf.(3.3)). Nous aurons besoin de quelques sorites préliminaires sur la notion de tor-dimension finie. Nous serons brefs, vu que cette question figure déjà dans la littérature : cf. ([H] II 4) et (SGA 4 XVII 4.1.9.).

Proposition 5.1. *Soient* $(\underline{S},A)$ *un topos annelé,* $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, $F \in \mathrm{ob}\ D^-({}_AX)$, $m, n \in \mathbb{Z}$ *tels que* $m \leq n$. *Conditions équivalentes :*

(i) F *est isomorphe, dans* $D^-({}_AX)$, *à un complexe* F' *tel que* F'^i *soit plat pour tout* i *et nul pour* $i \notin [m,n]$;

(ii) *pour tout* A_X*-Module à droite* E, *on a* $H^i(E \overset{L}{\otimes}_A F) = 0$ *pour* $i \notin [m,n]$.

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale; l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) résulte, par troncature, du

Lemme 5.1.1. (cf. (4.16)). *Soit* $F \in \mathrm{ob}\ D^-({}_AX)$. *On suppose que* F *satisfait à l'hypothèse* (ii) de (5.1), *que* $F^i = 0$ *pour* $i \notin [m,n]$, *et que* F^i *est plat pour* $i \neq m$. *Alors* F^m *est plat.*

Preuve. On a un triangle distingué



où F' est à composantes plates et nulles en dehors de l'intervalle $[m+1,n]$ (supposer $m < n$). Appliquer le foncteur $E \overset{L}{\otimes}_A$. pour E un A_X-Module à droite arbitraire, et écrire la suite exacte de cohomologie.

Définition 5.2. Un objet F de $D^-({}_A\underline{S})$ satisfaisant aux conditions équivalentes de (5.1) sera dit d'amplitude plate contenue dans l'intervalle $[m,n]$, et nous écrirons

$$\text{tor.amp}(F) \subset [m,n] \ .$$

Nous dirons que F est d'amplitude plate finie (ou de tor-dimension finie) s'il existe des entiers m et n tels que la condition précédente soit vérifiée.

5.3. Soit $X \in \text{ob } \underline{S}$. Nous noterons $D^-({}_AX)_{\text{torf}}$ la sous-catégorie pleine de $D^-({}_AX)$ formée des objets de tor-dimension finie. D'après le critère (ii) de (5.1), c'est une sous-catégorie triangulée de $D^-({}_AX)$. Pour X variable, les catégories $D^-({}_AX)_{\text{torf}}$ forment une sous-$\underline{S}$-catégorie triangulée (1.1.4) de $D^-({}_A\underline{S})$, que nous noterons $D^-({}_A\underline{S})_{\text{torf}}$. Le foncteur $\overset{L}{\otimes}_A$ induit un $\underline{S}$-foncteur exact

$$\overset{L}{\otimes}_A : D^b(\underline{S}_A) \times_{\underline{S}} D({}_A\underline{S})_{\text{torf}} \longrightarrow D^b(\underline{S}_{\mathbb{Z}}) \ .$$

5.4. Pour qu'un A-Module à gauche F soit d'amplitude plate contenue dans $[-n,0]$ ($n \in \mathbb{N}$) il faut et il suffit que F soit de tor-dimension $\leq n$ au sens ordinaire, i.e. que F admette une résolution gauche de longueur n par des A-Modules plats.

5.5. Soient $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, et $m, n \in \mathbb{Z}$ $(m \leqslant n)$. Pour que $F \in \mathrm{ob}\ D^-({}_A X)$ soit d'amplitude plate contenue dans $[m,n]$ il faut et il suffit qu'il existe une famille couvrante $(X_i \longrightarrow X)$ telle que $F \mid X_i$ soit d'amplitude plate contenue dans $[m,n]$. En particulier, si $\underline{S}_{/X}$ est de type fini (SGA 4 VI 1.7), et si F est localement de tor-dimension finie, alors F est de tor-dimension finie.

Proposition 5.6. Sous les hypothèses de (2.16), si E' est d'amplitude plate contenue dans $[m',n']$ en tant qu'objet de $D^-({}_{A'}\underline{S}')$ et si E est d'amplitude plate contenue dans $[m,n]$, alors $E' \overset{L}{\otimes}_A E$ est d'amplitude plate contenue dans $[m+m',\ n+n']$.

Preuve. C'est immédiat : utiliser la forme (5.1 (i)) de la notion de tor-dimension finie et le fait que, si E est un A-Module à gauche plat, $f^{-1}(E)$ est un $f^{-1}(A)$-Module à gauche plat (SGA 4 IV App. II).

En particulier :

Corollaire 5.6.1. a) Le foncteur $\mathbb{L}f^* : D^-({}_A\underline{S}) \longrightarrow D^-({}_{A'}\underline{S}')$ induit un foncteur

$$\mathbb{L}f^* : D({}_A\underline{S})_{\mathrm{torf}} \longrightarrow D({}_{A'}\underline{S}')_{\mathrm{torf}} .$$

b) Si A est commutatif, le foncteur $\overset{L}{\otimes}_A : D^-(\underline{S}) \times_{\underline{S}} D^-(\underline{S}) \longrightarrow D^-(\underline{S})$ induit un foncteur

$$\overset{L}{\otimes}_A : D(\underline{S})_{\mathrm{torf}} \times_{\underline{S}} D(\underline{S})_{\mathrm{torf}} \longrightarrow D(\underline{S})_{\mathrm{torf}} .$$

Remarque 5.6.2. Soient $E \in \mathrm{ob}\ D^-({}_A S)$ (S = objet final de $\underline{S}$), et $m, n \in \mathbb{Z}$ $(m \leqslant n)$. Si E est d'amplitude plate contenue dans $[m,n]$, il en est de même, d'après (5.6), de E_s pour tout point s de $\underline{S}$. La réciproque est vraie si $\underline{S}$ a assez de points (utiliser la forme (5.1.(ii)) de la notion d'amplitude

plate, et le fait que $\overset{L}{\otimes}_A$ commute au passage aux fibres).

Exercices 5.7. a) Supposons A commutatif et (S',A') fidèlement plat sur (S,A) (cf.(2.16.2)). Pour que $E \in \mathrm{ob}\, D^-({}_AS)$ (1) soit d'amplitude plate contenue dans $[m,n]$, il faut et il suffit que $f^*(E)$ le soit.

b) Soit $F \in \mathrm{ob}\, D^+({}_AS)$ (1). Montrer l'équivalence des conditions :

(i) F est isomorphe, dans $D^+({}_AS)$, à un complexe F' tel que F'^i soit injectif pour tout i et nul pour $i \notin [m,n]$;

(ii) pour tout A_S-Module à gauche E, on a $\mathrm{Ext}^i(E,F) = 0$ pour $i \notin [m,n]$.

Si F satisfait aux conditions précédentes, on dit que F est d'amplitude injective contenue dans $[m,n]$. La sous-catégorie pleine de $D^+({}_AS)$ formée des objets d'amplitude injective finie est une sous-catégorie triangulée, notée $D^+({}_AS)_{\mathrm{injf}}$. Montrer que, si A est commutatif, le foncteur $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}} : D(S)^\circ \times D^+(S) \longrightarrow D(S)$ induit un foncteur

$$\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}} : D(S)^\circ_{\mathrm{torf}} \times D(S)_{\mathrm{injf}} \longrightarrow D(S)_{\mathrm{injf}} \quad .$$

Nous pouvons maintenant répondre à la question de (5.0) et énoncer le résultat principal de ce numéro.

Théorème 5.8. Soient (S,A) un topos annelé, $E \in \mathrm{ob}\, D({}_AS)$, $m, n \in \mathbb{Z}$, avec $m \leq n$. Conditions équivalentes :

(i) $\mathrm{parf.amp}(E) \subset [m,n]$ (4.8) ;

(ii) E est $(m-1)$-pseudo-cohérent (2.15) et l'on a $\mathrm{tor.amp}(E) \subset [m,n]$ (5.2).

Comme "parfait" implique évidemment "pseudo-cohérent", on en déduit :

(1) S = objet final de S

Corollaire 5.8.1. Pour que E soit parfait (4.8), il faut et il suffit que E soit pseudo-cohérent (2.15) et localement de tor-dimension finie (5.2).

Pour la démonstration, nous aurons besoin de quelques lemmes.

Lemme 5.8.2. Soit B un anneau de S. Si E est un A-Module à gauche, G un B-Module à droite, et F un A-B-Bimodule (à gauche sur A, à droite sur B), il existe un homomorphisme canonique fonctoriel (5.8.2.1)

$$\underline{\mathrm{Hom}}_B(F,G) \otimes_A E \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_B(\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F),G) \quad .$$

Celui-ci est un isomorphisme pour G injectif et E de présentation finie.

Preuve. Définissons d'abord la flèche. Par la formule d'adjonction chère à Cartan, il revient au même de définir un homomorphisme de B-Modules :

$$(*) \qquad \underline{\mathrm{Hom}}_B(F,G) \otimes_A E \otimes_{\mathbb{Z}_S} \underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F) \longrightarrow G \qquad (1) \quad .$$

Or on a un homomorphisme canonique de A-B-biModules

$$(**) \qquad E \otimes_{\mathbb{Z}_S} \underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F) \longrightarrow F$$

(provenant par adjonction de la flèche identique de $\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F)$).

On a de même un homomorphisme canonique de B-Modules

$$(***) \qquad \underline{\mathrm{Hom}}_B(F,G) \otimes_A F \longrightarrow G.$$

On définit alors (*) comme le composé de (**) et (***). Pour voir que la flèche (5.8.2.1) est un isomorphisme quand G est injectif et E de présentation finie, il suffit de remarquer que, si G est injectif, la source et le but de la flèche sont des foncteurs exacts à droite en E et que la flèche induit l'identité pour E = A.

---

(1) on note S l'objet final de $\underline{S}$ et $\mathbb{Z}_S$ le faisceau constant de valeur $\mathbb{Z}$.

Voici maintenant un cas particulier de (5.8).

Lemme 5.8.3. Soit E un A-Module à gauche. Conditions équivalentes :

(i) E est localement facteur direct d'un Module libre de type fini;

(ii) E est plat et de présentation finie.

Preuve (d'après BOURBAKI Alg. Comm. chap. I, § 2 Exer 15).
Il est clair que (i) implique (ii). Prouvons (ii)$\Rightarrow$(i). En vertu de (1.3.1), il s'agit de montrer que le foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,.)$ est exact. Soit $F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$ une suite exacte de A-Modules (à gauche). On doit montrer que la suite

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F'') \longrightarrow 0$$

est exacte. Il suffit pour cela de prouver que, pour tout $\mathbb{Z}_S$-Module injectif I, la suite déduite par application du foncteur $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{Z}}(.,I)$ est exacte. Or on a un diagramme commutatif, où les flèches verticales sont les flèches canoniques de (3.17.1) :

$$\begin{array}{ccccc} 0 \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{Z}_S}(F'',I) \otimes_A E & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{Z}_S}(F,I) \otimes_A E & \\ & \downarrow & & \downarrow & \\ 0 \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{Z}_S}(\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F''),I) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{Z}_S}(\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F),I) & . \end{array}$$

Les flèches verticales sont des isomorphismes en vertu de (5.8.2). La ligne du haut est exacte parce que E est plat. Donc la ligne du bas est exacte, cqfd.

Preuve de (5.8). L'implication (i)$\Rightarrow$(ii) résulte trivialement des définitions. Prouvons (ii)$\Rightarrow$(i). La question étant locale, on peut supposer E strictement (m-1)-pseudo-cohérent. Comme d'autre part E est acyclique en degré $< m$, la

flèche de troncature

$$\begin{array}{ccccccccc} \longrightarrow & E^{m-1} & \longrightarrow & E^{m} & \longrightarrow & E^{m+1} & \longrightarrow & \cdots \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & E^{m}/B^{m} & \longrightarrow & E^{m+1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

est un quasi-isomorphisme. Notons E' le complexe tronqué. Par construction, E' est d'amplitude plate $\subset [m,n]$ et E'^{i} est libre de type fini pour $i > m$. Donc, d'après (5.1.1), E'^{m} est plat. On a d'autre part un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & E'^{m}[-m] & \\ {\scriptstyle +1}\swarrow & & \nwarrow \\ E'' & \longrightarrow & E' \end{array} \quad ,$$

où E" est strictement parfait. D'après (2.6), $E'^{m}[-m]$ est (m-1)-pseudo-cohérent, i.e. (2.9) E'^{m} est de présentation finie. On conclut grâce à (5.8.3) que E'^{m} est localement facteur direct d'un Module libre de type fini, donc que l'on a $\mathrm{parf.amp}(E) \subset [m,n]$.

Remarques 5.8.4. a) Utilisant (2.5), on retrouve le fait que les complexes parfaits forment une sous-catégorie triangulée de $D(_{A}\underline{S})$.

b) Un complexe parfait, même à cohomologie bornée, n'est pas nécessairement de tor-dimension finie. C'est cependant le cas si $\underline{S}$ est de type fini (5.5). Notons $D(_{A}\underline{S})_{\underline{parf}}$ la sous-$\underline{S}$-catégorie pleine de $D^{b}(_{A}\underline{S})$ formée des complexes parfaits et de tor-dimension finie. Il résulte aussitôt de (2.16.1 b)) et (5.3) que, si A est commutatif, le foncteur $\overset{L}{\otimes}_{A}$ induit un foncteur

$$\overset{L}{\otimes}_{A} : D(\underline{S})_{\underline{parf}} \times_{\underline{S}} D^{b}(\underline{S})_{coh} \longrightarrow D^{b}(\underline{S})_{coh} \quad .$$

Cette formule est le point de départ de la théorie des intersections sur les schémas. On notera que par contre le produit tensoriel (dérivé) de deux complexes pseudo-cohérents à cohomologie bornée n'est pas en général à cohomologie bornée.

Corollaire 5.9. Supposons que $\underline{S}$ = (Ens) (donc A "est" un anneau ordinaire) et que tout A-module à gauche soit de tor-dimension finie (c'est le cas par exemple si A est de dimension cohomologique globale finie, voir (MULT VI 2.6) et (EGA 0_{IV} 17.2.8)). Alors on a

(i) $D^b({}_A\underline{S}) = D({}_A\underline{S})_{torf}$, et

(ii) $D^b({}_A\underline{S})_{coh} = D({}_A\underline{S})_{parf}$.

Autrement dit, pour que $E \in ob\ D({}_A\underline{S})$ soit de tor-dimension finie (resp. de tor-dimension finie et parfait) il faut et il suffit que E soit à cohomologie bornée (resp. à cohomologie bornée et pseudo-cohérent).

Preuve. D'après (5.8), il suffit de prouver (i). Soit $E \in ob\ D^b({}_A\underline{S})$. On peut supposer (quitte à prolonger E par 0) que $E \in ob\ D^b({}_AS)$, où S est l'objet final de $\underline{S}$. Procédant par récurrence sur le nombre d'objets de cohomologie non nuls de E, on se ramène, par dévissage, au cas où E est un A-Module ordinaire, et l'on gagne.

On peut énoncer plus généralement :

Corollaire 5.10 Soit $X \in ob\ \underline{S}$. Supposons que $\underline{S}/X$ ait assez de points (SGA 4 IV 6.4.1.) et que, pour tout point s de $\underline{S}/X$, tout A_s-module à gauche soit de tor-dimension finie. Alors on a

$$D^b({}_AX)_{coh} = D^b({}_AX)_{parf} .$$

Autrement dit, pour que $E \in \mathrm{ob}\, D^b({}_AX)$ soit pseudo-cohérent il faut et il suffit que E soit parfait.

Preuve. Soient $E \in \mathrm{ob}\, D^b({}_AX)_{coh}$ et s un point de $\underline{S}/X$. Il s'agit de montrer que E est parfait "au voisinage de s", i.e. qu'il existe un objet s-ponctué U de $\underline{S}$ au-dessus de X tel que $E \mid U$ soit parfait. Or, le foncteur s^* étant exact, on a, d'après (2.16.1 a)), $E_s \in \mathrm{ob}\, D^b(A_s)_{coh}$.
Donc, en vertu de (5.9), E_s est parfait. L'assertion sera donc conséquence de (3.7.2) et du lemme suivant :

Lemme 5.10.1. Soit s un point de $\underline{S}$ et soit $F \in \mathrm{ob}\, D(A_s)_{parf}$. Il existe un objet s-ponctué U de $\underline{S}$ et $F' \in \mathrm{ob}\, D({}_AU)_{parf}$ tel que $F'_s = F$.

Preuve. C'est évident si F est un A_s-module libre de type fini. Supposons maintenant que F soit projectif de type fini, donc image d'un projecteur $p : L \longrightarrow L$ où L est libre de type fini. Il existe alors un "voisinage" U de s, un A_U-Module libre L' et un homomorphisme $p' : L' \longrightarrow L'$ tels que $p'_s = p$. Comme $p'^2_s = p'_s$, on peut supposer, quitte à rétrécir U, que $p'^2 = p'$. Donc $F' = \mathrm{Im}(p')$ est facteur direct de L' et vérifie $F'_s = F$. On généralise immédiatement au cas où F est strictement parfait, i.e. un complexe à degrés bornés composé de modules projectifs de type fini.

Exemples 5.11. Le corollaire (5.10) s'applique en particulier au cas où $(\underline{S},A)$ est défini par un espace annelé en anneaux locaux réguliers, par exemple un schéma régulier, ou un espace analytique complexe lisse sur $\mathbb{C}$.

6. Rang d'un complexe parfait

6.0. Soit $(X, \underline{O}_X)$ un espace annelé en anneaux locaux. Il est bien connu que l'on peut attacher à tout faisceau localement libre de type fini L sur un ouvert U de X une fonction $rg_U(L)$ localement constante sur U et à valeurs entières, qu'on appelle le rang de L, la famille des fonctions $rg_U(L)$ étant caractérisée par les propriétés suivantes :

(i) si $V \subset U$ est une inclusion d'ouverts, on a $rg_V(L \mid V) = rg_U(L) \mid V$;

(ii) pour toute suite exacte de $\underline{O}_U$-Modules localement libres de type fini

$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow 0 \ ,$$

on a $rg_U(L) = rg_U(L') + rg_U(L'')$;

(iii) $rg_X(\underline{O}_X) = 1$.

On se propose, dans ce numéro, d'étendre la notion de rang aux complexes parfaits.

Définition 6.1 (cf. SGA 5 VIII 2). Soient C une catégorie additive (resp. triangulée) et F un groupe abélien. On dit qu'une fonction $f : ob(C) \longrightarrow F$ est une fonction additive de C dans F si pour tous L, L', L" $\in ob(C)$ tels que l'on ait $L \simeq L' + L''$ (resp. un triangle distingué



) on a $f(L) = f(L') + f(L'')$.

Les fonctions additives de C dans F forment un groupe abélien, noté Add(C,F).

6.2. Soient C une catégorie triangulée, f une fonction additive de C dans un groupe abélien F. Alors f induit une fonction additive sur la catégorie additive C^{ad} sous-jacente à C, d'où une inclusion $Add(C,F) \subset Add(C^{ad},F)$. En particulier, on a $f(0) = 0$ et $f(L) = f(M)$ si $L \simeq M$. On a d'autre part $f(L[n]) = (-1)^n f(L)$ pour tout $L \in ob(C)$ et $n \in \mathbb{Z}$.

6.3. Soit C une catégorie additive (resp. triangulée). Le groupe $Add(C,F)$ dépend fonctoriellement de F. Le foncteur $Add(C,.)$ est représentable (cf. SGA 5 VIII 2) par un groupe abélien noté $k(C)$ (*) muni d'une application additive $cl_C : ob(C) \longrightarrow k(C)$ (si C est additive, on prend pour $k(C)$ le symétrisé du monoïde des classes d'isomorphie d'objets de C; si C est triangulée, on prend pour $k(C)$ le quotient du groupe abélien libre engendré par $ob(C)$ par les relations identifiant L à L' + L" chaque fois qu'on a un triangle distingué $L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow L'[1]$).

Le groupe $k(C)$ dépend fonctoriellement de C (par rapport aux foncteurs additifs (resp. exacts)). Si $u, u' : C \longrightarrow D$ sont des foncteurs additifs (resp. exacts) isomorphes, alors on a $k(u) = k(u')$.

Si C est une catégorie triangulée, on a un épimorphisme canonique $k(C^{ad}) \longrightarrow k(C)$ (cf. (6.2)).

Lemme 6.4. Soit C une catégorie additive. Le foncteur canonique $C \longrightarrow K^b(C)$ induit un isomorphisme (fonctoriel en C) $k(C) \longrightarrow k(K^b(C))$.

Preuve. C'est une conséquence immédiate de la formule suivante (qui résulte trivialement de (6.2)) :

(6.4.1) $\quad f(L) = \sum (-1)^i f(L^i)$

(*) nous n'utiliserons pas ici la notation usuelle K(C), vu que K(C) désigne déjà, lorsque C est additive, la catégorie des complexes de C "à homotopie près".

pour $L \in \mathrm{ob}\ K^b(C)$ et f une fonction additive sur $K^b(C)$.

Définition 6.5. Soient $\underline{S}$ une catégorie, $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie additive (resp. triangulée) (1.1.1), F un préfaisceau abélien sur $\underline{S}$. On dit qu'une famille de fonctions $f_X : \mathrm{ob}(\underline{C}_X) \longrightarrow F(X)$ indexée par $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$ est une $\underline{S}$-fonction additive de $\underline{C}$ dans F si les conditions suivantes sont réalisées :

(i) pour tout $X \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_X$, f_X est une fonction additive (6.1) ;

(ii) pour toute flèche $u : X \longrightarrow Y$ de $\underline{S}$, le diagramme suivant est commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{ob}\ \underline{C}_Y & \xrightarrow{f_Y} & F(Y) \\ {\scriptstyle u^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F(u)} \\ \mathrm{ob}\ \underline{C}_X & \xrightarrow{f_X} & F(X) \end{array} .$$

Les $\underline{S}$-fonctions additives de $\underline{C}$ dans F forment un groupe abélien, noté $\mathrm{Add}_{\underline{S}}(\underline{C},F)$.

Remarques 6.6. a) Notons $\underline{C}^{is}$ la $\underline{S}$-catégorie fibrée dont la fibre en $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$ est la catégorie ayant mêmes objets que $\underline{C}_X$ mais dont les flèches sont les isomorphismes de $\underline{C}_X$. Notons d'autre part $\underline{F}$ la $\underline{S}$-catégorie fibrée dont la fibre en $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$ est la catégorie discrète (i.e. les seules flèches sont les flèches identiques) F(X), le foncteur image inverse par $u \in \mathrm{Fl}(\underline{S})$ étant F(u). Alors une $\underline{S}$-fonction additive de $\underline{C}$ dans F n'est autre qu'un $\underline{S}$-foncteur cartésien de $\underline{C}^{is}$ dans $\underline{F}$, induisant sur chaque fibre une fonction additive au sens (6.1). Il nous sera commode d'interpréter l'additivité de la façon suivante. Supposons, pour fixer les idées, $\underline{C}$ triangulée. La catégorie $\underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(\underline{C}^{is},\underline{F})$ (resp. $\underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(\mathrm{Tr}(\underline{C})^{is},\underline{F})$ (1.1.2)) des $\underline{S}$-foncteurs cartésiens de $\underline{C}^{is}$ (resp. $\mathrm{Tr}(\underline{C})^{is}$) dans $\underline{F}$ est la catégorie discrète associée à un groupe

abélien, et l'on a un homomorphisme

$$\phi : \underline{\mathrm{Cart}}_S(\underline{C}^{is},\underline{F}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Cart}}_S(\mathrm{Tr}(\underline{C})^{is},\underline{F}) \quad ,$$

défini par $\phi(f)(T) = f(L) - f(L') - f(L'')$ pour $f \in \underline{\mathrm{Cart}}_S(\underline{C}^{is},F)$ et $T = (L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow L'[1]) \in \mathrm{ob}\ \mathrm{Tr}(\underline{C})$. Dire que $f \in \underline{\mathrm{Cart}}_S(\underline{C}^{is},\underline{F})$ est additif signifie que $\phi(f) = 0$, autrement dit on a une suite exacte (canonique fonctorielle)

$$(6.6.1) \qquad 0 \longrightarrow \mathrm{Add}_{\underline{S}}(\underline{C},F) \longrightarrow \underline{\mathrm{Cart}}_S(\underline{C}^{is},\underline{F}) \xrightarrow{\phi} \underline{\mathrm{Cart}}_S(\mathrm{Tr}(\underline{C})^{is},\underline{F}) \quad .$$

b) Soit $u : X \longrightarrow Y$ une flèche de $\underline{S}$. Les foncteurs "image inverse par u", étant tous isomorphes entre eux, définissent (6.3) un unique homomorphisme $k(Y) \longrightarrow k(X)$. Par suite, $X \longmapsto k(X)$ définit un préfaisceau abélien sur $\underline{S}$, noté $k(\underline{C})$. Une $\underline{S}$-fonction additive de $\underline{C}$ dans F s'interprète alors simplement comme un homomorphisme de préfaisceaux $k(\underline{C}) \longrightarrow F$, autrement dit on a

$$\mathrm{Add}_{\underline{S}}(\underline{C},F) = \mathrm{Hom}(k(\underline{C}),F) \quad .$$

Le préfaisceau $k(\underline{C})$ dépend bien entendu fonctoriellement de $\underline{C}$ vis-à-vis des $\underline{S}$-foncteurs additifs (resp. exacts).

Proposition 6.7. *Soient $\underline{S}$ un site, $\underline{C}$ une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate, $\underline{C}_o$ une sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}$ satisfaisant aux hypothèses* (4.0). *Alors le morphisme de préfaisceaux*

$$k(\underline{C}_o) \longrightarrow k(\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o)) \quad (\text{cf. } (4.9)) \quad ,$$

induit par l'inclusion de $\underline{C}_o$ dans $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o)$, définit un isomorphisme sur les faisceaux associés. En d'autres termes, pour tout faisceau abélien F sur $\underline{S}$,

l'homomorphisme de restriction

$$\mathrm{Add}_{\underline{S}}(\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o),F) \longrightarrow \mathrm{Add}_{\underline{S}}(\underline{C}_o,F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. Soit F un faisceau abélien sur $\underline{S}$, montrons que la flèche

$$\mathrm{Add}_{\underline{S}}(\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o),F) \longrightarrow \mathrm{Add}_{\underline{S}}(\underline{C}_o,F)$$

est un isomorphisme. Celle-ci se factorise en

$$\mathrm{Add}_{\underline{S}}(\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o),F) \xrightarrow{a} \mathrm{Add}_{\underline{S}}(K^b(\underline{C}_o),F) \xrightarrow{b} \mathrm{Add}_{\underline{S}}(\underline{C}_o,F) \quad .$$

Or, d'après (6.4), la flèche b est un isomorphisme. On est donc ramené à prouver que a est un isomorphisme.

Considérons le diagramme commutatif suivant, où les lignes sont exactes (6.6.1), et les flèches verticales sont les flèches de "restriction" :

$$\begin{array}{ccccccc}
0 \to & \mathrm{Add}_{\underline{S}}(\mathrm{Parf}(\underline{C}),F) & \to & \underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(\mathrm{Parf}(\underline{C})^{is},\underline{F}) & \to & \underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(\mathrm{Tr}(\mathrm{Parf}(\underline{C}))^{is},\underline{F}) \\
& \downarrow a & & \downarrow & & \downarrow \\
0 \to & \mathrm{Add}_{\underline{S}}(K^b(\underline{C}_o),F) & \to & \underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(K^b(\underline{C}_o)^{is},\underline{F}) & \to & \underline{\mathrm{Cart}}_{\underline{S}}(\mathrm{Tr}(K^b(\underline{C}_o))^{is},\underline{F})
\end{array} \quad .$$

Comme F est un faisceau, $\underline{F}$ est un champ (G II 2.2.4), donc, d'après (4.10), les deux flèches verticales de droite sont des isomorphismes.

Il en est donc de même de a, cqfd.

Remarque 6.7.1. (cf.4.10.1). On peut, dans (6.7), remplacer $\mathrm{Parf}(\underline{C},\underline{C}_o)$ par $D^*(\underline{C})_{\underline{C}_o\text{-parf}}$ ($* = -$ ou b).

6.8. Soient $(\underline{S},A)$ un topos annelé, $\underline{C}$ et $\underline{C}_o$ les $\underline{S}$-catégories fibrées envisagées en (4.8). On a des homomorphismes de préfaisceaux abéliens

$$k(\underline{C}_o) \xrightarrow{\alpha} k(D^-({}_A\underline{S})_{parf}) \xrightarrow{\beta} k(Parf({}_A\underline{S})) \quad ,$$

qui, d'après (6.7), induisent des isomorphismes sur les faisceaux associés. L'homomorphisme α est compatible avec les images inverses, i.e. si $u : (\underline{S}',A') \longrightarrow (\underline{S},A)$ est un morphisme de topos annelés, on a un diagramme commutatif, où les flèches verticales sont induites par le foncteur Lu^* (cf. (4.19.1)) :

$$\begin{array}{ccc} k(\underline{C}_o) & \longrightarrow & k(D^-({}_A\underline{S})_{parf}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ k(\underline{C}'_o) & \longrightarrow & k(D^-({}_{A'}\underline{S}')_{parf}) \end{array}$$

($\underline{C}'_o$ étant définie de manière analogue à $\underline{C}_o$). Si A est commutatif, le produit tensoriel $\overset{L}{\otimes}$ munit $k(\underline{C}_o)$ et $k(D^-({}_A\underline{S})_{parf})$ de structures de préfaisceaux d'anneaux (cf. (4.19.1)), et α est un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux.

6.9. Dans la situation de (6.8), supposons que $(\underline{S},A)$ soit localement annelé (cf. (2.15.1)). Alors (2.15.1) pour tout $X \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, $\underline{C}_{oX}$ est la catégorie des A_X-Modules localement libres de type fini. Notons $\underline{C}_1$ la $\underline{S}$-catégorie fibrée définie par $X \longmapsto$ (catégorie des A_X-Modules libres de type fini). Il est clair que $\underline{C}_1$ vérifie les hypothèses (4.0). Un objet de $D(\underline{S})$ est parfait si et seulement s'il est parfait relativement à $\underline{C}_1$. On a des homomorphismes de préfaisceaux abéliens

$$k(\underline{C}_1) \longrightarrow k(\underline{C}_o) \longrightarrow k(D^-(\underline{S})_{parf}) \longrightarrow k(Parf(\underline{S}))$$

(les deux de gauche étant des homomorphismes de préfaisceaux d'anneaux), qui induisent, d'après (6.7), des isomorphismes sur les faisceaux associés. On va montrer que les faisceaux associés sont en fait canoniquement isomorphes au faisceau constant $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$.

Lemme 6.10. Soient $(\underline{S},A)$ un topos localement annelé, U un objet de $\underline{S}$ distinct de l'objet vide, $p, q \in \mathbb{N}$. Si l'on a $A_U^p \simeq A_U^q$, alors $p = q$.

Preuve. Par un argument similaire à celui donné dans la preuve de (2.15.1), on se ramène au cas où $(\underline{S},A)$ est le topos localement annelé défini par un préschéma, et dans ce cas l'assertion est triviale (prendre un point dans U).

Définition 6.11. On appelle rang, et l'on note rg la $\underline{S}$-fonction additive de $\underline{C}_1$ dans $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$ définie par

$$rg(L) = p \text{ si } L \simeq A_X^p \text{ , } X \neq \emptyset \text{ ,}$$
$$rg(L) = 0 \text{ si } L \in \text{ob } \underline{C}_{1X}, \ X = \emptyset \text{ .}$$

En vertu de (6.7), la fonction rang se prolonge de manière unique en une $\underline{S}$-fonction additive de $\mathrm{Parf}(\underline{S})$ dans $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$ (que nous appellerons encore rang et noterons rg).

Proposition 6.12. a) Pour L, $M \in \text{ob } D^-(X)_{\mathrm{parf}}$ $(X \in \text{ob } \underline{S})$, on a $rg(L \overset{\mathbb{L}}{\otimes} M) = rg(L)\, rg(M)$.

b) Soit $u : (\underline{S}',A') \longrightarrow (\underline{S},A)$ un morphisme de topos localement annelés. Pour $M \in \text{ob } D^-(\underline{S})_{\mathrm{parf}}$, on a $rg(\mathbb{L}u^*(M)) = u^*(rg(M))$.

En d'autres termes, l'homomorphisme rang : $k(D^-(\underline{S})_{\mathrm{parf}}) \longrightarrow \mathbb{Z}_{\underline{S}}$ est un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux, compatible avec les images inverses.

Preuve. Il suffit de montrer que l'homomorphisme induit par le rang sur le faisceau associé à $k(D^-(\underline{S})_{parf})$ est un homomorphisme de faisceaux d'anneaux compatible avec les images inverses. D'après (6.9), on peut remplacer $k(D^-(\underline{S})_{parf})$ par $k(\underline{C}_1)$. On est donc ramené à vérifier a) et b) pour L et M libres de type fini, ce qui est trivial.

6.13. $(\underline{S},A)$ désignant toujours un topos localement annelé, soient $X \in$ ob $\underline{S}$, et $\underline{n} \in H^0(X, \mathbb{Z}_{\underline{S}})$. On définit un objet de Parf(X), noté $A_X^{\underline{n}}$, de la manière suivante. Si $\underline{n}$ est constante de valeur un entier $n \geqslant 0$ (resp. $n < 0$), on pose $A_X^{\underline{n}} = A_X^{n}$ (resp. $A_X^{\underline{n}} = A_X^{-n}[1]$); dans le cas général, on décompose X en morceaux disjoints X_i tels que $\underline{n}|X_i$ soit constante, et $A_X^{\underline{n}}$ est défini comme l'unique objet de Parf(X) induisant $A_{X_i}^{\underline{n}|X_i}$ sur chaque X_i. (On peut, plus généralement, définir $L^{\underline{n}}$ pour $L \in$ ob Parf(X), en posant $L^{\underline{n}} = A_X^{\underline{n}} \otimes L$.). L'application $i_X : H^0(X, \mathbb{Z}_{\underline{S}}) \longrightarrow k(Parf(X))$, définie par $i_X(\underline{n}) = cl(A_X^{\underline{n}})$, est un homomorphisme d'anneaux (tel que $i_X(1) = 1$), et définit, pour X variable, un homomorphisme de préfaisceaux d'anneaux

$$i : \mathbb{Z}_{\underline{S}} \longrightarrow k(Parf(\underline{S})) \quad .$$

Proposition 6.14. *Sous les hypothèses de* (6.13), *on a*

$$rg\ i = Id(\mathbb{Z}_{\underline{S}})$$

(autrement dit, $k(Parf(\underline{S}))$, *considéré comme préfaisceau de* $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$*-algèbres au moyen de* i, *est augmenté vers* $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$ *par le rang). En outre le rang*

$$rg : k(Parf(\underline{S})) \longrightarrow \mathbb{Z}_{\underline{S}}$$

définit un isomorphisme sur les faisceaux associés.

Preuve. La première assertion résulte trivialement des relations $cl(L[1]) = - cl(L)$, $cl(L^n)=ncl(L)$ pour $L \in ob\ Parf(\underline{S})$. Prouvons la seconde. On remarque d'abord que i se factorise de manière évidente à travers $k(\underline{C}_o)$. Comme rg i est l'identité, on est ramené (d'après (6.9)) à prouver que l'homomorphisme i rg : $k(\underline{C}_o) \longrightarrow k(\underline{C}_o)$ induit un isomorphisme sur les faisceaux associés, i.e. que, pour $L \in ob\ \underline{C}_o$, i rg(L) est localement isomorphe à L, ce qui est immédiat.

On en déduit, d'après (6.6.b)) ,

Corollaire 6.15. Sous les hypothèses de (6.13), pour tout faisceau abélien F sur $\underline{S}$, le groupe des $\underline{S}$-fonctions additives de Parf($\underline{S}$) dans F s'identifie canoniquement à $H^o(S,F)$ (S = objet final de $\underline{S}$), la fonction rang correspondant à $F = \mathbb{Z}_{\underline{S}}$ et à la section unité de $\mathbb{Z}_{\underline{S}}$.

7. Dualité des complexes parfaits

7.0. Dans ce numéro, ($\underline{S}$,A) désigne un topos annelé en anneaux commutatifs, on note S l'objet final de $\underline{S}$. On se propose de généraliser aux complexes parfaits les notions de dualité bien connues pour les faisceaux localement libres de type fini.

Proposition 7.1. Soient $E \in ob\ D(S)_{parf}$, $F \in ob\ D^+(S)$.
a) Si F est à cohomologie localement bornée, il en est de même de $\mathbb{R}\underline{Hom}(E,F)$. Si $F \in ob\ D(S)$ est pseudo-cohérent (resp. localement de tor-dimension finie, resp. parfait), il en est de même de $\mathbb{R}\underline{Hom}(E,F)$.

b) Supposons que E soit en outre de tor-dimension finie (condition réalisée si S est de type fini). Alors, si F est à cohomologie bornée (resp. de tor-dimension finie), il en est de même de $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)$. Plus précisément, soient a, b, m, n des entiers tels que $\mathrm{tor.amp}(E) \subset [a,b]$ (ou, ce qui revient au même, d'après (5.8), $\mathrm{parf.amp}(E) \subset [a,b]$) et $H^i(F) = 0$ pour $i \notin [m,n]$ (resp. $\mathrm{tor.amp}(F) \subset [m,n]$). Alors on a $H^i(\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)) = 0$ pour $i \notin [m-b,n-a]$ (resp. $\mathrm{tor.amp}(\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)) \subset [m-b,n-a]$).

Preuve. L'assertion a) est locale, donc on peut supposer E strictement parfait, et l'on gagne par dévissage sur E (en se ramenant à E = A).

Pour l'assertion b), on peut supposer E strictement parfait tel que $E^i = 0$ pour $i \notin [a,b]$, et $F^i = 0$ pour $i \notin [m,n]$ (resp. F^i plat pour tout i et $F^i = 0$ pour $i \notin [m,n]$). Il suffit alors d'appliquer le lemme suivant :

Lemme 7.1.1. Soit $E \in \mathrm{ob}\, D^-(S)$, $F \in \mathrm{ob}\, D^+(S)$. Si E est strictement pseudo-cohérent (i.e. (2.1) à composantes facteurs directs de Modules libres de type fini), la flèche canonique de $D^+(S)$

$$\underline{\mathrm{Hom}}^\cdot(E,F) \longrightarrow \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)$$

est un isomorphisme.

Preuve. La suite spectrale

$$E_2^{pq} = \underline{H}^p(\underline{\mathrm{Ext}}^q(E,F)^\cdot) \Longrightarrow \underline{\mathrm{Ext}}^*(E,F) \quad ,$$

où $\underline{\mathrm{Ext}}^q(E,F)^i = \prod_{i_2-i_1=i} \underline{\mathrm{Ext}}^q(E^{i_1}, F^{i_2})$,

dégénère puisque $\underline{\mathrm{Ext}}^q(E,F)^\cdot = 0$ pour tout $q > 0$ (1.3.1). On en déduit des isomorphismes

$$E_2^{pq} = \underline{H}^p(\underline{Hom}^\cdot(E,F)) \xrightarrow{\sim} \underline{Ext}^p(E,F) = \underline{H}^p(\mathbb{R}\,\underline{Hom}(E,F)) \quad ,$$

ce qui démontre l'assertion.

Proposition 7.1.2. Soit $f : (S',A') \longrightarrow (S,A)$ un morphisme de topos annelés. Soient $E \in \mathrm{ob}\, D^-(S)$ et $F \in \mathrm{ob}\, D^b(S)$ tels que l'on ait $\mathbb{R}\underline{Hom}(E,F) \in \mathrm{ob}\, D^b(S)$ et $\mathbb{L}f^*(F) \in \mathrm{ob}\, D^b(S')$. Il existe une flèche canonique fonctorielle

$$\mathbb{L}f^*\, \mathbb{R}\underline{Hom}(E,F) \longrightarrow \mathbb{R}\underline{Hom}(\mathbb{L}f^*E,\ \mathbb{L}f^*F) \quad .$$

Celle-ci est un isomorphisme si E est parfait.

Preuve. En vertu de l'adjonction des foncteurs $\mathbb{L}f^*$ et $\mathbb{R}f_*$, il suffit de définir une flèche

$$\mathbb{R}\underline{Hom}(E,F) \longrightarrow \mathbb{R}f_*\ \mathbb{R}\underline{Hom}(\mathbb{L}f^*E\ ,\ \mathbb{L}f^*F) \quad .$$

On utilise pour cela la flèche d'adjonction $F \longrightarrow \mathbb{R}f_*\mathbb{L}f^*F$ et l'isomorphisme de dualité

$$\mathbb{R}f_*\ \mathbb{R}\underline{Hom}(\mathbb{L}f^*E, \mathbb{L}f^*F) \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}\underline{Hom}(E, \mathbb{R}f_*\mathbb{L}f^*F) \quad .$$

Pour voir que la flèche de (7.1.2) est un isomorphisme pour E parfait, on se ramène trivialement, par localisation et dévissage, au cas où $E = A$, auquel cas c'est une tautologie.

Proposition 7.2. Il existe (cf. SGA 5 I 1.6), pour $E \in \mathrm{ob}\, D(S)$ et $F \in \mathrm{ob}\, D^+(S)$, une flèche canonique fonctorielle

$$E \longrightarrow \mathbb{R}\underline{Hom}(\mathbb{R}\underline{Hom}(E,F),F) \quad .$$

Celle-ci est un isomorphisme si $E \in \mathrm{ob}\, D(S)_{parf}$ et $F = A$.

Preuve. On définit la flèche en résolvant F injectivement et en utilisant la flèche canonique de K(S)

$$E \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}^{\cdot}(\underline{\mathrm{Hom}}^{\cdot}(E,F),F) \quad .$$

Pour voir que la flèche en question est un isomorphisme si E est parfait et F = A, on se ramène, par localisation et dévissage, à E = A, auquel cas c'est évident.

Définition 7.3. Soit $E \in$ ob D(S). Nous poserons $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,A) = E^{\check{}}$, et nous dirons que $E^{\check{}}$ est le dual de E.

D'après (7.1) et (7.2), si $E \in$ ob D(S) est parfait (resp. parfait et de tor-dimension finie), $E^{\check{}}$ l'est également, et la flèche canonique $E \longrightarrow E^{\check{}\check{}}$ est un isomorphisme. En d'autres termes, le foncteur $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(\ ,A)$ définit une anti-auto-équivalence de la catégorie $D(S)_{\mathrm{parf}}$ (resp. $D(S)_{\underline{\mathrm{parf}}}$ (5.8.4.b))) avec elle-même.

Lemme 7.4 (isomorphisme de CARTAN) (cf. ([H] II 5.15)). Pour $E \in$ ob D(S), $F \in$ ob $D^{-}(S)$, $G \in$ ob $D^{+}(S)$, il existe des isomorphismes fonctoriels canoniques :

$$\underline{\mathrm{RHom}}(E \overset{\mathbb{L}}{\otimes} F, G) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}(E, \underline{\mathrm{RHom}}(F,G)) \quad ,$$

$$\mathrm{RHom}(E \overset{\mathbb{L}}{\otimes} F, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(E, \underline{\mathrm{RHom}}(F,G)) \quad ,$$

$$\mathrm{Hom}(E \overset{\mathbb{L}}{\otimes} F, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E, \underline{\mathrm{RHom}}(F,G)) \quad .$$

Preuve : C'est standard : résoudre G injectivement et F platement.

Lemme 7.5. Pour $E \in \text{ob } D^-(S)$, $F \in \text{ob } D^+(S)$, il existe un homomorphisme fonctoriel canonique

$$E \overset{L}{\otimes} R\underline{\mathrm{Hom}}(E,F) \longrightarrow F$$

Proposition 7.6 (cf. ([H] II 5.13)). Soient $E \in \text{ob } D(S)$, $F \in \text{ob } D^+(S)$, $G \in \text{ob } D^+(S)$. Sous l'une des hypothèses suivantes

i) G de tor-dimension finie,

ii) $E \in \text{ob } D^-(S)$, F de tor-dimension finie et $G \in \text{ob } D^b(S)$,

il existe un homomorphisme fonctoriel canonique

$$R\underline{\mathrm{Hom}}(E,F) \overset{L}{\otimes} G \longrightarrow R\underline{\mathrm{Hom}}(E, F \overset{L}{\otimes} G) \quad .$$

Celui-ci est un isomorphisme quand E est parfait.

Preuve. Définissons la flèche. Sous l'hypothèse (i), il suffit de résoudre F injectivement et G platement. Sous l'hypothèse (ii), il est équivalent, d'après (7.4), de définir une flèche

$$E \overset{L}{\otimes} R\underline{\mathrm{Hom}}(E,F) \overset{L}{\otimes} G \longrightarrow F \overset{L}{\otimes} G \quad .$$

On applique le foncteur $\overset{L}{\otimes} G$ à la flèche de (7.5).

Pour voir que la flèche est un isomorphisme quand E est parfait, on utilise la méthode standard (cf. preuve de (7.2)) : on se ramène, par localisation et dévissage, au cas où E = A.

Corollaire 7.7. Il existe, pour $E \in \mathrm{ob}\, D(S)_{parf}$ et $F \in \mathrm{ob}\, D^+(S)$, un isomorphisme fonctoriel

$$E^\vee \overset{L}{\otimes} F \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F) \quad ,$$

avec la notation de (7.3).

Preuve. Appliquer (7.6), F et G étant remplacés respectivement par A et F, et tenir compte du fait (7.1) que $E^\vee \in \mathrm{ob}\, D(S)_{parf}$.

Corollaire 7.8. Soient $E, F \in \mathrm{ob}\, D(S)_{parf}$. Il existe une flèche naturelle

$$\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F) \overset{L}{\otimes} \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,E) \longrightarrow A \ ,$$

qui est une "dualité parfaite", i.e. identifie modulo (7.4) chacun des complexes $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)$, $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,E)$ au dual de l'autre (au sens de (7.3)).

Preuve. D'après (7.5), on a des accouplements naturels $E^\vee \overset{L}{\otimes} E \longrightarrow A$, $F^\vee \overset{L}{\otimes} F \longrightarrow A$, d'où, par produit tensoriel, un accouplement naturel

$$E^\vee \overset{L}{\otimes} F \overset{L}{\otimes} F^\vee \overset{L}{\otimes} E \longrightarrow A \ ,$$

qui, compte tenu de (7.7), donne l'accouplement annoncé sur les $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}$. Montrons qu'il s'agit d'une dualité parfaite. On a les isomorphismes canoniques

$$\begin{aligned} \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F^\vee \overset{L}{\otimes} E \ , \ A) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F^\vee, E^\vee) && (7.4) \\ &\xrightarrow{\sim} F^{\vee\vee} \overset{L}{\otimes} E^\vee && (7.6) \\ &\xrightarrow{\sim} F \overset{L}{\otimes} E^\vee && (7.2) \ . \end{aligned}$$

Donc, moyennant une vérification de compatibilité, on a gagné. On pourrait aussi se localiser et dévisser pour se ramener à $E = F = A$.

Exercice 7.9. Soient $E, F \in \mathrm{ob}\, D(S)_{\underline{parf}}$. Montrer qu'il existe un isomorphisme canonique

$$E^\vee \overset{L}{\otimes} F^\vee \xrightarrow{\sim} (E \overset{L}{\otimes} F)^\vee \quad .$$

8. Traces et cup-produits

8.0. Dans ce numéro, on généralise aux complexes parfaits la notion de trace d'un endomorphisme d'un module projectif de type fini (voir SGA 5 III pour des applications). Les hypothèses et notations sont celles de (7.0).

8.1. Soit $E \in \mathrm{ob}\, D(S)_{\underline{parf}}$ (5.8.4.b)). Il existe une flèche naturelle

$$\tau : \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,E) \longrightarrow A ,$$

composée de l'isomorphisme inverse de (7.7) $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,E) \xrightarrow{\sim} E^\vee \overset{L}{\otimes} E$ et de la flèche canonique (7.5) $E^\vee \overset{L}{\otimes} E \longrightarrow A$.

Soit $U \in \mathrm{ob}\, \underline{S}$. Appliquant à τ le foncteur $H^0(U,.)$, et tenant compte du fait que $H^0(U, \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,E))$ s'identifie à $\mathrm{Hom}_{D(U)}(E|U, E|U)$, on en déduit un homomorphisme de $H^0(U,A)$-modules,

$$\mathrm{Tr}_{E|U} : \mathrm{Hom}_{D(U)}(E|U , E|U) \longrightarrow H^0(U,A) ,$$

que l'on appelle homomorphisme trace(*).

Avant d'aller plus loin, donnons quelques propriétés de la trace qui découlent immédiatement de la définition.

(*) L'hypothèse de tor-dimension finie sur E est en fait superflue pour la définition de $\mathrm{Tr}_{E|U}$, voir (8.5).

8.1.1. Si $E = A$, $Tr_{A|U} : \mathrm{Hom}(A|U, A|U) \longrightarrow H^0(U,A)$ n'est autre que l'isomorphisme bien connu. Si E est facteur direct d'un Module libre de type fini, un homomorphisme de E dans E au-dessus de U est défini localement par

$$e \longmapsto \sum \langle e , x_i^\vee \rangle \ x_i \ ,$$

où x_i (resp. $x_i^\vee$) est une section locale de E (resp. $E^\vee$); la trace correspondante est $\sum \langle x_i , x_i^\vee \rangle$. On en déduit facilement que si E et F sont des facteurs directs de Modules libres de type fini, et si $u : (E+F)|U \longrightarrow (E+F)|U$ est défini par une matrice $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on a

$$Tr_{(E+F)|U}(u) = Tr_{E|U}(a) + Tr_{F|U}(d) \ .$$

8.1.2. Soient E un complexe strictement parfait, $U \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, $u : E|U \longrightarrow E|U$ un homomorphisme de complexes, de composantes $u^i : E^i|U \longrightarrow E^i|U$.

On a alors

$$Tr_{E|U}(u) = \sum (-1)^i \, Tr_{E^i|U}(u^i) \ .$$

En effet, la question étant locale, on peut supposer que u est défini par une section de $\underline{H}^0(E^\vee \otimes E)$, et même que cette section est du type $\coprod_i \sum_j x_{ij}^\vee \otimes x_{ij}$, où x_{ij} (resp. $x_{ij}^\vee$) est une section de E^i (resp. $E^{i\vee}$). Explicitant la flèche (7.5) $E^\vee \otimes E \longrightarrow A$, on trouve

$$Tr_{E|U}(u) = \sum (-1)^i \langle x_{ij}, x_{ij}^\vee \rangle = \sum (-1)^i \, Tr_{E^i|U}(u^i) \ , \ \text{cqfd.}$$

8.2. Soient $E, F \in \mathrm{ob}\ D(S)_{\underline{parf}}$. On a vu (7.8) qu'il existe un homomorphisme canonique

$$\gamma : \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F) \overset{L}{\otimes} \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,E) \longrightarrow A \ .$$

Soit $U \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, et donnons-nous $u \in H^0(U, \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F))$ et $v \in H^0(U, \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,E))$.

On peut interpréter u (resp. v) comme un homomorphisme, dans D(U), de A|U dans $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F)|U$ (resp. $\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,E)|U$), et former

$$u \overset{L}{\otimes} v : A|U \longrightarrow (\mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F) \overset{L}{\otimes} \mathbb{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,E))|U .$$

L'application $(u,v) \longmapsto \langle u,v\rangle = \gamma \circ (u \overset{L}{\otimes} v)$ définit une application $H^0(U,A)$-linéaire,

$$\mathrm{Hom}_{D(U)}(E|U,F|U) \otimes_{H^0(U,A)} \mathrm{Hom}_{D(U)}(F|U,E|U) \longrightarrow H^0(U,A) ,$$

que nous appellerons <u>cup-produit</u> (*).

Le lien entre trace et cup-produit s'exprime dans la

<u>Proposition</u> 8.3. <u>Dans la situation de</u> (8.2), <u>pour</u> $u \in \mathrm{Hom}(E|U,F|U)$ <u>et</u> $v \in \mathrm{Hom}(F|U,E|U)$, <u>on a</u>

$$\mathrm{Tr}_{E|U}(vu) = \mathrm{Tr}_{F|U}(uv) = \langle u,v\rangle .$$

<u>En particulier</u>, <u>si</u> E = F, <u>on a</u>

$$\mathrm{Tr}_{E|U}(u) = \langle u , \mathrm{Id}\rangle = \langle \mathrm{Id} , u\rangle .$$

<u>Preuve</u>. Pour simplifier, nous supposerons U = S. On a donc deux flèches $u : A \longrightarrow E^\vee \overset{L}{\otimes} F$ et $v : A \longrightarrow F^\vee \overset{L}{\otimes} E$, d'où

$$u \overset{L}{\otimes} v : A \longrightarrow E^\vee \overset{L}{\otimes} F \overset{L}{\otimes} F^\vee \overset{L}{\otimes} E .$$

D'autre part, on a vu : $A \longrightarrow E^\vee \overset{L}{\otimes} E$ et $uv : A \longrightarrow F^\vee \overset{L}{\otimes} F$. La proposition résulte de la commutativité des diagrammes suivants (laquelle est de vérification "purement mécanique") :

(*) même remarque que pour la définition de $\mathrm{Tr}_{E|U}$



Corollaire 8.4. E, F, U étant donnés comme en (8.2), soient $u \in \mathrm{Hom}(E|U, E|U)$, $s : E|U \longrightarrow F|U$ un isomorphisme, d'où $sus^{-1} \in \mathrm{Hom}(F|U, F|U)$. On a alors

$$\mathrm{Tr}_{F|U}(sus^{-1}) = \mathrm{Tr}_{E|U}(u) \quad .$$

Preuve. C'est immédiat.

Remarque 8.5. Si $\underline{C}$ est une $\underline{S}$-catégorie fibrée, notons $E(\underline{C})$ la $\underline{S}$-catégorie fibrée dont la fibre en $U \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$ est la catégorie ayant pour objets les couples (L,u) où $L \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_U$ et $u \in \mathrm{End}_{\underline{S}}(L)$ et pour flèches de (L,u) à (M,v) les flèches $f : L \longrightarrow M$ telles que $fu = vf$. On peut, d'après (8.4), considérer l'homomorphisme trace comme un $\underline{S}$-foncteur de $E(D(\underline{S})_{\underline{parf}})^{is}$ dans $\underline{A}$ (où l'exposant is signifie que les seules flèches considérées sont les isomorphismes, et $\underline{A}$ est la $\underline{S}$-catégorie à fibres discrètes définie par A (cf.(6.6.a))). Comme tout complexe parfait est localement de tor-dimension finie, le $\underline{S}$-foncteur d'oubli

$$E(D(\underline{S})_{\underline{parf}})^{is} \longrightarrow E(D(\underline{S})_{parf})^{is}$$

induit un isomorphisme sur les champs associés. Par suite, l'homomorphisme

trace se prolonge de manière unique en un $\underline{S}$-foncteur de $E(D(\underline{S})_{parf})^{is}$ dans $\underline{A}$. Pour $E \in ob\ Parf(U)$ ($U \in ob\ \underline{S}$), on note encore

$$Tr_E : Hom(E,E) \longrightarrow H^o(U,A)$$

l'homomorphisme correspondant, qui est un homomorphisme de $H^o(U,A)$-modules. On voit de même que la définition du cup-produit (8.2), ainsi que les assertions (8.3) et (8.4) se généralisent au cas de complexes parfaits (non nécessairement de tor-dimension finie).

Proposition 8.6. Soient $U \in ob\ \underline{S}$, $E, F \in Parf(U)$, $u \in Hom(E,E)$, $v \in Hom(F,F)$, d'où $u \overset{L}{\otimes} v \in Hom(E \overset{L}{\otimes} F, E \overset{L}{\otimes} F)$. On a

$$Tr_{E \overset{L}{\otimes} F}(u \overset{L}{\otimes} v) = Tr_E(u)\ Tr_F(v) \quad .$$

Preuve. La question étant locale, on peut supposer grâce à (8.4) et (4.10), que u et v sont des flèches de $K^b(\underline{C}_o)$. Utilisant (8.1.2), on se ramène au cas où u et v sont des flèches de $\underline{C}_o$. On termine grâce à (8.1.1).

I

BIBLIOGRAPHIE

[H] Hartshorne, R. Residues and Duality, Lecture Notes n° 20, Springer, 1966.

[V] Verdier, J-L. Catégories dérivées, I.H.E.S., 1963.

[G] Giraud, J. Cohomologie non abélienne, à paraître dans North Holl. Pub. Comp.

SGA 4 Cohomologie étale des schémas, par M. Artin, A. Grothendieck, et J-L. Verdier, à paraître dans North Holl. Pub. Comp.

SGA 5 Cohomologie ℓ-adique et fonctions L, par A. Grothendieck, à paraître dans North Holl. Pub. Comp.

[1] Hakim, M. Topos annelés et schémas relatifs, thèse (en préparation).

[2] Verdier, J-L. Les catégories dérivées des catégories abéliennes, à paraître dans North Holl. Pub. Comp.

[MULT] Cartan, H. et Eilenberg, S. Homological Algebra, Princeton, 1956.

Exposé II

EXISTENCE DE RÉSOLUTIONS GLOBALES

par L. ILLUSIE

1. Critères généraux de globalisation

1.0. Dans ce numéro, on se donne un site $\underline{S}$, une $\underline{S}$-catégorie abélienne plate $\underline{C}$ (I 1.1), et une sous-$\underline{S}$-catégorie additive strictement pleine $\underline{C}_o$ (I 1.1). On suppose $\underline{C}_o$ localement quasi-relevable dans $\underline{C}$ (I 1.2) et localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

Proposition 1.1. *Soit $S \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, et supposons que :*
(i) *$\underline{C}_{oS}$ est quasi-relevable dans $\underline{C}_S$ (I 1.2) ($\underline{C}_S$ étant considérée comme catégorie fibrée sur un site ponctuel) ;*
(ii) *tout objet de $\underline{C}_S$ qui est de $\underline{C}_o$-type fini (I 1.2) (resp. de $\underline{C}_o$-présentation finie (I 2.8)) est de $\underline{C}_{oS}$-type fini.*

Alors :

a) *$\underline{C}_{oS}$ est quasi-stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2) ($\underline{C}_{oS}$ étant considérée comme catégorie fibrée sur un site ponctuel).*

b) *Soient $E \in \mathrm{ob}\ D^-(\underline{C}_S)$ et $n \in \underline{\mathbf{Z}}$. Si E est n-$\underline{C}_o$-pseudo-cohérent (I 2.3), E est n-$\underline{C}_{oS}$-pseudo-cohérent (resp. $(n+1)$-$\underline{C}_{oS}$-pseudo-cohérent). En d'autres termes, on a*

$$D^-(\underline{C}_S)_{n\text{-}\underline{C}_o\text{-coh}} = D^-(\underline{C}_S)_{n\text{-}\underline{C}_{oS}\text{-coh}}$$

(resp. $D^-(\underline{C}_S)_{n\text{-}\underline{C}_o\text{-coh}} \subset D^-(\underline{C}_S)_{(n+1)\text{-}\underline{C}_{oS}\text{-coh}} \subset D^-(\underline{C}_S)_{(n+1)\text{-}\underline{C}_o\text{-coh}}$,

inclusions de sous-catégories strictement pleines de $D(\underline{C}_S)$, l'inclusion de droite étant d'ailleurs triviale).

c) *Pour que $E \in \mathrm{ob}\ D^-(\underline{C}_S)$ soit pseudo-cohérent relativement à $\underline{C}_o$ (I 2.3), il faut et il suffit qu'il le soit relativement à $\underline{C}_{oS}$; autrement dit, on a*

$$D^-(\underline{C}_S)_{\underline{C}_o\text{-coh}} = D^-(\underline{C}_S)_{\underline{C}_{oS}\text{-coh}} .$$

En outre, le foncteur canonique

$$K^-(\underline{C}_{oS})/K^{-,\phi}(\underline{C}_{oS}) \longrightarrow D(\underline{C}_S) ,$$

où $K^{-,\phi}(\underline{C}_{oS})$ désigne la sous-catégorie épaisse de $K^-(\underline{C}_{oS})$ formée des com-

plexes acycliques, est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(\underline{C}_S)_{\underline{C}_o\text{-coh}}$. Si $\underline{C}_{oS}$ est relevable dans $\underline{C}_S$ (I 1.2) (i.e. si les objets de $\underline{C}_{oS}$ sont projectifs), la catégorie $K^{-,\phi}(\underline{C}_{oS})$ est réduite aux objets nuls, et par suite le foncteur

$$K^-(\underline{C}_{oS}) \longrightarrow D(\underline{C}_S)$$

est pleinement fidèle (et a pour image essentielle $D^-(\underline{C}_S)_{\underline{C}_o\text{-coh}}$).

Preuve. a) Soit

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow L^0 \longrightarrow \dots \longrightarrow L^m \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\underline{C}_S$, avec $L^i \in \mathrm{ob}\ \underline{C}_{oS}$ pour tout i ; il s'agit de montrer que L est de $\underline{C}_{oS}$-type fini. Or, d'après (I 2.2), L est $\underline{C}_o$-pseudo-cohérent, donc (I 2.9) de $\underline{C}_o$-présentation finie, et l'assertion résulte de (ii).

b) Montrons, par récurrence descendante sur i, que E est i-$\underline{C}_{oS}$-pseudo-cohérent pour $i \geqslant n$ (resp. $i \geqslant n+1$). On peut déjà supposer E strictement $(n+1)$-$\underline{C}_{oS}$-pseudo-cohérent (resp. $(n+2)$-$\underline{C}_{oS}$-pseudo-cohérent) (I 2.1), et il s'agit de prouver que E est n-$\underline{C}_{oS}$-pseudo-cohérent (resp. $(n+1)$-$\underline{C}_{oS}$-pseudo-cohérent). On a donc un suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0 \quad ,$$

où E' est strictement $\underline{C}_{oS}$-parfait (I 2.1) et $E''^i = 0$ pour $i > n$ (resp. $i > n+1$). Quitte à remplacer E par E'', on peut donc supposer (I 2.6) que $E^i = 0$ pour $i > n$ (resp. $i > n+1$). Alors, d'après (I 2.10 a)), $H^n(E)$ (resp. $H^{n+1}(E)$) est de $\underline{C}_o$-type fini (resp. de $\underline{C}_o$-présentation finie). Donc, d'après (ii), $H^n(E)$ (resp. $H^{n+1}(E)$) est de $\underline{C}_{oS}$-type fini. Appliquant à nouveau (I 2.10 b)), on en déduit que E est n-$\underline{C}_{oS}$-pseudo-cohérent (resp. $(n+1)$-$\underline{C}_{oS}$-pseudo-cohérent), cqfd. (N.B. l'hypothèse (i) et l'assertion a) ont été utilisées implicitement dans les références à (I 2.6 et 2.10)).

c) La première assertion découle de b), la seconde de (I 2.7) ; la dernière est évidente.

Proposition 1.2. Supposons $\underline{C}_o$ localement relevable dans $\underline{C}$ (I 1.2) et localement stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2), et faisons les hypo-

thèses (1.1 (i) et (ii) respée). Notons $\underline{C}_{1S}$ la sous-catégorie strictement pleine de $\underline{C}_S$ formée des objets qui sont localement dans $\underline{C}_o$. Alors :

a) $\underline{C}_{1S}$ est stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2) et quasi-relevable dans $\underline{C}_S$ (I 1.2) (en tant que catégorie fibrée sur un site ponctuel).

b) Soient $E \in \mathrm{ob}\, D(\underline{C}_S)$ et $[m,n]$ un intervalle de $\underline{\mathbb{Z}}$. Pour que E soit de $\underline{C}_o$-amplitude parfaite contenue dans $[m,n]$, il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(\underline{C}_S)$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m,n]$, $F^i \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_{oS}$ pour $i > m$, et $F^m \in \mathrm{ob}\, \underline{C}_{1S}$.

c) Le foncteur canonique

$$K^b(\underline{C}_{1S})/K^{b,\phi}(\underline{C}_{1S}) \longrightarrow D(\underline{C}_S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D(\underline{C}_S)$ formée des complexes d'amplitude $\underline{C}_o$-parfaite finie.

d) Si $\underline{C}_{1S}$ est non seulement quasi-relevable mais relevable dans $\underline{C}_S$, on peut remplacer dans b) l'expression "E soit isomorphe à F dans $D(\underline{C}_S)$" par " il existe un quasi-isomorphisme $F \to E$", et dans c) la catégorie $K^{b,\phi}(\underline{C}_{1S})$ est réduite aux objets nuls.

Preuve. a) Il est clair que $\underline{C}_{1S}$ est stable par noyau d'épimorphisme. D'autre part, les objets de $\underline{C}_{1S}$ sont $\underline{C}_o$-pseudo-cohérents donc $\underline{C}_{oS}$-pseudo-cohérents d'après (1.1 c)) ; la deuxième assertion résulte donc de (I 2.14) (où l'on prend pour $\underline{S}$ le site ponctuel).

b) Il suffit de démontrer la nécessité. On sait déjà, grâce à (1.1 c)), que E est $\underline{C}_{oS}$-pseudo-cohérent. Comme E est acyclique en degré $> n$, on peut donc supposer (I 2.10), quitte à remplacer E par un complexe isomorphe dans $D^-(\underline{C}_S)$, que E est strictement $(m+1)$-$\underline{C}_{oS}$-pseudo-cohérent et que $E^i = 0$ pour $i > n$. Comme E est acyclique en degré $< m$, on peut en outre supposer, quitte à remplacer E par son tronqué

$$0 \longrightarrow E^m/B^m \longrightarrow E^{m+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0 \quad ,$$

que $E^i = 0$ pour $i < m$. Alors, d'après (I 4.16), E^m est localement objet de $\underline{C}_o$, donc objet de $\underline{C}_{1S}$, ce qui démontre l'assertion.

c) Compte tenu de (1.2 a)), l'assertion résulte de (1.2 b)) et (I 4 12.2).

d) Le fait que $K^{b,\phi}(\underline{C}_{1S})$ est réduite aux objets nuls est évident. L'autre assertion résulte de (I 4.6) (appliqué sur le site ponctuel).

2. Application à certaines catégories de Modules

2.0. Notations

Soit $(\underline{S},A)$ un topos annelé. Pour $U \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, on note Mod(U) la catégorie des A_U-Modules à gauche, et Lib(U) (resp. Loclib(U)) la sous-catégorie pleine de Mod(U) formée des A_U-Modules libres (resp. localement facteurs directs de libres) de type fini.

2.1. Lemmes de relèvement

Lemme 2.1.1 (cf. EGA O_I 5.2.3). *Soient $(\underline{S},A)$ un topos annelé, et $S \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$. On suppose que $\underline{S}$ est quasi-compact, i.e. que toute famille couvrante $(S_i \longrightarrow S)$ est majorée par une famille couvrante finie.*

a) *Soit F un A_S-Module à gauche limite inductive, suivant une catégorie filtrante Λ, de A_S-Modules F_λ, et soit*

$$u = \varinjlim u_\lambda : F \longrightarrow G$$

un épimorphisme, où G est un A_S-Module de type fini. Il existe alors $\lambda \in \Lambda$ tel que u_λ soit un épimorphisme.

b) *Soit F un A_S-Module à gauche engendré par ses sections (i.e. tel qu'il existe un épimorphisme $A_S^{(I)} \longrightarrow F$ pour un ensemble d'indices I convenable). Alors, si F est de type fini, il existe un épimorphisme $A_S^p \longrightarrow F$ pour $p \in \underline{\mathbb{N}}$.*

La preuve de a) est analogue à celle de (loc. cit.) et laissée en exercice au lecteur, et b) résulte aussitôt de a).

Lemme 2.1.2. *Soient $(\underline{S},A)$ un topos annelé, $\underline{C}$ la $\underline{S}$-catégorie fibrée des A-Modules à gauche, $\underline{C}_o$ la sous-catégorie fibrée des A-Modules libres de type fini (I 1.3 d)), $S \in \mathrm{ob}\ \underline{S}$, C'_S une sous-catégorie additive strictement pleine de $\underline{C}_S$ contenant $\underline{C}_{oS}$ et stable par noyau, conoyau et extension. On suppose que*

$$H^1(S,F) = 0 \quad \text{pour tout } F \in \text{ob } \underline{C}'_S \ .$$

Alors :

a) Toute suite exacte de $\underline{C}'_S$:

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0,$$

telle que $\underline{\mathrm{Hom}}(G,E) \in \text{ob } \underline{C}'_S$ et que G soit localement facteur direct d'un Module libre de type fini, est scindée. La catégorie $\underline{C}_{oS}$ est relevable dans $\underline{C}'_S$ (I 1.2).

b) Notons Mod(A(S)) la catégorie des A(S)-modules. Le foncteur

$$\Gamma'_S : \underline{C}'_S \longrightarrow \mathrm{Mod}(A(S))$$

est exact. En outre :

(i) Si tout objet F de $\underline{C}'_S$ admet une présentation finie globale

$$A_S^{\,p} \longrightarrow A_S^{\,q} \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

le foncteur $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \longrightarrow \mathrm{Mod}(A(S))$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de Mod(A(S)) formée des A(S)-modules de présentation finie ;

(ii) Si $\underline{C}'_S$ contient les A_S-Modules libres, si tout objet F de $\underline{C}'_S$ admet une présentation globale

$$A_S^{(I)} \longrightarrow A_S^{(J)} \longrightarrow F \longrightarrow 0 \ ,$$

et si le foncteur Γ'_S commute aux limites inductives filtrantes ([1]), le foncteur $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \longrightarrow \mathrm{Mod}(A(S))$ est une équivalence de catégories.

Preuve. a) Comme G est localement facteur direct d'un libre de type fini, la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(S,\underline{\mathrm{Ext}}^q(G,E)) \Longrightarrow \mathrm{Ext}^{\#}(G,E)$$

dégénère (I 1.3.1) et donne un isomorphisme

$$H^1(S,\underline{\mathrm{Hom}}(G,E)) \simeq \mathrm{Ext}^1(G,E),$$

([1]) hypothèse vérifiée si S est localement de type fini (SGA 4 VI 1.2) ou si S est le topos des faisceaux d'ensembles sur un espace compact et S l'objet final (T.F II 3.10.1).

d'où la première assertion. La seconde en est un cas particulier, puisque, pour $G \in \text{ob } \underline{C}_{oS}$, i.e. G libre et de type fini, et $E \in \text{ob } \underline{C}'_S$, on a $\underline{\text{Hom}}(G,E) \in \text{ob } \underline{C}'_S$.

b) La première assertion est triviale. Prouvons maintenant, dans le cas (i) ou (ii), la pleine fidélité de $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$. Soient $F, G \in \text{ob } \underline{C}'_S$, et soit

(ж) $A_S^{(I)} \longrightarrow A_S^{(J)} \longrightarrow F \longrightarrow 0$

une présentation globale de F (avec I et J finis dans le cas (i)). Appliquant à (ж) le foncteur Γ'_S, qui est exact sur $\underline{C}'_S$ et commute, dans le cas (ii), aux limites inductives filtrantes, on obtient une suite exacte

(жж) $A(S)^{(I)} \longrightarrow A(S)^{(J)} \longrightarrow \Gamma'_S(F) \longrightarrow 0$.

D'autre part, appliquant à (ж) (resp. (жж)) le foncteur exact à gauche $\text{Hom}_{A_S}(.,G)$ (resp. $\text{Hom}_{A(S)}(.,\Gamma'_S(F))$), on obtient un diagramme commutatif où les lignes sont exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 \longrightarrow \text{Hom}_{A_S}(F,G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A_S}(A_S^{(J)},G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A_S}(A_S^{(I)},G) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 \longrightarrow \text{Hom}_{A(S)}(F,G) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(J)},\Gamma'_S(G)) & \longrightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(I)},\Gamma'_S(G)). \end{array}$$

Les deux flèches verticales de droite sont visiblement des isomorphismes il en est donc de même de la flèche verticale de gauche, ce qui démontre la pleine fidélité de $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$. La caractérisation de l'image essentielle, dans le cas (i) ou (ii), est immédiate et laissée au lecteur.

Lemme 2.1.3. Soient A et B des catégories abéliennes, et $\phi : A \longrightarrow B$ un foncteur exact.

a) Pour $M \in \text{ob } A$, les conditions suivantes sont équivalentes :
(i) pour tout $L \in \text{ob } A$, la flèche canonique (induite par ϕ)

$$\text{Ext}_A^n(L,M) \longrightarrow \text{Ext}_B^n(\phi(L),\phi(M))$$

est un isomorphisme pour tout n ;
(ii) pour tout $L \in \text{ob } A$, la flèche canonique

$$\mathrm{Hom}_A(L,M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_B(\phi(L),\phi(M))$$

est un isomorphisme, et pour tout $n \geqslant 1$ et tout $x \in \mathrm{Ext}^n_B(\phi(L),\phi(M))$ il existe un épimorphisme $L' \longrightarrow L$ de A qui efface x.

b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tous L, $M \in$ ob A et tout $n \in \underline{Z}$, la flèche canonique

$$\mathrm{Ext}^n_A(L,M) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_B(\phi(L),\phi(M))$$

est un isomorphisme ;

(ii) le foncteur canonique (induit par ϕ)

$$D^b(A) \longrightarrow D^b(B)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D^b(B)$ formée des complexes F tels que $H^i(F)$ soit dans l'image essentielle de ϕ pour tout i.

Preuve. a) Pour l'implication (i) $\Longrightarrow$ (ii), il suffit de montrer ceci : soient $n \geqslant 1$, $L \in$ ob A, et $y \in \mathrm{Ext}^n_A(L,M)$, il existe alors un épimorphisme $L' \longrightarrow L$ qui efface y. On peut, pour cela, utiliser l'interprétation de Yoneda ([18] III 3.2) : y est la classe d'une suite exacte

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow E_{n-1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow E_o \longrightarrow L \longrightarrow 0 \quad ;$$

l'épimorphisme $E_o \longrightarrow L$ efface y ([18] III 3.2.5 et 3.2.8). Prouvons (ii) $\Longrightarrow$ (i). Posons, pour abréger,

$$\mathrm{Ext}^n_A(.,M) = F^n \quad , \quad \mathrm{Ext}^n_B(\phi(.),\phi(M)) = G^n \quad .$$

L'hypothèse d'effaçabilité signifie que l'on a, pour $n \geqslant 1$, et $L \in$ ob A,

$$G^n(L) = \varinjlim \mathrm{Coker}(G^{n-1}(L_o) \longrightarrow G^{n-1}(L_1)) \quad ,$$

la limite inductive étant prise suivant l'ensemble des suites exactes

$0 \longrightarrow L_1 \longrightarrow L_o \longrightarrow L \longrightarrow 0$. D'après ce qu'on a vu plus haut, on a de même

$$F^n(L) = \varinjlim \mathrm{Coker}(F^{n-1}(L_o) \longrightarrow F^{n-1}(L_1)) \quad .$$

comme $\phi = \phi^\circ : F^\circ \longrightarrow G^\circ$ est un isomorphisme, il en résulte, par récurrence sur n, que le morphisme $\phi^n : F^n \longrightarrow G^n$ induit par ϕ est un isomorphisme pour tout n.

b) L'équivalence (i)$\Longleftrightarrow$(ii) résulte d'un dévissage immédiat, laissé au lecteur.

Remarques 2.1.3.1. On a bien entendu une équivalence duale de a), qu'on laisse au lecteur le soin d'énoncer. D'autre part, si A et B ont assez d'injectifs, les conditions (i) et (ii) de b) sont équivalentes à (iii) pour $L \in \mathrm{ob}\, D^-(A)$ et $M \in \mathrm{ob}\, D^+(A)$, la flèche canonique

$$\underline{R}\,\mathrm{Hom}(L,M) \longrightarrow \underline{R}\,\mathrm{Hom}(\phi(L),\phi(M))$$

est un isomorphisme, comme on le voit aussitôt par un argument de suite spectrale.

2.2. Schémas noethériens et schémas divisoriels

Notations 2.2.1. Soit S un schéma. On note Qcoh(S) (resp. Coh(S)) la catégorie (abélienne) des $\underline{O}_S$-Modules quasi-cohérents (resp. cohérents). Soit $[m,n]$ un intervalle de $\underline{Z}$. On dira qu'un objet E de D(Qcoh(S)) est n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent, resp. d'amplitude parfaite contenue dans $[m,n]$, resp. parfait) si E est n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent, resp. d'amplitude parfaite contenue dans $[m,n]$, resp. parfait) relativement à la catégorie fibrée sur le site zariskien de S définie par $U \longmapsto \mathrm{Loclib}(U)$ ((I 2.3), (I 4.7) et (2.0)). On désignera par $D^-(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{coh}}$ (resp. $D(\mathrm{Qcoh}(S))_{\mathrm{parf}}$) la sous-catégorie triangulée pleine de D(Qcoh(S)) formée des complexes pseudo-cohérents (resp. parfaits).

Proposition 2.2.2 (*). Soit S un schéma noethérien. Le foncteur canonique

(*) Ce résultat, accessoire, ne sera pas utilisé dans la suite du Séminaire : on recommande au lecteur de le négliger en première lecture.

$$D^-(Coh(S)) \longrightarrow D(Qcoh(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(Qcoh(S)_{coh}$.

Preuve. On applique (1.1) en prenant pour $\underline{S}$ le site zariskien de S, pour $\underline{C}$ (resp. $\underline{C}_o$) la catégorie fibrée $U \mapsto Qcoh(U)$ (resp. $Coh(U)$). Comme $\underline{O}_S$ est cohérent, les objets de $\underline{C}_o$ sont pseudo-cohérents (I 3.5) donc un objet de $D(Qcoh(U))$ (U = ouvert de S) est pseudo-cohérent (au sens (2.2.1)) si et seulement s'il l'est relativement à $\underline{C}_o$ (I 2.14.1). Il suffit donc en vertu de (1.1 c)) de montrer que les conditions (i) et (ii) non respée de (1.1) sont satisfaites. Pour (ii), c'est trivial, puisqu'un Module quasi-cohérent qui est quotient d'un Module cohérent est cohérent, et que la notion de cohérence est locale. Pour (i), on utilise (2.1.1 a)) et le fait que tous $\underline{O}_S$-Module quasi-cohérent est limite inductive filtrante de $\underline{O}_S$-Modules cohérents (EGA I 9.4.9).

Admettant (3.5) et (3.7), indépendants du présent numéro, on en déduit facilement :

Corollaire 2.2.2.1. Soit S un schéma noethérien (resp. noethérien et de dimension finie). Le foncteur canonique

$$D^b(Coh(S)) \longrightarrow D(S)$$

$$(resp. D^-(Coh(S)) \longrightarrow D(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^b(S)_{coh}$ (resp. $D^-(S)_{coh}$) (I 2.15).

Proposition 2.2.3 (cf. EGA II 4.5.2 et 4.5.5). Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, et soit $(L_i)_{i \in I}$ une famille de faisceaux inversibles sur S. Pour tout $\underline{O}_S$-Module F, et tout couple $(i,n) \in I \times \underline{\underline{Z}}$, on note $F_{(i,n)}$ le sous-$\underline{O}_S$-Module de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ engendré par les sections de $F \otimes I_i^{\otimes n}$ au-dessus de S. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Les ouverts S_f, pour $f \in \Gamma(S, L_i^{\otimes n})$, $i \in I$ et $n \in \underline{N}$, forment une base de la topologie de S.

(i') Ceux des S_f qui sont affines recouvrent S.

(ii) Pour tout $\underline{O}_S$-Module F quasi-cohérent et de type fini, il existe une famille $(r_i)_{i \in I}$ (resp. $(n_i)_{i \in I}$) d'entiers $\geqslant 0$ (resp. > 0), et un épimorphisme

$$\coprod_{i \in I} \underline{O}_S^{r_i} \otimes L_i^{\otimes -n_i} \longrightarrow F \quad .$$

(iii) Pour tout $F \in \mathrm{ob}\ \mathrm{Qcoh}(S)$, on a

$$F = \sum_{(i,n) \in I \times \underline{N}^+} F_{(i,n)} \otimes L_i^{\otimes -n}$$

(somme (non directe) de sous-faisceaux de F).

(iii') Même condition que (iii), mais F étant un Idéal quasi-cohérent de $\underline{O}_S$

Preuve. Elle consiste en une simple paraphrase de (loc. cit.) ; nous la donnons, brièvement, pour la commodité du lecteur .

(i) $\Longrightarrow$ (i') : Pour $x \in S$, on choisit un ouvert affine U contenant x. Un ouvert S_f tel que $x \in S_f \subset U$, avec $f \in \Gamma(S, L_i^{\otimes n})$ $(n \geqslant 0)$, est nécessairement affine, comme il résulte du

Lemme 2.2.3.1. (EGA II 5.5.8). Soient X un schéma, L un $\underline{O}_X$-Module inversible $f \in \Gamma(X, L)$. L'immersion canonique $i : X_f \longrightarrow X$ est affine.

Preuve. C'est trivial : la question est locale sur X, donc on peut supposer X affine et $L \simeq \underline{O}_X$, et l'on gagne.

(i') $\Longrightarrow$ (ii) : Soit un recouvrement fini de S par des ouverts affines $S_{f_{ij}}$, où $f_{ij} \in \Gamma(S, L_i^{\otimes m_{ij}})$; posons $S_i = \bigcup_j S_{f_{ij}}$. Quitte à remplacer les f_{ij} par des puissances convenables, on peut supposer que les m_{ij} correspondant à un même indice i sont égaux à un entier m_i. Le faisceau

$F \mid S_{f_{ij}}$ est engendré par un nombre fini de sections h_{ijk} au-dessus de $S_{f_{ij}}$. Il existe (EGA I 9.3.1 et IV 1.7.5) un entier $q_i \geqslant 0$ tel que $h_{ijk} \otimes f_{ij}^{\otimes q_i}$ se prolonge en une section de $F \otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ au-dessus de S. Autrement dit, $F \otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ est engendré au-dessus de S_i par un nombre fini de ses sections au-dessus de S. Procédant comme dans la démonstration de (EGA II 4.5.5), on en déduit qu'il existe un entier n_i, qu'on peut supposer > 0, tel que, pour tout $n \geqslant n_i$, $F \otimes L_i^{\otimes n}$ soit engendré au-dessus de S_i par un nombre fini de ses sections au-dessus de S. En particulier, il existe un entier $r_i \geqslant 0$ et un morphisme

$$\underline{O}_S^{r_i} \otimes L_i^{\otimes -n_i} \longrightarrow F$$

qui induit un épimorphisme au-dessus de S_i. L'implication (i') $\Rightarrow$ (ii) en résulte aussitôt.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) : Comme tout faisceau quasi-cohérent sur S est limite inductive de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini (EGA I 9.4.9 et IV 1.7.7), on peut se borner à prouver (iii) pour F de type fini. Il existe alors, pour $i \in I$ des morphismes

$$u_i : \underline{O}_S^{r_i} \otimes L_i^{\otimes -n_i} \longrightarrow F$$

tels que $\sum u_i$ soit un épimorphisme. Or on a

$$\begin{aligned} \mathrm{Im}(u_i) &= \mathrm{Im}(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{\otimes n_i}) \otimes \mathrm{Id}(L_i^{\otimes -n_i})) \\ &= \mathrm{Im}(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{\otimes n_i})) \otimes L_i^{\otimes -n_i} \end{aligned}$$

Mais $\mathrm{Im}(u_i \otimes \mathrm{Id}(L_i^{\otimes n_i}))$ est un sous-faisceau de $F_{(i,n_i)}$, d'où l'assertion.

(iii) $\Rightarrow$ (iii') : C'est trivial.

(iii') $\Rightarrow$ (i) : Soient $x \in S$, U un ouvert contenant x, F un Idéal quasi-

cohérent définissant S - U. D'après (iii'), il existe $(i,n) \in I \times \underline{N}^+$ et une section f de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ au-dessus de S telle que $f(x) \neq 0$. On a $x \in S_f \subset U$, ce qui prouve (i).

Définition 2.2.4. Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, et soit $(L_i)_{i \in I}$ une famille de faisceaux inversibles sur S. On dit que les L_i forment une famille ample (*) si les conditions équivalentes de (2.2.3) sont vérifiées. (En particulier une famille réduite à un seul faisceau L est ample si et seulement si L est ample au sens usuel (EGA II 4.5.3)).

Définition 2.2.5. On dit qu'un schéma S est divisoriel si S est quasi-compact et quasi-séparé et s'il existe une famille ample (2.2.4) de $\underline{O}_S$-Modules inversibles.

Lemme 2.2.6. Soit X un schéma localement noethérien. Soit U un ouvert de X tel que l'inclusion $U \longrightarrow X$ soit affine (par exemple U affine et X séparé). Alors X - U est purement de codimension 0 ou 1 (i.e. en tout point maximal x de X - U on a $\dim(\underline{O}_{X,x}) = 0$ ou 1), donc purement de codimension 1 si U contient les points maximaux de X.

Preuve. Posons Y = X - U. Soit x un point maximal de Y, faisons le changement de base $X' = \mathrm{Spec}(\underline{O}_{X,x}) \longrightarrow X$: on obtient un diagramme cartésien :

$$\begin{array}{ccccc} U' & \longrightarrow & X' & \longleftarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X & \longleftarrow & Y \end{array} ,$$

où Y' = X' - U. Comme x est un point maximal de Y, Y' n'est autre que le point fermé de X'. D'autre part, comme X' est affine, U' est un ouvert affine de X'. Montrons que la dimension n de X' est égale à 0 ou 1. En effet, on sait (SGA 2 V 5.7) que $H^n_{Y'}(X', \underline{O}_{X'}) \neq 0$. Mais on a, si $n \geqslant 2$,

$$H^n_{Y'}(X', \underline{O}_{X'}) \simeq H^{n-1}(U', \underline{O}_{U'}) ,$$

or

$$H^{n-1}(U', \underline{O}_{U'}) = 0 ,$$

(*) Cette notion, sous la forme (i'), a été introduite par M. BORELLI et S.L. KLEIMAN ; la terminologie "famille ample" est proposée par le rédacteur.

puisque U' est affine et que l'on a $n-1 \geqslant 1$, d'où une contradiction.

Remarque 2.2.6.1. Sans l'hypothèse de séparation sur X, (2.2.6) pour un ouvert affine U de X serait faux, comme le montre l'exemple du plan affine où l'origine a été dédoublée (EGA I 5.5.11).

Proposition 2.2.7. Soit S un schéma noethérien, séparé, localement factoriel (i.e. dont les anneaux locaux sont factoriels). Alors S est divisoriel (2.2.5).

En particulier (EGA IV 21.11.1) :

Corollaire 2.2.7.1. Tout schéma noethérien régulier séparé est divisoriel.

Preuve de 2.2.7. On peut supposer S intègre. Soit $(S_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines non vides. En vertu de (2.2.6), $S - S_i$ est purement de codimension 1, donc, d'après (EGA IV 21.7.4), est le support d'un diviseur positif. En d'autres termes, pour chaque $i \in I$, il existe un faisceau inversible L_i et une section $f_i \in \Gamma(S, L_i)$ telle que $S_i = S_{f_i}$. La famille (L_i) est alors ample (2.2.4) d'après (2.2.3 (i')). Ceci achève la démonstration.

Remarque 2.2.7.2. Comme en (2.2.6), l'hypothèse de séparation sur S est essentielle. En effet, prenons encore une fois pour S le plan affine où l'origine a été dédoublée. Rappelons que S est obtenu en recollant deux exemplaires du plan affine $\underline{E}^2_k$ (k, un corps) par l'identité sur le complémentaire U de l'origine O ; on a donc une projection canonique

$$p : S \longrightarrow \underline{E}^2_k \quad ,$$

qui induit un isomorphisme au-dessus de U, $p^{-1}(O)$ se composant de deux points O_1 et O_2. Un faisceau inversible sur S s'obtient en recollant deux faisceaux inversibles sur $\underline{E}^2_k$ par un isomorphisme au-dessus de U ; comme tout faisceau inversible sur $\underline{E}^2_k$ est trivial, un faisceau inversible sur S est donc défini par un élément $g \in \Gamma(U, \underline{O}^*_U)$; mais g est nécessairement une constante, puisque la restriction $\Gamma(\underline{E}^2_k, \underline{O}_{\underline{E}^2_k}) \longrightarrow \Gamma(U, \underline{O}_U)$ est un isomorphisme, O étant de profondeur 2 dans le plan ; donc tout faisceau

inversible sur S est trivial. Il est immédiat d'autre part que p induit un isomorphisme

$$p^{*} : \Gamma'(\underline{\underline{E}}_k^2 , \underline{\underline{O}}_{\underline{\underline{E}}_k^2}) \longrightarrow \Gamma'(S, \underline{O}_S) \quad .$$

Par suite, toute section globale de $\underline{O}_S$ qui s'annule en O_1 s'annule aussi en O_2 , donc les S_f, pour $f \in \Gamma'(S, \underline{O}_S)$ ne forment pas une base de la topologie de S.

Lemme 2.2.8. Soient S un schéma divisoriel (2.2.5), $(L_i)_{i \in I}$ une famille ample de $\underline{O}_S$-Modules inversibles. Notons $\underline{L}(S)$ la sous-catégorie additive strictement pleine de Qcoh(S) (2.2.1) engendrée par les $L_i^{\otimes -n}$ pour $(i,n) \in I \times \underline{\underline{N}}^{+}$. Soit $E \in$ ob D(Qcoh(S)).

a) Les catégories $\underline{L}(S)$ et Loclib(S) (2.0) sont quasi-relevables dans Qcoh(S) (I 1.2) et quasi-stables par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

b) Soit $n \in \underline{\underline{Z}}$. Pour que E soit n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) (2.2.1) il faut et il suffit que E soit n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à $\underline{L}(S)$ ou Loclib(S) (I 2.3). Les foncteurs canoniques

$$K^{-}(\underline{L}(S))/K^{-,\phi}(\underline{L}(S)) \longrightarrow D(Qcoh(S))$$

et

$$K^{-}(Loclib(S))/K^{-,\phi}(Loclib(S)) \longrightarrow D(Qcoh(S))$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^{-}(Qcoh(S))_{coh}$ (2.2.1).

c) Soit $[m,n]$ un intervalle de $\underline{\underline{Z}}$. Pour que E soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m,n]$ (2.2.1), il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans D(Qcoh(S)), à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m,n]$, $F^i \in$ ob $\underline{L}(S)$ pour $i > m$, F^m étant localement libre de type fini. Le foncteur canonique

$$K^{b}(Loclib(S))/K^{b,\phi}(Loclib(S)) \longrightarrow D(Qcoh(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(Qcoh(S))_{parf}$ (2.2.1).

Preuve. Soit $F \longrightarrow G$ un épimorphisme de Qcoh(S), où G est de type fini. Comme F est limite inductive de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini (EGA I 9.4.9), il existe, en vertu de (2.1.1 a)) un sous-faisceau quasi-cohérent de type fini F' de F tel que le composé $F' \longrightarrow F \longrightarrow G$ soit un épimorphisme. D'après (2.2.3 (ii)), il existe un épimorphisme $E \longrightarrow F'$, avec $E \in ob\ \underline{L}(S)$, donc le composé $E \longrightarrow F' \longrightarrow F$, composé avec $F \longrightarrow G$ est un épimorphisme, ce qui prouve que la catégorie des $\underline{O}_S$-Modules quasi-cohérents de type fini est quasi-relevable dans Qcoh(S), donc a fortiori il en est de même de la catégorie Loclib(S) ou $\underline{L}(S)$. Ceci démontre la première assertion de a). Pour la seconde, appliquons (1.1) en prenant pour $\underline{S}$ le site zariskien de S, pour $\underline{C}$ (resp. $\underline{C}_o$) la catégorie fibrée $U \longmapsto Qcoh(U)$ (resp. $\underline{L}(U)$) (U désigne un ouvert variable de S et $\underline{L}(U)$ la sous-catégorie additive strictement pleine de Qcoh(U) engendrée par les $(L_i^{\otimes -n} \mid U)$). Comme tout objet de $\underline{L}$ est pseudo-cohérent, les notions de n-pseudo-cohérence (resp. pseudo-cohérence) (2.2.1) dans la catégorie fibrée D(Qcoh) coïncident avec les mêmes notions relativement à $\underline{L}$ (I 2.14). La condition (ii) (non respée) de (1 1) étant satisfaite en vertu de (2.2.3 (ii)), on en déduit, grâce à (1.1 a)), la seconde partie de a) relative à $\underline{L}(S)$; l'assertion relative à Loclib(S) se prouve de manière analogue. Les assertions b) découlent immédiatement de (1.1 b) et c)), compte tenu du fait que si $E \in ob\ D(Qcoh(S))$ est n-pseudo-cohérent, alors E est objet de $D^-(Qcoh(S))$ puisque S est quasi-compact. Un objet de la catégorie fibrée Qcoh est localement dans $\underline{L}$ si et seulement s'il est localement libre de type fini : la catégorie $\underline{L}$ est donc localement relevable dans Qcoh et localement stable par noyau d'épimorphisme. Par suite, les assertions c)) résultent de (1.2) appliqué pour $\underline{C}$ = Qcoh, $\underline{C}_o = \underline{L}$, $\underline{C}_{1S}$ = Loclib(S). Ceci achève la démonstration

Proposition 2.2.9. Les hypothèses et notations sont celles de (2.2.8), mais on suppose en outre S séparé ou noethérien.

a) Les foncteur canoniques

$$K^{-,b}(\underline{L}(S))/K^{-,\phi}(\underline{L}(S)) \longrightarrow D(S)$$

et

$$K^{-,b}(Loclib(S))/K^{-,\phi}(Loclib(S)) \longrightarrow D(S)$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^b(S)_{coh}$ (I 2.15). En outre, si S est de "dimension cohomologique finie" au sens de (3.7) ([1]) (par exemple si l'espace sous-jacent à S est noethérien et de dimension de Krull finie), alors les foncteurs

$$K^-(\underline{L}(S))/K^{-,\phi}(\underline{L}(S)) \longrightarrow K^-(\mathrm{Loclib}(S))/K^{-,\phi}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D^-(S)_{coh}$$

sont des équivalences de catégories.

b) Le foncteur canonique

$$K^b(\mathrm{Loclib}(S))/K^{b,\phi}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{parf}$ (I 4.9). Pour que $E \in \mathrm{ob}\, D(S)$ soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m,n]$ (I 4.8), il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans D(S), à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m,n]$, $F^i \in \mathrm{ob}\, \underline{L}(S))$ pour $i > m$, F^m étant localement libre de type fini.

Preuve. Compte tenu de (3.5) et (3.7) ([1]), c'est un corollaire immédiat de (2.2.8) : le seul point à vérifier, qui résulte d'ailleurs trivialement de (3.5) (resp. (3.7)), est que pour un objet E de $D^b(\mathrm{Qcoh}(S))$ (resp. $D(\mathrm{Qcoh}(S))$ dans le cas où S est de dimension cohomologique finie au sens de (3.7)), les notions de pseudo-cohérence et de perfection de (2.2.1) coïncident avec les notions usuelles (I 2.15 et 4.9) lorsqu'on regarde E comme objet de D(S).

Remarque 2.2.10. a) Si S est un schéma affine d'anneau A, la famille réduite au faisceau $\underline{O}_S$ est ample. Pour celle-ci, on a $\underline{L}(S) = \mathrm{Lib}(S)$. Il est clair par ailleurs que les catégories $K^{-,\phi}(\mathrm{Lib}(S))$, et $K^{-,\phi}(\mathrm{Loclib}(S))$ sont réduites aux objets nuls. Par suite, on conclut de (2.2.9) que, si l'on note Mod(A) la catégorie des A-modules et D(A) = D(Mod(A)), le foncteur $\underline{R}\Gamma_S : D^+(S) \longrightarrow D^+(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle $D^b(S)_{coh} \longrightarrow D(A)$ (resp. $D(S)_{parf} \longrightarrow D(A)$) dont l'image essentielle est

([1]) Le § 3 est indépendant du reste de l'exposé.

la sous-catégorie triangulée $D^b(A)_{coh}$ (resp. $D(A)_{parf}$) formée des complexes à cohomologie bornée et pseudo-cohérents (resp. parfaits) relativement à la sous-catégorie Lib(A) (resp. Loclib(A)) des modules libres (resp. projectifs) de type fini. On a des diagrammes commutatifs d'équivalences de catégories

$$\begin{array}{ccccc} K^{-,b}(\mathrm{Lib}(S)) & \longrightarrow & K^{-,b}(\mathrm{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D^b(S)_{coh} \\ \downarrow \Gamma_S & & \downarrow \Gamma_S & & \downarrow \mathbb{R}\Gamma_S \\ K^{-,b}(\mathrm{Lib}(A)) & \longrightarrow & K^{-,b}(\mathrm{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D^b(A)_{coh} \end{array} ,$$

$$\begin{array}{ccc} K^b(\mathrm{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D(S)_{parf} \\ \downarrow \Gamma_S & & \downarrow \mathbb{R}\Gamma_S \\ K^b(\mathrm{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D(A)_{parf} \end{array} ,$$

(où, dans le diagramme du haut, on peut remplacer b par - quand S est de dimension cohomologique finie au sens de (3.7)).

b) Soit S un schéma. Il résulte de a) qu'un complexe de $\underline{O}_S$-Modules pseudo-cohérent et à cohomologique bornée est localement isomorphe (dans D(S)) à un complexe strictement pseudo-cohérent, ce qui n'était nullement évident a priori (cf. (I 2.3.1)).

2.3. Faisceaux mous

2.3.1. Rappelons quelques définitions et résultats de [T.F]. Soit X un espace paracompact. On dit qu'un faisceau d'ensemble F sur X est mou si, pour tout fermé Y de X, toute section de F au-dessus de Y se prolonge en une section de F au-dessus de X. Les faisceaux abéliens mous sont acycliques, i.e. si F est mou, on a $H^i(X,F) = 0$ pour $i > 0$ (T.F. II 4.4.3).

Soit A un faisceau d'anneaux sur X. Si F est un A-Module mou, F est engendré par ses sections (cf. 2.1.1) : il est clair en effet que l'homomorphisme $A_X^{(I)} \longrightarrow F$ défini par $I = H^0(X,F)$ est un épimorphisme.

D'autre part, si A est mou, tout A-Module est mou (T.F II 3.7.1). Comme exemples de faisceaux d'anneaux mous, citons le faisceau des fonctions continues (réelles ou complexes) sur un espace paracompact, le faisceau des fonctions C^r sur une variété de classe C^r.

Proposition 2.3.2. Soit S un espace compact, muni d'un faisceau d'anneaux mou A. On note Mod(S) la catégorie des A-Modules à gauche, D(S) = D(Mod(S)).

a) La catégorie Lib(S) (resp. Loclib(S)) (2.0) est relevable dans Mod(S) et quasi-stable (resp. stable) par noyau d'épimorphisme (I 1.2) ([1]).

b) Soient $E \in$ ob D(S) et $n \in \underline{\mathbb{Z}}$. Pour que E soit n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) il faut et il suffit que E le soit relativement à Lib(S) ou à Loclib(S). Les foncteurs canoniques

$$K^-(Lib(S)) \longrightarrow D(S)$$

et

$$K^-(Loclib(S)) \longrightarrow D(S)$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^-(S)_{coh}$ (I 2.15).

c) Soient $E \in$ ob D(S), et $[m,n]$ un intervalle de $\underline{\mathbb{Z}}$. Pour que E soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m,n]$ (4.8) il faut et il suffit qu'il existe un quasi-isomorphisme $F \longrightarrow E$, où F est un complexe tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m,n]$, $F^i \in$ ob Lib(S) pour $i > m$ et $F^m \in$ ob Loclib(S). Le foncteur canonique

$$K^b(Loclib(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{parf}$ (4.9).

d) Notons Mod(A(S)) la catégorie des A(S)-modules à gauche, D(A(S)) la catégorie dérivée correspondante. Le foncteur

$$H^o(S,.) : Mod(S) \longrightarrow Mod(A(S))$$

est exact et une équivalence de catégories. En outre, il définit des

([1]) Cette assertion vaut plus généralement pour S paracompact.

équivalences de catégories :

$$D(S) \longrightarrow D(A(S))$$

$$D(S)_{coh} \longrightarrow D(A(S))_{coh}$$

$$D(S)_{parf} \longrightarrow D(A(S))_{parf} \quad ,$$

les notions de pseudo-cohérence (resp. perfection) dans D(A(S)) étant entendues relativement à la catégories des modules libres (resp. projectifs) de type fini. Il définit aussi une équivalence de la sous-catégorie pleine de D(S) formée des objets n-pseudo-cohérents (resp. d'amplitude parfaite contenue dans $[m,n]$) sur la sous-catégorie pleine analogue de D(A(S)).

Preuve. La première assertion de a) résulte de (2.1.2 a)) appliqué en prenant pour $\underline{S}$ le topos des faisceaux d'ensembles sur S, et $\underline{C}'_S = \mathrm{Mod}(S)$ (compte tenu de (2.3.1)). La seconde découle de (1.1 a)) (resp. (1.2 a))) avec $\underline{C} = \mathrm{Mod}$ (catégorie fibrée des A-Modules sur des ouverts variables), $\underline{C}_o = \mathrm{Lib}$ (resp. Loclib), la condition (ii) de (1.1) étant vérifiée d'après (2.3.1) et (2.1.1.b)). Pour l'assertion b), on applique (1.1 b),c)) (avec $\underline{C}$ et $\underline{C}_o$ comme précédemment). L'assertion c) résulte de (1.2.1 b),c),d)), où $\underline{C} = \mathrm{Mod}$ et $\underline{C}_o = \mathrm{Lib}$. La première assertion de d) découle, grâce à (2.3.1), de (2.1.2 b) (ii)) où l'on fait $\underline{C}'_S = \underline{C}_S = \mathrm{Mod}(S)$. Les autres assertions de d) se déduisent de la précédente, compte tenu de b) et c), et du fait que le foncteur Γ_S transforme Modules libres (resp.) facteurs directs de libres) de type fini en modules libres (resp. projectifs de type fini).

2.4. Espaces de Stein

Définition 2.4.1. Soit $\underline{S}$ un topos localement annelé (I 2.15.1 (ii)), d'objet final S. On dit que $\underline{S}$ est de Stein si le faisceau structural $\underline{O}_S$ est cohérent (I 3.1) et si l'on a les propriétés suivantes :
"théorème A" : tout $\underline{O}_S$-Module cohérent (I 3.1) est engendré par ses sections,
"théorème B" : pour tout $\underline{O}_S$-Module cohérent F, on a $H^i(S,F) = 0$ pour $i > 0$.

Remarque 2.4.1.1. Si $\underline{S}$ a "assez de points fermés" ([1]) s tels que l'Idéal $\underline{m}_s$ défini par s ([2]) soit cohérent, alors la relation "$H^1(S,F) = 0$ pour tout faisceau cohérent F" implique le théorème A. En effet, soient F un $\underline{O}_S$-Module cohérent et s un point fermé de S. On a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \underline{m}_s F \longrightarrow F \longrightarrow F/\underline{m}_s F \longrightarrow 0 \quad ,$$

où $F/\underline{m}_s F$ est un faisceau cohérent concentré sur s. Appliquant le foncteur $H^0(S,.)$ et écrivant la suite exacte de cohomologie, on trouve que $H^0(S,F) \longrightarrow H^0(S,F/\underline{m}_s F)$ est un épimorphisme. Comme on a $H^0(S,F/\underline{m}_s F) \xrightarrow{\sim} F_s/m_s F_s$, où m_s est l'idéal maximal de $\underline{O}_{S,s}$, on conclut par Nakayama.

Le rédacteur ignore si l'implication précédente est vraie en général (quand on suppose seulement que $\underline{O}_S$ est un faisceau cohérent d'anneaux locaux).

Le rédacteur ignore également si la relation "$H^1(S,F) = 0$ pour tout faisceau cohérent F" implique le théorème B.

Exemples 2.4.2. Un espace analytique complexe de Stein [3] , un compact convexe de $\underline{C}^n$ muni du faisceau induit par le faisceau des fonctions holomorphes [3] , le spectre d'un anneau noethérien, un espace rigide analytique affine [13] définissent des topos de Stein.

Lemme 2.4.3. *Soit* $\underline{S}$ *un topos de Stein* (2.4.1). *On suppose l'objet final* S *quasi-compact* (2.1.1), *et l'on note* Coh(S) *la catégorie abélienne des* $\underline{O}_S$*-Modules cohérents, i.e. de présentation finie. Alors :*

a) *La catégorie* Lib(S) (**resp.** Loclib(S)) (2.0) *est relevable dans* Coh(S) *et quasi-stable* (resp. stable) *par noyau d'épimorphisme* (I 1.2).

b) *Les foncteurs canoniques*

$$K^-(\mathrm{Lib}(S)) \longrightarrow K^-(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D^-(\mathrm{Coh}(S))$$

sont des équivalences de catégories.

([1]) i.e. assez de foncteurs fibres (SGA 4 IV 6.4.1) du type $i_s : s \longrightarrow \underline{S}$, où i_s est l'inclusion d'un fermé de $\underline{S}$.

([2]) i.e. formé des sections de $\underline{O}_S$ dont la fibre en s appartient à l'idéal maximal m_s de $\underline{O}_{S,s}$.

c) Posons $A = \Gamma(S, \underline{O}_S)$, et notons Mod(A) la catégorie des A-modules, D(A) la catégorie dérivée correspondante. Le foncteur

$$\Gamma_S : \mathrm{Coh}(S) \longrightarrow \mathrm{Mod}(A)$$

est exact, pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie additive strictement pleine de Mod(A) formée des A-modules de présentation finie. Il induit un foncteur pleinement fidèle

$$D^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow D(A) \quad ,$$

dont l'image essentielle est la sous-catégorie pleine $D^-(A)_{coh}$ formée des complexes pseudo-cohérents (relativement à la sous-catégorie des modules libres de type fini).

Preuve. Pour la première assertion de a) on applique (2.1.2 a)) pour $\underline{C}'_S = \mathrm{Coh}(S)$, l'hypothèse de (2.1.2) étant vérifiée d'après le théorème B : avec les notations de (2.1.2 a)), si E est cohérent et G localement libre de type fini, alors Hom(G,E) est cohérent, donc la catégorie Loclib(S) (et a fortiori Lib(S)) est relevable dans Coh(S). La deuxième assertion de a) résulte de (1.1 a)) (resp.(1.2 a))) appliqué pour $\underline{C}_o$ = Lib (resp. Loclib) ([1]), la condition (ii) respée de (1.1) étant vérifiée d'après le théorème A et (2.1.1 b)). L'assertion b) résulte de (1.1 c)) appliqué successivement pour $\underline{C}_o$ = Lib et $\underline{C}_o$ = Loclib. La première assertion de c) découle de (2.1.2 b)(ii)) appliqué pour $\underline{C}'_S = \mathrm{Coh}(S)$. Pour prouver que le foncteur $\Gamma_S : D^-(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow D(A)$ est pleinement fidèle, il suffit, compte tenu de b), de prouver que le composé

$$K^-(\mathrm{Lib}(S)) \longrightarrow D^-(\mathrm{Coh}(S)) \xrightarrow{\Gamma_S} D(A)$$

l'est. Mais celui-ci se factorise en

$$K^-(\mathrm{Lib}(S)) \xrightarrow{(\aleph)} K^-(\mathrm{Lib}(A)) \xrightarrow{(\aleph\aleph)} D(A) \quad ,$$

([1]) Lib et Loclib sont localement stables par noyau d'épimorphisme d'après (I 2.15.1).

où Lib(A) désigne la catégorie des A-modules libres de type fini et (*) est induit par Γ_S. Il est trivial que (*) est une équivalence de catégories. D'autre part, il résulte de (I 2.7 b)) appliqué pour $\underline{C} = \mathrm{Mod}(A)$, $\underline{C}_o = \mathrm{Lib}(A)$ (et compte tenu du fait que $K^{-,\phi}(\mathrm{Lib}(A)) = 0$) que (**) est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(A)_{coh}$. Cela prouve la dernière assertion de c) et achève la démonstration de (2.4.3).

Lemme 2.4.4. Sous les hypothèses de (2.4.3), le foncteur canonique

$$D^b(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^b(S)_{coh}$ (I 2.15).

Preuve On applique (2.1.3) avec $A = \mathrm{Coh}(S)$, $B = \mathrm{Mod}(S)$, $\phi : A \longrightarrow B$ étant le foncteur d'inclusion. Ce dernier étant pleinement fidèle, il suffit de vérifier, d'après (2.1.3 a)(ii)), que pour $M \in \mathrm{ob}\ \mathrm{Coh}(S)$ fixé et $n > 0$ le foncteur $L \longmapsto \mathrm{Ext}^n_{\mathrm{Mod}(S)}(L,M)$ est coeffaçable en $L \in \mathrm{ob}\ \mathrm{Coh}(S)$. Or, d'après le théorème A et (2.1.1 b)), tout $\underline{O}_S$-Module cohérent est quotient d'un Module libre de type fini, et, si L est libre de type fini, on a $\mathrm{Ext}^n_{\mathrm{Mod}(S)}(L,M) = 0$ d'après le théorème B, d'où notre assertion. On en déduit que le foncteur $D^b(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow D(S)$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de D(S) formée des complexes à cohomologie bornée et cohérente, qui n'est autre que $D^b(S)_{coh}$ puisque $\underline{O}_S$ est cohérent (I 3.5. b)).

Proposition 2.4.5. Avec les hypothèses et notations de (2.4.3), on a :

a) Les foncteurs canoniques

$$K^{-,b}(\mathrm{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{coh}$$

sont des équivalences de catégories. En outre le foncteur $\underline{R}\Gamma_S : D^+(S) \longrightarrow D^+(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle

$$\underline{R}\Gamma_S = D^b(S)_{coh} \longrightarrow D^+(A) \quad ,$$

dont l'image essentielle est $D^b(A)_{coh}$ (sous-catégorie triangulée de D(A) formée des complexes à cohomologie bornée et pseudo-cohérents relativement à la catégorie des modules libres de type fini).

b) Soit $E \in$ ob D(S), et soit $[m,n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Si E est d'amplitude parfaite contenue dans $[m,n]$ (I 4.8), E est isomorphe à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \in [m,n]$, $F^i \in$ ob Lib(S) pour $i > m$ et $F^m \in$ ob Loclib(S).

c) Le foncteur canonique

$$K^b(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)_{parf} \quad (I\ 4.9)$$

est une équivalence de catégories. En outre, le foncteur $R\Gamma_S : D^+(S) \to D^+(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle

$$R\Gamma_S : D(S)_{parf} \longrightarrow D^+(A) \quad ,$$

dont l'image essentielle est $D(A)_{parf}$ (sous-catégorie triangulée de D(A) formée des complexes parfaits relativement à la catégorie des modules projectifs de type fini).

Preuve. a) Les foncteurs

$$K^{-,b}(\mathrm{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\mathrm{Coh}(S)) \xrightarrow{\Gamma_S} D^b(A)_{coh}$$

sont des équivalences de catégories en vertu de (2.4.3 b) et c)). Comme le foncteur (pleinement fidèle) $\Gamma_S : D^b(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow D(A)$ se factorise en

$$D^b(\mathrm{Coh}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{coh} \xrightarrow{R\Gamma_S} D(A) \quad ,$$

on conclut grâce à (2.4.4).

b) Supposons $\mathrm{parf.amp}(E) \subset [m,n]$. En particulier, E est pseudo-cohérent ; en vertu de a), on peut donc supposer, quitte à remplacer E par un objet isomorphe, que $E^i \in$ ob Lib(S) pour $i > m$ et $E^i = 0$ pour $i > n$.

Quitte à tronquer, on peut même supposer que $E^i = 0$ pour $i < m$. D'après (I 4.16) appliqué pour $\underline{C} = \mathrm{Mod}$, $\underline{C}_o = \mathrm{Lib}$, on a alors $E^m \in \mathrm{ob}\ \mathrm{Loclib}(S))$, d'où l'assertion.

c) L'hypothèse (1.1 (i))(resp. (1.1 (ii)respée)) étant vérifiée pour $\underline{C}_S = \mathrm{Coh}(S)$, $\underline{C}_o = \mathrm{Lib}$ d'après (2.4.3 a)) (resp. (2.1.1 b)) et le théorème A), on sait d'après (1.2 c) et d)) que le foncteur

$$K^b(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\mathrm{Coh}(S))$$

est pleinement fidèle. Donc, d'après (2.4.4), il en est de même du foncteur

$$K^b(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S) \quad ,$$

dont l'image essentielle est $D(S)_{\mathrm{parf}}$ en vertu de b). Par un raisonnement analogue à celui fait dans la preuve de (2.4.3 c)), on voit que le foncteur $K^b(\mathrm{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$ induit par $\Gamma_S^!$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\mathrm{parf}}$, et l'on achève la démonstration comme en a).

Remarque 2.4.6. Le rédacteur ignore si dans (2.4.4) on peut remplacer D^b par D^-, et par suite si (2.4.5 a)) est encore vrai lorsqu'on remplace $K^{-,b}$ par K^- et D^b par D^-.

Voici, pour terminer, un complément intéressant à (2.4.5). Donnons d'abord une définition :

Définition 2.4.7. *On appelle espace pseudo-analytique complexe tout espace annelé localement isomorphe à un espace annelé du type* $(Y, \underline{O}_X|Y)$, *où* X *est un espace analytique complexe, et* Y *une partie fermée de* X.

Le faisceau structural d'un espace pseudo-analytique complexe est donc cohérent.

On dit qu'un espace pseudo-analytique complexe est de Stein si le topos correspondant l'est (2.4.1).

Proposition 2.4.8. ([1]). Soit S un espace pseudo-analytique complexe, compact, et de Stein (2.4.7). On suppose que, pour tout ouvert U de S et tout sous-espace fermé réduit X de U, le normalisé de X est localement connexe ([2]) (condition vérifiée par exemple si S est défini localement par des équations ou inéquations analytiques réelles dans un espace $\underline{\underline{R}}^n$ [15]). Alors l'anneau $A = \Gamma(S, \underline{O}_S)$ est un anneau noethérien.

Preuve. Il s'agit de montrer que, si M est un A-module de présentation finie, l'ensemble des sous-modules (ou, ce qui revient au même, l'ensemble des sous-modules de type fini) de M vérifie la condition maximale. Or, si N est un sous-module de type fini de M, alors M/N est de présentation finie d'après (I 2.6 et 2.9), donc N est de présentation finie d'après l'équivalence (2.4.3 c)). Utilisant à nouveau l'équivalence (2.4.3 c)) entre la catégorie des $\underline{O}_S$-Modules cohérents et la catégorie des A-modules de présentation finie, et la compacité de S, on est ramené à prouver le lemme suivant :

Lemme 2.4.8.1. Soit S un espace pseudo-analytique complexe vérifiant la condition de locale connexité de (2.4.8). Soient F un $\underline{O}_S$-Module cohérent, (E_n) une suite croissante de sous-$\underline{O}_S$-Modules cohérents de F, s un point de S. Il existe alors un voisinage ouvert U de s tel que la suite $(E_n|U)$ soit stationnaire.

Preuve. L'anneau $\underline{O}_{S,s}$ étant noethérien, il existe un entier n_o tel $(E_n)_s = (E_{n_o})_s$ pour $n \geqslant n_o$. Quitte à remplacer la suite (E_n) par la suite (E_n/E_{n_o}) pour $n \geqslant n_o$, on peut donc supposer que $(E_n)_s = 0$ pour tout n. D'autre part, $F_s = M$ est un $\underline{O}_s$-module de type fini, donc il existe (Bourbaki Alg. com. chap. IV §1 th.1) une filtration finie

$$M = M_o \supset M_1 \supset \ldots \supset M_q = 0$$

telle que $M_i/M_{i+1} \simeq \underline{O}_s/p_i$, où p_i est un idéal premier de $\underline{O}_s$. Comme la catégorie des $\underline{O}_s$-modules de type fini est équivalente à la catégorie des germes en s de $\underline{O}_S$-Modules cohérents, on peut supposer, quitte à se loca-

([1]) Ce résultat, ainsi que sa démonstration, a été communiqué gracieusement au rédacteur par A. Grothendieck ; il a été obtenu indépendamment par J. Frish [5] .

([2]) Nous admettrons que les notions de Géométrie analytique locale de [10] s'étendent aux espaces peeudo-analytiques complexes ; la réduction au cas habituel est en effet chaque fois immédiate.

liser au voisinage de s, que les M_i (resp. p_i) sont les fibres en s de sous-$\underline{O}_S$-Modules cohérents F_i (resp. Idéaux cohérents $\underline{p}_i$) de F (resp. $\underline{O}_S$) tels que l'on ait

$$F = F_o \supset F_1 \supset \ldots \supset F_q = 0$$

et $F_i/F_{i+1} \xrightarrow{\sim} \underline{O}_S/\underline{p}_i$. Prouver que la suite (E_n) est stationnaire au voisinage de s équivaut évidemment à prouver que les suites induites sur chaque cran de la filtration (F_i) de F le sont. De sorte qu'on peut supposer que $F = \underline{O}_S$, et que $\underline{O}_{S,s}$ est un anneau intègre, les E_n formant une suite croissante d'Idéaux de $\underline{O}_S$ tels que $(E_n)_s = 0$. Comme $\underline{O}_s$ est intègre, donc en particulier réduit, on peut en outre supposer grâce au théorème d'Oka ([10] IV §3), quitte à se localiser en s, que S est réduit. Montrons qu'il existe un voisinage ouvert U de s tel que $E_n|U = 0$ pour n assez grand. Considérons pour cela le normalisé $\widetilde{S}$ de S ([10] IV §4). On sait (loc. cit.) que S est le spectre analytique ([10] II §3) d'une $\underline{O}_S$-Algèbre finie $\widetilde{\underline{O}}_S$ dont la fibre en chaque $t \in S$ est la clôture intégrale de $\underline{O}_{S,t}$ (cf. note (2) de (2.4.8)). On a $E_n \subset E_n.\widetilde{\underline{O}}_S$, donc il suffit de prouver que $E_n.\widetilde{\underline{O}}_S = 0$ pour n assez grand. Or on a (10 II §3 Prop.8)

$$E_n.\widetilde{\underline{O}}_S = p_*(\widetilde{E_n.\underline{O}_S}) \quad ,$$

où $p : \widetilde{S} \longrightarrow S$ est la projection canonique, et $\widetilde{E_n.\underline{O}_S}$ l'Idéal de $\underline{O}_{\widetilde{S}}$ défini canoniquement par $E_n.\widetilde{\underline{O}}_S$. Il suffit donc de montrer qu'il existe un voisinage ouvert V de s dans $\widetilde{S}$ tel que $\widetilde{E_n.\underline{O}_S}|U = 0$ pour n assez grand, ce qui nous ramène au cas où S est normal, ce que nous supposerons maintenant. Comme $(E_n)_s = 0$, l'immersion fermée $i_n : S_n \longrightarrow S$ définie par E_n est étale en s. Mais, S étant normal, l'ensemble des points où i_n est étale est à la fois ouvert et fermé (voir lemme ci-dessous), donc son image dans S est une partie de S à la fois ouverte et fermée. Donc la restriction de E_n à la composante connexe de s dans S est nulle ; cette composante connexe étant un ensemble ouvert, puisque S est localement connexe, on a gagné. Il reste donc à établir le

Lemme 2.4.8.2. (cf. EGA IV 18.10.3) Soient Y un espace pseudo-analytique normal ([1]), et f : X ⟶ Y un morphisme non ramifié. L'ensemble des points de X où f est étale est à la fois ouvert et fermé.

Preuve. Il est immédiat que l'ensemble des points où f est étale est ouvert (car dire que f est étale en un point signifie que f est un isomorphisme au voisinage de ce point ([8] VI)). Il reste à montrer que l'ensemble des points où f n'est pas étale est ouvert. Comme un morphisme non ramifié est localement une immersion ([8] VI), on peut supposer que f est une immersion fermée, définie par un Idéal cohérent I. Soit x un point de X tel que $I_x \neq 0$. Soit $\underline{p}$ un idéal premier de $\underline{O}_{Y,x}$ contenant I_x. On a $\dim(\underline{O}_{Y,x})_{\underline{p}} > 0$, car dans le cas contraire on aurait $\underline{p} = 0$ puisque $\underline{O}_{Y,x}$ est intègre. Donc Y est de codimension > 0 en x, donc de codimension > 0 dans un voisinage de x ([10] III A Cor 1 du lemme 3), et l'on gagne.

3. Compléments sur les faisceaux quasi-cohérents sur les schémas ([2])

3.0. Dans cette section, on se fixe un schéma quasi-compact et quasi-séparé S. Le foncteur d'inclusion canonique (pleinement fidèle)

$$\phi : \mathrm{Qcoh}(S) \longrightarrow \mathrm{Mod}(S) \qquad ([3])$$

s'étend en un foncteur, encore noté ϕ, de $D(\mathrm{Qcoh}(S))$ dans $D(S) = D(\mathrm{Mod}(S))$, qu'on se propose d'étudier ([4]).

Lemme 3.1. La catégorie Qcoh(S) est une catégorie abélienne vérifiant (AB 5) et pour laquelle les faisceaux quasi-cohérents de type fini forment une "petite" famille de générateurs. En particulier (Tohoku 1.10.1), Qcoh(S) possède assez d'injectifs.

([1]) Il suffit que les anneaux locaux de Y soient intègres.

([2]) Ce numéro est dû essentiellement à J.L. Verdier.

([3]) Mod(S) (resp. Qcoh(S)) désigne la catégorie des $\underline{O}_S$-Modules (resp. $\underline{O}_S$-Modules quasi-cohérents).

([4]) Nous omettrons de noter ϕ dans les formules où il n'y aura pas de confusion à craindre.

Preuve. L'assertion relative aux générateurs résulte aussitôt de ce que tout faisceau quasi-cohérent sur S est limite inductive filtrante de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini (EGA I 9.4.9 et IV 1.7.7). Les autres assertions sont évidentes.

Remarque 3.1.1. Le rédacteur ignore si Qcoh(S) possède encore assez d'injectifs lorsqu'on suppose seulement S quasi-séparé.

Lemme 3.2. Le foncteur ϕ : Qcoh(S) $\longrightarrow$ Mod(S) a un adjoint à droite

$$Q : \mathrm{Mod}(S) \longrightarrow \mathrm{Qcoh}(S) \quad ,$$

(appelé cohéreur).

Preuve. Si S est affine, l'existence de Q est immédiate : on prend $Q = \widetilde{I_S^1}$ (EGA Err_I 1.3.7). Soit maintenant f : U $\longrightarrow$ S un ouvert affine de S ; il est clair que, pour E $\in$ ob Qcoh(S) et F $\in$ ob Mod(U), on a un isomorphisme canonique

$$\mathrm{Hom}(E, f_*(F)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E, f_*Q(F)) \quad . \tag{1}$$

Soit alors $(f_i : U_i \longrightarrow S)$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines, et pour chaque (i,j) soit $(U_{ijk} \longrightarrow U_{ij})$ un recouvrement fini de $U_{ij} = U_i \cap U_j$ par des ouverts affines (U_{ij} est quasi-compact puisque S est quasi-séparé). Soit F $\in$ ob Mod(S). On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow \coprod_i f_{i*}(F|U_i) \longrightarrow \coprod_{ijk} f_{ijk*}(F|U_{ijk}) \quad , \tag{2}$$

(où f_{ijk} désigne l'inclusion de U_{ijk} dans S). Notons que, si g : V $\longrightarrow$ U est une inclusion d'ouverts affines de S, on a une flèche naturelle évidente $Q(F|U) \longrightarrow g_*Q(F|V)$. Par suite, on déduit de (2) une flèche

$$\coprod_i f_{i*}Q(F|U_i) \longrightarrow \coprod_{ijk} f_{ijk*}Q(F|U_{ijk}) \quad , \tag{3}$$

dont nous désignerons le noyau par QF. Soit E $\in$ ob Qcoh(S). Appliquant le foncteur Hom(E,.) à la suite (2), on obtient, compte tenu de (1), un

isomorphisme fonctoriel en E :

$$\mathrm{Hom}(E,F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E,QF) \quad .$$

Cela prouve l'existence de Q ; l'unicité est évidente puisqu'il s'agit d'un adjoint.

Lemme 3.3. a) Le cohéreur est un foncteur additif transformant injectifs en injectifs.

b) Notons

$$\underline{R}Q : D^+(S) \longrightarrow D^+(\mathrm{Qcoh}(S))$$

le dérivé droit du cohéreur. Pour $E \in \mathrm{ob}\, D(\mathrm{Qcoh}(S))$ et $F \in \mathrm{ob}\, D^+(S)$, il existe des isomorphismes fonctoriels canoniques

(i) $\quad \underline{R}\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}}(E,F) \xrightarrow{\sim} \underline{R}\,\mathrm{Hom}_{\mathrm{Qcoh}}(E,\underline{R}Q(F))$ $\quad$ ([1])

(ii) $\quad \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}}(E,F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathrm{Qcoh}}(E,\underline{R}Q(F))$.

Preuve. L'assertion a) est conséquence immédiate de la définition. Pour b), il suffit d'établir l'isomorphisme (i), car (ii) s'en déduira par passage à la cohomologie. On peut, pour cela, supposer F à composantes injectives ; QF est alors à composantes injectives d'après a), et l'isomorphisme (i) provient simplement de la définition de Q.

Lemme 3.4. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés. Pour $E \in \mathrm{ob}\, \mathrm{Mod}(X)$, il existe un isomorphisme fonctoriel canonique

$$Qf_*(E) \xrightarrow{\sim} f_*Q(E) \quad .$$

([1]) L'indice Mod (resp. Qcoh) est une abréviation pour D(S) (resp. D(Qcoh(S))).

Preuve. Comme f est quasi-compact et quasi-séparé (EGA IV 1.2.3 et 1.2.4), f_* transforme faisceaux quasi-cohérents en faisceaux quasi-cohérents (III 1.4.10 et IV 1.7.21). Les foncteurs Qf_* et f_*Q de Mod(X) dans Qcoh(Y) sont tous deux adjoints à droite du foncteur f^* : Qcoh(Y) $\longrightarrow$ Mod(X), donc canoniquement isomorphes.

Proposition 3.5. *Si S est noethérien, ou quasi-compact et séparé, le foncteur*

$$\phi : D^+(\mathrm{Qcoh}(S)) \longrightarrow D^+(S) \qquad (3.0)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine $D^+(S)_{\mathrm{qcoh}}$ *de* $D^+(S)$ *formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.*

Preuve. On peut se borner à prouver l'assertion relative au cas où S est séparé, le cas où S est noethérien étant bien connu ([H]II 7.19). Il revient évidemment au même de prouver les assertions suivantes :

(3.5.1) : *pour* $E \in \mathrm{ob}\, D^+(\mathrm{Qcoh}(S))$, *la flèche d'adjonction*

$$E \longrightarrow \underline{R}Q(E)$$

(déduite de (3.3 b) (ii)) *) est un isomorphisme ;*

(3.5.2) : *pour* $E \in \mathrm{ob}\, D^+(S)_{\mathrm{qcoh}}$, *la flèche d'adjonction*

$$\underline{R}Q(E) \longrightarrow E$$

(déduite de (3.3 b)(ii)) *) est un isomorphisme.*

Preuve de (3.5.1). Par un dévissage immédiat ([1]), on est ramené à prouver que les faisceaux quasi-cohérents sont acycliques pour le cohéreur, (i.e. que, pour $E \in \mathrm{ob}\, \mathrm{Qcoh}(S)$, on a $R^iQ(E) = 0$ pour $i > 0$), et que d'autre part, pour $E \in \mathrm{ob}\, \mathrm{Qcoh}(S)$, la flèche d'adjonction $E \longrightarrow QE$ est un isomorphisme. Si S est affine, cela résulte de la formule $Q = \widetilde{\Gamma_S}$ (cf. preuve de (3.2)). Dans le cas général, recouvrons S par un nombre fini d'ouverts affines U_i. Comme S est séparé, les inclusions $f_i : U_i \longrightarrow S$ sont des morphismes affines,

([1]) Utilisant par exemple la suite spectrale $R^pQ(H^q(E)) \Rightarrow R^*Q(E)$.

ainsi d'ailleurs que les inclusions $f_{i_o \dots i_p} : U_{i_o \dots i_p} = U_{i_o} \cap \dots \cap U_{i_p} \longrightarrow S$.

Soit $E \in \mathrm{ob}\ \mathrm{Qcoh}(S)$, et considérons la résolution de E définie par le recouvrement (U_i) (T.F. II 5.2) :

$$(\aleph) \quad 0 \longrightarrow E \longrightarrow \coprod f_{i\aleph} f_i^{\aleph}(E) \longrightarrow \dots \longrightarrow \coprod f_{i_o \dots i_p \aleph} f_{i_o \dots i_p}^{\aleph}(E) \longrightarrow .$$

Elle fournit une suite spectrale

$$(\aleph\aleph) \quad E_1^{pq} = \coprod_{i_o \dots i_p} R^q Q(f_{i_o \dots i_p \aleph} f_{i_o \dots i_p}^{\aleph}(E)) \Longrightarrow R^{\aleph} Q(E) \quad .$$

Comme $f_{i_o \dots i_p}$ est affine, on a d'après (3.4) :

$$(\aleph\aleph\aleph) \quad R^q Q(f_{i_o \dots i_p \aleph} f_{i_o \dots i_p}^{\aleph}(E)) \simeq f_{i_o \dots i_p \aleph} R^q Q(f_{i_o \dots i_p}^{\aleph}(E))$$

pour tout q, d'où en particulier

$$E_1^{pq} = 0 \text{ pour } q > 0 \quad ,$$

d'après le cas affine, déjà traité. On déduit de $(\aleph\aleph)$ des isomorphismes

$$R^n Q(E) \simeq H^n(QE^{\cdot}) \quad \text{pour } n \geqslant 0 \quad ,$$

où $E^{\cdot}$ est la résolution de E définie par la suite exacte $(\aleph)$. Mais d'après $(\aleph\aleph\aleph)$ on a $QE^n \simeq E^n$ pour $n \geqslant 0$, d'où finalement

$$R^n Q(E) = 0 \text{ pour } n > 0 \ ,$$

et $Q(E) \simeq E$, cqfd.

Preuve de (3.5.2). Par la suite spectrale

$$R^p Q(H^q(E)) \Longrightarrow R^{\aleph} Q(E) \quad ,$$

on se ramène aussitôt au cas où $E \in \mathrm{ob}\ \mathrm{Qcoh}(S)$. Le composé

$$E \longrightarrow \underline{R}QE \longrightarrow E$$

des flèches d'adjonction étant l'identité, l'assertion résulte donc de (3.5.1). Ceci achève la démonstration de (3.5).

Remarque 3.6. La conclusion de (3.5) serait fausse si l'on omettait l'hypothèse "séparé ou noethérien", comme le montre un joli contre-exemple de J.L. Verdier (voir Appendice I au présent exposé).

Proposition 3.7. Sous l'hypothèse de (3.5), supposons en outre qu'il existe un entier N tel que l'on ait, pour tout $F \in \mathrm{ob}\ \mathrm{Mod}(S)$ et tout ouvert quasi-compact U de S,

$$H^i(U,F) = 0 \text{ pour } i > N \qquad (^1) \quad .$$

Alors :

a) Le cohéreur est de dimension cohomologique finie.

b) Le foncteur

$$\emptyset : D(\mathrm{Qcoh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine $D(S)_{\mathrm{qcoh}}$ de D(S) formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

Preuve de a). Si S est affine, la formule $Q = \widetilde{\Gamma_S}$ (cf. preuve de (3.2)) implique que Q est de dimension cohomologique $\leqslant N$. Passons au cas général. Montrons qu'il existe un entier a tel que l'on ait $R^qQ(E) = 0$ pour tout $E \in \mathrm{ob}\ \mathrm{Mod}(S)$ et tout $q > a$. L'hypothèse implique que tout $E \in \mathrm{ob}\ \mathrm{Mod}(S)$ admet une résolution finie droite $E^{\cdot}$ de longueur N telle que les E^i soient acycliques, i.e. vérifient $H^q(U,E^i) = 0$ pour tout ouvert U de S et tout $q > 0$. Par suite, il suffit de prouver qu'il existe un entier b tel que $R^qQ(E) = 0$ pour tout $\underline{O}_S$-Module acyclique E et tout $q > b$. (On pourra alors prendre $a = b + N$). Soit (U_i) un recouvrement fini de S par N' ouverts

(1) Condition réalisée, d'après (Tohoku 3.6.5), si l'espace sous-jacent à S est noethérien et de dimension de Krull $\leqslant N$.

affines. Soit E un $\underline{O}_S$-Module acyclique, et considérons la résolution $C^{\cdot}(E)$ de E définie par le recouvrement (U_i) (T.F. II 5.2). Deux cas sont à examiner :

1°) S est <u>séparé</u>. Alors les composantes de $C^{\cdot}(E)$ sont des sommes de termes du type $f_* f^*(E)$, où $f : U \longrightarrow S$ est l'inclusion d'un ouvert affine (donc un morphisme affine, S étant séparé). On a

$$\underline{\underline{R}}(Qf_*)\ f^*E \xrightarrow{\sim} \underline{\underline{R}}Q\ \underline{\underline{R}}f_*\ f^*E$$

$$\xrightarrow{\sim} \underline{\underline{R}}Q\ f_* f^*E \text{ , puisque } f^*E \text{ est acyclique.}$$

On a d'autre part, d'après (3.4),

$$\underline{\underline{R}}(Qf_*)\ f^*E \xrightarrow{\sim} \underline{\underline{R}}(f_*Q)\ f^*E$$

$$\xrightarrow{\sim} f_*\ \underline{\underline{R}}Q\ f^*E \text{ , puisque } f \text{ est affine.}$$

On en déduit

$$R^nQ\ (f_* f^*E) \xrightarrow{\sim} f_*\ R^nQ(f^*E) \quad \text{pour tout } n \geqslant 0 \quad ,$$

d'où d'après le cas affine,

$$R^nQ(f_* f^*E) = 0 \quad \text{pour } n > N \quad .$$

Comme $C^{\cdot}(E)$ est de longueur N', on a finalement

$$R^nQ(E) = 0 \quad \text{pour } n > N + N' \quad ,$$

et l'on a gagné.

2°) S est <u>noethérien</u>. Les composantes de $C^{\cdot}(E)$ sont des sommes de termes du type $f_* f^*(E)$, où $f : U \longrightarrow S$ est l'inclusion d'un ouvert quasi-compact et <u>séparé</u>. Comme dans le cas 1°), on a

(*) $\underline{\underline{R}}(Qf_*)\ f^*E \xrightarrow{\sim} \underline{\underline{R}}Q\ f_*f^*E \xrightarrow{\sim} \underline{\underline{R}}(f_*Q)\ f^*E$.

Comme U est noethérien, Qcoh(U) possède assez d'objets injectifs dans Mod(U) ([H] II 7.18), donc le dérivé droit de f_* : Qcoh(U) $\longrightarrow$ Qcoh(S) est "induit" par $\underline{\underline{R}}f_*$: $D^+(U) \longrightarrow D^+(S)$ lorsqu'on identifie $D^+(\mathrm{Qcoh}(U))$ (resp. $D^+(\mathrm{Qcoh}(S))$ à une sous-catégorie pleine de $D^+(U)$ (resp. $D^+(S)$) grâce à (3.5). Par suite, on a

$$\underline{\underline{R}}(f_*Q)\ f^*E \xrightarrow{\sim} \underline{\underline{R}}f_*\ \underline{\underline{R}}Q\ f^*E \quad .$$

On en déduit une suite spectrale

$$E_2^{pq} = R^pf_*\ R^qQ\ f^*E \Longrightarrow R^*(f_*Q)\ f^*E \quad .$$

D'après le cas 1°), il existe un entier n(U) ne dépendant que de U tel que Q soit de dimension cohomologique $\leq$ n(U) sur Mod(U). On a donc

$$E_2^{pq} = 0 \text{ pour } q > n(U).$$

Mais on a

$$E_2^{pq} = 0 \text{ pour } p > N \ ,$$

à cause de l'hypothèse de "dimension cohomologique" sur S. On a donc

$$R^n(f_*Q)f^*E = 0 \text{ pour } n > N + N",$$

où N" est un entier supérieur à tous les n(U), U parcourant l'ensemble des intersections $U_{i_o} \cap \ldots \cap U_{i_p}$. Tenant compte de (*), on obtient

$$R^nQ\ (f_*f^*E) = 0 \quad \text{pour } n > N + N" \ ,$$

d'où finalement

$$R^nQ(E) = 0 \quad \text{pour } n > N + N' + N" \ ,$$

ce qui achève la démonstration de a).

Preuve de b). Le cohéreur, étant de dimension cohomologique finie d'après a), admet ([H] I 5.3) un dérivé droit

$$\underline{\underline{R}}Q : D(S) \longrightarrow D(Qcoh(S))$$

(dont la restriction à $D^+(S)$ coïncide avec le foncteur $\underline{\underline{R}}Q$ défini plus haut). Pour $E \in$ ob $D(Qcoh(S))$, il existe un isomorphisme fonctoriel canonique

$$(1) \qquad E \xrightarrow{\sim} \underline{\underline{R}}Q(E) \quad ,$$

puisque, d'après (3.5.1), les E^i sont acycliques pour Q et tels que $E^i \xrightarrow{\sim} O(E^i)$. D'autre part, pour $E \in$ ob $D(S)$, on a un homomorphisme fonctoriel canonique

$$(2) \qquad \underline{\underline{R}}Q(E) \longrightarrow E$$

(provenant, dans le cas où les E^i sont Q-acycliques, de l'homomorphisme d'adjonction ordinaire entre ϕ et Q). On vérifie trivialement que les homomorphismes (1) et (2) font de $\underline{\underline{R}}Q : D(S) \longrightarrow D(Qcoh(S))$ un adjoint à droite de $\phi : D(Qcoh(S)) \longrightarrow D(S)$. Le fait que (1) soit un isomorphisme implique que ϕ est pleinement fidèle. Enfin, utilisant la suite spectrale

$$R^pQ\ (H^q(E)) \Longrightarrow R^nQ(E) \quad ,$$

(convergente puisque Q est de dimension cohomologique finie), on voit que (2) est un isomorphisme pour $E \in$ ob $D(S)_{qcoh}$, donc que ϕ a pour image essentielle $D(S)_{qcoh}$. Cela prouve b) et achève la démonstration de (3.7).

APPENDICE I
UN CONTRE-EXEMPLE DE VERDIER ([1])

0. Introduction

Si S est un schéma, on note Mod(S) (resp. Qcoh(S)) la catégorie des $\underline{O}_S$-Modules (resp. $\underline{O}_S$-Modules quasi-cohérents). L'objet de cet appendice est d'attirer l'attention du lecteur sur certaines propriétés pathologiques de la catégorie D(Qcoh(S)), et de prouver notamment les faits suivants :

0.1. Soient X un schéma affine d'anneau A , et I un A-module injectif. On sait ([H] II 7.14) que, si A est noethérien, le faisceau $\tilde{I}$ est un $\underline{O}_X$-Module injectif. Si A n'est pas noethérien, $\tilde{I}$ n'est pas nécessairement injectif, ni même flasque, même si l'espace sous-jacent à X est noethérien et de dimension de Krull finie. De plus, la restriction de $\tilde{I}$ à un ouvert U de X n'est pas en général un injectif de Qcoh(U).

0.2. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés. Le foncteur $\underline{R}f_* : D^+(X) \longrightarrow D^+(Y)$ n'induit pas en général sur $D^+(Qcoh(X))$ (sous-catégorie pleine de $D^+(X)$ d'après (II 3.5)) le dérivé droit de $f_* : Qcoh(X) \longrightarrow Mod(Y)$. Plus précisément, un injectif de Qcoh(X) n'est pas nécessairement acyclique pour $f_* : Mod(X) \longrightarrow Mod(Y)$.

0.3. Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé. Un objet de Qcoh(S), même injectif, n'est pas nécessairement acyclique pour le cohéreur (II 3.2). Le foncteur $\phi : D^b(Qcoh(S)) \longrightarrow D^b(S)$ (II 3.0) n'est pas en général pleinement fidèle.

1. Les contre-exemples

Rappelons d'abord le lemme suivant (SGA 2 II 9) :

Lemme 1.1. Soient A un anneau, X = Spec(A), $\underline{f} = (f_\alpha)$ un système fini d'éléments de A, Y le fermé défini par $\underline{f}(x) = 0$. Pour $i > 0$, les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tout A-module injectif I, on a $H^i_Y(X,\tilde{I}) = 0$;

(ii) le pro-objet $n \longmapsto H_i(\underline{f}^n, A)$ est nul, i.e. pour tout n, il existe $n' \geqslant n$

([1]) Cet appendice reproduit, à quelques détails de rédaction près, deux lettres de J.-L. Verdier (30/9/67 et 11/10/67) au rédacteur, en réponse à une question de celui-ci.

tel que $H_i(\underline{f}^{n'},A) \longrightarrow H_i(\underline{f}^{n},A)$ soit nul.

1.2 Nous allons utiliser (1.1) pour prouver (0.1). Soient k un corps, $B = k\left[\left[x,y\right]\right]$, $\underline{f}$ le système (x,y), $M = \coprod_{n\ 0} B/(\underline{f}^n)$, A la B-algèbre $D_B(M)$ (EGA O_{IV} 18.2.3). On a trivialement

$$H_2^A(\underline{f}^n,A) \simeq H_2^B(\underline{f}^n,A) \quad . \qquad (^1)$$

On a d'autre part

$$H_2^B(\underline{f}^n,A) \simeq H_2^B(\underline{f}^n,B) \oplus H_2^B(\underline{f}^n,M)$$

mais $H_2^B(\underline{f}^n,B) = 0$ puisque $\underline{f}$ est une suite régulière (EGA III 1.1.4 et O_{IV} 15.1.20), donc on a

$$H_2^B(\underline{f}^n,A) \simeq H_2^B(\underline{f}^n,M) \quad ,$$

On a enfin (EGA II 1.1.3.3)

$$H_2^B(\underline{f}^n,M) \simeq H_B^0(\underline{f}^n,M) \quad ,$$

$H_B^0(\underline{f}^n,M)$ s'identifiant canoniquement au sous-module $(\underline{f}^n)M$ de M annulé par $(\underline{f}^n)$. D'où finalement :

$$(*) \qquad H_2^A(\underline{f}^n,A \simeq (\underline{f}^n)M \quad .$$

Comme le morphisme de transition $H_2^A(\underline{f}^{n'},A) \longrightarrow H_2^A(\underline{f}^n,A)$ est induit par la multiplication par $\underline{f}^{n'-n}$ (EGA III 1.1.6), on vérifie immédiatement, à l'aide de (*), que le pro-objet $n \longmapsto H_2^A(\underline{f}^n,A)$ n'est pas nul. On déduit alors de (I.1) qu'il existe un A-module injectif I tel que $H_Y^2(X,\tilde{I}) \neq 0$, donc tel que $\tilde{I}$ ne soit pas flasque (SGA 2 I 2.12). Remarquons en passant que la projection $Spec(A) \longrightarrow Spec(B)$ est un homéomorphisme,

---

(^{1}) L'exposant A ou B indique relativement à quel anneau on calcule le complexe de Koszul.

donc que l'espace sous-jacent à X est noethérien de dimension 2. Soit I un A-module injectif tel que $H^2_Y(X,\tilde{I}) \neq 0$, et notons U l'ouvert complémentaire de Y dans X. On a (SGA 2 II 4)

$$H^2_Y(X,I) \xrightarrow{\sim} H^1(U,I) \neq 0 \quad .$$

Or, comme U est séparé, le foncteur $D^+(\mathrm{Qcoh}(U)) \longrightarrow D^+(U)$ est pleinement fidèle (II 3.5), donc $\tilde{I}|U$ n'est pas injectif dans Qcoh(U). On a donc prouvé l'assertion (0.1).

Notons Z le schéma quasi-compact et quasi-séparé obtenu en recollant deux exemplaires de X le long de U, j_1, j_2 les deux immersions ouvertes canoniques de X dans Z, de sorte qu'on a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_1} \\ X & \xrightarrow{j_2} & Z \end{array} \quad .$$

On a $j_2^* R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \xrightarrow{\sim} R^1 i_*(i^*\tilde{I})$,

d'où $H^0(X,R^1 j_{1*}(\tilde{I})) \xrightarrow{\sim} H^1(U,\tilde{I}) \neq 0$,

donc $R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \neq 0$, ce qui prouve (0.2).

D'autre part, on a, d'après (II 3.4 et 3.5)

$$\underline{RQ}\, \underline{R}j_{1*}(\tilde{I}) \xrightarrow{\sim} j_{1*}(\tilde{I}) \quad .$$

On en déduit une suite spectrale, dont la suite exacte des termes de bas degrés fournit l'isomorphisme

$$R^1 j_{1*}(\tilde{I}) \xrightarrow{\sim} R^2 Q(j_{1*}\tilde{I}) \quad .$$

Le faisceau $j_{1*}\tilde{I}$ étant injectif dans Qcoh(Z), on a prouvé la première par-

tie de (0.3).

Enfin, soit $E \in ob\ Qcoh(Z)$. On a l'isomorphisme de dualité

$$\underset{\sim}{R}\ Hom_{Mod}(E, \underset{\sim}{R}j_{1*}(\tilde{I})) \xrightarrow{\sim} \underset{\sim}{R}\ Hom_{Mod}(j_1^{*}E, \tilde{I}) \quad ,$$

mais comme X est affine, on a (II 3.5)

$$\underset{\sim}{R}\ Hom_{Mod}(j_1^{*}E, \tilde{I}) \xrightarrow{\sim} \underset{\sim}{R}\ Hom_{Qcoh}(j_1^{*}E, I) \xrightarrow{\sim} Hom(j_1^{*}E, \tilde{I}) \quad .$$

On en déduit

$$\underset{\sim}{R}\ Hom_{Mod}(E, \underset{\sim}{R}j_{1*}(\tilde{I})) \xrightarrow{\sim} Hom(j_1^{*}E, \tilde{I}) \quad ,$$

d'où une suite spectrale, dont la suite exacte des termes de bas degrés donne l'isomorphisme

$$Ext^2_{Mod}(E, j_{1*}\tilde{I}) \xrightarrow{\sim} Hom(E, R^1 j_{1*}\tilde{I}) \quad .$$

Par suite, le morphisme identique de $E = R^1 j_{1*}(\tilde{I})$ fournit un élément non nul de $Ext^2_{Mod}(E, j_{1*}\tilde{I})$, donc le foncteur $D^b(Qcoh(Z)) \longrightarrow D^b(Z)$ n'est pas pleinement fidèle, ce qui achève la démonstration de (0.3).

APPENDICE II

DÉFINITION DE L'INDICE ANALYTIQUE D'UN COMPLEXE ELLIPTIQUE RELATIF

On se propose, dans cet appendice, de montrer que la notion de complexe parfait conduit à une définition simple et naturelle de "l'indice analytique" d'une famille continue d'opérateurs différentiels elliptiques, ou plus généralement d'un "complexe elliptique relatif". Pour le lecteur initié, disons que la définition donnée ici présente l'avantage sur les définitions classiques (voir par exemple [2] [17]), de ne pas nécessiter de déformation du complexe elliptique considéré.

Les §§ 1 et 2 consistent en rappels sur la notion classique de "structure mixte" ([1]). Nous ne donnons, bien entendu, que le minimum de définitions et résultats requis pour pouvoir énoncer et démontrer, au § 3, le théorème central que nous avons en vue, et qui dit, de manière un peu plus précise, que l'image directe, par la projection (supposée propre) sur la base (supposée localement compacte), d'un complexe elliptique relatif est un complexe parfait. Quand la base S est compacte, la définition de l'indice analytique en tant qu'élément de K(S) ("groupe de Grothendieck" des fibrés vectoriels complexes de rang fini sur S) découle alors du sorite de globalisation de (II 2.3.2).

Dans toute la suite, si S est un espace topologique, on notera $\underline{O}_S$ le faisceau des fonctions continues sur S à valeurs réelles.

1. Le sorite des structures mixtes

Dans ce numéro, on se fixe un espace topologique S.

1.1. Définition des variétés mixtes

Soit V un ouvert de $\underline{\underline{R}}^n$. Pour $r \in \underline{\underline{N}}$, on note $C^r(V)$ l'espace de Fréchet des fonctions de classe C^r sur V à valeurs réelles. On pose $C^\infty(V) = \varprojlim_r C^r(V)$.

Soit U un ouvert de S. Pour $r \in \underline{\underline{N}} \cup \{\infty\}$, on note ${}^r\underline{O}_{UxV}$ le faisceau d'anneaux sur UxV défini par

([1]) On conseille au lecteur averti de les sauter.

$$\Gamma'(U'xV', {}^{r}\underline{O}_{U'xV'}) = C(U', C^{r}(V')),$$

où U' (resp. V') est un ouvert de U (resp. V), et $C(U', C^r(V'))$ désigne l'espace des applications continues de U' dans $C^r(V')$. On a une injection canonique

$$pr_1^{-1}(\underline{O}_U) \longrightarrow {}^{r}\underline{O}_{UxV} \quad ,$$

qui fait de $(UxV, {}^{r}\underline{O}_{UxV})$ un espace annelé au-dessus de U.

On dit qu'un espace annelé X au-dessus de S est une <u>variété mixte de classe</u> C^r ($r \in \underline{\mathbb{N}} \cup \{\infty\}$) si X est localement isomorphe (en tant qu'espace annelé au-dessus de S) à un espace du type $(UxV, {}^{r}\underline{O}_{UxV})$. (Si S est réduit à un point, une variété mixte de classe C^r au-dessus de S n'est autre qu'une variété de classe C^r au sens usuel).

Soit $f : X \longrightarrow S$ une variété mixte de classe C^r. Pour $s \in S$, la fibre $X_s = f^{-1}(s)$, munie du faisceau $i_s^{-1}(\underline{O}_X)/I_s$, où $i_s : X_s \longrightarrow X$ est l'injection et I_s l'Idéal des sections qui "s'annulent" sur X_s, est une variété de classe C^r.

1.2. <u>Opérateurs différentiels "relatifs"</u>

Il est facile de faire, sur le modèle de la Géométrie Algébrique (EGA IV 16, SGA 3 VII), une étude infinitésimale des variétés mixtes. Nous nous bornerons à passer rapidement en revue les notions dont nous aurons besoin.

1.2.1. Soit $f : X \longrightarrow S$ une variété mixte de classe C^∞ (1.1). Pour tout $n \in \underline{\mathbb{N}}$, on définit le faisceau $P^n_{X/S}$ des <u>parties principales à l'ordre</u> n sur X. C'est de deux façons différentes, correspondant aux deux projections pr_1 et pr_2 de $X \times_S X$ sur X, une $\underline{O}_X$-Algèbre augmentée vers $\underline{O}_X$, localement libre de type fini en tant que $\underline{O}_X$-Module. Quand nous ne préciserons pas la structure de $\underline{O}_X$-Module considérée sur $P^n_{X/S}$, il sera sous-entendu qu'il s'agit de celle provenant de pr_1. On a des isomorphismes canoniques

$$P^0_{X/S} \simeq \underline{O}_X \quad ,$$

$$P^1_{X/S} \simeq \underline{O}_X \oplus \Omega^1_{X/S} \quad ,$$

où $\Omega^1_{X/S}$ est le faisceau des différentielles relatives de X par rapport à S où <u>faisceau cotangent relatif</u>. On note $T_{X/S}$ le dual de $\Omega^1_{X/S}$, qu'on appelle <u>faisceau tangent relatif</u>. Le faisceau $T_{X/S}$ (resp. $\Omega^1_{X/S}$) est le faisceau des sections d'un fibré vectoriel de rang fini sur X, qu'on appelle <u>fibré tangent</u> (resp. <u>cotangent</u>) <u>relatif</u>, et qui est une S-variété mixte au-dessus de X.

L'homomorphisme $f^{-1}(\underline{O}_S)$-linéaire (correspondant à la structure de $\underline{O}_X$-Algèbre définie par pr_2)

$$d^n_{X/S} : \underline{O}_X \longrightarrow P^n_{X/S} \quad ,$$

qui à une section de $\underline{O}_X$ associe sa partie principale à l'ordre n, est appelé <u>opérateur différentiel universel d'ordre</u> n sur X relativement à S.

1.2.2. Plus généralement, si E est un $\underline{O}_X$-Module localement libre de type fini, on peut considérer le faisceau $P^n_{X/S}(E) = P^n_{X/S} \otimes_{\underline{O}_X} E$ des parties principales à l'ordre n de E (le produit tensoriel étant défini au moyen de la deuxième structure de $\underline{O}_X$-Module sur $P^n_{X/S}$), et l'on a un opérateur différentiel universel

$$d^n_{X/S}(E) : E \longrightarrow P^n_{X/S}(E) \quad .$$

Soient E, F des $\underline{O}_X$-Modules localement libres de type fini. Par définition, un opérateur différentiel de E dans F d'ordre $\leqslant n$ est un homomorphisme $f^{-1}(\underline{O}_X)$-linéaire de E dans F qui se factorise à travers $d^n_{X/S}(E)$ en un homomorphisme $\underline{O}_X$-linéaire de $P^n_{X/S}(E)$ dans F (la factorisation est alors unique). En d'autres termes, l'opérateur $d^n_{X/S}(E)$ établit une bijection

$$\text{(1.2.2.1)} \qquad \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(P^n_{X/S}(E), F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Diff}^n(E,F) \quad ,$$

où $\mathrm{Diff}^n(E,F)$ désigne l'ensemble des opérateurs différentiels de E

dans F d'ordre $\leqslant n$.

1.2.3. Nous aurons aussi à considérer des opérateurs différentiels à coefficients complexes. Notons $\underline{O}_S \otimes \underline{C}$ (resp. $\underline{O}_X \otimes \underline{C}$) le complexifié de $\underline{O}_S$ (resp. $\underline{O}_X$). Soient E, F des $(\underline{O}_X \otimes \underline{C})$-Modules localement libres de type fini. Par un opérateur différentiel de E dans F d'ordre $\leqslant n$, on entendra un homomorphisme $f^{-1}(\underline{O}_S \otimes \underline{C})$-linéaire de E dans F qui se factorise à travers $d^n{}_{X/S}(E)$ en un homomorphisme$(\underline{O}_X \otimes \underline{C})$-linéaire de $P^n{}_{X/S}(E)$ dans F. Si l'on désigne par $\mathrm{Diff}^n_{\underline{C}}(E,F)$ l'ensemble de ces opérateurs, l'opérateur $d^n{}_{X/S}(E)$ définit donc une bijection

$$\mathrm{Hom}_{\underline{O}_X \otimes \underline{C}}(P^n{}_{X/S}(E),F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Diff}^n_{\underline{C}}(E,F) \quad . \tag{1.2.3.1}$$

1.2.4. Pour $n \geqslant 1$, on a une suite exacte canonique

$$0 \longrightarrow S^n(\Omega^1{}_{X/S}) \longrightarrow P^n{}_{X/S} \longrightarrow P^{n-1}{}_{X/S} \longrightarrow 0 \quad . \ (1)$$

D'où, en tensorisant sur $\underline{O}_X$ (2) par un $\underline{O}_X$-Module (resp. $(\underline{O}_X \otimes \underline{C})$-Module) localement libre de type fini E, une suite exacte de $\underline{O}_X$ (resp. $(\underline{O}_X \otimes \underline{C})$)-Modules :

$$0 \longrightarrow S^n(\Omega^1{}_{X/S}) \otimes_{\underline{O}_X} E \longrightarrow P^n{}_{X/S}(E) \longrightarrow P^{n-1}{}_{X/S}(E) \longrightarrow 0 \quad . \tag{1.2.4.1}$$

Soit F un $\underline{O}_X$ (resp. $(\underline{O}_X \otimes \underline{C})$)-Module localement libre de type fini. Appliquant à (1.2.4.1) le foncteur $\mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(.,F)$ (resp. $\mathrm{Hom}_{\underline{O}_X \otimes \underline{C}}(.,F)$), on en déduit, compte tenu des identifications (1.2.2.1) et (1.2.4.1), une suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathrm{Diff}^{n-1}(E,F) \longrightarrow \mathrm{Diff}^n(E,F) \xrightarrow{\sigma_n} \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X}(S^n(\Omega^1{}_{X/S}) \otimes_{\underline{O}_X} E, F) \tag{1.2.4.2}$$

(resp.

$$0 \longrightarrow \mathrm{Diff}^{n-1}_{\underline{C}}(E,F) \longrightarrow \mathrm{Diff}^n_{\underline{C}}(E,F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\underline{O}_X \otimes \underline{C}}(S^n(\Omega^1{}_{X/S}) \otimes_{\underline{O}_X} E \ , \ F) \quad).$$

(1) $S^n(\ )$ désigne la puissance symétrique n-ième.

(2) Pour la deuxième structure de $\underline{O}_X$-Module de $P^n_{X/S}$ et $P^{n-1}{}_{X/S}$.

(Si X est paracompact et $\underline{O}_X$ mou (cf. II 2.3.1) on peut compléter la suite exacte (1.2.4.2) en ajoutant un zéro à droite). L'homomorphisme σ_n est appelé <u>symbole</u> ; il associe à un opérateur différentiel de E dans F d'ordre $\leqslant n$ une "application polynomiale homogène de degré n de $\Omega^1_{X/S}$ dans $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X}(E,F)$ (resp. $\underline{\mathrm{Hom}}_{\underline{O}_X \otimes \underline{\mathbb{C}}}(E,F)$)", que l'on peut regarder encore, si l'on veut, comme un homomorphisme $p^*(E) \longrightarrow p^*(F)$ (où p est la projection sur X du fibré cotangent relatif (1.2.1)), satisfaisant une certaine condition d'homogénéité.

Soient E, F, G des $\underline{O}_X$-Modules localement libres de type fini, et $u \in \mathrm{Diff}^m(E,F)$, $v \in \mathrm{Diff}^n(F,G)$, d'où $vu \in \mathrm{Diff}^{m+n}(E,G)$. On vérifie facilement la relation

$$\sigma_{m+n}(vu) = \sigma_n(v)\,\sigma_m(u) \qquad (1.2.4.3)$$

(On a la même relation pour les opérateurs différentiels à coefficients complexes). En particulier, si le composé de deux opérateurs différentiels est nul, le composé de leurs symboles l'est aussi.

1.2.5. Soit E un complexe, à degrés bornés, d'opérateurs différentiels à coefficients complexes sur X relativement à S (1.2.3) , $d^i : E^i \longrightarrow E^{i+1}$ étant d'ordre $\leqslant n_i$. D'après (1.2.4.3), on a

$$\sigma_{n_{i+1}}(d^{i+1})\,\sigma_{n_i}(d^i) = 0 \quad .$$

On dit que E est un <u>complexe elliptique</u> d'ordre $\underline{n} = (n_i)$ si le complexe $(p^*(E^i), \sigma_{n_i}(d^i))$ (où p est la projection sur X du fibré cotangent) est acyclique en dehors de la section nulle.

Quand S est réduit à un point, la notion précédente de complexe elliptique sur X coïncide avec la notion usuelle, étudiée en détail dans [4] ou [16].

1.2.6. Soient $s \in S$, i_s l'inclusion de la fibre X_s dans X (considérée comme monomorphisme d'espaces annelés) cf.(1.1)). Pour $n \in \underline{\mathbb{N}}$, on a un isomorphisme canonique

$$i_s^{*}(P^n_{X/S}) \xrightarrow{\sim} P^n_{X_s} \quad ;$$

d'où un homomorphisme de restriction

$$i_s^{*} : \mathrm{Diff}^n(E,F) \longrightarrow \mathrm{Diff}^n(i_s^{*}(E), i_s^{*}(F)),$$

pour E, F des $\underline{O}_X$-Modules localement libres de type fini (et un homomorphisme analogue pour les opérateurs à coefficients complexes). Soit E un complexe, à degrés bornés, d'opérateurs différentiels à coefficients complexes sur X ; pour que E soit elliptique (1.2.5) il faut et il suffit que, pour tout $s \in S$, $i_s^{*}(E)$ soit un complexe elliptique (vérification laissée au lecteur).

2. Lemmes de rigidité

2.0. Il est "bien connu" que les variétés différentiables compactes sont "rigides", i.e. n'admettent pas de déformation continue autre que triviale. Toutefois, comme ce résultat nous servira de façon essentielle au § 3, et que les références semblent assez rares, il n'est peut-être pas inutile de donner des énoncés précis et quelques démonstrations.

On se fixe un espace topologique S. Les variétes mixtes dont il sera question seront supposées de classe C^r, avec $r \geqslant 1$ (éventuellement $r = \infty$).

2.1. Notations. Soient X, Y des S-variétés mixtes. On note Hom(X,Y) l'ensemble des S-morphismes de X dans Y, $\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)$ le faisceau sur X des germes de S-morphismes de X dans Y (défini par

$$\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)(U) = \mathrm{Hom}(U,Y)$$

pour U ouvert de X).

Soit $s \in S$. On note i_s l'inclusion de X_s dans X. On a un homomorphisme canonique d'induction

(2.1.1) $$i_s^{-1}\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(X_s, Y_s) \quad ,$$

qui est un épimorphisme, comme on le constate aussitôt. Dans le cas où $Y = S \times \underline{\underline{R}}$, le faisceau $\underline{Hom}(X,Y)$ s'identifie canoniquement à $\underline{O}_X$, et l'épimorphisme (2.1.1) à l'épimorphisme

$$i_s^{-1}(\underline{O}_X) \longrightarrow i_s^{\#}(\underline{O}_X) = \underline{O}_{X_s}$$

considéré en (1.1).

Proposition ([1]) 2.2. Soient X, Y des S-variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que la fibre X_s est paracompacte et que s admet un système fondamental de voisinages paracompacts. Soient A un fermé de X_s, et $f \in H^0(A, \underline{Hom}(X_s, Y_s))$. Le sous-faisceau F de $i_s^{-1}\underline{Hom}(X,Y)$ formé des germes "qui prolongent f" (i.e. dont l'image par (2.1.1) coïncide avec f au-dessus de A) est mou.

Preuve. Soit X' un voisinage ouvert de x dans X, isomorphe (comme variété mixte) à S' x U, où S' est un voisinage paracompact de s et U un ouvert relativement compact de $\underline{\underline{R}}^m$, et tel que l'image par f de $X'_s \cap A$ soit contenue dans un ouvert de Y isomorphe à S' x V, ou V est un ouvert convexe de $\underline{\underline{R}}^n$ contenant l'origine. D'après (T.F. II 3.4.1), il suffit de montrer que toute section de F au-dessus d'un fermé A_o de X_s contenu dans X'_s se prolonge à X'_s. Or X'_s ($\simeq \{s\} \times U$) est relativement compact, de sorte qu'un fermé de X_s contenu dans X'_s est compact. Identifions X' (resp. Y') à S' x U (resp. S' x V), posons $A' = A \cap X'_s$, et soit A_o un compact de $X'_s = \{s\} \times U$. Comme A' est fermé dans $\{s\} \times U$, qui est paracompact, on a ([T.F.] II 3.3.1) ([1])

$$H^0(A', \underline{Hom}(X_s, Y_s)) = \varinjlim_{U' \supset A'} \mathrm{Hom}(U', Y'_s) \quad ,$$

suivant les ouverts U' de X'_s contenant A'. De même, comme A_o est fermé dans S' x $\bar{U}$, qui est paracompact (produit d'un paracompact et d'un compact), on a

$$H^0(A_o, i_s^{-1}\underline{Hom}(X,Y)) = \varinjlim_{U_o \supset A_o} \mathrm{Hom}(U_o, Y') \quad ,$$

suivant les ouverts U_o de X' contenant A_o. La proposition sera donc consé-

([1]) Communiquée au rédacteur par A. Douady.

([1]) Un fermé d'un espace paracompact admet un système fondamental de voisinages paracompacts.

quence du lemme suivant :

Lemme 2.2.1. Soient U un ouvert de $\underline{R}^m$, V un ouvert convexe de $\underline{R}^n$ contenant 0. Soient A_o, A_1 des fermés de $\{s\} \times U$, soit U_o (resp. U_1) un ouvert de $S \times U$ (resp. $\{s\} \times U$) contenant A_o (resp. A_1). Soit $f_1 : U_1 \longrightarrow V$ un morphisme et soit $f_o : U_o \longrightarrow S \times V$ un S-morphisme induisant sur $U_o \cap (\{s\} \times U)$ un morphisme définissant le même germe que f_1 au voisinage de A_1. Il existe alors un ouvert U' de $S \times U$ contenant $s \times U$, et un S-morphisme $\bar{f} : U' \longrightarrow S \times V$ tel que

(i) le germe de $\bar{f}$ suivant $\{s\} \times U$ prolonge le germe défini par f_o ;

(ii) le morphisme induit par $\bar{f}$ sur $\{s\} \times U$ définisse le même germe que f_1 au voisinage de A_1.

Preuve. Quitte à remplacer f_1 par af_1, où a est une fonction C^r sur U, valant 1 au voisinage de A_1 et à support dans U_1, on peut supposer que $U_1 = U$. Soit b une fonction C^r sur U, valant 1 sur A_o et à support dans $U_o \cap (\{s\} \times U)$. Alors

$$U' = U_o \cup (S \times (U - \mathrm{Supp}\ b))$$

est un ouvert de $S \times U$ contenant $\{s\} \times U$. Le morphisme $\bar{f} : U' \longrightarrow S \times V$ défini par

$$\bar{f}(t,x) = (t\ ,\ b(x)\mathrm{pr}_2 f_o(t,x) + (1-b(x))f_1(x))$$

satisfait visiblement aux conditions (i) et (ii).

Corollaire 2.3. Sous les hypothèses de (2.2), les faisceaux $i_s^{-1}\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)$, $\underline{\mathrm{Hom}}(X_s,Y_s)$ sont mous. En particulier, les faisceaux $i_s^{-1}(\underline{O}_X)$, $\underline{O}_{X_s}$ sont mous ([1]). Pour tout fermé A de X_s, l'application

$$H^o(X_s, i_s^{-1}\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)) \longrightarrow H^o(A, \underline{\mathrm{Hom}}(X_s,Y_s))$$

déduite de (2.1.1) est surjective.

([1]) Pour $\underline{O}_{X_s}$, c'est "très bien connu". Le rédacteur ignore si $\underline{O}_X$ est mou quand les hypothèses de (2.2) sont vérifiées pour chaque $s \in S$ et que X est paracompact. Cela impliquerait trivialement (moyennant lesdites hypothèses) la mollesse de $i_s^{-1}(\underline{O}_X)$ ainsi que (2.5) ci-dessous.

Preuve. Le fait que $i_s^{-1}\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)$ soit mou résulte de (2.2) appliqué pour $A = \emptyset$; prenant $S = s$, on en déduit que $\underline{\mathrm{Hom}}(X_s,Y_s)$ est mou. La dernière assertion découle de (2.2).

Corollaire 2.4. Sous les hypothèses de (2.2), soit E un $\underline{O}_X$-Module. Pour tout fermé A de X_s, l'homomorphisme canonique

$$H^o(X_s,i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^o(A,i_s^{\mathrm{H}}(E)) \quad ,$$

déduit de l'épimorphisme

$$i_s^{-1}(E) \longrightarrow i_s^{\mathrm{H}}(E) = i_s^{-1}(E) \otimes_{i_s^{-1}(\underline{O}_X)} \underline{O}_{X_s} \quad ,$$

est un épimorphisme.

Preuve. Comme $i_s^{-1}(\underline{O}_X)$ est mou (2.3), le foncteur $H^o(A,.)$ est exact sur la catégorie des $i_s^{-1}(\underline{O}_X)$-Modules (T.F. II 3.7.1, 3.4.2, 4.4.3), donc l'homomorphisme

$$H^o(A,i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^o(A,i_s^{\mathrm{H}}(E))$$

est un épimorphisme. Comme $i_s^{-1}(E)$ est mou, l'homomorphisme

$$H^o(X_s,i_s^{-1}(E)) \longrightarrow H^o(A,i_s^{-1}(E))$$

est un épimorphisme, et l'on gagne.

Corollaire 2.5. Soient $p : X \longrightarrow S$ une variété mixte, et $s \in S$. On suppose que s admet un système fondamental de voisinages paracompacts S' tels que les $p^{-1}(S')$ forment un système fondamental de voisinages paracompacts de X_s (condition réalisée par exemple si S est localement compact et p une application propre d'espaces topologiques). Alors, pour tout $\underline{O}_X$-Module E, on a

$$R^i p_{\mathrm{H}}(E)_s = 0 \quad \text{pour } i > 0.$$

Preuve. D'après (T.F. II 4.17.1), on a

$$R^i p_{\mathcal{H}}(E)_s = H^i(X_s, i_s^{-1}(E)) \quad .$$

Mais, comme $i_s^{-1}(\underline{O}_X)$ est mou (2.3), on a

$$H^i(X_s, i_s^{-1}(E)) = 0 \quad \text{pour } i > 0 \quad ,$$

d'où l'assertion.

Corollaire 2.6. Soient X, Y des S-variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que X satisfait aux hypothèses de (2.5). Pour tout morphisme $f : X_s \longrightarrow Y_s$, il existe un voisinage ouvert S' de s et un morphisme $\bar{f} : X|S' \longrightarrow Y|S'$ tel que $\bar{f}_s = f$.

Preuve. Conséquence immédiate de (2.3) (avec $A = X_s$) et du fait que, l'on a, grâce aux hypothèses sur X,

$$H^o(X_s, i_s^{-1}\underline{\mathrm{Hom}}(X,Y)) = \varinjlim_{S' \ni s} \mathrm{Hom}(X|S', Y) \qquad (S' \text{ ouvert})$$

(T.F. II 3.3.1).

Proposition 2.7. Soient X, Y des S-variétés mixtes, $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme, $s \in S$, $x \in X_s$. Si l'application linéaire tangente à $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ est inversible en x, alors f est un isomorphisme local en x, i.e. il existe un voisinage ouvert U de x dans X et un ouvert V de Y tels que f induise un isomorphisme de U sur V.

Preuve. C'est une conséquence facile du théorème des fonctions implicites. Les détails sont laissés au lecteur.

Corollaire 2.8. Soient X, Y des S-variétés mixtes, et $s \in S$. On suppose que s admet un système fondamental de voisinages S' tels que les X|S' (resp. Y|S') forment un système fondamental de voisinages de X_s (resp. Y_s) (condition réalisée par exemple si S est localement compact et X (resp. Y) propre sur S). Soit $f : X \longrightarrow Y$ un S-morphisme tel que $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ soit un isomorphisme. Il existe alors un voisinage S'

de s tel que $f|X|S' : X|S' \longrightarrow Y|S'$ soit un isomorphisme.

Preuve. D'après (2.7), il existe un voisinage ouvert U de X_s dans X tel que f|U soit étale (i.e. un isomorphisme local). On peut supposer que U = X|S', où S' est un voisinage de s dans S, autrement dit, quitte à restreindre S, on peut supposer que f est étale. On vérifie alors facilement que le produit fibré $Z = X \times_Y X$ est muni naturellement d'une structure de S-variété mixte (étale sur X pour chaque projection), et que le morphisme diagonal $\Delta : X \longrightarrow Z$ est une immersion ouverte ([1]). Il est immédiat, d'autre part, que Z vérifie la même hypothèse que X et Y, à savoir que les ouverts de la forme Z|S', pour S' voisinage ouvert de s dans S, forment un système fondamental de voisinage de Z_s. Comme $\Delta_s : X_s \longrightarrow Z_s$ est un isomorphisme, il en résulte, quitte à restreindre S, que Δ est un isomorphisme. Donc f est une immersion ouverte, donc un isomorphisme quitte à rétrécir à nouveau S, et l'on a gagné.

Corollaire 2.9. Soient X une S-variété mixte, et $s \in S$. On suppose vérifiée l'hypothèse de (2.5). Il existe alors un voisinage S' de s dans S tel que X|S' soit S'-isomorphe à $S' \times X_s$.

Preuve. Appliquer (2.6) et (2.8).

Corollaire 2.10. Soient $s \in S$ et V une variété paracompacte. Posons $X = S \times V$, et notons i_s l'injection de V dans X définie par s. Supposons vérifiée l'hypothèse de (2.5). Soit E un O_X (resp. $O_X \otimes \underline{C}$)-Module localement libre de type fini. Il existe alors un voisinage S' de s dans S tel que $E|X|S'$ soit isomorphe à $pr_2^{\#} i_s^{\#}(E)$ ($pr_2 : S' \times V \longrightarrow V$ étant la deuxième projection).

Preuve. Posons $F = pr_2^{\#} i_s^{\#}(E)$. En vertu de (2.4) appliqué au Module $\underline{Hom}(E,F)$, l'homomorphisme d'induction

$$Hom(i_s^{-1}(E), i_s^{-1}(F)) \longrightarrow Hom(i_s^{\#}(E), i_s^{\#}(F))$$

([1]) Noter l'analogie avec la Géométrie Algébrique (SGA 1 I 5.1).

est un épimorphisme. D'autre part, on a (T.F. II 3.3.1) :

$$\mathrm{Hom}(i_s^{-1}(E), i_s^{-1}(F)) \xrightarrow{\sim} H^0(X_s, i_s^{-1}\underline{\mathrm{Hom}}(E,F))$$

$$= \varinjlim_{S' \ni s} H^0(X|S', \underline{\mathrm{Hom}}(E,F)) \quad (S' \text{ ouvert})$$

$$\xrightarrow{\sim} \varinjlim_{S' \ni s} \mathrm{Hom}(E|X|S', F|X|S') .$$

Donc l'isomorphisme canonique $i_s^H(E) \xrightarrow{\sim} i_s^H(F)$ est induit par un homomorphisme $f : E \longrightarrow F$ (quitte à rétrécir S). Comme f_s est un isomorphisme, f est un isomorphisme au voisinage de X_s par Nakayama, donc au-dessus de $X|S'$, où S' est un voisinage convenable de s, cqfd.

3. Le théorème de finitude

3.0. Conventions et notations

3.0.1. Soient X et Y des espaces topologiques. On note C(X,Y) l'ensemble des applications continues de X dans Y, et $\underline{C}(X,Y)$ le faisceau sur X défini par $U \longmapsto C(U,Y)$.

3.0.2. Soient E, F des espaces de Banach (réels ou complexes). On note L(E,F) l'espace de Banach des applications linéaires continues de E dans F.

3.0.3. Les variétés mixtes dont il sera question dans ce numéro seront supposées de classe C^∞ . Soit X une S-variété mixte, nous identifierons souvent un $\underline{O}_X$ (resp. $\underline{O}_X \otimes \underline{C}$)-Module localement libre de type fini au fibré vectoriel réel (resp. complexe) correspondant.

3.0.4. Soit X une variété (ordinaire) compacte, et soit E un fibré vectoriel (réel ou complexe) de rang fini sur X. On note $C^\infty(X,E)$ l'espace de Fréchet des sections (de classe C^∞) sur X de E. Pour $r \in \underline{Z}$, on note $C_2^r(X,E)$ l'espace de Hilbert des sections de E r fois différentiables dans L^2 ([16] IX). Pour $s \geqslant r$, $C_2^s(X,E)$ s'envoie dans $C_2^r(X,E)$ par une application linéaire continue injective d'image dense, et l'on a

(loc.cit.)

$$C^{\infty}(X,E) = \varprojlim_{r} C_2^r(X,E) \quad .$$

3.0.5. Soit S un espace topologique. Nous aurons besoin de la notion de "fibré hilbertien" au-dessus de S, pour laquelle nous renvoyons le lecteur à [12] ou [14] . On a un foncteur additif de la catégorie des fibrés hilbertiens (réels resp. complexes) au-dessus de S dans celle des $\underline{O}_S$ rep. $\underline{O}_S \otimes \underline{\mathbb{C}}$ -Modules, associant à chaque fibré hilbertien E le faisceau $\underline{E}$ des sections continues de E.

3.1. Résultats techniques auxiliaires

Lemme 3.1.1. Soient X, Y des espaces topologiques, X étant localement compact. Notons $\underline{C}'(X,Y)$ le préfaisceau défini sur la base des ouverts relativement compacts de X par $\underline{C}'(X,Y)(U) = C(\bar{U},Y)$ (3.0.1). Le morphisme canonique de restriction

$$\underline{C}'(X,Y) \longrightarrow \underline{C}(X,Y)$$

induit un isomorphisme sur les faisceaux associés.

Preuve. C'est immédiat.

Lemme 3.1.2. Soient E, F des espaces vectoriels topologiques localement convexes (sur $\underline{\mathbb{C}}$, pour fixer les idées), et $u : E \longrightarrow F$ une application linéaire continue (resp. continue et d'image dense). Soit X un espace compact. Munissons $C(X,E), C(X,F)$ de la topologie de la convergence uniforme. Alors l'application linéaire

$$u_X : \quad C(X,E) \longrightarrow C(X,F)$$

induite par u est continue (resp. continue et d'image dense).

Preuve. Il est clair que u_X est continue. D'autre part (Bourbaki, Intégration, chap. III § 2, lemmes 1 et 2), le sous-espace $C(X,\underline{C}) \otimes_{\underline{C}} E$ de $C(X,E)$ (formé des applications continues de X dans E qui prennent leurs valeurs dans un sous-espace vectoriel de dimension finie) est dense ; de même $C(X,\underline{C})\otimes_{\underline{C}}F$ est dense dans $C(X,F)$. Supposons u continue et d'image dense. Alors

$$u_X(C(X,\underline{C})\otimes_{\underline{C}}E) = C(X,\underline{C})\otimes_{\underline{C}}u(E)$$

est dense dans $C(X,\underline{C})\otimes_{\underline{C}}F$, d'où l'on déduit, en prenant les adhérences, que $u_X(C(X,E))$ est dense dans $C(X,F)$, cqfd.

3.1.3. Soient V une variété compacte, E et F des fibrés vectoriels complexes ([1]) de rang fini sur V, et $n\in\underline{N}$. L'espace $\mathrm{Diff}^n_{\underline{C}}(E,F)$, s'identifiant par (1.2.3.1) à

$$\mathrm{Hom}(P^n(E),F) \xrightarrow{\sim} C^\infty(V,\underline{\mathrm{Hom}}(P^n(E),F)) \quad ,$$

est muni naturellement d'une structure d'espace de Fréchet. Soit $u\in \mathrm{Diff}^n_{\underline{C}}(E,F)$; on vérifie facilement que l'application linéaire de $C^\infty(V,E)$ dans $C^\infty(V,F)$ définie par u est continue. Si $L(C^\infty(V,E),C^\infty(V,F))$ désigne l'espace des applications linéaires continues de $C^\infty(V,E)$ dans $C^\infty(V,F)$, on a donc une application linéaire

$$\phi : \mathrm{Diff}^n_{\underline{C}}(E,F) \longrightarrow L(C^\infty(V,E),C^\infty(V,F)) \quad .$$

D'autre part, pour $r\in\underline{Z}$, u agit par extension des scalaires ([16] IX Th. 12) sur les sections C^r_2 de E et définit une application linéaire

$$\phi_r : \mathrm{Diff}^n_{\underline{C}}(E,F) \longrightarrow L(C^r_2(V,E),C^{r-n}_2(V,F)) \quad .$$

On vérifie aisément que :

(i) les ϕ_r sont continues (l'espace d'arrivée est un espace de Banach

([1]) Pour fixer les idées (résultats analogues dans le cas réel).

(3.0.2)) ;

(ii) $\phi = \varprojlim \phi_r$ (i.e. pour $u \in \mathrm{Diff}^n_{\subseteq}(E,F)$, $\phi(u)$ est la limite du système projectif des $\phi_r(u)$).

(Les assertions précédentes sont faciles à partir des résultats de (loc.cit) : on se ramène aussitôt à n = 0 , (ii) découle alors directement des définitions, tandis que (i) résulte (après localisation du problème grâce à une partition de l'unité) de la formule qui donne les dérivées successives d'un produit).

Lemme 3.1.4. Soient S un espace topologique, V une variété compacte, E et F des fibrés vectoriels complexes de rang fini sur V, et $n \in \underline{\mathbb{N}}$. Notons X la S-variété mixte S x V. Pour $u \in \mathrm{Diff}^n_{\subseteq}(\mathrm{pr}_2^{\#}(E), \mathrm{pr}_2^{\#}(F))$, l'application $s \longmapsto i_s^{\#}(u)$ de S dans $\mathrm{Diff}^n_{\subseteq}(E,F)$ est continue. L'application linéaire

$$\mathrm{Diff}^n_{\subseteq}(\mathrm{pr}_2^{\#}(E), \mathrm{pr}_2^{\#}(F)) \longrightarrow C(S, \mathrm{Diff}^n_{\subseteq}(E,F))$$

ainsi définie est un isomorphisme.

Preuve. Moyennant l'identification (1.2.3.1), on peut se borner à n = 0. Posant Hom(E,F) = G, on est alors ramené à montrer que pour $u \in \Gamma(X, \mathrm{pr}_2^{\#}(G))$, l'application $s \longmapsto u_s = i_s^{\#}(u)$ de S dans $C^\infty(V,G)$ est continue, et que l'application linéaire

$$\Gamma(X, \mathrm{pr}_2^{\#}(G)) \longrightarrow C(S, C^\infty(V,G))$$

ainsi obtenue est un isomorphisme. Mais cela résulte immédiatement de la définition des variétés mixtes (1.1).

3.1.5. Sous les hypothèses de (3.1.4), soit

$$u \in \mathrm{Diff}^n(\mathrm{pr}_2^{\#}(E), \mathrm{pr}_2^{\#}(F)) \quad . \ (^1)$$

---

(1) On omet l'indice $\subseteq$ pour abréger.

Identifiant u, par (3.1.4), à une application continue de S dans $\mathrm{Diff}^n(E,F)$, on constate que, pour U ouvert dans S, le morphisme

$$pr_{1*}(u)(U) : \Gamma(X|U,E) \longrightarrow \Gamma(X|U,F)$$

s'identifie canoniquement à l'application linéaire

$$C(U,C^\infty(V,E)) \longrightarrow C(U,C^\infty(V,F))$$

déduite de

$$\phi u : U \longrightarrow L(C^\infty(V,E),C^\infty(V,F)) \qquad (3.1.3) \quad .$$

Supposons S localement compact. Alors (3.1.1) le morphisme

$$pr_{1*}(u) : pr_{1*}\, pr_2^*(E) \longrightarrow pr_{1*}pr_2^*(F)$$

est le morphisme de faisceaux associé au morphisme de préfaisceaux

$$u_\infty : \underline{C}'(S,C^\infty(V,E)) \longrightarrow \underline{C}'(S,C^\infty(V,F))$$

défini par ϕu. D'autre part, pour $r \in \underline{\mathbb{Z}}$,

$$\phi_r u : S \longrightarrow L(C_2^r(V,E),C_2^{r-n}(V,F))$$

définit un morphisme de préfaisceaux

$$u_r : \underline{C}'(S,C_2^r(V,E)) \longrightarrow \underline{C}'(S,C_2^r(V,F)) \quad .$$

D'après (3.1.3 (ii)), les u_r forment un système projectif dont la limite est u_∞. Il nous sera commode d'interpréter $\phi_r u$ comme un morphisme de fibrés hilbertiens triviaux (3.0.5)

$$S \times C_2^r(V,E) \longrightarrow S \times C_2^{r-n}(V,F),$$

induisant sur les faisceaux de sections le morphisme de faisceaux associés à u_r.

3.2. Définition de l'indice

Théorème 3.2.1. Soient S un espace localement compact, $p : X \longrightarrow S$ une variété mixte propre, $E^\cdot$ un complexe elliptique d'ordre n de fibrés vectoriels complexes sur X (1.2.5). Alors le complexe $\underline{R}p_\#(E^\cdot)$ (qui, d'après (2.5), est isomorphe, à $p_\#(E^\cdot)$ dans la catégorie dérivée de celle des $\underline{O}_S \otimes \underline{\mathbb{C}}$ - Modules) est parfait.

Preuve. La question étant locale sur S, on peut supposer (2.9) que $X = S \times V$, où V est une variété compacte, et $p = pr_1$. En outre, on peut supposer (2.10) que l'on a, pour tout i, $E^i = pr_2^\#(F^i)$, où F^i est un fibré vectoriel complexe de rang fini sur V. D'après (3.1.5), le complexe $p_\#(E)$ est associé au complexe de préfaisceaux $(\underline{C}'(S,C^\infty(V,F^i)),d^i_\infty)$ (où les $d^i : E^i \longrightarrow E^{i+1}$ sont les opérateurs différentiels donnés), que nous noterons simplement $\underline{C}'(S,C^\infty(V,F^\cdot))$. Posons, pour chaque $i \in \underline{\mathbb{Z}}$,

$$m_i = \sum_{j<i} n_j \qquad \text{(on convient que } n_i = 0 \text{ si } E^i = 0\text{)}.$$

Pour chaque $r \in \underline{\mathbb{Z}}$, on a (3.1.5) un complexe de préfaisceaux $(\underline{C}'(S,C_2^{r-m_i}(V,F^i)),d^i_{r-m_i})$, que nous noterons $\underline{C}'(S,C_2^r(V,F^\cdot))$. Les $\underline{C}'(S,C_2^r(V,F^\cdot))$ forment un système projectif, et l'on a (3.1.5) :

$$\underline{C}'(S,C^\infty(V,F^\cdot)) = \varprojlim_r \underline{C}'(S,C_2^r(V,F^\cdot)) \qquad (3.2.1.1)$$

Enfin, nous noterons $F_r^\cdot$ le complexe de fibrés hilbertiens triviaux sur S défini par $\phi_{r-m_i} d^i$, et $\underline{F}_r^\cdot$ le complexe des faisceaux de sections correspondant, qui n'est autre (3.1.5) que le complexe de faisceaux associés à $\underline{C}'(S,C_2^r(V,F^\cdot))$. Cela posé, pour démontrer le théorème, il suffit de prouver les assertions suivantes :

(a) Pour $r \in \underline{\mathbb{Z}}$, le morphisme canonique

$$\underline{C}'(S,C^{\infty}(V,F^{\cdot})) \longrightarrow \underline{C}'(S,C_2^r(V,F^{\cdot}))$$

est un quasi-isomorphisme de complexes de préfaisceaux, i.e. induit des isomorphismes sur les préfaisceaux de cohomologie.

(b) Pour $r \in \underline{Z}$, le complexe $\underline{F}_r^{\cdot}$ est parfait.

Preuve de (b). L'ellipticité de $E^{\cdot}$ implique ([16] XI Th.6 ([1])) que, pour tout $s \in S$, la différentielle de $(F_r^{\cdot})_s$ est d'image fermée et que les $H^i((F_r^{\cdot})_s)$ sont des espaces vectoriels de dimension finie. Autrement dit, pour employer la terminologie de [11], $F_r^{\cdot}$ est un complexe quasi-acyclique direct de fibrés hilbertiens. Par suite, d'après ([12] 2.3), $F_r^{\cdot}$ est localement homotopiquement équivalent à un complexe borné de fibrés vectoriels de rang fini. Comme le foncteur "faisceau de sections" est additif (3.0.5), $\underline{F}_r^{\cdot}$ est localement homotopiquement équivalent à un complexe borné de faisceaux localement libres de type fini, donc est parfait.

Pour la preuve de (a), nous aurons besoin de l'assertion intermédiaire suivante :

(a') Pour $p \geqslant q$, le morphisme canonique

$$\underline{F}_p^{\cdot} \longrightarrow \underline{F}_q^{\cdot}$$

est un quasi-isomorphisme.

Preuve de (a'). Notons $M_{pq}^{\cdot}$ le complexe de fibrés hilbertiens cône du morphisme $F_p^{\cdot} \longrightarrow F_q^{\cdot}$. L'ellipticité de E implique que, pour tout $s \in S$, le morphisme $(F_p^{\cdot})_s \longrightarrow (F_q^{\cdot})_s$ est un quasi-isomorphisme ([16] XI Cor. 2 of Th. 6). En d'autre termes, $M_{pq}^{\cdot}$ est un complexe acyclique direct. Il en résulte ([11] 2.3) que $M_{pq}^{\cdot}$ est localement homotopiquement trivial, donc que $\underline{M}_{pq}^{\cdot}$, qui n'est autre que le cône de $\underline{F}_p^{\cdot} \longrightarrow \underline{F}_q^{\cdot}$, est acyclique, cqfd.

Preuve de (a). Il s'agit de montrer que, pour tout ouvert relativement compact U de S, le morphisme

---

([1]) qui se généralise aisément aux complexes elliptiques.

$$C(\bar{U},C^{\infty}(V,F^{\cdot})) \longrightarrow C(\bar{U},C_2^r(V,F^{\cdot}))$$

est un quasi-isomorphisme. Quitte à remplacer S par $\bar{U}$ (et $E^{\cdot}$ par le complexe induit au-dessus de $\bar{U}$), on est ramené à montrer que

$$C(S,C^{\infty}(V,F^{\cdot})) \longrightarrow C(S,C_2^r(V,F^{\cdot}))$$

est un quasi-isomorphisme, S étant supposé <u>compact</u>. D'après (3.2.1.1) on a

$$C(S,C^{\infty}(V,F^{\cdot})) = \varprojlim_r C(S,C_2^r(V,F^{\cdot}))$$

Pour chaque i, $C(S,C_2^r(V,F^i))$ est un espace de Banach (pour la topologie de la convergence uniforme), et les morphismes de transition

$$C(S,C_2^p(V,F^i)) \longrightarrow C(S,C_2^q(V,F^i))$$

sont, en vertu de (3.0.4) et (3.1.2), les applications linéaires continues d'image dense. D'autre part, appliquant aux quasi-isomorphismes (a') $\underline{F}_p^{\cdot} \longrightarrow \underline{F}_q^{\cdot}$ le foncteur Γ_S, qui est exact puisque $\underline{O}_S$ est mou, on voit que les morphismes de transition

$$C(S,C_2^p(V,F^{\cdot})) \longrightarrow C(S,C_2^q(V,F^{\cdot}))$$

sont des quasi-isomorphismes. L'assertion (a) résulte alors de (EGA O_{III} 13.2.3, variante "topologique"). Ceci achève la démonstration de (3.2.1).

3.2.2. Si S est un espace topologique, nous noterons Parf(S) la catégorie triangulée des complexes parfaits de $(\underline{O}_S \otimes \underline{C})$-Modules, et $K^{\cdot}(S)$ le "groupe de Grothendieck" correspondant (1).

Soient S, X, $E^{\cdot}$ comme en (3.2.1) ; on appelle <u>indice analytique</u> de $E^{\cdot}$ l'élément

$$\text{ind.an}(E^{\cdot}) = C\mathfrak{L}(\underline{Rp}_{\pi}(E^{\cdot})) \in K^{\cdot}(S).$$

---

(1) voir (I 6.3). Pour une revue générale des foncteurs K, voir Exp. IV.

Si S est compact, ind.an(E·) définit canoniquement un élément dans le groupe usuel K(S) des topologues. En effet, de manière générale, pour tout espace topologique S notons Loclib(S) la catégorie additive des $(\underline{O}_S \otimes \underline{\mathbb{C}})$-Modules localement libres de type fini, et K(S) le "groupe de Grothendieck" de la catégorie triangulée $K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b,\phi}(\text{Loclib}(S))$ (cette dernière s'identifie d'ailleurs à $K^b(\text{Loclib}(S))$ quand S est paracompact (II 2.3.2 (a)), de sorte que dans ce cas (I 6.4) K(S) est canoniquement isomorphe au "groupe de Grothendieck" de la catégorie additive Loclib(S)). On a un homomorphisme naturel

$$K(S) \longrightarrow K^{\cdot}(S) \ .$$

Mais, en vertu de (II 2.3.2), celui-ci est un isomorphisme pour S compact, d'où notre assertion. Plus généralement, ind.an(E·) définit un élément dans le groupe complété

$$\hat{K}(S) = \varprojlim K(A) \quad ,$$

la limite projective étant prise suivant les compacts A de S.

3.2.3. Le rédacteur ignore si le théorème de finitude (3.2.1) est encore valable lorsqu'au lieu de supposer S localement compact, on suppose seulement que chaque point de S admet un système fondamental de voisinages paracompacts. Au demeurant, l'hypothèse de locale compacité sur S ne paraît pas très naturelle. L'espace des "paramètres locaux universels" pour les complexes elliptiques d'ordre fixé est en effet un sous-espace (de dimension infinie) d'un espace de Fréchet. Précisons ce point. Soient V une variété compacte, $F = (F^i)_{i \in \underline{\mathbb{Z}}}$ une suite de fibrés vectoriels complexes de rang fini sur V, nuls sauf un nombre fini d'entre eux, et $\underline{n} = (n_i)$ une suite d'entiers $\geqslant 0$. Notons $\text{Comp.diff}^{\underline{n}}(F)$ l'espace des complexes d'opérateurs différentiels "de base F" et d'ordre $\underline{n}$, i.e. le sous espace fermé de $\prod \text{Diff}^{n_i}(F^i, F^{i+1})$ défini par les équations $d^{i+1} d^i = 0$. (l'espace $\prod \text{Diff}^{n_i}(F^i, F^{i+1})$ est un espace de Fréchet). Le sous-ensemble

$\mathrm{Ell}^{\underline{n}}(F)$ de $\mathrm{Comp.diff}^{\underline{n}}(F)$ formé des complexes elliptiques d'ordre $\underline{n}$ est ouvert ; c'est cet espace (qui en général n'est pas localement compact) qui joue le rôle d'un espace de paramètres locaux universels.

3.2.4. Cependant, même si la généralisation de (3.2.1) à laquelle il a été fait allusion plus haut s'avère impossible, on peut toujours associer à E', sous la seule hypothèse que la fibration p soit propre et localement triviale, un élément de $K'(S)$ méritant le nom d'indice analytique de E'. En effet, supposons (pour simplifier ([1])) que l'on soit dans la situation "locale" où $X = S \times V$ (V, une variété compacte), E' étant donné par une application continue de S dans $\mathrm{Ell}^{\underline{n}}(F)$ (3.2.3). Les assertions (a') et (b) de la démonstration de (3.2.1) sont en fait valables sans aucune hypothèse sur S : il est donc raisonnable de poser, avec les notations de (loc.cit.) :

$$\mathrm{ind.an}(E') = C\ell(\underline{F}'_r) \in K'(S) \quad ,$$

cet élément étant indépendant de r.

3.2.5. Supposons S paracompact, notons H un espace de Hilbert complexe de dimension hilbertienne infinie, I(H) le sous-espace de L(H,H) formé des opérateurs "à indice". Alors, les complexes F'_r définissent [12] un élément canonique dans le groupe $[S,I(H)]$ des classes d'homotopie d'applications continues de S dans I(H), mais le rédacteur ignore pour S non compact (même dans le cas où S est localement compact) quelles sont les relations entre les groupes $[S,I(S)]$ et $K'(S)$ (existe-t-il une flèche naturelle de l'un vers l'autre ? sont-ils isomorphes ?), donc a fortiori entre les deux indices ainsi définis.

Pour une généralisation, sous les hypothèses de (3.2.1), du théorème de l'index d'Atiyah-Singer, nous renvoyons au travail récent de Shih [17] , ou à un travail en préparation de M.F. Atiyah et I.M. Singer.

([1]) pour le cas général, utiliser la notion de "fibré hilbertien faible" ou champ continu d'espaces de Hilbert de [12] .

BIBLIOGRAPHIE

[1] Artin, M., Grothendieck, A., et Verdier, J-L., Cohomologie étale des schémas, à paraître dans North Holl. Pub. Comp., (cité SGA 4).

[2] Atiyah, M. et Segal, G., papiers secrets.

[3] Cartan, H. Funzioni e varietà complesse, Faisceaux analytiques cohérents, Cours au Centro Internazionale Matematico Estivo, 1964, Roma.

[4] Cartan, H.,et Schwartz, L., Théorème d'Atiyah-Singer, Séminaire 1963-64, Institut Henri Poincaré, Paris.

[5] Frisch, J., Fonctions analyliques sur un ensemble semi-analytique, note aux CRAS Paris, t. 260, p. 2974-2976 (1965).

[6] Godement, R., Théorie des Faisceaux, Hermann (1958), (cité T.F).

[7] Grothendieck, A., Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux, Séminaire de Géométrie Algébrique de l'IHES 1962, à paraître dans North Holl. Pub. Comp., (cité SGA 2).

[8] Grothendieck, A., Fondements de la Géométrie Analytique, Séminaire Cartan 1959-60, Institut Henri Poincaré, Paris.

[9] Hartshorne, R., Residues and Duality, Lecture Notes, Springer n° 20, cité [H].

[10] Houzel, C., Géométrie Analytique Locale, Séminaire Cartan 1959-60, Institut Henri Poincaré, Paris.

[11] Illusie, L., Complexes de fibrés et définitions du foncteur K, Séminaire Shih Weishu, IHES 1964-65.

[12] Illusie, L., Complexes quasi-acycliques directs de fibrés banachiques, note aux CRAS Paris, t. 260,p. 6499-6502.

[13] Kiehl, R., Theorem A und Theorem B in der nichtarchimedischen Funktionentheorie, Invent. math. 2, p. 256-273 (1967).

[14] Lang, S., Introduction to differentiable manifolds,

[15] Łojasiewicz, S., Ann. della Scuola Norm. Sup. Pisa , serie III, 18, fasc. IV, 1964.

[16] Palais, R., Exposés au Séminaire Princeton 1963-64 sur le théorème de l'index.

[17] Shih, W., Fiber cobordism and the index of a family of elliptic differential operators,

[18] Verdier, J.-L., Les catégories dérivées des catégories abéliennes, à paraître dans North Holl. Pub. Comp.

EXPOSE III

CONDITIONS DE FINITUDE RELATIVES

par L. ILLUSIE

1. Pseudo-cohérence relative

Théorème 1.1. *Soit* $n \in \mathbb{Z}$. *Pour chaque morphisme localement de type fini de schémas* $f : X \to Y$, *il existe une et une seule sous-catégorie pleine* $D(f)_{n\text{-coh}}$ *de* $D(X)$[1] *telle que les conditions ci-dessous soient satisfaites :*

(i) *Si* $E \in \mathrm{Ob}\, D(f)_{n\text{-coh}}$, *alors* $i^*(E) \in \mathrm{Ob}\, D(fi)_{n\text{-coh}}$ *pour tout ouvert* $i : U \to X$.

(ii) *Si* $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$ *et s'il existe un recouvrement ouvert* $(i_\alpha : U_\alpha \to X)_{\alpha\in A}$ *tel que* $i_\alpha^*(E) \in \mathrm{ob}\, D(fi_\alpha)_{n\text{-coh}}$ *pour tout* $\alpha\in A$, *alors* $E \in \mathrm{ob}\, D(f)_{n\text{-coh}}$.

(iii) *Si*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle h}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & Z & \end{array}$$

est un triangle commutatif de morphismes localement de type fini, où f *est une immersion fermée et* g *un morphisme lisse, alors on a*

$$E \in \mathrm{Ob}\, D(h)_{n\text{-coh}} \iff f_*(E) \in D(Y)_{n\text{-coh}} \quad (^2) \ .$$

Démonstration. L'unicité est évidente. Soit en effet $f : X \to Y$ un morphisme localement de type fini. Choisissons un recouvrement ouvert $(i_\alpha : X_\alpha \to X)_{\alpha\in A}$ tel que, pour chaque $\alpha\in A$, fi_α se factorise en $X_\alpha \xrightarrow{i'_\alpha} Y_\alpha \xrightarrow{f'_\alpha} Y$, où i'_α est une immersion fermée et f'_α un morphisme lisse. Il résulte aussitôt de (i), (ii), (iii) que les objets de $D(f)_{n\text{-coh}}$ sont les objets E de $D(X)$ tels que $i'_\alpha {}^* i_\alpha {}^*(E) \in \mathrm{ob}\, D(Y_\alpha)_{n\text{-coh}}$; donc $D(f)_{n\text{-coh}}$

---

(1) $D(X)$ = catégorie dérivée de celle des $\underline{O}_X$-Modules.

(2) $D(Y)_{n\text{-coh}}$ = sous-catégorie pleine de $D(Y)$ formée des objets n-pseudo-cohérents (I 2.15).

est bien déterminée (puisque c'est une sous-catégorie pleine de D(X)). Pour prouver l'existence, nous aurons besoin de quelques lemmes.

Lemme 1.1.1. Soit $i : X \longrightarrow Y$ une immersion fermée de schémas telle que $i_*(\underline{O}_X)$ soit pseudo-cohérent, et soit $E \in \text{ob } D(X)$. Pour que E soit n-pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $i_*(E)$ le soit.

Preuve. Le "il faut" résulte du critère général de stabilité de la pseudo-cohérence par application d'un foncteur (I 2.13). Inversement, supposons que $i_*(E)$ est n-pseudo-cohérent, et prouvons qu'il en est de même de E. Comme $i_*(E)$ est à cohomologie localement bornée supérieurement, il en est de même de E, donc, la question étant locale, on peut supposer que E est m-pseudo-cohérent pour m assez grand. Montrons, par récurrence descendante sur m, que E est m-pseudo-cohérent pour tout $m \geq n$. On peut supposer déjà prouvé que E est (n+1)-pseudo-cohérent. Quitte à localiser, on a donc un triangle distingué $E' \longrightarrow E \longrightarrow E''$ où E' est parfait et $E''^i = 0$ pour $i > n$. D'après (I 2.6), on est ramené à montrer que E" est n-pseudo-cohérent. Or, appliquant i_* au triangle précédent, on obtient un triangle distingué $i_*(E') \longrightarrow i_*(E) \longrightarrow i_*(E'')$. D'après la première partie de la démonstration, $i_*(E')$ est pseudo-cohérent, donc en vertu de (I 2.6), $i_*(E")$ est n-pseudo-cohérent. Comme $i_*(E")$ est nul en degré $> n$, cela signifie, d'après (I 2.10 b)), que $H^n(i_*(E"))$ est de type fini. Comme $H^n(i_*(E")) \xrightarrow{\sim} i_*H^n(E")$, on est ramené à montrer, d'après (I 2.10 b)), que si M est un $\underline{O}_X$-Module tel que $i_*(M)$ soit de type fini, alors M est de type fini, ce qui est immédiat (et indépendant de l'hypothèse sur $i_*(\underline{O}_X)$).

Remarque 1.1.2. Le lemme précédent s'applique notamment au cas où i est une immersion régulière (VII 1.4). En effet, on a localement, grâce au complexe de Kozsul, une résolution gauche finie de $i_*(\underline{O}_X)$ par des $\underline{O}_Y$-Modules libres de type fini, donc $i_*(\underline{O}_X)$ est parfait (I 4.8 et 4.14) (donc a fortiori pseudo-cohérent).

Lemme 1.1.3. Soit un carré cartésien de schémas

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{f} & X' \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i'} \\ Y & \xleftarrow{g} & Y' \end{array} ,$$

où i est une immersion fermée, et soit E un complexe de $\underline{O}_X$-Modules. Alors la flèche canonique de changement de base (EGA III 1.4.15.4)

$$g^* i_*(E) \longrightarrow i'_* f^*(E)$$

est un isomorphisme.

(ii) Posons $E' = f^*(E)$. Si g est plat et $i_*(E)$ n-pseudo-cohérent, alors $i'_*(E')$ est n-pseudo-cohérent. Inversement, si g est fidèlement plat et $i'_*(E')$ n-pseudo-cohérent, alors $i_*(E)$ est n-pseudo-cohérent.

Preuve. L'assertion se vérifie trivialement sur les fibres.

Lemme 1.1.4. Soit un diagramme commutatif de schémas



où i' (resp. i") est une immersion fermée, et f' (resp. f") un morphisme lisse, et soit $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$. On a alors :

$i'_*(E)$ n-pseudo-cohérent $\Longleftrightarrow$ i''_* n-pseudo-cohérent.

Preuve. Suivant une astuce due à Lichtenbaum, on envoie X diagonalement dans $X' \times_Y X''$, et l'on est aussitôt ramené à prouver l'assertion dans le cas où l'un des morphismes f', f" est l'identité. Changeant les notations, on a donc un triangle commutatif

(*)



où i et j sont des immersions fermées et f un morphisme lisse, et l'on doit montrer que "$i_*(E)$ n-pseudo-cohérent" équivaut à "$j_*(E)$ n-pseudo-cohérent". La question étant locale dans Y et dans Z au voisinage d'un point de X, on peut supposer que X, Y, Z sont affines et qu'on a une factorisation



où i' est une immersion fermée, et la flèche oblique la projection canonique. Alors (VII 1.10) i' est une immersion régulière, donc (1.1.1) un objet F de D(Y) est n-pseudo-cohérent si et seulement si $i'_*(F)$ l'est.

On peut donc supposer que $Y = Z[T_1,\dots,T_r]$, f étant la projection canonique. Le diagramme (*) correspond alors à un diagramme d'anneaux

$$\begin{array}{ccc} & \overset{u}{\swarrow} & B = C[T_1,\dots,T_r] \\ A & \underset{v}{\longleftarrow} & C \uparrow \epsilon \end{array} ,$$

où u et v sont des épimorphismes, et ϵ l'inclusion canonique. Pour $1 \leq i \leq r$, posons $u(T_i) = x_i$, et soit $z_i \in C$ tel que $v(z_i) = x_i$. La rétraction $\sigma : B \longrightarrow C$ de ϵ définie par $\sigma(T_i) = z_i$ est telle que $v\sigma = u$. En langage géométrique, elle correspond à une section s de f telle que $i = sj$. D'après (VII 1.10) s est une immersion régulière, l'assertion résulte donc de (1.1.1).

Preuve de (1.1)(fin). Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme localement de type fini. Il existe un recouvrement ouvert (X_α) de X tel que chaque X_α se plonge par une immersion fermée dans un schéma Y_α lisse sur Y. Posant $\coprod X_\alpha = X'$, $\coprod Y_\alpha = Y'$, on a donc un diagramme commutatif

(a')
$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{i''} & Y' \\ {\scriptstyle p'}\downarrow & & \\ X & & {\scriptstyle f'} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow & \\ Y & & \end{array}$$

où p' est un morphisme somme d'une famille surjective d'immersions ouvertes (nous dirons spécial pour abréger), i' une immersion fermée, et f' un morphisme lisse. Nous définirons $D(f)_{n\text{-coh}}$ comme la sous-catégorie pleine de D(X) formée des objets E tels que $i'_*p'^*(E)$ soit n-pseudo-cohérent. Montrons d'abord que cette définition a un sens, i.e. que $D(f)_{n\text{-coh}}$ est indépendant du choix de i', p', f'. Soit donc

(a")



un diagramme commutatif analogue à (a') (p" un morphisme spécial, i" une immersion fermée, f" un morphisme lisse). On déduit de (a') et (a") un diagramme commutatif



,

où les flèches horizontales, à l'exception de f sont des immersions fermées, les flèches du carré cartésien de gauche (resp. droite) des morphismes spéciaux (resp. des morphismes lisses). On est donc ramené à prouver l'assertion suivante :

(A) : Soit



un carré commutatif de schémas, où p est un morphisme spécial, q un morphisme lisse, i_1 et i_2 des immersions fermées, et soit $E \in \text{ob } D(X_2)$. Alors, pour que $i_{2*}(E)$ soit n-pseudo-cohérent, il faut et il suffit que $i_{1*}p^*(E)$ le soit.

Preuve de (A). Par définition, p est somme d'une famille d'ouverts U_α de X_2 qui recouvrent X_2. Chaque U_α est induit par un ouvert V_α de Y_2, et les V_α recouvrent un voisinage ouvert X'_2 de X_2 dans Y_2. On a donc un diagramme commutatif à carré cartésien



où i'_1 et i'_2 sont des immersions fermées, p et p' des morphismes spéciaux, et j une immersion ouverte. La condition "$i_{2*}(E)$ n-pseudo-cohérent" équivaut évidemment à "$i'_{2*}(E)$ n-pseudo-cohérent". D'autre part, il résulte aussitôt de (1.1.3) que la condition "$i'_{2*}(E)$ n-pseudo-cohérent" équivaut à "$i'_{1*}p^*(E)$ n-pseudo-cohérent". Appliquant alors (1.1.4) aux factorisations $(jp')i'_1$ et qi_1 de i_2p, et à $p^*(E) \in \text{ob } D(X_1)$, on conclut finalement que "$i_{2*}(E)$ n-pseudo-cohérent" équivaut à "$i_{1*}p^*(E)$ n-pseudo-cohérent", cqfd.

On a donc montré que la catégorie $D(f)_{n\text{-coh}}$ définie plus haut au moyen du diagramme (a') ne dépend en fait que de f. Par ailleurs, il est trivial sur la définition qu'elle vérifie bien les conditions (i) à (iii) de (1.1). Cela termine donc la démonstration de (1.1).

Définition 1.2. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, $E \in \text{ob } D(X)$, $n \in \mathbb{Z}$. On dira que E est n-pseudo-cohérent relativement à f si $E \in \text{ob } D(f)_{n\text{-coh}}$ (cf. (1.1)). On dira que E est pseudo-cohérent (ou encore $(-\infty)$-pseudo-cohérent) relativement à f si E est n-pseudo-cohérent relativement à f pour tout $n \in \mathbb{Z}$. On notera $D(f)_{coh}$ la sous-catégorie

pleine de $D(X)$ formée des objets pseudo-cohérents relativement à f. On dira que f est n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) si $\underline{O}_X$ est n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à f. On dira parfois, quand cela ne pourra prêter à confusion, "n-pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à Y" au lieu de "relativement à f", et l'on écrira aussi $D(X)_{Y\text{-n-coh}}$ (resp. $D(X)_{Y\text{-coh}}$) au lieu de $D(f)_{n\text{-coh}}$ (resp. $D(f)_{coh}$). Enfin pour $* = +, -, b$, on posera

$$D^*(f)_{n\text{-coh}} = D^*(X) \cap D(f)_{n\text{-coh}} \quad ,$$

$$D^*(f)_{coh} = D^*(X) \cap D(f)_{coh} \quad .$$

Remarques 1.2.1. a) Les catégories $D(f)_{n\text{-coh}}$, $D(f)_{coh}$ ne sont pas en général contenues dans $D^-(X)$. Il en est ainsi cependant si X est quasi-compact, car un objet de $D(X)$ à cohomologie localement bornée supérieurement est alors à cohomologie bornée supérieurement.

b) Les objets de $D(f)_{coh}$ sont à cohomologie quasi-cohérente. En effet, soit $E \in \text{ob } D(f)_{coh}$; la question étant locale, on peut supposer que f est une immersion fermée, alors $f_*(E)$ est pseudo-cohérent, donc à cohomologie quasi-cohérente, et l'on gagne du fait qu'un $\underline{O}_X$-Module M est quasi-cohérent si et seulement si $f_*(M)$ l'est.

c) Quand il s'agira d'un $\underline{O}_X$-Module, nous utiliserons la terminologie "de présentation finie rel. à f" de préférence à "(-1)-pseudo-cohérent rel. à f". Pour qu'un $\underline{O}_X$-Module E soit de présentation finie rel. à f, il faut et il suffit, compte tenu de (I 2.9), qu'il existe localement une immersion fermée $i : X \longrightarrow X'$, avec X' lisse sur Y, telle que $i_*(E)$ soit de présentation finie (au sens ordinaire). En particulier, dire que f est

(-1)-pseudo-cohérent équivaut à dire que f est localement de présentation finie au sens de (EGA IV 1.4).

Exemples 1.3. Un morphisme lisse, une immersion régulière (1.1.2) sont des morphismes pseudo-cohérents. Il en est de même d'un morphisme localement de type fini quelconque $f : X \longrightarrow Y$ si Y est localement noethérien.

Proposition 1.4. *Soit* $f : X \longrightarrow Y$ *un morphisme localement de type fini, et soit* $E \overset{G}{\longrightarrow} F$ *un triangle distingué de* $D(X)$. *On a alors le tableau suivant, où* $n \in \mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$ *indique un degré de pseudo-cohérence par rapport à f, et chaque ligne représente une implication dont le but est souligné :*

E	F	G
n+1	n	<u>n</u>
n	<u>n</u>	n
<u>n</u>	n	n-1

En particulier, $D(f)_{coh}$ *est une sous-catégorie triangulée de* $D(X)$.

Preuve. En vertu des propriétés (i) à (iii) de (1.1), on peut supposer que f est une immersion fermée. On a alors un triangle distingué

$$f_*(E) \longrightarrow f_*(F) \longrightarrow f_*(G) \quad ,$$

et l'assertion résulte de (I 2.6).

Définition 1.5. *Soient* X *et* Y *deux* S-*schémas. Nous dirons que* X *et* Y *sont tor-indépendants sur* S *si l'on a*

$$\underline{\mathrm{Tor}}_i^S(\underline{O}_X, O_Y) = 0 \quad \text{pour } i \neq 0 \quad ,$$

les $\underline{\mathrm{Tor}}_i^S$ *étant les hyper-tor locaux définis dans* (EGA III 6.5).

C'est une condition de nature locale ; si X, Y, S sont affines d'anneaux respectifs B, C, A, elle signifie que la flèche canonique $B \overset{L}{\otimes}_A C \longrightarrow B \otimes_A C$ est un isomorphisme. Elle est donc réalisée en particulier si X ou Y est plat sur S.

Lemme 1.5.1. Soient des carrés cartésiens de schémas

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \longleftarrow & X'' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & Y' & \longleftarrow & Y'' \end{array} \quad .$$

Si X et Y' sont tor-indépendants sur Y, et si X' et Y" sont tor-indépendants sur Y', alors X et Y" sont tor-indépendants sur Y.

Preuve. Exercice facile sur l'associativité du produit tensoriel.

Notation 1.6. Soient X et Y deux S-schémas, $E \in \text{ob } D^-(X)$, $F \in \text{ob } D^-(Y)$. Nous poserons

$$E \overset{L}{\otimes}_S F = Lpr_1^*(E) \overset{L}{\otimes} Lpr_2^*(F) \quad ,$$

où pr_1, pr_2 sont les deux projections de $X \times_S Y$.

Lemme 1.7. Soient S un schéma, et pour i = 1, 2, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ une S-immersion fermée. On suppose que X_1 et X_2, ainsi que Y_1 et Y_2 sont tor-indépendants sur S. Alors, pour $E_i \in \text{ob } D^-(X_i)_{qcoh}$ (1), il existe un isomorphisme canonique

$$f_{1*}(E_1) \overset{L}{\otimes}_S f_{2*}(E_2) \xrightarrow{\sim} (f_1 \times_S f_2)_*(E_1 \overset{L}{\otimes}_S E_2) \quad .$$

Preuve. Posons $f_1 \times_S f_2 = f$. On définit facilement, par adjonction, une flèche canonique

(1) $D(X_i)_{qcoh}$ désigne la sous-catégorie pleine de $D(X_i)$ formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

$$f_{1*}(E_1) \overset{L}{\otimes}_S f_{2*}(E_2) \longrightarrow f_*(E_1 \overset{L}{\otimes}_S E_2) \quad .$$

Montrons qu'elle est un isomorphisme. La question étant locale, on peut supposer S, X_i, Y_i affines d'anneaux respectifs C, A_i, B_i. Par dévissage, on se ramène à $E_i = \underline{O}_{X_i}$. On doit alors vérifier que

$$A_1 \overset{L}{\otimes}_{B_1} B \overset{L}{\otimes}_{B_2} A_2 \longrightarrow A$$

est un isomorphisme (on a posé $A = A_1 \otimes_C A_2$, $B = B_1 \otimes_C B_2$). Mais, compte tenu des hypothèses de tor-indépendance, cela résulte aussitôt de l'associativité du produit tensoriel.

Proposition 1.8. Soient S un schéma, et, pour i = 1, 2, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ un S-morphisme localement de type fini. On suppose X_1 et X_2, ainsi que Y_1 et Y_2, tor-indépendants sur S. Soient $[a_i,b_i]$ un intervalle de $\mathbf{Z}$, et $E_i \in \text{ob } D^-(X_i)_{qcoh}$ un complexe a_i-pseudo-cohérent rel. à f_i et acyclique en degré $> b_i$. Alors $E_1 \overset{L}{\otimes}_S E_2$ est a-pseudo-cohérent rel. à f et acyclique en degré > b, avec $f = f_1 x_S f_2$, $a = \text{Sup}(a_1+b_2, a_2+b_1)$, $b = b_1+b_2$.

Preuve. La question étant locale sur $X_1 x_S X_2$, on peut supposer que f_i se factorise en $X_i \xrightarrow{f'_i} Y'_i \xrightarrow{p_i} Y_i$, où f'_i est une immersion fermée et p_i un morphisme lisse. Posant $f' = f'_1 x_S f'_2$, on doit montrer que $f'_*(E_1 \overset{L}{\otimes}_S E_2)$ est a-pseudo-cohérent et acyclique en degré > b. D'après (1.5.1), Y'_1 et Y'_2 sont tor-indépendants sur S : quitte à changer les notations, on peut donc supposer que $f_i = f'_i$, autrement dit que f_i est une immersion fermée. Par hypothèse, $f_{i*}(E_i)$ est a_i-pseudo-cohérent et acyclique en degré $> b_i$, donc (I 2.16) $f_{1*}(E_1) \overset{L}{\otimes}_S f_{2*}(E_2)$ est a-pseudo-cohérent et acyclique en degré > b. On conclut grâce à (1.7).

Corollaire 1.9. Sous les hypothèses de (1.8), le foncteur
$\overset{L}{\otimes}_S : D^-(X_1) \times D^-(X_2) \longrightarrow D^-(X)$ induit un foncteur

$$\overset{L}{\otimes}_S : D^-(f_1)_{coh} \times D^-(f_2)_{coh} \longrightarrow D^-(f)_{coh} \qquad \text{(cf. (1.2))} \quad .$$

En particulier, si f_1 et f_2 sont pseudo-cohérents (1.2), il en est de même de f.

Corollaire 1.10. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{h} & Y' \end{array}$$

un carré cartésien, avec f localement de type fini. Alors :

a) Supposons X et Y' tor-indépendants sur Y (1.5). Pour $n \in \mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$, le foncteur $Lg^* : D^-(X) \longrightarrow D^-(X')$ induit un foncteur

$$Lg^* : D^-(f)_{n\text{-coh}} \longrightarrow D^-(f')_{n\text{-coh}} \quad .$$

En particulier, si f est n-pseudo-cohérent (1.2), il en est de même de f'.

b) Supposons h fidèlement plat, soient $n \in \mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$ et $E \in \text{ob } D^-(X)$ un complexe à cohomologie quasi-cohérente.

Pour que E soit n-pseudo-cohérent rel. à f, il faut et il suffit que $g^*(E)$ soit n-pseudo-cohérent à f'. En particulier, pour que f soit n-pseudo-cohérent, il faut et il suffit que f' le soit.

Preuve. Compte tenu de (1.2.1 b)), toutes les assertions de (1.9) et (1.10) résultent trivialement de (1.8), sauf la partie "il suffit" de (1.10 b)). Pour celle-ci, on peut, la question étant locale sur X, supposer que f se factorise en une immersion fermée suivie d'un morphisme lisse. On est alors ramené par (1.1.3) au cas où f (resp. f') est l'identité de X (resp. X'). L'assertion résulte alors, par un dévissage standard (cf. I 2.16.2), du fait qu'un faisceau quasi-cohérent L sur X est de type fini si et seulement si g^*L est de type fini.

Proposition 1.11. Soit



un triangle commutatif de morphismes localement de type fini, soient $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$, $F \in \mathrm{ob}\, D(Y)$, et $[a,b]$, $[c,d]$ des intervalles de $\mathbb{Z}$.

a) Si E est a-pseudo-cohérent rel. à f et acyclique en degré $> b$ et si F est c-pseudo-cohérent rel. à g et acyclique en degré $> d$, alors $E \overset{L}{\otimes}_Y F$ (cf. (1.6)) est m-pseudo-cohérent rel. à h et acyclique en degré $> n$, où $m = \mathrm{Sup}(a+d, b+c)$, et $n = b+d$.

b) Si E est a-pseudo-cohérent rel. à h et acyclique en degré $> b$, et si g est $(a+1-b)$-pseudo-cohérent, alors E est a-pseudo-cohérent rel. à f.

Preuve. La question étant locale sur X, on peut supposer qu'on a un diagramme commutatif à carré cartésien



,

où i, j, k sont des immersions fermées, et p, q les projections canoniques des espaces affines types. Si F est c-pseudo-cohérent rel. à Z, alors $k_*(F)$ est c-pseudo-cohérent d'après (1.1 (iii)), et $j_*(p^*(F))$ est c-pseudo-cohérent d'après (1.1.3). De même, si g est x-pseudo-cohérent, alors $j_*(\underline{O}_{E_Y^r})$ est x-pseudo-cohérent. Par définition de la pseudo-cohérence relative (1.2), on est donc ramené à prouver a) et b) quand f et g sont des immersions fermées.

Preuve de a). D'après (1.1 (iii)), on doit montrer ceci : supposons $f_*(E)$ a-pseudo-cohérent et acyclique en degré > b, et $g_*(F)$ c-pseudo-cohérent et acyclique en degré > d, alors $h_*(E \overset{L}{\otimes}_Y F)$ est m-pseudo-cohérent et acyclique en degré > n. Or on a un isomorphisme canonique

$$f_*(E) \overset{L}{\otimes} F \xrightarrow{\sim} f_*(E \overset{L}{\otimes}_Y F)$$

(cas particulier de l'isomorphisme (*) de la preuve de (1.8)). Comme le foncteur $g_*(. \overset{L}{\otimes} F)$ transforme faisceaux localement libres de type fini en complexes c-pseudo-cohérents, et complexes acycliques en degré > 0 en complexes acycliques en degré > d, l'assertion résulte donc de (I 2.13).

Preuve de b). On doit prouver l'assertion suivante : supposons $f_*(E)$ a-pseudo-cohérent et acyclique en degré > b, et $g_*(\underline{O}_Y)$ (a+1-b)-pseudo-cohérent, alors $f_*(E)$ est a-pseudo-cohérent. L'assertion portant sur $f_*(E)$, on peut supposer X = Y et f = Id_X. On procède alors comme dans la démonstration de (1.1.1), en prouvant par récurrence descendante que E est pseudo-cohérent en degré ≥ a. On suppose déjà prouvé que E est (a+1)-pseudo-cohérent, d'où (I 2.10), quitte à se localiser, un triangle distingué

$$E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \nwarrow \swarrow E' \quad ,$$

où E'^i est localement libre pour $i \in [a+1,b]$, $E'^i = 0$ pour $i \notin [a+1,b]$, et $E''^i = 0$ pour $i > a$. L'hypothèse que $g_*(\underline{O}_Y)$ est (a+1-b)-pseudo-cohérent implique alors (I 2.11 a)) que $g_*(E')$ est (a+1)-pseudo-cohérent. Comme $g_*(E)$ est a-pseudo-cohérent, il résulte de (I 2.6) que $g_*(E'')$ est a-pseudo-cohérent. On conclut grâce à (I 2.10 b)) et au fait qu'un $\underline{O}_Y$-Module M est de type fini si et seulement si $g_*(M)$ l'est.

On déduit trivialement de (1.11) les corollaires que voici :

Corollaire 1.12. Dans la situation de (1.11), si g est pseudo-cohérent, on a, pour $r \in \mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$,

$$D^-(f)_{r\text{-coh}} = D^-(h)_{r\text{-coh}} \quad ;$$

en particulier (faisant X = Y), les notions de r-pseudo-cohérence sur Y, "au sens absolu" ou rel. à g, coïncident.

Corollaire 1.13. Dans la situation de (1.11), si f est pseudo-cohérent, le foncteur $O_X \overset{L}{\otimes}_Y \cdot = Lf^* : D^-(Y) \longrightarrow D^-(X)$ induit, pour $r \in \mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$, un foncteur

$$Lf^* : D^-(g)_{r\text{-coh}} \longrightarrow D^-(h)_{r\text{-coh}} \quad .$$

Corollaire 1.14. Dans la situation de (1.11), si f est r-pseudo-cohérent et g est s-pseudo-cohérent ($r, s \in \mathbf{Z} \cup \{-\infty\}$), alors h est Sup(r,s)-pseudo-cohérent. Si h est r-pseudo-cohérent et g est (r+1)-pseudo-cohérent, f est r-pseudo-cohérent.

Remarque 1.14.1. En particulier, pour r = s = -1, on retrouve (cf. (1.2.1 c))) les assertions (ii) et (v) de (EGA IV 1.4.3).

2. Le théorème de finitude.

Conjecture 2.1. Soient S un schéma, $f : X \longrightarrow Y$ un S-morphisme propre de schémas localement de type fini sur S, $E \in \text{ob } D^+(X)$. Alors si E est pseudo-cohérent rel. à S (1.2), il en est de même de $Rf_*(E)$.

Théorème 2.2. La conjecture précédente est vraie dans les cas suivants :

(i) S est localement noethérien ;

(ii) f est projectif.

Preuve dans le cas (i). S étant localement noethérien, la projection de X (resp. Y) sur S est un morphisme pseudo-cohérent (1.3), et les notions de pseudo-cohérence sur X (resp. Y) et relativement à S coïncident (1.12). D'autre part, comme X (resp. Y) est localement noethérien, donc $\underline{O}_X$ (resp. $\underline{O}_Y$) cohérent, un objet M de D(X) (resp. D(Y)) est pseudo-cohérent si et seulement si (I 3.5) les $H^i(M)$ sont cohérents et M est localement dans D^-. Le théorème résulte donc du suivant :

Théorème 2.2.1. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme propre de schémas localement noethériens, et soit $E \in \text{ob } D^+(X)$. Si les $H^i(E)$ sont cohérents, il en est de même des $R^i f_*(E)$. Si en outre E est localement dans D^-, il en est de même de $Rf_*(E)$.

Preuve. La première assertion résulte de la suite spectrale

$$(*) \qquad R^p f_*(H^q(E)) \Longrightarrow R^* f_*(E)$$

et du théorème de finitude (EGA III 3.2.1). Pour la deuxième, on peut supposer Y affine ; X est alors quasi-compact et séparé, supposons-le recouvert par r ouverts affines. On sait (EGA III 1.4.12) que, dans ces conditions, on a $R^i f_*(M) = 0$ pour tout $\underline{O}_X$-Module quasi-cohérent M et tout $i > r$. Si E est localement dans D^-, E est dans D^- puisque X est quasi-compact, disons $H^i(E) = 0$ pour $i > N$. De la suite spectrale (*) on déduit alors que $R^i f_*(E) = 0$ pour $i > N+r$, d'où l'assertion.

Preuve dans le cas (ii). La question étant locale sur Y, on peut supposer S et Y affines. On a alors un diagramme commutatif à carré cartésien



,

où i, j, j' sont des immersions fermées, g' un morphisme lisse et affine, p, p' la projection de l'espace projectif type. Supposons E pseudo-cohérent rel. à S. D'après (1.1 (iii)), cela signifie que $(ji)_*(E)$ est pseudo-cohérent. On doit montrer que $Rf_*(E)$ est pseudo-cohérent rel. à S, i.e. (1.1 (iii)) que $j'_*Rf_*(E)$ est pseudo-cohérent. Mais on a

$$j'_*Rf_*(E) \xrightarrow{\sim} Rp'_*(ji)_*(E) \quad ,$$

l'assertion sera donc conséquence du résultat plus précis suivant :

Théorème 2.2.2. Soient Y un schéma affine, $f : X = P^r_Y \longrightarrow Y$ la projection d'un espace projectif type, $E \in \text{ob } D^b(X)_{coh}$, $a \in \mathbf{Z}$. Alors $Rf_*(E)$ est pseudo-cohérent. En outre, si E est acyclique en degré $> a$, $Rf_*(E)$ est acyclique en degré $> a+r$, et il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$, $Rf_*(E(n))$ (où $E(n) = E \otimes \underline{O}_X(n)$) soit acyclique en degré $> a$.

Preuve. Comme Y est affine, X est quasi-compact et séparé, donc (II 2.2.9 a)) E est isomorphe, dans D(X), à un complexe F à degrés bornés supérieurement tel que, pour tout i, $F^i \in \text{ob } \underline{L}(X)$, i.e. (loc. cit.) soit somme directe finie de faisceaux du type $\underline{O}_X(-n)$ $(n>0)$. En outre, si E est acyclique en degré $> a$, on peut choisir F de manière que $F^i = 0$ pour $i > a$: cela résulte formellement de l'assertion précédente, compte tenu de (I 2.10 a) et II 2.2.8 a)). Quitte à remplacer E par F, on peut donc supposer que $E^i \in \text{ob } \underline{L}(X)$ pour tout i, et $E^i = 0$ pour $i > a$. Comme X est recouvert par (r+1) ouverts affines, on a, d'après (EGA III 1.4.10) et la suite spectrale d'hypercohomologie, $R^q f_*(E) = 0$ pour $i > a+r$. Soit t un entier $\leq a$, posons $E' = (0 \to E^t \to \ldots \to E^a \to 0)$. On a une suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0 \quad ,$$

où E" vérifie les mêmes conditions que E, mais avec a remplacé par t-1. Appliquant Rf_*, on obtient un triangle distingué

(*)
$$\begin{array}{ccc} & & Rf_*(E'') \\ & \swarrow & \uparrow \\ Rf_*(E') & \longrightarrow & Rf_*(E) \end{array} \quad .$$

Comme t peut être choisi arbitrairement grand négatif, il suffit, pour la première assertion, de montrer que $Rf_*(E)$ est (t+r)-pseudo-cohérent. Or $Rf_*(E'')$ est acyclique en degré $\geq t+r$, donc (t+r)-pseudo-cohérent. On aura donc gagné, en vertu de (I 2.6), si l'on prouve que $Rf_*(E')$ est parfait. Pour cela, on se ramène par dévissage (I 4.10), au cas où E' est réduit au degré 0 et égal à $\underline{O}_X(-n)$, $n > 0$. Alors, d'après (EGA III 2.1.16), $R^r f_*(\underline{O}_X(-n))$ est localement libre de type fini, et l'on a

$$Rf_*(\underline{O}_X(-n)) \xrightarrow{\sim} R^r f_*(\underline{O}_X(-n))\ [-r] \quad .$$

Donc $Rf_*(\underline{O}_X(-n))$ est parfait, et l'on en déduit la première assertion de (2.2.2). On a déjà vu que $Rf_*(E)$ est acyclique en degré $> a+r$. Reste à prouver la dernière assertion. Pour $t < -r+a$, $Rf_*(E'')$ est acyclique en degré $> a$, donc on est ramené, compte tenu du triangle (*), à faire la démonstration pour E' au lieu de E. Comme E' est à degrés bornés et à composantes objets de $\underline{L}(X)$, il existe un entier N tel que, pour $n \geq N$, les composantes de E'(n) soient sommes directes finies de faisceaux du type $\underline{O}_X(p)$ où $p \geq 0$. Alors, d'après (EGA III 2.1.16) et la suite spectrale d'hypercohomologie, $Rf_*(E'(n))$ est acyclique en degré $> a$ pour tout $n \geq N$, ce qui achève la démonstration de (2.2.2), et par suite de (2.2).

On a un complément "classique" à (2.2 (ii)), que nous donnerons pour références ultérieures :

Corollaire 2.3 (EGA III 2.2.1). Soient S un schéma quasi-compact, $f : X \to Y$ un S-morphisme projectif de schémas de type fini sur S, $L = i^*\underline{O}_P(1)$ le faisceau inversible défini par un plongement $i : X \longrightarrow P = P(F)$, où F est un $\underline{O}_Y$-Module quasi-cohérent de type fini. Pour $M \in \text{ob } D(X)$ et $n \in \mathbb{Z}$, posons $M(n) = M \overset{L}{\otimes} L^{\otimes n}$. Alors, si $E \in \text{ob } D^+(X)$ est pseudo-cohérent rel. à S et acyclique en degré $> a$ ($a \in \mathbb{Z}$), il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$, $Rf_*E(n)$ vérifie les mêmes conditions.

Preuve. On se ramène trivialement, comme dans la preuve de (2.2 (ii)), à la situation de (2.2.2) : Y = S, $f : X = P^r_Y \longrightarrow Y$ la projection canonique, $L = \underline{O}_X(1)$ le faisceau canonique, $E \in \text{ob } D^b(X)$ un complexe pseudo-cohérent et acyclique en degré > a, et l'on gagne grâce à (2.2.2).

Corollaire 2.4. Soient S un schéma quasi-compact, et $f : X \longrightarrow Y$ un S-morphisme propre de schémas de type fini sur S. Si S est noethérien ou si f est projectif, le foncteur $Rf_* : D^+(X) \longrightarrow D^+(Y)$ induit un foncteur

$$Rf_* : D^b(X)_{S\text{-coh}} \longrightarrow D^b(Y)_{S\text{-coh}}$$

Preuve. Conséquence de (2.2) et du fait qu'il existe alors (EGA III 1.4.12 et IV 1.7.21) un entier **N** tel que $R^if_*(E) = 0$ pour tout $i > N$ et tout $\underline{O}_X$-Module quasi-cohérent E.

Corollaire 2.5. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme propre et pseudo-cohérent (1.2), et $E \in \text{ob } D^+(X)$. Supposons Y localement noethérien ou f projectif. Alors, si E est pseudo-cohérent (au sens absolu), il en est de même de $Rf_*(E)$. Si Y est quasi-compact, le foncteur Rf_* induit un foncteur

$$Rf_* : D^b(X)_{coh} \longrightarrow D^b(Y)_{coh} \quad .$$

Preuve. Conséquence de (2.2), (2.5) et (1.12).

Scholie 2.6. Pour démontrer la conjecture (2.1) dans le cas général, il faudra sans doute mettre en oeuvre de nouvelles techniques. On peut espérer que celles-ci aideront un jour à prouver la conjecture analogue en Géométrie Analytique, pour un morphisme propre d'espaces analytiques au-dessus d'un topos localement annelé en $\mathbb{C}$-algèbres convenablement topologisées, conjecture qui n'est "démontrée" pour l'instant qu'au-dessus d'un espace analytique complexe (théorème de Grauert [1]). (1)

3. Tor-dimension finie relative

Définition 3.1. Soient $f : (X,\underline{O}_X) \longrightarrow (Y,\underline{O}_Y)$ un morphisme de topos annelés, $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$, $[m,n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On dit que E est d'amplitude plate relativement à f (ou Y, s'il n'y a pas de confusion possible) contenue dans $[m,n]$, et l'on écrit

$$\mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [m,n] \qquad (\text{ou } \mathrm{tor.amp}_Y(E) \subset [m,n])$$

si E, considéré comme complexe de $f^{-1}(\underline{O}_Y)$-Modules, est d'amplitude plate contenue dans $[m,n]$ (I 5.2). On dit que f est d'amplitude plate contenue dans $[-a,0]$ $(a \geq 0)$, ou de tor-dimension $\leq a$, si $\underline{O}_X$ est d'amplitude plate rel. à f, contenue dans $[-a,0]$. On dit que E est d'amplitude plate finie rel. à f s'il existe un intervalle $[m,n]$ tel que l'on ait $\mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [m,n]$.

Notation 3.2. On notera $D(f)_{\mathrm{torf}}$, ou $D(X)_{f\text{-torf}}$, ou $D(X)_{Y\text{-torf}}$ s'il n'y a pas de confusion possible, la sous-catégorie pleine de $D^-(X)$ formée des complexes d'amplitude plate finie relativement à f. En vertu de (I 5.3), c'est une sous-catégorie triangulée de $D^b(X)$.

(1) (ajouté en Avril 1971) voir un article en préparation de R. Kiehl et J.L. Verdier, où le théorème de finitude 1 est démontré par des techniques différentes, plus simples, et sous des hypothèses plus générales.

Proposition 3.3. Les données étant celles de (3.1), supposons que X ait assez de points (SGA 4 XVII IV 6.4). Les conditions suivantes sont alors équivalentes :

(i) $\mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [m,n]$;

(ii) pour tout point x de X, on a

$$\mathrm{tor.amp}_y(E_x) \subset [m,n] \quad ,$$

où y est le point image de x par f, annelé par $\underline{O}_{Y,y}$;

(iii) pour tout objet V de Y et tout $\underline{O}_V$-Module M, on a

$$H^i((E|f^{-1}(V)) \overset{L}{\otimes}_V M) = 0 \text{ pour } i \notin [m,n] \quad ,$$

où $(E|f^{-1}(V)) \overset{L}{\otimes}_V M = (E|f^{-1}(V)) \overset{L}{\otimes} Lf^*(M)$;

(iv) même condition que (iii), mais avec M conoyau d'un homomorphisme $\underline{O}_V{}^q \longrightarrow \underline{O}_V{}^p$, où $p, q \in \mathbb{N}$.

Preuve. L'équivalence (i)$\Longleftrightarrow$(ii) résulte de (I 5.6.2), et les implications (ii)$\Longrightarrow$(iii)$\Longrightarrow$(iv) sont triviales. Prouvons (iv)$\Longrightarrow$(ii). Soient x un point de X, y = f(x) ; il s'agit de montrer que l'on a

$$(*) \qquad H^i(E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{Y,y}} M) = 0$$

pour tout $\underline{O}_{Y,y}$-module M et tout $i \notin [m,n]$. Comme tout $\underline{O}_{Y,y}$-module est limite inductive filtrante de modules de présentation finie, on peut se borner à vérifier la relation précédente pour M de présentation finie. Or, si M est un $\underline{O}_{Y,y}$-module de présentation finie, le même argument que pour les espaces annelés ordinaires (EGA O_I 5.3.9) montre qu'il existe un objet y-ponctué V de Y et un $\underline{O}_V$-Module P, conoyau d'un homomorphisme $\underline{O}_V{}^q \longrightarrow \underline{O}_V{}^p$ ($p, q \in \mathbb{N}$), tel que l'on ait $P_y \xrightarrow{\sim} M$. On a alors

$$((E|f^{-1}(V)) \overset{L}{\otimes}_V P)_x \xrightarrow{\sim} E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{Y,y}} M \quad ,$$

d'après la commutation du produit tensoriel au passage aux fibres, et l'hypothèse (iv) implique (*), cqfd.

Remarque 3.3.1. Le rédacteur ignore si les équivalences (i)$\iff$(iii)$\iff$(iv) sont vraies sans l'hypothèse que X a assez de points.

Corollaire 3.4. Soit



un triangle commutatif de topos annelés, où l'on suppose que X a assez de points, et soient $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$, $F \in \mathrm{ob}\, D(Y)$, $[a,b]$, $[c,d]$ des intervalles de $\mathbb{Z}$. On a alors :

$$\mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [a,b] \text{ et } \mathrm{tor.amp}_g(F) \subset [c,d]$$
$$\Longrightarrow \mathrm{tor.amp}_h(E \overset{L}{\otimes}_Y F) \subset [a+c, b+d] \quad .$$

Preuve. D'après (3.3), il s'agit de montrer que les relations de gauche impliquent

$$H^i(((E \overset{L}{\otimes}_Y F)|h^{-1}(Z')) \overset{L}{\otimes}_{Z'} M) = 0$$

pour tout $i \notin [a+c, b+d]$ et tout $\underline{O}_{Z'}$-Module M, où Z' est un objet de Z. Or, si l'on pose $Y' = g^{-1}(Z')$, $X' = f^{-1}(Y') = h^{-1}(Z')$, on a

$$((E \overset{L}{\otimes}_Y F)|X') \overset{L}{\otimes}_{Z'} M \simeq (E|X') \overset{L}{\otimes}_{Y'} ((F|Y') \overset{L}{\otimes}_{Z'} M) \quad ,$$

et l'assertion résulte aussitôt des hypothèses.

En particulier :

Corollaire 3.4.1. Sous les hypothèses de (3.4),

a) si g est de tor-dimension $\leq n$, on a

$$\mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \mathrm{tor.amp}_h(E) \subset [a-n, b] \quad ;$$

b) si f est de tor-dimension $\leq m$, on a

$$\text{tor.amp}_S(F) \subset [c,d] \Longrightarrow \text{tor.amp}_h(Lf^*(F)) \subset [c-m,d] \quad .$$

Remarque 3.4.2. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de tor-dimension finie et $E \in \text{ob } D(X)$. Alors, d'après (3.4.1 a)), si E est d'amplitude plate finie (au sens absolu), E est d'amplitude plate finie rel. à f. Mais la réciproque est fausse, même si f est plat, comme le montre l'exemple d'une singularité d'un schéma sur un corps.

Proposition 3.5. Soient S un schéma, et, pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ un S-morphisme, $E_i \in \text{ob } D^-(X_i)$, $[a_i,b_i]$ un intervalle de $\mathbf{Z}$. Supposons X_1 et X_2, ainsi que Y_1 et Y_2 tor-indépendants sur S (1.5). Posons $a = a_1+a_2$, $b = b_1+b_2$, $f = f_1 x_S f_2 : X \longrightarrow Y$. Alors :

a) Si l'on a $\text{tor.amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1,b_1]$ et si E_2 est acyclique en dehors de $[a_2,b_2]$, $E_1 \overset{L}{\otimes}_S E_2$ (cf. (1.6)) est acyclique en dehors de $[a,b]$.

b) Si l'on a $\text{tor.amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i,b_i]$ pour $i = 1, 2$, on a $\text{tor.amp}_f(E_1 \overset{L}{\otimes}_S E_2) \subset [a,b]$.

Preuve. D'après (3.3), il suffit de faire la vérification "sur les fibres". Soient s un point de S, x un point de X au-dessus de s, $y = f(x)$, x_i (resp. y_i) la projection canonique de x (resp. y) sur X_i (resp. Y_i). Posons $(E_i)_{x_i} = M_i$, $\underline{O}_{X_i,x_i} = A_i$, $\underline{O}_{Y_i,y_i} = B_i$, $\underline{O}_{S,s} = C$, $\underline{O}_{X,x} = A = A_1 \otimes_C A_2$, $\underline{O}_{Y,y} = B = B_1 \otimes_C B_2$. On a

$$(*) \qquad (E_1 \overset{L}{\otimes}_S E_2)_x \xrightarrow{\sim} M_1 \overset{L}{\otimes}_{A_1} A \overset{L}{\otimes}_{A_2} M_2 \quad .$$

Les hypothèses de tor-indépendance impliquent d'autre part :

$$A \xrightarrow{\sim} A_1 \overset{L}{\otimes}_{B_1} B \overset{L}{\otimes}_{B_2} A_2 \quad .$$

Par suite, le second membre de (*) est canoniquement isomorphe, dans la

catégorie dérivée D(B) des B-modules, à $M_1 \overset{L}{\otimes}_{B_1} B \overset{L}{\otimes}_{B_2} M_2$. Les relations $\text{tor.amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i, b_i]$ $(i = 1, 2)$ impliquent $\text{tor.amp}_{B_i}(M_i) \subset [a_i, b_i]$, donc (I 5.6) $\text{tor.amp}_B(M_1 \overset{L}{\otimes}_{B_1} B \overset{L}{\otimes}_{B_2} M_2) \subset [a,b]$, d'où l'assertion b). D'autre part, si l'on a $\text{tor.amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1, b_1]$, M_1 est isomorphe à un complexe de B_1-modules plats, nuls en dehors de $[a_1, b_1]$, et par suite si E_2 (donc M_2) est acyclique en dehors de $[a_2, b_2]$, $M_1 \overset{L}{\otimes}_{B_1} B \overset{L}{\otimes}_{B_2} M_2$ est acyclique en dehors de [a,b], d'où l'assertion a), ce qui achève la démonstration.

Corollaire 3.5.1. Sous les hypothèses de (3.5), si f_1 et f_2 sont de tor-dimension finie (3.1), il en est de même de f.

Corollaire 3.5.2. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{h} & Y' \end{array}$$

un carré cartésien de schémas, où X et Y' sont supposés tor-indépendants sur Y, et soit $E \in \text{ob } D(X)$. Alors on a

$$\text{tor.amp}_f(E) \subset [a,b] \Rightarrow \text{tor.amp}_{f'}(Lg^*(E)) \subset [a,b] \quad ,$$

et par suite le foncteur $Lg^* : D^-(X) \longrightarrow D^-(X')$ induit un foncteur

$$Lg^* : D(f)_{\text{torf}} \longrightarrow D(f')_{\text{torf}} \quad .$$

Proposition 3.6. Soit



un triangle commutatif de schémas, où i est une immersion fermée et f' un morphisme lisse, et soit $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$. Pour que E soit localement d'amplitude plate finie rel. à f, il faut et il suffit que $i_*(E)$ soit localement d'amplitude plate finie (au sens absolu). Plus précisément, si f' est de dimension relative $\leq d$, on a

(i) $\mathrm{tor.amp}(i_*(E)) \subset [a,b] \Longrightarrow \mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [a,b]$,

(ii) $\mathrm{tor.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \mathrm{tor.amp}(i_*(E)) \subset [a-d,b]$.

Preuve. Si [m,n] est un intervalle de $\mathbb{Z}$, on a évidemment

$$\text{tor.amp}_f(E) \subset [m,n] \iff \text{tor.amp}_{f'}(i_*(E)) \subset [m,n] \quad ,$$

de sorte qu'on peut supposer que X = X', i = Id_X, f = f'. La relation (i) résulte trivialement de (3.4.1 a)). Prouvons (ii). On a un carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{pr_2} & X \times_Y X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle pr_1} \\ Y & \xleftarrow{f} & X \end{array} \quad ,$$

et le morphisme diagonal s : X $\longrightarrow$ $X \times_Y X$ est une section de pr_1 et pr_2. Supposons f lisse de dimension relative d. Alors (VII 1.10) s est une immersion régulière de codimension $\leq$ d, donc est de tor-dimension $\leq$ d (comme on le voit à l'aide du complexe de Koszul). D'après (3.5.2), on a

$$\text{tor.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \text{tor.amp}_{pr_1}(pr_2^*(E)) \subset [a,b] \quad ,$$

et d'après (3.4.1 b)) on a

$$\text{tor.amp}_{pr_1}(pr_2^*(E)) \subset [a,b] \Rightarrow \text{tor.amp}(Ls^* pr_2^*(E)) \subset [a-d,b] \quad ,$$

d'où l'implication (ii) puisque $Ls^* pr_2^* \xrightarrow{\sim} Id$.

Remarque 3.6.1. L'énoncé (3.6) serait faux si l'on supposait seulement f' plat, voir (3.4.2).

Proposition 3.7. ("Formule de projection")([1]). Soient S un schéma quasi-compact, f : X $\to$ Y un S-morphisme quasi-compact et quasi-séparé de schémas quasi-compacts sur S, E $\in$ ob $D^b(X)_{qcoh}$, M $\in$ ob $D^b(S)_{qcoh}$ ([2]). Si M est d'amplitude plate finie, ou si E est d'amplitude plate finie rel. à S, il

([1]) cf. (H II 5.6).

([2]) L'indice "qcoh" indique la sous-catégorie pleine formée des complexes à cohomologie quasi-cohérente.

existe un isomorphisme fonctoriel canonique de $D(Y)_{qcoh}$

$$Rf_*(E) \overset{L}{\otimes}_S M \xrightarrow{\sim} Rf_*(E \overset{L}{\otimes}_S M) \qquad \text{(cf. (1.6))} \quad .$$

Preuve. Notons d'abord qu'il existe (EGA III 1.4.12 et IV 1.7.21) un entier N tel que l'on ait $R^i f_*(F) = 0$ pour tout $i > N$ et tout $\underline{O}_X$-Module quasi-cohérent F. Par suite le foncteur Rf_* envoie $D^b(X)_{qcoh}$ dans $D^b(Y)$ (et même $D^b(Y)_{qcoh}$ (EGA III 1.4.10 et IV 1.7.21)). Supposons E (resp. M) d'amplitude plate finie rel. à f (resp. finie). La flèche d'adjonction $Lf^*Rf_*(E) \longrightarrow E$ définit par tensorisation par M une flèche canonique de $D^-(X)$

$$Lf^*(Rf_*(E) \overset{L}{\otimes}_S M) \longrightarrow E \overset{L}{\otimes}_S M \quad ,$$

où $E \overset{L}{\otimes}_S M \in \text{ob } D^b(X)$. Par adjonction , on en déduit une flèche canonique de $D^-(Y)$

$$(*) \qquad Rf_*(E) \overset{L}{\otimes}_S M \longrightarrow Rf_*(E \overset{L}{\otimes}_S M) \quad .$$

Le but et la source sont d'ailleurs à cohomologie quasi-cohérente, puisque Rf_* envoie $D^b(X)_{qcoh}$ dans $D^b(Y)_{qcoh}$ (EGA III 1.4.10 et IV 1.7.21) et que $\overset{L}{\otimes}_S$ envoie $D^-(X)_{qcoh} \times D^-(S)_{qcoh}$ dans $D^-(X)_{qcoh}$ (idem avec Y au lieu de X). Prouvons que (*) est un isomorphisme. La question étant locale sur Y, on peut supposer S et Y affines. Par dévissage, on se ramène aussitôt, dans le cas non respé, au cas où M est un $\underline{O}_S$-Module quasi-cohérent ordinaire. Notant que les foncteurs $Rf_*(E) \overset{L}{\otimes}_S .$ et $Rf_*(E \overset{L}{\otimes}_S .)$ sont "way-out à gauche" sur la catégorie $D^b(S)_{qcoh}$ ([H] I 7), on se ramène alors, en prenant une résolution gauche de M par des Modules libres, puis en tronquant, au cas où M est libre. Comme les $R^i f_*$ commutent aux limites inductives (f étant quasi-compact et quasi-séparé), on peut même supposer M libre de type fini, puis $M = \underline{O}_S$. La flèche (*) est alors tautologiquement un isomorphisme. Dans le cas respé, on se ramène, par dévissage, à $M = P$, où P est un A-module plat

(S = Spec(A)). Si l'on pose A' = $D_A(P)$ (EGA O_{IV} 18.2.3), S' = Spec(A'), tout revient à prouver que $Rf_*(E)$ commute au changement de base plat S' $\longrightarrow$ S, i.e. que la flèche canonique

$$q^*Rf_*(E) \longrightarrow Rf'_*p^*(E)$$

est un isomorphisme (on a posé $f_{(S')} = f'$ et noté p (resp. q) la projection canonique $X_{(S')} \longrightarrow X$ (resp. $Y_{(S')} \longrightarrow Y$)). Mais cela résulte de (EGA III 1.4.15 et IV 1.7.21). Ceci achève la démonstration de (3.7).

Corollaire 3.7.1. Soient S un schéma, f : X $\longrightarrow$ Y un S-morphisme quasi-compact et quasi-séparé de schémas quasi-compacts sur S, E $\in$ ob $D^b(X)_{qcoh}$. Si E est localement d'amplitude plate finie rel. à S, il en est de même de $Rf_*(E)$. Plus précisément, si S est quasi-compact, et si N est un entier tel que $R^i f_*(F) = 0$ pour tout $i > N$ et tout O_X-Module quasi-cohérent F (EGA III 1.4.12 et IV 1.7.21), alors on a

$$\text{tor.amp}_S(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \text{tor.amp}_S(Rf_*(E)) \subset [a,b+N] \quad .$$

Preuve. On peut évidemment se borner à prouver la dernière assertion. D'après (3.3 (i) $\Longleftrightarrow$ (iv)), et compte tenu de ce que Rf_* "commute à la restriction à un ouvert de S", il s'agit de prouver que l'hypothèse $\text{tor.amp}_S(E) \subset [a,b]$ implique

$$H^i(Rf_*(E) \overset{L}{\otimes}_S M) = 0$$

pour tout $i \notin [a,b+N]$ et tout O_S-Module quasi-cohérent M. Or l'hypothèse précédente signifie que $H^i(E \overset{L}{\otimes}_S M) = 0$ pour tout $i \notin [a,b]$ et tout O_S-Module quasi-cohérent M, et l'on gagne grâce à (3.7).

Corollaire 3.7.2. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme quasi-compact, quasi-séparé, et localement de tor-dimension finie (3.1), et soit $E \in \mathrm{ob}\, D^b(X)_{qcoh}$. Si E est localement d'amplitude plate finie (au sens absolu), il en est de même de $Rf_*(E)$.

Preuve. Conjuguer (3.4.1 a)) et (3.7.1).

4. Perfection relative

Définition 4.1. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme localement de type fini de schémas, $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$, $[a,b]$ un intervalle de $\mathbf{Z}$. On dit que E est d'amplitude parfaite relativement à f (ou Y s'il n'y a pas d'ambiguité), contenue dans $[a,b]$, et l'on écrit

$$\mathrm{parf.amp}_f(E) \subset [a,b] \quad (\text{ou } \mathrm{parf.amp}_Y(E) \subset [a,b])$$

si, relativement à f, E est pseudo-cohérent (1.2) et d'amplitude plate contenue dans $[a,b]$ (3.1). On dit que f est d'amplitude parfaite contenue dans $[-n,0]$, ou de dimension parfaite $\leq n$ $(n \geq 0)$, si $\mathcal{O}_X$ est d'amplitude parfaite contenue dans $[-n,0]$. On dit que E est d'amplitude parfaite finie relativement à f s'il existe un intervalle $[a,b]$ tel que l'on ait $\mathrm{parf.amp}_f(E) \subset [a,b]$. On dit que E est parfait rel. à f si E est localement d'amplitude parfaite finie rel. à f. On dit que f est parfait si f est localement d'amplitude parfaite finie.

Exemple 4.1.1. Une immersion régulière de codimension d (VII 1.4) est de dimension parfaite $\leq d$ (comme on le voit grâce au complexe de Koszul). Un morphisme localement d'intersection complète (i.e. localement composé

d'une immersion régulière et d'un morphisme lisse) est un morphisme parfait

Notation 4.2. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme localement de type fini de schémas. On notera $D(f)_{parf}$, ou $D(X)_{f\text{-}parf}$, ou $D(X)_{Y\text{-}parf}$ s'il n'y a pas de confusion à redouter (resp. $D(f)_{\underline{parf}}$, $D(X)_{f\text{-}\underline{parf}}$, $D(X)_{Y\text{-}\underline{parf}}$) la sous-catégorie pleine de D(X) formée des complexes parfaits (resp. d'amplitude parfaite finie) rel. à f. D'après (I 5.3) et (1.4), $D(f)_{parf}$ et $D(f)_{\underline{parf}}$ sont des sous-catégories triangulées de D(X). Si X est quasi-compact, on a $D(f)_{parf} = D(f)_{\underline{parf}}$.

Proposition 4.3 (cf. I 5.8). Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme localement de type fini de schémas, $E \in ob\ D(X)$, $[a,b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$, x un point de X, $y = f(x)$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $parf.amp_f(E) \subset [a,b]$ au voisinage de x :

(ii) E est, au voisinage de x, (a-1)-pseudo-cohérent rel. à f et acyclique en dehors de $[a,b]$, et l'on a $tor.amp_{\underline{O}_{Y,y}}(E_x) \subset [a,b]$.

Preuve. L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale, prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). La question étant locale au voisinage de x, on se ramène aussitôt, d'après les définitions, au cas où f est lisse. Alors E est (a-1)-pseudo-cohérent au voisinage de x, donc, quitte à se localiser, on peut supposer E strictement (a-1)-pseudo-cohérent (I 2.1) et nul en degré > b, et quitte à tronquer (i.e. à remplacer E par le complexe $(0 \to E^a/B^a \to E^{a+1} \to \dots E^b \to 0)$), on peut supposer que E^i est libre de type fini pour $i > a$, E^a de présentation finie, et $E^i = 0$ pour $i \notin [a,b]$. D'après (I 5.1.1), E^a_x est plat rel. à $\underline{O}_{Y,y}$, donc (EGA IV 11.3.1) E^a est f-plat au voisinage de x. Posons pour abréger $E^a = F$, il s'agit de montrer que F est pseudo-cohérent (au voisinage de x). Quitte à plonger X dans un espace affine type sur Y, on peut

supposer que $X = Y[t_1,\dots,t_r]$, avec Y affine, f étant la projection canonique. Y est alors limite projective de schémas affines noethériens Y_α. Notons $f_\alpha : X_\alpha = Y_\alpha[t_1,\dots,t_r] \longrightarrow Y_\alpha$ la projection canonique. Il existe (EGA IV 8.5.2 et 11.2.6) un indice α et un $\underline{O}_{X_\alpha}$-Module F_α de présentation finie et f_α-plat tel que $g_\alpha^*(F_\alpha) \xrightarrow{\sim} F$, où $g_\alpha : X \longrightarrow X_\alpha$ est le morphisme canonique. Comme X_α est noethérien, F_α est cohérent, donc pseudo-cohérent rel. à f_α. Comme d'autre part F_α est f_α-plat et que f_α est plat, on a $g_\alpha^*(F) \xrightarrow{\sim} F_\alpha \overset{L}{\otimes}_{Y_\alpha} \underline{O}_Y$, et il résulte de (1.10 a)) que F est pseudo-cohérent rel. à Y, donc pseudo-cohérent, cqfd.

Corollaire 4.3.1. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, et E un $\underline{O}_X$-Module. Pour qu'on ait $\mathrm{parf.amp}_f(E) \subset [0,0]$, il faut et il suffit que E soit, rel. à f, plat et de présentation finie (1.2.1 c)). En particulier, pour que f soit de dimension parfaite nulle (4.1), il faut et il suffit que f soit plat et localement de présentation finie.

Preuve. Appliquer (4.3 (ii) $\Longrightarrow$ (i)) avec a = b = 0.

Corollaire 4.3.2. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme localement de type fini, et $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$ un complexe de $\underline{O}_X$-Modules plats et de présentation finie rel. à f (1.2.1 c)), et [a,b] un intervalle de $\mathbb{Z}$. Si $E^i = 0$ pour $i \notin [a,b]$, on a $\mathrm{parf.amp}_f(E) \subset [a,b]$. Si E est à degrés bornés supérieurement, E est pseudo-cohérent rel. à f.

Preuve. Conséquence de (4.3.1) et (I 4.15 et 2.11).

Proposition 4.4. Soit un triangle commutatif de schémas



,

où i est une immersion fermée et g un morphisme lisse, et soit $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$. Pour que E soit parfait rel. à f, il faut et il suffit que $i_*(E)$ soit parfait (au sens absolu (I 4.8)). Plus précisément, supposons g de dimension relative $\leq d$, et soit $[a,b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On a alors :

(i) $\mathrm{parf.amp}(i_*(E)) \subset [a,b] \Rightarrow \mathrm{parf.amp}_f(E) \subset [a,b]$;

(ii) $\mathrm{parf.amp}_f(E) \subset [a,b] \Rightarrow \mathrm{parf.amp}(i_*(E)) \subset [a-d,b]$.

Preuve. Conséquence immédiate de (3.6).

Proposition 4.5. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle h}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array}$$

un triangle commutatif de morphismes localement de type fini de schémas, et soient $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$, $F \in \mathrm{ob}\, D^-(Y)$, $[a,b]$, $[c,d]$ des intervalles de $\mathbb{Z}$. On a alors :

$\mathrm{parf.amp}_f(E) \subset [a,b]$ et $\mathrm{parf.amp}_g(F) \subset [c,d] \Rightarrow \mathrm{parf.amp}_h(E \overset{L}{\otimes}_Y F) \subset [a+c,b+d]$.

Par suite, si E est parfait rel. à f et F parfait rel. à g, $E \overset{L}{\otimes}_Y F$ est parfait rel. à h.

Preuve. Conjuguer (1.11) et (3.4).

Corollaire 4.5.1. Sous les hypothèses de (4.5) :

a) si g est de dimension parfaite $\leq n$, on a

$$\mathrm{parf.amp}_f(E) \subset [a,b] \Rightarrow \mathrm{parf.amp}_h(E) \subset [a-n,b] ;$$

par suite, si g est parfait, E parfait rel. à f implique E parfait rel. à h ;

b) si f est de dimension parfaite $\leq m$, on a

$$\mathrm{parf.amp}_g(F) \subset [c,d] \Rightarrow \mathrm{parf.amp}_h(Lf^*(F)) \subset [c-m,d] \quad ;$$

par suite, si f est parfait, F parfait rel. à g implique Lf*(F) parfait rel. à h.

Remarque 4.5.2. Avec les notations précédentes, si g est parfait, E parfait rel. à h n'implique pas nécessairement E parfait rel. à f, comme le montre le sempiternel exemple d'un point singulier d'un schéma sur un corps. On a le critère suivant :

Proposition 4.6 (critère de perfection par fibres)([1]). Soit



un triangle commutatif de morphismes de schémas. On suppose f, h localement de type fini, et g localement de présentation finie et plat. Soient $x \in X$, $y = f(x)$, $s = h(x) = g(y)$. Enfin, soit $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$, et soit $[a,b]$ un intervalle de $\mathbf{Z}$. On note $f_s : X_s \longrightarrow Y_s$ la fibre de f en s, i.e. le morphisme déduit de f par le changement de base $\mathrm{Spec}(k(s)) \longrightarrow S$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $\mathrm{parf.amp}_h(E) \subset [a,b]$ au voisinage de x, et

$\mathrm{tor.amp}_{\underline{O}_{Y_s,y}}(E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{Y,y}} \underline{O}_{Y_s,y}) \subset [a,b]$;

(ii) $\mathrm{parf.amp}_f(E) \subset [a,b]$ au voisinage de x.

Preuve. (ii) $\Longrightarrow$ (i). On sait déjà (4.3.1) que g est de dimension parfaite nulle. Donc (4.5.1 a)), la condition (ii) implique $\mathrm{parf.amp}_h(E) \subset [a,b]$ au voisinage de x . Elle entraîne aussi. d'après 4.3), $\mathrm{tor.amp}_{\underline{O}_{Y,y}}(E_x) \subset [a,b]$, donc (I 5.1 (i)), $\mathrm{tor.amp}_{\underline{O}_{Y_s,y}}(E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{Y,y}} \underline{O}_{Y_s,y}) \subset [a,b]$, ce

([1]) Analogue du "critère de platitude par fibres" (EGA IV 11.3.10).

qui achève la preuve de (ii) $\Rightarrow$ (i).

(i) $\Rightarrow$ (ii). La question étant locale au voisinage de x, on peut supposer que f se factorise en $X \xhookrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y$, où i est une immersion fermée et f' un morphisme lisse. Il est immédiat que les conditions (i) et (ii) ne sont pas altérées lorsqu'on remplace E par $i_*(E)$, f par f' (et h par gf'), de sorte qu'on peut supposer f lisse. Comme g est parfait (4.3.1), h est parfait, donc (1.12) E est pseudo-cohérent. Quitte à se localiser, on peut, d'après (II 2.2.10 b)) et (I 2.10 a)), supposer que E est strictement pseudo-cohérent (I 2.1) et nul en degré > b, et que la flèche de troncation

t) $\quad E \longrightarrow (0 \longrightarrow E^a/B^a \longrightarrow E^{a+1} \longrightarrow \ldots \longrightarrow E^b \longrightarrow 0)$

est un quasi-isomorphisme (l'hypothèse (i) implique en effet que E est, au voisinage de s, acyclique en dehors de $[a,b]$). Il s'agit de prouver que E^a/B^a est f-plat au voisinage de x. Notons $i : X_s \longrightarrow X$ la flèche canonique. On a :

$$E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{Y,y}} \underline{O}_{Y_s,y} \quad \overset{\sim}{\longrightarrow} \quad i^*(E)_x \ .$$

Comme h est plat, l'hypothèse (i) implique, d'après (3.5.2), $\text{tor.amp}_{h_s}(i^*(E)) \subset [a,b]$ au voisinage de x . Donc quitte à se localiser, on peut supposer que la flèche de troncation

$i^*(t) \quad i^*(E) \longrightarrow (0 \longrightarrow i^*(E^a)/B^a(i^*(E)) \longrightarrow \ldots \longrightarrow i^*(E^b) \longrightarrow 0)$

est un quasi-isomorphisme. L'hypothèse $\text{tor.amp}_{\underline{O}_{Y_s,y}} i^*(E)_x \subset [a,b]$ entraîne alors d'après (I 5.1.1), que $i^*(E^a/B^a)_x$ est un $\underline{O}_{Y_s,y}$-module plat.

D'autre part, la flèche (*) étant un quasi-isomorphisme, l'hypothèse $\text{tor.amp}_h(E) \subset [a,b]$ implique, toujours d'après (I 5.1.1),

que E^a/B^a est h-plat. Grâce au critère de platitude par fibres (EGA IV 11.3.10), on en conclut que E^a/B^a est f-plat au voisinage de x, cqfd.

Corollaire 4.6.1. Soient $f : X \longrightarrow S$ un morphisme localement de présentation finie et plat, $x \in X$, $s = f(x)$, $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$, $[a,b]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Notons $i_s : X_s = X \times_S \mathrm{Spec}(k(s)) \longrightarrow X$ la projection canonique, et posons $E_{X_s} = Li_s^*(E)$. On a alors

$\mathrm{parf.amp}_f(E) \subset [a,b]$ au voisinage de x et $\mathrm{tor.amp}(E_{X_s})_x \subset [a,b]$

$\Longleftrightarrow \mathrm{parf.amp}(E) \subset [a,b]$ au voisinage de x.

Par suite, E est parfait si et seulement si E est parfait rel. à f et E_{X_s} parfait pour tout $s \in S$.

Preuve. Appliquer (4.6) avec $X = Y$, $f = \mathrm{Id}_X$.

Remarque 4.6.2. De (4.6.1) et (I 5.10) résulte que, si f est localement de présentation finie, plat et à fibres des schémas réguliers, alors E parfait rel. à f équivaut à E parfait (cette équivalence avait déjà été obtenue (4.4) pour f lisse).

Proposition 4.7. Soient S un schéma, et pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ un S-morphisme localement de type fini, $E_i \in \mathrm{ob}\, D(X_i)$, $[a_i,b_i]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Supposons X_1 et X_2, ainsi que Y_1 et Y_2 tor-indépendants sur S (1.5). Posons $a = a_1+a_2$, $b = b_1+b_2$, $f = f_1 \times_S f_2$. Alors on a :

a) Si $\mathrm{parf.amp}_{f_1}(E_1) \subset [a_1,b_1]$, et si E_2 est pseudo-cohérent rel. à f_2 et acyclique en degré extérieur à $[a_2,b_2]$, $E_1 \overset{L}{\otimes}_S E_2$ (cf. (1.6)) est pseudo-cohérent rel. à f et acyclique en degré extérieur à $[a,b]$.

b) $\mathrm{parf.amp}_{f_i}(E_i) \subset [a_i, b_i]$ pour $i = 1, 2$

$\Longrightarrow \mathrm{parf.amp}_f(E_1 \overset{L}{\otimes}_S E_2) \subset [a,b]$.

Preuve. Conjuguer (1.9) et (3.5).

Corollaire 4.7.1. Sous les hypothèses de (4.6), si, pour $i = 1, 2$, f_i est de dimension parfaite $\leq n_i$, f est de dimension parfaite $\leq n_1+n_2$. Par suite, si f_1 et f_2 sont parfaits, il en est de même de f.

Corollaire 4.7.2. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{h} & Y' \end{array}$$

un carré cartésien de schémas, où f est localement de type fini et X et Y' sont supposés tor-indépendants sur Y, et soient $E \in \mathrm{ob}\, D(X)$, et $[a,b]$ un intervalle de $\mathbf{Z}$. On a :

$$\mathrm{parf.amp}_f(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \mathrm{parf.amp}_{f'}(Lg^*(E)) \subset [a,b] \ ,$$

et par suite le foncteur $Lg^* : D^-(X) \longrightarrow D^-(X')$ envoie $D(f)_{\mathrm{parf}}$ (resp. $D(f)_{\underline{\mathrm{parf}}}$) dans $D(f')_{\mathrm{parf}}$ (resp. $D(f')_{\underline{\mathrm{parf}}}$) (4.2).

Proposition 4.8. Soient S un schéma, $f : X \longrightarrow Y$ un S-morphisme propre de S-schémas localement de type fini, $E \in \mathrm{ob}\, D^b(X)$. Alors, sous réserve de validité de (2.1) pour f (donc en tout cas si S est localement noethérien ou si f est projectif) :

a) Si E est parfait rel. à S, il en est de même de $Rf_*(E)$.

b) Supposons S quasi-compact, X et Y de type fini sur S, soient $[a,b]$ un intervalle de $\mathbf{Z}$, et N un entier tel que $R^i f_*(M) = 0$ pour tout $i > N$ et

tout O_X-Module quasi-cohérent M (un tel entier existe d'après (EGA III 1.4.12 et IV 1.7.21)) ; on a alors

$$\text{parf.amp}_S(E) \subset [a,b] \Longrightarrow \text{parf.amp}_S(Rf_*(E)) \subset [a,b+N] .$$

Par suite, le foncteur Rf_* envoie $D(X)_{S\text{-parf}}$ dans $D(Y)_{S\text{-parf}}$ ([1]).

Preuve. L'assertion a) découle de b), et b) s'obtient en conjuguant (2.1) et (3.7.1).

Corollaire 4.8.1. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme propre et parfait, et $E \in \text{ob } D^+(X)$. Alors, sous réserve de validité de (2.1) pour f, si E est parfait, il en est de même de $Rf_*(E)$; en outre, si Y est quasi-compact, le foncteur Rf_* envoie $D(X)_{\text{parf}}$ dans $D(Y)_{\text{parf}}$ ([2]).

Preuve. En effet, si E est parfait, E est parfait rel. à f d'après (4.5.1 a)).

Proposition 4.9 ([3]). Soient S un schéma noethérien, X et Y des S-schémas de type fini, $f : X \longrightarrow Y$ un S-morphisme compactifiable (i.e. composé d'une immersion ouverte et d'un morphisme propre), $E \in \text{ob } D(X)$, $F \in \text{ob } D^+(Y)$. Si E est parfait rel. à f, et F parfait rel. à S, $R\underline{\text{Hom}}(E, f^!(F))$ est parfait rel. à S ([4]).

Preuve. La question étant locale sur X, on peut supposer que f se factorise en $X \xrightarrow{i} X' \xrightarrow{f'} Y$, où i est une immersion fermée et f' un morphisme lisse. Si E est parfait rel. à f, E est parfait rel. à i (4.4), et si F est parfait rel. à S, $f'^!(F)$ est parfait rel. à S d'après (4.5.1 b)) puisque $f'^!(F)$ est localement isomorphe à $f'^*(F)$ à translation près. Comme on a $f^! \simeq i^! f'^!$, on est donc ramené à prouver l'assertion dans le cas où f est une immersion fermée. Supposons donc E parfait rel. à f, i.e. $f_*(E)$ parfait, et F parfait rel. à S. Il s'agit de montrer que $f_* R\underline{\text{Hom}}(E, f^! F)$ est

([1]) on a d'ailleurs $D(X)_{S\text{-parf}} = D(X)_{S\text{-parf}}$ (et idem avec Y) puisque X et Y sont quasi-compacts (cf. (4.2)).

([2]) On a $D(X)_{\text{parf}} = D(X)_{\text{parf}}$ (et idem avec Y).

([3]) Ce résultat et ses corollaires ne seront pas utilisés dans la suite du présent Séminaire, mais jouent un rôle important dans la formule de Lefschetz-Verdier pour les faisceaux cohérents, voir SGA 5 Exp. III.

([4]) Pour la définition du foncteur $f^!$, voir [H] App. n° 4.

parfait rel. à S. Mais d'après le théorème de dualité ([H] III 6.7), on a

$$f_*\underline{RHom}(E, f^!F) \xrightarrow{\sim} \underline{RHom}(f_*(E), F) \quad .$$

Comme $f_*(E)$ est parfait, on a, d'après (I 7.7),

$$\underline{RHom}(f_*(E), F) \xrightarrow{\sim} (f_*(E))^\vee \overset{L}{\otimes} F \quad ,$$

et l'on gagne grâce à (4.5) (où X = Y et f = Id_X) .

Corollaire 4.9.1. Sous les hypothèses de (4.8), si f est parfait, $f^!$ envoie $D(Y)_{S\text{-parf}}$ dans $D(X)_{S\text{-parf}}$.

Preuve. Faire $E = \underline{O}_X$.

Corollaire 4.9.2. Soient S un schéma noethérien, f : X ⟶ S un morphisme compactifiable. Posons $f^!(\underline{O}_S) = K_X$, $\underline{RHom}(.,K_X) = \underline{D}_X$. Pour $E \in$ ob $D(f)_{parf}$, on a $\underline{D}_X(E) \in$ ob $D(f)_{parf}$, et la flèche canonique (I 7.2)

$$E \longrightarrow \underline{D}_X\, \underline{D}_X(E)$$

est un isomorphisme.

Preuve. Pour la première assertion, appliquer (4.8) avec Y = S, $F = \underline{O}_S$. Pour la seconde, on se ramène facilement au cas où f est une immersion fermée. Il suffit alors de prouver que la flèche déduite de la flèche canonique par application de f_* est un isomorphisme. D'après la dualité globale ([H] III 6.7), on a

$$f_*\underline{D}_X \xrightarrow{\sim} \underline{D}_S f_* \quad .$$

On est donc ramené à montrer que la flèche canonique

$$f_*(E) \longrightarrow \underline{D}_S\, \underline{D}_S\, f_*(E)$$

est un isomorphisme pour E parfait rel. à f, i.e. $f_*(E)$ parfait, ce qui résulte de la bidualité ordinaire pour les complexes parfaits (I 7.2).

5. Applications : théorèmes d'échange et de semi-continuité ([1]).

Lemme 5.1. Soit $(X,\underline{O}_X)$ un topos annelé (commutatif), notons Mod(X) la catégorie des $\underline{O}_X$-Modules, D(X) = D(Mod(X)). Soient $E \in$ ob $D^-(X)$, et $p \in \mathbb{Z}$. Considérons les conditions suivantes :

([1]) Les résultats de ce numéro ne seront pas utilisés dans la suite du Séminaire.

a) Le foncteur $M \longmapsto H^p(E \overset{L}{\otimes} M)$ de Mod(X) dans Mod(X) est exact à droite.

a') La flèche canonique

$$H^p(E) \otimes M \longrightarrow H^p(E \overset{L}{\otimes} M)$$

est un isomorphisme pour tout $M \in$ ob Mod(X).

b) Le foncteur $M \longmapsto H^{p+1}(E \overset{L}{\otimes} M)$ de Mod(X) dans Mod(X) est exact à gauche.

b') La flèche canonique définie ci-dessous

$$(*) \quad H^{p+1}(E \overset{L}{\otimes} M) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(H^{-p-1}(E^\vee), M)$$

est un isomorphisme pour tout $M \in$ ob Mod(X).

Alors on a :

a) $\Longleftrightarrow$ a') $\Longleftrightarrow$ b) $\Longleftarrow$ b') .

En outre, si E est pseudo-cohérent, les conditions a), a'), b), b') sont équivalentes.

Définition de (*) : La flèche canonique (I 7.5) $E^\vee \overset{L}{\otimes} E \longrightarrow \underline{O}_X$, où $E^\vee = \underline{\mathrm{RHom}}(E, \underline{O}_X)$, donne, par tensorisation avec $M \in$ ob Mod(X), une flèche $E^\vee \overset{L}{\otimes} E \overset{L}{\otimes} M \longrightarrow M$, d'où par la formule d'adjonction chère à Cartan (I 7.4), une flèche canonique

$$(**) \qquad E \overset{L}{\otimes} M \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(E^\vee, M) \quad .$$

Composant la flèche induite par (**) sur H^{p+1} avec la flèche canonique

$$(***) \qquad \underline{\mathrm{Ext}}^{p+1}(E^\vee, M) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(H^{-p-1}(E^\vee), M) \quad ,$$

on obtient la flèche (*).

Preuve. Les implications

a') $\Longrightarrow$ a) $\Longleftrightarrow$ b) $\Longleftarrow$ b')

sont triviales. Prouvons a) $\Longrightarrow$ a'). Soit M un $\underline{O}_X$-Module. Il existe une suite exacte $M^1 \longrightarrow M^0 \longrightarrow M \longrightarrow 0$, où M^0 et M^1 sont sommes directes de faisceaux

du type $\underline{O}_{U,X}$, où U est un objet de X. Utilisant l'exactitude à droite et la commutation aux sommes directes des foncteurs $H^p(E) \otimes .$ et $H^p(E \overset{L}{\otimes} .)$, on se ramène à prouver que la flèche de a') est un isomorphisme pour $M = \underline{O}_{U,X}$, $U \in$ ob X. Or $H^p(E) \otimes \underline{O}_{U,X}$ (resp. $H^p(E \overset{L}{\otimes} \underline{O}_{U,X})$) s'identifie canoniquement (SGA 4 IV 2.13) à $i_!(H^p(E)|U)$ (resp. $H^p(i_!(E|U))$), où $i_!$ est le prolongement par O en dehors de U, et l'on gagne car $i_!$ est exact. Supposons E pseuso-cohérent, et prouvons b) $\Rightarrow$b'). Il suffit évidemment de montrer que (*) est un isomorphisme pour M injectif. Comme la flèche (***) est un isomorphisme pour M injectif, l'assertion va donc résulter de la suivante :

(5.1.1) : <u>la flèche</u> (**) <u>est un isomorphisme si</u> E <u>est pseudo-cohérent et</u> M <u>injectif</u>.

<u>Preuve de</u> (5.1.1). Notons T (resp. T') le foncteur de $D^-(X)$ dans D(X) défini par $F \longmapsto F \overset{L}{\otimes} M$ (resp. $R\underline{Hom}(F^\vee, M)$). Soit $n \in \mathbb{Z}$; si $H^i(F) = 0$ pour $i > n$, alors $H^iT(F) = 0$ pour $i > n$, $H^i(F^\vee) = 0$ pour $i < -n$, et $H^iT'(F) = 0$ pour $i > n$ si M est injectif. Comme d'autre part la flèche (**) commute à la restriction à un ouvert, et qu'un injectif restreint à un ouvert est encore injectif, on peut, quitte à se localiser et à tronquer, supposer E strictement parfait (2.1). Par dévissage, on se ramène alors à $E = \underline{O}_X$, et l'on gagne.

<u>Remarques</u> 5.2. (i) La condition a) (resp. a'), b), b')) est de nature locale : si (X_α) est un recouvrement ouvert de l'objet final de X, et si, pour chaque α, la condition a) (resp...) est vérifiée pour X_α et $E \mid X_\alpha$, alors a) (resp...) est vérifiée.

(ii) Si x est un point de X, notons a_x) (resp. a'_x), etc.) la condi-

tion a) (resp. a'), etc.) relative à E_x et $\mathrm{Mod}(\underline{O}_{X,x})$. Alors, si X a assez de points, la condition a) (resp. a'), b)) équivaut à la condition "pour tout point x de X, a_x) (resp. a'_x), b_x))", et équivaut à la condition "pour tout point x de X, b'_x)" si E est pseudo-cohérent ; en outre la condition a') équivaut à la condition analogue où l'on remplace "pour tout $M \in \mathrm{ob}\ \mathrm{Mod}(X)$" par "pour tout $\underline{O}_X$-Module conoyau d'un homomorphisme $\underline{O}_{U,X}^p \longrightarrow \underline{O}_{U,X}^q$ où U est un objet de X".

(iii) Le critère (EGA III 7.4.2) s'étend mot pour mot à notre situation : si E est à composantes plates, la condition a) signifie simplement que $\mathrm{Coker}(E^p \longrightarrow E^{p+1})$ est plat, donc localement facteur direct d'un Module libre de type fini si E^p et E^{p+1} sont supposés être en outre de présentation finie (I 5.8.3). On en déduit en particulier que, si E est parfait, alors E vérifie la condition a) relative à l'entier p si et seulement si $E^\vee$ vérifie la condition a) relative à l'entier -p-1.

(iv) Soient X un schéma quasi-séparé, $\underline{O}_X$ le faisceau structural, $E \in \mathrm{ob}\ D^-(X)$ un complexe à cohomologie localement bornée et quasi-cohérente. Notons a_{qcoh}) (resp. a'_{qcoh}), etc.) la condition analogue à a) (resp. a'), etc). où l'on remplace Mod(X) par la catégorie Qcoh(X) des $\underline{O}_X$-Modules quasi-cohérents. Alors on a

$$a) \Longleftrightarrow a_{qcoh}) \Longleftrightarrow a'_{qcoh}) \Longleftrightarrow b_{qcoh}) \Longleftarrow b'_{qcoh}) \quad ,$$

et les conditions précédentes sont équivalentes si E est pseudo-cohérent.

En effet, comme X est quasi-séparé, tout faisceau quasi-cohérent sur un ouvert affine de X est induit par un faisceau quasi-cohérent sur X (EGA I 9.4.2 et IV 1.2.7). Il en résulte que la condition a_{qcoh}) (resp. a'_{qcoh}), b_{qcoh}), b'_{qcoh})) est vérifiée si et seulement si elle l'est au-dessus de tout ouvert affine. Pour prouver les implications ci-dessus, on peut donc supposer X affine. Alors (II 3.5) E est isomorphe dans D(X) à un complexe de Modules quasi-cohérents, et les implications

$$a_{qcoh}) \Longleftrightarrow a'_{qcoh}) \Longleftrightarrow b_{qcoh}) \Longleftarrow b'_{qcoh})$$

résultent de (5.1) appliqué au topos "ponctuel" annelé par $\Gamma(X,\underline{O}_X)$; il en est de même, en vertu de (II 2.2.10 a)), de l'implication $b_{qcoh}) \Rightarrow b'_{qcoh})$ pour E pseudo-cohérent. Enfin l'équivalence $a) \Leftrightarrow a_{qcoh})$, ou, ce qui revient au même, $a') \Leftrightarrow a'_{qcoh})$ découle de la dernière remarque de (ii) (et du fait que les faisceaux quasi-cohérents "se prolongent", X étant quasi-séparé).

Proposition 5.3. (propriété d'échange) (EGA III 7.7.5 II). Soient $f : X \to Y$ un morphisme de schémas quasi-compacts et quasi-séparés, $E \in \mathrm{ob}\, D^b(X)$ un complexe à cohomologie quasi-cohérente et d'amplitude plate finie rel. à f, et $p \in \mathbb{Z}$. Considérons les conditions suivantes :

a) Le foncteur $M \longmapsto R^p f_*(E \overset{L}{\otimes}_Y M)$ de Qcoh(Y) ([1]) dans Qcoh(Y) ([2]) est exact à droite.

a') La flèche canonique

$$R^p f_*(E) \otimes M \longrightarrow R^p f_*(E \overset{L}{\otimes}_Y M)$$

(composée de la flèche canonique $R^p f_*(E) \otimes M \longrightarrow H^p(Rf_*(E) \overset{L}{\otimes} M)$ et de l'isomorphisme (3.7) $H^p(Rf_*(E) \overset{L}{\otimes} M) \xrightarrow{\sim} R^p f_*(E \overset{L}{\otimes}_Y M)$) est un isomorphisme pour tout $M \in \mathrm{ob}\, \mathrm{Qcoh}(Y)$.

b) Le foncteur $M \longmapsto R^{p+1} f_*(E \overset{L}{\otimes}_Y M)$ de Qcoh(Y) dans Qcoh(Y) est exact à gauche.

b') La flèche canonique

$$R^{p+1} f_*(E \overset{L}{\otimes}_Y M) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(H^{-p-1}(Rf_*(E)^\vee), M)$$

(composée de l'isomorphisme (3.7) $R^{p+1} f_*(E \overset{L}{\otimes}_Y M) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}(Rf_*(E) \overset{L}{\otimes} M)$ et de la flèche canonique (5.1 (*)) $H^{p+1}(Rf_*(E) \overset{L}{\otimes} M) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}(H^{-p-1}(Rf_*(E)^\vee), M)$) est un isomorphisme pour tout $M \in \mathrm{ob}\, \mathrm{Qcoh}(Y)$.

([1]) Qcoh(Y) = catégorie des $\underline{O}_Y$-Modules quasi-cohérents.

([2]) en vertu de (3.7).

c) Pour tout changement de base $Y' \longrightarrow Y$, la flèche canonique

$$R^p f_*(E) \otimes_Y \underline{O}_{Y'} \longrightarrow H^p(Rf_*(E) \overset{L}{\otimes}_Y \underline{O}_{Y'})$$

est un isomorphisme.

Alors on a :

a) $\Longleftrightarrow$ a') $\Longleftrightarrow$ b) $\Longleftrightarrow$ c) $\Longleftarrow$ b') .

En outre, si f est propre, E pseudo-cohérent rel. à f (donc parfait rel. à f), et sous réserve de validité de (2.1) pour f (donc en particulier si f est projectif ou si Y est noethérien), les conditions précédentes sont équivalentes.

Preuve. Les implications a) $\Longleftrightarrow$ a') $\Longleftrightarrow$ b) $\Longleftarrow$ b') résultent aussitôt de (3.7), (5.1) et (5.2 (iv)), de même que l'implication b') $\Longleftarrow$ b) (pour f propre et E pseudo-cohérent rel. à f) en vertu de (2.1). Il reste à prouver qu'on a a) $\Longleftrightarrow$ c). Cela va découler de la première assertion du lemme suivant :

Lemme 5.3.1. Soit X un schéma quasi-séparé, et soit $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$ un complexe à cohomologie localement bornée et quasi-cohérente. Alors la condition (5.1 a)) équivaut à la condition

c) Pour tout schéma X' au-dessus de X la flèche canonique

$$H^p(E) \otimes_X \underline{O}_{X'} \longrightarrow H^p(E \overset{L}{\otimes}_X \underline{O}_{X'})$$

est un isomorphisme.

En outre, si E est pseudo-cohérent, la condition (5.1 a)) implique que, pour tout morphisme $X' \longrightarrow X$, la flèche canonique

(5.3.1.1) $$H^{-p-1}(E^\vee) \otimes_X \underline{O}_{X'} \longrightarrow H^{-p-1}((E \overset{L}{\otimes}_X \underline{O}_{X'})^\vee) ,$$

composée de $H^{-p-1}(E^\vee) \otimes_X \underline{O}_{X'} \longrightarrow H^{-p-1}(E^\vee \overset{L}{\otimes}_X \underline{O}_{X'})$ et de la flèche canonique (I 7.1.2) $H^{-p-1}(E^\vee \overset{L}{\otimes}_X \underline{O}_{X'}) \longrightarrow H^{-p-1}((E \overset{L}{\otimes}_X \underline{O}_{X'})^\vee)$, est un isomorphisme.

Preuve. a) $\Longrightarrow$c). La question étant locale sur X', on peut supposer X (resp. X') affine d'anneau A (resp. A'). D'après (II 3.5), on peut supposer d'autre part que l'on a $E = F^\sim$, où F est un complexe de A-modules. Par hypothèse (condition a')) la flèche

$$H^p(F) \otimes_A A' \longrightarrow H^p(F \overset{L}{\otimes}_A A')$$

est un isomorphisme, et l'on gagne puisque $H^p(E) \otimes_X \underline{O}_{X'}$ (resp. $H^p(E \overset{L}{\otimes}_X \underline{O}_{X'})$) s'identifie canoniquement au faisceau sur X' défini par le A'-module $H^p(F) \otimes_A A'$ (resp. $H^p(F \overset{L}{\otimes}_A A')$).

c) $\Longrightarrow$a). Compte tenu de (5.2 (iv)), il suffit de prouver c)$\Rightarrow$a'$_{qcoh}$). La question étant locale (puisque X est quasi-séparé), on peut supposer X affine d'anneau A, et $E = F^\sim$, où F est un complexe de A-modules. Soit $M = M^\sim$ un $\underline{O}_X$-Module quasi-cohérent. Il s'agit de montrer que la flèche

$$H^p(F) \otimes_A N \longrightarrow H^p(F \overset{L}{\otimes}_A N)$$

est un isomorphisme. Mais, si l'on pose $A' = D_A(N)$ (EGA O_{IV} 18.2.3), $X' = \mathrm{Spec}(A')$, cela résulte de c) appliquée au morphisme canonique $X' \longrightarrow X$.

Prouvons la dernière assertion. La question étant locale sur X', on peut, d'après (II 2.2.10 b)), supposer E strictement pseudo-cohérent. De plus, l'assertion ne faisant intervenir qu'une partie de longueur bornée de E, on peut, quitte à tronquer, supposer E strictement parfait. Alors $(E \overset{L}{\otimes}_X \underline{O}_{X'})^\vee$ s'identifie canoniquement (I 7.1.2) à $E^\vee \overset{L}{\otimes}_X \underline{O}_{X'}$, et la flèche (5.3.1.1) peut être récrite comme la flèche canonique

$$(*) \qquad H^{-p-1}(E^\vee) \otimes_X \underline{O}_{X'} \longrightarrow H^{-p-1}(E^\vee \overset{L}{\otimes}_X \underline{O}_{X'}) \quad .$$

Si E vérifie la condition (5.1 a)) pour l'entier p, $E^\vee$ vérifie la même condition pour l'entier -p-1 en vertu de (5.2 (iii)), et la flèche (*) est un isomorphisme, d'après la première assertion de (5.3.1). Ceci achève la démonstration de (5.3.1), et par suite de (5.3).

Remarque 5.3.2. La proposition (5.3) s'applique en particulier lorsque E est un complexe à degrés bornés de $\underline{O}_X$-Modules quasi-cohérents plats et de présentation finie rel. à f : en effet, E est alors d'amplitude parfaite finie rel. à f en vertu de (4.3.2).

Définition 5.4. Soit X un topos, notons Pt(X) l'ensemble de ses points (SGA 4 IV 6.1). Soient M un ensemble ordonné, f : Pt(X) $\longrightarrow$ M une application, et x $\in$ Pt(X). On dit que f est semi-continue supérieurement (resp. semi-continue inférieurement, resp. localement constante) en x s'il existe un objet x-ponctué U de X tel que pour tout point y de U on ait f(y) $\leq$ f(x) (resp. f(y) $\geq$ f(x), resp. f(y) = f(x)). On dit que f est semi-continue supérieurement (resp. semi-continue inférieurement, rep. localement constante) si elle l'est en tout point ([1]).

Exemples 5.4.1. a) Notons M_X le faisceau constant de valeur M sur X, et soit s $\in H^o(X,M)$. L'application x $\longmapsto$ s(x) = x*(s) de Pt(X) dans M est localement constante. En particulier, soit E un complexe parfait sur X supposé localement annelé : le rang de E (I 6.11) définit une fonction localement constante sur Pt(X) à valeurs dans $\mathbb{Z}$.

b) Supposons X localement annelé, et soit P un $\underline{O}_X$-Module de type fini. Pour x $\in$ Pt(X), notons $\underline{O}_{X,x}$ l'anneau local fibre de $\underline{O}_X$ en x, et k(x) le corps résiduel. Alors, pour x $\in$ Pt(X), $P_x \otimes_{\underline{O}_{X,x}} k(x)$ est de rang fini sur k(x), et la fonction x $\longmapsto$ $rg_{k(x)}(P \otimes_{\underline{O}_{X,x}} k(x))$ est semi-continue supérieurement. En effet, si, pour x $\in$ Pt(X), $P_x \otimes_{\underline{O}_{X,x}} k(x)$ est de rang n, il existe un épimorphisme $\underline{O}_{X,x}^{\,n} \longrightarrow P_x$ d'après Nakayama, et, comme P est de type fini, il existe un objet x-ponctué U de X et un épimorphisme $\underline{O}_U^{\,n} \longrightarrow P|U$, d'où l'assertion.

Lemme 5.5. Soient $(X,\underline{O}_X)$ un topos localement annelé, E $\in$ ob $D^-(X)$, et p $\in \mathbb{Z}$. Alors on a, avec les notations de (5.4.1 b)) :

([1]) Si X provient d'un espace topologique, on retrouve les notions usuelles.

(i) Si E est parfait, les $H^i(E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{X,x}} k(x))$, pour $x \in Pt(X)$, sont des espaces vectoriels de rang fini sur $k(x)$, nuls sauf un nombre fini, et la fonction

$$x \longmapsto \Sigma\ (-1)^i rg_{k(x)} H^i(E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{X,x}} k(x))$$

est localement constante sur $Pt(X)$.

(ii) Si E est $(p-1)$-pseudo-cohérent, $H^p(E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{X,x}} k(x))$ est, pour $x \in Pt(X)$, un espace vectoriel de rang fini sur $k(x)$, et la fonction

$$x \longmapsto rg_{k(x)} H^p(E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{X,x}} k(x))$$

est semi-continue supérieurement sur $Pt(X)$. Si en outre le foncteur $M \longmapsto H^p(E \overset{L}{\otimes} M)$ de $Mod(X)$ dans $Mod(X)$ est exact, $H^p(E)$ est localement libre de type fini et la fonction précédente est localement constante.

(iii) Supposons E p-pseudo-cohérent (resp. $(p-1)$-pseudo-cohérent), et soit $x \in Pt(X)$. Si le foncteur $M \longmapsto H^p(E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{X,x}} M)$ est exact à droite (resp. à gauche) sur la catégorie $Mod(x)$ des $\underline{O}_{X,x}$-Modules, il existe un ouvert x-ponctué U de X tel que le foncteur $M \longmapsto H^p(E|U \overset{L}{\otimes} M)$ soit exact à droite (resp. à gauche) sur $Mod(U)$.

Preuve. (i) D'après (I 4.19.1), $E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{X,x}} k(x)$ est un complexe parfait de $k(x)$-modules, donc (I 5.9 et 3.5) les $H^i(E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{X,x}} k(x))$ sont de rang fini sur $k(x)$ et nuls sauf un nombre fini. On a

$$(5.5.1)\quad rg(E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{X,x}} k(x)) = \Sigma\ (-1)^i\ rg_{k(x)} H^i(E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{X,x}} k(x)) \quad , \quad (^1)$$

comme on le voit par un dévissage immédiat utilisant l'additivité de la fonction rang. Compte tenu de (5.4.1 a)), l'assertion (i) résulte donc de

---

(^{1}) rg( ) désigne le rang d'un complexe parfait (I 6.11).

la compatibilité du rang avec les images inverses (I 6.12).

(ii) Quitte à tronquer et à translater, on peut, pour la première assertion, supposer E strictement parfait, p = 0, et $E^i = 0$ pour $i \notin [-1,+1]$. Pour $x \in Pt(X)$, posons $E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{X,x}} k(x) = E_{k(x)}$. On a d'après (5.5.1)

$$rg_{k(x)}H^0(E_{k(x)}) = rg_{k(x)}H^{-1}(E_{k(x)}) + rg_{k(x)}H^1(E_{k(x)}) + rg(E_x) \quad ,$$

donc il suffit de prouver que la fonction $x \longmapsto rg_{k(x)}H^{-1}(E_{k(x)})$ (resp. $rg_{k(x)}H^1(E_{k(x)})$ est semi-continue supérieurement (puisque la fonction $x \longmapsto rg(E_x) = rg(E_{k(X)})$ est localement constante). Pour la fonction $x \longmapsto rg_{k(x)}H^1(E_{k(x)})$, c'est une conséquence immédiate de (5.4.1 b)) (*). Pour la fonction $x \longmapsto rg_{k(x)}H^{-1}(E_{k(x)})$, on peut supposer $E^1 = 0$, i.e. remplacer E par $E' = (0 \to E^{-1} \to E^0 \to 0)$. On sait déjà que la fonction $x \longmapsto rg_{k(x)}H^0(E'_{k(x)})$ est semi-continue supérieurement, donc il en est de même de la fonction $x \longmapsto rg_{k(x)}H^{-1}(E'_{k(x)}) = rg_{k(x)}H^{-1}(E_{k(x)})$, puisque la fonction $x \longmapsto rg_{k(x)}H^0(E'_{k(x)}) - rg_{k(x)}H^{-1}(E'_{k(x)}) = rg(E'_x)$ est localement constante. Prouvons maintenant la seconde assertion. Quitte à tronquer, on peut supposer E strictement parfait et $E^i = 0$ pour $i < p-1$. Le $\underline{O}_X$-Module $Z'^i(E) = Coker(E^{i-1} \longrightarrow E^i)$ est donc de présentation finie. On a une suite exacte :

(*) $\quad 0 \longrightarrow H^p(E) \longrightarrow Z'^p(E) \longrightarrow E^{p+1} \longrightarrow Z'^{p+1}(E) \longrightarrow 0$.

Comme le foncteur $M \longmapsto H^p(E \overset{L}{\otimes} M)$ est exact à droite et à gauche, $Z'^{p+1}(E)$ et $Z'^p(E)$) sont plats d'après (5.2 (iii)), donc (I 5.8.3) localement libre de type fini. L'exactitude de (*) implique alors que $H^p(E)$ est localement libre de type fini, et par suite que la fonction $x \longmapsto rg_{k(x)}H^p(E_{k(x)}) = rg(H^p(E)_x)$

(*) compte tenu de ce que l'on a $H^1(E_{k(x)} \xrightarrow{\sim} H^1(E)_{k(x)}$.

est localement constante, ce qui achève la preuve de (ii).

(iii) On peut supposer E strictement parfait et $E^i = 0$ pour $i < p$ (resp. p-1). Dire que le foncteur $M \longmapsto H^p(E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{X,x}} M)$ est exact à droite (resp. à gauche) sur Mod(x) équivaut, d'après (5.2 (iii)), à dire que $Z'^{p+1}(E_x)$(resp. $Z'^p(E_x)$)(avec les notations de (ii)) est plat, donc libre de type fini (puisque de présentation finie). Comme on a $Z'^{p+1}(E_x) \simeq Z'^{p+1}(E)_x$ (resp. $Z'^p(E_x) \simeq Z'^p(E)_x$), l'argument habituel (cf. EGA O_I 5.2.7) montre qu'il existe un objet x-ponctué U de X tel que $Z'^{p+1}(E|U)$ (resp. $Z'^p(E|U)$) soit libre de type fini, et l'on gagne.

Corollaire 5.6 (EGA III 7.6.9). Soient X un schéma, $p \in \mathbb{Z}$, et $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$ un complexe (p-1)-pseudo-cohérent. Alors :

(i) Pour $x \in X$, $H^p(E \overset{L}{\otimes}_X k(x))$ est de rang fini sur k(x) et la fonction

$$x \longmapsto \mathrm{rg}_{k(x)} H^p(E \overset{L}{\otimes}_X k(x))$$

est constructible et semi-continue supérieurement sur X.

(ii) Supposons X quasi-séparé et E à cohomologie quasi-cohérente et localement bornée. Si le foncteur $M \longmapsto H^p(E \overset{L}{\otimes} M)$ est exact sur la catégorie des $\underline{O}_X$-Modules quasi-cohérents, la fonction $x \longmapsto \mathrm{rg}_{k(x)} H^p(E \overset{L}{\otimes}_X k(x))$ est localement constante et $H^p(E)$ est localement libre de type fini. Inversement, si X est localement noethérien et réduit et si la fonction précédente est localement constante, le foncteur $M \longmapsto H^p(E \overset{L}{\otimes} M)$ est exact sur la catégorie des $\underline{O}_X$-Modules quasi-cohérents.

Preuve. Si X est intègre de point générique x, le foncteur $M \longmapsto H^p(E_x \overset{L}{\otimes}_{\underline{O}_{X,x}} M)$ est exact sur la catégorie des $\underline{O}_{X,x}$-modules (puisque $\underline{O}_{X,x} = k(x)$), donc (5.5 (iii)), il existe un voisinage ouvert U de x tel que le foncteur $M \longmapsto H^p(E|U \overset{L}{\otimes} M)$ soit exact sur Mod(U), et, sur U, la fonction

$y \longmapsto rg_{k(x)} H^p(E \overset{L}{\otimes}_X k(y))$ est localement constante d'après (5.5 (ii)). L'assertion de constructibilité de (i) s'en déduit aussitôt. Les autres assertions découlent de (5.5 (ii) et (iii)) et (5.2 (iv)), sauf la réciproque de (ii), pour laquelle il suffit, après s'être ramené à E strictement parfait (après localisation et troncation), d'appliquer (EGA III 7.6.2 et 7.6.5) au foncteur $T_{-p} = H^p(E \otimes \ .\ )$.

Proposition 5.7. (EGA III 7.7.5 et 7.9.4). Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme propre de schémas quasi-compacts, $E \in ob\ D^b(f)_{parf}$ (4.2), et $p \in \mathbb{Z}$. Alors, sous réserve de validité de (2.1), donc par exemple si f est projectif ou si Y est noethérien :

(i) Pour $y \in Y$, les $H^i(Rf_*(E) \overset{L}{\otimes}_Y k(y)$ sont des espaces vectoriels de rang fini sur $k(y)$, nuls sauf un nombre fini, et la fonction

$$y \longmapsto \Sigma\ (-1)^i rg_{k(y)} H^i(Rf_*(E) \overset{L}{\otimes}_Y k(y)$$

est localement constante sur Y.

(ii) La fonction

$$y \longmapsto rg_{k(y)} H^p(Rf_*(E) \overset{L}{\otimes}_Y k(y)).$$

est constructible et semi-continue supérieurement sur Y.

(iii) Supposons Y quasi-séparé. Alors, si le foncteur $M \longmapsto R^p f_*(E \overset{L}{\otimes}_Y M)$ est exact sur la catégorie des O_Y-Modules quasi-cohérents, $R^p f_*(E)$ est un O_Y-Module localement libre de type fini, et la fonction de (ii) est localement constante. Inversement, si Y est noethérien et réduit, et si la fonction de (ii) est localement constante, le foncteur $M \longmapsto R^p f_*(E \overset{L}{\otimes}_Y M)$ est exact sur la catégorie des O_Y-Modules quasi-cohérents.

Preuve. D'après (4.8), $Rf_*(E)$ est un complexe parfait.

L'assertion (i) (resp. (ii)) résulte donc de (5.5 (i)) (resp. (5.6 (i))). Enfin, si M est un $\underline{O}_Y$-Module quasi-cohérent, la flèche canonique

$$Rf_*(E) \overset{L}{\otimes}_Y M \longrightarrow Rf_*(E \overset{L}{\otimes}_Y M)$$

est un isomorphisme d'après (3.7), donc l'assertion (iii) résulte de (5.6 (ii)).

Remarques 5.8.

a) Dans la situation de (5.7), notons $i_y : X_y \longrightarrow X$ l'injection de la fibre de X au-dessus d'un point y de Y . On peut montrer (cf. (EGA III 6 et (IV 3.1.0) que pour f plat (resp. E borné à composantes quasi-cohérentes et Y-plates) on a la formule de Künneth :

$$H^i(Rf_*(E) \overset{L}{\otimes}_Y k(y)) \xrightarrow{\sim} H^i(X_y, E_y) \quad ,$$

où $E_y = Li_y^*(E)$ (resp. $i_y^*(E)$).

b) On peut développer pour les espaces analytiques complexes un tapis analogue à celui de ce numéro (propriétés d'échange, de semi-continuité, de continuité) ([1]). Les ingrédients essentiels sont : 1) le théorème de finitude pour les morphismes propres ("théorème de Grauert") ; 2) un analogue de la formule de projection (3.7), qu'on peut énoncer ainsi : soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme d'espaces analytiques, où X est supposé de dimension majorée, et soient $E \in \text{ob } D^-(X)$, $M \in \text{ob } D^-(Y)_{coh}$ ("coh" signifie "à cohomologie cohérente"). La flèche canonique

$$Rf_*(E) \overset{L}{\otimes} M) \longrightarrow Rf_*(E \overset{L}{\otimes}_Y M)$$

est un isomorphime (l'hypothèse sur X assure (T.F II 5.12) que f_* est de dimension cohomologique finie, donc que Rf_* est défini sur D(X)).

A la différence de l'énoncé 1), l'énoncé 2) est essentiellement trivial, et résulte d'un dévissage analogue à celui de la preuve de (3.7) ; on a d'ailleurs les coudées plus franches puisque Rf_* est défini sur D(X), en particulier il n'est besoin d'aucune hypothèse sur E (en dehors de $E \in \text{ob } D^-(X)$).

BIBLIOGRAPHIE

[1] Grauert, H., Ein Theorem der Analytischen Garbentheorie ..., Pub. IHES, n°5.

[H] Hartshorne, R., Residues and Duality, Lecture Notes n°20, Springer, 1966.

[T.F] Godement, R., Théorie des faisceaux, Hermann, 1958.

([1]) C'est d'ailleurs dans ce oadre que ces propriétés ont été d'abord formulées (voir par exemple Grauert [1]), avant d'être transposées en Géométrie Algébrique dans (EGA III 7).

GROUPES DE GROTHENDIECK DES TOPOS ANNELES

par L. ILLUSIE

1. Rappels et généralités sur les groupes de Grothendieck

1.1. Soit C une catégorie triangulée. Rappelons (I 6.3 et SGA 5 VIII 2) qu'une application f de ob C dans un groupe abélien G est dite additive si l'on a $f(E) = f(E') + f(E'')$ pour tout triangle distingué $E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow E'[1]$. Les applications additives de ob C dans G forment un groupe abélien, qui dépend fonctoriellement de G. Le foncteur ainsi obtenu est représenté par un groupe abélien $k(C)$ et une application additive universelle cl_C: ob C $\longrightarrow k(C)$ (notée cl quand il n'y a pas de confusion à craindre).

Le groupe k(C) dépend fonctoriellement de C vis-à-vis des foncteurs exacts. Si C, C' sont des catégories triangulées, deux foncteurs exacts isomorphes de C dans C' induisent le même homomorphisme $k(C) \longrightarrow k(C')$; en particulier, si $u : C \longrightarrow C'$ est un foncteur exact qui est une équivalence de catégories, $k(u) : k(C) \longrightarrow k(C')$ est un isomorphisme.

Lemme 1.2. Soient C une catégorie triangulée, et $L \in$ ob C.

a) Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on a

$$cl(L[n]) = (-1)^n \, cl(L) \quad .$$

Si L', L" sont des objets de C tels qu'on ait $L \simeq L' \oplus L''$, alors on a $cl(L) = cl(L') + cl(L'')$.

b) Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $\coprod_{i \geq 0} L[2ni]$ soit représentable. Alors on a $cl(L) = 0$.

Preuve. L'assertion a) découle directement des définitions (cf. SGA 5 VIII 2). Pour b), il suffit de remarquer qu'on a

$$\coprod_{i\geq 0} L[2ni] \xrightarrow{\sim} L \oplus (\coprod_{i\geq 0} L[2ni])[2n] \quad ,$$

et d'appliquer a).

Lemme 1.3. Soient C une catégorie triangulée, A une sous-catégorie épaisse ([V] I 2.1). Les foncteurs d'inclusion et de passage au quotient définissent une suite exacte

$$k(A) \longrightarrow k(C) \longrightarrow k(C/A) \longrightarrow 0 \quad .$$

Preuve. Voir (SGA 5 VIII 3.1).

Lemme 1.4. Soient A une catégorie additive (resp. abélienne), et f une fonction additive (1.1) sur ob $K^b(A)$ (resp. ob $D^b(A)$). Pour $E \in$ ob $K^b(A)$ (resp. $D^b(A)$) on a

$$f(E) = \Sigma\, (-1)^i f(E^i)$$

(resp. $f(E) = \Sigma\, (-1)^i f(H^i(E))$).

Preuve. Laissée en exercice au lecteur.

1.5. Soient C une catégorie abélienne et A une sous-catégorie pleine de C stable par sommes finies. Une application f de ob A dans un groupe abélien G est dite additive si l'on a $\Sigma\, (-1)^i f(E^i) = 0$ pour tout complexe acyclique E de C, à degrés bornés et dont les composantes appartiennent à A. Lorsque A est stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2), il revient au même de dire qu'on a $f(L) = f(L') + f(L'')$ pour toute suite exacte $0 \to L' \to L \to L'' \to 0$ de C dont les termes appartiennent à A. Les applications additives de ob A dans G forment un groupe abélien dépendant fonctoriellement de G. Notons $K^{b,\emptyset}(A)$ la sous-catégorie épaisse de $K^b(A)$ formée des complexes acycliques. On déduit aisément de (1.3) et (1.4) que l'application

(1.5.1) $$cl_A : \text{ob } A \longrightarrow k(K^b(A)/K^{b,\emptyset}(A))$$

induite par $cl_{K^b(A)/K^{b,\phi}(A)}$ (1.1) est une application additive universelle, i.e. que le couple $(k(K^b(A)/K^{b,\phi}(A)), cl_A)$ représente le foncteur associant à chaque groupe abélien G le groupe abélien des applications additives de ob A dans G. On posera

(1.5.2) $$k(K^b(A)/K^{b,\phi}(A)) = k(A)$$

(on écrira k(A,C) au lieu de k(A) quand on voudra éviter toute ambiguité sur la catégorie abélienne ambiante) ([1]). En particulier, pour A = C, on a

(1.5.3) $$k(D^b(C)) = k(C) .$$

Lemme 1.6. Soient C une catégorie abélienne, A une sous-catégorie épaisse (i.e. une sous-catégorie pleine stable par noyaux, conoyaux, extensions). Notons $D_A(C)$ la sous-catégorie pleine de D(C) formée des objets E tels que $H^i(E) \in$ ob A pour tout i. Alors $D_A(C)$ est une sous-catégorie triangulée ([V] I 1.2.3) de D(C), et le foncteur canonique $D^b(A) \longrightarrow D^b_A(C) = D^b(C) \cap D_A(C)$ induit un isomorphisme

$$k(A) \xrightarrow{\sim} k(D^b_A(C)) ,$$

où k(A) est défini par (1.5.2).

Preuve. La première assertion est conséquence immédiate de la suite exacte de cohomologie. Pour la seconde, considérons l'application $f : \text{ob } D^b_A(C) \longrightarrow k(A)$ définie par

$$f(E) = \Sigma(-1)^i cl_A(H^i(E)) ,$$

où cl_A est l'application (1.5.1). D'après la suite exacte de cohomologie, f est additive (1.1), donc définit un homomorphisme

$$\varphi : k(D^b_A(C)) \longrightarrow k(A) .$$

([1]) La notation k(A) avait été introduite dans (I 6.3) pour désigner le groupe $k(K^b(A))$, qui n'est pas en général isomorphe au groupe défini par (1.5.2). Nous changeons donc ici de convention : dans le présent exposé la notation k(A) désignera exclusivement le groupe défini par (1.5.2).

Il résulte aussitôt de (1.4) que φ est inverse de l'homomorphisme canonique $k(A) \longrightarrow k(D^b_A(C))$.

Remarque 1.6.1. Dans la situation de (1.6), le foncteur canonique $D^b(A) \longrightarrow D^b_A(C)$ n'est pas en général une équivalence de catégories, comme le montre l'exemple où S est un schéma, C la catégorie des $\underline{O}_S$-Modules, A la catégorie des $\underline{O}_S$-Modules quasi-cohérents (II Ap. I 0.3). Voir cependant le critère (II 2.1.3).

Définition 1.7. Soient C une catégorie triangulée (resp. abélienne), et C' une partie de ob C. Nous dirons que C' est un sous-ensemble exact (cf. EGA III 3.1.1) si, pour tout triangle distingué $E' \to E \to E'' \to E'[1]$ (resp. toute suite exacte $0 \to E' \to E \to E'' \to 0$) tel (resp. telle) que deux des termes E', E, E'' appartiennent à C', le troisième y appartient également. Nous dirons que C' est dense dans ob C si ob C est le plus petit sous-ensemble exact de ob C contenant C'.

Lemme 1.8. Soient C une catégorie triangulée (resp. abélienne) et C' une partie dense de ob C. Alors les éléments $cl_C(E)$, pour $E \in C'$, engendrent k(C).

Preuve. Posons $C' = C_o$, et, pour $i \geq 1$, définissons C_i par récurrence comme l'ensemble des objets de C figurant dans un triangle distingué (resp. une suite exacte courte) dont deux des termes appartiennent à C_{i-1}. Les C_i forment une filtration croissante de ob C, qui, par hypothèse, est exhaustive. Pour $i \geq 0$, notons $k(C)_i$ le sous-groupe de k(C) engendré par les éléments $cl_C(E)$ pour $E \in C_i$. Il est immédiat sur les définitions que l'on a, pour tout $i \geq 0$, $k(C)_i = k(C)_{i+1}$, donc $k(C)_i = k(C)_o$. Soit alors $x \in k(C)$;

on peut écrire, comme on le voit facilement, $x = cl(E') - cl(E'')$ pour E', $E'' \in$ ob C (on peut même s'arranger, dans le cas non respé, pour que $E'' = 0$). Comme la filtration (C_i) est exhaustive, il existe un entier $i \geq 0$ tel que E' et E'' appartiennent à C_i ; on a alors $x \in k(C)_i = k(C)_o$ et l'on gagne.

Exercice 1.9. Soient C une catégorie abélienne, A une sous-catégorie pleine stable par sommes finies, sous-objets et quotients, et telle que ob A soit dense dans ob C. Alors l'homomorphisme $k(A,C) \longrightarrow k(C)$ défini par la fonction additive $E \longmapsto cl_C(E)$ sur ob A (cf. (1.5)) est un isomorphisme.

Hint : Poser $A = A_o$, et définir A_i, pour $i \geq 1$, comme la sous-catégorie pleine de C formée des objets de C qui sont extensions de deux objets de C_{i-1} . Prouver que A_i vérifie les mêmes hypothèses que A, puis montrer que l'homomorphisme canonique $\varinjlim k(A_i,C) \longrightarrow k(C)$ est un isomorphisme (la conclusion voulue en résulte aussitôt).

2. Les foncteurs K. et K' d'un topos annelé

2.1. Soit (X,A) un topos annelé. Rappelons les notations suivantes :

$D^b({}_AX)_{coh}$ = catégorie des complexes pseudo-cohérents et à cohomologie bornée de A-Modules à gauche (I 2.15).

$D({}_AX)_{parf}$ = catégorie des complexes de A-Modules à gauche d'amplitude parfaite finie (I 5.8.4).

$Loclib({}_AX)$ = catégorie des A-Modules à gauche localement facteurs directs de Modules libres de type fini (II 2.0).

$Coh({}_AX)$ = catégorie des A-Modules à gauche cohérents (relativement à la catégorie des A-Modules libres de type fini) (I 3.1).

Les deux dernières catégories sont des sous-catégories pleines de la catégorie $\mathrm{Mod}({}_AX)$ des A-Modules à gauche, les deux premières des sous-catégories triangulées pleines de $D({}_AX)$ $(= D(\mathrm{Mod}({}_AX)))$.

Définition 2.2. Soit (X,A) un topos annelé. Sauf mention du contraire, nous poserons

$$K.({}_AX) = k(D^b({}_AX)_{coh}) \quad ,$$

$$K^{\cdot}({}_AX) = k(D({}_AX)_{parf}) \quad ,$$

où $k(\ )$ est défini en (1.1), et

$$K.({}_AX)_{naïf} = k(\mathrm{Coh}({}_AX)) \quad ,$$

$$K^{\cdot}({}_AX)_{naïf} = k(\mathrm{Loclib}({}_AX)) \quad ,$$

où $k(\ )$ est défini par (1.5.2), la catégorie abélienne ambiante étant $\mathrm{Mod}({}_AX)$ ([1]). Nous dirons que $K.({}_AX)$ (resp. $K^{\cdot}({}_AX)$) est le groupe de Grothendieck des complexes pseudo-cohérents (resp. parfaits) de A-Modules à gauche, et que $K.({}_AX)_{naïf}$ (resp. $K^{\cdot}({}_AX)_{naïf}$) est le groupe de Grothendieck des A-Modules à gauche cohérents (resp. localement libres).

Remarques 2.3. a) On peut définir des variantes de $K.(\ )$ et $K^{\cdot}(\ )$ en posant

$$K.^{loc}({}_AX) = k(D^{locb}({}_AX)_{coh}) \quad (\text{où "locb" signifie "à cohomologie localement bornée"}), \text{ et}$$

$$K^{\cdot}_{loc}({}_AX) = k(D({}_AX)_{parf}) \quad .$$

Ces groupes coïncident avec ceux définis en (2.2) lorsque l'objet final de X est quasi-compact, mais d'une manière générale se prêtent moins bien au calcul des intersections.

([1]) On se permettra d'omettre l'indice A quand il n'en pourra résulter de confusion. Parfois aussi on laissera tomber l'indice "naïf", mais en le signalant explicitement.

b) Le groupe $K.(_AX)_{naff}$ n'a pratiquement d'intérêt que si A est cohérent (autrement il risque d'y avoir fort peu de faisceaux cohérents ...).

c) La considération du k de catégories triangulées "trop grosses" n'offre pas d'intérêt. Ainsi, de (1.2 b)) on déduit facilement les relations

$$k(D(_AX)) = k(D^-(_AX)) = k(D^+(_AX)) = k(D^b(_AX)) = k(D^-(_AX)_{coh}) = 0$$

(pour la dernière égalité, observer que $L \in ob\ D^-(_AX)_{coh}$ implique $\coprod_{i\geq 0} L[2i] \in ob\ D^-(_AX)_{coh}$).

2.4. Cas d'un faisceau d'anneaux cohérent . Soit (X,A) un topos annelé, où A est supposé cohérent en tant que A-Module à gauche (I 3.1 et 3.6). Tout A-Module à gauche cohérent est un complexe pseudo-cohérent (I 3.5), on a donc un foncteur pleinement fidèle

$$(2.4.1) \qquad Coh(_AX) \hookrightarrow D^b(_AX)_{coh} \quad .$$

Or (I 3.4) $Coh(_AX)$ est une sous-catégorie épaisse de $Mod(_AX)$, et, en vertu de (I 3.5), $D^b(_AX)_{coh}$ est la sous-catégorie pleine de $D^b(_AX)$ formée des objets L tels que $H^i(L) \in ob\ Coh(_AX)$ pour tout i. Par suite, il résulte de (1.6) que l'homomorphisme

$$(2.4.2) \qquad K.(_AX)_{naff} \longrightarrow K.(_AX)$$

défini par (2.4.1) est un isomorphisme.

2.5. L'homomorphisme $K' \longrightarrow K.$. Soit (X,A) un topos annelé. Le foncteur d'inclusion $D(_AX)_{parf} \hookrightarrow D^b(_AX)_{coh}$ définit un homomorphisme

$$(2.5.1) \qquad K'(_AX) \longrightarrow K.(_AX) \quad .$$

Celui-ci n'est en général ni injectif ni surjectif. Cependant, faisons les hypothèses suivantes :

(i) l'objet final de X est quasi-compact ;

(ii) X a assez de points, et, pour tout point x de X, tout A_x-module à gauche est de tor-dimension finie. Alors on a, d'après (I 5.10), $D(_AX)_{\underline{parf}} = D^b(_AX)_{coh}$, et l'homomorphisme (2.5.1) est un isomorphisme.

Les hypothèses (i) et (ii) sont satisfaites par exemple dans le cas d'un espace compact annelé en anneaux locaux réguliers.

2.6. Accouplements entre $K^\cdot$ et $K^\cdot$ (cas non commutatif). Soit

$$f : (X',A') \longrightarrow (X,A)$$

un morphisme de topos annelés. Notons $Mod(_{A'}X'_A)$ la catégorie des bi-Modules, à gauche sur A', à droite sur $f^{-1}(A)$, et $Loclib_{A'}(_{A'}X'_A)$ la sous-catégorie pleine formée des objets qui appartiennent à $Loclib(_{A'}X')$. Par analogie avec (2.2), nous poserons

$$K^\cdot_{naïf}(_{A'}X'_A)_{A'} = k(Loclib_{A'}(_{A'}X'_A)) \quad .$$

Le produit tensoriel

$$\otimes_A : Mod(_{A'}X'_A) \times Mod(_AX) \longrightarrow Mod(_{A'}X')$$

$$(E',E) \longmapsto E' \otimes_{f^{-1}(A)} f^{-1}(E)$$

induit un foncteur

(2.6.1) $\quad Loclib_{A'}(_{A'}X'_A) \times Loclib(_AX) \longrightarrow Loclib(_{A'}X')$.

L'application $(E',E) \longmapsto cl(E' \otimes_A E)$ déduite de (2.6.1) est biadditive au sens de (1.5), et définit par suite un homomorphisme

(2.6.2) $\quad K^\cdot_{naïf}(_{A'}X'_A)_{A'} \otimes K^\cdot_{naïf}(_AX) \longrightarrow K^\cdot_{naïf}(_{A'}X')$.

Notons $D(_{A'}X'_A)$ la catégorie dérivée de $Mod(_{A'}X'_A)$, $D(_{A'}X'_A)_{A'}\text{-}\underline{parf}$ la sous-catégorie pleine formée des complexes d'amplitude parfaite finie rel. à A' (i.e. en tant qu'objets de $D(_{A'}X')$), et posons, comme en (2.2),

$$K^\cdot(_{A'}X'_A)_{A'} = k(D(_{A'}X'_A)_{A'}\text{-}\underline{parf} \quad .$$

Les foncteurs d'inclusion définissent de manière évidente des homomorphismes

$$(2.6.3.1)\qquad K^{\cdot}_{naïf}({}_{A'}X'_{A})_{A'} \longrightarrow K^{\cdot}({}_{A'}X'_{A})_{A'} \quad ,$$

$$(2.6.3.2)\qquad K^{\cdot}_{naïf}({}_{A}X) \longrightarrow K^{\cdot}({}_{A}X) \quad ,$$

$$(2.6.3.3)\qquad K^{\cdot}_{naïf}({}_{A'}X') \longrightarrow K^{\cdot}({}_{A'}X') \quad .$$

On sait d'autre part (I 4.18, 4.19) que le foncteur dérivé de $\otimes_A$,

$$\overset{L}{\otimes}_A : D^{-}({}_{A'}X'_{A}) \times D^{-}({}_{A}X) \longrightarrow D^{-}({}_{A'}X') \quad ,$$

induit un foncteur (exact)

$$(2.6.4)\qquad D({}_{A'}X'_{A})_{A'}\text{-}\underline{parf} \times D({}_{A}X)_{\underline{parf}} \longrightarrow D({}_{A'}X')_{\underline{parf}} \quad .$$

Ce dernier définit un homomorphisme

$$(2.6.5)\qquad K^{\cdot}({}_{A'}X'_{A})_{A'} \otimes K^{\cdot}({}_{A}X) \longrightarrow K^{\cdot}({}_{A'}X') \quad .$$

Comme le foncteur (2.6.1) est induit par (2.6.4), les homomorphismes (2.6.2) et (2.6.5) sont compatibles avec les homomorphismes (2.6.3.1), (2.6.3.2) et (2.6.3.3), en d'autres termes on a un diagramme commutatif

$$(2.6.6)\qquad \begin{array}{ccc} K^{\cdot}_{naïf}({}_{A'}X'_{A})_{A'} \otimes K^{\cdot}_{naïf}({}_{A}X) & \longrightarrow & K^{\cdot}_{naïf}({}_{A'}X') \\ \downarrow & & \downarrow \\ K^{\cdot}({}_{A'}X'_{A})_{A'} \otimes K^{\cdot}({}_{A}X) & \longrightarrow & K^{\cdot}({}_{A'}X') \end{array} \quad ,$$

où les flèches horizontales supérieure et inférieure sont respectivement (2.6.2) et (2.6.5), et les flèches verticales sont définies par (2.6.3.1), (2.6.3.2) et (2.6.3.3).

2.7. Loi contravariante et structure d'anneau sur $K^{\cdot}$

Nous allons expliciter quelques cas particuliers importants des accouplements (2.6) (leur étude directe est d'ailleurs immédiate).

a) Soit $f : (X',A') \longrightarrow (X,A)$ un morphisme de topos annelés. Le foncteur $Lf^* : D^-({}_AX) \longrightarrow D^-({}_{A'}X')$ envoie (I 4.19.1) $D({}_AX)_{parf}$ dans $D({}_{A'}X')_{parf}$ (resp. $Loclib({}_AX)$ dans $Loclib({}_{A'}X')$), et définit un homomorphisme

(2.7.1) $$f^* : K^{\cdot}({}_AX) \longrightarrow K^{\cdot}({}_{A'}X')$$

(resp. (2.7.2) $f^* : K^{\cdot}({}_AX)_{naïf} \longrightarrow K^{\cdot}({}_{A'}X')_{naïf}$),

qu'on peut encore interpréter comme le produit par $cl(A')$ dans (2.6.2) (resp. (2.6.5)). On a un diagramme commutatif (cas particulier de (2.6.6))

$$\begin{array}{ccc} K^{\cdot}({}_AX)_{naïf} & \xrightarrow{f^*} & K^{\cdot}({}_{A'}X')_{naïf} \\ \downarrow & & \downarrow \\ K^{\cdot}({}_AX) & \xrightarrow{f^*} & K^{\cdot}({}_{A'}X') \end{array} ,$$

où les flèches verticales de gauche et de droite sont respectivement (2.6.3.2) et (2.6.3.3).

Soit $g : (X,A) \longrightarrow (X'',A'')$ un morphisme de topos annelés, la transitivité des foncteurs images inverses implique que les homomorphismes du type (2.7.1) (resp. 2.7.2) vérifient la relation

(2.7.3) $$(gf)^* = f^*g^* .$$

Ainsi $K^{\cdot}({}_AX)$ (resp. $K^{\cdot}({}_AX)_{naïf}$) est un foncteur contravariant de (X,A).

b) Soit $(X,\underline{O}_X)$ un topos commutativement annelé. Grâce à l'associativité et à la commutativité du produit tensoriel, l'homomorphisme (2.6.5) (resp. (2.6.2))(où l'on fait $A = \underline{O}_X$, $(X',A') = (X,A)$, $f = Id$) munit $K^{\cdot}(X)$ (resp. $K^{\cdot}(X)_{naïf}$) d'une structure d'anneau commutatif avec unité

$(1 = cl(\underline{O}_X))$, et l'homomorphisme canonique (2.6.3.2)

$$K'(X)_{naïf} \longrightarrow K'(X)$$

est un homomorphisme d'anneaux unifères.

Soit $f : (X,\underline{O}_X) \longrightarrow (Y,\underline{O}_Y)$ un morphisme de topos annelés en anneaux commutatifs. Alors la compatibilité du produit tensoriel avec les images inverses montre que l'homomorphisme

$$f^* : K'(Y) \longrightarrow K'(X)$$

(resp. $f^* : K'(Y)_{naïf} \longrightarrow K'(X)_{naïf}$)

est un homomorphisme d'anneaux unifères.

2.8. Augmentation de K' vers $H^0(\ ,\mathbb{Z})$. Soit $(X,\underline{O}_X)$ un topos localement annelé (I 2.15.1). Rappelons qu'on a défini (I 6.11 à 6.14) un homomorphisme d'anneaux (unifères)

$$i : H^0(X,\mathbb{Z}) \longrightarrow K'(X)_{naïf} \quad ,$$

munissant ainsi $K'(X)_{naïf}$ (et par suite aussi $K'(X)$ via l'homomorphisme canonique $K'(X)_{naïf} \longrightarrow K'(X)$ d'une structure d'algèbre (à unité) sur $H^0(X,\mathbb{Z})$. De plus (loc.cit.) l'algèbre $K'(X)_{naïf}$ (resp. $K'(X)$) est augmentée vers $H^0(X,\mathbb{Z})$ par le rang, et l'homomorphisme canonique $K'(X)_{naïf} \longrightarrow K'(X)$ est un homomorphisme d'algèbres augmentées.

Soit $f : (X,\underline{O}_X) \longrightarrow (Y,\underline{O}_Y)$ un morphisme de topos localement annelés. Les homomorphismes $f^* : K'(Y) \longrightarrow K'(X)$ et $f^* : K'(Y)_{naïf} \longrightarrow K'(X)_{naïf}$ sont compatibles (I 6.12, 6.13) avec les structures d'algèbres augmentées précédentes, ce qui s'exprime par la commutativité du diagramme (où rg désigne le rang) :

$$\begin{array}{ccccccc} H^0(Y,\mathbb{Z}) & \xrightarrow{i} & K'(Y)_{naïf} & \longrightarrow & K'(Y) & \xrightarrow{rg} & H^0(Y,\mathbb{Z}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^0(X,\mathbb{Z}) & \xrightarrow{i} & K'(X)_{naïf} & \longrightarrow & K'(X) & \xrightarrow{rg} & H^0(X,\mathbb{Z}) \end{array} .$$

* On verra dans la suite du Séminaire (V 3.9.1 et VI) que $K'(X)_{naïf}$ peut être muni d'une structure plus riche que celle d'algèbre augmentée vers $H^0(X,\mathbb{Z})$, à savoir d'une structure de λ-algèbre augmentée vers $H^0(X,\mathbb{Z})$ considéré comme anneau binômial (V 2.8), cette structure étant compatible avec les homomorphismes image inverse. Deligne [5] a prouvé récemment que $K'(X)$ peut être muni d'une structure analogue (du moins si X est de caractéristique $p \geq 0$) et que l'homomorphisme canonique $K'(X)_{naïf} \longrightarrow K'(X)$ est un homomorphisme de λ-algèbres augmentées, répondant ainsi par l'affirmative à une conjecture de Grothendieck (XIV 1).*

2.9. Comparaison de K' et $K'_{naïf}$. Soit (X,A) un topos annelé. Il n'y a pas de raison en général pour que l'homomorphisme canonique

$$K'(X)_{naïf} \longrightarrow K'(X)$$

soit injectif ou surjectif. Cependant, les "critères d'existence de résolutions globales" de Exp. II montrent que c'est un isomorphisme dans les cas suivants :

(i) X est le topos zariskien d'un schéma divisoriel, séparé ou noethérien (et $A = \underline{O}_X$) (II 2.2.9) ;

(ii) X est le topos défini par un espace compact et A est un faisceau mou (II 2.3.2) ;

(iii) X est un topos de Stein dont l'objet final est quasi-compact et $A = \underline{O}_X$ (II 2.4.5).

2.10. Accouplement entre K' et K. . Soit $(X,\underline{O}_X)$ un topos commutativement annelé. On sait (I 5.8.4 b)) que l'on a un accouplement

$$\overset{L}{\otimes}_A : D(X)_{\underline{parf}} \times D^b(X)_{coh} \longrightarrow D^b(X)_{coh} \quad .$$

Celui-ci définit un homomorphisme

(2.10.1) $$K'(X) \otimes K.(X) \longrightarrow K.(X) \quad .$$

Grâce à l'associativité du produit tensoriel, on voit que (2.10.1) munit K.(X) d'une structure de K'(X)-module. Plus généralement, si $f : (X,\underline{O}_X) \longrightarrow (Y,\underline{O}_Y)$ est un morphisme de topos commutativement annelés, on peut regarder K.(X) comme un K'(Y)-module via l'homomorphisme $f^* : K'(Y) \longrightarrow K'(X)$.

2.11. Loi covariante sur K. et formule de projection. Soit (X,A) un topos annelé. A la différence de $K'(_AX)$, le groupe $K.(_AX)$ n'a pas de variance naturelle par rapport à (X,A). Cependant, en Géométrie Algébrique et en Géométrie Analytique, K.(X) a tendance à être covariant en X pour les morphismes propres. Précisons ce point :

2.11.1. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme propre et pseudo-cohérent (III 1.2) de schémas quasi-compacts. Alors, sous réserve de validité de la conjecture de finitude pour f (III 2.1), donc en particulier (III 2.2) si Y est noethérien (auquel cas l'hypothèse de pseudo-cohérence sur f est automatiquement vérifiée (III 1.3)) ou si f est projectif, le foncteur Rf_* induit, en vertu de (III 2.6), un foncteur

$$Rf_* : D^b(X)_{coh} \longrightarrow D^b(Y)_{coh} \quad .$$

Celui-ci définit un homomorphisme

(2.11.1.1) $$f_* : K.(X) \longrightarrow K.(Y)$$

Cet homomorphisme est $K'(Y)$-linéaire (cf. (2.10)), autrement dit pour $y \in K'(Y)$ et $x \in K.(X)$ on a la formule dite de projection

(2.11.1.2) $$f_*(yx) = yf_*(x) \quad .$$

En effet, si $x = cl(E)$ pour $E \in ob\ D^b(X)_{coh}$ et $y = cl(M)$ pour $M \in ob\ D(Y)_{parf}$, on a (III 3.7)

$$Rf_*(E) \overset{L}{\otimes} M \xrightarrow{\sim} Rf_*(E \overset{L}{\otimes}_Y M) \quad .$$

Enfin, si $g : Y \longrightarrow Z$ est un morphisme satisfaisant aux mêmes hypothèses que f et pour lequel la conjecture de finitude (III 2.1) est vraie, la transitivité des foncteurs images directes implique, pour les homomorphismes (2.11.1.1), la formule

(2.11.1.3) $$g_*f_* = (gf)_* \quad .$$

2.11.2. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme propre d'espaces analytiques de dimension finie. Alors, d'après le théorème de finitude de Grauert [2], Rf_* envoie $D^b(X)_{coh}$ dans $D^b(Y)_{coh}$, et définit donc un homomorphisme

(2.11.2.1) $$f_* : K.(X) \longrightarrow K.(Y) \quad .$$

Comme son analogue algébrique (2.11.1.1), celui-ci est $K'(Y)$-linéaire, i.e. la formule (2.11.1.2) est valable, ainsi qu'il résulte de la formule de projection au niveau des catégories dérivées (III 5.9 b)). On a de même la formule de transitivité (2.11.1.3).

2.11.3. Dès qu'on sort du cadre algébrique ou analytique, ce caractère covariant de K. pour les morphismes propres disparaît. Ainsi, soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme propre d'espaces topologiques annelés par le faisceau des fonctions continues complexes. Alors, si $E \in ob\ D^b(X)_{coh}$, on n'a pas en général $Rf_*(E) \in ob\ D^b(Y)_{coh}$, comme il est déjà évident pour $E = \underline{O}_X$ et Y réduit à un point. En fait, la définition (2.2) de K.

paraît surtout adaptée aux besoins de la Géométrie Algébrique et de la Géométrie Analytique, et une bonne définition du K. d'un espace topologique reste à trouver. Il semble d'ailleurs qu'il faudra sortir du cadre des complexes $\underline{O}_X$-linéaires, et définir pour un morphisme $f : X \longrightarrow Y$ (d'espaces topologiques, resp. de variétés mixtes (II App. II), etc.) une classe convenable de complexes de faisceaux vectoriels topologiques sur X, devant englober par exemple, quand f est le morphisme structural d'une variété mixte, les complexes elliptiques sur X relativement à Y. C'est ce que suggère le théorème de finitude (II App. II), ainsi qu'un théorème analogue (où Y est supposé réduit à un point) démontré par Grothendieck dans [3].

2.12. Variances inhabituelles de K' et K. . Soit $f : (X,A) \longrightarrow (Y,B)$ un morphisme de tor-dimension finie de topos annelés (III 3.1). Le foncteur $Lf^* : D^-({}_BY) \longrightarrow D^-({}_AX)$ envoie $D^b({}_BY)$ dans $D^b({}_AX)$, donc (I 2.16.1) $D^b({}_BY)_{coh}$ dans $D^b({}_AX)_{coh}$, et par suite définit un homomorphisme

(2.12.1) $$f^* : K.({}_BY) \longrightarrow K.({}_AX) \quad .$$

Si A et B sont commutatifs, la commutation de l'image inverse au produit tensoriel montre que l'homomorphisme (2.12.1) est compatible avec les structures de modules de K.(Y) et K.(X) sur K'(Y) et K'(X) respectivement (2.10), autrement dit que, pour $a \in K'(Y)$ et $y \in K.(Y)$, on a la formule

(2.12.2) $$f^*(ay) = af^*(y) \quad .$$

Si $g : (Y,B) \longrightarrow (Z,C)$ est un morphisme de tor-dimension finie de topos annelés, la transitivité des foncteurs images inverses implique que les homomorphismes (2.12.1) vérifient la formule :

(2.12.1.1) $$f^*g^* = (gf)^* \quad .$$

Supposons maintenant qu'on soit dans la situation (2.11.1) (resp. (2.11.2)), avec f de tor-dimension finie. Alors (III 4.8.1 et 5.9 b)) le foncteur Rf_* envoie $D(X)_{\underline{parf}}$ dans $D(Y)_{\underline{parf}}$, et par suite définit un homomorphisme

(2.12.3) $$f_* : K'(X) \longrightarrow K'(Y) \quad .$$

Celui-ci n'est pas en général un homomorphisme d'anneaux. Cependant, pour $y \in K.(Y)$ (resp. $K'(Y)$ et $x \in K'(X)$, on a la formule

(2.12.4) $$f_*(f^*(y)x) = yf_*(x) \quad ,$$

où f^* est l'homomorphisme (2.12.1) (resp. (2.7.1)). La démonstration est analogue à celle de (2.11.1.2). Si $g : Y \longrightarrow Z$ est un morphisme satisfaisant aux mêmes hypothèses que f, les homomorphismes (2.12.3) vérifient la formule de transitivité :

(2.12.3.1) $$g_*f_* = (gf)_* \quad .$$

L'homomorphisme (2.12.3) est l'un des ingrédients essentiels du théorème de Riemann-Roch, aussi bien en Géométrie Algébrique qu'en Géométrie Analytique (pour des indications dans le cas analytique, voir (Exp. O, 5)). Supposons que X et Y soient des schémas séparés et divisoriels (II 2.2.5) (ce qui est le cas par exemple si X et Y possèdent des faisceaux inversibles amples). Alors (2.9 (i)) $K'(X)$ (resp. $K'(Y)$) s'identifie à $K'(X)_{naïf}$ (resp. $K'(Y)_{naïf}$), et (2.12.3) définit donc un homomorphisme

(2.12.3') $$f_* : K'(X)_{naïf} \longrightarrow K'(Y)_{naïf} \quad .$$

Comme il a déjà été expliqué dans (Exp. O, 3.1), la définition de (2.12.3') n'était nullement évidente à priori. Elle constitue même, dans l'optique de notre Séminaire, l'une des motivations principales des sorites de Exp. I à Exp. IV.

3. Compléments sur les groupes de Grothendieck des schémas [1]

Proposition 3.1.0. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{h} & Y' \end{array}$$

un carré cartésien de schémas, où Y est quasi-compact et f quasi-compact et quasi-séparé, et soit $E \in \mathrm{ob}\, D^b(X)$ un complexe à cohomologie quasi-cohérente. On suppose X et Y' tor-indépendants sur Y (III 1.5). On suppose d'autre part qu'on a ou bien h de tor-dimension finie ou bien E d'amplitude plate finie rel. à f . Dans ces conditions, la flèche de changement de base (cf. SGA 4 XVII 4)

$$Lh^*Rf_*E \longrightarrow Rf'_*Lg^*E$$

est définie et est un isomorphisme.

Preuve : Pour définir la flèche, on utilise la formule de dualité triviale (SGA 4 XVII 2.3) pour h , qui dit que l'on a un isomorphisme fonctoriel canonique

$$(*) \qquad \mathrm{Hom}(Lh^*L, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(L, Rh_*M)$$

pour $L \in \mathrm{ob}\, D^-(Y)$, $M \in \mathrm{ob}\, D^+(Y')$. Utilisant (III 3.5.2) et (III 3.7.1), on vérifie facilement qu'on a $Lg^*E \in \mathrm{ob}\, D^b(X')$ et $Rf_*E \in \mathrm{ob}\, D^-(Y)$, de sorte qu'appliquant (*) avec $L = Rf_*E$ et $M = Rf'_*Lg^*E$, on est ramené à définir une flèche

$$Rf_*E \longrightarrow Rf_*Rg_*Lg^*E \quad .$$

On prend pour celle-ci l'image par Rf_* de la flèche d'adjonction

$$E \longrightarrow Rg_*Lg^*E \quad ,$$

provenant de la formule de dualité triviale pour g . La flèche de changement de base

---

[1] Les résultats de ce numéro ne seront pas utilisés dans les Exp. V à VIII.

est donc définie, reste à montrer que c'est un isomorphisme. Pour cela, on peut d'abord supposer Y et Y' affines. Puis, par la suite spectrale de Leray d'un recouvrement ouvert de X , on se ramène au cas où X et X' sont affines. On a donc un carré cocartésien d'anneaux

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array} \quad ,$$

et l'on peut supposer que E est défini par un complexe borné supérieurement de B-modules. La tor-indépendance de A' et B sur A , qui s'écrit

$$B \overset{L}{\otimes}_A A' \xrightarrow{\sim} B' \quad ,$$

implique alors qu'on a dans D(A')

$$E \overset{L}{\otimes}_A A' \xrightarrow{\sim} E \overset{L}{\otimes}_B B' \quad ,$$

d'où la proposition.

Traduisant (3.1.0) en termes de groupes de Grothendieck, on obtient :

Proposition 3.1.1. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{h} & Y' \end{array}$$

un carré cartésien de schémas. On suppose Y et Y' quasi-compacts, X et Y' tor-indépendants sur Y (III 1.5), f propre, et pseudo-cohérent, et la conjecture de finitude (III 2.1) vérifiée pour f et f' (par exemple Y et Y' noethériens, ou f projectif). Alors, si f est parfait (resp. h de tor-dimension finie), on a, pour $x \in K^{\cdot}(X)$ (resp. $K.(X)$),

$$h^* f_*(x) = f'_* g^*(x) \quad ,$$

où h^*, g^* sont définis par (2.7.1) (resp. (2.12.1)), et f_*, f'_* par (2.12.3) (resp. (2.11.1.1)) (noter qu'en vertu de (III 4.7.1) f' est parfait si f l'est, et qu'en vertu de (III 3.5.1) g est de tor-dimension finie si h l'est).

3.2. Passage à la limite sur $K^{\cdot}_{naïf}$ et K

Soit $(X_i, f_{ij})_{i \in I}$ un système projectif filtrant de schémas quasi-compacts et quasi-séparés, les morphismes de transition étant affines (cf. EGA IV 8.2.2). Posons $X = \varprojlim X_i$, et notons $f_i : X \to X_i$ l'homomorphisme canonique.

3.2.1. Les homomorphismes (2.7.2) $f_i^* : K^{\cdot}(X_i)_{naïf} \longrightarrow K^{\cdot}(X)_{naïf}$ définissent grâce à la formule de transitivité (2.7.3) un homomorphisme

$$(3.2.1.1) \qquad \varinjlim K^{\cdot}(X_i)_{naïf} \longrightarrow K^{\cdot}(X)_{naïf} \quad .$$

Je dis que l'homomorphisme (3.2.1.1) est un isomorphisme. En effet, soit E un $\underline{O}_X$-Module localement libre de type fini. D'après (EGA IV 8.5.2 et 8.5.5), il existe un indice i et un $\underline{O}_{X_i}$-Module localement libre de type fini E_i tel que l'on ait $E \simeq f_i^*(E_i)$. En vertu de (EGA IV 8.5.2.5), l'image de $cl(E_i)$ dans $\varinjlim K^{\cdot}(X_i)_{naïf}$ ne dépend pas du choix de E_i, notons-la $u(E)$. D'après (EGA IV 8.5.2 et 8.5.6) l'application

u : ob Loclib(X) $\longrightarrow \varinjlim K^{\cdot}(X_i)_{naïf}$ ainsi définie est additive (1.5) ;

elle définit donc un homomorphisme $K'(X)_{naïf} \longrightarrow \varinjlim K'(X_i)_{naïf}$, dont on constate aussitôt, grâce à (EGA IV 8.5.2), qu'il est inverse de (3.2.1.1), ce qui prouve notre assertion.

3.2.2. On définit de même un homomorphisme canonique

(3.2.2.1) $$\varinjlim K'(X_i) \longrightarrow K'(X) \quad .$$

Utilisant la technique de localisation de Deligne (SGA 4 XVII) qui implique que la catégorie des complexes parfaits sur X est équivalente à la catégorie $\varinjlim$ des catégories analogues $Parf(X_i)$, on trouve encore que (3.2.2.1) est un isomorphisme.

3.2.3. Supposons les X_i et X noethériens, et les morphismes f_{ij} plats (il en est alors de même des f_i). Alors les homomorphismes (2.12.1) $f_i^* : K.(X_i) \longrightarrow K.(X)$ définissent un isomorphisme

(3.2.2.1) $$\varinjlim K.(X_i) \xrightarrow{\sim} K.(X) \quad .$$

La démonstration est analogue à celle de (3.2.1), en utilisant le fait (2.4) que $K.(X) \xrightarrow{\sim} K.(X)_{naïf}$ se calcule en termes de faisceaux cohérents sur X.

Comme les structures de modules des $K.(X_i)$ sur les $K'(X_i)_{naïf}$ sont compatibles avec les images inverses f_{ij}^* d'après (2.7 a)) et (2.12.2), on trouve, par passage à la limite, que $\varinjlim K.(X_i)$ est muni d'une structure de module sur $\varinjlim K'(X_i)_{naïf}$; celle-ci est compatible, via les isomorphismes (3.2.1.1) et (3.2.2.1) avec la structure de module de K.(X) sur $K'(X)_{naïf}$, en d'autres termes on a un diagramme commutatif, où les flèches verticales sont définies par (3.2.1.1) et (3.2.2.1) :

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim K'(X_i)_{naïf} \otimes \varinjlim K.(X_i) & \longrightarrow & \varinjlim K.(X_i) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ K'(X)_{naïf} \otimes K.(X) & \longrightarrow & K.(X) \end{array} \quad .$$

3.3. Groupes de Grothendieck relatifs

3.3.1. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme localement de type fini de schémas. Nous poserons :

$$K'(f) = k(D(f)_{\underline{parf}}) \quad ,$$

$$K.(f) = k(D^b(f)_{coh}) \quad ,$$

où $D^b(f)_{coh}$ désigne la catégorie des complexes pseudo-cohérents rel. à f et à cohomologie bornée (III 1.2), et $D(f)_{\underline{parf}}$ la catégorie des complexes d'amplitude parfaite finie rel. à f (III 4.2). Quand il n'y aura pas d'ambiguité possible, nous écrirons parfois $K'(X/Y)$ (resp. $K.(X/Y)$) au lieu de $K'(f)$ (resp. $K.(f)$).

Les groupes $K'(f)$ et $K.(f)$ ne possèdent pas la riche structure de leurs analogues "absolus" $K'(X)$ et $K.(X)$, car le produit tensoriel ne définit pas en général d'homomorphisme $K'(f) \otimes K'(f) \longrightarrow K'(f)$ (resp. $K'(f) \otimes K.(f) \longrightarrow K.(f)$). En revanche, ils vérifient d'intéressantes propriétés de variance, que nous allons passer en revue.

3.3.2. Soit

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle h}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array}$$

un triangle commutatif de morphisme localement de type fini de schémas.

3.3.2.1. Si g est pseudo-cohérent, on a $K.(f) = K.(h)$ (III 1.12). Si g est lisse et X quasi-compact, on a $K'(f) = K'(h)$ (III 4.4.1).

3.3.2.2. D'après (III 1.11 et 4.5), le foncteur $\overset{L}{\otimes}_Y$ définit des accouplements

$$D(f)_{\underline{parf}} \times D^b(g)_{coh} \longrightarrow D^b(h)_{coh} \quad ,$$

$$D(f)_{\underline{parf}} \times D(g)_{\underline{parf}} \longrightarrow D(h)_{\underline{parf}} \quad ,$$

qui induisent des homomorphismes

$$K'(f) \otimes K.(g) \longrightarrow K.(h) \quad ,$$

$$K'(f) \otimes K'(g) \longrightarrow K'(h) \quad .$$

On en déduit en particulier (en faisant X = Y, f = Id) que K.(g) est un K'(Y)-module. D'autre part, si f est parfait, le produit par $cl(\underline{O}_X) \in K'(f)$ définit des homomorphismes K'(Y)-linéaires

$$f^* : K.(Y/S) \longrightarrow K.(X/S) \quad , \text{ et}$$

$$f^* : K'(Y/S) \longrightarrow K'(X/S) \quad .$$

3.3.2.3. Supposons S quasi-compact, X et Y de type fini sur S, et f propre. Alors, sous réserve de validité de la conjecture de finitude (III 2.1), donc en particulier si Y est noethérien ou si f est projectif, le foncteur Rf_* envoie $D^b(h)_{coh}$ dans $D^b(g)_{coh}$, donc définit un homomorphisme

$$f_* : K.(X/S) \longrightarrow K.(Y/S) \quad .$$

Si en outre f est parfait, Rf_* envoie $D(h)_{\underline{parf}}$ dans $D(g)_{\underline{parf}}$ (III 4.8), et définit un homomorphisme

$$f_* : K'(X/S) \longrightarrow K'(Y/S) \quad .$$

De la formule de projection (III 3.7) on déduit la formule

$$f_*(ax) = af_*(x)$$

pour f propre, $a \in K'(S)$, $x \in K.(X)$ (resp. f propre et parfait, $a \in K.(S)$, $x \in K'(X/S)$).

3.3.2.4. Supposons S noethérien, X et Y de type fini sur S, et f compactifiable et parfait. Alors (III 4.9.1) le foncteur $f^!$ envoie $D(g)_{\underline{parf}}$ dans $D(h)_{\underline{parf}}$, et définit un homomorphisme

$$f^! : K'(Y/S) \longrightarrow K'(X/S) \quad .$$

3.3.3. Sous les hypothèses de (III 4.7), le foncteur $\overset{L}{\otimes}_S$ définit des accouplements

$$D(f_1)_{\underline{parf}} \times D^b(f_2)_{coh} \longrightarrow D^b(f)_{coh} \quad ,$$

$$D(f_1)_{\underline{parf}} \times D(f_2)_{\underline{parf}} \longrightarrow D(f)_{\underline{parf}} \quad ,$$

qui induisent des homomorphismes

$$K'(f_1) \otimes K.(f_2) \longrightarrow K.(f) \quad ,$$

$$K'(f_1) \otimes K'(f_2) \longrightarrow K'(f) \quad .$$

(Bien entendu, pour $X_i = Y_i = S$, on retrouve la structure de $K^{\cdot}(S)$-module de $K_{\cdot}(S)$.)

Si X est plat sur S, on en déduit, pour $n \geq 1$, des homomorphismes

$$K^{\cdot}(X/S)^{\otimes n} \longrightarrow K^{\cdot}((X/S)^n) \quad ,$$

qui devraient en un sens remplacer la structure d'anneau absente sur $K^{\cdot}(X/S)$.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Deligne, P., papiers secrets.

[2] Grauert, H., Ein Theorem der Analytischen Garbentheorie ..., Pub. Math. IHES, n°5 (1960).

[3] Grothendieck, A., Théorèmes de finitude pour la cohomologie des faisceaux, Bull. Soc. Math. France, 84, 1956, p.1-7.

[V] Verdier, J.-L., Catégories dérivées, IHES(1964), miméographié.

Exposé V

GENERALITES SUR LES λ-ANNEAUX

par P. BERTHELOT

La théorie des λ-anneaux est utile chaque fois que l'on utilise des anneaux tels que l'anneau des classes de fibrés vectoriels sur un site annelé, l'anneau des représentations d'un groupe, etc..., pour lesquels les opérations de puissance extérieure définissent des applications λ^i. Nous l'utiliserons abondamment dans la suite du Séminaire, il est donc nécessaire d'en développer d'abord le formalisme général. Cet exposé est donc tout à fait indépendant du reste du séminaire et peut servir aux utilisateurs de λ-anneaux en dehors de la géométrie algébrique.

Le premier paragraphe donne essentiellement la théorie des "suites multiplicatives de polynômes" de Hirzebruch (cf. [2]) ; le point de vue fonctoriel adopté ici à l'avantage, outre sa généralité, de réduire notablement les calculs. Les paragraphes suivants montreront comment, à tout λ-anneau augmenté, on peut associer un "anneau de Chern" permettant de développer une théorie des classes de Chern. C'est cette théorie qui nous permettra d'énoncer le théorème de Riemann-Roch sous la forme générale de Exp. VIII.

1. Polynômes universels

1.1. Soit K un anneau commutatif à élément unité, fixé dans tout ce paragraphe. On désigne par $\mathcal{C}$ la catégorie des K-algèbres filtrées, commutatives à élément unité, dont la filtration est décroissante et telle que le groupe des éléments de filtration nulle soit l'algèbre entière. On définit un foncteur sur $\mathcal{C}$, à valeurs dans la catégorie des groupes

abéliens, de la façon suivante : si $A \in Ob(\mathcal{B})$, on associe à A l'ensemble des séries formelles $\psi \in A[[t]]$, vérifiant les conditions suivantes : si $\psi = a_o + a_1 t + \ldots + a_n t^n + \ldots$, alors

(1.1.1) $$a_o = 1 \; ; \forall \, i \geqslant 1, \; a_i \in Fil^i A \quad .$$

Cet ensemble sera noté $\hat{G}_K(A)$, ou $\hat{G}(A)$ si aucune confusion n'est possible ; il est clair que c'est un groupe abélien pour la multiplication des séries formelles, et qu'on définit bien ainsi un foncteur

$$\hat{G}_K : \underline{K\text{-Alg. fil.}} \longrightarrow \underline{Ab} \quad .$$

Si A est muni de la filtration grossière, $\hat{G}(A)$ est le groupe des séries formelles d'augmentation 1, qu'on notera aussi $1 + A[[t]]^+$.

Lemme 1.2. Le foncteur $\hat{G}_K$ est représentable.

Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{N}, i \geqslant 1}$, une famille d'indéterminées ; on attribue le poids i à X_i, et on filtre l'anneau $K[X_i]_{i \geqslant 1}$ par le poids par rapport aux X_i. On définit alors une bijection :

$$\hat{G}_K(A) \xrightarrow{\sim} Hom_{K\text{-Alg. fil.}}(K[X_i]_{i \geqslant 1}, \; A)$$

en associant à toute série $\psi = 1 + a_1 t + \ldots + a_n t^n + \ldots \in \hat{G}_K(A)$ l'homomorphisme f_ψ déterminé par $f_\psi(X_i) = a_i$. Cet homomorphisme est compatible aux filtrations, et on obtient ainsi un isomorphisme de foncteurs.

On pose $\Phi = 1 + X_1 t + \ldots + X_n t^n + \ldots$; pour toute K-algèbre filtrée A et toute série $\psi \in \hat{G}(A)$, il existe un homomorphisme et un seul

f_ψ de $K[X_i]_{i\geq 1}$ dans A tel que $\hat{G}(f_\psi)(\varphi) = \psi$.

1.3. On définit pour tout $A \in Ob(\mathcal{C})$ une filtration sur $\hat{G}(A)$ de la façon suivante : une série $\psi = 1 + a_1 t + \ldots$ sera dite de filtration $\geq k$ si $a_i = 0$ pour $1 \leq i < k$. On note $F^k\hat{G}(A)$ le sous-groupe ainsi obtenu ; c'est un foncteur sur $\mathcal{C}$, et nous considérerons désormais $\hat{G}$ comme foncteur à valeurs dans la catégorie Ab.fil. des groupes abéliens filtrés grâce à cette filtration(avec $F^o\hat{G} = \hat{G}$).

Soit H un foncteur sur $\mathcal{C}$ à valeurs dans Ab fil ; nous supposerons que H satisfait les deux conditions suivantes :

i) $\forall A \in Ob(\mathcal{C})$, $H(A)$ est séparé et complet.

ii) Si $A \in Ob(\mathcal{C})$ est une K-algèbre graduée, munie de la filtration associée à sa graduation, et si G est un groupe fini opérant sur A par morphismes gradués, alors $H(A^G) \simeq H(A)^G$ (l'exposant G désignant les invariants sous G)

En fait, nous n'aurons besoin de ces conditions que lorsque A est un anneau de polynômes, et G un produit fini de groupes symétriques opérant par permutation des indéterminées.

Exemples : 1) $H(A) = \hat{G}(A)$.

2) $H(A) = 1 + A[[t]]^+$; ce foncteur sera noté $\hat{G}_g$ (g, initiale de "grossière").

3) $H(A) = \hat{G}_a(A)$, où $\hat{G}_a(A)$ désigne le groupe (pour l'addition) des séries formelles telles que $a_o = 0$, $a_i \in Fil^i A$ pour $i \geq 1$, muni de la filtration analogue à celle de $\hat{G}$.

1.4. Pour tout n, nous noterons f_n l'endomorphisme de $K[X_1,\ldots,X_n]$

défini par $f_n(X_i) = X_i$ si $i < n$, $f_n(X_n) = 0$. Il se factorise par l'inclusion de $K[X_1,\dots,X_{n-1}]$ dans $K[X_1,\dots,X_n]$, ce qui montre que l'homomorphisme de $H(K[X_1,\dots,X_{n-1}])$ dans $H(K[X_1,\dots,X_n])$ est injectif, et nous permettra d'identifier le permier à un sous-groupe du second, et de même nous considérerons $H(K[X_1,\dots,X_n])$ comme contenu dans $H(K[X_i]_{i\geqslant 1})$.

On notera que f_1 n'est autre que l'augmentation de $K[X]$.

1.5. On plonge $K[X_1,\dots,X_n]$ dans $K[T_1,\dots,T_n]$ en envoyant X_i sur la i-ème fonction symétrique des T_j ; en faisant opérer le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$ par permutation des T_j, et en utilisant le théorème des polynômes symétriques et (1.3.ii)), on voit que l'homomorphisme de $H(K[X_1,\dots,X_n])$ dans $H(K[T_1,\dots,T_n])$ qu'on en déduit est injectif, ce qui nous permettra encore d'identifier le premier à un sous-groupe du second :

$$H(K[X_1,\dots,X_n]) \simeq H(K[T_1,\dots,T_n]^{\mathfrak{S}_n}) \simeq H(K[T_1,\dots,T_n])^{\mathfrak{S}_n} \subset H(K[T_1,\dots,T_n])$$

On note

$$u_i^n : K[X] \longrightarrow K[T_1,\dots,T_n]$$

l'homomorphisme défini par $u_i^n(X) = T_i$, et on pose

$$u_H^n = \sum_{i=1}^{n} H(u_i^n) : H(K[X]) \longrightarrow H(K[T_1,\dots,T_n]) \quad .$$

Le groupe symétrique permute les morphismes $H(u_i^n)$, et laisse donc invariant le morphisme u_H^n, qui par suite prend ses valeurs dans

$H(K[X_1,\dots,X_n])$ d'après (1.3.ii)).

Remarquons enfin que si $H = \hat{G}$, $u_H^n(1+Xt) = \prod_{i=1}^{n} (1+T_i t)$ $= 1 + X_1 t + \dots + X_n t^n$.

Théorème 1.6. *L'application de* $\mathrm{Hom}_{Ab\ fil}(\hat{G}_K, H)$ *dans* $H(K[X])$ *qui, à un morphisme de foncteurs, associe sa valeur sur l'élément* $1+Xt$ *de* $\hat{G}_K(K[X])$, *est injective ; son image est le sous groupe de* $H(K[X])$ *formé des éléments* θ *tels que (avec les notations de* 1.4. *pour les* f_n) :

i) $H(f_1)(\theta) = 0$.

ii) $\forall\ n \geq 1$, $H(f_n)(u_H^n(\theta)) \equiv u_H^n(\theta) \mod F^n H(K[X_1,\dots,X_n])$.

Montrons d'abord l'injectivité. D'après le lemme 1.2, il suffit de voir qu'un morphisme de foncteurs Φ nul sur $1+Xt$ est nul sur $\varphi = 1+X_1 t + \dots + X_n t^n + \dots$. Le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \hat{G}(K[X]) & \xrightarrow{u_{\hat{G}}^n} & \hat{G}(K[X_1,\dots,X_n]) \\ \Phi \downarrow & & \downarrow \Phi \\ H(K[X]) & \xrightarrow{u_H^n} & H(K[X_1,\dots,X_n]) \end{array} \qquad (1.6.1)$$

montre que pour tout n, $\Phi(1+X_1 t+\dots+X_n t^n) = 0$.

Or $\varphi \equiv 1+X_1 t+\dots+X_n t^n \mod F^{n+1}\hat{G}$; donc $\Phi(\varphi) \equiv \Phi(1+\dots+X_n t^n)$ $\mod F^{n+1}H$, et par suite $\Phi(\varphi) \equiv 0 \mod F^{n+1}H$, pour tout n ; comme $H(K[X_i]_{i\geq 1})$ est séparé et complet, $\Phi(\varphi) = 0$.

Soit maintenant Φ un élément quelconque de $\mathrm{Hom}(\hat{G},H)$, et soit

$\theta = \xi(1+Xt)$; montrons que θ vérifie les conditions i) et ii).

i) : $H(f_1)(\theta) = H(f_1) \circ \xi(1+Xt) = \xi \circ \hat{G}(f_1)(1+Xt) = \xi(1) = 0$.

ii) : $u_H^n(\theta) = \xi(1+\ldots+X_n t^n)$ d'après (1.6.1) ; or $1+\ldots+X_n t^n \equiv 1+\ldots+X_{n-1} t^{n-1}$ mod. $\mathbf{F}^n\hat{G}$, et $1+\ldots+X_{n-1} t^{n-1} = \hat{G}(f_n)(1+\ldots+X_n t^n)$. Comme $\Phi \circ \hat{G}(f_n) = H(f_n) \circ \Phi$, et que Φ est un morphisme de foncteurs filtrés, on obtient ii).

Il faut enfin montrer que si $\theta \in H(K[X])$ vérifie i) et ii), il existe $\xi \in \mathrm{Hom}(\hat{G}, H)$ tel que $\theta = \xi(1+Xt)$.

On détermine d'abord la valeur de Φ pour l'élément $1+\ldots+X_n t^n$ de $\hat{G}(K[X_1,\ldots,X_n])$ grâce à (1.6.1) ; on a donc par définition : $\Phi(1+\ldots+X_n t^n) = \sum_{i=1}^{n} \Phi(1+T_i t)$, les $\xi(1+T_i t)$ étant connus par fonctorialité au moyen des morphismes u_i^n.

On recolle ensuite les $\xi(1+\ldots+X_n t^n)$ pour n variable grâce au diagramme commutatif :

$$
\begin{array}{ccc}
K[X_1,\ldots,X_n] & \xrightarrow{f_n} & K[X_1,\ldots,X_n] \\
\downarrow{\scriptstyle \sigma_n} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma'_n} \\
K[T_1,\ldots,T_n] & \xrightarrow{f'_n} & K[T_1,\ldots,T_n]
\end{array}
\qquad (1.6.2)
$$

où f'_n est déterminé par $f'_n(T_i) = T_i$ si $i<n$, $f'_n(T_n) = 0$, où σ_n envoie X_i sur la i-ième fonction symétrique des T_j, et σ'_n envoie X_i sur la i-ième fonction symétrique de $T_1,\ldots,T_{n-1}$ pour $i<n$, et X_n sur 0.

En effet, on en déduit :

$$
\begin{aligned}
H(f_n)(\xi(1+\ldots+X_n t^n)) &= H(f'_n)\Big(\sum_{i=1}^{n} \xi(1+T_i t)\Big) = \sum_{i=1}^{n-1} \Phi(1+T_i t) \quad \text{(par 1.6.i))} \\
&= \Phi(1+\ldots+X_{n-1} t^{n-1})
\end{aligned}
$$

(en se plaçant dans $H(K[T_1,\dots,T_{n-1}])$ grâce aux identifications 1.4).

Compte tenu de 1.6.ii), $\Phi(1+\dots+X_n t^n) \equiv \Phi(1+\dots+X_{n-1}t^{n-1})$ mod. $F^n H(K[X_i]_{i\geqslant 1})$, et les $\Phi(1+\dots+X_n t^n)$ définissent un élément ψ de $H(K[X_i]_{i\geqslant 1})$ puisque c'est un groupe séparé complet ; on posera donc $\Phi(\varphi) = \psi$.

Soient enfin $A \in Ob(\mathcal{C})$, et $\chi \in \hat{G}(A)$; on pose $\Phi(\chi) = H(f_\chi)(\psi)$, f_χ étant l'homomorphisme de $K[X_i]_{i\geqslant 1}$ dans A défini en 1.2. Comme on a déjà défini Φ sur les éléments $1+\dots+X_n t^n = \varphi_n$, il faut vérifier que les deux définitions donnent la même chose, c'est à dire que :

$$H(f_{\varphi_n})(\psi) = \Phi(1+\dots+X_n t^n) \quad .$$

Or pour tout p, on a : $\psi \equiv \Phi(1+\dots+X_p t^p)$ mod. $F^{p+1}H(K[X_i]_{i\geqslant 1})$.

D'où pour tout $p\geqslant n$; $H(f_{\varphi_n})(\psi) \equiv H(f_{\varphi_n})(\Phi(1+\dots+X_p t^p))$ mod. $F^{p+1}H(K[X_i]_{i\geqslant 1})$.

Utilisant les identifications de 1.4 et le recollement des $\Phi(\varphi_m)$ pour m variable, on obtient : $H(f_{\varphi_n})(\Phi(\varphi_p)) = \Phi(\varphi_n)$. On a donc finalement :

$\forall\, p\geqslant n$, $H(f_{\varphi_n})(\psi) \equiv \Phi(1+\dots+X_n t^n)$ mod. $F^p H(K[X_i]_{i\geqslant 1})$.

Comme H est séparé, on en déduit l'égalité cherchée.

On a donc défini ainsi un système d'application $\Phi_A : \hat{G}(A) \to H(A)$; pour vérifier qu'elles constituent un morphisme de foncteurs (à valeurs dans Ens), il faut montrer que pour tout morphisme $h:A \to A'$, le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} \hat{G}(A) & \xrightarrow{\hat{G}(h)} & \hat{G}(A') \\ \downarrow{\scriptstyle \Phi_A} & & \downarrow{\scriptstyle \Phi_{A'}} \\ H(A) & \xrightarrow{H(h)} & H(A') \end{array}$$

est commutatif. Soit $\chi \in \hat{G}(A)$; alors : $hof_\chi = f_{\hat{G}(h)(\chi)}$; d'où :

$H(h)(\Phi_A(\chi)) = H(h)oH(f_\chi(\psi)) = H(f_{\hat{G}(h)(\chi)})(\psi) = \Phi_{A'}(\hat{G}(h)(\chi))$.

Il reste donc à montrer que le morphisme de foncteurs ainsi construit est compatible aux structures de groupes filtrés.

Supposons que $\chi \in F^n\hat{G}(A)$. Dire que χ est de filtration $\geqslant n$ équivaut à dire que $f_\chi : K[X_i]_{i\geqslant 1} \to A$, se factorise par l'endomorphisme g_n de $K[X_i]_{i\geqslant 1}$ défini par : $g_n(X_i) = 0$ si $1 \leqslant i \leqslant n-1$, et $g_n(X_i) = X_i$ si $i \geqslant n$. Pour montrer que Φ est compatible aux filtrations, il suffit donc de montrer que $H(g_n)(\Phi(\varphi)) \in F^nH$. Or par construction :

$$\Phi(\varphi) \equiv \Phi(1+\ldots+X_{n-1}t^{n-1}) \quad \text{mod. } F^nH, \text{ d'où :}$$

$$H(g_n)(\Phi(\varphi)) \equiv H(g_n)(\Phi(1+\ldots+X_{n-1}t^{n-1})) = 0 \quad \text{mod. } F^nH.$$

Pour vérifier l'additivité de Φ, il suffit de le faire pour les éléments de degré fini de $\hat{G}(A)$, et de passer ensuite à la limite. Soient donc χ_1, χ_2 deux éléments de degré n de $\hat{G}(A)$, et χ leur produit. On considère le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} K[X_1,\ldots,X_{2n}] & \xrightarrow{\quad f_\chi \quad} & A \\ \downarrow & \nearrow_{f'_\chi} & \\ (K[T_1,\ldots,T_{2n}])^{\mathfrak{S}_n \times \mathfrak{S}_n} & & \end{array},$$

où les flèches sont définies comme suit : $\mathfrak{S}_n \times \mathfrak{S}_n$ opère sur $K[T_1,\ldots,T_{2n}]$

de façon que le premier facteur permute $T_1,\dots,T_n$ et le second $T_{n+1},\dots,T_{2n}$; $K[X_1,\dots,X_{2n}]$ est plongé dans l'anneau des invariants en envoyant X_j sur le j-ième fonction symétrique des T_i ; f' envoie la i-ième fonction symétrique de $T_1,\dots,T_n$ (resp. $T_{n+1},\dots,T_{2n}$) sur le i-ième coefficient de χ_1 (resp. χ_2). Alors :

$$\Phi(\chi) = H(f_\chi)(\Phi(\prod_{i=1}^{2n}(1+T_i t))) = H(f'_\chi)(\Phi(\prod_{i=1}^{2n}(1+T_i t))) ;$$

$$\Phi(\chi_1) = H(f'_\chi)(\Phi(\prod_{i=1}^{n}(1+T_i t))) \text{ (resp. } \chi_2,\ i=n+1,\dots,2n) \ .$$

Comme $H(f'_\chi)$ est un homomorphisme de groupes, on est ramené au cas où $\chi = \prod_{i=1}^{2n}(1+T_i t)$, et dans ce cas l'additivité de Φ résulte de la définition des $\Phi(1+X_1 t+\dots+X_k t^k)$.

1.7. On peut généraliser les considérations précédentes au cas d'un produit de foncteurs $\hat{G}$; le foncteur $(\hat{G})^k$ est représentable par l'anneau $K[(X_i^{(j)})]$, j=1,...,k, et $i\geqslant 1$, où $X_i^{(j)}$ est de poids i. On notera $\varphi^{(j)}$ la série $1 + X_1^{(j)} t + \dots + X_n^{(j)} t^n + \dots$; l'élément $(\varphi^{(j)})_j$ de $(\hat{G}(K[(X_i^{(j)})]))^k$ possède la propriété universelle analogue à celle de φ (cf. 1.2).

On peut introduire les morphismes $f_n^{(j)}$, $u_H^{n,(j)}$ comme précédemment en refaisant la construction pour chaque famille $(X_i^{(j)})_{i\geqslant 1}$ séparément. On obtient un résultat analogue au théorème 1.6 en cherchant les homomorphismes de foncteurs de $(\hat{G})^k$ dans H, $\mathbb{Z}$-multilinéaires et compatibles aux filtrations par rapport à chacun des k arguments séparément : ils sont déterminés par leur valeur pour l'élément

$(1+X^{(j)}t)_{j=1,..,k}$ de $(\hat{G}(K[(X^{(j)})_j]))^k$; un élément θ de $H(K[(X^{(j)})_j])$ détermine un morphisme de foncteurs si, et seulement si, il vérifie :

i) $\forall j,\ H(f_1^{(j)})(\theta) = 0$

ii) $\forall n,j,\ H(f_n^{(j)})(u_H^{n,(j)}(\theta)) \equiv u_H^{n,(j)}(\theta) \mod F^n H$.

Le lecteur se convaincra aisément qu'à des complications de notation près, il suffit de recopier la démonstration de 1.6.

1.8. On notera $\mathcal{C}_o$ la catégorie des K-algèbres, et

$$i : \mathcal{C}_o \longrightarrow \mathcal{C} \ ,$$

le foncteur qui à une K-algèbre A associe la K-algèbre A munie de la filtration grossière ; on notera

$$g : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}_o \ ,$$

le foncteur "oubli de la filtration". Ces foncteurs vérifient les relations suivantes :

$$g\circ i = Id_{\mathcal{C}_o} \ ; \ \hat{G}\circ i\circ g = \hat{G}_g \ ; \ \hat{G}_g\circ i\circ g = \hat{G}_g \text{ (cf. 1.3, ex.2)}$$

Lemme 1.9. Soit $H : \mathcal{C}_o \longrightarrow$ Ab fil un foncteur sur $\mathcal{C}_o$; alors l'homomorphisme canonique :

$$\mathrm{Hom}_{\text{Ab fil}}(\hat{G}, H\circ g) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\text{Ab fil}}(\hat{G}\circ i, H)$$

est un isomorphisme.

Pour le voir qu'il est injectif, on utilise la suite d'homomorphismes canoniques :

$$\mathrm{Hom}(\hat{G}, H\circ g) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\hat{G}\circ i, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\hat{G}_g, H\circ g) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\hat{G}, H\circ g) \quad ,$$

la dernière flèche venant de ce que $\hat{G}$ est un sous-foncteur de $\hat{G}_g$. Pour vérifier que l'homomorphisme composé est l'identité, on remarque qu'un morphisme de foncteurs : $\hat{G} \longrightarrow H\circ g$ est déterminé par sa valeur pour les objets de $\mathcal{C}$ dont la filtration est grossière ; en effet, soit $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, et A_g l'algèbre A munie de la filtration grossière ; le morphisme canonique $A \longrightarrow A_g$ définit un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \hat{G}(A) & \xrightarrow{\Phi_A} & H\circ g(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \hat{G}(A_g) & \xrightarrow{\Phi_{A_g}} & H\circ g(A_g) \end{array} \quad ,$$

montrant que Φ_A est la restriction de Φ_{A_g} à $\hat{G}(A)$.

On considère ensuite l'homomorphisme composé :

$$\mathrm{Hom}(\hat{G}\circ i, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\hat{G}_g, H\circ g) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\hat{G}, H\circ g) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\hat{G}\circ i, H) \quad ,$$

et il est clair que c'est l'identité, d'où le résultat annoncé.

Théorème 1.10. Soit H un foncteur sur la catégorie $\mathcal{C}_o$ des K-algèbres, à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens filtrés séparés complets, et commutant aux invariants sous un groupe fini. Alors l'application de $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Ab\ fil}}(\hat{G}\circ i, H)$ dans $H(K[X])$ qui, à un morphisme de foncteurs, associe

sa valeur sur l'élément $1+Xt$ de $\hat{G}\circ i(K[X])$, est injective ; son image est le sous-groupe de $H(K[X])$ formé des éléments θ tels que (avec des notations analogues à celles de 1.4 et 1.5) :

i) $H(f_1)(\theta) = 0$;

ii) $\forall n \geqslant 1$, $H(f_n)(u_H^n(\theta)) \equiv u_H^n(\theta) \mod. F^n H(K[X_1,\ldots,X_n])$.

Le théorème résulte immédiatement du théorème 1.6 et du lemme 1.9, compte tenu de ce que $H\circ g(K[X])$ ne dépend pas de la filtration choisie sur $K[X]$.

Le théorème analogue obtenu en remplaçant $\hat{G}$ par $(\hat{G})^k$ est également vrai (cf. 1.7)

Quand il n'y aura pas de risque de confusion, nous noterons le foncteur $\hat{G}\circ i$ par $\hat{G}$, ce qui est légitime, car i identifie $\mathscr{C}_o$ à une sous-catégorie de $\mathscr{C}$.

1.11. On notera $\mathscr{C}_f$ la catégorie des K-algèbres graduées, et j le foncteur de $\mathscr{C}_f$ dans $\mathscr{C}$ qui à une K-algèbre graduée B associe la K-algèbre B munie de la filtration canoniquement définie par sa graduation ; le foncteur "gradué associé" : $\mathscr{C} \longrightarrow \mathscr{C}_f$, sera noté Gr. Il existe un isomorphisme de foncteurs $\epsilon : Id_{\mathscr{C}_f} \xrightarrow{\sim} Gr\circ j$.

Soit $B \in Ob(\mathscr{C}_f)$; on notera $1+\hat{B}^+$ le groupe multiplicatif des éléments de $\prod_{i=0}^{\infty} B^i$ d'augmentation 1. En le munissant de la filtration analogue à celle de $\hat{G}$, on définit ainsi un foncteur : $\mathscr{C}_f \longrightarrow$ Ab fil.

Par ailleurs, on définit pour tout $A \in Ob(\mathscr{C})$ un homomorphisme de groupes filtrés : $\hat{G}(A) \to 1+\widehat{GrA}^+$, en associant à la série $1+\ldots+a_n t^n+\ldots$,

la série $1+\ldots+\bar{a}_n+\ldots$, où $\bar{a}_n$ est la classe de a_n dans $Gr^n A$. Son noyau est le groupe $\hat{G}'(A)$ des séries formelles telles que :

$$a_o = 1 \quad ; \forall\, i \geqslant 1, \quad a_i \in Fil^{i+1} A \ ;$$

on a donc un isomorphisme, fonctoriel en A :

$$\hat{G}(A)/\hat{G}'(A) \xrightarrow{\sim} 1+\widehat{GrA}^+ \quad .$$

Lemme 1.12. Soit $H : \mathcal{C} \to$ Ab fil un foncteur sur $\mathcal{C}$; alors l'homomorphisme canonique :

$$\rho : \mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Ab\ fil}}}(1+\hat{.}^+, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Ab\ fil}}}(\hat{G}, H\circ Gr) \quad ,$$

est un isomorphisme.

L'homomorphisme ρ est défini comme étant le composé :

$$\mathrm{Hom}(1+\hat{.}^+, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}(1+\widehat{Gr.}^+, H\circ Gr) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\hat{G}, H\circ Gr) \quad ,$$

la dernière flèche étant définie par l'homomorphisme $\hat{G} \to 1+\widehat{Gr.}^+$

On va construire un morphisme en sens inverse :

$$\rho' : \mathrm{Hom}(\hat{G}, H\circ Gr) \longrightarrow \mathrm{Hom}(1+\hat{.}^+, H) \quad .$$

Pour cela, on va montrer que tout morphisme de foncteurs de $\hat{G}$ dans $H\circ Gr$ se factorise par le morphisme canonique $\hat{G} \longrightarrow 1+\widehat{Gr.}^+$, ce qui équivaut à montrer qu'il s'annule sur $\hat{G}'$ d'après 1.11.

Soient $A \in Ob(\mathcal{C})$, $\chi \in \hat{G}'(A)$; on définit un homomorphisme de

K-algèbres filtrées $K[X_i]_{i\geqslant 1} \longrightarrow A$ en envoyant X_1 sur 0 et X_i sur le (i-1)-ième coefficient de χ pour $i > 1$; utilisant cet homomorphisme, on voit qu'il suffit de vérifier que le morphisme de foncteurs considéré s'annule pour l'élément $1+X_2t+\ldots+X_{n+1}t^n+\ldots$. On utilise alors l'endomorphisme f de $K[X_i]_{i\geqslant 1}$ défini par $f(X_i) = X_{i+1}$ pour tout i, et le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \hat{G}(K[(X_i)]) & \longrightarrow & H\circ Gr(K[(X_i)]) \\ \downarrow \hat{G}(f) & & \downarrow H(Gr(f)) \\ \hat{G}(K[(X_i)]) & \longrightarrow & H\circ Gr(K[(X_i)]) \end{array} \quad ;$$

or $Gr(f) = Gr(f_1)$, f_1 étant l'homomorphisme d'augmentation de $K[X_i]_{i\geqslant 1}$; comme ce dernier annule ω, il résulte du diagramme analogue écrit pour f_1 que $H(Gr(f))$ annule l'image de ω dans $H\circ Gr(K[X_i]_{i\geqslant 1})$, d'où le résultat.

Par passage au quotient, on associe donc à tout morphisme de foncteurs : $\hat{G} \to H\circ Gr$, un morphisme de foncteurs : $1+\widehat{Gr}.^+ \longrightarrow H\circ Gr$; par composition avec j, et en utilisant l'isomorphisme ε, on obtient un morphisme : $1+\hat{.}^+ \longrightarrow H$, ce qui définit l'homomorphisme ρ' cherché. Il est immédiat de vérifier que ρ et ρ' sont inverses l'un de l'autre.

Théorème 1.13. Soit H un foncteur sur $\mathcal{C}$, à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens filtrés séparés complets, et commutant aux invariants sous un groupe fini. Alors l'application de $\mathrm{Hom}_{\underline{\mathrm{Ab\ fil}}}(1+\hat{.}^+, H)$ dans $H(K[X])$ qui, à un morphisme de foncteurs, associe sa valeur sur l'élément

$1+X$ de $1+\widehat{K[X]}^+$ est injective ; son image est le sous-groupe de $H(K[X])$ formé des éléments θ tels que (notations de 1.4,1.5) :

i) $H(f_1)(\theta) = 0$;

ii) $\forall n \geqslant 1$, $H(f_n)(u_H^n(\theta)) \equiv u_H^n(\theta) \mod F^n H(K[X_1,\dots X_n])$.

Immédiat à partir de 1.6 et 1.12.

On a un énoncé analogue en remplaçant $\hat{G}$ par $(\hat{G})^k$.

Remarque 1.14. Si H est un foncteur sur $\mathcal{C}_\partial$, à valeurs dans la catégorie des groupes abéliens, commutant aux invariants sous un groupe fini, et satisfaisant la condition :

$\forall B \in Ob(\mathcal{C}_\partial)$, $H(B) \simeq \varprojlim_n H(B/B^{\geqslant n})$ (où $B^{\geqslant n} = \prod_{i \geqslant n} B^i$) ,

alors la condition ii) de 1.13 est toujours vérifiée si l'on prend comme filtration sur H la filtration par les noyaux des $H(B) \to H(B/B^{\geqslant n})$ (qui est séparée et complète). Soit en effet p_n l'homomorphisme canonique

$$K[X_1,\dots,X_n] \longrightarrow K[X_1,\dots,X_n]/K[X_1,\dots,X_n]^{\geqslant n} \quad ;$$

on a : $p_n \circ f_n = p_n$, d'où : $H(p_n)\,[H(f_n)\circ u_H^n(\theta) - u_H^n(\theta)] = 0$, c'est-à-dire :

$H(f_n)\circ u_H^n(\theta) - u_H^n(\theta) \in F^n H(K[X_1,\dots,X_n])$.

Pour se donner un morphisme de foncteurs de $1+\hat{.}^+$ dans H, il suffit donc de se donner un élément de $H(K[X])$ satisfaisant la seule condition i) de 1.13.

1.15. Soit $H : \mathcal{C} \to$ Ab fil (resp. $\mathcal{C}_o \to$ Ab fil, $\mathcal{C}_\partial \to$ Ab fil) un foncteur satisfaisant les conditions de 1.3 (resp. 1.10, 1.13), et soit $\theta : (\hat{G})^k \to H$ (resp. $(\hat{G}_o i)^k \to H$, $(1+\hat{.}^+)^k \to H$) un morphisme de foncteurs. Nous avons vu

(1.7) que Φ est déterminé par sa valeur sur l'élément $(\varphi^{(j)})_{j=1..k}$ de $(\hat{G}(K[X_i^{(j)}]_{\substack{i\geq 1\\ j=1..k}}))^k$ (resp....). Supposons que H soit un foncteur tel que $\hat{G}$, $\hat{G}_{\mathcal{L}}$, $\hat{G}_a$, $\widehat{1+Gr.}^+$, etc.. ; l'élément $\Phi((\varphi^{(j)})_j)$ est une série formelle à coefficients dans $K[X_i^{(j)}]_{i\geq 1, j=1..k}$; le n-ième coefficient de cette série sera appelé <u>n-ième polynôme universel de</u> Φ ; la connaissance de ces polynômes équivaut donc à la connaissance de Φ. D'après la démonstration de 1.6, ces polynômes sont eux-mêmes déterminés par l'élément $\Phi(1+X^{(1)}t,\ldots,1+X^{(k)}t)$, le calcul s'effectuant selon la méthode de la démonstration : on calcule les éléments $\Phi(1+X_1^{(1)}t+\ldots+X_n^{(1)}t^n,\ldots,1+X_1^{(k)}t+\ldots+X_n^{(k)}t^n)$, en décomposant $1+X_1^{(i)}t+\ldots+X_n^{(i)}t^n$ en $\prod_{j=1}^{n}(1+T_j^{(i)}t)$ et en utilisant l'additivité de Φ ; les polynômes ainsi obtenus sont symétriques par rapport aux $T_j^{(i)}$ (i fixe et j variable) et s'expriment en fonction des $X_j^{(i)}$; en recollant grâce à la filtration de H, on détermine ainsi les polynômes universels de Φ. Si $(\psi^{(1)},\ldots,\psi^{(k)}) \in (\hat{G}(A))^k$, le calcul de $\Phi(\psi^{(1)},\ldots,\psi^{(k)})$ se fait en substituant les coefficients $a_j^{(i)}$ des $\psi^{(i)}$ aux $X_j^{(i)}$ dans les polynômes universels.

Supposons qu'il existe un entier m tel que le coefficient de t^n dans $\theta = \Phi(1+X^{(1)}t,\ldots,1+X^{(k)}t)$ soit un polynôme dont les composantes isobares ont un poids variant entre n et mn ; alors le k-ième polynôme universel de Φ a des composantes isobares dont le poids varie entre k et km : ceci résulte immédiatement du mode de calcul exposé plus haut, et du théorème des fonctions symétriques.

Supposons en particulier que $H = \hat{G}$; alors le n-ième polynôme universel de Φ n'a pas de composantes de poids $< n$. Considérons maintement le morphisme canonique : $H \longrightarrow 1+\widehat{Gr.}^+$; par composition avec Φ , on obtient un morphisme : $(\hat{G})^k \longrightarrow 1+\widehat{Gr.}^+$, qui d'après la démonstration de 1.12 se factorise par $(1+\widehat{Gr.}^+)^k$ et définit un morphisme $\tilde{\Phi} : (1+\hat{.}^+)^k \to 1+\hat{.}^+$; on voit aussitôt que le n-ième polynôme universel de $\tilde{\Phi}$ est le même que celui de $(\hat{G})^k \to 1+\widehat{Gr.}^+$, c'est-à-dire la composante isobare de poids n du n-ième polynôme universel de Φ.

Les mêmes remarques s'appliquent au cas $H = \hat{G}_a$: on peut définir un morphisme de foncteurs $H \to \widehat{Gr.}^+$ (avec $\widehat{Gr.}^+ = \hat{.}^+ \circ Gr$, $\hat{.}^+$ étant le foncteur défini sur $\mathcal{C}_1$ par $\hat{B}^+ = \prod_{i \geqslant 1} B^i$) de façon analogue à 1.11 ; on recopie alors raisonnement et conclusions de l'alinéa précédent.

1.16. Terminons sur un exemple. On suppose que $K = \mathbb{Q}$. On définit un endomorphisme du foncteur $1+\hat{.}^+$, noté Todd, et appelé caractère de Todd, en posant :

$$\mathrm{Todd}(1+X) = \frac{X}{1 - e^{-X}} .$$

Les conditions i) et ii) du théorème 1.13 se vérifient immédiatement, ce qui montre que nous avons bien défini ainsi un endomorphisme de $1+\hat{.}^+$.

2. Définition des λ-anneaux ; exemples

Dans ce paragraphe, l'anneau de base du paragraphe 1 sera $\mathbb{Z}$ (sauf en 2.9) ; on se place sur la catégorie $\mathcal{C}_o$ (1.8) et on note $\hat{G}$ la restriction de $\hat{G}$ à $\mathcal{C}_o$ (1.10).

Définition 2.1. : On appelle pré-λ-anneau un anneau K, commutatif à élément unité, muni d'un homomorphisme de groupes abéliens :

$$\lambda_t : K \to 1 + K[[t]]^+ ,$$

tel que pour tout $x \in K$, $\lambda_t(x) = 1 + xt + \ldots$

On posera $\lambda_t(x) = \sum_{i \geq 0}^{\infty} \lambda^i(x) t^i$; la donnée d'une structure de pré-λ-anneau sur un anneau K équivaut donc à la donnée d'une famille d'applications λ^i, $i \in \mathbb{N}$, de K dans K, telles que :

i) $\forall x \in K$, $\lambda^0(x) = 1$,

ii) $\forall x \in K$, $\lambda^1(x) = x$,

iii) $\forall x, y \in K, \forall n \in \mathbb{N}$, $\lambda^n(x+y) = \sum_{p+q=n} \lambda^p(x).\lambda^q(y)$.

Soient K, K' deux pré-λ-anneaux, et $f : K \to K'$, un homomorphisme d'anneaux ; on dira que f est un homomorphisme de pré-λ-anneaux, ou encore un λ-homomorphisme, si le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\lambda_t} & 1 + K[[t]]^+ \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle \hat{G}(f)} \\ K' & \xrightarrow{\lambda_t} & 1 + K'[[t]]^+ \end{array} ,$$

est commutatif.

Ceci équivaut encore aux relations suivantes :

$\forall x \in K, \forall i \in \mathbb{N}$, $\lambda^i(f(x)) = f(\lambda^i(x))$.

Exemples 2.2. : a) On peut donner toutes les structures de pré-λ-anneau de $\mathbb{Z}$. Il suffit pour cela de se donner $\lambda_t(1)$, qui sera donc une série formelle à coefficients entiers, soumise à la seule condition de commencer par $1 + t$.

b) Soit $(T,\underline{A})$ un topos commutativement annelé, et soit K le "groupe de Grothendieck" des $\underline{A}$-Modules localement isomorphes à un facteur direct d'un $\underline{A}$-Module libre de type fini; on sait que K peut être muni d'une structure d'anneau grâce au produit tensoriel (Exp. IV), et nous allons le munir d'une structure de pré-λ-anneau de la façon suivante: pour tout A-Module $\underline{E}$, localement facteur direct d'un Module libre de type fini, on désigne par $\lambda^i(E)$ la classe dans K de la i-ième puissance extérieure de $\underline{E}$ (qui est également localement facteur direct d'un Module libre de type fini); ceci définit une fonction sur la catégorie des $\underline{A}$-Modules localement facteurs directs d'un libre de type fini, à valeurs dans le groupe abélien $1+K[[t]]^+$; il faut alors montrer que cette fonction est additive, ce qui entrainera qu'elle se factorise par le K, d'où la structure cherchée.

Lemme 2.2.1. Soit $0 \to \underline{E}' \xrightarrow{u} \underline{E} \xrightarrow{v} \underline{E}'' \to 0$ une suite exacte de $\underline{A}$-Modules qui est localement scindée (par exemple telle que E" soit localement facteur direct d'un Module libre de type fini). Il existe sur $\wedge^n(\underline{E})$ une filtration finie, et des isomorphismes :

$$\wedge^{n-p}(\underline{E}') \otimes_A \wedge^p(\underline{E}'') \xrightarrow{\sim} Gr^p \wedge^n(\underline{E}) \quad .$$

On prend pour $F^p\wedge^n(\underline{E})$ l'image du morphisme canonique :

$$\wedge^{n-p}(\underline{E}') \otimes_A \wedge^p(\underline{E}) \to \wedge^n(\underline{E}) \quad \text{pour } 0 \leqslant p \leqslant n \ ; \ \text{si } p \geqslant n \ ,$$

$F^p\wedge^n(\underline{E}) = \wedge^n(\underline{E})$, et si $p < 0$, $F^p\wedge^n(\underline{E}) = 0$. Ceci définit bien une filtration finie sur $\wedge^n(\underline{E})$.

On définit un homomorphisme :

$$f_p : \wedge^{n-p}(\underline{E}')\otimes_A\wedge^p(\underline{E}'') \longrightarrow F^p\wedge^n(\underline{E})/F^{p-1}\wedge^n(\underline{E})$$

en posant $f_p(x'_1\wedge\cdots\wedge x'_{n-p}\otimes x''_1\wedge\cdots\wedge x''_p) = cl_{Gr^p}(u(x'_1)\wedge\cdots\wedge u(x'_{n-p})\wedge x_1\wedge\cdots\wedge x_p)$ qui ne dépend visiblement pas du choix des x_i relevant les sections données x''_i de $\underline{E}''$. Si la suite exacte est localement scindée, f_p est un isomorphisme, car localement $\wedge^n(\underline{E})\simeq \bigoplus_{p+q=n} \wedge^p(\underline{E}')\otimes_A\wedge^q(\underline{E}'')$.

Dans le cas ou $\underline{E}'$, $\underline{E}$, $\underline{E}''$ sont localement facteurs directs de Modules libres de type fini, les $Gr^p\wedge^n(\underline{E})$ sont localement facteurs directs de libres de type fini, donc les $F^p\wedge^n(\underline{E})$ également ; on peut donc écrire dans K : $\lambda^n(E) = \sum_{p=o}^{n} cl(Gr^p\wedge^n(\underline{E})) = \sum_{p=o}^{n} \lambda^{n-p}(E').\lambda^p(E'')$, d'où l'additivité.

Soient $(T,\underline{A})$, $(T',\underline{A}')$ deux topos commutativement annelés, et $f : (T,\underline{A}) \to (T',\underline{A}')$ un morphisme de topos annelés. On sait (Exp.IV, 2.7) que f définit un morphisme d'anneau sur les K correspondants, soit $f^* : K'_{naïf}(T',\underline{A}') \longrightarrow K'_{naïf}(T,\underline{A})$. Comme l'image inverse commute aux puissances extérieures, le morphisme f^* correspondant sur les K est un λ-homomorphisme pour la structure qui vient d'être définie.

Signalons deux cas particuliers :

- Soit X un schéma ; $K'_{naïf}(X)$ est ainsi muni d'une structure de pré-λ-anneau ; c'est ce cas qui servira dans la suite du séminaire, et il peut être considéré comme "modèle" pour la théorie générale des

λ-anneaux.

- Soit A un anneau, X = Spec A ; soit d'autre part G un groupe, opérant trivialement sur A ; si on prend pour (T,A) le topos des faisceaux d'ensembles sur X, sur lesquels G opère, l'anneau K ainsi obtenu est l'anneau des représentations de G dans les A-modules projectifs de type fini.

2.3. Soit K un anneau commutatif à élément unité ; on se propose de munir le groupe abélien $\hat{G}(K) = 1+K[[t]]^+$ d'une structure de pré-λ-anneau, fonctorielle par rapport à K. A cet effet, nous allons appliquer les résultats de (1.10) sur le foncteur $\hat{G}$.

On définit d'abord la multiplication en se donnant un morphisme de $\mathbb{Z}$-bilinéaire de foncteurs : $\hat{G} \times \hat{G} \to \hat{G}$, par élément $1+XYt$ de $\hat{G}(\mathbb{Z}[X,Y])$; cet élément vérifie en effet 1.7.i), et pour voir qu'il vérifie 1.7.ii), il faut montrer que dans $\prod_{i=1}^{n} (1+T_i Yt)$, exprimé au moyen des fonctions symétriques élémentaires X_j des T_i, X_n ne figure pas dans les coefficients de t^k pour $k < n$, ce qui est évident pour des raisons de degré.

La loi ainsi définie sera notée par le signe ∘ ; on a donc par définition :

$$(2.3.1) \qquad (1 + Xt)\circ(1 + Yt) = 1 + XYt \quad .$$

Elle est distributive par construction, associative et commutative par les diagrammes :

$$\begin{array}{ccc} \hat{G}\times\hat{G}\times\hat{G} & \longrightarrow & \hat{G}\times\hat{G} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \hat{G}\times\hat{G} & \longrightarrow & \hat{G} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \hat{G}\times\hat{G} & \longrightarrow & \hat{G}\times\hat{G} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \hat{G} & \xrightarrow{\mathrm{Id}} & \hat{G} \end{array} ,$$

où la signification des flèches est évidente, et dont il suffit de vérifier la commutativité pour les éléments $1+Xt, 1+Yt, 1+Zt$ de $\hat{G}(\mathbb{Z}[X,Y,Z])$ (resp. $1+Xt$, $1+Xt$ de $\hat{G}(\mathbb{Z}[X,Y])$) d'après 1.10, vérification qui est immédiate.

D'après 1.8, le produit par cette loi de deux séries se calcule par substitution de leurs coefficients dans les polynômes universels de la loi. Le n-ième polynôme universel sera noté P_n ; c'est un polynôme de $\mathbb{Z}[X_i, Y_j]_{1\leqslant i,j\leqslant n}$, isobare de poids n par rapport à chacun des deux groupes de variables (voir 1.15), et symétrique par rapport à ces deux groupes. Donnons à titre d'exemple la valeur de P_2 :

$$P_2(X_1,X_2;Y_1,Y_2) = X_2Y_1^2 + Y_2X_1^2 - 2X_2Y_2 \quad .$$

On a également la relation suivante : soient $K \in Ob(\mathcal{C}_o)$, $\psi \in \hat{G}(K)$, $a \in K$, alors

$$\psi(t)\circ(1 + at) = \psi(at) \quad . \tag{2.3.2}$$

Comme d'habitude, elle se ramène par l'argument fonctoriel standard au cas $K = \mathbb{Z}[X,Y]$, $\psi = 1+Xt$, $a = Y$, où elle n'est autre que 2.3.1.

Appliquant 2.3.2 à $\hat{G}(K) = 1+K[[t]]^+$, et à $a = 1$, on voit que l'élément $1+t$ est unité pour cette multiplication. Pour éviter des confusions, nous le noterons parfois $\underline{1}$, ou encore $\underline{1}_\circ$.

Le foncteur $\hat{G}$ peut maintenant être considéré comme foncteur de $\mathcal{C}_o$ dans la catégorie des anneaux commutatifs à éléments unité, et par conséquent être composé avec lui même; pour éviter des confusions, nous

choisirons des indéterminées différentes pour chacun des facteurs du produit de $\hat{G}$ par lui-même, et nous indiquerons l'indéterminée en exposant lorsque ce sera nécessaire : $\hat{G}^t$, $\hat{G}^u$, etc. Pour $A \in Ob(\mathcal{C}_o)$, on a donc $\hat{G}^u \circ \hat{G}^t(A) = 1 + \{1+A[[t]]^+\}[[u]]^+$. Pour définir les opérations λ^i sur $1+K[[t]]^+$, nous allons donc nous donner un morphisme de foncteurs : $\hat{G} \to \hat{G}^u \circ \hat{G}^t$. Pour cela, il faut d'abord définir une filtration du foncteur $\hat{G}^u \circ \hat{G}^t$ qui permette le recollement de 1.6.

On remarque d'abord que $F^k\hat{G}$ est un idéal pour la loi $\circ$; pour cela on est ramené par fonctorialité au cas $A = \mathbb{Z}[X_i, Y]_{i \geq 1}$, et au produit $(1+\sum_{i \geq k} X_i t^i) \circ (1+Yt)$, et cela résulte de 2.3.2. On prend alors pour $F^n(\hat{G}^u \circ \hat{G}^t)$ l'ensemble des séries de la forme $1+\psi_1 u+\ldots+\psi_i u^i+\ldots$, $\psi_i \in F^{[n/i]}\hat{G}$, $[n/i]$ désignant la partie entière de n/i.

L'élément définissant le morphisme λ_u est $\underline{1} + \{1+Xt\}u$; le lecteur vérifiera à titre d'exercice que les conditions de 1.6 sont bien remplies (en fait, la filtration est choisie ad hoc).

Ici encore, les opérations λ^i se calculent par substitution à partir de $\lambda_u(1+\ldots+X_n t^n+\ldots)$, et sont donc déterminées par des polynômes universels. On notera $Q_{i,j}(X_1,\ldots,X_{ij})$ le coefficient de t^j dans $\lambda^i(1+\ldots+X_n t^n+\ldots)$; c'est un polynôme isobare de poids ij par rapport aux variables $X_1,\ldots,X_{ij}$ (vérification analogue à celle de 1.15). Il se calcule par fonctions symétriques à partir de l'élément de définition :

$$\lambda_u(1+Xt) = \underline{1} + \{1+Xt\}u. \tag{2.3.3}$$

Donnons à titre d'exemple la valeur de $Q_{2,2}$:

$$Q_{2,2}(X_1,X_2,X_3,X_4) = X_1X_3 - X_4 \quad .$$

Indiquons pour finir l'origine des formules (2.3.1) et (2.3.3). On considère l'exemple 2.2.b), où les opérations λ^i sont définies par les puissances extérieures des A-Modules. On souhaite que $\lambda_t : K \longrightarrow \hat{G}(K)$ soit un λ-homomorphisme ; on doit donc définir sur $\hat{G}$ des lois telles que pour tous A-Modules $\underline{E}$, $\underline{F}$, on ait :

$$\lambda_t(EF) = \lambda_t(E) \circ \lambda_t(F) \; ; \; \lambda_u(\lambda_t(E)) = \hat{G}^u(\lambda_t)(\lambda_u(E)) \quad ;$$

or les relations (2.3.1) et (2.3.3) sont précisément les relations précédentes appliquées au cas où $\underline{E}$ et $\underline{F}$ sont des modules inversibles.

Nous verrons dans Exp. VI dans quelle mesure la propriété souhaitée est vérifiée.

Définition 2.4. Un pré-λ-anneau K sera appelé un λ-anneau si l'homomorphisme de groupes abéliens $\lambda_t : K \to 1 + K[[t]]^+$ est un λ-homomorphisme pour la structure de pré-λ-anneau sur le deuxième membre définie en 2.3.

Cela signifie donc qu'on a les relations : $\forall x,y \in K$,

$$(2.4.1) \quad \lambda_t(1) = 1 + t \; ; \; \lambda_t(xy) = \lambda_t(x) \circ \lambda_t(y) \; ; \; \lambda_u(\lambda_t(x)) = \hat{G}(\lambda_t)(\lambda_u(x)) \quad .$$

En termes des applications λ^i, les deux dernières relations équivalent à : $x,y \in K$, $i,j \in \mathbb{N}$,

$$(2.4.2) \quad \begin{aligned} &\lambda^i(xy) = P_i(\lambda^1(x),\ldots,\lambda^i(x); \lambda^1(y),\ldots,\lambda^i(y)) \\ &\lambda^j(\lambda^i(x)) = Q_{i,j}(\lambda^1(x),\ldots,\lambda^{ij}(x)) \end{aligned}$$

On notera que nous nous écartons ici de la terminologie usuelle (cf. [1]), où on appelait λ - anneau ce que nous appelons pré-λ-anneau, et λ-anneaux "spéciaux" nos λ-anneaux ; la raison en est que seuls les λ-anneaux "spéciaux" sont utilisables en pratique.

Exemples 2.5. a) Nous avons déterminé toutes les structures de pré-λ-anneau de $\mathbb{Z}$; il résulte de 2.4.1 que seule celle qui est définie par $\lambda_t(1) = 1+t$ est susceptible d'être une structure de λ-anneau. On a alors $\lambda_t(n) = (1+t)^n$, d'où :

$$\forall\, n,n' \in \mathbb{Z}\ ,\ \lambda_t(n)\circ\lambda_t(n') = (1+t)^n\circ(1+t)^{n'} = (1+t)^{nn'} = \lambda_t(nn')\ ;$$

$$\lambda_u((1+t)^n) = (\lambda_u(1+t))^n = (\underline{1} + \{1+t\}u)^n = \hat{G}(\lambda_t)((1+u)^n) = \hat{G}(\lambda_t)(\lambda_u(n))\ .$$

Par suite c'est bien une structure de λ-anneau. Si on désigne par $\binom{X}{k}$ le polynôme à coefficients rationnels $\frac{1}{k!}X(X-1)\ldots(X-k+1)$, on a donc :

$$\lambda^i(n) = \binom{n}{i}\ . \tag{2.5.1}$$

b) Pour tout anneau K, le pré-λ-anneau $1+K[[t]]^+$ est un λ-anneau. D'abord, $\lambda_u(\underline{1}) = \lambda_u(1+t) = \underline{1} + \{1+t\}u = \underline{1} + \underline{1}.u$. On vérifie les autres relations par la commutativité des diagrammes :

$$\begin{array}{ccc} \hat{G}^t \times \hat{G}^t & \xrightarrow{\lambda_u \times \lambda_u} & (\hat{G}^u\circ\hat{G}^t) \times \hat{G}^u\circ\hat{G}^t) \\ {\scriptstyle\circ}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\circ} \\ \hat{G}^t & \xrightarrow{\lambda_u} & \hat{G}^u\circ\hat{G}^t \end{array}\ , \qquad \begin{array}{ccc} \hat{G}^t & \xrightarrow{\lambda_v} & \hat{G}^v\circ\hat{G}^t \\ {\scriptstyle\lambda_u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\hat{G}^v(\lambda_u)} \\ \hat{G}^u\circ\hat{G}^t & \xrightarrow{\lambda_v} & \hat{G}^v\circ\hat{G}^u\circ\hat{G}^t \end{array}\ ,$$

qui se vérifie d'après 1.10 sur les éléments 1+Xt, 1+Yt. Pour le premier,

$$\lambda_u(1+Xt)\circ\lambda_u(1+Yt) = (\underline{1}+\{Xt\}u)\circ(\underline{1}+\{1+Yt\}u)$$

$$= \underline{1} + \{(1+Xt)\circ(1+Yt)\}u$$

$$= \underline{1} + \{1+XYt\}u$$

$$= \lambda_u((1+Xt)\circ(1+Yt)) \quad .$$

Pour le deuxième :

$$\lambda_v(\lambda_u(1+Xt)) = \underline{1} + \{\underline{1}+\{1+Xt\}u\}v = \hat{G}^v(\lambda_u)(\lambda_v(1+Xt)) \quad .$$

c) Les exemples géométriques de 2.2 seront traités plus loin.

2.6. On peut généraliser l'exemple 2.5.a) de la façon suivante :

Soit K un anneau commutatif à élément unité, tel que :

i) K est sans torsion,

ii) $\forall x \in K, \forall n \in \mathbb{N}$, on a $\frac{x}{n} \in K$

On pose alors, pour tout $x \in K$, et tout $n \in \mathbb{N}$, $\lambda^n(x) = \binom{x}{n}$, soit :

$$(2.6.1) \qquad \lambda_t(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{x}{n} t^n = (1+t)^x = \exp(x \operatorname{Log}(1+t)) \quad ,$$

où la dernière identité est considérée dans $(K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})[[t]]$.
D'après la multiplicativité de l'exponentielle, ceci définit une structure de pré-λ-anneau sur K.

Pour voir que c'est une structure de λ-anneau, il faut prouver les relations 2.4.2, et il suffit de les prouver dans $K \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, d'après 2.6.i). On est alors ramené par fonctorialité au cas $K = \mathbb{Q}[X,Y]$, et aux éléments X,Y. Compte tenu de la définition des λ^i, les deux membres dans les

égalités 2.4.2 sont des polynômes en X,Y, à coefficients rationnels, et il suffit donc, pour montrer leur égalité, de montrer qu'ils prennent même valeur pour toutes valeurs entières de X,Y . Mais les relations obtenues par substitution de valeurs entières à X,Y sont celles qui expriment que le pré- -anneau Z (2.5.a)) est un -anneau ; elles sont donc satisfaites.

Définition 2.7. On appelle anneau binômial un anneau vérifiant les conditions 2.6.i) et ii), muni de la structure de λ-anneau définie par 2.6.1.

Exemple 2.8. Soient X un site, K un anneau binômial, $\underline{K}$ le faisceau associé au préfaisceau constant de valeur K sur X ; alors $H^0(X,\underline{K})$ est un anneau binômial.

En effet, les conditions 2.6 se conservent par passage à la limite inductive.

En particulier, $H^0(X,\underline{\mathbf{Z}})$ est un anneau binômial.

2.9. Soient K un anneau binômial, A une K-algèbre. Pour toute série $\varphi \in \hat{G}(A)$, et tout $a \in K$, on peut définir une série φ^a de la façon usuelle : on écrit $\varphi = 1 + \psi$, et on pose :

$$(2.9.1) \qquad \varphi^a = (1+\psi)^a = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} \psi^n \quad (= \exp(a\mathrm{Log}\varphi)) \quad ,$$

la dernière égalité ne pouvant être écrite que modulo torsion. Ces formules sont obtenues par substitution à partir des formules analogues pour $\varphi = 1+t$; les relations suivantes, propriétés classiques de l'exponentielle, restent donc encore vraies pour $a, b \in K$, $\varphi *_\psi \in \hat{G}(A)$:

$$(2.9.2) \qquad \varphi^a \varphi^b = \varphi^{a+b} \quad ; \quad \varphi^{ab} = (\varphi^a)^b \; ; \; \varphi^a \psi^a = (\varphi\psi)^a \quad .$$

On suppose toujours que $a \in K$. La multiplication pour la loi $\circ$ par $\lambda_t(a)$ définit un morphisme de foncteurs : $\hat{G}_K \to \hat{G}_K$, caractérisé par sa valeur pour l'élément $1+Xt$ de $\hat{G}(K[X])$. On a donc :

$\lambda_t(a)\circ(1+Xt) = \lambda_{Xt}(a)$ d'après (2.3.2), donc :

(2.9.3) $\lambda_t(a)\circ(1+Xt) = (1+Xt)^a = \exp(a\mathrm{Log}(1+Xt)) = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{a}{n} X^n t^n$.

On en déduit :

(2.9.4) $\lambda_t(a)\circ\varphi = \varphi^a$ ($= \exp(a\mathrm{Log}\varphi)$) ;

En effet, les deux membres sont des foncteurs additifs égaux pour $1+Xt$. De (2.9.3) et 1.15, il résulte que le n-ième polynôme universel définissant la multiplication par $\lambda_t(a)$ est isobare de poids n ; il sera noté $R_{n,a}$.

Notons enfin que si A est une K-λ-algèbre, i.e. un λ-anneau muni d'un λ-homomorphisme : $K \to A$, et si $b \in A$, on a :

(2.9.5) $\lambda_t(ab) = (\lambda_t(b))^a$.

Ceci résulte en effet de $\lambda_t(ab) = \lambda_t(a)\circ\lambda_t(b)$, et de (2.9.4).

3. Les opérations γ

On se place encore sur la catégorie $\mathcal{C}_o$.

3.1. Soit K un λ-anneau. Nous allons définir à partir des opérations λ^i de K de nouvelles oérations, notées γ^i. Elles sont destinées à introduire une notion de classes de Chern sous des conditions qui seront indiquées plus tard. Pour le moment, donnons une "justification" des définitions qui suivent : si $\underline{E}$ est un fibré vectoriel de rang d, la d-ième classe de Chern de $\underline{E}$ devra être (quelle que soit la théorie des classes de Chern envisagée) la "somme alternée des puissances extérieures

de $\underline{E}$" ; pour définir la n-ième classe de Chern, nous procèderons de façon analogue, en ramenant $\underline{E}$ au rang n en considérant $(c1(\underline{E})-d)+n$, et nous prendrons la somme alternée des puissances extérieures de l'élément ainsi obtenu ; on "interprêtera" la proposition qui suit en y faisant $x = c1(\underline{E})-d$:

Proposition 3.2. Soit K un λ-anneau.

i) $\forall x \in K, \forall n \in \mathbb{N}, \quad \lambda^n(x+n-1) = (-1)^n \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda^i(x+n)$.

ii) Si on pose $\gamma^n(x) = \lambda^n(x+n-1)$, et $\gamma_t(x) = \sum_{n\geq 0} \gamma^n(x)t^n$, alors :

$$\gamma_t(x) = \lambda_{t/1-t}(x) \text{ , donc}$$

$$\lambda_t(x) = \gamma_{t/1+t}(x) .$$

On voit donc que la connaissance des opérations γ équivaut à celle des opérations λ.

Démonstration.

i) On a

$$\lambda^n(x+n-1) = \sum_{i=0}^{n} \lambda^i(x+n)\, \lambda^{n-i}(-1) .$$

De $\lambda_t(1) = 1+t$, on tire : $\lambda_t(-1) = 1/1+t$, d'où : $\lambda^k(-1) = (-1)^k$, ce qui donne la relation cherchée.

ii) $\lambda_{t/1-t}(x) = \sum_{n\geq 0} \lambda^n(x).\, t^n(1-t)^{-n}$.

On développe $t^n(1-t)^{-n} = t^n \sum_{k\geq 0} \binom{-n}{k}(-1)^k t^k = \sum_{p\geq n} \binom{p-1}{p-n} t^p$.

$\lambda_{t/1-t}(x) = \sum_{n\geq 0} \left[\lambda^n(x).\, \sum_{p\geq n} \binom{p-1}{p-n}\, t^p\right]$; le coefficient de t^p est donc :

$\sum_{n=0} \lambda^n(x).\, \binom{p-1}{p-n} = \sum_{n=0} \lambda^n(x)\, \lambda^{p-n}(p-1) = \lambda^p(x+p-1)$.

3.3. Soient K, K' deux λ-anneaux, $f : K \to K'$ un homomorphisme d'anneaux. D'après le définition 3.2.ii), f est un λ-homomorphisme si et seulement si pour tout $i \in \mathbb{N}$, et tout $x \in K$, $f(\gamma^i(x)) = \gamma^i(f(x))$, ou encore $\gamma_t(f(x)) = \hat{G}_g(f) \circ \gamma_t(x)$.

3.4. De la relation 3.2.ii), on déduit les relations :

$$(3.4.1) \quad \gamma^0(x) = 1 \ , \ \gamma^1(x) = x \ , \ \gamma^n(x+y) = \sum_{p+q=n} \gamma^p(x)\gamma^q(y) \ .$$

Elles montrent que l'homomorphisme γ_t définit sur K une nouvelle structure de pré-λ-anneau ; nous allons voir que ce n'est pas en général une structure de λ-anneau. Si on désigne par ρ_t la substitution sur l'anneau des séries formelles en t à coefficients dans K définie par $\rho_t(t) = t/1-t$, on a :

$$\gamma_t = \rho_t \circ \lambda_t \ .$$

L'automorphisme ρ_t est fonctoriel par rapport à K, et définit un automorphisme du foncteur $\hat{G}$ considéré comme foncteur en groupes abéliens ; à l'aide de cet automorphisme, on peut, par transport de structure, définir sur $\hat{G}$ une nouvelle structure de foncteur en λ-anneaux, qui sera telle que pour tout λ-anneau K, l'homomorphisme $\gamma_t : K \to \hat{G}(K)$ soit un λ-homomorphisme ; nous allons expliciter la multiplication et les opérations λ^i de cette deuxième structure.

3.5. La multiplication est définie par l'homomorphisme de foncteurs :

$$\hat{G} \times \hat{G} \xrightarrow{(\rho^{-1}, \rho^{-1})} \hat{G} \times \hat{G} \xrightarrow{\circ} \hat{G} \xrightarrow{\rho} \hat{G} \ ,$$

où le signe $\circ$ note la multiplication définie en 2.3. Cette nouvelle multiplication sera notée v. Elle est comme d'habitude définie par sa valeur sur (1+Xt,1+Yt) ; on a donc :

$$(1+Xt)\nabla(1+Yt) = \rho(\rho^{-1}(1+Xt)\circ\rho^{-1}(1+Yt))$$

$$= \rho\left(\frac{1+(X+1)t}{1+t}\circ\frac{1+(Y+1)t}{1+t}\right)$$

$$(3.5.1) \qquad = \rho\left(\frac{(1+(X+1)(Y+1)t)(1+t)}{(1+(X+1)t)(1+(Y+1)t)}\right)$$

$$= \frac{1+(1+X+Y+XY)t}{(1+Xt)\ (1+Yt)} \quad .$$

Si K est un λ-anneau, on a donc pour tous $x,y \in K$:

$$(3.5.2) \qquad \gamma_t(xy) = \gamma_t(x)\nabla\gamma_t(y) \quad .$$

Le n-ième polynôme universel de la loi ∇ sera noté P'_n ; c'est un polynôme de $\mathbb{Z}[X_i,Y_j]_{1\leqslant i,j\leqslant n}$, dont les composantes isobares sont de poids variant de n à 2n par rapport à l'ensemble des variables X_i,Y_j, (1.15) et symétrique par rapport à ces deux groupes de variables.
Pour $x,y \in K$, on a donc :

$$(3.5.3) \qquad n \in \mathbb{N},\ \gamma^n(xy) = P'_n(\gamma^1(x),..,\gamma^n(x),\gamma^1(y),..,\gamma^n(y)) \quad .$$

Notons enfin que la loi ∇ admet un élément unité, qui est $\rho_t(1+t)$, soit 1/1-t ; il sera parfois noté $\underline{1}_\nabla$.

3.6. Les "opérations λ " sont définies par le diagramme commutatif :

$$(3.6.1) \qquad \begin{array}{ccc} 1+K[[t]]^+ & \xrightarrow{\lambda_u} & 1+\{1+K[[t]]^+\}[[u]]^+ \\ \rho_t\downarrow & & \hat{G}(\rho_t)\downarrow \\ 1+K[[t]]^+ & \xrightarrow{\lambda'_u} & 1+\{1+K[[t]]^+\}[[u]]^+ \end{array} ,$$

i.e. par le morphisme composé de foncteurs :

$$\lambda' : \quad \hat{G} \xrightarrow{\rho_t^{-1}} \hat{G} \xrightarrow{\lambda_u} \hat{G}\circ\hat{G} \xrightarrow{\hat{G}(\rho_t)} \hat{G}\circ\hat{G} \quad ,$$

et seront notées λ'. Elles sont définies par leur valeur pour 1+Xt ; on a :

$$\lambda'_u(1+Xt) = \hat{G}(\rho_t)(\lambda_u(\rho_t^{-1}(1+Xt)))$$
$$= \hat{G}(\rho_t)(\lambda_u\frac{(1+(X+1)t)}{1+t})$$
$$= \hat{G}(\rho_t)\left(\frac{1_o + \{1+(X+1)t\}u}{1_o + \{1+t\}u}\right)$$
$$= 1_\nabla + \frac{\{1+Xt\}u}{1_\nabla + 1_\nabla . u}$$
$$= \rho_u^{-1}(1_\nabla + \{1+Xt\}u).$$

Si on note γ' les opérations γ correspondant aux opérations λ', on a donc :

(3.6.2) $$\gamma'_u(1+Xt) = 1_\nabla + \{1+Xt\}u \quad .$$

On notera $Q'_{i,j}$ le coefficient de t^j dans $\gamma'^i(1+\ldots+X_n t^n+\ldots)$; le lecteur pourra vérifier que c'est un polynôme de $\mathbb{Z}[X_1,..,X_{ij}]$, dont les composantes isobares sont de poids variant entre j et ij.

Soient K un λ-anneau, $x \in K$. Du diagramme (3.6.1), on déduit les relations :

(3.6.3) $\forall i \in \mathbb{N}$, $\gamma_t(\lambda^i(x)) = \lambda'^i(\gamma_t(x))$; $\gamma_t(\gamma^i(x)) = \gamma'^i(\gamma_t(x))$.

(3.6.4) $$\gamma^j(\gamma^i(x)) = Q'_{i,j}(\gamma^1(x),\ldots,\gamma^{ij}(x)) \quad .$$

On remarquera enfin que la structure de pré-λ-anneau qui vient d'être définie sur $\hat{G}$ est une structure de λ-anneau, puisque déduite de celle qui a été définie en 2.3 par l'isomorphisme ρ.

3.7. Pour éviter les confusions, le foncteur $\hat{G}$, muni de la structure de foncteur en λ-anneaux définie au §2 (resp. au §3) sera noté $\hat{G}_o$ (resp. $\hat{G}_\nabla$). Il résulte des considérations précédentes que pour se donner une

structure de λ-anneau sur un anneau A, il revient au même de se donner un homomorphisme d'anneaux $A \to \hat{G}(A)_o$, tel que le diagramme 3.7.1 soit commumatif, ou un homomorphisme d'anneaux $A \to \hat{G}(A)_\nabla$, tel que le diagramme 3.7.2 soit commutatif ; le premier définit les opérations λ, le second les opérations γ.

(3.7.1)
$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\lambda_u} & \hat{G}^u(A)_o \\ {\scriptstyle\lambda_t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\hat{G}^u(\lambda_t)} \\ \hat{G}^t(A)_o & \xrightarrow{\lambda_u} & \hat{G}^u(\hat{G}^t(A)_o)_o \end{array}$$

(3.7.2)
$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\gamma_u} & \hat{G}^u(A)_\nabla \\ {\scriptstyle\gamma_t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\hat{G}^u(\gamma_t)} \\ \hat{G}^t(A)_\nabla & \xrightarrow{\gamma'_u} & \hat{G}^u(\hat{G}^t(A)_\nabla)_\nabla \end{array} .$$

3.8. Soit K un anneau binômial (2.7) ; de (2.6.1) on déduit $\forall x \in K$ les relations :

(3.8.1) $$\gamma_t(x) = (1/1-t)^x = \exp(-x\mathrm{Log}(1-t))$$

Soit a un élément de K ; la multiplication par $\gamma_t(a)$ pour la loi ∇ est caractérisée par sa valeur pour 1+Xt, soit :

$$\gamma_t(a)\nabla(1+Xt) = \rho_t(\lambda_t(a)\circ\frac{1+(X+1)t}{1+t}) = \rho_t\left(\left(\frac{1+(X+1)t}{1+t}\right)^a\right)$$

(3.8.2)
$$\gamma_t(a)\nabla(1+Xt) = (1+Xt)^a = \exp(a\mathrm{Log}(1+Xt)) = \sum_{n=0}^{\infty}\binom{a}{n}X^n t^n .$$

En particulier, on voit que le n-ième polynôme universel définissant la multiplication par $\gamma_t(a)$ pour la loi ∇ est le polynôme $R_{n,a}$ (2.9).

Définition 3.9. Soit K un λ-anneau ; on appelle K-λ-algèbre augmentée la donnée d'une K-λ-algèbre A et d'un λ-homomorphisme de K-algèbres $A \to K$; un homomorphisme de K-λ-algèbres augmentées est un λ-homomorphisme compatible aux augmentations.

Exemple 3.9.1. : Soit (X,A) un topos commutativement localement annelé, et $K^{\cdot}(X)$ le groupe de Grothendieck de la catégorie des faisceaux de A-modules localement libres de type fini sur X. Nous avons vu que $K^{\cdot}(X)$ peut être muni d'une structure de pré-λ-anneau (2.2.b, car tout facteur direct d'un libre de type fini est alors localement libre de type fini) et que $H^{o}(X,\underline{\mathbb{Z}})$ est canoniquement muni d'une structure d'anneau binômial. On définit un λ-homomorphisme de $H^{o}(X,\underline{\mathbb{Z}})$ dans $K^{\cdot}(X)$ de la façon suivante : soit a une section du faisceau constant $\underline{\mathbb{Z}}$ sur X ; elle définit une partition de l'objet final de X en une somme d'ouverts disjoints U_n, la section a ayant pour valeur n sur l'ouvert U_n ; soit alors $\underline{F}$ le faisceau égal à A^n sur U_n pour $n \geqslant 0$, et à 0 sur U_n pour $n \leqslant 0$, et soit $\underline{F}'$ le faisceau égal à A^{-n} sur U_n pour $n \leqslant 0$, et à 0 sur U_n pour $n \geqslant 0$; on associe à a l'élément $F - F'$ de $K^{\cdot}(X)$.

Il est immédiat de vérifier qu'on obtient bien ainsi un λ-homomorphisme de $H^{o}(X,\underline{\mathbb{Z}})$ dans $K^{\cdot}(X)$; on peut alors définir l'augmentation de $K^{\cdot}(X)$ dans $H^{o}(X,\underline{\mathbb{Z}})$, en associant à tout faisceau localement libre de type fini son rang, qui est une section de $\underline{\mathbb{Z}}$; l'additivité du rang entraine qu'on définit ainsi une fonction sur $K^{\cdot}(X)$, à valeurs dans $H^{o}(X,\underline{\mathbb{Z}})$. On a donc muni $K^{\cdot}(X)$ d'une structure de pré-λ-algèbre augmentée. C'est toujours de celle-ci qu'il sera question dans la suite.

3.10 Soit A une K-λ-algèbre augmentée. On définit sur A une filtration d'anneau de la manière suivante : pour tout $n \geqslant 0$, on désigne par $\mathrm{Fil}^n A$ l'idéal engendré par les produits :

(3.10.1) $\quad \gamma^{i_1}(x_1)\ldots\gamma^{i_k}(x_k)$, avec $i_1+\ldots+i_k \geqslant n$, et $\forall i$, $\varepsilon(x_i) = 0$

($\varepsilon : A \to K$ étant l'augmentation).

Supposons que A soit engendré en tant que groupe abélien par une famille d'éléments $(x_\alpha)_{\alpha\in I}$; alors $\mathrm{Fil}^n A$ est engendré comme K-module par les produits :

(3.10.2) $\quad \gamma^{i_1}(x_{\alpha_1}-\varepsilon(x_{\alpha_1}))\ldots\gamma^{i_k}(x_{\alpha_k}-\varepsilon(x_{\alpha_k}))$, avec $i_1+\ldots+i_k \geqslant n$, et $\alpha_i \in I$

En effet, si x est un élément de A d'augmentation nulle et si on écrit $x = \sum_i x_{\alpha_i}$, on a $\sum_i \varepsilon(x_{\alpha_i}) = 0$, donc $x = \sum_i x_{\alpha_i} - \varepsilon(x_{\alpha_i})$; par ailleurs, si $a \in A$, on peut écrire $a = (a-\varepsilon(a)) + \varepsilon(a) = \gamma^1(a-\varepsilon(a)) + \varepsilon(a)$; en utilisant les relations (3.4.1), on voit donc que les éléments de $\mathrm{Fil}^n A$ sont combinaisons linéaires à coefficients dans K des éléments (3.10.2) ; comme ceux-ci sont dans $\mathrm{Fil}^n A$, on obtient le résultat voulu.

La filtration ainsi définie est une filtration d'anneau ; elle est décroissante, et on a :

$$\mathrm{Fil}^0 A = A \quad ; \quad \mathrm{Fil}^1 A = \mathrm{Ker}\ \varepsilon \ .$$

De plus, elle est fonctorielle par rapport à A : tout λ-homomorphisme de K-λ-algèbres augmentées est compatible aux filtrations. Quand nous considérerons un λ-anneau augmenté comme muni d'une filtration, il s'agira, sauf mention expresse du contraire, de la filtration ci-dessus.

Proposition 3.11. Soient A un λ-anneau, et y_i, $i=1,..,n$ des éléments de A tels que $\lambda^j(y_i) = 0$ pour $j \geqslant 2$. On pose $x = \sum_i y_i$; alors :

i) pour $k > n$, on a $\gamma^k(x-n) = 0$

ii) pour $1 \leqslant k \leqslant n$, $\gamma^k(x-n)$ est la k-ième fonction symétrique des $y_i - 1$.

Soit $j \geqslant 2$. On a alors $\gamma^j(y_i-1) = \lambda^j(y_i+j-2) = \sum_{p+q=j} \lambda^p(y_i)\lambda^q(j-2)$. Comme $\lambda^p(y_i) = 0$ pour $p \geqslant 2$, et $\lambda^q(j-2) = 0$ pour $q > j-2$, $\gamma^j(y_i-1) = 0$. La proposition résulte alors de ce que $\gamma_t(x-n) = \prod_{i=1}^{n} \gamma_t(y_i-1)$.

4. λ-anneaux engendrés par générateurs et relations

On se place toujours sur $\mathcal{C}_o$.

4.1. Soit K un λ-anneau. On considère une famille d'indéterminées $(X_i)_{i\in I}$, et soit $A = K[X_i, \lambda^n X_i]_{i\in I, n\geqslant 2}$; on veut définir sur A une structure de λ-anneau prolongeant celle de K.

Pour se donner un homomorphisme $\lambda_t : A \longrightarrow \hat{G}(A)$, il suffit de se donner les images des X_i, $\lambda^n X_i$, ce qui définit un homomorphisme d'anneaux : $A \longrightarrow \hat{G}(A)_o$, et pour qu'il définisse une structure de λ-anneau sur A, il faut vérifier la commutativité du diagramme (3.7.1). On pose donc :

(4.1.1) $\lambda_t(X_i) = 1 + X_i t + \sum_{n\geqslant 2} \lambda^n X_i t^n$; $\lambda_t(\lambda^n X_i) = \lambda^n(\lambda_t(X_i))$.

Le diagramme (3.7.1) étant un diagramme d'homomorphismes d'anneaux, il suffit de vérifier sa commutativité pour les X_i, $\lambda^n X_i$ (elle est connue par hypothèse sur les éléments de K), ce qui résulte facilement des définitions (4.1.1) et de ce que λ_u et $\hat{G}^u(\lambda_t)$ sont des λ-homomorphismes.

Le λ-anneau A est caractérisé par la propriété universelle suivante :

Proposition 4.2. Pour toute K-λ-algèbre B, et toute famille $(b_i)_{i\in I}$ d'éléments de B, il existe un K-λ-homomorphisme et un seul f de A dans B tel que pour tout $i \in I$, $f(X_i) = b_i$.

Pour que f soit un λ-homomorphisme, il faut que $f(\lambda^j X_i) = \lambda^j(b_i)$ pour tous i,j ; ceci définit f de façon unique. L'homomorphisme ainsi obtenu est bien un λ-homomorphisme, car pour vérifier que $\lambda_t \circ f = \hat{G}(f) \circ \lambda_t$ il suffit de le vérifier sur un système de générateurs de A sur K, ce qui résulte de la définition de f et des relations (2.4.2).

4.3. On peut faire la même construction en utilisant les γ au lieu des λ. Soit $A' = K[X_i, \gamma^n X_i]_{i\in I, n\geqslant 2}$; pour définir la structure de λ-anneau de A', on se donne un homomorphisme d'anneaux : $A' \to \hat{G}(A')_\nabla$, par :

$$(4.3.1)\quad \gamma_t(X_i) = 1 + X_i t + \sum_{n\geqslant 2} \gamma^n X_i . t^n \quad ; \quad \gamma_t(\gamma^n X_i) = \gamma'^n(\gamma_t(X_i)).$$

On vérifie ensuite la commutativité de (3.7.2), ce qui montre qu'on obtient bien une structure de λ-anneau.

Le λ-anneau A' vérifie également la propriété universelle 4.2 ; il est donc canoniquement isomorphe (en tant que λ-anneau) au λ-anneau A.

Définition 4.4. Le λ-anneau A sera appelé le λ-anneau libre engendré sur K par la famille de générateurs $(X_i)_{i\in I}$.

Définition 4.5. Soient A un λ-anneau, J un idéal de A. On dit que J est un λ-idéal de A si pour tout $x \in J$, et tout $n \geqslant 1$, $\lambda^n(x) \in J$.

Si $f : A \to B$ est un λ-homomorphisme, le noyau de f est un λ-idéal.

Soit J un λ-idéal ; l'homomorphisme composé : $A \xrightarrow{\lambda_t} \hat{G}(A) \longrightarrow \hat{G}(A/J)$ s'annule sur J et se factorise donc par A/J, qui se trouve ainsi muni

d'une structure de λ-anneau, les relations (2.4.2) passant au quotient.

Toute intersection de λ-idéaux est un λ-idéal. En particulier, il existe un plus petit λ-idéal contenant une famille donnée d'éléments $(x_i)_{i\in I}$; d'après les relations (2.4.2), c'est l'idéal (ordinaire) engendré par les $\lambda^n(x_i)$, $(n\geqslant 1)$.

Soient toujours K un λ-anneau, $(X_i)_{i\in I}$ une famille d'indéterminées, $A = K[(X_i),(\lambda^n X_i)]$, et soit $(P_{i'})_{i'\in I'}$ une famille d'éléments de A : soit J le λ-idéal engendré par les $P_{i'}$.

Définition 4.6. Le λ-anneau A/J sera appelé λ-anneau engendré sur K par la famille de générateurs $(X_i)_{i\in I}$ soumis aux relations $(P_{i'})_{i'\in I'}$.

On peut également se donner des relations entre les X_i, $\gamma^n X_i$ et faire la même construction, en remarquant qu'un idéal est un λ-idéal si et seulement si il est stable pour les opérations γ^n, $n \geqslant 1$, comme il résulte des solutions 3.2.

Soit B une K-λ-algèbre, $(b_i)_{i\in I}$ une famille d'éléments de B. Les P_i, étant des polynômes par rapport aux indéterminées X_i, $\lambda^n X_i$, on peut substituer à ces indéterminées les b_i, $\lambda^n(b_i)$; si l'élément obtenu est nul, on dira que les b_i satisfont les relations $P_{i'}$. La K-λ-algèbre A/J est alors caractérisée par la propriété universelle suivante :

Proposition 4.7. Pour toute K-λ-algèbre B et toute famille $(b_i)_{i\in I}$ d'éléments de B, satisfaisant les relations $(P_{i'})_{i'\in I'}$, il existe un K-λ-homomorphisme et un seul $A/J \to B$ tel que pour tout i, on ait $f'(X_i) = b_i$

En effet, le noyau de l'homomorphisme f défini en 4.2 contient les $P_{i'}$, donc J puisque c'est un λ-idéal ; f passe donc au quotient et définit

f', évidemment unique.

Proposition 4.8. Soit n un entier $\geqslant 0$; dans le λ-anneau libre engendré sur K par une indéterminée X, l'idéal engendré par les $\lambda^k X$, $k > n$, est un λ-idéal.

Posons $A = K[X, \lambda^k X]_{k \geqslant 2}$, et soit J l'idéal engendré par les $\lambda^k X$ pour $k > n$; posons $B = A/J$. Il faut montrer que l'homomorphisme composé : $A \xrightarrow{\lambda_t} \hat{G}(A) \longrightarrow \hat{G}(B)$ s'annule sur J, i.e. que $\lambda_t(\lambda^k X)$, $k > n$, a pour image 1 dans $\hat{G}(B)$. Or $\lambda_t(\lambda^k X) = \lambda^k(\lambda_t(X))$, et $\hat{G}(A) \to \hat{G}(B)$ est un λ-homomorphisme ; il suffit donc de montrer que pour tout anneau C et toute série $\varphi \in \hat{G}(C)$, dont les coefficients sont nuls en degrés $> n$, $\lambda^k(\varphi) = 1$ si $k > n$. Mais il suffit pour prouver cette dernière propriété de la montrer pour $C = K[X_1, \ldots, X_n]$, et $\varphi = 1 + X_1 t + \ldots + X_n t^n$. Plongeant $K[X_1, \ldots, X_n]$ dans $K[T_1, \ldots, T_n]$ grâce aux fonctions symétriques, on peut écrire : $1 + X_1 t + \ldots + X_n t^n = \prod_{i=1}^{n} (1 + T_i t)$, d'où

$$\lambda_u(1 + X_1 t + \ldots + X_n t^n) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_u(1 + T_i t) = \prod_{i=1}^{n} (1 + \{1 + T_i t\}u),$$

qui est de degré n en u.

Corollaire 4.9. Le λ-anneau engendré sur K par le générateur X soumis aux relations $\lambda^k(X) = 0$ pour $k > n$, est isomorphe à $K[X, \ldots, \lambda^n X]$.

4.9.1. On aurait les mêmes énoncés en remplaçant les λ par les γ. On peut également remplacer X par une famille d'indéterminées $(X_i)_{i \in I}$, soumises aux relations $\lambda^k(X_i) = 0$ pour $k > n_i$, les n_i étant des entiers $\geqslant 2$; le λ-anneau obtenu est alors $K[X_i, \lambda^k X_i]_{i \in I, 2 \leqslant k \leqslant n_i}$.

4.10. Soient K un anneau binômial, et A une K-λ-algèbre augmentée. On désigne par $B = A[X, \gamma^k X]_{k \geqslant 2}$ le λ-anneau libre engendré par X sur A ;

on définit un λ-homomorphisme : B $\to$ K prolongeant l'augmentation de A en envoyant X sur O, ce qui munit B d'une structure de K-λ-algèbre augmentés. On se propose de déterminer sa filtration (3.10) en fonction de celle de A.

On gradue B par le poids par rapport aux $\gamma^k X$, $\gamma^k X$ étant affecté du poids k ; on désigne par M_k l'ensemble des monômes de poids k par rapport aux indéterminées $\gamma^i X$.

Lemme 4.11. Soit a $\in$ A ; le coefficient d'un monôme de poids n par rapport aux $\gamma^j X$ dans $\gamma^k(aX) = P'_k(\gamma^i(a), \gamma^j X)$ est de filtration au moins k-n(dans A)

Le polynôme P'_k est sans composantes isobares de poids < k par rapport aux $\gamma^i(a)$, $\gamma^j X$ (3.5) donc le lemme est vrai si a est d'augmentation nulle.

Si ε désigne l'homomorphisme d'augmentation : A $\to$ K, on peut écrire dans le cas général :

$$\gamma_t(aX) = \gamma_t((a-\varepsilon(a))X).\gamma_t(\varepsilon(a)X).$$

Or $\gamma_t(\varepsilon(a)X) = (\gamma_t(X))^{\varepsilon(a)} = \sum_{n=0}^{\infty} R_{n,a}(\gamma^j X)).t^n$, les $R_{n,a}$ étant isobares de poids n par rapport aux $\gamma^j X$ (3.8) ; on en déduit le lemme en faisant le produit.

Proposition 4.12. $\mathrm{Fil}^k B = \mathrm{Fil}^k A + \mathrm{Fil}^{k-1} A.M_1 + \ldots + \mathrm{Fil}^0 A.M_k + B.M_{k+1}$.

Il est clair que le second idéal est contenu dans le premier ; il y a donc simplement à montrer la réciproque.

Comme la filtration définie par la famille des idéaux du second membre pour k variable est une filtration d'anneau, il suffit de montrer la réciproque pour un élément du type $\gamma^k(b)$, avec $\varepsilon(b)=0$, ces éléments

engendrant la filtration canonique.

Ecrivant $b = \Sigma a_i m_i$, avec $a_i \in A$, et les m_i étant des monômes par rapport aux $\gamma^j X$, en utilisant l'additivité de γ_t, on voit qu'il suffit de faire la démonstration pour $\gamma^k(am_i)$, avec $a \in A$ et $m_i \in M_i$.

En utilisant le lemme 4.11. et le A-λ-homomorphisme de B dans B qui envoie X sur m_i, on voit qu'il suffit de faire la démonstration pour un élément du type $\gamma^k(m_i)$.

Enfin, le polynôme P'_k étant sans composantes isobares de poids $< k$, on est ramené au cas $\gamma^k(\gamma^j X)$, qui résulte lui-même du fait que les polynômes $Q'_{j,k}$ sont sans composantes isobares de poids $< k$ (3.6).

Remarques 4.13. i) La décomposition de $Fil^k B$ donnée en 4.12 est une décomposition en somme directe de A-modules. En d'autres termes, si $b \in Fil^k B$, et si on écrit $b = \sum_{j \leqslant k} a_{i,j} m_{i,j} + b'$, avec $a_{i,j} \in A$, $m_{i,j} \in M_j$, et $b' \in B.M_{k+1}$, alors $a_{i,j} \in Fil^{k-j} A$.

ii) L'énoncé 4.12. reste vrai pour tout quotient de B par un λ-idéal contenu dans l'idéal d'augmentation.

iii) L'énoncé analogue à 4.12. obtenu en remplaçant l'indéterminée X par une famille d'indéterminées (X_i) est encore vrai.

Corollaire 4.14. $Gr^k B \approx Gr^k A \oplus Gr^{k-1} A.M_1 \oplus \ldots \oplus Gr^0 A.M_k$.

On définit une flèche de la droite vers la gauche en associant à tout élément $\bar{a}.m$, où $\bar{a}$ est la classe dans $Gr^{k-i} A$ d'un élément a de $Fil^{k-i} A$ et $m \in M_i$, la classe dans $Gr^k B$ de am. On définit une flèche en sens inverse par décomposition d'après la proposition 4.12 et la remarque 4.13.i). Il est clair que ces deux flèches sont inverses l'une de l'autre.

Corollaire 4.15. Soit B' le λ-anneau engendré sur K par l'indéterminée X soumise aux relations $\gamma^k(X) = 0$ pour $k > n$, i.e. $B' = K[X, \ldots, \gamma^n X]$ (4.9). Alors la filtration de λ-anneau de B' est identique à la filtration par le poids par rapport aux $\gamma^j X$.

Compte tenu de la proposition 4.12, de la remarque 4.13.ii) et du fait que A=K, $\mathrm{Fil}^k B' = K.M_k + B'.M_{k+1}$, donc $\mathrm{Fil}^k B'$ est l'idéal engendré par les monômes de poids $\geqslant k$ par rapport aux $\gamma^j X$.

5. Les $\lambda^p(N,x)$.

Ce paragraphe ne sera utilisé que dans Exp.VII 4, pour l'étude des immersions régulières ; il peut donc être omis en première lecture.

5.1. Soit d un entier $\geqslant 1$. On désigne par A la $\mathbb{Z}$-λ-algèbre engendrée par les générateurs N, x soumis aux relations $\lambda^i(N) = 0$ pour $i > d$; on a donc :

$$A = \mathbb{Z}[N, \ldots, \lambda^d N \ ; \ x, \ldots, \lambda^j x, \ldots].$$

On pose $\lambda_{-1}(N) = \sum_{i=0}^{d} (-1)^i \lambda^i(N)$.

Lemme 5.2. Pour tout $p \geqslant 1$, $\lambda^p(x.\lambda_{-1}(N))$ est divisible par $\lambda_{-1}(N)$.

On sait (2.3) que $\lambda^p(x.\lambda_{-1}(N)) = P_p(\lambda^i x, \lambda^j(\lambda_{-1}(N)))$ est un polynôme isobare de poids p par rapport aux $\lambda^j(\lambda_{-1}(N))$; il suffit donc de montrer le lemme pour les $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$.

Soit B le λ-anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par les indéterminées $N_1, \ldots, N_d$, soumises aux relations $\lambda^i(N_j) = 0$ si $i \geqslant 2$. Il est clair que $\lambda^k(\sum_{i=1}^{d} N_i) = 0$ pour $k > d$. On peut donc définir un λ-homomorphisme f de A dans B, en envoyant N sur $\sum_{i=1}^{d} N_i$; on a alors $\hat{G}(f)(\lambda_t(N)) = \prod_{i=1}^{d} \lambda_t(N_i) = \prod_{i=1}^{d} (1+N_i t)$,

ce qui montre que pour $1 \leqslant k \leqslant d$, $\lambda^k N$ s'envoie sur la k-ième fonction symétrique des N_i, et par suite que f est injectif et identifie A à l'anneau des polynômes symétriques en les N_i.

On a alors $\lambda_{-1}(N) = \prod_{i=1}^{d}(1-N_i)$, et $\lambda_t(\lambda_{-1}(N)) = \lambda_t(\prod_{i=1}^{d}(1-N_i))$. Les $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ sont des polynômes par rapport aux N_i ; si pour certain indice i on fait $N_i=1$, on voit que $\lambda_t(\lambda_{-1}(N))$ devient $\lambda_t(0) = 1$, donc que les $\lambda^p(\lambda_{-1}(N))$ s'annulent pour $N_i = 1$, donc qu'ils contiennent $1-N_i$ en facteur. Donc ils contiennent le produit des $1-N_i$ en facteur, i.e. ils sont divisibles par $\lambda_{-1}(N)$ dans B, donc aussi dans A, le quotient de deux polynômes symétriques étant évidemment symétrique.

5.3. Comme A est intègre, on définit sans ambiguïté un élément $\lambda^p(N,x)$ en posant ($p \geqslant 1$) :

$$\lambda^p(N,x).\lambda_{-1}(N) = \lambda^p(x.\lambda_{-1}(N)) \quad . \tag{5.3.1}$$

L'élément $\lambda^p(N,x)$ est donc un polynôme par rapport aux $\lambda^i(x)$, $\lambda^j(N)$, isobare de poids p par rapport aux $\lambda^i(x)$, car il en est de même de $\lambda^p(x.\lambda_{-1}(N))$ d'après 2.3.

Soient d' un entier $\geqslant d$, et A' la $\mathbb{Z}$-λ-algèbre engendrée par les générateurs N' et x' soumis aux relations $\lambda^i(N') = 0$ pour $i > d'$; d'après la proposition 4.7, il existe un λ-homomorphisme et un seul $f : A' \longrightarrow A$, envoyant N' sur N et x' sur x. De la définition (5.3.1) résulte que $f(\lambda^p(N',x')) = \lambda^p(N,x)$ pour tout $p \geqslant 1$.

Si B est un λ-anneau, et N'' un élément de B tel que $\lambda^k(N'') = 0$ pour $k > d$, on peut, pour tout $x'' \in B$, définir un élément $\lambda^p(N'',x'')$ par substitution, on encore en utilisant l'unique λ-homomorphisme de A dans

B qui envoie N sur N", et x sur x" ; d'après la remarque précédente, l'élément obtenu ne dépend pas de l'entier d tel que $\lambda^k(N") = 0$ pour $k > d$. En utilisant le même homomorphisme, on voit que la relation (5.3.1) est vérifiée par N" et x".

5.4. Considérons le λ-anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par les indéterminées N,x,y, soumises aux relations $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. De (5.3.1) résulte :

$$\lambda^p(N,x+y).\lambda_{-1}(N) = \lambda^p((x+y).\lambda_{-1}(N))$$

$$= \sum_{i+j=p} \lambda^i(x.\lambda_{-1}(N)).\lambda^j(y.\lambda_{-1}(N))$$

$$= \sum_{\substack{i+j=p \\ i,j\neq 0}} \lambda^i(N,x).\lambda^j(N,y).(\lambda_{-1}(N))^2+(\lambda^p(N,x)+\lambda^p(N,y))\lambda_{-1}N$$

Comme l'anneau considéré est intègre, on en désuit la relation suivante, valable par substitution dans tout λ-anneau, et pour tout élément N tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$:

$$(5.4.1)\quad \lambda^p(N,x+y) = \sum_{\substack{i+j=p \\ i,j\neq 0}} \lambda^i(N,x).\lambda^j(N,y).\lambda_{-1}(N)+\lambda^p(N,x)+\lambda^p(N,y) \quad .$$

Considérons maintenant le λ-anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par des indéterminées N,N',x soumises aux relations $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$, et $\lambda^k(N') = 0$ pour $k > d'$. On a alors $\lambda^k(N+N') = 0$ pour $k > d+d'$; on peut donc définir les $\lambda^p(N+N',x)$. On obtient :

$$\lambda^p(N+N',x).\lambda_{-1}(N+N') = \lambda^p(x.\lambda_{-1}(N+N')) \quad .$$

Par additivité de λ_t, on a : $\lambda_{-1}(N+N') = \lambda_{-1}(N).\lambda_{-1}(N')$. On en déduit :

$$\lambda^p(N+N',x).\lambda_{-1}(N).\lambda_{-1}(N') = \lambda^p(x.\lambda_{-1}(N).\lambda_{-1}(N'))$$

$$= \lambda^p(N',x.\lambda_{-1}(N)).\lambda_{-1}(N') \quad .$$

Comme l'anneau considéré est intègre, on en déduit la relation suivante, valable par substitution dans tout λ-anneau , et pour tous éléments N,N' tels que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$, $\lambda^k(N') = 0$ pour $k > d'$;

(5.4.2) $$\lambda^p(N+N',x).\lambda_{-1}(N) = \lambda^p(N',x.\lambda_{-1}(N)) \quad .$$

5.5. Soit maintenant A un λ-anneau quelconque, et N un élément de A tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. On va associer à A un nouveau λ-anneau A_N.

On définit d'abord une nouvelle multiplication sur A en posant pour $x,y \in A$:

(5.5.1) $$x.y = x.y.\lambda_{-1}(N) \quad .$$
N

L'anneau A muni de cette multiplication n'est plus unitaire ; on considère donc l'anneau $\mathbb{Z}\times A$, obtenu par adjonction d'une unité à A. Ses opérations sont donc définie par :

$$(n,x) + (n',x') = (n+n',x+x')$$

(5.5.2)

$$(n,x).(n',x') = (nn',nx'+n'x+x.y)$$
N

On considère A comme plongé dans cet anneau par $x \rightsquigarrow (0,x)$. On définit alors une structure de pré-λ-anneau par :

(5.5.3) $$\lambda_t(n,x) = (1+t)^n.\sum_{p=0}^{\infty} \lambda^p(N,x).t^p.$$

C'est une structure de pré-λ-anneau en vertu de (5.4.1). On notera A_N le pré-λ-anneau ainsi obtenu. Pour voir que c'est un λ-anneau, il suffit par substitution de faire la démonstration dans le cas où A est le λ-anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par les générateurs N,X,Y, soumis aux relations $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. On définit alors un homomorphisme $A_N \longrightarrow A$, en

envoyant (1,0) sur 1, et (0,x) sur $x.\lambda_{-1}(N)$. Il est immédiat de voir sur (5.5.1) et (5.3.1) que c'est un λ-homomorphisme, et A étant intègre dans le cas considéré, on vérifie aussitôt qu'il est injectif ; comme A est un λ-anneau, on en déduit le résultat.

Dans le λ-anneau A_N, on peut définir des opérations γ(3.2). Pour $x \in A$, la valeur de γ^p calculée sur l'élément (0,x) de A_N est donnée par :

$$\gamma^p(0,x) = \sum_{i=0}^{p-1} \binom{p-1}{i} \lambda^i(N,x),$$

c'est donc un élément de A ; il est défini par la relation :

$$\gamma^p(N,x).\lambda_{-1}(N) = \gamma^p(x.\lambda_{-1}(N)) \quad , \tag{5.5.4}$$

et les polynômes universels qui en résultent.

5.6. Soit A le λ-anneau engendré sur $\mathbb{Z}$ par les générateurs N,L,x, soumis aux relations $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$, $\lambda^k(L) = 0$ pour $k > 1$. On se propose de calculer les $\lambda^p(N+L,x)$ en fonction des $\lambda^q(N,x)$.

Par définition :

$\lambda^p(N+L,x).\lambda_{-1}(N).\lambda_{-1}(L) = \lambda^p(x.\lambda_{-1}(N).\lambda_{-1}(L))$, soit :

$$1 + \lambda_{-1}(N).\lambda_{-1}(L).\sum_{k\geq 1} \lambda^k(N+L,x).t^k = \lambda_t(x.\lambda_{-1}(N)) \circ \lambda_t(1-L)$$

$$= \frac{\lambda_t(x.\lambda_{-1}(N))}{\lambda_{Lt}(x.\lambda_{-1}(N))} \quad (\text{car } \lambda_t(1-L) = \frac{\lambda_t(1)}{\lambda_t(L)} = \frac{1+t}{1+Lt}$$

et on applique (2.3.2))

$$= \frac{1+\ldots+\lambda^k(x.\lambda_{-1}(N))t^k+\ldots}{1+\ldots+\lambda^k(x.\lambda_{-1}(N))L^k t^k+\ldots}$$

$$= 1 + \frac{\sum_{k\geq 1} \lambda^k(N,x).\lambda_{-1}(N).(1-L^k)t^k}{1+\sum_{k\geq 1} \lambda^k(N,x).\ \lambda_{-1}(N)..L^k t^k}$$

Donc $\lambda^p(N+L,x)$ est le coefficient de t^p dans la série :

$$\frac{\sum_{k\geqslant 1} \lambda^k(N,x)(1+\ldots+L^{k-1})t^k}{1+\sum_{k\geqslant 1} \lambda^k(N,x)\lambda_{-1}(N)L^k t^k} \quad .$$

Proposition 5.7. Soient K un anneau binomial, A une K-λ-algèbre augmentée, N un élément de A tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$. Alors pour tout $x \in A$ et tout $p \geqslant 1$, on a :

$$(5.7.1) \qquad \gamma^p(N,x) \in \mathrm{Fil}^{p-d}A \quad .$$

Soit A_o la K-λ-algèbre engendrée par des générateurs N'_o, X'_o, soumis aux relations $\gamma^k(N'_o) = 0$ pour $k > d$. On définit l'homomorphisme d'augmentation $A_o \xrightarrow{\varepsilon} K$ par $\varepsilon(N'_o) = \varepsilon(X'_o) = 0$. On sait que A_o est l'anneau des polynômes à coefficients dans K par rapport aux indéterminées $\gamma^i(N'_o)$, avec $1 \leqslant i \leqslant d$, et $\gamma^j(X'_o)$, avec $j \geqslant 1$, et que la λ-filtration sur A_o est identique à la filtration par le poids, en affectant le poids i à $\gamma^i(N'_o), \gamma^i(X'_o)$ (4.12 et 4.15).

Posons $N_o = N'_o + d$, $X_o = X'_o + \varepsilon(x)$. Nous allons d'abord montrer 5.7 pour N_o et X_o. D'après ce qui précède, (5.7.1) est équivalent à :

$$\gamma^p(N_o,X_o).\gamma^d(N'_o) \in \mathrm{Fil}^p A_o \quad .$$

Or $\gamma^d(N'_o) = (-1)^d\lambda_{-1}(N_o)$; cette relation s'écrit donc :

$$(-1)^d\gamma^p(X_o\ \gamma^d(N_o)) \in \mathrm{Fil}^p A_o$$

d'après (5.5.4). Cette relation est bien vérifiée, puisque $\gamma^d(N_o)$ est d'augmentation nulle.

D'après 4.7, il existe un K-λ-homomorphisme $A_o \longrightarrow A$ compatible aux augmentations envoyant N'_o sur N-d, et X'_o sur $x-\varepsilon(x)$, donc N_o sur N et X_o

sur x, d'où le résultat, l'homomorphisme étant compatible aux filtrations.

6. Anneau de Chern

Dans ce paragraphe, l'anneau de base sera un anneau binômial (2.7) K, fixé une fois pour toutes. Nous utiliserons la catégorie $\mathcal{C}$ (1.1), et par suite reviendrons aux notations du paragraphe 1, réservant la notation $\hat{G}$ au foncteur défini sur $\mathcal{C}$ (1.1), et notant $\hat{G}\circ i$ sa restriction à $\mathcal{C}_o$ (1.8).

6.1. Nous avons défini en 3.5 et 3.6 des morphismes de foncteurs :

$$(\hat{G}\circ i)\times(\hat{G}\circ i) \xrightarrow{\nabla} \hat{G}\circ i \quad ,$$

$$\hat{G}^t\circ i \xrightarrow{\gamma'} (\hat{G}^u\circ i)\circ(\hat{G}^t\circ i)_{\nabla} \quad ,$$

$$\hat{G}\circ i \xrightarrow{a} \hat{G}\circ i \quad ,$$

le dernier étant la multiplication pour la loi ∇ par $\gamma_t(a)$, avec $a \in K$.

Par 1.9, on en déduit des morphismes :

$$\hat{G}\times\hat{G} \xrightarrow{\nabla} \hat{G}_g \quad ,$$

$$\hat{G}^t \xrightarrow{\gamma'} \hat{G}^u\circ i\circ\hat{G}^t_{g\,\nabla} \quad ,$$

$$\hat{G} \xrightarrow{a} \hat{G}_g \quad ;$$

et il résulte des propriétés d'isobarité des polynômes P'_n, $Q'_{i,j}$, $R_{n,a}$ (3.5, 3.6, 2.9) que l'image du premier et du troisième foncteurs est dans $\hat{G}$, et celle du deuxième, dans le sous-groupe des séries formelles en u dont les coefficients en degré non nul sont dans $\hat{G}^t$.

En composant le premier et le troisième avec le morphisme canonique : $\hat{G} \longrightarrow 1+\widehat{Gr.}^+$ (1.11), on obtient d'après 1.12 deux morphismes de foncteurs sur $\mathcal{C}_g$:

$$(1+\hat{.}^{+})\times(1+\hat{.}^{+}) \xrightarrow{*} 1+\hat{.}^{+} \quad ,$$

$$1+\hat{.}^{+} \xrightarrow{a} 1+\hat{.}^{+} \quad ,$$

définissant sur le foncteur $1+\hat{.}^{+}$ une multiplication et des opérations de K. D'après 1.13, la multiplication est définie par sa valeur sur l'élément $(1+X,1+Y)$ de $(1+\widehat{K[X,Y]}^{+})^2$; elle sera notée * ; on a donc :

$$(6.1.1) \qquad (1+X)*(1+Y) = \frac{1+X+Y}{(1+X)(1+Y)} \quad .$$

Le n-ième polynôme universel de cette loi est la composante isobare de poids n de P'_n (1.15) et sera noté P''_n.

Les opérations de K seront encore notées par l'exponentielle (3.8). Les polynômes universels définissant ces opérations sont les composantes isobares de plus bas degré des $R_{n,a}$ (1.15); ceux-ci étant isobares, ce sont les $R_{n,a}$ eux-mêmes.

Soit $A \in Ob(\mathfrak{C})$; l'anneau $1+\hat{A}^{+}$ défini par les lois précédentes est en général sans élément unité ; on étend donc cet anneau par adjonction des scalaires de K, en introduisant le nouvel anneau $K \times (1+\hat{A}^{+})$, muni des lois de composition définie par : $\forall\, a,a' \in A$, $\varpi, \varpi' \in 1+\hat{A}^{+}$,

$$(6.1.2) \qquad \begin{aligned} &(a,\varpi) + (a',\varpi') = (a+a',\varpi\varpi') \ ; \\ &(a,\varpi).(a',\varpi') = (aa',\varpi^{a'}.\varpi'^{a}.(\varpi*\varpi')) \quad . \end{aligned}$$

L'anneau ainsi construit admet (1.1) pour l'élément unité, et $1+\hat{A}^{+}$ s'identifie à l'idéal $(0) \times (1+\hat{A}^{+})$. Il est muni de façon naturelle d'une structure de K-algèbre, telle que :

$$(6.1.3) \qquad a.(a',\varpi) = (a,1).(a',\varpi) = (aa',\varpi^{a}) \quad .$$

On le munit d'une structure de K-λ-algèbre de la façon suivante : nous avons remarqué plus haut que l'image du foncteur $\gamma' : \hat{G}^t \longrightarrow \hat{G}^u \circ i \circ \hat{G}^t_g$ est dans le sous-groupe des séries formelles en u dont les coefficients en degré non nul sont dans $\hat{G}^t$. Utilisant le morphisme canonique : $\hat{G} \longrightarrow 1+\widehat{Gr.}^+$, qui donne : $\hat{G} \rightarrow K \times (1+Gr.^+)$, on en déduit finalement un morphisme :

$$\hat{G}^t \xrightarrow{\gamma'} \hat{G}^u \circ i \circ (K \times (1+\widehat{Gr.}^+)) \quad ,$$

qui d'après 1.12 définit un morphisme de foncteurs sur :

$$1+\hat{.}^+ \xrightarrow{\quad ' \quad} \hat{G}^u \circ i \circ (K \times (1+\hat{.}^+)) \quad .$$

Les polynômes universels définissant ce morphisme sont les coefficients des $\gamma'^i(1+X_1+\ldots+X_n+\ldots)$; le j-ième coefficient est la composante isobare de poids j de $Q'_{i,j}$ (démonstration analogue à celle de 1.15), et sera notée $Q''_{i,j}$.

On étend enfin le morphisme ainsi construit à $K \times (1+\hat{.}^+)$ de façon naturelle, en utilisant la λ-structure de K. On obtient donc une structure de pré-λ-anneau sur $K \times (1+\hat{.}^+)$, définie par les opérations γ correspondantes, qui sont telles que :

$$\gamma_t(a,\varphi) = \gamma_t(a).(1 + \sum_{p \geqslant 1} \gamma'^p(\varphi) t^p) \quad , \tag{6.1.4}$$

et qui seront notées γ au lieu de γ', aucune confusion n'étant possible.

Pour vérifier que c'est une structure de λ-anneau, on vérifie la commutativité de (3.7.2) ; elle est connue pour les éléments de K ; pour les éléments de $1+\hat{.}^+$, elle résulte de celle de (3.7.2) pour $\hat{G}$ par passage au quotient. On en tire aussitôt le résultat.

Définition 6.2. Le foncteur défini en 6.1 sur la catégorie des K-algèbres graduées, à valeurs dans la catégorie des K-λ-algèbres, est appelé anneau de Chern ; sa valeur pour $A \in Ob(\mathcal{C})$ est notée $Ch(A)$ (ou, s'il y a des risques de confusion, $Ch_K(A)$).

Des formules (6.1.1), (6.1.2), (6.1.4), et (3.6.2), on déduit les relations :

$$(6.2.1) \qquad (1,1+X).(1,1+Y) = (1,1+X+Y)$$
$$\lambda^i(1,1+X) = 0 \quad \text{pour} \quad i \geqslant 2 \quad ,$$

relations qui servaient à définir l'anneau de Chern dans [1]. A partir de ces formules, on peut inversement retrouver les relations (6.1.1) et (6.1.4).

Indiquons la raison pour laquelle on introduit l'anneau de Chern. On se place dans la situation de l'exemple 3.9, et on désigne par A le gradué associé (par la filtration définie en 3.10) au $K^\cdot$ d'un topos commutativement localement annelé (qu'on suppose être un λ-anneau pour simplifier) ; K est l'anneau d'augmentation. On verra plus loin qu'on peut définir pour tout élément d'un λ-anneau augmenté des classes de Chern à valeurs dans le gradué associé (6.7). A tout faisceau localement libre de type fini, on peut donc associer un élément de Ch(A), dont la composante sur le facteur K est le rang du faisceau, et la composante sur le facteur $1+\hat{A}^+$ la somme des classes de Chern. Les formules (6.2.1) sont alors les formules usuelles qui donnent les classes de Chern et le rang du produit tensoriel de deux faisceaux inversibles et des puissances extérieures d'un faisceau inversible (c'est-à-dire que l'application qu'on vient de définir du $K^\cdot$ dans Ch(A) est un λ-homomorphisme).

6.3. Pour toute K-algèbre graduée A, on désigne par $A_{\mathbb{Q}}$ la K-algèbre $A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, graduée de façon évidente. D'après 1.13, on définit un homomorphisme fonctoriel : $1+\hat{A}^+ \xrightarrow{\text{ch}} \hat{A}_{\mathbb{Q}}^+$ en donnant sa valeur pour 1+X, soit

(6.3.1) $$\text{ch}(1+X) = \exp(X) - 1 \quad .$$

Cet homomorphisme est compatible avec la multiplication définie en 6.1 sur $1+\hat{A}^+$: il suffit d'après 1.13 de la montrer pour les éléments 1+X, 1+Y de $1+K[\![X,Y]\!]^+$; or on a :

$$\begin{aligned} \text{ch}((1+X)*(1+Y)) &= \text{ch}\left(\frac{1+X+Y}{(1+X)(1+Y)}\right) \\ &= \text{ch}(1+X+Y) - \text{ch}(1+X) - \text{ch}(1+Y) \\ &= \exp(X+Y) - \exp(X) - \exp(Y) + 1 \\ &= \text{ch}(1+X).\text{ch}(1+Y) \quad . \end{aligned}$$

Notons η l'endomorphisme (fonctoriel par rapport à A) de $\hat{A}_{\mathbb{Q}}^+$, défini par :

$$\eta\Big(\sum_{k\geq 1} a_k t^k\Big) = \sum_{k\geq 1} \frac{(-1)^{k-1}}{(k-1)!} . a_k t^k \quad .$$

Alors, $\forall \varphi \in 1+\hat{A}^+$,

(6.3.2) $$\text{ch}(\varphi) = \eta\,(\text{Log}\ \varphi\ ).$$

En effet, ch et $\eta \circ \text{Log}$ sont deux homomorphismes fonctoriels de groupes abéliens, et il suffit pour qu'ils soient égaux qu'ils coïncident sur 1+X, ce qui est évident.

On en déduit que ch commute aux opérations de K : en effet, il suffit là encore de le montrer pour 1+X, et on a :

$$\begin{aligned} \forall a \in K, \quad \text{ch}(1+X)^a) &= \text{ch}(\exp(a\text{Log}(1+X))) \\ &= \eta(a\text{Log}(1+X)) \\ &= a.\eta(\text{Log}(1+X)) \\ &= a.\text{ch}(1+X). \end{aligned}$$

On peut donc de façon évidente étendre ch en un homomorphisme de K-algèbres : $Kx(1+\hat{A}^+) \longrightarrow K \oplus \hat{A}^+_{\mathbb{Q}}$. On a donc :

(6.3.3) $$ch(a,\varphi) = a + \eta(Log\varphi) .$$

Définition 6.4. L'homomorphisme ch : $ChA \longrightarrow K \oplus \hat{A}^+_{\mathbb{Q}}$ qui vient d'être défini s'appelle caractère de Chern.

Si A est de caractéristique 0 (i.e. est une $\mathbb{Q}$-algèbre), le caractère de Chern est un isomorphisme : en effet, soit $\psi \in K \oplus \hat{A}^+$; on peut écrire $\psi = a + \psi_1$, où ψ_1 est sans terme de degré nul ; on définit alors un morphisme inverse de ch par $\psi \rightsquigarrow (a, \exp(\eta^{-1}(\psi_1)))$.

Proposition 6.5. Soit A une K-algèbre graduée ; considérons sur Ch(A) la filtration définie comme suit (filtration par le degré) :

(6.5.1) $$(Ch(A))_0 = Ch(A); \forall n \geqslant 1, (Ch(A))_n = 0 \times 1+\hat{A}^{\geqslant n} ,$$

où $\hat{A}^{\geqslant n} = \prod_{i \geqslant n} A^i$. On a les congruences suivantes :

i) Soient $n \geqslant 1$, et $\varphi \in (ChA)_n$; posons $\varphi = 1+a_n+\ldots$; alors :

(6.5.2) $$ch(\varphi) = \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} . a_n + .. \quad ;$$

ii) Soient $\varphi \in (ChA)_m$, $\psi \in (ChA)_n$; posons $\varphi = 1+a_m+\ldots$, $\psi = 1+b_n+\ldots$; alors :

(6.5.3) $$\varphi * \psi = 1 - \frac{(m+n-1)!}{(m-1)!(n-1)!} . a_m b_n + .. ,$$

et par suite, la filtration par le degré est une filtration d'anneau.

i) Le caractère de Chern est par construction un morphisme de foncteurs filtrés ; de la congruence $\varphi \equiv 1+a_n$ mod. $(ChA)_{n+1}$, on déduit

donc $ch(\varphi) \equiv ch(1+a_n) \mod \hat{A}^{\geqslant n+1}$; or $ch(1+a_n) = \eta(Log(1+a_n))$

$$= \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!}\, a_n + \ldots$$

ii) Par substitution, il suffit de montrer la formule (6.5.3) pour $A = K[X_i ; Y_j]_{i,j\in\mathbb{N}}$ et pour $\varphi = 1 + \sum_{k\geqslant m} X_k$, $\psi = 1 + \sum_{k\geqslant n} Y_k$. Comme K est sans torsion, on peut plonger cet anneau dans son tensorisé par Q, et on voit ainsi que ch est injectif. Posons $\varphi * \psi = 1+Z_p+\ldots$, Z_p étant le premier terme non nul et $\neq 1$ de $\varphi * \psi$. La multiplicativité de ch nous donne, d'après (6.5.2) :

$$1 + \frac{(-1)^{p-1}}{(p-1)!}.Z_p + \ldots = (1 + \frac{(-1)^{m-1}}{(m-1)!}.X_m + \ldots)(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!}.Y_n + \ldots),$$

d'où la valeur de Z_p en identifiant les termes de plus bas degré.

6.6. Le λ-anneau ChA est augmenté vers K : on définit en effet un λ-homomorphisme de ChA dans K par $(a,\varphi) \rightsquigarrow a$. Il est donc muni d'une filtration canonique de λ-anneau augmenté. Nous allons la comparer à celle qui vient d'être définie.

Proposition 6.6.1. Soit $x \in ChA$ un élément de la forme $x = (n, 1+\ldots+a_n)$. Alors :

i) $\lambda^i(x) = 0$ pour $i \geqslant n$;

ii) $\lambda^n(x) = (1, 1+a_1)$

iii) $\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda^i(x) = 0, 1-(n-1)!a_n+\ldots)$, les termes non écrits étant de degré $> n$.

Par fonctorialité, il suffit de faire la démonstration dans le cas

où A est l'anneau $K[X_1,\dots,X_n]$, filtré par le poids par rapport aux X_i, X_i étant de poids i, et pour l'élément $(n,1+X_1+\dots+X_n)$.

On plonge A dans $A' = K[T_1,\dots,T_n]$ par les fonctions symétriques, et on obtient ainsi un homomorphisme injectif : $ChA \longrightarrow ChA'$; il vient alors :

$$(n,1+X_1+\dots+X_n) = (n,\prod_{i=1}^{n}(1+T_i))$$

$$= \sum_{i=1}^{n}(1,1+T_i)$$

On en déduit, d'après (6.2.1) :

$\lambda_t(x) = \prod_{i=1}^{n}(1 + (1,1+T_i)t)$, et on en tire :

$\lambda^k(x) = 0$ pour $k > n$, et $\lambda^n(x) = \prod_{i=1}^{n}(1,1+T_i) = (1,1+\sum_{i=1}^{n} T_i) = (1,1+X_1)$

Enfin, $\sum_{i=1}^{n}(-1)^i\lambda^i(x) = \lambda_{-1}(x) = \prod_{i=1}^{n}(1 - (1,1+T_i)) = (-1)^n.\prod_{i=1}^{n}(0,1+T_i)$.

Or, d'après (6.5.3), $\prod_{i=1}^{n}(0,1+T_i) = (0,1+(-1)^{n-1}(n-1)!\prod_{i=1}^{n}T_i +\dots)$

soit : $\lambda_{-1}(x) = (0,1 - (n-1)!X_n +\dots)$.

Corollaire 6.6.2. La relation 6.6.1.iii) est vraie pour tout élément X d'augmentation n.

Pour le montrer nous utiliserons le lemme :

Lemme 6.6.3. Pour tout n, $(ChA)_n$ est un λ-idéal de ChA.

On peut supposer $n \geqslant 1$. Soit $x = (0,\varphi) \in (ChA)_n$; on peut écrire $\gamma^i(0,\varphi) = (0,1+Q''_{i,1}+\dots+Q''_{i,j}+..)$ les $Q''_{i,j}$ étant les composantes isobares de poids j des $Q'_{i,j}$ (3.6). Pour tout j, les polynômes $Q''_{i,j}$ sont donc des polynômes par rapport aux j premiers coefficients de φ. Si $j < n$, ils sont donc nuls, et par suite, les $\gamma^i(x)$ appartiennent à $(ChA)_n$, et

$(ChA)_n$ est un λ-idéal.

Soit alors $x = (n,1+a_1+\ldots+a_n+\ldots)$ un élément d'augmentation n de ChA ; x est congru mod. $(ChA)_{n+1}$ à $(n,1+\ldots+a_n)$, et par suite, $\lambda_{-1}(x)$ est congru à $\lambda_{-1}(n,1+\ldots+a_n) = (0,1-(n-1)!a_n+\ldots)$, d'où :

$$\lambda_{-1}(x) = (0,1-(n-1)!a_n+\ldots) .$$

Corollaire 6.6.4. Soit ε l'homomorphisme d'augmentation de ChA ; alors, pour tout $x \in ChA$, on a :

$$\gamma^n(x-\varepsilon(x)) = (0,1+(-1)^{n-1}(n-1)!a_n + \ldots)$$

Par définition, $\gamma^n(x-\varepsilon(x)) = (-1)^n \sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda(x+n-\varepsilon(x))$. Comme $x+n-\varepsilon(x)$ est d'augmentation n on peut lui appliquer le corollaire 6.6.2, d'où le résultat.

Corollaire 6.6.5. Avec les notations de 3.10, $Fil_n ChA \subset (ChA)_n$.

D'après le corollaire précédent, $\gamma^n(x-\varepsilon(x)) \in (ChA)_n$. Le corollaire résulte alors de ce que les deux filtrations sont des filtrations d'anneau, et de ce que les $\gamma^n(x-\varepsilon(x))$, pour n et x variables, engendrent la filtration de λ-anneau.

Corollaire 6.6.7. Soit A une K-algèbre graduée de caractéristique nulle, à degrés bornés ; alors les deux filtrations définies sur ChA sont identiques.

Supposons que $Fil^p A = 0$, et soit $x = (0,1+a_n+\ldots+a_p)$ un élément de $(ChA)_n$. Posons $x' = (0,1+\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!}a_n+a_{n+1}+\ldots+a_p)$; on a alors : $\gamma^n(x') = (0,1+a_n+\ldots+a'_p)$, car x' est d'augmentation nulle. Par suite,

$x - \gamma^n(x') \in (ChA)_{n+1}$. En itérant l'opération p-n fois, on arrive à $(ChA)_{p+1}$, qui est nul, et on a donc écrit x comme un élément de $Fil^n ChA$. Compte tenu de (6.6.5), les deux filtrations sont donc identiques.

6.7. On suppose maintenant que A est un λ-anneau augmenté vers K, l'homomorphisme d'augmentation étant noté ε. On dispose donc sur A de la filtration canonique de λ-anneau augmenté, et on peut donc associer à Gr A son anneau de Chern.

Si $x \in A$, alors $\gamma_t(x-\varepsilon(x)) \in \hat{G}(A)$ par définition de la filtration de λ-anneau augmenté. On note c(x) et on appelle classe de Chern totale de x l'image de $\gamma_t(x-\varepsilon(x))$ dans $\hat{G}(A)/\hat{G}'(A) = 1+\widehat{GrA}^+$; on note $c^i(x)$, et on appelle i-ième classe de Chern de x, le i-ième coefficient de c(x) ; on a donc :

$$(6.7.1) \qquad c^i(x) = cl_{Gr^iA}(\gamma^i(x-\varepsilon(x))) \; ; \; c(x) = 1 + c^1(x) + \ldots$$

On pose alors :

$$(6.7.2) \qquad \tilde{c}(x) = (\varepsilon(x), c(x)) ,$$

et on appelle $\tilde{c}(x)$ la classe de Chern complétée de x.

Proposition 6.8. La classe de Chern complétée $c : A \to Ch(GrA)$, est un K-λ-homomorphisme de K-λ-algèbres augmentées.

Il est clair que l'homomorphisme ainsi défini est additif ; pour vérifier qu'il est multiplicatif, on écrit :

$$\gamma_t(xy-\varepsilon(xy)) = \gamma_t(\varepsilon(y)(x-\varepsilon(x))).\gamma_t(\varepsilon(x)(y-\varepsilon(y))).\gamma_t((x-\varepsilon(x))(y-\varepsilon(y)))$$

$$= (\gamma_t(x-\varepsilon(x)))^{\varepsilon(y)}.(\gamma_t(y-\varepsilon(y)))^{\varepsilon(x)}.(\gamma_t(x-\varepsilon(x)) \nabla \gamma_t(y-\varepsilon(y)))$$

d'où le résultat d'après (6.1.2) en passant au quotient.

Si $a \in K$, $\tilde{c}(a) = (a,1)$, donc $\tilde{c}$ est un homomorphisme de K-algèbres ; de plus il est compatible aux augmentations.

Il reste enfin à voir que c'est un λ-homomorphisme. Il faut donc montrer la commutativité du diagramme :

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\gamma t} & \hat{G}_g(A) \\ \downarrow{\scriptstyle \tilde{c}} & & \downarrow{\scriptstyle \hat{G}_g(\tilde{c})} \\ ChA & \xrightarrow{\gamma t} & \hat{G}_g(ChA) \end{array}$$

Par additivité, il suffit de la montrer pour les éléments de K, pour lesquels elle est évidente, et pour les éléments d'augmentation nulle de A, pour lesquels elle résulte, d'après la définition de c et (6.1.4), de celle du diagramme (3.7.2).

Proposition 6.9. Soit A une K-λ-algèbre augmentée, $z \in \mathrm{Fil}^m A$; alors :

$$\gamma^m(z) \equiv (-1)^{m-1}(m-1)!z \mod \mathrm{Fil}^{m+1}A,$$

i.e. $$c^m(z) = \mathrm{cl}_{\mathrm{Gr}^m A}((-1)^{m-1}(m-1)!\, z) \quad .$$

Il faut voir que ces deux éléments donnent même image dans $\mathrm{Gr}^m A$, c'est-à-dire que la m-ième classe de Chern de z est l'image de $(-1)^{m-1}(m-1)!z$.

On peut écrire z comme une somme $\Sigma\, a.\gamma^{i_1}(x_1)\ldots\gamma^{i_k}(x_k)$, avec $a \in A$ $\varepsilon(x_i) = 0$ pour tout i, et $i_1+\ldots+i_k \geq m$. On a alors :

$$\tilde{c}(z) = \sum \tilde{c}(a).\tilde{c}(\gamma^{i_1}(x_1))\ldots\tilde{c}(\gamma^{i_k}(x_k))$$

Comme $\tilde{c}$ est un λ-homomorphisme, on peut écrire :

$$\tilde{c}(\gamma^{i_j}(x_j)) = \gamma^{i_j}(\tilde{c}(x_j)).$$

Compte tenu de la définition de c, et de (6.6.4), on obtient :

$$\tilde{c}(\gamma^{i_j}(x_j)) = (0,1 + (-1)^{i_j-1}(i_j-1)!\,\gamma^{i_j}(x_j)+\dots)$$

D'après (6.5.3), et le fait que $\tilde{c}(a) = (a,1)$, on obtient finalement :

$$\tilde{c}(z) = \sum (0,(1+ (-1)^{i_1+\dots+i_k-1}(i_1+\dots+i_k-1)!\,\gamma^{i_1}(x_1)\dots\gamma^{i_k}(x_k)+\dots)^a)$$

$$= (0,1+ \sum_{\substack{(x_1,\dots,x_k)\\ i_1+\dots+i_k= m}} (-1)^{m-1}(m-1)!a\gamma^{i_1}(x_1)\dots\gamma^{i_k}(x_k) + \dots)$$

$$= (0,1 + (-1)^{m-1}(m-1)!\bar{z} + \dots),$$

d'où le résultat.

Proposition 6.10. Soient K un anneau binômial, R une K-λ-algèbre augmentée, N un élément de R tel que $\lambda^k(N) = 0$ pour $k > d$, et $x \in \mathrm{Fil}^i R$. Alors :

$$\gamma^{d+i}(N,x) - (-1)^{d+i-1}(d+i-1)!x \in \mathrm{Fil}^{i+1}R \quad .$$

On peut trouver des éléments $z_{\alpha,j}$ R, et $a_\alpha \in K$ tels que :

$$x = \sum_\alpha a_\alpha \gamma^{i_1}(x_{\alpha,1}) \dots \gamma^{i_k}(x_{\alpha,k}) \quad ,$$

avec $i_1+\dots+i_k \geqslant i$, et $\varepsilon(x_{\alpha,j}) = 0$ pour tout α et tout j. Soit R_o la K-λ-algèbre engendrée par des générateurs $N'_o, X_{\alpha,j}$ soumis aux relations :

$$\gamma^k(N'_o) = 0 \quad \text{pour } k > d.$$

On définit un homomorphisme d'augmentation $R_o \to K$ par $\varepsilon(N'_o) = \varepsilon(X_{\alpha,j})=0$. D'après (4.9.1), R_o est l'anneau des polynômes à coefficients dans K par rapport aux indéterminées $\gamma^n(N'_o)$, avec $1 \leqslant n \leqslant d$, et $\gamma^p(X_{\alpha,j})$ avec $p \geqslant 1$, et la λ-filtration de R_o est identique à sa filtration par le poids, en attribuant le poids k à $\gamma^k(N'_o)$ et $\gamma^k(X_{\alpha,j})$ (4.12 et 4.15).

On pose :

$$X_o = \sum_\alpha a_\alpha \gamma^{i_1}(X_{\alpha,1}) \dots \gamma^{i_k}(X_{\alpha,k}) \quad ,$$

et on va montrer 6.10 d'abord pour X_o et $N'_o = N_o + d$ (qui vérifient bien les hypothèses de 6.10). Compte tenu de la remarque faite plus haut sur la filtration de R_o, il suffit pour cela de montrer que :

$$\gamma^{d+i}(N_o, X_o)\gamma^d(N'_o) - (-1)^{d+i-1}(d+i-1)!X_o\gamma^d(N'_o) \in \mathrm{Fil}^{d+i+1}R_o \quad .$$

Or on a $\lambda_{-1}(N_o) = (-1)^d\gamma^d(N'_o)$; cette relation s'écrit donc :

$$(-1)^d\gamma^{d+i}(X_o\,(-1)^d\gamma^d(N'_o)) - (-1)^{d+i-1}(d+i-1)!X_o\gamma^d(N'_o) \in \mathrm{Fil}^{d+i+1}R_o \quad .$$

Posons $z = (-1)^d X_o\gamma^d(N'_o)$; alors $z \in \mathrm{Fil}^{d+i}R_o$, et on est ramené à montrer :

$$\gamma^{d+i}(z) - (-1)^{d+i-1}(d+i-1)!z \in \mathrm{Fil}^{d+i+1}R_o \quad .$$

Or ceci résulte de 6.9.

Pour déduire 6.10 de ce cas particulier, on considère le K-λ-homomorphisme $R_o \longrightarrow R$ qui envoie N'_o sur N - d et $X_{\alpha,j}$ sur $x_{\alpha,j}$ pour tout α et tout j (4.7). Cet homomorphisme est compatible aux λ-filtrations, et envoie N_o sur N, et X_o sur X, d'où le résultat.

Proposition 6.11. On suppose que K est de caractéristique nulle. Soit $n \geqslant o$ un entier. Alors, le foncteur Ch est une équivalence de catégories de la catégorie des K-algèbres graduées A telles que $A_o = K$, $A_k = 0$ pour $k > n$, dans la catégorie des K-λ-algèbres augmentées $\wedge$ telles que $\mathrm{Fil}^{n+1}\wedge = 0$; un foncteur quasi-inverse est donné par $\wedge \rightsquigarrow \mathrm{Gr}\wedge$.

Soit A une K-algèbre graduée telle que $A_k = 0$ pour $k > n$, munie de la filtration associée à sa graduation ; alors $(\mathrm{Ch}A)_{n+1} = 0$, donc $\mathrm{Fil}^{n+1}\mathrm{Ch}A = 0$ (6.6.5). Réciproquement, si $\wedge$ est une K-λ-algèbre augmentée telle que $\mathrm{Fil}^{n+1}\wedge = 0$, alors $\mathrm{Gr}^o\wedge = K$, $\mathrm{Gr}^k\wedge = 0$ pour $k > n$.

On va définir des isomorphismes de foncteurs :

$$A \longrightarrow \mathrm{Gr}(\mathrm{Ch}A) \quad , \quad \wedge \longrightarrow \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}\wedge) \quad .$$

Comme A est à graduation finie, les gradués associés aux filtrations sur ChA de λ-anneau et par le degré sont identiques (6.6.7). On définit alors $u : A \longrightarrow Gr_{deg}(ChA)$ par l'identité sur A_o et par :

$$\forall i > 1, \forall a_i \in A_i, \quad u(a_i) = cl_{Gr^i}(0,1+(-1)^{i-1}(i-1)!a_i) ,$$

et on prolonge par additivité. D'après la relation (6.5.3), c'est un homomorphisme d'anneaux gradués, et il est facile de voir qu'il est compatible aux opérations de K. Le morphisme inverse u^{-1} peut être défini ainsi : $\forall i \geqslant 1, \forall \bar{\varphi} \in Gr^i(ChA)$, le i-ième coefficient a_i de φ ne dépend pas de la façon dont $\bar{\varphi}$ a été remonté dans $(ChA)_i$, et on pose :

$$u^{-1}(\bar{\varphi}) = \frac{(-1)^{i-1}}{(i-1)!} a_i .$$

L'homomorphisme u est donc un isomorphisme.

L'isomorphisme $\wedge \longrightarrow Ch(Gr\wedge))$ est défini par la classe de Chern complétée $\tilde{c}$. Pour vérifier qu'elle définit bien un isomorphisme, il suffit de vérifier que l'homomorphisme obtenu par passage aux graudés associés en est un, les filtrations étant discrètes. On obtient donc :

$$Gr\wedge \xrightarrow{Gr(\tilde{c})} Gr_\lambda(Ch(Gr\wedge)) \simeq Gr_{deg}(Ch(Gr\wedge)) \xrightarrow{u^{-1}} Gr\wedge.$$

Il suffit de montrer que le composé est l'identité. Comme les homomorphismes sont des homomorphismes de K-algèbres graduées, il suffit, d'après la définition de la filtration de λ-anneau de $\wedge$, de montrer que c'est l'identité pour les $\overline{\gamma^i(x)}$, avec $\varepsilon(x) = 0$. On obtient alors :

$$Gr(\tilde{c})(\overline{\gamma^i(x)}) = cl_{Gr^i}(\gamma^i(\tilde{c}(x))) .$$

Or $\gamma^i(\tilde{c}(x)) = (0,1+(-1)^{i-1}(i-1)!c^i(x) + \ldots)$, d'après (6.6.4) ; donc :

$$cl_{Gr^i}(\gamma^i(\tilde{c}(x))) = u(c^i(x)),$$

ce q i montre que $u^{-1} \circ Gr(\widetilde{c}) = Id$.

Corollaire 6.12. Si K est de caractéristique nulle, et $\wedge$ une K-λ-algèbre de filtration discrète, alors la classe de Chern complétée :

$$\widetilde{c} : \wedge \longrightarrow Ch(Gr\wedge)$$

est un isomorphisme.

La démonstration est contenue dans celle de 6.11.

Définition 6.13. Soit A une K-algèbre graduée, et $\wedge$ une K-λ-algèbre augmentée ; on appelle théorie de Chern de $\wedge$ à valeurs dans A tout λ-homomorphisme : $\wedge \longrightarrow Ch(A)$, compatible avec les augmentations.

On définit un foncteur sur la catégorie des K-algèbres graduées, à valeurs dans la catégorie des ensembles, en associant à toute K-algèbre graduée A l'ensemble des théories de Chern de $\wedge$ à valeurs dans A, soit $\mathrm{Hom}_{\lambda}(\wedge, Ch(A))$.

Proposition 6.14. Le foncteur défini en 6.13 est représentable. Si K est de caractéristique nulle, et $\wedge$ de filtration discrète, il est représenté par le gradué associé à $\wedge$.

Montrons d'abord le premier point. On considère la K-algèbre graduée engendrée par des générateurs $c^i(x)$, avec $i \geqslant 1$, $x \in Fil^1 \wedge$, $c^i(x)$ étant de degré i, et on fait son quotient par les relations suivantes :

i) $c^k(x+y) = \sum_{i+j=k} c^i(x)c^j(y)$, pour $k \geqslant 1$, $x,y \in Fil^1\wedge$;

ii) $c^k(xy) = P''_k(c^i(x),c^j(y))$ (cf. 6.1), pour $k \geqslant 1$, $x,y \in Fil^1\wedge$;

iii) $c^k(ax) = R_{k,a}(c^i(x)$ (cf. 6.1), pour $k \geqslant 1$, $a \in K$, $x \in Fil^1\wedge$;

iv) $c^k(\gamma^j(x)) = Q''_{j,k}(c^i(x))$ (cf. 6.1), pour $j,k \geqslant 1$, $x \in Fil^1\wedge$,

Ces relations étant isobares, le quotient est une K-algèbre graduée Ω . On définit un morphisme $\wedge \xrightarrow{\tilde{c}_o} Ch(\Omega)$ par :

$$x \rightsquigarrow (\varepsilon(x), 1 + c^1(x-\varepsilon(x)) + \ldots).$$

Les relations imposées montrent que c'est une théorie de Chern de $\wedge$ à valeurs dans Ω. Si de plus on a une théorie de Chern f, à valeurs dans une K-algèbre graduée A, on a de façon unique un homomorphisme : $\Omega \to A$, tel que f se factorise par $Ch(\Omega)$; il est défini en envoyant, pour tout $i \geqslant 1$, et tout $x \in Fil^1\wedge$, l'élément $c^i(x)$ sur le i-ième coefficient de $f(x)$ (ce qui est bien défini car f est un λ-homomorphisme).

Supposons maintenant K de caractéristique nulle, et $\wedge$ de filtration discrète ; soit n tel que $Fil^n\wedge = 0$. Alors l'algèbre graduée Ω est nulle en degrés $\geqslant n$. Pour le montrer, il faut montrer que pour $x_1,\ldots,x_p \in Fil^1\wedge$, et $k_1+\ldots+k_p \geqslant n$, on a :

$$c^{k_1}(x_1)\ldots.c^{k_p}(x_p) = 0.$$

Or par hypothèse, on a :

$$\gamma^{k_1}(x_1)\ldots.\gamma^{k_p}(x_p) = 0 ;$$

En appliquant le λ-homomorphisme $\tilde{c}_o$, on obtient :

$$\gamma^{k_1}(\tilde{c}_o(x_1))\ldots.\gamma^{k_p}(\tilde{c}_o(x_p)) = (0,1).$$

Or d'après (6.6.4) et (6.5.3), ceci entraine :

$$(k_1+\ldots+k_p)!c^{k_1}(x_1)\ldots c^{k_p}(x_p) = 0.$$

Comme K est de caractéristique nulle, on a le résultat voulu.

La propriété universelle de Ω appliqué à l'homomorphisme canonique $\tilde{c}$ donne un diagramme commutatif :



D'après la proposition 6.11, l'homomorphisme : $\Omega \longrightarrow Gr\wedge$ est un isomorphisme si et seulement si l'homomorphisme : $Ch(\Omega) \longrightarrow Ch(Gr\wedge)$ en est un. Comme il est visiblement surjectif, ce dernier l'est aussi, et il suffit donc de montrer que $Ch(\Omega) \to Ch(Gr\wedge)$ est injectif. Par fonctorialité de Ch, on obtient le diagramme :



comme Ω est à degrés bornés, la flèche verticale de droite est un isomorphisme (6.12), et en utilisant 6.11, on obtient donc un morphisme : $Gr\wedge \longrightarrow \Omega$, le composé des deux étant l'identité d'après la propriété universelle de Ω.

APPENDICE : Les opérations Ψ^k d'Adams

Nous suivons ici une présentation due à J.P. Serre.

7.1. Soit K un pré-λ-anneau. Pour tout $x \in K$, on désigne par $\frac{d}{dt}(\lambda_t(x))$ la dérivée par rapport à t de $\lambda_t(x)$. On définit alors des éléments de K, notés $\Psi^k(x)$, en posant :

$$(7.1.1) \qquad \frac{d}{dt}(\lambda_t(x))/\lambda_t(x) = \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}\Psi^k(x)t^{k-1}.$$

Les applications $\Psi^k : K \to K$ sont additives ; en effet, on a :

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(x+y))/\lambda_t(x+y) = \frac{d}{dt}(\lambda_t(x)\lambda_t(y))/\lambda_t(x)\lambda_t(y)$$

$$= \frac{d}{dt}(\lambda_t(x))/\lambda_t(x) + \frac{d}{dt}(\lambda_t(y))/\lambda_t(y) ;$$

et par suite, pour tout k :

$$\psi^k(x+y) = \psi^k(x) + \psi^k(y).$$

D'après (7.1.1), les ψ^k sont des polynomes isobares de poids k par rapport aux λ^i, avec i = 1,...,k. Donnons par exemple les valeurs de ψ^1 et ψ^2 :

$$\psi^1(x) = \lambda^1(x) = x,$$
$$\psi^2(x) = x^2 - 2\lambda^2(x).$$

7.2. Soit K un anneau de caractéristique 0 ; supposons données des applications ψ^k de K dans K, additives, et telles que $\psi^1 = Id_K$. On définit alors une pré-λ-structure sur K en posant :

$$\lambda_t(x) = \exp\Big(\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1}\psi^k(x)t^k/k\Big). \tag{7.2.1}$$

La multiplicativité résulte de l'additivité des ψ^k. Il y a donc équivalence entre la donnée d'une pré-λ-structure sur K, et la donnée des opérations ψ^k correspondantes.

7.3. Il est clair d'après la formule (7.1.1) que les ψ^k commutent aux λ-homomorphismes. Si K, K' sont des pré-λ-anneaux de caractéristique nulle, il est nécéssaire et suffisant qu'un homomorphisme f : K → K' commute aux ψ^k pour qu'il soit un λ-homomorphisme : cela résulte de 7.2, les λ^i s'expriment comme polynomes par rapport aux ψ^k.

Exemples 7.4. i) Pour K = $\mathbb{Z}$, muni de sa structure de λ-anneau, on a :

$$\frac{d}{dt}(\lambda_t(n))/\lambda_t(n) = n(1+t)^{n-1}/(1+t)^n = n.\sum_{k=1}(-1)^{k-1}t^{k-1}.$$

Par suite, les ψ^k sont tous égaux à l'application identique de $\mathbb{Z}$.

ii) Plaçons nous sur la catégorie $\mathcal{C}_0$ des $\mathbb{Z}$-algèbres (1.8). Les

opérations Ψ^k définissent d'après 7.3 des endomorphismes additifs du foncteur en λ-anneaux $\hat{G}$; d'après 1.10, ils sont caractérisés par leur valeur pour $1+Xt$. On a :

$$\frac{d}{dt}(\lambda_u(1+Xt))/\lambda_u(1+Xt)) = \frac{1+Xt}{\underline{1} + \{1+Xt\}u}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1}\{1+Xt\}^{\circ k} u^{k-1}.$$

Par suite :

$$\Psi^k(1+Xt) = 1+X^k t. \tag{7.4.1}$$

Proposition 7.5. i) Si K est un λ-anneau, les opérations Ψ^k vérifient les identités :

$$\Psi^k(1) = 1 \quad ; \quad \Psi^k(xy) = \Psi^k(x)\Psi^k(y) \quad ; \quad \Psi^k \circ \Psi^{k'} = \Psi^{kk'}. \tag{7.5.1}$$

ii) Réciproquement, si les Ψ^t vérifient ces identités, et si K est de caractéristique nulle, K est un λ-anneau.

i) Si K est un λ-anneau, on a $\lambda_t(1) = 1+t$, d'où :

$\frac{d}{dt}(\lambda_t(1))/\lambda_t(1) = 1/1+t = \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k-1}t^{k-1}$, et par suite :

$$\Psi^k(1) = 1.$$

Pour montrer la seconde des relations (7.5.1), on considère le diagramme :

$$\begin{array}{ccccc} K \times K & \xrightarrow{\lambda_t \times \lambda_t} & \hat{G}(K) \times \hat{G}(K) & \xrightarrow{\Phi^k \times \Phi^k} & K \times K \\ \downarrow & & \circ \downarrow & & \downarrow \\ K & \xrightarrow{\lambda_t} & \hat{G}(K) & \xrightarrow{\Phi^k} & K \end{array} \tag{7.5.2}$$

où les flèches verticales sont définies par la multiplication, et les applications Φ^k comme suit : l'application "dérivée logarithmique" est

un homomorphisme de groupes de $\hat{G}(K)$ dans $K[[t]]$; l'application qui à une série associe son (k-1)-ième coefficient, multiplié par $(-1)^{k-1}$, est un homomorphisme additif de $K[[t]]$ dans K ; le morphisme Φ^k sera le composé des deux. Il est clair que $\Phi^k \circ \lambda_t = \psi^k$ d'après la définition (7.1.1).

La seconde des formules (7.5.1) exprime donc la commutativité du diagramme écrit plus haut. Si on suppose que K est un λ-anneau, le carré de gauche est commutatif, et il suffit de vérifier la commutativité de celui de droite. Or il s'agit d'un diagramme d'homomorphismes de foncteurs sur $\mathcal{C}_o$, ayant pour source $\hat{G} \times \hat{G}$; il suffit donc d'après 1.10 de vérifier la commutativité pour (1+Xt,1+Yt) ; on a alors :

$\Phi^k(1+Xt) = X^k$ ((k-1)-ième coefficient de X/1+Xt) ; $\Phi(1+Yt) = Y^k$;

$\Phi^k((1+Xt)\circ(1+Yt)) = \Phi^k(1+XYt) = (XY)^k = \Phi^k(1+Xt)\Phi^k(1+Yt)$, ce qui donne le résultat.

Pour montrer la dernière, on remarque d'abord que le diagramme :

(7.5.3)
$$\begin{array}{ccc} \hat{G}^t(K) & \xrightarrow{\lambda_u} & \hat{G}^u \circ \hat{G}^t(K) \\ {\scriptstyle \Phi^{kk'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Phi_u^{k'}} \\ K & \xrightarrow{\Phi^k} & \hat{G}^t(K), \end{array}$$

est commutatif. Comme plus haut, il suffit en effet de le voir pour 1+Xt et on a :

$\Phi_u^{k'}(\lambda_u(1+Xt)) = \Phi_u^{k'}(1 + \{1+Xt\}u) = (1+Xt)^{\circ k'} = 1+X^{k'}t$;

$\Phi^k(1+X^{k'}t) = X^{kk'} = \Phi^{kk'}(1+Xt)$.

Par suite, $\psi^{kk'} = \Phi^k \circ \Phi_u^{k'} \circ \lambda_u \circ \lambda_t = \Phi^k \circ \psi^{k'} \circ \lambda_t$.

Par ailleurs, $\psi^k \circ \psi^{k'} = \Phi^k \circ \lambda_t \circ \Phi^{k'} \circ \lambda_t = \Phi^k \circ \lambda_t \circ \psi^{k'}$.

Or si K est un λ-anneau, le diagramme :

(7.5.4)
$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\lambda_t} & \hat{G}(K) \\ {\scriptstyle \Psi^{k'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Psi^{k'}} \\ K & \xrightarrow{\lambda_t} & \hat{G}(K) \end{array}$$

est commutatif d'après 7.3, puisque λ_t est un λ-homomorphisme. On en déduit aussitôt les relations cherchées.

ii) Si K est de caractéristique nulle, l'application "dérivée logarithmique" est un isomorphisme de $\hat{G}(K)$ sur $K[[t]]$, car on peut intégrer. Par suite, deux éléments de $\hat{G}(K)$ sont égaux si, et seulement si pour tout k, ils ont même image par Φ^k.

Pour montrer que λ_t est un homomorphisme d'anneaux, il faut montrer la commutativité du carré de gauche du diagramme (7.5.2), et d'après la remarque précédente, il suffit de montrer que pour tout k, le diagramme (7.5.2) est commutatif, puisque le carré de droite l'est toujours. Or ceci n'est autre que les relations $\Psi^k(xy) = \Psi^k(x)\,\Psi^k(y)$.

Pour montrer que λ_t est un λ-homomorphisme, il suffit de montrer que le diagramme (7.5.4) est commutatif pour tout k', d'après 7.3. Or, d'après la remarque qui précède, cela équivaut à montrer pour tous k, k', que $\Phi^k \circ \Psi^{k'} \circ \lambda_t = \Phi^k \circ \lambda_t \circ \Psi^{k'}$, c'est-à-dire les relations $\Psi^{kk'} = \Psi^k \circ \Psi^{k'}$.

Enfin, la relation $\lambda_t(1) = 1+t$ s'obtient par intégration à partir des relations $\Psi^k(1) = 1$.

BIBLIOGRAPHIE

[1] A. Grothendieck, La théorie des classes de Chern, Bull. Soc. math. France, 86, 1958, p.137 à 154.

[2] F. Hirzebruch, Neue topologische Methoden in der algebraischen Geometrie.

Exposé VI

LE K' D'UN FIBRE PROJECTIF : CALCULS ET CONSEQUENCES

par Pierre BERTHELOT

1. Calcul du K' d'un fibré projectif : cas des faisceaux localement libres de type fini

Dans ce paragraphe, la notation $K'(X)$ désignera le groupe de Grothendieck des faisceaux localement libres de type fini sur un schéma X. Le but du paragraphe est de démontrer le théorème suivant :

Théorème 1.1. *Soient* S *un schéma quasi-compact,* $\underline{E}$ *un* $\underline{O}_S$*-Module localement libre de rang* r+1, $X = \underline{\mathbb{P}}(\underline{E})$ *le fibré projectif associé ; le morphisme structural :* $X \xrightarrow{f} S$ *définit un homomorphisme d'anneaux :* $K'(S) \xrightarrow{f^*} K'(X)$ *munissant* $K'(X)$ *d'une structure de* $K'(S)$*-algèbre. Soit* $\xi \in K'(X)$ *la classe du faisceau* $\underline{O}_X(1)$. *Alors* $K'(X)$ *est un* $K'(S)$*-module libre admettant pour base* $1, \ldots, \xi^r$.

Plan de la démonstration :

1°) Les puissances de ξ engendrent $K'(X)$ comme $K'(S)$-module. Pour le montrer, nous allons montrer les points suivants :

a) Si $\underline{F}$ est un $\underline{O}_X$-Module localement libre de type fini, il existe un $\underline{\mathbb{S}}(\underline{E})$-Module module gradué $\underline{M}$ de présentation finie, plat sur $\underline{O}_S$, tel que $\underline{F} = \underline{\mathrm{Proj}}_O(\underline{M})$ ($\underline{\mathbb{S}}(\underline{E})$ étant l'algèbre symétrique de $\underline{E}$; pour la notation $\underline{\mathrm{Proj}}_O$, voir EGA II 8.12.1 .

b) Il existe une résolution graduée finie de $\underline{M}$ par des $\underline{\mathbb{S}}(\underline{E})$-Modules graduée $\underline{L}_i$ localement libres de type fini : $0 \to \underline{L}_{r+1} \to \ldots \to \underline{L}_o \to \underline{M} \to 0$.

c) Les $\underline{L}_i$ admettent une filtration finie dont les quotients sont du type $\underline{N}_j \otimes_{\underline{O}_S} \underline{\mathbb{S}}(\underline{E})(j)$, les $\underline{N}_j$ étant localement libres de type fini sur S.

2°) $1,\ldots,\xi^{r+1}$ sont linéairement dépendants sur $K'(S)$.

3°) $1,\ldots,\xi^{r}$ sont linéairement indépendants sur $K'(S)$.

1.2. Pour plus de commodité, nous allons rappeler ici quelques définitions et propriétés classiques des Modules gradués.

Soient S un schéma, $\underline{B}$ une $\underline{O}_S$-Algèbre graduée, $\underline{M}$ un $\underline{B}$-Module gradué, Pour tout $\underline{B}$-Module gradué $\underline{N}$, on désigne comme d'habitude par $\underline{N}(n)$ le $\underline{B}$-Module gradué défini par :

$$(\underline{N}(n))_k = \underline{N}_{n+k} \quad \text{pour tout } k.$$

On dit que $\underline{M}$ est un $\underline{B}$-Module gradué localement libre (resp. localement libre de type fini) si tout point de S possède un voisinage ouvert U tel que $\underline{M}|U$ soit isomorphe, en tant que $\underline{B}$-Module gradué, à une somme directe de Modules de la forme $\underline{B}(n)|U$ (resp. une somme directe finie). On dit que $\underline{M}$ est un $\underline{B}$-Module gradué de présentation finie si tout point de S possède un voisinage ouvert U tel qu'il existe une suite exacte $\underline{P} \to \underline{Q} \to \underline{M}|U \to 0$, où $\underline{P}$ et $\underline{Q}$ sont des $(\underline{B}|U)$-Modules gradués libres de type fini, et les homomorphismes compatibles aux graduations.

1.2.1. Pour tout entier n, on peut définir un homomorphisme canonique de $\underline{B}$-Modules gradués :

$$\underline{M}_n \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-n) \to M, \tag{1.2.1}$$

en envoyant $x \otimes a$, où x est une section de $\underline{M}_n$, et a une section de $(\underline{B}(-n))_k = \underline{B}_{k-n}$ sur l'élément a.x de $\underline{M}_k$.

1.2.2. On dit qu'un $\underline{B}$-Module gradué $\underline{M}$ est libre de type fini, et homogène de degré n s'il est isomorphe en tant que $\underline{B}$-Module gradué à $(\underline{B}(-n))^k$ pour un certain entier k.

Soit $\underline{M}$ un $\underline{B}$-Module gradué libre de type fini. D'après 1.2, on peut trouver un isomorphisme gradué :

$$\underline{M} \simeq \bigoplus_{n=n_o}^{n_1} (\underline{B}(-n))^{k_n} \quad . \tag{1.2.2}$$

On obtient ainsi une décomposition de $\underline{M}$ en somme directe de $\underline{B}$-Modules gradués libres de type fini et homogènes, soit :

$$\underline{M} \simeq \bigoplus_{n=n_o}^{n_1} \underline{M}^{(n)} \quad ,$$

où $\underline{M}^{(n)}$ est libre homogène de degré n et de rang k_n.

Proposition 1.2.3. *Les entiers k_n intervenant dans la décomposition (1.2.2) ne dépendent pas de la décomposition choisie.*

Supposons données deux décompositions, donc un isomorphisme gradué :

$$\bigoplus_{n=n_o}^{n_1} (\underline{B}(-n))^{k_n} \simeq \bigoplus_{n=n'_o}^{n'_1} (\underline{B}(-n))^{k'_n} \quad .$$

La démonstration se fait par récurrence sur le nombre de facteurs directs libres homogènes non nuls intervenant dans la décomposition de gauche. Si c'est 0, alors $\underline{M} = 0$, et la proposition est évidente. Supposons la démontrée pour $n_1 - n_o = m$, et montrons la pour $n_1 - n_o = m+1$. L'isomorphisme donné, étant compatible aux graduations, donne un isomorphisme sur les composantes homogènes des deux membres, et en particulier un isomorphisme des composantes homogènes de degré $< n_o$, ce qui montre que pour $n < n_o$, on a $k'_n = 0$, et sur les composantes homogènes de degré n_o, ce qui montre qu'elles ont même rang, et par suite que $k_{n_o} = k'_{n_o}$.
L'isomorphisme donné induit donc un isomorphisme des facteurs directs libres homogènes de plus bas degré des deux décompositions et passe donc au quotient par ces facteurs directs ; on applique alors l'hypothèse de récurrence au Module quotient, d'où le résultat.

Il résulte en particulier de 1.2.3 que pour tout Module gradué libre de type fini $\underline{M}$, le nombre d'éléments d'une base homogène de $\underline{M}$ ayant un degré donné ne dépend pas de la base choisie. En particulier, les entiers n_o et n_1 intervenant dans la décomposition (1.2.2), définis par les conditions $k_{n_o} \neq 0$, $k_{n_1} \neq 0$, ne dépendent pas de la décomposition

Proposition 1.3. Soient S un schéma quasi-compact, $\underline{E}$ un $\underline{O}_S$-Module localement libre de type fini, X le fibré projectif associé. Soit $\underline{F}$ un $\underline{O}_X$-Module de présentation finie, plat sur S. Il existe un entier n_o, tel que pour $n \geqslant n_o$, on ait :

i) $R^i f_*(\underline{F}(n)) = 0$ pour $i \geqslant 1$;

ii) $f_*(\underline{F}(n))$ est localement libre de type fini sur S ;

iii) $\underline{M} = \bigoplus_{n \geqslant n_o} f_*(\underline{F}(n))$ est un $\underline{S}(\underline{E})$-Module gradué de présentation finie (1.2).

Les propriétés cherchées sont de nature locale sur S ; comme S est quasi-compact, on peut, en prenant le plus grand des entiers trouvés, se ramener au cas où S est affine.

Supposons d'abord S noethérien.

La propriété i) résulte alors du théorème de Serre.

La propriété ii) résulte de EGA III 7.9.10, n_o étant choisi tel que la propriété i) soit vérifiée.

D'après EGA II 3.4.5, il existe un $\underline{S}(\underline{E})$-Module gradué quasi-cohérent $\underline{M}'$, de type fini, tel que $\underline{F} = \underline{Proj}_o(\underline{M}')$. Par ailleurs, $\Gamma_*(\underline{F}) = \Gamma_*(\underline{Proj}_o \underline{M}') = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} f_*(\underline{F}(n))$ est TN-isomorphe à $\underline{M}'$ d'après EGA III 2.3.1 ; donc il existe un entier n_1 tel que $\bigoplus_{n \geqslant n_1} f_*(\underline{F}(n)) \simeq \bigoplus_{n \geqslant n_1} \underline{M}'_n$,

donc tel que $\bigoplus_{n \geqslant n_1} f_*(\underline{F}(n))$ soit un $\underline{\underline{S}}(\underline{E})$-Module de type fini, donc de présentation finie d'après les hypothèses noethériennnes ; le résultat est d'ailleurs valable pour tout entier n_1, les $f_*(\underline{F}(n))$ étant cohérents d'après le théorème de Serre.

La proposition est donc montrée dans le cas ou S est noethérien.

Supposons maintenant qu'on ait un carré cartésien :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & X_o \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_o} \\ S & \xrightarrow{g_o} & S_o, \end{array}$$

avec S_o noethérien, $X_o = \underline{\underline{P}}(\underline{E}_o)$; soit $\underline{F}_o$ un $\underline{O}_X$-Module de présentation finie, plat sur S_o, et soit $\underline{F} = g^*(\underline{F}_o)$. D'après ce qui précède la proposition est vraie pour $\underline{F}_o$. D'après EGA III 7.7.5 et 7.8.5, le théorème de changement de base est vrai avec les hypothèses précédentes ; on en déduit aussitôt que le théorème est vrai pour $\underline{F}$.

Il suffit donc, pour achever la démonstration, de montrer que le cas général (avec S affine) peut être obtenu à partir du cas noethérien par changement de base.

Comme S est affine, S est limite projective filtrante de schémas affines noethériens (si S = Spec(A), on écrit A comme limite inductive de ses sous-algèbres de type fini sur $\mathbb{Z}$). Soit donc $S = \varprojlim S_\lambda$. D'après EGA IV 8.5.2 et 8.5.5, il existe un indice λ et un $\underline{O}_{S_\lambda}$-Module localement libre de type fini $\underline{E}_\lambda$ tel que $\underline{E} = u_\lambda^*(\underline{E}_\lambda)$ (en notant u_λ le morphisme $S \to S_\lambda$, et $u_{\lambda\mu}$ les morphismes de transition $S_\mu \to S_\lambda$).

Si on pose, pour $\mu \geqslant \lambda$, $\underline{E}_\mu = u_{\lambda\mu}^*(\underline{E}_\lambda)$, et $X_\mu = \underline{\underline{P}}(\underline{E}_\mu)$, on a pour tout μ, $X = X_\mu \times_{S_\mu} S$, et $X = \varprojlim X_\mu$. Par suite, il existe un indice $\lambda' \geqslant \lambda$

et un faisceau $\underline{F}_{\lambda'}$, de présentation finie sur $X_{\lambda'}$, tel que $\underline{F} = u'^{*}_{\lambda'}(\underline{F}_{\lambda'})$ ($u'_{\lambda'}$ étant le morphisme $X \to X_{\lambda'}$). Comme les X_μ et les $\underline{F}_\mu$ sont de présentation finie, on peut d'après EGA IV 11.2.6 trouver un indice λ'' tel que $\underline{F}_{\lambda''}$ soit plat sur $S_{\lambda''}$. Toutes les hypothèses de 1.3 sont donc vérifiée, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 1.4. Avec les hypothèses de 1.3, il existe un $\underline{S}(E)$-Module gradué $\underline{M}$, de présentation finie, et plat sur $\underline{O}_S$, tel que $\underline{F} = \underline{Proj}_o(\underline{M})$.

Soit n_o un entier tel que les propriétés de 1.3 soient vérifiées. Si $\underline{M} = \bigoplus_{n \geqslant n_o} f_*(\underline{F}(n))$, on a vu que $\underline{M}$ est de présentation finie, et il est plat sur S, puisque les $f_*(\underline{F}(n))$, pour $n \geqslant n_o$, sont localement libres sur S.

Par ailleurs, $\underline{F} = \underline{Prcj}_o(\underline{M})$ d'après EGA II 3.4.

Passons à la partie b) de la démonstration.

Lemme 1.5.1. Soient A un anneau, B une A-algèbre graduée à degrés positifs telle que $B_o = A$, M un B-module gradué. On suppose que M est projectif de type fini, en tant que B-module non gradué. Soient $\widetilde{B}$ le faisceau d'algèbres sur Spec(A) défini par B, $\widetilde{M}$ le $\widetilde{B}$-Module associé à M ; alors $\widetilde{M}$ est localement sur Spec(A) libre de type fini sur $\widetilde{B}$, comme $\widetilde{B}$-Module gradué (1.2).

Comme M est de type fini, il est à degrés bornés inférieurement. Par ailleurs, $M \otimes_B A$ est projectif de type fini sur A, et par suite n'a qu'un nombre fini de composantes homogènes non nulles, elles mêmes projectives de type fini sur A ; en localisant sur Spec(A), on peut donc supposer $M \otimes_B A$ libre de type fini sur A. Enfin, M étant projectif, $\mathrm{Tor}_1^B(M,A) = 0$. De ces propriétés résulte que M est libre de type fini sur B comme module gradué (voir Bourbaki, Alg. ch.II §11 prop.7), donc $\widetilde{M}$ est libre de type fini sur $\widetilde{B}$, cqfd.

Lemme 1.5.2. Soient A un anneau, B une A-algèbre de présentation finie, M un B-module de présentation finie. On suppose B et M plats sur A, et que pour tout corps résiduel k de A, $M \otimes_A k$ est de dimension projective $\leq n$ sur $B \otimes_A k$ (ce qui est le cas si $B = A[t_o, \ldots, t_r]$). Sous ces conditions, M admet une résolution de longueur n par des B-modules projectifs de type fini :

$$0 \to L_n \to \ldots \to L_o \to M \to 0 \quad .$$

Ce lemme résulte immédiatement de EGA IV 12.3.2.

Proposition 1.6. Soient S un schéma quasi-compact, E un O_S-Module localement libre de rang r+1, B son algèbre symétrique, avec sa graduation habituelle, M un B-Module gradué de présentation finie, plat sur S. Alors il existe une résolution graduée :

$$0 \to \underline{L}_{r+1} \to \ldots \to \underline{L}_o \to \underline{M} \to 0 \ ,$$

les $\underline{L}_i$ étant des B-Modules gradués qui sont localement libres de type fini (en tant que B-Modules gradués).

Montrons d'abord que pour tout B-Module gradué M, satisfaisant aux conditions de la proposition, il existe un homomorphisme gradué surjectif : $\underline{L} \to \underline{M}$, où L est un B-Module localement libre de type fini.

Comme M est de type fini, il existe un entier N tel que M soit engendré sur B par ses composantes de degré $\leq N$. On pose alors :

$$\underline{L} = \bigoplus_{i \leq N} \underline{M}_i \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-i) \quad ;$$

l'homomorphisme de L dans M se définit grâce à (1.2.1), et il est clair qu'il surjectif.

D'après 1.5.2, M admet une résolution (non graduée) par des B-Modules localement libres de type fini sur chaque ouvert affine. Par suite, si

$\underline{M}$ a une résolution partielle globale :

$$\underline{L}_i \to \underline{L}_{i-1} \to \dots \to \underline{L}_o \to \underline{M} \to 0 \ ,$$

par des $\underline{B}$-Modules localement libres de type fini, le noyau $\underline{Z}_i$ de $\underline{L}_i \to \underline{L}_{i-1}$ est encore un $\underline{B}$-Module de type fini (I. 2.11). Il est même de présentation finie (en faisant le même raisonnement avec i+1 au lieu de i). Enfin, il est plat sur S. Il vérifie donc les mêmes hypothèses que $\underline{M}$, ce qui permet de construire de proche en proche une résolution globale graduée de $\underline{M}$ par des $\underline{B}$-Modules gradués localement libres de type fini, d'après la remarque initiale. Pour $i \geqslant r+1$, $\underline{Z}_i$ est un $\underline{B}$-Module projectif sur tout ouvert affine (1.5.2) et par suite est localement libre en tant que $\underline{B}$-Module gradué, d'après 1.5.1. On peut alors, dans la résolution graduée construite, remplacer $\underline{L}_{r+1}$ par $\underline{Z}_{r+1}$, et les termes suivants par 0, d'où la résolution annoncée.

Montrons enfin le point c) de la démonstration.

Proposition 1.7. *Soient S un schéma quasi-compact, E un $\underline{O}_S$-Module localement libre de type fini, $\underline{B} = \underline{S}(\underline{E})$, et L un $\underline{B}$-Module gradué, localement libre de type fini* (1.2). *Alors il existe une filtration décroissante de L par des sous-$\underline{B}$-Modules gradués $\underline{L}^{(m)}$, telle que :*

i) $\underline{L}^{(m)} = \underline{L}$ *pour* $m \leqslant m_o$;

ii) $\underline{L}^{(m)} = 0$ *pour* $m \geqslant m_1$;

iii) *pour tout* m, $\mathrm{gr}^m(\underline{L}) = \underline{L}^{(m)}/\underline{L}^{(m+1)}$ *est isomorphe comme $\underline{B}$-Module gradué à un $\underline{B}$-Module gradué de la forme $\underline{N}_m \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(m)$, où $\underline{N}_m$ est un $\underline{O}_S$-Module localement libre de type fini.*

Comme S est quasi-compact, on peut trouver des entiers n_o et n_1 tels qu'au voisinage de chaque point de S, les éléments d'une base homogène

de $\underline{L}$ aient des degrés compris entre n_o et n_1. On procède alors par récurrence sur $N = n_1 - n_o$.

Lorsque $N = 0$, i.e. $n_1 = n_o$, soit n la valeur commune. L'homomorphisme canonique (1.2.1) :

$$\underline{M}_n \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-n) \to \underline{M}$$

est alors un isomorphisme. En effet, la vérification est locale, et d'après (1.2.3), on peut alors supposer que $\underline{M} \simeq (\underline{B}(-n))^k$, et le résultat est trivial.

Dans le cas $N > 0$, on considère encore l'homomorphisme (1.2.1) :

$$\underline{M}_{n_o} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-n_o) \to M \quad .$$

On vérifie localement que cet homomorphisme est injectif, et que son conoyau $\underline{M}'$ est localement libre de type fini, à générateurs locaux de degré compris entre n_o+1 et n_1 : en effet, au voisinage de tout point de S, $\underline{M}_{n_o}$ est soit nul, soit la composante homogène non nulle de $\underline{M}$ dont le degré est minimum ; utilisant une décomposition de $\underline{M}$ en facteurs directs du type (1.2.2), on voit dans ce dernier cas en utilisant (1.2.3) que $\underline{M}_{n_o} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-n_o)$ est isomorphe au facteur direct $(\underline{B}(-n_o))^{k_{n_o}}$ de $\underline{M}$, d'où les propriétés annoncées. On applique alors l'hypothèse de récurrence à $\underline{M}'$, d'où aussitôt la conclusion voulue.

1.8. Revenant à la démonstration du théorème 1.1, montrons que $K'(X)$ est engendré comme $K'(S)$-module par les puissances de ξ.

Si $\underline{F}$ est un $\underline{O}_X$-Module localement libre de type fini, il existe d'après 1.4 un $\underline{B}$-Module gradué de présentation finie $\underline{M}$, plat sur S, tel que $\underline{F} = \underline{\mathrm{Proj}}_o(\underline{M})$. D'après 1.6, $\underline{M}$ admet une résolution graduée par des $\underline{B}$-Modules gradués localement libres de type fini. On en déduit une suite exacte :

$$0 \to \underline{Proj}_o(\underline{L}_{r+1}) \to \dots \to \underline{Proj}_o(\underline{L}_o) \to \underline{Proj}_o(\underline{M}) \to 0,$$

et l'égalité suivante dans $K^\cdot(X)$:

$$cl(\underline{F}) = \sum_i (-1)^i cl(\underline{Proj}_o(\underline{L}_i)) \quad .$$

En utilisant la filtration sur les $\underline{L}_i$ définie en 1.7, on trouve :

$$cl(\underline{Proj}_o(\underline{L}_i)) = \sum_j cl(\underline{Proj}_o(\underline{N}_{ij} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(j)))$$

Or $\underline{Proj}_o(\underline{N}_{ij} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(j)) = f^*(\underline{N}_{ij})(j)$; on trouve donc :

$$cl(\underline{Proj}_o(\underline{L}_i)) = \sum_j cl(f^*(\underline{N}_{ij})).\xi^j$$

$$= \sum_j f^*(cl(\underline{N}_{ij})).\xi^j \quad .$$

On a donc finalement exprimé $cl(\underline{F})$ comme combinaison linéaire à coefficients dans $K^\cdot(S)$ des puissances de ξ.

1.9. Pour voir que $1,\xi,\dots,\xi^{r+1}$ sont linéairement dépendants sur $K^\cdot(S)$ on considère l'homomorphisme canonique surjectif : $f^*(\underline{E}) \to \underline{O}_X(1)$, dont le noyau $\underline{F}$ est localement libre de rang r. On peut donc écrire :

$$\lambda^{r+1}(f^*(E) - \xi) = 0, \qquad \text{avec } E = cl\underline{E},$$

les opérations λ^i sur $K^\cdot(X)$ étant définies dans V 2.2. On obtient donc :

$$\sum_{i=0}^{r+1} \lambda^i(f^*(E))\ \lambda^{r+1-i}(-\xi) = 0 \quad .$$

Comme $\underline{O}_X(1)$ est un faisceau inversible, $\lambda_t(\xi) = 1 + \xi t$, et par suite, $\lambda_t(-\xi) = 1/1+\xi t$, d'où finalement la relation :

$$(1.9.1) \qquad \sum_{i=0}^{r+1} (-1)^{r+1-i} \xi^{r+1-i} \lambda^i(E) = 0 \quad .$$

Montrons enfin que $1,\xi,\dots,\xi^r$ sont indépendants sur $K^\cdot(S)$ (*).

(*) Cette démonstration est due à J.P. Jouanolou.

Lemme 1.10. Avec les notations et les hypothèses de 1.1, soient $\underline{F}$ et $\underline{G}$ deux faisceaux localement libres de type fini sur X, tels que :

$$cl_{K'(X)}(\underline{F}) = cl_{K'(X)}(\underline{G}) \ ;$$

alors il existe un entier n_o, tel que pour $n \geqslant n_o$, on ait :

i) $f_*(\underline{F}(n))$, $f_*(\underline{G}(n))$ sont localement libres de type fini sur S ;

ii) $cl_{K'(S)}(f_*(\underline{F}(n))) = cl_{K'(S)}(f_*(\underline{G}(n)))$.

Soit A le groupe abélien libre engendré par les classes (à isomorphisme près) de faisceaux localement libres de type fini sur X. Dire que, dans $K'(X)$, $\underline{F}$ et $\underline{G}$ ont même classe, c'est dire, d'après la construction du K', qu'il existe des suites exactes de $\underline{O}_X$-Modules localement libres de type fini :

$$0 \to \underline{L}_i \to \underline{M}_i \to \underline{N}_i \to 0, \quad i = 1,\ldots,k,$$

et des entiers n_i, tels que dans A on ait l'égalité :

$$(\underline{F}) - (\underline{G}) = \sum_i n_i ((\underline{L}_i) - (\underline{M}_i) + (\underline{N}_i)) \ .$$

Pour tout n, la tensorisation par $\underline{O}_X(n)$ définit un automorphisme de A, d'où :

$$(\underline{F}(n)) - (\underline{G}(n)) = \sum_i ((\underline{L}_i(n)) - (\underline{M}_i(n)) + (\underline{N}_i(n))),$$

les suites $0 \to \underline{L}_i(n) \to \underline{M}_i(n) \to \underline{N}_i(n) \to 0$ restant exactes.

Soient B le groupe abélien libre engendré par les classes (à isomorphisme près) de faisceaux quasi-cohérents sur S, et $A' \subset B$ le sous-groupe engendré par les classes de faisceaux localement libres de type fini sur S. Par image directe, on définit un homomorphisme $A \to B$, et on a donc encore :

$$(f_*(\underline{F}(n))) - (f_*(\underline{G}(n))) = \sum_i n_i((f_*(\underline{L}_i(n))-(f_*(\underline{M}_i(n))) + (f_*(\underline{N}_i(n)))).$$

D'après 1.2, pour n assez grand, les conditions suivantes seront remplies :

$\forall k \geqslant 1, \forall i$, $R^k f_*(\underline{L}_i(n)) = 0$;

$\forall i$, $f_*(\underline{L}_i(n))$, $f_*(\underline{M}_i(n))$, $f_*(\underline{N}_i(n))$, $f_*(\underline{F}(n))$, $f_*(\underline{G}(n))$ sont localement libres de type fini.

Il en résulte que pour n assez grand, ces éléments sont tous dans A', et vérifient la relation écrite plus haut, et que les suites :

$$0 \to f_*(\underline{L}_i(n)) \to f_*(\underline{M}_i(n)) \to f_*(\underline{N}_i(n)) \to 0$$

sont exactes. Cela entraine que dans $K'(S)$, $f_*(\underline{F}(n))$ et $f_*(\underline{G}(n))$ ont même classe.

1.11. Supposons donnée une équation de dépendance linéaire sur $K'(S)$ entre $1, \xi, \ldots, \xi^r$:

$$f^*(x_o) + f^*(x_1)\xi + \ldots + f^*(x_r)\xi^r = 0 \quad . \tag{1.11.1}$$

On peut écrire chacun des x_j comme différence des classes de deux faisceaux, soit : $x_j = cl(\underline{E}_j) - cl(\underline{E}'_j)$, $\underline{E}_j$ et $\underline{E}'_j$ étant localement libres de type fini sur S. Posons

$$\underline{F} = \bigoplus_{j=0}^{r} f^*(\underline{E}_j)(j) \quad , \quad \underline{F}' = \bigoplus_{j=0}^{r} f^*(\underline{E}'_j)(j) \quad .$$

L'égalité (1.11.1) s'écrit alors :

$$cl_{K'(X)}(\underline{F}) = cl_{K'(X)}(\underline{F}') \quad .$$

D'après le lemme 1.10, on obtient pour n assez grand :

$$cl_{K'(S)}(f_*(\underline{F}(n))) = cl_{K'(S)}(f_*(\underline{F}'(n))) \quad .$$

Or $f_*(\underline{F}(n)) = \bigoplus f_*(f^*(\underline{E}_j) \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_X(n+j))$

$= \bigoplus \underline{E}_j \otimes_{\underline{O}_S} f_*(\underline{O}_X(n+j))$.

Par ailleurs, $f_*(\underline{O}_X(n+j)) = \underline{\underline{S}}(\underline{E})^{n+j}$; nous noterons σ_p la classe dans $K^\cdot(S)$ de $\underline{\underline{S}}(\underline{E})^p$. La relation (1.11.1) donne donc finalement :

(1.11.2) $$\forall\, n \geqslant n_o, \quad \sum_{j=0}^{r} x_j \sigma_{n+j} = 0 \quad .$$

On considère alors le complexe :

$$0 \to \overset{r+1}{\wedge}(\underline{E}) \otimes_{\underline{O}_S} \underline{\underline{S}}(\underline{E}) \to \overset{r}{\wedge}(\underline{E}) \otimes_{\underline{O}_S} \underline{\underline{S}}(\underline{E}) \to \ldots \to \underline{E} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{\underline{S}}(\underline{E}) \to \underline{\underline{S}}(\underline{E}) \to 0 \ ,$$

dont les flèches sont définies par :

$$(x_1 \wedge \ldots \wedge x_n) \otimes (y_1 \otimes \ldots \otimes y_p) \rightsquigarrow \sum (-1)^{i-1} (x_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{x_i} \wedge \ldots \wedge x_n) \otimes (x_i \otimes y_1 \otimes \ldots \otimes y_p)$$

Si on considère $\overset{n}{\wedge}(\underline{E})$ comme $\underline{O}_S$-Module gradué réduit au degré n, c'est un complexe de $\underline{\underline{S}}(\underline{E})$-Modules gradués, les morphismes étant eux-mêmes gradués.

Ce complexe est une résolution de $\underline{O}_S$: sur un ouvert où $\underline{E}$ est libre, $\underline{\underline{S}}(\underline{E})$ s'identifie à une Algèbre de polynomes $\underline{O}_S[T_o, \ldots, T_r]$, et le complexe au complexe de Koszul défini par la suite $\underline{\underline{S}}(\underline{E})$-régulière $T_o, \ldots, T_r$; on sait que ce dernier est une résolution de $\underline{\underline{S}}(\underline{E})/(T_o, \ldots, T_r) = \underline{O}_S$.

En écrivant que chacune des composantes homogènes du complexe de degré $\geqslant 1$ est acyclique, on obtient donc des relations dans $K^\cdot(S)$:

(1.11.3) $$\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E) \sigma_{p-i} = 0 \qquad \text{pour tout } p \geqslant 1 \ .$$

(en posant $\sigma_k = 0$ pour $k < 0$).

Supposons la relation (1.11.2) vraie pour $n \geqslant n_o$; nous allons montrer qu'elle est encore vraie pour $n_o - 1$, ce qui permettra de redescendre par récurrence jusqu'à $n_o = -r$ (nous verrons plus loin que cela suffit à entrainer la nullité des x_j).

D'après (1.11.3), on peut écrire

$$\sum_{j=0}^{r} x_j \Big(\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E) \sigma_{p(j)-i} \Big) = 0 \quad ,$$

avec $p(j) \geqslant 1$. On prend $p(j) = n_o + r + j$, ce qui est bien $\geqslant 1$ si $n_o > -r$. On obtient alors :

$$\sum_{j=0}^{r} x_j \Big(\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E) \sigma_{n_o+r+j-i} \Big) = \sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E) \Big(\sum_{j=0}^{r} x_j \sigma_{n_o+r+j-i} \Big) .$$

Pour $i \neq r+1$, $n_o + r - i \geqslant n_o$, donc d'après (1.11.2) :

$$\sum_{j=0}^{r} x_j \sigma_{n_o+r+j-i} = 0 \quad .$$

Par conséquent, la relation (1.11.4) se réduit à :

$$\lambda^{r+1}(E) . \Big(\sum_{j=0}^{r} x_j \sigma_{n_o-1+j} \Big) = 0 \quad .$$

Or $\underline{E}$ est de rang $r+1$, donc $\lambda^{r+1}(E)$ est la classe d'un faisceau inversible, et est donc inversible dans $K'(S)$. Par suite, la relation (1.11.4) se réduit à la relation (1.11.2) pour $n_o - 1$.

Donc la relation (1.11.2) est vraie pour $n \geqslant -r$; pour $n = -r$, elle donne :

$$x_r \sigma_o = 0 \quad .$$

Comme $\sigma_o = 1$, on obtient $x_r = 0$. On montre ainsi par récurrence descendante sur j que les x_j sont tous nuls, en utilisant les relations (1.11.2) pour n variant de $-r$ à 0. Ceci montre que $1, .., \xi^r$ sont indépendants sur $K'(S)$, et achève la démonstration du théorème 1.1.

Remarque 1.12. Pour tout $\underline{O}_S$-Module localement libre de type fini $\underline{E}$, soit $\sigma_i(E)$ la classe dans $K'(S)$ de la i-ième puissance symétrique de $\underline{E}$; posons $\sigma_t(E) = 1 + \sum_{i \geqslant 1} \sigma_i(E) t^i$; les relations (1.11.3) peuvent encore s'écrire :

(1.12.1) $\lambda_t(E).\sigma_{-t}(E) = 1.$

Cette relation elle-même montre l'additivité de l'application σ_t, qui peut donc être prolongée en un homomorpnisme de $K^\cdot(S)$ dans $1+K^\cdot(S)[[t]]^+$.

Remarque 1.13. On peut prendre pour base de $K^\cdot(X)$ sur $K^\cdot(S)$ n'importe quelle suite de puissances de ξ ; $\xi^k,\ldots,\xi^{k+r+1}$, car ξ est inversible, et une telle suite est donc composée d'éléments linéairement indépendant sur $K^\cdot(S)$; par ailleurs, les autres puissances de ξ peuvent s'exprimer explicitement comme combinaisons linéaires à coefficients dans $K^\cdot(S)$ de celles-ci, d'après l'égalité (1.9.1), et l'inversibilité de ξ.

Posons $x = 1 - \xi^{-1}$ (x s'interprète comme "classe d'une section hyperplane"). On peut alors prendre pour base de $K^\cdot(X)$ sur $K^\cdot(S)$ les éléments $1,x,\ldots,x^r$. Pour obtenir l'équation de dépendance de $1,\ldots,x^{r+1}$ on considère la suite exacte :

$$0 \to \underline{F} \to f^*(\underline{E}) \to \underline{O}_X(1) \to 0,$$

et la suite exacte obtenue par passage aux duals :

$$0 \to \underline{O}_X(-1) \to f^*(\check{\underline{E}}) \to \check{\underline{F}} \to 0 .$$

On remarque alors que $\gamma^{r+1}(\check{F}-r) = 0$, d'où l'on déduit :

$$\gamma^{r+1}(\check{F}-r) = \gamma^{r+1}(\check{E}-r-1+x) = 0,$$

soit :

(1.13.1) $$\sum_{k=0}^{r+1} \gamma^{r+1-k}(\check{E}-r-1).x^k = 0 .$$

On obtient un résultat analogue en introduisant $x' = \xi-1$.

Notons enfin que si $\underline{E} = (\underline{O}_S)^{r+1}$, donc $X = \underline{P}^r_S$, on a $E = r+1$, et l'égalité (1.13.1) se réduit à :

(1.13.2) $$x^{r+1} = 0 .$$

Remarque 1.14. En utilisant la notion de "schéma relatif" (cf [3]), on peut encore donner un sens à 1.1 en supposant que S est un topos localement annelé. Si on suppose que l'objet final du topos est quasi-compact, la démonstration donnée dans le cas des schémas se transpose sans difficultés, et le théorème reste donc valable.

2. Calcul du K' d'un fibré projectif : cas des complexes parfaits

Le présent paragraphe ne sera pas utilisé dans la suite du séminaire.

La notation $K'(X)$ désignera dans ce paragraphe le groupe de Grothendieck des complexes parfaits sur X (IV 2.2). Nous nous proposons de prouver le théorème suivant, analogue de 1.1 :

Théorème 2.1. Soient S un schéma quasi-compact, E un $\underline{O}_S$-Module localement libre de rang r+1, $X = \underline{P}(\underline{E})$ le fibré projectif associé ; soit ξ la classe dans $K'(X)$ du complexe égal à $\underline{O}_X(1)$ en degré nul, et nul pour les autres degrés. Alors $K'(X)$, muni de sa structure naturelle de $K'(S)$-algèbre est un $K'(S)$-module libre admettant pour base $1, \xi, \ldots, \xi^r$.

2.2. Fixons les notations : B désignera l'algèbre symétrique de E ; on notera $\mathcal{A}$ la catégorie des $\underline{O}_X$-Modules, $\mathcal{C}$ la catégorie des B-Modules gradués avec pour morphismes les morphismes gradués, $\mathcal{C}_o$ la sous-catégorie pleine de $\mathcal{C}$ dont les objets sont les B-Modules localement libres de type fini en tant que B-Modules gradués, $\mathcal{C}'$ la catégorie des $\underline{O}_S$-Modules. Les catégories $\mathcal{A}$, $\mathcal{C}$, et $\mathcal{C}'$ sont abéliennes.

Pour tout n, et tout complexe $\underline{L}'$ de $D^+(\ )$, nous noterons $\underline{L}'(n)$ le complexe $\underline{L}' \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_X(n)$.

2.3. Nous aurons besoin d'appliquer le foncteur $\underline{Proj}_0$ à des $\underline{B}$-Modules gradués quelconques, et non seulement à des $\underline{B}$-Modules gradués quasi-cohérents comme dans la construction de EGA II 3.2. Aussi allons nous indiquer rapidement comment cette construction peut s'effectuer dans le cas général.

2.3.1. Soient d'abord S un schéma, $\underline{A}$ une $\underline{O}_S$-algèbre quasi-cohérente, $Y = \mathrm{Spec}(\underline{A})$, et $f : Y \to S$ le morphisme structural. De l'isomorphisme :

$$\underline{A} \xrightarrow{\sim} f_*(\underline{O}_Y)$$

on déduit un homomorphisme canonique :

$$f^{-1}(\underline{A}) \to \underline{O}_Y \tag{2.3.1.1}$$

où f^{-1} désigne l'image inverse au sens des faisceaux d'ensembles ; en d'autres termes, on a un morphisme d'espaces annelés :

$$\bar{f} : (Y, \underline{O}_Y) \to (S, \underline{A}) \tag{2.3.1.2}$$

On en déduit un foncteur "image inverse" $\bar{f}^*$ de la catégorie des $\underline{A}$-Modules dans la catégorie des $\underline{O}_Y$-Modules, adjoint à gauche du foncteur "image directe" $\bar{f}_*$ de la catégorie des $\underline{O}_Y$-Modules dans la catégorie des $f_*(\underline{O}_Y)$-Modules. On a donc :

$$\bar{f}^*(\underline{M}) = f^{-1}(\underline{M}) \otimes_{f^{-1}(\underline{A})} \underline{O}_Y \tag{2.3.1.3}$$

pour tout $\underline{A}$-Module $\underline{M}$.

Comme l'homomorphisme (2.3.1.1) est plat (car dans chaque fibre il correspond à une localisation), le foncteur $\tilde{f}^*$ ainsi défini est un foncteur exact (cf [4], p. 164).

Si $\underline{M}$ est un $\underline{A}$-Module quasi-cohérent, cette construction donne le Module $\widetilde{\underline{M}}$ défini dans EGA II 1.4.3. En effet, l'isomorphisme :

$$\underline{M} \simeq f_*(\widetilde{\underline{M}}) = \bar{f}_*(\widetilde{\underline{M}})$$

donne par adjonction un homomorphisme :

$$\bar{f}^*(\underline{M}) \to \underline{M}$$

et on vérifie immédiatement sur chaque fibre que c'est un isomorphisme.

2.3.2. Soient maintenant $\underline{B}$ une $\underline{O}_S$-Algèbre graduée quasi-cohérente, $\underline{M}$ un $\underline{B}$-Module gradué, et $X = \mathrm{Proj}(\underline{B})$. Pour tout ouvert affine U de S, et toute section s de $\underline{B}$ sur U, homogène de degré $d > 0$, on note $\underline{M}_{(s),U}$ la composante homogène de degré 0 du Module de fraction $\underline{M}_s$; on a donc :

$$\underline{M}_{(s),U} = ((\underline{M}|U) \otimes_{(\underline{B}|U)} (\underline{B}|U)_s)_0 \quad .$$

Si V est un ouvert affine de U, alors $\underline{M}_{(s),V}$ est la restriction à V de $\underline{M}_{(s),U}$.

On considère la base d'ouverts de X formée des ouverts affines :

$$D_+(U,s) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Spec}((\underline{B}|U)_{(s)}) \quad .$$

On note f le morphisme structural $X \to S$, et $f_{U,s}$ le morphisme affine :

$$f_{U,s} : D_+(U,s) \to U \quad .$$

On pose alors :

$$\underline{\mathrm{Proj}}_0(\underline{M})_{U,s} = \bar{f}^*_{U,s}(\underline{M}_{(s),U}) \quad ,$$

avec les notations de 2.3.1. Nous allons montrer que les $\underline{\mathrm{Proj}}_0(\underline{M})_{U,s}$ se recollent quand U et s varient, définissant ainsi un $\underline{O}_X$-Module noté $\underline{\mathrm{Proj}}_0(\underline{M})$. Le recollement pour U variable et s fixe étant évident, on est ramené (cf. EGA II 2.5.2) à montrer que si t est une section de $\underline{B}$ sur U, homogène de degré $e > 0$, alors la restriction de $\underline{\mathrm{Proj}}_0(\underline{M})_{U,s}$ à $D_+(U,st)$ est canoniquement isomorphe à $\underline{\mathrm{Proj}}_0(\underline{M})_{U,st}$. On considère :

$$\begin{array}{ccc} D_+(st) & \xrightarrow{i} & D_+(s) \\ & {\scriptstyle f_{U,st}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle f_{U,s}} & \\ & U & \end{array}$$

Il s'agit de montrer que les Modules $i^* \circ \bar{f}^*_{U,s}(\underline{M}_{(s),U})$ et $\bar{f}^*_{U,st}(\underline{M}_{(st),U})$ sont canoniquement isomorphes. Or on a d'une part les isomorphismes canoniques :

$$i^* \circ \bar{f}^*_{U,s}(\underline{M}_{(s),U}) \tilde{-} i^*(f^{-1}_{U,s}(\underline{M}_{(s),U}) \otimes_{f^{-1}_{U,s}((B|U)_{(s)})} \underline{O}_{D_+(s)})$$

$$\tilde{-} i^{-1}(f^{-1}_{U,s}(\underline{M}_{(s),U}) \otimes_{f^{-1}_{U,s}((B|U)_{(s)})} \underline{O}_{D_+(s)}) \otimes_{i^{-1}(\underline{O}_{D_+(s)})} \underline{O}_{D_+(st)}$$

$$\tilde{-} f^{-1}_{U,st}(\underline{M}_{(s),U}) \otimes_{f^{-1}_{U,st}((\underline{B}|U)_{(s)})} \underline{O}_{D_+(st)} \quad .$$

D'autre part :

$$\bar{f}^*_{U,st}(\underline{M}_{(st),U}) \tilde{-} f^{-1}_{U,st}(\underline{M}_{(st),U}) \otimes_{f^{-1}_{U,st}((\underline{B}|U)_{(st)})} \underline{O}_{D_+(st)} \quad .$$

Enfin, il résulte de EGA II 2.2.2, traduit en termes de faisceaux, qu'on a les isomorphismes canoniques :

$$\underline{M}_{(st),U} \tilde{-} (\underline{M}_{(s),U})_{t^d/s^e} \tilde{-} \underline{M}_{(s),U} \otimes_{(\underline{B}|U)_{(s)}} (\underline{B}|U)_{(st)} \quad ,$$

d'où finalement l'isomorphisme cherché.

Il est clair que si $\underline{M}$ est quasi-cohérent le Module $\underline{Proj}_o(\underline{M})$ ainsi construit est bien celui qui est défini dans EGA II.

2.3.3. Il résulte de 2.3.1 et 2.3.2 que le foncteur $\underline{Proj}_o$ est exact. Revenant aux notations de 2.2, on en déduit donc par passage aux catégories dérivées un foncteur encore noté $\underline{Proj}_o$:

$$\underline{Proj}_o : D^+(\mathcal{C}) \to D^+(\mathcal{A}) \quad .$$

On voit également sur les constructions précédentes que le foncteur

$\underline{\mathrm{Proj}}_{\cdot}$ sur la catégorie des $\underline{B}$-Modules gradués est compatible au produit tensoriel ; il en est encore de même du foncteur obtenu sur les catégories dérivées.

2.4. Pour tout entier k, et tout $\underline{O}_X$-Module $\underline{L}$, posons :

$$F_k(L) = \bigoplus_{n \geqslant k} f_*(\underline{L}(n)) \quad . \tag{2.4.1}$$

Le foncteur $F_k : \mathcal{A} \to \mathcal{C}$ ainsi défini est exact à gauche. Comme la catégorie des $\underline{O}_X$-Modules a assez d'injectifs, on peut définir un foncteur dérivé :

$$\underline{\underline{R}}F_k : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{C}) \quad . \tag{2.4.2}$$

Si $\underline{L}$ est un $\underline{O}_X$-Module localement libre de type fini, il existe un entier k_o tel que pour $k \geqslant k_o$, $\underline{L}$ soit F_k-acyclique. Il suffit pour le voir de montrer que, pour n assez grand, $\underline{L}$ est acyclique pour les foncteurs $L \rightsquigarrow f_*(\underline{L}(n))$. Comme la tensorisation par $\underline{O}_X(n)$ est un foncteur exact, cela résulte immédiatement de la suite spectrale des foncteurs composés et de 1.3.

2.5. On se propose de construire pour tout $\underline{O}_X$-Module $\underline{F}$ un homomorphisme fonctoriel en $\underline{F}$:

$$\beta : \underline{\mathrm{Proj}}_o(F_k(\underline{F})) \to \underline{F} \quad . \tag{2.5.1}$$

Pour cela on définit la restriction de β aux $D_+(U,s)$ (2.3.2). Or par construction on a, en posant $\underline{M} = F_k(\underline{F})$:

$$\underline{\mathrm{Proj}}_o(\underline{M}) \mid D_+(U,s) = \tilde{f}^*_{U,s}(\underline{M}_{(s),U}) \quad .$$

Pour définir un homomorphisme :

$$\tilde{f}^*_{U,s}(\underline{M}_{(s),U}) \to \underline{F} \mid D_+(U,s) \quad ,$$

il suffit, d'après la définition de $\bar{f}^{*}_{U,s}$ comme adjoint à gauche du foncteur image directe, de définir un homomorphisme $f_{U,s*}(\underline{O}_X)$-linéaire

$$\underline{M}_{(s),U} \to f_{U,s*}(\underline{F}|D_+(U,s)) \quad .$$

Pour ce faire, il faut se donner pour tout ouvert V de U un homomorphisme :

$$\Gamma(V,\underline{M})_{(s)} \to \Gamma(D_+(V,s),\underline{F}) \tag{2.5.2}$$

compatible aux restrictions aux ouverts de U, et prendre l'homomorphisme correspondant sur les faisceaux associés. L'homomorphisme (2.5.2) est défini de la façon suivante : soit $z/s^n \in \Gamma(V,\underline{M})_{(s)}$, où, s étant de degré d, $z \in \Gamma(V,\underline{M}_{nd}) = \Gamma(D_+(V,s),\underline{F}(nd))$; on associe alors à z/s^n la section $z.\alpha_d(s^n)^{-1}$ de $\underline{F}$ sur $D_+(V,s)$, en notant α_d l'homomorphisme canonique $\Gamma(V,\underline{B}_d) \to \Gamma(f^{-1}(V),\underline{O}_X(d))$ (cf. EGA II 2.6.3 et 2.6.4). On vérifie sans peine les compatibilités nécessaires, d'où par recollement l'homomorphisme (2.5.1).

Il est clair que dans le cas ou $\underline{F}$ est quasi-cohérent l'homomorphisme ainsi construit est celui de EGA II (3.3.4.1).

L'homomorphisme de foncteur $\underline{Proj}_o \circ F_k \to Id$ sur la catégorie des $\underline{O}_X$-Modules donne par passage aux catégories dérivées un homomorphisme de foncteur sur $D^+(\mathcal{A})$:

$$\underline{Proj}_o \circ \underline{R}F_k \to Id_{D^+(\mathcal{A})} \quad . \tag{2.5.3}$$

Proposition 2.6. Soient S un schéma quasi-compact, E un $\underline{O}_S$-Module localement libre de type fini, X = $\underline{P}(E)$, et L. un complexe parfait sur X. Alors il existe un entier k_o tel que pour $k \geqslant k_o$ les propriétés suivantes soient vérifiées :

i) $\underline{\underline{R}}F_k(\underline{L}^\cdot)$ est $\mathscr{C}_o$-parfait ;

ii) Le morphisme canonique (2.5.3) :

$$\underline{Proj}_o \circ \underline{\underline{R}}F_k(\underline{L}^\cdot) \to \underline{L}^\cdot$$

est un isomorphisme de $D^+(\mathcal{A})$.

La notion de complexe $\mathscr{C}_o$-parfait envisagée ici est locale, c'est-à-dire qu'il s'agit de perfection relativement à la catégorie fibrée sur S définie par $\mathscr{C}_o$. Cette notion de perfection a bien un sens, car $\mathscr{C}_o$ vérifie les axiomes de (I 4.0) : seule la stabilité par noyau d'épimorphisme n'est pas immédiate ; elle résulte de 1.5.1.

Comme S est quasi-compact, il suffit de vérifier les deux assertions de 2.6 localement sur S, de sorte qu'on peut supposer S affine. Le faisceau inversible $\underline{O}_X(1)$ est alors ample, et on dispose de résolutions globales sur X (II 2.2.9). Il existe donc un complexe $\underline{L}''$ de $D_{parf}(\mathcal{A})$, strictement parfait, et un isomorphisme dans $D_{parf}(\mathcal{A})$: $\underline{L}^\cdot \xrightarrow{\sim} \underline{L}''$, de qui permet de supposer $\underline{L}^\cdot$ strictement parfait. Or nous avons vu en 2.4 que, pour k assez grand, les $\underline{L}^i$, qui sont tous nuls sauf un nombre fini, sont F_k-acycliques ; on a par conséquent :

$$\underline{\underline{R}}F_k(\underline{L}^\cdot) = F_k(\underline{L}^\cdot)$$

si k est assez grand. Or d'après 1.3 et 1.6, on peut trouver k_o tel que pour $k \geq k_o$ la condition précédente soit remplie, et que les $F_k(\underline{L}^i)$ soient des $\underline{B}$-Modules $\mathscr{C}_o$-parfaits pour tout i. Le complexe $F_k(\underline{L}^\cdot)$ est alors $\mathscr{C}_o$-parfait, d'où le i).

Si k est choisi tel que précédemment, l'homomorphisme (2.5.3) est alors l'homomorphisme :

$\underline{\mathrm{Proj}}_o(F_k(\underline{L}^\cdot)) \to \underline{L}^\cdot$, ,

et c'est un isomorphisme sur chaque composante puisque $\underline{L}^\cdot$ a été supposé strictement parfait, d'où le ii).

2.7. Sur $\mathscr{C}$, le foncteur qui à un $\underline{B}$-Module gradué associe sa n-ième composante est un foncteur exact à valeurs dans $\mathscr{C}'$; il définit donc un foncteur :

(2.7.1) $$\mathrm{Comp}_n : D^+(\mathscr{C}) \to D^+(\mathscr{C}') \quad .$$

On peut, pour tout n, considérer le foncteur $\mathscr{C}' \to \mathscr{C}$ défini par la tensorisation par $\underline{B}(-n)$. L'homomorphisme (1.2.1) définit un morphisme de foncteurs sur $\mathscr{C}$, d'où un morphisme pour les foncteurs correspondants entre catégories dérivées :

(2.7.2) $$\mathrm{Comp}_n \otimes^{\mathbb{L}}_{\underline{O}_S} \underline{B}(-n) \to \mathrm{Id}_{D^+(\mathscr{C})} \quad .$$

Soit $\underline{M}^\cdot$ un complexe $\mathscr{C}_o$-parfait. Nous allons montrer qu'il existe une suite de triangles distingués :

$$\underline{N}_1^\cdot \to \underline{M}^\cdot \to \underline{P}_1^\cdot, \qquad \underline{N}_2^\cdot \to \underline{P}_1^\cdot \to \underline{P}_2^\cdot, \quad \ldots \quad , \qquad \underline{N}_k^\cdot \to \underline{P}_{k-1}^\cdot \to \underline{P}_k^\cdot ,$$

où $\underline{P}_k^\cdot$ est acyclique, et les $\underline{N}_i^\cdot$ du type $\underline{K}_i^\cdot \otimes^{\mathbb{L}}_{\underline{O}_S} \underline{B}(d)$, les $\underline{K}_i^\cdot$ étant des complexes parfaits au sens ordinaire sur S.

Puisque $\underline{M}^\cdot$ est $\mathscr{C}_o$-parfait, et que S est quasi-compact, il existe un recouvrement fini de S, et un entier d_o tel que sur tout ouvert de ce recouvrement, $\underline{M}^\cdot$ soit isomorphe à un complexe borné à termes localement libres de type fini sur $\underline{B}$, soit $\underline{M}'^\cdot_U$, tel que $\mathrm{Comp}_d(\underline{M}'^\cdot_U) = 0$ pour $d < d_o$.

On considère alors le morphisme canonique (2.7.2) :

$$\underline{N}_1^{\cdot} = \mathrm{Comp}_{d_o}(\underline{M}^{\cdot}) \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-d_o) \to \underline{M}^{\cdot} \quad ;$$

soit $\underline{P}_1^{\cdot}$ le cône de ce morphisme. C'est encore un complexe $\mathcal{C}_o$-parfait : en effet, pour tout n, $\mathrm{Comp}_n(\underline{M}^{\cdot})$ est un complexe parfait sur S, car il en est ainsi quand $\underline{M}^{\cdot}$ est borné à termes localement libres de type fini sur $\underline{B}$; par suite, le complexe $\mathrm{Comp}_n(\underline{M}^{\cdot}) \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-d_o)$ est $\mathcal{C}_o$-parfait, et il en est donc de même pour le cône (I 4.10).

Par ailleurs, on peut écrire sur tout ouvert U du recouvrement le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Comp}_{d_o}(\underline{M}^{\cdot}) \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-d_o) & \to & \underline{M}^{\cdot} \\ \downarrow\wr & & \downarrow\wr \\ \mathrm{Comp}_{d_o}(\underline{M}'^{\cdot}_U) \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(-d_o) & \to & \underline{M}'^{\cdot}_U, \end{array}$$

qui induit un isomorphisme entre les cônes ; or l'homomorphisme du bas est un isomorphisme en degré d_o ; donc $\underline{P}_1^{\cdot}$ est isomorphe sur U à un complexe borné à termes localement libres de type fini sur $\underline{B}$, dont les composantes Comp_d sont nulles pour $d < d_o+1$. Par suite, $\underline{P}_1^{\cdot}$ vérifie les mêmes propriétés que $\underline{M}^{\cdot}$, d_o étant remplacé par d_o+1. On peut donc itérer le processus, et il suffit de voir qu'au bout d'un nombre fini d'opérations, le complexe $\underline{P}_k^{\cdot}$ obtenu est acyclique. Là encore la question est locale, si bien qu'il suffit de le voir pour $\underline{M}'^{\cdot}_U$. Or pour chaque terme $\underline{M}'^{i}_U$, les morphismes considérés plus haut sont ceux qui définissent la filtration de la proposition 1.7 ; cette filtration est finie, donc en un nombre fini d'opérations, on arrive à partir de $\underline{M}'^{\cdot}_U$ au complexe nul, c'est-à-dire que le complexe $\underline{P}_k^{\cdot}$ correspondant est acyclique.

2.8. Soit $\underline{L}^{\cdot}$ un complexe parfait sur X. Il existe un entier k tel que $\underline{M}^{\cdot} = \underline{\underline{R}}F_k(\underline{L}^{\cdot})$ soit un complexe $\mathcal{E}_o$-parfait, et que $\underline{L}^{\cdot}$ soit isomorphe à $\underline{Proj}_o(\underline{\underline{R}}F_k(\underline{L}^{\cdot}))$. Si on applique 2.7 au complexe $\underline{M}^{\cdot}$, la suite des triangles distingués construite donne en appliquant le foncteur $\underline{Proj}_o$ une suite de triangles distingués de $D_{parf}(\mathcal{A})$ (il est clair que $\underline{Proj}_o$ transforme complexe $\mathcal{E}_o$-parfait en complexe parfait). Par ailleurs, on a :

$$\underline{Proj}_o(\underline{K}^{\cdot} \otimes_{\underline{O}_S} \underline{B}(d)) = f^*(\underline{K}^{\cdot})(d)$$

(notons que $f^* = \underline{\underline{L}}f^*$ d'après la platitude de f) pour $\underline{K}^{\cdot}$ dans $D^+(\mathcal{E}')$.

On obtient donc dans $K^{\cdot}(X)$ l'égalité :

$$cl(\underline{L}^{\cdot}) = \sum_i cl(f^*(\underline{K}_i^{\cdot})).\xi^{d_i} = \sum_i f^*(cl(\underline{K}_i^{\cdot})).\xi^{d_i} ,$$

où les $\underline{K}_i$ sont les complexes parfaits sur S définis dans 2.7. Il en résulte que $K^{\cdot}(X)$ est engendré comme $K^{\cdot}(S)$-module par les puissances de ξ.

Pour voir que $1,\xi,\ldots,\xi^{r+1}$ sont linéairement dépendants, on considère l'homomorphisme : $K^{\cdot}_{naïf}(X) \to K^{\cdot}_{parf}(X)$ qui à la classe d'un faisceau localement libre de type fini $\underline{L}$ associe la classe du complexe égal à $\underline{L}$ en degré 0, et nul pour les autres degrés. L'équation (1.9.1) donne alors une relation de dépendance dans $K^{\cdot}_{parf}(X)$.

Pour voir que $1,\xi,\ldots,\xi^{r}$ sont linéairement indépendants, on peut utiliser le morphisme $K^{\cdot}(S)$-linéaire f_* : $K^{\cdot}(X) \to K^{\cdot}(S)$ (IV2.11.1). On a :

$f_*(1) = 1$, car $f_*(\underline{O}_X) = \underline{O}_S$, et $R^i(f_*(\underline{O}_X)) = 0$ pour $i \geqslant 1$;

$f_*(\xi^n) = 0$ pour $-r \leqslant n < 0$, car $R^i(f_*(\underline{O}_X(n)) = 0$ pour $i \geqslant 0$.

Si on a une relation du type :

$$f^*(x_o) + f^*(x_1)\xi + \ldots + f^*(x_r)\xi^r = 0,$$

on la multiplie par ξ^{-r}, et on applique f_* ; on trouve alors $x_r = 0$; on

achève par récurrence, en notant que si $0 \leq s \leq r$, et si $x_j = 0$ pour $s < j \leq r$, on aura :

$$\sum_{i=0}^{s} f^*(x_i)\xi^i = 0 \quad ,$$

d'où :

$$\sum_{i=0}^{s} f^*(x_i)\xi^{i+r-s} = 0 \quad ,$$

d'où $x_s = 0$ d'après ce qui précède.

3. Conséquences du théorème de structure pour le K' d'un fibré projectif

Proposition 3.1. Soient S un schéma quasi-compact, $E_1,\ldots,E_n$ des O_S-Modules localement libres de type fini, $\underline{\underline{D}}(E_i)$ le schéma des drapeaux de E_i $X = \underline{\underline{D}}(E_1)\times_S\ldots\times_S\underline{\underline{D}}(E_n)$. Alors l'homomorphisme canonique :

$$K'(S) \rightarrow K'(X)$$

est injectif (K' étant défini, soit à partir des O_S-Modules localement libres de type fini, soit à partir des complexes parfaits).

On vérifie immédiatement en utilisant la propriété universelle des schémas de drapeaux que X peut être construit comme suit : on considère la suite de S-schémas $X_1,\ldots,X_n$, définis par récurrence en prenant pour X_k le schéma de drapeaux de l'image inverse de E_k sur X_{k-1}; alors $X = X_n$. On voit alors tout de suite que pour démontrer la proposition, il suffit de la montrer dans le cas où n=1, le cas général s'en déduisant par récurrence. On peut donc supposer que X est le schéma des drapeaux d'un O_S-Module localement libre de type fini E.

On sait que X peut alors être construit comme suit : on pose $E = F_o$, $S = X_o$, et on définit par récurrence des schémas $X_1,\ldots,X_n$ et

pour tout i un $\underline{O}_{X_i}$-Module localement libre de type fini $\underline{F}_i$ en posant :

$$X_k = \underline{P}(\underline{F}_{k-1}) \quad ; \quad \underline{F}_k = \mathrm{Ker}(f_k^*(\underline{F}_{k-1}) \to \underline{O}_{X_k}(1)) \quad ,$$

où f_k est le morphisme structural $X_k \to X_{k-1}$.

On voit alors qu'il suffit de montrer la proposition dans le cas où X est un fibré projectif sur S, le cas d'un fibré de drapeaux s'en déduisant par récurrence. Or ce cas résulte immédiatement de 1.1 (resp. 2.1).

Théorème 3.2. Soit S un schéma quasi-compact. Le pré-λ-anneau $K'(S)$, défini à partir des $\underline{O}_S$-Modules localement libres de type fini, est un λ-anneau (V 2.4).

L'homomorphisme $\lambda_t : K'(S) \to 1 + \widehat{K'(S)[[t]]}^+$ étant additif, il suffit, pour vérifier que c'est un λ-homomorphisme, de faire la vérification pour des éléments du type $cl(\underline{E})$, où $\underline{E}$ est un $\underline{O}_S$-Module localement libre de type fini. On est donc ramené à montrer que pour tout couple d'éléments E, F de $K'(S)$, classes de $\underline{O}_S$-Modules localement libres de type fini $\underline{E}$, $\underline{F}$, les relations V 2.4.2 sont vérifiées :

$$\lambda^i(EF) = P_i(\lambda^1(E),\dots,\lambda^i(E);\lambda^1(F),\dots,\lambda^i(F)) \quad ;$$

$$\lambda^j(\lambda^i(E)) = Q_{i,j}(\lambda^1(E),\dots,\lambda^{ij}(E)) \quad .$$

Comme S est un quasi-compact, on peut trouver un recouvrement fini de S par des ouverts disjoints tel que sur chacun $\underline{E}$ et $\underline{F}$ soient de rang constant. Or le K' d'une somme directe finie d'ouverts est le produit des K' de ces ouverts. Il suffit donc de vérifier les relations V 2.4.2 dans chacun des K' des ouverts du recouvrement. On peut donc supposer $\underline{E}$ et $\underline{F}$ de rang constant sur S.

Soit alors $X = \underline{\underline{D}}(\underline{E}) \times_{\underline{\underline{S}}} \underline{\underline{D}}(\underline{F})$. Le λ-homomorphisme $K^{\cdot}(S) \to K^{\cdot}(X)$ est injectif d'après 3.1. Par conséquent, on peut, pour montrer les relations V 2.4.2, se placer dans $K^{\cdot}(X)$. Comme dans $K^{\cdot}(X)$ les éléments E et F se décomposent en somme de classe de faisceaux inversibles, il suffit, par additivité, de montrer ces mêmes relations pour des éléments ξ, η, classes de faisceaux inversibles ; elles peuvent encore s'écrire :

$$1 + \xi\eta t = (1 + \xi t) \circ (1 + \eta t) \quad ; \quad \lambda_u(1 + \xi t) = 1 + \{1 + \xi t\}u \quad ,$$

en les mettant sous la forme V 2.4.1. Elles ne sont alors autres que les relations V 2.3.1 et 2.3.3 qui définissent la structure de λ-anneau de $1 + \widetilde{K^{\cdot}(S)[[t]]}^{+}$.

Indiquons le résultat plus général suivant :

Théorème 3.3 Soit (T,A) un topos commutativement annelé ; on désigne par K le groupe de Grothendieck des A-Modules localement libres de rang borné sur T . Alors, K , muni de sa pré-λ-structure canonique (V 2.2 b)) , est un λ-anneau.

Pour montrer que K est un λ-anneau, il faut montrer les relations V 2.4.1, et par additivité, il suffit de les montrer pour des éléments E, F qui sont classes de A-Modules localement libres de rang borné. Comme les rangs de E et F sont bornés, on peut décomposer T en "somme disjointe" finie d'ouverts sur lesquels E et F sont de rang constant. En utilisant la commutation du $K^{\cdot}$ aux sommes directes finies, et en mettant les relations V 2.4.1 sous la forme V 2.4.2, on voit qu'il suffit de montrer les relations V 2.4.2, dans chacun des $K^{\cdot}$ des ouverts considérés, c'est-à-dire qu'il suffit de montrer les relations V 2.4.2 pour des éléments E , F , classes de A-Modules E , F localement libres de rang constant.

Soit $\underline{E}$ un $\underline{A}$-Module localement libre de rang fini n. Il existe un torseur $\underline{P}$ sous $\underline{Gl}(n,\underline{A})$ tel que $\underline{E} = \underline{P}\times_{\underline{Gl}(n,\underline{A})}(\underline{A})^n$, où $(\underline{A})^n$ est considéré comme $\underline{Gl}(n,\underline{A})$-Module par la représentation standard. On peut alors définir un λ-homomorphisme de $R_{\mathbb{Z}}(\underline{\underline{Gl}}(n))$ dans K, en associant à toute représentation ρ de $\underline{\underline{Gl}}(n)$ dans un $\mathbb{Z}$-module libre de rang p la classe du $\underline{A}$-Module localement libre $\underline{P}\times_{\underline{Gl}(n,\underline{A})}(\underline{A})^p$, où $(\underline{A})^p$ est considéré comme $\underline{Gl}(n,\underline{A})$-module par la représentation ρ. Dans cet homomorphisme, la classe de $\underline{E}$ est donc l'image de la représentation standard. Pour vérifier une relation polynomiale entre les $\lambda^i(E)$, il suffit donc que cette relation soit vérifiée par la représentation standard dans $R_{\mathbb{Z}}(\underline{\underline{Gl}}(n))$.

On peut faire un raisonnement analogue avec deux $\underline{A}$-Modules localement libres $\underline{E}$, $\underline{F}$ de rangs n, p ; on peut alors trouver un torseur $\underline{P}$ sous $\underline{Gl}(n,\underline{A})\times\underline{Gl}(p,\underline{A})$ tel que $\underline{E} = \underline{P}\times_{\underline{Gl}(n,\underline{A})\times\underline{Gl}(p,\underline{A})}(\underline{A})^n$, où $(\underline{A})^n$ est considéré comme $\underline{Gl}(n,\underline{A})\times\underline{Gl}(p,\underline{A})$-Module en faisant opérer $\underline{Gl}(n,\underline{A})$ par la représentation standard et $\underline{Gl}(p,\underline{A})$ par la représentation triviale, et réciproquement pour $\underline{F}$. On définit ensuite un λ-homomorphisme de $R_{\mathbb{Z}}(\underline{\underline{Gl}}(n)\times\underline{\underline{Gl}}(p))$ dans K de la même façon que plus haut, et on se ramène ainsi à vérifier les relations entre les $\lambda^i(E)$, $\lambda^j(F)$ pour les éléments correspondants de $R_{\mathbb{Z}}(\underline{\underline{Gl}}(n)\times\underline{\underline{Gl}}(p))$.

On est donc ramené à montrer que pour tout schéma en groupes **G** sur **Spec $\mathbb{Z}$, produit fini de schémas en groupes linéaires, le pré-λ-anneau** $R_{\mathbb{Z}}(G)$ est un λ-anneau. Pour ce faire, on peut référer à [5], où $R_{\mathbb{Z}}(G)$ est calculé explicitement. Si l'on ne veut pas utiliser ce résultat, on peut raisonner de façon analogue à 3.2, en utilisant 1.14.

4. Calcul du K' d'un fibré de drapeaux

4.1. Soient S un schéma, et $\underline{E}$ un $\underline{O}_S$-Module localement libre de rang n. Soit $\pi = (p_1,\ldots,p_k)$ une suite d'entiers ≥ 1, telle que :

$$\sum_{i=1}^{k} p_i = n \quad .$$

Rappelons qu'on appelle foncteur des drapeaux de type π de $\underline{E}$ le foncteur sur la catégorie des S-schémas, à valeurs dans la catégorie des ensembles, qui à un S-schéma $X \xrightarrow{f} S$ associe l'ensemble des suites de quotients de $f^*(\underline{E})$:

$$(\underline{L}_{k-1},\ldots,\underline{L}_1) \quad ,$$

où, pour tout i, $\underline{L}_i$ est un quotient de $\underline{L}_{i+1}$, localement libre de rang $p_1+\ldots+p_i$.

Un tel foncteur est réprésentable par un S-schéma $\underline{\underline{D}}_\pi(\underline{E})$, qui est muni d'une suite de quotients canonique de l'image inverse de $\underline{E}$, localement libres de rang $p_1, p_1+p_2, \ldots$

Si $\pi = (1,n-1)$, alors $\underline{\underline{D}}_\pi(\underline{E}) = \underline{\underline{P}}(\underline{E})$.

Si $\pi = (r,n-r)$, alors $\underline{\underline{D}}_\pi(\underline{E}) = \underline{\underline{G}}_{r,n}(\underline{E})$, grassmanienne de type (r,n-r) de $\underline{E}$.

Si tous les p_i sont égaux à 1, on trouve le fibré en drapeau usuel de $\underline{E}$, noté $\underline{\underline{D}}(\underline{E})$.

Lemme 4.2. Soient S un schéma, $\underline{E}$ un $\underline{O}_S$-Module localement libre de rang n, $\pi = (p_1,\ldots,p_i,\ldots,p_k)$, avec $p_1+\ldots+p_k = n$; soient p', p" deux entiers ≥ 1, tels que $p'+p" = p_i$; posons $\pi' = (p_1,\ldots,p_{i-1},p',p",p_{i+1},\ldots,p_k)$, $\pi" = (p',p")$. Soient $\underline{L}_1,\ldots,\underline{L}_{k-1}$ les quotients canoniques de l'image inverse de $\underline{E}$ sur $\underline{\underline{D}}_\pi(\underline{E})$, et soit $\underline{F}$ le noyau de $\underline{L}_i \to \underline{L}_{i-1}$. Alors on a un S-isomorphisme canonique :

$$\underline{D}_{\underline{\pi}'}(\underline{E}) \simeq \underline{D}_{\underline{\pi}''}(\underline{F}) \quad .$$

La démonstration, immédiate sur la définition fonctorielle des schémas de drapeaux, est laissée au lecteur.

Lemme 4.3. Soient A un anneau commutatif avec unité, n un entier > 0, $(c_i)_{1\leq i\leq n}$ une famille d'éléments de **A** ; soit C la A-algèbre engendrée par des générateurs ξ_i, $i=1,\ldots,n$, soumis aux relations :

$$\sigma_i(\xi_1,\ldots,\xi_n) = c_i, \qquad i = 1,\ldots,n,$$

où les σ_i désignent les fonctions symétriques élémentaires. Soient $p_1,\ldots,p_k$ des entiers ≥ 1, de somme n, et pour $1 \leq j \leq k$,

$$\xi^{(j)} = (\xi_1^{(j)}, \ldots, \xi_{p_j}^{(j)}) \quad ,$$

avec

$$\xi_i^{(j)} = \xi_{\sum_{\alpha<j} p_\alpha + i} \quad .$$

Posons :

$$c_i^{(j)} = \sigma_i(\xi_1^{(j)}, \ldots, \xi_{p_j}^{(j)}), \quad 1 \leq j \leq k \ , \ 1 \leq i \leq p_j \ ,$$

et soit B la sous-algèbre de C engendrée par les $c_i^{(j)}$. Alors :

i) les éléments de la forme :

$$(\xi^{(1)})^{\alpha(1)} \ldots (\xi^{(k)})^{\alpha(k)} \quad ,$$

où $\alpha(j) = (\alpha_1^{(j)}, \ldots, \alpha_{p_j}^{(j)})$, et $0 \leq \alpha_i^{(j)} \leq p_j - i$,
forment une base de C considéré comme B-module.

ii) les générateurs $c_i^{(j)}$ de la A-algèbre B satisfont aux n relations isobares déduites de la relation :

$$\sum_{i=1}^{n} c_i = \prod_{j=1}^{k} \left(\sum_{i=1}^{p_j} c_i^{(j)} \right)$$

(c_i et $c_i^{(j)}$ étant effectués du poids i), et ces n relations engendrent l'idéal des relations entre les $c_i^{(j)}$.

Corollaire 4.4. Les éléments de C de la forme :

$$\xi_1^{\alpha_1} \dots \xi_{n-1}^{\alpha_{n-1}}, \qquad 0 \leq \alpha_i \leq n-i \quad ,$$

forment une base de C considéré comme module sur A.

Pour la démonstration du lemme et du corollaire, nous renvoyons à [2], exposé 4, pages 4. 19, auquel ils sont empruntés.

4.5. Soient S un schéma quasi-compact, $\underline{E}$ un $\underline{O}_S$-Module localement libre de rang n, $\pi = (p_1,\dots,p_k)$ une suite d'entiers ≥ 1, de somme n. Posons $X = \underline{D}_\pi(\underline{E})$; X est muni d'une suite de quotients canonique $\underline{L}_i$; on pose $\underline{L}_o = 0$, $\underline{L}_k = f^*(\underline{E})$, f étant le morphisme structural $X \to S$. Pour $1 \leq i \leq k$ on note $\underline{F}_i$ le noyau de $\underline{L}_i \to \underline{L}_{i-1}$. Soit $K'(X)$ le groupe de Grothendieck des faisceaux localement libres de type fini sur X (resp. des complexes parfaits). On note F_j la classe de $\underline{F}_j$, et $\lambda_i^{(j)}$ la classe de $\wedge^i(\underline{F}_j)$. Dans le cas où $K'(X)$ est défini en termes de complexes parfaits, on donne encore un sens évident aux séries $\lambda_t(E)$, $\lambda_t(F_j)$, où E est la classe de $\underline{E}$. Enfin, on remarque que :

$$\sum_{j=1}^{k} F_j = E \quad .$$

Théorème 4.6. Avec les hypothèses et les notations de 4.5, la $K'(S)$-algèbre $K'(X)$ est engendrée par les $\lambda_i^{(j)}$; l'idéal des relations entre les $\lambda_i^{(j)}$ est engendré par les relations déduites de :

$$\lambda_t(E) = \prod_{j=1}^{k} \lambda_t(F_j) \quad .$$

En d'autres termes, $K^{\cdot}(X)$ est la $K^{\cdot}(S)$-λ-algèbre engendrée par les générateurs $F_1,\dots,F_k$ soumis aux relations (cf. V 4.6) :

i) $\lambda^p(F_i) = 0$ pour $p > p_i$;

ii) $\sum_i F_i = E$.

On commence par le cas où tous les p_i sont égaux à 1 ; le théorème s'énonce alors :

Corollaire 4.7. *Soient S un schéma quasi-compact, E un O_S-Module localement de rang n, X le fibré en drapeaux de E, $\xi_1,\dots,\xi_n$ les classes des faisceaux inversibles $F_1,\dots,F_n$ (notation de 3.5). Alors $K^{\cdot}(X)$ est la $K^{\cdot}(S)$-algèbre engendrée par les ξ_i, soumis aux relations :*

$$\sigma_i(\xi_1,\dots,\xi_n) = \lambda^i(E) \quad .$$

On procède par récurrence sur n. Pour n = 1, le théorème est trivial. Supposons qu'il soit montré pour n-1 ; on considère alors $\underline{\underline{P}}(\underline{E})$, et sur $\underline{\underline{P}}(\underline{E})$ la suite exacte :

$$0 \to \underline{F} \to g^*(\underline{E}) \to \underline{O}_{\underline{\underline{P}}(\underline{E})}(1) \to 0 \quad ,$$

g étant le morphisme structural de $\underline{\underline{P}}(\underline{E})$. D'après le lemme 4.2, X s'identifie au fibré en drapeaux usuel $\underline{\underline{D}}(\underline{F})$ sur $\underline{\underline{P}}(\underline{E})$, les faisceaux canoniques se correspondant dans cette identification. Le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} \underline{\underline{D}}(\underline{E}) = \underline{\underline{D}}(\underline{F}) & \xrightarrow{h} & \underline{\underline{P}}(\underline{E}) \\ & \searrow^{f} & \downarrow g \\ & & S, \end{array}$$

montre que $K^{\cdot}(S) \to K^{\cdot}(X)$ se factorise par $K^{\cdot}(\underline{\underline{P}}(\underline{E}))$. D'après l'hypothèse de récurrence appliquée à $\underline{\underline{D}}(\underline{F})$, et le corollaire 3.4, $K^{\cdot}(X)$ admet pour base sur $K^{\cdot}(\underline{\underline{P}}(\underline{E}))$ les éléments de la forme :

$$\xi_2^{\alpha_2}\dots\xi_{n-1}^{\alpha_{n-1}}, \qquad \text{avec } 0 \le \alpha_i \le n-i \ ;$$

par ailleurs, $K^{\cdot}(\underline{\underline{P}}(\underline{E}))$ admet pour base sur $K^{\cdot}(S)$ les éléments $1,\xi_1,\dots,\xi_1^{n-1}$; donc $K^{\cdot}(X)$ admet pour base sur $K^{\cdot}(S)$ les éléments :

$$\xi_1^{\alpha_1} \ldots \xi_{n-1}^{\alpha_{n-1}}, \qquad \text{avec } 0 \leq \alpha_i \leq n-i.$$

De plus l'additivité de λ_t entraine que $\prod_i (1+\xi_i t) = \lambda_t(E)$, et les relations du corollaire sont vérifiées.

Si C est la $K^*(S)$-algèbre engendrée par des générateurs ξ_i, soumis aux relations :

$$\sigma_i(\xi_1, \ldots, \xi_n) = \lambda^i(E) \quad ,$$

il existe donc un homomorphisme surjectif de C sur $K^*(X)$. D'après 4.4, cet homomorphisme transforme une base de C en une base de $K^*(X)$, c'est donc un isomorphisme, ce qui achève la démonstration du corollaire.

Traitons le cas général d'un fibré en drapeaux de type π. Le fibré en drapeaux usuel $\underline{\underline{D}}(\underline{E})$ peut s'obtenir à partir de $\underline{\underline{D}}_\pi(\underline{E})$ en construisant successivement les fibrés en drapeaux des $\underline{F}_j$ (4.2). Il en résulte que $K^*(\underline{\underline{D}}(\underline{E}))$, considéré comme module sur $K^*(X)$, admet une base formée des éléments considérés dans 4.3.i), les $\xi_i^{(j)}$ étant les classes des faisceaux analogues aux $\underline{F}_j$ intervenant dans le scindage des images inverses des $\underline{F}_j$ sur $\underline{\underline{D}}(\underline{E})$ (notations de 3.5 et 3.7). Donc $K^*(X)$ est un sous-anneau de $K^*(\underline{\underline{D}}(\underline{E}))$; de plus, l'additivité de λ_t entraine que :

$$\lambda_i^{(j)} = \sigma_i(\xi_1^{(j)}, \ldots, \xi_{p_j}^{(j)}) \quad ,$$

et $K^*(X)$ contient la sous-$K^*(S)$-algèbre de $K^*(\underline{\underline{D}}(\underline{E}))$ engendrée par les $\lambda_i^{(j)}$. Soit B cette sous-algèbre ; d'après 4.3.i), et ce qui vient d'être dit, on a dans $K^*(\underline{\underline{D}}(\underline{E}))$ une famille d'éléments qui forme une base à la fois pour la structure de B-module et pour la structure de $K^*(X)$-module ; par suite, $K^*(X) = B$, ce qui montre que $K^*(X)$ est engendré par les $\lambda_i^{(j)}$. L'idéal des relations entre les $\lambda_i^{(j)}$ est alors donné par 4.3.ii), compte

tenu de la structure de $K^{\cdot}(\underline{\underline{D}}(\underline{E}))$ sur $K^{\cdot}(S)$, déterminée par 4.7, et du fait que les $\xi_i^{(j)}$ sont les classes des faisceaux intervenant dans le scindage de l'image inverse de $\underline{E}$ sur $\underline{\underline{D}}(\underline{E})$. Cela achève la démonstration de la première forme de 4.6.

Pour en déduire la deuxième forme, on remarque que les éléments F_i de la $K^{\cdot}(S)$-λ-algèbre $K^{\cdot}(X)$ vérifient les relations i) et ii). Si A est la $K^{\cdot}(S)$-λ-algèbre engendrée par des éléments F_i' satisfaisant i) et ii), il existe donc un $K^{\cdot}(S)$-λ-homomorphisme de A dans $K^{\cdot}(X)$ envoyant F_i' sur F_i (V 4.7). D'après 4.6, c'est homomorphisme est surjectif. Comme le λ-idéal engendré par les relations i) et ii) dans $K^{\cdot}(S)[F_1,\ldots,F_k]$ contient l'idéal usuel engendré par les relations de 4.6, cet homomorphisme est aussi injectif, donc est un isomorphisme.

Corollaire 4.8. Avec les hypothèses et les notations de 4.5, posons :

$$c_i^{(j)} = \gamma^i(F_j - p_j) \quad , \quad 1 \leq i \leq p_j \quad ;$$

alors la $K^{\cdot}(S)$-algèbre $K^{\cdot}(X)$ est engendrée par les $c_i^{(j)}$; l'idéal des relations entre les $c_i^{(j)}$ est engendré par les relations déduites de :

$$\gamma_t(E-n) = \prod_{j=1}^{k} \gamma_t(F_j - p_j) \quad .$$

Ce n'est qu'un autre énoncé de 4.6. On peut en effet exprimer les $c_i^{(j)}$ en fonction des $\lambda_i^{(j)}$, et réciproquement. De plus, la relation : $\lambda_t(E) = \prod \lambda_t(F_j)$ équivaut à la relation : $\gamma_t(E-n) = \prod \gamma_t(F_j - p_j)$.

4.9. Soit S un schéma ; notons $\underline{\underline{G}}_S^{n,r}$ la grassmanienne de type $(n, r-n)$ de $(\underline{O}_S)^r$, avec $r \geq n$. Pour r variable, les $\underline{\underline{G}}_S^{n,r}$ forment un système inductif, le morphisme $\underline{\underline{G}}_S^{n,r} \to \underline{\underline{G}}_S^{n,r+1}$ étant défini en considérant $(\underline{O}_{\underline{\underline{G}}_S^{n,r}})^r$ comme

quotient de $(\underline{O}_{\underline{\underline{G}}_S^{n,r}})^{r+1}$ par le (r+1)-ième facteur. Dans ce système de morphismes, les quotients canoniques se correspondent donc par image inverse. Le système inductif ainsi défini sera noté $\underline{\underline{G}}_S^{n,\infty}$.

On définit son K· par la formule :

$$K^\cdot(\underline{\underline{G}}_S^{n,\infty}) = \varprojlim_r (K^\cdot(\underline{\underline{G}}_S^{n,r})) \quad . \tag{4.9.1}$$

Soient $\underline{F}_1$, $\underline{F}_2$ les faisceaux canoniques sur $\underline{\underline{G}}_S^{n,r}$ (4.5), et F_1, F_2 leur classe dans $K^\cdot(\underline{\underline{G}}_S^{n,r})$. Posons $c_i = \gamma^i(F_1-n)$. Si on fait varier r, les c_i se correspondent par les morphismes de transition, et définissent par conséquent des éléments, encore notés c_i, de $K^\cdot(\underline{\underline{G}}_S^{n,\infty})$.

Proposition 4.10. Soit S un schéma quasi-compact. Alors, avec les notations de 4.9, on a un isomorphisme :

$$K^\cdot(\underline{\underline{G}}_S^{n,\infty}) \simeq K^\cdot(S)[[c_1,\ldots,c_n]] \quad .$$

D'après 4.8, $K^\cdot(\underline{\underline{G}}_S^{n,r})$ est la $K^\cdot(S)$-algèbre engendrée par les $c_i = \gamma^i(F_1-n)$, $1 \leq i \leq n$, et les $\gamma^j(F_2-r+n)$, $1 \leq j \leq r-n$, soumis aux relations déduites de :

$$\gamma_t(F_1-n).\gamma_t(F_2-r+n) = \gamma_t(r-r) = 1 \quad ,$$

soit encore :

$$\gamma_t(F_2-r+n) = 1/\gamma_t(F_1-n) \quad .$$

Cette relation permet d'exprimer les $\gamma^j(F_2-r+n)$ en fonction des c_i, et donne une série de relations isobares entre les c_i (c_i étant supposé de poids i) en écrivant que les coefficients de $1/\gamma_t(F_1-n)$ sont nuls en degré > r-n ; de plus, ces relations engendrent l'idéal des relations entre les c_i. On peut donc écrire :

$$K^{\cdot}(\underline{G}_S^{n,r}) = K^{\cdot}(S)[c_1,\ldots,c_n]/I_r \quad ,$$

où I_r est un idéal homogène de $K^{\cdot}(S)[c_1,\ldots,c_n]$, de degré $> r-n$. Il résulte alors de la définition (4.9.1) que $K^{\cdot}(\underline{G}_S^{n,\infty})$ est le séparé complété de $K^{\cdot}(S)[c_1,\ldots,c_n]$ pour la topologie définie par les I_r. Cette topologie est plus fine que la topologie définie par le poids ; nous allons montrer qu'elle lui est équivalente, ce qui entrainera la proposition.

Posons $A = K^{\cdot}(S)[c_1,\ldots,c_n]/I_r$, et soit C la A-algèbre engendrée par des générateurs $x_1,\ldots,x_n$ soumis aux relations :

$$\sigma_j(x_1,\ldots,x_n) = c_j \quad ,$$

où les σ_j désignent les fonctions symétriques élémentaires. D'après 4.4, l'homomorphisme canonique $A \to C$ est injectif. On obtient :

$$\gamma_t(F_1-n) = 1 + c_1 t + \ldots + c_n t^n = \prod_{i=1}^{n} (1+x_i t) \quad .$$

Comme $1/\gamma_t(F_1-n)$ est un polynome, il en est de même pour $1/(1+x_i t)$ pour tout i. Par suite, les x_i sont nilpotents, et il existe un entier N tel que tout polynome de degré $> N$ par rapport aux x_i, à coefficients dans $K^{\cdot}(S)$, soit nul. Par conséquent, tout polynome de A, de poids $> N$, est nul, i.e. tout polynome de $K^{\cdot}(S)[c_1,\ldots,c_n]$ de poids $> N$ appartient à I_r. Il s'ensuit que les deux topologies considérées sont équivalentes, ce qui achève la démonstration.

5. Applications aux fibrés projectifs ; étude de f_*

5.1. Dans ce paragraphe, S est un schéma quasi-compact, $\underline{E}$ un $\underline{O}_S$-Module localement libre de rang r+1, X le fibré projectif associé à $\underline{E}$. Sur X, on a la suite exacte canonique :

$$0 \to \underline{F} \to f^*(\underline{E}) \to \underline{O}_X(1) \to 0 \quad ,$$

f étant le morphisme structural $X \to S$.

Les K' considérés seront ceux qui sont définis à l'aide des faisceaux localement libres de type fini. On notera E, F, ξ, les classes de $\underline{E}$, $\underline{F}$, $\underline{O}_X(1)$. On pose $x = 1-\xi^{-1}$, $x' = \xi-1 = \xi x$, et on note $\bar{x}$, $\bar{x}'$ les classes de x, x' dans $Gr^1K'(X)$. Comme $\xi-1$ et x sont dans $Fil^1K'(X)$, on a $(\xi-1)x \in Fil^2K'(X)$, i.e. $x \equiv \xi x = x' \mod. Fil^2K'(X)$ i.e.. $\bar{x}' = -\bar{x}$

5.2. Si $\underline{G}$ est un $\underline{O}_X$-Module localement libre de type fini, les $R^if_*(\underline{G})$ ne sont pas en général localement libres de type fini sur S, si bien qu'on ne peut définir un homomorphisme $f_*: K'(X) \to K'(S)$ comme on le fait pour les K' définis à l'aide des complexes parfaits. Le théorème 1.1 permet de tourner cette difficulté de la façon suivante : si $y \in K'(X)$, on peut, d'une seule manière, écrire :

(5.2.1) $$y = a_o + a_1\xi^{-1} + \ldots + a_r\xi^{-r}, \quad \text{avec } a_i \in K'(S) \quad ;$$

on pose alors :

(5.2.2) $$f_*(y) = a_o \quad .$$

Il est clair que l'homomorphisme ainsi défini est additif, et vérifie la formule de projection, i.e. est $K'(S)$-linéaire.

On vérifie les relations suivantes :

(5.2.3) $$f_*(1) = 1 \; ; \; f_*(\xi^n) = 0 \text{ pour } -r \leq n < 0 \; ; \; f_*(\xi^n) = \sigma_n, \; 1 \leq n \; .$$

Pour vérifier le dernier groupe de relations, on procède par récurrence sur n. Supposons que pour $p \leq n-1$, $f_*(\xi^p) = \sigma_p$; la relation (1.9.1), multipliée par une puissance convenable de ξ, donne :

$$\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E)\xi^{n-i} = 0 \quad .$$

On peut lui appliquer f_* :

$$\sum_{i=0}^{r+1} (-1)^i \lambda^i(E) f_*(\xi^{n-i}) = 0 \quad .$$

Le résultat en découle aussitôt d'après la relation (1.11.3), et l'hypothèse de récurrence.

Proposition 5.3. Avec les notations et les hypothèses de 4.1, on a pour tout $k \geq 0$ une décomposition en somme directe de $K^\cdot(S)$-modules :

$$Fil^k K^\cdot(X) = Fil^k K^\cdot(S) + Fil^{k-1} K^\cdot(S).x + \ldots + Fil^{k-r} K^\cdot(S).x^r \quad ,$$

la filtration considérée étant la filtration de λ-algèbre augmentée définie en V 3.9.1 et 3.10.

On remarque d'abord que x est d'augmentation nulle. Par ailleurs, on a :

$$\gamma_t(x) = \lambda_{t/1-t}(1-\xi^{-1}) = (1+\frac{t}{1-t})(1+\frac{\xi^{-1}t}{1-t})^{-1} = 1/(1-xt) \quad .$$

Donc $\gamma^i(x) = x^i$ pour tout i. Par suite, $K^\cdot(X)$ est un quotient de la $K^\cdot(S)$-λ-algèbre engendrée par un générateur X soumis aux relations $\gamma^i(X) = X^i$ pour tout i, et l'idéal par lequel on fait le quotient est engendré par la relation (1.13.1). On peut donc appliquer V 4.12 et V 4.13.ii), et on est ramené à montrer que pour tout $n \geq 0$:

$$x^n \in Fil^n K^\cdot(S) + Fil^{n-1} K^\cdot(S).x + \ldots + Fil^{n-r} K^\cdot(S).x^r \quad .$$

C'est évident pour $n \leq r$; on poursuit par récurrence. La relation (1.13.1) donne :

$$x^n = -\sum_{i=0}^{r} \gamma^{r+1-i}(\overset{\vee}{E}-r-1).x^{n-r-1+i}, \text{ avec } n \geq r+1 \ ;$$

appliquant l'hypothèse de récurrence aux $x^{n-r-1+i}$, on en déduit le résultat cherché, la somme étant directe puisque $1,\ldots,x^r$ sont indépendants sur $K^\cdot(S)$.

Corollaire 5.4. La filtration induite par $K^{\cdot}(X)$ sur $K^{\cdot}(S)$ est identique à la filtration de $K^{\cdot}(S)$.

Corollaire 5.5. Soient S un schéma quasi-compact, $E_1,\dots,E_n$ des O_S-Modules localement libres de type fini, $\underline{\underline{D}}(E_i)$ le schéma de drapeaux de E_i, $X = \underline{\underline{D}}(E_1)\times_S\dots\times_S\underline{\underline{D}}(E_n)$. Alors l'homomorphisme canonique :

$$GrK^{\cdot}(S) \to GrK^{\cdot}(X)$$

est injectif.

Le raisonnement de 3.1 permet de se ramener à montrer la même propriété quand X est un fibré projectif sur S. Ce cas résulte alors immédiatement de 5.4.

Corollaire 5.6. Avec les notations et les hypothèses de 5.1, $GrK^{\cdot}(X)$ est un $GrK^{\cdot}(S)$-module libre, admettant pour base $1,\bar{x},\dots,\bar{x}^r$. Pour tout k, on a :

$$Gr^kK^{\cdot}(X) = Gr^kK^{\cdot}(S)\oplus Gr^{k-1}K^{\cdot}(S).\bar{x}\oplus\dots\oplus Gr^{k-r}K^{\cdot}(S).\bar{x}^r .$$

Enfin, les éléments $1,\bar{x},\dots,\bar{x}^{r+1}$ sont liés par la relation :

$$\sum_{i=0}^{r+1} c^{r+1-i}(\overset{\vee}{E})\bar{x}^i = 0 ,$$

où $c^k(\overset{\vee}{E})$ est la k-ième classe de Chern de $\overset{\vee}{E}$ (V 6.7).

Conséquence immédiate de 1.1, 5.3, et (1.13.1).

Corollaire 5.7. Avec les notations et les hypothèses de 4.5, la $GrK^{\cdot}(S)$-algèbre $GrK^{\cdot}(X)$ est engendrée par les $\bar{c}_i^{(j)}$, où $\bar{c}_i^{(j)}$ est la classe dans $Gr^iK^{\cdot}(X)$ de $\gamma^i(F_j-p_j)$. L'idéal des relations entre les $\bar{c}_i^{(j)}$ est engendré par les relations déduites de :

$$c(E-n) = \prod_{j=1}^{k} c(F_j-p_j) ,$$

où c est la classe de Chern totale (V 6.7).

Ce résultat se montre en recopiant la démonstration de 4.6, et en utilisant 5.6 (comparer [2], Exp 4).

Corollaire 5.8. Avec les notations et les hypothèses de 5.1, on a pour tout k :

$$f_*(\mathrm{Fil}^k K'(X)) \subset \mathrm{Fil}^{k-r} K'(S) \quad .$$

Conséquence immédiate de 5.3 et de la formule de projection.

Proposition 5.9. Avec les notations et les hypothèses de 5.1, on a pour tout $i \geq 1$:

$$f_*(\lambda^i(F)) = 0 \quad (\text{d'où } f_*(\gamma^i(F)) = 0).$$

En particulier, si on pose $\lambda_{-1}(F) = \sum_{i=0}^{r} (-1)^i \lambda^i(F)$, on obtient :

$$f_*(\lambda_{-1}(F)) = 1 \quad .$$

On définit une application

$$\bar{f}_* : 1 + K'(X)[[t]]^+ \to 1 + K'(S)[[t]]^+$$

en posant :

$$\bar{f}_*(\sum_{i\geq 0} a_i t^i) = \sum_{i\geq 0} f_*(a_i) t^i \quad .$$

Ce n'est pas en général un homomorphisme de groupes ; néanmoins, la relation suivante est vérifiée pour $\varphi \in 1 + K'(X)[[t]]^+$, $\psi \in 1 + K'(S)[[t]]^+$:

$$\bar{f}_*(\varphi . \hat{G}(f^*)(\psi)) = \psi . \bar{f}_*(\varphi) \quad .$$

En effet, elle se vérifie coefficient par coefficient, et résulte immédiatement de la formule de projection.

De la relation $E = F + \xi$, on déduit donc :

$$\bar{f}\,(\lambda_t(F)) = \bar{f}_*(\lambda_t(E)\lambda_t(-\xi)) = \lambda_t(E)\bar{f}_*(\lambda_t(-\xi)) \quad ;$$

Or $\bar{f}(\lambda_t(-\xi)) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i f_*(\xi^i)t^i = \sigma_{-t}(E)$ d'après (4.2.3). Utilisant la relation (1.12.1), on obtient finalement :

$$\bar{f}_*(\lambda_t(F)) = 1 \quad ;$$

d'où les relations cherchées

Proposition 5.10. Avec les notations et les hypothèses de 5.1, soit $z \in K'(X)$. Pour que $z(1-\xi) = 0$, il faut et il suffit qu'il existe $y \in K'(S)$, tel que :

i) $z = y.\lambda_{-1}(F)$;

ii) $y.\lambda_{-1}(E) = 0$.

De $E = F + \xi$, on déduit $\lambda_{-1}(E) = \lambda_{-1}(F).\lambda_{-1}(\xi) = \lambda_{-1}(F).(1-\xi)$. La condition est donc suffisante.

Soit z tel que $z(1-\xi) = 0$, soit $zx' = 0$. D'après la remarque 1.13, on peut, de façon unique, trouver des $a_i \in K'(S)$ tels que :

$$z = \sum_{i=0}^{r} a_i x'^i$$

Par ailleurs, les x'^i vérifient une équation de dépendance :

$$\sum_{i=0}^{r} c_i x'^i + x'^{r+1} = 0 \quad ,$$

avec $c_i = (-1)^{r+i+1}\gamma^{r+1-i}(E-r-1)$.

Comme $zx' = 0$, on obtient :

$$a_r x'^{r+1} = -\sum_{i=1}^{r} a_{i-1}x'^i = -\sum_{i=0}^{r} a_r c_i x'^i \quad .$$

Utilisant l'indépendance de $1,\ldots,x'^r$, on trouve :

$$a_r c_o = 0 \; ; \text{ pour } 0 \leq i < r, \; a_i = a_r c_{i+1}.$$

Donc :

$$z = a_r.\Big(\sum_{i=0}^{r-1} c_{i+1}x'^{i} + x'^{r}\Big) \quad .$$

Or : $\sum_{i=0}^{r-1} c_{i+1}x'^{i} + x'^{r} = (-1)^r.\Big(\sum_{i=0}^{r-1} \gamma^{r-i}(E-r-1).(-1)^i x'^{i} + (-1)^r x'^{r}\Big)$

$$= (-1)^r.\Big(\sum_{i=0}^{r} \gamma^{r-i}(E-r-1)\gamma^{i}(-x')\Big)$$

$$= (-1)^r\gamma^r(E-r-1-x') = (-1)^r\gamma^r(F-x')$$

$$= (-1)^r\lambda^r(F-1)$$

$$= \lambda_{-1}(F) \quad .$$

Si on pose $a_r = y$, on obtient donc :

$$z = y.\lambda_{-1}(F) \quad .$$

Par ailleurs, $y.c_o = 0$; or $c_o = (-1)^{r+1}\gamma^{r+1}(E-r-1) = \lambda_{-1}(E)$; donc $y.\lambda_{-1}(E) = 0$.

Proposition 5.11. Avec les notations et les hypothèses de 5.1, soit $z \in GrK'(X)$. Pour que $z.\bar{x}' = 0$, il faut et il suffit qu'il existe $y \in GrK'(S)$ tel que :

i) $z = y.c^r(F)$;

ii) $y.c^{r+1}(E) = 0$.

La démonstration est identique à celle de 5.10, en se plaçant dans les gradués, et en utilisant 5.6.

6. Etude de la filtration de $K'(X)$, X ayant un faisceau ample

Dans ce paragraphe, X est un schéma ayant un faisceau ample L. On rappelle que dans ce cas les K' définis en termes de faisceaux localement libres de type fini, ou de complexes parfaits, sont égaux (IV,2.9). On note

ε l'homomorphisme d'augmentation : $K^{\cdot}(X) \to H^{\circ}(X,\underline{\mathbb{Z}})$.

Proposition 6.1. Soit X un schéma quasi-compact ayant un faisceau ample $\underline{L}$. Alors $Fil^1K^{\cdot}(X)$ est un nilidéal.

Comme $Fil^1K^{\cdot}(X)$ est engendré par les éléments du type $E-\varepsilon(E)$, où E est la classe d'un $\underline{O}_X$-Module localement libre de type fini $\underline{E}$, et $\varepsilon: K^{\cdot}(X) \to H^{\circ}(X,\underline{\mathbb{Z}})$ l'augmentation de $K^{\cdot}(X)$, il suffit de montrer qu'un tel élément est nilpotent. La quasi-compacité de X, et la commutation du $K^{\cdot}$ aux sommes directes finies permet de se ramener au cas où $\underline{E}$ est de rang constant. Enfin, en passant au fibré de drapeaux de $\underline{E}$, ce qui donne une injection sur les $K^{\cdot}(3.1)$, et conserve l'hypothèse d'éxistence d'un faisceau ample, on peut supposer $\underline{E}$ inversible.

Soit $\underline{E}^*$ le dual de $\underline{E}$. Pour n assez grand, $\underline{E}^*(n) = \underline{E}^* \otimes_{\underline{O}_X} \underline{L}^{\otimes n}$ est engendré par ses sections globales ; on peut donc trouver un entier m, et un homomorphisme surjectif : $(\underline{O}_X)^m \to \underline{E}^*(n)$, donc (tensorisant par $\underline{E}(-n)$) un homomorphisme surjectif : $(\underline{E}(-n))^m \to \underline{O}_X$. Le noyau de cet homomorphisme est localement libre de rang m-1. On obtient donc, en notant L la classe de $\underline{L}$:

$$\lambda^m(mEL^{-n}-1) = 0 \quad .$$

Or $\lambda^m(mEL^{-n}-1) = (-1)^m\lambda_{-1}(mEL^{-n}) = (-1)^m\lambda_{-1}(EL^{-n})^m = (-1)^m(1-EL^{-n})^m$. Par conséquent, pour tout faisceau inversible $\underline{E}$, l'élément $1-EL^{-n}$ est nilpotent pour n assez grand, ou encore son produit L^n-E par L^n est nilpotent.

On peut alors écrire :

$$E-1 = (L^n-1) - (L^n-E)$$

et d'après ce qui précède, L^n-E et L^n-1 sont nilpotents si on choisit n assez grand. Donc E-1 est nilpotent.

Corollaire 6.2. Avec les hypothèses de 6.1, soit $R \subset K^{\cdot}(X)$ un sous-λ-anneau engendré par les classes d'un nombre fini de faisceaux. Alors la filtration de λ-anneau de R est discrète, et $R \cap Fil^1 K^{\cdot}(X)$ est nilpotent. De plus, R est un module de type fini sur $R \cap H^0(X,\mathbb{Z})$ (V 3.9.1).

Comme X est quasi-compact, on peut trouver un recouvrement fini de X par des ensembles ouverts disjoints, tel que sur chacun des ouverts de ce recouvrement les faisceaux dont les classes engendrent R soient tous de rang constant. L'argument standard permet alors de se ramener au cas où ces faisceaux sont de rang constant sur X ; R est alors augmenté vers $\mathbb{Z}$.

Soient E_i, $i = 1,\ldots,k$, les faisceaux dont les classes engendrent R, E_i leurs classes, $x_i = E_i - \varepsilon(E_i)$. On peut écrire R comme quotient du λ-anneau engendré par les x_i soumis aux relations $\gamma^j(x_i) = 0$ pour $j > r_i = \varepsilon(E_i)$ c'est-à-dire $\mathbb{Z}[x_i, \gamma^j(x_i)]_{\substack{1 \le i \le k \\ 2 \le j \le r_i}}$; par suite, R est noethérien. Mais d'après la proposition 6.1, les x_i, $\gamma^j(x_i)$ sont nilpotents. Donc l'idéal d'augmentation de R est nilpotent ; par ailleurs, il n'est autre que $R \cap Fil^1 K^{\cdot}(X)$.

Tout élément de $Fil^n R$ s'écrit comme polynome sans composantes de poids $< n$ par rapport aux $x_i, \gamma^j(x_i)$. Soit m le plus grand entier tel qu'il existe i tel que $\gamma^{m-1}(x_i) \neq 0$; soit p un entier tel que les puissances p-ièmes des x_i, $\gamma^j(x_i)$ soient toutes nulles. Pour $n > kp(1+\ldots+m)$, on voit tout de suite que $Fil^n R = 0$; la filtration de R est donc discrète.

La filtration de R étant discrète, il n'y a qu'un nombre fini de monômes non nuls par rapport aux x_i, $\gamma^j(x_i)$. Ces monômes forment un système de générateurs de R comme $\mathbb{Z}$-module, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 6.3. Avec les hypothèses de 6.1, soit A un anneau commutatif. Pour qu'un élément y de $K'(X)\otimes_{\mathbb{Z}}A = K'(X)_A$ soit inversible, il faut et il suffit que $z = (\varepsilon\otimes Id_A)(y)$ le soit. En particulier, si E est un faisceau localement libre de type fini sur X, partout $\neq 0$, alors sa classe dans $K'(X)_{\mathbb{Q}}$ est inversible.

L'idéal d'augmentation de $K'(X)\otimes_{\mathbb{Z}}A$ est $Fil^1K'(X)\otimes_{\mathbb{Z}}A$, et est donc un nilidéal, d'après 6.1. Pour qu'un élément de $K'(X)\otimes_{\mathbb{Z}}A$ soit inversible il est donc nécessaire et suffisant que son augmentation le soit.

Corollaire 6.4. Soient X un schéma quasi-compact, ayant un faisceau ample, et $f : X' \to X$ un morphisme propre et parfait. On suppose de plus vérifiée l'une des deux conditions suivantes :

i) f projectif,

ii) X noethérien,

de façon que le "théorème de finitude" soit vrai (III 2.2). On se donne un anneau A, et on considère l'homomorphisme "image directe" (IV 2.11) :

$$f_* : K'(X')\otimes_{\mathbb{Z}}A \to K'(X)\otimes_{\mathbb{Z}}A \quad .$$

On suppose enfin qu'il existe un élément $x' \in K'(X')\otimes_{\mathbb{Z}}A$ tel que $\varepsilon(f_*(x')) \in H^0(X,A)$ soit inversible. Alors l'homomorphisme :

$$f^* : K'(X)\otimes_{\mathbb{Z}}A \to K'(X')\otimes_{\mathbb{Z}}A$$

est injectif.

On écrit la formule de projection :

$$f_*(f^*(x)x') = x.f_*(x') \quad .$$

Or $f_*(x')$ est d'augmentation inversible, donc est inversible (6.3). Par suite, l'homomorphisme composé :

$$x \rightsquigarrow f^*(x) \rightsquigarrow f^*(x)x' \rightsquigarrow f_*(f^*(x)x')$$

est injectif, donc f^* l'est aussi.

6.5. Soit X un schéma noethérien de dimension d, ayant un faisceau ample $\underline{L}$. On munit $K'(X)$ de la filtration définie comme suit (cf. [1]) : x appartient à $K'(X)_i$ si et seulement si pour tout fermé Y de X, il existe un complexe $\underline{M}'(Y)$, parfait, tel que :

i) $cl(\underline{M}'(Y)) = x$;

ii) $Codim(Supp(H^*(\underline{M}'(Y))) \cap Y, Y) \geq i$, avec $H^*(\underline{M}'(Y)) = \bigoplus_{i \geq 0} H^i(\underline{M}'(Y))$.

Les $K'(X)_i$ ainsi définis sont des sous-groupes additifs de $K'(X)$. En effet, soient $x, x' \in K'(X)_i$, et pour un fermé Y donné dans X, $\underline{M}'$ et $\underline{M}''$ les complexes correspondants ; alors x+x' est la classe du complexe $\underline{M}' \oplus \underline{M}''$, et

$$Supp(H^*(\underline{M}' \oplus \underline{M}'')) = Supp(H^*(\underline{M}') \oplus H^*(\underline{M}''))$$
$$= Supp(H^*(\underline{M}')) \cup Supp(H^*(\underline{M}'')) \ ;$$

comme la codimension d'une réunion finie de fermés est la borne inférieure des codimensions des fermés, on a bien $x+x' \in K'(X)_i$.

Proposition 6.6. La filtration 5.5 de $K'(X)$ est une filtration d'anneau et $K'(X)_{d+1} = 0$.

Soient $x \in K'(X)_i$, $x' \in K'(X)_j$, et Y un fermé de X. Il existe un complexe $\underline{M}'$ tel que $x = cl(\underline{M}')$, et $codim(Supp(H^*(\underline{M}')) \cap Y, Y) \geq i$; il existe un complexe $\underline{M}''$ tel que $x' = cl(\underline{M}'')$, et :

$$codim(Supp(H^*(\underline{M}')) \cap Supp(H^*(\underline{M}'')) \cap Y, \ Supp(H^*(\underline{M}')) \cap Y) \geq j \ .$$

On a alors : $xx' = cl(\underline{M}' \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{M}'')$, et :

$$codim(Supp(H^*(\underline{M}')) \cap Supp(H^*(\underline{M}'')) \cap Y, \ Y) \geq i+j$$

(EGA O_{IV} 14.2.2.3).

Il suffit donc, pour achever la démonstration, de noter que :

$$\mathrm{Supp}(H^*(\underline{M}^\cdot \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \underline{M}'^\cdot)) \subset \mathrm{Supp}(H^*(\underline{M}^\cdot)) \cap \mathrm{Supp}(H^*(\underline{M}'^\cdot)) \quad .$$

Pour montrer que $K^\cdot(X)_{d+1}$ est nul, on prend $x \in K^\cdot(X)_{d+1}$, et $Y = X$ il existe alors $\underline{M}^\cdot$ tel que $x = cl(\underline{M}^\cdot)$, et $\mathrm{codim}_X(\mathrm{Supp}(H^*(\underline{M}^\cdot))) \geq d+1$; comme X est de dimension d, cela entraine $\mathrm{Supp}(H^*(\underline{M}^\cdot)) = \emptyset$, donc $\underline{M}^\cdot$ est acyclique, et $x = 0$.

Lemme 6.7. Soit X = Spec(A) un schéma affine noethérien, $x_1,\ldots,x_k$ un nombre fini de points de X, $\underline{E}$ un $\underline{O}_X$-Module inversible. Alors, il existe une section $s \in \Gamma(X,\underline{E})$ telle que pour tout i, s_{x_i} soit une base de $\underline{E}_{x_i}$.

Posons $M = \Gamma(X,\underline{E})$. Pour tout i, soit x_i' un point fermé de X tel que $x_i' \in \overline{\{x_i\}}$. Les x_i' correspondent à des idéaux maximaux $\underline{m}_i$ de A, qu'on peut supposer tous distincts, quitte à changer l'ensemble d'indices de façon que chacun des $\underline{m}_i$ intervienne une fois et une seule fans la famille $(\underline{m}_i)$. Comme $\underline{E}$ est inversible, on a pour tout i un isomorphisme $M_{\underline{m}_i} \simeq A_{\underline{m}_i}$ d'où on déduit un isomorphisme $M/\underline{m}_i M \simeq A/\underline{m}_i$, puis $\prod_i M/\underline{m}_i M \simeq \prod_i A/\underline{m}_i$, soit encore $A/\prod_i \underline{m}_i \simeq M/(\prod_i \underline{m}_i)M$. En relevant ce dernier isomorphisme, on obtient un homomorphisme $A \to M$ tel que l'homomorphisme $A_{\underline{m}_i} \to M_{\underline{m}_i}$ correspondant soit pour tout i un isomorphisme modulo $\underline{m}_i$, donc un isomorphisme d'après Nakayama. L'image de 1 par cet homomorphisme donne donc une section s de $\underline{E}$ qui est une base de $\underline{E}_{x_i'}$ pour tout i. Comme l'ensemble des points où s est une base de $\underline{E}$ est un ouvert de X, s est aussi une base de $\underline{E}_{x_i}$ pour i = 1,...,k.

Lemme 6.8. Soient X un schéma noethérien ayant un faisceau ample $\underline{L}$, $\underline{E}$ un $\underline{O}_X$-Module inversible, $x_1 \ldots,x_k$ des points de X. Alors il existe un

entier n tel que pour tout $k \geq 1$, il existe une section $s \in \Gamma(X,\underline{E}(kn))$ qui soit une base de $\underline{E}(kn)_{x_i}$ pour tout i.

On peut trouver un entier n_o, et une section $f \in \Gamma(X,\underline{L}^{\otimes n_o})$ telle que pour tout i, $x_i \in X_f$, et que X_f soit un ouvert affine (EGA II 4.5.4). Sur X_f, on peut trouver une section $t \in \Gamma(X_f,\underline{E})$ satisfaisant les conditions du lemme 6.7 ; de plus, il existe un entier n'_o tel que la section $f^{\otimes n'_o} \otimes t \in \Gamma(X_f,\underline{E}(n_o n'_o))$ se prolonge à X tout entier. Posons $n = n_o n'_o$; alors $f^{\otimes n'_o} \in \Gamma(X,\underline{L}^{n})$; en faisant le produit tensoriel de la section de $\underline{E}(n)$ obtenue plus haut et de $f^{\otimes kn'_o}$, on obtient donc une section de $\underline{E}((k+1)n)$ pour tout $k \geq 0$. Comme pour tout p, $X_{f^{\otimes p}} = X_f$, et que la section t est une base de $\underline{E}_{x_i}$ pour tout i, les sections de $\underline{E}(kn)$ ainsi construites pour tout $k \geq 1$ forment une base de $\underline{E}(kn)_{x_i}$ pour tout i.

Théorème 6.9. Soit X un schéma noethérien de dimension d, ayant un faisceau ample $\underline{L}$. Alors $\mathrm{Fil}^{d+1}K'(X) = 0$, et à fortiori $(\mathrm{Fil}^{1}K'(X))^{d+1}=0$.

(Cette dernière relation est due à J.P. Serre, dans le cas général envisagé ici).

Nous allons d'abord montrer que si $\underline{E}$, $\underline{E}'$ sont deux faisceaux inversibles sur X, de classes E, E', alors $E-E' \in K'(X)_1$.

Soient Y un fermé de X, $Y_1,\ldots,Y_k$ ses composantes irréductibles, et pour tout i, soit x_i un point de $Y_i - \bigcup_{j\neq i} Y_j$. D'après le lemme 6.8, il existe des entiers n, n', tels que, quels que soient les entiers k, $k' \geq 1$, on puisse trouver des homomorphismes de $\underline{O}_X$ dans $\underline{E}(kn)$, $\underline{E}'(k'n')$ qui soient des isomorphismes aux points x_i ; on obtient donc des morphismes :

$$\underline{L}^{\otimes -kn} \xrightarrow{s_k} \underline{E}, \quad \underline{L}^{\otimes -k'n'} \xrightarrow{s'_{k'}} \underline{E}' ,$$

qui sont des isomorphismes aux points x_i. Considérons alors le complexe :

$$\underline{N}^{\cdot} = \quad \ldots \to 0 \to \underline{L}^{\otimes -nn'} \xrightarrow{(s'_n, 0)} \underline{E}' \oplus \underline{L}^{\otimes -nn'} \xrightarrow{0+s_{n'}} \underline{E} \to 0 \to \ldots$$

La classe de $\underline{N}^{\cdot}$ est E-E' ; par ailleurs, $\underline{N}^{\cdot}$ est acyclique aux points x_i, donc $\mathrm{Supp}(H^*(\underline{N}^{\cdot})) \cap Y$ ne contient aucune composante irréductible de Y, et par conséquent est de codimension ≥ 1 dans Y ; ceci montre que E-E' est dans $K^{\cdot}(X)_1$.

Soit maintenant x un élément de $\mathrm{Fil}^{d+1}K^{\cdot}(X)$; nous allons montrer que $x = 0$. On peut supposer que x s'écrit :

$$x = \gamma^{i_1}(E_1 - F_1) \ldots \gamma^{i_k}(E_k - F_k) \quad , \text{ avec } i_1 + \ldots + i_k \geq d+1,$$

les E_i, F_i, étant les classes de faisceaux localement libres de type fini, et, pour tout i, $\underline{E}_i$ et $\underline{F}_i$ ayant même rang. De plus, quitte à décomposer X en somme d'un nombre fini d'ouverts, et à raisonner dans chaque ouvert, on peut supposer les $\underline{E}_i$, $\underline{F}_i$ de rang constant. Soit alors X' le produit fibré sur X des schémas de drapeaux des $\underline{E}_i$, $\underline{F}_i$. Dans $K^{\cdot}(X')$, les images des E_i, F_i sont sommes de classes de faisceaux inversibles. Soient ξ, η les classes de deux $\underline{O}_X$,-Modules inversibles ; on a :

$$\gamma_t(\xi - \eta) = \gamma_t(\xi - 1)/\gamma_t(\eta - 1) = (1 + (\xi - 1)t) \,/\, (1 + (\eta - 1)t) \quad .$$

Donc $\gamma^i(\xi - \eta) = (-1)^{i-1}(\xi - \eta)(\eta - 1)^{i-1}$. Or X' est noethérien et a un faisceau ample, donc, d'après ce qui précède et 6.6, $\gamma^i(\xi - \eta) \in K^{\cdot}(X')_i$. Utilisant l'additivité de γ_t et 6.6, on en déduit que $f^*(\gamma^{i_j}(E_j - F_j)) \in K^{\cdot}(X')_{i_j}$, et $f^*(x) \in K^{\cdot}(X')_{d+1}$, f étant le morphisme canonique $X' \to X$.

Nous allons en déduire que $f^*(x) = 0$. Soit r la dimension relative de X' sur X. Il existe un élément x' de $K^{\cdot}(X')$, appartenant à une base de $K^{\cdot}(X')$ sur $K^{\cdot}(X)$, tel que :

$$x' = \prod_{i=0}^{r} (\xi_i - 1) \quad ,$$

les ξ_i étant les classes de faisceaux inversibles : pour le montrer, on se ramène par le raisonnement de 3.1 au cas d'un fibré projectif sur X. Or ce dernier cas est conséquence immédiate de 1.13. L'élément x' considéré est dans $K^{\cdot}(X')_r$ d'après ce qui précède, et par conséquent $x'f^*(x) \in K^{\cdot}(X')_{d+r+1}$. Or dimX' = d+r; donc d'après 6.6, $x'f^*(x) = 0$. Comme x' fait partie d'une base de $K^{\cdot}(X')$ sur $K^{\cdot}(X)$, ceci entraine $f^*(x)=0$. Comme f^* est injectif (3.1), on a finalement x = 0.

Problème 6.10. Sous les hypothèses de 6.9, est-il vrai que pour tout k on ait : $Fil^k K^{\cdot}(X) \subset K^{\cdot}(X)_k$?

BIBLIOGRAPHIE

[1] Bass H. , K-Theory and stable algebra, Publ. Math. de l'IHES, n°22.

[2] Chevalley C. , Séminaire 1958 : Anneaux de Chow et applications.

[3] Hakim M. , Topos localement annelés et schémas relatifs, thèse (en préparation).

[4] Hartshorne R. , Residues and duality, Lectures notes in Mathematics n°20, Springer-Verlag.

[5] Serre J.-P. , Le groupe de Grothendieck des schémas en groupes réductifs, Publications Mathématiques de l'IHES, n° 34.

EXPOSE VII

IMMERSIONS REGULIERES ET CALCUL DU K' D'UN SCHEMA ECLATE

par Pierre BERTHELOT

1. Généralités sur les immersions régulières

La notion classique d'immersion régulière (EGA IV 16.9.2) s'avérant inadéquate dans le cas non noethérien, nous allons définir une notion plus faible, mais donnant lieu aux propriétés souhaitées, et qui équivaut à la définition usuelle dans le cas noethérien.

Définition 1.1. Soient A un anneau commutatif, E un A-module projectif de type fini, $u : E \to A$ un homomorphisme A-linéaire. On dit que u est régulier si le complexe de Koszul K.(u) défini par u est acyclique en dimension > 0, donc est une résolution de $B = A/u(E)$.

Rappelons que le complexe de Koszul associé à u est défini comme suit : le A-module gradué K.(u) est l'algèbre extérieure $\wedge(E)$, et l'opérateur bord la multiplication intérieure par u considéré comme élément du dual $\check{E}$: c'est une antidérivation de degré -1 de $\wedge(E)$, égale à u sur E.

Lemme 1.2. Soit $u : E \to A$ un homomorphisme régulier. Soient A' une A-algèbre, $u' : E' \to A'$ l'homomorphisme déduit de u par changement de base ; on suppose u' régulier. On pose $J = u(E)$, $J' = JA' = u(E')$. Alors on a les relations suivantes pour tout entier $n \geq 0$:

(1.2.1) $J^n/J^{n+1} \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n/J'^{n+1}$, (1.2.2) $\mathrm{Tor}_i^A(J^n/J^{n+1}, A') = 0$ pour $i \geq 1$;

(1.2.3) $J^n \otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n$, (1.2.4) $\mathrm{Tor}_i^A(J^n, A') = 0$ pour $i \geq 1$.

a) On suppose d'abord que les J^n/J^{n+1} sont projectifs sur $B = A/J$; comme J est de type fini, ils sont localement libres de type fini sur B.

Les relations à prouver se vérifiant ponctuellement sur Spec(A), on est ramené au cas A local, avec $u(E) \subset \mathrm{rad}(A)$. Les J^n/J^{n+1} sont alors libres sur B, et les relations $\mathrm{Tor}_i^A(J^n/J^{n+1},A') = 0$ pour $i \geq 1$ équivalent aux relations $\mathrm{Tor}_i^A(B,A') = 0$ pour $i \geq 1$. Or on peut calculer les Tor_i^A en utilisant la résolution projective $K.(u)$ de B ; ce sont les groupes d'homologie du complexe $K.(u)\otimes_A A' = K.(u')$. Comme on suppose u' régulier, ce dernier est acyclique en degrés > 0, d'où les relations $\mathrm{Tor}_i^A(J^n/J^{n+1},A') = 0$, pour $i \geq 1$.

On en déduit les relations $\mathrm{Tor}_i^A(A/J^n,A') = 0$ pour $i \geq 1$, en procédant par récurrence sur n grâce à la suite exacte des Tor associé à la suite exacte :

$$0 \longrightarrow J^n/J^{n+1} \longrightarrow A/J^{n+1} \longrightarrow A/J^n \longrightarrow 0.$$

Comme pour tout k on a $J^kA' = J'^k$, on tire de cette suite exacte et de $\mathrm{Tor}_1^A(A/J^n,A') = 0$ les relations $J^n/J^{n+1}\otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n/J'^{n+1}$.

De la suite exacte :

$$0 \longrightarrow J^n \longrightarrow A \longrightarrow A/J^n \longrightarrow 0,$$

et de $\mathrm{Tor}_1^A(A/J^n,A') = 0$, on déduit les relations $J^n\otimes_A A' \xrightarrow{\sim} J'^n$.

Enfin, de la suite exacte des Tor associée à la suite exacte :

$$0 \longrightarrow J^{n+1} \longrightarrow J^n \longrightarrow J^n/J^{n+1} \longrightarrow 0,$$

on déduit les relations $\mathrm{Tor}_i^A(J^n,A') = 0$ pour $i \geq 1$, par récurrence sur n, le cas $n = 0$ étant évident.

b) On va montrer maintenant que les J^n/J^{n+1} sont projectifs sur $B = A/J$. La question étant locale sur Spec(A), on peut supposer E libre, soit $E = (A)^d$, de sorte que u est défini par une suite $f_1,\ldots,f_d$ d'éléments de A. Posons $A_o = \mathbb{Z}[T_1,\ldots,T_d]$ et soit $A_o \longrightarrow A$ l'homomorphisme qui applique

T_i sur f_i ; notons $u_o : E_o = (A_o)^d \longrightarrow A_o$ l'homomorphisme défini par la suite $(T_1,\ldots,T_d)$, de sorte que u est déduit de u_o par changement de base de A_o à A. Comme la suite $(T_1,\ldots,T_d)$ est régulière (au sens classique), l'homomorphisme u_o est régulier, et on est sous les conditions du lemme, appliqué au changement de base $A_o \longrightarrow A$. Or les J_o^n/J_o^{n+1} sont libres de type fini sur $\mathbb{Z}$, donc on peut appliquer les résultats du a). Par suite $J^n/J^{n+1} \xrightarrow{\sim} J_o^n/J_o^{n+1}\otimes_{A_o} A$, et J^n/J^{n+1} est libre de type fini.

Proposition 1.3. Soient A un anneau, E un A-module projectif de type fini, $u : E \longrightarrow A$ un homomorphisme régulier, $J = u(E)$. Alors l'idéal J est quasi-régulier (EGA IV 16.9.7), c'est-à-dire (EGA IV 16.9.8) :

i) J est de type fini.

ii) J/J^2 est un A/J-module projectif de type fini ;

iii) l'homomorphisme canonique

$$\mathrm{Sym}_{A/J}(J/J^2) \longrightarrow \mathrm{gr}_J(A) = \bigoplus_{n\geq 0} J^n/J^{n+1}, \tag{1.3.1}$$

est un isomorphisme.

On a vu dans la démonstration de 1.2 b), que J/J^2 est projectif de type fini. Reprenons les notations de 1.2 b) (la question étant locale sur Spec(A), on suppose encore E libre de type fini). Alors l'homomorphisme canonique (1.3.1) se déduit de l'homomorphisme analogue pour J_o par le changement de base $A_o \longrightarrow A$, d'après les relations 1.2. Or ce dernier est un isomorphisme, donc il en est de même pour (1.3.1).

Définition 1.4. Soient (X,A) un site commutativement localement annelé, E un A-Module localement libre de type fini, $u : E \longrightarrow A$ un homomorphisme A-linéaire. On dit que u est régulier si le complexe de Koszul K.(u) défini par u est acyclique en degrés > 0. Soit J un Idéal de A ; on dit que J est

régulier, si, localement sur X, il existe un A-Module libre de type fini E, et un homomorphisme régulier surjectif : $E \longrightarrow J$.

Soit $i : Y \longrightarrow X$ une immersion de préschémas, et soit U un ouvert de X tel que $i(Y) \subset U$ et que i soit une immersion fermée de Y dans U. On dit que i est régulière si l'idéal de $\mathcal{O}_U$ définissant i(Y) est régulier (condition qui ne dépend pas de U). Si $y \in Y$, on dit que i est régulière en y s'il existe un voisinage V de i(y) tel que l'immersion $i^{-1}(V) \longrightarrow V$ soit régulière. Pour qu'une immersion soit régulière, il est donc nécéssaire et suffisant qu'elle le soit au voisinage de chaque point.

Cette définition est en conflit avec EGA IV 16.9.2, et remplace cette dernière. Toutefois, dans le cas noethérien, les deux définitions sont équivalentes (EGA IV 19.5.1). Une immersion qui peut localement être définie par une suite régulière est régulière ; une immersion régulière est quasi-régulière (1.3).

1.4.1. Soient X un schéma, J un Idéal de type fini de $\mathcal{O}_X$, x un point de $\mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/J)$. Nous dirons qu'une famille de sections $f_1,\ldots,f_d$ de J sur un voisinage de x forme un système minimum de générateurs de J au voisinage de x si les $(f_i)_x$ sont une famille de générateurs de J_x de nombre minimum, i.e. leurs images dans $J_x \otimes k(x)$ forment une base de cet espace vectoriel sur k(x). On notera que les f_i engendrent J sur un voisinage de x.

1.4.2. Dire qu'une immersion est régulière, c'est encore dire qu'elle est définie dans un certain ouvert de X par un idéal de type fini J, et que pour tout point $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/J)$, et tout système minimum de générateurs de J au voisinage de x, le complexe de Koszul associé à cette suite est acyclique au voisinage de x : soit en effet $f_1,\ldots,f_d$ un système minimum de

générateurs de $\underline{J}$ au voisinage de x tel que le complexe de Koszul associé soit acyclique (il en existe si on suppose l'immersion régulière) ; soit $g_1,\ldots,g_d$ un autre système minimum de générateurs de $\underline{J}$; il existe un voisinage de x sur lequel $\underline{J}$ peut être engendré soit les f_i, soit par les g_j, et par suite, il existe sur ce voisinage une matrice à coefficients dans $\underline{O}_X$ permettant d'exprimer les g_j en fonction des f_i. Or les images des f_i (resp. g_j) dans $\underline{J}/\underline{J}^2$ forment une base au point x, donc dans un voisinage de x, et par suite cette matrice est inversible dans un voisinage de x. Elle permet donc de définir un isomorphime du complexe de Koszul défini par les g_j sur le complexe de Koszul défini par les f_i, ce qui montre que le complexe de Koszul défini par les g_j est acyclique.

1.4.3. En supposant seulement $\underline{J}$ de type fini, et $\underline{J}/\underline{J}^2$ localement libre de type fini, notons que tout système minimum de générateurs de $\underline{J}$ au voisinage d'un point y de Y donne une base de $\underline{J}/\underline{J}^2$ au voisinage de y. Réciproquement, si on a au voisinage de y une base de $\underline{J}/\underline{J}^2$, on peut la relever au voisinage de y en une famille de sections de $\underline{J}$, qui engendrent $\underline{J}_y$ par Nakayama, donc $\underline{J}$ dans un voisinage de y puisque $\underline{J}$ est de type fini ; de plus ces générateurs sont en nombre minimum, puisqu'ils donnent un base de $\underline{J}/\underline{J}^2$.

Proposition 1.5. (Comparer EGA IV 19.1.5 (ii)). Soit $i : Y \longrightarrow X$ une immersion. Si i est régulière, il en est de même pour toute immersion déduite de i par changement de base plat. Pour que i soit régulière, il faut et il suffit qu'elle le soit localement pour la topologie fidèlement plate quasi-compacte.

La stabilité par changement de base plat est évidente.

Réciproquement, soit i' l'immersion déduite de i par un changement de

base fidèlement plat quasi-compact. Si i' est régulière, alors l'Idéal $\underline{J}$ qui définit i est de type fini, et $\underline{J}/\underline{J}^2$ est localement libre de type fini, car ces propriétés se descendent par morphismes fidèlement plats quasi-compacts. Si $f_1,\dots,f_d$ est une suite de sections de $\underline{J}$ relevant une base de $\underline{J}/\underline{J}^2$, le complexe de Koszul associé aux images inverses des f_i est acyclique en degrés > 0 d'après 1.4 ; comme c'est l'image inverse du complexe de Koszul associé aux f_i, ce dernier est acyclique en degrés > 0, et i est régulière.

Définition 1.6. Soit $i : Y \longrightarrow X$ une immersion définie dans un ouvert U de X par un Idéal $\underline{J}$ de $\underline{O}_X$; le $\underline{O}_Y$-Module $\underline{J}/\underline{J}^2$ (indépendant de U) est appelé faisceau conormal de Y dans X, et noté $\underline{N}_{X/Y}$. Si i est régulière, $\underline{J}/\underline{J}^2$ est localement libre de type fini, et son rang s'appelle codimension de Y dans X, ou encore codimension de i.

Si on a deux immersions fermées : $Z \xrightarrow{j} Y \xrightarrow{i} X$, les faisceaux conormaux forment une suite exacte :

$$j^*(\underline{N}_{X/Y}) \longrightarrow \underline{N}_{X/Z} \longrightarrow \underline{N}_{Y/Z} \longrightarrow 0. \tag{1.6.1}$$

Soient en effet $\underline{I}$ l'idéal de Y dans X, $\underline{J}$ l'idéal de Z dans X, $\underline{K}$ l'idéal de Z dans Y. On a la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \underline{I} \longrightarrow \underline{J} \longrightarrow \underline{K} \longrightarrow 0 ;$$

d'où par tensorisation par $\underline{O}_X/\underline{I} = \underline{O}_Y$, la suite exacte :

$$\underline{I}/\underline{I}^2 \longrightarrow \underline{J} \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_Y \longrightarrow \underline{K} \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_Y \longrightarrow 0 ;$$

en tensorisant par $\underline{O}_Z = \underline{O}_X/\underline{J} = \underline{O}_Y/\underline{K}$, on obtient la suite exacte :

$$j^*(\underline{I}/\underline{I}^2) \longrightarrow \underline{J} \otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_Z \longrightarrow \underline{K} \otimes_{\underline{O}_Y} \underline{O}_Z \longrightarrow 0,$$

qui est la suite cherchée.

Proposition 1.7. (Comparer EGA IV 19.1.5 (iv)). Soient $i : Y \longrightarrow X$, et $j : Z \longrightarrow Y$ deux immersions :

i) Si i et j sont régulières, $i \circ j$ est régulière, et la suite :

$$0 \longrightarrow j^*(\underline{N}_{X/Y}) \longrightarrow \underline{N}_{X/Z} \longrightarrow \underline{N}_{Y/Z} \longrightarrow 0$$

est exacte ; en particulier, $\operatorname{codim}(i \circ j) = \operatorname{codim}(i) + \operatorname{codim}(j)$.

ii) Si $i \circ j$ et i sont régulières, et si la suite :

$$0 \longrightarrow j^*(\underline{N}_{X/Y}) \longrightarrow \underline{N}_{X/Z} \longrightarrow \underline{N}_{Y/Z} \longrightarrow 0,$$

est exacte et localement scindée, j est régulière ;

iii) Si X est noethérien, et si $i \circ j$ et j sont régulières, i est régulière aux points de Z.

La question étant locale sur X, on peut supposer X affine et les immersions fermées ; soient $X = \operatorname{Spec}(A)$, $Y = \operatorname{Spec}(B)$, $Z = \operatorname{Spec}(C)$, avec $B = A/I$, $C = A/J = B/K$.

i) Quitte à se localiser, on peut supposer I/I^2 libre sur B, et K/K^2 libre sur C (1.3). Soient $f_1, \ldots, f_n$ des éléments de A relevant une base de I/I^2, $g_1, \ldots, g_m$ des éléments de A relevant une base de K/K^2 ; alors, quitte à se localiser davantage, on peut supposer que $f_1, \ldots, f_n$ engendrent I, que $f_1, \ldots, f_n, g_1, \ldots, g_m$ engendrent J, et que $\bar{g}_1, \ldots, \bar{g}_m$ engendrent K, $\bar{g}_j$ étant l'image de g_j dans B (1.4) ; de plus, $f_1, \ldots, f_n$ forment un système minimum de générateurs de I, et $\bar{g}_1, \ldots, \bar{g}_m$ un système minimum de générateurs de K.

On considère le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} A_o = \mathbb{Z}[T_1, \ldots, T_{n+m}] & \longrightarrow & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_o = \mathbb{Z}[T_1, \ldots, T_m] & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ C_o = \mathbb{Z} & \longrightarrow & C, \end{array} \tag{1.7.1}$$

où les flèches horizontales sont définies en envoyant T_i sur f_i pour $1 \leq i \leq n$, et T_{n+j} sur g_j pour $1 \leq j \leq m$, où l'homomorphisme $A_o \longrightarrow B_o$ est défini en envoyant T_i sur 0 pour $1 \leq i \leq n$, et T_{n+j} sur T_j pour $1 \leq j \leq m$, et l'homomorphisme $B_o \longrightarrow C_o$ en annulant les T_j, $1 \leq j \leq m$. On a alors :

$$B = A \otimes_{A_o} B_o \quad , \quad C = A \otimes_{A_o} C_o = B \otimes_{B_o} C_o \quad .$$

La situation étudiée se déduit donc de la situation (A_o, B_o, C_o) par le changement de base $A_o \longrightarrow A$. Or les immersions correspondantes i_o, j_o et $i_o \circ j_o$ sont régulières ; par suite, les groupes d'homologie des complexes de Koszul associés aux suites $(f_1, \ldots, f_n)$, $(f_1, \ldots, f_n, g_1, \ldots, g_m)$ et $(\bar{g}_1, \ldots, \bar{g}_m)$, sont respectivement les $\mathrm{Tor}_i^{A_o}(B_o, A)$, $\mathrm{Tor}_i^{A_o}(C_o, A)$, $\mathrm{Tor}_i^{A_o}(C_o, B)$. Par suite :

(1.7.2)
$$\text{i régulière} \iff \forall i \geq 1,\ \mathrm{Tor}_i^{A_o}(B_o, A) = 0 \ ;$$

$$\text{i}\circ\text{j régulière} \iff \forall i \geq 1,\ \mathrm{Tor}_i^{A_o}(C_o, A) = 0 \ ;$$

$$\text{j régulière} \iff \forall i \geq 1,\ \mathrm{Tor}_i^{B_o}(C_o, B) = 0 \ .$$

On utilise alors la suite spectrale de transitivité ([1], XVI 5)

(1.7.3)
$$E^2_{pq} = \mathrm{Tor}_p^{B_o}(C_o, \mathrm{Tor}_q^{A_o}(B_o, A)) \Longrightarrow \mathrm{Tor}_n^{A_o}(C_o, A).$$

D'après les hypothèses de i), $E^2_{pq} = 0$ pour p ou $q \neq 0$. Donc elle dégénère, et i∘j est régulière d'après (1.7.2).

D'après (1.6.1), la suite :

$$j^*(\underline{N}_{X/Y}) \longrightarrow \underline{N}_{X/Z} \longrightarrow \underline{N}_{Y/Z} \longrightarrow 0$$

est exacte. Comme i∘j est régulière, les trois faisceaux conormaux sont localement libres de type fini ; de plus, leur rang en un point est le

nombre d'éléments d'un système minimum de générateurs de l'idéal correspondant ; d'après la démonstration qui précède, on a

$$\text{rang}(\underline{N}_{X/Z}) = \text{rang}(\underline{N}_{X/Y}) + \text{rang}(\underline{N}_{Y/Z}) \quad .$$

Il en résulte que le noyau de $j^*(\underline{N}_{X/Y}) \longrightarrow \underline{N}_{X/Z}$ est localement libre de rang nul, donc que la suite (1.8.1) est exacte.

ii) On peut supposer J/J^2 libre sur C, et I/I^2 libre sur B ; de plus, l'hypothèse faite sur la suite des faisceaux conormaux permet de supposer que $I/I^2 \otimes_A A/J$ est facteur direct de J/J^2. On peut donc trouver des éléments $f_1,\ldots,f_n$ de A relevant une base de I/I^2, des éléments $g_1,..,g_m$ de A tels que $f_1,\ldots,f_n,g_1,\ldots,g_m$ relèvent une base de J/J^2, les images de $g_1,\ldots,g_m$ engendrant K/K^2 ; quitte à localiser encore, on peut supposer que $f_1,\ldots,f_n$ forment un système minimum de générateurs de I, que $f_1,\ldots,f_n,g_1,\ldots,g_m$ un système minimum de générateurs de J, et que $\bar{g}_1,\ldots,\bar{g}_m$ engendrent K. On peut alors construire le diagramme (1.7.1), et utiliser la suite spectrale (1.7.3).

D'après (1.7.2), i étant régulière, on a $E^2_{pq} = 0$ pour $q \geq 1$; on obtient donc des edge-isomorphismes : $E^2_{p,0} \xrightarrow{\sim} \text{Tor}_p^A(C_o,A)$. Comme i∘j est régulière, ceci entraine d'après (1.7.2) que $E^2_{p,0} = 0$ pour $p \geq 1$, et par suite que j est régulière, toujours d'après (1.7.2).

iii) Cette dernière propriété est démontrée dans EGA IV 19.1.5 (iv) puisque dans le cas noethérien la définition de EGA IV coïncide avec celle que nous adoptons ici.

Proposition 1.8. Soient X un schéma, E un $\underline{O}_X$-Module localement libre de type fini, $u : \underline{E} \longrightarrow \underline{O}_X$ un homomorphisme régulier, $\underline{J} = u(\underline{E})$. On note Y

le sous-schéma fermé de X défini par J, X' le schéma obtenu en faisant éclater Y, P le fibré projectif associé à E, p le morphisme structural $P \longrightarrow X$. Sur P, on considère la suite exacte canonique :

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow p^*(E) \longrightarrow \mathcal{O}_P(1) \longrightarrow 0 ,$$

et le morphisme composé :

$$v : F \longrightarrow p^*(E) \xrightarrow{p^*(u)} \mathcal{O}_P .$$

Alors :

i) La formation de X' commute à tout changement de base $f : T \longrightarrow X$ tel que $f^*(u)$ soit régulier.

ii) L'immersion fermée $j : X' \longrightarrow P$ définie par l'homomorphisme surjectif $\mathcal{S}(E) \longrightarrow \bigoplus_{n\geq 0} J^n$ défini par u en degré 1 est une immersion régulière, son idéal étant l'image du morphisme régulier v ; en particulier si codim(i) est constante, codim(j) = codim(i) - 1.

iii) Le $\mathcal{S}(E)$-Module $\bigoplus_{n\geq 0} J^n$ est parfait en tant que $\mathcal{S}(E)$-Module gradué, i.e. il existe localement une résolution finie, graduée, de $\bigoplus_{n\geq 0} J^n$ par des $\mathcal{S}(E)$-Modules gradués localement libres de type fini (VI 1.2).

i) Comme $X' = \mathrm{Proj}(\bigoplus_{n\geq 0} J^n)$, le résultat est une conséquence immédiate des relations (1.2.3) et de EGA II.

ii) Les propriétés énoncées étant locales sur X, on peut supposer X affine, et de plus E libre sur X. On pose X = Spec(A).

On fait d'abord la démonstration dans le cas standard $A = \mathbb{Z}[T_1,\ldots,T_d]$, E étant muni d'une base $e_1,\ldots,e_d$, avec $u(e_i) = T_i$. Alors $P = \mathrm{Proj}(\mathbb{Z}[T_1,\ldots,T_d,X_1,\ldots,X_d])$, la graduation étant prise par rapport aux X_i. Pour montrer que v est un morphisme régulier dont l'image est l'Idéal de j, il suffit de le faire localement sur P, donc sur les

$D^+(X_i)$; plaçons nous par exemple sur $D^+(X_1)$. Alors $p^*(\underline{E})$ est défini par le module $\mathbb{Z}[T_1,\ldots,T_d,X_2/X_1,\ldots,X_d/X_1]\otimes E$, et $\underline{O}_P(1)$ par $\mathbb{Z}[T_1,\ldots,T_d,X_2/X_1,\ldots,X_d/X_1]$, le morphisme canonique envoyant e_i sur X_i/X_1 pour tout i. Alors F admet pour base les éléments $e_i - e_1.X_i/X_1$ pour $i > 1$.

On a $v(e_i - e_1.X_i/X_1) = T_i - T_1.X_i/X_1$; posons $T'_i = T_i - T_1X_i/X_1$. Comme la suite des T_i est régulière dans $\mathbb{Z}[T_1,\ldots,T_d,X_2/X_1,\ldots,X_d/X_1]$, il en est de même de la suite $T_1,T'_2,\ldots,T'_d$ qui s'en déduit par une matrice inversible, et donc aussi de la suite $T'_2,\ldots,T'_d$ qui en est extraite (on est dans un cas noethérien). Par suite, v est un morphisme régulier.

Il faut donc montrer que les T'_i engendrent l'Idéal de j. Dans $\bigoplus_{n\geq 0} J^n$, nous noterons, pour $m \leq p$, $x^{(m)}$ l'élément x de J^p, considéré comme étant de degré m. Au-dessus de $D^+(X_1)$, $X' = \mathrm{Spec}((\bigoplus_{n\geq 0} J^n)_{(T_1^{(1)})})$, et j est défini par le morphisme qui envoie X_i sur $T_i^{(1)}$. Dans ce morphisme, l'image de T'_i est $T_i^{(0)} - T_1^{(0)}.T_i^{(1)}/T_1^{(1)} = ((T_iT_1)^{(1)} - (T_1T_i)^{(1)})/T_1^{(1)} = 0$. Donc les T'_i appartiennent à l'Idéal de j.

Comme tout élément de $\mathbb{Z}[T_1,\ldots,T_d,X_2/X_1,\ldots,X_d,X_1]$ peut s'exprimer comme polynôme par rapport à $T_1,T'_2,\ldots,T'_d,X_2/X_1,\ldots,X_d/X_1$, il suffit, pour montrer que les T'_i engendrent l'Idéal de j, de montrer qu'aucun élément non nul de $\mathbb{Z}[T_1,X_2/X_1,\ldots,X_d/X_1]$ n'appartient à l'Idéal de j, ce qui revient à montrer que l'homomorphisme

$$\mathbb{Z}[T_1,X_1,\ldots,X_d] \longrightarrow \bigoplus_{n\geq 0} J^n$$

est injectif, car $T_1^{(1)}$ n'est pas diviseur de 0 dans $\bigoplus_{n\geq 0} J^n$. Si on gradue $\mathbb{Z}[T_1,X_1,\ldots,X_d]$ en attribuant le degré 0 à T_1, et le degré 1 aux X_i, le noyau de l'homomorphisme considéré est un idéal gradué. Or il est clair que

ce noyau est contenu dans celui de l'homomorphisme composé :

$$\mathbb{Z}[T_1, X_1, \ldots, X_d] \longrightarrow \bigoplus_{n\geq 0} J^n \longrightarrow A \quad ,$$

le dernier étant défini en degré n par l'injection de J^n dans A. Or le noyau de l'homomorphisme composé est l'idéal principal engendré par $(X_1 - T_1)$, qui pour des raisons d'intégrité ne contient pas d'éléments homogènes non nuls. Donc le premier homomorphisme est injectif, ce qui achève la démonstration dans le cas considéré.

Revenons au cas général où A est quelconque ; on peut encore supposer $\underline{E}$ libre sur X. Affectons l'indice O au cas particulier qui vient d'être traité ; alors d'après la partie i) de la proposition, la situation considérée est obtenue par le changement de base $A_o \longrightarrow A$ à partir de la situation étudiée précédemment, l'homomorphisme $A_o \longrightarrow A$ étant défini en prenant une base de E, son image $f_1, \ldots, f_d$ dans J, et en envoyant T_i sur f_i. Posons $B_o = \left(\bigoplus_{n\geq 0} J_o^n\right)_{(T_1^{(1)})}$, $B = \left(\bigoplus_{n\geq 0} J^n\right)_{(f_1^{(1)})}$; alors $B = B_o \otimes_{A_o} A$; le complexe de Koszul défini par $v : \underline{F} \longrightarrow \underline{O}_P$ se déduit par changement de base du complexe de Koszul défini par v_o ; ce dernier étant une résolution projective de B_o (en se plaçant sur un ouvert convenable) les groupes d'homologie de K.(v) sont sur cet ouvert les $\mathrm{Tor}_i^{A_o}(A, B_o)$. Ces derniers sont les composantes de degré O des $\mathrm{Tor}_i^{A_o}(A, \left(\bigoplus_{n\geq 0} J_o^n\right)_{T_1^{(1)}}) = \left(\bigoplus_{n\geq 0} \mathrm{Tor}_i^{A_o}(A, J_o^n)\right)_{T_1^{(1)}}$; or les $\mathrm{Tor}_i^{A_o}(A, J_o^n)$ sont nuls pour $i \geq 1$ d'après les relations 1.2, donc K.(v) est une résolution de B, ce qui montre que j est régulière.

iii) La propriété étant locale sur X, on peut encore supposer X affine et $\underline{E}$ libre de type fini. On reprend alors les notations de ii).

On considère d'abord le cas standard de ii). L'anneau A_o est alors noethérien et de dimension cohomologique finie, et l'algèbre $\underline{S}(E_o)$ égale-

ment. On peut alors construire de proche en proche une résolution partielle graduée de $\bigoplus_{n\geq 0} J_o^n$, par des $\underline{\underline{S}}(E_o)$-modules gradués libres de type fini, de longueur supérieure à la dimension cohomologique de A_o ; le dernier noyau est alors un $\underline{\underline{S}}(E_o)$-module gradué, projectif de type fini en tant que $\underline{\underline{S}}(E_o)$-module non gradué, donc localement libre de type fini sur $\mathrm{Spec}(A_o)$ en tant que $\underline{\underline{S}}(\underline{E}_o)$-module gradué d'après VI 1.5.1. On obtient alors la résolution finie annoncée en remplaçant le dernier module de la résolution partielle par le noyau correspondant.

Si on tensorise la résolution ainsi construite par A, on obtient alors un complexe gradué de $\underline{\underline{S}}(E)$-modules gradués localement libres de type fini, et il s'agit de voir que c'est une résolution de $\bigoplus_{n\geq 0} J^n$. Or le i-ième Module d'homologie du complexe ainsi obtenu est un $\underline{\underline{S}}(E)$-Module gradué dont la n-ième composante est $\mathrm{Tor}_i^{A_o}(A, J_o^n)$, qui est nul pour $i \geq 1$ d'après (1.2.4). Par suite, d'après (1.2.3), on a construit ainsi une résolution du type voulu.

Proposition 1.9. Soient $i : Y \longrightarrow X$ une immersion fermée régulière, X' le X-schéma obtenu en faisant éclater Y, et $f : X' \longrightarrow X$ le morphisme structural. Alors i et f sont des morphismes parfaits. (III 4.1.).

La propriété étant locale sur X, on peut supposer donnés un $\underline{O}_X$-Module localement libre de type fini $\underline{E}$, et un homomorphisme régulier $u : \underline{E} \longrightarrow \underline{O}_X$, ayant pour image l'idéal $\underline{J}$ de Y. Le complexe de Koszul $\underline{K}.(u)$ est alors une résolution finie de $\underline{O}_Y$ par des $\underline{O}_X$-Modules localement libres de type fini ; par conséquent, $\underline{O}_Y$ est un $\underline{O}_X$-Module parfait. Il en résulte que toute immersion régulière est un morphisme parfait. D'après 1.8, f peut s'écrire comme le composé d'une immersion régulière $X' \longrightarrow \underline{\underline{P}}(\underline{E})$ et du morphisme structural $\underline{\underline{P}}(\underline{E}) \longrightarrow X$ qui est lisse, donc parfait ; c'est donc

le composé de deux morphismes parfaits, et par suite un morphisme parfait.

Proposition 1.10. Soient X, Y deux schémas lisses sur S. Alors toute S-immersion de X dans Y est régulière. En particulier, toute section d'un morphisme lisse est une immersion régulière.

La proposition résulte immédiatement de EGA IV 17.12.1, puisqu'une immersion régulière au sens de EGA IV est régulière au sens de 1.4.

2. Calculs sur les immersions régulières

2.1. Soient A un anneau, B et C deux A-algèbres. On se propose de munir $\bigoplus_{i\geq 0} \mathrm{Tor}_i^A(B,C)$ d'une structure de A-algèbre graduée, donc de définir des homomorphismes :

$$\mathrm{Tor}_i^A(B,C) \otimes_A \mathrm{Tor}_j^A(B,C) \longrightarrow \mathrm{Tor}_{i+j}^A(B,C). \tag{2.1.1}$$

Soit P. une résolution de B par des A-modules projectifs ; les $\mathrm{Tor}_i^A(B,C)$ sont les groupes d'homologie du complexe $P.\otimes_A C$. On sait définir des homomorphismes canoniques ([1], IV 6) :

$$H_i(P.\otimes_A C) \otimes_A H_j(P.\otimes_A C) \longrightarrow H_{i+j}((P.\otimes_A C) \otimes_A (P.\otimes_A C)). \tag{2.1.2}$$

Par ailleurs, $P.\otimes_A P.$ est un complexe de A-modules projectifs, à degrés ≥ 0, et $H_o(P.\otimes_A P.) = B\otimes_A B$; de plus, P. est une résolution de B. Par suite, le morphisme d'augmentation $B\otimes_A B \longrightarrow B$ se prolonge en un morphisme de complexes : $P.\otimes_A P. \longrightarrow P.$ et définit donc, compte tenu de l'homomorphisme $C\otimes_A C \longrightarrow C$ déduit de la structure d'algèbre de C, des homomorphismes :

$$H_{i+j}((P.\otimes_A C) \otimes_A (P.\otimes_A C)) \longrightarrow H_{i+j}(P.\otimes_A C) \quad . \tag{2.1.3}$$

En composant (2.1.2) et (2.1.3), on obtient les homomorphismes (2.1.1).

La structure d'algèbre définie par les homomorphismes (2.1.1) est associative (cf. [1] XI 2). Par ailleurs, le A-module $H_i(P.\otimes_A C)$ est muni de façon standard d'une structure de $B\otimes_A C$-module en faisant opérer C de façon évidente, et B par fonctorialité ; de même, les $H_j((P.\otimes_A C)\otimes_A(P.\otimes_A C))$ sont munis de deux structures de $B\otimes_A C$-modules. Il est clair que les homomorphismes (2.1.2) et (2.1.3) sont compatibles avec ces deux structures : pour (2.1.2), par fonctorialité (en se plaçant dans la catégorie des A-modules), et pour (2.1.3), en utilisant le résultat classique sur les morphismes d'un complexe acyclique. Nous avons donc muni $\bigoplus_{i\geq 0} \mathrm{Tor}_i^A(B,C)$ d'une structure de $B\otimes_A C$-algèbre associative.

2.2. Supposons que B admette une résolution par des A-modules projectifs P., telle que $P. = \bigoplus_{i\geq 0} P_i$ soit une A-algèbre graduée, la différentielle satisfaisant :

a) $P_o \longrightarrow B$ est un homomorphisme d'anneaux ; (1)

b) $\forall x \in P_i, \forall y \in P_j$, $d(xy) = d(x)y + (-1)^i xd(y)$.

Alors les applications "produit" définissent des diagrammes commutatifs pour $i,j \geq 0$:

$$\begin{array}{ccc} P_i\otimes_A P_j & \longrightarrow & (P_{i-1}\otimes_A P_j)\oplus(P_i\otimes_A P_{j-1}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ P_{i+j} & \longrightarrow & P_{i+j-1} \end{array} ,$$

et par suite un homomorphisme de complexes $P.\otimes_A P. \longrightarrow P.$ qui prolonge l'homomorphisme d'augmentation : $B\otimes_A B \longrightarrow B$. Ceci montre que la structure d'algèbre de $\bigoplus_{i\geq 0} \mathrm{Tor}_i^A(B,C)$ peut se calculer à partir de celle de P.. En particulier, si P. est une A-algèbre alternée (i.e. telle que pour tout

(1) On peut montrer qu'une telle résolution existe toujours.

$x \in P.$, on ait $x^2 = 0$), alors il en est de même pour $\bigoplus_{i\geq 0} \mathrm{Tor}_i^A(B,C)$.

Cette dernière remarque s'applique au cas où B est le quotient de A par un idéal régulier, car on peut alors prendre pour P. le complexe de Koszul associé à un homomorphisme régulier définissant l'idéal de B.

2.3. La structure de $B\otimes_A C$-algèbre définie en 2.1 sur $\bigoplus_{i\geq 0} \mathrm{Tor}_i^A(B,C)$ est fonctorielle en B et C. On peut alors globaliser les constructions précédentes : soient X un schéma, X', X" deux X-schémas ; alors on peut localement sur $X'x_XX"$ définir les morphismes (2.1.1), ils se recollent par fonctorialité, et définissent sur $\bigoplus_{i\geq 0} \underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_{X"})$ une structure de $\underline{O}_{X'x_XX"}$-Algèbre graduée associative.

Lemme 2.4. Soient X', X" deux X-schémas, et $\underline{M}$ un $\underline{O}_{X'}$-Module plat. Alors pour tout $i \geq 0$, on a un isomorphisme canonique :

$$\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{M},\underline{O}_{X"}) \xrightarrow{\sim} \underline{M} \otimes_{\underline{O}_{X'}} \underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_{X"}) \quad .$$

Il suffit de définir un isomorphisme fonctoriel dans le cas affine ; on pourra alors par recollement le définir globalement dans le cas général.

Soient alors X = Spec(A), X' = Spec(A'), X" = Spec(A") ; $\underline{M}$ est défini par un A'-module plat M, Soit P. une résolution projective de A" sur A ; les $\mathrm{Tor}_i^A(A',A")$ sont les groupes d'homologie de $A'\otimes_A P.$ Comme M est plat sur A', on a un isomorphisme canonique : $M \otimes_{A'} \mathrm{Tor}_i^A(A',A") \xrightarrow{\sim} H_i(M \otimes_{A'} (A'\otimes_A P.))$. Par ailleurs, l'isomomorphisme canonique : $M \otimes_{A'} (A'\otimes_A P.) \xrightarrow{\sim} M \otimes_A P.$ donne un isomorphisme canonique : $H_i(M \otimes_{A'} (A' \otimes_A P.)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Tor}_i^A(M,A")$, d'où le résultat.

Proposition 2.5. Soient X un schéma, Y et Z deux sous-schémas fermés de X, $T = Yx_XZ$. On suppose que pour tout $x \in T$, il existe un voisinage ouvert

U de x, et une suite de sections $f_1,\dots,f_p,g_1,\dots,g_r,h_1,\dots,h_s$ de $\underline{O}_U$ telles que le complexe de Koszul associé à $f_1,\dots,f_p,g_1,\dots,g_r$ soit une résolution de $\underline{O}_{Y\cap U}$, le complexe de Koszul associé à $f_1,\dots,f_p$, $h_1,\dots,h_s$ une résolution de $\underline{O}_{Z\cap U}$, et le complexe de Koszul associé à $f_1,\dots,f_p,g_1,\dots,g_r$, $h_1,\dots,h_s$ une résolution de $\underline{O}_{T\cap U}$ (conditions satisfaites en particulier dans le cas noethérien si la suite $f_1,\dots,f_p,g_1,\dots g_r,h_1,\dots,h_s$ est régulière et si $Y=V(f_1,\dots,f_p,g_1,\dots,g_r)$, $Z=V(f_1,\dots,f_p,h_1,\dots,h_s)$). Soient I, J les idéaux de Y, Z. On a alors les isomorphismes suivants :

i) $\forall\ i \geq 0$, $\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z) \xrightarrow{\simeq} \overset{i}{\wedge}\ \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z)$;

ii) $\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z) \simeq \underline{I}\cap\underline{J}/\underline{I}.\underline{J} \simeq \mathrm{Ker}(i^*(\underline{N}_{Y/X})\times j^*(\underline{N}_{Z/X}) \longrightarrow \underline{N}_{T/X})$,

où on note i l'immersion de T dans Y et j l'immersion de T dans Z.

En particulier, pour toute immersion fermée régulière $Y \longrightarrow X$, on a

i') $\forall\ i \geq 0$, $\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Y) \xrightarrow{\simeq} \overset{i}{\wedge}\ \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Y)$;

ii') $\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Y) \simeq \underline{N}_{Y/X}$.

i) On a vu en 2.3 que $\bigoplus_{i\geq 0} \underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z)$ pouvait être muni d'une structure de $\underline{O}_T$-Algèbre ; d'après 2.2, cette algèbre est alternée, car l'immersion de Y (ou Z) dans X est régulière. Il existe donc un homomorphisme d'algèbres et un seul :

$$\text{(2.5.1)} \qquad \wedge\ \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z) \longrightarrow \bigoplus_{i\geq 0} \underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z) \quad ,$$

prolongeant l'identité en degré 1.

Pour voir que c'est un isomorphisme, on peut le voir localement. On se place donc au voisinage d'un point de T, et on considère des sections $f_1,\dots,f_p,g_1,\dots,g_r,h_1,\dots,h_s$ de $\underline{O}_X$ dans ce voisinage, ayant les propriétés indiquées dans l'énoncé de 2.5. Posons alors $\underline{E} = (\underline{O}_X)^p$, $\underline{E}' = (\underline{O}_X)^r$, et soient $u : \underline{E} \longrightarrow \underline{O}_X$ l'homomorphisme défini par les f_i, $v : \underline{E}' \longrightarrow \underline{O}_X$ l'homomorphisme défini par les g_j, $\underline{K}.(u)$ et $\underline{K}.(v)$ les

complexes de Koszul associés. Le complexe de Koszul associé à la suite $f_1,\dots,f_p,g_1,\dots,g_r$ est isomorphe au complexe produit tensoriel $\underline{K}.(u)\otimes_{\underline{O}_X}\underline{K}.(v)$. Comme c'est une résolution de $\underline{O}_Y$ par des $\underline{O}_X$-Modules libres de type fini, les $\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z)$ sont les faisceaux d'homologie du complexe $\underline{K}.(u)\otimes_{\underline{O}_X}\underline{K}.(v)\otimes_{\underline{O}_X}\underline{O}_Z$. On peut le considérer comme le produit tensoriel des complexes $\underline{K}.(u)$ et $\underline{K}.(v)\otimes_{\underline{O}_X}\underline{O}_Z$, et utiliser pour calculer son homologie les suites spectrales associées à un bicomplexe (EGA O_{III} (11.3.5)), qui ont comme aboutissement l'homologie du complexe simple associé.

On considère la suite spectrale telle que ${}'E^2_{pq} = H^I_p(H^{II}_q(K..))$, avec les notations de EGA O_{III} (11.3.5), le premier indice étant relatif au complexe $\underline{K}.(u)$ et le second au complexe $\underline{K}.(v)\otimes_{\underline{O}_X}\underline{O}_Z$. Or le complexe $\underline{K}.(v)\otimes_{\underline{O}_X}\underline{O}_Z$ est le complexe de Koszul sur $\underline{O}_Z$ associé à la suite de sections $\bar{g}_1,\dots,\bar{g}_r$, où les $\bar{g}_i$ sont les images des g_i dans $\underline{O}_Z$, et ce complexe est une résolution de $\underline{O}_T$ sur $\underline{O}_Z$ car les immersions $Z \longrightarrow X$, et $T \longrightarrow Z \longrightarrow X$ sont régulières (cf. démonstration de 1.7 ii). Comme $\overset{p}{\wedge}\underline{E}$ est libre sur $\underline{O}_X$, le complexe $\overset{p}{\wedge}\underline{E}\otimes_{\underline{O}_X}(\underline{K}.(v)\otimes_{\underline{O}_X}\underline{O}_Z)$ est une résolution de $\overset{p}{\wedge}\underline{E}\otimes_{\underline{O}_X}\underline{O}_T$. Par conséquent la suite spectrale dégénère, et les $\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z)$ sont les faisceaux d'homologie du complexe $\underline{K}.(u)\otimes_{\underline{O}_X}\underline{O}_T$. Or la différentielle de $\underline{K}.(u)$ s'exprime en termes des f_i, qui annulent $\underline{O}_T$; par suite, la différentielle de $\underline{K}.(u)\otimes_{\underline{O}_X}\underline{O}_T$ est nulle, et on obtient donc les isomorphismes :

$$\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z) \xrightarrow{\sim} \underline{O}_T\otimes_{\underline{O}_X}\overset{i}{\wedge}\underline{E} \longrightarrow \overset{i}{\wedge}(\underline{O}_T)^p \quad . \tag{2.5.2}$$

En particulier, on trouve pour i = 1 :

$$\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z) \xrightarrow{\sim} (\underline{O}_T)^n \quad ,$$

d'où pour tout i :

$$\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z) \xrightarrow{\sim} \overset{i}{\wedge}\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z) \quad . \tag{2.5.3}$$

Or il résulte de 2.2 que l'isomorphisme :

$$\wedge(\underline{O}_T)^n \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{i\geq 0} \underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z)$$

défini par les isomorphismes (2.5.2) est compatible aux structures d'algèbres des deux membres ; il en est donc de même pour l'isomorphisme :

$$\wedge\, \underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{i\geq 0} \underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z)$$

défini par les isomorphismes (2.5.3). Pour des raisons d'unicité, ce dernier est donc la restriction de l'homomorphisme (2.5.1) qui avait été défini globalement. L'homomorphisme (2.5.1) est donc un isomorphisme.

ii) On considère la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \underline{I} \longrightarrow \underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_Y \longrightarrow 0 \quad ,$$

et la suite exacte des $\underline{\mathrm{Tor}}$ qui en résulte :

$$0 \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z) \longrightarrow \underline{I}\otimes_{\underline{O}_X}\underline{O}_Z \longrightarrow \underline{O}_Z \quad .$$

Il en résulte que $\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Z)$ est le noyau de l'homomorphisme :

$$\underline{I}\otimes_{\underline{O}_X}(\underline{O}_X/\underline{J}) \longrightarrow \underline{O}_X/\underline{J} \quad ,$$

c'est-à-dire $\underline{I}\cap\underline{J}/\underline{I}.\underline{J}$.

Pour montrer la dernière relation, nous allons montrer qu'il existe une suite exacte :

$$\underline{0} \longrightarrow \underline{I}\cap\underline{J}/\underline{I}.\underline{J} \longrightarrow i^*(\underline{N}_{Y/X})\times j^*(\underline{N}_{Z/X}) \longrightarrow \underline{N}_{T/X} \longrightarrow 0 \quad .$$

Les homomorphismes $i^*(\underline{N}_{Y/X}) \longrightarrow \underline{N}_{T/X}$ et $j^*(\underline{N}_{Z/X}) \longrightarrow \underline{N}_{T/X}$ ont été définis en (1.6.1) ; on prend ici leur différence. Par ailleurs, $\underline{I}\cap\underline{J}$ s'envoie de façon naturelle dans $\underline{I}/\underline{I}^2$, donc dans $i^*(\underline{I}/\underline{I}^2)$, et de même dans $j^*(\underline{J}/\underline{J}^2)$, et ces homomorphismes s'annulent sur $\underline{I}.\underline{J}$, car $\underline{I}$, $\underline{J} \subset \underline{K}$ (où $\underline{K}$ désigne l'idéal de T) ce qui définit la flèche de gauche.

Pour vérifier que la suite est exacte, on peut le faire localement sur T, et utiliser les sections définies dans l'énoncé de 2.5. On a alors une base de $\underline{N}_{T/X}$ formée des images des f_i, g_j, h_k, une base de $i^*(\underline{N}_{Y/X})$ formée des images des f_i, g_j, et une base de $j^*(\underline{N}_{Z/X})$ formée des images des f_i, h_k. Il est alors clair que $i^*(\underline{N}_{Y/X}) \times j^*(\underline{N}_{Z/X}) \longrightarrow \underline{N}_{T/X}$ est surjectif, et que son noyau est formé des éléments ayant des coordonnées nulles sur les $(\bar{g}_j, 0)$ et les $(0, \bar{h}_k)$, et des coordonnées égales pour tout i sur $(\bar{f}_i, 0)$ et $(0, \bar{f}_i)$. Par suite, la suite est également exacte au milieu. Or les trois $\underline{O}_T$-Modules intervenant sont localement libres de type fini ; comme $\underline{\mathrm{Tor}}_1^X(\underline{O}_Y, \underline{O}_Z)$ est de rang p d'après la démonstration du i), on voit immédiatement que la suite est exacte.

2.6. On suppose maintenant que X est un schéma ayant un faisceau ample. Tout sous-schéma fermé Y de X a alors un faisceau ample. On sait que dans ce cas "il existe des résolutions globales", et que les $K^\cdot$ formés respectivement avec les faisceaux localement libres de type fini et les complexes parfaits sont identiques (II, 2.2.9) . Si en outre l'immersion $i : Y \longrightarrow X$ est régulière, c'est un morphisme parfait, et on peut définir un homomorphisme additif $i_* : K^\cdot(Y) \longrightarrow K^\cdot(X)$ (IV 2.12), en associant à la classe d'un complexe parfait $\underline{L}^\cdot$ la classe du complexe $\underline{\mathrm{R}}i_*(\underline{L}^\cdot) = i_*(\underline{L}^\cdot)$ (i_* étant un foncteur exact).

Proposition 2.7. Soient X un schéma ayant un faisceau ample, $i : Y \longrightarrow X$ une immersion fermée régulière, N le faisceau conormal de Y dans X. Alors, pour tout $x \in K^\cdot(Y)$, on a la relation :

$$i^*(i_*(x)) = x.\lambda_{-1}(N) \quad ,$$

où N est la classe de $\underline{N}$ dans $K^\cdot(Y)$, et $\lambda_{-1}(N) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \lambda^i(N)$.

Comme les deux membres de la relation à démontrer sont additifs, on peut supposer que x est la classe d'un $\underline{O}_Y$-Module localement libre de type fini $\underline{M}$. L'élément $i^*(i_*(x))$ est alors la classe du complexe $\underline{\underline{L}}i^*(\underline{\underline{R}}i_*(\underline{M}))$, obtenu en prenant une résolution projective du complexe $\underline{\underline{R}}i_*(\underline{M}) = i_*(\underline{M})$, et en la tensorisant par $\underline{O}_Y$. Les faisceaux d'homologie de ce complexe sont donc les $\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{M},\underline{O}_Y)$. D'après 2.4, on a l'isomorphisme :

$$\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{M},\underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \underline{M}\otimes_{\underline{O}_Y}\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Y) \quad .$$

D'après 2.5, on a l'isomorphisme :

$$\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \overset{i}{\wedge}\underline{N} \quad .$$

Les $\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{M},\underline{O}_Y)$ sont donc des $\underline{O}_Y$-Modules localement libres de type fini, et la classe dans $K^\cdot(Y)$ du complexe $\underline{\underline{L}}i^*(\underline{\underline{R}}i_*(\underline{M}))$ est la somme alternée des classes de ses faisceaux d'homologie, soit :

$$i^*(i_*(x)) = \sum_{i\geq 0}(-1)^i \mathrm{cl}(\underline{M}\otimes_{\underline{O}_Y}\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_Y,\underline{O}_Y)) = \sum_{i\geq 0}(-1)^i x.\lambda^i(N) \quad .$$

Corollaire 2.8. Sous les hypothèses de 2.7, soient $x, y \in K^\cdot(Y)$; on a la relation :

$$i_*(xy\lambda_{-1}(N)) = i_*(x).i_*(y) \quad .$$

D'après 2.7, $y\lambda_{-1}(N) = i^*(i_*(y))$.

Par application de la formule de projection, on trouve donc :

$$i_*(xy\lambda_{-1}(N)) = i_*(x.i^*(i_*(y))) = i_*(x).i_*(y) \quad .$$

3. Calcul du $K^\cdot$ d'un schéma éclaté

3.1. Dans ce paragraphe, on désigne par $i : Y \longrightarrow X$ une immersion fermée régulière. On note X' le schéma obtenu en faisant éclater Y, et $Y' = Y\times_X X'$.

On sait (EGA II 8.1.8) que Y' est un sous-schéma fermé de X' défini par un idéal de $\underline{O}_X$, canoniquement isomorphe à $\underline{O}_{X'}(1)$; l'immersion $j : Y' \longrightarrow X$ étant définie par un idéal inversible, est une immersion fermée régulière de codimension 1. On note $\underline{J}$ l'idéal de $\underline{O}_X$ qui définit Y, et $\underline{J}'$ l'idéal de $\underline{O}_{X'}$ qui définit Y' ; on a donc $\underline{J}' \xrightarrow{\sim} \underline{J}.\underline{O}_{X'} \xrightarrow{\sim} \underline{O}_{X'}(1)$. Enfin, on note $f : X' \longrightarrow X$, et $g : Y' \longrightarrow Y$ les morphismes structuraux. On a donc le diagramme commutatif :

(3.1.1)
$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array} \quad .$$

Par définition, $X' = \mathrm{Proj}(\underline{S})$, où $\underline{S} = \bigoplus_{n\geq 0} \underline{J}^n$. Par suite, on a :

$$Y' = \mathrm{Proj}(i^*(\underline{S})) = \mathrm{Proj}((\bigoplus_{n\geq 0} \underline{J}^n)\otimes_{\underline{O}_X} (\underline{O}_X/\underline{J})) = \mathrm{Proj}(\bigoplus_{n\geq 0} \underline{J}^n/\underline{J}^{n+1}) \quad .$$

Or, i étant régulière, $\bigoplus_{n\geq 0} \underline{J}^n/\underline{J}^{n+1} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Sym}}_{\underline{O}_Y}(\underline{J}/\underline{J}^2)$ (1.3). On note $\underline{N}$ le faisceau conormal $\underline{J}/\underline{J}^2$; on a donc :

$$Y' = \underline{\mathbb{P}}(\underline{N}) \quad .$$

Sur Y', on peut écrire la suite exacte :

(3.1.2) $$0 \longrightarrow \underline{F} \longrightarrow g^*(\underline{N}) \longrightarrow \underline{O}_{Y'}(1) \longrightarrow 0 \quad .$$

On remarque que $\underline{O}_{Y'}(1) = j^*(\underline{O}_{X'}(1)) = \underline{J}'/\underline{J}'^2$; c'est donc le faisceau conormal de l'immersion j, et on le notera $\underline{L}$.

Lemme 3.2. Avec les hypothèses et les notations de 3.1, on a les isomorphismes suivants :

i) $\forall\, i \geq 0$, $\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \overset{i}{\wedge} \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y)$;

ii) $\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \underline{F}$.

i) Comme $\underline{O}_Y$ peut se résoudre localement par un complexe de Koszul, l'algèbre graduée $\bigoplus_{i\geq 0} \underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y)$ est alternée (2.2). Il existe donc un homomorphisme d'algèbres et un seul :

$$\wedge\, \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y) \longrightarrow \bigoplus_{i\geq 0} \underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y) \quad , \tag{3.2.1}$$

prolongeant l'injection de $\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y)$ dans $\bigoplus_{i\geq 0} \underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y)$. Il suffit de vérifier localement que c'est un isomorphisme.

On peut donc se placer sur un ouvert affine U = Spec(A) de X, $\underline{J}$ étant défini par un idéal J de A, et se donner un homomorphisme régulier u : E $\longrightarrow$ A, définissant J, avec $E = (A)^n$. Soient $f_1,\dots,f_d$ les images d'une base de E.

Dans $\bigoplus_{n\geq 0} J^n$, nous noterons, pour $m \leq p$, $x^{(m)}$ l'élément x de J^p considéré comme étant de degré m. On peut se restreindre à l'ouvert V de X' où l'élément $f_1^{(1)}$ par exemple est inversible.

Les $\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y)$ sont les faisceaux d'homologie du complexe $K.(u)\otimes_{\underline{O}_X} \underline{O}_{X'}$. Pour étudier ce complexe sur V, on fait le changement de base suivant dans $E' = E\otimes_A \Gamma(V,\underline{O}_{X'})$: si $e_1,\dots,e_d$ est la base donnée de E, on pose :

$$e'_1 = e_1 \quad ; \quad \text{pour } i \neq 1, \quad e'_i = e_i - (f_i^{(1)}/f_1^{(1)})e_1 \quad .$$

Posons $A' = \Gamma(V,\underline{O}_{X'})$; la différentielle du complexe $K.(u)\otimes_A A'$ est donnée par

$$d(e'_1) = f_1^{(0)} \quad ; \text{ pour } i \neq 1, \ d(e'_i) = 0 \quad .$$

En prenant pour base de $\wedge^k(E')$ les éléments $e'_{i_1}\wedge\dots\wedge e'_{i_k}$ avec $i_1<..<i_k$ on trouve donc :

$$d(a.e'_{i_1}\wedge\dots\wedge e'_{i_k}) = 0 \text{ si } i_1 \neq 1 \ ;$$

$$d(a.e'_{i_1}\wedge\dots\wedge e'_{i_k}) = af_1^{(0)}.e'_{i_2}\wedge\dots\wedge e'_{i_k} \text{ si } i_1 = 1 \quad .$$

En notant E" le sous-module de E' engendré par $e'_2,\dots,e'_d$, on voit donc que l'image de $d : \overset{k}{\wedge}E' \longrightarrow \overset{k-1}{\wedge}E'$ est $f_1^{(0)} \overset{k-1}{\wedge} E"$.

Par ailleurs, $f_1^{(0)}$ est régulier dans A', car sur V l'idéal inversible $\underline{J}'$ est défini par l'équation $f_1^{(0)}$. Le noyau de $d : \overset{k}{\wedge}E' \longrightarrow \overset{k-1}{\wedge} E'$ est donc $\overset{k}{\wedge}E"$. Par suite, le k-ième groupe d'homologie de $K.(u)\otimes_A A'$ est $\overset{k}{\wedge}E"/f_1^{(0)}\overset{k}{\wedge}E"$; on trouve donc sur V des isomorphismes :

$$\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} (\underline{O}_{X'}/f_1^{(0)}\underline{O}_{X'})\otimes_{\underline{O}_{X'}} \overset{i}{\wedge}(\underline{O}_{X'})^{d-1} \xrightarrow{\sim} \overset{i}{\wedge}(\underline{O}_{Y'})^{d-1} \quad . \tag{3.2.2}$$

En particulier, on trouve pour i = 1 :

$$\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} (\underline{O}_{Y'})^{d-1} \quad .$$

Par suite, on a pour tout i :

$$\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \overset{i}{\wedge} \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y) \tag{3.2.3}$$

Or d'après 2.2, l'isomorphisme :

$$\wedge(\underline{O}_{Y'})^{d-1} \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{i\geq 0} \underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y)$$

défini par les isomorphismes (3.2.2) est un isomorphisme d'algèbres. Il en est donc de même pour l'isomorphisme :

$$\wedge \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{i\geq 0} \underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y)$$

défini par les isomorphismes (3.2.3). Pour des raisons d'unicité, c'est alors la restriction à V de l'homomorphisme (3.2.1), et ce dernier est donc un isomorphisme.

ii) On considère la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \underline{J} \longrightarrow \underline{O}_X \longrightarrow \underline{O}_Y \longrightarrow 0 \quad ,$$

et la suite exacte des Tor obtenue par tensorisation avec $\underline{O}_{X'}$:

$$0 \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y) \longrightarrow \underline{J}\otimes_{\underline{O}_X}\underline{O}_{X'} \longrightarrow \underline{O}_{X'} \longrightarrow \underline{O}_{Y'} \longrightarrow 0 \quad .$$

L'image du morphisme : $\underline{J}\otimes_{\underline{O}_X}\underline{O}_{X'} \longrightarrow \underline{O}_{X'}$ est $\underline{J}.\underline{O}_{X'} = \underline{O}_{X'}(1)$. Par suite, on obtient la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y) \longrightarrow \underline{J}\otimes_{\underline{O}_X}\underline{O}_{X'} \longrightarrow \underline{O}_{X'}(1) \longrightarrow 0 \quad .$$

On fait alors son produit tensoriel par $\underline{O}_{Y'}$; comme $\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y)$ est un $\underline{O}_{Y'}$-Module, et que $\underline{O}_{X'}(1)$ est inversible, on obtient la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y) \longrightarrow g^*(\underline{N}) \longrightarrow \underline{O}_{Y'}(1) \longrightarrow 0 \quad .$$

On vérifie aisément que le morphisme $g^*(\underline{N}) \longrightarrow \underline{O}_{Y'}(1)$ figurant dans cette suite est le morphisme canonique, de sorte qu'elle s'identifie à la suite (3.1.2). Par définition, on a donc :

$$\underline{\mathrm{Tor}}_1^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y) = \underline{F} \quad .$$

3.3. On suppose maintenant que X est un schéma ayant un faisceau ample. Alors il en est de même pour X' qui est projectif sur X, et pour Y et Y'. Par ailleurs, i et j sont des morphismes parfaits, puisque ce sont des immersions régulières ; g est un morphisme lisse donc parfait car $Y' = \underline{P}(\underline{N})$; enfin, f est parfait d'après 1.9. Ces morphismes étant projectifs, on peut définir les homomorphismes additifs (IV

$$i_* : K'(Y) \longrightarrow K'(X) \quad ; \quad j_* : K'(Y') \longrightarrow K'(X') \quad ;$$

$$f_* : K'(X') \longrightarrow K'(X) \quad ; \quad g_* : K'(Y') \longrightarrow K'(Y) \quad .$$

Proposition 3.4. *Avec les hypothèses et les notations de* 3.1 *et* 3.3, *on a pour tout* $x \in K'(Y)$ *la relation* :

$$f^*(i_*(x)) = j_*(g^*(x).\lambda_{-1}(F)) \quad .$$

Comme les deux membres de la relation à démontrer sont additifs, on peut supposer que x est la classe d'un $\underline{O}_Y$-Module localement libre de type fini $\underline{M}$. L'élément $f^*(i_*(x))$ est alors la classe du complexe $\underline{\underline{L}}f^*(\underline{\underline{R}}i_*(\underline{M}))$, obtenu en prenant une résolution projective de $i_*(\underline{M})$ et en lui appliquant le foncteur f_*. Les faisceaux d'homologie du complexe ainsi obtenu sont les $\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{M},\underline{O}_{X'})$. Or d'après 2.4 et 3.2, on a :

$$\underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{M},\underline{O}_{X'}) \xrightarrow{\sim} \underline{M}\otimes_{\underline{O}_Y} \underline{\mathrm{Tor}}_i^{\underline{O}_X}(\underline{O}_{X'},\underline{O}_Y) \xrightarrow{\sim} \underline{M}\otimes_{\underline{O}_Y} \overset{i}{\wedge}\underline{F} \quad .$$

Il en résulte que ces faisceaux d'homologie sont localement libres de type fini sur $\underline{O}_{Y'}$, donc parfaits sur $\underline{O}_{X'}$; par suite, la classe dans $K'(X')$ du complexe $\underline{\underline{L}}f^*(\underline{\underline{R}}i_*(\underline{M}))$ est la somme alternée des classes de ses faisceaux d'homologie, soit :

$$f^*(i_*(x)) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i c1(j_*(\underline{M}\otimes_{\underline{O}_Y} \overset{i}{\wedge}\underline{F})) = \sum_{i\geq 0} (-1)^i j_*(g^*(x)\lambda^i(F)) \quad .$$

Lemme 3.5. *Avec les hypothèses et les notations de* 3.1, *on a les isomorphismes suivants* :

i) *pour tout* $n \geq 0$, *et pour tout* $i \geq 1$, $R^i f_*(\underline{O}_{X'}(n)) = 0$;

ii) *pour tout* $n \geq 0$, $f_*(\underline{O}_{X'}(n)) = \underline{J}^n$.

On peut évidemment supposer X affine, donc quasi-compact.

i) Rappelons d'abord le lemme suivant, qui a été démontré dans exp.

Lemme. Soit $X' \xrightarrow{f} X$ un morphisme projectif et parfait, avec X quasi-compact, et soit $\underline{L}^{\cdot}$ un complexe parfait sur $\underline{O}_{X'}$, acyclique en degrés > 0. Alors il existe un entier n_o tel que pour $n \geq n_o$ le complexe $\underline{\underline{R}}f_*(\underline{L}^{\cdot} \otimes_{\underline{O}_{X'}} \underline{O}_{X'}(n))$ soit acyclique en degrés > 0.

On applique ce lemme au complexe réduit à $\underline{O}_{X'}$; il existe donc un entier n_o tel que pour $n \geq n_o$, on ait $R^i f_*(\underline{O}_{X'}(n)) = 0$ si $i \geq 1$. On redescend alors par récurrence jusqu'à $n = 0$. Pour cela, on considère la suite exacte :

$$0 \longrightarrow \underline{O}_{X'}(n+1) \longrightarrow \underline{O}_{X'}(n) \longrightarrow \underline{O}_{Y'}(n) \longrightarrow 0 \quad ,$$

et on lui applique le foncteur f_*. Or on a $\underline{\underline{R}}f_*(\underline{O}_{Y'}(n)) = i_* \circ \underline{\underline{R}}g_*(\underline{O}_{Y'}(n))$. Comme $Y' = \underline{\underline{P}}(\underline{N})$, $\underline{O}_{Y'}(n)$ est g_*-acyclique pour $n \geq 0$. On a donc pour tout $n \geq 0$, et tout $i \geq 1$:

$$R^i f_*(\underline{O}_{Y'}(n)) = 0 \quad ,$$

et par conséquent les suites exactes :

$$R^i f_*(\underline{O}_{X'}(n+1)) \longrightarrow R^i f_*(\underline{O}_{X'}(n)) \longrightarrow 0 \quad ,$$

ce qui permet d'achever la récurrence.

ii) Il s'agit de montrer que le morphisme canonique :

$$\bigoplus_{n \geq 0} \underline{J}^n \longrightarrow \bigoplus_{n \geq 0} f_*(\underline{O}_{X'}(n))$$

est un isomorphisme. La propriété étant locale, on peut supposer $\underline{J}$ défini par une suite $f_1, \ldots, f_d$ de sections de $\underline{O}_{X'}$, telles que l'homomorphisme $(\underline{O}_{X'})^d \longrightarrow \underline{O}_{X'}$ correspondant soit régulier. Posons : $\underline{S} = \bigoplus_{n \geq 0} \underline{J}^n$; on définit un homomorphisme d'algèbres : $\underline{O}_{X'}[T_1, \ldots, T_d] \xrightarrow{v} \underline{S}$, surjectif, en envoyant

T_i sur $f_i^{(1)}$. Cet homomorphisme définit une immersion fermée $X' \longrightarrow \underline{P}_X^{d-1}$, régulière d'après 1.8 ii).

D'après 1.8 iii), $\underline{S}$ est parfait en tant que $\underline{O}_X[T_1,\dots,T_d]$-Module gradué. En particulier, $\underline{S}$ est de présentation finie comme Module gradué. Soit donc :

$$\underline{L}'' \longrightarrow \underline{L}' \longrightarrow \underline{S} \longrightarrow 0$$

une présentation finie graduée de $\underline{S}$ sur $\underline{O}_X[T_1,\dots,T_d]$. On obtient sur $\underline{P}_X^{d-1}$ la suite exacte :

$$\underline{M}'' \longrightarrow \underline{M}' \longrightarrow \underline{O}_{X'} \longrightarrow 0 \quad ,$$

où $\underline{M}'' = \underline{Proj}(\underline{L}'')$, $\underline{M}' = \underline{Proj}(\underline{L}')$, et sont donc libres de type fini sur $\underline{P}_X^{d-1}$. On peut donc écrire pour tout n le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccccc} \underline{L}''_n & \longrightarrow & \underline{L}'_n & \longrightarrow & \underline{J}^n & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow\sim & & \downarrow\sim & & \downarrow & & \\ p_*(\underline{M}''(n)) & \to & p_*(\underline{M}'(n)) & \to & p_*(\underline{O}_{X'}(n)) & \to & 0 \end{array} \quad ,$$

où p est le morphisme structural : $\underline{P}_X^{d-1} \longrightarrow X$, et $\underline{L}''_n$, $\underline{L}'_n$ les composantes de degré n de $\underline{L}'', \underline{L}'$. La ligne supérieure est exacte par hypothèse ; les deux premières flèches verticales sont des isomorphismes à cause des résultats classiques pour les images directes dans $\underline{O}_P(n)$, P étant un fibré projectif (EGA III, 2.1.15) ; enfin, la dernière ligne est exacte si n est assez grand, car le noyau de $\underline{M}' \longrightarrow \underline{O}_{X'}$ est un $\underline{O}_P$-Module parfait, et on peut appliquer le lemme rappelé plus haut, qui montre que ce noyau, tensorisé par $\underline{O}_P(n)$ pour n assez grand, est p_*-acyclique ; de même pour le noyau de $\underline{M}'' \longrightarrow \underline{M}'$. Il en résulte alors que pour n assez grand, $\underline{J}^n \longrightarrow p_*(\underline{O}_{X'}(n))$ est un isomorphisme. Or $p_*(\underline{O}_{X'}(n)) = f_*(\underline{O}_{X'}(n))$; on a

donc le résultat pour $n \geq n_o$.

Il reste à redescendre jusqu'à n = 0. On procède par récurrence descendante; grâce au diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \underline{J}^{n+1} & \longrightarrow & \underline{J}^{n} & \longrightarrow & \underline{J}^{n}/\underline{J}^{n+1} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \sim\downarrow & & \downarrow & & \sim\downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & f_*(\underline{O}_{X'}(n+1)) & \longrightarrow & f_*(\underline{O}_X,(n)) & \longrightarrow & f_*(\underline{O}_Y,(n)) & \longrightarrow & 0 \end{array} .$$

La ligne du bas est exacte car $R^1 f_*(\underline{O}_{X'}(n+1)) = 0$ pour tout $n \geq 0$ d'après i) déjà prouvé. Par ailleurs, on a :

$$f_*(\underline{O}_Y,(n)) = i_*(g_*(\underline{O}_Y,(n))) = i_*(\underline{S}(\underline{N})_n) = \underline{J}^n/\underline{J}^{n+1} .$$

La flèche de droite est donc un isomorphisme ; celle de gauche en est un d'après l'hypothèse de récurrence ; celle du milieu en est donc un également

Proposition 3.6. Avec les hypothèses et les notations de 3.1 et 3.3, on a la relation :

$$f_* \circ f^* = Id_{K^\cdot(X)} .$$

Soit $x \in K^\cdot(X)$; on peut écrire, d'après la formule de projection :

$$f_*(f^*(x)) = f_*(1.f^*(x)) = x.f_*(1) .$$

Il suffit donc de montrer que $f_*(1) = 1$.

Or 3.5 montre que la cohomologie de $\mathbb{R}f_*(\underline{O}_{X'})$ est nulle en degrés > 0, et égale à $\underline{O}_X$ en degré 0. La proposition en résulte aussitôt.

Théorème 3.7. Soient i : Y ⟶ X une immersion fermée régulière, X' le schéma obtenu en faisant éclater Y, et $Y' = X' \times_X Y$, de sorte qu'on a le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array} \quad .$$

On suppose que X **est quasi-compact et a un faisceau ample. Alors, on a la suite exacte :**

$$0 \longrightarrow K^{\cdot}(Y) \xrightarrow{u} K^{\cdot}(Y') \times K^{\cdot}(X) \xrightarrow{v} K^{\cdot}(X') \quad ,$$

où on pose, pour $y \in K^{\cdot}(Y)$:

$$u(y) = (g^{*}(y).\lambda_{-1}(F),\ -i_{*}(y)) \quad ,$$

et pour $y' \in K^{\cdot}(Y')$, $x \in K^{\cdot}(X)$:

$$v(y',x) = j_{*}(y') + f^{*}(x) \quad ,$$

les notations étant celles de 3.1 **et** 3.3. **En outre,** u **admet un inverse à gauche** u', **défini par** $u'(y',x) = g_{*}(y')$.

Si de plus X est noethérien, et Y régulier, alors v est surjectif, donc on a la suite exacte :

$$0 \longrightarrow K^{\cdot}(Y) \xrightarrow{u} K^{\cdot}(Y') \times K^{\cdot}(X) \xrightarrow{v} K^{\cdot}(X') \longrightarrow 0 \quad .$$

Tout d'abord, u admet l'inverse à gauche u', et a fortiori est injectif. En effet, on a :

$$g_{*}(g^{*}(y).\lambda_{-1}(F)) = y.g_{*}(\lambda_{-1}(F))$$

d'après la formule de projection. Par ailleurs, $g_{*}(\lambda_{-1}(F)) = 1$ (VI 5.9) d'où le résultat.

Ensuite, $v \circ u = 0$. Si $y \in K^{\cdot}(Y)$, on a en effet :

$v \circ u(y) = v(g^{*}(y)\lambda_{-1}(F), -i_{*}(y)) = j_{*}(g^{*}(y)\lambda_{-1}(F)) - f^{*}(i_{*}(x)) = 0$,

d'après 3.4.

Il reste donc à montrer que $\mathrm{Ker}(v) \subset \mathrm{Im}(u)$. Soient donc $x \in K^{\cdot}(X)$, $y' \in K^{\cdot}(Y')$, tels que :

$$j_*(y') + f^*(x) = 0 \quad .$$

Il faut trouver $y \in K^\cdot(Y)$ tel que :

(3.7.1) $$x = -i_*(y) \quad ; \quad y' = g^*(y).\lambda_{-1}(F) \quad .$$

Comme u admet un inverse à gauche u', on a nécéssairement

$$y = u'(y',x) = g_*(y') \quad .$$

Il faut donc montrer que y vérifie les relations (3.7.1).

Pour montrer que $x = -i_*(y)$, on part de la relation $f^*(x) = -j_*(y')$ et on lui applique f_*. On obtient donc :
$f_*(f^*(x)) = -f_*(j_*(y')) = -i_*(g_*(y')) = -i_*(y)$ par définition de y. Or d'après la proposition 3.6, $f_*(f^*(x)) = x$; d'où la relation voulue.

Pour achever la démonstration, il faut montrer que

$$y' = g^*(g_*(y'))\lambda_{-1}(F) \quad .$$

Posons $z = y' - g^*(g_*(y'))\lambda_{-1}(F)$. On obtient :
$g_*(z) = g_*(y') - g_*(y')g_*(\lambda_{-1}(F)) = 0$. D'autre part, on a par hypothèse : $j_*(y') = f^*(x)$, d'où d'après ce qui précède $j_*(y') = f^*(i_*(y))$, et d'après la proposition 3.4 : $j_*(y') = j_*(g^*(y)\lambda_{-1}(F))$; par suite, on a également $j_*(z) = 0$. Or $\mathrm{Ker}(j_*) \cap \mathrm{Ker}(g_*) = 0$. En effet, si $j_*(z) = 0$, $j^*(j_*(z)) = 0$; or $j^*(j_*(z)) = z(1-L)$ (prop.2.7), et pour que $z(1-L) = 0$, il faut qu'il existe $z' \in K^\cdot(Y)$ tel que $z = z'\lambda_{-1}(F)$ (VI,5.10) ; en appliquant g_* ceci entraine $z' = g_*(z) = 0$, donc $z = 0$.

Supposons maintenant X noethérien et Y régulier. Alors Y' est aussi régulier puisque c'est un fibré projectif sur Y, et pour tout point y' de Y', l'anneau local $\underline{O}_{X',y'}$ de X' en y' est un anneau régulier, car $\underline{O}_{Y',y'}$ est quotient de $\underline{O}_{X',y'}$ par un élément régulier (voir EGA O_{IV} 17.1.8).

On sait que pour tout schéma régulier ayant un faisceau ample, les groupes de Grothendieck formés avec les faisceaux localement libres de type fini et les faisceaux cohérents sont identiques. C'est donc en particulier le cas pour Y'.

Soit $\underline{E}$ un $\underline{O}_{X'}$-Module cohérent à support dans Y' ; alors $\underline{E}$ est un $\underline{O}_{X'}$-Module parfait. En effet, il l'est aux points de Y', puisque X' est régulier en ces points, et aux points de X'-Y' puisqu'il y est nul.

Si E est la classe de $\underline{E}$ dans $K'(X')$, E appartient à l'image de j_*. En effet, on peut filtrer $\underline{E}$ par les $\underline{J}'^n.\underline{E}$. Cette filtration est finie, car, X' étant noethérien, il existe un entier n_o tel que $\underline{J}'^{n_o}.\underline{E} = 0$; les quotients de cette filtration sont alors des $\underline{O}_{Y'}$-Modules, donc leur classe dans $K'(X')$ appartient à l'image de j_*. Comme E est la somme des classes de ces quotients, E y appartient aussi.

Soit maintenant $x \in K'(X')$. On peut trouver un complexe parfait $\underline{M}'$ dont la classe soit x. Considérons le triangle distingué :

$$\begin{array}{ccc} & \underline{N}' & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \underline{M}' & \longrightarrow & \underline{L}f^*(\underline{R}f_*(\underline{M}')) \end{array} ,$$

la flèche horizontale étant l'homomorphisme canonique. Cette flèche est un isomorphisme sur le complémentaire de Y', et par conséquent les faisceaux de cohomologie de $\underline{N}'$ sont des faisceaux cohérents à support dans Y'. D'après ce qui précède, ce sont des $\underline{O}_{X'}$-Modules parfaits, et leur classe appartient à l'image de j_*. On a donc :

$$x - f^*(f_*(x)) \in \mathrm{Im}(j_*) \quad ;$$

par suite, l'homomorphisme v est surjectif.

Remarque 3.8. Dans le cas X noethérien et Y régulier, 3.7 détermine entièrement le groupe abélien $K'(X')$ à partir des λ-anneaux $K'(X)$, $K'(Y)$, des applications i_*, i^* entre ces anneaux, et de l'élément N de $K'(Y)$: en effet, $K'(Y')$ peut se calculer en fonction de $K'(Y)$ et de N d'après (VI 1.1). Nous verrons au paragraphe suivant que la structure multiplicative de $K'(X')$ est déterminée par les mêmes données, de même que la λ-structure si l'on tensorise par $\mathbb{Q}$ (cette restriction étant sans doute inutile : voir 4.5).

4. Immersions régulières et filtration du K'

On garde dans ce paragraphe les notations et les hypothèses de 3.1.

Lemme 4.1. *Supposons qu'il existe sur Y un faisceau localement libre de type fini N', tel que, si N,N' sont les classes dans $K'(Y)$ de N, N', on ait $N = N' + 2$. Alors la congruence suivante est vérifiée :*

$$\lambda_{-1}(F) \equiv 0 \mod.(1-L) \quad .$$

Soit d le rang de N (qu'on peut supposer constant) ; celui de F est alors d-1. Par définition :

$$\begin{aligned}\lambda_{-1}(F) &= \sum_{i\geq 0} (-1)^i \lambda^i(F) \\ &= (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(F-1) \\ &= (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(F+L-1-L) \\ &= (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(N-2+1-L).\end{aligned}$$

Or $\lambda_t(1-L) = \lambda_t(1)/\lambda_t(L) = (1+t)/(1+Lt)$. Donc pour tout $i \geq 1$, $\lambda^i(1-L)$ est divisible par 1-L. Par suite :

$$\begin{aligned}\lambda_{-1}(F) &\equiv (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(N-2) \quad \mod.(1-L) \\ &\equiv (-1)^{d-1}\lambda^{d-1}(N') \quad \mod.(1-L).\end{aligned}$$

Or $\underline{N}'$ est de rang d-2, donc $\lambda^{d-1}(N') = 0$, d'où le résultat.

4.2. Soit $i : Y \longrightarrow X$ une immersion régulière. Soit r un entier ≥ 1, et $s : X \longrightarrow \underline{P}^r_X$ la section définie par l'homomorphisme : $(\underline{O}_X)^{r+1} \longrightarrow \underline{O}_X$, passage au quotient par le sous-faisceau engendré par les r dernières coordonnées. Si $\underline{P}^r_X$ est défini par la $\underline{O}_X$-Algèbre graduée $\underline{O}_X[T_o,\ldots,T_r]$, l'idéal $\underline{I}$ définissant la section s est l'idéal engendré par les sections $T_1,\ldots,T_r$, donc $\underline{I}/\underline{I}^2$ est isomorphe à $(\underline{O}_X[T_o])^r$, donc l'idéal correspondant de $\underline{O}_P$ à $(\underline{O}_X)^r$.

Comme la section s est évidemment une immersion régulière, il en est de même pour s∘i, et on peut écrire la suite exacte des faisceaux conormaux correspondante (1.7). On obtient ainsi l'égalité suivante dans K'(Y), en notant $\underline{N}$ le faisceau conormal de i, et $\underline{N}_1$ le faisceau conormal de s∘i :

$$N_1 = N + r \quad .$$

On voit donc que pour toute immersion régulière i, on peut, en la composant avec une section : $X \longrightarrow \underline{P}^2_X$, ou bien : $X \longrightarrow \underline{P}^1_{\underline{P}^1_X}$, obtenir une immersion régulière satisfaisant la propriété du lemme 4.1.

Théorème 4.3. Soient $i : Y \longrightarrow X$ une immersion fermée régulière, N la classe dans K'(Y) du faisceau conormal de Y dans X. On suppose que X est quasi-compact et a un faisceau ample. Alors, avec les notations de 2.3, on a pour tout $y \in K'(Y)$, et tout $p \geq 1$:

(4.3.1) $$i_*(\lambda^p(N,y)) \equiv \lambda^p(i_*(y)) \quad \text{mod. torsion},$$

$\lambda^p(N,y)$ étant l'élément défini dans (V 5.3).

i) On suppose d'abord que l'hypothèse de 4.1 est satisfaite ; on va dans ce cas montrer que $i_*(\lambda^p(N,y)) = \lambda^p(i_*(y))$. Comme $f_*\circ f^* = Id$, cette

relation est équivalente à la relation :

$$f^*(i_*(\lambda^p(N,y))) = f^*(\lambda^p(i_*(y))) \quad .$$

Or on a :

$$f^*(\lambda^p(i_*(y))) = \lambda^p(f^*(i_*(y)))$$

$$= \lambda^p(j_*(g^*(y)\lambda_{-1}(F))) \quad (3.4)$$

D'autre part :

$$f^*(i_*(\lambda^p(N,y))) = j_*(g^*(\lambda^p(N,y))\lambda_{-1}(F)) \ (3.4).$$

Comme $g^*(N) = F + L$, on peut appliquer la formule (V (5.4.2)) :

$$g^*(\lambda^p(N,y))\lambda_{-1}(F) = \lambda^p(g^*(N),g^*(y))\lambda_{-1}(F) = \lambda^p(L,g^*(y)\lambda_{-1}(F)).$$

En posant : $z = g^*(y)\lambda_{-1}(F)$, on est donc ramené à montrer la relation :

$$j_*(\lambda^p(L,z)) = \lambda^p(j_*(z)) \quad ,$$

c'est-à-dire la relation analogue pour l'immersion j, et l'élément z. Or par hypothèse $\lambda_{-1}(F)$ est multiple de (1-L) ; on peut trouver z' tel que $z = z'(1-L)$. Alors $z = j^*(u')$ avec $u' = j_*(z')$ (2.7) ; comme $L = j^*(J')$, on a finalement à vérifier :

$$j_*(j^*(\lambda^p(J',u'))) = \lambda^p(j_*(j^*(u'))) \quad .$$

La suite exacte

$$0 \longrightarrow \underline{J}' \longrightarrow \underline{O}_{X'} \longrightarrow \underline{O}_{Y'} \longrightarrow 0$$

donne la relation :

(4.3.2) $$j_*(1) = 1 - J' \quad .$$

La relation à vérifier s'écrit donc finalement, en appliquant la formule de projection :

$$\lambda^p(J',u')(1-J') = \lambda^p(u'(1-J'))\quad .$$

Comme $1-J' = \lambda_{-1}(J')$, c'est la formule qui sert à définir $\lambda^p(J',u')$.

ii) On se place dans le cas général. On compose alors i avec une section : $X \longrightarrow \underline{\underline{P}}^1_X$, puis avec une section : $\underline{\underline{P}}^1_X \longrightarrow \underline{\underline{P}}^1_{\underline{\underline{P}}^1_X}$, de façon que l'immersion composée vérifie la condition de 4.1. (voir 4.2). La proposition 4.3 est alors vraie pour l'immersion composée d'après ce qui précède ; il reste donc à "redescendre" à X. On redescend d'abord à $\underline{\underline{P}}^1_X$, puis à X, de sorte que la démonstration se fait en appliquant deux fois le lemme suivant (dû à J.P. Jouanolou) :

Lemme : Dans les conditions de 4.3, soit $s : X \longrightarrow \underline{\underline{P}}^1_X$ la section définie en 4.2. Si la proposition 4.3 est vraie pour $s\circ i$, elle est vraie pour i.

Si on suppose 4.3 vraie pour $s\circ i$, on a pour tout $p \geq 1$, et tout $y \in K'(Y)$:

$$(4.3.3)\qquad (s\circ i)_*(\lambda^p(N+1,y)) \equiv \lambda^p((s\circ i)_*(y)) \quad \text{mod. torsion.}$$

La section s est définie par un idéal isomorphe à $\underline{O}_p(-1)$ (4.2) ; on note ξ sa classe dans $K'(\underline{\underline{P}}^1_X)$. On a alors la relation suivante pour tout $x \in K'(X)$:

$$s_*(x) = p^*(x)(1-\xi)\quad ,$$

p étant le morphisme structural $\underline{\underline{P}}^1_X \longrightarrow X$. En effet, comme $p\circ s = Id_X$, on a $x = s^*(p^*(x))$, d'où $s_*(x) = s_*(s^*(p^*(x))) = p^*(x)s_*(1)$; comme $s_*(1) = 1-\xi$, on a la relation voulue :

La relation (4.3.3) s'écrit alors :

$$(s\circ i)_*(\lambda^p(N+1,y)) \equiv \lambda^p(p^*(i_*(y))(1-\xi)) \quad \text{mod. torsion}$$
$$\equiv \lambda^p(\xi,p^*(i_*(y)))(1-\xi) \quad \text{mod. torsion}.$$

Or $\lambda^P(\xi,p^*(i_*(y))) - \lambda^P(1,p^*(i_*(y)))$ est divisible par $1-\xi$: pour le voir, on peut se placer dans le λ-anneau universel qui sert à définir les $\lambda^P(\xi,X)$ (V 5) ; alors $\lambda^P(\xi,X) - \lambda^P(1,X)$ est un polynôme en ξ, nul pour $\xi = 1$, donc divisible par $\xi-1$. Par ailleurs, l'équation de dépendance de ξ sur $K^\cdot(X)$ est $(1-\xi)^2 = 0$ (VI (1.13.1)). On obtient donc :

$$(s\circ i)_*(\lambda^P(N+1,y)) \equiv \lambda^P(1,p^*(i_*(y)))(1-\xi) \text{ mod. torsion}$$

$$\equiv p^*(\lambda^P(1,i_*(y)))(1-\xi) \text{ mod. torsion.}$$

En appliquant p_*, on obtient :

$$i_*(\lambda^P(N+1,y)) \equiv \lambda^P(1,i_*(y)) \quad \text{mod. torsion,} \tag{4.3.4}$$

car $p_*(\xi) = 0$.

D'après la formule de (V 5.6), appliquée à $L = 1$, $\lambda^P(N+1,y)$ est le coefficient de t^P dans la série :

$$\frac{\sum_{k\geq 1} \lambda^k(N,y)kt^k}{1 + \sum_{k\geq 1} \lambda^k(N,y)\lambda_{-1}(N)t^k}.$$

De même, la même formule appliquée à $N = 0$ et $L = 1$ montre que $\lambda^P(1,y)$ est le coefficient de t^P dans la série :

$$\frac{\sum_{k\geq 1} \lambda^k(y)kt^k}{\sum_{k\geq 0} \lambda^k(y)t^k}.$$

Les congruences (4.3.4) peuvent donc s'écrire :

$$i_*\left(\frac{\sum_{k\geq 1} k\lambda^k(N,y)t^k}{1 + \sum_{k\geq 1} \lambda^k(N,y)\lambda_{-1}(N)t^k}\right) \equiv \frac{\sum_{k\geq 1} k\lambda^k(i_*(y))t^k}{\sum_{k\geq 0} \lambda^k(i_*(y))t^k} \quad \text{mod. torsion}$$

En appliquant la formule 2.8, on obtient :

$$\frac{\sum_{k\geq 0} k i_*(\lambda^k(N,y))t^k}{1 + \sum_{k\geq 1} i_*(\lambda^k(N,y))t^k} \equiv \frac{\sum_{k\geq 0} k\lambda^k(i_*(y))t^k}{\sum_{k\geq 0} \lambda^k(i_*(y))t^k} \quad \text{mod. torsion}$$

Si on pose :

$$u(t) = 1 + \sum_{k\geq 1} i_*(\lambda^k(N,y))t^k, \quad v(t) = \sum_{k\geq 0} \lambda^k(i_*(y))t^k,$$

cette dernière relation peut encore s'écrire :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{u(t)}{v(t)}\right) \equiv 0 \quad \text{mod. torsion.}$$

Comme le terme constant de $u(t)/v(t)$ est 1, et qu'on écrit des congruences modulo torsion, on peut intégrer et écrire la congruence $u(t) \equiv v(t)$. Ceci donne les congruences annoncées.

Corollaire 4.4. Avec les notations et les hypothèses de 4.3, on a pour tout $p \geq 1$, et tout $y \in K'(Y)$:

$$i_*(\gamma^p(N,y)) \equiv \gamma^p(i_*(y)) \quad \text{mod. torsion.}$$

Le corollaire résulte immédiatement de 4.3, et utilisant l'expression des γ^p comme combinaisons linéaires à coefficients entiers des λ^p.

Remarque 4.5. La démonstration même de 4.3 laisse penser que (4.3.1) doit être vrai non seulement modulo torsion, mais aussi en tant qu'égalité. Dans [RRR], l'égalité était montrée en caractéristique 0 grâce à une caractérisation géométrique des $\lambda^p(N,x)$. Une extension de cette méthode en toutes caractéristiques serait sans doute possible si on savait définir les opérations de puissance extérieure sur les complexes parfaits (cf. XIV).

Théorème 4.6. Soient X un schéma quasi-compact ayant un faisceau ample, d un entier > 0 et i : Y $\longrightarrow$ X une immersion régulière de codimension d. Alors, pour tout k, on a :

$$i_*((\mathrm{Fil}^k K'(Y))\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}) \subset (\mathrm{Fil}^{k+d} K'(X))\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q} \quad .$$

Remarquons tout d'abord que $i_*(K'(Y)) \subset \mathrm{Fil}^1 K'(X)$. En effet, X-Y est dense dans X : s'il n'en était pas ainsi, Y contiendrait un ouvert affine, et sur cet ouvert, l'idéal $\underline{J}$ définissant Y serait un nilidéal, donc un idéal localement nilpotent puisqu'il est de type fini. Or ceci est impossible, puisque les $\underline{J}^n/\underline{J}^{n+1}$ sont des $\underline{O}_Y$-Modules localement libres de rang $\neq 0$. L'augmentation dans K'(X) d'un élément de $i_*(K'(Y))$ est une fonction localement constante sur X ; étant nulle sur X-Y, elle est nulle sur X entier.

Pour tout groupe abélien A, nous poserons $A_{\mathbb{Q}} = A\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}$. Soit $x \in \mathrm{Fil}^k K'(Y)_{\mathbb{Q}}$; on peut écrire x sous la forme :

$$x = \sum a\gamma^{i_1}(x_1)\ldots\gamma^{i_n}(x_n) \quad ,$$

avec $\varepsilon(x_i) = 0$ pour tout i, $a \in \mathbb{Q}$, et $i_1+\ldots+i_n \geq k$. Les x_i peuvent s'exprimer comme combinaison à coefficients entiers des classes E_α d'un nombre fini de $\underline{O}_Y$-Modules localement libres de type fini $\underline{E}_\alpha$. Soit R la sous-$\mathbb{Q}$-λ-algèbre de $K'(Y)_{\mathbb{Q}}$ engendrée par les E_α et par N. On a alors :

$$x \in \mathrm{Fil}^k R \quad .$$

Par ailleurs, la filtration de λ-anneau de R est discrète (VI 6.2) ; soit m tel que $\mathrm{Fil}^m R = 0$. Enfin, on peut, quitte à décomposer X en une somme finie d'ouverts disjoints et à faire la démonstration dans chaque ouvert (le K' commutant aux sommes directes finies), supposer les $\underline{E}_\alpha$ de rang constant r_α. L'anneau d'augmentation de R est alors $\mathbb{Q}$.

On va montrer que pour tout i, on a :

$$i_*(\mathrm{Fil}^i R) \subset \mathrm{Fil}^{i+d}(K'(X)_{\mathbb{Q}}) \quad .$$

Cela entrainera en particulier :

$$i_*(x) \in \mathrm{Fil}^{k+d} K'(X) \quad ,$$

et montrera donc le théorème.

La démonstration se fait par récurrence descendante sur i, le cas $i = m$ étant trivial. Soit $y \in \mathrm{Fil}^i R$, et posons pour tout j :

$$a_j = (-1)^{j-1}(j-1)! \quad .$$

Alors d'après V 6.10,

$$\gamma^{d+i}(N,y) - a_{d+i} y \in \mathrm{Fil}^{i+1} R \quad .$$

On peut donc appliquer l'hypothèse de récurrence, supposant que :

$$i_*(\mathrm{Fil}^{i+1} R) \subset \mathrm{Fil}^{i+d+1} K'(X)_{\mathbb{Q}} \quad .$$

On a par conséquent :

$$i_*(\gamma^{d+i}(N,y) - a_{d+i} y) \in \mathrm{Fil}^{i+d+1} K'(X)_{\mathbb{Q}} \quad .$$

D'après 4.4, ceci entraine :

$$\gamma^{d+i}(i_*(y)) - a_{d+i} i_*(y) \in \mathrm{Fil}^{i+d+1} K'(X)_{\mathbb{Q}} \quad .$$

Comme $i_*(y)$ est d'augmentation nulle, $\gamma^{d+i}(i_*(y)) \in \mathrm{Fil}^{d+i} K'(X)$.

Comme on fait des calculs modulo torsion, on trouve donc :

$$i_*(y) \in \mathrm{Fil}^{i+d} K'(X)_{\mathbb{Q}} \quad .$$

Remarque 4.6.1. On voit que, même si 4.3 était vrai sans tensoriser par $\mathbb{Q}$, la démonstration ci-dessus ne marche que modulo torsion. Pour un contre-exemple, voir XIV 4.6.

4.7. On revient à la situation de 3.7, où on avait le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array} \quad ,$$

où i est une immersion régulière, X' le X-schéma obtenu en faisant éclater Y, et $Y' = X' \times_X Y$. On suppose X noethérien avec un faisceau ample, et Y régulier. On a vu en 3.7 qu'on a alors la suite exacte :

$$0 \longrightarrow K'(Y) \xrightarrow{u} K'(Y') \times K'(X) \xrightarrow{v} K'(X') \longrightarrow 0 \quad .$$

Nous allons montrer que cette suite exacte permet de décrire toute la situation formée par les K' de X, Y, X', Y' à partir de la donnée des λ-anneaux $K'(X)$, $K'(Y)$, des applications i^* et i_*, et de l'élément N de $K'(Y)$. (du moins à torsion près, jusqu'à nouvel ordre).

Soient donc K, K' deux λ-anneaux, $i_* : K \longrightarrow K'$ un homomorphisme additif, $i^* : K' \longrightarrow K$ un λ-homomorphisme, d un entier, et N un élément de K tel que $\lambda^i(N) = 0$ pour $i > d$ et que $\lambda^d(N)$ soit inversible. On suppose de plus vraies les propriétés suivantes :

i) i_* est K'-linéaire ("formule de projection") ;

ii) $i^* \circ i_*$ est l'homomorphisme "multiplication par $\lambda_{-1}(N)$" ;

iii) pour tout $n \geq 1$, et tout $y \in K$, $i_*(\lambda^n(N,y)) = \lambda^n(i_*(y))$ (relation (4.3.1))

On utilise d'abord VI.I.1 pour construire une K-$\hat{\lambda}$-algèbre K_1 qui joue le rôle de $K'(Y')$. Soit L une indéterminée, et $K[L]$ la K-$\hat{\lambda}$-algèbre engendrée par le générateur L soumis aux relations $\lambda^i(L) = 0$ pour $i \geq 2$ (V 4.9). Soit :

$$P(L) = \lambda^d(N-L) = \sum_{i=0}^{d} (-1)^i \lambda^{d-i}(N) L^i \quad .$$

L'idéal engendré par P est un λ-idéal. Pour le voir, on remarque d'abord que les relations $\lambda^i(N) = 0$ pour $i > d$ entrainent que les $\lambda^j(N-L)$ pour $j \geq d$ sont multiples de $\lambda^d(N-L)$. Si on se place dans $1 + \widehat{K/(P)[[t]]}^+$, l'image de $\lambda_t(N-L)$ est un polynôme de degré $< d$, et un argument universel montre alors que ses λ^i pour $i \geq d$ sont égaux à 1 (cf. V 4.8). Comme dans $1 + \widehat{K[[t]]}^+$ on a $\lambda_t(\lambda^d(N-L)) = \lambda^d(\lambda_t(N-L))$, on en déduit que les $\lambda^i(\lambda^d(N-L))$ pour $i \geq 1$ sont multiples de P. D'après les relations V 2.4.2, cela entraine que l'idéal engendré par P est un λ-idéal.

On pose alors $K_1 = K/(P)$. L'homomorphisme naturel $K \longrightarrow K_1$ sera noté g^* ; c'est un λ-homomorphisme. D'autre part, K_1 est un K-module libre ayant pour base les éléments $1, L, \ldots, L^{d-1}$. Il résulte de la relation $\lambda^d(N) = \lambda^{d-1}(N-L).L$ et de l'hypothèse d'inversibilité faite sur $\lambda^d(N)$ que L est inversible. Par suite K_1 admet pour base sur K les éléments $1, L^{-1}, \ldots, L^{-d+1}$; on définit alors une application $g_* : K_1 \longrightarrow K$ en associant à tout élément $y' = y_o + y_1 L^{-1} + \ldots + y_{d-1} L^{-d+1}$ de K_1 l'élément y_o de K. Il est clair que l'application ainsi définie est un homomorphisme additif, K-linéaire, et tel que $g_* \circ g^* = Id$.

On munit ensuite $K_1 \times K'$ d'une structure de λ-anneau, en posant :

$$(4.7.1) \qquad (y_1', x_1) * (y_2', x_2) = (y_1' y_2' (1-L) + x_1 y_2' + x_2 y_1', \; x_1 x_2) \quad ;$$

$$(4.7.2) \qquad \lambda_*^n(y', x) = \Big(\sum_{p=1}^{n} \lambda^{n-p}(x) \lambda^p(L, y'), \lambda^n(x) \Big) \quad .$$

Dans ces formules, K_1 est considéré comme K'-algèbre par l'homomorphisme $g^* \circ i^*$.

On pose ensuite, pour $y_1, y_2 \in K$ et $n \geq 1$:

$$(4.7.3) \qquad y_1 * y_2 = -y_1 y_2 \lambda_{-1}(N) \quad ;$$

$$(4.7.4) \qquad \lambda_*^n(y_1) = -\lambda^n(N, -y_1) \quad ;$$

et on définit un homomorphisme :

$$u : K \longrightarrow K_1 \times K'$$

en posant :

$$u(y) = (g^*(y).\lambda_{-1}(F), -i_*(y)) \quad ,$$

avec F = N-L.

Proposition 4.7.5. Les opérations définies par (4.7.1) et (4.7.2) munissent $K_1 \times K'$ d'une structure de λ-anneau, et u est un homomorphisme injectif qui identifie K, muni des opérations définies par (4.7.3) et (4.7.4) à un λ-idéal de $K_1 \times K'$.

Il est immédiat de vérifier que $K_1 \times K'$ est un λ-anneau : on se réfèrera par exemple à V 5.5, où une construction tout à fait analogue est faite. La démonstration de la seconde partie de la proposition se fait également sans difficultés en utilisant les relations précédentes, la relation $i_*(y_1 y_2 \lambda_{-1}(N)) = i_*(y_1).i_*(y_2)$ qui résulte immédiatement des hypothèses, la relation $g_*(\lambda_{-1}(F)) = 1$ (voir VI 5.9) et les relations de V 5.

On pose alors :

$$K_1' = (K_1 \times K') / K$$

et on note v l'homomorphisme canonique $K_1 \times K' \longrightarrow K_1'$. On considère K_1' comme λ-anneau grâce à la structure quotient.

On définit ensuite des homomorphismes additifs :

$$j_* : K_1 \longrightarrow K_1' \quad ; \quad j^* : K_1' \longrightarrow K_1 \quad ;$$

$$f_* : K_1' \longrightarrow K' \quad ; \quad f^* : K' \longrightarrow K_1' \quad .$$

L'homomorphisme j_* est le composé $K_1 \longrightarrow K_1 \times K' \longrightarrow K_1'$. De même, l'homomorphisme f^* est le composé $K' \longrightarrow K_1 \times K' \longrightarrow K_1'$. On a alors :

$$v = j_* + f^* \quad .$$

On définit ensuite un homomorphisme $K_1 \times K' \longrightarrow K_1$ en associant à (y',x) l'élément $y'(1-L)+g^* \circ i^*(x)$; cet homomorphisme s'annule sur K, et définit par conséquent un homomorphisme $j^* : K'_1 \longrightarrow K_1$. Enfin, on définit un homomorphisme $K_1 \times K' \longrightarrow K'$ en associant à (y',x) l'élément $i_* \circ g_*(y')+x$; cet homomorphisme s'annule sur K et définit donc un homomorphisme $f_* : K'_1 \longrightarrow K'$.

Proposition 4.7.6. i) j^* et f^* sont des λ-homomorphismes ;

ii) j_* est K'_1-linéaire et f_* est K'-linéaire ;

iii) $j^* \circ j_*$ est l'homomorphisme "multiplication par $1-L$" ;

iv) pour tout $y' \in K_1$, et tout $p \geq 1$, $j_*(\lambda^p(L,y')) = \lambda^p(j_*(y'))$;

v) $f_* \circ f^* = Id$.

Il suffit de faire tourner la machine.

Si on en revient à la situation géométrique rappellée plus haut, on voit que $K'(X')$ se construit à partir de $K'(Y)$, $K'(X)$, des applications i^* et i_* et de l'élément N de $K'(Y)$ par la méthode précédente, les opérations λ sur $K'(X')$ ne coïncidant toutefois avec les opérations λ définies plus haut sur K'_1 qu'à torsion près, tant que la relation (4.3.1) n'est prouvée que modulo torsion.

Théorème 4.8. Soient $i : Y \longrightarrow X$ une immersion fermée régulière de codimension constante d, X' le schéma obtenu en faisant éclater Y, et $Y' = X' \times_X Y$, de sorte qu'on a le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow{i} & X \end{array} .$$

On suppose que X est quasi-compact et a un faisceau ample. Alors on a pour tout k la suite exacte :

$$0 \longrightarrow Gr^{k-d}K^{\cdot}(Y)_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{u^{gr}} Gr^{k-1}K^{\cdot}(Y')_{\mathbb{Q}} \times Gr^{k}K^{\cdot}(X)_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{v^{gr}} Gr^{k}K^{\cdot}(X')_{\mathbb{Q}}$$

où on pose, pour $y \in Gr^{k-d}K^{\cdot}(Y)_{\mathbb{Q}}$:

$$u^{gr}(y) = (g^{gr}(y).(-1)^{d-1}c^{d-1}(F),\ -i_{gr}(y)) \quad ,$$

et pour $y' \in Gr^{k-1}K^{\cdot}(Y')_{\mathbb{Q}}$ et $x \in Gr^{k}K^{\cdot}(X)_{\mathbb{Q}}$:

$$v^{gr}(y',x) = j_{gr}(y') + f^{gr}(x) \quad ,$$

les notations étant celles de 3.1 et 3.3, et $c^{d-1}(F)$ désignant la (d-1)-ième classe de Chern de F (V 6.7). En outre, u^{gr} admet un inverse à gauche u'^{gr}, défini par $u'^{gr}(y',x) = g_{gr}(y')$.

Si de plus X est noethérien et Y régulier, on a la suite exacte :

$$0 \longrightarrow Gr^{k-d}K^{\cdot}(Y)_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{u^{gr}} Gr^{k-1}K^{\cdot}(Y')_{\mathbb{Q}} \times Gr^{k}K^{\cdot}(X)_{\mathbb{Q}} \xrightarrow{v^{gr}} Gr^{k}K^{\cdot}(X')_{\mathbb{Q}} \longrightarrow 0$$

Démonstration. Notons qu'on pourrait donner du cas Y régulier une démonstration purement algébrique, en termes de théorie des λ-anneaux, utilisant la description 4.7 de la situation. On va au lieu de cela calquer la démonstration de 3.7.

On sait que les homomorphismes "image inverse" f^{*}, g^{*}, étant des λ-homomorphismes, sont compatibles aux filtrations de λ-anneaux, et par suite ils définissent des homomorphismes sur les gradués associés, d'où les homomorphismes :

$$f^{gr} : Gr^{k}K^{\cdot}(X) \longrightarrow Gr^{k}K^{\cdot}(X') \ ; \ g^{gr} : Gr^{k-d}K^{\cdot}(Y) \longrightarrow Gr^{k-d}K^{\cdot}(Y') \quad ,$$

et les homomorphismes analogues obtenus après tensorisation par $\mathbb{Q}$. Par ailleurs, 4.6 montre qu'après tensorisation par $\mathbb{Q}$, les homomorphismes i_{*}, j_{*} passent aux gradués associés, et définissent donc :

$$i_{gr} : Gr^{k-d}K^{\cdot}(Y)_{\mathbb{Q}} \to Gr^{k}K^{\cdot}(X)_{\mathbb{Q}} \ ; \ j_{gr} : Gr^{k-1}K^{\cdot}(Y')_{\mathbb{Q}} \to Gr^{k}K^{\cdot}(X')_{\mathbb{Q}} \quad .$$

Enfin, on remarque que $\lambda_{-1}(F) = (-1)^{d-1}\gamma^{d-1}(F)$, donc que les morphismes u^{gr} et v^{gr} sont obtenus par passage au quotient à partir des morphismes u et v de 3.7. On a donc $v^{gr} \circ u^{gr} = 0$.

D'après VI 5.8, $g_*(\mathrm{Fil}^{k-1}K^\cdot(Y')) \subset \mathrm{Fil}^{k-d}K^\cdot(Y)$ pour tout k, puisque $Y' = \underline{\underline{P}}(\underline{N})$, $\underline{N}$ étant de rang d. On en déduit donc un homomorphisme :

$$g_{gr} : \mathrm{Gr}^{k-1}K^\cdot(Y') \longrightarrow \mathrm{Gr}^{k-d}K^\cdot(Y) \quad ,$$

et un homomorphisme analogue après tensorisation par $\mathbb{Q}$. L'homomorphisme u'^{gr} est donc obtenu à partir de u' (3.7) par passage au gradué associé. Comme u' est inverse à gauche de u, u'^{gr} est inverse à gauche de u^{gr}, ce qui prouve en même temps l'injectivité de u^{gr}.

Pour montrer que $\mathrm{Ker}(v^{gr}) = \mathrm{Im}(u^{gr})$, il faut montrer que si on a $y' \in \mathrm{Fil}^{k-1}K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}}$, et $x \in \mathrm{Fil}^{k}K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}}$, tels que :

(4.6.1) $$j_*(y') + f^*(x) \in \mathrm{Fil}^{k+1}K^\cdot(X')_{\mathbb{Q}} \quad ,$$

alors il existe $y \in \mathrm{Fil}^{k-d}K^\cdot(Y)_{\mathbb{Q}}$ tel que :

i) $x + i_*(y) \in \mathrm{Fil}^{k+1}K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}}$,

ii) $y' - g^*(y)\lambda_{-1}(F) \in \mathrm{Fil}^{k}K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}}$.

Posons :

$$y = g_*(y') \quad .$$

Alors d'après VI 5.8, $y \in \mathrm{Fil}^{k}K^\cdot(Y)$. On remarque ensuite que f_* conserve la filtration (en utilisant des résultats de l'exposé VIII, ce qui est sans inconvénient, car 4.8 n'est pas utilisé pour prouver ce fait). En effet, il résulte de 1.8 ii) que f est un morphisme d'intersection complète de dimension virtuelle relative nulle (VIII 4.2). Comme f est projectif, le résultat est conséquence de VIII 3.2. En appliquand f_* à la relation

(4.8.1), on obtient :

$$f_*(j_*(y')) + f_*(f^*(x)) \in \mathrm{Fil}^{k+1}K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}} \quad ,$$

soit d'après 3.6 :

$$i_*(y) + x \in \mathrm{Fil}^{k+1}K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}} \quad .$$

Pour montrer la relation ii), il faut montrer que :

$$y' - g^*(g_*(y'))\lambda_{-1}(F) \in \mathrm{Fil}^{k}K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}} \quad .$$

Posons $z = y' - g^*(g_*(y'))\lambda_{-1}(F)$. On a :

$$j_*(z) = j_*(y') - j_*(g^*(g_*(y'))\lambda_{-1}(F))$$

$$= j_*(y') - f^*(i_*(y)) \quad \text{d'après 3.4.}$$

Or la relation i) donne :

$$f^*(i_*(y)) + f^*(x) \in \mathrm{Fil}^{k+1}K^\cdot(X')_{\mathbb{Q}} \quad .$$

Compte tenu de (4.6.1), on obtient donc :

$$j_*(z) \in \mathrm{Fil}^{k+1}K^\cdot(X')_{\mathbb{Q}} \quad ,$$

d'où :

$$j^*(j_*(z)) = z(1-L) \in \mathrm{Fil}^{k+1}K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}} \quad .$$

Soit $\bar{z}$ l'image de z dans $\mathrm{Gr}^{k-1}K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}}$, et $\overline{(1-L)}$ celle de (1-L) dans $\mathrm{Gr}^{1}K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}}$. On a donc : $\overline{z(1-L)} = 0$. On peut alors appliquer (VI 5.11) (qui reste valable après tensorisation par $\mathbb{Q}$, car sa démonstration s'appuie seulement sur la structure de $K^\cdot(Y')$ comme $K^\cdot(Y)$-algèbre libre), et on peut donc trouver $z' \in K^\cdot(Y)_{\mathbb{Q}}$ tel que :

$$z - g^*(z')\lambda_{-1}(F) \in \mathrm{Fil}^{k}K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}} \quad .$$

En appliquant g_*, on trouve, compte tenu de ce que $g_*(z) = 0$:

$$z' \in \mathrm{Fil}^{k+1-d}K^\cdot(Y)_{\mathbb{Q}} \quad ,$$

d'où, puisque $\lambda_{-1}(F) \in \mathrm{Fil}^{d-1}K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}}$:

$$z \in \mathrm{Fil}^{k}K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}} \quad ,$$

ce qui achève la démonstration.

Supposons maintenant X noethérien et Y régulier, ce qui entraine que v est surjectif (3.7). On a vu dans la démonstration de 3.7 que pour tout $x' \in K^\cdot(X')$ il existe $y' \in K^\cdot(Y')$ tel que :

$$x' = f^*(f_*(x')) + j_*(y') \quad .$$

La même propriété reste évidemment vraie après tensorisation par $\mathbb{Q}$. Par suite, si $x' \in \mathrm{Fil}^k K^\cdot(X')_{\mathbb{Q}}$, il existe $(y',x) \in K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}}$ tels que :

$$x' = v(y',x) \quad , \quad x \in \mathrm{Fil}^k K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}} \quad .$$

En effet, il suffit de prendre $x = f_*(x')$.

On filtre l'anneau $K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}}$ défini en 4.7 en posant :

$$\mathrm{Fil}^k(K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}}) = \mathrm{Fil}^{k-1}K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}} \times \mathrm{Fil}^k K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}} \quad .$$

Il résulte immédiatement de (4.7.1) que c'est une filtration d'anneau.

Pour montrer que pour tout k l'homomorphisme :

$$\mathrm{Fil}^k(K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}}) \xrightarrow{v} \mathrm{Fil}^k K^\cdot(X')_{\mathbb{Q}}$$

est surjectif, il suffit donc de montrer que si $x' = \gamma^k(x_1')$, avec $\varepsilon(x_1') = 0$, il existe $(y',x) \in \mathrm{Fil}^k(K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}})$ tel que $x' = v(y',x)$.

Or d'après ce qui précède, il existe $(y_1',x_1) \in K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}} \times K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}}$ tel que $x_1' = v(y_1',x_1)$ et $x_1 \in \mathrm{Fil}^1 K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}}$. D'après 4.7, on a alors :

$$x' = v(\gamma^k_*(y_1',x_1)) \quad .$$

Or :

$$\gamma^k_*(y_1',x_1) = \Big(\sum_{p=1}^{k} \gamma^{k-p}(x_1)\gamma^p(L,y_1'),\ \gamma^k(x_1)\Big)$$

(conséquence immédiate de (4.7.2)). Comme x_1 est d'augmentation nulle, $\gamma^k(x_1) \in \mathrm{Fil}^k K^\cdot(X)_{\mathbb{Q}}$, et compte tenu de V 5.7,

$$\sum_{p=1}^{k} \gamma^{k-p}(x_1)\gamma^p(L,y_1') \in \mathrm{Fil}^{k-1}K^\cdot(Y')_{\mathbb{Q}} \quad ,$$

d'où le résultat.

Remarque 4.9. Dans le cas X noethérien, Y régulier, on peut, en procédant comme en 4.7, décrire la structure d'anneau graduée de $Gr^*K'(X')_{\mathbb{Q}}$ en termes des anneaux gradués $Gr^*K'(X)_{\mathbb{Q}}$, $Gr^*K'(Y)_{\mathbb{Q}}$, des homomorphismes additifs i^{gr} et i_{gr} déduits de i^* et i_*, et de l'élément $c'(N)$ de $Gr^*K'(Y)$. De même, on peut décrire à partir des mêmes données les homomorphismes f^{gr}, f_{gr}, j^{gr}, j_{gr} définis à partir de f^*, f_*, j^*, j_* par passage aux gradués associés.

4.10. Soit X un schéma régulier ayant un faisceau ample. On sait (IV) que les groupes de Grothendieck formés avec les $\underline{O}_X$-Modules localement libres de type fini, et avec les $\underline{O}_X$-Modules cohérents, sont isomorphes. On utilise ce fait pour définir sur $K'(X)$ une filtration "topologique", en prenant pour $Fil^i_{top}K'(X)$ le sous-groupe engendré par les classes des faisceaux cohérents dont le support est de codimension $\geq i$; on montre facilement que $Fil^i_{top}K'(X)$ est engendré par les classes des faisceaux $\underline{O}_Z$, où Z parcourt l'ensemble des sous-schémas fermés intègres de X, de codimension $\geq i$(X).

Proposition 4.11. Soit X un schéma régulier ayant un faisceau ample. Alors pour tout $k \geq 0$:

$$Fil^k_{top}K'(X)_{\mathbb{Q}} \subset Fil^k_{\lambda}K'(X)_{\mathbb{Q}} \quad .$$

(N.B. L'inclusion inverse, valable sans tensorisation par $\mathbb{Q}$, sera prouvée dans X).

D'après 4.10, il suffit de montrer que si Z est un sous-schéma fermé intègre de X, de codimension k, alors :

$$cl(\underline{O}_Z) \in Fil^kK'(X)_{\mathbb{Q}} \quad .$$

Pour cela, on procède par récurrence noethérienne sur les sous-schémas fermés intégres de X. Supposons donc la propriété prouvée pour les sous-schémas fermés intègres de Z, et montrons la pour Z. Soir $\underline{J}$ l'Idéal de $\underline{O}_X$

définissant Z, et soit z le point générique de Z. Comme Z est intègre, $\underline{J}_z$ est l'idéal maximal de $\underline{O}_{X,z}$, et, puisque X est régulier, $\underline{J}_z$ peut être engendré par une suite $\underline{O}_{X,z}$-régulière. On peut donc trouver une suite de sections de $\underline{J}$ dans un voisinage de z, formant une suite $\underline{O}_X$-régulière. Par suite, il existe un voisinage ouvert U de z, tel que Z' = X-U soit contenu dans Z, et que $\underline{J}|U$ soit un idéal régulier de $\underline{O}_U$. L'immersion $Z\cap U \xrightarrow{i} U$ est alors une immersion régulière, dont la codimension est $\dim(\underline{O}_{X,z}) = \operatorname{codim}(Z,X)$ (EGA IV 5.1.2). Par ailleurs, on a la suite exacte (IV :

$$K'(Z') \xrightarrow{j_*} K'(X) \xrightarrow{u^*} K'(U) \longrightarrow 0 \quad ,$$

où j est l'immersion $Z' \longrightarrow X$ et u l'immersion $U \longrightarrow X$; on obtient une suite analogue après tensorisation par $\mathbb{Q}$. Or $u^*(\underline{O}_Z) = i_*(\underline{O}_{Z\cap U})$, et d'après 4.6, l'image $u^*(1_Z)$ de la classe de $\underline{O}_Z$ par u^* est donc dans $\mathrm{Fil}^k K'(U)_{\mathbb{Q}}$. Comme u^* est un λ-homomorphisme surjectif, il induit une surjection $\mathrm{Fil}^k K'(X) \longrightarrow \mathrm{Fil}^k K'(U)$, donc $u^*(1_Z) = u^*(x)$ avec $x \in \mathrm{Fil}^k K'(X)$; il existe donc $y \in j_*(K'(Z'))$ tel que :

$$\mathrm{cl}(\underline{O}_Z) - y \in \mathrm{Fil}^k K'(X)_{\mathbb{Q}} \quad .$$

Or $Z' \subset Z$, et comme $z \notin Z'$, $\operatorname{codim}(Z',X) > k$. Par suite, x peut s'exprimer comme combinaison de classes de faisceaux $\underline{O}_{Z''_\alpha}$, où les Z''_α sont des sous-schémas fermés intègres de Z, distincts de Z. D'après l'hypothèse de récurrence, $x \in \mathrm{Fil}^{k+1} K'(X)_{\mathbb{Q}}$, ce qui achève la démonstration.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Cartan-Eilenberg, Homological Algebra.

EXPOSE VIII

LE THEOREME DE RIEMANN-ROCH

par Pierre BERTHELOT

1. Morphismes d'intersection complète

Définition 1.1. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme de schémas. On dit que f est un morphisme d'intersection complète si pour tout point x de X, il existe un voisinage ouvert U de x, un Y-schéma lisse V, tels que la restriction de f à U se factorise en :

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\ i\ } & V \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & Y & \end{array}$$

où i est une immersion régulière (VII 1.4).

Quitte à remplacer V par un ouvert, on peut supposer que i est une immersion fermée régulière.

On peut dans cette définition remplacer V par un fibré vectoriel $Y[T_1,\ldots,T_n]$. En effet, la notion étant locale, on peut supposer que V est affine, et que son image dans Y est contenue dans un ouvert affine W de Y. Il existe alors un entier n et une W-immersion fermée $V \longrightarrow W[T_1,\ldots,T_n]$, d'où une Y-immersion $V \longrightarrow Y[T_1,\ldots,T_n]$, qui est régulière d'après VII 1.10. Comme la composée de deux immersions régulières est régulière, on trouve donc une Y-immersion régulière $U \longrightarrow Y[T_1,\ldots,T_n]$ factorisant f.

Proposition 1.2. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme d'intersection complète. Alors toute Y-immersion $i : X \longrightarrow Z$ de X dans un Y-schéma lisse est régulière.

Nous montrerons d'abord le corollaire :

Corollaire 1.3. Soit le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} & \overset{j}{\nearrow} & V' \\ & \overset{i}{\nearrow} & \downarrow p \\ X & \longrightarrow & V \end{array} ,$$

où i et j sont des immersions, et p un morphisme lisse. Alors pour que i soit une immersion régulière, il faut et il suffit que j soit une immersion régulière.

i) Supposons i régulière. Posons $X' = V' \times_V X$. La donnée de j définit une section j' de X' au-dessus de X, telle que $j = i' \circ j'$:



Or j' est une immersion régulière, car c'est une section d'un morphisme lisse (VII 1.10) ; i' est une immersion régulière car elle est déduite de i par un changement de base lisse, donc plat (VII 1.5). Donc j est une immersion régulière (VII 1.7).

ii) Supposons j régulière, et p étale. Alors j' est une immersion ouverte (EGA IV 17.9.3), donc un isomorphisme de X sur j'(X) ; posons U = j'(X).

Soit i" la restriction de i' à U, et soit U' un ouvert de V' tel que $U = U' \cap X'$. On a alors : $i'' = j \circ (j')^{-1}$, donc i" est une immersion régulière de U dans U'. Or le morphisme $U' \longrightarrow V$, étant lisse, est plat et de présentation finie, donc ouvert. C'est par conséquent un morphisme fidèlement plat et quasi-compact de U' sur un voisinage ouvert de X dans V. Il en résulte (VII 1.5) que i est une immersion régulière.

iii) Supposons j régulière, et que V' soit un fibré vectoriel sur V. Comme la propriété à prouver (i régulière) est locale sur V, on peut supposer V affine, i fermée, et que $V' = V[T_1, \ldots, T_n]$. Posons V = Spec(A),

X = Spec(B) ; on a le diagramme commutatif :



où les morphismes u et v sont surjectifs. Soient t_i, pour i = 1,...,n, des éléments de A tels que pour tout i, on ait

$$u(t_i) = v(T_i) \quad .$$

On définit un homomorphisme w : $A[T_1,\ldots,T_n] \longrightarrow A$ en posant $w(T_i) = t_i$. On obtient ainsi une immersion fermée s : $V \longrightarrow V'$ qui est une section de p, et qui est telle que $j = s \circ i$. De plus, étant une section d'un morphisme lisse, c'est une immersion régulière (VII 1.10). Sachant que s et $s \circ i$ sont régulières, on en déduira que i est régulière si on montre que la suite :

$$0 \longrightarrow i^*(\underline{K}/\underline{K}^2) \longrightarrow \underline{J}/\underline{J}^2 \longrightarrow \underline{I}/\underline{I}^2 \longrightarrow 0$$

est exacte et localement scindée, $\underline{I}$, $\underline{J}$ et $\underline{K}$ désignant respectivement les idéaux définissant i, j, et s (VII 1.7). Il suffit pour cela de montrer que $i^*(\underline{K}/\underline{K}^2)$ est facteur direct de $\underline{J}/\underline{J}^2$. Or on voit tout de suite que j' se déduit de s par le changement de base i' : $X' \longrightarrow V'$. En outre, les immersions j' et s sont régulières (VII 1.10). Par conséquent (VII 1.2), l'idéal qui définit j' est $i'^*(\underline{K})$, et le faisceau conormal de j' est $i^*(\underline{K}/\underline{K}^2)$. La suite exacte des faisceaux conormaux relative à la décomposition $j = i' \circ j'$ donne donc en particulier un homomorphisme : $\underline{J}/\underline{J}^2 \longrightarrow i^*(\underline{K}/\underline{K}^2)$. Il est immédiat de vérifier que le composé : $i^*(\underline{K}/\underline{K}^2) \longrightarrow \underline{J}/\underline{J}^2 \longrightarrow i^*(\underline{K}/\underline{K}^2)$ est l'identité (du point de vue affine, cela correspond à la décomposition de J en somme directe d'un idéal de A, et de l'idéal engendré par les $T_i - t_i$). On a donc bien ainsi le scindage cherché.

iv) Supposons enfin j régulière et p lisse. Pour tout $x \in X$, on peut trouver un voisinage ouvert W de i(x), un voisinage ouvert W' de j(x) au dessus de W, et un diagramme commutatif :



où p_o est le morphisme structural, et q un morphisme étale (EGA IV 17.11.4). On peut alors supposer V = W, V' = W'. Il est facile de voir que $q \circ j$ est une immersion (introduire le produit fibré $X[T_1,\ldots,T_n]$). Appliquant les résultats ii) et iii), on en déduit que $q \circ i$ est régulière, puis que i est régulière.

Montrons maintenant 1.2.

La propriété étant locale sur Z, on peut, pour la prouver, se placer au voisinage d'un point x de X. On peut alors trouver un voisinage ouvert U de x dans X, un Y-schéma lisse V, et une Y-immersion régulière $i' : U \longrightarrow V$. On a alors le diagramme commutatif suivant :



On en déduit une immersion fermée $i'' : U \longrightarrow Z \times_Y V$, et le diagramme commutatif :



Comme i' est régulière, et p et p' lisses, on en déduit d'après 1.3 que i" et i sont régulières.

La proposition qui suit ne sera pas utilisée dans la suite du Séminaire :

Proposition 1.4. Soit f : X ⟶ Y un morphisme plat localement de présentation finie. Pour que f soit un morphisme d'intersection complète au sens de 1.1, il faut et il suffit qu'il soit un morphisme d'intersection complète au sens de EGA IV 19.3.6.

Supposons que f soit un morphisme d'intersection complète au sens de 1.1, et soit $x \in X$. Alors il existe un voisinage ouvert U de x, et une factorisation :

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & V \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & Y & \end{array}$$

où i est une immersion régulière, et g un morphisme lisse. Soit y = f(x) ; alors l'immersion $i_y : U_y \longrightarrow V_y$ est régulière en x. En effet, on peut supposer, quitte à restreindre V, qu'il existe un $\underline{O}_V$-Module libre de type fini $\underline{E}$, et un homomorphisme régulier $u : \underline{E} \longrightarrow \underline{O}_V$ tel que le complexe de Koszul associé à u soit une résolution de $\underline{O}_U$. On considère alors l'homomorphisme u_y induit sur la fibre en y, et le complexe de Koszul associé $\underline{K}.(u_y) = \underline{K}.(u)_y$. Comme g est lisse, donc plat, $\underline{K}.(u)$ est une résolution Y-plate de $\underline{O}_U$. Par suite, les groupes d'homologie de $\underline{K}.(u)_y$ sont les $\underline{\mathrm{Tor}}_i^{O_Y}(\underline{O}_U, \underline{k}(y))$, où $\underline{k}(y)$ est le corps résiduel de $\underline{O}_{Y,y}$. Comme f est un morphisme plat, ils sont nuls, et i_y est régulière en x. Par ailleurs, comme g est lisse, l'anneau local de V_y en x est régulier. Comme l'anneau local de U_y en y est quotient d'un anneau régulier par un idéal régulier,

c'est un anneau d'intersection complète (EGA IV 19.3.2), et par suite f est d'intersection complète en x au sens de EGA IV 19.3.6.

Réciproquement, supposons que f soit un morphisme d'intersection complète au sens de EGA IV 19.3.6, et soit $x \in X$. Soit U un voisinage affine de x, au-dessus d'un voisinage affine U' de $y = f(x)$. On peut alors trouver un U'-schéma lisse V, et une immersion fermée $U \xrightarrow{i} V$ (en prenant par exemple pour V un fibré vectoriel sur U'). Nous allons montrer que i est régulière. Or d'après EGA IV 19.3.7, i est transversalement régulier en x, puisque V est lisse sur Y, donc V_y régulier en x, et U' plat sur Y. Il résulte alors de EGA IV 19.2.4, a)⇒ c), que i est régulière en x. Par suite, f est un morphisme d'intersection complète au sens de 1.1.

Proposition 1.5. *Soient* $f : X \longrightarrow Y$, *et* $g : Y \longrightarrow Z$ *deux morphismes localement d'intersection complète. Alors* $g \circ f$ *est un morphisme localement d'intersection complète.*

Soit $x \in X$. On peut trouver des voisinages ouverts U, V de x, f(x), et des immersions régulières i, j telles qu'on ait les factorisations :



On peut compléter ce diagramme par le carré commutatif :

$$\begin{array}{ccc} V[T_1,\ldots,T_n] & \xrightarrow{j'} & Z[T'_1,\ldots,T'_m,T_1,\ldots,T_n] \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \xrightarrow{j} & Z[T'_1,\ldots,T'_m] \end{array} ,$$

où j' est obtenu à partir de j par changement de base ; ce changement de base étant plat, j' est une immersion régulière, et par suite, j'∘i est une immersion régulière de U dans un schéma lisse sur W, d'où le résultat.

Proposition 1.6. Soit f : X ⟶ Y un morphisme g : Y' ⟶ Y un changement de base plat. Si f est d'intersection complète, alors le morphisme f' : $Xx_Y Y'$ ⟶ Y' déduit de f l'est aussi. La réciproque est vraie si g est de plus quasi-compact et surjectif.

On peut trouver un recouvrement de X par des ouverts U_i tels que pour tout i, la restriction de f à U_i se factorise en $U_i \longrightarrow V_i \longrightarrow Y$, où $U_i \longrightarrow V_i$ est une immersion régulière, et $V_i \longrightarrow Y$ un morphisme lisse. Les $U_i x_Y Y'$ forment un recouvrement ouvert de $Xx_Y Y'$, les immersions $U_i x_Y Y' \longrightarrow V_i x_Y Y'$ sont régulières d'après VII 1.5, et les morphismes $V_i x_Y Y' \longrightarrow Y'$ sont lisses, d'où le premier résultat. Pour la réciproque on conclut d'abord de EGA IV 2.7.1 (iv) que f est localement de présentation finie, ce qui nous ramène facilement, grâce à 1.2, au cas ou f est une immersion fermée, auquel cas l'assertion n'est autre que VII 1.5.

Proposition 1.7. Soit f : X ⟶ Y un morphisme d'intersection complète. Alors f est un morphisme parfait.

La propriété étant locale sur X, on peut se placer au voisinage d'un point x de X, et supposer qu'il existe un ouvert U contenant x, et une factorisation :



où i est une immersion régulière, et g un morphisme lisse. Comme g est lisse, c'est un morphisme parfait (III 4.1). D'après VII 1.9, i est également un morphisme parfait. Comme le composé de deux morphismes parfaits est parfait (III 4.5), on en déduit la proposition.

Proposition 1.8. Soient $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme d'intersection complète, x un point de X, et une factorisation :



où U est un voisinage ouvert de x, i une immersion régulière, et g un morphisme lisse. On note J l'idéal de $\mathcal{O}_V$ définissant U. Alors l'entier

$$d_x = \operatorname{rang}((\underline{\Omega}^1_{V/Y})_{i(x)}) - \operatorname{rang}((\underline{J}/\underline{J}^2)_x)$$

est indépendant de la factorisation choisie de f.

Supposons que la restriction de f à U se factorise par deux Y-schémas lisses V et V', et posons $V'' = V \times_Y V'$. Alors V'' est lisse sur Y, et aussi sur V et V'. De plus, les immersions $X \longrightarrow V$ et $X \longrightarrow V'$ définissent une immersion $X \longrightarrow V''$, régulière d'après 1.2. On peut donc se ramener à comparer les entiers d_x relatifs à deux factorisations de f par des Y-schémas lisses V et V' tels qu'il existe un diagramme commutatif au-dessus de Y :



où p est un morphisme lisse. On peut de plus supposer $\underline{\Omega}^1_{V/Y}$, $\underline{\Omega}^1_{V'/Y}$, $\underline{\Omega}^1_{V'/V}$ de rang constant, ainsi que les faisceaux conormaux de i et j.

Du diagramme commutatif (où tous les morphismes sont lisses) :



on déduit :

(1.8.1) $$\text{rang}(\underline{\Omega}^1_{V'/Y}) = \text{rang}(\underline{\Omega}^1_{V/Y}) + \text{rang}(\underline{\Omega}^1_{V'/V}) \quad .$$

Soit $X' = V' \times_V X$; alors le rang de $\underline{\Omega}^1_{V'/V}$ est égal à celui de $\underline{\Omega}^1_{X'/X}$. Par ailleurs, j définit une section $X \xrightarrow{j'} X'$, qui est une immersion régulière de codimension égale au rang de $\underline{\Omega}^1_{X'/X}$ (EGA IV 17.10.4). Si i' est l'immersion déduite de i par le changement de base $V' \longrightarrow V$, on a $j = i' \circ j'$ et par suite (VII 1.7) :

(1.8.2) $$\text{rang}(\underline{N}_{V'/X}) = \text{rang}(\underline{N}_{V/X}) + \text{rang}(\underline{\Omega}^1_{V'/V}).$$

En comparant (1.8.1) et (1.8.2), on en déduit la proposition.

Définition 1.9. L'entier d_x de la proposition 1.8 s'appelle dimension relative virtuelle de X sur Y (ou de f) au point x.

La dimension relative virtuelle de X sur Y est donc une fonction localement constante sur X, à valeurs entières (positives ou négatives). Si f est un morphisme lisse de dimension relative n, sa dimension relative virtuelle est n. Si f est une immersion régulière de codimension n, sa dimension relative virtuelle est -n.

Proposition 1.10. Soient $f : X \longrightarrow Y$ et $g : Y \longrightarrow Z$ deux morphismes d'intersection complète, et soit x un point de X. Alors :

$$\text{dim.rel.virt.}_x(g \circ f) = \text{dim.rel.virt.}_x(f) + \text{dim.rel.virt.}_{f(x)}(g)$$

Cela résulte immédiatement de 1.9 et de la démonstration de 1.5.

2. Complexe cotangent relatif

2.1. Nous donnerons ici une définition du complexe cotangent qui, sans avoir toute la généralité possible (voir Exp. O 4.4), sera suffisante pour les besoins du théorème de Riemann-Roch ; bien entendu, la définition donnée dans exp. O coïncide dans le cas envisagé avec la définition donnée ici.

Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme lissifiable, c'est-à-dire admettant une factorisation :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\ i\ } & V \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & Y & \end{array} \quad ,$$

où g est un morphisme lisse, et i une immersion qu'on peut supposer fermée. Soit $\underline{J}$ l'idéal de X dans V. La dérivation canonique :

$$d : \underline{O}_V \longrightarrow \underline{\Omega}^1_{V/Y}$$

définit un homomorphisme :

$$\underline{J} \longrightarrow \underline{O}_V \xrightarrow{d} \underline{\Omega}^1_{V/Y} \longrightarrow \underline{\Omega}^1_{V/Y} \otimes_{\underline{O}_V} \underline{O}_X$$

qui s'annule sur $\underline{J}^2$, et définit donc un homomorphisme, encore noté d :

$$(2.1.1) \qquad \underline{J}/\underline{J}^2 \xrightarrow{\ d\ } i^*(\underline{\Omega}^1_{V/Y}) \quad .$$

On vérifie aisément que cet homomorphisme est $\underline{O}_X$-linéaire. On définit alors un complexe de chaines $\underline{L}^{X/Y}_\cdot$ en posant :

$$\underline{L}^{X/Y}_o = i^*(\underline{\Omega}^1_{V/Y}) \quad , \quad \underline{L}^{X/Y}_1 = \underline{J}/\underline{J}^2 \quad ; \quad \underline{L}^{X/Y}_i = 0 \text{ si } i \neq 0, 1,$$

et en prenant comme homomorphisme $\underline{L}^{X/Y}_1 \longrightarrow \underline{L}^{X/Y}_o$ l'homomorphisme (1.5.1).

Proposition 2.2. Le complexe $\underline{L}^{X/Y}_{\cdot}$ ne dépend pas, à un isomorphisme canonique près dans la catégorie dérivée D(X), de la factorisation choisie par un Y-schéma lisse.

Soient V, V' deux Y-schémas lisses par lesquels se factorise f. Posons : $V'' = V \times_Y V'$; alors V'' est lisse sur Y, et aussi sur V et V'. De plus, les immersions $X \longrightarrow V$ et $X \longrightarrow V'$ définissent une immersion $X \longrightarrow V''$ qui factorise f. On peut donc se ramener à comparer les complexes $\underline{L}^{X/Y}_{\cdot}$ relatifs à deux factorisations par des Y-schémas lisses V et V', tels qu'il existe un diagramme commutatif au-dessus de Y :

$$\begin{array}{ccc} & \overset{j}{\nearrow} & V' \\ & \overset{i}{\searrow} & \downarrow p \\ X & \longrightarrow & V \end{array} \quad ,$$

où i et j sont des immersions fermées, et p un morphisme lisse.

Par fonctorialité, on obtient alors des homomorphismes :

$$\underline{I}/\underline{I}^2 \longrightarrow \underline{J}/\underline{J}^2 \quad ; \quad p^*(\underline{\Omega}^1_{V/Y}) \to \underline{\Omega}^1_{V'/Y} \quad ,$$

d'où un diagramme :

$$\begin{array}{ccc} \underline{I}/\underline{I}^2 & \longrightarrow & \underline{J}/\underline{J}^2 \\ \downarrow d & & \downarrow d \\ i^*(\underline{\Omega}^1_{V/Y}) & \longrightarrow & j^*(\underline{\Omega}^1_{V'/Y}) \end{array} \quad . \tag{2.2.1}$$

Comme V et V' sont lisses sur Y, on obtient la suite exacte :

$$0 \longrightarrow p^*(\underline{\Omega}^1_{V/Y}) \longrightarrow \underline{\Omega}^1_{V'/Y} \longrightarrow \underline{\Omega}^1_{V'/V} \longrightarrow 0 \quad .$$

Comme les Modules de différentielles considérés sont localement libres sur $\underline{O}_V$, on trouve en appliquant le foncteur j^* la suite exacte :

$$0 \longrightarrow i^*(\underline{\Omega}^1_{V/Y}) \longrightarrow j^*(\underline{\Omega}^1_{V'/Y}) \longrightarrow j^*(\underline{\Omega}^1_{V'/V}) \longrightarrow 0 \quad . \tag{2.2.2}$$

Par ailleurs, j définit une section j' de $X' = V' \times_V X$:



Soient $\underline{I}$, $\underline{J}$, $\underline{K}$ les idéaux définissant i, j, j' ; on a : $j = i' \circ j'$, et les immersions i', j, j' sont régulières ; de plus, i' est définie par l'idéal $p^*(\underline{I})$ (car p est plat), et son faisceau conormal est donc $i'^*(p^*(\underline{I})) = p'^*(\underline{I}/\underline{I}^2)$. On obtient alors la suite exacte :

$$(2.2.3) \qquad 0 \longrightarrow \underline{I}/\underline{I}^2 \longrightarrow \underline{J}/\underline{J}^2 \longrightarrow \underline{K}/\underline{K}^2 \longrightarrow 0 \quad .$$

Nous allons montrer :

a) que le diagramme (2.2.1) est commutatif ; on obtiendra donc ainsi un morphisme de complexes θ du complexe $\underline{L}.^{X/Y}$ défini par V dans le complexe $\underline{L}.^{X/Y}$ défini par V' ;

b) que l'homomorphisme : $\underline{K}/\underline{K}^2 \longrightarrow j^*(\underline{\Omega}^1_{V'/V})$ défini par (2.2.2), (2.2.3) et (2.2.1) est un isomorphisme ; cela entrainera que le mapping cylinder de θ est acyclique, donc que θ est un quasi-isomorphisme, donc définit un isomorphisme dans la catégorie dérivée.

Les propriétés a) et b) sont de nature locale sur X. On peut donc supposer X, Y, V et V' affines. Posons : Y = Spec(A), V = Spec(B), V' = Spec(B'), X = Spec(C), et gardons les mêmes lettres pour noter les homomorphismes et les idéaux correspondants. On a le diagramme :



L'homomorphisme $\underline{I}/\underline{I}^2 \longrightarrow \underline{J}/\underline{J}^2$ se déduit de l'homomorphisme : $IB' \longrightarrow J$ et coïncide avec celui qui se déduit de $p : I \longrightarrow J$; l'homomorphisme : $i^*(\underline{\Omega}^1_{V/Y}) \longrightarrow j^*(\underline{\Omega}^1_{V'/Y})$ se déduit du carré commutatif (1). La propriété a) est donc évidente.

L'homomorphisme : $\underline{K}/\underline{K}^2 \longrightarrow j^*(\underline{\Omega}^1_{V'/V})$ considéré dans b) peut-être défini comme suit : soit $\bar{x} \in K/K^2$, soit x un élément de J remontant $\bar{x}$ (il en existe car $K = J/IB'$). On associe à $\bar{x}$ l'image de x par l'homomorphisme composé : $J \xrightarrow{d} \Omega_{B'/A}\otimes_{B'}C \longrightarrow \Omega^1_{B'/B}\otimes_{B'}C$. Par ailleurs, soit H l'idéal d'augmentation de : $B'\otimes_B B' \longrightarrow B'$; le carré commutatif (2) donne un homomorphisme : $H \longrightarrow K$, d'où un homomorphisme : $H/H^2\otimes_{B'}C \longrightarrow K/K^2$. Or $H/H^2 = \Omega^1_{B'/B}$; par suite, il suffit de vérifier que les homomorphismes construits sont inverses l'un de l'autre, ce qui se fait sans difficulté.

Définition 2.3. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme lissifiable. Le complexe $\underline{L}^{X/Y}_{\cdot}$, défini à isomorphisme canonique près dans la catégorie dérivée $D(X)$, est appelé complexe cotangent relatif de X sur Y (ou de f).

Proposition 2.4. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme d'intersection complète (1.1) lissifiable. Alors $\underline{L}^{X/Y}_{\cdot}$ est parfait. Plus précisément, pour toute

factorisation de f comme composé d'une immersion et d'un morphisme lisse, le complexe $\underline{L}^{X/Y}_{\cdot}$ défini en 2.1 est strictement parfait.

Soit $f = g \circ i$, où g est un morphisme lisse, et i une immersion. D'après 1.2, i est une immersion régulière. Si $\underline{J}$ est l'Idéal définissant i, $\underline{J}/\underline{J}^2$ est donc un $\underline{O}_X$-Module localement libre de type fini. De même, comme $g : V \longrightarrow Y$ est lisse, $i^*(\underline{\Omega}^1_{V/Y})$ est localement libre de type fini, d'où 2.4.

Corollaire 2.5. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme d'intersection complète lissifiable, et $f = g \circ i$ une factorisation de f par un Y-schéma lisse V. Soit $\underline{J}$ l'idéal de $\underline{O}_V$ définissant i. Alors, si $K^{\cdot}(X)$ désigne le groupe de Grothendieck des $\underline{O}_X$-Modules localement libres de type fini (resp. des complexes parfaits sur X), l'élément $T_f \in K^{\cdot}(X)$ défini par :

$$T_f = cl(i^*(\underline{\Omega}^1_{V/Y})) - cl(\underline{J}/\underline{J}^2)$$

$$(\text{resp. } T_f = cl(\underline{L}^{X/Y}_{\cdot}))$$

ne dépend pas de la factorisation de f choisie. La valeur en un point x de X de l'augmentation de T_f n'est autre que la dimension relative virtuelle de X sur Y au point x (1.9).

L'élément T_f est bien défini dans les deux cas envisagés d'après 2.4, et sa classe dans $K^{\cdot}(X)$ ne dépend pas de la factorisation, d'après 2.2, dans le cas respé, et d'après la démonstration de 2.2 dans le cas non respé. La dernière assertion de 2.5 est triviale.

Proposition 2.6. Soient $f : X \longrightarrow Y$, et $g : Y \longrightarrow Z$ deux morphismes d'intersection complète lissifiables, et supposons de plus la condition suivante remplie :

(G) Il existe un Y-schéma lisse V, factorisant f, tel que pour toute immersion fermée : $Y \longrightarrow V'$ on puisse trouver un V'-schéma lisse V", avec $V \simeq V''\times_{V'}Y$ (cette condition est en particulier remplie si f est quasi-projectif et si Y a un faisceau ample, en prenant pour V un $\mathbb{P}^r_Y$).

Alors $g\circ f$ est d'intersection complète, lissifiable, et on a un triangle distingué :

$$\begin{array}{ccc} & \underline{L}^{X/Y}_{\cdot} & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \underline{L}f^*(\underline{L}^{Y/Z}_{\cdot}) & \longrightarrow & \underline{L}^{X/Z}_{\cdot} \end{array}$$

Soit V' un Z-schéma lisse factorisant g. On considère le diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{i} & V & \xrightarrow{j'} & V'' \\ & \searrow^{f} & \downarrow p & & \downarrow p'' \\ & & Y & \xrightarrow{j} & V' \\ & & & \searrow^{g} & \downarrow p' \\ & & & & Z \end{array} .$$

Alors l'immersion j' est régulière, car déduite de j par un changement de base plat. Par suite $j'\circ i$ est une immersion régulière factorisant $g\circ f$, qui est donc lissifiable et d'intersection complète. De plus, on a la suite exacte des faisceaux conormaux :

$$0 \longrightarrow i^*(\underline{J}'/\underline{J}'^2) \longrightarrow \underline{K}/\underline{K}^2 \longrightarrow \underline{I}/\underline{I}^2 \longrightarrow 0 \quad ,$$

en notant $\underline{I}$, $\underline{J}$, $\underline{J}'$, $\underline{K}$ les faisceaux définissant respectivement les immersions i, j, j', $j'\circ i$. Or, p" étant plat, $\underline{J}' = p''^*(\underline{J})$. La suite peut donc s'écrire :

$$(2.6.1) \qquad 0 \longrightarrow f^*(\underline{J}/\underline{J}^2) \longrightarrow \underline{K}/\underline{K}^2 \longrightarrow \underline{I}/\underline{I}^2 \longrightarrow 0 \quad .$$

Par ailleurs, V' et V" étant lisses sur Z, on a la suite exacte :

$$0 \longrightarrow p''^*(\underline{\Omega}^1_{V'/Z}) \longrightarrow \underline{\Omega}^1_{V''/Z} \longrightarrow \underline{\Omega}^1_{V''/V'} \longrightarrow 0 \quad .$$

En appliquant $i^* \circ j'^*$, on trouve la suite exacte :

$$0 \longrightarrow (p'' \circ j' \circ i)^*(\underline{\Omega}^1_{V'/Z}) \longrightarrow (j' \circ i)^*(\underline{\Omega}^1_{V''/Z}) \longrightarrow (j' \circ i)^*(\underline{\Omega}^1_{V''/V'}) \longrightarrow 0.$$

Comme $j'^*(\underline{\Omega}^1_{V''/V'}) = \underline{\Omega}^1_{V/Y}$ d'après l'hypothèse (G), on obtient :

(2.6.2) $$0 \longrightarrow f^*(j^*(\underline{\Omega}^1_{V'/Z})) \longrightarrow (j' \circ i)^*(\underline{\Omega}^1_{V''/Z}) \longrightarrow i^*(\underline{\Omega}^1_{V/Y}) \longrightarrow 0 \quad .$$

En combinant (2.6.1) et (2.6.2), on est ramené à voir que le diagramme :

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & f^*(\underline{J}/\underline{J}^2) & \longrightarrow & \underline{K}/\underline{K}^2 & \longrightarrow & \underline{I}/\underline{I}^2 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f^*(d)} & & \downarrow{\scriptstyle d} & & \downarrow{\scriptstyle d} & & \\ 0 & \longrightarrow & f^*(j^*(\underline{\Omega}^1_{V'/Z})) & \longrightarrow & (j' \circ i)^*(\underline{\Omega}^1_{V''/Z}) & \longrightarrow & i^*(\underline{\Omega}^1_{V/Y}) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

est commutatif, ce qui se fait localement sans difficulté en revenant aux définitions des morphismes en jeu.

De la suite exacte de complexes ainsi obtenue, on déduit le triangle distingué annoncé dans la catégorie dérivée.

Corollaire 2.7. Avec les notations et les hypothèses de 2.6, on a dans $K'(X)$ l'égalité suivante :

$$T_{g \circ f} = T_f + f^*(T_g) \quad .$$

3. Théorème de Riemann-Roch : énoncé

3.1. Dans le numéro 3, Y est un schéma quasi-compact ayant un faisceau ample.

Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme projectif, d'intersection complète (1.1) ; on suppose de plus que la dimension relative virtuelle de f (1.9)

est constante sur X. Comme f est projectif, il existe une immersion fermée $X \longrightarrow P$, où P est un fibré projectif sur Y, et comme Y a un faisceau ample, on peut supposer que $P = \underline{P}^r_Y$. On a donc une factorisation :



Comme f est d'intersection complète, l'immersion i est régulière (1.2).

D'après 1.7, f est un morphisme parfait. De plus, Y a un faisceau ample et par suite X et P également. On peut alors définir un homomorphisme additif :

$$f_* : K'(X) \longrightarrow K'(Y)$$

(IV 2.12), les K' définis en termes de faisceaux localement libres de type fini, ou de complexes parfaits, étant identiques. On peut également définir des homomorphismes additifs :

$$i_* : K'(X) \longrightarrow K'(P) \; ; \quad g_* : K'(P) \longrightarrow K'(Y),$$

et on a : $f_* = g_* \circ i_*$.

Soit d la dimension relative virtuelle de X sur Y. La codimension de i est alors r-d. D'après VII 4.6, l'homomorphisme i_* donne après tensorisation par $\mathbb{Q}$ des inclusions :

$$i_*(\mathrm{Fil}^k K'(X)_{\mathbb{Q}}) \subset \mathrm{Fil}^{k+r-d} K'(P)_{\mathbb{Q}} \quad .$$

D'après VI 5.8, l'homomorphisme g_* donne des inclusions :

$$g_*(\mathrm{Fil}^{k'} K'(P)) \subset \mathrm{Fil}^{k'-r} K'(Y) \quad .$$

En composant les deux, on obtient donc :

Proposition 3.2. Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme projectif, d'intersection complète, et dont la dimension relative virtuelle d est constante. On suppose que Y est quasi-compact, et admet un faisceau ample. On a alors pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$f_*(\mathrm{Fil}^k K'(X)_{\mathbb{Q}}) \subset \mathrm{Fil}^{k-d} K'(Y)_{\mathbb{Q}} \quad .$$

On obtient donc en particulier un homomorphisme additif :

$$f_{gr} : \mathrm{Gr}K'(X)_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathrm{Gr}K'(Y)_{\mathbb{Q}}$$

envoyant $\mathrm{Gr}^k K'(X)_{\mathbb{Q}}$ dans $\mathrm{Gr}^{k-d} K'(Y)_{\mathbb{Q}}$.

3.3. Rappelons que nous avons défini dans (V 6.1) un foncteur $A \longmapsto \mathrm{Ch}(A)$ sur la catégorie des K-algèbres graduées, à valeurs dans la catégorie des K-λ-algèbres augmentées, K étant un anneau binômial (V 2.7). Si A est une K-algèbre graduée, on a :

$$\mathrm{Ch}(A) = K \times (1+\hat{A}^+) \quad .$$

Pour toute K-λ-algèbre augmentée Λ, nous avons défini un K-λ-homomorphisme, nommé "classe de Chern complétée" (V 6.7) :

$$\tilde{c} = (\varepsilon, c): \Lambda \longrightarrow \mathrm{Ch}(\mathrm{Gr}_\lambda \Lambda) \quad .$$

Enfin, nous avons défini un homomorphisme d'anneaux, fonctoriel en A, et nommé caractère de Chern (V 6.4) :

$$\mathrm{ch} : \mathrm{Ch}(A) \longrightarrow K \oplus \hat{A}^+_{\mathbb{Q}} \quad ,$$

et un endomorphisme de groupes, nommé caractère de Todd (V 1.16) :

$$\mathrm{Todd} : 1+\hat{A}^+ \longrightarrow 1+\hat{A}^+ \quad .$$

Nous allons appliquer ces définitions aux λ-anneaux augmentés $K^{\cdot}(X)$ et $K^{\cdot}(Y)$, les anneaux d'augmentation $H^{0}(X,\underline{\mathbb{Z}})$ et $H^{0}(Y,\underline{\mathbb{Z}})$, étant binômiaux (V 2.8). Pour simplifier les notations, nous poserons, pour tout schéma Z, et tout $z \in K^{\cdot}(Z)$:

$$ch(z) = ch(\tilde{c}(z)) \; ; \quad Todd(z) = Todd(c(z)) \quad .$$

Nous considérerons pour toute algèbre graduée A le groupe $1+\hat{A}^{+}$ comme contenu dans $\hat{A}$. Enfin, si on a un homomorphisme $f : A \longrightarrow B$, additif, et compatible aux graduations à un décalage près, on notera encore f l'homomorphisme $\hat{A} \longrightarrow \hat{B}$ qu'on en déduit.

3.4. Soit X un schéma. Pour tout $\underline{O}_X$-Module localement libre de type fini $\underline{E}$, on note $\check{E}$ la classe dans $K^{\cdot}(X)$ du dual $\check{\underline{E}}$ de $\underline{E}$. Il est clair que la fonction qui à $\underline{E}$ associe $\check{E}$ est une fonction additive sur la catégorie des $\underline{O}_X$-Modules localement libres de type fini, et par suite définit un endomorphisme de $K^{\cdot}(X)$, qu'on notera $x \rightsquigarrow \check{x}$.

Proposition 3.5. Soit X un schéma quasi-compact. Alors pour tout $x \in K^{\cdot}(X)$ et tout $i \geq 0$, on a :

$$c^{i}(\check{x}) = (-1)^{i} c^{i}(x) \quad .$$

La relation à démontrer peut encore s'écrire :

$$c_{t}(\check{x}) = c_{-t}(x) \quad ,$$

en posant : $c_{t}(x) = \sum_{i \geq 0} c^{i}(x) t^{i}$.

Par additivité, on peut donc supposer que x est la classe d'un $\underline{O}_X$-Module localement libre de type fini $\underline{E}$. De plus, quitte à remplacer X par le schéma des drapeaux de $\underline{E}$, ce qui donne une injection sur les

$GrK^{\cdot}$ (VI 5.5), on peut supposer que $\underline{E}$ est un faisceau inversible. On a alors : $\check{\underline{E}} = \underline{E}^{-1}$; donc $\check{x} = x^{-1}$.

Les $c^i(\check{x})$, $c^j(x)$ sont nuls pour $i, j \geq 2$. Il suffit donc de montrer que $c^1(x^{-1}) = -c^1(x)$. Or $c^1(x)$ est la classe dans $Gr^k K^{\cdot}(X)$ de $x-1$, et $c^1(x^{-1})$ celle de $x^{-1}-1$. L'égalité :

$$x^{-1}-1 = 1-x + (x-1)(1-x^{-1})$$

donne :

$$x^{-1}-1 \equiv 1-x \quad \text{mod. } Fil^2 K^{\cdot}(X) \quad ;$$

on en déduit le résultat.

Théorème 3.6. (Riemann-Roch). Soit $f : X \longrightarrow Y$ un morphisme projectif d'intersection complète (1.1), et dont la dimension relative virtuelle d est constante (1.9). On suppose que Y est quasi-compact, et admet un faisceau ample. Avec les notations de 3.3, on a alors pour tout $x \in K^{\cdot}(X)$ la relation :

$$ch(f_*(x)) = f_{gr}(ch(x).Todd(\check{T}_f)) \quad ,$$

$\check{T}_f$ désignant l'élément dual de la classe du complexe cotangent relatif $\underline{L}^{X/Y}$ (2.5 et 2.3).

En d'autres termes, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K^{\cdot}(X) & \xrightarrow{ch\circ\tilde{c}} & GrK^{\cdot}(X)_{\mathbb{Q}} \\ \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow{\scriptstyle x \mapsto f_{gr}(x.\ Todd(\check{T}_f))} \\ K^{\cdot}(Y) & \xrightarrow{ch\circ\tilde{c}} & GrK^{\cdot}(Y)_{\mathbb{Q}} \end{array}$$

est commutatif.