

TRAVAUX DE SHIMURA

PIERRE DELIGNE

INTRODUCTION

Soit X/Γ le quotient d'un domaine hermitien symétrique X par un groupe discret arithmétique Γ (supposé défini par des conditions de congruence, voir 1.7). D'après Baily et Borel, X/Γ est une variété algébrique complexe. Dans les articles [?] à [?], Shimura montre entre autres, pour beaucoup de ces variétés, qu'elles peuvent être définies sur des corps de nombres qu'il explicite. C'est là le sujet du présent exposé.

Pour obtenir des énoncés propres, on est contraint à utiliser un langage adélique. Celui-ci conduit à considérer, pour une "condition de congruence" donnée, un schéma sur $\mathbb{C}$, sommes disjointes d'un nombre fini de variétés du type X/Γ (voir §§ 1 et 2). Dans de nombreux cas, ce schéma pourra être défini sur un corps de nombres E , indépendant de la condition de congruence considérée. Ses composantes connexes géométriques, elles, seront définies sur des corps de classe de E . Ce phénomène, bien qu'essentiel, va être négligé dans la suite de cette introduction.

Dans un petit nombre de cas, X/Γ peut s'interpréter comme l'ensemble des classes d'isomorphie des variétés abéliennes complexes, munies de quelques structures algébriques additionnelles (polarisations, endomorphismes, structures sur les points d'ordre n). La solution, sur $\mathbb{Q}$, d'un problème de modules correspondant fournit alors un schéma M sur un corps de nombres explicite F , dont X/Γ est l'ensemble des points complexes. On appellera M un "modèle" de X/Γ . Le cas fondamental est celui des variétés abéliennes polarisées de la série principales, munies d'une structure de niveau n (1.6, 1.11, 4.16, 4.17 et 4.21).

Dans d'autres cas, X/Γ peut s'interpréter comme l'ensemble des classes d'isomorphie des variétés abéliennes complexes A munies de quelques structures comme plus haut, et de quelques classes de cohomologie entières de type (p, p)

$$a_i \in H^{2p}(A \times \cdots \times A, \mathbb{C})$$

(cf. Mumford [?]). Dans ce cas, l'idée sera de construire un modèle M de X/Γ comme sous-schéma d'un modèle M' déjà construit d'une variété X'/Γ' . En gros, on commence par construire dans M' les points de M correspondant à des variétés abéliennes de type C.M. (= maximum de multiplication complexe). On définit alors M comme l'adhérence de l'ensemble de ces

(*) Texte rédigé en mars 1971.

points. Cette construction repose sur la connaissance détaillée des variétés abéliennes de type C.M. fournie par [?].

Dans les cas considérés plus haut, on dispose de beaucoup d'information sur les corps de définition des points de M correspondant à des variétés abéliennes de type C.M. Ceci permet de donner des solutions partielles au 12^e problème de Hilbert (cf. l'introduction de [?] et 3.15, 3.16).

En regardant ce que ces cas ont en commun, on aboutit à la notion de “modèle canonique” (§ 3). On montre qu'il y a au plus un “modèle canonique” des X/Γ (5.5). Des techniques de descente permettent alors de construire quelques modèles canoniques qui semblent loin d'être des solutions de problèmes de modules ([?] [?] [?] et [?]). Pour la description de ces “modèles étranges”, on renvoie aux §§ 5 et 6.

On désignera par $\mathbb{Z}/n(1)$ tant le schéma en groupe μ_n des racines n -ièmes de l'unité que le groupe des racines n -ièmes de l'unité dans un corps algébriquement clos fixé $\bar{k}$. Pour $\bar{k} = \mathbb{C}$, l'exponentielle permet d'identifier $\mathbb{Z}/n(1)$ et $\mathbb{Z}/n$. Les $\mathbb{Z}/n(1)$ forment un système projectif : les applications de transition sont les $\varphi_{n,m} : x \mapsto x^{n/m}$. On pose

$$\hat{\mathbb{Z}} = \varprojlim \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \prod_p \mathbb{Z}_p, \quad \hat{\mathbb{Z}}(1) = \varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}(1),$$

$$\mathbb{A}^f = \mathbb{Q} \otimes \hat{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} \prod'_p \mathbb{Q}_p \quad (\text{produit restreint}), \quad \mathbb{A}^f(1) = \mathbb{Q} \otimes \hat{\mathbb{Z}}(1) = \mathbb{A}^f \otimes_{\hat{\mathbb{Z}}} \hat{\mathbb{Z}}(1)$$

et on désigne par $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de $\mathbb{Q}$.

On utilisera les notations suivantes :

$\pi_0(X)$ (pour X un espace topologique) : l'ensemble des composantes connexes de X . Dans la suite, $\pi_0(X)$, muni de la topologie quotient de celle de X , sera discret ou compact totalement discontinu.

G° : composante connexe de l'origine d'un groupe topologique G (ou d'un espace topologique pointé).

$G(K)$, G_K , $G \otimes_F K$: pour G un schéma sur F (par exemple un groupe algébrique sur F) et K une F -algèbre, on désigne par $G(K)$ l'ensemble des points de G à valeurs dans K et par G_K ou par $G \otimes_F K$ le schéma sur K déduit de G par extension des scalaires.

E^* : pour E une algèbre de rang fini sur un corps F , E^* désigne le groupe algébrique sur F des éléments inversibles de E . Pour E un corps de nombres et $F = \mathbb{Q}$, $E^*(\mathbb{A})/E^*(\mathbb{Q})$ est le groupe des classes d'idèles de E .

On dira qu'un groupe algébrique G sur $\mathbb{Q}$ vérifie le principe de Hasse si

$$H^1(\mathbb{Q}, G) \stackrel{\text{dfn}}{=} H^1(\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}), G(\overline{\mathbb{Q}}))$$

s'injecte dans le produit étendu à toutes les places de $\mathbb{Q}$ des $H^1(\mathbb{Q}_v, G_{\overline{\mathbb{Q}}_v})$. On utilisera les théorèmes suivants.

(0.1) **Principe de Hasse** : un groupe semi-simple simplement connexe, sans facteur de type E_8 , vérifie le principe de Hasse [?].

- (0.2) Un groupe semi-simple simplement connexe G sur un corps local non archimédien K vérifie $H^1(K, G) = 0$ (une démonstration indépendante de la classification est annoncée dans Bruhat–Tits [?]).
- (0.3) **Théorème d’approximation fort** : soit G un groupe semi-simple simplement connexe sur un corps global K . Si G est K -simple, et si v est une place de K telle que $G(K_v)$ soit non compact, alors $G(K_v) \cdot G(K)$ est dense dans $G(\mathbb{A})$ (pour une démonstration indépendante de la classification, voir Platonov [?]).
- (0.4) **Théorème d’approximation réel** : soit G un groupe algébrique connexe (linéaire) sur $\mathbb{R}$. Alors, $G(\mathbb{Q})$ est dense dans $G(\mathbb{R})$ (pour le prouver, on se ramène aisément au cas des tores, qui est un corollaire de ([?] 5.1)).

1. LE LANGAGE ADÉLIQUE

1.1. Soit G un groupe réductif sur $\mathbb{Q}$. On désigne par G' le groupe dérivé de la composante neutre de G , par C le centre de cette composante neutre, et on pose $T = G/G'$. On dispose de suites exactes de groupes algébriques

$$(1) \quad 0 \longrightarrow C \longrightarrow G \longrightarrow G/C \longrightarrow 0$$

$$(2) \quad 0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow T \longrightarrow 0$$

et les applications canoniques de C dans T et de G' dans G/C sont des isogénies de noyau $C \cap G'$.

1.2. Soit S le groupe algébrique réel des éléments inversibles de la $\mathbb{R}$ -algèbre $\mathbb{C}$. C’est encore le groupe algébrique réel déduit par restriction des scalaires à la Weil, de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}$, du groupe multiplicatif $\mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}$. On a $S(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$, et $S_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}} \times \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}$. Le groupe $\text{Hom}(S_{\mathbb{C}}, \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}})$ des caractères de $S_{\mathbb{C}}$ a pour base les caractères z et $\bar{z}$ tels que le composé

$$\mathbb{C}^* \xrightarrow{s} S(\mathbb{C}) \xrightarrow{z^p \bar{z}^q} \mathbb{C}^*$$

soit respectivement l’identité et la conjugaison complexe.

Soit V un espace vectoriel réel. Pour toute représentation $h : S \rightarrow \text{GL}(V)$, on désigne par V^{pq} le sous-espace de $V_{\mathbb{C}}$ sur lequel S agit par le caractère $z^p \bar{z}^q$. Les V^{pq} forment une bigraduation de $V_{\mathbb{C}}$, et la construction $h \mapsto (V^{pq})$ identifie les représentations de S dans $\text{GL}(V)$ aux bigraduations de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$, i.e. aux bigraduations de $V_{\mathbb{C}}$ telles que $V^{pq} = \overline{V^{qp}}$. On désignera par $F(h)$ la filtration de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$:

$$(3) \quad F(h)^p = \bigoplus_{p' \geq p} V^{p'q'}.$$

1.3. On désigne par $r : \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \rightarrow S_{\mathbb{C}}$ le $\mathbb{C}$ -homomorphisme tel que $(z^p \bar{z}^q) \circ r = (x \mapsto x^p)$, et par $w : \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \rightarrow S$ le $\mathbb{R}$ -homomorphisme tel que $(z^p \bar{z}^q) \circ w = (x \mapsto x^{p+q})$. Pour $h : S \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ une représentation et $v^{pq} \in V^{pq}$, on a

$$h_r(x) \cdot v^{pq} = x^p \cdot v^{pq} \quad \text{et} \quad h_w(x) \cdot v^{pq} = x^{p+q} \cdot v^{pq}.$$

Le composé $w : \mathbb{R}^* = \mathbb{G}_m(\mathbb{R}) \xrightarrow{w} S(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$ est l'inclusion évidente.

1.4. Soit $h : S \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ un homomorphisme. Pour toute représentation $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ de G sur un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel V , ρh définit une bigraduation de $V_{\mathbb{C}}$ (1.2). Si V est fidèle, et si G est le sous-groupe de $\mathrm{GL}(V)$ laissant fixes quelques tenseurs s_i , la construction $h \mapsto (V^{pq})$ identifie les homomorphismes h aux bigraduations de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$ telles que les s_i soient de type $(0, 0)$.

1.5. Soit $h_0 : S \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ un homomorphisme vérifiant les conditions suivantes (cf. [?] et [?]; (1.5.2) est motivé par le théorème de transversalité de Griffiths).

(1.5.1) L'image de $h_0 \circ w : \mathbb{G}_m \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ est centrale. On appellera $h_0 \circ w$ le *poids* de h_0 ;

(1.5.2) la bigraduation de Hodge du complexifié $\mathrm{Lie}(G)_{\mathbb{C}}$ de l'espace de la représentation adjointe (1.2) est de type $(-1, 1) + (0, 0) + (1, -1)$;

(1.5.3) l'automorphisme $\mathrm{ad} h_0(i)$ de G , une involution d'après (1.5.1), induit une involution de Cartan de G' .

Soit K_{∞} le centralisateur de h_0 dans $G(\mathbb{R})$; il contient le centre de $G(\mathbb{R})$, et $K_{\infty} \cap G'(\mathbb{R})^{\circ}$ est un sous-groupe compact maximal de $G'(\mathbb{R})^{\circ}$, identique au centralisateur dans $G'(\mathbb{R})^{\circ}$ de $h_0(i)$. L'espace $K_{\infty} \backslash G(\mathbb{R})$ s'identifie à l'ensemble X des conjugués de h_0 par un élément de $G(\mathbb{R})$. On vérifie qu'il possède une et une seule structure complexe telle que, pour toute représentation $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$, la filtration $F(\rho h)$ de $V_{\mathbb{C}}$ dépende holomorphiquement de $h \in X$.

Cette structure est invariante à droite sous $G(\mathbb{R})$, et les composantes connexes de X sont des domaines hermitien symétriques. On désignera par X° la composante connexe de h_0 .

1.6. Exemple I. Soit $\mathrm{Gp}(V)$ le groupe des similitudes symplectiques d'un vectoriel réel V muni d'une forme alternée non dégénérée ψ . Il existe alors une et une seule classe de conjugaison X d'homomorphismes $h : S \rightarrow \mathrm{Gp}(V)$ vérifiant les conditions (1.5.1) et de poids -1 , i.e. de poids $h \circ w : \mathbb{G}_m \rightarrow \mathrm{Gp}(V) : x \mapsto$ homothétie de rapport x^{-1} . L'espace X s'identifie à la somme de deux demi-espaces de Siegel.

La construction 1.5 identifie les $h \in X$ aux décompositions

$$V_{\mathbb{C}} = V^{-1,0} \oplus V^{0,-1}$$

de $V_{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, telles que $\overline{V^{pq}} = V^{qp}$, que $V^{-1,0}$ soit totalement isotrope pour $\psi_{\mathbb{C}}$ et que, si C désigne l'endomorphisme de $V_{\mathbb{C}}$ qui induit la multiplication par i^{p-q} sur V^{pq} , la forme symétrique $\psi(x, Cy) = \psi(x, h(i)y)$ sur V soit définie (> 0 ou < 0).

1.7. Soit Γ un sous-groupe arithmétique de $G(\mathbb{Q})$. On s'intéresse au cas où Γ est défini par des conditions de congruence. Si $V_{\mathbb{Z}}$ est un réseau entier dans une représentation fidèle V de G , ceci signifie qu'il existe n tel que Γ contienne avec un indice fini, le groupe $\Gamma_n \subset G(\mathbb{Q})$ des $\gamma \in G(\mathbb{Q})$ tels que $\gamma \in G(\mathbb{R})^\circ$, que $\gamma V_{\mathbb{Z}} = V_{\mathbb{Z}}$ et que $\gamma \equiv \text{Id} \pmod{n}$. D'après Baily et Borel, le quotient ${}_{\Gamma}X^\circ$ est muni d'une structure naturelle de schéma quasi-projectif sur $\mathbb{C}$. Soit K_n le sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$ formé des $k = (k_p)$ tels que $k_p \equiv 1 \pmod{n}$ pour $p \nmid n$, $k_p V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_p = V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_p$ et que $k_p \in G(\mathbb{Q}_p)^\circ$. Le groupe Γ_n est alors l'intersection, dans $G(\mathbb{Q})$, de $G(\mathbb{Q})$ et de $G(\mathbb{R})^\circ \times K_n$.

1.8. Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$. L'espace

$${}_K X^\circ \stackrel{\text{dfn}}{=} K \backslash X \times G(\mathbb{A}^f)/G(\mathbb{Q}) = K \backslash X \times (K \backslash G(\mathbb{A}^f))/G(\mathbb{Q})$$

est alors somme d'une famille finie d'espaces du type considéré en 1.7. C'est donc un schéma quasi-projectif sur $\mathbb{C}$. On le notera ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ (voire simplement ${}_K M_{\mathbb{C}}(G)$ ou ${}_K M_{\mathbb{C}}$).

Pour K de plus en plus petit, ces schémas forment un système projectif de schémas à morphismes de transition finis et surjectifs

$$(4) \quad {}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_0) \quad (K \rightarrow 0).$$

On désignera par $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ (voire simplement $M_{\mathbb{C}}(G)$, ou $M_{\mathbb{C}}$) le schéma quasi-compact et séparé (non de type fini pour $G \neq \{1\}$) limite projective de (1.8.1)

$$(5) \quad M_{\mathbb{C}}(G, h_0) = \varprojlim_K {}_K X \times_K G(\mathbb{A}^f)/G(\mathbb{Q}).$$

On doit le considérer comme un avatar du système projectif (1.8.1). Le groupe $G(\mathbb{A}^f)$ agit sur $M_{\mathbb{C}}$, ou, si l'on préfère, sur le pro-objet défini par le système projectif (1.8.1), mais bien sûr pas sur les ${}_K M_{\mathbb{C}}$ individuels (cf. 3.2). On a

$$(6) \quad M_{\mathbb{C}} = \varprojlim_K {}_K M_{\mathbb{C}}$$

de sorte que $G(\mathbb{A}^f)$ agit continûment sur $M_{\mathbb{C}}$.

La construction suivante sera utile pour interpréter les ${}_K M_{\mathbb{C}}$ comme des schémas de modules.

1.9. Soient H un groupe algébrique sur $\mathbb{Q}$ et V une représentation fidèle de H . On définit une H -structure $\mathcal{T}$ sur un vectoriel W comme étant un isomorphisme de V avec W , donné modulo $H(\mathbb{Q})$: $\mathcal{T} \subset \text{Isom}(V, W)/H(\mathbb{Q})$. Si $H(\mathbb{Q})$ est le groupe des automorphismes d'une structure s d'espèce Σ sur V , alors une H -structure sur W s'identifie à une structure t de même espèce sur W , isomorphe à s (avec $\mathcal{T} = \text{Isom}((V, s), (W, t))$). Soit W muni d'une H -structure $\mathcal{T}$. Le groupe algébrique $\bigcap_{\varphi \in \mathcal{T}} \varphi H \varphi^{-1} \subset \text{GL}(W)$ ne dépend que de $\mathcal{T}$. On le note $H_{\mathcal{T}}$. Soit A une $\mathbb{Q}$ -algèbre. L'ensemble $\text{Isom}_{\mathcal{T}}(W \otimes A, V \otimes A)$ des isomorphismes permis de $W \otimes A$ avec $V \otimes A$ est l'ensemble des isomorphismes k tels que, pour $\varphi \in \mathcal{T}$, on ait $k\varphi \in H(A)$.

1.10. Soient (G, h_0) comme en 1.5, V une représentation linéaire fidèle de G , K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$, et considérons les objets du type suivant : H consiste en

- (a) un espace vectoriel $H_{\mathbb{Q}}$ sur $\mathbb{Q}$, muni d'une G -structure $\mathcal{T}$ (1.9);
- (b) un homomorphisme $h : S \rightarrow H_{\mathbb{R}}$ tel que, pour $\varphi \in \mathcal{T}$, $\varphi^{-1}h\varphi : S \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ soit conjugué à h_0 ;
- (c) une classe $\alpha \in K \backslash \text{Isom}_{\mathcal{T}}(H \otimes \mathbb{A}^f, V \otimes \mathbb{A}^f) / H(\mathbb{Q})$.

1.11. Exemple I (suite de 1.6). Soient V un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel muni d'une forme alternée non dégénérée ψ , G le groupe des similitudes symplectiques de V , $V_{\mathbb{Z}}$ un réseau entier sur lequel ψ soit à valeurs entières de discriminant 1 en 1.6. Prenons $K = \prod_p G(V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_p)$.

Une donnée (a) s'interprète comme un vectoriel H de même dimension que V , muni d'une forme alternée $\tilde{\psi}$ donnée à un facteur rationnel près. Une donnée (b) s'interprète comme une bigraduation de Hodge de $H_{\mathbb{C}}$ de type 1.6. Une donnée (c) s'interprète comme un réseau entier $H_{\mathbb{Z}}$ de H , sur lequel un multiple rationnel de $\tilde{\psi}$ est à valeurs entières et de discriminant 1 : α est l'ensemble des k tels que, pour tout p , $V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_p = k\varphi(H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_p)$. On peut normaliser $\tilde{\psi}$ par les conditions d'être à valeurs entières de discriminant 1 sur $H_{\mathbb{Z}}$, et de vérifier $\tilde{\psi}(x, Cx) > 0$ (cf. 1.6).

Soient n un entier, et K_n le sous-groupe de K formé des k tels que $k \equiv 1 \pmod{n}$. Pour K_n , une donnée (c) s'interprète comme $H_{\mathbb{Z}}$ comme plus haut, plus une similitude symplectique $H_{\mathbb{Z}}/nH_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{Z}}/nV_{\mathbb{Z}}$.

1.12. Sous les hypothèses de 1.10, les points de ${}_KM_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ sont en correspondance biunivoque avec les classes d'isomorphie d'objets H du type $H = (H_{\mathbb{Q}}, \mathcal{T}, h, \alpha)$; à H muni de $t \in \mathcal{T}$, on associe le morphisme $t^{-1}ht : S \rightarrow G_{\mathbb{R}}$, un élément de $X \xrightarrow{\sim} K_{\infty} \backslash G(\mathbb{R})$, et αt dans $K \backslash G(\mathbb{A}^f)$, soit au total un élément de ${}_KX \times G(\mathbb{A}^f)$; à H seul, on associe seulement un élément de ${}_KM_{\mathbb{C}}(G, h_0) = K \backslash X \times G(\mathbb{A}^f) / G(\mathbb{Q}) = K \backslash X \times_K G(\mathbb{A}^f) / G(\mathbb{Q})$, qui détermine univoquement la classe d'isomorphisme de H .

Dans certains cas (voir 4.11), se donner un objet H comme plus haut revient à se donner une variété abélienne, munie de quelques structures supplémentaires. On obtient alors une interprétation de ${}_KM_{\mathbb{C}}(G)$ (et de $M_{\mathbb{C}}(G)$) comme étant le schéma de modules (grossier) de ce type de variétés abéliennes.

1.13. Soient G_i ($i = 1, 2$) deux groupes réductifs, $h_i : S \rightarrow G_{i\mathbb{R}}$ des homomorphismes vérifiant les conditions de 1.5 et X_i l'ensemble des conjugués de h_i par un élément de $G_i(\mathbb{R})$. Soient $G = G_1 \times G_2$, $h : S \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ le morphisme (h_1, h_2) et $X = X_1 \times X_2$ l'ensemble des conjugués de h . On définit de façon évidente un isomorphisme

$$(7) \quad M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1) \times M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2) \xrightarrow{\sim} M_{\mathbb{C}}(G, h)$$

Pour K_i compact ouvert dans $G_i(\mathbb{A}^f)$ et $K = K_1 \times K_2$ on a de même

$$(8) \quad {}_{K_1}M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1) \times {}_{K_2}M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2) \xrightarrow{\sim} {}_KM_{\mathbb{C}}(G, h)$$

1.14. Soit G_1, G_2, h_1, h_2 comme en 1.13. Un homomorphisme $u : G_1 \rightarrow G_2$ tel que $uX_1 \subset X_2$ définit

$$(9) \quad u : M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1) \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2)$$

Pour K_i compact ouvert dans $G_i(\mathbb{A}^f)$, avec $u(K_1) \subset K_2$, il définit

$$(10) \quad u(K_1, K_2) : {}_{K_1}M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1) \longrightarrow {}_{K_2}M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2)$$

Proposition 1.1. *Avec les notations de 1.14, supposons que G_1 soit un sous-groupe de G_2 . Alors, pour tout sous-groupe compact ouvert K_1 de $G_1(\mathbb{A}^f)$, il existe un sous-groupe compact ouvert $K_2 \supset K_1$ de $G_2(\mathbb{A}^f)$ tel que $u(K_1, K_2)$ identifie ${}_{K_1}M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1)$ à un sous-schéma fermé de ${}_{K_2}M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2)$.*

Si les K_i sont assez petits pour que l'application de $X_i \times (K_i \backslash G_i(\mathbb{A}^f))$ dans ${}_{K_i}M_{\mathbb{C}}(G_i, h_i)$ soit étale, alors l'application $u(K_1, K_2)$ est finie et non ramifiée. Il suffit de traiter ce cas, et de montrer que $u(K_1, K_2)$ est injectif pour $K_2 \supset K_1$ assez petit. Le graphe de la relation d'équivalence $u(K_1, K_2)(x) = u(K_1, K_2)(y)$ est un sous-schéma fermé de $({}_{K_1}M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1))^2$, qui décroît avec K_2 , donc est stationnaire pour $K_2 \supset K_1$ assez petit. Il suffit de montrer que

$$u(K_1) : {}_{K_1}M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1) \longrightarrow \varinjlim_{K_2} {}_{K_2}M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2) \stackrel{\text{dfn}}{=} {}_{K_1}M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2)$$

est injectif. On a

$${}_{K_1}M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1) = K_1 \backslash X_1 \times {}_{K_1}G_1(\mathbb{A}^f) / G_1(\mathbb{Q}), \quad {}_{K_1}M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2) = K_1 \backslash X_2 \times {}_{K_1}G_2(\mathbb{A}^f) / G_2(\mathbb{Q})$$

de sorte qu'il suffit de prouver la

Variante 1. $u : M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1) \rightarrow M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2)$ est injectif.

Lemme 1.2. *Cette assertion se déduit aisément des deux lemmes suivants.*

Soit $U_i \subset G_i(\mathbb{Q})$ le groupe des unités du centre de G_i , et soit $\widehat{G_i(\mathbb{Q})} = \varprojlim_n G_i(\mathbb{Q}) / (U_i)^n$. Alors

$${}_{K_i}M_{\mathbb{C}}(G_i, h_i) = K_i \backslash G_i(\mathbb{A}^f) / \widehat{G_i(\mathbb{Q})}.$$

C'est un corollaire du théorème de Chevalley selon lequel les sous-groupes de congruence de U_i sont cofinaux parmi les sous-groupes d'indice fini de U_i .

Lemme 1.3. $u : G_1(\mathbb{A}^f) / \widehat{G_1(\mathbb{Q})} \longrightarrow G_2(\mathbb{A}^f) / \widehat{G_2(\mathbb{Q})}$ est injectif.

Par translation à gauche, il suffit de montrer que $u^{-1}(\{e\}) = \{e\}$: on complète le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \widehat{G_1(\mathbb{Q})} & \longrightarrow & G_1(\mathbb{A}^f) & \longrightarrow & G_1(\mathbb{A}^f) / \widehat{G_1(\mathbb{Q})} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow u & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{G_2(\mathbb{Q})} & \longrightarrow & G_2(\mathbb{A}^f) & \longrightarrow & G_2(\mathbb{A}^f) / \widehat{G_2(\mathbb{Q})} \longrightarrow 0 \end{array}$$

où $(G_2/G_1)(\mathbb{Q})^\wedge = \varprojlim_n (G_2/G_1)(\mathbb{Q}) / (U_2/U_1)^n$.

2. COMPOSANTES CONNEXES

2.1. Soit G un groupe réductif connexe sur $\mathbb{Q}$. On reprend les notations 1.1 et on suppose que G' n'admet pas de sous-groupe invariant non trivial H (défini sur $\mathbb{Q}$) et tel que $H(\mathbb{R})$ soit compact. Cette hypothèse n'exclut pas que $G(\mathbb{R})$ ait des facteurs compacts. On désigne par $\tilde{G}'$ le revêtement simplement connexe du groupe dérivé G' .

Proposition 2.1. (i) *Le groupe $G(\mathbb{A}^f)$ agit transitivement sur l'ensemble $\pi_0(G()/G(\mathbb{Q}))$ des composantes connexes de $G()/G(\mathbb{Q})$.*

(ii) *Le groupe $\tilde{G}'()$ agit trivialement sur $\pi_0(G()/G(\mathbb{Q}))$.*

(iii) *Le quotient de $G()$ par l'image de $\tilde{G}'()$ est un groupe commutatif.*

L'assertion (i) résulte de (0.4) : $G() = G(\mathbb{A}^f) \cdot G(\mathbb{R}) \cdot G(\mathbb{Q})$. Puisque $\tilde{G}'$ est simplement connexe, le groupe $\tilde{G}'(\mathbb{R})$ est connexe. D'après (0.3), $G(\mathbb{R}) \cdot \tilde{G}'(\mathbb{Q})$ est dense dans $\tilde{G}'()$, de sorte que $\tilde{G}'()/\tilde{G}'(\mathbb{Q})$ est connexe. Pour $x \in G()$, on a $\tilde{G}'() \cdot x = x \cdot \tilde{G}'()$, de sorte que l'image de $\tilde{G}'() \cdot x$ dans $G()/G(\mathbb{Q})$ est une image de $\tilde{G}'()/\tilde{G}'(\mathbb{Q})$: elle est connexe, et (ii) en résulte.

Soit Z le centre de $\tilde{G}'$. L'assertion (iii) résulte de ce que l'application "commutateur" $xyx^{-1}y^{-1} : G \times G \rightarrow G$ admet une factorisation

$$G \times G \rightarrow G/C \times G/C \xleftarrow{\sim} \tilde{G}'/Z \times \tilde{G}'/Z \rightarrow \tilde{G}' \rightarrow G$$

Définition 2.2. On désigne par $\mathcal{A}(G)$ le quotient (commutatif) de $G()$ (ou $G(\mathbb{A}^f)$) qui agit fidèlement sur $\pi_0(G()/G(\mathbb{Q}))$ en muni de sa structure de groupe commutatif "évidente".

Rappelons le théorème suivant

Théorème 2.3. *Sous les hypothèses de 2.1, l'homomorphisme canonique*

$$(11) \quad \mathcal{A}(G) = \pi_0(G()/G(\mathbb{Q})) \rightarrow \pi_0(T()/T(\mathbb{Q}))$$

est bijectif.

Pour prouver la surjectivité de (2.4.1), il suffit d'après 2.2 (i) appliqué à T de montrer que $G(\mathbb{A}^f)$ s'envoie sur $\pi_0(T(\mathbb{A}^f))$. Le noyau G' de $\nu : G \rightarrow T$ étant connexe, on sait que, pour presque tout p , $\nu(G(\mathbb{Z}_p)) = T(\mathbb{Z}_p)$ (cette formule a un sens pour presque tout p , et est un corollaire du théorème de Lang appliqué à G' réduit modulo p). Il suffit donc de prouver que pour tout p , $\nu(G(\mathbb{Q}_p)) = T(\mathbb{Q}_p)$, ce qui résulte de (0.2) appliqué à G' .

Le théorème 2.4 équivaut à l'énoncé plus concret

Variante 2. *Pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, l'application*

$$(12) \quad \nu : \pi_0(K \backslash G()/G(\mathbb{Q})) \rightarrow \pi_0(\nu(K) \backslash T()/T(\mathbb{Q}))$$

est bijective.

En effet, $\pi_0(G()/G(\mathbb{Q})) = \varprojlim_K \pi_0(K \backslash G()/G(\mathbb{Q}))$, et de même pour T . Par ailleurs, $\pi_0(K \backslash G()/G(\mathbb{Q})) = G(\mathbb{R})^\circ \times K \backslash G()/G(\mathbb{Q})$.

Montrons que si $x, y \in G()$ ont même image dans le membre de droite de (2.5.1), alors ils ont même image dans celui de gauche. Une translation à gauche par y^{-1} , qui remplace K par $y^{-1}Ky$, permet de supposer que $y = e$. Modifiant x par un élément de $G(\mathbb{R})^\circ \times K$, on peut supposer que $\nu(x) = \tau$ avec $\tau \in T(\mathbb{Q})$. D'après le principe de Hasse (0.1) pour G' , l'équation $\nu(y) = \tau$ a une solution dans $G(\mathbb{Q})$. Corrigeant x par y , on peut supposer que $x \in G(\mathbb{A}^f)$. D'après 2.2 (ii), l'image de x dans $G()/G(\mathbb{Q})$ est dans la composante neutre, et a fortiori x et y ont même image dans le membre de gauche de 2.5.1.

Cette démonstration semble utiliser, via (0.1), que G' soit sans facteur E_8 . En fait, la classe dans $H^1(\mathbb{Q}, G')$ qui obstrue l'équation $\nu(y) = \tau$ vient du centre de G' et les facteurs E_8 , étant adjoints, comptent pour du beurre.

Proposition 2.4. *On a $K_\infty = C(\mathbb{R}) \cdot (K_\infty \cap \tilde{G}'(\mathbb{R})^\circ)$. Le groupe $K_\infty \cap \tilde{G}'(\mathbb{R})^\circ$ est connexe, et $\pi_0(K_\infty) \xrightarrow{\sim} \text{Im}(\pi_0(C(\mathbb{R})) \rightarrow \pi_0(C(\mathbb{R})))$.*

Soit $h' : S \rightarrow G'_\mathbb{R} \rightarrow (G/C)_\mathbb{R}$. Le centralisateur de h' dans $(G/C)(\mathbb{R})$ est connexe, car c'est un groupe compact dont le complexifié est connexe (comme centralisateur d'un tore). En particulier, l'image de K_∞ dans $G/C(\mathbb{R})$ tombe dans la composante neutre, image de $\tilde{G}'(\mathbb{R})^\circ$, et $K_\infty = C(\mathbb{R}) \cdot (K_\infty \cap \tilde{G}'(\mathbb{R})^\circ)$. Le groupe $K_\infty \cap \tilde{G}'(\mathbb{R})^\circ$ est connexe en tant que sous-groupe compact maximal d'un groupe connexe. 2.6 en résulte.

2.2. L'image de $\pi_0(K_\infty)$ dans $\pi_0(G()/G(\mathbb{Q}))$ ne dépend que de la classe de conjugaison de h_0 , et $\pi_0(M_\mathbb{C}(G, h)) = \varprojlim_K \pi_0(KX \times_K G()/G(\mathbb{Q}))$ s'identifie à $\mathcal{A}(G)/\pi_0(K_\infty)$.

En particulier, si $\tilde{G}'$ est simplement connexe, on a

$$(13) \quad \pi_0(M_\mathbb{C}(G, h)) \xrightarrow{\sim} \pi_0(T()/T(\mathbb{Q}))/\pi_0(K_\infty).$$

Plus concrètement, pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, $\pi_0({}_K M_\mathbb{C}(G, h))$ est alors un espace principal homogène sous $\nu(K \times K) \backslash T()/T(\mathbb{Q})$.

3. MODÈLES

3.1. Soient G un groupe réductif sur $\mathbb{Q}$, $h : S \rightarrow G_\mathbb{R}$ vérifiant les conditions de 1.5 et E un corps muni d'un plongement complexe $\rho : E \hookrightarrow \mathbb{C}$. On pose $M_\mathbb{C}(G) = M_\mathbb{C}(G, h)$.

Définition 3.1. Un *modèle* sur E de $M_\mathbb{C}(G)$ consiste en

- (a) un schéma M sur E , muni d'une action continue de $G(\mathbb{A}^f)$;
- (b) un isomorphisme m de $M \otimes_{E, \rho} \mathbb{C}$ avec $M_\mathbb{C}(G)$, compatible à l'action de $G(\mathbb{A}^f)$.

Soit F une extension finie de E , munie d'un plongement complexe qui prolonge celui de E . Si $M_E(G, h)$ est un modèle de $M_\mathbb{C}(G, h)$ sur E , on désigne par $M_F(G, h)$ le modèle $M_E(G, h) \otimes_E F$ de $M_\mathbb{C}(G, h)$ sur F .

3.2. Se donner un schéma M sur E , muni d'une action continue de $G(\mathbb{A}^f)$, revient à se donner pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, un schéma ${}_KM$ sur E ;

(a) pour K et L deux sous-groupes compacts ouverts de $G(\mathbb{A}^f)$ et pour $x \in G(\mathbb{A}^f)$ tel que $xKx^{-1} \subset L$, un homomorphisme $j_{L,K}(x) : {}_KM \rightarrow {}_LM$, ces homomorphismes vérifiant

(α) $j_{M,L}(y) \circ j_{L,K}(x) = j_{M,K}(yx)$.

(β) $j_{K,K}(x) = \text{Id}$ si $x \in K$.

(γ) Pour K distingué dans L , j définit une action de L/K sur ${}_KM$, et $j_{L,K}(e)$ définit $(L/K) \backslash {}_KM \xrightarrow{\sim} {}_LM$.

On aura

$$(14) \quad M = \varprojlim_K {}_KM$$

et

$$(15) \quad {}_KM = K \backslash M.$$

3.3. Soit $M(G)$ un module sur E de $M_{\mathbb{C}}(G)$. Pour K compact ouvert dans $G(\mathbb{A}^f)$, on pose ${}_KM(G) = K \backslash M(G)$. Les ${}_KM(G)$ sont des schémas quasi-projectifs sur E , non nécessairement géométriquement connexes. L'isomorphisme structural m induit des isomorphismes

$$(16) \quad m : {}_KM(G) \otimes_E \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} {}_KM_{\mathbb{C}}(G).$$

3.4. Supposons que G vérifie les hypothèses de 2.1, et soit (M, m) un modèle de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur E . Soit $\overline{E}$ la clôture algébrique de E dans $\mathbb{C}$. Puisque M est défini sur E , le groupe de Galois $\text{Gal}(\overline{E}/E)$ agit sur l'ensemble profini $\pi_0(M \otimes \overline{E}) = \varprojlim_K \pi_0({}_KM \otimes \overline{E}) \xrightarrow{\sim} \pi_0(M_{\mathbb{C}}(G, h))$. Le groupe $G(\mathbb{A}^f)$ agit sur $\pi_0(M \otimes \overline{E})$ via son quotient $\mathcal{A}(G)/\pi_0(K_{\infty})$, et $\pi_0(M \otimes \overline{E})$ est un espace principal homogène sous le groupe commutatif $\mathcal{A}(G)/\pi_0(K_{\infty})$ (2.6).

L'action de $\text{Gal}(\overline{E}/E)$ commute à celle de $G(\mathbb{A}^f)$, donc à celle de $\mathcal{A}(G)/\pi_0(K_{\infty})$. L'action d'un élément σ de $\text{Gal}(\overline{E}/E)$ ne peut donc être que la translation définie par un élément $\psi(\sigma)$ de $\mathcal{A}(G)/\pi_0(K_{\infty})$, et ψ est un homomorphisme

$$(17) \quad \psi_M : \text{Gal}(\overline{E}/E) \longrightarrow \mathcal{A}(G)/\pi_0(K_{\infty})$$

Supposons que E soit un corps de nombres. La théorie du corps de classe identifie alors le plus grand quotient abélien de $\text{Gal}(\overline{E}/E)$ à $\varprojlim (E^*(\cdot)/E^*(\mathbb{Q}))$, et (3.4.1) s'identifie à

$$(18) \quad k_M : \text{Gal}(\overline{E}/E)^{\text{ab}} \xrightarrow{\sim} \pi_0(E^*(\cdot)/E^*(\mathbb{Q})) \longrightarrow \mathcal{A}(G)/\pi_0(K_{\infty})$$

Dans le cas particulier où $\tilde{G}'$ est simplement connexe, l'homomorphisme (3.4.2) s'identifie (2.7.1) à

$$(19) \quad k_M : \pi_0(E^*(\cdot)/E^*(\mathbb{Q})) \longrightarrow \pi_0(T(\cdot)/T(\mathbb{Q}))/\pi_0(K_{\infty})$$

Définition 3.2. Les homomorphismes (3.4.1) (3.4.2) (3.4.3) s'appellent la *loi de réciprocité* du module M . Si $\tilde{G}'$ est simplement connexe, et que k_M provient d'un homomorphisme de groupes algébriques sur $\mathbb{Q}$ de E^* dans T , ce dernier s'appellera encore la “loi de réciprocité” de M .

3.5. Il existe une règle, applicable à chacun des modèles construits par Shimura, pour déterminer E et la loi de réciprocité k_M à partir de G et h_0 . Le corps E , pour G quelconque, et k_M , pour $\tilde{G}'$ simplement connexe, se décrivent comme suit.

3.6. L'homomorphisme composé h_r (1.3)

$$h_r : \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \xrightarrow{r} S_{\mathbb{C}} \xrightarrow{h} G_{\mathbb{C}}$$

est un homomorphisme sur $\mathbb{C}$ entre groupes algébriques définis sur $\mathbb{Q}$. Le sous-corps E de $\mathbb{C}$ est le corps de définition $E(G, h_0)$ de la classe de conjugaison de cet homomorphisme.

Pour G semi-simple adjoint, le corps $E(G, h_0)$ peut se décrire comme suit. Soient Δ le diagramme de Dynkin de $G_{\mathbb{C}}$ et $|\Delta|$ l'ensemble des sommets de Δ . Le groupe de Galois $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ agit sur Δ . Soit H un tore maximal de $G_{\mathbb{C}}$, muni d'un système de racines simples $(\alpha_i)_{i \in |\Delta|}$. Les α_i identifient H à $\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^{|\Delta|}$. Pour tout homomorphisme $u : \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \rightarrow G_{\mathbb{C}}$, il existe alors un unique homomorphisme $u' : \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \rightarrow H = \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^{|\Delta|} : x \mapsto (x^{n_i})_{i \in |\Delta|}$ avec $n_i \geq 0$, qui soit conjugué à u . La construction $u \mapsto \eta(u) = (n_i)_{i \in |\Delta|}$ identifie l'ensemble des classes de conjugaisons d'applications de $\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}$ dans $G_{\mathbb{C}}$ avec l'ensemble des fonctions de $|\Delta|$ dans $\mathbb{N}$. On en déduit que le corps $E(G, h_0)$ est défini par le sous-groupe de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ qui stabilise $\eta(h_r)$.

Proposition 3.3. Soit $G^{\text{ad}} = \prod_{i=1}^g G_i$ la décomposition du groupe adjoint en facteurs $\mathbb{Q}$ -simples, et soit h_i le composé $h_i : S \xrightarrow{h_0} G_{\mathbb{R}}^{\text{ad}} \rightarrow G_{i\mathbb{R}}$.

- (i) Le sous-corps $E(G, h_0)$ de $\mathbb{C}$ est le composé des sous-corps $E(T, \nu \circ h_0)$ et $E(G_i, h_i)$ ($1 \leq i \leq g$) de $\mathbb{C}$.
- (ii) Si l'involution d'opposition du diagramme de Dynkin de G_i respecte $\eta(h_{ir})$, alors $E(G_i, h_i)$ est totalement réel. Sinon, $E(G_i, h_i)$ est une extension quadratique totalement imaginaire d'un corps de nombres totalement réel.

L'assertion (i) est facile à vérifier, et il suffit de prouver (ii) pour G $\mathbb{Q}$ -simple et adjoint. Soit Δ son diagramme de Dynkin. Il résulte des hypothèses 1.5 que $G_{\mathbb{R}}$ admet un tore maximal compact ; ceci implique que la conjugaison complexe agit sur Δ par l'involution d'opposition σ . Celle-ci est dans le centre du groupe des automorphismes de Δ .

Soit E' l'extension galoisienne de $\mathbb{Q}$ définie par le sous-groupe de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ qui agit trivialement sur Δ . Alors, l'image de la conjugaison complexe est centrale dans $\text{Gal}(E'/\mathbb{Q})$; il en résulte que E' est totalement réel ou extension quadratique totalement imaginaire d'un corps totalement réel. Enfin,

σ est l'identité sur $E(G, h_0) \subset E'$ si et seulement si σ respecte $\eta(h_r)$, d'où l'assertion.

3.7. On reprend les notations de 3.6. On suppose que $\tilde{G}'$ est simplement connexe, que E contient $E(G, h_0)$, et que le plongement complexe de E induit celui de $E(G, h_0)$. Le morphisme composé

$$r^*(h_0) : \mathbb{G}_{m, \mathbb{C}} \xrightarrow{r} S_{\mathbb{C}} \xrightarrow{h_0} G_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\nu} T_{\mathbb{C}}$$

ne dépend que de la classe de conjugaison de h_0^r . Il est donc défini sur E , i.e. provient par extension des scalaires d'un homomorphisme de groupes algébriques sur E de $\mathbb{G}_{m, E}$ dans T_E . Appliquons la restriction des scalaires à la Weil, et soit

$$r'(h_0) : E^* \longrightarrow T$$

le composé $\text{Res}_{E/\mathbb{Q}}(r^*(h_0)) : E^* \rightarrow \text{Res}_{E/\mathbb{Q}}(T_E) \rightarrow T$.

La loi de réciprocité de M est l'inverse $r(G, h_0)$ de $r'(h_0)$:

$$(20) \quad r(G, h_0) = r'(h_0)^{-1} : E^* \longrightarrow T.$$

3.8. Exemple II. Soient H un tore et $h : S \rightarrow H_{\mathbb{R}}$. Les conditions de 1.5 sont automatiquement vérifiées. Les ${}_K M_{\mathbb{C}}(H, h)$ sont des ensembles finis. Un schéma réduit fini sur le corps $E(H, h)$ (3.7) s'identifie à un ensemble galoisien. On en déduit qu'il existe à isomorphisme unique près un et un seul module de $M_{\mathbb{C}}(H, h)$ sur $E(H, h)$, de loi de réciprocité donnée par 3.9.1. On le note $M(H, h)$.

3.9. Soit F une extension finie de E , munie d'un plongement complexe qui prolonge celui de E . Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} F^* & \xrightarrow{N_{F/E}} & E^* \\ r'(h_0) \downarrow & & \downarrow r'(h_0) \\ T & = & T \end{array}$$

est commutatif.

Si $M_E(G, h_0)$ est un module sur E de $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$, ayant (3.9.1) pour loi de réciprocité, il en résulte que $M_F(G, h_0)$ (3.1) a encore (3.9.1) pour la loi de réciprocité.

3.10. Soient $u : (G_1, h_1) \rightarrow (G_2, h_2)$ comme en 1.14, et $M_i(G_i, h_i)$ un module de $M_{\mathbb{C}}(G_i, h_i)$ sur E_i . Soit E le composé des sous-corps E_1 et E_2 de $\mathbb{C}$. On a (notation de 3.1)

$$M_{\mathbb{C}}(G_i, h_i) = M_i(G_i, h_i) \otimes_{E_i} \mathbb{C}.$$

Il a donc un sens de se demander si $u : M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1) \rightarrow M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2)$ est défini sur E .

Définition 3.4. Soient G un groupe réductif connexe sur $\mathbb{Q}$ vérifiant la condition de 2.1, $h : S \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ un homomorphisme vérifiant les conditions de 1.5 et E une extension de $E(G, h_0)$ (3.7), munie d'un plongement complexe prolongeant celui de $E(G, h_0)$. Un module $M_E(G, h_0)$ de $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ sur E

est dit *faiblement canonique* si, pour tout tore $u : H \hookrightarrow G$ dans G , muni de $h' : S \rightarrow H_{\mathbb{R}}$ tel que $u \circ h'$ soit le conjugué de h_0 par un élément de $G(\mathbb{R})$, le morphisme (1.14)

$$M_{\mathbb{C}}(H, h') \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$$

est défini (3.10) (3.12) sur le composé $E(H, h') \cdot E \subset \mathbb{C}$. Un modèle $M_E(G, h_0)$ est dit *canonique* s'il est faiblement canonique et que $E = E(G, h_0)$.

3.11. Traduction. Soit M un module canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$, de loi de réciprocité ψ_M . Si $\tilde{G}'$ est simplement connexe, alors ψ_M est donnée par 3.9.1 (5.6). Pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, désignons encore par $\psi(K)$ l'image de K dans $\mathcal{A}(G)/\pi_0(K_{\infty})$, et soit $E(K)$ l'extension de $E(G, h_0)$ définie par le groupe de classes d'idèles $\psi_M^{-1}(\psi(K))$. On vérifie que $E(K)$ est le corps de définition de la composante neutre ${}_K M_{\mathbb{C}}^{\circ}$ de ${}_K M_{\mathbb{C}}$, considérée comme sous-schéma de ${}_K M_{\mathbb{C}} = {}_K M \otimes_E \mathbb{C}$.

Par définition, ${}_K M_{\mathbb{C}}^{\circ}$ provient par extension des scalaires de $E(K)$ d'un sous-schéma ${}_K M^{\circ}$ de ${}_K M \otimes_E E(K)$. Le schéma ${}_K M^{\circ}/E(K)$ est géométriquement connexe sur $E(K)$, et on peut encore décrire le schéma ${}_K M^{\circ}$ comme celle des composantes connexes (sur E) de ${}_K M$ qui, après extension des scalaires de E à $\mathbb{C}$ contient l'origine.

$$\begin{array}{ccccc} {}_K M^{\circ} & \subset & {}_K M & {}_K M_{\mathbb{C}}^{\circ} & \subset & {}_K M_{\mathbb{C}} \\ \downarrow & & \downarrow & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(E(K)) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(E) & \mathrm{Spec}(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(E) \end{array}$$

Shimura a l'habitude de s'exprimer en terme du système des variétés ${}_K M^{\circ}/E(K)$ et des homomorphismes de type 2.2 qu'on a entre celles-ci. Pour un énoncé typique, voir [?, page 146]. Pour la traduction, cf. [?, 2.7].

3.12. Pour $u : (H, h') \rightarrow (G, h)$ comme en 3.13, l'image de $M_{\mathbb{C}}(H, h')$ dans ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h)$ est un ensemble fini. L'hypothèse est que cette partie de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h)$ soit définie sur $E(H, h')$, que ses points soient définis sur une extension abélienne de $E(H, h')$, et que $\mathrm{Gal}(\overline{E(H, h')}/E(H, h'))$ les permute d'une manière précrite. On appellera "spéciaux" les points de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h)$ dans l'image d'un $M_{\mathbb{C}}(H, h')$.

Supposons connu un plongement projectif $q : {}_K M_{\mathbb{C}} \hookrightarrow \mathbb{P}^r$, qui soit défini sur $E(K)$. On peut l'interpréter comme $q : X^{\circ} \rightarrow \mathbb{P}^r$ (cf. 1.7, 1.8).

Si $u \circ h' \in X$ est dans X° , alors les coordonnées de $q(u \circ h')$ engendrent sur $E(K) \cdot E(H, h')$ une extension abélienne de $E(H, h')$ qu'on peut expliciter comme corps de classe.

3.13. L'exemple classique d'une telle situation est fourni par le schéma de module des courbes elliptiques (correspondant à $G = \mathrm{GL}_2$, $K = \mathrm{GL}_2(\hat{\mathbb{Z}})$, h_0 comme en 1.6), et par ceux de ses points définis par des courbes elliptiques à multiplication complexe.

Soit j l'invariant modulaire, vu comme fonction sur le demi-plan de Poincaré X° . Si $\tau \in X^{\circ}$ appartient à un corps quadratique imaginaire K , soit

$L(\tau) = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau \subset \mathbb{C}$, et soit $\mathfrak{a}(\tau) = \{k \in K \mid k \cdot L(\tau) \subset L(\tau)\}$. Le corps $K(j(\tau))$ est l'extension abélienne de K de groupe de Galois le groupe des classes d'idéaux de K correspond à un module inversible L , et si $\sigma_{\mathfrak{a}}$ est l'élément de Galois correspondant à $\mathfrak{a}(\tau)'$, on a $j(\tau)^{\sigma_{\mathfrak{a}}} = j(\mathfrak{a}^{-1}L(\tau))$. Pour des exemples explicites plus étranges, voir [?, page 45–46].

4. VARIÉTÉS ABÉLIENNES

4.1. Soit k un corps algébriquement clos de caractéristique 0. Soit A une variété abélienne sur k . Pour $n \geq 1$, on désigne par A_n le noyau de la multiplication par n . Les A_n forment un système projectif ($\varphi_{nm,n} : A_{nm} \rightarrow A_n$ est $x \mapsto x^m$) et on pose

$$T(A) = \varprojlim_n A_n, \quad V(A) = \mathbb{A}^f \otimes_{\hat{\mathbb{Z}}} T(A).$$

Le $\hat{\mathbb{Z}}$ -module $T(A)$ est le produit des modules de Tate (= représentations de Weil) $T_p(A)$. Si $k = \mathbb{C}$, on a

$$(21) \quad T(A) = \hat{\mathbb{Z}} \otimes H_1(A, \mathbb{Z})$$

$$(22) \quad V(A) = \mathbb{A}^f \otimes H_1(A, \mathbb{Q})$$

4.2. La catégorie des variétés abéliennes à isogénie près sur k est la catégorie dont les objets sont les variétés abéliennes sur k et dans laquelle $\text{Hom}_{\text{iso}}(A, B) = \text{Hom}(A, B) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$. On désigne par $A \otimes \mathbb{Q}$ la variété abélienne “à isogénie près” sous-jacente à une variété abélienne A . Tout foncteur additif de la catégorie des variétés abéliennes dans une catégorie additive $\mathbb{Q}$ -linéaire se factorise par le foncteur $A \mapsto A \otimes \mathbb{Q}$. Ainsi, le foncteur contravariant “variété duale” $A \mapsto A^{\vee}$ se prolonge aux variétés abéliennes à isogénie près. Le foncteur $A \mapsto V(A)$ se prolonge de même. De plus, si A^0 est une variété abélienne à isogénie près, il revient au même de se donner une variété abélienne B , plus un isomorphisme $B \otimes \mathbb{Q} = A^0$, ou de se donner $T(A^0) \subset V(A^0)$.

4.3. Soit A une variété abélienne sur k . On désigne par $\text{NS}(A)$ le groupe des classes d'équivalence algébrique de faisceaux inversibles sur A . On définit une polarisation effective (resp. une polarisation) de A comme un élément de $\text{NS}(A)$ (resp. de $\text{NS}(A) \otimes \mathbb{Q}$) dont un multiple positif est défini par un plongement projectif de A . Une polarisation homogène est un élément de $(\text{NS}(A) \otimes \mathbb{Q})/\mathbb{Q}_+^*$ qui est la classe d'une polarisation.

Rappelons que $\text{NS}(A) \otimes \mathbb{Q}$ s'identifie par une bijection $\rho \mapsto \rho'$ à l'ensemble des éléments de $\text{Hom}(A, A^{\vee}) \otimes \mathbb{Q}$ égaux à leur transposée. Un isomorphisme $u \in \text{Hom}(A \otimes \mathbb{Q}, B \otimes \mathbb{Q})$ induit des isomorphismes de $\text{Hom}(A, A^{\vee}) \otimes \mathbb{Q}$ avec $\text{Hom}(B, B^{\vee}) \otimes \mathbb{Q}$, de $\text{NS}(A) \otimes \mathbb{Q}$ avec $\text{NS}(B) \otimes \mathbb{Q}$, et transforme polarisation en polarisation. Ceci permet de parler de polarisation d'une variété abélienne à isogénie près.

4.4. Si $A^\vee$ est la duale d'une variété abélienne à isogénie près A , alors $V(A^\vee)$ et $V(A)^\vee$ sont en dualité à valeurs dans $\mathbb{A}^f(1)$. Si ρ est une polarisation de A^0 , la forme de polarisation $\psi_\rho(x, y) = \langle x, \rho'(y) \rangle$ est une forme alternée non dégénérée sur le $\mathbb{A}^f$ -module libre $V(A^0)$, à valeurs dans $\mathbb{A}^f(1)$.

Les rappels 4.1 et 4.5 s'étendent aux schémas abéliens sur une base quelconque.

4.5. Faisons $k = \mathbb{C}$. Le foncteur additif $A \mapsto H_1(A, \mathbb{Z})$ se prolonge aux variétés abéliennes à isogénie près sur $\mathbb{C}$ (4.2). Pour A^0 une variété abélienne à isogénie près, $H_1(A^0, \mathbb{Q})$ et $H^1(A^0, \mathbb{Q})$ sont en dualité. Via 4.1.2 et l'isomorphisme de $\mathbb{A}^f(1)$ avec $\mathbb{A}^f$ défini par l'exponentielle, cette dualité est compatible à celle considérée en 4.5. La forme alternée $\psi_\rho(x, y) = \langle x, \rho'(y) \rangle$ sur $H^1(A^0, \mathbb{Q})$ définie par une polarisation ρ de A^0 s'appelle encore la forme de polarisation.

La structure de Hodge de $H^1(A^0, \mathbb{Q})$ est l'homomorphisme $h : S \rightarrow \mathrm{GL}(H^1(A^0, \mathbb{Q}))_{\mathbb{R}}$, tel que S agisse sur $H^1(A^0, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C}$ par les caractères z^{-1} et $\bar{z}^{-1}$, et que $F(h)^0$ (1.5) soit le noyau de l'exponentielle $H^1(A^0, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C} \rightarrow \mathrm{Lie}(A)$.

Théorème 4.1 (Riemann). *Les constructions*

$$(A, \rho) \longmapsto (H^1(A, \mathbb{Q}), \psi_\rho, H^1(A, \mathbb{Z}), h) \quad (V, \psi, V_{\mathbb{Z}}, h) \longmapsto h^\circ \backslash V \otimes \mathbb{C} / V_{\mathbb{Z}}$$

établissent une équivalence entre

- (a) *variétés abéliennes polarisées sur $\mathbb{C}$;*
- (b) *systèmes formés d'un vectoriel V sur $\mathbb{Q}$, d'une forme alternée non dégénérée ψ sur V , d'un réseau entier $V_{\mathbb{Z}}$ dans V et d'un homomorphisme h de S dans le groupe $\mathrm{Gp}(V)_{\mathbb{R}}$ des similitudes symplectiques de $V \otimes \mathbb{R}$, du type 1.6 et tel que $\psi(x, h(i)x) > 0$ ($x \in V \otimes \mathbb{R}$, $x \neq 0$).*

Variante 3. *Il revient au même de se donner une variété abélienne à isogénie près A sur $\mathbb{C}$, munie d'une polarisation homogène, ou de se donner un vectoriel sur $\mathbb{Q}$, muni d'une forme alternée non dégénérée ψ , donnée à un facteur près, et de $h : S \rightarrow \mathrm{Gp}(V)$ du type 1.6.*

4.6. Soient L une algèbre semi-simple à involution sur $\mathbb{Q}$, et V un vectoriel sur $\mathbb{Q}$, muni d'une structure de L -module fidèle et d'une forme alternée non dégénérée ψ telle que

$$(23) \quad \psi(\ell x, y) = \psi(x, \ell^* y)$$

On désigne par G le groupe algébrique sur $\mathbb{Q}$ des similitudes symplectiques L -linéaires de V . Le groupe $G(\mathbb{Q})$ est l'ensemble des $g \in \mathrm{GL}_L(V)$ tels qu'il existe $\mu(g) \in \mathbb{Q}^*$ vérifiant

$$(24) \quad \psi(gx, gy) = \mu(g)\psi(x, y)$$

On suppose donné un homomorphisme $h_0 : S \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ tel que, via h_0 , S agisse sur $V_{\mathbb{C}}$ par les caractères z^{-1} et $\bar{z}^{-1}$ et que la forme $\psi(x, h_0(i)y)$ soit symétrique et définie positive. Les conditions (1.5.1) à (1.5.3) sont alors vérifiées par (G, h_0) , et l'involution de L est positive.

4.7. Appliquons (1.11) à (G, h_0) et à la représentation V de G . Une G -structure $\mathcal{T}$ sur un vectoriel H s'interprète, par 1.9, comme la donnée sur H d'une structure de L -module et d'une forme alternée $\tilde{\psi}$, donnée à un facteur près, le vectoriel H , muni de ces structures, étant isomorphe à V . Soit $\mathcal{T}$ une G -structure sur H . Une donnée 1.9 (b) $h : S \rightarrow H_{\mathbb{R}}$ sur H définit alors, d'après 4.8 appliqué à $(H, \tilde{\psi}, h)$, une variété abélienne à isogénie près A , munie d'une polarisation homogène ρ , telle que H soit $H^1(A, \mathbb{Q})$, h la structure de Hodge de $H^1(A, \mathbb{Q})$ et $\tilde{\psi}$ la forme de polarisation. De plus, la structure de L -module de H provient de $\rho : L \rightarrow \text{End}(A)$, et H , muni de ρ et h , est déterminé par (A, ρ, ψ) .

Pour qu'un triple (A, ρ, ψ) provienne d'un H comme plus haut, il faut et il suffit que

(4.10.1) $H^1(A, \mathbb{Q})$, muni de sa structure de L -module et de la forme de polarisation (donnée à un facteur près), est isomorphe à V ;

(4.10.2) Pour tout $\ell \in L$, $\text{Tr}(\rho(\ell), \text{Lie}(A)) = t(\ell)$, où t est l'application de L dans $\mathbb{Q}$ donnée par $t(\ell) = -\text{Tr}(\ell; V_{\mathbb{C}}/F^0(h_0))$.

Scholie 4.2. Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$. Les points de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ correspondent bijectivement aux classes d'isomorphie de variétés abéliennes à isogénie près A , munies de

- (a) $\rho : L \rightarrow \text{End}(A)$ tel que $\text{Tr}(\rho(\ell), \text{Lie}(A)) = t(\ell)$ ($\ell \in L$),
- (b) une polarisation homogène ρ qui induise l'involution donnée de L ,
- (c) une classe mod K , α , de similitudes symplectiques L -linéaires k :

$$V(A) \xrightarrow{\sim} V \otimes \mathbb{A}^f,$$

et telles que

- (e) les conditions (4.10.1) (4.10.2) soient vérifiées.

On applique 1.11 et 4.10, en notant qu'une donnée 1.9 (c) s'identifie à une donnée (c), et que les conditions en (b) et (a) résultent de (4.10.1) et (4.10.2) respectivement.

4.8. Soient K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$, $V_{\mathbb{Z}}$ un réseau entier dans V tel que $V_{\mathbb{Z}} \otimes \hat{\mathbb{Z}}$ soit K -invariant, $L_{\mathbb{Z}}$ un ordre de L tel que $L_{\mathbb{Z}} \cdot V_{\mathbb{Z}} \subset V_{\mathbb{Z}}$, ψ un multiple rationnel positif de la forme alternée de V , à valeurs entières sur $V_{\mathbb{Z}}$, et $V_{\mathbb{Z}}^{\perp}$ le plus grand réseau de V tel que $\psi(V_{\mathbb{Z}}^{\perp}, V_{\mathbb{Z}}) \subset \mathbb{Z}$.

Soient n un entier, et $K_n = \{g \in G(\mathbb{A}^f) \mid (g-1)V_{\mathbb{Z}}^{\perp} \subset nV_{\mathbb{Z}}\}$. On suppose n assez grand pour que $K \supset K_n$.

Si A est comme en 4.11, alors $k^{-1}(V_{\mathbb{Z}}^{\perp}) \subset V(A)$ ne dépend pas de $k \in \alpha$, et définit une variété abélienne B avec $B \otimes \mathbb{Q} = A$ et $T(B) = k^{-1}(V_{\mathbb{Z}}^{\perp}) \subset V(A)$.

L'action de L sur A induit une action de $L_{\mathbb{Z}}$ sur B . Il existe un unique polarisation effective ρ de B , avec $\rho \in \psi$, telle que $k^{-1}(V_{\mathbb{Z}}^{\perp})$ soit le plus grand "réseau" $T'(B) \supset T(B)$ vérifiant $\psi_{\rho}(T(B), T(B)) \subset \hat{\mathbb{Z}}(1)$. Enfin, l'ensemble α d'isomorphismes symplectiques L -linéaires de $T(B)$ avec $V_{\mathbb{Z}}^{\perp}$ est l'image réciproque de son image dans $\text{Isom}(B_n, V_{\mathbb{Z}}^{\perp}/nV_{\mathbb{Z}}^{\perp})$.

Ceci permet encore d'interpréter les points de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ comme correspondant aux classes d'isomorphie de systèmes (B, ρ, α_n) consistant en

- (a) une variété abélienne polarisée (B, ρ) , à multiplication complexe par $L_{\mathbb{Z}}$, vérifiant 4.11 (a) (b),
- (b) une classe mod K/K_n , α_n , d'isomorphismes $k : B_n \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{Z}}^{\perp}/nV_{\mathbb{Z}}^{\perp}$ qui peuvent se relever en des isomorphismes symplectiques L -linéaires $k : T(B) \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{Z}}^{\perp}$, et qui vérifient (4.10.1) (4.10.2).

4.9. Désignons par F l'algèbre des invariants par $*$ du centre de L . C'est un produit de corps totalement réels. Il existe une et une seule forme F -bilinéaire alternée $F\psi$ sur V telle que $\text{Tr}_{F/\mathbb{Q}} \circ F\psi = \psi$.

On désigne par G_1 le groupe des similitudes symplectiques L -linéaires de $F\psi : G_1(\mathbb{Q})$ est l'ensemble des $g \in \text{GL}_L(V)$ tels qu'il existe $\mu(g) \in F^*$ vérifiant

$$(25) \quad F\psi(gx, gy) = \mu(g)F\psi(x, y),$$

i.e.

$$(26) \quad \psi(gx, gy) = \text{Tr}_{F/\mathbb{Q}}(\mu(g)\psi(x, y)).$$

Variante 4. Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G_1(\mathbb{A}^f)$. Les points de ${}_KM_{\mathbb{C}}(G_1, h_0)$ correspondent bijectivement aux classes d'isomorphie de variétés abéliennes à isogénie près A , munies de

- (a) $\rho : L \rightarrow \text{End}(A)$ comme en 4.11,
- (b) une polarisation faible (relative à F) ψ qui induise l'involution donnée de L ,
- (c) une classe (pour les formes $F \otimes \mathbb{A}^f$ -bilinéaires des deux membres) mod K de similitudes symplectiques L -linéaires $k : V(A) \xrightarrow{\sim} V \otimes \mathbb{A}^f$, et telles que des conditions analogues à (4.10.1) (4.10.2) soient vérifiées.

4.10. On peut préciser 4.11 et 4.14 en montrant que ${}_KM_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ est le schéma de modules grossier d'un foncteur évident sur les schémas de type fini sur $\mathbb{Q}$.

4.11. Exemple I (suite de 1.6, 1.11). Soient $V_{\mathbb{Z}}$, n et K_n comme 1.11. Plaçons-nous dans le cas particulier de 4.9 où $L = \mathbb{Q}$ et où $\dim(V) = 2g$. On a alors $G = \text{Gp}(V)$ (groupe des similitudes symplectiques). Pour $h_0 : S \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ de type 1.6, on a $E(\text{Gp}, h_0) = \mathbb{Q}$.

Pour tout schéma S , soit $\mathcal{F}(S)$ l'ensemble des classes d'isomorphie de schémas abéliens polarisés de la série principale A/S , munis d'une similitude symplectique $k : A_n \xrightarrow{\sim} (V_{\mathbb{Z}}/nV_{\mathbb{Z}})_S$. Pour $n \geq 3$, les objets classifiés n'ont plus d'automorphismes et le foncteur $\mathcal{F}$ est représenté par un $\mathbb{Q}$ -schéma ${}_K M$ [?]. D'après 1.11, 4.11 et 4.12, on dispose de

$$m : M(\mathbb{C}) \xrightarrow{\sim} {}_K M_{\mathbb{C}}(\text{Gp}, h_0).$$

Proposition 4.3. Le $\mathbb{Q}$ -schéma $M(\text{Gp}, h_0) = \varprojlim_n {}_K M$ est un module sur $\mathbb{Q} = E(\text{Gp}, h_0)$ de $M_{\mathbb{C}}(\text{Gp}, h_0)$.

4.12. Plaçons-nous dans le cas particulier de 4.9 où V est un L -module monogène. Les groupes G et G_1 sont alors contenus dans le centre de L^* .

Soient $\overline{E}$ une clôture algébrique de $E(G, h_0)$ et M^+ l'ensemble des classes d'isomorphie $[A, \rho, k, \psi]$ d'objets (A, ρ, k, ψ) consistant en

- (a) une variété abélienne à isogénie près $A/\overline{E}$, munie d'une polarisation homogène et de $\rho : L \rightarrow \text{End}(A)$ tel qu'avec la notation de 4.10.3, on ait pour $\ell \in L$

$$\text{Tr}(\ell, \text{Lie}(A)) = t(\ell) \in E(G, h_0)$$

- (b) un isomorphisme $L \otimes \mathbb{A}^f$ -linéaire $k : V(A) \xrightarrow{\sim} V \otimes \mathbb{A}^f$.

La variété abélienne A est donc “de type CM”. On renvoie à [?] pour la démonstration du théorème fondamental suivant.

Théorème 4.4 (Shimura–Taniyama). *Le groupe de Galois $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E(G, h_0))$ agit sur M^+ via son plus grand quotient abélien $\pi_0(E(G, h_0)^*(\overline{\mathbb{Q}})/E(G, h_0)^*(\mathbb{Q}))$. Pour $\varepsilon \in E(G, h_0)^*(\overline{\mathbb{Q}})$, d'image $\sigma(\varepsilon)$ dans Galois rendu abélien, et de composante dans $E(G, h_0)^*(\mathbb{A}^f)$, on a*

$$(27) \quad \sigma(\varepsilon)([A, \rho, k, \psi]) = [A, \rho, r(G, h_0)(\varepsilon_f) \circ k, \psi]$$

Soient τ un plongement de $\overline{E}$ dans $\mathbb{C}$ qui prolonge celui de $E(G, h_0)$, K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$ et ${}_K M(G, h)(\overline{E})$ l'ensemble des classes d'isomorphie d'objets (A, ρ, ψ, α) où

- (a) A , ρ et ψ sont comme plus haut ;
- (b) α est une classe mod K de similitudes symplectiques $L \otimes \mathbb{A}^f$ -linéaires $k : V(A) \xrightarrow{\sim} V \otimes \mathbb{A}^f$;
- (c) le vectoriel $H^1(A_\tau, \mathbb{Q})$ (où A_τ est défini via τ), muni de l'action de V et de la forme de polarisation (donnée à un facteur près) est isomorphe à V .

D'après 4.19, la condition (c) est indépendante du choix de τ , de sorte que l'ensemble fini ${}_K M(G, h)(\overline{E})$ est muni d'une action de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E(G, h_0))$; en tant qu'ensemble galoisien, il s'identifie à l'ensemble des points sur $\overline{E}$ d'un $E(G, h_0)$ -schéma fini étale ${}_K M(G, h)$. D'après 4.14,

$${}_K M(G, h)(\mathbb{C}) = G(\mathbb{Q}) \times_K G(\mathbb{C})/G(\mathbb{Q})$$

et par 4.19, on a :

Proposition 4.5. *Le $E(G, h_0)$ -schéma $M(G, h) = \varprojlim_K {}_K M(G, h)$ de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ est un module canonique.*

Théorème 4.6. *Le module $M(\text{Gp}, h_0)$ construit en 4.17 est un module canonique.*

Soient (V, ψ) comme en 4.16, L , $\rho : L \rightarrow \text{End}(V)$, G et $h : S \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ comme en 4.18. On dispose de $u : (G, h) \rightarrow (\text{Gp}, h_0)$. Soit $K \subset G(\mathbb{A}^f)$, tel que $u(K) \subset K_n$ (4.16). Si $\overline{E}$ est une clôture algébrique de $E(G, h_0)$, on définit

$$u : {}_K M(G, h)(\overline{E}) \longrightarrow {}_{K_n} M(\text{Gp}, h_0)(\overline{E})$$

par “oubli de la multiplication complexe”, en associant à $[A, \rho, \psi, \alpha]$ le triple formé de

- (a) la variété abélienne B , munie de $B \otimes \mathbb{Q} = A$ et telle que $T(B) = k^{-1}(V_{\mathbb{Z}}^{\perp}) \subset V(A)$ ($k \in \alpha$);
- (b) la polarisation ψ de B ;
- (c) l’isomorphisme $k : B_n \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{Z}}/nV_{\mathbb{Z}}$ ($k \in \alpha$).

Les applications u définissent un morphisme de modules

$$u : M(G, h) \longrightarrow M(\mathrm{Gp}, h_0) \otimes_{\mathbb{Q}} E(G, h_0).$$

On achève la démonstration en montrant ([?]) que pour tout $u : (H, h') \rightarrow (\mathrm{Gp}, h_0)$ comme en 3.13, il existe $v : (G, h) \rightarrow (\mathrm{Gp}, h_0)$ comme plus haut (pour L convenable) tel que $u \circ h' = v \circ h$.

Variante 5. Soient F un corps de nombres totalement réel, $n = [F : \mathbb{Q}]$, et $\mathrm{Gp}_{2g}(F)$ le groupe des similitudes symplectiques d’un F -vectoriel symplectique de dimension $2g$. Soit $h_0 : S \rightarrow \mathrm{Gp}_{2g}(F) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} = \mathrm{Gp}_{2g}(\mathbb{R})^n$ comme en 1.6. On peut construire un module canonique de $M_{\mathbb{C}}(\mathrm{Gp}_{2g}(F), h_0)$ à partir de modules des schémas abéliens faiblement polarisés.

5. TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

La définition 3.13 n’est utilisable que parce qu’il y a “beaucoup” de points spéciaux.

Théorème 5.1. Soient G et h_0 comme en 3.13. Pour toute extension finie F de $E(G, h_0)$, il existe $(H, h', u : H \hookrightarrow G)$ comme en 3.13 tels que l’extension $E(H, h')$ de $E(G, h_0)$ soit linéairement disjointe de F .

Soit $Y = \mathrm{Hom}(\mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}, G_{\mathbb{C}})/G_{\mathbb{C}}$ le schéma des classes de conjugaison de morphismes de $\mathbb{G}_m$ dans G . Le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ agit sur l’ensemble (discret infini) $Y(\mathbb{C})$ des classes de conjugaison de morphisme de $\mathbb{G}_{m, \mathbb{C}}$ dans $G_{\mathbb{C}}$. Soit Y_0 le sous-schéma fini de Y tel que $Y_0(\mathbb{C})$ soit l’orbite sous Galois de la classe de h_0^r . C’est le spectre de $E(G, h_0)$.

Soient $V' = \mathrm{Lie}(G)$, considéré comme espace affine sur $\mathbb{Q}$, et soit V le sous-schéma ouvert des éléments réguliers de l’algèbre de Lie. Pour v dans V , on désigne par T_v le centralisateur de v (un tore maximal). Soit W le schéma de modules des tores maximaux T de G , munis de $s : \mathbb{G}_m \rightarrow T$, $v \in \mathrm{Lie}(T)$ tels que

- (a) v est régulier dans $\mathrm{Lie}(G)$;
- (b) la classe de $s : \mathbb{G}_m \rightarrow T$ est dans Y_0 .

Le morphisme $f : W \rightarrow V : (T, s, v) \mapsto v$ est fini étale surjectif (noter que $T = T_v$). Soit p le morphisme de W dans $Y_0 : (T, s, v) \mapsto (\text{classe de } s)$.

$$(5.1.1) \quad \begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{p} & Y_0 \\ f \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathbb{Q}) \end{array}$$

Lemme 5.2. Le schéma W est irréductible, et les fibres géométriques de p sont (géométriquement) irréductibles.

Puisque Y_0 est irréductible (le spectre d'une extension de $\mathbb{Q}$), il suffit de prouver la seconde assertion. Elle résulte de ce que

- (a) puisque G est connexe, le schéma sur $\mathbb{C}$ des homomorphismes de $\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}$ dans $G_{\mathbb{C}}$, conjugués à un homomorphisme donné, est irréductible ;
- (b) pour $i : \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \rightarrow G_{\mathbb{C}}$ donné, d'après le théorème de conjugaison des tores maximaux appliqué au centralisateur (connexe) de $i(\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}})$, le schéma des tores maximaux de $G_{\mathbb{C}}$ contenant $i(\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}})$ est irréductible.

Soit $U \subset V(\mathbb{R})$ l'ensemble des $v \in V(\mathbb{R})$ tels que $T_v/C(\mathbb{R})$ soit compact. Pour la topologie usuelle, U est un ouvert. Pour $v \in U$ et $w \in W(\mathbb{C})$ tel que $f(w) = v \in V(\mathbb{R}) \subset V(\mathbb{C})$, il existe un et un seul homomorphisme $h(w) : S \rightarrow T_v$, tel que $h(w) \circ r = s : \text{après extension des scalaires à } \mathbb{C}$

$$h(w) = s \circ z \cdot \overline{s \circ z}.$$

Soit $v \in U$. D'après le théorème de conjugaison des sous-groupes compacts maximaux dans $G/C(\mathbb{R})^\circ$, il existe $g \in G(\mathbb{R})$ (même $g \in G'(\mathbb{R})^\circ$) tel que $gT_vg^{-1} \subset K_\infty$. Puisque T_v est un tore maximal, gT_vg^{-1} contient le centre de K_∞ . On en déduit l'existence de $w \in W(\mathbb{C})$ tel que $f(w) = v$ et que $h(w)$ soit conjugué à h_0 .

On conclut la démonstration de 5.1 en appliquant au diagramme (5.1.1) et à U la variante suivante du théorème d'irréductibilité de Hilbert, dont je dois la démonstration à J.P. Serre.

Lemme 5.3. *Soient E une extension finie de $\mathbb{Q}$, et un diagramme commutatif*

$$\begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & \text{Spec}(E) \\ \downarrow f & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & \text{Spec}(\mathbb{Q}) \end{array}$$

dans lequel

- (i) V est un ouvert de Zariski d'un espace affine sur $\mathbb{Q}$;
- (ii) les fibres géométriques de p sont irréductibles, et
- (iii) f est quasi-fini et dominant.

Alors, pour tout ouvert $U \subset V(\mathbb{R})$ (topologie usuelle) et toute extension F de E , il existe $v \in V(\mathbb{Q}) \cap U$ tel que $f^{-1}(v)$ soit le spectre d'une extension de E linéairement disjointe de F .

Soit $W' = W \otimes_E F$. Les hypothèses de 5.1.2 sont encore vérifiées pour W'/F et $f' : W' \rightarrow W \rightarrow V$, et il faut construire $v \in V(\mathbb{Q}) \cap U$ tel que $f'^{-1}(v) = f^{-1}(v) \otimes_E F$ soit le spectre d'un corps. Ceci nous ramène au cas où $E = F$, qui résulte du théorème d'irréductibilité de Hilbert (cf. Lang, Diophantine Geometry, Chap VIII).

Proposition 5.4. *Pour $x \in M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ et K compact ouvert dans $G(\mathbb{A}^f)$, l'image $G(\mathbb{Q}) \cdot x \subset M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ dans ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ de $G(\mathbb{A}^f) \cdot x \subset M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ est dense.*

C'est une conséquence de (0.4). Le lecteur vérifiera :

Proposition 5.5. *Soient E un corps muni d'un plongement complexe ρ , X un schéma sur E et Y un sous-schéma réduit fermé de $X \otimes_{E,\rho} \mathbb{C}$. Supposons qu'il existe des extensions finies E_i de E dans $\mathbb{C}$, des schémas $M_{i,\alpha}/E_i$ et des E_i -morphisms $v_{i,\alpha} : M_{i,\alpha} \rightarrow X \otimes_E E_i$, soit $v_i : \prod_{\alpha} M_{i,\alpha} \rightarrow X \otimes_E E_i$, tels que $v_i(\prod_{\alpha} M_{i,\alpha} \otimes_{E_i} \mathbb{C}) \subset Y$ et que $v_i(\prod_{\alpha} M_{i,\alpha} \otimes_{E_i} \mathbb{C})$ soit dense dans Y . Alors, Y est défini sur E .*

Corollaire 5.6. *Soit $u : (G_1, h_1) \rightarrow (G_2, h_2)$ comme en 1.14. Soient $M_E(G_1, h_1)$ et $M_E(G_2, h_2)$ des modèles faiblement canoniques des $M_{\mathbb{C}}(G_i, h_i)$ sur un corps de nombres E ($E(G_i, h_i) \subset E \subset \mathbb{C}$). Alors $v : M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1) \rightarrow M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2)$ est défini sur E (cf. 3.12).*

Soient $K_i \subset G_i(\mathbb{A}^f)$ des sous-groupes compacts ouverts tels que $v(K_1) \subset K_2$. Prouvons que $v(K_1, K_2) : K_1 M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1) \rightarrow K_2 M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2)$ est défini sur E . Soit $u : (H, h') \rightarrow (G_1, h_1)$ comme en 3.13 et $F = E \cdot E(H, h')$. Pour $g \in G_1(\mathbb{A}^f)$ on dispose de F -morphisms

$$a(g) : M_F(H, h') \longrightarrow M_F(G_1, h_1) \xrightarrow{v(g)} M_F(G_2, h_2) \longrightarrow K_2 M_F(G_2, h_2)$$

et, après extension des scalaires à $\mathbb{C}$, $v(K_1, K_2) \circ a(g) = b(g)$.

Grâce à 5.1 et 5.2, on peut appliquer 5.3 à $X = K_1 M_E(G_1, h_1) \times_{K_2} M_E(G_2, h_2)$, au graphe Y de v , aux $E_i = E \cdot E(H, h')$ pour (H, h', u) variable, et aux $(a(g), b(g)) : M_{E_i}(H, h') \rightarrow X_{E_i}$: on trouve que le graphe de v est défini sur E .

Dans le cas particulier $(G_1, h_1) = (G_2, h_2)$, $u = \text{Id}$, 5.4 signifie :

Corollaire 5.7. *À isomorphisme (unique) près, il existe au plus un module faiblement canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur E ($E(G, h) \subset E \subset \mathbb{C}$).*

Corollaire 5.8. *Si $\tilde{G}'$ est simplement connexe, la loi de réciprocité d'un module faiblement canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur E ($E(G, h) \subset E \subset \mathbb{C}$) est donnée par 3.9.1.*

Même démonstration que le cas particulier $v : (G, h) \rightarrow (T, \nu \circ h_0)$ de 5.4.

Corollaire 5.9. *Soit $v : (G_1, h_1) \rightarrow (G_2, h_2)$ comme en 1.15. Si $M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2)$ admet un module faiblement canonique sur E , avec $E(G_2, h_2) \subset E(G_1, h_1) \subset E \subset \mathbb{C}$, alors $M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1)$ admet un module faiblement canonique sur E .*

Soit K_i un sous-groupe compact ouvert de $G_i(\mathbb{A}^f)$. Utilisant 1.15, on se ramène à montrer seulement que si $v(K_1) \subset K_2$ et que $K_1 M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1) \subset K_2 M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2)$, alors le sous-schéma $K_1 M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1)$ de $K_2 M_{\mathbb{C}}(G_2, h_2) = K_2 M_E(G_2, h_2) \otimes_E \mathbb{C}$ est défini sur E .

Soit $u : (H, h') \rightarrow (G_1, h_1)$ comme en 3.13, et pour $g \in G_1(\mathbb{A}^f)$, soit $a(g)$ l'homomorphisme composé, défini sur $F = E \cdot E(H, h')$:

$$a(g) : M_F(H, h') \longrightarrow M_F(G_1, h_1) \xrightarrow{v(g)} M_F(G_2, h_2) \longrightarrow K_2 M_F(G_2, h_2).$$

Grâce à 5.1 et 5.2, on conclut en appliquant 5.3 à $X = K_2 M_E(G_2, h_2)$, $Y = K_1 M_{\mathbb{C}}(G_1, h_1)$, aux $E_i = E \cdot E(H, h')$ pour (H, h', u) variable et aux $a(g) : M_{E_i}(H, h') \rightarrow X_{E_i}$.

Exemple 5.10. Pour (G, h_0) comme en 4.9, on construit par 5.7 et 4.21 un module canonique

$$M(G, h_0) \subset M(\mathrm{Gp}(V, \psi), h_0) \otimes_{\mathbb{Q}} E(G, h_0).$$

Variante 6. Soit (G_1, h_0) tel que, avec les notations de 4.22, il existe $u : (G_1, h_0) \rightarrow (\mathrm{Gp}_{2g}(F), h_0)$ (par exemple (G_1, h_0) avec (G_1, h_0) comme en 4.13). Une application de 5.7 fournit un module canonique de $M(G_1, h_0)$.

Proposition 5.11. Soient (G, h) comme en 3.13, des corps de nombres $E_i : E(G, h) \subset E_i \subset \mathbb{C}$, E l'intersection des E_i , et M_{E_i} un module faiblement canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur E_i . Il existe alors un unique module $M_E(G, h)$ de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur E , tel que pour tout i le module $M_E(G, h) \otimes_E E_i$ sur E_i soit isomorphe à $M_{E_i}(G, h)$.

Vu l'assertion d'unicité, on peut supposer les E_i en nombre fini. Soit F l'extension de E dans $\mathbb{C}$ qu'ils engendrent, et soit $\mathcal{E}$ l'ensemble des sous-extensions de F contenant l'un des E_i . Utilisant 5.5, on obtient pour tout $F' \in \mathcal{E}$ un module $M_{F'}(G, h)$, et pour toute inclusion $F' \subset F''$ ($F', F'' \in \mathcal{E}$) un isomorphisme de modules $\varphi(F'', F') : M_{F'}(G, h) \otimes_{F'} F'' \rightarrow M_{F''}(G, h)$.

Soit $u : (H, h') \rightarrow (G, h)$ comme en 3.13, avec $E(H, h')$ linéairement disjoint de F sur $E(G, h)$ (5.1). Posons $E_1 = E(H, h') \cdot E$ et $F'_1 = E_1 \cdot F'_1 = E(H, h') \cdot F'$ ($F' \in \mathcal{E}$). Soit $g \in G(\mathbb{A}^f)$ et $K \subset G(\mathbb{A}^f)$ un sous-groupe compact ouvert. Puisque $M_{F'}(G, h)$ est faiblement canonique, on dispose d'un F'_1 -morphisme

$$a'(g) : M_{F'_1}(H, h') \longrightarrow M_{F'_1}(G, h) \longrightarrow {}_K M_{F'}(G, h).$$

Puisque $F'_1 = E_1 \otimes_E F'$, on peut "l'interpréter" comme un morphisme de F' -schémas

$$a(g) : M_{E_1}(H, h') \otimes_E F' \longrightarrow {}_K M_{F'}(G, h).$$

Les $a(g)$ vérifient $\varphi(F'', F') \circ a(g)_{F'} = a(g)_{F''}$. On conclut par 5.2 et le lemme suivant, appliqué à $X = \coprod_{g \in G(\mathbb{A}^f)} M_{E_1}(H, h')$. Sa démonstration est laissée en exercice au lecteur.

Lemme 5.12. Soient F/E une extension finie de corps et $\mathcal{E}$ un ensemble de sous-corps de F , d'intersection réduite à E , telle que $F \in \mathcal{E}$ et $F' \subset F'' \subset F \Rightarrow F'' \in \mathcal{E}$.

- (i) Le foncteur qui à un schéma X/E associe le système des schémas $X_{F'}/F'$ ($F' \in \mathcal{E}$) et des isomorphismes $(X_{F'}) \otimes_{F'} F'' \xrightarrow{\sim} X_{F''}$ ($F' \subset F''$, $F', F'' \in \mathcal{E}$) est pleinement fidèle.
- (ii) Pour qu'un système $[X(F')/F' (F' \in \mathcal{E}); \varphi(F'', F') : X(F') \otimes_{F'} F'' \xrightarrow{\sim} X(F'') (F' \subset F'', F', F'' \in \mathcal{E})]$ provienne d'un schéma X/E , il suffit que les $X(F')/F'$ soient quasi-projectifs et qu'il existe un schéma X_1/E et un morphisme $u : X_1 \rightarrow X$ tel que les $u(F') : X_1 \otimes_E F' \rightarrow X(F')$ soient d'image dense.

Remarque 5.13. Sous les hypothèses de 5.10, pour $u : (H, h') \rightarrow (G, h)$ comme en 3.13, le corps de définition de $u : M_{\mathbb{C}}(H, h') \rightarrow M_{\mathbb{C}}(G, h)$ est contenu dans l'extension $\bigcap_i E(H, h') \cdot E_i$ de $E(H, h') \cdot E$.

Proposition 5.14. Soient $h : S \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ comme en 3.13 et $\delta : S \rightarrow C_{\mathbb{R}}^{\circ}$ ($C = \text{centre de } G$). Si $E(G, h), E(C, \delta) \subset E \subset \mathbb{C}$ et si $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ admet un module faiblement canonique sur E , alors $M_{\mathbb{C}}(G, h\delta)$ en admet un aussi.

Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$ et $L = K \cap C^{\circ}(\mathbb{A}^f)$. Sur $\mathbb{C}$, le morphisme

$$u : (G \times C^{\circ}, (h, \delta)) \longrightarrow (G, h\delta) : (g, c) \longmapsto gc$$

induit des morphismes

$$u_K : {}_K M_{\mathbb{C}}(G, h) \times {}_L M_{\mathbb{C}}(C^{\circ}, \delta) \longrightarrow {}_K M_{\mathbb{C}}(G, h\delta).$$

Soit d le morphisme $d : C^{\circ} \rightarrow G \times C^{\circ} : c \mapsto (c, c^{-1})$. Le sous-groupe $d(C^{\circ}(\mathbb{A}^f))$ de $G \times C^{\circ}(\mathbb{A}^f)$ agit sur $M_{\mathbb{C}}(G, h) \times M_{\mathbb{C}}(C^{\circ}, \delta)$ via le quotient $d(C^{\circ}(\mathbb{A}^f))$ de $C^{\circ}(\mathbb{A}^f)$, et u_K induit un isomorphisme

$$\bar{u}_K : ({}_K M_{\mathbb{C}}(G, h) \times {}_L M_{\mathbb{C}}(C^{\circ}, \delta)) / (L \cdot d(C^{\circ}(\mathbb{A}^f))) \xrightarrow{\sim} {}_K M_{\mathbb{C}}(G, h\delta).$$

On définit ${}_K M_E(G, h\delta)$ comme le quotient

$${}_K M_E(G, \delta) \times {}_L M_E(C^{\circ}, \delta) / (L \cdot d(C^{\circ}(\mathbb{A}^f)))$$

et on vérifie qu'on trouve ainsi un module faiblement canonique. Par construction, on dispose de

$${}_K M_E(G, h) \times {}_L M_E(C^{\circ}, \delta) \longrightarrow {}_K M_E(G, h\delta).$$

Conjecture 5.15. Pour tout (G, h_0) comme 3.13, il existe un module canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$.

Supposons, c'est un cas typique, que G soit $\mathbb{Q}$ -simple et adjoint. Soit $\tilde{G}$ le revêtement universel de G et ω un poids de $\tilde{G}_{\mathbb{C}}$. Si, avec les notations de 3.7, la classe de conjugaison de h_0^r est décrite par des entiers $(n_i)_{i \in |\Delta|}$, et que $\sum_{i \in |\Delta|} n_i m_i = 1$, on pose $\langle \omega, h_0 \rangle = \sum_{i \in |\Delta|} n_i m_i$. Jusqu'ici, on n'a pu attaquer 5.12 que lorsque $\tilde{G}$ admet une représentation non triviale V telle que toutes les composantes irréductibles V' de $V_{\mathbb{C}}$ vérifient :

(*) pour λ parcourant les poids de V' , $\langle \lambda, h_0^r \rangle$ prend au plus deux valeurs.

Soit σ l'involution d'opposition. La condition (*) signifie encore que le poids dominant ω de V' vérifie $\langle \omega, h_0^r \rangle + \langle \sigma\omega, h_0^r \rangle = 0$ ou 1. Il n'existe pas de telle représentation V si G est exceptionnel (les facteurs non compacts de $G_{\mathbb{R}}$ sont alors de type $E_6(-14)$ ou $E_7(-25)$), ou de type D_4 triality, ni si G est de type D_n et que $G_{\mathbb{R}}$ a des facteurs non compacts des deux types D_n^* et D_n^{**} .

6. MODÈLES ÉTRANGES

6.1. Soit F un corps de nombres totalement réel, et soit

$$(28) \quad {}_F\Sigma : 0 \longrightarrow {}_FG' \longrightarrow {}_FG \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow 0$$

la suite exacte où G_p désigne un groupe de similitudes symplectiques.

On suppose que, pour chaque place réelle τ de F , ${}_FG' \otimes_{F,\tau} \mathbb{R}$ est de l'un des types suivants :

- (a) ${}_FG' \otimes_{F,\tau} \mathbb{R}$ est isomorphe à ${}_FG' \otimes_{F,\tau_0} \mathbb{R}$, ou
- (b) ${}_FG' \otimes_{F,\tau} \mathbb{R}$ est compact.

On désigne par $\tau_1, \dots, \tau_g$ les places réelles de F , et on suppose que les places de type (a) sont les places $\tau_1, \dots, \tau_r$ avec $r > 0$.

6.2. Le groupe ${}_FG$ peut se décrire de la manière suivante :

- (a) On choisit une algèbre de quaternions B sur F , indéfinie en les places τ_i pour $i \leq r$, et définie pour $i > r$. On désigne par $x \mapsto \bar{x}$ son involution canonique.
- (b) On choisit un B -module libre V , muni d'une forme F -bilinéaire non dégénérée ψ , symétrique et telle que $\psi(bx, y) = \psi(x, \bar{b}y)$.
- (c) On suppose que, pour $i > r$, la forme déduite de ψ par l'extension des scalaires $\tau_i : F \rightarrow \mathbb{R}$ est définie positive.
- (d) On prend pour ${}_FG$ le groupe des similitudes B -linéaires de ψ ; en d'autres termes, les $g \in G(\mathbb{Q})$ sont les $g \in \mathrm{GL}_B(V)$ tels qu'il existe $\mu(g) \in F^*$ vérifiant $\psi(gx, gy) = \mu(g)\psi(x, y)$.

6.3. Désignons par

$$(29) \quad \Sigma : 0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow 0$$

la suite exacte de groupes algébriques sur $\mathbb{Q}$ déduite de ${}_F\Sigma$ par restriction des scalaires à la Weil de F à $\mathbb{Q}$. On a

$$(30) \quad G_{\mathbb{R}} = \prod_{\tau} {}_FG \otimes_{F,\tau} \mathbb{R} \quad (\tau \text{ place réelle}).$$

Un morphisme $h : S \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ est défini par ses coordonnées $h_i : S \rightarrow {}_FG \otimes_{F,\tau_i} \mathbb{R}$. D'après 1.6, il existe une et une seule classe de conjugaison de morphismes h_0 tels que, pour $i \leq r$, h_i soit du type 1.6, et que, pour $i > r$, h_i soit trivial. Soit h_0 dans cette classe.

Le corps $E(G, h_0)$ est le sous-corps totalement réel de E engendré par $\sum_{i=1}^r \tau_i(f)$ pour $f \in F$.

Théorème 6.1. *Avec les notations précédentes, $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ admet un modèle canonique $M(G, h_0)$.*

Soit Z une extension quadratique totalement imaginaire de F . Soient $V' = V \otimes_F Z$, $L = B \otimes_F Z$, et G'' le sous-groupe algébrique de $\mathrm{GL}(V')$ engendré par G et Z^* :

$$(31) \quad 0 \longrightarrow F^* \longrightarrow G \times Z^* \xrightarrow{q} G'' \longrightarrow 0$$

Soit $x \mapsto \bar{x}$ l'involution de L produit tensoriel des involutions de B et Z . À un facteur dans F près, il existe sur V' une unique forme F -bilinéaire alternée ψ_Z . Si $F\psi$ est la forme F -bilinéaire alternée sur V' produit tensoriel de ψ et ψ_Z , on a

$$\psi(x, y) = \text{Tr}_{F/\mathbb{Q}}(F\psi(x, y)).$$

Choisissons, pour chaque place réelle de F , un plongement complexe de Z qui l'induit. On a alors $Z_{\mathbb{R}}^*(\mathbb{C}) = \prod_{i=1}^g \mathbb{C}^*$. Soit h_Z l'homomorphisme de S dans $Z_{\mathbb{R}}^*$ de coordonnées $h_i : S(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ égales à $(z \mapsto z^{-1})$ pour $i \leq r$, $(z \mapsto 1)$ pour $i > r$.

Pour chaque $h : S \rightarrow G_{\mathbb{R}}$ comme en 6.3, on pose, $h' = q \circ (h \times h_Z) : S \rightarrow G_{\mathbb{R}}''$.

Lemme 6.2. *Il existe $b \in L$ tel que, pour un choix convenable de ψ_Z , la forme $\psi(x, b \cdot h'(i)y)$ soit symétrique et définie positive sur $V' \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$.*

Ceci se vérifie après extension des scalaires de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$.

Ce lemme et 5.9 permettent de construire un module canonique de $M(G'', h'_0)$ (car G'' est contenu dans le groupe des similitudes symplectiques de $F\psi(x, by)$).

Appliquant 5.11 et 5.7, on en déduit un module faiblement canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ sur l'extension $E(Z^*, h_Z)$ de $E(G, h_0)$. On conclut par 5.10, 5.10.2 et le lemme suivant, qu'on peut déduire de 5.13.

Lemme 6.3. *Soit F un corps de nombres totalement réel, muni d'un ensemble S de plongements réels. Soit F^W le corps de nombres correspondant au sous-groupe de $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ qui stabilise S . Pour Z une extension quadratique totalement imaginaire de F , munie d'un ensemble T de plongements complexes, un au-dessus de chaque élément de S , soit de même $Z^W \supset F^W$ le corps des invariants du stabilisateur de T .*

Alors, pour toute extension E de F^W , il existe Z et T tels que Z^W soit linéairement disjoint de E .

Remarque 6.4. L'application canonique 1.13, 1.14

$$(32) \quad M_{\mathbb{C}}(G, h_0) \times M_{\mathbb{C}}(Z^*, h_Z) \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G'', h'_0)$$

s'interprète de la façon suivante. Chaque conjugué de h_0 définit sur $V_{\mathbb{C}}$ une bigraduation de Hodge invariante par F

$$V_{\mathbb{C}} = V^{-1,0} \oplus V^{0,-1} \oplus V^{0,0} \quad (V^{pq} = \overline{V^{qp}}).$$

On prendra garde que la graduation (par le poids) de $V_{\mathbb{C}}$ n'est pas définie sur $\mathbb{Q}$ si $r \neq g$. De même, $Z_{\mathbb{C}}$ est bigradué : $Z^{-1,0} \oplus Z^{0,-1} \oplus Z^{0,0}$. Le miracle est que le produit tensoriel

$$V_{\mathbb{C}}'' = (V \otimes_F Z)_{\mathbb{C}}, \text{ muni de la bigraduation } V''^{pq} = \bigoplus_{p'+q''=p, q'+q''=q} V^{p'q'} \otimes Z^{p''q''}$$

est le $\mathbb{Q}$ -vectoriel $V'' = V \otimes_F Z$, muni de la bigraduation $V''^{pq} = \overline{V''^{qp}}$ d'une variété abélienne.

RÉFÉRENCES

- [1] F. Bruhat et J. Tits, *Groupes algébriques simples sur un corps local*, Proc. on a conf. on local fields, p. 23–26, Driebergen 1966, Springer-Verlag.
- [2] P. Deligne, *Travaux de Griffiths*, Sémin. Bourbaki, 1969/70, exposé n° 376, Lecture Notes 180, Springer-Verlag.
- [3] G. Harder, *Über die Galoiskohomologie halbeinfacher Matrizen Gruppen II*, Math. Zeitschrift, **92** (1966), p. 396–415.
- [4] M. Kneser, *Schwache Approximation in algebraischen Gruppen*, Coll. sur la théorie des groupes algébriques, p. 41–52, Bruxelles 1962, CBRM.
- [5] K. Miyake, *On models of certain automorphic function fields*.
- [6] D. Mumford, *Geometric invariant theory*, Ergebnisse **34**, 1965, Springer-Verlag.
- [7] D. Mumford, *Families of abelian varieties*, in Alg. groups and discontinuous subgroups, p. 347–351, Boulder 1965, AMS.
- [8] D. Mumford, *A Note on Shimura's Paper "Discontinuous groups and Abelian Varieties"*, Math. Ann. 181 (1969), 345–351.
- [9] V.P. Platonov, *Le problème d'approximation forte et l'hypothèse de Kneser-Tits*, Izvestia Acad. Nauk CCCP, **33** (1969), p. 1211–1219 et **34** (1970), p. 775–777.
- [10] G. Shimura, *On analytic families of polarized abelian varieties and automorphic functions*, Ann. of Math., **78** (1963), p. 149–192.
- [11] G. Shimura, *On the field of definition for a field of automorphic functions I, II, III*, Ann. of Math., **80** (1964), p. 160–189 ; **81** (1965), p. 124–165 et **83** (1966), p. 377–385.
- [12] G. Shimura, *Construction of class fields and zeta functions of algebraic curves*, Ann. of Math. **85** (1967), p. 58–159.
- [13] G. Shimura, *Algebraic number fields and symplectic discontinuous groups*, Ann. of Math., **86** (1967), p. 503–592.
- [14] G. Shimura, *On canonical models of arithmetic quotients of bounded symmetric domains*, Ann. of Math., **91** (1970), p. 144–222.
- [15] G. Shimura, *Automorphic functions and number theory*, Lecture Notes in Math. 54, 1968, Springer-Verlag.
- [16] G. Shimura and T. Taniyama, *Complex multiplication of abelian varieties and its applications to number theory*, Publ. Math. Soc. Jap., **6** (1961).