

The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Volume I

Pages 151–175

Contents

24. On the Inverse Elliptic Functions (continued)	151
25. Mémoire sur les Fonctions Doublement Périodiques	156

[24] (continued)

On the Inverse Elliptic Functions.

[From the Cambridge Mathematical Journal, t. iv. (1845), pp. 257–277.]

each of them, except (E'), (the system for which, admitting no exponential, has already been given,) multiplied by an exponential e^{iax^2+bx} , the limits of a being $\pm 2\beta$, $\pm \frac{4}{3}\beta$, $\pm \beta$, $\pm 3\beta$, $\pm 2\beta$, $\pm 4\beta$. For the limiting values, b must be entirely impossible for the superior limit, and entirely possible for the inferior one.

Thus the last case is

$$\begin{aligned} \frac{1}{\gamma x g x G x \mathfrak{S} x} \cdot e^{iax^2+bx} &= \Sigma \Sigma \left[e^{ia(m,n)^2+b(m,n)} q_1^{\frac{1}{4}m^2} q^{\frac{1}{4}n^2} \{x - (m, n)\}^{-1} \right] \quad (H'), \\ &- \Sigma \Sigma \left[e^{ia(\bar{m},n)^2+b(\bar{m},n)} q_1^{\frac{1}{4}(m+\frac{1}{2})^2} q^{\frac{1}{4}n^2} \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1} \right] \\ &+ \Sigma \Sigma \left[e^{ia(m,\bar{n})^2+b(m,\bar{n})} q_1^{\frac{1}{4}m^2} q^{\frac{1}{4}(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (m, \bar{n})\}^{-1} \right] \\ &- \Sigma \Sigma \left[e^{ia(\bar{m},\bar{n})^2+b(\bar{m},\bar{n})} q_1^{\frac{1}{4}(m+\frac{1}{2})^2} q^{\frac{1}{4}(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1} \right]; \end{aligned}$$

in particular

$$\begin{aligned} \frac{1}{\gamma x g x G x \mathfrak{S} x} \cdot e^{i\beta x^2} &= \Sigma \Sigma q_1^{m^2} q^{n^2} \{x - (m, n)\}^{-1} \quad \dots (46), \\ &- \Sigma \Sigma q_1^{(m+\frac{1}{2})^2} q^{n^2} \{x - (\bar{m}, n)\}^{-1} \\ &+ \Sigma \Sigma q_1^{m^2} q^{(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (m, \bar{n})\}^{-1} \\ &+ \Sigma \Sigma q_1^{(m+\frac{1}{2})^2} q^{(n+\frac{1}{2})^2} \{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}, \end{aligned}$$

or the analogous formula obtained by changing β , q_1 , m into $-\beta$, q , n .

The function $\phi^2 x$, which is even, and for which $\lambda = 0$, cannot be expanded entirely in a series of partial fractions: but $(x - a)^{-1} \phi^2 x$ may be so expanded. Multiply by $(x - a)$; the second side has for its general term

$$(x - a)(Mx + N)\{x - (m, n)\}^{-1},$$

equivalent to

$$K' + (M'x + N')\{x - (m, n)\}^{-1}.$$

Summing all the K' 's, we have an equation of the form

$$\phi^2 x = A + \Sigma \Sigma \left[L\{x - (m, n)\}^{-2} + M\{x - (m, n)\}^{-1} \right] \quad \dots (47).$$

To determine the coefficients as simply as possible, change x into $x + \frac{1}{2}\omega + \frac{1}{2}\varpi i$,

$$-e^{-2}c^{-2}(\mathfrak{S}x)^{-2} = A + \Sigma \Sigma \left[L\{x - (m, n)\}^{-2} + M\{x - (m, n)\}^{-1} \right] \quad \dots (48),$$

$$L = -e^{-2}c^{-2} \left[\{x - (m, n)\}^2 (\mathfrak{S}x)^{-2} \right]_{x=(m,n)} \quad \dots (49),$$

$$M = -e^{-2}c^{-2} d_x \left\{ \{x - (m, n)\}^2 (\mathfrak{S}x)^{-2} \right\},$$

or writing $x + (m, n)$ for x , and therefore $x = 0$ in the values of L and M ,

$$L = -e^{-2}c^{-2}\{x^2(\mathfrak{S}x)^{-2}\} = e^{-2}c^{-2} \quad \dots (50),$$

$$M = -e^{-2}c^{-2}d_x\{x^2(\mathfrak{S}x)^{-2}\} = 0;$$

whence

$$\phi^2x = A - e^{-2}c^{-2}\Sigma\Sigma\{x - (m, n)\}^{-2} \quad \dots (51).$$

Integrating this last equation twice,

$$\int_0^x dx \int_0^x \phi^2 x = \frac{1}{2} A x^2 + e^{-2} c^{-2} \Sigma \Sigma l \{x - (m, n)\} \quad \dots (52),$$

or

$$\mathfrak{S}x = e^{-\frac{1}{2}e^2 c^2 \int_0^x dx \int_0^x \phi^2 x} \quad \dots (53),$$

an equation from which it is easy to determine the coefficient A .

Suppose for a moment $\phi_1 x = \int_0^x \phi^2 x dx$, $\phi_{11} x = \int_0^x \phi_1 x dx$; then, since $\phi^2(x+\omega) - \phi^2 x = 0$,

$$\phi_1(x+\omega) - \phi_1 x = \phi_1 \omega, \quad \phi_{11}(x+\omega) - \phi_{11} x = \phi_{11} \omega + x \phi_1 \omega.$$

But similarly $\phi_1 x - \phi_1(\omega - x) = 0$; whence

$$\phi_1 x + \phi_1(\omega - x) = \phi_1 \omega, \quad \phi_{11} x - \phi_{11}(\omega - x) + \phi_{11} \omega = x \phi_1 \omega;$$

whence, writing $x = \frac{\omega}{2}$,

$$\phi_1 \omega = 2\phi_1\left(\frac{\omega}{2}\right), \quad \phi_{11} \omega = \omega \phi_1\left(\frac{\omega}{2}\right), \quad \text{or } \phi_{11}(x+\omega) - \phi_{11} x = \phi_1\left(\frac{\omega}{2}\right)(2x+\omega).$$

Hence

$$\mathfrak{S}(x+\omega) = e^{-\frac{1}{2}e^2 c^2 [A x^2 + e^2 c^2 \phi_1(\omega/2)(2x+\omega)]} \mathfrak{S}x \quad \dots (54).$$

But

$$\mathfrak{S}(x+\omega) = e^{\beta \omega^2} q_1^{-1} \mathfrak{S}x = e^{\beta(2x\omega+\omega^2)} \mathfrak{S}x \quad \dots (55);$$

or, comparing these,

$$-e^2 c^2 \left\{ A - \frac{2}{\omega} \phi_1\left(\frac{\omega}{2}\right) \right\} = \beta \quad \dots (56),$$

$$-\frac{1}{2}e^2 c^2 A = \frac{1}{2}\beta - \frac{e^2 c^2}{\omega} \phi_1\left(\frac{\omega}{2}\right) \quad \dots (57),$$

or writing

$$M = -\frac{e^2 c^2}{\omega} \int_0^{\omega/2} \phi^2 x dx \quad \dots (58),$$

then

$$\mathfrak{S}x = e^{(\frac{1}{2}B-M)x^2 + e^2 c^2 \int_0^x dx \int_0^x \phi^2 x} \quad \dots (59),$$

which is the formula corresponding to the one of Jacobi's referred to at the beginning of this paper. Analogous formulae may be deduced from it by writing $x + \frac{\omega}{2}$, or $x + \frac{\omega i}{2}$, or $x + \frac{\omega}{2} + \frac{\omega i}{2}$, instead of x .

The following formulae, making the necessary changes of notation, are taken from Jacobi. We have

$$\phi'(x+a) - \phi'(x-a) = \frac{4\phi a f a F a \phi a \phi' x}{(1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x)^2} \quad \dots (59'),$$

whence

$$\int_{-a}^{\infty} \{\phi'(x+a) - \phi'(x-a)\} dx = \frac{2\phi a f a F a \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x} \quad \dots (60),$$

the first side of which is

$$\int_{-a}^{\infty} \phi'(x+a) dx - \int_{-a}^{\infty} \phi'(x-a) dx - 2 \int_0^{\infty} \phi'^2 a da \quad \dots (61).$$

Hence, multiplying by $e^2 c^2$, and observing the value of $\mathfrak{S}x$,

$$\frac{\mathfrak{S}'(x+a)}{\mathfrak{S}(x+a)} - \frac{\mathfrak{S}'(x-a)}{\mathfrak{S}(x-a)} - \frac{2\mathfrak{S}'a}{\mathfrak{S}a} = \frac{2e^2 c^2 \phi a f a F a \phi^2 x}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x} \quad \dots (62).$$

If in this case we interchange x , a and add,

$$\frac{\mathfrak{S}'x}{\mathfrak{S}x} - \frac{\mathfrak{S}'a}{\mathfrak{S}a} - \frac{\mathfrak{S}'(x+a)}{\mathfrak{S}(x+a)} = e^2 c^2 \phi a \phi x \phi(a+x) \quad \dots (63).$$

[By subtracting, we should have obtained an equation only differing from the above in the sign of a .]

Integrating the last equation but one, with respect to a ,

$$l\mathfrak{S}(x+a) + l\mathfrak{S}(x-a) - 2l\mathfrak{S}x - 2l\mathfrak{S}a = l(1 + e^2 c^2 \phi^2 x \phi^2 a),$$

the integral being taken from $a = 0$. Hence

$$\mathfrak{S}(x+a)\mathfrak{S}(x-a) = \mathfrak{S}^2 x \mathfrak{S}^2 a (1 + e^2 c^2 \phi^2 x \phi^2 a) \quad \dots (64);$$

whence also

$$\mathfrak{S}(x+a)\mathfrak{S}(x-a) = \mathfrak{S}^2 x \mathfrak{S}^2 a + e^2 c^2 \gamma^2 x \gamma^2 a,$$

$$\gamma(x+a)\gamma(x-a) = \gamma^2 x \mathfrak{S}^2 a - \gamma^2 a \mathfrak{S}^2 x,$$

$$g(x+a)g(x-a) = g^2 x \mathfrak{S}^2 a - c^2 \gamma^2 a \mathfrak{S}^2 x,$$

$$G(x+a)G(x-a) = G^2 x \mathfrak{S}^2 a + e^2 \gamma^2 a \mathfrak{S}^2 x,$$

these equations being obtained from the first by the change of x into $x + \frac{\omega}{2}$, $x + \frac{\overline{\omega}i}{2}$, $x + \frac{\omega}{2} + \frac{\overline{\omega}i}{2}$. They form a most important group of formulae in the present theory. By integrating the same formulae with respect to x , and representing by $\Pi(x, a)$ the integral

$$\int_0^{\infty} \frac{-e^2 c^2 \phi a f a F a \phi x dx}{1 + e^2 c^2 \phi^2 a \phi^2 x}, \quad \text{Jacobi obtains}$$

$$\Pi(x, a) = \frac{1}{2} l \frac{\mathfrak{S}(x-a)}{\mathfrak{S}(x+a)} + x \frac{\mathfrak{S}'a}{\mathfrak{S}a},$$

an equation which conducts him almost immediately to the formulae for the addition of the argument or of the parameter in the function Π . This, however, is not very

closely connected with the present subject. For some formulae also deduced from (63), by which $\frac{\mathfrak{S}(x-a)\mathfrak{S}(y-a)\mathfrak{S}(x+y+a)}{\mathfrak{S}(x+a)\mathfrak{S}(y+a)\mathfrak{S}(x+y-a)}$ is expressed in terms of the function ϕ , see Jacobi.

Note.—We have

$$\gamma_{\beta}x = x \prod \left(1 + \frac{x}{(m, n)}\right),$$

$$g_{\beta}x = \prod \left(1 + \frac{x}{(\bar{m}, n)}\right),$$

the limits of n being $\pm q$, and those of m being $\pm p$ in the first case, and $p, -p-1$ in the second case. Also $\frac{p}{q} = \infty$.

We deduce immediately

$$\gamma_{\beta}\left(x + \frac{\omega}{2}\right) = \left(x + \frac{\omega}{2}\right) \prod \left(1 + \frac{x + \frac{\omega}{2}}{(m, n)}\right) = \prod \left(1 + \frac{x}{(\bar{m}, n)}\right) \cdot \frac{\omega}{2} \prod \frac{(\bar{m}, n)}{(m, n)}$$

(paying attention to the omission of $(m=0, n=0)$ in $\gamma_{\beta}x$, and supposing that this value enters into the numerator of the expression just obtained, but not into its denominator). This is of the form

$$\gamma_{\beta}\left(x + \frac{\omega}{2}\right) = A \prod \left(1 + \frac{x}{(\bar{m}, n)}\right);$$

but the limits are not the same in this product and in $g_{\beta}x$. In the latter m assumes the value $-p-1$, which it does not in the former; hence

$$\gamma_{\beta}\left(x + \frac{\omega}{2}\right) = g_{\beta}x = A \cdot \prod_n \left(1 + \frac{x}{-(p + \frac{1}{2})\omega + n\varpi i}\right),$$

and the above product reduces itself to unity in consequence of all the values assumed by n being indefinitely small compared with the quantity $(p + \frac{1}{2})\omega$; we have therefore

$$\gamma_{\beta}\left(x + \frac{\omega}{2}\right) = Ag_{\beta}x \quad \dots (65),$$

and similar expressions for the remaining functions. To illustrate this further, suppose we had been considering, instead of $\gamma_{\beta}x$, the function $\gamma_{-\beta}x$, given by the same formula, but with $\frac{p}{q} = 0$, instead of $\frac{p}{q} = \infty$. We have in this case also

$$\gamma_{-\beta}\left(x + \frac{\omega}{2}\right) = g_{-\beta}x = A' \cdot \prod_n \left(1 + \frac{x}{-(p + \frac{1}{2})\omega + n\varpi i}\right),$$

A' different from A on account of the different limits. The divisor of the second side takes the form

$$\{x - (p + \frac{1}{2})\omega\} \Pi \left(1 + \frac{x - (p + \frac{1}{2})\omega}{n\varpi i} \right) \div (-p + \frac{1}{2})\omega \Pi \left(1 + \frac{(p + \frac{1}{2})\omega}{n\varpi i} \right),$$

where the extreme values of n are infinite as compared with p . This may be reduced to

$$\begin{aligned} & -\sin \frac{\pi}{\varpi i} \{x - (p + \frac{1}{2})\omega\} \div \sin \frac{\pi}{\varpi i} (p + \frac{1}{2})\omega, \\ & = e^{-\frac{\pi}{\varpi} [(p + \frac{1}{2})\omega - x]} \div e^{-\frac{\pi}{\varpi} [(p + \frac{1}{2})\omega]}, \end{aligned}$$

neglecting the exponentials whose indices are infinitely great and negative. Observing the value of β this becomes $e^{2\beta\omega x}$, and we have

$$\gamma_{-\beta} \left(x + \frac{\omega}{2} \right) = e^{2\beta\omega x} \cdot A' g_{-\beta} x;$$

a result of the form of that which would be deduced from the equations $\gamma_{-\beta} x = e^{2\beta x^2} \gamma_{\beta} x$, $g_{-\beta} x = e^{2\beta x^2} g_{\beta} x$, $\gamma_{\beta} \left(x + \frac{\omega}{2} \right) = A g_{\beta} x$. It is scarcely necessary to remark that $\gamma_{-\beta} x$ has the same relations to the change of x into $x + \frac{\varpi i}{2}$ as $\gamma_{\beta} x$ has to that of x into $x + \frac{\omega}{2}$.

25.

MÉMOIRE SUR LES FONCTIONS DOUBLEMENT
PÉRIODIQUES.

[From the *Journal des Mathématiques (Liouville)*, tom. x. (1845), pp. 385–420.]

Un des plus beaux résultats des recherches de l'illustre Abel, dans la théorie des fonctions elliptiques, consiste dans les expressions qu'il obtint pour les fonctions inverses ϕa , $f a$, $F a$ (équivalentes à-peu-près à $\sin am a$, $\cos am a$, $\Delta am a$) en forme de fractions avec un dénominateur commun : ce dénominateur et les trois numérateurs étant chacun le produit d'une suite infinie double de facteurs. On ne sait pas à quel point Abel avait poussé l'investigation des propriétés de ces nouvelles fonctions ; on trouve seulement, dans une Lettre à Legendre, imprimée parmi ses Œuvres [t. II. p. 259, Ed. 2, p. 274], qu'il s'en était occupé. Depuis, les fonctions H , Θ , qui sont essentiellement les mêmes que ces fonctions d'Abel, ont été l'objet des savantes recherches de M. Jacobi, à qui l'on doit, en particulier, la belle formule

$$\log \Theta(u) - \log \Theta(0) = \frac{1}{2}u^2\left(1 - \frac{E}{K}\right) - k^2 \int_0^u du \int_0^u du \sin^2 am u,$$

qui est vraiment fondamentale, et sur laquelle on peut dire que sa théorie est basée. Mais les expressions qu'obtient M. Jacobi pour les fonctions H , Θ , sont sous la forme d'un produit d'une suite infinie simple de facteurs, ce qui ne met pas à beaucoup près si bien en évidence la vraie nature de ces fonctions que les expressions d'Abel ; celles-ci sont, en outre, si analogues aux formules en produits infinis des fonctions circulaires, que l'on est seulement étonné que personne ne se soit avisé jusqu'ici de les poser, à priori, comme les définitions les plus simples des fonctions doublement périodiques, pour en déduire la théorie de ces fonctions. C'est de cette manière que je me propose de traiter ici la question. Je prends pour définitions les formules d'Abel, en supposant, pour plus de généralité, que les fonctions complètes Ω , T (K' , K de M. Jacobi) sont chacune de la forme $A + B\sqrt{-1}$ (ce qui donne lieu à quelques intégrations assez délicates). Et de ces seules équations, sans me servir en rien de la

théorie des fonctions elliptiques, je déduis les propriétés fondamentales des fonctions en question, et de là des fonctions elliptiques. On a ainsi quatre fonctions à considérer au lieu des deux H , Θ , dont l'une est pour ainsi dire analogue à un sinus et les autres à des cosinus. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est l'apparition d'un facteur exponentiel qui entre presque partout. On le prévoyait d'après les formules de M. Jacobi, mais ces formules n'expliquent pas, ce me semble, pourquoi ce facteur s'y rencontre : mon analyse le fait voir de la manière la plus satisfaisante. Ce facteur résulte, en effet, de ce que, pour les produits infinis doubles, il ne suffit pas, pour obtenir un résultat déterminé, d'attribuer aux deux entiers variables des valeurs quelconques depuis $-\infty$ jusqu'à ∞ , même en supposant l'égalité des valeurs positives et négatives ; il faut, en outre, établir une relation entre les valeurs infinies que reçoivent les deux variables. Mais dans les produits que je considère, on démontre qu'en supposant toujours cette égalité des valeurs positives et négatives, quelque liaison que l'on établisse entre les valeurs infinies, il résulte toujours la même valeur du produit, à un facteur exponentiel près, dont l'indice est le carré de x , multiplié par une constante dont la valeur s'exprime au moyen d'une intégrale définie double, et qui dépend de la liaison établie entre les valeurs infinies des variables. C'est-à-dire qu'en multipliant par un facteur exponentiel de cette forme, convenablement choisi, on peut changer à volonté la relation en question sans affecter la valeur du produit. Voilà l'idée fondamentale du Mémoire qui suit.

En me servant de quelques formules de M. Cauchy, relatives à la décomposition des fonctions en fractions simples, j'établis d'une manière rigoureuse des relations entre les trois quotients de mes quatre fonctions, qui sont les mêmes par lesquelles Abel démontre les propriétés fondamentales des fonctions ϕ , f , F . Ces formules une fois obtenues, on peut supposer connue toute la théorie des fonctions elliptiques. Ces théorèmes de M. Cauchy me conduisent, en outre, à un grand nombre de nouvelles formules qui contiennent des suites infinies doubles. Parmi celles-ci, il y en a une qui me fournit la démonstration du théorème déjà cité de M. Jacobi, théorème duquel il déduit une foule de résultats intéressants. Je finis en citant ceux qui se rapportent de plus près aux fonctions dont je parle. J'espère reprendre une autre fois la considération d'une autre partie de la théorie, dans laquelle j'entrevois des conclusions intéressantes.

Soient Ω , T des quantités finies quelconques, assujetties à la seule condition que la fraction $\Omega : T$ ne soit pas réelle. En représentant par m , n des entiers positifs ou négatifs quelconques, mettons, pour abréger,

$$m\Omega + nT = (m, n) \quad \cdots (1),$$

et considérons une expression de cette forme

$$u = x\Pi\left(1 + \frac{x}{(m, n)}\right) \quad \cdots (2),$$

où le symbole Π dénote, comme à l'ordinaire, le produit d'un nombre infini de facteurs que l'on obtient en donnant à m , n des valeurs entières quelconques, depuis $-\infty$ jusqu'à

$+\infty$, en excluant seulement la combinaison ($m = 0, n = 0$). Pour qu'une telle expression soit finie, il faut que pour chaque combinaison de valeurs de m, n , il y en ait une autre des mêmes valeurs avec les signes contraires. Cependant, comme on l'a déjà expliqué, cela ne suffit pas pour rendre déterminée la valeur de u . Soit ϕ une fonction de m, n qui ne change pas en changeant à la fois les signes de ces deux quantités; et imaginons que l'équation

$$\phi = T$$

représente une courbe fermée, dont tous les points s'éloignent, au cas limite de $T = \infty$, d'une distance infinie de l'origine. Cela posé, en donnant à m, n des valeurs entières qui satisfassent à cette condition $\phi \leq T$, et puis faisant $T = \infty$, on obtient pour u une valeur parfaitement déterminée, qui dépend de la forme de la fonction ϕ . Soit u' ce que devient la fonction u en changeant seulement l'équation aux limites dans l'équation analogue

$$\phi' = T;$$

on peut, pour simplifier, supposer que la courbe représentée par cette équation soit située entièrement en dehors de celle que représente l'équation

$$\phi = T,$$

mais cela n'est pas essentiel. Il est facile de trouver une relation très-simple qui existe entre ces deux expressions u' et u . En effet,

$$u' : u = \Pi \left(1 + \frac{x}{(m, n)} \right),$$

en donnant à m, n des valeurs qui satisfassent à la fois aux deux conditions $\phi > T$, $\phi' < T$. Donc, en considérant toujours ces valeurs,

$$\log u' - \log u = \log \Pi \left(1 + \frac{x}{(m, n)} \right) = \Sigma \log \Pi \left(1 + \frac{x}{(m, n)} \right) = x \Sigma \frac{1}{(m, n)} - \frac{1}{2} x^2 \Sigma \frac{1}{(m, n)^2} + \dots$$

Dans cette expression, les termes qui contiennent les puissances impaires x s'évanouissent, à cause des valeurs égales positives et négatives. Mais puisque, à la limite, m, n ne reçoivent que des valeurs infinies, on peut négliger les termes multipliés par x^4 , etc. Donc

$$\log u' - \log u = -\frac{1}{2} x^2 \Sigma \frac{1}{(m, n)^2},$$

ou enfin,

$$\log u' - \log u = -\frac{1}{2} A x^2, \quad u' = u e^{-\frac{1}{2} A x^2} \quad \dots (3),$$

où j'ai représenté par e la base du système hyperbolique de logarithmes, et où A est donné par l'équation

$$A = \Sigma \frac{1}{(m, n)^2} \quad \dots (4).$$

Il est facile de voir que l'on peut changer la sommation en intégration double, et écrire

$$A = \iint \frac{dm \, dn}{(m, n)^2} \quad \dots (5),$$

entre les mêmes limites qu'auparavant, c'est-à-dire que m, n doivent satisfaire aux deux conditions $\phi > T, \phi' < T$.

Prenons par exemple, pour limite supérieure,

$$(m^2 = m^2, \, n^2 = n^2),$$

et pour limite inférieure,

$$(m^2 + n^2 = r^2);$$

m, n sont censés contenir T comme facteur, de manière qu'ils deviennent infinis avec cette quantité; on suppose aussi $m > T, n > T$, mais cela est seulement pour la clarté.

Il devient nécessaire à ce point de définir de plus près les valeurs de Ω, T ; nous écrirons

$$\Omega = \omega + \omega' i, \quad T = v + v' i \quad \dots (6),$$

où $i = \sqrt{-1}$; ω, ω', v, v' sont des quantités réelles, telles que $\omega v' - \omega' v$ ne s'évanouit pas; c'est la condition pour que $\Omega : T$ contienne une partie imaginaire.

Avec les coordonnées polaires

$$A = \iint \frac{dr \, d\theta}{r(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2} = \int \frac{d\theta(\log r - \log T)}{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2}, \quad \dots (7),$$

en représentant par r ce que devient r à la limite supérieure; l'intégrale doit être prise depuis $\theta = 0$ jusqu'à $\theta = 2\pi$. On voit tout de suite que la partie qui contient $\log T$ s'évanouit; donc

$$A = \int_0^{2\pi} \frac{\log r \, d\theta}{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2}.$$

Soit α un angle positif plus petit que $\frac{1}{2}\pi$, tel que $\tan \alpha = \frac{m}{n}$, on a évidemment

$$r = \frac{\pm m}{\cos \theta},$$

depuis $\theta = -\alpha$ jusqu'à $\theta = +\alpha$, ou depuis $\theta = \pi - \alpha$ jusqu'à $\theta = \pi + \alpha$, et

$$r = \frac{\pm n}{\cos \theta'},$$

depuis $\theta = \alpha$ jusqu'à $\theta = \pi - \alpha$, ou depuis $\theta = \pi + \alpha$ jusqu'à $\theta = 2\pi - \alpha$ (le signe ambigu, de manière que r soit toujours positif). En réunissant les parties opposées de l'intégrale, on obtient

$$A = 2 \int_{-\alpha}^{+\alpha} \frac{(\log m - \log \cos \theta) \, d\theta}{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2} + 2 \int_{\alpha}^{\pi-\alpha} \frac{(\log n - \log \sin \theta) \, d\theta}{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2},$$

ou, en mettant dans la seconde intégrale $\frac{1}{2}\pi - \alpha = \alpha'$, et $\frac{1}{2}\pi - \theta$ au lieu de θ ,

$$A = 2 \int_{-\alpha}^{+\alpha} \frac{(\log m - \log \cos \theta) d\theta}{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2} + 2 \int_{-\alpha'}^{+\alpha'} \frac{(\log n - \log \cos \theta) d\theta}{(T \cos \theta + \Omega \sin \theta)^2}.$$

La première intégrale se réduit à

$$\begin{aligned} & \frac{2}{T} (\log m - \log \cos \theta) \frac{1}{\Omega + T \tan \theta} \quad (\text{entre les limites}) \\ & + \frac{2}{T} \int_{-\alpha}^{+\alpha} \frac{\tan \theta d\theta}{\Omega + T \tan \theta}, \\ & = -\frac{4(\log m - \log \cos \alpha) \tan \alpha}{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \alpha} + \frac{4}{T^2} \int_0^\alpha \frac{\tan^2 \theta d\theta}{\frac{\Omega^2}{T^2} - \tan^2 \theta} \\ & = -\frac{4(\log m - \log \cos \alpha) \tan \alpha}{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \alpha} + \frac{4}{\Omega^2 + T^2} \int_0^\alpha d\theta \left[1 - \frac{\Omega^2(1 + \tan^2 \theta)}{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \theta} \right]. \end{aligned}$$

L'intégrale, dans cette formule

$$\int_0^\alpha \frac{(1 + \tan^2 \theta) d\theta}{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \theta} = \int_0^{\tan \alpha} \frac{dx}{\Omega^2 - T^2 x^2},$$

s'exprime tout de suite par les logarithmes, mais il faut apporter une attention particulière à la manière de déterminer quelle valeur doit être attribuée à ce logarithme, dans le cas où la partie réelle en est négative. Je renvoie cette discussion à une Note. Voici le résultat auquel j'arrive.

En représentant par Lu la valeur principale du logarithme de u , quand il y a une valeur principale (c'est-à-dire quand la partie réelle de u est positive), et écrivant

$$L_{\pm} u = Lu, \text{ ou } L(-u) \pm \pi i,$$

selon qu'il y a une valeur principale de $\log u$, ou de $\log(-u)$, on a

$$\int_0^{\tan \alpha} \frac{dx}{\Omega^2 - T^2 x^2} = \frac{1}{2\Omega T} L_{\pm} \left(\frac{\Omega + T \tan \alpha}{\Omega - T \tan \alpha} \right) \quad \dots (8),$$

en prenant le signe supérieur pour $\omega v' - \omega' v$ positif, et le signe inférieur pour $\omega v' - \omega' v$ négatif.

La première partie de A se réduit donc à

$$\frac{4(\log m - \log \cos \alpha) \tan \alpha}{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \alpha} + \frac{4}{\Omega^2 + T^2} \left[\alpha - \frac{1}{2} \frac{\Omega}{T} L_{\pm} \frac{\Omega + T \tan \alpha}{\Omega - T \tan \alpha} \right],$$

ou, en rétablissant la valeur de α , à

$$\frac{4mn \log \sqrt{m^2 + n^2}}{m^2 \Omega^2 - n^2 T^2} + \frac{4}{\Omega^2 + T^2} \left[\arctan \frac{n}{m} - \frac{1}{2} \frac{\Omega}{T} L_{\pm} \frac{m\Omega + nT}{m\Omega - nT} \right].$$

Pour avoir la seconde partie de A , il faut changer m, n, Ω, T en n, m, T, Ω . En faisant cela, on change le signe de $\omega v' - \omega' v$; ainsi il faut écrire $L_{\mp}$ au lieu de $L_{\pm}$. En réunissant les deux parties, et mettant $\frac{1}{2}\pi$ au lieu de $\arctan \frac{n}{m} + \arctan \frac{m}{n}$, on obtient enfin

$$A = \frac{2}{\Omega^2 + T^2} \left\{ \frac{\pi}{T} + \frac{\Omega}{T} L_{\pm} \left(\frac{m\Omega + nT}{m\Omega - nT} \right) - \frac{T}{\Omega} L_{\mp} \left(\frac{nT + m\Omega}{nT - m\Omega} \right) \right\} \quad \dots (9),$$

formule que l'on pourrait rendre plus simple en distinguant les deux cas où le premier ou le second logarithme a une valeur principale; mais il vaut mieux la laisser sous cette forme.

On aurait pu croire que la valeur de A pourrait s'obtenir plus facilement en réduisant A à la différence de deux intégrales définies, les conditions pour les limites étant données, dans la première, par $m^2 < \mu^2$, $n^2 < \nu^2$, et, pour la seconde, par $m^2 + n^2 < T^2$, en désignant généralement les coordonnées par m, n . Cependant, de cette manière, on admet dans les deux intégrales les valeurs $m = 0$, $n = 0$, qui rendent infinie la fonction à intégrer. Ainsi la valeur de l'intégrale dépendrait du choix des variables, et l'on obtiendrait des résultats inexacts. Autrement dit, on obtiendrait de cette façon la valeur de A , à une quantité V près, qui est la différence de deux intégrales de la même forme, entre des limites $m^2 < \mu^2$, $n^2 < \nu^2$ ou $m^2 + n^2 < \tau^2$, μ, ν, τ des quantités infiniment petites. On voit tout de suite que V n'est pas pour cela infiniment petit (en effet, sa valeur dépend du rapport $\mu : \nu$ et nullement des valeurs absolues de ces quantités), et, pour en trouver la valeur, il faudrait se servir de l'analyse précédente.

Soit, comme exemple, $\frac{n}{m} = \infty$,

$$\begin{aligned} A &= \frac{2}{\Omega^2 + T^2} \left\{ \frac{\pi}{T} - \frac{\Omega}{T} L_{\pm}(1) - \frac{T}{\Omega} L_{\mp}(-1) \right\} \\ &= \frac{2\pi}{\Omega^2 + T^2} \left(1 \pm \frac{Ti}{\Omega} \right) = \frac{2\pi}{\Omega(\Omega + Ti)} = \pm \frac{2\pi i}{\Omega T} \cdot \frac{T}{\Omega + Ti}. \end{aligned}$$

De même, pour $\frac{n}{m} = \infty$,

$$A = \frac{2\pi i}{\Omega T} \cdot \frac{\Omega}{\Omega + Ti}.$$

En représentant par A' , A'' ces deux valeurs de A , on a

$$A' - A'' = \pm \frac{2\pi i}{\Omega T} = -2\xi \quad \dots (10),$$

où j'écris

$$\xi = \pm \frac{\pi i}{\Omega T} \quad \dots (11).$$

en prenant toujours le signe supérieur pour $\omega v' - \omega' v$ positif, et le signe inférieur pour $\omega v' - \omega' v$ négatif.

Soient u_β ce que devient u en prenant $\frac{m}{n} = \infty$, $u_{-\beta}$ ce que devient cette même fonction en prenant $\frac{n}{m} = \infty$; on a évidemment

$$u_{-\beta} = u_\beta e^{-\frac{1}{2}(A''-A')x^2} = e^{\xi x^2} u_\beta.$$

On peut donc s'imaginer une fonction U donnée par les équations

$$U = e^{-\frac{1}{2}\beta x^2} u_{-\beta} = e^{\frac{1}{2}\beta x^2} u_\beta \quad \dots (12).$$

On verra dans la suite que u_β est analogue à la fonction $H(u)$ de M. Jacobi. Il convient cependant, pour la symétrie, de considérer, au lieu de u_β , la nouvelle fonction U qui vient d'être définie. Quoique suffisamment donnée par ces équations, nous allons en chercher encore une autre définition. Pour cela, il faut trouver la valeur de l'intégrale définie qui détermine A , prise depuis la même limite inférieure jusqu'à celle donnée par l'équation

$$\text{mod}(m, n) = T.$$

Mettons, comme auparavant,

$$m = r \cos \theta, \quad n = r \sin \theta;$$

soient aussi

$$\Omega_1 = \omega - \omega' i, \quad T_1 = v - v' i.$$

L'équation pour la limite supérieure se réduit à

$$r^2(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)(\Omega_1 \cos \theta + T_1 \sin \theta) = T^2,$$

et celle pour la limite inférieure, à

$$r = T.$$

On trouve tout de suite

$$\begin{aligned} A &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{\log(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)(\Omega_1 \cos \theta + T_1 \sin \theta) d\theta}{(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)^2} \\ &= -\frac{1}{2T(\Omega + T \tan \theta)} \log(\Omega \cos \theta + T \sin \theta)(\Omega_1 \cos \theta + T_1 \sin \theta) \quad (\text{entre } \theta = 0, \theta = \frac{1}{2}\pi) \\ &\quad - \frac{1}{2T} \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + T \tan \theta} \left(\frac{T - \Omega \tan \theta}{\Omega + T \tan \theta} + \frac{T_1 - \Omega_1 \tan \theta}{\Omega_1 + T_1 \tan \theta} \right) \\ &= -\frac{1}{T} \int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + T \tan \theta} \left(\frac{T - \Omega \tan \theta}{\Omega + T \tan \theta} + \frac{T_1 - \Omega_1 \tan \theta}{\Omega_1 + T_1 \tan \theta} \right) \quad \dots (13). \end{aligned}$$

D'abord

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + T \tan \theta} \cdot \frac{T - \Omega \tan \theta}{\Omega + T \tan \theta} &= \int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} d\theta \left(\frac{M}{\Omega + T \tan \theta} + \frac{M_1}{\Omega_1 + T_1 \tan \theta} \right), \\ \int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + T \tan \theta} &= 2\Omega \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \theta} = \frac{2\Omega}{\Omega^2 + T^2} \int_0^{\frac{1}{2}\pi} d\theta \left[1 + \frac{\Omega^2 - T^2 \tan^2 \theta}{T^2(1 + \tan^2 \theta)} \right] \\ &= \frac{2\Omega}{\Omega^2 + T^2} \left\{ \theta + \frac{T}{2\Omega} L_{\pm} \left(\frac{\Omega + T \tan \theta}{\Omega - T \tan \theta} \right) \right\} \quad (\text{entre } \theta = 0, \theta = \tfrac{1}{2}\pi) \\ &= \frac{2\Omega}{\Omega^2 + T^2} \left\{ \frac{\pi}{2} \pm \frac{T}{2\Omega} \pi i \right\} = \frac{\pi}{\Omega + Ti}. \end{aligned}$$

On a de même, en remarquant qu'en changeant Ω, T en T, Ω , on change le signe de $\omega v' - \omega' v$,

$$\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega_1 + T_1 \tan \theta} = \frac{\pi}{\Omega_1 + T_1 i}.$$

D'un autre côté,

$$M = \frac{TT_1 + \Omega\Omega_1}{T\Omega_1 - T_1\Omega}, \quad M_1 = -\frac{T_1\Omega + \Omega_1 T}{T\Omega_1 - T_1\Omega};$$

cela donne

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + T \tan \theta} \cdot \frac{T_1 - \Omega_1 \tan \theta}{\Omega_1 + T_1 \tan \theta} &= \frac{\pi}{T\Omega_1 - T_1\Omega} \left\{ \frac{TT_1 + \Omega\Omega_1}{\Omega + Ti} - (\Omega + Ti) \right\} \\ &= \frac{\pi}{T\Omega_1 - T_1\Omega} \cdot \frac{TT_1 + \Omega\Omega_1 - (\Omega + Ti)(\Omega_1 + T_1 i) + 2T_1 Ti}{\Omega + Ti} = \pm \frac{\pi i}{\Omega + Ti} \pm \frac{2T_1 Ti}{\Omega T_1 - T\Omega_1}. \end{aligned}$$

ou enfin

$$\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + T \tan \theta} \cdot \frac{T_1 - \Omega_1 \tan \theta}{\Omega_1 + T_1 \tan \theta} = \frac{\pm \pi i}{\Omega + Ti} - \frac{\pi T_1}{\omega v' - \omega' v};$$

et de même

$$\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta (T - \Omega \tan \theta)}{(\Omega + T \tan \theta)^2} = \frac{\pm \pi i}{\Omega + Ti};$$

en omettant seulement le dernier terme de l'autre intégrale; ce que l'on peut vérifier, au reste, en différentiant par rapport à Ω, T l'équation

$$\int_{-\frac{1}{2}\pi}^{\frac{1}{2}\pi} \frac{d\theta}{\Omega + T \tan \theta} = \frac{\pi}{\Omega + Ti}.$$

On a donc, en ajoutant les deux parties qui composent l'intégrale,

$$A = -\frac{2\pi i}{\Omega T} \cdot \frac{\Omega}{\Omega + Ti} \pm \frac{T_1 \pi}{T(\omega v' - \omega' v)} \quad \dots (14).$$

Il est facile de voir, en écrivant

$$A = \frac{2\pi i}{\Omega T} \cdot \frac{\Omega}{\Omega + Ti} \pm \frac{\pi T_1 i}{T(T\Omega_1 - T_1\Omega)},$$

que cette expression ne change pas de valeur en mettant Ω_1 , T_1 , Ω , T au lieu de Ω , T , Ω_1 , T_1 , pourvu qu'on change aussi le signe de i ; cela doit évidemment être ainsi et peut servir de vérification.

Soit, pour un moment, u_τ ce que devient u en prenant pour limite l'équation

$$m^2 + n^2 = r^2,$$

et supposons que dans la fonction u on ait pour limite l'équation

$$\text{mod}(m, n) = T.$$

En retenant la valeur de A , qui vient d'être trouvée,

$$u = e^{-\frac{1}{2}Bx^2} u_\tau;$$

mais aussi

$$U = e^{\frac{\pi i}{2\Omega T}x^2} u_{-\beta} = e^{\frac{\pi i}{2\Omega T}x^2 + \frac{\Omega}{\omega v' - \omega' v}x^2} u_\tau,$$

à cause de l'équation, conséquence facile des résultats précédents,

$$u_{-\beta} = e^{\frac{\pi i}{\Omega T} \cdot \frac{\Omega}{\Omega + Ti} x^2} u_\tau.$$

En éliminant u_τ , on obtient, entre u , U , une équation de la forme

$$U = e^{-\frac{1}{2}Bx^2} u \quad \dots (15),$$

dans laquelle

$$\begin{aligned} B &= -A \pm \frac{\pi i}{\Omega T} + \frac{2\pi i}{\Omega + Ti} = \pm \frac{\pi i}{\Omega T} + \frac{T_1 \pi}{T(\omega v' - \omega' v)} \\ &= \frac{\pm \pi}{\Omega T(\omega v' - \omega' v)} \{2(\omega v' - \omega' v) + (\omega + \omega' i)(v - v' i)\}, \end{aligned}$$

ou enfin

$$B = \frac{\pm \pi(\omega v + \omega' v')}{\Omega T(\omega v' - \omega' v)} = \frac{\pi(\omega v + \omega' v')}{\Omega T \text{ mod}(\omega v' - \omega' v)} \quad \dots (16).$$

En rassemblant tous ces résultats, on a le système de formules

$$(A) \left\{ \begin{array}{l} U = e^{-\frac{1}{2}Bx^2}u = e^{\frac{1}{2}\beta x^2}u_\beta = e^{-\frac{1}{2}\beta x^2}u_{-\beta}, \\ \xi = \frac{\pi i}{\Omega T} \cdot \frac{(\omega v' - \omega' v)}{\text{mod}(\omega v' - \omega' v)}, \\ B = \frac{\pi(\omega v + \omega' v')}{\text{mod}(\omega v' - \omega' v)}; \\ u, u_\beta, u_{-\beta} \text{ des fonctions de la forme} \\ x\Pi\left(1 + \frac{x}{(m, n)}\right), \\ \text{mais avec des limites différentes, savoir :} \\ \text{mod}(m, n) = T, T = \infty, \text{ pour la fonction } u; \\ m^2 = m^2, n^2 = n^2, m = \infty, n = \infty, \frac{m}{n} = \infty, \text{ pour } u_\beta; \\ m^2 = m^2, n^2 = n^2, m = \infty, n = \infty, \frac{n}{m} = \infty, \text{ pour } u_{-\beta}. \end{array} \right.$$

À présent, il importe de remarquer que la fonction u_β est périodique à l'égard de Ω , de la manière d'un sinus ou d'un cosinus, mais ne l'est pas à l'égard de T ; de même $u_{-\beta}$ est périodique à l'égard de T , mais non à l'égard de Ω . Quant à U, u , elles ne sont simplement périodiques ni à l'égard de Ω , ni à l'égard de T . Pour démontrer cela, considérons, par exemple, l'équation

$$u_\beta = x\Pi\left(1 + \frac{x}{(m, n)}\right) \quad \dots (17)$$

[m depuis $-m$ jusqu'à m , n depuis $-n$ jusqu'à n , $m = \infty, n = \infty, \frac{m}{n} = \infty$, le système ($m = 0, n = 0$) toujours exclu]; en représentant par u'_β ce que devient u_β quand on écrit $x + \Omega$ au lieu de x , on a évidemment

$$\begin{aligned} u'_\beta &= (x + \Omega)\Pi\left(1 + \frac{x + \Omega}{(m, n)}\right) \\ &= -x\Pi\left(1 + \frac{1}{(m + 1, n)}\right) \cdot \Pi\left(\frac{m + 1, n}{(m, n)}\right), \end{aligned}$$

admettant dans le premier produit la combinaison ($m = 0, n = 0$), mais excluant ($m + 1 = 0, n = 0$), et excluant l'une et l'autre du second produit. Cette équation est de la forme

$$u'_\beta = A'x\Pi\left(1 + \frac{x}{(m + 1, n)}\right),$$

avec les mêmes limites que dans u ; donc

$$u'_\beta : u_\beta = A'\Pi\left(1 + \frac{x}{(m + 1, n)}\right) : \Pi\left(1 + \frac{x}{(-m, n)}\right).$$

où Π se rapporte à la seule variable n qui doit s'étendre depuis $-n$ jusqu'à n . Puisqu'ainsi n ne reçoit jamais des valeurs qui soient comparables à m , chacun de ces produits se réduit à l'unité, et l'on obtient

$$u'_\beta : u_\beta = A',$$

ou enfin

$$u'_\beta = -u_\beta \quad \dots (18),$$

en posant

$$x = -\frac{1}{2}\Omega,$$

et remarquant que u est fonction impaire de x , ce qui donne

$$A' = -1.$$

Soit de même u''_β ce que devient u_β en changeant x en $x + T$. On a pareillement

$$u''_\beta : u_\beta = A'' \Pi \left(1 + \frac{x}{(m, n+1)} \right) : \Pi \left(1 + \frac{x}{(m, -n)} \right),$$

où Π se rapporte à la seule variable m . Mais ici les produits ne se réduisent point à l'unité ; en effet,

$$\begin{aligned} & \Pi \left(1 + \frac{x}{(m, n+1)} \right) \div \Pi \left(1 + \frac{x}{(m, -n)} \right) \\ &= (x + nT) \Pi \left(1 + \frac{x - nT}{n\Omega} \right) : nT \Pi \left(1 + \frac{nT}{n\Omega} \right) \\ &= \sin \frac{\pi}{\Omega} (x + nT) : \sin \frac{\pi}{\Omega} nT. \end{aligned}$$

Mais quand la partie imaginaire de θ est infinie, on trouve

$$\sin \theta = \frac{1}{2i} (e^{\theta i} - e^{-\theta i}) = \pm \frac{1}{2i} e^{\pm \theta i},$$

selon que la partie réelle de θi est positive ou négative. Or la partie réelle de $\frac{\pi T}{\Omega}$ est de signe contraire à $\omega v' - \omega' v$; on a donc

$$\Pi \left(1 + \frac{x}{(m, n+1)} \right) = e^{\mp \frac{\pi i}{\Omega} x} \cdot e^{\mp \xi x};$$

de même,

$$\Pi \left(1 + \frac{x}{(m, -n)} \right) = e^{\xi x},$$

et de là

$$u''_\beta = A'' e^{-2\xi x} u_\beta \quad \dots (19),$$

équation de la même forme que celle que l'on obtiendrait en posant

et remarquant que $u_{-\beta}$ est périodique à l'égard de T . On voit aussi qu'en sommant par rapport à m , il est permis d'exprimer u_{β} par un produit infini simple, dont chaque facteur est de la forme

$$\sin \frac{\pi}{\Omega}(x + nT),$$

mais qu'on n'arrive pas à un tel résultat, en sommant par rapport à n . En effet, l'équation

$$u_{\beta} = e^{-\xi x^2} u_{-\beta}$$

fait voir que u_{β} s'exprime par un tel produit où chaque terme est de la forme

$$\sin \frac{\pi}{T}(x + m\Omega),$$

multiplié par le facteur exponentiel $e^{-\xi x^2}$. On établit de cette façon l'identité, à un facteur constant près, de u_{β} à $H(u)$; mais, à présent, pour éviter les longueurs, je ne me propose de considérer aucun de ces produits infinis simples.

Il faut maintenant, pour le développement de la théorie, introduire les trois fonctions qui correspondent au cosinus. Mettant, pour abréger,

$$\bar{m} = m + \frac{1}{2}, \quad \bar{n} = n + \frac{1}{2} \quad \dots (20),$$

j'écris

$$(B) \quad \begin{cases} \gamma x = e^{-\frac{1}{2}\beta x^2} x \Pi \left(1 + \frac{x}{(m, n)} \right), & \text{mod}(m, n) = T, \quad T = \infty. \\ gx = e^{-\frac{1}{2}\beta x^2} \Pi \left(1 + \frac{x}{(\bar{m}, n)} \right), & \text{mod}(\bar{m}, n) = T. \\ Gx = e^{-\frac{1}{2}\beta x^2} \Pi \left(1 + \frac{x}{(m, \bar{n})} \right), & \text{mod}(m, \bar{n}) = T. \\ Zx = e^{-\frac{1}{2}\beta x^2} \Pi \left(1 + \frac{x}{(\bar{m}, \bar{n})} \right), & \text{mod}(\bar{m}, \bar{n}) = T. \end{cases}$$

En représentant par $\gamma_{\beta}x$, $\gamma_{-\beta}x$, etc., ce que deviennent ces fonctions, et prenant pour limites

$$\begin{aligned} (m^2 = m^2, \quad n^2 = n^2), \quad (\bar{m}^2 = m^2, \quad n^2 = n^2), \\ (m^2 = m^2, \quad \bar{n}^2 = n^2), \quad (\bar{m}^2 = m^2, \quad \bar{n}^2 = n^2), \end{aligned}$$

où $\frac{m}{n} = \infty$ pour $\gamma_{\beta}x$, etc., $\frac{n}{m} = \infty$ pour $\gamma_{-\beta}x$, etc., on a, en général, en mettant J au lieu de l'une quelconque des lettres γ , g , G , Z ,

$$Jx = e^{\frac{1}{2}\beta x^2} J_{\beta}x = e^{-\frac{1}{2}\beta x^2} J_{-\beta}x \quad \dots (21),$$

où $J_{\beta}x$ est périodique à l'égard de Ω , et $J_{-\beta}x$ à l'égard de T . C'est cette équation remarquable qui définit la loi de périodicité des fonctions J , et de laquelle se déduisent presque toutes les propriétés de ces fonctions.

Il est clair qu'en changeant entre elles les quantités Ω , T (quantités que nous désignons comme les *fonctions complètes*), on ne change pas les fonctions γx , Zx , tandis que gx se change en Gx , et Gx en gx . On change de cette manière ξ en $-\xi$ et β en $-\beta$ (par exemple, $\gamma_\beta x$ se change en $\gamma_{-\beta} x$, etc.). Cette considération fait voir que toute propriété des fonctions J est double, et donne le moyen le plus facile pour passer d'une propriété quelconque à la propriété correspondante.

On tire immédiatement des définitions mêmes les équations

$$(C) \quad \begin{cases} \gamma(-x) = -\gamma x, & g(-x) = gx, & G(-x) = Gx, & Z(-x) = Zx; \\ \gamma 0 = 0, & g 0 = 1, & G 0 = 1, & Z 0 = 1; \\ \gamma' 0 = 1. \end{cases}$$

Il est facile de démontrer, de la même manière dont nous avons prouvé la périodicité de $J_\beta x$ à l'égard de Ω , que ces fonctions se changent l'une en l'autre, à un facteur constant près, en changeant x en $x + \frac{1}{2}\Omega$. Faisant donc attention à l'équation qui lie ensemble Jx et $J_\beta x$, on obtient le système de formules

$$\begin{cases} \gamma(x + \frac{1}{2}\Omega) = e^{\frac{1}{2}\beta\Omega x} A gx, \\ g(x + \frac{1}{2}\Omega) = e^{\frac{1}{2}\beta\Omega x} B \gamma x, \\ G(x + \frac{1}{2}\Omega) = e^{\frac{1}{2}\beta\Omega x} C Zx, \\ Z(x + \frac{1}{2}\Omega) = e^{\frac{1}{2}\beta\Omega x} D Gx. \end{cases} \quad \dots (22)$$

Pour déterminer A , B , C , D , posons

$$x = 0 \text{ ou } x = -\frac{1}{2}\Omega.$$

En écrivant, pour abréger,

$$(D) \quad e^{\frac{1}{4}\beta\Omega^2} = e^{\frac{\pi\Omega i}{4T}} = q_1^{-\frac{1}{4}},$$

on trouve

$$\begin{cases} A = \gamma(\frac{1}{2}\Omega) = q_1^{-\frac{1}{4}} \cdot g(\frac{1}{2}\Omega), \\ B = g(\frac{1}{2}\Omega) = -q_1^{-\frac{1}{4}} : \gamma(\frac{1}{2}\Omega), \\ C = G(\frac{1}{2}\Omega) = q_1^{-\frac{1}{4}} : Z(\frac{1}{2}\Omega), \\ D = Z(\frac{1}{2}\Omega) = q_1^{-\frac{1}{4}} : G(\frac{1}{2}\Omega); \end{cases} \quad \dots (23)$$

d'où l'on déduit cette équation de condition,

$$G(\frac{1}{2}\Omega)Z(\frac{1}{2}\Omega) = q_1^{-\frac{1}{2}} \quad \dots (24).$$

On a de même le système

$$\begin{cases} \gamma(x + \frac{1}{2}T) = e^{-\frac{1}{2}\beta T x} A' Gx, \\ g(x + \frac{1}{2}T) = e^{-\frac{1}{2}\beta T x} B' Zx, \\ G(x + \frac{1}{2}T) = e^{-\frac{1}{2}\beta T x} C' \gamma x, \\ Z(x + \frac{1}{2}T) = e^{-\frac{1}{2}\beta T x} D' Gx, \end{cases} \quad \dots (25)$$

De là, si

$$(E) \quad e^{-\frac{1}{4}\beta T^2} = e^{-\frac{\pi T i}{4\Omega}} = q^{-\frac{1}{4}},$$

ce qui donne

$$\log q \log q_1 = -\pi^2,$$

il résulte

$$\begin{cases} A' = \gamma(\frac{1}{2}T), \\ B' = g(\frac{1}{2}T) = q^{-\frac{1}{4}} : Z(\frac{1}{2}T), \\ C' = -q^{-\frac{1}{4}} : \gamma(\frac{1}{2}T), \\ D' = Z(\frac{1}{2}T) : g(\frac{1}{2}T); \end{cases} \quad \dots (26);$$

d'où nous tirons l'équation de condition

$$g(\frac{1}{2}T)Z(\frac{1}{2}T) = q^{-\frac{1}{2}} \quad \dots (27).$$

En posant $x = \frac{1}{2}T$ dans l'équation pour $\gamma(x + \frac{1}{2}\Omega)$ et $x = \frac{1}{2}\Omega$ dans l'équation pour $\gamma(x + \frac{1}{2}T)$, on obtient aussi

$$\gamma(\frac{1}{2}\Omega)g(\frac{1}{2}T) = -i\gamma(\frac{1}{2}T)G(\frac{1}{2}\Omega) \quad \dots (28),$$

et l'on déduirait cette même équation, ou une équation équivalente, des autres formules, de manière qu'on ne peut pas trouver d'autres équations de condition.

Enfin, en rapprochant ces systèmes, on obtient

$$\begin{cases} \gamma(x + \frac{1}{2}\Omega + \frac{1}{2}T) = e^{\frac{1}{2}\beta(\Omega-T)x} A'' Zx, \\ g(x + \frac{1}{2}\Omega + \frac{1}{2}T) = e^{\frac{1}{2}\beta(\Omega-T)x} B'' Gx, \\ G(x + \frac{1}{2}\Omega + \frac{1}{2}T) = e^{\frac{1}{2}\beta(\Omega-T)x} C'' gx, \\ Z(x + \frac{1}{2}\Omega + \frac{1}{2}T) = e^{\frac{1}{2}\beta(\Omega-T)x} D'' \gamma x, \end{cases} \quad \dots (29),$$

avec les équations suivantes pour les coefficients,

$$\begin{cases} A'' = (-1)^{\frac{1}{2}} \gamma(\frac{1}{2}\Omega)g(\frac{1}{2}T), \\ B'' = -(-1)^{\frac{1}{2}} q_1^{-\frac{1}{4}} \gamma(\frac{1}{2}T) : \gamma(\frac{1}{2}\Omega), \\ C'' = (-1)^{\frac{1}{2}} R(\frac{1}{2}\Omega)Z(\frac{1}{2}T), \\ D'' = -(-1)^{\frac{1}{2}} q^{-\frac{1}{4}} Z(\frac{1}{2}\Omega) : \gamma(\frac{1}{2}T). \end{cases} \quad \dots (30).$$

En rassemblant les équations entre $J(\frac{1}{2}\Omega)$, $J(\frac{1}{2}T)$, on a

$$\begin{cases} g(\frac{1}{2}\Omega) = 0, \\ G(\frac{1}{2}T) = 0, \\ G(\frac{1}{2}\Omega)Z(\frac{1}{2}\Omega) = q_1^{-\frac{1}{2}}, \\ g(\frac{1}{2}T)Z(\frac{1}{2}T) = q^{-\frac{1}{2}}, \\ \gamma(\frac{1}{2}\Omega)g(\frac{1}{2}T) = -i\gamma(\frac{1}{2}T)G(\frac{1}{2}\Omega), \end{cases} \quad \dots (31).$$

d'où l'on conclut les formules

$$\begin{aligned}
B'C'' : A''D'' &= B'D' : A'C' = CD : AB = -1, \\
A'B' : C'D' &= -A''B'' : C''D'' = -\gamma^2(\tfrac{1}{2}T) : Z^2(\tfrac{1}{2}T), \\
A''C'' : B''D'' &= -A'C' : B'D' = \gamma^2(\tfrac{1}{2}\Omega) : Z^2(\tfrac{1}{2}\Omega) = -\gamma^2(\tfrac{1}{2}T), \quad \cdots (32), \\
AD : BC &= -A'D' : B'C' = \gamma^2(\tfrac{1}{2}\Omega),
\end{aligned}$$

dont nous aurons bientôt besoin.

On peut passer maintenant à ce système général de formules, où j'écris $(-)^m$ au lieu de $(-1)^m$:

$$\begin{aligned}
&\left\{ \begin{aligned}
&\Theta = (-)^{mn} e^{2\beta(m, -n)x} q_1^{-\frac{1}{2}m^2} q^{-\frac{1}{2}n^2}; \\
&\text{là, comme toujours, } (m, -n) = m\Omega - nT; \\
&\gamma\{x + (m, n)\} = (-)^{m+n} \Theta \gamma x, \\
&g\{x + (m, n)\} = (-)^m \Theta g x, \\
&G\{x + (m, n)\} = (-)^n \Theta G x, \\
&Z\{x + (m, n)\} = \Theta Z x; \\
&\Phi = (-)^{mn + \frac{1}{2}m} e^{2\beta(\bar{m}, -n)x} q_1^{-\frac{1}{2}\bar{m}^2} q^{-\frac{1}{2}n^2}; \\
&\gamma\{x + (\bar{m}, n)\} = (-)^{m+n} \Phi A g x, \\
&g\{x + (\bar{m}, n)\} = (-)^m \Phi B \gamma x, \\
&G\{x + (\bar{m}, n)\} = (-)^n \Phi C Z x, \\
&Z\{x + (\bar{m}, n)\} = \Phi D G x; \\
&\Psi = (-)^{mn + \frac{1}{2}n} e^{2\beta(m, -\bar{n})x} q_1^{-\frac{1}{2}m^2} q^{-\frac{1}{2}\bar{n}^2}; \\
&\gamma\{x + (m, \bar{n})\} = (-)^{m+n} \Psi A' G x, \\
&g\{x + (m, \bar{n})\} = (-)^m \Psi B' Z x, \\
&G\{x + (m, \bar{n})\} = (-)^n \Psi C' \gamma x, \\
&Z\{x + (m, \bar{n})\} = \Psi D' g x; \\
&X = (-)^{mn + \frac{1}{2}m + \frac{1}{2}n} e^{2\beta(\bar{m}, -\bar{n})x} q_1^{-\frac{1}{2}\bar{m}^2} q^{-\frac{1}{2}\bar{n}^2}; \\
&\gamma\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} = (-)^{m+n} X A'' Z x, \\
&g\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} = (-)^m X B'' G x, \\
&G\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} = (-)^n X C'' g x, \\
&Z\{x + (\bar{m}, \bar{n})\} = X D'' \gamma x.
\end{aligned} \right. \quad (F)
\end{aligned}$$

Soit $x = 0$:

$$(G) \quad \left\{ \begin{array}{l} \Theta_0 = (-)^{mn} q_1^{-\frac{1}{2}m^2} q^{-\frac{1}{2}n^2}; \\ \gamma(m, n) = 0, \quad \gamma'(m, n) = (-)^{m+n} \Theta_0, \\ g(m, n) = (-)^m \Theta_0, \\ G(m, n) = (-)^n \Theta_0, \\ Z(m, n) = \Theta_0; \\ \Phi_0 = (-)^{mn+\frac{1}{2}m} q_1^{-\frac{1}{2}\bar{m}^2} q^{-\frac{1}{2}n^2}; \\ \gamma(\bar{m}, n) = (-)^{m+n} \Phi_0 A, \\ g(\bar{m}, n) = 0, \quad g'(\bar{m}, n) = (-)^m \Phi_0 B, \\ G(\bar{m}, n) = (-)^n \Phi_0 C, \\ Z(\bar{m}, n) = \Phi_0 D; \\ \Psi_0 = (-)^{mn+\frac{1}{2}n} q_1^{-\frac{1}{2}m^2} q^{-\frac{1}{2}\bar{n}^2}; \\ \gamma(m, \bar{n}) = (-)^{m+n} \Psi_0 A', \\ g(m, \bar{n}) = (-)^m \Psi_0 B', \\ G(m, \bar{n}) = 0, \quad G'(m, \bar{n}) = (-)^n \Psi_0 C', \\ Z(m, \bar{n}) = \Psi_0 D'; \\ X_0 = (-)^{mn+\frac{1}{2}m+\frac{1}{2}n} q_1^{-\frac{1}{2}\bar{m}^2} q^{-\frac{1}{2}\bar{n}^2}; \\ \gamma(\bar{m}, \bar{n}) = (-)^{m+n} X_0 A'', \\ g(\bar{m}, \bar{n}) = (-)^m X_0 B'', \\ G(\bar{m}, \bar{n}) = (-)^n X_0 C'', \\ Z(\bar{m}, \bar{n}) = 0, \quad Z'(\bar{m}, \bar{n}) = X_0 D''. \end{array} \right.$$

On a de suite, en prenant les différentielles des logarithmes des fonctions Jx ,

$$(H) \quad \left\{ \begin{array}{l} \gamma'x : \gamma x = -Bx + \Sigma\{x - (m, n)\}^{-1}, \\ g'x : gx = -Bx + \Sigma\{x - (\bar{m}, n)\}^{-1}, \\ G'x : Gx = -Bx + \Sigma\{x - (m, \bar{n})\}^{-1}, \\ Z'x : Zx = -Bx + \Sigma\{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1}. \end{array} \right.$$

(B est le coefficient de x^2 , dans l'exponentielle $e^{-\frac{1}{2}Bx^2}$ des équations (B); il n'y a pas à craindre de le confondre avec le B qui entre dans les équations pour $\gamma(\bar{m}, n)$, etc. : c'est par hasard que j'ai pris deux fois la même lettre.)

Réduisons en fractions simples la fonction

$$gx Gx : \gamma x Zx.$$

En écrivant

$$gx Gx : \gamma x Zx = \Sigma \left[L\{x - (m, n)\}^{-1} + M\{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1} \right],$$

on obtient

$$\begin{aligned} L &= g(m, n)G(m, n) : \gamma'(m, n)Z(m, n) = 1, \\ M &= g(\bar{m}, \bar{n})G(\bar{m}, \bar{n}) : \gamma(\bar{m}, \bar{n})Z'(\bar{m}, \bar{n}) = B''C'' \div A''D'' = -1. \end{aligned}$$

Donc

$$gx Gx : \gamma x Zx = \Sigma\{x - (m, n)\}^{-1} - \Sigma\{x - (\bar{m}, \bar{n})\}^{-1},$$

c'est-à-dire

$$gx Gx : \gamma x Zx = (\gamma'x : \gamma x) - (Z'x : Zx).$$

(Nous allons bientôt justifier, au moyen d'un théorème de M. Cauchy, l'emploi de cette méthode de décomposition en fractions simples qui ne s'applique pas toujours aux fonctions transcendentes.)

On obtient de même

$$(I) \quad \begin{cases} gx Zx : \gamma x Gx = (\gamma'x : \gamma x) - (G'x : Gx), \\ Gx Zx : \gamma x gx = (\gamma'x : \gamma x) - (g'x : gx), \\ -b^2\gamma x Zx : gx Gx = (g'x : gx) - (G'x : Gx), \\ e^2\gamma x gx : Gx Zx = (G'x : Gx) - (Z'x : Zx), \\ c^2\gamma x Gx : Zx gx = (Z'x : Zx) - (g'x : gx), \end{cases}$$

en mettant, pour abréger,

$$(J) \quad \begin{cases} \gamma(\frac{1}{2}T) : Z(\frac{1}{2}T) = \frac{1}{e}, \\ \gamma(\frac{1}{2}\Omega) : Z(\frac{1}{2}\Omega) = \frac{1}{c}, \\ \gamma(\frac{1}{2}\Omega) : G(\frac{1}{2}\Omega) = -i\gamma(\frac{1}{2}T) : g(\frac{1}{2}T) = \frac{1}{b}. \end{cases}$$

Donc, en éliminant les fonctions dérivées,

$$G^2x - Z^2x = e^2\gamma^2x,$$

$$g^2x - G^2x = -b^2\gamma^2x,$$

$$Z^2x - g^2x = c^2\gamma^2x,$$

¹ J'ai écrit $\frac{1}{c}$ au lieu de $\frac{1}{e}$ pour me conformer à la notation d'Abel; il est à peine nécessaire de remarquer que c, e sont, en général, l'une et l'autre des quantités imaginaires.

ce qui donne, en ajoutant,

$$(K) \quad b^2 = e^2 + c^2, \text{ ou } b = \sqrt{e^2 + c^2},$$

en nous retiendrons désormais la lettre b dans cette signification. Puis

$$(L) \quad \begin{cases} g^2x = Z^2x - c^2\gamma^2x, \\ G^2x = Z^2x + e^2\gamma^2x. \end{cases}$$

Soient maintenant

$$(M) \quad \begin{cases} \phi x = \gamma x : Zx, \\ fx = gx : Zx, \\ Fx = Gx : Zx. \end{cases}$$

On obtient

$$(N) \quad \begin{cases} f^2x = 1 - c^2\phi^2x, \\ F^2x = 1 + e^2\phi^2x; \end{cases}$$

$$(O) \quad \begin{cases} \phi'x = fx Fx, \\ f'x = -c^2\phi x Fx, \\ F'x = e^2\phi x fx. \end{cases}$$

Ces équations sont précisément les équations fondamentales d'Abel (*Œuvres*, t. i., p. 143 [Ed. 2, p. 268]), et il en déduit

$$(P) \quad \begin{cases} \phi(x+y) = \frac{\phi x Fy fy + \phi y fx Fx}{1 + e^2c^2\phi^2x \phi^2y}, \\ f(x+y) = \frac{fx fy - c^2\phi x \phi y Fx Fy}{1 + e^2c^2\phi^2x \phi^2y}, \\ F(x+y) = \frac{Fx Fy + e^2\phi x \phi y fx fy}{1 + e^2c^2\phi^2x \phi^2y}, \end{cases}$$

qui sont les formules connues pour l'addition des fonctions elliptiques.

En effet, on peut écrire l'équation

$$\phi'x = fx Fx$$

sous la forme

$$1 = \frac{\phi'x}{\sqrt{(1 - c^2\phi^2x)(1 + e^2\phi^2x)}},$$

ou, en mettant $y = \phi x$,

$$(Q) \quad x = \int_0^{\phi x} \frac{dy}{\sqrt{(1 - c^2y^2)(1 + e^2y^2)}};$$

on peut donc de ce point supposer connues toutes les propriétés des fonctions elliptiques. On a, par exemple,

$$\phi(\tfrac{1}{2}T) = \tfrac{1}{e}, \quad \phi(\tfrac{1}{2}\Omega) = \tfrac{1}{c},$$

et de là

$$(R) \quad \begin{cases} \tfrac{1}{2}\Omega = \int_0^{\frac{1}{c}} \frac{dy}{\sqrt{(1-c^2y^2)(1+e^2y^2)}}, \\ \tfrac{1}{2}T = \int_0^{\frac{1}{e}} \frac{dy}{\sqrt{(1-c^2y^2)(1+e^2y^2)}}, \end{cases}$$

qui déterminent Ω , T en fonction de c , e . Il paraît au premier abord que T , Ω soient des fonctions parfaitement déterminées de c , e . J'ai des raisons pour croire que cela n'est pas précisément le cas, et que la question admettrait des développements intéressants; mais je réserve ce sujet pour une autre occasion.

On peut, à l'aide des équations entre $\gamma(\tfrac{1}{2}\Omega)$, etc., et les quantités c , e , exprimer cette suite de fonctions en termes de c , e . On déduit :

$$(S) \quad \begin{cases} \gamma(\tfrac{1}{2}\Omega) = b^{-\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \quad \gamma(\tfrac{1}{2}T) = ib^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}; \\ g(\tfrac{1}{2}\Omega) = 0, \quad g(\tfrac{1}{2}T) = b^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}; \\ G(\tfrac{1}{2}\Omega) = b^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \quad G(\tfrac{1}{2}T) = 0; \\ Z(\tfrac{1}{2}\Omega) = b^{-\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \quad Z(\tfrac{1}{2}T) = b^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}; \end{cases}$$

et de là

$$(T) \quad \begin{cases} A = b^{-\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \quad A' = ib^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}, \quad A'' = (-)^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}q^{-\frac{1}{4}}; \\ B = -b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \quad B' = b^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}, \quad B'' = -(-)^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}e^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}q^{-\frac{1}{4}}; \\ C = b^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \quad C' = -ib^{\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}, \quad C'' = (-)^{\frac{1}{2}}c^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}q^{-\frac{1}{4}}; \\ D = b^{-\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}, \quad D' = b^{-\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q^{-\frac{1}{4}}, \quad D'' = -(-)^{\frac{1}{2}}ic^{\frac{1}{2}}e^{\frac{1}{2}}q_1^{-\frac{1}{4}}q^{-\frac{1}{4}}; \end{cases}$$

qu'on doit introduire dans toutes les formules où entrent les quantités A , B , etc.

Voici le théorème de M. Cauchy (*Exercices de Mathématiques*, tome ii. page 289) :

“Si, en attribuant au module r de la variable

$$z = r(\cos p + i \sin p)$$

des valeurs infiniment grandes, on peut les choisir de manière que les deux fonctions

$$\frac{fz + f(-z)}{2}, \quad \frac{fz - f(-z)}{2z}$$

deviennent sensiblement nulles, quel que soit l'angle p , ou du moins que chacune de ces fonctions reste toujours finie ou infiniment petite, et ne cesse d'être infiniment

petite, en demeurant finie, que dans le voisinage de certaines valeurs particulières de p , on aura

$$fx = \Sigma \frac{((fz))}{x - z},$$

pourvu qu'on réduise le résidu intégral à sa valeur principale."

On se rappelle que cela veut dire qu'en supposant ces conditions satisfaites, la fonction fx peut s'exprimer de la manière ordinaire comme la somme d'une suite de fractions simples, mais qu'il faut étendre d'abord la sommation aux racines de l'équation

$$\frac{1}{fz} = 0,$$

dont les modules sont inférieurs à une certaine limite qu'on fait alors infinie.

Soit, par exemple,

$$fz = e^{iaz^2+bz} \frac{Tz}{T_1z} \quad \dots (33),$$

où Tx , T_1x ne contiennent que des facteurs qui sont des puissances entières des fonctions γx , gx , Gx , Zx . En supposant que r n'est d'aucune des formes

$$\text{mod}(m, n), \text{mod}(\bar{m}, n), \text{mod}(m, \bar{n}), \text{mod}(\bar{m}, \bar{n}),$$

mais, d'ailleurs, une quantité infinie quelconque, on peut toujours écrire

$$z = r(\cos p + i \sin p) = (m, n) + \theta \quad \dots (34),$$

où θ est une quantité finie telle qu'aucune des fonctions $\gamma\theta$, $g\theta$, $G\theta$, $Z\theta$ ne s'évanouit, m , n sont des entiers dont l'un au moins est infini, mais qui varient depuis $-\infty$ jusqu'à ∞ , avec l'angle p . Soit δ le degré de Tx , δ_1 celui de T_1x à l'égard de γx , etc.; soit aussi $\lambda = \delta_1 - \delta$; on a, en général, une équation de cette forme,

$$fz = e^{ia(m,n)^2+b(m,n)} q_1^{\frac{1}{4}\lambda m^2} q^{\frac{1}{4}\lambda n^2} F \quad \dots (35),$$

où F est fini. En supposant donc que la partie réelle de

$$a(m, n)^2 = \lambda\beta m^2\Omega^2 + \lambda\beta n^2T^2 \quad \dots (36)$$

est négative quelles que soient les valeurs de m , n , on a

$$fz = 0,$$

et de même

$$\frac{fz + f(-z)}{2} = 0, \quad \frac{fz - f(-z)}{2z} = 0.$$

Si, au contraire, cette partie réelle est positive, ces trois fonctions sont toujours infinies. Il y a cependant un cas particulier à considérer, savoir, celui où cette partie réelle se réduit à $P\omega^2$ ou Qn^2 ; P , Q étant des quantités positives. Il faut ici que le