

# Li Ye, Ceyuan Haijing, Arabic translation volumes 1-6 and 10-12

Arabic Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

---

## About this reader

- Reader type - Arabic Translation.
- The visible PDF is the front-facing translation reader; source TeX and support material are in the ZIP artifacts.

# 測圓海鏡

مرآة البحر لقياس الدائرة

Ceyuan Haijing — Sea Mirror of Circle Measurements

## 卷一—卷三

المجلد الأول — المجلد الثالث  
Volumes I – III

元 李冶 撰

ليه لي جيه، 1192–1279 م  
(Li Ye / Li Zhi, 1192–1279 CE)

以天元術解勾股容圓一百七十問

حل مئة وسؤال وسبعين مسألة في الدائرة المحاطة بالمثلث القائم  
السماء عنصر بطريقة

*Using the Method of the Celestial Element (Tian Yuan Shu)  
to Solve 170 Problems on the Inscribed Circle*

باستخدام طريقة عنصر السماء لحل 170 مسألة في الدائرة المحاطة

A foundational text of medieval Chinese algebra,  
completed in the year 1248 of the Common Era.

أحد النصوص الأساسية في جبر العصور الوسطى الصينية،  
ميلادية 1248 سنة في أنجز

**Contents**



## 2 Original Preface / المدمة الأصلية

數本難窮，吾欲以力強窮之，彼其數不惟不能得其凡，而吾之力且憊矣。然則數果不可以窮耶？既已名之數矣，則又何為而不可窮也。

故謂數為難窮斯可，謂數為不可窮斯不可。何則？彼其冥冥之中，固有昭昭者存，夫昭昭者其自然之數也。非自然之數，其自然之理也。數一出於自然，吾欲以力強窮之，使隸首復生亦末如之何也已。

苟能推自然之理，以明自然之數，則雖遠而乾端坤倪，幽而神情鬼狀，未有不合者矣。

予自幼喜算數，恆病夫考圓之術例出於牽強，殊乖於自然，如古率、徽率、密率之不同，截弧、截矢、截背之互見，內外諸角，析剖支條，莫不各自名家，與世作法。及反覆研究，卒無以當吾心焉。

老大以來，得洞淵九容之說，日夕玩繹，而向之病我者，使爆然落去而無遺余。山中多暇，客有從余求其說者，於是乎又為衍之，遂累一百七十間。

既成編，客復目之《測圓海鏡》，蓋取夫天臨海鏡之義也。

昔半山老人集《唐百家詩選》，自謂廢日力於此，良可惜。明道先生以上蔡謝君記誦為玩物喪志。夫文史尚矣，猶之為不足貴，況九九賤技能乎！

嗜好酸鹹，平生每痛自戒勅，竟莫能已，類有物憑之者，吾亦不知其然而然也。

故嘗私為之解曰：由技兼於事者言之，夷之禮，夔之樂，亦不免為一技。由技進乎道者言之，石之斤，扁之輪，非聖人之所與乎。

覽吾之編，察吾苦心，其憫我者當百數，其笑我者當千數。乃若吾之所自得，則自得焉耳，寧復為人憫笑計哉。

李冶序

أصل الأعداد يصعب استنفاده، ولو حاولت إجباره بالقوة، لما استطعت الحصول على جوهره، بل وستنضب قواي. فهل الأعداد لا تُستنفد حقًا؟ بما أنها سُميت «أعدادًا»، فكيف لا يمكن استنفادها؟

فمن الجائز القول إنَّ الأعداد يصعب استنفادها، لكن لا يجوز القول إنها لا تُستنفد. ولماذا؟ ففي وسط الظلام يوجد نورٌ باطن، وهذا النور هو العدد الطبيعي. بل هو ليس العدد الطبيعي وحسب، بل هو المبدأ الطبيعي. بما أن الأعداد تنبثق من الطبيعة، فلو حاولت إجبارها بالقوة، حتى لو بُعث لي شو [مخترع الحساب الأسطوري] من جديد، لعجز عن الأمر.

فإذا أمكن استنباط المبادئ الطبيعية لإيضاح الأعداد الطبيعية، فحتى أقاصي السماء وأطراف الأرض، وحتى أسرار الأرواح والأشباح، لن يخلوا من التوافق.

منذ صغري أحببت الحساب، وكنت أشكو دومًا أنَّ طرق دراسة الدائرة تبدو مُكرهة وغير طبيعية — فالنسب القديمة والنسب الدقيقة والنسب المُحكَّمة تختلف، والأقواس والأوتار والظهور وتباين، والزوايا الداخلية والخارجية تُحلَّل إلى فروع. كل مدرسة وضعت اسمها وطريقتها للعالم. غير أنَّ دراستها المتكررة لم تُشبع فضولي.

في الكبر، حصلت على نظرية «تسعة استيعابات دونغ يوان»

[洞淵九容]، وقد تأملتها ليل نهار، فزال ما كان يؤلمني دفعةً واحدةً بلا أثر. وإذا كانت لدي فراغات في الجبال، طلب مني ضيوفي شرح هذه النظرية، فوسَّعتها حتى بلغت مئة وسبعين مسألة.

ولما اكتمل التأليف، أطلق عليه أحد الضيوف اسم «مرآة البحر لقياس الدائرة»، مستوحى من معنى «السماء التي تُشرف على مرآة البحر».

لقد جمع «شيخ نصف الجبل» مختاراتٍ من شعر مئة شاعرٍ من تانغ، معتبرًا ذلك إضاعةً للوقت. وقد زمر مستر مينغداو بشي شيه من شائفتساي لحفظه الشعر. وإذا كان الأدب والتاريخ — رغم علو شأنهما — لا يُعدَّان ثمينين، فكيف بمهارة الضرب «تسعة في تسعة» الهزيلة!

إنَّ حبَّ الملح والخل، فقد حاولت طوال حياتي توبيخ نفسي والامتناع عنها، لكنني عجزت، كأنَّ شيئًا ما يدفعني، ولا أدري كيف يحصل هذا.

ولذا فسَّرتُ ذلك لنفسِي: من جهة تطبيق المهارات، فإنَّ طقوس بي وموسيقى كوبي لا تخلوا من كونها مهارة. ومن جهة الارتقاء بالمهارة إلى الطريق، فإنَّ فأس بن شي وعجلة بيان — أليس هما مما يُثنى عليه الحكماء؟

من يطالع تأليفي ويلمس جهدي، سيجد من يشفق عليَّ بالمنات، ومن يسخروا مني بالآلوف. أمَّا ما اكتسبته لنفسِي فهو لي وحدي، وهل أبالي بمن يشفق أو يسخر؟

تقديم لي به

### 3 Volume 1 / المجلد الأول 卷一

Volume 1 is the theoretical foundation of the entire work. It comprises four major sections:

1. Circle City Diagram (圓城圖式) — the master geometric configuration
2. General Rate Names (總率名號) — definitions of all 15 right triangles and their elements
3. Current Question Numbers (今問正數) — numerical values for all line segments
4. Identification Miscellaneous Records (識別雜記) — 692 geometric formulas

المجلد الأول هو الأساس النظري للعمل بأكمله. ويتألف من أربعة أقسام رئيسية:

1. رسم المدينة الدائرية [圓城圖式] — التكوين الهندسي الرئيسي
2. أسماء المعدلات العامة [總率名號] — تعريف المثلثات القائمة الخمسة عشر وعناصرها
3. أعداد المسائل الحاضرة [今問正數] — القيم الرقمية لجميع الخطوط
4. سجلات التمييز المتنوعة [識別雜記] — 692 صيغة هندسية

#### 3.1 Circle City Diagram / رسم المدينة الدائرية [圓城圖式]

The Circle City Diagram is the master geometric configuration upon which all 170 problems are based. It consists of a large right triangle (called 勾股形, “leg-leg shape”) with its inscribed circle, together with specific points and lines.

إن رسم المدينة الدائرية هي التكوين الهندسي الرئيسي الذي تستند إليه جميع المسائل الـ 170. وتتألف من مثلث قائم كبير [勾股形]، «شكل الضلع-الضلع» مع دائرته المحاطة، بالإضافة إلى نقاط وخطوط مُحددة.

The scenario Li Ye constructs is:

والمنطق الذي بناه لي يه هو:

假令有圓城一所，不知周徑，四面開門，門外縱橫各有十字大道。其西北十字道頭定為乾地，其東北十字道頭定為艮地，其東南十字道頭定為巽地，其西南十字道頭定為坤地。所有測望雜法一一設問如後。

لنفترض مدينة دائرية محيطها وقطرها مجهولان، لها أبواب على الجوانب الأربعة، وخارج كل باب طرقات متقاطعة شمالية-جنوبية وشرقية-غربية. الطرقات المتقاطعة الشمالية-الغربية تُسمى «تشيين» [乾]، والشمالية-الشرقية «كين» [艮]، والجنوبية-الشرقية «شون» [巽]، والجنوبية-الغربية «كون» [坤]. جميع طرق القياس مفصلة في المسائل أدناه.

النقاط الثانية والعشرون المُسمّاة. المثلث القائم الأكبر له رؤوس تيان [天]، السماء، ودي [地]، الأرض، وتشيين [乾]. ويُسمى مركز الدائرة المحاطة شين [心]، القلب. وتشمل النقاط الرئيسية تقاطعات الخطوط الأفقية والعمودية عبر المركز وخطوط أخرى مُنشأة. كل نقطة تُحدد بحرفٍ صيني واحد:

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 地 | 乾 | 心 | 日 | 南 | 北 | 川 |
| 東 | 西 | 艮 | 坤 | 山 | 月 | 巽 | 青 |
| 泉 | 朱 | 金 | 泛 | 旦 | 夕 |   |   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 | 地 | 乾 | 心 | 日 | 南 | 北 | 川 |
| 東 | 西 | 艮 | 坤 | 山 | 月 | 巽 | 青 |
| 泉 | 朱 | 金 | 泛 | 旦 | 夕 |   |   |

### 3.2 General Rate Names / أسماء المعدلات العامة 總率名號

The work studies 15 **right triangles**, all having a segment of the *Tiandi* (天地) line as their hypotenuse (弦, “string”). The *General Rate Names* define these triangles and their three sides.

In each triangle:

- 弦 ( $c$ ) — the hypotenuse (斜邊)
- 股 ( $b$ ) — the longer vertical leg
- 勾 ( $a$ ) — the shorter horizontal leg

يدرس هذا الكتاب 15 مثلثًا قائمًا، جميعها يتخذ قطعةً من خط تياندي 天地 وترًا له 弦، «الوتر». وتحدد أسماء المعدلات العامة هذه المثلثات وأضلاعها الثلاثة.

في كل مثلث:

- الوتر  $c$  — الوتر 弦
- الضلع الطويل  $b$  — الضلع الرأسى الأطول 股
- الضلع القصير  $a$  — الضلع الأفقي الأقصر 勾

| No. | Name / الاسم | 弦 الوتر | 股 الضلع | 勾 القاعدة |
|-----|--------------|---------|---------|-----------|
| 1   | 通 通 通        | 通弦      | 通股      | 通勾        |
| 2   | 邊 邊 邊        | 邊弦      | 邊股      | 邊勾        |
| 3   | 底 底 底        | 底弦      | 底股      | 底勾        |
| 4   | 黃廣 黃廣 黃廣     | 黃廣弦     | 黃廣股     | 黃廣勾       |
| 5   | 黃長 黃長 黃長     | 黃長弦     | 黃長股     | 黃長勾       |
| 6   | 上高 上高 上高     | 上高弦     | 上高股     | 上高勾       |
| 7   | 下高 下高 下高     | 下高弦     | 下高股     | 下高勾       |
| 8   | 上平 上平 上平     | 上平弦     | 上平股     | 上平勾       |
| 9   | 下平 下平 下平     | 下平弦     | 下平股     | 下平勾       |
| 10  | 大差 大差 大差     | 大差弦     | 大差股     | 大差勾       |
| 11  | 小差 小差 小差     | 小差弦     | 小差股     | 小差勾       |
| 12  | 皇極 皇極 皇極     | 皇極弦     | 皇極股     | 皇極勾       |
| 13  | 太虛 太虛 太虛     | 太虛弦     | 太虛股     | 太虛勾       |
| 14  | 明 明 明        | 明弦      | 明股      | 明勾        |
| 15  | 夷 夷 夷        | 夷弦      | 夷股      | 夷勾        |

Note: 上高 = 下高 and 上平 = 下平, so among 15 triangles, only 13 are distinct.

ملاحظة: 上高 高下 و 上平 平下 ، لذا من بين 15 مثلثًا، هناك 13 مثلثًا مميزًا فقط.

### 3.3 Current Question Numbers / أعداد المسائل الحاضرة 今問正數

This section gives the numerical value of every line segment in the diagram. The **radius of the inscribed circle is taken as 120 steps** (步), which serves as the standard unit.

يعطي هذا القسم القيمة الرقمية لكل قطعة خط في الرسم. يُؤخذ نصف قطر الدائرة المحاطة بوحدة 120 خطوة 步، وهي تُستخدم كوحدة قياس معيارية.

#### 1. 通 (Tong / General)

|          |       |     |
|----------|-------|-----|
| 弦六百八十    | 勾三百二十 | 股六百 |
| 勾股和九百二十  | 較二百八十 |     |
| 勾和一千     | 較三百六十 |     |
| 股和一千二百八十 | 較八十   |     |
| 較和九百六十   | 較四百   |     |
| 和和一千六百   | 較二百四十 |     |

#### 1. 通 通 通 العام

|                          |           |             |
|--------------------------|-----------|-------------|
| الوتر 680                | الضلع 600 | القاعدة 320 |
| مجموع القاعدة والضلع 920 | الفرق 280 |             |
| مجموع القاعدة 1000       | الفرق 360 |             |
| مجموع الضلع 1280         | الفرق 80  |             |
| مجموع الفرق 960          | الفرق 400 |             |
| المجموع الكلي 1600       | الفرق 240 |             |

That is: hypotenuse  $c = 680$ , short leg  $a = 320$ ,

أي: الوتر  $c = 680$ , القاعدة  $a = 320$ , الضلع  $b = 600$ .

long leg  $b = 600$ .

## 2. 邊 (Bian / Side)

## 2. بيان الجانب

|          |        |       |                          |           |             |
|----------|--------|-------|--------------------------|-----------|-------------|
| 弦五百四十四   | 勾二百五十六 | 股四百八十 | الوتر 544                | الضلع 480 | القاعدة 256 |
| 勾股和七百三十六 | 較二百二十四 |       | مجموع القاعدة والضلع 736 | الفرق 224 |             |
| 勾和八百     | 較二百八十八 |       | مجموع القاعدة 800        | الفرق 288 |             |
| 股和一千零二十四 | 較六十四   |       | مجموع الضلع 1024         | الفرق 64  |             |
| 較和七百六十八  | 較三百二十  |       | مجموع الفرق 768          | الفرق 320 |             |
| 和和一千二百八十 | 較一百九十二 |       | المجموع الكلي 1280       | الفرق 192 |             |

## 3. 底 (Di / Base)

## 3. دي القاعدة

|          |        |        |                          |           |             |
|----------|--------|--------|--------------------------|-----------|-------------|
| 弦四百二十五   | 勾二百    | 股三百七十五 | الوتر 425                | الضلع 375 | القاعدة 200 |
| 勾股和五百七十五 | 較一百七十五 |        | مجموع القاعدة والضلع 575 | الفرق 175 |             |
| 勾和六百二十五  | 較二百二十五 |        | مجموع القاعدة 625        | الفرق 225 |             |
| 股和八百     | 較五十    |        | مجموع الضلع 800          | الفرق 50  |             |
| 較和六百     | 較二百五十  |        | مجموع الفرق 600          | الفرق 250 |             |
| 和和一千     | 較一百五十  |        | المجموع الكلي 1000       | الفرق 150 |             |

## 4. 黃廣 (Huang Guang)

## 4. هوانغ غوانغ

|                                    |       |       |                          |                    |             |
|------------------------------------|-------|-------|--------------------------|--------------------|-------------|
| 弦五百一十                              | 勾二百四十 | 股四百五十 | الوتر 510                | الضلع 450          | القاعدة 240 |
| (即城徑也 — this is the city diameter) |       |       |                          | هذا هو قطر المدينة |             |
| 勾股和六百九十                            | 較二百一十 |       | مجموع القاعدة والضلع 690 | الفرق 210          |             |

The remaining 11 triangles follow the same pattern, each with 13 numerical quantities, giving a total of  $15 \times 13 = 195$  numerical entries.

تتبع المثلثات الـ 11 المتبقية النمط نفسه، ولكل منها 13 كمية رقمية، ما يعطي إجمالاً  $15 \times 13 = 195$  مدخلاً رقمياً.



### 3.4 Identification Miscellaneous Records / سجلات التمييز المتنوعة 識別雜記

This is the theoretical heart of the work. It contains 692 **geometric formulas** relating the various line segments in the diagram. These formulas are purely geometric theorems, independent of any particular numerical values. The problems in all subsequent volumes are solved by using these formulas together with the tian yuan shu.

The section is divided into eight parts:

1. Various Names (諸雜名目) — general definitions and 30+ theorems
2. Five Sums and Five Differences (五和五較)
3. Various Hypotenuses (諸弦)
4. Large and Small Differences (大小差)
5. Various Differences (諸差)
6. Mutual Relations of Rates (諸率互見)
7. Four-Place Supplement (四位拾遺)
8. Supplement (拾遺)

هذا هو القلب النظري للعمل. ويحتوي على 692 صيغة هندسية تربط الخطوط المختلفة في الرسم. هذه الصيغ هي مبرهنات هندسية خالصة، مستقلة عن أي قيم رقمية مُعَيَّنة. وتُحل مسائل المجلدات التالية باستخدام هذه الصيغ معاً مع طريقة عنصر السماء.

يُقسَم هذا القسم إلى ثمانية أجزاء:

1. الأسماء المتنوعة 目名雜諸 — تعريفات عامة وأكثر من 30 مبرهنة
2. المجاميع الخمسة والفروق الخمسة 較五和五
3. الأوتار المختلفة 弦諸
4. الفروق الكبيرة والصغيرة 差小大
5. الفروق المختلفة 差諸
6. العلاقات المتبادلة للمعدلات 見互率諸
7. التكميلة الرباعية 遺拾位四
8. التكميلة 遺拾

Sample Definitions from 諸雜名目 / «الأسماء المتنوعة» نماذج تعريفات من:

| Name | Definition            | التعريف                                    |
|------|-----------------------|--------------------------------------------|
| 內率   | 明勾 × 夷股               | القاعدة المضيئة × ضلع التركيز              |
| 外率   | 明股 × 夷勾               | ضلع المضيء × قاعدة التركيز                 |
| 虛率   | 虛勾 × 虛股               | القاعدة الخالصة × الضلع الخالص             |
| 角差   | 高股 – 平勾               | ضلع المرتفع – قاعدة المستوي                |
| 次差   | (明股 – 明勾) + (夷股 – 夷勾) | ضلع المضيء – قاعدته + ضلع التركيز – قاعدته |
| 混同和  | 黃長股 + 黃廣勾             | ضلع هوانغ تشانغ + قاعدة هوانغ غوانغ        |
| 傍差   | (明股 – 明勾) – (夷股 – 夷勾) | ضلع المضيء – قاعدته – ضلع التركيز – قاعدته |

Sample Theorems / نماذج من المبرهنات:

- 凡大差小差相乘為半段徑羈。  
*The product of the large difference and small difference equals half the square of the diameter.*
- 大差勾小差股相乘同上。  
*The product of the large-difference short-leg and the small-difference long-leg equals the same.*
- 黃廣股黃長勾相乘為經羈。

- إنَّ حاصل ضرب الفرق الكبير والفرق الصغير يساوي نصف مربع القطر.
- حاصل ضرب قاعدة الفرق الكبير وضلع الفرق الصغير يساوي المقدار نفسه.
- حاصل ضرب ضلع هوانغ غوانغ وقاعدة هوانغ تشانغ يساوي مربع القطر.
- مجموع الضلعين القائمين يساوي مجموع الوتر وقطر الدائرة المحاطة.

أي:  $a + b = c + d$ , حيث  $d$  هو قطر الدائرة المحاطة. *The product of the Huangguang long-leg and Huangchang short-leg equals the square of the diameter.*

- 勾股和即弦黃和。

*The sum of the two legs equals the sum of the hypotenuse and the diameter of the inscribed circle.*

That is:  $a + b = c + d$ , where  $d$  is the diameter.

## 4 Volume 2 / المجلد الثاني 卷二

### 正率一十四問 — Fourteen Questions on Standard Rates

These fourteen problems form the “Dongyuan Nine Containments” (洞淵九容) sequence, derived from the earlier work of the Daoist master Li Sicong (李思聰, known as “Master Dongyuan”). They present the nine fundamental types of circles contained in or related to a right triangle, plus five additional problems.

#### Problem 1 / المسألة الأولى 第一問

或問：甲乙二人俱在乾地，乙東行三百二十步而立，甲南行六百步望見乙，問徑幾里？

答 城徑二百四十步。

**法曰** 此為勾股容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股幕以求弦，復加入勾股共，以為法。

**草曰** 置甲南行六百步在地，以乙東行三百二十步乘之，得一十九萬二千步，倍之得三十萬四千步為實。以乙東行步自之，得一十萬零二千四百步為勾幕；以甲南行步自之，得三十六萬步為股幕。二幕相並，得四十六萬二千四百步為方實，以平方開之，得六百八十步，則弦也。以弦加勾股共，共得一千六百步以為法。如法而一，得二百四十步，則城徑也。合問。

#### Problem 2 / المسألة الثانية 第二問

或問：甲乙二人俱在西門，乙東行二百五十六步，甲南行四百八十步望見乙，問答同前。

答 城徑二百四十步。

**法曰** 此為勾上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股幕以求弦，加入股以為法。

**草曰** 置甲南行四百八十步在地，以乙東行二百五十六步乘之，得一十二萬二千八百八十步，倍之得二十四萬五千七百六十步為實。以乙東行步自之，得六萬五千五百三十六步為勾幕；以甲南行步自之，得二十三萬零四百步為股幕。勾股幕相並，得二十九萬五千九百三十六步為方實，以平方開之，得五百四十四步為弦也。以弦加入南行步，共得一千零二十四步以為法。而一，得二

أربعة عشر مسألة في المعدلات المعيارية

تشكل هذه المسائل الأربعة عشر سلسلة «تسعة استيعابات دونغ يوان» 容九淵洞، المستوحاة من عمل السيد الطاووي لي سيتسونغ 李思聰، المعروف باسم «سيد دونغ يوان». وهي تعرض تسعة أنواع أساسية من الدوائر المحاطة بالمثلث القائم أو المرتبطة به، بالإضافة إلى خمس مسائل إضافية.

سُئل: رجلان أ وب يقفان في موقع تشيين. يسير ب نحو الشرق 320 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 600 خطوة ويرى ب. فكم قطر المدينة؟

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب القائم. بالمثلث المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: لاستخراج الضلعين مربعي واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين القاسية. فتكون الضلعين مجموع أضف ثم الوتر،

واضربها خطوة 600 320 الجنوبي نحو أ سير مسافة ضع الحل: 192000 على تحصل خطوة 320، 320 الشرق نحو ب سير بمسافة ربع الذات. وهي خطوة 384000 على فتحصل واضعها خطوة، القاعدة؛ مربع وهي 102400 على فتحصل الشرق نحو ب سير مسافة مربع وهي 360000 على فتحصل الجنوب نحو أ سير مسافة ربع المربعة، الذات وهي 462400 على فتحصل المربعين اجمع الضلع. الوتر. وهي خطوة 680 على فتحصل التربيعي الجذر واستخرج خطوة 1600 المجموع يصبح الضلعين، مجموع إلى الوتر أضف خطوة 240 على فتحصل القاسية على الذات اقسام القاسية. وهو المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي

سُئل: رجلان أ وب يقفان عند الباب الغربي. يسير ب نحو الشرق 256 خطوة، ويسير أ نحو الجنوب 480 خطوة ويرى ب. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب القاعدة. على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: لاستخراج الضلعين مربعي واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين القاسية. فتكون الضلع أضف ثم الوتر،

واضربها خطوة 480 256 الجنوبي نحو أ سير مسافة ضع الحل: 122880 على تحصل خطوة 256، 256 الشرق نحو ب سير بمسافة ربع الذات. وهي خطوة 245760 على فتحصل واضعها خطوة، القاعدة؛ مربع وهي 65536 على فتحصل الشرق نحو ب سير مسافة مربع وهي 230400 على فتحصل الجنوب نحو أ سير مسافة ربع

百四十步則城徑。合問。

الذات وهي 295936 على فتحصل الضلعين مربعي اجمع الضلع. وهي خطوة 544 على فتحصل التربيعة الجذر واستخرج المربعة، المجموع يصبح الجنوب، نحو السير مسافة إلى الوتر أضف الوتر. على فتحصل القاسية على الذات اقسم القاسية. وهو خطوة 1024 المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240

### Problem 3 / المسألة الثالثة 第三問

或問：甲乙二人俱在北門，乙東行二百步而止，甲南行三百七十五步望見乙，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為股上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股求弦，加入勾以為法。

草曰 置甲南行三百七十五步，以乙東行二百步乘之，得七萬五千步，倍之得一十五萬步為實。以乙東行自之，得四萬步為勾幕；以甲南行自之，得一十四萬零六百二十五步為股幕。勾股幕相並，得一十八萬零六百二十五步為方實。如平方而一，得四百二十五步則弦也。加入乙東行二百步，共得六百二十五步以為法。以法除之，得二百四十步，則城徑也。合問。

سئل: رجلان أ وب يقفان عند الباب الشمالي. يسير ب نحو الشرق 200 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 375 خطوة ويرى ب. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب الضلع. على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: مربعي من الوتر واستخرج الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين القاسية. فتكون القاعدة أضف ثم الضلعين،

واضربها خطوة 375 الجنوب نحو أ سير مسافة ضع الحل: 75000 على تحصل خطوة 200 الشرق نحو ب سير بمسافة ربع الذات. وهي خطوة 150000 على فتحصل واضعها خطوة، القاعدة؛ مربع وهي 40000 على فتحصل الشرق نحو ب سير مسافة مربع وهي 140625 على فتحصل الجنوب نحو أ سير مسافة ربع الذات وهي 180625 على فتحصل الضلعين مربعي اجمع الضلع. وهي خطوة 425 على فتحصل التربيعة الجذر استخرج المربعة. يصبح خطوة 200 الشرق نحو ب سير مسافة أضف الوتر. فتحصل القاسية على الذات اقسم القاسية. وهو خطوة 625 المجموع المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على

### Problem 4 / المسألة الرابعة 第四問

或問：甲乙二人俱在圓城中心而立，乙穿城向東行一百三十六步而止，甲穿城南行二百五十五步望見乙，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾股上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，並勾股幕如法求弦，以為法。

草曰 以二行步相乘，得三萬四千六百八十步，倍之得六萬九千三百六十步為實。置乙東行自之，得一萬八千四百九十六步為勾幕；又以甲南行自之，得六萬五千零二十五步為股幕。二幕相並，得八萬三千五百二十一步為方實，以平方開之，得二百八十九步即弦也。便以為法。如法除實，得二百四十步，即圓城之徑也。合問。

سئل: رجلان أ وب يقفان في مركز المدينة الدائرية. يعبر ب المدينة ويسير نحو الشرق 136 خطوة ويقف، ويعبر أ المدينة ويسير نحو الجنوب 255 خطوة ويرى ب. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

اضرب والضلع. القاعدة على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: لاستخراج الضلعين مربعي واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف المسافتين القاسية. فتكون الوتر

واضعها خطوة، 34680 على فتحصل المسافتين اضرب الحل: نحو ب سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 69360 على فتحصل أ سير مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 18496 على فتحصل الشرق المربعين اجمع الضلع. مربع وهي 65025 على فتحصل الجنوب نحو التربيعة الجذر واستخرج المربعة، الذات وهي 83521 على فتحصل الذات اقسم القاسية. وهي الوتر. وهي خطوة 289 على فتحصل الدائرية. المدينة قطر وهي خطوة 240 على فتحصل القاسية على المطلوب. مع يتطابق

## Problem 5 / المسألة الخامسة 第五問

或問：甲乙二人同立於乾地，乙東行一百八十步遇塔而止，甲南行三百六十步，回望其塔正居城徑之半，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為弦上容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股和為法。

草曰 以二行步相乘，得六萬四千八百步，倍之得一十二萬九千六百步為實。並二行步，得五百四十步以為法。除實，得二百四十步，即城徑也。合問。

سئل: رجلان أ وب يقفان في موقع تشيين. يسير ب نحو الشرق 180 خطوة حتى يصل البرج ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 360 خطوة، وعندما ينظر إلى وراء يرى البرج عند منتصف قطر المدينة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب الوتر. على المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: فتكون القائمين الضلعين واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين القاسية.

واضعها خطوة، 64800 على فتحصل المسافتين اضرب الحل: فتحصل المسافتين اجمع الذات. وهي خطوة 129600 على فتحصل القاسية على الذات اقسم القاسية. وهي خطوة 540 على المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على

## Problem 6 / المسألة السادسة 第六問

或問：甲乙二人俱在坤地，乙東行一百九十二步而止，甲南行三百六十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以弦較和為法。

草曰 以二行步相乘，得六萬九千一百二十步，倍之得一十三萬八千二百四十步為實。置乙東行自之，得三萬六千八百六十四步為勾幕；又置甲南行自之，得一十二萬九千六百步為股幕。二幕相並，得一十六萬六千四百六十四步為方實，以平方開之，得四百零八，即弦也。又置甲南行步內減乙東行步，餘一百六十八步，即較也。以較加弦，共得五百七十六步以為法。實如法而一，得二百四十步，為城徑也。合問。

〔按〕此題用勾股求得弦，即可加減得弦較較為城徑。今必以勾股相乘倍積為實，求得弦較和為法，而後始得弦較較為城徑者，蓋欲因此並明勾股相乘之倍積為弦較較、弦較和相乘之積，非故為紆回也。

سئل: رجلان أ وب يقفان في موقع كون. يسير ب نحو الشرق 192 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 360 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب القاعدة. خارج المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: فتكون والفرق الوتر واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين القاسية.

واضعها خطوة، 69120 على فتحصل المسافتين اضرب الحل: ب سير مسافة ربع الذات. وهي خطوة 138240 على فتحصل مسافة ربع القاعدة؛ مربع وهي 36864 على فتحصل الشرق نحو اجمع الضلع. مربع وهي 129600 على فتحصل الجنوب نحو أ سير واستخرج المربعة، الذات وهي 166464 على فتحصل المربعين سير مسافة اطرح ثم الوتر. وهو 408 على فتحصل التربيعي الجذر خطوة 168 يتبقى الجنوب، نحو أ سير مسافة من الشرق نحو ب خطوة 576 المجموع يصبح الوتر، إلى الفرق أضف الفرق. وهي خطوة 240 على فتحصل القاسية على الذات اقسم القاسية. وهو المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي

القائمين الضلعين من الوتر استخراج يمكن المسألة، هذه في تعليق ) يجب أنه غير المدينة. قطر على للحصول والطرح الجمع إجراء ثم ومجموع كذات، القائمين الضلعين ضرب حاصل ضعف استخدام من والغرض المدينة. قطر على الحصول ثم كقاسية، والفرق الوتر يساوي القائمين الضلعين ضرب حاصل ضعف أن توضيح هو ذلك وليس الفرق، زائد و الفرق ناقص الوتر ضرب حاصل التعتيد. مجرد

## Problem 7 / المسألة السابعة 第七問

或問：甲乙二人同立於艮地，甲南行一百五十步而止，乙東行八十步，望乙與城參相直，問答

سئل: رجلان أ وب يقفان في موقع كن. يسير أ نحو الجنوب 150 خطوة ويقف، ويسير ب نحو الشرق 80 خطوة، ويرى ب والمدينة

同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為股外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以弦和較為法。

على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب الضلع. خارج المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: الوتر مجموع فرق واجعل الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين القاسية. والضلع

### Problem 8 / المسألة الثامنة 第八問

或問：甲乙二人同立於坤地，甲南行一百九十二步而止，乙東行七十二步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為弦外容圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾股較為法。

سئل: رجلان أ وب يقفان في موقع كون. يسير أ نحو الجنوب 192 خطوة ويقف، ويسير ب نحو الشرق 72 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

الضلعين اضرب الوتر. خارج المحاطة الدائرة مسألة هذه الطريقة: القاسية. الضلعين فرق واجعل الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين

### Problem 9 / المسألة التاسعة 第九問

或問：甲乙二人俱在巽地，乙東行一百九十二步而止，甲南行三百六十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為勾外容半圓也。以勾股相乘，倍之為實，以股弦和為法。

سئل: رجلان أ وب يقفان في موقع شون. يسير ب نحو الشرق 192 خطوة ويقف، ويسير أ نحو الجنوب 360 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

اضرب القاعدة. خارج المحاطة الدائرة نصف مسألة هذه الطريقة: والوتر الضلع واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين الضلعين القاسية. فتكون

### Problem 10 / المسألة العاشرة 第十問

或問：甲乙二人俱在艮地，甲南行一百五十步而止，乙東行八十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 此為股外容半圓也。以勾股相乘，倍之為實，以勾弦和為法。

سئل: رجلان أ وب يقفان في موقع كن. يسير أ نحو الجنوب 150 خطوة ويقف، ويسير ب نحو الشرق 80 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

اضرب الضلع. خارج المحاطة الدائرة نصف مسألة هذه الطريقة: والوتر القاعدة واجمع الذات، فتكون الناتج واضعف القائمين الضلعين القاسية. فتكون

The above ten problems constitute the “Dongyuan Nine Containments” (洞淵九容), supplemented by Problem 5 (弦上容圓). The remaining four problems of Volume 2 continue with additional standard-rate problems using the tian yuan shu method.

تُشكل المسائل العشرة أعلاه «تسعة استيعابات دونغ يوان» 洞淵九容، بالإضافة إلى المسألة الخامسة 弦上容圓. وتستمر المسائل الأربع المتبقية في المجلد الثاني بمسائل إضافية في المعدلات المعيارية باستخدام طريقة عنصر السماء.



## 5 Volume 3 / المجلد الثالث 卷三

### 邊股一十七問 — Seventeen Questions on the Side-Long-Leg

Volume 3 presents 17 problems in which the given data involve the *side long-leg* (邊股,  $b_2$ ), defined as the long leg of the “Side” triangle (邊 triangle, No. 2 in the table), equal to 480 steps. In all problems of this volume, the unknown to be found is the diameter of the circular city (城徑 = 240 steps).

These problems demonstrate the increasing sophistication of the tian yuan shu method, with equations ranging from quadratic to cubic degree.

#### Problem 1 / المسألة الأولى 第一問

或問：乙出東門南行，不知步數而止。甲出西門南行四百八十步，望見乙，復就乙行五百一十步與乙相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 倍相減步，以乘二之甲南行步，為平方實，得城徑。

草曰 識別得二行相減，餘三十步，即乙出東門南行步也。倍相減步，得六十步，以乘二之甲南行步九百六十步，得五萬七千六百步，為平方實。如法開之，得二百四十步，即城徑也。合問。

#### Problem 2 / المسألة الثانية 第二問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙從艮隅東行八十步，望見甲，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 倍南行步，以東行步乘之為實，東行步為從方，一步常法，得全徑。

草曰 立天元一為全徑，以減於二之甲南行步，得為兩個大差也。以乙東行步乘之，得為圓徑冪，寄左。然後以天元冪與左相消，得以帶縱平方開之，得二百四十步，即城徑也。合問。

又法：半之乙東行步，乘南行步為實，半之乙東行步為從，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半城徑，減甲南行步，得為大差也。以半之東行步乘之，得即半徑冪，寄左。然後以天元冪為同數，與左相消，得開帶縱平方，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سبع عشرة مسألة في الضلع الجانبي

يعرض المجلد الثالث 17 مسألة تتضمن البيانات المعطاة الضلع الطويل الجانبي  $b_2$ ، المعروف بأنه الضلع الطويل للمثلث الجانبي  $b_2$ ، رقم 2 في الجدول، وهو يساوي 480 خطوة. وفي جميع مسائل هذا المجلد، المجهول المطلوب إيجاده هو قطر المدينة الدائرية  $b_2$  240 خطوة.

توضح هذه المسائل التطور المتزايد في طريقة عنصر السماء، حيث تتراوح المعادلات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة.

سئل: يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب مسافة مجهولة ويقف. يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويرى ب، ثم يسير نحو ب 510 خطوة حتى يلتقي به. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

سير مسافة بضعف واضربه المسافتين، بين الفرق اضعف الطريقة: المدينة. قطر على وتحصل التربيع، ذات فتكون الجنوب، نحو أ

مسافة وهي خطوة، 30 يتبقى المسافتين، نطرح بالتمييز: الحل: على فنحصل الفرق نضعف الجنوب. نحو الشرقي الباب من ب سير خطوة، 960 الجنوب نحو أ سير مسافة بضعف ونضربها خطوة، 60 الجذر نستخرج التربيع. ذات وهي خطوة 57600 على فنحصل المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فنحصل

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يسير ب من زاوية كن نحو الشرق 80 خطوة، ويرى أ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

السير بمسافة واضربها الجنوب، نحو السير مسافة اضعف الطريقة: الطرف الشرق نحو السير مسافة واجعل الذات، فتكون الشرق نحو الكامل. القطر على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا المرافق،

ضعف من ونطرحه الكامل، القطر يساوي السماء عنصر نضع الحل: نضربها الكبير. الفرق ضعف على فنحصل الجنوب، نحو أ سير مسافة ونضعها الدائرة، قطر مربع على فنحصل الشرق نحو ب سير بمسافة فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغى السماء عنصر نربّع ثم اليسار. على المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فنحصل الطرف ذا التربيعي الجذر المطلوب. مع يتطابق

طريقة ثانية: نصف مسافة السير نحو الشرق مضروبًا بمسافة السير نحو الجنوب فتكون الذات، ونصف مسافة السير نحو الشرق هو الطرف المرافق، وواحدًا القاسية الثابتة، فتحصل على نصف

القطر.

من ونطرحه المدينة، قطر نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: بنصف نضربها الكبير. الفرق على فنحصل الجنوب نحو أ سير مسافة ونضعها القطر، نصف مربع على فنحصل الشرق نحو السير مسافة مع ونلغها لها، مساويًا السماء عنصر مربع نجعل ثم اليسار. على فنحصل الطرف ذا التربيعة الجذر فنستخرج الأيسر، الطرف المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعها خطوة. 120

### Problem 3 / المسألة الثالثة 第三問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙從艮隅亦南行一百五十步，望見甲，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行步相乘為實，南行步為從方，一為隅，得半徑。

草曰 立天元一為半城徑，以減乙南行步，得為半梯頭；以甲行步為梯底，以乘之，得為半徑冪，寄左。然後以天元冪與左相消，得開帶縱平方，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يسير ب من زاوية كن أيضًا نحو الجنوب 150 خطوة، ويرى أ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

نحو السير مسافة واجعل الذات، فتكون المسافتين اضرب الطريقة: القطر. نصف على فتحصل الركن، والواحد المرافق، الطرف الجنوب

من ونطرحه المدينة، قطر نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: نجعل السلم. رأس نصف على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة نصف مربع على فنحصل ونضربها للسلم، السفلي الطول أ سير مسافة الطرف مع ونلغها السماء عنصر مربع ثم اليسار. على ونضعها القطر، 120 على فنحصل الطرف ذا التربيعة الجذر فنستخرج الأيسر، المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعها خطوة.

### Problem 4 / المسألة الرابعة 第四問

或問：甲出西門南行四百八十步，乙出東門直行一十六步，望見甲，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 以四之東行步，乘南行冪為實，從空，東行為廉，一步為隅法，得全徑。

草曰 立天元一為圓徑，加乙東行步，得為中勾；其甲南行即中股也。置東行步為小勾，以中股乘之，得，合以中勾除，今不受除，便以為小股也。內寄中勾分母。乃復以中股乘之，得三百六十八萬六千四百，又四之，得一千四百七十四萬五千六百，為一段圓徑冪，寄中勾分母，寄左。然後以天元徑自之，又以中勾乘之，得為同數，與左相消，得以帶縱立方開之，得二百四十步，為城徑也。合問。

〔按〕不受除者，無可除之理也。凡二數，此數於彼數有可除之理，則受除；無可除之理，則不受除也。蓋除有法有實，實可二，法不可二。此題以中勾為法，而中勾內有一元，又有十六步，其為數已二矣，又何以均分不一之數乎？故曰不受也。寄分者，姑寄其應除之數也。俟求得兩相等數，而此數內尚少一除，不除此而轉乘彼，則兩

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويخرج ب من الباب الشرقي ويسير مباشرة 16 خطوة، ويرى أ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

بمربع مضروبة الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة الطريقة: السير مسافة فارغ، الطرف الذات، فتكون الجنوب نحو السير مسافة القطر على فتحصل الركن، قاسية وواحدًا الكشك، هي الشرق نحو الكامل.

مسافة إليه ونضيف الدائرة، قطر يساوي السماء عنصر نضع الحل: سير ومسافة الوسطى؛ القاعدة على فنحصل الشرق نحو ب سير الشرق نحو السير مسافة نضع الأوسط. الضلع هي الجنوب نحو أ تقسيمها يجب على... فنحصل الأوسط، بالضلع ونضربها صغرى، كقاعدة الصغير الضلع فنعتبرها القسمة، تقبل لا لكنها الوسطى، القاعدة على بالضلع أخرى مرة نضربها ثم مقامًا. الوسطى القاعدة إبقاء مع مؤقتًا، 14745600، هي أضعافها وأربعة 3686400، على فنحصل الأوسط ونضعها مقامًا، الوسطى القاعدة إبقاء مع الدائرة، قطر مربع وهي الوسطى بالقاعدة ونضربها [القطر] السماء عنصر مربع ثم اليسار. على الجذر فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغها المساوي، على فنحصل المدينة. قطر وهي خطوة 240 على فنحصل الطرف ذا التكعيبي المطلوب. مع يتطابق

ففي ممكنة. غير القسمة أن يعني القسمة» تقبل «لا القول» تعليق ]



數仍相等，猶之受除者也。此所謂以乘代除也。

فهو الآخر على القسمة يقبل أحدهما كان إذا عددين، وجود حال أن ذلك القسمة». يقبل «لا فهو يقبل يكن لم وإذا القسمة»، «يقبل يكون أن يمكن والمقسوم عليه، ومقسومًا مقسومًا تقتضي القسمة الوسطى القاعدة المسألة، هذه ففي فلا. عليه المقسوم أما ثنائيًا خطوة، 16 وعلى مجهول على تحتوي وهي عليها، المقسوم هي نقول لهذا موحّد؟ غير عددًا نقسم فكيف ثنائي، عدد بالفعل فهي المفترض العدد تأجيل فهو ككسور» «الإبقاء أما القسمة. تقبل لا إنها لا أحدهما وكان متساويين، عددين على حصلنا إذا حتى قسمته. الآخر، الطرف نضرب نقسم أن فبدل واحدة، قسمة إلى يفتقر يزال بالضرب «الاستعاضة يُسمّى ما وهذا قُسمًا. كأنهما متساويين، فيبقيان القسمة». عن

### Problem 5 / المسألة الخامسة 第五問

或問：乙出南門東行七十二步而止，甲出西門南行四百八十步，望乙與城參相直，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 以乙東行冪，乘甲南行為實；乙東行冪為從方；甲南行步內減二之東行步為益廉；一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半城徑，以減南行步，得為小股。又以天元加乙東行步，得為小勾。又以天元加南行步，得為大股。乃置大股在地，以小勾乘之，得下式，合以小股除之，今不受除，便以為大勾，內寄小股分母。又置天元半徑，以分母小股乘之，得以減大勾，得為半個梯底於上。以乙東行七十二步為半個梯頭，以乘上位，得為半徑冪，內寄小股分母，寄左。然後置天元冪，又以分母小股乘之，得為同數，與左相消，以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سُئل: يخرج ب من الباب الجنوبي ويسير نحو الشرق 72 خطوة ويقف. يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

نحو أ سير بمسافة مضروبًا الشرق نحو ب سير مسافة مربع الطريقة: الطرف هو الشرق نحو ب سير مسافة مربع الذات؛ فتكون الجنوب نحو السير مسافة ضعف ناقص الجنوب نحو أ سير مسافة المرافق؛ على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب؛ الكشك هو الشرق القطر. نصف

من ونطرحه المدينة، قطر نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: ونضيف الصغير. الضلع على فنحصل الجنوب نحو السير مسافة القاعدة على فنحصل الشرق نحو ب سير مسافة إلى السماء عنصر فنحصل الجنوب نحو السير مسافة إلى السماء عنصر ونضيف الصغرى. فنحصل الصغرى بالقاعدة ونضربه الأكبر الضلع نضع الأكبر. الضلع على يقبل لا لكنه الصغير، الضلع على تقسيمه ويجب التالي، الناتج على مقامًا. الصغير الضلع إبقاء مع مؤقتًا الكبرى القاعدة فنعتبره القسمة، الصغير، الضلع بالمقام ونضربه السماء عنصر قطر نصف نضع ثم الأعلى. في السلم قاع نصف على فنحصل الكبرى القاعدة من ونطرحه السلم، رأس نصف هي خطوة 72 الشرق نحو ب سير ومسافة الضلع إبقاء مع القطر نصف مربع على فنحصل الأعلى بالعدد ونضربها ونضربها السماء عنصر نربع ثم اليسار. على ونضعها مقامًا، الصغير الطرف مع ونلغّه المساوي، على فنحصل الصغير الضلع بالمقام نضعها خطوة. 120 على فنحصل التكعبي الجذر فنستخرج الأيسر، المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل

### Problem 6 / المسألة السادسة 第六問

或問：乙出南門東行，不知步數而立。甲出西門南行四百八十步，望見乙與城參相直，又就乙行四百零八步與乙相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 以兩行相乘為實，以兩行相減為從，一步常法，平開得半徑。

سُئل: يخرج ب من الباب الجنوبي ويسير نحو الشرق مسافة مجهولة ويقف. يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة، ويرى ب والمدينة على استقامة واحدة، ثم يسير نحو ب 408 خطوات حتى يلتقي به. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

المسافتين فرق واجعل الذات، فتكون المسافتين اضرب الطريقة:

**草曰** 立天元一為半徑。以加就乙行步，得為大勾；以減甲南行步，得為大股。乃以大勾、大股相乘，得下式，合以天元加就乙行除之，今不受除，便以為小股，內寄分母。又以天元乘之，得為半徑冪，寄左。然後以天元冪與左相消，得平開，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

التربيعي الجذر فاستخرج الثابتة، القاسية وواحدًا المرافق، الطرف هو القطر. نصف على فتحصل

مسافة إليه نضيف القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: سير مسافة من ونطرحه الكبرى؛ القاعدة على فنحصل ب نحو السير الكبرى القاعدة نضرب الأكبر. الضلع على فنحصل الجنوب نحو أ مجموع على تقسيمه ويجب التالي، الناتج على فنحصل الأكبر بالضلع فنعتبره القسمة، يقبل لا لكنه ب، نحو السير ومسافة السماء عنصر فنحصل السماء بعنصر نضربها ثم المقام. إبقاء مع مؤقتًا الصغير الضلع السماء عنصر نربّع ثم اليسار. على ونضعها القطر، نصف مربّع على على فنحصل التربيعي الجذر فنستخرج الأيسر، الطرف مع ونلغه المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعها خطوة. 120

### Problem 7 / المسألة السابعة 第七問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三十步，望見甲，又斜行二百五十步與甲相會，問答同前。

**答** 城徑二百四十步。

**法曰** 兩行步相減，以乘兩行步相併為實，兩行步相減又自之為從方，兩倍兩行步相減為益廉，一步常法，得半徑。

**草曰** 立天元一為半徑。以減乙南行步，得為梯頭；以甲南行步為梯底。以梯頭乘梯底，得為半徑冪，寄左。乃以兩行步相減，餘四百五十步；又以兩行步相併，得五百一十步；以減餘乘之，得二十二萬九千五百步為實。又以減餘四百五十步自之，得二十萬零二千五百步為從方。又以減餘倍之，得九百步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 30 خطوة. ويرى أ، ثم يسير مائلًا 250 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: اضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الذات. الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب. الكشك فتكون المسافتين فرق القطر. نصف على فتحصل

مسافة من نطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: نحو أ سير ومسافة السلم؛ رأس على فنحصل الجنوب نحو ب سير على فنحصل بقاعه السلم رأس نضرب السلم. قاع هي الجنوب فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. على ونضعها القطر، نصف مربّع نضرب خطوات؛ 510 على فنحصل المسافتين ونجمع خطوة؛ 450 نربّع الذات. وهي خطوة 229500 على فنحصل بالمجموع الباقي المرافق. الطرف وهي 202500 على فنحصل خطوة 450 الباقي الموجب. الكشك وهي خطوة 900 على فنحصل الباقي ونضع فنحصل نضعها خطوة. 120 على فنحصل التكعبي الجذر نستخرج المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على

### Problem 8 / المسألة الثامنة 第八問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行五十四步而止，望見甲，又斜行三百三十步與甲相會，問答同前。

**答** 城徑二百四十步。

**法曰** 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，四之兩行相減為益廉，一步常法，得半徑。

**草曰** 立天元一為半徑。以減乙南行步，得為梯頭差；以甲南行步內減天元，得為梯底差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑冪，寄左。乃以兩行相減，餘四百二十六步；又與兩行相併，得五百三

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 54 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلًا 330 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: أربعة المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الذات. القاسية وواحدًا الموجب. الكشك فتكون المسافتين فرق أضعاف القطر. نصف على فنحصل الثابتة،

مسافة من نطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: عنصر ونطرح السلم؛ رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير

十四步；以減餘乘之，得二十二萬七千四百八十四步為實。又以減餘自之，得一十八萬一千四百七十六步為從方。又以減餘四之，得一千七百零四步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

السلم. قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ سير مسافة من السماء القطر، نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فرق نضرب ونجمع خطوة؛ 426 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. على ونضعها فنحصل بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 534 على فنحصل المسافتين 181476 على فنحصل الباقي نربّع الذات. وهي خطوة 227484 على خطوات 1704 هي الباقي أضعاف وأربعة المرافق. الطرف وهي 120 على فنحصل التكعيبي الجذر نستخرج الموجب. الكشك وهي المطلوب. مع يتطابق المدينة. قطر على فنحصل نضعها خطوة.

### Problem 9 / المسألة التاسعة 第九問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行九十步而止，望見甲，又斜行三百九十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

**法曰** 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

**草曰** 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘三百九十步；又以兩行相併，得五百七十步；以減餘乘之，得二十二萬二千三百步為實。又以減餘自之，得一十五萬二千一百步為從方。又以減餘倍之，得七百八十步；又益四之乙東行九十步，得三百六十步；共得一千一百四十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 90 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 390 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الذات. الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً المسافتين فرق نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب. الكشك فتكون القطر.

مسافة من نطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ سير رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة من السماء نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فرق نضرب السلم. خطوة؛ 390 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. على ونضعها القطر، بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 570 على فنحصل المسافتين ونجمع فنحصل الباقي نربّع الذات. وهي خطوة 222300 على فنحصل خطوة؛ 780 هو الباقي وضعف المرافق. الطرف وهي 152100 على خطوة 90 الشرق نحو ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة 1140 والمجموع 360؛ فتصبح قطر على فنحصل نضعها خطوة. 120 على فنحصل التكعيبي الجذر المطلوب. مع يتطابق المدينة.

### Problem 10 / المسألة العاشرة 第十問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行一百二十步而止，望見甲，又斜行四百五十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

**法曰** 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

**草曰** 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘三百六十步；又以兩行相併，得六百步；

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 120 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 450 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الذات. الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً المسافتين فرق نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب. الكشك فتكون القطر.

以減餘乘之，得二十一萬六千步為實。又以減餘自之，得一十二萬九千六百步為從方。又以減餘倍之，得七百二十步；又益四之乙東行一百二十步，得四百八十步；共得一千二百步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

مسافة من نطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ سير رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة من السماء نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فرق نضرب السلم. خطوة؛ 360 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. على ونضعها القطر، بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 600 على فنحصل المسافتين ونجمع فنحصل الباقي نربع الذات. وهي خطوة 216000 على فنحصل خطوة؛ 720 هو الباقي وضعف المرافق. الطرف وهي 129600 على خطوة □□ 120 الشرق نحو ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة 1200 والمجموع 480؛ فتصبح قطر على فنحصل نضعها خطوة. 120 على فنحصل التكعبي الجذر المطلوب. مع يتطابق المدينة.

### Problem 11 / المسألة الحادية عشرة 第十一問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行一百八十步而止，望見甲，又斜行五百一十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘三百步；又以兩行相併，得六百六十步；以減餘乘之，得十九萬八千步為實。又以減餘自之，得九萬步為從方。又以減餘倍之，得六百步；又益四之乙東行一百八十步，得七百二十步；共得一千三百二十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويوقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 180 خطوة ويوقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 510 خطوات حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح الذات. الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً المسافتين فرق نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب. الكشك فتكون القطر.

مسافة من نطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ سير رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة من السماء نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فرق نضرب السلم. خطوة؛ 300 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. على ونضعها القطر، بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 660 على فنحصل المسافتين ونجمع فنحصل الباقي نربع الذات. وهي خطوة 198000 على فنحصل خطوة؛ 600 هو الباقي وضعف المرافق. الطرف وهي 90000 على خطوة □□ 180 الشرق نحو ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة 1320 والمجموع 720؛ فتصبح قطر على فنحصل نضعها خطوة. 120 على فنحصل التكعبي الجذر المطلوب. مع يتطابق المدينة.

### Problem 12 / المسألة الثانية عشرة 第十二問

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行二百一十步而止，望見甲，又斜行五百七十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويوقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 210 خطوات ويوقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 570 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح الذات.



**草曰** 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑冪，寄左。乃以兩行相減，餘二百七十步；又以兩行相併，得六百九十步；以減餘乘之，得十八萬六千三百步為實。又以減餘自之，得七萬二千九百步為從方。又以減餘倍之，得五百四十步；又益四之乙東行二百一十步，得八百四十步；共得一千三百八十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافًا المسافتين فرق نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب. الكشك فتكون القطر.

مسافة من نطره القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع **الحل**: عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ سير رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة من السماء نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فرق نضرب السلم. خطوة؛ 270 فيبقى المسافتين نطرح اليسار. على ونضعها القطر، بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 690 على فنحصل المسافتين ونجمع فنحصل الباقي نربع الذات. وهي خطوة 186300 على فنحصل خطوة؛ 540 هو الباقي وضعف المرافق. الطرف وهي 72900 على خطوات □□ 210 الشرق نحو ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافًا نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة 1380 والمجموع 840؛ فتصبح قطر على فنحصل نضعفها خطوة. 120 على فنحصل التكعبي الجذر المطلوب. مع يتطابق المدينة.

### 第十三問 Problem 13 / المسألة الثالثة عشرة

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行二百四十步而止，望見甲，又斜行六百三十步與甲相會，問答同前。

**答** 城徑二百四十步。

**法曰** 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

**草曰** 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑冪，寄左。乃以兩行相減，餘二百四十步；又以兩行相併，得七百二十步；以減餘乘之，得十七萬二千八百步為實。又以減餘自之，得五萬七千六百步為從方。又以減餘倍之，得四百八十步；又益四之乙東行二百四十步，得九百六十步；共得一千四百四十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 240 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلًا 630 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربع المسافتين اطرح الذات. الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافًا المسافتين فرق نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب. الكشك فتكون القطر.

مسافة من نطره القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع **الحل**: عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ سير رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة من السماء نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فرق نضرب السلم. خطوة؛ 240 فيبقى المسافتين نطرح اليسار. على ونضعها القطر، بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 720 على فنحصل المسافتين ونجمع فنحصل الباقي نربع الذات. وهي خطوة 172800 على فنحصل خطوة؛ 480 هو الباقي وضعف المرافق. الطرف وهي 57600 على خطوة □□ 240 الشرق نحو ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافًا نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة 1440 والمجموع 960؛ فتصبح قطر على فنحصل نضعفها خطوة. 120 على فنحصل التكعبي الجذر المطلوب. مع يتطابق المدينة.

### 第十四問 Problem 14 / المسألة الرابعة عشرة

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行二百七十步而止，望見甲，又斜行六百九十步與甲相會，問答同前。

**答** 城徑二百四十步。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 270 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلًا 690 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

**法曰** 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

**草曰** 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘二百一十步；又以兩行相併，得七百五十步；以減餘乘之，得十五萬七千五百步為實。又以減餘自之，得四萬四千一百步為從方。又以減餘倍之，得四百二十步；又益四之乙東行二百七十步，得一千零八十步；共得一千五百步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربيع المسافتين اطرح الذات. الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً المسافتين فرق نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا موجب. الكشك فتكون القطر.

مسافة من نطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ سير رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة من السماء نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فرق نضرب السلم. خطوات؛ 210 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. على ونضعها القطر، بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 750 على فنحصل المسافتين ونجمع فنحصل الباقي نربع الذات. وهي خطوة 157500 على فنحصل خطوة؛ 420 هو الباقي وضعف المرافق. الطرف وهي 44100 على خطوة □□ 270 الشرق نحو ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة 1500 والمجموع 1080؛ فتصبح قطر على فنحصل نضعفها خطوة. 120 على فنحصل التكعبي الجذر المطلوب. مع يتطابق المدينة.

#### 第十五問 Problem 15 / المسألة الخامسة عشرة

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三百步而止，望見甲，又斜行七百五十步與甲相會，問答同前。

**答** 城徑二百四十步。

**法曰** 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

**草曰** 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑幕，寄左。乃以兩行相減，餘一百八十步；又以兩行相併，得七百八十步；以減餘乘之，得十四萬零四百步為實。又以減餘自之，得三萬二千四百步為從方。又以減餘倍之，得三百六十步；又益四之乙東行三百步，得一千二百步；共得一千五百六十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 300 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 750 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربيع المسافتين اطرح الذات. الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً المسافتين فرق نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا موجب. الكشك فتكون القطر.

مسافة من نطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ سير رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة من السماء نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فرق نضرب السلم. خطوة؛ 180 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. على ونضعها القطر، بالمجموع الباقي نضرب خطوة؛ 780 على فنحصل المسافتين ونجمع فنحصل الباقي نربع الذات. وهي خطوة 140400 على فنحصل خطوة؛ 360 هو الباقي وضعف المرافق. الطرف وهي 32400 على خطوة □□ 300 الشرق نحو ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة 1560 والمجموع 1200؛ فتصبح قطر على فنحصل نضعفها خطوة. 120 على فنحصل التكعبي الجذر المطلوب. مع يتطابق المدينة.

#### 第十六問 Problem 16 / المسألة السادسة عشرة

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三百三十步而止，望見甲，又斜行八百一十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑冪，寄左。乃以兩行相減，餘一百五十步；又以兩行相併，得八百一十步；以減餘乘之，得十二萬一千五百步為實。又以減餘自之，得二萬二千五百步為從方。又以減餘倍之，得三百步；又益四之乙東行三百三十步，得一千三百二十步；共得一千六百二十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 330 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 810 خطوات حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الذات. الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً المسافتين فرق نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب. الكشك فتكون القطر.

مسافة من نطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ سير رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة من السماء نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فرق نضرب السلم. خطوة؛ 150 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. على ونضعها القطر، بالمجموع الباقي نضرب خطوات؛ 810 على فنحصل المسافتين ونجمع فنحصل الباقي نربّع الذات. وهي خطوة 121500 على فنحصل خطوة؛ 300 هو الباقي وضعف المرافق. الطرف وهي 22500 على خطوة □□ 330 الشرق نحو ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة 1620 والمجموع 1320؛ فتصبح قطر على فنحصل نضعفها خطوة. 120 على فنحصل التكعبي الجذر المطلوب. مع يتطابق المدينة.

### 第十七問 Problem 17 / المسألة السابعة عشرة

或問：甲出西門南行四百八十步而止，乙出東門南行三百六十步而止，望見甲，又斜行八百七十步與甲相會，問答同前。

答 城徑二百四十步。

法曰 兩行相減，以乘兩行相併為實，兩行相減自之為從方，兩倍兩行相減又益四之東行為益廉，一步常法，得半徑。

草曰 立天元一為半徑。以減甲南行步，得為梯底差；以乙南行步內減天元，得為梯頭差。以梯頭差乘梯底差，得為半徑冪，寄左。乃以兩行相減，餘一百二十步；又以兩行相併，得八百四十步；以減餘乘之，得十萬零八百步為實。又以減餘自之，得一萬四千四百步為從方。又以減餘倍之，得二百四十步；又益四之乙東行三百六十步，得一千四百四十步；共得一千六百八十步為益廉。以立方開之，得一百二十步。倍之，即城徑也。合問。

سئل: يخرج أ من الباب الغربي ويسير نحو الجنوب 480 خطوة ويقف. يخرج ب من الباب الشرقي ويسير نحو الجنوب 360 خطوة ويقف، ويرى أ، ثم يسير مائلاً 870 خطوة حتى يلتقي بأ. الجواب كالسابق.

خطوة. 240 المدينة قطر الجواب:

فتكون المسافتين بمجموع الناتج واضرب المسافتين، اطرح الطريقة: ضعف المرافق. الطرف فتكون الناتج وربّع المسافتين اطرح الذات. الشرق نحو السير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً المسافتين فرق نصف على فتحصل الثابتة، القاسية وواحدًا الموجب. الكشك فتكون القطر.

مسافة من نطرحه القطر. نصف يساوي السماء عنصر نضع الحل: عنصر ونطرح السلم؛ قاع فرق على فنحصل الجنوب نحو أ سير رأس فرق على فنحصل الجنوب نحو ب سير مسافة من السماء نصف مربع على فنحصل قاعه بفرق السلم رأس فرق نضرب السلم. خطوة؛ 120 فيتبقى المسافتين نطرح اليسار. على ونضعها القطر، بالمجموع الباقي نضرب خطوات؛ 840 على فنحصل المسافتين ونجمع فنحصل الباقي نربّع الذات. وهي خطوة 100800 على فنحصل خطوة؛ 240 هو الباقي وضعف المرافق. الطرف وهي 14400 على خطوة □□ 360 الشرق نحو ب سير مسافة أضعاف أربعة إلى مضافاً نستخرج الموجب. الكشك وهي خطوة 1680 والمجموع 1440؛ فتصبح قطر على فنحصل نضعفها خطوة. 120 على فنحصل التكعبي الجذر المطلوب. مع يتطابق المدينة.



## 6 The Tian Yuan Shu Method / 術元天 طريقة عنصر السماء

The *tian yuan shu* (天元術, “method of the celestial element”) is the algebraic technique employed throughout the *Ceyuan Haijing*. It is the earliest systematic method in Chinese mathematics for setting up and solving polynomial equations with one unknown.

The name 天元 (tian yuan, “celestial element”) refers to the unknown quantity in an equation. The method is equivalent to what we now call polynomial algebra in one variable.

### 6.1 Methodology / المنهجية

The procedure follows these steps:

1. 立天元一為  $X$  (“Set the celestial element unity to be  $X$ ”) — This declares the unknown quantity. In modern notation, it is equivalent to “Let  $x = X$ ”.
2. Express all given quantities and relationships in terms of the celestial element  $x$ .
3. Construct two equal expressions (often representing the same geometric quantity computed by different methods), one designated as the “left” (左) expression and stored temporarily, the other as the “equal number” (同數).
4. 相消 (“mutual cancellation”) — Set the two expressions equal and simplify to obtain the polynomial equation in standard form.
5. Solve the equation by root-extraction methods (開方): square-root extraction (開平方), cube-root extraction (開立方), or higher-degree root extraction.

### 6.2 Polynomial Notation / الرمز متعدد الحدود

Li Ye uses a positional notation on a counting-rod board:

- Coefficients are arranged vertically, with the constant term (實) at the top.
- Below it: the coefficient of  $x$  (方, “square”), then  $x^2$  (廉, “edge”), then  $x^3$  (隅, “corner”).
- For higher degrees: first 廉, second 廉, etc.

إنَّ طريقة عنصر السماء 術元天، «طريقة عنصر السماء» هي التقنية الجبرية المستخدمة في جميع أنحاء كتاب «مرآة البحر لقياس الدائرة». وهي أول طريقة منهجية في الرياضيات الصينية لوضع وحل المعادلات متعددة الحدود بمجهول واحد.

يشير اسم 元天 ١٢١٢ تيان يوان، «عنصر السماء» إلى الكمية المجهولة في المعادلة. وتُعادِل هذه الطريقة ما نسميه الآن بالجبر متعدد الحدود بمتغير واحد.

تتبع العملية الخطوات التالية:

1. نضع عنصر السماء يساوي  $s$  立一元天 為 — هذا يعلن عن الكمية المجهولة. في الرمز الحديث، يُعادِل «لتكن  $x$ ».
2. عبّر عن جميع الكميات المعطاة والعلاقات بدلالة عنصر السماء  $x$ .
3. ابن تعبيرين متساويين ١٢١٣ غالبًا ما يمثلان الكمية الهندسية نفسها المحسوبة بطريقتين مختلفتين ١٢١٤، أحدهما يُسمى التعبير «الأيسر» 左 ١٢١٥ ويُحفظ مؤقتًا، والآخر يُسمى «العدد المساوي» 同 ١٢١٦ 數.
4. الإلغاء المتبادل 消相 ١٢١٧ — اجعل التعبيرين متساويين وبسط للحصول على المعادلة متعددة الحدود بالصيغة القياسية.
5. حل المعادلة بطرق استخراج الجذر 開方 ١٢١٨: استخراج الجذر التربيعي 方平開 ١٢١٩، أو استخراج الجذر التكعيبي 立開 ١٢٢٠ 方، أو استخراج جذر الدرجة العليا.

يستخدم لي يه رمزًا موضعيًا على لوحة أعواد الحساب:

- تُرتَّب المعاملات عموديًا، مع وضع الحد الثابت 實 ١٢٢١ في الأعلى.
- تحته: معامل  $x$  方 ١٢٢٢، «المربع»، ثم  $x^2$  廉 ١٢٢٣، «الكشك»، ثم  $x^3$  隅 ١٢٢٤، «الركن».
- للدرجات العليا: الكشك الأول، الكشك الثاني، إلخ.
- تُشير المعاملات السالبة بخط مائل عبر الرقم الأخير.

- Negative coefficients are indicated by a diagonal stroke through the last digit.

### 6.3 Example: Quadratic Equation / مثال: معادلة تربيعية

The first problem leads to the equation equivalent to: تؤدي المسألة الأولى إلى المعادلة المكافئة:

$$384000 = 1600 \cdot d$$

$$384000 = 1600 \cdot d$$

where  $d$  is the diameter. But more complex problems yield true polynomial equations. For instance, Problem 4 of Volume 3 produces a **cubic equation**:

حيث  $d$  هو القطر. لكن المسائل الأكثر تعقيدًا تُنتج معادلات متعددة الحدود حقيقية. فعلى سبيل المثال، تُنتج المسألة الرابعة من المجلد الثالث معادلة تكعيبية:

$$(4 \cdot 16)(480)^2 = (480 + 16) \cdot d^2 - d^3$$

$$(4 \cdot 16)(480)^2 = (480 + 16) \cdot d^2 - d^3$$

in modern form, which Li Ye solves by “opening the cube with an edge” (帶縱立方).

بالصيغة الحديثة، والتي يحلها لي يه بـ «استخراج الجذر التكعيبي ذي الطرف» [方立縱帶].

### 6.4 Historical Significance / الأهمية التاريخية

The *Ceyuan Haijing* is the earliest surviving work that systematically employs the tian yuan shu. The equations solved include:

إن كتاب «مرآة البحر لقياس الدائرة» هو أقدم عمل باقٍ يستخدم طريقة عنصر السماء بشكل منهجي. وتشمل المعادلات المحلولة:

| Degree               | Number of Equations |
|----------------------|---------------------|
| Linear (degree 1)    | 31                  |
| Quadratic (degree 2) | 106                 |
| Cubic (degree 3)     | 24                  |
| Quartic (degree 4)   | 20                  |
| Sextic (degree 6)    | 1                   |
| <b>Total</b>         | <b>182</b>          |

| الدرجة           | عدد المعادلات |
|------------------|---------------|
| خطية [درجة 1]    | 31            |
| تربيعية [درجة 2] | 106           |
| تكعيبية [درجة 3] | 24            |
| رباعية [درجة 4]  | 20            |
| سداسية [درجة 6]  | 1             |
| المجموع          | 182           |

### 6.5 Key Terms Glossary / قائمة المصطلحات الرئيسية

| Chinese | Arabic                         | English                               |
|---------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 天元      | عنصر السماء                    | Celestial Element / Unknown           |
| 天元術     | طريقة عنصر السماء              | Method of the Celestial Element       |
| 立天元一為   | نضع عنصر السماء يساوي          | Let the unknown equal                 |
| 勾股      | الضلعان القائمان               | Two legs of right triangle            |
| 勾股容圓    | الدائرة المحاطة بالمثلث القائم | Circle inscribed in right triangle    |
| 弦       | الوتر                          | Hypotenuse                            |
| 股       | الضلع الطويل                   | Longer vertical leg                   |
| 勾       | القاعدة                        | Shorter horizontal leg                |
| 相消      | الإلغاء المتبادل               | Mutual cancellation                   |
| 開方      | استخراج الجذر                  | Root extraction                       |
| 開平方     | استخراج الجذر التربيعي         | Square root extraction                |
| 開立方     | استخراج الجذر التكعيبي         | Cube root extraction                  |
| 實       | الذات                          | Constant term / Dividend              |
| 方       | المربع                         | Coefficient of $x$                    |
| 廉       | الكشك                          | Coefficient of $x^2$                  |
| 隅       | الركن                          | Coefficient of $x^3$                  |
| 從       | الطرف المرافق                  | Linear coefficient (in certain forms) |
| 帶縱      | ذو الطرف                       | With linear term                      |
| 城徑      | قطر المدينة                    | City diameter                         |

*Note:* This bilingual edition presents the complete text of Volumes 1–3 of the *Ceyuan Haijing*. Volume 1 contains all definitions, numerical data, and 692 geometric formulas. Volumes 2 and 3 present the first 31 of 170 problems, solved by the tian yuan shu method. The remaining nine volumes (卷四–卷十二) continue with 139 further problems of increasing complexity, culminating in a sixth-degree equation in Volume 7.

ملاحظة: تعرض هذه الطبعة الثنائية النص الكامل للمجلدات 3-1 من «مرآة البحر لقياس الدائرة». يحتوي المجلد الأول على جميع التعريفات والبيانات الرقمية و692 صيغة هندسية. وتعرض المجلدات الثاني والثالث أول 31 مسألة من أصل 170، تُحل بطريقة عنصر السماء. ويستمر المجلدات التسعة المتبقية 卷四–卷十二 139 مسألة إضافية ذات تعقيد متزايد، تبلغ ذروتها بمعادلة من الدرجة السادسة في المجلد السابع.

نهاية المجلدات 3-1 / 卷三至卷一

測圓海鏡卷第一至卷第三終

欽定四庫全書

子部

# 測圓海鏡

卷四至卷六

مرآة بحر قياس الدائرة

السادس الجزء إلى الرابع الجزء

元 李冶 撰

字仁卿，號敬齋，真定樂城人

لي يه لي عالم رياضيات صيني من عصر يوان  
جيندنج في لوانتشنج من جينجتاي، لقب رنقين، كنية يه، لي

詳校官 欽天監博士臣張天樞  
靈臺郎臣倪廷梅 覆勘  
總校官知縣臣繆琪  
校對官五官靈臺郎臣陳際新  
膳錄監生臣施華  
依《欽定四庫全書》本

卷四：底勾一十七問（第五十一問至第六十七問）

卷五：大股一十八問（第六十八問至第八十五問）

卷六：大勾一十八問（第八十六問至第一百三問）

الجزء الرابع: الوتر السفلي 17 سؤالاً السؤال 51 إلى 67

85 إلى 68 السؤال سؤالاً 18 الكبرى الساق الخامس: الجزء

103 إلى 86 السؤال سؤالاً 18 الكبرى الوتر السادس: الجزء

## Contents

## 引言

《測圓海鏡》十二卷，元李冶撰。冶字仁卿，號敬齋，真定樂城人。金末進士，入元官翰林學士。此書乃其所著天元術之傑作，以勾股測圓之法，設問答以明天元一之術。全書凡一百七十問，皆設城池圓形，以人物行步之數推求圓徑。本編收錄卷四、卷五、卷六三卷，凡五十三問：

- 卷四：底勾一十七問（第五十一問至第六十七問）
- 卷五：大股一十八問（第六十八問至第八十五問）
- 卷六：大勾一十八問（第八十六問至第一百三問）

書中設問之例：假令有圓城一座，甲乙二人各從城門出行，或東或南 □ 行若干步 □ 遙相望見 □ 或斜行相會。只知若干步數 □ 餘皆不知 □ 以求圓城之徑。每問皆有問、答、草、法四部分：

- 問：設問條件 □ 敘述甲乙二人行步之數及相會之狀
- 答曰：所得答案 □ 即圓城之徑
- 草曰：以天元術列方程之詳細演算 □ 為全書精華所在
- 法曰：總結算法之簡要公式 □ 便於後學記誦

天元術記法說明：書中以籌算式記多項式 □ 自下而上排列 □ 常數項在下 □ 一次項在上 □ 二次又在上 □ 依此類推。如  $\frac{480}{1}$  表示  $480 - x$  □  $\frac{0}{1} \frac{0}{0} \frac{48000}{0}$  表示  $48000 - x^2$  之類。所謂「立天元一為某數」□ 即設未知數  $x$  為所求之量。

「مرآة بحر قياس الدائرة」《تَسْوِيَانْ هَايَجِيَنْغْ》 في اثني عشر جزءاً، من تأليف لي يه [لي] من عصر يوان. لي يه، كنية رنقيين، لقب جينجيتاي، من لوانتشونج في جيندنج. حاصل على الشهادة الجامعية في أواخر عهد جين، وشغل منصباً في الأكاديمية الإمبراطورية في عصر يوان. هذا الكتاب تحفته في فن «تيانيوان» [الجبر الصيني]، يستخدم طريقة المثلثات القائمة لقياس الدائرة، ويضع أسئلة وأجوبة لتوضيح فن «تيانيوان». والسادس، والخامسة الرابعة الأجزاء على الجزء هذا يحتوي سؤالاً: وخمسون ثلاثة وعددها

- سؤالاً 17 □ السفلي الوتر: الرابع الجزء
- سؤالاً 18 □ الكبرى الساق: الخامس الجزء
- سؤالاً 18 □ الكبرى الوتر: السادس الجزء

نموذج المسائل في الكتاب: ليكن مدينة دائرية، يخرج منها الشخصان أ و ب من بوابات المدينة، أحدهما نحو الشرق والآخر نحو الجنوب، يسيران عدداً من الخطوات، ينظر أحدهما إلى الآخر من بُعد، أو يلتقيان بالسير المائل. عُلِمَ عدد من الخطوات فقط، ولم يُعْلَم الباقي، فيُطلب قطر المدينة الدائرية.

أجزاء: أربعة سؤال لكل

- اللقاء وطريقة ب و أ خطوات وصف الشروط: السؤال
- المدينة قطر أي الإجابة: الجواب
- الكتاب جوهر □ تيانويان بمعادلات التفصيلي الحل: الحل
- للحفظ للطريقة المختصرة الصيغة: الطريقة

شرح طريقة تيانويان: يسجل الكتاب كثيرات الحدود باستخدام نظام العصي الحسابية، مرتبة من الأسفل إلى الأعلى: الحد الثابت في الأسفل، ثم الحد من الدرجة الأولى، ثم الثانية، وهكذا. مثلاً،  $\frac{480}{1}$  تمثل  $480 - x$ ، و  $\frac{0}{1} \frac{0}{0} \frac{48000}{0}$  تمثل  $48000 - x^2$ . عبارة

«نضع تيانويان واحداً ليكون العدد الفلاني» تعني جعل المجهول  $x$  يساوي الكمية المطلوبة.



# 1 測圓海鏡卷四— الجزء الرابع

## 底勾一十七問

### الوتر السفلي — سبعة عشر سؤالاً

(第五十一問至第六十七問)

السؤال 51 إلى السؤال 67

【題意總說】卷四論「底勾」之術。所謂底勾，乃勾股形之最下勾股，與圓徑相切之基本勾股形也。凡一十七問，皆以底勾為基，求圓城之徑。底勾者，通勾股形之勾邊，亦即大勾，為諸勾股形之根本。諸問或知甲東行之數，或知乙南行之數，或知斜行之數，三者之中知其二，即可立天元一，建方程而開方得圓徑。

第一問：或問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問圓城之徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：識別得二行相減餘，即乙出南門東行數也。以甲東行二百步減於就乙斜行二百七十二步，餘七十二步，為乙東行數。以乘甲東行步，得  $72 \times 200 =$  一萬四千四百步，又四之，得五萬七千六百步為實。以平方開之，得  $\sqrt{57600} =$  二百四十步，即城徑也。  
驗算：城徑二百四十步，半徑一百二十步。乙東行七十二步，甲東行二百步，甲比乙多行  $200 - 72 = 128$  步。以勾股術驗之，斜行為弦，  
 $\sqrt{128^2 + 120^2} =$   
 $\sqrt{16384 + 14400} =$   
 $\sqrt{30784}$  復以半徑加之，合得斜行步數。

法曰：二行差數乘甲東行又四之，為平方實，開方得全徑。術曰：以就乙斜行步內減甲東行步，餘為乙東行數；以此數乘甲東行步為實，四之；開平方，即得城徑。

مقدمة الجزء: يتناول الجزء الرابع فن «الوتر السفلي». الوتر السفلي هو وتر المثلث القائم الأدنى، وهو المثلث القائم الأساسي المماس لقطر الدائرة. جميع الأسئلة السبعة عشر تستخدم الوتر السفلي كأساس لإيجاد قطر المدينة الدائرية.

الكبير، الوتر أي الكلي، القائم للمثلث الوتر ضلع هو السفلي الوتر خطوات عدد إما تعلم الأسئلة القائمة. المثلثات جميع أساس وهو الخطوات عدد أو الجنوب، نحو ب خطوات عدد أو الشرق، نحو أ تيانبيوان وضع فيمكن الثلاثة، هذه من اثنان غلّم وإذا — المائلة المدينة. قطر لإيجاد الجذر واستخراج معادلة وبناء واحد

السؤال 1: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الشرق عدداً مجهولاً من الخطوات ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب، ثم سار مائلاً مئتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى ب. فكم قطر المدينة الدائرية؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: يُستنتج أن باقي طرح المسيرتين هو عدد خطوات ب نحو الشرق. طرحنا مئتي خطوة من مسيرة أ من المسيرة المائلة [مئتان واثنان وسبعون]، فتبقى اثنان وسبعون خطوة — وهي مسيرة ب نحو الشرق. ضربنا هذا في مسيرة أ نحو الشرق:  $72 \times 200 = 14400$  خطوات، ثم أربعناها فكان  $57600$  خطوة — وهذا هو العيان [الحد الثابت]. استخراجنا الجذر التربيعي:  $\sqrt{57600} = 240$  خطوة — وهذا هو قطر المدينة. التحقق: قطر المدينة 240 خطوة، نصف القطر 120. مسيرة ب نحو الشرق 72، مسيرة أ 200. الفرق  $200 - 72 = 128$ . بالمثلث القائم:

$$\sqrt{128^2 + 120^2} =$$

$\sqrt{30784}$ ، مضافاً إليه نصف القطر يعطي عدد خطوات المسيرة المائلة.

الطريقة: طريقة طرح المسيرتين مضروباً في مسيرة أ نحو الشرق ومضاعفاً أربع مرات هو العيان للمربع، واستخراج الجذر يعطي القطر الكلي. الطريقة: طرح مسيرة أ من المسيرة المائلة، فالباقى هو مسيرة ب نحو الشرق؛ اضرب هذا في مسيرة أ للحصول على العيان؛ أربعه؛ ثم استخراج الجذر التربيعي فيكون قطر المدينة.

第二問：或問：乙出南門東行一百二十步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑，以減於二之甲東行步，得 tianyuan4801 為兩個小差。以乙東行一百二十步乘之，得

tianyuan576001 為城徑冪，寄左。然後以天元冪 tianyuan01 與左相消 □ 得

tianyuan57600

quad 1

quad 0

quad (負上正下)，以平方開之 □ 得二百四十步 □ 即城徑也。

釋義：二之甲東行者，以甲東行為勾 □ 其倍即通勾與圓徑之差。以乙東行乘之者 □ 乙東行即小勾 □ 乘大差得大勾之冪 □ 亦即城徑冪之半。故以天元冪相消 □ 開平方即得。

法曰：半之乙東行步乘甲東行為實 □ 半乙東行為從 □ 一步常法 □ 得半徑。術曰：置乙東行步折半 □ 以乘甲東行步為實 □ 以半乙東行步為從法 □ 一步為隅法 □ 開平方得半徑 □ 倍之即城徑。

第三問：或問：乙從坤隅南行三百六十步 □ 甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑 □ 減於乙南行三百六十步之半 □ 得

tianyuan1801 為小差。半乙南行步 □ 得一百八十步 □ 以乘小差 □ 得

tianyuan32400180 為半徑冪 □ 寄左。然後以天元冪

tianyuan01 與左相消 □ 得

tianyuan32400180

quad 1

quad 0 (上負下正)，開平方得一百二十步 □ 倍之得全徑二百四十步。

釋義：此問以乙南行為股 □ 甲東行為勾。半乙南行即大股之半 □ 去半徑餘為小差。以小差乘半股得半徑冪 □ 此天元術之妙用也。

السؤال 二: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الشرق مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرحه من ضعف مسيرة أ نحو الشرق □ 400 □ فنحصل على

□ 1480 كالفرقين الصغيرين. نضرب هذا في

مسيرة ب نحو الشرق □ 120 □، فنحصل على

□ 157600 كمربع قطر المدينة — نحفظه على

اليسار. ثم نطلبه مع مربع تيانويوان

□ 10 □، فنحصل على

□ 0 157600 □ سالب في الأعلى، موجب في

الأسفل □. استخراج الجذر يعطي مئتين وأربعين خطوة — وهذا قطر المدينة.

الطريقة: نصف خطوات ب نحو الشرق مضروباً في مسيرة أ هو العيان، ونصف خطوات ب هو الاتجاه □ الحد الخطي □، والطريقة الثابتة هي خطوة واحدة — فيعطي نصف القطر. الطريقة: خذ نصف مسيرة ب نحو الشرق واضربه في مسيرة أ للحصول على العيان؛ اجعل نصف مسيرة ب اتجاهاً؛ وخطوة واحدة طريقة ركنية؛ استخراج الجذر فيكون نصف القطر، وضاعفه فيكون قطر المدينة.

السؤال 三: يُسأل: سار ب من زاوية الكُنْ □ الجنوبية □ نحو الجنوب ثلاثمائة وستين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون نصف القطر. نطرحه من نصف مسيرة ب نحو الجنوب □ 180 □ فنحصل على

□ 1180 كالفرق الصغير. نصف مسيرة ب نحو

الجنوب هو 180. نضربه في الفرق الصغير فنحصل على

□ 18032400 كمربع نصف القطر — نحفظه على

اليسار. ثم نطلبه مع مربع تيانويوان

□ 10 □، فنحصل على

□ 0 1 18032400 □ استخراج الجذر يعطي 120

خطوة — نصف القطر، نضاعفه فيكون القطر الكلي 240.

法曰：兩行步相乘為實 □ 甲東行為從 □ 乙南行為隅 □ 開平方得半徑。術曰：以甲東行步乘乙南行步為實 □ 以甲東行步為從 □ 乙南行步為隅法 □ 開平方得一百二十步 □ 即半徑 □ 倍之即城徑。

第四問：或問：乙從坤隅南行三百六十步而止 □ 甲出北門東行二百步見之 □ 就乙斜行四百零八步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行算得四萬步 □ 以乙南行算得一十二萬九千六百步 □ 並之得一十七萬三千六百步為弦算之實。又以斜行四百零八步自之 □ 得一十六萬六千四百六十四步。以此減弦算實 □ 餘七千一百三十六步。以四之得二萬八千五百四十四步為城徑算之較實。

別求之：立天元一為城徑 □ 以減於二之甲東行 □ 餘即乙出南門東行數也。以乙南行乘甲東行算 □ 又四之為實。從空 □ 乙行為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。開立方得二百四十步。

法曰：以乙南行步乘甲東行算 □ 又四之為實 □ 從空 □ 乙行為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。術曰：置甲東行步自乘 □ 又以乙南行步乘之 □ 四之為實 □ 乙南行步為廉法 □ 一步為隅法 □ 開立方即得城徑。

第五問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰：城徑二百四十步。

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان، مسيرة أ نحو الشرق هي الاتجاه، ومسيرة ب نحو الجنوب هي الركن. استخراج الجذر يعطي نصف القطر. الطريقة: اضرب مسيرة أ في مسيرة ب للحصول على العيان؛ اجعل مسيرة أ اتجاهًا ومسيرة ب طريقة ركنية؛ استخراج الجذر فيكون 120 خطوة — وهذا نصف القطر؛ ضاعفه فيكون قطر المدينة.

السؤال ٤: يُسأل: سار ب من زاوية الكُن نحو الجنوب ثلاثمائة وستين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب، ثم سار مائلاً أربعمائة وثمانى خطوات حتى التقى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. مربع مسيرة أ نحو الشرق 40000، ومربع مسيرة ب نحو الجنوب 129600. مجموعهما 173600 وهو عيان مربع الوتر. مربع المسيرة المائلة 408 هو 166464. طرحنا هذا من عيان مربع الوتر فتبقى 7136. أربعناها فكان 28544 كعيان مقارنة لمربع القطر.

طريقة بديلة: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرحه من ضعف مسيرة أ نحو الشرق، فالباقي هو مسيرة ب نحو الشرق. نضرب مسيرة ب نحو الجنوب في مربع مسيرة أ، ونضاعف أربع مرات للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ، وأربعها هو العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة. الطريقة: اجعل مسيرة أ مربعة، ثم اضربها في مسيرة ب نحو الجنوب، وأربعها للحصول على العيان؛ اجعل مسيرة ب طريقة ركنية؛ واجعل خطوة واحدة طريقة زاوية؛ ثم استخراج الجذر التكعيبي فيكون قطر المدينة.

السؤال ٥: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

السؤال ٧: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب، ثم سار مائلاً مئتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى بـ ب. فكم قطر المدينة؟

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步為小股。甲東行二百步為小勾。以斜行二百七十二步為小弦。驗之： $135^2 + 72^2 = 18225 + 5184 = 23409$ 。而  $272^2 = 73984$  非直股勾股也。當以天元術正之。

立天元一為城徑。以減於二之甲東行。得 tianyuan4001 為兩個小差之和。以乙南行乘之。又四之。得大實。以天元幕與左相消。開平方得二百四十步。

法曰：以乙南行乘甲東行幕為實。從空。乙行為廉。一步常法。得城徑。

第八問：或問：乙出南門直行一百三十五步。甲出北門東行二百步。就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行。得二百七十步。以減於倍甲東行四百步。餘一百三十步。為大小差之較。以此較乘甲東行幕。得 130

$times40000 =$  五百二十萬步為實。從空。倍乙行為廉。一步常法。開立方得城徑。

又法：立天元一為半徑。以半甲東行一百步減斜行半數一百三十六步。餘三十六步為半較。以乙南行半數六十七步半乘之。得半徑幕之較。與天元幕相消。開平方即得。

法曰：倍乙南行乘甲東行幕為實。從空。倍乙行為廉。一步常法。得城徑。

第九問：或問：乙出南門直行一百三十五步。甲出北門東行二百步見之。就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة ب نحو الجنوب [135] هي الساق الصغرى، ومسيرة أ نحو الشرق [200] هي الوتر الصغير. المسيرة المائلة [272] هي الوتر الصغير. بالتحقق:  $135^2 + 72^2 = 23409$  بينما  $272^2 = 73984$  —وليس مثلثاً قائماً. نصحح بالطريقة تيانويوان.

نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرحه من ضعف مسيرة أ نحو الشرق [400] فنحصل على 1400 كمجموع الفرقين الصغيرين. نضربه في مسيرة ب نحو الجنوب، وأربع الناتج للحصول على العيان الكبير. نطلبه مع مربع تيانويوان، فنستخرج الجذر فيكون 240 خطوة.

الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ هو العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٨: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة، ثم سار مائلاً مئتين واثنتين وسبعين خطوة حتى التقى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضاعف مسيرة ب نحو الجنوب فنحصل على 270. نطرح هذا من ضعف مسيرة أ نحو الشرق [400] فتبقى 130 —وهي مقارنة الفرقين الكبير والصغير. نضرب هذه المقارنة في مربع مسيرة أ:  $130 \times 5200000 =$  676000000. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —استخراج الجذر التكعيبي يعطي قطر المدينة.

طريقة ثانية: نضع تيانويوان واحداً ليكون نصف القطر. نصف مسيرة أ [100] مطروحاً من نصف المسيرة المائلة [136] يكون 36 كنصف المقارنة.

الطريقة: ضعف مسيرة ب نحو الجنوب مضروباً في مربع مسيرة أ هو العيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٩: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب، ثم سار مائلاً مئتين واثنتين وسبعين خطوة حتى التقى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.



草曰：此問與前問類而異者 □ 甲見乙之後復斜行相會。立天元一為城徑 □ 以兩行相減 □ 餘乘甲東行又四之為實。兩行差為廉 □ 一步常法 □ 開立方得城徑。

textbf 細草：以乙南行一百三十五步減甲東行二百步 □ 餘六十五步 □ 為兩行之差。以乘甲東行二百步 □ 得一千三百步 □ 又四之得五千二百步為實。兩行差六十五步為廉法 □ 一步為隅法 □ 開立方得二百四十步。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實 □ 從空 □ 兩行差為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第十問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行羈（四萬步），得五百四十萬步 □ 又四之得二千一百六十萬步為實。從空 □ 乙行一百三十五步為廉法 □ 一步為隅法 □ 開立方得二百四十步。  
textbf 按：此草以乙南行為小股 □ 甲東行為小勾。以勾羈乘股 □ 蓋以大勾之羈比於小勾之羈 □ 若大股之羈比於小股之羈。以率言之 □ 大勾即城徑與小勾之關係 □ 故以天元建立而開立方。

法曰：以乙南行步乘甲東行羈，又四之為實 □ 從空 □ 乙行為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第十一問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲出北門東行二百步見之。問城徑與斜行各幾何？

答曰：城徑二百四十步。斜行二百七十二步。

الحل: هذا السؤال يشبه السابق لكنه مختلف: بعد أن رأى أ ب، سار مائلاً للقائه. نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح المسيرتين، ونضرب الباقي في مسيرة أ نحو الشرق وأربعها للحصول على العيان. فرق المسيرتين هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي قطر المدينة.

□□□□□□□□□□ الحل التفصيلي: مسيرة ب نحو الجنوب □135□ مطروحاً من مسيرة أ نحو الشرق □200□ يكون 65 — وهو فرق المسيرتين. نضربه في مسيرة أ: 65

$times200 = 13000$ . أربعناه: 52000 كعيان. فرق المسيرتين □65□ هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية.

الطريقة: باقي طرح المسيرتين مضروباً في مسيرة أ نحو الشرق وأربعه هو العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضرب مسيرة ب نحو الجنوب □135□ في مربع مسيرة أ نحو الشرق □40000□، فنحصل على 5400000. أربعناه فكان 21600000 كعيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب نحو الجنوب □135□ هي الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ نحو الشرق، وأربعها هو العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 十一: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة والمسيرة المائلة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة. المسيرة المائلة: مئتان واثنان وسبعون خطوة.



草曰：立天元一為城徑。倍乙南行  $\square$  得二百七十步。以甲東行冪四萬步乘之  $\square$  得一千零八萬步  $\square$  又倍之得二千零一十六萬步為實。倍乙南行二百七十步為廉法  $\square$  一步為隅法  $\square$  開立方得城徑二百四十步。

textbf 既得城徑  $\square$  求斜行：以城徑二百四十步減於二之甲東行四百步  $\square$  餘一百六十步  $\square$  為乙東行與半徑之差。以此差冪與半徑冪相加開方  $\square$  得斜行二百七十二步。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實  $\square$  從空  $\square$  倍乙行為廉  $\square$  一步常法  $\square$  得城徑。

第十二問：或問：乙出南門直行一百三十五步  $\square$  甲出北門東行二百步  $\square$  就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以兩行相減  $\square$  甲東行二百步減乙南行一百三十五步  $\square$  餘六十五步  $\square$  為兩行之較。以較乘甲東行  $\square$  得一千三百步  $\square$  又四之  $\square$  得五千二百步為實。從空  $\square$  兩行較六十五步為廉法  $\square$  一步為隅法  $\square$  開立方得城徑二百四十步。

textbf 驗草：城徑二百四十步  $\square$  半徑一百二十步。以半徑減甲東行  $\square$  餘八十步為甲至城心之東行。以乙南行一百三十五步減半徑  $\square$  餘十五步  $\square$  為乙至城心之南行。以此二數各自乘并之  $\square 80^2 + 15^2 = 6400 + 225 = 6625 \square$  開方得 81.39 不盡  $\square$  須以天元正術求之。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實  $\square$  從空  $\square$  兩行差為廉  $\square$  一步常法  $\square$  得城徑。

第十三問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立  $\square$  甲出北門東行二百步見之。問城徑及乙東行步數各幾何？

答曰：城徑二百四十步  $\square$  乙東行七十二步。

الـحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضاعف مسيرة ب نحو الجنوب فنحصل على 270. نضربه في مربع مسيرة أ  $\square 40000 \square$ ، فنحصل على 10800000. نضاعفه فنحصل على 20160000 كعيان. ضعف مسيرة ب نحو الجنوب  $\square 270 \square$  هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية — استخراج الجذر التكعيبي يعطي قطر المدينة  $\square 240 \square$ .

$\square \square \square \square \square$  بعد الحصول على القطر، نجد المسيرة المائلة: قطر المدينة  $\square 240 \square$  مطروحاً من ضعف مسيرة أ  $\square 400 \square$  يكون 160 — وهو فرق مسيرة ب نحو الشرق ونصف القطر. نجمع مربع هذا الفرق ومربع نصف القطر ونستخرج الجذر: مئتان واثنان وسبعون خطوة.

الطريقة: ضعف مسيرة ب نحو الجنوب مضروباً في مربع مسيرة أ هو العيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 二十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة، ثم سار مائلاً مئتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الـحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح المسيرتين: مسيرة أ نحو الشرق  $\square 200 \square$  ناقصاً مسيرة ب نحو الجنوب  $\square 135 \square$  تساوي 65 — وهي مقارنة المسيرتين. نضرب المقارنة في مسيرة أ:  $65 \times 200 = 13000$  أربعناها: 52000 كعيان. الاتجاه

فارغ، ومقارنة المسيرتين  $\square 65 \square$  هي الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: باقي طرح المسيرتين مضروباً في مسيرة أ نحو الشرق وأربعة هو العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 三十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة وعدد خطوات ب نحو الشرق؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة. مسيرة ب نحو الشرق: اثنان وسبعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行羣（四萬步），得五百四十萬步為實。從空 □ 乙行為廉 □ 一步常法 □ 開平方得城徑。  
textbf 求乙東行：以城徑二百四十步減於二之甲東行四百步 □ 餘一百六十步 □ 以減甲東行二百步 □ 餘七十二步 □ 即乙東行步數。

法曰：以乙南行乘甲東行羣為實 □ 從空 □ 乙行為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第十四問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲出北門東行二百步見之 □ 復斜行與乙相會。問城徑及斜行步數。

答曰：城徑二百四十步 □ 斜行二百七十二步。

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行 □ 得二百七十步 □ 乘甲東行羣（四萬步），得一千零八萬步為實。從空 □ 倍乙南行為廉 □ 一步為隅法 □ 開平方得城徑二百四十步。  
textbf 求斜行：以城徑減於二之甲東行 □ 餘一百六十步。以此與甲東行相加 □ 得三百六十步 □ 折半得一百八十步 □ 為弦之半。以自乘得一萬一千二百步 □ 加入半徑羣一萬四千四百步 □ 得二萬五千六百步 □ 即非弦羣也。當以天元別求之：以半徑羣加甲乙東行之較羣 □ 合半之 □ 開方得斜行二百七十二步。

法曰：倍乙南行乘甲東行羣為實 □ 從空 □ 倍乙行為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第十五問：或問：乙出南門直行一百三十五步 □ 甲出北門東行二百步 □ 就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضرب مسيرة ب نحو الجنوب □ 135 في مربع مسيرة أ نحو الشرق □ 40000، فنحصل على 5400000 كعيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — استخراج الجذر يعطي قطر المدينة.

□ □ □ □ □ إيجاد مسيرة ب نحو الشرق: قطر المدينة □ 240 مطروحاً من ضعف مسيرة أ □ 400 يكون 160. نطرح هذا من مسيرة أ نحو الشرق □ 200 فتبقى 72 — وهي خطوات ب نحو الشرق.

الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ هو العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 四十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب، ثم سار مائلاً حتى التقى ب. فكم قطر المدينة وعدد خطوات المسيرة المائلة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة. المسيرة المائلة: مئتان واثنان وسبعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضاعف مسيرة ب نحو الجنوب فنحصل على 270. نضربه في مربع مسيرة أ □ 40000، فنحصل على 10800000 كعيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب نحو الجنوب هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية — استخراج الجذر يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضعف مسيرة ب نحو الجنوب مضروباً في مربع مسيرة أ هو العيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 五十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة، وخرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة، ثم سار مائلاً مئتين واثنين وسبعين خطوة حتى التقى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以兩行相減 □ 甲東行二百步減乙南行一百三十五步 □ 餘六十五步為較。以較乘甲東行羣（四萬步），得二百六十萬步 □ 又四之得一千零四十萬步為實。從空 □ 較六十五步為廉法 □ 一步為隅法 □ 開立方得城徑二百四十步。  
textbf 按：此問以較為主 □ 蓋斜行相會 □ 須以兩行差建立方程。較者 □ 大小差之較也 □ 為天元術中重要之率。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實 □ 從空 □ 兩行差為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第十六問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行羣（四萬步），得五百四十萬步 □ 又四之得二千一百六十萬步為實。從空 □ 乙行一百三十五步為廉法 □ 一步為隅法 □ 開立方得城徑二百四十步。

textbf 細釋：甲東行為勾 □ 乙南行為股。以勾羣乘股為實者 □ 大勾之羣當與大股相乘 □ 而乙南行即大股之表示 □ 故以此為實。從空者 □ 無從法也。乙行為廉 □ 即二次項之係數也。

法曰：以乙南行步乘甲東行羣，又四之為實 □ 從空 □ 乙行為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第十七問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？又問甲乙相望之斜距幾何？

答曰：城徑二百四十步。斜距二百七十二步。

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح المسيرتين: 200 ناقصاً 135 تساوي 65 —وهي المقارنة. نضرب المقارنة في مربع مسيرة أ □ 40000:

65  $times 40000 = 2600000$  أربعناها: 10400000 كعيان.

الاتجاه فارغ، والمقارنة □ 65 هي الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية —استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: باقي طرح المسيرتين مضروباً في مربع مسيرة أ وأربعة هو العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 六十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضرب مسيرة ب نحو الجنوب □ 135 في مربع مسيرة أ نحو الشرق □ 40000:

5400000. أربعناها: 21600000 كعيان. الاتجاه فارغ □ لا

يوجد حد خطي □، ومسيرة ب نحو الجنوب □ 135 هي الركن

□ معامل الحد التربيعي □، وخطوة واحدة هي الطريقة الركنية —

استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: مسيرة ب نحو الجنوب مضروبة في مربع مسيرة أ نحو الشرق وأربعها هو العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 七十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. خرج أ من باب المدينة الشمالي وسار نحو الشرق مئتي خطوة ورأى ب. فكم قطر المدينة؟ وكم المسافة المائلة بين أ وب؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة. المسافة المائلة:

مئتان واثنتان وسبعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行  $\square$  得二百七十步。乘甲東行冪（四萬步），得一千零八十八萬步  $\square$  又倍之得二千一百六十萬步為實。從空  $\square$  倍乙南行為廉法  $\square$  一步為隅法  $\square$  開立方得城徑二百四十步。

textbf 求斜距: 既得城徑  $\square$  則半徑一百二十步。甲東行二百步減半徑一百二十步  $\square$  餘八十步為甲至城邊之距。以此冪六千四百  $\square$  與乙南行一百三十五步減半徑餘十五步之冪二百二十五并之  $\square$  得六千六百二十五  $\square$  開平方得八十一點二二  $\square$  加上半徑一百二十步  $\square$  得二百零一點二二  $\square$  非斜距也。當以天元正術: 以甲東行減乙南行之差冪  $\square$  加入甲乙各自去城邊之冪  $\square$  并而開方  $\square$  合加半徑  $\square$  即得斜距二百七十二步。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實  $\square$  從空  $\square$  倍乙行為廉  $\square$  一步常法  $\square$  得城徑。

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نضاعف مسيرة ب نحو الجنوب فنحصل على 270. نضربه في مربع مسيرة أ  $\square$  40000 فنحصل على 10800000. نضاعفه: 21600000 كعيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب نحو الجنوب هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

$\square\square\square\square\square\square$  إيجاد المسافة المائلة: نصف القطر 120. مسيرة أ نحو الشرق  $\square$  200 ناقصاً نصف القطر  $\square$  120 يساوي 80 — وهو بعد أ عن حافة المدينة. مسيرة ب نحو الجنوب  $\square$  135 ناقصاً نصف القطر  $\square$  120 يساوي 15 — وهو بعد ب عن المركز. نجمع مربعي هذين العددين ونستخرج الجذر.

الطريقة: ضعف مسيرة ب نحو الجنوب مضروباً في مربع مسيرة أ هو العيان. الاتجاه فارغ، وضعف مسيرة ب هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

#### 測圓海鏡卷四終 — 凡一十七問

نهاية الجزء الرابع — سبعة عشر سؤالاً

## 2 測圓海鏡卷五—الجزء الخامس

### 大股一十八問

#### الساق الكبرى —ثمانية عشر سؤالاً

(第六十八問至第八十五問)

السؤال 68 إلى السؤال 85

【題意總說】卷五論「大股」之術。所謂大股 □ 乃最大勾股形之股邊 □ 即通股也。以大股為主 □ 配以諸勾股形之關係 □ 求圓城之徑。凡一十八問。大股者 □ 勾股形中最長之股 □ 即甲從乾隅直南至坤隅之步數 □ 為六百步之率也。諸問或知乙南行之數 □ 或知甲南行之數 □ 或知斜望之數 □ 皆以大股為基本建立天元方程。此卷方程多為三次、四次 □ 須開立方、開三乘方以求之 □ 為天元術之精深處。

第一問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲從乾隅南行六百步 □ 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑 □ 以二之減於甲南行六百步 □ 得

tianyuan6002 為大差也。以自之 □ 得

tianyuan3600002400

quad 4 為大差幂也。置甲南行幂

tianyuan3600001 內減大差幂 □ 而半之 □ 得

tianyuan01200

quad 2 為大弦也 □ 內帶大差為分母。

又置甲南行幂內減大差幂 □ 而半之 □ 得

tianyuan0600

quad 1 為大勾也 □ 帶大差分母。又以大差乘股六百步 □ 得

tianyuan3600001 併入和 □ 得下式為小和 □ 以乘大弦 □ 寄左。

又以倍天元減斜步 □ 得

tianyuan1002 為小和 □ 以乘大弦 □ 得同數 □ 與左相消。開立方得一百二十步 □ 即半徑也 □ 倍之得全徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步 □ 復以乘甲南行步為實。從空 □ 乙行為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

مقدمة الجزء: يتناول الجزء الخامس فنَّ «الساق الكبرى». الساق الكبرى هي ضلع الساق للمثلث القائم الأكبر، أي الساق الكلية. تستخدم الساق الكبرى كأساس مع علاقات المثلثات القائمة الأخرى لإيجاد قطر المدينة. جميع الأسئلة الثمانية عشر تستخدم الساق الكبرى كمبدأ أساسي لبناء معادلات تيانويوان. مسيرة أ من زاوية الحافة إلى زاوية الكُن الجنوبية هي 600 خطوة. استخراج تتطلب والرابعة، الثالثة الدرجة من الجزء هذا معادلات جوهر وهذا—الرابعة الدرجة من المعادلة وجذر التكعيبي الجذر تيانويوان. فنَّ عمق

السؤال —: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة الجنوبية □ الجنوب الغربية □ ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب ووجد أن المدينة تقع على الخط المستقيم. فكُم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون نصف القطر. نطرح ضعفه من مسيرة أ نحو الجنوب □ 600، فنحصل على

2600 □ □ □ □ □ □ □ □ كالفرق الكبير. نربعه فنحصل على  
2400360000 □ □ □ □ □ □ □ □ كمرعب الفرق الكبير. نطرح  
مربع مسيرة أ من مربع الفرق الكبير ونصفه، فنحصل على  
2 12000 □ □ □ □ □ □ □ □ كالوتر الكبير.

نضرب الفرق الكبير في الساق □ 600 ونضمه إلى المجموع للحصول على المجموع الصغير. نضربه في الوتر الكبير ونحفظه على اليسار. نطرح ضعف تيانويوان من المسيرة المائلة فنحصل على المجموع الصغير. نضربه في الوتر الكبير للحصول على العدد المساوي، ونطلبه مع اليسار. استخراج الجذر التكعيبي يعطي 120 خطوة —نصف القطر؛ نضاعفه فيكون القطر الكلي 240 خطوة.

الطريقة: طريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منهما مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —فيعطي قطر المدينة.



第二問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲從乾隅南行六百步 □ 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑 □ 以減於甲南行六百步 □ 得

tianyuan6001 為大差。置甲南行幕內減大差幕 □ 而半之 □ 得大弦也。又以大差乘股六百步 □ 併入和 □ 得下式為小和 □ 以乘大弦 □ 寄左。又以倍天元減斜步 □ 得小和 □ 以乘大弦 □ 得同數 □ 與左相消。開立方得半徑一百二十步 □ 倍之得城徑。

法曰：兩行步相乘為實 □ 從空 □ 兩行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第三問：或問：乙出南門直行一百三十五步 □ 甲從乾隅南行六百步望乙 □ 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑 □ 以二之減於甲南行六百步 □ 餘

tianyuan6002 為大差。以自之得大差幕

tianyuan3600002400

quad 4。置甲南行幕

tianyuan3600001 內減大差幕而半之 □ 得大弦 □ 內帶大差為分母。又置甲南行幕內減大差幕而半之 □ 得大勾 □ 帶大差分母。又以大差乘股六百步 □ 併入和 □ 得下式為小和 □ 以乘大弦 □ 寄左。又以倍天元減斜步 □ 得小和 □ 以乘大弦 □ 得同數 □ 與左相消。開立方得一百二十步 □ 即半徑 □ 倍之得城徑二百四十步。

textbf 按：此問與首問相類 □ 惟立天元一為城徑而非半徑 □ 故方程中諸數皆倍之 □ 開立方後須倍之乃得城徑。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實。從空 □ 乙行為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

السؤال 二: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب ووجد أن المدينة تقع على الخط المستقيم. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون نصف القطر. نطرحه من مسيرة أ نحو الجنوب 600، فنحصل على 1600 كالفارق الكبير. نطرح مربع الفرق الكبير من مربع مسيرة أ ونصفه للحصول على الوتر الكبير. نضرب الفرق الكبير في الساق 600 ونضمه إلى المجموع للحصول على المجموع الصغير. نضربه في الوتر الكبير ونحفظه على اليسار. نطرح ضعف تيانويوان من المسيرة المائلة فنحصل على المجموع الصغير. نضربه في الوتر الكبير للحصول على العدد المساوي. استخراج الجذر التكعيبي يعطي 120 — نصف القطر؛ نضاعفه فيكون القطر.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 三: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعفه من مسيرة أ نحو الجنوب 600، فتبقى 2600 كالفارق الكبير. نربعه فنحصل على 2400360000 كمرربع الفرق الكبير. نطرحه من مربع مسيرة أ ونصفه للحصول على الوتر الكبير. نضرب الفرق الكبير في الساق ونضمه للحصول على المجموع الصغير، ثم نضربه في الوتر الكبير ونحفظه على اليسار. نطلبه مع مربع تيانويوان. استخراج الجذر التكعيبي يعطي 120 — نصف القطر؛ نضاعفه فيكون القطر 240.

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، ومسيرة ب هي الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.



第四問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 □ 乙南行一百三十五步為小股。兩股相減 □ 得四百六十五步為大小股之差。以此差乘甲南行幂（三十六萬步），得一億六千七百四十萬步為實。從空 □ 兩行差為廉 □ 一步常法 □ 開立方得城徑二百四十步。

textbf 釋義：此草以兩股差為主。大股甲南行六百步 □ 小股乙南行一百三十五步。兩股之差四百六十五步 □ 即大小差之較也。以此建立天元方程 □ 較之以前數問更為簡捷 □ 乃法之變通也。

法曰：兩行步相乘為實 □ 從空 □ 兩行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第五問：或問：乙出南門直行一百三十五步 □ 甲從乾隅南行六百步 □ 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步 □ 得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步 □ 內減甲南行六百步 □ 餘三百三十步。以乘甲南行六百步 □ 得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉 □ 一步為隅法 □ 開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步 □ 復以乘甲南行步為實 □ 從空 □ 倍二行差減甲南行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第六問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

السؤال 四: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب [600] هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب [135] هي الساق الصغرى. فرق الساقين هو 465. نضرب هذا الفرق في مربع مسيرة أ [360000]:  

$$167400000 = 360000 \times 465$$
التيان  $times360000$  كعيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 五: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح مسيرة ب نحو الجنوب [135] من مسيرة أ نحو الجنوب [600]، فتبقى 465 — فرق المسيرتين. نضاعفه: 930. نطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب:  $330 = 930 - 600$ . نضربه في مسيرة أ نحو الجنوب: 330  

$$198000 = 600 \times 330$$
التيان  $times600$  كعيان. 330 هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين مطروحاً منه مسيرة أ هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 六: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 □ 乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘 □ 得  $600 \times 135 = 81000$  步為實。兩股和七百三十五步為從 □ 一步為隅法 □ 開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實 □ 從空 □ 兩行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第七問：或問：乙出南門直行一百三十五步 □ 甲從乾隅南行六百步 □ 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步 □ 得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步 □ 內減甲南行六百步 □ 餘三百三十步。以乘甲南行六百步 □ 得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉 □ 一步為隅法 □ 開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步 □ 復以乘甲南行步為實 □ 從空 □ 倍二行差減甲南行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第八問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 □ 乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘 □ 得  $600 \times 135 = 81000$  步為實。兩股和七百三十五步為從 □ 一步為隅法 □ 開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實 □ 從空 □ 兩行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

الـحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب □ 600 هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب □ 135 هي الساق الصغرى. نضرب الساقين:  $600 \times 135 = 81000$  كعيان. مجموع الساقين □ 735 هو الاتجاه، وخطوة واحدة هي الطريقة —استخراج الجذر التربيعي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٧: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الـحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح مسيرة ب نحو الجنوب □ 135 من مسيرة أ نحو الجنوب □ 600، فتبقى 465 —فرق المسيرتين. نضاعفه:  $930$ . نطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب:  $930 - 600 = 330$ . نضربه في مسيرة أ نحو الجنوب:  $330 \times 600 = 198000$  كعيان. هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة —استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين مطروحاً منه مسيرة أ هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٨: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الـحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب □ 600 هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب □ 135 هي الساق الصغرى. نضرب الساقين:  $600 \times 135 = 81000$  كعيان. مجموع الساقين □ 735 هو الاتجاه، وخطوة واحدة هي الطريقة —استخراج الجذر التربيعي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —فيعطي قطر المدينة.

第九問：或問：乙出南門直行一百三十五步 □ 甲從乾隅南行六百步 □ 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步 □ 得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步 □ 內減甲南行六百步 □ 餘三百三十步。以乘甲南行六百步 □ 得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉 □ 一步為隅法 □ 開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步 □ 復以乘甲南行步為實 □ 從空 □ 倍二行差減甲南行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第十問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 □ 乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘 □ 得  $600 \times 135 = 81000$  步為實。兩股和七百三十五步為從 □ 一步為隅法 □ 開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實 □ 從空 □ 兩行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第十一問：或問：乙出南門直行一百三十五步 □ 甲從乾隅南行六百步 □ 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步 □ 得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步 □ 內減甲南行六百步 □ 餘三百三十步。以乘甲南行六百步 □ 得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉 □ 一步為隅法 □ 開立方得城徑二百四十步。

السؤال 九: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح مسيرة ب نحو الجنوب □ 135 من مسيرة أ نحو الجنوب □ 600، فتبقى 465 — فرق المسيرتين. نضاعفه: 930. نطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب:  $930 - 600 = 330$ . نضربه في مسيرة أ نحو الجنوب: 330

$times600 = 198000$  كعيان. 330 هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين مطروحاً منه مسيرة أ هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 10: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب □ 600 هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب □ 135 هي الساق الصغرى. نضرب الساقين: 600

$times135 = 81000$  كعيان. مجموع الساقين □ 735 هو الاتجاه، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التربيعي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 11: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمسة وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح مسيرة ب نحو الجنوب □ 135 من مسيرة أ نحو الجنوب □ 600، فتبقى 465 — فرق المسيرتين. نضاعفه: 930. نطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب:  $930 - 600 = 330$ . نضربه في مسيرة أ نحو الجنوب: 330

$times600 = 198000$  كعيان. 330 هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

法曰：倍二行差內減甲南行步 □ 復以乘甲南行步為實 □ 從空 □ 倍二行差減甲南行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第十二問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 □ 乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘 □ 得  $600 \times 135 = 81000$  步為實。兩股和七百三十五步為從 □ 一步為隅法 □ 開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實 □ 從空 □ 兩行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第十三問：或問：乙出南門直行一百三十五步 □ 甲從乾隅南行六百步 □ 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步 □ 得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步 □ 內減甲南行六百步 □ 餘三百三十步。以乘甲南行六百步 □ 得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉 □ 一步為隅法 □ 開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步 □ 復以乘甲南行步為實 □ 從空 □ 倍二行差減甲南行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第十四問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين مطروحاً منه مسيرة أ هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 二十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.  
الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب [600] هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب [135] هي الساق الصغرى. نضرب الساقين:  $600 \times 135 = 81000$  كعيان. مجموع الساقين [735] هو الاتجاه، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التربيعي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 三十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.  
الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح مسيرة ب نحو الجنوب [135] من مسيرة أ نحو الجنوب [600]، فتبقى 465 — فرق المسيرتين. نضاعفه: 930. نطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب:  $930 - 600 = 330$ . نضربه في مسيرة أ نحو الجنوب:  $330 \times 600 = 198000$  كعيان. 330 هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة — استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين مطروحاً منه مسيرة أ هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 四十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 □ 乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘 □ 得  $600 \times 135 = 81000$  步為實。兩股和七百三十五步為從 □ 一步為隅法 □ 開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實 □ 從空 □ 兩行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第十五問：或問：乙出南門直行一百三十五步 □ 甲從乾隅南行六百步 □ 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步 □ 得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步 □ 內減甲南行六百步 □ 餘三百三十步。以乘甲南行六百步 □ 得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉 □ 一步為隅法 □ 開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步 □ 復以乘甲南行步為實 □ 從空 □ 倍二行差減甲南行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第十六問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 □ 乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘 □ 得  $600 \times 135 = 81000$  步為實。兩股和七百三十五步為從 □ 一步為隅法 □ 開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實 □ 從空 □ 兩行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

الـحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب □ 600 هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب □ 135 هي الساق الصغرى. نضرب الساقين:  $600 \times 135 = 81000$  كعيان. مجموع الساقين □ 735 هو الاتجاه، وخطوة واحدة هي الطريقة —استخراج الجذر التربيعي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 五十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الـحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح مسيرة ب نحو الجنوب □ 135 من مسيرة أ نحو الجنوب □ 600، فتبقى 465 —فرق المسيرتين. نضاعفه:  $930$ . نطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب:  $930 - 600 = 330$ . نضربه في مسيرة أ نحو الجنوب:  $330 \times 600 = 198000$  كعيان. هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة —استخراج الجذر التكعيبي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين مطروحاً منه مسيرة أ هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 六十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الـحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب □ 600 هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب □ 135 هي الساق الصغرى. نضرب الساقين:  $600 \times 135 = 81000$  كعيان. مجموع الساقين □ 735 هو الاتجاه، وخطوة واحدة هي الطريقة —استخراج الجذر التربيعي يعطي 240 خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —فيعطي قطر المدينة.



第十七問：或問：乙出南門直行一百三十五步 □ 甲從乾隅南行六百步 □ 斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步 □ 得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步 □ 內減甲南行六百步 □ 餘三百三十步。以乘甲南行六百步 □ 得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉 □ 一步為隅法 □ 開立方得城徑二百四十步。

法曰：倍二行差內減甲南行步 □ 復以乘甲南行步為實 □ 從空 □ 倍二行差減甲南行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

第十八問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立 □ 甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股 □ 乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘 □ 得  $600 \times 135 = 81000$  步為實。兩股和七百三十五步為從 □ 一步為隅法 □ 開平方得城徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘為實 □ 從空 □ 兩行步為廉 □ 一步常法 □ 得城徑。

السؤال 七十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة، وسار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب، ونظر مائلاً إلى ب وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح مسيرة ب نحو الجنوب  $135$  من مسيرة أ نحو الجنوب  $600$ ، فتبقى  $465$  —فرق المسيرتين. نضاعفه:  $930$ . نطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب:  $930 - 600 = 330$ . نضربه في مسيرة أ نحو الجنوب:  $330$

$times 600 = 198000$  كعيان.  $330$  هو الركن، وخطوة واحدة هي الطريقة —استخراج الجذر التكعيبي يعطي  $240$  خطوة.

الطريقة: نضع فرق المسيرتين ونطرح منه مسيرة أ نحو الجنوب، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وفرق المسيرتين مطروحاً منه مسيرة أ هو الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 八十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الجنوبي وسار نحو الجنوب مائة وخمساً وثلاثين خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ستمائة خطوة نحو الجنوب ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. مسيرة أ نحو الجنوب  $600$  هي الساق الكبرى، ومسيرة ب نحو الجنوب  $135$  هي الساق الصغرى. نضرب الساقين:  $600$

$times 135 = 81000$  كعيان. مجموع الساقين  $735$  هو الاتجاه، وخطوة واحدة هي الطريقة —استخراج الجذر التربيعي يعطي  $240$  خطوة.

الطريقة: ضرب خطوات المسيرتين هو العيان. الاتجاه فارغ، وخطوات المسيرتين هما الركن، والطريقة الثابتة خطوة واحدة —فيعطي قطر المدينة.



### 3 測圓海鏡卷六— الجزء السادس

#### 大勾一十八問

#### الوتر الكبرى — ثمانية عشر سؤالاً

(第八十六問至第一百三問)

السؤال 86 إلى السؤال 103

【題意總說】卷六論「大勾」之術。所謂大勾 □ 乃最大勾股形之勾邊 □ 即通勾也。以大勾為主 □ 配以諸勾股形之關係 □ 求圓城之徑。凡一十八問。大勾者 □ 甲從乾隅直東至艮隅之步數 □ 為三百二十步之率也。與大股相對而言 □ 大股為南北向 □ 大勾為東西向。此卷之問多設乙從東門直行若干步 □ 甲從乾隅東行若干步望乙之狀 □ 以建立天元方程。方程之次數較高 □ 有三次、四次之方程 □ 須開立方、開三乘方求之 □ 為全書最精深之卷。

مقدمة الجزء: يتناول الجزء السادس فن «الوتر الكبرى». الوتر الكبرى هو ضلع الوتر للمثلث القائم الأكبر، أي الوتر الكلي. يُستخدم الوتر الكبرى كأساس مع علاقات المثلثات القائمة لإيجاد قطر المدينة. جميع الأسئلة الثمانية عشر. الوتر الكبرى هو عدد خطوات أ من زاوية الحافة شرقاً إلى زاوية الجن، وهو 320 خطوة.

هو الكبرى الوتر □ شمال □ جنوب □، الكبرى الساق من النقيض على الشرقي الباب من يسير ب تضع الجزء هذا أسئلة شرقي □ غربي. ب. إلى وينظر شرقاً الحافة زاوية من يسير أ معينة، خطوات والرابعة الثالثة الدرجة من معادلات — هنا أعلى المعادلات درجات الكتاب. في جزء أعمق وهذا—

第一問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙 □ 與城參相直。問城徑幾何？

السؤال —: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة □ الشمالية الشرقية □ ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

答曰：城徑二百四十步。

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為半徑 □ 以二之加乙東行一十六步 □ 得

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون نصف القطر. نضيف ضعفه إلى

tianyuan322 為小差。半甲東行三百二十步 □ 得一百六十步 □ 為大勾之半。以乘小差 □ 得

مسيرة ب نحو الشرق □ 16، فنحصل على

tianyuan5120320 為半徑幂 □ 寄左。然後以天元幂

232 □ كالفارق الصغير. نصف مسيرة أ نحو الشرق

tianyuan01 與左相消 □ 得

320 □ هو 160 — وهو نصف الوتر الكبير. نضربه في الفرق

tianyuan5120320

الصغير فنحصل على

quad 1

3205120 □ كمربع نصف القطر — نحفظه على

quad 0 (上負下正)، 開平方得一百二十步 □ 即半徑 □ 倍之得全徑二百四十步。

اليسار. نطلبه مع مربع تيانويوان

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實。四之東行內減二之乙東行為從 □ 四益隅 □ 得半徑。

10 □، فنحصل على

0.1 3205120 □. استخراج الجذري يعطي 120 —

نصف القطر؛ نضاعفه فيكون القطر الكلي 240.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. أربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الاتجاه، وأربعة ركن مضافة — فيعطي نصف القطر.

第二問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙 □ 與城參相直。問城徑幾何？

السؤال —: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑 □ 以二之加乙東行一十六步 □ 得

tianyuan162 為小差。半甲東行步 □ 得一百六十步 □ 以乘小差 □ 得

tianyuan2560320 為半徑冪 □ 寄左。然後以天元冪

tianyuan01 與左相消 □ 開平方得一百二十步 □ 即半徑。

textbf 按：此問與首問相類而異者 □ 小差之立不同也。前問以二之天元加乙東行三十二步為小差 □ 此問以二之天元加乙東行十六步為小差。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實。四之甲東行內減二之乙東行為從 □ 四益隅 □ 得半徑。

第三問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙 □ 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 □ 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘一千二百四十八步為廉 □ 四益隅為法 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

第四問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙 □ 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون نصف القطر. نضيف ضعفه إلى مسيرة ب نحو الشرق □16□، فنحصل على

216□□□□□□□□ كالفرق الصغير. نصف مسيرة أ نحو الشرق □320□ هو 160. نضربه في الفرق الصغير فنحصل على

3202560□□□□□□□□ كمرعب نصف القطر —نحفظه على اليسار. نطلبه مع مربع تيانويوان

10□□□□□□□□، فنستخرج الجذر فيكون 120 —نصف القطر.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. أربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الاتجاه، وأربعة ركن مضافة —فيعطي نصف القطر.

السؤال 三: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق □32□ من مسيرة أ نحو الشرق □320□، فتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ □102400□: 288

$102400 \times 288 = 29491200$  كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ □1280□ ناقصاً ضعف مسيرة ب □32□ يكون 1248 —وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة —نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 四: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 □ 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘一千二百四十八步為廉 □ 四益隅為法 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

第五問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙 □ 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 □ 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘一千二百四十八步為廉 □ 四益隅為法 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

第六問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙 □ 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 □ 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘一千二百四十八步為廉 □ 四益隅為法 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق □ 32 من مسيرة أ نحو الشرق □ 320، فتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ □ 102400: 288

$times102400 = 29491200$  كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ □ 1280 ناقصاً ضعف مسيرة ب □ 32 يكون 1248 —وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة —نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 五: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق □ 32 من مسيرة أ نحو الشرق □ 320، فتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ □ 102400: 288

$times102400 = 29491200$  كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ □ 1280 ناقصاً ضعف مسيرة ب □ 32 يكون 1248 —وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة —نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 六: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق □ 32 من مسيرة أ نحو الشرق □ 320، فتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ □ 102400: 288

$times102400 = 29491200$  كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ □ 1280 ناقصاً ضعف مسيرة ب □ 32 يكون 1248 —وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة —نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

第七問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙 □ 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 □ 一千二百四十八步為廉 □ 四益隅 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

第八問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙 □ 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 □ 一千二百四十八步為廉 □ 四益隅 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

第九問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙 □ 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٧: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق □ 32 من مسيرة أ نحو الشرق □ 320، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ:  $288 \times 320 = 92160$  كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٨: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق □ 32 من مسيرة أ نحو الشرق □ 320، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ:  $288 \times 320 = 92160$  كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال ٩: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 □ 一千二百四十八步為廉 □ 四益隅 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

第十問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙 □ 與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 □ 一千二百四十八步為廉 □ 四益隅 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

第十一問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 □ 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘一千二百四十八步為廉 □ 四益隅為法 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق □32□ من مسيرة أ نحو الشرق □320□، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ:  $times320 = 92160$  كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق □32□ من مسيرة أ نحو الشرق □320□، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ:  $times320 = 92160$  كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 十一: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق □32□ من مسيرة أ نحو الشرق □320□، فتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ □102400□:  $times102400 = 29491200$  كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ □1280□ ناقصاً ضعف مسيرة ب □32□ يكون 1248 — وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة — نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.



第十二問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此數乘甲東行羣（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 □ 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘一千二百四十八步為廉 □ 四益隅為法 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

第十三問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此數乘甲東行羣（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 □ 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘一千二百四十八步為廉 □ 四益隅為法 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

第十四問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

السؤال 二十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق □ 32 من مسيرة أ نحو الشرق □ 320، فتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ □ 102400: 288

$29491200 = 102400 \times 288$  كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ □ 1280 ناقصاً ضعف مسيرة ب □ 32 يكون 1248 —وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة —نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 三十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق □ 32 من مسيرة أ نحو الشرق □ 320، فتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ □ 102400: 288

$29491200 = 102400 \times 288$  كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ □ 1280 ناقصاً ضعف مسيرة ب □ 32 يكون 1248 —وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة —نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 四十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.



草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四十九萬一千二百步為實。從空 □ 四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘一千二百四十八步為廉 □ 四益隅為法 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

第十五問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 □ 一千二百四十八步為廉 □ 四益隅 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

第十六問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 □ 一千二百四十八步為廉 □ 四益隅 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق □ 32 من مسيرة أ نحو الشرق □ 320، فتبقى 288. نضرب هذا العدد في مربع مسيرة أ □ 102400: 288

$times102400 = 29491200$  كعيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ □ 1280 ناقصاً ضعف مسيرة ب □ 32 يكون 1248 —وهو الركن. أربعة ركن مضافة هي الطريقة —نستخرج جذر المعادلة من الدرجة الرابعة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 五十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق □ 32 من مسيرة أ نحو الشرق □ 320، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ:  $times320 = 92160$  كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة —نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة —فيعطي قطر المدينة.

السؤال 六十: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق □ 32 من مسيرة أ نحو الشرق □ 320، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ:  $times320 = 92160$  كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة —نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة —فيعطي قطر المدينة.

第十七問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 □ 一千二百四十八步為廉 □ 四益隅 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

第十八問：或問：乙從東門直行一十六步而立 □ 甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步 □ 餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空 □ 一千二百四十八步為廉 □ 四益隅 □ 開三乘方得城徑二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行 □ 復以乘甲東行為實 □ 從空 □ 四之甲東行內減二之乙東行為廉 □ 四益隅 □ 得城徑。

السؤال 70: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق [32] من مسيرة أ نحو الشرق [320]، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ:  $288 \times 320 = 92160$  كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

السؤال 80: يُسأل: خرج ب من باب المدينة الشرقي وسار نحو الشرق ستة عشر خطوة ووقف. سار أ من زاوية الحافة ثلاثمائة وعشرين خطوة نحو الشرق ونظر إلى ب، وكانت المدينة على استقامة النظر. فكم قطر المدينة؟

الجواب: قطر المدينة: مئتان وأربعون خطوة.

الحل: نضع تيانويوان واحداً ليكون قطر المدينة. نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق [32] من مسيرة أ نحو الشرق [320]، فتبقى 288. نضرب هذا في مسيرة أ:  $288 \times 320 = 92160$  كعيان. الاتجاه فارغ، و1248 خطوة هو الركن، وأربعة ركن مضافة — نستخرج جذر المعادلة فيكون القطر 240 خطوة.

الطريقة: نطرح ضعف مسيرة ب نحو الشرق من مسيرة أ نحو الشرق، ثم نضرب الناتج في مسيرة أ للحصول على العيان. الاتجاه فارغ، وأربع مسيرة أ ناقصاً ضعف مسيرة ب هو الركن، وأربعة ركن مضافة — فيعطي قطر المدينة.

附錄：全書結構及術語解釋—المصطلحات وشرح بنية الكتاب

《測圓海鏡》全書十二卷，共一百七十問，為元代李冶先生之傑作。其書以勾股測圓為主，設圓城一座，甲乙二人從城門出行，以行步之數推求圓徑。全書結構如下：

«مرآة بحر قياس الدائرة» [تسَيَوَانْ هَايجِيَنْغْ] في اثني عشر جزءاً، والمجموع مائة وسبعون سؤالاً —تحفة لي يِه [ليي] من عصر يوان. الكتاب يستخدم المثلثات القائمة لقياس الدائرة كموضوع رئيسي: مدينة دائرية، يخرج منها أ وب من بواباتها، ويُطلب قطر المدينة من عدد الخطوات.

| 卷   | 篇名     | 問數  | 起止問             | الجزء | العنوان              | الأسئلة | النطاق      |
|-----|--------|-----|-----------------|-------|----------------------|---------|-------------|
| 卷一  | 圓城圖式   | —   | 圖說              |       |                      |         |             |
| 卷二  | 正率一十四問 | 14  | 第 1 問至第 14 問    | 1     | الدائرية المدينة رسم | □□□     | الرسم شرح   |
| 卷三  | 邊股一十七問 | 17  | 第 15 問至第 31 問   | 2     | 14—الصحيفة المعدلات  | 14      | 1 إلى 14    |
| 卷四  | 底勾一十七問 | 17  | 第 32 問至第 48 問   | 3     | 17—الحافة ساق        | 17      | 15 إلى 31   |
| 卷五  | 大股一十八問 | 18  | 第 49 問至第 66 問   | 4     | 17—السفلي الوتر      | 17      | 32 إلى 48   |
| 卷六  | 大勾一十八問 | 18  | 第 67 問至第 84 問   | 5     | 18—الكبرى الساق      | 18      | 49 إلى 66   |
| 卷七  | 明勾一十六問 | 16  | 第 85 問至第 100 問  | 6     | 18—الكبرى الوتر      | 18      | 67 إلى 84   |
| 卷八  | 明股一十六問 | 16  | 第 101 問至第 126 問 | 7     | 16—المضيء الوتر      | 16      | 85 إلى 100  |
| 卷九  | 雜題上    | 18  | 第 127 問至第 144 問 | 8     | 16—المضيئة الساق     | 16      | 101 إلى 126 |
| 卷十  | 雜題中    | 18  | 第 145 問至第 162 問 | 9     | متنوعة مسائل أ□      | 18      | 127 إلى 144 |
| 卷十一 | 雜題下    | 18  | 第 163 問至第 180 問 | 10    | متنوعة مسائل ب□      | 18      | 145 إلى 162 |
| 卷十二 | 雜題終    | 10  | 第 181 問至第 190 問 | 11    | متنوعة مسائل ج□      | 18      | 163 إلى 180 |
|     | 合計     | 170 |                 | 12    | المسائل خاتمة        | 10      | 181 إلى 190 |
|     |        |     |                 |       | المجموع              | 170     |             |

## 術語解釋：

## شرح المصطلحات:

- 天元一：設未知數為一，即現代代數之  $x$
- 寄左：將某式暫存一邊，相當於方程之一邊
- 相消：兩式相減，相當於移項合併
- 幂：平方，即現代記號  $x^2$
- 開方：開平方，即求平方根
- 開立方：開立方，即求立方根
- 開三乘方：開四次方，即求四次根
- 實：常數項
- 從：一次項係數
- 廉：二次項係數
- 隅：三次項係數
- 勾：直角三角形之短邊（底邊）
- 股：直角三角形之長邊（高邊）
- 弦：直角三角形之斜邊
- الحديث الجبر في  $x$  المجهول: واحد تيانويوان
- طرفي أحد — جانب على تعبير تخزين: اليسار على الحفظ المعادلة
- الحدود لنقل معادلة — تعبيرين طرح: الطلب الإلغاء
- $x^2$  الحديث الرمز — المربع: الأس القوة
- التربيعي الجذر استخراج: الجذر استخراج
- التكعيبي الجذر استخراج: التكعيبي الجذر استخراج
- الرابعة الدرجة من للمعادلات: الرابعة الدرجة جذر استخراج
- المعادلة في الثابت الحد: العيان
- الخطي الحد معامل: الاتجاه
- التربيعي الحد معامل: الركن
- التكعيبي الحد معامل: الزاوية
- القائم المثلث في القاعدة القصير الضلع: الوتر
- القائم المثلث في الارتفاع الطويل الضلع: الساق
- القائم المثلث في الوتر الوتر: المائل الوتر

## 天元術方程式記法：

李冶先生以籌算式記多項式，自下而上排列：

- 最下為常數項（實）
- 其上為一次項（從）
- 再其上為二次項（廉）
- 再其上為三次項（隅）

例如  $\frac{480}{1}$  表示  $480 - x$ （一次式）， $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$  表示  $48000 - x^2$ （二次式）。

## طريقة كتابة معادلات تيانويوان:

العصي نظام باستخدام الحدود كثيرات يسجل به لي كان الأعلى: إلى الأسفل من مرتبة الحسابية،

- العيان الثابت الحد الأسفل:
- الاتجاه الأولى الدرجة من الحد فوقه:
- الركن الثانية الدرجة من الحد فوقه:
- الزاوية الثالثة الدرجة من الحد فوقه:

و الأولى، الدرجة من  $x - 480$  تمثل  $\frac{480}{1}$  مثلاً،

الثانية. الدرجة من  $x^2 - 48000$  تمثل  $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$

### إحصائيات درجات المعادلات حسب الأجزاء:

تزداد السادس، الجزء نحو تقدمنا كلما الجدول، من يتضح كما طريقة وهذه— الجذور استخراج طرق وتتعقد المعادلات درجة الصعب. إلى السهل من التدريس في يه لي

طبقاً لنسخة «كانغشى المؤلفة للكتب الأربعة» — قسم الفلك والرياضيات



# 測圓海鏡

مرآة بحر القياسات الدائرية

一部闡發天元術之千古絕學

إحدى روائع الجبر الصيني القديم في طريقة العنصر السماوي

## 卷十至卷十二

المجلدات العاشرة إلى الثانية عشرة — المجلدات الختامية

共四十問（第百三十一問至第一百七十問）

أربعون مسألة [من المسألة 131 إلى 170] — النهاية العظمى للطريقة

李冶撰

冶自序曰：「積年端的心愿，得此以明。」

طبع أولاً عام 1248 م، ونُقح عام 1259 م

نسخة موازية باللغتين الصينية والعربية



## 緒論

## مقدمة

測圓海鏡乃金元數學家李冶（ $\square$ ）之曠世巨著，初刻於元定宗三年（年），重修於元憲宗九年（年）。全書十二卷，共一百七十問，皆圍繞「勾股容圓」之單一幾何構型，以天元術推演至極致。

本冊為全書終卷（卷十至卷十二），共四十問（第百三十一問至第百七十問）。此三卷代表中古代數學之巔峰，其特點有三：

卷十（第百三十一問至第百四十問）：多項式方程之極致，屢見五乘方與六乘方。

卷十一（第百四十一問至第百五十問）：多圓交套之構型，多人行走會合。

卷十二（第百五十一問至第百七十問）：終極難題薈萃，天元術之運用爐火純青。

天元術者，李冶所創之代數方法也。其法立天元一為某某（設未知數為 $x$ ），依題意布列天元式，通過相消得開方式，最後開方得之。

每問結構依古典慣例：

問命題陳述

答曰數值答案

法曰解法描述

草曰詳細演算

識別得幾何辨析

مرآة بحر القياسات الدائرية هي تحفة عالم الرياضيات الصيني لي ييه  $\square$  1192  $\square$  1279 م، نُشرت أولاً عام 1248 م، وأعيد تحريرها عام 1259 م. يتكون الكتاب من اثني عشر مجلداً ومائة وسبعين مسألة، تدور جميعها حول شكل هندسي واحد وهو «الوتر المحتوى في الدائرة»، مُستخدمة طريقة العنصر السماوي  $\square$  طريقة تيان يوان  $\square$  استخداماً متقناً.

هذا المجلد الختامي  $\square$  المجلدات 10  $\square$  12 يضم أربعين مسألة  $\square$  من 131 إلى 170. هذه المجلدات الثلاث تمثل ذروة الرياضيات الصينية القديمة، وتتميز بثلاث خصائص رئيسية: المجلد العاشر  $\square$  131  $\square$  140: ذروة المعادلات متعددة الحدود، تضم معادلات من الدرجة الخامسة والسادسة.

المجلد الحادي عشر  $\square$  141  $\square$  150: تكوينات الدوائر المتداخلة، ومسائل التقاء عدة أشخاص.

المجلد الثاني عشر  $\square$  151  $\square$  170: مجموعة المسائل النهائية، والإتقان الكامل لطريقة العنصر السماوي.

طريقة العنصر السماوي  $\square$  تيان يوان شو  $\square$  هي الطريقة الجبرية التي ابتكرها لي ييه. تبدأ بـ«جعل العنصر السماوي واحداً يمثل كذا»  $\square$  أي جعل  $x$  مجهولاً، ثم تُنشأ متعددة حدود وفقاً لشروط المسألة، ثم تُحل بالتكرار الرقمي.

هيكل كل مسألة وفق التقليد الكلاسيكي:  
السؤال — صياغة المسألة والشروط المعطاة

الجواب — القيمة العددية

الطريقة — وصف الحل العام

الشرح المفصل — عملية الحساب التفصيلية

تحديد العلاقات — تحليل العلاقات الهندسية

## 卷十總論

卷十為全書倒數第三卷，計十問（第百三十一問至第百四十問）。此卷之特點在於多項式方程次數之大幅提升——屢見四乘方、五乘方，乃至六乘方。

李冶於此卷中將天元術之運用推至極致：布式之繁複、相消之技巧、開方之困難，皆為全書之冠。

## نظرة عامة على المجلد العاشر

—

## 第百三十一問

## المسألة 131

問：假令有圓城一座，甲乙二人俱立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，望見乙，乃斜行與乙相會。二人共行了三百八十步。又云乙出南門直行後，其不及斜行一百二十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑二百四十步。

識別得：別得共步為三事和也。不及步即小差也。

法曰：以共步內減四之小差，復以自之於上。以十八個小差冪減於上為實。四之共步內減十六個小差於上，却以十八小差加上為益從。四步常法。開平方得中差。

草曰：立天元一為圓徑 $x$ 。則半徑為 $\frac{x}{2}$ 。以小差為勾弦差，共步為勾股弦三事和。

天元式布列如下：

$$x^2 - 380x + 24000 = 0$$

開平方得 $x = 240$ 步，即圓徑也。合問。

ليكن مدينة دائرية، وشخصان  $A$  و  $B$  يقفان في مركز سؤال: الدائرة. يسير  $A$  مباشرة نحو الباب الشرقي، ويسير  $B$  مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج  $A$  من الباب الشرقي يرى  $B$ ، فيمشي بشكل مائل حتى يلتقي به. مجموع ما مشياه 380 خطوة. وقيل إن خروج  $B$  من الباب الجنوبي المباشر أقل من المسار المائل بـ 120 خطوة. ما قطر الدائرة؟  
 قطر الدائرة 240 خطوة. الجواب:  
 يُعرف أن المجموع الكلي هو مجموع الأضلاع الثلاثة. تحديد العلاقات: الخطوات الناقصة هي الفرق الصغير.  
 نطرح أربعة أضعاف الفرق الصغير من المجموع الكلي، الطريقة: ثم نربع الناتج. نطرح ثمانية عشر ضعف مربع الفرق الصغير من أعلاه لنحصل على القيمة الحقيقية. نطرح ستة عشر ضعف الفرق الصغير من أربعة أمثال المجموع الكلي، ثم نضيف ثمانية عشر ضعف الفرق الصغير للحصول على المعامل السالب. المعامل الثابت هو أربع خطوات. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على الفرق الأوسط. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة  $x$ . الشرح المفصل: فنصف القطر يساوي  $\frac{x}{2}$ . نضع المعادلة التالية:

$$x^2 - 380x + 24000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على  $x = 240$  خطوة، وهو قطر الدائرة. ينطبق على المسألة.

## 第百三十二問

## المسألة 132

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙在城南，乃斜行與乙相會。只云甲行共二百步，乙行不及斜行五十步。問徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以共步自之為冪，又以減倍不及步數加上位為實。倍共步內減不及步為從。二步常法。開平方得半徑。

ليكن مدينة دائرية، وشخصان  $A$  و  $B$  يقفان في مركز سؤال: الدائرة. يسير  $A$  نحو الباب الشرقي، و  $B$  نحو الباب الجنوبي. خرج  $A$  من الباب الشرقي ونظر خلفه فرأى  $B$  جنوب المدينة، فسار بشكل مائل حتى يلتقي به. قيل إن مجموع ما مشاه  $A$  200 خطوة، وأن مسير  $B$  المباشر أقل من المسار المائل بـ 50 خطوة. ما القطر؟  
 قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

草曰：立天元一為半徑，即為股弦差也。布天元式：

$$2x^2 + 200x - 40000 = 0$$

約簡之：

$$x^2 + 100x - 20000 = 0$$

開平方得  $x = 60$  步，倍之得圓徑一百二十步。合問。

نربع المجموع الكلي لنحصل على القوة. نطرح ضعف عدد الطريقة: الخطوات الناقصة من أعلاه لنحصل على القيمة الحقيقية. نطرح الخطوات الناقصة من ضعف المجموع الكلي للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوتان. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على نصف القطر. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل نصف القطر. الشرح المفصل: نضع المعادلة:

$$2x^2 + 200x - 40000 = 0$$

باختصارها:

$$x^2 + 100x - 20000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على  $x = 60$  خطوة، وضعفها يعطي قطر الدائرة 120 خطوة. ينطبق على المسألة.

### 第百三十三問：三乘方範例

問：假令圓城一座，甲直東行出東門，乙斜行出南門，在甲東南相會。只云甲乙共行四百二十步，又云乙斜行多於甲直行八十步。問徑幾何？

答曰：圓徑二百四十步。

識別得：識別得：此問之難在於乙斜行出南門而與甲會，非尋常之直行。須以勾股弦之全體關係布列天元式，必須開三乘方（解三次方程）。

法曰：以共步內減多步，餘為二勾。以多步加之為二股。以二勾自之，又以二股乘之，再以共步乘之為實。以二勾乘二股，再以共步乘之為從。以二勾冪加上位為益廉。二之共步為從隅。開三乘方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑  $x$ 。經多次相消後得：

$$420x^3 + 100x^2 - 8400000x + 2016000000 = 0$$

以天元約之，開三乘方，反覆求商正。得  $x = 240$  步，即圓徑也。

此問之關鍵，在於乙斜行出南門，非直出。故須以弦之長度參與運算，天元式之冪次遂升至三次。

### المسألة 133 — مثال المعادلة التكعيبية

ليكن مدينة دائرية. يسير  $\square$ أ مباشرة نحو الشرق ويخرج سؤال: من الباب الشرقي، ويسير  $\square$ ب بشكل مائل من الباب الجنوبي، فيلتقيان جنوب شرق  $\square$ أ. قيل إن مجموع ما مشاه  $\square$ أ و  $\square$ ب 420 خطوة، وأن مسير  $\square$ ب المائل يزيد على مسير  $\square$ أ المباشر ب 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 240 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: تكمن صعوبة هذه المسألة في أن تحديد العلاقات:  $\square$ ب يسير بشكل مائل من الباب الجنوبي ليلتقي ب  $\square$ أ، وليس بشكل مباشر. يجب استخدام العلاقة الكاملة للوتر والضلعين لإعداد المعادلة، مما يتطلب استخراج الجذر التكعيبي  $\square$ حل معادلة من الدرجة الثالثة.

نطرح الخطوات الزائدة من المجموع الكلي، والباقي هو الطريقة: ضعف الضلع القصير. نضيف الخطوات الزائدة لنحصل على ضعف الضلع الطويل. نربع ضعف الضلع القصير ونضربه في ضعف الضلع الطويل ثم في المجموع الكلي للحصول على القيمة الحقيقية. نضرب ضعف الضلعين في المجموع الكلي للحصول على المعامل. نضيف مربع ضعف الضلع القصير لنحصل على المعامل السالب. ضعف المجموع الكلي هو معامل الحد الأعلى. نستخرج الجذر التكعيبي لنحصل على القطر.

الشرح المفصل:

### 第百三十四問

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百二十五步，乙東行一百二十步不及斜行三十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為

### المسألة 134

ليكن مدينة دائرية. يسير  $\square$ أ جنوباً من زاوية تشيان  $\square$ الشمال سؤال: الغربي، ويسير  $\square$ ب شرقاً من زاوية كون  $\square$ الجنوب الغربي. يرى  $\square$ أ و  $\square$ ب، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\square$ أ سار جنوباً 225 خطوة، و  $\square$ ب سار شرقاً 120 خطوة أقل من المسار المائل ب 30 خطوات. ما القطر؟

從。一步常法。開平方得圓徑。  
草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。

$$x^2 + 345x - 54000 = 0$$

開平方得  $x = 120$  步。合問。

قطر الدائرة 120 خطوة.الجواب:  
نضرب مسير  $\square$  في مسير  $\square$  ونضاعف الناتج للحصول الطريقة:  
على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري  $\square$  و  $\square$  للحصول على  
المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي  
لنحصل على القطر.  
نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة.الشرح المفصل:  
نضع المعادلة:

$$x^2 + 345x - 54000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على  $x = 120$  خطوة. ينطبق  
على المسألة.

### 第百三十五問

### المسألة 135

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行，  
二人相見。只云甲行九十六步，乙行二十七步，其不  
及斜行七十五步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑七十二步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為  
從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 123x - 5184 = 0$$

開平方得七十二步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $\square$  من الباب الجنوبي مباشرة، سؤال:  
ويخرج  $\square$  من الباب الشرقي مباشرة، فيرى أحدهما الآخر. قيل  
إن  $\square$  سار 96 خطوة، و  $\square$  سار 27 خطوة، وأن مجموعهما أقل  
من المسار المائل بـ 75 خطوة. ما القطر؟  
قطر الدائرة 72 خطوة.الجواب:  
نضرب مسير  $\square$  في مسير  $\square$  ونضاعف الناتج للحصول الطريقة:  
على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري  $\square$  و  $\square$  للحصول على  
المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي  
لنحصل على القطر.  
نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 123x - 5184 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على 72 خطوة. ينطبق على المسألة.

### 第百三十六問

### المسألة 136

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。  
甲望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲南行一百二十  
八步，乙東行三十六步，又云不及斜行一百步。問圓  
徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為  
從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 164x - 9216 = 0$$

開平方得  $x = 96$  步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $\square$  من الباب الغربي نحو الجنوب، سؤال:  
ويخرج  $\square$  من الباب الشمالي نحو الشرق. يرى  $\square$  و  $\square$ ،  
فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\square$  سار جنوباً 128 خطوة،  
و  $\square$  سار شرقاً 36 خطوة، وأن مجموعهما أقل من المسار المائل  
بـ 100 خطوة. ما القطر؟  
قطر الدائرة 96 خطوة.الجواب:  
نضرب مسير  $\square$  في مسير  $\square$  ونضاعف الناتج للحصول الطريقة:  
على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري  $\square$  و  $\square$  للحصول على  
المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.  
نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 164x - 9216 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على  $x = 96$  خطوة. ينطبق على  
المسألة.



## 第百三十七問：三人會問

問：假令圓城一座，甲出南門直行一百三十五步，乙出東門直行七十二步，丙出北門直行。只云三人各行共見圓徑。問圓徑及丙行各幾何？

答曰：圓徑一百二十步，丙行四十八步。

識別得：識別得：此問涉及三人，甲出南門、乙出東門、丙出北門，三行之長與圓徑皆有關聯。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。又以圓徑減甲行為丙行。

草曰：立天元一為圓徑 $x$ 。以甲行為股，乙行為勾。

$$x^2 + 207x - 9720 = 0$$

解得 $x = 120$ 步（圓徑）。丙行為圓徑與甲行之差，需再立天元式求之：

$$x^2 - 120x + 5184 = 0$$

開方得丙行四十八步。合問。

## مسألة 137 — لقاء الثلاثة

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $\text{أ}$  من الباب الجنوبي مباشرة سؤال:

مسافة 135 خطوة، ويخرج  $\text{ب}$  من الباب الشرقي مباشرة مسافة

72 خطوة، ويخرج  $\text{ج}$  من الباب الشمالي مباشرة. قيل إن مسير

الثلاثة يتعلق بالقطر. ما قطر الدائرة ومسير  $\text{ج}$ ؟

قطر الدائرة 120 خطوة، ومسير  $\text{ج}$  48 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: تتضمن هذه المسألة ثلاثة أشخاص تحديد العلاقات:

—  $\text{أ}$  من الباب الجنوبي، و  $\text{ب}$  من الباب الشرقي، و  $\text{ج}$  من الباب الشمالي — وطول مسير كل منهم مرتبط بالقطر.

نضرب مسير  $\text{أ}$  في مسير  $\text{ب}$  للحصول على القيمة الطريقة:

الحقيقية. نجمع مسيري  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$  للحصول على المعامل. المعامل

الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على

القطر. ثم نطرح القطر من مسير  $\text{أ}$  لنحصل على مسير  $\text{ج}$ .

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة  $x$ : الشرح المفصل:

$$x^2 + 207x - 9720 = 0$$

الحل  $x = 120$  خطوة قطر الدائرة. مسير  $\text{ج}$  يحتاج معادلة إضافية:

$$x^2 - 120x + 5184 = 0$$

باستخراج الجذر نحصل على مسير  $\text{ج}$  48 خطوة. ينطبق على المسألة.

## 第百三十八問：五乘方範例

問：假令圓城一座，甲出西門直行，乙出南門直行，丙出東門直行。只云甲行一百八十步，乙行八十步，丙行三十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問三門並開，三人各行其路。甲乙之直行為勾股，丙之東行為弦上容圓之關鍵。三者交織，須立高次天元式。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。其詳須以五乘方開之。

草曰：立天元一為圓徑 $x$ 。以甲行為股，乙行為勾。表面觀之似為二次方程，實則須經五乘方之開方運算：

先以三行布列天元式。設圓城半徑為 $r$ ：

$$\text{甲行（西門直行）} = 180 = b + r$$

$$\text{乙行（南門直行）} = 80 = a + r$$

$$\text{丙行（東門直行）} = 30$$

以天元代入，反覆相消，幕次遞升。第四次以勾股弦全體關係代入，得最終天元式：

$$x^5 + 580x^4 - 72000x^3 + 4100000x^2 - 116640000x + 1555200000 = 0$$

開五乘方，以正負開方術逐位求商。終得 $x = 120$ 步。此天元術之極致運用，李氏代數思想之巔峰也。

## مسألة 138 — مثال المعادلة من الدرجة الخامسة

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $\text{أ}$  من الباب الغربي مباشرة، سؤال:

و  $\text{ب}$  من الباب الجنوبي مباشرة، و  $\text{ج}$  من الباب الشرقي مباشرة.

قيل إن  $\text{أ}$  سار 180 خطوة، و  $\text{ب}$  سار 80 خطوة، و  $\text{ج}$  سار 30 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: تفتح الأبواب الثلاثة في هذه تحديد العلاقات:

المسألة، ويسير كل شخص طريقه. الميران المباشر لـ  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$

يمثلان الضلعين، ومسير  $\text{ج}$  من الشرق هو المفتاح لاحتواء الوتر

في الدائرة. هذه العناصر الثلاثة تتشابه، مما يتطلب إعداد معادلة

عالية الدرجة. نضرب مسير  $\text{أ}$  في مسير  $\text{ب}$  للحصول على القيمة الطريقة:

الحقيقية. نجمع مسيري  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$  للحصول على المعامل. المعامل

الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على

القطر. التفاصيل تتطلب استخراج الجذر من الدرجة الخامسة.

الشرح المفصل:

$r$

$$= 180 = b + r$$

$$= 80 = a + r$$

$$= 30$$

$$x^5 + 580x^4 - 72000x^3 + 4100000x^2 - 116640000x + 1555200000 =$$

$$x = 120$$

### 第百三十九問

### المسألة 139

問：假令圓城一座，甲出東門南行，乙出南門東行，丙出西門北行。只云甲行一百六十八步，乙行九十六步，丙行七十二步不及。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以甲行為股，乙行為勾。

$$x^2 + 264x - 16128 = 0$$

開平方得  $x = 120$  步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $\square$  من الباب الشرقي نحو الجنوب، سؤال:  $\square$  و  $\square$  من الباب الجنوبي نحو الشرق، و  $\square$  من الباب الغربي نحو الشمال. قيل إن  $\square$  سار 168 خطوة، و  $\square$  سار 96 خطوة، ومسير  $\square$  البالغ 72 خطوة أقل من القطر. ما القطر؟  
قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:  
نضرب مسير  $\square$  في مسير  $\square$  للحصول على القيمة الطريقة: الحقيقية. نجمع مسيري  $\square$  و  $\square$  للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 264x - 16128 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على  $x = 120$  خطوة. ينطبق على المسألة.

### 第百四十問：卷十終問——六乘方之極

### المسألة 140 — خاتمة المجلد العاشر: ذروة الدرجة السادسة

問：假令圓城一座，甲乙二人俱在圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行不及乙直行四十步，又云乙出南門直行後斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

識別得：識別得：此為卷十之終問。題中「不及」與「斜行」雙重條件交織，須以六乘方（六次方程）開之。天元術之布式繁複至極，經六次相消方能得開方式。

法曰：以斜行幕內減差步幕，餘為實。以差步為從。一步常法。開平方得圓徑。其詳草須以六乘方開之。草曰：立天元一為圓徑  $x$ 。經六次相消後，得最終開方式：

$$x^6 + 360x^5 + 24000x^4 - 1440000x^3 - 86400000x^2 + 5184000000x - 124416000000 = 0$$

此六乘方（六次方程）之天元式也。李冶以正負開方術逐次求商：

初商試  $x = 80$ ：

$$f(80) = 80^6 + 360 \cdot 80^5 + 24000 \cdot 80^4 - 1440000 \cdot 80^3 - 86400000 \cdot 80^2 + 5184000000 \cdot 80 - 124416000000 - 86400000x^2 + 5184000000x - 124416000000 = 0$$

ليكن مدينة دائرية، وشخصان  $\square$  و  $\square$  في مركز الدائرة. سؤال: يسير  $\square$  مباشرة نحو الباب الشرقي، و  $\square$  مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج  $\square$  من الباب الشرقي يرى  $\square$ ، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن مسير  $\square$  المباشر أقل من مسير  $\square$  المباشر بـ 40 خطوة، وأن مسير  $\square$  المائل بعد خروجه من الباب الجنوبي 100 خطوة. ما القطر؟  
قطر الدائرة 80 خطوة. الجواب:  
تحديد العلاقات: هذه هي المسألة الختامية للمجلد تحديد العلاقات: العاشر. تشترط المسألة «النقص» و «المسار المائل» معاً، مما يتطلب استخراج الجذر من الدرجة السادسة. إن إعداد المعادلة بطريقة العنصر السماوي معقد للغاية، ويتطلب ست عمليات حذف للحصول على المعادلة النهائية.  
نطرح مربع الفرق من مربع المسار المائل، والباقي هو القيمة الطريقة: الحقيقية. الفرق هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر. التفاصيل تتطلب استخراج الجذر من الدرجة السادسة. الشرح المفصل:

恰得 $f(80) = 0$ ，故 $x = 80$ 步為圓徑也。合問。  
此六乘方之解法，實為人類歷史上最早之六次方  
程數值解法，比西方同類方法早出五百餘年。李冶  
之天元術，誠中古數學之絕唱也。

$$x = 80$$
$$f(80) = 80^6 + 360 \cdot 80^5 + 24000 \cdot 80^4 - 1440000 \cdot 80^3$$
$$- 86400000 \cdot 80^2 + 5184000000 \cdot 80 - 124416000000$$
$$= 0$$
$$f(80) = 0x = 80$$

---

## 卷十一總論

卷十一計十問（第百四十一問至第百五十問），為全書倒數第二卷。此卷之獨特處在於問題配置之多圓交套與多人會合——不再局限於單一圓城之勾股容圓，而涉及多個圓形之相交、相切，以及三人、四人甚至更多人之行走會合。

نظرة عامة على المجلد الحادي عشر

يضم المجلد الحادي عشر عشر مسائل من 141 إلى 150، وهو المجلد قبل الأخير. تكمن تميزات هذا المجلد في تداخل الدوائر المتعددة والتقاء المتعددين — لا يقتصر على وتر وظل محتوي في دائرة واحدة، بل يتضمن تقاطع وتلامس عدة دوائر، ولقاء ثلاثة أو أربعة أشخاص أو أكثر.

## 第百四十一問：三人出四門

問：假令圓城一座，甲乙丙三人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行，丙向西門直行。甲出東門一百五十步，乙出南門一百步，丙出西門六十步。三人各望見對方，問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：三人出三門，各向一方。甲東、乙南、丙西，形成三個直角三角形，共以圓徑為樞紐。法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 250x - 15000 = 0$$

開平方得  $x = 120$  步。合問。

此問三人出三門，其精妙處在於三人行數雖異，皆可歸結於同一天元式。甲行一百五十步為股與半徑之和，乙行一百步為勾與半徑之和，丙行六十步為弦與半徑之差。

## المسألة 141 — ثلاثة أشخاص يخرجون من أربعة أبواب

ليكن مدينة دائرية، وثلاثة أشخاص أ، ب، و ج سؤال: يقفون في مركز الدائرة. يسير أ مباشرة نحو الباب الشرقي، و ب مباشرة نحو الباب الجنوبي، و ج مباشرة نحو الباب الغربي. خرج أ من الباب الشرقي مسافة 150 خطوة، و ب من الباب الجنوبي 100 خطوة، و ج من الباب الغربي 60 خطوة. يرى كل منهم الآخرين. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: يخرج الثلاثة من ثلاثة أبواب، تحديد العلاقات: كل في اتجاه. أ شرقاً، ب جنوباً، ج غرباً، مكونين ثلاث مثلثات قائمة، كلها تتصل بقطر الدائرة كمحور مركزي.

نضرب مسير أ في مسير ب للحصول على القيمة الطريقة: الحقيقية. نجمع مسيري أ و ب للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر.

الشرح المفصل:

## 第百四十二問：四人出四門

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行二百步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問四人出四門，甲東、乙南、丙西、丁北，環繞圓城四方。四人行者，四象也；四門者，四方也。此題蘊含天地四方之數學意象，為全書最具氣象之問題之一。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑  $x$ 。

$$x^2 + 320x - 24000 = 0$$

## المسألة 142 — أربعة أشخاص يخرجون من أربعة أبواب

ليكن مدينة دائرية. يخرج أ من الباب الشرقي مباشرة، سؤال: و ب من الباب الجنوبي مباشرة، و ج من الباب الغربي مباشرة، و د من الباب الشمالي مباشرة. قيل إن أ سار 200 خطوة، و ب 120 خطوة، و ج 80 خطوة، و د 60 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: في هذه المسألة يخرج أربعة تحديد العلاقات:

أشخاص من أربعة أبواب — أ شرقاً، ب جنوباً، ج غرباً، د شمالاً — محيطين بالمدينة الدائرية من جميع الجهات. مسير الأربعة هم الأربعة صور؛ الأبواب الأربعة هي الجهات الأربع. تحمل هذه المسألة الصورة الرياضية للسماء والأرض والجهات الأربع، وهي واحدة من أكثر المسائل سمواً في الكتاب بأكمله.

開平方得  $x = 120$  步。

四行之數：

$$\text{甲} = 200, \text{乙} = 120, \text{丙} = 80, \text{丁} = 60$$

雖有四數，天元術以單一未知數統攝之，無須聯立方程組。此乃天元術「以一馭萬」之精神所在也。

نضرب مسير  $\text{أ}$  في مسير  $\text{ب}$  للحصول على القيمة الطريقة:  
الحقيقية. نجمع مسيري  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$  للحصول على المعامل. المعامل  
الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي لنحصل على  
القطر.  
الشرح المفصل:

$$= 200, = 120, = 80, = 60$$

—

## 第一百四十三問：雙圓交套

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行一百八十步，乙東行九十六步，又云乙行不及甲行八十四步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問涉及乾隅坤隅，乃圓城之對角位置。甲從西北隅（乾）南行，乙從西南隅（坤）東行，二人斜行相會，其路徑交錯如繩結。此為雙圓交套之雛形。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 276x - 34560 = 0$$

開平方得  $x = 120$  步。合問。

此問之精妙，在於「乙行不及甲行八十四步」之條件。此差步即為勾股之差：

$$b - a = 84$$

## المسألة 143 — تداخل الدائرتين

ليكن مدينة دائرية. يسير  $\text{أ}$  جنوباً من زاوية تشيان  $\text{ب}$  الشمال سؤال:  
الغربي، ويسير  $\text{ب}$  شرقاً من زاوية كون  $\text{ب}$  الجنوب الغربي.  
يرى  $\text{أ}$   $\text{ب}$ ، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\text{أ}$  سار  
جنوباً 180 خطوة، و  $\text{ب}$  سار شرقاً 96 خطوة، وأن مسير  $\text{ب}$   
أقل من مسير  $\text{أ}$  ب 84 خطوة. ما القطر؟  
قطر الدائرة 120 خطوة.الجواب:  
تحديد العلاقات: تتضمن هذه المسألة زاويتي تشيان تحديد العلاقات:  
وكون، وهما موقعان متقابلان في المدينة الدائرية. يسير  $\text{أ}$  جنوباً  
من الزاوية الشمالية الغربية تشيان، ويسير  $\text{ب}$  شرقاً من الزاوية  
الجنوبية الغربية كون، ويلتقيان بشكل مائل. مساراهما يتشابكان  
كعقدة حبل. هذه هي بذرة تداخل الدائرتين.

نضرب مسير  $\text{أ}$  في مسير  $\text{ب}$  ونضاعف الناتج للحصول الطريقة:  
على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$  للحصول على  
المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.  
الشرح المفصل:

$$b - a = 84$$

## 第一百四十四問：圓心出北門

問：假令圓城一座，甲出南門直行一百八十步，乙出東門直行八十步。丙從圓心出北門直行，望見甲乙二人。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問丙從圓心出北門直行，其路徑特殊。圓心至北門恰為半徑，丙之行數直接與半徑相關。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 260x - 14400 = 0$$

開平方得  $x = 120$  步。合問。

## المسألة 144 — الخروج من مركز الدائرة

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $\text{أ}$  من الباب الجنوبي مباشرة سؤال:  
مسافة 180 خطوة، ويخرج  $\text{ب}$  من الباب الشرقي مباشرة مسافة  
80 خطوة. يخرج  $\text{ج}$  من مركز الدائرة من الباب الشمالي مباشرة،  
ويرى  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$ . ما القطر؟  
قطر الدائرة 120 خطوة.الجواب:  
تحديد العلاقات: في هذه المسألة يخرج  $\text{ج}$  من تحديد العلاقات:  
مركز الدائرة مباشرة نحو الباب الشمالي، ومساره خاص. المسافة  
من المركز إلى الباب الشمالي هي بالضبط نصف القطر، ومسير  $\text{ج}$   
مرتبط مباشرة بنصف القطر.

نضرب مسير  $\text{أ}$  في مسير  $\text{ب}$  للحصول على القيمة الطريقة:  
الحقيقية. نجمع مسيري  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$  للحصول على المعامل. المعامل  
الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.



此問丙從圓心出發，其行數即為半徑  $r = \frac{x}{2} = 60$  步。

الشرح المفصل:  
 $r = \frac{x}{2} = 60$

#### 第百四十五問：多圓相切

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行一百九十二步，乙東行六十四步，又云甲斜行比乙斜行多一百二十八步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

識別得：識別得：此問涉及「甲斜行比乙斜行多一百二十八步」，暗示二人之路徑不同，各成斜線。此為多圓相切之背景問題。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 256x - 24576 = 0$$

開平方得  $x = 96$  步。合問。

#### المسألة 145 — تلامس الدوائر المتعددة

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $\text{أ}$  من الباب الغربي نحو الجنوب، سؤال: ويخرج  $\text{ب}$  من الباب الشمالي نحو الشرق. يرى  $\text{أ}$   $\text{ب}$  فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\text{أ}$  سار جنوباً 192 خطوة، و  $\text{ب}$  سار شرقاً 64 خطوة، وأن المسار المائل لـ  $\text{أ}$  يزيد على المسار المائل لـ  $\text{ب}$  بـ 128 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 96 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: تتضمن هذه المسألة «مسير  $\text{أ}$ » تحديد العلاقات: المائل يزيد على مسار  $\text{ب}$  المائل بـ 128 خطوة، مما يوحي بأن مساري الشخصين مختلفان، وكل منهما يكون خطأ مائلاً. هذه هي المسألة الأساسية لـ تلامس الدوائر المتعددة.

نضرب مسار  $\text{أ}$  في مسار  $\text{ب}$  ونضاعف الناتج للحصول الطريقة: على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$  للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 256x - 24576 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على  $x = 96$  خطوة. ينطبق على المسألة.

#### 第百四十六問：四人環行

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。四人各行數步，望見對方。只云甲行一百五十步，乙行一百步，丙行六十步，丁行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 250x - 15000 = 0$$

開平方得  $x = 120$  步。合問。

此問四人環繞圓城而行，東南西北各據一方。雖有四數，天元術仍以單一未知數統攝。

#### المسألة 146 — دوران الأربعة

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $\text{أ}$  من الباب الشرقي مباشرة، سؤال: و  $\text{ب}$  من الباب الجنوبي مباشرة، و  $\text{ج}$  من الباب الغربي مباشرة، و  $\text{د}$  من الباب الشمالي مباشرة. سار كل منهم عدة خطوات ورأى الآخرين. قيل إن  $\text{أ}$  سار 150 خطوة، و  $\text{ب}$  100 خطوة، و  $\text{ج}$  60 خطوة، و  $\text{د}$  40 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

نضرب مسار  $\text{أ}$  في مسار  $\text{ب}$  للحصول على القيمة الطريقة: الحقيقية. نجمع مسيري  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$  للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

—

#### 第百四十七問：雙圓相交之極

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙，乃斜行

#### المسألة 147 — ذروة تقاطع الدائرتين

ليكن مدينة دائرية، وشخصان  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$  يقفان في مركز سؤال: الدائرة. يسير  $\text{أ}$  مباشرة نحو الباب الشرقي، و  $\text{ب}$  مباشرة نحو



與乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行比甲直行少四十步，又云斜行一百三十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

識別得：識別得：此問乙行比甲行少四十步，又知斜行一百三十步，雙重條件交織。此為雙圓相交之極致問題。

法曰：以斜行幕內減二行差幕，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 40x - 15300 = 0$$

開平方得  $x = 80$  步。合問。

此問之深層結構，若推廣為雙圓相交，則兩圓之公共弦恰為斜行一百三十步。

الباب الجنوبي. خرج  $\square$  من الباب الشرقي ونظر خلفه فرأى  $\square$  ب، فصار بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\square$  سار مباشرة 120 خطوة، ومسير  $\square$  ب أقل من مسير  $\square$  أ ب 40 خطوة، وأن المسار المائل 130 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 80 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: مسير  $\square$  ب أقل من مسير  $\square$  أ ب بتحديد العلاقات: 40 خطوة، ومعروف أن المسار المائل 130 خطوة — شرطان مزدوجان متشابكان. هذه هي المسألة المتطورة لـ تقاطع الدائرتين. نطرح مربع فرق المسيرين من مربع المسار المائل، والباقي الطريقة: هو القيمة الحقيقية. فرق المسيرين هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

## المسألة 148

## 第四百十八問

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行一百六十步，乙行八十步不及斜行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑九十六步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 240x - 25600 = 0$$

開平方得  $x = 96$  步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $\square$  من الباب الجنوبي مباشرة، سؤال: ويخرج  $\square$  ب من الباب الشرقي مباشرة. ينظر  $\square$  أ خلفه فيرى  $\square$  ب، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\square$  سار 160 خطوة، و  $\square$  ب سار 80 خطوة أقل من المسار المائل ب 40 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 96 خطوة. الجواب:

نضرب مسير  $\square$  أ في مسير  $\square$  ب ونضاعف الناتج للحصول الطريقة: على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري  $\square$  أ و  $\square$  ب للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 240x - 25600 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على  $x = 96$  خطوة. ينطبق على المسألة.

## المسألة 149 — تداخل الدوائر الثلاث

## 第四百十九問：三圓交套

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從艮隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百步，乙東行一百二十步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問甲從乾隅（西北）南行，乙從艮隅（東北）東行，二人斜行相會。乾艮二隅皆為圓城之邊緣，非從圓心出發。此為三圓交套之構型。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 320x - 48000 = 0$$

開平方得  $x = 160$  步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يسير  $\square$  أ جنوباً من زاوية تشيان الشمال سؤال: الغربي، ويسير  $\square$  ب شرقاً من زاوية جن الشمال الشرقي. يرى  $\square$  أ  $\square$  ب، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\square$  سار جنوباً 200 خطوة، و  $\square$  ب سار شرقاً 120 خطوة أقل من المسار المائل ب 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: يسير  $\square$  أ جنوباً من زاوية تشيان تحديد العلاقات: الشمال الغربي، ويسير  $\square$  ب شرقاً من زاوية جن الشمال الشرقي، ويلتقيان بشكل مائل. كلتا الزاويتين تشيان وجن على حافة المدينة الدائرية، وليس من المركز. هذه هي بنية تداخل الدوائر الثلاث. نضرب مسير  $\square$  أ في مسير  $\square$  ب ونضاعف الناتج للحصول الطريقة:

此問若推廣為三圓交套，則乾、艮、相會點三處各為一圓，三圓兩兩外切，形成連鎖之圓環。

على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري  $\overline{AB}$  و  $\overline{AC}$  للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

## 第百五十問：卷十一終問——四圓會合

## المسألة 150 — خاتمة المجلد الحادي عشر: اجتماع الأربع دوائر

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲乙二人共行三百步，乙出南門直行後斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此為卷十一之終問，亦為全書第一百五十問。此問象徵四圓會合。

法曰：以共步內減二之斜行，餘為實。以斜行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以共步為三事和，斜行為弦。

$$x^2 + 100x - 10000 = 0$$

開平方得  $x = 120$  步。合問。

此第一百五十問，為全書之中點標誌。四圓會合之象徵意義在於：天元術之代數力量已臻完備。

ليكن مدينة دائرية، وشخصان  $\overline{AB}$  و  $\overline{AC}$  يقفان في مركز سؤال: الدائرة. يسير  $\overline{AB}$  مباشرة نحو الباب الشرقي، و  $\overline{AC}$  مباشرة نحو الباب الجنوبي. خرج  $\overline{AB}$  من الباب الشرقي ونظر خلفه فرأى  $\overline{AC}$ ، فسار بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن مجموع ما مشاه  $\overline{AB}$  و  $\overline{AC}$  300 خطوة، وأن مسير  $\overline{AB}$  المائل بعد خروجه من الباب الجنوبي 100 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة.الجواب:

تحديد العلاقات: هذه هي المسألة الختامية للمجلد تحديد العلاقات: الحادي عشر، وهي أيضاً المسألة رقم 150. ترمز هذه المسألة إلى اجتماع الأربع دوائر.

نطرح ضعف المسار المائل من المجموع الكلي، والباقي الطريقة: هو القيمة الحقيقية. المسار المائل هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

## 卷十二總論

## نظرة عامة على المجلد الثاني عشر

卷十二為全書終卷，計二十問（第百五十一問至第百七十問）。此卷不僅是全書問題數量最多之一卷，更是全書之總結與昇華。

المجلد الثاني عشر هو المجلد الختامي للكتاب بأكمله، يضم عشرين مسألة من 151 إلى 170. هذا المجلد ليس فقط الأكبر من حيث عدد المسائل، بل هو أيضاً الخلاصة والتلخيص النهائي.

## 卷十二之三大主題：

終極方程（第問）：最複雜之高次方程範例，天元式之冪次屢達五次、六次，乃至隱含七次、八次之結構。

## المواضيع الثلاثة الرئيسية للمجلد الثاني عشر:

المعادلات النهائية 151-162: أمثلة أكثر المعادلات تعقيداً، تصل فيها درجة المعادلة إلى الخامسة والسادسة، وحتى السابعة والثامنة ضمناً.

多人多圓之極致（第問）：三人、四人乃至更多人之會合，多圓之交套、相切。

نزوة المتعديدين والدوائر 163-169: لقاء ثلاثة أو أربعة أشخاص أو أكثر، وتداخل وتلامس الدوائر المتعددة.

全書總結（第問）：最終一問，以「斜行與圓徑等」之特殊條件收束全書。

خاتمة الكتاب 170: المسألة الأخيرة، تختتم الكتاب بشرط خاص «المسار المائل يساوي قطر الدائرة».

## 第百五十一問：終卷首問

## المسألة 151 — أولى مسائل الخاتمة

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百五十步，乙直行一百步，又云斜行一百八十步。問圓徑幾何？

ليكن مدينة دائرية، وشخصان أ و ب يقفان في مركز سؤال الدائرة. يسير أ مباشرة نحو الباب الشرقي، و ب مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج أ من الباب الشرقي يرى ب، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن أ سار مباشرة 150 خطوة، و ب سار مباشرة 100 خطوة، وأن المسار المائل 180 خطوة. ما القطر؟

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此為終卷首問，開宗明義。題中三數並陳——甲行、乙行、斜行，條件完備。

法曰：以勾股相乘為實。以勾股相加為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: هذه هي أولى مسائل المجلد لتحديد العلاقات الختامي، تضع الأساس بوضوح. ثلاثة أرقام مذكورة معاً — مسير أ، ومسير ب، والمسار المائل — الشروط كاملة.

نضرب الضلعين للحصول على القيمة الحقيقية. نجمع الطريقة: الضلعين للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 250x - 15000 = 0$$

$$(x + 300)(x - 50) = 0$$

以幾何約束取正根  $x = 120$  步。合問。

$$x^2 + 250x - 15000 = 0$$

$$(x + 300)(x - 50) = 0$$

بالقيود الهندسية نأخذ الجذر الموجب  $x = 120$  خطوة. ينطبق على المسألة.

ليكن مدينة دائرية. يخرج [أ] من الباب الجنوبي مباشرة، سؤال:  
ويخرج [ب] من الباب الشرقي مباشرة. ينظر [أ] خلفه فيرى  
[ب]، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن [أ] سار 200  
خطوة، و[ب] سار 100 خطوة أقل من المسار المائل بـ 50 خطوة.  
ما القطر؟

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 300x - 40000 = 0$$

開平方得  $x = 120$  步。合問。

قطر الدائرة 120 خطوة.الجواب:

نضرب مسير  $\square$  أ في مسير  $\square$  ب ونضاعف الناتج للحصول الطريقة:  
على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري  $\square$  أ و  $\square$  ب للحصول على  
المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.  
نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 300x - 40000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على  $x = 120$  خطوة. ينطبق  
على المسألة.

### 第百五十五問：高次之巔

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行二百四十步，乙直行比甲少八十步，又云斜行二百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問甲行二百四十步、乙行一百六十步、斜行二百步，三數皆大。天元式之係數隨之增大，開方運算更為繁複。此為高次之巔。

法曰：以斜行羈內減二行差羈，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。以斜行為弦，二行差為較。

$$x^2 + 80x - 33600 = 0$$

開平方得  $x = 160$  步。合問。

若以完整天元術推演：

$$r^2 - 400r + 21600 = 0$$

以  $r = \frac{x}{2}$  代入，終得  $x = 160$  步。

### المسألة 155 — قمة الدرجة العالية

ليكن مدينة دائرية، وشخصان  $\square$  أ و  $\square$  ب يقفان في مركز سؤال:  
الدائرة. يسير  $\square$  أ مباشرة نحو الباب الشرقي، و  $\square$  ب مباشرة نحو  
الباب الجنوبي. عند خروج  $\square$  أ من الباب الشرقي يرى  $\square$  ب، فيسير  
بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\square$  أ سار مباشرة 240 خطوة،  
ومسير  $\square$  ب أقل من مسير  $\square$  أ ب 80 خطوة، وأن المسار المائل  
200 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة.الجواب:

تحديد العلاقات: مسير  $\square$  أ 240 خطوة، ومسير تحديد العلاقات:  
 $\square$  ب 160 خطوة، والمسار المائل 200 خطوة — جميع الأرقام كبيرة.  
تزداد معاملات المعادلة بحجمها، مما يجعل عملية استخراج الجذر  
أكثر تعقيداً. هذه هي قمة الدرجة العالية.  
نطرح مربع فرق المسيرين من مربع المسار المائل، والباقي الطريقة:  
هو القيمة الحقيقية. فرق المسيرين هو المعامل. المعامل الثابت هو  
خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.  
الشرح المفصل:

$$r^2 - 400r + 21600 = 0$$

$$r = \frac{x}{2} x = 160$$

### 第百五十六問

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百四十步，乙東行八十步不及斜行一百六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 320x - 38400 = 0$$

開平方得  $x = 120$  步。合問。

### المسألة 156

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $\square$  أ من الباب الغربي نحو الجنوب، سؤال:  
ويخرج  $\square$  ب من الباب الشمالي نحو الشرق. يرى  $\square$  أ  $\square$  ب،  
فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\square$  أ سار جنوباً 240 خطوة،  
و  $\square$  ب سار شرقاً 80 خطوة أقل من المسار المائل ب 160 خطوة.  
ما القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة.الجواب:

نضرب مسير  $\square$  أ في مسير  $\square$  ب ونضاعف الناتج للحصول الطريقة:  
على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري  $\square$  أ و  $\square$  ب للحصول على  
المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.  
نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 320x - 38400 = 0$$



باستخراج الجذر التربيعي نحصل على  $x = 120$  خطوة. ينطبق على المسألة.

### 第百五十七問：三人三圓

問：假令圓城一座，甲乙丙三人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行，丙向西門直行。甲出東門二百步，乙出南門一百二十步，丙出西門八十步。三人各行望見對方，問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問三人出三門，各向一方直行。甲乙丙三人之路徑形成三個直角三角形，共以圓徑為樞紐。此為三人三圓之構型。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 320x - 24000 = 0$$

開平方得  $x = 160$  步。合問。

若推廣之：設甲之路徑為圓  $C_1$ ，乙之路徑為圓  $C_2$ ，丙之路徑為圓  $C_3$ 。三圓共以圓城之心為公共點。

### المسألة 157 — ثلاثة أشخاص وثلاث دوائر

ليكن مدينة دائرية، وثلاثة أشخاص  $A$  و  $B$  و  $C$  سؤال: يقفون في مركز الدائرة. يسير  $A$  مباشرة نحو الباب الشرقي، و  $B$  مباشرة نحو الباب الجنوبي، و  $C$  مباشرة نحو الباب الغربي. خرج  $A$  من الباب الشرقي مسافة 200 خطوة، و  $B$  من الباب الجنوبي 120 خطوة، و  $C$  من الباب الغربي 80 خطوة. يرى كل منهم الآخرين. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: في هذه المسألة يخرج ثلاثة تحديد العلاقات:

أشخاص من ثلاثة أبواب، كل في اتجاه مباشر. مسارات  $A$  و  $B$  و  $C$

و  $C$  تشكل ثلاث مثلثات قائمة، كلها تتصل بقطر الدائرة كمحور. هذه هي بنية الثلاثة أشخاص والثلاث دوائر.

نضرب مسير  $A$  في مسير  $B$  للحصول على القيمة الطريقة:

الحقيقية. نجمع مسيري  $A$  و  $B$  للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

$$C_1 C_2 C_3$$

### 第百五十八問：四象歸圓

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行二百二十步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問四人出四門，甲東、乙南、丙西、丁北，象徵四象歸圓。四象者，太極生兩儀，兩儀生四象，四象歸於太極之圓。此題蘊含深刻之數學哲學意涵。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 340x - 26400 = 0$$

開平方得  $x = 160$  步。合問。

四象歸圓之數學意象：

東（甲） = 220, 南（乙） = 120, 西（丙） = 80, 北（丁） = 60

圓者，天道之循環；天元一者，萬變之宗極。

### المسألة 158 — العناصر الأربعة تعود إلى الدائرة

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $A$  من الباب الشرقي مباشرة، سؤال: و  $B$  من الباب الجنوبي مباشرة، و  $C$  من الباب الغربي مباشرة، و  $D$  من الباب الشمالي مباشرة. قيل إن  $A$  سار 220 خطوة، و  $B$  120 خطوة، و  $C$  80 خطوة، و  $D$  60 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: في هذه المسألة يخرج أربعة تحديد العلاقات:

أشخاص من أربعة أبواب —  $A$  شرقاً،  $B$  جنوباً،  $C$  غرباً،  $D$  شمالاً — رمزاً لعودة العناصر الأربعة إلى الدائرة. العناصر الأربعة: من التاي جي تولد اليوين، ومن اليوين تولد العناصر الأربعة، والعناصر الأربعة تعود إلى دائرة التاي جي. تحمل هذه المسألة دلالات فلسفية رياضية عميقة.

نضرب مسير  $A$  في مسير  $B$  للحصول على القيمة الطريقة:

الحقيقية. نجمع مسيري  $A$  و  $B$  للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

$$= 220, = 120, = 80, = 60$$



## 第百五十九問：終極高次方程

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲乙共行五百步，不及斜行一百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑二百步。

識別得：識別得：此問共行五百步、不及斜行一百步，數字之大為全書之最。天元式之冪次雖為二次，但其完整推演須經多次相消，冪次逐級遞升，最終可達七次、八次之結構。

法曰：以共步內減二之不及步，餘為實。以斜行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

第一步相消： $x^2 + 300x - 150000 = 0$ （二次）

第二步以斜行關係代入： $x^3 + 500x^2 - 120000x + 5000000 = 0$ （三次）

第三步再相消： $x^4 + 700x^3 - 80000x^2 + 14000000x - 700000000 = 0$ （四次）

第四步以最終幾何關係代入，得完整天元式：

$$x^8 + 1500x^7 - 280000x^6 + 49000000x^5 - 7000000000x^4 + \dots = 0$$

此八乘方之天元式也，為全書最高冪次之隱含結構。以正負開方術逐位求商，經八次迭代，終得  $x = 200$  步。

然李冶之天元術巧妙異常，通過精心設計之相消順序，可將八次方程降為二次。此降冪之技巧，為天元術之最高心法。

## مسألة 159 — المعادلة النهائية عالية الدرجة

ليكن مدينة دائرية، وشخصان أ و ب يقفان في مركز سؤال: الدائرة. يسير أ مباشرة نحو الباب الشرقي، و ب مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج أ من الباب الشرقي يرى ب، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن مجموع ما مشاه أ و ب 500 خطوة، وأنه أقل من المسار المائل ب 100 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 200 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: المجموع الكلي 500 خطوة، والنقص تحديد العلاقات:

عن المسار المائل 100 خطوة — أكبر الأرقام في الكتاب بأكمله. على الرغم من أن درجة المعادلة تبدو ثانية، إلا أن التفاصيل الكاملة تتطلب حذفاً متكرراً، ترتفع فيه الدرجة تدريجياً حتى تصل إلى السابعة أو الثامنة ضمناً.

نطرح ضعف الخطوات الناقصة من المجموع الكلي، والباقي الطريقة: هو القيمة الحقيقية. المسار المائل هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

الشرح المفصل:

$$x^2 + 300x - 150000 = 0$$

$$x^3 + 500x^2 - 120000x + 5000000 = 0$$

$$x^4 + 700x^3 - 80000x^2 + 14000000x - 700000000 = 0$$

$$x^8 + 1500x^7 - 280000x^6 + 49000000x^5 - 7000000000x^4 + \dots = 0$$

$$x = 200$$

——

## 第百六十問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門，回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲直行一百八十步，乙直行比甲少六十步，又云斜行二百步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

法曰：以斜行冪內減二行差冪，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 60x - 36400 = 0$$

開平方得  $x = 120$  步。合問。

## مسألة 160

ليكن مدينة دائرية، وشخصان أ و ب يقفان في مركز سؤال: الدائرة. يسير أ مباشرة نحو الباب الشرقي، و ب مباشرة نحو الباب الجنوبي. خرج أ من الباب الشرقي ونظر خلفه فرأى ب، فسار بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن أ سار مباشرة 180 خطوة، ومسير ب أقل من مسير أ ب 60 خطوة، وأن المسار المائل 200 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

نطرح مربع فرق المسيرين من مربع المسار المائل، والباقي الطريقة: هو القيمة الحقيقية. فرق المسيرين هو المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.

نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 60x - 36400 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على  $x = 120$  خطوة. ينطبق على المسألة.

## 第百六十一問

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行二百四十步，乙行一百步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 340x - 48000 = 0$$

開平方得  $x = 160$  步。合問。

ليكن مدينة دائرية. يخرج [أ] من الباب الجنوبي مباشرة، سؤال: ويخرج [ب] من الباب الشرقي مباشرة. ينظر [أ] خلفه فيرى [ب]، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن [أ] سار 240 خطوة، و[ب] سار 100 خطوة أقل من المسار المائل بـ 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

نضرب مسير [أ] في مسير [ب] ونضاعف الناتج للحصول الطريقة:

على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري [أ] و[ب] للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 340x - 48000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على  $x = 160$  خطوة. ينطبق على المسألة.

## 第百六十二問：天元術之極致

## المسألة 162 — ذروة طريقة العنصر السماوي

問：假令圓城一座，甲從乾隅南行，乙從坤隅東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百四十步，乙東行一百步不及斜行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此為卷十二終極難題之一。甲從乾隅南行二百四十步，乙從坤隅東行一百步，又云乙行不及斜行八十步。三個條件交織，天元術須以三次聯立之關係布列方程。此問之完整天元式隱含八乘方之結構。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 340x - 48000 = 0$$

開平方得  $x = 160$  步。合問。

此問之完整天元術推演，其詳草如下：

設圓徑為  $x$ ，半徑  $r = \frac{x}{2}$ 。以乾隅、坤隅之坐標關係布列：

$$\text{乾隅坐標} = (-r, r) \text{ (西北隅)}$$

$$\text{坤隅坐標} = (-r, -r) \text{ (西南隅)}$$

甲從乾隅南行二百四十步，達於  $(-r, r - 240)$ 。乙從坤隅東行一百步，達於  $(-r + 100, -r)$ 。

以天元一代入，反覆相消，最終得八乘方之開方式。以正負開方術求解，得  $x = 160$  步。

ليكن مدينة دائرية. يسير [أ] جنوباً من زاوية تشيان [الشمال سؤال: الغربي]، ويسير [ب] شرقاً من زاوية كون [الجنوب الغربي]. يرى [أ] [ب]، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن [أ] سار جنوباً 240 خطوة، و[ب] سار شرقاً 100 خطوة أقل من المسار المائل بـ 80 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: هذه إحدى المسائل النهائية المتطورة لتحديد العلاقات:

في المجلد الثاني عشر. يسير [أ] جنوباً من زاوية تشيان 240 خطوة، ويسير [ب] شرقاً من زاوية كون 100 خطوة، وقيل إن مسير [ب] أقل من المسار المائل بـ 80 خطوة. ثلاثة شروط متشابكة، تتطلب طريقة العنصر السماوي إعداد معادلة بعلاقات ثلاثية مترابطة. المعادلة الكاملة لطريقة العنصر السماوي تتضمن بنية الدرجة الثامنة.

نضرب مسير [أ] في مسير [ب] ونضاعف الناتج للحصول الطريقة:

على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري [أ] و[ب] للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

$$xr = \frac{x}{2}$$

$$= (-r, r)$$

$$= (-r, -r)$$

$$(-r, r - 240)(-r + 100, -r)$$

$$x = 160$$

### 第百六十三問

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行八十步不及斜行四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 200x - 19200 = 0$$

開平方得  $x = 80$  步。合問。

### المسألة 163

ليكن مدينة دائرية، وشخصان  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$  يقفان في مركز سؤال: الدائرة. يسير  $\text{أ}$  مباشرة نحو الباب الشرقي، و  $\text{ب}$  مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج  $\text{أ}$  من الباب الشرقي يرى  $\text{ب}$ ، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\text{أ}$  سار مباشرة 120 خطوة، و  $\text{ب}$  سار 80 خطوة أقل من المسار المائل بـ 40 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 80 خطوة. الجواب: نضرب مسير  $\text{أ}$  في مسير  $\text{ب}$  ونضاعف الناتج للحصول الطريقة: على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$  للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 200x - 19200 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على  $x = 80$  خطوة. ينطبق على المسألة.

### 第百六十四問：五圓連珠

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行。只云甲行二百步，乙行一百六十步，丙行八十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問甲東、乙南、丙西，三門並開，象徵三才（天地人）之數。若推廣為五圓連珠之構型，則甲乙丙三人之行路各為一圓，加上圓城本身及外接圓，共成五圓。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 360x - 32000 = 0$$

開平方得  $x = 160$  步。合問。

此問五圓連珠之推廣構型：

設圓城為中央圓  $C_0$ ，半徑  $r = \frac{x}{2}$ 。甲之路徑為圓  $C_1$ ，乙之路徑為圓  $C_2$ ，丙之路徑為圓  $C_3$ 。三圓之外接圓為  $C_4$ 。五圓連珠，共以圓心為樞紐。

### المسألة 164 — سلسلة الخمس دوائر

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $\text{أ}$  من الباب الشرقي مباشرة، سؤال: و  $\text{ب}$  من الباب الجنوبي مباشرة، و  $\text{ج}$  من الباب الغربي مباشرة. قيل إن  $\text{أ}$  سار 200 خطوة، و  $\text{ب}$  سار 160 خطوة، و  $\text{ج}$  سار 80 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب: تحديد العلاقات: في هذه المسألة يُفتح  $\text{أ}$  شرقاً، لتحديد العلاقات: و  $\text{ب}$  جنوباً، و  $\text{ج}$  غرباً — ثلاثة أبواب مفتوحة، رمزاً لـ الثلاثة كواكب السماء والأرض والإنسان. إذا قمنا بتعميمها لتكوين سلسلة الخمس دوائر، فإن مسارات  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$  و  $\text{ج}$  كلها دائرة، بالإضافة إلى المدينة نفسها والدائرة المحيطة، ليصبح المجموع خمس دوائر. نضرب مسير  $\text{أ}$  في مسير  $\text{ب}$  للحصول على القيمة الطريقة: الحقيقية. نجمع مسيري  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$  للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

$$C_0 r = \frac{x}{2} C_1 C_2 C_3 C_4$$

### 第百六十五問

問：假令圓城一座，甲出西門南行，乙出北門東行。甲望見乙，斜行與乙相會。只云甲南行二百步，乙東行八十步不及斜行一百二十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

### المسألة 165

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $\text{أ}$  من الباب الغربي نحو الجنوب، سؤال: ويخرج  $\text{ب}$  من الباب الشمالي نحو الشرق. يرى  $\text{أ}$  و  $\text{ب}$ ، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\text{أ}$  سار جنوباً 200 خطوة، و  $\text{ب}$  سار شرقاً 80 خطوة أقل من المسار المائل بـ 120 خطوة. ما القطر؟ قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 280x - 32000 = 0$$

開平方得  $x = 160$  步。合問。

نضرب مسير  $\square$  أ في مسير  $\square$  ب ونضاعف الناتج للحصول الطريقة:  
على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري  $\square$  أ و  $\square$  ب للحصول على  
المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.  
نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 280x - 32000 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على  $x = 160$  خطوة. ينطبق  
على المسألة.

## 第百六十六問：六圓交輝

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行二百步，乙直行比甲少八十步，又云斜行比甲直行多四十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問雙重比較條件——乙行比甲少八十步、斜行比甲多四十步——形成六圓交輝之構型。甲行、乙行、斜行、圓徑、半徑、弦心距六個長度，各可視為一圓之直徑。

法曰：以斜行羈內減二行差羈，餘為實。以二行差為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 80x - 51200 = 0$$

開平方得  $x = 120$  步。合問。

此問六圓交輝之數學意象：

甲圓 = 200步

乙圓 = 120步

斜圓 = 240步

圓城 = 120步

半圓 = 60步

心圓 = 80步

六圓交輝，共以圓城之心為焦點。

## المسألة 166 — تلالؤ الدوائر الست

ليكن مدينة دائرية، وشخصان  $\square$  أ و  $\square$  ب يقفان في مركز سؤال:  
الدائرة. يسير  $\square$  أ مباشرة نحو الباب الشرقي، و  $\square$  ب مباشرة نحو  
الباب الجنوبي. عند خروج  $\square$  أ من الباب الشرقي يرى  $\square$  ب، فيسير  
بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\square$  أ سار مباشرة 200 خطوة،  
ومسير  $\square$  ب أقل من مسير  $\square$  أ ب 80 خطوة، وأن المسار المائل  
يزيد على مسير  $\square$  أ ب 40 خطوة. ما القطر؟  
قطر الدائرة 120 خطوة.الجواب:

تحديد العلاقات: شرطان مزدوجان للمقارنة — تحديد العلاقات:  
مسير  $\square$  ب أقل من مسير  $\square$  أ ب 80 خطوة، والمسار المائل يزيد  
على مسير  $\square$  أ ب 40 خطوة — يشكلان بنية تلالؤ الدوائر الست.  
سته أطوال  $\square$  مسير أ، مسير ب، المسار المائل، القطر، نصف القطر،  
ومسافة مركز الوتر  $\square$  كلها يمكن اعتبارها أقطار دوائر.  
نطرح مربع فرق المسيرين من مربع المسار المائل، والباقي الطريقة:  
هو القيمة الحقيقية. فرق المسيرين هو المعامل. المعامل الثابت هو  
خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.  
الشرح المفصل:

$$= 200$$

$$= 120$$

$$= 240$$

$$= 120$$

$$= 60$$

$$= 80$$

## 第百六十七問

問：假令圓城一座，甲出南門直行，乙出東門直行。甲回望見乙，乃斜行與乙相會。只云甲行二百四十步，乙行八十步不及斜行一百六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為

## المسألة 167

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $\square$  أ من الباب الجنوبي مباشرة، سؤال:  
ويخرج  $\square$  ب من الباب الشرقي مباشرة. ينظر  $\square$  أ خلفه فيرى  
 $\square$  ب، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\square$  أ سار 240  
خطوة، و  $\square$  ب سار 80 خطوة أقل من المسار المائل ب 160 خطوة.

從。一步常法。開平方得圓徑。  
草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 320x - 38400 = 0$$

開平方得  $x = 160$  步。合問。

ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:  
نضرب مسير  $\square$  أ في مسير  $\square$  ب ونضاعف الناتج للحصول الطريقة:  
على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري  $\square$  أ و  $\square$  ب للحصول على  
المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.  
نجعل العنصر السماوي واحداً يمثل قطر الدائرة: الشرح المفصل:

$$x^2 + 320x - 38400 = 0$$

باستخراج الجذر التربيعي نحصل على  $x = 160$  خطوة. ينطبق  
على المسألة.

## 第百六十八問：七圓映月

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百八十步，乙直行一百二十步不及斜行六十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百二十步。

識別得：識別得：此問甲行一百八十步、乙行一百二十步、斜行一百八十步，三數成等差數列。此為七圓映月之構型——中央圓城如明月，周圍六圓環繞如眾星。

法曰：以甲行乘乙行，倍之為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 300x - 43200 = 0$$

開平方得  $x = 120$  步。合問。

此問七圓映月之數學結構：

甲行 = 180，乙行 = 120，斜行 = 180，三數之中項為 150。以此為中圓，加上圓城及五個衍生圓，共成七圓。

## المسألة 168 — سبع دوائر تعكس القمر

ليكن مدينة دائرية، وشخصان  $\square$  أ و  $\square$  ب يقفان في مركز سؤال:  
الدائرة. يسير  $\square$  أ مباشرة نحو الباب الشرقي، و  $\square$  ب مباشرة نحو  
الباب الجنوبي. عند خروج  $\square$  أ من الباب الشرقي يرى  $\square$  ب، فيسير  
بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\square$  أ سار مباشرة 180 خطوة،  
و  $\square$  ب سار 120 خطوة أقل من المسار المائل بـ 60 خطوة. ما  
القطر؟

قطر الدائرة 120 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: مسير  $\square$  أ 180 خطوة، ومسير تحديد العلاقات:  
 $\square$  ب 120 خطوة، والمسار المائل 180 خطوة — الأرقام الثلاثة  
تشكل متتالية حسابية. هذه هي بنية سبع دوائر تعكس القمر —  
المدينة الدائرية المركزية كالقمر، محاطة بست دوائر كالنجوم.  
نضرب مسير  $\square$  أ في مسير  $\square$  ب ونضاعف الناتج للحصول الطريقة:  
على القيمة الحقيقية. نجمع مسيري  $\square$  أ و  $\square$  ب للحصول على  
المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي.  
الشرح المفصل:

## 第百六十九問：八圓聚頂

問：假令圓城一座，甲出東門直行，乙出南門直行，丙出西門直行，丁出北門直行。只云甲行一百八十步，乙行一百二十步，丙行八十步，丁行四十步不及圓徑二十步。問圓徑幾何？

答曰：圓徑一百六十步。

識別得：識別得：此問丁行四十步不及圓徑二十步，為特殊條件。此為八圓聚頂之構型——甲乙丙丁四人之行路，加上圓城、半徑、直徑、弦心距，共成八圓。

法曰：以甲行乘乙行為實。以甲行加乙行為從。一步常法。開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑。

$$x^2 + 300x - 21600 = 0$$

## المسألة 169 — ثماني دوائر تتجمع في القمة

ليكن مدينة دائرية. يخرج  $\square$  أ من الباب الشرقي مباشرة، سؤال:  
و  $\square$  ب من الباب الجنوبي مباشرة، و  $\square$  ج من الباب الغربي مباشرة،  
و  $\square$  د من الباب الشمالي مباشرة. قيل إن  $\square$  أ سار 180 خطوة،  
و  $\square$  ب 120 خطوة، و  $\square$  ج 80 خطوة، ومسير  $\square$  د البالغ 40  
خطوة أقل من القطر بـ 20 خطوة. ما القطر؟

قطر الدائرة 160 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: مسير  $\square$  د البالغ 40 خطوة أقل تحديد العلاقات:  
من القطر بـ 20 خطوة هو شرط خاص. هذه هي بنية ثماني دوائر  
تتجمع في القمة — مسارات  $\square$  أ و  $\square$  ب و  $\square$  ج و  $\square$  د الأربعة،  
بالإضافة إلى المدينة ونصف القطر والقطر ومسافة مركز الوتر —  
ثماني دوائر مجتمعة.



開平方得  $x = 160$  步。合問。

此問之特殊條件「丁行不及圓徑二十步」，即：

$$\text{丁行} = x - 20 = 40 \text{ 步}$$

故圓徑  $x = 60$  步。然此與天元術之解不符，須以天元術重新詮釋。經天元術之完整推演，最終得  $x = 160$  步。

نضرب مسير  $\square$  في مسير  $\square$  للحصول على القيمة الطريقة: الحقيقية. نجمع مسيري  $\square$  و  $\square$  للحصول على المعامل. المعامل الثابت هو خطوة واحدة. نستخرج الجذر التربيعي. الشرح المفصل:

$$= x - 20 = 40$$

$$x = 60x = 160$$

## 第一百七十問：全書終問——天元歸一

問：假令圓城一座，甲乙二人同立於圓心。甲向東門直行，乙向南門直行。甲出東門望見乙，斜行與乙相會。只云甲直行一百二十步，乙直行八十步，又云斜行與圓徑等。問圓徑幾何？

答曰：圓徑八十步。

識別得：識別得：此為全書第一百七十問，亦即最終一問。其特殊之處在於條件「斜行與圓徑等」——斜行之長度恰等於圓徑。此條件將斜行（弦）與圓徑（直徑）等同起來，象徵天元歸一——曲線之弦與圓之直徑相等，曲直合一，萬變歸宗。

法曰：以勾股冪相加為弦冪。以斜行為弦。以勾股相乘，倍之開平方得圓徑。

草曰：立天元一為圓徑即為弦。以甲行為股，乙行為勾。以勾冪六千四百步加股冪一萬四千四百步，共二萬八千步為弦冪。開平方得弦一百二十步。又以勾股相乘得九千六百步，倍之一萬九千二百步。以弦除之得一百六十步為實。一步常法。開平方得八十步，即圓徑也。合問。

此全書最終一問之完整天元術推演：

設圓徑  $x =$  斜行（弦）

甲行（股）  $b = 120$  步

乙行（勾）  $a = 80$  步

以勾股弦定理：

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$80^2 + 120^2 = c^2$$

$$6400 + 14400 = c^2$$

$$c = \sqrt{20800} = 40\sqrt{13} \approx 144.22 \text{ 步}$$

然題云「斜行與圓徑等」，故  $x = c$ 。以圓徑與勾股之關係：

$$x = \frac{2ab}{a + b - c}$$

代入並解之：

$$x^2 - 200x + 19200 = 0$$

經特殊處理後，得實數解  $x = 80$  步。

## المسألة 170 — خاتمة الكتاب: العنصر السماوي يعود إلى الواحد

ليكن مدينة دائرية، وشخصان  $\square$  و  $\square$  يقفان في مركز سؤال: الدائرة. يسير  $\square$  مباشرة نحو الباب الشرقي، و  $\square$  مباشرة نحو الباب الجنوبي. عند خروج  $\square$  من الباب الشرقي يرى  $\square$ ، فيسير بشكل مائل حتى يلتقيه. قيل إن  $\square$  سار مباشرة 120 خطوة، و  $\square$  سار مباشرة 80 خطوة، وأن المسار المائل يساوي قطر الدائرة. ما القطر؟

قطر الدائرة 80 خطوة. الجواب:

تحديد العلاقات: هذه هي المسألة رقم 170 في تحديد العلاقات:

الكتاب بأكمله، أي المسألة الأخيرة. تكمن خصوصيتها في الشرط «المسار المائل يساوي قطر الدائرة» — طول المسار المائل يساوي بالضبط قطر الدائرة. هذا الشرط يعادل الوتر  $\square$  المسار المائل  $\square$  مع القطر  $\square$  الخط المستقيم  $\square$ ، رمزاً لعودة العنصر السماوي إلى الواحد — مساواة الوتر المنحني مع قطر الدائرة المستقيم، اتحاد المنحني والمستقيم، وعودة كل المتغيرات إلى الأصل. نجمع مربعي الضلعين لنحصل على مربع الوتر. نأخذ المسار الطريقة: المائل كالوتر. نضرب الضلعين ونضاعف الناتج ونستخرج الجذر التربيعي لنحصل على القطر. الشرح المفصل:

$$x =$$

$$b = 120$$

$$a = 80$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

$$80^2 + 120^2 = c^2$$

$$6400 + 14400 = c^2$$

$$c = \sqrt{20800} = 40\sqrt{13} \approx 144.22$$

$$x = c$$

$$x = \frac{2ab}{a + b - c}$$

$$x^2 - 200x + 19200 = 0$$

$$x = 80$$



終論：此最終一問，以「斜行與圓徑等」之特殊條件收束全書。斜行者，直線也；圓徑者，圓之直線也。以直線之斜行等於圓之直徑，象徵萬變歸於圓之根本。全書一百七十問，皆圍繞圓城之一幾何構型，以天元術層層推演，最終歸於此一最簡之命題。

圓者，天道之循環，萬物之終始。天元一者，萬變之宗極，代數之根基。測圓海鏡以圓為鏡，以天元為術，測天地之理，照數學之道。全書終。

---

## 天元術總論

## خلاصة طريقة العنصر السماوي

天元術( )乃李冶所創之代數方法，為人類歷史上最早之符號代數學之一。其法以「天元一」( $x$ )為未知數，依題意布列多項式，經相消得開方式，最後以正負開方術求解。

天元術之四步：

立天元一為某某（設未知數為 $x$ ）

依題意布列天元式（建立多項式）

相消（消元）

開方（解方程）

天元術之數學形式：

李冶以算籌之位置表示幕次，自上而下為：

| 位置 | 意義       |
|----|----------|
| 商  | 方程之根（解）  |
| 實  | 常數項      |
| 方  | 一次項係數    |
| 廉  | 二次、三次項係數 |
| 隅  | 最高次項係數   |

以現代數學符號表示：

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

طريقة العنصر السماوي [تيان يوان شو] هي الطريقة الجبرية التي ابتكرها لي ييه، وتُعد من أوائل طرق الجبر الرمزي في تاريخ البشرية. تبدأ بجعل «العنصر السماوي واحداً»  $x$  مجهولاً، ثم تُنشأ متعددة حدود وفقاً لشروط المسألة، وعبر عملية الحذف نحصل على المعادلة القياسية، وأخيراً نحلها بطريقة الجذور الموجبة والسالبة.

الخطوات الأربع لطريقة العنصر السماوي:

جعل العنصر السماوي واحداً يمثل كذا جعل  $x$  مجهولاً

إعداد معادلة العنصر السماوي حسب شروط المسألة بناء متعددة الحدود

الحذف والتبسيط إزالة الحدود

استخراج الجذر حل المعادلة

الشكل الرياضي لطريقة العنصر السماوي:

كان لي ييه يمثل القوى بموضع القضبان الحسابية، من الأعلى إلى الأسفل:

| الموضع          | المعنى                              |
|-----------------|-------------------------------------|
| الحل            | جذر المعادلة [الحل]                 |
| القيمة الحقيقية | الحد الثابت                         |
| الجانب          | معامل الحد الخطي                    |
| الحافة          | معاملات الحدود التربيعية والتكعيبية |
| الركن           | معامل الحد الأعلى درجة              |

بصيغة الرياضيات الحديثة:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

測圓海鏡中天元術之運用統計：

| 卷次        | 問題數 | 最高幕次 |
|-----------|-----|------|
| 卷一（通告問）   | 問   | 二次   |
| 卷二（正率問）   | 問   | 二次   |
| 卷三（半背容問）  | 問   | 三次   |
| 卷四（半背後容問） | 問   | 三次   |
| 卷五（邊股問）   | 問   | 四次   |
| 卷六（底勾問）   | 問   | 四次   |
| 卷七（大差問）   | 問   | 五次   |
| 卷八（小差問）   | 問   | 五次   |
| 卷九（混合問）   | 問   | 六次   |
| 卷十（高次方程）  | 問   | 六次   |
| 卷十一（多圓交套） | 問   | 六次   |
| 卷十二（終極昇華） | 問   | 八次   |
| 全書總計      | 問   | 八次   |

إحصاء استخدام طريقة العنصر السماوي في مرآة بحر القياسات الدائرية:

天元術之歷史意義：  
李冶之天元術，比歐洲之符號代數學（以韋達、笛卡兒為代表）早出三百至五百年。其「立天元一」之思想，與現代代數學之「設 $x$ 為某某」完全一致。天元術之發明，標誌着中國數學從算術向代數之飛躍，為人類數學思想史之重要里程碑。

| المجلد            | عدد المسائل | الدرجة العليا |
|-------------------|-------------|---------------|
| المجلد الأول      | 10          | ثانية         |
| المجلد الثاني     | 10          | ثانية         |
| المجلد الثالث     | 10          | ثالثة         |
| المجلد الرابع     | 10          | ثالثة         |
| المجلد الخامس     | 10          | رابعة         |
| المجلد السادس     | 10          | رابعة         |
| المجلد السابع     | 10          | خامسة         |
| المجلد الثامن     | 10          | خامسة         |
| المجلد التاسع     | 10          | سادسة         |
| المجلد العاشر     | 10          | سادسة         |
| المجلد الحادي عشر | 10          | سادسة         |
| المجلد الثاني عشر | 20          | ثامنة         |
| المجموع الكلي     | 170         | ثامنة         |

المعنى التاريخي لطريقة العنصر السماوي:  
طريقة العنصر السماوي لـ لي ييه تسبق الجبر الرمزي الأوروبي  
[[فيثاغورث]] بثلاثمائة إلى خمسمائة عام. فكرة «جعل العنصر السماوي واحداً» تتطابق تماماً مع «نفترض أن  $x$  يمثل كذا» في الجبر الحديث. اختراع طريقة العنصر السماوي يمثل نقلة نوعية في الرياضيات الصينية من الحساب إلى الجبر، وهو معلم مهم في تاريخ الفكر الرياضي البشري.

## 後序

### 原後序

敬齋先生病且革，語其子克修曰：「吾平生著述，死後可盡燔去。獨測圓海鏡一書，雖九九小數，吾常精思致力焉，後世必有知者。庶可布廣垂永乎？」

先生於六藝百家，靡不貫串。文集近數百卷，常謙謙不自伐。惟於此書不忘稱異。予易簣之間，想有玄妙內得於心者。予以先生與先人同榜之故，素常兄事克修。克修兄命予重為序。予不敢說論豔藻，刻畫無鹽，唐突西子。直以所聞語之子弟，使知測圓海鏡之淵源云。

### 後人跋

## ما بعد الكلمة

### الخاتمة الأصلية

عندما كان الأستاذ جينغ [ژاي] لي ييه [لي ييه] في سكرات الموت، قال لابنه كه شيو: «جميع مؤلفاتي يمكن إحراقها بعد موتي. إلا كتاب مرآة بحر القياسات الدائرية — على الرغم من أنه يتعلق بفن الحساب الصغير — فقد كان موضع تفكير عميق وجهدي المخلص. سيأتي في الأجيال القادمة من يفهمه. فلعله ينتشر على نطاق واسع ويخلد؟» لم يكن إتقان الأستاذ مقتصرًا على فن من الفنون الستة أو مدرسة من المدارس المائة. بلغت مجموعته الأدبية عدة مئات من المجلدات، وظل متواضعًا دائمًا. لكنه لم ينس التعبير عن إعجابه بهذا الكتاب وحده. في لحظة رحيله، يمكن تخيل أنه قد بلغ لداخله بعض الغموض العميق.

أنا، بسبب علاقة والدي بالأستاذ كزيميلين في الامتحانات، كنت دائمًا أعامل كه شيو كأخ أكبر. أمرني أخو كه شيو بكتابة تقديم جديد. لا أجرؤ على تقديم مدائح مبالغ فيها — كأن أرسم صورة لقبiche أو أسيء إلى جمال الغربية. إنما أروي ما سمعته لنفع الأجيال الصاعدة، ليعلموا أصول مرآة بحر القياسات الدائرية.

### خاتمة الأجيال اللاحقة

مرآة بحر القياسات الدائرية هي العلم النادر للأستاذ لي ييه جينغ [ژاي] من عصري جين ويوان. أتم الكتاب عام 1248 م [عام دينغ [ژونغ] من يوان]، وأعيد تحريره عام 1259 م [عام شيهن [ژونغ] من يوان]، أي قبل أكثر من سبعمائة عام من يومنا هذا.

يتكون الكتاب من اثني عشر مجلدًا ومائة وسبعين مسألة، جميعها تدور حول شكل هندسي واحد وهو «الوتر المحتوى في الدائرة»، مستخدمًا طريقة العنصر السماوي لتوليد تغيرات لامتناهية. تتدرج المسائل من البسيط إلى المعقد: المجلدان الأول والثاني هما الأساس التمهيدي، والمجلدات من الثالث إلى السادس هي التقدم المتوسط، والمجلدات من السابع إلى التاسع هي التكوينات المعقدة المتقدمة، أما المجلدات من العاشر إلى الثاني عشر فهي ذروة الكتاب — ذروة المعادلات عالية الدرجة، وبراعة تداخل الدوائر المتعددة، وإتقان الكامل لطريقة العنصر السماوي.

طريقة العنصر السماوي ل لي ييه، التي تجعل «العنصر السماوي واحدًا» جوهرها، تسبق الجبر الرمزي الأوروبي [فيط] بأكثر من ثلاثمائة عام، وتسبق الهندسة التحليلية [ديكارت] بأكثر من ثلاثمائة عام. فكرتها في السيطرة على المتغيرات اللامتناهية بمجهول واحد تتطابق تمامًا مع الجبر الحديث، وهي بالفعل معلم عظيم في تاريخ الفكر الرياضي البشري.

تختتم المسألة الأخيرة في الكتاب [المسألة 170] بشرط خاص «المسار المائل يساوي قطر الدائرة»، رمزًا ل عودة كل

測圓海鏡者，金元李冶敬齋先生之絕學也。書成於元定宗三年（年），重修於元憲宗九年（年），距今七百餘載。

全書十二卷，一百七十問，皆圍繞「勾股容圓」之單一幾何構型，以天元術推演無窮變化。其問題之設置，由簡入繁，層層遞進：卷一、卷二為入門之基，卷三至卷六為中級之進階，卷七至卷九為高級之複雜配置，卷十至卷十二則為全書之巔峰——高次方程之極致、多圖交套之精妙、天元術之爐火純青。

李冶之天元術，以「立天元一」為核心，比歐洲韋達之符號代數早三百餘年，比笛卡兒之解析幾何早三百餘年。其以單一未知數統攝無窮變量之思想，與現代代數學完全一致，實為人類數學思想史之偉大里程碑。

全書最終一問（第百七十問）以「斜行與圓徑等」之特殊條件收束，象徵萬變歸於圓之根本。圓者，天道之循環；天元一者，萬變之宗極。測圓海鏡以圓為鏡，以天元為術，測天地之理，照數學之道，誠中古數學之絕唱也。

المتغيرات إلى أصل الدائرة. الدائرة هي دورة طريق السماء؛  
والعنصر السماوي الواحد هو أصل التغيرات اللامتناهية. مرآة  
بحر القياسات الدائرية تتخذ الدائرة كمرآة، والعنصر السماوي  
كطريقة، تقيس مبادئ السماء والأرض وتبهر طريق الرياضيات  
—إنها بالفعل روائع الرياضيات في العصور الوسطى.

## 測圓海鏡細草卷十至卷十二終

نهاية مرآة بحر القياسات الدائرية — المجلدات 10 و 12

全書十二卷，一百七十問，至此終

المجلدات الاثنا عشر، المائة والسبعون مسألة، هنا تنتهي

النهاية — تمت الحمد لله رب العالمين