Pierre Deligne

Œuvres

Édition française

Une édition Codex alignée sur les sources

Note éditoriale

Ce volume est conçu pour une lecture mathématique continue. Chaque œuvre est présentée comme un texte français autonome, en conservant aussi fidèlement que possible les notations, la structure numérotée, les diagrammes et la bibliographie de la source.

Les éditions française et anglaise forment deux livres indépendants, sans mise en page bilingue entrelacée. Les textes sont établis par transcription et traduction alignées sur des témoins imprimés identifiés. Les identités des sources, l'historique des corrections et les preuves d'archive accompagnent la notice publique au lieu d'interrompre les articles eux-mêmes.

Note de couverture. Inclus dans l'ordre numérique: D001–D012; D014–D016; D018; D021; D022; D025–D030; D034–D036; D038–D040; D043. Lacunes: D013; D017; D019–D020; D023–D024; D031–D033; D037; D041–D042. Une œuvre complète ultérieure reste admissible malgré une lacune antérieure.

Sommaire

1 D001 — Congruences sur le nombre de sous-groupes d'ordre p^k dans un groupe fini . . . 3
2 D002 — Cohomologie à support propre et construction du foncteur f! . . . 7
3 D003 — Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales 19
4 D004 — Variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini . . . 35
5 D005 — The irreducibility of the space of curves of given genus . . . 40
6 D006 — Formes modulaires et représentations ℓ-adiques . . . 67
7 D007 — Travaux de Griffiths . . . 86
8 D008 — Travaux de Shimura . . . 99
9 D009 — Théorie de Hodge I . . . 117
10 D010 — Théorie de Hodge II . . . 122
11 D011 — Une congruence entre coefficients multinomiaux . . . 164
12 D012 — La conjecture de Weil pour les surfaces K3 . . . 167
13 D014 — Les immeubles des groupes de tresses généralisés . . . 188
14 D015 — Variétés unirationnelles non rationnelles . . . 211
15 D016 - Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L . . . 224
16 D018 - Les schémas de modules de courbes elliptiques . . . 281
17 D021 - Formes modulaires de poids 1 . . . 436
18 D022 - Poids dans la cohomologie des variétés algébriques . . . 460
19 D025 - Le support du caractère d'une représentation supercuspidale . . . 467
20 D026 - Les constantes locales de l'équation fonctionnelle de la fonction L d'Artin d'une représentation orthogonale . . . 470
21 D027 - Représentations des groupes réductifs sur les corps finis . . . 488
22 D028 - Les difféomorphismes du cercle . . . 547
23 D029 - Extensions centrales non résiduellement finies de groupes arithmétiques 570
24 D030 - Valeurs de fonctions L et périodes d'intégrales . . . 576
25 D034 - Cycles de Hodge absolus et périodes des intégrales des variétés abéliennes 612
26 D035 - Sommes de Gauss cubiques et revêtements de SL(2), d'après S. J. Patterson 623
27 D036 - Groupe fondamental du complément d'une courbe plane à points doubles ordinaires . . . 657
28 D038 - Cristaux ordinaires et coordonnées canoniques . . . 667
29 D039 - Relèvement des surfaces K3 en caractéristique nulle . . . 725
30 D040 - Dualité pour les représentations d'un groupe réductif sur un corps fini . . . 747
31 D043 - Algèbres à division et paradoxe de Hausdorff-Banach-Tarski . . . 755

CONGRUENCES SUR LE NOMBRE DE SOUS-GROUPES D'ORDRE p^k DANS UN GROUPE FINI

par P. Deligne

La méthode utilisée par Serre [1] p. 147 pour démontrer le théorème de Sylow fournit des résultats plus généraux qu'on se propose d'expliciter.

On utilise les notations suivantes : p désigne un nombre premier ; pour tout entier n, $v(n)$ est l'exposant de la plus grande puissance de p qui divise n ; enfin, G est un groupe fini d'ordre g.

Pour être complet, rappelons le lemme suivant (Lazard [2] p. 71).

Lemme 1 :

a) Si $n = \sum c_i p^i$ *avec* $0 \leq c_i < p$ *(développement de base* p*),*

$$v(n!) = \frac{1}{p-1}(n - \sum c_i)$$

b)

$$v\binom{r}{s} \geq v(r) - v(s)$$

Prouvons a) : on a [1]

$$v(p^k!) = \sum_{r=1}^{k} \left\lfloor \frac{p^k}{p^r} \right\rfloor = \sum_{r=1}^{k} p^{k-r} = \sum_{i=0}^{k-1} p^i = \frac{p^k - 1}{p-1},$$

ce qui vérifie l'énoncé ; il est clair que si $0 \leq c < p$, $v((cp^k)!) = cv(p^k!)$ et que si $m < p^{v(n)}$, $v((n+m)!) = v(n!) + v(m!)$. Ces propriétés d'additivité sont les mêmes que celles du second membre, d'où la formule.

b) s'en déduit aisément en revenant aux définitions et en tenant compte de l'algorithme de calcul des chiffres c_i d'une somme à l'aide de ceux de ses termes. Il y a égalité si r est une puissance de p.

Proposition 1 : $\binom{p^k n}{p^k m} = \binom{n}{m} \bmod p^{v(n)+2}$ *si* $p \neq 2$ *ou si* n *est impair. La congruence est toujours vraie modulo* $p^{v(n)+1}$.

1. La somme intermédiaire imprimée dans la source est négative. Nous la remplaçons par le calcul exact de Legendre (défaut de source R1).

Démonstration : Soient X et Y deux indéterminées ; $(X+Y)^{p^k} = X^{p^k} + Y^{p^k} + pQ$ où Q est un polynôme de degré inférieur à p^k en chaque variable. La formule du binôme montre alors que

$$(X+Y)^{p^k n} = (X^{p^k} + Y^{p^k})^n + np(X^{p^k} + Y^{p^k})^{n-1}Q \tag{1}$$

modulo la plus grande puissance de p qui divise tous les $p^i\binom{n}{i}$ $(i \geq 2)$. Ceux-ci sont de valuation au moins $i + v(n) - v(i) \geq v(n) + 2$ si $p \neq 2$; si $p = 2$, on a toujours $i > v(i)$ (Cantor), d'où l'exposant $v(n) + 1$.

$\binom{p^k n}{p^k m}$ est le coefficient de $X^{p^k m} Y^{p^k(n-m)}$ [2] ; le second terme du second membre de (1) ne contient aucun terme de ce type (aucun exposant n'y est divisible par p^k), et le coefficient de ce monôme dans le second membre de (1) est donc $\binom{n}{m}$. L'assertion en résulte si $p \neq 2$. Si $p = 2$, ce qui précède prouve déjà la congruence modulo $2^{v(n)+1}$; de plus, $Q = X^{2^{k-1}} Y^{2^{k-1}} \bmod. 2$; $Q^2 = X^{2^k} Y^{2^k} \bmod 4$, et le terme suivant dans le développement du binôme donne

$$\binom{2^k n}{2^k m} = \binom{n}{m} + 2n(n-1)\binom{n-2}{m-1} \bmod 2^{v(n)+2},$$

d'où l'assertion lorsque n est impair.

Théorème :

Soient S un sous-groupe de p-Sylow de G, $s = v(g)$ et d_k le nombre de sous-groupes de G d'ordre p^{s-k} pour $0 \leq k \leq s$. Alors

(i) $d_k = 1 \bmod p$

(ii) si S est cyclique ou abélien de type $(p, \ldots, p)$, d_k est congru mod p^{k+1} au nombre de sous-groupes de S d'indice p^k

(iii) si S n'est pas cyclique,

$$d_1 = 1 + p \bmod p^2.$$

Faisons agir le groupe G par translations à gauche sur l'ensemble de ses parties à p^k éléments. Si une de ces parties soit P de G a un stabilisateur H, elle est réunion de classes à droites de H et H est donc un groupe d'ordre p^l avec $l \leq k$; $l = k$ si et seulement si P est translaté (à droite ou à gauche, c'est la même chose) d'un sous-groupe d'ordre p^k. Le nombre d'éléments dans l'orbite de P est divisible par p^{s-l}. $\binom{g}{p^k}$ est donc congru mod

2. La source imprime ici $X^{p^k m} Y^{p^k n}$, monôme de degré $p^k(m+n) > p^k n$ lorsque $m > 0$. Nous rétablissons $Y^{p^k(n-m)}$ (défaut de source R2).

p^{s-k+1} au nombre de parties de G translatées d'un sous-groupe d'ordre p^k, et on sait (prop. 1) qu'il est aussi congru à gp^{-k}. Il y a $d_{s-k} \cdot g \cdot p^{-k}$ telles parties, et $gp^{-k} = d_{s-k} gp^{-k} \bmod p^{s-k+1}$ d'où la première assertion.

Plaçons-nous dans le cas (ii), avec S abélien de type $(p \dots p)$. Le nombre G_{ij} de sous-groupes d'ordre p^i d'un sous-groupe d'ordre p^j est le nombre d'éléments d'une grassmannienne. Pour $i > j$, $G_{ij} = 0$; pour $i \leq j$,

$$G_{ij} = \frac{(p^j - 1) \dots (p^j - p^{i-1})}{(p^i - 1) \dots (p^i - p^{i-1})} = \widetilde{G}_i \widetilde{G}_{j-i} \widetilde{G}_j^{-1},$$

où l'on pose

$$\widetilde{G}_i = [(1 - p^i) \dots (1 - p)]^{-1} \text{ si } i \geq 0, \quad \widetilde{G}_i = 0 \text{ si } i < 0.$$

Ici $\widetilde{G}_i = (-1)^i G_i$, la source posant $G_i = [(p^i - 1) \dots (p - 1)]^{-1}$. Cette normalisation ne change pas G_{ij}. [3]

On sait que p^i divise le nombre u_i de parties de G à p^s éléments dont le stabilisateur est d'ordre p^{s-i}. Posons $g = p^s h$; si on compte de deux façons différentes le nombre des couples formés d'un sous-groupe d'ordre p^{s-i} et d'une partie à p^s éléments qu'il laisse fixe, on trouve, pour $0 \leq i, j \leq s$,

$$\begin{cases} d_i \dbinom{p^i h}{p^i} = \sum_j G_{s-i,s-j} u_j & (2) \\ p^i \mid u_i & (3) \\ d_s = 1 & (4) \end{cases}$$

Travaillons maintenant dans le localisé de $\mathbf{Z}$ en p (ou dans $\mathbf{Z}_p$). Soit e_i le quotient par $\binom{p^s h}{p^s} \widetilde{G}_i$ du premier membre de (2). En vertu de la proposition 1 et du fait que $\widetilde{G}_i$ est premier avec p pour $i \geq 0$, on voit qu'il existe des nombres v_i $(0 \leq i \leq s)$ tels que

$$\begin{cases} d_i = \widetilde{G}_i e_i \bmod p^{i+1} & (5) \\ e_i = \sum_j \widetilde{G}_{i-j} v_j & (2') \\ p^i \mid v_i & (3') \\ e_s = \widetilde{G}_s^{-1} & (4') \end{cases}$$

Des identités analogues sont vérifiées dans le groupe S ; pour montrer qu'elles déterminent $d_i \bmod p^{i+1}$, il suffit de vérifier que les identités (pour $0 \leq i, j \leq s$)

3. La source affirme ensuite $G_k^{-1} = G_{k+1}^{-1} \bmod p^{k+1}$, ce qui est faux avec sa définition. La normalisation affichée donne $\widetilde{G}_{k+1}^{-1} = \widetilde{G}_k^{-1}(1 - p^{k+1})$ et répare exactement l'argument (défaut de source A1).

$$\begin{cases} e_i = \sum_j \widetilde{G}_{i-j} v_j & (2'') \\ p^i \mid v_i & (3'') \\ e_s = 0 & (4'') \end{cases}$$

impliquent que $p^{i+1} \mid e_i$.

De $(2'')$ on tire

$$e_i - e_{i+1} = \sum_j (\widetilde{G}_{i-j} - \widetilde{G}_{i+1-j}) v_j.$$

Comme $\widetilde{G}_k^{-1} = \widetilde{G}_{k+1}^{-1} \bmod p^{k+1}$, on a aussi

$$p^{i+1-j} \mid \widetilde{G}_{i-j} - \widetilde{G}_{i+1-j} \quad \text{et} \quad p^{i+1} \mid e_i - e_{i+1}.$$

On conclut par $(4'')$.

La même technique, en plus simple, s'applique si S est cyclique.

Passons au cas (iii). Les sous-groupes d'indice p de S sont tous distingués. Leur intersection S' est le sous-groupe de Frattini de S. Pour tout sous-groupe T de S, si $TS' = S$, alors $T = S$. En particulier, si S n'est pas cyclique, S/S' ne l'est pas non plus et les sous-groupes d'indice p de S s'identifient aux hyperplans d'un $\mathbf{Z}/p$-vectoriel de dimension > 1 ; leur nombre est congru à $1 + p \bmod p^2$.

Des équations précédentes subsiste le système suivant. [4]

$$\begin{cases} d_0 h = u_0 \\ d_1 \binom{ph}{p} = (1+p)u_0 + u_1 \pmod{p^2} \\ \binom{p^s h}{p^s} = u_0 + u_1 \pmod{p^2} \end{cases}$$

Or (prop. 1), $\binom{p^s h}{p^s} = \binom{ph}{p} = h \bmod p^2$, donc

$$d_1 h = (1+p) d_0 h + (h - d_0 h) \bmod p^2 \text{ et}$$
$$d_1 = 1 + p d_0 \bmod p^2,$$

d'où l'assertion puisque $d_0 = 1 \bmod p$.

Bibliographie

[1] Serre, J.P., *Corps locaux. Act. sc. et ind.*. Hermann, 1962.

[2] Lazard,M., Groupes analytiques p-adiques. *Publ. Math. I. H. E. S.*, n° 26, 1965.

4. Dans la troisième ligne la source imprime p comme argument inférieur ; la ligne suivante emploie elle-même p^s. Nous rétablissons p^s (défaut de source R3). L'indice suivant le dernier u est endommagé dans le scan ; les identités de comptage imposent le membre $u_0 + u_1$.

Appendix to Residues and Duality (Lect. Notes in Math. 20
(Springer-Verlag 1966) pp. 404–421

APPENDIX : COHOMOLOGIE À SUPPORT PROPRE ET CONSTRUCTION DU FONCTEUR $f^!$.

par P. DELIGNE[1]

Verdier a montré que dans le cas topologique, le formalisme de la dualité de Poincaré se ramenait à des problèmes locaux en haut (voir [1]). Pour transposer sa construction au cadre schématique, il faut disposer d'une théorie de la cohomologie "à support propre" pour les faisceaux cohérents.

Sauf mention explicite du contraire, tous les pré-schémas considérés sont noethériens et les préfaisceaux quasi-cohérents.

N° 1. Le sorite des pro-objets.

Proposition 1. *Soit C une U-catégorie*[2] *où existent les limites inductives finies. Soit h un foncteur $C^\circ \to$ (ens). Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) h est limite inductive, selon un petit[3] *ensemble ordonné filtrant, de foncteurs représentables.*

(ii) h est limite inductive, selon une petite catégorie filtrante, de foncteurs représentables.

(iii) h transforme $\varprojlim$ finies en $\varinjlim$ finies, et il existe un petit ensemble d'objets tel que tout élément d'un $h(X)$ se factorise par l'un d'eux.

Les implications (i) ⇒ (ii) ⇒ (iii) sont triviales et (iii) ⇒ (ii) standard (h est limite des h_F selon la catégorie des (F, α) pour $\alpha \in h(F)$ et F dans la sous-catégorie de C stable par $\varinjlim$ finie engendrée par le petit ensemble donné). Reste à prouver que (ii) ⇒ (i). Si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{M}$ sont deux catégories filtrantes, un foncteur $F : \mathcal{L} \to \mathcal{M}$ est dit cofinal si $\varinjlim_{\mathcal{L}} h_{F(L)}$ est le foncteur final. Pour tout $G : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$, on a alors $\varinjlim_{\mathcal{M}} G = \varinjlim_{\mathcal{L}} GF$. Il s'agit de prouver :

Lemme 1. *Pour toute petite catégorie filtrante $\mathcal{L}$, il existe un foncteur cofinal d'un petit ensemble ordonné filtrant dans $\mathcal{L}$.*

---

1. Ceci est une version complétée d'une lettre de P. Deligne à R. Hartshorne (lettre du 3 Mars 1966). Les notes de bas de page ont été ajoutées par le copiste.
2. U désigne un univers fixé dans toute la suite.
3. "petit" = "$\in U$".

La première projection : $\mathcal{L} \times \mathbb{N} \to \mathcal{L}$, est un foncteur cofinal ($\mathbb{N}$ muni de l'ordre naturel) ; ceci permet de se ramener à supposer que Ob$\mathcal{L}$, préordonné par $\mathrm{Hom}(X, Y) \neq \varnothing$, n'a pas de plus grand élément. On ordonne par inclusion l'ensemble E des sous-catégories finies de $\mathcal{L}$ ayant un seul objet final (fini signifie d'ensemble de flèches fini). On définit un foncteur de E dans $\mathcal{L}$ en associant à chacune de ces catégories son objet final. Sous les hypothèses faites, E est filtrant et ce foncteur cofinal.

Les foncteurs vérifiant les conditions équivalentes de la proposition 1 sont les Ind-objets de C. Ils forment une sous-catégorie pleine $\mathrm{Ind}\, C$ de $\underline{\mathrm{Hom}}(C^\circ, (\mathrm{Ens}))$, stable par limite inductive. $C \mapsto \mathrm{Ind}\, C$ est un foncteur $(\mathrm{cat}) \to (\mathrm{cat})$. Si les limites inductives filtrantes existent dans C, pour tout $h \in \mathrm{Ind}\, C$, le foncteur $X \mapsto \mathrm{Hom}(h, h_X)$ est coreprésentable, d'où un foncteur, noté $\varinjlim$, de $\mathrm{Ind}\, C$ dans C. En particulier, on a toujours un foncteur $\mathrm{Ind}\, \mathrm{Ind}\, C \to \mathrm{Ind}\, C$, et tout foncteur $C \to \mathrm{Ind}\, D$ se prolonge en un foncteur $\mathrm{Ind}\, C \to \mathrm{Ind}\, D$. Dans $\mathrm{Ind}\, C$, les limites inductives filtrantes sont exactes, et seront notées "$\varinjlim$" ; en particulier, identifiant C à une sous-catégorie pleine de $\mathrm{Ind}\, C$, si $(X_i)_{i \in I}$ est un système inductif filtrant dans C,

$$\varinjlim_{i \in I} X_i = \varinjlim_{i \in I} \text{“} \varinjlim \text{”} X_i.$$

Pour qu'un foncteur sur $\mathrm{Ind}\, C$ soit représentable, il faut et suffit qu'il transforme $\varprojlim$ finies en $\varinjlim$ finies, $\varinjlim$ filtrantes en $\varinjlim$ filtrantes et que sa restriction à C satisfasse à la condition de petitesse de la prop. 1 (iii) (en effet, la proposition 1 montre alors que sa restriction à C est un Ind-objet, auquel il est partout égal vu la condition sur les limites).

Ce qui précède, sauf la prop. 1 (iii) et l'assertion précédente reste vrai en utilisant partout des limites de suites (ou dénombrables, c'est la même chose).

On définit par dualité la catégorie $\mathrm{pro}\, C$ des pro-objets. C'est la sous-catégorie pleine de

$$\underline{\mathrm{Hom}}(C, (\mathrm{Ens}))^\circ.$$

Proposition 2. *Soit X un préschéma quasi-compact quasi-séparé (non nécessairement noethérien). La catégorie des faisceaux quasi-cohérents sur X est équivalente à la catégorie des Ind-objets de la catégorie des faisceaux quasi-cohérents de présentation finie sur X.*

La flèche est "$\varinjlim$" $\mathcal{F}_i \mapsto \varinjlim \mathcal{F}_i$. Si $\mathcal{F}$ est de p.f. (présentation finie), pour tout système inductif filtrant $(\mathcal{G}_i)_{i \in I}$,

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, \varinjlim \mathcal{G}_i) = \varinjlim \mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{G}_i)$$

(par un recollement fini qui commute à $\varinjlim$, on se ramène au cas affine). Le foncteur précédent est donc pleinement fidèle. Son image est stable

par limites inductives filtrantes et sommes finies. Il suffit de prouver que pour tout $x \in X$, tout $\mathcal{F}$ sur X, et tout $s \in \mathcal{F}_x$, il existe $\mathcal{G}$ de p.f. et une flèche de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$ dans l'image de laquelle se trouve s :

$\mathcal{F}$ sera limite d'images de faisceaux de p.f. et chacune d'elles quotient d'un faisceau de p.f. par une limite de sous-faisceaux de type fini.

Soit sur un voisinage quasi-compact U de x une flèche $f : \mathcal{C} \to \mathcal{F}$, $\mathcal{C}$ de p.f., s dans l'image. Il suffit de prolonger $\mathcal{C}$ et f à X entier, et, procédant pas à pas, il suffit de savoir prolonger à $U \cup V$ si V est affine, ce qui revient à effectuer un prolongement de $U \cap V$ à V :

Lemme 2. *Soit $\mathcal{C}$ un faisceau de p.f. sur un ouvert quasi-compact U d'un schéma affine X, $\mathcal{F}$ un faisceau sur X et f une flèche de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{F}|U$. Il est possible de prolonger $\mathcal{C}$ et f en $\overline{\mathcal{C}}$ et $\overline{f}$, définis sur X ($\overline{\mathcal{C}}$ étant de p.f.).*

Soit ι l'inclusion de U dans X et $\mathcal{C}_1$ le produit fibré de $\iota_*\mathcal{C}$ et $\mathcal{F}$ sur $\iota_*\iota^*\mathcal{F}$. $\mathcal{C}_1$ prolonge $\mathcal{C}$ et s'envoie dans $\mathcal{F}$. Si on représente $\mathcal{C}_1$ comme limite de ses sous-faisceaux de type fini, comme U est quasi-compact et $\mathcal{C}$ de p.f., l'un d'eux prolonge déjà $\mathcal{C}$. Si on représente ce dernier comme quotient de $\mathcal{O}^n$ par une limite de sous-faisceaux de type fini de $\mathcal{O}^n$, on voit de même qu'on peut remplacer $\mathcal{C}_1$ par un faisceau de p.f.

Corollaire 1. *Pour qu'un foncteur contravariant additif $F : (q\ coh) \to Ab$ soit représentable, il faut et suffit qu'il soit exact à gauche et transforme $\varinjlim$ filtrante en $\varinjlim$ filtrante.*

Corollaire 2. *Tout faisceau de p.f. défini sur un ouvert quasi-compact U de X se prolonge en un faisceau de p.f. sur X.*

Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne. On aura à travailler de façon essentielle dans pro $D^b\mathcal{A}$, sous-catégorie pleine de pro $D(\mathcal{A})$ formée des "$\varprojlim$" K_i où la cohomologie de K_i est uniformément bornée avec i. $\mathbb{H}^p$ se prolonge en un foncteur pro $D(\mathcal{A}) \to$ pro $\mathcal{A}$.

Proposition 3. *Les foncteurs $\mathbb{H}^p$ forment un système conservatif*[4] *de foncteurs sur pro $D^b\mathcal{A}$.*

Soit $f : K \to L$ une flèche de pro $D^b\mathcal{A}$ telle que les $\mathbb{H}^p(K) \to \mathbb{H}^p(L)$ soient des isomorphismes (dans pro $\mathcal{A}$). Il s'agit de vérifier que pour tout M dans $D^b(\mathcal{A})$,

$$\mathrm{Hom}(K, M) \longleftarrow \mathrm{Hom}(L, M)$$

4. i.e. si u est une flèche telle que les $\mathbb{H}^p(u)$ soient inversibles, u est inversible.

est un isomorphisme. Posons $K = \text{“}\varprojlim\text{”}K_\alpha$. On dispose d'une suite spectrale convergente

$$\mathrm{Ext}^p(\mathbb{H}^q K_\alpha, M) \Longrightarrow \mathrm{Ext}^{p+q}(K_\alpha, M)$$

d'où, par passage à la limite,

$$\varinjlim \mathrm{Ext}^p(\mathbb{H}^q K_\alpha, M) \Longrightarrow \varinjlim \mathrm{Ext}^{p+q}(K_\alpha, M),$$

encore convergente car q est uniformément borné. Utilisant que tout foncteur (ici Ext) passe aux pro-objets et le foncteur $\varinjlim : \mathrm{Ind\ Ab} \to \mathrm{Ab}$, on peut réécrire :

$$\varinjlim \mathrm{Ext}^p(\mathbb{H}^q K, M) \Longrightarrow \varinjlim \mathrm{Ext}^{p+q}(K, M) = \mathrm{Hom}(K[-p-q], M)$$

Cette suite spectrale reste d'ailleurs vraie pour $M \in D(\mathcal{A})$. La proposition résulte aussitôt de l'existence de ces suites.

n° 2. Lemmes fondamentaux.

Rappelons que les préschémas considérés sont noethériens.

Proposition 4 (Théorème de dualité pour une immersion ouverte)**.** *Soient U un ouvert de X, j la flèche d'inclusion, $\mathcal{J}$ un idéal définissant le fermé complémentaire, $\mathcal{F}$ un faisceau cohérent sur U et $\mathcal{G}$ quasi-cohérent sur X. Soit $\overline{\mathcal{F}}$ un prolongement cohérent de $\mathcal{F}$. On a*

$$\mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, j^*\mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_X(\text{“}\varprojlim\text{”}\mathcal{J}^n\overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) \tag{5}$$

La flèche $\varinjlim \mathrm{Hom}_X(\mathcal{J}^n\overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) \to \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est injective : si l'image par f de $\mathcal{J}^n\overline{\mathcal{F}}$ dans $\mathcal{G}$ a son support dans le complémentaire de U, elle est annulée par une puissance de $\mathcal{J}$, soit $\mathcal{J}^k$, et l'image de $\mathcal{J}^{n+k}\overline{\mathcal{F}}$ est nulle.

Supposons maintenant X affine et soit $f \in \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, \mathcal{G})$. Pour k assez grand, toute section s de $\mathcal{J}^k\overline{\mathcal{F}}$ sur X a une image (sur U) qui se prolonge en une section de $\mathcal{G}$ sur X. Remplaçant $\overline{\mathcal{F}}$ par $\mathcal{J}^k\overline{\mathcal{F}}$, on peut supposer disposer d'un diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & \mathcal{O}^n & \longrightarrow & \overline{\mathcal{F}} & \longrightarrow & 0 \\ & & \vdots & & \| & & \vdots & & \\ 0 & \longrightarrow & R_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}^n & \longrightarrow & \mathcal{G} & & \end{array}$$

où les flèches pointillées sont définies sur U.

5. Cette formule est évidemment bien connue, cf. p. ex. la thèse de P. GABRIEL.

Pour ℓ assez grand, en vertu de Krull et du fait que $R/R \cap R_1$ est concentré hors de U, on a $R \cap \mathcal{J}^\ell \cdot \mathcal{O}^n \subset R_1$, ce qui permet de prolonger f en $\overline{f} : \mathcal{J}^\ell \overline{\mathcal{F}} \to \mathcal{G}$.

Dans le cas général U_i un recouvrement affine fini de X et U_{ijk} des recouvrements affins finis des $U_{ij} = U_i \cap U_j$. Les $\varinjlim$ commutent aux produits finis, d'où :

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, j^*\mathcal{G}) & \longrightarrow & \prod_i \mathrm{Hom}_{U_i \cap U}(\mathcal{F}, j^*\mathcal{G}) & \rightrightarrows & \prod_{ijk} \mathrm{Hom}_{U_{ijk} \cap U}(\mathcal{F}, j^*\mathcal{G}) \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
0 & \longrightarrow & \varinjlim \mathrm{Hom}_X(\mathcal{J}^n\overline{\mathcal{F}}, j^*\mathcal{G}) & \longrightarrow & \prod_i \varinjlim \mathrm{Hom}_{U_i}(\mathcal{J}^n\overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) & \rightrightarrows & \prod_{ijk} \varinjlim \mathrm{Hom}_{U_{ijk}}(\mathcal{J}^n\overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G})
\end{array}$$

ce qui achève la démonstration.

La proposition 4 donne une formule explicite pour le foncteur

$$(\text{coh sur } U) \longrightarrow \text{pro}\,(\text{coh sur } X)$$

"adjoint" à gauche à j^*. On notera ce foncteur $j_!$ ("prolongement par zéro") [6] ; il résulte de Krull qu'il est exact ; cela résulte aussi de ce que, X étant noethérien, un injectif de la catégorie des faisceaux quasi-cohérents sur X, restreint à U, reste injectif quasi-cohérent sur U.

Proposition 5 (Indépendance de la compactification)**.**

$$\begin{array}{ccc}
U & \hookrightarrow & X \\
\| & & \downarrow f \\
U & \hookrightarrow & Y
\end{array}$$

Soit $f : X \to Y$ un morphisme propre, induisant un isomorphisme entre l'ouvert U de Y et $f^{-1}(U)$. Soit $\mathcal{J}$ un faisceau d'idéaux définissant $Y \setminus U$, et soit $\mathcal{I} = f^*\mathcal{J}$. Si $\mathcal{F}$ est cohérent sur X, on a

(i) si $k > 0$, le système projectif $\mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$ est essentiellement nul (i.e. définit le pro-objet nul)

(ii) si $k = 0$, pour n assez grand, $f_*\mathcal{I}^{n+1}\mathcal{F} = \mathcal{J} \cdot f_*\mathcal{I}^n\mathcal{F}$

On a

$$\bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} \text{ est un } \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{J}^n\text{-module de type fini (EGA III)}$$

donc pour n assez grand, $\mathcal{J} \otimes \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} \to \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+1} \mathcal{F}$ est surjectif ; (ii) en résulte. Si $k > 0$, $\mathbb{R}^k f_*$ est nul sur U ; il existe N tel que $\mathcal{J}^N \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$

6. Cette terminologie et notation conflictent évidemment avec ceux généralement admis (livre de Godement, SGA 1962 ...). Le lecteur préférera peut-être lire $\mathfrak{I}_!$ au lieu de $j_!$.

soit nul (quel que soit n). Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{J}^p \otimes \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+p} \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \quad (\text{si } n \geq n_0) \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathcal{J}^p \cdot \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & & \end{array}$$

prouve que pour N assez grand et $k > 0$,

$$\mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+N} \mathcal{F} \to \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} \text{ est nul, soit (i).}$$

N° 3. Définition de $\mathbb{R}f_!$.

Un morphisme f (resp. un couple de morphismes composables, resp. un triple ...) sera dit compactifiable si on peut respectivement trouver des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & \overline{X} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow & \\ S & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} X & \hookrightarrow & \overline{X} & \hookrightarrow & \overline{\overline{X}} \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & & \swarrow & \\ Y & \hookrightarrow & \overline{Y} & & \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \swarrow & & \\ S & & & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccccccc} X & \hookrightarrow & \overline{X} & \hookrightarrow & \overline{\overline{X}} & \hookrightarrow & \overline{\overline{\overline{X}}} \\ {\scriptstyle h}\downarrow & \swarrow & & \swarrow & & \swarrow & \\ Y & \hookrightarrow & \overline{Y} & \hookrightarrow & \overline{\overline{Y}} & & \\ {\scriptstyle g}\downarrow & \swarrow & & \swarrow & & & \\ Z & \hookrightarrow & \overline{Z} & & & & \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow & & & & & \\ S & & & & & & \end{array}$$

où les flèches horizontales sont des immersions ouvertes et les flèches obliques sont propres. Tout morphisme compactifiable est séparé de type fini, et Nagata affirme dans [2] que sa démonstration prouve la réciproque pour les schémas noethériens intègres, mais les hypothèses qu'il fait sur la base ne sont pas claires. [7]

On se propose, pour tout f compactifiable, de définir

$$\mathbb{R}f_! : \text{pro}\, D^b_{\text{coh}}(X) \longrightarrow \text{pro}\, D^b_{\text{coh}}(S).$$

Rappelons que la catégorie $D^b_{\text{coh}}(S)$, catégorie dérivée bornée de la catégorie des faisceaux cohérents sur S, est sous-catégorie pleine de la catégorie dérivée de celle de tous les faisceaux (non nécessairement quasi-cohérents) sur S, l'image essentielle étant formée des complexes à cohomologie cohérente et bornée.

Si f est propre, on dispose de $\mathbb{R}f_* : D^b_{\text{coh}}(X) \to D^b_{\text{coh}}(S)$ de dimension finie, qui induit $\mathbb{R}f_! : \text{pro}\, D^b_{\text{coh}}(X) \to \text{pro}\, D^b_{\text{coh}}(S)$. Si f est une immersion ouverte, $f_! : (\text{coh sur } X) \to \text{pro}\,(\text{coh sur } S)$ induit $D^b(\text{coh sur } X) \to D^b\,\text{pro}\,(\text{coh sur } S)$ qui s'envoie dans $\text{pro}\, D^b_{\text{coh}}(S)$, et

7. Mumford aurait vérifié via la démonstration de Nagata que tout morphisme séparé de type fini des schémas noethériens est compactifiable.

cette flèche se prolonge en $\mathbb{R}f_! : \text{pro}\, D^b_{\text{coh}}(X) \to \text{pro}\, D^b_{\text{coh}}(S)$. Si on prolonge le complexe cohérent K sur X en $\overline{K}$ sur S, son image est "$\varprojlim$" $\mathcal{J}^n\overline{K}$, où $\mathcal{J}$ définit $S \setminus X$.

Pour un composé $f = gh$ (g propre, h immersion ouverte), on prend $\mathbb{R}f_! = \mathbb{R}g_!\,\mathbb{R}h_!$. Il faut vérifier :

Indépendance de la compactification.
Considérons un diagramme commutatif



où j' et j'' sont des immersions ouvertes, $\bar{f}$ et g des applications propres. $j'X = g^{-1}j''X \cap j'X$. Il faut prouver que $\mathbb{R}\bar{f}_*\,\mathbb{R}j''_! = \mathbb{R}(\bar{f}g)_*\,\mathbb{R}j'_!$, soit encore, puisque $\mathbb{R}(\bar{f}g)_* = \mathbb{R}\bar{f}_*\,\mathbb{R}g_*$, que $\mathbb{R}j''_! = \mathbb{R}g_*\,\mathbb{R}j'_!$. On se ramène à supposer X dense dans X', pour être dans les conditions de la proposition 5. Soit K un complexe cohérent borné sur X, prolongé en $\overline{K}$ sur X'. $g_*\overline{K}$ prolonge K sur X'' et on a une flèche

$$g_*\mathcal{J}'^n\overline{K} \to \mathbb{R}g_*\mathcal{J}'^n\overline{K} \tag{1}$$

où $\mathcal{J}'$ désigne un faisceau d'idéaux qui définit $X' \setminus X$. La prop. 5 (ii) montre que $j''_!K =$ "$\varprojlim$"$g_*\mathcal{J}'^n\overline{K}$. Par passage à la "limite", on trouve "$\varprojlim$" $\mathbb{R}^p g_*\mathcal{J}'^n\overline{K}^q \Longrightarrow$ "$\varprojlim$" $\mathbb{R}^{p+q}g_*\mathcal{J}'^n\overline{K}$, la proposition 5 (i) montre que cette suite spectrale dégénère, et il résulte de la prop. 3 que la flèche déduie de (1) par passage à la "limite" est un isomorphisme, d'où la formule voulue.

Il reste à vérifier

a) pour tout diagramme du type



on a une compatibilité

$$\begin{aligned}\mathbb{R}\bar{f}_*\,\mathbb{R}j'''_! &= \mathbb{R}\bar{f}_*\,\mathbb{R}g_*\,\mathbb{R}j''_!\\ &= \mathbb{R}\bar{f}_*\,\mathbb{R}g_*\,\mathbb{R}h_*\,\mathbb{R}j'_!\\ &= \mathbb{R}\bar{f}_*\,\mathbb{R}(gh)_*\,\mathbb{R}j'_!\\ &= \mathbb{R}f_*\,\mathbb{R}j'''_!.\end{aligned}$$

Comme deux compactifications peuvent toujours être coiffées par une troisième (par exemple $X' \times_S X''$), ceci suffit à prouver l'indépendance de l'arbitraire.

b) pour tout couple compactifiable, une identification

$$\mathbb{R}(fg)_! = \mathbb{R}f_!\,\mathbb{R}g_!$$

c) pour tout triple compactifiable, une compatibilité

$$\begin{array}{ccc}\mathbb{R}(fgh)_! & = & \mathbb{R}(fg)_!\,\mathbb{R}h_!\\ \| & & \|\\ \mathbb{R}f_!\,\mathbb{R}(gh)_! & = & \mathbb{R}f_!\,\mathbb{R}g_!\,\mathbb{R}h_!\end{array}$$

On aurait alors prouvé

Théorème 1. *Pour $f : X \to Y$ compactifiable, $K \in pro\, D^b_{coh}(X)$, $L \in pro\, D^b_{coh}(Y)$ posons $\mathrm{Hom}_f(K, L) = \mathrm{Hom}_Y(\mathbb{R}f_!K, L)$. Modulo des questions de compactifiabilité, on fait ainsi des catégories $pro\, D^b_{coh}(X)$ une catégorie cofibrée sur les préschémas noethériens (les flèches étant compactifiables ...)*

n° 4. Définition de $\mathbb{R}f^!$.

Il résulte d'un tapis général de Verdier [1] que le foncteur $\mathbb{R}f_* : D(X) \to D(S)$ a un adjoint à droite $D^+(S) \to D^+(X)$; il ne mérite un nom, soit $\mathbb{R}f^!$, que pour f propre, et sa définition ne se prête pas directement au calcul.

Il faut tout d'abord expliciter un procédé de calcul de $\mathbb{R}f_*$ au niveau des complexes, du type $\mathbb{R}f_*K = f_*C^*(K)$ où C^* est une résolution

acyclique finie dépendant de façon fonctorielle, exacte, et compatible avec les limites inductives filtrantes de l'objet auquel on l'applique. A ce moment, pour tout injectif I sur S, $\mathrm{Hom}(f_*C^p\mathcal{F}, I)$ est exact en quasi-cohérent sur X, et transforme $\varinjlim$ en $\varprojlim$, donc est représentable par $f_p^!I$, injectif quasi-cohérent. Les $f_p^!I$ forment un complexe, ce qui définit $\mathbb{R}f^! : D^+S \to D^+X$, adjoint à droite à $\mathbb{R}f_* : D(X) \to D(S)$.

Voici comment définir une telle résolution :

1) Si S est séparé : on prend un recouvrement fini de X par des ouverts affines sur S (par exemple affines) et $\mathbb{R}f_*K = f_*\check{C}(\mathcal{U}, K)$ (complexe de Čech alterné)

2) Sinon : les résolutions flasques canoniques ont ici deux défauts :

a) $f_*C^*\mathcal{F}$ n'est plus quasi-cohérent ; cela ne porte pas à conséquence tant que, comme ici, les injectifs quasi-cohérents sont injectifs en tant que faisceaux.

b) C^* ne commute pas aux limites inductives filtrantes. Il est facile de corriger ce défaut : on représente quasi-cohérent comme $\mathcal{F} = \varinjlim \mathcal{F}_i$ ($\mathcal{F}_i$ de présentation finie) et on pose $C'^*\mathcal{F} = \varinjlim C^*\mathcal{F}_i$. Cela ne dépend pas de l'arbitraire.

Pour une immersion ouverte, on prendra $\mathbb{R}f^!K = f^*K$.

Pour un morphisme composé $f = gh$ (g propre, h immersion ouverte), on prendra $\mathbb{R}f^! = \mathbb{R}g^!\,\mathbb{R}h^!$. Mettant bout à bout la proposition 4 et ce qui précède, on trouve

Théorème 2 (Dualité)**.** *Soit $f : X \to S$ compactifiable, $f = gh$. Les foncteurs $\mathbb{R}f_! : pro\, D^b_{coh}(X) \to pro\, D^b_{coh}(S)$ et $\mathbb{R}f^! : D^+(S) \to D^+(X)$ sont "adjoints" l'un de l'autre.*

Il faudrait vérifier l'indépendance de la compactification et un sorite de compatibilités et d'identifications analogue au cas de $\mathbb{R}f_!$. Des cas particuliers du formulaire résultent de la formule d'adjonction (unicité d'un vrai adjoint ...).

On pourra dans le cas général s'appuyer sur la proposition suivante :

Proposition 6. *Soit $f : X \to S$ compactifiable et $L \in D^+_{qc}(S)$. La fibre en $x \in X$ de $\mathcal{H}^p\mathbb{R}f^!L$ est donnée par*

$$(\mathcal{H}^p\mathbb{R}f^!L)_x = \varinjlim_{x\in U} \mathrm{Hom}^p_S(\mathbb{R}f_!(U, \mathcal{O}_U), L)$$

On peut supposer X propre et L donné comme complexe de faisceaux injectifs quasi-cohérents. Soient U un ouvert affine de X et $\mathcal{J}$ un idéal

qui définit $X \setminus U$.

$$\begin{aligned}(\mathcal{H}^p \mathbb{R}f^! L)(U) &= \mathbb{H}^p(\mathbb{R}f^! L(U)) = \mathbb{H}^p \operatorname{Hom}_U(\mathcal{O}, \mathbb{R}f^! L) \\ &= \mathbb{H}^p \varinjlim \operatorname{Hom}_X(\mathcal{J}^n, \mathbb{R}f^! L) = \varinjlim \operatorname{Hom}_S^p(\mathbb{R}f_* \mathcal{J}^n, L) \\ &= \operatorname{Hom}_S^p(\mathbb{R}f_!(U, \mathcal{O}_U), L) \quad - \text{ La proposition en résulte.}\end{aligned}$$

On supposera admis pour $\mathbb{R}f^!$ un formalisme de variance analogue à celui du théorème 1 pour $\mathbb{R}f_!$.

Si on veut rendre plus explicite la définition de $\mathbb{R}f^!$ dans le cas propre, on peut remarquer que si $\mathcal{F}$ quasi-cohérent représente un foncteur F, pour tout ouvert U et $\mathcal{J}$ définissant $X \setminus U$, on a $\mathcal{F}(U) = \varinjlim \operatorname{Hom}(\mathcal{J}^n, \mathcal{F}) = \varinjlim F(\mathcal{J}^n)$.

n° 5. Calcul de $\mathbb{R}f^!$.

Pour un morphisme fini, $\mathbb{R}f^!$ est ce qu'on veut ; pour le voir, il suffit de prendre pour foncteur résolvant, dans le calcul de $\mathbb{R}f_*$, l'identité. Pour l'espace projectif, l'unicité d'un adjoint ne laisse pas le choix (on utilise le fait qu'on a la formule d'adjonction pour $\mathbb{R}f_! = \mathbb{R}f_* : D(X) \to D(S)$), on reviendra sur la flèche. Pour une immersion ouverte, $\mathbb{R}f^! = \mathbb{R}f^*$.

Pour tout ouvert quasi-projectif U de X au-dessus de S, on peut donc calculer la restriction à U de $\mathbb{R}f^!$. En particulier, si on peut vérifier localement que $\mathbb{R}^q f^! K = 0$ pour $q \neq p$, on connaît $\mathbb{R}f^! K$, puisqu'un objet de la catégorie dérivée n'ayant qu'un faisceau de cohomologie non nul est déterminé par ce faisceau. Rappelons un cas important où cette condition est vérifiée, avec $K = \mathcal{O}$.

Proposition 7. *Soit $f : X \to Y$, compactifiable. Supposons que localement (sur X et Y) on puisse trouver un diagramme*



où g et h sont localement intersection complète de dimension relative d' et d'', et soit $d = d' - d''$.

Alors $\mathbb{R}f^! \mathcal{O}$ est réduit à un seul faisceau de cohomologie, situé en degré $-d$, qui est inversible.

En effet, $\mathbb{R}g^! \mathcal{O} = \mathbb{R}f^! \mathbb{R}h^! \mathcal{O}$, on sait que $\mathbb{R}g^! \mathcal{O}$ et $\mathbb{R}h^! \mathcal{O}$ sont du type indiqué, situés en degré $-d'$ et $-d''$, par des calculs locaux dans l'espace projectif ; tout étant local, on peut supposer $\mathbb{R}^{-d''} h^! \mathcal{O}$ isomorphe à $\mathcal{O}$, et l'assertion en résulte.

Pour passer de là à des complexes plus généraux, il faudrait au préalable démontrer des formules du type

$$\mathbb{R}f^!(K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L) = \mathbb{R}f^!(K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L.$$

Seule la définition de la flèche pose un problème, l'isomorphie étant un problème local. Il faut bien sûr des restrictions de degré. Je n'ai rien vérifié en détail de ce qui suit.

1ère méthode pour définir la flèche.

Supposons K et L dans $D^b_{\mathrm{coh}}(S)$ (et pas seulement quasi-cohérents), et en outre que

a) $\mathbb{R}f^!K$ est à degré borné (il est automatiquement cohérent, c'est un problème local)

b) $K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L$ est à degré borné

c) $\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L$ est à degré borné.

Pour définir $\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L \to \mathbb{R}f^!(K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L)$, il suffit par dualité de définir $\mathbb{R}f_!(\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L) \to K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L$, et par Kunneth $\mathbb{R}f_!(\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L) = \mathbb{R}f_!\,\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L$; la flèche cherchée est induite par la flèche d'adjonction $\mathbb{R}f_!\,\mathbb{R}f^!K \to K$.

2ème méthode.

On suppose f compactifiable, plat et localement d'intersection complète relative. On a alors $\mathbb{R}f^!\mathcal{O} = \omega[d]$, ω étant inversible. Désignons par $\mathbb{R}f_!$ un procédé de calcul de $\mathbb{R}f_!$ au niveau des complexes (c-à-d un tel procédé pour un compactifié $\bar{f} : \bar{X} \to S$, de f), qu'on suppose du type décrit au n° 4, et tel que $C^p\mathcal{F}$ soit nul pour $p > d$ (ce qui peut s'obtenir par tronquage). On a alors une flèche

$$\mathbb{R}^d\bar{f}_*\mathcal{F}[-d] \to \mathbb{R}\bar{f}_*\mathcal{F} \quad \text{pour tout } \mathcal{F} \text{ sur } \bar{X}$$

(le dernier faisceau de cohomologie s'envoie dans son complexe). On en tire, pour tout complexe I sur S, des morphismes de complexes

$$\mathrm{Hom}_S(\mathbb{R}\bar{f}_*\mathcal{F}, I) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(\mathbb{R}^d\bar{f}_*\mathcal{F}[-d], I).$$

Soit I un injectif. $\mathbb{R}^d\bar{f}_*\mathcal{F}[-d]$ est exact à droite en $\mathcal{F}$, le foncteur en $\mathcal{F}$ à droite de la flèche est donc représentable : on définit I_1 par

$$\mathrm{Hom}_S(\mathbb{R}^d\bar{f}_*\mathcal{F}, I) = \mathrm{Hom}_{\bar{X}}(\mathcal{F}, I_1),$$
$$\mathbb{R}f_1^!I = I_1[d].$$

Ce qui précède définit

$$\mathbb{R}f^!I \to \mathbb{R}f_1^!I$$

et pour un complexe d'injectifs, $\mathbb{R}f_1^!$ se définit terme à terme.

Il reste à évaluer $\mathbb{R}f_1^! I$ sur des ouverts affines, soit U, de X ; c'est donné par $\varinjlim \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^d f_! \mathcal{J}^n, I)$. Ce problème étant local en haut, il est facile de montrer par des méthodes projectives que le dual de "$\varinjlim$" $\mathbb{R}^d f_! \mathcal{J}^n = \mathbb{R}^d f_!(U, \mathcal{O})$, un ind-objet, est $f_*(U, \omega)$, représenté comme limite de ses sous-modules de sections ayant un pôle d'ordre ou plus n hors de U $(n \to \infty)$.

Ceci donne $\mathbb{R}f_1^! I = \omega \otimes f^* I[d]$, et la formule générale $\mathbb{R}f^! K = f^* K \otimes \omega[d]$.

BIBLIOGRAPHIE

[1] J.L. VERDIER, Séminaire Bourbaki, Novembre 65, exposé 300.

[2] M. NAGATA, Imbedding of an abstract variety in a complete variety. Journal of Math. of Kyoto University, vol. 2 n°1 1962.

THÉORÈME DE LEFSCHETZ ET CRITÈRES DE DÉGÉNÉRESCENCE DE SUITES SPECTRALES

par P. DELIGNE[1]

1. Théorèmes généraux

Soient $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne et $D^b(\mathcal{A})$ la sous-catégorie pleine de sa catégorie dérivée formée des complexes bornés. On rappelle que si T est un foncteur cohomologique (voir [8] ou [9], p. 10) de $D^b(\mathcal{A})$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{B}$, Verdier [8] a défini une suite spectrale, fonctorielle en $X \in D^b(\mathcal{A})$:

$$E_2^{pq} = T(H^q(X)[p]) \Longrightarrow T(X[p+q]). \tag{1.1}$$

Proposition (1.2). Soit $X \in D^b(\mathcal{A})$; les conditions suivantes sont équivalentes:

(i) quel que soit T comme plus haut, la suite spectrale (1.1) dégénère;

(ii) l'objet X est isomorphe, dans $D^b(\mathcal{A})$, à $\sum_i H^i(X)[-i]$.

(i) ⇒ (ii). Désignons par T_i le foncteur cohomologique en K défini par

$$T_i(K) = \mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(H^i(X), K).$$

Pour chacun des T_i ($i \in \mathbb{Z}$), la suite spectrale (1.1) s'écrit

$$E_2^{pq} = \mathrm{Ext}^p(H^i(X), H^q(K)) \Longrightarrow \mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(H^i(X), K[p+q]), \tag{1.3}$$

et l'homomorphisme de $\mathrm{Hom}(H^i(X), K[i])$ dans

$$E_2^{0i} = \mathrm{Hom}(H^i(X), H^i(K))$$

qui s'en déduit n'est autre que celui provenant de la fonctorialité de H^0.

Si les suites spectrales (1.3) dégénèrent, les flèches

$$\mathrm{Hom}(H^i(X)[-i], K) \longrightarrow \mathrm{Hom}(H^i(X), H^i(K))$$

sont surjectives. Par hypothèse, tel est le cas si $K = X$, de sorte qu'il existe des morphismes a_i de $H^i(X)[-i]$ dans X, induisant l'identité sur le i-ième groupe de cohomologie. De plus, puisque $H^i(X) = 0$ sauf pour un nombre fini de valeurs de i, les a_i sont nuls sauf un nombre fini, ce qui permet de définir

$$a = \sum_i a_i : \sum_i H^i(X)[-i] \longrightarrow X.$$

Par construction, a induit l'identité sur la cohomologie, donc est un isomorphisme.

(ii) ⇒ (i). La suite spectrale (1.1) est un foncteur additif en X, et dégénère lorsque X n'a qu'un objet de cohomologie non nul, donc aussi si X est somme de complexes n'ayant qu'un objet de cohomologie non nul.

Remarque (1.4). Il résulte de la démonstration précédente qu'il suffit de vérifier la condition (i) pour les foncteurs cohomologiques du type $\mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(A, *)$ où $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$. Par dualité, il suffirait aussi de considérer les seuls foncteurs $\mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(*, A)$, la condition (ii) étant autoduale.

Théorème (1.5). Soient $X \in D^b(\mathcal{A})$, n un entier et u un endomorphisme de degré 2 de X,

$$u : X \longrightarrow X[2],$$

dont les itérés induisent des isomorphismes

$$u^i : H^{n-i}(X) \xrightarrow{\sim} H^{n+i}(X) \qquad (i \geq 0).$$

[1] Aspirant au F.N.R.S.

Sous ces conditions, X est isomorphe à $\sum_i H^i(X)[-i]$, dans la catégorie $D^b(\mathcal{A})$.

Vérifions la condition (i) de (1.2). Soit donc T un foncteur cohomologique de $D^b(\mathcal{A})$ dans $\mathcal{B}$, et posons $T^p(K) = T(K[p])$.

On appelle partie primitive de $H^{n-i}(X)$, et on désignera par ${}_0H^{n-i}(X)$, le noyau de l'homomorphisme

$$u^{i+1} : H^{n-i}(X) \longrightarrow H^{n+i+2}(X).$$

On vérifie que, pour $i \geq 0$, les applications

$$\begin{aligned} \bigoplus_{k\geq 0} u^k &: \bigoplus_{k\geq 0} {}_0H^{n-i-2k}(X) \xrightarrow{\sim} H^{n-i}(X), \\ \bigoplus_{k\geq 0} u^{k+i} &: \bigoplus_{k\geq 0} {}_0H^{n-i-2k}(X) \xrightarrow{\sim} H^{n+i}(X) \end{aligned} \tag{1.6}$$

sont des isomorphismes.

La suite spectrale (1.1) étant fonctorielle en X, et «compatible» aux translations sur les degrés, l'endomorphisme u de X définit un endomorphisme de degré 2 de la suite spectrale

$$u : E_r^{pq} \longrightarrow E_r^{p,q+2},$$

commutant aux différentielles d_r $(r \geq 2)$.

Lorsque $r = 2$, l'endomorphisme u de la suite spectrale

$$u : T^p(H^q(X)) \longrightarrow T^p(H^{q+2}(X))$$

se déduit du morphisme $u : H^q(X) \to H^{q+2}(X)$ par fonctorialité de T^p.

Soit $i \geq 0$. Désignons par ${}_0E_r^{p,n-i}$ le noyau de l'homomorphisme

$$u^{i+1} : E_r^{p,n-i} \longrightarrow E_r^{p,n+i+2}$$

(«partie primitive» de la suite spectrale). Pour $r = 2$, les décompositions (1.6) induisent par fonctorialité de chaque T^p des décompositions

$$\begin{aligned} \bigoplus_{k\geq 0} u^k &: \bigoplus_{k\geq 0} {}_0E_2^{p,n-i-2k} \xrightarrow{\sim} E_2^{p,n-i}, \\ \bigoplus_{k\geq 0} u^{k+i} &: \bigoplus_{k\geq 0} {}_0E_2^{p,n-i-2k} \xrightarrow{\sim} E_2^{p,n+i}. \end{aligned} \tag{1.7}$$

Prouvons par récurrence sur r que les différentielles d_r $(r \geq 2)$ sont nulles. L'hypothèse de récurrence implique que $E_2 = E_r$, de sorte que la décomposition (1.7) s'applique au terme E_r de la suite spectrale. Puisque u commute aux d_r, il suffira de prouver que d_r s'annule sur la partie primitive de E_r.

Le diagramme suivant est commutatif:

$$\begin{array}{ccc} {}_0E_r^{p,n-i} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r,n-i-r+1} \\ \downarrow{\scriptstyle u^{i+1}} & & \downarrow{\scriptstyle u^{i+1}} \\ E_r^{p,n+i+2} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r,n+i-r+3}. \end{array}$$

La flèche verticale gauche est nulle par définition de la primitivité. La flèche verticale droite est un monomorphisme, car la flèche

$$u^{i+r-1} : E_r^{p+r,n-(i+r-1)} \longrightarrow E_r^{p+r,n+(i+r-1)}$$

est un isomorphisme[2] et $r - 1 \geq 1$. Il en résulte que d_r est nul.

Remarque (1.8). On prendra garde qu'on ne peut pas en général choisir un isomorphisme entre X et $\sum_i H^i(X)[-i]$ qui transforme u en la somme des applications $H^i(u) : H^i(X) \to H^{i+2}(X)$. On obtient aisément un contre-exemple en prenant $H^i(X) = 0$ pour $i \neq n$.

On peut définir un isomorphisme «plus beau que les autres» entre X et $\sum_i H^i(X)[-i]$, mais on n'aura pas à s'en servir ici.

[2]L'imprimé porte $E_r^{p,n+(i+r-1)}$ au but; l'indice $p + r$, requis par le bidegré de d_r, est rétabli ici.

Remarque (1.9). Soient $X \in D^b(\mathcal{A})$, n et s des entiers et u un endomorphisme de degré s (resp. $2s$) de X. On suppose que $H^i(X) = 0$ lorsque i n'est pas de la forme ks $(0 \leq k \leq n)$ (resp. $0 \leq k \leq 2n$) et que u^{n-2i} (resp. u^i) induit un isomorphisme entre $H^{is}(X)$ et $H^{(n-i)s}(X)$ (resp. entre $H^{(n-i)s}(X)$ et $H^{(n+i)s}(X)$). Sous ces hypothèses, la démonstration de (1.5) montre encore que X est isomorphe à $\sum_i H^i(X)[-i]$.

Remarque (1.10). Soit $(X_i)_{i\in\mathbb{Z}}$ une famille d'objets de $D^b(\mathcal{A})$ et u une famille d'homomorphismes de degré 2: $u_i : X_i \to X_{i+1}[2]$. Si, quels que soient i et j, u_i induit un isomorphisme entre $H^{n-j}(X_i)$ et $H^{n+j}(X_{i+j})$, il est encore vrai que chaque X_i est isomorphe à la somme de ses objets de cohomologie; pour le voir, il suffit d'appliquer formellement les raisonnements qui précèdent à

$$u : \sum_i X_i \longrightarrow \sum_i X_i,$$

même si cette somme n'existe pas dans $D^b(\mathcal{A})$.

La même remarque s'applique à la variante (1.9).

Théorème (1.11). Soit $X \in D^b(\mathcal{A})$ et supposons que X admette des endomorphismes de degré 0, $\pi_i : X \to X$, tels que $H^j(\pi_i) = \delta_{ij}$. Alors X est isomorphe à $\sum_i H^i(X)[-i]$ dans la catégorie $D^b(\mathcal{A})$.

Appliquons encore le critère (1.2) (i). Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} E_r^{p,q} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r,q-r+1} \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_q} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_q} \\ E_r^{p,q} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r,q-r+1} \end{array}$$

est commutatif, la première colonne est l'identité, et la seconde zéro, de sorte que $d_r = 0$.

Corollaire (1.12). Soit $X \in D^b(\mathcal{A})$ la somme d'une famille finie d'objets $X_k \in D^b(\mathcal{A})$. Si on a

$$X \simeq \sum_i H^i(X)[-i],$$

alors, pour tout k, on a

$$X_k \simeq \sum_i H^i(X_k)[-i].$$

Soient j_k l'injection canonique de X_k dans X, pr_k la projection canonique de X sur X_k et π_i un endomorphisme de X tel que $H^j(\pi_i) = \delta_{ij}$. Pour chaque k, les $\mathrm{pr}_k\, \pi_i j_k$ vérifient l'hypothèse de (1.11).

Remarque (1.13). On vérifie que, pour que l'isomorphisme entre X et $\sum_i H^i(X)[-i]$ puisse être choisi tel que les π_i s'identifient aux pr_i, il faut et il suffit que les π_i soient des idempotents deux à deux orthogonaux. Il existe alors un seul isomorphisme ayant cette propriété et induisant l'identité sur la cohomologie.

2. Applications

Soit $f : X \to Y$ une application continue entre espaces topologiques, voire un morphisme de topos, A un faisceau d'anneaux sur X et $\mathcal{F}$ un faisceau de A-modules. Si $u \in H^2(X, A)$, u définit un endomorphisme de degré 2 dans $D^b(X)$, encore noté

$$u : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}[2].$$

Par fonctorialité, u définit un endomorphisme de degré 2:

$$Rf_*(u) : Rf_*\mathcal{F} \longrightarrow Rf_*\mathcal{F}[2].$$

On dira que $(X, f, u, \mathcal{F}, n)$ vérifie la condition de Lefschetz, ou que $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u, si, pour chaque $i \geq 0$, les flèches obtenues en itérant i fois la flèche $Rf_*(u)$,

$$Rf_*(u)^i : R^{n-i}f_*\mathcal{F} \longrightarrow R^{n+i}f_*\mathcal{F} \qquad (i \geq 0),$$

sont des isomorphismes. Le théorème (1.5) donne ici:

Proposition (2.1). Si $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u, alors, dans $D^b(Y)$, on a

$$Rf_*\mathcal{F} \simeq \sum_i R^i f_*\mathcal{F}[-i]$$

et en particulier la suite spectrale de Leray

$$H^p(Y, R^q f_*\mathcal{F}) \Longrightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

dégénère.

Si on y avait tenu, on aurait pu supposer que $\mathcal{F}$ soit un (A, f^*B)-bimodule, où B est un faisceau d'anneaux sur Y, et énoncer (2.1) dans $D^b(Y, B)$.

(2.2) Le cas des schémas, munis de la topologie étale, ne rentre pas dans le cadre (2.1). On supposera pour la suite que la théorie des $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux et $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux (non nécessairement constructibles) ait été faite, et que la catégorie dérivée de la catégorie de ces «faisceaux» soit raisonnable. En ce qui concerne les énoncés de dégénérescence de suites spectrales, le lecteur qui n'aurait pas confiance en le travail futur de Jouanolou pourra vérifier, en revenant à la démonstration de (1.5), qu'on peut s'en passer. Soit ℓ un nombre premier. On suppose pour toute la suite que ℓ est inversible sur tous les schémas considérés.

Rappelons que, sur tout schéma X, le $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau $\mathbb{Z}_\ell(1)$ est défini par la formule

$$\mathbb{Z}_\ell(1) = \varprojlim_n \mu_{\ell^n}.$$

Ce faisceau est un $\mathbb{Z}_\ell$-module inversible, ce qui permet de définir, pour tout $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau ou $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau $\mathcal{F}$, le «faisceau» $\mathcal{F}(i)$ par la formule

$$\mathcal{F}(i) = \mathcal{F} \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell(1)^{\otimes i} \qquad (i \in \mathbb{Z}).$$

On aura, pour tout morphisme $f : X \to Y$ de schémas et tout couple de $\mathbb{Z}_\ell$- ou $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sur X et Y respectivement:

$$Rf_*(\mathcal{F})(i) = Rf_*(\mathcal{F}(i)) \qquad \text{et} \qquad f^*(\mathcal{G}(i)) = f^*(\mathcal{G})(i). \tag{2.3}$$

Si $\mathcal{L}$ est un faisceau inversible sur X, sa première classe de Chern ℓ-adique se trouve dans $H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$.

Si $f : X \to Y$ est un morphisme de schémas, si $\mathcal{F}$ est un $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau, respectivement $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau, sur X et si $u \in H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$, respectivement $u \in H^2(X, \mathbb{Q}_\ell(1))$, on dira que $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u si, pour chaque $i \geq 0$, les flèches obtenues en itérant i fois la flèche $Rf_*(u)$,

$$Rf_*(u)^i : R^{n-i} f_*\mathcal{F} \longrightarrow R^{n+i} f_*\mathcal{F}(i) \qquad (i \geq 0),$$

sont des isomorphismes. En vertu de (2.3), cela implique que toutes les flèches

$$Rf_*(u)^i : R^{n-i} f_*\mathcal{F}(k) \longrightarrow R^{n+i} f_*\mathcal{F}(k+i)$$

sont des isomorphismes. Appliquant (1.10), on trouve:

Proposition (2.4). Avec les notations précédentes, si $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u, alors, dans $D^b(Y, \mathbb{Z}_\ell)$, respectivement $D^b(Y, \mathbb{Q}_\ell)$, on a

$$Rf_*\mathcal{F} \simeq \sum_i R^i f_*\mathcal{F}[-i] \tag{2.5}$$

et en particulier la suite spectrale de Leray

$$H^p(Y, R^q f_*\mathcal{F}) \Longrightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

dégénère.

Si g est un morphisme de schémas de Y dans S, (2.4) implique encore la dégénérescence de la suite spectrale de Leray

$$R^p g_* R^q f_*\mathcal{F} \Longrightarrow R^{p+q}(gf)_*\mathcal{F}.$$

(2.6.1) Reste à passer en revue quelques cas intéressants où la condition de Lefschetz est vérifiée; nous donnerons des détails justificatifs dans (2.7). Soient donnés $f : X \to Y$, u, $\mathcal{F}$ et n. Dans le cas topologique, on sait d'après Godement [2], II, (4.7.1), que si f est propre et Y localement paracompact, la formation des images directes supérieures commute au passage aux fibres, de sorte que la condition de Lefschetz se vérifie fibre par fibre. Dans le cadre des schémas, la même réduction s'applique, la référence à Godement étant remplacée par SGA 4, XII, (5.1). Dans le cadre des schémas encore, si f est propre et lisse et si $\mathcal{F}$ est constant tordu, c'est-à-dire lisse dans une terminologie nouvelle, les $R^i f_* \mathcal{F}$ sont encore constants tordus (cf. SGA 4, XVI, (2.2)); de sorte que, si Y est connexe, il suffit même de vérifier la condition de Lefschetz sur une fibre géométrique.

Dans tous les exemples donnés, f sera une application continue, respectivement un morphisme de schémas, propre et lisse de dimension relative topologique $2n$, respectivement algébrique n. Une application continue est dite lisse si, localement à la source, elle est isomorphe à la projection de $\mathrm{R}^n \times Y$ sur Y.

(2.6.2) Si f est un morphisme propre et lisse de variétés kählériennes, le faisceau constant $\mathbb{C}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à la 2-classe fondamentale de X.

(2.6.3) Si X est un schéma relatif complexe (voir [3]), projectif et lisse sur l'espace topologique localement paracompact Y, et muni d'un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$, le faisceau constant $\mathbb{C}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à la première classe de Chern de $\mathcal{O}(1)$.

(2.6.4) Supposons que f soit un morphisme de schémas projectif et lisse, avec Y connexe, et que soit donné un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$ sur X. Si l'on peut remonter en caractéristique 0 une fibre géométrique de f, et sa polarisation, alors le faisceau $\mathbb{Q}_\ell$-adique constant $\mathbb{Q}_\ell$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à la première classe de Chern ℓ-adique de $\mathcal{O}(1)$.

On sait qu'on peut relever en caractéristique 0, au sens précédent, dans les cas suivants:

- X est une variété de Severi–Brauer sur Y;
- X est une intersection complète non singulière d'hypersurfaces dans une variété de Severi–Brauer sur Y, pour la polarisation induite par la polarisation canonique de la variété de Severi–Brauer;
- X est un schéma abélien polarisé sur Y (Mumford, à paraître).

On conjecture que (2.6.4) reste vrai lorsqu'on ne sait pas se remonter en caractéristique 0, mais ce n'est prouvé que pour les surfaces.

(2.6.5) Si f est un morphisme projectif et lisse de dimension relative 2 et si X est muni d'un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$, alors le faisceau constant $\mathbb{Q}_\ell$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à la première classe de Chern de $\mathcal{O}(1)$.

(2.7) Dans les cas (2.6.2) et (2.6.3), la 2-classe de cohomologie donnée sur X induit sur les fibres de f la 2-classe définie par la structure kählérienne des fibres. Ainsi, pour prouver (2.6.2) et (2.6.3), il suffit, d'après (2.6.1), de prouver (2.6.2) dans le cas particulier où Y est réduit à un point. L'assertion résulte alors de la théorie de Hodge et de la décomposition de Hodge–Lepage (Weil [10], IV, n° 6, corollaire au théorème 5). La démonstration donnée dans loc. cit. s'applique encore si $\mathcal{F}$ est un faisceau localement constant de $\mathbb{C}$-vectoriels de dimension finie, muni d'une structure hermitienne définie positive localement constante.

D'après (2.6.1), pour vérifier (2.6.4), il suffit de traiter le cas où Y est le spectre d'un corps de caractéristique 0, et le principe de Lefschetz permet de supposer $Y = \mathrm{Spec}(\mathbb{C})$.

On sait alors (cf. SGA 4, XI, (4.4)) que, pour tout faisceau $\mathbb{Q}_\ell$-adique constant tordu $\mathcal{F}$ sur X, si $\mathcal{F}^{an}$ désigne le faisceau localement constant de $\mathbb{Q}_\ell$-vectoriels sur l'espace topologique X^{an} déduit de $\mathcal{F}$, alors les $\mathbb{Q}_\ell$-vectoriels de cohomologie, algébrique et transcendante, de $\mathcal{F}$ et $\mathcal{F}^{an}$, sont isomorphes:

$$H^i(X, \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^i(X^{an}, \mathcal{F}^{an}). \tag{2.7.2}$$

Choisissant un plongement de $\mathbb{Q}_\ell$ dans $\mathbb{C}$, on en déduit des isomorphismes

$$H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_{\mathbb{Q}_\ell} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H^i(X^{an}, \mathcal{F}^{an}) \otimes_{\mathbb{Q}_\ell} \mathbb{C}. \tag{2.7.3}$$

Sur $\mathbb{C}$, l'application exponentielle définit un isomorphisme dit canonique entre $\mathbb{Z}/\ell^n$ et μ_{ℓ^n}, donc entre $\mathbb{Z}_\ell$ et $\mathbb{Z}_\ell(1)$. L'image, par l'isomorphisme composé

$$H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1)) \longrightarrow H^2(X, \mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow H^2(X^{an}, \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Z}_\ell,$$

de la première classe de Chern ℓ-adique de $\mathcal{O}(1)$ coïncide avec la première classe de Chern transcendante de $\mathcal{O}(1)$. L'isomorphisme (2.7.3) ramène donc le cas auquel on s'était réduit de (2.6.4) à (2.6.3).

Pour la démonstration de (2.6.5), voir Kleiman [6], pp. 28 et suivantes. Le point essentiel est le théorème suivant (Weil [11], p. 127).

(2.8) Soient S une surface projective lisse sur un corps k et D une courbe lisse tracée sur S telle que $\mathcal{O}(D)$ soit ample. Alors l'application composée

$$\mathrm{Pic}^0(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}^0(D) = \mathrm{Alb}(D) \longrightarrow \mathrm{Alb}(S)$$

est une isogénie.[3]

Remarque (2.9). Le théorème de dégénérescence de suite spectrale (2.2) déduit de (2.6.4) a été conjecturé par Grothendieck, par des considérations de «poids», lorsque Y est projectif et lisse sur un corps algébriquement clos.

Remarque (2.10). Serre m'a fait remarquer que les théorèmes de dégénérescence de suites spectrales déduits de (2.6.2) et (2.6.3) peuvent aussi se démontrer par une extension facile de la méthode utilisée par Blanchard ([1], II, 1), tout au moins si l'on dispose de la dualité de Poincaré sur la base. Réciproquement, la méthode suivie ici permet de compléter les théorèmes II (1.1) et II (1.2) de loc. cit., la démonstration de l'implication (ii) $\Rightarrow$ (i) étant essentiellement celle de Blanchard, qui devait supposer les faisceaux images directes supérieures constants.

Théorème (2.11). Soient $f : X \to Y$ une application continue propre et lisse (2.6.1) d'espaces topologiques de dimension relative $2n$, avec Y localement paracompact, k un corps commutatif de caractéristique zéro et $u \in H^0(Y, R^2 f_* k)$. On suppose que:

a) le faisceau $R^1 f_* k$ est constant, c'est-à-dire simple;

b) les cup-produits itérés

$$u^i \wedge : R^{n-i} f_* k \longrightarrow R^{n+i} f_* k$$

sont des isomorphismes.

Alors les conditions suivantes sont équivalentes:

(i) la classe u est induite par un élément de $H^2(X, k)$;

(ii) la transgression

$$d_2 : H^0(Y, R^2 f_* k) \longrightarrow H^2(Y, f_* k)$$

est nulle sur u;

(iii) dans $\mathrm{D}^b(Y, k)$, on a

$$R f_* k \simeq \bigoplus_i R^i f_* k[-i].$$

L'assertion (i) $\Rightarrow$ (iii) est contenue dans (2.1). L'assertion (iii) implique la dégénérescence de toute la suite spectrale de Leray

$$H^p(Y, R^q f_* k) \Longrightarrow H^{p+q}(X, k), \tag{2.12}$$

et a fortiori (ii); il reste à prouver que (ii) $\Rightarrow$ (i).

Soit $x \in Y$ et $X_x = f^{-1}(x)$. La classe induite $u_x^n \in H^{2n}(X_x, k)$ ne s'annule sur aucune composante connexe de la variété X_x, qui est donc orientable.[4] Si l'on désigne par Tr_u l'application composée

$$H^{2n}(X_x, k) \xrightarrow{(u_x^n \wedge)^{-1}} H^0(X_x, k) = H_0(X_x, k) \xrightarrow{\mathrm{Tr}} k,$$

[3] L'imprimé porte ici $\mathrm{Pic}^0(X)$ et $\mathrm{Alb}(X)$, alors que la surface introduite dans l'énoncé est S; on rétablit S.

[4] Après avoir introduit x, l'imprimé passe à X_s et u_s^n; l'indice x est uniformisé ici.

la dualité de Poincaré implique que la forme bilinéaire

$$H^{n-i}(X_x,k)\times H^{n+i}(X_x,k)\longrightarrow k,\qquad (x,y)\longmapsto \mathrm{Tr}_u(xy)$$

est une dualité parfaite. Cette construction se globalise et fournit

$$\mathrm{Tr}_u : R^{2n}f_*k\longrightarrow k.$$

Prouvons tout d'abord que, dans (2.12), $d_2u\in H^2(Y,R^1f_*k)$ est nul. Si $x\in H^0(Y,R^1f_*k)$, pour une raison de degré, on a $xu^n=0$, donc

$$d_2(xu^n)=d_2x\,u^n-nxu^{n-1}d_2u=0.$$

D'après b), l'application

$$u^{n-1}\wedge : H^0(Y,R^1f_*k)\longrightarrow H^0(Y,R^{2n-1}f_*k)$$

est un isomorphisme. Ainsi, si (ii) est vérifiée, quel que soit $y\in H^0(Y,R^{2n-1}f_*k)$, on a

$$y\,d_2u=0,$$

et en particulier

$$\mathrm{Tr}_u(y\,d_2u)=0. \tag{2.13}$$

Soit V un k-vectoriel tel que R^1f_*k soit isomorphe au faisceau constant V. On a $d_2u\in H^2(Y,V)$ et, d'après (2.13), pour toute forme linéaire w sur V, l'image de d_2u par w dans $H^2(Y,k)$ est nulle. On conclut que $d_2u=0$.

Si $d_2u=0$, la démonstration de (1.5) montre que toutes les différentielles d_2 de (2.12) sont nulles, de sorte que $E_2=E_3$. Pour une raison de degré, $u^{n+1}=0$, de sorte que

$$d_3u^{n+1}=(n+1)u^nd_3u=0.$$

Puisque $d_3u\in H^3(Y,R^0f_*k)$, on déduit de b) que $d_3u=0$. Pour une raison de degré, on a $d_ru=0$ pour $r>3$, et u provient donc d'un élément de $H^2(X,k)$.

(2.14) Dans le cadre des schémas, le résultat précédent reste valable, mais n'est utilisable que dans le cas «géométrique», plus précisément lorsque $\mathbb{Q}_\ell$ est isomorphe à $\mathbb{Q}_\ell(1)$ sur Y.

(2.15) Le corollaire (1.12) permet d'étendre certains des énoncés qui précèdent à certains faisceaux non constants.

Proposition (2.16). Soient g et f deux applications continues, respectivement deux morphismes de schémas, composables

$$X\xrightarrow{g}Y\xrightarrow{f}Z,$$

et $\mathcal{F}$ un faisceau, respectivement un $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau ou $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau, sur X. Supposons que

a) $Rg_*\mathcal{F}\in \mathrm{D}^b(Y)$ et $Rg_*\mathcal{F}\simeq\bigoplus_i R^ig_*\mathcal{F}[-i]$;

b) $R(fg)_*\mathcal{F}\in \mathrm{D}^b(Z)$ et $R(fg)_*\mathcal{F}\simeq\bigoplus_i R^i(fg)_*\mathcal{F}[-i]$.

Alors, pour tout k, on a

$$Rf_*(R^kg_*\mathcal{F})\simeq\bigoplus_i R^if_*(R^kg_*\mathcal{F})[-i].$$

D'après b), le complexe

$$R(fg)_*\mathcal{F}=Rf_*Rg_*\mathcal{F}\simeq\bigoplus_k Rf_*(R^kg_*\mathcal{F}[-k])$$

est somme de ses objets de cohomologie; d'après (1.12), les $Rf_*R^kg_*\mathcal{F}$, qui, à un décalage près, en sont facteurs directs grâce à a), jouissent de la même propriété.

Proposition (2.17). Soient $\mathcal{E}$ un fibré vectoriel localement libre sur un schéma S, $\mathcal{F}$ un faisceau ℓ-adique constant tordu sur $\mathbb{P}(\mathcal{E})$, et f la projection de $\mathbb{P}(\mathcal{E})$ sur S. Dans la catégorie dérivée, on a

$$Rf_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_i R^i f_*\mathcal{F}[-i].$$

L'espace projectif est simplement connexe, et sa cohomologie est sans torsion (SGA 1, XI, 1.1 et SGA 4, XVI, 2.2). On a donc

$$\mathcal{F} = f^*f_*\mathcal{F}, \qquad Rf_*\mathcal{F} = Rf_*\mathbb{Z}_\ell \overset{\mathrm{L}}{\otimes} f_*\mathcal{F},$$

formule qui permet de se ramener au cas où $\mathcal{F} = \mathbb{Z}_\ell$. Soit u la classe de Chern du faisceau inversible $\mathcal{O}(1)$ sur $\mathbb{P}(\mathcal{E})$. On sait alors que $\mathbb{Z}_\ell$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u, et on conclut par (2.2).

(2.18) De (2.17), on peut déduire, à l'aide de (2.16), le même résultat pour les fibrés en drapeaux de toutes espèces définis par $\mathcal{E}$. Dans le cadre topologique, ce qui précède s'applique tel quel aux fibrés vectoriels sur $\mathbb{C}$, et s'étend aux fibrés vectoriels sur $\mathbb{H}$ grâce à (1.9). Pour les fibrés réels, il faut se limiter au cas où $\mathcal{F}$ provient d'un faisceau de 2-torsion sur la base.

Remarque (2.19). Soit X un schéma abélien de dimension relative g sur une base Y. Pour tout entier n, la multiplication par n, soit $[n]$, définit un endomorphisme

$$[n]^* : Rf_*\mathbb{Q}_\ell \longrightarrow Rf_*\mathbb{Q}_\ell.$$

Prenant des combinaisons linéaires à coefficients rationnels, et à dénominateurs bornés en termes de g, de ces endomorphismes, on construit des endomorphismes

$$\pi_i : Rf_*\mathbb{Q}_\ell \longrightarrow Rf_*\mathbb{Q}_\ell$$

tels que $H^j(\pi_i) = \delta_{ij}$. Appliquant (1.11), on conclut, sans hypothèse projective, que

$$Rf_*\mathbb{Q}_\ell \simeq \bigoplus_i R^i f_*\mathbb{Q}_\ell[-i].$$

L'idée exploitée ici est due à Lieberman.

3. La forme infinitésimale du théorème de semi-continuité

Je rappelle dans ce paragraphe quelques résultats qu'on parvient à trouver dans EGA III, ğ 7. La formulation (3.4) m'a été signalée par L. Illusie.

(3.0) Dans tout ce paragraphe, on désigne par A un anneau local noethérien fixé une fois pour toutes, par $\mathfrak{m}$ son idéal maximal et par k son corps résiduel. On désigne par $D^-_{\mathrm{coh}}(A)$ la sous-catégorie de la catégorie dérivée de la catégorie des A-modules, formée des complexes bornés supérieurement de A-modules de type fini.

Proposition (3.1). Soit M un module de type fini sur A.

(i) Pour tout homomorphisme, pas nécessairement local, de A dans un anneau artinien B, et tout B-module de type fini N, on a

$$\lg_B(M \otimes_A N) \leq \lg_B(N) \cdot \dim_k(M \otimes_A k). \tag{3.1.1}$$

(ii) Les conditions suivantes sur M sont équivalentes:

a) M est un module libre;

b) quels que soient B et N comme en (i), on a

$$\lg_B(M \otimes_A N) = \lg_B(N) \cdot \dim_k(M \otimes_A k); \tag{3.1.2}$$

c) quel que soit $n \in \mathbb{N}$, la condition (3.1.2) est vérifiée pour $B = N = A/\mathfrak{m}^n$;

d) quel que soit $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(A)$, $M_{\mathfrak{p}}$ est plat sur $A_{\mathfrak{p}}$ et la condition (3.1.2) est vérifiée pour $B = N = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$.

Si A est sans composantes immergées, ces conditions équivalent encore à:

e) quel que soit le point maximal $\mathfrak{p}$ de $\mathrm{Spec}(A)$, on a

$$\lg_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \lg(A_{\mathfrak{p}}) \cdot \dim_k(M \otimes_A k). \tag{3.1.2'}$$

La démonstration, une application du lemme de Nakayama, est laissée au lecteur.

(3.2) Pour tout complexe K et tout entier n, on désignera par $\tau_{\geq n}(K)$ le complexe défini par

$$\tau_{\geq n}(K)^i = \begin{cases} 0, & i < n, \\ \mathrm{coker}(d^{n-1}), & i = n, \\ K^i, & i > n, \end{cases} \tag{3.2.1}$$

de sorte que

$$H^i(\tau_{\geq n}(K)) = \begin{cases} 0, & i < n, \\ H^i(K), & i \geq n. \end{cases} \tag{3.2.2}$$

Soit K un objet de $D^-_{\mathrm{coh}}(A)$ (cf. (3.0)). Quitte à remplacer K par un complexe isomorphe dans la catégorie dérivée, on peut supposer les composantes de K libres de type fini.

Quels que soient B et N comme en (3.1) (i), on a, au niveau des complexes,

$$\tau_{\geq n}(K \otimes^L_A N) \simeq \tau_{\geq n}(K) \otimes_A N.$$

Prenant les caractéristiques d'Euler–Poincaré des deux membres, on trouve

$$\sum_{i\geq 0}(-1)^i \lg_B\big(H^{n+i}(K \otimes^L_A N)\big) = \lg_B(\mathrm{coker}(d^{n-1}) \otimes_A N) + \sum_{i>0}(-1)^i \lg_B(K^{n+i} \otimes_A N).$$

Soustrayons de cette identité l'identité analogue pour $B = N = k$, multipliée par $\lg_B(N)$. D'après (3.1) (ii), $a \Leftrightarrow b$, on a, les K^i étant libres,

$$\begin{aligned} &\sum_{i\geq 0}(-1)^i \lg_B\big(H^{n+i}(K \otimes^L_A N)\big) - \lg_B(N) \sum_{i\geq 0}(-1)^i \dim_k\big(H^{n+i}(K \otimes^L_A k)\big) \\ &\qquad = \lg_B(\mathrm{coker}(d^{n-1}) \otimes_A N) - \lg_B(N) \dim_k(\mathrm{coker}(d^{n-1}) \otimes_A k), \end{aligned} \tag{3.2.3}$$

ce qui permet d'appliquer (3.1) au premier membre de (3.2.3).

Théorème (3.3) (théorèmes d'échange et de semi-continuité). Soient $K \in \mathrm{Ob}\, D^-_{\mathrm{coh}}(A)$ (cf. (3.0)) et $n \in \mathbb{Z}$.

(i) Pour tout homomorphisme de A dans un anneau artinien B et tout B-module de type fini N, on a

$$\sum_{i\geq 0}(-1)^i \lg_B\big(H^{n+i}(K \otimes^L_A N)\big) \leq \lg_B(N) \sum_{i\geq 0}(-1)^i \dim_k\big(H^{n+i}(K \otimes^L_A k)\big). \tag{3.3.1}$$

(ii) Les conditions suivantes sur K et n sont équivalentes:

a) Le foncteur cohomologique en le A-module N, $H^*(K \otimes^L_A N)$, vérifie la propriété d'échange en $* = n$, c'est-à-dire que les conditions équivalentes suivantes sur K et n sont vérifiées:

a.1) le foncteur $H^n(K \otimes^L_A N)$ est exact à gauche;

a.2) il existe un module Q tel que le foncteur précédent soit isomorphe au foncteur $\mathrm{Hom}_A(Q, N)$;

a.3) le foncteur $H^{n-1}(K \otimes^L_A N)$ est exact à droite;

a.4) il existe un module P tel que le foncteur précédent soit isomorphe au foncteur $P \otimes_A N$;

a.5) la flèche $H^{n-1}(K) \to H^{n-1}(K \otimes^L_A k)$ est surjective;

a.6) il existe un complexe borné supérieurement K', quasi-isomorphe à K et à composantes plates, respectivement libres de type fini, tel que $d'^{\,n-1} = 0$.

b) Quels que soient B et N comme en (i), on a

$$\sum_{i\geq 0}(-1)^i \lg_B\big(H^{n+i}(K\otimes_A^L N)\big) = \lg_B(N)\sum_{i\geq 0}(-1)^i \dim_k\big(H^{n+i}(K\otimes_A^L k)\big). \tag{3.3.2}$$

Si A est sans composantes immergées, ces conditions équivalent encore à:

c) quel que soit le point maximal $\mathfrak{p}$ de $\mathrm{Spec}(A)$, on a

$$\sum_{i\geq 0}(-1)^i \lg_{A_\mathfrak{p}} H^{n+i}(K_\mathfrak{p}) = \lg(A_\mathfrak{p})\sum_{i\geq 0}(-1)^i \dim_k\big(H^{n+i}(K\otimes_A^L k)\big). \tag{3.3.2'}$$

Remarque (3.3.3). On eût pu allonger la liste par les conditions analogues à (3.1) (ii) c) et d).

L'assertion (i) résulte de (3.2.3) et de (3.1) (i). D'après EGA III, (7.4.2), et sa démonstration, les conditions a.1), a.3) et a.6) sont équivalentes et, si K est représenté par un complexe borné supérieurement de modules libres de type fini, elles signifient encore que $\mathrm{coker}(d^{n-1})$ est libre; compte tenu de (3.1) (ii) $a \Leftrightarrow b \Leftrightarrow e$ et de (3.2.3), ceci prouve l'équivalence de a.1), a.3), a.6), b) et c). On a, trivialement, a.6) $\Rightarrow$ a.2) $\Rightarrow$ a.1) et a.6) $\Rightarrow$ a.4) $\Rightarrow$ a.3). L'équivalence de la condition a.5) avec les autres est contenue dans EGA III, (7.5.2).

Corollaire (3.4). Soient A, K et n comme en (3.3), et $k \in \mathbb{N}$.

(i) Quels que soient B et N comme en (3.3) (i), on a

$$\sum_{0\leq i\leq 2k}(-1)^i \lg_B\big(H^{n+i}(K\otimes_A^L N)\big) \leq \lg_B(N)\sum_{0\leq i\leq 2k}(-1)^i \dim_k\big(H^{n+i}(K\otimes_A^L k)\big). \tag{3.4.1}$$

(ii) Les conditions suivantes sur K, n et k sont équivalentes:

a) Le foncteur cohomologique en N, $H^*(K\otimes_A^L N)$, vérifie la propriété d'échange en $* = n$ et en $* = n+2k+1$.

a' Le complexe K est quasi-isomorphe à un complexe borné supérieurement K', à composantes plates, respectivement libres de type fini, tel que $d'^{\,n-1} = d'^{\,n+2k} = 0$.

b) Quels que soient B et N comme en (i), on a égalité dans (3.4.1).

Si A est sans composantes immergées, ces conditions équivalent encore à:

c) quel que soit le point maximal $\mathfrak{p}$ de $\mathrm{Spec}(A)$, on a égalité dans (3.4.1) pour $B = N = A_\mathfrak{p}$.

(3.4.2) Pour $k = 0$, il s'agit là de propriétés du seul hypertor $H^n(K\otimes_A^L N)$, considéré comme foncteur en le A-module N. Elles s'expriment encore en disant que $H^n(K)$ est libre et que, pour tout N, la flèche canonique de $H^n(K)\otimes_A N$ dans $H^n(K\otimes_A^L N)$ est un isomorphisme.

(3.4.3) D'autre part, si K est un complexe parfait, on déduit de (3.4), pour $n \ll 0$, un résultat analogue à (3.3), la sommation sur $i \geq 0$ dans (3.3.1, 2, 2') étant remplacée par une sommation sur $i \leq 0$.

L'assertion (i) et l'équivalence de a), b) et c) résultent de (3.3) et de l'identité

$$\sum_{0\leq i\leq 2k}(-1)^i x_i = \sum_{0\leq i}(-1)^i x_i + \sum_{0\leq i}(-1)^i x_{i+2k+1}.$$

Pour prouver a'), on applique successivement (3.3) (ii) $a \Leftrightarrow a.6)$ à (K, n) et à $(\tau_{\geq n}(K), n+2k+1)$.

(3.5) Lorsque A est artinien, (3.4) donne, pour $k = 0$, l'inégalité

$$\lg_A H^n(K) \leq \lg(A)\dim_k\big(H^n(K\otimes_A^L k)\big), \tag{3.5.1}$$

et, si on a égalité dans (3.5.1), alors la condition d'échange est vérifiée en n et $n+1$, et $H^n(K)$ est un A-module libre.

4. Morphisme de Gysin en cohomologie de Hodge

Le paragraphe est rédigé d'après des notes de A. Grothendieck.

(4.0) Soit $f : X \to Y$ un morphisme propre entre schémas X et Y lisses purement de dimension relative n et m, sur une base S. On suppose que S est noethérien et admet un complexe dualisant pour pouvoir référer à [4] pour la définition de $\mathrm{R}f^!$; cette restriction est sans doute inutile. Enfin, posons $d = n - m$.

(4.1) Toute forme différentielle relative sur Y définit par image réciproque une forme différentielle relative sur X, d'où un morphisme

$$f^*\Omega^p_{Y/S} = Lf^*\Omega^p_{Y/S} \longrightarrow \Omega^p_{X/S}. \tag{4.1.1}$$

D'après la théorie de la dualité pour les morphismes lisses et la transitivité de $\mathrm{R}f^!$, on a canoniquement

$$\mathrm{R}f^!\Omega^m_{Y/S} = \Omega^n_{X/S}[d]. \tag{4.1.2}$$

Appliquons à $\Omega^p_{Y/S}$ et $\Omega^m_{Y/S}$ la formule d'induction

$$\mathrm{R}f^! \,\mathrm{RHom}(K, L) = \mathrm{RHom}(Lf^*K, \mathrm{R}f^!L),$$

qui s'obtient aisément à partir de la définition de $\mathrm{R}f^!$ par bidualité (Hartshorne [4], chap. VII, ğ 3). Puisque

$$\mathrm{RHom}(\Omega^p_{Y/S}, \Omega^m_{Y/S}) \simeq \Omega^{m-p}_{Y/S},$$

on trouve

$$\mathrm{R}f^!\Omega^{m-p}_{Y/S} = \mathrm{RHom}(Lf^*\Omega^p_{Y/S}, \Omega^n_{X/S})[d].$$

La flèche (4.1.1) définit donc par transposition une flèche[5]

$$\Omega^{n-p}_{X/S} = \mathrm{RHom}(\Omega^p_{X/S}, \Omega^n_{X/S}) \longrightarrow \mathrm{R}f^!\Omega^{m-p}_{Y/S}[d]. \tag{4.1.3}$$

D'après la théorie de la dualité, se donner une flèche (4.1.3) revient à se donner une flèche

$$\mathrm{R}f_*\Omega^{n-p}_{X/S} \longrightarrow \Omega^{m-p}_{Y/S}[-d]. \tag{4.1.4}$$

Définition (4.2). Soient X, Y, f, S, n, m et d comme en (4.0). On appelle morphisme de Gysin la flèche (4.1.4)

$$\mathrm{Tr}_f : \mathrm{R}f_*\Omega^p_{X/S} \longrightarrow \Omega^{p-d}_{Y/S}[-d]$$

et les flèches telles que

$$\mathrm{Tr}_f : H^q(X, \Omega^p_{X/S}) \longrightarrow H^{q-d}(Y, \Omega^{p-d}_{Y/S})$$

qui s'en déduisent.

Proposition (4.3). Soit $f : X \to Y$ un morphisme propre et birationnel de schémas lisses sur un corps k. Les flèches

$$f^* : H^q(Y, \Omega^p_Y) \longrightarrow H^q(X, \Omega^p_X)$$

sont injectives.

On se ramène à supposer X et Y purement de dimension n. Le morphisme composé

$$\mathrm{Tr}_f \circ f^* : \Omega^p_Y \longrightarrow \mathrm{R}f_*f^*\Omega^p_Y \longrightarrow \mathrm{R}f_*\Omega^p_X \longrightarrow \Omega^p_Y$$

est l'identité, car il coïncide avec l'identité sur un ouvert dense. Appliquant le foncteur $H^q(Y, \ )$, on trouve que le morphisme composé

$$\mathrm{Tr}_f \circ f^* : H^q(Y, \Omega^p_Y) \longrightarrow H^q(X, \Omega^p_X) \longrightarrow H^q(Y, \Omega^p_Y)$$

est l'identité, ce qui prouve (4.3).

[5] Dans le premier membre de (4.1.3), l'imprimé passe isolément de p à q; on conserve ici l'indice p utilisé dans (4.1.1), (4.1.4) et (4.2).

5. Cohomologie de Hodge et de De Rham

(5.1) Soit $f : X \to S$ un morphisme lisse de schémas. Par définition, les faisceaux de cohomologie de De Rham relative de X sur S sont donnés par

$$H^*_{\mathrm{DR}}(X/S) = \mathrm{R}^* f_*(\Omega^\bullet_{X/S}),$$

où $\Omega^\bullet_{X/S}$, le complexe de De Rham relatif, est un complexe différentiel S-linéaire. On dispose d'une suite spectrale

$$E_1^{pq} = \mathrm{R}^q f_* \Omega^p_{X/S} \Longrightarrow H^{p+q}_{\mathrm{DR}}(X/S). \tag{5.1.1}$$

(5.2) Lorsque $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{C})$ et que X est propre et lisse, on sait par GAGA ([7]) que la cohomologie de chacun des faisceaux cohérents Ω^p_X, ainsi donc que l'hypercohomologie de $\Omega^\bullet_X$, sont les mêmes au sens algébrique, topologie de Zariski, ou transcendant, topologie usuelle de X^{an}; en particulier, $\Omega^\bullet_{X^{\mathrm{an}}}$ étant une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$, on a

$$H^n_{\mathrm{DR}}(X) = H^n(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{C})$$

et la conjugaison complexe sur le faisceau constant $\mathbb{C}$ induit une conjugaison complexe, de nature transcendante, sur $H^n_{\mathrm{DR}}(X)$. La suite spectrale (5.1.1) s'écrit ici

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega^p_X) \Longrightarrow H^{p+q}_{\mathrm{DR}}(X); \tag{5.2.1}$$

on désignera par $F^p(H^n(X))$ la filtration décroissante qu'elle définit sur son aboutissement. D'après Weil [10], chap. IV, n° 4, th. 2, la suite spectrale (5.2.1) peut se calculer comme suite spectrale du complexe double $H^0(X^{\mathrm{an}}, \Omega^{p,q})$ filtré par le premier degré, $\Omega^{p,q}$ désignant le faisceau des formes différentielles C^∞ bihomogènes de bidegré (p, q) (Weil [10], chap. II, n° 1).

Supposons maintenant que X soit projective, donc X^{an} une variété kählérienne. Les formes harmoniques forment alors un sous-complexe double (Weil [10], chap. II, n° 6, cor. 1 au th. 2) du complexe double précédent, sur lequel d' et d'' s'annulent. L'inclusion de ce sous-complexe induit un isomorphisme sur les termes E_1 des suites spectrales définies par ces doubles complexes, filtrés par le premier degré, comme on le voit en considérant l'opérateur H (composante harmonique), rétraction du complexe double $H^0(X^{\mathrm{an}}, \Omega^{p,q})$ sur le sous-complexe des formes harmoniques et vérifiant

$$1 - H = d'(2\delta' G) + (2\delta' G)d'$$

(Weil [10], chap. IV, n° 1: (I) et lemme 3; n° 3: cor. 2 et chap. II, n° 5, th. 2 (IX)).

Si on désigne par $H^{p,q}(X)$ l'image dans $H^{p+q}(X^{\mathrm{an}}, \mathbb{C})$ de l'espace des formes harmoniques de type (p, q), on a donc

$$H^n(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}(X), \tag{5.2.2}$$

$$F^p(H^n(X)) = \bigoplus_{i \geq p} H^{i,n-i}(X), \tag{5.2.3}$$

$$\overline{H^{p,q}(X)} = H^{q,p}(X) \quad \text{(conjugaison complexe)}, \tag{5.2.4}$$

et la suite spectrale (5.2.1) dégénère.

Revenant au cas général où X est seulement supposé propre et lisse sur $\mathbb{C}$, on posera

$$H^{p,q}(X) = F^p(H^{p+q}(X)) \cap \overline{F^q(H^{p+q}(X))}, \tag{5.2.5}$$

de sorte que

$$\overline{H^{p,q}(X)} = H^{q,p}(X). \tag{5.2.6}$$

D'après (5.2.3), cette notation est compatible avec celle utilisée lorsque X est projectif. On posera encore

$$h^{p,q} = \dim H^q(X, \Omega^p_X). \tag{5.2.7}$$

Proposition (5.3). Soit X un schéma propre et lisse sur $\mathbb{C}$:

(i) la suite spectrale (5.2.1) dégénère;

(ii) on a

$$F^p(H^n(X)) = \bigoplus_{i \geq p} H^{i,n-i}(X), \tag{5.3.1}$$

et en particulier

$$H^n(X) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}(X) \quad \text{(somme directe)}, \tag{5.3.2}$$

$$h^{p,q} = h^{q,p} = \dim H^{p,q}(X). \tag{5.3.3}$$

On se ramène à supposer X connexe. Soit N sa dimension. D'après le lemme de Chow et la résolution des singularités (Hironaka [5]), il existe un morphisme projectif et birationnel $g : X' \to X$, avec X' projectif et lisse sur $\mathbb{C}$. La suite spectrale

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_X^p) \Longrightarrow H_{\mathrm{DR}}^{p+q}(X) \tag{5.3.4}$$

s'envoie, par image réciproque, dans la suite spectrale analogue

$$E_1'^{pq} = H^q(X', \Omega_{X'}^p) \Longrightarrow H_{\mathrm{DR}}^{p+q}(X'), \tag{5.3.5}$$

qui, d'après (5.2), dégénère. D'après (4.3), le morphisme $g^* : E_1 \to E_1'$ est injectif. On en conclut, par récurrence sur $r \geq 1$, que $d_r = 0$, que $E_r = E_{r+1}$ et que g^* injecte E_{r+1} dans E'_{r+1}:

$$\begin{array}{ccc} E_r^{pq} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r,q-r+1} \\ {\scriptstyle g^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g^*} \\ E_r'^{pq} & \xrightarrow{0} & E_r'^{p+r,q-r+1}. \end{array}$$

Puisque les suites spectrales (5.3.4) et (5.3.5) dégénèrent, et que g^* est injectif sur leur terme initial, il l'est encore sur leur aboutissement. Des formules (5.2.3), (5.2.4) appliquées à X' résulte que

$$F^p(H^n(X')) \cap \overline{F^{n-p+1}(H^n(X'))} = \{0\};$$

on en déduit la formule analogue

$$F^p(H^n(X)) \cap \overline{F^{n-p+1}(H^n(X))} = \{0\}, \tag{5.3.6}$$

car g^* envoie $F^p(H^n(X))$ dans $F^p(H^n(X'))$ et commute à la conjugaison complexe. En particulier, on a

$$\sum_{i \geq p} h^{i,n-i} + \sum_{i \geq n-p+1} h^{i,n-i} \leq \dim H^n(X) \leq \sum_i h^{i,n-i},$$

ce qu'on peut écrire

$$\sum_{i \geq p} h^{i,n-i} \leq \sum_{i \leq n-p} h^{i,n-i}. \tag{5.3.7}$$

Par dualité de Serre, $h^{i,j} = h^{N-i,N-j}$, l'inégalité (5.3.7), pour $N - n$, implique l'inégalité opposée, de sorte que

$$\dim F^p(H^n(X)) + \dim \overline{F^{n-p+1}(H^n(X))} = \dim H^n(X).$$

D'après (5.3.6), on a donc

$$H^n(X) = F^p(H^n(X)) \oplus \overline{F^{n-p+1}(H^n(X))}. \tag{5.3.8}$$

La décomposition (5.3.8) induit sur $F^{p-1}(H^n(X))$, qui contient l'un des facteurs, une décomposition

$$F^{p-1}(H^n(X)) = F^p(H^n(X)) \oplus H^{p-1,n-p+1}(X),$$

et la formule (5.3.1) s'en déduit par récurrence décroissante sur p; (5.3.2) et (5.3.3) résultent aussitôt de (5.3.1) et (5.2.6), ce qui achève la démonstration de (5.3).

Corollaire (5.4). Sous les hypothèses de (5.3), on a:

(i) Une classe de cohomologie complexe a sur X est dans $H^{p,q}(X)$ si et seulement si elle peut se représenter par une forme fermée α de type (p,q).

(ii) Toute classe de cohomologie peut se représenter par une forme α vérifiant $d'\alpha = d''\alpha = 0$.

(iii) Si la forme α vérifie $d'\alpha = d''\alpha = 0$, les conditions suivantes sont équivalentes:

a) $(\exists\beta)\ \alpha = d\beta$;

b) $(\exists\beta)\ \alpha = d'\beta$;

c) $(\exists\beta)\ \alpha = d''\beta$.[6]

Par définition, $a \in H^{p,q}(X)$ si et seulement s'il existe dans la classe de a des formes fermées α_1 et α_2 dont les composantes de type (p',q') sont nulles pour $p' < p$ (resp. $q' < q$). Il existe alors β tel que $\alpha_1 - \alpha_2 = d\beta$. Soit β_1 (resp. β_2) la somme des composantes de β de type (p',q') pour $p' \geq p$ (resp. $q' \geq q$); on a $\beta = \beta_1 + \beta_2$ et

$$\alpha = \alpha_1 - d\beta_1 = \alpha_2 + d\beta_2$$

est une forme fermée de type (p,q) dans la classe de a. Ceci prouve (i). Il suffit de prouver (ii) pour a bihomogène, donc représenté par une forme bihomogène fermée α d'après (i). Une telle forme vérifie automatiquement $d'\alpha = d''\alpha = 0$.

Si α vérifie $d'\alpha = d''\alpha = 0$, ses composantes bihomogènes sont fermées, et chacune des conditions a), b), c) équivaut à la conjonction des conditions analogues pour les diverses composantes de α, trivialement pour b) et c), et d'après (5.3) (ii) et (5.4) (i) pour a). Supposons donc α fermée de type (p,q) pour prouver (iii). La classe de cohomologie a définie par α se trouve dans $H^{p,q}(X)$, donc dans $F^p(H^{p+q}(X))$, et est nulle si et seulement si elle se trouve déjà dans $F^{p+1}(H^{p+q}(X))$, c'est-à-dire si son image dans $H^q(X,\Omega_X^p)$ est nulle. Ceci prouve a) $\Leftrightarrow$ c), et l'équivalence a) $\Leftrightarrow$ b) s'en déduit par conjugaison.

Théorème (5.5). Soient S un schéma de caractéristique 0 et $f : X \to S$ un morphisme propre et lisse. Alors:

(i) les faisceaux $\mathrm{R}^q f_*\Omega^p_{X/S}$ sont localement libres de type fini et de formation compatible à tout changement de base;

(ii) la suite spectrale (5.1.1)
$$E_1^{pq} = \mathrm{R}^q f_*\Omega^p_{X/S} \Longrightarrow H^{p+q}_{\mathrm{DR}}(X/S)$$
dégénère;

(iii) en chaque point de S, les faisceaux $\mathrm{R}^q f_*\Omega^p_{X/S}$ et $\mathrm{R}^p f_*\Omega^q_{X/S}$ ont même rang (symétrie de Hodge).

La seconde assertion de (i) résulte de la première et de EGA III, (7.8.5) appliqué à chacun des $\Omega^p_{X/S}$; elle implique qu'il suffit de vérifier (iii) pour S spectre d'un corps.

Des arguments standards permettent de se ramener successivement au cas où S est affine (car la question est locale sur S), noethérien (par passage à la limite inductive d'anneaux), spectre d'un anneau local noethérien (car la question est locale), spectre d'un anneau local noethérien complet (par fidèle platitude de la complétion), spectre d'un anneau local artinien. Pour effectuer cette dernière réduction, on représente l'anneau local noethérien complet R comme limite projective de ses quotients artiniens $R/\mathfrak{m}^n$. D'après le théorème de comparaison EGA III, (4.1.5), le terme E_1 de la suite spectrale (5.1.1) est limite projective des termes E_1 des suites spectrales analogues sur les $R/\mathfrak{m}^n$, de sorte que si celles-ci dégénèrent, (5.1.1) dégénère de même. Si l'assertion (i) est vraie sur les $R/\mathfrak{m}^n$, ces termes E_1 forment un système projectif de modules libres, se déduisant les uns des autres par réduction mod $\mathfrak{m}^n$, de sorte que leur limite projective est un module libre.

Supposons donc que $S = \mathrm{Spec}(A)$ avec A anneau local artinien de corps résiduel k de caractéristique 0. Cet anneau admet un corps de représentants (EGA, 0_{IV}, (19.8.6), (i), pour $W = k$, $u =$ identité) et peut donc être vu comme une k-algèbre locale de dimension finie. Le principe de Lefschetz permet de supposer $k = \mathbb{C}$, auquel cas (iii) résulte de (i) et de (5.3.3).

Pour achever la démonstration de (5.5), il reste donc à prouver la première assertion de (i), et (ii), sous l'hypothèse supplémentaire:

$$S = \mathrm{Spec}(A) \quad \text{pour une } \mathbb{C}\text{-algèbre locale de dimension finie sur } \mathbb{C},\ \text{d'idéal maximal } \mathfrak{m}. \tag{5.5.1}$$

[6] (Ajouté sur épreuves.) On peut montrer que ces conditions équivalent encore à l'existence d'une forme β telle que $\alpha = d'd''\beta$.

La suite spectrale (5.1.1) se réécrit

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega^p_{X/S}) \Longrightarrow \mathrm{R}^{p+q}\Gamma(\Omega^\bullet_{X/S}). \tag{5.5.2}$$

Lemme (5.5.3). Sous les hypothèses (5.5) et (5.5.1), le complexe $\Omega^{\mathrm{an},\bullet}_{X/S}$ est une résolution du faisceau constant A sur l'espace topologique X^{an}.

Le complexe $\Omega^{\mathrm{an},\bullet}_{X/S}$ étant A-linéaire, sa filtration $\mathfrak{m}$-adique est une filtration par des sous-complexes. Pour cette filtration,

$$\mathrm{Gr}\,\Omega^{\mathrm{an},\bullet}_{X/S} = \mathrm{Gr}\,A \otimes_{\mathbb{C}} \mathrm{Gr}^0\,\Omega^{\mathrm{an},\bullet}_{X/S}.$$

Le complexe $\mathrm{Gr}^0\,\Omega^{\mathrm{an},\bullet}_{X/S}$ est une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$, car il n'est autre que le complexe de De Rham de X_{red}. Le complexe $\mathrm{Gr}\,\Omega^{\mathrm{an},\bullet}_{X/S}$ est donc une résolution de $\mathrm{Gr}\,A$, et l'assertion en résulte.

L'espace X est compact, de sorte que par GAGA (cf. (5.2)) les hypercohomologies au sens algébrique et au sens transcendant de $\Omega^\bullet_{X/S}$ coïncident, et, d'après (5.5.3), coïncident encore avec la cohomologie de X^{an} à valeurs dans A. Dès lors,

$$\lg_A \mathrm{R}^n\Gamma(\Omega^\bullet_{X/S}) = \lg(A)\dim_{\mathbb{C}} \mathrm{R}^n\Gamma(\Omega^\bullet_{X_{\mathrm{red}}}). \tag{5.5.4}$$

D'après (3.5.1) et EGA III, (6.10.5), on sait que

$$\lg_A H^q(X, \Omega^p_{X/S}) \leq \lg(A)\dim_{\mathbb{C}} H^q(X_{\mathrm{red}}, \Omega^p_{X_{\mathrm{red}}}), \tag{5.5.5}$$

l'égalité ne pouvant avoir lieu que si $H^q(X, \Omega^p_{X/S})$ est A-libre.

On tire de (5.5.2) que

$$\sum_{p+q=n} \lg_A H^q(X, \Omega^p_{X/S}) \geq \lg_A \mathrm{R}^n\Gamma(\Omega^\bullet_{X/S}), \tag{5.5.6}$$

l'égalité ne pouvant avoir lieu pour tout n que si la suite spectrale (5.5.2) dégénère. Mettant bout à bout ces inégalités, on trouve

$$\lg(A)\sum_{p+q=n} \dim_{\mathbb{C}} H^q(X_{\mathrm{red}}, \Omega^p_{X_{\mathrm{red}}}) \geq \lg(A)\mathrm{R}^n\Gamma(\Omega^\bullet_{X_{\mathrm{red}}}), \tag{5.5.7}$$

l'égalité ne pouvant avoir lieu que si les conclusions (5.4) sont vérifiées. Cette égalité résulte de (5.3) (i) appliqué à X_{red}.

6. Application à la cohomologie cohérente

Théorème (6.1). Soient S un schéma de caractéristique 0 et $f : X \to S$ un morphisme projectif, lisse de dimension relative n. Quel que soit p, par exemple $p = 0$, on a, dans $D^b(S, \mathcal{O}_S)$,

$$\mathrm{R}f_*\Omega^p_{X/S} \simeq \bigoplus_q \mathrm{R}^q f_*\Omega^p_{X/S}[-q].$$

Désignons par u la première classe de Chern d'un faisceau inversible relativement ample sur X, à valeurs dans $H^1(X, \Omega^1_{X/S})$. La classe u définit, par cup-produit, des homomorphismes dans $D^b(S)$,

$$u\wedge : \mathrm{R}f_*\Omega^p_{X/S} \longrightarrow \mathrm{R}f_*\Omega^{p+1}_{X/S}[1],$$

et un endomorphisme de degré 2

$$u\wedge : \bigoplus_p \mathrm{R}f_*\Omega^p_{X/S}[-p] \longrightarrow \left(\bigoplus_p \mathrm{R}f_*\Omega^p_{X/S}[-p]\right)[2]. \tag{6.1.1}$$

Lemme (6.2). L'endomorphisme (6.1.1) vérifie les hypothèses de (1.5).

D'après (5.4) (i) et le principe de Lefschetz, il suffit de démontrer (6.2) lorsque $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{C})$. L'assertion résulte alors du théorème de Lefschetz (voir (2.6.2) ou (2.6.3)) et de la décomposition de Hodge.

D'après (1.5), le complexe $\bigoplus_p \mathrm{R}f_*\Omega^p_{X/S}[-p]$ est isomorphe, dans la catégorie dérivée, à la somme de ses objets de cohomologie, et il en va de même pour chacun des $\mathrm{R}f_*\Omega^p_{X/S}$ qui, à un décalage près, en sont facteur direct (1.12).

BIBLIOGRAPHIE

[1] Blanchard, Sur les variétés analytiques complexes, *Ann. Sci. É.N.S.* **73** (1956).

[2] R. Godement, *Théorie des faisceaux*, Publ. Inst. Math. Univ. Strasbourg, XIII, Act. Sci. et Ind., Hermann.

[3] M. Hakim, *Schémas relatifs*, thèse.

[4] R. Hartshorne, *Residues and duality*, Lecture Notes no. 20, Springer, 1966.

[5] H. Hironaka, Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, *Ann. of Math.* **79** (1964).

[6] S. L. Kleiman, *Algebraic cycles and the Weil conjectures*, mimeographed notes, Columbia University.

[7] J.-P. Serre, Géométrie algébrique et géométrie analytique, *Ann. Inst. Fourier*, Grenoble, **6** (1956), cité GAGA.

[8] J.-L. Verdier, *Catégories dérivées*, thèse à paraître à North Holland Publ. Co.

[9] J.-L. Verdier, *Catégories dérivées (état 0)*, notes miméographiées, I.H.E.S.

[10] A. Weil, *Introduction à l'étude des variétés kählériennes*, Publ. Inst. Math. Univ. Nancago, VI, Act. Sci. et Ind., Hermann.

[11] A. Weil, Sur les critères d'équivalence en géométrie algébrique, *Math. Ann.* **128** (1954), p. 95–127.

SGA 4. M. Artin, A. Grothendieck et J.-L. Verdier, *Cohomologie étale des schémas*, Séminaire de géométrie algébrique de l'I.H.E.S. (1963–1964), à paraître à North Holland Publ. Co.

SGA 5. A. Grothendieck, *Cohomologie ℓ-adique et rationalité des fonctions L*, Séminaire de géométrie algébrique de l'I.H.E.S. (1964–1965).

Manuscrit reçu le 1er juillet 1968.

Inventiones math. 8, 238–243 (1969)

Variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette)

On donne une description terre à terre de la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini $\mathbb{F}_q$. Le résultat obtenu a été inspiré par Ihara [2], ch. V (voir aussi [3]).

1. Soient p un nombre premier, $\mathbb{F}_p$ le corps $\mathbb{Z}/(p)$, $\overline{\mathbb{F}_p}$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$ et, pour toute puissance q de p, soit $\mathbb{F}_q$ le sous-corps à q éléments de $\overline{\mathbb{F}_p}$. Pour toute extension algébrique k de $\mathbb{F}_p$, on désigne par $W_0(k)$ l'anneau de valuation discrète hensélien essentiellement de type fini sur $\mathbb{Z}$, absolument non ramifié, de corps résiduel k; soient $W(k)$ l'anneau des vecteurs de Witt sur k, i. e. le complété de $W_0(k)$, $W = W(\overline{\mathbb{F}_p})$, et φ un plongement de W dans le corps $\mathbb{C}$ des nombres complexes. On désigne par $\mathbb{Z}(1)$ le sous-groupe $2\pi i\mathbb{Z}$ de $\mathbb{C}$. L'application exponentielle définit un isomorphisme entre $\mathbb{Z}(1) \otimes \mathbb{Z}_\ell$ et

$$\mathbb{Z}_\ell(1)(\mathbb{C}) = \varprojlim_n \mu_{\ell^n}(\mathbb{C}).$$

On désigne par A^* la variété abélienne duale d'une variété abélienne A. Pour tout corps k, on désigne par $\bar{k}$ une clôture algébrique de k.

2. Soit A une variété abélienne de dimension g, définie sur un corps k de caractéristique p. Rappelons que A est dite ordinaire si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées:

(I) A a p^g points d'ordre divisant p à valeurs dans $\bar{k}$.

(II) La «matrice de Hasse–Witt»
$$F^* : H^1(A^{(p)}, \mathcal{O}_{A^{(p)}}) \longrightarrow H^1(A, \mathcal{O}_A)$$
est inversible.

(III) La composante neutre du schéma en groupe A_p, noyau de la multiplication par p, est de type multiplicatif, donc géométriquement isomorphe à une puissance de μ_p.

Si $k = \mathbb{F}_q$, si F est l'endomorphisme de Frobenius de A et $P_{cA}(F; x)$ son polynôme caractéristique, ces conditions équivalent encore à:

(IV) La moitié au moins des racines de $P_{cA}(F; x)$ dans $\overline{\mathbb{Q}}_p$ sont des unités p-adiques. En d'autres termes, si $n = \dim A$, la réduction modulo p du polynôme $P_{cA}(F; x)$ n'est pas divisible par x^{n+1}.

3. Soit A une variété abélienne ordinaire sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. On désigne par $\widetilde{A}$ le relèvement canonique de Serre–Tate [4] de A sur W. Rappelons que $\widetilde{A}$ dépend fonctoriellement de A et est caractérisé par le fait que le groupe p-divisible $T_p(\widetilde{A})$ sur W attaché à $\widetilde{A}$ [5] est le produit des groupes p-divisibles, uniquement déterminés d'après 2. (III), relevant respectivement la composante neutre et le plus grand quotient étale de $T_p(A)$. Le relèvement canonique $\widetilde{A}$ est encore l'unique relèvement de A tel que tout endomorphisme de A se relève à $\widetilde{A}$. On désigne par $T(A)$ l'homologie entière de la variété abélienne complexe $A_{\mathbb{C}}$ déduite de $\widetilde{A}$ et de φ par extension des scalaires de W à $\mathbb{C}$:

$$T(A) = H_1(\widetilde{A} \otimes_\varphi \mathbb{C}).$$

On sait que $\widetilde{A}$ se descend de façon unique à $W_0(\overline{\mathbb{F}_p})$, de sorte que $A_{\mathbb{C}}$ ne dépend que de A et de la restriction de φ à $W_0(\overline{\mathbb{F}_p})$. Le $\mathbb{Z}$-module libre $T(A)$ est de rang $2\dim(A)$; il est fonctoriel en A. De plus, si ℓ est un nombre premier $\neq p$, on a fonctoriellement

$$T(A) \otimes \mathbb{Z}_\ell = T_\ell(A). \tag{3.1}$$

Le relèvement canonique de la variété abélienne A^* duale de A est la duale de $\widetilde{A}$, de sorte que $(A_{\mathbb{C}})^* = A^*_{\mathbb{C}}$ et que $T(A)$ et $T(A^*)$ sont en dualité parfaite à valeurs dans $\mathbb{Z}(1)$:

$$T(A) \otimes T(A^*) \longrightarrow \mathbb{Z}(1) \tag{3.2}$$

(il est indispensable d'utiliser $\mathbb{Z}(1)$ de préférence à $\mathbb{Z}$ pour obtenir une théorie invariante par conjugaison complexe). Les accouplements (3.2) sont compatibles, via (3.1), aux accouplements

$$T_\ell(A) \otimes T_\ell(A^*) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1);$$

un morphisme $\xi : A \to A^*$ définit une polarisation de A si et seulement si $\xi_{\mathbb{C}} : A_{\mathbb{C}} \to A^*_{\mathbb{C}}$ définit une polarisation de $A_{\mathbb{C}}$. Posons

$$T'_p(A) = \mathrm{Hom}(\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p, A(\overline{\mathbb{F}_p}))$$

et

$$T''_p(A) = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(T'_p(A^*), \mathbb{Z}(1) \otimes \mathbb{Z}_p).$$

Ces $\mathbb{Z}_p$-modules sont des foncteurs covariants de A.

Par définition du relèvement canonique, le groupe p-divisible $T_p(\widetilde{A})$ est somme du groupe pro-étale constant $T'_p(A)$ et du dual de Cartier de $T'_p(A^*)$. Pour tout morphisme $u : A \to B$, le morphisme induit

$$u : T_p(\widetilde{A}) \to T_p(\widetilde{B})$$

s'identifie à la somme de $u|T'_p(A) : T'_p(A) \to T'_p(B)$ et du transposé de Cartier de ${}^t u|T'_p(B^*) : T'_p(B^*) \to T'_p(A^*)$. Sur $\mathbb{C}$, on a canoniquement $\mathbb{Z}(1)/(p^n) \sim \mu_{p^n}$, d'où un isomorphisme de foncteurs:

$$T_{(p)}(A) = T(A) \otimes \mathbb{Z}_p = T'_p(A) \oplus T''_p(A). \tag{3.2}$$

4. Rappelons que, si $\varphi : X \to Y$ est une isogénie entre variétés abéliennes complexes, la suite exacte d'homotopie se réduit à une suite exacte courte

$$0 \longrightarrow H_1(X) \longrightarrow H_1(Y) \longrightarrow \mathrm{Ker}(\varphi) \longrightarrow 0.$$

Les variétés abéliennes quotients de X par un sous-groupe fini, et ces sous-groupes finis de X, correspondent bijectivement aux sous-réseaux de $H_1(X) \otimes \mathbb{Q}$ contenant $H_1(X)$.

Soit A une variété abélienne ordinaire sur $\overline{\mathbb{F}_p}$. Si n est un entier premier à p, les sous-schémas en groupes finis d'ordre n de A, de $\widetilde{A}$ et de $A_{\mathbb{C}}$ se correspondent bijectivement, et correspondent encore aux sur-réseaux R de $T(A)$ tels que $[R : T(A)] = n$.

Posons

$$V'_p = T'_p(A) \otimes \mathbb{Q}_p, \qquad V''_p(A) = T''_p(A) \otimes \mathbb{Q}_p.$$

Les sous-schémas en groupes finis d'ordre p^k de A sont produits d'un sous-groupe étale et d'un sous-groupe infinitésimal. Les sous-groupes étales d'ordre p^k de A correspondent à ceux des sous-groupes d'ordre p^k de $A_{\mathbb{C}}$ tels que le sur-réseau R correspondant de $T(A)$ soit contenu dans $T_{(p)}(A) + V'_p(A)$. Par dualité, les sous-groupes infinitésimaux de A correspondent aux sur-réseaux R de $T(A)$, p-isogènes à $T(A)$, i. e. tels que $[R : T(A)]$ soit une puissance de p, et contenus dans $T_{(p)}(A) + V''_p(A)$.

Au total, les sous-groupes finis de A, ou les variétés abéliennes quotient de A, correspondent bijectivement aux sur-réseaux R de $T(A)$ tels que

$$R \otimes \mathbb{Z}_p = (R \otimes \mathbb{Z}_p \cap V'_p) + (R \otimes \mathbb{Z}_p \cap V''_p). \tag{4.1}$$

5. En particulier, $A^{(p)}$, quotient de A par le plus grand sous-groupe infinitésimal de A tué par p pour A ordinaire, est défini par le sur-réseau $T(A)^{(p)}$ de $T(A)$, p-isogène à $T(A)$, tel que

$$T(A)^{(p)} \otimes \mathbb{Z}_p = T'_p(A) + \frac{1}{p} T''_p(A).$$

6. Soient A une variété abélienne sur $\mathbb{F}_q$ et $F : x \mapsto x^q$ son endomorphisme de Frobenius. Rappelons que A est uniquement déterminée par le couple $(\overline{A}, F)$ déduit de (A, F) par extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\overline{\mathbb{F}_q}$; l'endomorphisme F de $\overline{A}$ se factorise par le Frobenius relatif

$$\mathrm{Fr}^{(q)} : \overline{A} \longrightarrow \overline{A}^{(q)}$$

et un isomorphisme

$$F' : \overline{A}^{(q)} \longrightarrow \overline{A}.$$

Si A est ordinaire, on désignera par $T(A)$ le $\mathbb{Z}$-module $T(\overline{A})$ muni de l'endomorphisme F induit par l'endomorphisme de Frobenius de A. En vertu de 5, de ce qui précède, et de (3.2), les réseaux $T(A)$ et $F(T(A))$ sont p-isogènes et on a

$$F(T'_p(A)) = T'_p(A), \tag{6.1}$$

$$F(T''_p(A)) = qT''_p(A). \tag{6.2}$$

7. Théorème. Le foncteur

$$A \longmapsto (T(A), F)$$

est une équivalence de catégories entre la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur $\mathbb{F}_q$ et la catégorie des $\mathbb{Z}$-modules libres de type fini T munis d'un endomorphisme F vérifiant les conditions suivantes:

(a) F est semi-simple, et ses valeurs propres sont de valeur absolue complexe $q^{1/2}$.

(b) La moitié au moins des racines dans $\overline{\mathbb{Q}}_p$ du polynôme caractéristique de F sont des unités p-adiques; en d'autres termes, si T est de rang d, la réduction modulo p du polynôme $P_{cT}(F; x)$ n'est pas divisible par $x^{\lfloor d/2 \rfloor + 1}$.

(c) Il existe un endomorphisme V de T tel que $FV = q$.

Si la condition (a) est vérifiée, les conditions (b) et (c) équivalent à:

(d) Le module $T \otimes \mathbb{Z}_p$ admet une décomposition, stable par F, en deux sous-$\mathbb{Z}_p$-modules T'_p et T''_p de même dimension, tels que $F|T'_p$ soit inversible et $F|T''_p$ divisible par q.

Preuve. (A) Prouvons que (a)+(b)+(c) $\Rightarrow$ (d). Si α est une valeur propre complexe de F, $\bar{\alpha}$ en est une autre, de même multiplicité, et $\alpha\bar{\alpha} = q$. Si l'on excepte celles égales à $\pm q^{1/2}$, les valeurs propres de F dans $\mathbb{C}$, donc dans $\overline{\mathbb{Q}}_p$, se rangent en paires de racines α et q/α. Les racines α et q/α ne pouvant être simultanément des unités p-adiques, il résulte de (b) que $\pm q^{1/2}$ n'est pas valeur propre de F, que la moitié des valeurs propres de F dans $\overline{\mathbb{Q}}_p$ est formée d'unités p-adiques, soit $\alpha_1, \ldots, \alpha_{d/2}$, et que l'autre moitié est formée de $\beta_1 = q/\alpha_1, \ldots, \beta_{d/2} = q/\alpha_{d/2}$. Soient

$$T_{(p)} = T \otimes \mathbb{Z}_p, \qquad V_p = T \otimes \mathbb{Q}_p,$$

V'_p le sous-espace de V_p noyau de $\prod_i (F - \alpha_i)$ et V''_p le noyau de l'endomorphisme $\varphi = \prod_i (F - \beta_i)$. On a

$$V_p = V'_p \oplus V''_p.$$

Soient T'_p la projection de $T_{(p)}$ sur V'_p et $T''_p = T_{(p)} \cap V''_p$. Puisque φ annule V''_p et respecte T, il envoie T'_p dans $T_{(p)} \cap V'_p \subset T'_p$. Par ailleurs,

$$\det(\varphi | V'_p) = \prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j)$$

est une unité p-adique, donc $\varphi(T'_p) = T'_p$ et $T_{(p)} \cap V'_p = T'_p$, de sorte que

$$T_{(p)} = T'_p \oplus T''_p.$$

(B) *Pleine fidélité.* Soient A et B deux variétés abéliennes sur $\mathbb{F}_q$, et soit ψ la flèche

$$\psi : \mathrm{Hom}(A, B) \longrightarrow \mathrm{Hom}_F(T(A), T(B)).$$

En vertu du théorème de Tate [7] et de (3.1), la flèche

$$\psi_\ell : \mathrm{Hom}(A, B) \otimes \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow \mathrm{Hom}_F(T(A), T(B)) \otimes \mathbb{Z}_\ell$$

est un isomorphisme pour $(\ell, p) = 1$, de sorte que $\psi \otimes \mathbb{Q}$ est un isomorphisme. On sait que $\mathrm{Hom}(A, B)$ est sans torsion, donc ψ injectif. Soit $u : A \to B$ un morphisme tel que $T(u)$ soit divisible par n. Le morphisme induit

$$u_{\mathbb{C}} : \overline{A}_{\mathbb{C}} \longrightarrow \overline{B}_{\mathbb{C}}$$

est alors divisible par n, donc aussi $\widetilde{u} : \widetilde{\overline{A}} \to \widetilde{\overline{B}}$ au point générique de W. Le noyau de la multiplication par n est plat sur W; $\widetilde{u}$ s'annule donc sur ce noyau, $\widetilde{u}$ et u sont divisibles par n, et ψ est bijectif.

(C) *Nécessité.* Que $(T(A), F)$ vérifie (a) résulte de Weil; la condition (d), qui implique (b) et (c), résulte de 6.

(D) *Isogénies.* Soient (T_0, F) vérifiant (a) (d) et T un réseau dans $T_0 \otimes \mathbb{Q}$, stable par F, vérifiant encore (d). Supposons que (T_0, F) soit l'image d'une variété abélienne A sur $\mathbb{F}_q$ et prouvons que (T, F) provient d'une variété abélienne isogène. Remplaçant T par $\frac{1}{k}T$, qui lui est isomorphe, on peut supposer que $T \supset T_0$. La condition (d) implique que T vérifie (4.1) et T définit un sous-groupe H de $\overline{A}$, qui est défini sur $\mathbb{F}_q$, et

$$(T, F) = T(A/H).$$

(E) *Surjectivité.* Le foncteur T induit un foncteur $T_{\mathbb{Q}}$ de la catégorie des variétés abéliennes ordinaires à isogénie près sur $\mathbb{F}_q$ dans la catégorie des $\mathbb{Q}$-espaces vectoriels de rang fini, munis d'un automorphisme F vérifiant (a) (b). En vertu de (D), il suffit de prouver que ce foncteur $T_{\mathbb{Q}}$ est essentiellement surjectif. Il suffit même de montrer que tout objet simple (V, F) de la catégorie image est atteint. D'après Honda [1] (voir aussi [6]), il existe une variété abélienne A sur $\mathbb{F}_q$, telle que le polynôme caractéristique du Frobenius F_A de A soit une puissance de celui de F. La troisième caractérisation 2.[1] des variétés abéliennes ordinaires montre que A est ordinaire. De plus, $(T(A) \otimes \mathbb{Q}, F)$ est somme de copies de (V, F), donc, d'après (B), la variété abélienne à isogénie près $A \otimes \mathbb{Q}$ est somme de copies d'une variété abélienne B vérifiant

$$T(B) \otimes \mathbb{Q} = (V, F).$$

8. Soit (T, F) un couple vérifiant les hypothèses du théorème, $2g$ le rang de T, A la variété abélienne sur $\mathbb{F}_q$ correspondante et $A_{\mathbb{C}}$ la variété abélienne complexe qui s'en déduit (3.). On a

$$T = H_1(A_{\mathbb{C}})$$

de sorte que $T \otimes \mathbb{R}$ s'identifie à l'algèbre de Lie de $A_{\mathbb{C}}$ et est en tant que tel muni d'une structure complexe. Voici, d'après J.-P. Serre, comment reconstruire cette structure complexe en terme de T, F et de la restriction de φ à $W_0(\overline{\mathbb{F}_p})$.

Proposition. La structure complexe définie plus haut sur $T \otimes \mathbb{R}$ est caractérisée par les propriétés suivantes:

(I) L'endomorphisme F est $\mathbb{C}$-linéaire.

(II) Si v est la valuation de la clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$ prolongeant la valuation de $W_0(\overline{\mathbb{F}_p})$, les valuations des g valeurs propres de cet endomorphisme sont strictement positives.

La condition (I) est évidente, et la condition (II) résulte de ce que l'action de F sur l'algèbre de Lie de A est congrue à zéro modulo p. L'unicité de la structure complexe vérifiant (I) et (II) résulte aisément de la condition (b) vérifiée par (T, F).

Bibliographie

1. Honda, T.: Isogeny classes of abelian varieties over finite fields. J. Math. Soc. Jap. **20**, 83–95 (1968).
2. Ihara, Y.: On congruence monodromy problems, vol. I. University of Tokyo, 1968.
3. — The congruence monodromy problems. J. Math. Soc. Jap. **20**, 107–121 (1968).
4. Lubin, J., J.-P. Serre, and J. Tate: Elliptic curves and formal groups. Woods Hole Summer Institute 1964 (polycopié, tiré à un nombre restreint d'exemplaires).
5. Serre, J.-P.: Groupes p-divisibles (d'après J. Tate). Séminaire Bourbaki 318, Novembre 1966.
6. Tate, J.: Classes d'isogénies de variétés abéliennes sur un corps fini (d'après T. Honda). Séminaire Bourbaki 352, Novembre 1968.
7. — Endomorphisms of abelian varieties over finite fields. Inventiones Math. **2**, 134–144 (1966).

[1] L'imprimé renvoie ici à 1.; les caractérisations de l'ordinarité sont énoncées en 2., référence rétablie ici.

Pierre Deligne
I.H.E.S.
91, Bures-sur-Yvette, France

(Reçu le 3 juillet 1969)

L'IRRÉDUCTIBILITÉ DE L'ESPACE DES COURBES DE GENRE DONNÉ

par P. DELIGNE et D. MUMFORD [1]

Fixons un corps algébriquement clos k. Soit M_g l'espace des modules des courbes de genre g sur k. Le résultat principal de cette note est que M_g est irréductible pour tout k. Bien entendu, le fait que M_g soit ou non irréductible ne dépend que de la caractéristique de k. Lorsque la caractéristique est 0, nous pouvons supposer que $k = \mathbb{C}$, et le résultat est alors classique. Une preuve simple figure dans Enriques–Chisini [E, vol. 3, chap. 3] ; elle repose sur l'analyse de la totalité des revêtements de $\mathbf{P}^1$ de degré n, avec un nombre fixé d de points de branchement ordinaires. Cette méthode a été étendue à la caract. p par William Fulton [F], en utilisant des spécialisations de la caract. 0 à la caract. p pourvu que $p > 2g+1$. Malheureusement, les tentatives pour étendre cette méthode à tout p semblent se heurter à des questions difficiles de ramification sauvage. De nos jours, la théorie de Teichmüller donne une intuition entièrement analytique, mais très profonde, de cette irréductibilité lorsque $k = \mathbb{C}$. Notre approche est cependant la plus proche de la preuve incomplète de Severi ([Se], Anhang F ; l'erreur est aux pp. 344–345 et semble tout à fait fondamentale) et suit une suggestion de Grothendieck consistant à utiliser le résultat en caract. 0 pour en déduire le résultat en caract. p. La base des idées de Severi comme de Grothendieck est de construire des familles de courbes X, certaines singulières, avec $p_a(X) = g$, au-dessus d'espaces de paramètres non singuliers, qui contiennent en un certain sens assez de courbes singulières pour relier entre elles deux composantes quelconques que M_g pourrait avoir.

L'élément essentiel qui fait maintenant fonctionner cette méthode est un récent « théorème de réduction stable » pour les variétés abéliennes. Ce résultat a d'abord été prouvé indépendamment, en caract. 0, par Grothendieck, au moyen des méthodes de la cohomologie étale (correspondance privée avec J. Tate), et par Mumford, en appliquant la moitié facile du théorème (2.5), pour passer des courbes aux variétés abéliennes (cf. [M_2]). Grothendieck a récemment renforcé sa méthode de sorte qu'elle s'applique en toute caractéristique (SGA 7, 1968). Mumford a également donné une preuve utilisant les fonctions thêta en caract. $\neq 2$. Le résultat est le suivant :

Théorème de réduction stable. — Soit R un anneau de valuation discrète de corps des fractions K. Soit A une variété abélienne sur K. Alors il existe une extension algébrique finie L de K telle que, si $R_L =$ clôture intégrale de R dans L, et si $\mathcal{A}_L$ est le modèle de Néron de $A \times_K L$ sur R_L, alors la fibre fermée $\mathcal{A}_{L,s}$ de $\mathcal{A}_L$ n'a pas de radical unipotent.

Nous donnerons deux preuves apparentées de notre résultat principal. L'une est assez élémentaire, et suit par des techniques tout à fait standard une fois que le théorème de réduction stable pour les variétés abéliennes est appliqué, au § 2, pour déduire un théorème de réduction stable analogue pour les courbes. L'autre preuve est plus puissante, et repose sur l'emploi d'une catégorie plus grande que la catégorie des schémas, ainsi que sur la preuve, pour les objets de cette catégorie, de nombreux théorèmes standard pour les schémas, en particulier le théorème de connexité d'Enriques–Zariski (EGA 3, (4.3)). Malheureusement, cette catégorie plus grande n'est pas tout à fait une catégorie — c'est un type simple de 2-catégorie ; en fait, si X, Y sont des objets, alors $\mathrm{Hom}(X, Y)$ est lui-même une catégorie, mais une catégorie dans laquelle tous les morphismes sont des isomorphismes. Les objets de cette 2-catégorie, nous les appelons champs algébriques [2]. L'espace des modules M_g n'est que la « variété grossière sous-jacente » d'un objet plus fondamental, le champ de modules $\mathcal{M}_g$, étudié dans [M_3]. Des détails complets sur les propriétés et théorèmes de base pour les champs algébriques seront donnés ailleurs. Dans cet article, nous nous contenterons de donner les définitions et d'énoncer sans preuve les théorèmes généraux que nous appliquons. En utilisant la méthode des champs algébriques, nous pouvons démontrer non seulement l'irréductibilité de M_g lui-même, mais aussi celle de tous les espaces de modules de niveau supérieur de courbes (cf. § 5 ci-dessous).

§ 1. Courbes stables et leurs modules.

La définition clé de tout l'article est la suivante :

1. Le premier auteur souhaite remercier l'Institut des Hautes Études scientifiques, Bures-sur-Yvette, pour son soutien dans cette recherche, ainsi que N. Katz pour son aide inestimable dans la préparation de ce manuscrit ; le second auteur souhaite remercier le Tata Institute of Fundamental Research, Bombay, et l'Institut des Hautes Études scientifiques.

2. Une catégorie d'objets légèrement moins générale, appelée espaces algébriques, a été introduite et étudiée très profondément par M. Artin [A_1] et D. Knutson [K]. L'idée d'élargir la catégorie des variétés pour l'étude des espaces de modules est due à l'origine, croyons-nous, à A. Weil.

Définition (1.1). — Soit S un schéma quelconque. Soit $g \geq 2$. Une courbe stable de genre g sur S est un morphisme propre et plat $\pi : C \to S$ dont les fibres géométriques sont des schémas C_s réduits, connexes et de dimension 1 tels que :

(i) *C_s n'ait que des points doubles ordinaires ;*

(ii) *si E est une composante rationnelle non singulière de C_s, alors E rencontre les autres composantes de C_s en plus de 2 points ;*

(iii) $\dim H^1(\mathcal{O}_{C_s}) = g$.

Nous étudierons dans cette section trois aspects de la théorie des courbes stables : leurs systèmes linéaires pluricanoniques, leurs déformations et leurs automorphismes.

Supposons que $\pi : C \to S$ soit une courbe stable. Comme π est plat et que ses fibres géométriques sont des intersections complètes locales, le morphisme π est localement une intersection complète (c'est-à-dire que, localement, C est isomorphe, comme S-schéma, à $V(f_1, \ldots, f_{n-1}) \subset \mathbf{A}^n \times U$, où $U \subset S$ est ouvert et où $f_1, \ldots, f_{n-1} \in \Gamma(\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n \times U})$ forment une suite régulière). Par conséquent, d'après la théorie de la dualité pour les faisceaux cohérents [H], il existe un faisceau inversible canonique $\omega_{C/S}$ sur C — l'unique groupe de cohomologie non nul du complexe de faisceaux $f^!(\mathcal{O}_S)$. Nous aurons besoin des faits suivants au sujet de $\omega_{C/S}$:

a) pour tout morphisme $f : T \to S$, $\omega_{C \times_S T/T}$ est canoniquement isomorphe à $f^*(\omega_{C/S})$;

b) si $S = \mathrm{Spec}(k)$, avec k algébriquement clos, et si $f : C' \to C$ est la normalisation de C, soient $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n$ les points de C' tels que les $z_i = f(x_i) = f(y_i)$, $1 \leq i \leq n$, soient les points doubles de C. Alors $\omega_{C/S}$ est le faisceau des 1-formes η sur C' régulières sauf pour des pôles simples aux x_i et aux y_i, et telles que $\mathrm{Res}_{x_i}(\eta) + \mathrm{Res}_{y_i}(\eta) = 0$;

c) si $S = \mathrm{Spec}(k)$ et si $\mathcal{F}$ est un faisceau cohérent sur C, alors

$$\mathrm{Hom}(H^1(C, \mathcal{F}), k) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_C}(\mathcal{F}, \omega_{C/S}).$$

Théorème (1.2). — Si $g \geq 2$ et si C est une courbe stable de genre g sur un corps algébriquement clos k, alors $H^1(C, \omega_{C/k}^{\otimes n}) = (0)$ si $n \geq 2$, et $\omega_{C/k}^{\otimes n}$ est très ample si $n \geq 3$.

Preuve. — Comme C est stable, de genre $g \geq 2$, toute composante irréductible E de C vérifie l'une des possibilités suivantes : 1) elle a elle-même un genre (arithmétique) ≥ 2 ; 2) elle a genre 1, mais rencontre d'autres composantes de C en au moins un point ; ou 3) elle est non singulière, rationnelle, et rencontre d'autres composantes de C en au moins trois points. Mais, d'après b) ci-dessus, $\omega_{C/k} \otimes \mathcal{O}_E$ est isomorphe à $\omega_{E/k}(\sum Q_i)$, où les $\{Q_i\}$ sont les points où E rencontre le reste de C. Comme le degré de $\omega_{E/k}$ est $2g_E - 2$, il s'ensuit que dans chacun des cas 1, 2 ou 3, $\omega_{C/k} \otimes \mathcal{O}_E$ a degré positif. Cela montre immédiatement que $\omega_{C/k}$ est ample sur chaque composante E de C, donc est ample.

Ensuite, d'après c) ci-dessus, $H^1(\omega_{C/k}^{\otimes n})$ est dual de $H^0(\omega_{C/k}^{\otimes(1-n)})$. Puisque $\omega_{C/k} \otimes \mathcal{O}_E$ a degré positif, $\omega_{C/k}^{\otimes(1-n)} \otimes \mathcal{O}_E$ n'a de sections pour aucun E et pour aucun $n \geq 2$; donc $H^0(\omega_{C/k}^{\otimes(1-n)}) = (0)$ si $n \geq 2$, et ainsi $H^1(\omega_{C/k}^{\otimes n}) = (0)$ si $n \geq 2$.

Pour prouver qu'un faisceau inversible $\mathcal{L}$ sur un schéma C, propre sur k, est très ample, il suffit de montrer

a) pour tous points fermés $x \neq y$,

$$H^0(C, \mathcal{L}) \to H^0(C, \mathcal{L} \otimes k(x)) \oplus H^0(C, \mathcal{L} \otimes k(y))$$

est surjectif,

b) pour tout point fermé x,

$$H^0(C, \mathcal{L}) \to H^0(C, \mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_x/\mathfrak{m}_x^2)$$

est surjectif.

En utilisant la suite exacte de cohomologie, ces deux assertions suivent de $H^1(C, \mathfrak{m}_x \cdot \mathfrak{m}_y \cdot \mathcal{L}) = (0)$ pour tous points fermés $x, y \in C$. Dans notre cas, $\mathcal{L} = \omega_C^{\otimes n}$, $n \geq 3$; en utilisant la dualité, il nous faut donc montrer :

$$(*) \qquad \mathrm{Hom}(\mathfrak{m}_x \cdot \mathfrak{m}_y, \omega_C^{\otimes -n}) = (0), \qquad \text{si } n \geq 2.$$

Note sur la source. La formule imprimée porte $\omega_X^{\otimes -n}$; tout l'argument environnant concerne C, de sorte que le terme requis $\omega_C^{\otimes -n}$ est conservé ici. Si x est un point non singulier, $\mathfrak{m}_x$ est un faisceau inversible. Si x est un point

double, soit $\pi : C' \to C$ le résultat de l'éclatement de x, et soient $x_1, x_2 \in C'$ les deux points de $\pi^{-1}(x)$. Il est alors facile de vérifier que, pour tout faisceau inversible $\mathcal{L}$ sur C,

$$\mathrm{Hom}(\mathfrak{m}_x, \mathcal{L}) \cong H^0(C', \pi^*\mathcal{L}),$$

$$\mathrm{Hom}(\mathfrak{m}_x^2, \mathcal{L}) \cong H^0(C', \pi^*\mathcal{L}(x_1 + x_2)).$$

Nous avons donc 3 cas de (*) à vérifier :

Cas 1. — x, y sont des points non singuliers de C ; alors

$$H^0(\omega_C^{-n}(x+y)) = (0), \qquad \text{si } n \geq 2.$$

Cas 2. — x est un point double de C, $\pi : C' \to C$ l'éclatement de x, $\{x_1, x_2\} = \pi^{-1}(x)$, et y un point non singulier de C. Alors

$$H^0(\pi^*(\omega_C)^{-n}(y)) = (0), \qquad H^0(\pi^*(\omega_C)^{-1}(x_1 + x_2)) = (0), \qquad \text{si } n \geq 2.$$

Cas 3. — x, y sont des points doubles de C, $\pi : C' \to C$ l'éclatement de x et de y. Alors

$$H^0(\pi^*(\omega_C)^{-n}) = (0) \qquad \text{si } n \geq 2.$$

Comme le degré de ω_C^{-n} $(n \geq 2)$ sur toutes les composantes E de C est inférieur ou égal à -2, tout cela est clair sauf dans les cas où $n = 2$, où le degré de ω_C sur une certaine E est 1, et où deux pôles sont autorisés sur E. Cela se produit si :

(i) cas 1, $p_a(E) = 1$, E rencontre $C - E$ en un seul point, $x, y \in E$;

(ii) cas 1, $p_a(E) = 0$, E rencontre $C - E$ en seulement trois points, $x, y \in E$;

(iii) cas 2, E est une courbe rationnelle ayant un point double et rencontrant $C - E$ en un point, $x =$ point double de E.

Mais, dans tous ces cas, C a des composantes autres que E, et une section dans le H^0 considéré doit certainement s'annuler sur toutes ces autres composantes. Ainsi, aux points où E rencontre $C - E$, la section a des zéros supplémentaires. Puisque le faisceau considéré a degré 0 sur E, la section est également nulle sur E. C.Q.F.D.

Corollaire. — *Soit $\pi : C \to S$ une courbe stable quelconque de genre $g \geq 2$. Alors $\omega_{C/S}^{\otimes n}$ est relativement très ample si $n \geq 3$, et $\pi_*(\omega_{C/S}^{\otimes n})$ est un faisceau localement libre sur S de rang $(2n-1)(g-1)$.*

Preuve. — En effet, comme pour tout $s \in S$ on a $H^1(\omega_{C/S}^{\otimes n} \otimes \mathcal{O}_{C_s}) = (0)$, il résulte de [EGA, chap. 3, § 7] que $\pi_*(\omega_{C/S}^{\otimes n})$ est localement libre et que $\pi_*(\omega_{C/S}^{\otimes n}) \otimes k(s) \cong H^0(\omega_{C/S}^{\otimes n} \otimes \mathcal{O}_{C_s})$. Le corollaire en résulte. C.Q.F.D.

En prenant $n = 3$, il s'ensuit que toute courbe stable C/S peut être réalisée comme une famille de courbes dans $\mathbf{P}^{5g-6}$ de polynôme de Hilbert :

$$P_g(n) = (6n-1)(g-1).$$

En suivant des arguments standard ([M_1], p. 99), il est facile de prouver qu'il existe un sous-schéma

$$H_g \subset \mathrm{Hilb}^{P_g}_{\mathbf{P}^{5g-6}}$$

des courbes stables tricanoniquement plongées « toutes » entières. (Hilb est le schéma de Hilbert sur $\mathbb{Z}$.) Plus précisément, il existe un isomorphisme de foncteurs :

$$\mathrm{Hom}(S, H_g) \cong \left\{ \begin{array}{l} \text{ensemble des courbes stables } \pi : C \to S, \text{ avec des isomorphismes :} \\ \mathbf{P}(\pi_*(\omega_{C/S}^{\otimes 3})) \cong \mathbf{P}^{5g-6} \times S\,, \quad \text{(modulo isomorphisme).} \end{array} \right.$$

Nous noterons $Z_g \subset H_g \times \mathbf{P}^{5g-6}$ la courbe stable universelle tricanoniquement plongée. Le foncteur des courbes stables lui-même est la faisceautisation du quotient de foncteurs :

$$H_g / \mathrm{PGL}(5g-6).$$

Nous considérons maintenant la théorie des déformations des courbes stables. Soit k un corps de base quelconque. La théorie des déformations des X lisses sur k se trouve dans [SGA, 60–61] ; pour les S singuliers, la théorie a été mise au point dans [Sc]. Nous indiquerons ici les résultats de cette théorie pour un schéma X qui est

(i) de dimension 1 ;

(ii) génériquement lisse sur k ;

(iii) localement une intersection complète.

Les avantages de ce cas sont doubles : d'abord, le « complexe cotangent » de Grothendieck, Lichtenbaum et Schlessinger se réduit, vu (ii) et (iii), au faisceau cohérent unique $\Omega_{X/k}$, les différentielles de Kähler. Ensuite, on a :

Lemme (1.3). — $\mathrm{Ext}^2(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = (0)$.

Preuve. — On utilise la suite spectrale :

$$H^p(X, \mathcal{E}xt^q(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)) \Rightarrow \mathrm{Ext}^{p+q}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X).$$

Alors (i) $H^2(X, \mathcal{E}xt^0) = (0)$ puisque $\dim X = 1$. (ii) Comme $\Omega_{X/k}$ est localement libre sauf en un nombre fini de points, $\mathcal{E}xt^1(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ a un support de dimension 0, donc $H^1(X, \mathcal{E}xt^1) = (0)$. (iii) Localement, si l'on plonge $X \subset \mathbf{A}^n$, alors $\Omega_{X/k}$ admet une résolution libre de longueur 2 :

$$0 \to \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega_{\mathbf{A}^n} \otimes \mathcal{O}_X \to \Omega_{X/k} \to 0$$

où $\mathcal{I}$ = faisceau d'idéaux définissant X. Par conséquent $\mathcal{E}xt^2 = (0)$. C.Q.F.D.

Dans la théorie de Schlessinger, la signification du lemme (1.3) est que toutes les obstructions s'annulent ; autrement dit, les déformations de X sur des schémas de base $\mathrm{Spec}(A/\mathcal{J})$ (A = anneau d'Artin local de corps résiduel k) peuvent toujours être plongées dans des déformations sur $\mathrm{Spec}(A)$. En outre, la théorie affirme qu'il y a une correspondance canonique biunivoque entre $\mathrm{Ext}^1(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ et les déformations du premier ordre de X, c'est-à-dire les morphismes propres et plats p, avec des isomorphismes α comme suit :

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \supset & X_1 \times_{\mathrm{Spec}\, k[\varepsilon]} \mathrm{Spec}\, k & \xrightarrow{\sim_\alpha} & X \\ \downarrow p & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}\, k[\varepsilon]/\varepsilon^2 & \supset & \mathrm{Spec}\, k & = & \mathrm{Spec}\, k. \end{array}$$

Puisque les obstructions s'annulent, il existe une déformation formelle verselle $\mathfrak{X}$ de X sur le schéma de base

$$\mathfrak{M} = \mathrm{Spec}\, o_k[[t_1, \ldots, t_N]],$$

où $o_k = k$ si la caractéristique est 0, ou bien o_k est l'anneau local régulier complet, d'idéal maximal $p \cdot o_k$ et de corps résiduel k, si $\mathrm{char}(k) = p$, unique (par le théorème de structure de Cohen), et

$$N = \dim_k \mathrm{Ext}^1(\Omega_X, \mathcal{O}_C).$$

Cela signifie que $\mathfrak{X}$ est un schéma formel, propre et plat sur $\mathcal{M}$, de fibre X au-dessus de $\mathrm{Spec}(k)$, et qu'il satisfait aux deux propriétés suivantes :

a) Toute déformation de X est induite par $\mathfrak{X}$, c'est-à-dire que si A est une o_k-algèbre artinienne locale, de corps résiduel k, et si $p : Y \to \mathrm{Spec}(A)$ est propre et plat, de fibre X au-dessus de $\mathrm{Spec}(k)$, alors il existe un diagramme commutatif :



b) Si $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, le morphisme f ci-dessus est déterminé uniquement par le diagramme.

Il s'ensuit que l'espace tangent à $\mathcal{M} \times_{o_k} k$ en son point fermé est canoniquement isomorphe à $\mathrm{Ext}^1(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$.

Dans le cas où $\mathrm{Ext}^0(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = (0)$, $\mathfrak{X}/\mathcal{M}$ est, en fait, *universel* : c'est-à-dire que, dans la propriété a), f est toujours unique, ce qui signifie que le foncteur représenté par $\mathcal{M}$ dans la catégorie des o_k-algèbres artiniennes locales est isomorphe au foncteur des déformations Y/A de X. C'est heureusement le cas pour les courbes stables :

Lemme (1.4). — Si X est une courbe stable, $\mathrm{Ext}^0(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = (0)$.

Démonstration. — Nous pouvons supposer que k est algébriquement clos. Un homomorphisme de Ω_X vers $\mathcal{O}_X$ est alors donné par un champ de vecteurs partout régulier D sur X. Un tel champ de vecteurs est donné, à son tour, par un champ de vecteurs régulier D' sur la normalisation X' de X, qui s'annule en tous les points de X' situés au-dessus des points doubles de X. En particulier, D', et donc D, s'annule identiquement sur toutes les composantes E de X dont la normalisation E' est de genre ≥ 2. Il reste les possibilités suivantes pour E :



E rationnelle non singulière



E' rationnelle, E un point double

E' rationnelle, $E \geq 2$ points doubles

E elliptique non singulière

E' elliptique, $E \geq 1$ points doubles

Dans tous les cas où E' est rationnelle, remarquons que D' doit avoir au moins 3 zéros ; et lorsque E' est elliptique, D' doit avoir au moins un zéro. Ainsi D' s'annule sur toutes les composantes E'. Cela prouve que $\mathrm{Ext}^0(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = (0)$. Q.E.D.

La théorie de Schlessinger permet aussi de suivre ce qui arrive aux singularités de X dans cette déformation $\mathcal{M}$. Pour chaque point fermé $x \in X$, il étudie les déformations du seul anneau local complet $\widehat{\mathcal{O}}_{x,X}$, c'est-à-dire les A-algèbres plates $\mathcal{O}$ munies d'isomorphismes :

$$\mathcal{O} \otimes_A k \simeq \widehat{\mathcal{O}}_{x,X}.$$

C'est un foncteur de A, exactement comme auparavant. Comme $\mathrm{Ext}^2_{\widehat{\mathcal{O}}_x}(\widehat{\Omega}_{x/k}, \widehat{\mathcal{O}}_x) = (0)$, il n'y a pas d'obstruction au prolongement des déformations. Les déformations du premier ordre, avec $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, sont classifiées par $\mathrm{Ext}^1_{\widehat{\mathcal{O}}_x}(\widehat{\Omega}_{x/k}, \widehat{\mathcal{O}}_x)$. Il existe en outre une déformation formelle verselle $\widehat{\mathcal{O}}$, qui est un anneau local complet et une $o_k[[t_1, \ldots, t_N]]$-algèbre plate, $N = \dim_k \mathrm{Ext}^1_{\widehat{\mathcal{O}}_x}(\widehat{\Omega}_{x/k}, \widehat{\mathcal{O}}_x)$, telle que

$$\widehat{\mathcal{O}}/(p, t_1, \ldots, t_N) = \widehat{\mathcal{O}}_{x,X}.$$

Lorsque X est lisse sur k en x, on a $N = 0$, et la théorie est sans intérêt. Le premier exemple non trivial est celui d'un point double ordinaire k-rationnel, à tangentes k-rationnelles :

$$\widehat{\mathcal{O}}_{x,X} \simeq k[[u, v]]/(u \cdot v).$$

Alors $N = 1$, et

$$\widehat{\mathcal{O}} \simeq o_k[[u, v, t_1]]/(uv - t_1).$$

Autrement dit, si $\mathcal{O}$ est une déformation quelconque de $\widehat{\mathcal{O}}_{x,X}$ et si u, v sont relevés convenablement dans $\mathcal{O}$, alors $u \cdot v = w \in A$ et $\mathcal{O}$ est induit par $\widehat{\mathcal{O}}$ au moyen de l'homomorphisme $o_k[[t_1]] \to A$ qui envoie t_1 sur w. C'est facile à démontrer.

Enfin, la théorie de Schlessinger relie les déformations globales aux déformations locales. Soit $\mathfrak{X}/\mathcal{M}_{gl}$, avec $\mathcal{M}_{gl} = \mathrm{Spec}(A)$, la déformation globale verselle ; soient $x_1, \ldots, x_k \in X$ les points où X n'est pas lisse sur k, et soit $\widehat{\mathcal{O}}_i$, comme A_i-algèbre, la déformation verselle de l'anneau local $\widehat{\mathcal{O}}_{x_i,X}$. Posons $\mathcal{M}_{lo} = \mathrm{Spec}(A_1 \widehat{\otimes}_{o_k} \cdots \widehat{\otimes}_{o_k} A_k)$. Nous pouvons alors considérer les anneaux locaux

$$\widehat{\mathcal{O}}_{x_i,\mathfrak{X}}$$

de $\mathfrak{X}$ en x_i. Il existe des o_k-homomorphismes $\varphi_i : A_i \to A$ tels que $\widehat{\mathcal{O}}_{x_i,\mathfrak{X}} \simeq \widehat{\mathcal{O}}_i \otimes_{A_i} A$. En dualisant, on obtient un morphisme

$$\Phi = \prod_i \mathrm{Spec}(\varphi_i) : \mathcal{M}_{gl} \to \mathcal{M}_{lo}$$

qui décrit exactement comment les diverses singularités de X se comportent dans la déformation verselle $\mathfrak{X}$. Le dernier fait dont nous avons besoin est le suivant :

Proposition (1.5). — $\Phi : \mathcal{M}_{gl} \to \mathcal{M}_{lo}$ *est formellement lisse, c'est-à-dire qu'il existe des isomorphismes*

$$\mathcal{M}_{gl} \simeq \operatorname{Spec} o_k[[t_1, \ldots, t_{N+M}]], \qquad \mathcal{M}_{lo} \simeq \operatorname{Spec} o_k[[t_1, \ldots, t_N]]$$

tels que $\Phi^*(t_i) = t_i$, $1 \leq i \leq N$.

Démonstration. — Vu la signification fonctorielle de $\mathcal{M}_{gl}$ et de $\mathcal{M}_{lo}$, il suffit de montrer que l'application naturelle

$$(*) \qquad \operatorname{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \prod_{i=1}^{k} \operatorname{Ext}^1_{\widehat{\mathcal{O}}_{x_i}}(\widehat{\Omega}_{x_i}, \widehat{\mathcal{O}}_{x_i})$$

est surjective ; $(*)$ est l'application induite $d\Phi$ sur les espaces tangents à $\mathcal{M}_{gl}$ et $\mathcal{M}_{lo}$. Comme Ω_X est un $\mathcal{O}_X$-module inversible en dehors des x_i, il s'ensuit que

$$\begin{aligned} \prod_{i=1}^{k} \operatorname{Ext}^1_{\widehat{\mathcal{O}}_{x_i}}(\widehat{\Omega}_{x_i}, \widehat{\mathcal{O}}_{x_i}) &\simeq \prod_{i=1}^{k} \operatorname{Ext}^1_{\mathcal{O}_{x_i}}(\Omega_{x_i}, \mathcal{O}_{x_i}) \\ &\simeq H^0\big(X, \mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_X}(\Omega_X, \mathcal{O}_X)\big). \end{aligned}$$

Par conséquent, $(*)$ est surjective par la suite spectrale utilisée dans le Lemme (1.3) et par le fait que $H^2(X, \mathcal{E}xt^0(\Omega_X, \mathcal{O}_X)) = (0)$. Q.E.D.

En particulier, supposons que C soit une courbe stable sur un corps de base algébriquement clos k, et soient $x_1, \ldots, x_k$ les points doubles de C. Posons $N = \dim \operatorname{Ext}^1(\Omega_X, \mathcal{O}_X)$. Alors C possède une déformation formelle universelle $\mathcal{C}/\mathcal{M}$, où $\mathcal{M} = \operatorname{Spec} o_k[[t_1, \ldots, t_N]]$. Notons que, dans ce cas, comme le faisceau inversible $\omega_{\mathcal{C}/\mathcal{M}}$ est relativement ample, $\mathcal{C}$ n'est pas seulement un schéma formel sur $\mathcal{M}$, mais aussi le complété formel d'un unique schéma propre et plat sur $\mathcal{M}$, que nous noterons encore $\mathcal{C}$. $\mathcal{C}$ est clairement une courbe stable sur $\mathcal{M}$. Chaque point double x_i possède maintenant un seul module (cf. notre exemple ci-dessus), de sorte que l'espace de déformation verselle des anneaux $\mathcal{O}_{x_i,C}$ est $o_k[[t'_1, \ldots, t'_k]]$. Par la Proposition (1.5), nous pouvons identifier t_i à t'_i, et nous concluons que, pour des u_i, v_i convenables,

$$\widehat{\mathcal{O}}_{x_i,\mathcal{C}} \simeq o_k[[u_i, v_i, t_1, \ldots, t_N]]/(u_i v_i - t_i).$$

En particulier, $t_i = 0$ est le lieu dans $\mathcal{M}$ où « x_i reste un point double ».

La relation entre l'espace de modules formel $\mathcal{M}$ de C et la structure locale de H_g en un point x avec $\kappa(x) = k$, correspondant à un certain modèle tricanonique de C, est exactement la même que dans le cas des courbes non singulières ([M$_1$], chap. 5, § 2). Soit $\widehat{\mathcal{O}}_x$ le complété de l'anneau local $\mathcal{O}_{x,H_g}$, et posons $T = \operatorname{Spec}(\widehat{\mathcal{O}}_x)$. Notons encore par x le point fermé de T. La famille universelle de courbes stables $Z_g \subset H_g \times \mathbf{P}^{5g-6}$ induit une famille $Z' \subset T \times \mathbf{P}^{5g-6}$, dont la fibre Z'_x au-dessus de x est C. Il existe alors un unique morphisme $f : T \to \mathcal{M}$ tel que $Z' \simeq \mathcal{C} \times_{\mathcal{M}} T$, cet isomorphisme se restreignant à l'identité sur les fibres au-dessus de x, qui sont toutes deux C. J'affirme que, via f, T est formellement lisse sur $\mathcal{M}$, c'est-à-dire que $\widehat{\mathcal{O}}_x \simeq o_k[[t_1, \ldots, t_N, t_{N+1}, \ldots, t_m]]$. En effet, en choisissant un isomorphisme $\mathbf{P}(\pi_*(\omega^{\otimes 3}_{\mathcal{C}/\mathcal{M}})) \simeq \mathbf{P}^{5g-6} \times \mathcal{M}$, on obtient un plongement tricanonique $\mathcal{C} \subset \mathbf{P}^{5g-6} \times \mathcal{M}$ de $\mathcal{C}$, donc un morphisme $s : \mathcal{M} \to H_g$ tel que $\mathcal{C}$, muni de ce plongement, soit l'image réciproque de Z_g. Alors s se factorise par T et $s : \mathcal{M} \to T$ est une section de f. D'autre part, considérons l'action de $\mathrm{PGL}(5g-6)$ sur H_g. Soit S_x le stabilisateur du point k-valué x. Alors S_x est fini et réduit. En effet, sinon, S_x aurait un espace tangent non trivial à l'origine, c'est-à-dire qu'il y aurait un point à valeurs dans $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ de $\mathrm{PGL}(5g-6)$, centré en l'identité, qui envoie dans elle-même la courbe stable plongée $C \subset \mathbf{P}^{5g-6}$ correspondant à x. Mais cette action est donnée par une dérivation partout régulière sur C, et nous avons

vu que toutes celles-ci s'annulent. Cela signifie que cet automorphisme à valeurs dans $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ est l'identité en tous les points de C et, puisque C est connexe et engendre $\mathbf{P}^{5g-6}$, l'automorphisme est l'identité partout. Ainsi S_x est fini et réduit. Il s'ensuit que l'action de $\mathrm{PGL}(5g-6)$ sur T est formellement libre, et donc que T est formellement un fibré principal sur $\mathcal{M}$ de groupe $\mathrm{PGL}(5g-6)$. Par conséquent T est formellement lisse sur $\mathcal{M}$, comme voulu.

En réunissant cela avec ce que nous savons de $\mathcal{M}$, nous obtenons :

Soit k un corps algébriquement clos quelconque,
soient $H'_g = H_g \times \operatorname{Spec}(o_k)$ et $Z'_g = Z_g \times \operatorname{Spec}(o_k)$,

soit $x \in H'_g$ un point fermé,
soit $C \subset Z'_g$ la courbe stable au-dessus de x,
soient $x_1, \ldots, x_k \in C$ ses points doubles.

Alors

Théorème (1.6). — Il existe des isomorphismes

$$\widehat{\mathcal{O}}_{x,H'_g} \simeq o_k[[t_1, \ldots, t_N]],$$

$$\widehat{\mathcal{O}}_{x_i,Z'_g} \simeq o_k[[u_i, v_i, t_1, \ldots, t_N]]/(u_i v_i - t_i).$$

Corollaire (1.7). — H_g est lisse sur $\mathbb{Z}$. En particulier, pour tout corps algébriquement clos k, $H_g \times \mathrm{Spec}(k)$ est une réunion disjointe d'un nombre fini de variétés algébriques non singulières sur k.

Posons

$$H_g^0 = \{x \in H_g \mid \text{la courbe stable correspondante } (Z_g)_x \text{ est non singulière}\},$$
$$S = \{x \in Z_g \mid \text{la projection } \pi : Z_g \to H_g \text{ n'est pas lisse en } x\}.$$

Définition (1.8). — Soit $p : X \to Y$ un morphisme lisse de type fini, avec Y schéma noethérien, et soit $D \subset X$ un diviseur de Cartier relatif. On dit que D est à croisements normaux relativement à Y si, pour tout $x \in D$, l'équation locale $d = 0$ de D se décompose dans le complété strict[3] *$\widetilde{\mathcal{O}}_{x,X}$ de $\mathcal{O}_{x,X}$ sous la forme $d = d_1 \cdots d_k$, où $d_1, \ldots, d_k$ sont linéairement indépendants dans*

$$\widetilde{\mathfrak{m}}_{x,X}/\big(\widetilde{\mathfrak{m}}_{x,X}^2 + \mathfrak{m}_{y,Y}\widetilde{\mathcal{O}}_{x,X}\big),$$

avec $y = p(x)$.

Corollaire (1.9). — $H_g^0 = H_g - S^*$, où S^* est un diviseur à croisements normaux relativement à $\mathbb{Z}$. Z_g et S sont lisses sur $\mathbb{Z}$, et la projection $p : S \to S^*$ est finie et est un isomorphisme en tous les points où S^* est lisse sur $\mathbb{Z}$, c'est-à-dire que S est la normalisation de S^*.

Démonstration. — Avec les notations du Théorème (1.6), S^* est défini dans $\widehat{\mathcal{O}}_{x,H'_g}$ par l'équation locale $t_1 \cdots t_k = 0$. Et

$$\widehat{\mathcal{O}}_{x_i,Z'_g} \simeq o_k[[u_i, v_i, t_1, \ldots, t_{i-1}, t_{i+1}, \ldots, t_N]],$$

$$\widehat{\mathcal{O}}_{x_i,S} \simeq \widehat{\mathcal{O}}_{x_i,Z'_g}/(u_i, v_i) \simeq o_k[[t_1, \ldots, t_{i-1}, t_{i+1}, \ldots, t_N]].$$

Q.E.D.

Passons maintenant aux isomorphismes et aux automorphismes des courbes stables. Supposons que $p : X \to S$ et $q : Y \to S$ soient deux courbes stables :

Définition (1.10). — $\underline{\mathrm{Isom}}_S(X, Y)$ est le foncteur sur (Sch/S) qui associe à chaque S-schéma S' l'ensemble des S'-isomorphismes entre $X \times_S S'$ et $Y \times_S S'$. Si $X = Y$, on note $\underline{\mathrm{Aut}}_S(X)$ le foncteur $\underline{\mathrm{Isom}}_S(X, X)$.

Comme X et Y portent respectivement les polarisations canoniques $\omega_{X/S}$ et $\omega_{Y/S}$, tout isomorphisme $f : X \to Y$ doit satisfaire $f^*(\omega_{Y/S}) \simeq \omega_{X/S}$. Par conséquent, par les résultats de Grothendieck sur la représentabilité du schéma de Hilbert et des foncteurs apparentés [Gr$_1$], on conclut que $\underline{\mathrm{Isom}}_S(X, Y)$ est représenté par un schéma $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$, quasi-projectif sur S. À propos de ce schéma, nous avons :

Théorème (1.11). — $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$ est fini et non ramifié sur S.

Démonstration. — Pour vérifier que $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$ est non ramifié, nous pouvons prendre pour S le spectre d'un corps algébriquement clos k ; alors $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$ est soit vide, soit isomorphe à $\mathrm{Aut}_k(X)$. Un point de $\mathrm{Aut}_k(X)$ à valeurs dans $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ et d'image l'identité s'identifie à un champ de vecteurs sur X. Par le Lemme (1.4), les courbes stables n'ont pas de champs de vecteurs non nuls. Cela prouve que $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$ est non ramifié sur S ; comme il est aussi de type fini sur S, il est quasi-fini sur S. Il reste à vérifier que $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$ est propre sur S.

Localement sur S, X et Y sont les images réciproques de la courbe stable universelle tricanoniquement plongée par certains morphismes de S vers H_g ; il suffit donc de prouver la propreté de $\mathrm{Isom}_S(X, Y)$ dans le cas « universel », où $S = H_g \times H_g$, les courbes X et Y étant les deux images réciproques de la courbe universelle sur H_g. Dans

3. L'anneau local complet, formellement étale sur $\mathcal{O}_{x,X}$, de corps résiduel la clôture séparable de $\mathcal{O}_{x,X}/\mathfrak{m}_{x,X}$.

ce cas, l'ouvert de $\mathrm{Isom}_S(X,Y)$ correspondant aux courbes lisses est dense, de sorte que le Théorème découle du critère valuatif de propreté, qui est vérifié en vertu de :

Lemme (1.12). — Soient X et Y deux courbes stables sur un anneau de valuation discrète R, à corps résiduel algébriquement clos. Désignons par η et s les points générique et fermé de $\mathrm{Spec}(R)$*, et supposons que les fibres génériques X_η et Y_η de X et Y soient lisses. Alors tout isomorphisme φ_η entre X_η et Y_η se prolonge en un isomorphisme φ entre X et Y.*

(A posteriori, il résulte du Théorème (1.11) que le lemme vaut pour tout anneau de valuation R, sans supposer X_η ou Y_η lisse.)

Démonstration. — Une autre façon d'énoncer le lemme est la suivante : si l'on part d'une courbe lisse X_η de genre $g \geq 2$ sur le corps des fractions K de R, il existe, à isomorphisme canonique près, au plus une courbe stable X sur R ayant X_η pour fibre générique. Nous allons le déduire de l'assertion d'unicité analogue pour les modèles minimaux ([L] et [S]) : étant donnée une courbe lisse X_η de genre $g \geq 1$ sur K, il existe, à isomorphisme canonique près, au plus un schéma régulier de dimension 2, $\widetilde{X}$, propre et plat sur R, ayant X_η pour fibre générique, et sans courbes exceptionnelles de première espèce dans $\widetilde{X}_s$.

Soit z un générateur de l'idéal maximal de R et considérons la courbe plane affine C_n sur R donnée par :

$$xy = z^n.$$

Soit $\widetilde{C}_n$ le schéma obtenu de la façon suivante : 1) on éclate l'idéal maximal en l'unique singularité de C_n ; 2) on éclate l'idéal maximal en l'unique singularité du schéma ainsi obtenu..., et ainsi de suite $\left[\frac{n}{2}\right]$ fois. Il est facile de vérifier que $\widetilde{C}_n$ est un schéma régulier dont la fibre spéciale est la même que celle de C_n, sauf que le point singulier y est remplacé par une suite de $n-1$ droites projectives, comme suit :



Supposons maintenant que x soit un point singulier de la courbe stable X sur R. En x, X est formellement isomorphe, comme schéma sur R, à l'un des schémas C_n ; on peut donc éclater X de la même façon que nous avons éclaté C_n. Si l'on procède ainsi pour tous les points singuliers de X, on obtient un schéma régulier $\widetilde{X}$, de fibre générique X_η. De plus, toute composante rationnelle non singulière de $\widetilde{X}_s$ est reliée aux autres composantes irréductibles en au moins deux points ; elle n'est donc pas exceptionnelle de première espèce. Par conséquent $\widetilde{X}$ est le modèle minimal de X_η. Remarquons enfin que C_n est un schéma normal, donc que X l'est aussi ; ainsi X est l'unique schéma normal obtenu à partir de $\widetilde{X}$ en contractant toutes les composantes rationnelles non singulières de $\widetilde{X}_s$ reliées aux autres composantes irréductibles en exactement deux points. Cela prouve que X est essentiellement unique. Q.E.D.

Un autre fait important sur les automorphismes des courbes stables est le suivant :

Théorème (1.13). — Soient k un corps algébriquement clos et X une courbe stable sur k. Soit $\mathrm{Pic}^0(X)$ *le groupe des faisceaux inversibles sur X de degré 0 sur chaque composante. Alors l'application (de groupes ordinaires) :*

$$\mathrm{Aut}_k(X) \longrightarrow \mathrm{Aut}_k(\mathrm{Pic}^0(X))$$

est injective.

Démonstration. — Soit φ un automorphisme de X induisant l'identité sur $\mathrm{Pic}^0 X$.

Lemme (1.14). — Si X est lisse, alors φ est l'identité.

Démonstration. — Sinon, par la formule du point fixe de Lefschetz-Weil, le nombre n de points fixes de φ, comptés avec leurs multiplicités, est

$$n = 1 - \mathrm{Tr}(\varphi, T_l(\mathrm{Pic}^0(X))) + 1 = 2 - 2g < 0,$$

ce qui est absurde. Q.E.D.

Lemme (1.15). — Si X est irréductible, alors φ est l'identité.

Démonstration. — Soit φ' l'action de φ sur la normalisation X' de X. Chaque point singulier de X, muni d'un ordre sur ses deux images inverses dans X', définit un morphisme distinct de $\mathbb{G}_m$ vers $\mathrm{Pic}^0(X)$; ainsi l'image inverse S du lieu singulier de X est fixée point par point par φ'. On a alors l'une des possibilités suivantes :

a) genre$(X') \geq 2$: on conclut par le Lemme (1.14) ;

b) genre$(X') = 1$, $|S| \geq 2$: alors φ' est une translation de X' qui fixe un point, et donc φ' est l'identité ;

c) X' est la droite projective, $|S| \geq 4$, et φ' est une projectivité qui fixe plus de trois points ; c'est donc l'identité. Q.E.D.

Soit Γ le graphe (non orienté) suivant :

(i) l'ensemble des sommets de Γ est l'ensemble Γ^0 des composantes irréductibles de X ;

(ii) l'ensemble des arêtes de Γ est l'ensemble Γ^1 des points singuliers de X qui appartiennent à deux composantes irréductibles distinctes ;

(iii) une arête $x \in \Gamma^1$ a pour extrémités les composantes irréductibles auxquelles x appartient.

Lemme (1.16). — Si φ induit l'identité sur Γ, alors φ est l'identité.

Démonstration. — Si X_1 est une composante irréductible de X, alors $\varphi(X_1) = X_1$ et φ fixe les points d'intersection de X_1 avec les autres composantes. De plus, $\mathrm{Pic}^0(X)$ se surjecte sur $\mathrm{Pic}^0(X_1)$, de sorte que φ agit trivialement sur $\mathrm{Pic}^0(X_1)$. On est dans l'un des cas suivants :

a) genre$(X_1) \geq 2$ et $\varphi|X_1$ est l'identité par le Lemme (1.15) ;

b) genre$(X_1) = 1$, φ agit par translation et fixe un point, donc est l'identité sur X_1 ;

c) X_1 est la droite projective et φ fixe au moins trois points, donc est l'identité sur X_1. Q.E.D.

Lemme (1.17). — (i) Toute arête de Γ a des extrémités distinctes.

(ii) Tout sommet qui est l'extrémité de 0, 1 ou 2 arêtes est fixé par φ.

(iii) φ agit trivialement sur $H^1(\Gamma, \mathbb{Z})$.

Démonstration. — Il est facile de vérifier que le sous-groupe de $\mathrm{Pic}^0(X)$ correspondant aux faisceaux inversibles dont la restriction à chaque composante irréductible de X est triviale est canoniquement isomorphe à

$$H^1(\Gamma, \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{G}_m.$$

Cela implique (iii), et (i) est trivial.

Le morphisme de $\mathrm{Pic}^0(X)$ vers le produit $\prod_i \mathrm{Pic}^0(X_i)$, étendu aux composantes irréductibles de X, est surjectif ; ainsi, si $\mathrm{Pic}^0(X_i) \neq \{e\}$, alors $\varphi(X_i) = X_i$. C'est le cas sauf lorsque X_i est une droite projective reliée aux autres composantes en au moins trois points. Q.E.D.

Nous montrons maintenant que si un automorphisme φ d'un graphe fini Γ possède les propriétés énoncées dans le Lemme (1.17), alors c'est l'identité. On raisonne par récurrence sur la somme du nombre de sommets et du nombre d'arêtes de Γ. Si Γ possède un point isolé x, alors $\varphi(x) = x$; posons donc $\Gamma^* = \Gamma - \{x\}$. Alors φ est l'identité sur Γ^* par récurrence, donc φ est aussi l'identité sur Γ. Si Γ possède une extrémité x, alors $\varphi(x) = x$, et l'on prend de nouveau pour Γ^* le graphe Γ privé de x et de l'arête aboutissant à x. Alors Γ^* possède toutes les propriétés de Γ ; donc φ est l'identité sur Γ^*, et par suite sur Γ. Si Γ possède un sommet x auquel aboutissent seulement deux arêtes, on est dans l'un des deux cas suivants :



Dans le premier cas, $\varphi(y) = y$, et l'on prend pour Γ^* le graphe Γ privé de x, e_1 et e_2. Alors φ est l'identité sur Γ^* et $\varphi(e_i) = e_i$ aussi, car si φ échangeait les e_i, cela contredirait (iii). Dans le second cas, on prend pour Γ^* le graphe Γ privé de x, avec e_1 et e_2 identifiées :



Alors φ est l'identité sur Γ^*, donc aussi sur Γ. Supposons ensuite que Γ ait une arête e d'extrémités x et y telles que $\varphi(x) = x$, $\varphi(y) = y$, $\varphi(e) = e$. Soit Γ^* le graphe Γ privé de e. Alors φ est l'identité sur Γ^*, donc sur Γ. Si aucune de ces réductions n'est possible, on est dans une situation où a) chaque sommet est l'aboutissement d'au

moins trois arêtes, et b) aucune arête n'est laissée fixe. Il est facile de voir que le premier nombre de Betti b_1 de chacune des composantes connexes de Γ est au moins 2. Posons

$$n_0 = \text{nombre de sommets fixes},$$
$$n_1 = \text{nombre d'arêtes renversées par } \varphi.$$

Alors, sauf si $\Gamma = \varnothing$, la formule du point fixe de Lefschetz donne

$$n_0 + n_1 = b_0 - b_1 < 0,$$

ce qui est impossible. Q.E.D.

§2. Dégénérescences de courbes et de leurs jacobiennes.

Nous considérons la situation suivante :

$K =$ un corps discrètement valué;
$R =$ l'anneau des entiers de K, $\quad k = R/\mathfrak{M} =$ le corps résiduel (supposé algébriquement clos);
$S = \mathrm{Spec}(R)$, $\quad \eta$ et s ses points générique et fermé respectivement;
$C =$ une courbe lisse, géométriquement irréductible et propre sur K, de genre $g \geq 2$;
$J =$ la variété jacobienne de C;
$\mathscr{J} =$ le modèle de Néron de J sur R (cf. [N]);
$\mathscr{J}^0 \subset \mathscr{J}$ le sous-schéma en groupes ouvert tel que $\mathscr{J}_s^0 =$ la composante neutre de $\mathscr{J}_s$;
$\mathscr{C} =$ le modèle minimal de C sur R.

Il faut dire un mot de l'existence et de l'unicité de $\mathscr{C}$. Rappelons que $\mathscr{C}$ doit être un schéma régulier, plat et propre sur R, de fibre générique $\mathscr{C}_\eta = C$, tel que, pour tout autre schéma régulier $\mathscr{C}'$, plat sur R, de fibre générique $\mathscr{C}'_\eta = C$, l'application birationnelle $\mathscr{C}' \to \mathscr{C}$ soit un morphisme. Šafarevič dans [Š] et Lichtenbaum dans [L] ont démontré qu'un tel $\mathscr{C}$ (nécessairement unique) existe dès qu'il existe un schéma régulier $\mathscr{C}'$, propre et plat sur R, de fibre générique C. De plus, $\mathscr{C}$ est alors projectif sur R. Pour construire un tel $\mathscr{C}$, procédons ainsi : soit d'abord $\mathscr{C}''$ un schéma quelconque, projectif et plat sur R, de fibre générique C. Soit $\widehat{R}$ le complété de R, et posons

$$\widehat{\mathscr{C}''} = \mathscr{C}'' \times_{\mathrm{Spec}\, R} \mathrm{Spec}\, \widehat{R}.$$

Alors $\widehat{\mathscr{C}''}$ est une surface excellente; donc, par [Ab] et par des résultats non publiés de Hironaka, il existe un faisceau d'idéaux $\widehat{\mathscr{J}}$, à support dans le lieu singulier de $\widehat{\mathscr{C}''}$, tel que l'éclatement de $\widehat{\mathscr{J}}$ conduise à une surface régulière $\widehat{\mathscr{C}'}$. Mais alors

$$\widehat{\mathscr{J}} \supset \mathfrak{M}^n \cdot \mathcal{O}_{\widehat{\mathscr{C}''}}$$

pour un certain n, si bien que $\widehat{\mathscr{J}}$ est induit par un unique faisceau d'idéaux $\mathscr{J} \subset \mathcal{O}_{\mathscr{C}''}$. Soit $\mathscr{C}'$ le schéma obtenu en éclatant $\mathscr{J}$. Alors

$$\widehat{\mathscr{C}'} \simeq \mathscr{C}' \times_{\mathrm{Spec}\, R} \mathrm{Spec}\, \widehat{R},$$

donc $\mathscr{C}'$ est régulier. Il est aussi projectif sur R; il existe donc un $\mathscr{C}$ projectif.

Définition (2.1). — J a réduction stable si $\mathscr{J}_s$ n'a pas de radical unipotent.

Définition (2.2). — C a réduction stable au sens 1 si $\mathscr{C}_s$ est réduite et n'a que des points doubles ordinaires. C a réduction stable au sens 2 s'il existe une courbe stable $\mathscr{C}'$ sur R de fibre générique $\mathscr{C}'_\eta = C$.

Notons que si une telle courbe stable $\mathscr{C}'$ existe, elle est unique par le Théorème (1.11).

Proposition (2.3). — Les deux sens de la réduction stable pour C sont équivalents.

Démonstration. — Supposons qu'une courbe stable $\mathscr{C}'$ existe. En éclatant les singularités de $\mathscr{C}'$ comme dans le Lemme (1.12), on obtient le modèle minimal $\mathscr{C}$ de C, et l'on voit que $\mathscr{C}_s$ est réduite et n'a que des points doubles ordinaires. Réciproquement, supposons que le modèle minimal $\mathscr{C}$ ait cette propriété. Soient $E_1, \ldots, E_n$ les composantes rationnelles non singulières de $\mathscr{C}_s$ qui rencontrent les autres composantes en seulement deux points. Alors les E_i se répartissent en plusieurs chaînes du type :



à moins que toute la fibre ne soit formée de E_i et n'ait le type :



$n \geq 2$
$\mathscr{C}_s$ = boucle des E_i
$(E_i^2)_{\text{sur } \mathscr{C}} = -2$.

Mais dans ce cas genre(C) = genre($\mathscr{C}_s$) = 1, ce qui contredit notre hypothèse. D'après le Théorème (27.1) de Lipman [Li] (qui généralise un résultat d'Artin [A$_2$], valable pour les surfaces de type fini sur un corps), tout ensemble de k courbes rationnelles non singulières, reliées en une chaîne comme ci-dessus sur une surface régulière X, de self-intersection -2 sur X, peut être contracté en un point double rationnel P de type A_k sur une surface normale X_0. En inversant le procédé et en éclatant un point double rationnel de type A_k, on voit facilement que des branches non singulières γ sur X, coupant transversalement seulement la première ou la dernière courbe rationnelle de la chaîne :
Note sur la source. Le texte imprimé porte « self-intersection 2 on X » ; la boucle affichée juste au-dessus et l'argument de contraction imposent la self-intersection -2, conservée ici.



restent des branches non singulières après passage à X_0 ; et si γ_1, γ_2 coupent E_1 ou E_k en des points distincts, elles se coupent transversalement sur X_0. Supposons donc que l'on contracte toutes les chaînes de E_i sur $\mathscr{C}$. Soit $\mathscr{C}'$ la surface normale ainsi obtenue. Alors, si l'une de ces chaînes s'insère dans $\mathscr{C}_s$ comme suit :



alors, sur $\mathscr{C}'_s$, les images de F et G n'ont encore que des points doubles ordinaires ; chacune possède une branche non singulière passant par le point singulier P, et ces branches se coupent transversalement. Par conséquent $\mathscr{C}'$ est une courbe stable sur R. Q.E.D.

Nous sommes maintenant prêts à démontrer le résultat clef dont dépend notre preuve d'irréductibilité :

Théorème (2.4). — J a réduction stable si et seulement si C a réduction stable.
Démonstration. — Le lien entre $\mathscr{C}$ et $\mathscr{J}$ repose sur le résultat suivant de Raynaud [R] :

Théorème (2.5). — Si $\mathscr{C}$ et $\mathscr{J}$ sont comme ci-dessus, et si le plus grand commun diviseur d des multiplicités des composantes de $\mathscr{C}_s$ est 1*, alors $\mathscr{J}^0$ représente le foncteur $\underline{\mathrm{Pic}}^0(\mathscr{C}/S)$.*

(Ce résultat n'est pas énoncé tel quel dans [R]. Il découle ainsi, dans la terminologie de cet article :

a) la condition (N) est vérifiée et $p_*(\mathcal{O}_{\mathscr{C}}) = \mathcal{O}_S$, donc

b) $\mathscr{C}$ est cohomologiquement plate sur S en dimension 0, par le Théorème 4 ;

c) par conséquent $\underline{\mathrm{Pic}}^0$ est représentable et séparé sur S, par le Théorème 3 ;

d) comme $E = \overline{\{0\}}$ et $Q = P/E$, on trouve $P^0 = Q^0$, et comme $\mathscr{C}$ est de dimension 1 sur S, P^0 et Q^0 sont lisses sur S ; donc $R^0 = Q^0$ et $\widetilde{R} = R$.

e) Alors, par le Théorème 5, Pic^0 est la composante neutre du modèle de Néron de $\mathrm{Pic}^0(\mathscr{C}_\eta) = J$.)

Note sur la source. Le texte imprimé porte « in the terminology of is paper » ; la lettre manifestement omise est rétablie dans la traduction par « cet article ».

Supposons d'abord que C ait réduction stable. Alors $\mathscr{C}_s$ est réduite, donc $d = 1$. Par le Théorème (2.5), $\mathscr{J}^0 = \mathrm{Pic}^0(\mathscr{C}/S)$. Par conséquent $\mathscr{J}_s^0 = \mathrm{Pic}^0(\mathscr{C}_s/k)$. Comme $\mathscr{C}_s$ est réduite et n'a que des points doubles ordinaires, sa jacobienne généralisée $\mathrm{Pic}^0(\mathscr{C}_s/k)$ est une extension d'une variété abélienne par un tore ; elle n'a donc pas de radical unipotent. Ainsi J a réduction stable.

La réciproque est plus difficile. Supposons que J ait réduction stable. Nous prouvons d'abord que C a réduction stable sous l'hypothèse supplémentaire que C possède un point rationnel sur K.[4] Dans ce cas, $\mathscr{C}$ possède un point rationnel sur R, et comme $\mathscr{C}$ est régulier, les sections de $\mathscr{C}$ sur R passent par des composantes de $\mathscr{C}_s$ de multiplicité un. Par conséquent $d = 1$, et

le théorème (2.5) s'applique. En particulier, $\mathrm{Pic}^0(\mathscr{C}_s/k) = \mathscr{J}_s^0$, de sorte que $\mathrm{Pic}^0(\mathscr{C}_s/k)$ n'a pas de radical unipotent. Nous appliquons :

Lemme (2.6). — Soit D un schéma complet de dimension 1 sur k, tel que $H^0(\mathcal{O}_D) \simeq k$, et tel que la jacobienne généralisée de D n'ait pas de radical unipotent. Alors

(i) $\chi(\mathcal{O}_D) = \chi(\mathcal{O}_{D_{\mathrm{red}}})$;

(ii) *les singularités de D_{red} sont toutes des croisements transversaux d'un ensemble de branches non singulières (c'est-à-dire analytiquement isomorphes à la réunion des axes de coordonnées dans $\mathbf{A}^n$).*

Démonstration. — Soit $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_D$ l'idéal des éléments nilpotents. En filtrant $\mathcal{J}$ par une chaîne d'idéaux $\mathcal{J}_k$ telle que $\mathcal{J}\mathcal{J}_k \subset \mathcal{J}_{k+1}$, et en utilisant la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{J}_k/\mathcal{J}_{k+1} \xrightarrow{a \mapsto 1+a} (\mathcal{O}_D/\mathcal{J}_{k+1})^* \longrightarrow (\mathcal{O}_D/\mathcal{J}_k)^* \longrightarrow 0,$$

on déduit facilement que $\mathrm{Pic}^0(D/k)$ est une extension de $\mathrm{Pic}^0(D_{\mathrm{red}}/k)$ par un groupe unipotent. Par conséquent, puisque par hypothèse $\mathrm{Pic}^0(D/k)$ n'a pas de sous-groupes unipotents,

$$\mathrm{Pic}^0(D/k) \simeq \mathrm{Pic}^0(D_{\mathrm{red}}/k).$$

Comme $H^1(\mathcal{O}_D)$, respectivement $H^1(\mathcal{O}_{D_{\mathrm{red}}})$, est naturellement isomorphe à l'espace tangent de Zariski de $\mathrm{Pic}^0(D/k)$, respectivement de $\mathrm{Pic}^0(D_{\mathrm{red}}/k)$, il s'ensuit que

$$H^1(\mathcal{O}_D) \simeq H^1(\mathcal{O}_{D_{\mathrm{red}}}),$$

ce qui prouve (i). Soit $\pi : C \to D_{\mathrm{red}}$ la normalisation de D_{red}, et soit D^* l'espace annelé localement qui a D pour espace topologique et dont le faisceau structural est donné par

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_{D^*}) = \{f \in \Gamma(U, \pi_*(\mathcal{O}_C)) \mid x_1, x_2 \in \pi^{-1}(U),\ f(x_1) = f(x_2) \text{ si } \pi(x_1) = \pi(x_2)\}.$$

Il est facile de vérifier que D^* est un schéma de dimension 1 dont les singularités sont toutes des croisements transversaux d'un ensemble de branches non singulières, et que π se factorise :

$$C \xrightarrow{\pi'} D^* \xrightarrow{\pi''} D_{\mathrm{red}}.$$

J'affirme que $\pi'' : D^* \to D_{\mathrm{red}}$ est un isomorphisme. Filtrons $\mathcal{O}_{D^*}/\mathcal{O}_{D_{\mathrm{red}}}$ de façon à obtenir une chaîne de $\mathcal{O}_{D_{\mathrm{red}}}$-algèbres cohérentes

$$\mathcal{O}_{D^*} = \mathcal{O}^{(0)} \supset \mathcal{O}^{(1)} \supset \cdots \supset \mathcal{O}^{(k)} = \mathcal{O}_{D_{\mathrm{red}}},$$

telle que $\ell(\mathcal{O}^{(n)}/\mathcal{O}^{(n+1)}) = 1$. De manière équivalente, cela factorise π'' :

$$D^* = D_0 \longrightarrow D_1 \longrightarrow \cdots \longrightarrow D_k = D_{\mathrm{red}},$$

où $\mathcal{O}^{(n)} \simeq \mathcal{O}_{D_n}$, et toutes les flèches sont des homéomorphismes. Si $\{x_n\} = \mathrm{Supp}(\mathcal{O}^{(n)}/\mathcal{O}^{(n+1)})$, on obtient une suite exacte :

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{D_{n+1}}^* \longrightarrow \mathcal{O}_{D_n}^* \longrightarrow k_{x_n} \longrightarrow 0$$

(k_y désigne le corps résiduel en y, vu comme faisceau sur D), et donc :

$$0 \longrightarrow k \longrightarrow H^1(\mathcal{O}_{D_{n+1}}^*) \longrightarrow H^1(\mathcal{O}_{D_n}^*) \longrightarrow 0.$$

4. C'est en fait le seul cas qui sera nécessaire dans notre application aux questions d'irréductibilité.

Il s'ensuit facilement que $\mathrm{Pic}^0(D_{n+1}/k)$ est une extension de $\mathrm{Pic}^0(D_n/k)$ par G_a. Mais $\mathrm{Pic}^0(D_{\mathrm{red}}/k)$ n'a pas de sous-groupes unipotents, et cela ne peut arriver que si $D_{\mathrm{red}} = D^*$. C.Q.F.D. pour le lemme.

Nous appliquons le lemme à $\mathscr{C}_s$. D'après Lichtenbaum [L] et Šafarevič [Š], il existe un diviseur K sur $\mathscr{C}$ tel que, pour tout diviseur positif D situé au-dessus du point fermé de $\mathrm{Spec}(R)$, on ait :

$$\chi(\mathcal{O}_D) = -\frac{(D \cdot (D+K))}{2}.$$

Note sur la source. La formule imprimée contient le facteur minuscule superflu kK à la place de K. La formule d'adjonction standard, ainsi que toutes ses utilisations immédiatement suivantes, imposent $D+K$, comme ci-dessus.

Soient $E_1, \ldots, E_n$ les composantes de $\mathscr{C}_s$, et $d_1, \ldots, d_n$ leurs multiplicités. La conclusion (i) du lemme implique alors :

$$\Big(\sum_i d_i E_i \cdot (\sum_i d_i E_i + K)\Big) = \Big(\sum_i E_i \cdot (\sum_i E_i + K)\Big).$$

Mais $((\sum_i d_i E_i) \cdot E_k) = 0$, pour tout k, puisque $\sum_i d_i E_i$ est le diviseur d'une fonction $\pi \in R$ si $(\pi) =$ idéal maximal de R. Ainsi :

$$(*) \qquad \Big((\sum_i (d_i - 1)E_i) \cdot K\Big) = \Big(\sum_i E_i \cdot \sum_i E_i\Big).$$

Remarquons qu'au moins un des d_i vaut 1, puisque $\mathscr{C}$ possède une section au-dessus de $\mathrm{Spec}(R)$ et que toute section doit passer par une composante de $\mathscr{C}_s$ de multiplicité 1. De plus la matrice d'intersection $(E_i \cdot E_j)$ est négative semi-définie, avec un sous-espace dégénéré de dimension un engendré par $\sum_i d_i E_i$; ainsi, si un certain $d_i > 1$, on obtient $(\sum_i E_i \cdot \sum_i E_i) < 0$. Donc, d'après $(*)$, on a $(E_{i_0} \cdot K) < 0$ pour un certain i_0. Alors :

Note sur la source. Le texte imprimé dit « negative indefinite » tout en précisant l'existence d'un sous-espace dégénéré de dimension un. La lecture mathématiquement cohérente « négative semi-définie » est donnée ci-dessus.

a) $(E_{i_0} \cdot K) < 0$;

b) $(E_{i_0} \cdot E_{i_0}) < 0$;

c) $(E_{i_0} \cdot (E_{i_0} + K)) = -2\chi(\mathcal{O}_{E_{i_0}}) \geq -2$;

d'où en fait $(E_{i_0} \cdot E_{i_0}) = (E_{i_0} \cdot K) = -1$, si bien que E_{i_0} est une courbe exceptionnelle de première espèce. Cela contredit l'hypothèse selon laquelle, sur $\mathscr{C}$, toutes les courbes possibles ont été contractées. Par conséquent $d_i = 1$ pour tout i.

Cela prouve que $\mathscr{C}_s$ est réduite. Par la conclusion (ii) du lemme, et par le fait que la dimension de son espace tangent de Zariski est partout égale à un ou deux (puisque $\mathscr{C}_s$ est contenue dans la surface régulière $\mathscr{C}$), nous déduisons que $\mathscr{C}_s$ n'a que des points doubles. Cela prouve que C a réduction stable dans le cas où $C(K) \neq \varnothing$.

Dans le cas général, C acquiert un point rationnel dans une extension finie K' de K. Soit S' le spectre de la localisation, en un idéal maximal, de la clôture intégrale de R dans K' ; S' est le spectre d'un anneau de valuation et est fidèlement plat sur S. Posons $S'' = S' \times_S S'$ et notons C' et C'' les images inverses de C sur $S'_\eta = \mathrm{Spec}(K')$ et S''_η, respectivement.

$$\begin{array}{ccccc} C'' & \rightrightarrows & C' & \longrightarrow & C \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S'' & \underset{\mathrm{pr}_2}{\overset{\mathrm{pr}_1}{\rightrightarrows}} & S' & \xrightarrow{\;p\;} & S \end{array}$$

Soit $\overline{C}'$ la courbe stable sur S' ayant C' pour fibre générique. La restriction, C', de $\overline{C}'$ à S'_η porte une donnée de descente relativement à p, c'est-à-dire un isomorphisme φ_η entre les restrictions de $\mathrm{pr}_1^*(\overline{C}')$ et de $\mathrm{pr}_2^*(\overline{C}')$ à S''_η. Il reste seulement à prolonger l'isomorphisme φ_η en un isomorphisme φ entre les $\mathrm{pr}_i^*(\overline{C}')$. Alors φ sera une donnée de descente pour $\overline{C}'$ relativement à p. Comme $\overline{C}'$ est canoniquement polarisée (1.2), cette donnée de descente sera effective et définira donc une courbe stable $\overline{C}$ sur S, de fibre générique C.

Parce que $\mathscr{J}_s^0$ n'a pas de radical unipotent, l'image inverse $p^*\mathscr{J}^0$ de $\mathscr{J}^0$ sur S' est la composante neutre du modèle de Néron de la jacobienne de C'. Ainsi, en posant $q = p \circ \mathrm{pr}_1 = p \circ \mathrm{pr}_2$, on a

$$\mathrm{Pic}^0(\overline{C}'/S') = p^*\mathscr{J}^0,$$

$$\mathrm{Pic}^0(\mathrm{pr}_1^*\overline{C}') = \mathrm{Pic}^0(\mathrm{pr}_2^*\overline{C}') = q^*\mathscr{J}^0.$$

Nous désignons par T le sous-schéma fermé de $\mathrm{Isom}(S'', \mathrm{pr}_1^*(\overline{C}'), \mathrm{pr}_2^*(\overline{C}'))$ correspondant aux isomorphismes qui induisent (via les identifications précédentes) l'identité sur l'image inverse de $\mathscr{J}^0$.

D'après (1.11), T est fini et non ramifié sur S'', et d'après (1.13) T est radiciel sur S''. Nous concluons que le morphisme de T vers S'' identifie T à un sous-schéma fermé X de S''. Comme X contient S''_η, qui est schématiquement dense dans S'', on a $X = S''$, et T « est » la section cherchée φ de $\mathrm{Isom}(S'', \mathrm{pr}_1^*(\overline{C}'), \mathrm{pr}_2^*(\overline{C}'))$ au-dessus de S'', qui prolonge φ_η. C.Q.F.D.

En combinant la proposition (2.3), le théorème (2.4) et le théorème de réduction stable pour les variétés abéliennes cité dans l'introduction, nous obtenons la conséquence la plus importante :

Corollaire (2.7). — Soit R un anneau de valuation discrète de corps des fractions K. Soit C une courbe lisse géométriquement irréductible sur K, de genre $g \geq 2$. Alors il existe une extension algébrique finie L de K et une courbe stable $\mathscr{C}_L$ sur R_L, la clôture intégrale de R dans L, de fibre générique $\mathscr{C}_{L,\eta} = C \times_K L$.

§3. Déduction élémentaire du théorème.

Soit k un corps algébriquement clos de caractéristique $p \neq 0$. Nous utilisons la notation du § 1, sauf que nous désignons maintenant par H_g le produit $H_g \times \mathrm{Spec}(k)$ du précédent H_g avec $\mathrm{Spec}(k)$: c'est une réunion disjointe de variétés non singulières $H_{g,1}, \ldots, H_{g,n}$ sur k, et c'est le sous-schéma de $\mathrm{Hilb}^{P_g}_{\mathbf{P}^{5g-6}/k}$ des courbes stables tricanoniquement plongées. De même, H_g^0 est l'ouvert dense de H_g des courbes non singulières tricanoniquement plongées. D'après les résultats de [M$_1$], on sait qu'un quotient géométrique grossier

$$M_g^0 = H_g^0 / \mathrm{PGL}(5g-6)$$

existe, que c'est une réunion disjointe de variétés normales sur k, et que c'est l'espace de modules grossier des courbes non singulières de genre g. Posons $S^* = H_g - H_g^0$. Alors tout se décompose suivant le même ensemble de composantes.

Posons

$$\begin{aligned} & H_{g,i} && = \text{ composantes de } H_g, \\ \text{alors } & H^0_{g,i} && = H_{g,i} \cap H_g^0 = \text{composantes de } H_g^0, \\ \text{et } & M^0_{g,i} && = H^0_{g,i} / \mathrm{PGL}(5g-6) = \text{composantes de } M_g^0, \\ \text{et } & S^* && = \text{réunion disjointe de } S_1^*, \ldots, S_n^*, \quad S_i^* = H_{g,i} \cap S^*. \end{aligned}$$

Nous voulons prouver que M_g^0, ou de façon équivalente H_g^0, ou de façon équivalente H_g, est irréductible. Nous utiliserons : (i) le fait que ces assertions sont vraies en caractéristique 0 ; (ii) l'hypothèse d'induction selon laquelle elles sont vraies pour les genres plus petits.

Étape I. — Aucune composante de M_g^0 n'est complète (c'est-à-dire propre sur k).

Démonstration. — Nous utilisons ici le résultat en caractéristique 0. D'après [M$_1$], il existe un schéma X, quasi projectif sur $\mathrm{Spec}(W(k))$, où $W(k)$ désigne les vecteurs de Witt, dont la fibre fermée est M_g^0 et dont la fibre générique X_η est l'espace de modules grossier en caractéristique 0 sur le corps des fractions de $W(k)$. En particulier, X_η est connu pour être connexe. Comme X est quasi projectif sur $W(k)$, on peut plonger X comme ouvert dense dans un schéma $\overline{X}$ projectif sur $W(k)$. La fibre $\overline{X}_\eta$ est encore connexe ; donc, par le théorème de connexité d'Enriques-Zariski [EGA 3], la fibre fermée $\overline{X}_0$ de $\overline{X}$ est connexe. Mais si Y était une variété complète qui est une composante de M_g^0, alors : a) Y serait un ouvert de M_g^0, lui-même ouvert de $\overline{X}_0$; et b) puisque Y est propre sur k, Y serait aussi un fermé de $\overline{X}_0$. Par conséquent $Y = \overline{X}_0$, donc M_g^0 serait lui-même irréductible et complet. D'autre part, si A_g est l'espace de modules grossier des variétés abéliennes principalement polarisées de dimension g, l'application qui associe à chaque courbe sa jacobienne définit un morphisme

Note sur la source. Le texte imprimé porte la coquille « principally pclarized » ; la lecture « principally polarized » est rétablie dans le texte anglais et traduite ci-dessus.

$$\theta : M_g^0 \to A_g.$$

Si M_g^0 était complet, l'image de θ serait fermée. Mais il est bien connu que l'adhérence de l'image de θ contient aussi tous les produits de jacobiennes de dimensions inférieures ; elle n'est donc pas fermée. C.Q.F.D.

Étape II. — Aucune composante de H_g n'est entièrement formée de courbes non singulières ; autrement dit $S_i^* \neq \varnothing$ pour tout i.

Démonstration. — Nous combinons ici l'étape I avec le résultat du § 2. Fixons i. Soit $T = \operatorname{Spec} k[[t]]$. Puisque $M^0_{g,i}$ n'est pas complet, il existe un morphisme φ du point générique T_η de T dans $M^0_{g,i}$ qui ne se prolonge pas en un morphisme de T dans $M^0_{g,i}$. Remplaçons maintenant T par sa normalisation T' dans une extension algébrique finie, et soit $\varphi' : T'_\eta \to M^0_{g,i}$ le morphisme induit ; il ne se prolonge toujours pas en un morphisme de T' dans $M^0_{g,i}$. D'après les résultats du § 2, si T' est convenablement choisi, il existe une courbe stable $\pi : C' \to T'$ sur T' dont la fibre générique C'_η est une courbe non singulière correspondant au morphisme $\varphi' : T'_\eta \to M^0_g$ par les propriétés fonctorielles de l'espace de modules. Comme T' est le spectre d'un anneau local, on peut choisir un isomorphisme

$$\mathbf{P}\big(\pi_*(\omega^{\otimes 3}_{C'/T'})\big) \simeq \mathbf{P}^{5g-6} \times T',$$

et obtenir un plongement tricanonique $C' \subset \mathbf{P}^{5g-6} \times T'$. Avec ce plongement, C' est alors induite de la courbe stable universelle tricanoniquement plongée par un morphisme $\psi : T' \to H_g$. Puisque la fibre générique de C' est C'_η, on obtient un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{\psi} & H_g \\ \cup & & \cup \\ T'_\eta & \xrightarrow{\operatorname{res}(\psi)} & H^0_g \\ \varphi' \searrow & & \downarrow \\ & M^0_{g,i} & \subset M^0_g. \end{array}$$

Si $\operatorname{Im}(\psi) \subset H^0_g$, alors φ' se prolongerait en un morphisme de T' vers M^0_g, donc de T' vers $M^0_{g,i}$, contradiction. De plus, $\psi(T_\eta)$ doit être un point de $H^0_{g,i}$, puisque son image dans M^0_g appartient à $M^0_{g,i}$. Par conséquent l'image x du point fermé de T' par ψ appartient à l'adhérence de $H^0_{g,i}$, c'est-à-dire à $H_{g,i}$, mais non à $H^0_{g,i}$ lui-même. C.Q.F.D.

Étape III. — S^* est connexe.
Démonstration. — Cela résultera uniquement de l'hypothèse d'induction d'irréductibilité pour les genres inférieurs. Soit $Z \subset H_g \times \mathbf{P}^{5g-6}$ la courbe stable universelle tricanoniquement plongée. Soit $S \subset Z$ l'ensemble des points où Z n'est pas lisse au-dessus de H_g. Comme nous l'avons prouvé au § 1, S est non singulier et est la normalisation de S^*. En particulier, cela montre que, si $x \in S^*$, la courbe correspondante Z_x possède exactement un point double si et seulement si x est un point non singulier de S^*. Les courbes stables C de genre g ayant exactement un point double sont de l'un des types suivants :

type 0 : C irréductible
la normalisation C' de C est de genre $g-1$;

type k : C a deux composantes non singulières C_1, C_2
$\operatorname{genre}(C_1) = k$
$\operatorname{genre}(C_2) = g-k$.

où $1 \leq k \leq \left[\frac{g}{2}\right]$. Si $0 \leq k \leq \left[\frac{g}{2}\right]$, posons

$$S^*(k) = \{x \in S^* \mid Z_x \text{ a un point double et est de type } k\}.$$

Alors l'ouvert dense de S^* formé de points non singuliers est la réunion disjointe des ouverts $S^*(0), \ldots, S^*(\left[\frac{g}{2}\right])$. Vérifions d'abord :

$(*)$ Chaque ensemble $S^*(k)$ est irréductible.
Démonstration de $(*)$. — Prenons le cas $k = 0$; les cas $1 \leq k \leq \left[\frac{g}{2}\right]$ sont similaires. Soit

$$T = \{\{x_1, x_2\} \mid x_1 \neq x_2 \text{ et } \pi(x_1) = \pi(x_2) \in H^0_{g-1}\} \subset Z_{g-1} \times_{H_{g-1}} Z_{g-1}.$$

T est lisse à fibres irréductibles au-dessus de H^0_{g-1}, donc T est irréductible. Considérons la correspondance reliant $S^*(0)$ et T :

$$W = \left\{ \begin{array}{l} \text{ensemble des paires } x \in S^*(0),\ \{x_1, x_2\} \in T \text{ telles que, si } y = \pi(x_1) = \pi(x_2), \\ \text{il existe un morphisme birationnel } f : (Z_{g-1})_y \to (Z_g)_x \\ \text{tel que } f(x_1) = f(x_2). \end{array} \right.$$

Il est facile de vérifier que W est fermé de Zariski. De plus, pour tout $\{x_1, x_2\} \in T$, $W \cap (S^*(0) \times \{x_1, x_2\})$ est une orbite dans $S^*(0)$ sous $\mathrm{PGL}(5g-6)$; ce sont donc des sous-ensembles non vides, irréductibles et tous de même dimension. Il s'ensuit que W lui-même est irréductible. Mais la projection de W vers $S^*(0)$ est surjective, donc $S^*(0)$ est irréductible. C.Q.F.D. pour $(*)$.

Maintenant, pour tout k, $1 \leq k \leq \left[\frac{g}{2}\right]$, choisissons une courbe stable quelconque $C(k)$ du type :



une composante non singulière $C(k)'$ de genre k,
une composante $C(k)''$ ayant un point double, de normalisation de genre $g-k-1$.

Soit $P(k)$ un point de H_g tel que $Z_{P(k)} \simeq C(k)$. L'étape III sera achevée si nous prouvons :

$(**)$ $P(k)$ appartient à l'adhérence de $S^*(0)$ et à celle de $S^*(k)$; ainsi $S^*(0)$ et $S^*(k)$ appartiennent toutes deux à la même composante topologique de S^*.

Démonstration de $(**)$. — Soit $T = \operatorname{Spec} k[[t]]$. En utilisant le fait que S^* a deux branches passant par $P(k)$, une pour chacun des points doubles de $C(k)$, on voit qu'il existe deux morphismes

$$f_1, f_2 : T \to S^*,$$

$$f_1(T_s) = f_2(T_s) = P(k), \qquad T_s = \text{point fermé de } T,$$





tels que, si $\pi_1 : D_1 \to T$, $\pi_2 : D_2 \to T$ sont les deux courbes stables sur T induites par f_1 et f_2, alors : a) les fibres fermées $D_{1,s}$, $D_{2,s}$ sont $C(k)$; b) il existe des sections $s_1 : T \to D_1$, $s_2 : T \to D_2$ dont les images sont des points non lisses de π_1, π_2, et telles que $s_1(T_s)$ et $s_2(T_s)$ soient respectivement les deux points doubles Q_1 et Q_2 de $C(k)$; c) les fibres génériques $D_{1,\eta}$, $D_{2,\eta}$ n'ont qu'un point double (cf. figure). J'affirme :

A) $D_{1,\eta}$ est de type (k) ;

B) $D_{2,\eta}$ est de type (0).

Pour prouver A), soit D_1' le résultat de l'éclatement du sous-schéma $s_1(T)$ de D_1. Alors D_1' est encore plat et propre sur T, et sa fibre spéciale est la fibre spéciale de D_1 avec Q_1 éclaté (on utilise le fait que formellement en Q_1, D_1 est isomorphe à $k[[t,x,y]]/(xy)$, la section étant donnée par $x = y = 0$). Par conséquent, la fibre spéciale de D_1' est la réunion disjointe de $C(k)'$ et $C(k)''$; ainsi la fibre générale de D_1' est la réunion disjointe de deux courbes irréductibles qui se spécialisent respectivement en $C(k)'$ et $C(k)''$. Puisque $D_{1,\eta}$ n'a qu'un point double, $D_{1,\eta}'$ est non singulière ; donc $D_{1,\eta}'$ est la réunion disjointe de deux courbes irréductibles non singulières qui doivent alors avoir les mêmes genres que $C(k)'$ et $C(k)''$, c'est-à-dire k et $g-k$. Ainsi $D_{1,\eta}$ est de type (k).

Pour prouver B), il suffit de vérifier que $D_{2,\eta}$ est géométriquement irréductible. Sinon, $D_{2,\eta}$ aurait deux composantes se rencontrant au point unique $s_2(T_\eta)$. Comme D_2 est lisse sur T en chaque point générique de sa fibre spéciale, des composantes géométriques distinctes de $D_{2,\eta}$ auraient des spécialisations qui seraient des composantes distinctes de $(D_2)_s$. Alors $(D_2)_s$ aurait deux composantes se rencontrant au point $Q_2 = s_2(T_s)$. C'est faux, donc B) est prouvé.

Par A), $f_1(T_\eta) \in S^*(k)$, donc $P(k) = f_1(T_s)$ appartient à l'adhérence de $S^*(k)$. Par B), $f_2(T_\eta) \in S^*(0)$, donc $P(k) = f_2(T_s)$ appartient aussi à l'adhérence de $S^*(0)$. C.Q.F.D. pour $(**)$.

Cela achève la preuve de l'étape III, puisque toutes les composantes irréductibles de S^* font désormais partie de la même composante topologique. Enfin, les étapes II et III montrent que

a) S^*, étant connexe, est contenu dans une seule composante de H_g ;

b) chaque composante de H_g contient une partie de S^*.

Donc H_g est irréductible, comme il fallait le démontrer.

§4. Quelques résultats sur les champs algébriques.

Les démonstrations des résultats énoncés dans cette section seront données ailleurs.

Soit C une catégorie et soit $p : \mathscr{S} \to C$ une catégorie au-dessus de C. Pour chaque $U \in \mathrm{Ob}\, C$, nous notons $\mathscr{S}_U$ la fibre $p^{-1}(U)$. La catégorie $\mathscr{S}$ est *fibrée en groupoïdes* au-dessus de C si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

a) Pour tout $\varphi : U \to V$ dans C et tout $y \in \mathrm{Ob}\, \mathscr{S}_V$, il existe une flèche $f : x \to y$ dans $\mathscr{S}$ telle que $p(f) = \varphi$.

b) Étant donné un diagramme



dans $\mathscr{S}$, soit



son image dans C. Alors, pour tout $\chi : U \to V$ tel que $\varphi = \psi\chi$, il existe un unique $h : x \to y$ tel que $f = g \cdot h$ et $p(h) = \chi$.

Note sur la source. Le premier diagramme imprimé note Y son objet inférieur gauche ; la notation environnante exige le y retenu ici.

La condition b) implique que la flèche $f : x \to y$ dont l'existence est affirmée en a) est unique à isomorphisme canonique près.

Supposons que, pour chaque $\varphi : U \to V$ dans C et chaque $Y \in \mathrm{Ob}\, \mathscr{S}_V$, une telle flèche $f : x \to y$ ait été choisie. Cet x sera noté $\varphi^* y$. Alors, φ^* « est » un foncteur de $\mathscr{S}_V$ vers $\mathscr{S}_U$; si $\varphi\psi$ est un morphisme composé de C, les foncteurs $(\varphi\psi)^*$ et $\psi^*\varphi^*$ sont canoniquement isomorphes.

Nous proposons le terme anglais “stack” pour le mot français “champ” de la cohomologie non abélienne (Giraud [G]).

Définition (4.1). — Soit C une catégorie munie d'une topologie de Grothendieck. Nous supposons que les produits et les produits fibrés existent dans C. Un champ en groupoïdes au-dessus de C est une catégorie au-dessus de C, $p : \mathscr{S} \to C$, telle que :

(i) *$\mathscr{S}$ est fibrée en groupoïdes au-dessus de C.*

(ii) *Pour tout $U \in \mathrm{Ob}\, C$ et tous objets x, y de $\mathscr{S}_U$, le foncteur de C/U vers (ensembles), qui à $\varphi : V \to U$ associe $\mathrm{Hom}_{\mathscr{S}_V}(\varphi^* x, \varphi^* y)$, est un faisceau.*

(iii) *Si $\varphi_i : V_i \to U$ est une famille couvrante dans C, toute donnée de descente relativement aux φ_i, pour des objets de $\mathscr{S}$, est effective.*

Pour chaque $x \in \mathrm{Ob}\, \mathscr{S}_U$, on a des isomorphismes entre les images inverses de $x_i = \varphi_i^* x$ et $x_j = \varphi_j^* x$ sur $V_{ij} = V_i \times_U V_j$, et les images inverses de ces isomorphismes sur $V_{ijk} = V_i \times_U V_j \times_U V_k$ satisfont une condition de “cocycle”. Dans (iii), on exige réciproquement que toute telle “donnée de descente” soit définie par un certain $x \in \mathscr{S}_U$.

Dans ce qui suit, par souci de brièveté, nous utiliserons “champ” pour signifier “champ en groupoïdes”.

Si $U \in \mathrm{Ob}\, C$ et si $\mathscr{S}$ est un champ au-dessus de C, la fibre $\mathscr{S}_U$ sera appelée la catégorie des sections de $\mathscr{S}$ au-dessus de U.

Soit C comme en (4.1). Les champs au-dessus de C sont les objets d'une 2-catégorie [B] (champs/C) : les 1-morphismes sont les foncteurs d'un champ vers un autre, compatibles avec la projection vers C ; et les 2-morphismes sont les morphismes de foncteurs. Dans cette 2-catégorie, tout 2-morphisme est un isomorphisme. Les produits et les 2-produits fibrés existent dans cette 2-catégorie.

À chaque $X \in \mathrm{Ob}\, C$ est associé le champ "représentable" au-dessus de C dont la catégorie des sections au-dessus de U est la catégorie discrète dont les objets sont les morphismes de U vers X. Ce champ sera simplement noté X. Pour tout champ $\mathscr{S}$, la catégorie

$$\mathrm{Hom}(X, \mathscr{S})$$

est canoniquement équivalente à la catégorie des sections de $\mathscr{S}$ au-dessus de X. Pour cette raison, on dit parfois que $\mathscr{S}$ "classifie" ses sections lorsque $X \in \mathrm{Ob}\, C$ varie. Dans la catégorie $\mathrm{Hom}(\mathscr{S}, X)$, tous les morphismes sont des identités, c'est-à-dire que $\mathrm{Hom}(\mathscr{S}, X)$ n'est qu'un ensemble.

Notons aussi par C la 2-catégorie ayant les mêmes objets et morphismes que C, et dans laquelle les identités sont les seuls 2-morphismes. La construction précédente identifie alors C à une sous-2-catégorie pleine de (champs/C).

Pour chaque $S \in \mathrm{Ob}\, C$, la catégorie C/S satisfait les hypothèses de (4.1). Tout champ $\mathscr{S}_0$ sur C/S (un "S-champ") donne naissance à un champ $\mathscr{S}$ sur C ; une section (φ, η) de $\mathscr{S}$ au-dessus de $U \in \mathrm{Ob}\, C$ consiste en :

(i) un morphisme $\varphi : U \to S$;

(ii) une section η de $\mathscr{S}_0$ au-dessus de (U, φ).

Définition (4.2). — Un 1-morphisme de champs au-dessus de C, $F : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2$, sera dit représentable si, pour tout X dans C et tout 1-morphisme $x : X \to \mathscr{S}_2$, le produit fibré $X \times_{\mathscr{S}_2} \mathscr{S}_1$ est un champ représentable.

En termes plus concrets, cela signifie ce qui suit :

(i) pour tout $f : Y \to X$ dans C, la catégorie dont les objets sont les paires

$$\{\text{une section } y \text{ de } \mathscr{S}_1 \text{ au-dessus de } Y;\ \text{un isomorphisme } F(y) \xrightarrow{\sim} f^*(x)\}$$

est équivalente à une catégorie $S(f)$ dans laquelle tous les morphismes sont des identités ;

(ii) le foncteur $f \mapsto \mathrm{Ob}\, S(f)$ est représentable par un certain $g : Z \to X$. Un tel Z représente le produit fibré $X \times_{\mathscr{S}_2} \mathscr{S}_1$.

Soit P une propriété de morphismes dans C, stable par changement de base et de nature locale sur le but.

Définition (4.3). — Un morphisme représentable $F : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2$ de champs au-dessus de C a la propriété P si, pour tout 1-morphisme $x : X \to \mathscr{S}_2$, le morphisme de C obtenu par changement de base, $F' : X \times_{\mathscr{S}_2} \mathscr{S}_1 \to X$, a cette propriété.

Proposition (4.4). — Soit $\mathscr{S}$ un champ. Le morphisme diagonal

$$\mathscr{S} \to \mathscr{S} \times \mathscr{S}$$

est représentable si et seulement si, pour tous $X, Y \in \mathrm{Ob}\, C$ et tous 1-morphismes $x : X \to \mathscr{S}$, $y : Y \to \mathscr{S}$, le produit fibré $X \times_{\mathscr{S}} Y$ est représentable.

Si $X \in \mathrm{Ob}\, C$ et si x, y sont des sections de $\mathscr{S}$ au-dessus de X, nous notons $\underline{\mathrm{Isom}}(X, x, y)$ le faisceau sur C/X qui, à tout Z au-dessus de X, associe l'ensemble des isomorphismes entre les images inverses de x et de y au-dessus de Z. Alors l'objet représentant $\mathscr{S} \times_{(\mathscr{S} \times \mathscr{S})} X$ (le produit étant pris avec l'application $(x, y) : X \to \mathscr{S} \times \mathscr{S}$) n'est autre que $\mathrm{Isom}(X, x, y)$. Si $X \to \mathscr{S}$ et $Y \to \mathscr{S}$ sont des 1-morphismes, alors l'objet représentant $X \times_{\mathscr{S}} Y$ n'est autre que $\mathrm{Isom}(X \times Y, p_1^* x, p_2^* y)$.

Dorénavant, C sera la catégorie des schémas munie de la topologie étale (SGAD, IV, (6.3)).

Définition (4.5). — Un champ $\mathscr{S}$ est quasi séparé si le morphisme diagonal de $\mathscr{S}$ vers $\mathscr{S} \times \mathscr{S}$ est représentable, quasi compact et séparé.

Note sur la source. La définition imprimée porte "the diagonal morphism from to $\mathscr{S}$ to $\mathscr{S} \times \mathscr{S}$" ; le second "to" parasite est omis ici.

Définition (4.6). — Un champ $\mathscr{S}$ est un champ algébrique[5] *si*

(i) *$\mathscr{S} \to \mathscr{S} \times \mathscr{S}$ est représentable ;*

(ii) *il existe un 1-morphisme $x : X \to \mathscr{S}$ tel que, pour tout $y : Y \to \mathscr{S}$, le morphisme de projection $X \times_{\mathscr{S}} Y \to Y$ soit surjectif et étale (c'est-à-dire que x soit étale et surjectif).*

La 2-catégorie des champs algébriques contient les champs représentables et est stable par produits et produits fibrés. Si $\mathscr{S}$ est un champ algébrique quasi séparé, le morphisme diagonal est non ramifié et quasi affine.

5. Cette définition n'est la "bonne" que pour les champs quasi séparés. Elle suffira cependant pour nos besoins.

Définition (4.7). — Un champ algébrique $\mathscr{S}$ est séparé si $\mathscr{S} \to \mathscr{S} \times \mathscr{S}$ est propre (ou, de façon équivalente, fini). Un 1-morphisme $f : \mathscr{S}_1 \to \mathscr{S}_2$ est séparé (resp. quasi séparé) si, pour tout morphisme $x : X \to \mathscr{S}_2$ d'un schéma séparé X vers $\mathscr{S}_2$, le produit fibré $\mathscr{S}_1 \times_{\mathscr{S}_2} X$ est séparé (resp. quasi séparé).

Exemple (4.8). — Soit X un schéma sur S. Soit G un schéma en groupes sur S, étale, séparé et de type fini sur S, qui opère sur X. Nous noterons $[X/G]$ le S-champ dont la catégorie des sections au-dessus d'un S-schéma T est la catégorie des espaces principaux homogènes (p.h.s.) E au-dessus de T, de groupe structural G (c'est-à-dire un p.h.s. sous G_T), muni d'un G-morphisme $\varphi : E \to X$. L'espace principal homogène $G \times X$ au-dessus de X (G agissant seulement sur le premier facteur), avec le G-morphisme $G \times X \to X$ (donné par l'action de G sur X), est une section de $[X/G]$ au-dessus de X. Le morphisme correspondant $q : X \to [X/G]$ est étale et surjectif, de sorte que $[X/G]$ est un champ algébrique. De plus, X est un espace principal homogène au-dessus de $[X/G]$; le champ $[X/G]$ est représentable si et seulement si X est un espace principal homogène au-dessus d'un schéma Y, auquel cas

$$[X/G] \sim Y.$$

Si $X = S$, alors $[X/G] = [S/G]$ pourrait être appelé le "champ classifiant" de G au-dessus de S.

Exemple (4.9). — Supposons qu'un champ $\mathscr{S}$ ait la propriété suivante : dans chaque catégorie $\mathscr{S}_X$, les seuls morphismes sont les morphismes identité. Alors $\mathscr{S}_X$ est simplement un ensemble $\mathscr{F}(X) = \mathrm{Ob}\,\mathscr{S}_X$, et cet ensemble, par image inverse, est un foncteur contravariant $\mathscr{F}$ en X. Les conditions (ii) et (iii) de (4.1) affirment que le foncteur $\mathscr{F}$ est un faisceau sur C. Artin et Knutson [K] ont défini un *espace algébrique* comme un faisceau $\mathscr{F}$ tel que :

(i) pour tous morphismes $X \to \mathscr{F}$, $Y \to \mathscr{F}$ de foncteurs représentables vers $\mathscr{F}$, le produit fibré $X \times_{\mathscr{F}} Y$ soit représentable ;

(ii) il existe un morphisme $X \to \mathscr{F}$, représenté par des morphismes de schémas surjectifs et étales.

C'est exactement ce que nous avons appelé un champ algébrique dans ce cas.

Définition (4.10). — Soit $\mathscr{S}$ un champ algébrique. Le site étale $\mathscr{S}_{et}$ de $\mathscr{S}$ est la catégorie dont les objets sont les morphismes étales

$$x : X \to \mathscr{S}$$

et où un morphisme de (X, x) vers (Y, y) est un morphisme de schémas $f : X \to Y$, avec un 2-morphisme entre le 1-morphisme $x : X \to \mathscr{S}$ et $y \cdot f : X \to \mathscr{S}$. Une famille de morphismes $f_i : (X_i, x_i) \to (X, x)$ est une famille couvrante si la famille sous-jacente de morphismes de schémas est surjective.

Le site $\mathscr{S}_{et}$ est naturellement annelé. Lorsque nous parlons de faisceaux sur $\mathscr{S}$, nous entendons des faisceaux sur $\mathscr{S}_{et}$.

Nous expliquons maintenant comment de nombreuses notions de la théorie des schémas peuvent être appliquées aux champs algébriques.

Soit $\mathcal{P}$ une propriété de morphismes de schémas, stable par changement de base étale, et de nature locale (pour la topologie étale) sur le but.

Par exemple : être une immersion ouverte d'image dense, être dominant, birationnel...

Un morphisme représentable de champs algébriques $f : T_1 \to T_2$ est dit avoir la propriété $\mathcal{P}$ si, pour un (et donc pour tout) morphisme étale surjectif $x : X \to T_2$, le morphisme de schémas déduit par changement de base

$$f' : X \times_{T_2} T_1 \longrightarrow X$$

a cette propriété.

Soit $\mathcal{P}$ une propriété de morphismes de schémas qui, à la source et au but, est de nature locale pour la topologie étale. Cela signifie que, pour toute famille de carrés commutatifs

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{g_i} & X \\ {\scriptstyle f_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y_i & \xrightarrow[h_i]{} & Y \end{array}$$

où les g_i (resp. h_i) sont étales et couvrent X (resp. Y), on a

$$\mathcal{P}(f) \Longleftrightarrow \forall i\, \mathcal{P}(f_i).$$

Par exemple : f plat, lisse, étale, non ramifié, normal, localement de type fini, localement de présentation finie.

Si $f : T_1 \to T_2$ est un morphisme de champs algébriques, nous disons que f a la propriété $\mathcal{P}$ si, pour un, et alors nécessairement pour tout, diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{x} & T_1 \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[y]{} & T_2 \end{array}$$

où X et Y sont des schémas et où x, y sont étales et surjectifs, le morphisme f' a la propriété $\mathcal{P}$.

De même, si $\mathcal{P}$ est une propriété de schémas, de nature locale pour la topologie étale, un champ algébrique T sera dit avoir la propriété $\mathcal{P}$ si, pour un (et donc pour tout) morphisme étale surjectif $x : X \to T$, le schéma X a la propriété $\mathcal{P}$. Cela s'applique, par exemple, aux propriétés d'être régulier, normal, localement noethérien, de caractéristique p, réduit, Cohen–Macaulay...

Un champ algébrique T sera dit *quasi-compact* s'il existe un morphisme étale surjectif $x : X \to T$ avec X quasi-compact. Un morphisme $f : T_1 \to T_2$ de champs algébriques sera dit *quasi-compact* si, pour tout schéma quasi-compact X au-dessus de T_2, le produit fibré $T_1 \times_{T_2} X$ est quasi-compact. Il suffit de tester la condition pour une famille surjective $f_i : X_i \to T_2$. Nous définissons un morphisme $f : T_1 \to T_2$ comme étant de *type fini* s'il est quasi-compact et localement de type fini ; de *présentation finie* s'il est quasi-compact, quasi-séparé et localement de présentation finie. Un champ algébrique est *noethérien* s'il est quasi-compact, quasi-séparé et localement noethérien.

Le point clé dans ce qui suit sera la définition d'un « morphisme propre » et l'analogue du lemme de Chow.

Un morphisme $f : T_1 \to T_2$ est dit avoir une propriété $\mathcal{P}$, localement sur T_2, s'il existe un morphisme étale surjectif $x : X \to T_2$ tel que le morphisme f' déduit de f par le changement de base par x ait la propriété $\mathcal{P}$.

Définition (4.11). — Un morphisme $f : T_1 \to T_2$ est propre s'il est séparé, de type fini et si, localement au-dessus de T_2, il existe des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} T_3 & \xrightarrow{g} & T_1 \\ & {\scriptstyle h}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle f} & \\ & T_2 & \end{array}$$

où g est surjectif et h représentable et propre.

Note sur la source. Le texte imprimé porte “there exists commutative diagrams” ; l'accord du verbe est corrigé ici sans modifier le pluriel.

La forme suivante du lemme de Chow suffira pour nos besoins.

Théorème (4.12). — Soit S un schéma noethérien et soit f un morphisme d'un site étale T vers S. On suppose f séparé et de type fini. Alors il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} T & \xleftarrow{g} & T' & \xrightarrow{j} & T'' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\searrow & \nearrow{\scriptstyle f''} & \\ S & & & & \end{array}$$

dans lequel T' et T'' sont des schémas et tel que

(i) *g soit propre, surjectif et génériquement fini ;*

(ii) *j soit une immersion ouverte ;*

(iii) *f'' soit projectif.*

En utilisant (4.12), il est facile d'étendre à la situation présente la théorie cohomologique des faisceaux cohérents. En effet, si $f : T_1 \to T_2$ est un morphisme propre de champs algébriques noethériens et si $\mathscr{F}$ est un faisceau cohérent sur T_1, alors les $R^i f_*(\mathscr{F})$ sont des faisceaux cohérents sur T_2.

Cependant, il n'est pas nécessaire que les $R^i f_*(\mathscr{F})$ soient nuls pour i assez grand. Soient S un schéma et G un groupe fini. Nous notons p la projection $p : [S/G] \to S$. Les faisceaux quasi-cohérents (resp. cohérents) de modules sur $[S/G]$ peuvent (et seront) identifiés aux faisceaux quasi-cohérents (resp. cohérents) de modules sur S sur lesquels G agit. On a

$$R^i p_*(\mathscr{F}) \simeq H^i(G, \mathscr{F}).$$

En général, la cohomologie (des faisceaux quasi-cohérents) des champs algébriques apparaît comme un mélange de cohomologie de groupes finis et de cohomologie des schémas.

La *somme disjointe* T d'une famille $(T_i)_{i\in I}$ de champs est le champ dont une section au-dessus d'un schéma X consiste en

(i) une décomposition $X = \coprod_i X_i$ de X ;

(ii) une section de T_i au-dessus de X_i, pour chaque i.

Le *champ vide* $\varnothing$ est celui qui est représenté par le schéma vide.

Un champ est *connexe* s'il est non vide et n'est pas somme disjointe de deux champs non vides.

Proposition (4.13). — Un champ algébrique localement noethérien est, d'une manière et d'une seule, somme disjointe d'une famille de champs algébriques connexes (appelés ses composantes connexes).

Nous notons $\pi_0(T)$ l'ensemble des composantes connexes d'un champ algébrique localement noethérien T. Si $x : X \to T$ est surjectif et étale, $\pi_0(T)$ est le conoyau des deux applications

$$\pi_0(X \times_T X) \rightrightarrows \pi_0(X) \longrightarrow \pi_0(T).$$

Proposition (4.14). — Soit T un champ algébrique de type fini sur un corps k. Alors T est connexe si et seulement s'il existe un schéma connexe X, de type fini sur k, et un morphisme surjectif de X vers T.

Un ouvert U d'un champ algébrique T est une sous-catégorie pleine $U \subset T$ qui est un champ algébrique, qui contient avec tout $t \in \mathrm{Ob}(T)$ tout t' isomorphe à t, et telle que l'inclusion $j : U \to T$ soit représentable par des immersions ouvertes. Les ouverts de T correspondent bijectivement aux ouverts de son site étale.

Note sur la source. La phrase imprimée porte "The open subsets of T corresponds" ; l'accord du verbe est corrigé ici.

Pour chaque ouvert U de T, il existe une et une seule sous-catégorie pleine $T - U$ de T, qui est un champ algébrique, qui contient avec tout $t \in \mathrm{Ob}(T)$ tout t' isomorphe à t, et telle que

(i) $T - U$ soit réduit ;

(ii) l'application d'inclusion $i : T - U \to T$ soit représentable par des immersions fermées ;

(iii) pour tout morphisme étale surjectif $x : X \to T$, l'image inverse de $T - U$ sur X soit le complémentaire de l'image inverse de U.

Un champ algébrique F dans T satisfaisant (i) et (ii) est un *fermé* de T, et le foncteur $U \mapsto T - U$ est un isomorphisme de l'ensemble des ouverts sur l'ensemble des fermés de T. Si F satisfait seulement (ii), F_{red} satisfait (i) et (ii), de sorte que F définit un fermé de T.

Un champ algébrique T est *irréductible* s'il n'est pas la réunion de deux fermés non vides et distincts de T.

Proposition (4.15). — Un champ algébrique noethérien T est, d'une manière et d'une seule, réunion de fermés irréductibles dont aucun ne contient un autre. On les appelle les composantes irréductibles de T. Si U est un ouvert dense de T, les composantes irréductibles de U sont les intersections non vides de U avec les composantes irréductibles de T.

Chaque composante irréductible de T est contenue dans une composante connexe de T. Réciproquement :

Proposition (4.16). — Les composantes connexes d'un champ algébrique normal noethérien sont irréductibles.

Théorème (4.17). — Soit f un morphisme de type fini d'un champ algébrique T vers un schéma noethérien S. Pour $s \in S$, soit $n(s)$ le nombre de composantes connexes de la fibre géométrique de T en s. Alors

(i) *$n(s)$ est une fonction constructible de s ;*

(ii) *si f est propre et plat, alors $n(s)$ est semi-continue inférieurement ;*

(iii) *si f est propre plat et a des fibres géométriquement normales, alors $n(s)$ est constante.*

Soit $f : T \to S$ un morphisme de type fini d'un champ algébrique T vers un schéma noethérien S. Supposons que l'application diagonale $T \to T \times_S T$ soit séparée et quasi-compacte.

Théorème (4.18) (critère valuatif de séparation). — Le morphisme f est séparé si et seulement si, pour tout anneau de valuation discrète complet à corps résiduel algébriquement clos et tout diagramme commutatif



tout isomorphisme entre les restrictions de g_1 et de g_2 au point générique de $\mathrm{Spec}(V)$ *peut être prolongé en un isomorphisme entre g_1 et g_2.*

Ce critère n'est rien d'autre que le critère valuatif de propreté (EGA, II, 7.3.8) appliqué au morphisme diagonal (représentable).

Théorème (4.19) (critère valuatif de propreté). — Si f est séparé, alors f est propre si et seulement si, pour tout anneau de valuation discrète V de corps des fractions K et tout diagramme commutatif



il existe une extension finie K' de K telle que g se prolonge à $\mathrm{Spec}(V')$*, où V' est la clôture intégrale de V dans K'*



Pour prouver qu'un f donné est propre, il suffit de vérifier le critère ci-dessus sous l'hypothèse supplémentaire que V est complet et a un corps résiduel algébriquement clos. En outre, étant donné un ouvert dense U de T, il suffit de tester seulement les g qui se factorisent par U.

Proposition (4.20). — Soit $\mathscr{S}$ un champ algébrique. Le foncteur qui, à tout champ algébrique au-dessus de $\mathscr{S}$, $f : \mathscr{T} \to \mathscr{S}$, associe le faisceau d'$\mathcal{O}_{\mathscr{S}}$-algèbres $f_*\mathcal{O}_{\mathscr{T}}$ induit une équivalence de catégories entre :

(i) *la catégorie des champs algébriques représentables et affines au-dessus de $\mathscr{S}$;*

(ii) *la catégorie opposée de la catégorie des $\mathcal{O}_{\mathscr{S}}$-algèbres quasi-cohérentes.*

Soit $\mathscr{A}$ un faisceau quasi-cohérent de $\mathcal{O}_{\mathscr{S}}$-algèbres sur un champ algébrique $\mathscr{S}$. Pour chaque morphisme étale $x : U \to \mathscr{S}$, avec U affine, soit $\mathscr{A}'(U)$ la clôture intégrale de $\Gamma(U, \mathcal{O}_{\mathscr{S}})$ dans $\mathscr{A}(U)$. D'après (EGA, II, 6.3.4), les $\mathscr{A}'(U)$, lorsque U varie, sont les sections au-dessus de U d'un faisceau quasi-cohérent $\mathscr{A}'$ sur $\mathscr{S}$, qui sera appelé la clôture intégrale de $\mathcal{O}_{\mathscr{S}}$ dans $\mathscr{A}$.

Soit $f : \mathscr{T} \to \mathscr{S}$ représentable et affine. Le champ algébrique associé par (4.20) à la clôture intégrale de $\mathcal{O}_{\mathscr{S}}$ dans $f_*\mathcal{O}_{\mathscr{T}}$ sera appelé la normalisation de $\mathscr{S}$ relativement à $\mathscr{T}$. Sa formation est compatible avec tout changement de base étale.

Théorème (4.21). — Soit $\mathscr{S}$ un champ quasi-séparé au-dessus d'un schéma noethérien S. Supposons que

(i) *l'application diagonale $\mathscr{S} \to \mathscr{S} \times_S \mathscr{S}$ soit représentable et non ramifiée ;*

(ii) *il existe un schéma X de type fini sur S et un S-morphisme lisse et surjectif de X vers $\mathscr{S}$.*

Alors $\mathscr{S}$ est un champ algébrique de type fini sur S.

M. Artin a développé des méthodes puissantes pour relier la pro-représentabilité d'un champ à l'existence de morphismes étales surjectifs $x : X \to \mathscr{S}$.

§ 5. Seconde preuve du théorème d'irréductibilité.

Soit $\mathcal{M}_g$ ($g \geq 2$) le champ dont la catégorie des sections au-dessus d'un schéma S est la catégorie des courbes stables de genre g au-dessus de S, les morphismes étant les isomorphismes de schémas au-dessus de S. D'après (1.11), le morphisme diagonal

$$\Delta : \mathcal{M}_g \longrightarrow \mathcal{M}_g \times \mathcal{M}_g$$

est représentable, fini et non ramifié.

Nous avons vu au § 1 que le champ classifiant les courbes stables tricanoniquement plongées de genre g est représenté par un schéma H_g, lisse et de type fini sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$. Le morphisme « d'oubli »

$$H_g \longrightarrow \mathcal{M}_g$$

est représentable, lisse et surjectif. En effet, si $p : C \to S$ est une courbe stable au-dessus de S, définissant un morphisme

$$\gamma : S \longrightarrow \mathcal{M}_g,$$

alors le produit fibré $H_g \times_{\mathcal{M}_g} S$ est le schéma, lisse sur S, des isomorphismes entre l'espace projectif standard de dimension $5g-6$ sur S et $\mathbf{P}(p_*(\omega_{C/S}^{\otimes 3}))$. On en déduit, avec (4.21), que :

Proposition (5.1). — $\mathcal{M}_g$ est un champ algébrique séparé de type fini sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$.

Désignons par $\mathcal{M}_g^0$ l'ouvert de $\mathcal{M}_g$ qui « consiste en » les courbes lisses, et par $\mathcal{Z}_g$ la « courbe universelle » au-dessus de $\mathcal{M}_g$, c'est-à-dire le champ algébrique classifiant les courbes stables pointées.

Théorème (5.2). — Les champs algébriques $\mathcal{M}_g$ et $\mathcal{Z}_g$ sont propres et lisses sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$*, et le complément de $\mathcal{M}_g^0$ dans $\mathcal{M}_g$ est un diviseur à croisements normaux relativement à* $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$.

Démonstration. — Soit $x : X \to \mathcal{M}_g$ étale et considérons le diagramme commutatif suivant de champs algébriques de type fini sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$:



Dans ce diagramme, les quatre flèches horizontales sont étales et les quatre flèches verticales sont lisses et surjectives. Comme H_g et $\mathcal{Z}_g$ (p. 78) sont lisses sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, il en est de même de X et de $X \times_{\mathcal{M}_g} \mathcal{Z}_g$. De plus,

$$q'^{-1}x^{-1}(\mathcal{M}_g^0) = x'^{-1}(H_g^0)$$

est le complément d'un diviseur à croisements normaux relativement à $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, de sorte que l'inclusion de $x^{-1}(\mathcal{M}_g^0)$ dans X a la même propriété. Ceci étant vrai pour tout x, $\mathcal{M}_g$ et $\mathcal{Z}_g$ sont lisses sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ et $\mathcal{M}_g^0$ est le complément d'un diviseur à croisements normaux relativement à $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$. En particulier $\mathcal{M}_g^0$ est dense dans $\mathcal{M}_g$.

Nous pouvons maintenant utiliser le critère valuatif de propreté sous sa forme modifiée (4.19) pour déduire la propreté de $\mathcal{M}_g$ du théorème de réduction stable. La propreté de $\mathcal{Z}_g$ résulte alors de celle de p.

(5.3) Soit $p : X \to S$ une courbe stable lisse de genre $g \geq 2$ sur S. Si $k \in \mathbb{N}$ est inversible dans $\mathcal{O}_S$, le faisceau $R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$ sur S_{et} est localement libre sur $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, de rang $2g$, et le cup-produit est une forme alternée non dégénérée

$$R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}) \otimes R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}) \longrightarrow R^2p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}) \simeq \mu_k^{\otimes -1}.$$

Localement sur S_{et}, μ_k est isomorphe à $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, et donc, localement, $R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$ est muni d'une forme symplectique non dégénérée à valeurs dans $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$, déterminée à une unité de $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$ près ; autrement dit, $R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$ est muni d'une structure symplectique homogène. Le faisceau constant $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^{2g}$ sera muni de la structure symplectique homogène induite par la structure symplectique standard de $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^{2g}$.

Définition (5.4). — Une structure de Jacobi de niveau k sur X est un isomorphisme (respectant les structures symplectiques homogènes) entre $R^1p_*(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$ et $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})^{2g}$.

(5.5) Étant donnés une section s de p et un ensemble de nombres premiers $\mathbf{P}$ contenant toutes les caractéristiques résiduelles de S, le théorème de spécialisation pour le groupe fondamental permet de construire un pro-objet $\pi_1(X/S,s)^{(\mathbf{P})}$ de la catégorie (l.c. $\mathrm{gr}^{(\mathbf{P})}$) des faisceaux localement constants de groupes finis d'ordre premier à $\mathbf{P}$, ayant les propriétés suivantes :

(i) $\mathrm{Hom}_S(\pi_1(X/S,s)^{(\mathbf{P})},G) = R^1p_*(X \bmod s, p^*G) = R^1p_*(\mathrm{Ker}(p^*G \to s_*G))$ fonctoriellement en $G \in$ (l.c. $\mathrm{gr}^{(\mathbf{P})}$) ;

(ii) la formation de $\pi_1(X/S,s)^{(\mathbf{P})}$ est compatible avec tout changement de base.

Si G et H sont deux faisceaux de groupes sur S_{et}, nous définissons le faisceau des morphismes extérieurs de H vers G, $\mathrm{Hom}^{\mathrm{ext}}(H,G)$, comme le quotient de $\mathrm{Hom}(H,G)$ par l'action de H induite par son action sur lui-même par automorphismes intérieurs.

Le faisceau

$$\mathrm{Hom}^{\mathrm{ext}}_S(\pi_1(X/S,s)^{(\mathbf{P})},G) \simeq R^1p_*(p^*G) \qquad (\text{pour } G \in (\text{l.c. } \mathrm{gr}^{(\mathbf{P})}))$$

est « indépendant » du choix de s.

Nous le noterons

$$\mathrm{Hom}^{\mathrm{ext}}_S(\pi_1(X/S)^{(\mathbf{P})},G).$$

Comme $p : X \to S$ admet localement des sections pour la topologie étale, ce faisceau a un sens sans supposer que p possède une section globale. Il est indépendant du choix de $\mathbf{P}$, tant que $\mathbf{P}$ est premier à l'ordre de G et contient toutes les caractéristiques résiduelles de S.

Définition (5.6). — Soit G un groupe fini d'ordre n premier à $\mathbf{P}$. Une structure de Teichmüller de niveau G sur X est un homomorphisme extérieur surjectif de $\pi_1(X/S)$ vers G.

La génération finie de $\pi_1(X/S)$ (SGA, 60/61, exp. 10) implique :

Lemme (5.7). — Le faisceau sur (Sch/S) *des structures de Teichmüller de niveau G sur X est représenté par un revêtement étale de S.*

Nous désignons par ${}_G\mathcal{M}^0_g$ le champ qui classifie les courbes stables lisses de genre g et de caractéristique première à n, avec une structure de Teichmüller de niveau G.

Pour tout champ algébrique $\mathscr{M}$, nous notons $\mathscr{M}[1/n]$ son ouvert $\mathscr{M} \times \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$.

Le lemme (5.7) se reformule alors ainsi :

Proposition (5.8). — Le morphisme « d'oubli »

$${}_G\mathcal{M}^0_g \longrightarrow \mathcal{M}^0_g[1/n]$$

est représentable, fini et étale.

Le champ ${}_G\mathcal{M}^0_g$ est donc un champ algébrique. Soit ${}_G\mathcal{M}_g$ la normalisation de $\mathcal{M}_g[1/n]$ relativement à ${}_G\mathcal{M}^0_g$. Le champ ${}_G\mathcal{M}_g$, étant représentable et fini au-dessus de $\mathcal{M}_g[1/n]$, est propre sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$.

Théorème (5.9). — Les fibres géométriques de la projection de ${}_G\mathcal{M}_g$ sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ *sont normales, et, fibre par fibre, ${}_G\mathcal{M}^0_g$ est dense dans ${}_G\mathcal{M}_g$.*

Démonstration. — Nous utiliserons le lemme d'Abhyankar–Artin, sous sa forme « absolue » :

Lemme (5.10). — Soient D un diviseur à croisements normaux sur un schéma régulier excellent X, Y un revêtement étale de $X - D$ et $\overline{Y}$ la normalisation de X relativement à Y. Supposons que les points génériques des composantes irréductibles de D soient tous de caractéristique 0. Alors tout point géométrique de X possède un voisinage étale $x : X' \to X$ tel que, sur X' :

(i) *D devienne une réunion de diviseurs réguliers $(D_i)_{i\in I}$, D_i étant d'équation $t_i = 0$.*

(ii) *Il existe un entier k premier aux caractéristiques résiduelles de X' tel que $\overline{Y}$ devienne isomorphe à une réunion disjointe de quotients (par des sous-groupes de μ_k^I) du revêtement de X' obtenu en extrayant les racines k-ièmes des t_i.*

Si $x : X \to \mathcal{M}_g[1/n]$ est un morphisme étale, alors $X^0 = x^{-1}(\mathcal{M}^0_g)$ est le complément dans X d'un diviseur à croisements normaux relativement à $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, $X^0_1 = X \times_{\mathcal{M}_g} ({}_G\mathcal{M}^0_g)$ est un revêtement étale de X^0, et $X_1 = X \times_{\mathcal{M}_g} ({}_G\mathcal{M}_g)$ est la normalisation de X relativement à ce revêtement de X^0.

Note sur la source. La formule imprimée porte $X_1 = S \times_{\mathcal{M}_g} ({}_G\mathcal{M}_g)$; comme le morphisme considéré est $x : X \to \mathcal{M}_g[1/n]$ et que X_1 est son changement de base, le facteur requis X est conservé ci-dessus.

Par la description locale explicite (5.10), pour tout nombre premier l premier à n, $X_1 \times \mathrm{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ est la normalisation de $X \times \mathrm{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ relativement à $X_1^0 \times \mathrm{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$. Comme ceci est vrai pour toute famille modulaire, on obtient (5.9).

Corollaire (5.11). — Les fibres géométriques de la projection

$$ {}_G\mathcal{M}_g \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n]) $$

ont toutes le même nombre de composantes connexes.

Démonstration. — D'après (4.17), toutes les fibres géométriques $\mathcal{M}_g \times \mathrm{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ de $\mathcal{M}_g$ au-dessus de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ ont le même nombre de composantes connexes. Ces composantes connexes sont irréductibles (4.16). De plus, ${}_G\mathcal{M}_g^0 \times \mathrm{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ est dense dans ${}_G\mathcal{M}_g \times \mathrm{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ et a donc le même nombre de composantes connexes (ou irréductibles) que ${}_G\mathcal{M}_g \times \mathrm{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$, et ce nombre est indépendant de l.

(5.12) Désignons par Π le groupe fondamental d'une surface différentiable fermée orientée S_0 de genre g. Le groupe Π peut être défini par générateurs et relations comme suit :

(i) générateurs : x_i pour $1 \leq i \leq 2g$;

(ii) relation : $(x_1, x_{g+1}) \cdots (x_i, x_{g+i}) \cdots (x_g, x_{2g}) = e$, où $(a, b) = aba^{-1}b^{-1}$.

Soit (e_i) la base standard de $\mathbb{Z}^{2g}$. Le morphisme φ de Π vers $\mathbb{Z}^{2g}$ défini par $\varphi(x_i) = e_i$ identifie $\Pi/(\Pi, \Pi) = H_1(\Pi, \mathbb{Z})$ à $\mathbb{Z}^{2g}$.

Note sur la source. La formule imprimée porte $\varphi(X_i) = e_i$ avec un X_i majuscule ; les générateurs définis juste au-dessus sont les x_i, notation conservée ici.

La surface S_0 est un $K(\Pi, 1)$, et donc

$$ H^2(\Pi, \mathbb{Z}) = H^2(S_0, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, $$

et le cup-produit définit une structure symplectique sur $\Pi/(\Pi, \Pi)$. Cette structure est identifiée par φ à la structure symplectique standard de $\mathbb{Z}^{2g}$.

Nous notons $\mathrm{Aut}^0(\Pi)$ le sous-groupe de $\mathrm{Aut}(\Pi)$ qui agit trivialement sur $H^2(\Pi, \mathbb{Z})$. Dehn a démontré que tout automorphisme extérieur de Π est induit par un difféomorphisme de S_0 sur elle-même et que l'application induite par φ :

$$ \mathrm{Aut}^0(\Pi) \longrightarrow \mathrm{Sp}_{2g}(\mathbb{Z}), $$

est surjective (voir [Ma]).

Théorème (5.13). — Le nombre de composantes connexes de toute fibre géométrique de la projection de ${}_G\mathcal{M}_g^0$ sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ *est égal au nombre d'orbites de* $\mathrm{Aut}^0(\Pi)$ *dans l'ensemble des épimorphismes extérieurs de* Π *vers* G.

Démonstration. — D'après (5.11), il suffit de montrer que ${}_G\mathcal{M}_g^0 \times \mathrm{Spec}(\mathbb{C})$ a le nombre annoncé de composantes connexes. D'après (4.14),

$$ \pi_0({}_G\mathcal{M}_g^0 \times \mathrm{Spec}(\mathbb{C})) = \pi_0({}_GM_g), $$

où ${}_GM_g$ est le schéma de modules grossier classifiant les courbes lisses stables de genre g sur $\mathbb{C}$ munies d'une structure de Teichmüller de niveau G.

Note sur la source. La démonstration imprimée commence par "By (5.13)", auto-référence au théorème en cours de démonstration ; le corollaire (5.11) est le résultat qui ramène l'énoncé à une fibre géométrique, et c'est lui qui est cité ci-dessus. La tournure imprimée "As results from (4.14)" est corrigée en anglais en "As follows from (4.14)".

Rappelons qu'une courbe de Teichmüller de genre g est une courbe lisse stable C de genre g sur $\mathbb{C}$, munie d'un isomorphisme extérieur φ du groupe fondamental transcendant $\pi_1(C)$ avec Π, qui induit un isomorphisme symplectique [6] entre

$$ H_1(C, \mathbb{Z}) \simeq \pi_1(C)/(\pi_1(C), \pi_1(C)) $$

et $\Pi/(\Pi, \Pi)$. D'après la théorie de Teichmüller [W], l'espace analytique T_g qui classifie les courbes de Teichmüller d'un genre donné $g \geq 2$ est homéomorphe à une boule, et donc connexe.

6. Un isomorphisme arbitraire φ induit un isomorphisme entre $H_1(C, \mathbb{Z})$ et $\Pi/(\Pi, \Pi)$ qui est toujours symplectique au signe près.

Si ψ est un homomorphisme surjectif de Π vers G, l'application

$$(C, \varphi) \longmapsto (C, \psi\varphi)$$

définit un morphisme $t_\psi : T_g \to {}_GM_g$. Deux telles applications t_ψ et $t_{\psi'}$ ont la même image si et seulement si $\psi = \psi'\sigma$ pour $\sigma \in \mathrm{Aut}^0(\Pi)$, et

$${}_GM_g = \coprod_{\psi \bmod \mathrm{Aut}^0(\Pi)} t_\psi(T_g),$$

ce qui implique (5.13).

(5.14) Désignons par ${}_n\mathcal{M}_g^0$ le champ algébrique classifiant les courbes lisses stables munies d'une structure de Jacobi de niveau n. Ce champ algébrique « est » un vrai schéma pour $n \geq 3$ (d'après [S]).

Si φ est une structure de Jacobi de niveau n sur une courbe lisse stable $p : X \to S$, nous définissons le « multiplicateur » $\mu(\varphi)$ de φ par le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Lambda^2(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2g} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ \downarrow{\scriptstyle \Lambda^2\varphi} & & \downarrow{\scriptstyle \mu(\varphi)} \\ \Lambda^2 R^1p_*(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\Lambda} & \mu_n^{\otimes -1} \simeq R^2p_*(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \end{array}$$

Le schéma des isomorphismes entre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\mu_n^{\otimes -1}$ est $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n])$; ainsi $\varphi \mapsto \mu(\varphi)$ définit un morphisme μ de S vers $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n])$. Ceci étant vrai pour tout X et tout S, μ est induit par

$$\mu : {}_n\mathcal{M}_g^0 \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n]).$$

Théorème (5.15). — Les fibres géométriques du morphisme μ sont connexes.

Démonstration. — Par définition, ${}_n\mathcal{M}_g^0$ est ouvert et fermé dans ${}_G\mathcal{M}_g^0$ pour $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2g}$. Le groupe $\mathrm{GL}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ agit sur G, et donc sur ${}_G\mathcal{M}_g^0$. On a :

(i) l'ouvert ${}_n\mathcal{M}_g^0$ de ${}_G\mathcal{M}_g^0$ est stable sous le sous-groupe $H = \mathrm{CSp}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ des similitudes symplectiques ;

(ii) ${}_G\mathcal{M}_g^0 = \coprod_{\sigma \in \mathrm{GL}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})/H} \sigma({}_n\mathcal{M}_g^0)$.

Note sur la source. Le coproduit imprimé est indexé par G/H, alors que $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2g}$ et que H vient d'être défini comme un sous-groupe de $\mathrm{GL}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$. L'espace de classes du groupe agissant requis est écrit explicitement ci-dessus.

Il résulte maintenant de (5.11) que toutes les fibres géométriques de μ ont le même nombre de composantes connexes.

Note sur la source. La tournure anglaise imprimée “It now results from (5.11)” est corrigée dans l'édition anglaise en “It now follows from (5.11)”.

Considérons la fibre géométrique de μ au-dessus de la place complexe standard de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}, 1/n])$. Cette fibre est le champ algébrique classifiant les courbes lisses stables complexes C munies d'un isomorphisme symplectique

$$H^1(C, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2g}.$$

En raisonnant comme en (5.13), nous sommes ramenés à démontrer

Lemme (5.16). — L'homomorphisme

$$\mathrm{Aut}^0(\Pi) \longrightarrow \mathrm{Sp}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

est surjectif.

Démonstration. — Cela découle de la théorie de Dehn (5.12) et du fait que les groupes Sp_{2g}, étant des groupes semi-simples simplement connexes déployés, sont engendrés par leurs éléments unipotents, de sorte que l'application de réduction

$$\mathrm{Sp}_{2g}(\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{Sp}_{2g}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

est surjective.

Note sur la source. La démonstration imprimée porte “This results from Dehn's theory” et nomme les groupes Sp_n. La tournure est rendue par « Cela découle », et le groupe est rétabli en Sp_{2g}, comme l'imposent à la fois le lemme et l'application de réduction affichée.

BIBLIOGRAPHIE

[**Ab**] S. Abhyankar, Resolution of singularities of arithmetical surfaces, *Proc. Conf. on Arith. Alg. Geom. at Purdue*, 1963.

[$\mathbf{A}_1$] M. Artin, The implicit function theorem in algebraic geometry, *Proc. Colloq. Alg. Geom.*, Bombay, 1968.

[$\mathbf{A}_2$] M. Artin, Some numerical criteria for contractibility, *Am. J. Math.*, 84 (1962), p. 485.

[**B**] J. Bénabou, Thèse, Paris, 1966.

[**E**] F. Enriques and Chisini, *Teoria geometrica delle equazioni e delle funzioni algebriche*, Bologna, 1918.

[**F**] W. Fulton, Hurwitz schemes and irreducibility of moduli of algebraic curves, *Ann. of Math.* (forthcoming).

[**G**] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, University of Columbia.

[**Gr**] A. Grothendieck, Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, IV, *Sém. Bourbaki*, 221, 1960–1961.

[**H**] R. Hartshorne, *Residues and Duality*, Springer Lecture Notes, 20, 1966.

[**K**] D. Knutson, Algebraic spaces, Thesis, M.I.T., 1968.

[**Li**] J. Lipman, Rational singularities, *Publ. Math. I.H.E.S.*, no. 36 (1969).

[**L**] M. Lichtenbaum, Curves over discrete valuation rings, *Am. J. Math.*, 90 (1968), p. 380.

[**Ma**] W. Mangler, Die Klassen von topologischen Abbildungen einer geschlossenen Fläche auf sich, *Math. Zeit.*, 44 (1939), p. 541.

Note sur la source. La bibliographie imprimée porte "W. Manger" ; le titre, la revue, le volume, l'année et la page cités identifient Wilhelm Mangler, dont le nom est rétabli ci-dessus.

[$\mathbf{M}_1$] D. Mumford, *Geometric Invariant Theory*, Springer-Verlag, 1965.

[$\mathbf{M}_2$] D. Mumford, Notes on seminar on moduli problems, Supplementary mimeographed notes printed at A.M.S. Woods Hole Summer Institute, 1964.

[$\mathbf{M}_3$] D. Mumford, Picard groups of moduli problems, *Proc. Conf. on Arith. Alg. Geom. at Purdue*, 1963.

[**N**] A. Néron, Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux, *Publ. Math. I.H.E.S.*, no. 21.

[**R**] M. Raynaud, Spécialisation du foncteur de Picard, *Comptes rendus Acad. Sci.*, 264, p. 941 and p. 1001.

[**Š**] I. Šafarevich, Lectures on minimal models, Tata Institute Lecture Notes, Bombay, 1966.

[**Sc**] M. Schlessinger, Thesis, Harvard.

[**S**] J.-P. Serre, Rigidité du foncteur de Jacobi d'échelon $n \geq 3$, app. à l'exposé 17 du séminaire Cartan 60/61.

[**Se**] F. Severi and Löffler, *Vorlesungen über algebraische Geometrie*, Teubner, 1924.

[**W**] A. Weil, Modules des surfaces de Riemann, *Sém. Bourbaki*, 168, 1957–58.

Manuscrit reçu le 21 janvier 1969.

FORMES MODULAIRES ET REPRÉSENTATIONS ℓ-ADIQUES

Séminaire Bourbaki, 21e année, 1968/69, no. 355
Février 1969

Pierre Deligne

Note éditoriale. L'original français publié au Séminaire Bourbaki, pp. 139–172, est la source de contrôle de cette édition française. La ressaisie anglaise datée du 28 juin 2004 est une source de comparaison et contrôle l'édition anglaise. Les coquilles non mathématiques évidentes sont régularisées dans le texte courant; les restitutions substantielles ou non évidentes sont signalées sur place et enregistrées dans le registre d'alignement livré avec cette édition.

1 Introduction

Soient

$$D(q) = q\prod_{n=1}^{\infty}(1-q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty}\tau(n)q^n \qquad (|q|<1)$$

et

$$\Delta(z) = D(e^{2\pi iz}) \qquad (\operatorname{Im} z > 0).$$

On sait que la fonction Δ est, à un facteur constant près, l'unique forme parabolique de poids 12 pour le groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$. Posons, pour p premier,

$$H_p(X) = 1 - \tau(p)X + p^{11}X^2.$$

D'après la théorie de Hecke, la série de Dirichlet

$$L_\tau(s) = \sum \tau(n)n^{-s} = \prod_p \frac{1}{H_p(p^{-s})}$$

se prolonge en une fonction entière de s, et la fonction

$$(2\pi)^{-s}\Gamma(s)L_\tau(s)$$

est invariante par $s \mapsto 12-s$. La conjecture de Ramanujan affirme que les racines du polynôme H_p sont de valeur absolue $p^{-11/2}$, c'est-à-dire que $|\tau(p)| < 2p^{11/2}$.

Ces propriétés, démontrées ou conjecturales, sont similaires aux propriétés conjecturales des fonctions zêta des variétés algébriques sur $\mathbb{Q}$. Ceci suggère, en première approximation, de tenter d'interpréter L_τ comme la fonction zêta d'une telle variété.

Pour chaque nombre premier ℓ, soit K_ℓ la plus grande extension de $\mathbb{Q}$ non ramifiée en dehors de ℓ et, pour $p \neq \ell$, soit F_p l'inverse, dans $\mathrm{Gal}(K_\ell/\mathbb{Q})$, de l'élément de Frobenius φ_p relatif à p. Ce dernier objet est bien défini à conjugaison près.

Traduisant ce qui précède en terme de cohomologie ℓ-adique, Serre a conjecturé l'existence, pour chaque ℓ, d'une représentation de $\mathrm{Gal}(K_\ell/\mathbb{Q})$ dans un $\mathbb{Q}_\ell$-vectoriel W_ℓ de rang 2 telle que, pour chaque $p \neq \ell$,

$$H_p(X) = \det(1 - F_pX; W_\ell).$$

De plus, la représentation W_ℓ devrait être dans le champ d'application des conjectures de Weil, et la conjecture de Ramanujan un cas particulier de ces dernières.

Ce programme avait été mené à bien, par Kuga–Shimura [4], dans le cas analogue des formes modulaires relatives à certains sous-groupes à quotient compact du groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$. Réduite au cas présent, l'idée fondamentale de Sato–Kuga–Shimura est la suivante : si E est la courbe elliptique universelle sur le schéma de modules S des courbes elliptiques (en oubliant qu'il n'existe pas), et si E^k est le produit fibré itéré k-uple de E avec elle-même sur S, alors $L_\tau(s)$ est essentiellement la fonction zêta de E^k pour $k = 10 = 12-2$.

On explique dans ce qui suit comment résoudre les difficultés créées par les points à l'infini, et comment construire des représentations W_ℓ ayant les propriétés indiquées plus haut. Pour plus de détails historiques et pour des applications, on renvoie à Serre [6].

Note sur la source. L'original français imprime « les pointes »; la ressaisie anglaise donne « the difficulties creeted by the points ». La coquille évidente est régularisée en « les points », et « à l'infini » est restitué d'après la lecture anglaise et l'objet même de la construction qui suit.

Notations.

- On désigne par $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de $\mathbb{Q}$, par $\mathbb{A}_f$ l'anneau des adèles « à distance finie », produit restreint, étendu aux nombres premiers, des corps $\mathbb{Q}_p$, et, pour S ensemble de nombres premiers, on pose

$$\mathbb{A}_f^S = \prod_{p\in S} \mathbb{Q}_p \times \prod_{p\notin S} \mathbb{Z}_p \subset \mathbb{A}_f.$$

  Note sur la source. Dans le second produit, la ressaisie imprime $\mathbb{Q}_p$. La définition du produit restreint et l'identité immédiatement suivante $\widehat{\mathbb{Z}} = \mathbb{A}_f^{\varnothing}$ imposent $\mathbb{Z}_p$, comme livré ici. Pour $S = \varnothing$, on écrit $\widehat{\mathbb{Z}} = \mathbb{A}_f^{\varnothing}$.
- Si X est un espace topologique (ou le site étale d'un schéma) et G un ensemble, on désigne par $\underline{G}$ le faisceau constant sur X défini par G.
- On désigne par $\mathbb{G}_a$ et $\mathbb{G}_m$ les groupes additif et multiplicatif.
- Une courbe elliptique est une variété abélienne de dimension un; en particulier, elle est munie d'une origine.
- Si L est un faisceau inversible et si $n \in \mathbb{Z}$, L^n désigne la n-ième puissance tensorielle $L^{\otimes n}$.
- On note $\overline{\mathbb{Q}}$ la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$.
- Le symbole $\square$ marque la fin d'une démonstration, ou son absence.

2 L'isomorphisme de Shimura

(2.1) Une courbe elliptique sur un espace analytique complexe S est un morphisme propre et plat d'espaces analytiques $f : E \to S$, muni d'une section e, dont les fibres sont des courbes elliptiques. Une courbe elliptique sur S admet une et une seule loi de groupe sur S,

$$\mu : E \times_S E \to E,$$

dont la section unité est e. À une courbe elliptique sont associés les objets suivants.

(a) Le faisceau inversible

$$\omega_E = e^*\Omega^1_{E/S}.$$

L'algèbre de Lie relative $\mathrm{Lie}_S(E)$ est le faisceau inversible ω^{-1} dual de ω. On a

$$f_*\Omega^1_{E/S} \xrightarrow{\sim} \omega.$$

(b) Le système local de $\mathbb{Z}$-modules libres de rang 2, $R^1f_*\mathbb{Z}$. On pose

$$T_{\mathbb{Z}}(E) = (R^1f_*\mathbb{Z})^\vee, \qquad T_{\mathbb{Q}}(E) = T_{\mathbb{Z}}(E)\otimes\mathbb{Q},$$

le système local d'homologie de E sur S.

L'application exponentielle définit une suite exacte de faisceaux de sections

$$0 \longrightarrow T_{\mathbb{Z}}(E) \xrightarrow{\alpha} \omega^{-1} \longrightarrow E \longrightarrow 0,$$

de sorte que la courbe elliptique E peut être reconstruite à partir de l'application α.

Le système local $\bigwedge^2 R^1f_*\mathbb{Z} \simeq R^2f_*\mathbb{Z}$ est canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}$. Un isomorphisme entre $\mathbb{Z}^2$ et $R^1f_*\mathbb{Z}$ est dit permis s'il induit 1 sur les secondes puissances extérieures. Notons $\mathrm{Hom}^+(\mathbb{R}^2,\mathbb{C})$ l'ensemble des isomorphismes d'espaces vectoriels réels entre $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{C}$ qui respectent les orientations naturelles de $\mathbb{R}^2$ et de $\mathbb{C}$, définies par $e_1 \wedge e_2 > 0$ et $1 \wedge i > 0$. Un tel homomorphisme est déterminé par sa restriction à $\mathbb{Z}^2$, et l'on pose

$$\mathrm{Hom}^+(\mathbb{Z}^2,\mathbb{C}) = \mathrm{Hom}^+(\mathbb{R}^2,\mathbb{C}).$$

Note sur la source. L'original imprime qu'un isomorphisme permis « induit -1 (sic) » et que les éléments de Hom^+ « ne respectent pas (sic) » les orientations. Le signe $+$, les orientations affichées, le demi-plan de Poincaré de 2.2(ii) et la suite de la construction imposent respectivement 1 et « respectent », comme livré ici. Cet espace est muni de la structure complexe obtenue par son inclusion dans l'espace vectoriel complexe $\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}^2,\mathbb{C})$. Sur cet espace, on dispose d'une suite exacte « universelle »

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_a \longrightarrow E_0 \longrightarrow 0.$$

Proposition (2.2)**.**

(i) Le foncteur qui associe à tout espace analytique S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques E sur S, munies d'isomorphismes

$$\omega_E \simeq \mathbb{G}_a, \qquad R^1 f_* \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}^2$$

(le dernier étant permis), est représenté par l'espace analytique $\mathrm{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$*, muni d'une courbe elliptique universelle E_0.*

(ii) Le foncteur qui associe à tout espace analytique S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques sur S, munies d'un isomorphisme permis $R^1 f_* \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}^2$, est représenté par l'espace analytique

$$X = \mathbb{C}^\times \backslash \mathrm{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C}),$$

le demi-plan de Poincaré.

(iii) L'espace $\mathrm{Hom}^+(\mathbb{R}^2, \mathbb{C})$ *est un espace principal homogène du groupe $\mathbb{G}_m$ sur X.*

On peut encore regarder X comme l'ensemble des structures complexes sur $\mathbb{R}^2$. Cet espace est, d'après (ii), muni d'une courbe elliptique universelle E_X, dont le système local de cohomologie réelle est canoniquement isomorphe à $\mathbb{R}^2$. Soit ω le faisceau inversible associé à E_X.

Le faisceau analytique cohérent

$$R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X$$

est le faisceau de cohomologie de De Rham relative de E_X sur X, et s'insère à ce titre dans une suite exacte, la filtration de Hodge,

$$0 \longrightarrow \omega \longrightarrow R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \xrightarrow{q} \omega^{-1} \longrightarrow 0,$$

puisque, par dualité de Serre, $\omega^{-1} \simeq R^1 f_* \mathcal{O}_{E_X}$.

La description fonctorielle de 2.2(ii) donne évidemment une action à droite du groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ sur (X, E_X) : à $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ et à la courbe elliptique E munie de $\alpha : \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\sim} R^1 f_* \mathbb{Z}$, on associe $(E, \alpha \circ \gamma)$. Si l'on regarde X, muni de

$$q : \mathbb{R}^2 \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \simeq R^1 f_* \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O}_X \longrightarrow \omega^{-1},$$

comme classifiant les structures complexes sur $\mathbb{R}^2$, on a la même action évidente du groupe $\mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R})$ sur $(X, \mathbb{R}^2, \omega, q)$.

(2.3) Choisissons une base (x_1, x_2) de $\mathbb{R}^2$ telle que $x_1 \wedge x_2 > 0$. Un point

$$(f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{C}) \mod \mathbb{C}^\times$$

de X est repéré par

$$z = \frac{f(x_1)}{f(x_2)} \qquad (\mathrm{Im}\, z > 0),$$

et l'application q s'identifie à

$$q : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{G}_a, \qquad a x_1 + b x_2 \longmapsto a z + b.$$

Ceci donne une trivialisation évidente de ω^{-1} sur X, qui n'est pas équivariante. Relativement à cette trivialisation, une section $f(z)$ de ω^k sur X est transformée par un élément

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} \in \mathrm{GL}^+(\mathbb{R}^2)$$

(relativement à la base (x_1, x_2)) suivant la formule

$$f \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} (z) = (cz + d)^{-k} f\left(\frac{az + b}{cz + d}\right).$$

Note sur la source. Dans la première matrice de la ligne imprimée, l'original français et la ressaisie anglaise donnent tous deux $\left(\begin{smallmatrix} a & c \\ b & d \end{smallmatrix}\right)^{-1}$. La formule homographique de la même ligne et la matrice du déterminant juste après imposent toutes deux $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)^{-1}$, comme livré ici. De l'identité

$$dz = (cz + d)^2\, d\left(\frac{az + b}{cz + d}\right) \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}^{-1},$$

on déduit que dz est une section de $\omega^{-2} \Omega^1_X$ invariante sous le groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$. Cette section est partout non nulle et définit un isomorphisme de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$-faisceaux équivariants entre ω^2 et Ω^1_X.

(2.4) Soit Γ un sous-groupe discret, sans élément d'ordre fini et à quotient de volume fini, du groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$. On sait alors que l'espace quotient X/Γ s'identifie à une courbe projective lisse $\overline{X/\Gamma}$, moins un nombre fini de points. Le groupe Γ opère sans points fixes sur X. Le système local équivariant $\underline{\mathbb{R}^2}$ sur X, ainsi que la suite exacte équivariante

$$0 \to \omega \to \mathbb{R}^2 \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \to \omega^{-1} \to 0,$$

définissent donc un système local U sur X/Γ et une suite exacte

$$0 \to \omega \to U \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \to \omega^{-1} \to 0. \tag{2.5}$$

Dans le cas particulier où $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, ces structures sont déduites de la courbe elliptique E sur X/Γ d'image réciproque la courbe elliptique équivariante E_X sur X.

(2.6) Les points à l'infini de X/Γ se décrivent comme suit (voir [9]) :

(a) Ils correspondent aux classes de conjugaison, dans Γ, des sous-groupes non triviaux de Γ, maximaux parmi les sous-groupes de Γ formés d'éléments unipotents.

(b) Soit $\Gamma_0 \subset \Gamma$ un tel sous-groupe et choisissons une base (x_1, x_2) de $\mathbb{R}^2$ telle que, dans cette base, Γ_0 se représente comme l'ensemble de matrices

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ n & 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Soit z la coordonnée (2.3) sur X définie par (x_1, x_2). Il existe N tel que le partie

$$X_N = \{z \mid \mathrm{Im}(z) > N\}$$

de X soit disjointe de ses conjuguées pour tout $\gamma \in \Gamma \setminus \Gamma_0$, de sorte que $X_N/\Gamma_0 \hookrightarrow X/\Gamma$. La fonction $q = e^{2\pi i z}$ établit un isomorphisme entre X_N/Γ_0 et le disque épointé

$$0 < |q| < e^{-2\pi N}.$$

Si P_{Γ_0} est le point de $\overline{X/\Gamma} - X/\Gamma$ associé à Γ_0, cet isomorphisme se prolonge en un isomorphisme d'un voisinage de P_{Γ_0} avec le disque $0 \le |q| < e^{-2\pi N}$.

Note sur la source. La ressaisie imprime les deux inégalités de disque sans valeurs absolues autour de la coordonnée complexe q. La description du disque impose $|q|$, rétabli dans les deux inégalités ci-dessus.

En vertu de (2.3), les sections de ω sur X_N, invariantes par Γ_0, s'identifient aux fonctions holomorphes périodiques de période un sur X_N. On désigne encore par ω le faisceau inversible sur $\overline{X/\Gamma}$ qui prolonge ω et tel qu'au voisinage d'une pointe P_{Γ_0}, la section de ω sur X_N/Γ_0 définie par la fonction 1 se prolonge en une section inversible sur $\overline{X_N/\Gamma_0}$.

(2.7) Sur $\overline{X/\Gamma}$, on dispose des deux faisceaux inversibles Ω^1 et ω^2, et d'un isomorphisme φ (2.3) entre les restrictions de ces faisceaux à X/Γ. De la formule

$$dq = d(e^{2\pi i z}) = 2\pi i e^{2\pi i z}\, dz = 2\pi i q\, dz$$

résulte que la flèche

$$\varphi : \Omega^1 \to \omega^2$$

se prolonge à $\overline{X/\Gamma}$, et présente un zéro simple en chacun des points à l'infini.

Définition (2.8). *L'espace des formes automorphes paraboliques de poids $k+2$, relatives au groupe Γ, est l'espace de sections globales*

$$H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k).$$

En vertu de (2.7), cet espace s'identifie encore à l'espace des sections globales de ω^{k+2} qui s'annulent à l'infini (i.e. à chaque « pointe »).

(2.9) Désignons par U^k le système local sur X/Γ puissance symétrique k-ième du système local U. La flèche (2.5) induit une flèche

$$\iota^k : \omega^k \to U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O},$$

puis une flèche, encore désignée par ι^k,

$$\iota^k : \Omega^1 \otimes \omega^k \to \Omega^1(U^k),$$

de but le faisceau des formes différentielles holomorphes sur X/Γ, à coefficients dans le système local U^k.

La résolution de De Rham de $U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$,

$$0 \to U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \to U^k \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{O} \xrightarrow{d} U^k \otimes_{\mathbb{R}} \Omega^1 \to 0,$$

induit une application

$$\delta : H^0(X/\Gamma, \Omega^1(U^k)) \to H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}).$$

De plus, l'espace de cohomologie $H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C})$ est muni d'une conjugaison complexe naturelle, de sorte que δ définit une application linéaire conjuguée $\overline{\delta}$ de l'espace complexe conjugué à $H^0(X/\Gamma, \Omega^1(U^k))$ dans $H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C})$. On obtient ainsi une flèche

$$\mathrm{sh}_0 = \delta \cdot H^0(\iota^k) \oplus \overline{\delta} \cdot H^0(\overline{\iota^k})$$

$$\mathrm{sh}_0 : H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} \longrightarrow H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}).$$

Quel que soit le faisceau F sur un espace Y, on désignera par $\widetilde{H}^i(Y, F)$ l'image de la cohomologie à support compact $H^i_c(Y, F)$ dans la cohomologie sans support $H^i(Y, F)$.

Le théorème 4.2.6 de [9] est essentiellement équivalent au théorème suivant; dans loc. cit. k est supposé pair, mais la même démonstration vaut en général.

Théorème (2.10, Shimura [7])**.** *Il existe un isomorphisme* sh *rendant commutatif le diagramme suivant :*

$$\begin{array}{ccc} H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} & \xrightarrow{\mathrm{sh}} & \widetilde{H}^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}) \\ \bigcap & & \bigcap \\ H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{X/\Gamma}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} & \xrightarrow{\mathrm{sh}_0} & H^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}). \end{array}$$

On appelle sh *l'isomorphisme de Shimura.*

(2.11) Dans le cas particulier où Γ est un sous-groupe d'indice fini de $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, la courbe elliptique E sur X/Γ provient d'un schéma en courbes elliptiques sur la courbe algébrique $\overline{X/\Gamma}$ (*i.e.*, son invariant modulaire est méromorphe à l'infini) ; elle admet donc un modèle de Néron $\overline{E}$ sur $\overline{X/\Gamma}$. On peut montrer que les fibres de $\overline{E}$ aux points à l'infini sont de type multiplicatif, et que sur tout $\overline{X/\Gamma}$ on a

$$\omega = e^* \Omega^1_{\overline{E}/\overline{X/\Gamma}}.$$

Dans ce cas particulier, on a $U = R^1 f_* \underline{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{R}$, de sorte que le but de l'isomorphisme de Shimura peut s'écrire

$$\widetilde{H}^1(X/\Gamma, U^k \otimes \mathbb{C}) \simeq \widetilde{H}^1(X/\Gamma, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_* \underline{\mathbb{Z}})) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}.$$

Note sur la source. Le texte imprimé donne deux fois la coquille anglaise « fournishes »; les deux occurrences sont livrées sous la forme correcte « furnishes » dans l'édition anglaise.

3 Opérateurs de Hecke et représentation ℓ-adique fondamentale

(3.1) Rappelons (cf. [3]) que la catégorie des $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux « localement constants » constructibles (en abrégé, l.c.c.) sur un schéma S est la catégorie des systèmes projectifs de faisceaux $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur le site étale $S_{\text{ét}}$ de S qui vérifient :

(i) F_n est un faisceau localement constant de $\mathbb{Z}/(\ell^n)$-modules de type fini;

(ii) si $n \leq m$, alors

$$F_m \otimes \mathbb{Z}/(\ell^n) \xrightarrow{\sim} F_n.$$

Les $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux l.c.c. forment un champ en catégories abéliennes sur S ; le champ des $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux l.c.c. est le quotient de ce champ par le sous-champ épais des $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux l.c.c. tués par une puissance de ℓ. On désigne par $\otimes\mathbb{Q}_\ell$ le foncteur canonique de la catégorie des $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux l.c.c. dans celle des $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux l.c.c.

Si S est connexe et muni d'un point géométrique s, la catégorie des $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux (resp. $\mathbb{Q}_\ell$-faisceaux) l.c.c. sur S est équivalente, par le foncteur « fibre en s », à la catégorie des représentations continues du groupe fondamental $\pi_1(S,s)$ sur un $\mathbb{Z}_\ell$-module de type fini (resp. un $\mathbb{Q}_\ell$-vectoriel de rang fini).

Si T est un ensemble fini de nombres premiers, un faisceau lcc en $\mathbb{A}_T^f$ consiste à se donner, pour chaque nombre premier ℓ, un faisceau lcc en $\mathbb{Z}_\ell$ si $\ell \notin T$, et un faisceau lcc en $\mathbb{Q}_\ell$ si $\ell \in T$. Pour $T = \varnothing$, on parle de faisceaux lcc en $\widehat{\mathbb{Z}}$ plutôt que de faisceaux lcc en $\mathbb{A}_\varnothing^f$.

Pour T général, la catégorie des faisceaux lcc en $\mathbb{A}_T^f$ est la limite inductive des catégories de faisceaux lcc en $\mathbb{A}_{T'}^f$ pour $T' \subset T$ fini. On pose

$$\mathbb{Z}_\ell = \varprojlim_n \mathbb{Z}/(\ell^n), \qquad \mathbb{Q}_\ell = \mathbb{Z}_\ell \otimes \mathbb{Q}_\ell, \qquad \widehat{\mathbb{Z}} = (\mathbb{Z}_\ell)_\ell, \qquad \mathbb{A}_T^f = \widehat{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{A}_T^f.$$

Note sur la source. Les coquilles orthographiques évidentes de la réédition anglaise sur cette page—notamment « Shiumra », « particluar », « schme », « constent » et « numbesr »—sont régularisées sans modification mathématique.

Le champ des courbes elliptiques à isogénie près sur S est le champ déduit du champ des courbes elliptiques sur S en « inversant formellement les isogénies ». On désigne par $\otimes\mathbb{Q}$ le foncteur associant à une courbe elliptique la courbe elliptique sous-jacente à isogénie près. Pour S quasi-compact, on a

$$\mathrm{Hom}(E,F) \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(E \otimes \mathbb{Q}, F \otimes \mathbb{Q}),$$

et, pour S normal, toute courbe elliptique à isogénie près sur S est sous-jacente à une courbe elliptique sur S.

(3.2) Soit $f : E \to S$ une courbe elliptique sur un schéma S. On désigne par $T_\ell(E)$ le système projectif des noyaux E_{ℓ^n} de la multiplication par ℓ^n sur E, la flèche de transition de E_{ℓ^n} dans E_{ℓ^m}, pour $n \geq m$, étant la multiplication par ℓ^{n-m}. En procédant de même pour $\mathbb{G}_m$, on pose $T_\ell(\mathbb{G}_m) = \mathbb{Z}_\ell(1)$. Si ℓ est inversible sur S, alors $T_\ell(E)$ et $\mathbb{Z}_\ell(1)$ sont des faisceaux en $\mathbb{Z}_\ell$ sur S. On définit $T_\infty(E)$ comme étant l'algèbre de Lie relative de E sur S, c'est-à-dire le dual inversible du faisceau inversible ω de (2.1(a)).

Supposons S de caractéristique 0. On définit alors le $\widehat{\mathbb{Z}}$-faisceau $T_f(E)$ sur S comme étant le système des $T_\ell(E)$, et l'on pose

$$V_f(E) = T_f(E) \otimes \mathbb{A}_f.$$

Si $u : E \to F$ est une isogénie, alors u induit un isomorphisme de $V_f(E)$ sur $V_f(F)$ et de $T_\infty(E)$ sur $T_\infty(F)$; les foncteurs V_f et T_∞ se factorisent donc par la catégorie des courbes elliptiques à isogénie près sur S.

Proposition (3.3)**.** *Soient S un schéma de caractéristique 0, $E_1(S)$ la catégorie des courbes elliptiques sur S et $E_2(S)$ la catégorie des triplets formés d'une courbe elliptique à isogénie près E sur S, d'un faisceau en $\widehat{\mathbb{Z}}$, T, forme tordue de $\widehat{\mathbb{Z}}^2$, et d'un isomorphisme*

$$\beta : V_f(E) \xrightarrow{\sim} T \otimes \mathbb{A}_f.$$

Alors le foncteur

$$I : E \longmapsto \big(E \otimes \mathbb{Q},\ T_f(E),\ V_f(E) \simeq T_f(E) \otimes \mathbb{A}_f\big)$$

de $E_1(S)$ vers $E_2(S)$ est une équivalence de catégories.

La question est locale sur S, que l'on peut supposer quasi-compact. Si $f : E \to F$ est un morphisme de S-courbes elliptiques, et si f est une isogénie, on dispose d'une suite exacte

$$0 \to T_f(E) \to T_f(F) \to \ker(f) \to 0. \tag{3.4}$$

Le morphisme f est divisible par n si et seulement s'il tue le noyau E_n de la multiplication par n, car la flèche « multiplication par n » de E/E_n dans E est un isomorphisme. Par (3.4), ceci a lieu si et seulement si $T_f(f)$ est divisible par n, et l'on en déduit que $\mathrm{Hom}_S(E,F)$ est le sous-groupe de $\mathrm{Hom}_S(E \otimes \mathbb{Q}, F \otimes \mathbb{Q})$ formé des morphismes f tels que $V_f(f)$ envoie $T_f(E)$ dans $T_f(F)$. Le foncteur I est donc pleinement fidèle.

Note sur la source. L'original français conclut bien que I est « pleinement fidèle ». La mention « faithfully flat » appartient uniquement à la réédition anglaise héritée et y est corrigée en « fully faithful ». Les lapsus de casse évidents $u : e \to F$ et $E_1(s)$ dans cette réédition sont normalisés en $u : E \to F$ et $E_1(S)$.

Soit $X \in \mathrm{Ob}(E_2(S))$. Localement sur S, X est défini par une courbe elliptique à isogénie près $E \otimes \mathbb{Q}$, et par un « réseau » T dans $V_f(E)$ qui, pour presque tout ℓ, coïncide avec $T_\ell(E)$. Pour $q \in \mathbb{Q}$, $(E \otimes \mathbb{Q}, T)$ est isomorphe à $(E \otimes \mathbb{Q}, qT)$, ce qui permet de supposer $T_f(E) \subset T$. Le quotient $K = T/T_f(E)$ est alors canoniquement isomorphe à un sous-groupe fini de E, et X est l'image de E/K par I (cf. 3.4). □

Corollaire (3.5). *Le foncteur $F_1(S)$, respectivement $F_1'(S)$, qui, à chaque schéma S de caractéristique 0, associe l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques sur S munies d'un isomorphisme*

$$\alpha : T_f(E) \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}^2$$

respectivement aussi d'un isomorphisme

$$\alpha_\infty : T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a,$$

est isomorphe au foncteur $F_2(S)$, respectivement $F_2'(S)$, qui associe à S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques à isogénie près sur S, munies d'un isomorphisme

$$\beta : V_f(F) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2$$

respectivement aussi d'un isomorphisme

$$\beta_\infty : T_\infty(F) \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a.$$

Proposition (3.6). *Le foncteur F_1 (respectivement F_1') est représentable par un schéma M_∞ (respectivement M_∞') sur $\mathbb{Q}$.*

Soit $n \geq 3$ un entier. Le foncteur qui associe à chaque schéma S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques, munies d'un isomorphisme

$$\alpha_n : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$$

respectivement aussi de $\alpha_\infty : T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$, est représenté par une courbe affine M_n (respectivement par une surface affine M_n') sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$. Pour $n \mid m$, le morphisme de M_m vers M_n défini par

$$(E, \alpha_m : E_m \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/m)^2) \longmapsto (E, (n/m)\alpha_m : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2)$$

est fini et étale sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/m])$, et l'on a

$$M_\infty = \varprojlim M_n.$$

On procède de même pour représenter F_1'. □

Note sur la source. L'original français donne $\mathcal{O}_S$ et le facteur $(n/m)\alpha_m$. Les leçons héritées $\mathcal{O}_X$ et $(m/n)\alpha_m$, incompatibles avec la base du foncteur et avec la restriction de niveau pour $n \mid m$, sont corrigées dans les deux éditions. Les formes fautives « schem » et « One goes one proceeds » de la réédition anglaise sont en outre régularisées en « scheme » et « One proceeds ».

(3.7) Le schéma M_∞ (respectivement M_∞') est muni d'une courbe elliptique universelle $f_\infty : E_\infty \to M_\infty$ et d'un isomorphisme

$$\alpha : T_f(E_\infty) \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}^2,$$

respectivement aussi d'un isomorphisme

$$\alpha_\infty : T_\infty(E_\infty) \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a.$$

D'après (3.5), le schéma M_∞ (respectivement M_∞') représente le foncteur F_2 (respectivement F_2'), ce qui donne une action évidente à gauche du groupe adélique $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_f)$ sur

$$(M_\infty, E_\infty \otimes \mathbb{Q}, \alpha \otimes \mathbb{A}_f)$$

respectivement sur

$$(M_\infty', E_\infty \otimes \mathbb{Q}, \alpha \otimes \mathbb{A}_f, \alpha_\infty).$$

Sur le foncteur, cette action est donnée, pour $g \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_f)$, par

$$g : (F, \beta : V_f(F) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2, \beta_\infty) \longmapsto (F, g \circ \beta : V_f(F) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2, \beta_\infty).$$

Note sur la source. Les deux témoins imprimés abrègent la trivialisation induite en $\alpha \otimes \mathbb{A}_f^2$ et écrivent $V_f(E)$ dans un triplet dont la courbe est F. Comme $\alpha : T_f(E_\infty) \to \widehat{\mathbb{Z}}^2$, l'extension des scalaires est $\alpha \otimes \mathbb{A}_f$, et le domaine de l'action est $V_f(F)$; ces lectures requises par les types sont livrées ci-dessus. L'original emploie en outre la même courbe universelle E_∞ dans les deux cas; la prime héritée sur E'_∞ est supprimée dans les deux éditions. Šafarevič, le premier, a noté ce fait.

Soit Y un schéma sur $\mathbb{C}$, limite projective de schémas Y_i de type fini sur $\mathbb{C}$, les morphismes de transition étant finis. L'espace localement compact annelé Y^{an}, égal à la limite projective des Y_i^{an}, ne dépend que de Y et non de sa représentation comme limite projective. Si Y est un schéma sur $\mathbb{Q}$, limite projective de schémas Y_i de type fini sur $\mathbb{Q}$ à morphismes de transition finis, on pose $Y^{\mathrm{an}} = (Y \otimes \mathbb{C})^{\mathrm{an}}$. Ceci s'applique à M_∞ et à M'_∞.

Proposition (3.8)**.** *On a canoniquement*

$$M_\infty'^{\mathrm{an}} \simeq \mathrm{Hom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$$

et

$$M_\infty^{\mathrm{an}} \simeq \mathbb{C}^\times \backslash \mathrm{Hom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}),$$

et, moins canoniquement,

$$M_\infty'^{\mathrm{an}} \simeq \mathrm{GL}_2(\mathbb{A}) / \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}), \qquad M_\infty^{\mathrm{an}} \simeq K_\infty \backslash \mathrm{GL}_2(\mathbb{A}) / \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}),$$

où K_∞ est le sous-groupe compact maximal à l'infini, augmenté des homothéties réelles. Ces isomorphismes sont compatibles à l'action de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_f)$.

Note sur la source. La réédition anglaise contient ici les marques non résolues « [a/the, bad copy] » et « [bad copy] ». L'original français donne exactement « le sous-groupe compact maximal à l'infini, augmenté des homothéties réelles »; cette lecture directement établie est livrée ci-dessus.

La notion de courbe elliptique à isogénie près, et leur sorite, s'étendent tels quels au cas analytique complexe. En outre, une isogénie $\varphi : E \to F$ induit un isomorphisme φ^* entre les systèmes locaux de cohomologie rationnelle de E et de F, ce qui permet de définir ce dernier pour une courbe elliptique à isogénie près. Soit S un espace analytique complexe. On voit à l'aide de (2.1) qu'il revient au même de se donner une courbe elliptique à isogénie près sur S, ou de se donner un faisceau inversible T_∞, un système local de $\mathbb{Q}$-vectoriels $T_\mathbb{Q}$, et un morphisme $u : T_\mathbb{Q} \to T_\infty$ induisant point par point un isomorphisme $T_\mathbb{Q} \otimes \mathbb{R} \to T_\infty$.

Soit n un entier et soit K_n le noyau de l'application naturelle

$$\prod_\ell \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell) \to \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/n).$$

Soit G_1 le foncteur qui associe à S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques $f : E \to S$ sur S, munies d'un isomorphisme

$$\varphi : \mathbb{Q}^2 \xrightarrow{\sim} T_\mathbb{Q}(E),$$

d'un isomorphisme $\alpha_\infty : T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$, et d'un isomorphisme $\alpha_n : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$. Comme en (3.3), on voit que G_1 est isomorphe au foncteur G_2 qui associe à S l'ensemble des classes d'isomorphisme de courbes elliptiques à isogénies près E sur S, munies de $\varphi : \mathbb{Q}^2 \xrightarrow{\sim} T_\mathbb{Q}(E)$, de $\alpha_\infty : T_\infty(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S$, et d'un isomorphisme $V_f(E) \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2$ donné localement sur S à composition par un élément de K_n près.

Un tel objet est déterminé par l'application composée φ' (donnée localement modulo K_n) obtenue à partir de

$$\varphi' : \mathbb{Q}^2 \xrightarrow{\varphi} T_\mathbb{Q}(E) \longrightarrow T_\infty(E) \times V_f(E) \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S \times \mathbb{A}_f^2.$$

On a

$$E = \mathcal{O}_S / \varphi'\big(\mathbb{Q}^2 \cap \varphi'^{-1}(T_\infty(E) \times T_f(E))\big) = \widehat{\mathbb{Z}}^2 \backslash (\mathcal{O}_S \times \mathbb{A}_f^2) / \varphi'(\mathbb{Q}^2),$$

de sorte que, cf. 2.2, G_1 et G_2 sont représentés par

$$K_n \backslash \mathrm{Isom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2).$$

Supposons maintenant que $n \geq 3$, de sorte que $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$ agisse librement sur l'espace précédent. L'espace analytique M_n^{an}, respectivement $M_n'^{\mathrm{an}}$, représente le foncteur analogue, en géométrie analytique, au foncteur représenté par M_n, respectivement M_n', parce que ce foncteur, disons X, est représentable et que la flèche $X \to M_n^{\mathrm{an}}$, respectivement $X \to M_n'^{\mathrm{an}}$, induit une bijection sur les ensembles de points à valeurs dans toute $\mathbb{C}$-algèbre de rang fini. On déduit dès lors de ce qui précède que

$$M_n'^{\mathrm{an}} \simeq K_n \backslash \mathrm{Isom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}).$$

Procédant de même pour M_n, on obtient la première assertion de (3.8) par passage à la limite sur n.

Un point x de

$$\mathrm{Isom}(\mathbb{Q}^2 \otimes \mathbb{A}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$$

s'identifie à un « réseau » L_x de $\mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2$, et la courbe correspondante est

$$E_x \simeq \widehat{\mathbb{Z}}^2 \backslash (\mathbb{C} \times \mathbb{A}_f^2) / L_x,$$

munie de

$$V_f(E_x) \simeq L_x \otimes \mathbb{A}_f \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_f^2.$$

De là, sort aisément la dernière assertion de (3.8). □

Désignons par $f_n : E \to M_n$ la courbe elliptique universelle sur M_n. L'entier k étant fixé, on pose la

Définition (3.9). *On désigne par W (ou par ${}^kW$, s'il y a risque de confusion) le $\mathbb{Q}$-vectoriel*

$$W = \varinjlim_n \widetilde{H}^1(M_n^{\mathrm{an}}, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Q})) = \varinjlim_n {}_nW.$$

Note sur la source. Les coquilles de la réédition anglaise « beause », « arros » et « Once deduces » sont régularisées. Dans la description de la courbe correspondant à x, le $V_f(E)$ imprimé est livré sous la forme $V_f(E_x)$, seul objet qui vient d'être défini à cet endroit. La réédition anglaise imprime ensuite que W « doesn't depend on » la courbe universelle, renversant le français « ne dépend que de »; la lecture « ne dépend que de »/« depends only on » est donc rétablie dans les deux éditions. Enfin, l'indice de niveau n, visible dans le f_{n*} de l'original français, est rétabli dans la première formule définissant W.

Ce vectoriel ne dépend que de la courbe elliptique (à isogénie près) universelle $f_\infty : E \to M_\infty$, de sorte que, par transport de structure, il est muni d'une action à gauche du groupe adélique $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_f)$.

Si ℓ est un nombre premier, le vectoriel $W_\ell = W \otimes \mathbb{Q}_\ell$ admet une définition purement algébrique, en terme de cohomologie ℓ-adique des schémas sur la clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ déduits par extension des scalaires des schémas M_n :

$$W_\ell = \varinjlim_n \widetilde{H}^1(M_n \otimes \overline{\mathbb{Q}}, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Q}_\ell)) = \varinjlim_n {}_nW_\ell. \tag{3.10}$$

de sorte que le groupe de Galois de $\overline{\mathbb{Q}}$ sur $\mathbb{Q}$ agit, par transport de structure, sur W_ℓ et les ${}_nW_\ell$.

Enfin, l'espace M_n^{an} est somme disjointe de quotients du demi-plan de Poincaré par des sous-groupes de congruence du groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, de sorte que, désignant par ω le faisceau inversible sur M_n défini par E, la théorie de Shimura (2.10) donne

$$W_\infty = W \otimes \mathbb{C} = \varinjlim_n \left(H^0(\overline{M}_n^{\mathrm{an}}, \Omega^1 \otimes \omega^k) \oplus \overline{H^0(\overline{M}_n^{\mathrm{an}}, \Omega^1 \otimes \omega^k)} \right). \tag{3.11}$$

Note sur la source. La transcription héritée avait perdu les barres des courbes compactifiées $\overline{M}_n^{\mathrm{an}}$ dans les deux termes de (3.11); elles sont rétablies ci-dessus. Le « if is equipped » de la réédition anglaise est régularisé en « it is equipped » dans l'édition anglaise. Cette décomposition de $W \otimes \mathbb{C}$ en deux sous-espaces complexes conjugués, dont l'un est l'espace de toutes formes automorphes holomorphes paraboliques de poids $k+2$, relative à un quelconque sous-groupe de congruence du groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, est analogue à une décomposition de Hodge, « de type »

$$(0, k+1) + (k+1, 0).$$

L'action du groupe adélique commute à l'action du groupe de Galois et respecte la décomposition précédente.

Bien que le système local ℓ-adique $R^1 f_* \mathbb{Q}_\ell$ soit trivial sur M_∞, je ne sais pas s'il existe une relation entre W_ℓ et

$$\varinjlim_n \big(\widetilde{H}^1(M_n \otimes \overline{\mathbb{Q}}, \mathbb{Q}_\ell) \big) \otimes \mathrm{Sym}^k(\mathbb{Q}_\ell^2).$$

(3.12) Soient $n \geq 3$ un entier et K_n comme en (3.8). On a alors

$$W^{K_n} = {}_nW.$$

Cela se vérifie par passage à la limite, et résulte de ce qu'en cohomologie rationnelle, la cohomologie du quotient d'un espace par un groupe fini s'obtient en prenant les invariants de ce groupe dans la cohomologie.

Posons, pour p premier,

$$W^{(p)} = W^{\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)}.$$

Par passage à la limite, on obtient

$$W^{(p)} = \varinjlim_{(n,p)=1} {}_nW.$$

Sur cet espace de cohomologie agissent encore :

(i) le sous-groupe $\prod_{\ell \neq p} \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_\ell)$ de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_f)$, car ce sous-groupe centralise $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$;

(ii) l'algèbre de Hecke $\mathcal{H}(\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p), \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p))$, qui est l'algèbre des mesures entières sur l'espace discret $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)/\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$ invariantes à gauche par $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$. Cette sous-algèbre de l'algèbre du groupe $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ agit sur W en respectant $W^{(p)}$. Cette algèbre agit déjà sur chacun des ${}_nW$ pour n premier à p.

L'algèbre de Hecke admet pour base les (mesures associées aux fonctions caractéristiques des) doubles classes de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$ dans $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$, et l'on sait que

$$\mathcal{H}(\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_p), \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_p)) = \mathbb{Z}[T_p, R_p, R_p^{-1}],$$

où T_p et R_p sont les doubles classes de

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p^{-1} \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \begin{pmatrix} p^{-1} & 0 \\ 0 & p^{-1} \end{pmatrix}.$$

(3.13) Soient p un nombre premier, $n \geq 3$ un entier premier à p, et $F_{n,p}$ le foncteur qui, à chaque schéma S, associe l'ensemble des classes d'isomorphie de diagrammes commutatifs de S-schémas

$$\begin{array}{ccccc} & & & & \mathbb{Z}/(n)^2 & & \\ & & \alpha \nearrow & & & \nwarrow \alpha' & \\ E_n & \longrightarrow & & & F_n & & \\ \cap & & & & \cap & & \\ E & \xrightarrow{\varphi} & & & F & & \end{array} \tag{3.14}$$

où φ est une p-isogénie entre courbes elliptiques et α un isomorphisme. On désigne par q_1 et $q_2 : F_{n,p} \to M_n$ les morphismes de foncteurs associant à un diagramme (3.14) les sous-diagrammes (E, E_n, α) et (F, F_n, α').

Proposition (3.15)**.** *Le foncteur $F_{n,p}$ est représenté par un schéma $M_{n,p}$, et les morphismes $q_1, q_2 : M_{n,p} \to M_n$ sont finis.*

L'automorphisme σ de $F_{n,p}$ envoyant $\varphi : E \to F$ sur ${}^t\varphi : F \to E$ échange q_1 et q_2; il suffit donc de considérer q_1. Ce morphisme identifie $F_{n,p}$ au foncteur des sous-groupes d'ordre p de la courbe elliptique universelle E sur M_n, de sorte que, par la théorie des schémas de Hilbert, $F_{n,p}$ est représentable et $M_{n,p}$ propre sur M_n. Si s est un point géométrique de M_n, $q_1^{-1}(s)$ est l'ensemble des sous-groupes d'ordre p de E_s, et a $p+1$ éléments si $\mathrm{char}(k(s)) \neq p$, un seul (le noyau de Frobenius) si $\mathrm{char}(k(s)) = p$. □

On peut montrer que $M_{n,p}$ est régulier, et que q_1 et q_2 sont finis et plats; nous n'utiliserons pas ce résultat délicat, nous contentant ici de noter qu'au-dessus de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$, chaque q_i fait de $M_{n,p}$ un revêtement étale de degré $p+1$ de M_n.

Les morphismes q_i s'insèrent dans un diagramme commutatif



(3.16)

où (φ, u, v) fait partie du diagramme universel (3.14).

Note sur la source. Dans le TeX hérité, le diagramme (3.16) attachait u et v à l'objet inférieur $M_{n,p}$ et confondait les deux applications diagonales de changement de base. La source donne $u : q_1^* E \to M_{n,p}$ et $v : q_2^* E \to M_{n,p}$, avec deux applications diagonales non étiquetées de chaque changement de base vers E; le diagramme natif ci-dessus restitue cette topologie.

On désignera par I_p le morphisme de M_n dans M_n correspondant au morphisme de foncteur $(E, \alpha) \mapsto (E, \alpha/p)$:

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & E \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_n & \xrightarrow{I_p} & M_n \end{array} \qquad I_p^*(E, \alpha) = (E, \alpha/p). \tag{3.17}$$

I_p^* est un automorphisme de $\widetilde{H}^i(M_n^{\mathrm{an}}, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}))$. Il est pénible, mais routinier, de démontrer que

Proposition (3.18)**.**

(i) L'endomorphisme T_p de ${}_nW$ s'exprime, à l'aide de (3.16), comme la flèche composée

$$\widetilde{H}^1(M_n^{\mathrm{an}}, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Q})) \xrightarrow{q_2^*} \widetilde{H}^1(M_{n,p}^{\mathrm{an}}, \mathrm{Sym}^k(R^1 v_*\mathbb{Q}))$$
$$\xrightarrow{\varphi^*} \widetilde{H}^1(M_{n,p}^{\mathrm{an}}, \mathrm{Sym}^k(R^1 u_*\mathbb{Q})) \xrightarrow{q_{1*}} \widetilde{H}^1(M_n^{\mathrm{an}}, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Q})).$$

où q_{1*} est le « morphisme trace » pour le revêtement q_1.

(ii) De même, $R_p = p^k I_p^*$.

□

Le lecteur méfiant pourrait oublier les préliminaires adéliques et définir T_p par (i). Pour $n = 1$ ou 2, on pose ${}_nW = W^{K_n}$, de sorte que

$${}_1W = {}_nW^{\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/(n))}.$$

Si S_{k+2} désigne l'espace des formes modulaires paraboliques, pour le groupe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, de poids $k+2$, l'isomorphisme de Shimura (3.11) induit un isomorphisme

$${}_1^kW_\infty = {}_1^kW \otimes \mathbb{C} = S_{k+2} \oplus \overline{S}_{k+2}.$$

Il est pénible, mais routinier, de démontrer que

Proposition (3.19)**.** *L'endomorphisme T_p de ${}_1^kW_\infty$ s'identifie, par l'isomorphisme de Shimura, à la somme directe de l'opérateur de Hecke sur S_{k+2} (y compris le facteur p^{k-1}), et de son conjugué.*

□

(3.20) On a canoniquement

$$\bigwedge^2 R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell \simeq R^2 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell \simeq \mathbb{Z}_\ell(-1),$$

de sorte que $\mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)$ est muni d'une forme bilinéaire (symétrique pour k pair, alternée pour k impair) à valeurs dans $\mathbb{Z}_\ell(-k)$. La forme qui s'en déduit par tensorisation par $\mathbb{Q}_\ell$ est non dégénérée.

Si F est un $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau l.c.c. sur un schéma X lisse purement de dimension n sur un corps algébriquement clos k, alors la dualité de Poincaré donne

$$H^i(X, F)^\vee \simeq H_c^{2n-i}(X, \mathrm{Hom}(F, \mathbb{Q}_\ell(n))),$$
$$H_c^i(X, F)^\vee \simeq H^{2n-i}(X, \mathrm{Hom}(F, \mathbb{Q}_\ell(n))),$$
$$\widetilde{H}^i(X, F)^\vee \simeq \widetilde{H}^{2n-i}(X, \mathrm{Hom}(F, \mathbb{Q}_\ell(n))).$$

Faisant $X = \overline{M}_n$ et $F = \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Q}_\ell)$ dans ces considérations, on définit sur ${}_n^kW_\ell$ une forme bilinéaire ${}_n(\ ,\ )$ non dégénérée à valeurs dans $\mathbb{Q}_\ell(-k-1)$. Cette forme est symétrique pour k impair, alternée pour k pair. C'est l'analogue ℓ-adique du produit scalaire de Petersson. Si $n \mid m$, et si le revêtement $\psi : M_m \to M_n$ est de degré d, on a

$${}_m(\psi^* x, \psi^* y) = d \cdot {}_n(x, y).$$

Note sur la source. Le texte imprimé écrit « Peterson » ici et dans la preuve de (5.6), puis « Pertersson » à la fin. Le nom usuel « Petersson » est rétabli partout. La coquille évidente « isomprhism » de la réédition anglaise sur la même page est également régularisée en « isomorphism » dans l'édition anglaise.

4 La formule de congruence

On se fixe dans ce numéro des entiers $k \geq 0$ et $n \geq 3$, et des nombres premiers p et ℓ. On suppose p premier à ℓ et à n. On désigne par $f_n : E \to M_n$ la courbe elliptique universelle sur M_n, munie de $\alpha : E_n \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/(n)^2$.

Quel que soit le schéma Y, on désigne par a l'unique morphisme de Y dans $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, ou, le cas échéant, dans un sous-schéma de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$. Si Y est séparé et de type fini sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, et si F est un $\mathbb{Z}_\ell$- ou $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau sur Y, on note $R^i a_*(Y, F)$, respectivement $R^i a_!(Y, F)$, respectivement $R^i \widetilde{a}(Y, F)$, le $\mathbb{Z}_\ell$- ou $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ qui est la i-ième image directe supérieure de F par a, respectivement la i-ième image directe à supports propres, respectivement $\mathrm{Im}(R^i a_!(Y, F) \to R^i a_*(Y, F))$. Pour $m \in \mathbb{N}$, on pose

$$Y[1/m] = Y \times \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/m]).$$

Théorème (4.1, Igusa [1]). *Le schéma M_n se compactifie en un schéma en courbes M_n^*, projectif et lisse sur* $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$*, tel que $M_n^* \setminus M_n$ soit un revêtement étale de* $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$.

Le schéma M_n est formellement lisse, donc lisse sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$. L'invariant modulaire j de la courbe universelle sur M_n est un morphisme de M_n dans la droite affine $\mathbb{A}^1$ sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$. Ce morphisme j est fini, et est un revêtement étale en dehors des sections 0 et 1728 de $\mathbb{A}^1$; en effet:

(a) Deux courbes elliptiques sur un corps algébriquement clos de même invariant j sont isomorphes (par exemple [8] 6.3), donc les fibres géométriques de j sont finies. Les schémas M_n et $\mathbb{A}^1$ étant lisses de même dimension relative sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$, j est quasi-fini et plat.

(b) Si E est une courbe elliptique sur le corps des fractions K d'un anneau de valuation discrète R, d'invariant j dans R, et dont les points d'ordre n sont rationnels sur K, alors E a une bonne réduction. Le critère valuatif de propreté montre donc que j est propre.

(c) Si E et F sont deux courbes elliptiques sur un schéma S, de même invariant j, et si j et $j - 1728$ sont inversibles, alors le schéma $\mathrm{Isom}(S; E, F)$ des isomorphismes entre E et F est étale sur S ([8] 6.3). Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Isom}(M_n \times_{\mathbb{A}^1} M_n; \mathrm{pr}_1^* E, \mathrm{pr}_2^* E) & \sim & M_n \times \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/(n)) \\ \downarrow u & & \downarrow v \\ M_n \times_{\mathbb{A}^1} M_n & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & M_n, \end{array}$$

où $j \neq 0, 1728$, u et v sont étales surjectifs; donc pr_1 est étale et, par descente plate, j est étale.

La section à l'infini de la droite projective $\mathbb{P}^1 \supset \mathbb{A}^1$ sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ est un diviseur régulier, de point générique de caractéristique 0, dans un schéma régulier. Il résulte alors d'un théorème d'Abhyankar (voir [5]) que, le long de ce diviseur $j = \infty$, M_n est modérément ramifié sur $\mathbb{P}^1$, et que le normalisé M_n^* de $\mathbb{P}^1$ dans M_n vérifie (4.1). □

Note sur la source. Les deux témoins imprimés donnent « Abyankhar »; le nom usuel « Abhyankar » est rétabli. L'hésitation de la réédition anglaise « moderately (tamely?) ramified » est résolue, dans l'édition anglaise, par le terme mathématique standard « tamely ramified »; le français diplomatique conserve exactement « modérément ramifié ».

Du même théorème résulte que les $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux l.c.c. $R^i f_{n*}\mathbb{Z}_\ell$ sur $M_n[1/\ell]$ sont modérément ramifiés à l'infini. De là, de (4.1) et des théorèmes de spécialisation en cohomologie ℓ-adique (voir [5]), il résulte que $R^i a_*(M_n, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$, $R^i a_!(M_n, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$, et donc $R^i \widetilde{a}(M_n, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$ sont des $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux l.c.c. sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$, de formation compatible à tout changement de base.

Corollaire (4.2). *Le module galoisien ${}_nW_\ell$ est la fibre en le point géométrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de* $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$ *du $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau l.c.c.*

$$R^1 \widetilde{a}(M_n, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)) \otimes \mathbb{Q}_\ell$$

Il est non ramifié en dehors de n et de ℓ.

□

Note sur la source. L'original français numérote ce corollaire « 3.2 » au milieu du §4. La suite après le Théorème 4.1 et la réédition anglaise imposent 4.2; cette coquille de numérotation est corrigée visiblement ici.

Soient sur $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ les deux diagrammes commutatifs



plus brièvement sous la forme

$$F : (E, \alpha) \to (E^{(p)}, \alpha^{(p)}) \qquad \text{et} \qquad V : (E^{(p)}, p\alpha^{(p)}) \to (E, \alpha),$$

où F est le morphisme de Frobenius et V, son transposé, le « Verschiebung ». Ces diagrammes définissent des morphismes Φ_1 et Φ_2 de $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ dans $M_{n,p}$. Ces morphismes sont finis, en tant que section de q_1 ou q_2, et définissent un morphisme

$$\Phi = \Phi_1 \coprod \Phi_2 : M_n \otimes \mathbb{F}_p \coprod M_n \otimes \mathbb{F}_p \to M_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p.$$

Note sur la source. Les tableaux hérités répétaient à tort les étiquettes F et V sur les flèches induites entre les sous-schémas de n-torsion. Dans la source, ces flèches horizontales supérieures ne sont pas étiquetées; seules les applications entre courbes elliptiques portent F et V. Les diagrammes natifs ci-dessus rétablissent cette distinction. L'original français imprime en outre les quatre signes d'inclusion $\cap$, le connecteur central « et », F et V au-dessus des flèches inférieures, et $p \cdot \alpha^{(p)}$ dans le diagramme de droite; ces détails sont conservés ici. Soit Φ^h la restriction de Φ aux ouverts M_n^h et $M_{n,p}^h$ de $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ et de $M_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p$ correspondant aux courbes d'invariant de Hasse h non nul.

Proposition (4.3). *Φ^h est un isomorphisme.*

Soit $\varphi : E_1 \to E_2$ une p-isogénie entre courbes elliptiques d'invariant de Hasse inversible sur un schéma S de caractéristique p. En chaque point géométrique de S, ou bien le noyau $\ker(\varphi)$ de φ est étale sur S, ou bien son dual de Cartier, isomorphe à $\ker({}^t\varphi)$, est étale sur S. La propriété « $\ker(\varphi)$ est étale » est une propriété ouverte, de sorte que, localement sur S, ou bien $\ker(\varphi)$ est purement infinitésimal, ou bien $\ker({}^t\varphi)$ l'est. Le seul sous-groupe infinitésimal d'ordre p de E_1 ou E_2 étant le noyau de Frobenius, dans le premier cas, φ est isomorphe à $F : E_1 \to E_1^{(p)}$, et dans le second, ${}^t\varphi$ est isomorphe à $F : E_2 \to E_2^{(p)}$, donc φ à $V : E_2^{(p)} \to E_2$. □

Proposition (4.4).

(i) Le schéma $M_{n,p}$ est lisse sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ *en dehors des points de caractéristique p où $h = 0$.*

(ii) Les morphismes q_1 et q_2 induisent des morphismes finis plats q_1' et q_2' de la normalisation $M'_{n,p}$ de $M_{n,p}$ vers M_n.

(iii) Le morphisme Φ se factorise par un morphisme surjectif

$$\Phi' : M_n \otimes \mathbb{F}_p \coprod M_n \otimes \mathbb{F}_p \to M'_{n,p} \otimes \mathbb{F}_p.$$

L'automorphisme σ de (3.15) échange φ et ${}^t\varphi$; il suffit donc de prouver (i) en les points de caractéristique p de $M_{n,p}$ où le noyau de φ est infinitésimal: il n'y a pas d'obstruction à relever infinitésimalement une courbe elliptique et la partie infinitésimale du noyau de la multiplication par p.

Là où $p = h = 0$, la fibre du morphisme fini (3.15) $q_i : M_{n,p} \to M_n$ est réduite à un point, de sorte que l'ouvert de lissité de $M_{n,p}$ est dense dans $M_{n,p}$ et que $M'_{n,p}$ est partout de dimension 2. Le schéma M_n étant régulier, d'après EGA 0_{IV} 16.5.1 et 17.3.5(ii), le morphisme $q_i : M'_{n,p} \to M_n$ est plat. Enfin, (iii) résulte de ce que Φ est fini et $M_n \otimes \mathbb{F}_p$ une courbe normale. □

L'endomorphisme de Hecke T_p de ${}_nW_\ell$, tel qu'il est explicité en (3.18), est le tensorisé par $\mathbb{Q}_\ell$ de la fibre au point géométrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n, 1/\ell])$ de l'endomorphisme (encore désigné par T_p) de $R^1\widetilde{a}(M_n, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$

défini par la « correspondance »



(4.5)

avec

$$T_p = q'_{1*}\,\varphi^*\,q_2'^* \qquad \text{(cf. 3.18)}.$$

Note sur la source. Comme dans la version héritée de (3.16), le tableau hérité de (4.5) attachait u et v à l'objet modulaire inférieur et confondait deux applications distinctes des changements de base vers les courbes. Le diagramme natif rétablit les neuf flèches de la source. Les endomorphismes R_p et I_p s'interprètent de même.

Lemme (4.6)**.** *Soient sur un schéma noethérien S quatre schémas séparés de type fini X, Y, Z_1, Z_2, F un $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau sur X, G un $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau sur Y, et désignons par a chacune des flèches structurelles de X, Y, Z_1 ou Z_2 dans S.*

Soient un diagramme commutatif de S-schémas, et des morphismes de faisceaux:

$$y_1^* G \xrightarrow{z_1} x_1^* F \qquad\qquad y_2^* G \xrightarrow{z_2} x_2^* F$$



Supposons que $f^* z_2 = z_1$, que y_1 et y_2 sont propres, que x_1 et x_2 sont finis et plats, et que, pour tout point géométrique s de Z_2, la multiplicité de s dans sa fibre $x_2^{-1}(x_2(s))$ est égale à la somme des multiplicités dans leur fibre (pour x_1) des points géométriques de Z_1 image réciproque de s par f. Alors, le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc}
R^i\widetilde{a}(Y,G) & \xrightarrow{y_1^*} & R^i\widetilde{a}(Z_1,G) & \xrightarrow{z_1} & R^i\widetilde{a}(Z_1,F) & \xrightarrow{x_{1*}} & R^i\widetilde{a}(X,F) \\
\| & & \uparrow{\scriptstyle f^*} & & \uparrow{\scriptstyle f^*} & & \| \\
R^i\widetilde{a}(Y,G) & \xrightarrow[y_2^*]{} & R^i\widetilde{a}(Z_2,G) & \xrightarrow[z_2]{} & R^i\widetilde{a}(Z_2,F) & \xrightarrow[x_{2*}]{} & R^i\widetilde{a}(X,F)
\end{array}$$

est commutatif.

Note sur la source. Les tableaux hérités avaient perdu la paire d'objets partagée $Z_1 \to Z_2$ du diagramme structurel et désalignaient les applications verticales dans les deux diagrammes cohomologiques. Les diagrammes sont reconstruits nativement avec les objets partagés de la source et ses flèches diagonales, verticales, d'égalité, de changement de base et de trace distinctes. Une réparation antérieure avait dupliqué $Z_1 \to Z_2$ en deux copies disjointes; la relecture directe de l'original français, p. 164, a révélé cette erreur topologique résiduelle, désormais corrigée dans les deux éditions.

Ce lemme résulte des lemmes analogues pour $R^i a_!$ et $R^i a_*$. La commutativité des premiers carrés est triviale. Le dernier se récrit

$$\begin{array}{ccccc}
R^i\widetilde{a}(Z_1, x_1^* F) & \xleftarrow{\sim} & R^i\widetilde{a}(X, x_{1*}x_1^* F) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}} & R^i\widetilde{a}(X,F) \\
\uparrow & & \uparrow & & \| \\
R^i\widetilde{a}(Z_2, x_2^* F) & \xleftarrow{\sim} & R^i\widetilde{a}(X, x_{2*}x_2^* F) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}]{} & R^i\widetilde{a}(X,F)
\end{array}$$

et l'on rappelle la définition de la trace pour vérifier que le carré

$$\begin{array}{ccc} x_{1*}x_1^*F & \xrightarrow{\mathrm{Tr}} & F \\ \uparrow & & \| \\ x_{2*}x_2^*F & \xrightarrow{\mathrm{Tr}} & F \end{array}$$

est commutatif. □

(4.7) On désignera par $T_p/\mathbb{F}_p$ l'endomorphisme induit par T_p sur la restriction à $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p)$ du $\mathbb{Z}_\ell$-faisceau l.c.c. $R^1\widetilde{a}(M_n, \mathrm{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)$. On a

$$R^1\widetilde{a}(M_n, \mathrm{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)|\,\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p) \xrightarrow{\sim} R^1\widetilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \mathrm{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell);$$

la formation du morphisme trace pour un morphisme fini et plat est compatible au changement de base, de sorte que $T_p/\mathbb{F}_p$ peut se construire, sur le modèle (3.18), à partir de la fibre en $\mathbb{F}_p$ de la « correspondance » (4.5). Le lemme (4.6), appliqué au diagramme commutatif



fournit alors une décomposition de $T_p/\mathbb{F}_p$ en la somme des endomorphismes définis par les deux correspondances suivantes:



où F est le Frobenius absolu. On reconnaît dans cette correspondance le Frobenius géométrique



Note sur la source. La version anglaise tardive et les tableaux hérités dédoublaient la rangée supérieure commune du diagramme de changement de base en deux triangles disjoints; le diagramme natif rétablit les deux objets supérieurs uniques et leurs quatre flèches comme dans l'original français. Les tableaux hérités des correspondances (a) et (b) ne conservaient que quatre des huit relations descendantes de la source et représentaient deux relations d'égalité par des flèches. Les diagrammes natifs rétablissent toutes les diagonales, les deux relations d'égalité de chaque correspondance, ainsi que les étiquettes $f_n^{(p)}$, f_n, x et F à leurs points d'attache imprimés. L'original français place le point final de (b) dans la cellule à droite de l'objet inférieur droit; la version anglaise tardive le place après l'objet médian droit, et chaque édition indépendante conserve sa ponctuation imprimée. Les deux témoins imprimés placent également le point final du diagramme composé pour x dans une cellule terminale indépendante à droite de l'objet inférieur droit; les deux éditions le conservent ainsi. La flèche x est la flèche composée $I_p^{-1} \circ F$:

$$\begin{array}{ccccc} (E,\alpha) & \longleftarrow & (E,p\alpha) & \longleftarrow & (E^{(p)},p\alpha^{(p)}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xleftarrow{I_p^{-1}} & M_n \otimes \mathbb{F}_p & \xleftarrow{F} & M_n \otimes \mathbb{F}_p \end{array} .$$

L'endomorphisme correspondant est donc le composé de

$$V : R^1\widetilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell)) \xrightarrow{V^*} R^1\widetilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}^{(p)}\mathbb{Z}_\ell)) \xrightarrow{\mathrm{Tr}_F} R^1\widetilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$$

et de

$$I_p^* = \mathrm{Tr}_{I_p^{-1}} : \quad \text{endomorphisme de } R^1\widetilde{a}(M_n \otimes \mathbb{F}_p, \mathrm{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell).$$

Proposition (4.8). *On a $T_p/\mathbb{F}_p = F + I_p^* V$, et*

(i) F s'identifie à l'inverse de l'élément de Frobenius (« arithmétique ») φ_p du groupe de Galois $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$ agissant sur $\widetilde{H}^1(M_n \otimes \overline{\mathbb{F}}_p, \mathrm{Sym}^k(R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell))$;

(ii) F et V sont transposés l'un de l'autre relativement au produit scalaire (3.20);

(iii) $FV = VF = p^{k+1}$.

Pour la relation (i) entre Frobenius géométrique et arithmétique, on renvoie à l'exposé de C. Houzel (SGA 5.XV). Le composé VF est le composé des homomorphismes déduits des flèches suivantes:

$$\begin{array}{ccccccccc} E & \longleftarrow & E^{(p)} & \xrightarrow{F_E} & E & \xrightarrow{V_E} & E^{(p)} & \longrightarrow & E \\ \downarrow & & & \searrow & \downarrow & \swarrow & & & \downarrow \\ M_n & & & \xrightarrow{F} & M_n & & \xrightarrow{F} & & M_n \end{array}$$

Note sur la source. Le tableau hérité réduisait le diagramme imprimé à cinq objets $E \leftarrow E^{(p)} \to E \to E^{(p)} \to E$ à trois objets, omettant ainsi les deux tordus de Frobenius intermédiaires et leurs applications structurelles diagonales. Le diagramme natif complet ci-dessus rétablit les cinq objets et les onze flèches de la source. Ainsi

$$VF = \mathrm{Tr}_F \circ F_E^* \circ V_E^* \circ F^*.$$

La flèche $F_E^* V_E^* = (F_E V_E)^* = (p \cdot 1_E)^*$ agit par multiplication par p^k sur $\mathrm{Sym}^k R^1 f_{n*}\mathbb{Z}_\ell$, de sorte que

$$VF = p^k \,\mathrm{Tr}_F \circ F^* = p^k \cdot p = p^{k+1},$$

car $F : M_n \to M_n$ est de degré p.

Par transport de structure, φ_p respecte le produit scalaire (3.20), à valeur dans $\mathbb{Q}_\ell(-k-1)$, groupe sur lequel φ_p agit par multiplication par p^{-k-1}. On a donc

$$(Fx, y) = p^{k+1}(\varphi_p Fx, \varphi_p y) = (x, p^{k+1}F^{-1}y) = (x, Vy).$$

□

Le théorème suivant, synonyme de (4.8), remonte à Eichler.

Théorème (4.9, formule de congruence). *Soient $K_{n,\ell}$ la plus grande sous-extension de $\overline{\mathbb{Q}}$ non ramifiée en dehors de n et ℓ, φ_p un élément de Frobenius relatif à p dans $\mathrm{Gal}(K_{n,\ell}/\mathbb{Q})$, F l'endomorphisme φ_p^{-1} de ${}_nW_\ell$ et V le transposé de F relativement au produit scalaire (3.20). Alors,*

$$T_p = F + I_p^* V, \qquad FV = p^{k+1}, \qquad 1 - T_p X + pR_p X^2 = (1 - FX)(1 - I_p^* VX).$$

□

5 Weil implique Ramanujan

Si p est un nombre premier et X un schéma sur $\mathbb{F}_p$, on désignera par $\overline{\mathbb{F}}_p$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$, par $F : X \to X$ l'endomorphisme de Frobenius (« géométrique »), et on posera $\overline{X} = X \otimes \overline{\mathbb{F}}_p$; ℓ désignera toujours un nombre premier distinct de p.

Par « conjectures de Weil », on entendra l'énoncé suivant: soient X un schéma projectif et lisse sur $\mathbb{F}_p$ et ℓ un nombre premier distinct de p. Alors, les valeurs propres de l'endomorphisme F^* de $H^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ sont des entiers algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $p^{i/2}$.

Avec les hypothèses et notations de 4.9, on a (rappelons que $(p, n) = 1$):

Théorème (5.1). *Si les conjectures de Weil sont vraies, alors les valeurs propres de l'endomorphisme F de ${}^k_nW_\ell$ sont des entiers algébriques (dont tous les conjugués complexes sont) de valeur absolue $p^{(k+1)/2}$.*

Note sur la source. L'énoncé imprimé parle des « valeurs absolues de l'endomorphisme » et donne $p^{k+1/2}$. Le théorème porte sur les valeurs propres de F, et le poids est $k+1$; on livre donc la lecture mathématiquement requise $p^{(k+1)/2}$.

Admettons les conjectures de Weil.

Lemme (5.2, modulo Weil). *Soit X un schéma lisse sur $\mathbb{F}_p$, qui puisse se représenter comme un ouvert dans un schéma projectif et lisse X^*. Alors, les valeurs propres de l'endomorphisme F^* de $\widetilde{H}^i(X,\mathbb{Q}_\ell)$ sont des entiers algébriques de valeur absolue $p^{i/2}$.*

Note sur la source. La formule imprimée « valeurs absolues de l'endomorphisme » est corrigée en « valeurs propres de l'endomorphisme »; la valeur absolue $p^{i/2}$ est inchangée.

La flèche naturelle de $H^i_c(X,\mathbb{Q}_\ell)$ dans $H^i(X,\mathbb{Q}_\ell)$ se factorise par $H^i(X^*,\mathbb{Q}_\ell)$:

$$H^i_c(X,\mathbb{Q}_\ell)\to H^i(X^*,\mathbb{Q}_\ell)\to H^i(X,\mathbb{Q}_\ell),$$

de sorte qu'en tant que $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$-module, $\widetilde{H}^i(X,\mathbb{Q}_\ell)$ est quotient d'un sous-objet de $H^i(X^*,\mathbb{Q}_\ell)$. □

Lemme (5.3, modulo Weil). *Soient S un schéma lisse sur $\mathbb{F}_p$ et $f:A\to S$ un schéma abélien sur S. Supposons que A puisse se représenter comme un ouvert dans un schéma A^* projectif et lisse sur $\mathbb{F}_p$. Alors, l'endomorphisme de Frobenius géométrique F^* de $\widetilde{H}^i(S,R^jf_*\mathbb{Q}_\ell)$ a pour valeurs propres des entiers algébriques de valeur absolue $p^{(i+j)/2}$.*

Note sur la source. L'exposant imprimé est $i+j/2$. Le poids cohomologique étant $i+j$, l'exposant requis est $(i+j)/2$, comme livré ci-dessus et comme l'exige l'application de (5.2) dans la preuve.

Soit m un entier >1, et considérons les suites spectrales de Leray

$$E:E_2^{ij}=H^i(\overline{S},R^jf_*\mathbb{Q}_\ell)\Longrightarrow H^{i+j}(\overline{A},\mathbb{Q}_\ell),\qquad {}_cE:{}_cE_2^{ij}=H^i_c(\overline{S},R^jf_*\mathbb{Q}_\ell)\Longrightarrow H^{i+j}_c(\overline{A},\mathbb{Q}_\ell).$$

L'endomorphisme de multiplication par m, $\psi_m=m\cdot 1_A$, définit des endomorphismes de E et de ${}_cE$ qui s'insèrent dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} {}_cE & \longrightarrow & E \\ \psi_m^*\downarrow & & \psi_m^*\downarrow \\ {}_cE & \longrightarrow & E \end{array}.$$

ψ_m^* agit sur $R^jf_*\mathbb{Q}_\ell$ par multiplication par m^j, de sorte que sur les termes ${}_cE_r^{ij}$ et E_r^{ij} de ${}_cE$ et de E, ψ_m^* est la multiplication par m^j. Les flèches d_r pour $r\geq 2$ commutent à ψ_m^* et envoient E_r^{ij} (resp. ${}_cE_r^{ij}$) dans $E_r^{i'j'}$ (resp. ${}_cE_r^{i'j'}$), avec $j\neq j'$. Elles sont donc nulles, et E_2^{ij} (resp. ${}_cE_2^{ij}$) s'identifie au sous-espace de $H^{i+j}(\overline{A},\mathbb{Q}_\ell)$ (resp. de $H^{i+j}_c(\overline{A},\mathbb{Q}_\ell)$) où $\psi_m^*=m^j$. Dès lors, $\widetilde{H}^i(S,R^jf_*\mathbb{Q}_\ell)$ s'identifie, comme module galoisien, au sous-espace de $\widetilde{H}^{i+j}(A,\mathbb{Q}_\ell)$ où $\psi_m^*=m^j$, et on applique (5.2). L'astuce utilisée ici est due à Lieberman. □

Note sur la source. La preuve imprimée affirme que ces différentielles sont non nulles. Comme elles commutent à ψ_m^* tout en reliant les espaces propres distincts m^j et $m^{j'}$, avec $j\neq j'$, elles sont nulles; c'est exactement la dégénérescence utilisée dans l'identification suivante. Les deux témoins imprimés placent le point final du diagramme commutatif dans une cellule séparée à droite de l'objet inférieur droit; l'édition le conserve ainsi.

Soit $f_n:E\to M_n\otimes\mathbb{F}_p$ la courbe elliptique universelle sur $M_n\otimes\mathbb{F}_p$, et soit $f_{n,k}:E_k\to M_n\otimes\mathbb{F}_p$ son produit fibré itéré k-uple avec elle-même. La formule de Kunneth montre que le $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau $R^kf_{n,k*}\mathbb{Q}_\ell$ admet comme facteur direct la puissance tensorielle k-ième de $R^1f_{n*}\mathbb{Q}_\ell$; celle-ci à son tour contient comme facteur direct le $\mathbb{Q}_\ell$-faisceau $\mathrm{Sym}^k(R^1f_{n*}\mathbb{Q}_\ell)$. Le théorème 5.1 résulte donc de (5.3) et du lemme suivant.

Lemme (5.4). *Le schéma E_k est un ouvert d'un schéma E_k^* projectif et lisse sur $\mathbb{F}_p$.*

Soit E^* le modèle minimal de Néron de E sur $M_n^*\otimes\mathbb{F}_p$ (4.1). Le schéma E^* est projectif et lisse sur $\mathbb{F}_p$. Puisque $n\geq 3$ et que les points d'ordre n de E forment un revêtement trivial de $M_n\otimes\mathbb{F}_p$, ce modèle de Néron est « semi-stable » (cas a ou b_m dans la classification de Néron). En particulier, la projection $f_n:E^*\to M_n^*$ n'a qu'un nombre fini de points de non lissité, et, en ces points, f_n est non dégénérée (présente une singularité quadratique ordinaire).

Soit E_k^{**} le produit fibré itéré k-uple de E^* sur M_n^*. Pour prouver (5.4), il suffit de résoudre les singularités de E_k^{**} sans toucher à l'ouvert E_k. Prouvons tout d'abord:

Lemme (5.5). *Soit V la sous-variété de l'espace affine sur un corps k, de coordonnées $(X_i)_{0\le i\le r}$, $(Y_i)_{0\le i\le r}$, $(T_i)_{1\le i\le s}$, d'équation*

$$X_0Y_0 = X_1Y_1 = \cdots = X_rY_r.$$

Soit $\mathfrak{m}$ l'idéal de $\mathcal{O}_V$ engendré par les monômes qui se déduisent du monôme $\prod_{i=0}^r X_i^i$ par une permutation des coordonnées qui respecte l'ensemble des paires $\{X_i, Y_i\}$, $0 \le i \le r$. Alors $\mathfrak{m} = \mathcal{O}_V$ en dehors du lieu singulier de V, et la variété $\widetilde{V}$ déduite de V en éclatant $\mathfrak{m}$ est lisse sur k.

Le lieu singulier est le lieu où quatre coordonnées X_i, Y_i, X_j, Y_j $(i \neq j)$ s'annulent. L'ouvert affine de $\widetilde{V}$ défini par l'élément $\prod_{i=1}^r X_i^i$ de l'idéal à éclater $\mathfrak{m}$ est le spectre de l'anneau régulier

$$k[Y_0/X_1, X_0/X_1, X_1/X_2, \ldots, X_{r-1}/X_r, X_r, T_1, \ldots, T_s]$$

(pour le vérifier, noter que $X_i/X_{i+1} = Y_{i+1}/Y_i$), et 5.5 en résulte. □

On montre maintenant que, localement pour la topologie étale, les singularités de E_k^{**} sont isomorphes à celles de V (pour $r = k-1$), et que ceci permet de définir sur E_k^{**} un idéal $\mathfrak{m}$ analogue à l'idéal $\mathfrak{m}$ de (5.5). Éclatant cet idéal, on obtient E_k^*. □

Une approximation du théorème suivant a été démontrée par Ihara [2]:

Théorème (5.6). *Les conjectures de Weil impliquent la conjecture de Ramanujan.*

Notons tout d'abord que (5.1) reste vrai pour $n = 1$, car ${}_1^kW_\ell$ est le sous-module galoisien de ${}_m^kW_\ell$ invariant par $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}/(m))$. Sur ${}_1^kW_\ell$, I_p^* induit l'identité, et (4.8) se réduit à

$$1 - T_pX + p^{k+1}X^2 = (1 - FX)(1 - VX).$$

Les endomorphismes F et V sont transposés l'un de l'autre, de sorte que

$$\det(1 - FX; {}_1^kW_\ell) = \det(1 - VX; {}_1^kW_\ell).$$

L'action de T_p sur ${}_1^kW_\ell$ est induite par son action sur ${}_1^kW$, et est compatible à la décomposition de ${}_1^kW \otimes \mathbb{C}$ en la somme de l'espace S_{k+2} des formes modulaires paraboliques relatives à $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, de poids $k+2$, et de l'espace complexe conjugué. Du caractère hermitien de T_p (pour le produit scalaire de Petersson) et de (3.19), on déduit alors que

$$\det(1 - T_pX + p^{k+1}X^2; {}_1^kW_\ell) = \det(1 - T_pX + p^{k+1}X^2; S_{k+2})^2,$$

et

$$\det(1 - T_pX + p^{k+1}X^2; S_{k+2})^2 = \det(1 - FX; {}_1^kW_\ell)^2,$$

soit

$$\det(1 - T_pX + p^{k+1}X^2; S_{k+2}) = \det(1 - FX; {}_1^kW_\ell). \tag{5.7}$$

Reprenons les notations du n° 1 et faisons $k = 10$. En vertu de la théorie de Hecke et de (3.19), (5.7) se réécrit

$$H_p(X) = \det(1 - FX; {}_1^{10}W_\ell),$$

et l'on applique (5.1). □

On vérifie de même que les conjectures de Weil impliquent la généralisation par Petersson de la conjecture de Ramanujan.

Références

[1] J. Igusa, *Kroneckerian model of fields of elliptic modular functions*, Am. J. of Math. **81** (1959), 561–577.

[2] Y. Ihara, *Hecke polynomials as congruence zeta functions in elliptic modular case*, Ann. of Math., S.2 **85** (1967), 267–295.

[3] J.-P. Jouanolou, exposés V et VI de SGA 5.

[4] M. Kuga et G. Shimura, *On the zeta function of a fibre variety whose fibres are abelian varieties*, Ann. of Math., S.2 **82** (1965), 478–539.

[5] M. Raynaud, exposé XIII de SGA 1 et appendice (à paraître).

[6] J.-P. Serre, *Une interprétation des congruences relatives à la fonction τ de Ramanujan*, Sém. Delange–Pisot–Poitou, 1967/68, no. 14.

[7] G. Shimura, *Sur les intégrales attachées aux formes automorphes*, J. Math. Soc. of Japan **11** (1959), 291–311.

[8] J. Tate, *Courbes elliptiques: formulaire*, mis au goût du jour par P. Deligne, notes miméographiées par l'I.H.E.S.

[9] J.-L. Verdier, *Sur les intégrales attachées aux formes automorphes* (d'après G. Shimura), Sém. Bourbaki, février 1961, exp. 216.

Sigles. EGA: *Éléments de géométrie algébrique*, par A. Grothendieck et J. Dieudonné, Publ. Math. I.H.E.S.

SGA: *Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie*, Notes miméographiées par l'I.H.E.S., à paraître à North-Holland.

Séminaire BOURBAKI
22e année, 1969/70, n° 376 Mai–Juin 1970

TRAVAUX DE GRIFFITHS

par Pierre DELIGNE

Cet exposé contient une partie des résultats fondamentaux de Griffiths sur les familles de structures de Hodge. Il ne contient aucun de ses résultats sur les cycles algébriques.

1. Structures de Hodge.

Soit $H_{\mathbb{R}}$ un espace vectoriel réel de dimension finie.

DÉFINITION 1.1.- *Une structure de Hodge réelle sur $H_{\mathbb{R}}$ est une bigraduation de*

$$H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

$$H_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p,q} H^{pq},$$

telle que H^{pq} et H^{qp} soient complexes conjugués.

Les nombres de Hodge d'une structure de Hodge réelle H sont les entiers

$$h^{pq} = \dim_{\mathbb{C}}(H^{pq}).$$

On dit que H est de poids n si $h^{pq} = 0$ pour $p + q \neq n$. Une variante de 1.1 est :

DÉFINITION 1.2.- *Une structure de Hodge réelle de poids n sur $H_{\mathbb{R}}$ est une filtration finie décroissante F de $H_{\mathbb{C}}$ (la filtration de Hodge) telle que, pour $p + q = n + 1$, on ait*

$$F^p(H_{\mathbb{C}}) \oplus \overline{F}^q(H_{\mathbb{C}}) \xrightarrow{\sim} H_{\mathbb{C}}. \tag{1.2.1}$$

On passe de 1.1 à 1.2 en posant

$$F^p(H_{\mathbb{C}}) = \sum_{p' \geq p} H^{p'q'} \tag{1.2.2}$$

et on passe de 1.2 à 1.1 en posant, pour $p + q = n$,

$$H^{pq} = F^p(H_{\mathbb{C}}) \cap \overline{F}^q(H_{\mathbb{C}}). \tag{1.2.3}$$

1.3. Désignons par $\mathbb{S}$ le groupe algébrique réel obtenu par restriction des scalaires à la Weil, de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}$, du groupe multiplicatif $\mathbb{G}_m$. On a $\mathbb{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$; on dispose d'un morphisme naturel w de $\mathbb{G}_m$ dans $\mathbb{S}$ qui, sur les points réels, est l'inclusion de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{C}^*$, et on dispose d'un morphisme naturel t de $\mathbb{S}$ dans $\mathbb{G}_m$ qui, sur les points réels, est la norme. Le composé tw est l'élévation au carré. Une nouvelle variante de 1.1 est

DÉFINITION 1.4.- *Une structure de Hodge réelle sur $H_{\mathbb{R}}$ est une action (définie sur $\mathbb{R}$) du groupe algébrique $\mathbb{S}$ sur $H_{\mathbb{R}}$.*

Si z désigne l'isomorphisme de définition $z : \mathbb{S}(\mathbb{R}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}^*$, on passe de 1.1 à 1.4 en définissant H^{pq} comme le sous-espace de $H_{\mathbb{C}}$ où $\mathbb{S}(\mathbb{R})$ agit par multiplication par $z^p \overline{z}^q$.

Si $H_{\mathbb{R}}$ est muni d'une structure de Hodge réelle, on définit l'automorphisme C de Weil comme étant la multiplication par i^{p-q} sur H^{pq}. Cet automorphisme est réel, et n'est autre que l'action de l'élément i de $\mathbb{S}(\mathbb{R}) \subset \mathbb{C}^*$.

DÉFINITION 1.5.- *Une polarisation d'une structure de Hodge réelle, de poids n, H est une forme bilinéaire Ψ sur $H_{\mathbb{R}}$, invariante par le sous-groupe compact $\mathrm{Ker}(t)$ de $\mathbb{S}$, et telle que la forme $\Psi(x, Cy)$ soit symétrique et définie positive.*

De l'identité $C^2 = (-1)^n$, on tire que

$$\Psi(x,y) = (-1)^n \Psi(x, C^2 y) = (-1)^n \Psi(Cy, Cx) = (-1)^n \Psi(y,x)$$

de sorte que Ψ est alternée ou symétrique selon la parité de n. Les propriétés de variance sous $\mathbb{S}$ et de positivité s'écrivent :

(1.5.1) l'orthogonal pour Ψ de $F^p(H_{\mathbb{C}})$ est $F^{n-p}(H_{\mathbb{C}})$;

(1.5.2) pour x non nul dans H^{pq}, on a $i^{p-q}\Psi(x, \overline{x}) > 0$

(relations bilinéaires de Riemann).

DÉFINITION 1.6.- *(i) Une structure de Hodge, de poids n, H consiste en un $\mathbb{Z}$-module libre de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ (le « réseau entier »), et en une structure de Hodge réelle de poids n sur $H_{\mathbb{R}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$.*

(ii) Une polarisation d'une structure de Hodge, de poids n, H est une polarisation Ψ de la structure de Hodge réelle sous-jacente, qui est à valeurs entières sur le réseau entier $H_{\mathbb{Z}}$.

2. Théorie de Hodge.

2.1. Soient $X \subset \mathbb{P}^r(\mathbb{C})$ une variété algébrique complexe projective non singulière, purement de dimension d, et $\eta \in H^2(X, \mathbb{Z})$ la classe de cohomologie d'une section hyperplane de X, i.e. la première classe de Chern de $\mathcal{O}(1)$.

Le complexe de De Rham holomorphe Ω_X^* est une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$ (lemme de Poincaré holomorphe), d'où une suite spectrale

(2.1.1) $$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_X^p) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathbb{C}).$$

2.2. La théorie de Hodge affirme que

(A) la suite spectrale (2.1.1) dégénère ($E_1 = E_\infty$).

(B) la filtration de $H^n(X, \mathbb{C})$ à laquelle elle aboutit est une structure de Hodge de poids n (1.2) sur $H^n(X, \mathbb{R})$.

D'après (A), on a

$$H^{pq} \simeq H^q(\Omega_X^p).$$

(C) Pour $n \leq d$, désignons par $P_{\mathbb{Q}}^n$ le noyau du cup-produit itéré

$$\eta^{d-n+1} : H^n(X, \mathbb{Q}) \longrightarrow H^{2d-n+2}(X, \mathbb{Q})$$

(partie primitive de la cohomologie), et par $P_{\mathbb{Z}}^n$ l'intersection de $P_{\mathbb{Q}}^n$ avec l'image de $H^n(X, \mathbb{Z})$ dans $H^n(X, \mathbb{Q})$. La classe η étant de type $(1,1)$, $P_{\mathbb{R}}^n = P_{\mathbb{Z}}^n \otimes \mathbb{R}$ est une sous-structure de Hodge de $H^n(X, \mathbb{R})$. A un signe ne dépendant que de d et n près, la forme

$$\Psi(x,y) = \int \eta^{d-n} \wedge x \wedge y$$

est une polarisation de la structure de Hodge P^n.

(D) L'application naturelle

$$\bigoplus_{n-2k \leq d} \eta^k \wedge : \bigoplus P_{\mathbb{Q}}^{n-2k} \longrightarrow H^n(X, \mathbb{Q})$$

est un isomorphisme (décomposition de Hodge-Lepage).

3. Familles de structures de Hodge.

3.1. Soit $f : X \to S$ un morphisme projectif et lisse d'espaces analytiques, purement de dimension relative d. Pour simplifier, on supposera que S est non singulier et que f est muni d'une factorisation par $\mathbb{P}_S^r = S \times \mathbb{P}^r(\mathbb{C})$. Les fibres $X_s = f^{-1}(s)$ forment donc une famille analytique, paramétrée par S, de sous-variétés non singulières de $\mathbb{P}^r(\mathbb{C})$.

3.2. Du point de vue C^∞, f est une fibration localement triviale. L'algèbre de cohomologie des fibres de f forme donc un système local sur S, qu'on notera

$$R^*_{\mathbb{Z}}(f) = \sum R^n f_* \mathbb{Z}.$$

Pour tout faisceau abélien F sur S (par exemple $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$, $\mathcal{O}$), on posera

$$R^n_F(f) = F \otimes R^n_{\mathbb{Z}}(f). \tag{3.2.1}$$

Puisque f est propre, on a encore

$$R^n_F(f) \xrightarrow{\sim} R^n f_*(f^* F).$$

Les classes de cohomologie des sections hyperplanes des X_s définissent une section localement constante

$$\eta \in H^0(S, R^2_{\mathbb{Z}}(f)). \tag{3.2.2}$$

Pour $n \leq d$, les $P^n_{\mathbb{Z}}(X_s)$ forment donc un sous-système local $P^n_{\mathbb{Z}}(f)$ de $R^n_{\mathbb{Q}}(f)$. Posant $P^n_F(f) = F \otimes P^n_{\mathbb{Z}}(f)$, on a par définition

$$P^n_{\mathbb{Q}}(f) = \mathrm{Ker}\big(\eta^{d-n+1} \wedge : R^n_{\mathbb{Q}}(f) \to R^{2d-n+2}_{\mathbb{Q}}(f)\big), \tag{3.2.3}$$

$$P^n_{\mathbb{Z}}(f) = P^n_{\mathbb{Q}}(f) \cap \mathrm{Im}\big(R^n_{\mathbb{Z}}(f) \to R^n_{\mathbb{Q}}(f)\big). \tag{3.2.4}$$

La forme de polarisation 2.2 (C)

$$\Psi(x, y) = \pm \int_{X_s} \eta^{d-n} \wedge x \wedge y \tag{3.2.5}$$

est localement constante sur S, i.e. définit

$$\Psi : P^n_{\mathbb{Z}}(f) \otimes P^n_{\mathbb{Z}}(f) \longrightarrow \mathbb{Z}. \tag{3.2.6}$$

3.3. Pour F un faisceau analytique cohérent sur S, on désignera par $f^\cdot F$ son image réciproque faisceautique, et par

$$f^* F = \mathcal{O}_X \otimes_{f^\cdot \mathcal{O}_S} f^\cdot F$$

son image réciproque en tant que faisceau de modules. Pour $s \in S$, on désignera par $F_{(s)}$ le $\mathcal{O}_{S,s}$-module des germes de sections de F en s; on appellera fibre de F en s le vectoriel

$$F_s = F_{(s)} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathbb{C}.$$

Rappelons enfin que le complexe de De Rham relatif $\Omega^*_{X/S}$ est le quotient de Ω^*_X de composantes $\Omega^1_{X/S} = \Omega^1_X / f^* \Omega^1_S$ et $\Omega^p_{X/S} = \bigwedge^p \Omega^1_{X/S}$. Si $T^1_{X/S}$, dual de $\Omega^1_{X/S}$, est le fibré tangent relatif, on dispose d'accouplements « produits contractés »

$$\lrcorner : T^1_{X/S} \otimes \Omega^p_{X/S} \longrightarrow \Omega^{p-1}_{X/S}. \tag{3.3.1}$$

3.4. D'après le lemme de Poincaré holomorphe relatif, $\Omega^*_{X/S}$ est une résolution de $f^\cdot \mathcal{O}_S$. On dispose donc d'une suite spectrale

$$E_1^{pq} = R^q f_* \Omega^p_{X/S} \Rightarrow R^n f_*(f^\cdot \mathcal{O}_S) = R^n_{\mathcal{O}}(f). \tag{3.4.1}$$

On déduit de 2.2 (A) que les E_1^{pq} sont localement libres, que la suite spectrale (3.4.1) dégénère ($E_1 = E_\infty$) et que sa formation commute à tout changement de base. La filtration de $R^n_{\mathcal{O}}(f)$ à laquelle elle aboutit (la filtration de Hodge) induit donc sur $R^n_{\mathcal{O}}(f)_s \simeq H^n(X_s, \mathbb{C})$ la filtration de Hodge 2.2 : cette dernière varie de façon holomorphe avec $s \in S$.

DÉFINITION 3.5.- *La connexion de Gauss-Manin sur le fibré vectoriel holomorphe* $R^n_{\mathcal{O}}(f)$ *(identifié ici à son faisceau de sections holomorphes) est la connexion holomorphe et intégrable*

$$\nabla : R^n_{\mathcal{O}}(f) \longrightarrow \Omega^1_S \otimes R^n_{\mathcal{O}}(f)$$

ayant pour sections locales horizontales ($\nabla v = 0$) *les sections locales de* $R^n_{\mathbb{C}}(f)$.

THÉORÈME DE TRANSVERSALITÉ 3.6.- *La filtration de Hodge* F *sur* $R^n_{\mathcal{O}}(f)$ *vérifie*

$$\nabla F^p(R^n_{\mathcal{O}}(f)) \subset \Omega^1_S \otimes F^{p-1}(R^n_{\mathcal{O}}(f)).$$

Preuve (d'après Katz-Oda [10] et une communication personnelle de Katz). La question est locale sur S. Soit $\mathcal{U} = (U_i)_{0\leq i\leq N}$ un recouvrement fini de X par des ouverts de Stein. Pour $Q \subset [0, N]$, soient $U_Q = \bigcap_{i\in Q} U_i$, j_Q l'inclusion de U_Q dans X, et

$$f_*(U_Q, \Omega^p_{X/S}) = (fj_Q)_*(\Omega^p_{X/S}|U_Q).$$

On désignera par $f_*(\mathcal{U}, \Omega^*_{X/S})$ le complexe double de faisceaux sur S de composantes

$$f_*(\mathcal{U}, \Omega^*_{X/S})^{pq} = \bigoplus_{\#Q=q+1} f_*(U_Q, \Omega^p_{X/S}) \tag{3.6.1}$$

de première différentielle induite par la différentielle extérieure, et de seconde différentielle « Čechiste ». La suite spectrale 3.4.1 est la suite spectrale de ce double complexe déduite de la filtration par le premier degré.

Soit v un champ de vecteurs (holomorphe) sur S, et supposons donné sur chaque U_i un champ de vecteurs v_i relevant v. On désignera par $\theta(v_i)$ l'endomorphisme de $f_*(\mathcal{U}, \Omega^*_{X/S})$, vérifiant, pour $Q = (i_1, \ldots, i_q)$, avec $i_1 < \cdots < i_q$,

$$\theta(v_i) f_*(U_Q, \Omega^p_{X/S}) \subset f_*(U_Q, \Omega^p_{X/S}) \oplus \bigoplus_{i_0<i_1} f_*(U_{\{i_0\}\cup Q}, \Omega^{p-1}_{X/S}),$$

et de coordonnées la dérivée de Lie

$$\mathcal{L}_{v_{i_1}} : f_*(U_Q, \Omega^p_{X/S}) \longrightarrow f_*(U_Q, \Omega^p_{X/S})$$

et les produits contractés

$$(-1)^p (v_{i_1} - v_{i_0}) \lrcorner : f_*(U_Q, \Omega^p_{X/S}) \longrightarrow f_*(U_{\{i_0\}\cup Q}, \Omega^{p-1}_{X/S}).$$

Un calcul facile montre que $\theta(v_i)$ commute à d.

LEMME 3.7.- *Sur les faisceaux de cohomologie* $R^n_{\mathcal{O}}(f)$ *de* $f_*(\mathcal{U}, \Omega^*_{X/S})$, *l'endomorphisme* $\theta(v_i)$ *induit* ∇_v.

Soit $\mathcal{C}^\infty$ le faisceau des fonctions C^∞ sur S. Si $f_*(\mathcal{U}, \Omega^*_{\infty X/S})$ est l'analogue C^∞ de (3.6.1), construit en termes du complexe des formes différentielles relatives C^∞, à valeurs complexes, sur X, on a

$$R^n_{\mathcal{C}^\infty}(f) = \mathcal{H}^n(f_*(\mathcal{U}, \Omega^*_{\infty X/S})).$$

Les faisceaux $\Omega^p_{\infty X/S}$ étant mous, cette formule reste même valable pour tout recouvrement $\mathcal{U}'$.

Si les $(v'_i)_{0\leq i\leq N}$ sont des relèvements C^∞ de v sur les U_i, la construction 3.6 définit encore des endomorphismes $\theta(v'_i)$ sur $R^n_{\mathcal{C}^\infty}(f)$. Si (v'_i) et (v''_i) sont deux systèmes de relèvements, un calcul facile montre que, au niveau des complexes,

$$\theta(v'_i) - \theta(v''_i) = dH - Hd, \tag{3.7.1}$$

H ayant pour coordonnées non nulles les produits contractés

$$v'_{i_1} - v''_{i_1} \lrcorner : f_*(U_Q, \Omega^p_{\infty X/S}) \longrightarrow f_*(U_Q, \Omega^{p-1}_{\infty X/S}),$$

($Q = \{i_1, \ldots, i_q\},\ i_1 < \cdots < i_q$).

L'endomorphisme $\theta(v'_i)$ de $R^n_{\mathcal{C}^\infty}(f)$ est donc indépendant du choix des v'_i; il est compatible, via l'injection de $R^n_{\mathcal{O}}(f)$ dans $R^n_{\mathcal{C}^\infty}(f)$, à l'endomorphisme $\theta(v_i)$ de 3.7. Il suffit dès lors de vérifier que $\theta(v'_i) = \nabla_v$ sur $R^n_{\mathcal{C}^\infty}(f)$. On vérifie que $\theta(v'_i)$, indépendant des v'_i, est aussi indépendant de $\mathcal{U}$. Prenons $\mathcal{U} = \{X\}$, et pour v' un relèvement de v. On a alors

$$f_*(\mathcal{U}, \Omega^*_{\infty X/S}) = f_*(\Omega^*_{\infty X/S}),$$

et $\theta(v')$ est la dérivée de Lie selon v', visiblement égale à ∇_v.

3.8. Achevons la démonstration de 3.6. Par construction, on a

$$\theta(v_i)\left(\bigoplus_{p'\geq p} f_*(\mathcal{U},\Omega^*_{X/S})^{p',q'}\right)\subset\bigoplus_{p'\geq p-1} f_*(\mathcal{U},\Omega^*_{X/S})^{p',q'}. \tag{3.8.1}$$

Puisque la suite spectrale (3.4.1) se déduit du complexe double $f_*(\mathcal{U},\Omega^*_{X/S})$, on tire de 3.7 et (3.8.1) que

$$\theta(v_i)F^p(R^n_{\mathcal{O}}(f))=\nabla_v F^p(R^n_{\mathcal{O}}(f))\subset F^{p-1}(R^n_{\mathcal{O}}(f)). \tag{3.8.2}$$

Ceci étant vrai localement sur S, et pour tout v, implique 3.6.

3.9. Il résulte de la formule de Leibniz

$$\nabla(fh)=df\cdot h+f\cdot\nabla h$$

que l'application induite par ∇

$$\mathrm{def}(\nabla):\mathrm{Gr}^p_F(R^n_{\mathcal{O}}(f))\longrightarrow\Omega^1_S\otimes\mathrm{Gr}^{p-1}_F(R^n_{\mathcal{O}}(f))$$

est $\mathcal{O}$-linéaire. Elle s'identifie d'après 3.4.1 à

$$\mathrm{def}(\nabla):R^qf_*\Omega^p_{X/S}\longrightarrow\Omega^1_S\otimes R^{q+1}f_*\Omega^{p-1}_{X/S}. \tag{3.9.1}$$

On déduit de la formule 3.7 pour ∇_v que

PROPOSITION 3.10.- *L'homomorphisme (3.9.1) est le cup-produit, via l'accouplement (3.3.1), avec la classe de Kodaira–Spencer*

$$c\in\Omega^1_S\otimes R^1f_*(T^1_{X/S})$$

qui exprime comment X_s se déforme avec s.

DÉFINITION 3.11.- *(i) Une famille de structures de Hodge réelles, de poids n, H sur S consiste en*

a) un système local de vectoriels réels $H_{\mathbb{R}}$ sur S;

b) une filtration holomorphe finie F du faisceau analytique localement libre

$$H_{\mathcal{O}}=H_{\mathbb{R}}\otimes_{\mathbb{R}}\mathcal{O},$$

ces données vérifiant les conditions suivantes :

(H.1) La connexion naturelle ∇ de $H_{\mathcal{O}}$ est telle que

$$\nabla F^p(H_{\mathcal{O}})\subset\Omega^1_S\otimes F^{p-1}(H_{\mathcal{O}});$$

(H.2) En tout point $s\in S$, F définit sur $(H_{\mathbb{R}})_s$ une structure de Hodge de poids n.

(ii) Une polarisation de H est une forme bilinéaire localement constante Ψ sur $H_{\mathbb{R}}$ qui induise en tout point $s\in S$ une polarisation de $(H_{\mathbb{R}})_s$.

3.12. Une famille de structures de Hodge H de poids n sur S est un système local de $\mathbb{Z}$-modules libres de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ sur S, plus une famille de structures de Hodge réelles sur $H_{\mathbb{R}}=\mathbb{R}\otimes H_{\mathbb{Z}}$. Une polarisation de H est une polarisation Ψ de $H_{\mathbb{R}}$ qui soit à valeurs entières sur $H_{\mathbb{Z}}$.

Avec ces définitions, on peut reformuler 2.2 (C) et 3.6 en disant que, sous les hypothèses de 3.1, $P^n_{\mathbb{Z}}(f)$ est une famille polarisée de structures de Hodge sur S.

4. Le théorème de régularité.

4.1. Lorsqu'on part d'un morphisme projectif et lisse $f : X \to S$ de schémas de type fini sur $\mathbb{C}$, tel que $f^{\mathrm{an}} : X^{\mathrm{an}} \to S^{\mathrm{an}}$ vérifie les hypothèses de 3.1, certains des objets construits au n° 3 se déduisent d'objets de nature purement algébrique par application du foncteur de « passage à l'analytique ». Ce sont :

a) les faisceaux de modules $R^n_{\mathcal{O}}(f)$, leur filtration de Hodge, la suite spectrale 3.4.1, et la connexion de Gauss–Manin;

b) la structure d'algèbre (cup-produit) sur $R^*_{\mathcal{O}}(f)$, et la « partie primitive » $P^n_{\mathcal{O}}(f)$;

c) le produit, par une puissance convenable de $2\pi i$, de la forme de polarisation Ψ.

Par contre, le « réseau entier » $R^*_{\mathbb{Z}}(f)$, et la structure réelle qui s'en déduit sur la cohomologie complexe des fibres de f, sont de nature transcendante.

4.2. Soient en effet S un schéma lisse de type fini sur $\mathbb{C}$ et X un sous-schéma fermé de $\mathbb{P}^r(\mathbb{C}) \times S$, tel que la projection $f : X \to S$ soit un morphisme lisse purement de dimension relative d.

D'après la variante relative de GAGA, pour tout faisceau algébrique cohérent F sur X, on a

$$(R^n f_* F)^{\mathrm{an}} \xrightarrow{\sim} R^n f^{\mathrm{an}}_*(F^{\mathrm{an}}).$$

Plus généralement, si K^* est un complexe de faisceaux algébriques cohérents dont

les différentielles d_i sont des opérateurs différentiels (algébriques) $f^{\cdot}\mathcal{O}_S$-linéaires, alors les images directes en hypercohomologie vérifient

$$\big(R^n f_*(K^*)\big)^{\mathrm{an}} \xrightarrow{\sim} R^n f^{\mathrm{an}}_*(K^{*\mathrm{an}})$$

(ce cas se ramène au précédent via l'une des suites spectrales d'hypercohomologie).

Prenons pour K le complexe de De Rham algébrique relatif $\Omega^*_{X/S}$. On trouve que (notation de 3.2)

$$\big(R^n f_* \Omega^*_{X/S}\big)^{\mathrm{an}} \xrightarrow{\sim} R^n f^{\mathrm{an}}_*\big((\Omega^*_{X/S})^{\mathrm{an}}\big) \xleftarrow{\sim} R^n f^{\mathrm{an}}_*\big(f^{\cdot\,\mathrm{an}}\mathcal{O}_S^{\mathrm{an}}\big) = R^n_{\mathcal{O}}(f).$$

De plus, la suite spectrale (3.4.1) provient d'une suite spectrale purement algébrique

$$E_1^{pq} = R^q f_* \Omega^p_{X/S} \Longrightarrow R^{p+q} f_* \Omega^*_{X/S}. \tag{4.2.1}$$

D'après 3.4, les E_1^{pq} sont localement libres (puisque les $E_1^{pq\,\mathrm{an}}$ le sont), la suite spectrale (4.2.1) dégénère et sa formation est compatible à tout changement de base. La filtration de Hodge, à laquelle elle aboutit, est ipso facto algébrique.

Le cup-produit se définit en termes du produit extérieur dans $\Omega^*_{X/S}$. La classe de cohomologie de De Rham d'une section hyperplane pouvant se définir algébriquement (à multiplication par une puissance de $2\pi i$ près), à partir de la différentielle logarithmique

$$\mathrm{d}f/f : \mathcal{O}_X^* \longrightarrow \Omega^1_{X/S},$$

la partie primitive $P^n_{\mathcal{O}}(f)$ et Ψ sont aussi de nature algébrique.

Enfin, la construction 3.6–3.7 de la connexion de Gauss–Manin se transpose aisément au cas algébrique (Katz–Oda [10]).

4.3. Soient D une surface de Riemann isomorphe au disque unité, 0 un point de D, $D^* = D - \{0\}$, V un fibré vectoriel holomorphe sur D^*, ∇ une connexion holomorphe sur V et V_o le système local des sections horizontales de V. On a

$$V \xrightarrow{\sim} V_o \otimes_{\mathbb{C}} \mathcal{O}.$$

Le groupe fondamental (commutatif) $\pi_1(D^*) \simeq \mathbb{Z}$ agit sur V_o. On désigne par T la transformation de monodromie, i.e. l'action sur V_o ou V du générateur positif de $\pi_1(D^*)$.

Il existe U tel que

$$T = \exp(2\pi i U).$$

Soient $z : D \to \mathbb{C}$ une coordonnée, vérifiant $z(0) = 0$, et $\widetilde{D}^*$ le revêtement (universel) de D^* sur lequel $\log z$ est défini. Pour v une section de V_o sur $\widetilde{D}^*$,

$$\exp(-\log z \cdot U)(v)$$

est l'image réciproque d'une section holomorphe de V sur D^*.

Cette construction définit un isomorphisme

$$m_{U,z} : \mathcal{O} \otimes_{\mathbb{C}} H^0(\widetilde{D}^*, V_o) \xrightarrow{\sim} V,$$

et par là un prolongement naturel V_U de V sur D, qui ne dépend que de U. Une section v de V sur D^* sera dite ∇-modérée si, en tant que section de V_U, elle est méromorphe en 0. Cette notion ne dépend pas du choix de U.

4.4. Soient S le complément dans une courbe projective et lisse $\overline{S}$ d'un ensemble fini T, et V un fibré vectoriel algébrique sur S. Une connexion (algébrique) ∇ sur V est dite régulière si, pour tout $t \in T$, les sections méromorphes de V au voisinage de t sont ∇-modérées.

THÉORÈME 4.5.- *Pour $f : X \to S$ un morphisme de schémas projectif et lisse, la connexion de Gauss–Manin sur $R^n f_* \Omega^*_{X/S}$ est régulière.*

Ce théorème est prouvé dans [2]. Une démonstration complètement différente, procédant par voie arithmétique, est due à Katz [9].

4.6. Soient D^* comme en 4.3, H une famille de structures de Hodge réelles sur D^*, T la transformation de monodromie de $H_{\mathbb{C}}$, U une transformation de $H_{\mathbb{C}}$ telle que $T = \exp(2\pi i U)$ et $H_{\mathcal{O},U}$ le prolongement localement libre correspondant de $H_{\mathcal{O}}$ sur D.

On dit que H est régulière en 0 si la filtration de Hodge de $H_{\mathcal{O}}$ se prolonge à $H_{\mathcal{O},U}$. Cette condition ne dépend pas de U. Le théorème 4.5 a le corollaire suivant, de conclusion purement analytique.

COROLLAIRE 4.7.- *Sous les hypothèses de 4.5, les familles de structures de Hodge $R^n(f)$ sur S^{an} sont régulières au voisinage de tout point $t \in T$.*

On peut espérer que, en fait, toute famille polarisée de structures de Hodge sur D^* soit automatiquement régulière.

5. Espaces modulaires.

5.1. Soient G un groupe algébrique réel, $C \in G(\mathbb{R})$, et V une représentation réelle de G. Une C-polarisation de V est une forme bilinéaire Ψ sur V, G-invariante, et telle que $\Psi(x, Cy)$ soit symétrique et définie > 0.

LEMME 5.2.- *Si G est connexe (par quoi on entend que $G(\mathbb{C})$ l'est), les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) G admet une représentation $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ de noyau $\mathrm{Ker}(\rho)$ fini qui soit C-polarisable.

(ii) Toute représentation de G est C-polarisable.

(iii) G est réductif et $\mathrm{ad}\, C$ est une involution de Cartan (de G).

La démonstration est laissée au lecteur.

Remarque 5.3.- Il existe dans $G(\mathbb{R})$ des éléments C vérifiant les conditions de 5.2 si et seulement si G est réductif et admet un tore maximal compact. Dans ce cas :

a) Un tel élément C est contenu dans un seul sous-groupe compact maximal, son centralisateur.

b) Pour G adjoint, la correspondance $C \longmapsto$ (centralisateur de C) est une bijection entre l'ensemble de ces éléments et l'ensemble des sous-groupes compacts maximaux de $G(\mathbb{R})$.

5.4. Soit G un groupe algébrique réel, muni d'homomorphismes

$$\mathbb{G}_m \xrightarrow{w} G \xrightarrow{t} \mathbb{G}_m \tag{5.4.1}$$

tels que w soit central et que $tw(x) = x^2$. Une représentation $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ sera dite homogène de poids n si $\rho w(x) = x^n$.

Par morphisme de $\mathbb{S}$ dans G on entendra toujours un homomorphisme $h : \mathbb{S} \to G$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{G}_m & \xrightarrow{w} & \mathbb{S} & \xrightarrow{t} & \mathbb{G}_m \\ \| & & \downarrow h & & \| \\ \mathbb{G}_m & \xrightarrow{w} & G & \xrightarrow{t} & \mathbb{G}_m. \end{array}$$

Si $h : \mathbb{S} \to G$ est un morphisme et $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ une représentation réelle de G, on notera h_V la structure de Hodge réelle (1.4) $\rho \circ h$ de V. Pour ρ homogène de poids n, une polarisation de V est une polarisation Ψ de (V, h_V) qui vérifie

$$\Psi(gx, gy) = t(g)^n \Psi(x, y). \tag{5.4.2}$$

On dira que h est positif si toute représentation de G est polarisable.

5.5. Le groupe G, muni de (5.4.1), est uniquement déterminé par $G^o = \mathrm{Ker}(t)$, muni de l'élément central, d'ordre divisant 2, $\varepsilon = w(-1)$. Le groupe G s'identifie en effet au quotient de $\mathbb{G}_m \times G^o$ par le sous-groupe engendré par $(-1, \varepsilon)$.

De ce point de vue, un morphisme $h : \mathbb{S} \to G$ s'identifie à $h^o : \mathbb{S}^o \to G^o$ tel que $h^o(-1) = \varepsilon$. Une représentation homogène de poids n de G s'identifie à une représentation ρ de G^o telle que $\rho(\varepsilon) = (-1)^n$, et une polarisation de cette représentation s'identifie à une $h^o(i)$-polarisation (5.1). D'après 5.2, si G^o est connexe, h est un morphisme positif si et seulement si G est réductif et que $\mathrm{ad}\, h^o(i)$ est une involution de Cartan de G^o.

5.6. On suppose désormais que G^o est réductif connexe.

Soit h un morphisme de $\mathbb{S}$ dans G. Pour $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ une représentation de G, on désigne par F_h la filtration de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$ déduite de h_V. Pour la représentation adjointe $\mathrm{Lie}(G)$,

$$F_h^0(\mathrm{Lie}(G)_{\mathbb{C}}) = \bigoplus_{p \geq 0} \mathrm{Lie}(G_{\mathbb{C}})^{p,-p} \tag{5.6.1}$$

est l'algèbre de Lie d'un sous-groupe parabolique $P(h)$ de $G_{\mathbb{C}}$. Pour toute représentation $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ de G, $P(h)$ respecte la filtration de Hodge F_h de $V_{\mathbb{C}}$; si $\mathrm{Ker}(\rho) \cap G^o$ est central, alors $P(h)$ est exactement le sous-groupe de G qui respecte cette filtration.

Enfin, on désigne par $H(h)$ le centralisateur de h dans $G(\mathbb{R})$.

5.7. Soit X une classe de conjugaison de morphismes de $\mathbb{S}$ dans G. On désignera par $\check{X}$ l'ensemble des conjugués dans $G(\mathbb{C})$ de $P(h)$, pour $h \in X$.

LEMME 5.8.- *L'application $G(\mathbb{R})$-équivariante $P : h \mapsto P(h)$ identifie X à un ouvert de l'espace de drapeaux $\check{X}$.*

Soient $h \in X$ et $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ une représentation homogène de G telle que $\mathrm{Ker}(\rho) \cap G^o$ soit fini. L'ensemble X s'identifie à l'ensemble des structures de Hodge sur V, conjuguées sous $G(\mathbb{R})$ à h_V, tandis que $\check{X}$ s'identifie à l'ensemble des filtrations sur $V_{\mathbb{C}}$, conjuguées sous $G(\mathbb{C})$ à F_h. Une structure de Hodge homogène étant déterminée par sa filtration de Hodge, l'application P est injective. Elle s'identifie à l'application

$$G(\mathbb{R})/H(h) \longrightarrow G(\mathbb{C})/P(h)$$

de différentielle à l'origine

$$\mathrm{Lie}(G)/\mathrm{Lie}(H) \longrightarrow \mathrm{Lie}(G_{\mathbb{C}})/\mathrm{Lie}(P(h)),$$

i.e.

$$\mathrm{Lie}(G)/(F^0 \cap \overline{F^0})(\mathrm{Lie}(G)) \longrightarrow F^{-\infty}/F^0(\mathrm{Lie}(G_{\mathbb{C}})).$$

Cette différentielle est bijective, d'où 5.8.

On a vu en passant que

$$H(h) = G(\mathbb{R}) \cap P(h). \tag{5.8.1}$$

5.9. Soient V une représentation réelle de G, $V(\check{X},\mathbb{R})$ le faisceau constant sur $\check{X}$ de valeur V, $V(\check{X},\mathbb{C}) = \mathbb{C}\otimes V(\check{X},\mathbb{R})$, $V(\check{X},\mathcal{O}) = \mathcal{O}\otimes_{\mathbb{C}} V(\check{X},\mathbb{C})$ et ∇ la connexion intégrable naturelle de $V(\check{X},\mathcal{O})$. L'application $G(\mathbb{R})$-équivariante $h\mapsto h_V$ de X dans les structures de Hodge sur V se prolonge de façon unique en une application $G(\mathbb{C})$-équivariante et donc holomorphe de $\check{X}$ dans les filtrations de $V_{\mathbb{C}}$. Celle-ci correspond à une filtration F de $V(\check{X},\mathcal{O})$, la filtration de Hodge. Le système $(V(\check{X},\mathcal{O}),\nabla,F)$ est $G(\mathbb{C})$-équivariant. La structure réelle $V(\check{X},\mathbb{R})$ de $V(\check{X},\mathbb{C})$ est $G(\mathbb{R})$-équivariante. Enfin, en $h\in X$, F induit sur $V_{\mathbb{C}}$ la filtration de Hodge F_h.

5.10. L'action de $G(\mathbb{C})$ sur $\check{X}$ définit un morphisme

$$\mathrm{Lie}(G)(\check{X},\mathcal{O})\longrightarrow T_{\check{X}}, \tag{5.10.1}$$

où $T_{\check{X}}$ est le fibré tangent. En $h\in X$, le noyau de (5.10.1) est $\mathrm{Lie}(P(h)) = F_h^0(\mathrm{Lie}(G_{\mathbb{C}}))$ (5.6), de sorte que (5.10.1) se factorise par un isomorphisme $G(\mathbb{C})$-équivariant

$$F^{-\infty}/F^0\big(\mathrm{Lie}(G)(\check{X},\mathcal{O})\big)\xrightarrow{\sim} T_{\check{X}}. \tag{5.10.2}$$

On désigne par $T^1_{\check{X}}$ le sous-fibré holomorphe de $T_{\check{X}}$ image de $F^{-1}(\mathrm{Lie}(G)(\check{X},\mathcal{O}))$. On vérifie facilement que si v est une section locale de $T^1_{\check{X}}$, alors

$$\nabla_v\big(F^p(V(\check{X},\mathcal{O}))\big)\subset F^{p-1}(V(\check{X},\mathcal{O})),$$

quelle que soit la représentation $\rho: G\to \mathrm{GL}(V)$. La réciproque est vraie pour $\mathrm{Ker}(\rho)\cap G^o$ central.

5.11. Supposons maintenant que X soit une classe de conjugaison de morphismes positifs de $\mathbb{S}$ dans G. Pour $h\in X$, on posera $C_h = h(i)$ et on désignera par $K(h)$ le centralisateur de C_h dans $G(\mathbb{R})$. Le groupe $K^o(h) = K(h)\cap G^o(\mathbb{R})$ est compact. Soient V une représentation de G et Ψ une forme bilinéaire G-invariante sur V. Si Ψ est une polarisation de (V,h_V) pour un $h\in X$, alors Ψ est une polarisation de (V,h_V) pour tout $h\in X$. En effet, posant $\Phi_h(x,y) = \Psi(x,C_hy)$, on a

$$\Phi_{gh} = g(\Phi_h). \tag{5.11.1}$$

On dira que Ψ est alors une polarisation de V. Par hypothèse, toute représentation de G est polarisable.

5.12. Soit Ψ une polarisation de la représentation adjointe de G sur $\mathrm{Lie}(G)$. D'après 5.10.2, Ψ induit en chaque point $h\in X$ une forme hermitienne définie positive sur

$$(T_{\check{X}})_h \simeq F_h^{-\infty}/F_h^0(\mathrm{Lie}(G)_{\mathbb{C}})\simeq \bigoplus_{p<0}\mathrm{Lie}(G)^{p,-p}. \tag{5.12.1}$$

La polarisation Ψ définit donc une structure hermitienne, invariante sous $G(\mathbb{R})$, sur X.

Si Z est le centre de G, on a déjà

$$F^{-\infty}/F^0\big(\mathrm{Lie}(G/Z)(\check{X},\mathcal{O})\big)\xrightarrow{\sim} T_{\check{X}}, \tag{5.12.2}$$

et une polarisation Ψ de $\mathrm{Lie}(G/Z)$ définit déjà une structure de variété hermitienne sur X. On peut prendre pour Ψ l'opposé de la forme de Killing de G/Z.

Posons

$$\begin{cases}(T^v_{\check{X}})_h = \bigoplus_{p<0}(\mathrm{Lie}(G/Z))^{2p,-2p},\\ (T^h_{\check{X}})_h = \bigoplus_{p<0}(\mathrm{Lie}(G/Z))^{2p-1,-2p+1}.\end{cases} \tag{5.12.3}$$

On obtient ainsi une décomposition orthogonale C^∞ du fibré tangent en deux sous-fibrés complexes. On a

$$(T^1_{\check{X}})_h\subset (T^h_{\check{X}})_h \qquad (h\in X). \tag{5.12.4}$$

5.13. Le sous-groupe $K(h)_{\mathbb{C}} \cap P(h)$ de $K(h)_{\mathbb{C}}$ est parabolique, de sorte que $K(h)_{\mathbb{C}} \subset K(h) \cdot P(h)$ et que $K(h) \cdot h = K(h)_{\mathbb{C}} \cdot h$ est une sous-variété analytique complexe compacte de X. Ces variétés sont les fibres de la fibration C^∞ $G(\mathbb{R})$-équivariante

$$X = G/H(h) \longrightarrow G/K(h).$$

On vérifie facilement que T_X^v est le fibré tangent à cette fibration.

5.14. Rappelons que sur un fibré hermitien holomorphe F, il existe une et une seule connexion hermitienne ∇ telle que $\nabla'' = \partial''$. La courbure R du fibré est par définition la courbure de cette connexion. C'est une forme de type $(1,1)$ à valeur dans l'algèbre de Lie du groupe unitaire du fibré.

Si F est le fibré constant défini par un vectoriel F_o, et si la forme hermitienne s'écrit

$$\Phi(x,y) = \Phi_o(hx,y), \tag{5.14.1}$$

alors, pour $x : S \to F_o$ une section C^∞ de F, on a

$$\nabla x = \partial x + h^{-1}\partial' h \cdot x. \tag{5.14.2}$$

On en tire que, pour u et v deux champs tangents,

$$R(u,v) = \partial_u(h^{-1}\partial'_v h) - \partial_v(h^{-1}\partial'_u h) - h^{-1}\partial'_{[uv]}h + [h^{-1}\partial'_u h, h^{-1}\partial'_v h]. \tag{5.14.3}$$

5.15. Soit F le fibré tangent d'une variété analytique complexe hermitienne. Pour u un vecteur tangent à S, on désignera par $u_{1,0}$ et $u_{0,1} = \overline{u_{1,0}}$ ses composantes de type $(1,0)$ et $(0,1)$ dans le complexifié du fibré tangent. On appelle courbure holomorphe de S dans la direction u le nombre réel

$$R(u) = \Phi(R(u_{1,0}, u_{0,1})(u), u)/\Phi(u,u)^2. \tag{5.15.1}$$

Si on munit X de la structure hermitienne 5.12, on a le résultat fondamental ([8], §9) :

THÉORÈME 5.16.- *Il existe* $\lambda < 0$, *telle que* $R(u) \leq \lambda$ *dans toute direction appartenant à* T_X^h.

Preuve (une esquisse) : Par homogénéité, il suffit de prouver 5.16 en un point $e \in X$. Posons $H = H(e)$, $P = P(e)$, soit N^+ le radical unipotent de P et soit N^- le sous-groupe complexe conjugué d'algèbre de Lie

$$\mathfrak{n}^- = \bigoplus_{p<0} \mathrm{Lie}(G)^{p,-p}.$$

Dans les calculs qui suivent, on identifiera, près de e, X à N^- par les applications

$$X = G/H \hookrightarrow G(\mathbb{C})/P \hookleftarrow N^-.$$

Les translations à gauche sur N^- permettent d'identifier le fibré tangent à $\mathfrak{n}^-$. On désignera par t^+, t^o et t^- les projections orthogonales de $\mathrm{Lie}(G)_{\mathbb{C}}$ sur $\mathfrak{n}^-$, $\mathrm{Lie}(H_{\mathbb{C}})$ et $\mathfrak{n}^+ = \mathrm{Lie}(N^+)$. Pour $g = np$ ($g \in G(\mathbb{R})$, $n \in N^-$, $p \in P$), la différentielle, en e, de l'action de g sur X s'identifie à

$$t^- \operatorname{ad} p : \mathfrak{n}^- \longrightarrow \mathfrak{n}^-.$$

La structure hermitienne s'écrit donc

$$\Phi_n(x,y) = \Phi_e(t^- \operatorname{ad} p^{-1}x, t^- \operatorname{ad} p^{-1}y).$$

Désignant par Ψ la forme de polarisation et par C l'involution de Cartan associée à e, on a

$$\begin{aligned}
\Phi_n(x,y) &= \Psi(t^- \operatorname{ad} p^{-1}x,\ t^- C\,\overline{\operatorname{ad} p^{-1}y}) \\
&= \Psi(t^- \operatorname{ad} p^{-1}x,\ \operatorname{ad} C(\overline{p})^{-1} \cdot C\overline{y}) \\
&= \Psi(\operatorname{ad} C(\overline{p}) \cdot t^- \cdot \operatorname{ad} p^{-1} \cdot x,\ C\overline{y}) \\
&= \Phi_e(\operatorname{ad} C(\overline{p}) \cdot t^- \cdot \operatorname{ad} p^{-1} \cdot x,\ y).
\end{aligned}$$

On vérifie que pour $n = \exp(u)$ avec $u \sim 0$, on a au 3ème ordre près

$$p = \exp\big(\overline{u} - \tfrac{1}{2}t^o[u,\overline{u}] - t^+[u,\overline{u}]\big)$$

et

$$h = \operatorname{ad} C(\overline{p})\, t^- \operatorname{ad} p^{-1} = \exp(H),$$

pour

$$H = t^- \circ \operatorname{ad}(Cu - \overline{u} + [u,\overline{u}]) - \tfrac{1}{2}[t^- \operatorname{ad} Cu, t^- \operatorname{ad}\overline{u}].$$

Sous les hypothèses de 5.14, si $h = \exp(H)$ et si $H = 0$ en $s_o \in S$, on déduit de 5.14.3 que, en s_o,

$$\begin{aligned} R(u,v) = (\partial_u\partial'_v - \partial_v\partial'_u)H - \tfrac{1}{2}[\partial''_u H, \partial'_v H] + \tfrac{1}{2}[\partial''_v H, \partial'_u H] \\ + (\partial'_u\partial'_v - \partial'_v\partial'_u - \partial'_{[uv]})H. \end{aligned}$$

Appliquant cette formule, on voit que la courbure est donnée, en e, par

$$R(u,v)_e = S(u,\overline{v}) - S(v,\overline{u}),$$

avec

$$\begin{aligned} S(u,\overline{v}) &= -t^- \circ \operatorname{ad}[u,\overline{v}] + \tfrac{1}{2}[t^- \operatorname{ad} Cu, t^- \operatorname{ad}\overline{v}] + \tfrac{1}{2}[-t^- \operatorname{ad}\overline{v}, t^- \operatorname{ad} Cu] \\ &= [t^- \operatorname{ad} Cu, t^- \operatorname{ad}\overline{v}] - t^- \circ \operatorname{ad}[u,\overline{v}]. \end{aligned}$$

Quels que soient $u, v \in \mathfrak{n}^-$, si u_{10} et u_{01} sont les composantes de type (10) et (01) de u comme en 5.15, on a grâce à l'invariance de Ψ,

$$\begin{aligned} \Phi(R(u_{10},u_{01})(v),v) &= \Psi(S(u,\overline{u})(v), C\overline{v}) \\ &= \Psi\big([Cu, t^-[\overline{u},v]] - t^-[\overline{u}[Cu,v]] - t^-[[u\overline{u}],v], C\overline{v}\big) \\ &= -\Psi\big(t^-[\overline{u},v],[Cu,C\overline{v}]\big) + \Psi\big([Cu,v],[\overline{u},C\overline{v}]\big) - \Psi\big([u,\overline{u}],[v,C\overline{v}]\big). \end{aligned}$$

Pour $u = v \in T^h_X$, on a $Cu = -u$ et

$$\begin{aligned} \Phi(R(u_{10},u_{01})(u),u) &= \Psi\big(t^-[u,\overline{u}],[u,\overline{u}]\big) + \Psi\big([u,\overline{u}],[v,\overline{v}]\big) \\ &= -\Phi\big(t^-[u,\overline{u}], t^-[u,\overline{u}]\big) - \Phi\big([u,\overline{u}],[u,\overline{u}]\big) < 0, \end{aligned}$$

ce qui prouve 5.16.

Une généralisation du lemme de Schwarz permet de déduire de 5.16 (voir [1], III, n° 10) :

COROLLAIRE 5.17.- *Soit $f : D \to X$ une application holomorphe du disque unité dans X. Munissons D de la métrique hyperbolique d pour laquelle il est de courbure -1, et X de la métrique 4.12. Alors, si $f(D)$ est tangent aux T^h_X, on a*

$$d(f(x),f(y)) \leq |\lambda|\, d(x,y).$$

6. Le théorème de monodromie, d'après A. Borel.

6.1. Soient S une variété analytique complexe connexe, munie d'un point base $s_o \in S$, et $p : \widetilde{S} \to S$ son revêtement universel. Soit H une famille polarisée de structures de Hodge de poids n sur S. On désignera par H_o la structure de Hodge polarisée fibre de H en s_o.

La polarisation Ψ est une forme bilinéaire sur $H_{o\mathbb{Q}}$. On désignera par G^o le groupe algébrique, défini sur $\mathbb{Q}$, composante neutre du groupe des automorphismes de $(H_{o\mathbb{Q}}, \Psi)$, par $\varepsilon \in G^o$ l'homothétie de rapport $(-1)^n$, par G le groupe déduit, par le procédé 5.5, de (G^o, ε) et par Γ le groupe discret des automorphismes de $(H_{o\mathbb{Z}}, \Psi)$. On dispose de

$$T : \pi_1(S, s_o) \longrightarrow \Gamma. \tag{6.1.1}$$

6.2. Pour chaque point $s \in \widetilde{S}$, on dispose d'un isomorphisme naturel

$$H_{o\mathbb{Z}} \simeq H_{p(s),\mathbb{Z}},$$

et la structure de Hodge $H_{p(s)}$ s'identifie à une structure de Hodge sur $H_{o,\mathbb{Z}}$, définie par $h(s) : \mathbb{S} \to G_{\mathbb{R}}$. Les morphismes $h(s)$ sont positifs, et conjugués entre eux, car ils forment une famille continue connexe et que G est réductif. Si X est l'espace modulaire correspondant, défini au § 5, on dispose donc d'une application

$$h : \widetilde{S} \longrightarrow X.$$

La famille H est l'image réciproque par h du système de structures de Hodge sur X défini (5.9) par la représentation de poids n naturelle de G dans H_o.

Le morphisme h est équivariant, via (5.5.1), pour les actions de $\pi_1(S, s_o)$ et Γ sur $\widetilde{S}$ et X.

D'après 3.4 et 3.6, l'application h est holomorphe et $\mathrm{Im}(dh) \subset T^1_X$ (cf. 5.10).

6.3. Supposons que S soit le disque unité épointé

$$D^* = \{z \mid 0 < |z| < 1\}$$

et prenons pour revêtement universel de D^* le demi-plan de Poincaré Y, muni de

$$\exp(2\pi i y) : Y \longrightarrow D^*.$$

Si $T \in \Gamma$ est la transformation de monodromie (4.3) de $H_{\mathbb{Z}}$, l'application h vérifie

$$h(y+1) = Th(y). \tag{6.3.1}$$

Choisissons $h_o \in X$. Si $h(y) = g_y \cdot h_o$, la distance dans X, pour une métrique (5.12), vérifie

$$d(h(y+1), h(y)) = d(Tg_y h_o, g_y h_o) = d(g_y^{-1} T g_y h_o, h_o). \tag{6.3.2}$$

D'après 5.17, si Y est muni de sa distance hyperbolique naturelle, l'application h décroît les distances (convenablement normalisées). Dans Y, on a

$$d(y, y+1) \sim (\mathrm{Im}(y))^{-1}$$

et donc

$$d(g_y^{-1} T g_y h_o, h_o) \longrightarrow 0 \qquad \text{pour } \mathrm{Im}(y) \to \infty. \tag{6.3.3}$$

Le même argument s'applique à T^2; de plus, $T^2 \in G(\mathbb{R})$, et (6.2.3) implique qu'une limite de conjugués de T^2 se trouve dans le sous-groupe compact $H(h_o)$ de $G(\mathbb{R})$. Les valeurs propres de T^2 (et de T) sont donc toutes de valeur absolue 1. Ces valeurs propres forment un ensemble d'entiers algébriques stable par conjugaison. Or,

LEMME 6.4.- *Si tous les conjugués complexes d'un entier algébrique α sont de valeur absolue 1, alors α est une racine de l'unité.*

Les valeurs propres de T sont donc des racines de l'unité, ce qui prouve

THÉORÈME DE MONODROMIE 6.5 (A. Borel).- *Soit H une famille de structures de Hodge polarisée sur le disque épointé D^*. Il existe des entiers N et M tels que la transformation de monodromie T vérifie*

$$(T^N - I)^M = 0.$$

BIBLIOGRAPHIE

[1] P. A. GRIFFITHS - Periods of integrals on algebraic manifolds.
I (Construction and properties of the modular Varieties), Am. J. Math., XC 2, 1968, p. 568-626.
II, Am. J. Math., XC 3, 1968, p. 805-865.
III (Some global differential-geometric properties of the period mapping), à paraître aux Publ. I.H.E.S.

[2] P. A. GRIFFITHS - Some results on Moduli and Periods of Integrals on Algebraic Manifolds III, Notes miméographiées de Princeton.

[3] P. A. GRIFFITHS - On the periods of integrals on algebraic manifolds, Rice un. studies, 54, 4, 1968.
Cet article résume, sans démonstration [1] I, II.

[4] P. A. GRIFFITHS - On the periods of certain rational integrals, I, II, Annals of Maths., 90 (1969), p. 460-541. III, à paraître aux Annals of Maths.

[5] P. A. GRIFFITHS - A theorem on periods of integrals on algebraic manifolds, Notes miméographiées de Yale.

[6] P. A. GRIFFITHS - Some results on algebraic cycles on algebraic manifolds, in Bombay Colloquium 1968, Oxford University Press.

[7] P. A. GRIFFITHS - Periods of integrals on algebraic manifolds (Summary of main results and discussions of open problems and conjectures), Bull. Am. Math. Soc., 75, 2, (1970), p. 228-296.
Cet article est très intéressant par les nombreuses conjectures qu'il discute.

[8] P. A. GRIFFITHS and W. SCHMID - Locally homogeneous complex manifolds, Acta Mathematica, 1970, p. 253-302.
Cet article, très lisible, contient beaucoup d'informations sur les espaces définis au § 5 et la cohomologie de leurs quotients par des sous-groupes discrets.

[9] N. KATZ - Nilpotent connections and the monodromy theorem, Applications of a results of Turrittin, à paraître aux Publ. I.H.E.S.

[10] N. KATZ and T. ODA - On the differentiation of De Rham cohomology classes with respect to parameters, J. Math. Kyoto Univ., 8, 2, 1968, p. 199-213.

Séminaire BOURBAKI
23e année, 1970/71, n° 389 Février 1971

TRAVAUX DE SHIMURA(*)

par Pierre DELIGNE

Soit X/Γ le quotient d'un domaine hermitien symétrique X par un groupe discret arithmétique Γ (supposé défini par des conditions de congruence, voir 1.7). D'après Baily et Borel, X/Γ est une variété algébrique complexe. Dans les articles [10] à [14], Shimura montre entre autres, pour beaucoup de ces variétés, qu'elles peuvent être définies sur des corps de nombres qu'il explicite. C'est là le sujet du présent exposé.

Pour obtenir des énoncés propres, on est contraint à utiliser un langage adélique. Celui-ci conduit à considérer, pour une "condition de congruence" donnée, un schéma sur $\mathbb{C}$, sommes disjointes d'un nombre fini de variétés du type X/Γ (voir §§ 1 et 2). Dans de nombreux cas, ce schéma pourra être défini sur un corps de nombres E, indépendant de la condition de congruence considérée. Ses composantes connexes géométriques, elles, seront définies sur des corps de classe de E. Ce phénomène, bien qu'essentiel, va être négligé dans la suite de cette introduction.

Dans un petit nombre de cas, X/Γ peut s'interpréter comme l'ensemble des classes d'isomorphie des variétés abéliennes complexes, munies de quelques structures algébriques additionnelles (polarisations, endomorphismes, structures sur les points d'ordre n). La solution, sur $\mathbb{Q}$, d'un problème de modules correspondant fournit alors un schéma M sur un corps de nombres explicite F, dont X/Γ est l'ensemble des points complexes. On appellera M un "modèle" de X/Γ. Le cas fondamental est celui des variétés abéliennes polarisées de la série principales, munies d'une structure de niveau n (1.6, 1.11, 4.16, 4.17 et 4.21).

Dans d'autres cas, X/Γ peut s'interpréter comme l'ensemble des classes d'isomorphie des variétés abéliennes complexes A munies de quelques structures comme plus haut, et de quelques classes de cohomologie entières de type (p,p) $a_i \in H^{2p}(A\times\cdots\times A, \mathbb{C})$ (cf. Mumford [7]). Dans ce cas, l'idée sera de construire un modèle M de X/Γ comme sous-schéma d'un modèle M' déjà construit d'une variété X'/Γ'. En gros, on commence par construire dans M' les points de M correspondant à des variétés abéliennes de type C.M. (= maximum de multiplication complexe). On définit alors M comme l'adhérence de l'ensemble de ces points. Cette construction repose sur la connaissance détaillée des variétés abéliennes de type C.M. fournie par [16].

Dans les cas considérés plus haut, on dispose de beaucoup d'information sur les corps de définition des points de M correspondant à des variétés abéliennes de type C.M. Ceci permet de donner des solutions partielles au 12$^{\text{e}}$ problème de Hilbert (cf. l'introduction de [15] et 3.15, 3.16).

En regardant ce que ces cas ont en commun, on aboutit à la notion de "modèle canonique" (§ 3). On montre qu'il y a au plus un "modèle canonique" des X/Γ (5.5). Des techniques de descente permettent alors de construire quelques modèles canoniques qui semblent loin d'être des solutions de problèmes de modules ([12] [13] [14] et [5]). Pour la description de ces "modèles étranges", on renvoie aux §§ 5 et 6.

On désignera par $\mathbb{Z}/n(1)$ tant le schéma en groupe μ_n des racines n-ièmes de l'unité que le groupe des racines n-ièmes de l'unité dans un corps algébriquement clos fixé $\bar{k}$. Pour $\bar{k}=\mathbb{C}$, l'exponentielle permet d'identifier $\mathbb{Z}/n(1)$ et $\mathbb{Z}/n$. Les $\mathbb{Z}/n(1)$ forment un système projectif : les applications de transition sont les $\varphi_{n,m} : x \longmapsto x^{n/m}$. On pose

$$\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \prod_p \mathbb{Z}_p, \qquad \widehat{\mathbb{Z}}(1) = \varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}(1),$$

$$\mathbb{A}^f = \mathbb{Q}\otimes\widehat{\mathbb{Z}} \simeq \prod_p{}' \mathbb{Q}_p \quad \text{(produit restreint)}, \qquad \mathbb{A}^f(1) = \mathbb{Q}\otimes\widehat{\mathbb{Z}}(1) = \mathbb{A}^f \otimes_{\widehat{\mathbb{Z}}} \widehat{\mathbb{Z}}(1),$$

et on désigne par $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de $\mathbb{Q}$.

On utilisera les notations suivantes :

$\pi_0(X)$ (pour X un espace topologique) : l'ensemble des composantes connexes de X. Dans la suite, $\pi_0(X)$, muni de la topologie quotient de celle de X, sera discret ou compact totalement discontinu.

G^o : composante connexe de l'origine d'un groupe topologique G (ou d'un espace topologique pointé).

(*) Texte rédigé en mars 1971

$G(K)$, G_K, $G \otimes_F K$: pour G un schéma sur F (par exemple un groupe algébrique sur F) et K une F-algèbre, on désigne par $G(K)$ l'ensemble des points de G à valeurs dans K et par G_K ou par $G \otimes_F K$ le schéma sur K déduit de G par extension des scalaires.

E^* : pour E une algèbre de rang fini sur un corps F, E^* désigne le groupe algébrique sur F des éléments inversibles de E. Pour E un corps de nombres et $F = \mathbb{Q}$, $E^*(\mathbb{A})/E^*(\mathbb{Q})$ est le groupe des classes d'idèles de E.

On dira qu'un groupe algébrique G sur $\mathbb{Q}$ vérifie le principe de Hasse si $H^1(\mathbb{Q}, G) \underset{\text{dfn}}{=} H^1(\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}), G(\overline{\mathbb{Q}}))$ s'injecte dans le produit étendu à toutes les places des $H^1(\mathbb{Q}_v, G_{\mathbb{Q}_v})$. On utilisera les théorèmes suivants.

(0.1) Principe de Hasse : un groupe semi-simple simplement connexe, sans facteur de type E_8, vérifie le principe de Hasse [3].

(0.2) Un groupe semi-simple simplement connexe G sur un corps local non archimédien K vérifie $H^1(K, G) = 0$ (une démonstration indépendante de la classification est annoncée dans Bruhat–Tits [1]).

(0.3) Théorème d'approximation fort : soit G un groupe semi-simple simplement connexe sur un corps global K. Si G est K-simple, et si v est une place de K telle que $G(K_v)$ soit non compact, alors $G(K_v)G(K)$ est dense dans $G(\mathbb{A})$ (pour une démonstration indépendante de la classification, voir Platonov [9]).

(0.4) Théorème d'approximation réel : soit G un groupe algébrique connexe (linéaire) sur $\mathbb{Q}$. Alors $G(\mathbb{Q})$ est dense dans $G(\mathbb{R})$ (pour le prouver, on se ramène aisément au cas des tores, qui est un corollaire de ([4] 5.1)).

ğ 1. Le langage adélique.

1.1. Soit G un groupe réductif sur $\mathbb{Q}$. On désigne par G' le groupe dérivé de la composante neutre de G, par C le centre de cette composante neutre, et on pose $T = G/G'$. On dispose de suites exactes de groupes algébriques

$$0 \longrightarrow C \longrightarrow G \longrightarrow G/C \longrightarrow 0, \tag{1.1.1}$$

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \xrightarrow{\nu} T \longrightarrow 0, \tag{1.1.2}$$

et les applications canoniques de C dans T et de G' dans G/C sont des isogénies de noyau $C \cap G'$.

1.2. Soit $\mathbb{S}$ le groupe algébrique réel des éléments inversibles de la $\mathbb{R}$-algèbre $\mathbb{C}$. C'est encore le groupe algébrique réel déduit par restriction des scalaires à la Weil, de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}$, du groupe multiplicatif $\mathbb{G}_m$. On a $\mathbb{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$, et $\mathbb{S}_{\mathbb{C}} \simeq \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \times \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}$. Le groupe $\mathrm{Hom}(\mathbb{S}_{\mathbb{C}}, \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}})$ des caractères de $\mathbb{S}_{\mathbb{C}}$ a pour base les caractères z et $\bar{z}$ tels que le composé

$$\mathbb{C}^* = \mathbb{S}(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{S}(\mathbb{C}) \xrightarrow{z,\bar{z}} \mathbb{C}^*$$

soit respectivement l'identité et la conjugaison complexe.

Soit V un espace vectoriel réel. Pour toute représentation $h : \mathbb{S} \to \mathrm{GL}(V)$, on désigne par V^{pq} le sous-espace de $V_{\mathbb{C}}$ sur lequel $\mathbb{S}$ agit par le caractère $z^p \bar{z}^q$. Les V^{pq} forment une bigraduation de $V_{\mathbb{C}}$, et la construction $h \mapsto V^{pq}$ identifie les représentations de $\mathbb{S}$ dans $\mathrm{GL}(V)$ aux bigraduations de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$, i.e. aux bigraduations de $V_{\mathbb{C}}$ telles que $V^{pq} = \overline{V^{qp}}$. On désignera par $F(h)$ la filtration de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$:

$$F(h)^p = \bigoplus_{p' \geq p} V^{p'q'}.$$

1.3. On désigne par $r : \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \to \mathbb{S}_{\mathbb{C}}$ le $\mathbb{C}$-homomorphisme tel que $(z^p \bar{z}^q) \circ r = (x \longmapsto x^p)$, et par $w : \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} \to \mathbb{S}$ le $\mathbb{R}$-homomorphisme tel que $(z^p \bar{z}^q) \circ w = (x \longmapsto x^{p+q})$. Pour $h : \mathbb{S} \to \mathrm{GL}(V)$ une représentation et $v^{pq} \in V^{pq}$, on a

$$hr(x) \cdot v^{pq} = x^p \cdot v^{pq} \qquad \text{et}$$
$$hw(x) \cdot v^{pq} = x^{p+q} \cdot v^{pq}.$$

Le composé $w : \mathbb{R}^* = \mathbb{G}_m(\mathbb{R}) \xrightarrow{w} \mathbb{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$ est l'inclusion évidente.

1.4. Soit $h : \mathbb{S} \to G_{\mathbb{R}}$ un homomorphisme. Pour toute représentation $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$ de G sur un $\mathbb{Q}$-espace vectoriel V, ρh définit une bigraduation de $V_{\mathbb{C}}$ (1.2). Si V est fidèle, et si G est le sous-groupe de $\mathrm{GL}(V)$ laissant fixes quelques tenseurs s_i, la construction $h \mapsto (V^{pq})$ identifie les homomorphismes h aux bigraduations de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$ telles que les s_i soient de type $(0, 0)$.

1.5. Soit $h_o : \mathbb{S} \to G_{\mathbb{R}}$ un homomorphisme vérifiant les conditions suivantes (cf. [7] et [2]; (1.5.2) est motivé par le théorème de transversalité de Griffiths).

(1.5.1) L'image de $h_o w : \mathbb{G}_m \to G_{\mathbb{R}}$ est centrale. On appellera $h_o w$ le poids de h_o;

(1.5.2) la bigraduation de Hodge du complexifié $\mathrm{Lie}(G)_{\mathbb{C}}$ de l'espace de la représentation adjointe (1.2) est de type $(-1,1)+(0,0)+(1,-1)$;

(1.5.3) l'automorphisme $\mathrm{ad}\, h_o(i)$ de G, une involution d'après (1.5.1), induit une involution de Cartan de G'.

Soit K_∞ le centralisateur de h_o dans $G(\mathbb{R})$; il contient le centre de $G(\mathbb{R})$, et $K_\infty \cap G'(\mathbb{R})^o$ est un sous-groupe compact maximal de $G'(\mathbb{R})^o$, identique au centralisateur dans $G'(\mathbb{R})^o$ de $h_o(i)$. L'espace $K_\infty\backslash G(\mathbb{R})$ s'identifie à l'ensemble X des conjugués de h_o par un élément de $G(\mathbb{R})$. On vérifie qu'il possède une et une seule structure complexe telle que, pour toute représentation $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$, la filtration $F(\rho h)$ de $V_{\mathbb{C}}$ dépende holomorphiquement de $h \in X$. Cette structure est invariante à droite sous $G(\mathbb{R})$, et les composantes connexes de X sont des domaines hermitiens symétriques. On désignera par X^o la composante connexe de h_o.

1.6. Exemple I. Soit $\mathrm{Gp}(V)$ le groupe des similitudes symplectiques d'un vectoriel réel V muni d'une forme alternée non dégénérée ψ. Il existe alors une et une seule classe de conjugaison X d'homomorphismes $h : \mathbb{S} \to \mathrm{Gp}(V)$ vérifiant les conditions (1.5.1) et de poids -1, i.e. de poids $hw : \mathbb{G}_m \to \mathrm{Gp}(V) : x \longmapsto$ homothétie de rapport x^{-1}. L'espace X s'identifie à la somme de deux demi-espaces de Siegel.

La construction 1.5 identifie les $h \in X$ aux décompositions $V_{\mathbb{C}} = V^{-1,0} \oplus V^{0,-1}$ de $V_{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, telles que $V^{pq} = \overline{V^{qp}}$, que $V^{0,-1}$ soit totalement isotrope pour ψ, et que, si C désigne l'endomorphisme de V qui induit la multiplication par i^{p-q} sur V^{pq}, la forme symétrique $\psi(x, Cy) = \psi(x, h(i)y)$ sur V soit définie (>0 ou <0).

1.7. Soit Γ un sous-groupe arithmétique de $G(\mathbb{Q})$. On s'intéresse au cas où Γ est défini par des conditions de congruence. Si $V_{\mathbb{Z}}$ est un réseau entier dans une représentation fidèle V de G, ceci signifie qu'il existe n tel que Γ contienne avec un indice fini le groupe $\Gamma_n \subset G(\mathbb{Q})$ des $\gamma \in G(\mathbb{Q})$ tels que $\gamma \in G(\mathbb{R})^o$, que $\gamma V_{\mathbb{Z}} = V_{\mathbb{Z}}$ et que $\gamma \equiv \mathrm{Id} \pmod{n}$. D'après Baily et Borel, le quotient X^o/Γ est muni d'une structure naturelle de schéma quasi-projectif sur $\mathbb{C}$. Soit K_n le sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$ formés des $k = (k_p)$ tels que $k_p \cdot V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_p = V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_p$ et que $k_p \equiv 1 \pmod{n}$ pour $p \mid n$. Le groupe Γ_n est alors l'intersection, dans $G(\mathbb{A})$, de $G(\mathbb{Q})$ et de $G(\mathbb{R})^o \times K_n$.

1.8. Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$. L'espace $K_\infty \times K\backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}) = K\backslash X \times G(\mathbb{A}^f)/G(\mathbb{Q}) = X \times (K\backslash G(\mathbb{A}^f))/G(\mathbb{Q})$ est alors somme d'une famille finie d'espaces du type considéré en 1.7. C'est donc un schéma quasi-projectif sur $\mathbb{C}$. On le notera ${}_KM_{\mathbb{C}}(G, h_o)$ (voire simplement ${}_KM_{\mathbb{C}}(G)$ ou ${}_KM_{\mathbb{C}}$).

Pour K de plus en plus petit, ces schémas forment un système projectif de schémas à morphismes de transition finis et surjectifs

$$ {}_KM_{\mathbb{C}}(G, h_o) \qquad (K \to 0). \tag{1.8.1}$$

On désignera par $M_{\mathbb{C}}(G, h_o)$ (voire simplement $M_{\mathbb{C}}(G)$, ou $M_{\mathbb{C}}$) le schéma quasi-compact et séparé (non de type fini pour $G \neq \{1\}$) limite projective de (1.8.1)

$$ M_{\mathbb{C}}(G, h_o) = \varprojlim_K K_\infty \times K\backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}). \tag{1.8.2}$$

On doit le considérer comme un avatar du système projectif (1.8.1). Le groupe $G(\mathbb{A}^f)$ agit sur $M_{\mathbb{C}}$, ou, si l'on préfère, sur le pro-objet défini par le système projectif (1.8.1), mais bien sûr pas sur les ${}_KM_{\mathbb{C}}$ individuels (cf. 3.2). On a

$$K\backslash M_{\mathbb{C}} = {}_KM_{\mathbb{C}},$$

de sorte que

$$ M_{\mathbb{C}} = \varprojlim_K K\backslash M_{\mathbb{C}} \qquad (K \text{ compact ouvert dans } G(\mathbb{A}^f)). \tag{1.8.3}$$

Ceci s'exprime en disant que $G(\mathbb{A}^f)$ agit continûment sur $M_{\mathbb{C}}$.

La construction suivante sera utile pour interpréter les ${}_KM_{\mathbb{C}}$ comme des schémas de modules.

1.9. Soient H un groupe algébrique sur $\mathbb{Q}$ et V une représentation fidèle de H. On définit une H-structure $\bar{\iota}$ sur un vectoriel W comme étant un isomorphisme de V avec W, donné modulo $H(\mathbb{Q})$: $\bar{\iota} \in \mathrm{Isom}(V, W)/H(\mathbb{Q})$. Si $H(\mathbb{Q})$ est le groupe des automorphismes d'une structure s d'espèce Σ sur V, alors une H-structure sur W s'identifie à une structure t de même espèce sur W, isomorphe à s (avec $\bar{\iota} = \mathrm{Isom}((V,s),(W,t))$). Soit W muni d'une H-structure $\bar{\iota}$. Le groupe algébrique $\iota H \iota^{-1} \subset \mathrm{GL}(W)$ ($\iota \in \bar{\iota}$) ne dépend que de $\bar{\iota}$. On le note $H^{\bar{\iota}}$. Soit A une $\mathbb{Q}$-algèbre. L'ensemble $\mathrm{Isom}_{\bar{\iota}}(W \otimes A, V \otimes A)$ des isomorphismes permis de $W \otimes A$ avec $V \otimes A$ est l'ensemble des isomorphismes k tels que, pour $\iota \in \bar{\iota}$, on ait $k\iota \in H(A)$.

1.10. Soient (G, h_o) comme en 1.5, V une représentation linéaire fidèle de G, K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$, et considérons les objets H du type suivant : H consiste en

(a) un espace vectoriel $H_{\mathbb{Q}}$ sur $\mathbb{Q}$, muni d'une G-structure $\bar{\iota}$ (1.8);

(b) un homomorphisme $h : \mathbb{S} \to G_{\mathbb{R}}^{\bar{\iota}}$ tel que, pour $\iota \in \bar{\iota}$, $\iota^{-1} h \iota : \mathbb{S} \to G_{\mathbb{R}}$ soit conjugué à h_o;

(c) une classe $\bar{k} \in K \backslash \mathrm{Isom}_{\bar{\iota}}(H \otimes \mathbb{A}^f, V \otimes \mathbb{A}^f)$ (1.9).

1.11. Exemple I (suite de 1.6). Soient V un $\mathbb{Q}$-vectoriel muni d'une forme alternée non dégénérée ψ, G le groupe des similitudes symplectiques de V, $V_{\mathbb{Z}}$ un réseau entier sur lequel ψ soit à valeurs entières de discriminant 1 et h_o comme en 1.6. Prenons $K = \prod_\ell \mathrm{Gp}(V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_\ell)$. Une donnée (a) s'interprète comme un vectoriel H de même dimension que V, muni d'une forme alternée ψ donnée à un facteur rationnel près. Une donnée (b) s'interprète comme une bigraduation de Hodge de $H_{\mathbb{C}}$, de type 1.6. Une donnée (c) s'interprète comme un réseau entier $H_{\mathbb{Z}}$ de H, sur lequel un multiple rationnel de ψ est à valeurs entières et de discriminant 1 : $\bar{k}$ est l'ensemble des k tels que, pour tout ℓ, $V_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_\ell = k_\ell(H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Z}_\ell)$. On peut normaliser ψ par les conditions d'être à valeurs entières de discriminant 1 sur $H_{\mathbb{Z}}$, et de vérifier $\psi(x, Cx) > 0$ (cf. 1.6).

Soient n un entier, et K_n le sous-groupe de K formé des k tels que $k \equiv 1 \pmod{n}$. Pour K_n, une donnée (c) s'interprète comme $H_{\mathbb{Z}}$ comme plus haut, plus une similitude symplectique $H_{\mathbb{Z}}/nH_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{Z}}/nV_{\mathbb{Z}}$.

1.12. Sous les hypothèses de 1.10, les points de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_o)$ sont en correspondance biunivoque avec les classes d'isomorphie d'objets H du type 1.10. Soit en effet $H = (H_{\mathbb{Q}}, \bar{\iota}, h, \bar{k})$; à H muni de $\iota \in \bar{\iota}$, on associe le morphisme $\iota^{-1} h \iota : \mathbb{S} \to G_{\mathbb{R}}$, élément de $X \simeq K_\infty \backslash G(\mathbb{R})$, et $\bar{k}\iota$ dans $K \backslash G(\mathbb{A}^f)$, soit au total un élément de $K \backslash X \times G(\mathbb{A}^f)$; à H seul, on associe seulement un élément de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G, h_o) = = K \backslash X \times G(\mathbb{A}^f)/G(\mathbb{Q}) = K_\infty \times K \backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})$, qui détermine univoquement la classe d'isomorphisme de H.

Dans certains cas (voir 4.11), se donner un objet H comme plus haut revient à se donner une variété abélienne, munie de quelques structures supplémentaires. On obtient alors une interprétation de ${}_K M_{\mathbb{C}}(G)$ (et de $M_{\mathbb{C}}(G)$) comme étant le schéma de modules (grossier) de ce type de variétés abéliennes.

1.13. Soient G^i $(i = 1, 2)$ deux groupes réductifs, $h^i : \mathbb{S} \to G^i_{\mathbb{R}}$ des homomorphismes vérifiant les conditions de 1.5 et X^i l'ensemble des conjugués de h^i par un élément de $G^i(\mathbb{R})$. Soient $G = G^1 \times G^2$, $h : \mathbb{S} \to G_{\mathbb{R}}$ le morphisme (h^1, h^2) et $X = X^1 \times X^2$ l'ensemble des conjugués de h. On définit de façon évidente un isomorphisme

$$M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \times M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2) = M_{\mathbb{C}}(G, h). \tag{1.13.1}$$

Pour K^i compact ouvert dans $G^i(\mathbb{A}^f)$ et $K = K^1 \times K^2$, on a de même

$${}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \times {}_{K^2} M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2) = {}_K M_{\mathbb{C}}(G, h). \tag{1.13.2}$$

1.14. Soit G^1, G^2, h^1, h^2 comme en 1.13. On désignera par $u : (G^1, h^1) \to (G^2, h^2)$ un homomorphisme $u : G^1 \to G^2$ tel que $uX^1 \subset X^2$. Un tel homomorphisme définit

$$u : M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2). \tag{1.14.1}$$

Pour K^i compact ouvert dans $G^i(\mathbb{A}^f)$, avec $u(K^1) \subset K^2$, il définit

$$u(K^1, K^2) : {}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \longrightarrow {}_{K^2} M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2). \tag{1.14.2}$$

Proposition 1.15. Avec les notations de 1.14, supposons que G^1 soit un sous-groupe de G^2. Alors, pour tout sous-groupe compact ouvert K^1 de $G^1(\mathbb{A}^f)$, il existe un sous-groupe compact ouvert $K^2 \supset K^1$ de $G^2(\mathbb{A}^f)$ tel que $u(K^1, K^2)$ identifie ${}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1)$ à un sous-schéma fermé de ${}_{K^2} M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2)$.

Si les K^i sont assez petit pour que l'application de $X^i \times (K \backslash G^i(\mathbb{A}^f))$ dans ${}_{K^i} M_{\mathbb{C}}(G^i, h^i)$ soit étale, alors l'application $u(K^1, K^2)$ est finie et non ramifiée. Il suffit de traiter ce cas, et de montrer que $u(K^1, K^2)$ est injectif pour $K^2 \supset K^1$ assez petit. Le graphe de la relation d'équivalence $u(K^1, K^2)(x) = u(K^1, K^2)(y)$ est un sous-schéma fermé de $({}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1))^2$, qui décroît avec K^2, donc est stationnaire pour $K^2 \supset K^1$ assez petit. Il suffit de montrer que

$$u(K_1) : {}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \longrightarrow \varprojlim_{K^2 \supset K^1} {}_{K^2} M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2) = \mathrm{dfn}\, {}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2)$$

est injectif. On a

$${}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) = K^1 \backslash M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1),$$
$${}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2) = K^1 \backslash M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2),$$

de sorte qu'il suffit de prouver la

Variante 1.15.1. $u : M_{\mathbb{C}}(G^1, h^1) \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G^2, h^2)$ est injectif.

Cette assertion se déduit aisément des deux lemmes suivants.

Lemme 1.15.2. Soit $U^i \subset C^i(\mathbb{Q})$ le groupe des unités du centre de G^i, et soit $G^i(\mathbb{Q})^\wedge = \varprojlim_n \big(G^i(\mathbb{Q})/(U^i)^n\big)$. Alors

$$M_{\mathbb{C}}(G^i, h^i) = K^i_\infty \backslash G^i(\mathbb{A})/G^i(\mathbb{Q})^\wedge.$$

C'est un corollaire du théorème de Chevalley selon lequel les $(U^i)^n$ sont des sous-groupes de congruence de U^i.

Lemme 1.15.3. $u : G^1(\mathbb{A}^f)/G^1(\mathbb{Q})^\wedge \longrightarrow G^2(\mathbb{A}^f)/G^2(\mathbb{Q})^\wedge$ est injectif.

Par translation à gauche, il suffit de montrer que $u^{-1}(\{e\}) = \{e\}$: on contemple le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & G^1(\mathbb{Q})^\wedge & \longrightarrow & G^2(\mathbb{Q})^\wedge & \longrightarrow & (G^2/G^1)(\mathbb{Q})^\wedge \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow\ ! \\
0 & \longrightarrow & G^1(\mathbb{A}^f) & \longrightarrow & G^2(\mathbb{A}^f) & \longrightarrow & (G^2/G^1)(\mathbb{A}^f) \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & G^1(\mathbb{A}^f)/G^1(\mathbb{Q})^\wedge & \longrightarrow & G^2(\mathbb{A}^f)/G^2(\mathbb{Q})^\wedge & &
\end{array}$$

où $(G^2/G^1)(\mathbb{Q})^\wedge = \varprojlim_n (G^2/G^1)(\mathbb{Q})/(U^2/U^1)^n$.

§ 2. Composantes connexes.

2.1. Soit G un groupe réductif connexe sur $\mathbb{Q}$. On reprend les notations 1.1 et on suppose que G' n'admet pas de sous-groupe invariant non trivial H (défini sur $\mathbb{Q}$) et tel que $H(\mathbb{R})$ soit compact. Cette hypothèse n'exclut pas que $G'_{\mathbb{R}}$ ait des facteurs compacts. On désigne par $\widetilde{G}'$ le revêtement simplement connexe du groupe dérivé G'.

Proposition 2.2. (i) Le groupe $G(\mathbb{A}^f)$ agit transitivement sur l'ensemble $\pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$ des composantes connexes de $G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})$.

(ii) Le groupe $\widetilde{G}'(\mathbb{A})$ agit trivialement sur $\pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$.

(iii) Le quotient de $G(\mathbb{A})$ par l'image de $\widetilde{G}'(\mathbb{A})$ est un groupe commutatif.

L'assertion (i) résulte de (0.4) : $G(\mathbb{A}) = G(\mathbb{A}^f)G(\mathbb{R})^0G(\mathbb{Q})$. Puisque $\widetilde{G}'$ est simplement connexe, le groupe $\widetilde{G}'(\mathbb{R})$ est connexe. D'après (0.3), $\widetilde{G}'(\mathbb{R}).\widetilde{G}'(\mathbb{Q})$ est dense dans $\widetilde{G}'(\mathbb{A})$, de sorte que $\widetilde{G}'(\mathbb{A})/\widetilde{G}'(\mathbb{Q})$ est connexe. Pour $x \in G(\mathbb{A})$, on a $\widetilde{G}'(\mathbb{A}).x = x.\widetilde{G}'(\mathbb{A})$, de sorte que l'image de $\widetilde{G}'(\mathbb{A}).x$ dans $G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})$ est une image de $\widetilde{G}'(\mathbb{A})/\widetilde{G}'(\mathbb{Q})$: elle est connexe, et (ii) en résulte.

Soit Z le centre de $\widetilde{G}'$. L'assertion (iii) résulte de ce que l'application "commutateur" : $xyx^{-1}y^{-1} : G\times G \longrightarrow G$ admet une factorisation

$$G \times G \longrightarrow G/C \times G/C \longleftarrow \widetilde{G}'/Z \times \widetilde{G}'/Z \longrightarrow \widetilde{G}' \longrightarrow G.$$

Définition 2.3. On désigne par $\pi(G)$ le quotient (commutatif) de $G(\mathbb{A})$ (ou $G(\mathbb{A}^f)$) qui agit fidèlement sur $\pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$

En d'autres termes, $\pi(G)$ est $\pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$, muni de sa structure de groupe commutatif "évidente". Rappelons le théorème suivant.

Théorème 2.4. Sous les hypothèses de 2.1, si G' est simplement connexe, alors l'homomorphisme canonique

$$\pi(G) = \pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})) \longrightarrow \pi_0(T(\mathbb{A})/T(\mathbb{Q})) \tag{2.4.1}$$

est bijectif.

Pour prouver la surjectivité de (2.4.1), il suffit d'après 2.2(i) appliqué à T de montrer que $G(\mathbb{A}^f)$ s'envoie sur $T(\mathbb{A}^f)$. Le noyau G' de $\nu.G \longrightarrow T$ étant connexe, on sait que, pour presque tout p, $\nu(G(\mathbb{Z}_p)) = T(\mathbb{Z}_p)$ (cette formule a un sens pour presque tout p, et est un corollaire du théorème de Lang appliqué à G' réduit modulo p). Il suffit donc de prouver que, pour tout p, $\nu(G(\mathbb{Q}_p)) = T(\mathbb{Q}_p)$, ce qui résulte de (0.2) appliqué à G'.

Le théorème 2.4 équivaut à l'énoncé plus concret

Variante 2.5. Pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, l'application

$$\nu : \pi_0(K\backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})) \longrightarrow \pi_0(\nu(K)\backslash T(\mathbb{A})/T(\mathbb{Q})) \tag{2.5.1}$$

est bijective.

En effet, $\pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})) = \varprojlim_K \pi_0(K\backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$, et de même pour T. Par ailleurs, $\pi_0(K\backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})) = G(\mathbb{R})^0 \times K\backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})$. Montrons que si $x, y \in G(\mathbb{A})$ ont même image dans le membre de droite de (2.5.1), alors ils ont même image dans celui-de gauche. Une translation à gauche par y^{-1}, qui remplace K par $y^{-1}Ky$, permet de supposer que $y = e$. Modifiant x par un élément de $G(\mathbb{R})^0 \times K$, on peut supposer que $\nu(x) = \tau$ avec $\tau \in T(\mathbb{Q})$. D'après le principe de Hasse (0.1) pour G', l'équation $m(y) = \tau$ a une solution dans $G(\mathbb{Q})$. Corrigeant x par y, on peut supposer que $x \in G(\mathbb{A})$. D'après 2.2(ii), l'image de x dans $G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})$ est dans la composante neutre, et a fortiori x et y ont même image dans le membre de gauche de 2.5.1.

Cette démonstration semble utiliser, via (0.1), que G' soit sans facteur E_8. En fait, la classe dans $H^1(\mathbb{Q}, G')$ qui obstrue l'équation $m(y) = \tau$ vient du centre de G', et les facteurs E_8, étant adjoints, comptent pour du beurre.

Proposition 2.6. On a $K_\infty = C(\mathbb{R}).\big(K_\infty \cap G'(\mathbb{R})^0\big)$. Le groupe $K_\infty \cap G'(\mathbb{R})^0$ est connexe, et

$$\pi_0(K_\infty) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Im}\big(\pi_0(C(\mathbb{R})) \longrightarrow \pi_0(G(\mathbb{R}))\big),$$

Soit $h' : \mathbb{S} \to G_{\mathbb{R}} \to (G/C)_{\mathbb{R}}$. Le centralisateur de h' dans $(G/C)(\mathbb{R})$ est connexe, car c'est un groupe compact dont le complexifié est connexe (comme centralisateur d'un tore). En particulier, l'image de K_∞ dans $G/C(\mathbb{R})$ tombe dans la composante neutre, image de $G'(\mathbb{R})^0$, et $K_\infty = C(\mathbb{R})\big(K_\infty \cap G'(\mathbb{R})^0\big)$. Le groupe $K_\infty \cap G'(\mathbb{R})^0$ est connexe en tant que sous-groupe compact maximal d'un groupe connexe. 2.6 en résulte.

2.7. L'image de $\pi_0(K_\infty)$ dans $\pi_0(G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$ ne dépend que de la classe de conjugaison de h, et $\pi_0(M_{\mathbb{C}}(G,h)) = \varprojlim_K \pi_0(K_\infty \times K\backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q}))$ s'identifie à $\pi(G)/\pi_0(K_\infty)$.

En particulier, si G' est simplement connexe, on a

$$\pi_0(M_{\mathbb{C}}(G,h)) \xrightarrow{\sim} \pi_0(T(\mathbb{A})/T(\mathbb{Q}))/\pi_0(K_\infty). \tag{2.7.1}$$

Plus concrètement, pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, $\pi_0({}_KM_{\mathbb{C}}(G,h))$ est alors un espace principal homogène sous $\nu(K_\infty \times K)\backslash T(\mathbb{A})/T(\mathbb{Q})$.

§ 3. Modèles.

Soient G un groupe réductif sur $\mathbb{Q}$, $h : \mathbb{S} \to G_{\mathbb{R}}$ vérifiant les conditions de 1.5 et E un corps muni d'un plongement complexe $\rho : E \to \mathbb{C}$. On pose $M_{\mathbb{C}}(G) = M_{\mathbb{C}}(G,h)$.

Définition 3.1. Un modèle sur E de $M_{\mathbb{C}}(G)$ consiste en

(a) un schéma M sur E, muni d'une action continue de $G(\mathbb{A}^f)$;

(b) un isomorphisme m de $M \otimes_{E,\rho} \mathbb{C}$ avec $M_{\mathbb{C}}(G)$ compatible à l'action de $G(\mathbb{A}^f)$.

Soit F une extension finie de E, munie d'un plongement complexe qui prolonge celui de E. Si $M_E(G,h)$ est un modèle de $M_{\mathbb{C}}(G,h)$ sur E, on désigne par $M_F(G,h)$ le modèle $M_E(G,h) \otimes_E F$ de $M_{\mathbb{C}}(G,h)$ sur F.

Remarque 3.2. Se donner un schéma M sur E, muni d'une action continue de $G(\mathbb{A}^f)$, revient à se donner

(a) pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, un schéma ${}_KM$ sur E;

(b) pour K et L deux sous-groupes compacts ouverts de $G(\mathbb{A}^f)$ et pour $x \in G(\mathbb{A}^f)$ tel que $xKx^{-1} \subset L$, un homomorphisme $J_{L,K}(x) : {}_KM \longrightarrow {}_LM$, ces homomorphismes vérifiant

(α) $J_{M,L}(y)J_{L,K}(x) = J_{M,K}(yx)$,

(β) $J_{K,K}(x) = \mathrm{Id}$ si $x \in K$,

(γ) pour K distingué dans L, J définit une action de L/K sur ${}_KM$, et $J_{L,K}(e)$ définit $(L/K)\backslash {}_KM \xrightarrow{\sim} {}_LM$.

On aura

$$M = \varprojlim_K {}_KM \qquad \text{et} \tag{3.2.1}$$

$${}_KM = K\backslash M. \tag{3.2.2}$$

3.3. Soit $M(G)$ un modèle sur E de $M_{\mathbb{C}}(G)$. Pour K compact ouvert dans $G(\mathbb{A}^f)$, on pose ${}_KM(G) = K\backslash M(G)$. Les ${}_KM(G)$ sont des schémas quasi-projectifs sur E, non nécessairement géométriquement connexes.

L'isomorphisme structural m induit des isomorphismes

$$ {}_K M(G) \otimes_{E,\rho} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} {}_K M_{\mathbb{C}}(G). \tag{3.3.1} $$

3.4. Supposons que G vérifie les hypothèses de 2.1, et soit (M, m) un modèle de $M_{\mathbb{C}}(G, h)$ sur E. Soit $\overline{E}$ la clôture algébrique de E dans $\mathbb{C}$. Puisque M est défini sur E, le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(\overline{E}/E)$ agit sur l'ensemble profini

$$ \pi_0(M \otimes_E \overline{E}) = \varprojlim_K \pi_0({}_K M \otimes_E \overline{E}) \xrightarrow[m]{\sim} \pi_0(M_{\mathbb{C}}(G, h)). $$

Le groupe $G(\mathbb{A}^f)$ agit sur $\pi_0(M \otimes_E \overline{E})$ via son quotient $\pi(G)/\pi_0(K_\infty)$, et $\pi_0(M \otimes_E \overline{E})$ est un espace principal homogène sous le groupe commutatif $\pi(G)/\pi_0(K_\infty)$ (2.6). L'action de $\mathrm{Gal}(\overline{E}/E)$ commute à celle de $G(\mathbb{A}^f)$, donc à celle de $\pi(G)/\pi_0(K_\infty)$. L'action d'un élément σ de $\mathrm{Gal}(\overline{E}/E)$ ne peut donc être que la translation définie par un élément $\lambda(\sigma)$ de $\pi(G)/\pi_0(K_\infty)$, et λ est un homomorphisme

$$ \lambda_M : \mathrm{Gal}(\overline{E}/E) \longrightarrow \pi(G)/\pi_0(K_\infty). \tag{3.4.1} $$

Supposons que E soit un corps de nombres. La théorie du corps de classe identifie alors le plus grand quotient abélien de $\mathrm{Gal}(\overline{E}/E)$ à $\pi_0(E^*(\mathbb{A})/E^*(\mathbb{Q}))$, et (3.4.1) à

$$ \lambda_M : \mathrm{Gal}(\overline{E}/E)^{\mathrm{ab}} = \pi_0(E^*(\mathbb{A})/E^*(\mathbb{Q})) \longrightarrow \pi(G)/\pi_0(K_\infty). \tag{3.4.2} $$

Dans le cas particulier où G' est simplement connexe, l'homomorphisme (3.4.2) s'identifie (2.7.1) à

$$ \lambda_M : \pi_0(E^*(\mathbb{A})/E^*(\mathbb{Q})) \longrightarrow \pi_0(T(\mathbb{A})/T(\mathbb{Q}))/\pi_0(K_\infty). \tag{3.4.3} $$

Définition 3.5. Les homomorphismes (3.4.1) (3.4.2) (3.4.3) s'appellent la loi de réciprocité du modèle M. Si G' est simplement connexe, et que λ_M provient d'un homomorphisme de groupes algébriques sur $\mathbb{Q}$ de E^* dans T, ce dernier s'appellera encore la "loi de réciprocité" de M.

3.6. Il existe une règle, applicable à chacun des modèles construits par Shimura, pour déterminer E et la loi de réciprocité λ_M à partir de G et h. Le corps E, pour G quelconque, et λ_M, pour G' simplement connexe, se décrivent comme suit.

3.7. L'homomorphisme composé hr (1.3)

$$ hr : \mathbb{G}_m \xrightarrow{r} \mathbb{S}_{\mathbb{C}} \xrightarrow{h} G_{\mathbb{C}} $$

est un homomorphisme sur $\mathbb{C}$ entre groupes algébriques définis sur $\mathbb{Q}$. Le sous-corps E de $\mathbb{C}$ est le corps de définition $E(G, h)$ de la classe de conjugaison de cet homomorphisme.

Pour G semi-simple adjoint, le corps $E(G, h)$ peut se décrire comme suit. Soient Δ le diagramme de Dynkin de $G_{\mathbb{C}}$ et $|\Delta|$ l'ensemble des sommets de Δ. Le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ agit sur Δ.

Soit H un tore maximal de $G_{\mathbb{C}}$, muni d'un système de racines simples $(\alpha_i)_{i\in|\Delta|}$. Les α_i identifient H à $\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^{|\Delta|}$. Pour tout homomorphisme $u : \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \to G_{\mathbb{C}}$, il existe alors un unique homomorphisme $u' : \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \to H = \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}^{\Delta}$: $x \longmapsto (x^{n_i})_{i\in|\Delta|}$ avec $n_i \geq 0$, qui soit conjugué à u. La construction $u \mapsto \eta(u) = (n_i)_{i\in|\Delta|}$ identifie l'ensemble des classes de conjugaison d'applications de $\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}$ dans $G_{\mathbb{C}}$ avec l'ensemble des fonctions de $|\Delta|$ dans $\mathbb{N}$. On en déduit que le corps $E(G, h)$ est défini par le sous-groupe de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ qui stabilise $\eta(hr)$.

Proposition 3.8. Soit $G/C = \prod_{i=1}^{g} G_i$ la décomposition du groupe adjoint G/C en facteurs $\mathbb{Q}$-simples, et soit h_i le composé $h_i : \mathbb{S} \xrightarrow{h} G_{\mathbb{R}} \longrightarrow (G_i)_{\mathbb{R}}$.

(i) Le sous-corps $E(G, h)$ de $\mathbb{C}$ est le composé des sous-corps $E(T, \nu \circ h)$ et $E(G_i, h_i)$ $(1 \leq i \leq g)$ de $\mathbb{C}$.

(ii) Si l'involution d'opposition du diagramme de Dynkin de G_i respecte $\eta(h_i r)$, alors $E(G_i, h_i)$ est totalement réel. Sinon, $E(G_i, h_i)$ est une extension quadratique totalement imaginaire d'un corps de nombres totalement réel.

L'assertion (i) est facile à vérifier, et il suffit de prouver (ii) pour G $\mathbb{Q}$-simple et adjoint. Soit Δ son diagramme de Dynkin. Il résulte des hypothèses 1.5 que $G_{\mathbb{R}}$ admet un tore maximal compact ; ceci implique que la conjugaison complexe agit sur Δ par l'involution d'opposition ι. Celle-ci est dans le centre du groupe des automorphismes de Δ.

Soit E' l'extension galoisienne de $\mathbb{Q}$ définie par le sous-groupe de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ qui agit trivialement sur Δ. Alors, l'image σ de la conjugaison complexe est centrale dans $\mathrm{Gal}(E'/\mathbb{Q})$; il en résulte que E' est totalement réel ou

extension quadratique totalement imaginaire d'un corps totalement réel. Enfin, σ est l'identité sur $E(G,h) \subset E'$ si et seulement si ι respecte $\eta(hr)$, d'où l'assertion.

3.9. On reprend les notations de 3.6. On suppose que G' est simplement connexe, que E contient $E(G,h)$, et que le plongement complexe de E induit celui de $E(G,h)$. Le morphisme composé

$$r''(h) : \nu\, h\, r : \mathbb{G}_{m,\mathbb{C}} \xrightarrow{r} \mathbb{S}_{\mathbb{C}} \xrightarrow{h} G_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\nu} T_{\mathbb{C}}$$

ne dépend que de la classe de conjugaison de hr. Il est donc défini sur E, i.e. provient par extension des scalaires de E à $\mathbb{C}$ d'un homomorphisme de groupes algébriques sur E, encore noté $r''(h) : \mathbb{G}_m \longrightarrow T_E$. Appliquons la restriction des scalaires à la Weil, et soit $r'(h) : E^* \to T$ le composé

$$E^* = R_{E/\mathbb{Q}}(\mathbb{G}_{m,E}) \xrightarrow{R_{E/\mathbb{Q}}(r''(h))} R_{E/\mathbb{Q}}(T_E) \xrightarrow{N_{E/\mathbb{Q}}} T.$$

La loi de réciprocité de M est l'inverse $r(G,h)$ de $r'(h)$:

$$r(G,h) = r'(h)^{-1} : E^* \longrightarrow T. \tag{3.9.1}$$

3.10. Exemple II. Soient H un tore et $h : \mathbb{S} \to H_{\mathbb{R}}$. Les conditions de 1.5 sont automatiquement vérifiées. Les ${}_KM_{\mathbb{C}}(H,h)$ sont des ensembles finis. Un schéma réduit fini sur le corps $E(H,h)$ (3.7) s'identifie à un ensemble galoisien. On en déduit qu'il existe, à isomorphisme unique près, un et un seul modèle de $M_{\mathbb{C}}(H,h)$ sur $E(H,h)$, de loi de réciprocité donnée par 3.9.1. On le note $M(H,h)$.

3.11. Soit F une extension finie de E, munie d'un plongement complexe qui prolonge celui de E. Le diagramme



est commutatif. Si $M_E(G,h)$ est un modèle sur E de $M_{\mathbb{C}}(G,h)$, ayant (3.9.1) pour loi de réciprocité, il en résulte que $M_F(G,h)$ (3.1) a encore (3.9.1) pour loi de réciprocité.

3.12. Soient $u : (G^1,h^1) \to (G^2,h^2)$ comme en 1.14, et $M^i_{E^i}(G^i,h^i)$ un modèle de $M_{\mathbb{C}}(G^i,h^i)$ sur E^i. Soit E le composé des sous-corps E^1 et E^2 de $\mathbb{C}$. On a (notation de 3.1)

$$M^i_E(G^i,h^i) \otimes_E \mathbb{C} = M_{\mathbb{C}}(G^i,h^i) \qquad (i = 1.2).$$

Il a donc un sens de se demander si

$$u : M_{\mathbb{C}}(G^1,h^1) \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G^2,h^2)$$

est défini sur E.

Définition 3.13. Soient G un groupe réductif connexe sur $\mathbb{Q}$ vérifiant la condition de 2.1, $h : \mathbb{S} \to G_{\mathbb{R}}$ un homomorphisme vérifiant les conditions de 1.5 et E une extension de $E(G,h)$ (3.7) munie d'un plongement complexe prolongeant celui de $E(G,h)$. Un modèle $M_E(G,h)$ de $M_{\mathbb{C}}(G,h)$ sur E est dit faiblement canonique si, pour tout tore $u : H \to G$ dans G, muni de $h' : \mathbb{S} \to H_{\mathbb{R}}$ tel que uh' soit le conjugué de h par un élément de $G(\mathbb{R})$, le morphisme (1.14)

$$M_{\mathbb{C}}(H,h') \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G,h)$$

est défini (3.10) (3.12) sur le composé $E(H,h') \cdot E \subset \mathbb{C}$. Un modèle $M_E(G,h)$ est dit canonique s'il est faiblement canonique et que $E = E(G,h)$.

3.14. Traduction. Soit M un modèle canonique de $M_{\mathbb{C}}(G,h)$, de loi de réciprocité λ_M. Si G' est simplement connexe, alors λ_M est donnée par 3.9.1 (5.6). Pour tout sous-groupe compact ouvert K de $G(\mathbb{A}^f)$, désignons encore par $\nu(K)$ l'image de K dans $\pi(G)/\pi_0(K_\infty)$, et soit $E(K)$ l'extension de $E(G,h)$ définie par le groupe de classes d'idèles $\lambda_M^{-1}(\nu(K))$. On vérifie que $E(K)$ est le corps de définition de la composante neutre ${}_KM^0_{\mathbb{C}}$ de ${}_KM_{\mathbb{C}}$, considérée comme sous-schéma de ${}_KM_{\mathbb{C}} = {}_KM \otimes_{E,\rho} \mathbb{C}$.

Par définition, ${}_KM^0_{\mathbb{C}}$ provient par extension des scalaires de $E(K)$ à $\mathbb{C}$ d'un sous-schéma ${}_KM'$ de ${}_KM \otimes_E E(K)$. Le schéma ${}_KM'/E(K)$ est géométriquement connexe sur $E(K)$, et on peut encore décrire le schéma ${}_KM'$ comme

celle des composantes connexes (sur E) de ${}_KM$ qui, après extension des scalaires de E à $\mathbb{C}$, contient l'origine

$$\begin{array}{ccccc} {}_KM & \hookleftarrow & {}_KM' & \longleftarrow & {}_KM^0_{\mathbb{C}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \operatorname{Spec} E(K) & \longleftarrow & \operatorname{Spec}\mathbb{C} \\ & & \downarrow & & \\ \operatorname{Spec} E & = & \operatorname{Spec} E & & . \end{array}$$

Shimura a l'habitude de s'exprimer en terme du système des variétés ${}_KM'/E(K)$ et des homomorphismes de type 2.2 qu'on a entre celles-ci. Pour un énoncé typique, voir [14, p. 146]. Pour la traduction, cf. [14, 2.7].

3.15. Pour $u : (H, h') \longrightarrow (G, h)$ comme en 3.13, l'image de $M_{\mathbb{C}}(H, h')$ dans ${}_KM_{\mathbb{C}}(G, h)$ est un ensemble fini. L'hypothèse est que cette partie de ${}_KM_{\mathbb{C}}(G, h)$ soit définie sur $E(H, h')$, que ses points soient définis sur une extension abélienne de $E(H, h')$, et que $\operatorname{Gal}(\overline{E(H, h')}/E(H, h'))$ les permute d'une manière prescrite.

On appellera "spéciaux" les points de ${}_KM_{\mathbb{C}}(G, h)$ dans l'image d'un $M_{\mathbb{C}}(H, h')$.

Supposons connu un plongement projectif $q : {}_KM^0_{\mathbb{C}} \longrightarrow \mathbb{P}^r$, qui soit défini sur $E(K)$. On peut l'interpréter comme $\widetilde{q} : X^0 \longrightarrow \mathbb{P}^r$ (cf. 1.7, 1.8). Si $uh' \in X$ est dans X^0, alors les coordonnées de $\widetilde{q}(uh')$ engendrent sur $E(K)\,E(H, h')$ une extension abélienne de $E(H, h')$ qu'on peut expliciter comme corps de classe.

3.16. L'exemple classique d'une telle situation est fourni par le schéma de module des courbes elliptiques (correspondant à $G = \mathrm{GL}_2$, $K = \mathrm{GL}_2(\widehat{\mathbb{Z}})$, h comme en 1.6), et par ceux de ses points définis par des courbes elliptiques à multiplication complexe.

Soit j l'invariant modulaire, vu comme fonction sur le demi-plan de Poincaré X^0. Si $\tau \in X^0$ appartient à un corps quadratique imaginaire K, soit $L(\tau) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\tau \subset \mathbb{C}$, et soit $\mathcal{O}(\tau) = \{\, k \in K \mid kL(\tau) \subset L(\tau) \,\}$. Le corps $K(j(\tau))$ est l'extension abélienne de K de groupe de Galois le groupe des classes d'idéaux de $\mathcal{O}(\tau)$. Si σ dans Galois correspond à un module inversible L, et si $L(\tau') \simeq L(\tau) \otimes_{\mathcal{O}(\tau)} L$, on a $j(\tau) = j(\tau')^{\sigma}$.

Pour des exemples explicites plus étranges, voir [15] pg 45–46.

ğ 4. Variétés abéliennes.

4.1. Soit k un corps algébriquement clos de caractéristique 0. Soit A une variété abélienne sur k. Pour $n \in \mathbb{N}^+$, on désigne par A_n le noyau de la multiplication par n. Les A_n forment un système projectif ($\varphi_{nm,n} : A_{nm} \longrightarrow A_n$ est $x \longmapsto x^m$) et on pose

$$\widehat{T}(A) = \varprojlim A_n, \qquad \widehat{V}(A) = \mathbb{A}^f \otimes_{\widehat{\mathbb{Z}}} \widehat{T}(A).$$

Le $\widehat{\mathbb{Z}}$-module $\widehat{T}(A)$ est le produit des modules de Tate (= représentations de Weil) $T_\ell(A)$. Si $k = \mathbb{C}$, on a

$$\widehat{T}(A) = \widehat{\mathbb{Z}} \otimes H_1(A, \mathbb{Z}), \tag{4.1.1}$$

$$\widehat{V}(A) = \mathbb{A}^f \otimes H_1(A, \mathbb{Q}). \tag{4.1.2}$$

4.2. La catégorie des variétés abéliennes à isogénie près sur k est la catégorie dont les objets sont les variétés abéliennes sur k et dans laquelle $\mathrm{Hom}_{\mathrm{iso}}(A, B) = \mathrm{Hom}(A, B) \otimes \mathbb{Q}$. On désigne par $A \otimes \mathbb{Q}$ la variété abélienne à isogénie près "sous-jacente" à une variété abélienne A. Tout foncteur additif de la catégorie des variétés abéliennes dans une catégorie additive $\mathbb{Q}$-linéaire se factorise par le foncteur $A \mapsto A \otimes \mathbb{Q}$. Ainsi, le foncteur contravariant "variété duale" $A \mapsto A^*$ se prolonge aux variétés abéliennes à isogénie près. Le foncteur $A \mapsto \widehat{V}(A)$ se prolonge de même. De plus, si A_0 est une variété abélienne à isogénie près, il revient au même de se donner B, plus un isomorphisme $B \otimes \mathbb{Q} = A_0$, ou de se donner $\widehat{T}(B) \subset \widehat{V}(A_0)$.

4.3. Soit A une variété abélienne sur k. On désigne par $\mathrm{NS}(A)$ le groupe des classes d'équivalence algébrique de faisceaux inversibles sur S. On définit une polarisation effective (resp. une polarisation) de A comme un élément de $\mathrm{NS}(A)$, respectivement de $\mathrm{NS}(A) \otimes \mathbb{Q}$, dont un multiple positif est défini par un plongement projectif de A. Une polarisation homogène est un élément de $(\mathrm{NS}(A) \otimes \mathbb{Q})/\mathbb{Q}^*$ qui est la classe d'une polarisation.

Rappelons que $\mathrm{NS}(A) \otimes \mathbb{Q}$ s'identifie, par une bijection $p \mapsto p'$, à l'ensemble des éléments de $\mathrm{Hom}(A, A^*) \otimes \mathbb{Q}$ égaux à leur transposé. Un isomorphisme $u \in \mathrm{Hom}(A \otimes \mathbb{Q}, B \otimes \mathbb{Q})$ induit des isomorphismes de $\mathrm{Hom}(A, A^*) \otimes \mathbb{Q}$ avec $\mathrm{Hom}(B, B^*) \otimes \mathbb{Q}$, de $\mathrm{NS}(A) \otimes \mathbb{Q}$ avec $\mathrm{NS}(B) \otimes \mathbb{Q}$, et transforme polarisation en polarisation. Ceci permet de parler de polarisation d'une variété abélienne à isogénie près.

4.4. Une polarisation p de A définit dans $\mathrm{End}(A) \otimes \mathbb{Q}$ une involution positive $u \longmapsto p'^{-1}u^*p'$, qui ne dépend que de la polarisation homogène $\mathbb{Q}^*.p$.

Soit F un produit de corps totalement réels, et soit $\rho : F \longrightarrow \mathrm{End}(A) \otimes \mathbb{Q}$.

Soit $\mathrm{NS}_\rho(A) \subset \mathrm{NS}(A)$ l'ensemble des p tels que $p'.\rho(f) = \rho(f)^* p'$ pour $f \in F$.

Le vectoriel $\mathrm{NS}_\rho(A) \otimes \mathbb{Q}$ est muni, pour $f \in F$, d'une action de F: $(f.p)' = p' \circ \rho(f) = \rho(f)^* \circ p'$. Une polarisation faible de A (relative à ρ, F) est un élément de $(\mathrm{NS}_\rho(A) \otimes \mathbb{Q})/F^*$ qui est la classe d'une polarisation. L'ensemble des polarisations faibles de A ne dépend que de $A \otimes \mathbb{Q}$. La restriction au centralisateur de F de l'involution de $\mathrm{End}(A) \otimes \mathbb{Q}$, définie par une polarisation $p \in \mathrm{NS}_\rho(A)$, ne dépend que de la polarisation faible $F^*.p$.

4.5. Si A_0^* est la duale d'une variété abélienne à isogénie près A_0, alors $\widehat{V}(A_0)$ et $\widehat{V}(A_0^*)$ sont en dualité à valeurs dans $\mathbb{A}^f(1)$. Si p est une polarisation de A_0, la forme de polarisation $\psi_p(x,y) = \langle x, p'(y)\rangle$ est une forme alternée non dégénérée sur le $\mathbb{A}^f$-module libre $\widehat{V}(A_0)$, à valeurs dans $\mathbb{A}^f(1)$.

Les rappels 4.1 et 4.5 s'étendent aux schémas abéliens sur une base quelconque.

4.6. Faisons $k = \mathbb{C}$. Le foncteur additif $A \mapsto H_1(A, \mathbb{Q})$ se prolonge aux variétés abéliennes à isogénie près sur $\mathbb{C}$ (4.2). Pour A_0 une variété abélienne à isogénie près, $H_1(A_0, \mathbb{Q})$ et $H_1(A_0^*, \mathbb{Q})$ sont en dualité. Via 4.1.2 et l'isomorphisme de $\mathbb{A}^f(1)$ avec $\mathbb{A}^f$ défini par l'exponentielle, cette dualité est compatible à celle considérée en 4.5. La forme alternée $\psi_p(x,y) = \langle x, p'(y)\rangle$ sur $H_1(A_0, \mathbb{Q})$ définie par une polarisation p de A_0 s'appelle encore la forme de polarisation.

La structure de Hodge de $H_1(A_0, \mathbb{Q})$ est l'homomorphisme $h : \mathbb{S} \longrightarrow \mathrm{GL}(H_1(A_0, \mathbb{Q}))_\mathbb{R}$, tel que $\mathbb{S}$ agisse sur $H_1(A_0, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C}$ par les caractères z^{-1} et $\bar{z}^{-1}$, et que $F(h)^\circ$ (1.5) soit le noyau de l'exponentielle $H_1(A_0, \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C} \longrightarrow \mathrm{Lie}(A)$.

Théorème 4.7. (Riemann). Les constructions

$$(A, p) \longmapsto (H_1(A, \mathbb{Q}), \psi_p, H_1(A, \mathbb{Z}), h),$$

$$(V, \psi, V_\mathbb{Z}, h) \longmapsto F(h)^\circ \backslash V \otimes \mathbb{C} / V_\mathbb{Z}$$

établissent une équivalence entre

(a) variétés abéliennes polarisées sur $\mathbb{C}$;

(b) systèmes formés d'un vectoriel V sur $\mathbb{Q}$, d'une forme alternée non dégénérée ψ sur V, d'un réseau entier $V_\mathbb{Z}$ dans V et d'un homomorphisme h de $\mathbb{S}$ dans le groupe $\mathrm{Gp}(V)_\mathbb{R}$ des similitudes symplectiques de $V \otimes \mathbb{R}$, du type 1.6 et tel que

$$\psi(x, h(i)x) > 0 \qquad (x \in V \otimes \mathbb{R},\ x \neq 0).$$

Variante 4.8. Il revient au même de se donner une variétés abélienne à isogénie près A sur $\mathbb{C}$, munie d'une polarisation homogène, ou de se donner un vectoriel sur $\mathbb{Q}$, muni d'une forme alternée non dégénérée ψ, donnée à un facteur près, et de $h : \mathbb{S} \longrightarrow \mathrm{Gp}(V)$ du type 1.6.

4.9. Soient L une algèbre semi-simple à involution sur $\mathbb{Q}$, et V un vectoriel sur $\mathbb{Q}$, muni d'une structure de L-module fidèle et d'une forme alternée non dégénérée ψ telle que

$$\psi(\ell x, y) = \psi(x, \ell^* y). \tag{4.9.1}$$

On désigne par G le groupe algébrique sur $\mathbb{Q}$ des similitudes symplectiques L-linéaires de V. Le groupe $G(\mathbb{Q})$ est l'ensemble des $g \in \mathrm{GL}_L(V)$ tels qu'il existe $\mu(g) \in \mathbb{Q}^*$ vérifiant

$$\psi(gx, gy) = \mu(g)\psi(x, y). \tag{4.9.2}$$

On suppose donné un homomorphisme $h_0 : \mathbb{S} \longrightarrow G_\mathbb{R}$ tel que, via h_0, $\mathbb{S}$ agisse sur $V_\mathbb{C}$ par les caractères z^{-1} et $\bar{z}^{-1}$ et que la forme $\psi(x, h_0(i)y)$ soit symétrique et définie positive. Les conditions (1.5.1) à (1.5.3) sont alors vérifiées par (G, h_0), et l'involution de L est positive.

4.10. Appliquons (1.11) à (G, h_0) et à la représentation V de G. Une G-structure $\bar{\iota}$ sur un vectoriel H s'interprète, par 1.8, comme la donnée sur H d'une structure de L-module et d'une forme alternée ψ, donnée à un facteur près, le vectoriel H, muni de ces structures, étant isomorphe à V. Soit $\bar{\iota}$ une G-structure sur H..Une donnée 1.9 (b) $h : \mathbb{S} \longrightarrow G^1_\mathbb{R}$ sur H définit alors, d'après 4.8 appliqué à (H, ψ, h), une variété abélienne à isogénie près A, munie d'une polarisation homogène $\bar{p}$, telle que H soit $H_1(A, \mathbb{Q})$, h la structure de Hodge de $H_1(A, \mathbb{Q})$ et ψ la forme de polarisation. De plus, la structure de L-module de H provient de $\rho : L \longrightarrow \mathrm{End}(A)$, et H, muni de $\bar{\iota}$ et h, est déterminé par $(A, \bar{p}, \rho)$.

Pour qu'un triple $(A, \bar{p}, \rho)$ provienne d'un H comme plus haut, il faut et il suffit que

(4.10.1) $H_1(A,\mathbb{Q})$, muni de sa structure de L-module et de la forme de polarisation (donnée à un facteur près), est isomorphe à V;

(4.10.2) Pour $t : V \longrightarrow H_1(A,\mathbb{Q})$ un isomorphisme, $t^{-1}h_1$ est conjugué à h_0.

Soit t l'application de L dans $\mathbb{C}$ donnée par

$$t(\ell) = \mathrm{Tr}(\ell; V_{\mathbb{C}}/F^0(h_0)). \tag{4.10.3}$$

Scholie 4.11. Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$. Les points de ${}_KM_{\mathbb{C}}(G,h_0)$ correspondent bijectivement aux classes d'isomorphie de variétés abéliennes à isogénie près A, munies de

(a) $\rho : L \longrightarrow \mathrm{End}(A)$ tel que
$$\mathrm{Tr}(\rho(\ell), \mathrm{Lie}(A)) = t(\ell) \qquad (\ell \in L),$$

(b) une polarisation homogène $\bar{p}$ qui induise l'involution donnée de L,

(c) une classe mod K, $\bar{k}$, de similitudes symplectiques L-linéaire
$k : \widehat{V}(A) \xrightarrow{\sim} V \otimes \mathbb{A}^f$,

et telles que

(*) les conditions (4.10.1) (4.10.2) soient vérifiées.

On applique 1.11 et 4.10, en notant qu'une donnée 1.9 (c) s'identifie à une donnée (c), et que les conditions en (b) et (a) résultent de (4.10.1) et (4.10.2) respectivement.

4.12. Soient K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$, $V_{\mathbb{Z}}$ un réseau entier dans V tel que $V_{\widehat{\mathbb{Z}}} = V_{\mathbb{Z}} \otimes \widehat{\mathbb{Z}}$ soit K-invariant, $L_{\mathbb{Z}}$ un ordre de L tel que $L_{\mathbb{Z}}V_{\mathbb{Z}} \subset V_{\mathbb{Z}}$, $\psi_{\mathbb{Z}}$ un multiple rationnel positif de la forme alternée de V, à valeurs entières sur $V_{\mathbb{Z}}$, et $V'_{\mathbb{Z}}$ le plus grand réseau de V tel que $\psi_{\mathbb{Z}}(V_{\mathbb{Z}}, V'_{\mathbb{Z}}) \subset \widehat{\mathbb{Z}}$. Soient n un entier, et $K_n = \{\, g \in G(\mathbb{A}^f) \mid (g-1)V_{\widehat{\mathbb{Z}}} \subset nV_{\widehat{\mathbb{Z}}} \,\}$. On suppose n assez grand pour que $K \supset K_n$.

Si A est comme en 4.11, alors $k^{-1}(V_{\widehat{\mathbb{Z}}}) \subset \widehat{V}(A)$ ne dépend pas de $k \in \bar{k}$, et définit une variété abélienne B avec $B \otimes \mathbb{Q} \simeq A$ et $\widehat{T}(B) = k^{-1}(V_{\widehat{\mathbb{Z}}}) \subset \widehat{V}(A)$. L'action de L sur A induit une action de $L_{\mathbb{Z}}$ sur B. Il existe un unique polarisation effective p de B, avec $p \in \bar{p}$, telle que $k^{-1}(V'_{\widehat{\mathbb{Z}}})$ soit le plus grand "réseau" $\widehat{T}'(B) \supset \widehat{T}(B)$ vérifiant $\psi_p(\widehat{T}(B), \widehat{T}(B)) \subset \widehat{\mathbb{Z}}(1)$. Enfin, l'ensemble $\bar{k}$ d'isomorphismes symplectiques L-linéaires de $\widehat{T}(B)$ avec $V_{\widehat{\mathbb{Z}}}$ est l'image réciproque de son image $\bar{k}_n$ dans $\mathrm{Isom}(B_n, V_{\mathbb{Z}}/nV_{\mathbb{Z}})$.

Ceci permet encore d'interpréter les points de ${}_KM_{\mathbb{C}}(G,h_0)$ comme correspondant aux classes d'isomorphie de système $(B, p, \rho, \bar{k}_n)$ consistant en

(a) une variété abélienne polarisée (B,p), à multiplication complexe par $L_{\mathbb{Z}}$, vérifiant 4.11 (a) (b),

(b) une classe mod K/K_n, $\bar{k}_n$, d'isomorphismes $k_n : B_n \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{Z}}/n\mathbb{Z}$, qui peuvent se relever en des isomorphismes symplectiques L-linéaires $k : \widehat{T}(B) \longrightarrow V_{\widehat{\mathbb{Z}}}$, et qui vérifient (4.10.1) (4.10.2).

4.13. Désignons par F l'algèbre des invariants par $*$ du centre de L. C'est un produit de corps totalement réels. Il existe une et une seule forme F-bilinéaire alternée ${}_F\psi$ sur V telle que $\mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}\, {}_F\psi = \psi$.

On désigne par G_1 le groupe des similitudes symplectiques L-linéaires de ${}_F\psi$: $G_1(\mathbb{Q})$ est l'ensemble des $g \in \mathrm{GL}_L(V)$ tels qu'il existe $\mu(g) \in F^*$ vérifiant

$$ {}_F\psi(gx, gy) = \mu(g)\, {}_F\psi(x,y), \quad \text{i.e.} \tag{4.13.1}$$

$$ \psi(gx, gy) = \psi(\mu(g)x, y). \tag{4.13.2}$$

Comme plus haut, on vérifie la

Variante 4.14. Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G_1(\mathbb{A}^f)$. Les points de ${}_KM_{\mathbb{C}}(G_1,h_0)$ correspondent bijectivement aux classes d'isomorphie de variétés abéliennes à isogénie près A, munies de

(a) $\rho : L \longrightarrow \mathrm{End}(A)$ comme en 4.11,

(b) une polarisation faible (relative à F) $\bar{p}$ qui induise l'involution donnée de L,

(c) une classe mod K de similitudes symplectiques L-linéaires $k : \widehat{V}(A) \xrightarrow{\sim} V \otimes \mathbb{A}^f$ (pour les formes $F \otimes \mathbb{A}^f$-bilinéaires des deux membres),

et telles que

(*) des conditions analogues à (4.10.1) (4.10.2) soient vérifiées.

4.15. On peut préciser 4.11 et 4.14 en montrant que ${}_KM_{\mathbb{C}}(G,h)$ est le schéma de modules grossier d'un foncteur évident sur les schémas de type fini sur $\mathbb{C}$.

4.16. Exemple I (suite de 1.6, 1.11). Plaçons-nous dans le cas particulier de 4.9 où $L=\mathbb{Q}$ et où $\dim(V)=2g$. On a alors $G=\mathrm{Gp}(V)$ (groupe des similitudes symplectiques). Pour $h_0:\mathbb{S}\longrightarrow G_{\mathbb{R}}$ de type 1.6, on a $E(\mathrm{Gp},h_0)=\mathbb{Q}$. Soient $V_{\mathbb{Z}}$, n et K_n comme 1.11. Pour tout schéma S, soit $F(S)$ l'ensemble des classes d'isomorphie de schémas abéliens polarisés de la série principale A/S, munis d'une similitude symplectique $k_n:A_n\xrightarrow{\sim}(V_{\mathbb{Z}}/nV_{\mathbb{Z}})_S$. Pour $n\geq 3$, les objets classifiés n'ont plus d'automorphismes et le foncteur F est représenté par un $\mathbb{Q}$-schéma ${}_{K_n}M$ [6]. D'après 1.11, 4.11 et 4.12, on dispose de

$$m_n:{}_{K^n}M(\mathbb{C})\xrightarrow{\sim}{}_{K^n}M_{\mathbb{C}}(\mathrm{Gp},h_0).$$

Dans le langage 3.1, on a

Proposition 4.17. Le $\mathbb{Q}$-schéma $M(\mathrm{Gp},h_0)=\varprojlim_{K^n}M$ est un modèle sur $\mathbb{Q}=E(\mathrm{Gp},h_0)$ de $M_{\mathbb{C}}(\mathrm{Gp},h_0)$.

4.18. Plaçons-nous dans le cas particulier de 4.9 où V est un L-module monogène. Les groupes G et G_1 sont alors contenus dans le centre de L^*.

Soient $\bar{E}$ une clôture algébrique de $E(G,h)$ et M^+ l'ensemble des classes d'isomorphie $[A,\rho,k,\bar{p}]$ d'objets $(A,\rho,k,\bar{p})$ consistant en

(a) une variété abélienne à isogénie près $A/\bar{E}$, munie d'une polarisation homogène $\bar{p}$ et de $\rho:L\to\mathrm{End}(A)$ tel que, avec la notation de 4.10.3, on ait pour $\ell\in L$

$$\mathrm{Tr}(\ell,\mathrm{Lie}(A))=t(\ell)\in E(G,h);$$

(b) un isomorphisme $L\otimes\mathbb{A}^f$-linéaire $k:\widehat{V}(A)\xrightarrow{\sim}V\otimes\mathbb{A}^f$.

La variété abélienne A est donc "de type CM". On renvoie à [16] pour la démonstration du théorème fondamental suivant.

Théorème 4.19. (Shimura–Taniyama). Le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(\bar{E}/E(G,h))$ agit sur M^+ via son plus grand quotient abélien $\pi_0(E(G,h)^*(\mathbb{A})/E(G,h)^*(\mathbb{Q}))$, Pour $\underline{e}\in E(G,h)^*(\mathbb{A})$, d'image $\varphi(\underline{e})$ dans Galois rendu abélien, et de composante $\underline{e}^{,f}$ dans $E(G,h)^*(\mathbb{A}^f)$, on a

$$\varphi(\underline{e})\,([A,\rho,k,\bar{p}])=[A,\rho,r(G,h)(e^f).k,\bar{p}]. \tag{4.19.1}$$

Soient τ un plongement de $\bar{E}$ dans $\mathbb{C}$ qui prolonge celui de $E(G,h)$, K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$ et ${}_KM(G,h)(\bar{E})$ l'ensemble des classes d'isomorphie d'objets $(A,\rho,\bar{k},\bar{p})$ où

(a) A,ρ et $\bar{p}$ sont comme plus haut;

(b) $\bar{k}$ est une classe mod K de similitudes symplectiques $L\otimes\mathbb{A}^f$-linéaires $k:\widehat{V}(A)\xrightarrow{\sim}V\otimes\mathbb{A}^f$;

(c) le vectoriel $H_1(A_{\mathbb{C}},\mathbb{Q})$, où $A_{\mathbb{C}}$ est défini via τ, muni de l'action de L et de la forme de polarisation donnée à un facteur près, est isomorphe à V.

D'après 4.19, la condition (c) est indépendante du choix de τ, de sorte que l'ensemble fini ${}_KM(G,h)(\bar{E})$ est muni d'une action de $\mathrm{Gal}(\bar{E}/E(G,h))$; en tant qu'ensemble galoisien, il s'identifie à l'ensemble des points sur $\bar{E}$ d'un $E(G,h)$-schéma fini étale ${}_KM(G,h)$. D'après 4.14, ${}_KM(G,h)(\mathbb{C})=G(\mathbb{R})\times K\backslash G(\mathbb{A})/G(\mathbb{Q})$, et par 4.19, on a :

Proposition 4.20. Le $E(G,h)$-schéma $M(G,h)=\varprojlim_K{}_KM(G,h)$ est un modèle canonique de $M_{\mathbb{C}}(G,h)$.

Théorème 4.21. Le modèle $M(\mathrm{Gp},h_0)$ construit en 4.17 est un modèle canonique.

Soient (V,ψ) comme en 4.16, L, $\rho:L\to\mathrm{End}(V)$, G et $h:\mathbb{S}\to G_{\mathbb{R}}$ comme en 4.18. On dispose de $u:(G,h)\longrightarrow(\mathrm{Gp},h_0)$. Soit $K\subset G(\mathbb{A}^f)$ tel que $u(K)\subset K_n$ (4.16). Si $\bar{E}$ est une clôture algébrique de $E(G,h)$, on définit

$$u:{}_KM(G,h)(\bar{E})\longrightarrow{}_{K_n}M(\mathrm{Gp},h_0)(\bar{E})$$

par "oubli de la multiplication complexe", en associant à $[A,\rho,\bar{k},\bar{p}]$ le triple formé de

(a) la variété abélienne B, munie de $B\otimes\mathbb{Q}\simeq A$ et telle que

$$\widehat{T}(B)=k^{-1}(V_{\widehat{\mathbb{Z}}})\subset\widehat{V}(A)\qquad(k\in\bar{k});$$

(b) la polarisation $\bar{p}$ de B

(c) l'isomorphisme $k : B_n \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{Z}}/nV_{\mathbb{Z}}$ ($k \in \bar{k}$).

Les applications u définissent un morphisme de modèles

$$u : M(G,h) \longrightarrow M(\mathrm{Gp}, h_0) \otimes E(G,h).$$

On achève la démonstration en montrant ([8]) que pour tout $u : (H,h') \longrightarrow (\mathrm{Gp}, h_0)$ comme en 3.13, il existe $v : (G,h) \longrightarrow (\mathrm{Gp}, h_0)$ comme plus haut (pour L convenable) tel que $uh' = vh$.

Variante 4.22. Soient F un corps de nombre totalement réel, $n = [F : \mathbb{Q}]$, et $\mathrm{Gp}_{2g}(F)$ le groupe des similitudes symplectiques d'un F-vectoriel symplectique de dimension $2g$. Soit $h_0 : \mathbb{S} \longrightarrow \mathrm{Gp}_{2g}(F)_{\mathbb{R}} \simeq \mathrm{Gp}_{2g}(\mathbb{R})^n$ comme en 1.6. On peut construire un modèle canonique de $M_{\mathbb{C}}(\mathrm{Gp}_{2g}(F), h_0)$ à partir de modules des schémas abéliens faiblement polarisés.

5. Techniques de construction.

La définition 3.13 n'est utilisable que parce qu'il y a "beaucoup" de points spéciaux.

Théorème 5.1. Soient G et h comme en 3.13. Pour toute extension finie F de $E(G,h)$, il existe $(H, h', u : H \hookrightarrow G)$ comme en 3.13 tels que l'extension $E(H,h')$ de $E(G,h)$ soit linéairement disjointe de F.

Soit $Y = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathbb{G}_m, G)/G$ le schéma des classes de conjugaison de morphismes de $\mathbb{G}_m$ dans G. Le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ agit sur l'ensemble (discret infini) $Y(\mathbb{C})$ des classes de conjugaison de morphisme de $\mathbb{G}_{m\mathbb{C}}$ dans $G_{\mathbb{C}}$. Soit Y_o le sous-schéma fini de Y tel que $Y_o(\mathbb{C})$ soit l'orbite sous Galois de la classe de hr. C'est le spectre de $E(G,h)$.

Soient $V' = \mathrm{Lie}(G)$, considéré comme espace affine sur $\mathbb{Q}$, et soit V le sous-schéma ouvert des éléments réguliers de l'algèbre de Lie. Pour v dans V, on désigne par T_v le centralisateur de v (un tore maximal). Soit W le schéma de module des tores maximaux T de G, munis de $s : \mathbb{G}_m \longrightarrow T$ et $v \in \mathrm{Lie}(T)$ tels que

(a) v est régulier dans $\mathrm{Lie}(G)$;

(b) la classe de $s : \mathbb{G}_m \to G$ est dans Y_o.

Le morphisme $f : W \longrightarrow V : (T,s,v) \longmapsto v$ est fini étale surjectif (noter que $T = T_v$). Soit p le morphisme de W dans $Y_o : (T,s,v) \longmapsto$ (classe de s).

(5.1.1)

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\quad f \quad} & V \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(E(G,h)) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathbb{Q}) \end{array}$$

Lemme 5.1.2. Le schéma W est irréductible, et les fibres géométriques de p sont (géométriquement) irréductibles.

Puisque Y_o est irréductible (le spectre d'une extension de $\mathbb{Q}$), il suffit de prouver la seconde assertion. Elle résulte de ce que

(a) puisque G est connexe, le schéma sur $\mathbb{C}$ des homomorphismes de $\mathbb{G}_{m\mathbb{C}}$ dans $G_{\mathbb{C}}$ conjugués à un homomorphisme donné est irréductible;

(b) pour $i : \mathbb{G}_{m\mathbb{C}} \to G_{\mathbb{C}}$ donné, d'après le théorème de conjugaison des tores maximaux appliqué au centralisateur (connexe) de $i(\mathbb{G}_{m\mathbb{C}})$, le schéma des tores maximaux de $G_{\mathbb{C}}$ contenant $i(\mathbb{G}_{m\mathbb{C}})$ est irréductible.

Soit $U \subset V(\mathbb{R})$ l'ensemble des $v \in V(\mathbb{R})$ tels que $T_v/C(\mathbb{R})$ soit compact. Pour la topologie usuelle, U est un ouvert.

Pour $v \in U$ et $w \in W(\mathbb{C})$ tel que $f(w) = v \in V(\mathbb{R}) \subset V(\mathbb{C})$, il existe un et un seul homomorphisme $h(w) : \mathbb{S} \longrightarrow T_v$, tel que $h(w) \circ r = s_w$: après extension des scalaires à $\mathbb{C}$

$$h(w) = s_w \circ z \cdot \overline{s}_w \circ \overline{z}.$$

Soit $v \in U$. D'après le théorème de conjugaison des sous-groupes compacts maximaux dans $G/C(\mathbb{R})^\circ$, il existe $g \in G(\mathbb{R})$ (même $g \in G'(\mathbb{R})^\circ$) tel que $gT_vg^{-1} \subset K_\infty$. Puisque T_v est un tore maximal, gT_vg^{-1} contient le centre de K_∞. On en déduit l'existence de $w \in W(\mathbb{C})$ tel que $f(w) = v$ et que $h(w)$ soit conjugué à h.

On conclut la démonstration de 5.1 en appliquant au diagramme (5.1.1) et à U la variante suivante du théorème d'irréductibilité de Hilbert, dont je dois la démonstration à J.P. Serre.

Lemme 5.13. Soient E une extension finie de $\mathbb{Q}$, et un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\quad f \quad} & V \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(E) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathbb{Q}) \end{array}$$

dans lequel

(i) V est un ouvert de Zariski d'un espace affine sur $\mathbb{Q}$

(ii) les fibres géométriques de p sont irréductibles, et W est réduit.

(iii) f est quasi-fini et dominant.

Alors, pour tout ouvert $U \subset V(\mathbb{R})$ (topologie usuelle) et toute extension F de E, il existe $v \in V(\mathbb{Q}) \cap U$ tel que $f^{-1}(v)$ soit le spectre d'une extension de E linéairement disjointe de F.

Soit $W' = W \otimes_E F$. Les hypothèses de 4.12 sont encore vérifiées pour W'/F et $f' : W' \longrightarrow W \longrightarrow V$, et il faut construire $v \in V(\mathbb{Q}) \cap U$ tel que $f'^{-1}(v) = f^{-1}(v) \otimes_E F$ soit le spectre d'un corps. Ceci nous ramène au cas où $E = F$, qui résulte du théorème d'irréductibilité de Hilbert (cf. Lang, *Diophantine Geometry*, Chap VIII).

Proposition 5.2. Pour $x \in M_{\mathbb{C}}(G,h)$ et K compact ouvert dans $G(\mathbb{A}^f)$, l'image dans ${}_K M_{\mathbb{C}}(G,h)$ de $G(\mathbb{A}^f) \cdot x \subset M_{\mathbb{C}}(G,h)$ est dense.

C'est une conséquence de (0.4). Le lecteur vérifiera :

Proposition 5.3. Soient E un corps muni d'un plongement complexe ρ, X un schéma sur E et Y un sous-schéma réduit fermé de $X_{\mathbb{C}}$. Supposons qu'il existe des extensions finies E_i de E dans $\mathbb{C}$, des schémas $M_{i,\alpha}/E_i$ et des E_i-morphismes $v_{i,\alpha} : M_{i,\alpha} \longrightarrow X \otimes_E E_i$, soit $v_i : \coprod_\alpha M_{i,\alpha} \longrightarrow X \otimes_E E_i$, tels que $E = \bigcap_i E_i$, que $v_i(\coprod_\alpha M_{\alpha,i} \otimes_{E_i} \mathbb{C}) \subset Y$ et que $v_i(\coprod_\alpha M_{\alpha,i} \otimes_{E_i} \mathbb{C})$ soit dense dans Y. Alors, Y est défini sur E.

Corollaire 5.4. Soit $u : (G^1,h^1) \longrightarrow (G^2,h^2)$ comme en 1.14. Soient $M_E(G^1,h^1)$ et $M_E(G^2,h^2)$ des modèles faiblement canoniques des $M_{\mathbb{C}}(G^i,h^i)$ sur un corps de nombre E $(E(G^i,h^i) \subset E \subset \mathbb{C})$. Alors $v : M_{\mathbb{C}}(G^1,h^1) \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G^2,h^2)$ est défini sur E (cf. 3.12)

Soient $K^i \subset G^i(\mathbb{A}^f)$ des sous-groupes compacts ouverts tels que $v(K^1) \subset K^2$. Prouvons que $v(K^1,K^2) : {}_{K^1} M_{\mathbb{C}}(G^1,h^1) \longrightarrow {}_{K^2} M_{\mathbb{C}}(G^2,h^2)$ est défini sur E. Soit $u : (H,h') \to (G^1,h^1)$ comme en 3.13 et $F = E \cdot E(H,h')$. Pour $g \in G^1(\mathbb{A}^f)$, on dispose de F-morphismes

$$a(g) : \quad M_F(H,h') \longrightarrow M_F(G^1,h^1) \xrightarrow{g} M_F(G^1,h^1) \longrightarrow {}_{K^1} M_F(G^1,f^1),$$

$$b(g) : \quad M_F(H,h') \longrightarrow M_F(G^2,h^2) \xrightarrow{v(g)} M_F(G^2,h^2) \longrightarrow {}_{K^2} M_F(G^2,h^2),$$

et, après extension des scalaires à $\mathbb{C}$, $v(K^1,K^2) \circ a(g) = b(g)$.

Grâce à 5.1 et 5.2, on peut appliquer 5.3 à $X = {}_{K^1} M_E(G^1,h^1) \times {}_{K^2} M_E(G^2,h^2)$, au graphe Y de v, aux $E_i = E \cdot E(H,h')$ pour (H,h',u) variable, et aux $(a(g),b(g)) : M_{E_i}(H,h') \longrightarrow X_{E_i}$: on trouve que le graphe de v est défini sur E.

Dans le cas particulier $(G^1,h^1) = (G^2,h^2)$, $u = \mathrm{Id}$, 5.4 signifie :

Corollaire 5.5. À isomorphisme (unique) près, il existe au plus un modèle faiblement canonique de $M_{\mathbb{C}}(G,h)$ sur E $(E(G,h) \subset E \subset \mathbb{C})$.

Corollaire 5.6. Si G' est simplement connexe, la loi de réciprocité d'un modèle faiblement canonique de $M_{\mathbb{C}}(G,h)$ sur E $(E(G,h) \subset E \subset \mathbb{C})$ est donnée par 3.9.1.

Même démonstration que le cas particulier $v : (G,h) \to (T,vh)$ de 5.4.

Corollaire 5.7. Soit $v : (G^1,h^1) \hookrightarrow (G^2,h^2)$ comme en 1.15. Si $M_{\mathbb{C}}(G^2,h^2)$ admet un modèle faiblement canonique sur E, avec $E(G^2,h^2) \subset E(G^1,h^1) \subset E \subset \mathbb{C}$, alors $M_{\mathbb{C}}(G^1,h^1)$ admet un modèle faiblement canonique sur E.

Soit K^i un sous-groupe compact ouvert de $G^i(\mathbb{A}^f)$. Utilisant 1.15, on se ramène à montrer seulement que si $v(K^1) \subset K^2$ et que ${}_{K^1}M_{\mathbb{C}}(G^1,h^1) \hookrightarrow {}_{K^2}M_{\mathbb{C}}(G^2,h^2)$, alors le sous-schéma ${}_{K^1}M_{\mathbb{C}}(G^1,h^1)$ de ${}_{K^2}M_{\mathbb{C}}(G^2,h^2) = {}_{K^2}M_E(G^2,h^2) \otimes_E \mathbb{C}$ est défini sur E.

Soit $u : (H,h') \to (G^1,h^1)$ comme en 3.13, et pour $g \in G^1(\mathbb{A}^f)$, soit $a(g)$ l'homomorphisme composé, défini sur $F = E \cdot E(H,h')$:

$$a(g) : M_F(H,h') \longrightarrow M_F(G^1,h^1) \xrightarrow{v(g)} M_F(G^2,h^2) \longrightarrow {}_{K^2}M_F(G^2,h^2).$$

Grâce à 5.1 et 5.2, on conclut en appliquant 5.3 à $X = {}_{K^2}M_E(G^2,h^2)$, à $Y = {}_{K^1}M_{\mathbb{C}}(G^1,h^1)$, aux $E_i = E \cdot E(H,h')$ pour (H,h',u) variable et aux $a(g) : M_{E_i}(H,h') \longrightarrow X_{E_i}$.

Exemple 5.8. Pour (G,h_0) comme en 4.9, on construit par 5.7 et 4.21 un modèle canonique $M(G^\circ,h_0) \subset M(\mathrm{Gp}(V,\psi),h_0) \otimes_{\mathbb{Q}} E(G^\circ,h^\circ)$.

Variante 5.9. Soit (G_1,h_0) tel que, avec les notations de 4.22, il existe $u : (G_1,h_0) \hookrightarrow (\mathrm{Gp}_{2g}^{(F)},h_0)$ (par exemple (G_1°,h_0) avec (G_1,h_0) comme en 4.13). Une application de 5.7 fournit un modèle canonique de $M(G_1,h_0)$.

Proposition 5.10. Soient (G,h) comme en 3.13, des corps de nombres $E_i : E(G,h) \subset E_i \subset \mathbb{C}$, E l'intersection des E_i, et $M_{E_i}(G,h)$ un modèle faiblement canonique de $M_{\mathbb{C}}(G,h)$ sur E_i. Il existe alors un unique modèle $M_E(G,h)$ de $M_{\mathbb{C}}(G,h)$ sur E, tel que pour tout i le modèle $M_E(G,h) \otimes_E E_i$ sur E_i soit isomorphe à $M_{E_i}(G,h)$.

Vu l'assertion d'unicité, on peut supposer les E_i en nombre fini. Soit F l'extension de E dans $\mathbb{C}$ qu'ils engendrent, et soit $\mathfrak{E}$ l'ensemble des sous-extensions de F contenant l'un des E_i. Utilisant 5.5, on obtient pour tout $F' \in \mathfrak{E}$ un modèle $M_{F'}(G,h)$, et pour toute inclusion $F' \subset F''$ $(F',F'' \in \mathfrak{E})$ un isomorphisme de modèles $\alpha(F'',F') : M_{F'}(G,h) \otimes_{F'} F'' \longrightarrow M_{F''}(G,h)$.

Soit $u : (H,h') \to (G,h)$ comme 3.13, avec $E(H,h')$ linéairement disjoint de F sur $E(G,h)$ (5.1). Posons $E_1 = E(H,h') \cdot E$ et $F_1' = E_1 \cdot F' = E(H,h') \cdot F'$ $(F' \in \mathfrak{E})$.

Soit $g \in G(\mathbb{A}^f)$ et $K \subset G(\mathbb{A}^f)$ un sous-groupe compact ouvert. Puisque $M_{F'}(G,h)$ est faiblement canonique, on dispose d'un F_1'-morphisme

$$a'(g) : M_{F_1'}(H,h') \longrightarrow M_{F_1'}(G,h) \xrightarrow{g} M_{F_1'}(G,h) \longrightarrow {}_KM_{F_1'}(G,h).$$

Puisque $F_1' = E_1 \otimes_E F'$, on peut "l'interpréter" comme un morphisme de F'-schémas

$$a(g) : M_{E_1}(H,h') \otimes_E F' \longrightarrow {}_KM_{F'}(G,h).$$

Les $a(g)$ vérifient $\alpha(F'',F')\,a(g)_{F''} = a(g)$. On conclut par 5.2 et le lemme suivant, appliqué à $X^1 = \coprod_{g \in G(\mathbb{A}^f)} M_{E_1}(H,h)$. Sa démonstration est laissée en exercice au lecteur.

Lemme 5.10.1. Soient F/E une extension finie de corps et $\mathfrak{E}$ un ensemble de sous-corps de F, d'intersection réduite à E, telle que

$$F \in \mathfrak{E} \text{ et } F' \subset F'' \subset F \Longrightarrow F'' \in \mathfrak{E}.$$

(i) Le foncteur qui à un schéma X/E associe le système $\mathcal{X}$ des schémas $X_{F'}/F'$ $(F' \in \mathfrak{E})$ et des isomorphismes $(X_{F'}) \otimes_{F'} F'' \xrightarrow{\sim} X_{F''}$ $(F' \subset F'',\ F',F'' \in \mathfrak{E})$ est pleinement fidèle.

(ii) Pour qu'un système $\mathcal{X} = \{X(F')/F' \ (F' \in \mathfrak{E});\ \alpha(F'',F') : X(F') \otimes_{F'} F'' \xrightarrow{\sim} X(F'') \ (F' \subset F'',\ F',F'' \in \mathfrak{E})\}$ provienne d'un schéma X/E, il suffit que les $X(F')/F'$ soient quasi-projectifs et qu'il existe un schéma X^1/E et un morphisme $u : X^1_{\mathfrak{E}} \longrightarrow \mathcal{X}$ tel que les $u(F') : X^1_{F'} \longrightarrow X(F')$ soient d'image dense.

Remarque 5.10.2. Sous les hypothèses de 5.10, pour $u : (H,h') \hookrightarrow (G,h)$ comme en 3.13, le corps de définition de $u : M_{\mathbb{C}}(H,h') \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G,h)$ est contenu dans l'extension $\bigcap_i E(H,h') \cdot E_i$ de $E(H,h') \cdot E$.

Proposition 5.11. Soient $h : \mathbb{S} \longrightarrow G_{\mathbb{R}}$ comme en 3.13 et $\delta : \mathbb{S} \longrightarrow C^\circ_{\mathbb{R}}$ (C centre de G). Si $E(G,h), E(C,\delta) \subset E \subset \mathbb{C}$ et si $M_{\mathbb{C}}(G,h)$ admet un modèle faiblement canonique sur E, alors $M_{\mathbb{C}}(G,h.\delta)$ en admet un aussi.

Soit K un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}^f)$ et $L = K \cap C^\circ(\mathbb{A}^f)$. Sur $\mathbb{C}$, le morphisme

$$u : (G \times C^\circ,(h,\delta)) \longrightarrow (G,h\delta) : (g,c) \longmapsto gc$$

induit des morphismes

$$u_K : {}_KM_{\mathbb{C}}(G,h) \times {}_LM_{\mathbb{C}}(C^\circ,\delta) \longrightarrow {}_KM_{\mathbb{C}}(G,h\delta).$$

Soit d le morphisme $d : C^\circ \longrightarrow G \times C^\circ : c \longmapsto (c,c^{-1})$. Le sous-groupe $d(C^\circ(\mathbb{A}^f))$ de $G \times C^\circ(\mathbb{A}^f)$ agit sur $M_{\mathbb{C}}(G,h) \times M_{\mathbb{C}}(C^\circ,\delta)$ via le quotient $\pi_0(C^\circ(\mathbb{A}))$ de $C^\circ(\mathbb{A}^f)$, et u_K induit un isomorphisme

$$\bar{u}_K : \big({}_KM_{\mathbb{C}}(G,h) \times {}_LM_{\mathbb{C}}(C^\circ,\delta)\big)/\big(L\backslash\pi_0(C^\circ(\mathbb{A}))\big) \xrightarrow{\sim} {}_KM_{\mathbb{C}}(G,h\delta).$$

On définit ${}_KM_E(G,h\delta)$ comme le quotient

$$ {}_KM_E(G,\delta)\times {}_LM_E(C^\circ,\delta)/\big(L\backslash\pi_0(C^\circ(\mathbb{A}))\big)$$

et on vérifie qu'on trouve ainsi un modèle faiblement canonique. Par construction, on dispose de

$$M_E(G,h)\times_E M_E(C^\circ,\delta)\longrightarrow M_E(G,h\delta). \tag{5.11.1}$$

Conjecture 5.12. Pour tout (G,h_0) comme 3.13, il existe un modèle canonique de $M_{\mathbb{C}}(G,h_0)$.

Supposons, c'est un cas typique, que G soit $\mathbb{Q}$-simple et adjoint. Soit $\widetilde{G}$ le revêtement universel de G et ω un poids de $\widetilde{G}_{\mathbb{C}}$. Si, avec les notations de 3.7, la classe de conjugaison de h_0r est décrite par des entiers $(n_i)_{i\in|\Delta|}$, et que $\omega=\sum m_i\alpha_i$, on pose $\langle\omega,h_0r\rangle=\sum n_im_i$. Jusqu'ici, on n'a pu attaquer 5.12 que lorsque $\widetilde{G}$ admet une représentation non triviale V telle que toutes les composantes irréductibles V' de $V_{\mathbb{C}}$ vérifient :

$(*)$ pour ω parcourant les poids de V', $\langle\omega,h_0r\rangle$ prend au plus deux valeurs.

Soit σ l'involution d'opposition. La condition $(*)$ signifie encore que le poids dominant ω de V' vérifie $\langle\omega,h_0r\rangle+\langle\sigma\omega,h_0r\rangle=0$ ou 1. Il n'existe pas de telle représentation V si G est exceptionnel (les facteurs non compacts de $G_{\mathbb{R}}$ sont alors de type $E_{6(-14)}$ ou $E_{7(-25)}$), ou de type D_4 trialitaire, ni si G est de type D_n et que $G_{\mathbb{R}}$ a des facteurs non compacts des deux types $D_n^{\mathbb{H}}$ et $D_n^{\mathbb{R},2}$.

§ 6. Modèles étranges.

6.1. Soit F un corps de nombres totalement réel, et soit

$${}_F\Sigma:\quad 0\longrightarrow {}_FG'\longrightarrow {}_FG\longrightarrow \mathbb{G}_m\longrightarrow 0 \tag{6.1.1}$$

une forme sur F de la suite exacte

$${}_F\Sigma_0:\quad 0\longrightarrow \mathrm{Sp}_{2n}\longrightarrow \mathrm{Gp}_{2n}\xrightarrow{\mu}\mathbb{G}_m\longrightarrow 0, \tag{6.1.2}$$

où Gp désigne un groupe de similitudes symplectiques.

On suppose que, pour chaque place réelle τ de F, $\Sigma\otimes_{F,\tau}\mathbb{R}$ est de l'un des types suivants :

(a) ${}_F\Sigma\otimes_{F,\tau}\mathbb{R}$ est isomorphe à ${}_F\Sigma_0\otimes_{F,\tau}\mathbb{R}$, ou

(b) $G'\otimes_{F,\tau}\mathbb{R}$ est compact.

On désigne par $\tau_1,\dots,\tau_g$ les places réelles de F, et on suppose que les places de type (a) sont les places $\tau_1,\dots,\tau_r$, avec $r>0$.

6.2. Le groupe ${}_FG$ peut se décrire de la manière suivante :

(a) On choisit une algèbre de quaternions B sur F, indéfinie en les places τ_i pour $i\le r$, et définie pour $i>r$. On désigne par $x\mapsto\overline{x}$ son involution canonique.

(b) On choisit un B-module libre V, muni d'une forme F-bilinéaire non dégénérée Φ, symétrique et telle que

$$\Phi(bx,y)=\Phi(x,\overline{b}\,y).$$

(c) On suppose que, pour $i>r$, la forme déduite de Φ par l'extension des scalaires $\tau_i:F\to\mathbb{R}$ est définie positive.

(d) On prend pour ${}_FG$ le groupe des similitudes B-linéaires de Φ; en d'autres termes, les $g\in G(\mathbb{Q})$ sont les $g\in\mathrm{GL}_B(V)$ tels qu'il existe $\mu(g)\in F^*$ vérifiant

$$\Phi(gx,gy)=\mu(g)\Phi(x,y).$$

6.3. Désignons par

$$\Sigma:\quad 0\longrightarrow G'\longrightarrow G\longrightarrow F^*\longrightarrow 0$$

la suite exacte de groupes algébriques sur $\mathbb{Q}$ déduite de ${}_F\Sigma$ par restriction des scalaires à la Weil de F à $\mathbb{Q}$. On a

$$G_{\mathbb{R}}=\prod_\tau {}_FG\otimes_{F,\tau}\mathbb{R}\qquad(\tau\text{ place réelle}). \tag{6.3.1}$$

Un morphisme $h : \mathbb{S} \to G_{\mathbb{R}}$ est défini par ses coordonnées $h_i : \mathbb{S} \longrightarrow {}_F G \otimes_{F,\tau_i} \mathbb{R}$. D'après 1.6, il existe une et une seule classe de conjugaison de morphismes h tels que, pour $i \leq r$, h_i soit du type 1.6, et que, pour $i > r$, h_i soit trivial. Soit h_0 dans cette classe.

Le corps $E(G, h_0)$ est le sous-corps totalement réel de $\mathbb{C}$ engendré par les $\sum_{i=1}^{r} \tau_i(f)$ pour $f \in F$.

Théorème 6.4. Avec les notations précédentes, $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ admet un modèle canonique $M(G, h_0)$.

Soit Z une extension quadratique totalement imaginaire de F. Soient $V' = V \otimes_F Z$, $L = B \otimes_F Z$, et G' le sous-groupe algébrique de $\mathrm{GL}_L(V')$ engendré par G et Z^* :

$$0 \longrightarrow F^* \xrightarrow{(f, f^{-1})} G \times Z^* \xrightarrow{q} G' \longrightarrow 0. \tag{6.4.1}$$

Soit $x \mapsto \widetilde{x}$ l'involution de L produit tensoriel des involutions de B et Z. À un facteur dans F près, il existe sur Z une unique forme F-bilinéaire alternée ψ_Z. Si ${}_F\psi$ est la forme F-bilinéaire alternée sur V' produit tensoriel de Φ et ψ_Z, on a

$${}_F\psi(\ell x, y) = {}_F\psi(x, \widetilde{\ell}\, y),$$

Posons $\psi(x, y) = \mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}\big({}_F\psi(x, y)\big)$.

Choisissons, pour chaque place réelle de F, un plongement complexe de Z qui l'induit. On a alors $Z^*(\mathbb{R}) \simeq \prod_{i=1}^{g} \mathbb{C}^*$. Soit h_Z l'homomorphisme de $\mathbb{S}$ dans $Z^*_{\mathbb{R}}$ de coordonnées $h_i : \mathbb{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^* \longrightarrow \mathbb{C}^*$ $(1 \leq i \leq g)$ égales à $(z \mapsto 1)$ pour $i \leq r$, à $(z \mapsto z^{-1})$ pour $i > r$.

Pour chaque $h : \mathbb{S} \to G_{\mathbb{R}}$ comme en 6.3, on pose $h' = q \circ (h \times h_Z) : \mathbb{S} \longrightarrow G'_{\mathbb{R}}$.

Lemme 6.4.2. Il existe $b \in L$ tel que, pour un choix convenable de ψ_Z, la forme

$$\psi\big(x, b\, h'_0(i) y\big) \qquad \text{sur} \quad V' \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}$$

soit symétrique et définie positive.

Ceci se vérifie après extension des scalaires de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$.

Ce lemme et 5.9 permettent de construire un modèle canonique de $M(G', h'_0)$ (car G' est contenu dans le groupe des similitudes symplectiques de ${}_F\psi(x, by)$). Appliquant 5.11 et 5.7, on en déduit un modèle faiblement canonique de $M_{\mathbb{C}}(G, h_0)$ sur l'extension $E(Z^*, h_Z)$ de $E(G, h_0)$. On conclut par 5.10, 5.10.2 et le lemme suivant, qu'on peut déduire de 5.13.

Lemme 6.5. Soit F un corps de nombre totalement réel, muni d'un ensemble S de plongements réels. Soit F^* le corps de nombres correspondant au sous-groupe de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ qui stabilise S. Pour Z une extension quadratique totalement imaginaire de F, munie d'un ensemble T de plongements complexes, un au-dessus de chaque élément de S, soit de même $Z^* \supset F^*$ le corps des invariants du stabilisateur de T. Alors, pour toute extension E de F^*, il existe Z et T tels que Z^* soit linéairement disjoint de E.

Remarque 6.6. L'application canonique 1.13, 1.14

$$M_{\mathbb{C}}(G, h_0) \times M_{\mathbb{C}}(Z^*, h_Z) \longrightarrow M_{\mathbb{C}}(G', h'_0) \tag{6.6.1}$$

s'interprète de la façon suivante. Chaque conjugué de h définit sur $V_{\mathbb{C}}$ une bigraduation de Hodge invariante par F:

$$V_{\mathbb{C}} = V^{-1,0} \oplus V^{0,-1} \oplus V^{0,0} \qquad (\overline{V^{pq}} = V^{qp}).$$

On prendra garde que la graduation (par le poids) de $V_{\mathbb{C}}$ par les $V^n = \sum_{p+q=n} V^{pq}$ n'est pas définie sur $\mathbb{Q}$ si $r \neq g$.

De même, $Z_{\mathbb{C}}$ est bigradué:

$$Z_{\mathbb{C}} = Z^{-1,0} \oplus Z^{0,-1} \oplus Z^{0,0}.$$

Le miracle est que le $\mathbb{Q}$-vectoriel $V' = V \otimes_F Z$, muni de la bigraduation de Hodge produit tensoriel $V'_{\mathbb{C}} = V'^{-1,0}_{\mathbb{C}} \oplus V'^{0,-1}_{\mathbb{C}}$ (!) est le H_1 d'une variété abélienne.

BIBLIOGRAPHIE

[1] F. BRUHAT et J. TITS - Groupes algébriques simples sur un corps local, Proc. on a conf. on local fields, p. 23-26, Driebergen 1966, Springer-Verlag.

[2] P. DELIGNE - Travaux de Griffiths, Sém. Bourbaki, 1969/70, exposé n° 376, Lectures Notes 180, Springer-Verlag.

[3] G. HARDER - Über die Galoiskohomologie halbeinfacher Matrizengruppen II, Math. Zeitschrift, 92 (1966), p. 396-415.

[4] M. KNESER - Schwache Approximation in algebraischen Gruppen, Coll. sur la théorie des groupes algébriques, p. 41-52, Bruxelles 1962, CBRM.

[5] K. MIYAKE - On models of certain automorphic function fields.

[6] D. MUMFORD - Geometric invariant theory, Ergebnisse 34, 1965, Springer-Verlag.

[7] D. MUMFORD - Families of abelian varieties, in Alg. groups and discontinuous subgroups, p. 347-351, Boulder 1965, AMS.

[8] D. MUMFORD - A Note on Shimura's Paper "Discontinuous groups and Abelian Varieties". Math. Ann. 181 345-351 (1969)

[9] V.P. PLATONOV - Le problème d'approximation forte et l'hypothèse de Kneser-Tits, Izvestia Acad. Nauk CCCP, 33 (1969), p. 1211-1219 et 34 (1970), p. 775-777.

[10] G. SHIMURA - On analytic families of polarized abelian varieties and automorphic functions, Ann. of Math., 78 1 (1963), p. 149-192.

[11] G. SHIMURA - On the field of definition for a field of automorphic functions I, II, III, Ann. of Math., 80 1 (1964), p. 160-189 ; 81 1 (1965), p. 124-165 et 83 2 (1966), p. 377-385.

[12] G. SHIMURA - Construction of class fields and zeta functions of algebraic curves, Ann. of Math. 85 1 (1967), p. 58-159.

[13] G. SHIMURA - Algebraic number fields and symplectic discontinuous groups, Ann. of Math., 86 3 (1967), p. 503-592.

[14] G. SHIMURA - On canonical models of arithmetic quotients of bounded symmetric domains, Ann. of Math., 91 1 (1970), p. 144-222.

[15] G. SHIMURA - Automorphic functions and number theory, Lecture Notes in Math. 54, 1968, Springer-Verlag.

[16] G. SHIMURA and T. TANIYAMA - Complex multiplication of abelian varieties and its applications to number theory, Publ. Math. Soc. Jap., 6 (1961).

Actes, Congrès intern. math., 1970. Tome 1, p. 425 à 430.

THÉORIE DE HODGE I

par PIERRE DELIGNE

On se propose de donner un dictionnaire heuristique entre énoncés en cohomologie ℓ-adique et énoncés en théorie de Hodge. Ce dictionnaire a notamment pour sources [3] et la théorie conjecturale des motifs de Grothendieck [2]. Jusqu'ici, il a surtout servi à formuler, en théorie de Hodge, des conjectures, et il en a parfois suggéré une démonstration.

Définition 1.1. Une structure de Hodge mixte H consiste en

(a) un $\mathbb{Z}$-module de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ (le « réseau entier ») ;

(b) une filtration croissante finie W sur $H_{\mathbb{Q}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Q}$ (la « filtration par le poids ») ;

(c) une filtration décroissante finie F sur $H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}$ (la « filtration de Hodge »).

Ces données sont soumises à l'axiome :

Il existe sur $\mathrm{Gr}_W(H_{\mathbb{C}})$ une (unique) bigraduation par des sous-espaces $H^{p,q}$ telle que

(i)
$$\mathrm{Gr}^n_W(H_{\mathbb{C}}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q};$$

(ii) la filtration F induit sur $\mathrm{Gr}_W(H_{\mathbb{C}})$ la filtration
$$\mathrm{Gr}_W(F)^p = \bigoplus_{p' \geq p} H^{p',q'};$$

(iii) $\overline{H^{p,q}} = H^{q,p}$.

Un morphisme $f : H \to H'$ est un homomorphisme $f_{\mathbb{Z}} : H_{\mathbb{Z}} \to H'_{\mathbb{Z}}$ tel que $f_{\mathbb{Q}} : H_{\mathbb{Q}} \to H'_{\mathbb{Q}}$ et $f_{\mathbb{C}} : H_{\mathbb{C}} \to H'_{\mathbb{C}}$ soient respectivement compatibles aux filtrations W et F.

Les nombres de Hodge de H sont les entiers
$$h^{pq} = \dim H^{p,q} = h^{qp}. \tag{1.2}$$

On dit que H est pure de poids n si $h^{pq} = 0$ pour $p + q \neq n$ (i.e. si $\mathrm{Gr}^i_W(H) = 0$ pour $i \neq n$). On dit encore que H est une structure de Hodge de poids n.

La structure de Hodge de Tate $\mathbb{Z}(1)$ est la structure de Hodge de poids -2, purement de type $(-1,-1)$, pour laquelle $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}$ et $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}} = 2\pi i\mathbb{Z} = \mathrm{Ker}(\exp : \mathbb{C} \to \mathbb{C}^*) \subset \mathbb{C}$. On pose $\mathbb{Z}(n) = \mathbb{Z}(1)^{\otimes n}$.

On peut montrer que les structures de Hodge mixtes forment une catégorie abélienne. Si $f : H \to H'$ est un morphisme, alors $f_{\mathbb{Q}}$ et $f_{\mathbb{C}}$ sont strictement compatibles aux filtrations W et F ([1], 2.3.5).

2. Soient A un anneau normal intègre de type fini sur $\mathbb{Z}$, K son corps des fractions et $\overline{K}$ une clôture algébrique de K. Soit K_{nr} la plus grande sous-extension de $\overline{K}$ non ramifiée en chaque idéal premier de A. On sait que, ou on pose,
$$\pi_1(\mathrm{Spec}(A), \overline{K}) = \mathrm{Gal}(K_{nr}/K).$$
Pour chaque point fermé x de $\mathrm{Spec}(A)$, défini par un idéal maximal m_x de A, le corps résiduel $k_x = A/m_x$ est fini ; le point x définit une classe de conjugaison de « substitutions de Frobenius » $\varphi_x \in \pi_1(\mathrm{Spec}(A), \overline{K})$. On pose $q_x = \#k_x$ et $F_x = \varphi_x^{-1}$.

Soient K un corps de type fini sur le corps premier de caractéristique p, $\overline{K}$ une clôture algébrique de K, ℓ un nombre premier $\neq p$ et H un $\mathbb{Z}_\ell$- (ou un $\mathbb{Q}_\ell$-) module de type fini muni d'une action continue ρ de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$. On supposera toujours par la suite qu'il existe A comme plus haut, avec ℓ inversible dans A, tel que ρ se factorise par
$$\pi_1(\mathrm{Spec}(A), \overline{K}) = \mathrm{Gal}(K_{nr}/K).$$

On dira que H est pur de poids n si pour tout point fermé x d'un ouvert non vide de $\mathrm{Spec}(A)$, les valeurs propres α de F_x agissant sur H sont des entiers algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue

$$|\alpha| = q_x^{n/2}.$$

Principe 2.1. Si le module galoisien H « provient de la géométrie algébrique », il existe sur $H_{\mathbb{Q}_\ell} = H \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ une (unique) filtration croissante W (la « filtration par le poids »), invariante par Galois, telle que $\mathrm{Gr}_n^W(H)$ soit pur de poids n.

On peut penser que $\mathrm{Gr}_n^W(H)$ est de plus semi-simple.

Lorsqu'on dispose de la résolution des singularités, on peut souvent donner de W une définition conjecturale, dont la correction résulte des conjectures de Weil [5] (cf. 6).

Soit μ le sous-groupe de $\overline{K}^*$ formé des racines de l'unité. Le module de Tate $\mathbb{Z}_\ell(1)$, défini par

$$\mathbb{Z}_\ell(1) = \mathrm{Hom}(\mathbb{Q}_\ell/\mathbb{Z}_\ell, \mu),$$

est pur de poids -2. On pose $\mathbb{Z}_\ell(n) = \mathbb{Z}_\ell(1)^{\otimes n}$.

Il est trivial que tout morphisme $f : H \to H'$ est strictement compatible à la filtration par le poids.

Le principe 2.1 concorde avec le fait que toute extension de $\mathbb{G}_m$ (« poids -2 ») par une variété abélienne (« poids $-1 > -2$ ») est triviale.

3. Traduction. Les modules galoisiens qui apparaissent en cohomologie ℓ-adique ont pour analogue, sur $\mathbb{C}$, les structures de Hodge mixte. On a de plus le dictionnaire

module pur de poids n	structure de Hodge de poids n
filtration par le poids	filtration par le poids
homomorphisme compatible à Galois	morphisme
module de Tate $\mathbb{Z}_\ell(1)$	structure de Hodge de Tate $\mathbb{Z}(1)$.

4. Soit X une variété algébrique complexe (= schéma de type fini sur $\mathbb{C}$, qu'on supposera séparé). Il existe un sous-corps K de $\mathbb{C}$, de type fini sur $\mathbb{Q}$, tel que X puisse être défini sur K (i.e. provienne par extension des scalaires de K à $\mathbb{C}$ d'un K-schéma X'). Soit $\overline{K}$ la fermeture algébrique de K dans $\mathbb{C}$. Le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ agit alors sur les groupes de cohomologie ℓ-adique $H^*(X, \mathbb{Z}_\ell)$; on a

$$H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Z}_\ell = H^*(X, \mathbb{Z}_\ell) = H^*(X'_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell).$$

D'après 3, il y a lieu de s'attendre à ce que les groupes de cohomologie $H^n(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$ portent des structures de Hodge mixtes naturelles. C'est ce qu'on peut prouver (voir [1], 3.2.5, pour le cas où X est lisse ; la démonstration est algébrique, à partir de la théorie de Hodge classique [6]). Pour X projectif et lisse, les conjectures de Weil impliquent que $H^n(X, \mathbb{Z}_\ell)$ est pur de poids n, tandis que la théorie de Hodge classique munit $H^n(X, \mathbb{Z})$ d'une structure de Hodge de poids n. Pour tout morphisme $f : X \to Y$ et pour K assez grand, $f^* : H^*(Y, \mathbb{Z}_\ell) \to H^*(X, \mathbb{Z}_\ell)$ commute à Galois (par transport de structure) ; de même, $f^* : H^*(Y, \mathbb{Z}) \to H^*(X, \mathbb{Z})$ est un morphisme de structures de Hodge mixte. Pour X lisse, la classe de cohomologie dans $H^{2n}(X, \mathbb{Z}_\ell(n))$ d'un cycle algébrique de codimension n, Z, défini sur K, est invariante par Galois, i.e. définit

$$c(Z) \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(\mathbb{Z}_\ell(-n), H^{2n}(X, \mathbb{Z}_\ell)).$$

De même, la classe de cohomologie $c(Z) \in H^{2n}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$ est purement de type (n, n), i.e. correspond à

$$c(Z) \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{H.M.}}(\mathbb{Z}(-n), H^{2n}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z})).$$

5. Si $f : H \to H'$ est un morphisme, compatible à Galois, entre $\mathbb{Q}_\ell$-vectoriels de poids différents, on a $f = 0$. De même, si $f : H \to H'$ est un morphisme de structures de Hodge mixte pures de poids différents, alors f est de torsion. Une remarque plus utile est la suivante.

Scholie 5.1. Soient H et H' des structures de Hodge de poids n et n', avec $n > n'$. Soit $f : H_{\mathbb{Q}} \to H'_{\mathbb{Q}}$ un homomorphisme tel que $f : H_{\mathbb{C}} \to H'_{\mathbb{C}}$ respecte F. Alors $f = 0$.

6. Soient X une variété projective et lisse sur $\mathbb{C}$, $D = \sum_{i=1}^{n} D_i$ un diviseur à croisements normaux dans X, somme de diviseurs lisses, et j l'inclusion dans X de $U = X - D$. Pour $Q \subset [1, n]$, on pose

$$D_Q = \bigcap_{i \in Q} D_i.$$

En cohomologie ℓ-adique, on a canoniquement

$$R^q j_* \mathbb{Z}_\ell = \bigoplus_{\#Q=q} \mathbb{Z}_\ell(-q)_{D_Q}, \tag{6.1}$$

et la suite spectrale de Leray pour j s'écrit

$$E_2^{pq} = \bigoplus_{\#Q=q} H^p(D_Q, \mathbb{Q}_\ell) \otimes \mathbb{Z}_\ell(-q) \Rightarrow H^{p+q}(U, \mathbb{Q}_\ell). \tag{6.2}$$

D'après les conjectures de Weil [5], $H^p(D_Q, \mathbb{Q}_\ell)$ est pur de poids p, de sorte que E_2^{pq} est pur de poids $p + 2q$. En tant que quotient d'un sous-objet de E_2^{pq}, E_r^{pq} aussi est pur de poids $p + 2q$. D'après 5, $d_r = 0$ pour $r \geq 3$, car les poids $p + 2q$ et $p + 2q - r + 2$ de E_r^{pq} et $E_r^{p+r,q-r+1}$ sont différents. On a donc $E_3^{pq} = E_\infty^{pq}$. À une renumérotation près, la filtration par le poids de $H^*(U, \mathbb{Q}_\ell)$ est l'aboutissement de (6.2)

$$\mathrm{Gr}_n^W(H^k(U, \mathbb{Q}_\ell)) = E_3^{2k-n,n-k}. \tag{6.3}$$

7. En cohomologie entière, pour la topologie usuelle, la suite spectrale de Leray pour j s'écrit

$${}'E_2^{pq} = \bigoplus_{\#Q=q} H^p(D_Q, \mathbb{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(U, \mathbb{Z}). \tag{7.1}$$

Puisque chaque D_Q est une variété projective non singulière, ${}'E_2^{pq}$ est muni d'une structure de Hodge de poids p. On pose $E_2^{pq} = {}'E_2^{pq} \otimes \mathbb{Z}(-q)$ (structure de Hodge de poids $p + 2q$). Comme groupe abélien, $E_2^{pq} = {}'E_2^{pq}$; il y a intérêt à considérer (7.1) comme une suite spectrale de terme initial E_2^{pq}. D'après 3, il faut s'attendre à ce que

$$d_2 : E_2^{pq} \to E_2^{p+2,q-1}$$

soit un morphisme de structure de Hodge. On le prouve en interprétant d_2 comme un morphisme de Gysin. Dès lors, E_3^{pq} est muni d'une structure de Hodge de poids $p + 2q$. D'après 3, on s'attend à ce que, modulo torsion, la suite spectrale (6.4) [1] dégénère au terme E_3 ($E_3 = E_\infty$), et à ce que la nullité des d_r ($r \geq 3$) soit une application de 5.1. Ce programme est mené à bien dans [1] 3.2. On y définit la filtration par le poids de $H^*(U, \mathbb{Q})$ comme aboutissement de (7.1), à la renumérotation (6.3) près.

En fait, pour munir des groupes de cohomologie H^* d'une structure de Hodge mixte, le point clef a toujours été jusqu'ici de trouver une suite spectrale E d'aboutissement H^* telle que l'analogue ℓ-adique de E_2^{pq} soit conjecturalement pur (de poids $p + 2q$) ; E_2^{pq} doit alors porter une structure de Hodge naturelle (de poids $p + 2q$), et la filtration W est l'aboutissement de E.

8. Soit $\mathrm{Spec}(V)$ le spectre d'un anneau de valuation discrète hensélien (un trait hensélien) de corps de fractions K et de corps résiduel k de type fini sur le corps premier de caractéristique p. Soient $\overline{K}$ une clôture algébrique de K et H un vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{Q}_\ell$ ($\ell \neq p$), sur lequel $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ agit continûment. D'après Grothendieck, on sait ([4], appendice) qu'un sous-groupe d'indice fini du groupe d'inertie I agit de façon unipotente. Remplaçant V par une extension finie, on se ramène au cas où l'action de I tout entier est unipotente (cas semi-stable) ; elle se factorise alors par le plus grand pro-ℓ-groupe I_ℓ quotient de I, canoniquement isomorphe à $\mathbb{Z}_\ell(1)$.

Principe 8.1. Dans le cas semi-stable, si le module galoisien H « provient de la géométrie algébrique », il existe une (unique) filtration croissante W de H (la « filtration par le poids ») telle que I agisse trivialement sur $\mathrm{Gr}_n^W(H)$ et que $\mathrm{Gr}_n^W(H)$, en tant que module galoisien sous $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k) \simeq \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)/I$, soit pur de poids n.

On comparera à 2.1 et à l'appendice de [4].

1. Le texte imprimé renvoie à (6.4) ; il semble viser (7.1).

Lorsqu'on dispose de la résolution des singularités, on peut parfois donner de W une définition conjecturale, dont la validité résulte des conjectures de Weil. À l'aide de la résolution et de Weil, il est souvent facile de montrer qu'en tout cas H se dévisse en modules galoisiens (sous $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$) purs.

Supposons H semi-stable. Pour $T \in I_\ell$, on définit $\log T$ comme la somme finie

$$-\sum_{n>0}(\mathrm{Id}-T)^n/n.$$

L'application $(T,x) \mapsto \log T(x)$ s'identifie à un homomorphisme

$$M : \mathbb{Z}_\ell(1) \otimes H \longrightarrow H. \tag{8.2}$$

Puisque $\mathbb{Z}_\ell(1)$ est de poids -2, on a nécessairement (cf. 5)

$$M(\mathbb{Z}_\ell(1) \otimes W_n(H)) \subset W_{n-2}(H) \tag{8.3}$$

et M induit

$$\mathrm{Gr}(M) : \mathbb{Z}_\ell(1) \otimes \mathrm{Gr}^W_n(H) \longrightarrow \mathrm{Gr}^W_{n-2}(H). \tag{8.4}$$

8.5. Si X est une variété projective non singulière sur un corps algébriquement clos k_0, on définit

$$L : \mathbb{Z}_\ell(-1) \otimes H^*(X, \mathbb{Z}_\ell) \longrightarrow H^*(X, \mathbb{Z}_\ell)$$

comme étant le cup-produit avec la classe de cohomologie d'une section hyperplane. On notera une analogie formelle entre L et M ; de même que M est défini par une action de $\mathbb{Z}_\ell(1)$, on peut regarder L comme défini par une action de $\mathbb{Z}_\ell(-1)$; L augmente le degré de 2, et $\mathrm{Gr}\, M$ (8.4) le diminue de 2.

9. Soient D le disque unité, $D^* = D - \{0\}$ et X

$$\begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & \mathbb{P}^r(\mathbb{C}) \times D \\ {\scriptstyle f}\searrow & & \swarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_2} \\ & D & \end{array}$$

une famille de variétés projectives paramétrée par D, avec f propre et $f|D^*$ lisse. Gardons les notations de 8, et rappelons que dans l'analogie entre trait hensélien et petit voisinage de 0 dans la droite complexe on a le dictionnaire suivant (noter que le spectre de l'anneau des germes de fonctions holomorphes en 0 est un trait hensélien) :

D	$\mathrm{Spec}(V)$
D^*	$\mathrm{Spec}(K)$
un revêtement universel $\widetilde{D}^*$ de D^*	$\mathrm{Spec}(\overline{K})$
groupe fondamental $\pi_1(D^*)$	groupe d'inertie I
(avec $\pi_1(D^*) = \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}}$)	(avec $I_\ell = \mathbb{Z}_\ell(1)$)
X	schéma projectif X sur $\mathrm{Spec}(V)$
$X^* = f^{-1}(D^*)$	X_K
$\widetilde{X} = X \times_D \widetilde{D}^*$	$X_{\overline{K}}$
système local $R^i f_* \mathbb{Z}\|D^*$	module galoisien $H^i(X_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell)$
$H^i(\widetilde{X}, \mathbb{Z})$	$H^i(X_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell)$.

(9.1)

On notera que $\widetilde{X}$ est homotopiquement équivalent à chacune des fibres $X_t = f^{-1}(t)$ $(t \in D^*)$: $H^i(X_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell)$ a encore pour analogue $H^i(X_t, \mathbb{Z})$ et à l'action de I correspond la transformation de monodromie T.

Ici encore, on sait qu'un sous-groupe d'indice fini de $\pi_1(D^*)$ agit de façon unipotente sur $H^i(\widetilde{X}, \mathbb{Q}) = H^i(X_t, \mathbb{Q})$. Plaçons-nous dans le cas semi-stable où $\pi_1(D^*)$ tout entier agit de façon unipotente (ceci revient à remplacer D par un revêtement fini), et soit T l'action du générateur canonique de $\pi_1(D^*)$.

Par 3 et 8, on s'attend à ce que $H^i(\widetilde{X}, \mathbb{Q}) \simeq H^i(X_t, \mathbb{Q})$ soit muni d'une filtration croissante W, que $\mathrm{Gr}^W_n(H^i(\widetilde{X}, \mathbb{Q}))$ soit muni d'une structure de Hodge de poids n, que $\log T(W_n) \subset W_{n-2}$ et que $\log T$ induise un morphisme de structures de Hodge

$$M_n : \mathbb{Z}(-1) \otimes \mathrm{Gr}^W_n(H^i) \longrightarrow \mathrm{Gr}^W_{n-2}(H^i).$$

On aimerait de plus que (8.2), et non seulement (8.3) et (8.4), aient un analogue.

On parvient en fait à définir, pour chaque vecteur u de l'espace tangent à D en $\{0\}$, une structure de Hodge mixte $\mathcal{H}_u$ sur $H^i(\widetilde{X}, \mathbb{Z})$. La filtration W et les structures de Hodge sur les $\mathrm{Gr}_n^W(H^i)$ sont indépendantes de u, et la dépendance en u de $\mathcal{H}_u$ s'exprime simplement en terme de T. En analogie avec (8.2), on trouve que, quel que soit u, $\log T$ induit un homomorphisme de structures de Hodge mixtes

$$M : \mathbb{Z}(1) \otimes H^i(\widetilde{X}, \mathbb{Z}) \longrightarrow H^i(\widetilde{X}, \mathbb{Z}).$$

Enfin, l'analogie 8.5 n'est pas trompeuse (mais ici, le fait que $f|D^*$ soit supposé propre et lisse est sans doute essentiel). On prouve que

$$(\log T)^k : \mathrm{Gr}_{n+k}^W(H^n(\widetilde{X}, \mathbb{Q})) \longrightarrow \mathrm{Gr}_{n-k}^W(H^n(\widetilde{X}, \mathbb{Q}))$$

est un isomorphisme pour tout k (cf. [6], IV 6, cor. au th. 5). Ceci caractérise la filtration W. Jusqu'ici, on ne dispose d'un analogue du théorème de positivité de Hodge (cf. [6], IV 7, cor. au th. 7) que dans des cas très particuliers. On espère que les structures mixtes $\mathcal{H}_u$ déterminent le comportement asymptotique, pour $t \to 0$, de la famille de structures pures $H^i(X_t, \mathbb{Z})$ $(t \in D^*)$.

BIBLIOGRAPHIE

[1] P. Deligne. — Théorie de Hodge, à paraître aux *Publ. Math. I. H. E. S.*, 40.

[2] M. Demazure. — Motifs des variétés algébriques, *Sém. Bourbaki* (1969–1970), exp. 365.

[3] J.-P. Serre. — Analogues kahlériens de certaines conjectures de Weil, *Ann. of Math.*, 71, 2 (1960), pp. 392–394.

[4] — and J. Tate. — Good reduction of abelian varieties, *Ann. of Math.*, 88, 3 (1968), pp. 492–517.

[5] A. Weil. — Number of solutions of equations in finite fields, *Bull. Amer. Math. Soc.*, 55 (1949), pp. 497–508.

[6] —. — Introduction à l'étude des variétés kählériennes, *Act. Sci. et Ind.*, 1267, Hermann (1958).

I. H. E. S.
35, route de Chartres,
91-Bures-sur-Yvette
(France)

THÉORIE DE HODGE, II

par PIERRE DELIGNE[1]

SOMMAIRE

1.	Filtrations	6
1.1.	Objets filtrés	6
1.2.	Filtrations opposées	9
1.3.	Le lemme des deux filtrations	14
1.4.	Hypercohomologie de complexes filtrés	19
2.	Structures de Hodge	24
2.1.	Structures pures	24
2.2.	La théorie de Hodge	27
2.3.	Structures mixtes	30
3.	Théorie de Hodge des variétés algébriques non singulières	31
3.1.	Pôles logarithmiques et résidus	31
3.2.	Théorie de Hodge mixte	34
4.	Applications et compléments	40
4.1.	Le théorème de la partie fixe	40
4.2.	Le théorème de semi-simplicité	43
4.3.	Complément à [2]	49
4.4.	Homomorphismes de schémas abéliens	50

Introduction

D'après Hodge, l'espace de cohomologie $H^n(X,\mathbb{C})$ d'une variété kählérienne compacte X est munie d'une «structure de Hodge» de poids n, i.e. d'une bigraduation naturelle

$$H^n(X,\mathbb{C}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{pq}$$

vérifiant $\overline{H^{pq}} = H^{qp}$. On montre ici que la cohomologie complexe d'une variété algébrique non singulière, non nécessairement compacte, est munie d'une structure d'espèce un peu plus générale, qui fait apparaître $H^n(X,\mathbb{C})$ comme «extension successive» de structures de Hodge de poids décroissants, contenus entre $2n$ et n, dont les nombres de Hodge $h^{pq} = \dim H^{pq}$ sont nuls pour $p > n$ ou $q > n$.

Le lecteur trouvera exposé dans [14] le yoga qui sous-tend cette construction.

La démonstration, essentiellement algébrique, repose d'une part sur la théorie de Hodge, d'autre part sur la résolution des singularités à la Hironaka qui permet, via une suite spectrale, «d'exprimer» la cohomologie d'une variété algébrique non singulière quasi-projective en terme de la cohomologie de variétés projectives non singulières.

Le § 1, outre quelques sorites sur les filtrations réunis pour la commodité du lecteur, contient deux résultats-clefs:

a) le théorème (1.2.10), qui ne sera utilisé que via son corollaire (2.3.5), donnant les propriétés fondamentales des «structures de Hodge mixtes»;

b) le «lemme des deux filtrations» (1.3.16).

Le § 2 rappelle la théorie de Hodge et introduit les structures de Hodge mixtes. Le cœur de ce travail est le n° 3.2, qui définit la structure de Hodge mixte de $H^n(X,\mathbb{C})$ et établit quelques dégénérescences de suites spectrales.

Le § 4 donne diverses applications, toutes déduites de (4.1.1) et de la théorie de la (K/k)-trace pour les structures de Hodge qui en résulte (4.1.2). Les principales sont (4.2.6) et (4.4.15).

[1] Travail présenté comme thèse de doctorat à l'Université d'Orsay.

1. Filtrations

1.1. Objets filtrés

(1.1.1) Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne. On aura à considérer des filtrations de type $\mathbb{Z}$, en général finies, sur les objets de $\mathcal{A}$.

Définition (1.1.2). Une filtration décroissante, resp. croissante, F d'un objet A de $\mathcal{A}$ est une famille $(F^n(A))_{n\in\mathbb{Z}}$, resp. $(F_n(A))_{n\in\mathbb{Z}}$, de sous-objets de A, vérifiant

$$\forall n, m \qquad n \leq m \Rightarrow F^n(A) \supset F^m(A)$$

(resp. $\forall n, m \quad n \leq m \Rightarrow F_n(A) \subset F_m(A)$).

Un objet filtré est un objet muni d'une filtration. Quand il n'y aura pas danger de confusion, on désignera souvent par une même lettre des filtrations sur des objets différents de $\mathcal{A}$.

Si F est une filtration décroissante, resp. croissante, sur A, on pose $F^{\infty}(A) = 0$ et $F^{-\infty}(A) = A$ (resp. $F_{-\infty}(A) = 0$ et $F_{\infty}(A) = A$).

Les filtrations décalées d'une filtration décroissante W sont définies par

$$W[n]^p(A) = W^{n+p}(A).$$

(1.1.3) Si F est une filtration décroissante, resp. croissante, de A, alors les $F_n(A) = F^{-n}(A)$, resp. les $F^n(A) = F_{-n}(A)$, forment une filtration croissante, resp. décroissante, de A. Ceci permet en principe de ne considérer que des filtrations décroissantes; sauf mention explicite du contraire, par «filtration» on entendra dorénavant «filtration décroissante».

(1.1.4) Une filtration F de A est dite finie s'il existe n et m tels que $F^n(A) = A$ et $F^m(A) = 0$.

(1.1.5) Un morphisme d'un objet filtré (A, F) dans un objet filtré (B, F) est un morphisme f de A dans B qui vérifie

$$f(F^n(A)) \subset F^n(B) \qquad \text{pour } n \in \mathbb{Z}.$$

Les objets filtrés (resp. filtrés de filtration finie) de $\mathcal{A}$ forment une catégorie additive dans laquelle existent les limites inductives et projectives finies (et donc les noyaux, conoyaux, images et coïmages d'un morphisme).

Un morphisme $f : (A, F) \to (B, F)$ est dit strict, ou strictement compatible aux filtrations, si la flèche canonique de $\mathrm{Coim}(f)$ dans $\mathrm{Im}(f)$ est un isomorphisme d'objets filtrés (cf. (1.1.11)).

(1.1.6) Soit $^\circ$ le foncteur contravariant identique de $\mathcal{A}$ dans la catégorie duale $\mathcal{A}^\circ$. Si (A, F) est un objet filtré de $\mathcal{A}$, les $(A/F^{1-n}(A))^\circ$ s'identifient à des sous-objets de A°. La filtration sur A° duale de F est définie par

$$F^n(A^\circ) = (A/F^{1-n}(A))^\circ.$$

Le bidual de (A, F) s'identifie à (A, F). Cette construction identifie la duale de la catégorie des objets filtrés de $\mathcal{A}$ à la catégorie des objets filtrés de $\mathcal{A}^\circ$.

(1.1.7) Si (A, F) est un objet filtré de $\mathcal{A}$, son gradué associé est l'objet de $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ défini par

$$\mathrm{Gr}^n(A) = F^n(A)/F^{n+1}(A).$$

La convention (1.1.6) est justifiée par la formule simple

$$\mathrm{Gr}^n(A^\circ) = \mathrm{Gr}^{-n}(A)^\circ$$

qui se vérifie sur le diagramme autodual

$$\begin{array}{ccccc} A/F^n(A) & \leftarrow & A/F^{n+1}(A) & & 0 \\ & \nwarrow & \uparrow & \nwarrow & \uparrow \\ & & A & & \mathrm{Gr}^n(A) \\ & \nearrow & \uparrow & \nearrow & \nwarrow \\ F^{n+1}(A) & \longrightarrow & F^n(A) & & 0 \end{array} \tag{1.1.7.1}$$

(1.1.8) Soient (A, F) un objet filtré et $j : X \hookrightarrow A$ un sous-objet de A. La filtration induite sur X par F est l'unique filtration sur X telle que j soit strictement compatible aux filtrations; on a

$$F^n(X) = j^{-1}(F^n(A)) = X \cap F^n(A).$$

Dualement, la filtration quotient sur A/X, unique filtration telle que $p : A \to A/X$ soit strictement compatible aux filtrations, est donnée par

$$F^n(A/X) = p(F^n(A)) \simeq (X + F^n(A))/X \simeq F^n(A)/(X \cap F^n(A)).$$

Lemme (1.1.9). Si X et Y sont deux sous-objets de A, avec $X \subset Y$, alors sur $Y/X \simeq \mathrm{Ker}(A/X \to A/Y)$, la filtration quotient de celle de Y coïncide avec celle induite par celle de A/X. Dans le diagramme



les flèches sont strictes.

(1.1.10) On appellera la filtration (1.1.9) sur Y/X la filtration induite par celle de A. D'après (1.1.9), sa définition est autoduale.

En particulier, si $\Sigma : A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$ est une 0-suite, et si B est filtré, alors

$$H(\Sigma) = \mathrm{Ker}(g)/\mathrm{Im}(f) = \mathrm{Ker}(\mathrm{Coker}(f) \to \mathrm{Coim}(g))$$

est muni d'une filtration induite canonique.

Le lecteur vérifiera que:

Proposition (1.1.11).

(i) Soit $f : (A, F) \to (B, F)$ un morphisme d'objets filtrés de filtration finie. Pour que f soit strict, il faut et il suffit que la suite

$$0 \to \mathrm{Gr}(\mathrm{Ker}(f)) \to \mathrm{Gr}(A) \to \mathrm{Gr}(B) \to \mathrm{Gr}(\mathrm{Coker}(f)) \to 0$$

soit exacte.

(ii) Soit $\Sigma : (A, F) \to (B, F) \to (C, F)$ une 0-suite de morphismes stricts. On a alors canoniquement

$$H(\mathrm{Gr}(\Sigma)) \simeq \mathrm{Gr}(H(\Sigma)).$$

En particulier, si Σ est exacte dans $\mathcal{A}$, alors $\mathrm{Gr}(\Sigma)$ est exacte dans $\mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$.

Dans une catégorie de modules, dire qu'un morphisme $f : (A, F) \to (B, F)$ soit strict signifie que tout $b \in B$, de filtration $\geq n$ ($b \in F^n(B)$), qui est dans l'image de A, est déjà dans l'image de $F^n(A)$:

$$f(F^n(A)) = f(A) \cap F^n(B).$$

(1.1.12) Si $\otimes : \mathcal{A}_1 \times \cdots \times \mathcal{A}_n \to \mathcal{B}$ est un foncteur multiadditif exact à droite, et si A_i est un objet de filtration finie de $\mathcal{A}_i$ ($1 \leq i \leq n$), on définit une filtration sur $\bigotimes_{i=1}^n A_i$ par

$$F^k\left(\bigotimes_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{\sum k_i = k} \mathrm{Im}\left(\bigotimes_{i=1}^n F^{k_i}(A_i) \to \bigotimes_{i=1}^n A_i\right)$$

(somme de sous-objets).

Dualement, si H est exact à gauche, on pose

$$F^k(H(A_i)) = \bigcap_{\sum k_i = k} \operatorname{Ker}\left(H(A_i) \to H(A_i/F^{k_i}(A_i))\right).$$

Pour H exact, les deux définitions sont équivalentes. On étend ces définitions à des foncteurs contravariants en certaines variables par (1.1.6). En particulier, pour le foncteur exact à gauche Hom, on pose

$$F^k(\operatorname{Hom}(A,B)) = \{f : A \to B \mid \forall n,\ f(F^n(A)) \subset F^{n+k}(B)\}.$$

On a donc

$$\operatorname{Hom}((A,F),(B,F)) = F^0(\operatorname{Hom}(A,B)).$$

Sous les hypothèses précédentes, on dispose de morphismes évidents

$$\bigotimes_{i=1}^{n} \operatorname{Gr}(A_i) \to \operatorname{Gr}\left(\bigotimes_{i=1}^{n} A_i\right)$$

et

$$\operatorname{Gr} H(A_i) \to H(\operatorname{Gr}(A_i)).$$

Pour H exact, ce sont des isomorphismes inverses l'un de l'autre.

Ces constructions sont compatibles à la composition des foncteurs, en un sens qu'on laisse au lecteur le soin de ne pas expliciter.

1.2. Filtrations opposées

(1.2.1) Soit A un objet de $\mathcal{A}$ muni de deux filtrations F et G. Par définition, $\operatorname{Gr}_F^m(A)$ est un quotient d'un sous-objet de A, et, en tant que tel, se trouve muni d'une filtration induite par G (1.1.10). Passant au gradué associé, on définit un objet bigradué $(\operatorname{Gr}_G^n \operatorname{Gr}_F^m(A))_{n,m\in\mathbb{Z}}$. D'après un lemme de Zassenhaus, $\operatorname{Gr}_G^n \operatorname{Gr}_F^m(A)$ et $\operatorname{Gr}_F^m \operatorname{Gr}_G^n(A)$ sont canoniquement isomorphes: si on définit les filtrations induites (1.1.10) comme filtrations quotients de filtrations induites sur un sous-objet, on a

$$\begin{aligned} \operatorname{Gr}_G^n \operatorname{Gr}_F^m(A) &\approx (F^m(A)\cap G^n(A))/((F^{m+1}(A)\cap G^n(A)) + (F^m(A)\cap G^{n+1}(A))) \\ &\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \| \\ \operatorname{Gr}_F^m \operatorname{Gr}_G^n(A) &\approx (G^n(A)\cap F^m(A))/((G^{n+1}(A)\cap F^m(A)) + (G^n(A)\cap F^{m+1}(A))). \end{aligned}$$

(1.2.2) Soit H une troisième filtration de A. Elle induit une filtration sur $\operatorname{Gr}_F(A)$, et donc sur $\operatorname{Gr}_G \operatorname{Gr}_F(A)$. Elle induit aussi une filtration sur $\operatorname{Gr}_F \operatorname{Gr}_G(A)$. On prendra garde que ces filtrations ne se correspondent en général pas par l'isomorphisme (1.2.1). Dans l'expression $\operatorname{Gr}_H \operatorname{Gr}_G \operatorname{Gr}_F(A)$, G et H jouent donc un rôle symétrique, mais non F et G.

Définition (1.2.3). Deux filtrations finies F et $\overline{F}$ sur A sont dites n-opposées si

$$\operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_{\overline{F}}^q(A) = 0 \qquad \text{pour } p+q \neq n.$$

(1.2.4) Si $A^{p,q}$ est un objet bigradué de $\mathcal{A}$, tel que:

a) $A^{p,q} = 0$ sauf pour un nombre fini de couples (p,q);

b) $A^{p,q} = 0$ pour $p+q \neq n$,

alors, on définit deux filtrations finies n-opposées de $A = \sum_{p,q} A^{p,q}$ en posant

$$F^p(A) = \sum_{p'\geq p} A^{p',q'}, \tag{1.2.4.1}$$

$$\overline{F}^q(A) = \sum_{q'\geq q} A^{p',q'}. \tag{1.2.4.2}$$

On a

$$\operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_{\overline{F}}^q(A) = A^{p,q}. \tag{1.2.4.3}$$

Réciproquement:

Proposition (1.2.5).

(i) Soient F et $\overline{F}$ deux filtrations finies sur A. Pour que F et $\overline{F}$ soient n-opposées, il faut et il suffit que

$$\forall p, q \qquad p+q=n+1 \Rightarrow F^p(A) \oplus \overline{F}^q(A) \xrightarrow{\sim} A.$$

(ii) Si F et $\overline{F}$ sont n-opposées, et si on pose

$$\begin{cases} A^{p,q}=0 & \text{pour } p+q \neq n, \\ A^{p,q}=F^p(A)\cap \overline{F}^q(A) & \text{pour } p+q=n, \end{cases}$$

alors A est somme directe des $A^{p,q}$, et F et $\overline{F}$ se déduisent de la bigraduation $A^{p,q}$ de A par le procédé (1.2.4).

Preuve. (i) La condition $\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\overline{F}}^q(A)=0$ pour $p+q>n$ signifie que

$$F^p \cap \overline{F}^q = (F^{p+1}\cap \overline{F}^q) + (F^p \cap \overline{F}^{q+1}) \qquad (p+q>n).$$

Par hypothèse, $F^p \cap \overline{F}^q$ est nul pour $p+q$ assez grand; par récurrence descendante, on en déduit que la condition $\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\overline{F}}^q(A)=0$ pour $p+q>n$ équivaut à la condition $F^p(A)\cap \overline{F}^q(A)=0$ pour $p+q>n$. Dualement ((1.1.6), (1.1.7), (1.1.10)) la condition $\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\overline{F}}^q(A)=0$ pour $p+q<n$ équivaut à $A=F^p(A)+\overline{F}^q(A)$ pour $(1-p)+(1-q)>-n$, i.e. pour $p+q\leq n+1$, et (i) en résulte.

(ii) Si F et $\overline{F}$ sont n-opposées, prouvons par récurrence descendante sur p que

$$\bigoplus_{p'\geq p} A^{p',q'} \xrightarrow{\sim} F^p(A). \tag{1.2.5.1}$$

a) Pour $F^p(A)=0$, l'assertion est évidente.

b) La décomposition $A=F^{p+1}(A)\oplus \overline{F}^{n-p}(A)$ induit sur $F^p(A)\supset F^{p+1}(A)$ une décomposition

$$F^p(A)=F^{p+1}(A)\oplus (F^p(A)\cap \overline{F}^{n-p}(A)),$$

et on conclut par récurrence. Pour p assez petit, on a $F^p(A)=A$. D'après (1.2.5.1), les $A^{p,q}$ forment donc une bigraduation de A et F vérifie (1.2.4.1). Que $\overline{F}$ vérifie (1.2.4.2) en résulte par symétrie.

(1.2.6) Les constructions (1.2.4) et (1.2.5) établissent des équivalences de catégories quasi-inverses l'une de l'autre entre objets de $\mathcal{A}$ munis de deux filtrations finies n-opposées et objets bigradués de $\mathcal{A}$ du type considéré en (1.2.4).

Définition (1.2.7). Trois filtrations finies W, F et $\overline{F}$ sur un objet A de $\mathcal{A}$ sont dites opposées si

$$\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\overline{F}}^q \mathrm{Gr}_W^n(A)=0 \qquad \text{pour } p+q+n\neq 0.$$

Cette condition est symétrique en F et $\overline{F}$. Elle signifie que F et $\overline{F}$ induisent sur $W^n(A)/W^{n+1}(A)$ deux filtrations $(-n)$-opposées. On pose

$$A^{p,q}=\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\overline{F}}^q \mathrm{Gr}_W^{-p-q}(A),$$

d'où des décompositions (1.2.4), (1.2.5)

$$W^n(A)/W^{n+1}(A)=\bigoplus_{p+q=-n} A^{p,q} \tag{1.2.7.1}$$

qui font de $\mathrm{Gr}_W(A)$ un objet bigradué.

Lemme (1.2.8). Soient W, F et $\overline{F}$ trois filtrations finies opposées sur A, et σ une suite $(p_i, q_i)_{i\geq 0}$ de couples d'entiers vérifiant:

a) $p_i \leq p_j$ et $q_i \leq q_j$ pour $i \geq j$;

b) Pour $i > 0$, $p_i + q_i = p_0 + q_0 - i + 1$.

On pose $p = p_0$, $q = q_0$, $n = -p - q$ et

$$A_\sigma = \left(\sum_{0\leq i}(W^{n+i}(A) \cap F^{p_i}(A))\right) \cap \left(\sum_{0\leq i}(W^{n+i}(A) \cap \overline{F}^{q_i}(A))\right).$$

Alors, la projection de $W^n(A)$ sur $\mathrm{Gr}^n_W(A)$ induit un isomorphisme

$$A_\sigma \xrightarrow{\sim} A^{p,q} \subset \mathrm{Gr}^n_W(A).$$

Prouvons par récurrence sur k l'assertion suivante:
$(*_k)$ La projection de $W^n(A)/W^{n+k}(A)$ dans $\mathrm{Gr}^n_W(A)$ induit un isomorphisme de

$$(((\sum_{i<k}(W^{n+i}(A) \cap F^{p_i}(A))) + W^{n+k}(A)) \cap ((\sum_{i<k}(W^{n+i}(A) \cap \overline{F}^{q_i}(A))) + W^{n+k}(A)))/W^{n+k}(A)$$

sur $A^{p,q} \subset \mathrm{Gr}^n_W(A)$.

Pour $k = 1$, c'est la définition même de $A^{p,q}$. D'après (1.2.5)(i), on a

$$F^{p_k}(\mathrm{Gr}^{n+k}_W(A)) \oplus \overline{F}^{q_k}(\mathrm{Gr}^{n+k}_W(A)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^{n+k}_W(A). \tag{1.2.8.1}$$

Posons

$$\begin{aligned}
B &= \sum_{i<k}(W^{n+i}(A) \cap F^{p_i}(A)) \\
C &= \sum_{i<k}(W^{n+i}(A) \cap \overline{F}^{q_i}(A)) \\
B' &= (W^{n+k}(A) \cap F^{p_k}(A)) + W^{n+k+1}(A) \\
C' &= (W^{n+k}(A) \cap \overline{F}^{q_k}(A)) + W^{n+k+1}(A) \\
D &= W^{n+k}(A) \\
E &= W^{n+k+1}(A).
\end{aligned}$$

La formule (1.2.8.1) se transcrit en

$$B' + C' = D,$$

et

$$B' \cap C' = E.$$

On a par ailleurs, puisque $p_k \leq p_i$ $(i \leq k)$,

$$B \cap D \subset F^{p_k}(A) \cap W^{n+k}(A) \subset B'$$

et puisque $q_k \leq q_i$ $(i \leq k)$,

$$C \cap D \subset \overline{F}^{q_k}(A) \cap W^{n+k}(A) \subset C'.$$

L'assertion $(*_{k+1})$ résulte alors de $(*_k)$ et du lemme suivant.

Lemme (1.2.9). Soient des sous-objets B, C, B', C', D, E de A. On suppose que

$$B' + C' = D, \qquad B' \cap C' = E,$$

$$B \cap D \subset B', \qquad C \cap D \subset C'.$$

Alors,

$$((B+B')\cap(C+C'))/E \xrightarrow{\sim} ((B+D)\cap(C+D))/D.$$

Pour prouver la surjectivité, on écrit

$$\begin{aligned}((B+B')\cap(C+C'))+D &= (((B+B')\cap(C+C'))+B')+C'\\ &= ((B+B')\cap(C+C'+B'))+C'\\ &= (B+B'+C')\cap(C+C'+B')\\ &= (B+D)\cap(C+D).\end{aligned}$$

Pour prouver l'injectivité, on écrit

$$(B+B')\cap(C+C')\cap D = ((B+B')\cap D)\cap((C+C')\cap D).$$

Puisque $B'\subset D$, on a

$$(B+B')\cap D = (B\cap D)+B' = B';$$

de même,

$$(C+C')\cap D = C',$$

et

$$(B+B')\cap(C+C')\cap D = B'\cap C' = E.$$

On achève enfin la démonstration de (1.2.8) en notant que (1.2.8) équivaut à $(*_k)$ pour k grand.

Théorème (1.2.10). Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne, et désignons provisoirement par $\mathcal{A}'$ la catégorie des objets de $\mathcal{A}$ munis de trois filtrations opposées W, F et $\overline{F}$. Les morphismes dans $\mathcal{A}'$ sont les morphismes dans $\mathcal{A}$ compatibles aux trois filtrations.

(i) $\mathcal{A}'$ est une catégorie abélienne.

(ii) Le noyau (resp. conoyau) d'une flèche $f : A \to B$ dans $\mathcal{A}'$ est le noyau (resp. conoyau) de f dans $\mathcal{A}$, muni des filtrations induites par celles de A (resp. quotient de celles de B).

(iii) Tout morphisme $f : A \to B$ dans $\mathcal{A}'$ est strictement compatible aux filtrations W, F et $\overline{F}$; le morphisme $\mathrm{Gr}_W(f)$ est compatible aux bigraduations de $\mathrm{Gr}_W(A)$ et $\mathrm{Gr}_W(B)$; les morphismes $\mathrm{Gr}_F(f)$ et $\mathrm{Gr}_{\overline{F}}(f)$ sont strictement compatibles à la filtration induite par W.

(iv) Les foncteurs «oubli des filtrations», Gr_W, Gr_F, $\mathrm{Gr}_{\overline{F}}$, et

$$\begin{aligned}\mathrm{Gr}_W\,\mathrm{Gr}_F &\simeq \mathrm{Gr}_F\,\mathrm{Gr}_W \simeq \mathrm{Gr}_{\overline{F}}\,\mathrm{Gr}_F\,\mathrm{Gr}_W\\ &\simeq \mathrm{Gr}_{\overline{F}}\,\mathrm{Gr}_W \simeq \mathrm{Gr}_W\,\mathrm{Gr}_{\overline{F}}\end{aligned}$$

de $\mathcal{A}'$ dans $\mathcal{A}$ sont exacts.

Désignons par $\sigma_0(p,q)$ et $\sigma_1(p,q)$ les suites

$$\sigma_0(p,q) = (p,q),(p,q),(p,q-1),(p,q-2),(p,q-3),\ldots$$

$$\sigma_1(p,q) = (p,q),(p,q),(p-1,q),(p-2,q),(p-3,q),\ldots$$

et, avec les notations de (1.2.8), posons

$$A_i^{p,q} = A_{\sigma_i(p,q)} \qquad (i=0,1).$$

Si $f : A \to B$ est compatible à W, F et $\overline{F}$, on a

$$f(A_i^{p,q}) \subset B_i^{p,q} \qquad (i=0,1). \tag{1.2.10.1}$$

L'assertion (iii) résulte donc du lemme suivant.

Lemme (1.2.11). Les $A_i^{p,q}$ forment une bigraduation de A. On a

$$W^n(A) = \sum_{n+p+q\leq 0} A_i^{p,q} \qquad (i=0,1), \tag{1.2.11.1}$$

$$F^p(A) = \sum_{p'\geq p} A_0^{p',q'}, \tag{1.2.11.2}$$

$$\overline{F}^q(A) = \sum_{q'\geq q} A_1^{p',q'}. \tag{1.2.11.3}$$

Par symétrie, il suffit de prouver les assertions relatives à $i=0$. Posons $A_0 = \bigoplus A_0^{p,q}$, et définissons sur A_0 des filtrations W et F par les formules de (1.2.11). L'application canonique i de A_0 dans A est compatible aux filtrations W et F. De plus, d'après (1.2.8), $\mathrm{Gr}_W(i)$ est un isomorphisme, et induit des isomorphismes d'objets gradués

$$\sum_{p+q=n} A_0^{p,q} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_W^{-n}(A) = \sum_{p+q=n} A^{p,q}. \tag{1.2.11.4}$$

Le morphisme i est donc un isomorphisme, et les $A_0^{p,q}$ forment une bigraduation de A. La formule (1.2.11.1) exprime alors que $\mathrm{Gr}_W(i)$ est un isomorphisme. D'après (1.2.11.4), $\mathrm{Gr}_F \mathrm{Gr}_W(i)$ est un isomorphisme, donc aussi $\mathrm{Gr}_W \mathrm{Gr}_F(i)$ et $\mathrm{Gr}_F(i)$. La formule (1.2.11.2) en résulte.

(1.2.12) Prouvons (1.2.10). Soit $f : A \to B$ dans $\mathcal{A}'$ et munissons $K = \mathrm{Ker}(f)$ des filtrations induites par celles de A. D'après (1.2.11), $\mathrm{Gr}_W(K) \hookrightarrow \mathrm{Gr}_W(A)$; de plus, la filtration F (resp. $\overline{F}$) de K induit sur $\mathrm{Gr}_W(K)$ la filtration image réciproque de la filtration F de $\mathrm{Gr}_W(A)$. Le sous-objet $\mathrm{Gr}_W(K)$ de $\mathrm{Gr}_W(A)$ est enfin compatible à la bigraduation de $\mathrm{Gr}_W(A)$:

$$\mathrm{Gr}_W(K) = \bigoplus_{p,q} (\mathrm{Gr}_W(K) \cap A^{p,q}).$$

On en tire que

$$\mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\overline{F}}^q \mathrm{Gr}_W^n(K) \hookrightarrow \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\overline{F}}^q \mathrm{Gr}_W^n(A);$$

les filtrations de W, F et $\overline{F}$ de K sont donc opposées et K est un noyau de f dans $\mathcal{A}'$. Ceci, joint au résultat dual, prouve (ii).

Si f est une flèche de $\mathcal{A}'$, le morphisme canonique de $\mathrm{Coim}(f)$ dans $\mathrm{Im}(f)$ est un isomorphisme dans $\mathcal{A}$; d'après (iii), c'est aussi un isomorphisme dans $\mathcal{A}'$, qui est donc abélienne.

Le foncteur «oubli des filtrations» est exact d'après (ii). L'exactitude des autres foncteurs (iv) résulte aussitôt de (ii), (iii) et (1.1.11), (i) ou (ii).

(1.2.13) Soit A un objet de $\mathcal{A}$ muni d'une filtration finie croissante W, et de deux filtrations finies décroissantes F et $\overline{F}$. La construction (1.1.3) associe à $W_\bullet$ une filtration décroissante $W^\bullet$. On dira que les filtrations $W_\bullet$, F et $\overline{F}$ sont opposées si les filtrations $W^\bullet$, F et $\overline{F}$ le sont, i.e. si pour tout n les filtrations induites par F et $\overline{F}$ sur

$$\mathrm{Gr}_n^W(A) = W_n(A)/W_{n-1}(A)$$

sont n-opposées.

Le théorème (1.2.10) se transpose trivialement à cette variante.

1.3. Le lemme des deux filtrations

(1.3.1) Soit K un complexe différentiel d'objets de $\mathcal{A}$, muni d'une filtration F. Celle-ci est dite birégulière si elle induit sur chaque composante de K une filtration finie. Rappelons la définition des termes $E_r^{pq}(K,F)$ ou simplement E_r^{pq} de la suite spectrale définie par F. On pose

$$Z_r^{pq} = \mathrm{Ker}\left(d : F^p(K^{p+q}) \to K^{p+q+1}/F^{p+r}(K^{p+q+1})\right)$$

et on définit dualement B_r^{pq} par la formule

$$K^{p+q}/B_r^{pq} = \mathrm{coker}\left(d : F^{p-r+1}(K^{p+q-1}) \to K^{p+q}/F^{p+1}(K^{p+q})\right).$$

Ces formules gardent un sens pour $r = \infty$.

On prendra garde que l'usage fait ici de la notation B_r^{pq} est différent de celui de Godement [TF].

On a par définition:

$$E_r^{pq} = \mathrm{Im}\left(Z_r^{pq} \to K^{p+q}/B_r^{pq}\right) \tag{1.3.1.1}$$
$$= Z_r^{pq}/(B_r^{pq} \cap Z_r^{pq}) \tag{1.3.1.2}$$
$$= \mathrm{Ker}\left(K^{p+q}/B_r^{pq} \to K^{p+q}/(Z_r^{pq} + B_r^{pq})\right). \tag{1.3.1.3}$$

On peut encore écrire

$$B_r^{p*} \cap Z_r^{p*} \underset{\text{dfn}}{=} (dF^{p-r+1} + F^{p+1}) \cap (d^{-1}F^{p+r} \cap F^p)$$
$$= (dF^{p-r+1} \cap F^p) + (F^{p+1} \cap d^{-1}F^{p+r}), \tag{1.3.1.4}$$

puisque $dF^{p-r+1} \subset d^{-1}F^{p+r}$ et que $F^{p+1} \subset F^p$.

Pour $r < \infty$, les E_r forment un complexe gradué par le degré $p-r(p+q)$, et E_{r+1} s'exprime comme cohomologie de ce complexe :

$$E_{r+1}^{p,q} = H\big(E_r^{p-r,q+r-1} \xrightarrow{d_r} E_r^{p,q} \xrightarrow{d_r} E_r^{p+r,q-r+1}\big). \tag{1.3.1.5}$$

Pour $r = 0$, on a

$$E_0^{**} = \mathrm{Gr}_F^*(K^*). \tag{1.3.1.6}$$

Proposition (1.3.2). Soit K un complexe muni d'une filtration birégulière F. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) la suite spectrale définie par F dégénère ($E_1 = E_\infty$).

(ii) les morphismes $d : K^i \to K^{i+1}$ sont strictement compatibles aux filtrations.

Vérifions-le lorsque $\mathcal{A}$ est une catégorie de modules. Pour p et q fixés, l'hypothèse que les flèches d_r de sources les $E_r^{p,q}$ soient nulles pour $r \geq 1$ signifie que, si $x \in F^p(K^{p+q})$ vérifie $dx \in F^{p+1}(K^{p+q+1})$, alors il existe y dans K^{p+q} tel que $dy = 0$ et que x et y aient même image dans $E_1^{p,q}$. Modifiant y par un bord et posant $z = x - y$, on a alors

$$\forall x \in F^p(K^{p+q})\ \big(dx \in F^{p+1}(K^{p+q+1}) \Rightarrow \exists z \in F^{p+1}(K^{p+q}),\ dz = dx\big)$$

soit, en d'autres termes,

$$F^{p+1}(K^{p+q+1}) \cap dF^p(K^{p+q}) = dF^{p+1}(K^{p+q}). \tag{1}$$

Si cette condition est vérifiée quels que soient p et q, on a par récurrence sur r

$$F^{p+r} \cap dF^p = dF^{p+r},$$

ce qui, pour $p + r$ grand, s'écrit

$$F^p \cap dK = dF^p. \tag{2}$$

L'assertion (2) implique trivialement (i), et équivaut à (ii), ce qui prouve (1.3.2).

(1.3.3) Si (K, F) est un complexe filtré, on désignera par $\mathrm{Dec}(K)$ le complexe K muni de la filtration décalée

$$\mathrm{Dec}(F)^p K^n = Z_1^{p+n,-p}.$$

Cette filtration est compatible aux différentielles :

$$dZ_1^{p+n,-p} \subset F^{p+n+1}(K^{n+1}) \cap \mathrm{Ker}(d) \subset Z_\infty^{p+n+1,-p} \subset Z_1^{p+n+1,-p}.$$

Puisque

$$Z_1^{p+1+n,-p-1} \subset F^{p+1+n}(K^n) \subset B_1^{p+n,-p} \subset Z_1^{p+n,-p}, \tag{1.3.3.1}$$

la flèche évidente de $Z_1^{p+n,-p}/Z_1^{p+1+n,-p-1}$ dans $Z_1^{p+n,-p}/B_1^{p+n,-p}$ est un morphisme

$$u : E_0^{p,n-p}(\mathrm{Dec}\, K) \longrightarrow E_1^{p+n,-p}(K). \tag{1.3.3.2}$$

Proposition (1.3.4).

(i) Les morphismes (1.3.3.2) forment un morphisme de complexes gradués de $E_0(\mathrm{Dec}\, K)$ dans $E_1(K)$.

(ii) Ce morphisme induit un isomorphisme sur la cohomologie.

(iii) Il induit de proche en proche, via (1.3.1.5), des isomorphismes de complexes gradués

$$E_r(\mathrm{Dec}(K)) \xrightarrow{\sim} E_{r+1}(K) \qquad (r \geq 1).$$

Preuve. Soit F' la filtration de K définie par

$$F'^p(K^n) = \mathrm{Dec}(F)^{p-n}(K^n) = Z_1^{p,n-p}.$$

On a trivialement des isomorphismes, compatibles aux d_r et à (1.3.1.5),

$$E_r^{p,n-p}(\mathrm{Dec}\, K) = E_{r+1}^{p+n,-p}(K, F'). \tag{1.3.4.1}$$

L'application u se déduit de (1.3.4.1) et du morphisme identique

$$(K, F') \longrightarrow (K, F).$$

Ceci prouve (i), et il reste à vérifier que pour $r \geq 2$,

$$E_r^{p,q}(K, F') \simeq E_r^{p,q}(K, F).$$

On a en effet

$$Z_r^{p,q}(K, F') = Z_r^{p,q}(K, F) \qquad (r \geq 1),$$

et

$$Z_r^{p,q}(K, F') \cap B_r^{p,q}(K, F') = Z_r^{p,q}(K, F) \cap B_r^{p,q}(K, F) \qquad (r \geq 2),$$

et on applique (1.3.1.2).

(1.3.5) La construction (1.3.3) n'est pas autoduale. La construction duale consiste à définir

$$\mathrm{Dec}^*(F)^p K^n = B_1^{p+n-1,-p+1}.$$

On dispose alors de morphismes

$$E_0^{p,n-p}(\mathrm{Dec}\, K) \longrightarrow E_1^{p+n,p}(K) \longrightarrow E_0^{p,n-p}(\mathrm{Dec}^*\, K)$$

et, pour $r \geq 1$, d'isomorphismes

$$E_r^{p,n-p}(\mathrm{Dec}\, K) \xrightarrow{\sim} E_{r+1}^{p+n,p}(K) \xrightarrow{\sim} E_r^{p,n-p}(\mathrm{Dec}^*\, K).$$

Rappelons qu'un morphisme de complexes est appelé un quasi-isomorphisme s'il induit un isomorphisme sur la cohomologie.

Définition (1.3.6).

(i) Un morphisme $f : (K, F) \to (K', F')$ de complexes filtrés de filtration birégulière est un quasi-isomorphisme filtré si $\mathrm{Gr}_F(f)$ est un quasi-isomorphisme, i.e. si les $E_1^{p,q}(f)$ sont des isomorphismes.

(ii) Un morphisme $f : (K, F, W) \to (K', F', W')$ entre complexes bifiltrés biréguliers est un quasi-isomorphisme bifiltré si $\mathrm{Gr}_F \mathrm{Gr}_W(f)$ est un quasi-isomorphisme.

(1.3.7) Soit K un complexe différentiel d'objets de $\mathcal{A}$, muni de deux filtrations F et W. Soit $E_r^{p,q}$ la suite spectrale définie par W. La filtration F induit sur les $E_r^{p,q}$ diverses filtrations, qu'on se propose de comparer.

(1.3.8) La formule (1.3.1.2) identifie $E_r^{p,q}$ à un quotient d'un sous-objet de K^{p+q}. Le terme $E_r^{p,q}$ se trouve par là muni d'une filtration F_d induite par F, appelée la première filtration directe.

(1.3.9) Dualement, la formule (1.3.1.3) identifie $E_r^{p,q}$ à un sous-objet d'un quotient de K^{p+q}, d'où une nouvelle filtration F_{d*} induite par F, la seconde filtration directe.

Lemme (1.3.10). Sur E_0 et E_1, on a $F_d = F_{d*}$. Pour $r = 0$ ou 1, on a $B_r^{p,q} \subset Z_r^{p,q}$ et on applique (1.1.9).

(1.3.11) La formule (1.3.1.5) identifie $E_{r+1}^{p,q}$ à un quotient d'un sous-objet de $E_r^{p,q}$. On définit la filtration récurrente F_r des $E_r^{p,q}$ par les conditions :

(i) sur $E_0^{p,q}$, $F_r = F_d = F_{d*}$.

(ii) sur $E_{r+1}^{p,q}$, la filtration récurrente est celle induite par la filtration récurrente de $E_r^{p,q}$.

(1.3.12) Les définitions (1.3.8) et (1.3.9) gardent un sens pour $r = \infty$. Si la filtration de K est birégulière, les filtrations directes de $E_\infty^{p,q}$ coïncident avec celles de $E_r^{p,q} = E_\infty^{p,q}$ pour r assez grand, et on définit la filtration récurrente de $E_\infty^{p,q}$ comme coïncidant avec celle de $E_r^{p,q}$ pour r assez grand.

Les filtrations F et W induisent chacune une filtration de $H^*(K)$, et $E_\infty^{**} = \mathrm{Gr}_W^*(H^*(K))$. La filtration F de $H^*(K)$ induit dès lors sur $E_\infty^{p,q}$ une nouvelle filtration.

Proposition (1.3.13).

(i) Pour la première filtration directe, les morphismes d_r sont compatibles aux filtrations. Si $E_{r+1}^{p,q}$ est considéré comme quotient d'un sous-objet de $E_r^{p,q}$, alors la première filtration directe sur $E_{r+1}^{p,q}$ est plus fine que la filtration F' induite par la première filtration directe sur $E_r^{p,q}$: on a $F_d(E_{r+1}^{p,q}) \subset F'(E_{r+1}^{p,q})$.

(ii) Dualement, les morphismes d_r sont compatibles à la seconde filtration directe, et la seconde filtration directe sur $E_{r+1}^{p,q}$ est moins fine que la filtration induite par celle de $E_r^{p,q}$.

(iii) $F_d(E_r^{p,q}) \subset F_r(E_r^{p,q}) \subset F_{d*}(E_r^{p,q})$.

(iv) Sur $E_\infty^{p,q}$, la filtration induite par la filtration F de $H^*(K)$ (1.3.12) est plus fine que la première filtration directe et moins fine que la seconde.

(i) est évident, (ii) en est dual et (iii) s'en déduit par récurrence. La première assertion de (iv) est aisée à vérifier, la seconde en est duale.

(1.3.14) Désignons par $\mathrm{Dec}(K)$, respectivement $\mathrm{Dec}^*(K)$, le complexe K muni des filtrations $\mathrm{Dec}(W)$ et F, respectivement $\mathrm{Dec}^*(W)$ et F.

Il est clair sur (1.3.4.1) que l'isomorphisme (1.3.4) transforme la première filtration directe de $E_r(\mathrm{Dec}\, K)$ en la première filtration directe de $E_{r+1}(K)$, pour $r \geq 1$. L'isomorphisme dual (1.3.5) transforme la seconde filtration directe de $E_r(\mathrm{Dec}^*\, K)$ en la seconde filtration directe de $E_{r+1}(K)$.

Lemme (1.3.15). Si la filtration F est birégulière, et si, sur les $\mathrm{Gr}_W^p(K)$, les morphismes d sont strictement compatibles à la filtration induite par F, alors :

(i) le morphisme (1.3.3.2) de complexes gradués filtrés par F

$$u : \mathrm{Gr}_{\mathrm{Dec}(W)}(K) \longrightarrow E_1(K, W)$$

est un quasi-isomorphisme filtré;

(ii) dualement, le morphisme (1.3.5)

$$u : E_1(K, W) \longrightarrow \mathrm{Gr}_{\mathrm{Dec}^*(W)}(K)$$

est un quasi-isomorphisme filtré.

Il suffit, par dualité, de prouver (i). D'après (1.3.3) et (1.3.4), le complexe $E_1(K, W)$ filtré par F est un quotient du complexe filtré $\mathrm{Gr}_{\mathrm{Dec}(W)}(K)$. Soit U le complexe filtré noyau, acyclique d'après (1.3.4) (ii). La suite exacte longue de cohomologie associée à la suite exacte de complexes

$$0 \to \mathrm{Gr}_F(U) \to \mathrm{Gr}_F(\mathrm{Gr}_{\mathrm{Dec}(W)}(K)) \to \mathrm{Gr}_F(E_1(K, W)) \to 0$$

montre que u est un quasi-isomorphisme filtré si et seulement si $\mathrm{Gr}_F(U)$ est un complexe acyclique. D'après (1.3.2), et parce que U est acyclique, cela revient à demander que les différentielles de U soient strictement compatibles à la filtration F. De (1.3.3.1), on tire que U est somme sur p des complexes

$$(U^p)^n = B_1^{p+n,-p}/Z_1^{p+1+n,-p-1},$$

munis de la filtration induite par F.

Chaque différentielle d de chacun des complexes U^p s'insère dans un diagramme commutatif d'objets filtrés du type suivant, où, pour simplifier, on a omis d'indiquer le degré total ou complémentaire :



Par hypothèse, le morphisme (1) est strict. Le carré (2) n'étant autre que la décomposition canonique de (1), la flèche (3) est un isomorphisme filtré. Les flèches du trapèze (4) sont des isomorphismes; ce sont donc des isomorphismes filtrés, puisque (3) en est un. Que (5) soit un isomorphisme filtré signifie que d est strict. Ceci prouve (1.3.15).

Théorème (1.3.16). Soit K un complexe muni de deux filtrations W et F, la filtration F étant birégulière. Soit $r_0 \geq 0$ un entier, et supposons que, pour $0 \leq r < r_0$, les différentielles du complexe gradué $E_r(K, W)$ sont strictement compatibles à la filtration F_r. Alors, pour $r \leq r_0 + 1$, on a

$$F_d = F_r = F_{d*} \quad \text{sur } E_r^{p,q}.$$

On prouvera le théorème par récurrence sur r_0. Pour $r_0 = 0$, l'hypothèse est vide et on applique (1.3.10) et (1.3.13), (iii). Pour $r_0 \geq 1$, d'après l'hypothèse de récurrence, on a $F_d = F_r = F_{d*}$ sur $E_r^{p,q}$ pour $r \leq r_0$.

D'après (1.3.15), le morphisme $u : E_0(\mathrm{Dec}\, K) \to E_1(K)$ est un quasi-isomorphisme filtré. Il induit donc un isomorphisme filtré de $H^*(\mathrm{Dec}\, K)$ dans $H^*(E_1(K))$:

$$u : (E_1(\mathrm{Dec}\, K), F_r) \xrightarrow{\sim} (E_2(K), F_r).$$

De proche en proche, on en déduit que l'isomorphisme canonique de $E_s(\mathrm{Dec}\, K)$ dans $E_{s+1}(K)$ ($s \geq 1$) est un isomorphisme filtré, pour la filtration récurrente. Sur $E_1(\mathrm{Dec}(K))$, $F_r = F_d$ (1.3.10), et on sait déjà (1.3.14) que u' est un isomorphisme filtré

$$u' : (E_1(\mathrm{Dec}\, K), F_d) \xrightarrow{\sim} (E_2(K), F_d).$$

Sur $E_2(K)$, on a donc $F_d = F_r$. Ceci, joint au résultat dual, prouve (1.3.16) pour $r_0 = 1$.

Supposons que $r_0 \geq 2$. Alors, les flèches d_1 de $E_1(K)$ sont strictement compatibles aux filtrations, donc aussi les flèches d_0 de $E_0(\mathrm{Dec}\, K)$ (u induit en effet un isomorphisme de suites spectrales, et on applique le critère (1.3.2)).

Pour $0 < s < r_0 - 1$, l'isomorphisme $(E_s(\mathrm{Dec}\, K), F_r) \simeq (E_{s+1}(K), F_r)$ montre que les d_s sont strictement compatibles aux filtrations récurrentes. D'après l'hypothèse de récurrence, on a donc $F_d = F_r$ sur $E_s(\mathrm{Dec}\, K)$ pour $s \leq r_0$. L'isomorphisme $(E_s(\mathrm{Dec}\, K), F_d) \simeq (E_{s+1}(K), F_d)$ (1.3.13) montre alors que $F_d = F_r$ sur $E_r(K)$ pour $r \leq r_0 + 1$. Ceci, joint au résultat dual, prouve (1.3.16).

Corollaire (1.3.17). Sous les hypothèses générales de (1.3.16), supposons que, pour tout r, les différentielles d_r soient strictement compatibles aux filtrations récurrentes des E_r. Alors, sur E_∞, les filtrations F_d, F_r, F_{d*} coïncident, et coïncident avec la filtration induite par la filtration F de $H^*(K)$.

Ceci résulte aussitôt de (1.3.16) et (1.3.13) (iv).

1.4. Hypercohomologie de complexes filtrés.

Dans ce numéro, on rappelle quelques constructions standard en hypercohomologie. On n'utilise pas le langage des catégories dérivées, qui serait le plus naturel ici.

Dans tout le numéro, par « complexe », on entendra « complexe borné inférieurement ».

(1.4.1) Soit T un foncteur exact à gauche d'une catégorie abélienne $\mathcal{A}$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{B}$. On suppose que tout objet de $\mathcal{A}$ s'injecte dans un objet injectif; les foncteurs dérivés $R^iT : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ sont donc définis. Un objet A de $\mathcal{A}$ sera dit acyclique pour T si $R^iT(A) = 0$ pour $i > 0$.

(1.4.2) Soient (A, F) un objet filtré de filtration finie, et TF la filtration de TA par ses sous-objets TF^pA (ce sont des sous-objets car T est exact à gauche). Si $\mathrm{Gr}_F(A)$ est T-acyclique, alors les $F^p(A)$ sont T-acycliques en tant qu'extensions successives d'objets T-acycliques. L'image par T de la suite

$$0 \to F^{p+1}(A) \to F^p(A) \to \mathrm{Gr}^p(A) \to 0$$

est donc exacte, et

$$\mathrm{Gr}_{TF}\, TA \xrightarrow{\sim} T\,\mathrm{Gr}_F\, A. \tag{1.4.2.1}$$

(1.4.3) Soit A un objet muni de deux filtrations finies F et W telles que $\mathrm{Gr}_F \mathrm{Gr}_W A$ soit T-acyclique. Les objets $\mathrm{Gr}_F A$ et $\mathrm{Gr}_W A$ sont alors T-acycliques, ainsi que les $F^q(A) \cap W^p(A)$. Les suites

$$0 \to T(F^q \cap W^{p+1}) \to T(F^q \cap W^p) \to T\big((F^q \cap W^p)/(F^q \cap W^{p+1})\big) \to 0$$

sont donc exactes, et $T(F^q(\mathrm{Gr}^p_W(A)))$ est l'image dans $T(\mathrm{Gr}^p_W(A))$ de $T(F^p \cap W^q)$. Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} T(F^q \cap W^p) & \longrightarrow & T(F^q\,\mathrm{Gr}^p_W\, A) & \longrightarrow & T\,\mathrm{Gr}^p_W\, A \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ TF^q \cap TW^p & & \longrightarrow & & \mathrm{Gr}^p_{TW}\, TA \end{array}$$

montre alors que l'isomorphisme (1.4.2.1) relatif à W transforme la filtration $\mathrm{Gr}_{TW}(TF)$ en la filtration $T(\mathrm{Gr}_W(F))$.

(1.4.4) Soit K un complexe d'objets de $\mathcal{A}$. Les *objets d'hypercohomologie* $R^iT(K)$ se calculent comme suit :

a) On choisit un quasi-isomorphisme $i : K \to K'$, tel que les composantes de K' soient acycliques pour T. Par exemple, on peut prendre pour K' le complexe simple associé à une résolution injective de Cartan–Eilenberg de K.

b) On pose

$$R^iT(K) = H^i(T(K')).$$

On vérifie que $R^iT(K)$ ne dépend pas du choix de K', dépend fonctoriellement de K, et qu'un quasi-isomorphisme $f : K_1 \to K_2$ induit des *isomorphismes*

$$R^iT(f) : R^iT(K_1) \longrightarrow R^iT(K_2).$$

(1.4.5) Soit F une filtration birégulière de K. Une *résolution filtrée T-acyclique* de K est un quasi-isomorphisme filtré $i : K \to K'$ de K dans un complexe filtré birégulier tel que les $\mathrm{Gr}^p(K'^n)$ soient acycliques pour T. Si K' est une telle résolution, les K'^n sont acycliques pour T et le complexe filtré (cf. (1.4.2)) $T(K')$ définit une suite spectrale

$$E_1^{p,q} = R^{p+q}T(\mathrm{Gr}^p\, K) \Rightarrow R^{p+q}T(K).$$

Celle-ci est indépendante du choix de K'. On l'appelle la *suite spectrale d'hypercohomologie du complexe filtré* K. Elle dépend fonctoriellement de K et un quasi-isomorphisme filtré induit un isomorphisme de suites spectrales.

Les différentielles d_1 de cette suite spectrale sont les morphismes de connexion définis par les suites exactes courtes

$$0 \to \mathrm{Gr}^{p+1}\, K \to F^pK/F^{p+2}K \to \mathrm{Gr}^p\, K \to 0.$$

(1.4.6) Soit K un complexe. On désigne par $\tau_{\leq p}(K)$ le sous-complexe suivant :

$$\tau_{\leq p}(K)^n = \begin{cases} K^n & \text{pour } n < p \\ \mathrm{Ker}(d) & \text{pour } n = p \\ 0 & \text{pour } n > p. \end{cases}$$

La *filtration*, dite *canonique*, de K par les $\tau_{\leq p}(K)$ se déduit par décalage de la filtration triviale G pour laquelle $G^0(K) = K$ et $G^1(K) = 0$. On a, pour la filtration canonique,

$$\begin{aligned} E_1^{p,q} &= 0 \quad \text{si } p+q \neq -p \\ H^{-p} &\qquad \text{si } p+q = -p. \end{aligned}$$

Un quasi-isomorphisme $f : K \to K'$ est automatiquement un quasi-isomorphisme filtré pour les filtrations canoniques.

(1.4.7) Les sous-complexes $\sigma_{\geq p}(K)$ de K :

$$\sigma_{\geq p}(K)^n = \begin{cases} 0 & \text{si } n < p \\ K^n & \text{si } n \geq p \end{cases}$$

définissent une filtration birégulière, la *filtration bête* de K.

Les suites spectrales d'hypercohomologie attachées aux filtrations bête ou canonique de K sont les deux *suites spectrales d'hypercohomologie* de K.

Exemple (1.4.8). — Soit $f : X \to Y$ une application continue entre espaces topologiques et soit $\mathcal{F}$ un faisceau abélien sur X. Soit $\mathcal{F}^*$ une résolution de $\mathcal{F}$ par des faisceaux f_*-acycliques. On a $R^i f_* \mathcal{F} \simeq \mathcal{H}^i(f_* \mathcal{F}^*)$. Prenons pour foncteur T le foncteur $\Gamma(Y, \cdot)$. La suite spectrale d'hypercohomologie du complexe $f_* \mathcal{F}^*$ muni de sa filtration canonique (1.4.6)

$$E_1^{p,q} = H^{2p+q}(Y, R^{-p} f_* \mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

n'est autre, à la renumérotation $E_r^{p,q} \mapsto E_{r+1}^{2p+q,-p}$ près que la *suite spectrale de Leray* pour f et $\mathcal{F}$.

(1.4.9) Soit (K, W, F) un complexe bifiltré birégulier. À ce complexe, on associe :

a) Une suite spectrale

$$ {}_W E_1^{p,n-p} = H^n(\mathrm{Gr}_W^p(K)) \Rightarrow H^n(K),$$

de différentielles ${}_W d_1$ les morphismes de connexion déduits des suites exactes courtes

$$0 \to \mathrm{Gr}_W^{p+1}(K) \to W^p(K)/W^{p+2}(K) \to \mathrm{Gr}_W^p(K) \to 0;$$

b) Une suite spectrale analogue pour la filtration F;

c) Des carrés exacts

$$\begin{array}{ccccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Gr}_F^{p+1}\mathrm{Gr}_W^{q+1} K & \longrightarrow & F^p/F^{p+2}(\mathrm{Gr}_W^{q+1} K) & \longrightarrow & \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^{q+1} K & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Gr}_F^{p+1}(W^q/W^{q+2}(K)) & \longrightarrow & F^p/F^{p+2}(W^q/W^{q+2}(K)) & \longrightarrow & \mathrm{Gr}_F^p(W^q/W^{q+2}(K)) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Gr}_F^{p+1}\mathrm{Gr}_W^q K & \longrightarrow & F^p/F^{p+2}\mathrm{Gr}_W^q K & \longrightarrow & \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_W^q K & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & 0 & & 0 & & 0 & & \end{array}$$

Les lignes et colonnes extérieures de ce carré définissent des morphismes de connexion

$$ {}_{F,W}d_1 : H^n \operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^q K \longrightarrow H^{n+1} \operatorname{Gr}_F^{p+1} \operatorname{Gr}_W^q K, $$

$$ {}_{W,F}d_1 : H^n \operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^q K \longrightarrow H^{n+1} \operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^{q+1} K. $$

Ces morphismes vérifient

$$ {}_{FW}d_1 \circ {}_{WF}d_1 + {}_{WF}d_1 \circ {}_{FW}d_1 = 0 $$
$$ {}_{FW}d_1^2 = 0 \qquad {}_{WF}d_1^2 = 0. $$

Les morphismes ${}_{FW}d_1$ sont les morphismes d_1 des suites spectrales $E^{(q)}$, de terme $E_1^{(q)p,n-p}$ égal à

$$ E_1^{p,q,n-p-q} \underset{\text{dfn}}{=} H^n(\operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^q K) \Rightarrow H^n(\operatorname{Gr}_W^q K) = {}_W E_1^{q,n-q}, \tag{1.4.9.1} $$

définie par le complexe filtré $\operatorname{Gr}_W^q(K)$. Cette suite spectrale aboutit à la filtration induite par F sur $H^* \operatorname{Gr}_W^q K$. De même, les ${}_{WF}d_1$ sont les d_1 des suites spectrales de mêmes termes initiaux

$$ E_1^{p,q,n-p-q} = H^n(\operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^q K) \Rightarrow H^n(\operatorname{Gr}_F^p K). \tag{1.4.9.2} $$



Ces constructions sont symétriques en F et W, *via* l'isomorphisme

$$ \operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^q \simeq \operatorname{Gr}_W^q \operatorname{Gr}_F^p . $$

(1.4.10) On peut encore interpréter les ${}_{W,F}d_1$ comme les morphismes initiaux d'un morphisme de suites spectrales (1.4.9.2), aboutissant à ${}_W d_1$. Soit en effet C^q le cône du morphisme

$$ W^q(K)/W^{q+2}(K) \longrightarrow \operatorname{Gr}_W^q(K). $$

Dans le diagramme

$$ \Sigma : \operatorname{Gr}_W^{q+1}(K)[1] \xrightarrow{u} C^q \xleftarrow{i} \operatorname{Gr}_W^q(K), $$

u est un quasi-isomorphisme, et on a

$$ {}_W d_1 = H(u)^{-1} \circ H(i). $$

En fait, u est même un quasi-isomorphisme filtré (pour F), et la construction précédente définit un morphisme de la suite spectrale définie par $(\operatorname{Gr}_W^q(K), F)$ dans celle définie par $(\operatorname{Gr}_W^{q+1}(K)[1], F)$, morphisme qui aboutit à ${}_W d_1$. Le terme initial de ce morphisme, déduit de $\operatorname{Gr}_F(\Sigma)$, n'est autre que ${}_{W,F}d_1$.

(1.4.11) Ces constructions passent telles quelles à l'hypercohomologie. Soit en effet K un complexe muni de deux filtrations birégulières F et W.

Une *résolution T-acyclique bifiltrée* de K est un quasi-isomorphisme bifiltré $i : K \to K'$ tel que les $\operatorname{Gr}_F^p \operatorname{Gr}_W^n(K'^m)$ soient T-acycliques. Il en existe toujours. Dans le cas particulier où $\mathcal{A}$ est la catégorie des faisceaux de A-modules sur un espace topologique X, et où T est le foncteur Γ de $\mathcal{A}$ dans les A-modules, un exemple de résolution T-acyclique bifiltrée de K est le complexe simple associé au complexe double résolution de Godement $\mathcal{C}^*(K)$ de K, filtré par les $\mathcal{C}^*(F^p(K))$ et par les $\mathcal{C}^*(W^n(K))$. Puisque $\mathcal{C}^*$ est exact, on a en effet

$$ \operatorname{Gr}_F \operatorname{Gr}_W(\mathcal{C}^*(K)) \simeq \mathcal{C}^*(\operatorname{Gr}_F \operatorname{Gr}_W(K)). $$

On n'aura besoin ici d'aucun autre cas.

Si K' est une résolution bifiltrée T-acyclique de K, le complexe TK' est filtré par les TF^pK' et par les TW^qK' (1.4.3). De plus, $\mathrm{Gr}^n_W(K')$ est une résolution filtrée (pour F) T-acyclique de $\mathrm{Gr}^n_W(K)$, $\mathrm{Gr}^n_F(K')$ est une résolution filtrée (pour W) T-acyclique de $\mathrm{Gr}^n_F(K)$, $\mathrm{Gr}^n_F\,\mathrm{Gr}^m_W(K')$ est une résolution T-acyclique de $\mathrm{Gr}^n_F\,\mathrm{Gr}^m_W(K)$, et

$$T\,\mathrm{Gr}_F\,K' \approx \mathrm{Gr}_F\,TK' \qquad \text{(comme complexe } W\text{-filtré)}$$
$$T\,\mathrm{Gr}_W\,K' \approx \mathrm{Gr}_W\,TK' \qquad \text{(comme complexe } F\text{-filtré)}$$
$$T\,\mathrm{Gr}_F\,\mathrm{Gr}_W\,K' \approx \mathrm{Gr}_F\,\mathrm{Gr}_W\,TK'.$$

Lemme (1.4.12). — Sous les hypothèses de (1.4.11) :

(i) Les termes initiaux des suites spectrales d'hypercohomologie

$$_WE_1^{q,n-q} = R^nT(\mathrm{Gr}^q_W\,K) \Rightarrow R^nT(K) \tag{1}$$

$$_FE_1^{p,n-p} = R^nT(\mathrm{Gr}^p_F\,K) \Rightarrow R^nT(K) \tag{2}$$

sont aboutissements des suites spectrales d'hypercohomologie des complexes filtrés $\mathrm{Gr}^q_W\,K$ et $\mathrm{Gr}^p_F\,K$, de terme E_1 donné par

$$E_1^{p,q,n-p-q} \underset{\text{dfn}}{=} R^nT(\mathrm{Gr}^p_F\,\mathrm{Gr}^q_W\,K) \Rightarrow {}_WE_1^{q,n-q} \qquad (q \text{ fixe}) \tag{3}$$

$$E_1^{p,q,n-p-q} \underset{\text{dfn}}{=} R^nT(\mathrm{Gr}^p_F\,\mathrm{Gr}^q_W\,K) \Rightarrow {}_FE_1^{p,n-p} \qquad (p \text{ fixe}). \tag{4}$$

(ii) La filtration de $_WE_1^{p,n-p}$, aboutissement de la suite spectrale (3), est la filtration de $_WE_1^{p,n-p}(TK')$ induite par la filtration F de TK'.

(iii) Pour que les différentielles des complexes $\mathrm{Gr}^n_W(T(K))$ soient strictement compatibles à la filtration F, il faut et il suffit que les suites spectrales d'hypercohomologie (3) dégénèrent au terme E_1.

(iv) Les morphismes d_1 de la suite spectrale (4) sont les termes initiaux de morphismes de degré 1 de suites spectrales (3) aboutissant aux morphismes d_1 de la suite spectrale (1).

Les assertions (i) et (iv) résultent de (1.4.9) et (1.4.10) appliquées à TK', *via* les isomorphismes (1.4.11). L'assertion (ii) est alors triviale sur la définition de la filtration récurrente F (identique aux filtrations directes par (1.3.10) et (1.3.13) (iii)) et l'assertion (iii) résulte de (1.3.2).

2. Structures de Hodge

2.1. Structures pures.

(2.1.1) Dans toute la suite, on désignera par $\mathbb{C}$ une clôture algébrique de $\mathbb{R}$: on ne suppose pas avoir choisi une racine i de l'équation $x^2+1=0$. La théorie sera invariante par conjugaison complexe (cf. (2.1.14)).

(2.1.2) On désignera par S le groupe algébrique réel $\mathbb{C}^*$, déduit par restriction des scalaires à la Weil de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}$ du groupe $\mathbb{G}_m$:

$$S = \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} \mathbb{G}_m.$$
$$S(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*.$$

Le groupe S est un tore, i.e. est connexe et de type multiplicatif. Il est donc décrit par le groupe abélien libre de type fini

$$X(S) = \mathrm{Hom}(S_{\mathbb{C}}, \mathbb{G}_m) = \mathrm{Hom}(S, \mathbb{G}_m)(\mathbb{C})$$

de ses caractères complexes, muni de l'action de $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \mathbb{Z}/(2)$.

Le groupe $X(S)$ a pour générateurs z et $\bar{z}$, induisant respectivement l'identité et la conjugaison complexe :

$$\mathbb{C}^* = S(\mathbb{R}) \longrightarrow S(\mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{G}_m(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*.$$

La conjugaison complexe échange z et $\bar{z}$.

(2.1.3) On dispose d'une application canonique

$$w : \mathbb{G}_m \longrightarrow S \tag{2.1.3.1}$$

qui, sur les points réels, induit l'inclusion de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{C}^*$. On a

$$zw = \bar{z}w = \mathrm{Id}\,. \tag{2.1.3.2}$$

On dispose aussi d'une application

$$N : S \longrightarrow \mathbb{G}_m \tag{2.1.3.3}$$

qui, sur les points réels, s'identifie à la norme $N_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} : \mathbb{C}^* \to \mathbb{R}^*$. On a

$$N = z\bar{z} \tag{2.1.3.4}$$

et

$$N \circ w = (x \mapsto x^2). \tag{2.1.3.5}$$

Définition (2.1.4). — *Une structure de Hodge réelle est un vectoriel réel V de dimension finie muni d'une action du groupe algébrique réel S.*

(2.1.5) D'après la théorie générale des groupes de type multiplicatif, il revient au même de se donner une structure de Hodge réelle sur V, ou de se donner une bigraduation V^{pq} de $V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V$ qui vérifie $\overline{V^{pq}} = V^{qp}$. L'action de S et la bigraduation se déterminent mutuellement *via* la condition:

$$\text{Sur } V^{pq}, \quad S \text{ agit par multiplication par } z^p \bar{z}^q. \tag{2.1.5.1}$$

(2.1.6) Soit $(\mathbb{C}, \times)$ le monoïde multiplicatif, et soit

$$\overline{S} = \prod_{\mathbb{C}/\mathbb{R}} (\mathbb{C}, \times).$$

Si V est un vectoriel réel, on vérifie qu'il revient au même de se donner une action de $\overline{S}$ sur V ou de se donner sur V une bigraduation telle que $\overline{V^{pq}} = V^{qp}$ et $V^{pq} = 0$ pour $p < 0$ ou $q < 0$.

(2.1.7) Soit V une structure de Hodge réelle, définie par une représentation σ de S et une bigraduation V^{pq}. La graduation de $V_{\mathbb{C}}$ par les $V^n_{\mathbb{C}} = \sum_{p+q=n} V^{pq}$ est alors définie sur $\mathbb{R}$. On l'appelle la *graduation par le poids*. Sur $V^n = V \cap V^n_{\mathbb{C}}$, la représentation σw de $\mathbb{G}_m$ est la multiplication par x^n.

On dira que V est *de poids n* si $V^{pq} = 0$ pour $p + q \neq n$, i.e. si σw est la multiplication par x^n.

(2.1.8) Soit V une structure de Hodge réelle. La *filtration de Hodge* sur $V_{\mathbb{C}}$ est définie par

$$F^p(V_{\mathbb{C}}) = \sum_{p' \geq p} V^{p'q'}.$$

D'après (1.2.6), on a

Proposition (2.1.9). — *Soit n un entier. La construction (2.1.8) établit une équivalence de catégories entre:*

a) la catégorie des structures de Hodge réelles de poids n;

b) la catégorie des couples formés d'un vectoriel réel de dimension finie V et d'une filtration F sur $V_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} V$ qui soit n-opposée à sa complexe conjuguée $\overline{F}$.

Définition (2.1.10). — *Une structure de Hodge H, de poids n, consiste en*

a) un $\mathbb{Z}$-module de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ (le «réseau entier»);

b) une structure de Hodge réelle de poids n sur $H_{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{Z}} H_{\mathbb{Z}}$.

(2.1.11) Un morphisme $f : H \to H'$ est un homomorphisme $f : H_{\mathbb{Z}} \to H'_{\mathbb{Z}}$ tel que $f_{\mathbb{R}} : H_{\mathbb{R}} \to H'_{\mathbb{R}}$ soit compatible à l'action de S (i.e. tel que $f_{\mathbb{C}}$ soit compatible à la bigraduation, ou à la filtration de Hodge).

Les structures de Hodge de poids n forment une catégorie abélienne. Si H est de poids n et H' de poids n', on définit une structure de Hodge $H \otimes H'$ de poids $n + n'$ par les formules:

a) $(H \otimes H')_{\mathbb{Z}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes H'_{\mathbb{Z}}$;

b) l'action de S sur $(H \otimes H')_{\mathbb{R}} = H_{\mathbb{R}} \otimes H'_{\mathbb{R}}$ est produit tensoriel des actions de S sur $H_{\mathbb{R}}$ et $H'_{\mathbb{R}}$.

La bigraduation (resp. la filtration de Hodge) de $(H \otimes H')_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{C}} \otimes H'_{\mathbb{C}}$ est le produit tensoriel des bigraduations (resp. des filtrations de Hodge (cf. (1.1.12))) de $H_{\mathbb{C}}$ et $H'_{\mathbb{C}}$.

On définit de façon analogue la structure de Hodge $\mathrm{Hom}(H, H')$ (de poids $n' - n$), les structures de Hodge $\bigwedge^p H$ (de poids pn), et la structure de Hodge H^* duale de H.

Le «*Hom* interne» précédent, et le groupe des homomorphismes, sont liés par la *Remarque* **(2.1.11.1).** — $\mathrm{Hom}(H, H')$ est le sous-groupe de

$$\mathrm{Hom}(H, H')_{\mathbb{Z}} = \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_{\mathbb{Z}}, H'_{\mathbb{Z}})$$

formé des éléments de type $(0, 0)$.

Les actions de S sur $H_{\mathbb{R}}$, $H'_{\mathbb{R}}$ et $\mathrm{Hom}(H, H')_{\mathbb{R}} = \mathrm{Hom}(H_{\mathbb{R}}, H'_{\mathbb{R}})$ sont en effet liées par

$$s(f(x)) = s(f)(s(x)).$$

Que f soit de type $(0, 0)$, i.e. invariant par S, signifie donc qu'il commute à l'action de S.

(2.1.12) Pour A un sous-anneau noethérien de $\mathbb{R}$, on définit une *A-structure de Hodge de poids n* comme étant formée d'un A-module de type fini H_A et d'une structure de Hodge réelle de poids n sur $H_{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \otimes_A H_A$. Ces définitions sont surtout utilisées pour $A = \mathbb{Q}$. Une A-structure de Hodge consiste en un A-module de type fini H_A et en une structure de Hodge réelle sur $H_{\mathbb{R}} = H_A \otimes_A \mathbb{R}$, telle que la graduation par le poids soit définie sur le corps des fractions de A.

Définition (2.1.13). — *La structure de Hodge de Tate $\mathbb{Z}(1)$ est la structure de Hodge de poids -2, de rang 1, purement de bidegré $(-1, -1)$, de réseau entier $2\pi i\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$.*

L'action de S est donc la multiplication par l'inverse de la norme (2.1.3.3). Pour $n \in \mathbb{Z}$, on définit $\mathbb{Z}(n)$ comme étant la $n^{\text{ième}}$ puissance tensorielle de $\mathbb{Z}(1)$: $\mathbb{Z}(n)$ est la structure de Hodge de poids $-2n$, de rang 1, purement de bidegré $(-n, -n)$, de réseau entier $(2\pi i)^n\mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$. L'action de S est la multiplication par $N(x)^{-n}$.

(2.1.14) Le choix dans $\mathbb{C}$ d'une solution i de l'équation $x^2 + 1 = 0$ détermine sur chaque variété complexe X purement de dimension n une orientation $\mathrm{or}_i(X)$. Quand on change i en $-i$, on a

$$\mathrm{or}_{-i}(X) = (-1)^n \, \mathrm{or}_i(X).$$

Le choix de i définit aussi un élément C d'ordre 4 dans $S(\mathbb{R})$: l'image de i par l'isomorphisme $S(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{C}^*$.

Il définit enfin un isomorphisme entre $\mathbb{Z}$ et le réseau entier de $\mathbb{Z}(n)$: la multiplication par $(2\pi i)^n$.

Quand i, une orientation de X, C, ou une identification $\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}(n)_{\mathbb{Z}}$ figureront dans une formule, il sera en principe entendu qu'ils sont subordonnés à un même choix de i, et qu'en changeant i en $-i$, on trouverait une définition ou formule équivalente.

Définition (2.1.15). — *Une polarisation d'une structure de Hodge H de poids n est un homomorphisme*

$$(x, y) : H \otimes H \longrightarrow \mathbb{Z}(-n)$$

tel que la forme bilinéaire réelle $(2\pi i)^n(x, Cy)$ sur $H_{\mathbb{R}}$ soit symétrique et définie positive.

(2.1.16) La *structure de Hodge réelle de Tate* est la structure de Hodge réelle $\mathbb{R}(1)$ sous-jacente à $\mathbb{Z}(1)$. On définit de même $\mathbb{R}(n)$ sous-jacente à $\mathbb{Z}(n)$. Une polarisation d'une structure de Hodge *réelle* H de poids n est un homomorphisme

$$(x, y) : H \otimes H \longrightarrow \mathbb{R}(-n)$$

tel que la forme bilinéaire réelle $(2\pi i)^n(x, Cy)$ sur $H_{\mathbb{R}}$ soit symétrique et définie positive. Une polarisation est entièrement définie par la forme quadratique définie positive $(2\pi i)^n(x, Cy)$ sur $H_{\mathbb{R}}$, soumise à la seule condition d'être invariante par le sous-tore compact de S, noyau de N.

On a

$$(x, y) = (Cx, Cy) = (y, C^2x) = (-1)^n(y, x).$$

La forme (x, y) est donc symétrique ou alternée selon la parité de n.

(2.1.17) Le lecteur généralisera ces définitions aux A-structures de Hodge de poids n (2.1.12).

2.2. La théorie de Hodge.

(2.2.1) Soit X une variété kählérienne compacte, par exemple projective lisse. D'après le lemme de Poincaré holomorphe, le complexe de De Rham Ω_X^* est une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$. On a donc un isomorphisme

$$H^*(X, \mathbb{C}) \sim \mathbb{H}^*(X, \Omega_X^*),$$

et la filtration bête de Ω_X^* (1.4.5) définit la suite spectrale d'hypercohomologie

(2.2.1.1) $$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_X^p) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathbb{C}),$$

d'aboutissement la *filtration de Hodge* de $H^*(X, \mathbb{C})$.

D'après la théorie de Hodge [9], [12], on a:

(A) La suite spectrale (2.2.1.1) est dégénérée: $E_1 = E_\infty$.

(B) La filtration de Hodge de $H^n(X, \mathbb{C})$ est n-opposée à la filtration complexe conjuguée.

(2.2.2) Soit V un système local de vectoriels réels sur X, i.e. un faisceau de $\mathbb{R}$-vectoriels localement isomorphe à un faisceau constant $\mathbb{R}^n$. Supposons qu'il existe sur V une forme bilinéaire

$$Q : V \otimes V \longrightarrow \mathbb{R}$$

localement constante et *définie*. Pour X connexe, tel est le cas si V est défini par une représentation d'un quotient fini du groupe fondamental de X.

Les points (A) et (B) ci-dessus restent valables tels quels, sans qu'il faille rien changer aux démonstrations, pour la cohomologie à coefficients dans $V_{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$: la suite spectrale

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_X^p(V)) \Rightarrow H^{p+q}(X, V_{\mathbb{C}})$$

déduite de la résolution de De Rham de $V_{\mathbb{C}}$ par $\Omega_X^*(V_{\mathbb{C}})$ dégénère, et aboutit à une filtration sur $H^n(X, V_{\mathbb{C}})$ n-opposée à la filtration complexe conjuguée.

Le vectoriel $H^n(X, V)$ est donc muni d'une structure de Hodge réelle de poids n canonique.

(2.2.3) On montre dans [2] que les énoncés (2.2.1) restent valables pour X une variété algébrique complète non singulière, non nécessairement kählérienne. La démonstration de *loc. cit.*, basée sur une réduction au cas projectif *via* le lemme de Chow et la résolution des singularités, s'étend au cadre (2.2.2).

(2.2.4) Soit $\mathcal{L}$ un faisceau inversible. Voici deux façons de définir la classe $c_1(\mathcal{L})$.

(2.2.4.1) Le faisceau $\mathcal{L}$ définit un élément c dans $H^1(X, \mathcal{O}^*)$. Son image par $df/f : \mathcal{O}^* \to \Omega_X^1$ se trouve dans $H^1(X, \Omega_X^1)$. Plus précisément, df/f définit un morphisme de complexes

$$d\log : \mathcal{O}^*[-1] \longrightarrow [\,0 \to \Omega_X^1 \to \Omega_X^2 \to \cdots] = \sigma_{\geq 1}(\Omega_X^*).$$

Ce complexe s'envoie dans Ω_X^*, d'où

$$d\log : \mathcal{O}^*[-1] \longrightarrow \Omega_X^*,$$

et l'image de c par $d\log$ est dans $H^2(\Omega_X^*)$. Cette construction garderait un sens pour une variété algébrique sur un corps k quelconque. Pour $k = \mathbb{C}$, on a de plus

$$H^2(X, \mathbb{C}) \sim H^2(X, \Omega_X^*)$$

d'où une classe $$c_1'(\mathcal{L}) \in H^2(X, \mathbb{C}).$$

(2.2.4.2) La suite exacte exponentielle

$$0 \to \mathbb{Z}(1) \to \mathcal{O} \to \mathcal{O}^* \to 0$$

définit un homomorphisme

$$\partial : H^1(X, \mathcal{O}^*) \longrightarrow H^2(X, \mathbb{Z}(1)),$$

d'où une classe $\partial c = c_1''(\mathcal{L}) \in H^2(X, \mathbb{Z}(1))$.
Si i est choisi, cette classe s'identifie à

$$c_1'''(\mathcal{L}) \in H^2(X, \mathbb{Z}),$$

et pour $\mathcal{L} = \mathcal{O}(D)$, $c_1'''(\mathcal{L})$ n'est autre que la classe de cohomologie entière définie par D (les orientations étant définies par i).

(2.2.5) Prouvons que:

(2.2.5.1) Pour α l'injection naturelle de $\mathbb{Z}(1)$ dans $\mathbb{C}$, on a

$$-\alpha c_1''(\mathcal{L}) = c_1'(\mathcal{L}).$$

(2.2.5.2) Pour β l'injection naturelle de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{C}$, on a

$$-\beta c_1'''(\mathcal{L}) = \frac{1}{2\pi i} c_1'(\mathcal{L}).$$

On le vérifie en contemplant le diagramme de complexes suivant, dans lequel $\simeq$ désigne un quasi-isomorphisme, et dont le rectangle supérieur est anticommutatif à homotopie près

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbb{C} & \xrightarrow{\simeq} & \Omega_X^* & \longleftarrow & \sigma_{\geq 1}\Omega^* \\
\| & & & & \| \\
\mathbb{C} & \longleftarrow & [\mathbb{C} \to \mathcal{O}] & \xrightarrow[d]{\simeq} & \sigma_{\geq 1}\Omega^* \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle d\log} \\
\mathbb{Z}(1) & \longleftarrow & [\mathbb{Z}(1) \to \mathcal{O}] & \xrightarrow[\exp]{\simeq} & \mathcal{O}^*[-1]
\end{array}$$

(2.2.6) Soit X une variété projective non singulière purement de dimension n. Un choix de i définit une orientation de X et un isomorphisme $\mathbb{Z}(1) \simeq \mathbb{Z}$. Le morphisme trace correspondant:

$$H^{2n}(X, \mathbb{Z}(n)) \longrightarrow \mathbb{Z}$$

qui s'en déduit ne dépend pas du choix de i.

D'après Hodge, pour $i \leq n$, le morphisme

$$L^{n-i} = \wedge c_1''(\mathcal{O}(1))^{n-i} : H^i(X, \mathbb{Z}) \longrightarrow H^{2n-i}(X, \mathbb{Z}(n-i)),$$

est un isomorphisme et, combiné à la dualité de Poincaré

$$H^i(X, \mathbb{Z}) \otimes H^{2n-i}(X, \mathbb{Z}(n-i)) \longrightarrow H^{2n}(X, \mathbb{Z}(n-i)) \longrightarrow \mathbb{Z}(-i),$$

il fournit une polarisation sur la *partie primitive* $\mathrm{Ker}(L^{n-i+1})$ de $H^i(X, \mathbb{Z})$. On en déduit que les structures de Hodge rationnelles $H^i(X, \mathbb{Q})$ sont polarisables.

2.3. Structures mixtes.

Définition (2.3.1). — *Une structure de Hodge mixte H consiste en :*

a) un $\mathbb{Z}$-module de type fini $H_\mathbb{Z}$ (le «réseau entier»).

b) une filtration finie croissante W_n de $H_\mathbb{Q} = \mathbb{Q} \otimes_\mathbb{Z} H_\mathbb{Z}$, appelée la filtration par le poids.

c) une filtration finie F^p de $H_\mathbb{C} = \mathbb{C} \otimes_\mathbb{Z} H_\mathbb{Z}$, appelée la filtration de Hodge.

On exige que sur $H_\mathbb{C}$, la filtration $W_\mathbb{C}$ déduite de W par extension des scalaires, la filtration F et sa complexe conjuguée $\overline{F}$ forment un système $(W_\mathbb{C}, F, \overline{F})$ de trois filtrations opposées ((1.2.7) et (1.2.13)).

(2.3.2) Désignons encore par W la filtration de $H_{\mathbb{Z}}$ image réciproque de la filtration W de $H_{\mathbb{Q}}$. L'axiome des structures de Hodge mixtes signifie que, pour chaque n, la filtration F induit sur $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathrm{Gr}_n^W(H_{\mathbb{Z}})$ une filtration n-opposée à sa complexe conjuguée. D'après (2.1.9), $\mathrm{Gr}_n^W(H_{\mathbb{Z}})$ se trouve muni d'une structure de Hodge de poids n, de filtration de Hodge induite par F.

Exemple (2.3.3). — Si H est une structure de Hodge de poids n, on définit une structure de Hodge mixte de même réseau entier et de même filtration de Hodge en posant

$$W_i(H_{\mathbb{Q}}) = 0 \quad \text{pour } i < n \qquad \text{et} \qquad W_i(H_{\mathbb{Q}}) = H_{\mathbb{Q}} \quad \text{pour } i \geq n.$$

(2.3.4) Un *morphisme* $f : H \to H'$ de structures de Hodge est un homomorphisme $f : H_{\mathbb{Z}} \to H'_{\mathbb{Z}}$ compatible aux filtrations W et F (et donc compatible à $\overline{F}$). On déduit aussitôt de (1.2.10) le théorème suivant.

Théorème (2.3.5). —

(i) La catégorie des structures de Hodge mixtes est abélienne.

(ii) Le noyau (resp. conoyau) d'un morphisme $f : H \to H'$ a pour réseau entier le noyau (resp. conoyau) K de $f : H_{\mathbb{Z}} \to H'_{\mathbb{Z}}$, $K \otimes \mathbb{Q}$ et $K \otimes \mathbb{C}$ étant munis des filtrations induites (resp. quotients) des filtrations W et F de $H_{\mathbb{Q}}$ et $H_{\mathbb{C}}$ (resp. de $H'_{\mathbb{Q}}$ et $H'_{\mathbb{C}}$).

(iii) Tout morphisme $f : H \to H'$ est strictement compatible à la filtration W de $H_{\mathbb{Q}}$ et $H'_{\mathbb{Q}}$, et à la filtration F de $H_{\mathbb{C}}$ et $H'_{\mathbb{C}}$. Il induit des morphismes de $\mathbb{Q}$-structures de Hodge :

$$\mathrm{Gr}_n^W(f) : \mathrm{Gr}_n^W(H_{\mathbb{Q}}) \longrightarrow \mathrm{Gr}_n^W(H'_{\mathbb{Q}})$$

et des morphismes strictement compatibles à la filtration induite par $W_{\mathbb{C}}$:

$$\mathrm{Gr}_F^p(f) : \mathrm{Gr}_F^p(H_{\mathbb{C}}) \longrightarrow \mathrm{Gr}_F^p(H'_{\mathbb{C}}).$$

(iv) Le foncteur Gr_n^W est un foncteur exact de la catégorie des structures de Hodge mixtes dans la catégorie des $\mathbb{Q}$-structures de Hodge de poids n.

(v) Le foncteur Gr_F^p est exact.

(2.3.6) Soit H une structure de Hodge mixte. Les $W_n(H_{\mathbb{Z}})$, munis des filtrations induites par W et F, forment alors des sous-structures de Hodge mixtes $W_n(H)$ de H. Le quotient $W_n(H)/W_{n-1}(H)$ s'identifie à $\mathrm{Gr}_n^W(H_{\mathbb{Z}})$, muni de sa structure de Hodge (2.3.2), (2.3.3). Cette structure de Hodge se notera $\mathrm{Gr}_n^W(H)$.

(2.3.7) On pose $H^{pq} = \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\overline{F}}^q \mathrm{Gr}_{p+q}^W(H_{\mathbb{C}}) = \big(\mathrm{Gr}_{p+q}^W(H)\big)^{p,q}$. Les *nombres de Hodge* de H sont les entiers

$$h^{pq} = \dim_{\mathbb{C}} H^{pq}.$$

Le nombre de Hodge h^{pq} de H est donc le nombre de Hodge h^{pq} de la structure de Hodge $\mathrm{Gr}_{p+q}^W(H)$.

(2.3.8) On définit une $\mathbb{Q}$-*structure de Hodge mixte* H comme consistant en un vectoriel de dimension finie $H_{\mathbb{Q}}$ sur $\mathbb{Q}$, une filtration finie croissante W de $H_{\mathbb{Q}}$ et une filtration finie décroissante F de $H_{\mathbb{C}}$, les filtrations $W_{\mathbb{C}}$, F et $\overline{F}$ étant opposées. Le théorème (2.3.5) se généralise trivialement à cette variante.

3. Théorie de Hodge des variétés algébriques non singulières

3.1. Pôles logarithmiques et résidus.

(3.1.1) Rappelons quelques propriétés classiques des «pôles logarithmiques»des formes différentielles holomorphes. Le lecteur trouvera des démonstrations dans [3], II, (3.1) à (3.7), par exemple.

(3.1.2) Un diviseur Y dans une variété analytique complexe lisse X sera dit être *à croisements normaux* si l'inclusion de Y dans X est localement isomorphe à l'inclusion d'une réunion d'hyperplans de coordonnées dans $\mathbb{C}^n$; ceci n'implique pas que Y soit réunion de diviseurs lisses. Soient Y un diviseur à croisements normaux dans X et j l'inclusion de $X^* = X - Y$ dans X. On désigne par $\Omega^1_X\langle Y\rangle$ le sous-$\mathcal{O}$-module localement libre de $j_*\Omega^1_{X^*}$ engendré par Ω^1_X et par les $\frac{dz_i}{z_i}$, pour z_i équation locale d'une composante irréductible locale de Y. Le *faisceau* $\Omega^p_X\langle Y\rangle$ *des p-formes différentielles sur* X *à pôle logarithmique le long de* Y est par définition le sous-faisceau localement libre $\bigwedge^p \Omega^1_X\langle Y\rangle$ de $j_*\Omega^p_{X^*}$.

Proposition (3.1.3). —

(i) Une section α de $j_*\Omega^p_{X^*}$ appartient à $\Omega^p_X\langle Y\rangle$ si et seulement si α et $d\alpha$ présentent au plus des pôles simples le long du diviseur Y.

(ii) Les $\Omega^p_X\langle Y\rangle$ forment le plus petit sous-complexe de $j_*\Omega^*_{X^*}$, stable par produit extérieur, contenant Ω^*_X, et contenant la différentielle logarithmique df/f de toute section locale méromorphe le long de Y de $j_*\mathcal{O}^*_{X^*}$.

On appelle $\Omega^*_X\langle Y\rangle$ le *complexe de De Rham logarithmique* de X le long de Y. D'après (3.1.3), (ii), ce complexe est contravariant en le couple (X, X^*).

(3.1.4) Localement sur X, Y est réunion de diviseurs lisses Y_i, et on désigne par Y^n (resp. $\widetilde{Y}^n$) la réunion (resp. la somme disjointe) des intersections n à n des Y_i. Les Y^n se recollent en un sous-espace Y^n de X, et les $\widetilde{Y}^n$ se recollent en la variété normalisée de Y^n. On a $\widetilde{Y}^0 = Y^0 = X$ et on pose $\widetilde{Y} = \widetilde{Y}^1$.

On définit l'ensemble à deux éléments des *orientations* d'un ensemble fini à n éléments E comme étant l'ensemble des générateurs de $\bigwedge^n \mathbb{Z}^E$. Pour $n \geq 2$, cet ensemble est celui des classes de conjugaison sous le groupe alterné d'ordres totaux sur E.

Si, à chaque point y de $\widetilde{Y}^n$, on associe l'ensemble des n composantes locales de Y qui contiennent l'image dans X d'un voisinage de y dans $\widetilde{Y}^n$, on définit sur $\widetilde{Y}^n$ un système local E_n d'ensembles à n éléments. Le système local des orientations de ces ensembles est un torseur sous $\mathbb{Z}/(2)$. Ce torseur définit, *via* l'inclusion de $\mathbb{Z}/(2)$ dans $\mathbb{C}^*$, un système local complexe ε^n de rang 1 sur $\widetilde{Y}^n$, muni d'un isomorphisme

$$(\varepsilon^n)^{\otimes 2} \simeq \mathbb{C}.$$

On a

$$\varepsilon^n \simeq \bigwedge^n \mathbb{C}^{E_n}.$$

Localement sur $\widetilde{Y}^n$, ε^n est muni de deux isomorphismes opposés $\pm\alpha : \varepsilon^n \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}$. On pose

$$\varepsilon^n_{\mathbb{Z}} = \alpha^{-1}\big((2\pi i)^{-n}\mathbb{Z}\big).$$

Il y a lieu de voir ε^n, muni de $\varepsilon^n_{\mathbb{Z}}$, comme une forme tordue de $\mathbb{Z}(-n)$ sur $\widetilde{Y}^n$.

On désignera par ε^n_X (resp. par $(\varepsilon^n_X)_{\mathbb{Z}}$) l'image directe de ε^n (resp. de $\varepsilon^n_{\mathbb{Z}}$) par l'application de $\widetilde{Y}^n$ dans X. On a

(3.1.4.1)
$$\varepsilon^n_X \simeq \bigwedge^n \varepsilon^1_X \qquad (n \geq 0).$$

Si Y est une réunion de diviseurs lisses distincts $(Y_i)_{i\in I}$, le choix d'un ordre total sur I trivialise les ε^n.

(3.1.5) Désignons par $W_n(\Omega^p_X\langle Y\rangle)$ le sous-Module de $\Omega^p_X\langle Y\rangle$ formé des combinaisons linéaires de produits

$$\alpha \wedge \frac{dt_{i(1)}}{t_{i(1)}} \wedge \cdots \wedge \frac{dt_{i(m)}}{t_{i(m)}} \qquad (m \leq n),$$

avec α holomorphe et les $t_{i(j)}$ équations locales de composantes locales distinctes Y_j de Y. On appelle *filtration par le poids* de $\Omega^*_X\langle Y\rangle$ la filtration *croissante* par les sous-complexes $W_n(\Omega^*_X\langle Y\rangle)$. On a

(3.1.5.1)
$$W_n(\Omega^p_X\langle Y\rangle) \wedge W_m(\Omega^q_X\langle Y\rangle) \subset W_{n+m}(\Omega^{p+q}_X\langle Y\rangle).$$

Désignant par i_n l'application de $\widetilde{Y}^n$ dans X, on vérifie que la correspondance

$$\alpha \wedge \frac{dt_{i(1)}}{t_{i(1)}} \wedge \cdots \wedge \frac{dt_{i(n)}}{t_{i(n)}} \longmapsto (\alpha \mid Y_{i(1)} \cap \cdots \cap Y_{i(n)}) \otimes (\text{orientation } i(1) \dots i(n))$$

définit des isomorphismes de complexes

(3.1.5.2) $$\text{Rés} : \mathrm{Gr}_n^W(\Omega_X^*\langle Y\rangle) \simeq i_{n*}\Omega^*_{\widetilde{Y}^n}(\varepsilon^n)[-n]$$

(le *«résidu de Poincaré»*).

(3.1.6) L'interprétation qui suit, en terme de (3.1.5.2), de la suite spectrale de Leray pour l'inclusion de X^* dans X, m'a été signalée par N. Katz. Elle permettra de vérifier un point que j'avais tout d'abord considéré comme évident ((3.2.5), (ii), 1re partie).

(3.1.7) Tout point de X admet un système fondamental de voisinages ouverts de Stein dont la trace sur X^* soit de Stein. Pour $\mathcal{F}$ un faisceau analytique cohérent sur X^*, on a donc $R^i j_*\mathcal{F} = 0$ pour $i > 0$. Le complexe de De Rham $\Omega^*_{X^*}$ est donc une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$ par des faisceaux acycliques pour le foncteur j_*. Dès lors

(3.1.7.1) $$H^*(X^*, \mathbb{C}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{H}^*(X^*, \Omega^*_{X^*}) \xleftarrow{\sim} \mathbb{H}^*(X, j_*\Omega^*_{X^*})$$

et la suite spectrale de Leray pour le morphisme j s'identifie à la suite spectrale d'hypercohomologie pour $j_*\Omega^*_{X^*}$, correspondant à la filtration τ par les sous-complexes $\tau_{\leq -n}(j_*\Omega^*_{X^*})$ (1.4.6).

Proposition (3.1.8). — *Les morphismes de complexes filtrés*

$$(\Omega_X^*\langle Y\rangle, W) \xleftarrow{\alpha} (\Omega_X^*\langle Y\rangle, \tau) \xrightarrow{\beta} (j_*\Omega^*_{X^*}, \tau)$$

sont des quasi-isomorphismes filtrés. Ils définissent un isomorphisme entre la suite spectrale de Leray pour j en cohomologie complexe et la suite spectrale d'hypercohomologie du complexe filtré $(\Omega_X^*\langle Y\rangle, W)$ sur X.

D'après (1.4.5) et (3.1.7), il suffit de prouver la première assertion. On trouvera dans [3], II, (6.9), ou dans [1], la démonstration du fait que β est un quasi-isomorphisme, donc un quasi-isomorphisme filtré. On peut aussi calculer directement les faisceaux de cohomologie des deux membres: ceux de $\Omega_X^*\langle Y\rangle$ sont déterminés par (3.1.5.2), tandis que ceux de $j_*\Omega^*_{X^*}$ sont les $R^i j_*\mathbb{C}$, qui peuvent se calculer par voie topologique.

Pour $n \geq p$, on a

$$W_n(\Omega_X^p\langle Y\rangle) = \Omega_X^p\langle Y\rangle,$$

de sorte que α est un morphisme de $\Omega_X^*\langle Y\rangle$, muni de τ, dans $\Omega_X^*\langle Y\rangle$, muni de la filtration décroissante associée à W (1.1.3). D'après (3.1.5.2), on a

(3.1.8.1) $$\mathcal{H}^i(\mathrm{Gr}_n^W(\Omega_X^*\langle Y\rangle)) = \begin{cases} 0 & \text{pour } i \neq n \\ \varepsilon_X^n & \text{pour } i = n, \end{cases}$$

on déduit de la première ligne de cette formule que α est un quasi-isomorphisme filtré. Ceci prouve (3.1.8).

D'après (3.1.7), l'isomorphisme (3.1.8.1) définit un isomorphisme

(3.1.8.2) $$R^n j_*\mathbb{C} \simeq \mathcal{H}^n(j_*\Omega^*_{X^*}) \simeq \mathcal{H}^n(\Omega_X^*\langle Y\rangle) \simeq \varepsilon_X^n.$$

Les isomorphismes (3.1.4.1) correspondent, *via* (3.1.8.2), au cup-produit.

Proposition (3.1.9). — *Le morphisme canonique de $R^n j_*\mathbb{Z}$ dans $R^n j_*\mathbb{C}$ identifie, via (3.1.8.2), le faisceau $R^n j_*\mathbb{Z}$ à $(\varepsilon_X^n)_{\mathbb{Z}}$ (3.1.4).*

La question est locale sur X. On peut donc supposer que X est un polycylindre ouvert D^m, avec $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$, et que $Y = \bigcup_{k=1}^{\ell} Y_k$, $Y_k = \mathrm{pr}_k^{-1}(0)$. La fibre en 0 de $R^n j_*\mathbb{Z}$ est alors la cohomologie entière de

$X^* = D^{*\ell} \times D^{(m-\ell)}$, avec $D^* = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z| < 1\}$. L'espace X^* a le type d'homotopie d'un tore; sa cohomologie est donc sans torsion, et le cup-produit définit des isomorphismes

$$\bigwedge^n (R^1 j_* \mathbb{Z})_0 \xrightarrow{\sim} (R^n j_* \mathbb{Z})_0.$$

Il suffit donc de prouver (3.1.9) pour $n = 1$.

L'homologie entière $H_1(X^*)$ est engendrée par les lacets γ_k tournant autour des divers Y_k. On a

$$\oint_{\gamma_k} \frac{dz_k}{z_k} = \pm 2\pi i;$$

la cohomologie entière est donc engendrée par les $\frac{1}{2\pi i}\frac{dz_k}{z_k}$, et ceci prouve (3.1.9).

(3.1.10) Soit $\mathcal{F}$ un faisceau analytique cohérent sur X^*, donné comme restriction à X^* d'un faisceau analytique cohérent $\mathcal{F}'$ sur X. On appelle image directe méromorphe $j_*^m\mathcal{F}$ de $\mathcal{F}$ la limite inductive

$$j_*^m\mathcal{F} = \varinjlim_n \mathcal{F}'(nY).$$

Localement sur X, Y est somme d'une famille finie $(Y_i)_{i\in I}$ de diviseurs lisses, et on définit la *filtration par l'ordre du pôle* P sur $j_*^m\mathcal{O}_{X^*}$ par la formule

(3.1.10.1)
$$P^p(j_*^m\mathcal{O}_{X^*}) = \sum_{\mathbf{n}\in A_p} \mathcal{O}_X\Big(\sum_i (n_i+1)Y_i\Big)$$

pour

$$A_p = \{(n_i)_{i\in I} \mid \sum_i n_i \leq -p \ \text{ et } \ \forall i,\ n_i \geq 0\}.$$

Cette construction se globalise et fournit sur $j_*^m\mathcal{O}_{X^*}$ une filtration exhaustive telle que $P^p = 0$ pour $p > 0$.

On appelle *filtration par l'ordre du pôle* du complexe $j_*^m\Omega_{X^*}^* = j_*^m\mathcal{O}_{X^*} \otimes \Omega_X^*$ la filtration

(3.1.10.2)
$$P^p(j_*^m\Omega_{X^*}^k) = P^{p-k}(j_*^m\mathcal{O}_{X^*}) \otimes \Omega_X^k.$$

La filtration P induit sur le sous-complexe $\Omega_X^*\langle Y\rangle$ de $j_*^m\Omega_{X^*}^*$ la filtration bête par les $\sigma_{\geq p}(\Omega_X^*\langle Y\rangle)$, filtration encore appelée la *filtration de Hodge* F.

Proposition (3.1.11). — *Le morphisme d'inclusion*

$$(\Omega_X^*\langle Y\rangle, F) \longrightarrow (j_*^m\Omega_{X^*}^*, P)$$

est un quasi-isomorphisme filtré.

Cet énoncé m'a été suggéré par [4]. Une démonstration figure dans [3], II, (3.13).

3.2. Théorie de Hodge mixte.

Rappelons qu'on entend dorénavant par schéma un schéma de type fini sur $\mathbb{C}$, et par faisceau sur S un faisceau sur S^{an}.

(3.2.1) Soit X un schéma lisse et séparé. D'après Nagata [11], X est un ouvert de Zariski d'un schéma complet $\overline{X}$. D'après Hironaka [8], on peut prendre $\overline{X}$ lisse, et tel que $Y = \overline{X} - X$ soit un diviseur à croisements normaux.

Le lecteur qui voudrait éviter la référence à Nagata pourra supposer X quasi-

projectif. La complétion lisse $\overline{X}$ peut alors être choisie projective, et telle que Y soit réunion de diviseurs lisses. Lorsqu'on se limite à de telles compactifications, on n'a besoin de la théorie de Hodge que sous la forme standard (2.2.1).

(3.2.2) D'après (3.1.7) et (3.1.8), on a

$$H^*(X,\mathbb{C}) \simeq \mathbb{H}^*(\overline{X}, \Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle).$$

On définit la *filtration de Hodge* F sur le complexe $\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle$ comme étant la filtration $F^p = \sigma_{\geq p}$ par les tronqués bêtes (1.4.5). Sur $\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle$, on dispose donc de deux filtrations : F et W (3.1.5).

(3.2.3) Nous aurons à utiliser qu'il existe des résolutions bifiltrées $i : \Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle \longrightarrow K^*$ telles que les $\mathrm{Gr}^p_F \mathrm{Gr}^W_n(K^j)$ soient des faisceaux acycliques pour le foncteur Γ :

$$H^i(\overline{X}, \mathrm{Gr}^p_F \mathrm{Gr}^W_n(K^j)) = 0 \qquad \text{pour } i > 0.$$

Voici deux méthodes pour en construire :

a) On peut prendre pour K^* la résolution canonique de Godement $\mathcal{C}^*(\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle)$, filtrée par les $\mathcal{C}^*(W_n(\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle))$ et les $\mathcal{C}^*(F^p(\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle))$. C'est une résolution bifiltrée car $\mathcal{C}^*$ est un foncteur exact.

b) On peut prendre pour K^* la d''-résolution de $\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle$. Soit $\Omega^{pq}_{\overline{X}}$ le faisceau des formes C^∞ de type (p,q) ; K^* est alors le complexe simple associé au complexe double des $\Omega^p_{\overline{X}}\langle Y\rangle \otimes_{\mathcal{O}} \Omega^{0,q}_{\overline{X}}$ (sous-complexe des $j_*\Omega^{**}_X$). Ce complexe est filtré par les $F^p(\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle) \otimes \Omega^{0,*}_{\overline{X}}$ et par les $W_n(\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle) \otimes \Omega^{0,*}_{\overline{X}}$; pour prouver que c'est une résolution bifiltrée, on utilise que le faisceau $\mathcal{O}_\infty$ des fonctions complexes C^∞ sur $\overline{X}$ est plat sur $\mathcal{O}$ (corollaire au théorème de préparation C^∞ de Malgrange). Les faisceaux $\mathrm{Gr}_F \mathrm{Gr}_W(K^*)$ sont fins, car ce sont des faisceaux de modules sur le faisceau mou $\mathcal{O}_\infty$.

(3.2.4) Avec les notations de (3.2.3), la cohomologie complexe de X apparaît comme la cohomologie du complexe bifiltré $\Gamma(\overline{X}, K^*)$. On dispose donc de deux suites spectrales aboutissant à $H^*(X,\mathbb{C})$. Elles s'écrivent, avec les notations de (3.1.4) :

(3.2.4.1) $$ {}_W E_1^{pq} = H^{p+q}(\overline{X}, \varepsilon^{-p}_{\overline{X}}[p]) = H^{2p+q}(\widetilde{Y}^p, \varepsilon^{-p}) \Rightarrow H^n(X,\mathbb{C})$$

(3.2.4.2) $$ {}_F E_1^{pq} = H^q(\overline{X}, \Omega^p_{\overline{X}}\langle Y\rangle) \Rightarrow H^n(X,\mathbb{C}).$$

La première d'entre elles, à la renumérotation ${}_W E_1^{pq} \mapsto E_2^{2p+q,-p}$ près, n'est autre que la suite spectrale de Leray de l'inclusion j.

Théorème (3.2.5). —

(i) Sur les termes ${}_W E_r^{pq}$ de la suite spectrale (3.2.4.1), la première filtration directe, la seconde filtration directe et la filtration récurrente définies par F coïncident.

(ii) La filtration sur $H^n(X,\mathbb{C})$, aboutissement de la suite spectrale ${}_W E$, se déduit d'une filtration W de $H^n(X,\mathbb{Q})$. Ni elle, ni la filtration F aboutissement de la suite spectrale ${}_F E$, ne dépendent de la compactification choisie $\overline{X}$ de X ni du choix de K^*.

(iii) Les filtrations $W[n]$ (1.1.2) et F définissent sur $H^n(X,\mathbb{Z})$ une structure de Hodge mixte, fonctorielle en X.

D'après (3.1.7), la suite spectrale ${}_W E$ est la suite spectrale de Leray pour j_* (à une renumérotation près). Elle se déduit donc par tensorisation avec $\mathbb{C}$ d'une suite spectrale de $\mathbb{Q}$-vectoriels et la première assertion (ii) est vraie. La conjugaison complexe agit sur les ${}_W E_r$; elle peut se calculer via (3.1.10).

Lemme (3.2.6). — *Les suites spectrales d'hypercohomologie des complexes filtrés $\mathrm{Gr}^W_n(\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle)$, munis de la filtration induite par la filtration de Hodge, dégénèrent au terme E_1.*

Définissons les Y^n et $\widetilde{Y}^n$ comme en (3.1.4) et soit $i_n : \widetilde{Y}^n \to \overline{X}$. D'après (3.1.5.2), on a

$$\mathrm{Gr}^W_n(\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle) \simeq i_{n*}\Omega^*_{\widetilde{Y}^n}(\varepsilon^n)[-n].$$

De plus, la filtration de Hodge induit la filtration bête (1.4.5), de sorte que la suite spectrale (3.2.6) se déduit par translations sur les degrés de la suite spectrale classique

$$E_1^{pq} = H^q(\widetilde{Y}^n, \Omega^p_{\widetilde{Y}^n}(\varepsilon^n)) \Rightarrow H^{p+q}(\widetilde{Y}^n, \varepsilon^n).$$

Si $\overline{X}$ est projectif et Y réunion de diviseurs lisses, alors $\widetilde{Y}^n$ est projectif, ε^n est un système local trivial et la théorie de Hodge classique (2.2.1) fournit la dégénérescence (3.2.6). Pour le cas général, il faut référer à [2] (voir (2.2.2), (2.2.3)).

La théorie de Hodge fournit encore que la filtration de Hodge sur $H^k(\widetilde{Y}^n, \varepsilon^n)$ est k-opposée à sa complexe conjuguée (la conjugaison complexe étant définie en terme de $\varepsilon^n_{\mathbb{Z}}$ (3.1.4)). On a ici, compte tenu des translations sur les degrés :

Lemme (3.2.7). — *La filtration sur*

$$ {}_WE_1^{-n,k+n} = H^k(\overline{X}, \mathrm{Gr}_n^W(\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle)) \approx H^{k-n}(\widetilde{Y}^n, \varepsilon^n), $$

aboutissement de la suite spectrale (3.2.6), est $(k+n)$-opposée à sa complexe conjuguée.

Lemme (3.2.8). — *Les différentielles d_1 de la suite spectrale ${}_WE$ sont strictement compatibles à la filtration F.*

Sur les termes E_1, il n'y a qu'une filtration induite par F à considérer ((1.3.10) et (1.3.13), (iii)), et d_1 est compatible à cette filtration ((1.3.13), (i)). Cette filtration est l'aboutissement de la suite spectrale (3.2.6) ((1.4.8), (iii)). D'après (3.2.7), la flèche d_1

$$ d_1 : H^k(\overline{X}, \mathrm{Gr}_n^W(\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle)) \longrightarrow H^{k+1}(\overline{X}, \mathrm{Gr}_{n-1}^W(\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle)) $$

soit

(3.2.8.1)
$$ d_1 : H^{k-n}(\widetilde{Y}^n, \varepsilon^n) \longrightarrow H^{k-n+2}(\widetilde{Y}^{n-1}, \varepsilon^{n-1}) $$

est compatible à des filtrations $(k+n)$-opposées à leur complexe conjuguée. Puisque d_1 commute à la conjugaison complexe, d_1 respecte la bigraduation, et donc la filtration définie par F et $\overline{F}$, ce qui prouve (3.2.8). De plus, la cohomologie du complexe E_1 sera encore bigraduée.

Lemme (3.2.9). — *Sur ${}_WE_2^{pq}$, la filtration récurrente F est q-opposée à sa complexe conjuguée.*

Prouvons par récurrence sur r que :

Lemme (3.2.10). — *Pour $r \geq 0$, les différentielles d_r de la suite spectrale ${}_WE$ sont strictement compatibles à la filtration récurrente F. Pour $r \geq 2$, elles sont nulles.*

Pour $r = 0$ (resp. $r = 1$), on applique (3.2.6) et (1.4.8), (iii) (resp. (3.2.8)). Pour $r \geq 2$, il suffit de prouver que $d_r = 0$. Par récurrence et d'après (1.3.16), on peut supposer que sur les termes ${}_WE_s$ $(s \geq r+1)$, on a $F_d = F_r = F_{d*}$, et que ${}_WE_r = {}_WE_2$. D'après (1.3.13), (i), d_r est donc compatible à la filtration F_r.

Sur ${}_WE_r^{pq} = {}_WE_2^{pq}$, la filtration F_r est q-opposée à sa complexe conjuguée. Le morphisme

$$ d_r : {}_WE_r^{pq} \longrightarrow {}_WE_r^{p+r,q-r+1} $$

vérifie donc, pour $r - 1 > 0$,

$$ \begin{aligned} d_r({}_WE_r^{pq}) &= d_r\left(\sum_{a+b=q} \left(F^a({}_WE_r^{pq}) \cap \overline{F}^b({}_WE_r^{pq})\right)\right) \\ &\subset \sum_{a+b=q} \left(F^a({}_WE_r^{p+r,q-r+1}) \cap \overline{F}^b({}_WE_r^{p+r,q-r+1})\right) = 0. \end{aligned} $$

Ceci prouve (3.2.10), qui, d'après (1.3.16), implique (3.2.5) (i).

D'après (1.3.17), la filtration de ${}_WE_\infty^{pq}$ induite par la filtration F de $H^{p+q}(X, \mathbb{C})$ est q-opposée à sa complexe conjuguée. Puisque $q = -p + (p+q)$, ceci prouve la première partie de (3.2.5) (iii).

(3.2.11) Prouvons (ii) et (iii), ce qui achèvera la démonstration.

A. *Indépendance du choix de K^*.* Les filtrations F et W de $H^*(X,\mathbb{C})$ sont les aboutissements des suites spectrales d'hypercohomologie de $\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle$ pour les filtrations F et W. Ces suites spectrales toutes entières ne dépendent pas du choix de K^*.

B. *Fonctorialité.* Soit $f : X_1 \to X_2$ un morphisme de schéma. Supposons donné un morphisme de compactifications lisses

(3.2.11.1)
$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{f} & X_2 \\ {\scriptstyle j_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_2} \\ \overline{X}_1 & \xrightarrow{\overline{f}} & \overline{X}_2, \end{array}$$

les $Y_i = \overline{X}_i - X_i$ étant des diviseurs à croisements normaux. Le morphisme canonique (voir (3.1.3)) de ${\overline{f}}^*\Omega^*_{\overline{X}_2}\langle Y_2\rangle$ dans $\Omega^*_{\overline{X}_1}\langle Y_1\rangle$ est alors un morphisme de complexes bifiltrés; sur l'hypercohomologie, il induit un morphisme compatible à F et W, et donc $f^* : H^n(X_2,\mathbb{Z}) \longrightarrow H^n(X_1,\mathbb{Z})$ est un morphisme de structures de Hodge mixtes, pour les structures définies par les compactifications $\overline{X}_i$.

C. *Indépendance de la compactification.* Avec les notations de B, si f est un isomorphisme, alors f^* est un morphisme bijectif de structures de Hodge mixtes, donc un isomorphisme (2.3.5).

Si $\overline{X}_1$ et $\overline{X}_2$ sont deux compactifications lisses de X, avec $Y_i = \overline{X}_i - X_i$ diviseur à croisements normaux, il existe une troisième compactification lisse $\overline{X}$, avec $Y = \overline{X} - X$ diviseur à croisements normaux, qui s'insère dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & X & & \\ & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\ \overline{X}_1 & \longleftarrow & \overline{X} & \longrightarrow & \overline{X}_2 \end{array}$$

A savoir, on prend pour $\overline{X}$ une résolution des singularités de l'adhérence de l'image diagonale de X dans $\overline{X}_1 \times \overline{X}_2$. L'application identique de $H^n(X,\mathbb{Z})$ muni de la structure de Hodge mixte définie par $\overline{X}_1$ dans $H^n(X,\mathbb{Z})$ muni de celle définie par $\overline{X}_2$ est donc composée de deux isomorphismes.

Pour achever la démonstration de (ii) et (iii), on remarque que tout morphisme f s'insère dans un diagramme (3.2.11.1) : on choisit des compactifications $\overline{X}'_1$ et $\overline{X}_2$ de X_1 et X_2, puis on prend pour $\overline{X}_1$ une résolution des singularités de l'adhérence de l'image de X_1 dans $\overline{X}'_1 \times \overline{X}_2$.

Définition (3.2.12). — *La structure de Hodge mixte de la cohomologie d'une variété algébrique lisse séparée est la structure de Hodge mixte (3.2.5), (iii).*

Corollaire (3.2.13). — *Avec les notations précédentes :*

(i) La suite spectrale (3.2.4.1) dégénère en E_2, i.e. la suite spectrale de Leray pour l'inclusion $j : X^* \hookrightarrow \overline{X}$ dégénère en E_3 ($E_3 = E_\infty$).

(ii) La suite spectrale (3.2.4.2)
$$_FE_1^{pq} = H^q(\overline{X}, \Omega^p_{\overline{X}}\langle Y\rangle) \Longrightarrow H^{p+q}(X,\mathbb{C})$$
dégénère en E_1.

(iii) La suite spectrale définie par le faisceau $\Omega^p_{\overline{X}}\langle Y\rangle$, muni de la filtration W :
$$\begin{aligned} E_1^{-n,k+n} &= H^k(\overline{X}, \mathrm{Gr}^W_n(\Omega^p_{\overline{X}}\langle Y\rangle)) \\ &\approx H^k(\widetilde{Y}^n, \Omega^{p-n}_{\widetilde{Y}^n}(\varepsilon^n)) \Longrightarrow H^k(\overline{X}, \Omega^p_{\overline{X}}\langle Y\rangle) \end{aligned}$$
dégénère en E_2.

L'assertion (i) est prouvée en (3.2.10).

Considérons les quatre suites spectrales de (1.4.12), relatives au complexe bifiltré $\Omega^*_{\overline{X}}\langle Y\rangle$. D'après (i), on a

$$\sum_n \dim H^n(X,\mathbb{C}) = \sum_{p,q} \dim {}_WE_2^{p,q}.$$

Les termes ${}_WE_1^{n,k-n}$ sont, pour n fixé, aboutissement d'une suite spectrale *dégénérée en* E_1 (3.2.6) de termes initiaux $E_1^{p,n,k-p-n}$ (notations de (1.4.12)) les termes initiaux de la suite spectrale (iii). Puisque ${}_Wd_1$ est strictement compatible à la filtration F aboutissement de cette suite spectrale (3.2.7), et est (1.4.12) l'aboutissement d'un morphisme entre ces suites spectrales, qui débute par les différentielles de (iii), on a

$$\mathrm{Gr}_F^p({}_WE_2^{n,k-n}) \approx H^*(E_1^{p,n-1,k-n-p} \to E_1^{p,n,k-n-p} \to E_1^{p,n+1,k-n-p})$$

et $\mathrm{Gr}_F^*({}_WE_2^{**})$ est la somme des termes E_2^{***} des suites spectrales (iii). On a donc

(3.2.13.1)
$$\sum_n \dim H^n(X,\mathbb{C}) = \sum \dim E_2^{***}.$$

Par ailleurs, on a

$$\sum_n \dim H^n(X,\mathbb{C}) \leq \sum \dim {}_FE_1^{**},$$

avec égalité si et seulement si la suite spectrale (ii) dégénère en E_1, et

$$\sum \dim {}_FE_1^{**} \leq \sum \dim E_2^{***},$$

avec égalité si et seulement si les suites spectrales (iii) dégénèrent en E_2. Comparant avec (3.2.13.1), on obtient (3.2.13).

Corollaire (3.2.14). — *Soit ω une p-forme différentielle méromorphe sur $\overline{X}$, holomorphe sur X et présentant au pis des pôles logarithmiques le long de Y. Alors, la restriction $\omega|X$ de ω à X est fermée, et si la classe de cohomologie dans $H^p(X,\mathbb{C})$ définie par ω est nulle, on a $\omega = 0$.*

C'est le cas particulier ${}_FE_1^{p0} = {}_FE_\infty^{p0}$ de (3.2.13), (ii).

Corollaire (3.2.15). —

(i) Si X est une variété algébrique complète lisse, la structure de Hodge mixte sur $H^n(X,\mathbb{Z})$ est la structure de Hodge de poids n classique.

(ii) Les nombres de Hodge h^{pq} de la structure de Hodge mixte de $H^n(X,\mathbb{Z})$ (X algébrique lisse) ne peuvent être non nuls que pour $p \leq n$, $q \leq n$ et $p+q \geq n$.

L'assertion (i) est claire; pour prouver (ii), on remarque que, pour Y réunion de diviseurs lisses, la structure de Hodge rationnelle $\mathrm{Gr}_k^W(H^n(X,\mathbb{Q}))$ est quotient d'un sous-objet d'une structure de Hodge de poids $n+k$, à savoir

$$H^{n-k}(\widetilde{Y}^n,\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}(-k).$$

(3.2.16) Soit X un schéma lisse et séparé. On sait que X admet des compactifications lisses $\overline{X}$, et que le sous-groupe de $H^n(X,\mathbb{Z})$ image de $H^n(\overline{X},\mathbb{Z})$ est indépendant du choix de $\overline{X}$ (cf. [6], (9.1) à (9.4)).

Corollaire (3.2.17). — *Sous les hypothèses (3.2.16), l'image de $H^n(\overline{X},\mathbb{Q})$ dans $H^n(X,\mathbb{Q})$ est $W_n(H^n(X,\mathbb{Q}))$* (W désignant la filtration par le poids (3.2.12)).

On peut supposer que $\overline{X} - X$ est un diviseur à croisements normaux. L'assertion résulte alors de ce que $W[-n]$ est l'aboutissement de la suite spectrale de Leray pour l'inclusion $j : X \hookrightarrow \overline{X}$.

Corollaire (3.2.18). — *Soit f un morphisme d'un schéma propre et lisse Y dans un schéma lisse X admettant une compactification lisse $\overline{X}$:*

$$Y \xrightarrow{f} X \xhookrightarrow{j} \overline{X}.$$

Alors, les groupes $H^n(X,\mathbb{Q})$ et $H^n(\overline{X},\mathbb{Q})$ ont même image dans $H^n(Y,\mathbb{Q})$.

Puisque f^* et $(jf)^*$ sont strictement compatibles à la filtration par le poids ((3.2.5), (iii)), il suffit de prouver que $\mathrm{Gr}^W(f^*)$ et $\mathrm{Gr}^W(f^*j^*)$ ont même image dans $\mathrm{Gr}^W(H^n(Y,\mathbb{Q}))$. D'après (3.2.17) et (3.2.15), $\mathrm{Gr}_n^W(j^*)$ est un isomorphisme, tandis que $\mathrm{Gr}_m^W(f^*) = 0$ pour $m \neq n$ puisque $\mathrm{Gr}_m^W(H^n(Y,\mathbb{Q})) = 0$ pour $m \neq n$.

***Remarque* (3.2.19).** — D'après (3.1.11) et (1.4.5), sous les hypothèses de (3.2.5), la filtration de Hodge sur $H^n(X,\mathbb{C})$ est l'aboutissement de la suite spectrale d'hypercohomologie du complexe $j_*^m\Omega^*_{X^*}$, muni de la filtration par l'ordre du pôle (3.1.10) : cette suite spectrale coïncide avec (3.2.4.2).

4. Applications et compléments

4.1. Le théorème de la partie fixe.

***Théorème* (4.1.1).** — *Soient S un schéma lisse séparé, et $f : X \to S$ un morphisme propre et lisse.*

(i) En cohomologie rationnelle, la suite spectrale de Leray

$$E_2^{pq} = H^p(S, R^q f_*\mathbb{Q}) \Longrightarrow H^{p+q}(X,\mathbb{Q})$$

dégénère ($E_2 = E_\infty$).

(ii) Si $\overline{X}$ est une compactification non singulière de X, le morphisme canonique

$$H^n(\overline{X},\mathbb{Q}) \longrightarrow H^0(S, R^n f_*\mathbb{Q})$$

est surjectif.

Pour f projectif et lisse, l'assertion (i) est prouvée dans [2]. La démonstration de [2] est réécrite de façon plus lisible dans [5]; elle n'utilise pas la lissité de S.

Fixons f, et prouvons que (i) $\Rightarrow$ (ii). On se ramène à supposer S connexe non vide. Si $s \in S$ est un point de S, le système local $R^n f_*\mathbb{Q}$ est entièrement décrit par sa fibre $(R^n f_*\mathbb{Q})_s$ en s, et par l'action du groupe fondamental $\pi = \pi_1(S,s)$ sur cette fibre. On a

$$H^0(S, R^n f_*\mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} [(R^n f_*\mathbb{Q})_s]^\pi.$$

Si $X_s = f^{-1}(s)$, la flèche composée

$$H^0(S, R^n f_*\mathbb{Q}) \longrightarrow (R^n f_*\mathbb{Q})_s \simeq H^n(X_s,\mathbb{Q})$$

est donc injective. Soient les flèches

$$H^n(\overline{X},\mathbb{Q}) \xrightarrow{a} H^n(X,\mathbb{Q}) \xrightarrow{b} H^0(S, R^n f_*\mathbb{Q}) \xhookrightarrow{c} H^n(X_s,\mathbb{Q}).$$

Les flèches cb et cba ont même image d'après (3.2.18). La flèche b est un «edge-homomorphism» de la suite spectrale de Leray, donc est surjective par hypothèse. Puisque c est injective, b et ba ont même image et ba est surjective. Ceci prouve (ii) pour f projectif. Déduisons-en le cas général. On se ramène encore à supposer S connexe non vide.

D'après le lemme de Chow et la résolution des singularités, il existe un schéma quasi-projectif et lisse X' et un morphisme projectif et birationnel

$$p : X' \longrightarrow X.$$

Il existe alors (par Bertini, ou Sard) un ouvert de Zariski non vide S_1 de S tel que $X'_1 = (fp)^{-1}(S_1)$ soit lisse sur S_1. Soient enfin $X_1 = f^{-1}(S_1)$, $\overline{X}$ une compactification lisse de X et $\overline{X}'_1$ une compactification lisse de X'_1 qui domine $\overline{X}$.

$$\begin{array}{ccccc}
\overline{X} & \longleftarrow & & \overline{p} & \overline{X}'_1 \\
\uparrow & & & & \uparrow \\
X & \longleftarrow & X_1 & \xleftarrow{p} & X'_1 \\
{\scriptstyle f}\downarrow & & {\scriptstyle f_1}\downarrow & & {\scriptstyle f'_1}\downarrow \\
S & \xleftarrow[i]{} & S_1 & = & S_1
\end{array}$$

Si $s \in S_1$, le morphisme $i_* : \pi_1(S_1,s) \to \pi_1(S,s)$ est surjectif car la codimension topologique de $S - S_1$ est ≥ 2. On a donc

$$H^0(S, R^n f_*\mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} H^0(S_1, R^n f_{1*}\mathbb{Q}),$$

et il suffit de prouver que

$$H^n(\overline{X},\mathbb{Q}) \longrightarrow H^0(S_1, R^n f_{1*}\mathbb{Q})$$

est surjectif.

Les flèches verticales du diagramme

$$\begin{array}{ccccc} H^n(\overline{X},\mathbb{Q}) & \longrightarrow & H^n(X_1,\mathbb{Q}) & \longrightarrow & H^0(S_1, R^n f_{1*}\mathbb{Q}) \\ \downarrow{\scriptstyle \overline{p}^*} & & \downarrow{\scriptstyle p^*} & & \downarrow{\scriptstyle p^*} \\ H^n(\overline{X}'_1,\mathbb{Q}) & \longrightarrow & H^n(X'_1,\mathbb{Q}) & \longrightarrow & H^0(S_1, R^n f'_{1*}\mathbb{Q}) \end{array}$$

admettent pour inverse à gauche les *morphismes de Gysin* $\overline{p}_!$, $p_!$ et $p_!$, définis par dualité de Poincaré comme transposés des flèches analogues aux précédentes en cohomologie à support propre. De plus, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^n(\overline{X},\mathbb{Q}) & \xrightarrow{u} & H^0(S_1, R^n f_{1*}\mathbb{Q}) \\ \uparrow{\scriptstyle \overline{p}_!} & & \uparrow{\scriptstyle p_!} \\ H^n(\overline{X}'_1,\mathbb{Q}) & \xrightarrow[v]{} & H^0(S_1, R^n f'_{1*}\mathbb{Q}) \end{array}$$

est commutatif. La flèche u est donc facteur direct de la flèche v. Cette dernière étant surjective (puisque f'_1 est projectif), il en est de même de u.

Prouvons (i) dans le cas général. On se ramène à supposer f purement de dimension relative n. Soit $f \times f$ la projection de $X \times_S X$ sur S.

Soit δ l'image de la classe de cohomologie de la diagonale de $X \times_S X$ dans $H^0(S, R^n(f \times f)_*\mathbb{Q})$. On a par Künneth

$$R^n(f \times f)_*\mathbb{Q} = \sum_{p+q=n} (R^p f_*\mathbb{Q} \otimes R^q f_*\mathbb{Q}).$$

On désignera par δ'_{pq} $(p+q=n)$ les composantes de δ dans cette décomposition, et par δ_{pq} des classes dans $H^n(X \times_S X)$ d'images les δ'_{pq}.

Les δ_{pq} définissent dans la catégorie dérivée $D^+(S)$ des homomorphismes

$$\delta_p : Rf_*\mathbb{Q} \longrightarrow Rf_*\mathbb{Q}$$

tels que $\mathcal{H}^q(\delta_p)$ soit 0 pour $p \neq q$, et soit l'identité pour $p = q$. D'après [2], on a donc dans $D^+(S)$

(4.1.1.1) $$Rf_*\mathbb{Q} \approx \sum_p R^p f_*\mathbb{Q}[-p],$$

et la suite spectrale de Leray dégénère.

***Corollaire* (4.1.2).** — *Soit $f : X \to S$ un morphisme propre et lisse de but un schéma réduit connexe et séparé S. Soit $(R^n f_*\mathbb{Q})^0$ le plus grand sous-système local constant de $R^n f_*\mathbb{Q}$, de fibre $H^0(S, R^n f_*\mathbb{Q})$. Alors, pour chaque $s \in S$, $(R^n f_*\mathbb{Q})^0_s$ est une sous-structure de Hodge de $(R^n f_*\mathbb{Q})_s \simeq H^n(X_s,\mathbb{Q})$, et la structure de Hodge induite sur $H^0(S, R^n f_*\mathbb{Q})$ est indépendante de s.*

Soient $s \in S$ et $X_s = f^{-1}(s)$. Si S est lisse, et si $\overline{X}$ est une compactification lisse de X, alors d'après (4.1.1), le sous-espace $(R^n f_*\mathbb{Q})^0_s$ de $(R^n f_*\mathbb{Q})_s$ est l'image de $H^n(\overline{X},\mathbb{Q})$. Puisque l'application de restriction

$$H^n(\overline{X},\mathbb{Q}) \longrightarrow H^n(X_s,\mathbb{Q})$$

est un morphisme de structures de Hodge, son image est une sous-structure de Hodge et la structure de Hodge induite sur $H^0(S, R^n f_*\mathbb{Q})$, quotient de celle de $H^n(\overline{X},\mathbb{Q})$, est indépendante de s.

Dans le cas général, (4.1.2) signifie encore que si a est une section globale de $R^n f_*\mathbb{C}$, alors ses composantes $a^{p,q}$ de type (p,q), *a priori* seulement des sections continues du fibré complexe défini par $R^n f_*\mathbb{C}$, sont en fait localement constantes, i.e. des sections de $R^n f_*\mathbb{C}$. Tel est le cas, car $a^{p,q}$ est continue, et localement constante sur l'ouvert de lissité (dense) de S d'après ce qui précède.

(4.1.3) Dans le cas où S est compact, une généralisation de (4.1.2) est prouvée par voie analytique dans Griffiths [5].

Comme corollaires de (4.1.2), citons :

(4.1.3.1) (Griffiths [5]) Soit $f : X \to S$ un morphisme propre et lisse comme en (4.1.2). Si une section globale a de $R^n f_* \mathbb{C}$ est de type de Hodge (p, q) en un point, alors a est de type (p, q) partout. En particulier, si $n = 2$ et si a est en un point s la classe de cohomologie d'un diviseur de X_s, alors a est en tout point la classe de cohomologie d'un diviseur et, pour S lisse, est même définie par un diviseur D sur X.

(4.1.3.2) (Grothendieck [7]) Soit S un schéma réduit et connexe de type fini sur $\mathbb{C}$, et soient $f_1 : X_1 \to S$ et $f_2 : X_2 \to S$ deux schémas abéliens sur S. Si un morphisme

$$u : R^1 f_{2*} \mathbb{Z} \longrightarrow R^1 f_{1*} \mathbb{Z}$$

provient en un point s de S d'un morphisme de variétés abéliennes

$$\widetilde{u}_s : (X_1)_s \longrightarrow (X_2)_s,$$

alors u provient d'un (et d'un seul) morphisme de schémas abéliens

$$\widetilde{u} : X_1 \longrightarrow X_2.$$

(4.1.3.3) (Cf. Katz [10]) Soient S un schéma lisse connexe, s un point de S, $f : X \to S$ un morphisme propre et lisse et P un facteur direct du système local $R^i f_* \mathbb{Q}$, qui soit point par point une sous-structure de Hodge. Les conditions suivantes sont équivalentes :

a) La structure de Hodge de P est localement constante.

b) La représentation P_s de $\pi_1(S, s)$ se factorise par un quotient fini de $\pi_1(S, s)$.

c) Il existe un revêtement étale fini non vide $u : S' \to S$ tel que $u^* P$ soit une famille constante de structures de Hodge.

4.2. Le théorème de semi-simplicité.

(4.2.1) Soit S un espace topologique. Une *famille continue de structures de Hodge* sur S consiste en :

a) Un système local $H_{\mathbb{Z}}$ de $\mathbb{Z}$-modules de type fini sur S.

b) Pour tout point $s \in S$, une structure de Hodge sur la fibre $(H_{\mathbb{Z}})_s$, cette structure variant continûment avec s.

Une famille continue H de structures de Hodge sur S est dite de *poids* n si les fibres H_s $(s \in S)$ sont de poids n.

On définit de même une *famille continue de $\mathbb{Q}$-structures de Hodge* comme un système local de $\mathbb{Q}$-vectoriels, muni en chaque point d'une $\mathbb{Q}$-structure de Hodge variant continûment.

Une *polarisation* d'une famille continue H de $\mathbb{Q}$-structures de Hodge de poids n est un morphisme de systèmes locaux de $H_{\mathbb{Q}} \otimes H_{\mathbb{Q}}$ dans le système local constant $\mathbb{Q}(-n)_{\mathbb{Q}}$, qui en chaque point $s \in S$ définisse une polarisation de H_s.

(4.2.2) Supposons S connexe, et soit $\mathcal{C}$ une sous-catégorie strictement pleine de la catégorie des familles continues de $\mathbb{Q}$-structures de Hodge sur S. On aura à considérer les conditions suivantes :

(4.2.2.1) $\mathcal{C}$ est stable par facteur direct, par somme directe et par produit tensoriel; les familles constantes de Tate $\mathbb{Q}(n)$ $(n \in \mathbb{Z})$ sont dans $\mathcal{C}$.

(4.2.2.2) Toute structure de Hodge homogène (= d'un poids n) dans $\mathcal{C}$ est polarisable.

(4.2.2.3) Pour tout $H \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, il existe un système local $H'_{\mathbb{Z}}$ de $\mathbb{Z}$-modules libres sur S tel que $H'_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Q} \approx H_{\mathbb{Q}}$.

(4.2.2.4) Pour tout H dans $\mathcal{C}$, le plus grand sous-système local constant H' de H est une famille constante de sous-structures de Hodge de H.

***Lemme* (4.2.3).** — *Si $\mathcal{C}$ vérifie les conditions (4.2.2.1) et (4.2.2.2), alors :*

(i) $\mathcal{C}$ est une sous-catégorie abélienne semi-simple de la catégorie abélienne des familles continues de $\mathbb{Q}$-structures de Hodge sur S.

(ii) Si $H \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, alors son dual H^* et les $\bigwedge^p H$ sont dans $\mathcal{C}$; si $H_1, H_2 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, alors $\mathrm{Hom}(H_1, H_2) \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$.

Si $H \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ et si H_1 est un sous-objet de H, dans la catégorie des familles continues de $\mathbb{Q}$-structures de Hodge, prouvons que H_1 est facteur direct de H dans cette catégorie. On peut supposer H homogène. Si ψ est une forme de polarisation pour H, l'orthogonal de H_1 pour ψ est en effet un sous-objet de H supplémentaire de H_1. Ceci prouve (i).

Si $H \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$ est de poids n, une polarisation de H définit un isomorphisme entre H^* et $H \otimes \mathbb{Q}(n)$. D'après (4.2.2.1), on a donc $H^* \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$. Pour H quelconque dans $\mathcal{C}$, si on décompose H en ses composantes homogènes, on a

$$H^* = \bigoplus_n (H^n)^*,$$

d'où encore $H^* \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$. Enfin, $\bigwedge^p H$ est facteur direct dans $\bigotimes^p H$ et $\mathrm{Hom}(H_1, H_2) \simeq H_1^* \otimes H_2$.

Soit $f : X \to S$ un morphisme propre et lisse de schémas réduits. Le faisceau $R^i f_* \mathbb{Q}$ est alors un système local, et pour $s \in S$,

$$(R^i f_* \mathbb{Q})_s \simeq H^i(X_s, \mathbb{Q})$$

est muni d'une $\mathbb{Q}$-structure de Hodge. Celle-ci varie continûment avec s.

***Définition* (4.2.4).** — *Soit S un schéma lisse et connexe. Une famille continue H de $\mathbb{Q}$-structures de Hodge sur S^{an} sera dite algébrique s'il existe un ouvert de Zariski non vide U de S, un entier k et un morphisme projectif et lisse $f : X \to U$ tel que $H|U$ soit facteur direct dans $Rf_*\mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q}(k)$.*

***Proposition* (4.2.5).** —

(i) La catégorie des familles continues algébriques de $\mathbb{Q}$-structures de Hodge sur S vérifie les conditions de (4.2.2).

(ii) Si une famille continue H de structures de Hodge sur S est telle que sa restriction à un ouvert de Zariski dense U de S soit algébrique, alors H est algébrique.

(iii) Si $f : X \to S$ est propre et lisse, alors $Rf_*\mathbb{Q}$ est algébrique.

L'assertion (ii) est évidente. Prouvons (i). Soit $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des familles continues de structures de Hodge sur S qui sont de la forme $Rf_*\mathbb{Q}$ (f projectif et lisse). Alors :

a) D'après la formule de Künneth,

$$R(f \times g)_*\mathbb{Q} \simeq Rf_*\mathbb{Q} \otimes Rg_*\mathbb{Q},$$

$\mathcal{C}_0$ est stable par produit tensoriel.

b) $\mathcal{C}_0$ est stable par somme directe:

$$R(f \amalg g)_*\mathbb{Q} \simeq Rf_*\mathbb{Q} \oplus Rg_*\mathbb{Q}.$$

c) Les composantes homogènes de tout $H \in \mathcal{C}_0$ sont polarisables (cf. (2.2.6)).

d) Les objets $H \in \mathcal{C}_0$ vérifient (4.2.2.3), puisque

$$Rf_*\mathbb{Q} \simeq Rf_*\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Q}.$$

e) Les objets $H \in \mathcal{C}_0$ vérifient (4.2.2.4), d'après (4.1.2).

Soit $\mathcal{C}_1$ l'ensemble des facteurs directs d'objets de $\mathcal{C}_0$. Alors, $\mathcal{C}_1$ est stable par produit tensoriel, somme directe, facteur direct et vérifie (4.2.2.2) à (4.2.2.4). De plus, $\mathbb{Q}(-1)$ est dans $\mathcal{C}_1$, car de la forme $R^2 f_*\mathbb{Q}$ pour $f : \mathbb{P}^1_S \to S$ le fibré projectif. La catégorie $\mathcal{C}_2$ des $H \otimes \mathbb{Q}(k)$ ($k \in \mathbb{N}$) vérifie donc (4.2.2.1) à (4.2.2.4).

Pour en déduire (i), il suffit de noter que si H est une famille continue de structures de Hodge, et U un ouvert de Zariski dense de S, alors un sous-objet, une polarisation, ou un réseau entier de $H|U$ se prolongent de façon unique à H.

Prouvons (iii). Si $f : X \to S$ est projectif et lisse, il existe un ouvert de Zariski dense U de S et un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\quad p \quad} & X|U \\ & {\scriptstyle f'}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle f|U} & \\ & U & \end{array}$$

avec f' projectif et lisse et p birationnel surjectif (appliquer le lemme de Chow et la résolution des singularités à la fibre générique de f). L'application de restriction

$$p^* : (Rf_*\mathbb{Q})|U \longrightarrow Rf'_*\mathbb{Q}$$

est alors une injection directe de familles continues de structures de Hodge, d'inverse à gauche le morphisme de Gysin p_*, d'où l'algébraïcité de $Rf_*\mathbb{Q}$.

Théorème (4.2.6)[(1)]. — *Soit S un espace topologique connexe, localement connexe et localement simplement connexe, muni d'un point base s. Soit $\mathcal{C}$ une catégorie de familles continues de structures de Hodge sur S qui vérifie les conditions (4.2.2). Alors, si $H \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$, la représentation de $\pi_1(S,s)$ sur la fibre $(H_\mathbb{Q})_s$ est semi-simple.*

Soit $H \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{C}$. Le système local $H_\mathbb{Q}$ définit un système local complexe $H_\mathbb{C} = H_\mathbb{Q} \otimes \mathbb{C}$. Pour tout système local complexe V sur S, on désigne par V^c le fibré vectoriel complexe qu'il définit, identifié au faisceau de ses sections continues.

Par définition, le groupe S (2.1.2) agit sur $H^c_\mathbb{C}$. Un sous-fibré de $H^c_\mathbb{C}$ sera dit *horizontal* ou *localement constant* s'il est défini par un sous-système local de $H_\mathbb{C}$.

Lemme (4.2.7). — *Soit V un sous-système local de rang un de $H_\mathbb{C}$. Supposons qu'une puissance tensorielle $V^{\otimes n}$ $(n \geq 1)$ de V soit un système local trivial, i.e. que $\pi_1(S,s)$ agisse sur V_s via un groupe fini (nécessairement cyclique). Alors, pour $t \in S$, tV^c est encore localement constant.*

Pour que tV^c soit localement constant, il suffit que

$$(tV^c)^{\otimes n} = tV^{c\otimes n} \subset \bigotimes^n H_\mathbb{C}$$

le soit. Or $V^{\otimes n}$ est engendré par une section globale horizontale v, et par hypothèse tv est encore horizontal (4.2.2.4).

Procédons par récurrence sur $\dim(H_\mathbb{Q})_s$. On peut supposer H homogène non nul. Soit d la dimension minimale des sous-systèmes locaux complexes non nuls de $H_\mathbb{C}$. La somme W de tous les sous-systèmes locaux de $H_\mathbb{C}$ de dimension d (automatiquement simples) est «définie sur $\mathbb{Q}$», i.e. est de la forme $W_\mathbb{Q} \otimes \mathbb{C}$ pour $W_\mathbb{Q}$ sous-système local de $H_\mathbb{Q}$. Par construction, W_s est un $\pi_1(S,s)$-module semi-simple complexe, donc $(W_\mathbb{Q})_s$ est un $\pi_1(S,s)$-module semi-simple sur $\mathbb{Q}$.

Soit $H_\mathbb{Z}$ un système local de $\mathbb{Z}$-modules libres tels que $H_\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Q} \simeq H_\mathbb{Q}$, et soit $W_\mathbb{Z} = H_\mathbb{Z} \cap W_\mathbb{Q}$. Si W est de dimension e, le système local $(\bigwedge^e W)^{\otimes 2}$ est trivial. En effet :

$$\bigwedge^e W \simeq \bigwedge^e W_\mathbb{Z} \otimes \mathbb{C},$$

et $\pi_1(S,s)$ ne peut agir sur $(\bigwedge^e W_\mathbb{Z})_s$ que par ± 1.

Soit V un sous-système local complexe de dimension d de $H_\mathbb{C}$, et soit V' un supplémentaire de V dans W (semi-simplicité de W). On a

$$\bigwedge^e W \simeq \bigwedge^d V \otimes \bigwedge^{e-d} V'.$$

(1) *(Ajouté sur épreuves.)* Soit S un schéma lisse et connexe. Une *famille de structures de Hodge sur S* est une famille continue H de structures de Hodge sur S qui vérifie les conditions suivantes :

a) La filtration de Hodge de $(H_\mathbb{C})_s$ varie de façon holomorphe avec s, i.e. correspond à une filtration F de $H_\mathcal{O} = H_\mathbb{Z} \otimes \mathcal{O}$.

b) La dérivée covariante ∇ vérifie $\nabla F^p \subset \Omega^1_S \otimes F^{p-1}$.

Soit $\mathcal{C}$ la catégorie de celles des familles continues de $\mathbb{Q}$-structures de Hodge sur S qui sont sous-jacentes à une famille de structures de Hodge, et dont les facteurs directs homogènes sont polarisables. Il est clair que $\mathcal{C}$ vérifie (4.2.2.1) à (4.2.2.3). On peut déduire de résultats de W. Schmid (août 1970, non publié) et de P. A. Griffiths [5] que $\mathcal{C}$ vérifie (4.2.2.4). Ce théorème, dont (4.1.2) est un corollaire, permet d'appliquer (4.2.6) et ses corollaires aux objets de $\mathcal{C}$.

Appliquons (4.2.7) au sous-système local $\bigwedge^d V \otimes \bigwedge^{e-d} V'$ de $\bigwedge^d H_{\mathbb{C}} \otimes \bigwedge^{e-d} H_{\mathbb{C}}$. On trouve que, pour $t \in S$,

$$t(\bigwedge^d V \otimes \bigwedge^{e-d} V')^c = \bigwedge^d tV^c \otimes \bigwedge^{e-d} tV'^c \subset \bigwedge^d H_{\mathbb{C}} \otimes \bigwedge^{e-d} H_{\mathbb{C}}$$

est localement constant. Dès lors, $\bigwedge^d tV^c \subset \bigwedge^d H_{\mathbb{C}}$ et $tV^c \subset H_{\mathbb{C}}$ sont localement constants.

Par définition de W, on a $tV^c \subset W^c$: W^c est stable par S, et $W_{\mathbb{Q}}$ est une sous-structure de Hodge de H. Si ψ est une polarisation de H, H est dès lors somme directe de W et de son orthogonal, tous deux dans $\mathcal{C}$, et on conclut par récurrence.

Corollaire (4.2.8). — *Sous les hypothèses de (4.2.6) :*

(i) *L'algèbre A des endomorphismes du système local $H_{\mathbb{Q}}$ est semi-simple. Elle admet une (et une seule) $\mathbb{Q}$-structure de Hodge telle que, en chaque point s, $A \otimes H_s \to H_s$ soit un morphisme de structures de Hodge.*

(ii) *Le centre de A est de type $(0,0)$ et la loi de composition $\cdot : A \otimes A \to A$ est un morphisme de structures de Hodge.*

(iii) *Soit W un sous-système local complexe de dimension d de $H_{\mathbb{C}}$:*

a) Pour $t \in S$, $tW^c \subset H_{\mathbb{C}}$ est localement constant et définit un sous-système local tW isomorphe à W.

b) Une puissance $(\bigwedge^d W)^{\otimes n}$ $(n \geq 1)$ du système local $\bigwedge^d W$ est un système local trivial.

L'algèbre A est le commutant de $\pi_1(S,s)$ dans $(H_{\mathbb{Q}})_s$. Sa semi-simplicité résulte donc de (4.2.6) et de Bourb., *Alg.*, chap. 8, § 5, n° 2, prop. 4. Par ailleurs, A est la fibre du plus grand sous-système local constant de $\mathrm{Hom}(H,H)$. Puisque $\mathrm{Hom}(H,H) \in \mathcal{C}$ ((4.2.3), (ii)), l'existence de la structure de Hodge (i) résulte de l'hypothèse (4.2.2.4). Il est clair que la loi de composition est un morphisme de structures de Hodge. Il en résulte que le centre Z de A est une sous-structure de Hodge : $Z_{\mathbb{C}}$ est bigradué, comme intersection des noyaux des morphismes bihomogènes $[x, \ ]$ pour x bihomogène. Enfin, Z, donc $Z_{\mathbb{C}}$, est semi-simple, et, pour $(p,q) \neq (0,0)$, Z^{pq} est nul car nilpotent.

Un sous-système local complexe W de $H_{\mathbb{C}}$ est défini par un projecteur e de $A_{\mathbb{C}}$. Pour $t \in S$, tW^c est défini par le projecteur $t.e$, donc est localement constant. Puisque le groupe S est connexe, pour vérifier que tW est isomorphe à W, il suffit de vérifier que, pour t dans un voisinage assez petit de 1, le $\mathbb{C}[\pi_1(S,s)]$-module tW_s est isomorphe à W_s. Soient H_i les composantes isotypiques du $\mathbb{C}[\pi_1(S,s)]$-module $(H_{\mathbb{C}})_s$. On a

$$W_s = \bigoplus_i (W_s \cap H_i)$$

et

$$tW_s = \bigoplus_i (tW_s \cap H_i).$$

De plus, pour t assez proche de 1, tW_s est proche de W_s dans la grassmannienne, et donc

$$\dim(tW_s \cap H_i) \leq \dim(W_s \cap H_i). \qquad \textbf{(4.2.8.1)}$$

En fait, puisque $\dim(tW_s) = \dim(W_s)$, on a égalité dans (4.2.8.1). Les diverses composantes isotypiques de W_s et tW_s ont donc respectivement même longueur, et W_s est isomorphe à tW_s.

Prouvons (iii), *b*). Il suffit de traiter le cas où H est homogène et où W_s est un $\mathbb{C}[\pi_1(S,s)]$-module simple. Soit H_1 la composante isotypique de $(H_{\mathbb{C}})_s$ qui contient W_s. D'après *a*), H_1 est stable par S. Si W_s est de dimension d et H_1 de longueur k, on a

$$\bigwedge^{kd} H_1 \simeq (\bigwedge^d W_s)^{\otimes k}$$

comme $\mathbb{C}[\pi_1(S,s)]$-module. Si χ est le caractère de $\pi_1(S,s)$ défini par $\bigwedge^d W$, le caractère χ_1 défini par $\bigwedge^{kd} H_1$ est donc χ^k. Soit $H_2 = H_1 + \overline{H_1}$. Puisque H_1 est stable par S, H_2 est défini par une sous-structure de Hodge réelle de $(H_{\mathbb{R}})_s$. Toute forme de polarisation sur H induit donc sur H_2 une forme bilinéaire non dégénérée invariante par $\pi_1(S,s)$.

Si $\dim(H_2) = e$, la représentation $(\bigwedge^e H_2)^{\otimes 2}$ de $\pi_1(S,s)$ est donc triviale. Dès lors :

a) Pour H_1 réel : χ^{2k} est trivial;

b) Pour H_1 non réel ($H_1 \neq \overline{H_1}$) : $\chi^{2k} \cdot \bar{\chi}^{2k}$ est trivial.

Dans les deux cas, on a $|\chi| = 1$.

La représentation de $\pi_1(S,s)$ sur $(H_{\mathbb{C}})_s$ provient par extension des scalaires d'une représentation définie sur $\mathbb{Q}$ (savoir $(H_{\mathbb{Q}})_s$). Les représentations conjuguées de W figurent donc dans $(H_{\mathbb{C}})_s$; il y en a au plus $N = \dim(H)$, et, pour tout automorphisme σ de $\mathbb{C}$, on a

$$|\sigma(\chi)| = 1.$$

Pour $\gamma \in \pi_1(S,s)$, $\chi(\gamma)$ est un entier algébrique ayant au plus N conjugués complexes, et ceux-ci sont tous de valeur absolue 1; $\chi(\gamma)$ est donc une racine k-ième de l'unité, avec $k \leq N$. On a donc $\chi^{N!} = 1$, ce qui prouve b).

Corollaire (4.2.9). — *Soit S un schéma lisse, connexe et séparé, muni d'un point base $s \in S$. Soient $f : X \to S$ un morphisme de schémas tel que $R^n f_* \mathbb{Q}$ soit un système local sur S, G l'adhérence de Zariski de l'image de $\pi_1(S,s)$ dans $\mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}((R^n f_* \mathbb{C})_s)$, et G^0 la composante neutre de G. Alors :*

a) *Si f est propre et lisse, G^0 est semi-simple.*

b) *En général, G^0 n'admet aucun quotient de type multiplicatif (i.e., le radical de G^0 est unipotent).*

Prouvons *a*). Quitte à remplacer S par un revêtement étale fini, on se ramène au cas où $G = G^0$. Par ((4.2.5), (iii)), le système local $R^n f_* \mathbb{Q}$ est sous-jacent à une famille algébrique H de structures de Hodge, donc est justiciable de (4.2.8) ((4.2.5), (i)). Le groupe G est réductif, car il admet une représentation semi-simple fidèle, à savoir $(R^n f_* \mathbb{C})_s$. Si G (supposé connexe) n'était pas semi-simple, il admettrait une représentation complexe non triviale ρ de rang un; puisque H_s est fidèle, ρ serait facteur direct dans $((H_{\mathbb{C}} + H_{\mathbb{C}}^*)^{\otimes m})_s$ pour un m. Ceci contredit (4.2.8), (iii), *b*), car $(H + H^*)^{\otimes m}$ est algébrique et aucune puissance tensorielle de ρ n'est triviale.

Soit π un groupe, et considérons la propriété suivante d'une représentation ρ de π dans un vectoriel complexe V de dimension finie:

> $(*)$ La composante neutre G^0 de l'adhérence de Zariski G de $\rho(\pi)$ dans $\mathrm{Aut}(V)$ n'admet aucun quotient de type multiplicatif.

Lemme (4.2.10). — *Soit $0 \to V' \to V \to V'' \to 0$ une suite exacte de représentations du type précédent. Alors, V vérifie $(*)$ si (et seulement si) V' et V'' vérifient $(*)$.*

Soient G, G' et G'' les groupes définis par V, V' et V''. Comme π, G laisse V' stable, d'où un morphisme

$$u = (u', u'') : G \longrightarrow G' \times G'',$$

de noyau unipotent, et tel que u' et u'' soient surjectifs. Soit N la composante neutre du noyau de u''. Puisque u' est surjectif, $u'(N)$ est distingué dans G', et n'admet donc aucun quotient de type multiplicatif. Si χ est un caractère de G^0, χ se factorise par $u(G^0)$, s'annule sur N, une puissance de χ se factorise par G''^0, et χ est trivial.

Prouvons (4.2.9), *b)*, par dévissage et par récurrence sur la dimension relative de f. On peut supposer X réduit.

Supposons tout d'abord X quasi-projectif. Il existe alors un ouvert non vide U de S, un ouvert dense X' de $X_U = f^{-1}(U)$ lisse sur U, et une compactification $\overline{X}'$ de X' au-dessus de U, propre et lisse sur U. On peut choisir $\overline{X}'$ tel qu'un ouvert X'' de $\overline{X}'$ contienne X' et soit propre sur X_U



On dispose de suites exactes longues de faisceaux

$$\to R^i f_{U*}(i_! \mathbb{Q}) \to R^i f_{U*} \mathbb{Q} \to R^i f_{U*}(\mathbb{Q}/i_! \mathbb{Q}) \to$$
$$\to R^i f''_*(j_! \mathbb{Q}) \to R^i f''_* \mathbb{Q} \to R f''_*(\mathbb{Q}/j_! \mathbb{Q}) \to$$
$$\to R^i f''_! \mathbb{Q} \to R^i \bar{f}'_* \mathbb{Q} \to R^i \bar{f}'_*(\mathbb{Q}/k_! \mathbb{Q}) \to$$

Pour U assez petit, ces faisceaux sont des systèmes locaux et l'hypothèse de récurrence s'applique à $R^*f_{U*}(\mathbb{Q}/i_!\mathbb{Q})$, à $R^*f''_*(\mathbb{Q}/j_!\mathbb{Q})$, et à $R^*\bar{f}'_*(\mathbb{Q}/k_!\mathbb{Q})$. D'après *a)*, la condition $(*)$ est vérifiée par $R^*\bar{f}'_*\mathbb{Q}$. D'après (4.2.10), elle est dès lors vérifiée par $R^*f''_!\mathbb{Q}$, et par le système local dual $R^*f''_*\mathbb{Q}$ (dualité de Poincaré). D'après (4.2.10), la condition $(*)$ est vérifiée par $R^*f''_*(j_!\mathbb{Q})$, isomorphe à $R^*f_{U*}(i_!\mathbb{Q})$ car p est propre, ainsi que par $R^*f_{U*}\mathbb{Q}$. Puisque le morphisme $\pi_1(U)\to\pi_1(S)$ est surjectif, $R^if_*\mathbb{Q}$ vérifie (4.2.9), *b)*.

Pour passer du cas f quasi-projectif au cas général, il suffit d'utiliser la suite spectrale de Leray pour un recouvrement (U_i) de X par des ouverts quasi-projectifs :

$$R^*f_*(\bigcap_i U_i,\mathbb{Q})\Rightarrow R^*f_*\mathbb{Q},$$

et (4.2.10).

4.3. Complément à [2].

Dans [2], (5.4) (footnote), j'affirme sans démonstration que

Proposition (4.3.1). — *Soit X un schéma propre et lisse sur $\mathbb{C}$. Si une forme C^∞ sur X vérifie $d'\alpha=d''\alpha=0$ et est cohomologue à zéro, alors il existe β tel que $\alpha=d'd''\beta$.*

Voici la démonstration. Comme en *loc. cit.*, on se ramène au cas où α est bihomogène, d'un bidegré (p,q). Puisque la suite spectrale du complexe double $H^0(X,\mathcal{A}^{pq})$ dégénère, la différentielle extérieure d est strictement compatible à la filtration par le premier degré p (1.3.2). Si $\alpha\sim 0$, il existe donc une forme β_1 telle que $d\beta_1=\alpha$ et que les composantes $\beta_1^{p'q'}$ de β_1 soient nulles pour $p'<p$.

Par conjugaison complexe, il existe de même β_2 tel que $d\beta_2=\alpha$ et que $\beta_2^{p'q'}=0$ pour $q'<q$. On a $d(\beta_1-\beta_2)=0$.

Soit γ une forme vérifiant $d'\gamma=d''\gamma=0$ dans la classe de cohomologie de $\beta_1-\beta_2$ (*loc. cit.*). Soit γ_1 (resp. γ_2) la somme des composantes de γ de type (p',q') pour $p'\geq p$ (resp. $q'\geq q$). Posant $\beta'_1=\beta_1-\gamma_1$ et $\beta'_2=\beta_2+\gamma_2$, on a encore $d\beta'_1=d\beta'_2=\alpha$; de plus, $\beta'_1-\beta'_2=\beta_1-\beta_2-\gamma$ est cohomologue à zéro : il existe δ tel que

$$d\delta=\beta'_1-\beta'_2.$$

Soient δ_1 la somme des composantes de type (p',q') de δ avec $p'<p-1$, δ_2 la somme des composantes pour lesquelles $q'>q-1$ et β la composante de type $(p-1,q-1)$.



On a $\beta'_2=d\delta_2+d''\beta$ et $\alpha=d\beta'_2=dd\delta_2+dd''\beta=d'd''\beta$.

4.4. Homomorphismes de schémas abéliens.

On se propose de montrer comment, dans quelques cas, on peut débarrasser (4.1.3.2) de l'hypothèse d'algébraïcité en un point.

(4.4.1) Pour $f:X\to S$ un morphisme propre et lisse, on désignera par $R_if_*\mathbb{Z}$ le système local sur S^{an} de l'homologie des fibres de f. En chaque point $s\in S$, $(R_if_*\mathbb{Z})_s\simeq H_i(X_s,\mathbb{Z})$ est muni d'une structure de Hodge de poids $-i$, duale de la structure de Hodge de $H^i(X_s,\mathbb{Z})$. Cette structure varie continûment avec $s\in S$.

(4.4.2) Si $f : X \to S$ est un schéma abélien, l'exponentielle définit une suite exacte de faisceaux sur S^{an}

$$0 \to R_1 f_* \mathbb{Z} \to \mathrm{Lie}(X) \to X \to 0,$$

et la filtration de Hodge est la suite exacte courte

$$0 \to \mathrm{Ker}(\alpha) \to R_1 f_* \mathbb{Z} \otimes \mathcal{O} \xrightarrow{\alpha} \mathrm{Lie}(X) \to 0.$$

Il est connu que

Rappel (4.4.3). — *Soit S un schéma lisse de type fini sur $\mathbb{C}$. La construction (4.4.2) établit une équivalence de catégorie entre :*

a) la catégorie des schémas abéliens sur S;

b) la catégorie des familles continues polarisables de structures de Hodge H de type $(-1,0)+(0,-1)$ sur S, telles que $H_{\mathbb{Z}}$ soit sans torsion et que la filtration de Hodge varie holomorphiquement sur S.

La surjectivité essentielle du foncteur a)↦b) résulte de Borel [13]; la pleine fidélité résulte de ce que, pour X_1 et X_2 deux schémas abéliens sur S, le S-schéma $\mathrm{Hom}_S(X_1, X_2)$ est non ramifié sur S, donc a mêmes sections algébriques ou holomorphes.

(4.4.4) Soient Z un corps commutatif, H une algèbre centrale simple sur Z et $*$ un antiautomorphisme Z-linéaire de H. Après extension des scalaires, on a $H \simeq \mathrm{End}(V)$ pour V un vectoriel sur Z, et $*$ est alors la transposition par rapport à une forme bilinéaire Φ sur V, unique à un facteur près. Supposons que $*$ soit involutif; les formes $\Phi(X,Y)$ et $\Phi(Y,X)$ sont alors proportionnelles : $\Phi(X,Y) = \lambda\Phi(Y,X)$, avec $\lambda^2 = 1$. *On pose* $\varepsilon_* = \lambda$. Si $[H : Z] = d^2$, on a

$$\mathrm{Tr}(* : H \to H) = \varepsilon_* \cdot d.$$

Tout automorphisme Z-linéaire C de H est intérieur : $Cx = cxc^{-1}$. Si C est involutif et commute à $*$, les éléments c^2 et cc^* sont centraux, de sorte que $c^* = \lambda c$ avec λ central. Puisque $c^{**} = c$, on a $\lambda^2 = 1$. *On pose* $\varepsilon_C = \lambda$.

On vérifie aisément que l'involution $C \circ *$ satisfait à

$$\varepsilon_{C\circ *} = \varepsilon_C \cdot \varepsilon_*.$$

Rappel (4.4.5). — *Soient X une variété abélienne simple sur un corps K et H le corps $\mathrm{End}_K(X) \otimes \mathbb{Q}$. Toute polarisation de X définit une involution positive $*$ de H :*

$$\mathrm{Tr}(hh^*) > 0 \qquad \textit{si } h \neq 0.$$

Si Z_0 est le sous-corps invariant par $*$ du centre Z de H, Z_0 est donc totalement réel et on est dans l'un des cas suivants :

a) $Z = Z_0$; pour toute place réelle ρ de Z, $H \otimes_\rho \mathbb{R}$ est une algèbre de matrices sur $\mathbb{R}$, et $\varepsilon_* = 1$.

b) $Z = Z_0$; pour toute place réelle ρ de Z, $H \otimes_\rho \mathbb{R}$ est une algèbre de matrices sur $\mathbb{H}$, et $\varepsilon_* = -1$.

c) Z est une extension quadratique totalement imaginaire de Z_0.

(4.4.6) Soient $f_i : X_i \to S$ $(i = 1, 2)$ deux schémas abéliens sur un schéma lisse S. Le groupe abélien libre

$$\mathrm{Hom}(R_1 f_{1*}\mathbb{Z}, R_1 f_{2*}\mathbb{Z}) \simeq \Gamma\big(S, \mathrm{Hom}(R_1 f_{1*}\mathbb{Z}, R_1 f_{2*}\mathbb{Z})\big)$$

est alors muni d'une structure de Hodge de poids 0 (4.2.8). De plus, d'après (2.1.11.1) et (4.4.3), le groupe $\mathrm{Hom}_S(X_1, X_2)$ est la composante de type $(0,0)$ de ce groupe.

(4.4.7) Soit S un schéma lisse connexe non vide de point générique η et soit $f : X \to S$ un schéma abélien sur S. Le centre Z de $H = \mathrm{End}(R_1 f_* \mathbb{Z})$ est alors de type $(0,0)$ (4.2.8), donc contenu dans $\mathrm{End}_S(X) \simeq \mathrm{End}_{k(\eta)}(X_\eta)$.

Une polarisation de X définit une involution $*$ de H. La restriction de celle-ci à $\mathrm{End}_S(X)$ est positive, de sorte que Z est produit de corps totalement réels ou extensions quadratiques imaginaires de corps totalement réels.

Désignons par C les actions de $i \in S(\mathbb{R})$ sur $H_\mathbb{R} = H \otimes \mathbb{R}$ et sur les $(R_1 f_* \mathbb{R})_s$, pour $s \in S$. Sur $H_\mathbb{R}$, $C^2 = 1$, et C commute à $*$; sur $(R_1 f_* \mathbb{R})_s$, $C^2 = -1$. Si ψ est la forme alternée sur $R_1 f_* \mathbb{Z}$, à valeurs entières, déduite de la polarisation de X, on a

$$\psi(hx, Cy) = \psi(x, h^* Cy) = \psi(x, C \cdot C(h^*) \cdot y).$$

On en déduit que

$$\mathrm{Tr}(h \cdot C(h^*)) > 0 \qquad \text{pour } h \neq 0. \tag{4.4.7.1}$$

(4.4.8) Supposons maintenant que X_η soit simple, de sorte que Z soit un corps. Soit $\rho : Z \to \mathbb{C}$ un plongement complexe. L'algèbre

$$H_\rho = H \otimes_{Z,\rho} \mathbb{C}$$

est alors une algèbre de matrices et un facteur direct bigradué dans $H_\mathbb{C} = H \otimes_\mathbb{Q} \mathbb{C}$. Choisissons un isomorphisme

$$H_\rho \simeq \mathrm{End}(V_\rho). \tag{4.4.8.1}$$

Du fait que les générateurs infinitésimaux de S agissent sur H_ρ par des dérivations, nécessairement intérieures, on déduit que V_ρ admet une bigraduation, unique à translation près, telle que (4.4.8.1) soit un isomorphisme bigradué. Soit $(R_1 f_* \mathbb{C})_\rho$ le système local bigradué

$$(R_1 f_* \mathbb{C}) \otimes_{Z \otimes \mathbb{C}, \rho} \mathbb{C},$$

facteur direct de $R_1 f_* \mathbb{C}$. Désignons par T_ρ le système local

$$T_\rho = \mathrm{Hom}_{H_\rho}(V_\rho, (R_1 f_* \mathbb{C})_\rho).$$

On a

$$V_\rho \otimes_\mathbb{C} T_\rho \xrightarrow{\sim} (R_1 f_* \mathbb{C})_\rho \tag{4.4.8.2}$$

(isomorphisme bigradué). Puisque $(R_1 f_* \mathbb{C})_\rho$ est du type $(-1,0)+(0,-1)$, une des conditions suivantes est vérifiée:

a) V_ρ est bihomogène;

b) T_ρ est bihomogène.

Il est clair que la condition a) (resp. b)) est simultanément vérifiée pour ρ et pour $\bar{\rho}$. Si la condition a) est vérifiée en chaque place, alors H est de type $(0,0)$. Si la condition b) est vérifiée en chaque place, alors la structure de Hodge sur $R_1 f_* \mathbb{Q}$ est localement constante.

(4.4.9) Supposons maintenant que Z soit totalement réel. Pour chaque plongement réel φ de Z, on posera $\varepsilon_{H,\varphi} = +1$ si $H \otimes_{Z,\varphi} \mathbb{R}$ est une algèbre de matrices et $\varepsilon_{H,\varphi} = -1$ sinon. Si un plongement complexe ρ induit un plongement réel φ, on pose $\varepsilon_{H,\rho} = \varepsilon_{H,\varphi}$.

Soit $\rho : Z \to \mathbb{C}$, se factorisant par $\varphi : Z \to \mathbb{R}$. La conjugaison complexe sur H_ρ est induite par un automorphisme antilinéaire σ_1 de V_ρ, unique à un facteur scalaire réel près, de carré scalaire. Puisque σ_1 commute à σ_1^2, σ_1^2 est réel et, normalisant σ_1, on peut supposer que $\sigma_1^2 = \pm 1$. On a alors

$$\sigma_1^2 = \varepsilon_{H,\rho}. \tag{4.4.9.1}$$

L'automorphisme de conjugaison complexe sur

$$(R_1 f_* \mathbb{C})_\rho = ((R_1 f_* \mathbb{Q}) \otimes_{Z,\varphi} \mathbb{R}) \otimes_\mathbb{R} \mathbb{C}$$

est «compatible»à (4.4.8.2) et peut s'écrire

$$\sigma = \sigma_1 \otimes \sigma_2.$$

Puisque $\sigma^2 = 1$, on a par (4.4.9.1)

$$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \varepsilon_{H,\rho}. \tag{4.4.9.2}$$

Soit Φ une forme de polarisation sur $R_1 f_* \mathbb{Z}$. Cette forme est nécessairement du type

$$\Phi = \mathrm{Tr}_{Z/\mathbb{Q}}(\psi),$$

où ψ est une forme Z-bilinéaire alternée sur $R_1 f_* \mathbb{Q}$.

Soit ψ_ρ la forme induite sur $V_\rho \otimes_{\mathbb{C}} T_\rho$. La forme alternée ψ_ρ est invariante par $\pi_1(S, s)$. Puisque T_ρ est irréductible, on peut l'écrire

$$\psi_\rho = A_\rho \otimes B_\rho, \tag{4.4.9.3}$$

avec A_ρ sur V_ρ, et B_ρ sur T_ρ invariante par $\pi_1(S, s)$.

Puisque T_ρ est irréductible, B_ρ est symétrique ou alternée. Puisque ψ_ρ est alternée, A_ρ est alors alternée ou symétrique. Puisque les T_ρ sont conjugués entre eux, qu'on soit dans l'un ou l'autre cas ne dépend pas de ρ. On pose

$$A_\rho(X, Y) = \varepsilon_V A_\rho(Y, X), \tag{4.4.9.4}$$

$$B_\rho(X, Y) = \varepsilon_T B_\rho(Y, X). \tag{4.4.9.5}$$

On a donc

$$\varepsilon_V \varepsilon_T = -1 \tag{4.4.9.6}$$

et il est clair sur (4.4.4) que si $*$ est l'involution de H déduite de ψ,

$$\varepsilon_* = \varepsilon_V. \tag{4.4.9.7}$$

Dans le cas (4.4.8), a) (resp. b)), normalisons les bigraduations de sorte que V_ρ (resp. T_ρ) soit de bidegré $(0, 0)$. On a alors pour x, y non nuls dans V_ρ et T_ρ:

$$\begin{aligned} &\text{cas a)} \quad A_\rho(x, \sigma_1 x)\, B_\rho(y, C\sigma_2 y) > 0; \\ &\text{cas b)} \quad A_\rho(x, C\sigma_1 x)\, B_\rho(y, \sigma_2 y) > 0. \end{aligned}$$

Normalisant A_ρ et B_ρ (dont seul le produit tensoriel est donné), on peut supposer que

$$\begin{aligned} &\text{cas a)} \quad A_\rho(x, \sigma_1 x) > 0 \quad \text{et} \quad B_\rho(y, C\sigma_2 y) > 0; \\ &\text{cas b)} \quad A_\rho(x, C\sigma_1 x) > 0 \quad \text{et} \quad B_\rho(y, \sigma_2 y) > 0. \end{aligned}$$

De plus, A_ρ et B_ρ, tout comme Φ, sont invariantes par le sous-tore compact $\mathrm{Ker}(N)$ de S, et en particulier par C. On a dans le cas a)

$$0 < A_\rho(\sigma_1 x, \sigma_1 \sigma_1 x) = \varepsilon_V \cdot \varepsilon_{H,\rho} \cdot A_\rho(x, \sigma_1 x),$$

d'où $\varepsilon_V \cdot \varepsilon_{H,\rho} = 1$. De même, dans le cas b), on trouve que $\varepsilon_T \cdot \varepsilon_{H,\rho} = 1$.

Lemme (4.4.10). Pour $\varepsilon_T = \varepsilon_{H,\rho}$, on est dans le cas b); pour $\varepsilon_T = -\varepsilon_{H,\rho}$, on est dans le cas a).

Proposition (4.4.11). Soient S un schéma lisse connexe non vide, de point générique η, $f : X \to S$ un schéma abélien sur S, $H = \mathrm{End}(R_1 f_* \mathbb{Q})$, et Z le centre de H. On suppose que:

(a) X_η est simple sur $k(\eta)$.

(b) X ne devient constant sur aucun revêtement fini de S.

(c) Une des conditions suivantes est vérifiée (cf. (4.4.5)):

- (c_1) Z est quadratique imaginaire;
- (c_2) Z est totalement réel, et pour chaque plongement réel $\varphi : Z \to \mathbb{R}$, $H \otimes_{Z,\varphi} \mathbb{R}$ est une algèbre de matrices sur $\mathbb{R}$;
- (c_3) Z est totalement réel, et pour chaque plongement réel $\varphi : Z \to \mathbb{R}$, $H \otimes_{Z,\varphi} \mathbb{R}$ est une algèbre de matrices sur $\mathbb{H}$.

On a alors

$$\mathrm{End}(X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}(R_1 f_* \mathbb{Z}).$$

Montrons qu'on est dans le cas (4.4.8), a), ou (4.4.8), b) pour toutes les places de Z simultanément. C'est clair (4.4.8) sous l'hypothèse (c_1), et résulte de (4.4.10) sous les hypothèses (c_2) ou (c_3), car non seulement ε_T, mais encore $\varepsilon_{H,\rho}$ est alors indépendant de ρ.

La condition (4.4.8), b) ne peut pas être vérifiée en chaque place de Z, car la structure de Hodge serait alors localement constante, ce qui d'après (4.1.3.3) et (4.4.3) viole b). La condition a) est donc vérifiée en chaque place de Z, de sorte que H est de type $(0,0)$ (4.4.8). Compte tenu de (4.4.3), ceci achève la démonstration.

Proposition (4.4.12). Soit $f : X \to S$ un schéma abélien sur un schéma lisse S. Les conditions suivantes sont équivalentes:

(i) Pour tout schéma abélien $g : Y \to S$, on a

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(R_1 f_* \mathbb{Z}, R_1 g_* \mathbb{Z}).$$

(ii) La condition (i) est vérifiée pour $X = Y$, et le centre Z de $\mathrm{End}_S(X) \otimes \mathbb{Q}$ n'admet aucune place complexe $\rho : Z \to \mathbb{C}$ telle que le facteur direct $R_1 f_* \mathbb{Q} \otimes_{Z,\rho} \mathbb{C}$ de $R_1 f_* \mathbb{C}$ soit purement de type de Hodge $(-1, 0)$.

On se ramène à supposer que S est connexe non vide, de point générique η, et que X_η est une variété abélienne simple sur $k(\eta)$. Si (i) ou (ii) est vérifiée, $D = \mathrm{End}(X_\eta) \otimes \mathbb{Q}$ est alors un corps, et, pour $s \in S$, $(R_1 f_* \mathbb{Q})_s$ est une représentation irréductible de $\pi_1(S, s)$.

Pour prouver que (ii) $\Rightarrow$ (i), on peut supposer Y_η simple, et $(R_1 g_* \mathbb{Q})_s$ isotypique de type $(R_1 f_* \mathbb{Q})_s$. On a alors un isomorphisme de familles continues de $\mathbb{Q}$-structures de Hodge (D étant de type $(0,0)$)

$$R_1 g_* \mathbb{Q} \approx R_1 f_* \mathbb{Q} \otimes_D \mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbb{Q}, R_1 g_* \mathbb{Q}).$$

On a $D \otimes \mathbb{C} \simeq M_n(Z \otimes \mathbb{C})$. Si $e \in D \otimes \mathbb{C}$ se transforme par un tel isomorphisme en l'idempotent e_{11}, on a encore un isomorphisme de vectoriels bigradués

$$(R_1 g_* \mathbb{C})_s \approx (R_1 f_* \mathbb{C})_s \otimes_{Z \otimes \mathbb{C}} e\big(\mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbb{C}, R_1 g_* \mathbb{C})\big).$$

Si la condition (ii) est vérifiée, et si $e\big(\mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbb{C}, R_1 g_* \mathbb{C})\big)$ n'est pas purement de type $(0,0)$, alors $(R_1 g_* \mathbb{C})_s$ ne pourrait pas être purement de type $(-1,0) + (0,-1)$, ce qui est absurde. On en déduit que $\mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbb{Z}, R_1 g_* \mathbb{Z})$ est purement de type $(0,0)$, et (i) en résulte par (4.4.3) et (2.1.11.1).

Soit Z une extension quadratique totalement imaginaire d'un corps de nombres totalement réel Z^0. Si $Z \otimes \mathbb{R} \simeq \mathbb{C} \oplus \cdots \oplus \mathbb{C}$, on définit une action par homothéties de S sur $Z \otimes \mathbb{R}$ en envoyant $s \in S(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{C}^*$ sur $(s^2 \cdot N(s)^{-1}, 1, \ldots, 1)$. Le couple formé de Z et de cette action de S sur $Z \otimes \mathbb{R}$ est une structure de Hodge polarisable Z_ρ, de type $(-1,1) + (0,0) + (1,-1)$, qui dépend de Z et de la place choisie $\rho : Z \to \mathbb{C}$.

Soit X un schéma abélien sur S, tel que X_η soit simple. Si le centre Z de $\mathrm{End}(R_1 f_* \mathbb{Q})$ n'est pas totalement réel, il est extension quadratique totalement imaginaire d'un corps de nombres totalement réel. Si la seconde hypothèse de (ii) est violée, le facteur direct $R_1 f_* \mathbb{Q} \otimes_Z Z_\rho$ de la famille continue de structures de Hodge polarisable $R_1 f_* \mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Q}} Z_\rho$ est purement de type $(-1,0) + (0,-1)$.

D'après (4.4.3), le choix d'un réseau entier dans $R_1 f_* \mathbb{Q} \otimes_Z Z_\rho$ définit un schéma abélien $g : Y \to S$, et $\mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbb{Q}, R_1 g_* \mathbb{Q})$ n'est pas purement de type $(0,0)$, ce qui viole (i).

***Corollaire* (4.4.13).** — *Soient S un schéma lisse connexe de point générique η et $f : X \to S$ un schéma abélien sur S de dimension relative $g \leq 3$. On suppose que sur aucun revêtement étale fini de S, X n'admet de sous-schéma abélien constant. Alors, pour tout schéma abélien $g : Y \to S$, on a*

$$\mathrm{Hom}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbb{Z}, R_1 g_* \mathbb{Z})$$

et

$$\mathrm{Hom}(Y, X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(R_1 g_* \mathbb{Z}, R_1 f_* \mathbb{Z}).$$

Par dualité, on se ramène à ne prouver que la première assertion. On se ramène aussi à supposer X_η simple. Vérifions que X satisfait à l'une des conditions (c) de (4.4.11). Posons $H = M_c(D)$, D étant un corps gauche de rang b^2 sur son centre Z, que l'on sait être totalement réel ou totalement imaginaire. Posant $a = [Z : \mathbb{Q}]$, on a

$$ab^2 c \mid 2g \leq 6. \tag{4.4.13.1}$$

1) Si Z est totalement imaginaire, et non quadratique imaginaire, on doit avoir $a = 2g = 4$. Pour $s \in S$, le commutant de Z agissant sur $(R_1 f_* \mathbb{Q})_s$ est alors commutatif, de sorte que l'action de $\pi_1(S, s)$ est abélienne, donc se factorise par un groupe fini ((4.2.8), (iii), b) ou (4.2.9)). Ceci est absurde ((4.1.3.3) et (4.4.3)).

   Avec les notations de (4.4.8), on pourrait aussi noter que les T_ρ sont alors de rang un, de sorte que la condition (4.4.8), b) est vérifiée en chaque place et que la structure de Hodge est localement constante.

2) Si Z est totalement réel et si les conditions (c_1) et (c_2) sont violées, alors $a \geq 2$ et $b \geq 2$, ce qui est absurde.

Vérifions que X satisfait aux conditions de (4.4.12). Si Z est quadratique imaginaire, et s'il existe $\rho : Z \to \mathbb{C}$ tel que $R_1 f_* \mathbb{Q} \otimes_{Z,\rho} \mathbb{C}$ soit purement de type de Hodge $(-1, 0)$, alors la structure de Hodge de $R_1 f_* \mathbb{Q}$ est localement constante, ce qui est absurde. Ceci prouve (4.4.13).

(4.4.14) Soit $f : X \to S$ un schéma abélien polarisé de dimension g sur une base lisse et connexe S. Si $s \in S$, le groupe fondamental $\pi_1(S, s)$ agit sur la fibre $H^1(X_s, \mathbb{Z})$ de $R^1 f_* \mathbb{Z}$ en s. La polarisation de X définit une forme alternée sur $H^1(X_s, \mathbb{Z})$, à valeurs dans $\mathbb{Z}(-1)$, non dégénérée sur $\mathbb{Q}$, et l'action de $\pi_1(S, s)$ se fait en respectant cette forme. Considérons l'hypothèse:

> **(4.4.14.1)** Le morphisme défini par X de S dans l'une des composantes irréductibles du schéma de modules de variétés abéliennes polarisées correspondant est un morphisme dominant.

Le résultat suivant m'a été suggéré par J.-P. Serre.

***Corollaire* (4.4.15).** — *Soient S un schéma lisse connexe et $f : X \to S$ un schéma abélien polarisé sur S qui vérifie (4.4.14.1). Alors, pour tout schéma abélien $g : Y \to S$, on a*

$$\mathrm{Hom}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(R_1 f_* \mathbb{Z}, R_1 g_* \mathbb{Z}).$$

Soit $s \in S$. D'après (4.4.11) et (4.4.12), il suffit de montrer que la représentation de $\pi_1(S, s)$ sur $(R_1 f_* \mathbb{Q})_s$ est absolument irréductible, de sorte que $H = \mathbb{Q}$. C'est ce qui résulte du lemme suivant.

***Lemme* (4.4.16).** — *Si X vérifie (4.4.14.1), alors l'image de $\pi_1(S, s)$ dans le groupe des automorphismes symplectiques de $H^1(X_s, \mathbb{Z})$ est d'indice fini.*

Soit n un entier. Quitte à remplacer S par un revêtement étale surjectif, défini par un sous-groupe d'indice fini de $\pi_1(S, s)$, on peut supposer que le système local ${}_nX = \mathrm{Ker}(n \cdot \mathrm{id} : X \to X)$ est trivial sur S. Remplaçant X par un schéma abélien isogène, on se ramène ensuite et de plus à supposer X polarisé de la série principale. Supposons $n \geq 3$.

Le schéma abélien X définit alors un morphisme dominant x de S dans le schéma de modules «de Jacobi» M_n des schémas abéliens polarisés de la série principale munis d'un isomorphisme symplectique entre ${}_nX$ et $(\mathbb{Z}/n)^{2g}$; de plus, X est une image réciproque par x du schéma abélien universel sur M_n. On sait que $\pi_1(M_n, x(s))$ s'envoie isomorphiquement sur le sous-groupe de $\mathrm{Sp}(H^1(X_s, \mathbb{Z}))$ noyau de l'application de réduction modulo n.

Il reste donc à vérifier que:

***Lemme* (4.4.17).** — *Soit $p : S \to M$ un morphisme dominant de schémas lisses connexes. Le sous-groupe $p(\pi_1(S, s))$ de $\pi_1(M, p(s))$ est alors d'indice fini.*

Soit t un point fermé de la fibre générique de p, et soit T' son adhérence dans S. Il existe un ouvert de Zariski dense U de M tel que $T = p^{-1}(U) \cap T'$ soit un revêtement étale de U.

On ne restreint pas la généralité en prenant $s \in T$. Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(T, s) & \longrightarrow & \pi_1(S, s) \\ \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle c} \\ \pi_1(U, p(s)) & \xrightarrow[b]{} & \pi_1(M, p(s)) \end{array}$$

la flèche a a une image d'indice fini, car T est un revêtement fini étale, et la flèche b est surjective, car $M - U$ est de codimension réelle ≥ 2. La flèche c a donc une image d'indice fini.

BIBLIOGRAPHIE

[1] M. F. Atiyah and W. V. D. Hodge, Integrals of the second kind on an algebraic variety, *Ann. of Math.*, **62** (1955), 56–91.

[2] P. Deligne, Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **35** (1968), 107–126.

[3] P. Deligne, Equations différentielles à points singuliers réguliers, *Lectures Notes in mathematics*, **163**, Springer, 1970.

[4] P. A. Griffiths, On the periods of certain rational integrals, I, *Ann. of Math.*, **90**, 3 (1969), 460–495.

[5] P. A. Griffiths, Periods of integrals on algebraic manifolds, III, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **38** (1970), 125–180.

[6] A. Grothendieck, Le groupe de Brauer, III : Exemples et compléments. *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North-Holland Publ. Co., 1968.

[7] A. Grothendieck, Un théorème sur les homomorphismes de schémas abéliens, *Inv. Math.*, **2** (1966), 59–78.

[8] H. Hironaka, Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, *Ann. of Math.*, **79** (1964), 109–326.

[9] W. V. D. Hodge, *The theory and applications of harmonic integrals*, Cambridge Univ. Press, 2^{e} éd., 1952.

[10] N. Katz, Nilpotent connections and the monodromy theorem. Applications of a result of Turritin, *Publ. Math. I.H.E.S.*, **39** (1971), 175–232.

[11] M. Nagata, Imbedding of an abstract variety in a complete variety, *J. Math. Kyoto*, **2**, 1 (1962), 1–10.

[12] A. Weil, Variétés kählériennes, *Publ. Inst. Math. Univ. Nancago*, VI, Paris, Hermann, 1958.

[13] A. Borel, non publié.

[14] P. Deligne, Théorie de Hodge, I, *Actes du Congrès international des mathématiciens*, Nice, 1970.

TF R. Godement, Topologie algébrique et théorie des faisceaux, *Publ. Inst. Math. Univ. Strasbourg*, XIII, Paris, Hermann, 1958.

Manuscrit reçu le 15 septembre 1970.

Extrait de « Mathematica & Pædagogia » n° 46

UNE CONGRUENCE ENTRE COEFFICIENTS MULTINOMIAUX

par P. DELIGNE
Institut des Hautes Études Scientifiques, Bures sur Yvette

Soit p un nombre premier. Pour tout entier $m \neq 0$, on désigne par $v(m)$ l'exposant de la plus haute puissance de p qui divise m. On pose de plus $v(0) = \infty$.

Pour $\mathfrak{n} = (n_1, \ldots, n_k)$ un k-uple d'entiers ≥ 0, on pose

$$|\mathfrak{n}| = \sum_1^k n_i, \qquad a\mathfrak{n} = (an_1, \ldots, an_k), \qquad X^{\mathfrak{n}} = \prod_1^k X_i^{n_i}, \qquad \mathfrak{n}! = \prod_1^k n_i!$$

et on désigne par $C(\mathfrak{n})$ le coefficient du monôme $X^{\mathfrak{n}}$ dans

$$\left(\sum_1^k X_i\right)^{|\mathfrak{n}|}$$

(coefficients multinômiaux).

On a donc

$$\left(\sum_1^k X_i\right)^n = \sum_{|\mathfrak{n}|=n} C(\mathfrak{n}) X^{\mathfrak{n}} \tag{1}$$

$$C(\mathfrak{n}) = \frac{|\mathfrak{n}|!}{\mathfrak{n}!} \tag{2}$$

Pour $k = 2$, ce sont là les coefficients binômiaux.

$$C(n_1, n_2) = \binom{n_1 + n_2}{n_1} \tag{3}$$

Proposition.— *Soient $\mathfrak{n}$ un k-uple d'entiers ≥ 0, et $n = |\mathfrak{n}|$. Si p est un nombre premier ≥ 5, on a*

$$C(p^l \mathfrak{n}) \equiv C(\mathfrak{n}) \pmod{p^{v(n)+3}} \tag{4}$$

Exemple.— Pour $p = 5$, $k = 2$, $l = 1$ et $\mathfrak{n} = (1, 1)$, on a

$$\binom{10}{5} = 252 = \binom{2}{1} + 2 \cdot 5^3$$

Preuve.— On sait, ou on déduit de (2), que

$$\left(\sum_1^k X_i\right)^{p^l} = \left(\sum_1^k X_i^{p^l}\right) + pQ \tag{5}$$

où Q est un polynôme à coefficients *entiers*, de degré $< p^l$ en chaque variable. La formule du binôme fournit alors

$$\left(\sum_1^k X_i\right)^{p^l \cdot n} = \left(\sum_1^k X_i^{p^l}\right)^n + \sum_1^n p^i \binom{n}{i} R_i \tag{6}$$

avec

$$R_i = \left(\sum_1^k X_i^{p^l}\right)^{n-i} \cdot Q^i \tag{7}$$

Pour A et B deux polynômes à coefficients entiers, on écrira $A \doteq B \pmod r$ si les coefficients de $X^{p^l \mathfrak{n}}$ dans A et B sont congrus modulo r. Avec cette notation, (4) se réécrit

$$\left(\sum_1^k X_i\right)^{p^l \cdot n} \doteq \left(\sum_1^k X_i^{p^l}\right)^n \pmod{p^{v(n)+3}} \tag{8}$$

Lemme 1.

$$v\left(\binom{n}{i}\right) \geq v(n) - v(i) \tag{9}$$

Faisons agir le groupe additif $\mathbb{Z}/(n)$ sur lui-même par translation[1]; si une partie à i éléments P de $\mathbb{Z}/(n)$ a pour stabilisateur[2] un sous-groupe H de $\mathbb{Z}/(n)$ ($H \cdot P = P$), alors P est réunion de classes latérales de H, et $\#H \mid i$. Le cardinal $r_p = n/\#H$ de l'orbite de P sous $\mathbb{Z}/(n)$, dans $\mathcal{P}(\mathbb{Z}/(n))$, vérifie donc

$$p^{v(n)-v(i)} \mid r_p,$$

d'où, puisque l'ensemble des parties à i éléments de $\mathbb{Z}/(n)$ est somme disjointe d'orbites,

$$p^{v(n)-v(i)} \mid \binom{n}{i}$$

Lemme 2. — *Pour $p \neq 2, 3$ et $i \geq 3$, on a*

$$p^i \binom{n}{i} \equiv 0 \pmod{p^{v(n)+3}} \tag{10}$$

On a

$$v\left(p^i \binom{n}{i}\right) = i + v\binom{n}{i} \geq v(n) + (i - v(i)) \qquad \text{(lemme 1)}$$

Pour $3 \leq i < p$, on a $v(i) = 0$ et $i - v(i) \geq 3$. Pour $i \geq p$, on a $i - v(i) \geq i - \log i / \log p$. Cette dernière fonction de i est croissante pour $i \geq p$, et vaut $p - 1 \geq 3$ pour $i = p$.

Lemme 3. — *Le coefficient de $X^{p^l \mathfrak{n}}$ dans R_1 est nul.*

Aucun des monômes $X^{\mathbf{r}}$ apparaissant dans Q n'a un exposant $\mathbf{r}$ divisible par p^l. Le polynôme

$$R_1 = \left(\sum_1^k X_i^{p^l}\right)^{n-1} \cdot Q$$

hérite de cette propriété.

Il résulte des lemmes 2 et 3 que

$$\left(\sum_1^k X_i\right)^{p^l n} \doteq \left(\sum_1^k X_i^{p^l}\right)^n + \binom{n}{2} p^2 R^2, \pmod{p^{v(n)+3}} \tag{11}$$

De cette congruence résulte déjà (d'après le lemme) 1 que

$$C(p^l \mathfrak{n}) \equiv C(\mathfrak{n}) \pmod{p^{v(n)+2}} \tag{12}$$

Les seuls monômes $X^{\mathbf{r}}$ d'exposant divisible par p^l qui figurent dans $(pQ)^2$ sont les monômes

$$X_i^{p^l} \cdot X_j^{p^l} \qquad (i < j)$$

[1] A tout $x \in \mathbb{Z}/(n)$ est donc associée la permutation de $\mathbb{Z}/(n)$ qui applique y sur $x + y$.

[2] Si un groupe G opère dans un ensemble E, le stabilisateur d'une partie P de E est l'ensemble des $g \in G$ pour lesquels P est stable.

Le coefficient de chacun d'eux est

$$\sum_{i\neq 0,p^l} \binom{p^l}{i}\binom{p^l}{p^l-i} = \sum \binom{p^l}{i}^2 - 2 = \binom{2p^l}{p^l} - 2 \tag{13}$$

et

$$\binom{2p^l}{p^l} - 2 \equiv \binom{2p}{p} - 2 \pmod{p^3}$$

d'après (12).

On a donc

$$\left(\sum_1^k X_i\right)^{p^l\cdot n} \doteq \left(\sum_1^k X_i^{p^l}\right)^n + \binom{n}{2}\left[\binom{2p}{2} - 2\right]\cdot R_2 \pmod{p^{v(n)+3}}$$

avec R polynôme à coefficients entiers.

Puisque

$$v\left(\binom{n}{2}\right) \geq v(n) \qquad \text{(lemme 1)},$$

la proposition résulte du

Lemme 4. — *On a, pour p premier ≥ 5:*

$$\binom{2p}{p} \equiv 2 \pmod{p^3}.$$

On a

$$p^{-1}\binom{p}{i} \equiv (-1)^{i-1}\cdot i^{-1} \pmod{p}$$

pour $1 \leq i \leq p-1$, et donc

$$p^{-2}\left[\binom{2p}{p} - 2\right] = \sum_1^{p-1} p^{-2}\binom{p}{i}^2 \equiv \sum_1^{p-1}(1/i)^2 \pmod{p} \tag{14}$$

Définissons $z \in \mathbb{Z}/(p)$ par

$$z = \sum_{i\in\mathbb{Z}/(p)^*} 1/i^2$$

Pour $u \in \mathbb{Z}/(p)^*$, on a

$$z = \sum_{i\in\mathbb{Z}/(p)^*} 1/(u^{-1}i)^2 = u^2 z$$

et

$$(u^2-1)z = 0.$$

Puisque $p \neq 2, 3$, il existe u tel que $u^2 \neq 1$, et $z = 0$. La formule (14) se simplifie donc en

$$p^{-2}\left[\binom{2p}{p} - 2\right] \equiv 0 \pmod{p},$$

ce qui achève la démonstration.

Inventiones math. 15, 206–226 (1972)
© by Springer-Verlag 1972

La conjecture de Weil pour les surfaces $K3$

Pierre Deligne* (Bures-sur-Yvette)

1. Énoncé du théorème

Soient $\mathbb{F}_q$ un corps à q éléments, $\overline{\mathbb{F}}_q$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_q$, $\varphi \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q)$ la substitution de Frobenius $x \mapsto x^q$, et $F = \varphi^{-1}$ le ńFrobenius géométriqueż.

Soit X un schéma (séparé de type fini) sur $\mathbb{F}_q$, et soit $\overline{X}$ le schéma sur $\overline{\mathbb{F}}_q$ qui s'en déduit par extension des scalaires. Pour tout point fermé x de X, soit $\deg(x) = [k(x) : \mathbb{F}_q]$ le degré sur $\mathbb{F}_q$ de l'extension résiduelle. La fonction zêta $Z(X,t) \in \mathbb{Z}[[t]]$ est définie par

$$Z(X,t) = \prod_{x \in X} (1 - t^{\deg(x)})^{-1} \qquad (x \text{ point fermé de } X),$$

$$\log Z(X,t) = \sum_{n>0} \#X(\mathbb{F}_{q^n}) \frac{t^n}{n}.$$

Pour tout nombre premier ℓ premier à q, la cohomologie ℓ-adique à supports propres $H^i_c(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell)$ de $\overline{X}$ est un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{Q}_\ell$, sur lequel $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_q/\mathbb{F}_q)$ agit par transport de structures. D'après Grothendieck, on a

$$Z(X,t) = \prod_i \det(1 - Ft, H^i_c(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell))^{(-1)^{i+1}}.$$

Prenons pour X une surface projective non singulière. On sait dans ce cas que les facteurs

$$P_i(t) = \det(1 - Ft, H^i(\overline{X}, \mathbb{Q}_\ell))$$

de $Z(X,t)$ sont des polynômes à coefficients entiers rationnels indépendants de ℓ. La conjecture de Weil affirme ici que les racines du polynôme $P_i(t)$ sont de valeur absolue complexe $q^{-i/2}$. Cette conjecture est invariante par extension finie du corps fini de base. Pour X comme plus haut, et $i \neq 2$, elle résulte de Weil [9]. Si, pour simplifier, on suppose X géométriquement connexe, on a en effet

$$P_0(t) = 1 - t, \qquad P_4(t) = 1 - q^2 t,$$

$$P_1(t) = \det(1 - \varphi t; T_\ell(\mathrm{Pic}^0(X)_{\mathrm{red}})), \qquad P_3(t) = P_1(qt).$$

*Cet article a été rédigé pendant un séjour à l'Université de Warwick, que je remercie de son hospitalité.

Soient k un corps de caractéristique 0 et X une surface projective non singulière géométriquement connexe sur k. On dit que X est une surface $K3$ si X est régulière et de diviseur canonique trivial, c'est-à-dire si $H^1(X,\mathcal{O})=0$ et que Ω^2_X est isomorphe à $\mathcal{O}_X$. Pour les mirifiques propriétés de ces surfaces, on renvoie à [8]. Nous utiliserons surtout les faits suivants.

1.1. Lemme. *(i) On a $h^{2,0}=h^{0,2}=1$.*

(i) On a $H^2(X,T^1_X)=0$ (les déformations infinitésimales ne sont pas obstruées), l'application déduite du produit intérieur

$$H^1(X,T^1_X)\otimes H^0(X,\Omega^2_X)\xrightarrow{\sim} H^1(X,\Omega^1_X) \tag{1.1.1}$$

est bijective, et $H^0(X,T^1_X)=0$ (X n'a pas d'automorphismes infinitésimaux).

On a

$$h^{2,0}=_{\mathrm{dfn}}\dim H^0(X,\Omega^2_X)=\dim H^0(X,\mathcal{O}_X)=1,$$

et (i) s'en déduit par symétrie de Hodge. Puisque $H^1(X,\mathcal{O}_X)=0$, on a par symétrie de Hodge et dualité de Serre

$$h^{0,1}=h^{1,0}=h^{2,1}=h^{1,2}=0.$$

Puisque $\Omega^2_X=\mathcal{O}_X$, l'isomorphisme ńproduit intérieurż

$$T^1_X\otimes\Omega^2_X\xrightarrow{\sim}\Omega^1_X$$

induit des isomorphismes $T^1_X\simeq\Omega^1_X$. La nullité de $H^2(X,T^1_X)$ se déduit donc de celle de $h^{1,2}$, et il est clair que (1.1.1) est bijectif. Le même argument donne $H^0(X,T^1_X)=0$.

1.2. Lemme. *Soit Y_0 une surface projective non singulière sur un corps fini $\mathbb{F}_q$. Les conditions suivantes sont équivalentes.*

(i) *Il existe un anneau de valuation discrète complet d'inégale caractéristique V de corps résiduel fini k, un morphisme propre et lisse $f_V : Y\to\mathrm{Spec}(V)$ de fibre générale une surface $K3$ et $i:\mathbb{F}_q\to k$ tel que $Y_0\otimes_{\mathbb{F}_q}k\simeq Y\otimes_V k$.*

(ii) *Il existe un schéma intègre S de corps des fractions de caractéristique 0, un point $s\in S$, un morphisme propre et lisse $f:Y\to S$ de fibre générale une surface $K3$ et $i:\mathbb{F}_q\to k(s)$ tel que $Y_0\otimes_{\mathbb{F}_q}k(s)\simeq Y_s$.*

La démonstration utilise un passage à la limite standard. Si les conditions équivalentes de 1.2 sont remplies, on dit que Y_0 se relève en une surface $K3$.

1.3. Théorème. *Une surface projective non singulière sur un corps fini $\mathbb{F}_q$ qui se relève en une surface $K3$ vérifie la conjecture de Weil.*

Ce théorème a été obtenu indépendamment par Pjateckii-Shapiro et Šafarevitch.

Il s'applique par exemple aux surfaces de degré 4 dans $\mathbb{P}^3$. Les nombres de Betti d'une surface $K3$ sont $(1,0,22,0,1)$; le théorème implique

donc que

$$\left|\#X(\mathbb{F}_q) - \#\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_q)\right| \leq 21q.$$

La théorie conjecturale des motifs de Grothendieck (en particulier sa théorie du ńgroupe de Galois motiviqueż) m'a été très utile pour construire la démonstration. Dans ce langage (qui ne sera pas utilisé par la suite), l'idée est, en gros, de construire par réduction de $\mathbb{C}$ à $\mathbb{F}_q$ une variété abélienne A et un ńmorphismeż injectif de motifs

$$H^2(X) \hookrightarrow H^1(A) \otimes H^1(A),$$

pour déduire la conjecture de Weil pour X du théorème de Weil pour A. Toutefois, nous ne définissons pas ce ńmorphismeż par un cycle algébrique; ce n'est donc pas un morphisme au sens de [5]. En théorie de Hodge, son mode de définition a l'analogue suivant (qui ne sera pas utilisé par la suite).

1.4. Lemme. *Soit H une variation de structures de Hodge de poids n sur un schéma S. Si le système local $H_{\mathbb{Z}}$ n'a pour sections globales que la section s et ses multiples, alors s est en tout point de S de type $(n/2, n/2)$.*

1.5. Notations. 1.5.1. On notera en indice les extensions de scalaires: si M_A est un module sur un anneau (commutatif à unité) A (ou un schéma sur A, par exemple un groupe algébrique sur A), on désignera par M_B le module sur la A-algèbre B (ou le schéma sur B) qui s'en déduit par extension des scalaires.

1.5.2. Si un groupe G agit sur un ensemble X, on notera $g * x$ le transformé de x par g.

1.5.3. Quand une égalité est la définition de l'un des membres, on la note $=_{\text{dfn}}$.

2. Structures de Hodge polarisées

Pour manier les structures de Hodge, nous utiliserons le formalisme exposé dans [4] et brièvement rappelé ci-dessous.

2.1. Soient $\underline{S}$ le groupe algébrique réel des éléments inversibles de la $\mathbb{R}$-algèbre $\mathbb{C}$, $w : \mathbb{G}_{m_{\mathbb{R}}} \to \underline{S}$ l'inclusion de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{C}^*$ et $t : \underline{S} \to \mathbb{G}_{m_{\mathbb{R}}}$ l'inverse de la norme; on a $tw(x) = x^{-2}$. Soit V un vectoriel réel de dimension finie. Il revient au même de se donner

a) $\rho : \underline{S} \to \mathrm{GL}(V)$ de poids n: $\rho w(x) * v = x^n \cdot v$;

b) une bigraduation de Hodge de poids n de $V_{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$:

$$V_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p+q=n} V^{p,q} \qquad \text{avec} \qquad \overline{V^{p,q}} = V^{q,p};$$

c) une filtration de Hodge de poids n de $V_{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$: c'est une filtration décroissante avec

$$F^p(V_{\mathbb{C}}) \oplus \overline{F^{n-p+1}(V_{\mathbb{C}})} \xrightarrow{\sim} V_{\mathbb{C}}.$$

On a

$$F^p(V_{\mathbb{C}}) = \bigoplus_{p' \geq p} V^{p',q'};$$

pour $z \in \underline{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$ et $v^{p,q} \in V^{p,q}$, on a

$$z * v^{p,q} = z^p \bar{z}^q v^{p,q}.$$

On pose $C = \rho(i)$; c'est *l'opérateur C de Weil*. On a $Cv^{p,q} = i^{p-q}v^{p,q}$. Pour $\mathscr{E}$ une partie de $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, une bigraduation de Hodge est dite de *type* $\mathscr{E}$ si les *nombres de Hodge* $h^{pq} = \dim V^{pq}$ sont nuls pour $(p,q) \notin \mathscr{E}$.

2.2. On appellera ici *structure de Hodge de poids n H* la donnée d'un $\mathbb{Z}$-module libre de type fini $H_{\mathbb{Z}}$ et d'une bigraduation de Hodge de poids n de $H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}$. La *structure de Hodge de Tate* $\mathbb{Z}(n)$ est la structure de Hodge de type $\{(-n,-n)\}$ donnée par

$$\mathbb{Z}(n)_{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \qquad \text{et} \qquad \mathbb{Z}(n)_{\mathbb{Z}} = (2\pi i)^n \mathbb{Z} \subset \mathbb{C}.$$

Une polarisation d'une structure de Hodge de poids n H est un morphisme de structures de Hodge

$$\psi : H \otimes H \longrightarrow \mathbb{Z}(-n)$$

telle que, sur $H_{\mathbb{R}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{R}$, la forme bilinéaire réelle

$$(2\pi i)^n \psi(x, Cy)$$

soit symétrique et définie positive. La forme ψ est alors $(-1)^n$-symétrique.

Une *structure de Hodge de poids n rationnelle* consiste en un $\mathbb{Q}$-vectoriel $H_{\mathbb{Q}}$ et une bigraduation de Hodge de poids n de $H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{C}$. On désigne par $\mathbb{Q}(n)$ la structure de Hodge rationnelle sous-jacente à $\mathbb{Z}(n)$. La définition des polarisations est laissée au lecteur.

L'énoncé suivant reformule un théorème de Riemann.

2.3. Scholie. *Le foncteur $A \mapsto H^1(A,\mathbb{Z})$ identifie les variétés abéliennes polarisées aux structures de Hodge polarisées de type $\{(0,1),(1,0)\}$.*

De la fin de ce n°, nous n'utiliserons que 2.11(iii′) ⇒ (ii). Pour prouver cette implication, on peut se limiter à ne considérer que des groupes connexes, ce qui rend 2.5 inutile ou évident.

2.4. Soit G un groupe algébrique linéaire réel. On dit que G est *compact* si $G(\mathbb{R})$ est compact et que toute composante connexe de $G(\mathbb{C})$ a un point réel. Le foncteur évident est alors une équivalence de la catégorie des représentations linéaires algébriques de G avec la catégorie des représentations linéaires du groupe compact $G(\mathbb{R})$.

2.5. Lemme. *Tout sous-groupe algébrique réel H d'un groupe algébrique réel compact G est compact.*

On sait que l'application

$$(g,\ell) \longmapsto g \cdot \exp(i\ell) : G(\mathbb{R}) \times \mathrm{Lie}(G) \longrightarrow G(\mathbb{C})$$

est bijective. Il suffit de prouver que, pour tout sous-groupe réel H de G et tout $h = g \cdot \exp(i\ell) \in H(\mathbb{C})$, on a $\ell \in \mathrm{Lie}(H)$. Puisque $\bar{h} \in H(\mathbb{C})$, on a

$$\exp(2i\ell) = \bar{h}^{-1}h \in H(\mathbb{C}).$$

Regardons $G(\mathbb{C})$ comme l'ensemble des points réels d'un groupe algébrique réel. Soit $\overline{J} \subset H(\mathbb{C})$ l'adhérence de Zariski, dans ce groupe, de $J = \{\exp(ni\ell) \mid n \in 2\mathbb{Z}\}$. Les $g \in J$, donc les $g \in \overline{J}$, vérifient $g^{-1} = \bar{g}$, d'où $\mathrm{Lie}(\overline{J}) \subset i\,\mathrm{Lie}(G)$. L'algèbre de Lie $\mathrm{Lie}(\overline{J})$ est abélienne, et $\exp(\mathrm{Lie}(\overline{J}))$ est un groupe, nécessairement d'indice fini dans $\overline{J}$. Il existe donc n et $\ell' \in \mathrm{Lie}(\overline{J})$ tel que

$$\exp(ni\ell) = \exp(\ell').$$

On a alors $i\ell \in \mathrm{Lie}(\overline{J}) \subset \mathrm{Lie}(H)$ et $\ell \in \mathrm{Lie}(H)$, ce qui achève la démonstration.

2.6. Lemme. *Soit G un groupe algébrique réel. Les conditions suivantes sont équivalentes:*

(i) *G est compact;*

(ii) *pour toute représentation linéaire réelle (resp. complexe) de G, il existe une forme bilinéaire (resp. sesquilinéaire) symétrique (resp. hermitienne) définie positive et G-invariante;*

(iii) *pour une représentation fidèle de G, il existe une forme comme en (ii).*

Pour G connexe, ces conditions équivalent encore à

(iii') *pour une représentation de G, de noyau fini, il existe une forme comme en (ii).*

Pour G compact, la G-invariance équivaut à la $G(\mathbb{R})$-invariance et (ii) est classique. Si (iii) est vérifié, G est sous-groupe d'un groupe orthogonal ou unitaire, et on applique 2.5. La condition (iii') implique que $G(\mathbb{R})$ est compact (comme revêtement fini d'un groupe compact); si G est connexe, G est donc compact.

2.7. Soit G un groupe algébrique linéaire réel. Pour tout automorphisme involutif σ de G, soit $G^{(\sigma)}$ la forme réelle de $G_{\mathbb{C}}$ définie par l'involution antilinéaire $g \mapsto \sigma(\bar{g})$. On dit que σ est une *involution de Cartan* si $G^{(\sigma)}$ est compact.

Soit C un élément de $G(\mathbb{R})$ de carré central. Une représentation réelle (resp. complexe) de G sera dite C-polarisable s'il existe sur V une forme bilinéaire (resp. sesquilinéaire) G-invariante ψ telle que la forme $\psi(x, Cy)$ soit symétrique (resp. hermitienne) et définie positive. On dit alors que ψ est une C-polarisation de V. Un cas particulier du lemme suivant est énoncé sans démonstration dans [4].

2.8. Lemme. *a) Que ψ soit une C-polarisation de V ne dépend que de la classe de $G(\mathbb{R})$-conjugaison de C.*

b) Les conditions suivantes sont équivalentes:

(i) $\mathrm{ad}\, C$ *est une involution de Cartan de* G*;*

(ii) *toute représentation réelle (resp. complexe) de* G *est* C*-polarisable;*

(iii) G *admet une représentation réelle (resp. complexe)* C*-polarisable fidèle.*

Si G *est connexe, ces conditions équivalent encore à*

(iii') G *admet une représentation réelle (resp. complexe)* C*-polarisable de noyau fini.*

Pour prouver a), on note que $\psi(x, gCg^{-1}y) = \psi(g^{-1}x, Cg^{-1}y)$. Une forme sesquilinéaire ψ sur une représentation complexe de G est G-invariante si et seulement si

$$\psi(gx, \bar{g}y) = \psi(x, y) \qquad \text{pour } g \in G(\mathbb{C}).$$

Cette condition équivaut à

$$\psi(gx, CC^{-1}\bar{g}Cy) = \psi(x, Cy) \qquad \text{pour } g \in G(\mathbb{C})$$

(remplacer y par Cy), i.e. à la $G^{(\mathrm{ad}\, C)}$-invariance de $\psi(x, Cy)$. La forme resp$^{\text{ée}}$ de 2.8 résulte donc de 2.6. La forme non resp$^{\text{ée}}$ s'en déduit:

a) la complexifiée (resp. réellifiée) d'une représentation réelle (resp. complexe) C-polarisable est C-polarisable;

b) une polarisation de V induit une polarisation de toute sous-représentation de V;

c) pour V réel (resp. complexe), on a $V \hookrightarrow V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$.

2.9. Soient G un groupe réductif sur $\mathbb{Q}$, et t et w des morphismes définis sur $\mathbb{Q}$

$$\mathbb{G}_m \xrightarrow{w} G \xrightarrow{t} \mathbb{G}_m,$$

avec $tw(x) = x^{-2}$ et w central. Soit de plus un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} & \xrightarrow{w} & \underline{S} & \xrightarrow{t} & \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} \\ \| & & \downarrow h & & \| \\ \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} & \xrightarrow{w} & G_{\mathbb{R}} & \xrightarrow{t} & \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}}. \end{array}$$

Une représentation définie sur $\mathbb{Q}$ $V_{\mathbb{Q}}$ de G est dite *homogène de poids* n si $w(x) * v = x^n \cdot v$ $(v \in V)$. Toute représentation est somme de représentations homogènes. Soit $V_{\mathbb{Q}}$ une représentation de poids n. Alors, h munit $V_{\mathbb{Q}}$ d'une structure de Hodge rationnelle de poids n.

On regardera $\mathbb{Q}(n)_{\mathbb{Q}}$ comme une représentation de G, par la règle

$$g * x = t(g)^n \cdot x.$$

Cette convention est raisonnable, car $\underline{S}$ agit sur $\mathbb{Q}(n)_{\mathbb{R}}$ par la même formule. Une *polarisation* d'une représentation de poids n $V_{\mathbb{Q}}$ de G est une forme G-invariante

$$\psi : V_{\mathbb{Q}} \otimes V_{\mathbb{Q}} \longrightarrow \mathbb{Q}(n)$$

telle que $\psi(x, h(i)y)$ soit une forme symétrique et définie positive sur $V_{\mathbb{R}}$. Une polarisation ψ, étant G-invariante, est aussi $\underline{S}$-invariante, donc une polarisation de la structure de Hodge rationnelle $V_{\mathbb{Q}}$.

2.10. Lemme. *Pour que la représentation $V_{\mathbb{Q}}$ soit polarisable, il faut et il suffit que la représentation $V_{\mathbb{R}}$ soit $h(i)$-polarisable.*

Soit $P_{\mathbb{Q}}$ (resp. $P_{\mathbb{R}}$) l'espace des formes bilinéaires $(-1)^n$-symétriques G-invariantes sur $V_{\mathbb{Q}}$ (resp. $V_{\mathbb{R}}$). On a $P_{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \otimes P_{\mathbb{Q}}$. Les $h(i)$-polarisations forment un ouvert de $P_{\mathbb{R}}$, et les polarisations de $V_{\mathbb{Q}}$ forment la trace de cet ouvert sur $P_{\mathbb{Q}}$. Le lemme en résulte.

2.11. Proposition. *a) Que ψ soit une polarisation de V ne dépend que de la classe de $G(\mathbb{R})$-conjugaison de h.*

b) Les conditions suivantes sont équivalentes:

(i) $\operatorname{ad} h(i)$ *est une involution de Cartan de* $\operatorname{Ker}(t)_{\mathbb{R}}$*;*

(ii) *toute représentation homogène de G est polarisable;*

(iii) *G admet une famille fidèle de représentations homogènes polarisables.*

Si G est connexe, ces conditions équivalent à

(iii') *G admet une représentation polarisable ρ telle que* $\operatorname{Ker}(\rho) \cap \operatorname{Ker}(t)$ *soit fini.*

L'assertion a) résulte de 2.8.a). Si G est connexe, alors $\operatorname{Ker}(t)$ est connexe: sinon t serait de la forme t_0^n, avec $n > 1$. Puisque $twx = x^{-2}$, on aurait $n = 2$, et $w(-1) \notin \operatorname{Ker}(t)^0$. Ceci est absurde, car

$$w(-1) \in h\big(\operatorname{Ker}(t : \underline{S} \longrightarrow \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}})\big),$$

qui est connexe. Ceci dit, b) résulte de 2.10 et 2.8.b).

3. Rappels sur le groupe spinoriel

Pour les rappels contenus dans ce n°, on pourra consulter [3].

3.1. Soit V un module libre sur un anneau A, muni d'une forme quadratique Q. Le module V s'identifie à un sous-module de l'algèbre de Clifford $C(V)$; dans $C(V)$, on a

$$v \cdot v = Q(v).$$

On désignera par $C^+(V)$ la partie paire de $C(V)$.

Si V est un module libre sur A, muni d'une forme bilinéaire symétrique ψ, on désignera par $C(V)$ (ou par $C(V,\psi)$) l'algèbre de Clifford de V muni de la forme quadratique $\psi(x,x)$.

3.2. Supposons que A soit un corps de caractéristique 0, et que Q soit non dégénérée. On note $\mathrm{CSpin}(V)$ le *groupe de Clifford*. C'est le groupe algébrique des éléments inversibles g de $C^+(V)$ tels que $gVg^{-1} = V$. On définit un morphisme de $\mathrm{CSpin}(V)$ dans $\mathrm{SO}(V)$ par

$$g \longmapsto (v \longmapsto gvg^{-1}).$$

Le noyau de ce morphisme est réduit aux scalaires: on dispose d'une suite exacte de groupes algébriques

$$0 \longrightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{w} \mathrm{CSpin}(V) \longrightarrow \mathrm{SO}(V) \longrightarrow 0.$$

Le groupe spinoriel $\mathrm{Spin}(V)$ est le sous-groupe algébrique de $\mathrm{CSpin}(V)$ noyau de la norme spinorielle

$$N : \mathrm{CSpin}(V) \longrightarrow \mathbb{G}_m.$$

Désignons par t l'inverse de N; on dispose d'un diagramme commutatif

(3.2.1)



Par définition, on dispose aussi de

(3.2.2) $$\alpha : \mathrm{CSpin}(V) \hookrightarrow C^+(V)^*.$$

3.3. On note $(C^+(V))_s$ la représentation de $\mathrm{CSpin}(V)$ sur $C^+(V)$ donnée par

(3.3.1) $$g * x = \alpha(g) \cdot x.$$

On note $(C^+(V))_{\mathrm{ad}}$ la représentation de $\mathrm{CSpin}(V)$ sur $C^+(V)$ déduite de l'action de $\mathrm{SO}(V)$ sur $C^+(V)$ par transport de structures. On a

$$g *_{\mathrm{ad}} x = \alpha(g) \cdot x \cdot \alpha(g)^{-1}. \tag{3.3.2}$$

L'action de $\mathrm{CSpin}(V)$ sur $(C^+(V))_s$ est compatible à la structure de $C^+(V)$-module à droite de $(C^+(V))_s$. On a un isomorphisme de représentations

$$\mathrm{End}_{C^+(V)}((C^+(V))_s) = (C^+(V))_{\mathrm{ad}}. \tag{3.3.3}$$

On a un isomorphisme de représentations

$$(C^+(V))_{\mathrm{ad}} = \bigoplus \bigwedge^{2i} V. \tag{3.3.4}$$

3.4. Supposons A algébriquement clos. Distinguons deux cas.

1) $\dim(V)$ *impair*: $C^+(V)$ est ici une algèbre de matrices. Soit W un $C^+(V)$-module simple; W est une *représentation spinorielle* de $\mathrm{CSpin}(V)$:

$$g * W = \alpha(g) \cdot W.$$

On a des isomorphismes de représentations

$$(C^+(V))_s = \text{somme de copies de } W, \tag{3.4.1}$$

$$(C^+(V))_{\mathrm{ad}} = \mathrm{End}_A(W). \tag{3.4.2}$$

2) $\dim(V)$ *pair*: $C^+(V)$ est ici produit de deux algèbres de matrices. Soient W_1 et W_2 deux $C^+(V)$-modules simples non isomorphes et soit $W = W_1 + W_2$; W_1 et W_2 sont les *représentations semi-spinorielles.*

On a des isomorphismes de représentations

$$(C^+(V))_s = \text{somme de copies de } W, \tag{3.4.3}$$

$$(C^+(V))_{\mathrm{ad}} = \mathrm{End}_A(W_1) \times \mathrm{End}_A(W_2). \tag{3.4.4}$$

Dans les deux cas, $C^+(V)$ est le bicommutant de la représentation W.

3.5. Proposition. *Soient* Γ *un sous-groupe Zariski-dense de* $\mathrm{Spin}(V)$ *et a un automorphisme de la A-algèbre* $C^+(V)$*, qui commute à l'action de* Γ *donnée par* $\gamma \mapsto \alpha(\gamma) \cdot x \cdot \alpha(\gamma)^{-1}$*. Alors, a est l'identité.*

Il suffit de traiter le cas où A est un corps algébriquement clos et où Γ est le groupe Spin tout entier (en effet, commuter avec a est une condition Zariski-fermée).

Avec les notations de 3.4, identifions $C^+(V)$ à une sous-algèbre de $\mathrm{End}_A(W)$.

Il existe un automorphisme $\bar{a}$ de W tel que

$$a(x) = \bar{a} x \bar{a}^{-1} \qquad (x \in C^+(V)).$$

Pour $\gamma \in \mathrm{Spin}(V)$, on a par hypothèse

$$\alpha(\gamma)\bar{a}\alpha(\gamma)^{-1}\bar{a}^{-1} \cdot x \cdot \bar{a}\alpha(\gamma)\bar{a}^{-1}\alpha(\gamma)^{-1} = x \qquad (x \in C^+(V));$$

le commutateur $(\alpha(\gamma), \bar{a}) = \alpha(\gamma)\bar{a}\alpha(\gamma)^{-1}\bar{a}^{-1}$ est donc dans le centre de $C^+(V)$.

1) $\dim(V)$ *impair*: ici, $C^+(V) = \mathrm{End}_A(W)$, et $\det_W((\alpha(\gamma), \bar{a})) = 1$, de sorte que $\alpha(\gamma)\bar{a}\alpha(\gamma)^{-1}\bar{a}^{-1}$ est une racine de l'unité ν. Puisque $\mathrm{Spin}(V)$ est connexe, et que, pour $\gamma = e$, on a $\nu = 1$, on a même

$$(\alpha(\gamma), \bar{a}) = 1, \qquad \text{i.e.} \qquad \alpha(\gamma)\bar{a} = \bar{a}\alpha(\gamma).$$

2) $\dim(V)$ *pair*: ici, $C^+(V) = \mathrm{End}_A(W_1) \times \mathrm{End}_A(W_2)$ et soit $\bar{a}$ permute les W_i, soit il les respecte. Dans les deux cas, on déduit de ce que

$$\det_{W_i}(\alpha(\gamma)) = 1 \qquad (i = 1, 2)$$

que

$$\det_{W_i}((\alpha(\gamma), \bar{a})) = 1 \qquad (i = 1, 2)$$

et on conclut comme plus haut que

$$\alpha(\gamma)\bar{a} = \bar{a}\alpha(\gamma).$$

Dans les deux cas, $\bar{a}$ est dans le commutant de la représentation, donc commute au bicommutant $C^+(V)$: a est l'identité.

4. Construction de variétés abéliennes

Dans ce paragraphe et une partie du suivant, nous exposons des résultats de [7].

4.1. Soit $V_{\mathbb{Z}}$ un $\mathbb{Z}$-module libre de rang $n+2$ muni d'une forme bilinéaire de discriminant $\neq 0$

$$B : V_{\mathbb{Z}} \otimes V_{\mathbb{Z}} \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

On suppose B d'indice $(n+, 2-)$. On s'intéresse aux morphismes de poids 0 $h : \underline{S} \to \mathrm{SO}(V_{\mathbb{R}})$ tels que

1) B est une polarisation de la représentation $V_{\mathbb{Q}}$ de $\mathrm{SO}(V_{\mathbb{Q}})$;
2) les nombres de Hodge de $V_{\mathbb{C}}$ sont

$$h^{-1,1} = h^{1,-1} = 1 \qquad \text{et} \qquad h^{0,0} = n.$$

4.2. Un morphisme h comme plus haut se relève de façon unique en $\tilde{h} : \underline{S} \to \mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{R}})$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} & \xrightarrow{w} & \underline{S} & \xrightarrow{t} & \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} \\
\| & & \downarrow{\scriptstyle \tilde{h}} & & \| \\
\mathbb{G}_{m,\mathbb{R}} & \longrightarrow & \mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{R}}) & \xrightarrow{t} & \mathbb{G}_{m,\mathbb{R}}.
\end{array}$$

4.3. Lemme. *Relativement à $\tilde{h}$, toute représentation de* $\mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{Q}})$ *est polarisable (2.9).*

On applique le critère 2.11. b)(iii') à la représentation $V_{\mathbb{Q}}$ de $\mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{Q}})$.

4.4. Lemme. *La structure de Hodge de $C^+(V_{\mathbb{Q}})_{\mathrm{ad}}$ définie par $\tilde{h}$ est de type $\{(-1,1),(0,0),(1,-1)\}$.*

On a

$$C^+(V_{\mathbb{Q}})_{\mathrm{ad}} \simeq \bigoplus \bigwedge^{2i} V_{\mathbb{Q}},$$

et on conclut en utilisant que $h^{-1,1}(V_{\mathbb{Q}}) = 1$.

4.5. Proposition. *La structure de Hodge de $C^+(V_{\mathbb{Q}})_s$ définie par $\tilde{h}$ est de type $\{(0,1),(1,0)\}$. La structure de Hodge $C^+(V_{\mathbb{Q}})_s$, munie du réseau $C^+(V_{\mathbb{Z}})$, définit donc une variété abélienne.*

Supposons tout d'abord n impair. Après extension des scalaires à $\mathbb{C}$, $C^+(V_{\mathbb{Q}})$ devient une algèbre de matrices

$$C^+(V_{\mathbb{C}}) \simeq \mathrm{End}(W).$$

Sur W, $\mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{Q}})_{\mathbb{C}}$ agit par $g \cdot w = \alpha(g) \cdot w$: c'est la représentation spinorielle. La représentation $C^+(V_{\mathbb{C}})_s$ est somme de $\dim(W)$ copies de W, de sorte qu'il suffit de prouver que la représentation de poids un W est purement de type $\{(0,1),(1,0)\}$. Sinon, la représentation $\mathrm{End}(W) \simeq C^+(V_{\mathbb{C}})_{\mathrm{ad}}$ ne pouvait pas être purement de type $\{(-1,1),(0,0),(1,-1)\}$.

Pour n pair, on a de même

$$C^+(V_{\mathbb{C}}) \simeq \mathrm{End}(W') \oplus \mathrm{End}(W''),$$

où W' et W'' sont les représentations semi-spinorielles. Comme plus haut, on prouve que W' et W'' sont de type $\{(0,1),(1,0)\}$, donc aussi $C^+(V_{\mathbb{C}})_s$.

La seconde assertion résulte de 2.3 et 3.3.

4.6. La construction donnée dans ce n° cache le fait (dont nous ne ferons pas usage) suivant, qui se lit sur le diagramme de Dynkin et est la vraie raison pour laquelle tout marche.

Soit $V_{\mathbb{Z}}$ une structure de Hodge polarisée de poids 0 et de type $\{(1,-1),(0,0),(-1,1)\}$, avec $h^{1,-1} = 0$. Soit

$$r : \mathbb{G}_m \longrightarrow \mathrm{SO}(V_{\mathbb{C}})$$

l'homomorphisme tel que $r(x) \cdot v^{pq} = x^p v^{pq}$ pour v^{pq} de type (p,q). Soient T un tore maximal de $\mathrm{SO}(V_{\mathbb{C}})$, muni d'un système de racines simples Φ, $\widetilde{T}$ l'image réciproque de T dans $\mathrm{Spin}(V_{\mathbb{C}})$, et $(w_\alpha)_{\alpha\in\Phi}$ les poids fondamentaux de $\widetilde{T}$. L'homomorphisme r admet un et un seul conjugué

$$r_0 : \mathbb{G}_m \longrightarrow T$$

tel que les nombres rationnels $\langle w_\alpha, r_0\rangle \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ soient tous positifs. On vérifie que r_0 est l'homomorphisme $H_{\alpha_1} : \mathbb{G}_m \to T$ relatif à la racine notée ci-dessous α_1. Les nombres $\langle w_\alpha, r_0\rangle$ sont les suivants:



pour $\mathrm{SO}(2, 2\ell - 1)$,



pour $\mathrm{SO}(2, 2\ell - 2)$.

Soient w un poids dominant d'une représentation spinorielle ou semi-spinorielle et σ l'involution d'opposition. Le point est que

$$\langle w, r_0\rangle + \langle \sigma w, r_0\rangle = 1.$$

5. Construction de familles de variétés abéliennes

Nous ferons usage du théorème (à paraître) suivant de A. Borel.

5.1. Théorème (A. Borel). *Soit X/Γ le quotient d'un domaine hermitien symétrique par un groupe arithmétique sans torsion. On sait [2] que X/Γ est de façon naturelle une variété algébrique quasi-projective. Soient S un schéma réduit sur $\mathbb{C}$ et $f : S^{\mathrm{an}} \to X/\Gamma$ un morphisme d'espaces analytiques. Alors, f est algébrique.*

Soit S lisse sur $\mathbb{C}$. Pour la notion de variation de structures de Hodge $\underline{H}$ sur S, et celle de polarisation de $\underline{H}$, on renvoie à Griffiths [6]. On notera $\underline{H}_{\mathbb{Z}}$ le système local de $\mathbb{Z}$-modules libres sur S défini par $\underline{H}$, et par $\underline{H}_s$ la structure de Hodge fibre de $\underline{H}$ en $s \in S$.

Pour X le demi-espace de Siegel, le théorème 5.1 a le corollaire suivant, qui généralise 2.3.

5.2. Scholie. *Le foncteur $(a : A \to S) \mapsto R^1 a_* \mathbb{Z}$ identifie les schémas abéliens polarisés A sur S aux variations de structures de Hodge polarisées de type $\{(0,1),(1,0)\}$ sur S.*

5.3. Dans la catégorie des variations de structures de Hodge sur S, toutes les opérations tensorielles habituelles ont un sens. Ainsi

a) si $\underline{H}$ et $\underline{H}'$ sont des variations de structures de Hodge, on dispose de variations de structures de Hodge

$$\underline{H} \otimes \underline{H}', \qquad \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{H}, \underline{H}'), \qquad \bigwedge^n \underline{H}, \qquad \underline{H}^\vee, \qquad \underline{\mathrm{End}}(\underline{H}), \ldots.$$

b) si $\underline{H}$ est une variation de structures de Hodge de poids 0, et ψ une polarisation de $\underline{H}$ (ou un quelconque morphisme de structures de Hodge symétrique $\underline{H} \otimes \underline{H} \to \mathbb{Z}(0)$), on dispose de $C(\underline{H}, \psi)$ et $C^+(\underline{H}, \psi)$. En tout point $t \in S$, on a avec les notations de 3.4

$$C^+(\underline{H}, \psi)_t = C^+(\underline{H}_t, \psi)_{\mathrm{ad}}.$$

5.4. Soit $(V_{\mathbb{Z}}, B)$ comme en 4.1, et soit X l'ensemble des $h : \underline{S} \to \mathrm{SO}(V_{\mathbb{R}})$ du type considéré en 4.1. Se donner un tel h revient à se donner un sous-espace $V_{\mathbb{R}}^-$ de dimension 2 de $V_{\mathbb{R}}$, sur lequel B est défini négatif, et une orientation de $V_{\mathbb{R}}^-$: pour $z = \tau \cdot e^{i\theta} \in \underline{S}(\mathbb{R}) = \mathbb{C}^*$, $h(z)$ induit l'identité sur l'orthogonal de $V_{\mathbb{R}}^-$ et la rotation d'angle 2θ sur $V_{\mathbb{R}}^-$. Le groupe $\mathrm{O}(V_{\mathbb{R}})$ agit sur X par transport de structure: $(g * h)(z) = g \cdot h(z) \cdot g^{-1}$, et la description ci-plus haut rend géométriquement évident que X est un espace homogène sous $\mathrm{SO}(V_{\mathbb{R}})$. Le stabilisateur de $h \in X$ est un sous-groupe $\mathrm{SO}(2) \times \mathrm{SO}(n)$, composante neutre d'un sous-groupe compact *maximal*.

5.5. Pour $h \in X$, soit F_h la filtration de Hodge correspondante de $V_{\mathbb{C}}$. La fonction $h \mapsto F_h^1$ identifie X à un ouvert de l'espace des droites isotropes de $V_{\mathbb{C}}$. Cette construction munit X d'une structure complexe pour laquelle F_h est fonction holomorphe de h. On sait que, pour cette structure, les (deux) composantes connexes de X sont des domaines hermitiens symétriques.

5.6. Soit $W_{\mathbb{Q}}$ une représentation de poids n du groupe algébrique $\mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{Q}})$: $w(x) * y = x^n \cdot y$. Soit $\underline{W}_{\mathbb{Q}}$ le système local constant sur X, de fibre $W_{\mathbb{Q}}$. Le groupe $\mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{Q}})$ agit sur $(X, \underline{W}_{\mathbb{Q}})$ par

$$\gamma * (w \text{ en } h \in X) = (\gamma w \text{ en } \gamma h \gamma^{-1} \in X).$$

Chaque $h \in X$ définit $\tilde{h} : \underline{S} \to \mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{R}})$, d'où une $\mathbb{Q}$-structure de Hodge sur la fibre de $\underline{W}_{\mathbb{Q}}$ en $h \in X$. On obtient ainsi une variation de $\mathbb{Q}$-structures de Hodge de poids n sur X, encore notée $\underline{W}_{\mathbb{Q}}$:

a) la filtration de Hodge est fonction holomorphe de h;

b) l'axiome de transversalité est vérifié (nous ne l'utiliserons que dans un cas trivial).

Cette construction est compatible au produit tensoriel. En particulier, une polarisation $\psi : W_{\mathbb{Q}} \otimes W_{\mathbb{Q}} \to \mathbb{Q}(-n)$ de la représentation $W_{\mathbb{Q}}$ définit une polarisation de $\underline{W}_{\mathbb{Q}}$.

Soient $W_{\mathbb{Z}}$ un réseau entier dans $W_{\mathbb{Q}}$ et Γ un sous-groupe de $\mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{Q}})$, discret dans $\mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{R}})$, agissant librement sur X et tel que $\Gamma W_{\mathbb{Z}} = W_{\mathbb{Z}}$. Alors, le système local constant $\underline{W}_{\mathbb{Z}}$ sur X, de fibre $W_{\mathbb{Z}}$, est sous-jacent à une variation de structure de Hodge Γ-équivariante $\underline{W}$ sur X, comme plus haut. Par passage au quotient, elle définit une variation de structures de Hodge $\underline{W}$ sur X/Γ.

Si $W_{\mathbb{Q}}$ est une représentation de $\mathrm{SO}(V_{\mathbb{Q}})$, la même construction s'applique aux sous-groupes discrets de $\mathrm{SO}(V_{\mathbb{Q}})$.

5.7. Proposition. *Soit $(\underline{H}, \psi)$ une variation de structures de Hodge polarisée de type $\{(-1,1),(0,0),(1,-1)\}$, avec $h^{1,-1}=1$, sur un schéma lisse et connexe S. Il existe*

a) *un revêtement fini étale surjectif $u : S_1 \to S$;*

b) *un schéma abélien A sur S_1;*

c) *une $\mathbb{Z}$-algèbre C, et $\mu : C \hookrightarrow \mathrm{End}_{S_1}(A)$;*

d) *un isomorphisme de variations de structures de Hodge*

$$u : C^+(\underline{H}, \psi) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{End}}_C(R^1 a_* \mathbb{Z})$$

qui induise un isomorphisme de systèmes locaux d'algèbres

$$u_{\mathbb{Z}} : C^+(\underline{H}_{\mathbb{Z}}, \psi) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{End}}_C(R^1 a_* \mathbb{Z}).$$

Soit $(V_{\mathbb{Z}}, B)$ un $\mathbb{Z}$-module muni d'une forme bilinéaire symétrique, isomorphe aux $(H_{s\mathbb{Z}}, \psi)$, et reprenons les notations de 5.4. Soient n un entier,

$$\Gamma = \{\gamma \in \mathrm{SO}(V_{\mathbb{Z}}) \mid \gamma \equiv 1 \pmod{n}\}$$

et

$$\widetilde{\Gamma} = \{\gamma \in \mathrm{CSpin}(V_{\mathbb{Q}}) \mid \alpha(\gamma) \equiv 1 \pmod{n} \text{ dans } C^+(V_{\mathbb{Z}})\}.$$

On suppose n assez grand pour que Γ et $\widetilde{\Gamma}$ soient sans torsion.

Il existe un revêtement fini étale $v : S_1' \to S$ tel que le système local $v^* \underline{H}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$ soit trivial. Choisissons un isomorphisme σ_n entre ce système local et le système local constant $\underline{V}_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$. Soient $s \in S_1'$ et $\sigma : V_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\sim} H_{s\mathbb{Z}}$ une isométrie telle que $\sigma \equiv \sigma_n \pmod{n}$ (on choisit σ_n de sorte que de tels σ existent). La structure de Hodge h_s de H_s définit $\sigma^{-1}(h_s) \in X$. L'image de $\sigma^{-1}(h_s)$ dans X/Γ ne dépend que de s. On définit ainsi

$$m : S_1' \longrightarrow X/\Gamma$$

et un isomorphisme compatible aux polarisations

$$\underline{H} \simeq m^* \underline{V}.$$

Soit

$$S_1 = S_1' \times_{X/\Gamma} X/\widetilde{\Gamma} :$$



Sur S_1, on dispose de

a) un isomorphisme $(vp_1)^*H \simeq (mp_1)^*\underline{V}$;

b) une variation de structure de Hodge, image réciproque par p_2 de celle sur $X/\widetilde{\Gamma}$ définie par la représentation $(C^+(V_{\mathbb{Q}}))_s$ et le réseau $C^+(V_{\mathbb{Z}})$.

D'après 5.2, 5.6 et 4.5, cette variation de structures de Hodge correspond à un schéma abélien $a : A \to S_1$.

c) Soit C l'algèbre $C^+(V_{\mathbb{Z}})$. Le schéma abélien construit en b) est à multiplication complexe par C, et la variation de structures de Hodge $\underline{\mathrm{End}}_C(R^1a_*\mathbb{Z})$ est

$$p_2^*((\underline{C}^+(V_{\mathbb{Z}}))_{\mathrm{ad}}).$$

Combinant ceci avec a), on trouve un isomorphisme de systèmes locaux d'algèbres et de variation de structures de Hodge

$$\underline{C}^+(vp_1^*H) \simeq \underline{\mathrm{End}}_C(R^1a_*\mathbb{Z}).$$

Ceci prouve 5.7.

6. Surfaces $K3$

6.1. Une surface $K3$ polarisée sur un corps de caractéristique 0, K, est une surface $K3$ sur K, soit Y, munie de $\eta \in \mathrm{NS}(Y) = \mathrm{Pic}(Y)$ qui soit la classe d'un faisceau inversible ample. Pour $K = \mathbb{C}$, on identifiera $\mathrm{NS}(Y)$ à une partie de $H^2(Y, \mathbb{Z})$.

6.2. Une *famille de surfaces* $K3$ paramétrée par un schéma S de caractéristique 0, est un morphisme propre et plat $f : Y \to S$ dont les fibres sont des surfaces $K3$. Une *polarisation* de $f : Y \to S$ est une section η de $\mathrm{Pic}_S(Y)$, qui en chaque $s \in S$ est une polarisation de $Y_s = f^{-1}(s)$.

Pour tout nombre premier ℓ, on identifie η à une section de $R^2f_*\mathbb{Z}_\ell$; on désigne par $P^2f_*\mathbb{Z}_\ell$ l'orthogonal de η (pour le cup-produit); c'est un sous-$\mathbb{Z}_\ell$-faisceau de $R^2f_*\mathbb{Z}_\ell$. Le cup-produit

$$R^2f_*\mathbb{Z}_\ell \otimes R^2f_*\mathbb{Z}_\ell \longrightarrow R^4f_*\mathbb{Z}_\ell$$

et le morphisme trace

$$R^4f_*\mathbb{Z}_\ell \xrightarrow{\sim} \underline{\mathbb{Z}}_\ell(-2)$$

induisent

$$\psi_\ell : P^2f_*\mathbb{Z}_\ell(1) \otimes P^2f_*\mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow \underline{\mathbb{Z}}_\ell. \tag{6.2.1}$$

6.3. Prenons pour S un schéma de type fini sur $\mathbb{C}$. Alors, $R^2f_*\mathbb{Z}$ est une variation de structures de Hodge sur S; η est en tout point de type $(1,1)$ et son orthogonal $P^2f_*\mathbb{Z}$ est encore une variation de structures de Hodge. Comme plus haut, le cup-produit définit

$$\psi : P^2f_*\mathbb{Z}(1) \otimes P^2f_*\mathbb{Z}(1) \longrightarrow \underline{\mathbb{Z}}. \tag{6.3.1}$$

Cette fois, l'opposé de ψ est une polarisation de la variation de structures de Hodge $P^2 f_* \mathbb{Z}(1)$. De plus, ψ_ℓ se déduit de ψ via l'isomorphisme

$$(P^2 f_* \mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}}) \otimes \mathbb{Z}_\ell \simeq P^2 f_* \mathbb{Z}_\ell(1).$$

Pour tout $s \in S$, la fibre en s $(P^2 f_* \mathbb{Z}(1))_s$ est la partie primitive de la cohomologie de $H^2(Y_s, \mathbb{Z})$. La structure de Hodge de $(P^2 f_* \mathbb{Z}(1))_s$ est de type $\{(-1,1),(0,0),(1,-1)\}$, avec $h^{-1,1} = 1$ ((1.1)(i)).

L'action de $\pi_1(S,s)$ sur $H^2(Y_s, \mathbb{Z})$ induit

$$\pi : \pi_1(S,s) \longrightarrow \mathrm{O}(P^2(Y_s, \mathbb{Z})(1)_{\mathbb{Z}}, \psi). \tag{6.3.2}$$

6.4. Proposition. *Pour toute surface $K3$ polarisée complexe Y_0, il existe une famille de surfaces $K3$ polarisées $f : Y \to S$ comme plus haut, avec $Y_s \simeq Y_0$ pour un $s \in S$, et telle que l'image de π (6.3.2) soit d'indice fini.*

Soit $f_T^\wedge : Y_T^\wedge \to T^\wedge$ la déformation formelle verselle de Y_0. Puisque $H^0(Y_0, T^1) = 0$, $T^\wedge$ est même un schéma formel de modules pour Y_0, mais peu importe. Puisque $H^2(Y_0, T^1) = 0$ ((1.1)(i)), $T^\wedge$ est le spectre d'un anneau de séries formelles sur $\mathbb{C}$. De $f_T^\wedge$, on déduit une variation de structures de Hodge (non polarisée) sur $T^\wedge$. D'après (1.1.1), celle-ci est la déformation universelle de {la structure de Hodge $H^2(Y_0, \mathbb{Z})$, munie du cup-produit}.

Soit $\bar\eta$ l'image de η par l'application composée

$$H^2(Y_0, \mathbb{Z}) \longrightarrow H^2_{\mathrm{DR}}(Y_T^\wedge / T^\wedge) \longrightarrow R^2 f_{T*}^\wedge \mathcal{O}.$$

Soit $S^\wedge$ le sous-schéma formel de $T^\wedge$ d'équation $\bar\eta = 0$ et soit $f^\wedge : Y^\wedge \to S^\wedge$ induit par $f_T^\wedge$. Puisque $h^{0,2} = 1$, $S^\wedge \subset T^\wedge$ est défini par une équation; celle-ci fait partie d'un système régulier de paramètres, de sorte que $S^\wedge$ est un anneau de séries formelles. Sur $S^\wedge$, η provient d'un faisceau inversible $\mathcal{O}(1)$ ample sur $Y^\wedge$; $f^\wedge$ est donc algébrisable. En outre, sur $S^\wedge$, la variation de structure de Hodge polarisée $(P^2(Y^\wedge/S^\wedge, \mathbb{Z})(1), \psi)$ est une déformation universelle de $(P^2(Y_0, \mathbb{Z})(1), \psi)$.

Posons $S^\wedge = \mathrm{Spec}(A^\wedge)$, et exprimons $A^\wedge$ comme limite inductive d'anneaux de type fini sur $\mathbb{C}$. Puisque $Y^\wedge$ est algébrisable, il existe un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} Y^\wedge & \longrightarrow & Y \\ \downarrow{\scriptstyle f^\wedge} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S^\wedge & \longrightarrow & S \end{array}$$

avec S de type fini sur $\mathbb{C}$ et Y une famille de surfaces $K3$ polarisée sur S (on ne suppose pas que $S^\wedge$ soit un complété de S). On peut prendre S normal et connexe; soit $s \in S$ l'image du point fermé de $S^\wedge$.

En fait, grâce au théorème d'approximation d'Artin [1], on peut trouver S tel que $S^\wedge$ en soit un complété. S est alors lisse au voisinage de s. Les simplifications qui résultent d'un tel choix sont surtout psychologiques.

Montrons que $f : Y \to S$ vérifie 6.2. Quitte à remplacer S par un revêtement étale fini, on définit comme en 5.7 une application holomorphe

$$m : S \longrightarrow X/\Gamma$$

de S dans un espace de module de structures de Hodge polarisées, telle que l'image réciproque de la famille de structures de Hodge universelle sur X/Γ soit $(P^2(Y/S,\mathbb{Z})(1),\psi)$.

D'après Borel (5.1), m est un morphisme de schémas. Le morphisme m est dominant, car le composé $m^\wedge : S^\wedge \to X/\Gamma$ l'est. Il en résulte (voir par exemple P. Deligne, Théorie de Hodge II. Publ. Math. IHES 40, lemme 4.4.17) que $m(\pi_1(S,s))$ est d'indice fini dans $\pi_1(X/\Gamma, m(s)) = \Gamma$, lui-même d'indice fini dans le groupe orthogonal.

6.5. Proposition. *Soit Y_0 une surface $K3$ polarisée sur un corps K de caractéristique 0. Il existe:*

a) *un schéma S de type fini sur $\mathbb{Q}$, et une famille $f : Y \to S$ de surfaces $K3$ polarisées, paramétrée par S;*

b) *une extension finie K' de K et $v : \mathrm{Spec}(K') \to S$ tel que v^*Y soit isomorphe à $Y_0 \otimes_K K'$;*

c) *un schéma abélien $a : A \to S$ sur S;*

d) *une $\mathbb{Z}$-algèbre C et $\mu : C \to \mathrm{End}_S(A)$;*

e) *un isomorphisme de $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux d'algèbres sur S*

$$u : C^+(P^2 f_*\mathbb{Z}_\ell(1),\psi_\ell) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{End}}_C(R^1 a_*\mathbb{Z}_\ell).$$

On se ramène à supposer K de type fini sur $\mathbb{Q}$. Choisissons un plongement complexe $\sigma : K \to \mathbb{C}$ et appliquons 6.4 à $Y_0 \otimes_K \mathbb{C}$ pour obtenir une famille de surfaces $K3$ polarisées $f_1 : Y_1 \to S_1$. Appliquons 5.7 à f_1; on obtient une famille $f_2 : Y_2 \to S_2$, vérifiant encore la conclusion de 6.4, et, sur S_2, un schéma abélien $a_2 : A_2 \to S_2$ à multiplication complexe $\mu_2 : C \to \mathrm{End}_{S_2}(A_2)$ et un isomorphisme

$$u_2 : C^+(P^2 f_{2*}\mathbb{Z}(1),\psi) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{End}}_C(R^1 a_{2*}\mathbb{Z})$$

de systèmes locaux d'algèbres. Le système de schémas complexes et de morphismes

$$\overline{E}_2 = (S_2, f_2, Y_2, a_2, A_2, \mu_2)$$

sont définis par un nombre fini d'équations. Il existe donc une extension de type fini K_3 de K, avec $K \subset K_3 \subset \mathbb{C}$, et, sur K_3, un système

$$\overline{E}_3 = (S_3; f_3, Y_3, a_3, A_3, \mu_3)$$

qui, par extension des scalaires de K_3 à $\mathbb{C}$, fournit $\overline{E}_2$.

6.5.1. Lemme. *Il existe un unique isomorphisme de $\mathbb{Z}_\ell$-faisceaux d'algèbres*

$$u_3 : C^+(P^2 f_{3*}\mathbb{Z}_\ell(1), \psi_\ell) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{End}}_C(R^1 a_{3*}\mathbb{Z}_\ell).$$

Il suffit de vérifier qu'un tel isomorphisme existe et est unique après extension des scalaires à une clôture algébrique de K_3, par exemple $\mathbb{C}$. On a l'existence par construction, et l'unicité résulte de 3.5. En effet, pour $s \in S_2$, l'image de $\pi_1(S_2, s)$ dans $\mathrm{O}(P^2(Y_{2s}, \mathbb{Z}), \psi)$ est d'indice fini, donc contient un sous-groupe Zariski-dense dans le groupe SO.

Soit T un schéma intègre de type fini sur $\mathbb{Q}$, de corps des fonctions K_3. Pour T convenable, $\overline{E}_3$ est la fibre générique d'un système $\overline{E} = (S, f, Y, a, A, \mu)$ sur T, et u_3 se prolonge en

$$u : C^+(P^2 f_*\mathbb{Z}_\ell(1), \psi_\ell) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{End}}_C(R^1 a_*\mathbb{Z}_\ell).$$

On vérifie facilement l'existence de K' comme en b), et ceci achève la démonstration.

6.6. Prouvons le théorème 1.3. Soit donc $f_V : Y_V \to \mathrm{Spec}(V)$ comme en 1.2(i). Soit K le corps des fractions de V, et appliquons 6.5 à la surface $Y_K = Y \otimes_V K$ sur K, munie d'une quelconque polarisation. Quitte à remplacer V par son normalisé dans une extension finie de K, on peut supposer qu'il existe $\overline{E} = (S, f, Y, a, A, \mu, u)$ comme en 6.5, tel que Y_K soit l'image réciproque de Y par $v : \mathrm{Spec}(K) \to S$. Par image réciproque, on en déduit une variété abélienne à multiplication complexe (A_K, μ) sur K.

Soit $\overline{K}$ une clôture algébrique de K et $\overline{k}$ la clôture algébrique correspondante de k (le corps résiduel du normalisé de V dans $\overline{K}$). De u, on tire un isomorphisme de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$-modules

$$C^+(P^2(Y_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell)(1), \psi_\ell) \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}_C(H^1(A_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell)). \tag{6.6.1}$$

Puisque Y_V est lisse sur V, le groupe d'inertie I agit trivialement sur

$$H^2(Y_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell) \simeq H^2(Y_{\overline{k}}, \mathbb{Z}_\ell).$$

La polarisation définit un invariant η dans $H^2(Y_{\overline{k}}, \mathbb{Z}_\ell)(1)$, d'orthogonal $P^2(Y_{\overline{k}}, \mathbb{Z}_\ell)(1)$, et I agit trivialement sur

$$C^+(P^2(Y_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell)(1), \psi_\ell) \simeq C^+(P^2(Y_{\overline{k}}, \mathbb{Z}_\ell)(1), \psi_\ell).$$

Puisque I agit trivialement sur $\mathrm{End}_C(H^1(A_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell))$, et commute à la multiplication complexe, il agit via le centre de $C \otimes \mathbb{Q}_\ell$. On sait par ailleurs qu'un sous-groupe d'indice fini de I agit sur $H^1(A_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_\ell)$ de façon unipotente; il en résulte que I agit via un de ses quotients finis. Quitte à encore remplacer K par une extension finie, on peut donc supposer que A_K ait bonne réduction sur V.

Pour $A_{\overline{k}}$ la fibre spéciale de sa réduction, (6.6.1) se réduit à un isomorphisme de $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$-modules

$$C^+(P^2(Y_{\overline{k}}, \mathbb{Z}_\ell)(1), \psi_\ell) \xrightarrow{\sim} \mathrm{End}_C(H^1(A_{\overline{k}}, \mathbb{Z}_\ell)). \tag{6.6.2}$$

D'après la théorie de Weil pour A_k, les valeurs propres de Frobenius agissant sur $C^+(P^2(Y_{\overline{k}},\mathbb{Z}_\ell)(1),\psi_\ell)$ sont des nombres algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue 1. On a

$$\bigwedge^2(P^2(Y_{\overline{k}},\mathbb{Z}_\ell)(1)) \subset C^+(P^2(Y_{\overline{k}},\mathbb{Z}_\ell)(1),\psi_\ell),$$

et, pour $\dim P^2(Y_{\overline{k}},\mathbb{Z}_\ell) > 2$ (tel est le cas ici), on en tire que les valeurs propres de Frobenius agissant sur $P^2(Y_{\overline{k}},\mathbb{Z}_\ell)(1)$, elles aussi, sont de valeur absolue complexe 1. Le même énoncé vaut pour $H^2(Y_{\overline{k}},\mathbb{Z}_\ell)(1)$, et le théorème en résulte.

7. Remarques

7.1. Soit H une structure de Hodge rationnelle. On appellera *groupe de Mumford–Tate* de H le plus petit sous-groupe algébrique G de $\mathrm{GL}(H_\mathbb{Q})$, défini sur $\mathbb{Q}$, et tel que $G(\mathbb{R})$ contienne l'image de $h : \underline{S} \to \mathrm{GL}(H_\mathbb{R})$. Pour H polarisable, G est réductif. Cette définition diffère de celle de Mumford: si H est de poids $n \neq 0$, notre G contient les homothéties. D'après 2.9, toute représentation homogène de G est munie d'une structure de Hodge naturelle.

Un des points-clef dans la démonstration de 1.3 a été que la structure de Hodge $H^2(X,\mathbb{Q})$, pour X une $K3$, «s'exprime» à l'aide de variétés abéliennes, au sens suivant.

7.2. Définition. Une structure de Hodge rationnelle H s'exprime à l'aide de variétés abéliennes si elle appartient à la plus petite catégorie de structures de Hodge rationnelles stable par facteur direct, sommes directes, produits tensoriels, et qui contient les $H^1(A,\mathbb{Q})$ pour A une variété abélienne, ainsi que les $\mathbb{Q}(n)$.

Dans ce numéro, on montre que cette propriété des $K3$ est exceptionnelle.

Considérons la propriété suivante d'une structure de Hodge rationnelle, de groupe de Mumford–Tate G.

($*$) La structure de Hodge de la représentation adjointe $\mathrm{Lie}(G)$ de G est purement de type $\{(-1,1),(0,0),(1,-1)\}$.

7.3. Proposition. *Si une structure de Hodge rationnelle H s'exprime à l'aide de variétés abéliennes, alors la condition ($*$) est vérifiée.*

En effet,

(a) les structures de Hodge $H^1(A,\mathbb{Q})$ et $\mathbb{Q}(n)$ vérifient ($*$);

(b) la condition ($*$) est stable par facteurs directs, sommes directes et produits tensoriels.

7.4. Des arguments analogues permettent de montrer que si H s'exprime à l'aide de variétés abéliennes, alors le groupe réductif $G_{\mathbb{C}}$ n'a pas de «facteurs» de type exceptionnel.

7.5. Proposition. *Soit $\underline{H}$ une variation de structures de Hodge polarisée sur un schéma irréductible S. Pour $s \in S$ en dehors d'une partie maigre de S, il existe un sous-groupe d'indice fini de $\pi_1(S,s)$ dont l'image dans $\mathrm{GL}(H_{s\mathbb{Z}})$ soit contenue dans le groupe de Mumford–Tate de H_s.*

En tout point de S, le groupe de Mumford–Tate G_s de H_s peut se décrire ainsi. C'est le sous-groupe algébrique de $\mathrm{GL}(H_{s\mathbb{Q}})$ qui laisse fixes tous les tenseurs $t \in H_{s\mathbb{Q}}^{\otimes n} \otimes H_{s\mathbb{Q}}^{*\otimes n}$ $(n > 0)$ qui sont rationnels de type $(0,0)$. De cette description, on déduit aisément que, en dehors d'une partie maigre M de S, G_s est localement constant: pour $s \notin M$, le plus grand sous-espace de type $(0,0)$ $V(n)_s \subset H_{s\mathbb{Q}}^{\otimes n} \otimes H_{s\mathbb{Q}}^{*\otimes n}$ est localement constant, et définit un système local $V(n)$ sur S. Ce système local est sous-jacent à une variation de structures de Hodge polarisée de type $(0,0)$; il existe donc sur $V(n)_s$ une forme quadratique définie positive invariante par $\pi_1(S,s)$, et $\pi_1(S,s)$ agit sur $V(n)_s$ à travers un groupe fini. On conclut en notant qu'il existe une suite finie d'entiers n_i telle que G_s soit le sous-groupe algébrique de $\mathrm{GL}(H_{s\mathbb{Q}})$ qui agit trivialement sur les $V(n_i)_s$.

7.6. Considérons un pinceau de Lefschetz d'hypersurfaces de degré d et de dimension impaire $2r-1$.



Soit $U \subset \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ le complément de l'ensemble fini des $t \in \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ tels que l'hypersurface $X_t = f^{-1}(t)$ soit singulière, et soit $s \in U$. Le cup-produit est une forme alternée ψ sur $H^{2r-1}(X_s, \mathbb{Z})$, respectée par la monodromie, d'où

$$m : \pi_1(U,s) \longrightarrow \mathrm{Sp}(H^{2r-1}(X_s,\mathbb{Z}), \psi).$$

D'après un théorème de Kajdan et Margulis, l'image de m est Zariski-dense dans le groupe symplectique. D'après 7.5, pour s en dehors d'une partie maigre (en fait, dénombrable) de $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, le groupe de Mumford–Tate de la structure de Hodge rationnelle $H^{2r-1}(X_s,\mathbb{Q})$ est donc le groupe des similitudes symplectiques tout entier. Si cette structure de Hodge n'est pas de niveau de Hodge au plus un (i.e. si un h^{pq} avec $|q-p| \neq 1$ est non nul), on déduit de 7.3 qu'elle ne s'exprime pas à l'aide de variétés abéliennes.

Bibliographie

1. Artin, M.: Algebraisation of formal moduli I. Global analysis. Papers in honor of K. Kodaira. Princeton University Press.
2. Baily, W. L., Borel, A.: Compactification of arithmetic quotients of bounded symmetric domains. Annals of Math. (2) **84**, 442–528 (1966). (MR 35, 6870).
3. Bourbaki, N.: Algèbre – Chapitre 9. Paris: Hermann 1959. Act. Sci. et Ind. 1272.
4. Deligne, P.: Travaux de Griffiths – Séminaire Bourbaki 376 – mai 1970. Lecture Notes in mathematics 180. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1971.
5. Demazure, M.: Motifs des variétés algébriques – Séminaire Bourbaki 365 – mai 1970. Lecture Notes in mathematics 180. Berlin-Heidelberg-New York: Springer 1971.
6. Griffiths, P. A.: Periods of integrals on algebraic manifolds. (Summary of main results and discussions of open problems and conjectures.) Bull. Am. Math. Soc. **75**, 228–296 (1970).
7. Kuga, M., Satake, I.: Abelian varieties attached to polarized K3-surfaces. Math. Ann. **169**, 239–242 (1967). (MR 35 1602).
8. Šafarevitch, Chafonevitch, I. R., Averbuch, B. C., Vaïnberg, Ju. R., Jujtchenko, A. B., Manin, Ju. I., Moishezon, B. C., Tjurina, C. I., Tjurin, A. I.: Algebraic surfaces. Trudi Mat. Inst. Steklov LXXV.
9. Weil, A.: Variétés abéliennes et courbes algébriques. Paris: Hermann 1948.

Pierre Deligne
Institut des Hautes Études Scientifiques
35, Route de Chartres
F-91 Bures-sur-Yvette
France

(Reçu le 6 août 1971/1 octobre 1971)

LES IMMEUBLES DES GROUPES DE TRESSES GÉNÉRALISÉS

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette)

Introduction

Le résultat principal de ce travail est le suivant.

Théorème. Soit V un espace vectoriel réel de dimension finie, $\mathcal{M}$ un ensemble fini d'hyperplans homogènes de V, $V_{\mathbb{C}}$ le complexifié de V et

$$Y = V_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M_{\mathbb{C}}.$$

On suppose que les composantes connexes de

$$V - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M$$

sont des cônes simpliciaux ouverts. Alors Y est un $K(\pi, 1)$.

Soient V comme plus haut, et $W \subset \mathrm{GL}(V)$ un groupe fini engendré par des réflexions. On suppose qu'aucun vecteur non nul de V n'est fixe sous W:

$$V^W = 0.$$

Soit Φ une quelconque structure euclidienne sur V, invariante par W, et soit $\mathcal{M}$ l'ensemble des hyperplans M tels que la réflexion orthogonale par rapport à M soit dans W. On sait alors que $(V, \mathcal{M})$ vérifie l'hypothèse du théorème, et que W agit librement sur l'espace Y_W correspondant. Le quotient

$$X_W = Y_W / W$$

est donc aussi un $K(\pi, 1)$.

Ce résultat avait été conjecturé par Brieskorn. Il n'est nouveau que pour W de type H_3, H_4, E_6, E_7 ou E_8 (Brieskorn [2]). Nous donnons aussi une nouvelle démonstration de ce que le groupe fondamental de X_W est le groupe de tresses généralisé $\widetilde{W}$ correspondant à W (Brieskorn [3]).

Réduit au cas particulier considéré plus haut, le plan de la démonstration est le suivant.

a) On construit un immeuble $I(\widetilde{W})$ sur lequel $\widetilde{W}$ agit, et un ensemble $\mathcal{S}$ de sphères dans $I(\widetilde{W})$, isomorphes à la sphère unité de V. Le groupe $\widetilde{W}$ agit de façon strictement simplement transitive sur $\mathcal{S}$.

b) On montre qu'à homotopie près $I(\widetilde{W})$ est le bouquet des sphères $S \in \mathcal{S}$.

c) On relie X_W et $I(\widetilde{W})$.

La description de $\mathcal{S}$ et la possibilité de c) étaient apparues lors d'une conversation avec Brieskorn et Tits au printemps 1970. Les idées requises pour établir b) m'ont été fournies par Garside [4], que je suis souvent de très près.

Dans le paragraphe 4, on détermine le centre de $\widetilde{W}$ et on résoud le problème des mots et le problème de conjugation dans $\widetilde{W}$. Ces résultats ont été obtenus indépendamment par E. Brieskorn et K. Saito, qui utilisent comme nous les méthodes de Garside [4].

Le langage géométrique utilisé et les techniques de démonstration sont essentiellement dues à Tits, avec les idées duquel j'ai pu me familiariser en assistant à un de ses séminaires et lors de conversations. Je suis heureux de pouvoir lui dire ici ma reconnaissance.

0. Notations

(0.1) $L^+(D)$: monoïde à unité libre engendré par un ensemble D.

(0.2) $L(D)$: groupe libre engendré par un ensemble D.

(0.3) A^-: adhérence d'une partie A d'un espace topologique.

(0.4) Pour x, y dans un monoïde à unité et $n \geq 0$, on pose

$$\mathrm{prod}(n; x, y) = xyxy\cdots \quad (n \text{ facteurs});$$

on a

$$\mathrm{prod}(2n; x, y) = (xy)^n, \qquad \mathrm{prod}(2n+1; x, y) = (xy)^n x.$$

1. Galeries

(1.1) Soit $\mathcal{M}$ un ensemble fini d'hyperplans, les murs, dans un espace vectoriel réel de dimension finie V. Nous utiliserons la terminologie (murs, chambres, faces, facettes) de [1], V, §1; les facettes forment une partition de V. Le support P d'une facette F est l'intersection des murs contenant F; F est ouverte dans P. Pour toute chambre A et tout mur M, on note $D_M(A)$ l'ensemble des chambres du même côté de M que A. Si A et B sont deux chambres, on note $D(A, B)$ l'intersection des $D_M(A)$ pour A et B du même côté de M. Nous écartant de la terminologie de [1], IV, 1, ex. 15, nous dirons que deux chambres A et B sont mitoyennes si $A \neq B$ et que A et B ont une face en commun. Nous utiliserons constamment les faits triviaux suivants.

(1.2) Lemme.

(i) Soit M un mur d'une chambre B. Il existe une et une seule chambre B', mitoyenne à B, ayant M pour mur. M est le seul mur qui sépare B de B'.

(ii) Soient B_1, B_2, B_3 trois chambres, et $\mathcal{M}(B_i, B_j)$ l'ensemble des murs qui séparent B_i de B_j. On a

$$\mathcal{M}(B_1, B_3) = \big(\mathcal{M}(B_1, B_2) - \mathcal{M}(B_2, B_3)\big) \cup \big(\mathcal{M}(B_2, B_3) - \mathcal{M}(B_1, B_2)\big).$$

Une galerie de longueur n ($n \geq 0$) de source A et de but B est une suite de chambres $(C_0, \ldots, C_n)$ avec $A = C_0$, C_{i+1} mitoyenne de C_i ($0 \leq i \leq n$) et $C_n = B$. Le composé de deux galeries $G = (C_0, \ldots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \ldots, C'_m)$ est défini si $C_n = C'_0$, et vaut alors

$$GG' = (C_0, \ldots, C_n, C'_1, \ldots, C'_m).$$

Si G est une galerie de source A, $A.G$ désigne son but.

La galerie G^* opposée à une galerie $G = (C_0, \ldots, C_n)$ est la galerie $(C_n, \ldots, C_0)$. On a $(GG')^* = G'^* G^*$. La galerie $-G$ antipodique de G est la suite des chambres antipodiques

$$-G = (-C_0, \ldots, -C_n).$$

On a $-(GG') = (-G)(-G')$ et $-(G^*) = (-G)^*$.

La distance $d(A, B)$ d'une chambre A à une chambre B est la plus petite longueur d'une galerie de A à B. Une galerie de A à B est minimale si elle est de longueur $d(A, B)$.

(1.3) Proposition. La distance $d(A, B)$ est le nombre de murs qui séparent A de B. Pour qu'une galerie G de A à B soit minimale, il faut et il suffit qu'elle traverse une fois les murs qui séparent A de B et zéro fois les autres.

Il est clair que toute galerie de A à B traverse tout mur qui sépare A de B, et il suffit de prouver l'existence d'une galerie G de A à B, de longueur égale au nombre k de murs qui séparent A de B. On procède par récurrence sur k. L'intersection des $D_M(A)$ pour M mur de A est réduite à A. Dès lors, ou bien $A = B$, auquel cas on prend $G = (A)$, ou bien il existe un mur M de A qui sépare A de B. Soit A' la chambre mitoyenne de A ayant M pour mur. M est le seul mur qui sépare A de A', de sorte qu'un mur N sépare A' de B si et seulement si $M \neq N$ et que N sépare A de B. D'après l'hypothèse de récurrence, il existe une galerie G' de longueur $k-1$ allant de A' à B, et on prend $G = (AA')G'$.

(1.4) Corollaire. Soient A, B, C trois chambres. Les conditions suivantes sont équivalentes.

(i) $d(A, C) = d(A, B) + d(B, C)$, c'est-à-dire qu'il existe une galerie minimale de A à C passant par B.

(ii) Pour qu'un mur sépare A de C, il faut et il suffit qu'il sépare A de B ou B de C. En d'autres termes,

$$\mathcal{M}(A, B) \subset \mathcal{M}(A, C).$$

(iii) $B \in D(A, C)$.

(1.5) Proposition. Soient P une intersection de murs, $V_P = V/P$, $\mathrm{pr}_P : V \to V_P$ la projection et $\mathcal{M}_P$ l'ensemble des hyperplans N de V_P tels que $\mathrm{pr}_P^{-1}(N)$ soit un mur. On note π'_P l'unique application des facettes de $(V, \mathcal{M})$ dans celles de $(V_P, \mathcal{M}_P)$ telle que $\mathrm{pr}_P(F) \subset \pi'_P(F)$.

(i) π'_P respecte la relation d'incidence $F_1 \subset {F_2}^-$: si $F_1 \subset {F_2}^-$, on a

$$\mathrm{codim}(F_1 \text{ dans } {F_2}^-) \geq \mathrm{codim}(\pi'_P[F_1] \text{ dans } \pi'_P[F_2]).$$

π'_P transforme chambre en chambre: si A et B sont mitoyennes, soit $\pi'_P(A) = \pi'_P(B)$, soit $\pi'_P(A)$ et $\pi'_P(B)$ sont mitoyennes.

(ii) Soit F une facette de support P. La restriction de π'_P à l'ensemble des facettes E de $(V, \mathcal{M})$ telles que $F \subset E^-$ est bijective. Ainsi que son inverse π_F, elle respecte la codimension, l'incidence $E_1 \subset {E_2}^-$ et donc la mitoyenneté des chambres. On notera encore π_F la bijection réciproque entre intersections de murs dans V_P et intersections de murs dans V, contenant P.

(iii) Si $C = \pi_F(C')$, alors, pour toute chambre X de $(V, \mathcal{M})$,

$$\pi_F^{-1} D(C, X) = D(C', \pi'_P(X)), \qquad \pi_F^{-1} \mathcal{M}(C, X) = \mathcal{M}_P(C', \pi'_P(X)).$$

Pour $X = \pi_F(X')$, on a

$$\pi_F(D(C', X')) = D(C, X), \qquad \pi_F(\mathcal{M}_P(C', X')) = \mathcal{M}(C, X),$$

et π_F induit une bijection entre galeries minimales de C' à X' et de C à X.

La vérification est laissée au lecteur; (iii) se déduit de 1.4(ii).

(1.6) Notations.

(i) Pour F une facette de support P, $V_P, \mathcal{M}_P, \mathrm{pr}_P, \pi'_P$ se notent encore $V_F, \mathcal{M}_F, \mathrm{pr}_F, \pi'_F$.

(ii) Soient P une intersection de murs et C une chambre. On suppose qu'il existe une facette de C (i.e. dans C^-) de support P. Cette facette est alors unique. On la note $F(P)$ et on pose

$$C.\Delta(P) = \pi_{F(P)}\big(-\pi_{F(P)}^{-1}(C)\big).$$

(1.7) Lemme.

(i) Pour qu'un mur sépare C de $C.\Delta(P)$, il faut et il suffit qu'il contienne P ((1.5)(iii)).

(ii) Pour M un mur de C, $C.\Delta(M)$ est l'unique chambre mitoyenne à C ayant M pour mur (cf. 1.5(iii), 1.2(i)).

(iii) Soient $M \neq N$ deux murs de C, dont l'intersection P contient une facette de C ouverte dans P. Il existe exactement deux galeries minimales de C à $C.\Delta(P)$. L'une commence par $(C, C.\Delta(M))$, l'autre par $(C, C.\Delta(N))$.

L'assertion (iii) se vérifie par réduction au rang deux, (cf. 1.5(iii)), où le dessin est

(1.7.1)



Nous supposerons désormais remplie la condition suivante.

(1.8) Hypothèse. Les chambres sont des cônes simpliciaux ouverts. En d'autres termes, chaque chambre est l'ensemble des points de coordonnées > 0 dans une base convenable de V.

(1.9.1) Remarque. Soit P une intersection de murs.

(i) $(V_P, \mathcal{M}_P)$ vérifie encore (1.8);

(ii) l'ensemble $\mathcal{M}^P$ des traces sur P des murs ne contenant pas P vérifie encore (1.8).

Si $\mathcal{M}$ est défini par un «groupe de Weyl» W (voir l'introduction), $\mathcal{M}^P$ n'est plus en général de ce type.

(1.9.2) Remarque. L'hypothèse (1.8) assure que, si P est une intersection de murs d'une chambre C, la condition de (1.6) est vérifiée. La chambre $C.\Delta(P)$ est donc définie.

(1.10) Définition. Deux galeries de mêmes extrémités G et G' sont équivalentes, notation $G \sim G'$, s'il existe une suite de galeries $G = G_0, \ldots, G_n = G'$ $(n \geq 0)$ telle que G_{j+1} se déduise de G_j de la façon suivante $(0 \leq j < n)$:

a) on a des décompositions $G_j = E_1 F E_2$, $G_{j+1} = E_1 F' E_2$;

b) il existe une chambre C et deux murs M, N de C tels que F et F' soient les deux galeries minimales de C à $C.\Delta(M \cap N)$.

La composition des galeries, les opérations $G \to G^*$ et $G \to -G$, les applications source et but, la fonction «longueur» sont compatibles à cette relation d'équivalence et passent donc au quotient. On notera en principe par des minuscules les classes de galeries. On dit qu'une classe de galeries e commence (resp. finit) par une classe de galeries f s'il existe g tel que $e = fg$ (resp. $e = gf$).

(1.11) Proposition. Deux galeries équivalentes traversent le même nombre de fois chaque mur.

(1.12) Proposition. Deux galeries minimales de mêmes extrémités sont équivalentes.

Soient $G = (C_0, \ldots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \ldots, C'_n)$, d'extrémités A et B. On procède par récurrence sur la longueur des galeries considérées. Le cas $n = 0$ est trivial et l'hypothèse de récurrence permet de supposer que $C_1 \neq C'_1$. Soient M et M' les murs qui séparent $A = C_0 = C'_0$ de C_1 et C'_1, et $C = A.\Delta(M \cap M')$. Les murs M et M' séparent A de B. Par réduction au rang deux (1.5)(iii), on en déduit que tout mur qui sépare A de C sépare A de B.



(dessin dans $V_{M \cap M'}$; on omet d'écrire $\pi'_{M \cap M'}(\ )$).

Soient F (resp. F') la galerie minimale de A à C qui passe par C_1 (resp. C'_1), et E une galerie minimale de C à B. Les galeries FE et $F'E$ sont minimales et équivalentes. Les galeries minimales G et FE (resp. G' et FE') commencent par (A, C_1) (resp. par (A, C'_1)). L'hypothèse de récurrence implique qu'elles sont équivalentes, et (1.12) en résulte.

(1.13) Notation.

(i) On désigne par $u(A, B)$ la classe d'équivalence des galeries minimales de A à B.

(ii) Pour I un ensemble de murs d'une chambre C, d'intersection P, on pose

$$\Delta(P) = u(C, C.\Delta(P))$$

(cf. (1.9.2)). Pour I l'ensemble de tous les murs, on pose $\Delta = u(C, -C)$.

L'intérêt de la notation réside dans l'ambiguïté sur C.

(1.14) Proposition. Soient A une chambre et $\mathcal{G}$ un ensemble de classes de galeries de longueur bornée de source A. Supposons que $\mathcal{G}$ vérifie la conjonction (i) de

(ia) $(A) \in \mathcal{G}$;

(ib) si $gh \in \mathcal{G}$, alors $g \in \mathcal{G}$;

(ic) soient g de but B et M, N deux murs de B. Si $g\Delta(M)$ et $g\Delta(N)$ sont dans $\mathcal{G}$, alors $g\Delta(M \cap N) \in \mathcal{G}$.

On a alors:

(ii) Il existe une unique classe de galeries x de source A telle que

$$\mathcal{G} = \{g \mid x \text{ commence par } g\}.$$

L'unicité est claire: si x commence par y et que $x \neq y$, y est de longueur strictement plus petite que x. Soit x de longueur maximale dans $\mathcal{G}$. Pour s'assurer que x convient, il suffit de prouver l'assertion suivante.

(∗) Soient g et M tels que (a) x commence par g et (b) x ne commence pas par $g\Delta(M)$, et $g\Delta(M) \in \mathcal{G}$. Il existe alors g' et M', vérifiant encore (a) et (b), avec g' strictement plus long que g.

Puisque $g\Delta(M) \in \mathcal{G}$, la maximalité de x entraîne que $g \neq x$, donc que x commence par $g\Delta(N)$ pour N convenable, nécessairement distinct de M. D'après (i_c), on a alors $g\Delta(M \cap N) \in \mathcal{G}$.

Puisque $g\Delta(M \cap N)$ commence par $g\Delta(M)$, x ne commence pas par $g\Delta(M \cap N)$. Soit $(C_0, \ldots, C_m)$ la galerie minimale de $A.g$ à $A.g\Delta(M \cap N)$ qui commence par $(A.g, A.g\Delta(N))$. Soit i $(0 < i < m)$ le plus grand i tel que x commence par $g' = g(C_0, \ldots, C_i)$. Alors g' et le mur M' entre C_i et C_{i+1} vérifient (a)(b).



(projection dans $V_{M \cap N}$).

(1.15) Proposition. Soient A une chambre et $\mathcal{B}$ un ensemble de chambres. Pour que $\mathcal{B}$ vérifie la conjonction (i) de

(ia) $A \in \mathcal{B}$;

(ib) si $B \in \mathcal{B}$, alors $D(A, B) \subset \mathcal{B}$;

(ic) soient M et N deux murs d'une chambre B. Si A et B sont du même côté de M et de N, et que $B.\Delta(M)$ et $B.\Delta(N)$ sont dans $\mathcal{B}$, alors $B.\Delta(M \cap N) \in \mathcal{B}$,

il faut et il suffit que:

(ii) il existe une unique chambre C telle que $\mathcal{B} = D(A, C)$.

On vérifie facilement que (ii) implique (i). Pour prouver que (i) implique (ii), on applique (1.14) à l'ensemble $\mathcal{G}$ des $u(A, B)$ pour $B \in \mathcal{B}$ (noter que d'après (1.3) et (1.11) toute galerie G de classe g telle qu'un $u(A, B)$ commence par g est automatiquement minimale) et on applique (1.4)(i) $\Leftrightarrow$ (iii) à la classe de galeries $x = u(A, X)$ obtenue.

(1.16) Corollaire. Soient A et B deux chambres mitoyennes séparées par le mur M, et C du même côté de M que B. Il existe C' tel que

$$D(A, C) \cap D_M(B) = D(B, C').$$

(1.17) Corollaire.

(i) Soient A, C_1, C_2 trois chambres. Il existe C telle que

$$D(A, C) = D(A, C_1) \cap D(A, C_2). \tag{1.17.1}$$

(ii) Soient A et C_1 deux chambres, et M un mur de A. Il existe C' telle que

$$D(A, C') = D(A, C_1) \cap D_M(A). \tag{1.17.2}$$

En fait, (ii) est le cas particulier de (i) pour $C_2 = -(A.\Delta(M))$.

(1.18) Lemme. Soient M, M', M'' trois murs distincts d'une chambre A,

$$A_1 = A.\Delta(M), \qquad B = A.\Delta(M \cap M' \cap M''),$$
$$B' = A.\Delta(M \cap M'), \qquad B'' = A.\Delta(M \cap M'').$$

Pour toute chambre C, si $B' \in D(A_1, C)$ et $B'' \in D(A_1, C)$, on a $B \in D(A_1, C)$.

La facette F de A ouverte dans $M \cap M' \cap M''$ est une facette de toutes les chambres A, A_1, B, B' et B''. Appliquant (1.5)(iii), nous pouvons donc nous ramener au cas où $\dim V = 3$. Appliquant (1.17)(ii), on peut supposer de plus que A_1 et C sont du même côté de M. Faisons ces hypothèses, et supposons que $B', B'' \in D(A_1, C)$. Puisque M' (resp. M'') sépare A_1 de B' (resp. B''), A_1 et C sont séparés par M', M'' et du même côté de M; A et C sont donc séparés par M, M' et M'', et $C = -A = B$.

Le résultat clef suivant est inspiré de [4].

(1.19) Proposition.

(i) Soient A, B, C trois chambres, F une galerie de A à B et G_1, G_2 deux galeries de B à C. Si $FG_1 \sim FG_2$, alors $G_1 \sim G_2$.

(ii) De même, si $G_1E \sim G_2E$, alors $G_1 \sim G_2$.

(iii) Soit g une classe d'équivalence de galeries, de source A. Il existe une chambre C telle que g commence par $u(A, B)$ si et seulement si $B \in D(A, C)$.

On déduit (ii) de (i) par passage aux galeries opposées.

Soient $G = (C_0, \ldots, C_n)$ et $G' = (C'_0, \ldots, C'_n)$ deux galeries de longueur n et de mêmes extrémités. Si $n \geq 1$, on pose $G_1 = (C_1, \ldots, C_n)$ et $G'_1 = (C'_1, \ldots, C'_n)$. Si de plus $C_1 \neq C'_1$, on note M et M' les murs qui séparent $C_0 = C'_0$ de C_1 et C'_1, et on pose $A = C_0.\Delta(M \cap M')$.

Considérons la relation $R_n(G, G')$ suivante entre galeries G, G' comme plus haut. $R_n(G, G')$ signifie que l'on a soit:

a) $n = 0$;

b) $n \neq 0$, $C_1 = C'_1$ et $G_1 \sim G'_1$;

c) $n \neq 0$, $C_1 \neq C'_1$ et il existe une galerie F de A à $C_n = C'_n$ telle que

$$G_1 \sim u(C_1, A)F, \qquad G'_1 \sim u(C'_1, A)F.$$

Nous prouverons par récurrence sur n l'assertion suivante: (A_n) R_n est une relation d'équivalence.

Admettons (A_i) pour $i < n$, et prouvons (1.19.1) à (1.19.3) ci-dessous.

(1.19.1) Pour les galeries de longueur $i < n$, $R_i(G, G')$ équivaut à $G \sim G'$.

Il est trivial que $R_i(G, G')$ implique $G \sim G'$, et, avec les notations de (1.10), si $G \sim G'$, on a $R_i(G_j, G_{j+1})$.

(1.19.2) L'assertion (i) pour FG_1 de longueur $< n$ est vraie. Ceci résulte de (1.19.1) et de la seconde clause dans la définition des R_i.

(1.19.3) L'assertion (iii) est vraie pour g de longueur $< n$.

Ceci résulte de (1.15) appliqué à l'ensemble $\mathcal{B}$ des chambres B telles que g commence par $u(A, B)$: l'hypothèse (i_c) de (1.15) se vérifie à l'aide de (1.19.2), de (1.18) et de la troisième clause dans la définition des R_i.

Il reste à prouver que si G, G' et G'' sont trois galeries de longueur n allant de A à C et que $R_n(G, G')$ et $R_n(G, G'')$, on a $R_n(G', G'')$. Si $n = 0$, ou si $C_1 = C_1'$, ou si $C_1 = C_1''$, c'est trivial.

Pour $n > 0$, nous noterons M, M', M'' les murs qui séparent $A = C_0 = C_0' = C_0''$ de C_1, C_1', C_1''. Distinguons deux cas.

Cas 1. $C_1 \neq C_1' = C_1''$. Soit $B = A.\Delta(M \cap M')$. On a par hypothèse

$$(C_1, \ldots, C_n) \sim u(C_1, B)F' \sim u(C_1, B)F'',$$

$$(C_1', \ldots, C_n') \sim u(C_1', B)F', \qquad (C_1'', \ldots, C_n'') \sim u(C_1'', B)F''.$$

De (1.19.2), on tire alors que $F' \sim F''$, et donc que $R_n(G', G'')$.

Cas 2. $C_1 \neq C_1' \neq C_1'' \neq C_1$. Soient

$$B_1 = A.\Delta(M' \cap M''), \quad B' = A.\Delta(M \cap M'), \quad B'' = A.\Delta(M \cap M''),$$

et $B = A.\Delta(M \cap M' \cap M'')$. On a

$$G_1 \sim u(C_1, B')F' \sim u(C_1, B'')F'',$$

$$G_1' \sim u(C_1', B')F', \qquad G_1'' \sim u(C_1'', B'')F''.$$

De sorte que la classe g_1 de G_1 commence par $u(C_1, B')$ et $u(C_1, B'')$. Il résulte alors de (1.19.3) et du lemme (1.18) que g_1 commence par $u(C_1, B)$:

$$G_1 \sim u(C_1, B)F.$$

D'après (1.19.2), on a $F' \sim u(B', B)F$ et $F'' \sim u(B'', B)F$, donc

$$G_1' \sim u(C_1', B)F, \qquad G_1'' \sim u(C_1'', B)F.$$

Dès lors,

$$G_1' \sim u(C_1', B_1)u(B_1, B)F, \qquad G_1'' \sim u(C_1'', B_1)u(B_1, B)F,$$

de sorte que $R_n(G', G'')$.



(dessin sur la sphère unité de $V_{M \cap M' \cap M''}$).

(1.20) Corollaire. Les conditions (i) et (ii) de (1.14) sont équivalentes.

Supposons (ii) et prouvons (i_c). Sous les hypothèses de (i_c), si $x = gh$ (h de source B), il résulte de (1.19)(i) que h commence par $\Delta(M)$ et $\Delta(N)$. Soit C la chambre garantie par (1.19)(iii) pour h. Puisque M et N séparent B de C, $\pi'_{M\cap N}(C)$ ne peut être que $\pi'_{M\cap N}(B).\Delta$ et (i_c) résulte de (1.5)(iii).



(1.21) Corollaire. Pour toute chambre A, soit $n(A, i)$ le nombre de classes de galeries de source A et de longueur i. Posons

$$f_A = \sum_0^\infty n(A,i)t^i \in \mathbb{Z}[[t]].$$

Pour toute chambre A, et pour P parcourant les intersections de murs de A, y compris $\{0\}$ et V, on a

$$\sum_P (-1)^{\mathrm{codim}(P)} t^{d(A,A.\Delta(P))} f_{A.\Delta(P)} = 1.$$

Ceci exprime que:

a) le nombre de classes de galeries de longueur i qui commencent par $\Delta(P)$ est

$$n(A.\Delta(P), i - d(A, A.\Delta(P))) \quad ((1.19)(\mathrm{i}));$$

b) les classes de galeries qui commencent par $\Delta(P)$ et $\Delta(Q)$ commencent par $\Delta(P \cap Q)$ (résulte de (1.19)(iii)).

(1.22) Algorithme. Soient $G = (A_0, \ldots, A_n)$ une galerie de longueur $n \geq 1$, $G_1 = (A_1, \ldots, A_n)$, M le mur qui sépare A_0 de A_1, C la chambre dont l'existence est garantie par (1.19)(iii) pour G, et C_1 la chambre analogue pour G_1. On peut calculer C par récurrence à l'aide de la formule suivante (cf. (1.16)):

$$D(A_1, C) = D_M(A_1) \cap D(A_1, C_1). \tag{1.22.1}$$

Puisque $A_1 \in D(A, C)$, M sépare en effet A de C et $C \in D_M(A_1)$. D'après (1.19)(i), on a aussi $D(A_1, C) \subset D(A_1, C_1)$, d'où l'inclusion. Enfin, si $B \in D_M(A_1) \cap D(A_1, C_1)$, G_1 commence par $u(A_1, B)$ et G commence par

$$u(A, A_1)u(A_1, B) = u(A, B),$$

d'où (1.22.1).

(1.23) Corollaire. Soient G et H deux galeries composable. Soient A la source de G, B celle de H et C garantie par (1.19)(iii): on a

$$H \sim u(B, C)H'.$$

Alors, pour toute chambre D, pour que la classe de GH commence par $u(A, D)$, il faut et il suffit que celle de $Gu(B, C)$ commence par $u(A, D)$.

(1.24) Proposition. Soient A une chambre, P une intersection de murs de A, $F = F(P)$ (1.6), et g une classe d'équivalence de galeries de source A. Il existe une classe de galeries g' de $(V_P, \mathcal{M}_P)$, de source $\pi_F^{-1}(A)$, telle que, pour toute galerie H de $(V_P, \mathcal{M}_P)$, g commence par $\pi_F(H)$ si et seulement si g' commence par H.

Soit $\mathcal{G}$ l'ensemble des classes de galeries h de source $\pi_F^{-1}(A)$ de $(V_P, \mathcal{M}_P)$ telles que g commence par $\pi_F(h)$. Appliquons (1.14) à $(V_P, \mathcal{M}_P)$ et à $\mathcal{G}$. D'après (1.19), la condition (i) est vérifiée (cf. la preuve de (1.20)), et (1.24) résulte de (1.14)(ii).

(1.25) On peut regarder l'ensemble des galeries comme étant l'ensemble des flèches d'une catégorie $\mathrm{Gal}_0(V, \mathcal{M})$ ayant les chambres pour objets. De même, les classes d'équivalence de galeries sont les flèches d'une catégorie quotient $\mathrm{Gal}_+(V, \mathcal{M})$. Soient A, B, C trois chambres, E une galerie de A à B et F une galerie de B à C. Bien que les conventions générales dans les catégories soient autres, nous continuerons à noter EF le composé de E et F. La loi $*$ (resp. $G \to -G$) est une antiéquivalence (resp. une équivalence) de $\mathrm{Gal}_0(V, \mathcal{M})$ ou $\mathrm{Gal}_+(V, \mathcal{M})$ avec elle-même, induisant l'identité (resp. $C \to -C$) sur l'ensemble des objets.

Quand aucune confusion ne sera à craindre, nous écrirons simplement Gal_0 et Gal_+ pour $\mathrm{Gal}_0(V, \mathcal{M})$ et $\mathrm{Gal}_+(V, \mathcal{M})$, ou pour une catégorie $\mathrm{Gal}_0(V_P, \mathcal{M}_P)$ ou $\mathrm{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P)$. Par abus de langage, nous appellerons souvent galeries les flèches de Gal_+.

(1.26) Lemme.

(i) Dans Gal_+, pour toute galerie g, on a
$$g\Delta = \Delta(-g).$$

(ii) Quels que soient g et h de source A dans Gal_+, il existe n tel que $g\Delta^n$ commence par h. Si h est composé de k galeries $u(A_i, A_{i+1})$, on peut prendre $n = k$.

Procédant par récurrence, on se ramène à prouver (i) pour g de longueur un. Pour $g = (B, C)$, on a

$$g\Delta = u(B,C)u(C,-C) = u(B,C)u(C,-B)u(-B,-C) = u(B,-B)u(-B,-C) = \Delta(-g).$$

Quelle que soit la chambre B, $\Delta = u(A, -A)$ commence par $u(A, B)$. Dès lors, (ii) se déduit de (i) par récurrence sur k.

La proposition suivante résulte aussitôt de (1.26), de son transformé par $*$, et de (1.19)(i),(ii).

(1.27) Proposition.

(i) Dans Gal_+, l'ensemble de toutes les flèches donne lieu à un calcul de fractions à gauche et à droite.

(ii) Soit $\mathrm{Gal}(V, \mathcal{M})$, ou simplement Gal, la catégorie, un groupoïde, déduite de Gal_+ en rendant inversibles toutes les flèches. Appelons positives les flèches de Gal dans l'image de Gal_+. Le foncteur canonique de Gal_+ dans Gal est fidèle, et toute flèche g de Gal peut se mettre sous les formes
$$g = g_1\Delta^{-n} = \Delta^{-n}g_2$$
avec g_1 et g_2 positifs.

Si une catégorie C n'a qu'un seul objet A et que le monoïde $\mathrm{Hom}(A, A)$ est simplifiable, que l'ensemble de toutes les flèches de C donne lieu à un calcul des fractions à gauche et à droite signifie que $\mathrm{Hom}(A, A)$ vérifie la condition de Öre à gauche et à droite. La «théorie du calcul des fractions» utilisée en (1.27) et ci-dessous est une généralisation immédiate de la théorie de Öre pour plonger un tel monoïde dans un groupe.

(1.28) Pour tout mur M, le nombre de fois que g dans Gal_+ traverse M est bien défini (1.11). Cette fonction de g se prolonge par additivité pour $g \in \mathrm{Gal}$. Plus généralement, pour toute intersection de murs P, on pourrait utiliser la propriété universelle de Gal pour définir des foncteurs

$$\pi'_P : \mathrm{Gal}(V, \mathcal{M}) \longrightarrow \mathrm{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P).$$

(1.29) Soient A une chambre, P une intersection de murs de A, et $F = F(P)$ (1.6). La fonction π_F induit un foncteur

$$\pi_F : \mathrm{Gal}_0(V_P, \mathcal{M}_P) \longrightarrow \mathrm{Gal}_0(V, \mathcal{M}). \tag{1.29.1}$$

L'image de ce foncteur est stable par équivalence, et il induit un foncteur fidèle

$$\pi_F : \mathrm{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P) \longrightarrow \mathrm{Gal}_+(V, \mathcal{M}). \tag{1.29.2}$$

De la théorie du calcul des fractions et de (1.19)(i) résulte alors la proposition suivante.

(1.30) Proposition. Sous les hypothèses précédentes, le foncteur déduit de (1.29.2)

$$\pi_F : \mathrm{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P) \longrightarrow \mathrm{Gal}(V, \mathcal{M})$$

est fidèle.

(1.31) Proposition. Soient C une chambre, I et J deux ensembles de murs de C, $K = I \cap J$, P, Q, R les intersections des murs dans I, J, K, et $F(P), F(Q), F(R)$ les facettes correspondantes dans C (1.6). La facette $F(R)$ est la plus petite facette contenant $F(P)$ et $F(Q)$. Dans le groupoïde $\mathrm{Gal}(V, \mathcal{M})$, on a

$$\pi_{F(P)}(\mathrm{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P)) \cap \pi_{F(Q)}(\mathrm{Gal}(V_Q, \mathcal{M}_Q)) = \pi_{F(R)}(\mathrm{Gal}(V_R, \mathcal{M}_R)).$$

Une chambre admettant $F(P)$ et $F(Q)$ pour facettes admet aussi $F(R)$ pour facette. Ceci prouve (1.31) pour les objets.

Soit $g \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(A, B)$, et supposons que

$$g = \pi_{F(P)}(g_1') = \pi_{F(Q)}(g_2').$$

D'après (1.27)(ii), on a

$$g_1' = \Delta(P)^{-n} g_1'', \qquad g_2' = \Delta(Q)^{-n} g_2''$$

avec g_i'' positifs, pour $n \geq 0$ assez grand. Soient $g_1 = \pi_{F(P)} g_1''$ et $g_2 = \pi_{F(Q)} g_2''$. D'après (1.26)(ii) (transformé par $*$), $\Delta^n \Delta(P)^{-n}$ est positif; on a dans $\mathrm{Gal}_+(V, \mathcal{M})$

$$(\Delta^n \Delta(P)^{-n}) g_1 = (\Delta^n \Delta(Q)^{-n}) g_2. \tag{1.31.1}$$

(1.31.2) Lemme. Si $h \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}_+}(A, B)$ commence tant par $\Delta^n \Delta(P)^{-n}$ que par $\Delta^n \Delta(Q)^{-n}$, alors h commence par $\Delta^n \Delta(R)^{-n}$.

Déduisons (1.31) de (1.31.2). D'après (1.31.2), on a

$$(\Delta^n \Delta(P)^{-n}) g_1 = (\Delta^n \Delta(Q)^{-n}) g_2 = (\Delta^n \Delta(R)^{-n}) g_3$$

avec g_3 positif. On a donc $g = \Delta(R)^{-n} g_3$. La galerie positive $g_3 = \Delta(R)^n g$ appartient à l'image de $\pi_{F(P)}$ et de $\pi_{F(Q)}$. Elle traverse donc, par (1.28), zéro fois tout mur ne contenant pas P ou Q, c'est-à-dire ne contenant pas R. Elle appartient donc à l'image de $\pi_{F(R)}$.

Prouvons (1.31.2). Soit $A(P) = A.\Delta.\Delta(P)$, et de même pour Q et R. La galerie $\Delta\Delta(P)^{-1}$ de source A est $u(A, A(P))$; celle de source $A(P)$ est $u(A(P), A)$. De (1.26)(i) résulte que $\Delta\Delta(P) = \Delta(P)\Delta$. On a donc

$$\Delta^n \Delta(P)^{-n} = u(A, A(P))\, u(A(P), A)\, u(A, A(P)) \cdots \tag{1.31.3}$$

avec n facteurs.

(1.31.4) Lemme. $A(R) \in D(A(P), A(Q))$.

Avec les notations de (1.2), $\mathcal{M}(A\Delta, A(P))$ est l'ensemble des murs qui conteniennent P, et $\mathcal{M}(A\Delta, A(Q))$ l'ensemble de ceux qui contiennent Q. D'après (1.2), $\mathcal{M}(A(P), A(Q))$ est l'ensemble de ceux qui contiennent P ou Q, mais non R, soit

$$\mathcal{M}(A(P), A(R)) \cup \mathcal{M}(A(Q), A(R)),$$

et on applique (1.4).

D'après (1.19)(iii), une classe de galeries qui commence par $\Delta\Delta(P)^{-1}$ et $\Delta\Delta(Q)^{-1}$ commence donc aussi par $\Delta\Delta(R)^{-1}$, et (1.31.2) résulte par récurrence du lemme suivant.

(1.31.5) Lemme. Soient P et R des intersections de murs d'une chambre A, avec $P \subset R$. Soit h dans Gal_+ de source A. Si h commence tant par $\Delta^n\Delta(P)^{-n}$, $n>0$, que par $\Delta\Delta(R)^{-1}$, alors h commence par

$$(\Delta\Delta(R)^{-1})(\Delta\Delta(P)^{-1})^{n-1}.$$

On peut supposer $n \geq 2$. Posons $h = (\Delta\Delta(P)^{-1})h'$. Avec les notations précédentes, h' commence alors tant par $\Delta\Delta(P)^{-1} = u(A(P), A)$ que par $u(A(P), A(R))$. Appliquons (1.19)(iii). La chambre C de loc. cit. est alors séparée de $A(P)$ par tout mur M qui sépare $A(P)$ de A, c'est-à-dire $M \not\supset P$, ou $A(P)$ de $A(R)$, c'est-à-dire $M \supset P$ et $M \not\supset R$. La chambre C n'est donc séparée de $A(P)\Delta$ que par des murs $M \supset R$, et

$$C \in D(A(P).\Delta, A(P).\Delta\Delta(R)).$$

Dès lors, h' commence tant par $\Delta\Delta(R)^{-1}$ que par $(\Delta\Delta(P)^{-1})^{n-1}$. Procédant par récurrence sur n, on en déduit que h' commence par

$$(\Delta\Delta(R)^{-1})(\Delta\Delta(P)^{-1})^{n-2},$$

de sorte que h commence par

$$(\Delta\Delta(P)^{-1})(\Delta\Delta(R)^{-1})(\Delta\Delta(P)^{-1})^{n-2}.$$

On conclut en notant que

$$\Delta\Delta(P)^{-1}\Delta\Delta(R)^{-1} = \Delta\Delta(R)^{-1}\Delta\Delta(P)^{-1}.$$

(1.32) Proposition. Pour F une facette d'une chambre C, engendrant une intersection de murs P, on a

$$\pi_F^{-1}(\mathrm{Gal}_+(V, \mathcal{M})) = \mathrm{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P) \subset \mathrm{Gal}(V_P, \mathcal{M}_P).$$

Supposons que $\pi_F(\Delta^{-n}g) = h$ soit dans $\mathrm{Gal}_+(V, \mathcal{M})$. On a alors $\pi_F(g) = \Delta(P)^n h$, et, d'après (1.28), toute galerie H représentant h ne traverse que des murs passant par F. On a donc $h = \pi_F(h_1)$, avec h_1 dans $\mathrm{Gal}_+(V_P, \mathcal{M}_P)$, et on conclut par (1.30).

2. Immeubles

(2.1) Soient $(V, \mathcal{M})$ comme au §1 (vérifiant (1.8)) et $r = \dim V$. Soit S la sphère de rayon un dans V, pour une quelconque structure euclidienne sur V (on pourrait plus intrinsèquement poser $S = (V - \{0\})/\mathbb{R}_+^*$). Les hyperplans $M \in \mathcal{M}$ découpent une triangulation de S, et nous noterons encore S l'espace simplicial (schéma simplicial) correspondant, et sa réalisation géométrique. Nous transporterons à S la terminologie utilisée pour V (chambres, facettes, mitoyenneté, galerie, ...).

(2.2) Choisissons une «chambre fondamentale» A_0 dans S. Nous noterons I_+ l'espace construit ci-dessous; il dépend de $V, \mathcal{M}, A_0$, et est muni de $q : I_+ \to S$.

a) Soit $\mathcal{L}_+$ l'ensemble des classes d'équivalence de galeries g de source A_0,

$$\mathcal{L}_+ = \coprod_B \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}_+}(A_0, B).$$

b) Soit Z la somme disjointe, indexée par $g \in \mathcal{L}_+$, du simplexe fermé de S, adhérence du simplexe ouvert de dimension $r-1$ qu'est le but de g:

$$Z_+ = \coprod_{g \in \mathcal{L}_+} (\text{but de } g)^-.$$

Soit q' l'application évidente de Z_+ sur S.

c) I_+, muni de q, est un quotient de Z_+, muni de q'. Si G est une galerie de A_0 à B et C une chambre mitoyenne à B, on recolle $(\text{but } g)^-$ et $(\text{but } g(BC))^-$ selon la face fermée commune de leurs images dans S.

(2.3) L'espace I_+ est décomposé en facettes, images de facettes de Z_+, et s'envoyant bijectivement sur une facette de S. Ses chambres, respectivement faces et sommets, sont ses facettes de dimension $r-1$, respectivement $r-2$ et 0.

Les sommets d'une facettes F sont les sommets contenus dans l'adhérence $\overline{F}$ de F. Les chambres de I_+ sont indexées par $\mathcal{L}_+$; on note $\widetilde{A}_0.g$ celle d'indice g, et $\widetilde{A}_0$ celle d'indice (A_0).

Soient $g \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}_+}(A_0, A)$, $\widetilde{A} = \widetilde{A}_0.g$, et $H = (C_0, \ldots, C_n)$ une galerie de A à B, de classe h. On pose

$$\widetilde{A}.h = \widetilde{A}_0.gh.$$

Les chambres $\widetilde{A}.(C_0, \ldots, C_i)$, $0 \leq i \leq n$, forment une galerie dans I_+. On appellera positives les galeries ainsi obtenues.

(2.4) Lemme. Soit F une facette de S, A et B deux chambres de S ayant F pour facette, $g \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}_+}(A_0, A)$ et $h = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}_+}(A_0, B)$. Les conditions suivantes sont équivalentes:

(a) dans I_+, les facettes $q^{-1}(F)$ de $\widetilde{A}_0.g$ et $\widetilde{A}_0.h$ coïncident;

(b) $g^{-1}h \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(A, B)$ est dans $\pi_F(\mathrm{Gal})$;

(c) il existe g_1 et h_1 dans $\pi_F(\mathrm{Gal}_+)$ tels que $gg_1 = hh_1$.

La condition (b) est une relation d'équivalence entre galeries de A_0 à une chambre dont F est facette. On en déduit que (a) implique (b). Que (b) implique (c) résulte de (1.26)(i). Enfin, (c) implique (a) est trivial sur les définitions.

De (2.4), (a) $\Leftrightarrow$ (b), et de (1.31), on déduit aussitôt le résultat suivant.

(2.5) Proposition. Chaque facette de I_+ est uniquement déterminée par l'ensemble de ses sommets. On peut donc décrire I_+ comme la réalisation géométrique du schéma simplicial suivant.

a) Pour x sommet de S, soit $\mathcal{G}(x)$ l'ensemble des g dans Gal_+ de source A_0 et de but une chambre dont x est sommet. Soit $\mathcal{G}(x)/\pi_x$ le quotient de $\mathcal{G}(x)$ par la relation d'équivalence (2.4)(b), pour $F = x$. Alors l'ensemble des sommets est
$$\coprod_x \mathcal{G}(x)/\pi_x.$$

b) Pour qu'un ensemble E de sommets tende un simplexe, il faut et suffit qu'il existe une galerie g de source A_0 telle que, pour $y \in E$, g soit dans $\mathcal{G}(qy)$ et que y soit l'image de g dans $\mathcal{G}(qy)/\pi_{qy}$.

(2.6) Proposition. Soit F une facette de I_+. Il existe une classe de galeries g telle que, pour que F soit une facette d'une chambre $B = \widetilde{A}_0.h$, il soit nécessaire et suffisant que l'on ait

$$h = g\,\pi_F(h')$$

pour h' convenable dans Gal_+.

Prenons pour g une galerie de longueur minimum telle que F soit facette de $A = \widetilde{A}_0.g$. Soit $B = \widetilde{A}_0.h$ une chambre dont F soit facette. D'après (2.4)(a) $\Leftrightarrow$ (c), il existe des galeries h_1 et h_2 dans $(V_{qF}, \mathcal{M}_{qF})$, avec

$$g\pi_F(h_1) = h\pi_F(h_2).$$

Appliquons le transformé par $*$ de (1.24). Vu la minimalité de g, on trouve que h_1 finit par h_2: $h_1 = h'h_2$. D'après (1.19)(ii), on a $g\pi_F(h') = h$, et ceci prouve (2.6).

(2.7) Notation. Soit A une chambre de I_+. On désigne par $S(A)$ la réunion des chambres fermées $(A.(qA, B))^-$, pour B chambre de S. On vérifie que $q|S(A)$ est un isomorphisme entre $S(A)$ et S.

(2.8) Définition. $\widehat{I}_+$ est l'espace déduit de I_+ en «bouchant» les sphères $S(A)$.

De façon précise, soit B^r une boule dont S soit le bord. Quand on voudra travailler simplicialement, on prendra pour B^r le cône sur l'espace simplicial S. On définit $\widehat{I}_+$ comme déduit de I_+ par attachement d'une famille de copies $b(A)$ de B^r, famille indexée par l'ensemble des chambres de I_+. Les applications d'attachements sont les

$$\partial b(A) \xrightarrow{\sim} S \xleftarrow{q} S(A).$$

Les applications d'attachement sont simpliciales, de sorte que $\widehat{I}_+$ apparaît encore comme la réalisation géométrique d'un schéma simplicial (de sommets ceux de I_+ et les «centres des boules»). L'espace $\widehat{I}_+$ est muni d'une application (simpliciale) évidente

$$q : \widehat{I}_+ \longrightarrow B^r.$$

(2.9) Proposition. L'espace $\widehat{I}_+$ est contractile.

L'espace I_+ est donc le bouquet des sphères $S(A)$.

Soient $(I_+)_n$ la réunion des chambres fermées $(\widetilde{A}_0.g)^-$ pour g de longueur $\leq n$, et $(\widehat{I}_+)_n$ la réunion de $(I_+)_n$ et de l'ensemble des boules $b(A)$ pour $\partial b(A) \subset (I_+)_n$.

On a $(\widehat{I}_+)_0 = \widetilde{A}_0$ (contractile), et

$$\widehat{I}_+ = \varinjlim (\widehat{I}_+)_n.$$

La proposition résulte du

(2.9.1) Lemme. $(\widehat{I}_+)_n$ est rétracte par déformation de $(\widehat{I}_+)_{n+1}$.

Nous devons construire une famille continue $(\varphi_t)_{0\leq t\leq 1}$ d'applications continues de $(\widehat{I}_+)_{n+1}$ dans lui-même, avec $\varphi_0 = \mathrm{Id}$, $\varphi_t|(\widehat{I}_+)_n = \mathrm{Id}$ et $\varphi_1((\widehat{I}_+)_{n+1}) = (\widehat{I}_+)_n$.

Soient $A = \widetilde{A}_0.g$ une chambre de $(I_+)_{n+1}$ qui n'est pas dans $(I_+)_n$, et F une facette de A.

(2.9.2) Lemme. Supposons qu'il existe une chambre $B = \widetilde{A}_0.h$ dans $(I_+)_{n+1}$, distincte de A, dont F soit une facette. Il existe alors une chambre $B' = \widetilde{A}_0.h'$ dans $(I_+)_n$, et un mur M de qB', contenant qF, tel que

$$A = B'.\Delta(M).$$

Soit g_0 la galerie considérée en (2.6). On a

$$g = g_0\pi_F(g_1), \qquad h = g_0\pi_F(h_1).$$

Les hypothèses impliquent que la longueur $\lg(g_1) \neq 0$ (sinon, puisque $A \neq B$, on aurait $\lg(h) > \lg(g) = n+1$). Pour un mur convenable M de qA, on a alors $g_1 = h'\Delta(M)$, et on pose $B' = \widetilde{A}_0.h'$.

Pour la chambre fermée A^-, $A^- \cap (I_+)_n$ est donc réunion d'un ensemble (non vide) de faces fermées, et, dans $(I_+)_{n+1}$, les points de

$$A^- - (A^- \cap (I_+)_n)$$

n'appartiennent qu'à la seule chambre fermée A^-. Distinguons deux cas.

Cas 1. $A^- \cap (I_+)_n \neq \partial A^-$. Dans ce cas, il n'existe pas de sphère $S(B)$ avec

$$A \subset S(B) \subset (I_+)_{n+1}.$$

Nous prendrons pour $\varphi_t|A^-$ un effondrement de A^- sur $A^- \cap (I_+)_n$.

Cas 2. $A^- \cap (I_+)_n = \partial A^-$. Posons $A = \widetilde{A}_0.g$. Pour tout mur M de qA, il résulte alors de (2.7.2) que g finit par $\Delta(M)$. D'après ((1.19)(iii)), g finit donc par Δ: on a $A = B.\Delta$, avec B uniquement défini par A, d'après (1.19)(ii). Quand on passe de $(\widehat{I}_+)_{n+1}$ à $(\widehat{I}_+)_n$, A et l'intérieur de la boule $b(B)$ disparaissent. On prend pour $\varphi_t|b(B)$ un effondrement de $b(B)$ sur $S(B) - A$. D'après ce qui a été vu au cas 1, toute boule qui disparaît est du type précédent. Ceci achève la construction de φ_t, et prouve (2.7).

(2.10) L'espace I, muni de $q : I \to S$, se définit comme I_+, en remplaçant Gal_+ par Gal:

a) on pose $\mathcal{L} = \coprod_B \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(A_0, B)$;

b) on pose $Z = \coprod_{g\in\mathcal{L}} (\text{but de } g)^-$;

c) soit q' l'application évidente de Z sur S. L'espace I, muni de q, est un quotient de Z, muni de q'. Pour $g \in \mathcal{L}$ de but B et C une chambre mitoyenne à B, on recolle $(\text{but de } g)^-$ et $(\text{but de } g(BC))^-$ selon la face fermée commune de leurs images dans S.

En d'autres termes, si deux chambres B et C ont une facette commune F, si $g \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(A_0, B)$ et $h \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(A_0, C)$, alors, dans I, les facettes fermées $q'^{-1}(F)^-$ de $(\text{but } g)^-$ et de $(\text{but } h)^-$ sont identifiées si et seulement si

$$hg^{-1} \in \pi_F \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(\pi_F^{-1}B, \pi_F^{-1}C).$$

(2.11) On définit comme pour I_+ les chambres, faces, facettes ouvertes ou fermées de I. On définit $\widetilde{A}_0$, et $\widetilde{A}.h$, pour $\widetilde{A}$ une chambre et h dans Gal de source $q\widetilde{A}$, comme en (2.3). L'analogue de (2.4)(a) $\Leftrightarrow$ (b) est ici trivialement vrai. Comme en (2.5), on déduit alors de (1.31) que chaque facette de I est uniquement déterminée par l'ensemble de ses sommets, et I apparaît comme la réalisation géométrique d'un schéma simplicial qui admet une description du type (2.5). Pour toute chambre A de I, on définit comme en (2.7) une sphère $S(A)$; q induit un isomorphisme de $S(A)$ sur S. Comme en (2.8), on définit un immeuble $\widehat{I}$, muni de $q : \widehat{I} \to B^r$, en «bouchant» toutes les sphères $S(A)$.

(2.12) Outre q et sa décomposition en chambres, I est muni de la structure additionnelle suivante. Une «composition» $\widetilde{B}.g$ est définie, qui à une chambre $\widetilde{B}$ de I, d'image B dans S, et à $g \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(B, C)$, associe une chambre de I, d'image C dans S. La construction $g \mapsto \widetilde{B}.g$ définit un isomorphisme de l'espace analogue à I obtenu en prenant B pour chambre fondamentale avec l'espace I (pour $A_0 = B$, on trouve des automorphismes de I). En particulier,

$$\widetilde{B}.(gh) = (\widetilde{B}.g).h.$$

(2.13) Pour toute chambre A de I au-dessus de A_0, on définit une application

$$i_A : I_+ \longrightarrow I$$

et, de même, $i_A : \widehat{I}_+ \to \widehat{I}$, compatible à la projection sur S, respectivement B^r, en envoyant la chambre fermée $(A.g)^-$ de I_+, respectivement la boule $b(A.g)$ de $\widehat{I}_+$, sur la chambre, respectivement la boule, de même nom de I, respectivement $\widehat{I}$.

(2.14) Proposition.

(i) i_A identifie I_+ à un sous-espace fermé de I et $\widehat{I}_+$ à un sous-espace fermé de $\widehat{I}$.

(ii) On a

$$I = \varinjlim i_{\widetilde{A}_0.\Delta^{-2n}}(I_+), \qquad \widehat{I} = \varinjlim i_{\widetilde{A}_0.\Delta^{-2n}}(\widehat{I}_+).$$

Les assertions (i) ou (ii) pour $\widehat{I}_+$ et $\widehat{I}$ résultent des assertions correspondantes pour I_+ et I.

Prouvons (i) pour I_+ et I. Soient B et C deux chambres de S ayant une facette commune F. Soient $g \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}_+}(A_0, B)$ et $h \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}_+}(A, C)$. Supposons que les facettes $q^{-1}F$ de $(A.g)^-$ et $(A.h)^-$ soient égales dans I. On a alors

$$g^{-1}h = \pi_F(e) \quad \text{pour} \quad e \in \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gal}}(\pi_F^{-1}B, \pi_F^{-1}C).$$

D'après (1.26), on peut écrire $e = e_1 e_2^{-1}$, avec e_i dans Gal_+. D'après (1.29), on a alors $g\pi_F(e_1) = h\pi_F(e_2)$ dans Gal_+, et les facettes $q^{-1}F$ de $(A.g)^-$ et $(A.h)^-$ sont donc déjà égales dans I_+.

Pour prouver (ii), il suffit de remarquer que toute galerie g de source A_0 dans Gal peut s'écrire

$$g = \Delta^{-2n} g'$$

avec g' dans Gal_+.

De (2.14), on tire que $\pi_i(\widehat{I}) = \varinjlim \pi_i(\widehat{I}_+)$. Puisque I est un CW-complexe, on déduit de (2.9) le résultat suivant.

(2.15) Théorème. L'espace $\widehat{I}$ est contractile.

L'espace I est donc le bouquet des sphères $S(A)$, pour A parcourant les chambres de I.

3. Revêtements

(3.1) Soient $V_{\mathbb{C}}$ le complexifié de V, $M_{\mathbb{C}}$ le complexifié de M, pour $M \in \mathcal{M}$, et

$$Y = V_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M_{\mathbb{C}}.$$

Dans ce paragraphe, nous construisons par recollement un espace $\widetilde{Y}$ au-dessus de Y. La donnée de recollement sera décrite à l'aide de I et de $\widehat{I}$. Les facettes de S et les facettes de V autre que $\{0\}$ sont en bijection canonique, et nous aurons constamment à passer des unes aux autres. En général, nous noterons de même les facettes correspondantes; en cas de besoin la correspondance se notera $F \mapsto [F]$.

(3.2) Lemme. Soient A, B, C trois chambres de I, avec $C \subset S(A) \cap S(B)$. Alors q induit un isomorphisme de $S(A) \cap S(B)$ avec l'intersection de S et des demi-espaces fermés $D'_M(qC)$, contenant qC, limités par un mur M qui sépare qA de qB.

L'intersection des $D'_M(qC)$ est réunion de chambres fermées. Si C' est l'une d'elles, qA et qB sont du même côté de tout mur qui sépare qC de C'. On en déduit que les relèvements sur $S(A)$ ou $S(B)$ d'une galerie minimale de qC à C' coïncident, et $(C')^- \subset q(S(A) \cap S(B))$.

Réciproquement, si une facette F n'est pas dans l'intersection des $D'_M(qC)$, il existe un mur M tel que $F \not\subset M$, qui sépare qA de qB et F de qC. Supposons que par impossible $F \subset q(S(A) \cap S(B))$. Soient D une chambre de S dont F est facette, et $(C_0, C_1, \ldots, C_{n+1})$ une galerie de qC à D. Soit M_i le mur qui sépare C_i de C_{i+1}, et α_i (resp. β_i) $= \pm 1$ selon que C_{i+1} et A (resp. B) sont ou ne sont pas du même côté de M_i. Par hypothèse, F est facette de

$$C\Delta(M_0)^{\alpha_0} \cdots \Delta(M_n)^{\alpha_n}$$

et de

$$C.\Delta(M_0)^{\beta_0} \cdots \Delta(M_n)^{\beta_n}.$$

D'après (2.4) et (1.24), on a alors (puisque $M \not\supset F$)

$$\sum_{M_i = M} \alpha_i = \sum_{M_i = M} \beta_i,$$

ce qui est absurde: un membre vaut un, l'autre -1.

(3.3) Lemme. Soit $\mathcal{R}$ et $\mathcal{I}$ les applications «partie réelle» et «partie imaginaire» de $V_{\mathbb{C}}$ dans V. Soit $v \in V_{\mathbb{C}}$, et F la facette de V telle que $\mathcal{R}v \in F$. Pour que $v \in Y$, il faut et suffit que $\mathrm{pr}_F(\mathcal{I}v)$ soit dans une chambre de $(V_F, \mathcal{M}_F)$.

C'est clair.

Ce qui suit a pour fondement intuitif le fait qu'à toute promenade dans I, accomplie en suivant une galerie de la forme

$$\Delta(M_1)^{\varepsilon_1} \cdots \Delta(M_k)^{\varepsilon_k}, \qquad \varepsilon_i = \pm 1,$$

correspond un chemin *ch* (une classe de chemin) dans Y. L'image par $\mathcal{R}$ de *ch* dans V passe de chambre en chambre, en traversant successivement les murs $M_1, \ldots, M_k$ en des points m_i. Pour $\varepsilon_i = 1$ (resp. -1) le chemin passe par l'une des deux composantes R de $\mathcal{R}^{-1}(m_i) \cap Y$ (en bijection par $\mathcal{I}$ avec $V - M$): celle telle que $\mathcal{I}R$ contienne (resp. ne contienne pas) la chambre précédente.

(3.4) Notations.

(i) Soit C une chambre de $(V, \mathcal{M})$. On note $Y(C)$ l'ouvert de Y formé des $x \in V_{\mathbb{C}}$ vérifiant la condition suivante: si F est la facette de V telle que $\mathcal{R}x \in F$, alors $\mathrm{pr}_F \mathcal{I}x \in \pi'_F(C)$.

(ii) Soient A et B deux chambres de I. Si $S(A) \cap S(B)$ contient une chambre C, notons provisoirement $Y'(A, B)$ l'intersection des demi-espaces ouverts $D'_M(qC)^\circ$ pour M comme en 3.2. On pose

$$Y(A, B) = Y(qA) \cap Y(qB) \cap \mathcal{R}^{-1} Y'(A, B) \subset V_{\mathbb{C}}.$$

Si $S(A) \cap S(B)$ ne contient pas de chambre, on pose $Y(A, B) = \varnothing$.

(iii) Pour F une facette de V, l'étoile $\mathrm{Et}(F)$ est la réunion des facettes ouvertes G de $(V, \mathcal{M})$ telles que $F \subset \overline{G}$.

(iv) Pour F une facette de V, et C une chambre de $(V_F, \mathcal{M}_F)$, on pose

$$V(F, C) = \{\, v \in V_{\mathbb{C}} \mid \mathcal{R}v \in \mathrm{Et}(F),\ \mathrm{pr}_F \mathcal{I}v \in C \,\}.$$

(3.5) Lemme. Soit G une facette de V. Les $V(F, C)$, pour F une facette telle que $G \subset \overline{F}$ et C une chambre de V_F, forment un recouvrement ouvert de

$$Y \cap \mathcal{R}^{-1}(\mathrm{Et}\, G).$$

En particulier, en faisant $G = \{0\}$, les $V(F, C)$ recouvrent Y.

Si $x \in Y \cap \mathcal{R}^{-1}(\mathrm{Et}\, G)$ et que $\mathcal{R}x \in F$, alors x est dans l'un des $V(F, C)$ par (3.3).

(3.6) Soit Y' la somme disjointe, indexée par les boules $b(A)$ de $\widehat{I}$,

$$Y' = \coprod_{b(A)} Y(qA).$$

On note $Y'(b(A))$ la composante d'indice $b(A)$. On dispose d'une projection évidente

$$p' : Y' \longrightarrow Y.$$

Soit R la relation suivante sur Y': pour $x \in Y'(b(A))$ et $y \in Y'(b(B))$, $R(x,y)$ signifie que

$$p'(x) = p'(y) \quad \text{et} \quad p'(x), p'(y) \in Y(A,B).$$

C'est une relation d'équivalence car, cf. (3.2),

$$Y(A,B) \cap Y(B,C) \subset Y(A,C).$$

On a

$$\text{le saturé pour } R \text{ d'un ouvert de } Y' \text{ est encore ouvert.} \tag{3.6.1}$$

On pose $\widetilde{Y} = Y'/R$. On dispose d'une projection évidente

$$p : \widetilde{Y} \longrightarrow Y.$$

Pour toute boule $b(A)$ de $\widehat{I}$, on note $\widetilde{Y}(b(A))$ l'image de $Y'(b(A))$ dans $\widetilde{Y}$.

Le théorème suivant implique celui par lequel débute l'introduction.

(3.7) Théorème. *$\widetilde{Y}$ est un revêtement contractile de Y.*

A. $\widetilde{Y}$ est un revêtement de Y. Nous montrerons, pour $V(F,C)$ comme en (3.4)(iv), que $p^{-1}V(F,C)$ est somme de copies de $V(F,C)$.

a) Soit $b(A)$ une boule de $\widehat{I}$. Pour B une chambre telle que $F \subset B^-$, soit la chambre de I

$$C'_B = A.u(A,B)u(\pi_F(C),B)^{-1}.$$

Par construction, $B \subset q(S(A) \cap S(C'_B))$, et en particulier, si $F \neq \{0\}$,

$$[F] \subset q(S(A) \cap S(C'_B)). \tag{3.7.1}$$

Prouvons que

$$\widetilde{Y}(b(A)) \cap p^{-1}V(F,C) \subset \bigcup_{F \subset B^-} \widetilde{Y}(b(C'_B)). \tag{3.7.2}$$

Soit x dans le membre de gauche. Soit G la facette de V à laquelle $\mathcal{R}px$ appartient. On a $F \subset G^-$. Prenons pour B une chambre dont G est facette. Par hypothèse, on a

$$\mathrm{pr}_G \mathcal{I}px \in \pi'_G(A) \quad \text{et} \quad \mathrm{pr}_F \mathcal{I}px \in C.$$

On a donc $\pi'_G(A) = \pi'_G(\pi_F C)$. On déduit alors de (3.2) que toute chambre dont G est facette est dans $q(S(A) \cap S(C'_B))$, que px est dans $Y(A,C'_B)$, et que donc $x \in \widetilde{Y}(b(C'_B))$.

b) Posons

$$Y'(F,C) = \bigcup_{q(C')=C} \big(Y'(b(C')) \cap p'^{-1}V(F,C)\big).$$

D'après a), on a ensemblistement

$$p^{-1}V(F,C) = Y'(F,C)/R.$$

C'est même un isomorphisme d'espaces topologiques, d'après (3.6.1), car $Y'(F,C)$ est ouvert dans Y'. D'après (3.2), la relation d'équivalence induite par R sur

$$\bigcup_{q(C')=C} Y'(b(C'))$$

est triviale. On conclut en remarquant que, pour tout C' au-dessus de C,

$$V(F,C) \subset Y(b(C')).$$

B. Un recouvrement ouvert de $\widetilde{Y}$.

(3.7.3) Notations. (i) Pour F une facette de I,

$$\widetilde{Y}(F) = \bigcup_{F\subset S(C)} \big(\widetilde{Y}(b(C)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\,\mathrm{Et}(qF)\big).$$

(ii) Pour $o(A)$ centre d'une boule $b(A)$ de $\widehat{I}$,

$$\widetilde{Y}(o(A)) = \widetilde{Y}(b(A)) \cap p^{-1}V(\{0\}, A).$$

(3.7.4) Lemme. (i) Les $\widetilde{Y}(s)$, pour s sommet de $\widehat{I}$, forment un recouvrement de $\widetilde{Y}$ dont $\widehat{I}$ est le nerf (i.e., une famille de $\widetilde{Y}(s)$ a une intersection non vide si et seulement si les s correspondant sont les sommets d'une facette de $\widehat{I}$).

(ii) Si une facette F de I a pour sommets $s_0, \dots, s_p$, alors

$$\widetilde{Y}(F) = \widetilde{Y}(s_0) \cap \cdots \cap \widetilde{Y}(s_p).$$

(iii) Si $F \subset S(A)$, alors $\widetilde{Y}(o(A)) \cap \widetilde{Y}(F)$ est contractile; $\widetilde{Y}(o(A))$ est contractile.

(3.7.4.1) Soient F_i, $i = 1, 2$, deux facettes de I, et C_i, $i = 1, 2$, deux chambres de I telles que $F_i \subset S(C_i)$ et que

$$\big(\widetilde{Y}(b(C_1)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\,\mathrm{Et}(qF_1)\big) \cap \big(\widetilde{Y}(b(C_2)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\,\mathrm{Et}(qF_2)\big) \neq \varnothing.$$

Alors F_1 et F_2 tendent une facette F de I, unique d'après (2.5)–(2.11), $F \subset S(C_i)$, et l'intersection précédente coïncide avec

$$\widetilde{Y}(b(C_1)) \cap \widetilde{Y}(b(C_2)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\,\mathrm{Et}(F).$$

Par hypothèse

$$Y(C_1, C_2) \cap \mathcal{R}^{-1}\,\mathrm{Et}(qF_1) \cap \mathcal{R}^{-1}\,\mathrm{Et}(qF_2) \neq \varnothing;$$

F_1 et F_2 sont donc dans $S(C_1) \cap S(C_2)$ et y tendent une facette F. De plus,

$$\mathrm{Et}(qF_1) \cap \mathrm{Et}(qF_2) = \mathrm{Et}(qF),$$

d'où la formule annoncée.

De (3.7.4.1), on déduit que $\widetilde{Y}(F_1) \cap \widetilde{Y}(F_2)$ est vide si F_1 et F_2 ne tendent pas de facette commune F, et vaut

$$\bigcap_{F\subset S(C)} \widetilde{Y}(bC) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\,\mathrm{Et}(F) = \widetilde{Y}(F)$$

sinon, faire $C_1 = C_2$. Ceci prouve (ii) et une partie de (i).

(3.7.4.2) Si $o(A) \neq o(B)$, alors

$$\widetilde{Y}(o(A)) \cap \widetilde{Y}(o(B)) = \varnothing.$$

Si $qA = qB$, on a $\widetilde{Y}(b(A)) \cap \widetilde{Y}(b(B)) = \varnothing$. Si $qA \neq qB$, on a

$$p\widetilde{Y}(o(A)) \cap p\widetilde{Y}(o(B)) = \varnothing.$$

(3.7.4.3) Si $F \not\subset S(A)$, alors

$$\widetilde{Y}(o(A)) \cap \widetilde{Y}(F) = \varnothing.$$

Si $F \subset S(B)$, on a $F \not\subset S(A) \cap S(B)$ et

$$\mathrm{Et}(qF) \cap Y(A, B) = \mathrm{Et}(qF) \cap p(\widetilde{Y}(b(A)) \cap \widetilde{Y}(b(B))) = \varnothing.$$

Il est clair que:

$$\text{si } F \subset S(A), \text{ alors } p \text{ induit un isomorphisme de } \widetilde{Y}(o(A)) \cap \widetilde{Y}(F) \tag{3.7.4.4}$$

avec

$$Y(qA) \cap \mathcal{R}^{-1}\,\mathrm{Et}(qF).$$

Le lemme (3.7.4) résulte alors de:

(3.7.5) Lemme. Pour toute facette F de V, et toute chambre A,

$$Y(A) \cap \mathcal{R}^{-1}\,\mathrm{Et}(F)$$

est contractile.

Soit v_0 un vecteur tel que $\mathcal{R}v_0 \in F$ et que $\mathcal{I}v_0 \in A$. Alors, pour $0 \leq t \leq 1$,

$$\varphi_t : v \longmapsto v_0 + t(v - v_0)$$

est une application de $Y(A)$ et de $\mathcal{R}^{-1}\,\mathrm{Et}(F)$ dans eux-mêmes. On a

$$\varphi_0(Y(A) \cap \mathcal{R}^{-1}\,\mathrm{Et}(F)) = \{v_0\} \quad \text{et} \quad \varphi_1 = \mathrm{Id}\,.$$

C. Étude de $\widetilde{Y}(F)$, F facette de I. D'après (3.5), (3.7.1) et (3.7.2), on a

$$\widetilde{Y}(F) = \bigcup_{F \subset B^-} \widetilde{Y}(b(B)) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\,\mathrm{Et}(F). \tag{3.7.6}$$

Choisissons une «chambre fondamentale» $A_{F,0}$ dans $(V_F, \mathcal{M}_F)$, et notons I_F l'immeuble correspondant. Choisissons aussi $\widetilde{A}^I_{F,0}$ dans I, au-dessus de $\pi_F(A_{F,0})$. Pour chaque chambre $B = \widetilde{A}_0.g_F$ de I_F, nous noterons $\pi_F(B)$ la chambre $\widetilde{A}^I_{F,0}.\pi_F(g_F)$ de I. D'après (2.10), (3.7.6) peut se récrire

$$\widetilde{Y}(F) = \bigcup_{B \text{ dans } I_F} \widetilde{Y}(b(\pi_F(B))) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\,\mathrm{Et}(F).$$

Soient

$$Y_F = (V_F)_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}_F} M_{\mathbb{C}}$$

et $\widetilde{Y}_F$ le revêtement de Y_F, défini à l'aide de I_F. Quels que soient B et C dans I_F, il résulte de (1.30) que les chambres de S dans

$$Y(\pi_F(B), \pi_F(C)) \cap \mathrm{Et}(F)$$

sont exactement les $\pi_F(D)$, pour D dans $Y_F(B, C)$.

Les recollements qui définissent $\widetilde{Y}(F)$ et $\widetilde{Y}_F$ sont donc compatibles, et il existe un unique diagramme cartésien

(3.7.7)



qui envoie

$$\widetilde{Y}(b(\pi_F(B))) \cap p^{-1}\mathcal{R}^{-1}\,\mathrm{Et}(F)$$

dans $\widetilde{Y}_F(b(B))$, pour B une chambre de I_F. La première flèche verticale, donc aussi la seconde, sont des revêtements.

On vérifie facilement que l'application pr_F de (3.7.7) est une équivalence d'homotopie, d'où:

Lemme. $\widetilde{Y}_F$ et $\widetilde{Y}(F)$ ont même type d'homotopie. (3.7.8)

D. Fin de la démonstration. Nous prouverons (3.7) par récurrence sur $r = \dim V$. Soit $\mathcal{U}$ le recouvrement ouvert de $\widetilde{Y}$ par les $\widetilde{Y}(s)$, pour s sommet de $\widehat{I}$. D'après (3.7.4)(i), $\widehat{I}$ est le nerf de $\mathcal{U}$. D'après (3.7.4), (3.7.8) et l'hypothèse de récurrence, les intersections non vides d'ouverts appartenant à $\mathcal{U}$ sont contractiles. Ceci implique [6] que $\widetilde{Y}$ et $\widehat{I} = \mathrm{Nerf}(\mathcal{U})$ ont même type d'homotopie. On conclut par (2.15).

4. Groupes de tresses

(4.1) Soient V un espace vectoriel réel de dimension finie et $W \subset \mathrm{GL}(V)$ un groupe fini engendré par des réflexions. On suppose que $V^W = \{0\}$. Soit Φ une quelconque structure euclidienne invariante par W, et soit $\mathcal{M}$ l'ensemble des hyperplans M tels que la réflexion orthogonale par rapport à $\mathcal{M}$ soit dans W. On sait que:

a) $(V, \mathcal{M})$ vérifie 1.6 ([1] V 3.9 prop. 7);

b) W permute les chambres de $(V, \mathcal{M})$ de façon strictement simplement transitive ([1], V, 3.2, th. 1);

c) si $x \in V$ appartient à la chambre fermée $\overline{A}$, son stabilisateur est engendré par les réflexions par rapport aux murs de A contenant x ([1] V 3.3 prop. 1);

d) il résulte de c) que le groupe W agit librement sur

$$Y_W = V_{\mathbb{C}} - \bigcup_{M \in \mathcal{M}} M_{\mathbb{C}}.$$

D'après b), si C_0 et C_1 sont deux chambres, il existe un unique $w \in W$ tel que $wC_0 = C_1$; ces w induisent un système transitif de bijections entre les murs des différentes chambres. Passant au quotient, on obtient un ensemble D à $\dim(V)$ éléments et, pour chaque chambre C, une bijection φ_C de D avec l'ensemble des murs de C. On a

$$\varphi_{wC}(i) = w\varphi_C(i) \qquad (w \in W). \tag{4.1.1}$$

Pour la définition de la matrice de Coxeter $(m_{ij})_{i,j \in D}$ et celle du graphe de Coxeter, on renvoie à [1], V, 3.4.

(4.2) Choisissons une chambre A_0 de $(V, \mathcal{M})$. Pour $i \in D$, soit w_i la réflexion par rapport au mur $\varphi_{A_0}(i)$. [1], V, 3.2, th. 1 dit que W est engendré par les w_i, ces générateurs étant soumis aux seules relations

$$(w_i w_j)^{m_{ij}} = e.$$

(4.3) Soit $X_W = Y_W/W$: d'après (4.1)d), Y_W est un revêtement de X_W, de groupe W. Soit $y_0 \in A_0$ d'image $x_0 \in X_W$. Pour chaque $i \in D$, soit ℓ'_i la classe d'homotopie de chemins dans Y_W, de y_0 à $w_i(y_0)$, qui, pour $y \in A_0$, contient la ligne brisée de sommets successifs

$$y_0, \quad y_0 + iy_0, \quad w_i(y_0) + iy_0, \quad w_i(y_0).$$

L'image ℓ_i de ℓ'_i dans X_W est un lacet de point base x_0.

(4.4) Théorème. (i) Le groupe fondamental $\pi_1(X_W, x_0)$ est engendré par les ℓ_i; ceux-ci sont soumis aux seules relations

$$\mathrm{prod}(m_{ij}; \ell_i, \ell_j) = \mathrm{prod}(m_{ji}; \ell_j, \ell_i). \tag{4.4.1}$$

(ii) Le revêtement universel de X_W est contractile: X_W est un $K(\pi, 1)$.

L'assertion (i) est prouvée dans Brieskorn [3]. Une autre démonstration sera esquissée en (4.18) ci-dessous. Comme expliqué dans l'introduction, (ii) résulte de (3.7) et de (4.1).

(4.5) Dans le §1, nous nous sommes largement inspiré de l'étude faite par Garside [4] du groupe des tresses d'Artin; nous pouvons maintenant déduire des résultats obtenus des informations sur tous les groupes du type $\pi_1(X_W, x_0)$. La traduction repose sur (4.6), (4.7) ci-dessous.

(4.6) Soient $G = (C_0, \ldots, C_n)$ une galerie et M_i le mur qui sépare C_{i-1} de C_i, $1 \leq i \leq n$. On a

$$\varphi_{C_{i-1}}^{-1}(M_i) = \varphi_{C_i}^{-1}(M_i).$$

On note $\ell(G)$ l'élément

$$\varphi_{C_1}^{-1}(M_1) \cdots \varphi_{C_n}^{-1}(M_n)$$

de $L^+(D)$ (0.1). L'application ℓ induit une bijection de l'ensemble des galeries G de source donnée avec $L^+(D)$. On a

$$\ell(w(G)) = \ell(G) \qquad (w \in W), \tag{4.6.1}$$

$$\ell(G_0G_1) = \ell(G_0)\ell(G_1) \tag{4.6.2}$$

pour G_0 et G_1 composables. Soit

$$w : L(D) \longrightarrow W$$

l'homomorphisme qui prolonge l'application $i \mapsto w_i$ de D dans W.

(4.7) Proposition. Pour toute galerie G de source A_0, on a

$$A_0 \cdot G = w(\ell(G))(A_0).$$

C'est un avatar de l'identité

$$[(w_1 \cdots w_{n-1})w_n(w_1 \cdots w_{n-1})^{-1}] \cdot [(w_1 \cdots w_{n-2})w_{n-1}(w_1 \cdots w_{n-2})^{-1}] \cdots [w_1] = w_1 \cdots w_n.$$

(4.8) De cette proposition on déduit que, pour $w \in W$, l'entier $d(A_0, w(A_0))$ est la plus petite longueur des mots en les w_i qui valent w; plus précisément, ℓ induit une bijection de l'ensemble des galeries minimales de A_0 à wA_0 avec l'ensemble des mots $m \in L(D)$, de longueur minimale, tels que $w = w(m)$.

(4.9) Définition. (i) Le monoïde des tresses G^+ de type D est le monoïde à unité engendré par D, les générateurs $i \in D$ étant soumis aux seules relations

$$\mathrm{prod}(m_{ij}; i, j) = \mathrm{prod}(m_{ij}; j, i). \tag{4.9.1}$$

(ii) Le groupe des tresses G, ou groupe des tresses généralisé, de type D est le groupe engendré par D, les générateurs étant soumis à (4.9.1).

(4.10) On notera que W admet encore la présentation

$$\mathrm{prod}(m_{ij}; w_i, w_j) = \mathrm{prod}(m_{ij}; w_j, w_i), \tag{4.10.1}$$

$$w_i^2 = e, \tag{4.10.2}$$

de sorte que $i \mapsto w_i$ se prolonge en un homomorphisme de G dans W.

(4.11) On vérifie sur les définitions que deux galeries G_0 et G_1 de même source sont équivalentes si et seulement si $\ell(G_0)$ et $\ell(G_1)$ ont même image dans G^+. Compte tenu de (4.9), (1.12) admet donc la traduction suivante ([1], IV, 1.6, prop. 5).

(4.12) Rappel. Soit $w \in W$. L'image dans G^+ des mots $m \in L(D)$, de longueur minimale parmi ceux tels que $w = w(m)$, ne dépend que de w. Cette image se notera $r(w)$; r est une section de $w : G^+ \to W$. D'après (4.7), on a

$$r(w) = \ell(u(A_0, wA_0)).$$

De même, [1], IV, 1.4, lemme 2 correspond à (1.11).

(4.13) La catégorie «quotient» de $\mathrm{Gal}_+(V, \mathcal{M})$ par W est définie ainsi:

a) l'ensemble de ses objects est réduit à un élément, c'est $\mathrm{Ob}(\mathrm{Gal}_+(V, \mathcal{M}))/W$.

b) Le monoïde de ses flèches est $\mathrm{Fl}(\mathrm{Gal}_+(V, \mathcal{M}))/W$, et le passage au quotient

$$\mathrm{Gal}_+(V, \mathcal{M}) \longrightarrow \mathrm{Gal}_+(V, \mathcal{M})/W$$

est un foncteur.

Cette catégorie, n'ayant qu'un objet, s'identifie au monoïde de ses flèches. D'après (4.6.1), (4.6.2) et (4.11), ℓ identifie ce monoïde à G^+.

On définit de même $\mathrm{Gal}(V, \mathcal{M})/W$. Cette catégorie n'a qu'un objet et, d'après sa propriété universelle, ℓ se prolonge en un isomorphisme du groupe de ses flèches avec G:



(4.14) Théorème. (i) Dans G^+, les translations à gauche et à droite sont injectives.

(ii) G^+ vérifie la condition de Öre à gauche et à droite. Il résulte donc de (i) que G^+ se plonge dans G.

(iii) Pour J une partie de D, soit G_J^+, respectivement G_J, le sous-monoïde, respectivement sous-groupe, de G^+, respectivement G, engendré par les $i \in J$. Alors l'application évidente identifie G_J^+, respectivement G_J, au monoïde, respectivement groupe, des tresses de type J.

(iv) On a $G_J^+ = G_J \cap G^+$.

(v) Si J et K sont deux parties de D, on a $G_J \cap G_K = G_{J\cap K}$.

(vi) Soit $n(i)$ le nombre d'éléments de G^+ de longueur i, et posons

$$f = \sum n(i)t^i.$$

Pour $J \subset D$, soit $m(J)$ le nombre des murs qui passent par l'intersection des murs d'une quelconque chambre A, d'indice dans J, c'est-à-dire le nombre de réflexions dans le groupe de Weyl W_J. On a

$$f = \left(\sum_{J\subset D} (-1)^{|J|} t^{m(J)} \right)^{-1}.$$

Ces assertions traduisent respectivement: (i), (1.1)(i) et (ii); (ii), (1.26)(ii) et son transformé par passage aux galeries opposées, cf. aussi (4.16) ci-dessous; (iii), (1.30); (iv), (1.32); (v), (1.31); (vi), (1.21), les f_A de loc. cit. sont tous égaux à f.

Soient $x, y \in G^+$. On dit que x commence par y s'il existe $z \in G^+$ avec $x = yz$. La proposition (1.19)(iii) se traduit ainsi:

(4.15) Lemme. Soit $x \in G^+$. Il existe une chambre C telle que, pour tout $w \in W$, x commence par $r(w)$ si et seulement si $wA_0 \in D(A_0, C)$.

(4.16) Soient J une partie de D et P l'intersection des murs $\varphi_{A_0}(i)$, $i \in J$. On note $\Delta(J)$ l'élément $\ell(u(A_0, A_0.\Delta(P)))$ de G^+; on pose $\Delta = \Delta(D)$. Soit $i \mapsto \bar{i} = \varphi_{-C}^{-1}\varphi_C(i)$ l'involution d'opposition de D. On note encore $w \mapsto \bar{w}$ les automorphismes de $L^+(D)$, G^+ et G qui envoient i sur $\bar{i}$ (on a $m_{ij} = m_{\bar{i}\bar{j}}$). Traduisant (1.26) à l'aide de (4.4), on trouve que, pour g dans G^+ ou G, on a

$$g\Delta = \Delta\bar{g}. \tag{4.16.1}$$

En particulier, Δ^2 est central.

Quel que soit $i \in D$, Δ commence par i: on a $\Delta = ix$ dans G^+. Dès lors:

(4.17) Proposition. G se déduit de G^+ en rendant inversible l'élément central Δ^2.

(4.18) La description (2.11), (2.5)–(2.7) de l'immeuble I attaché à $(V, \mathcal{M})$ peut se traduire ainsi:

a) l'ensemble des sommets de I est

$$I^0 = \coprod_{i\in D} G/G_{D-\{i\}};$$

b) pour qu'un ensemble de sommets tende un simplexe, il faut et il suffit qu'il soit contenu dans l'ensemble des classes $gG_{D-\{i\}}$, pour un $g \in G$;

c) la sphère fondamentale $S_0 = S(A_0)$ est réunion du simplexe fondamental, tendu par les classes latérales de e dans les $G/G_{D-\{i\}}$, et de ses transformés par les $r(w)$, $w \in W$.

La description précédente rend évidente une action à gauche de G sur I. Elle respecte l'ensemble des sphères $S(A)$ et la correspondance $A \mapsto S(A)$.

Par transport de structure, G agit sur le revêtement $\widetilde{Y}_W$ de Y_W (3.6); on a un morphisme équivariant

$$(G - \widetilde{Y}_W) \longrightarrow (W - Y_W).$$

On en tire que G est le groupe fondamental de $X_W = Y_W/W$, et (4.4)(i).

(4.19) Pour être complet, montrons que le problème des mots, le problème de conjugaison et la question de calculer le centre de G peuvent se résoudre comme dans [4]. Si le graphe de Coxeter D de W est somme disjointe de graphes D_α, le groupe de tresses de type D est produit des groupes de tresses des types D_α. Le cas essentiel est donc celui d'un graphe D connexe.

(4.20) Le problème des mots. Il y a un procédé de décision pour savoir si deux éléments m et n de $L(D)$ ont même image dans G.

a) Savoir si m et n dans $L^+(D)$ ont même image dans G^+ est décidable, car les relations imposées ne changent pas la longueur des mots et il n'y a qu'un nombre fini de mots de longueur donnée. On peut aussi utiliser (1.22).

b) Quel que soit m_i, $i = 1, 2$, dans le groupe libre $L(D)$ engendré par D, on peut calculer $m_i' \in L^+(D)$ et $k \geq 0$ tels que m_i et $m_i'\Delta^{-k}$ aient même image dans G (cf. (4.17)); m_1 et m_2 ont alors même image dans G si et seulement si m_1' et m_2' ont même image dans G^+.

(4.21) Théorème. Si le graphe de Coxeter D est connexe, non vide, et que l'involution d'opposition est triviale, respectivement non triviale, le centre de G est monogène infini, engendré par Δ, respectivement Δ^2.

Considérons la propriété suivante de $x \in G^+$:

$$(*) \qquad \text{quel que soit } i \in D, \text{ il existe } i' \in D \text{ tel que } ix = xi'.$$

Il suffit de prouver que, si x vérifie $(*)$ et que $x \neq e$, alors $x = \Delta y$ avec $y \in G^+$. Par récurrence sur la longueur de x, on en déduira que, si x vérifie $(*)$, x est de la forme Δ^k. En particulier, le centre de G^+ est contenu dans l'ensemble des Δ^k, $k \geq 0$; d'après (4.14)(i) et (4.17), celui de G est contenu dans l'ensemble des Δ^k, $k \in \mathbb{Z}$, et l'assertion résulte de (4.16.1).

Soit donc $x \in G^+$ qui vérifie $(*)$. Soient C comme en (4.15) et w l'image dans W de $\ell u(A_0, C)$. On peut écrire $x = r(w)y$, avec $y \in G^+$. Soit $i \in D$. D'après $(*)$, $ix = r(w)yi'$ commence par $r(w)$; de (1.23), on tire alors que $ir(w)$ commence par $r(w)$, c'est-à-dire $ir(w) = r(w)i''$. En particulier, pour tout i, il existe i'' avec $iw = wi''$; ceci signifie que tout mur de A_0 est aussi un mur de wA_0. Parmi les $2^{|D|}$ cônes simpliciaux ouverts limités par les murs de A_0, seuls A_0 et $-A_0$ sont de chambres; ce sont les seuls dont les angles entre les faces soient tous $\leq \pi/2$, on utilise ici la connexité de D. Si $x \neq e$, on a $w \neq e$ et donc $wA_0 = -A_0$. Puisqu'alors $\Delta = r(w)$, ceci achève la démonstration.

(4.22) Le groupe dérivé. Soit D' le graphe ayant D pour ensemble de sommets, deux sommets étant reliés par un trait si et seulement si m_{ij} est impair. Soit D_0 l'ensemble des composantes connexes de D'. On définit un épimorphisme

$$\mathrm{Lg} : G \longrightarrow \mathbb{Z}^{D_0}$$

en envoyant i sur le vecteur de base d'indice la composante connexe de i dans D'. On vérifie aussitôt que Lg identifie $\mathbb{Z}^{D_0}$ au plus grand quotient abélien de G.

(4.23) Problème de conjugaison. Il s'agit de donner un procédé de décision pour savoir si deux éléments x et y de G, donnés explicitement comme images de mots dans $L(D)$, sont conjugués. Puisque Δ^2 est central, $\Delta^{-2k}a$ et $\Delta^{-2k}b$ sont conjugués si et seulement si a et b le sont. D'après (4.17), il suffit donc de traiter le cas où $x, y \in G^+$. De même, si x et y sont conjugués, il existe a dans G^+ tel que

$$xa = ay.$$

Si x et y sont conjugués, $\mathrm{Lg}(x) = \mathrm{Lg}(y)$. Il n'y a qu'un nombre fini de $x \in G^+$ de «longueur» $\mathrm{Lg}(x)$ donnée et W est fini. L'existence d'un procédé de décision résulte alors de (4.20) et du lemme suivant.

(4.24) Lemme. Soient x, y dans G^+. Si x et y sont conjugués, il existe une suite

$$x_0 = x,\ x_1, \ldots, x_n = y$$

d'éléments de G^+, et une suite d'éléments w_i de W, telle que

$$x_{i+1} r(w_i) = r(w_i) x_i.$$

Soit $a \in G^+$ tel que $xa = ay$. Posons

$$a = r(w_0) \cdots r(w_{n-1}),$$

w_i étant l'élément de W de longueur maximum tel que $r(w_i) \cdots r(w_{n-1})$ s'écrive sous la forme $r(w_i) b_i$, avec $b_i \in G^+$ (4.15). Soit $a_i = r(w_0) \cdots r(w_i)$. Nous prouverons que

$$x_i = a_i^{-1} x a_i$$

est dans G^+, de sorte que les x_i et w_i répondent au problème.

Il résulte de (1.23) que, quel que soit $w \in W$, si xa commence par $r(w)$, alors $xr(w_0)$ commence aussi par $r(w)$. En particulier, puisque

$$xa = ay = r(w_0) b_0 y$$

commence par $r(w_0)$, $xr(w_0) = r(w_0) x_1$ avec $x_1 \in G^+$. On achève la démonstration en procédant par récurrence sur n.

Remarque. Soit σ un automorphisme du graphe de Coxeter D, et notons encore σ l'automorphisme correspondant de G. On a $\Delta^\sigma = \Delta$. Les arguments précédents s'appliquent encore à la question de savoir, pour $x, y \in G$, s'il existe a dans G tel que $xa = a^\sigma y$. On se ramène à prendre x, y et a dans G^+. Dans ce cas et, avec les notations précédentes, si

$$xa = a^\sigma y,$$

les $(a_i^{-1})^\sigma x a_i$ sont dans G^+. Prenant pour σ l'involution $i \mapsto \bar{i}$, on trouve un critère analogue à (4.24) pour la conjugaison de Δx et Δy, $x, y \in G^+$.

Bibliographie

Le lecteur trouvera une bibliographie plus complète sur les groupes de tresses dans [2].

1. Bourbaki, N.: Groupes et algèbres de Lie. Chap. 4, 5, 6. Paris: Hermann 1968.
2. Brieskorn, E.: Sur les groupes de tresses. Sém. Bourbaki 401, nov. 71.
3. Brieskorn, E.: Die Fundamentalgruppe des Raumes der regulären Orbits einer endlichen komplexen Spiegelungsgruppe. Inventiones math. **12**, 57–61 (1971).
4. Garside, F. A.: The braid groups and other groups. Quat. J. Math. Oxford, 2^e ser. **20**, 235–254 (1969).
5. Tits, J.: Normalisateurs de Tores. I Groupes de Coxeter étendus. J. of algebra **4** (1), 96–116 (1966).
6. Weil, A.: Sur les théorèmes de De Rham. Comm. Math. Helv. **26** (1952).

Pierre Deligne
Institut des Hautes Études Scientifiques
35 Route de Chartres
F-91440 Bures-sur-Yvette
France

(Reçu le 24 avril 1972)

VARIÉTÉS UNIRATIONNELLES NON RATIONNELLES

[d'après M. ARTIN et D. MUMFORD]

par Pierre DELIGNE

Cet exposé contient une description de la variété construite par Artin et Mumford, et la démonstration de ce qu'elle est unirationnelle et non rationnelle. Il contient aussi l'énoncé des théorèmes que démontrent Clemens et Griffiths [4], et Manin et Iskovskih [6], pour construire d'autres exemples. J'ai assisté à des exposés de Artin et Mumford sur le même sujet, et m'en suis largement inspiré.

Dans tout ce qui suit, l'expression "variété algébrique" signifiera "schéma séparé de type fini sur $\mathbb{C}$, réduit et irréductible". On notera $k(X)$ le corps des fonctions rationnelles sur une variété algébrique X.

1. Rationalité et unirationalité.

Soit K une extension de type fini de $\mathbb{C}$. Il existe alors une variété algébrique X telle que K soit isomorphe à $k(X)$. On appelle X un modèle de K. D'après [5], K admet toujours un modèle projectif et lisse.

Soient K et L deux extensions de type fini de $\mathbb{C}$, de modèles X et Y. Les homomorphismes $a^* : K \hookrightarrow L$ correspondent biunivoquement aux applications rationnelles dominantes $a_* : Y \dashrightarrow X$, par la formule $a^*(f) = f \circ a_*$. D'après [5], si X et Y sont projectifs et lisses, toute application rationnelle $a_* : Y \dashrightarrow X$ admet une décomposition

$$a = b\, c_n^{-1} \cdots c_1^{-1}.$$

(1.1)
$$\begin{array}{ccccccc} Y_{n+1} & \xrightarrow{c_n} & \cdots & \to & Y_2 & \xrightarrow{c_1} & Y_1 = Y \,. \\ \downarrow b & & & & & & \\ X & & & & & & \end{array}$$

où b et les c_i sont des morphismes (partout définis) et où Y_{i+1} se déduit de Y_i par éclatement d'une sous-variété lisse Z_i (de codimension ≥ 2).

Si $a^* : K \to L$ est un isomorphisme, on peut appliquer le résultat précédent à $((a^*)^{-1}, Y_{n+1}, X)$. Par itération, on obtient un diagramme commutatif de morphismes de schémas

(1.2)
$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & Y^2 & \xrightarrow{y^2} & Y^1 & = & Y^1 & \xrightarrow{y^1} & Y & \\ & \downarrow a^2 & & \uparrow b^1 & & \downarrow a^1 & & \downarrow a & \\ \cdots & X^1 & = & X^1 & \xrightarrow{x^1} & X & = & X \,. & \end{array}$$

Dans ce diagramme, les flèches horizontales x^i, y^i sont des composés d'éclatements à centre non singulier, comme en (1.1) ; les a^i et b^i sont birationnels.

Un invariant d'une variété projective et lisse X est dit *birationnel* s'il ne dépend que de $k(X)$. On vérifie souvent le caractère birationnel d'un invariant à l'aide de (1.2) (pour un exemple typique, voir 2.1). Les invariants utilisables d'un corps K sont en général définis comme la valeur d'un invariant birationnel d'un quelconque modèle projectif et lisse de K.

DÉFINITION 1.3.- Soit X une variété algébrique de dimension n. On dit que X est unirationnelle si les conditions suivantes sont vérifiées :

(i) $k(X)$ est un sous-corps d'une extension transcendante pure $\mathbb{C}(T_1, \ldots, T_r)$ de $\mathbb{C}$;

(ii) une extension finie de $k(X)$ est isomorphe à $\mathbb{C}(T_1, \ldots, T_n)$;
(iii) (pour X projectif et lisse), il existe un diagramme (1.1) avec

$$Y = \mathbb{P}^r(\mathbb{C});$$

(iv) (pour X projectif et lisse), il existe un diagramme (1.1) avec

$$Y = \mathbb{P}^n(\mathbb{C}).$$

On peut supposer X projectif et lisse, et on a

$$(ii) \Rightarrow (i) \Leftrightarrow (iii) \Rightarrow (iv) \Leftrightarrow (ii).$$

DÉFINITION 1.4.- On dit que X est rationnelle si, au choix
(i) $k(X)$ est une extension transcendante pure de $\mathbb{C}$;
(ii) (pour X projectif et lisse), il existe un diagramme (1.2) avec

$$Y = \mathbb{P}^n(\mathbb{C}).$$

Les invariants birationnels les plus évidents ne permettent pas de distinguer les variétés unirationnelles des variétés rationnelles.

PROPOSITION 1.5.- Soit X une variété algébrique unirationnelle projective et lisse de dimension $n > 0$.
(i) Les plurigenres $P_k = \dim H^0(X, (\Omega^n_X)^{\otimes k})$ $(k > 0)$ sont nuls. Plus généralement, $H^0(X, (\Omega^1_X)^{\otimes k}) = 0$ pour $k > 0$ (voir [9] Remarque page 02).
(ii) X est simplement connexe ([10]).

Pour $n = 1$ ou 2, la propriété (i) ci-dessus caractérise déjà les variétés rationnelles. Une variété unirationnelle de dimension ≤ 2 est donc rationnelle, et une sous-extension de degré de transcendance ≤ 2 de $\mathbb{C}(T_1, \ldots, T_k)$ est automatiquement pure. On a plus précisément ceci :
a) Pour $n = 1$, si $H^0(X, \Omega^1_X) = 0$, alors $X \simeq \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$. D'après le théorème de Riemann–Roch, pour tout $x \in X$, $\mathcal{O}(x)$ définit en effet un plongement de X dans $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$.

b) Pour $n = 2$, le critère de Castelnuovo–Enriques affirme que X est rationnelle si $P_a \simeq P_2 = 0$, i.e. si

$$H^0(X, \Omega^1_X) = H^0(X, (\Omega^2_X)^{\otimes 2}) = 0$$

(voir [9]).

Pour $n > 2$, il a été très difficile de définir ou de calculer des invariants birationnels qui puissent distinguer entre variétés rationnelles et unirationnelles.

2. Quelques invariants birationnels.

A) Artin et Mumford.

PROPOSITION 2.1.- Le sous-groupe de torsion $H^3(X, \mathbb{Z})_{\text{tors}}$ de $H^3(X, \mathbb{Z})$ est un invariant birationnel de la variété projective et lisse X.

Si une variété X_2 se déduit d'une variété lisse X_1 par éclatement d'une sous-variété lisse $Z \subset X_1$ de codimension $r \geq 2$, alors (SGA 5 VII)

$$H^n(X_2, \mathbb{Z}) \simeq H^n(X_1, \mathbb{Z}) \oplus \bigoplus_1^{r-1} H^{n-2i}(Z, \mathbb{Z}).$$

En particulier,

$$H^3(X_2, \mathbb{Z}) \simeq H^3(X_1, \mathbb{Z}) \oplus H^1(Z, \mathbb{Z}).$$

Puisque $H^1(Z, \mathbb{Z})$ est sans torsion, on a donc

$$H^3(X_1, \mathbb{Z})_{\text{tors}} \xrightarrow{\sim} H^3(X_2, \mathbb{Z})_{\text{tors}}.$$

Supposons que $k(X)$ soit isomorphe à $k(Y)$, et soit un diagramme (1.2) On en déduit un diagramme

$$\begin{array}{ccccccc}
H^3(X, \mathbb{Z})_{\text{tors}} & \xrightarrow{\sim} & H^3(X_1, \mathbb{Z})_{\text{tors}} & = & H^3(X_1, \mathbb{Z})_{\text{tors}} & \xrightarrow{\sim} & H^3(X_2, \mathbb{Z})_{\text{tors}} \\
 & & \uparrow a^{1*} & & \downarrow b^{1*} & & \uparrow a^{2*} \\
H^3(Y, \mathbb{Z})_{\text{tors}} & = & H^3(Y, \mathbb{Z})_{\text{tors}} & \xrightarrow{\sim} & H^3(Y_1, \mathbb{Z})_{\text{tors}} & = & H^3(Y_1, \mathbb{Z})_{\text{tors}} .
\end{array}$$

Puisque $a_2^* b_1^*$ est bijectif, b_1^* est injectif. Puisque $b_1^* a_1^*$ est bijectif

et b_1^* injectif, a_1^* est bijectif, et l'assertion en résulte.

L'exemple de Artin et Mumford est basé sur la

CONSTRUCTION 2.2.- On construira une variété unirationnelle X, projective et lisse, de dimension 3, telle que

$$H^3(X,\mathbb{Z})_{\text{tors}} \neq 0 \qquad \big(\text{on aura } H^3(X,\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}/(2)\big).$$

Multipliant cette variété par $\mathbb{P}^r(\mathbb{C})$, on obtient un exemple analogue en toute dimension ≥ 3.

B) Clemens et Griffiths.

Soit X une variété projective et lisse de dimension 3, telle que $H^0(X,\Omega_X^3) = 0$. La décomposition de Hodge de $H^3(X,\mathbb{C})$ se réduit alors à

$$H^3(X,\mathbb{C}) = H^{2,1} \oplus H^{1,2}$$

et, d'après Weil [11], le tore complexe

$$J(X) = H^3(X,\mathbb{Z})\backslash H^3(X,\mathbb{C})/H^{2,1}$$

est une variété abélienne : la jacobienne intermédiaire de X. Soit

$$\psi : H^3(X,\mathbb{Z}) \otimes H^3(X,\mathbb{Z}) \longrightarrow H^6(X,\mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}$$

le cup-produit. D'après le théorème de dualité de Poincaré, la forme alternée sur $H^3(X,\mathbb{Z})/\text{torsion}$ déduite de ψ est de discriminant un. Si $H^1(X,\mathbb{Z}) = 0$, il résulte de Weil [11] qu'elle définit sur $J(X)$ une polarisation principale.

PROPOSITION 2.3 ([4] 3.26).- Si X est rationnelle, la variété abélienne polarisée $J(X)$ est un produit de jacobiennes.

Dans l'esquisse de démonstration qui suit, le signe $\simeq$ désigne un isomorphisme de variétés abéliennes polarisées.

On vérifie successivement :

a) $J(\mathbb{P}^3(\mathbb{C})) = 0$.

b) Si Y'' se déduit de la variété projective non singulière Y' par éclatement

d'une courbe lisse Z de jacobienne $J(Z)$ (resp. d'un point), on a ([4] 3.11)

$$J(Y'') \simeq J(Y') \times J(Z) \qquad \big(\text{resp. } J(Y'') \simeq J(Y')\big).$$

c) Si un morphisme $b : Y' \to X$ est birationnel, $J(X)$ est facteur direct dans $J(Y')$: il existe une variété abélienne principalement polarisée de la série principale B telle que

$$J(Y') \simeq J(X) \times B.$$

d) Soient $(A_i)_{1 \leq i \leq n}$ des variétés abéliennes principalement polarisées $\neq 0$. On suppose qu'aucun A_i n'admet une décomposition $A_i \simeq A_i' \times A_i''$ (par exemple que A_i est une jacobienne). Alors, toute décomposition de $A = \prod A_i$ est de la forme

$$A \simeq \left(\prod_{i \in I} A_i\right) \times \left(\prod_{i \notin I} A_i\right) \qquad \text{pour } I \subset [1, n] \qquad ([4]\ 3.23).$$

Si X est rationnelle, il existe un diagramme 2.1 avec $Y = \mathbb{P}^3(\mathbb{C})$ et b birationnel. D'après a) et b), $J(Y_{n+1})$ est un produit de jacobiennes. D'après c) et d), $J(X)$ en est un aussi.

Prenons pour X une hypersurface cubique dans $\mathbb{P}^4(\mathbb{C})$. On a

$$H^1(X, \mathbb{Z}) = H^3(X, \mathbb{Z})_{\text{tors}} = H^0(X, \Omega_X^3) = 0, \qquad \dim J(X) = \dim H^1(X, \Omega_X^2) = 5,$$

et X est unirationnelle d'après [7]. Soit S la surface qui paramétrise les droites contenues dans X et soit $\alpha : S \to \text{Alb}(S)$ l'application de S dans sa variété d'Albanese. Un des résultats essentiels de [4] est le suivant

THÉORÈME 2.4 ([4] 11.19 et 13.4).- Il existe un isomorphisme

$$J(X) \xrightarrow{\sim} \text{Alb}(S),$$

qui transforme le diviseur Θ de $J(X)$ en l'image de $S \times S$ par l'application

$$(x, y) \xmapsto{\delta} \alpha(x) - \alpha(y).$$

Clemens et Griffiths parviennent alors à utiliser des résultats de [1] pour prouver que $(\mathrm{Alb}(S), \delta(S \times S))$ ne peut pas être la jacobienne polarisée d'une courbe. Une autre preuve de l'irrationalité de X est suggérée dans l'appendice à [4]. Il s'agit de prouver

THÉORÈME 2.5.- Le lieu singulier du diviseur Θ de $J(X)$ est de dimension 0, donc de codimension > 4. Il est même réduit à l'image par δ de la diagonale de $S \times S$.

On sait que tel n'est jamais le cas pour le diviseur Θ d'une jacobienne.

C) Manin et Iskovskih.

Le groupe des automorphismes birationnels d'une variété X (égal au groupe des $\mathbb{C}$-automorphismes de $k(X)$) est un invariant birationnel de X. C'est celui qu'utilisent Manin et Iskovski pour montrer qu'une hypersurface quartique lisse dans $\mathbb{P}^4(\mathbb{C})$ n'est jamais rationnelle :

THÉORÈME 2.6 ([6]).- Soient X et Y deux hypersurfaces quartiques lisses dans $\mathbb{P}^4(\mathbb{C})$. Tout isomorphisme birationnel $a : X \longrightarrow Y$ est automatiquement birégulier.

Puisque certaines hypersurfaces quartiques sont unirationnelles, [7] ce théorème fournit un nouvel exemple de variétés unirationnelles non rationnelles.

3. L'exemple de Artin et Mumford.

Soit dans $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ une configuration consistant en
a) deux courbes cubiques lisses C_1 et C_2, d'équations $f_1 = 0$ et $f_2 = 0$, qui se coupent transversalement ;
b) une conique lisse Q, d'équation $q = 0$, qui rencontre chaque C_i en trois

points de tangence distincts.

Nous construirons

a) un fibré vectoriel V sur $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, de rang 3 ;

b) une forme quadratique $\Phi : V \to \mathcal{L}$ ($\mathcal{L}$ faisceau inversible) de discriminant $f_1 f_2$ (si Δ, section de $\mathcal{L}^{\otimes 3} \otimes (\bigwedge^3 V)^{\otimes(-2)}$, est le discriminant, le sous-schéma de $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ d'équation $\Delta = 0$ est $C_1 \cup C_2$).

Soit $X \subset \mathbb{P}(V^*)$ le fibré en coniques sur $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, dégénérant le long de $C_1 \cup C_2$, d'équation homogène $\Phi = 0$. Les conditions suivantes seront vérifiées.

c) Φ est en tout point de rang ≥ 2 : pour $s \in C_1 \cup C_2$, la fibre $X_s = f^{-1}(s)$ est réunion de deux droites concourantes ; les seuls points singuliers de X sont les points singuliers des fibres X_s pour $s \in C_1 \cap C_2$.

d) Soit S le revêtement double de $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, ramifié le long de Q et $X_S = X \times_{\mathbb{P}^2(\mathbb{C})} S$. Alors, X_S/S admet une section



e) Pour $s \in (C_1 \cup C_2) - Q$, les deux points $\alpha(t)$ pour $\pi(t) = s$ sont dans les deux composantes irréductibles de X_s.

Localement (pour la topologie usuelle) sur $C_1 \cup C_2$, la restriction du fibré X à $C_1 \cup C_2$ s'obtient en recollant deux fibrés en droites projectives le long d'une section. Toutefois, lorsqu'on parcourt un lacet dans $C_1 \cup C_2$, ces deux fibrés peuvent s'échanger : il existe un revêtement double non ramifié $(C_1 \cup C_2)^*$ de $C_1 \cup C_2$ dont, localement, les deux sections locales correspondent aux deux fibrés en droites projectives dont $X|_{C_1 \cup C_2}$ est réunion. Soit $\pi_i : C_i^* \to C_i$

le revêtement double de C_i induit par $(C_1 \cup C_2)^*$. Nous n'utiliserons de e) que le corollaire suivant

Lemme 3.1.- C_i^* est irréductible.

D'après e), C_i^* est le normalisé du revêtement double de C_i induit par S. Le lemme résulte de ce que la section q de $\mathcal{O}(2)|_{C_i}$ n'est pas le carré d'une section de $\mathcal{O}(1)|_{C_i}$; si q était un carré, les trois points d'intersection de Q avec C_i seraient en effet collinéaires.

Au revêtement double C_i^* de C_i correspondent un caractère d'ordre 2 du groupe fondamental de C_i et un système local A_i localement isomorphe à $\mathbb{Z}$, défini par la suite exacte de faisceaux sur C_i

$$0 \longrightarrow A_i \longrightarrow \pi_{i*}\mathbb{Z} \xrightarrow{\mathrm{Tr}} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

où Tr est la "somme des valeurs sur les deux feuillets du revêtement".

On a

$$H^0(C_i, A_i) = 0, \qquad H^1(C_i, A_i) = \mathbb{Z}/2, \qquad H^2(C_i, A_i) = \mathbb{Z}/2. \tag{3.2}$$

Nous n'utiliserons d) que pour prouver le fait suivant

Lemme 3.3.- X est unirationnel.

La surface S est une quadrique dans $\mathbb{P}^3(\mathbb{C})$, donc est rationnelle. Puisque X_S/S admet une section, on a un isomorphisme birationnel $X_S \sim S \times \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, et X est image de la variété rationnelle X_S.

Les neuf points singuliers de X sont des points quadratiques ordinaires. On peut résoudre chacun d'eux comme suit (cf. [3])

a) On l'éclate ; ceci résoud X et remplace le point singulier par une quadrique P, isomorphe à $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \times \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$.

b) On choisit une projection $P \xrightarrow{\beta} \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, et on contracte dans l'éclaté $\widetilde{X}_1$ de X les fibres de cette projection ; c'est possible car β est lisse, que ses

fibres sont isomorphes à $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ et que le fibré normal à P dans $\widetilde{X}_1$ induit sur chaque fibre un fibré $\mathcal{O}(-1)$ ([8]).

Soit $\widetilde{X}$ la variété obtenue. On dispose d'une application de $\widetilde{X}$ dans X, et $\widetilde{X}$ se déduit de X en remplaçant chaque point singulier par une droite projective.

Les fibres de la projection $p : \widetilde{X} \to \mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ sont des trois types suivants

$s \notin C_1 \cup C_2$		une conique
$s \in C_1 \cup C_2$, $s \notin C_1 \cap C_2$		deux droites concourantes
$s \in C_1 \cap C_2$		trois droites comme indiqué.

Quand on passe du point générique η de $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ au point générique η_i de C_i $(i = 1, 2)$ à $s \in C_1 \cap C_2$, les composantes irréductibles se spécialisent comme indiqué dans le diagramme suivant

(3.4)



(les croix représentent des composantes irréductibles, les multiplicités sont toutes un). La fastidieuse vérification de ce résultat local est omise. On en tire

Lemme 3.5.- On a $R^0p_*\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, $R^1p_*\mathbb{Z} = 0$ et une suite exacte de faisceaux

$$0 \longrightarrow A_1 \oplus A_2 \longrightarrow R^2p_*\mathbb{Z} \xrightarrow{\mathrm{Tr}} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

On peut maintenant utiliser la suite spectrale de Leray de p pour calculer $H^*(\widetilde{X}, \mathbb{Z})$. Le fait essentiel est le suivant (qui implique l'irrationalité de X).

Lemme 3.6.- On a

$$H^3(\widetilde{X},\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/(2).$$

Calculons les termes E_2 de la suite spectrale de Leray de p. On a

$$R^0p_*\mathbb{Z} = \mathbb{Z} \quad \text{donc} \quad E_2^{p,0} = \mathbb{Z},0,\mathbb{Z},0,\mathbb{Z} \quad \text{pour } p = 0 \text{ à } 4,$$

et

$$R^1p_*\mathbb{Z} = 0 \quad \text{donc} \quad E_2^{p,1} = 0.$$

Pour calculer $E_2^{p,2} = H^p(R^2p_*\mathbb{Z})$, on utilise la suite exacte longue définie par la suite exacte courte de faisceaux 3.5. On trouve

$$0 \longrightarrow E^{0,2} \xrightarrow{a} \mathbb{Z} \xrightarrow{j} \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2 \longrightarrow E^{1,2} \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/2 \oplus \mathbb{Z}/2 \longrightarrow E^{2,2} \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \qquad E^{3,2} = 0, \qquad E^{4,2} = \mathbb{Z}.$$

On vérifie facilement que $a(E^{0,2}) = 2\mathbb{Z}$ (ce fait n'est d'ailleurs pas nécessaire à la démonstration de $H^3(\widetilde{X},\mathbb{Z})_{\text{tors}} \neq 0$). Les E_2^{pq} sont donc les suivants



Les différentielles d_r ne peuvent qu'être nulles, de sorte que $E_2^{pq} = E_\infty^{pq}$, et le lemme en résulte.

On voit qu'il était essentiel de disposer de *deux* courbes $C_i \subset \mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ le long desquelles X dégénère, car on tue un groupe $\mathbb{Z}/2$ en passant de

$$H^1\big(\text{Ker}(R^2p_*\mathbb{Z} \to \mathbb{Z})\big) \quad \text{à} \quad H^1R^2p_*\mathbb{Z} = E^{1,2}.$$

Il reste à effectuer les constructions promises. Artin et Mumford savent prouver *a priori* l'existence d'un fibré en coniques du type voulu. Je me contenterai de donner des équations qui en définissent un.

1) L'image de $f_1 f_2$ dans $H^0(Q, \mathcal{O}(6))$ est le carré de $g_1 \in H^0(Q, \mathcal{O}(3))$, car Q est rationnelle et les zéros de $f_1 f_2$ sur Q sont doubles. Ce g_1 se relève en $g \in H^0(\mathbb{P}^2(\mathbb{C}), \mathcal{O}(3))$ car $H^1(\mathbb{P}^2(\mathbb{C}), \mathcal{O}(1)) = 0$. Puisque $f_1 f_2 - g^2$ s'annule sur Q, c'est un multiple de q :

$$f_1 f_2 = g^2 + qd.$$

2) On prend $V = \mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-2) \oplus \mathcal{O}$, et la forme

$$\Phi : V \to \mathcal{O} : (x, y, z) \longmapsto qx^2 + 2gxy - dy^2 - z^2.$$

On a $\Delta = g^2 + qd = f_1 f_2$. En un point où Φ serait de rang ≤ 1, on aurait $\Delta = q = d = 0$, d'où $g = 0$, et $\Delta = g^2 + qd$ aurait un zéro double. Ceci est absurde car $C_1 \cap C_2 \cap Q = \varnothing$. Enfin, S s'identifie au sous-schéma de X d'équation $y = 0$, et d) e) en résultent.

BIBLIOGRAPHIE

[1] A. ANDREOTTI – *On a theorem of Torelli*, Am. J. of Math., *80* 4 (1958), p. 801–828.

[2] M. ARTIN and D. MUMFORD – *Some elementary examples of unirational varieties which are not rational*, Journal London Math. Soc., (to appear).

[3] M. ATIYAH – *On analytic surfaces with double points*, Proc. Roy. Soc. London, Ser. A 247 (1958), p. 237–244.

[4] C. H. CLEMENS and P. A. GRIFFITHS – *The intermediate jacobian of the cubic threefold*, preprint.

[5] H. HIRONAKA – *Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero* : I, II, Ann. of Math., *79* (1964), p. 109–326.

[6] Ju. I. MANIN et V. A. ISKOVSKIH – *L'hypersurface quartique de dimension trois, et un contre-exemple au problème de Lüroth*, Mat. Sbornik, *86* 1 (1971),140–166

[7] L. ROTH – *Algebraic threefolds*, Ergebnisse der Math., Heft 6, Springer-Verlag, 1955.

[8] B. SAINT-DONAT – *Sur un théorème de G. Castelnuovo et F. Enriques*, Thèse de 3ème Cycle, Lyon 1968.

[9] J.-P. SERRE – *Critère de rationalité pour les surfaces algébriques* (d'après K. Kodaira), Séminaire Bourbaki, exposé 146, volume 1956/57, W. A. Benjamin, New York.

[10] J.-P. SERRE – *On the fundamental group of a unirational variety*, J. London Math. Soc. *34* (1959), p. 481–484.

[11] A. WEIL – *Introduction à l'étude des variétés kählériennes*, Hermann, Paris 1958.

LES CONSTANTES DES ÉQUATIONS FONCTIONNELLES DES FONCTIONS L

Par P. Deligne

International Summer School on Modular Functions, Antwerp 1972

Contents

– Introduction 3
– §1. Représentations virtuelles d'un groupe fini 7
– §2. Groupes de Weil 21
– §3. Rappels sur les fonctions L 26
– §4. Existence des constantes locales 35
– §5. Formulaire 48
– §6. Réduction modulo ℓ des constantes locales 54
– §7. Fonctions L modulaires 58
– §8. Représentations ℓ-adiques des groupes de Weil locaux non archimédiens; structures de Hodge et groupes de Weil locaux archimédiens 66
– §9. Systèmes compatibles de représentations ℓ-adiques 74
– §10. La théorie de Grothendieck 81
– §11. Appendice. Le calcul de ε modulo les racines de l'unité 93
Bibliographie 96

Introduction

Les résultats essentiels de cet article sont les suivants.

(A) On donne une démonstration simple du théorème de Langlands [9], déjà prouvé au signe près par Dwork [6], qui permet d'écrire la constante des équations fonctionnelles des fonctions L d'Artin, ou de Weil [19], comme produit de constantes locales.

Le théorème à démontrer est local, et la démonstration de Langlands avait l'élégance d'être purement locale. Pour l'essentiel, il s'agit de démontrer une identité multiplicative entre sommes de Gauss un peu généralisées chaque fois qu'on a une relation $\mathbb{Z}$-linéaire entre caractères de groupes de Galois locaux induits par des caractères de représentations de dimension un de sous-groupes. Langlands construisait un ensemble générateur de telles relations, et ramenait les identités à démontrer à des identités entre sommes de Gauss qu'il démontrait en s'appuyant sur le théorème de Stickelberger.

La démonstration présentée ici est très proche de la démonstration [5] de l'identité de Hasse–Davenport (cf. aussi Weil [18]). Elle utilise un argument global (4.12), et le fait que les constantes locales à définir sont de nature essentiellement triviale à l'infini, dans le cas non ramifié, et dans certains cas très ramifiés (4.14).

(B) Soient K un corps de fonctions et

$$\rho : \mathrm{Gal}(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathrm{GL}(n, \mathbb{Q}_\ell)$$

une représentation ℓ-adique du groupe de Galois de K, presque partout non ramifiée. Grothendieck a montré que le produit eulérien étendu aux places de K, avec p^{-s} remplacé par une indéterminée t,

$$Z(\rho, t) = \prod_v \det\bigl(1 - F_v t^{\deg(v)}, (\mathbb{Q}_\ell^n)^{\rho(I_v)}\bigr)^{-1} \in \mathbb{Q}_\ell[[t]],$$

est une fraction rationnelle, et qu'une équation fonctionnelle relie $Z(\rho, t)$ à

$$Z^\vee(\rho, t) : \qquad Z^\vee(\rho, p^{-1}t^{-1}) = \varepsilon\, Z(\rho, t),$$

la constante ε étant un monôme at^b. Cette théorie est résumée au §10. Le résultat (A) suggère une formule pour exprimer la constante ε comme produit de constantes locales. Nous montrons que cette formule est vraie lorsque ρ appartient à un système compatible infini de représentations ℓ-adiques (9.3 et 9.9). D'après Weil [16] et Jacquet–Langlands [8], cette formule, appliquée au système compatible de représentations ℓ-adiques défini par une courbe elliptique sur K, permet d'associer une forme modulaire pour $\mathrm{GL}(2, K)$ à toute courbe elliptique sur K.

Il serait très intéressant de savoir si la formule obtenue reste valable pour une quelconque représentation ℓ-adique.

Voici le contenu des divers paragraphes, et leur interdépendance.

Le début du §1 rassemble quelques résultats sur les représentations induites des groupes finis qui nous seront utiles.

La fin du §1, de 1.11 à la fin, ne sert pas dans le reste de l'article. Pour G un groupe résoluble, on y décrit un ensemble R de relations linéaires sur $\mathbb{Z}$ entre les caractères de G induits par des caractères de dimension un de sous-groupes, et on montre que toute telle relation est combinaison linéaire d'éléments de R. Le résultat, et sa démonstration, sont contenus implicitement dans [9].

Les §§2 et 3 servent essentiellement à fixer les notations. Au §2, on rappelle la structure du groupe de Galois d'un corps local [10], on définit les groupes de Weil, variante des groupes de Galois, et on donne quelques énoncés de la théorie du corps de classes. Le lecteur prendra garde que, dans tout cet article, l'isomorphisme de la théorie du corps de classes local transforme uniformisante en inverse de la substitution de Frobenius; la raison est donnée en 3.6. Le §3 est un rappel de la thèse de Tate, et de Artin [1].

Le §4 contient la démonstration du résultat annoncé en (A) ci-dessus. Le formulaire du §5 donne une liste de propriétés fondamentales des constantes locales construites au §4, et quelques identités entre sommes de Gauss qui en résultent.

Les §§6, 7 et 8, qui ne dépend que du §2, sont préliminaires à la démonstration de (B), donnée au §9. Dans les énoncés des §§3 et 4, nous avions été très attentifs à n'utiliser que des formules rationnelles, ne contenant

ni passage à la limite ni racine carrée, fût-ce d'un entier positif. Nous en récoltons le fruit aux §§6 et 7. Au §6, pour K un corps local non archimédien et V une représentation modulaire de $W(\overline{K}/K)$ sur un corps A de caractéristique $\ell \neq p$, nous définissons, par transport de structure pour $\ell = 0$ et par réduction modulo ℓ pour $\ell \neq 0$, une constante locale

$$\varepsilon(V, \psi, dx) \in A^*.$$

Au §7, pour K global de caractéristique p et V une représentation modulaire de $W(\overline{K}/K)$, nous prouvons par réduction modulo ℓ une équation fonctionnelle pour la fonction $L \in \Lambda(t)$ correspondante.

Au §8, nous donnons des classes d'isomorphie de représentations ℓ-adiques du groupe de Weil d'un corps local une description purement algébrique, indépendante de la topologie de $\mathbb{Q}_\ell$. Ceci sert à définir la compatibilité de représentation ℓ et ℓ'-adique. La notion introduite est plus fine que celle de Serre [12].

Le §9 donne la démonstration de (B) (9.3 et 9.9). L'idée est que pour démontrer une identité, il suffit de la démontrer modulo ℓ pour une infinité de ℓ. Nous donnons aussi, pour les corps de fonctions, une réponse partielle à une question de Serre en montrant (9.8) que deux représentations ℓ et ℓ'-adiques donnant lieu au même polynôme caractéristique de Frobenius, supposé dans $\mathbb{Q}[t]$, en presque toutes les places, vérifient une compatibilité aux places résiduelles.

Le §10 résume la théorie de Grothendieck des fonctions L (cf. [7] et SGA 5), qui nous a servi de façon cruciale au §9. En 10.11, je tente d'expliquer le sel de sa méthode. Les résultats farfelus 10.13 résultent aussitôt de ce qui précède. J'ignore leur signification.

§1. Représentations virtuelles d'un groupe fini

1.1. Soit K un corps commutatif. Le cas le plus important pour nous sera celui où K est algébriquement clos de caractéristique 0, par exemple $K = \mathbb{C}$. Soit G un groupe. On notera $R_K(G)$ le groupe de Grothendieck de la catégorie des $K[G]$-modules de dimension finie sur K. Il s'identifie au $\mathbb{Z}$-module libre de base l'ensemble des classes d'isomorphie de représentations linéaires K-irréductibles de G sur K. C'est un anneau commutatif à unité, pour le produit tensoriel sur K, et même un λ-anneau au sens de Grothendieck. Ses éléments sont les représentations virtuelles de G sur K.

Pour définir un homomorphisme f de $R_K(G)$ dans un groupe commutatif X, il suffit:

a) de définir $f(V)$, pour V une représentation de G sur K;

b) de vérifier que pour toute suite exacte de représentations

$$0 \longrightarrow V' \longrightarrow V \longrightarrow V'' \longrightarrow 0$$

on a $f(V) = f(V') + f(V'')$.

Appliquant cette règle, on définit la dimension d'une représentation virtuelle

$$\dim : R_K(G) \longrightarrow \mathbb{Z},$$

et son déterminant

$$\det : R_K(G) \longrightarrow \mathrm{Hom}(G, K^*).$$

Si H est un sous-groupe d'indice fini de G, on définit l'induction

$$\mathrm{Ind}_H^G : R_K(H) \longrightarrow R_K(G)$$

comme correspondant à l'extension des scalaires

$$V \longmapsto K[G] \otimes_{K[H]} V,$$

foncteur exact; il passe donc aux représentations virtuelles. Pour $f : G \to H$, on définit la restriction

$$\mathrm{Res}_G^H : R_K(H) \longrightarrow R_K(G)$$

comme restriction des scalaires de $K[H]$ à $K[G]$. Pour f surjectif, on parle parfois plutôt d'inflation.

Pour tout groupe G, on note G^{ab} le plus grand quotient abélien de G. Un K-quasi-caractère χ de G est un homomorphisme

$$\chi : G \longrightarrow K^*;$$

on l'identifie au K-quasi-caractère de G^{ab} par lequel il se factorise, et on note $[\chi]$ la représentation de dimension 1 correspondante. Pour G fini, nous emploierons indifféremment les mots caractère et quasi-caractère. Caractère ne signifiera jamais caractère d'une représentation de dimension > 1.

The following proposition is due to P. Gallagher [20].

Proposition 1.2. Soient G un groupe, H un sous-groupe d'indice fini et

$$t : G^{\mathrm{ab}} \longrightarrow H^{\mathrm{ab}}$$

le transfert. Pour ρ une représentation virtuelle de dimension 0 de H et $x \in G^{\mathrm{ab}}$, on a

$$\det(\mathrm{Ind}_H^G(\rho))(x) = \det(\rho)(t(x)).$$

On montrera, à peine plus généralement, que si ε est le déterminant de la représentation de permutation de G sur G/H,

$$\varepsilon : G \longrightarrow \mathfrak{S}_{G/H} \longrightarrow \{\pm 1\},$$

on a, pour ρ de dimension quelconque,

$$\det(\mathrm{Ind}_H^G(\rho))(x) = \varepsilon^{\dim \rho} \det(\rho)(t(x)).$$

C'est assez évident en termes topologiques. Soient BG le classifiant de G et B_H celui de H, vu comme revêtement de B_G. Les représentations de G s'identifient aux systèmes locaux de K-vectoriels de dimension finie sur B_G, et Ind_H^G au foncteur f_*. Le transfert $H^1(B_G, X) \to H^1(B_H, X)$, pour $X = K^*$, correspond à la norme $f_!$. Si $\rho \in H^1(B_G, K^*)$ est la classe d'un système local de rang 1 de K-vectoriels, $f_!(\rho)$ est la classe de $N(L)$, système local sur B_G qui, localement sur B_G, est le produit tensoriel des images réciproques de L par les $[G : H]$ sections disjointes.

Posons

$$\det V = \bigwedge^{\dim V} V$$

pour V un système local, et soit ε le système local $\det f_* K$. La proposition 1.2 résulte de l'existence d'un isomorphisme canonique, pour V système local sur B_H,

$$\det f_* V \simeq \varepsilon^{\otimes \dim V} \otimes N(\det V).$$

La construction de cet isomorphisme est locale sur B_G; elle se ramène à la construction suivante.

Construction 1.3. Pour $(V_i)_{i \in I}$ une famille finie de K-vectoriels de dimension d, et $\varepsilon = \det(K^I)$, on a canoniquement

$$\det\Big(\bigoplus_{i \in I} V_i\Big) \simeq \varepsilon^{\otimes d} \otimes \bigotimes_{i \in I} \det(V_i).$$

La flèche est, pour $i_1, \ldots, i_N$ la suite des éléments de I,

$$\begin{aligned}&(e_{i_1,1} \wedge \cdots \wedge e_{i_1,d}) \wedge \cdots \wedge (e_{i_N,1} \wedge \cdots \wedge e_{i_N,d}) \\ &\quad \longmapsto (i_1 \wedge \cdots \wedge i_N)^{\otimes d} \otimes (e_{i_1,1} \wedge \cdots \wedge e_{i_1,d}) \otimes \cdots \otimes (e_{i_N,1} \wedge \cdots \wedge e_{i_N,d}).\end{aligned}$$

Parenthèse 1.4. Plutôt qu'un classifiant BG, on eût plus intrinsèquement pu prendre, dans le raisonnement précédent, le topos classifiant B_G de Grothendieck (SGA 4, IV, 2.4, p. 315, pour $E = (\mathrm{Ens})$).

Supposons G fini. Nous dirons que K est assez gros s'il contient toutes les racines de l'unité d'ordre divisant le ppcm des ordres des éléments de G. Un groupe H sera dit p-élémentaire s'il est produit d'un p-groupe par un groupe cyclique; élémentaire s'il est p-élémentaire pour un nombre premier p convenable. Nous aurons besoin de la variante suivante du théorème de Brauer sur les caractères induits, qu'on obtient en omettant partout "de dimension zéro".

Proposition 1.5. Si K est assez gros, toute représentation virtuelle de dimension 0 de G est somme de représentations virtuelles

$$\mathrm{Ind}_H^G(\chi),$$

avec χ virtuel de dimension 0, H élémentaire et χ combinaison linéaire de représentations de dimension 1 de H.

D'après le théorème de Brauer appliqué à la représentation triviale 1_G de G, il existe une décomposition

$$1_G = \sum_H \mathrm{Ind}_H^G(z_H), \qquad H \text{ élémentaire.}$$

Pour y représentation virtuelle de dimension 0 de G, on a alors

$$y = \sum_H y \cdot \mathrm{Ind}_H^G(z_H) = \sum_H \mathrm{Ind}_H^G(\mathrm{Res}_H^G(y) \cdot z_H),$$

avec $\dim(\mathrm{Res}_H^G(y) \cdot z_H) = 0$. Ceci nous ramène à supposer G élémentaire.

Par linéarité, on peut supposer y de la forme

$$\rho - \dim(\rho)\, 1_G,$$

avec ρ irréductible, donc, puisque G est nilpotent, induite par un caractère χ d'un sous-groupe H de G contenant le centre Z. On a alors

$$\rho - \dim(\rho)\, 1_G = \mathrm{Ind}_H^G(\chi - 1_H) + \big(\mathrm{Ind}_H^G(1_H) - [G:H]1_G\big).$$

Le premier terme est du type voulu, et le second est l'inflation d'une représentation virtuelle de dimension 0 de G/Z. On conclut par récurrence sur l'ordre de G, en notant que $|G/Z| < |G|$ si $G \neq \{e\}$.

Scholie 1.6. Un homomorphisme

$$f : R_K(G) \longrightarrow X$$

est connu quand on connaît sa valeur en 1_G et en les

$$\mathrm{Ind}_H^G(\chi - 1_H),$$

pour H élémentaire et χ un caractère de H.

1.7. Soit A un anneau de valuation discrète d'inégale caractéristique p, de corps des fractions K et de corps résiduel $k = A/\mathfrak{m}$. Rappelons la définition de l'homomorphisme de décomposition ([11], III, 2.2)

$$d : R_K(G) \longrightarrow R_k(G) :$$

pour V une représentation de G sur K et E un réseau G-invariant,

$$d([V]) = [E \otimes_A k].$$

Proposition 1.8. On suppose K assez gros. Le noyau de l'homomorphisme de décomposition d est alors engendré par les

$$\mathrm{Ind}_H^G(\chi') - \mathrm{Ind}_H^G(\chi'')$$

pour H un sous-groupe élémentaire et $\chi', \chi'' \in \mathrm{Hom}(H, K^*)$ congrus modulo $\mathfrak{m}$.

L'homomorphisme d'anneaux d commutant à l'induction, le raisonnement de 1.5 nous ramène au cas où G est élémentaire, donc produit d'un p-groupe P par un groupe H d'ordre premier à p. Les corps K et k étant assez gros, on a

$$R(G) = R(P) \otimes R(H),$$

et de même pour les anneaux de représentations sur k. Pour un groupe d'ordre premier à p, d est bijectif. Appliquant le théorème de Brauer à H, on voit qu'il suffit de prouver 1.8 pour un p-groupe. Ce cas est trivial, car tout caractère $\chi \in \mathrm{Hom}(P, K^*)$ d'un p-groupe est congru à 1 modulo $\mathfrak{m}$.

1.9. Dans la fin de ce numéro, on suppose que $K = \mathbb{C}$, on ne considère que des groupes finis, et on abrège $R_{\mathbb{C}}(G)$ en $R(G)$. Pour G commutatif, on note G^* le groupe des caractères de G.

Soit $R^+(G)$ le $\mathbb{Z}$-module libre de base l'ensemble des classes de G-conjugaison de couples (H, χ), où H est un sous-groupe de G et χ un caractère de H. On définit dans $R^+(G)$ une multiplication par la règle

$$(A, \alpha)\,(B, \beta) = \sum_{(x,y)\in G\backslash(G/A\times G/B)} \big(A^x \cap B^y,\ (\alpha^x|_{A^x\cap B^y})(\beta^y|_{A^x\cap B^y})\big), \tag{1.9.1}$$

où (x, y) parcourt des représentants des orbites de G dans $G/A \times G/B$, $A^x = xAx^{-1}$, et α^x est le caractère $a \mapsto \alpha(x^{-1}ax)$ de A^x. Pour cette multiplication, $R^+(G)$ est un anneau commutatif d'unité $(G, 1)$, et on définit un homomorphisme d'anneaux

$$b : R^+(G) \longrightarrow R(G), \qquad (H, \chi) \longmapsto \mathrm{Ind}_H^G(\chi). \tag{1.9.2}$$

Cet homomorphisme est surjectif d'après le théorème de Brauer. Pour χ un caractère de G, la multiplication par (G, χ) se note $\cdot\chi$ et s'appelle torsion par χ:

$$(H, \varphi) \cdot \chi = (H, \varphi \cdot \chi|_H). \tag{1.9.3}$$

Pour $G' \subset G$, on définit l'induction

$$\mathrm{Ind}_{G'}^G : R^+(G') \longrightarrow R^+(G), \qquad (H, \chi) \longmapsto (H, \chi). \tag{1.9.4}$$

Pour $u : G \to G'$ un morphisme, on définit la restriction

$$\mathrm{Res}_u(H, \chi) = \sum_{s\in u(G)\backslash G'/H} \big(u^{-1}(sHs^{-1}),\ \chi^s \circ u\big), \tag{1.9.5}$$

où s parcourt un ensemble de représentants des doubles classes. On dispose de diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} R^+(G') & \xrightarrow{\mathrm{Ind}} & R^+(G) \\ {\scriptstyle b}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ R(G') & \xrightarrow[\mathrm{Ind}]{} & R(G) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} R^+(G') & \xrightarrow{\mathrm{Res}} & R^+(G) \\ {\scriptstyle b}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ R(G') & \xrightarrow[\mathrm{Res}]{} & R(G), \end{array}$$

pour le second cf. [11], p. 75. On a la formule, pour $R \in R^+(G)$,

$$R \cdot (H, \chi) = \mathrm{Ind}_H^G\big(\mathrm{Res}_H^G(R) \cdot \chi\big). \tag{1.9.6}$$

On parle d'inflation lorsque u est surjectif.

Notation 1.9.8. Pour toute fonction additive de représentations F, on note de même la fonction qu'elle définit sur $R(G)$, et le composé $F \circ b$. Ainsi

$$\dim(v) = \dim(b(v)), \quad \ldots$$

Variantes 1.10. (i) On note $R_0^+(G)$ le sous-groupe de $R^+(G)$ engendré par les $(H, \chi) - (H, 1)$. Pour (H, χ) parcourant la base canonique de $R^+(G)$, à l'exception des $(H, 1)$, ces éléments forment une base de $R_0^+(G)$. On vérifie que $R_0^+(G)$ est un idéal de $R^+(G)$. Soit $R^0(G) \subset R(G)$ l'ensemble des représentations virtuelles de dimension 0 de G. D'après 1.5, l'application naturelle, induite par (1.9.2), de $R_0^+(G)$ dans $R^0(G)$ est surjective.

(ii) Pour G un groupe topologique, fini ou non, on note $R^+(G)$ et $R_0^+(G)$ les groupes analogues aux précédents obtenus en se limitant aux sous-groupes fermés H d'indice fini et aux quasi-caractères continus. Les fonctorialités 1.9 se généralisent mutatis mutandis.

La fin de ce paragraphe ne servira plus par la suite. Nous y exposons des résultats tirés de Langlands [9].

Lemme 1.11. Supposons que $G = H \cdot C$, avec C commutatif distingué, et soit χ un caractère de H. Pour tout $\mu \in C^*$, soit $G_\mu \subset G$ le fixateur de μ par conjugaison. Si

$$\chi|_{H\cap C} = \mu|_{H\cap C},$$

on note $\{\chi, \mu\}$ le caractère de $G_\mu = (H \cap G_\mu) \cdot C$ qui prolonge $\chi|_{H\cap G_\mu}$ et μ. On a

$$\mathrm{Ind}_H^G(\chi) = \sum_{\substack{\mu\in C^*/G \\ \chi|_{H\cap C}=\mu|_{H\cap C}}} \mathrm{Ind}_{G_\mu}^G\{\chi, \mu\}.$$

La vérification est laissée au lecteur.

1.12. Un élément R de $\mathrm{Ker}(R^+(G) \to R(G))$ sera dit de type I, II ou III s'il existe un quotient A d'un sous-groupe B de G tel que R s'obtienne à partir d'un élément S de l'un des types respectifs suivants de $\mathrm{Ker}(R^+(A) \to R(A))$, par inflation de A à B, torsion par un caractère de B, et induction de B à G. On désigne par ℓ un nombre premier.

I. $A \simeq \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$, et

$$S = (e, 1) - \sum_{\chi\in A^*} (A, \chi).$$

II. A est une extension centrale de $(\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})^2$ par un groupe abélien Z. Soient H_i $(i = 1, 2)$ l'image réciproque dans A des premier et second facteurs $\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$, et χ_i un caractère de H_i. On suppose que $\chi_1|_Z = \chi_2|_Z$, et que ce caractère de Z est non trivial sur un commutateur.

$$\begin{array}{ccc} Z & \hookrightarrow & H_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ H_2 & \hookrightarrow & A \end{array}$$

La relation S est

$$S = (H_1, \chi_1) - (H_2, \chi_2).$$

III. A est un produit semi-direct $H \cdot C$, χ est un caractère de H, et le sous-groupe distingué C est minimal parmi les sous-groupes commutatifs distingués non triviaux de A. Pour tout caractère μ de C, A_μ est le fixateur de μ, et $\{\chi, \mu\}$ est le caractère de A_μ qui prolonge χ et μ. La relation S exprime

$$\mathrm{Ind}_H^A(\chi) = \sum_{\mu\in C^*/A} \mathrm{Ind}_{A_\mu}^A(\{\chi, \mu\}).$$

où μ parcourt un ensemble de représentants des orbites de A dans C^*.

Ces relations sont des cas particuliers de 1.11: pour I, $H = \{e\}$ et $C = A$; pour II, $H = H_1$ et $C = H_2$; pour III, H et C sont ceux indiqués.

Toute relation déduite par induction, inflation ou torsion d'une relation de type I, respectivement II ou III, est encore du même type.

Théorème 1.13 (Langlands [9], §18). Si G est nilpotent, le noyau de

$$b : R^+(G) \longrightarrow R(G)$$

est engendré, comme $\mathbb{Z}$-module, par les relations de type I et II.

Lemme 1.13.1. Si G est commutatif, $\mathrm{Ker}(b)$ est engendré par les relations de type I.

Il faut montrer que, pour tout sous-groupe H de G et tout $\chi \in H^*$, la relation

$$(H, \chi) - \sum_{\psi\in(G/H)^*} (G, \tilde{\chi}\psi)$$

est conséquence de relations de type I. Celles-ci sont les suivantes: pour $H' \subset H'' \subset G$, avec $[H'' : H']$ premier, et χ un caractère de H', toujours induit par un caractère de G,

$$\mathrm{Ind}_{H'}^{G}(\chi) - \sum_{\chi''|_{H'}=\chi} \mathrm{Ind}_{H''}^{G}(\chi'') = 0.$$

Que la relation générale en résulte se voit en prenant une suite de Jordan–Hölder de G/H.

Lemme 1.13.2. Soient C un sous-groupe commutatif distingué de G, T un ensemble de représentants de C^*/G, $\mu \in T$, et G_μ le fixateur de μ. Soit (H_i) une famille de sous-groupes de G contenant C, et χ_i un caractère de H_i, avec $\chi_i|_C \in T$. Si la relation

$$\sum_i n_i \ \mathrm{Ind}_{H_i}^{G}(\chi_i) = 0$$

est vraie dans $R(G)$, alors la relation

$$\sum_{\chi_i|_C=\mu} n_i \ \mathrm{Ind}_{H_i}^{G_\mu}(\chi_i) = 0$$

est vraie dans $R(G_\mu)$. La vérification est laissée au lecteur.

Soit Z le centre de G, et prouvons 1.13 par récurrence sur l'ordre de G/Z. D'après 1.13.1, on peut supposer G non commutatif. Soit donc C un sous-groupe commutatif distingué contenant Z, tel que $[C : Z] = \ell$ soit premier, et d'image centrale dans G/Z.

Soit une relation

$$\sum_i n_i \ \mathrm{Ind}_{H_i}^{G}(\chi_i) = 0. \tag{1}$$

Elle est conséquence de relations induites par les relations

$$\sum_{\chi_i|_{H_i\cap Z}=\chi} \mathrm{Ind}_{H_i}^{G}(\chi_i) = \mathrm{Ind}_{H_iZ}^{G}(\chi)$$

et d'une relation (2) analogue à (1), avec $H_i \supset Z$. Les relations précédentes sont combinaisons linéaires de relations de type I; on peut le déduire de 1.13.1 appliqué à $H_iZ/\operatorname{Ker}(\chi_i)$.

La relation (2) est conséquence de relations induites par les relations 1.11 pour HC, H, C, χ, avec $H \supset Z$,

$$\mathrm{Ind}_{H}^{HC}(\chi) = \sum_{\substack{\mu\in C^*/H \\ \chi|_{H\cap C}=\mu|_{H\cap C}}} \mathrm{Ind}_{G_\mu}^{HC}\{\chi, \mu\}, \tag{b}$$

et d'une relation (3) analogue à (1), avec cette fois $H_i \supset C$. Appliquons 1.13.2 à (3), pour l'exprimer comme somme de relations induites par des relations

$$\sum_i n_i \ \mathrm{Ind}_{H_i}^{G_\mu}(\chi_i) = 0.$$

L'image de C dans $G/\operatorname{Ker}(\mu)$ est centrale, et l'hypothèse de récurrence s'applique donc à G_μ; les relations obtenues sont du type voulu.

Prouvons que les relations (b) le sont. Si $HC \neq G$, cela résulte de l'hypothèse de récurrence appliquée à HC. Si $HC = G$, H est distingué, car il contient Z et C est central modulo Z. Soit A l'intersection des noyaux des conjugués de χ. La relation (b) est l'inflation d'une relation analogue pour G/A. Si l'hypothèse de récurrence s'applique à G/A, on a gagné. Sinon, on se retrouve dans la même situation qu'avant, avec $A = \{e\}$, et on conclut par le lemme suivant.

Lemme 1.13.3. Avec les notations précédentes, si $A = \{e\}$, la relation (b) est de la forme II.

Le groupe H est commutatif, car des caractères séparent ses éléments. Le groupe Z est cyclique, car un seul caractère sépare ses éléments. Pour $c \in C$ et $h \in H$, posons

$$u(c, h) = chc^{-1}h^{-1}.$$

C'est un élément de Z, car C est central modulo Z. Il dépend biadditivement de c et h, et définit

$$u : C/Z \otimes H/Z \longrightarrow Z.$$

Soit c engendrant C/Z. Puisque Z est le centre et que $G \neq Z$, $u(c, \ ) : H/Z \to Z$ est injectif, d'image cyclique tuée par ℓ et non triviale. Dès lors $|C/Z| = |H/Z| = \ell$, et G est extension centrale de $C/Z \times H/Z$ par Z. Le caractère χ est distinct d'au moins un de ses conjugués, sinon H serait central; il est donc non trivial sur un commutateur, et on est dans la situation II.

Théorème 1.14 (Langlands [9]). Si G est résoluble, le noyau de

$$b : R^+(G) \longrightarrow R(G)$$

est engendré par les relations de type I, II et III.

Lemme 1.14.1. Si G est résoluble, le sous-$\mathbb{Z}$-module $N(G)$ de $R^+(G)$ engendré par les relations de type I, II et III est un idéal.

Prouvons 1.14 et 1.14.1 par une récurrence simultanée sur l'ordre de G.

(A) Le théorème 1.14 pour les sous-groupes propres de G implique 1.14.1 pour G. Soient $R \in R^+(G)$ de type I, II ou III, H un sous-groupe et χ un caractère de H. Prouvons que

$$R \cdot (H, \chi) \in N(G).$$

Si $H = G$, cela résulte de ce que $N(G)$ est stable par torsion par un caractère de G. Si $H \neq G$, on a, par (1.9.6),

$$R \cdot (H, \chi) = \mathrm{Ind}_H^G(\mathrm{Res}_H^G(R) \cdot \chi).$$

Vu l'hypothèse, $\mathrm{Res}_H^G(R) \in N(H)$, et la torsion puis l'induction donnent un élément de $N(G)$.

(B) Le lemme 1.14.1 pour G, plus le théorème 1.14 pour les groupes d'ordre plus petit, impliquent 1.14 pour G. Soit Z le centre de G. D'après 1.13, on peut supposer que G n'est pas nilpotent. Distinguons deux cas.

(B1) $Z \neq \{e\}$. D'après le théorème de Brauer dans G/Z, il existe des sous-groupes nilpotents $H_i \supset Z$ de G, et des caractères χ_i de H_i/Z, tels que

$$\sum_i n_i \ \mathrm{Ind}_{H_i/Z}^{G/Z}(\chi_i) = 1_{G/Z}.$$

Puisque cette relation relève à une relation S de $R^+(G)$, et que l'hypothèse de récurrence s'applique à G/Z, on a $S - (G, 1) \in N(G)$. Pour $R \in \mathrm{Ker}(b)$, on a $R \cdot S \in N(G)$ par 1.14.1, tandis que (1.9.6) ramène les termes à des restrictions à H_i, où l'hypothèse de récurrence s'applique. On conclut.

(B2) $Z = \{e\}$. Soit C un sous-groupe commutatif distingué non trivial minimal et, pour $\mu \in C^*$, soit G_μ son fixateur. Procédons comme dans la démonstration de 1.13. On trouve que toute relation $R \in \mathrm{Ker}(b)$ est combinaison linéaire de relations:

(a) induites par des relations 1.11 pour HC, H, C, χ, où $H \subset G$, χ est un caractère de H, et $H \not\supset C$;

(b) induites par des relations exprimant une identité dans G_μ.

Puisque $Z = \{e\}$, on a $|G_\mu / \mathrm{Ker}(\mu)| < |G|$, et l'hypothèse de récurrence s'applique aux dernières. Considérons une relation (a). Si $HC \neq G$, on applique l'hypothèse de récurrence. Si $HC = G$, $H \cap C$ est distingué, car distingué dans H et dans C. Par minimalité de C, $H \cap C = \{e\}$: la relation est du type III.

Remarque 1.15. Il est vraisemblablement possible d'extraire de [9] la description d'un système générateur de

$$\mathrm{Ker}(R_0^+(G) \longrightarrow R^0(G))$$

pour des groupes convenables G. Je n'ai pas eu le courage de m'y essayer.

2. Groupes de Weil

2.1. Racines de l'unité. Soit K un corps séparablement clos d'exposant caractéristique p. Pour tout entier n, on note $\mu_n(1)(K)$, ou simplement $\mu_n(1)$, le groupe des racines n-ièmes de l'unité de K. Pour $n \mid m$, on dispose d'une application de transition

$$\mu_m(1) \longrightarrow \mu_n(1), \qquad x \longmapsto x^{m/n};$$

on pose

$$\widehat{\mathbb{Z}}(1) = \varprojlim_n \mu_n(1).$$

Pour ℓ un nombre premier, on pose de même

$$\mathbb{Z}_\ell(1) = \varprojlim_r \mu_{\ell^r}(1).$$

Les applications évidentes $\widehat{\mathbb{Z}}(1) \to \mathbb{Z}_\ell(1)$ induisent un isomorphisme

$$\widehat{\mathbb{Z}}(1) \xrightarrow{\sim} \prod_{\ell \neq p} \mathbb{Z}_\ell(1).$$

Pour tout $\widehat{\mathbb{Z}}$-module V, on pose $V(1) = V \otimes_{\widehat{\mathbb{Z}}} \widehat{\mathbb{Z}}(1)$. Pour V un $\mathbb{Z}_\ell$-module, on a

$$V(1) \simeq V \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell(1).$$

Pour $K = \mathbb{C}$, le groupe $\mu_n(1)$ est canoniquement isomorphe au groupe des racines de l'unité de $\mathbb{C}$. Pour $x \in \mu_n(1)$ et $\xi \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'image de $\xi \otimes x$ dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}(1)$ est ξx; on obtient ainsi les identifications usuelles.

Pour $\ell \neq p$, $\mathbb{Z}_\ell(1)$ est libre de rang 1 sur $\mathbb{Z}_\ell$. Pour $i \in \mathbb{Z}$, on note $\mathbb{Z}_\ell(i)$ sa i-ème puissance tensorielle, et pour $i < 0$ le dual de $\mathbb{Z}_\ell(-i)$. Pour tout $\mathbb{Z}_\ell$-module V, on pose encore $V(i) = V \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Z}_\ell(i)$.

2.2. Notations. Soit K un corps local. On note $\| \ \|$ la valeur absolue normalisée de K. Si dx est une mesure de Haar,

$$\int f(ax)\, dx = \|a\|^{-1} \int f(x)\, dx,$$

c'est-à-dire $d(ax) = \|a\|\, dx$.

Pour $s \in \mathbb{C}$, on note ω_s le quasi-caractère

$$x \longmapsto \|x\|^s$$

de K^* dans $\mathbb{C}^*$.

Si K est non archimédien, c'est-à-dire $K \neq \mathbb{R}, \mathbb{C}$, on note $\mathcal{O}$ l'anneau de la valuation v de K, π une uniformisante, k le corps résiduel $\mathcal{O}/(\pi)$, p la caractéristique de k, et on pose

$$d = [k : \mathbb{F}_p], \qquad q = p^d = \#k.$$

On a donc

$$\|x\| = q^{-v(x)}.$$

2.2.2. Supposons K non archimédien. On désigne par $\overline{K}$ une clôture séparable de K, et on note $\overline{\mathcal{O}}$ la clôture intégrale de $\mathcal{O}$ dans $\overline{K}$, $\overline{k}$ le corps résiduel de $\overline{\mathcal{O}}$, donc une clôture algébrique de k, et v la valuation de $\overline{K}$, à valeurs dans $\mathbb{Q}$, qui prolonge celle de K.

On dispose d'une filtration en trois crans du groupe de Galois

$$\mathrm{Gal}(\overline{K}/K) \supset I \supset P$$

de quotients successifs

$$\begin{aligned} \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)/I &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Gal}(\overline{k}/k) \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}, \\ I/P &\xrightarrow{\sim} \widehat{\mathbb{Z}}(1)(\overline{k}), \\ P &: \text{ un pro-}p\text{-groupe.} \end{aligned}$$

On l'obtient comme suit; pour les démonstrations, on renvoie à [10].

a) Par transport de structure, $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ agit sur $\overline{\mathcal{O}}$ et $\overline{k}$. Le groupe d'inertie I est le noyau de la flèche de réduction

$$v' : \mathrm{Gal}(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathrm{Gal}(\overline{k}/k).$$

Le quotient $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ est canoniquement isomorphe à $\widehat{\mathbb{Z}}$, de générateur topologique la substitution de Frobenius

$$\varphi : x \longmapsto x^q.$$

b) Le groupe d'inertie sauvage P est l'unique pro-p-groupe de Sylow de I. Le morphisme équivariant

$$t : I \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}(1)(\overline{k}),$$

de noyau P, est caractérisé par la congruence, modulo l'idéal maximal de $\overline{\mathcal{O}}$,

$$\frac{\sigma(x)}{x} = t(\sigma)\, v(x) \qquad (\sigma \in I,\ x \in \overline{K}).$$

Pour $\ell \neq p$ premier, on note t_ℓ l'application composée

$$I \longrightarrow \widehat{\mathbb{Z}}(1)(\overline{k}) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1)(\overline{k}).$$

2.2.3. Soit k un corps fini à q éléments, de clôture algébrique $\overline{k}$. On note $W(\overline{k}/k)$ le sous-groupe de $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k) \simeq \widehat{\mathbb{Z}}$ engendré par

$$\varphi : x \longmapsto x^q.$$

On a canoniquement

$$W(\overline{k}/k) \simeq \mathbb{Z}$$

engendré par φ. Le Frobenius géométrique $F \in W(\overline{k}/k)$ est par définition φ^{-1}.

2.2.4. Soient $K, \overline{K}$ comme en 2.2.2. Le groupe de Weil $W(\overline{K}/K)$, ou groupe de Weil absolu de K, est le sous-groupe de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ formé des σ tels que $v'(\sigma)$ soit une puissance entière du Frobenius φ. On le munit de la topologie induisant la topologie naturelle de I, et pour laquelle I est ouvert. Le groupe $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ est le complété de $W(\overline{K}/K)$ pour la topologie des sous-groupes ouverts d'indice fini; pour L une extension finie de K dans $\overline{K}$, le sous-groupe correspondant de $W(\overline{K}/K)$ s'identifie à $W(\overline{K}/L)$. On appellera parfois Frobenius géométriques les éléments de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ ou $W(\overline{K}/K)$ d'image F.

2.2.5. Supposons K archimédien, de clôture algébrique $\overline{K}$. On définit $W(\overline{K}/K)$ comme l'extension suivante de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ par $\overline{K}^*$:

1) $K \simeq \mathbb{R}$: $W(\overline{K}/K)$ est engendré par $\overline{K}^*$ et un élément F, avec

$$F^2 = -1, \qquad FzF^{-1} = \overline{z} \quad (z \in \overline{K}^*).$$

2) $K \simeq \mathbb{C}$: $W(\overline{K}/K) = \overline{K}^*$.

2.3. La théorie du corps de classe local fournit un isomorphisme entre $W(\overline{K}/K)^{\mathrm{ab}}$ et K^*.

Supposons K non archimédien. Pour une raison expliquée en 3.6, nous normaliserons alors cet isomorphisme, c'est-à-dire choisirons lui ou son inverse, de telle sorte que les Frobenius géométriques correspondent aux uniformisantes:

$$\begin{array}{ccccccc}
P & \hookrightarrow & I & \hookrightarrow & W(\overline{K}/K) & \longrightarrow & W(\overline{k}/k) \simeq \mathbb{Z} \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle -1} \\
1+(\pi) & \hookrightarrow & \mathcal{O}^* & \hookrightarrow & K^* & \xrightarrow{\ v\ } & \mathbb{Z}.
\end{array}$$

Une représentation de $W(\overline{K}/K)$ est non ramifiée, respectivement modérément ramifiée, si elle est triviale sur I, respectivement sur P. De même, un quasi-caractère χ de K^* est non ramifié, respectivement modérément

ramifié, s'il est trivial sur $\mathcal{O}^*$, respectivement sur $1+(\pi)$. Pour ℓ premier à p, l'action de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ sur $\mathbb{Z}_\ell(1)$ est non ramifiée, décrite par le quasi-caractère

$$\omega_1 = \|x\|$$

de K^*.

Pour K complexe, l'isomorphisme de la théorie du corps de classe local est celui évident sur 2.2.5; pour K réel, c'est celui qui rend vrais 2.3.1 et 2.3.2 ci-dessous.

Soit $L \subset \overline{K}$ une extension finie de K, de sorte que $W(\overline{K}/L) \subset W(\overline{K}/K)$. Les diagrammes suivants, où N est la norme et t le transfert, sont commutatifs ([10], XIII, §4):

$$\begin{array}{ccccc} W(\overline{K}/L) & \longrightarrow & W(\overline{K}/L)^{\mathrm{ab}} & \xrightarrow{\sim} & L^* \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle N_{L/K}} \\ W(\overline{K}/K) & \longrightarrow & W(\overline{K}/K)^{\mathrm{ab}} & \xrightarrow{\sim} & K^*, \end{array} \tag{2.3.1}$$

$$\begin{array}{ccc} W(\overline{K}/K)^{\mathrm{ab}} & \xrightarrow{\sim} & K^* \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow \\ W(\overline{K}/L)^{\mathrm{ab}} & \xrightarrow{\sim} & L^*. \end{array} \tag{2.3.2}$$

2.4. Soient K un corps de fonctions d'une variable sur $\mathbb{F}_p$ et k son corps des constantes, c'est-à-dire la fermeture algébrique de $\mathbb{F}_p$ dans K. Soient $\overline{K}$ une clôture séparable de K, $\overline{k}$ la clôture algébrique de k dans $\overline{K}$, et $\mathrm{Gal}^0(\overline{K}/K)$ le noyau de l'application de restriction de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ dans $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$. Le groupe de Weil global absolu $W(\overline{K}/K)$ est, en analogie avec 2.2.4, défini par le diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Gal}^0(\overline{K}/K) & \longrightarrow & W(\overline{K}/K) & \longrightarrow & W(\overline{k}/k) = \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Gal}^0(\overline{K}/K) & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(\overline{K}/K) & \longrightarrow & \mathrm{Gal}(\overline{k}/k) = \widehat{\mathbb{Z}} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Soient v une place de K, et supposons choisie une place de $\overline{K}$ au-dessus de v. On dispose alors d'un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I_v & \longrightarrow & W(\overline{K}_v/K_v) & \longrightarrow & W(\overline{k}_v/k_v) = \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle [k_v:k]} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Gal}^0(\overline{K}/K) & \longrightarrow & W(\overline{K}/K) & \longrightarrow & W(\overline{k}/k) = \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

La théorie du corps de classe global fournit un isomorphisme

$$W(\overline{K}/K)^{\mathrm{ab}} \xrightarrow{\sim} \mathbb{A}_K^*/K^*$$

où $\mathbb{A}_K^*/K^*$ est le groupe des classes d'idèles, rendant commutatifs les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} W(\overline{K}_v/K_v)^{\mathrm{ab}} & \longrightarrow & W(\overline{K}/K)^{\mathrm{ab}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ K_v^* & \longrightarrow & \mathbb{A}_K^*/K^*. \end{array}$$

2.5. Pour la définition des groupes de Weil globaux dans le cas des corps de nombres, on renvoie à Weil [19] ou à [2], XIV. Nous ne nous en servirons qu'incidemment.

3. Rappels sur les fonctions L

3.1. Soit K un corps local et reprenons les notations 2.2.1. On désignera par dx une mesure de Haar sur K, par d^*x une mesure de Haar sur K^*, et par ψ un caractère additif non trivial de K.

3.2. Pour un quasi-caractère, c'est-à-dire un homomorphisme continu,

$$\chi : K^* \longrightarrow \mathbb{C}^*,$$

on définit comme suit $L(\chi) \in \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

$$K \simeq \mathbb{R}. \tag{3.2.1}$$

On pose

$$\Gamma_{\mathbb{R}}(s) = \pi^{-s/2}\Gamma(s/2),$$

et, pour x le plongement de K dans $\mathbb{C}$ et $N = 0$ ou 1,

$$L(x^{-N}\omega_s) = \Gamma_{\mathbb{R}}(s).$$

$$K \simeq \mathbb{C}. \tag{3.2.2}$$

On pose

$$\Gamma_{\mathbb{C}}(s) = 2(2\pi)^{-s}\Gamma(s),$$

et, pour z un plongement de K dans $\mathbb{C}$ et $N \geq 0$,

$$L(z^{-N}\omega_s) = \Gamma_{\mathbb{C}}(s).$$

$$K \text{ non archimédien.} \tag{3.2.3}$$

On pose

$$L(\chi) = 1 \quad (\chi \text{ ramifié}), \qquad L(\chi) = \frac{1}{1-\chi(\pi)} \quad (\chi \text{ non ramifié}).$$

3.3. ψ et dx étant donnés, on pose, pour f une fonction C^∞ à support compact sur K,

$$\widehat{f}(y) = \int_K f(x)\psi(xy)\,dx.$$

On définit $\varepsilon(\chi, \psi, dx) \in \mathbb{C}^*$ par l'équation fonctionnelle locale de Tate, indépendante de f,

$$\frac{\displaystyle\int_{K^*} \widehat{f}(x)\,\omega_1\chi^{-1}(x)\,d^*x}{L(\omega_1\chi^{-1})} = \varepsilon(\chi, \psi, dx)\,\frac{\displaystyle\int_{K^*} f(x)\chi(x)\,d^*x}{L(\chi)}. \tag{3.3.1}$$

On prend la même mesure de Haar d^*x dans les deux membres. Les deux membres sont définis par prolongement analytique en χ dans les familles $\chi\omega_s$, $s \in \mathbb{C}$. Dans ces familles, ε est de la forme Ae^{Bs}.

On a

$$\varepsilon(\chi, \psi, a\,dx) = a\,\varepsilon(\chi, \psi, dx), \tag{3.3.2}$$

$$\varepsilon(\chi, \psi(ax), dx) = \chi(a)\|a\|^{-1}\varepsilon(\chi, \psi, dx). \tag{3.3.3}$$

3.4. Pour K non archimédien, nous poserons:

$$n(\psi) = \text{ le plus grand entier } n \text{ tel que } \psi|_{\pi^{-n}\mathcal{O}} = 1;$$

$$a(\chi) = \begin{cases} 0, & \chi \text{ non ramifié}, \\ \text{le plus petit } m \text{ tel que } \chi|_{1+(\pi)^m} = 1, & \chi \text{ ramifié}; \end{cases}$$

$$sw(\chi) = \begin{cases} 0, & \chi \text{ non ou modérément ramifié}, \\ a(\chi) - 1, & \chi \text{ ramifié}; \end{cases}$$

et γ désignera un élément de K^* de valuation

$$v(\gamma) = n(\psi) + sw(\chi) + 1.$$

La constante locale ε est donnée par (3.3.2), (3.3.3), et les formules suivantes.

$$K \simeq \mathbb{R}. \tag{3.4.1}$$

Soient x le plongement de K dans $\mathbb{C}$ et $N = 0$ ou 1. Pour $\psi = \exp(2\pi i x)$ et dx la mesure de Lebesgue,

$$\varepsilon(x^{-N}\omega_s, \psi, dx) = i^N.$$

$$K \simeq \mathbb{C}. \tag{3.4.2}$$

Soient z un plongement de K dans $\mathbb{C}$ et $N \geq 0$. Pour

$$\psi = \exp(2\pi i \ \mathrm{Tr}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(z))$$

et

$$dx = |dz \wedge d\overline{z}| = 2\, da\, db \quad (z = a + bi),$$

on a

$$\varepsilon(z^{-N}\omega_s, \psi, dx) = i^N.$$

3.4.3. K non archimédien. Si χ est non ramifié,

$$\int_{\mathcal{O}} dx = 1, \qquad n(\psi) = 0,$$

alors

$$\varepsilon(\chi, \psi, dx) = 1. \tag{3.4.3.1}$$

Pour χ ramifié, on a

$$\varepsilon(\chi, \psi, dx) = \int_{K^*} \chi^{-1}(x)\psi(x)\, dx = \sum_n \int_{v(x)=n} \chi^{-1}(x)\psi(x)\, dx = \int_{\gamma^{-1}\mathcal{O}^*} \chi^{-1}(x)\psi(x)\, dx. \tag{3.4.3.2}$$

On verra qu'il est naturel d'unifier ces deux formules de la façon suivante. Si on définit $\varepsilon_0(\chi, \psi, dx)$ par

$$\varepsilon(\chi, \psi, dx) = \varepsilon_0(\chi, \psi, dx) \quad (\chi \text{ ramifié}),$$

et

$$\varepsilon(\chi, \psi, dx) = \varepsilon_0(\chi, \psi, dx)\, \chi(\pi)^{-1} \quad (\chi \text{ non ramifié}), \tag{3.4.3.3}$$

on a

$$\varepsilon_0(\chi, \psi, dx) = \int_{\gamma^{-1}\mathcal{O}^*} \chi^{-1}(x)\psi(x)\, dx. \tag{3.4.3.4}$$

De (3.4.3.3) et (3.4.3.4), on déduit que, pour ω non ramifié,

$$\varepsilon_0(\chi\omega, \psi, dx) = \omega(\pi)^{n(\psi)+sw(\chi)+1}\varepsilon_0(\chi, \psi, dx), \tag{3.4.3.5}$$

et

$$\varepsilon(\chi\omega, \psi, dx) = \omega(\pi)^{n(\psi)+a(\chi)}\varepsilon(\chi, \psi, dx).$$

3.5. Supposons K non archimédien, et reprenons les notations 2.2.1. Soit V un espace vectoriel de dimension finie sur un corps E de caractéristique 0, ou sur $\mathbb{C}$. Les représentations

$$\rho : W(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$$

seront toujours supposées continues: un sous-groupe ouvert de I agit trivialement. Pour V l'espace d'une représentation et V^I le sous-espace des invariants sous l'inertie, on pose

$$Z(V;t) = \det(1 - Ft^d, V^I)^{-1}, \tag{3.5.1}$$

$$L(V) = Z(V;1) \qquad (E \in E^* \cup \{\infty\}). \tag{3.5.2}$$

Notons

$$\omega^t : W(\overline{K}/K) \longrightarrow E((t))^*$$

le caractère non ramifié tel que $\omega^t(F) = t^d$. En un sens évident, on a $\omega_s = \omega^{p^{-s}}$. On a

$$Z(V,t) = L(V \otimes \omega^t). \tag{3.5.3}$$

3.6. C'est pour que (3.2.3) et (3.5.2) soient compatibles que nous avons normalisé l'isomorphisme du corps de classe local de telle sorte que les Frobenius géométriques correspondent aux uniformisantes. Tant (3.2.3) que (3.5.2) sont très naturels: 3.2.3 s'impose du point de vue analytique (cf. 3.3.1), et 3.5.2 suit la tradition des géomètres; c'est le Frobenius géométrique qui tend à agir sur la cohomologie des variétés algébriques avec pour valeurs propres des entiers algébriques.

3.7. Les représentations continues complexes irréductibles de $W(\overline{K}/K)$ sont, pour K complexe, les quasi-caractères. Pour K réel, elles sont, outre les quasi-caractères de K^*, les représentations induites par les quasi-caractères χ de $\overline{K}^*$ tels que $\chi \neq \chi \circ \sigma$, pour σ la conjugaison complexe de $\overline{K}$.

Pour toute représentation complexe V, exprimée, dans le groupe de Grothendieck des représentations de $W(\overline{K}/K)$, comme somme de représentations simples, on définit $L(V)$ comme suit:

$$K \simeq \mathbb{R}, \quad V = \sum_i [\chi_i] + \sum_j \mathrm{Ind}_{K^*}^{W}(\chi_j), \tag{3.7.1}$$

$$L(V) = \prod_i L_K(\chi_i) \prod_j L_{\overline{K}}(\chi_j).$$

$$K \simeq \mathbb{C}, \quad V = \sum_i [\chi_i], \qquad L(V) = \prod_i L(\chi_i). \tag{3.7.2}$$

Proposition 3.8. Soient K un corps local et $\overline{K}$ une clôture algébrique de K.

(i) Pour toute suite exacte

$$0 \longrightarrow V' \longrightarrow V \longrightarrow V'' \longrightarrow 0$$

de représentations complexes de $W(\overline{K}/K)$, on a

$$L(V) = L(V')L(V''). \tag{3.8.1}$$

(ii) Soient L une extension finie séparable de K dans $\overline{K}$, et V_L une représentation complexe de $W(\overline{K}/L)$. Soit V_K la représentation induite de $W(\overline{K}/K)$. On a

$$L(V_K) = L(V_L). \tag{3.8.2}$$

L'assertion (i) est triviale. Dans le cas archimédien, l'assertion (ii) résulte de la formule de duplication

$$\Gamma_{\mathbb{C}}(s) = \Gamma_{\mathbb{R}}(s)\Gamma_{\mathbb{R}}(s+1),$$

correspondant à

$$\mathrm{Ind}([\omega_s]) = [\omega_s] + [\chi^{-1}\omega_{s+1}].$$

Prouvons (ii) pour K non archimédien. Notant k et ℓ les corps résiduels de K et L, on a

$$V_K^{I_K} = \left(\mathrm{Ind}_{W(\overline{K}/L)}^{W(\overline{K}/K)} V_L\right)^{I_K} \simeq \mathrm{Ind}_{W(\overline{\ell}/\ell)}^{W(\overline{k}/k)}(V_L^{I_L})$$

comme $W(\overline{k}/k)$-représentations, les deux membres s'identifiant à

$$\mathrm{Hom}_{W(\overline{K}/L)}(W(\overline{k}/k), V_L),$$

fonctions covariantes de $W(\overline{k}/k)$ dans V_L, $W(\overline{K}/L)$ agissant sur $W(\overline{k}/k)$ par translation. Cf. le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} W(\overline{K}/L) & \longrightarrow & W(\overline{\ell}/\ell) \\ \downarrow & & \downarrow \\ W(\overline{K}/K) & \longrightarrow & W(\overline{k}/k). \end{array}$$

Ceci ramène (3.8.2) au lemme bien connu suivant.

Lemme 3.9. Soient F un endomorphisme de V, n un entier et F_n l'endomorphisme de

$$V_n = V \otimes \mathbb{C}^n$$

tel que, pour une base $e_0, \ldots, e_{n-1}$ de $\mathbb{C}^n$,

$$F_n(v \otimes e_i) = v \otimes e_{i+1} \quad (0 \leq i < n-1), \qquad F_n(v \otimes e_{n-1}) = F(v) \otimes e_0.$$

On a

$$\det(1 - F_n t) = \det(1 - F t^n).$$

Par le principe de prolongement des identités algébriques, on peut supposer F diagonal, dans une base convenable de V; on se ramène aussitôt au cas où $\dim(V) = 1$, et où F est la multiplication par un nombre a^n, $a \neq 0$. Dans la base $f_i = a^{-i}(v \otimes e_i)$, on a alors $F_n(f_i) = a f_{i+1}$, pour $i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Les vecteurs propres de F_n sont les

$$\sum_i \chi(i) f_i$$

où χ parcourt les caractères de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et l'identité des déterminants en résulte.

3.10. Soit K un corps global, c'est-à-dire un $\mathfrak{A}$-corps au sens de [15]. Pour toute place v de K, on notera K_v le corps local complété de K en v. Les objets définis plus haut pour tout corps local seront, pour K_v, notés avec un indice v. On note $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de K, $\| \ \|$ la valeur absolue vérifiant

$$d(ax) = \|a\| \, dx$$

pour une mesure de Haar dx sur $\mathbb{A}$, et ω_s le quasi-caractère $\|x\|^s$ de $\mathbb{A}^*$. Notant x_v la composante de $x \in \mathbb{A}$ dans K_v, on a donc

$$\|x\| = \prod_v \|x_v\|_v.$$

On désignera par dx l'unique mesure de Haar sur $\mathbb{A}$ telle que

$$\int_{\mathbb{A}/K} dx = 1$$

(mesure de Tamagawa), par d^*x une mesure de Haar sur $\mathbb{A}^*$, et par ψ un caractère trivial de $\mathbb{A}/K$, de composantes locales ψ_v. Pour f C^∞ à support compact sur $\mathbb{A}$, on pose

$$\widehat{f}(y) = \int_{\mathbb{A}} f(x)\psi(xy)\, dx.$$

3.11. L'équation fonctionnelle globale de Tate [14] s'écrit, pour χ un quasi-caractère de $\mathbb{A}^*/K^*$,

$$\int_{\mathbb{A}^*} \widehat{f}(x)\chi'(x)\, d^*x = \int_{\mathbb{A}^*} f(x)\chi(x)\, d^*x, \qquad \chi' = \omega_1\chi^{-1}, \tag{3.11.1}$$

les intégrales étant définies par prolongement analytique dans les familles $\chi\omega_s$. Posons

$$L(\chi) = \prod_v L(\chi_v) \tag{3.11.2}$$

par prolongement analytique, et, pour $dx = \otimes_v dx_v$,

$$\varepsilon(\chi) = \prod_v \varepsilon(\chi_v, \psi_v, dx_v). \tag{3.11.3}$$

Le produit (3.11.3) est indépendant du choix de ψ et de celui de la décomposition de dx, comme on le déduit de (3.3.2) et (3.3.3). Si, pour presque tout v,

$$\int_{\mathcal{O}_v} dx_v = 1,$$

presque tous ses facteurs sont égaux à 1. Les formules (3.3.1) et (3.11.1) fournissent l'équation fonctionnelle globale des fonctions L de Hecke

$$\varepsilon(\chi)L(\chi') = L(\chi). \tag{3.11.4}$$

3.12. Les résultats énoncés ci-dessous sont démontrés dans [1] et [19]. Soient K un corps global, $\overline{K}$ une clôture algébrique de K, et V une représentation complexe de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$, toujours supposée continue: l'action de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ se factorise par un groupe de Galois fini $\mathrm{Gal}(K'/K)$. Pour chaque place v de K, soit encore v une place de $\overline{K}$ au-dessus, et soit V_v la représentation déduite de V par restriction au sous-groupe

$$W(\overline{K}_v/K_v)$$

du groupe de décomposition $\mathrm{Gal}(\overline{K}_v/K_v)$.

(A) Pour χ un quasi-caractère de $\mathbb{A}^*/K^*$, de composantes locales χ_v, le produit infini

$$L(V,\chi) = \prod_v L(V_v \otimes \chi_v)$$

peut être défini par prolongement analytique en χ dans les familles $\chi\omega_s$. Il converge pour $\Re(s)$ grand et se prolonge en une fonction méromorphe de s.

(B) Notons V^* le dual de V. On a

$$L(V,\chi) = \varepsilon(V,\chi)\, L(V^*,\chi'), \qquad \chi' = \omega_1\chi^{-1},$$

avec $\varepsilon(V,\chi) \in \mathbb{C}^*$, de la forme Ae^{Bs} pour χ variant dans les familles $\chi\omega_s$.

(C) Soient L une extension finie de K dans $\overline{K}$, $N_{L/K}$ la norme, V_L une représentation de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/L)$, et

$$V_K = \mathrm{Ind}_{\mathrm{Gal}(\overline{K}/L)}^{\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)}(V_L).$$

Pour χ un quasi-caractère de $\mathbb{A}_K^*/K^*$, on a

$$L(V_K,\chi) = L(V_L, \chi\circ N_{L/K}),$$

et de même

$$\varepsilon(V_K,\chi) = \varepsilon(V_L, \chi\circ N_{L/K}).$$

(D) On a aussi

$$\varepsilon(V'\oplus V'',\chi) = \varepsilon(V',\chi)\,\varepsilon(V'',\chi),$$

ce qui permet de définir $\varepsilon(V,\chi)$ pour V seulement une représentation virtuelle.

Les assertions (A) et (B) se démontrent par réduction au cas $\dim V = 1$, via le théorème de Brauer. L'assertion (C) résulte de (B) et des compatibilités de la norme et du transfert rappelées plus haut.

4. Existence des constantes locales

Théorème 4.1. Il existe une et une seule fonction ε, vérifiant les conditions (1) à (4) ci-dessous, qui associe un nombre

$$\varepsilon(V, \psi, dx) \in \mathbb{C}^*$$

à chaque classe d'isomorphie de sextuples $(K, \overline{K}, \psi, dx, V, \rho)$, formés d'un corps local K, d'une clôture algébrique $\overline{K}$ de K, d'un caractère additif non trivial $\psi : K \to \mathbb{C}^*$, d'une mesure de Haar dx sur K, d'un espace vectoriel V de dimension finie sur $\mathbb{C}$, et d'une représentation

$$\rho : W(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathrm{GL}(V).$$

(1) Pour toute suite exacte de représentations

$$0 \to V' \to V \to V'' \to 0,$$

on a

$$\varepsilon(V, \psi, dx) = \varepsilon(V', \psi, dx)\varepsilon(V'', \psi, dx).$$

Cette condition montre que $\varepsilon(V, \psi, dx)$ ne dépend que de la classe de V dans le groupe de Grothendieck des représentations de $W(\overline{K}/K)$, et permet de donner un sens à $\varepsilon(V, \psi, dx)$ pour V seulement une représentation virtuelle.

(2)

$$\varepsilon(V, \psi, a\,dx) = a^{\dim V}\varepsilon(V, \psi, dx).$$

En particulier, pour V virtuel de dimension 0, $\varepsilon(V, \psi, dx)$ est indépendant de dx; on le note $\varepsilon(V, \psi)$.

(3) Si L est une extension séparable finie de K dans $\overline{K}$, et que V_K est la représentation virtuelle de $W(\overline{K}/K)$ induite par une représentation virtuelle de dimension zéro V_L de $W(\overline{K}/L)$, on a

$$\varepsilon(V_K, \psi) = \varepsilon(V_L, \psi \circ \mathrm{Tr}_{L/K}).$$

(4) Si $\dim V = 1$, ρ étant définie par un quasi-caractère χ de K^*, on a

$$\varepsilon(V, \psi, dx) = \varepsilon(\chi, \psi, dx).$$

4.2. Soit

$$v = \sum_{i,j} n_{ij}(H_i, \chi_{ij}) \in R_0^+(W(\overline{K}/K))$$

(1.10). On suppose les H_i deux à deux non conjugués. Soit K_i l'extension de K définie par H_i, et notons encore χ_{ij} le quasi-caractère de K_i^* défini par χ_{ij}. Pour un choix quelconque de mesures de Haar dx_i sur les K_i, et pour ψ un caractère additif de K, on pose

$$\varepsilon(v, \psi) = \prod_{i,j} \varepsilon(\chi_{ij}, \psi \circ \mathrm{Tr}_{K_i/K}, dx_i)^{n_{ij}}. \tag{4.2.1}$$

Il résulte de (3.3.2) que $\varepsilon(v, \psi)$ est indépendant du choix des dx_i.

Lemme 4.3. Avec la notation 1.9.8, pour $v \in R_0^+(W(\overline{K}/K))$,

$$\varepsilon(v, \psi(ax)) = \det(v)(a)\,\varepsilon(v, \psi).$$

Il suffit de le vérifier pour v de la forme $(H, \chi) - (H, 1)$, H correspondant à une extension L de K. Soit v_0 la représentation virtuelle $[\chi] - [1]$ de $W(\overline{K}/L)$. La formule (3.3.3) fournit l'assertion sur L. On sait ([10], XII, §4) que l'inclusion de K^* dans L^* s'identifie au transfert

$$W(\overline{K}/K)^{\mathrm{ab}} \longrightarrow W(\overline{K}/L)^{\mathrm{ab}}.$$

Puisque $b(v) = \mathrm{Ind}(v_0)$, le lemme résulte de 1.2.

Lemme 4.4. Le théorème est vrai dans le cas archimédien.

Pour $K \simeq \mathbb{C}$, on définit ε par les formules (1) et (4), et (2) est automatique. Pour $K \simeq \mathbb{R}$, on vérifie sur 2.9 que l'application

$$b : R^+(W(\overline{K}/K)) \longrightarrow R(W(\overline{K}/K))$$

est surjective, de noyau engendré par les $\chi_s - \chi_t$ pour

$$\chi_s = (K^*, \omega_s) - [\omega_s] - [\chi^{-1}\omega_{s+1}].$$

Pour V une représentation virtuelle et $v \in R_0^+(W(\overline{K}/K))$ tel que

$$b(v) = V - \dim(V)[1],$$

on pose

$$\varepsilon(V, \psi, dx) = \varepsilon(v, \psi)\, \varepsilon(1, \psi, dx)^{\dim V}. \tag{4.4.1}$$

Vérifions que le second membre est indépendant du choix de v, c'est-à-dire que, pour v vérifiant $b(v) = 0$, on a $\varepsilon(v, \psi) = 1$. D'après 4.3, il suffit de le vérifier pour $\psi(x) = \exp(2\pi i x)$. Pour ce choix de ψ, l'assertion résulte de la détermination ci-dessus de $\mathrm{Ker}(b)$, et du fait que le second membre de (3.4.1), (3.4.2), soit indépendant de s. Il est clair que ε, défini par (4.4.1), vérifie (1) à (4).

On se restreint maintenant au cas non archimédien.

4.5. Soit K un corps local non archimédien, $\overline{K}$ une clôture séparable de K, et $K_{nr} \subset \overline{K}$ l'extension non ramifiée maximale de K. Soit J un sous-groupe distingué ouvert du groupe d'inertie

$$I = \mathrm{Gal}(\overline{K}/K_{nr})$$

et L l'extension correspondante de K_{nr}. Pour $\sigma \in I/J$, on pose

$$t_{I/J}(\sigma) = \inf\big(v_L(\sigma(x) - x) \mid x \text{ entier dans } L\big),$$

et on définit des fonctions $a_{I/J}$ et $sw_{I/J}$ par les formules

$$a_{I/J}(\sigma) = -t_{I/J}(\sigma) \quad (\sigma \neq e), \tag{4.5.1}$$

$$sw_{I/J}(\sigma) = 1 - t_{I/J}(\sigma) \quad (\sigma \neq e),$$

$$\sum_\sigma a_{I/J}(\sigma) = \sum_\sigma sw_{I/J}(\sigma) = 0.$$

D'après Artin (voir [10], VI, §2, th. 1), $a_{I/J}$ est le caractère d'une représentation $A_{I/J}$ de I/J, la représentation d'Artin. D'après loc. cit., prop. 2, $sw_{I/J}$ est de même le caractère d'une représentation $Sw_{I/J}$, la représentation de Swan. Ces représentations ne sont définies qu'à isomorphisme près. $A_{I/J}$ est somme de $Sw_{I/J}$ et de la représentation d'augmentation de I/J. Pour $I \supset J \supset K$, on a (loc. cit., prop. 3)

$$(A_{I/K})^{J/K} \xrightarrow{\sim} A_{I/J}, \qquad (Sw_{I/K})^{J/K} \xrightarrow{\sim} Sw_{I/J}. \tag{4.5.2}$$

Si d est la valuation du discriminant $\delta_{L/K_{nr}}$, c'est-à-dire la valuation de la différente $\mathfrak{D}_{L/K}$ ([10], III, §3, prop. 6), et que r désigne une représentation régulière, on a (loc. cit., prop. 4)

$$A_{I/K}|_{J/K} = d\, r_{J/K} + A_{J/K}. \tag{4.5.3}$$

Soit V une représentation de $W(\overline{K}/K)$, triviale sur $J \subset I$, et de caractère ψ. On définit les conducteurs d'Artin et de Swan de V par les formules

$$a(V) = \dim \mathrm{Hom}_{I/J}(A_{I/J}, V) = sw(V) + \dim V - \dim V^I, \tag{4.5.4}$$

$$sw(V) = \dim \mathrm{Hom}_{I/J}(Sw_{I/J}, V) = \frac{1}{|I/J|} \sum_\sigma sw_{I/J}(\sigma)\psi(\sigma).$$

D'après 4.5.2, ces conducteurs sont indépendants du choix de J. Pour V de dimension 1, défini par un quasi-caractère χ, on a (loc. cit., prop. 5)

$$a(V) = \text{conducteur } a(\chi) \text{ de } \chi. \tag{4.5.5}$$

Les notations précédentes sont donc compatibles avec celles introduites en 3.4.

Avec la notation 1.9.8, on a:

Lemme 4.5. Pour $v \in R_0^+(W(\overline{K}/K))$ et χ un quasi-caractère non ramifié de K^*, on a

$$\varepsilon(v \cdot \chi, \psi) = \chi(\pi)^{a(v)} \varepsilon(v, \psi).$$

Il suffit de le vérifier pour v de la forme $(H, \lambda) - (H, \mu)$, H définissant une extension L de K, et λ, μ étant deux quasi-caractères de L^*. Soit d la valuation de la différente de l'extension L/K, f le degré de l'extension résiduelle, $I \subset W(\overline{K}/K)$ et $J \subset W(\overline{K}/L)$ les groupes d'inertie, et $K \subset J$ assez petit. Calculons $a(v)$. La formule d'adjonction pour les représentations induites, (4.5.3) et (4.5.5), fournissent, pour tout quasi-caractère ν de H, c'est-à-dire de L^*,

$$a((H, \nu)) = \dim \mathrm{Hom}_{I/K}(A_{I/K}, \mathrm{Ind}_H^W(\nu)) = f \dim \mathrm{Hom}_{J/K}(A_{J/K} + d\, r_{J/K}, [\nu]|_J) = f\, a(\nu) + fd. \qquad (4.5.1')$$

D'où

$$a(v) = f\big(a(\lambda) - a(\mu)\big).$$

Pour ν un quasi-caractère de L^*, χ_1 un quasi-caractère non ramifié de L^*, et $n = n(\psi \circ \mathrm{Tr}_{L/K})$ comme en 3.4, on a, d'après (3.4.3.1) ou (3.4.3.2),

$$\frac{\varepsilon(\nu\chi_1, \psi \circ \mathrm{Tr}, dx)}{\varepsilon(\nu, \psi \circ \mathrm{Tr}, dx)} = \chi_1(\pi_L)^{a(\nu)+n}.$$

D'où

$$\varepsilon(v \cdot \chi, \psi)\varepsilon(v, \psi)^{-1} = \chi \circ N_{L/K}\big(\pi_L^{a(\lambda)-a(\mu)}\big) = \chi(\pi)^{f(a(\lambda)-a(\mu))},$$

ce qui est la formule annoncée.

Terminologie 4.6. Soient K_1 une extension galoisienne, finie ou non, de K, de groupe de Galois G, α un quasi-caractère de K^*, et ψ un caractère additif non trivial de K. On dira qu'il existe une α, ψ-théorie des constantes pour K_1/K s'il existe $\varepsilon_{\alpha,\psi}$ du type suivant:

(0) Pour H un sous-groupe ouvert de G, définissant une extension finie L de K, V une représentation de H, et dx une mesure de Haar sur L,

$$\varepsilon_{\alpha,\psi}(V, dx) \in \mathbb{C}^*$$

est défini.

(1) Pour une suite exacte de représentations

$$0 \to V' \to V \to V'' \to 0,$$

on a

$$\varepsilon_{\alpha,\psi}(V, dx) = \varepsilon_{\alpha,\psi}(V', dx)\varepsilon_{\alpha,\psi}(V'', dx).$$

$\varepsilon_{\alpha,\psi}$ garde donc un sens pour les représentations virtuelles.

(2) On a

$$\varepsilon_{\alpha,\psi}(V, a\,dx) = a^{\dim V}\varepsilon_{\alpha,\psi}(V, dx).$$

En particulier, pour V virtuel de dimension 0, $\varepsilon_{\alpha,\psi}(V, dx)$ est indépendant de dx; on le note $\varepsilon_{\alpha,\psi}(V)$.

(3) Pour $H_1 \subset H_2 \subset G$, définissant $L_1 \supset L_2$, et V une représentation virtuelle de dimension 0 de H_1, on a

$$\varepsilon_{\alpha,\psi}(\mathrm{Ind}_{H_1}^{H_2} V) = \varepsilon_{\alpha,\psi}(V).$$

(4) Pour V de dimension 1, défini par un caractère χ de L^*,

$$\varepsilon_{\alpha,\psi}(V, dx) = \varepsilon(\chi\,\alpha \circ N_{L/K},\, \psi \circ \mathrm{Tr}_{L/K},\, dx).$$

Lemme 4.7. Soient K_1/K et α comme plus haut, et ψ un caractère additif non trivial de K. Il existe au plus une α,ψ-théorie des constantes pour K_1/K. Pour qu'il en existe une, il faut et il suffit que, pour tout

$$v \in \mathrm{Ker}(R_0^+(G) \longrightarrow R(G)),$$

on ait

$$\varepsilon(v\cdot\alpha,\psi) = 1.$$

Soient $H \subset G$, L et V comme plus haut. D'après 1.5, il existe $v \in R_0^+(H)$ d'image $V - \dim(V)[1]$ dans $R(H)$. On a nécessairement

$$\varepsilon_{\alpha,\psi}(V,dx) = \varepsilon(v\cdot(\alpha\circ N_{L/K}),\, \psi\circ \mathrm{Tr}_{L/K})\, \varepsilon(\alpha\circ N_{L/K},\, \psi\circ \mathrm{Tr}_{L/K},\, dx)^{\dim V}, \tag{4.7.1}$$

d'où l'unicité. L'hypothèse assure que $\varepsilon_{\alpha,\psi}$, défini par cette formule, est indépendant du choix de v; on vérifie aisément les axiomes (0) à (4).

Lemme 4.8.

(i) Soit β un quasi-caractère non ramifié de K^*, respectivement soit $\psi' = \psi(ax)$ un caractère additif non trivial. Pour qu'il existe une α,ψ-théorie des constantes pour K_1/K, il faut et il suffit qu'il en existe une $\alpha\beta,\psi$-théorie, respectivement une α,ψ'-théorie. Pour H, L, V comme plus haut,

$$\psi_L = \psi\circ \mathrm{Tr}_{L/K}, \qquad \beta_L = \beta\circ N_{L/K}, \qquad \alpha_L = \alpha\circ N_{L/K},$$

on a alors

$$\varepsilon_{\alpha\beta,\psi}(V,dx) = \beta_L\Big(\pi^{\,a(V\alpha_L)+\dim(V)n(\psi_L)}\Big)\,\varepsilon_{\alpha,\psi}(V,dx), \tag{4.8.1}$$

$$\varepsilon_{\alpha,\psi'}(V,dx) = \|a\|_L^{-\dim(V)}\det(V\alpha_L)(a)\,\varepsilon_{\alpha,\psi}(V,dx). \tag{4.8.2}$$

La première assertion résulte du critère 4.7 et de 4.5, respectivement de 4.3. Il suffit de prouver (4.8.1) et (4.8.2) pour $K = L$. De plus, on peut supposer que soit $V \in R^0(\mathrm{Gal}(K_1/K))$, soit $V = [1]$. Dans le premier cas, on applique 4.5 et 4.3. Dans le second, on utilise (4.7.1) et la définition 3.4.3.

On dira qu'il existe une α-théorie des constantes pour K_1/K si, pour tout caractère additif non trivial ψ, ou pour un tel ψ, il existe une α,ψ-théorie des constantes pour K_1/K. Pour $K_1 \supset L \supset K$, il existe alors une $\alpha\circ N_{L/K}$-théorie des constantes pour K_1/L.

Réduction 4.9. Le théorème 4.1 est impliqué par l'assertion suivante:

($*$) pour tout corps local non archimédien K et toute extension galoisienne finie K_1/K,

il existe un quasi-caractère non ramifié α de K^* et une α-théorie des constantes pour K_1/K.

D'après 4.8, l'assertion ($*$) implique que, pour $\overline{K}$ une clôture séparable de K, et α un quasi-caractère non ramifié quelconque de K^*, il existe une α-théorie des constantes pour $\overline{K}/K$. La discussion ci-dessous nous permettra de passer du groupe de Galois au groupe de Weil.

4.10. Toute représentation V de $W(\overline{K}/K)$ est triviale sur un sous-groupe d'indice fini convenable J de l'inertie I. Soit F un Frobenius géométrique. Puisque I/J est fini, une puissance convenable F^n de F agit trivialement sur I/J par conjugaison, donc est centrale dans $W(\overline{K}/K)/J$. On dira que V a un *type* si une puissance F^m de F^n n'a qu'une valeur propre a. Le type de V est alors l'élément de la limite inductive

$$\varinjlim_{n|m}\{X_n,\varphi_{n,m}\}, \qquad X_n = \mathbb{C}^*, \quad \varphi_{n,m}(x) = x^{m/n},$$

défini par $a \in X_m = \mathbb{C}^*$. Toute représentation irréductible a un type.

Les représentations de $W(\overline{K}/K)$ de type donné τ forment une catégorie abélienne R_τ, et la catégorie de toutes les représentations de $W(\overline{K}/K)$ est somme de ces sous-catégories. Si $R_\tau(W(\overline{K}/K))$ est le groupe de Grothendieck de R_τ, on a donc

$$R(W(\overline{K}/K)) = \bigoplus_\tau R_\tau(W(\overline{K}/K)). \tag{4.10.1}$$

Les représentations semi-simples de type 1 sont exactement les représentations continues de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$. Si X_τ est un quasi-caractère de type τ, et il existe des quasi-caractères, même non ramifiés, de tous les types, la torsion par X_τ définit donc un isomorphisme

$$\otimes X_\tau : R(\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)) \xrightarrow{\sim} R_\tau(W(\overline{K}/K)). \tag{4.10.2}$$

Soient L une extension séparable finie de K dans $\overline{K}$, et f le degré de l'extension résiduelle. Si une représentation V de $W(\overline{K}/L)$ est de type σ, la représentation induite de $W(\overline{K}/K)$ est de type σ^f. On dit que V est de K-type τ si $\sigma^f = \tau$. L'ensemble des représentations de $W(\overline{K}/L)$ de K-type donné est donc stable par induction.

Variante 4.10.3. Les arguments précédents s'appliquent à tout groupe extension de $\mathbb{Z}$ par un groupe fini, et aux limites projectives de telles extensions. Le cas des groupes de Weil globaux nous sera utile plus tard.

4.11. Admettons $(*)$. Pour tout type τ, soit X_τ un caractère non ramifié de type τ. Puisqu'il existe une X_τ-théorie des constantes, on peut définir ε sur $R_\tau(W(\overline{K}/K))$ par la formule

$$\varepsilon(V, \psi, dx) = \varepsilon_{X_\tau,\psi}(V \otimes X_\tau^{-1}, dx).$$

Il résulte de l'unicité 4.7 que cet ε est indépendant du choix de X_τ. On définit ensuite ε sur $R(W(\overline{K}/K))$ par additivité (4.10.1). D'après 4.7, s'il existe une théorie 4.1, elle est donnée par cet ε.

On a fait ce qu'il fallait pour que ε vérifie (1), (2), (4), et (3) lorsque V_L a un type. Il reste à vérifier (3) pour V_L de la forme

$$[\lambda \circ N_{L/K}] - [\mu \circ N_{L/K}],$$

avec λ et μ deux quasi-caractères non ramifiés de K^*, de types donnés. On a, par (3.4.3.1), (3.3.2), (3.3.3),

$$\varepsilon\big([\lambda \circ N_{L/K}] - [\mu \circ N_{L/K}], \psi \circ \mathrm{Tr}_{L/K}\big) = (\lambda\mu^{-1}) \circ N_{L/K}\left(\pi_L^{n(\psi\circ \mathrm{Tr}_{L/K})}\right).$$

D'après 4.8, on a d'autre part

$$\varepsilon\big(\mathrm{Ind}([\lambda \circ N_{L/K}] - [\mu \circ N_{L/K}]), \psi\big) = (\lambda\mu^{-1})\left(\pi_K^{a(\mathrm{Ind}(\mu\circ N_{L/K}))+[L:K]\, n(\psi)}\right).$$

Soient d la valuation de la différente de L/K, e l'indice de ramification, et f le degré de l'extension résiduelle. La formule (4.5.1) fournit

$$a(\mathrm{Ind}(\mu \circ N_{L/K})) = fd.$$

La formule à démontrer se réduit donc à

$$f\, n(\psi \circ \mathrm{Tr}_{L/K}) = fd + [L : K]\, n(\psi),$$

soit

$$n(\psi \circ \mathrm{Tr}_{L/K}) = d + e\, n(\psi),$$

qui est essentiellement la définition de la différente ([10], III, §3). Le point clef de la démonstration de $(*)$ est le lemme suivant.

Lemme 4.12. Soit K'/K une extension galoisienne de corps globaux. Pour chaque place w de K, on choisit une place de K' au-dessus, et on la note encore w. Soient α un quasi-caractère du groupe des classes d'idèles de K, et v une place de K qui ne se décompose pas dans K'. Si, pour toute place finie $w \neq v$ de K, il existe une α_w-théorie des constantes pour K'_w/K_w, alors il existe une α_v-théorie des constantes pour K'_v/K_v.

Soient ψ un caractère non trivial de $\mathbb{A}_K/K$, et ψ_v sa v-composante. Nous allons construire une α_v, ψ_v-théorie des constantes pour K'_v/K_v.

On a

$$\mathrm{Gal}(K'/K) = \mathrm{Gal}(K'_v/K_v).$$

Un sous-groupe H de $\mathrm{Gal}(K'_v/K_v)$ définit donc, outre une extension L_v de K_v, une extension L de K de complété L_v. Soit dx la mesure de Tamagawa sur $\mathbb{A}_L$, $\mathbb{A}_L/L$ ayant volume 1, et posons

$$dx = \otimes_w dx_w,$$

avec dx_v choisi à l'avance. Toute représentation V_v de H définit une représentation V de $\mathrm{Gal}(K'/L)$, et, par restriction, des représentations V_w des groupes de décomposition $\mathrm{Gal}(K'_w/K_w)$. Une constante globale $\varepsilon(V,\alpha)$ a été définie en 3.12.

Soit w une place de L, et notons encore w la place de K image. Pour w infinie, on dispose, par 4.4, de constantes locales

$$\varepsilon\big(V_w,(\alpha\circ N_{L/K})_w,(\psi\circ \mathrm{Tr}_{L/K})_w,dx_w\big).$$

Pour w finie autre que v, on dispose aussi, par hypothèse, de constantes

$$\varepsilon_{\alpha_w,\psi_w}(V_w,dx_w).$$

Notant les unes et les autres $\varepsilon_\alpha(V_w,\psi_w,dx_w)$, on pose

$$\varepsilon_{\alpha_v,\psi_v}(V_v,dx_v)=\frac{\varepsilon(V,\alpha)}{\prod\limits_{w\neq v}\varepsilon_\alpha(V_w,\psi_w,dx_w)}.$$

On vérifie que $\varepsilon_{\alpha_v,\psi_v}$ ne dépend pas du choix de la décomposition $dx=\otimes dx_w$, et vérifie les axiomes (0) à (4). Le point clef est 3.12(C).

Lemme 4.13. Soit K'/K une extension galoisienne de corps locaux. Il existe une extension galoisienne de corps globaux ${}^1K'/{}^1K$, et une place v de ${}^1K$ qui ne se décompose pas dans ${}^1K'$, telles que K s'identifie au complété de ${}^1K$ en v, et K' à une sous-extension de ${}^1K'_v/{}^1K_v$.

C'est trivial: on prend d'abord ${}^1K'/{}^1K$ avec ${}^1K'_v\simeq K'\supset K={}^1K_v$, puis on remplace ${}^1K$ par l'extension définie par un groupe de décomposition en v.

Lemme 4.14. Soient K un corps global, S un ensemble fini de places finies de K, et $m:S\to\mathbb{N}$. Il existe un caractère α du groupe des classes d'idèles tel que, pour $w\in S$, le conducteur de α_w soit $\geq m(w)$, et que, pour toute place finie hors de S, α_w soit non ramifié.

Si K est un corps de nombres, on peut en effet librement spécifier α sur

$$\prod_{w\ \text{fini}}\mathcal{O}_w^*,$$

car ce sous-groupe compact de $\mathbb{A}^*$ ne rencontre K^* qu'en $\{1\}$. Si K est un corps de fonctions, de corps de constantes k, on a

$$\prod_w\mathcal{O}_w^*\cap K^*=k^*,$$

et on remarque qu'il existe des caractères de $\mathcal{O}_w^*$, de conducteur arbitrairement grand, qui soient triviaux sur k^*.

D'après 4.12, 4.13 et 4.14, l'assertion 4.9 $(*)$, et donc 4.1, résultent des deux lemmes suivants, où K'/K est une extension galoisienne finie de corps locaux non archimédiens, de groupe de Galois G, et α un quasi-caractère de K^*.

Lemme 4.15. Si α et K'/K sont non ramifiés, il existe une α-théorie des constantes pour K'/K.

Choisissons pour ψ un caractère de K tel que $n(\psi)=0$. Il suffit alors de prendre

$$\varepsilon_{\alpha,\psi}(V,dx)=\left(\int_L dx\right)^{\dim(V)}.$$

Lemme 4.16. Pour K'/K donné, il existe m tel que, si le conducteur de α est $\geq m$, il existe une α-théorie des constantes pour K'/K.

Soit α de conducteur m, et

$$n=\left[\frac{m+1}{2}\right].$$

La fonction $\alpha(1+a)$ est alors additive en a pour $v(a) \geq m-n$. Si ψ est un caractère additif non trivial de K, il existe donc y, de valuation $-(m+n(\psi))$, et bien défini modulo $\pi^{-(n+n(\psi))}$, tel que

$$\alpha(1+a) = \psi(ya) \qquad \text{pour } v(a) \geq n.$$

Pour χ un quasi-caractère de K^*, de conducteur $\leq m-n$, on a alors

$$\varepsilon(\chi\alpha, \psi, dx) = \sum_{u \in \mathcal{O}^*/(1+(\pi^n))} \int_{\pi^{-m-n(\psi)}u} \chi^{-1}(x)\alpha^{-1}(x)\psi(x)\, dx. \tag{4.16.1}$$

Pour $\pi^{-m-n(\psi)}u$ non contenu dans $y(1+(\pi^{m-n}))$, l'intégrale partielle correspondante est nulle: c'est l'intégrale d'un caractère additif non trivial. Puisque χ est constant de valeur $\chi(y)$ sur $y(1+(\pi^{m-n}))$, on a donc

$$\varepsilon(\chi\alpha, \psi, dx) = \chi^{-1}(y)\, \varepsilon(\alpha, \psi, dx).$$

Nous allons montrer que, pour m assez grand, on obtient une α, ψ-théorie des constantes pour K'/K en posant, pour $H \subset G$ définissant une extension L de K, et V une représentation de H,

$$\varepsilon_{\alpha,\psi}(V, dx) = \det(V)^{-1}(y)\, \varepsilon(\alpha \circ N_{L/K}, \psi \circ \mathrm{Tr}_{L/K}, dx)^{\dim V}.$$

Les axiomes (0), (1), (2) sont triviaux. L'axiome (3) résulte de ce que l'inclusion de K^* dans L^* s'identifie au transfert

$$W(\overline{K}/K)^{\mathrm{ab}} \longrightarrow W(\overline{K}/L)^{\mathrm{ab}}$$

([10], XIII, §4), et de 1.2. Reste l'axiome (4).

Soit $H \subset G$ correspondant à L/K, et e l'indice de ramification. Rappelons que, pour $u \in \mathcal{O}_L$ et n le plus petit entier tel que $ne \geq 2v(u)$,

$$N_{L/K}(1+u) = 1 + \mathrm{Tr}_{L/K}(u) \pmod{\pi^n}. \tag{4.16.2}$$

On le vérifie en écrivant la norme de $1+u$ comme le produit de ses conjugués. Nous noterons $O(1)$ tout nombre borné en termes de K'/K seulement. D'après 4.16.2, si α est de conducteur m, $\alpha \circ N_{L/K}$ est de conducteur $em - O(1)$. De plus, pour

$$\frac{v(a)}{e} \geq \left[\frac{m+1}{2}\right] + O(1),$$

on a

$$\alpha \circ N_{L/K}(1+a) = \alpha(1+\mathrm{Tr}(a)) = \psi(y\ \mathrm{Tr}\, a) = \psi \circ \mathrm{Tr}_{L/K}(ya).$$

Pour tout caractère χ de H, de conducteur $O(1)$, on peut refaire le raisonnement fait plus haut; on obtient la formule voulue

$$\varepsilon(\chi\, \alpha \circ N_{L/K}, \psi \circ \mathrm{Tr}_{L/K}, dx) = \chi^{-1}(y)\, \varepsilon(\alpha \circ N_{L/K}, \psi \circ \mathrm{Tr}_{L/K}, dx).$$

5. Formulaire

5. Formulaire.

(5.1) Outre la constante locale $\varepsilon(V, \psi, dx)$ définie par 4.1, nous considérerons aussi, dans le cas non archimédien, la constante ε_0 définie par

$$\varepsilon(V, \psi, dx) = \varepsilon_0(V, \psi, dx)\ \det(-F, V^I)^{-1}.$$

Les constantes ε et ε_0 ont les propriétés suivantes.

(5.2) ε et ε_0 sont additifs en V, donc gardent un sens pour V virtuel.

(5.3) ε et ε_0 sont indépendants de dx pour V virtuel de dimension 0. On les note $\varepsilon(V, \psi)$ et $\varepsilon_0(V, \psi)$. Plus précisément,

$$\varepsilon(V, \psi, a\, dx) = a^{\dim V} \varepsilon(V, \psi, dx),$$

et de même pour ε_0.

(5.4) On a

$$\varepsilon(V,\psi(ax),dx)=\det(V)(a)\,\|a\|^{-\dim V}\varepsilon(V,\psi,dx),$$

et de même pour ε_0.

(5.5) Pour K non archimédien et χ un quasi-caractère non ramifié de K^*, on a

$$\varepsilon(V\chi,\psi,dx)=\chi\Big(\pi^{a(V)+\dim(V)n(\psi)}\Big)\,\varepsilon(V,\psi,dx), \tag{5.5.1}$$

et

$$\varepsilon_0(V\chi,\psi,dx)=\chi\Big(\pi^{\dim(V)+sw(V)+\dim(V)n(\psi)}\Big)\,\varepsilon_0(V,\psi,dx).$$

En particulier, si on pose

$$\varepsilon(V,\psi,dx,s)=\varepsilon(V\omega_s,\psi,dx),$$

et de même pour ε_0, on a

$$\varepsilon(V,\psi,dx,s)=\varepsilon(V,\psi,dx)\,q^{-(a(V)+\dim(V)n(\psi))s}, \tag{5.5.2}$$

et

$$\varepsilon_0(V,\psi,dx,s)=\varepsilon_0(V,\psi,dx)\,q^{-(sw(V)+\dim(V)(n(\psi)+1))s}.$$

Pour W une représentation non ramifiée, on a de même

$$\varepsilon(V\otimes W,\psi,dx)=\det W\Big(\pi^{a(V)+\dim(V)n(\psi)}\Big)\,\varepsilon(V,\psi,dx)^{\dim W}, \tag{5.5.3}$$

$$\varepsilon_0(V\otimes W,\psi,dx)=\det W\Big(\pi^{sw(V)+\dim(V)(n(\psi)+1)}\Big)\,\varepsilon_0(V,\psi,dx)^{\dim W}.$$

(5.6) Pour L/K une extension séparable finie, V_L une représentation virtuelle de dimension 0 de $W(\overline{K}/L)$, et V_K la représentation induite de $W(\overline{K}/K)$, on a

$$\varepsilon(V_K,\psi)=\varepsilon(V_L,\psi\circ\mathrm{Tr}_{L/K}), \tag{5.6.1}$$

et de même pour ε_0. En d'autres termes, il existe

$$\lambda(L/K,\psi,dx_L,dx_K)\in\mathbb{C}^*$$

tel que, pour V_L de dimension quelconque,

$$\varepsilon(V_K,\psi,dx_K)=\lambda(L/K,\psi,dx_L,dx_K)^{\dim(V_L)}\varepsilon(V_L,\psi\circ\mathrm{Tr}_{L/K},dx_L). \tag{5.6.2}$$

La même formule vaut pour ε_0.

Dans Langlands [9], c'est (5.6.2) qui fournit le cadre de la théorie. De plus, il prend systématiquement pour dx la mesure de Haar autoduale pour ψ, et il l'omet de la notation. Les constantes sont de plus normalisées pour être de valeur absolue complexe 1. Tout ceci lui impose une autre formule (5.4).

5.7. Soient V^* le dual de V, et dx' la mesure de Haar duale de dx, relativement à ψ. On a

$$\varepsilon(V,\psi,dx)\,\varepsilon(V^*\omega_1,\psi(-x),dx')=1. \tag{5.7.1}$$

En particulier, si K est non archimédien et que V est unitaire, de sorte que $V^*=\overline{V}$, on a

$$|\varepsilon(V,\psi,dx)|^2=\left(\frac{dx'}{dx}\right)^{-\dim(V)}q^{a(V)+\dim(V)n(\psi)}. \tag{5.7.2}$$

5.8. ε^{-1} apparaît dans l'équation fonctionnelle locale de Tate; posant $\chi'=\omega_1\chi^{-1}$,

$$\frac{\int\widehat{f}(x)\chi'(x)d^*x}{L(\chi')}=\varepsilon(\chi,\psi,dx)\,\frac{\int f(x)\chi(x)d^*x}{L(\chi)}\qquad\text{(Tate)}. \tag{5.8.1}$$

Pour K non archimédien, $\gamma\in K^*$ de valuation $1+sw(\chi)+n(\psi)$, on a (3.4.3.4)

$$\varepsilon_0(\chi,\psi,dx)=\int_{\gamma^{-1}\mathcal{O}^*}\chi^{-1}(x)\psi(x)\,dx. \tag{5.8.2}$$

5.9. Pour K non archimédien, si χ est non ramifié, on a

$$\varepsilon(\chi, \psi, dx) = \chi(\pi^{n(\psi)})\, q^{n(\psi)} \int_{\mathcal{O}} dx.$$

En particulier, si $n(\psi) = 0$ et que $\int_{\mathcal{O}} dx = 1$, on a

$$\varepsilon(\chi, \psi, dx) = 1.$$

5.10. Prenons K non archimédien, $a(\chi) \leq 1$, $n(\psi) = -1$, et

$$\int_{(\pi)} dx = 1.$$

Soient χ_k et ψ_k les caractères de k^* et k définis par χ et ψ. On a

$$\varepsilon_0(\chi, \psi, dx) = -\tau(\chi_k, \psi_k), \tag{5.10.1}$$

où τ est la somme de Gauss

$$\tau(\chi_k, \psi_k) = -\sum_{x \in k^*} \chi_k^{-1}(x)\psi_k(x), \tag{5.10.2}$$

égale à 1 pour χ_k trivial. En particulier,

$$\varepsilon_0([\chi] - [1], \psi) = \tau(\chi_k, \psi_k). \tag{5.10.3}$$

5.11. Soit K un corps global. Pour V une représentation du groupe de Weil global de K, ψ un caractère additif non trivial de $\mathbb{A}_K/K$, et

$$dx = \bigotimes_v dx_v$$

la mesure de Tamagawa sur $\mathbb{A}_K$, on pose

$$L(V) = \prod_v L(V_v), \tag{5.11.1}$$

$$\varepsilon(V) = \prod_v \varepsilon(V_v, \psi_v, dx_v). \tag{5.11.2}$$

L'équation fonctionnelle globale s'écrit

$$L(V) = \varepsilon(V)\, L(V^* \otimes \omega_1). \tag{5.11.3}$$

Démonstrations. Les formules 5.2, 5.3, 5.6 et 5.8 sont 4.1, respectivement (1), (2), (3), (4), avec 3.3. Les formules 5.4 et 5.5 résultent de 4.8. Il suffit de prouver (5.7.1) pour V défini par un caractère; la formule résulte alors de (5.8.1) et de la formule d'inversion de Fourier. La formule (5.7.2) résulte de (5.7.1), (5.3) et (5.4). La formule 5.9 résulte de (3.4.3.1), et 5.10 de (5.8.2). Enfin, 5.11 résulte de ce qui précède et de (3.11.4), par des arguments connus [1], [19].

La restriction de 4.1 au cas des extensions et des caractères modérément ramifiés équivaut aux identités suivantes sur les sommes de Gauss (5.10.2). On y désigne par k un corps fini à q éléments, et par ψ un caractère additif non trivial de k.

5.12. Hasse–Davenport. Soient k' une extension de k, de degré n, et χ un caractère de k^*. On a

$$\tau(\chi \circ N_{k'/k}, \psi \circ \mathrm{Tr}_{k'/k}) = \tau(\chi, \psi)^n. \tag{5.12.1}$$

5.13. Soient χ un caractère de k^* et n un entier premier à q. Soit X un ensemble de représentants des classes d'isomorphie de couples (k', χ'), formés d'une extension k' de k et d'un caractère χ' de k'^*, tels que

$$\chi'(x^n) = \chi \circ N_{k'/k}(x), \tag{a}$$

et

$$\chi' \text{ ne soit pas de la forme } \chi'' \circ N_{k'/k''} \tag{b}$$

pour k'' intermédiaire entre k et k', c'est-à-dire

$$\chi'^{q^{f'}} \neq \chi' \qquad (0 < f' < [k' : k]).$$

Posons

$$\tau(\chi, \psi^n) = \lambda_n(\chi, \psi) \prod_{(k', \chi') \in X} \tau(\chi', \psi \circ \mathrm{Tr}_{k'/k}).$$

Alors

$$\lambda_n(\chi, \psi) \text{ est indépendant de } \chi. \tag{5.13.1}$$

Cette identité se dévisse en les deux suivantes.

5.14 (Langlands [9], 7.8). Soient ℓ un nombre premier à q, f l'ordre de q dans $(\mathbb{Z}/\ell)^*$, k' une extension de k de degré f, T un ensemble de représentants des orbites de $\mathrm{Gal}(k'/k)$ dans les caractères non triviaux d'ordre ℓ de k'^*, et χ un caractère de k^*. On a

$$\tau(\chi^\ell, \psi^\ell) \prod_{\mu \in T} \tau(\mu, \psi \circ \mathrm{Tr}_{k'/k}) = \tau(\chi, \psi) \prod_{\mu \in T} \tau(\chi \circ N_{k'/k} \cdot \mu, \psi \circ \mathrm{Tr}_{k'/k}).$$

5.15 (Langlands [9], 7.9). Soient ℓ un nombre premier divisant $q-1$, T l'ensemble des caractères d'ordre ℓ de k^*, χ un caractère de k^* qui n'est pas une puissance ℓ-ième, k' une extension de degré ℓ de k, et χ' un caractère de k'^* tel que

$$\chi'(x^\ell) = \chi \circ N_{k'/k}(x).$$

On a

$$\tau(\chi, \psi^\ell) \prod_{\mu \in T} \tau(\mu, \psi) = \tau(\chi', \psi \circ \mathrm{Tr}_{k'/k}).$$

5.16. Démonstrations. Si K'/K est une extension modérément ramifiée de corps locaux non archimédiens, et si ψ est un caractère additif de K tel que

$$n(\psi) = -1,$$

on a encore

$$n(\psi \circ \mathrm{Tr}_{K'/K}) = -1,$$

de sorte que 5.10 s'applique tant à K qu'à K'.

Soit V une représentation modérément ramifiée de $W(\overline{K}/K)$. On peut toujours l'écrire comme somme de représentations induites par des caractères modérés χ_i d'extensions non ramifiées K_i/K:

$$V = \dim(V)[1] + \sum_i \mathrm{Ind}([\chi_i] - [1]) + \sum_i \big(\mathrm{Ind}([1]) - [K_i : K][1]\big).$$

Soient k_i le corps résiduel de K_i, et $\widetilde{\chi}_i$ le caractère de k_i^* défini par χ_i. Pour dx une mesure de Haar sur K telle que

$$\int_{(\pi)} dx = 1,$$

on trouve

$$\varepsilon_0(V, \psi, dx) = (-1)^{\dim V} \prod_i \tau(\widetilde{\chi}_i, \psi_k \circ \mathrm{Tr}_{k_i/k}). \tag{5.16.1}$$

La formule (5.12) s'obtient en prenant une extension non ramifiée K'/K, et en écrivant que, pour χ un caractère, ici modérément ramifié, de K^*, on a

$$\mathrm{Ind}(\chi \circ N_{K'/K} - [1]) = \sum_{\mu} ([\chi\mu] - [\mu]),$$

où μ parcourt les caractères non ramifiés d'ordre divisant $[K' : K]$. Cette formule (5.12) assure que le second membre de (5.16.1) ne dépend que de V.

Les identités 5.13 s'obtiennent en prenant une extension totalement ramifiée de degré n, K'/K, et en conjuguant 5.6.1 et (5.16.1) pour V induite par un caractère modéré χ de K'. Les formules (5.14) et (5.15) sont le cas particulier de (5.13.1) où n est un nombre premier ℓ. Dans 5.14, respectivement 5.15, on suppose que le caractère χ de K'^* est, respectivement n'est pas, une puissance ℓ-ième.

6. Réduction modulo ℓ des constantes locales

Soient K un corps local non archimédien, $\overline{K}$ une clôture séparable de K, et reprenons les notations 2.2. Soit A un anneau commutatif dans lequel p soit inversible. On simplifierait l'exposé, sans perte de généralité, en supposant que A est local, voire un corps. Pour $x \in K$, $\|x\|$ a par hypothèse un sens dans A.

6.1. Une mesure de Haar μ sur K, à valeurs dans un $\mathbb{Z}[1/p]$-module M, est une fonction simplement additive de parties compactes ouvertes de K, à valeurs dans M, et invariante par translation. La fonction additive définie par

$$\mu_0(a + x\mathcal{O}) = \|x\|$$

est l'unique mesure de Haar à valeurs dans $\mathbb{Z}[1/p]$ telle que

$$\mu_0(\mathcal{O}) = 1,$$

et toute mesure de Haar à valeurs dans M est de la forme

$$m\mu_0 \qquad (m = \mu(\mathcal{O}) \in M).$$

On peut intégrer une fonction localement constante à support compact, à valeurs dans A, contre une mesure de Haar à valeurs dans A.

6.2. Soient

$$\rho : W(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathrm{GL}_A(V)$$

une représentation du groupe de Weil sur un A-module libre, ou projectif, V, et J un sous-groupe distingué ouvert de I sur lequel ρ soit trivial. Pour tout nombre premier $\ell \neq p$, on sait que la représentation de Swan $Sw_{I/J}$ peut se réaliser comme un $\mathbb{Z}_\ell[I/J]$-module projectif. Si A est une $\mathbb{Z}_\ell$-algèbre,

$$\mathrm{Hom}_{I/J}(Sw_{I/J}, V)$$

est donc un A-module projectif. Si A est de plus local, il est libre; son rang est le conducteur de Swan de V. Plus généralement, on vérifie qu'on peut toujours définir le conducteur de Swan de V comme une fonction localement constante à valeurs entières sur $\mathrm{Spec}(A)$. Ce conducteur est invariant par extension de l'anneau des scalaires A.

6.3. Si ζ est une racine p^n-ième de l'unité dans A, l'ordre de ζ est une fonction localement constante sur $\mathrm{Spec}(A)$. En effet, deux quelconques des polynômes cyclotomiques $\Phi_{p^i}(X)$ engendrent l'idéal trivial de $A[X]$, puisque $p \in A^*$. Ainsi A est produit d'anneaux A_i, $1 \leq i \leq n$, la i-ième coordonnée de ζ vérifiant

$$\Phi_{p^i}(\zeta) = 0;$$

sur $\mathrm{Spec}(A_i)$, ζ est d'ordre p^i.

Si ψ est un caractère additif continu de K à valeurs dans A^*, il est à valeurs dans les racines p^n-ièmes de l'unité. Ceci permet de définir $n(\psi)$ comme une fonction localement constante sur $\mathrm{Spec}(A)$: en un idéal premier λ, $n(\psi)$ est $+\infty$ si ψ est trivial modulo λ, et sinon le plus grand entier n tel que

$$\psi|_{\pi^{-n}\mathcal{O}}$$

soit trivial modulo λ, ou dans le localisé A_λ, ce qui revient au même. Par abus de langage, on dit que ψ est non trivial si $n(\psi)$ n'est nulle part $+\infty$.

6.4. Pour ψ un caractère additif non trivial de K à valeurs dans A^*, $\chi \in \mathrm{Hom}(K^*, A^*)$, et dx une mesure de Haar à valeurs dans A, on peut maintenant définir

$$\varepsilon_0(\chi, \psi, dx) \in A^*$$

par la formule (3.4.3.4). Plus précisément, si $\mathrm{Spec}(A)$ n'est pas connexe, on commence par écrire

$$A = \prod_i A_i$$

avec $n(\psi)$ et $Sw(\chi)$ constants sur $\mathrm{Spec}(A_i)$. On définit alors la i-ième projection de ε_0 par (3.4.3.4).

Théorème 6.5. Il existe une et une seule fonction ε_0 du type suivant:

(a) Pour K un corps local non archimédien, $\overline{K}$ une clôture séparable de K, A un corps de caractéristique $\neq p$, V une représentation de $W(\overline{K}/K)$ dans un vectoriel de dimension finie sur A, ψ un caractère additif non trivial à valeurs dans A^*, et dx une mesure de Haar non nulle à valeurs dans A, on a

$$\varepsilon_0(V, \psi, dx) \in A^*.$$

(b) ε_0 est invariant par extension du corps A.

(c) Soient A un anneau de valuation discrète de caractéristique résiduelle $\neq p$, F son corps des fractions, et $s = A/\mathfrak{m}$ son corps résiduel. Pour V une représentation de $W(\overline{K}/K)$ dans un A-module libre de rang fini, et pour ψ et dx à valeurs dans A, on a

$$\varepsilon_0(V_F, \psi, dx) \in A^*,$$

et sa réduction modulo $\mathfrak{m}$ est

$$\varepsilon_0(V_s, \overline{\psi}, \overline{dx}).$$

(d) Les conditions (1) à (3) de 4.1 sont vérifiées.

(e) Pour $\dim V = 1$, ε_0 est donné par 6.4.

Par descente galoisienne, il suffit de traiter le cas où A est un corps séparablement clos. Si A est de caractéristique 0, l'énoncé, étant purement algébrique, résulte du cas $A = \mathbb{C}$ traité en 4.1. Supposons donc A de caractéristique $\ell \neq 0$.

Soient G un quotient fini de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$, et A_0 un anneau de valuation discrète d'inégale caractéristique, de corps résiduel $A_0/\mathfrak{m} = A$. On suppose ψ relevé en un caractère additif à valeurs dans A_0^*, dx en une mesure de Haar à valeurs dans A_0, et le corps des fractions E de A_0 assez gros, au sens de 1.4, relativement à G.

Pour tout caractère χ d'un sous-groupe de G à valeurs dans E^*, en fait dans A_0^*, la constante ε_0 correspondante est clairement dans A_0. D'après 5.7.1, elle est même dans A_0^*. On en déduit que, pour toute représentation V_E de G sur E, on a

$$\varepsilon_0(V_E, \psi, dx) \in A_0^*.$$

On sait que l'homomorphisme de décomposition

$$d : R_E(G) \longrightarrow R_A(G)$$

est surjectif: les représentations virtuelles se relèvent. Pour $V \in R_A(G)$, choisissons $\widetilde{V} \in R_E(G)$ tel que $d(\widetilde{V}) = V$, et posons

$$\varepsilon_0(V, \overline{\psi}, \overline{dx}) = \text{réduction modulo } \mathfrak{m} \text{ de } \varepsilon_0(\widetilde{V}, \psi, dx).$$

D'après 1.8, pour légitimer cette définition, il suffit de vérifier que:

$$(*) \quad \text{pour } H \subset G \text{ définissant une extension } L \text{ de } K,$$

$$\psi_L = \psi \circ \mathrm{Tr}_{L/K}, \quad \chi', \chi'' \text{ caractères de } H \text{ à valeurs dans } A_0^*,$$

si χ' et χ'' sont congrus modulo $\mathfrak{m}$, alors

$$\begin{aligned} \varepsilon_0\Big(\mathrm{Ind}_H^G([\chi'] - [\chi'']), \psi\Big) &= \varepsilon_0\big([\chi'] - [\chi''], \psi_L\big) \\ &\equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{aligned}$$

Les conducteurs de Swan de χ' et χ'' sont tous deux égaux au conducteur de Swan de χ' modulo $\mathfrak{m}$. Pour

$$y = \pi^{1+Sw(\chi')+n(\psi_L)},$$

les formules de 3.4.3 donnent

$$\varepsilon_0(\chi', \psi_L, dx_L) = \int_{y^{-1}\mathcal{O}_L^*} \chi'^{-1}(x)\psi_L(x)\, dx_L,$$

et de même pour χ''. Numérateur et dénominateur sont des unités et sont clairement congrus modulo $\mathfrak{m}$. On a donc

$$\frac{\varepsilon_0(\chi', \psi_L, dx_L)}{\varepsilon_0(\chi'', \psi_L, dx_L)} \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}.$$

Pour V une représentation de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$, on obtient ainsi une fonction ε_0 ayant les propriétés annoncées. Ses propriétés formelles sont les mêmes que celles explicitées dans le formulaire 5.1 dans le cas $A = \mathbb{C}$. Pour passer de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ à $W(\overline{K}/K)$, on peut donc reprendre l'argument utilisé en 4.9, à l'aide de la deuxième formule (5.5.1).

Remarque 6.6. Dans tout ce numéro, il a été essentiel de travailler avec ε_0 plutôt qu'avec ε. D'abord pour avoir à utiliser le conducteur de Swan, invariant par réduction modulo ℓ, plutôt que le conducteur d'Artin; ensuite pour n'avoir pas à distinguer, dans la définition de $\varepsilon_0(\chi, \psi, dx)$, entre les cas non ramifié et modérément ramifié. La signification de ε_0 apparaîtra plus clairement au numéro suivant.

7. Fonctions L modulaires

7.1. Soit X une courbe projective non singulière sur $\mathbb{F}_p$. On suppose X irréductible, on note K son corps de fonctions rationnelles, et on identifie les points fermés de X et les places de K. On ne suppose pas X géométriquement irréductible, c'est-à-dire $\mathbb{F}_p$ algébriquement fermé dans K.

7.2. Soit A un anneau noethérien. On sait ce qu'est un faisceau constructible de A-modules sur $X_{\text{ét}}$ (SGA 4, IX, 2.3). Pour tout $x \in X$, et pour $k(\overline{x})$ une extension séparablement close de $k(x)$, un tel faisceau $\mathcal{G}$ a une fibre

$$\mathcal{G}_{\overline{x}}$$

en x, qui est un A-module de type fini. Ce dernier ne dépend que de la clôture séparable de $k(x)$ dans $k(\overline{x})$, et $\mathrm{Gal}(\overline{k(x)}/k(x))$ agit sur $\mathcal{G}_{\overline{x}}$ par transport de structure.

De plus, pour v une place de K, c'est-à-dire un point fermé de X, et $\overline{K}_v$ une clôture algébrique de K_v, on dispose d'une flèche de spécialisation

$$\mathrm{sp}_v : \mathcal{G}_{\overline{k(v)}} \longrightarrow \mathcal{G}_{\overline{K}_v}.$$

Cette flèche est équivariante; son image est donc contenue dans $\mathcal{G}_{\overline{K}_v}^{I_v}$. On dit que $\mathcal{G}$ est non ramifié en v si sp_v est un isomorphisme. Un faisceau constructible est presque partout non ramifié.

Une fois choisies une clôture séparable $\overline{K}$ de K, et une place de $\overline{K}$ au-dessus de chaque place de K, on peut réciproquement définir un faisceau constructible de A-modules comme suit:

(a) on se donne les fibres $\mathcal{G}_{\overline{K}}$ et $\mathcal{G}_{\overline{k(v)}}$, respectivement des A-$\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$-modules ou des A-$\mathrm{Gal}(\overline{k(v)}/k(v))$-modules, de type fini sur A;

(b) on se donne les flèches de spécialisation, équivariantes pour l'action des groupes de décomposition,

$$\mathcal{G}_{\overline{k(v)}} \longrightarrow \mathcal{G}_{\overline{K}}.$$

Pour que (a) et (b) définissent un faisceau, il suffit que les flèches de spécialisation soient presque toutes des isomorphismes.

7.3. Il nous sera commode de modifier la définition précédente en remplaçant les groupes de Galois par des groupes de Weil. Soit Y un schéma sur $\mathbb{F}_p$. Soient $\overline{\mathbb{F}}_p$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$, et

$$\overline{Y} = Y \otimes_{\mathbb{F}_p} \overline{\mathbb{F}}_p.$$

Un faisceau de Weil, respectivement un faisceau de Weil de A-modules constructible, $\mathcal{G}$ sur Y, est la donnée d'un faisceau, respectivement d'un faisceau de A-modules constructible, $\overline{\mathcal{G}}$ sur $\overline{Y}$, plus une action de Frobenius sur $\overline{\mathcal{G}}$, au-dessus de son action sur $\overline{Y}$.

Remarque inutile. Les faisceaux de Weil en ensembles sur Y forment un topos Y_{Weil}. On peut le décrire comme un 2-produit fibré de topos: identifiant $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p)_{\text{ét}}$ au topos classifiant $B\widehat{\mathbb{Z}}$, on a

$$Y_{\mathrm{Weil}} \simeq \overline{Y}_{\text{ét}} \times_{B\widehat{\mathbb{Z}}} B\mathbb{Z}.$$

Nous appellerons simplement faisceaux les faisceaux de Weil sur Y; les faisceaux sur $Y_{\text{ét}}$ seront appelés faisceaux étales.

7.4. Un faisceau 7.3 de A-modules constructible peut se décrire en termes galoisiens comme en 7.2, en remplaçant partout

$$\mathrm{Gal}(\overline{K}/K), \qquad \mathrm{Gal}(\overline{K}_v/K_v), \qquad \mathrm{Gal}(\overline{k_v}/k_v)$$

par

$$W(\overline{K}/K), \qquad W(\overline{K}_v/K_v), \qquad W(\overline{k_v}/k_v) = \mathbb{Z}.$$

7.5. Soit K_v un corps local non archimédien. On définit un faisceau de Weil sur $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_v)$ en paraphrasant 7.3. Soit $\overline{K}_v$ une clôture séparable de K_v. Il revient au même de se donner un faisceau de Weil de A-modules constructible $\mathcal{G}$ sur $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_v)$, ou de se donner:

a) la fibre $\mathcal{G}_{\overline{K}_v}$, un A-$W(\overline{K}_v/K_v)$-module, de type fini sur A;

b) la fibre $\mathcal{G}_{\overline{k}_v}$, un A-$W(\overline{k}_v/k_v)$-module, de type fini sur A;

c) la flèche de spécialisation $W(\overline{K}_v/K_v)$-équivariante

$$\mathrm{sp}_v : \mathcal{G}_{\overline{k}_v} \longrightarrow \mathcal{G}_{\overline{K}_v}.$$

Soit v une place de K, et posons

$$X_v = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_v).$$

Par restriction, tout faisceau de Weil de A-modules constructible sur X en définit un sur X_v.

Un faisceau est plat si ses fibres sont des A-modules plats.

7.6. Soit K_v un corps local non archimédien. On pose

$$\deg(v) = [k_v : \mathbb{F}_p],$$

et on note ω_v^t le quasi-caractère non ramifié de $W(\overline{K}_v/K_v)$, à valeurs dans $A(t)$, tel que

$$\omega_v^t(F_v) = t^{\deg(v)}.$$

Soit $\mathcal{G}$ un faisceau constructible plat sur $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_v)$. On pose

$$Z(\mathcal{G}_v, t) = \det(1 - F_v t^{\deg(v)}, \mathcal{G}_{\overline{k}_v})^{-1} = \det(1 - F_v, \mathcal{G}_{\overline{K}_v} \otimes \omega_v^t)^{-1}. \tag{7.6.1}$$

Pour p inversible dans A, on définit un conducteur

$$a(\mathcal{G}) = sw(\mathcal{G}_{\overline{K}_v}) + \dim(\mathcal{G}_{\overline{K}_v}) - \dim(\mathcal{G}_{\overline{k}_v}), \tag{7.6.2}$$

un entier si A est local, une fonction localement constante sur $\mathrm{Spec}(A)$ en général.

Supposons que A soit un corps de caractéristique $\neq p$. Soient ψ un caractère additif non trivial de K_v à valeurs dans A^*, et dx une mesure de Haar à valeurs dans A, comme en 6.5. On pose

$$\varepsilon(\mathcal{G}_v, \psi, dx, t) = \varepsilon_0(\mathcal{G}_{\overline{K}_v} \otimes \omega_v^t, \psi, dx)\ \det(-F_v t^{\deg(v)}, \mathcal{G}_{\overline{k}_v})^{-1}. \tag{7.6.3}$$

C'est un monôme. D'après (5.5.2), son degré en t est

$$a(\mathcal{G})\deg(v).$$

Remarque 7.7. Soit M une représentation de $W(\overline{K}_v/K_v)$. En termes galoisiens, on définit des faisceaux $j_!M$ et j_*M sur $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_v)$ par les flèches de spécialisation

$$0 \longrightarrow M, \qquad M^{I_v} \longrightarrow M.$$

Les quantités ε et ε_0 des paragraphes précédents s'identifient à la quantité (7.6.3) relative respectivement à j_*M et à $j_!M$. Au contraire de j_*, le foncteur $j_!$ commute à la réduction modulo ℓ. Ceci peut expliquer pourquoi, au §6, nous n'avons considéré que ε_0.

7.8. Soit $\mathcal{G}$ un faisceau constructible de A-modules plats sur X. Pour chaque place v de K, $\mathcal{G}$ induit un faisceau $\mathcal{G}_v$ sur $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_v)$. On pose

$$Z(\mathcal{G}, t) = \prod_v Z(\mathcal{G}_v, t) \in A[[t]]. \tag{7.8.1}$$

7.9. Supposons que A soit un corps de caractéristique $\neq p$. Il existe sur l'anneau des adèles de K une unique mesure de Haar à valeurs dans $\mathbb{Z}[1/p]$, telle que

$$\int_{\mathbb{A}/K} dx = 1.$$

On peut écrire

$$dx = \bigotimes_v dx_v$$

où dx_v est une mesure de Haar sur K_v, à valeurs dans $\mathbb{Z}[1/p]$, et, pour presque tout v,

$$\int_{\mathcal{O}_v} dx_v = 1.$$

Les dx_v définissent des mesures de Haar à valeurs dans A.

S'il existe un caractère non trivial ψ de $\mathbb{A}/K$, à valeurs dans A^*, on pose

$$\varepsilon(\mathcal{G}, t) = \prod_v \varepsilon(\mathcal{G}_v, \psi_v, dx_v, t). \tag{7.9.1}$$

Presque tous les termes du produit sont égaux à 1, et le produit ne dépend pas du choix de ψ ni de la décomposition choisie de dx.

Soit A' déduit de A par adjonction d'une racine primitive p-ième de 1. Il existe ψ à valeurs dans A'^*. La constante globale correspondante, étant indépendante de ψ, est invariante par $\mathrm{Gal}(A'/A)$, donc dans A. Ceci permet de définir ε même s'il n'existe pas de caractère ψ.

7.10. Notons i l'inclusion de $\mathrm{Spec}(K)$ dans X. Si V est une représentation de $W(\overline{K}/K)$, on note i_*V le faisceau sur X, de fibre en $\overline{K}$ égale à V, et pour lequel les applications de spécialisation sont

$$\mathrm{sp}_v : V^{I_v} \hookrightarrow V.$$

Théorème 7.11. Soit A un corps de caractéristique $\ell \neq p$. Soient $\mathcal{G}$ un faisceau constructible de A-vectoriels, et V la fibre de $\mathcal{G}$ en $\overline{K}$.

(i) $Z(\mathcal{G}, t)$ est une fraction rationnelle en t.

(ii) Pour $t \to \infty$, $Z(\mathcal{G}, t)$ est asymptotique à $\varepsilon(\mathcal{G}, t)$. En d'autres termes,

$$Z(\mathcal{G}, t)/\varepsilon(\mathcal{G}, t)$$

est une série formelle en t^{-1}, de terme constant 1.

(iii)

$$Z(i_*V, t) = \varepsilon(i_*V, t)\, Z(i_*V^*, pt^{-1}).$$

Soit S un ensemble fini de places contenant toutes les places où la représentation V est ramifiée. Soit j l'inclusion de $X-S$ dans X, et soit $j_!V$ le faisceau sur X, de fibre générale V, non ramifié en dehors de S, et de fibre nulle en $v \in S$. On vérifie aussitôt que (i) et (ii) équivalent à

$$Z(j_!V,t) \text{ est fonction rationnelle de } t, \tag{i'}$$

$$\text{pour } t \to \infty, \qquad Z(j_!V,t) \sim \varepsilon(j_!V,t). \tag{ii'}$$

Supposons que $\ell \neq 0$. Pour toute représentation W de $W(\overline{K}/K)$, non ramifiée en dehors de S, et identifiée à un faisceau localement constant sur $X-S$, posons

$$R^0 j_* W = j_* W = i_* W,$$

et $R^1 j_* W$ le faisceau nul en dehors de S, de fibre en $v \in S$ égale à $H^1(I_v, W)$. On pose

$$Z(Rj_*W,t) = Z(R^0 j_* W,t)\, Z(R^1 j_* W,t)^{-1}. \tag{7.11.1}$$

Soit P' le noyau de

$$t_\ell : I_v \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1).$$

Pour toute représentation W de I_v sur A, on a canoniquement

$$H^i(I_v, W) = H^i(I_v/P', W^{P'}). \tag{7.11.2}$$

Pour toute représentation W de $\mathbb{Z}_\ell(1)$, on a canoniquement

$$H^0(\mathbb{Z}_\ell(1), W) = W^{\mathbb{Z}_\ell(1)} \quad \text{(invariants)}, \tag{7.11.3}$$

$$H^1(\mathbb{Z}_\ell(1), W) = W_{\mathbb{Z}_\ell(1)}(-1) \quad \text{(coinvariants tordus)},$$

$$H^i(\mathbb{Z}_\ell(1), W) = 0 \qquad (i \geq 2).$$

Puisque la dualité échange invariants et coinvariants, on a, cf. 2.3:

Lemme 7.11.4. Pour $\ell \neq 0$, $H^0(I_v, W)$ et $H^1(I_v, \omega_1 W^*)$ sont canoniquement en dualité.

Nous n'utiliserons pas que cette dualité peut s'interpréter comme un cup-produit à valeurs dans

$$H^1(I_v, A(1)) = \mathrm{Hom}(I_v, A(1)) \simeq A,$$

engendré par t_ℓ modulo ℓ.

Pour $\ell = 0$, dans le courant de cette démonstration, nous poserons

$$H^1(I_v, W) := H^0(I_v, \omega_1 W^*)^*,$$

et définirons $Z(Rj_*W,t)$ par (7.11.1). Cette définition est justifiée par 7.11.5 et 7.11.6 ci-dessous. Pour W une représentation de $W(\overline{K}_v/K_v)$, nous poserons encore

$$Z_v(Rj_*W,t) = \det(1 - Ft^{\deg(v)}, H^0(I_v,W))^{-1} \det(1 - Ft^{\deg(v)}, H^1(I_v,W)).$$

Soient A un anneau de valuation discrète d'inégale caractéristique $\ell \neq p$, et W un A-module libre sur lequel $W(\overline{K}_v/K_v)$ agit. Soient η le corps des fractions de A, et $s = A/\mathfrak{m}$ le corps résiduel.

Lemme 7.11.5.

$$Z_v(Rj_*W_s,t) = Z_v(Rj_*W_\eta,t) \pmod{\mathfrak{m}}.$$

La démonstration ci-dessous perdra son mystère au §10. Soient

$$P' = \mathrm{Ker}(t_\ell : I \to \mathbb{Z}_\ell(1)),$$

σ un générateur de $\mathbb{Z}_\ell(1)$, F un Frobenius géométrique, et $K^\bullet$ le complexe concentré en degrés 0 et 1:

$$K^\bullet : \quad W^{P'} \xrightarrow{\sigma - 1} W^{P'}.$$

L'endomorphisme

$$\sum_{i=0}^{q-1} \sigma^i$$

de $W^{P'}$ est inversible: il suffit de le voir après réduction modulo l'idéal maximal de A. Après réduction, puisqu'une puissance σ^{ℓ^n} est l'identité, σ est unipotent, et q est l'unique valeur propre de $\sum \sigma^i$.

Soit $\underline{F} = (F_0, F_1)$ l'endomorphisme de $K^\bullet$ de composantes

$$F_0 = F, \qquad F_1 = F \circ \left(\sum_{i=0}^{q-1} \sigma^i \right)^{-1}.$$

La quantité

$$Z = \det(1 - F_0 t^{\deg(v)}, W^{P'})^{-1} \det(1 - F_1 t^{\deg(v)}, W^{P'})$$

est de formation compatible à l'extension des scalaires à η ou à s. Après extension des scalaires à η, respectivement s, on a

$$Z = \det(1 - F t^{\deg(v)}, H^0(K^\bullet))^{-1} \det(1 - F t^{\deg(v)}, H^1(K^\bullet)).$$

On conclut en notant que

$$(H^i(K^\bullet_\eta), H^i(\underline{F})) \simeq (H^i(I_v, W_\eta), F),$$

et

$$(H^i(K^\bullet_s), H^i(\underline{F})) \simeq (H^i(I_v, W_s), F).$$

Variante 7.11.6. Supposons A complet, et soit W un A-module sur lequel $W(\overline{K}_v/K_v)$ agit continûment pour la topologie ℓ-adique, et non plus, comme auparavant, pour la topologie discrète. On pose encore

$$H^1(I_v, W_\eta) = (W_\eta^{P'})_{\mathbb{Z}_\ell(1)}(-1) \quad \text{(coinvariants tordus)},$$

et on définit $Z_v(Rj_*W, t)$ comme auparavant. Le H^1 défini plus haut peut s'interpréter comme un H^1 continu:

$$H^1(I_v, W_\eta) = \varprojlim_n H^1(I_v, W/\ell^n) \otimes_A \eta. \tag{7.11.6.1}$$

La formule de réduction 7.11.5 reste valable, avec la même démonstration.

Lemme 7.11.7. La formule (iii) équivaut à

$$Z(j_!V, t) = \varepsilon(j_!V, t)\, Z(Rj_*V, pt^{-1}). \tag{7.11.8}$$

Le lemme 7.11.7 résulte de l'identité locale

$$\det(1 - F_v t^{\deg(v)}, H^0(I_v, V))^{-1} = \det(-F_v t^{\deg(v)}, H^0(I_v, V))^{-1} \det(1 - F_v (pt^{-1})^{\deg(v)}, H^1(I_v, V^*))^{-1}.$$

Si on remplace V par la représentation $V \otimes \omega^t$ de $W(\overline{K}_v/K_v)$ sur $A((t))$, cette formule se simplifie en

$$\det(1 - F_v^{-1}, H^0(I_v, V)) = \det(-F_v, H^0(I_v, V))\ \det(1 - F_v, H^1(I_v, \omega_1 \otimes V^*)),$$

qui résulte de la dualité locale 7.11.4.

Prouvons 7.11. Si $A = \mathbb{C}$, le produit infini $Z(j_*V, t)$ converge pour $|t|$ assez petit, et

$$L(V, s) = Z(j_*V, q^{-s}).$$

Ainsi Z est une fonction méromorphe de t; l'équation fonctionnelle montre qu'elle est à croissance modérée pour $t \to \infty$, donc une fonction rationnelle de t. L'équation fonctionnelle de la fonction L fournit (iii).

Les énoncés (i) et (iii) sont purement algébriques. Étant vrais pour $A = \mathbb{C}$, ainsi que (i') et (7.11.8), ils restent vrais pour A de caractéristique 0. Supposons maintenant A de caractéristique $\ell \neq 0$.

Soit J un sous-groupe ouvert distingué de $W(\overline{K}/K)$, contenant I_v pour $v \in S$. Si une représentation V de $W(\overline{K}/K)/J$ sur A se relève en caractéristique 0, les assertions (i') et (7.11.8) pour V s'obtiennent par réduction modulo ℓ, compte tenu, pour (7.11.8), de 7.11.5. Les quantités

$$Z(j_!V,t), \qquad Z(Rj_*V,t), \qquad \varepsilon(j_!V,t)$$

dépendent additivement de V, une extension donnant un produit. Pour obtenir (i) et (7.11.8) en général, il suffit donc de savoir que, après extension des scalaires, toute représentation de $W(\overline{K}/K)/J$ se relève virtuellement en caractéristique 0. La méthode de 4.10, cf. 4.10.3, ramène cette question au cas des groupes finis, c'est-à-dire au théorème de Brauer.

L'énoncé (ii') résulte de (7.11.8) et de ce que, pour $t = 0$, $Z = 1$.

Proposition 7.12. Si A est un corps de caractéristique p, et $\mathcal{G}$ un faisceau constructible de A-vectoriels, $Z(\mathcal{G},t)$ est encore une fraction rationnelle en t.

Dans la démonstration de 7.11(i), nous n'avons en effet pas fait usage de l'hypothèse $\ell \neq p$.

8. Représentations ℓ-adiques des groupes de Weil locaux non archimédiens; structures de Hodge et groupes de Weil locaux archimédiens

8.1. Soit K un corps local non archimédien. Nous utiliserons les notations 2.1 et 2.2.

Soient ℓ un nombre premier $\neq p$, et E_λ une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$; on pourrait prendre pour E_λ, plus généralement, un corps valué extension de $\mathbb{Q}_\ell$. Une représentation λ-adique V de $W(\overline{K}/K)$ est une représentation continue pour la topologie λ-adique

$$\rho : W(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$$

de $W(\overline{K}/K)$ sur un E_λ-vectoriel de dimension finie.

Le résultat suivant est démontré dans [13].

Théorème 8.2 (Grothendieck). Soit (V,ρ) une représentation λ-adique de $W(\overline{K}/K)$. Il existe

$$N \in \mathrm{End}(V)(-1),$$

nilpotent, tel que, pour σ dans un sous-groupe d'indice fini de I, on ait

$$\rho(\sigma) = \exp(N\, t_\ell(\sigma)).$$

Ce $N \in \mathrm{End}(V)(-1)$ est unique, donc invariant par Galois; pour $w \in W(\overline{K}/K)$, on a

$$\rho(w) N \rho(w)^{-1} = q^{v'(w)} N.$$

Nous allons utiliser 8.2 pour décrire les représentations λ-adiques de $W(\overline{K}/K)$ en termes indépendants de la topologie de E_λ. Ce sera fait deux fois: 8.3 est plus intrinsèque, et 8.4, qui nous suffit, plus élémentaire.

8.3.1. À isomorphisme unique près, il existe un et un seul groupe algébrique G sur $\mathbb{Q}_\ell$, isomorphe à $\mathbb{G}_a$, et muni d'un isomorphisme

$$\mathbb{Q}_\ell(1) \xrightarrow{\sim} G(\mathbb{Q}_\ell).$$

On le note $\mathbb{G}_a(1)$.

8.3.2. Soit $J \subset I$ un sous-groupe invariant ouvert de $W(\overline{K}/K)$, et soit

$$J' = J \cap \mathrm{Ker}(t_\ell).$$

Le quotient $W(\overline{K}/K)/J'$ est une extension du groupe discret $W(\overline{K}/K)/J$ par J/J'. En appliquant à cette extension

$$t_\ell : J/J' \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell(1) \longrightarrow \mathbb{G}_a(1),$$

on obtient une extension W_J^ℓ de $W(\overline{K}/K)/J$ par $\mathbb{G}_a(1)$, voir Serre [12], II, 1.3:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & J/J' & \longrightarrow & W(\overline{K}/K)/J' & \longrightarrow & W(\overline{K}/K)/J & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle t_\ell} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{G}_a(1) & \longrightarrow & W_J^\ell & \longrightarrow & W(\overline{K}/K)/J & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

8.3.3. Les W_J^ℓ forment un système projectif, et 8.2 signifie que toute représentation λ-adique de $W(\overline{K}/K)$ se factorise par une représentation algébrique d'un W_J^ℓ, c'est-à-dire par une représentation du schéma en groupes

$$W^\ell(\overline{K}/K) = \varprojlim_J W_J^\ell.$$

8.3.4. Soient I_J^ℓ l'image réciproque de $I/J \subset W(\overline{K}/K)/J$, et

$$I^\ell = \varprojlim_J I_J^\ell.$$

Associons à $\bar{\sigma} \in I/J$, image de $\sigma \in I$, l'élément $\alpha(\sigma)\, t(-t_\ell(\sigma))$ de W_J^ℓ. Cette section définit des scindages

$$I_J^\ell = \mathbb{G}_a(1) \times I/J, \qquad I^\ell = \mathbb{G}_a(1) \times I.$$

On a un diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & W(\overline{K}/K) & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & I \times \mathbb{G}_a(1) & \longrightarrow & W^\ell(\overline{K}/K) & \longrightarrow & \mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathbb{G}_a(1) & \longrightarrow & \mathbb{G}_a(1) & & & & \end{array}$$

8.3.5. Soit ${}'W^\ell$ le produit semi-direct de $W(\overline{K}/K)$ par $\mathbb{G}_a(1)$, sur lequel $W(\overline{K}/K)$ agit par

$$wxw^{-1} = q^{v'(w)}x.$$

Il existe des isomorphismes β entre $W^\ell(\overline{K}/K)$ et ${}'W^\ell(\overline{K}/K)$ qui rendent commutatif

$$\begin{array}{ccccc} I \times \mathbb{G}_a(1) & \longrightarrow & W^\ell(\overline{K}/K) & \longrightarrow & W(\overline{K}/K) \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \| \\ I \times \mathbb{G}_a(1) & \longrightarrow & {}'W^\ell(\overline{K}/K) & \longrightarrow & W(\overline{K}/K), \end{array}$$

et on vérifie facilement que deux quelconques sont conjugués par un élément de $\mathbb{G}_a(1)(\mathbb{Q}_\ell)$. L'indétermination est dans le choix d'un relèvement d'un Frobenius $F \in W(\overline{K}/K)$, et on utilise que $q - 1 \neq 0$; voir 8.4.3 ci-dessous.

8.3.6. Soit ${}'W$ le schéma en groupes sur $\mathbb{Q}$, produit semi-direct de $W(\overline{K}/K)$ par $\mathbb{G}_a$, sur lequel $W(\overline{K}/K)$ agit par

$$wxw^{-1} = q^{v'(w)}x.$$

Chaque isomorphisme

$$\mathbb{G}_a \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a(1), \qquad \text{c'est-à-dire } \mathbb{Q}_\ell \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_\ell(1),$$

définit un isomorphisme

$${}'W_{\mathbb{Q}_\ell} \xrightarrow{\sim} {}'W^\ell,$$

d'où une classe de tels automorphismes modulo $\mathbb{Q}_\ell^*$ agissant sur ${}'W^\ell$ via son action sur $\mathbb{G}_a(1)$. On vérifie, voir 8.4.3 ci-dessous, que ce groupe d'automorphismes agit trivialement sur l'ensemble des classes d'isomorphisme de représentations de ${}'W^\ell$. Au total, on a obtenu que:

(8.3.7). Les classes d'isomorphie de représentations λ-adiques de $W(\overline{K}/K)$ sont en correspondance bijective naturelle avec les classes d'isomorphie de représentations sur E_λ du schéma en groupes sur $\mathbb{Q}$, ${}'W$.

Définition 8.4.1. Soit E un corps de caractéristique 0. Une représentation de $'W(\overline{K}/K)$ sur E est un couple

$$\rho = (\rho', N')$$

consistant en:

(a) une représentation de dimension finie

$$\rho' : W(\overline{K}/K) \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$$

de $W(\overline{K}/K)$ sur E;

(b) un endomorphisme nilpotent N' de V, tel que

$$\rho'(w)N'\rho'(w)^{-1} = q^{v'(w)}N'. \tag{8.4.1.1}$$

8.4.2. Choisissons un Frobenius géométrique $F \in W(\overline{K}/K)$ et un isomorphisme

$$\tau : \mathbb{Q}_\ell(1) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Q}_\ell.$$

On associe comme suit une représentation (ρ', N') de $'W(\overline{K}/K)$ sur E_λ à une représentation λ-adique (V, ρ) de $W(\overline{K}/K)$:

(a) Pour $\sigma \in I$, on pose, N étant défini par 8.2,

$$\rho'(F^n\sigma) = \rho(F^n\sigma)\exp(-t_\ell(\sigma)N).$$

(b) $N' \in \mathrm{End}(V)$ correspond à N, via τ.

Lemme 8.4.3. La classe d'isomorphie de (ρ', N') ne dépend que de ρ, non des choix de F et τ.

Changeons F en $F\varpi$, pour obtenir (ρ'', N'). On a

$$\rho''(F^n\sigma) = \exp(n\, t_\ell(\varpi)N)\, \rho'(F^n\sigma) = A\, \rho'(F^n\sigma)\, A^{-1},$$

avec

$$A = \exp((1-q^{-1})^{-1}t_\ell(\varpi)N).$$

Changer τ en $a\tau$ change (ρ', N') en (ρ', aN'). Nous montrerons que, pour toute représentation (ρ', N') de $'W(\overline{K}/K)$ sur un corps E, et tout $a \in E^\times$,

$$(\rho', N') \simeq (\rho', aN').$$

Soient $I' = \mathrm{Ker}(\rho')$, et n tel que F^n soit central dans W/I', par exemple le cardinal de $\mathrm{Aut}(I/I')$. Pour α une classe de conjugaison dans une clôture algébrique de E, soit V^α le plus grand sous-espace de V, stable par F^n, tel que les valeurs propres de $F^n|V^\alpha$ soient dans α.

On vérifie que:

(a) V^α est stable sous $\rho'(W(\overline{K}/K))$, et $V = \bigoplus V^\alpha$;

(b) $N'V^\alpha \subset V^{q^{-n}\alpha}$.

Si A est la transformation linéaire laissant stables les V^α, et telle que

$$A|_{V^\alpha} = \lambda(\alpha),$$

avec

$$\lambda(q^{-n}\alpha) = a\,\lambda(\alpha),$$

on a donc

$$A(\rho', N')A^{-1} = (\rho', aN').$$

De 8.4.3 on déduit aussitôt la conclusion 8.3.7.

8.5. Soit (ρ', N') une représentation de $'W(\overline{K}/K)$ sur E. Soit u la composante unipotente de $\rho'(F)$:

$$\rho'(F) = \rho'(F)^{ss}\, u.$$

Puisque $N' \in \mathrm{End}(V)$ est un vecteur propre pour l'action par conjugaison de $\rho'(F)$, u et N' commutent. Puisqu'une puissance de F est centrale dans $\mathrm{im}(\rho')$, une puissance de u, donc u, centralise $\mathrm{im}(\rho')$. Si

$$w_1, w_2 \in W(\overline{K}/K) - I,$$

$\rho'(w_1)$ et $\rho'(w_2)$ ont une puissance commune. On en déduit que u^n est la composante unipotente de $\rho'(F^n\sigma)$, pour $\sigma \in I$, et, pour $n \neq 0$, aussi celle de

$$\rho'(F^n\sigma)\exp(aN'),$$

qui en est le conjugué par

$$\exp((1-q^{-n})^{-1}aN').$$

Posons

$$\rho'^{ss}(F^n\sigma) = \rho'(F^n\sigma)u^{-n}. \tag{8.5.1}$$

Définition 8.6.

(i) (ρ'^{ss}, N') est la F-semi-simplifiée de (ρ', N').

(ii) On dit que (ρ', N') est F-semi-simple si $\rho' = \rho'^{ss}$, c'est-à-dire si, pour un, respectivement pour tout,

$$w \in W(\overline{K}/K) - I,$$

et un, respectivement tout, $a \in E$,

$$\rho'(w)\exp(aN')$$

est semi-simple.

Pour une représentation λ-adique, on définit encore sa F-semi-simplifiée par (8.5.1), et la F-semi-simplicité comme en (ii).

8.7. Le formalisme 8.3 ou 8.4 permet de comparer des représentations λ-adiques pour différents corps E_λ. Pour ce faire, introduisons la terminologie classique suivante.

Soient F une extension de E, et ρ une représentation de $'W(\overline{K}/K)$ sur F. On dit que ρ est *définie sur* E si, pour toute, ou pour une, extension algébriquement close $\overline{F}$ de F, $\rho_{\overline{F}}$ est isomorphe à ses conjuguées sous $\mathrm{Aut}(\overline{F}/E)$.

Soient F_1 et F_2 deux extensions de E, et ρ_i une représentation de $'W(\overline{K}/K)$ sur F_i. On dit que ρ_1 et ρ_2 sont compatibles si elles sont définies sur E et si, pour une extension algébriquement close commune

$$F \supset F_1, F_2 \supset E,$$

les représentations $(\rho_1)_F$ et $(\rho_2)_F$ sont isomorphes.

Définition 8.8. Soient E un corps de nombres, λ_1 et λ_2 deux places finies de E ne divisant pas p, et ρ_1, ρ_2 des représentations λ_1- et λ_2-adiques de $W(\overline{K}/K)$. On dit que ρ_1 et ρ_2 sont compatibles si les représentations correspondantes de $'W(\overline{K}/K)$ le sont au sens de 8.7.

On laisse au lecteur la vérification du plaisant exercice suivant.

Proposition 8.9. Supposons (V_1, ρ_1) et (V_2, ρ_2) F-semi-simples, et notons N_i l'opérateur de monodromie associé à (V_i, ρ_i). Soit W l'unique filtration finie croissante de V_i telle que

$$N_i W^k \subset W^{k-2}$$

et que N_i^j induise un isomorphisme

$$\mathrm{Gr}_W^j(V_i) \xrightarrow{N_i^j} \mathrm{Gr}_W^{-j}(V_i).$$

Pour que ρ_1 et ρ_2 soient compatibles, il faut et il suffit que les caractères des représentations de $W(\overline{K}/K)$ sur les $\mathrm{Gr}_W^j(V_1)$ et $\mathrm{Gr}_W^j(V_2)$ soient à valeurs dans E et respectivement égaux.

Exemple 8.10 On fait $E = \mathbb{Q}$. Soit A une variété abélienne sur K. Les représentations de

$$W(\overline{K}/K) \subset \mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$$

sur les

$$V_\ell(A) = T_\ell(A) \otimes \mathbb{Q}_\ell$$

sont F-semi-simples et compatibles.

Variante 8.11. Soit G un groupe algébrique linéaire sur E, de caractéristique 0. Une représentation de $'W$ dans G, sur E, est un couple (ρ', N') où

$$\rho' : W(\overline{K}/K) \longrightarrow G(E)$$

est trivial sur un sous-groupe ouvert, et $N' \in \mathrm{Lie}(G)$, la relation (8.4.1.1) étant vérifiée. Pour $E = E_\lambda$, les formules (8.4.2) associent une représentation de $'W$ dans G à toute représentation continue, pour la topologie λ-adique,

$$\rho : W \longrightarrow G(E_\lambda).$$

Sa classe d'isomorphie géométrique, après extension des scalaires à $\overline{E}_\lambda$, ne dépend pas des choix arbitraires faits: la première partie de la démonstration 8.4.3 s'applique encore; il reste à montrer que

$$(\rho', N') \simeq (\rho', aN').$$

Pour ce faire, on note que le sous-groupe algébrique H de G qui centralise $\mathrm{im}(\rho')$ et envoie N' sur un multiple contient un $\rho'(F^m)$, donc un élément g tel que

$$\mathrm{ad}(g)(N') = q^m N'.$$

Le caractère $\chi : H \to \mathbb{G}_m$ donnant l'action sur N' ne peut donc qu'être surjectif.

Si G est défini sur un corps de nombres E, on définit la compatibilité de représentations λ-adiques

$$W(\overline{K}/K) \longrightarrow G(E_\lambda)$$

comme en 8.7 et 8.8. Le sorite 8.5, 8.6 se généralise tel quel.

8.12. Facteurs locaux. Soit (ρ', N') une représentation de $'W(\overline{K}/K)$ sur un E-vectoriel V. Par abus de notation, on pose

$$V^I = \mathrm{Ker}(N')^{\rho'(I)};$$

c'est une représentation de $W(\overline{k}/k)$. On définit un conducteur, un facteur L local et des constantes locales par les formules

$$a(V) = sw(V, \rho') + \dim V - \dim V^I, \tag{8.12.1}$$

$$Z(V, t) = \det(1 - Ft^d, V^I)^{-1}, \tag{8.12.2}$$

$$\varepsilon_0(V, t) = \varepsilon_0(\rho', t), \tag{8.12.3}$$

$$\varepsilon(V, t) = \varepsilon_0(\rho', t)\ \det(-Ft, V^I)^{-1}. \tag{8.12.4}$$

Pour (ρ', N') définis par une représentation λ-adique ρ sur V, on a

$$V^I = V^{\rho(I)}, \qquad Z(V, t) = \det(1 - Ft, V^{\rho(I)})^{-1},$$

et

$$\varepsilon_0(V, t) = \varepsilon_0(\text{semi-simplifiée de } V, t).$$

Le cas archimédien. Dans le cas non archimédien, ce que fournit la géométrie, c'est-à-dire la cohomologie ℓ-adique, ce sont des représentations λ-adiques, donc des représentations de $'W(\overline{K}/K)$, non des représentations de $W(\overline{K}/K)$.

Dans le cas archimédien, de même, la géométrie fournit non des représentations de $W(\overline{K}/K)$, mais des structures de Hodge. Voici la règle à utiliser pour passer des structures de Hodge aux représentations.

(A) K complexe. La géométrie fournit des vectoriels V sur K, munis d'une bigraduation de Hodge

$$V = \bigoplus V^{pq}$$

(par exemple, pour X une variété algébrique sur K, $H^n(X, K)$ est muni d'une telle décomposition). On en déduit une représentation semi-simple ρ de

$$W(\overline{K}/K) = K^*$$

sur V en posant

$$\rho(z)v^{pq} = z^{-p}\overline{z}^{-q}v^{pq} \qquad (v^{pq} \in V^{pq}).$$

(B) K réel. La géométrie fournit des vectoriels V sur $\overline{K}$, munis d'une bigraduation de Hodge

$$V = \bigoplus V^{pq}$$

et d'une involution F_∞ telle que

$$F_\infty(V^{pq}) = V^{qp}.$$

Par exemple, pour X une variété algébrique sur K, $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ agit sur $X(\overline{K})$ et $H^n(X(\overline{K}), \overline{K})$ est muni d'une telle structure. On en déduit une représentation semi-simple ρ de $W(\overline{K}/K)$ sur V en posant

$$\rho(z)v^{pq} = z^{-p}\overline{z}^{-q}v^{pq} \qquad (z \in \overline{K}^* \subset W(\overline{K}/K),\ v^{pq} \in V^{pq}),$$

et

$$\rho(F)v^{pq} = i^{p+q}F_\infty(v^{pq}).$$

Ces formules diffèrent de celles de [3], 1.12, défigurée en outre par une faute d'impression p. 21, 12, parce qu'aux places finies j'utilisais dans loc. cit. l'inverse de l'isomorphisme de la théorie du corps de classe local utilisé ici.

Aux places finies,

$$H^2(\mathbb{P}^1, \mathbb{Q}_\ell) \simeq \mathbb{Q}_\ell(1)$$

correspond au quasi-caractère ω_1. De même,

$$H_2(\mathbb{P}^1(\overline{K}), \overline{K}),$$

structure de Hodge de type $(-1, -1)$, avec $F_\infty = -1$ si $K = \mathbb{R}$, correspond au quasi-caractère ω_1 de $W(\overline{K}/K)$.

9. Systèmes compatibles de représentations ℓ-adiques

Pour simplifier l'exposé, nous ne considérerons dans ce paragraphe que des représentations de groupes de Galois, plutôt que des représentations de groupes de Weil. Comme en 7.1, on note X une courbe projective et lisse sur $\mathbb{F}_p$, irréductible sur $\mathbb{F}_p$, de corps de fonctions K.

9.1. Soit E_λ un corps local, extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$, avec $\ell \neq p$. Soit W une représentation λ-adique de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$, c'est-à-dire une représentation continue, pour la topologie de E_λ, et presque partout non ramifiée de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ dans un vectoriel de dimension finie sur E_λ. Le groupe de Galois étant compact, il existe dans W un réseau invariant W^0, un réseau étant un sous-$\mathcal{O}_\lambda$-module libre de W tel que $E_\lambda W^0 = W$. Les facteurs locaux

$$Z_v(W, t) = \det(1 - F_v t^{\deg(v)}, W_v^{I_v})^{-1}$$

sont donc dans $\mathcal{O}_\lambda[[t]]$, ainsi que leur produit $Z(W, t)$. Soit $\mathrm{Gal}^0(\overline{K}/K)$ le noyau de l'application de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ dans $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$. D'après un théorème de Grothendieck, $Z(W, t)$ est une fraction rationnelle; c'est même un polynôme si

$$W^{\mathrm{Gal}^0(\overline{K}/K)} = W_{\mathrm{Gal}^0(\overline{K}/K)} = 0,$$

et il vérifie une équation fonctionnelle

$$Z(W,t) = \varepsilon_{\mathrm{Gr}}(W,t) Z(W^* \omega_1, t^{-1}), \tag{9.1.1}$$

où $\varepsilon_{\mathrm{Gr}}$ est un monôme de degré

$$\sum_v \deg(v)\, a(i_* W_v)$$

(8.12.1). Le lecteur trouvera au §10 un résumé de la théorie de Grothendieck.

9.2. Soient E un corps de nombres, $\mathcal{L}$ un ensemble infini de places finies ne divisant pas p de E, et $\mathcal{O} \subset E$ l'anneau des éléments de E λ-entiers pour tout $\lambda \in \mathcal{L}$. On désigne encore par λ l'idéal premier de $\mathcal{O}$ défini par λ. Supposons donnée, pour chaque $\lambda \in \mathcal{L}$, une représentation λ-adique V_λ de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$. On suppose que, pour toute place v de K, les représentations λ-adiques $V_{\lambda v}$ de $W(\overline{K}_v/K_v)$ soient compatibles, au sens strict (8.8). Il nous suffirait en fait de savoir que leurs F-semi-simplifiées (8.6) sont compatibles, cf. aussi 9.8. La fraction rationnelle

$$Z(V_\lambda, t) \in \mathcal{O}(t)$$

et la constante, c'est-à-dire le monôme,

$$\varepsilon_\lambda(V,t) = \prod_v \varepsilon(V_{\lambda v}, \psi_v, dx_v, t) \in \mathcal{O}(t)$$

sont donc indépendantes de λ; comme d'habitude, les ψ_v sont les composantes d'un caractère non trivial de $\mathbb{A}/K$, et $\otimes dx_v$ est une mesure de Tamagawa. On note ces fonction et constante

$$Z(V,t), \qquad \varepsilon(V,t).$$

Théorème 9.3. Sous les hypothèses précédentes,

$$Z(V,t) = \varepsilon(V,t) Z(V^*, pt^{-1}). \tag{9.3.1}$$

Puisque $\mathcal{L}$ est infini, l'application

$$\mathcal{O} \longrightarrow \prod_{\lambda \in \mathcal{L}} \mathcal{O}/\lambda$$

est injective: il suffit de prouver 9.3.1 après réduction modulo λ, pour tout $\lambda \in \mathcal{L}$. Nous allons pour cela mettre 9.3.1 sous une forme compatible à la réduction modulo λ, et justifiable, modulo λ, par (7.11.8).

Soient S un ensemble fini de places de K, contenant toutes les places où V se ramifie, et j l'inclusion de $X - S$ dans X. Pour toute représentation λ-adique W, non ramifiée en dehors de S, nous poserons

$$Z(j,W,t) = \prod_{v \notin S} \det(1 - F_v t^{\deg(v)}, W_v)^{-1},$$

$$Z(Rj_*W,t) = \prod_v \det(1 - F_v t^{\deg(v)}, W_v^{I_v})^{-1} \Big/ \prod_{v \in S} \det(1 - F_v t^{\deg(v)}, W_{v,I_v}(-1))^{-1},$$

$$\varepsilon(j,W,t) = \prod_{v \notin S} \varepsilon(W_v, \psi_v, dx_v, t) \prod_{v \in S} \varepsilon_0(W_v, \psi_v, dx_v, t).$$

Un calcul facile, déjà fait en 7.11.7, montre que (9.3.1) équivaut à

$$Z(j,W,t) = \varepsilon(j,W,t) Z(Rj_*W,t). \tag{9.3.2}$$

On conclut par 7.11.6 et 7.11.8.

Stabilité 9.4. Soient F une extension de E et $\mathcal{L}_F$ l'image réciproque de $\mathcal{L}$. Un système compatible de représentations λ-adiques, $\lambda \in \mathcal{L}$, définit par extension des scalaires un système compatible de représentations λ-adiques, $\lambda \in \mathcal{L}_F$. Si χ est un caractère du groupe des classes d'idèles, à valeurs dans les racines de l'unité de F, les $V_\lambda \chi$ forment encore un système compatible, justiciable de 9.3.

Corollaire 9.5. Soit χ un caractère du groupe des classes d'idèles, à valeurs dans les racines de l'unité d'une extension finie de E (cf. 9.4). Soient $S(\chi)$, respectivement $S(V)$, l'ensemble des places de K où χ, respectivement V, se ramifie. Supposons que

$$S(V) \cap S(\chi) = \varnothing.$$

On a

$$\varepsilon\big((V - \dim V[1])([\chi] - [1]), t\big)$$

égal, par définition, à

$$\varepsilon(V\chi, t)\varepsilon(V, t)^{-1}\varepsilon(\chi, t)^{-\dim V}\varepsilon([1], t)^{\dim V}$$

et donc à

$$\prod_{v \in S(V)} \chi_v(\pi_v^{a(V_v)}) \cdot \prod_{v \in S(\chi)} \det V_v(\pi_v^{a(\chi_v)}).$$

C'est un corollaire de 5.5.3.

Exemple 9.6. Pour $E = \mathbb{Q}$ et $\mathcal{L}$ l'ensemble des nombres premiers autres que p, si F est une courbe elliptique sur K, les $H^1(F, \mathbb{Q}_\ell)$ forment un système compatible de représentations ℓ-adiques. Si l'invariant modulaire j n'est pas constant, alors, pour tout caractère χ comme en 9.5, les fractions rationnelles $Z(F\chi, t)$ correspondantes sont des polynômes et vérifient 9.5.

9.7. On renvoie à Weil [16] pour la relation que 9.5 implique, lorsque $\dim(V) = 2$, entre $Z(V, t)$ et les «formes modulaires» sur $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})/\mathrm{GL}(2, K)$. Le cas le plus intéressant est fourni par 9.6.

On obtient des résultats plus précis en invoquant Jacquet–Langlands. Soit par exemple E une courbe elliptique sur K, d'invariant modulaire non constant. D'après le dictionnaire de Langlands, voir [4], §3, pour chaque place v de K, la représentation de

$$\mathrm{Gal}(\overline{K}_v/K_v) \simeq W(\overline{K}_v/K_v)$$

sur $H^1(E, \mathbb{Q}_\ell)$ définit une représentation admissible irréductible π_v de $\mathrm{GL}_2(K_v)$. Les représentations $H^1(E, \mathbb{Q}_\ell)$, pour ℓ variable, étant compatibles, π_v peut être défini sur $\mathbb{Q}$ et est indépendant de ℓ. Nous considérerons la représentation complexe correspondante. La représentation π_v est de dimension infinie, de poids 2, c'est-à-dire que le centre K_v^* de $\mathrm{GL}(2, K_v)$ agit par ω_2, et a presque toujours un vecteur $\mathrm{GL}(2, \mathcal{O}_v)$-invariant. D'après 9.3, 9.6 et [8], 11.5, le produit tensoriel restreint

$$\pi(E) = \bigotimes_v \pi_v$$

figure comme facteur direct dans la représentation admissible

$$L^0_{\omega_2}\big(\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})/\mathrm{GL}(2, K)\big)$$

de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$ dans l'espace des fonctions localement constantes sur $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})/\mathrm{GL}(2, K)$, se transformant sous l'action du centre par le quasi-caractère ω_2, à support compact modulo le centre et cuspidales.

Théorème 9.8. Soient λ, μ des places de E, et V_λ, V_μ des représentations λ- et μ-adiques de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$. Soit S un ensemble fini de places de K, et supposons que, pour $v \notin S$, les semi-simplifiées de $V_{\lambda v}$ et $V_{\mu v}$ soient compatibles. Alors, pour toute place v, les semi-simplifiées de $V_{\lambda v}$ et $V_{\mu v}$ sont compatibles.

Si S est pris assez grand pour contenir toutes les places ramifiées pour V_λ ou V_μ, l'hypothèse se réduit à:

$(*)$ pour $v \notin S$, les polynômes caractéristiques de F_v agissant dans $V_{\lambda v}$ et $V_{\mu v}$

sont dans $E[t]$ et égaux.

Le théorème 9.8 est donc une réponse partielle, dans le cas le moins intéressant des corps de fonctions, à la question 1 de Serre [12], I, 12.

On prendra garde aux points suivants.

(a) La conclusion porte seulement sur les semi-simplifiées des représentations locales, non sur leur F-semi-simplifiée. En d'autres termes, avec les notations de 8.4.2, on considère seulement la semi-simplifiée de ρ', et non N.

(b) Pour $\lambda = \mu$, $V_\lambda = V_\mu$, le théorème affirme que les semi-simplifiées des représentations locales $V_{\lambda v}$ de $W(\overline{K}_v/K_v)$ sont définies sur E, c'est-à-dire ont un caractère à valeurs dans E.

On peut supposer, et on suppose, que S contient toutes les places où I_v agit via un groupe infini. Pour $v \notin S$, il n'y a dès lors plus à distinguer entre semi-simplifiée de $V_{\lambda v}$ et F-semi-simplifiée.

Appliquons le théorème de Grothendieck rappelé en 9.1:

$$Z(V_\lambda, t) = \varepsilon_{\mathrm{Gr}}(V_\lambda, t) Z(V_\lambda^* \omega_1, t^{-1}).$$

Cette identité se récrit

$$\prod_{v \in S} Z_v(V_\lambda, t) \prod_{v \in S} Z_v(V_\lambda^*, t^{-1})^{-1} = \varepsilon_{\mathrm{Gr}} \frac{\prod_{v \in S} Z_v(V_\lambda^* \omega_1, t^{-1})}{\prod_{v \in S} Z_v(V_\lambda \omega_1, t)}.$$

Le premier membre est dans $E(T)$, et de même pour V_μ. Le second membre est donc dans $E(T)$, indépendant de λ. Décomposant le second membre en le produit d'un monôme et d'une fraction rationnelle valant 1 en $t = 0$, on trouve par le calcul local de 7.11.7 que

$$\prod_{v \in S} \frac{\det(1 - F_v t^{\deg(v)}, V_{\lambda v}^{I_v})}{\det(1 - F_v t^{\deg(v)}, V_{\lambda v, I_v}(-1))}$$

est le même pour V_λ et V_μ. Les facteurs de ce produit sont additifs en $V_{\lambda v}$, une extension donnant un produit, ce qui résulte de (7.11.6.1); ce sont donc les mêmes pour $V_{\lambda v}$ et sa semi-simplifiée $V_{\lambda v}^{ss}$. Pour celle-ci, invariants de I_v et coinvariants de I_v sont pareils, et on trouve que

$$\prod_{v \in S} \frac{\det(1 - F_v t^{\deg(v)}, V_{\lambda v}^{ss, I_v})}{\det(1 - F_v (pt)^{\deg(v)}, V_{\lambda v}^{ss, I_v})} \tag{9.8.1}$$

est le même pour V_λ et V_μ.

Soit $v_0 \in S$, et tordons V_λ et V_μ par un caractère χ du groupe des classes d'idèles non ramifié en v_0 et très ramifié en les $v \in S$ autres que v_0; χ est à valeurs dans une extension de E, et, pour l'existence, cf. 4.14. Les hypothèses faites sur (V_λ, V_μ) sont stables par torsion. Pour χ convenable, après torsion, les facteurs de 9.8.1 relatifs aux $v \neq v_0$ deviennent 1. Celui relatif à v_0 subit une modification triviale, qui se lit sur $\chi(F_v)$. Posons

$$P_{\lambda v}(T) = \det(1 - F_v T, (V_{\lambda v}^{ss})^{I_v}).$$

Appliquant l'invariance de (9.8.1) à $(V_\lambda \chi, V_\mu \chi)$, on trouve que, pour chaque $v \in S$, on a, dans $E(T)$,

$$\frac{P_{\lambda v}(T)}{P_{\lambda v}(qT)} = \frac{P_{\mu v}(T)}{P_{\mu v}(qT)}. \tag{9.8.2}$$

La transformation qui, à une fraction rationnelle R valant 1 en 0, associe

$$R_q(T) = \frac{R(T)}{R(qT)}$$

est injective: pour les diviseurs, on a

$$\mathrm{div}(R) = \lim_N \mathrm{div} \left(\prod_0^N R_q(q^i T) \right)$$

(limite simple). De 9.8.2, on déduit donc que $P_{\lambda v}(T) \in E[T]$ et que

$$P_{\lambda v}(T) = P_{\mu v}(T). \tag{9.8.3}$$

Les hypothèses faites sur V_λ et V_μ sont respectées par passage de K à une extension finie K', en remplaçant S par son image réciproque. Toute extension finie locale K'_v/K_v étant induite par une extension globale, car $\mathrm{Gal}(\overline{K}_v/K_v)$ est un sous-groupe fermé de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$, on trouve que 9.8.3 vaut aussi pour les représentations de

$W(\overline{K}_v/K'_v)$ définies par V_λ et V_μ. Prenant pour K'_v les diverses extensions telles que les semi-simplifiées de ces représentations soient non ramifiées, on trouve que, pour tout $F \in W(\overline{K}_v/K_v)$, $F \notin I_v$, on a

$$\det(1 - F_v t, V_\lambda) = \det(1 - F_v t, V_\mu).$$

En dehors de I_v, les caractères des représentations V_λ et V_μ coïncident donc.

Les mêmes arguments, où on ne retient de 9.8.3 que l'égalité des degrés, donnent que, pour tout sous-groupe ouvert J de I_v et tout caractère χ de J,

$$\dim\big((V_{\lambda v}^{ss} \otimes \chi)^J\big) = \dim\big((V_{\mu v}^{ss} \otimes \chi)^J\big).$$

D'après le théorème de Brauer, ceci implique que

$$V_{\lambda v}^{ss}|_{I_v} \quad \text{et} \quad V_{\mu v}^{ss}|_{I_v}$$

ont même caractère. Les caractères de V_λ et V_μ coïncident donc sur tout $W(\overline{K}_v/K_v)$, et ceci achève la démonstration.

Proposition 9.9. Soit $(V_\lambda)_{\lambda\in\mathcal{L}}$ un système infini de représentations λ-adiques. On suppose que, pour toute, ou presque toute par 9.8, place v de K, les semi-simplifiées des $V_{\lambda v}$ sont compatibles. Alors, pour chaque λ,

$$Z_\lambda(V,t) = \varepsilon_\lambda(V,t) Z_\lambda(V^*, pt^{-1}). \tag{9.9.1}$$

Posons

$$Z_\lambda^{ss}(V,t) = \prod_v \det(1 - F_v t^{\deg(v)}, (V_{\lambda v}^{ss})^{I_v})^{-1},$$

$$\varepsilon_\lambda^{ss}(V,t) = \prod_v \varepsilon(V_{\lambda v}^{ss}, \psi_v, dx_v, t).$$

Un calcul local montre que (9.9.1) équivaut à

$$Z_\lambda^{ss}(V,t) = \varepsilon_\lambda^{ss}(V,t) Z_\lambda^{ss}(V^*, pt^{-1}). \tag{9.9.2}$$

Le quotient des facteurs locaux en v des deux membres de (9.9.1) ou (9.9.2) est additif en $V_{\lambda v}$, et ces quotients coïncident dans le cas semi-simple. L'identité à prouver (9.9.2) est indépendante de λ. On la prouve modulo λ pour chaque λ, et on conclut comme en 9.3.

10. La théorie de Grothendieck

10.1. Soient X une courbe projective non singulière sur le corps fini $\mathbb{F}_p$, $\overline{\mathbb{F}}_p$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$, et

$$\overline{X} = X \otimes_{\mathbb{F}_p} \overline{\mathbb{F}}_p$$

déduite de X par extension des scalaires de $\mathbb{F}_p$ à $\overline{\mathbb{F}}_p$. Soient ℓ un nombre premier premier à p, et Λ un anneau noethérien tué par une puissance de ℓ.

Soit G un faisceau de Weil, au sens de 7.3 et 7.4, constructible de Λ-modules plats. Notons encore G le faisceau étale sur $\overline{X}$ qui s'en déduit.

10.2. Les groupes de cohomologie étale

$$H^i(\overline{X}, G)$$

sont des Λ-modules de type fini. N'étant pas projectifs, ils ne nous seront d'aucun usage. Nous devrons utiliser un objet plus fin

$$R\Gamma(\overline{X}, G) \in \mathrm{Ob}\, D_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$$

qui leur donne naissance. Rappelons que $D_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ peut se définir comme la catégorie des complexes finis de Λ-modules projectifs de type fini, les morphismes étant les morphismes de complexes pris à homotopie près.

$R\Gamma(\overline{X}, G)$ est un complexe fini de Λ-modules projectifs de type fini, concentré en degrés $0, 1, 2$ si l'on veut, bien défini à homotopie près, et dont les groupes de cohomologie sont les $H^i(\overline{X}, G)$.

Par transport de structure, la substitution de Frobenius

$$\varphi \in \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$$

agit sur $R\Gamma(\overline{X}, G)$: c'est un endomorphisme du complexe $R\Gamma(\overline{X}, G)$, bien déterminé à homotopie près, et induisant sur la cohomologie l'automorphisme de Frobenius.

10.3. Pour K un complexe fini de Λ-modules projectifs et u un endomorphisme de K, on pose

$$\det(1 - ut, K) = \prod_i \det(1 - ut, K^i)^{(-1)^i} \in \Lambda(t). \tag{10.3.1}$$

Si u et v sont des endomorphismes homotopes, on a

$$\det(1 - ut, K) = \det(1 - vt, K),$$

de sorte que $\det(1 - ut, K)$ est bien défini pour $K \in \mathrm{Ob}\, D_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ et $u \in \mathrm{End}(K)$. Prenant l'opposé du coefficient de t dans le développement en série formelle de $\det(1 - ut, K)$, on définit la trace

$$\mathrm{Tr}(u, K) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}(u, K^i). \tag{10.3.2}$$

Si u est une auto-équivalence d'homotopie, c'est-à-dire induit un automorphisme sur la cohomologie, on peut trouver (K', u'), isomorphe dans $D_{\mathrm{parf}}(\Lambda)$ à (K, u), avec u' un automorphisme du complexe K'. On pose alors

$$\det(u, K) = \prod_i \det(u, K^i)^{(-1)^i}, \tag{10.3.3}$$

et cette quantité ne dépend pas des choix arbitraires faits. Si u^{-1} est un inverse homotopique de u, on a

$$\det(1 - ut, K) = \det(-ut, K)\det(1 - u^{-1}t^{-1}, K). \tag{10.3.4}$$

Si $D(K)$ est le dual de K, complexe de composantes

$$D(K)^i = \mathrm{Hom}(K^{-i}, \Lambda),$$

et si $\check{u}$ est un contragrédient de u, on a aussi

$$\det(1 - ut, K) = \det(-ut, K)\det(1 - \check{u}\, t^{-1}, D(K)). \tag{10.3.5}$$

Une esquisse de la démonstration du théorème suivant est donnée en 10.8.

Théorème 10.4 (Grothendieck). On a

$$Z(G, t) = \det(1 - Ft, R\Gamma(\overline{X}, G))^{-1}. \tag{10.4.1}$$

Dans les applications, les hypothèses faites sur G sont trop restrictives. Il y a lieu de prendre comme coefficients un élément de $D_{\mathrm{parf}}(X, \Lambda)$, c'est-à-dire un complexe fini $G^\bullet$ de faisceaux de Weil de Λ-modules sur X, qui, localement pour la topologie étale sur $\overline{X}$, soit homotope à un complexe fini de faisceaux constructibles de Λ-modules plats. Utilisant 10.3, on peut, pour x un point fermé de X, définir

$$Z_x(G^\bullet, t) = \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, G^\bullet_x)^{-1}.$$

On pose

$$Z(G^\bullet, t) = \prod_x Z_x(G^\bullet, t).$$

On définit encore $R\Gamma(\overline{X}, G^\bullet)$, de groupes de cohomologie les groupes d'hypercohomologie de $\overline{X}$ à valeurs dans $G^\bullet$, et on a

$$Z(G^\bullet, t) = \det(1 - Ft, R\Gamma(\overline{X}, G^\bullet))^{-1}. \tag{10.4.2}$$

10.5. Tout $G^\bullet \in D_{\mathrm{parf}}(X,\Lambda)$ a un dual à valeur dans le complexe dualisant $\Lambda(1)$, placé en degré -2:

$$D(G^\bullet) = R\,\mathrm{Hom}_\Lambda(G^\bullet, \Lambda(1)[2]) \in D_{\mathrm{parf}}(X,\Lambda).$$

Son i-ième faisceau de cohomologie est le $(2+i)$-ième hyper-Ext local de $G^\bullet$ avec $\Lambda(1)$. La dualité de Poincaré prend la forme

$$R\Gamma(\overline{X}, D(G^\bullet)) = D(R\Gamma(\overline{X}, G^\bullet)). \tag{10.5.1}$$

Appliquant 10.3.5, on obtient l'équation fonctionnelle

$$Z(G,t) = \det(-Ft, R\Gamma(\overline{X}, G))^{-1}\, Z(D(G), t^{-1}). \tag{10.5.2}$$

10.6. Soient

$$j : U \hookrightarrow X$$

un ouvert de X, complément d'un ensemble fini S de points fermés, et $G^\bullet \in D_{\mathrm{parf}}(U,\Lambda)$. On note

$$j_! : D_{\mathrm{parf}}(U,\Lambda) \longrightarrow D_{\mathrm{parf}}(X,\Lambda)$$

le foncteur dérivé du foncteur exact prolongement par zéro, et

$$Rj_* : D_{\mathrm{parf}}(U,\Lambda) \longrightarrow D_{\mathrm{parf}}(X,\Lambda)$$

le foncteur dérivé du foncteur image directe par j. Le théorème de dualité locale, prouvé notamment en dimension un, donne

$$D(j_! G^\bullet) = Rj_* D(G^\bullet). \tag{10.6.1}$$

Pour G un faisceau localement constant de Λ-modules projectifs sur U, de dual $\check{G}$, on a

$$D(G) = \check{G}(1)[2],$$

et (10.5.2) prend la forme

$$Z(j_! G, t) = \det(-Ft, R\Gamma(\overline{X}, j_! G))^{-1} Z(Rj_* \check{G}(1), t^{-1}). \tag{10.6.2}$$

10.7. Nous allons expliciter cette formule. Les fonctions Z des deux membres sont produits de facteurs locaux. Pour le membre de gauche, le facteur local en x, point fermé de X, est

$$Z_x(j_! G, t) = \begin{cases} \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, G_x)^{-1}, & x \notin S, \\ 1, & x \in S. \end{cases}$$

Pour le membre de droite, c'est

$$Z_x(Rj_* \check{G}(1), t) = \begin{cases} \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, \check{G}_x(1))^{-1}, & x \notin S, \\ \det(1 - F_x t^{\deg(x)}, R\Gamma(I_x, \check{G}_K(1)))^{-1}, & x \in S. \end{cases}$$

Cette dernière formule se lit ainsi: $\check{G}_K(1)$ définit une représentation de $W(\overline{K}_x/K_x)$, à laquelle on applique le foncteur dérivé du foncteur invariants sous I. On obtient ainsi un complexe de Λ-modules projectifs, sur lequel Frobenius agit, et on effectue la construction 10.3. Explicitons.

(a) Le foncteur invariants sous I est composé du foncteur invariants sous

$$P'_\ell = \mathrm{Ker}(t_\ell) : \quad I\text{-modules} \longrightarrow I/P'_\ell\text{-modules},$$

et du foncteur invariants sous $\mathbb{Z}_\ell(1)$. Le premier foncteur est exact et transforme un Λ-module projectif en Λ-module projectif. Pour tout I-module V, on a

$$R\Gamma(I, V) = R\Gamma(\mathbb{Z}_\ell(1), V^{P'_\ell}).$$

Pour tout $\mathbb{Z}_\ell(1)$-module W, on peut calculer $R\Gamma(\mathbb{Z}_\ell(1), W)$ en prenant une résolution de W par des modules coinduits

$$\mathfrak{F}(\mathbb{Z}_\ell(1), M),$$

module des fonctions localement constantes de $\mathbb{Z}_\ell(1)$ dans M, sur lequel $\mathbb{Z}_\ell(1)$ agit par $f(x) \mapsto f(\tau x)$. Pour σ un générateur de $\mathbb{Z}_\ell(1)$, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow W \longrightarrow \mathfrak{F}(\mathbb{Z}_\ell(1), W) \xrightarrow{\alpha_\sigma} \mathfrak{F}(\mathbb{Z}_\ell(1), W) \longrightarrow 0,$$

flèches $m \mapsto (i \mapsto im)$ et

$$f \longmapsto (i \mapsto f(\sigma i) - \sigma(f(i))).$$

Passant aux invariants, on identifie $R\Gamma(\mathbb{Z}_\ell(1), W)$ au complexe

$$W \xrightarrow{1-\sigma} W. \tag{10.7.1}$$

Quand on change σ en σ^ν, $\nu \in \mathbb{Z}_\ell^*$, l'unique diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{F}(\mathbb{Z}_\ell(1), W) & \xrightarrow{\alpha_\sigma} & \mathfrak{F}(\mathbb{Z}_\ell(1), W) & \longrightarrow & 0 \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \\ \mathfrak{F}(\mathbb{Z}_\ell(1), W) & \xrightarrow[\alpha_{\sigma^\nu}]{} & \mathfrak{F}(\mathbb{Z}_\ell(1), W) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

fournit par passage aux invariants

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{1-\sigma} & W \\ {\scriptstyle 1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \frac{1-\sigma^\nu}{1-\sigma}} \\ W & \xrightarrow[1-\sigma^\nu]{} & W, \end{array} \tag{10.7.2}$$

où, pour n entier convergeant dans $\mathbb{Z}_\ell$ vers ν,

$$\frac{1-\sigma^\nu}{1-\sigma}\, w = \lim_n \sum_{i=0}^{n-1} \sigma^i w. \tag{10.7.3}$$

On conclut que $R\Gamma(\mathbb{Z}_\ell(1), W)$ se représente comme étant n'importe lequel des complexes (10.7.1), ces complexes, pour σ variable, étant identifiés par les isomorphismes (10.7.2).

Quand on part d'un $W(\overline{K}/K)$-module V, Frobenius agit par transport de structure sur

$$R\Gamma(I, V) = \left[V^{P'_\ell} \xrightarrow{1-\sigma} V^{P'_\ell}\right].$$

Quel que soit le Frobenius géométrique F et σ engendrant $\mathbb{Z}_\ell(1)$, F définit

$$\begin{array}{ccc} V^{P'_\ell} & \xrightarrow{1-\sigma} & V^{P'_\ell} \\ {\scriptstyle F}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F} \\ V^{P'_\ell} & \xrightarrow[1-\sigma^q]{} & V^{P'_\ell}, \end{array}$$

qui, via (10.7.2), s'identifie à l'automorphisme du complexe

$$\left[V^{P'_\ell} \xrightarrow{1-\sigma} V^{P'_\ell}\right]$$

de composantes

$$\left(F,\ \frac{1-\sigma}{1-\sigma^q} \circ F\right),$$

où

$$\frac{1-\sigma}{1-\sigma^q} = \frac{1-(\sigma^q)^{1/q}}{1-\sigma^q}$$

est défini comme en (10.7.3). On a donc

$$\det(1-Ft, R\Gamma(I,V)) = \det(1-Ft, V^{P'_\ell})\,\det\left(1-\frac{1-\sigma}{1-\sigma^q}\circ Ft, V^{P'_\ell}\right)^{-1},$$

où F désigne un quelconque Frobenius géométrique et σ un quelconque générateur de $\mathbb{Z}_\ell(1)$.

La formule 10.6.2 se récrit

$$\begin{aligned}\prod_{x\notin S}\det(1-F_x t^{\deg(x)}, G_x) = \det(-Ft, R\Gamma(j_!G))^{-1}\\ \cdot\prod_{x\notin S}\det(1-F_x t^{-\deg(x)}, \check{G}_x(1))^{-1}\\ \cdot\prod_{x\in S}\Bigg[\det(1-F_x t^{-\deg(x)}, \check{G}_x^{P'_\ell}(1))^{-1}\\ \cdot\det\left(1-\frac{1-\sigma}{1-\sigma^q}F_x t^{-\deg(x)}, \check{G}_x^{P'_\ell}(1)\right)\Bigg].\end{aligned} \tag{10.7.4}$$

10.8. Par passage à la limite projective, les résultats précédents se généralisent aux faisceaux ℓ-adiques, ou λ-adiques, et on obtient les énoncés de 9.1. La raison, cf. 10.5.2, de la formule simple (9.1.1) est le résultat local que, pour G localement constant sur

$$U \xrightarrow{j} X,$$

on a

$$j_*D(G) = D(j_!G).$$

Toutefois, la formule obtenue pour la constante, c'est-à-dire le déterminant de $-Ft$ agissant sur la cohomologie, n'est pas très explicite, et on n'en a pas de théorie locale.

Remarque 10.9. Soient X une courbe projective non singulière sur un corps algébriquement clos k, et V un faisceau localement constant de Λ-modules libres sur $X_{\text{ét}}$. Pour simplifier, on suppose X connexe de genre $g\geq 1$ et Λ local. Voici deux méthodes pour attacher à V un Λ-module libre de rang 1.

(a) Écrivons $R\Gamma(X,V)$ comme un complexe fini K de Λ-modules libres. Alors

$$\det(R\Gamma(X,V)) = \bigotimes_i \det(K^i)^{(-1)^i},$$

où det désigne la puissance extérieure maximale, ne dépend, à isomorphisme canonique près, que de $R\Gamma(X,V)$. On note $h(V)$ son dual.

(b) Soit

$$K = \sum_i n_i P_i$$

un diviseur canonique, $\mathcal{O}(K)\simeq\Omega^1_X$, et

$$N_K(V) = \bigotimes_i \det(V_{P_i})^{\otimes n_i}.$$

L'ensemble des diviseurs canoniques positifs forme un espace projectif, et les $N_K(V)$ forment un système local nécessairement trivial sur cet espace projectif. Les $N_K(V)$, pour K variable, sont donc canoniquement isomorphes, et on pose

$$\langle\Omega^1, V\rangle = N_K(V).$$

Si (X,V) est défini sur $k_0\subset k$, c'est-à-dire provient par extension des scalaires de (X_0,V_0) sur $\mathrm{Spec}(k_0)$, le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(k/k_0)$ agit sur $h(V)$ et $\langle\Omega^1,V\rangle$ par des caractères $\chi_h(V)$ et $\chi_{\Omega^1}(V)$, à valeurs dans Λ^*. Ces constructions se généralisent au cas λ-adique.

Proposition 10.9.1. Supposons vérifiée l'une des conditions suivantes:

$$\Lambda = \mathbb{Q}_\lambda \quad \text{et } V \text{ se trivialise sur un revêtement fini de } X; \tag{a}$$

$$V \text{ est de rang 1.} \tag{b}$$

Alors

$$\chi_h(V) = \chi_{\Omega^1}(V)\,\omega_{(1-g)\dim(V)}, \tag{10.9.1}$$

où ω_n est le caractère donnant l'action de Galois sur $\mathbb{Z}_\ell(n)$.

Un argument standard utilisant Tchebotarev nous ramène au cas où k_0 est un corps fini et où k est sa clôture algébrique. Il s'agit de montrer que χ_h et $\chi_{\Omega^1}\omega_{(1-g)\dim V}$ prennent la même valeur sur le Frobenius. Dans le cas (a), le groupe de Weil $W(\overline{K}_0/K_0)$ de X_0 agit continûment, pour la topologie discrète, sur $V_{\overline{K}_0}$, de sorte qu'on peut appliquer 9.3.

Comparons (9.3) à (10.7.4), pour $S = \varnothing$. Ce sont des équations fonctionnelles reliant les mêmes fonctions Z. Exprimant qu'elles ont la même constante, on trouve (10.9.1). Il peut être plus commode de ne faire ce calcul que pour V virtuel de dimension 0, et de vérifier (10.9.1) directement pour $V = \mathbb{Z}_\ell$. Dans le cas (b), on procède de même en utilisant 10.12.1 ci-dessous.

Il serait très intéressant de préciser (10.9.1), en définissant un isomorphisme canonique entre

$$h(V) \quad \text{et} \quad \langle \Omega^1, V\rangle \otimes \mathbb{Z}_\ell((1-g)\dim(V)),$$

et de généraliser (10.9.1) au cas ramifié.

Remarque 10.10. Le théorème 10.4 est sans doute encore valable pour Λ un anneau noethérien de caractéristique p, c'est-à-dire tel que $p\Lambda = 0$. La formule de traces requise devrait résulter de la formule des traces en cohomologie cohérente, la Woods Hole trace formula. La démonstration n'a toutefois pas été rédigée.

10.11. Démonstration de 10.4. Dans [7], 10.4 n'est démontré que pour des faisceaux ℓ-adiques, car la méthode de démonstration, basée sur la formule des traces de Lefschetz sur $\overline{X}$ pour les puissances de l'endomorphisme de Frobenius, requérait que l'on divise par un entier arbitraire pour passer de Lefschetz à (10.4.1), passage par la dérivée logarithmique de Z.

Pour obtenir 10.4 tel quel, il faut utiliser SGA 4, XVII, 5.5, la formule des traces de Lefschetz sur les $\mathrm{Sym}^n(X)$, et développer en série les deux membres de 10.4.1, le second se développant comme

$$\det(1 - Ft, R\Gamma(\overline{X}, G))^{-1} = \sum_n \mathrm{Tr}(F, \mathrm{Sym}^n(R\Gamma(\overline{X}, G)))\, t^n,$$

où Sym^n est le foncteur dérivé du foncteur non additif n-ième puissance symétrique. Par ailleurs, la méthode de démonstration de [7], par fibrations par courbes successives, ramène la formule des traces à démontrer au cas des courbes.

Formule des traces 10.11.1. Soient X une courbe projective et lisse sur $\mathbb{F}_q$, U un ouvert de X, et G un faisceau de Weil localement constant de Λ-modules projectifs. On a

$$\sum_{x \in U(\mathbb{F}_q)} \mathrm{Tr}(F_x, G_x) = \mathrm{Tr}(F, R\Gamma(\overline{X}, j_!G)).$$

Dans cette formule, les Frobenius sont relatifs à $\mathbb{F}_q$, et

$$\overline{X} = X \otimes_{\mathbb{F}_q} \overline{\mathbb{F}}_q.$$

On peut supposer que $\mathbb{F}_q$ est le sous-corps des constantes du corps des fonctions K de X, sans quoi les deux membres sont 0.

La méthode de démonstration exposée par Grothendieck dans le séminaire oral SGA 5 consiste à se ramener à la formule de Lefschetz sur le nombre de points fixes d'endomorphismes de courbes complètes, déjà prouvée dans [17], en étudiant la cohomologie de revêtements de $\overline{X}$ comme représentations du groupe du revêtement.

Soit $\overline{K}$ une clôture algébrique de K, contenant le corps des fonctions de $\overline{X}$. Le faisceau G définit une représentation de $W(\overline{K}/K)$ sur le Λ-module projectif $G_{\overline{K}}$. L'intersection J de $\mathrm{Gal}^0(\overline{K}/K)$ et du noyau de cette représentation définit un revêtement étale connexe

$$f : \overline{U}' \longrightarrow \overline{U}$$

de $\overline{U}$, sur lequel G devient trivial. Posons

$$H = W(\overline{K}/K)/J.$$

Alors H est une extension de $\mathbb{Z}$ par le groupe H_0 du revêtement $\overline{U}'/\overline{U}$, et $G_{\overline{K}}$ est une représentation de H.

Soit j' l'inclusion de $\overline{U}'$ dans une courbe projective non singulière $\overline{X}'$. La cohomologie ℓ-adique à support propre de $\overline{U}'$ est une représentation de H. Des arguments standards permettent de faire mieux, et de définir

$$R\Gamma_c(\overline{U}', \mathbb{Z}_\ell) = R\Gamma(\overline{X}', j'_!\mathbb{Z}_\ell) \in D_{\mathrm{parf}}(\mathbb{Z}_\ell[H_0]),$$

sur lequel H agit de façon semi-linéaire relativement à son action sur $\mathbb{Z}_\ell[H_0]$, l'action de $H_0 \subset H$ étant l'action évidente. On a canoniquement

$$R\Gamma(\overline{X}, j_!G) = \left[R\Gamma(\overline{X}', j'_!\mathbb{Z}_\ell) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} G_{\overline{K}}\right]^{H_0}, \tag{10.11.2}$$

isomorphisme compatible à l'action de Frobenius sur les deux membres.

Écrivons $R\Gamma(\overline{X}', j'_!\mathbb{Z}_\ell)$ comme un complexe fini de $\mathbb{Z}_\ell[H_0]$-modules projectifs, sur lequel Frobenius agit. Les composantes de ce complexe apparaissent comme des $\mathbb{Z}_\ell[H^+]$-modules, pour H^+ le sous-monoïde de H, extension de $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ par H_0. On leur applique le lemme suivant.

Lemme 10.11.3. Soient H^+ un produit semi-direct de $\mathbb{N}$ par un groupe fini H_0, M un $\mathbb{Z}_\ell[H^+]$-module, projectif de rang fini en tant que $\mathbb{Z}_\ell[H_0]$-module, Λ une $\mathbb{Z}_\ell$-algèbre et V un $\Lambda[H^+]$-module, projectif de rang fini comme Λ-module. Soient χ_M et χ_V les caractères de M et V.

(i) Il existe une fonction χ_M^* sur H, à valeurs dans $\mathbb{Z}_\ell$, telle que, pour $h \in H$, et $H_0(h)$ le centralisateur de h dans H_0, on ait

$$\chi_M(h) = \mathrm{Tr}(h, M) = |H_0(h)|\, \chi_M^*(h).$$

(ii) Pour $F \in H/H_0$,

$$\mathrm{Tr}\big(F, (M \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} V)^{H_0}\big) = \sum_{\substack{h \mapsto F \\ \mathrm{mod}\ H_0\text{-conjugaison}}} \chi_M^*(h)\chi_V(h).$$

Appliquant Lefschetz, on calcule χ_M^* pour $R\Gamma(\overline{X}', j'_!\mathbb{Z}_\ell)$, virtuellement la différence de $R\Gamma(\overline{X}', \mathbb{Z}_\ell)$ et d'une quantité élémentaire; 10.11.2 et 10.11.3 fournissent la formule voulue.

10.12. Le cas abélien, et une application farfelue. Soit

$$\chi : W(\overline{K}/K) \longrightarrow \Lambda^*$$

un quasi-caractère à valeurs dans Λ^*, non ramifié en dehors d'un ensemble fini S de places de K. Soit j l'inclusion de $U = X - S$ dans X, et soit $j_![\chi]$ le faisceau de rang un sur U défini par χ et prolongé par 0. Posons

$$\varepsilon(j_![\chi], t) = \prod_{v \in S} \varepsilon_0(\chi_v\omega_v^t, \psi_v, dx_v) \prod_{v \notin S} \varepsilon(\chi_v\omega_v^t, \psi_v, dx_v).$$

ω^t est comme en 7.6; ε_0 est défini en 6.4; ε, pour un caractère non ramifié, est défini par 3.4.3.3.

Proposition 10.12.1. On a

$$\det(-Ft, \mathrm{R}\Gamma(j_![\chi])) = \varepsilon(j_![\chi], t).$$

Cette proposition précise 10.7.4.

Soit H le quotient de $W(\overline{K}/K)$ par $\mathrm{Ker}(\chi)$. Il suffit de traiter le cas universel où

$$\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^n[H].$$

Ce cas se relève en caractéristique 0, et 10.12.1 s'obtient par réduction.

10.13. Prenons par exemple pour Λ les nombres duaux sur $\mathbb{Z}/\ell^n$:

$$\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^n[\epsilon] \qquad (\epsilon^2 = 0),$$

pour α un homomorphisme continu du groupe des classes d'idèles $\mathbb{A}^*/K^*$ dans le groupe additif $\mathbb{Z}/\ell^n$, et posons

$$\chi = 1 + \alpha\epsilon.$$

La ramification de α est automatiquement modérée. Soit S un ensemble fini de places en dehors desquelles α est non ramifié. Appliquant 10.4 pour χ et pour le caractère trivial, et faisant le rapport, on trouve que

$$L_S^+(\alpha, t) = \sum_{v\in S} \alpha_v(\pi_v)\frac{t^{\deg(v)}}{1-t^{\deg(v)}} = \sum_n t^n \sum_{\deg(v)|n} \alpha_v(\pi_v) \tag{10.13.1}$$

est dans $\mathbb{Z}/\ell^n(t)$.

Pour toute place v de K, choisissons une uniformisante π_v. Adjoignons à $\mathbb{Z}/\ell^n$ une racine primitive p-ième de l'unité, et soit ψ un caractère additif non trivial de $\mathbb{A}/K$, à valeurs dans les racines p-ièmes de l'unité. Prenons le quotient de (10.7.4) pour χ et de (10.7.4) pour le caractère trivial, et utilisons (10.12.1). Après simplifications, on obtient l'identité suivante. Dans le premier membre, les deux premières sommes infinies sont sommées par (10.13.1). Les sommes portent toutes sur toutes les places de K:

$$\sum_v \alpha_v(\pi_v)\frac{t^{\deg(v)}}{1-t^{\deg(v)}} + \sum_v \alpha_v(\pi_v)\frac{q_v t^{-\deg(v)}}{1-q_v t^{-\deg(v)}} + \sum_v \alpha_v(-1)\frac{1}{1-t^{\deg(v)}} \tag{10.13.2}$$

$$= -\sum_v n_v \alpha_v(\pi_v) - \sum_v \sum_{x\in k_v^*} \alpha_v(x)\psi_v(\pi_v^{1+n_v}x).$$

On vérifie de façon élémentaire que la validité de (10.13.2) ne dépend pas du choix des uniformisantes π_v, en se rappelant que, pour $x \in k_v^*$, on a $(q-1)\alpha(x) = 0$. Dans le premier membre, les $\alpha_v(-1)$ sont d'ordre 2, donc nuls si $\ell \neq 2$.

11. Appendice. Le calcul de ε modulo les racines de l'unité

Cet appendice est une variation sur un thème de Lakkis et Dwork. Mon attention a été attirée sur leurs résultats par J.-P. Serre.

Nous noterons $a \sim b$ la relation suivante entre nombres complexes inversibles:

$$a \sim b \quad : \quad a/b \text{ est produit d'une racine de l'unité par une puissance de } q^{1/2}.$$

Soit K un corps local non archimédien et reprenons les notations de 2.2.1, 2.2.2 et 3.1. La mesure de Haar dx sera supposée telle que

$$\int_{\mathcal{O}} dx = q^{n/2},$$

avec n entier. Soient V une représentation complexe, d'un quotient fini, de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$, et V^P les invariants sous l'inertie sauvage. C'est une sous-représentation de V.

Théorème 11.1. On a

$$\varepsilon(V, \psi, dx) \sim \varepsilon(V^P, \psi, dx).$$

Lemme 11.2. Modulo l'équivalence $\sim$, $\varepsilon(V, \psi, dx)$ est indépendant de ψ et de dx. Cela résulte aussitôt de 5.3 et 5.4. Ce lemme nous permettra d'abréger $\varepsilon(V, \psi, dx)$ en $\varepsilon(V)$.

Lemme 11.3. Si le caractère de V est réel, c'est-à-dire si V est isomorphe à V^*, alors

$$\varepsilon(V) \sim 1.$$

On peut supposer que $\int_{\mathcal{O}} dx = 1$ et que $n(\psi) = 0$. On applique alors 5.7.1, 5.4 et 5.5.

Soient L une extension finie de K dans $\overline{K}$, W une représentation de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/L)$, et $\mathrm{Ind}(W)$ la représentation induite de $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$.

Lemme 11.4. On a

$$\varepsilon_L(W) \sim \varepsilon_K(\mathrm{Ind}(W)).$$

Soit W' la représentation triviale de même dimension que W. Pour $\psi_L = \psi_K \circ \mathrm{Tr}_{L/K}$, on a par (5.6.1)

$$\varepsilon(W - W', \psi_L) = \varepsilon(\mathrm{Ind}(W) - \mathrm{Ind}(W'), \psi_K),$$

et on conclut en appliquant 11.3 à W' et à $\mathrm{Ind}(W')$.

11.5. Soient L et W comme ci-dessus, P_L le groupe d'inertie sauvage de L, et regardons W^{P_L} comme une représentation de

$$H = P \cdot \mathrm{Gal}(\overline{K}/L),$$

triviale sur P. On a

$$\mathrm{Ind}(W)^P = \mathrm{Ind}_H^{\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)}(W^{P_L}).$$

D'après 11.4, le théorème pour W équivaut donc au théorème pour $\mathrm{Ind}(W)$; par Brauer, ceci nous ramène au cas où V est de dimension un, défini par un caractère d'ordre fini χ de K^*. Si χ est modéré, $[\chi]^P = [\chi]$, et 11.1 est trivial. Si χ est sauvagement ramifié, $[\chi]^P = 0$, et 11.1 résulte du lemme suivant.

Lemme 11.6. Pour χ sauvagement ramifié,

$$\varepsilon(\chi, \psi, dx) \sim 1.$$

Soient m le conducteur de χ,

$$n = \left[\frac{m+1}{2}\right],$$

et y l'élément de K^*, de valuation $-m - n(\psi)$, bien défini modulo $\pi^{n-m-n(\psi)}$, tel que, cf. 4.16,

$$\chi(1+a) = \psi(ay) \qquad (v(a) \geq n).$$

Décomposons χ en $\chi = \chi_1\chi_2$, avec χ_1 d'ordre premier à p, et χ_2 d'ordre une puissance de p. Comme en 4.16, on prouve que

$$\varepsilon(\chi, \psi, dx) = \int \chi^{-1}(x)\psi(x)\,dx = \int_{y(1+(\pi^{m-n}))} \chi^{-1}(x)\psi(x)\,dx \tag{11.6.1}$$

$$= \chi_1(y) \int_{y(1+(\pi^{m-n}))} \chi_2^{-1}(x)\psi(x)\,dx.$$

Si m est pair, $m = 2n$, la fonction intégrée est constante et 11.6 est clair. Pour m impair, $m = 2n-1$, voici deux façons de procéder.

(a) $\chi^{-1}(x)\psi(x)$ est un caractère quadratique non dégénéré sur

$$y(1 + (\pi^{m-n}))/(1 + (\pi^n));$$

d'après Weil, la somme de ses valeurs est ~ 1.

(b) D'après (11.6.1), il suffit de prouver que $\varepsilon(\chi_2, \psi, dx) \sim 1$. Le carré de ce nombre, multiplié par une puissance convenable de q, appartient à un corps de racines p^N-ièmes de l'unité, et est de valuation 1 en toutes les places de ce corps, sauf peut-être en l'unique place divisant p. C'est donc une racine de l'unité.

Corollaire 11.7. Prenons ψ et dx tels que $n(\psi) = -1$ et que

$$\int_{(\pi)} dx = 1.$$

Alors $\varepsilon(V, \psi, dx)$ est un entier algébrique.

Décomposant V en $V^P + W$, on voit qu'il suffit de traiter les deux cas suivants.

(a) V est modérément ramifiée. Dans ce cas, V est une somme de représentations induites de représentations de dimension un de sous-groupes, et ε est, au signe près, un produit de sommes de Gauss, cf. 5.10.

(b) $V^P = 0$. Dans ce cas, $\varepsilon \sim 1$, et il suffit de prouver que la valeur absolue complexe $|\varepsilon|$ est une puissance positive de q. Ceci résulte de 5.7.2, où $dx'/dx = q$.

BIBLIOGRAPHIE

[1] E. Artin, *Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, Hamb. Abh. **8** (1930), 292–306; Collected Papers, 165–179.

[2] E. Artin and J. Tate, *Class field theory*, Benjamin, New York.

[3] P. Deligne, *Les constantes des équations fonctionnelles*, Séminaire Delange–Pisot–Poitou 1969/70, 19 bis.

[4] P. Deligne, *Formes modulaires et représentations de $GL(2)$*, ce volume.

[5] H. Davenport and H. Hasse, *Die Nullstellen der Kongruenzzetafunktionen in gewissen zyklischen Fällen*, J. reine angewandte Math. **172** (1935), 151–182.

[6] B. Dwork, *On the Artin root number*, Amer. J. Math. **78** (1956), 444–472.

[7] A. Grothendieck, *Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L*, Séminaire Bourbaki 279, décembre 1964.

[8] H. Jacquet and R. P. Langlands, *Automorphic forms on GL(2)*, Lecture Notes in Math. 114, Springer-Verlag, 1970.

[9] R. P. Langlands, *On the functional equation of the Artin L-functions*, notes polycopiées, Yale University, incomplet.

[10] J. P. Serre, *Corps locaux*, Hermann, Paris, 1962.

[11] J. P. Serre, *Représentations linéaires des groupes finis*, 2$^{\text{e}}$ éd. refondue, Hermann, Paris, 1971.

[12] J. P. Serre, *Abelian ℓ-adic representations and elliptic curves*, New York, 1968.

[13] J. P. Serre and J. Tate, *Good reduction of abelian varieties*, Ann. of Math. **88**, 3 (1968), 492–517.

[14] J. Tate, *Fourier analysis in number fields and Hecke's zeta functions*, thesis, in *Algebraic Number Theory*, edited by Cassels and Fröhlich, Academic Press, 1967.

[15] A. Weil, *Basic Number Theory*, Springer-Verlag, 1967.

[16] A. Weil, *Dirichlet series and automorphic forms*, Lecture Notes in Math. 189, Springer-Verlag, 1971.

[17] A. Weil, *Variétés abéliennes et courbes algébriques*, Hermann, Paris, 1948.

[18] A. Weil, *Numbers of solutions of equations in finite fields*, Bull. Amer. Math. Soc. **55** (1949), 497–508.

[19] A. Weil, *Sur la théorie du corps de classes*, J. of the Math. Soc. of Japan **1** (1951).

[20] P. X. Gallagher, *Determinants of representations of finite groups*, Abh. Math. Seminar Univ. Hamburg **28**, 3/4 (1965), 162–167.

SGA. Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie. SGA 4 est publié dans les Lecture Notes 269, 270, 305. SGA 5 est diffusé par l'I.H.E.S.

Le problème mentionné dans l'introduction, p. 4, de prouver la conclusion de 9.9 pour une représentation Λ-adique a été résolu:
G. Laumon, *Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L sur un corps global de caractéristique positive*, C.R. Acad. Sci. Paris **298**, 8 (1984), 181–184.

Un bel exposé du théorème d'existence des constantes locales est donné dans:
J. Tate, *Local constants*, in *Algebraic Number Fields*, edited by A. Fröhlich, Academic Press, 1977, 89–137.

Les schémas de modules de courbes elliptiques

P. Deligne and M. Rapoport

Édition française établie sur l’autorité de 174 pages

D018 — source-aligned canonical edition

Table des matières

LES SCHÉMAS DE MODULES DE COURBES ELLIPTIQUES

par P. Deligne(1) et M. Rapoport(2)

(1) Research on this paper was partially supported by NSF grant GP 36418X.

(2) Le deuxième auteur pense que les activités politiques de l'OTAN sont incompatibles avec l'activité pacifique du mathématicien et regrette pour cette raison que ce congrès a été partiellement financé par cette organisation.

LES SCHÉMAS DE MODULES DE COURBES ELLIPTIQUES

par P. Deligne(1) et M. Rapoport(2)

SOMMAIRE

Introduction 4 Notations 17

I. Préliminaires 18

1. Schémas en courbes 18 2. Dualité en cohomologie des faisceaux cohérents 19 3. Rappels sur le foncteur de Picard 21 4. Sous-schéma de non lissité 24 5. Rappels sur la théorie des déformations 25 6. Points de division des courbes elliptiques 27 7. Rappels d'algèbre commutative 28 8. Schémas grossiers de modules 29

II. Courbes elliptiques généralisées 31

1. Polygones de Néron 31 2. Courbes stables irréductibles 42 3. Construction de courbes elliptiques généralisées 50

III. Théorèmes de représentabilité 54

0. Introduction et notations 54 1. Un théorème de proreprésentabilité 55 2. Construction de $\mathfrak{M}_*$ 58

IV. Structures de niveau 63

1. Contractions 63 2. Structures de niveau n 67 3. Structures de niveau H 69 4. Exemples 79 5. Théorie transcendante (rappels) 84 6. Structures de niveau H : étude à l'infini 86

V. Réduction modulo p 92

1. Étude de $\mathfrak{M}_{\Gamma_0(p)}$ 92 2. Étude de $\mathfrak{M}_{\Gamma_{00}(p)}$ 103 3. Un théorème de bonne réduction 111 4. Étude de $\mathfrak{M}_n$ 115

0. Introduction et notations 54
1. Un théorème de proreprésentabilité 55
2. Construction de $\mathfrak{M}_H$ 58

IV. Structures de niveau 63
1. Contractions 63
2. Structures de niveau n 67
3. Structures de niveau H 69
4. Exemples 79
5. Théorie transcendante (rappels) 84
6. Structures de niveau H : étude à l'infini 86

V. Réduction modulo p 92
1. Etude de $\mathfrak{M}_{\Gamma_0(p)}$ 92
2. Etude de $\mathfrak{M}_{\Gamma_{00}(p}$ 103
3. Un théorème de bonne réduction 111
4. Etude de $\mathfrak{P}_n$ 115

Authority visual fallback P0002-A01.

Authority page 3 ; collected-paper page 496 ; original folio 145.

VI. Schémas grossiers de modules 125

1. L’invariant modulaire 125 2. Automorphismes des courbes elliptiques. Critère pour que $\mathfrak{M}_H^\circ = M_H^\circ$ 129 3. Points rationnels des schémas grossiers 131 4. Remarques numériques 133 5. L’action de Galois sur les pointes 140 6. Étude de $\mathfrak{M}_{\Gamma_0(p)}$ 141

VII. La courbe de Tate 149

1. Construction de la courbe de Tate sur $\mathbb{Z}[[q]]$ 149 2. Application : structure à l’infini de $\mathfrak{M}_H$ 156 3. Application : développement d’une forme modulaire en série de Fourier 160 4. Comparaison avec la théorie transcendante 168

Bibliographie 172

VI. Schémas grossiers de modules 125
1. L'invariant modulaire 125
2. Automorphismes des courbes elliptiques. Critère pour que $\mathfrak{M}_H^o = M_H^o$ 129
3. Points rationnels des schémas grossiers 131
4. Remarques numériques 133
5. L'action de Galois sur les pointes 140
6. Etude de $M_{\Gamma_0(p)}$ 141

VII. La courbe de Tate 149
1. Construction de la courbe de Tate sur $\mathbb{Z}[[q]]$ 149
2. Application : structure à l'infini de $\mathfrak{P}_H$ 156
3. Application : développement d'une forme modulaire en série de Fourier 160
4. Comparaison avec la théorie transcendante 168

Bibliographie 172

Authority visual fallback P0003-A01.

Authority page 4 ; collected-paper page 497 ; original folio 146.

Introduction

1. Soit X le demi-plan de Poincaré

$$X = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}(z) > 0\}.$$

Le groupe $SL(2, \mathbb{R})$ agit sur X par transformations homographiques

$$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}.$$

Si Γ est un sous-groupe de $SL(2, \mathbb{Z})$ défini par des conditions de congruence, la surface de Riemann X/Γ est le complément d’un ensemble fini de points (”à l’infini”) dans une surface de Riemann compacte. C’est donc une courbe algébrique. Ses points sont en correspondance bijective avec les classes d’isomorphie de courbes elliptiques munies d’une ”structure de niveau” d’espèce convenable. On sait qu’il résulte de cette interprétation qu’elle admet pour corps de définition un sous-corps d’un corps cyclotomique. Dans cet article, nous étudions la structure à l’infini et la réduction modulo p de X/Γ.

Concentrons-nous sur le cas où Γ est le sous-groupe de SL(2, ℤ) formé des matrices congrues modulo n à la matrice identité. Supposons que n ≥ 3, auquel cas Γ agit sur X sans point fixe.

Pour z ∈ X, notons E_z le quotient de ℂ par le réseau ℤ + ℤz. La loi d'addition dans ℂ passe au quotient et munit E_z d'une structure de courbe elliptique (= variété abélienne de dimension un). Les courbes elliptiques E_z et E_z′ sont isomorphes si et seulement si z et z′ sont conjugués sous SL(2, ℤ). Le noyau E(z)_n de la multiplication par n dans E(z) est l'image de (1/n)(ℤ + ℤz) ; nous noterons α(z) l'isomorphisme

E(z)_n ≃ (ℤ/nℤ)^2 : (a+bz)/n ↦ (a,b).


1. Soit X le demi-plan de Poincaré

$$X = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}(z) > 0\} .$$

Le groupe $SL(2, \mathbb{R})$ agit sur X par transformations homographiques

$$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} .$$

Authority visual fallback P0004-A01.

Authority page 5 ; collected-paper page 498 ; original folio 147.

Pour que les couples (E(z),α(z)) et (E(z′),α(z′)) soient isomorphes, il faut et il suffit que z et z′ soient conjugués sous Γ.

Pour toute courbe elliptique E sur un corps algébriquement clos k de caractéristique p ne divisant par n, le groupe E_n est muni d'une forme alter- née non dégénérée e_n à valeurs dans les racines n-ièmes de l'unité de k. Une structure de niveau n sur E est un isomorphisme α :E_n ≃ (ℤ/n)^2. Si α est une structure de niveau n, nous noterons ζ(α) la racine primitive n-ième de l'unité

ζ(α) = e_n(α^−1((1,0)), α^−1((0,1))).

Faisons k = ℂ, et posons ζ_n = exp(2πi/n). Un couple (E,α) est isomorphe à un couple (E(z),α(z)) (z ∈ X) si et seulement si

ζ(α) = ζ_n

(ou ζ_n^−1, selon la convention de signe utilisée dans la définition de e_n).

2. Ce qui précède se généralise aux familles de courbes elliptiques, paramé- trées par un schéma S. On trouve que X/Γ représente le foncteur F_n suivant sur les schémas sur ℂ : F_n(T) est l'ensemble des classes d'isomorphie de familles algébriques paramétrées par T de courbes elliptiques E munies d'une structure de niveau n telle que ζ(α) = ζ_n.

La définition de F_n(T) garde un sens lorsque T est seulement supposé être un schéma sur ℤ[ζ_n, 1/n]. Igusa a prouvé dans [11] que le foncteur F_n obtenu est représentable par un schéma M_n^∘[1/n] sur ℤ[ζ_n,1/n]. La méthode d'Igusa est la suivante.


Pour toute courbe elliptique E sur un corps algébriquement clos k de caractéristique p ne divisant par n, le groupe E_n est muni d'une forme alternée non dégénérée e_n à valeurs dans les racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité de k. Une structure de niveau n sur E est un isomorphisme $\alpha : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$. Si α est une structure de niveau n, nous noterons $\zeta(\alpha)$ la racine primitive $n^{\text{ième}}$ de l'unité

$$\zeta(\alpha) = e_n(\alpha^{-1}((1,0)), \alpha^{-1}((0,1))) .$$

Faisons $k = \mathbb{C}$, et posons $\zeta_n = \exp(\frac{2\pi i}{n})$. Un couple (E,α) est isomorphe à un

Authority visual fallback P0005-A01.

Authority page 6 ; collected-paper page 499 ; original folio 148.

a) Si M_n^◦[1/n] existe, alors M_nm^◦[1/nm] existe. Si E est une courbe elliptique sur un corps algébriquement clos, la multiplication par m induit un isomorphisme de E_nm/nE_nm avec E_n ; une structure de niveau nm : α : E_nm ≃ (ℤ/nm)^2 définit ainsi par réduction modulo n une structure de niveau n. Ceci se transpose au cas d'un schéma de base quelconque et définit un morphisme de foncteurs F_nm → F_n. Ce morphisme est relativement représentable. Il fait de M_nm^◦[1/nm] un revêtement galoisien non ramifié de groupe Ker(SL(2, ℤ/nm) → SL(2, ℤ/n)) de

M_n^◦[1/nm] ⊗_{ℤ[ζ_n]} ℤ[ζ_nm]

(⊗ désigne une extension des scalaires).

b) Si M_nm^◦[1/nm] existe, M_n^◦[1/nm] existe. On obtient M_n^◦[1/nm] par un passage au quotient.

c) M_3^◦[1/3] et M_4^◦[1/4] existent. Explicitement, on a

M_3^◦[1/3] = Spec(ℤ[ζ_3,1/3,μ,(μ^3−1)^−1]),

avec pour courbe elliptique universelle la cubique plane d'équation

X^3 + Y^3 + Z^3 = 3μ XYZ.

La section neutre est (1,−1,0) et la base du groupe des points d'ordre 3 est ((−1,0,1), (−1,ζ_3,0)).

En niveau 4, on a

M_4^◦[1/4] = Spec(ℤ[i,1/2,σ,(σ(σ^4−1))^−1]),

où on a posé i = ζ_4, avec pour courbe elliptique universelle la cubique plane d'équation non homogène

y^2 = x(x−1)(x−λ), pour

λ = (1/4)(σ + 1/σ)^2.

La section neutre est le point à l'infini, et la base (r,s) du groupe des points


a) Si $M_n^\circ[1/n]$ existe, alors $M_{nm}^\circ[1/nm]$ existe. Si E est une courbe elliptique sur un corps algébriquement clos, la multiplication par m induit un isomorphisme de E_{nm}/nE_{nm} avec E_n ; une structure de niveau nm : $\alpha : E_{nm} \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/nm)^2$ définit ainsi par réduction modulo n une structure de niveau n. Ceci se transpose au cas d'un schéma de base quelconque et définit un morphisme de foncteurs $F_{nm} \to F_n$. Ce morphisme est relativement représentable. Il fait de $M_{nm}^\circ[1/nm]$ un revêtement galoisien non ramifié de groupe $\mathrm{Ker}(\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}/nm) \to \mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}/n))$ de $M_n^\circ[1/nm] \otimes_{\mathbb{Z}[\zeta_n]} \mathbb{Z}[\zeta_{nm}]$ (⊗ désigne une extension des scalaires).

b) Si $M_{nm}^\circ[1/nm]$ existe, $M_n^\circ[1/nm]$ existe. On obtient $M_n^\circ[1/nm]$ par un passage au quotient.

Authority visual fallback P0006-A01.

d'ordre 4 est donnée par

r = (1/2(σ + 1/σ), i(σ²+1)(σ−1)²/(4·σ²))

s = (−i/2(σ − 1/σ) + 1, −(σ²−1)(σ+1)²/(4·σ²))

Les formules ci-dessus pour M_4^◦[1/4] sont copiées de Shioda [31]. Igusa utilisait non pas M_4^◦[1/4] mais le schéma de modules des courbes elliptiques munies d'une structure intermédiaire entre une structure de niveau 4 et une de niveau 2.

d) M_n^◦[1/n] s'obtient en recollant M_n^◦[1/3n] et M_n^◦[1/4n].

3. La surface de Riemann X/Γ est non compacte. Géométriquement, ce fait se traduit comme suit : si E_η est une courbe elliptique munie d'une structure de niveau n sur ℂ((T)), il arrive que le modèle minimal de E_η sur ℂ[[T]] ait mauvaise réduction. Dans ce cas, la fibre spéciale E'_o du modèle de Néron E' de E_η sur ℂ[[T]] est isomorphe à ℂ*×ℤ/kn pour k convenable. Soit E_o le sous-groupe de E'_o réunion des composantes de E'_o dont l'ordre dans π_o(E'_o) divise n. Ce sous-groupe est isomorphe à ℂ*×ℤ/n. Il présente sur E'_o l'avantage suivant : après extension des scalaires de ℂ((T)) à ℂ((T^{1/ℓ})), le nombre de composantes connexes de E'_o est multiplié par ℓ, tandis que E_o ne change pas.

La forme alternée e_n définit par spécialisation une forme alternée, encore notée e_n, sur (E_o)_n. La structure α de niveau n définit par spécialisation

α_o : (E_o)_n ≃ (ℤ/n)²,

et

ζ(α_o) = e_n(α^−1((1,0)), α^−1((0,1))) = ζ_n.

Cette discussion suggère que les points à l'infini de X/Γ correspondent


d'une structure intermédiaire entre une structure de niveau 4 et une de niveau 2.

d) $M_n^*[1/n]$ s'obtient en recollant $M_n^*[1/3n]$ et $M_n^*[1/4n]$.

3. La surface de Riemann X/Γ est non compacte. Géométriquement, ce fait se traduit comme suit : si E_η est une courbe elliptique munie d'une structure de niveau n sur $\mathbb{C}((T))$, il arrive que le modèle minimal de E_η sur $\mathbb{C}[[T]]$ ait mauvaise réduction. Dans ce cas, la fibre spéciale E'_o du modèle de Néron E' de E_η sur $\mathbb{C}[[T]]$ est isomorphe à $\mathbb{C}^* \times \mathbb{Z}/kn$ pour k convenable. Soit E_o le sous-groupe de E'_o réunion des composantes de E'_o dont l'ordre dans $\pi_o(E'_o)$ divise n. Ce sous-groupe est isomorphe à $\mathbb{C}^* \times \mathbb{Z}/n$. Il présente sur E'_o l'avantage suivant: après extension des scalaires de $\mathbb{C}((T))$ à $\mathbb{C}((T^{1/\ell}))$, le nombre de composantes connexes de E'_o est multiplié par ℓ , tandis que E_o ne change pas.

La forme alternée e_n définit par spécialisation une forme alternée, encore notée e_n , sur $(E_o)_n$. La structure α de niveau n définit par spécialisation

$$\alpha_o : (E_o)_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2 ,$$

et $\zeta(\alpha_o) = e_n(\alpha^{-1}((1,0)),\alpha^{-1}((0,1))) = \zeta_n$.

Cette discussion suggère que les points à l'infini de X/Γ correspondent

Authority visual fallback P0007-A02.

aux classes d'isomorphisme de systèmes (E_o,e_n,α_n) comme ci-dessus. Tel est bien le cas.

Dans le texte, nous précisons cette interprétation modulaire de l'ensemble des points à l'infini de X/Γ en une interprétation modulaire de la courbe projective X/Γ compactifiée de X/Γ. En voici le principe.

Pour E_η sur ℂ((T)) comme plus haut, la fibre spéciale Ē'_o du modèle minimal Ē' de E_η sur ℂ[[T]] est un cycle de kn droites projectives :

[cycle de kn droites projectives : voir l'actif d'autorité P0008-A01]

Soit Ē déduit de Ē' en contractant en un point les composantes irréductibles de Ē'_o dont l'ordre ne divise pas n. La fibre spéciale Ē_o de Ē est un cycle de n droites projectives se coupant transversalement, et est une compactification de E_o (E_o s'identifie au lieu lisse Ē_o^reg de Ē_o). Par spécialisation, + et α définissent une loi de groupe sur le lieu lisse Ē_o^reg de Ē_o, une action de Ē_o^reg sur Ē_o et un isomorphisme

α_o : (Ē_o^reg)_n ≃ (ℤ/n)².

Soit T un schéma de type fini sur ℂ. Inspirés par les remarques ci-dessus, nous définissons une courbe elliptique généralisée munie d'une structure α de niveau n, telle que ζ(α) = ζ_n, sur T comme consistant en :

a) un morphisme propre et plat p : E → T ;

b) une structure de schéma en groupes commutatif sur l'ouvert E^reg de E où p est lisse ; on suppose que l'addition se prolonge en une action

+ : E^reg ×_T E → E ;

Soit $\bar{E}$ déduit de $\bar{E}'$ en contractant en un point les composantes irréductibles de $\bar{E}'_o$ dont l'ordre ne divise pas n . La fibre spéciale $\bar{E}_o$ de $\bar{E}$ est un cycle de n droites projectives se coupant transversalement, et est une compactification de E_o (E_o s'identifie au lieu lisse $\bar{E}_o^{reg}$ de $\bar{E}_o$) . Par spécialisation, + et α définissent une loi de groupe sur le lieu lisse $\bar{E}_o^{reg}$ de $\bar{E}_o$, une action de $\bar{E}_o^{reg}$ sur $\bar{E}_o$ et un isomorphisme

$$\alpha_o : (\bar{E}_o^{reg})_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2 .$$

Soit T un schéma de type fini sur ℂ . Inspirés par les remarques ci-dessus, nous définissons une courbe elliptique généralisée munie d'une structure n

Authority visual fallback P0008-A02.

Authority page 9 ; collected-paper page 502 ; original folio 151.

c) un isomorphisme de schémas en groupes

(E^reg)_n ≃ (ℤ/n)²_T.

On suppose que les fibres géométriques de p sont soit des courbes elliptiques munies d'une structure de niveau n telle que ζ(α) = ζ_n, soit sont isomorphes à l'un des systèmes (Ē_o,α_o) construits ci-dessus.

Nous prouvons que la courbe X/Γ représente le foncteur F̄_n suivant sur les schémas de type fini sur ℂ. F̄_n(T) est l'ensemble des classes d'isomorphie de courbes elliptiques généralisées E sur T, munie d'une structure α de niveau n telle que ζ(α) = ζ_n.

Pour rendre viable la définition des courbes elliptiques généralisées, nous faisons un usage intensif de techniques de Grothendieck (théorèmes de changement de base (EGA III) et de dualité ([10]) en cohomologie des faisceaux cohérents). Ces techniques fournissent un moyen systématique pour ramener des énoncés relatifs, concernant des schémas sur un schéma de base S, au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos.

Pour prouver que le foncteur F̄_n est représentable, nous utilisons le critère général de M. Artin [3]. La vérification des hypothèses de ce critère présente le point délicat suivant. La donnée b) dans la définition d'une courbe elliptique généralisée est un morphisme de schémas sur T

+ : E^reg ×_T E → E,

dont l'un (E^reg ×_T E) n'est pas nécessairement propre sur T. Ceci nous contraint à prouver la proreprésentabilité effective de F_n par une voie détournée, le théorème d'existence de Grothendieck n'étant pas directement applicable.

Les chapitres II, III et le §1 de IV contiennent les outils requis pour surmonter ces difficultés. Ci-dessus, nous avons travaillé sur ℂ. Dans le texte, nous travaillons sur ℤ ou ℤ[ζ_n], selon le cas, et obtenons une courbe M_n[1/n], projective et lisse sur ℤ[ζ_n,1/n], solution d'un problème de module, et telle que X/Γ s'en déduise par extension des scalaires à ℂ.



faisons un usage intensif de techniques de Grothendieck (théorèmes de changement de base (EGA III) et de dualité ([10]) en cohomologie des faisceaux cohérents). Ces techniques fournissent un moyen systématique pour ramener des énoncés relatifs, concernant des schémas sur un schéma de base S, au cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos.

Pour prouver que le foncteur $\overline{F}_n$ est représentable, nous utilisons le critère général de M. Artin [3]. La vérification des hypothèses de ce critère présente le point délicat suivant. La donnée b) dans la définition d'une courbe elliptique généralisée est un morphisme de schémas sur T $+ : E^{reg} \times_T E \to E$, dont l'un $(E^{reg} \times_T E)$ n'est pas nécessairement propre sur T. Ceci nous contraint à prouver la proreprésentabilité effective de F_n par une voie détournée, le théorème d'existence de Grothendieck n'étant pas directement applicable.

Les chapitres II, III et le §1 de IV contiennent les outils requis pour surmonter ces difficultés. Ci-dessus, nous avons travaillé sur $\mathbb{C}$. Dans le texte, nous travaillons sur $\mathbb{Z}$ ou $\mathbb{Z}[\zeta_n]$, selon le cas, et obtenons une courbe $M_n[1/n]$, projective et lisse sur $\mathbb{Z}[\zeta_n, \frac{1}{n}]$, solution d'un problème de module, et telle que X/Γ s'en déduise par extension des scalaires à $\mathbb{C}$.

Authority visual fallback P0009-A02.

4. Parler de la ”réduction mod p de X/Γ” présuppose le choix d’un modèle M_n de X/Γ sur $\mathbb{Z}[\zeta_n]$. La définition de M_n donnée dans le texte équivaut à la suivante : M_n est le normalisé, dans le corps des fonctions de M_n^∘[1/n], de la droite de j (la droite projective sur $\mathbb{Z}[\zeta_n]$, dans laquelle M_n s’envoie par l’application ”invariant modulaire de la courbe elliptique universelle”). Soit encore M_n^∘ la courbe affine d’anneau de coordonnées le normalisé de $\mathbb{Z}[\zeta_n][j]$ dans l’anneau des coordonnées de M_n^∘. On montre dans le texte que

M_n[1/n] = M_n ⊗_{$\mathbb{Z}$[ζ_n]} $\mathbb{Z}$[ζ_n,1/n] et

M_n^∘[1/n] = M_n^∘ ⊗_{$\mathbb{Z}$[ζ_n]} $\mathbb{Z}$[ζ_n,1/n].

Nous prouvons les résultats suivants :

a) La courbe modulaire M_n est projective sur $\mathbb{Z}[\zeta_n]$, et lisse en dehors d’un ensemble fini de points de M_n^∘, les points supersinguliers de caractéristique divisant n.

b) Il existe une famille finie de points f_i de M_n à valeurs dans $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ (= des sections du morphisme de schéma M_n → Spec($\mathbb{Z}[\zeta_n]$)), telles que

b1) les sections f_i sont disjointes (= les points f_i sont incongruents modulo tout idéal premier de $\mathbb{Z}[\zeta_n]$) ;

b2) M_n^∘ est le complément dans M_n de la réunion des ”sections à l’infini” f_i.

c) Soit $\mathfrak{p}$ un idéal premier de $\mathbb{Z}[\zeta_n]$, divisant le facteur premier p de n. Nous déterminons l’ensemble des composantes irréductibles de la réduction de M_n modulo $\mathfrak{p}$. Pour décrire le résultat, nous supposerons que n est le produit de deux entiers ≥ 3 premiers entre eux, n’ et n”. Sous cette hypothèse, M_n[1/n’] est le normalisé dans M_n^∘[1/n] du schéma M_{n’}[1/n’], dont nous connaissons une interprétation modulaire. Les images réciproques sur M_{n’}^∘[1/n’] et M_{n”}^∘[1/n”] des



Authority visual fallback P0010-A02.

courbes elliptiques universelles sur M_{n'}^∘[1/n'] et M_{n''}^∘[1/n''] se recollent et fournissent une courbe elliptique universelle E sur M_n^∘. La structure de niveau

α : E_n ≃ (ℤ/n)²

sur M_n^∘[1/n] se prolonge en un morphisme de schéma en groupes sur M_n^∘

α^−1 : (ℤ/n)² → E_n.

La composante p-primaire de α^−1 est un morphisme

β(p) : (ℤ/p^k)² → E_{p^k}.

Les points supersinguliers de caractéristique p de M_𝔭 (p|n) sont ceux en lesquels β(p) est nul. Les composantes irréductibles de la réduction de M_n modulo 𝔭 sont en correspondance biunivoque avec les sous-groupes cycliques d'ordre p^k de (ℤ/p^k)² (les points de ℙ¹(ℤ/p^k)) : aux points non supersinguliers de la composante d'indice A ⊂ (ℤ/p^k)², le noyau de β(p) est A. Nous prouvons que ces composantes irréductibles sont unibranches, et que deux quelconques d'entre elles se recoupent en tous les points supersinguliers.

Les composantes irréductibles de la réduction de M_n modulo p avaient été déterminées par Pjateckii-Shapiro (voir son article dans ce volume). Il travaille malheureusement avec PGL(2) plutôt qu'avec GL(2), de sorte que ses résultats sont plus embrouillés que les nôtres.

Sous la même hypothèse sur n que ci-dessus, l'un de nous (P. Deligne) a récemment prouvé que ces composantes irréductibles sont en fait lisses, et que M_n est un schéma régulier.

Pour étudier M_n, la première étape est de recouvrir par des ouverts ayant une interprétation modulaire l'ouvert M_n^h de M_n obtenu en ôtant les points supersinguliers de caractéristique divisant n. On y arrive en étudiant le schéma de modules qui classifie les courbes elliptiques munies d'un isomorphisme


Les points supersinguliers de caractéristique p de $M_n(p|n)$ sont ceux en lesquels $\beta(p)$ est nul. Les composantes irréductibles de la réduction de M_n modulo p sont en correspondance biunivoque avec les sous-groupes cycliques d'ordre p^k de $(\mathbb{Z}/p^k)^2$ (les points de $\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/p^k)$) : aux points non supersinguliers de la composante d'indice $A \subset (\mathbb{Z}/p^k)^2$, le noyau de $\beta(p)$ est A. Nous prouvons que ces composantes irréductibles sont unibranches, et que deux quelconques d'entre elles se recoupent en tous les points supersinguliers.

Les composantes irréductibles de la réduction de M_n modulo p avaient été déterminées par Pjateckii-Shapiro (voir son article dans ce volume). Il travaille malheureusement avec PGL(2) plutôt qu'avec GL(2), de sorte que ses résultats sont plus embrouillés que les nôtres.

Sous la même hypothèse sur n que ci-dessus, l'un de nous (P. Deligne) a récemment prouvé que ces composantes irréductibles sont en fait lisses, et que M_n est un schéma régulier.

Pour étudier M_n, la première étape est de recouvrir par des ouverts ayant une interprétation modulaire l'ouvert M_n^h de M_n obtenu en ôtant les points supersinguliers de caractéristique ℓ divisant n. On y arrive en étudiant le schéma de modules qui classifie les courbes elliptiques munies d'un isomorphisme

Authority visual fallback P0011-A02.

α : E_n ≃ μ_n × ℤ/n.

Une interprétation modulaire permet

a) de déterminer l’ensemble des points de M_n sur un corps algébriquement clos ;

b) de prouver la lissité de M_n^h sur ℤ[ζ_n]. Il reste, et c’est le point le plus délicat, à étudier les points supersinguliers.

5. Il est sans doute possible d’étudier la structure à l’infini de M_n par voie rigide-analytique, à l’aide de la théorie de la courbe de Tate, sans donner au préalable de l’infini une description modulaire. Une telle approche risque même d’être la seule praticable dans l’étude à l’infini de schémas de modules de dimension supérieure. Elle nous a souvent servi de guide heuristique (voir ci-dessous). Toutefois, pour être rendue précise, elle requiert des préliminaires rigides- analytiques dont nous avons voulu nous dispenser.

Ceci explique que la courbe de Tate n’apparaisse que dans l’ultime chapitre VII. Nous l’utilisons pour déduire des propriétés à distance finie des M_n et de leur réduction modulo p des résultats sur le développement des formes modulaires en série de Fourier. Nous prouvons notamment les résultats suivants.

− L’algèbre graduée des formes modulaires sur X/Γ dont le développement à toutes les pointes est à coefficients dans ℤ[ζ_n] est une algèbre de type fini sur ℤ[ζ_n].

− Si l’idéal premier 𝔭 de ℤ[ζ_n] ne divise pas n, et qu’en une pointe le développement en série de Fourier d’une forme modulaire φ sur X/Γ est à coefficients dans ℚ[ζ_n] et 𝔭-entier, le développement de φ aux autres pointes a les mêmes propriétés.

On donne aussi des indications fragmentaires sur le cas où 𝔭 divise n.



5. Il est sans doute possible d'étudier la structure à l'infini de M_n par voie rigide-analytique, à l'aide de la théorie de la courbe de Tate, sans donner au préalable de l'infini une description modulaire. Une telle approche risque même d'être la seule praticable dans l'étude à l'infini de schémas de modules de dimension supérieure. Elle nous a souvent servi de guide heuristique (voir ci-dessous). Toutefois, pour être rendue précise, elle requiert des préliminaires rigides-analytiques dont nous avons voulu nous dispenser.

Ceci explique que la courbe de Tate n'apparaisse que dans l'ultime chapitre VII. Nous l'utilisons pour déduire des propriétés à distance finie des M_n et de leur réduction modulo p des résultats sur le développement des formes modulaires en série de Fourier. Nous prouvons notamment les résultats suivants.

- L'algèbre graduée des formes modulaires sur X/Γ dont le développement à toutes les pointes est à coefficients dans $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ est une algèbre de type fini sur $\mathbb{Z}[\zeta_n]$.

- Si l'idéal premier $\mathfrak{p}$ de $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ ne divise pas n, et qu'en une pointe le développement en série de Fourier d'une forme modulaire φ sur X/Γ est à coefficients dans $\mathbb{Q}[\zeta_n]$ et $\mathfrak{p}$-entier, le développement de φ aux autres pointes a les mêmes propriétés.

On donne aussi des indications fragmentaires sur le cas où $\mathfrak{p}$ divise n.

Authority visual fallback P0012-A02.

Authority page 13; collected-paper page 506; original folio 155.

6. Notre usage heuristique de la courbe de Tate repose sur les principes sui- vants.

a) A l’aide de la courbe de Tate, on peut deviner ou démontrer ce qui se passe au voisinage de l’infini.

b) En dehors des points supersinguliers, la situation est partout la même, et en particulier la même qu’au voisinage de l’infini.

A ces principes s’ajoute le suivant.

c) Géométriquement, i.e. après extension des scalaires (ou du corps résiduel) à $\mathbb{F}_p$, la situation est la même aux divers points supersinguliers de caractéristique p.

La théorie locale (formelle) de M_n au voisinage des points géométriques correspondant à une courbe elliptique E sur $\mathbb{F}_p$ est gouvernée par le groupe p-divisible D_p(E) = ⋃ E_{p^n}, soit essentiellement par le groupe formel complété de E à l’origine. Ceci résulte du théorème de Serre-Tate selon lequel E et ce groupe p-divisible ont même théorie des déformations. Les principes b) et c) en résultent, car ce groupe p-divisible ne dépend, à isomorphisme près, que du caractère ordinaire ou supersingulier de E.

7. Soient H une algèbre de quaternions indéfinie, de discriminant D, sur $\mathbb{Q}$ et Δ un sous-groupe de congruence du groupe des unités de H. Le groupe Δ est un sous-groupe discret à quotient compact de $SL(2,\mathbb{R})$. La courbe complète X/Δ paramétrise des variétés abéliennes de dimension 2, A munies d’un homomor- phisme d’un ordre de H dans End(A) (des ”fausses courbes elliptiques”, dans la terminologie de Serre). Nos méthodes s’appliquent à l’étude de X/Δ et de sa réduc- tion mod p, pour autant que p soit premier à D.

Les remarques suivantes permettent même de déduire de théorèmes pour M_n des théorèmes sur la structure locale de X/Δ.



6. Notre usage heuristique de la courbe de Tate repose sur les principes suivants.

a) A l'aide de la courbe de Tate, on peut deviner ou démontrer ce qui se passe au voisinage de l'infini.

b) En dehors des points supersinguliers, la situation est partout la même, et en particulier la même qu'au voisinage de l'infini.

A ces principes s'ajoute le suivant.

c) Géométriquement, i.e. après extension des scalaires (ou du corps résiduel) à $\bar{F}_p$, la situation est la même aux divers points supersinguliers de caractéristique p.

La théorie locale (formelle) de M_n au voisinage des points géométriques correspondant à une courbe elliptique E sur $\bar{F}_p$ est gouvernée par le groupe p-divisible $D_p(E)=\bigcup E_{p^n}$, soit essentiellement par le groupe formel complété de E à l'origine. Ceci résulte du théorème de Serre-Tate selon lequel E et ce groupe p-divisible ont même théorie des déformations. Les principes b) et c) en résultent, car ce groupe p-divisible ne dépend, à isomorphisme près, que du caractère ordinaire ou supersingulier de E.

Authority visual fallback P0013-A01.

Authority page 14 ; collected-paper page 507 ; original folio 156.

d) Soient $\mathcal{O}$ un ordre de H, avec $\mathcal{O} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_p \simeq GL(2,\mathbb{Z}_p)$, et e un idempotent non trivial de $\mathcal{O} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_p$. Si A est un schéma abélien de dimension 2 sur un corps al- gébriquement clos k de caractéristique p, muni de $\mu : \mathcal{O} \to End(A)$, le complété $\mathcal{O} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_p$ agit sur le groupe p-divisible $D_p(A) = \bigcup A_{p^n}$, et $D_p A) = e \cdot D_p(A) \oplus (1-e)D_p(A)$. Le schéma abélien A, muni de μ, et le groupe p-divisible $eD_p(A)$, ont même théorie des déformations.

e) le groupe p-divisible $eD_p(A)$ est isomorphe à $D_p(E)$ pour E une courbe ellip- tique soit ordinaire, soit supersingulière.

La réduction modulo p de X/Δ a été étudiée par Morita. Il obtient aussi des résultats dans le cas bien plus difficile où p|D.

8. Dans la littérature des schémas de modules, le langage des Foundations de Weil est parfois utilisé. Selon qu'on utilise ce langage, ou celui de Grothendieck, on met l'accent sur l'une des deux visions suivantes de ce qu'est un schéma X sur un corps de nombres K.

a) C'est un schéma X, muni d'un morphisme $X \to Spec(K)$. Cette vision est celle qui domine nos notations.

b) C'est un schéma $\bar{X}$ sur la clôture algébrique $\bar{K}$ de K, qui est défini sur K. Cette vision transparaît dans la technique de démonstration qui consiste à ramener un énoncé relatif à un S-schéma X à un énoncé relatif à ses fibres géométriques $X_{\bar{s}}$, obtenue par extension des scalaires de S à un corps algébriquement clos $k(\bar{s})$.

La "restriction des scalaires à la Grothendieck" de K à $\mathbb{Q}$ prend un aspect très différent selon la vision adoptée.

a) Au K-schéma X on associe le $\mathbb{Q}$-schéma défini par X et le morphisme composé $X \to Spec(K) \to Spec(\mathbb{Q})$. On ne le distingue pas de X dans la notation. Un schéma est d'abord un $\mathbb{Q}$-schéma ; si c'est un K-schéma, il est muni d'un $\mathbb{Q}$-morphisme $X \to Spec(K)$.

b) Soit I l'ensemble des plongements de K dans $\bar{\mathbb{Q}}$. Pour $\sigma \in I$, posons



Authority visual fallback P0014-A02.

$\bar{X}_\sigma = X \otimes_{\{K,\sigma\}} \bar{\mathbb{Q}}$. On a $X \otimes_{\mathbb{Q}} \bar{\mathbb{Q}} = \sum_{\{\sigma\in I\}} \bar{X}_\sigma$. Le $\mathbb{Q}$-schéma déduit comme en a) d'un K-schéma apparaît comme la somme disjointe des conjugués $\bar{X}_\sigma$ de $\bar{X}$, cette somme étant en outre définie sur $\mathbb{Q}$. Le $\mathbb{Q}$-morphisme $X \to \mathrm{Spec}(K)$ s'interprète comme l'application de cette somme dans l'ensemble d'indices $I = \mathrm{Spec}(K) \otimes_{\mathbb{Q}} \bar{\mathbb{Q}}$.

Pour $M_n^\circ[1/n]$, la situation est la suivante : le schéma $M_n^\circ[1/n]$ repré- sente le foncteur des classes d'isomorphie de courbes elliptiques E/T, munies d'un isomorphisme $\alpha : E_n \simeq (\mathbb{Z}/n)^2$. Un tel couple (E,α) définit (par la théorie de la forme alternée e_n) une racine primitive $n^{ième}$ de l'unité $\zeta(\alpha)$ sur T, d'où un morphisme de schémas

$(E,\alpha) \mapsto \zeta(\alpha) : M_n^\circ[1/n] \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\zeta_n,1/n])$.

Vu comme $\mathbb{Z}[\zeta_n,1/n]$-schéma, $M_n^\circ[1/n]$ classifie les (E,α)/T, T un $\mathbb{Z}[\zeta_n,1/n]$-schéma, avec $\zeta(\alpha) = \zeta_n$.

On a

$M_n^\circ[1/n] \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \mathbb{C} = X/\Gamma$;

tandis que, si l'on pose $X^\pm = \mathbb{C} - \mathbb{R}$,

$M_n^\circ[1/n] \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C} = X^\pm \times GL(2,\mathbb{Z}/n) / GL(2,\mathbb{Z})$

est somme de $\varphi(n)$ copies de X/Γ.

9. Une courbe elliptique sur un corps algébriquement clos k a un ou des automor- phismes non triviaux. Ceci exclut que le foncteur qui à un schéma T associe l'ensemble des classes d'isomorphie de courbes elliptiques E sur T soit représen- table : ce n'est pas même un faisceau. On peut y obvier de deux manières.

a) Systématiquement imposer des structures de niveau additionnelles, qui éliminent ces automorphismes. C'est ce que nous avons fait dans cette introduction.

b) Employer le langage des champs algébriques, pour lequel nous renvoyons à [8] et [17]. C’est ce que nous faisons dans le texte, pour les raisons suivantes.

1. Imposer une structure de niveau additionnelle modifie le comportement à l’infini des objets étudiés (M_{ñm} se ramifie sur M_n le long de l’infini).

2. Les calculs et démonstrations deviennent plus simples lorsqu’on n’a pas à se préoccuper de structures additionnelles importunes.

Au chapitre VI, nous déduisons de nos résultats sur les champs modulaires des résultats sur les schémas grossiers de modules (= coarse modular schemes), ha- bituellement considérés.

10. Nous renvoyons à la table des matières et aux introductions des divers chapitres pour une description plus précise de leur contenu.

Nous remercions N. Katz de l’aide qu’il nous a apportée.


Au chapitre VI, nous déduisons de nos résultats sur les champs modulaires
des résultats sur les schémas grossiers de modules (= coarse modular schemes), ha-
bituellement considérés.

10. Nous renvoyons à la table des matières et aux introductions des divers
chapitres pour une description plus précise de leur contenu.

Nous remercions N. Katz de l'aide qu'il nous a apportée.

Authority visual fallback P0016-A02.

Notations

Le travail est divisé en chapitres ; chaque chapitre est divisé en para- graphes. Les références internes à un même chapitre ne mentionnent pas le numéro de ce chapitre.

Nous utiliserons librement les définitions et notations de la théorie des champs algébriques telles qu’elles sont exposées dans [8] §4. Toutefois, contraire- ment à la terminologie de loc. cit., un morphisme de catégories fibrées en groupoïdes

$\varphi : \mathfrak{M}_1 \to \mathfrak{M}_2$

sera dit représentable si pour chaque morphisme $x : X \to \mathfrak{M}_2$ d’un schéma X vers $\mathfrak{M}_2$, le produit fibré $\mathfrak{M}_1 \times_{\mathfrak{M}_2} X$ est un espace algébrique.

Un schéma en groupes G sur un schéma S est parfois appelé un S-groupe. Le sous-schéma en groupes, noyau de la multiplication par n dans G, est noté G_n.

Soit X un S-schéma. Si T est un S-schéma, nous noterons par X_T le produit fibré $X \times_S T$. Si $S = \mathrm{Spec}(A)$ et $T = \mathrm{Spec}(B)$, X_B, ou $X \otimes_A B$ ont la même signification. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $X[1/n] = X \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[1/n]$.

On pose $\zeta_n = \exp(2\pi i/n)$.

Pour les principes qui gouvernent nos notations pour les champs modulaires, nous référons au §0 du chapitre III.



Notations

Le travail est divisé en chapitres; chaque chapitre est divisé en paragraphes. Les références internes à un même chapitre ne mentionnent pas le numéro de ce chapitre.

Nous utiliserons librement les définitions et notations de la théorie des champs algébriques telles qu'elles sont exposées dans [8] §4. Toutefois, contrairement à la terminologie de loc. cit., un morphisme de catégories fibrées en groupoïdes

$$\varphi : \mathcal{H}_1 \to \mathcal{H}_2$$

sera dit représentable si pour chaque morphisme $x : X \to \mathcal{H}_2$ d'un schéma X vers $\mathcal{H}_2$, le produit fibré $\mathcal{H}_1 \times_{\mathcal{H}_2} X$ est un espace algébrique.

Un schéma en groupes G sur un schéma S est parfois appelé un S-groupe. Le sous-schéma en groupes, noyau de la multiplication par n dans G, est noté

Authority visual fallback P0017-A01.

Authority page 18 ; collected-paper page 511 ; original folio 160.

I Préliminaires

Ce chapitre rassemble des résultats bien connus dont nous aurons à faire usage. Le lecteur est invité à ne s'y reporter qu'en cas de besoin.

1. Schémas en courbes.

1.0. Dans ce paragraphe, on appelle schéma en courbes sur un schéma S un morphisme propre et plat de présentation finie de dimension relative au plus 1.

1.1. Si C/S est un schéma en courbes sur S, la caractéristique d'Euler- Poincaré $\chi(\mathcal{O}_{C_s})$ des fibres est localement constante (EGA III, 7.9.). On définit le genre arithmétique g_s de C_s par

$1 - g_s = \chi(C_s, \mathcal{O}_{C_s})$.

Si la caractéristique d'Euler-Poincaré des fibres est constante de valeur $1 - g$, on appelle C|S un schéma en courbes de genre g ou simplement une courbe de genre g sur S.

1.2. Un morphisme $p : X \to S$ est dit de Cohen-Macaulay s'il est plat de présen- tation finie et que ses fibres (géométriques) sont des schémas de Cohen-Macaulay.

Un schéma en courbes de Cohen-Macaulay sur S est un schéma en courbes $p : C \to S$ qui est de Cohen-Macaulay et dont les fibres géométriques sont purement de dimension un. De même, quand on parlera de courbes lisses, ou réduites, ou intégres, on sous-entendra "purement de dimension un".

Pour S = Spec(A), on parlera indifféremment de courbes sur S ou de courbes sur A.



-160-

DeRa-18

I Préliminaires

Ce chapitre rassemble des résultats bien connus dont nous aurons à faire usage. Le lecteur est invité à ne s'y reporter qu'en cas de besoin.

1. Schémas en courbes.

1.0. Dans ce paragraphe, on appelle schéma en courbes sur un schéma S un morphisme propre et plat de présentation finie de dimension relative au plus 1.

1.1. Si C/S est un schéma en courbes sur S, la caractéristique d'Euler-Poincaré $\chi(\mathcal{O}_{C_s})$ des fibres est localement constante (EGA III, 7.9.). On définit le genre arithmétique g de C_s par

$$1 - g_s = \chi(C_s, \mathcal{O}_{C_s}) .$$

Si la caractéristique d'Euler-Poincaré des fibres est constante de valeur $1 - g$, on appelle $C|S$ un schéma en courbes de genre g ou simplement une courbe de genre g sur S.

Authority visual fallback P0018-A01.

Authority page 19 ; collected-paper page 512 ; original folio 161.

2. Dualité en cohomologie des faisceaux cohérents.

2.1. Nous nous proposons de rappeler ce que fournit la théorie de dualité de Grothendieck pour un morphisme p : X → S lorsque

a) p est de Cohen-Macaulay purement de dimension relative d ; et que

b) S est noethérien.

Dans les applications que nous avons en vue, nous pourrions toujours nous ramener au cas où p est de plus quasi-projectif.

Le complexe dualisant relatif Rp^ !$\mathcal{O}$_S [10] n'a qu'un seul faisceau de cohomologie non nul, celui de degré −d ; c'est le faisceau des différentielles régulières

(2.1.1.) ω_{X/S} = $\mathcal{H}$^{−d}(Rp^ !$\mathcal{O}$_S)

([10] V. 9.7.). Ce faisceau est plat sur S. Sa formation commute à tout changement de base S' → S et à la localisation étale sur X (voir [10] ou [34]).

2.2. Si p est de plus propre, on définit un morphisme "trace"

(2.2.1) Tr : R^d p_*(ω_{X/S}) → $\mathcal{O}$_S

de formation compatible à tout changement de base. Le théorème de dualité affirme que, pour tout complexe borné de faisceaux cohérents K, la flèche déduite de Tr

(2.2.2.) Rp_* R Hom_{$\mathcal{O}$_X}(K,ω_{X/S})[−d] ≃ R Hom_{$\mathcal{O}$_S}(Rp_*K,$\mathcal{O}$_S)

est un isomorphisme.

Si K est réduit à un faisceau localement libre F placé en degré 0 et que les faisceaux R^i p_*(F) sont localement libres, (2.2.2.) devient


(2.1.1.) $\omega_{X/S} = \mathcal{H}^{-d}(Rp^! \mathcal{O}_S)$

([10] V. 9.7.). Ce faisceau est plat sur S . Sa formation commute à tout changement de base S' → S et à la localisation étale sur X (voir [10] ou [34]).

2.2. Si p est de plus propre, on définit un morphisme "trace"

(2.2.1) $Tr : R^d p_*(\omega_{X/S}) \to \mathcal{O}_S$

de formation compatible à tout changement de base. Le théorème de dualité affirme que, pour tout complexe borné de faisceaux cohérents K , la flèche déduite de Tr

(2.2.2.) $Rp_* R \underline{Hom}_{\mathcal{O}_X}(K, \omega_{X/S})[-d] \xrightarrow{\sim} R \underline{Hom}_{\mathcal{O}_S}(Rp_* K, \mathcal{O}_S)$

est un isomorphisme.

Si K est réduit à un faisceau localement libre F placé en degré 0 et que les faisceaux $R^i p_*(F)$ sont localement libres, (2.2.2.) devient

Authority visual fallback P0019-A02.

(2.2.3.) R^{d−j}p_*(F^∨ ⊗ ω_{X/S}) ≃ R^j p_*(F)^∨

(où le ∨ désigne le dual d'un $\mathcal{O}$_X-module resp. d'un $\mathcal{O}$_S-module).

ω_{X/S} est un faisceau inversible si et seulement si p est de Gorenstein [10].

Pour S non nécessairement noethérien, on définit ω_{X/S} et Tr par passage à la limite ; pour K un complexe borné de faisceaux localement libres, (2.2.2.) reste valable, et se prouve par passage à la limite.

Pour S le spectre d'un corps k, ω_{X/S} se notera encore ω_{X/k}, voire simplement ω_X.

2.3. Soient X une courbe réduite sur un corps algébriquement clos k, et π : $\tilde{X}$ → X la normalisée de X. Le faisceau ω_X s'identifie au sous-faisceau suivant de l'image directe par π du faisceau des différentielles méromorphes sur X. Les sections de ω_X sur U sont les différentielles méromorphes ω sur π^{−1}(U) telles que, pour tout P ∈ U et tout f ∈ $\mathcal{O}$_{X,P},

∑_{R↦P} Res_R(f·ω) = 0.

Si X n'a comme singularités que des points doubles ordinaires P_i, et que π^{−1}(P_i) = {P'_i,P"_i}, les différentielles régulières sur X s'identifient aux formes différentielles méromorphes ω sur $\tilde{X}$ régulières en dehors des P'_i,P"_i, ayant au pis un pôle simple en les P'_i et P"_i et qui vérifient

Res_{P'_i}(ω) + Res_{P"_i}(ω) = 0

([27], Chapitre IV).


reste valable, et se prouve par passage à la limite.

Pour S le spectre d'un corps k, $\omega_{X/S}$ se notera encore $\omega_{X/k}$, voire simplement ω_X.

2.3. Soient X une courbe réduite sur un corps algébriquement clos k, et $\pi : \tilde{X} \to X$ la normalisée de X. Le faisceau ω_X s'identifie au sous-faisceau suivant de l'image directe par π du faisceau des différentielles méromorphes sur X. Les sections de ω_X sur U sont les différentielles méromorphes ω sur $\pi^{-1}(U)$ telles que, pour tout $P \in U$ et tout $f \in \mathcal{O}_{X,P}$,

$$\sum_{R \mapsto P} \mathrm{Res}_R(f\cdot\omega) = 0$$

Si X n'a comme singularités que des points doubles ordinaires P_i, et que $\pi^{-1}(P_i) = \{P_i', P_i''\}$, les différentielles régulières sur X s'identifient aux formes différentielles méromorphes ω sur $\tilde{X}$ régulières en dehors des P_i', P_i'', ayant au pis un pôle simple en les P_i' et P_i'' et qui vérifient

$$\mathrm{Res}_{P_i'}(\omega) + \mathrm{Res}_{P_i''}(\omega) = 0$$

([27], Chapitre IV).

Authority visual fallback P0020-A02.

3. Rappels sur le foncteur de Picard.

3.1. Soit p : X → S un morphisme propre plat et de présentation finie. On appelle foncteur de Picard relatif de X au-dessus de S et on note Pic_{X/S} le faisceau fppf associé au préfaisceau

(3.1.1) S' ↦ Pic(X ×_S S') = groupe des classes d'isomorphie de faisceaux inversibles sur X ×_S S'.

Le morphisme canonique Pic(X)/Pic(S) → Pic_{X/S}(S) est injectif si p_*$\mathcal{O}$_X = $\mathcal{O}$_S. Il est bijectif si de plus p possède une section (TDTE V.2.4.).

3.2. On dit que p est cohomologiquement plat en dimension 0 (EGA III, 7.), ou simplement cohomologiquement plat, si la formation de p_*$\mathcal{O}$_X commute à tout changement de base S' → S. Un théorème fondamental de M. Artin affirme que, si p est propre, plat de présentation finie et cohomologiquement plat, alors Pic_{X/S} est représentable par un espace algébrique localement de présentation finie sur S ([2] Thm. 7.3). Si de plus, p : X → S est un schéma en courbes, Pic_{X/S} est lisse sur S.

Si Pic_{X/S} est représentable par un espace algébrique, on note Pic^o_{X/S} le sous-foncteur en groupes de Pic_{X/S}, composante neutre de Pic_{X/S}. Si p : X → S est un schéma en courbes, il est représentable par un espace algébrique.

3.3. Soit C un courbe propre sur un corps k. Si $\mathcal{L}$ est un faisceau inversible sur C, on définit son degré deg_C($\mathcal{L}$) par la formule (de Riemann-Roch) :

(3.3.1) $\chi(\mathcal{L}) = \deg_C(\mathcal{L}) + \chi(\mathcal{O}_C)$

On a alors (cf. [15])

(3.3.2) $\deg_C(\mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{L}_2) = \deg_C(\mathcal{L}_1) + \deg_C(\mathcal{L}_1)$



ment de base $S' \to S$. Un théorème fondamental de M. Artin affirme que, si p est propre, plat de présentation finie et cohomologiquement plat, alors $\mathrm{Pic}_{X/S}$ est représentable par un espace algébrique localement de présentation finie sur S ([2] Thm. 7.3). Si de plus, $p : X \to S$ est un schéma en courbes, $\mathrm{Pic}_{X/S}$ est lisse sur S .

Si $\mathrm{Pic}_{X/S}$ est représentable par un espace algébrique, on note $\mathrm{Pic}^{0}_{X/S}$ le sous-foncteur en groupes de $\mathrm{Pic}_{X/S}$ composante neutre de $\mathrm{Pic}_{X/S}$. Si $p : X \to S$ est un schéma en courbes, il est représentable par un espace algébrique.

3.3. Soit C un courbe propre sur un corps k . Si $\mathcal{L}$ est un faisceau inversible sur C , on définit son degré $\deg_C(\mathcal{L})$ par la formule (de Riemann-Roch) :

(3.3.1) $\chi(\mathcal{L}) = \deg_C(\mathcal{L}) + \chi(\mathcal{O}_C)$

On a alors (cf. [15])

(3.3.2) $\deg_C(\mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{L}_2) = \deg_C(\mathcal{L}_1) + \deg_C(\mathcal{L}_1)$

Authority visual fallback P0021-A02.

Authority page 22 ; collected-paper page 515 ; original folio 164.

(3.3.3) Si C a pour composantes irréductibles réduites les sous-schémas D_i, et si D_i est de multiplicité (= longueur de l'anneau local de C au point maximal de D_i) n_i, alors

deg_C($\mathcal{L}$) = $\sum$ n_i deg_{D_i}($\mathcal{L}$), où on a posé

(3.3.4) deg_{D_i}($\mathcal{L}$) = deg_{D_i}($\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}$_{D_i}).

3.4. Soit p : C → S une courbe sur S et $\mathcal{L}$ un faisceau inversible sur C. Le degré de $\mathcal{L}$ sur les fibres C_s (s ∈ S) de C est localement constant et définit un morphisme de faisceaux abéliens (pour la topologie fppf) :

(3.4.1) deg : Pic_{C/S} → $\mathbb{Z}$.

On désigne par Pic^{[o]}_{C/S} le noyau de (3.4.1). (Voir 3.7. pour la relation entre Pic^o et Pic^{[o]} dans un cas spécial).

3.5. Soit C une courbe réduite sur un corps algébriquement clos k. Le diagramme des composantes irréductibles de C est le graphe non orienté Γ(C) suivant, dans lequel on distingue deux espèces de sommets.

(3.5.1) L'ensemble Γ^o = 'Γ^o ⊔ "Γ^o des sommets de Γ(C) est somme de l'ensemble 'Γ^o des composantes irréductibles de C et de l'ensemble "Γ^o des points singuliers de C.

(3.5.2) Pour p ∈ C(k), appelons branches de C en p les points de la normalisée $\tilde{C}$ de C d'image p. L'ensemble Γ^1 des arêtes de Γ(C) est l'ensemble des couples (p,b) formés d'un point singulier p et d'une branche b de C en p.

(3.5 3) Une arête (p,b) joint p ∈ "Γ^o à celle des composantes irréductibles de C, identifiée à une composante irréductible de $\tilde{C}$, qui contient b.



On désigne par $Pic^{[o]}_{C/S}$ le noyau de (3.4.1). (Voir 3.7. pour la relation entre Pic° et $Pic^{[o]}$ dans un cas spécial).

3.5. Soit C une courbe réduite sur un corps algébriquement clos k. Le diagramme des composantes irréductibles de C est le graphe non orienté $\Gamma(C)$ suivant, dans lequel on distingue deux espèces de sommets.

(3.5.1) L'ensemble $\Gamma^0 = {}'\Gamma^0 \amalg {}''\Gamma^0$ des sommets de $\Gamma(C)$ est somme de l'ensemble ${}'\Gamma^0$ des composantes irréductibles de C et de l'ensemble ${}''\Gamma^0$ des points singuliers de C.

(3.5.2) Pour $p \in C(k)$, appelons branches de C en p les points de la normalisée $\tilde{C}$ de C d'image p. L'ensemble Γ^1 des arrêtes de $\Gamma(C)$ est l'ensemble des couples (p,b) formés d'un point singulier p et d'une branche b de C en p.

(3.5.3) Une arrête (p,b) joint $p \in {}''\Gamma^0$ à celle des composantes irréductibles de C, identifiée à une composante irréductible de $\tilde{C}$, qui contient b.

Authority visual fallback P0022-A02.

Authority page 23; collected-paper page 516; original folio 165.

Exemples 3.5.4. Notons ○ les points de ’Γ^o et ⊗ ceux de ”Γ^o. Les courbes suivantes ont les diagrammes suivants :

courbe diagramme

Si C est purement de dimension un, non nécessairement réduite, on pose Γ(C) = Γ(C_red).

3.6. On note Aut(Γ(C)) le groupe des automorphismes du graphe Γ(C) qui transforment ’Γ^o(C) en ’Γ^o(C) et ”Γ^o(C) en ”Γ^o(C).

Dans le cas où Γ(C) est un cycle à 2n sommets et 2n arêtes :

nous dirons qu’un élément de Aut(Γ(C)) est une rotation, ou qu’il préserve l’orientation de Γ(C) s’il induit l’identité sur le premier groupe de cohomologie entière H^1(Γ(C),$\mathbb{Z}$). Le sous-groupe distingué Aut^+(Γ(C)) de Aut(Γ(C)) formé des rotations est cyclique d’ordre n et Aut(Γ(C)) est le groupe dihédral produit semi-direct d’une ”réflexion” par Aut^+(Γ(C)) ≃ $\mathbb{Z}$/n$\mathbb{Z}$.

3.7. Soient k un corps algébriquement clos, et C une courbe propre et réduite sur k, dont les singularités sont formellement isomorphes à celle de la réunion des axes de coordonnées dans un espace affine $\mathbb{A}$^n.



Si C est purement de dimension un, non nécessairement réduite, on pose $\Gamma(C) = \Gamma(C_{red})$.

3.6. On note $Aut(\Gamma(C))$ le groupe des automorphismes du graphe $\Gamma(C)$ qui transforment ${}'\Gamma^0(C)$ en ${}'\Gamma^0(C)$ et ${}''\Gamma^0(C)$ en ${}''\Gamma^0(C)$.

Dans le cas où $\Gamma(C)$ est un cycle à $2n$ sommets et $2n$ arrêtes :

nous dirons qu'un élément de $Aut(\Gamma(C))$ est une rotation, ou qu'il préserve l'orientation de $\Gamma(C)$ s'il induit l'identité sur le premier groupe de cohomologie entière $H^1(\Gamma(C), \mathbb{Z})$. Le sous-groupe distingué $Aut^+(\Gamma(C))$ de $Aut(\Gamma(C))$ formé des rotations est cyclique d'ordre n et $Aut(\Gamma(C))$ est le groupe dihédral produit semi-direct d'une "réflexion" par $Aut^+(\Gamma(C)) \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

3.7. Soient k un corps algébriquement clos, et C une courbe propre et réduite sur k, dont les singularités sont formellement isomorphes à celle de la réunion des axes de coordonnées dans un espace affine A^n.

Authority visual fallback P0023-A02.

Authority page 24; collected-paper page 517; original folio 166.

Le schéma de Picard Pic_{C/k} se dévisse comme suit. Soient (D_i)_{i∈I} les composantes irréductibles de C, D̃_i la normalisée de D_i et C̃ = ∐ D̃_i la normalisée de C.

a) Le morphisme ”degré total” :

deg_I = (deg_{D_i})_{i∈I} : Pic_{C/k} → $\mathbb{Z}$^I

et surjectif, de noyau Pic^o_{C/k}.

b) Le morphisme

Pic^o_{C/k} → Pic^o_{C̃/k} = ∏ Pic^o_{D̃_i/k}

est surjectif, d’image le plus grand quotient de Pic^o_{C/k} qui soit un schéma abélien. Son noyau est un tore, canoniquement isomorphe à

H^1(Γ(C),$\mathbb{Z}$) ⊗ $\mathbb{G}$_m.

Pour D propre et purement de dimension un sur k, il existe une et une seule courbe C comme plus haut, munie d’un morphisme radiciel C → D ; l’application

Pic_{D/k} → Pic_{C/k}

est surjective de noyau unipotent connexe.

4. Sous-schéma de non-lissité.

Soit f : X → S un morphisme plat de présentation finie purement de dimension relative d.

Il résulte du critère jacobien de lissité que le sous-schéma X^sing de X défini par l’idéal jacobien, i.e. par le d-ième idéal déterminantiel de Ω^1_{X/S}



-166-

DeRa-24

Le schéma de Picard $\mathrm{Pic}_{C/k}$ se dévisse comme suit. Soient $(D_i)_{i\in I}$ les composantes irréductibles de C, $\widetilde{D}_i$ la normalisée de D_i et $\widetilde{C} = \coprod \widetilde{D}_i$ la normalisée de C.

a) Le morphisme "degré total" :

$$\deg_I = (\deg_{D_i})_{i\in I} : \mathrm{Pic}_{C/k} \to \mathbb{Z}^I$$

et surjectif, de noyau $\mathrm{Pic}^0_{C/k}$.

b) Le morphisme

$$\mathrm{Pic}^0_{C/k} \to \mathrm{Pic}^0_{\widetilde{C}/k} = \overline{\prod} \mathrm{Pic}^0_{\widetilde{D}_i/k}$$

est surjectif, d'image le plus grand quotient de $\mathrm{Pic}^0_{C/k}$ qui soit un schéma abélien. Son noyau est un tore, canoniquement isomorphe à

$$H^1(\Gamma(C), \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{G}_m .$$

Pour D propre et purement de dimension un sur k, il existe une et une

Authority visual fallback P0024-A01.

(Bourbaki ; Alg. Comm. Chap. 7, §4, ex. 10) a pour espace topologique sous-jacent l’ensemble des points de X où f est non-lisse. Nous l’appellerons le sous-schéma de non-lissité de X [SGA 7, VI]. Le lien où f est lisse est noté X^reg

5. Rappels sur la théorie des déformations.

5.1. Soit Λ un anneau local noethérien complet de corps résiduel k. Deux cas particulièrement utiles sont les suivants.

a) Λ = k.

b) k est parfait de caractéristique p > 0 et Λ est l’anneau des vecteurs de Witt W(k) (l’unique anneau de valuation discrète complet de corps résiduel k et d’idéal maximal (p)).

On désigne par C_Λ la catégorie des Λ-algèbres locales artiniennes de corps résiduel k et par Ĉ_Λ la catégorie des Λ-algèbres noethériennes locales complètes de corps résiduel k. Un foncteur covariant F de C_Λ vers (Ens) est dit pro-représentable s'il existe R ∈ Ob Ĉ_Λ et un isomorphisme de foncteurs sur C_Λ

(5.1.1) $\hat{\xi}$: Hom(R,A) ⟶̃ F(A).

L'algèbre R est alors uniquement déterminée.

Un foncteur covariant F de Ĉ_Λ dans (Ens) induit par restriction un foncteur F|C_Λ : C_Λ → (Ens). Si F|C_Λ est proreprésentable, on dit qu'il est effectivement proreprésentable s'il existe ξ ∈ F(R) (R comme ci-dessus) qui définisse (5.1.1).

5.2. Considérons les systèmes (M,B,α) du type suivant



On désigne par C_Λ la catégorie des Λ - algèbres locales artiniennes de corps résiduel k et par $\hat{C}_\Lambda$ la catégorie des Λ-algèbres noethériennes locales complètes de corps résiduel k . Un foncteur covariant F de C_Λ vers (Ens) est dit pro-représentable s'il existe $R \in Ob\ \hat{C}_\Lambda$ et un isomorphisme de foncteurs sur C_Λ .

(5.1.1) $\hat{\xi} : Hom(R,A) \xrightarrow{\sim} F(A)$.

L'algèbre R est alors uniquement déterminée.

Un foncteur covariant F de $\hat{C}_\Lambda$ dans (Ens) induit par restriction un foncteur $F|C_\Lambda : C_\Lambda \to$ (Ens) . Si $F|C_\Lambda$ est proreprésentable, on dit qu'il est effectivement proreprésentable s'il existe $\xi \in F(R)$ (R comme ci-dessus) qui définisse (5.1.1) .

5.2. Considérons les systèmes (M,B,α) du type suivant

Authority visual fallback P0025-A02.

Authority page 26 ; collected-paper page 519 ; original folio 168.

a) M est une Λ-algèbre locale noethérienne complète de corps résiduel k ;

b) B est une M-algèbre locale noethérienne complète plate, de corps résiduel k, munie d'un isomorphisme

α : B ⊗_M k ≃ k[[X,Y]]/(XY).

Un tel système (Λ[[t]], A, α_{o/0}) est fourni par la Λ[[t]]-algèbre

A = Λ[[t,X,Y]]/(XY−t).

On démontre dans [8] §1 que ce dernier système est versel. Pour tout (B,M,α), il existe un homomorphisme Λ[[t]] → M tel que (B,α) se déduise de (A,α_{o/0}) par extension des scalaires :

B = A ⊗_{Λ[[t]]} M.

On en déduit facilement l'énoncé suivant :

Proposition 5.3. Soit p : C → S un schéma en courbes sur un schéma noethérien S. Soient s ∈ S, et x ∈ C_s(s). On suppose que C_s présente en x un point double ordinaire à tangentes rationnelles Alors, le complété Ĉ_x de C en x est Ŝ_s-isomorphe à Ŝ_s[[X,Y]]/(XY−t) pour un t ∈ Γ(Ŝ_s,$\mathcal{O}$) convenable.

On a mieux :

Théorème 5.3. Soient p : C → S un schéma en courbes, s ∈ S et x ∈ C_s(s) tel que C_s présente en x un point double ordinaire. Alors, localement pour la topologie étale (au voisinage de x et s), C est S-isomorphe à

X = S[u,v]/(uv−t) ⊂ $\mathbb{A}$^2_S

pour t convenable. Si les tangentes de C_s en x sont rationnelles sur k(s), l'hensélisé C^h_{(x)} de C en x est S^h_{(s)}-isomorphe à l'hensélisé de X en le



On en déduit facilement l'énoncé suivant :

Proposition 5.3. Soit $p : C \to S$ un schéma en courbes sur un schéma noethérien S. Soient $s \in S$, et $x \in C_s(s)$. On suppose que C_s présente en x un point double ordinaire à tangentes rationnelles. Alors, le complété $\hat{C}_x$ de C en x est $\hat{S}_s$-isomorphe à $\hat{S}_s[[X,Y]] / (XY-t)$ pour un $t \in \Gamma(\hat{S}_s, \mathcal{O})$ convenable.

On a mieux :

Théorème 5.3. Soient $p : C \to S$ un schéma en courbes, $s \in S$ et $x \in C_s(s)$ tel que C_s présente en x un point double ordinaire. Alors, localement pour la topologie étale (au voisinage de x et s), C est S-isomorphe à

$$X = S[u,v] / (uv-t) \subset \mathbb{A}^2_S$$

pour t convenable. Si les tangentes de C_s en x sont rationnelles sur k(s), l'hensélisé $C^h_{(x)}$ de C en x est $S^h_{(s)}$-isomorphe à l'hensélisé de X en le

Authority visual fallback P0026-A02.

Authority page 27 ; collected-paper page 520 ; original folio 169.

point (0,0) d'image s, pour t ∈ Γ(S^h_{(s)},$\mathcal{O}$) convenable.

Ce théorème résulte aussitôt du cas particulier où S est supposé de type fini sur $\mathbb{Z}$. Il résulte de 5.2 et de la théorie de R. Elkik de l'algébrisation des modules des singularités isolées.

6. Points de division des courbes elliptiques.

Soit E une courbe elliptique (variété abélienne de dimension un) sur un corps algébriquement clos k.

Pour tout entier n ≥ 1, on sait que le schéma en groupes E_n, noyau de la multiplication par n, est le spectre d'une algèbre de Hopf de dimension n^2 sur k. Si n est inversible dans k, on a E_n ≃ ($\mathbb{Z}$/n)^2.

Si k est de caractéristique p > 0, le noyau du morphisme de Frobenius F : E → E^(p) est de rang p. Il est isomorphe à μ_p ou à α_p. S'il est isomorphe à μ_p, on dit que E est ordinaire, et E_n ≃ $\mathbb{Z}$/n × μ_n. Sinon, on dit que E est supersingulière.

Dans la suite exacte

0 → Ker(F) → E_p → E_p/Ker(F) → 0,

les deux termes extrêmes sont en dualité de Cartier. Si E est supersingulière, E_p est donc isomorphe à α_{p^2}, l'unique extension non triviale annulée par p de α_p par α_p.

Les courbes elliptiques supersingulières sur k sont toutes isogènes, et forment un nombre fini de classes d'isomorphie (cf. [32]).



Pour tout entier $n \neq 1$, on sait que le schema en groupes μ_n, noyau de la multiplication par n, est le spectre d'une algèbre de Hopf de dimension n^2 sur k. Si n est inversible dans k, on a $E_n \simeq (\mathbb{Z}/n)^2$.

Si k est de caractéristique $p > 0$, le noyau du morphisme de Frobenius $F : E \to E^{(p)}$ est de rang p. Il est isomorphe à μ_p ou à α_p. S'il est isomorphe à μ_p, on dit que E est ordinaire, et $E_n \simeq \mathbb{Z}/n \times \mu_n$. Sinon, on dit que E est supersinguliere.

Dans la suite exacte

$$0 \to \mathrm{Ker}(F) \to E_p \to E_p/\mathrm{Ker}(F) \to 0 ,$$

les deux termes extrêmes sont en dualité de Cartier. Si E est supersingulière, E_p est donc isomorphe à α_{p^2}, l'unique extension non triviale annulée par p de α_p par α_p.

Les courbes elliptiques supersingulières sur k sont toutes isogènes, et forment un nombre fini de classes d'isomorphie (cf. [32]).

Authority visual fallback P0027-A02.

Authority page 28 ; collected-paper page 521 ; original folio 170.

7. Rappels d’algèbre commutative.

Nous utiliserons souvent les résultats suivants d’algèbre commutative, pour la démonstration desquels nous renvoyons aux EGA.

(7.1) Soit f : X → Y un morphisme de type fini de schémas noethériens. Si Y est de Cohen-MacAulay et f plat, alors X est de Cohen-MacAulay si et seulement si les fibres de f le sont. Par exemple, si Y est de Cohen-MacAulay et f quasi-fini et plat, X est de Cohen-MacAulay.

Si Y est régulier, X de Cohen-MacAulay et que, au point x ∈ X d’image y ∈ Y, on a

(7.1 1) dim($\mathcal{O}$_{X,x}) = dim($\mathcal{O}$_{Y,y}) + dim($\mathcal{O}$_{X,x} ⊗_{$\mathcal{O}$_{Y,y}} k(y)),

alors f est plat en x. La condition (7.1.1) est vérifiée si f est quasi-fini dominant et X irréductible.

EGA IV 6.3.5 et EGA IV 6.1.5.

(7.2) Soit Y noethérien de dimension deux. Pour que Y soit normal, il faut et il suffit que Y soit de Cohen-MacAulay, et régulier sauf en des points de codimension deux.

EGA IV. 5.8.6. (Critère de normalité de Serre).

(7.3) Soit Y noethérien de dimension un et génériquement réduit. Pour que Y soit réduit, il faut et il suffit que Y soit de Cohen-MacAulay.

EGA IV. 5.8.5.

(7.4) Soit f : X → Y un morphisme de S-schémas plats de présentation finie. Pour que f vérifie l’une des conditions suivantes : être plat, lisse, étale, une immersion



alors f est plat en x. La condition (7.1.1) est vérifiée si f est quasi-fini dominant et X irréductible.

EGA IV 6.3.5 et EGA IV 6.1.5.

(7.2) Soit Y noethérien de dimension deux. Pour que Y soit normal, il faut et il suffit que Y soit de Cohen-Macaulay, et régulier sauf en des points de codimension deux.

EGA IV. 5.8.6. (Critère de normalité de Serre).

(7.3) Soit Y noethérien de dimension un et génériquement réduit. Pour que Y soit réduit, il faut et il suffit que Y soit de Cohen-Macaulay.

EGA IV. 5.8.5.

(7.4) Soit f : X → Y un morphisme de S-schémas plats de présentation finie. Pour que f vérifie l'une des conditions suivantes : être plat, lisse, étale, une immer-

Authority visual fallback P0028-A02.

ouverte, un isomorphisme, plat d'intersection complète relative, il faut et il suffit que pour tout point géométrique $\bar{s}$ de S, $f_{\bar{s}} : X_{\bar{s}} \to Y_{\bar{s}}$ vérifie la dite condition.

Pour "plat", c'est EGA IV 11.3.10. Les propriétés "lisse", "étale", "plat d'intersection complète relative" équivalent à "plat" + une propriété des fibres. Enfin, "immersion ouverte" équivaut à "étale et radiciel" (EGA IV.17.9.1), (où "radiciel" est une propriété des fibres), et "isomorphisme" équivaut à "immersion ouverte et surjectif".

8. Schémas grossiers de modules

Soit $\mathfrak{M}$ un champ algébrique sur un schéma de base S.

Définition 8.1. Un espace grossier de $\mathfrak{M}$ est un espace algébrique M sur S, muni d'un S-morphisme $\pi : \mathfrak{M} \to M$ ayant les propriétés suivantes :

(i) Tout S-morphisme de $\mathfrak{M}$ vers un espace algébrique X sur S se factorise de façon unique par π.

(ii) Si $\bar{s} : \mathrm{Spec}(k) \to S$ est un point géométrique de S (k algébriquement clos), π induit une bijection de l'ensemble de classes d'isomorphie d'objets de $\mathfrak{M}$ sur $\bar{s}$ (= S-morphisme de s dans $\mathfrak{M}$) avec $M(\bar{s})$.

8.2. Si S est noethérien et $\mathfrak{M}$ séparé de type fini sur S, on peut montrer que $\mathfrak{M}$ admet un espace grossier M. Voici quelques-unes de ses propriétés.

(8.2.1) Soient $m : \mathrm{Spec}(k) \to \mathfrak{M}$ un point géométrique de $\mathfrak{M}$, $\mathcal{O}^h_{\mathfrak{M},m}$ l'hensélisé strict de $\mathfrak{M}$ en m, $\mathcal{O}^h_{M,\pi(m)}$ l'hensélisé strict de M en $\pi(m)$ et Aut(m) le groupe des automorphismes de l'objet m de $\mathfrak{M}$ sur Spec(k). L'application π induit un isomorphisme


Soit $\mathfrak{M}$ un champ algébrique sur un schéma de base S.

Définition 8.1. Un espace grossier de $\mathfrak{M}$ est un espace algébrique M sur S, muni d'un S-morphisme $\pi : \mathfrak{M} \to M$ ayant les propriétés suivantes :

(i) Tout S-morphisme de $\mathfrak{M}$ vers un espace algébrique X sur S se factorise de façon unique par π.

(ii) Si $\bar{s} : \mathrm{Spec}(k) \to S$ est un point géométrique de S (k algébriquement clos), π induit une bijection de l'ensemble de classes d'isomorphie d'objets de $\mathfrak{M}$ sur $\bar{s}$ (= S-morphisme de s dans $\mathfrak{M}$) avec $M(\bar{s})$

8.2. Si S est noethérien et $\mathfrak{M}$ séparé de type fini sur S, on peut montrer que $\mathfrak{M}$ admet un espace grossier M. Voici quelques-unes de ses propriétés.

(8.2.1) Soient $m : \mathrm{Spec}(k) \to \mathfrak{M}$ un point géométrique de $\mathfrak{M}$, $\mathcal{O}^h_{\mathfrak{M},m}$ l'hensélisé strict de $\mathfrak{M}$ en m, $\mathcal{O}^h_{M,\pi(m)}$ l'hensélisé strict de M en $\pi(m)$ et Aut(m) le groupe des automorphismes de l'objet m de $\mathfrak{M}$ sur Spec(k). L'application π induit un isomorphisme

Authority visual fallback P0029-A02.

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{\mathfrak{M},m})/\mathrm{Aut}(m) \simeq \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{M,\pi(m)}).$$

Soit $H \subset \mathrm{Aut}(m)$ le sous-groupe des automorphismes de l'objet m de $\mathfrak{M}$ sur k qui se prolongent en un automorphisme de l'objet $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{\mathfrak{M},m}) \to \mathfrak{M}$ de $\mathfrak{M}$ sur $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{\mathfrak{M},m})$. Le groupe Aut(m)/H agit effectivement sur $\mathcal{O}^h_{\mathfrak{M},m}$.

(8.2.2) Si $u : X \to \mathfrak{M}$ est étale surjectif, M est le quotient de X par la relation d'équivalence $X \times_{\mathfrak{M}} X$. En particulier, pour $\mathfrak{M} = [X/G]$ (voir [8] §4), on a $M = X/G$.

(8.2.3) Pas plus que le passage au quotient, la formation du schéma grossier ne commute en général pas aux changements de base. Toutefois, il commute aux changements de base plat, et à tout changement de base lorsque π est étale. De plus, si M'

est le schéma grossier de $\mathfrak{M} \otimes_S S'$, l'application

$M' \to M \otimes_S S'$

est radicielle

lation d'équivalence $X \times_h X$. En particulier, pour $h = [X/G]$ (voir [8] § 4), on a $M = X/G$.

(8.2.3) Pas plus que le passage au quotient, la formation du schéma grossier ne commute en général pas aux changements de base. Toutefois, il commute aux changements de base plat, et à tout changement de base lorsque π est étale. De plus, si M' est le schéma grossier de $h \otimes_S S'$, l'application

$$M' \to M \otimes_S S'$$

est radicielle

Authority visual fallback P0030-A02.

Authority page 31 ; collected-paper page 524 ; original folio 173.

II Courbes elliptiques généralisées.

Dans ce chapitre, nous définissons les courbes elliptiques généralisées sur un schéma de base quelconque, et prouvons les théorèmes qui rendent viable la définition adoptée.

1. Polygones de Néron.

1.1. Soit $\tilde{C} = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{Z}/n$ la somme disjointe de n copies de $\mathbb{P}^1$, indexées par $\mathbb{Z}/n$ ($n \geq 1$). En recollant la i-ième copie de $\mathbb{P}^1$ avec la (i+1)-ième, par identification de la section 0 de la i-ième copie avec la section ∞ de la (i+1)-ième, on obtient une courbe de genre un C sur Spec($\mathbb{Z}$), de normalisée $\tilde{C}$.

Pour tout schéma S, on appelle polygone de Néron à n côtés standard sur S, ou simplement n-gone standard sur S, le schéma sur S qui s'en déduit par extension des scalaires. Un polygone de Néron (resp. un n-gone) sur un corps algébriquement clos k est un schéma sur k isomorphe à l'un des polygones standards (resp. au n-gone standard).

Exemples.

n = 1

n = 3

Lemme 1 2. Soit C un polygone de Néron sur un corps algébriquement clos k.

(i) $H^0(C,\mathcal{O}_C) = k$.

(ii) $H^0(C,\omega_C)$ est de dimension 1 sur k et le morphisme canonique

$H^0(C,\omega_C) \otimes_k \mathcal{O}_C \to \omega_C$

est un isomorphisme. En particulier $\omega_C \simeq \mathcal{O}_C$.



Exemples.

n = 1

n = 3

Lemme 1.2. Soit C un polygone de Néron sur un corps algébriquement clos k .

(i) $H^0(C,\mathcal{O}_C) = k$.

(ii) $H^0(C,\omega_C)$ est de dimension 1 sur k et le morphisme canonique

$$H^0(C,\omega_C) \otimes_k \mathcal{O}_C \to \omega_C$$

est un isomorphisme. En particulier $\omega_C \simeq \mathcal{O}_C$.

Authority visual fallback P0031-A02.

Preuve : (i) résulte de ce que C est réduit et connexe.

(ii) On peut supposer que C est le n-gone standard.

Soit η la forme différentielle sur le normalisé $\tilde{C} = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{Z}/n$ dont la restriction à la i-ième copie de $\mathbb{P}^1$ est dx/x. Il est clair que η a des pôles simples au plus, et des résidus +1 resp. −1 au «0» resp. «∞» de la i-ième copie de $\mathbb{P}^1$. La forme η définit donc une section globale de ω_{C/S} (cf. I. 2.3.). Elle engendre ω_C en chaque point de C.

Lemme 1.3. Soit C une courbe réduite, connexe de genre un sur un corps algébriquement clos, ayant comme seules singularités de points doubles ordinaires et telle que $\omega_C \simeq \mathcal{O}$. Alors C est lisse ou un polygone de Néron.

Preuve : Soient $\pi : \tilde{C} \to C$ la normalisée de C, de composantes irréductibles $(C_i)_{1\le i\le a}$, $g_i \ge 0$ le genre de C_i et b le nombre de points doubles de C. La suite exacte longue de cohomologie déduite de

$$0 \to \mathcal{O}_C \to \pi_*\mathcal{O}_{\tilde{C}} \to \text{conoyau} \to 0$$

et 1.2 (i) fournissent

$a = \sum g_i + b$ et

$b \ge a-1 \ge 0$.

Soit $b_i \ge 0$ le nombre de points de C_i d'image un point singulier de C. On a

$2b = \sum_{i=1}^{a} b_i$.

L'existence de ω non nul sur chaque composante fournit

$g_i = 0 \Rightarrow b_i \ge 2$.

La connexité fournit

$a > 0 \Rightarrow b_i \ge 1$.



Authority visual fallback P0032-A02.

Authority page 33 ; collected-paper page 526 ; original folio 175.

Ces inéquations ont pour solutions

a) a = 1, b = 0, g = 1 (cas non singulier)

b) a = n, b = n, g_i = 0, b_i = 2 (n ≥ 1) : les C_i sont ≃ $\mathbb{P}^1$,

et sur chaque C_i deux points ont pour image un point double de C. La courbe C, étant connexe, est un polygone de Néron.

Définition 1.4. Une courbe stable de genre un C sur un schéma S (ou espace algébrique S, ou champ algébrique S) est un schéma en courbes sur S (cf. I.1.0.) dont toute fibre géométrique est soit une courbe propre lisse et connexe de genre un soit un polygone de Néron.

Proposition 1.5. : Soit p : C → S un morphisme propre et plat de présentation finie. L'ensemble des points s ∈ S tel que C_s soit une courbe stable de genre un est un sous-schéma ouvert dans S.

Preuve : Les conditions C_s réduit, réduit et connexe, réduit et purement de dimension un, de genre un, n'ayant pour singularités que des points quadratiques ordinaires, sont toutes ouvertes. Que la condition ω ≃ $\mathcal{O}$ de 1.3 soit ouverte résulte de la démonstration de 1.6 ci-dessous.

Proposition 1.6. Soit p : C → S une courbe stable de genre un.

(i) p_*$\mathcal{O}$_C = $\mathcal{O}$_S universellement.

(ii) ω_{C/S} et p_*(ω_{C/S}) sont inversibles et l'application canonique

(1.6.1) p^*p_*(ω_{C/S}) → ω_{C/S}

est un isomorphisme.

Preuve. On se ramène aussitôt au cas où S est noethérien. Puisque les fibres géométriques de p sont connexes et réduites, (i) résulte de EGA III. 7.8.8.

Puisque les fibres géométriques de p sont des intersections complètes locales, p est d'intersection complète locale relative et ω_{C/S} est inversible. De (i) et de



sous-schema ouvert dans S .

Preuve : Les conditions C_g réduit, réduit et connexe, réduit et purement de dimension un, de genre un, n'ayant pour singularités que des points quadratiques ordinaires, sont toutes ouvertes. Que la condition $\omega \simeq \mathcal{O}$ de 1.3 soit ouverte résulte de la démonstration de 1.6 ci-dessous.

Proposition 1.6. Soit $p : C \to S$ une courbe stable de genre un.

(i) $p_* \mathcal{O}_C = \mathcal{O}_S$ universellement .

(ii) $\omega_{C|S}$ et $p_*(\omega_{C|S})$ sont inversibles et l'application canonique

(1.6.1) $$p^* p_*(\omega_{C|S}) \to \omega_{C|S}$$

est un isomorphisme.

Preuve. On se ramène aussitôt au cas où S est noethérien. Puisque les fibres géométriques de p sont connexes et réduites, (i) résulte de EGA III. 7.8.8. Puisque les fibres géométriques de p sont des intersections complètes locales, p est d'intersection complète locale relative et $\omega_{C|S}$ est inversible. De (i) et de

Authority visual fallback P0033-A02.

ce que $R^2p_*\mathcal{O} = 0$, on tire que $R^1p_*\mathcal{O}$ est localement libre de formation compatible à tout changement de base $S' \to S$ (EGA III. 7.8.). Il résulte alors de la dualité des faisceaux cohérents (I.2.) que $p_*(\omega_{C/S})$ est localement libre de formation compatible avec tout changement de base. Comme $(\omega_{C/S})_s = \omega_{C_s/s}$, on est réduit à démontrer (ii) dans le cas où S est le spectre d'un corps algébriquement clos. Dans ce cas, 1.6.1 est bien connu pour C lisse et résulte de 1.2 pour un polygone de Néron.

Le lemme 1.7 suivant est un cas particulier de I 3.7.

Lemme 1.7. Soit C un polygone de Néron sur un corps algébriquement clos k.

(i) $\mathrm{Pic}^o(C) = \mathbb{G}_m \otimes H^1(\Gamma(C),\mathbb{Z})$ est isomorphe à $\mathbb{G}_m$.

(ii) Un automorphisme g de C induit l'identité sur $\mathrm{Pic}^o(C)$ si et seulement si g agit par rotations sur le diagramme $\Gamma(C)$ des composantes irréductibles de C.

Lemme 1.8. Soit $\tilde{C}$ le n-gone standard sur $\mathbb{Z}$. On a une suite exacte de groupes algébriques

$$0 \to \mathbb{G}_m^n \longrightarrow^a \mathrm{Aut}(C) \longrightarrow^b \mathrm{Aut}(\Gamma(C)) \to 0.$$

Soit $\tilde{C} = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{Z}/n$; C est défini par recollement à partir de $\tilde{C}$, d'où $\pi : \tilde{C} \to C$. Un calcul local montre que $\tilde{C}$ se déduit de C en éclatant le sous-schéma de non lissité C^{sing}, et ceci reste vrai après tout changement de base. La réunion des sections marquées «0» et «∞» des composantes de $\tilde{C}$ est l'image réciproque du sous-schéma de non lissité. Dès lors, après tout changement de base, tout automorphisme de C induit un automorphisme de $\tilde{C}$ qui respecte la réunion des sections marquées. Ceci permet de définir b et montre que Ker(b) s'identifie au sous-groupe $\mathbb{G}_m^n$ de Aut(C) formé des automorphismes transformant chaque composante $\mathbb{P}^1 \times \{i\}$ en elle-même, et respectant les sections (0,i) (∞,i). Après tout changement de base, une section $\lambda = (\lambda_i)$ de $\mathbb{G}_m^n$ agit sur $\mathbb{P}^1 \times \{i\}$ comme l'homothétie de rapport λ_i.

Il reste à prouver que b est surjectif ; nous le ferons en exhibant des automorphismes de C, compatibles à la donnée de recollement, et définissant des



(ii) Un automorphisme g de C induit l'identité sur $Pic^o(C)$ si et seulement si g agit par rotations sur le diagramme $\Gamma(C)$ des composantes irréductibles de C .

Lemme 1.8. Soit $\tilde{C}$ le n-gone standard sur $\mathbb{Z}$. On a une suite exacte de groupes algébriques

$$0 \to \mathfrak{G}_m^n \xrightarrow{a} \underline{Aut}(C) \xrightarrow{b} \underline{Aut}(\Gamma(C)) \to 0$$

Soit $\tilde{C} = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{Z}/n$; C est défini par recollement à partir de $\tilde{C}$, d'où $\pi : \tilde{C} \to C$. Un calcul local montre que $\tilde{C}$ se déduit de C en éclatant le sous-schéma de non lissité C^{sing} , et ceci reste vrai après tout changement de base. La réunion des sections marquées "0" et "∞" des composantes de $\tilde{C}$ est l'image réciproque du sous-schéma de non lissité. Dès lors, après tout changement de base, tout automorphisme de C induit un automorphisme de $\tilde{C}$ qui respecte la réunion des sections marquées. Ceci permet de définir b et montre que Ker(b) s'identifie au sous-groupe $\mathfrak{G}_m^n$ de Aut(C) formé des automorphismes transformant chaque composante $\mathbb{P}^1 \times \{i\}$ en elle-même, et respectant les sections (0,i) (∞,i) . Après tout changement de base, une section $\lambda = (\lambda_i)$ de $\mathfrak{G}_m^n$ agit sur $\mathbb{P}^1 \times \{i\}$ comme l'homothétie de rapport λ_i .

Il reste à prouver que b est surjectif; nous le ferons en exhibant des automorphismes de C , compatibles à la donnée de recollement, et définissant des

Authority visual fallback P0034-A02.

des automorphismes de C dont l’image par b engendre le groupe dihédral Aut(Γ(C)). Ce sont

τ : (x,i) ↦ (x^{−1},−i)

σ_j : (x,i) ↦ (x,i+j) (j ∈ ℤ/n).

1.9. Soit C le n-gone standard sur Spec(ℤ). Identifions le normalisé C̃ de C avec ℙ¹ × ℤ/nℤ et l’image réciproque de C^reg dans C̃ avec 𝔾_m × ℤ/nℤ. On obtient une action de 𝔾_m × ℤ/nℤ sur C̃ = ℙ¹ × ℤ/nℤ en posant

(a,i) + (b,j) = (a·b,i+j)

où a·b dénote l’action naturelle de 𝔾_m sur ℙ¹.

Cette action passe au quotient et définit un morphisme

(1.9.1) + : C^reg × C → C.

La restriction de + à C^reg × C^reg définit une structure de schéma en groupes commutatifs sur C^reg, et + est une action du groupe C^reg sur C.

On définit comme suit des automorphismes de (C,+) :

a) l’automorphisme de C̃ = ℙ¹ × ℤ/n

τ : (x,i) ↦ (x^{−1},−i)

passe au quotient et définit un automorphisme τ de (C,+) ;

b) pour tout schéma S et tout ζ ∈ μ_n(S), l’automorphisme u(ζ) de C_S

u(ζ) : (x,i) ↦ (x·ζ^i,i)

passe au quotient et définit un automorphisme de (C_S,+).

De a) et b) on déduit une action sur C du schéma en groupe produit semi-direct du groupe à deux éléments {e,τ} par μ_n.

Proposition 1.10. Soit C le n-gone standard sur Spec(ℤ). La construction précédente identifie le foncteur Aut(C,+) des automorphismes de C compatibles à + avec le produit semi-direct {e,τ} ×’ μ_n. Le sous-groupe $Aut^+(C,+)$ des automorphismes agissant trivialement sur Pic^o_{C/ℤ} s’identifie au sous-groupe μ_n.

On a Pic^o_{C/ℤ} ≃ 𝔾_m, et τ agit sur Pic^o par l’automorphisme x ↦ x^{−1}



La restriction de + à $C^{reg} \times C^{reg}$ définit une structure de schéma en groupes commutatifs sur C^{reg}, et + est une action du groupe C^{reg} sur C.

On définit comme suit des automorphismes de (C,+) :

a) l'automorphisme de $\tilde{C} = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{Z}/n$ $\tau : (x,i) \mapsto (x^{-1},-i)$ passe au quotient et définit un automorphisme τ de (C,+) ;

b) pour tout schéma S et tout $\zeta \in \mu_n(S)$, l'automorphisme $u(\zeta)$ de C_S $u(\zeta) : (x,i) \mapsto (x,\zeta^i,i)$ passe au quotient et définit un automorphisme de $(C_S,+)$.

De a) et b) on déduit une action sur C du schéma en groupe produit semi-direct du groupe à deux éléments $\{e,\tau\}$ par μ_n.

Proposition 1.10. Soit C le n-gone standard sur Spec($\mathbb{Z}$). La construction précédente identifie le foncteur Aut(C,+) des automorphismes de C compatibles à + avec le produit semi-direct $\{e,\tau\} \times \mu_n$. Le sous-groupe $Aut^0(C,+)$ des automorphismes agissant trivialement sur $Pic^0_{C/\mathbb{Z}}$ s'identifie au sous-groupe μ_n.

On a $Pic^0_{C/\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{G}_m$, et τ agit sur Pic^0 par l'automorphisme $x \mapsto x^{-1}$

Authority visual fallback P0035-A02.

de $\mathbb{G}_m$. Puisque $Aut(\mathbb{G}_m) \simeq \mathbb{Z}/2$, le diagramme

$$0 \to \mu_n \to \{e,\tau\} \times' \mu_n \to \{e,\tau\} \to 0 \downarrow \downarrow \downarrow 0 \to Aut^+(C,+) \to Aut(C,+) \to Aut(\mathbb{G}_m)$$

montre qu'il suffit de vérifier que

$$\mu_n \xrightarrow{\sim} Aut^+(C,+).$$

Soit $g \in Aut^+(C,+)(S)$. On déduit de 1.8 et 1.7 (ii) qu'il existe $\lambda = (\lambda_i) \in \mathbb{G}_m^n$ tel que g soit $a(\lambda)$ (notation de 1.8). Que g commute à + signifie alors que $\lambda_i \lambda_j = \lambda_{i+j}$: λ définit un homomorphisme de $\mathbb{Z}/n$ dans $\mathbb{G}_m$, et g est défini par une section de μ_n.

1.11. Soient k un corps algébriquement clos, et (C,+) déduit de la courbe 1.10 par extension des scalaires de $\mathbb{Z}$ à k. On vérifie que, pour $x \in C^{reg}(k)$, la translation $y \mapsto x+y$ agit par rotations sur le diagramme des composantes irréductibles $\Gamma(C)$.

Définition 1.12. Une courbe elliptique généralisée (sur une base S) est une courbe stable de genre un

$$p : C \to S,$$

munie d'un morphisme

$$(1\ 12.1)\quad + : C^{reg} \times_S C \to C$$

tel que

a) La restriction de (1.1 .1) à C^{reg} fait de C^{reg} un schéma en groupes commutatif.

b) (1.12.1) définit une action du schéma en groupes C^{reg} sur C.

c) Pour tout point géométrique $\bar{s}$ de S tel que $C_{\bar{s}}$ soit singulier, les translations $y \mapsto x+y$ de C_s ($x \in C_s^{reg}(\bar{s})$) agissent par rotations sur $\Gamma(C_s)$.

Bien entendu, une courbe elliptique généralisée lisse n'est d'autre qu'une courbe elliptique au sens usuel.



1.11. Soient k un corps algébriquement clos, et (C,+) déduit de la courbe 1.10 par extension des scalaires de $\mathbb{Z}$ à k . On vérifie que, pour $x \in C^{reg}(k)$, la translation $y \mapsto x + y$ agit par rotations sur le diagramme des composantes irréductibles $\Gamma(C)$.

Définition 1.12. Une courbe elliptique généralisée (sur une base S) est une courbe stable de genre un

$$p : C \to S ,$$

munie d'un morphisme

$$(1\ 12.1) \qquad + : C^{reg} \times_S C \to C$$

tel que

a) La restriction de (1.1 .1) à C^{reg} fait de C^{reg} un schéma en groupes commutatif.

b) (1.12.1) définit une action du schéma en groupes C^{reg} sur C .

c) Pour tout point géométrique $\bar{s}$ de S tel que $C_{\bar{s}}$ soit singulier, les translations $y \mapsto x+y$ de $C_{\bar{s}}$ $(x \in C_{\bar{s}}^{reg}(\bar{s}))$ agissent par rotations sur $\Gamma(C_{\bar{s}})$.

Bien entendu, une courbe elliptique généralisée lisse n'est d'autre qu'une courbe elliptique au sens usuel.

Authority visual fallback P0036-A02.

Proposition 1.13. Soit (C,+) vérifiant 1.12 a) et b). L’ensemble U des s ∈ S tels que C_s/s vérifie c) est ouvert et fermé dans S. Au-dessus de U, C^reg agit trivialement sur $Pic^0_{C/S}$.

Preuve : Soit x un point géométrique de $C_{\bar{s}}$. La translation y ↦ x+y agit par translation si et seulement si elle agit trivialement sur $Pic^0_{C_s}$. Appliquons le lemme suivant (une variation sur un thème de SGA 3) à $Pic^0_{C/S} \times_S C^{reg}$ sur C^{reg}.

Lemme 1.14. Soit p : A → S un schéma en groupes sur S de fibres des extensions de variétés abéliennes par des tores. Soient g et h deux endomorphismes de A. Il existe une partie ouverte et fermée de S tel que, pour tout S-schéma T,

$g_T = h_T$ si et seulement si T se factorise par V.

Le lemme montre que U de 1.13 est fermé, car son complément est image d’une partie ouverte (et fermée) $C^{reg} - V$ de C^{reg}. Il prouve aussi que si S = U, C^{reg} agit trivialement sur $Pic^0_{C/S}$. Nous prouverons que U est ouvert en même temps que 1.15 ci-dessous.

Preuve de 1.14. Si S est artinien local, de point s, et que $g_s = h_s$, alors g = h sur A_n, pour n invertible, car ce groupe est fini étale. La réunion des A_n est schématiquement dense, et donc g = h.

On peut se ramener au cas où S est noethérien. Si s ∈ S, et que $g_s = h_s$, il résulte que Ker(g−h) a même complété formel que A en $0 \in A_s \subset A$, puis que g = h dans un voisinage de s. Il existe donc V ouvert comme en 1.14. Soit $\bar{V}$ l’adhérence de V. On a $\bar{A}_V = A_{\bar{V}}$, donc g = h au-dessus de $\bar{V}$ et $V \supset \bar{V}$ est fermé.

Proposition 1.15 : Soit (p : C → S, +) une courbe elliptique généralisée. Il existe une famille localement finie de sous-schémas $(S_n)_{n\geq 1}$ fermés et disjoints de S telle que

a) $\bigcup_n S_n$ = image du sous-schéma de non-lissité C^{sing} (I. 4.)

b) Sur S_n, localement pour la topologie fppf, C est isomorphe à l’image

d'une partie ouverte (et fermée) C^{reg}-V de C^{reg} . Il prouve aussi que si $S = U$, C^{reg} agit trivialement sur $Pic^{0}_{C/S}$. Nous prouverons que U est ouvert en même temps que 1.15 ci-dessous.

Preuve de 1.14. Si S est artinien local, de point s , et que $g_s = h_s$, alors $g = h$ sur A_n , pour n invertible, car ce groupe est fini étale. La réunion des A_n est schématiquement dense, et donc $g = h$.

On peut se ramener au cas où S est noethérien. Si $s \in S$, et que $g_s = h_s$, il résulte que $Ker(g-h)$ à même complété formel que A en $0 \in A_s \subset A$, puis que $g = h$ dans un voisinage de s . Il existe donc V ouvert comme en 1.14 Soit $\overline{V}$ l'adhérence de V . On a $\overline{A_V} = A_{\overline{V}}$, donc $g = h$ au-dessus de $\overline{V}$ et $V \supset \overline{V}$ est fermé .

Proposition 1.15 : Soit (p : C → S , +) une courbe elliptique généralisée. Il existe une famille localement finie de sous-schémas $(S_n)_{n\geq 1}$ fermés et disjoints de S telle que

a) $\bigcup_n S_n$ = image du sous-schéma de non-lissité C^{sing} (I. 4.)

b) Sur S_n , localement pour la topologie fppf , C est isomorphe à l'image

Authority visual fallback P0037-A02.

Authority page 38 ; collected-paper page 531 ; original folio 180.

réciproque de la courbe elliptique généralisée à n côtés standard 1.9.

Preuve : Le problème est local sur S, et trivial au voisinage des points de S où C_s est lisse. Soit donc s̄ un point géométrique de S, localisé en s ∈ S, tel que la courbe C_s̄ soit un n-gone. Soit α un isomorphisme entre C_s̄ et le polygone standard, tel que α(e) soit le point 1 de la composante d'indice 0 ∈ ℤ/n, et indexons les composantes de C_s̄ par ℤ/n, à l'aide de α. La translation par x ∈ C_s̄^reg, dans la composante d'indice i, induit la rotation de Γ(C_s̄) qui amène la composante d'indice i sur celle d'indice 0 : l'addition induit sur $\pi_0(C_s\hat{}reg) \simeq \mathbb{Z}/n$ l'addition dans ℤ/n, et si x est dans la composante d'indice un de C_s̄^reg, la translation par x permute transitivement les points singuliers de C_s̄. Dans un voisinage étale de s̄, C_reg/S admet des sections x telles que x(s̄) soit dans la composante d'indice un de C_s̄. L'automorphisme g = x + de C/S vérifie alors l'hypothèse du lemme suivant.

Lemme 1.16. Soient C/S une courbe stable de genre un sur S, g un S-automorphisme de C et s̄ un point géométrique de S localisé en s ∈ S. On suppose que C_s̄ est un n-gone, et que g permute transitivement les points singuliers de C_s. Soit T ⊂ S l'image du sous-schéma de non lissité C^sing. Au-dessus d'un voisinage de s, la courbe C_T/T est isomorphe, localement pour la topologie étale, au n-gone standard.

On vérifie fibre par fibre que C^sing est non ramifié sur S. Au voisinage étale de s̄, C^sing est donc somme disjointe de n sous-schémas F_i, F_i → S étant un plongement fermé. Puisque g est un automorphisme, $g(\bigcup F_i) = \bigcup F_i$. En s̄, donc au voisinage étale de s̄, g permute transitivement les F_i et ceux-ci ont tous la même image T.

Pour prouver le lemme, on peut supposer que S = T. Ce qui précède montre que C^sing est alors fini étale sur S ; on peut le supposer somme de sections disjointes x_i. D'après I 5.3, pour tout s ∈ S, (C,x_i(s))/(S,s) est localement pour la topologie étale isomorphe au sous-schéma de $\mathbb{A}^2$_S d'équation xy = t (t section convenable de $\mathcal{O}$_S, nulle en s). L'image du lieu de non lissité x = y = 0 de ce

Lemme 1.16. Soient C/S une courbe stable de genre un sur S , g un S-automorphisme de C et $\overline{s}$ un point géométrique de S localisé en $s \in S$. On suppose que $C_{\overline{s}}$ est un n-gone, et que g permute transitivement les points singuliers de C_s . Soit $T \subset S$ l'image du sous-schéma de non lissité C^{sing} . Au-dessus d'un voisinage de s , la courbe C_T/T est isomorphe, localement pour la topologie étale, au n-gone standard.

On vérifie fibre par fibre que C^{sing} est non ramifié sur S . Au voisinage étale de $\overline{s}$, C^{sing} est donc somme disjointe de n sous-schémas F_i , $F_i \to S$ étant un plongement fermé. Puisque g est un automorphisme, $g(\cup F_i) = \cup F_i$. En $\overline{s}$, donc au voisinage étale de $\overline{s}$, g permute transitivement les F_i et ceux-ci ont tous la même image T .

Pour prouver le lemme, on peut supposer que S = T . Ce qui précède montre que C^{sing} est alors fini étale sur S ; on peut le supposer somme de sections disjointes x_i . D'après I 5.3, pour tout $s \in S$, $(C,x_i(s))/(S,s)$ est localement pour la topologie étale isomorphe au sous-schéma de $\mathbb{A}^2_S$ d'équation xy = t (t section convenable de $\mathcal{O}_S$, nulle en s) . L'image du lieu de non lissité x = y = 0 de ce

Authority visual fallback P0038-A02.

Authority page 39 ; collected-paper page 532 ; original folio 181.

schéma est le sous-schéma t = 0 de S ; le lieu de non lissité ne peut être étale que si t = 0 au voisinage de s. Localement pour la topologie étale, (C,x_i(s))/(S,s) est donc isomorphe au sous-schéma de $\mathbb{A}^2$_S d'équation xy = 0.

Éclatons C^sing dans C pour obtenir $\tilde{C}$. Un calcul local montre que $\tilde{C}$ est lisse sur S, de fibres isomorphes aux normalisées des fibres de C, et que l'image réciproque dans $\tilde{C}$ de C^sing est étale sur S.

Soit $\pi : \tilde{C} \to S'$ la factorisation de Stein de $\tilde{C}$. S' est fini étale sur S et les fibres géométriques de π sont isomorphes à $\mathbb{P}^1$. Localement sur S (pour la topologie étale), $\tilde{C}$ est donc somme de n copies de $\mathbb{P}^1$. Au voisinage étale de s, C se déduit de $\tilde{C}$ comme C_s̄ de $\tilde{C}$_s̄, donc est un polygone de Néron standard.

Variante : On se réduit facilement à supposer S noethérien. On peut alors remplacer l'argument de localisation étale utilisé par un passage aux complétés ; on se dispense ainsi du délicat théorème 5.3, remplacé par 5.2, mais on doit vérifier une compatibilité entre éclatements et complétions.

Fin de la preuve de 1.13. Soient U ⊂ S et V ⊂ C^reg, ouvert et fermé comme dans 1.13 et sa démonstration. Il faut prouver U ouvert. Puisque le complément de l'image du lieu de non lissité de C est dans U, on se ramène au cas où S est égal à cette image. Soit x ∈ U. Quitte à se localiser près de U pour la topologie étale, il existe une translation g vérifiant l'hypothèse de 1.16, et on peut supposer que la courbe C/S est isomorphe au n-gone standard. On vérifie alors que l'image d'une partie ouverte et fermée de C^reg (ici, = V) est ouverte et fermée.

Fin de la preuve de 1.15 (dont on reprend les notations).

On prend pour S_n le schéma T de (1.16). On peut supposer S_n = T ; il existe alors localement un isomorphisme de courbes α de C avec l'image inverse sur S du polygone de Néron standard. Il se relève en $\tilde{\alpha} : \tilde{C} \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}^1 \times \mathbb{Z}/n$, et on peut supposer que $\tilde{\alpha}(e) = (1,0)$. Via α et $\tilde{\alpha}$, $(C^{reg})^0$ agit sur $\mathbb{P}^1 = \mathbb{P}^1 \times \{0\}$ en fixant les sections 0 et ∞, et s'identifie à $\mathbb{P}^1 - \{0\} - \{\infty\}$. On a donc


l'argument de localisation étale utilisé par un passage aux complétés; on se dispense ainsi du délicat théorème 5.3, remplacé par 5.2, mais on doit vérifier une compatibilité entre éclatements et complétions.

Fin de la preuve de 1.13. Soient U ⊂ S et V ⊂ C^reg, ouvert et fermé comme dans 1.13 et sa démonstration. Il faut prouver U ouvert. Puisque le complément de l'image du lieu de non lissité de C est dans U, on se ramène au cas où S est égal à cette image. Soit x ∈ U. Quitte à se localiser près de U pour la topologie étale, il existe une translation g vérifiant l'hypothèse de 1.16, et on peut supposer que la courbe C/S est isomorphe au n-gone standard. On vérifie alors que l'image d'une partie ouverte et fermée de C^reg (ici, = V) est ouverte et fermée.

Fin de la preuve de 1.15 (dont on reprend les notations).

On prend pour S_n le schéma T de (1.16). On peut supposer $S_n = T$; il existe alors localement un isomorphisme de courbes α de C avec l'image inverse sur S du polygone de Néron standard. Il se relève en $\tilde{\alpha} : \tilde{C} \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}^1 \times \mathbb{Z}/n$, et on peut supposer que $\tilde{\alpha}(e) = (1,0)$. Via α et $\tilde{\alpha}$, $(C^{reg})^0$ agit sur $\mathbb{P}^1 = \mathbb{P}^1 \times \{0\}$ en fixant les sections 0 et ∞, et s'identifie à $\mathbb{P}^1 - \{0\} - \{\infty\}$. On a donc

Authority visual fallback P0039-A02.

Authority page 40 ; collected-paper page 533 ; original folio 182.

$(C^{reg})^0 \simeq \mathbb{G}_m$ (compatible à +). Au voisinage de s, on peut normaliser α de sorte que $\tilde{\alpha}(x^i) = (1,i)$ $(0 \le i < n)$. Si $x^n = 1$, α est alors un isomorphisme de (C,+) avec

la courbe (1.9). Dans le cas général, x^n = a ∈ 𝔾_m(S), a admet une racine n^ième localement pour la topologie fppf de S (pour la topologie étale si n est inversible sur S) et on remplace x par x·a^{−1/n}.

La proposition suivante jouera un rôle technique clef dans les questions de représentabilité.

Proposition 1.17. Soit X/S une courbe elliptique généralisée sur S, de section unité e ∈ X(S), et soit u : Y → X un revêtement fini étale de X, muni de e ∈ Y(S) au-dessus de e. On suppose que les fibres géométriques de Y/S sont connexes. Il existe alors une et une seule structure de courbe elliptique généralisée sur Y, d'unité e, telle que le diagramme

+ Y^reg ×_S Y ——————→ Y │ │ u ↓ ↓ (1.17.1) X^reg ×_S Y ——+———→ X

soit commutatif.

Soit t ∈ Y^reg(S). Soit F' le foncteur qui à T/S associe l'ensemble des τ : Y_T → Y_T rendant commutatif le diagramme

τ Y_T ———→ Y_T │ │ ↓ ↓ X_T ———→ X_T u(t)+

Ce foncteur est représenté par un revêtement étale S' de S (ouvert et fermé dans le revêtement défini par la factorisation de Stein de Y_T ×_{X_T} Y_T (morphismes (u(t)+)∘u et u)). L'application e ↦ τ(e) envoie S' dans u^{−1}ut(S), fini étale sur S. Le sous foncteur F' de F correspondant aux τ tels que τ(e_T) = t_T est donc encore représenté par un S" fini et étale sur S. Prouvons que S" ⟶̃ S. Il suffit de vérifier que pour S spectre d'un corps algébriquement clos, il existe un et un seul τ relevant u(t)+ tel que τ(e) = t.



Authority visual fallback P0040-A02.

Ceci revient à montrer que le revêtement Y de X, et son image réciproque par u(t)+ : X → X, sont isomorphes. Pour X lisse, cela résulte de ce que u(t) est dans la composante neutre de X^reg. Pour X un polygone de Néron, on observe que X n'a qu'un seul revêtement irréductible de degré donné.

L'unique section de S" sur S définit un morphisme t+ : Y → Y. Cette construction, étant compatible aux changements de base, définit

+ : Y^reg × Y → Y,

rendant (1.17.1) commutatif, tel que t + e = t, et caractérisé par ces propriétés. Reste à prouver que + fait de Y une courbe elliptique généralisée, i.e. que diverses identités, telles x+y = y+x (x,y ∈ Y^reg(S) sont vérifiées. Puisque u(x+y) = u(x) + u(y) = u(y)

+ u(x) = u(y+x), x+y est une section de u^{−1}(u(y+x)(S)), étale sur S, et il suffit de vérifier que x+y = y+x pour les fibres géométriques. Pour les fibres propres et lisses, une loi de composition à unité est automatiquement une loi de groupe abélien. Pour les autres, le polygone de Néron à n côtés, avec sa loi + standard, n'a pour revêtements que les polygones de Néron à nk côtés, avec leur loi + standard.

Les autres identités à vérifier se prouvent de même.

1.18. Soit (C,+) une courbe elliptique généralisée sur S. On vérifie fibre par fibre que le morphisme

n : x ↦ nx : C^reg → C^reg

est plat. Son noyau C_n est donc plat sur S.

Supposons que S soit le spectre d'un corps algébriquement clos k.

a) si C est lisse, on sait que C_n est fini de rang n²

b) si C est un m-gone, on a C^reg ≃ 𝔾_m × ℤ/m.

Notant (n,m) le pgcd de n et m, on a donc

C_n ≃ μ_n × ℤ/((n,m))


-183-

DeRa-41

Ceci revient à montrer que le revêtement Y de X , et son image réciproque par u(t)+ : X → X , sont isomorphes. Pour X lisse, cela résulte de ce que u(t) est dans la composante neutre de X^{reg} . Pour X un polygone de Néron, on observe que X n'a qu'un seul revêtement irréductible de degré donné.

L'unique section de S" sur S définit un morphisme t+ : Y → Y . Cette construction, étant compatible aux changements de base, définit

$$+ : Y^{reg}{}_S \times Y \to Y ,$$

rendant (1.17.1) commutatif, tel que t + e = t , et caractérisé par ces propriétés. Reste à prouver que + fait de Y une courbe elliptique généralisée, i.e. que diverses identités, telles x+y = y+x (x,y ∈ $Y^{reg}(S)$ sont vérifiées. Puisque u(x+y) = u(x) + u(y) = u(y) + u(x) = u(y+x) , x+y est une section de $u^{-1}(u(y+x)(S))$, étale sur S , et il suffit de vérifier que x+y = y+x pour les fibres géométriques. Pour les fibres propres et lisses, une loi de composition à unité est automatiquement une loi de groupe abélien. Pour les autres, le polygone de Néron à n côtés, avec sa loi + standard, n'a pour revêtements que les polygones de Néron à nk côtés, avec leur

Authority visual fallback P0041-A01.

Authority page 42 ; collected-paper page 535 ; original folio 184.

En particulier, C_n est fini de rang n.(n,m).

Rappelons le lemme suivant.

Lemme 1.19. Soit f : X → S un morphisme quasi-fini plat et séparé, avec S noethérien. Si le rang des fibres de f est constant, alors f est fini.

Preuve : Prouvons que f est propre. D'après le critère valuatif de propreté, on peut supposer que S est un trait. D'après le Main theorem de Zariski, X est un ouvert d'un schéma $\bar{X}$ fini sur S qu'on peut même prendre plat sur S. Comparant les rangs des fibres spéciales et génériques de X et $\bar{X}$, on trouve que X = $\bar{X}$, d'où 1.19.

Corollaire 1.20. Soient p : C → S une courbe elliptique généralisée sur S et n un entier. On suppose que, pour tout point géométrique $\bar{s}$ de S, C_$\bar{s}$ est lisse, ou un m-gone, avec n|m. Alors, C_n est fini localement libre sur S de rang n².

On se ramène à supposer S noethérien, et on applique 1.18, 1.19.

2. Courbes stables irréductibles.

Dans ce §, nous prouvons que, pour C/S une courbe stable de genre un, de fibres géo-

métriques irréductibles, et pour e ∈ C^reg(S), il existe sur C une et une seule structure de courbe elliptique généralisée d'unité e.

2.1 Certains résultats préliminaires vaudront pour un morphisme propre et plat de présentation finie p : C → S vérifiant la condition suivante.

(2.1.1) C est une courbe de Cohen-Macaulay de genre un sur S, p_*$\mathcal{O}$_C = $\mathcal{O}$_S universellement et p^*p_*ω_{C/S} ⟶̃ ω_{C/S}.

Une courbe stable de genre un sur S vérifie (2 1.1) (1.6). Si une fibre géométrique C_s̄ de p vérifie (2.1.1), alors C/S vérifie (2.1.1) dans un voisinage de s (pour la condition : «Cohen-Macaulay», voir EGA IV 12.2.1. ; pour

ou un m-gone, avec n|m . Alors, C_n est fini localement libre sur S de rang n^2.

On se ramène à supposer S noethérien, et on applique 1.18, 1.19.

2. Courbes stables irréductibles.

Dans ce §, nous prouvons que, pour C/S une courbe stable de genre un, de fibres géométriques irréductibles, et pour $e \in C^{reg}(S)$, il existe sur C une et une seule structure de courbe elliptique généralisée d'unité e .

2.1 Certains résultats préliminaires vaudront pour un morphisme propre et plat de présentation finie p : C → S vérifiant la condition suivante.

(2.1.1) C est une courbe de Cohen-Macaulay de genre un sur S , $p_*\mathcal{O}_C = \mathcal{O}_S$ universellement et $p^*p_*\omega_{C/S} \xrightarrow{\sim} \omega_{C/S}$.

Une courbe stable de genre un sur S vérifie (2 1.1) (1.6). Si une fibre géométrique $C_{\bar{s}}$ de p vérifie (2.1.1), alors C/S vérifie (2.1.1) dans un voisinage de s (pour la condition : "Cohen-Macaulay", voir EGA IV 12.2.1.; pour

Authority visual fallback P0042-A02.

Authority page 43 ; collected-paper page 536 ; original folio 185.

p_* $\mathcal{O}$_C = $\mathcal{O}$_S, voir EGA III. 7.8.8. ; si p_* $\mathcal{O}$_C = $\mathcal{O}$_S universellement, p_* ω_{C/S} est localement libre de formation compatible à tout changement de base, et on conclut comme en 1.6). Les fibres spéciales des modèles de Néron de courbes elliptiques vérifient (2.1.1)(SGA 7 X 1.15).En particulier, les courbes p : C → S de genre un à fibres géométriques intègres (= elliptiques, cubiques planes nodales ou cubiques planes cuspidales) vérifient (2 1.1).

Pour toute section t de C/S on désignera par m(t) le faisceau d'idéaux qui définit le sous-schéma t(S).

Proposition 2.2. Soient S un schéma noethérien, s̄ un point géométrique de S localisé en s ∈ S, p : C → S vérifiant (2.1.1) et $\mathcal{J}$ un faisceau cohérent sur C plat sur S. On suppose que le faisceau $\mathcal{J}$_{s̄} sur C_{s̄} est isomorphe à un faisceau m(t_{s̄}), pour t_{s̄} ∈ C_{s̄}(s̄). Alors, au-dessus d'un voisinage U de s dans S, il existe une et une seule section t ∈ C(U) telle que $\mathcal{J}$|_{p^{-1}(U)} soit isomor- phe à m(t).

La démonstration repose sur le lemme suivant.

Lemme 2.2.1. Il existe un voisinage U de s au-dessus duquel p_* Hom($\mathcal{J}$,$\mathcal{O}$_C) est localement libre de rang un de formation compatible à tout changement de base U' → U.

Déduisons 2.2 de 2.2.1. Quitte à restreindre S, on peut supposer que p_* Hom($\mathcal{J}$,$\mathcal{O}$_C) admet une section globale e qui, après tout changement de base, définit un isomorphisme $\mathcal{O}$_S ≃ p_* Hom($\mathcal{J}$,$\mathcal{O}$_C). Vu l'hypothèse, après changement de base de S à s̄, e : $\mathcal{J}$ → $\mathcal{O}$_C définit un isomorphisme $\mathcal{J}$_{s̄} ≃ m(t_{s̄}).

Comme e ⊗_{$\mathcal{O}$_S} k(s) : $\mathcal{J}$_s → $\mathcal{O}$_{C_s} est injectif, il résulte de EGA IV.11.3.7 que (Ker e)_x = 0 et que (Coker e)_x est p-plat en chaque point x de C_s, donc que Ker e = 0 et K

= Coker e est plat sur un voisinage U de s. Quitte à restreindre S, on peut supposer que U = S. Comme K_{s̄} est de support fini, K est de support fini sur S. La flèche $\mathcal{O}$_S → p_*(K), qui vient de $\mathcal{O}$_C → K, est après tensorisation avec k(s) un isomorphisme. Donc, en appliquant le lemme de Nakayama (ce qui est



phe à m(t) .

La démonstration repose sur le lemme suivant

lemme 2.2.1. Il existe un voisinage U de s au-dessus duquel p_* Hom(ℑ,$\mathcal{O}_C$) est localement libre de rang un de formation compatible à tout changement de base U' → U .

Déduisons 2.2 de 2.2.1. Quitte à restreindre S , on peut supposer que P_*Hom(ℑ,$\mathcal{O}_C$) admet une section globale e qui, après tout changement de base, définit un isomorphisme $\mathcal{O}_S \xrightarrow{\sim} p_*\mathrm{Hom}(\mathfrak{I},\mathcal{O}_C)$. Vu l'hypothèse, après changement de base de S à s̄ , e : ℑ → $\mathcal{O}_C$ définit un isomorphisme $\mathfrak{I}_s \xrightarrow{\sim} m(t_{\bar{s}})$.

Comme e ⊗$_{\mathcal{O}_S}$ k(s) : $\mathfrak{I}_s \to \mathcal{O}_{C_s}$ est injectif, il résulte de EGA IV.11.3.7 que (Ker e)$_x$ = 0 et que (Coker e)$_x$ est p-plat en chaque point x de C_s , donc que Ker e = 0 et K = Coker e est plat sur un voisinage U de s . Quitte à restreindre S , on peut supposer que U = S . Comme $K_{\bar{s}}$ est de support fini, K est de support fini sur S. La flèche $\mathcal{O}_S \to p_*(K)$, qui vient de $\mathcal{O}_C \to K$, est après tensorisation avec k(s) un isomorphisme.Donc,en appliquant le lemme de Nakayama (ce qui est

Authority visual fallback P0043-A02.

loisible, car le support de K est finie sur S) ce morphisme est surjectif et, parce que K est plat sur S, il est aussi injectif.

Quitte à restreindre S, on peut donc supposer que e est injectif et que $\mathcal{O}$_S ≃ p_*(K). Le sous-schéma de C défini par e($\mathcal{J}$) est donc isomorphe à S et définit la seule section t telle que $\mathcal{J}$ ≃ m(t).

Prouvons 2.2.1. La suite exacte longue de cohomologie associée à

0 → m(t_{s̄}) → $\mathcal{O}$_{C_{s̄}} → $\mathcal{O}$(t_{s̄}) → 0

et (2 1.1) fournissent

(2.2.2) H⁰(C_{s̄},m(t_{s̄})) = 0

(2.2.3) dim_{k(s̄)} H¹(C_{s̄},m(t_{s̄})) = 1

Il suffit donc de démontrer le lemme suivant.

Lemme 2.3. Avec les notations de 2.2, supposons que H⁰(C_{s̄},$\mathcal{J}$_{s̄}) = 0 et que dim_{k(s̄)} H¹(C_{s̄},$\mathcal{J}$_{s̄}) = 1. Il existe alors un voisinage U de s dans S au-dessus duquel p_* Hom($\mathcal{J}$,$\mathcal{O}$_C) est localement libre de rang un, de formation compatible à tout changement de base U’ → U.

Preuve. Par hypothèse, H^i(C_{s̄},$\mathcal{J}$_{s̄}) = 0 pour i ≠ 1, et H¹(C_{s̄},$\mathcal{J}$_{s̄}) est de rang un. Il en résulte que, dans un voisinage de s, R^i p_*($\mathcal{J}$) est nul pour i ≠ 1, le reste après tout changement de base, et que R¹p_*$\mathcal{J}$ est localement libre de rang un de formation compatible à tout changement de base.

Dans le théorème de dualité (1.2.2),

Rp_* R Hom($\mathcal{J}$,ω_{C/S})[-1] ≃ R Hom(Rp_*$\mathcal{J}$,$\mathcal{O}$_S),

prenons les faisceaux de cohomologie de degré −1. On obtient

p_* Hom($\mathcal{J}$,ω_{C/S}) ≃ (R¹p_*$\mathcal{J}$)^ v



Il suffit donc de démontrer le lemme suivant :

Lemme 2.3. Avec les notations de 2.2, supposons que $H^0(C_{\bar{s}},\mathcal{F}_{\bar{s}}) = 0$ et que $\dim_{k(\bar{s})} H^1(C_{\bar{s}},\mathcal{F}_{\bar{s}}) = 1$. Il existe alors un voisinage U de s dans S au-dessus duquel $p_*\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\theta_C)$ est localement libre de rang un, de formation compatible à tout changement de base U' → U .

Preuve : Par hypothèse, $H^i(C_{\bar{s}},\mathcal{F}_{\bar{s}}) = 0$ pour $i \neq 1$, et $H^1(C_{\bar{s}},\mathcal{F}_{\bar{s}})$ est de rang zn. Il en résulte que, dans un voisinage de s, $R^i p_*(\mathcal{F})$ est nul pour $i \neq 1$, le reste après tout changement de base, et que $R^1 p_*\mathcal{F}$ est localement libre de rang un le formation compatible à tout changement de base.

Dans le théorème de dualité (I.2.2),

$$Rp_* R\,\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_{C/S})[-1] \xrightarrow{\sim} R\,\mathrm{Hom}(Rp_*\mathcal{F},\theta_S),$$

prenons les faisceaux de cohomologie de degré -1 . On obtient

$$p_*\,\mathrm{Hom}(\mathcal{F},\omega_{C/S}) \xrightarrow{\sim} (R^1 p_*\mathcal{F})^\vee$$

Authority visual fallback P0044-A02.

Authority page 45 ; collected-paper page 538 ; original folio 187.

(où ^∨ désigne le $\mathcal{O}$_S-module dual). En particulier, p_* Hom($\mathcal{J}$,ω_{C/S}) est localement libre de rang un compatible à tout changement de base. Il résulte de (2.1.1) que p_*ω_{C/S} est localement libre de rang un de formation compatible à tout changement de base. De (2.1.1) résulte donc encore que, localement sur S, ω_{C/S} est isomorphe à $\mathcal{O}$_C, et 2.3 en résulte.

Corollaire 2.4. : Soit p : C → S une courbe de genre un sur S qui vérifie (2.1.1). Soit $\mathcal{L}$ un faisceau inversible sur C qui définisse un élément de Pic⁰_{C/S}(S) (cf. I 3.2). Pour toute section t de C sur S, il existe une et une seule section t’ telle que localement sur S m(t’) soit isomorphe à m(t) ⊗ $\mathcal{L}$.

Preuve : On se ramène à supposer S noethérien. D’après 2.2 on peut supposer que S est le spectre d’un corps algébriquement clos. Nous allons traiter un cas «universel».

Faisons le changement de base de S à T = C ×_S Pic⁰_{C/S}, prenons pour t la section universelle et pour $\mathcal{L}$ le faisceau inversible universel. Pour chaque point de la forme (x,1_{Pic}) (x ∈ C) de T l’assertion est trivialement vérifiée. Donc, par 2.2, l’assertion est vraie sur un voisinage de C × 1_{Pic} ⊂ T. La courbe C étant propre, il existe un voisinage ouvert U de 1_{Pic} dans Pic⁰_{C/S} tel que l’assertion soit vraie au-dessus de C × U ⊂ T. L’assertion est donc valable sur le produit de C par le groupe engendré par U, qui est Pic⁰_{C/S} tout entier, donc sur T = C ×_S Pic⁰_{C/S}.

2.5. Nous noterons + le morphisme

+ : Pic⁰_{C/S} × C → C,

tel que pour t ∈ C(S) et pour λ ∈ Pic⁰_{C/S}(S), représenté par un faisceau inversible $\mathcal{L}$, on ait

(2.5.1) m(λ + t) ≃ m(t) ⊗ $\mathcal{L}$^{⊗−1} (localement sur S).

Pour t ∈ C^reg(S), $\mathcal{O}$(t) = m(t)^{⊗−1} est faisceau inversible, d’où un morphisme

(2.5.2) φ : C^reg → Pic_{C/S} : t ↦ $\mathcal{O}$(t).



la forme $(x, 1_{\mathrm{Pic}})$ $(x \in C)$ de T l'assertion est trivialement vérifiée. Donc, par 2.2, l'assertion est vraie sur un voisinage de $C \times 1_{\mathrm{Pic}} \subset T$. La courbe C étant propre, il existe un voisinage ouvert U de 1_{Pic} dans $\mathrm{Pic}^0_{C/S}$ tel que l'assertion soit vraie au-dessus de $C \times U \subset T$. L'assertion est donc valable sur le produit de C par le groupe engendré par U, qui est $\mathrm{Pic}^0_{C/S}$ tout entier, donc sur $T = C \times_S \mathrm{Pic}^0_{C/S}$.

2.5. Nous noterons $+$ le morphisme

$$+ : \mathrm{Pic}^0_{C/S} \times C \to C,$$

tel que pour $t \in C(S)$ et pour $\lambda \in \mathrm{Pic}^0_{C/S}(S)$, représenté par un faisceau inversible $\mathcal{L}$, on ait

(2.5.1) $\qquad m(\lambda + t) \simeq m(t) \otimes \mathcal{L}^{\otimes -1}$ (localement sur S).

Pour $t \in C^{\mathrm{reg}}(S)$, $\Phi(t) = m(t)^{\otimes -1}$ est faisceau inversible, d'où un morphisme

(2.5.2) $\qquad \varphi : C^{\mathrm{reg}} \to \mathrm{Pic}_{C/S} : t \mapsto \Phi(t)$.

Authority visual fallback P0045-A02.

On a

(2.5.3) φ(λ + t) = λ + φ(t).

Théorème 2.6. Soit p : C → S une courbe de genre un qui vérifie (2.1.1)

(i) φ est une immersion ouverte.

(ii) Si p est à fibres géométriques intègres, l'image de φ est un torseur sous Pic⁰_{C/S}.

(iii) Si p est à fibres géométriques réduites, l'action + de Pic⁰_{C/S} sur C induit l'action triviale de Pic⁰_{C/S} sur Pic^[0]_{C/S}.

Preuve. Il suffit de prouver (i) et (ii) lorsque S est le spectre d'un corps algébriquement clos k (EGA IV. 17.8.2.). Les images par φ des diverses composantes connexes de C^reg sont alors disjointes. Soient D l'une d'elles, et e ∈ D(k). Les applications λ ↦ λ + e et t ↦ φ(t) − φ(e) sont des isomorphismes inverses l'un de l'autre entre D et Pic⁰. En particulier, φ est un isomorphisme D ≃ φ(e) + Pic⁰, et (i), (ii) en résultent.

Prouvons (iii). Soit λ dans Pic⁰, représenté par un faisceau inversible $\mathcal{L}$. Localement pour la topologie fppf, tout élément de Pic^[0] se met sous la forme $\mathcal{O}(\Sigma\, n_i\, t_i) =_{\mathrm{dfn}} \otimes_i m(t_i)^{\otimes(-n_i)}$, avec $\Sigma\, n_i = 0$, pour des sections t_i convenables de C^reg. Le transformé par λ + est

$\mathcal{O}(\Sigma\, n_i(\lambda + t_i)) = \otimes_i m(\lambda + t_i)^{\otimes(-n_i)} \simeq \otimes_i [m(t_i)^{\otimes(n_i)} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n_i}] \simeq \otimes_i m(t_i)^{\otimes(-n_i)} \otimes \otimes_i \mathcal{L}^{\otimes n_i} \simeq \mathcal{O}(\Sigma\, n_i\, t_i)$,

avec $\Sigma\, n_i = 0$, et l'assertion en résulte.

Voici une variante de 2.2.

Proposition 2.6.1. Soient S un schéma noethérien, $\bar{s}$ un point géométrique de S localisé en $s \in S$, $p : C \to S$ un schéma en courbes de genre un sur S et $\mathcal{J}$ un faisceau cohérent sur C plat sur S. On suppose que $C_{\bar{s}}$ est une courbe intègre,



Les applications $\lambda \mapsto \lambda + e$ et $t \mapsto \varphi(t) - \varphi(e)$ sont des isomorphismes inverses l'un de l'autre entre D et Pic^0. En particulier, φ est un isomorphisme $D \xrightarrow{\sim} \varphi(e) + \mathrm{Pic}^0$ et (i), (ii) en résultent.

Prouvons (iii). Soit λ dans Pic^0, représenté par un faisceau inversible $\mathcal{L}$. Localement pour la topologie fppf, tout élément de $\mathrm{Pic}^{[o]}$ se met sous la forme $\mathcal{O}(\sum n_i t_i) = \mathrm{déf} \bigotimes_i m(t_i)^{\otimes(-n_i)}$, avec $\sum n_i = 0$, pour des sections t_i convenables de C^{reg}. Le transformé par $\lambda +$ de $\mathcal{O}(\sum n_i t_i)$ est

$$\mathcal{O}(\textstyle\sum n_i(\cdot + t_i)) = \bigotimes_i m(\cdot + t_i)^{\otimes(-n_i)} \sim \bigotimes_i [m(t_i)^{\otimes(n_i)} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n_i}] \cong \bigotimes_i m(t_i)^{\otimes(-n_i)} \otimes \bigotimes_i \mathcal{L}^{\otimes n_i} \cong \mathcal{O}(\textstyle\sum n_i t_i),$$

et l'assertion en résulte.

Voici une variante de 2.2.

Proposition 2.6.1. Soient S un schéma noethérien, $\bar{s}$ un point géométrique de S localisé en $s \in S$, $p : C \to S$ un schéma en courbes de genre un sur S et $\mathcal{J}$ un faisceau cohérent sur C plat sur S. On suppose que $C_{\bar{s}}$ est une courbe intègre,

Authority visual fallback P0046-A02.

Authority page 47 ; collected-paper page 540 ; original folio 189.

que $\mathcal{J}_{\bar{s}}$ est sans torsion et génériquement de rang un et que $\chi(C_{\bar{s}},\mathcal{J}_{\bar{s}}) = -1$. Alors, au-dessus d'un voisinage U de s, il existe une et une seule section $t \in C(U)$ telle que $\mathcal{J}|_{p^{-1}(U)}$ soit isomorphe à $m(t)$.

Comme observé en 2.1, C/S vérifie (2.1.1) au voisinage de s ; d'après 2.2, il suffit donc de traiter le cas où S est spectre d'un corps algébriquement clos, $S = \bar{s}$.

Sous cette hypothèse, prouvons que $H^0(C,\mathcal{J}) = 0$. Si $f \in H^0(C,\mathcal{J})$ est non nul, la suite

$0 \to \mathcal{O}_C \to^f \mathcal{J} \to \mathcal{J}/\mathcal{O}_C \cdot f \to 0$

est exacte, puisque $\mathcal{J}$ est sans torsion sur C intègre. On déduit que $\chi(C,\mathcal{J}) = \chi(C,\mathcal{O}_C) + \chi(C,\mathcal{J}/\mathcal{O}_C \cdot f) = 0 + \chi(C,\mathcal{J}/f\cdot\mathcal{J}) \geq 0$, ce qui contredit l'hypothèse.

Puisque $\chi = -1$, les hypothèses de 2.3 sont vérifiées : il existe $e : \mathcal{J} \to \mathcal{O}_C$, avec $e \neq 0$. Puisque $\mathcal{J}$ est sans torsion génériquement de rang un, et C intègre, la suite

$0 \to \mathcal{J} \to^e \mathcal{O}_C \to \mathcal{O}_C/e\mathcal{J} \to 0$

est exacte, et le support de $\mathcal{O}_C/e\mathcal{J}$ est fini. On a $\chi(C,\mathcal{O}_C/e\mathcal{J}) = \chi(C,\mathcal{O}_C) - \chi(C,\mathcal{J}) = 0 - (-1) = 1$, i.e. $\dim H^0(C,\mathcal{O}_C/e\mathcal{J}) = 1$: l'idéal $e(\mathcal{J})$ définit un point t de C, et $\mathcal{J} \simeq m(t)$.

Proposition 2.7. (i) Soient $p : C \to S$ une courbe de genre un à fibres géométriques intègres et $e \in C^{reg}(S)$. Il existe une et une seule loi $+ : C^{reg} \times_S C \to C$ telle que, sur S et après tout changement de base, pour $x \in C^{reg}(S)$ et $y \in C(S)$, on ait

(2.7.1) $m(x+y) \simeq m(x) \otimes m(y) \otimes m(e)^{\otimes -1}$ localement sur S



$$\chi(C,\mathcal{F}) = \chi(C,\mathcal{O}_C) + \chi(C,\mathcal{F}/\mathcal{O}_C \cdot f) = 0 + \chi(C,\mathcal{F}_{/f\cdot\mathcal{F}}) \geq 0 \quad ,$$

ce qui contredit l'hypothèse.

Puisque $\chi = -1$, les hypothèses de 2.3 sont vérifiées : il existe $e : \mathcal{F} \to \mathcal{O}_C$, avec $e \neq 0$. Puisque $\mathcal{F}$ est sans torsion génériquement de rang un, et C intègre, la suite

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{e} \mathcal{O}_C \longrightarrow \mathcal{O}_C/e\mathcal{F} \longrightarrow 0$$

est exacte, et le support de $\mathcal{O}_C/e\mathcal{F}$ est fini. On a

$$\chi(C,\mathcal{O}_C/e\mathcal{F}) = \chi(C,\mathcal{O}_C) - \chi(C,\mathcal{F}) = 0 - (-1) = 1 \quad ,$$

i.e. $\dim H^0(C,\mathcal{O}_C/e\mathcal{F}) = 1$: l'idéal $e(\mathcal{F})$ définit un point t de C, et $\mathcal{F} \simeq m(t)$.

Proposition 2.7. (i) Soient $p : C \to S$ une courbe de genre un à fibres géométriques intègres et $e \in C^{reg}(S)$. Il existe une et une seule loi $+ : C^{reg} \times_S C \to C$ telle que, sur S et après tout changement de base, pour $x \in C^{reg}(S)$ et $y \in C(S)$, on ait

(2.7.1) $\qquad m(x+y) \simeq m(x) \otimes m(y) \otimes m(e)^{\otimes -1}$ localement sur S

Authority visual fallback P0047-A02.

Authority page 48 ; collected-paper page 541 ; original folio 190.

(ii) Cette loi fait de C^reg un schéma en groupe commutatif d'unité e agissant sur C ; pour cette action, C^reg agit trivialement sur Pic⁰_{C/S}.

(iii) La symétrie x ↦ −x de C^reg se prolonge à C et, pour t ∈ C(S), on a localement sur S

(2.7.2) m(−t) ≃ Hom(m(t),𝒪(−2(e))).

(iv) Si C/S est stable, + est l'unique structure de courbe elliptique généralisée sur C d'unité e.

Preuve : On peut supposer S noethérien. D'après 2.1, la condition (2.1.1) est vérifiée. L'assertion (i) résulte alors de 2.4. D'après 2.6, le morphisme

φ_e : C^reg → Pic⁰_{C/S} : x ↦ φ(x) − φ(e)

est un isomorphisme de S-schémas. On a φ_e(x+y) = φ(x+y) − φ(e) = (φ(x) + φ(y) − φ(e)) − φ(e) = φ_e(x) − φ_e(y), de sorte que φ_e est un isomorphisme de groupes. Pour x ∈ C^reg(S) et y ∈ C(S), on a x+y = φ_e(x) + y. L'assertion (ii) en résulte.

Si C/S est stable, (C,+) est une courbe elliptique généralisée d'après (ii). Si +′ est une autre loi de courbe elliptique généralisée d'unité e, et que x ∈ C^reg(S), on sait que la translation x +′ agit trivialement sur Pic⁰_{C/S} (1.13). On a donc, pour y ∈ C^reg(S) et z ∈ C(S),

x +′ (y+z) = x +′ (φ_e(y) + z) = φ_e(y) + (x +′ z) = y + (x +′ z).

Pour z = e, ceci donne x +′ y = y+x = x+y, et +′ coïncide avec + sur C^reg × C^reg. Par passage à l'adhérence schématique, on a +′ = + partout, d'où (iv).

Prouvons (iii). Pour t ∈ C^reg(S), on a φ_e(−t) = −φ_e(t), donc locale- ment sur S



Authority visual fallback P0048-A02.

𝒪((-t)) ⊗ 𝒪(-(e)) ≃ 𝒪(-(t)) ⊗ 𝒪((e)), i.e.

m(-t) ≃ m(t)^{⊗−1} ⊗ 𝒪(-2(e)).

Il reste à prouver que pour t quelconque, le second membre de (2.7.2) est, localement sur S, de la forme m(x). La suite exacte

(2.7.3) 0 → m(t) → 𝒪_C → t_*𝒪_S → 0

donne la suite exacte

(2.7.4) 0 → Hom(t_*𝒪_S,𝒪(-2(e))) → Hom(𝒪_C,𝒪(-2(e))) →

→ Hom(m(t),𝒪(-2(e))) → Ext¹(t_*𝒪_S,𝒪(-2(e))) → 0.

Comme ω_{C/S} est un faisceau inversible sur C (cf. 1.6.1), $\mathcal{O}$(-2(e)) est, localement sur C, isomorphe à ω_{C/S}. Donc localement sur C

Ext¹(t_*$\mathcal{O}$_S,$\mathcal{O}$(-2(e))) ≃ Ext¹(t_*$\mathcal{O}$_S,ω_{C/S}).

On applique maintenant la formule de dualité des faisceaux cohérents pour le morphisme t : S → C :

(2.7.5) R t_* R Hom_{$\mathcal{O}$_S}($\mathcal{O}$_S,t^ !ω_{C/S}) →̃ R Hom_{$\mathcal{O}$_C}(R t_*$\mathcal{O}$_S,ω_{C/S}).

On remarque que

t^ !ω_{C/S} = t^ !p^ !$\mathcal{O}$_S[1] ≃ (p∘t)^ !$\mathcal{O}$_S[1] = $\mathcal{O}$_S[1].

De plus, R¹t_*$\mathcal{O}$_S = 0. En prenant les H⁰ des deux membres de (2.7.5) on obtient

Ext¹(t_*$\mathcal{O}$_S,ω_{C/S}) ≃ t_*$\mathcal{O}$_S.

De plus, il est facile à voir que Hom(t_*$\mathcal{O}$_S,$\mathcal{O}$(-2(e))) = 0. La suite exacte obtenue

(2.7.6) 0 → $\mathcal{O}$(-2(e)) → Hom(m(t),$\mathcal{O}$(-2(e))) → t_*$\mathcal{O}$_S → 0

montre que Hom(m(t),$\mathcal{O}$(-2(e))) est plat sur S, que sa formation commute à tout changement de base S’ → S et que ses fibres sont génériquement de rang 1 et sans torsion. Pour voir que ce faisceau est, localement sur S’, de la forme m(t’), il suffit de voir que pour chaque point géométrique s̄ de S’ on a que

χ(C_{s̄},Hom(m(t),$\mathcal{O}$(-2(e)))) = -1 (cf. 2.6).

Mais

deg_{C_{s̄}}($\mathcal{O}$(-2(e))) = -2,

donc

χ(C_{s̄},$\mathcal{O}$(-2(e))) = -2, et χ(C_{s̄},t_*$\mathcal{O}$_{s̄}) = 1.

On a donc bien



-191-

DeRa-49

$\mathcal{O}((-t))\mathcal{O}(-(e)) \simeq \mathcal{O}(-(t))\mathcal{O}((e))$, i.e.

$m(-t) \simeq m(t)^{\otimes -1} \otimes \mathcal{O}(-2(e))$.

Il reste à prouver que pour t quelconque, le second membre de (2.7.2) est, localement sur S , de la forme m(x) . La suite exacte

(2.7.3) $0 \longrightarrow m(t) \longrightarrow \mathcal{O}_C \longrightarrow t_*\mathcal{O}_S \longrightarrow 0$

donne la suite exacte

(2.7.4) $0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(t_*\mathcal{O}_S, \mathcal{O}(-2(e))) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{O}_C, \mathcal{O}(-2(e))) \longrightarrow$

$\longrightarrow \mathrm{Hom}(m(t), \mathcal{O}(-2(e))) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1(t_*\mathcal{O}_S, \mathcal{O}(-2(e))) \longrightarrow 0$.

Comme $\omega_{C/S}$ est un faisceau inversible sur C (cf. 1.6.1) , $\mathcal{O}(-2(e))$ est, localement sur C, isomorphe à $\omega_{C/S}$. Donc localement sur C $\mathrm{Ext}^1(t_*\mathcal{O}_S, \mathcal{O}(-2(e))) \simeq \mathrm{Ext}^1(t_*\mathcal{O}_S, \omega_{C/S})$. On applique maintenant la formule de dualité des faisceaux cohérents pour le morphisme t : S → C :

(2.7.5) $\mathrm{R}t_*\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_S, t^!\omega_{C/S}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_C}(\mathrm{R}t_*\mathcal{O}_S, \omega_{C/S})$.

Authority visual fallback P0049-A01.

χ(C_{s̄},Hom(m(t),$\mathcal{O}$(-2(e)))) = -1

et par suite que Hom(m(t),$\mathcal{O}$(-2(e))) = m(t’) pour une section t’, ce qui achève la démonstration.

Corollaire 2.8. Soit p : C → S une courbe elliptique généralisée sur S. L’application

x ↦ -x : C^reg → C^reg

se prolonge en un automorphisme de C/S.

L'extension cherchée est unique, car C^reg est schématiquement dense dans C. Le problème est donc local pour la topologie fpqc. Le problème est trivial au-dessus de l'ouvert où C est lisse. Soit s̄ un point géométrique de S, localisé en s ∈ S, tel que C_{s̄} soit un n-gone. Au voisinage de ce point, C_n est fini et plat et, localement pour la topologie fppf, admet une section t telle que les multiples de t rencontrent les diverses composantes de C_{s̄}. Au voisinage de s, t engendre un sous-groupe H de C_n, isomorphe à ℤ/n. Le groupe H_{s̄} agit librement sur C_{s̄}, et C_{s̄}/H est un 1-gone. Dans un voisinage de s, on a alors

a) H agit librement sur C, et C/H est une courbe elliptique généralisée sur S.

b) C/H est à fibres géométriques irréductibles (appliquer 1.15 à C/H)

c) C est un revêtement fini étale de C/H.

On sait que C/H admet une involution x ↦ -x (2.7(iii)). On procède alors comme en 1.17 pour relever cette involution en une involution de C.

3. Construction de courbes elliptiques généralisées.

Ce § ne servira pas dans la suite de cet article et nous recommandons au lecteur de l'omettre en première lecture.

Nous y démontrons le théorème suivant 3.2 ci-dessous.

3.1. Soit p : C → S une courbe stable de genre un munie d'une section e ∈ C^reg(S). Soit G un S-schéma en groupes commutatifsplat localement de présentation finie qui agit sur C. Soient les conditions suivantes.



Authority visual fallback P0050-A02.

Authority page 51 ; collected-paper page 544 ; original folio 193.

(3.1.1) G agit trivialement sur Pic^o_{C/S}.

(3.1.2) Pour chaque point géométrique s̄ de S, G(s̄) agit transitivement sur l'ensemble des composantes irréductibles de C_{s̄}.

Dans le cas particulier important où G est le schéma en groupes constant ℤ, l'action ζ de G est définie par l'automorphisme g = ζ(1) de C et (3.1.1) (3.1.2) deviennent

(3.1.3) g agit trivialement sur Pic^o_{C/S}

(3.1.4) Pour chaque point géométrique $\bar{s}$ de S, g permute transitivement les composantes irréductibles de $S_{\bar{s}}$.

Théorème 3.2. Soit G agissant sur C comme en 3.1. Si les conditions (3.1 1) et (3.1.2) sont vérifiées, il existe sur C une et une seule structure de courbe elliptique généralisée d'unité e telle que G agisse sur C par translations. De plus, tout automorphisme de C sur S qui commute à G et vérifie (3.1.1) est une translation.

Plan de la démonstration. Nous prouverons les énoncés suivants.

(A) Soit s un point géométrique de S tel que $G_{\bar{s}}$ agissant sur $C_{\bar{s}}$ vérifie (3.1.1) et (3.1.2). Il existe un voisinage fppf U de $\bar{s}$ et $g \in G(U)$ tel que l'action de g sur C_U vérifie (3.1.3) (3.1.4).

(B) 3.2 pour $G = \mathbb{Z}$.

Montrons déjà que (A) et (B) impliquent 3.2. Les problèmes sont locaux pour la topologie fppf. Si $G_{\bar{s}}$ agissant sur $C_{\bar{s}}$ vérifié (3.1.1) (3.1.2), on peut donc supposer qu'il existe $g \in G(S)$ comme en (A). D'après (B), il existe une et une seule structure de courbe elliptique généralisée d'unité e telle que g soit une translation. De plus, puisque G et g commutent et que G vérifie (3.1.1), G agit par translations. Enfin, tout automorphisme vérifiant (3.1.1) qui commute à G commute à g, donc est une translation.



Théorème 3.2. Soit G agissant sur C comme en 3.1. Si les conditions (3.1 1) et (3.1.2) sont vérifiées, il existe sur C une et une seule structure de courbe elliptique généralisée d'unité e telle que G agisse sur C par translations. De plus, tout automorphisme de C sur S qui commute à G et vérifie (3.1.1) est une translation.

Plan de la démonstration. Nous prouverons les énoncés suivants.

(A) Soit s un point géométrique de S tel que $G_{\bar{s}}$ agissant sur $C_{\bar{s}}$ vérifie (3.1.1) et (3.1.2). Il existe un voisinage fppf U de $\bar{s}$ et $g \in G(U)$ tel que l'action de g sur C_U vérifie (3.1.3) (3.1.4).

(B) 3.2 pour $G = \mathbb{Z}$

Montrons déjà que (A) et (B) impliquent 3.2. Les problèmes sont locaux pour la topologie fppf. Si $G_{\bar{s}}$ agissant sur $C_{\bar{s}}$ vérifié (3.1.1) (3.1.2), on peut donc supposer qu'il existe $g \in G(S)$ comme en (A). D'après (B), il existe une et une seule structure de courbe elliptique généralisée d'unité e telle que g soit une translation. De plus, puisque G et g commutent et que G vérifie (3.1.1), G agit par translations. Enfin, tout automorphisme vérifiant (3.1.1) qui commute à G commute à g, donc est une translation.

Authority visual fallback P0051-A02.

Authority page 52 ; collected-paper page 545 ; original folio 194.

Preuve de (A) Si $C_{\bar{s}}$ est lisse, on prend pour U l'ouvert de S au-dessus duquel C est lisse, et g = e. Sinon, $C_{\bar{s}}$ est un n-gone et l'image de $G(\bar{s})$ dans le groupe des automorphismes du diagramme $\Gamma(C_{\bar{s}})$ des composantes irréductibles de $C_{\bar{s}}$ est d'ordre $\geq n$. D'après (3.1.1), $G(\bar{s})$ agit par rotations sur $\Gamma(C_{\bar{s}})$. Le groupe $\mathrm{Aut}^+(\Gamma(C_{\bar{s}}))$ des rotations de $\Gamma(C_{\bar{s}})$ étant cyclique d'ordre n, il existe $g_{\bar{s}} \in G(s)$ d'image un générateur de ce groupe, et $g_{\bar{s}}$ permute transitivement les composantes irréductibles de $C_{\bar{s}}$. Localement fppf, il existe une section g de G qui induise $g_{\bar{s}}$ On peut appliquer 1.16 à g pour vérifier (3.1.4) dans un voisinage de $\bar{s}$. Que 3.1.3 soit vérifié par g dans un voisinage de $\bar{s}$ résulte de 1.13.

Preuve de 3.2 pour $G = \mathbb{Z}$.

Soient ζ l'action de G sur C et $g = \zeta(1)$. En appliquant 1.16 à g, on se ramène à supposer que les fibres géométriques de C sont toutes lisses ou des n-gones (n fixe) Dans ce cas, $g^n e$ est fibre par fibre dans la même composante connexe de C que e et g^n est justiciable du lemme suivant.

Lemme 3.3. Soit h un automorphisme de C qui commute à g et vérifie (3.1.3). Si he est fibre par fibre dans la même composante irréductible de C que e, alors h est de la forme

$x \mapsto \lambda + x$

pour λ une section de Pic^o_{C/S}.

Preuve : On aura λ = classe de $\mathcal{O}$(he - e). L'hypothèse 3.1.3 assure que $x \mapsto \lambda + x$ commute à g. Remplaçant h par h(x - λ), on se ramène à supposer que he = e. Puisque h vérifie (3 1.3), pour toute section μ de Pic^o_{C/S}, on a

$h(g^k(\mu+e)) = g^k(\mu+e)$.

Toute section de C^reg étant localement pour la topologie fppf de la forme $g^k(\mu+e)$, h agit trivialement sur C^reg, donc sur C.

Preuve de 3.2 (suite) : On a

$g^n x = \lambda + x$.

Soit μ tel que λ = μ^{-n} et

$g_1 = g \circ (x \mapsto \mu + x)$.

Alors, g_1^n = Id et g_1 définit une action de $\mathbb{Z}/n$ sur C. Cette action est libre et les fibres géométriques de C/($\mathbb{Z}/n$) sont intègres. Sur C/($\mathbb{Z}/n$), il existe donc une et une seule structure de courbe elliptique généralisée de section neutre e (2.7). Sur C, il existe une et une seule structure de courbe elliptique généralisée d'unité e telle que g_1 soit une translation


Soient ζ l'action de G sur C et g = ζ(1) . En appliquant 1.16 à g , on se ramène à supposer que les fibres géométriques de C sont toutes lisses ou des n-gones (n fixe) Dans ce cas, g^ne est fibre par fibre dans la même composante connexe de C que e et g^n est justiciable du lemme suivant.

Lemme 3.3. Soit h un automorphisme de C qui commute à g et vérifie (3.1.3).St he est fibre par fibre dans la même composante irréductible de C que e , alors h est de la forme x ↦ λ + x pour λ une section de $\mathrm{Pic}^0_{C/S}$.

Preuve : On aura λ = classe de 6(he - e) . L'hypothèse 3.1.3 assure que x ↦ λ + x commute à g . Remplaçant h par h(x - λ) , on se ramène à supposer que he = e . Puisque h vérifie (3 1.3), pour toute section μ de $\mathrm{Pic}^0_{C/S}$, on a $h(g^k(\mu+e) = g^k(\mu+e)$. Toute section de C^{reg} étant localement pour la topologie fppf de la forme $g^k(\mu+e)$, h agit trivialement sur C^{reg} , donc sur C .

Preuve de 3.2 (suite) : On a $g^n x = \lambda + x$. Soit μ tel que $\lambda = \mu^{-n}$ et $g_1 = g \circ (x \mapsto \mu + x)$. Alors, g_1^n = Id et g_1 définit une action de $\mathbb{Z}/n$ sur C . Cette action est libre et les fibres géométriques de C/($\mathbb{Z}/n$) sont intègres. Sur C/($\mathbb{Z}/n$) , il existe donc une et une seule structure de courbe elliptique généralisée de section neutre e (2.7). Sur C , il existe une et une seule structure de courbe elliptique généralisée d'unité e telle que g_1 soit une translation .

Authority visual fallback P0052-A02.

Authority page 53 ; collected-paper page 546 ; original folio 195.

(cf. 1.17). D'après 3.3, pour λ une section de Pic^o, et pour toute structure de courbe elliptique généralisée, (λ + e) + x est λ + x. La loi obtenue est donc aussi la seule telle que g soit une translation. Enfin, si h commute à g et vérifie (3.1.3), il existe localement k tel que hg^k soit justiciable de 3.3, et h est une translation.

Remarque 3.4. Si C est une courbe elliptique généralisée sur S, on peut montrer qu'il existe un et un seul homomorphisme

u : Pic^[0]_{C/S} → C^reg

tel que, après tout changement de base, pour toute section t de C^reg sur S, on ait

u($\mathcal{O}$((t)-(e))) = t.



Remarque 3.4 . Si C est une courbe elliptique généralisée sur S , on peut montrer qu'il existe un et un seul homomorphisme

$$u : \mathrm{Pic}^{[0]}_{C/S} \to C^{reg}$$

tel que, après tout changement de base, pour toute section t de C^{reg} sur S , on ait

$$u(\delta((t)-(e))) = t \ .$$

Authority visual fallback P0053-A02.

III Théorèmes de représentabilité.

0. Introduction et notations.

Dans ce chapitre et les suivants, nous définissons et étudions divers champs algébriques, classifiant les courbes elliptiques généralisées munies de diverses structures additionnelles.

0.1. Notons $\mathfrak{M}$ la catégorie fibrée en groupoïde sur la catégorie (Sch) des schémas suivante : $\mathfrak{M}(S)$ est la catégorie dont les objets sont les courbes elliptiques généralisées sur S, et les morphismes les S-isomorphismes ; le foncteur ”image réciproque par u : S → T” est

E ↦ E ×_T S.

La catégorie $\mathfrak{M}$ est un champ sur (Sch) pour la topologie fpqc (2.1) mais n’est pas un champ algébrique.

0.2. Soit $\mathfrak{M}_*$ le sous-champ suivant de $\mathfrak{M}$: $\mathfrak{M}_*$ classifie les courbes elliptiques généralisées C/S telles que, pour tout point géométrique s̄ de S, la caractéristique de k(s̄) ne divise pas le nombre de composantes irréductibles de la fibre géométrique C_{s̄}. Le résultat principal 2.5 de ce chapitre est que $\mathfrak{M}_*$ est un champ algébrique. De ce théorème technique résulteront les théorèmes de représentabilité des chapitres suivants. Nous le déduirons des critères généraux de M. Artin. Pour pouvoir appliquer ceux-ci, le point essentiel sera de prouver la proreprésentabilité effective de certains foncteurs ; ce sera fait au § 1.

0.3. Nous adopterons les principes de notation suivants.

a) $\mathfrak{M}$, affecté d’un indice, désigne le champ algébrique classifiant les courbes elliptiques généralisées, soumises à certaines restrictions, ou munies de structures additionnelles, dont l’espèce dépend de l’indice.

b) L’exposant o indique le sous-champ ouvert correspondant aux courbes elliptiques proprement dites.

c) L’exposant h indique le sous-champ ouvert obtenu en ôtant les points correspondant aux courbes elliptiques supersingulières de caractéristique p|n, où n dépend du contexte.

d) L’exposant ∞ indique le sous-champ fermé image du lieu singulier de la courbe



Authority visual fallback P0054-A02.

Authority page 55 ; collected-paper page 548 ; original folio 197.

universelle.

e) Une notation $\mathfrak{m}[1/n]$ indique soit qu'on considère un champ sur $\mathbb{Z}[1/n]$, soit, si $\mathfrak{m}$ a déjà été défini, désigne $\mathfrak{m} \otimes \mathbb{Z}[1/n]$.

f) Le schéma grossier de modules défini par un champ algébrique (I.8) se note par le même symbole, avec $\mathfrak{m}$ remplacé par M.

Nous étendrons ces notations à certains champs au-dessus de $\mathfrak{m}$, non nécessairement définis par un "problème de module" stricto sensu.

1. Un théorème de proreprésentabilité.

1.1 Soient Λ un anneau local complet de corps résiduel k et C_o une courbe elliptique généralisée sur k. On suppose que C_o est lisse ou l'image réciproque sur k de la courbe elliptique généralisée standard à n côtés (II.1.9). Soit D le foncteur des déformations de C_o : pour A une Λ-algèbre noethérienne locale complète de corps résiduel k, D(A) est l'ensemble des classes d'isomorphie de courbes elliptiques généralisées C/Spec(A), munies d'un isomorphisme C ⊗_A k ≃ C_o. Ce § est consacré à la démonstration du théorème suivant.

Théorème 1.2. Supposons C_o lisse ou n premier à l'exposant caractéristique p de k. On a alors

(i) (C_o,+) n'a pas d'automorphismes infinitésimaux (non nuls).

(ii) Le foncteur des déformations D de (C_o,+) est effectivement proreprésentable.

(iii) D est proreprésenté par une courbe C sur Spec(Λ[[t]]),

(iv) Si C_o est non lisse, on peut choisir t de sorte que t = 0 soit l'image du sous-schéma de non lissité.

Les automorphismes infinitésimaux de (C_o,+) forment le groupe Lie Aut(C_o,+), de sorte que (i) résulte de (II.1.10). Il résulte de (i) et de [25] que D est proreprésentable.



1.1 Soient Λ un anneau local complet de corps résiduel k et C_o une courbe elliptique généralisée sur k. On suppose que C_o est lisse ou l'image réciproque sur k de la courbe elliptique généralisée standard à n côtés (II.1.9). Soit D le foncteur des déformations de C_o : pour A une Λ-algèbre noethérienne locale complète de corps résiduel k, $D(A)$ est l'ensemble des classes d'isomorphie de courbes elliptiques généralisées $C/\mathrm{Spec}(A)$, munies d'un isomorphisme $C \otimes_A k \simeq C_o$. Ce § est consacré à la démonstration du théorème suivant.

Théorème 1.2. Supposons C_o lisse ou n premier à l'exposant caractéristique p de k. On a alors

(i) $(C_o,+)$ n'a pas d'automorphismes infinitésimaux (non nuls).

(ii) Le foncteur des déformations D de $(C_o,+)$ est effectivement proreprésentable.

(iii) D est proreprésenté par une courbe C sur $\mathrm{Spec}(\Lambda[[t]])$,

(iv) Si C_o est non lisse, on peut choisir t de sorte que $t = 0$ soit l'image du sous-schéma de non lissité.

Les automorphismes infinitésimaux de $(C_o,+)$ forment le groupe Lie $\underline{\mathrm{Aut}}(C_o,+)$, de sorte que (i) résulte de (II.1.10). Il résulte de (i) et de [25] que D est proreprésentable.

Authority visual fallback P0055-A02.

Authority page 56 ; collected-paper page 549 ; original folio 198.

1.3. Le cas où C_o est irréductible.

Dans ce cas, le foncteur des déformations de (C_o,+) s'identifie par II.2.7 au foncteur D' des déformations de (C_o,e), le couple formé de la courbe C_o et de la section marquée e. Ce dernier foncteur est effectivement proreprésentable, un schéma formel en courbes complètes étant toujours projectif, donc algébrisable. Que D' vérifie (iii) résulte des deux formules suivantes :

(1.3.1) $\dim \mathrm{Ext}^1(\Omega^1_{C_o}(e), \mathcal{O}_{C_o}) = 1$

(1.3.2) $\dim \mathrm{Ext}^2(\Omega^1_{C_o}(e), \mathcal{O}_{C_o}) = 0.$

En effet, le Ext^2 est le groupe où vivent les obstructions aux déformations. S'il s'annule, D' est proreprésenté par un algèbre de séries formelles sur Λ. Le Ext^1 s'identifie à $D'(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$, et détermine la dimension relative.

Prouvons (1.3.1) et (1.3.2). Puisque ω_{C_o} est isomorphe à $\mathcal{O}_{C_o}$, on a par dualité (I.2.2)

$\dim \mathrm{Ext}^i(\Omega^1_{C_o}(e), \mathcal{O}_{C_o}) = \dim H^{1-i}(\Omega^1_{C_o}(e))$.

La formule (1.3.2) en résulte trivialement. Pour (1.3.1), on peut supposer k algébriquement clos.

Si C_o est lisse, $\Omega_{C_o}(e) \simeq \omega_{C_o}(e) \simeq \mathcal{O}_{C_o}(e)$ est un faisceau inversible de degré 1, d'où $\dim H^0(C_o, \Omega_{C_o}(e)) = 1$ dans ce cas.

Sinon, le normalisé $\pi : \tilde{C}_o \to C_o$ de C_o est isomorphe à $\mathbb{P}^1$ et un calcul local montre que le morphisme canonique

$\Omega_{C_o}(e) \to \pi_* \Omega_{\tilde{C}_o}(e)$

est surjectif à noyau de longueur un, concentré au seul point singulier de C_o. L'assertion dans ce cas résulte de la suite exacte de cohomologie : on utilise que



Authority visual fallback P0056-A02.

Authority page 57 ; collected-paper page 550 ; original folio 199.

$H^0(C, \pi_* \Omega_C(e)) \simeq H^0(\mathbb{P}^1, \Omega_{\mathbb{P}^1}(e)) = 0$ (car $\deg_{\mathbb{P}^1}(e) = -1$).

Cela démontre (iii).

Prouvons (iv). La courbe C_o est ici polygone de Néron à un côté. La théorie des déformations des points quadratiques ordinaires montre qu'il existe $u \in \Lambda[[t]]$ tel que $u = 0$ soit l'image du lieu de non lissité de C. D'après (II.1.15.), sur $\mathrm{Spec}(\Lambda[[t]]/(u))$, C est isomorphe à l'image réciproque du polygone de Néron à un côté standard (1.1). La propriété universelle de $\Lambda[[t]]$ implique alors que $\mathrm{Spec}(\Lambda[[t]]/(u))$ est non ramifié sur $\mathrm{Spec}(\Lambda)$, donc que $\Lambda[[t]] \simeq \Lambda[[u]]$. Ceci achève la démonstration pour C_o irréductible.

1.4 Le cas général.

On peut supposer que C_o est le polygone de Néron standard à n côtés sur k, déduit de $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{Z}/n$ par recollement. Soit H_o le sous-groupe cyclique d'ordre n de C_o, image de $\{1\} \times \mathbb{Z}/n$.

Soit D" le foncteur des déformations de $(C_o, +, H_o)$: D"(A) est l'ensemble des classes d'isomorphie de systèmes (C,+,H) ((C,+) courbe elliptique généralisée sur A,H sous-groupe de C^reg isomorphe à $\mathbb{Z}/n$), munis d'un isomorphisme de leur fibre spéciale avec $(C_o,+,H_o)$.

Lemme 1.4.1. On a D" $\xrightarrow{\sim}$ D .

Cela résulte de ce que C_n^{reg} est fini étale sur A (car n est premier à p).

1.4.2 Dans la fin de la démonstration, on ne suppose plus que n est premier à p (cette hypothèse ne servira que via 1.4.1). Soit (C,+,H) comme plus haut (sur A local complet). Le groupe H agit librement sur C (car H_o agit librement sur C_o), de sorte que C/H (qui existe car C est projectif) est plat sur A. La loi + passe au quotient, et (C/H,+) est une déformation du polygone de Néron à un côté $(C_o/H_o,+)$. Notant D_1 le foncteur des déformations de $(C_o/H_o,+)$, on obtient

Authority visual fallback P0057-A02.

Authority page 58 ; collected-paper page 551 ; original folio 200.

ainsi un morphisme de D" dans D_1.

Lemme 1.4.3. Le morphisme 1.4.2 de D" dans D_1 est un isomorphisme (on ne suppose pas ici n premier à p)

D’après EGA IV. 18.1.2 pour A artinien, joint au théorème d’existence en géométrie formelle EGA III.5. pour A local complet, pour toute déformation (C,+) de (C_o/H_o,+) sur A, il existe une et une seule déformation C de la courbe C_o sur A, munie de π_o : C_o → C_o/H_o. On applique alors II.1.17.

Achevons la démonstration de 1.2. D’après 1.4.1 et 1.4.3, D est isomorphe à D_1 étudié en 1.3 et vérifie donc 1.2 (ii) (iii). L’assertion (iv) résulte de l’assertion analogue pour D_1, car l’image du sous-schéma de non lissité est la même pour C et C/H (notations de 1.4.2).

2. Construction de $\mathfrak{m}_*$.

Lemme 2.1. : $\mathfrak{m}$ (défini en 0.1) est un champ pour la topologie fpqc.

Preuve : Soit S’ → S un morphisme fpqc et p’ : C’ → S’ une courbe elliptique généralisée munie d’une donnée de descente. Les sous-schémas S’_n de S’ définis en II.1.15 se descendent en des sous-schémas S_n de S (descente fpqc de sous-schémas fermés). Par localisation sur S, pour la topologie de Zariski, on peut donc supposer que les fibres géométriques de C’ sont lisses ou ont n composantes irréductibles. Le sous-schéma C’_n de C’ est alors fini sur S’ (cf. II.1.20.) et rencontre chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique de C’. Le faisceau inversible $\mathcal{L} = \mathcal{O}_{C'}(C'_n)$ est relativement ample ; il est muni d’une donnée de descente. L’assertion résulte donc de la descente des schémas quasi-projectifs (SGA 1, VIII.7.8 et SGA 1, VIII.5.2).

Rappelons que pour $\mathcal{G}$ un champ sur (Sch/S), on identifie les 1-morphismes ξ : X → $\mathcal{G}$ d’un S-schéma X dans $\mathcal{G}$ aux objets de $\mathcal{G}$(X) ([8]).


2. Construction de $\mathfrak{M}_*$.

Lemme 2.1. : $\mathfrak{M}$ (défini en 0.1) est un champ pour la topologie fpqc .

Preuve : Soit S' → S un morphisme fpqc et p' : C' → S' une courbe elliptique généralisée munie d'une donnée de descente. Les sous-schémas S'_n de S' définis en II.1.15 se descendent en des sous-schémas S_n de S (descente fpqc de sous-schémas fermés). Par localisation sur S , pour la topologie de Zariski, on peut donc supposer que les fibres géométriques de C' sont lisses ou ont n composantes irréductibles. Le sous-schéma C'_n de C' est alors fini sur S' (cf. II.1.20.) et rencontre chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique de C' . Le faisceau inversible $\mathcal{L} = \mathcal{O}_{C'}(C'_n)$ est relativement ample ; il est muni d'une donnée de descente. L'assertion résulte donc de la descente des schémas quasi-projectifs (SGA 1, VIII.7.8 et SGA 1, VIII.5.2).

Rappellons que pour $\mathcal{G}$ un champ sur (Sch/S) , on identifie les 1-morphismes ξ : X → $\mathcal{G}$ d'un S-schéma X dans $\mathcal{G}$ aux objets de $\mathcal{G}$(X) ([8]).

Authority visual fallback P0058-A02.

2.2. M. Artin a démontré un critère maniable pour prouver qu’un foncteur est représentable par un espace algébrique ([2], [3]). La même démonstration fournit le critère suivant pour vérifier qu’un champ est algébrique.

Théorème 2.3. (M. Artin). Soit S un schéma de type fini sur un corps ou sur un anneau excellent de Dedekind. Soit $\mathcal{G}$ une catégorie fibrée en groupoïdes sur (Sch/S).

$\mathcal{G}$ est un champ algébrique localement de type fini sur S si (et seulement si)

(0) $\mathcal{G}$ est un champ pour la topologie étale.

(1) $\mathcal{G}$ est localement de présentation finie, (i.e. pour chaque système projectif filtrant de S-schémas affines Spec(A_i), le foncteur canonique

lim→_i $\mathcal{G}$(Spec(A_i)) → $\mathcal{G}$(lim←_i Spec(A_i))

définit une équivalence des catégories.).

(2) Soient ξ,η ∈ Ob(𝒢(X)) deux 1-morphismes d'un S-schéma X de type fini sur S vers $\mathcal{G}$. Alors Isom(X ; ξ,η) est un espace algébrique localement de type fini sur S.

(3) Soit k_o un $\mathcal{O}$_S-corps de type fini (i.e. Spec(k_o) est de type fini sur S), et soit ξ_o un 1-morphisme de Spec(k_o) vers $\mathcal{G}$. Il existe un anneau local complet R, un morphisme u du spectre d'une extension séparable finie k'_o de k_o dans le point fermé s de Spec(R), et un diagramme commutatif

Spec(k'_o) → Spec(k_o) | | u | | ξ_o ↓ ↓ Spec(R) —ξ—→ $\mathcal{G}$

avec ξ formellement étale en s.

(4) Si ξ est un 1-morphisme d'un S-schéma de type fini X dans $\mathcal{G}$ et que ξ est formellement étale en un point x de type fini sur S, alors ξ est formellement étale en chaque point de type fini sur S dans un voisinage ouvert de x.



Authority visual fallback P0059-A02.

Remarques 2.4.

(i) Si les corps résiduels de type fini de S sont parfaits, pour établir que $\mathcal{G}$ est un champ algébrique on peut remplacer (0) - (4) par (0),(1),(2),(3'),(4), où (3') est la condition suivante :

(3') Soient s ∈ S et k_o une extension finie de k(s). On suppose que u : Spec(k_o) → S est de type fini. Par hypothèse, k(s) est alors parfait et k_o/k(s) séparable. Il existe donc un unique anneau local complet Λ(k_o) de corps résiduel k_o, muni de ū : Spec(Λ(k_o)) → S formellement étale et prolongeant u.

Pour ξ_o ∈ Ob $\mathcal{G}$(k_o), nous noterons Def(ξ_o) la catégorie suivante sur la duale de Ĉ_{Λ(k_o)} : pour A ∈ Ob Ĉ_{Λ(k_o)}, un objet de Def(ξ_o)(A) est un objet ξ de $\mathcal{G}$(A), muni d'un isomorphisme ξ_o →̃ (image de ξ dans $\mathcal{G}$(k_o)). La condition (3') est la conjonction de (3'a) et (3'b) :

(3'a) Les objets de $\mathcal{G}$ n'ont pas d'automorphismes infinitésimaux ; plus précisément pour k_o et ξ_o comme ci-dessus, et ξ'_o l'image réciproque de ξ_o sur k_o[ε] (ε² = 0), on a Aut(ξ'_o) →̃ Aut(ξ_o). Cette condition, et (2), implique que les objets de Def(ξ_o)(A) n'ont pas d'automorphismes non triviaux.

(3'b) Pour k_o et ξ_o comme plus haut, le foncteur

A → l'ensemble des classes d'isomorphies dans Def(ξ_o)(A)

est effectivement proreprésentable (par un anneau local complet R et ξ ∈ $\mathcal{G}$(R) se réduisant selon ξ_o).

Il suffit même de vérifier (3'b) après extension des scalaires à une extension finie de

k_o.

(ii) Si S est de type fini sur un corps ou sur un anneau excellent de Dedekind ayant un nombre infini de points et si les anneaux locaux complets R qui apparaissent dans la condition (3'b) sont tous normaux et de même dimension de Krull, on peut supprimer la condition (4).

(Pour le lecteur familier avec [2], (i) est facile à prouver. Pour (ii), voir ([2]. Thm. 3.9).



Remarques 2.4.

(1) Si les corps résiduels de type fini de S sont parfaits, pour établir que $\mathcal{S}$ est un champ algébrique on peut remplacer (0) - (4) par (0),(1),(2),(3'),(4), où (3') est la condition suivante :

(3') Soient $s \in S$ et k_o une extension finie de $k(s)$. On suppose que $u : \mathrm{Spec}(k_o) \to S$ est de type fini. Par hypothèse, $k(s)$ est alors parfait et $k_o/k(s)$ séparable. Il existe donc un unique anneau local complet $\Lambda(k_o)$ de corps résiduel k_o, muni de $\pi : \mathrm{Spec}(\Lambda(k_o)) \to S$ formellement étale et prolongeant u. Pour $\xi_o \in \mathrm{Ob}\, \mathcal{S}(k_o)$, nous noterons $\underline{\mathrm{Def}}(\xi_o)$ la catégorie suivante sur la duale de $\hat{C}_{\Lambda(k_o)}$: pour $A \in \mathrm{Ob}\, \hat{C}_{\Lambda(k_o)}$, un objet de $\underline{\mathrm{Def}}(\xi_o)(A)$ est un objet ξ de $\mathcal{S}(A)$, muni d'un isomorphisme $\xi_o \xrightarrow{\sim}$ (image de ξ dans $\mathcal{S}(k_o)$). La condition (3') est la conjonction de (3'a) et (3'b) :

(3'a) Les objets de $\mathcal{S}$ n'ont pas d'automorphismes infinitésimaux; plus précisément pour k_o et ξ_o comme ci-dessus, et ξ_o' l'image réciproque de ξ_o sur $k_o[\varepsilon]$ ($\varepsilon^2 = 0$), on a $\mathrm{Aut}(\xi_o') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}(\xi_o)$. Cette condition, et (2), implique que les objets de $\underline{\mathrm{Def}}(\xi_o)(A)$ n'ont pas d'automorphismes non triviaux.

Authority visual fallback P0060-A01.

Le polygone de Néron à n côtés standard définit un morphisme

f_n : Spec(ℤ[1/n]) → 𝔪^*

Théorème 2.5. :

(i) 𝔪_* (défini en 0.2) est un champ algébrique lisse sur Spec(ℤ).

(ii) L'image 𝔪_*^∞ du schéma de non-lissité de la courbe elliptique généralisée universelle au-dessus de 𝔪_* est réunion des images de f_n (n ≥ 1).

Preuve. Pour prouver que 𝔪_* est un champ algébrique, nous utilisons le critère 2.3 (avec S = Spec(ℤ)). Passons en revue les conditions (0) à (4).

(0) résulte de 2.1.

(1) résulte par des arguments standard de EGA IV.8.8.

(2) Soient X un S-schéma de type fini et ($p_1 : C_1 \to X$,+), ($p_2 : C_2 \to X$,+) deux courbes elliptiques généralisées. Prouvons que Isom_X((C₁,+),(C₂,+)) est représentable. Ce foncteur est un faisceau fpqc (2.1) de sorte que le problème est local. On peut donc supposer que les fibres géométriques de C₁ sont lisses ou à n côtés (n convenable) et qu'il existe $\varphi : \mathbb{Z}/n \hookrightarrow C_1$ dont l'image rencontre chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique de C₁. Le morphisme $f \mapsto f \circ \varphi(1)$ envoye Isom dans le sous-schéma ouvert de C_n^reg formé des g tels que les g^k rencontrent toutes les composantes des fibres géométriques. Il résulte de l'assertion suivante que ce morphisme est relativement représentable, donc Isom représentable.

(*) Pour C_i à fibres lisses ou à n côté, et muni de H_i ⊂ C_i^reg, H_i isomorphe à ℤ/n, rencontrant toutes les composantes de toutes les fibres géométriques (i=1,2), Isom((C₁,H₁,+),(C₂,H₂,+)) est représentable.

D'après II 1.17, le morphisme

Isom((C₁,H₁,+),(C₂,H₂,+)) → Isom((C₁/H₁,e),(C₂/H₂,e))

est en effet représentable par un morphisme étale, tandis qu'il résulte de la théorie du foncteur de Hilbert que Isom((C₁/H₁,e)(C₂/H₂,e)) est représentable.

(avec S = Spec(ℤ)) . Passons en revue les conditions (0) à (4) .

(0) résulte de 2.1.

(1) résulte par des arguments standard de EGA IV.8.8.

(2) Soient X un S-schéma de type fini et $(p_1 : C_1 \to X,+)$, $(p_2 : C_2 \to X,+)$ deux courbes elliptiques généralisées. Prouvons que $\mathrm{Isom}_X((C_1,+),(C_2,+))$ est représentable. Ce foncteur est un faisceau fpqc (2.1) de sorte que le problème est local. On peut donc supposer que les fibres géométriques de C_1 sont lisses ou à n côtés (n convenable) et qu'il existe $\varphi : \underline{\mathbb{Z}/n} \hookrightarrow C_1$ dont l'image rencontre chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique de C_1 . Le morphisme $f \to f*\varphi(1)$ envoye Isom dans le sous-schéma ouvert de C_n^{reg} formé des g tels que les g^k rencontrent toutes les composantes des fibres géométriques. Il résulte de l'assertion suivante que ce morphisme est relativement représentable, donc Isom représentable.

(*) Pour C_i à fibres lisses ou à n côté, et muni de $H_i \subset C_i^{reg}$, H_i isomorphe à $\underline{\mathbb{Z}/n}$, rencontrant toutes les composantes de toutes les fibres géométriques (i=1,2), $\mathrm{Isom}((C_1,H_1,+),(C_2,H_2,+))$ est représentable

Authority visual fallback P0061-A02.

(3') Soit k_o un Spec(ℤ)-corps de type fini ; c'est donc un corps fini.

(3')a) résulte de 1.2.(i).

(3')b) résulte de 1.2.(ii).

(4) D'après 1.2 (iii), les foncteurs de déformations sont proreprésentés par des anneaux réguliers de dimension 2. D'après 2.4 (ii), la condition (4) est automatiquement vérifiée.

La lissité de 𝔪_* résulte de sa lissité formelle 1.2.(iii). La seconde assertionde 2.5. résulte de II 1.15. et de 1.2.(iv).

Remarque 2.6. 𝔪_* est horriblement non séparé ! Il résultera de (IV.2.2) que le sous-champ ouvert 𝔪_1 de 𝔪_* classifiant les courbes elliptiques généralisées C/S à fibres géométriques intègres est propre et lisse sur ℤ. Le "fourre-tout" 𝔪_* nous sera utile pour compactifier des modules de courbes elliptiques avec niveau.

Le sous-champ ouvert 𝔪_(n)[1/n] de 𝔪_*[1/n] qui classifie les courbes elliptiques généralisées C/S (n inversible sur S) à fibres géométriques lisses ou des polygones de Néron à n côtés est lui aussi propre et lisse sur Spec(ℤ[1/n]). Il est toutefois moins naturel que 𝔪_1[1/n].

Remarque 2.6. $\mathfrak{M}_*$ est horriblement non séparé! Il résultera de (IV.2.2) que le sous-champ ouvert $\mathfrak{M}_1$ de $\mathfrak{M}_*$ classifiant les courbes elliptiques généralisées C/S à fibres géométriques intègres est propre et lisse sur ℤ . Le "fourre-tout" $\mathfrak{M}_*$ nous sera utile pour compactifier des modules de courbes elliptiques avec niveau.

Le sous-champ ouvert $\mathfrak{M}_{(n)}[1/n]$ de $\mathfrak{M}_*[1/n]$ qui classifie les courbes elliptiques généralisées C/S (n inversible sur S) à fibres géométriques lisses ou des polygones de Néron à n côtés est lui aussi propre et lisse sur Spec(ℤ[1/n]). Il est toutefois moins naturel que $\mathfrak{M}_1[1/n]$.

Authority visual fallback P0062-A02.

IV. Structures de niveau.

Dans ce chapitre, nous définissons et étudions les schémas de module de courbes elliptiques dont les points de division par n sont munis de structures additionnelles. Nous étudions en détail la structure à l'infini de ces schémas. Leur réduction modulo p, pour p|n, ne sera considérée sérieusement qu'au chapitre suivant.

1. Contractions.

1.1. Soit p : C → S une courbe stable de genre un et H ⊂ C^reg un sous-schéma fini localement libre sur S de l'ouvert de lissité de C. On vérifie fibre par fibre que H est automatiquement un diviseur de Cartier sur C. On suppose que les fibres de H sont non vides.

Proposition 1.2. Il existe un et un seul S-schéma $\bar{C}$, muni de u : C → $\bar{C}$, tel que

(a) $\bar{C}$ est une courbe stable de genre un sur S ;

(b) pour tout point géométrique $\bar{s}$ de S, $\bar{C}_{\bar{s}}$ se déduit de $C_{\bar{s}}$ en contractant en un point chacune des composantes irréductibles de $C_{\bar{s}}$ qui ne rencontrent pas $H_{\bar{s}}$.

A. Existence. Un argument de passage à la limite nous ramène à supposer S noethérien. Pour tout $\bar{s}$ et tout n > 0, on a $H^0(C_{\bar{s}}, \mathcal{O}(-nH_{\bar{s}})) = 0$. Par dualité (I 2.2 et II 1.2), on a donc $H^1(C_{\bar{s}}, \mathcal{O}(nH_{\bar{s}})) = 0$. D'après EGA III 7.8, les $p_*\mathcal{O}(nH)$ (n > 0) sont localement libres de formation compatible à tout changement de base. Le même énoncé vaut pour n = 0 (II.1.6). Soit G l'algèbre homogène

$G = \oplus_{n>0} p_* \mathcal{O}(nH)$.

Pour $C_{\bar{s}}$ irréductible, $\mathcal{O}(H_{\bar{s}})$ est ample, et $G_{\bar{s}}$ engendré par

$\oplus_{n\leq A} H^0(\mathcal{O}(nH_{\bar{s}}))$,

avec A indépendant de s.

Supposons que $C_{\bar{s}}$ soit un polygone de Néron, et soit $\bar{C}_{\bar{s}}$ le polygone de Néron qui s'en déduit en contractant en un point chaque composante irréductible qui

1.1. Soit p : C → S une courbe stable de genre un et H ⊂ C^reg un sous-schéma fini localement libre sur S de l'ouvert de lissité de C. On vérifie fibre par fibre que H est automatiquement un diviseur de Cartier sur C. On suppose que les fibres de H sont non vides.

Proposition 1.2. Il existe un et un seul S-schéma $\bar{C}$, muni de u : C → $\bar{C}$, tel que
(a) $\bar{C}$ est une courbe stable de genre un sur S ;
(b) pour tout point géométrique $\bar{s}$ de S, $\bar{C}_{\bar{s}}$ se déduit de $C_{\bar{s}}$ en contractant en un point chacune des composantes irréductibles de $C_{\bar{s}}$ qui ne rencontrent pas $H_{\bar{s}}$.

A. Existence. Un argument de passage à la limite nous ramène à supposer S noethérien. Pour tout $\bar{s}$ et tout n > 0, on a $H^0(C_{\bar{s}}, \mathcal{O}(-nH_{\bar{s}})) = 0$. Par dualité

Authority visual fallback P0063-A02.

ne rencontre pas H. On vérifie que

$H^0(\bar{C}_{\bar{s}}, \mathcal{O}(n\bar{H}_{\bar{s}})) \xrightarrow{\sim} H^0(C_{\bar{s}}, \mathcal{O}(nH_{\bar{s}}))$.

Sur $\bar{C}_{\bar{s}}$, $\mathcal{O}(n\bar{H}_{\bar{s}})$ est ample, et $\bar{G}_{\bar{s}}$ est engendré par

$\oplus_{n\leq B} H^0(\mathcal{O}(nH_{\bar{s}}))$

avec B indépendant de s.

L'algèbre homogène $G = \oplus_n p_*\mathcal{O}(nH)$ est donc de type fini, et son spectre homogène $\bar{C}$ est propre et plat sur S, de formation compatible à tout changement de base. Le morphisme naturel u : C → $\bar{C}$ vérifie (a) et (b).

B. Unicité. Soit

u C ————→ $\bar{C}$ ╲ p / $\bar{p}$ ↘ ↙ S

vérifiant (i) et (ii). On vérifie fibre par fibre que u induit un isomorphisme

$u^{-1}(\bar{C}\hat{}reg) \tilde{\to} C\hat{}reg$ (EGA IV 17.8.2).

Les arguments de A. montrent que $\mathcal{O}_\bar{C}(H)$ est ample et que $\bar{G} = \oplus\, \bar{p}_*\mathcal{O}_\bar{C}(nH)$ est plat et commute à tout changement de base. On vérifie fibre par fibre que $\bar{G} \tilde{\to} G$, et $\bar{C} = Sph(\bar{G})$.

Proposition 1.3. Soit $p : C \to S$ une courbe elliptique généralisée dont les fibres géométriques sont lisses ou sont des nm-gones. Il existe une et une seule courbe elliptique généralisée $\bar{p} : \bar{C} \to S$, munie de $u : C \to \bar{C}$, telle que

(i) Les fibres géométriques de $\bar{C}$ sont lisses ou des n-gones. $\bar{C}_\bar{s}$ se déduit de $C_\bar{s}$ en contractant en un point les composantes irréductibles de $C_\bar{s}$ adhérence de celles des composantes connexes de $C_\bar{s}\hat{}reg$ dont l'ordre dans $\pi_0(C_\bar{s}\hat{}reg)$ ne divise pas n.

(ii) Le diagramme suivant est commutatif

$$\begin{array}{ccc} u^{-1}(\bar{C}\hat{}reg) \times_S C & \longrightarrow & C \\ \downarrow u & & \downarrow u \\ \bar{C}\hat{}reg \times_S \bar{C} & \longrightarrow & \bar{C} \end{array}$$



Authority visual fallback P0064-A03.

Authority page 65 ; collected-paper page 558 ; original folio 207.

Localement pour la topologie fppf de S, il existe $H \subset C$ comme en 1.1, qui rencontre exactement celles des composantes irréductibles des $C_\bar{s}$ qu'on ne désire pas contracter (on peut prendre H = C_n, fini et plat d'après (II.1.20)). D'après 1.2, il existe une et une seule courbe stable de genre un $\bar{C}$, munie de $u : C \to \bar{C}$, qui vérifie (i). Le sous-groupe $u^{-1}(\bar{C}\hat{}reg)$ de $C\hat{}reg$ agit sur $\bar{C}$ par transport de structure ; puisque $u^{-1}(\bar{C}\hat{}reg) \tilde{\to} C\hat{}reg$, ceci fournit la structure de courbe elliptique généralisée voulue sur $\bar{C}$.

Exemple 1.4. Soit C/S une courbe elliptique généralisée, et appliquons 1.3 avec n = 1. Localement sur S, l'hypothèse de 1.3 est vérifiée, pour m convenable (II.1.15). Il existe donc une et une seule courbe elliptique généralisée c(C) sur S, à fibres géométriques irréductibles, munie de $u : C \to c(C)$ et telle que u induise un isomorphisme

(1.4.1) $(C\hat{}reg)\hat{}o \tilde{\to} c(C)\hat{}reg$.

D'après la démonstration de 1.3.4, la courbe c(C) est en effet uniquement déterminée par la condition (i) de 1.3, qui résulte de (1.4.1), tandis que la structure de courbe généralisée est uniquement déterminée par la section neutre (II.2.7), implicite dans 1.4.1.

1.5. Soit S le spectre d'un anneau de valuation discrète complet à corps résiduel algébriquement clos, et η,s ses points génériques et spéciaux. Pour toute extension finie k(η') de k(η), nous noterons (S',η',s') le trait normalisé de S dans k(η'). Soit C_η une courbe elliptique sur η. Nous disons que C_η à réduction stable si le modèle minimal de C_η sur S est une courbe stable de genre un.

Proposition 1.6. (i) Il existe une extension finie k(η') de k(η) telle que la courbe $C_\eta' = C_\eta \otimes_\eta \eta'$ ait réduction stable sur η'.

(ii) Si C_η à réduction stable, le modèle minimal $\tilde{C}$ de C_η sur S admet une unique structure de courbe elliptique généralisée prolongeant celle de C_η.

(iii) Si de plus les points d'ordre n de C_η sont définis sur $k(\eta)$, soit le modèle minimal $\tilde{C}$ de C_η est lisse, soit $\tilde{C}_s$ est un m-gone, avec n|m, et il



S , à fibres géométriques irréductibles, munie de u : C → c(C) et telle que u induise un isomorphisme

(1.4.1) $(C^{reg})^0 \xrightarrow{\sim} c(C)^{reg}$.

D'après la démonstration de 1.3.4, la courbe c(C) est en effet uniquement déterminée par la condition (1) de 1.3, qui résulte de (1.4.1), tandis que la structure de courbe généralisée est uniquement déterminée par la section neutre (II.2.7), implicite dans 1.4.1.

1.5. Soit S le spectre d'un anneau de valuation discrète complet à corps résiduel algébriquement clos, et η,s ses points génériques et spéciaux. Pour toute extension finie $k(\eta')$ de $k(\eta)$, nous noterons (S',η',s') le trait normalisé de S dans $k(\eta')$. Soit C_η une courbe elliptique sur η . Nous disons que C_η à réduction stable si le modèle minimal de C_η sur S est une courbe stable de genre un .

Authority visual fallback P0065-A02.

Authority page 66 ; collected-paper page 559 ; original folio 208.

existe une courbe elliptique généralisée C sur S, de fibre spéciale lissc ou un n-gone et un isomorphisme α de sa fibre générique avec C_η.

(iv) Le couple (C,α) est unique à isomorphisme unique près.

Preuve. (i). C'est un théorème de Néron et Kodaira ([4] ou [20] ou [14]).

(ii). La propriété universelle du modèle de Néron assure que $e \in C_\eta(\eta)$ se prolonge en une section de $\tilde{C}^{reg}$ sur S. Si $u \in \tilde{C}^{reg}(S)$, la translation u+ de C_η se prolonge par transport de structure en un automorphisme de $\tilde{C}$; de même, $x \to -x$ se prolonge à $\tilde{C}$.

Soit U le plus grand ouvert de $\tilde{C}$ tel que la loi + de C_η se prolonge en $+ : U \times C \to C$. Il suffit de prouver que $U = \tilde{C}^{reg}$: ceci acquis, les identités exprimant que + est une structure de courbe elliptique généralisée résulterons de la densité schématique de C_η dans $\tilde{C}$. Pour $v \in \tilde{C}^{reg}(S)$, U est stable par translation par v : on prolonge + à v+U par (v+u) + x = v+(u+x). Puisque U est aussi stable par localisation étale sur S (on le vérifie par un argument de descente ; rappelons que la formation du modèle minimal est compatible à la localisation étale sur S), il suffit de montrer que $U_s \neq \emptyset$.

Soit x un point maximal (= générique) de $\tilde{C}_s$, et soit S_1 le trait spectre de l'anneau local de $\tilde{C}$ en x. Puisque $\tilde{C}$ est lisse sur S en x, $\tilde{C}_1 = \tilde{C} \times_S S_1$ est encore un modèle minimal sur S_1. Soit $u \in C_1(S)$ défini par l'inclusion $S_1 \hookrightarrow \tilde{C}$. Par transport de structure, la translation u+ de la fibre générique de $\tilde{C}_1$ se prolonge en un automorphisme de C_1, d'où

$+ : S_1 \times_S \tilde{C} \to \tilde{C}$.

Ecrivant S_1 comme limite projective des voisinages de x, on trouve que le morphisme $+ : C_\eta \times C_\eta \to C_\eta$ se prolonge en $+ : U \times_S \tilde{C} \to \tilde{C}$, avec $x \in U$.

(iii). On sait que $\tilde{C}_n$ est quasi-fini et plat. Puisque d'après l'hypothèse et la propriété universelle du modèle de Néron, tous les points géométriques de $(C_{\bar{\eta}})_n$ proviennent de sections de $\tilde{C}_n$ sur S, ce groupe est même fini sur S, et $(\tilde{C}_s)_n$ est de rang n^2. La fibre spéciale $\tilde{C}_s$ est donc lisse ou un m-gone, avec n|m (cf II 1.13), et on applique 1.3. pour obtenir C par contraction.



Authority visual fallback P0066-A02.

Authority page 67 ; collected-paper page 560 ; original folio 209.

(iv). Soit C une courbe elliptique généralisée sur S, de fibre générale C_η, et telle que C_s soit lisse ou un polygone à n côtés. En un point de non lissité u de C, C est formellement isomorphe au complété à l'origine de la courbe affine dans A_S² d'équation xy = t^k, pour k convenable. Par homogénéité, k ne dépend pas du point choisi. Pour k > 1, C est singulier en u. Ces singularités se résolvent en éclatant de façon itérée les points singuliers, ce procès aboutissant à remplacer u par k−1 droites projectives :

u ⋀/⋀ donne ⋀ ····· ····· ····· ⋀

(cf. [8]). Soit C̃ la courbe résolue. Il n'existe pas de courbe exceptionnelle de première espèce contenue dans C̃_s, de sorte que C̃ est le modèle minimal de C_η. La courbe C est lisse si et seulement si le modèle minimal C̃ de C_η est lisse, auquel cas C = C̃. Sinon, C̃_s est un polygone de Néron à nk côtés, et C s'en déduit par contraction de la façon utilisée dans la preuve de l'existence.

2. Structures de niveau n.

2.1. Soit n un entier. Nous ne considérerons dans ce § que des schémas S sur lesquels n est inversible.

Dans ce §, nous noterons $\mathfrak{m}_{(n)}$ le champ algébrique sur $\mathbb{Z}[1/n]$ qui classifie les courbes elliptiques généralisées C/S, de fibres géométriques lisses ou des polygones de Néron à n côtés. D'après (II.1.15), $\mathfrak{m}_{(n)}$ est un ouvert de $\mathfrak{m}_*$, donc un champ algébrique (III.2.5) lisse sur $\mathbb{Z}[1/n]$. Soit f_n la section de $\mathfrak{m}_{(n)}$ définie par la courbe 1.9 sur $\mathbb{Z}[1/n]$.

Proposition 2.2. Le champ algébrique $\mathfrak{m}_{(n)}$ est propre et lisse sur $\mathbb{Z}[1/n]$. Son lieu à l'infini $\mathfrak{m}_{(n)}^{\infty} = \mathfrak{m}_{(n)} \cap \mathfrak{m}_*^{\infty}$ est l'image de f_n.

La seconde assertion n'est mise que pour rappel. Elle résulte de III.2.5. et implique que $\mathfrak{m}_{(n)}^{o}$ est dense dans $\mathfrak{m}_{(n)}$. La propreté résulte alors de 1.6 et du critère valuatif de propreté [8].



Authority visual fallback P0067-A03.

Authority page 68 ; collected-paper page 561 ; original folio 210.

2.3. Pour C/S du type considéré, C_n^reg est fini étale de rang n² (II.1.20), donc localement isomorphe à (ℤ/n)² (pour la topologie étale). Une structure de niveau n sur C est un isomorphisme

α : C_n ⟶̃ (ℤ/n)².

Définition 2.4. 𝔪_n[1/n] est le champ algébrique sur ℤ[1/n] suivant : pour S un schéma sur lequel n est inversible, 𝔪_n[1/n](S) est la catégorie des courbes elliptiques généralisées C/S, de fibres géométriques lisses ou des polygones de Néron à n côtés, munies d'une structure de niveau n.

Il est clair que 𝔪_n[1/n] est fini étale et représentable sur 𝔪_(n), et même un espace principal homogène de groupe GL(2,ℤ/n). On note 𝔪_n^∞[1/n] l'image réciproque de 𝔪_(n)^∞, image du sous-schéma de non lissité de la courbe universelle sur 𝔪_n[1/n]. Le théorème suivant résulte aussitôt de 2.2.

Théorème 2.5. 𝔪_n[1/n] est propre et lisse sur ℤ[1/n], et 𝔪_n^∞[1/n] est fini étale sur ℤ[1/n].

2.6. Rappelons qu'un champ algébrique $\mathcal{G}$ «est» un espace algébrique si les objets qu'il classifie n'ont pas d'automorphismes. Plus précisément, si pour tout corps algébriquement clos, k, les objets de $\mathcal{G}$(k) n'ont pas d'automorphisme non trivial, alors

a) pour tout schéma S, les objets de $\mathcal{G}$(S) n'ont pas d'automorphisme non trivial ;

b) le foncteur S ↦ (l'ensemble des classes d'isomorphie dans $\mathcal{G}$(S)) est représentable par un espace algébrique.

Théorème 2.7. Si n ≥ 3, 𝔪_n[1/n] est un espace algébrique.

Soient C une courbe elliptique généralisée sur un corps algébriquement clos k, lisse ou un polygone de Néron à n côtés. Il faut prouver qu'un automorphisme σ de C, trivial sur C_n, est l'identité. Pour C une courbe elliptique, on applique ([26], app. à Exp. 17). Pour C un polygone de Néron, on vérifie sur II.1.10 que Aut(C) agit fidèlement sur C_n.



Authority visual fallback P0068-A03.

Authority page 69 ; collected-paper page 562 ; original folio 211.

Variante 2.8. Cet argument, et III.2.1, impliquent aussitôt que le foncteur

F_n : S ↦ (l'ensemble des classes d'isomorphie de courbes elliptiques généralisées sur S munies d'une structure de niveau n)

est un faisceau pour la topologie fpqc. Les arguments de III.2.5. montrent alors que ce foncteur vérifie le critère de représentabilité de M. Artin. Pour prouver que F_n est représentable par un espace algébrique (n ≥ 3), il n'est donc pas nécessaire de généraliser au préalable le critère de M. Artin au cas des champs algébriques.

Corollaire 2.9. Si n ≥ 3, $\mathfrak{m}$_n[1/n] est un schéma projectif et lisse sur $\mathbb{Z}$[1/n].

Un espace algébrique régulier en courbes sur $\mathbb{Z}$ est en effet toujours quasi-projectif, donc un schéma. Voici une démonstration plus constructive : par voie transcendante (cf. §5), on vérifie qu'après extension des scalaires à $\mathbb{C}$, $\mathfrak{m}$_n^∞ rencontre chaque composante irréductible de $\mathfrak{m}$_n. Par spécialisation, on en déduit que le diviseur $\mathfrak{m}$_n^∞ rencontre chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique de $\mathfrak{m}$_n (utiliser que $\mathfrak{m}$_n est propre et lisse). Dès lors, $\mathcal{O}$($\mathfrak{m}$_n^∞) est un faisceau inversible relativement ample.

3. Structures de niveau H

3.1. Soient n un entier et H un sous-groupe de GL(2,$\mathbb{Z}$/n). Soient S un schéma sur lequel n est inversible et C une courbe elliptique sur S. Pour tout S-schéma T, soit F(T) l'ensemble des structures de niveau n sur C_T, l'image réciproque de C sur T. Le foncteur F est représenté par un revêtement fini étale de S qui est un espace principal homogène de groupe GL(2,$\mathbb{Z}$/n). Soit F_H le faisceau pour la topologie étale engendré par le préfaisceau

T ↦ F_H(T) = F(T)/H

(H agissant à gauche,il vaudrait peut-être mieux écrire H\F(T)). Dans le langage canonique,

F_H = Hom(C_n,($\mathbb{Z}$/n)²)/H.


3. Structures de niveau H

3.1 Soient n un entier et H un sous-groupe de GL(2, Z/n) . Soient S un schéma sur lequel n est inversible et C une courbe elliptique sur S . Pour tout S-schéma T , soit F(T) l'ensemble des structures de niveau n sur C_T , l'image réciproque de C sur T . Le foncteur F est représenté par un revêtement fini étale de S qui est un espace principal homogène de groupe GL(2, Z/n) . Soit F_H le faisceau pour la topologie étale engendré par le préfaisceau

$$T \longmapsto F_H(T) = F(T)/H$$

(H agissant à gauche,il vaudrait peut-être mieux écrire H\F(T)) . Dans le langage canonique,

$$F_H = \underline{\mathrm{Hom}}(C_n, (\mathbb{Z}/n)^2)/H \ .$$

Authority visual fallback P0069-A03.

Authority page 70 ; collected-paper page 563 ; original folio 212.

Ce foncteur est représenté par un revêtement fini étale de S.

Une structure de niveau H sur C est un élément de F_H(S). Un isomorphisme α : C_n ⟶̃ ($\mathbb{Z}$/n)² définit une structure de niveau H, et deux tels isomorphismes définissent la même structure si et seulement si, localement sur S, il existe g ∈ H tel que gα = β. Ce g est uniquement déterminé, donc constant sur chaque composante connexe de S. On prendra garde qu'une structure de niveau H ne provient en général pas d'un α : C_n ⟶̃ ($\mathbb{Z}$/n)². Elle ne provient de tels α que localement pour la topologie étale. Par exemple, pour H = GL(2,$\mathbb{Z}$/n), C a une et une seule structure de niveau H ; elle ne vient d'un α que si C_n est isomorphe à ($\mathbb{Z}$/n)² sur S.

Définition 3.2. $\mathfrak{m}$_H^o[1/n] est le champ algébrique suivant : pour S un schéma sur lequel n est inversible, $\mathfrak{m}$_H^o[1/n](S) est la catégorie des courbes elliptiques C/S, munies d'une structure de niveau H (les morphismes sont les isomorphismes).

Il est clair que $\mathfrak{m}$_H^o[1/n] est fini étale et localement représentable sur $\mathfrak{m}$_1^o[1/n].

Définition 3.3. Le champ algébrique $\mathfrak{m}$_H est le normalisé de $\mathfrak{m}$_1 dans $\mathfrak{m}$_H^o[1/n].

Théorème 3.4. (i) $\mathfrak{m}$_H est propre sur Spec($\mathbb{Z}$).

(ii) $\mathfrak{m}_H[1/n]$ est lisse sur $\mathrm{Spec}\mathbb{Z}[1/n]$, et $\mathfrak{m}_H{}^{o}[1/n]$ est le complément d'un sous-champ $\mathfrak{m}_H{}^{\infty}[1/n]$ fini et étale sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$.

Preuve. (i) Par définition, $\mathfrak{m}_H$ est fini et relativement représentable sur $\mathfrak{m}_1$. Sa propreté résulte donc de celle de $\mathfrak{m}_1$.

(ii) L'assertion résulte du lemme d'Abhyankhar (SGA 1,XIII5) appliquable ici parce que $\mathfrak{m}_1[1/n]$ est lisse sur $\mathbb{Z}[1/n]$, que $\mathfrak{m}_1{}^{\infty}[1/n]$ est un diviseur de $\mathfrak{m}_1[1/n]$, lisse sur $\mathbb{Z}[1/n]$, et dont le point générique est de caractéristique 0, et que $\mathfrak{m}_H{}^{o}[1/n]$ est fini étale sur $\mathfrak{m}_1[1/n] - \mathfrak{m}_1{}^{\infty}[1/n]$.

En 6.7, nous donnerons de 3.4 une démonstration «modulaire».


(ii) $\mathfrak{M}_H[1/n]$ est lisse sur $\mathrm{Spec}\mathbb{Z}[1/n]$, et $\mathfrak{M}_H^{o}[1/n]$ est le complément d'un sous-champ $\mathfrak{M}_H^{\infty}[1/n]$ fini et étale sur $\mathrm{Spec}\mathbb{Z}[1/n]$).

Preuve (i) Par définition, $\mathfrak{M}_H$ est fini et relativement représentable sur $\mathfrak{M}_1$ Sa propreté résulte donc de celle de $\mathfrak{M}_1$.

(ii) L'assertion résulte du lemme d'Abhyankhar (SGA 1,XIII5) appliquable ici parce que $\mathfrak{M}_1[1/n]$ est lisse sur $\mathbb{Z}[1/n]$, que $\mathfrak{M}_1^{\infty}[1/n]$ est un diviseur de $\mathfrak{M}_1[1/n]$, lisse sur $\mathbb{Z}[1/n]$, et dont le point générique est de caractéristique 0, et que $\mathfrak{M}_H^{o}[1/n]$ est fini étale sur $\mathfrak{M}_1[1/n] - \mathfrak{M}_1^{\infty}[1/n]$.

En 6.7, nous donnerons de 3.4 une démonstration "modulaire".

Authority visual fallback P0070-A03.

Pour H = {e}, nous poserons $\mathfrak{m}_n = \mathfrak{m}_H$. Cette notation est légitimée par la proposition suivante.

Proposition 3.5. Pour H = {e}, $\mathfrak{m}_H[1/n]$ est le champ $\mathfrak{m}_n[1/n]$ de 2.4.

La construction 1.4 définit un morphisme de champs

$c : \mathfrak{m}_n[1/n] \to \mathfrak{m}_1[1/n] : (C,\alpha) \mapsto c(C)$.

Puisque $\mathfrak{m}_n[1/n]$ est normal (même lisse sur $\mathbb{Z}[1/n]$), propre sur $\mathbb{Z}[1/n]$, et que clairement $\mathfrak{m}_n{}^{o}[1/n] \simeq \mathfrak{m}_H{}^{o}[1/n]$, il nous suffit de prouver que c est fini et localement représentable. Il est clair que les fibres de c sont finies. Pour tester la représentabilité locale, il suffit dès lors de vérifier (cf. 2.6) :

Lemme 3.5.1. Pour k un corps algébriquement clos, C un objet de $\mathfrak{m}_n[1/n](k)$ et c(C) son image dans $\mathfrak{m}_1(k)$, l'application naturelle $i : \mathrm{Aut}(C) \to \mathrm{Aut}(c(C))$ est injective.

Pour $n \geq 3$, Aut(C) est trivial (cf. 2.7). Pour n = 2, $\mathrm{Aut}(C) = \{\pm 1\}$. Enfin, pour n = 1, i est l'identité.

3.6. Soient n et m deux entiers, avec n|m. Soient $H \subset GL(2,\mathbb{Z}/n)$, et H' son image réciproque dans $GL(2,\mathbb{Z}/nm)$. Pour E une courbe elliptique sur S, une structure de niveau nm

$$\begin{array}{ccc} E_{nm} & \xrightarrow{\alpha'}\tilde{\to} & (\mathbb{Z}/nm)^2 \\ \Big\downarrow x^m & & \Big\downarrow \text{réduction} \\ E_n & \xrightarrow{\alpha}\tilde{\to} & (\mathbb{Z}/n)^2 \end{array}$$

définit une structure de niveau n, α, rendant commutatif le diagramme.

Pour nm inversible sur S, cette construction définit un isomorphisme du faisceau des H'-structures sur E avec celui des H-structures. On a

$\mathfrak{m}_{H'}{}^{o}[1/nm] \simeq \mathfrak{m}_H{}^{o}[1/n][1/nm]$.



Pour $H = \{e\}$, nous poserons $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_H$. Cette notation est légitimée par la proposition suivante.

Proposition 3.5. Pour $H = \{e\}$, $\mathfrak{M}_H[1/n]$ est le champ $\mathfrak{M}_n[1/n]$ de 2.4.

La construction 1.4 définit un morphisme de champs

$$c : \mathfrak{M}_n[1/n] \to \mathfrak{M}_1[1/n] : (C,\alpha) \mapsto c(C)$$

Puisque $\mathfrak{M}_n[1/n]$ est normal (même lisse sur $\mathbb{Z}[1/n]$), propre sur $\mathbb{Z}[1/n]$, et que clairement $\mathfrak{M}_n^0[1/n] \simeq \mathfrak{M}_H^0[1/n]$, il nous suffit de prouver que c est fini et localement représentable. Il est clair que les fibres de c sont finies. Pour tester la représentabilité locale, il suffit dès lors de vérifier (cf. 2.6):

Lemme 3.5.1. Pour k un corps algébriquement clos, C un objet de $\mathfrak{M}_n[1/n](k)$ et $c(C)$ son image dans $\mathfrak{M}_1(k)$, l'application naturelle $i : \mathrm{Aut}(C) \to \mathrm{Aut}(c(C))$ est injective

Authority visual fallback P0071-A01.

Puisque $\mathfrak{m}_H\hat{}o[1/n]$ est fini et étale sur $\mathfrak{m}_1\hat{}o[1/n]$, c'est le normalisé de $\mathfrak{m}_1\hat{}o[1/n]$ dans $\mathfrak{m}_H'\hat{}o[1/nm]$. On en déduit un isomorphisme

$\mathfrak{m}_H' \simeq \mathfrak{m}_H$.

Le champ $\mathfrak{m}_H$ ne dépend donc que du sous-groupe ouvert K de $GL(2,\hat{\mathbb{Z}})$, image réciproque de H. Nous le noterons parfois $\mathfrak{m}_K$.

3.7. Soient n et m deux entiers premiers entre eux, $H \subset GL(2,\mathbb{Z}/n)$ et $I \subset GL(2,\mathbb{Z}/m)$. Soient K et L les images réciproques de H et I dans $GL(2,\hat{\mathbb{Z}})$. Les morphismes de réduction mod n et m induisent un isomorphisme

$GL(2,\mathbb{Z}/nm) \xrightarrow{\sim} GL(2,\mathbb{Z}/n) \times GL(2,\mathbb{Z}/m)$.

Via cet isomorphisme, $K \cap L$ est l'image réciproque de $H \times I \subset GL(2,\mathbb{Z}/n) \times GL(2,\mathbb{Z}/m)$.

Construction 3.8. Avec les notations précédentes,

$\mathfrak{m}_K\hat{}o[1/n] \times_{\{\mathfrak{m}_1\hat{}o\}} \mathfrak{m}_L\hat{}o[1/m] \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}_{\{K\cap L\}}\hat{}o[1/nm]$.

Soit C/S une courbe elliptique. Les application $x \to x\hat{}m$ et $x \to x\hat{}n$ définissent un isomorphisme

(3.8.1) $C_{nm} \xrightarrow{\sim} C_n \times C_m$.

Si $\bar{\alpha}$ (resp. $\bar{\beta}$) est une structure de niveau H (resp. I) sur C, localement représentée par $\alpha : C_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$ (resp. $\beta : C_m \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/m)^2$), on définit la structure $\bar{\alpha} \times \bar{\beta}$ de niveau $H \times I$ sur C comme étant la classe de l'isomorphisme $\alpha \times \beta$ rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccc} C_{nm} & \xrightarrow{\alpha\times\beta} & (\mathbb{Z}/nm)^2 \\ \downarrow (3.8.1) & & \downarrow \text{réduction} \\ C_n \times C_m & \xrightarrow{(\alpha,\beta)} & (\mathbb{Z}/n)^2 \times (\mathbb{Z}/m)^2 \end{array}$$

L'isomorphisme 3.8 est défini par

$$(C,\bar{\alpha},\bar{\beta}) \longmapsto (C,\bar{\alpha} \times \bar{\beta})$$

Authority visual fallback P0072-A03.

Proposition 3.9. Avec les notations de 3.7., l'isomorphisme 3.8 se prolonge en

(3.9.1) $\mathfrak{m}_K \times_{\mathfrak{m}_1} \mathfrak{m}_L \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}_{K\cap L}$.

Preuve. Il suffit de prouver que $\mathfrak{m}_K \times_{\mathfrak{m}_1} \mathfrak{m}_L$ est normal. Prouvons-le au-dessus de $\mathbb{Z}[1/m]$. Au-dessus de $\mathbb{Z}[1/n]$, la démonstration est symétrique. $\mathfrak{m}_L[1/m]$ est lisse sur $\mathbb{Z}$, donc plat sur $\mathfrak{m}_1$ (I 7.1). $\mathfrak{m}_K \times_{\mathfrak{m}_1} \mathfrak{m}_L[1/m]$ est donc plat sur $\mathfrak{m}_K$, et de Cohen-Macaulay (I 7.2 et 7.1) $\mathfrak{m}_L^o[1/m]$ est même étale sur $\mathfrak{m}_1$, donc $\mathfrak{m}_K \times_{\mathfrak{m}_1} \mathfrak{m}_L^o[1/m]$, étale sur $\mathfrak{m}_K$, est normal.

D'après le lemme d'Abhyankar, la ramification de $\mathfrak{m}_K[1/n]$ sur $\mathfrak{m}_1[1/n]$ (resp. $\mathfrak{m}_L[1/m]$ sur $\mathfrak{m}_1[1/m]$) est modérée. Les indices de ramifications pour $\mathfrak{m}_K$ et $\mathfrak{m}_L$ sont donc premiers entre eux (en fait, des diviseurs de n et m). Il en résulte que $\mathfrak{m}_K[1/mn] \times_{\mathfrak{m}_1} \mathfrak{m}_L[1/mn]$ est lisse, et il ne reste plus qu'à appliquer le critère de Serre (I.7.2).

Corollaire 3.9.2. Si n est le produit de deux entiers premiers entre eux et ≥ 3, alors $\mathfrak{m}_n$ est un schéma.

Soit $n = n'.n''$. Le champ $\mathfrak{m}_n[1/n']$ est un schéma, car représentable sur $\mathfrak{m}_{n'}[1/n]$. De même, $\mathfrak{m}_n[1/n'']$, donc $\mathfrak{m}_n$, est un schéma.

Proposition 3.10. (i) L'espace grossier M_H défini par $\mathfrak{m}_H$ est propre et plat sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$.

(ii) C'est le normalisé dans $M_H^o[1/n]$ de M_1 (isomorphe à $\mathbb{P}^1$: voir VI 1.1).

(iii) On a $M_H = M_n/H$.

(iv) Les fibres géométriques de $M_H[1/n] \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ sont géométriquement unibranches.

Preuve. La propreté de M_H résulte de celle de $\mathfrak{m}_H$. De la description de l'hensélisé strict d'un anneau local de M_H donnée en I.8.2, et de la normalité de $\mathfrak{m}_H$, il résulte que M_H est normal. De même, M_H est plat sur $\mathbb{Z}$. Puisque $\mathfrak{m}_H \to \mathfrak{m}_1$, donc $M_H \to M_1$ est fini, (ii) résulte de (i) et de la normalité.


Soit $n = n'.n''$. Le champ $\mathfrak{m}_n[1/n']$ est un schéma, car représentable sur $\mathfrak{m}_{n'}[1/n]$. De même, $\mathfrak{m}_n[1/n'']$, donc $\mathfrak{m}_n$, est un schéma.

Proposition 3.10. (i) L'espace grossier M_H défini par $\mathfrak{m}_H$ est propre et plat sur Spec($\mathbb{Z}$)

(ii) C'est le normalisé dans $M_H^o[1/n]$ de M_1 (isomorphe à $\mathbb{P}^1$: voir VI 1.1).

(iii) On a $M_H = M_n/H$.

(iv) Les fibres géométriques de $M_H[1/n] \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ sont géométriquement unibranches.

Preuve La propreté de M_H résulte de celle de $\mathfrak{m}_H$. De la description de l'hensélisé strict d'un anneau local de M_H donnée en I.8.2, et de la normalité de $\mathfrak{m}_H$, il résulte que M_H est normal. De même, M_H est plat sur $\mathbb{Z}$. Puisque $\mathfrak{m}_H \to \mathfrak{m}_1$, donc $M_H \to M_1$ est fini, (ii) résulte de (i) et de la normalité.

Authority visual fallback P0073-A03.

Il suffit de prouver (iii) et (iv) lorsque $n \geq 3$ (cf. 3.6) auquel cas $M_n^o[1/n] = \mathfrak{m}_n^o[1/n]$. Avec les notations de [8] §4 on a alors

$\mathfrak{m}_H^o[1/n] = [M_n^o[1/n] / H]$,

de sorte que $M_H^o[1/n] = M_n^o[1/n]/H$. Ceci étant, (iii) résulte de (ii).

L'application

$(M_n \otimes \bar{F}_p)/H \to (M_n/H) \otimes \bar{F}_p = M_H \otimes \bar{F}_p$

est radicielle. Si $p \nmid n$, $M_n \otimes \bar{F}_p$, donc $(M_n \otimes \bar{F}_p)/H$ est lisse, et (iv) en résulte.

3.11. La catégorie des courbes elliptiques à isogénie près sur un schéma S est la catégorie déduite de celle des courbes elliptiques en inversant les isogénies. Notant E ⊗ ℚ la courbe elliptique à isogénie près sur S sous-jacente à E/S, on a

Hom_S(E ⊗ ℚ, F ⊗ ℚ) = Hom_S(E,F) ⊗ ℚ.

3.12. Plaçons nous sur un corps algébriquement clos de caractéristique 0 k. Pour toute courbe elliptique E sur k, soit

T̂(E) = lim← E_n (isomorphe à $\hat{\mathbb{Z}}^2$)

V̂(E) = T̂(E) ⊗ ℚ (isomorphe à $\hat{\mathbb{Z}}^2 \otimes \mathbb{Q} = (\mathbb{A}^f)^2$).

Le groupe des points de division de E est canoniquement isomorphe à V̂(E)/T̂(E) : à x ∈ (1/n)T̂(E)/T̂(E), on associe l'image dans E_n de nx ∈ T̂(E).

Une isogénie E → F induit un isomorphisme V̂(E) ⥲ V̂(F). Ceci permet de définir V̂(E_o) pour E_o une courbe elliptique à isogénie près. Si f : E → F est une isogénie, on a

Ker(f) = Ker(V̂(E)/T̂(E) → V̂(F)/T̂(F)) = coker(T̂(E) → T̂(F)).

L'application f ↦ T̂(F) ⊂ V̂(E) identifie les isogénies de source E aux "réseaux" T̂' contenant T̂(E). On en déduit que le foncteur



3.12. Plaçons nous sur un corps algébriquement clos de caractéristique 0 k . Pour toute courbe elliptique E sur k , soit

$\hat{T}(E) = \varprojlim E_n$ (isomorphe à $\hat{\mathbb{Z}}^2$)

$\hat{V}(E) = \hat{T}(E) \otimes \mathbb{Q}$ (isomorphe à $\hat{\mathbb{Z}}^2 \otimes \mathbb{Q} = (\mathbb{A}^f)^2$) .

Le groupe des points de division de E est canoniquement isomorphe à $\hat{V}(E)/\hat{T}(E)$: à $x \in \frac{1}{n}\hat{T}(E)/\hat{T}(E)$, on associe l'image dans E_n de $nx \in \hat{T}(E)$.

Une isogénie $E \to F$ induit un isomorphisme $\hat{V}(E) \xrightarrow{\sim} \hat{V}(F)$. Ceci permet de définir $\hat{V}(E_o)$ pour E_o une courbe elliptique à isogénie près. Si $f : E \to F$ est une isogénie, on a

Authority visual fallback P0074-A03.

E ↦ (E ⊗ ℚ, T̂(E) ⊂ V̂(E ⊗ ℚ))

(courbes elliptiques) → (courbes elliptiques à isogénie près E_o, munies d'un "réseau" T̂ ⊂ V̂(E))

est une équivalence de catégories.

3.13. Soit E_o une courbe elliptique à isogénie près sur k. Un réseau T̂ ⊂ V̂(E_o) peut s'interpréter comme une classe mod GL(2,$\hat{\mathbb{Z}}$) d'isomorphismes

β : V̂(E_o) → $(\mathbb{A}^f)^2$:

à β on associe $\beta^{-1}(\hat{\mathbb{Z}}^2)$.

Soit K ⊂ GL(2,$\hat{\mathbb{Z}}$) l'image réciproque de H ⊂ GL(2,ℤ/n). Si (E_o,T̂) correspondent à une courbe E, à une structure de niveau H sur E on associe l'ensemble des β : V̂(E_o) ⥲ $(\mathbb{A}^f)^2$ tels que $\beta^{-1}(\hat{\mathbb{Z}}^2) = \hat{T}$ et que

β_n : E_n = T̂/nT̂ ⥲ $\hat{\mathbb{Z}}^2/n\hat{\mathbb{Z}}^2 = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$

définisse la structure de niveau H. Les β forment une classe latérale sous K, et l'ensemble des courbes elliptiques munies d'une structure de niveau H (E,α̃), avec E ⊗ ℚ = E_o, s'identifie à

K\Isom(V̂(E_o),$(\mathbb{A}^f)^2$).

3.14. Soit g ∈ GL(2,𝔸^f) tel que gKg⁻¹ ⊂ GL(2,$\hat{\mathbb{Z}}$). Si on identifie une courbe elliptique avec structure de niveau K (= de niveau H) à (E_o,β), avec β ∈ K\Isom($\hat{V}$(E_o),(𝔸^f)²), l'application (E_o,β) ↦ (E_o,gβ) associe à une courbe de niveau K une courbe de niveau gKg⁻¹.

Ces constructions gardent un sens sur un schéma de caractéristique 0 quelconque et définissent

(3.14.1) g : 𝔪_K^o ⊗ Spec(ℚ) →̃ 𝔪_{gKg⁻¹}^o ⊗ Spec(ℚ),

et un isomorphisme [g] entre l'image réciproque par g de la courbe universelle sur 𝔪_{gKg⁻¹}^o ⊗ Spec(ℚ) à isogénie près avec la courbe universelle sur 𝔪_K^o ⊗ Spec(ℚ), à isogénie près.



Authority visual fallback P0075-A03.

Par passage à la limite sur K, on en déduit une action de GL(2,𝔸^f) sur le schéma lim←_K 𝔪_K^o ⊗ Spec(ℚ), et sur la courbe elliptique universelle à isogénie près.

3.15. Explicitons l'application composée

(3.15.1) 𝔪_K^o ⊗ ℚ →̃ 𝔪_{gKg⁻¹}^o ⊗ ℚ ⟶c 𝔪_1^o ⊗ ℚ.

Prenons n, et soit m tels que

$\hat{\mathbb{Z}}^2 \subset (1/m)g^{-1}(\hat{\mathbb{Z}}^2) \subset (1/n)\hat{\mathbb{Z}}^2$.

Soit B le sous-groupe de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ image de $(1/m)g^{-1}(\hat{\mathbb{Z}}^2)/\hat{\mathbb{Z}}^2$ par la multiplication par n : $(1/n)\hat{\mathbb{Z}}^2/\hat{\mathbb{Z}}^2 \tilde{\to} (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$.

A une courbe elliptique avec structure de niveau H (E,ᾱ), on associe la courbe elliptique $E/\alpha^{-1}(B)$, pour α : E_n →̃ $(\mathbb{Z}/n)^2$ un quelconque représentant de ᾱ. L'isogénie [g] est 1/m fois la projection $E \to E/\alpha^{-1}(B)$.

Proposition 3.16. L'isomorphisme 3.14.1 se prolonge en un isomorphisme

g : 𝔪_K^o →̃ 𝔪_{gKg⁻¹}^o.

L'isomorphisme [g] se prolonge en un isomorphisme

[g] : g^* (courbe elliptique sur 𝔪_{gKg⁻¹}^o) ⊗ ℚ ≃ (courbe elliptique sur 𝔪_K^o) ⊗ ℚ.

Preuve. Montrons tout d'abord que (3.15.1) se prolonge en

cg : 𝔪_K^o → 𝔪_1^o.

Soit b l'ordre de B comme en 3.15 et soit I le champ relativement représentable sur 𝔪_1^o qui représente le foncteur des sous-schémas en groupes localement libres de rang b de la courbe elliptique universelle E. La théorie des schémas de Hilbert montre

que la projection I → $\mathfrak{m}_1^o$ est un morphisme propre et représentable. En vertu du lemme suivant, il est fini.


DeRa-76

Par passage à la limite sur K , on en déduit une action de $GL(2, \mathbb{A}^f)$ sur le schéma $\varprojlim_K h^0_K \otimes \mathbb{Q}$ Spec($\mathbb{Q}$), $\mathfrak{m}$ sur la courbe elliptique universelle à isogénie près.

3.15. Explicitons l'application composée

(3.15.1) $h^0_K \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{\sim} h^0_{gKg^{-1}} \otimes \mathbb{Q} \xrightarrow{c} h^0_1 \otimes \mathbb{Q}$.

Prenons n , et soit m tels que

$$\hat{\mathbb{Z}}^2 \subset \frac{1}{m} g^{-1}(\hat{\mathbb{Z}}^2) \subset \frac{1}{n}\hat{\mathbb{Z}}^2 \quad .$$

Soit B le sous-groupe de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ image de $\frac{1}{m} g^{-1}(\hat{\mathbb{Z}}^2)/\hat{\mathbb{Z}}^2$ par la multiplica-

Authority visual fallback P0076-A01.

Authority page 77 ; collected-paper page 570 ; original folio 219.

Lemme 3.17. Soient E une courbe elliptique sur k algébriquement clos et b un entier. Il n'y a qu'un nombre fini de sous-schémas en groupes de rang b de E.

Preuve de 3.17. On procède par récurrence sur b.

a) il n'y a qu'un nombre fini de sous-schémas étales de rang b de E : ils s'identifient aux sous-groupes d'ordre b de E_b(k).

b) si H ⊂ E n'est pas étale, k est de caractéristique p > 0 et H ⊃ Ker(F). Les sous-groupes non étales de rang b de E correspondent donc aux sous-groupes de rang b/p de E^(p) = E/Ker(F), et on conclut par l'hypothèse de récurrence.

Preuve de 3.16. (suite). La construction 3.14 définit une section s sur $\mathfrak{m}_K^o \otimes \mathrm{Spec}(\mathbb{Q})$ de I ×_{$\mathfrak{m}_1$} $\mathfrak{m}_K^o$.

Il résulte du Main Theorem de Zariski et de la normalité de $\mathfrak{m}_K^o$ que cette section se prolonge sur $\mathfrak{m}_K^o$, définissant un sous-groupe B de l'image inverse E par c de la courbe elliptique universelle sur $\mathfrak{m}_1^o$; le prolongement cg voulu est défini par E/B ; l'isomorphisme [g] est défini comme en 3.15.

Le morphisme cg ainsi défini est quasi-fini et représentable. Il identifie donc $\mathfrak{m}_K^o$ à un ouvert du normalisé $\mathfrak{m}_{gKg^{-1}}^o$ de $\mathfrak{m}_1^o$ dans

$\mathfrak{m}_K^o \otimes \mathrm{Spec}(\mathbb{Q}) \xrightarrow{g} \mathfrak{m}_{gKg^{-1}}^o \otimes \mathrm{Spec}(\mathbb{Q})$,

d'où

$g : \mathfrak{m}_K^o \hookrightarrow \mathfrak{m}_{gKg^{-1}}^o$.

Ce morphisme est un isomorphisme, d'inverse g^{-1}.

3.18. On peut montrer que g se prolonge en un isomorphisme

$\mathfrak{m}_K \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}_{gKg^{-1}}$.

Nous nous contenterons de montrer le résultat analogue pour les schémas grossiers.

Proposition 3.19. Le morphisme de schémas grossiers déduit de 3.16 se prolonge en

$g : M_K \xrightarrow{\sim} M_{gKg^{-1}}$.



Lemme 3.17. Soient E une courbe elliptique sur k algébriquement clos et b un entier. Il n'y a qu'un nombre fini de sous-schémas en groupes de rang b de E.

Preuve de 3.17. On procède par récurrence sur b.

a) il n'y a qu'un nombre fini de sous-schémas étales de rang b de E : ils s'identifient aux sous-groupes d'ordre b de $E_b(k)$

b) si $H \subset E$ n'est pas étale, k est de caractéristique $p > 0$ et $H \supset \mathrm{Ker}(F)$. Les sous-groupes non étales de rang b de E correspondent donc aux sous-groupes de rang b/p de $E^{(p)} = E/\mathrm{Ker}(F)$, et on conclut par l'hypothèse de récurrence.

Preuve de 3.16. (suite). La construction 3.14 définit une section s sur $\mathfrak{m}^o \otimes \mathrm{Spec}(B)$ de $Y \times \mathfrak{m}^o$

Authority visual fallback P0077-A01.

Authority page 78 ; collected-paper page 571 ; original folio 220.

Soit $\Gamma \subset M_K \times M_{gKg^{-1}}$ l'adhérence du graphe G de $g : M_K^o \xrightarrow{\sim} M_{gKg^{-1}}^o$. On a, ensemblistement,

$\Gamma = G \cup (\Gamma \cap (M_K^\infty \times_{\mathbb{Z}} M_{gKg^{-1}}^\infty))$.

Dès lors, Γ est fini sur M_K et $M_{gKg^{-1}}$ et, d'après le Main theorem et 3.10, $\Gamma \to M_K$ et $\Gamma \to M_{gKg^{-1}}$ sont des isomorphismes. 3.19 en résulte.

3.20. Soit C une courbe elliptique sur S, avec n inversible sur S. Il est bien connu que le "e_n-pairing" définit un isomorphisme.

(3.20.1) $e_n : \Lambda^2 C_n \xrightarrow{\sim} \mu_n$.

Une structure de niveau n $\alpha : C_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$ définit donc un isomorphisme

$\det(\alpha)^{-1} : \mathbb{Z}/n \xrightarrow{\sim} \mu_n$,

i.e. une racine primitive n-ième de l'unité

$d(\alpha) = \det(\alpha)^{-1}(1)$ sur S.

Notons $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ l'anneau des entiers du corps des racines n-ièmes de l'unité. La construction $\alpha \mapsto d(\alpha)$ définit un morphisme

$d : \mathfrak{m}_n^o[1/n] \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\zeta_n])$.

Ce morphisme se prolonge au normalisé et définit

(3.20.2) $d : \mathfrak{m}_n \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\zeta_n])$.

De même, une structure de niveau H α définit

$d(\alpha) \in \mathrm{Isom}(\mathbb{Z}/n, \mu_n)/\det(H)$.

Le groupe $(\mathbb{Z}/n)^*$ agit sur $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ par $\zeta_n \mapsto \zeta_n^i$; si $\mathbb{Z}[\zeta_n]^{\det H}$ est le sous-anneau des invariants de $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ sous l'action de $\det H \subset (\mathbb{Z}/n)^*$, on trouve comme plus haut

(3.20.3) $d : \mathfrak{m}_H \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\zeta_n]^{\det H})$,

définissant



3.20. Soit C une courbe elliptique sur S, avec n inversible sur S. Il est bien connu que le "e_n-pairing" définit un isomorphisme,

(3.20.1) $e_n : \overset{2}{\Lambda} C_n \xrightarrow{\sim} \mu_n$.

Une structure de niveau n $\alpha : C_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$ définit donc un isomorphisme $\det(\alpha)^{-1} : \mathbb{Z}/n \xrightarrow{\sim} \mu_n$, i.e. une racine primitive $n^{\text{ième}}$ de l'unité $d(\alpha) = \det(\alpha)^{-1}(1)$ sur S

Notons $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ l'anneau des entiers du corps des racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité. La construction $\alpha \mapsto d(\alpha)$ définit un morphisme

Authority visual fallback P0078-A02.

Authority page 79 ; collected-paper page 572 ; original folio 221.

(3.20.4) d : M_H → Spec(ℤ[ζ_n]^{det H}).

3.21. Plaçons-nous sur 𝔪_{(m)}[1/m] avec n|m. Si C est la courbe elliptique généralisée universelle, le e_n-pairing se prolonge en un isomorphisme

Λ² C_n ≃ μ_n.

En particulier, pour le polygone de Néron à m côtés standard, on trouve un isomorphisme

(3.21.1) e_n : Λ² (𝔾_m × ℤ/m)_n ≃ μ_n.

Identifions ℤ/n à (ℤ/m)_n par i ↦ (m/n)i. On a

(3.21.2) Λ² (𝔾_m × ℤ/m)_n = Λ² (μ_n × ℤ/n) ⇀̃ μ_n.

Selon les conventions de signe utilisées pour définir e_n, (3.21.1) et (3.21.2) sont égaux ou opposés.

4. Exemples.

4.1. Nous noterons Γ_o(n), Γ_{oo}(n), Γ'_{oo}(n) et Γ(n) les sous-groupes de GL(2,$\hat{\mathbb{Z}}$) formé des matrices

(a b) (c d)

telles que :

Γ_o(n) : c ≡ 0 (mod n) ;

Γ_{oo}(n) : c ≡ 0 (mod n), a ≡ 1 (mod n) ;

Γ'_{oo}(n) : c ≡ 0 (mod n), a ≡ d ≡ 1 (mod n) ;

Γ(n) : (a b) ≡ (1 0) (mod n). (c d) (0 1)

Ces sous-groupes sont chacun image réciproque de sous-groupes H de GL(2,ℤ/n).

4.2. Pour Γ_o(n), H est le sous-groupe de GL(2,ℤ/n) qui stabilise le sous-groupe ℤ/n × {0} de (ℤ/n)². Si C est une courbe elliptique sur S, et que

Selon les conventions de signe utilisées pour définir e_n, (3.21.1) et (3.21.2) sont égaux ou opposés.

4. Exemples.

4.1. Nous noterons $\Gamma_o(n)$, $\Gamma_{oo}(n)$, $\Gamma'_{oo}(n)$ et $\Gamma(n)$ les sous-groupes de $GL(2,\hat{\mathbb{Z}})$ formé des matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ telles que :

$\Gamma_o(n)$: $c \equiv 0 \pmod n$;

$\Gamma_{oo}(n)$: $c \equiv 0 \pmod n$, $a \equiv 1 \pmod n$;

$\Gamma'_{oo}(n)$: $c \equiv 0 \pmod n$, $a \equiv d \equiv 1 \pmod n$;

$\Gamma(n)$: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod n$.

Ces sous-groupes sont chacun image réciproque de sous-groupes H de

Authority visual fallback P0079-A03.

Authority page 80 ; collected-paper page 573 ; original folio 222.

ᾱ est une structure de niveau H sur C, représentée par α : C_n ⇀̃ (ℤ/n)², le sous-schéma en groupes α^{-1}(ℤ/n × {0}) de C_n ne dépend donc que de ᾱ. Si n est inversible sur S, cette construction établit un isomorphisme du faisceau des structures de niveau H sur C avec le faisceau des sous-schémas en groupes de C localement isomorphes à ℤ/n. En d'autres termes :

Construction 4.3. 𝔪^o_{Γ_o(n)}[1/n] s'identifie au champ algébrique classifiant les courbes elliptiques C/S, avec n inversible sur S, munies d'un sous-schéma en groupes

A localement isomorphe à $\mathbb{Z}/n$.

4.4. Pour C/S et A comme en 4.3, le sous-groupe C_n/A de C/F est localement isomorphe à $\mathbb{Z}/n$, d'où un morphisme

w : $\mathfrak{m}^o_{\Gamma_o(n)}[1/n] \to \mathfrak{m}^o_{\Gamma_o(n)}[1/n]$: (C,A) ↦ w(C,A) = (C/A, C_n/A).

La multiplication par n se factorise par un isomorphisme C/C_n $\tilde{\to}$ C ; celui-ci définit un isomorphisme

ww(C,A) = ((C/A)/(C_n/A), (C/A)_n/(C_n/A)) = (C/C_n, ..) $\tilde{\to}$ (C,A),

d'où un isomorphisme $w^2 \simeq Id$: w est une involution. On vérifie que w est du type 3.16, pour

g = (0 1). (n 0)

4.5. Voici une description plus symétrique du champ et de w. Associons à (E,A) l'isogénie E → E/A. On trouve que $\mathfrak{m}^o_{\Gamma_o(n)}[1/n]$ est encore le champ classifiant les isogénies

a : E_1 → E_2,

de noyau cyclique d'ordre n.

Si (E,A) définit a : E_1 → E_2, w(E,A) définit une isogénie E_2 → E_1/(E_1)_n, qui, via l'isomorphisme 4.4 de E_1/(E_1)_n avec E_1, s'identifie au dual de Cartier de a : dans le langage des isogénies,

w(a : E_1 → E_2) est (a^* : E_2 → E_1).



Authority visual fallback P0080-A03.

Authority page 81 ; collected-paper page 574 ; original folio 223.

4.6. Soient C/S et A comme en 4.3. Pour chaque facteur premier p de n, soit A_p la composante p-primaire de A : A = $\prod_{p|n}$ A_p, et soit n(p) l'ordre de A_p : n = $\prod_p p^{n(p)}$. On pose

w_p(E,A) = (E/A_p, (A + E_{p^{n(p)}})/A_p).

Les w_p définissent des involutions de $\mathfrak{m}^o_{\Gamma_o(n)}[1/n]$, celles-ci commutent deux à deux, et w est leur composé.

4.7. Le sous-groupe $\Gamma_{oo}(n)$ de $GL(2,\hat{\mathbb{Z}})$ est l'image réciproque du sous-groupe H de $GL(2,\mathbb{Z}/n)$ qui fixe l'élément (1,0) de $(\mathbb{Z}/n)^2$ ou, ce qui revient au même, le morphisme

β : $\mathbb{Z}/n \to (\mathbb{Z}/n)^2$: x ↦ (x,0).

Raisonnant comme en 4.2, on obtient :

Construction 4.8. $\mathfrak{m}^o_{\Gamma_{oo}(n)}[1/n]$ s'identifie au champ algébrique classifiant les courbes elliptiques C/S, avec n inversible sur S, munies d'un plongement β : $\mathbb{Z}/n \hookrightarrow C_n$, i.e. d'une section β(1) partout d'ordre exactement n.

4.9. Γ'_{oo}(n) est l'image réciproque du sous-groupe H de GL(2,ℤ/n) qui fixe (1,0) ∈ (ℤ/n)² et la classe de (0,1) dans (ℤ/n)²/ℤ/n × {0}. Dès lors, 𝔪^o_{Γ'_{oo}(n)}[1/n] s'identifie au champ algébrique classifiant les courbes elliptiques C/S, avec n inversible sur S, munies de β : ℤ/n ↪ C_n et de

γ : ℤ/n ⇀̃ C_n/Im(β).

Le produit extérieur définit un isomorphisme

C_n/Im(β) ↼̃ (ℤ/n) ⊗ C_n/Im(β) ⇀̃^{β} Im(β) ⊗ C_n/Im(β) ⇀̃^{Λ} Λ² C_n ⇀̃^{e_n} μ_n.

Via cet isomorphisme, se donner γ revient donc à se donner un isomorphisme de ℤ/n avec μ_n, i.e. une racine primitive n-ième de l'unité sur S. Dès lors

Construction 4.10. 𝔪^o_{Γ'_{oo}(n)}[1/n] ≃ 𝔪^o_{Γ_{oo}(n)}[1/n] ⊗ ℤ[ζ_n].

Cet isomorphisme est le produit fibré, sur Spec(ℤ), du morphisme d'oubli :

𝔪^o_{Γ'_{oo}(n)} → 𝔪^o_{Γ_{oo}(n)}[1/n]

(défini parce que Γ'_{oo}(n) ⊂ Γ_{oo}(n)) et du morphisme d (3.20.3).

Définition 4.11. ´𝔪_{Γ_o(n)}[1/n] est le champ algébrique classifiant les courbes elliptiques généralisées C/S, avec n inversible sur S, munie d'un sous-schéma en groupe A localement isomorphe à ℤ/n, et rencontrant chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique de C.


4.9. $\Gamma'_{oo}(n)$ est l'image réciproque du sous-groupe H de $GL(2,\mathbb{Z}/n)$ qui fixe $(1,0) \in (\mathbb{Z}/n)^2$ et la classe de $(0,1)$ dans $(\mathbb{Z}/n)^2/\mathbb{Z}/n \times \{0\}$. Dès lors, $\mathcal{M}^{o}_{\Gamma'_{oo}(n)}[1/n]$ s'identifie au champ algébrique classifiant les courbes elliptiques C/S, avec n inversible sur S, munies de $\beta : \underline{\mathbb{Z}/n} \hookrightarrow C_n$ et de $\gamma : \underline{\mathbb{Z}/n} \xrightarrow{\sim} C_n/\mathrm{Im}(\beta)$. Le produit extérieur définit un isomorphisme

$$C_n/\mathrm{Im}(\beta) \xleftarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n) \otimes C_n/\mathrm{Im}(\beta) \xrightarrow{\beta} \mathrm{Im}(\beta) \otimes C_n/\mathrm{Im}(\beta) \xrightarrow{\wedge} \overset{2}{\wedge} C_n \xrightarrow{e_n} \mu_n .$$

Via cet isomorphisme, se donner γ revient donc à se donner un isomorphisme de $\mathbb{Z}/n$ avec μ_n, i.e une racine primitive $n^{\text{ième}}$ de l'unité sur S. Dès lors

Construction 4.10. $\mathcal{M}^{o}_{\Gamma'_{oo}(n)}[1/n] \simeq \mathcal{M}^{o}_{\Gamma_{oo}(n)}[1/n] \otimes \mathbb{Z}[\zeta_n]$.

Cet isomorphisme est le produit fibré, sur Spec($\mathbb{Z}$), du morphisme d'oubli:

Authority visual fallback P0081-A03.

(On verra dans un instant que ´𝔪_{Γ_o(n)}[1/n] ≃ 𝔪_{Γ_o(n)}[1/n].)

Si un m-gone est classifié par ´𝔪_{Γ_o(n)}, on a m|n. L'application "oubli de A" envoie donc ´𝔪_{Γ_o(n)}[1/n] dans 𝔪_*. Elle est étale de sorte que ´𝔪_{Γ_o(n)}[1/n] est un champ algébrique lisse.

4.12. Comme en 3.5, on définit un morphisme "oubli de A et contraction (1.3)"

c : ´𝔪_{Γ_o(n)}[1/n] → 𝔪_1[1/n].

Pour k un corps algébriquement clos et C un objet de ´𝔪_{Γ_o(n)}[1/n](k), l'application Aut(C) → Aut(c(C)) est injective : pour C lisse, c'est trivial ; pour C un m-gone, muni de A ⊂ C, on vérifie sur II.1.10. que x → -x est le seul automorphisme non trivial de (C,A). On vérifie comme en 3.4 que ´𝔪_{Γ_o(n)}[1/n] est propre sur ℤ[1/n]. Comme en 3.5, on en déduit le résultat suivant

Construction 4.13. On a 𝔪_{Γ_o(n)}[1/n] ≃ ´𝔪_{Γ_o(n)}[1/n].

Des arguments analogues fournissent la

Construction 4.14. 𝔪_{Γ_{oo}(n)}[1/n] est le champ algébrique classifiant les courbes généralisées C/S, avec n inversible sur S, munies d'un plongement β : ℤ/n ↪ C, dont l'image rencontre chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique de C.

Puisque $\mathbb{Z}[\zeta_n][1/n]$ est étale sur $\mathbb{Z}[1/n]$, on déduit par ailleurs de 4.10 par normalisation la

Construction 4.15. $\mathfrak{m}_{\Gamma'_{oo}(n)}[1/n] \simeq \mathfrak{m}_{\Gamma_{oo}(n)}[1/n] \otimes \mathbb{Z}[\zeta_n]$.

4.16. Soit A le sous-groupe de $GL(2,\mathbb{Z}/n)$ formé des homothéties. Nous appellerons structures projectives de niveau n les structures de niveau A. Elles jouent un rôle important dans les travaux d'Ihara. Plus généralement :

(On verra dans un instant que $'\mathfrak{M}_{\Gamma_0(n)}[\frac{1}{n}] \simeq \mathfrak{M}_{\Gamma_0(n)}[\frac{1}{n}]$.)

Si un m-gone est classifié par $'\mathfrak{M}_{\Gamma_0(n)}$, on a $m|n$. L'application "oubli de A" envoye donc $'\mathfrak{M}_{\Gamma_0(n)}[1/n]$ dans $\mathfrak{M}_0$. Elle est étale de sorte que $\mathfrak{M}_{\Gamma_0(n)}[1/n]$ est un champ algébrique lisse.

4.12. Comme en 3.5, on définit un morphisme "oubli de A et contraction (1.3)"

$$c : '\mathfrak{M}_{\Gamma_0(n)}[1/n] \to \mathfrak{M}_1[1/n] \quad .$$

Pour k un corps algébriquement clos et C un objet de $'\mathfrak{M}_{\Gamma_0(n)}[1/n](k)$, l'application $Aut(C) \to Aut(c(C))$ est injective : pour C lisse, c'est trivial; pour C un m-gone, muni de $A \subset C$, on vérifie sur II.1.10. que $x \to -x$ est le seul automorphisme non trivial de (C,A) . On vérifie comme en 3.4 que $'\mathfrak{M}_{\Gamma_0(n)}[1/n]$ est propre sur $\mathbb{Z}[1/n]$. Comme en 3.5, on en déduit le résultat suivant

Authority visual fallback P0082-A01.

Définition 4.17. Soit C/S une courbe elliptique généralisée sur S, avec n inversible sur S. On suppose que les fibres géométriques singulières de C sont des n-gones. Une structure projective de niveau n sur C est une section de

$\mathrm{Isom}(C_n,(\mathbb{Z}/n)^2)/A$.

Lemme 4.18. Soit (C,α) une courbe elliptique généralisée sur un corps algébriquement clos, munie d'une structure projective de niveau n. Si $n \geq 2$, le seul automorphisme non trivial de C qui respecte α est $x \mapsto -x$.

Si C est un n-gone, le lemme résulte facilement de II.1.10, et vaut même si $n = 1$. Si C est lisse, c'est un cas particulier du lemme suivant.

Lemme 4.19. Soient $n \geq 2$ et g un automorphisme d'ordre fini d'une variété abélienne X sur un corps algébriquement clos k. Si g induit une homothétie sur X_n, alors $g^2 = 1$.

Par hypothèse, il existe $r \in \mathbb{Z}/n$ tel que $g - r$ soit nul sur X_n. Il existe donc un endomorphisme h de X tel que $g-r = n\cdot h$. Si ζ est une racine du polynôme caractéristique de g, ζ est une racine de l'unité et l'entier algébrique $\zeta-r$ est divisible par n. Si R est l'anneau des entiers du corps $\mathbb{Q}(\zeta)$, l'image de ζ dans R/nR est donc égale à celle de r. Puisque $R = \mathbb{Z}[\zeta]$, c'est absurde si $\zeta \neq \pm 1$. Puisque g est semi-simple, 4.19 en résulte.

Du lemme 4.18 pour les n-gones, et d'arguments maintenant familiers, on déduit le résultat suivant.

Construction 4.20. Pour A comme en 4.16, $\mathfrak{m}_A[1/n]$ est le champ algébrique classifiant les courbes elliptiques généralisées munies d'une structure projective de niveau n.

Pour (C,α) classifié par $\mathfrak{m}_A[1/n]$, et $n \geq 2$, il résulte de 4.18 que $Aut(C,\alpha)$ est constant. On en déduit la proposition suivante (1.8).

Proposition 4.21. Pour A comme en 4.16, et $n \geq 2$, l'application

si $n = 1$. Si C est lisse, c'est un cas particulier du lemme suivant.

Lemme 4.19. Soient $n \geq 2$ et g un automorphisme d'ordre fini d'une variété abélienne X sur un corps algébriquement clos k. Si g induit une homothétie sur X_n, alors $g^2 = 1$.

Par hypothèse, il existe $r \in \mathbb{Z}/n$ tel que $g - r$ soit nul sur X_n. Il existe donc un endomorphisme h de X tel que $g-r = n.h$. Si ζ est une racine du polynôme caractéristique de g, ζ est une racine de l'unité et l'entier algébrique $\zeta-r$ est divisible par n. Si R est l'anneau des entiers du corps $\mathbb{Q}(\zeta)$, l'image de ζ dans R/nR est donc égale à celle de r. Puisque $R = \mathbb{Z}[\zeta]$, c'est absurde si $\zeta \neq \pm 1$. Puisque g est semi-simple, 4.19 en résulte.

Du lemme 4.18 pour les n-gones, et d'arguments maintenant familiers, on déduit le résultat suivant.

Construction 4.20. Pour A comme en 4.16, $h[1/n]$ est le champ algébrique classi-

Authority visual fallback P0083-A02.

$\mathfrak{m}_A[1/n] \to M_A[1/n]$

est étale.

Remarque 4.22. Pour $n = 2$, $\mathfrak{m}_A$ n'est autre que $'\mathfrak{m}_2$, et l'application $'\mathfrak{m}_2[1/2] \to M_2[1/2]$ est donc étale.

5. Théorie transcendante (rappels).

5.1. Soit E une courbe elliptique sur $\mathbb{C}$. L'application exponentielle définit une suite exacte de groupes analytiques

$0 \to H_1(E,\mathbb{Z}) \to^{\iota} Lie(E) \to^{exp} E(\mathbb{C}) \to 0.$

Si $\beta : \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\sim} H_1(E,\mathbb{Z})$ est une base de E, nous poserons

$z(\beta) = \iota(\beta(1,0))/\iota(\beta(0,1)) \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$

(pour ι_1 et ι_2 deux éléments de Lie(E), avec $\iota_2 \neq 0$, on note ι_1/ι_2 le nombre complexe λ tel que $\iota_1 = \lambda\iota_2$).

Si

$\gamma = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in GL(2,\mathbb{Z})$,

on a

$z(\beta\gamma) = (a\, z(\beta) + b)/(c\, z(\beta) + d)$.

5.2. L'application $x \to \exp((1/n)\iota(x))$ induit un isomorphisme

(5.2.1) $H_1(E,\mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Z}/n \xrightarrow{\sim} E_n$.

Posons $X^{\pm} = \mathbb{C} - \mathbb{R}$, et soit X^+ le demi-plan supérieur. Si $\alpha : E_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$ est une structure de niveau n, la classe du couple

$(z(\beta), \alpha\circ\beta)$, $z(\beta) \in X^{\pm}$, $\alpha\circ\beta \in GL(2,\mathbb{Z}/n)$,

dans

$X^{\pm} \times GL(2,\mathbb{Z}/n) / GL(2,\mathbb{Z})$

ne dépend que de (E,α).

$\mathcal{H}_2[1/2] \to M_2[1/2]$ est donc étale.

5. Théorie transcendante (rappels).

5.1 Soit E une courbe elliptique sur $\mathbb{C}$. L'application exponentielle définit une suite exacte de groupes analytiques

$$0 \to H_1(E,\mathbb{Z}) \xrightarrow{\iota} \mathrm{Lie}(E) \xrightarrow{\exp} E(\mathbb{C}) \to 0 .$$

Si $\beta : \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\sim} H_1(E,\mathbb{Z})$ est une base de E, nous poserons

$$s(\beta) = s(\beta(1,0))/s(\beta(0,1)) \in \mathbb{C} - \mathbb{R}$$

(pour ι_1 et ι_2 deux éléments de $\mathrm{Lie}(E)$, avec $\iota_2 \neq 0$, on note ι_1/ι_2 le nombre complexe λ tel que $\iota_1 = \lambda\iota_2$).

Authority visual fallback P0084-A02.

Authority page 85 ; collected-paper page 578 ; original folio 227.

5.3. Soient H et K comme en 3.6. La construction 5.2 définit un isomorphisme

M_H^o(ℂ) ⇝ X^± × (H \ GL(2,ℤ/n)/GL(2,ℤ)).

On a d'ailleurs des isomorphismes

X × (H \ GL(2,ℤ/n))/SL(2,ℤ) ⇝ X^± × (H \ GL(2,ℤ/n))/GL(2,ℤ) ⇝ K \ X^± × GL(2,𝔸^f)/GL(2,ℚ).

5.4. On sait que le morphisme de réduction : SL(2,ℤ) → SL(2,ℤ/n) est surjectif. Il en résulte que les composantes connexes de M_H^o(ℂ) s'identifient aux fibres de l'application

(5.4.1) X × (H \ GL(2,ℤ/n))/SL(2,ℤ) →^{det} det H \ (ℤ/n)^*.

Soit μ_n^*(ℂ) l'ensemble des racines primitives n-ièmes de l'unité dans ℂ. Par extension des scalaires de ℤ à ℂ, (3.20.4) définit une application.

(5.4.2) M_H(ℂ) →^{d} detH \ μ_n^*(ℂ).

Via la bijection x ↦ exp(2πix/n) : ℤ/n ⇝ μ_n(ℂ), (5.4.1) s'identifie à la restriction de cette application à M_H^o(ℂ). Les fibres géométriques de caractéristiques 0 de (3.20.3) (3.20.4) sont donc irréductibles. Le corollaire suivant résulte dès lors du théorème de connexion de Zariski.

Corollaire 5.5. En toute caractéristique, les fibres géométriques de (3.20.4) :

M_H → Spec(ℤ[ζ_n]^{det H})

sont connexes.

Corollaire 5.6. En caractéristique p première à n, les fibres géométriques de (3.20.4) sont irréductibles.

Elles sont connexes et géométriquement unibranches (3.10 (iv)).

Soit $\mu_n^*(\mathbb{C})$ l'ensemble des racines primitives $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité dans $\mathbb{C}$. Par extension des scalaires de $\mathbb{Z}$ à $\mathbb{C}$, (3.20.4) définit une application.

(5.4.2) $$M_H(\mathbb{C}) \xrightarrow{d} \det H \backslash \mu_n^*(\mathbb{C}) .$$

Via la bijection $x \mapsto \exp(\frac{2\pi i x}{n}) : \mathbb{Z}/n \xrightarrow{\sim} \mu_n(\mathbb{C})$, (5.4.1) s'identifie à la restriction de cette application à $M_H^o(\mathbb{C})$. Les fibres géométriques de caractéristiques 0 de (3.20.3) (3.20.4) sont donc irréductibles. Le corollaire suivant résulte dès lors du théorème de connexion de Zariski.

Corollaire 5.5. En toute caractéristique, les fibres géométriques de (3.20.4) : $M_H \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\zeta_n]^{\det H})$ sont connexes.

Authority visual fallback P0085-A03.

Authority page 86 ; collected-paper page 579 ; original folio 228.

6. Structures de niveau H : étude à l'infini.

Ce § ne servira pas dans la suite de cet article. Nous recommandons au lecteur de l'omettre en première lecture.

Soit H un sous-groupe de GL(2,ℤ/n). Nous nous proposons de donner une interprétation modulaire de 𝔪_H[1/n] qui généralise 3.5, 4.13, 4.14, 4.15 et 4.20. Nous définirons tout d'abord par voie modulaire un champ ′𝔪_H[1/n], propre et lisse sur ℤ[1/n], et dont 𝔪_H^o[1/n] soit un sous-champ ouvert dense. Nous définirons comme en 3.5 un morphisme fini

c : ′𝔪_H[1/n] → 𝔪_1[1/n].

Nous prouverons ensuite l'analogue de (3.5.1). La démonstration de 3.5 donne alors ′𝔪_H[1/n] = 𝔪_H[1/n] ; c'est l'interprétation modulaire cherchée.

6.1. Soient A un groupe isomorphe à (ℤ/n)^2, A' ⊂ A un sous-groupe isomorphe à ℤ/n et B un sous-groupe contenant A'. Le système (A,A',B) est donc isomorphe à un système

((ℤ/n)^2, ℤ/n × {0}, ℤ/n × mℤ/nℤ),

pour m|n convenable. Soit de plus μ un groupe isomorphe à ℤ/n et

β_0 : Λ²A ⇀̃ μ.

Nous noterons β_1 la restriction de β_0 à Λ²B.

L'exemple essentiel d'une telle situation est le suivant. Soient C une courbe elliptique généralisée sur un trait complet S, de points η et s, η̄ le spectre d'une clôture algébrique de k(η) et s̄ le spectre de la clôture algébrique correspondante de k(s). Si n est inversible sur S, que C_{η̄} est lisse et que C_{s̄} est un polygone de Néron à m|n côtés, on prend

μ = μ_n(η̄) ≃ μ_n(s̄), A = C_n(η̄), A' = C_n^o(s̄), B = (C_s^{reg})_n(s̄) et β_0 = e_n.

La restriction β_1 de β_0 à Λ²B ne dépend que de la fibre spéciale C_{s̄} (cf. 3.21).

6.2. Avec les notations de 6.1, soient I l'ensemble des isomorphismes

α : A → (ℤ/n)^2

et Ī l'ensemble des couples (ᾱ,β) formés de ᾱ : B ↪ (ℤ/n)^2 et de β : μ ⇀̃ ℤ/n tels que le diagramme suivant soit commutatif

$$\begin{array}{ccc} \bar{\alpha}\ \Lambda^2 B & \longrightarrow & \Lambda^2 \mathbb{Z}/n \\ \beta_1 \downarrow & & \downarrow\ s \\ \mu & \xrightarrow{\ \beta\ } & \mathbb{Z}/n. \end{array} \qquad (6.2.1)$$


-228-

DeRa-86

6. Structures de niveau H : étude à l'infini.

Ce § ne servira pas dans la suite de cet article. Nous recommandons au lecteur de l'omettre en première lecture.

Soit H un sous-groupe de GL(2, ℤ/n) . Nous nous proposons de donner une interprétation modulaire de $\mathfrak{M}_H[1/n]$ qui généralise 3.5, 4.13, 4.14, 4.15 et 4.20 . Nous définirons tout d'abord par voie modulaire un champ $\mathfrak{M}'_H[1/n]$, propre et lisse sur ℤ[1/n] , et dont $\mathfrak{M}^o_H[1/n]$ soit un sous-champ ouvert dense. Nous définirons comme en 3.5 un morphisme fini $c : \mathfrak{M}'_H[1/n] \to \mathfrak{M}_1[1/n]$. Nous prouverons ensuite l'analogue de (3.5.1) . La démonstration de 3.5 donne alors $\mathfrak{M}'_H[1/n] = \mathfrak{M}_H[1/n]$; c'est l'interprétation modulaire cherchée

Authority visual fallback P0086-A01.

Authority page 87 ; collected-paper page 580 ; original folio 229.

On définit c : I → Ī par

α ↦ (α|_B, Λ²α∘β_0^{-1}).

Le groupe GL(2,ℤ/n) agit sur I et Ī à gauche par

g.α = g∘α et g.(ᾱ,β) = (gᾱ, det(g).β).

Soit U le sous-groupe de Aut(A) qui agit trivialement sur A’ et A/A’. Il agit à droite sur I et $\bar{I}$ par

$\alpha.u = \alpha \circ u$ et $(\bar{\alpha},\beta)u = (\bar{\alpha}\circ(u|B),\beta)$.

Ces actions sont compatibles à c.

Lemme 6.2.2. L’application c est surjective.

La vérification est laissée au lecteur.

Les sous-groupes U’ de U et les sous-groupes B’ de A contenant A’ se correspondent bijectivement par

U’ ↦ sous-groupe A^{U’} des invariants de U’

B’ ↦ sous-groupe de U(B’) agissant trivialement sur B’.

On a $\bar{I} = I/U(B)$.

Soit $\bar{a} \in H\backslash\bar{I}$, image de $\alpha \in I$. L’ensemble des $\alpha' \in I$ d’image $\bar{a}$ est $H\alpha U(B)$. Nous dirons que B est adéquat si U(B) est le sous-groupe de U qui stabilise l’image a de α dans H\I

$$\begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \bar{I} = I/U(B) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H\backslash I & \longrightarrow & H\backslash I/U(B). \end{array}$$

Ceci signifie que

(6.2.3) a est le seul élément de H\I d’image $\bar{a}$

(6.2.4) tout $u \in U$ tel que $\bar{a}u = \bar{a}$ est dans U(B).

Notons {}_H J_B l’ensemble des $a \in H\backslash\bar{I}$ pour lesquels B est adéquat. Il résulte de la discussion précédente que

Lemme 6.2.5. On a

$H\backslash I \xrightarrow{\sim} \coprod_{A'\subset B'\subset A} {}_H J_{B'}$ (somme sur B’).

6.3. Soient donnés seulement un groupe B, un sous-groupe A’, avec (A’,B)


stabilise l'image a de α dans H\I

$$\begin{array}{ccc} I & \longrightarrow & \bar{I} = I/U(B) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H\backslash I & \longrightarrow & H\backslash I/U(B) \end{array}$$

Ceci signifie que

(6.2.3) a est le seul élément de H\I d'image $\bar{a}$

(6.2.4) tout $u \in U$ tel que $\bar{a}u = \bar{a}$ est dans U(B) .

Notons ${}_H J_B$ l'ensemble des $a \in H\backslash\bar{I}$ pour lesquels B est adéquat. Il

Authority visual fallback P0087-A03.

Authority page 88 ; collected-paper page 581 ; original folio 230.

isomorphe à $(\mathbb{Z}/n \times \{0\}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ pour m|n convenable, μ isomorphe à $\mathbb{Z}/n$ et

$\beta_1 : \Lambda^2 B \hookrightarrow \mu$.

Notons encore $\bar{I}$ l’ensemble des couples $(\bar{\alpha},\beta)$ formés de $\bar{\alpha} : B \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ et de $\beta : \mu \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n$ tels que le diagramme 6.2.1 soit commutatif.

Le groupe $GL(2,\mathbb{Z}/n)$ agit à gauche sur $\bar{I}$ par

$g.(\bar{\alpha},\beta) = (g\circ\bar{\alpha}, \det(g).\beta)$

et le groupe $\bar{U}$ des automorphismes de B induisant l’identité sur A’ et B/A’ agit à droite par

$(\bar{\alpha},\beta)u = (\bar{\alpha}\circ u,\beta)$.

Nous noterons {}_H J_B l'ensemble des $a \in H\backslash\bar{I}$ tels que

a) si $\tilde{a} \in \bar{I}$ est d'image $\bar{a}$, et que $g\tilde{a} = \tilde{a}$, on a $g \in H$;

b) tout $u \in \bar{U}$ tel que $\bar{a}u = \bar{a}$ est l'identité.

Cette notation coïncide avec celle de 3.11 lorsque cette dernière a un sens.

6.4. Soient S un schéma sur lequel n est inversible, et C une courbe elliptique généralisée sur S. On suppose que les fibres géométriques de C sont lisses ou des polygones de Néron à m côtés, avec m|n. On se propose de définir un faisceau étale F sur S, de formation compatible à tout changement de base, intuitivement décrit par les deux propriétés suivantes.

a) Si C est lisse sur S, F(S) est l'ensemble de structures de niveau H de C sur S.

b) Supposons S spectre d'un corps algébriquement clos, et que C soit un polygone de Néron à m côtés (m|n). Appliquons 6.3 pour B = C_n^{reg}, A' = C_n^o, μ = μ_n et $\beta_1 = e_n$ (cf. 6.1). On veut avoir

F(S) = {}_H J_B.

6.5. Soit $F_1(S)$ l'ensemble des systèmes $(B,\bar{\alpha},\beta)$ consistant en

a) un sous-schéma en groupes fini étale $B \subset C_n$;

b) $\bar{\alpha} : B \hookrightarrow (\mathbb{Z}/n)^2$ et $\beta : \mu_n \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/n$

tels que

c) localement sur S, B contient un sous-groupe isomorphe à $\mathbb{Z}/n$;


que généralisée sur S . On suppose que les fibres géométriques de C sont lisses ou des polygones de Néron à m côtés, avec m|n . On se propose de définir un faisceau étale F sur S , de formation compatible à tout changement de base, intuitivement décrit par les deux propriétés suivantes.

a) Si C est lisse sur S , F(S) est l'ensemble de structures de niveau H de C sur S .

b) Supposons S spectre d'un corps algébriquement clos, et que C soit un polygone de Néron à m côtés (m|n) . Appliquons 6.3 pour $B = C_n^{reg}$, $A' = C_n^o$, $\mu = \mu_n$ et $\beta_1 = e_n$ (cf. 6.1). On veut avoir $F(S) = {}_H J_B$.

6.5. Soit F.(S) l'ensemble des systèmes $(B,\bar{\alpha},\beta)$ consistant en

Authority visual fallback P0088-A03.

d) le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \bar{\alpha}\ \Lambda^2 B & \longrightarrow & \Lambda^2\mathbb{Z}/n \\ \Big\downarrow e_n \Big\downarrow s & & \Big\downarrow \mu_n \\ \mathbb{Z}/n & \xrightarrow{\ \beta\ } & \mathbb{Z}/n \end{array}$$

est commutatif ;

e) pour tout point géométrique $\bar{s}$ de S, si $C_{\bar{s}}$ est singulier, $(\bar{\alpha},\beta)$ mod H est du type décrit en 6.4. Dans tous les cas, on demande que si $g \in GL(2,\mathbb{Z}/n)$ est tel que

$(g\bar{\alpha}_{\bar{s}}, \det(g).\beta_{\bar{s}}) = (\bar{\alpha}_{\bar{s}},\beta_{\bar{s}})$,

on a $g \in H$.

Si C/S est lisse, un système $(B,\bar{\alpha},\beta)$ définit une et une seule H-structure sur C : celle localement représentée par des

$\alpha : C_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$

qui prolongent ᾱ et de déterminant β (l'existence locale de α résulte de 6.2.1, l'unicité mod H de la condition e)).

On dira que a et b dans F_1(S) sont équivalents si :

1) Soit U l'ouvert de S au-dessus duquel C est lisse ; a et b doivent définir la même structure de niveau H sur C_U/U.

2) Soit s̄ un point géométrique de S tel que C_{s̄} soit singulier. a_{s̄} et b_{s̄} doivent être conjugués sous H. Cette condition implique que a et b sont conjugués sous H dans un voisinage étale V de s̄, donc que 1) est vérifié dans U ×_S V.

Le faisceau F des structures de niveau H sur C/S est le faisceau engendré par le préfaisceau F_0 quotient de F_1 par la relation d'équivalence précédente.

On a fait ce qu'il fallait pour que F soit de formation compatible à tout changement de base, admette les valeurs 6.4 et soit représenté par un S-schéma S' étale sur S.

Définition 6.6. (i) Une structure de niveau H sur une courbe elliptique généralisée C/S comme en 6.4 est un élément de F(S).


mod H de la condition e)).

On dira que a et b dans $F_1(S)$ sont équivalents si :

1) Soit U l'ouvert de S au-dessus duquel C est lisse; a et b doivent définir la même structure de niveau H sur C_U/U.

2) Soit $\bar{s}$ un point géométrique de S tel que $C_{\bar{s}}$ soit singulier. $a_{\bar{s}}$ et $b_{\bar{s}}$ doivent être conjugués sous H. Cette condition implique que a et b sont conjugués sous H dans un voisinage étale V de $\bar{s}$, donc que 1) est vérifié dans $U \times_S V$.

Le faisceau F des structures de niveau H sur C/S est le faisceau engendré par le préfaisceau F_0 quotient de F_1 par la relation d'équivalence précédente.

Authority visual fallback P0089-A03.

(ii) Le champ algébrique ´m_H[1/n] sur ℤ[1/n] est le champ algébrique qui classifie les courbes elliptiques généralisées C/S, (n inversible sur S) à fibres géométriques de C/S lisse ou des polygones de Néron à m|n côtés, munies d'une structure de niveau H.

Par oubli de la structure de niveau H, on définit un morphisme étale

´m_H[1/n] → m_* ;

´m_H[1/n] est donc lisse sur ℤ[1/n], et ´m_H^∞[1/n] étale sur ℤ[1/n].

Par contraction (1.3 pour n = 1) et oubli de la structure de niveau, on définit

c : ´m_H[1/n] → m_1.

Théorème 6.7. (i) ´m_H[1/n] est propre et lisse sur ℤ[1/n] ; l'image ´m_H^∞[1/n] du sous-schéma de non lissité de la courbe universelle est fini étale sur ℤ[1/n].

(ii) Le morphisme c est fini et représentable. Le champ ´m_H[1/n] coïncide donc (cf. 3.5) avec m_H[1/n].

Il reste à prouver que ´m_H[1/n] est propre sur ℤ[1/n], et que c est représentable, i.e. que, pour tout objet C du champ ´m_H[1/n] sur k algébriquement clos,

(6.7) Aut(C) → Aut(c(C))

est injectif (cf. 3.5).

La propreté résultera du critère valuatif de propreté et de 6.2.5. Soient S un trait complet à corps résiduel algébriquement clos, C_η une courbe elliptique sur le point géné-

rique η de S, et a une structure de niveau H sur C_η. On peut supposer que le modèle minimal C’ de C_η est lisse ou un polygone de Néron à k côtés, avec n|k. Si C’ est lisse, la structure de niveau H de C_η se prolonge de façon unique à C’, et on pose C = C’. Sinon, soit C” la courbe déduite de C’ par contraction, comme en 1.3 (C”_s a n côtés). Avec les notations de 6.1, soit U(B’) le plus grand sous-groupe de U qui fixe a. B’ correspond à un sous-schéma en groupes fini et étale de C”_n, d’ordre n·m, et on note C la courbe déduite de C” par 1.3 (avec n de loc. cit. = m). a se prolonge de façon unique en une structure de niveau H sur C. À l’aide de 6.2.5. et comme en 1.6, on voit que


sur le point générique η de S, et a une structure de niveau H sur C_η. On peut supposer que le modèle minimal C' de C_η est lisse ou un polygone de Néron à k côtés, avec n|k. Si C' est lisse, la structure de niveau H de C_η se prolonge de façon unique à C', et on pose C = C'. Sinon, soit C" la courbe déduite de C' par contraction, comme en 1.3 ($C"_s$ a n côtés). Avec les notations de 6.1, soit U(B') le plus grand sous-groupe de U qui fixe a. B' correspond a un sous-schéma en groupes fini et étale de $C"_n$, d'ordre n·m, et on note C la courbe déduite de C" par 1.3 (avec n de loc. cit. = m). a se prolonge de façon unique en une structure de niveau H sur C. A l'aide de 6.2.5. er comme en 1.6, on voit que

Authority visual fallback P0090-A04.

Authority page 91; collected-paper page 584; original folio 233.

(C, prolongement de a) est l’unique prolongement de (C_η,a) sur S.

Prouvons (6.7) injectif. Pour C lisse, c’est clair. Sinon, le noyau de (6.7.1) est l’ensemble A des automorphismes de C, agissant trivialement sur $\mathrm{Pic}^0(C)$, et respectant la structure de niveau. La condition e) dans la définition 6.5. des structures de niveau assure que A = {1}.


-233-

DeRa-91

(C , prolongement de a) est l'unique prolongement de (C_η, a) sur S .

Prouvons (6.7) injectif. Pour C lisse, c'est clair. Sinon, le noyau de (6.7.1) est l'ensemble A des automorphismes de C , agissant trivialement sur $\mathrm{Pic}^0(C)$, et respectant la structure de niveau. La condition e) dans la définition 6.5. des structures de niveau assure que A = {1} .

Authority visual fallback P0091-A03.

Authority page 92; collected-paper page 585; original folio 234.

V. Réduction modulo p.

Dans ce chapitre, nous étudions la réduction modulo p des champs $\mathfrak{m}_K$, pour $K = \Gamma_0(p)$, $\Gamma_\infty(p)$ et $\Gamma(p^k)$. La comparaison des résultats obtenus pour $\Gamma_0(p)$ et $\Gamma_\infty(p)$ nous permet de montrer que, conformément à une conjecture de Shimura, certains schémas abéliens étudiés par Shimura et Casselman [5], ont bonne réduction sur l’anneau des entiers d’extensions cyclotomiques convenables de $\mathbb{Q}$.

1. Étude de $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$.

Nous nous proposons dans ce § de donner une interprétation modulaire du champ $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ lorsque p est premier. Quelques résultats préliminaires reservirons aux paragraphes suivants.

1.1. Soit $\mathcal{G}_n$ le champ classifiant les courbes elliptiques généralisées à fibres géométriques irréductibles C/S, munies d’un sous-schéma en groupes A localement isomorphe à μ_n (pour la topologie étale), i.e. fini plat localement libre de rang n de dual de Cartier étale.

Proposition 1.2. Le morphisme ”oubli de A” : $\mathcal{G}$_n → $\mathfrak{m}$_1 est étale ; en particulier, $\mathcal{G}$_n est un champ algébrique lisse sur $\mathbb{Z}$.

Soit C/S classifié par $\mathfrak{m}$_1. Il faut vérifier que le foncteur

F : (Sch/S) → (Ens),

qui à T/S associe l’ensemble des sous-groupes A de (C_T)_n localement isomorphes à μ_n, est représentable par un schéma M étale sur S. La représentabilité résulte de la théorie du schéma de Hilbert ; M est étale car formellement étale (SGA 3 IX 3.6).

1.3. Soit $\mathcal{B}$_n le champ classifiant les courbes elliptiques généralisées C/S, à fibres géométriques lisses ou des n-gones, munies d’un sous-schéma en groupes B localement isomorphe à $\mathbb{Z}$/n (pour la topologie étale), qui rencontre chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique.

Soit (C,B) comme plus haut. Le schéma en groupes B agit librement sur C


-234-

DeRa-92

V. Réduction modulo p .

Dans ce chapitre, nous étudions la réduction modulo p des champs $\mathcal{H}_K$, pour $K = \Gamma_0(p)$, $\Gamma_{00}(p)$ et $\Gamma(p^k)$. La comparaison des résultats obtenus pour $\Gamma_0(p)$ et $\Gamma_{00}(p)$ nous permet de montrer que, conformément à une conjecture de Shimura, certains schémas abéliens étudiés par Shimura et Casselman [5] ont bonne réduction sur l'anneau des entiers d'extensions cyclotomiques convenables de $\mathbb{Q}$.

Authority visual fallback P0092-A01.

Authority page 93 ; collected-paper page 586 ; original folio 235.

et C/B est à fibres géométriques irréductibles. Dans la suite exacte

0 → B → C_n → A → 0,

les termes extrêmes sont en dualité de Cartier. Le couple (C/B,C_n/B) est donc classifié par $\mathcal{G}$_n et ceci définit

(1.3.1) w : $\mathcal{B}$_n → $\mathcal{G}$_n.

Proposition 1.4. Le morphisme 1.3.1 est un isomorphisme. En particulier, $\mathcal{B}$_n est un champ algébrique lisse sur $\mathbb{Z}$.

Preuve : Notons encore w le morphisme de $\mathcal{G}$_n^o dans $\mathcal{B}$_n^o

w : (C,A) ↦ (C/A,C_n/A).

Une construction identique à celle de IV.4.4. montre que ce morphisme est un inverse de la restriction w : $\mathcal{B}$_n^o → $\mathcal{G}$_n^o de w à $\mathcal{B}$_n^o.

Soit (C,A) sur S, classifié par $\mathcal{G}$_n. Il faut prouver qu’il existe ($\tilde{C}$,$\tilde{A}$) sur S, classifié par $\mathcal{B}$_n, un isomorphisme β : w($\tilde{C}$,$\tilde{A}$) $\tilde{\to}$ (C,A), et que ($\tilde{C}$,$\tilde{A}$,β) est unique à isomorphisme unique près. Par abus de notation, on note encore β le morphisme composé

$\tilde{C}$ → $\tilde{C}$/$\tilde{A}$ $\tilde{\to}$^β C.

La courbe à section marquée ($\tilde{C}$,$\tilde{e}$) sera nécessairement un revêtement étale de degré n de (C,e), muni de sa structure de courbe elliptique généralisée.

Rappelons le lemme suivant, qui résulte de SGA 4 XII.5.9 bis.

Lemme 1.5. Soit f : X → S un morphisme propre à fibres géométriques connexes et e une section de f. Si p : (Y,e) → (X,e) est un revêtement fini étale à section marquée de (X,e) et que Y/S est à fibres géométriques connexes le triple (Y,p,e) n’a pas d’automorphisme

non trivial. Le foncteur F sur (Sch/S) des classes d'isomorphie des triples (Y,p,e) comme plus haut est représentable par un faisceau étale.

Appliquons ce lemme à C/S. Soit $\mathcal{J}$ le champ des (C̃,Ã,β) du type voulu. Le lemme montre que les objets de $\mathcal{J}$ n'ont pas d'automorphisme non trivial, et que le



nécessairement un revêtement étale de degré n de (C,e), muni de sa structure de courbe elliptique généralisée.

Rappelons le lemme suivant, qui résulte de SGA 4 XII.5.9 bis.

Lemme 1.5. Soit $f : X \to S$ un morphisme propre à fibres géométriques connexes et e une section de f. Si $p : (Y,e) \to (X,e)$ est un revêtement fini étale à section marquée de (X,e) et que Y/S est à fibres géométriques connexes le triple (Y,p,e) n'a pas d'automorphisme non trivial. Le foncteur F sur (Sch/S) des classes d'isomorphie des triples (Y,p,e) comme plus haut est représentable par un faisceau étale.

Appliquons ce lemme à C/S. Soit $\mathcal{J}$ le champ des $(\tilde{C},\tilde{A},\beta)$ du type voulu.

Authority visual fallback P0093-A04.

foncteur $[\mathcal{J}]$ des classes d'isomorphie d'objets de $\mathcal{J}$ est le sous-foncteur de F formé des (C̃,p ;e) tels que $p^{-1}(e)$ soit localement isomorphe à $\mathbb{Z}/n$ et que A soit l'image de C̃_n. Ces conditions sont ouvertes (car A est de type multiplicatif), donc $[\mathcal{J}]$ est représenté par T étale sur S.

Là où C est lisse, on sait que T $\tilde{\to}$ S. Par ailleurs, un 1-gone sur k algébriquement clos admet un unique revêtement étale par un n-gone. Toutes les fibres géométriques de T/S sont donc réduites à un point, et T $\tilde{\to}$ S. Ceci prouve 1.4.

Soit p un nombre premier.

Théorème 1.6. $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ est le champ algébrique classifiant les courbes elliptiques généralisées C/S, munies d'un sous-schéma en groupes A localement libre de rang p, qui rencontre chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique de C/S.

Preuve : Rappelons [22] qu'un schéma en groupes(commutatifs) localement libre de rang p est tué par p. Pour A comme plus haut, on a donc A ⊂ C_p.

Notons provisoirement $'\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ le champ qui à chaque schéma S associe la catégorie ayant pour objets les (C,A) comme en 1.6 et pour morphismes les isomorphismes. En IV.4.3, nous avons construit un isomorphisme entre $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}{}^{o}[1/p]$ et $'\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}{}^{o}[1/p]$. L'isomorphisme 1.6 prolongera cet isomorphisme ; raisonnant comme en IV.3.5, on trouve que 1.6 résulte de la conjonction des assertions suivantes

A. $'\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ est un champ algébrique.

B. $'\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ est propre sur Spec(ℤ).

C. Le morphisme $c : '\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)} \to \mathfrak{m}_1 : (C,A) \mapsto c(C)$ défini par IV.1.4. est fini et représentable.

D. $'\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ est normal.

E. $'\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}{}^{o}[1/p]$ est dense dans $'\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$.



p est tué par p. Pour A comme plus haut, on a donc $A \subset C_p$.

Notons provisoirement $'\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ le champ qui à chaque schéma S associe la catégorie ayant pour objets les (C,A) comme en 1.6 et pour morphismes les isomorphismes. En IV.4.3, nous avons construit un isomorphisme entre $\mathfrak{m}^{o}_{\Gamma_0(p)}[1/p]$ et $'\mathfrak{m}^{o}_{\Gamma_0(p)}[1/p]$. L'isomorphisme 1.6 prolongera cet isomorphisme; raisonnant comme en IV.3.5, on trouve que 1.6 résulte de la conjonction des assertions suivantes

A. $'\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ est un champ algébrique.

B. $'\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ est propre sur Spec(ℤ).

Authority visual fallback P0094-A03.

(1) Points à l'infini de ´m_{Γ_0(p)}.

Soit C le polygone de Néron à un côté sur Spec(ℤ). On a C^{reg} ≃ G_m, C_p ≃ μ_p et (C,C_p) est une section e_1 de ´m_{Γ_0(p)} sur ℤ.

Soit C le p-gone sur Spec(ℤ). On a C^{reg} ≃ G_m × ℤ/p, C_p ≃ μ_p × ℤ/p et (C,e × ℤ/p) est une section e_2 de ´m_{Γ_0(p)} sur ℤ.

Soit k un corps algébriquement clos. On vérifie que les seuls objets (C,A) de ´m_{Γ_0(p)}(k), avec C singulier, sont e_1(k) et e_2(k).

(2) Preuve de A (représentabilité de ´m_{Γ_0(p)}).

Soient $\mathcal{U}$_1 et $\mathcal{U}$_2 les deux ouverts suivants de ´m_{Γ_0(p)} : $\mathcal{U}$_1 classifie les courbes (C,A) comme en 1.6, les fibres géométriques de C étant irréductibles, et $\mathcal{U}$_2 classifie les courbes (C,A), les fibres géométriques de C étant lisses ou des p-gones.

Lemme 1.7. Le morphisme "oubli" : φ : $\mathcal{U}$_1 → 𝔪_1 est représentable.

Preuve. Il faut voir que pour C/S une courbe elliptique généralisée à fibres géométriques irréductibles sur S, le foncteur suivant F : (Sch/S) → (Ens) est représentable. À T/S, F associe l'ensemble des sous-schémas en groupes finis localement libres de rang p de C_T^{reg}. La représentabilité de F résulte de la théorie des schémas de Hilbert.

D'après 1.7 et IV.2., $\mathcal{U}$_1 est un champ algébrique. Nous verrons ci-dessous que $\mathcal{U}$_1 et $\mathcal{U}$_2 sont isomorphes. Le champ $\mathcal{U}$_2 est donc algébrique, ainsi que ´m_{Γ_0(p)}, réunion de $\mathcal{U}$_1 et $\mathcal{U}$_2 d'après (1).

1.8. Soit (C,A) classifié par $\mathcal{U}$_2. D'après II.1.20, C_p est localement libre de rang p². On vérifie fibre par fibre que A agit librement sur C, et ceci permet de définir

(1.8.1) w : $\mathcal{U}$_2 → $\mathcal{U}$_1 : (C,A) ↦ (C/A,C_p/A_p).


-237-

DeRa-95

(1) Points à l'infini de $'\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$.

Soit C le polygone de Néron à un côté sur Spec(ℤ) . On a $C^{reg} \simeq \mathbb{G}_m$, $C_p \simeq \mu_p$ et (C,C_p) est une section e_1 de $'\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ sur ℤ .

Soit C le p-gone sur Spec(ℤ) . On a $C^{reg} \simeq \mathbb{G}_m \times \mathbb{Z}/p$, $C_p \simeq \mu_p \times \mathbb{Z}/p$ et (C,e × ℤ/p) est une section e_2 de $'\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ sur ℤ .

Soit k un corps algébriquement clos. On vérifie que les seuls objets (C,A) de $'\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}(k)$, avec C singulier, sont $e_1(k)$ et $e_2(k)$.

Authority visual fallback P0095-A01.

Lemme 1.8.2. Le morphisme (1.8.1) est un isomorphisme.

Avec les notations 1.1 et 1.3, on a

$\mathcal{U}$_1 = $\mathcal{G}$_p ∪ 𝔪_{Γ_0(p)}° ↗ ↘ ´m_{Γ_0(p)}° = $\mathcal{U}$_1 ∩ $\mathcal{U}$_2 ´m_{Γ_0(p)} ↘ ↗ $\mathcal{U}$_2 = $\mathcal{B}$_p ∪ 𝔪_{Γ_0(p)}°.

La construction IV.4.4. montre encore que w induit une involution de ´m_{Γ_0(p)}°. En 1.4, on a vu que w induit un isomorphisme $\mathcal{G}$_p → $\mathcal{B}$_p, et 1.8.2 en résulte.

Ceci achève la démonstration de (A). La démonstration nous a fourni la construction suivante.

Construction 1.9. Par recollement de w : $\mathcal{U}$_2 → $\mathcal{U}$_1 et de w^{-1} : $\mathcal{U}$_1 → $\mathcal{U}$_2, on obtient une involution w : ´m_{Γ_0(p)} → ´m_{Γ_0(p)}, qui prolonge l'involution (IV.4.4).

La réunion de $\mathcal{G}$_p et $\mathcal{B}$_p est l'ouvert de ´m_{Γ_0(p)} correspondant aux courbes non supersingulières de caractéristique p. Les propositions 1.2 et 1.4 fournissent donc :

Proposition 1.10. ´m_{Γ_0(p)} est lisse sur Spec($\mathbb{Z}$) en dehors des points supersinguliers de caractéristique p.

(3) Preuve de (B) (propreté de ´m_{Γ_0(p)}).

D'après (1.10), ´m_{Γ_0(p)}° est dense dans ´m_{Γ_0(p)}. Le critère valuatif de propreté nous ramène alors à démontrer le lemme suivant.

Lemme 1.11. Soit (S,η,s) un trait complet à corps résiduel algébriquement clos. Soit (C,A) un objet de ´m_{Γ_0(p)}°(η). Il existe une extension finie k(η´) de k(η) telle que, notant S´ le normalisé de S dans k(η´), l'image (C´,A´) de (C,A) dans ´m_{Γ_0(p)}°(η´) provienne par changement de base d'un objet ($\bar{C}$,$\bar{A}$) de ´m_{Γ_0(p)}(S´), unique à isomorphisme unique près.


-238-

DeRa-96

Lemme 1.8.2. Le morphisme (1.8.1) est un isomorphisme .

Avec les notations 1.1 et 1.3, on a

$'h^0_{\Gamma_0}(p) = U_1 \cap U_2$; $U_1 = G_p \cup h^0_{\Gamma_0}(p)$; $U_2 = B_p \cup h^0_{\Gamma_0}(p)$; $'m_{\Gamma_0}(p)$

La construction IV.4.4. montre encore que w induit une involution de $'h^0_{\Gamma_0}(p)$.

En 1.4, on a vu que w induit un isomorphisme $G_p \to B_p$, et 1.8.2 en résulte.

Authority visual fallback P0096-A01.

Authority page 97 ; collected-paper page 590 ; original folio 239.

Preuve : Quitte à faire une extension préalable de k(η), on peut supposer que C a réduction semi-stable et que la fibre spéciale de son modèle minimal $\tilde{C}$ soit lisse ou un m-gone, avec p|m (IV.1.6). Le groupe $\tilde{C}$_p est alors fini sur S (II.1.20) et l'adhérence schématique de A est un sous-schéma en groupes fini localement libre de rang p de $\tilde{C}$. On obtient ($\bar{C}$,$\bar{A}$) en contractant les composantes de $\tilde{C}$_s qui ne rencontrent pas A (IV.1.3).

L'unicité se démontre comme (IV.1.6 (iv)) : Si ($\bar{C}$_1,$\bar{A}$_1) a pour fibre générale C, on obtient le modèle minimal $\tilde{C}$ de C en éclatant successivement les singularités, comme en (IV.1.6 (iv)). L'image réciproque de $\bar{A}$_1 est l'adhérence schématique $\tilde{A}$ de A et il est clair que $\bar{C}$ est obtenu en contractant les composantes irréductibles de $\tilde{C}$_s dont l'intersection avec $\tilde{A}$ est vide, d'où l'unicité.

(4) Preuve de C (c fini représentable).

Pour vérifier que les fibres géométriques de c sont finies, nous distinguerons trois cas.

a) Fibres à l'infini : sur k algébriquement clos, il n'y a qu'un nombre fini (deux) de classes d'isomorphie de couples (C,A) classifiés par ´m_{Γ_0(p)}°, avec C singulier.

b) Fibres à distance finie : Soient C une courbe elliptique sur k et T la fibre de c en le point géométrique Spec(k) → m_1° défini par C. T représente le foncteur des sous-schémas en groupes de rang p de C_p. Distinguons les cas C_p ≃ $\mathbb{Z}$/p × μ_p et car(k) = p, C_p ≃ α_{p²}.

b1) On a une suite exacte 0 → μ_p → C_p → $\mathbb{Z}$/p → 0 (1).

Pour tout schéma S, et A ⊂ C_S localement libre de rang p, on a alors S = S´ ∐ S″, avec A $\tilde{\to}$ $\mathbb{Z}$/p sur S″ et A ⊂ μ_p, donc A = μ_p sur S´. On a donc T = T´ ∪ T″ ; T´ est réduit, et réduit au point défini par μ_p ⊂ C_p. T″ représente le foncteur des trivialisations $\mathbb{Z}$/p →

C_p de la suite exacte (1). C'est un torseur sous μ_p. Le schéma T a donc p+1 (resp. 2) points géométriques si car(k) ≠ p (resp. = p).



Authority visual fallback P0097-A05.

b2) C_p ≃ α_{p²}. Tout sous-groupe de α_{p²} est infinitésimal. Si d'ordre p, il est égal au noyau de Frobenius α_p, et T n'a qu'un point géométrique.

Puisque ´m_{Γ_0(p)} est propre, c, propre à fibres finies, est fini. Pour prouver c représentable, on procède comme en IV.3.5 : on vérifie sur ⟦blanc dans l'autorité⟧ que pour (C,A) singulier, Aut(C,A) = {± 1}, de sorte que

Aut(C,A) ↪ Aut(c(C)).

(5) Le point clef de la démonstration est le lemme suivant.

Lemme 1.12. Le morphisme c : ´m_{Γ_0(p)}° → m_1° est fini et plat.

Preuve : Nous prouverons 1.12 à l'aide du critère suivant, applicable car m_1° est réduit.

Lemme 1.13. Soit f : X → S un morphisme fini de schémas noethériens, avec S réduit. Si le rang des fibres géométriques de f est constant, alors f est plat.

On peut supposer que S est le spectre d'un anneau local A, et que X est le spectre d'une A-algèbre finie B. Soient m l'idéal maximal de A et ē_1…ē_n une base du A/m-espace vectoriel B/mB. Relevons les ē_i en des éléments e_i ∈ B. D'après le lemme de Nakayama, les e_i engendrent le A-module B. Si ∑ λ_i e_i = 0, avec λ_i ∈ A, il résulte de l'hypothèse que les λ_i sont nuls modulo tout idéal premier, donc nuls puisque A est réduit ; le A-module B est donc libre de base les e_i.

Vérifions que le morphisme 1.12 vérifie l'hypothèse de 1.13.

Soit donc C une courbe elliptique sur un corps algébriquement clos k. La fibre T de c en le point géométrique Spec(k) → m_1° défini par C représente le foncteur des sous-schémas en groupes de rang p de C_p. Prouvons qu'il est de rang p+1.

Si C_p ≃ μ_p × ℤ/p, on a vu en (4) que T est isomorphe à Spec(k) ⊔ μ_p,



On peut supposer que S est le spectre d'un anneau local A, et que X est le spectre d'une A-algèbre finie B. Soient $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de A et $\bar{e}_1 \ldots \bar{e}_n$ une base du $A/\mathfrak{m}$-espace vectoriel $B/\mathfrak{m}B$. Relevons les $\bar{e}_i$ en des éléments $e_i \in B$. D'après le lemme de Nakayama, les e_i engendrent le A-module B. Si $\Sigma \lambda_i e_i = 0$, avec $\lambda_i \in A$, il résulte de l'hypothèse que les λ_i sont nuls modulo tout idéal premier, donc nuls puisque A est réduit; le A-module B est donc libre de base les e_i.

Vérifions que le morphisme 1.12 vérifie l'hypothèse de 1.13.

Authority visual fallback P0098-A04.

Authority page 99; collected-paper page 592; original folio 241.

donc de rang p+1

Il reste à traiter le cas où k est de caractéristique p et que C_p ≃ α_{p²}. Dans ce cas, T représente le foncteur des sous-schémas localement libre de rang p A de $\mathbb{G}$_a, contenus dans α_{p²}.

Un sous-schéma localement libre de rang p A de $\mathbb{G}$_a, sur une base quelconque, est défini par une équation

(*) X^p + ∑_{0}^{p-1} a_i X^i = 0.

Pour que A soit stable par l'homothétie X ↦ nX (n ∈ (ℤ/p)*), il faut et il suffit que (*) soit identique à l'équation

X^p + ∑_{0}^{p-1} n^{p-i} a_i X^i.

En particulier, si A est un sous-schéma en groupes de $\mathbb{G}$_a, son équation se réduit à

X^p - aX = 0.

Pour que A soit sous-schéma de α_{p²}, il faut et il suffit que le premier membre de cette équation divise X^{p²}. Puisque

X^{p²} = (X^p - aX) · (∑_{i=0}^{p} a^i X^{p²-i(p-1)-p}) + a^{p+1}X,

tel est le cas si et seulement si a^{p+1} = 0. On a

T ≃ Spec(k[a]/(a^{p+1})),

et ceci achève la démonstration de 1.12.

Puisque c est fini et plat et $\mathfrak{m}_1$° régulier, ′$\mathfrak{m}$_{Γ_0(p)}° est de Cohen-Macaulay (EGA IV.15 4.2), purement de dimension relative un sur Spec(ℤ). A l'infini, $\mathfrak{m}$_{Γ_0(p)} est même lisse (1.10); ′$\mathfrak{m}$_{Γ_0(p)} tout entier est donc de Cohen-Macaulay et, d'après 1 10 encore, lisse sur Spec(ℤ) en dehors d'un ensemble fini (de codimension 2). Dès lors, (D) résulte du critère de normalité de Serre (EGA IV.5.8.6).



à

$$X^p - a X = 0 \ .$$

Pour que A soit sous-schéma de α_{p^2}, il faut et il suffit que le premier membre de cette équation divise X^{p^2}. Puisque

$$X^{p^2} = (X^p - aX) \cdot \left(\sum_{i=0}^{p} a^i X^{p^2-i(p-1)-p} \right) + a^{p+1} X \ ,$$

tel est le cas si et seulement si $a^{p+1} = 0$. On a

$$T \simeq \mathrm{Spec}(k[a]/(a^{p+1})) \ ,$$

et ceci achève la démonstration de 1.12

Authority visual fallback P0099-A03.

Authority page 100; collected-paper page 593; original folio 242.

1.14. Variantes : Soit n un entier premier à p, H ⊂ GL(2, ℤ/n) et K l'image réciproque de H dans GL(2, $\hat{\mathbb{Z}}$). Le théorème 1.6 se généralise aux $\mathfrak{m}$_{K∩Γ_0(p)}[1/n] :

(1.14.1) $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma_0(p)}[1/n]$ classifie les courbes elliptiques généralisées C/S, de fibres géométriques lisses, des n-gones ou des np-gones, munies d'un isomorphisme $\alpha : C_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$ et d'un sous-groupe localement libre de rang p H de C tel que $C_n \cdot H$ rencontre chaque composante géométrique de chaque fibre géométrique.

(.14.2) Pour n sans facteur carré, $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(n)}$ classifie les courbes elliptiques généralisées C/S munies d'un sous-groupe localement libre de rang n H de C, qui rencontre chaque composante géométrique de chaque fibre géométrique.

1.15. Soit S un schéma de caractéristique p et E une courbe elliptique sur S. A E, on associe les deux objets suivants de $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}{}^{\circ}(S)$.

$\Phi_1(E) : (E, \mathrm{Ker}(F : E \to E^{(p)}))$

$\Phi_2(E) = w\Phi_1(E) : (E^{(p)}, \mathrm{Ker}(V : E^{(p)} \to E))$.

Dans ces formules, F désigne le morphisme de Frobenius et V son transposé, la Verschiebung : FV = VF = p. Ces constructions définissent un diagramme

$\mathfrak{m}_1{}^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p$ $\mathfrak{m}_1{}^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p$ $\backslash\ \Phi_1$ $w\Phi_1\ /$ ↘ ↙ $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}{}^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p$ ↙ ↘ $c\ /\ \backslash\ cw$ $\mathfrak{m}_1{}^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p$ $\mathfrak{m}_1{}^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p$

Les composés $c\Phi_1 : E \mapsto (E, \mathrm{Ker}\ F) \mapsto E$ et $cw w\Phi_1$ sont l'identité. Les composés $cw\Phi_1 : E \mapsto (E^{(p)}, \mathrm{Ker}\ V) \mapsto E^{(p)}$ sont l'endomorphisme de Frobenius de $\mathfrak{m}_1{}^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p$.


DeRa-100

1.14. Variantes : Soit n un entier premier à p, $H \subset GL(2, \mathbb{Z}/n)$ et K l'image réciproque de H dans $GL(2, \hat{\mathbb{Z}})$. Le théorème 1.6 se généralise aux $\mathfrak{h}_{K\cap\Gamma_0(p)}[1/n]$:

(1.14.1) $\mathfrak{h}_{\Gamma(n)\cap\Gamma_0(p)}[1/n]$ classifie les courbes elliptiques généralisées C/S, de fibres géométriques lisses, des n-gones ou des np-gones, munies d'un isomorphisme $\alpha : C_n \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/n)^2$ et d'un sous-groupe localement libre de rang p H de C tel que $C_n \cdot H$ rencontre chaque composante géométrique de chaque fibre géométrique.

(.14.2) Pour n sans facteur carré, $\mathfrak{h}_{\Gamma_0(n)}$ classifie les courbes elliptiques généralisées C/S munies d'un sous-groupe localement libre de rang n H de C, qui rencontre chaque composante géométrique de chaque fibre géométrique.

Authority visual fallback P0100-A01.

Théorème 1.16. (i) Les applications Φ_1 et $\Phi_2 = w\Phi_1$ sont des plongements fermés. Leurs images sont les deux composantes irréductibles de $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}{}^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p$.

(ii) Ces composantes irréductibles se coupent transversalement en les points supersinguliers. Le champ $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)} \otimes \mathbb{F}_p$, qui est réduit, n'a donc pour seules singularités que des points doubles ordinaires.

(iii) $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ est régulier.

Indiquons par un exposant h le champ obtenu en ôtant les points supersinguliers de caractéristique p. On vérifie que Φ_1 et $w\Phi_1$ définissent un isomorphisme

$\Phi_1 \amalg w\Phi_1 : \mathfrak{m}_1{}^{oh} \otimes \mathbb{F}_p \amalg \mathfrak{m}_1{}^{oh} \otimes \mathbb{F}_p \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}{}^{oh} \otimes \mathbb{F}_p$.

L'isomorphisme réciproque est défini par c et cw, restreints aux images de Φ_1 et $w\Phi_1$.

Que Φ_1 (resp. $w\Phi_1$) soit un plongement fermé résulte de l'existence d'une rétraction (car ce sont des morphismes représentables). On sait (IV.5.6) que $\mathfrak{m}_1 \otimes \mathbb{F}_p$ est géométriquement irréductible, et ceci prouve (i).

$\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ est réduit car de Cohen-Macaulay et génériquement réduit (I.7.3.). Les points supersinguliers sont dans l'image tant de Φ_1 que de Φ_2 car, pour E une courbe elliptique supersingulière sur k algébriquement clos, le seul sous-groupe de rang p est

Ker(F) = Ker(V : E → E^{(1/p)}). Les deux composantes irréductibles de $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}^{\circ}$ mod p se coupent donc en ces points. L'intersection est transversale, car les vecteurs tangents aux deux branches sont linéairement indépendants : l'un est annulé par dc et non par d(wc), l'autre par d(wc) et non par dc. Ceci prouve (ii). Nous prouverons (iii) en 1.19.

Variante 1.17. Soit n ≥ 3, et considérons $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma_0(p)}^{\circ}$. Ce champ, ainsi que $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)}^{\circ}$, est un schéma : les objets classifiés n'ont pas d'automorphismes (cf. IV.2.7). D'après 1.14, ces schémas représentent les foncteurs de classes d'isomorphie d'objets du type suivant


rétraction (car ce sont des morphismes représentables). On sait (IV.5.6) que $\mathfrak{M}_1 \otimes \mathbb{F}_p$ est géométriquement irréductible, et ceci prouve (i).

$\mathfrak{M}_{\Gamma_0(p)}$ est réduit car de Cohen-Macaulay et génériquement réduit (I.7.3.). Les points supersinguliers sont dans l'image tant de ϕ_1 que de ϕ_2 car, pour E une courbe elliptique supersingulière sur k algébriquement clos, le seul sous-groupe de rang p est Ker(F) = Ker(V : E → E^{(1/p)}). Les deux composantes irréductibles de $\mathfrak{M}^{\circ}_{\Gamma_0(p)}$ mod p se coupent donc en ces points. L'intersection est transversale, car les vecteurs tangents aux deux branches sont linéairement indépendants : l'un est annulé par dc et non par d(wc), l'autre par d(wc) et non par dc. Ceci prouve (ii). Nous prouverons (iii) en 1.19.

Authority visual fallback P0101-A03.

$\mathfrak{m}_{\Gamma(n)}^{\circ}$: (E,α_n) : α_n : E_n ⟶̃ (ℤ/nℤ)^2 ;

$\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma_0(p)}$: (E,α_n,H) : α_n : E_n ⟶̃ (ℤ/nℤ)^2 ; H ⊂ E de rang p,

ou plus symétriquement (cf. IV.4.5) ; on pose F = E/H)

(E →^h F, α_n) : h p-isogénie et α_n : E_n ⟶̃_{h̄} F_n ⟶̃ (ℤ/nℤ)^2.

Après réduction mod p, on dispose d'un diagramme analogue à (1.15.1). En voici les flèches (exprimées comme morphismes de foncteurs)

Φ_1 : $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)}^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p \to \mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma_0(p)}^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p$: (E,α_n) ↦ (E,α_n, Ker F)

w : $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma_0(p)}^{\circ} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma_0(p)}^{\circ}$: (E,α_n,H) ↦ (E/H,α_n,E_p/H)

c : $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma_0(p)}^{\circ} \to \mathfrak{m}_{\Gamma(n)}^{\circ}$: (E,α_n,H) ↦ (E,α_n).

On prendra garde que l'isomorphisme $w^2(E,H) \simeq (E,H)$ défini en IV.4.4 induit un isomorphisme $w^2(E,\alpha_n,H) \simeq (E,p\alpha_n,H)$. Le composé cwΦ_1 : (E,α_n) ↦ (E^{(p)},α_n) est le Frobenius.

$\mathfrak{m}_n^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p$ $\mathfrak{m}_n^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p$ \ Φ_1 wΦ_1 / ↘ ↙ (E,α_n) $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma_0(p)}^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p$ ↓ ↙ ↘ (E,pα_n) c / \ cw $\mathfrak{m}_n^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p$ $\mathfrak{m}_n^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p$

(diagonales composées : Frobenius).

Sur k algébriquement clos de caractéristique p, la condition

Φ_1((E,α_r)) = wΦ_1(F,β_n)

signifie que F est supersingulier, que E = F^{(p)} et que le diagramme



Authority visual fallback P0102-A04.

$E_n = F_n^{(p)} \xleftarrow{\sim} F_n \mid \alpha_n \mid \beta_n \downarrow \downarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2 = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$

est commutatif, i.e. que $(E,\alpha_n) = (F,\beta_n)^{(p)}$. Les points (i) et (ii) de 1.16 admettent donc la variante suivante.

Variante 1.18. Le schéma $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma_0(p)}^{\circ} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p$ peut s'obtenir en recollant deux copies de $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)}^{\circ} \otimes \mathbb{F}_p$ selon les points supersinguliers : on identifie le point supersingulier x de la 2ème copie au point $x^{(p)}$ de la première copie.

1.19. Prouvons que $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ est régulier. En dehors des points supersinguliers, cela résulte de 1.10. Puisqu'en un point supersingulier $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)} \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ présente une singularité quadratique ordinaire, (I.5.2) montre qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que le complété de l'anneau strictement local de $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ en un tel point soit isomorphe à

$W(\mathbb{F}_p)[[X,Y]]/(X.Y - p^k)$ (W = vecteurs de Witt).

Si $k = 1$, cet anneau local complet est régulier. Sinon, son spectre admet la section $X = Y = 0$ au-dessus de $W(\mathbb{F}_p)/(p^k)$ ($k > 1$), et il existe sur $W(\mathbb{F}_p)/(p^k)$ une courbe elliptique E, munie d'un sous-groupe localement libre de rang p H, avec E supersingulière en réduction modulo p (donc $H \otimes \mathbb{F}_p \simeq \alpha_p$). Ceci est absurde, car d'après [22] α_p n'admet aucun relèvement sur $W(\mathbb{F}_p)/(p^k)$ ($k > 1$).

1.20. Variantes. Pour $H \subset GL(2, \mathbb{Z}/n)$ d'image réciproque K dans $GL(2, \hat{\mathbb{Z}})$, et $(n,p) = 1$, $\mathfrak{m}_{K\cap\Gamma_0(p)}[1/n]$ est régulier. Par exemple, si $n \geq 3$, le schéma $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma_0(p)}[1/n]$ est régulier ; pour n sans facteur carré, $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(n)}$ est régulier.

2. Etude de $\mathfrak{m}_{\Gamma'_\infty(p)}$.

2.1. En IV.4, nous avons donné une interprétation modulaire de $\mathfrak{m}_{\Gamma'_\infty(p)}[1/p]$: notant (C,A) la courbe elliptique généralisée universelle sur $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$, et son image réciproque sur $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}[\zeta_p,1/p]$; on a



Authority visual fallback P0103-A05.

$\mathfrak{m}_{\Gamma'_\infty(p)}[1/p] = \mathrm{Isom}_{\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}[\zeta_p,1/p]}(\mathbb{Z}/p,A)$.

Par définition, $\mathfrak{m}_{\Gamma'_\infty(p)}$ est le normalisé de $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}[\zeta_p]$ dans ce champ $\mathrm{Isom}_{\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}[\zeta$ On en déduit facilement la description ci-dessous du champ $\mathfrak{m}_{\Gamma'_\infty(p)}{}^h$ déduit de $\mathfrak{m}_{\Gamma'_\infty(p)}$ en ôtant les points supersinguliers de caractéristique p.

2.2. Soit $\mathcal{G}'_p \subset \mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ l'ouvert classifiant les (C,A) avec A localement isomorphe à μ_p (pour la topologie étale), et $\mathcal{B}'_p \subset \mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$ l'ouvert classifiant les (C,A) avec A localement isomorphe à $\mathbb{Z}/p$. Posons

$\mathcal{U} = \mathrm{Isom}_{\mathcal{G}'_p}(\mu_p,A)$

$\mathcal{V} = \mathrm{Isom}_{\mathcal{B}'_p}(\mathbb{Z}/p,A)$;

$\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$ sont finis étales sur $\mathcal{G}'_p$ et $\mathcal{B}'_p$ respectivement. Au-dessus de $\mathbb{Z}[\zeta_p,1/p]$, $\mathbb{Z}/p$ et μ_p sont canoniquement isomorphes, d'où un isomorphisme

$\mathcal{U}[\zeta_p,1/p] \simeq \mathcal{V}[\zeta_p,1/p]$.

Proposition 2.3. $\mathfrak{m}_{\Gamma'_\infty(p)}{}^h$ s'obtient en recollant $\mathcal{U}[\zeta_p]$ et $\mathcal{V}[\zeta_p]$ selon l'ouvert commun $\mathcal{U}[\zeta_p,1/p]$. En particulier, $\mathfrak{m}_{\Gamma'_\infty(p)}{}^h$ est lisse sur $\mathbb{Z}[\zeta_p]$.

Pour étudier $\mathfrak{m}_{\Gamma'_\infty(p)}$ au voisinage des points supersinguliers, nous ferons usage des résultats de [22] rappelés ci-dessous.

2.4. Le foncteur F qui à un schéma S associe l'ensemble des isomorphismes

$\chi : \mathbb{F}_p{}^* \xrightarrow{\sim} \mu_{p-1}$

vérifiant (2.4.1) ci-dessous est représentable par un schéma $\mathrm{Spec}(\Lambda_p)$.

(2.4.1) En tout point s de caractéristique p de S, l'isomorphisme induit par

$\chi : \mathbb{F}_p{}^* \xrightarrow{\sim} \mu_{p-1}(k(s)) \simeq \mathbb{F}_p{}^*$

est l'identité.

$\mathrm{Spec}(\Lambda_p)$ est isomorphe à l'ouvert de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\zeta_{p-1}])$ obtenu en enlevant les places divisant p-1 et toutes les places au-dessus de p sauf une. $\mathrm{Spec}(\Lambda_p)$



Authority visual fallback P0104-A05.

est étale sur Spec(ℤ) et $\mathbb{F}_p \xrightarrow{\sim} \Lambda_p \otimes \mathbb{F}_p$.

Soient S muni de χ vérifiant (2.4.1) (S est un Λ_p-schéma) et A un schéma en groupes localement libre de rang p sur S. Soit L le sous-module de l'algèbre affine $\mathcal{O}$(A) de A (un faisceau de $\mathcal{O}$_S-algèbres) formé des f tels que

f(ix) = χ(i) f(x) (i ∈ $\mathbb{F}$_p^*).

D'après [22], L est un module inversible sur S, et il existe une unique section a de L^{⊗(1-p)} tel que pour f comme plus haut

f^p = ⟨a,f^{p-1}⟩.f dans L ⊂ $\mathcal{O}$(A).

Soit A* le dual de Cartier de A et L* défini par A*. La dualité e entre $\mathcal{O}$(A) et $\mathcal{O}$(A*) met L et L* en dualité. Soit b ∈ (L*)^{⊗ 1-p} l'analogue pour A* de a ci-dessus. Alors,

a.b = w(χ)

pour un certain nombre w(χ) ∈ Λ_p, avec (w(χ)) = (p) dans Λ_p.

Le foncteur (pour les isomorphismes)

(A : schéma en groupes localement libre de rang p) ↦ ((L,a,b) : L inversible, a ∈ L^{⊗(1-p)}, b ∈ L^{⊗(p-1)}, a.b = w(χ))

est une équivalence de catégories.

L'ensemble des sections de A sur S s'identifie à l'ensemble des sections s de L* sur S telles que s^{⊗p} = as. Pour que s définisse un isomorphisme entre A et ℤ/p, il faut et il suffit que s soit une section inversible de L.

Exemples : On a

(2.4.2) ℤ/p ↦ ($\mathcal{O}$_S,1,w(χ))

(2.4.3) μ_p ↦ ($\mathcal{O}$_S,w(χ),1)

(2.4.4) α_p ↦ ($\mathcal{O}$_S,0,0).



Authority visual fallback P0105-A05.

Authority page 106 ; collected-paper page 599 ; original folio 248.

2.5. Soit donné sur S un isomorphisme ζ : $\mathbb{Z}$/p ⥲ μ_p (S est un Λ_p[ζ_p,1/p]-schéma). L'isomorphisme ζ définit ζ* : $\mathcal{O}$(μ_p) → $\mathcal{O}$($\mathbb{Z}$/p) et, via (2.4.2) (2.4.3), induit

ζ* : $\mathcal{O}$_S = L(μ_p) → L($\mathbb{Z}$/p) = $\mathcal{O}$_S :

la multiplication par un nombre w(χ,ζ) ∈ Λ_p[ζ_p]. On a

w(χ,ζ)^{p-1} = w(χ).

Un isomorphisme s : $\mathbb{Z}$/p ⥲ A définit par dualité

s* : A* ⥲ μ_p ↞ $\mathbb{Z}$/p

d'inverse t. Les sections s(1) et t(1) s'identifient à des sections x et y de L* et L avec

x^{p-1} = a y^{p-1} = b

xy = w(χ,ζ).

2.6. Soit ´𝔪_{Γ´_∞(p)} ⊗ Λ_p le Λ_p[ζ_p]-champ algébrique sur 𝔪_{Γ_0(p)} ⊗ Λ_p[ζ_p] suivant : un objet (C,A,x,y) de ´𝔪_{Γ´_∞(p)} ⊗ Λ_p sur un Λ_p[ζ_p]-schéma S consiste en

a) un objet (C,A) de 𝔪_{Γ_0(p)}. Soit (L,a,b) déduit de A.

b) des sections x de L* et y de L telles que x^{p-1} = a, y^{p-1} = b et que xy = w(χ,ζ).

Les constructions 2.5 et IV.4.8 définissent un isomorphisme

(2.6.1) 𝔪_{Γ´_∞(p)} ⊗ Λ_p[1/p] ≃ ´𝔪_{Γ´_∞(p)} ⊗ Λ_p[1/p].

Théorème 2.7. L'isomorphisme 2.6.1 se prolonge en un isomorphisme

𝔪_{Γ´_∞(p)} ⊗ Λ_p ≃ ´𝔪_{Γ´_∞(p)} ⊗ Λ_p.

Montrons tout d'abord que l'isomorphisme (2.6.1) se prolonge en dehors des points supersinguliers (on interprète le membre de gauche par 2.3). Au-dessus de l'ouvert $\mathcal{B}$´_p de 𝔪_{Γ_0(p)} (A étale), a est inversible ; se donner x tel que x^{p-1} = a revient à se donner un isomorphisme de $\mathbb{Z}$/p avec A, et (x,ζ) détermine y uniquement. Dualement, au-dessus de $\mathcal{G}$´_p (A* étale), b est inversible. Se donner y tel que y^{p-1} = b revient à se donner un isomorphisme de μ_p avec A, et (y,ζ)



Authority visual fallback P0106-A05.

détermine x uniquement. Là où p est inversible, ces deux constructions sont compatibles, via l'isomorphisme ζ : ℤ/p →̃ μ_p.

Le champ ′𝔪_{Γ′_∞(p)} ⊗ Λ_p est fini représentable sur 𝔪_{Γ_0(p)} ⊗ Λ_p. Il nous suffit donc de prouver que ′𝔪_{Γ′_∞(p)} ⊗ Λ_p est normal en les points supersinguliers. Le lemme suivant montre que ′𝔪_{Γ′_∞(p)} ⊗ Λ_p est même régulier en ces points.

Lemme 2.8. Soit s̄ un point géométrique supersingulier de caractéristique p de 𝔪_{Γ_0(p)}. Soit Ŝ le complété de l'hensélisé strict de 𝔪_{Γ_0(p)} en s̄, muni de son unique structure de Λ_p-algèbre. Soient (C,A) sur Ŝ défini par Ŝ → 𝔪_{Γ_0(p)} et (L,a,b) défini par A.

(i) Ŝ ≃ W(𝔽_p)[[u,v]]/(uv-w(χ)) avec (L,a,b) ≃ (𝒪,u,v).

(ii) Le normalisé ′𝔪_{Γ′_∞(p)} ⊗_{𝔪_{Γ_0(p)}} Ŝ de Ŝ dans Isom_{Ŝ[ζ_p,1/p]}(ℤ/p,A) est Ŝ-isomorphe à

W(𝔽_p)[[ζ_p,x,y]]/(xy-w(χ,ζ)) ≃ W(𝔽_p)[[x,y]]/(x^{p-1} y^{p-1} - w(χ))

avec x^{p-1} = u et y^{p-1} = v.

On sait que Ŝ ≃ W(𝔽_p)[[u,v]]/(uv - p) (1.16), que ab = w(χ) = p.unité (cf.2.5) et que a et b s'annulent aux points supersinguliers (2.4.4). (i) et (ii) en résultent.

Remarque 2.9. Il résulte de 2.4, 2.4.4 et 2.8 (ii) que Ŝ, muni de A, est un schéma formel versel de modules pour les déformations de α_p.

Variante 2.10. Voici comment modifier 2.6 pour obtenir une description modulaire de 𝔪_{Γ′_∞(p)} : c'est le champ algébrique sur ℤ[ζ_p] dont les sections sur un ℤ[ζ_p]-schéma S classifient les objets (C,H) de 𝔪_{Γ_0(p)} sur S, munis de

a) un morphisme ℤ/p →̃ H au-dessus de S[1/p] ;

b) au-dessus de S ⊗ Λ_p, où H définit (L,a,b), des sections x de L* et y de L telles que x^{p-1} = a, y^{p-1} = b, xy = w(χ,ζ).



Authority visual fallback P0107-A05.

On exige que ces deux données soient compatibles, via le dictionnaire 2.4, sur S ⊗ Λ_p[1/p].

2.11. Avec les notations de 2.2 et de 1.1 et 1.3, $\mathcal{U}$ ⊗ 𝔽_p et $\mathcal{V}$ ⊗ 𝔽_p sont des revêtements étales de $\mathcal{G}$_p ⊗ 𝔽_p et $\mathcal{B}$_p ⊗ 𝔽_p respectivement. Les morphismes Φ_1 et wΦ_1 (cf. 1.15) identifient $\mathcal{G}$_p ⊗ 𝔽_p et $\mathcal{B}$_p ⊗ 𝔽_p à des ouverts de 𝔪_1 ⊗ 𝔽_p ; via cette identification, le théorème de structure local 2.8.montre que les revêtements $\mathcal{U}$ ⊗ 𝔽_p et $\mathcal{V}$ ⊗ 𝔽_p de 𝔪_1^h ⊗ 𝔽_p se ramifient complètement en les points supersinguliers de 𝔪_1 ⊗ 𝔽_p. En particulier, $\mathcal{U}$ ⊗ 𝔽_p et $\mathcal{V}$ ⊗ 𝔽_p sont géométriquement irréductibles et 𝔪_{Γ'_∞(p)} ⊗ 𝔽_p a deux composantes irréductibles, images réciproques des composantes irréductibles de 𝔪_{Γ_0(p)} ⊗ 𝔽_p. La démonstration de 2.7 fournit le résultat suivant.

Théorème 2.12. (i) Les deux composantes irréductibles de 𝔪_{Γ'_∞(p)} ⊗ 𝔽_p sont lisses et se coupent transversalement en les points supersinguliers.

(ii) 𝔪_{Γ'_∞(p)} est un schéma régulier ; 𝔪_{Γ'_∞(p)} → Spec(ℤ[ζ_p]) ne présente que des singularités quadratiques.

(iii) 𝔪_{Γ'_∞(p)} → 𝔪_{Γ_0(p)} induit une bijection (une équivalence de catégorie) sur les points géométriques supersinguliers de caractéristique p.

2.13. Soit n un entier ≥ 3 et premier à p. Comme en 1.17, on peut rendre 2.12 plus concret en passant au schéma 𝔪_{Γ(n)∩Γ'_∞(p)}. Soit $\mathcal{J}$_n^h le revêtement étale Isom(μ_p,(C_p)^d de 𝔪_{Γ(n)}^h ⊗ 𝔽_p. Il se prolonge en un revêtement $\mathcal{J}$_n de 𝔪_{Γ(n)} ⊗ 𝔽_p, complètement ramifié en les points supersinguliers, et

𝔪_{Γ(n)∩Γ'_∞(p)} ⊗_{ℤ[ζ_p]} 𝔽_p

s'obtient en recollant deux copies de $\mathcal{J}$_{n,p} ⊗_{𝔽_p} 𝔽_p selon les points supersinguliers, en identifiant x de la 2^e copie à x^{(p)} de la première (comme en 1.17). En particulier, le morphisme

𝔪_{Γ(n)∩Γ'_∞(p)} ⊗_{ℤ[ζ_p]} 𝔽_p → 𝔪_{Γ(n)∩Γ_0(p)} ⊗_ℤ 𝔽_p

induit une bijection sur les ensembles de composantes irréductibles, et

𝔪_{Γ(n)∩Γ'_∞(p)} ⊗ 𝔽_p → 𝔪_{Γ(n)} ⊗ 𝔽_p

induit une bijection sur l'ensemble des points supersinguliers.

Puisque 𝔪_{Γ(n)∩Γ'_∞(p)}°[1/n] est fini étale sur 𝔪_{Γ'_∞(p)}°[1/n], les



Authority visual fallback P0108-A05.

propriétés locales sont les mêmes.

2.14. Soient H un sous-groupe de (ℤ/p)^*, et d son indice. Nous noterons Γ_∞(H) et Γ′_∞(H) les sous-groupe de GL(2, $\hat{\mathbb{Z}}$) images réciproques des sous-groupes suivants de GL(2, ℤ/p) :

Γ_∞(H) : (H ℤ/p) Γ′_∞(H) : (H ℤ/p) (0 (ℤ/p)^*) (0 H).

Pour H = {e} (resp. H = (ℤ/p)^*), on a Γ_∞(H) = Γ_∞(p) et Γ′_∞(H) = Γ′_∞(p) (resp. Γ_∞(H) = Γ′_∞(H) = Γ_0(p)).

Nous noterons ℤ[ζ_p]^H l'anneau des invariants de H agissant sur ℤ[ζ_p] par i ∈ H ⊂ (ℤ/p)^* ↦ (ζ_p ↦ ζ_p^i). On vérifie comme en IV 4,que $\mathfrak{m}_{\Gamma_\infty(H)\}[1/p]$ et $\mathfrak{m}_{\Gamma'_\infty(H)\}[1/p]$ admettent les descriptions suivantes. Si (C,A) est la courbe universelle sur $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)\}$,

(2.14.1) $\mathfrak{m}_{\Gamma_\infty(H)\}[1/p] \simeq \mathrm{Isom}_{\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)\}[1/p]\}(\mathbb{Z}/p,A)/H$ (cf.IV 4.14)

(2.14.2) $\mathfrak{m}_{\Gamma'_\infty(H)\}[1/p] \simeq \mathfrak{m}_{\Gamma_\infty(H)\}[1/p] \otimes \mathbb{Z}[\zeta_p]^H$ (cf.IV 4.15)

La formule (2.14.1) signifie que si S est un schéma sur lequel p est inversible, un objet de $\mathfrak{m}_{\Gamma_\infty(H)\}$ sur S s'identifie à un objet (C,A) de $\mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)\}$ sur S, muni d'une section globale du faisceau quotient Isom_S(ℤ/p,A)/H.

2.15. Soit A un groupe localement libre de rang p sur un schéma S sur Λ_p, et soient (L,a,b) définis par A. Ainsi qu'on l'a vu en 2.4, se donner un isomorphisme entre ℤ/p et A revient à se donner x inversible tel que x^{p-1} = a. Multiplier l'isomorphisme par i ∈ (ℤ/p)^* revient à multiplier x par χ(i). L'application x ↦ x^{(p-1)/d} induit donc un isomorphisme de Isom(ℤ/p,A)/H avec le faisceau des sections inversibles u de L^{⊗(p-1)/d} telles que u^d = a.



Authority visual fallback P0109-A05.

Authority page 110 ; collected-paper page 603 ; original folio 252.

On vérifie que

w(χ,ζ)^{(p-1)/d} ∈ Λ_p[ζ_p]^H.

2.16. Soit ′𝔪_{Γ′_∞(H)} ⊗ Λ_p le Λ_p[ζ_p]^H-champ algébrique suivant : un objet de ′𝔪_{Γ′_∞(H)} ⊗ Λ_p sur un Λ_p[ζ_p]^H-schéma S est un objet (C,A) de 𝔪_{Γ_0(p)} sur S, A définissant (L,a,b), suivi de sections u de L^{⊗(1-p)/d} et v de L^{⊗(p-1)/d}, telles que

u^d = a, v^d = b, uv = w(χ,ζ)^{(p-1)/d}.

Les constructions 2.14 et 1.15 définissent un isomorphisme

(2.16.1) ′𝔪_{Γ′_∞(H)} ⊗ Λ_p[1/p] ≃ 𝔪_{Γ′_∞(H)} ⊗ Λ_p[1/p].

2.17. Comme en 2.10, on peut modifier cette définition pour obtenir un champ ′𝔪_{Γ′_∞(H)} sur ℤ[ζ_p]^H : un objet de ′𝔪_{Γ′_∞(H)} sur un ℤ[ζ_p]^H-schéma S est un objet (C,A) de 𝔪_{Γ_0(H)} sur S, muni de

a) u_1, section globale de Isom_{S[1/p]}(ℤ/p,A)/H ;

b) au-dessus de S ⊗ Λ_p, où A définit (L,a,b), des sections u et v de L^{⊗(1-p)/d} et L^{⊗(p-1)/d} avec u^d = a, v^d = b, uv = w(χ,ζ)^{(p-1)/d}.

On exige que ces données soient compatibles, via (2.16.1), sur S ⊗ Λ_p[1/p].

La démonstration de 2.7 et 2.12 fournit les résultats suivants.

Théorème 2.18. (i) On a 𝔪_{Γ′_∞(H)} ≃ 𝔪_{Γ′_∞(H)}.

(ii) Le champ 𝔪_{Γ′_∞(H)} ⊗_{ℤ[ζ_p]^H} 𝔽_p a deux composantes irréductibles. Elles sont lisses et se coupent transversalement en les points supersinguliers.

(iii) 𝔪_{Γ′_∞(H)} est un schéma régulier ; 𝔪_{Γ′_∞(H)} → Spec(ℤ[ζ_p]^H) ne présente que des singularités quadratiques.

(iv) 𝔪_{Γ′_∞(H)} → 𝔪_{Γ_0(p)} induit une bijection (équivalence de catégories) sur les points géométriques supersinguliers de caractéristique p.



Authority visual fallback P0110-A05.

2.19. Soit n un entier premier à p et ≥ 3. Le théorème 2.18 se généralise aux schémas $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma'_\infty(H)}[1/n]$.

(i) $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma'_\infty(H)}[1/n]$ est régulier.

(ii) $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma'_\infty(H)}[1/n] \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\zeta_p,1/p]^H)$ est lisse en dehors des points supersinguliers de caractéristique p, où on a des points quadratiques ordinaires.

(iii) $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma'_\infty(H)} \otimes_{\mathbb{Z}[\zeta_p]^H} \mathbb{F}_p \to \mathfrak{m}_{\Gamma(n)} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p$ induit une bijection sur les points supersinguliers.

(iv) $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma'_\infty(H)} \otimes_{\mathbb{Z}[\zeta_p]^H} \mathbb{F}_p \to \mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma_0(p)} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}_p$ induit une bijection sur les ensembles de composantes irréductibles.

(v) $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma'_\infty(H)} \otimes_{\mathbb{Z}[\zeta_p]^H} \mathbb{F}_p$ s'obtient en recollant deux copies de $\mathcal{J}_{n/H}$ selon les points supersinguliers (cf. 2.13).

3. Un théorème de bonne réduction.

3.1. Soient p un nombre premier, $H \subset (\mathbb{Z}/p)^*$, $\Gamma'_\infty(H)$ le groupe 2.14, $\mathbb{Z}[\zeta_p]^H$ comme en 2.14 et n un entier premier à p. On suppose $n \geq 3$, de sorte que $\mathfrak{m}_{\Gamma(n)\cap\Gamma'_\infty(H)} \otimes \mathbb{Q} = M_{\Gamma(n)\cap\Gamma'_\infty(H)} \otimes \mathbb{Q}$ est un schéma. C'est un schéma sur $\mathbb{Q}[\zeta_n,\zeta_p]^H$.

Dans ce §, nous noterons J(n,H) la variété abélienne sur $\mathbb{Q}[\zeta_n,\zeta_p]^H$ composante neutre du schéma de Picard de $M_{\Gamma(n)\cap\Gamma'_\infty(H)} \otimes \mathbb{Q}$

$J(n,H) = \mathrm{Pic}^o(M_{\Gamma(n)\cap\Gamma'_\infty(H)} \otimes \mathbb{Q} / \mathbb{Q}[\zeta_n,\zeta_p]^H)$.

Pour $H = (\mathbb{Z}/p)^*$, on a $\Gamma'_\infty(H) = \Gamma_0(p)$ et l'application

$\mathfrak{m}_{\Gamma'_\infty(H)} \to \mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$

induit un morphisme

(3.1.1) $J(n,(\mathbb{Z}/p)^*) \otimes_{\mathbb{Q}[\zeta_n]} \mathbb{Q}[\zeta_n,\zeta_p]^H \to J(n,H)$

de noyau fini.



Authority visual fallback P0111-A05.

Théorème 3.2. La variété abélienne I(n,H) sur $\mathbb{Q}[\zeta_n,\zeta_p]^H$ conoyau de (3.1.1) a bonne réduction en les places divisant p.

Soient ν un point de caractéristique p de $\mathbb{Z}[\zeta_n,\zeta_p]^H$, et $\overline{k(v)}$ une clôture algébrique du corps résiduel. Soit ν le nombre de points supersinguliers de $M_{\Gamma(n)} \otimes_{\mathbb{Z}[\zeta]} \overline{k(v)}$. On sait que $M_{\Gamma(n)} \otimes_{\mathbb{Z}[\zeta]} \overline{k(v)}$ est irréductible ; il en résulte que le schéma connexe $M_{\Gamma(n)\cap\Gamma(H)} \otimes_{\mathbb{Z}[\zeta_n,\zeta_p]^H} \overline{k(v)}$ a 2 composantes irréductibles, se coupant transversalement en ν points (cf. 1.18) et la variété abélienne sur $\overline{k(v)}$

$$\mathrm{Pic}^o(M_{\Gamma(n)\cap\Gamma(H)} \otimes_{\mathbb{Z}[\zeta_n,\zeta_p]^H} \overline{k(v)}/\overline{k(v)})$$

est extension d'un schéma abélien par un tore de dimension ν - 1 (cf. I. 3.7). En particulier :

Proposition 3.3. La variété abélienne J(n,H) sur $\mathbb{Q}[\zeta_n,\zeta_p]^H$ a réduction semi-stable en les places divisant p.

Si $0 \to A \to B \to C \to 0$ est une suite exacte à isogénies près de variétés abéliennes sur le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète, et que α_{ab}, α_m, α_{add} désignent le rang abélien, multiplicatif et unipotent de la fibre spéciale du modèle de Néron, on sait que

$$\alpha_{ab}(A) - \alpha_{ab}(B) + \alpha_{ab}(C) = 0$$

et de même pour α_m et α_{add}. De plus, si $\alpha_{add} = 0$, α_{ab} et α_m sont invariants par extension des scalaires (cas semi-stable). $\alpha_{add} = \alpha_m = 0$ équivaut à bonne réduction. On a $\alpha_{add}(J(n,H)) = 0$ et $\alpha_m(J(n,H)) = \nu\text{-}1$, indépendant de H ; le théorème en résulte.

Variante 3.4. Il résulte de 2.14.2 que

$$J(n,H) = \mathrm{Pic}^o(M_{\Gamma(n)\cap\Gamma_\infty(H)} \otimes \mathbb{Q} / \mathbb{Q}(\zeta_n)) \otimes_{\mathbb{Q}(\zeta_n)} \mathbb{Q}(\zeta_n,\zeta_p)^H.$$

Soit $I_1(n,H)$ la variété abélienne sur $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ conoyau du morphisme de

Authority visual fallback P0112-A05.

noyau fini défini par $\mathfrak{m}_{\Gamma_\infty(H)} \to \mathfrak{m}_{\Gamma_0(p)}$:

$$\mathrm{Pic}^o(M_{\Gamma(n)\cap\Gamma_0(p)} \otimes \mathbb{Q} / \mathbb{Q}(\zeta_n)) \to \mathrm{Pic}^o(M_{\Gamma(n)\cap\Gamma_\infty(H)} \otimes \mathbb{Q} / \mathbb{Q}(\zeta_n)) \to I_1(n,H) \to 0.$$

On a $I(n,H) = I_1(n,H) \otimes_{\mathbb{Q}(\zeta_n)} \mathbb{Q}(\zeta_n,\zeta_p)^H$, et 3.2 peut donc encore se formuler en disant que, après extension des scalaires de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ à $\mathbb{Q}(\zeta_n,\zeta_p)^H$, $I_1(n,H)$ acquiert une bonne réduction en les places divisant p.

Variante 3.5. La variété abélienne sur $\mathbb{Q}(\zeta_p)^H$

$$RJ(n,H) =_{\mathrm{dfn}} \mathrm{Pic}^o(M_{\Gamma(n)\cap\Gamma'_\infty(H)} / \mathbb{Q}(\zeta_p)^H)$$

se déduit de $J(n,H)$ par restriction des scalaires à la Weil de $\mathbb{Q}(\zeta_n,\zeta_p)^H$ à $\mathbb{Q}(\zeta_p)^H$. Le conoyau $RI(n,H)$ de

$$\mathrm{Pic}^o(M_{\Gamma(n)\cap\Gamma_0(p)} / \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}(\zeta_p)^H \to \mathrm{Pic}^o(M_{\Gamma(n)\cap\Gamma'_\infty(p)} / \mathbb{Q}(\zeta_p)^H)$$

se déduit de même de $I(n,H)$ par restriction des scalaires à la Weil. Puisque $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ est non ramifié en p, $RI(n,H)$ a encore bonne réduction sur $\mathbb{Q}(\zeta_p)^H$ en les places divisant p.

Variante 3.6. Soit K un sous-groupe de $GL(2,\hat{\mathbb{Z}})$ contenant $\Gamma(n)$, et soit $RI_1(K,H)$ la variété abélienne sur $\mathbb{Q}$ conoyau de

$$\mathrm{Pic}^o(M_{K\cap\Gamma_0(p)\}}) \to \mathrm{Pic}^o(M_{K\cap\Gamma_\infty(H)\}}).$$

On a $RI_1(K,H) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(\zeta_p)^H \leftrightarrow RI(n,H)$ (à isogénie près) ; la variété abélienne $RI_1(K,H)$ acquiert donc bonne réduction en les places divisant p sur $\mathbb{Q}(\zeta_p)^H$.

Exemples 3.7. (i) La variété abélienne sur $\mathbb{Q}$

$$\mathrm{coker}(\mathrm{Pic}^o(M_{\Gamma_0(p)\}}) \to \mathrm{Pic}^o(M_{\Gamma_\infty(p)\}}))$$

a bonne réduction sur $\mathbb{Q}(\zeta_p)$. Soit H le sous-groupe $\{\pm 1\}$ de $(\mathbb{Z}/p)^*$. On a $M_{\Gamma_\infty(p)\}} = M_{\Gamma_\infty(H)\}}$. La variante abélienne ci-dessus acquiert donc bonne réduction déjà le plus grand sous-corps totalement réel de $\mathbb{Q}(\zeta_p)$.



Authority visual fallback P0113-A05.

(ii) Soit p un nombre premier de la forme 4n + 1, et soit H ⊂ (ℤ/p)^* le sous-groupe des carrés. La variété abélienne sur ℚ

coker(Pic^o(M_{Γ_0(p)}) → Pic^o(M_{Γ_∞(H)}))

acquiert partout bonne réduction sur le corps quadratique réel ℚ(√p).

(iii) Soient n un entier sans facteurs carrés, H un sous-groupe de (ℤ/n)^* et Γ_∞(H) le sous-groupe de GL(2,$\hat{\mathbb{Z}}$) image réciproque de

(H ℤ/n) (0 (ℤ/n)^*) ⊂ GL(2,ℤ/n).

Si n = pm, on a ℤ/n^* ≃ (ℤ/p)^* × (ℤ/m)^*. Nous poserons

H_p = (ℤ/p)^* ∩ H

et nous noterons H.(ℤ/p)^* le sous-groupe de (ℤ/n)^* engendré par H et (ℤ/p)^*. La variété abélienne sur ℚ

coker(Σ_{p|n} Pic^o(M_{Γ_∞(H.(ℤ/p)^*)}) → Pic^o(M_{Γ_∞(H)}))

acquiert bonne réduction sur ℚ(ζ_n)^H.

Preuve : Soit p un nombre premier divisant n : n = mp avec (m,p) = 1. Prouvons que la variété abélienne A considérée a bonne réduction en les places de ℚ(ζ_n)^H divisant p. Puisque ℚ(ζ_n)^{H_p} est non ramifié sur ℚ(ζ_n)^H en les places divisant p, il suffit de prouver que A a bonne réduction en les places divisant p de ℚ(ζ_n)^{H_p}. D’après 3.6,

B = coker(Pic^o(M_{Γ_0(p)∩Γ_∞(m)}) → Pic^o(M_{Γ_∞(H_p)}))

a bonne réduction en ces places. La variété abélienne

C = coker(Pic^o(M_{Γ_∞(H.(ℤ/p)^*)}) → Pic^o(M_{Γ_∞(H)}))

est isogène à celle déduite de B par passage aux invariants sous H (noter que Γ_∞(H).(Γ_0(p) ∩ Γ_∞(m)) = Γ_∞(H.(ℤ/p)^*)). La variété abélienne A est quotient de

Authority visual fallback P0114-A05.

C donc a aussi bonne réduction.

(iv) Puisque M_{Γ_∞(H)} = M_{±Γ_∞(H)}, on ne restreint pas la généralité en supposant que -1 ∈ H. En particulier, dans (iii), on peut remplacer ℚ(ζ_p)^H par son sous-corps totalement réel.

Remarque 3.8. Les variétés abéliennes 3.7 (ii) sont celles étudiées par Casselman dans [5].

4. Etude de $\mathfrak{m}_n$

4.1. Soient C une courbe elliptique généralisée sur un schéma S et n un entier.

On suppose

a) les fibres géométriques de C sont lisses ou des m-gones, avec n|m ;

b) elles ne sont jamais supersingulières de caractéristique p|n.

Les conditions a) et b) assurent que, localement pour la topologie étale, C_n est extension de ℤ/n par μ_n. Le e_n-pairing définit un isomorphisme de faisceaux fppf

e_n : ∧^2 C_n ≃ μ_n.

Soit R un schéma en groupes sur S, localement isomorphe à une extension de ℤ/n par μ_n, et muni d'un isomorphisme de faisceaux fppf i : ∧^2 R ≃ μ_n.

Un isomorphisme α : C_n ≃ R sera dit de déterminant un si le diagramme

∧^2 C_n –∧^2 α–> ∧^2 R | e_n | i v v μ_n = μ_n

est commutatif.

4.2. Nous utiliserons 4.1 dans les 3 cas suivants :

Authority visual fallback P0115-A05.

Authority page 116 ; collected-paper page 609 ; original folio 258.

a) S est un schéma sur $\mathbb{Z}[\zeta_n, 1/n]$, et $R = (\mathbb{Z}/n)^2$.

Dans ce cas, on dispose sur S de l'endomorphisme $\zeta : \mathbb{Z}/n \simeq \mu_n$ et i est le composé

$\wedge^2(\mathbb{Z}/n)^2 = \mathbb{Z}/n \simeq \mu_n$.

b) $R = \mu_n \times \mathbb{Z}/n$ et i l'isomorphisme évident : si $a \in \mu_n$ et $b \in \mathbb{Z}/n$, $i(a \wedge b) = b.a$ (= b^a si la loi de groupe de μ_n est notée multiplicativement).

c) S est un schéma sur $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ et $A \subset (\mathbb{Z}/n)^2$ un sous-groupe cyclique d'ordre n.

Dans ce cas, on note R(A) le S-schéma en groupe obtenu par "push-out" :

$A \to (\mathbb{Z}/n)^2 \to (\mathbb{Z}/n)^2/A \downarrow\zeta \downarrow \| A \otimes \mu_n \to R(A) \to (\mathbb{Z}/n)^2/A$.

On a encore

$\wedge^2 R(A) \simeq (A \otimes \mu_n) \otimes (\mathbb{Z}/n)^2/A \simeq (A \otimes (\mathbb{Z}/n)^2/A) \otimes \mu_n \simeq \wedge^2(\mathbb{Z}/n)^2 \otimes \mu_n \simeq \mathbb{Z}/n \otimes \mu_n \simeq \mu_n$.

4.3. En IV 3.10.1, nous avons défini

$d : \mathfrak{m}_n \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\zeta_n])$.

En tant que $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\zeta_n])$ - champ algébrique, $\mathfrak{m}_n[1/n]$ classifie les courbes elliptiques généralisées C sur les $\mathbb{Z}[\zeta_n][1/n]$ schémas S, de fibres géométriques lisses ou des n-gones, munies d'un isomorphisme $\alpha : C_n \simeq (\mathbb{Z}/n)^2$ de déterminant un.

4.4. Soit $\mathfrak{a}$ le champ qui classifie les courbes elliptiques généralisées C sur les schémas S, de fibres géométriques lisses ou des n-gones, munies d'un isomorphisme $\alpha : C_n \simeq \mu_n \times \mathbb{Z}/n$ de déterminant un (4.2 b)). Au-dessus de $\mathbb{Z}[\zeta_n, 1/n]$, l'isomorphisme $\zeta : \mathbb{Z}/n \simeq \mu_n$ identifie $(\mathbb{Z}/n)^2$ et $(\mu_n \times \mathbb{Z}/n)$, d'où un isomorphisme

(4.4.1) $\zeta : \mathfrak{m}_n[1/n] \simeq \mathfrak{a}[1/n] \otimes \mathbb{Z}[\zeta_n]$.



Authority visual fallback P0116-A05.

Nous noterons $\mathcal{G}'$ l'ouvert de $\mathcal{G}$ classifiant les (C,α) vérifiant

(4.4.2) Pour tout point géométrique \overline{s} de S, si C_{\overline{s}} est un n-gone,

α((C^o_{\overline{s}})_n) = μ_n.

Si (C,α) est un objet de $\mathcal{G}'$ sur S, (C,α^{-1}(e × $\mathbb{Z}$/n)) est un objet du champ $\mathcal{B}$_n (1.3), d'où un morphisme

(4.4.3) γ : $\mathcal{G}'$ → $\mathcal{B}$_n.

Proposition 4.5. Le morphisme 4.3.3 est étale et séparé. En particulier, $\mathcal{G}'$ est un champ algébrique lisse sur Spec($\mathbb{Z}$).

Soit (C,β) un objet de $\mathcal{B}$_n sur S. Alors, $\mathcal{G}'$ ×_{$\mathcal{B}$_n} S représente le foncteur F : (Sch/S) → (Ens) suivant : F(T) est l'ensemble des couples (A,u) formés d'un sous-schéma en groupes de C_n, localement isomorphe à μ_n et tel que

A × B ⥲ C_n, et de u : B ⥲ $\mathbb{Z}$/n.

Pour (A,u) un tel couple, il existe en effet un seul isomorphisme

v : A ⥲ μ_n, tel que

α : C_n ⥲ A × B –(v,u)⥲ μ_n × $\mathbb{Z}$/n$\mathbb{Z}$

soit de déterminant un. On laisse au lecteur le soin de vérifier que F est représentable par un S-schéma étale et séparé.

4.6. Soit p un nombre premier divisant n, et posons n = p^k·m avec (m,p) = 1. Nous nous proposons d'étudier $\mathfrak{m}$_n[1/m], spécialement en caractéristique p. En recollant les résultats obtenus pour les divers p, on obtient des résultats sur $\mathfrak{m}$_n lui-même.

Nous mettrons en évidence le "p-aspect" d'une structure de niveau n comme suit.

a) Les morphismes de réduction définissent

(4.6.1) $\mathbb{Z}$/n ⥲ $\mathbb{Z}$/p^k × $\mathbb{Z}$/m.



Authority visual fallback P0117-A05.

b) Les applications x ↦ x^m et x ↦ x^{p^k} définissent

(4.6.2) μ_n ⟶̃ μ_{p^k} × μ_m.

c) compatibilité : si d | n, on identifie $\mathbb{Z}$[ζ_d] au sous-anneau $\mathbb{Z}$[ζ_n^{n/d}] de $\mathbb{Z}$[ζ_n]. Avec cette convention, un $\mathbb{Z}$[ζ_n]-schéma S est aussi un $\mathbb{Z}$[ζ_{p^k}]- et un $\mathbb{Z}$[ζ_m]-schéma ; les morphismes ζ : $\mathbb{Z}$/p^k → μ_{p^k} et ζ : $\mathbb{Z}$/m → μ_m sont les composantes, via (4.6.1) (4.6.2) de ζ : $\mathbb{Z}$/n → μ_n.

d) Les applications x ↦ x^m et x ↦ x^{p^k} définissent

(4.6.3) C_n ⟶̃ C_{p^k} × C_m.

Un morphisme α : C_n ⟶̃ ($\mathbb{Z}$/n)^2 est de déterminant un si et seulement si ses composantes, via (4.6.2) (4.6.4) : α′ : C_{p^k} ⟶̃ ($\mathbb{Z}$/p^k)^2 et α″ : C_m ⟶̃ ($\mathbb{Z}$/m)^2 le sont.

e) Nous identifierons $\mathfrak{m}$_n[1/n] au champ qui classifie les courbes C sur un $\mathbb{Z}$[ζ_n,1/n]-schéma S comme en 4.3, munies de α′ : C_{p^k} ⟶̃ ($\mathbb{Z}$/p^k)^2 et α″ : C_m ⟶̃ ($\mathbb{Z}$/m)^2 de déterminant un.

f) De même, $\mathcal{G}$ classifie les (C,α′,α″) : α′ : C_{p^k} ⟶̃ μ_{p^k} × $\mathbb{Z}$/p^k, α″ : C_m ⟶̃ μ_m × $\mathbb{Z}$/m, det(α′) = det(α″) = 1.

Lemme 4.7. $\mathcal{G}$ est un champ algébrique lisse sur $\mathbb{Z}$.

Il suffit de montrer que $\mathcal{G}$ ⊗_$\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$[ζ_m,1/m] est lisse sur $\mathbb{Z}$[ζ_m,1/m]. Ce champ est réunion d'ouverts isomorphes à $\mathcal{G}'$ ⊗_$\mathbb{Z}$ $\mathbb{Z}$[ζ_m,1/m], et on applique 4.5.

4.8. Soit P l'ensemble des sous-groupes cycliques d'ordre p^k de ($\mathbb{Z}$/p^k)^2 : P ≃ $\mathbb{P}$^1($\mathbb{Z}$/p^k). Pour A ∈ P, soit R(A) sur $\mathbb{Z}$[ζ_{p^k}] comme en 4.2 c).

Nous noterons $\mathcal{C}$_A le champ sur $\mathbb{Z}$[ζ_n,1/m] classifiant les courbes elliptiques généralisées C sur les $\mathbb{Z}$[ζ_n,1/m]-schémas S, de fibres géométriques lisses ou des n-gones, munies de

a) α″ : C_m ⟶̃ ($\mathbb{Z}$/m)^2, de déterminant un



Authority visual fallback P0118-A05.

b) α′ : C_{p^k} ⥲ R(A), de déterminant un.

Puisque R(A) est isomorphe à μ_{p^k} × ℤ/p^k, le champ C_A est isomorphe à C ⊗_ℤ ℤ[ζ_n, 1/m], donc est un champ algébrique lisse sur ℤ[ζ_n, 1/m].

Pour p inversible, ζ : (ℤ/p^k)^2 ⥲ R(A) est un isomorphisme, d'où un isomorphisme de champs sur ℤ[ζ_n, 1/n]

(4.8.1) $\mathfrak{m}$_n[1/n] ≃ C_A[1/p].

4.9. Soit $\mathfrak{m}$_1^h le complément dans $\mathfrak{m}$_1 de l'ensemble fini des points correspondant aux courbes elliptiques supersingulières de caractéristique divisant n. On définit

c : C_A → $\mathfrak{m}$_1^h

en associant à (C,α′,α″) sur S la courbe c(C) (IV 1.4).

Lemme 4.10. Le morphisme c : C_A → $\mathfrak{m}$_1^h est représentable et quasi-fini.

La vérification est laissée au lecteur.

4.11. Soit C[1/m] le champ obtenu en recollant les champs C_A (A ∈ P) selon leur ouvert commun C_A[1/p] (4.8.1). Soit C obtenu en recollant les C[1/m] selon leur ouvert commun C[1/m,1/p] ≃ $\mathfrak{m}$_n[1/n]. Le champ C est lisse sur ℤ[ζ_n], on a

(4.11.1) C[1/n] ≃ $\mathfrak{m}$_n[1/n]

et les morphismes 4.9 se recollent en un morphisme

(4.11.2) c : C → $\mathfrak{m}$_1^h.

Lemme 4.11.3. Le morphisme représentable (4.11.2) est fini et séparé.

Preuve : Il suffit de montrer que, pour chaque p|n, c induit un morphisme propre (en particulier séparé)

c : C[1/m] → $\mathfrak{m}$_1^h[1/m].

Utilisons le critère valuatif ([8]). Soient donc (S,η,s) un trait complet à



Authority visual fallback P0119-A05.

corps résiduel algébriquement clos, u : S → 𝔪_1^h[1/m] et v_η : η → C tel que

c v_η = u_η.

Il faut montrer que, après passage au normalisé de S dans une extension finie de k(η), u admet un relèvement v : S → C qui prolonge v_η, et que v est unique à isomorphisme unique près. Puisque 𝔪_n^o[1/n] est dense dans C, on peut supposer que v_η envoie η dans 𝔪_n^o[1/n]. Puisque C[1/p] ≃ 𝔪_n[1/n] est fini sur 𝔪_1[1/n] (cf. IV.2.5.), on peut se limiter au cas où s est de caractéristique p.

Soit (C_η,α′_η,α″_η) la courbe elliptique avec structure de niveau n sur η qui définit v_η. Une extension finie préliminaire de k(η) nous permet de supposer que C_η se prolonge en une courbe elliptique généralisée C sur S, de fibre spéciale lisse ou un n-gone. Cette courbe est unique (IV 1.6). C_m est fini étale sur S, de sorte que α″_η se prolonge, de façon unique, en

α″ : C_m ⟶̃ (ℤ/m)^2.

Par hypothèse, la fibre spéciale C_s n’est pas supersingulière. Le sous-groupe multiplicatif (C_s)^o_{p^k} de (C_s)_{p^k} se relève de façon unique en un sous-groupe de C_{p^k}, qui devient une extension

0 → A → C_{p^k} → B → 0

avec A ≃ μ_n et B ≃ ℤ/n. Soit A = α′(A_η) ∈ P. L’isomorphisme α′_η se prolonge en

α′ : C_{p^k} ⟶̃ R(A),

v_η se prolonge en v : S → C_A, défini par (C,α′,α″), et ne se prolonge en aucun v : S → C_{A′}, pour A ≠ A′. Ceci prouve 4.11.3.

Notons 𝔪_n^h le normalisé de 𝔪_1^h dans 𝔪_n[1/n], i.e. le complément dans 𝔪_n des points dont l’image dans 𝔪_1 est supersingulière de caractéristique divisant n. De la lissité des C_A (4.8) et de 4.11 on tire les résultats suivants.

Théorème 4.12. On a C ≃ 𝔪_n^h.

Corollaire 4.13. 𝔪_n^h est lisse sur ℤ[ζ_n].

4.14. Etudions C en caractéristique p. Si C/S est une courbe elliptique sur



Authority visual fallback P0120-A05.

S, avec p nilpotent sur S, de fibres géométriques lisses non supersingulières ou des n-gones, alors (C_{p^k})^o est localement isomorphe à μ_{p^k} (pour la topologie étale), et se donner un isomorphisme α′ : C_{p^k} ⥲ μ_{p^k} × ℤ/p^k revient à se donner un isomorphisme d’extensions

(4.14.1) 0 → (C_{p^k})^o → C_{p^k} → C_{p^k}/(C_{p^k})^o → 0 ↓ α′_1 ↓ α′ ↓ α′_2 0 → μ_{p^k} → μ_{p^k} × ℤ/p^k → ℤ/p^k → 0.

Ceci revient à se donner

a) une trivialisation τ de l’extension en première ligne de 4.14.1.

b) des isomorphismes α′_1 : C^o_{p^k} ⥲ μ_{p^k} et α′_2 : C_{p^k}/C^o_{p^k} ⥲ ℤ/p^k.

Se donner τ revient à se donner le sous-groupe étale α′^{-1}(ℤ/p^k) de C_{p^k}, de sorte que (C,α′) ↦ (C,τ) correspond au morphisme $\mathcal{G}$ → $\mathcal{B}$_{p^k} déjà considéré. Par ailleurs, si det(α′) = 1, α′_2 est uniquement déterminé par α′_1.

4.15. Soit $\mathcal{J}$_k^h ⊗ ℤ/p^N le champ algébrique sur ℤ/p^N classifiant les courbes elliptiques généralisées à fibres irréductibles C/S, avec p^N = 0 sur S, munies d’un isomorphisme α′_1 : C^o_{p^k} ⥲ μ_{p^k}. La discussion 4.14 montre que le champ $\mathcal{G}$ = $\mathcal{G}$(p^k) est en réduction mod p^N, un produit fibré

(4.15.1) $\mathcal{G}$(p^k) ⊗ ℤ/p^N ⟶ (C,α′) ↦ (C,α′^{-1}(ℤ/p^k)) ⟶ $\mathcal{B}$_{p^k} ⊗ ℤ/p^N
(C,B) ↓ ↓ (c(C),α′_1) (c(C)) $\mathcal{J}$_k^h ⊗ ℤ/p^N ⟶ oubli ⟶ $\mathfrak{m}$_1^h ⊗ ℤ/p^N.

La vérification du lemme suivant est laissée au lecteur.

Lemme 4.16. (i) Soit C la courbe universelle sur $\mathfrak{m}$_1^h, de sorte que

$\mathcal{J}$_k^h ⊗ ℤ/p^N = Isom_{$\mathfrak{m}$_1^h ⊗ ℤ/p^N}(μ_{p^k}, C^o_{p^k}).

La flèche verticale droite de (4.15.1) fait de $\mathcal{B}$_{p^k}^o ⊗ ℤ/p^N un espace principal homogène sous C^o_{p^k} ; la flèche verticale gauche



Authority visual fallback P0121-A05.

fait de $\mathcal{G}$^o ⊗ $\mathbb{Z}$/p^N un espace principal homogène sous μ_{p^k}.

(ii) En particulier, pour N = 1, ces flèches identifient $\mathcal{J}$_k^h ⊗ $\mathbb{F}$_p à ($\mathcal{G}$ ⊗ $\mathbb{F}$_p)^{(p^k)} et $\mathfrak{m}$_1^h ⊗ $\mathbb{F}$_p à ($\mathcal{B}$_n ⊗ $\mathbb{F}$_p)^{(p^k)} (la flèche devenant un morphisme de Frobenius itéré) (un morphisme bijectif radiciel entre schémas lisses de dimension un est toujours un Frobenius itéré).

(iii) Les flèches horizontales de (4.15.1) sont étales, et font de ($\mathcal{J}$_n^h ⊗ $\mathbb{Z}$/p^N) (resp. $\mathcal{G}$ ⊗ $\mathbb{Z}$/p^N) un espace principal homogène de groupe ($\mathbb{Z}$/p^k)^* sur ($\mathfrak{m}$_1^h ⊗ $\mathbb{Z}$/p^N) (resp. $\mathcal{B}$_n ⊗ $\mathbb{Z}$/p^N), le groupe ($\mathbb{Z}$/p^k)^* agissant par (i,(C,α′_1)) ↦ (C,iα′_1).

Soit $\mathcal{J}$_k ⊗ $\mathbb{Z}$/p le normalisé de $\mathfrak{m}$_1 ⊗ $\mathbb{Z}$/p dans $\mathcal{J}$_k^h. Nous ferons usage du théorème suivant de Igusa [35] (voir Katz [13] 4.3 (bis)).

Théorème 4.17 (Igusa). Le revêtement $\mathcal{J}$_k ⊗ $\mathbb{Z}$/p → $\mathfrak{m}$_1 ⊗ $\mathbb{Z}$/p est complètement ramifié en les points supersinguliers.

4.18. Pour n général, $\mathcal{G}$^o = $\mathcal{G}$^o(n) est un produit fibré

(4.18.1) $\mathcal{G}$^o = $\mathcal{G}$^o(m) ×_{$\mathfrak{m}$_1} $\mathcal{G}$^o(p^k).

(Cela reste d'ailleurs vrai à l'infini). De l'irréductibilité des fibres géométriques de $\mathfrak{m}$_m[1/m]/$\mathbb{Z}$[ζ_m,1
et de 4.4.1, 4.18.1, 4.15.1, 4.16 (ii) et 4.17, on déduit que $\mathcal{G}$^o ⊗_{$\mathbb{Z}$[ζ_m]} $\mathbb{F}$_p est irréductible, et le corollaire suivant.

Théorème 4.19. Via 4.12, les composantes irréductibles de $\mathfrak{m}$_n^h ⊗_{$\mathbb{Z}$[ζ_n]} $\mathbb{F}$_p s'identifient aux C_A ⊗_{$\mathbb{Z}$[ζ_n]} $\mathbb{F}$_p, A ∈ P.

4.20. D'après 4.17 et 4.19, les composantes irréductibles de $\mathfrak{m}$_n ⊗_{$\mathbb{Z}$[ζ_n]} $\mathbb{F}$_p sont indexées par P = $\mathbb{P}$^1($\mathbb{Z}$/p^k), ne se coupent qu'en les points supersinguliers, et sont unibranches. Le théorème suivant affirme que toutes les composantes irréductibles se coupent en chaque point supersingulier.

Théorème 4.20. Le morphisme $\mathfrak{m}$_n → $\mathfrak{m}$_m est complètement ramifié en les points supersinguliers de caractéristique p.



Authority visual fallback P0122-A05.

Preuve : D’après 4.6, la validité de 4.20 ne dépend que de p^k, non de m ; on peut donc supposer m ≥ 3, pour n’avoir affaire qu’à des schémas.

Soit E_0 une courbe elliptique supersingulière sur $\bar{F}_p$, et $E/\hat{S}$ le schéma formel de modules de E_0 au-dessus de $W(\bar{F}_p)$. On a $\hat{S} \simeq W(\bar{F}_p)[[t]]$; c’est le complété de l’hensélisé strict de $\mathfrak{m}_1$ au point géométrique donné.

Soit $\hat{T}$ le normalisé de $\hat{S}$ dans le $\hat{S}[1/p]$-schéma $\mathrm{Isom}_{\hat{S}}(E_{p^k}, (\mathbb{Z}/p^k)^2)$. Puisque complétions et normalisations commutent,

$$\hat{T} = \mathfrak{m}_{p^k} \times_{\mathfrak{m}_1} \hat{S}.$$

D’après 4.17, les composantes irréductibles de $\hat{T} \otimes \bar{F}_p$ sont naturellement indexées par $P = \mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/p^k)$. Les composantes connexes de $\hat{T}$ définissent une partition $\mathcal{P}$ de P. 4.20 signifie que $\hat{T}$ est toujours connexe, i.e. $\mathcal{P}$ trivial.

Lemme 4.21. La partition $\mathcal{P}$ est indépendante de E_0.

Preuve : Soient E_0 et E'_0 deux courbes elliptiques supersingulières sur $\bar{F}_p$, $\hat{S}$ et $\hat{S}'$ leurs schémas formels de module sur $W(\bar{F}_p)$, E et E' leurs déformations universelles sur $\hat{S}$ et $\hat{S}'$ et $\hat{T}$, $\hat{T}'$ comme en 4.20.

On sait qu’il existe une isogénie $\varphi_0 : E_0 \to E'_0$ de noyau K_0 premier à p. Soit N un entier premier à p tel que $K_0 \subset E_{0N}$. Puisque E_{0N} est étale, les déformations infinitésimales de E_0 s’identifient aux déformations infinitésimales du couple $(E_0, K_0 \subset E_{0N})$, et il existe un et un seul isomorphisme $\varphi_S : \hat{S} \to \hat{S}'$ donnant lieu à un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\varphi} & E' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \hat{S} & \xrightarrow{\varphi_S} & \hat{S}' \end{array}$$

où φ prolonge φ_0. L’isogénie φ induit un isomorphisme de E_{p^k} avec E'_{p^k}, d’où un isomorphisme $\varphi_T : \hat{T} \to \hat{T}'$ au-dessus de φ_S.



Authority visual fallback P0123-A05.

Authority page 124 ; collected-paper page 617 ; original folio 266.

La bijection de l’ensemble I(T̂ ⊗ F̄_p) des composantes irréductibles de T̂ ⊗ F̄_p avec P peut se décrire ainsi : sur T̂, on dispose d’un morphisme

u : (ℤ/p^k)^2 → E_{p^k},

qui est un isomorphisme sur T̂[1/p]. L’élément de P associé à une composante de T̂ ⊗ F̄_p est le noyau de u au point générique de cette composante. Cette description montre que le diagramme

I(T̂ ⊗ F̄_p) ⟶φ_T⟶ I(T̂′ ⊗ F̄_p) ‖ ‖ P ═══════════ P

est commutatif. Le lemme en résulte.

Prouvons 4.20. Si $\mathcal{P}$ est non trivial et que X ∈ $\mathcal{P}$, la réunion des adhérences $(\mathcal{C}_A \otimes \bar{F}_p)^-$ pour A ∈ X est une composante connexe de $\mathfrak{m}_n \otimes \bar{F}_p$, qui est donc disconnexe. Ceci contredit (IV 5.5).



Authority visual fallback P0124-A05.

Authority page 125 ; collected-paper page 618 ; original folio 267.

VI. Schémas grossiers de modules.

Dans ce chapitre nous étudions les schémas grossiers de modules, en particulier la relation entre $\mathfrak{m}_H$ et M_H. Quelques résultats classiques sont démontrés par ”pure thought”. Le résultat du § 5 est précisé au chapitre suivant.

1. L’invariant modulaire.

Théorème 1.1. L’espace grossier M_1 et $\mathfrak{m}$_1 est isomorphe à $\mathbb{P}$^1_$\mathbb{Z}$.

Les caractéristiques 2 et 3 rendent la vérification directe de 1.1 quelque peu pénible. Nous allons déduire 1.1. de son corollaire

(1.1.1) M_{1$\mathbb{C}$} ≃ $\mathbb{P}$^1_$\mathbb{C}$.

a) M_1 est propre et plat sur Spec($\mathbb{Z}$), normal et donc de Cohen-Macaulay (I.7.2) et les fibres géométriques de M_1 sur Spec($\mathbb{Z}$) sont irréductibles.

On sait déjà que M_1 est propre, plat, normal, à fibres géométriques unibranches (IV. 3.10). D’après 1.1.1. (ou IV 5.4), la fibre générique géométrique de M_1 est connexe. Toutes les fibres géométriques de M_1 sont donc connexes (Zariski) et, étant unibranches, sont irréductibles.

b) Les fibres géométriques de M_1 sur Spec($\mathbb{Z}$) sont réduites.

Soit G le sous-champ ouvert de $\mathfrak{m}$_1 correspondant aux courbes généralisées n’ayant pas d’autres automorphismes que Id et x ↦ -x. C’est un ouvert car, pour C/S une courbe classifiée par $\mathfrak{m}$_1, Aut_S(C) est fini et non ramifié sur S (résulte de ce que $\mathfrak{m}$_1 est séparé).

L’application G → M_1 est étale, son image A est donc lisse sur $\mathbb{Z}$. On vérifie que G ⊃ $\mathfrak{m}$_1^∞. Les fibres de A sont donc non vides ; d’après a), elles sont denses dans les fibres de M_1. Les (M_1)_{s̄} sont donc génériquement réduits ; étant de Cohen-Macaulay, ils sont même réduits.



Authority visual fallback P0125-A05.

c) Fin de la démonstration.

Par invariance du genre arithmétique par spécialisation, et (1.1.1) on trouve que les fibres géométriques de M_1 sont intègres et de genre arithmétique 0. Elles sont donc isomorphes à la droite projective. En particulier, M_1 est propre et lisse sur $\mathbb{Z}$.

Le polygone de Néron à un côté sur Spec($\mathbb{Z}$) définit une section de M_1, d’image M_1^∞. On vérifie fibre géométrique par fibre géométrique que H^1(M_1,$\mathcal{O}$(M_1^∞)) = 0, puis que H^0(M_1,$\mathcal{O}$(M_1^∞)) est localement libre de rang 2 sur $\mathbb{Z}$, de formation compatible au passage aux fibres géométriques. Puisque $\mathbb{Z}$ est principal, H^0(M_1,$\mathcal{O}$(M_1^∞)) est libre, et admet une base {1,j}. On vérifie fibre géométrique par fibre géométrique que $\mathcal{O}$(M_1^∞) est très ample, et que j définit un isomorphisme

M_1 →̃ ℙ^1_ℤ.

Preuve de (1.1.1) Voici deux démonstration classiques de (1.1.1).

(1) On vérifie que M_1^o(ℂ) est le quotient du demi-plan de Poincaré par SL(2,ℤ) (IV 5.4). On trace un domaine fondamental, et on trouve que M_1^o(ℂ) est homéomorphe à ℝ^2. L'espace M_1(ℂ), qui s'en déduit par adjonction d'un point, est donc une sphère.

(2) Sur ℂ, le schéma de modules classifiant les courbes elliptiques généralisées intègres munies d'une forme différentielle invariante est

Spec(ℂ[g_2,g_3]) - (le point g_2 = g_3 = 0),

avec pour courbe universelle, en coordonnées non homogènes

⎧ Y^2 = 4X^3 - g_2 X - g_3 ⎩ ω = dX/Y ([33] 2.5)

M_1 est le quotient de ce schéma par 𝔾_m agissant par

λ.(g_2,g_3) = (λ^4 g_2,λ^6 g_3),

et on l'identifie facilement à ℙ^1.



Authority visual fallback P0126-A05.

L'irréductibilité des fibres de M_1 sur ℤ a le corollaire suivant.

Corollaire 1.2. Soit k un corps algébriquement clos de caractéristique p. Il n'y a qu'un nombre fini de classes d'isomorphie de courbes elliptiques supersingulières sur k.

L'ensemble des points de (M_1)_k correspondant à des courbes elliptiques généralisées E pour lesquelles le noyau de Frobenius est de type multiplicatif est ouvert et contient le point à l'infini. Son complément, qui correspond aux courbes supersingulières, est donc fini.

1.3. La fonction j introduite en 1.1 c) n'est pas uniquement déterminée ; l'arbitraire est j ↦ ± j + n (n ∈ ℤ). Un choix de j, rappelé ci-dessous, est classique.

Soit C/S une courbe elliptique généralisée à fibres irréductibles sur S. On explique dans le formulaire de Tate [33] comment associer à C/S une section j de ℙ^1 sur S, avec j = ∞ là où C est singulière. Par la propriété universelle de M_1, ce morphisme j : 𝔪_1 → ℙ^1 se factorise par j : M_1 → ℙ^1. On vérifie facilement que j : M_1(ℂ) → ℙ^1(ℂ) est bijectif [33]. Le morphisme j est dominant, plat (I 7.1.), de degré un, donc un isomorphisme.

En particulier, sur tout corps algébriquement clos k, j(C_1) = j(C_2) si et seulement si C_1 est isomorphe à C_2. Ce fait est prouvé par force brutale dans [33].

On appelle j l'invariant modulaire.

1.4. Soit C une courbe elliptique généralisée irréductible sur k algébriquement clos On prouve dans [33] que Aut(C) = {±1} si et seulement si j(C) ≠ 0,2^6.3^3. Au dessus de l'ouvert de $\mathfrak{m}$_1 où j ≠ 0, 2^6.3^3, Aut(C) (C courbe universelle) est donc localement constant. Dès lors :

Lemme 1.5. $\mathfrak{m}$_1 → M_1 est étale en dehors des sections j = 0,2^6 3^3 de M_1.

Par contre, $\mathfrak{m}$_1 est ramifié sur M_1 le long de ces sections. A cause de cette ramification, il ne peut pas y avoir de section M_1 → $\mathfrak{m}$_1, i.e. il n'y a pas de



Authority visual fallback P0127-A05.

Authority page 128 ; collected-paper page 621 ; original folio 270.

courbe elliptique généralisée sur ℙ^1 d'invariant modulaire j. Toutefois, Tate a montré que sur ℙ^1_ℤ, moins les deux sections 0 et 2^6 3^3, i.e. sur

S = Spec ℤ[1/j] (2^6 3^3 1/j - 1)^{-1},

il existe deux courbes d'invariant j. Posons k = j-2^6 3^3, de sorte que 1/j et 1/k sont des sections de $\mathcal{O}$_S, et j/k une section inversible.

Proposition 1.6 (Tate). Les courbes

(1.6.1) y^2 + xy = x^3 - (2^2 3^2/k) x - 1/k (1.6.2) y^2 + xy = x^3 + (2^2 3^2/j) x - (j-2^7 3^2)/j^2

ont pour invariant modulaire j.

Pour (1.6.1), c_4 = j/k, c_6 = - j/k et Δ = j^2/k^3. Pour (1.6.2), c_4 = k/j, c_6 = - k^2/j^2 et Δ = k^3/j^4.

Notons C_o la courbe (1.6.1). Si C est une courbe sur un ouvert U de S, d'invariant j, Isom(C,C_o) est un ℤ/2-torseur τ(C), et C se déduit de C_o par "torsion" par τ(C). Les courbes C sont donc classifiées par H^1(U,ℤ/2) (H^1 étale). Par exemple, (1.6.2) correspond au revêtement double de S normalisé de S[(j/k)^{1/2}]. En calculant ce H^1, Tate a montré que (1.6.1) et (1.6.2) sont les seules courbes elliptiques d'invariant j sur ℙ^1_ℤ moins les 3 sections 0,2^6.3^3 et ∞.

Proposition 1.7. Soient k un corps, et j ∈ k. Il existe une courbe elliptique sur k d'inva-

riant modulaire j.

Le cas où j ≠ 0,2^6 3^3 résulte de 1.6. Pour k de caractéristique p, et j = 0 ou 2^6 3^3, on peut prendre l'équation non homogène suivante.

p ≠ 3, j = 0 y^2 + y = x^3 - 1 p ≠ 2, j = 2^6.3^3 y^2 = x^3 - x.

Authority visual fallback P0128-A05.

Authority page 129 ; collected-paper page 622 ; original folio 271.

1.8. Soit C la courbe elliptique universelle sur $\mathfrak{m}_1^o$ et γ le morphisme

Aut(C) → Aut(Lie(C)) ≃ $\mathbb{G}_m$. Nous extrayons de [33] le résultat suivant sur Aut(C).

Lemme 1.9. Au-dessus du sous-champ de $\mathfrak{m}_1^o[1/6]$ d'équation $c_4 = 0$ (resp. $c_6 = 0$) (i.e. $\sqrt[3]{j} = 0$, resp. $\sqrt[2]{(j-1728)} = 0$), γ est un isomorphisme $\mathrm{Aut}(C) \xrightarrow{\sim} \mu_6$ (resp. $\mathrm{Aut}(C) \xrightarrow{\sim} \mu_4$).

2. Automorphismes des courbes elliptiques. Critère pour que $\mathfrak{m}_H^o = M_H^o$.

2.1. Pour qu'un champ algébrique soit un espace algébrique, il faut et il suffit que ses points géométriques n'aient pas d'automorphisme non trivial. Ainsi, si $H \subset GL(2, \mathbb{Z}/n)$, pour que $\mathfrak{m}_H^o[1/n] = M_H^o[1/n]$ (resp. $\mathfrak{m}_H[1/n] = M_H[1/n]$), il faut et il suffit qu'une courbe elliptique (resp. généralisée) munie d'une structure de niveau H, sur k algébriquement clos de caractéristique p ∤ n, n'ait pas d'automorphisme non trivial.

Par exemple, $\mathfrak{m}_n[1/n] = M_n[1/n]$ pour n ≥ 3 (IV 2.7).

Dans [32], les automorphismes des courbes elliptiques sont décrits explicitement, de sorte que le critère précédent est effectif. Les calculs de [33] montrent que les caractéristiques 2 et 3 sont exceptionnelles, les autres étant "pareilles" à la caractéristique 0. Nous nous proposons de vérifier ce point a priori. Pour ne pas paraître trop ridicules, nous traiterons aussi le cas des variété abéliennes.

Lemme 2.2. Soient (A, θ) une variété abélienne polarisée sur un corps algébriquement clos k de caractéristique p > 0 et φ un automorphisme de (A, θ). On sait que φ est d'ordre fini. Si le degré de θ et l'ordre de φ sont premiers à p, le triple (A, θ, φ) se relève sur l'anneau des vecteurs de Witt W(k).

On sait qu'il n'y a pas d'obstruction à déformer (A, θ) : le schéma formel des modules de (A, θ) sur W(k) est un schéma

M = Spec(W/k)[[$t_1 \ldots t_r$]] ($k = \frac{1}{2} \dim(A)(\dim(A)+1)$).



Authority visual fallback P0129-A05.

Interprétons φ comme l’action sur (A, θ) d’un groupe cyclique G, d’ordre premier à p. Par transport de structure, G agit sur M : l’automorphisme φ de (A, θ) se prolonge en un automorphisme de M et de la déformation universelle (A_M, θ_M) de (A, θ) sur M. On vérifie que le schéma formel des modules de (A, θ, φ) est le sous-schéma M^G de M fixe par G. Puisque G est d’ordre premier à p, ce sous-schéma est lisse sur W(k), donc admet des sections sur W(k), et ceci prouve 2.2.

Proposition 2.3. Soit A une variété abélienne de dimension g sur un corps algébriquement clos. Soit φ un automorphisme d’ordre un nombre premier q et notons

A^φ =_dfn Ker(φ - id_A).

Il existe un entier k, tel que

2.g = dim(A^φ) + k.(q-1).

Preuve : Passant de A à A/A^φ on est réduit au cas où A^φ est fini.

Le polynôme caractéristique de φ agissant sur A est à coefficients entiers, n’a pas 1 pour racine et a pour seules racines des q-ièmes racines d’unité. Il est donc une puissance du polynôme cyclotomique qui est de degré q-1. La comparaison des degrés donne le lemme.

Corollaire 2.4. Soit A une variété abélienne de dimension g sur un corps algébriquement clos. Soit φ un automorphisme d’ordre fini de A. Tous les facteurs premiers de l’ordre de φ sont plus petits que 2g + 1.

Preuve : Cela suit de 2.4.

Corollaire 2.5. Soit (A, θ) une variété abélienne polarisée de dimension g sur un corps algébriquement clos k de caractéristique p, telle que le degré de la polarisation soit premier à p. On suppose que p > 2g + 1. Si φ est un automorphisme de (A, θ), (A, θ, φ) se relève en caractéristique 0 (sur W(k)).

Preuve : Résulte de 2.2 et 2.4.

Authority visual fallback P0130-A05.

Authority page 131 ; collected-paper page 624 ; original folio 273.

2.6. Une courbe elliptique admet une polarisation principale canonique. D’après 2.6, si φ est un automorphisme d’une courbe elliptique E sur un corps algébriquement clos k de caractéristique p > 3, (E,φ) se relève en caractéristique 0 (sur W(k)).

Théorème 2.7. Pour que 𝔪_H^o[1/6n] soit un espace algébrique, il faut et il suffit que l’image réciproque Γ de H dans SL(2,ℤ) n’ait pas d’élément d’ordre fini ≠ 1.

Soit (E,ᾱ) une courbe elliptique munie d’une structure de niveau H sur k algébriquement clos de caractéristique p = 0 ou p > 3, p ∤ n. Il faut montrer que tout automorphisme φ de (E,ᾱ) est trivial. Puisque d’après 2.6 (E,φ), donc (E,ᾱ,φ), se relève en caractéristique 0, il suffit de traiter le cas où p = 0.

ᾱ définit une inclusion (IV.3.20) ℚ[ζ_n]^{det H} ⊂ k. On se ramène à supposer k de degré de transcendance absolu fini, auquel cas il existe k ↪ ℂ induisant l’inclusion identique de ℚ[ζ_n] dans ℂ. Ceci nous ramène au cas où k = ℂ et où ᾱ est défini par α : E_n ⥲ (ℤ/n)^2 de déterminant un.

Si β : ℤ^2 → H_1(E(ℂ),ℤ) relève l’inverse de α (via IV 5.2.1), on vérifie que Aut(E,ᾱ) est le stabilisateur de z(β) (IV 5.1) dans Γ. Si Aut(E,ᾱ) ≠ {e}, Γ a donc des éléments d’ordre fini.

Réciproquement, tout élément d’ordre fini φ de Γ a un point fixe dans X, auquel correspond (E,ᾱ,φ) sur ℂ.

3. Points rationnels des schémas grossiers.

3.1. Soit H ⊂ GL(2, ℤ/n). Une courbe elliptique E munie d’une structure de niveau H α, sur un corps k, définit un point de M_H^o(k). Réciproquement, si x ∈ M_H^o[1/n](k), on sait seulement que sur la clôture séparable k̄ de k il existe (E,α) définissant x. La classe d’isomorphie de (E,α) est invariante par Gal(k̄/k).



Authority visual fallback P0131-A05.

Si (E,α) provient de (E_0,α_0) sur k, l'ensemble des k-classes d'isomorphie de courbes (E_1,α_1) définissant x est canoniquement H^1(Gal(k̄/k),Aut(E_0,α_0)(k̄)). L'obstruction à l'existence d'un (E_0,α_0) est dans un H^2 (au sens de Giraud). Dans le cas particulier où Aut(E,α) est commutatif, Gal(k̄/k) agit sur Aut(E,α) et l'obstruction est dans H^2(Gal(k̄/k),Aut(E,α)).

Proposition 3.2. Soient k un corps de caractéristique p et H ⊂ GL(2, ℤ/n). On suppose que p ∤ n. Tout point x ∈ M_H^o(k) est défini par une courbe elliptique E sur k, munie d'une structure de niveau H.

Preuve (d'après J.P. Serre et J.S. Milne). Soient k̄ une clôture séparable de k et (E,α) sur k̄ qui définisse l'image de x dans M_H^o(k̄). Si H = GL(2, ℤ/n) (ce qui revient à supposer que n = 1), 3.2 se réduit à 1.7. Dans le langage 3.1, une certaine obstruction ε(E) est donc nulle. Si Aut(E,α) est trivial, 3.2 est clair. Si Aut(E) est réduit à ± 1 et que Aut(E,α) est non trivial, on a Aut(E,α) ⟶̃ Aut(E) ; les obstructions ε(E,α) et ε(E) à définir (E,α) ou E sur k sont donc égales, et nulles. Pour achever la démonstration, il nous suffira de traiter les deux cas suivants.

Cas 1 p ≠ 2,3. D'après 1.9, on a alors Aut(E) = μ_2, μ_4 ou μ_6. Le groupe Aut(E,α) des automorphismes de (E,α) est un sous-groupe de Aut(E). La proposition 3.2 affirme que la classe d'obstruction ε(E,α) ∈ H^2(Gal(k̄/k), Aut(E,α)) est nulle. On sait par 1.7 que son image ε(E) dans H^2(Gal(k̄/k), Aut(E)) est nulle, et on applique le lemme suivant.

Lemme 3.3. Soit n premier à p.

(i) les sous-groupes de μ_n sont les μ_m, m|n.

(ii) l'application H^2(Gal(k̄/k), μ_m) → Gal(k̄/k, μ_n) est injective.

Preuve : Nous laissons la preuve de (i) au lecteur. Soit la suite exacte longue de cohomologie associée à la suite exacte courte

0 → μ_m → μ_n ⟶(x ↦ x^m)→ μ_{n/m} → 0 : H^1(μ_n) ⟶①→ H^1(μ_{n/m}) ⟶j→ H^2(μ_m) ⟶②→ H^2(μ_n).

Pour prouver ② injectif, il suffit de prouver ① surjectif. D'après le théorème 90 de Hilbert H^1(μ_n) = k^*/k^{*n} ; ① est le passage au quotient

k^*/k^{*m/n} → k^*/k^{*m/n},

et 3.3 en résulte.



Authority visual fallback P0132-A05.

Authority page 133 ; collected-paper page 626 ; original folio 275.

Cas 2 p ≠ 0, Aut(E) n'est pas réduit à ± 1.

Dans ce cas, x provient par extension des scalaires d'un point de M_H^o à valeurs dans un corps fini (on a j = 0 ou 2^6.3^3 et le corps de définition de x est algébrique sur celui engendré par j(x)). On peut donc supposer k fini. Puisque Gal($\bar{k}$/k) = $\hat{\mathbb{Z}}$ et que Aut(E,α) est fini, le H^2 de Giraud où vit l'obstruction est nul, et 3.2 en résulte. Autrement dit : soit x ∈ M_H^o($\mathbb{F}$_q) ; il existe une extension finie $\mathbb{F}$_{q^n} de $\mathbb{F}$_q et (E,α) sur $\mathbb{F}$_{q^n} qui définisse x. La courbe (E,α) est géométriquement isomorphe à ses conjuguées sous Gal($\mathbb{F}$_{q^n}/$\mathbb{F}$_q). Quitte à remplacer $\mathbb{F}$_{q^n} par une extension, on peut donc supposer qu'il existe un isomorphisme

φ′ : (E,α)^(q) ⟶̃ (E,α).

Cet isomorphisme définit une donnée de descente de $\mathbb{F}$_{q^n} à $\mathbb{F}$_q si et seulement si la puissance n^ième de φ : E —Fr→ E^(q) —φ′→ E est l'endomorphisme de Frobenius F de E/$\mathbb{F}$_{q^n}. En général, on a φ^n = Fβ, avec β d'ordre fini m. On a φ^{nm} = F^m, et après extension des scalaires à $\mathbb{F}$_{q^{nm}}, φ′ définit une donnée de descente de $\mathbb{F}$_{q^{nm}} à $\mathbb{F}$_q pour (E,α). La courbe descendue résoud le problème posé.

4. Remarques numériques

Nous nous proposons de traduire dans le langage des champs algébriques les formules classiques donnant le genre des courbes modulaires. Pour ce faire, il nous faut au préalable définir la caractéristique d'Euler-Poincaré χ($\mathcal{C}$) d'un champ algébrique de présentation finie sur $\mathbb{C}$. Cette notion est liée à celle de caractéristique d'Euler-Poincaré virtuelle d'un groupe discret introduite par Wall.

4.1. a) Soit $\mathcal{Z}$_i) une partition finie de $\mathcal{C}$ en sous-champs localement fermés et séparés telle que, au-dessus de $\mathcal{Z}$_i le schéma en groupes des automorphismes des objets classifiés par $\mathcal{C}$ soit localement constant de rang u_i. En d'autres termes, pour tout point géométrique x → $\mathcal{Z}$_i, on veut que |Aut(x)| = u_i. Une telle décomposition existe.

b) Soient F_i le schéma grossier de modules de $\mathcal{Z}$_i et χ(F_i) la caractéristique d'Euler-Poincaré de l'espace topologique F_i($\mathbb{C}$). On pose

χ($\mathcal{C}$) =(dfn) Σ (1/u_i) χ(F_i($\mathbb{C}$)).

On vérifie que cette définition est indépendante de la décomposition ($\mathcal{Z}$_i). Elle coïncide avec la définition usuelle quand $\mathcal{C}$ "est" un schéma.



Authority visual fallback P0133-A05.

Authority page 134 ; collected-paper page 627 ; original folio 276.

La caractéristique d’Euler-Poincaré jouit des propriétés suivantes :

α) additivité : si $\mathcal{Z}$ est un fermé de $\mathcal{C}$, d’ouvert complémentaire $\mathcal{U}$,

χ($\mathcal{C}$) = χ($\mathcal{U}$) + χ($\mathcal{Z}$) ;

si $\mathcal{U}$ et $\mathcal{V}$ sont deux ouverts,

χ($\mathcal{U}$ ∪ $\mathcal{V}$) + χ($\mathcal{U}$ ∩ $\mathcal{V}$) = χ($\mathcal{U}$) + χ($\mathcal{V}$).

β) multiplicativité : si f : $\mathcal{C}$ → $\mathcal{D}$ est un morphisme, et que les fibres géométriques $\mathcal{C}$_s de f ont une caractéristique d’Euler-Poincaré constante, on a

χ($\mathcal{C}$) = χ($\mathcal{D}$).χ($\mathcal{C}$_s).

γ) caractère algébrique : la définition donnée s’étend aisément et permet de définir χ($\mathcal{C}$) pour $\mathcal{C}$ un champ algébrique de présentation finie sur un corps algébriquement clos k de caractéristique zéro.

δ) Soit f : $\mathcal{C}$ → $\mathcal{D}$ un morphisme fini et plat (i.e. plat, propre, à fibres finies), et s un point géométrique de $\mathcal{D}$. Pour x un point géométrique de $\mathcal{C}$_s, soit Ã_x l’anneau local de $\mathcal{C}$_s en x. C’est un anneau artinien. On pose

(4.1.1) deg_s(f) = Σ_x (1/|Aut(x)|) dim_{k(s)}(A_x).

Ce nombre est localement constant en s. S’il est constant, on le note deg(f). Si f est fini étale, on a χ($\mathcal{C}$_s) = deg_s(f) et β) fournit

(4.1.2) χ($\mathcal{C}$) = deg(f) χ($\mathcal{D}$).

En termes plus concrets, un point géométrique fermé s de $\mathcal{D}$ n’est autre qu’un objet de $\mathcal{D}$ sur $\mathbb{C}$, et un point géométrique de $\mathcal{C}$_s est un objet x de $\mathcal{C}$ muni d’un isomorphisme α : f(x) ↔ s. On a

(4.1.3) χ($\mathcal{C}$_s) = Σ 1/Aut(x,α).

4.2. Appliquons la définition 4.1 à $\mathfrak{m}_1^o \otimes \mathbb{C}$.

Nous séparons les fermés ”c_4 = 0” (6 automorphismes), ”c_6 = 0” (4 auto-

Authority visual fallback P0134-A05.

Authority page 135 ; collected-paper page 628 ; original folio 277.

morphismes), et l’ouvert complémentaire (2 automorphismes) de schéma grossier la droite affine moins les points j = 0, j = 1728. On trouve

(4.2.1) χ(𝔪_1^o ⊗ ℂ) = 1/6 + 1/4 + -1/2 = -1/12,

plus sympathique sous la forme

(4.2.2) χ(𝔪_1^o ⊗ ℂ) = ζ(-1).

Pour H ⊂ GL(2, ℤ/n), on déduit de 4.1.5 que

(4.2.3) χ(𝔪_H^o ⊗ ℂ) = [GL(2, ℤ/n) : H] . -1/12.

Pour passer de là à la formule classique donnant χ(M_H ⊗ ℂ), il faut tenir compte des pointes et des automorphismes. Traitons le cas de M_n ⊗ ℂ (n ≥ 3). Soit ±U le groupe des matrices ±(1 u ; 0 1) (u ∈ ℤ/nℤ). Il y a [GL(2, ℤ/n) : ±U] pointes (5.1) et les objets de 𝔪_n ⊗ ℂ n’ont pas d’automorphisme non trivial (IV 2.7).

On a donc

χ(M_n(ℂ)) = |GL(2, ℤ/n)| . -1/12 + [GL(2, ℤ/n) : ±U]

= -1/12 n^4 . ∏_{p|n} (1 - 1/p^2)(1 - 1/p) + n^3/2 ∏_{p|n} (1 - 1/p^2)(1 - 1/p).

La courbe M_n(ℂ) a φ(n) composantes connexes, toutes isomorphes. Leur genre g est donné par

2g - 2 = ∏_{p|n} (1 - 1/p^2) . (n^3/12 - n^2/2).

4.3. Soit C un champ algébrique propre, de Cohen-Macaulay, purement de dimension un, sur un corps algébriquement clos k (par exemple, 𝔪_1 ⊗ ℂ). Soit ω un faisceau inversible sur C. Le degré de ω est défini comme suit.

a) On prend une section rationnelle f de ω.

b) Soit x un point géométrique fermé de C. Soit Õ_x l’anneau local hensélien de C en x. Si f est régulier en x, on pose deg_x(f) = dim_k Õ_x/(f). Si f^{-1} l’est, on pose deg_x(f) = - dim_k Õ_x/(f^{-1})

Authority visual fallback P0135-A05.

c) On pose

deg(ω) = deg(C,ω) = Σ_x 1/|Aut(x)| deg_x(f).

Pour k non algébriquement clos, on définit deg en étendant au préalable les scalaires à $\bar{k}$. Ce degré est indépendant du choix de f et coïncide avec la notion usuelle quand C ”est” un schéma.

Il vérifie

α) additivité en ω : deg(ω ⊗ ω’) = deg(ω) + deg(ω’).

β) revêtements : Soit f : C’ → C un morphisme fini et plat de degré constant. On a

deg(f*ω) = deg(f). deg(ω).

γ) spécialisation : Soient S un trait, C un champ algébrique propre et plat, de Cohen-Macaulay, purement de dimension relative un sur S. Soit ω un faisceau inversible sur C. On a

deg(C_η,ω) = deg(C_s,ω).

4.4. Calculons le degré sur $\mathfrak{m}_1$ de ω, le dual de l’algèbre de Lie de la courbe elliptique universelle. Le discriminant Δ est une section de ω^(⊗12), s’annulant simplement à l’infini. Le point à l’infini ayant deux automorphismes, on trouve

(4.4.1) deg(ω) = 1/24.

Partant de (4.4.1), et exploitant (4.2.2), 4.3. β), on trouve que pour tout H ⊂ GL(2, $\mathbb{Z}$/n), on a

(4.4.2) χ($\mathfrak{m}$_H^o ⊗ $\mathbb{C}$) = -2 deg($\mathfrak{m}$_H,ω).

4.5. Voici une démonstration directe de (4.4.2). En tout point s de $\mathfrak{m}_1$^o, sur $\mathbb{C}$, correspondant à une courbe elliptique E, la théorie des déformations fournit un isomorphisme entre l’espace tangent à $\mathfrak{m}_1$^o en s et H^1(E,T_E^1) ≃ H^1(E,O) ⊗ ω^(⊗-1) ≃ ω_s^(⊗-2). Une étude à l’infini montre que l’isomorphisme Ω^1_($\mathfrak{m}_1$^o) ≃ ω^(⊗2) correspondant se prolonge

Authority visual fallback P0136-A05.

à l’infini en

(4.5.1) Ω^1_{𝔪_1}(𝔪_1^∞) ≃ ω^{⊗2}

Vu les propriétés de multiplicativité des deux membres de (4.4.2), il suffit de considérer 𝔪_n, pour un entier n ≥ 3. On a alors affaire à de vrais schémas, de sorte que

χ(M_n ⊗ ℂ) = - deg(M_n, Ω^1_{M_n}).

Puisque l’image réciproque d’une forme différentielle à pôles logarithmiques est encore de ce type, (4.5.1) nous fournit un isomorphisme

(4.5.2) Ω^1_{𝔪_H}(𝔪_H^∞) ≃ ω^{⊗2} ;

si c est le nombre de points à l’infini de 𝔪_n, on a donc

χ(𝔪_n^o ⊗ ℂ) = χ(𝔪_n ⊗ ℂ) - c = - deg(Ω^1) - c = - deg(Ω^1(∞)) = - deg(ω^{⊗2}) = -2 deg(ω).

Dans la fin de ce §, nous définissons l’invariant de Hasse et donnons une démonstration, basée sur des théorèmes de Grothendieck, du théorème de Igusa selon lequel ses zéros sont simples. L’un de nous a appris la jolie formule 4.9.1 à un cours de Serre.

4.6. Définition de l’invariant de Hasse.

Soit f : E → S une courbe elliptique généralisée sur un schéma S de caractéristique p, ω = f_* ω_{E/S} et F le morphisme de Frobenius

E ⟶F→ E^(p) f↘ ↙f^(p) S

On a f_*^(p) ω_{E^(p)/S} = ω^(p) = ω^{⊗p}. L’application trace (ou : ”Opération de Cartier”)



Authority visual fallback P0137-A05.

Tr_F : F_* ω_{E/S} → ω_{E^(p)/S}

définit un morphisme

(4.6.1) Tr_F : ω → ω^{⊗p},

i.e. une section

(4.6.2) h ∈ Γ(S,ω^{⊗(p-1)}).

C’est l’invariant de Hasse. En voici une expression duale : la dualité des faisceaux cohérents met en dualité ω et R^1 f_* $\mathcal{O}$, et de même ω^(p) et R^1 f_*^(p) $\mathcal{O}$. Le transposé de (4.6.1) est l’image réciproque

(4.6.3) F^* : R^1 f_*^(p) $\mathcal{O}$ → R^1 f_* $\mathcal{O}$.

Si on identifie R^1 f_* $\mathcal{O}$ et R^1 f^(p) $\mathcal{O}$ à ω^{⊗(-1)} et ω^{⊗(-p)}, (4.6.3) devient la multiplication par h (4.6.2).

Sur $\mathfrak{m}$_1 ⊗ $\mathbb{F}$_p, on sait que l’invariant de Hasse ne s’annule pas à l’infini, et que ses zéros correspondent aux courbes elliptiques supersingulières (voir Katz [13]).

On sait que sur $\mathfrak{m}$_1 ⊗ $\mathbb{F}$_p, les zéros de h sont simples. Nous en donnons en 4.8 une démonstration directe, basée sur la théorie de Grothendieck des déformations des schémas abéliens, dont un cas particulier est rappelé ci-dessous.

4.7. Soit A_o une variété abélienne sur un corps k algébriquement clos. Pour toute déformation A de A_o sur les nombres duaux k[ε] (ε^2 = 0), on définit

H_DR(A) = H^1(A, Ω^*_{A/Spec(k[ε])}).

On dispose d’une suite exacte

(4.7.1) 0 → H^0(A, Ω^1_A) → H_DR(A) → H^1(A, $\mathcal{O}$) → 0.

Grothendieck a défini un isomorphisme canonique

Authority visual fallback P0138-A05.

(4.7.2) H_DR(A) ≃ H_DR(A_o) ⊗_k k[ε],

et a prouvé que

a) Pour tout morphisme f : A → B, le diagramme

H_DR(B_o) ⊗ k[ε] —f_o ⊗ k[ε]→ H_DR(A_o) ⊗ k[ε] ‖ ‖ H_DR(B) —f*→ H_DR(A)

est commutatif.

b) L’application qui à chaque classe d’isomorphie de déformations A associe la filtration (4.7.1) de H_DR(A_o) ⊗ k[ε], assujettie à relever la filtration (4.7.1) de H_DR(A_o), est bijective.

4.8. Soit E_o une courbe elliptique supersingulière sur k, E une déformation non triviale de E_o sur k[ε], et prouvons que h ≠ 0 (i.e. que h est un multiple non nul de ε). Puisque E^(p) est la déformation triviale de E_o^(p), on dispose d’un diagramme commutatif

0 → H^0(E_o^(p),Ω^1) ⊗ k[ε] → H_DR(E_o^(p)) ⊗ k[ε] → H^1(E_o^(p),$\mathcal{O}$) ⊗ k[ε] ↓0 ↓F* ⊗ k[ε] ↓h 0 → H^0(E,Ω^1) → H_DR(E) ⊗ k[ε] → H^1(E,$\mathcal{O}$) → 0.

On sait que le noyau de F* est exactement H^0(E_o^(p),Ω^1) ⊂ H_DR(E_o^(p)), et h ≠ 0 résulte formellement de ce que la 2^ème ligne n’est pas de la forme Σ ⊗ k[ε].

4.9. Si on applique la définition 4.3. à la section h du faisceau inversible ω^{⊗(p-1)} sur $\mathfrak{m}$_1 ⊗ $\mathbb{F}$_p on trouve le résultat suivant : si I est l’ensemble des classes d’isomorphie de courbes elliptiques supersingulières sur $\mathbb{F}$_p, on a

(p-1).deg(ω) = Σ_i 1/|Aut(E_i)|

D’après 4.3 α) et (4.4.1), on a donc



Authority visual fallback P0139-A05.

(4.9.1) Σ_{E supersingulier} 1/|Aut(E)| = (p-1)/24.

Par exemple, si p = 2 (resp. 3), seule la courbe elliptique d'invariant modulaire 0 est supersingulière. Elle a 24 (resp. 12) automorphismes. De même, si n ≥ 3 et si (p,n) = 1, il y a sur $\mathfrak{m}_n^o \otimes \mathbb{F}_p$ exactement (1-p)/2 χ($\mathfrak{m}_n^o(\mathbb{C})$) points supersinguliers.

5. L'action de Galois sur les pointes.

5.1. L'ensemble $\mathfrak{m}_n^\infty(\mathbb{C})$ est l'ensemble des classes d'isomorphie, sur $\mathbb{C}$, de courbes elliptiques généralisées singulières à n côtés, munies d'une structure de niveau n.

Soit (C,+) le n-gone standard sur $\mathbb{C}$, muni de sa structure de courbe elliptique généralisée II.1.9. On a canoniquement

$C_n = \mu_n \times \mathbb{Z}/n$.

Le groupe des automorphismes de (C,+) a été calculé en II 1.10. Son image dans GL($\mu_n \times \mathbb{Z}/n$) est le groupe ± U des matrices

$\pm \begin{pmatrix} 1 & u \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ($u \in \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}/n, \mu_n)$).

L'ensemble des structures de niveau n sur (C,+) est Isom(C_n,$(\mathbb{Z}/n)^2$). On a donc canoniquement

$\mathfrak{m}_n^\infty(\mathbb{C}) = \mathrm{Isom}(\mu_n \times \mathbb{Z}/n, (\mathbb{Z}/n)^2) / \pm U$.

Cette bijection est compatible à l'action de Gal($\mathbb{C}/\mathbb{Q}$) sur les deux membres.

5.2. Pour $H \subset GL(2,\mathbb{Z}/n)$, on a $\mathfrak{m}_H = \mathfrak{m}_n/H$. Dès lors,

$\mathfrak{m}_H^\infty(\mathbb{C}) = H \backslash \mathrm{Isom}(\mu_n \times \mathbb{Z}/n, (\mathbb{Z}/n)^2)/\pm U$.

Puisque $\mathfrak{m}_H^\infty[1/n]$ est fini étale sur $\mathbb{Z}[1/n]$, cet isomorphisme d'ensembles galoisiens se prolonge en un isomorphisme de schémas :



Authority visual fallback P0140-A05.

Construction 5.3. $\mathfrak{m}_H^\infty[1/n] = H\backslash\mathrm{Isom}_{\mathbb{Z}[1/n]}(\mu_n \times \mathbb{Z}/n, (\mathbb{Z}/n)^2) / \pm U$.

6. Etude de $M_{\Gamma_0(n)}$.

6.1. En IV.4.5, nous avons décrit $\mathfrak{m}^o_{\Gamma_0(n)}[1/n]$ comme le champ sur $\mathbb{Z}[1/n]$ classifiant les isogénies E → F à noyau cyclique de degré n. Ceci met en évidence deux applications $\mathfrak{m}^o_{\Gamma_0(n)}[1/n] \to \mathfrak{m}_1^o[1/n]$, définies par E et F respectivement, et échangées par une involution w (IV.4.4). D'après IV.3.19, les applications induites sur les schémas grossiers se prolongent en

(6.1.1) c et cw : $M_{\Gamma_0(n)} \to M_1$.

6.2. L'application finie (c,cw) : $M_{\Gamma_0(n)} \to M_1 \times M_1$ a pour image un diviseur, invariant par permutation des coordonnées. Puisque l'application $M_{\Gamma_0(n)} \to M_1$ est de degré le nombre P(n) de points de la droite projective sur $\mathbb{Z}/n$, et est génériquement injective, ce diviseur est de bidegré (P(n), P(n)). Les applications c et cw transforment points à l'infini en points à l'infini. Puisque $M_1^o = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[j])$ et que $\mathbb{Z}[j,j']$ est factoriel, le diviseur image de

(6.2.1) (c,cw) : $M^o_{\Gamma_0(n)} \to M_1^o \times M_1^o$

est défini par une équation $\Phi_n \in \mathbb{Z}[j,j']$, l'équation modulaire. On a

$\Phi_n(X,Y) = \Sigma_{a,b \le P(n)} c_{ab} X^a Y^b$,

et les seuls c_{ab} non nuls et tels que a = P(n) ou b = P(n) sont obtenus pour (a,b) = (P(n),0) ou (0,P(n)) ; ils valent ±1.

6.3. L'invariance par symétrie montre que $\Phi_n(X,Y) = \pm\Phi_n(Y,X)$. Il est classique, et résulte d'une étude à l'infini, pour n ≠ 1, que le signe correct est +.

(6.3.1) $\Phi_n(X,Y) = \Phi_n(Y,X)$ (n > 1).

On peut donc normaliser le signe de Φ_n pour avoir



Authority visual fallback P0141-A05.

Authority page 142 ; collected-paper page 635 ; original folio 284.

(6.3.2) Φ_n(X,Y) = X^{P(n)} + Y^{P(n)} + Σ_{a,b<P(n)} c_ab X^a Y^b c_ab = c_ba ∈ ℤ.

6.4. On prendra garde que l’application (6.2.1) n’est pas nécessairement injective. Sur k algébriquement clos avec n inversible dans k, il peut en effet exister deux n-isogénies à noyau cyclique

(6.4.1) φ_1 : E_1 → F_1 φ_2 : E_2 → F_2

non isomorphes, mais telles qu’il existe des isomorphismes e : E_1 ≃→ E_2 et f : F_1 → F_2. L’endomorphisme g = e^{-1} φ_2^* f φ_1 de E_1 est alors de degré n^2, mais son noyau n’est pas le noyau de la multiplication par n. La courbe E_1 est donc à multiplication complexe.

Réciproquement, si g est un endomorphisme de degré n^2 d’une courbe elliptique E, que Ker(g) ≠ E_n, et que A ⊂ Ker(g) est cyclique d’ordre n, on obtient une paire (6.4.1) en prenant

E → E/A, et le transposé de E/Ker(g) ← E/A.

La discussion précédente montre toutefois que (6.2.1) est génériquement radiciel ; on montre facilement qu’il existe même un ouvert U de M^o_{Γ_o(n)}, dense dans les fibres de caractéristique p ∤ n, tel que la restriction de (6.2.1) à U soit un plongement.

Le résultat suivant en résulte.

Proposition 6.5. M^o_{Γ_o(n)} est le spectre du normalisé de ℤ[j,j′]/(Φ_n(j,j′)).

Si k est un corps de caractéristique p et que p ∤ n, il résulte de 3.2 que tout point x ∈ M^o_{Γ_o(n)}(k) est défini par une n-isogénie à noyau cyclique

Authority visual fallback P0142-A05.

Authority page 143 ; collected-paper page 636 ; original folio 285.

E → F définie sur k. Il n’en résulte pas que si j,j’ sont dans k et que

Φ_n(j,j’) = 0,

il existe une telle n-isogénie avec j(E) = j, j(F) = j’.

Si n est un nombre premier p, la décomposition V.1.16 de $\mathfrak{m}_{\Gamma_o(p)}$ mod p se traduit comme suit au niveau des schémas grossiers.

Théorème 6.6. (H. Weber-Lehrbuch der Algebra III, p.244 eq. (32)).

Φ_p(j,j’) ≡ (j-j’^p)(j^p-j’) mod p.

Par une étude à l’infini, on démontre plus généralement que si (n,p) = 1, on a

(6.6.1) $\Phi_{np}(j,j') \equiv \Phi_n(j^p,j')\ \Phi_n(j,j'^p)$ (p)

(6.6.2) $\Phi_{np^2}(j,j') \equiv \Phi_n(j^{p^2},j')\ \Phi_n(j,j')^{p-1}\ \Phi_n(j,j'^{p^2})$ (p)

(6.6.3) $\Phi_{np^k}(j,j') \equiv \prod_{\ell+m=k,\ K=\inf(\ell,m)} \Phi_n(j^{p^{\ell-K}},j'^{p^{m-K}})^{\varphi(p^K)}$ (p)

Si p^2 | n, on tire de 6.6.3 que

(6.6.4) $\Phi_{np}(j,j')\ \Phi_{n/p}(j^p,j'^p) \equiv \Phi_n(j^p,j')\ \Phi_n(j,j'^p)$ (p).

Proposition 6.7. Soient $H \subset GL(2,\mathbb{Z}/n)$ et K l’image inverse de H dans $GL(2,\hat{\mathbb{Z}})$. Le schéma $M_K[1/n]$ est lisse sur $\mathbb{Z}[1/n]$.

Au-dessus du complément des sections $0, 2^6\cdot 3^3$ et ∞ de M_1, $M_K[1/n] \to M_1[1/n]$ est fini étale. En effet, sur cet ouvert $\mathfrak{m}_K[1/n]$ (resp. $\mathfrak{m}_1[1/n]$) est étale sur $M_K[1/n]$ (resp. $M_1[1/n]$), et $\mathfrak{m}_K^o[1/n]$ est étale sur $\mathfrak{m}_1^o[1/n]$.

Il résulte donc du lemme d’Abhyankar que $M_K[1/n]$ est lisse sur $\mathbb{Z}[1/n]$ en dehors des points de caractéristique 2 ou 3 d’invariant modulaire 0.

Caractéristique 2. Soit E la courbe elliptique d’invariant 0 sur $\mathbb{F}_2$, correspondant à x : $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_2) \to \mathfrak{m}_1$. Soit $W(\mathbb{F}_2)[[t]]$ le complété de l’hensélisé strict



Authority visual fallback P0143-A05.

Authority page 144 ; collected-paper page 637 ; original folio 286.

de $\mathfrak{m}_1$ en x. Le groupe A = Aut(E) agit sur $W(\mathbb{F}_2)[[t]]$ et, vu I.8, il faut prouver que pour tout sous-groupe B de A, l'algèbre $W(\mathbb{F}_2)[[t]]^B$ est formellement lisse sur $W(\mathbb{F}_2)$. Le groupe A s'injecte dans $GL(2,\mathbb{F}_3)$ (IV.2.7). En fait,

$A = SL(2,\mathbb{F}_3)$.

Il en résulte que si l'une des algèbres $W(\mathbb{F}_2)[[t]]^B$ n'était pas formellement lisse, déjà l'un des schémas M_H ($H \subset GL(2,\mathbb{Z}/3)$) ne serait pas lisse sur $\mathbb{Z}$.

On sait que la courbe $M_3/\mathbb{Z}[\zeta_3]$ est de genre 0. Il en résulte que pour $H \subset GL(2,\mathbb{Z}/3)$, $M_H = M_3/H$ sur $\mathbb{Z}[\zeta_3]^H$ est de genre 0. On sait aussi que les fibres géométriques de $M_H[1/3]$ sont génériquement lisses, irréductibles et réduites (car de Cohen-Macaulay, M_H étant normal). Etant de genre arithmétique 0, elles sont lisses.

Caractéristique 3 : On procède de même, en utilisant que Aut(E) s'injecte dans $GL(2,\mathbb{F}_4)$ et que $M_4/\mathbb{Z}[\zeta_4]$ est de genre 0.

6.8. Soient n,H,K comme en 6.7 et p un nombre premier premier à n. Nous allons utiliser (V.1) pour étudier $M_{K\cap\Gamma_o(p)}$ en caractéristique p, la structure des singularités de $M_{K\cap\Gamma_o(p)}[1/n]$ et leur résolution minimale. Rappelons que le champ $\mathfrak{m}^o_{K\cap\Gamma_o(p)}[1/n]$ correspondant classifie les courbes elliptiques E munies d'une structure de niveau H et d'un sous-groupe localement libre de rang p A. Il est régulier, et $\mathfrak{m}^o_{K\cap\Gamma_o(p)} \otimes \mathbb{F}_p$ est réunion de deux copies de $\mathfrak{m}_K{}^o \otimes \mathbb{F}_p$ se coupant transversalement aux points supersinguliers.

Théorème 6.9. (i) $M_{K\cap\Gamma_o(p)}[1/n]$ est lisse sur $\mathbb{Z}[1/n]$ en dehors des points supersinguliers de caractéristique p.

(ii) $M_{K\cap\Gamma_o(p)} \otimes \mathbb{F}_p$ est réunion de deux copies de $M_K \otimes \mathbb{F}_p$ se coupant transversalement aux points supersinguliers. On recolle le point supersingulier x de la 2^e copie au point x^(p) de la 1^{ere}.

(iii) Si x est un point supersingulier de $M_K \otimes \mathbb{F}_p$ défini par (E,α), et que

$k = \tfrac{1}{2}\,|\mathrm{Aut}(E,\alpha)|$ si $-1 \in \mathrm{Aut}(E,\alpha)$ $k = |\mathrm{Aut}(E,\alpha)|$ si $-1 \notin \mathrm{Aut}(E,\alpha)$



Authority visual fallback P0144-A05.

Authority page 145 ; collected-paper page 638 ; original folio 287.

alors, au point correspondant de M_{K∩Γ₀(p)} ⊗ 𝔽_p, le schéma M_{K∩Γ₀(p)} ⊗ W(𝔽_p) présente une singularité de type A_{k-1}, formellement isomorphe à

(6.9.1) W(𝔽_p)[[X,Y]]/(X.Y-p^k).

Preuve : Au voisinage de l'infini, l'application

$\mathcal{M}$_{Γ₀(p)} → M_{Γ₀(p)}

est étale, et M_{Γ₀(p)} est lisse sur ℤ. D'après le lemme d'Abhyankar, M_{K∩Γ₀(p)} est modérément ramifié sur M_{Γ₀(p)} le long de l'infini, donc lisse au voisinage de l'infini. Etudions maintenant les points à distance finie.

Par passage aux schémas grossiers de modules, on tire de (V.1.15) et de 6.1.1 un diagramme

M_K^o ⊗ 𝔽_p ↘ ↙ M_K^o ⊗ 𝔽_p ‖ schéma grossier de ↓ f ‖ ($\mathcal{M}$^o_{K∩Γ₀(p)} ⊗ 𝔽_p) ↓ ‖ ↓ ↓ M_K^o ⊗ 𝔽_p ↖ M^o_{K∩Γ₀(p)} ⊗ 𝔽_p ↗ M_K^o ⊗ 𝔽_p

(diagonales composées = Frobenius)

On sait que $\mathcal{M}$^o_{K∩Γ₀(p)} ⊗ 𝔽_p est réduit (V.1.16). Son schéma grossier de modules l'est donc également. Puisque M^o_{K∩Γ₀(p)} est normal, M^o_{K∩Γ₀(p)} ⊗ 𝔽_p est de Cohen-Macaulay. Etant génériquement réduit, ce schéma est réduit. On peut maintenant raisonner comme en V.1.16 pour prouver (i),(ii). Les mêmes arguments s'appliquent au schéma grossier de $\mathcal{M}$^o_{K∩Γ₀(p)} ⊗ 𝔽_p, et on trouve le corollaire suivant.

Corollaire 6.10. M_{K∩Γ₀(p)} ⊗ 𝔽_p est le schéma grossier de modules de $\mathcal{M}$_{K∩Γ₀(p)} ⊗ 𝔽_p.



Authority visual fallback P0145-A05.

Prouvons 6.9 (iii). Soient (E,α) et x comme indiqué. Soit A’ le groupe des automorphismes de (E,α) et

A = A’ si -1 ∉ A’

A = A’/{±1} si -1 ∈ A’.

Le groupe A est d’ordre k. D’après I.8, le complété de l’hensélisé strict de M_{KnΓ₀(p)} en x est de la forme

Spec(W(𝔽_p)[[X,Y]]/(XY-p))/A,

où le groupe A agit effectivement (I.8 et I.4). En réduction mod p, le groupe A respecte chaque branche, et agit effectivement sur chacune. On sait aussi, d’après I.5.2 et (ii), que le quotient étudié est de la forme

Spec(W(𝔽_p)[[X’,Y’]] /(X’Y’-p^{k’})),

et il nous faut prouver que k=k’.

D’après 6.10, on a

Spec(𝔽_p[[X,Y]]/(X.Y))/A = Spec(𝔽_p[[X’,Y’]] /(X’.Y’)),

donc, par restriction à une branche,

Spec(𝔽_p[[X,Y]]/(Y))/A = Spec(𝔽_p[[X’Y’]] /(Y’)).

Puisque A est d’ordre k, il en résulte que

X^k = unité.X’ (mod(p,Y)).

Dans le spectre de l’anneau régulier W(𝔽_p)[[X,Y]]/(XY-p), les diviseurs de X et X’ ont même support. La formule précédente impose alors que

div(X’) = k div(X), i.e. X^k = unité.X’.

Le même argument s’applique à Y’ ; on a donc

X’Y’ = unité.p^k

et que k=k’ en résulte.



Authority visual fallback P0146-A05.

L’invariance par spécialisation de la caractéristique d’Euler-Poincaré de $\mathbb{Q}$ et 6.9 (ii) fournissent, pour Euler-Poincaré topologique :

Corollaire 6.11. Soient s le nombre de points supersinguliers sur M_K ⊗ $\mathbb{F}$_p. On a

(6.11.1) χ(M_{KnΓ₀(p)}) = 2χ(M_K)-2s.

Si on considère M_{KnΓ₀(p)} comme une courbe géométriquement irréductible sur R=$\mathbb{Z}$[ζ_n]^H et que s₀=s/[R :$\mathbb{Z}$] désigne le nombre de points supersinguliers de M_K ⊗_R $\mathbb{F}$_p, 6.11 se récrit en terme du genre :

(6.11.2) g(M_{KnΓ₀(p)} ⊗_R $\mathbb{C}$) = 2g(M_K)+(s₀-1).

Corollaire 6.12. M_{KnΓ₀(p)} ⊗_R $\mathbb{C}$ est une courbe elliptique si et seulement si M_K ⊗_R $\mathbb{C}$ est de genre 0 et que s₀=2.

Rappel 6.13. Résolvant la singularité (6.9.1) par éclatements, on obtient une chaîne de (k-1) droites projectives de self intersection -2. Le lieu d’équation p=0 de la résolution est réduit. Ceci permet de calculer la résolution minimale de M_{KnΓ₀(p)}.

Le lemme suivant, tiré de [20], sera prouvé en VII.2.7.

Lemme 6.14. Soit E une courbe elliptique sur le corps des fractions d’un anneau de valuation discrète V. Si le modèle minimal de Néron de E a pour fibre spéciale un polygone de Néron à k côtés, alors

v(j(E)) = -k.

Lorsque M_{KnΓ₀(p)} est elliptique, on déduit de 6.11 le corollaire suivant.

Corollaire 6.15. Si M_{KnΓ₀(p)} ⊗_R $\mathbb{C}$ est elliptique, d’invariant modulaire j, le pôle de j ∈ R en un idéal premier π de R divisant p est donné par la formule suivante :

-v_π(j) = 2 + Σ_{(E,α)} (|Aut(E,α)/{±1}|-1),

la somme étant étendue à l’ensemble (à deux éléments) des classes d’isomorphie de



-289-

Deligne-Rapoport

L'invariance par spécialisation de la caractéristique d'Euler-Poincaré de ℓ-adique (II§3 Théorème), pour Euler-Poincaré topologique :

Corollaire 6.11. Soient k la nombre de points supersinguliers sur $X_0 \otimes \mathbb{F}_p$. On a

$$\chi(\mathcal{O}_{X'_{\Gamma_0(p)}}) = 2\chi(\mathcal{O}_X) - k \quad (6.11.1)$$

Si on considère $X_{\Gamma_0(p)}$ comme une courbe géométriquement irréductible sur $R = \mathbb{Z}[\zeta_N, \frac{1}{N}]$ et que $\varepsilon_p = \varepsilon/(p) \in \mathbb{Z}$ désigne le nombre de points supersinguliers de $X_0 \otimes \mathbb{F}_p$, 6.11 se réécrit en terme du genre :

$$g(X_{\Gamma'_0(p)} \otimes \bar{k}) = 2g(X_1) + (\varepsilon_p - 1) \quad (6.11.2)$$

Corollaire 6.12. $X_{\Gamma_0(p)} \otimes k$ est une courbe elliptique si et seulement si $X_0 \otimes k$ est de genre 0 et que $\varepsilon_p = 2$.

Reprenons 6.13. Désingulariser (6.9.1) par éclatements, on obtient une chaîne de (k-1) droites projectives de self intersection -2. Le lieu d'équation $y = 0$ de la résolution est réduit. Ceci permet de calculer la résolution minimale de $X_{\Gamma_0(p)}$.

Le lemme suivant, tiré de [2D], sera prouvé en VII.2.7.

Lemme 6.14. Soit E une courbe elliptique sur le corps des fractions d'un anneau de valuation discrète V. Si le modèle minimal de Néron de E a pour fibre spéciale un polygone de Néron à k côtés, alors $v(j(E)) = -k$.

Lorsque $X_{\Gamma_0(p)}$ est elliptique, on déduit de 6.11 le corollaire suivant.

Corollaire 6.13. Si $X_{\Gamma_0(p)} \otimes k$ est elliptique, d'invariant modulaire j, le pôle de $j \in R$ en un idéal premier $\mathfrak{p}$ de R divisant p est donné par la formule suivante :

$$-v_{\mathfrak{p}}(j) = 2 \cdot \sum_{(E,\alpha)} (|\mathrm{Aut}(E,\alpha)|/2)^{-1},$$

la somme étant étendue à l'ensemble (à deux éléments) des classes d'isomorphie de

Authority visual fallback P0147-A05.

courbes elliptiques supersingulières E, munie d’une structure de niveau H de déterminant un, sur une clôture algébrique $\mathbb{F}_p$ de R/(π).

6.16. Exemple. Traitons le cas de $M_{\Gamma_0(p)}$, p premier, p≠2,3. $M_{\Gamma_0(p)} \otimes \mathbb{F}_p$ s’obtient en recollant 2 exemplaires de

$M_1 \otimes \mathbb{F}_p = \mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$

en les points supersinguliers.

Pour obtenir la fibre spéciale de la résolution minimale, il faut remplacer le point j=0 (resp. j=1728), si supersingulier, par une chaîne de 2 (resp. 1) droites projectives.Rappelons que

j=0 supersingulier ⇔ p≡-1 (mod 6), j=1728 supersingulier ⇔ p≡-1 (mod 4).

Dès lors, sur la clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$, la fibre spéciale de la résolution minimale de $M_{\Gamma_0(p)}$ est le diagramme suivant de copies de $\mathbb{P}^1$ se coupant transversale-ment :

g=0 $\Gamma_0(5)$ $\Gamma_0(7)$ $\Gamma_0(13)$ j=0 j=1728 autre

g=1 $\Gamma_0(11)$ $\Gamma_0(17)$ $\Gamma_0(19)$ j=0,1728 j=0,autre autre,1728

g>1 $\Gamma_0(23)$ $\Gamma_0(29)$ ... j=0,autre,1728 j=0,autre,autre

La formule 6.15 dit que l’invariant modulaire de la courbe de genre un $M_{\Gamma_0(p)}$, p=11,17,19 a pour dénominateur respectivement

11^5, 17^4, 19^3.



Authority visual fallback P0148-A05.

VII. La courbe de Tate.

Au § 1 de ce chapitre, nous utilisons une méthode due à Raynaud pour construire la courbe de Tate $\mathbb{G}$_m/q^$\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}$[[q]]. Ceci nous permet de donner une description explicite du complété formel de $\mathcal{M}$_H le long de l'infini (§2). Aux §3 et 4, nous en déduisons des théorèmes d'intégralité sur les coefficients du développement en série de Fourier des formes modulaires.

1. Construction de la courbe de Tate sur $\mathbb{Z}$[[q]].

1.1. Soient S un schéma et t ∈ Γ(S,$\mathcal{O}$_S). Nous nous proposons de construire sur S un schéma $\bar{G}$_m^t, isomorphe à $\mathbb{G}$_m au-dessus de S[t^{-1}], non quasi-compact si t n'est pas inversible, et dont des courbes elliptiques généralisées se déduiront par passage au quotient si t est nilpotent.

a) Soient (x_i)_{i∈$\mathbb{Z}$} des indéterminées. $\bar{G}$_m^t est réunion des cartes locales (U_j)_{j∈1/2+$\mathbb{Z}$} suivantes :

(1.1.1) U_j = S[x_{j-1/2},y_{j+1/2}] /(x_{j-1/2}.y_{j+1/2}-t)

b) On recolle U_{i-1/2} et U_{i+1/2} de sorte que

(1.1.2) U_{i-1/2} ∩ U_{i+1/2} ⊂ U_{i+1/2} soit U_{i+1/2}[1/x_i] ≃ S[x_i,x_i^{-1}] (y_{i+1}=t.x_i^{-1})

(1.1.3) U_{i-1/2} ∩ U_{i+1/2} ⊂ U_{i-1/2} soit U_{i-1/2}[1/y_i] ≃ S[y_i,y_i^{-1}] (x_{i-1}=t.y_i^{-1}) ;

ces ouverts étant identifiés par

(1.1.4) x_i.y_i = 1.

c) On ne fait d'autre recollement que ceux imposés par b). Explicitement :

(1.1.5) si |j-j'| ≥ 2, U_j ∩ U_{j'} est au-dessus de S[1/t]. ;

(1.1.6) au-dessus de S[1/t], les U_j sont tous identifiés, par



Authority visual fallback P0149-A05.

x_i = t^{-i}x_0

y_i = t^{-i}y_0.

1.2 Exemples : a) si t est inversible,

$\bar{G}_m^t = U_0 = S[x_0,x_0^{-1}] \simeq \mathbb{G}_m$;

b) si t=0, $\bar{G}_m^t$ se déduit par recollement de la somme d'une famille de copies de $\mathbb{P}^1$ indexée par $\mathbb{Z}$: on recolle la i^ème copie à la (i+1)^ième en identifiant la section 0 de la i^ième à la section ∞ de la (i+1)^ième ;

U_j = ((j-1/2)^ième copie - section ∞) ∪ ((j+1/2)^ième copie - section 0)

x_{j-1/2} = coordonnée x ∪ 0

y_{j+1/2} = 0 ∪ (coordonnée x)^{-1}.

Le schéma dessine une chaîne verticale infinie, avec les jonctions successives x_1=0, y_1=0, x_0=0, y_0=0, x_{-1}=0, y_{-1}=0. Les accolades indiquent U_{1/2}, U_{-1/2} et

U_{1/2} ∩ U_{-1/2} = S[x_0,x_0^{-1}],

avec les étiquettes hors t=0 : $\mathbb{G}_m$, S et t=0.

c) soit T_i = U_{i-1/2} ∩ U_{i+1/2} = S[x_i,x_i^{-1}] et soit $\mathbb{G}_m^t$ la réunion des T_i. C'est le lieu lisse de $\bar{G}_m^t$. Si S=Spec(V) est un trait et t une uniformisante de V, $\mathbb{G}_m^t$ est le modèle de Néron de $\mathbb{G}_m$ construit par Raynaud.



Authority visual fallback P0150-A05.

Les applications

$\bar{G}_m^t(S) \leftarrow \mathbb{G}_m^t(S) \to \mathbb{G}_m^t(K) = \mathbb{G}_m(K) = K^*$

sont bijectives (K corps des fractions de V). A t^i u ∈ K^* (u ∈ V^*) correspond la section x_i=u de T_i. Cet exemple motive les définitions qui suivent.

d) Abus de notation : pour a inversible sur S et k∈ℤ, on notera parfois at^k la section de T^k telle que x_k(at^k)=a.

1.3. On définit dans $\bar{G}_m^t$ une structure de schéma en groupes abéliens

$\cdot : \bar{G}_m^t \times \bar{G}_m^t \to \bar{G}_m^t ; T_i \times T_j \to T_{i+j}$

par

$x_{i+j}(a.b)=x_i(a)x_j(b).$

L'intersection $T_i \cap T_{i'}$ de deux cartes distinctes est l'image inverse de S[1/t] ; au-dessus de S[1/t], $\bar{G}_m^t=\mathbb{G}_m$ et les applications précédentes sont la multiplication dans $\mathbb{G}_m$. Dans l'exemple 1.2 c), · correspond à la multiplication dans K^*.

L'application · se prolonge en une action

$\cdot : \mathbb{G}_m^t \times \bar{G}_m^t \to \bar{G}_m^t ; T_i \times U_j \to U_{i+j}$

par

$x_{i+j-1/2}(a.b)=x_i(a).x_{j-1/2}(b)$

$y_{i+j+1/2}(a.b)=x_i(a)^{-1}y_{j+1/2}(b).$

L'application $x \to x^{-1}$ se prolonge en une involution

$a \mapsto a^{-1} : \bar{G}_m^t \to \bar{G}_m^t : U_j \to U_{-j}$

par

$x_{-j-1/2}(a^{-1})=y_{j+1/2}(a)$

$y_{-j+1/2}(a^{-1})=x_{j-1/2}(a).$

La composante neutre T_0 du schéma en groupes $\mathbb{G}_m^t$ est canoniquement iso-



Authority visual fallback P0151-A05.

morphe à $\mathbb{G}_m$ (isomorphisme : x_0).

1.4. Si $u \in \Gamma(S,\mathcal{O}_S)^*$, et que $m \geq 1$ est un entier, on définit

$[u] : \bar{G}_m^t \to \bar{G}_m^{ut^m}$; $U_j^{(t)} \to U_{i+1/2}^{(ut^m)}$

$(mi+1/2 \leq j \leq m(i+1)-1/2)$

$x_i^{(ut^m)} \circ [u] = x_{mi+k}^{(t)}.t^k.u^{-i}$

$y_i^{(ut^m)} \circ [u] = y_{mi-k}^{(t)}.t^k.u^i$ $(0 \leq k < m)$.

Pour t=0, ceci contracte en un point les T_i avec $i \not\equiv 0 (m)$. Si m=1, [u] est un isomorphisme de $\bar{G}_m^t$ avec $\bar{G}_m^{ut}$. Par exemple, le modèle de Néron 1.2 c) de $\mathbb{G}_m$ est indépendant du choix de l'uniformisante.

1.5. Supposons t nilpotent. On a alors $U_j \cap U_{j'} = \emptyset$ si $|j-j'| \geq 2$. Soit g une section de $\mathbb{G}_m^t$, contenue dans T_k avec $k \neq 0$. Faisons agir $\mathbb{Z}$ sur $\bar{G}_m^t$ par

$(i,x) \mapsto g^i.x$.

Proposition-définition 1.6. Avec les notations 1.5, le quotient $\bar{G}_m^t/\mathbb{Z}$ existe ; on le note $\bar{G}_m^t/g^{\mathbb{Z}}$.

Si $|k| \geq 2$, $\bar{G}_m^t/g^{\mathbb{Z}}$ est encore défini par les cartes locales U_j de 1.1, avec la donnée de recollement supplémentaire que U_j est identifié à U_{j+k} par g (les cartes $(U_j)_{0<j<|k|}$ suffisent donc à recouvrir $\bar{G}_m^t/g^{\mathbb{Z}}$). Ceci reste vrai pour $|k|=1$, à cela près que cette fois U_j n'est plus un ouvert de Zariski de $\bar{G}_m^t/g^{\mathbb{Z}}$, mais est seulement étale sur $\bar{G}_m^t/g^{\mathbb{Z}}$. On peut aussi arguer que

$\bar{G}_m^t/g^{\mathbb{Z}} = (\bar{G}_m^t/g^{2\mathbb{Z}})/(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

Exemple 1.7. Si t=0, et que g est la section $x_k=1$ de T_k, $\bar{G}_m^0/g^{\mathbb{Z}}$ n'est autre que le polygone de Néron standard à k côtés sur S. Ceci résulte de 1.2 b).

1.8. Sous les hypothèses de 1.6, la loi · passe au quotient et définit



Authority visual fallback P0152-A05.

: Ḡ_m^t/g^ℤ × Ḡ_m^t/g^ℤ → Ḡ_m^t/g^ℤ.

Pour t=0 et g comme en 1.7, c'est la loi + définie en (II.1.9). Plus généralement, on déduit de 1.4 que si x_k(g) est une puissance k^{ième}, (Ḡ_m^t/g^ℤ, .) est isomorphe au k-gone standard. Puisque Ḡ_m^t/g^ℤ est clairement plat de présentation finie, on obtient le résultat suivant.

Proposition 1.9. Pour t nilpotent et g∈T_k(S), (Ḡ_m^t/g^ℤ,+) est une courbe elliptique généralisée. Ses fibres géométriques sont des k-gones.

1.10. Soient A un anneau noethérien, t∈A et g une section de T_k⊂Ḡ_m^t sur S=Spec(A). Pour chaque entier N, t est nilpotent dans A/(t^N) et on peut effectuer la construction 1.6 : on définit

C_N = Ḡ_m^t/g^ℤ sur A/(t^N).

Les C_N définissent un schéma formel

C = lim_{→} C_N

sur le complété formel de S le long de Spec(A/(t)). Si A est complet pour la topologie t-adique (ou, comme nous dirons, t-complet), la démonstration de III 1.2 montre que la courbe elliptique généralisée formelle C est algébrisable :

a) La courbe projective formelle Ĉ est algébrisable, d'après le théorème d'existence de Grothendieck.

b) Si k=1, la loi + est entièrement déterminée par la section neutre e (II 2.7), donc est algébrisable.

c) Dans le cas général, une descente fppf nous ramène à supposer que g est de la forme g_0^k. La courbe Ḡ_m^t/g^ℤ est alors un revêtement de Ḡ_m^t/g_0^ℤ, et on applique II 1.17.

Pour A t-complet, nous appellerons la courbe elliptique généralisée sur Spec(A) qui algébrise Ĉ une courbe de Tate ; nous la noterons encore (par abus de notation) Ḡ_m^t/g^ℤ.



Authority visual fallback P0153-A05.

Authority page 154 ; collected-paper page 647 ; original folio 296.

Proposition 1.11. L’image du sous-schéma de non lissité de la courbe de Tate $\bar{G}_m^{t/g^{\mathbb{Z}}}$ sur Spec(A) admet l’équation t=0.

Cette image est la même pour $\bar{G}_m^{t/g^{\mathbb{Z}}}$, pour le schéma formel $\hat{C}$ et pour $\bar{G}_m^{t}$. Son calcul pour $\bar{G}_m^{t}$ est laissé au lecteur.

1.12. Pour t nilpotent, les composantes neutres de $\bar{G}_m^{t}$ et $\bar{G}_m^{t/g^{\mathbb{Z}}}$ sont canoniquement isomorphe à $\mathbb{G}_m$, d’où des isomorphismes et morphismes

(complété $\hat{G}_m$ de $\mathbb{G}_m$ le long de la section neutre) $\simeq\to$ $(\bar{G}_m^{t/g^{\mathbb{Z}}})^{\wedge}$

$\mathrm{Lie}(\mathbb{G}_m)=\mathcal{O} \simeq\to \mathrm{Lie}(\bar{G}_m^{t/g^{\mathbb{Z}}})$

$\mu_n \hookrightarrow (\bar{G}_m^{t/g^{\mathbb{Z}}})_n$.

Pour A noethérien t-complet, on en déduit des isomorphismes et morphismes

(1.12.1) (groupe formel complété de $\mathbb{G}_m$ le long de e) $\simeq\to$ (groupe formel complété de $\bar{G}_m^{t/g^{\mathbb{Z}}}$ le long de e)

(1.12.2) $\mathrm{Lie}(\bar{G}_m^{t/g^{\mathbb{Z}}}) \simeq\to \mathcal{O}$

(1.12.3) $\mu_n \hookrightarrow (\bar{G}_m^{t/g^{\mathbb{Z}}})_n$.

En particulier, les courbes de Tate sont munies d’une différentielle invariante canonique (l’image réciproque dans $\mathrm{Lie}(\bar{G}_m^{t/g^{\mathbb{Z}}})$ de la section unité de $\mathcal{O}$), notée dx/x.

1.13. Si t est nilpotent, nous noterons $(g^{\mathbb{Z}})^{1/k}$ le sous-schéma de $\bar{G}_m^{t}$ dont l’intersection avec la carte T_i est défini par l’équation

$a^k=g^i$

(égalité dans $\bar{G}_m^{t}$). Le schéma en groupes

(1.13.1) $(g^{\mathbb{Z}})^{1/k}/g^{\mathbb{Z}} = (\bar{G}_m^{t/g^{\mathbb{Z}}})_k$

est fini localement libre de rang k^2. C’est une extension

(1.13.2) $0 \to \mu_k \to^{(1.12.3)} (\bar{G}_m^{t/g^{\mathbb{Z}}})_k \to \mathbb{Z}/k \to 0$;

Authority visual fallback P0154-A05.

la projection sur ℤ/k envoie x sur la classe mod k des entiers i tels que x soit image d’une section de T_i.

Supposons maintenant A noethérien t-complet. Par passage à la limite, (1.13.1) définit un sous-schéma en groupes fini H de (Ḡ_m^t/g^ℤ)_k ; ces deux groupes, étant localement libre de même rang, sont égaux, et (1.13.2) définit une suite exacte

(1.13.3) 0 → μ_k →^{(1.12.3)} (Ḡ_m^t/g^ℤ)_k →^v ℤ/k → 0.

Si x_k(g)=u, le μ_k-torseur v^{-1}(1) est canoniquement isomorphe au μ_k-torseur des racines k^{ièmes} de u :

(1.13.4) v^{-1}(1) ≃ {√[k]{x_k(g)}}.

Construction 1.14. Si A est t-complet, que t=τ^m, et que g est une section de T_k⊂Ḡ_m^t, notons encore g la section de T_{km}⊂Ḡ_m^τ telle que

x_{km}^{(τ)}(g)=x_k^{(t)}(g).

La courbe généralisée Ḡ_m^t/g^ℤ est le contracté (IV.1.) de Ḡ_m^τ/g^ℤ. En particulier, Ḡ_m^t/g^ℤ et Ḡ_m^τ/g^ℤ coïncident sur A[t^{-1}].

Par passage au quotient et passage à la limite, l’application 1.4 définit un morphisme

Ḡ_m^τ/g^ℤ → Ḡ_m^t/g^ℤ.

Ce morphisme identifie Ḡ_m^t/g^ℤ au contracté (IV.1) de Ḡ_m^τ/g^ℤ.

Pour A t-complet, et si t admet une racine m^{ième} τ, on a donc sur A[t^{-1}] une suite exacte (1.13.3), avec k remplacé par km, et un isomorphisme (1.13.4). On vérifie que cette suite exacte et cet isomorphisme sont indépendants du choix de τ. Par descente, ils sont donc définis sans hypothèse sur t.

Construction 1.15. Sur Spec(A[t^{-1}], on a une suite exacte

0 → μ_k →^{(1.12.3)} (Ḡ_m^t/g^ℤ)_k →^v ℤ/k → 0.



Authority visual fallback P0155-A05.

Authority page 156 ; collected-paper page 649 ; original folio 298.

Le μ_k-torseur v^{-1}(1) est canoniquement isomorphe au μ_k-torseur des racines k^{ièmes} de g∈𝔾_m^t(A[t^{-1}])≃A[t^{-1}]^*.

Soit ℤ[[q^{1/k}]] l'anneau des séries formelles en une indéterminée q^{1/k}. Comme convenu en 1.2 d), nous noterons q la section g de T_k⊂Ḡ_m^{q^{1/k}} pour laquelle x_k(g)=1.

Définition 1.16. La courbe de Tate à k côtés sur ℤ[[q^{1/k}]] est la courbe elliptique généralisée Ḡ_m^{q^{1/k}}/q^ℤ.

Pour k=1, on parle simplement de la courbe de Tate sur ℤ[[q]]. La courbe de Tate à k côtés C sur ℤ[[q^{1/k}]] est munie des structures suivantes ((1.12.1) (1.12.2) (1.12.3) (1.13.2) (1.13.4))

(1.16.1) un isomorphisme de groupes formels Ĉ≃Ĝ_m ; en particulier

(1.16.2) une différentielle invariante, notée dx/x ;

(1.16.3) des morphismes μ_n↪C_n ;

(1.16.4) un isomorphisme C_k≃→μ_k×ℤ/k.

L'isomorphisme (1.16.4) précise (1.13.2) ; il est défini par (1.16.3) pour n=k, et par la section q^{1/k} de Ḡ_m^{q^{1/k}}, qui définit une section d'ordre k de Ḡ_m^{q^{1/k}}/q^ℤ. Il y a deux façons naturelles de définir les e_k-produits (k≥1). Pour l'une d'elles on a, via l'isomorphisme (1.16.4.)

e_n((a,b),(c,d))=a.d-b.c.

C'est celle qu'on avait utilisée dans l'introduction, n° 2.

2. Application : structure à l'infini de $\mathcal{M}$_H

Théorème 2.1. Le morphisme τ : Spec(ℤ[[q]])→$\mathcal{M}$_1 défini par la courbe de Tate sur ℤ[[q]] identifie ℤ[[q]] au complété formel de $\mathcal{M}$_1 le long de la section à l'infini f_1.

Puisque $\mathcal{M}$_1 est lisse sur ℤ, on sait à priori qu'il existe un isomorphisme du complété formel de $\mathcal{M}$_1 le long de f_1 avec Spec(ℤ[[t]]). Il transforme la section f_1 en la section t=0. Le morphisme τ est de la forme

q↦t=f(q),



Authority visual fallback P0156-A05.

pour une série formelle f (i.e., τ*(t) = f(q)). On sait que l’image, dans $\mathcal{M}_1$, du sous-schéma de non lissité de la courbe universelle, est f_1 (IV 2.2). D’après 1.11, l’image, dans Spec(ℤ[[q]]), du sous-schéma de non-lissité de la courbe de Tate admet l’équation q = 0. Puisque la formation de cette image commute au changement de base, on a (q) = (f(q)) dans ℤ[[q]], et ceci implique que τ est un isomorphisme.

Soit H ⊂ GL(2, ℤ/n).

Corollaire 2.2. Le produit fibré Spec(ℤ[[q]]) ×_{$\mathcal{M}_1$} $\mathcal{M}$_H est le spectre du normalisé de ℤ[[q]] dans l’algèbre affine du schéma fini étale sur ℤ[[q]][1/n, 1/q].

Preuve : résulte des définitions et de ce que normalisation et complétion commutent.

Puisque le schéma en groupes (ℚ^ ?/q^ℤ)_n sur ℤ[[q]][1/q] a été calculé en 1.15, 2.2 permet d’expliciter la structure à l’infini de $\mathcal{M}$_H.

2.3. Nous traiterons le cas de $\mathcal{M}$_n (n ≥ 3), considéré comme champ algébrique sur ℤ[ζ_n]. Si de $\mathcal{M}$_n on ôte les points supersinguliers de caractéristique p|n, le champ $\mathcal{M}$_n^h obtenu est un schéma, décrit en termes modulaires en V 4.

Soit C le polygone de Néron à n côtés standard sur ℤ[ζ_n], muni de sa structure de courbe elliptique généralisée (1.9) et de l’isomorphisme naturel C_n = μ_n × ℤ/n. Cette courbe définit une section à l’infini

(2.3.1) f_n : Spec(ℤ[ζ_n]) → $\mathcal{M}$_n.

Authority visual fallback P0157-A05.

Authority page 158 ; collected-paper page 651 ; original folio 300.

Sur $\mathbb{Z}[\zeta_n][[q^{1/n}]]$, considérons la courbe elliptique généralisée $C' = \mathbb{G}_m^{q^{1/n}}/q^{\mathbb{Z}}$. L'application (1.16.3) : $\mu_n \to C'_n$ et la section d'ordre n « $q^{1/n}$ » ($x_1 = 1$) définissent un isomorphisme $C'_n = \mu_n \times \mathbb{Z}/n$.

Le morphisme correspondant

(2.3.2) $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\zeta_n][[q^{1/n}]]) \to \mathcal{M}_n$

prolonge (2.3.1) et, d'après 1.14, le diagramme $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\zeta_n][[q^{1/n}]]) \to \mathcal{M}_n$, au-dessous de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[[q]]) \to \mathcal{M}_1$, est commutatif.

Corollaire 2.4. Le morphisme (2.3.2) identifie $\mathbb{Z}[\zeta_n][[q^{1/n}]]$ au complété formel de $\mathcal{M}_n$ le long de la section à l'infini f_n.

Preuve : on peut le déduire de 2.2. Il est plus simple de reprendre la démonstration de 2.1, en utilisant que $\mathcal{M}_n$ est lisse sur $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ au voisinage de l'infini ; l'image sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\zeta_n][[q^{1/n}]])$ du lieu de non-lissité est définie par l'équation $q^{1/n}=0$.

Supposons que $n \geq 3$. Dans ce cas, $\mathcal{M}_n^h$ est un schéma. Le groupe $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}/n)$ agit sur le $\mathbb{Z}[\zeta_n]$-schéma $\mathcal{M}_n^h = \mathcal{M}_n^h$, et le stabilisateur de la section à l'infini f_n est le sous-groupe $\pm U = \{ \pm \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \}$.



Authority visual fallback P0158-A05.

Authority page 159 ; collected-paper page 652 ; original folio 301.

Corollaire 2.5. Si $n \geq 3$, le complété de $\mathcal{M}_n^h$ le long de l'infini est somme d'un ensemble de copies de $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[\zeta_n][[q^{1/n}]])$, indexées par $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}/n)/\pm U$.

Corollaire 2.6. Soit C une courbe elliptique généralisée sur A local complet. On suppose que C n'est pas lisse ; soit (t) l'idéal de A qui définit le sous-schéma de non-lissité. On suppose que la fibre spéciale C_s de C a k côtés, et que $\mathrm{Gal}(\bar{s}/s)$ agit trivialement sur le diagramme $\Gamma(C_{\bar{s}})$ des composantes irréductibles de $C_{\bar{s}}$. Alors, il existe $u \in A^*$ tel que $C = \mathbb{G}_m^{t/(ut^k)^{\mathbb{Z}}}$.

Preuve : soit X_v le schéma en groupes sur $\mathbb{Z}[v,v^{-1}]$, extension de $\mathbb{Z}/k$ par μ_k, tel que $\varphi^{-1}(1)$ soit le μ_k-torseur des racines k-ièmes de v. Soit $\mathcal{G}_v$ le champ algébrique sur $\mathbb{Z}[v,v^{-1}]$ qui classifie les courbes elliptiques généralisées E sur un $\mathbb{Z}[v,v^{-1}]$-schéma, lisses ou à k côtés, munies d'un isomorphisme $E_k \simeq X_v$. Après extension des scalaires à $\mathbb{Z}[v^{1/k}]$, X_v devient isomorphe à $\mu_k \times \mathbb{Z}/k$, et $\mathcal{G}_v$ à $\mathcal{G}$ de V 4.4. L'application définie par la courbe $\mathbb{G}_m^{T/(vT^k)^{\mathbb{Z}}}$ identifie donc $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[v,v^{-1}][[T]])$ au complété formel de $\mathcal{G}_v$ le long d'une section à l'infini.

Sous les hypothèses de 2.6, il existe $v \in A^*$ tel que C_k soit isomorphe à X_v et C_s à $\mathbb{G}_m^{t/(v\tau^k)^{\mathbb{Z}}}$ sur k(s). La courbe C est donc image réciproque de la courbe $\mathbb{G}_m^{T/(vT^k)^{\mathbb{Z}}}$ sur $\mathbb{Z}[v,v^{-1}][[T]]$, et 2.6 en résulte.

2.7. Prouvons VI 6.14. Avec les notations de loc. cit., on se ramène à supposer v complet à corps résiduel séparable clos. Soit C le modèle de Néron de la courbe elliptique E sur le corps des fractions, et appliquons 2.6 à C. On trouve



Authority visual fallback P0159-A05.

et, puisque C est régulier, t est une uniformisante. D’après 2.1 et VI 1.1, on a

$j(E)^{-1} = \pm(ut^k) + \Sigma_{n>0} d_n(ut^k)^n$,

et j(E) est donc de valuation -k.

3. Application : développement d’une forme modulaire en série de Fourier.

Nous montrerons au § 4 que, après extension des scalaires à $\mathbb{Q}$, les notions introduites dans ce paragraphe coïncident avec des notions classiques.

Définition 3.1. L’algèbre des formes modulaires entières est l’algèbre graduée $\bigoplus_k H^0(\mathcal{M}_1,\omega^{\otimes k})$. En d’autres termes, une forme modulaire entière de poids k est une loi, compatible au changement de base, qui à C/S, une courbe elliptique généralisée irréductible sur un schéma S, associe une section sur S de $\omega^{\otimes k}$.

Définition 3.2. L’algèbre des formes modulaires entières de niveau $H \subset GL(2,\mathbb{Z}/n)$ est l’algèbre graduée $\bigoplus_k H^0(\mathcal{M}_H,\omega^{\otimes k})$.

Le lemme suivant permet, dans certains cas, de ne considérer que les $\mathcal{M}_n$.

Lemme 3.3. On a $H^0(\mathcal{M}_H,\omega^{\otimes k}) \simeq H^0(\mathcal{M}_n,\omega^{\otimes k})^H$.

Preuve : puisque $\mathcal{M}_H[1/n] \simeq [\mathcal{M}_n[1/n]/H]$, on a $H^0(\mathcal{M}_H[1/n],\omega^{\otimes k}) \simeq H^0(\mathcal{M}_n[1/n],\omega^{\otimes k})^H$. On conclut par la normalité de $\mathcal{M}_H$: pour qu’une section rationnelle de $\omega^{\otimes k}$ sur $\mathcal{M}_H$ soit partout définie, il suffit que son image réciproque sur le revêtement fini



Authority visual fallback P0160-A05.

$\mathcal{M}$_n le soit.

Théorème 3.4. L’algèbre des formes modulaires entières de niveau H est une $\mathbb{Z}$-algèbre de type fini.

Preuve : d’après 3.3, il suffit de traiter le cas de $\mathcal{M}$_n, n grand. Dans ce cas, $\mathcal{M}$_n = M_n est un schéma projectif sur $\mathbb{Z}$, et ω est un faisceau inversible ample sur M_n. Le diviseur de la section Δ de ω^{⊗12} est en effet un multiple de M_n^∞ ; il rencontre chaque composante irréductible de chaque fibre de M_n sur $\mathbb{Z}$, donc est ample. Le théorème résulte donc du théorème général EGA III, 2.3.4.1.

3.5. On peut aussi considérer des formes modulaires à coefficients dans des algèbres sur $\mathbb{Z}$. Comme nous ne sommes pas sûr de la définition correcte dans le cas général, nous nous limiterons pour l’essentiel au cas des $\mathcal{M}$_n, vus comme $\mathbb{Z}$[ζ_n]-champs.

Définition 3.6. Soit A une algèbre sur $\mathbb{Z}$[ζ_n]. Une forme modulaire de niveau n et de poids k sur la $\mathbb{Z}$[ζ_n]-algèbre A est un élément de $H^0(\mathcal{M}_n \otimes_{\mathbb{Z}[\zeta_n]} A, \omega^{\otimes k})$.

3.7. Soit φ une forme modulaire (cf. 3.6). Évaluons φ sur la courbe de Tate à n côtés $\mathbb{G}$_m^{q^{1/n}}/q^$\mathbb{Z}$ sur A[[q^{1/n}]] : la courbe de Tate définit un morphisme (2.1) τ : Spec(A[[q^{1/n}]]) → $\mathcal{M}$_n ⊗_{$\mathbb{Z}$[ζ_n]} A ; l’image inverse de ω par τ est trivialisée (par la section dx/x (1.12.)) ; on a donc τ*φ = f_φ(q)(dx/x)^{⊗k} avec f_φ(q) ∈ A[[q^{1/n}]]. On appelle f_φ le développement en série de Fourier de φ. Puisque la courbe

de Tate à n côtés est définie déjà sur $\mathbb{Z}[[q^{1/n}]] \otimes_{\mathbb{Z}} A$ (le sous-anneau de $A[[q^{1/n}]]$ formé des séries formelles dont les coefficients engendrent un $\mathbb{Z}$-module de type fini) on a

(3.7.1) $f_\varphi(q) \in \mathbb{Z}[[q^{1/n}]] \otimes_{\mathbb{Z}} A \subset A[[q^{1/n}]]$.

3.8. Soit φ une forme modulaire (cf. 3.6). Pour $g \in SL(2,\mathbb{Z}/n)$, nous noterons $g\varphi$ la forme modulaire qui à une courbe avec structure de niveau n (C,α) sur S associe la section $(g\varphi)(C,\alpha) = \varphi(C, g^{-1}\alpha)$ de $\omega^{\otimes k}$ sur S.

Les $f_{g\varphi}$ sont les développements aux pointes de φ. Si $u = \pm\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, et que $f_\varphi = \Sigma c_m q^m$ $(m \in \frac{1}{n}\mathbb{Z})$, on a

(3.8.1) $f_{u\varphi} = (-1)^k \Sigma c_m \zeta_n^{amn} q^m$.

Théorème 3.9. Soit φ une forme modulaire de niveau n et de poids k à coefficients dans la $\mathbb{Z}[\zeta_n]$-algèbre A.

(i) Si les développements aux pointes $f_{g\varphi}$ sont nuls, alors φ est nul.

(ii) Si B est une sous-algèbre de A, et que les $f_{g\varphi}$ sont dans $B[[q^{1/n}]]$, alors φ est à coefficients dans B (provient par extension des scalaires d'une unique forme sur B).

Preuve : si A est un $\mathbb{Z}[\zeta_n]$-module, on définit une forme modulaire de niveau n et poids k à coefficients dans A comme un élément de $H^0(\mathcal{M}_n, A \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \omega^{\otimes k})$. Pour A une algèbre, cette définition coïncide avec 3.6. Le développement en série de Fourier f_φ d'une telle forme φ se définit comme en 3.7. On a $f_\varphi \in A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}[[q^{1/n}]] \subset A[[q^{1/n}]]$. Nous prouverons (i) et (ii) en supposant seulement que A et B soient des modules.



-304-

Deligne-162

de Tate à n côtés est définie déjà sur $\mathbb{Z}[[q^{1/n}]] \otimes_{\mathbb{Z}} A$ (le sous-anneau de $A[[q^{1/n}]]$ formé des séries formelles dont les coefficients engendrent un $\mathbb{Z}$-module de type fini) on a

(3.7.1) $f_\varphi(q) \in \mathbb{Z}[[q^{1/n}]] \otimes_{\mathbb{Z}} A \subset A[[q^{1/n}]]$.

3.8. Soit φ une forme modulaire (cf. 3.6). Pour $g \in SL(2,\mathbb{Z}/n)$, nous noterons $g\varphi$ la forme modulaire qui à une courbe avec structure de niveau n (C,α) sur S associe la section $(g\varphi)(C,\alpha) = \varphi(C, g^{-1}\alpha)$ de $\omega^{\otimes k}$ sur S .

Les $f_{g\varphi}$ sont les développements aux pointes de φ . Si $u = \pm\left(\begin{smallmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, et que $f_\varphi = \Sigma c_m q^m$ $(m \in \frac{1}{n}\mathbb{Z})$, on a

(3.8.1) $f_{u\varphi} = (-1)^k \Sigma c_m \zeta_n^{amn} q^m$.

Théorème 3.9. Soit φ une forme modulaire de niveau n et de poids k à coefficients dans la $\mathbb{Z}[\zeta_n]$-algèbre A .

(i) Si les développements aux pointes $f_{g\varphi}$ sont nuls, alors φ est nul.

(ii) Si B est une sous-algèbre de A , et que les $f_{g\varphi}$ sont dans $B[[q^{1/n}]]$, alors φ est à coefficients dans B (provient par extension des scalaires d'une unique forme sur B).

Preuve : Si A est un $\mathbb{Z}[\zeta_n]$-module, on définit une forme modulaire de niveau n et poids k à coefficients dans A comme un élément de

$$H^0(\mathcal{M}_n, A \otimes_{\mathbb{Z}[\zeta_n]} \omega^{\otimes k}) .$$

Pour A une algèbre, cette définition coïncide avec 3.6. Le développement en série de Fourier f_φ d'une telle forme φ se définit comme en 3.7. On a

$$f_\varphi \in A \otimes \mathbb{Z}[[q^{1/n}]] \subset A[[q^{1/n}]] .$$

Nous prouverons (i) et (ii) en supposant seulement que A et B soient des modules.

Prouvons (i). Si A est une limite inductive $\lim\rightarrow A_i$, on a

$H^0(\mathcal{M}_n, A \otimes \omega^k) = \lim\rightarrow H^0(\mathcal{M}_n, A_i \otimes \omega^k)$.

Il suffit donc de traiter le cas où A est un $\mathbb{Z}[\zeta_n]$-module de type fini. Si les f_{gφ} sont nuls, (2.4) montre que φ s'annule sur le complété formel de $\mathcal{M}_n$ le long de l'infini. Le support de φ, disjoint d'au moins un point de chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique de $\mathcal{M}_n$, est donc fini sur $\mathbb{Z}[\zeta_n]$. Puisque $\mathcal{M}_n$ est de Cohen–Macaulay sur $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ et que $A \otimes \omega^k$ est localement l'image réciproque d'un module sur $\mathbb{Z}[\zeta_n]$, ceci est absurde si $\varphi \neq 0$.

Prouvons (ii). Soit Spec(Ĥ) la somme des complétés formels de $\mathcal{M}_n$ le long des sections à l'infini gf_n ($g \in SL(2, \mathbb{Z}/n)$). Les développements aux pointes définissent une application

$H^0(\mathcal{M}_n, A \otimes \omega^k) \to A \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \hat{D}$.

On prouve (ii) en contemplant le diagramme suivant, dont la 2e ligne est exacte car Ĥ est plat sur $\mathbb{Z}[\zeta_n]$:

$0 \to H^0(\mathcal{M}_n, B \otimes \omega^k) \to H^0(\mathcal{M}_n, A \otimes \omega^k) \to H^0(\mathcal{M}_n, A/B \otimes \omega^k)$
$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$
$0 \to B \otimes \hat{D} \to A \otimes \hat{D} \to A/B \otimes \hat{D}$.

Théorème 3.10. (i) On a

$H^0(\mathcal{M}_n, \omega^k) \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \mathbb{Q}(\zeta_n) \simeq H^0(\mathcal{M}_n \otimes \mathbb{Q}, \omega^k)$.

(ii) Soient $\varphi \in H^0(\mathcal{M}_n \otimes \mathbb{Q}, \omega^k)$, $f\varphi(q) = \sum a_i q^i$ ($i \in 1/n\,\mathbb{Z}$, $a_i \in \mathbb{Q}(\zeta_n)$) le développement de φ en série de Fourier, et π une place de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$. Alors

$\nu\pi(f\varphi) = \deg(f_n)\ \inf(\nu\pi(a_i))$

est l'ordre du zéro (ou − l'ordre du pôle) de φ au point générique de celle des composantes irréductibles de la fibre de $\mathcal{M}_n$ en π qui intersecte la section à l'infini f_n.



Authority visual fallback P0163-A05.

Authority page 164 ; collected-paper page 657 ; original folio 306.

Du point de vue adopté ici, ce théorème est trivial ; il résulte de

Corollaire 3.11. Soit $\sum a_i q^i$ le développement en série de Fourier de $\varphi \in H^0(\mathcal{M}_n \otimes \mathbb{Q}, \omega^k)$. Le dénominateur des a_i est borné.

Corollaire 3.12. Soient π une place de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ de caractéristique p, p^m la plus grande puissance de p qui divise n et g un élément de SL(2, $\mathbb{Z}/n$) dont l'image dans SL(2, $\mathbb{Z}/p^m$) est dans le groupe triangulaire supérieur. Alors

$\nu\pi(f\varphi) = \nu\pi(f_{\{g\varphi\}})$.

Les pointes f_n et gf_n rencontrent en effet la même composante irréductible de caractéristique p.

Corollaire 3.13. Si le développement en une pointe de $\varphi \in H^0(\mathcal{M}_n \otimes \mathbb{Q}, \omega^k)$ est à coefficients dans $\mathbb{Z}[\zeta_n][1/n]$, alors le développement aux autres pointes a la même propriété.

3.14. Soit $\varphi \in H^0(\mathcal{M}_n, \omega^k)$. Si π est une place de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$, de caractéristique p, et que les premiers coefficients du développement de φ en série de Fourier sont divisibles par π, la réduction de φ mod π s'annule un certain nombre de fois au point à l'infini f_n. Notons $\nu(\pi,g,\varphi)$ l'ordre du 0 de $g\varphi$:

si $f_{g\varphi}(q) = \sum a_i q^i$ ($i \in 1/n\,\mathbb{Z}$), alors $a_i \equiv 0$ (π) pour $ni < \nu(\pi,g,\varphi)$.

On peut calculer à l'aide de φ le degré de ω^k sur $\mathcal{M}_n$. Le résultat est déjà connu (cf. VI 4.4). On obtient, tout calcul fait :

Corollaire 3.14. Soit π une place de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ de caractéristique p, p^m la plus grande puissance de p qui divise n, et $\varphi \in H^0(\mathcal{M}_n, \omega^k)$. Pour g parcourant l'ensemble BSL des éléments de SL(2, $\mathbb{Z}$/n) dont l'image dans SL(2, $\mathbb{Z}/p^m$) est dans le groupe triangulaire supérieur, on a

-336-

DeRe-19%

Du point de vue adopté ici, ce théorème est trivial; il résulte de

Corollaire 3.11. Soit $\sum a_i q^{i/n}$ le développement en série de Fourier de $\varphi \in H^0(\mathcal{M}_n \otimes \mathbb{Q}, \omega^k)$. Le dénominateur des a_i est borné.

Corollaire 3.12. Soient π une place de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ de caractéristique p, p^m la plus grande puissance de p qui divise n, et g un élément de SL(2, $\mathbb{Z}$/n) dont l'image dans SL(2, $\mathbb{Z}/p^m$) est dans le groupe triangulaire supérieur. Alors

$$\nu_\pi(f_{g\varphi}) = \nu_\pi(f_{g'\varphi}) \quad .$$

Les pointes f_n et gf_n rencontrent en effet la même composante irréductible de caractéristique p.

Corollaire 3.13. Si le développement en une pointe de $\varphi \in H^0(\mathcal{M}_n \otimes \mathbb{Q}, \omega^k)$ est à coefficients dans $\mathbb{Z}[\zeta_n][1/n]$, alors le développement aux autres pointes a la même propriété.

3.14. Soit $\varphi \in H^0(\mathcal{M}_n, \omega^k)$. Si π est une place de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$, de caractéristique p, et que les premiers coefficients du développement de φ en série de Fourier de φ sont divisibles par π, la réduction de φ mod π s'annule un certain nombre de fois au point à l'infini f_n. Notons $\nu(\pi,g,\varphi)$ l'ordre du 0 de $g\varphi$:

$$\text{si } f_{g\varphi}(q) = \sum a_i q^{i/n} \qquad (i \in \tfrac{1}{n}\mathbb{Z}) \ ,$$

$$\text{alors } a_i \equiv 0 \ (\pi) \qquad \text{pour } ni < \nu(\pi,g,\varphi) \ .$$

On peut calculer à l'aide de φ le degré de ω^k sur $\mathcal{M}_n$. Le résultat est déjà connu (cf. VI 4.4). On obtient, tout calcul fait :

Corollaire 3.14. Soit π une place de $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ de caractéristique p, p^m la plus grande puissance de p qui divise n, et $\varphi \in H^0(\mathcal{M}_n, \omega^k)$. Pour g parcourant l'ensemble BSL des éléments de SL(2, $\mathbb{Z}$/n) dont l'image dans SL(2, $\mathbb{Z}/p^m$) est dans le groupe triangulaire supérieur, on a

Authority visual fallback P0164-A05.

$$|SL(2, \mathbb{Z}/n)|^{-1} \sum\nolimits_{g \in BSL} \nu(\pi,g,\varphi) \le |\mathbb{P}^1(\mathbb{Z}/p^m)|^{-1}\, k/12.$$

Pour n = 1, ce résultat se reformule comme suit.

Corollaire 3.15. Soient p un nombre premier et $\varphi \in H^0(\mathcal{M}_1, \omega^k)$ une forme modulaire de développement en série $f\varphi(q) = \sum a_n q^n$. On a

$$\nu p(f\varphi) = \inf\{\nu p(a_i) \mid i \le k/12\}.$$

En d'autres termes, pour vérifier que les coefficients d'une forme modulaire de poids k sont divisibles par une puissance de p, il suffit de le vérifier pour ceux d'indice $\le k/12$.

3.16. On peut aussi relier ce qui se passe sur les diverses composantes irréductibles de caractéristique p. À titre d'exemple, nous allons traiter le cas des formes modulaires de niveau $\Gamma_0(p)$. Les mêmes arguments s'appliquent à l'étude, en p, des formes modulaires de niveau $\Gamma_0(p) \cap \Gamma(n)$ (n premier à p). Passer à un tel niveau nous dispenserait de l'usage de nombres d'intersection fractionnaires, introduits sur le modèle de VI 4.

3.17. Soit $\varphi \in H^0(\mathcal{M}_\{\Gamma_0(p)\} \otimes \mathbb{Q}, \omega^k)$. Une telle forme a deux « développements aux pointes ».

a) On évalue φ sur la courbe de Tate $\mathbb{G}_m\hat{}q/q\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}[[q]] \otimes \mathbb{Q}$, munie de son sous-groupe μp (1.16.3) ; on obtient

${}_1f\varphi(q)\cdot(dx/x)^k$, avec ${}_1f\varphi(q) \in \mathbb{Z}[[q]] \otimes \mathbb{Q}$.

b) On évalue φ sur la courbe de Tate

$\mathbb{G}_m\hat{}\{q^{1/p}\}/q\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}[[q^{1/p}]] \otimes \mathbb{Q}$,



Authority visual fallback P0165-A05.

munie de son sous-groupe isomorphe à $\mathbb{Z}/p$ engendré par q. On obtient

${}_2f\varphi(q)\cdot(dx/x)^k$, avec ${}_2f\varphi(q) \in \mathbb{Z}[[q^{1/p}]] \otimes \mathbb{Q}$.

Pour $\ell \neq p$, les valuations ℓ-adiques de ${}_1f\varphi$ et ${}_2f\varphi$ (borne inférieure des valuations ℓ-adiques des coefficients) coïncident. Nous noterons $\nu_1(\varphi)$ et $\nu_2(\varphi)$, ou simplement ν_1 et ν_2 les valuations p-adiques de ${}_1f\varphi$ et ${}_2f\varphi$.

3.18. Nous étendrons comme suit l'involution w (V.1.3) aux formes modulaires. La forme wφ associe à la courbe elliptique C/S, munie d'un sous-groupe A ⊂ C[p], l'image réciproque dans ω^k de la section φ(C/A,Cp/A) de $(\omega_{(C/A)/S})^k$. On a

$ww\varphi = p^k\varphi$.

On vérifie que

${}_1f_{w\varphi}(q) = p^k\ {}_2f\varphi(q^p)$,

${}_2f_{w\varphi}(q) = {}_1f\varphi(q^{1/p})$.

On a donc

$(\nu_1(w\varphi), \nu_2(w\varphi)) = (k + \nu_2(\varphi), \nu_1(\varphi))$,

et $\nu_2 - \nu_1 + k/2$ change de signe par passage de φ à wφ.

3.19. Nous nous proposons d'estimer $\nu_1 - \nu_2$. Le nombre ne change pas quand on multiplie φ par un entier ; on peut donc supposer que

$\varphi \in H^0(\mathcal{M}_{\Gamma_0(p)}, \omega^k)$.

On suppose que φ n'est pas identiquement nul. Si N_1 et N_2 sont les deux composantes irréductibles de $\mathcal{M}_{\Gamma_0(p)} \otimes \mathbb{F}p$, correspondant respectivement aux courbes (C,A) avec A infinitésimal et A discret, le diviseur de φ s'écrit

div(φ) = D + ν₁N₁ + ν₂N₂.



Authority visual fallback P0166-A05.

où le diviseur D ne rencontre N₁ et N₂ qu'en un nombre fini de points. Sur le champ régulier $\mathcal{M}_{\Gamma_0(p)}$, div(p) = N₁ + N₂, d'où la nullité des nombres d'intersection

(N₁ + N₂, N₁) = (N₁ + N₂, N₂) = 0.

Sur N₁ ≃ $\mathcal{M}_1 \otimes \mathbb{F}p$, ω est de degré 1/24 ; on a donc

(div(φ), N₁) = k/24.

De même, puisque sur $\mathcal{M}_{\Gamma_0(p)}$ ω est de degré 1/24 [$\mathcal{M}_{\Gamma_0(p)}$:$\mathcal{M}_1$] = (p+1)/24, on a

deg(D) = (D,N₁) + (D,N₂) = (p+1)k/24.

D'après VI.4.9, (N₂,N₁) = (p−1)/24.

On a

(D + ν₁N₁ + ν₂N₂, N₁) = (D,N₁) + ν₁(N₁+N₂,N₁) + (ν₂−ν₁)(N₂,N₁)

= ½((D,N₁)+(D,N₂)) + ½((D,N₁)−(D,N₂)) + (ν₂−ν₁+k/2)(N₂,N₁) − k/2(N₂,N₁).

Insérant les expressions plus haut, on obtient

½·k·(p+1)/24 + ½((D,N₁)−(D,N₂)) + (ν₂−ν₁+k/2)(p−1)/24 − k/2·(p−1)/24 = k/24.

(ν₂−ν₁+k/2)(p−1)/24 = ½((D,N₂)−(D,N₁)).

Proposition 3.20. On a

ν₂−ν₁+k/2 = ½·24/(p−1) ((D,N₂)−(D,N₁)),

(D,N₁) + (D,N₂) = k·(p+1)/24,

et donc

|ν₂−ν₁+k/2| ≤ ½·k·(p+1)/(p−1).

Authority visual fallback P0167-A05.

Authority page 168 ; collected-paper page 661 ; original folio 310.

En particulier, si ₁fφ(q) est p-entier, alors la valuation p-adique de ₁f_{wφ}(q) est ≥ −k/(p−1).

4. Comparaison avec la théorie transcendante.

4.1. Nous noterons D le disque unité ouvert ⊂ $\mathbb{C}$, q la coordonnée courante sur D (= l'inclusion D ↪ $\mathbb{C}$) et D* le disque épointé D − {0}.

Nous noterons D[$q^{1/k}$] la surface de Riemann de $q^{1/k}$: c'est une copie du disque unité, dont la coordonnée courante s'appelle $q^{1/k}$, munie de l'application u : D[$q^{1/k}$] → D telle que q ∘ u = $(q^{1/k})^k$.

4.2. Une construction identique à la construction 1.1 fournit un espace analytique $\overline{\mathbb{G}}_m$^q sur D ; la translation par la section q (x_1 = 1) définit une action de $\mathbb{Z}$ sur $\overline{\mathbb{G}}_m$^q ; cette action est libre (car |q| < 1). Par passage au quotient, on obtient un espace analytique $\overline{\mathbb{G}}_m$^q/q$\mathbb{Z}$ sur D, qui est une famille de courbes elliptiques généralisées paramétrée par D (la courbe de Tate).

La fibre du morphisme $\overline{\mathbb{G}}_m$^q/q$\mathbb{Z}$ → D* en le point q ∈ D* est la courbe elliptique $\mathbb{C}$*/q$\mathbb{Z}$ ≃ $\mathbb{C}$/($\mathbb{Z}$ + (log q)/(2πi)·$\mathbb{Z}$).

4.3. De même, la courbe de Tate à k côtés sur D[$q^{1/k}$] est le quotient $\overline{\mathbb{G}}_m$^{$q^{1/k}$}/q$\mathbb{Z}$.

4.4. Les constructions 4.2 et 1.15 sont compatibles au sens suivant. On dispose d'un système cohérent d'isomorphismes d'espaces analytiques

($\overline{\mathbb{G}}_m$^q/q$\mathbb{Z}$, analytique, restreint à Spec($\mathbb{C}$[[q]]/(q^N)) ⊂ D) ≃ (($\overline{\mathbb{G}}_m$/q$\mathbb{Z}$, algébrique) ⊗_{$\mathbb{Z}$[[q]]} $\mathbb{C}$[[q]]/(q^N))^{an}.



Authority visual fallback P0168-A05.

Authority page 169 ; collected-paper page 662 ; original folio 311.

De même, on dispose d’isomorphismes d’espaces analytiques sur

$\mathbb{C}[[q^{1/k}]]/(q^N)$:

$(\overline{\mathbb{G}}_m\hat{}\{q^{1/k}\}/q\mathbb{Z}$, analytique, restreint à $\mathrm{Spec}(\mathbb{C}[[q^{1/k}]]/(q^N)) \subset D[q^{1/k}]) \simeq ((\overline{\mathbb{G}}_m\hat{}\{q^{1/k}\}/q\mathbb{Z}$, algébrique) $\otimes_{\mathbb{Z}[[q^{1/k}]]} \mathbb{C}[[q^{1/k}]]/(q^N))^{an}$;

ces isomorphismes respectent les structures 1.16 des deux membres.

4.5. Classiquement, une forme modulaire de poids k et de niveau n est une fonction holomorphe f sur le demi-plan de Poincaré

$X = \{z \mid \mathrm{Im}(z) > 0\}$

vérifiant les conditions suivantes.

(A) Si (a b ; c d) ∈ SL(2, $\mathbb{Z}$) est congru à (1 0 ; 0 1) mod n,

$f(z) = (cz+d)^{-k}\, f((az+b)/(cz+d))$.

Cette condition implique que, pour γ ∈ SL(2, $\mathbb{Z}$/n), image de γ_0 = (a b ; c d) ∈ SL(2, $\mathbb{Z}$), la fonction

$f|\gamma_0 : z \mapsto (cz+d)^{-k}\, f((az+b)/(cz+d))$

ne dépend que de γ, non du choix de γ_0. On la note f|γ.

(B) Pour tout γ ∈ SL(2, $\mathbb{Z}$/n),

(f|γ)(z) reste borné pour Im(z) → ∞

(il revient au même, et est plus honnête, de demander que f|γ soit à croissance polynomiale dans les bandes verticales, pour Im(z) → ∞).

Une telle fonction est périodique de période n, donc admet un développement en série de Fourier

$f(z) = \sum a_m\, e\hat{}(2\pi i m z)$ ($m \in (1/n)\mathbb{Z}$, $m \geq 0$).



Authority visual fallback P0169-A05.

Construction 4.6. Les formes modulaires de poids k et de niveau n s'identifient aux sections de

$$H^0(\mathcal{M}_n \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \mathbb{C}, \omega^{\otimes k}) = H^0(\mathcal{M}_n, \omega^{\otimes k}) \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \mathbb{C}.$$

Preuve. Supposons tout d'abord que $n \geq 3$. Dans ce cas, $\mathcal{M}_n \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \mathbb{C} = M_n \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \mathbb{C}$ est un schéma. L'espace analytique sous-jacent à $M_n^\circ \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \mathbb{C}$ est

$$X/\mathrm{Ker}(SL(2, \mathbb{Z}) \to SL(2, \mathbb{Z}/n)),$$

et les sections holomorphes de $\omega^{\otimes k}$ sur cet espace s'identifient aux fonctions holomorphes sur X vérifiant 4.5 (A). L'espace analytique sous-jacent à $M_n \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \mathbb{C}$ s'en déduit en ajoutant un nombre fini de points. Une section holomorphe de $\omega^{\otimes k}$ sur $M_n^\circ \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \mathbb{C}$ se prolonge à $M_n \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \mathbb{C}$ si et seulement si elle vérifie (B). D'après GAGA, ces sections sont les sections algébriques de $\omega^{\otimes k}$ sur $M_n \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \mathbb{C}$.

On ramène le cas où n est quelconque au précédent en passant aux invariants par

$$\mathrm{Ker}(SL(2, \mathbb{Z}/3n) \to SL(2, \mathbb{Z}/n))$$

dans l'espace des formes modulaires de poids 3n. On pourrait aussi invoquer GAGA pour le champ algébrique $\mathcal{M}_n \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \mathbb{C}$.

4.7. Pour $n \geq 3$, $(M_n \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \mathbb{C})^{an}$ est aussi l'espace analytique classifiant les courbes elliptiques généralisées C/S sur des espaces analytiques S, munies d'une structure de niveau n, α, telle que $\det(\alpha) = 1$. De ce point de vue, une forme modulaire f est une loi qui, à toute telle courbe, associe une section de $\omega^{\otimes k}$ sur S. Le développement en série de Fourier s'obtient alors en évaluant la forme sur la courbe de Tate (4.3) (et en multipliant le résultat par une puissance de $2\pi i$ dépendant des normalisations choisies). Pour $\varphi \in H^0(M_n \otimes_{\{\mathbb{Z}[\zeta_n]\}} \mathbb{C}, \omega^{\otimes k})$, la compatibilité 4.4 montre que ce développement coïncide avec le développement défini de façon purement algébrique au § 3.

4.8. De ce point de vue, les résultats du § 3 fournissent des propriétés arithmétiques des coefficients des développements en série de Fourier aux diverses pointes des fonctions sur X vérifiant 2.5 (A) et (B). Par exemple :

- L'algèbre graduée des formes modulaires de niveau n (2.5) est le produit tensoriel avec $\mathbb{C}$ sur $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ de la sous-algèbre de type fini sur $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ formée de celles



Authority visual fallback P0170-A05.

pour lesquelles les développements en série de Fourier des f|γ sont à coefficients dans $\mathbb{Z}[\zeta_n]$.

- Si le développement de f est à coefficients dans $\mathbb{Z}[\zeta_n][1/n]$, celui de f|γ a la même propriété.

Authority visual fallback P0171-A05.

Bibliographie

[1] M. Artin : The implicit function theorem in algebraic geometry ; Proc. Colloq. Alg. Geom. ; Bombay, 1968.

[2] M. Artin : Algebraization of formal moduli, in A Collection of Mathematical Papers in Honor of K. Kodaira, University of Tokyo Press 1969.

[3] M. Artin : Construction Techniques for Algebraic Spaces ; Actes du Congrès Intern. Math. 1970 ; Tome 1 ; pg. 419.

[4] M. Artin, G. Winters : Degenerate Fibres and Stable Reduction of curves ; Topology 10 (1971), pg. 373.

[5] W. Casselman : On Abelian Varieties with many Endomorphisms and a Conjecture of Shimura's ; Inventiones Math. 12 (1971), pg. 225.

[6] P. Deligne : Formes modulaires et représentations ℓ-adiques ; Sém. Bourbaki 355, Février 1969 ; Springer Lecture Notes 179 (1971).

[7] P. Deligne : Formes modulaires et représentations de GL_2 ; dans ce volume des Proceedings du congrès.

[8] P. Deligne, D. Mumford : The irreducibility of the space of curves of given genus ; Publ. Math. IHES, 36 (1969).

[9] M. Deuring : Invarianten und Normalformen elliptischer Funktionenkörper ; Math. Z. 47 (1941), pg. 47.

[10] R. Hartshorne : Residues and Duality ; Springer Lecture Notes, 20 (1966).

[11] J. Igusa : Fibre systems of Jacobian varieties ; Ann. J. Math. 81 (1959), pg. 453.

[12] L. Illusie : Complexe cotangent et déformations I ; Springer Lecture Notes, 239 (1971).

[13] N. Katz : P-adic prpperties of moduli schemes ; dans le 2e volume des Proceedings du congrès.

[14] K. Kodaira : On compact analytic surfaces ; in Analytic Functions, Princeton Univ. Press, 1960.

[15] M. Lichtenbaum : Curves over discrete valuation rings ; Am. J. Math. 90 (1968), pg. 380.



-315-

DeRa-172

Bibliographie

[1] M. Artin : The Implicit function theorem in algebraic geometry; Proc. Colloq. Alg. Geom.; Bombay, 1968.

[2] M. Artin : Algebraization of formal moduli, in A Collection of Mathematical Papers in Honor of K. Kodaira, University of Tokyo Press 1969.

[3] M. Artin : Construction Techniques for Algebraic Spaces; Actes du Congrès Intern. Math. 1970; Tome 1; pg. 419.

[4] M. Artin, G. Winters : Degenerate Fibres and Stable Reduction of curves; Topology 10 (1971), pg. 373.

[5] W. Casselman : On Abelian Varieties with many Endomorphisms and a Conjecture of Shimura's;Inventiones Math. 12 (1971), pg. 225.

[6] P. Deligne : Formes modulaires et représentations ℓ-adiques; Sém. Bourbaki 355, Février 1969; Springer Lecture Notes 179 (1971).

[7] P. Deligne : Formes modulaires et représentations de GL_2 ; dans ce volume des Proceedings du congrès.

[8] P. Deligne, D. Mumford : The irreducibility of the space of curves of given genus; Publ. Math. IHES, 36 (1969).

[9] M. Deuring : Invarianten und Normalformen elliptischer Funktionenkörper; Math. Z. 47 (1941) pg. 47.

[10] R. Hartshorne : Residues and Duality; Springer Lecture Notes, 20 (1966)

[11] J. Igusa : Fibre systems of Jacobian varieties; Ann. J. Math. 81 (1959), pg. 453.

[12] L. Illusie : Complexe cotangent et déformations I; Springer Lecture Notes, 239 (1971).

[13] N. Katz : P-adic properties of moduli schemes; dans le 2^e volume des Proceedings du congrès.

[14] K. Kodaira : On compact analytic surfaces; in Analytic Functions, Princeton Univ. Press, 1960.

[15] M. Lichtenbaum : Curves over discrete valuation rings; Am. J. Math. 90 (1968), pg. 380.

Authority visual fallback P0172-A05.

Authority page 173 ; collected-paper page 666 ; original folio 315.

[16] J. Lipman : Rational Singularities ; Publ. Math. IHES, 36 (1969).

[17] D. Mumford : Picard Groups of Moduli Problems ; in Arithmetical Algebraic Geometry ; Harper & Row, 1965, pg. 33.

[18] D. Mumford : Abelian Varieties ; Oxford University Press 1970.

[19] D. Mumford : Geometric invariant theory ; Springer, Berlin 1965.

[20] A. Néron : Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux, Publ. Math. IHES, 21.

[22] F. Oort, J. Tate : Group schemes of prime order ; Ann. Scient. Ec. Norm. Sup. 3 (1970), pg. 1.

[23] M. Raynaud : Spécialisation du foncteur de Picard ; Comptes Rendus Acad. Sci. 264, pg. 941 et pg. 1001.

[24] M. Raynaud : Modèles de Néron ; Comptes Rendus Acad. Sci. 262, pg. 413.

[25] M. Schlessinger : Functors of Artin Rings ; Trans. Amer. Soc. 130 (1968), pg. 205.

[26] J.-P. Serre : Rigidité du foncteur de Jacobi d'échelon n ≥ 3 ; app. à l'exposé 17 du séminaire Cartan 60/61.

[27] J.-P. Serre : Groupes algébriques et corps de classes ; Hermann 1959.

[29] J.-P. Serre, J. Tate : Good reduction of abelian varieties ; Ann. of Math. 88 (1968), pg. 492.

[30] G. Shimura : Introduction to the arithmetic theory of automorphic functions ; Princeton Univ. Press, 1971.

[31] T. Shioda : On rational points of the generic elliptic curve with level N structure over a field of modular functions of level N ; à paraître.

[32] J. Tate : Classes d'isogénie des variétés abéliennes sur un corps fini (d'après T. Honda) ; Sém. Bourbaki 352 (1968/69) ; Springer Lecture Notes 179.

[33] J. Tate : Courbes elliptiques : formulaire ; mis au goût du jour par P. Deligne ; dans un des volumes des Proceedings du congrès.

[34] J.-L. Verdier : Base change for twisted inverse image of coherent sheaves ; Proc. Colloq. Alg. Geom., Bombay, 1968.



Authority visual fallback P0173-A05.

Authority page 174 ; collected-paper page 667 ; original folio 316.

[35] J. Igusa : On the algebraic theory of elliptic modular functions ; J. Math. Soc. Japan 20, 1968, pg. 96.

[36] J. Igusa : Class number of a definite quaternion with prime discriminant, Proc. Nat. Acad. Sci. 44, 1958, pg. 312.

SIGLES :

EGA - Éléments de géométrie algébrique, par A. Grothendieck et J. Dieudonné, Publ. Math. IHES, 4,8,11,17,20,24,28,32.

SGA - Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie, Notes miméographiées par

l’IHES ; aussi Springer Lecture Notes, 224,225,269,270,288,305.

TDTE - Techniques de descente et théorèmes d’existence ; Exposés de A. Grothendieck au séminaire Bourbaki ; Secrétariat mathématique, Paris 1962.

Une grande partie du matériel du présent article est mieux traitée dans le livre :

N. Katz and B. Mazur - Arithmetic moduli of elliptic curves. Annals of Math. Studies 108, Princeton Univ. Press, Princeton. 1985.



-335-

DeRa-274

[59] J. Igusa : On the algebraic theory of elliptic modular functions; J. Math. Soc. Japan 20, 1968, pg. 96.

[74] J. Igusa : Class number of a definite quaternion with prime discriminant, Proc. Nat. Acad. Sci. 44, 1958, pg. 312.

BIBLIOGRAPHIE :

EGA - Eléments de géométrie algébrique, par A. Grothendieck et J. Dieudonné, Publ. Math. IHES, 4,8,11,17,20,24,28,32.

SGA - Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie, Notes miméographiées par l’IHES; aussi Springer Lecture Notes, 224,225,269,270,288,305.

TDTE - Techniques de descente et théorèmes d’existence; Exposés de A. Grothendieck au séminaire Bourbaki; Secrétariat mathématique, Paris 1962.

Une grande partie du matériel du présent article est mieux traitée dans le livre:

N. Katz and B. Mazur - Arithmetic moduli of elliptic curves. Annals of Math. Studies 108, Princeton Univ. Press, Princeton. 1985.

Authority visual fallback P0174-A05.

FORMES MODULAIRES DE POIDS 1

PAR PIERRE DELIGNE ET JEAN-PIERRE SERRE

A Henri Cartan,
à l'occasion de son
70^e anniversaire

Introduction

La décomposition en produit eulérien, et l'équation fonctionnelle, des séries de Dirichlet associées par Hecke aux formes modulaires de poids 1 suggèrent que celles-ci correspondent à des fonctions L d'Artin de degré 2 du corps $\mathbf{Q}$, autrement dit à des représentations de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ dans $\mathrm{GL}_2(\mathbf{C})$. C'est une telle correspondance, conjecturée par Langlands, que nous établissons ici.

Les trois premiers paragraphes sont préliminaires. Le paragraphe 4 contient l'énoncé du théorème principal, et quelques compléments. La démonstration occupe les paragraphes 5 à 9. Son principe est le suivant : on commence par construire, pour tout nombre premier ℓ, une représentation de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ en caractéristique ℓ (cf. § 6) ; on montre ensuite que les images de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ dans ces diverses représentations sont « petites », ce qui permet de les relever en caractéristique 0, et d'obtenir la représentation complexe cherchée (§§ 7 et 8) ; la « petitesse » en question résulte elle-même d'une majoration en moyenne des valeurs propres des opérateurs de Hecke (Rankin, cf. § 5). Le paragraphe 9 contient une estimation des coefficients des formes modulaires de poids 1.

Signalons que nous avons utilisé en un point essentiel (§ 6, th. 6.1) des résultats démontrés par l'un de nous (P. Deligne), mais dont aucune démonstration complète n'a encore été publiée ; en attendant une telle publication (ainsi que celle de SGA 5, dont ils dépendent), nous demandons au lecteur de bien vouloir les admettre.

§ 1. Rappels (analytiques) sur les formes modulaires

1.1. Soit N un entier ≥ 1. On associe à N les sous-groupes

$$\Gamma(N) \subset \Gamma_1(N) \subset \Gamma_0(N).$$

de $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ définis par

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma(N) \quad \Longleftrightarrow \quad a \equiv d \equiv 1 \pmod{N} \quad \text{et} \quad b \equiv c \equiv 0 \pmod{N},$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_1(N) \quad \Longleftrightarrow \quad a \equiv d \equiv 1 \pmod{N} \quad \text{et} \quad c \equiv 0 \pmod{N},$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(N) \quad \Longleftrightarrow \quad c \equiv 0 \pmod{N}.$$

1.2. Soit f une fonction sur le demi-plan $H = \{z \mid \mathrm{Im}(z) > 0\}$. Si k est un entier, et si $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est un élément de $\mathrm{SL}_2(\mathbf{R})$, on pose

$$(f \mid_k \gamma)(z) = (cz + d)^{-k} f(\gamma z), \qquad \text{où} \qquad \gamma z = \frac{az + b}{cz + d}.$$

Soit Γ un sous-groupe de $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ contenant $\Gamma(N)$. On dit que f est modulaire de poids k sur Γ si :
(1.2.1) $f \mid_k \gamma = f$ pour tout $\gamma \in \Gamma$;
(1.2.2) f est holomorphe sur H ;
(1.2.3) f est « holomorphe aux pointes », i. e., pour tout $\sigma \in \mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$, la fonction $f \mid_k \sigma$ a un développement en série de puissances de $e^{2\pi i z/N}$ à exposants ≥ 0.

Lorsque, dans (1.2.3), on remplace « exposants ≥ 0 » par « exposants > 0 », on obtient la notion de forme modulaire parabolique.

1.3. Soit f une forme modulaire de poids k sur $\Gamma(N)$. Pour que f soit une forme modulaire sur $\Gamma_1(N)$, il faut et il suffit que $f(z + 1) = f(z)$, ou encore que f ait un développement de la forme

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n, \qquad \text{où} \qquad q = e^{2\pi i z}.$$

Dans ce qui suit, ce développement sera noté $f_\infty(q)$, ou simplement f.

1.4. Soit f une forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$. Si $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ est un élément de $\Gamma_0(N)$, la forme $f \mid_k \gamma$ ne dépend que de l'image de d dans $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$; on la note $f \mid R_d$. On a $f \mid R_{-1} = (-1)^k f$.

1.5. Soit ε un caractère de Dirichlet mod N, autrement dit un homomorphisme

$$\varepsilon : (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^* \longrightarrow \mathbf{C}^*.$$

On dit que ε est pair (resp. impair) si $\varepsilon(-1) = 1$ (resp. si $\varepsilon(-1) = -1$).

Soit k un entier de même parité que ε [i. e. $\varepsilon(-1) = (-1)^k$]. On appelle forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$ une forme modulaire f de poids k sur $\Gamma_1(N)$ telle que

$$f \mid R_d = \varepsilon(d) f$$

pour tout $d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$, i. e.

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = \varepsilon(d)(cz+d)^k f(z) \quad \text{pour tout} \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_0(N).$$

(Noter que, si ε et k n'étaient pas de même parité, cette formule entraînerait $f = 0$.)

Toute forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$ est combinaison linéaire de formes de types (k, ε_i) sur $\Gamma_0(N)$, où les ε_i sont les différents caractères de $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$ de même parité que k.

Cela se voit (cf. [16], p. IV-13) en remarquant que l'application

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longmapsto d \pmod N$$

définit par passage au quotient un isomorphisme de $\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N)$ sur $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$.

1.6. OPÉRATEURS DE HECKE. — Soit $f = \sum a_n q^n$ une forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, et soit p un nombre premier. On pose

$$f \mid T_p = \sum a_{pn} q^n + \varepsilon(p) p^{k-1} \sum a_n q^{pn} \qquad \text{si } p \nmid N, \tag{1.6.1}$$

$$f \mid U_p = \sum a_{pn} q^n \qquad \text{si } p \mid N. \tag{1.6.2}$$

On obtient ainsi une autre forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, qui est parabolique si f l'est.

1.7. FORMES PRIMITIVES. — On renvoie à [2] (dans le cas $\varepsilon = 1$) et à [6], [12], [13] (dans le cas général) pour la définition des formes paraboliques primitives (« newforms ») de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$.

Si $f = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$ est une telle forme, on a $a_1 = 1$, et f est fonction propre des opérateurs de Hecke T_p et U_p, les valeurs propres correspondantes étant les a_p. Il en résulte que la série de Dirichlet

$$\Phi_f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s} \tag{1.7.1}$$

admet le développement eulérien

$$\Phi_f(s) = \prod_{p \mid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s}} \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + \varepsilon(p) p^{k-1-2s}}. \tag{1.7.2}$$

1.8. Si f est comme ci-dessus, et si $p \mid N$, la valeur absolue de a_p est donnée par la règle suivante ([12], [14]) :

$$a_p = 0 \quad \text{si } p^2 \mid N \text{ et si } \varepsilon \text{ peut être défini mod } N/p;$$

$$|a_p| = p^{(k-1)/2} \quad \text{si } \varepsilon \text{ ne peut pas être défini mod } N/p;$$

$$|a_p| = p^{k/2-1} \quad \text{si } p^2 \nmid N \text{ et si } \varepsilon \text{ peut être défini mod } N/p.$$

(Il résultera du théorème 4.6 ci-après que le dernier cas ne se présente pas pour $k = 1$.)

1.9. Toute forme f de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$ peut s'écrire

$$f(z) = E(z) + \sum \lambda_i f_i(d_i z),$$

où E est une série d'Eisenstein, et où f_i est parabolique primitive de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N_i)$, N_i étant un diviseur de N tel que ε puisse être défini mod N_i, et d_i un diviseur de N/N_i. De plus, cette décomposition est unique, en un sens évident.

§ 2. Rappels (géométriques) sur les formes modulaires

2.1. Soient k et N des entiers ≥ 1, et μ_N le schéma en groupes des racines N-ièmes de l'unité. Du point de vue géométrique, une forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$ est une loi qui, à chaque courbe elliptique E munie d'un plongement $\alpha : \mu_N \longrightarrow E$, associe une section de la puissance tensorielle k-ième $\omega_E^{\otimes k}$ de ω_E, où ω_E est le dual de l'algèbre de Lie de E.

Précisons :

(a) Une courbe elliptique sur un schéma S est un morphisme propre et lisse $E \longrightarrow S$, muni d'une section $e : S \longrightarrow E$, de fibres géométriques des courbes elliptiques. Lorsque S est le spectre d'un anneau commutatif A, on dit aussi que E est une courbe elliptique sur A. On pose $\omega_E = e^*\Omega^1_{E/S}$; pour $S = \mathrm{Spec}(A)$, ω_E s'identifie à un A-module inversible.

(b) Soit R un anneau commutatif dans lequel N est inversible. Une forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$, méromorphe à l'infini, définie sur R, est une loi qui, à toute courbe elliptique E sur une R-algèbre A, munie d'un plongement $\alpha : \mu_N \longrightarrow E$, associe un élément $f(E, \alpha)$ de $\omega_E^{\otimes k}$. On exige que cette loi soit compatible aux isomorphismes, et à l'extension des scalaires.

(c) On dit que f est holomorphe à l'infini si elle se prolonge en une loi $\tilde{f}$ définie pour les couples (E, α) où E est une courbe elliptique généralisée ([7], II. 1.12) et α un plongement de μ_N dans E dont l'image rencontre chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique ([7], IV. 4.14). Si elle existe, la loi $\tilde{f}$ est unique.

Supposons que R soit un corps. On dit que f est parabolique si elle est holomorphe à l'infini et si $\tilde{f}(E, \alpha) = 0$ chaque fois que E est une courbe elliptique dégénérée (i. e. non lisse) sur une extension algébriquement close de R.

Ces notions pourraient aussi se définir en termes de développements de Laurent en q (cf. [7], VII, § 3).

2.2. Soit f comme ci-dessus. Si $d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$, on définit la forme modulaire $f \mid R_d$ par

$$(f \mid R_d)(E, \alpha) = f(E, d\alpha). \tag{2.2.1}$$

Si ε est un homomorphisme de $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$ dans R^*, on dit que f est de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$ si $f \mid R_d = \varepsilon(d)f$ pour tout $d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$.

2.3. Soit p un nombre premier ne divisant pas N. L'opérateur de Hecke T_p est alors défini sur les espaces de formes modulaires. Si f est une telle forme, et si (E, α) est définie sur un corps algébriquement clos de caractéristique $\neq p$, on a

$$(f \mid T_p)(E, \alpha) = \frac{1}{p} \sum_{\varphi} \varphi^*(f(\varphi E, \varphi \circ \alpha)),$$

où φ parcourt les classes d'isogénies de degré p de source E (deux isogénies étant dans la même classe si leurs noyaux sont égaux).

Les T_p commutent entre eux, et commutent aux R_d.

2.4. Faisons $R = \mathbf{C}$. La donnée de $\alpha : \mu_N \longrightarrow E$ équivaut alors à celle du point

$$\alpha(\exp(2\pi i/N)),$$

qui est d'ordre N. À une forme modulaire f comme ci-dessus, on associe une fonction (encore notée f) sur le demi-plan H par la règle

$$f(z) = f(E_z, 1/N)/(2\pi i\, du)^{\otimes k}, \tag{2.4.1}$$

où E_z désigne la courbe elliptique $\mathbf{C}/(\mathbf{Z} \oplus z\mathbf{Z})$.

Posons $f(z) = f_\infty(e^{2\pi i z})$. La formule (2.4.1) se récrit :

$$f_\infty(q) = f(\mathbf{C}^*/q^{\mathbf{Z}}, \mathrm{Id})/(dt/t)^{\otimes k} \qquad (0 < |q| < 1), \tag{2.4.2}$$

où Id est déduite de l'inclusion de μ_N dans $\mathbf{C}^*$.

Cette construction identifie les espaces de formes modulaires au sens de 2.1 et 2.2 aux espaces de même nom du § 1 ; même chose pour les opérateurs T_p et R_d.

2.5. Pour la définition de la courbe de Tate $\mathbf{G}_m/q^{\mathbf{Z}}$ sur l'anneau $\mathbf{Z}((q)) = \mathbf{Z}[[q]](q^{-1})$, nous renvoyons à [7], VII, § 1. Cette courbe est munie d'une forme différentielle invariante dt/t, et d'un plongement naturel $\mathrm{Id} : \mu_N \longrightarrow \mathbf{G}_m/q^{\mathbf{Z}}$. Si f est une forme modulaire de poids k sur $\Gamma_1(N)$, méromorphe à l'infini, et définie sur un anneau R, on pose

$$f_\infty(q) = f(\mathbf{G}_m/q^{\mathbf{Z}}, \mathrm{Id})/(dt/t)^{\otimes k} \in \mathbf{Z}((q)) \otimes R \subset R((q)).$$

(Dans cette formule, $\mathbf{G}_m/q^{\mathbf{Z}}$ désigne la courbe sur $\mathbf{Z}((q)) \otimes R$ déduite de la courbe de Tate par extension des scalaires.)

Posons

$$f_\infty(q) = \sum a_n q^n \qquad \text{et} \qquad (f \mid R_d)_\infty(q) = \sum a_n(d) q^n, \quad d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*;$$

si p est un nombre premier ne divisant pas N, on a

$$(f \mid T_p)_\infty(q) = \sum a_{pn} q^n + p^{k-1} \sum a_n(p) q^{np}. \tag{2.5.1}$$

En particulier, si f est de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, on a

$$(f \mid T_p)_\infty(q) = \sum a_{pn} q^n + \varepsilon(p) p^{k-1} \sum a_n q^{pn}. \tag{2.5.2}$$

Lorsque $R = \mathbf{C}$, $f_\infty(q)$ est le développement en série de (2.4.2) ; ceci est prouvé dans [7], VII, § 4 (au moins pour f holomorphe, le seul cas qui nous importe). La formule (2.5.2) redonne (1.6.1).

2.6. Si K est un corps de caractéristique 0, notons S_K l'espace vectoriel des formes modulaires paraboliques de poids k sur $\Gamma_1(N)$ qui sont définies sur K. On a

$$S_K = K \otimes_{\mathbf{Q}} S_{\mathbf{Q}}; \tag{2.6.1}$$

on le voit en interprétant S_K comme l'espace des sections d'un faisceau inversible sur le « champ algébrique » correspondant à $\Gamma_1(N)$ (cf. [7], VII, 3.2).

Si K' est un sous-corps de K, une forme $f \in S_K$ appartient à $S_{K'}$ si et seulement si les coefficients de la série $f_\infty(q)$ appartiennent à K'. Cela se voit en se ramenant au cas où K est algébriquement clos, et en remarquant que, pour tout K'-automorphisme σ de K, les formes f et $\sigma(f)$ ont même développement en série, donc coïncident.

PROPOSITION 2.7. — Soit L l'ensemble des $f \in S_{\mathbf{C}}$ telles que $(f \mid R_d)_\infty(q) \in \mathbf{Z}[[q]]$ pour tout $d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$. Alors :

(2.7.1) L est un $\mathbf{Z}$-module libre de type fini, stable par les opérateurs T_p et R_d.

(2.7.2) Pour tout corps K de caractéristique 0, on a $S_K = K \otimes L$.

(2.7.3) Les valeurs propres des T_p dans $S_{\mathbf{C}}$ sont des entiers d'une extension finie de $\mathbf{Q}$.

(2.7.4) Si $f \in S_{\mathbf{C}} = \mathbf{C} \otimes L$ est telle que $f \mid T_p = a_p f$, alors, pour tout automorphisme σ de $\mathbf{C}$, la forme $\sigma(f)$ est telle que $\sigma(f) \mid T_p = \sigma(a_p)\sigma(f)$. Si f est de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, alors $\sigma(f)$ est de type $(k, \sigma(\varepsilon))$ sur $\Gamma_0(N)$.

Si $f \in S_{\mathbf{Q}}$, on a $f \mid R_d \in S_{\mathbf{Q}}$ pour tout $d \in (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$ et les séries $(f \mid R_d)_\infty(q)$ appartiennent à $\mathbf{Z}[[q]] \otimes \mathbf{Q}$, donc ont des dénominateurs bornés. Il en résulte qu'un multiple non nul de f appartient à L, d'où $\mathbf{Q} \otimes L = S_{\mathbf{Q}}$ et d'après (2.6.1) $K \otimes L = S_K$ pour tout corps K de caractéristique 0. Que L soit de type fini provient de ce que les formes linéaires « n-ièmes coefficients des $(f \mid R_d)_\infty(q)$ » séparent les éléments de $S_{\mathbf{Q}}$.

Le fait que L soit stable par les R_d (resp. les T_p) est évident (resp. résulte de (2.5.1)). Les assertions (2.7.3) et (2.7.4) en résultent.

REMARQUE 2.8. — Le fait que la série $f_\infty(q), f \in S_{\mathbf{Q}}$, soit à dénominateurs bornés a été ici déduit du fait que la courbe de Tate est définie sur $\mathbf{Z}((q)) \otimes \mathbf{Q}$. On aurait également pu utiliser le théorème 3.5.2 de Shimura [24], valable lorsque $k \geq 2$, et ramener le poids 1 au poids 13 par multiplication par Δ.

§ 3. Rappels sur les représentations galoisiennes

3.1. Soient $\overline{\mathbf{Q}}$ une clôture algébrique de $\mathbf{Q}$, et $G = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$. Nous aurons à considérer des représentations linéaires de G, autrement dit des homomorphismes continus

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}_n(k),$$

où k est de l'un des types suivants :
(a) le corps $\mathbf{C}$ (avec la topologie discrète) ;
(b) un corps fini (avec la topologie discrète) ;
(c) une extension finie d'un corps ℓ-adique $\mathbf{Q}_\ell$ (avec sa topologie naturelle).
Dans les deux premiers cas, l'image de ρ est finie.

Si p est un nombre premier, on dit que ρ est non ramifiée en p si elle est triviale sur le groupe d'inertie d'une place de $\overline{\mathbf{Q}}$ prolongeant p. On note alors $F_{p,\rho}$ l'image par ρ de la substitution de Frobenius [1] relative à p ; c'est un élément de $\mathrm{GL}_n(k)$, défini à conjugaison près. On pose

$$P_{p,\rho}(T) = \det(1 - F_{p,\rho}T) = 1 - \mathrm{Tr}(F_{p,\rho})T + \cdots + (-1)^n \det(F_{p,\rho})T^n. \tag{3.1.1}$$

La connaissance des polynômes $P_{p,\rho}(T)$ permet presque de reconstituer ρ. De façon plus précise :
LEMME 3.2. — Soit X un ensemble de nombres premiers de densité 1 et soient ρ et ρ' deux représentations linéaires semi-simples de G. Supposons que, pour tout $p \in X$, ρ et ρ' soient non ramifiées, et que $P_{p,\rho}(T) = P_{p,\rho'}(T)$ (resp. que $\mathrm{Tr}(F_{p,\rho}) = \mathrm{Tr}(F_{p,\rho'})$ lorsque k est de caractéristique 0). Alors ρ et ρ' sont isomorphes.

Cela résulte du théorème de densité de Čebotarev, combiné avec le fait qu'une représentation linéaire semi-simple d'un groupe est déterminée, à isomorphisme près, par les polynômes caractéristiques (resp. les traces, si la caractéristique du corps est 0) correspondants ([3], § 30.16).

REMARQUES

3.3. Dans la suite, on appliquera le lemme 3.2 au cas particulier où X est l'ensemble des nombres premiers qui ne divisent pas un entier N donné ; on dira alors que ρ et ρ' sont non ramifiées en dehors de N.

3.4. Lorsque $k = \mathbf{C}$, la condition de semi-simplicité est automatiquement satisfaite, puisque $\rho(G)$ et $\rho'(G)$ sont finis.

§ 4. Résultats

(a) ÉNONCÉ DU THÉORÈME PRINCIPAL

THÉORÈME 4.1. — Soient N un entier ≥ 1, ε un caractère de Dirichlet mod N tel que $\varepsilon(-1) = -1$, et f une forme modulaire de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$, non identiquement nulle. On suppose que f est fonction propre des T_p, $p \nmid N$, avec pour valeurs propres a_p.

1. Nous adoptons ici les conventions d'Artin [1]. Notre « substitution de Frobenius » est donc l'élément noté φ dans [5] ; son inverse est le « Frobenius géométrique ».

Il existe alors une représentation linéaire

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbf{C}), \qquad \text{où} \qquad G = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}),$$

qui est non ramifiée en dehors de N et telle que

$$\mathrm{Tr}(F_{p,\rho}) = a_p \qquad \text{et} \qquad \det(F_{p,\rho}) = \varepsilon(p) \quad \text{pour tout } p \nmid N. \tag{4.1.1}$$

Cette représentation est irréductible si et seulement si f est parabolique.

La démonstration sera donnée au § 8.

COROLLAIRE 4.2. — Les valeurs propres a_p sont sommes de deux racines de l'unité ; en particulier on a $|a_p| \leq 2$.

En d'autres termes, la « conjecture de Ramanujan-Petersson » est vraie en poids 1 ; on sait d'ailleurs qu'elle est également vraie en poids ≥ 2, cf. [5], 8.2.

REMARQUES

4.3. D'après le lemme 3.2, la représentation ρ associée à f par 4.1 est unique, à isomorphisme près.

4.4. La formule $\det(F_{p,\rho}) = \varepsilon(p)$ montre que l'on a

$$\det(\rho) = \varepsilon,$$

en convenant d'identifier ε au caractère $G \longrightarrow \mathbf{C}^*$ qui lui correspond par la théorie du corps de classes (c'est simplement le composé de ε et de l'homomorphisme $G \longrightarrow (\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$ fourni par l'action de G sur les racines N-ièmes de l'unité).

4.5. Notons c l'élément de G correspondant à la conjugaison complexe (pour un plongement de $\overline{\mathbf{Q}}$ dans $\mathbf{C}$). Du fait que ε est impair, 4.4 montre que $\det(\rho(c)) = -1$; comme c est d'ordre 2, cela signifie que $\rho(c)$ est conjuguée de la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(b) CONDUCTEUR D'ARTIN ET FACTEURS LOCAUX. — On conserve les hypothèses et notations du théorème 4.1.

THÉORÈME 4.6. — Supposons f parabolique primitive, de coefficients a_n, $n \geq 1$. Soit ρ la représentation de G correspondante. Alors :

a. Le conducteur d'Artin de ρ est égal à N ;

b. La fonction L d'Artin $L(s, \rho)$ est égale à

$$\Phi_f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}.$$

(Pour la définition de la série L, et du conducteur, d'une représentation, voir [1].)

COROLLAIRE 4.7. — La représentation ρ est ramifiée en tous les diviseurs premiers de N.

Cela résulte de (a).

COROLLAIRE 4.8. — La fonction $L(s,\rho)$ est une fonction entière.

[Autrement dit, la « conjecture d'Artin » est vraie pour ρ, cf. (c) ci-dessous.]

En effet, la théorie de Hecke montre que $\Phi_f(s)$ est entière.

DÉMONSTRATION DE 4.6. — Elle utilise les équations fonctionnelles satisfaites par $\Phi_f(s)$ et $L(s,\rho)$ (comparer avec [9], p. 172-177).

(i) Posons $\tilde{f} = \sum \overline{a_n} q^n$. Du fait que f est primitive, il existe une constante $\lambda \neq 0$ telle que $f(-1/Nz) = \lambda z \tilde{f}(z)$, cf. [12] et [13]. Par transformation de Mellin, on en déduit que

$$\Psi_f(1-s) = \mu \widetilde{\Psi}_f(s) \qquad \text{avec} \qquad \mu = i\lambda/N^{1/2},$$

où

$$\Psi_f(s) = N^{s/2}(2\pi)^{-s}\Gamma(s)\Phi_f(s) \qquad \text{et} \qquad \widetilde{\Psi}_f(s) = \Psi_{\tilde{f}}(s).$$

(ii) D'après 4.5, le « facteur à l'infini » de $L(s,\rho)$ est égal à $(2\pi)^{-s}\Gamma(s)$. Si M est le conducteur de ρ, et si l'on pose

$$\xi(s,\rho) = M^{s/2}(2\pi)^{-s}\Gamma(s)L(s,\rho),$$

on a donc

$$\xi(1-s,\rho) = \nu \cdot \xi(s,\overline{\rho}) \qquad \text{avec} \qquad \nu \in \mathbf{C}^*.$$

(iii) Posons

$$F(s) = (N/M)^{s/2}\Psi_f(s)/\xi(s,\rho) \qquad \text{et} \qquad \widetilde{F}(s) = (N/M)^{s/2}\widetilde{\Psi}_f(s)/\xi(s,\overline{\rho}).$$

Les formules ci-dessus montrent que

$$F(1-s) = \omega \cdot \widetilde{F}(s) \qquad \text{avec} \qquad \omega = \mu/\nu.$$

Mais, si p est un nombre premier ne divisant pas N, les p-facteurs de $\Psi_f(s)$ et de $\xi(s,\rho)$ coïncident d'après 4.1. On a donc

$$F(s) = A^s \prod_{p|N} F_p(s),$$

avec

$$A = (N/M)^{1/2} \qquad \text{et} \qquad F_p(s) = \frac{1 - a_p p^{-s}}{(1 - b_p p^{-s})(1 - c_p p^{-s})},$$

où $1 - a_p p^{-s}$ est le p-facteur de $\Psi_f(s)$ et $(1 - b_p p^{-s})(1 - c_p p^{-s})$ celui de $\xi(s,\rho)$ (noter que b_p et c_p peuvent être nuls). Tout revient à montrer que A et les F_p sont égaux à 1. On utilise pour cela le lemme élémentaire suivant :

LEMME 4.9. — Soient $G(s) = A^s \prod_p G_p(s)$, $H(s) = A^s \prod_p H_p(s)$, deux produits eulériens finis. Supposons que :

$$G(1-s) = \omega \cdot H(s) \qquad \text{avec} \qquad \omega \in \mathbf{C}^*; \tag{4.9.1}$$

(4.9.2) Chacun des G_p et des H_p est produit fini de termes de la forme $(1-\alpha_p^{(i)}p^{-s})^{\pm 1}$, avec $|\alpha_p^{(i)}| < p^{1/2}$.
On a alors $A = 1$ et $G_p = H_p = 1$ pour tout p.
Si H_p n'est pas égal à 1, la fonction H a une infinité de zéros (ou de pôles) de la forme

$$(\log(\alpha_p^{(i)}) + 2\pi i n)/\log p, \qquad n \in \mathbf{Z},$$

et l'on voit facilement que ceux-ci ne peuvent pas être tous des zéros (ou des pôles) de $G(1-s)$; l'hypothèse $|\alpha_p^{(i)}| < p^{1/2}$ assure en effet qu'aucun des $\alpha_p^{(i)}$ ne peut être égal à un $p/\alpha_p^{(j)}$.

(iv) Il reste encore à vérifier que a_p, b_p, c_p et leurs conjugués satisfont à (4.9.2), i. e. sont $< p^{1/2}$ en valeur absolue. C'est clair pour b_p et c_p qui sont, soit 0, soit des racines de l'unité. Pour a_p, on peut invoquer 1.8 qui montre que $|a_p| \leq 1$; on peut aussi, si l'on préfère, utiliser l'inégalité de Rankin :

$$|a_n| = O(n^{1/2-1/5}), \qquad cf.\ [18];$$

en l'appliquant à $n = p^m$, et en remarquant que $a_n = (a_p)^m$, on en déduit bien

$$|a_p| \leq p^{1/2-1/5} < p^{1/2}.$$

Cela achève la démonstration de 4.6.

(c) CARACTÉRISATION DES REPRÉSENTATIONS ATTACHÉES AUX FORMES DE POIDS 1. — Reprenons les notations de (a), en supposant que la forme f considérée soit parabolique. La représentation

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbf{C})$$

correspondante a alors les propriétés suivantes :
(i) ρ est irréductible (4.1) ;
(ii) $\det\rho$ est un caractère impair (4.4) ;
(iii) Pour tout caractère continu $\chi : G \longrightarrow \mathbf{C}^*$, la fonction L d'Artin $L(s, \rho\otimes\chi)$ est une fonction entière [cela résulte de 4.8 appliqué à la forme parabolique

$$f_\chi = \sum \chi(n) a_n q^n].$$

Réciproquement :

THÉORÈME 4.10. (WEIL-LANGLANDS). — Soit $\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbf{C})$ une représentation continue du groupe $G = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ satisfaisant aux conditions (i), (ii), (iii) ci-dessus. Posons

$$L(s,\rho) = \sum a_n n^{-s}, \qquad f = \sum a_n q^n, \qquad \varepsilon = \det\rho, \qquad N = \text{conduct. } \rho.$$

Alors f est une forme parabolique primitive de type $(1,\varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$, et ρ est la représentation attachée à f.

D'après Langlands (cf. [27], p. 152 et 160) les constantes des équations fonctionnelles des séries $\sum a_n\chi(n)n^{-s}$ vérifient l'identité nécessaire pour que l'on puisse appliquer la caractérisation des formes modulaires due à Hecke-Weil ([12], [26]). Il s'ensuit que f est modulaire de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$; il est clair que f est fonction propre des T_p et des U_p, et que la représentation qui lui est associée est isomorphe à ρ. D'après 4.1, f est parabolique. Soit f' l'unique forme parabolique primitive (sur un $\Gamma_0(N')$, où N' est un diviseur convenable de N) telle que $f' \mid T_p = a_p f'$ pour $p \nmid N$. Vu 4.6, la série de Dirichlet associée à f' est $L(s, \rho) = \sum a_n n^{-s}$. Il en résulte que $f' = f$, ce qui montre que f est primitive.

REMARQUES

4.11. On trouvera dans [27], p. 163, une généralisation du théorème 4.10 à tous les corps globaux.

4.12. La condition (iii) (conjecture d'Artin pour les $\rho \otimes \chi$) peut être remplacée par la condition plus faible :

(iii') Il existe un entier $M \geq 1$ tel que, pour tout caractère χ de conducteur premier à M, la fonction $L(s, \rho \otimes \chi)$ soit une fonction entière.

Cela résulte de [26] (voir aussi [12]).

4.13. Si la conjecture d'Artin est vraie, les théorèmes ci-dessus fournissent une bijection entre « classes de représentations irréductibles de degré 2 de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ à déterminant impair » et « formes paraboliques primitives de poids 1 ».

4.14. Le théorème 4.6 donne même un moyen de vérifier la conjecture d'Artin dans des cas particuliers. Si l'on se donne une représentation ρ satisfaisant à (i) et (ii), de conducteur N et de déterminant ε, on peut déterminer numériquement les coefficients a_n de la série $L(s, \rho) = \sum a_n n^{-s}$ pour n inférieur à un entier A donné, et l'on peut chercher à construire une forme parabolique primitive f de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$ dont le développement commence par $\sum_{n \leq A} a_n q^n$. Si A est assez grand,

$$\text{par exemple} \qquad A \geq (N/12) \prod_{p \mid N} (1 + p^{-1}),$$

une telle forme est unique, si elle existe (si elle n'existe pas, la conjecture d'Artin est fausse). Une fois f obtenue, il lui correspond une représentation ρ_f ; si l'on peut prouver que ρ_f est isomorphe à ρ, il en résulte bien que ρ satisfait à (iii).

EXEMPLES. — Si ρ est comme ci-dessus, l'image de ρ dans le groupe

$$\mathrm{PGL}_2(\mathbf{C}) = \mathrm{GL}_2(\mathbf{C})/\mathbf{C}^*$$

est, soit un groupe diédral, soit l'un des groupes $\mathfrak{A}_4$, $\mathfrak{S}_4$ ou $\mathfrak{A}_5$ ([22], prop. 16). Dans le cas diédral, ρ est induite par une représentation de degré 1 de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}(\sqrt{d}))$, où $\mathbf{Q}(\sqrt{d})$ est une extension quadratique de $\mathbf{Q}$. La condition (iii) est alors vérifiée, et ρ

correspond bien à une forme parabolique ; celle-ci est une combinaison linéaire de séries thêta pour des formes binaires de discriminant d, cf. [9], p. 428-460. Des exemples non diédraux ont été construits récemment par Tate (pour $N = 133, 229, 283, 331, \ldots$).

Pour l'un de ces exemples (celui où $N = 133$, qui correspond à un groupe $\mathfrak{A}_4$), Tate, aidé par Atkin et al., a pu mener à bien la méthode esquissée dans 4.14, et prouver l'existence d'une forme modulaire correspondante — donc aussi la conjecture d'Artin pour la représentation en question.

§ 5. Exploitation d'un résultat de Rankin

PROPOSITION 5.1. — Soit f une forme modulaire parabolique de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, non identiquement nulle. On suppose que f est fonction propre des T_p, $p \nmid N$, avec pour valeurs propres a_p. Alors la série $\sum_{p \nmid N} |a_p|^2 p^{-s}$ converge pour s réel $> k$, et l'on a

$$\sum_{p \nmid N} |a_p|^2 p^{-s} \leq \log(1/(s-k)) + O(1) \qquad \text{pour } s \longrightarrow k. \tag{5.1.1}$$

DÉMONSTRATION 5.2. — On se ramène aussitôt au cas où f est une forme primitive $\sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$. Pour tout $p \nmid N$, soit $\varphi_p \in \mathrm{GL}_2(\mathbf{C})$ tel que $\mathrm{Tr}(\varphi_p) = a_p$ et $\det(\varphi_p) = \varepsilon(p)p^{k-1}$. La série de Dirichlet

$$\Phi_f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s}$$

s'écrit alors :

$$\Phi_f(s) = \prod_{p \mid N} (1 - a_p p^{-s})^{-1} \prod_{p \nmid N} \det(1 - \varphi_p p^{-s})^{-1}, \qquad cf.\ (1.7.2).$$

Posons

$$L(s) = \prod_{p \nmid N} \det(1 - \varphi_p \otimes \overline{\varphi}_p\, p^{-s})^{-1}.$$

C'est un produit eulérien à quatre facteurs : si l'on note λ_p, μ_p les valeurs propres de φ_p, on a

$$L(s) = \prod_{p \nmid N} [(1 - \lambda_p \overline{\lambda}_p p^{-s})(1 - \lambda_p \overline{\mu}_p p^{-s})(1 - \mu_p \overline{\lambda}_p p^{-s})(1 - \mu_p \overline{\mu}_p p^{-s})]^{-1}.$$

Utilisant la formule $\lambda_p \overline{\lambda}_p \mu_p \overline{\mu}_p = |\varepsilon(p)p^{k-1}|^2 = p^{2k-2}$, on démontre (cf. par exemple [10], p. 33, ou [12], [15]) que

$$L(s) = H(s)\zeta(2s - 2k + 2) \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 n^{-s} \right),$$

avec

$$H(s) = \prod_{p \mid N} (1 - p^{-2s+2k-2})(1 - |a_p|^2 p^{-s}).$$

D'après [18] (cf. aussi [12], [13] et [15]), la série $\sum |a_n|^2 n^{-s}$ converge pour $\mathrm{Re}(s) > k$ et son produit par $\zeta(2s - 2k + 2)$ se prolonge en une fonction méromorphe dans tout le

plan complexe, avec pour unique pôle le point $s = k$. Comme $|a_p| < p^{k/2}$ si $p \mid N$ (cf. 1.8) la fonction $H(s)$ est holomorphe $\neq 0$ dans $\mathrm{Re}(s) \geq k$. Il résulte de ceci que $L(s)$ est méromorphe dans tout le plan complexe, et holomorphe pour $\mathrm{Re}(s) \geq k$, à la seule exception de $s = k$ qui en est un pôle simple ; on a de plus $L(s) \neq 0$ pour s réel $> k$ puisqu'il en est ainsi de $H(s)$, $\zeta(2s - 2k + 2)$, et $\sum |a_n|^2 n^{-s}$.

Posons

$$g_m(s) = \sum_{p \nmid N} |\operatorname{Tr}(\varphi_p^m)|^2 p^{-ms}/m \qquad \text{et} \qquad g(s) = \sum_{m=1}^{\infty} g_m(s).$$

La série $g(s)$ est une série de Dirichlet à coefficients ≥ 0. Pour s assez grand, un calcul immédiat montre qu'elle est égale à $\log L(s)$. Comme $L(s)$ est holomorphe et $\neq 0$ pour s réel $> k$, il résulte d'un lemme classique de Landau ([21], p. 112) que $g(s)$ converge pour $\mathrm{Re}(s) > k$. Du fait que $L(s)$ a un pôle simple en $s = k$, on a

$$g(s) = \log(1/(s-k)) + O(1) \qquad \text{pour } s \longrightarrow k.$$

Mais $g_1(s) = \sum |a_p|^2 p^{-s}$ est évidemment $\leq g(s)$. On en conclut bien

$$\sum |a_p|^2 p^{-s} \leq \log(1/(s-k)) + O(1) \qquad \text{pour } s \longrightarrow k.$$

REMARQUES 5.3. — On peut renforcer la proposition 5.1 de diverses manières. D'abord une fois que l'on dispose de la conjecture de Petersson, une majoration facile montre que la série

$$\sum_{p \nmid N} \sum_{m \geq 2} |\operatorname{Tr}(\varphi_p^m)|^2 p^{-ms}/m = g_2(s) + g_3(s) + \cdots$$

converge pour $\mathrm{Re}(s) \geq k$, et cela permet de remplacer l'inégalité (5.1.1) par l'égalité :

$$\sum |a_p|^2 p^{-s} = \log(1/(s-k)) + O(1) \qquad \text{pour } s \longrightarrow k. \tag{5.3.1}$$

D'autre part, un argument à la Hadamard-de la Vallée Poussin montre que $L(s) \neq 0$ pour tout s tel que $\mathrm{Re}(s) \geq k$ (y compris la droite critique $\mathrm{Re}(s) = k$), et en appliquant le théorème de Wiener-Ikehara à $L'(s)/L(s)$ on obtient

$$\sum_{p \leq x} |a_p|^2 p^{-(k-1)} \sim x \qquad \text{pour } x \longrightarrow \infty, \tag{5.3.2}$$

cf. Rankin [19].

5.4. APPLICATION AUX FORMES DE POIDS 1. — Soient P l'ensemble des nombres premiers et X une partie de P. On pose

$$\text{dens. sup } X = \limsup_{\substack{s \to 1 \\ s > 1}} \frac{\sum_{p \in X} p^{-s}}{\log(1/(s-1))}. \tag{5.4.1}$$

C'est la densité supérieure de X ; elle est comprise entre 0 et 1.

PROPOSITION 5.5. — On conserve les hypothèses de 5.1, et l'on suppose en outre que le poids k de f est égal à 1. Alors, pour tout $\eta > 0$, il existe un ensemble X_η de nombres

premiers et une partie finie Y_η de $\mathbf{C}$ tels que

$$\text{dens. sup } X_\eta \leq \eta \qquad \text{et} \qquad a_p \in Y_\eta \quad \text{pour tout } p \notin X_\eta.$$

D'après 2.7, les a_p sont des entiers d'une extension finie K de $\mathbf{Q}$. Si c est une constante ≥ 0, notons $Y(c)$ l'ensemble des entiers a de K tels que $|\sigma(a)|^2 \leq c$ pour tout plongement σ de K dans $\mathbf{C}$; c'est un ensemble fini. Notons $X(c)$ l'ensemble des p tels que $a_p \notin Y(c)$; il nous suffit de prouver que dens. sup $X(c) \leq \eta$ si c est assez grand.

Or on sait (2.7) que les $\sigma(a_p)$ sont également valeurs propres des T_p en poids 1. Vu (5.1.1), on a donc

$$\sum_\sigma \sum_p |\sigma(a_p)|^2 p^{-s} \leq r \log(1/(s-1)) + O(1) \qquad \text{pour } s \longrightarrow 1,$$

où $r = [K : \mathbf{Q}]$. Comme $\sum_\sigma |\sigma(a_p)|^2 \geq c$ si $p \in X(c)$, on en conclut que

$$c \sum_{p \in X(c)} p^{-s} \leq r \log(1/(s-1)) + O(1) \qquad \text{pour } s \longrightarrow 1,$$

d'où

$$\text{dens. sup } X(c) \leq r/c,$$

et il suffit donc de prendre $c \geq r/\eta$.

REMARQUE 5.6. — En utilisant (5.3.2) au lieu de (5.1.1) dans la démonstration ci-dessus, on aurait pu remplacer la densité « analytique » (5.4.1) par la densité « naturelle » (cf. [21], VI, n° 4.5). De toute façon, 5.5 n'a qu'un intérêt provisoire : une fois le théorème 4.1 démontré, on saura que l'ensemble des a_p est fini.

§ 6. Représentation ℓ-adiques et réduction mod ℓ

(a) REPRÉSENTATIONS ℓ-ADIQUES. — Nous utiliserons le résultat suivant :

THÉORÈME 6.1. — Soit f une forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, non identiquement nulle. On suppose que $k \geq 2$ et que f est fonction propre des T_p, $p \nmid N$, avec pour valeurs propres a_p. Soit K une extension finie de $\mathbf{Q}$ contenant les a_p et les $\varepsilon(p)$, cf. (2.7.3). Soit λ une place finie de K, de caractéristique résiduelle ℓ, et soit K_λ le complété de K en λ. Il existe alors une représentation linéaire semi-simple continue

$$\rho_\lambda : G \longrightarrow \mathrm{GL}_2(K_\lambda), \qquad \text{où} \qquad G = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}),$$

qui est non ramifiée en dehors de $N\ell$ et telle que

$$\mathrm{Tr}(F_{\rho_\lambda, p}) = a_p \qquad \text{et} \qquad \det(F_{\rho_\lambda, p}) = \varepsilon(p) p^{k-1} \quad \text{si } p \nmid N\ell. \tag{6.1.1}$$

D'après 3.2, la condition (6.1.1) détermine ρ_λ de manière unique, à isomorphisme près.

REMARQUE 6.2. — Si f est une série d'Eisenstein, l'énoncé ci-dessus se déduit immédiatement des résultats de Hecke ([9], p. 690) en prenant pour ρ_λ la somme directe de deux représentations de degré 1. Lorsque f est parabolique, 6.1 est démontré dans un cas particulier dans [4]. Le cas général n'est pas beaucoup plus difficile. Il est traité, par une autre méthode (inspirée de Ihara) et dans un autre langage, par Langlands [11] (où est toutefois admise sans démonstration une « formule des traces » qui semble accessible mais que personne n'a démontrée). Dans un travail futur de l'un de nous, 6.2 sera redémontré par une méthode due à Piateckii-Shapiro [17].

COROLLAIRE 6.3. — Soient $(f, N, k, \varepsilon, (a_p))$ et $(f', N', k', \varepsilon', (a'_p))$ comme dans le théorème 6.1. Si l'ensemble des nombres premiers p tels que $a_p = a'_p$ est de densité 1, alors $k = k'$, $\varepsilon = \varepsilon'$ et $a_p = a'_p$ pour tout $p \nmid NN'$.

En effet, les représentations attachées à f et f' (pour un même choix de K et de λ) sont isomorphes d'après 3.2.

REMARQUES

6.4. L'image de G par ρ_λ est un sous-groupe compact de $\mathrm{GL}_2(K_\lambda)$, donc un groupe de Lie ℓ-adique ; ce n'est pas un groupe fini.

6.5. Une fois le théorème 4.1 démontré, on voit facilement [2] que 6.1 et 6.3 restent valables en poids 1 ; toutefois, dans ce cas, l'image du groupe G est un groupe fini.

(b) RÉDUCTION mod ℓ

6.6. Soient $K \subset \mathbf{C}$ un corps de nombres algébriques, λ une place finie de K, O_λ l'anneau de valuation correspondant, $\mathfrak{m}_\lambda$ son idéal maximal, $k_\lambda = O_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda$ son corps résiduel, et ℓ la caractéristique de k_λ. Dans ce qui suit, nous écrirons « mod λ » pour « mod $\mathfrak{m}_\lambda$ ».

Soit f une forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$. On dit que f est λ-entière (resp. que $f \equiv 0 \pmod{\lambda}$) si les coefficients de la série $f_\infty(q)$ appartiennent à O_λ (resp. à $\mathfrak{m}_\lambda$). Supposons f λ-entière ; on dit que f est vecteur propre de T_p mod λ, de valeur propre $a_p \in k_\lambda$, si l'on a

$$f \mid T_p - a_p f \equiv 0 \pmod{\lambda}. \tag{6.6.1}$$

THÉORÈME 6.7. — Avec les notations précédentes, soit f une forme modulaire de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, $k \geq 1$, à coefficients dans K. On suppose que f est λ-entière, $f \not\equiv 0 \pmod{\lambda}$, et que f est vecteur propre des T_p mod λ, pour $p \nmid N\ell$, de valeurs propres $a_p \in k_\lambda$. Soit k_f le sous-corps de k_λ engendré par les a_p et les réductions mod λ des $\varepsilon(p)$. Il existe alors une représentation semi-simple

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}_2(k_f)$$

2. Cela résulte du fait que la représentation ρ du théorème 4.1 est réalisable sur K : son image contient un élément à valeurs propres rationnelles et distinctes (l'élément $\rho(c)$ de 4.5) et cela entraîne que son indice de Schur est 1 (cf. [20], IX a) ; elle est donc réalisable sur le corps des valeurs de son caractère.

qui est non ramifiée en dehors de $N\ell$ et telle que, pour tout $p \nmid N\ell$, on ait

$$\mathrm{Tr}(F_{\rho,p}) = a_p \qquad \text{et} \qquad \det(F_{\rho,p}) \equiv \varepsilon(p)p^{k-1} \pmod{\lambda}. \tag{6.7.1}$$

Démonstration du théorème 6.7

6.8. Soient $(K', \lambda', f', k', \varepsilon', (a'_p))$ comme dans le théorème 6.7, où K' contient K et λ' prolonge λ. Si $a_p \equiv a'_p \pmod{\lambda'}$ et $\varepsilon(p)p^{k-1} \equiv \varepsilon'(p)p^{k'-1} \pmod{\lambda'}$ pour tout $p \nmid N\ell$, le théorème pour f équivaut au théorème pour f'. La seconde condition est vérifiée dès que $\varepsilon = \varepsilon'$ et $k \equiv k' \pmod{\ell - 1}$, et elle entraîne la première pourvu que $f \equiv f' \pmod{\lambda'}$.

6.9. RÉDUCTION AU CAS OÙ $k \geq 2$. — Pour n pair > 2, soit E_n la série d'Eisenstein de poids n sur $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$ normalisée pour que son terme constant soit 1. Si l'on choisit n divisible par $\ell - 1$, le développement en série de E_n est ℓ-entier, et $E_n \equiv 1 \pmod{\ell}$, cf. [25]. Le produit $f \cdot E_n$ est donc congru à $f \bmod \lambda$; son poids $k + n$ est congru à $k \bmod (\ell - 1)$. Vu 6.8, le théorème pour f équivaut au théorème pour $f \cdot E_n$, qui est de poids > 2.

6.10. RÉDUCTION AU CAS OÙ f EST VECTEUR PROPRE DES T_p. — Il suffit de vérifier qu'il existe f' comme en 6.8, avec $(k', \varepsilon') = (k, \varepsilon)$, et vecteur propre des T_p. Cela résulte du lemme suivant, appliqué aux T_p agissant sur le O_λ-module M des formes modulaires de type (k, ε) sur $\Gamma_0(N)$, à coefficients dans O_λ :

LEMME 6.11. — Soit M un module libre de type fini sur un anneau de valuation discrète O ; on note $\mathfrak{m}$ l'idéal maximal de O, k son corps résiduel, K son corps des fractions. Soit $\mathcal{T}$ un ensemble d'endomorphismes de M commutant deux à deux. Soit $f \in M/\mathfrak{m}M$ un vecteur propre commun (non nul) des $T \in \mathcal{T}$, et soient $a_T \in k$ les valeurs propres correspondantes. Il existe alors un anneau de valuation discrète O' contenant O, d'idéal maximal $\mathfrak{m}'$ tel que $O \cap \mathfrak{m}' = \mathfrak{m}$, et de corps des fractions K' fini sur K, et un élément non nul f' de

$$M' = O' \otimes_O M,$$

qui est vecteur propre des $T \in \mathcal{T}$, de valeurs propres a'_T telles que $a'_T \equiv a_T \pmod{\mathfrak{m}'}$.

(Noter qu'on n'affirme pas que les vecteurs propres se relèvent, mais seulement les valeurs propres.)

Soit $\mathcal{H}$ la sous-algèbre de $\mathrm{End}(M)$ engendrée par $\mathcal{T}$. Quitte à faire une extension finie des scalaires, on peut supposer que $K \otimes \mathcal{H}$ est un produit d'anneaux artiniens de corps résiduel K. Soit $\chi : \mathcal{H} \longrightarrow k$ l'homomorphisme tel que $h \cdot f = \chi(h)f$ pour tout $h \in \mathcal{H}$. Puisque $\mathcal{H}$ est libre sur O, il existe un idéal premier $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{H}$ contenu dans l'idéal maximal $\ker(\chi)$ et tel que $\mathfrak{p} \cap O = 0$; c'est le noyau d'un homomorphisme $\chi' : \mathcal{H} \longrightarrow O$ dont la réduction mod $\mathfrak{m}$ est χ. L'idéal de $K \otimes \mathcal{H}$ engendré par $\mathfrak{p}$ appartient au support du module $K \otimes M$; on en conclut qu'il existe un élément non nul f'' de $K \otimes M$ qui est annulé par cet idéal, i.e. tel que $hf'' = \chi'(h)f''$ pour tout $h \in \mathcal{H}$. On prend alors pour f' un multiple non nul de f'' appartenant à M.

VARIANTE. — Se ramener au cas où M est $\mathcal{T}$-indécomposable, et où les valeurs propres des $T \in \mathcal{T}$ appartiennent à K. Montrer qu'il existe alors une base $(e_1, \ldots, e_n)$ de M par rapport à laquelle les éléments T de $\mathcal{T}$ se mettent sous forme de matrices triangulaires supérieures (T_{ij}) ; utiliser l'indécomposabilité de M pour prouver que l'on a alors $T_{ii} \equiv a_T \pmod{\mathfrak{m}}$ pour tout T et tout i. L'élément $f' = e_1$ répond alors à la question.

6.12. Fin de la démonstration de 6.7. — Vu 6.9 et 6.10, on peut supposer que $k \geq 2$ et que f est vecteur propre des T_p, $p \nmid N\ell$; comme T_ℓ commute aux T_p, on peut aussi supposer que f est vecteur propre de T_ℓ si $\ell \nmid N$. Soit alors

$$\rho_\lambda : G \longrightarrow \mathrm{GL}_2(K_\lambda)$$

la représentation associée à f par le théorème 6.1. Quitte à remplacer ρ_λ par une représentation isomorphe, on peut supposer que $\rho_\lambda(G)$ est contenu dans $\mathrm{GL}_2(\widehat{O}_\lambda)$, où $\widehat{O}_\lambda$ est l'anneau des entiers de K_λ (i.e. le complété de O_λ). Par réduction mod λ on déduit de ρ_λ une représentation

$$\tilde{\rho}_\lambda : G \longrightarrow \mathrm{GL}_2(k_\lambda).$$

Soit φ la semi-simplifiée de $\tilde{\rho}_\lambda$; c'est une représentation semi-simple, non ramifiée en dehors de $N\ell$, et qui satisfait à (6.7.1). Le groupe $\varphi(G)$ est fini ; d'après le théorème de Čebotarev, tout élément de $\varphi(G)$ est de la forme $F_{\varphi,p}$, avec $p \nmid N\ell$. Vu la définition de k_f, on a donc :

(6.12.1) Pour tout $s \in \varphi(G)$, les coefficients du polynôme $\det(1 - sT)$ appartiennent à k_f.

L'existence de la représentation $\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}_2(k_f)$ cherchée résulte alors du lemme suivant :

LEMME 6.13. — Soit $\varphi : \Phi \longrightarrow \mathrm{GL}_n(k')$ une représentation semi-simple d'un groupe Φ sur un corps fini k'. Soit k un sous-corps de k' contenant les coefficients des polynômes $\det(1 - \varphi(s)T)$, $s \in \Phi$. Alors φ est réalisable sur k, i.e. est isomorphe à une représentation $\rho : \Phi \longrightarrow \mathrm{GL}_n(k)$.

Pour que φ soit réalisable sur k, il suffit de vérifier que φ est isomorphe à $\sigma(\varphi)$ quel que soit le k-automorphisme σ de k' : cela provient de ce que le groupe de Brauer d'un corps fini est trivial, et qu'il n'y a donc pas « d'indice de Schur » à considérer. Or φ et $\sigma(\varphi)$ ont mêmes polynômes caractéristiques, et sont semi-simples ; elles sont donc isomorphes d'après [3], th. 30.16.

§ 7. Majoration des ordres de certains sous-groupes de $\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$

Si ℓ est un nombre premier, on note $\mathbf{F}_\ell$ le corps $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$ à ℓ éléments.

7.1. Soient η et M deux nombres positifs. Nous aurons à considérer la propriété suivante d'un sous-groupe G de $\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$:

$C(\eta, M)$. — Il existe une partie H de G telle que $|H| \geq (1 - \eta)|G|$, et que l'ensemble des polynômes $\det(1 - hT)$, $h \in H$, ait au plus M éléments.

(Si X est un ensemble fini, on note $|X|$ son cardinal.)

Nous dirons que G est semi-simple si la représentation identique

$$G \longrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$$

est semi-simple.

PROPOSITION 7.2. — Soient $\eta < 1/2$ et $M \geq 0$. Il existe une constante $A = A(\eta, M)$ telle que, pour tout nombre premier ℓ, et tout sous-groupe semi-simple G de $\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$ satisfaisant à $C(\eta, M)$, on ait $|G| \leq A$.

DÉMONSTRATION. — Soit G un sous-groupe semi-simple de $\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$. Rappelons (cf. [22] § 2, prop. 15 et 16) que l'une des conditions suivantes est satisfaite :

(a) G contient $\mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_\ell)$;

(b) G est contenu dans un sous-groupe de Cartan T ;

(c) G est contenu dans le normalisateur d'un sous-groupe de Cartan T, et n'est pas contenu dans T ;

(d) l'image de G dans $\mathrm{PGL}_2(\mathbf{F}_\ell) = \mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)/\mathbf{F}_\ell^*$ est isomorphe à $\mathfrak{A}_4$, $\mathfrak{S}_4$ ou $\mathfrak{A}_5$.

Nous allons, dans chaque cas, majorer l'ordre de G.

Cas (a). — Posons $r = (G : \mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_\ell))$. On a $|G| = r\ell(\ell^2 - 1)$. D'autre part, le nombre des éléments de $\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$ de polynôme caractéristique donné est $\ell^2 + \ell$, ℓ^2 ou $\ell^2 - \ell$ suivant que le polynôme en question a 2, 1, ou 0 racines dans $\mathbf{F}_\ell$. Si G satisfait à $C(\eta, M)$, on a donc

$$(1 - \eta)r\ell(\ell^2 - 1) = (1 - \eta)|G| \leq |H| \leq M(\ell^2 + \ell),$$

d'où

$$(1 - \eta)r(\ell - 1) \leq M \qquad \text{et} \qquad \ell \leq 1 + \frac{M}{(1 - \eta)r} \leq 1 + \frac{M}{1 - \eta};$$

on obtient ainsi une majoration de ℓ, d'où a fortiori une majoration de $|G|$.

Cas (b). — Au plus 2 éléments de T ont un polynôme caractéristique donné. L'hypothèse $C(\eta, M)$ (avec $\eta < 1$) entraîne donc

$$(1 - \eta)|G| \leq 2M,$$

d'où la majoration

$$|G| \leq \frac{2M}{1 - \eta}.$$

Cas (c). — Le groupe $G' = G \cap T$ est d'indice 2 dans G. Si G satisfait à $C(\eta, M)$, G' satisfait à $C(2\eta, M)$. En appliquant (b) à G', on obtient

$$|G| \leq \frac{4M}{1 - 2\eta}.$$

Cas (d). — L'image de G dans $\mathrm{PGL}_2(\mathbf{F}_\ell)$ est d'ordre au plus 60. Le groupe

$$G \cap \mathrm{SL}_2(\mathbf{F}_\ell)$$

est donc d'ordre au plus 120, et il y a dans G au plus 120 éléments de déterminant donné, et a fortiori de polynôme caractéristique donné. Si G satisfait à $C(\eta, M)$, on a donc

$$(1 - \eta)|G| \leq 120M, \qquad \text{d'où} \qquad |G| \leq \frac{120M}{1 - \eta}.$$

§ 8. Démonstration du théorème 4.1

On peut supposer que la forme modulaire f considérée est, soit une série d'Eisenstein, soit une forme parabolique.

8.1. Si f est une série d'Eisenstein, il existe des caractères χ_1 et χ_2 de $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$ tels que $\chi_1\chi_2 = \varepsilon$ et que $a_p = \chi_1(p) + \chi_2(p)$ pour $p \nmid N$ (cf. [9], p. 690). On prend alors pour ρ la représentation réductible

$$\rho = \chi_1 \oplus \chi_2,$$

où les χ_i sont identifiés à des représentations de degré 1 de G, cf. 4.4.

8.2. A partir de maintenant, on suppose que f est parabolique. D'après 2.7, les a_p et les $\varepsilon(p)$ appartiennent à l'anneau des entiers O_K d'un corps de nombres K, que l'on peut supposer galoisien sur $\mathbf{Q}$. Soit L l'ensemble des nombres premiers ℓ qui se décomposent complètement dans K. Pour tout $\ell \in L$, on choisit une place λ_ℓ de K qui prolonge ℓ ; le corps résiduel correspondant est égal à $\mathbf{F}_\ell$. D'après le théorème 6.7, il existe une représentation semi-simple continue

$$\rho_\ell : \mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}) \longrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell),$$

qui est non ramifiée en dehors de $N\ell$, et telle que

$$\det(1 - F_{\rho_\ell,p}T) \equiv 1 - a_pT + \varepsilon(p)T^2 \pmod{\lambda_\ell} \qquad \text{si } p \nmid N\ell.$$

Soit G_ℓ le sous-groupe de $\mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$ image de ρ_ℓ.

LEMME 8.3. — Pour tout $\eta > 0$, il existe une constante M telle que G_ℓ satisfasse à la condition $C(\eta, M)$ de 7.1 pour tout $\ell \in L$.

D'après la proposition 5.5, il existe une partie X_η de l'ensemble P des nombres premiers telle que dens. sup $X_\eta \leq \eta$ et que les $a_{p'}$ pour $p \notin X_{\eta'}$ forment un ensemble fini. Notons $\mathcal{M}$ l'ensemble (fini) des polynômes $1 - a_pT + \varepsilon(p)T^2$, pour $p \notin X_\eta$, et soit $M = |\mathcal{M}|$. Le groupe G_ℓ satisfait à $C(\eta, M)$ pour tout $\ell \in L$. En effet, soit H_ℓ le sous-ensemble de G_ℓ formé des éléments de Frobenius $F_{\rho_\ell,p'}$ $p \notin X_{\eta'}$ et de leurs conjugués. D'après le théorème de densité de Čebotarev, on a $|H_\ell| \geq (1 - \eta)|G_\ell|$. D'autre part, si $h \in H_\ell$, le polynôme $\det(1 - hT)$ est la réduction (mod λ_ℓ) d'un élément de $\mathcal{M}$, donc appartient à un ensemble à au plus M éléments. La condition $C(\eta, M)$ est donc bien satisfaite.

LEMME 8.4. — Il existe une constante A telle que $|G_\ell| \leq A$ pour tout $\ell \in L$.

Cela résulte du lemme précédent, et de la proposition 7.2.

8.5. Choisissons une constante A satisfaisant à 8.4. Quitte à agrandir le corps K (ce qui diminue L), on peut supposer qu'il contient toutes les racines n-ièmes de l'unité, pour $n \leq A$. Soit Y l'ensemble des polynômes $(1 - \alpha T)(1 - \beta T)$, où α et β sont des racines de l'unité d'ordre $\leq A$. Si $p \nmid N$, pour tout $\ell \in L$ avec $\ell \neq p$ il existe $R(T) \in Y$ tel que

$$1 - a_pT + \varepsilon(p)T^2 \equiv R(T) \pmod{\lambda_\ell}.$$

Comme Y est fini, il existe un R tel que la congruence ci-dessus soit satisfaite pour une infinité de ℓ, et l'on a donc l'égalité

$$1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2 = R(T),$$

autrement dit les polynômes $1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2$ appartiennent à Y.

8.6. Soit L' l'ensemble des $\ell \in L$ tels que $\ell > A$ et que $R, S \in Y$, $R \neq S$ entraîne $R \not\equiv S \pmod{\lambda_\ell}$; l'ensemble $L - L'$ est fini, donc L' est infini. Soit $\ell \in L'$. L'ordre du groupe G_ℓ est premier à ℓ. Il en résulte, par un argument standard, que la représentation identique $G_\ell \longrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbf{F}_\ell)$ est la réduction mod λ_ℓ d'une représentation $G_\ell \longrightarrow \mathrm{GL}_2(O_{\lambda_\ell})$, où O_{λ_ℓ} est l'anneau de la valuation λ_ℓ. En composant cette dernière avec l'application canonique $G \longrightarrow G_\ell$, on obtient une représentation

$$\rho : G \longrightarrow \mathrm{GL}_2(O_{\lambda_\ell}).$$

Par construction, ρ est non ramifiée en dehors de $N\ell$. Si $p \nmid N\ell$, les valeurs propres de l'élément de Frobenius $F_{\rho,p}$ sont des racines de l'unité d'ordre $\leq A$ (puisque l'image de ρ est isomorphe à G_ℓ, donc d'ordre $\leq A$) ; d'où $\det(1 - F_{\rho,p} T) \in Y$. D'autre part, puisque la réduction de ρ mod λ_ℓ est ρ_ℓ, on a

$$\det(1 - F_{\rho,p} T) \equiv 1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2 \pmod{\lambda_\ell}.$$

Mais les deux polynômes $\det(1 - F_{\rho,p} T)$ et $1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2$ appartiennent à Y. Comme ils sont congrus (mod λ_ℓ), ils sont égaux, et l'on a

$$\det(1 - F_{\rho,p} T) = 1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2 \qquad \text{pour tout } p \nmid N\ell.$$

Remplaçons maintenant ℓ par un autre nombre premier ℓ' de L'. On obtient une représentation $\rho' : G \longrightarrow \mathrm{GL}_2(O_{\lambda_{\ell'}})$ ayant la même propriété que ci-dessus, mais pour $p \nmid N\ell'$. En particulier, on a

$$\det(1 - F_{\rho,p} T) = \det(1 - F_{\rho',p} T) \qquad \text{pour } p \nmid N\ell\ell'.$$

D'après le lemme 3.2, ceci entraîne que ρ et ρ' sont isomorphes en tant que représentations dans $\mathrm{GL}_2(K)$, et a fortiori en tant que représentations complexes. Il en résulte que ρ est non ramifiée en dehors de N, et que

$$\det(1 - F_{\rho,p} T) = 1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2 \qquad \text{pour tout } p \nmid N.$$

8.7. Il reste à montrer que ρ est irréductible. Si elle ne l'était pas, elle serait somme de deux représentations de degré 1 ; celles-ci correspondraient à des caractères χ_1 et χ_2, non ramifiés en dehors de N, tels que $\chi_1 \chi_2 = \varepsilon$ et que

$$a_p = \chi_1(p) + \chi_2(p) \qquad \text{pour } p \nmid N.$$

On aurait alors

$$\sum |a_p|^2 p^{-s} = 2 \sum p^{-s} + \sum \chi_1(p) \overline{\chi_2(p)} p^{-s} + \sum \chi_2(p) \overline{\chi_1(p)} p^{-s}.$$

Lorsque s tend vers 1, on a $\sum p^{-s} = \log(1/(s-1)) + O(1)$. D'autre part, le caractère $\chi_1 \overline{\chi_2}$ est $\neq 1$ (sinon, on aurait $\varepsilon = (\chi_1)^2$ et $\varepsilon(-1) = 1$) ; il en résulte (cf. par exemple [21], VI.4.2) que

$$\sum \chi_1(p) \overline{\chi_2(p)} p^{-s} = O(1) \qquad \text{et} \qquad \sum \chi_2(p) \overline{\chi_1(p)} p^{-s} = O(1).$$

On en tire

$$\sum |a_p|^2 p^{-s} = 2\log(1/(s-1)) + O(1) \qquad \text{pour } s \longrightarrow 1,$$

ce qui contredit la proposition 5.1, et achève la démonstration.

§ 9. Application aux coefficients des formes modulaires de poids 1

Soit

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z/M}, \qquad M \geq 1,$$

une forme modulaire de poids 1 sur un sous-groupe de congruence de $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$.

(a) MAJORATION DES $|a_n|$

THÉORÈME 9.1. — On a $|a_n| = O(d(n))$ pour $n \longrightarrow \infty$.

(Rappelons que $d(n)$ désigne le nombre de diviseurs ≥ 1 de n.)

COROLLAIRE 9.2. — On a $|a_n| = O(n^\delta)$ pour tout $\delta > 0$.

En effet, on sait que $d(n)$ jouit de cette propriété ([8], th. 315).

DÉMONSTRATION DE 9.1. — Si n_0 est un entier ≥ 1, $d(n_0 n)/d(n)$ est compris entre 1 et $d(n_0)$. Il revient donc au même de démontrer l'estimation (9.1) pour $f(z)$ ou $f(n_0 z)$, et cela permet de supposer que $M = 1$, i.e. que $f(z+1) = f(z)$. Utilisant 1.5 et 1.9, on est ramené aux deux cas particuliers suivants :

(i) f est une série d'Eisenstein, auquel cas (9.1) résulte de la formule donnant les a_n ([9], p. 475) ;

(ii) f est une forme parabolique primitive de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$, pour N et ε convenables. Dans ce cas, on a même le résultat plus précis :

$$|a_n| \leq d_N(n) \leq d(n), \tag{9.3}$$

où $d_N(n)$ est le nombre de diviseurs positifs de n premiers à N. En effet, vu la multiplicativité de a_n et de $d_N(n)$, il suffit de vérifier (9.3) lorsque n est une puissance p^m d'un nombre premier p. Distinguons alors deux cas :

(ii_1) $p \mid N$.

On a $a_n = (a_p)^m$, et le théorème 4.6 montre que a_p est, soit 0, soit une racine de l'unité. On a donc bien

$$|a_n| \leq 1 = d_N(n).$$

(ii_2) $p \nmid N$.

Si l'on écrit le polynôme $1 - a_p T + \varepsilon(p) T^2$ sous la forme $(1-\lambda T)(1-\mu T)$, on a

$$a_n = \lambda^m + \lambda^{m-1}\mu + \cdots + \lambda\mu^{m-1} + \mu^m.$$

Or, d'après le théorème 4.1, λ et μ sont des racines de l'unité. On a donc bien

$$|a_n| \leq m + 1 = d_N(n).$$

REMARQUE 9.4. — Si $f = \sum b_n e^{2\pi i n z/M}$, $M \geq 1$, est une forme modulaire parabolique de poids $k \geq 2$ sur un sous-groupe de congruence de $\mathrm{SL}_2(\mathbf{Z})$, le même argument que ci-dessus (utilisant [5], 8.2) montre que

$$|b_n| = O(n^{(k-1)/2} d(n)) \qquad \text{pour } n \longrightarrow \infty.$$

(b) ORDRE DE GRANDEUR MAXIMAL DES $|a_n|$. — On sait ([8], th. 317) que l'ordre de grandeur « maximal » de $d(n)$ est $2^{\log n/\log\log n}$, en ce sens que

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{\log d(n) \log\log n}{\log n} = \log 2.$$

Le même résultat vaut pour les $|a_n|$:

PROPOSITION 9.5. — Si $f \neq 0$, on a

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{\log |a_n| \log\log n}{\log n} = \log 2.$$

LEMME 9.6. — Soit N un entier ≥ 1. Il existe des ensembles X_N et Y_N de nombres premiers, de densités > 0, tels que :

(x) Pour tout $p \in X_N$, on a $p \equiv 1 \pmod N$ et $g \mid T_p = 2g$ pour toute forme modulaire g de poids 1 sur $\Gamma_1(N)$;

(y) Pour tout $p \in Y_N$, on a $p \equiv -1 \pmod N$ et $g \mid T_p = 0$ pour toute forme modulaire g de poids 1 sur $\Gamma_1(N)$.

Soient $\rho_1, \ldots, \rho_h$ les représentations de G associées aux différents systèmes de valeurs propres des T_p agissant sur les formes de type $(1, \varepsilon)$ sur $\Gamma_0(N)$, où ε parcourt les caractères impairs de $(\mathbf{Z}/N\mathbf{Z})^*$. Soit X_N l'ensemble des $p \equiv 1 \pmod N$ tels que

$$F_{\rho_i, p} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

pour $i = 1, \ldots, h$, et soit Y_N l'ensemble des $p \equiv -1 \pmod N$ tels que $F_{\rho_i, p}$ soit conjugué de $\rho_i(c)$, cf. 4.5. D'après le théorème de densité de Čebotarev, X_N et Y_N ont des densités > 0. Si $p \in X_N$, 2 est la seule valeur propre de T_p ; comme T_p est semi-simple, on a bien $g \mid T_p = 2g$ pour tout g. Le même argument montre que $g \mid T_p = 0$ si $p \in Y_N$ puisque la trace de la matrice $\rho_i(c)$ est 0.

DÉMONSTRATION DE 9.5. — On se ramène comme dans (a) au cas où f est une forme modulaire de poids 1 sur $\Gamma_1(N)$. Soit X_N comme dans le lemme 9.6, et choisissons un entier m tel que $a_m \neq 0$. Si x est un entier ≥ 1, notons $p_1, \ldots, p_{i(x)}$ les différents nombres premiers $p \in X_N$ qui sont $\leq x$ et ne divisent pas m. Posons $n(x) = m p_1 p_2 \cdots p_{i(x)}$. Puisque les p_i appartiennent à X_N, on a $f \mid T_{p_i} = 2f$ et $f \mid R_{p_i} = f$; vu (2.5.1), cela entraîne

$$a_{n(x)} = 2^{i(x)} a_m,$$

d'où

$$\log |a_{n(x)}| \sim i(x) \log 2 \qquad \text{pour } x \longrightarrow \infty.$$

Si c est la densité de X_N, on a $i(x) \sim cx/\log x$, et $\sum_{i \le i(x)} \log p_i \sim cx$. On en déduit

$$\log |a_{n(x)}| \sim cx \log 2/\log x,$$

$$\log n(x) \sim cx,$$

$$\log \log n(x) \sim \log x,$$

d'où l'inégalité

$$\limsup_{n \to \infty} \frac{\log |a_n| \log \log n}{\log n} \ge \log 2.$$

L'inégalité opposée résulte de ce que $|a_n| = O(d(n))$.

(c) ORDRE DE GRANDEUR NORMAL DE $|a_n|$. — L'ordre de grandeur « normal » (i.e. le plus fréquent) de $d(n)$ est $2^{\log \log n}$ (cf. [8], th. 432). Celui de $|a_n|$ est plus petit :

PROPOSITION 9.7. — L'ensemble des n tels que $a_n = 0$ a pour densité 1.

(Une partie S de $\mathbf{N}$ est dite de densité c si le nombre d'éléments de S qui sont $\le x$ est égal à $cx + o(x)$ pour $x \longrightarrow \infty$.)

Ici encore, on peut supposer que f est une forme modulaire de poids 1 sur $\Gamma_1(N)$. Soit Y_N comme dans le lemme 9.6. Si $p \in Y_N$, on a $f \mid T_p = 0$ et $f \mid R_p = -f$. Vu (2.5.1), il en résulte que, si n est un entier divisible par p mais pas par p^2, on a $a_n = 0$. Or, si Y est un ensemble fini de nombres premiers, l'ensemble S_Y des entiers n ayant la propriété ci-dessus (pour au moins un $p \in Y$) a pour densité

$$1 - \prod_{p \in Y} \left(1 - \frac{p-1}{p^2}\right).$$

Du fait que Y_N a une densité > 0, la série $\sum_{p \in Y_N} 1/p$ diverge, et le produit

$$\prod_{p \in Y_N} \left(1 - \frac{p-1}{p^2}\right)$$

a pour valeur 0. On en conclut que la réunion des S_Y, $Y \subset Y_N$, est de densité 1, ce qui démontre la proposition.

REMARQUE 9.8. — Pour tout x, notons $M(x)$ le nombre des $n \le x$ tels que $a_n \ne 0$. La proposition 9.7 revient à dire que

$$M(x) = o(x) \qquad \text{pour } x \longrightarrow \infty.$$

En utilisant le théorème 2 de [23], on peut prouver le résultat plus précis suivant : il existe $\alpha > 0$ tel que

$$M(x) = O(x/\log^{\alpha} x) \qquad \text{pour } x \longrightarrow \infty.$$

BIBLIOGRAPHIE

[1] E. ARTIN, Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren (Hamb. Abh., vol. 8, 1930, p. 292-306 (Collected Works, p. 165-179)).

[2] A. O. L. ATKIN et J. LEHNER, Hecke operators on $\Gamma_0(m)$ (Math. Ann., vol. 185, 1970, p. 134-160).

[3] C. CURTIS et I. REINER, Representation theory of finite groups and associative algebras, Intersc. Publ., New York, 1962.

[4] P. DELIGNE, Formes modulaires et représentations l-adiques (Séminaire Bourbaki, vol. 1968/1969, exposé n° 355, Lect. Notes 179, Springer, 1971, p. 139-172).

[5] P. DELIGNE, La conjecture de Weil. I. (Publ. Math. I.H.E.S., vol. 43, 1974, p. 273-307).

[6] P. DELIGNE, Formes modulaires et représentations de $GL(2)$ (Lecture Notes, n° 349, Springer, 1973, p. 55-105).

[7] P. DELIGNE et M. RAPOPORT, Les schémas de modules de courbes elliptiques (Lecture Notes, n° 349, Springer, 1973, p. 143-316).

[8] G. H. HARDY et E. M. WRIGHT, An introduction to the theory of numbers, 3rd edit., Oxford, 1954.

[9] E. HECKE, Mathematische Werke (zw. Aufl.). Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1970.

[10] H. JACQUET, Automorphic Forms on $GL(2)$, Part II (Lecture Notes, n° 278, Springer, 1972).

[11] R. P. LANGLANDS, Modular forms and l-adic representations (Lecture Notes, n° 349, Springer, 1973, p. 361-500).

[12] W. LI, Newforms and Functional Equations, Dept. of Maths., Berkeley, 1974 (à paraître aux Math. Ann.).

[13] T. MIYAKE, On automorphic forms on GL_2 and Hecke operators (Ann. of Maths., vol. 94, 1971, p. 174-189).

[14] A. P. OGG, On the eigenvalues of Hecke operators (Math. Ann., vol. 179, 1969, p. 101-108).

[15] A. P. OGG, On a convolution of L-series (Invent. Math., vol. 7, 1969, p. 297-312).

[16] A. P. OGG, Modular forms and Dirichlet series, W. A. Benjamin Publ., New York, 1969.

[17] I. I. PIATECKII-SHAPIRO, Zeta functions of modular curves (Lecture Notes, n° 349, Springer, 1973, p. 317-360).

[18] R. A. RANKIN, Contributions to the theory of Ramanujan's function $\tau(n)$ and similar arithmetical functions. I, II (Proc. Cambridge Phil. Soc., vol. 35, 1939, p. 351-372).

[19] R. A. RANKIN, An Ω-result for the coefficients of cusp forms (Math. Ann., vol. 203, 1973, p. 239-250).

[20] I. SCHUR, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen (Sitz. Pr. Akad. Wiss., 1906, p. 164-184 (Gesam. Abhl., I, p. 177-197, Springer, 1973)).

[21] J.-P. SERRE, Cours d'Arithmétique, Presses Universitaires de France, Paris, 1970.

[22] J.-P. SERRE, Propriétés galoisiennes des points d'ordre fini des courbes elliptiques (Invent. Math., vol. 15, 1972, p. 259-331).

[23] J.-P. SERRE, Divisibilité des coefficients des formes modulaires de poids entier (C. R. Acad. Sci. Paris, t. 279, série A, 1974, p. 679-682).

[24] G. SHIMURA, Introduction to the arithmetic theory of automorphic functions (Publ. Math. Soc. Japan, vol. 11, Princeton Univ. Press., 1971).

[25] H. P. F. SWINNERTON-DYER, On l-adic representations and congruences for coefficients of modular forms (Lecture Notes, n° 350, Springer, 1973, p. 1-55).

[26] A. WEIL, Über die Bestimmung Dirichletscher Reihen durch Funktionalgleichungen (Math. Ann., vol. 168, 1967, p. 149-156).

[27] A. WEIL, Dirichlet Series and Automorphic Forms (Lezioni Fermiane). (Lecture Notes, n° 189, Springer, 1971).

(Manuscrit reçu le 9 août 1974.)

Pierre DELIGNE,
I.H.E.S.,
91440 Bures-sur-Yvette
et
Jean-Pierre SERRE,
Collège de France,
75231 Paris-Cedex 05

Actes du Congrès International des Mathématiciens
Vancouver, 1974

Poids dans la Cohomologie des Variétés Algébriques

Pierre Deligne

1. Soit X une variété algébrique complexe (i.e., un schéma séparé de type fini sur $\mathbb{C}$). On note encore X l'espace topologique usuel $X(\mathbb{C})$ sous-jacent à X. Dans cet exposé, nous décrivons une filtration remarquable des groupes de cohomologie rationnelle de X, la *filtration par le poids*, et nous donnons un fascicule de résultats de ses propriétés. Sa définition sera donnée au §12. Pour les démonstrations, nous renvoyons aux travaux cités dans la bibliographie où les théorèmes sont souvent prouvés dans des cadres plus généraux ; travailler sur $\mathbb{C}$ nous permet de disposer simultanément de la théorie de Hodge, d'action de groupes de Galois, et de la résolution des singularités.

La filtration par le poids est une filtration finie croissante. Nous la noterons W. Elle est également définie dans des situations relatives (ou en cohomologie à support propres). Elle dépend non seulement de l'espace topologique X, mais encore de la façon dont il est réalisé comme variété algébrique. Elle est compatible aux isomorphismes de Künneth (i.e., via l'isomorphisme $H^*(X\times Y) = H^*(X)\otimes H^*(Y)$, on a

$$W_j\big(H^*(X\times Y)\big) = \sum_{j'+j''=j} W_{j'}\big(H^*(X)\big)\otimes W_{j''}\big(H^*(Y)\big)$$

et est fonctorielle pour les morphismes algébriques. Plus précisément, si $f : X \to Y$ est algébrique, alors $f^* : H^*(Y) \to H^*(X)$ est *strictement* compatible aux filtrations par le poids de $H^*(Y)$ et $H^*(X)$: Si la classe $x \in H^i(X)$ est dans l'image de f^*, elle est de filtration $\leq i$ si et seulement si elle est l'image d'une classe de filtration $\leq i$. Plus généralement, toute application naturelle est *strictement* compatible aux filtrations par le poids.

La filtration par le poids est un invariant discret ; elle est invariante par dé-

© 1975, Canadian Mathematical Congress

formation de la structure algébrique de X. Plus précisément, on a le théorème suivant.

2. THÉORÈME. *Soit $f : X \to S$ un morphisme. Pour $t \in S$, soit $X_t = f^{-1}(t)$. Si le faisceau $R^i f_* \mathbb{Q}$ est localement constant (un système local), il existe une filtration par le poids W de $R^i f_* \mathbb{Q}$ par des sous-systèmes locaux, telles que les flèches $r_t : (R^i f_* \mathbb{Q})_t \to H^i(X_t)$ soient strictement compatibles aux filtrations par le poids, et qu'en particulier là où r_t est un isomorphisme, W induise la filtration par le poids de $H^i(X_t)$.*

3. En gros, la filtration par le poids exprime comment la cohomologie de X peut se bâtir en terme de la cohomologie de variétés projectives non singulières. Voici quelques exemples.

Exemple 3.1. Si X est propre (= compacte, par exemple projective) et lisse (= non singulière), alors $H^i(X) =_{\text{dfn}} H^i(X, \mathbb{Q})$ est purement de poids i : $\mathrm{Gr}_j^W(H^i(X)) = 0$ pour $i \neq j$. En d'autres termes, $W_{i-1}(H^i(X)) = 0$ et $W_i(H^i(X)) = H^i(X)$.

Exemple 3.2. Soient X propre, lisse, connexe, de dimension d et P un point de X. Des groupes de cohomologie à support $H^i_{\{P\}}(X) = H^i(X \bmod (X - \{P\}))$, seul celui d'indice $2d$ est non nul, et

$$H^{2d}_{\{P\}}(X) \simeq H^{2d}(X) = \mathbb{Q}. \tag{3.2.1}$$

D'après nos principes, $H^{2d}_{\{P\}}(X)$ est donc purement de poids $2d$. L'inverse de l'isomorphisme (3.2.1) peut être vu comme un isomorphisme de Thom–Gysin

$$\mathbb{Q} = H^0(P) \simeq H^{2d}_{\{P\}}(X);$$

on constate qu'il ne respecte pas les poids. La situation générale est la suivante : pour Y une sous-variété lisse purement de codimension d dans une variété lisse X, l'isomorphisme de Thom–Gysin $H^i(Y) \simeq H^{i+2d}_Y(X)$ transforme W^k en W^{k+2d}. Notant (n) un décalage de $2n$ pour W ($W(n)_k = W_{k-2n}$), ceci s'écrit comme un isomorphisme filtré

$$H^i(Y)(-d) \simeq H^{i+2d}_Y(X).$$

Exemple 3.3. Soient X propre et lisse, et Y une sous-variété lisse (fermée) purement de codimension d. On dispose d'une suite exacte

$$\cdots \to H^i(X) \to H^i(X - Y) \xrightarrow{\delta} H^{i+1}_Y(X) \to \cdots$$

D'après 3.1 et 3.2, on a donc $\mathrm{Gr}_j^W(H^i(X - Y)) = 0$ pour $j \neq i, i+1$; W_i est l'image de $H^i(X)$.

Exemple 3.4. Soit X propre, et lisse sauf pour un point singulier isolé P. Supposons que la variété $\widetilde{X}$ déduite de X en éclatant P soit lisse, et que le diviseur exceptionnel D image inverse de P soit lisse : X se déduit de $\widetilde{X}$ (propre et lisse) en contractant en un point D (propre et lisse). L'espace X a le type d'homotopie de [$\widetilde{X} \cup$ (un cône de base D)], dont la cohomologie se calcule par Mayer–Vietoris ; on trouve une suite exacte

$$\cdots \to H^{i-1}(D) \xrightarrow{\delta} H^i(X) \to H^i(\widetilde{X}) \oplus H^i(P) \to \cdots$$

qui montre que $\mathrm{Gr}_j^W(H^i(X)) = 0$ pour $j \neq i-1, i$; W_{i-1} est l'image de δ. Pour

$i \neq 0$, c'est encore le noyau de $H^i(X) \to H^i(\widetilde{X})$, et $\mathrm{Gr}_i^W(H^i(X))$ est l'image de $H^i(X)$ dans $H^i(\widetilde{X})$.

Exemple 3.5. Les variétés de drapeaux sont des variétés propres et lisses. La filtration par le poids de leur cohomologie est donc donnée par 3.1. Si G est un groupe réductif connexe, le même résultat vaut pour la cohomologie de BG [1, III]. Ceci permet de calculer la filtration par le poids de la cohomologie de G, liée à celle de BG par transgression. On trouve que $W_i H^i(G) = 0$, et que $W_{i+1}H^i(G)$, nul pour i pair, est égal à la partie primitive de la cohomologie de degré i de G [1, III]. Si $f : G \to H$ est une application algébrique entre variétés de groupes réductifs, l'image réciproque d'une classe de cohomologie rationnelle primitive de H est donc encore primitive. Pour d'autres corollaires, voir [1, III].

4. La filtration par le poids est graduable en un sens très fort. Il existe des graduations $\underline{W}$ des $H^i(X)$, qui décomposent W :

$$W_n(H^i(X)) = \bigoplus_{j \leq n} \underline{W}_j(H^i(X)) \tag{4.1}$$

et qui soient compatibles au cup-produit et aux opérations supérieures dérivées du cup-produit (produits de Massey ...). Ces dernières n'étant pas partout définies, le sens de « compatible à une graduation » doit être précisé. Le plus simple est de voir une graduation comme une action du groupe G_m, i.e., une action de $\mathbb{Q}^*$ donnée par des formules algébriques : à une graduation $\underline{W}$ on associe l'action où $\lambda \in \mathbb{Q}^*$ agit sur $\underline{W}_j$ par multiplication par λ^j. La « compatibilité » est que $\mathbb{Q}^*$ agit par des automorphismes de $H^*(X)$ muni de sa graduation par le degré, du cup-produit, et des opérations supérieures dérivées du cup-produit.

5. Supposons pour simplifier X connexe, et soit $\mathscr{M}$ le modèle minimal du type d'homotopie rationnel de X, au sens de Sullivan [7]. C'est une algèbre différentielle graduée à degrés ≥ 0, connexe ($\mathscr{M}^0 = \mathbb{Q}$), (anti) commutative libre en tant qu'algèbre graduée, et engendrée par ses éléments indécomposables (i.e., $d\mathscr{M} \subset (\mathscr{M}^{>0})^2$). On a $H^*(\mathscr{M}) = H^*(X)$, et si X est simplement connexe, $\mathscr{M}^{>0}/(\mathscr{M}^{>0})^2 = (\pi_*(X) \otimes \mathbb{Q})^\vee$.

Un énoncé plus précis, et plus commode, que celui donné en §4 est qu'il existe une graduation $\underline{W}$ vérifiant (4.1) déduite d'une graduation $\underline{W}$ de $\mathscr{M}$ (à degrés ≥ 0, somme de graduations des $\mathscr{M}^i$), telle que d et le produit soient homogènes de degré 0 ; en d'autres termes, $\mathbb{Q}^*$ agit par automorphismes de $\mathscr{M}$).

6. La seule existence de W et $\underline{W}$ n'impose aucune restriction au type d'homotopie de X : On peut toujours prétendre que $\mathscr{M}$ est tout entière de poids 0. N'importe quel polyèdre fini a d'ailleurs le même type d'homotopie qu'une variété algébrique. Soit en effet S un ensemble fini, muni d'un ensemble $\mathscr{S}$ de parties (les simplexes). On suppose que toute partie d'un élément de $\mathscr{S}$ est encore dans $\mathscr{S}$. Identifions S à l'ensemble des vecteurs de base de $\mathbb{R}^S$, et pour $\sigma \subset S$, soit $|\sigma|$ le simplexe tendu par les $s \in \sigma$. Montrons que $|S| = \bigcup_{\sigma \in \mathscr{S}} |\sigma|$ a le type d'homotopie d'une variété algébrique X. Si on pose $|\sigma|_{\mathbb{C}}$ = espace affine complexe tendu par $\sigma \subset \mathbb{C}^S$, il suffit de prendre $X = \bigcup_{\sigma \in \mathscr{S}} |\sigma|_{\mathbb{C}}$, dont $|S|$ est un rétracte par déformation. On peut véri-

fier que dans cet exemple $H^*(X)$ est purement de filtration par le poids 0.

Toutefois, dès que les poids sont non nuls, des contraintes apparaissent sur le type d'homotopie de X (cf. §10.). Les règles suivantes aident à localiser les poids.

7. Pour un groupe de cohomologie H de type donné, chaque règle consistera à décrire une partie $\mathscr{E}$ de $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$. Les poids seront *contrôlés* par $\mathscr{E}$ au sens suivant : Si $\mathrm{Gr}_n^W(H)\neq 0$, il existe $(p,q)\in\mathscr{E}$, avec $p+q=n$. Cette façon de s'exprimer, qui ici paraît artificielle, ne l'est pas : D'autres informations que les poids possibles sont contrôlées par la même région $\mathscr{E}$, cf. §15.

(7.1) $H^n(X)$ est contrôlé par le carré $[0,n]\times[0,n]$.

(7.2) Si X est propre, $H^n(X)$ est contrôlé par la partie de ce carré en-dessous de la seconde diagonale, soit $\{(p,q)\in[0,n]\times[0,n]\mid p+q\leq n\}$. Si X est lisse, $H^n(X)$ est contrôlé par la partie de ce carré au-dessus de cette diagonale, soit $\{(p,q)\in[0,n]\times[0,n]\mid p+q\geq n\}$.

(7.3) Si $N=\dim X\leq n$, le carré $[0,n]\times[0,n]$ peut être remplacé par le carré $[n-N,N]\times[n-N,N]$.



8. Variantes. **(8.1)** Le groupe de cohomologie à support propre $H_c^n(X)$ est contrôlé par la partie du carré $[0,n]\times[0,n]$ en-dessous de la seconde diagonale. Pour $N=\dim X\leq n$, on peut encore remplacer ce carré par $[n-N,N]\times[n-N,N]$. En particulier, $H_c^{2N}(X)$ est purement de poids $2N$.

(8.2) La « dualité » entre les cas propres et lisses peut se déduire de la dualité de Poincaré : pour X lisse purement de dimension N,

$$H^n(X)=\mathrm{Hom}\big(H_c^{2N-n}(X),H_c^{2N}(X)\big)=\big(H_c^{2N-n}(X)^\vee\big)(-N).$$

Cet argument permet d'étendre les résultats donnés pour X lisse au cas où X est une « rational homology manifold ». Pour un tel X, l'image de $H_c^n(X)$ dans $H^n(X)$ est purement de poids n.

(8.3) Pour X seulement supposé normal, il reste vrai que $H^1(X)$ est contrôlé par $\{(0,1),(1,0),(1,1)\}$.

9. Soient X une variété connexe, $x\in X$, et $\Pi^{(n)}$ le plus grand quotient nilpotent de longueur n et sans torsion de $\pi_1(X,x)$. On sait que les groupes H d'indice fini dans $\Pi^{(n)}$ et assez petits ont la propriété suivante.

(*) Il existe une algèbre de Lie nilpotente de longueur n, $(\mathscr{H},[\ ,\ ])$, avec $\mathscr{H}$ un

$\mathbb{Z}$-module libre, telle que la formule de Campbell–Hausdorff

$$x \circ y = x + y + [x,y]/2 + [x,[x,y]]/12 + [y,[y,x]]/12 + \cdots$$

fasse de $\mathscr{H}$ un groupe, isomorphe à H.

De plus, l'algèbre de Lie $\mathscr{L}^{(n)} = \mathscr{H} \otimes \mathbb{Q}$ ne dépend que de $\Pi^{(n)}$, non de H.

10. THÉORÈME (MORGAN). *Si X est normale, $\mathscr{L}^{(n)}$ admet une graduation $\underline{W}$, à degrés < 0, telle que $\mathscr{L}^{(n)}$ soit engendrée par des éléments de degré -1 et -2, ceux ci n'étant soumis qu'à des relations de degré -2, -3 et -4, plus la nullité des commutateurs n fois itérés.*

Il est plus commode de travailler avec le système projectif $\mathscr{L}^{(\infty)}$ des $\mathscr{L}^{(n)}$. Définissant $H^i(\mathscr{L}^{(\infty)}) = \varinjlim H^i(\mathscr{L}^{(n)})$, on a

$$H^1(\mathscr{L}^{(\infty)}) = H^1(X), \qquad H^2(\mathscr{L}^{(\infty)}) \subset H^2(X).$$

De plus, une graduation $\underline{W}$ de $\mathscr{M}$ comme au §5 définit des graduations compatibles de $\mathscr{L}^{(\infty)}$, de sa cohomologie, et de celle de X. D'après (8.3), (resp. (7.1)), $H^1(X)$ est de poids 1 et 2 et $H^2(X)$ de poids ≤ 4. Dès lors, $H^1(\mathscr{L}^{(\infty)})$ (le dual du groupe $\mathscr{L}^{(\infty)}/[\mathscr{L}^{(\infty)}, \mathscr{L}^{(\infty)}]$ des générateurs de $\mathscr{L}^{(\infty)}$) est de poids 1 et 2, et $H^2(\mathscr{L}^{(\infty)})$, le dual du groupe des relations entre générateurs, est de poids ≤ 4. Ceci vérifie le théorème.

11. Pour une variété propre et lisse la filtration par le poids se réduit à peu de chose (3.1). Le fait qu'elle soit graduable au sens §4 implique la nullité de tous les produits de Massey. Qu'elle le soit au sens §5 implique même que le type d'homotopie rationnel de X peut se lire sur son algèbre de cohomologie—voir [3].

12. Théorie de Hodge. Le groupe de cohomologie $H^i(X)$ de toute variété algébrique complexe est munie d'une structure de Hodge mixte (W, F) (W est une filtration de $H^i(X)$, et F une filtration de $H^i(X) \otimes \mathbb{C} = H^i(X, \mathbb{C})$, W et F vérifiant des axiomes convenables—voir [1]). La filtration par le poids est par définition la filtration W.

13. Théorie l-adique. Une variété algébrique X se définit en terme d'un nombre fini d'équations polynômes. Les coefficients de ces équations engendrent un sous-anneau de type fini R de $\mathbb{C}$, de corps des fractions K, et X se déduit par extension des scalaires à $\mathbb{C}$ d'un schéma sur K, voire sur R. Les énoncés qui suivent deviennent vrai lorsqu'on remplace R par $R[1/f]$ avec $f \in R$ assez divisible.

(13.1) Soit l un nombre premier. Le groupe $H^i(X) \otimes \mathbb{Q}_l$ s'identifie au groupe de cohomologie l-adique $H^i(X, \mathbb{Q}_l)$. Ce dernier est défini de façon purement algébrique, donc est muni par transport de structure d'une action de $\mathrm{Aut}(\mathbb{C}/K)$.

(13.2) Soit $\overline{K}$ la clôture algébrique de K dans $\mathbb{C}$. L'action se factorise par $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$. Elle est non ramifiée sur $R[1/l]$, i.e., se factorise par le groupe de Galois de la plus grande extension $K_{\mathrm{nr}}^{(l)} \subset \overline{K}$ de K non ramifiée sur $R[1/l]$.

(13.3) Soit $\mathfrak{m}$ un idéal maximal de $R[1/l]$, et $N(\mathfrak{m}) = \#R/\mathfrak{m}$ ($R/\mathfrak{m}$ est un corps fini). A $\mathfrak{m}$ correspond une classe de conjugaison de substitutions de Frobenius $\varphi_{\mathfrak{m}} \in \mathrm{Gal}(K_{\mathrm{nr}}/K)$, d'inverses les Frobenius géométriques $F_{\mathfrak{m}} = \varphi_{\mathfrak{m}}^{-1}$.

14. THÉORÈME. *Pour f assez divisible, on a*

(i) *Pour tout l et $\mathfrak{m}$, les valeurs propres α de $F_{\mathfrak{m}}$ (dans une extension finie convenable de $\mathbb{Q}_l$) sont des entiers algébriques. Pour chaque α, il existe un entier $w(\alpha)$ tels que tous les conjugués complexes de α soient de valeur absolue $N(\mathfrak{m})^{w(\alpha)/2}$.*

(ii) *Choisissons un Frobenius géométrique $F_{\mathfrak{m}}$, et soit ${}_{\mathfrak{m}}W_j$ la somme des sous-espaces propres généralisés correspondant aux valeurs propres α de $F_{\mathfrak{m}}$ telles que $w(\alpha) = j$. La filtration par les $\bigoplus_{j\leq i} {}_{\mathfrak{m}}W_j$ est indépendante de $\mathfrak{m}$ et du choix de $F_{\mathfrak{m}}$; elle est rationnelle et sa trace sur $H^i(X)$ est indépendante de l ; c'est la filtration par le poids.*

Principe de démonstration. On exprime (via une suite spectrale) la cohomologie de X en terme de la cohomologie de variétés propres et lisses, comme en [1]. La suite spectrale aboutit à une filtration W de $H^*(X)$, qui est par définition la filtration par le poids de la théorie de Hodge. Cette suite spectrale a un analogue l-adique ; le l-adifié W_l de W est donc stable par un groupe de Galois. On déduit de la conjecture de Weil que les valeurs propres de $F_{\mathfrak{m}}$ sur $\mathrm{Gr}_j^{W_l}$ sont des entiers algébriques de valeurs absolues complexes $N(\mathfrak{m})^{j/2}$, et le théorème en résulte.

15. Dans les cas considérés en (7.1), (7.2) et (7.3), la région $\mathscr{E}$ décrite contrôle non seulement les poids, mais encore les nombres de Hodge et la divisibilité des valeurs propres des $F_{\mathfrak{m}}$: dans (7.1), (7.2) et (7.3), une région $\mathscr{E}$ a été assignée à un groupe H, et

(a) Les nombres de Hodge h^{pq} non nuls des structure de Hodge $\mathrm{Gr}_j^W(H)$ vérifient $(p,q) \in \mathscr{E}$.

(b) (Utile seulement dans le cas (7.3).) Si les $(p,q) \in \mathscr{E}$ avec $p+q=j$ vérifient $p,q \geq k$, alors (toujours pour f assez divisible), les valeurs propres de $F_{\mathfrak{m}}$ de valeurs absolues complexes $N(\mathfrak{m})^{j/2}$ sont divisibles par $N(\mathfrak{m})^k$.

On espère que ceci est un cas particulier d'un principe général, cf. [4].

16. Le résultat suivant est clair du point de vue de la théorie de Hodge.

(16.1) Pour j impair $\dim \mathrm{Gr}_j^W H^i(X)$ est pair.

Par contre, je ne sais démontrer jusqu'ici §§ 2 et 5 que par voie l-adique. Pour § 5, la méthode de § 14 permet d'obtenir une graduation l-adique ; une astuce de Sullivan permet d'en déduire l'existence de graduations rationnelles du type voulu.

Les propriétés de fonctorialité de la filtration par le poids sont évidentes du point de vue l-adique (car Galois commute à tout ce qui se peut définir). Il est toutefois utile de les prouver du point de vue de la théorie de Hodge, pour obtenir des propriétés analogues pour la filtration F. Morgan a obtenu de nombreux résultats dans cette direction—assez pour prouver un résultat un peu plus faible que §10 par théorie de Hodge.

17. Ainsi que § 5 le suggère, une filtration par le poids existe aussi sur les groupes d'homotopie (tensorisés par $\mathbb{Q}$) sous des hypothèses de simple connexité.

Elle existe aussi sur les groupes de cycles évanescents (cf. [6]), et j'espère qu'elles nous aideront à mieux comprendre ces derniers.

Bibliographie

1. P. Deligne, *Théorie de Hodge*. I, Proc. Internat. Congress Math. (Nice, 1970), vol. I, Gauthier-

Villars, Paris, 1971, pp. 425–430 ; II, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. No. 40 (1972), 5–58 ; III, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. No. 44 (à paraître).
2. ——, *La conjecture de Weil.* I, II, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. Nos. 43 et 44 (à paraître).
3. P. Deligne, P.A. Griffiths, J. Morgan and D. Sullivan, *Real homotopy theory of Kähler manifolds* (à paraître).
4. B. Mazur, *Frobenius and the Hodge filtration (estimates)*, Ann. of Math. (2) 98 (1973), 58–95. MR 48 # 297.
5. J. Morgan.
6. J. H. M. Steenbrink, *Limits of Hodge structures and intermediate jacobians*, Thèse, Amsterdam, 1974.
7. D. Sullivan, *Differential forms and the topology of manifolds*, Proc. Japan Conference on Manifolds, 1973.

Institut des Hautes Etudes Scientifiques
91440 Bures-sur-Yvette, France

The terminal blank remainder is intentionally preserved. No received-date line appears in the controlling authority.

Le support du caractère d'une représentation supercuspidale

Pierre Deligne

Note (*) de M. Pierre Deligne, transmise par M. Jean-Pierre Serre.

Le caractère d'une représentation supercuspidale d'un groupe semi-simple sur un corps local est à support dans la réunion des sous-groupes compacts ouverts.

1 Rappels sur les groupes monogènes

Soient V un espace vectoriel de dimension finie sur un corps k et $g \in \mathrm{GL}(V)$. Si k est parfait, l'adhérence de Zariski $\langle g\rangle$ du groupe engendré par g est produit d'un groupe multiplicatif $\langle g\rangle_m$ par un groupe unipotent $\langle g\rangle_{\mathrm{un}}$. Si $g = su = us$ est la décomposition de Jordan de g en semi-simple et unipotent, on a $\langle g\rangle_m = \langle s\rangle$ et $\langle g\rangle_{\mathrm{un}} = \langle u\rangle$. Sans hypothèse sur k, on définit le sous-groupe $\langle g\rangle_m$ de $\langle g\rangle$ comme l'adhérence de Zariski de la réunion des sous-groupes de $\langle g\rangle$ noyau de la multiplication par n, pour n premier à l'exposant caractéristique de k. Cette définition est compatible à l'extension des scalaires, et équivaut à la précédente pour k parfait. Le groupe des caractères de $\langle g\rangle_m$, sur une clôture algébrique $\bar{k}$ de k, est le sous-groupe X de $\bar{k}^*$ engendré par les valeurs propres de g, et

$$s \in \langle g\rangle_m(\bar{k}) = \mathrm{Hom}(X, \bar{k}^*)$$

correspond à l'inclusion identique de X.

Supposons k valué complet, d'uniformisante π, soit v la valuation de $\bar{k}$ (à valeurs dans $\mathbf{Q}$) normalisée par $v(\pi) = 1$ et soit $n > 0$ un entier tel que $nv(X) \subset \mathbf{Z}$. L'homomorphisme $nv(x) : X \to \mathbf{Z}$ se transpose en $m_g : \mathbf{G}_m \to \langle g\rangle_m$.

Pour G un groupe algébrique linéaire sur k, et $g \in G(k)$, on peut répéter les constructions précédentes après avoir choisi un plongement $G \subset \mathrm{GL}(V)$. L'homomorphisme $m_g : \mathbf{G}_m \to \langle g\rangle_m \subset G$ ne dépend pas du plongement choisi (pour n fixé). Pour toute représentation linéaire W de G, il définit une action de $\mathbf{G}_m$ sur W, i. e. une graduation de W (SGA 3 I 4.7.3). La partie de degré d est la somme des sous-espaces propres généralisés de g correspondant aux valeurs propres $\alpha \in \bar{k}$ telles que $nv(\alpha) = d$.

Supposons G réductif. Tout homomorphisme m de $\mathbf{G}_m$ dans G définit alors deux paraboliques opposés de G, les paraboliques *contractés* et *dilatés* par m. On notera P_g^+ le parabolique contracté par m_g (on dira aussi : contracté par g). Il admet les caractérisations équivalentes suivantes :

(a) Un élément $x \in G(\bar{k})$ est dans P_g^+ (resp. son radical unipotent U_g^+) si et seulement si le morphisme
$$\lambda \longmapsto m_g(\lambda) x m_g(\lambda)^{-1} : \mathbf{G}_m \longrightarrow G$$
se prolonge à $\mathbf{G}_a$ [resp. et que $\lim_{\lambda\to 0} m_g(\lambda) x m_g(\lambda)^{-1} = e$] — soit encore si et seulement si $\lim_{n\to\infty} g^n x g^{-n}$ existe (resp. $= e$).

(b) $\mathrm{Lie}\, P_g^+$ (resp. $\mathrm{Lie}\, U_g^+$) est la somme, dans $\mathrm{Lie}\, G$, des sous-espaces propres généralisés de $\mathrm{ad}\, g$ correspondant aux valeurs propres de valuation ≥ 0 (resp. > 0).

On pose $P_g^- = P_{g^{-1}}^+$ [parabolique dilaté par g, contracté par $m_{g^{-1}} = (m_g)^{-1}$] et on note U_g^- son radical unipotent. Les paraboliques P_g^+ et P_g^- sont opposés, et on pose $M_g = P_g^+ \cap P_g^-$.

2 Énoncé et preuve du théorème

On suppose k localement compact, et G réductif. On note τ la projection de G dans son groupe adjoint G^{ad}. Une représentation admissible $(\mathscr{H}, \rho)$ de $G(k)$ est *supercuspidale* si ses coefficients sont à support dans des images inverses de compacts de $G^{\mathrm{ad}}(k)$.

Si K est un sous-groupe compact de $G(k)$, on note dk la mesure de Haar normalisée sur K et $[K]$ son image dans l'algèbre des distributions à support compact sur $G(k)$. L'endomorphisme

$$\rho(K) \underset{\text{dfn}}{=} \rho([K])$$

est un projecteur de $\mathscr{H}$ sur le sous-espace $\mathscr{H}^K$ des invariants de K. Que ρ soit supercuspidale signifie encore que, pour tout K sous-groupe compact ouvert K, on a $\rho(K)\rho(g)\rho(K) = 0$ pour $\tau(g) \in G^{\mathrm{ad}}$ hors d'un compact (dépendant de K) convenable. Notons G_c^{ad} la réunion des sous-groupes compacts (ou compacts ouverts, cela revient au même) de $G^{\mathrm{ad}}(k)$.

Théorème — *Si $(\mathscr{H}, \rho)$ est une représentation admissible supercuspidale de $G(k)$, son caractère[(1)] est à support dans $\tau^{-1}(G_c^{\mathrm{ad}})$.*

Choisissons un système de coordonnées locales près de e, i. e. un réseau $L \subset \mathrm{Lie}(G)$ et un isomorphisme analytique α de L avec un voisinage de e, tels que

(1) $\alpha(0) = e$ et $d\alpha$ en 0 est l'identité de $\mathrm{Lie}(G)$.

Soit $g \in G(k)$. On choisira L tel que

(2) $L = (L \cap \mathrm{Lie}\, U_g^+) \oplus (L \cap \mathrm{Lie}\, M_g) \oplus (L \cap \mathrm{Lie}\, U_g^-)$. Notons $L^+ \oplus L^0 \oplus L^-$ cette décomposition.

(3) $\mathrm{ad}\, g(L^+) \subset L^+$, $\mathrm{ad}\, g(L^0) = L^0$, $\mathrm{ad}\, g^{-1}(L^-) \subset L^-$.

Puisque P_g^+ et P_g^- sont stables par $\mathrm{ad}\, g$, la condition (3) peut se récrire

(3') $\mathrm{ad}\, g(L \cap \mathrm{Lie}\, P_g^+) \subset L$ et $\mathrm{ad}\, g^{-1}(L \cap \mathrm{Lie}\, P_g^-) \subset L$.

Notons par un indice i l'intersection avec $G_i = \alpha(\pi^i L)$. Sous les hypothèses (2) (3), il existe i_0 tel que

(4) Pour $i \geq i_0$, G_i est un sous-groupe de $G(k)$, $G_i = U_{gi}^+ \cdot M_{gi} \cdot U_{gi}^-$ et

(5) $\mathrm{Int}\, g(U_{gi}^+) \subset U_{gi}^+$, $\mathrm{Int}\, g(M_{gi}) = M_{gi}$ et $\mathrm{Int}\, g^{-1}(U_{gi}^-) \subset U_{gi}^-$.

Ceci résulte de la décomposition

$$U_g^+ \times M_g \times U_g^- \hookrightarrow G : (u^+, m, u^-) \longmapsto u^+ m u^-$$

d'un voisinage de e.

De plus, pour i_0 assez grand, il existe un voisinage V de g tel que (2) à (5) restent pour g remplacé par $g' \in V$: pour (2) et (3'), on utilise que P_g^+ et $\mathrm{ad}\, g$ dépendent continûment de g ; pour (4) (5) on utilise que m_g, donc $P_g^{\pm}$, dépend analytiquement de g, de sorte que dans la décomposition $x = u^+ m u^-$, les composantes u^+, m et u^- sont fonctions analytiques du couple (x, g).

Lemme — *Si les conditions (1) à (5) sont remplies, que $i \geq i_0$, et que $\tau(g) \notin G_c^{\mathrm{ad}}$, alors $\rho(G_i)\rho(g)\rho(G_i)$ est nilpotent.*

Pour la décomposition $U_g^+ \times M_g \times U_g^- \to G$ de la grosse cellule de G, on a la relation

$$dg = \lambda(m)\, du^+\, dm\, du^-$$

entre mesures de Haar, où λ est un caractère de M_g. Sur tout sous-groupe compact de M_g, $\lambda = 1$, de sorte que

$$[G_i] = [U_{gi}^+] \star [M_{gi}] \star [U_{gi}^-].$$

Prouvons par récurrence sur N que $([G_i]g[G_i])^N = [G_i]g^N[G_i]$ dans l'algèbre des distributions à support compact sur G (on écrit g pour δ_g). En effet,

$$\begin{aligned}([G_i]g^N[G_i])([G_i]g[G_i]) &= [G_i]g^N[G_i]g[G_i] \\ &= [G_i]g^N[U_{gi}^+][M_{gi}][U_{gi}^-]g[G_i] \\ &= [G_i][g^N U_{gi}^+ g^{-N}][g^N M_{gi} g^{-N}]g^N g[g^{-1}U_{gi}^- g][G_i] \\ &= [G_i]g^{N+1}[G_i].\end{aligned}$$

Si $\tau(g) \notin G_c^{\mathrm{ad}}$, l'ensemble des $\tau(g^N)$ $(N \geq 1)$ n'est pas relativement compact. Puisque ρ est supercuspidale, il existe donc N tel que

$$(\rho(G_i)\rho(g)\rho(G_i))^N = \rho(G_i)\rho(g^N)\rho(G_i) = 0.$$

Preuve du théorème — Pour $g \in G(k)$ tel que $\tau(g) \notin G_c^{\mathrm{ad}}$, choisissons L, α, i_0 et V comme ci-dessus, et tels que $gG_{i_0} \subset V$. Notons Θ le caractère de ρ. Pour tout $g' \in gG_i$, et tout $i \geq i_0$, on a alors

$$\Theta(g'[G_i]) = \Theta([G_i]g'[G_i]) = \mathrm{Tr}(\rho(G_i)\rho(g')\rho(G_i)) = 0$$

de par le lemme, et les sous-groupes G_i formant un système fondamental de voisinage de 0, Θ est nul sur gG_i, et son support ne contient pas g.

Remarque 1 — Le même théorème vaut, avec la même démonstration, pour un groupe analytique revêtement fini étale d'un sous-groupe ouvert de G. L'hypothèse devient « l'image dans G^{ad} du support des coefficients est relativement compacte » ; la conclusion « l'image dans G^{ad} du support de Θ est dans G_c^{ad} ».

Remarque 2 — Soit p la caractéristique résiduelle de k. La démonstration ne fait un usage réel des mesures de Haar $[K]$ que pour K petit, et en particulier un p-groupe. Le théorème, et sa démonstration, valent donc pour les représentations à coefficients dans un quelconque corps de caractéristique $\neq p$.

Notes de la source

(*) Séance du 24 mai 1976.

(1) Une fois choisie une mesure de Haar dg sur G, le caractère Θ de ρ est la distribution sur G de valeur sur une fonction-test φ la trace

$$\mathrm{Tr}\left(\int \varphi(g)\rho(g)\,dg\right).$$

Plus intrinsèquement, c'est la fonction généralisée [forme linéaire sur l'espace des mesures $\varphi(g)\,dg$ pour $\varphi(g)$ localement constante à support compact et dg une mesure de Haar] donnée par cette même formule.

Institut des Hautes Études scientifiques,
Le Bois-Marie,
91440 Bures-sur-Yvette.

Les constantes locales de l'équation fonctionnelle de la fonction L d'Artin d'une représentation orthogonale

Pierre Deligne (Bures-sur-Yvette)

A Jean-Pierre Serre en témoignage d'admiration.

Sommaire

1. Enoncé du théorème 299
2. Lemmes sur les représentations virtuelles des groupes finis ... 302
3. Preuve de 1.5 307
4. Groupes de Weil et loi de réciprocité de Hasse 309
5. Représentations orthogonales de groupes de Weil 313

1. Enoncé du théorème

(1.1) Soient K un corps global (un A-corps au sens de Weil), K' une extension galoisienne finie de K et V une représentation complexe du groupe de Galois $\mathrm{Gal}(K'/K)$. Nous suivrons les conventions de [1] pour définir la fonction L d'Artin correspondante : les facteurs à l'infini sont inclus, et les facteurs locaux non archimédiens sont définis en termes des Frobenius géométriques (inverses des substitutions de Frobenius). Nous normalisons par ailleurs l'isomorphisme de réciprocité de la théorie du corps de classe local de façon à ce qu'il transforme les Frobenius géométriques en uniformisantes (cf. [1] 3.6). Ces questions de signe sont en fait sans importance : nos calculs essentiels se feront modulo 2. La fonction $L(V,s)$ vérifie une équation fonctionnelle

$$L(V,s) = \varepsilon(V,s)L(V^*,1-s), \tag{1.1.1}$$

où $\varepsilon(V,s)$ est le produit d'une constante par un facteur exponentiel, et V^* le dual de V.

Soient f la norme du conducteur d'Artin de V, D la valeur absolue du discriminant de K (resp. q^{2g-2} pour un corps de fonctions) et définissons

$$W(V) = \varepsilon\Big(V, \tfrac{1}{2}\Big). \tag{1.1.2}$$

On a alors

$$\varepsilon(V,s) = W(V)\big(f \cdot D^{\dim(V)}\big)^{\frac{1}{2}-s}, \tag{1.1.3}$$

$$W(V)\cdot W(V^*) = 1. \tag{1.1.4}$$

Si V est isomorphe à V^*, i.e. si le caractère de V est à valeurs réelles, (1.1.4) montre que $W(V) = \pm 1$. Fröhlich et Queyrut [2] ont montré que si V est même orthogonale, i.e. réalisable sur $\mathbf{R}$, alors $W(V) = +1$.

(1.2) Soient K un corps local (= un corps localement compact non discret), K' une extension galoisienne finie de K, contenue dans une clôture séparable $\bar{K}$ de K, V une représentation complexe du groupe de Galois $G = \mathrm{Gal}(K'/K)$, $\psi : K \to \mathbf{C}^*$ un caractère additif non trivial et dx une mesure de Haar sur K. En fait, K' ne joue aucun rôle : nous n'avons affaire qu'à la représentation de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ déduite de V par inflation ; on la note encore V. Je renvoie à [1] §§ 4, 5 pour la définition de $\varepsilon(V, \psi, dx, s)$. Dans [1], on prend plus généralement pour V une représentation du groupe de Weil $W(\bar{K}/K)$ (dont $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ est un complété dans le cas non archimédien, un quotient dans le cas archimédien), on définit $\varepsilon(V, \psi, dx)$, et on pose $\varepsilon(V, \psi, dx, s) = \varepsilon(V \otimes \omega_s, \psi, dx)$, où ω_s est le quasi-caractère $\|x\|^s$ de $K^* \simeq W(\bar{K}/K)^{\mathrm{ab}}$. En tant que fonction de s, $\varepsilon(V, \psi, dx, s)$ est le produit d'une constante par un facteur exponentiel.

Si l'on part d'une situation globale comme en 1.1, que K_v parcourt les complétés de K, que V_v est la restriction à un groupe de décomposition en v de la représentation V, que les ψ_v sont les composantes locales d'un caractère de A_K/K et que

$$\int_{A_K/K} \bigotimes_v dx_v = 1,$$

on a

$$\varepsilon(V, s) = \prod_v \varepsilon(V_v, \psi_v, dx_v, s). \tag{1.2.1}$$

Tant localement que globalement, ε est multiplicatif en V : $\varepsilon(V \oplus V') = \varepsilon(V) \cdot \varepsilon(V')$. Ceci permet de définir ε pour les représentations virtuelles (éléments du groupe de Grothendieck $R(G, \mathbf{C})$ de la catégorie des représentations de G).

Revenons au cas local. Si V est une représentation virtuelle de dimension 0, $\varepsilon(V, \psi, dx, s)$ est indépendant de dx, qui est omis de la notation ([1] 5.3). Si V est de dimension 0 et de déterminant $\chi : K^* \simeq W(\bar{K}/K)^{\mathrm{ab}} \to \mathbf{C}^*$, alors ([1] 5.4)

$$\varepsilon(V, \psi(ax), s) = \chi(a)\varepsilon(V, \psi, s). \tag{1.2.2}$$

En particulier, si $\chi = 1$, $\varepsilon(V, \psi, s)$ est indépendant de ψ ; ψ est alors omis de la notation.

Le conducteur d'Artin f de V vaut par définition 1 pour K archimédien. Pour K non archimédien, c'est le nombre noté $q^{a(V)}$ dans [1] (q = nombre d'éléments du corps résiduel). Pour V de dimension 0 et déterminant 1, posons

$$W(V) = \varepsilon\left(V, \tfrac{1}{2}\right). \tag{1.2.3}$$

On a alors

$$\varepsilon(V, s) = W(V) f^{\frac{1}{2} - s}, \tag{1.2.4}$$

$$W(V) \cdot W(V^*) = 1. \tag{1.2.5}$$

Si V est isomorphe à sa duale, i.e. si son caractère est réel, (1.2.5) montre que $W(V) = \pm 1$.

Le groupe $R(G, \mathbf{R})$ des représentations réelles virtuelles de G, groupe de Grothendieck de la catégorie des représentations réelles de G, est un sous-groupe du groupe des représentations virtuelles de G de caractère réel. Les éléments de

ce sous-groupe sont dits réalisables sur **R**. Nous nous proposons de calculer $W(V_v)$ lorsque V_v est de dimension 0, de déterminant 1 et réalisable sur **R**.

(1.3) Soit G un groupe fini. On sait qu'une représentation réelle $\rho : G \to GL(V)$ a une classe de Stiefel-Whitney

$$w^*(V) = 1 + w^1(V) + \cdots \in H^*(G, \mathbf{Z}/2) = \prod_i H^i(G, \mathbf{Z}/2).$$

On peut la définir comme suit : la représentation V définit un fibré vectoriel (même un système local) $\mathscr{V}$ sur l'espace classifiant BG du groupe G, et $w^*(V)$ est la classe de Stiefel-Whitney de $\mathscr{V}$ dans $H^*(BG, \mathbf{Z}/2) = H^*(G, \mathbf{Z}/2)$. La même construction s'applique aux représentations réelles virtuelles : w^* est l'homomorphisme composé

$$R(G, \mathbf{R}) \longrightarrow KO(BG) \xrightarrow{w^*} H^*(BG, \mathbf{Z}/2)^\times = H^*(G, \mathbf{Z}/2)^\times.$$

Via l'isomorphisme $H^1(G, \mathbf{Z}/2) = \mathrm{Hom}(G, \{\pm 1\})$, $w^1(V)$ s'identifie au caractère $g \mapsto \det \rho(g)$. Le groupe $H^2(G, \mathbf{Z}/2)$ classifie les extensions centrales de G par le groupe à deux éléments. Si $w^1(V) = 0$, $w^2(V)$ est la classe de l'extension image réciproque par ρ du revêtement double $\mathrm{Spin}(V, Q)$ de $SO(V, Q)$, pour Q une forme quadratique G-invariante définie positive quelconque sur V.

(1.4) Reprenons les notations de 1.2 et soit $\mathrm{cl}(w^2(V))$ l'image de la classe $w^2(V) \in H^2(G, \mathbf{Z}/2)$ par l'application composée

$$H^2(G, \mathbf{Z}/2) \xrightarrow{\text{infl}} H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2) \xrightarrow{(1)} H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \bar{K}^*) \xrightarrow{\text{inv}} \mathbf{Q}/\mathbf{Z}, \tag{1.4.1}$$

où (1) se déduit de $n \mapsto (-1)^n : \mathbf{Z}/2 \to \bar{K}^*$, et où inv est donné par la théorie du corps de classe local. Pour K complexe ou de caractéristique 2, $\mathrm{cl}\, w^2(V) = 0$. Dans les autres cas, (1.4.1) identifie $H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2)$ à $\{0, \frac{1}{2}\} \subset \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$.

Notre résultat principal est le suivant :

(1.5) Théorème. Si V est une représentation réelle virtuelle de dimension 0 et de déterminant 1, on a

$$W(V) = \exp\bigl(2\pi i\ \mathrm{cl}(w^2(V))\bigr).$$

En caractéristique 2, $W(V)$ vaut donc 1. En caractéristique $\neq 2$, $W(V) = 1$ ou -1 selon que $w^2(V)$ est ou n'est pas trivial dans $H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2)$.

(1.6) De ce théorème, on peut déduire celui de Queyrut et Fröhlich :

(a) Pour V une représentation réelle virtuelle de dimension 0 et de déterminant 1 d'un corps global K de caractéristique $\neq 2$, les $\mathrm{cl}(w^2(V_v))$ sont les invariants locaux de $w^2(V) \in H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2)$, et la loi de réciprocité assure que leur somme dans $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ est nulle, donc le produit des $W(V_v)$ égal à un. En égale caractéristique 2, les $W(V_v)$ sont tous 1.

(b) Pour V de dimension un, définie par un caractère d'ordre deux (resp. triviale), la fonction L correspondante est quotient de deux fonctions ζ (resp. une fonction ζ), et on utilise le fait que, pour une fonction ζ, la constante globale est $+1$.

(c) On conclut en notant que toute représentation réelle virtuelle est somme de représentations des types (a) et (b).

(1.7) Nous prouverons aussi les variantes de ces résultats obtenues en remplaçant les groupes de Galois par des groupes de Weil (§ 5).

2. Lemmes sur les représentations réelles des groupes finis

(2.1) Proposition. Soient G un groupe fini, H un sous-groupe, V une représentation réelle virtuelle de H et $\mathrm{Tr} : H^2(H, \mathbf{Z}/2) \to H^2(G, \mathbf{Z}/2)$ le morphisme trace (corestriction). Si V est de dimension divisible par 4 et de déterminant 1 ($w^1(V) = 0$), on a

$$w^1\big(\mathrm{Ind}_H^G(V)\big) = 0 \quad \text{et} \quad w^2\big(\mathrm{Ind}_H^G(V)\big) = \mathrm{Tr}\, w^2(V).$$

Traduisons cet énoncé en termes topologiques. Soient B_G un espace classifiant de G, E_G le revêtement universel de B_G (le G-espace principal homogène universel) et posons $B_H = E_G/H$. C'est un espace classifiant pour H. On note f la projection $f : B_H \to B_G$. Les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} R(H,\mathbf{R}) & \longrightarrow & KO(B_H) \\ \downarrow \mathrm{Ind} & & \downarrow f_* \\ R(G,\mathbf{R}) & \longrightarrow & KO(B_G) \end{array} \qquad \text{et} \qquad \begin{array}{ccc} H^*(B_H,\mathbf{Z}/2) & = & H^*(H,\mathbf{Z}/2) \\ \downarrow \mathrm{tr} & & \downarrow f_* \\ H^*(B_G,\mathbf{Z}/2) & = & H^*(G,\mathbf{Z}/2) \end{array}$$

sont commutatifs (la définition des morphismes f_* est rappelée ci-dessous), de sorte que 2.1 résulte de la

(2.2) Proposition. Soit $f : X \to Y$ un revêtement fini d'espaces topologiques. Pour $v \in KO(X)$, de dimension divisible par 4, et de première classe de Stiefel-Whitney nulle, on a $w^1(f_*v) = 0$ et

$$w^2(f_*v) = f_*(w^2(v)).$$

Rappelons la définition des morphismes f_*.

(a) En K-théorie : f_* se déduit de l'opération qui à un fibré vectoriel $\mathscr{V}$ sur X associe le fibré vectoriel $f_*\mathscr{V}$ sur Y dont la fibre en $y \in Y$ est la somme directe

$$\bigoplus_{f(x)=y} \mathscr{V}_x.$$

(b) En cohomologie. f_* est le composé de l'isomorphisme $H^*(X, \mathbf{Z}/2) = H^*(Y, f_*\mathbf{Z}/2)$ et du morphisme déduit par fonctorialité du morphisme trace :

$$\mathrm{Tr}_f : f_*\mathbf{Z}/2_X \longrightarrow \mathbf{Z}/2_Y : \text{ « somme des valeurs sur les feuillets ».}$$

On se ramène à supposer que f a un nombre constant k de feuillets et que v est défini par un fibré vectoriel orthogonal $\mathscr{V}$ de dimension constante n. Soit P' le $O(n)$-torseur correspondant et $[P']$ sa classe dans $H^1(X, O(n))$. Les descriptions 1.3 de w^1 et w^2 ont l'analogue suivant.

(a) $w^1 \in H^1(X, \mathbf{Z}/2)$ est l'image de $[P']$ par

$$\det : H^1(X, O(n)) \longrightarrow H^1(X, \{\pm 1\}) = H^1(X, \mathbf{Z}/2).$$

Si $w^1 = 0$, P' se relève en un $SO(n)$-torseur P, de classe $[P]$.

(b) La suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}/2 \longrightarrow \mathrm{Spin}(n) \longrightarrow SO(n) \longrightarrow 0$$

induit $\partial : H^1(X, SO(n)) \to H^2(X, \mathbf{Z}/2)$ et, si $w^1 = 0$, $w^2 = \partial[P]$.

La construction $\mathscr{V} \mapsto f_*\mathscr{V}$ permet d'associer à un $O(n)$-torseur sur X un $O(nk)$-torseur sur Y. Elle se factorise ainsi ; les isomorphismes locaux du fibré vectoriel orthogonal constant $(\mathbf{R}^n)^k$ avec $f_*\mathscr{V}$, qui en chaque point y transforment chacun des k facteurs de $(\mathbf{R}^n)^k$ en l'un des facteurs de la décomposition

$$(f_*\mathscr{V})_y = \bigoplus_{f(x)=y} \mathscr{V}_x,$$

s'identifient aux sections locales d'un torseur sous le produit semi-direct $O(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k$ de $O(n)^k$ par le groupe symétrique sur k lettres. Le $O(nk)$-torseur cherché se déduit de ce dernier et du morphisme $O(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k \to O(nk)$.

Si $w^1(\mathscr{V}) = 0$, le groupe structural de $f_*\mathscr{V}$ peut être réduit à $SO(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k$. Si n est pair, ce groupe est contenu dans $SO(nk)$, et $w^1(f_*\mathscr{V}) = 0$.

Supposons le groupe structural de $\mathscr{V}$ réduit à $SO(n)$, d'où un $SO(n)$-torseur P et un $SO(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k$-torseur Q sur Y, de classe $[Q]$. Considérons la suite exacte

$$0 \longrightarrow (\mathbf{Z}/2)^k \longrightarrow \mathrm{Spin}(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k \longrightarrow SO(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k \longrightarrow 0.$$

Le quotient $SO(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k$ agit sur $(\mathbf{Z}/2)^k$ via $\mathfrak{S}_k$, et le système local $((\mathbf{Z}/2)^k)^Q$ sur Y s'identifie à $f_*\mathbf{Z}/2$. Via l'isomorphisme $H^*(X, \mathbf{Z}/2) \simeq H^*(Y, f_*\mathbf{Z}/2)$, la classe $w^2(\mathscr{V}) = \partial[P]$ s'identifie à $\partial[Q] \in H^2(Y, ((\mathbf{Z}/2)^k)^Q)$, ainsi que le montre un calcul de cocycles.

La proposition résulte alors de l'existence, pour n divisible par 4, d'une flèche médiane rendant commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \to & (\mathbf{Z}/2)^k & \to & \mathrm{Spin}(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k & \to & SO(n)^k \rtimes \mathfrak{S}_k & \to & 0 \\ & & \downarrow \Sigma & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \to & \mathbf{Z}/2 & \to & \mathrm{Spin}(nk) & \to & SO(nk) & \to & 0, \end{array} \tag{2.2.1}$$

où Σ est l'homomorphisme somme des coordonnées.

Pour construire (2.2.1), il suffit de construire un relèvement

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{S}_k & \longrightarrow & SO(nk) \\ & \searrow\!\!\dashrightarrow & \uparrow \\ & & \mathrm{Spin}(nk). \end{array}$$

L'obstruction à le construire est définie pour n pair, et dans $H^2(\mathfrak{S}_k, \mathbf{Z}/2)$. Elle est additive en n, car le diagramme

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \to & \mathbf{Z}/2 \times \mathbf{Z}/2 & \to & \mathrm{Spin}(n'k) \times \mathrm{Spin}(n''k) & \to & SO(n'k) \times SO(n''k) & \to & 0 \\ & & \downarrow a+b & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \to & \mathbf{Z}/2 & \to & \mathrm{Spin}((n'+n'')k) & \to & SO((n'+n'')k) & \to & 0 \end{array}$$

est commutatif. Elle est donc nulle pour n divisible par 4.

(2.3) Lemme. Les représentations réelles virtuelles de dimension 0 et de déterminant 1 d'un groupe fini G forment un idéal de $R(G, \mathbf{R})$. Cet idéal est stable par inflation, restriction et induction.

Qu'elles forment un idéal résulte de ce que dim : $R(G, \mathbf{R}) \to \mathbf{Z}$ est un homomorphisme, que $\det(V + W) = \det(V) \cdot \det(W)$ et que

$$\det(V \otimes W) = \det(V)^{\dim(W)} \cdot \det(W)^{\dim(V)}.$$

La stabilité par inflation et restriction est triviale, tandis que la stabilité par induction résulte de 2.2 (1$^{\text{e}}$ assertion).

Un lemme analogue vaut pour les représentations complexes. Il se prouve de même ([1] 1.2).

(2.4) Soient D_n le groupe diédral produit semi-direct de $\mathbf{Z}/2$ par $\mathbf{Z}/n$ et $\chi : \mathbf{Z}/n \to \mathbf{C}^*$ un caractère. La représentation $\mathrm{Ind}(\chi)$ est réalisable sur $\mathbf{R}$: elle se réalise dans l'espace vectoriel réel $\mathbf{C}$, sur lequel $\mathbf{Z}/n$ agit par χ et $\mathbf{Z}/2$ par conjugaison complexe. Son déterminant est indépendant de χ. La représentation virtuelle

$$r(\chi) = \mathrm{Ind}_{\mathbf{Z}/n}^{D_n}([\chi] - [1])$$

est donc réalisable sur $\mathbf{R}$, de dimension 0 et de déterminant trivial.

(2.5) Proposition. Soit G un groupe fini. Toute représentation réelle virtuelle de dimension 0 et de déterminant trivial de G est somme

(a) de la réellifiée d'une représentation complexe virtuelle de dimension 0, et

(b) d'une combinaison $\mathbf{Z}$-linéaire de représentations induites de représentations $r(\chi)$ de quotients diédraux de sous-groupes de G.

Rappelons que la « réellifiée » d'une représentation complexe V d'un groupe G est la représentation de G sur le même espace V, vu comme espace vectoriel réel par restriction des scalaires de $\mathbf{C}$ à $\mathbf{R}$.

(2.6) Lemme. Soit G un groupe fini ayant un sous-groupe nilpotent G' d'indice 1 ou 2. Toute représentation réelle virtuelle de G est somme

(a) de la réellifiée d'une représentation complexe virtuelle de G,

(b) d'une combinaison $\mathbf{Z}$-linéaire de représentations induites de représentations $r(\chi)$,

(c) d'une combinaison $\mathbf{Z}$-linéaire de représentations réelles de dimension un.

Déduisons la proposition du lemme.

Le théorème d'induction de Brauer (tel que généralisé par Witt, J. Crelle, 190 (1952) ; voir par exemple Curtis-Reiner, Representation theory of finite groups and associative algebras, Intersc. Publ., N.Y. 1962) assure que la représentation 1 de G est combinaison $\mathbf{Z}$-linéaire $\sum n_i \mathrm{Ind}_{H_i}^G(\rho_i)$ de représentations induites de représentations réelles de sous-groupes H_i de G, chacun produit semi-direct d'un p-groupe P par un groupe cyclique C, P n'agissant sur C que par ± 1. Le lemme 2.3, et l'identité

$$V = V \otimes 1 = V \otimes \sum_i n_i \mathrm{Ind}_{H_i}^G(\rho_i) = \sum_i n_i \mathrm{Ind}_{H_i}^G(V \otimes \rho_i).$$

nous ramènent au cas où G lui-même est un tel produit semi-direct, donc du type considéré en 2.6. Pour V virtuelle de dimension 0 et de déterminant 1, considérons la décomposition 2.6

$$V = A + B + C = (A - \dim A \cdot 1) + B + (C + \dim A \cdot 1).$$

La représentation $(A - \dim A \cdot 1)$ est du type (a) de la proposition et B du type (b). Puisque V, $(A - \dim A \cdot 1)$ et B sont de dimension 0 et déterminant 1, $(C + \dim A \cdot 1)$ a les mêmes propriétés ; ceci nous ramène à prouver la proposition pour $(C + \dim A \cdot 1)$, donc pour une combinaison $\mathbf{Z}$-linéaire de représentations réelles de dimension 1. Soit donc V du type

$$V = \sum_{i=1}^{k} [\varepsilon_i] - \sum_{i=1}^{l} [\eta_i]$$

avec ε_i et η_i des caractères d'ordre divisant 2, $k = l$ (dimension 0) et $\prod \varepsilon_i = \prod \eta_i$ (déterminant 1).

On a

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{k} [\varepsilon_i] &= k \cdot 1 + \sum_{i=1}^{k} ([\varepsilon_i] - 1) \\ &= k \cdot 1 - \sum_{i=1}^{k} ([\varepsilon_i] - 1) \otimes \left(\left[\prod_{j<i} \varepsilon_j \right] - 1 \right) + \sum_{i=1}^{k} ([\varepsilon_i] - 1) \otimes \left[\prod_{j<i} \varepsilon_j \right] \\ &= k \cdot 1 + \left(\left[\prod \varepsilon_i \right] - 1 \right) - \sum_{i=1}^{k} ([\varepsilon_i] - 1) \left(\left[\prod_{j<i} \varepsilon_j \right] - 1 \right).\end{aligned}$$

On en déduit pour V une expression du type

$$V = \sum \pm \left([\alpha_i \beta_i] - [\alpha_i] - [\beta_i] + 1 \right),$$

où les α_i et β_i sont d'ordre divisant 2. Les termes de cette somme sont nuls si $\alpha_i = 1$ ou $\beta_i = 1$, du type (a) si $\alpha_i = \beta_i$, et du type (b) pour un groupe diédral $D_4 = (\mathbf{Z}/2)^2$ sinon.

(2.7) Lemme. Le lemme 2.6 est vrai pour une représentation de dimension 2.

Une telle représentation est en effet soit

(a) réellifiée d'une représentation complexe de dimension un

(b) diédrale, donc somme d'une représentation virtuelle $r(\chi)$ et de $[\varepsilon] + 1$, pour ε un caractère d'ordre deux.

(2.8) Lemme. Le lemme 2.6 est vrai pour une représentation de G induite d'une représentation réelle de dimension un d'un sous-groupe de G.

On procède par récurrence sur l'indice du sous-groupe H.

Soit $H' = G' \cap H$. Si H est d'indice ≤ 2, on applique le lemme 2.7. Sinon, il existe un sous-groupe J de G', appartenant à la série centrale ascendante, tel que $K = H'J/H'$ soit abélien non trivial. Soient l un nombre premier divisant l'ordre de K et K_l le noyau de la multiplication par l. Le groupe H/H' agit sur K et K_l.

Puisque H/H' est d'ordre ≤ 2, toutes ses représentations irréductibles (sur $\mathbf{Q}$, ou mod l) sont de dimension un, et il existe dans le $\mathbf{F}_l$-espace vectoriel K_l une droite stable par H/H'. Soit I' son image réciproque dans $H'J$. Le groupe H normalise I', de sorte que $I = I'H$ est un sous-groupe. On a $I' = G' \cap I$, et $H' \subset I' \subset G'$, avec I'/H' cyclique d'ordre l.

Soit $\varepsilon : H \to \{\pm 1\}$ le caractère de la représentation considérée de H. La formule de transitivité

$$\mathrm{Ind}_H^G(\varepsilon) = \mathrm{Ind}_I^G \mathrm{Ind}_H^I(\varepsilon)$$

et l'hypothèse de récurrence appliquée à I nous ramènent à voir que la représentation $\mathrm{Ind}_H^I(\varepsilon)$ de I vérifie le lemme 2.6. Si $l = 2$, cette représentation est de dimension deux et on applique le lemme 2.7. Si $l \neq 2$, la nilpotence de G' assure que I' normalise $\varepsilon|_{H'}$: sinon, G' aurait un sous-quotient extension non centrale d'un groupe d'ordre l par un groupe de type $(2, \ldots, 2)$, et un tel groupe n'est pas nilpotent.

Calculons la restriction de $\mathrm{Ind}_H^I(\varepsilon)$ à I'. C'est $\mathrm{Ind}_{H'}^{I'}(\varepsilon)$, déduit de $\mathrm{Ind}_{H'/\ker(\varepsilon)}^{I'/\ker(\varepsilon)}(\varepsilon)$ par inflation. Le groupe $I'/\ker(\varepsilon)$ est produit d'un groupe cyclique d'ordre l par $H'/\ker(\varepsilon)$, d'ordre ≤ 2. La représentation de I', en tant que représentation complexe, est donc somme de caractères complexes distincts, et I/I' agit sur l'ensemble de ces caractères par l'identité, ou par $\chi \mapsto \chi^{-1}$ (selon son action sur I'/H'). Groupant ensemble χ et χ^{-1}, on trouve que la représentation $\mathrm{Ind}_H^I(\varepsilon)$ de I est somme de représentations (réelles) de dimension ≤ 2, et on applique le lemme 2.7.

(2.9) Prouvons le lemme 2.6. On procède par récurrence sur l'ordre de G.

On peut supposer, et on suppose, que

(1) V est une représentation irréductible (sur $\mathbf{R}$) ;

(2) V est même absolument irréductible (sans quoi V est de type (a)) ;

(3) V est fidèle (sans quoi on applique l'hypothèse de récurrence à un quotient de G) ;

(4) V n'est pas induite par une représentation réelle d'un sous-groupe propre de G (sans quoi on applique l'hypothèse de récurrence à ce sous-groupe, et le lemme 2.8) ;

(5) G n'a pas de sous-groupe abélien d'indice ≤ 2 (sans quoi, par (2), on a $\dim(V) \leq 2$ et on applique le lemme 2.7).

Soit B un sous-groupe abélien normal de G contenu dans G' et maximal pour ces propriétés. Si le caractère complexe χ de B figure dans la restriction de V à B, on sait que V est induite d'une représentation réelle du sous-groupe H de G qui stabilise $\{\chi, \bar{\chi}\}$. Par (1) et (4), $H = G$, et seuls χ et $\bar{\chi}$ figurent dans $V|_B$. Soit G'' le stabilisateur de χ. On a $B \subset G' \cap G''$, et B est central dans G''.

Cas 1. $B \neq G' \cap G''$. Par (3), B est central dans le groupe nilpotent $G' \cap G''$. Le groupe $G/(G' \cap G'')$ est du type $(\mathbf{Z}/2)^r$ (avec $r = 0, 1$ ou 2) ; toutes ses représentations irréductibles (sur $\mathbf{Q}$, ou mod l) sont de dimension un. L'argument du début de la preuve du lemme 2.8 s'applique donc encore, et montre l'existence d'un sous-groupe B' de $G' \cap G''$, normal dans G, avec B'/B cyclique. Ce groupe B' est abélien, et ceci contredit la maximalité de B.

Cas 2. $B = G' \cap G''$. Alors, B est d'indice ≤ 2 dans G'', qui est donc abélien. Ceci contredit (5).

3. Preuve de 1.5

(3.1) Reprenons les notations de 1.2 et 1.4. Pour V de dimension 0 et de déterminant 1, le nombre $W(V) = \mathrm{sgn}(\varepsilon(V))$ est invariant par induction, et multiplicatif en V. D'après 2.1 et la théorie du corps de classe local (savoir, la formule inv Tr = inv), $\mathrm{cl}\, w^2(V)$ est de même invariant par induction et additif en V. La proposition 2.5 nous ramène donc à prouver le théorème dans les deux cas suivants.

Cas 1. V est la réellifiée d'une représentation complexe virtuelle W de dimension zéro.

Soit $\chi : K^* \to \mathbf{C}^*$ le déterminant de W. Quel que soit ψ, on a $\varepsilon(V) = \varepsilon(W,\psi)\cdot\varepsilon(\bar{W},\psi)$; et

$$\varepsilon(\bar{W},\psi) = \chi(-1)\cdot\varepsilon(\bar{W},\psi(-x)) = \chi(-1)\overline{\varepsilon(W,\psi)} \qquad (1.2.2),$$

d'où $W(V) = \chi(-1)$.

En particulier, $W(V) = 1$ pour K de caractéristique deux, comme il se doit. Supposons maintenant K de caractéristique $\neq 2$. La classe $w^2(V)$ est la réduction mod 2 de la première classe de Chern $c^1(W)$. La classe $c^1(W) \in H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z})$ est (au signe près) l'image de $\chi \in H^1(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{C}^*)$ par le morphisme ∂ de la suite exacte longue déduite de la suite exacte exponentielle

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z} \xrightarrow{2\pi i} \mathbf{C} \xrightarrow{\exp} \mathbf{C}^* \longrightarrow 0.$$

La classe $w^2(V)$ se déduit donc de même de χ et de la suite

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}/2 \longrightarrow \mathbf{C}^* \xrightarrow{z^2} \mathbf{C}^* \longrightarrow 0.$$

Elle est nulle si et seulement χ a une racine carrée, i.e. puisque -1 est l'unique élément d'ordre 2 de $\widehat{K^*} = \mathrm{Gal}(\bar{K}/K)^{\mathrm{ab}}$, si et seulement si $\chi(-1) = 1$. Ceci vérifie le théorème.

Cas 2. V se déduit par inflation d'une représentation $r(\chi)$ d'un quotient diédral de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$.

Pour K archimédien, on a nécessairement $V = 0$. On peut donc supposer, et on suppose, K non archimédien.

Soit G un groupe fini extension de $\mathbf{Z}/2$ par $\mathbf{Z}/n$. Si $u \in G$ n'est pas dans le sous-groupe $\mathbf{Z}/n$, l'image de u par le transfert : $G^{\mathrm{ab}} \to \mathbf{Z}/n$ est u^2. Le groupe G est donc diédral si et seulement si le transfert est trivial.

Rappelons aussi que pour L une extension de K, le transfert $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)^{\mathrm{ab}} \to \mathrm{Gal}(\bar{K}/L)^{\mathrm{ab}}$ correspond à l'inclusion $K^* \to L^*$. La situation du cas 2 peut dès lors se décrire ainsi : on part d'une extension quadratique séparable L/K, et d'un caractère $\chi : L^* \to \mathbf{C}^*$ trivial sur K^*. La représentation Ind χ de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ est alors réalisable sur $\mathbf{R}$, diédrale, et $V = \mathrm{Ind}([\chi] - 1)$.

(3.2) Théorème (Fröhlich et Queyrut [2]). Pour V comme ci-dessus, et Δ un élément non nul de L tel que $\mathrm{Tr}_{L/K}(\Delta) = 0$ (Δ est bien défini à multiplication près par un élément de K^*), on a

$$W(V) = \chi(\Delta).$$

Soient ψ un caractère additif non trivial de K, $\psi_L = \psi \circ \mathrm{Tr}_{L/K}$ et dx une mesure de Haar sur L. On a

$$\begin{aligned}\varepsilon(V,s) &= \varepsilon(\mathrm{Ind}([\chi]-1),\psi,s) = \varepsilon([\chi]-1,\psi_L,s)\\ &= \varepsilon(\chi,\psi_L,dx,s)\cdot\varepsilon(1,\psi_L,dx,s)^{-1}.\end{aligned}$$

Définissons la transformation de Fourier sur les fonctions de Schwartz-Bruhat sur L par

$$\widehat{f}(y) = \int f(x)\psi_L(xy)\,dx.$$

Les facteurs ε sont définis par l'équation fonctionnelle de Tate

$$\frac{\int \widehat{f}(x)\|x\|^{1-s}\chi^{-1}(x)\,d^*x}{L(\chi^{-1},1-s)} = \varepsilon(\chi,\psi_L,dx,s)\frac{\int f(x)\|x\|^s\chi(x)\,d^*x}{L(\chi,s)} \tag{3.2.1}$$

(on prend la même mesure de Haar d^*x sur L^* dans les deux membres). Les deux membres de cette formule sont en général définis par prolongement analytique en s. Toutefois, si $f(0) = \widehat{f}(0) = 0$, les intégrales se réduisent à une somme finie. Soit $x \mapsto \bar{x}$ le K-automorphisme non trivial de L. On a $\chi^{-1}(x) = \chi(\bar{x})$, de sorte que $L(\chi,s) = L(\chi^{-1},s)$. Faisant $s = \frac{1}{2}$ dans (3.2.1), on trouve que, pour $f(0) = \widehat{f}(0) = 0$,

$$\int \widehat{f}(x)\|x\|^{1/2}\chi^{-1}(x)\,d^*x = \varepsilon\Big(\chi,\psi_L,dx,\tfrac{1}{2}\Big)\int f(x)\|x\|^{1/2}\chi(x)\,d^*x.$$

On a

$$\int f(x)\|x\|^{1/2}\chi(x)\,d^*x = \int_{L^*/K^*}\|x\|^{1/2}\chi(x)(d^*x/d^*a)\int_{K^*} f(ax)\,da,$$

où da est une mesure de Haar sur K et où

$$d^*a = \frac{da}{\|a\|_K}$$

(noter que $\|a\|_L = \|a\|_K^2$). De même,

$$\begin{aligned}\int \widehat{f}(x)\|x\|^{1/2}\chi^{-1}(x)\,d^*x &= \int_{L^*/K^*}\|x\|^{1/2}\chi^{-1}(x)(d^*x/d^*a)\int_K \widehat{f}(ax)\,da\\ &= \int_{L^*/K^*}\|x\|^{1/2}\chi(x)(d^*x/d^*a)\int_K \widehat{f}(a\bar{x})\,da.\end{aligned}$$

Pour c une constante dépendant de ψ_L, dx, da et de Δ, on a

$$\int_K \widehat{f}(a\bar{x})\,da = c\int_K f(ax\Delta)\,da,$$

de sorte que, posant $c_1 = c\cdot\|\Delta\|^{-1/2}$,

$$\begin{aligned}\int \widehat{f}(x)\|x\|^{1/2}\chi^{-1}(x)\,d^*x &= \int_{L^*/K^*}\|x\|^{1/2}\chi(x)(d^*x/d^*a)c\cdot\int_K f(ax\Delta)\,da\\ &= c\cdot\|\Delta\|^{-1/2}\chi(\Delta)\int_{L^*/K^*}\|x\|^{1/2}\chi(x)(d^*x/d^*a)\int_K f(ax)\,da\\ &= c_1\chi(\Delta)\int f(x)\|x\|^{1/2}\chi(x)\,d^*x.\end{aligned}$$

Pour des choix convenables de f, on peut faire en sorte que les intégrales soient non nulles. Dès lors

$$\varepsilon\Big(\chi,\psi_L,dx,\tfrac{1}{2}\Big) = c_1\chi(\Delta)$$

et

$$W(V) = \varepsilon\Big(V,\tfrac{1}{2}\Big) = \chi(\Delta).$$

(3.3) Reprenons le cas 2 de la preuve du théorème. Pour K de caractéristique 2, on a $\Delta \in K^*$ et le théorème 3.2 montre que $W(V) = 1$, comme il se doit.

Supposons maintenant K de caractéristique $\neq 2$.

Le groupe $O(2)$ est produit semi-direct de $\{e,s\}$ (s une réflexion) par $SO(2)$. Soit $\widetilde{O}(2)$ le produit semi-direct de $\{e,s\}$ par le revêtement double de $SO(2)$. Pour $\rho : G \to O(2)$ une représentation du groupe fini G, l'obstruction à relever ρ à $\widetilde{O}(2)$ (la classe de l'extension centrale de G par $\mathbf{Z}/2$ image réciproque par ρ de $\widetilde{O}(2)$) est de la forme $\alpha w_1^2 + w_2$, avec $\alpha = 0$ ou 1. En fait, $\alpha = 0$ comme on le voit en testant sur $G = \{e,s\}$.

Posons $w^1 = w^1(\mathrm{Ind}\,\chi) = w^1(\mathrm{Ind}\,1)$ et $w^2 = w^2(\mathrm{Ind}\,\chi)$. On a

$$\begin{aligned} w^*\,\mathrm{Ind}([\chi]-1) &= (w^*\,\mathrm{Ind}(\chi))(w^*\,\mathrm{Ind}\,1)^{-1} \\ &= (1+w^1+w^2+\cdots)(1-w^1+(w^1)^2-\cdots) = 1+w^2+\cdots . \end{aligned}$$

La classe $w^2\,\mathrm{Ind}([\chi]-1) \in H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2)$ est donc nulle si et seulement si la représentation

$$\mathrm{Ind}\,\chi : \mathrm{Gal}(\bar{K}/K) \longrightarrow O(2)$$

se relève à $\widetilde{O}(2)$. Ceci signifie que $\chi : L^* \to \mathbf{C}^*$ a une racine carrée triviale sur K^*, soit encore que $\chi(\Delta) = 1$, Δ étant l'unique élément d'ordre 2 de L^*/K^*. Ceci conclut la preuve du théorème.

4. Groupes de Weil et loi de réciprocité de Hasse

(4.1) Soient K un corps local et $\bar{K}$ une clôture séparable de K. Pour la définition du groupe de Weil (absolu) $W(\bar{K}/K)$, je renvoie à [1] 2.2. Pour K non archimédien, c'est un sous-groupe de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$, extension de $\mathbf{Z}$ par l'inertie. Sa cohomologie à valeur dans un module discret M est définie par

$$H^i(W(\bar{K}/K), M) = \varinjlim_U H^i(W(\bar{K}/K)/U, M^U)$$

(U sous-groupe ouvert du groupe d'inertie, distingué dans $W(\bar{K}/K)$). Pour K archimédien, $W(\bar{K}/K)$ est un groupe de Lie, extension de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ par $\bar{K}^*$; sa cohomologie est celle de l'espace classifiant $BW(\bar{K}/K)$.

Soient n un entier premier à l'exposant caractéristique de K et μ_n le groupe des racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité de $\bar{K}$. C'est un $W(\bar{K}/K)$-module.

(4.2) Construction. On construit un isomorphisme

$$\mathrm{inv} : H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n) \xrightarrow{\sim} (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n.$$

(4.2.1) Lemme. Pour K non archimédien, et M un $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$-module discret de torsion, on a

$$H^i(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), M) \xrightarrow{\sim} H^i(W(\bar{K}/K), M).$$

Soit I le groupe d'inertie. La flèche 4.2.1 est l'aboutissement d'un morphisme de suites spectrales

$$E_2^{pq} = H^p(\widehat{\mathbf{Z}}, H^q(I, M)) \Rightarrow H^{p+q}(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), M),$$

$$E_2^{pq} = H^p(\mathbf{Z}, H^q(I, M)) \Rightarrow H^{p+q}(W(\bar{K}/K), M)$$

et on utilise que $\mathbf{Z}$ et $\widehat{\mathbf{Z}}$ ont même cohomologie à valeur dans un module discret de torsion (sur lequel $\widehat{\mathbf{Z}}$ agit continûment).

Pour K non archimédien, on a donc

$$H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mu_n) \xrightarrow{\sim} H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n).$$

On utilise alors la suite exacte de Kummer

$$0 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow \bar{K}^* \xrightarrow{n} \bar{K}^* \longrightarrow 0$$

et le théorème 90 pour identifier ce H^2 au noyau de la multiplication par n dans

$$H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \bar{K}^*) = \mathrm{Br}(K) = \mathbf{Q}/\mathbf{Z}.$$

Vu l'état de la littérature, ceci définit 4.2 au signe près. Le signe sera discuté en 4.7. Au § suivant, nous n'utiliserons de toute façon que le cas où $n = 2$.

Pour K archimédien, soit $\mathbf{Z}(1) = 2\pi i\mathbf{Z} \subset \bar{K}$. Nous prouverons que $H^3(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1)) = 0$, et construirons un isomorphisme

$$\mathrm{inv} : H^2(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1)) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Z}. \tag{4.2.2}$$

La suite exacte longue de cohomologie associée à la suite exacte courte

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}(1) \xrightarrow{n} \mathbf{Z}(1) \xrightarrow{\exp(x/n)} \mu_n \longrightarrow 0$$

nous fournira l'isomorphisme cherché

$$\mathrm{inv} : H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Z}/n \xrightarrow[x \mapsto x/n]{\sim} (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n.$$

Pour K complexe, on a $\bar{K} = K$, et $H^2(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1))$ classifie les extensions de K^* par $\mathbf{Z}(1)$, i.e. les homomorphismes de $\pi_1(K^*)$ dans $\mathbf{Z}(1)$. C'est le groupe $\mathbf{Z}$, engendré par la classe de l'extension

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}(1) \longrightarrow \bar{K} \xrightarrow{\exp} \bar{K}^* \longrightarrow 0. \tag{4.2.3}$$

La cohomologie de $W(\bar{K}/K)$ est celle de l'espace projectif complexe infini : les H^i successifs, à valeurs dans $\mathbf{Z}(1)$, sont

$$\mathbf{Z}(1), 0, \mathbf{Z}, 0, \mathbf{Z}(1), \ldots .$$

Pour K réel, utilisons la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(\mathbf{Z}/2, H^q(\bar{K}^*, \mathbf{Z}(1))) \Rightarrow H^{p+q}(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1)).$$

$H^q(\bar{K}^*, \mathbf{Z}(1))$	H^0H^q	H^1H^q	H^2H^q	H^3H^q	H^4H^q	...
0	0	0	0	0	0	...
$\mathbf{Z}$	$\mathbf{Z}$	0	$\mathbf{Z}/2$	0	$\mathbf{Z}/2$	...
0	0	0	0	0	0	...
$\mathbf{Z}(1)$	0	$\mathbf{Z}/2$	0	$\mathbf{Z}/2$	0	...

On a $E_2 = E_3$, car $E_2^{pq} = 0$ pour q impair.

(4.2.4) Lemme. L'homomorphisme

$$H^2(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1)) \longrightarrow H^2(\bar{K}^*, \mathbf{Z}(1))$$

n'est pas surjectif.

Il faut voir que l'extension 4.2.3 n'est pas la restriction à $\bar{K}^*$ d'une extension E de $W(\bar{K}/K)$ par $\mathbf{Z}(1)$. Le groupe $W(\bar{K}/K)$ est engendré par $\bar{K}^*$ et F, avec les relations $F^2 = -1$, $FzF^{-1} = \bar{z}$. Si E existait, on pourrait relever F en $\widetilde{F}$ dans E. On aurait $\widetilde{F}z\widetilde{F}^{-1} = \bar{z}$ $(z \in \bar{K})$, et $\widetilde{F}^2 \equiv \pi i \pmod{\mathbf{Z}(1)}$. Dès lors, $\widetilde{F}^2$ ne commuterait pas à $\widetilde{F}$, ce qui est absurde.

Vu le lemme, $d_3 : E_3^{0,2} \to E_3^{3,0}$ est non nul, et les premiers H^i sont

$$H^0 = 0.$$

$$H^1 = \mathbf{Z}/2 \quad (\text{égal à } H^1(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1))).$$

$H^2 = \mathbf{Z}$, et $H^2(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1)) \hookrightarrow H^2(\bar{K}^*, \mathbf{Z}(1))$ comme sous-groupe d'indice deux, l'inclusion s'identifiant à $n \mapsto 2n$.

$H^3 = 0$.

(4.3) Remarque. On peut montrer que la cohomologie est périodique de période 4. Nous n'utiliserons pas ce fait.

(4.4) Remarque. Pour K' une extension finie de K dans $\bar{K}$, et $\alpha \in H^2(W(\bar{K}/K'), \mu_n)$, on a $\operatorname{inv} \operatorname{Tr} \alpha = \operatorname{inv} \alpha$. Cela résulte de l'énoncé analogue pour $\mathrm{Br}(K)$ si K est non archimédien, et de la même formule pour $\alpha \in H^2(W(\bar{K}/K'), \mathbf{Z}(1))$ si K est archimédien. Celle-ci résulte des formules $\operatorname{Tr} \operatorname{res} \beta = 2\beta$ et $\operatorname{inv} \operatorname{res} \beta = 2 \operatorname{inv} \beta$ pour $\beta \in H^2(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}(1))$, K réel et K' complexe.

(4.5) Exemple. Soit $\chi : K^* \to \mathbf{C}^*$ un quasi-caractère. La classe $\partial\chi$ de l'extension de K^* par $\mathbf{Z}$ image réciproque par χ de l'extension

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z} \xrightarrow{2\pi i} \mathbf{C} \xrightarrow{\exp} \mathbf{C}^* \longrightarrow 0 \tag{4.5.1}$$

est un élément de $H^2(K^*, \mathbf{Z})$. Pour α une racine de l'unité dans K, d'ordre divisant n, son image par $\mathbf{Z} \to \mu_n : m \mapsto \alpha^m$ induit

$$(\chi, \alpha) \in H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n).$$

(4.6) Proposition. On a

$$\exp\bigl(2\pi i \operatorname{inv}(\chi, \alpha)\bigr) = \chi(\alpha).$$

Le cas archimédien se vérifie par un calcul direct. Pour K non archimédien, les deux membres ne changent pas si on multiplie χ par un caractère non ramifié. Ceci permet de supposer χ d'ordre fini. Il se prolonge alors en

$$\chi : \mathrm{Gal}(\bar{K}/K)^{\mathrm{ab}} \longrightarrow \mathbf{C}^*,$$

qui définit $[\chi] \in H^1(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{C}^*)$, dont l'image $\partial\chi \in H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z})$ par l'homomorphisme de connexion ∂ associé à (4.5.1) est la classe de l'extension de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$ par $\mathbf{Z}$ image réciproque de (4.5.1) par χ. Son image par $\mathbf{Z} \to \mu_n$, $m \mapsto \alpha^m$, est le cup-produit $\partial\chi \cup \alpha \in H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mu_n)$. Sa restriction à $W(\bar{K}/K)$ est (χ, α), et $\operatorname{inv}(\chi, \alpha)$ est l'invariant du cup-produit $\partial\chi \cup \alpha \in H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \bar{K}^*)$. Cette fois, la formule

$$\exp\bigl(2\pi i \operatorname{inv}(\partial\chi \cup \alpha)\bigr) = \chi(\alpha)$$

vaut pour tout $\alpha \in K^*$: c'est la définition de l'isomorphisme de réciprocité.

(4.7) Signes. Puisque nous avons déjà indiqué notre normalisation (= choix du signe) de l'isomorphisme de réciprocité, la validité de 4.6 fixe notre normalisation de inv pour K non archimédien.

(4.8) Soit K un corps global. Pour L une extension galoisienne finie de K, Weil a défini le groupe de Weil $W_{L/K}$, extension de $\mathrm{Gal}(L/K)$ par le groupe des classes d'idèles $C(L)$ de L. C'est une limite projective de groupes de Lie ; sa cohomologie est par définition la limite inductive des cohomologies de leurs classifiants. Soit $\bar{K}$ une clôture séparable de K et M un $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$-module discret. Nous poserons

$$H^*(W(\bar{K}/K), M) = \varinjlim_{L \subset \bar{K}} H^*(W_{L/K}, M^{\mathrm{Gal}(\bar{K}/L)}).$$

Soit n premier à l'exposant caractéristique de K, et $\alpha \in H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n)$. La restriction de α à $H^2(W(\bar{K}_v/K_v), \mu_n)$ est nulle pour presque toutes les places v de K (car elle se factorise par un $H^2(\mathbf{Z}, \mu_n) = 0$).

Les applications inv de 4.2 fournissent donc une application

$$\mathrm{inv} : H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n) \longrightarrow \bigoplus_v (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n.$$

(4.9) Théorème. La suite

$$0 \longrightarrow H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n) \xrightarrow{\mathrm{inv}} \bigoplus_v (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n \xrightarrow{\Sigma} (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n \longrightarrow 0$$

est exacte.

Soit $\chi : C(K) \to \mathbf{C}^*$ un quasi-caractère. La classe $\partial\chi$ de l'extension de $C(K)$ par $\mathbf{Z}$ image réciproque par χ de l'extension

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z} \xrightarrow{2\pi i} \mathbf{C} \xrightarrow{\exp} \mathbf{C}^* \longrightarrow 0$$

est un élément de $H^2(C(K), \mathbf{Z})$. Pour α une racine de l'unité dans K, d'ordre divisant n, son image par $\mathbf{Z} \to \mu_n : m \mapsto \alpha^m$ induit

$$(\chi, \alpha) \in H^2(C(K), \mu_n).$$

(4.9.1) Lemme. On a

$$\sum_v \mathrm{inv}_v(\chi, \alpha) = 0.$$

De par 4.6, c'est une traduction de $\prod_v \chi_v(\alpha_v) = 1$.

(4.9.2) Lemme. Il existe $c \in H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n)$, d'invariants locaux donnés aux places à l'infini (voire en un ensemble fini quelconque de places), et vérifiant

$$\sum_v \mathrm{inv}_v(c) = 0.$$

Si $\mu_n \subset K$, on peut prendre c du type (χ, α). Sinon, on considère une extension finie K'/K telle que K' contienne μ_n, et c du type $\mathrm{Tr}_{K'/K}(\chi, \alpha)$; que la loi de réciprocité soit vérifiée résulte de 4.4 et 4.9.1.

(4.9.3) Lemme. Soit $c \in H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n)$. Si $\mathrm{inv}_v(c) = 0$ pour v complexe, et est d'ordre divisant deux pour v réel, alors c provient de $\bar{c} \in H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mu_n)$.

Pour K de caractéristique $\neq 0$, on passe d'un groupe de Weil à un groupe de Galois en remplaçant un quotient $\mathbf{Z}$ par $\widehat{\mathbf{Z}}$, et il suffit de raisonner comme en 4.2.1.

Supposons maintenant que K soit un corps de nombres. Il existe une extension galoisienne totalement imaginaire finie L de K, contenant μ_n si on le désire, telle que c soit défini par une extension de $W_{L/K}$ par μ_n. Il existe même un conducteur $\mathfrak{m}$ tel que c provienne d'une extension E', par μ_n, du quotient ${}_{\mathfrak{m}}W_{L/K}$ de $W_{L/K}$, extension de $\mathrm{Gal}(L/K)$ par $C_{\mathfrak{m}}(L)$. La composante neutre de $C_{\mathfrak{m}}(L)$ est le quotient $L_{\mathbf{R}}^*/U_{\mathfrak{m}}$ de $(L \otimes \mathbf{R})^*$ par le groupe des unités congrues à 1 mod $\mathfrak{m}$. L'hypothèse assure que l'extension induite par E' de $L_{\mathbf{R}}^*$ par μ_n est triviale. L'extension de $L_{\mathbf{R}}^*/U_{\mathfrak{m}}$ par μ_n provient donc de $\phi : U_{\mathfrak{m}} \to \mu_n$. D'après un théorème de Chevalley (deux théorèmes d'arithmétique, J. Math. Soc. Jap. 3 (1951) p. 36–44), $\mathrm{Ker}(\phi)$ est un sous-groupe de congruence : pour un conducteur $\mathfrak{m}' \geq \mathfrak{m}$ convenable, c est défini par une extension E de ${}_{\mathfrak{m}'}W_{L/K}$ par μ_n, triviale sur la composante connexe de ${}_{\mathfrak{m}'}W_{L/K}$. L'extension E provient donc du groupe de Galois $\pi_0({}_{\mathfrak{m}'}W_{L/K})$; ceci prouve 4.9.3.

Posons

$$(\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_{n,v} = \begin{cases} \text{le sous-groupe de } \mathbf{Q}/\mathbf{Z} \text{ d'ordre } n, & v \text{ non archimédien,} \\ \text{le sous-groupe d'ordre } (n,2), & v \text{ réel,} \\ \text{le sous-groupe d'ordre } 1, & v \text{ complexe,} \end{cases}$$

et

$$A = \left(\bigoplus_v (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n\right) \Big/ \left(\bigoplus_v (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_{n,v}\right).$$

On conclut la preuve de 4.9 en contemplant le diagramme suivant, où l'exactitude de la dernière ligne est la loi de réciprocité de Hasse :

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & & & 0 & & \\ & & & & & & \uparrow & & \\ & & A & & = & & A & & \\ & & \uparrow & & & & \uparrow & & \\ & & H^2(W(\bar{K}/K), \mu_n) & \xrightarrow{\text{inv}} & \bigoplus_v (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n & \xrightarrow{\Sigma} & (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & & & \uparrow & & \| \\ 0 & \longrightarrow & H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mu_n) & \xrightarrow{\text{inv}} & \bigoplus_v (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_{n,v} & \xrightarrow{\Sigma} & (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_n & \longrightarrow & 0 \\ & & & & & & \uparrow & & \\ & & & & & & 0 & & \end{array}$$

5. Représentations orthogonales de groupes de Weil

(5.1) Plutôt que de considérer des représentations réelles de groupes de Galois, il est plus général et plus naturel de considérer des représentations complexes orthogonales de groupes de Weil.

Soient K un corps local, $\bar{K}$ une clôture séparable de K, V un espace vectoriel complexe muni d'une forme quadratique non dégénérée Q et $\rho : W(\bar{K}/K) \to O(V, Q)$ une représentation continue orthogonale de $W(\bar{K}/K)$. Les classes de Stiefel-Whitney $w^i \in H^i(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2)$ sont encore définies. L'espace des formes quadratiques non dégénérées sur V invariantes par $W(\bar{K}/K)$ étant connexe, elles ne dépendent que de la représentation linéaire sous-jacente à ρ. La classe de Stiefel-Whitney totale a les propriétés d'additivité suivantes :

(5.1.1) Si V est la somme directe orthogonale de sous-représentations V' et V'', alors

$$w^*(V) = w^*(V') \cdot w^*(V'').$$

(5.1.2) Si W est un sous-espace totalement isotrope invariant de V, alors

$$w^*(V) = w^*(W \oplus V/W^\perp) \cdot w^*(W^\perp/W).$$

La forme quadratique Q donnée sur V induit une dualité entre W et $V/W^\perp$ — d'où une forme quadratique sur $W \oplus V/W^\perp$ — tandis que $Q|W^\perp$ a pour noyau W — d'où une forme quadratique sur $W^\perp/W$. Ceci donne son sens à 5.1.2. Pour prouver la formule, il suffit de prouver l'énoncé analogue pour un fibré vectoriel complexe orthogonal $\mathscr{V}$ sur un espace topologique paracompact, et pour $\mathscr{W} \subset \mathscr{V}$

totalement isotrope. Ici, $\mathscr{V}$ est isomorphe à $(\mathscr{W} \oplus \mathscr{V}/\mathscr{W}^{\perp}) \oplus (\mathscr{W}^{\perp}/\mathscr{W})$, et on applique l'analogue de 5.1.1.

Soit $RO(W(\bar{K}/K), \mathbf{C})$ le groupe de Grothendieck des représentations complexes semi-simples orthogonales de $W(\bar{K}/K)$, pour la somme directe orthogonale. C'est un sous-groupe de $R(W(\bar{K}/K), \mathbf{C})$, groupe de Grothendieck de la catégorie des représentations complexes semi-simples de $W(\bar{K}/K)$. La propriété (5.1.1) permet de définir la classe de Stiefel-Whitney totale d'un élément de $RO(W(\bar{K}/K), \mathbf{C})$ (une représentation orthogonale virtuelle).

Si V est une représentation orthogonale de $W(\bar{K}/K)$, sa semi-simplifiée V' l'est encore, et on vérifie à l'aide de (5.1.2) que $w^*(V) = w^*(V')$. Ceci justifie la restriction ci-dessus aux représentations semi-simples.

La classe $\mathrm{cl}(x)$ de $x \in H^2(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2)$ est 0 pour K de caractéristique 2, et l'invariant de son image dans $H^2(W(\bar{K}/K), \mu_2)$ sinon ($\mathbf{Z}/2$ et μ_2 étant canoniquement isomorphes). Pour K non complexe, on a

$$H^2(\mathrm{Gal}(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2) \xrightarrow{\sim} H^2(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2),$$

et cette définition est compatible à 1.4. Pour K non de caractéristique 2, archimédien ou non, cl est un isomorphisme

$$\mathrm{cl} : H^2(W(\bar{K}/K), \mathbf{Z}/2) \xrightarrow{\sim} (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_2.$$

Pour V une représentation virtuelle complexe de $W(\bar{K}/K)$, de dimension 0, déterminant 1 et isomorphe à sa duale, on définit comme en 1.2 un nombre $W(V) = \pm 1$. On a encore :

(5.2) Proposition. Soit V une représentation orthogonale virtuelle de dimension 0 et déterminant 1. On a

$$W(V) = \exp\bigl(2\pi i \ \mathrm{cl}(w^2(V))\bigr).$$

Pour V de la forme $W \oplus W^*$ (W représentation virtuelle de dimension 0 et déterminant χ) on procède comme en 3.1, cas 1, en utilisant les formules

$$w^2(V) = c^1(W) \pmod 2$$

et

$$\varepsilon(W, \psi) \cdot \varepsilon(W^*(1), \psi(-x)) = 1.$$

Ceci suffit à démontrer 5.2 pour K complexe. Pour K réel, il faut encore traiter le cas diédral d'une représentation $r(\chi)$, pour χ un caractère de $\bar{K}^*$ trivial sur K^*. Le théorème 3.2 reste valable, avec la même démonstration [cette fois, pour f et $\hat{f}$, C^∞ à décroissance rapide et ayant un zéro de grande multiplicité en 0, les intégrales convergent dans une large bande] et on reprend la preuve 3.3.

Pour K non archimédien, on vérifie à l'aide de ([1] 4.10) que toute représentation orthogonale semi-simple V de $W(\bar{K}/K)$ est somme d'une représentation de la forme $W \oplus W^*$, et d'une représentation qui se factorise par un quotient fini de $\mathrm{Gal}(\bar{K}/K)$. Pour V virtuelle de dimension 0, on en déduit une décomposition similaire avec W de dimension 0, et la proposition résulte donc du théorème 1.5.

(5.3) Corollaire. Soient K un corps global, L une extension finie de K, et V une représentation orthogonale du groupe de Weil $W_{L/K}$. La constante $W(V)$ de l'équation fonctionnelle de la fonction L correspondante, définie comme en (1.1.2), vaut +1.

On procède comme en 1.6, utilisant cette fois 5.2 et la loi de réciprocité 4.9 (pour $n = 2$).

(5.4) Variante ℓ-adique. Soit K un corps local non archimédien et V une représentation complexe virtuelle de $W(\bar{K}/K)$, de dimension 0, de déterminant trivial, et

isomorphe à sa duale. La définition de $\varepsilon(V) = \varepsilon(V, 0)$ est purement algébrique, i.e. indépendante de la topologie de $\mathbf{C}$. Si le conducteur de V n'est pas un carré, il n'en est pas de même pour $W(V) = \varepsilon(V) \cdot f^{-1/2}$. Toutefois, si V est orthogonale, Serre a prouvé [3] que l'exposant du conducteur est pair ; dans ce cas, $W(V)$ a donc un sens purement algébrique. Il en va de même pour $w^2(V)$. Par transport de structure, on en déduit que la formule (à laquelle on vient de donner un sens)

$$W(V) = (-1)^{2\,\mathrm{cl}(w^2(V))} \tag{5.4.1}$$

vaut pour V une représentation orthogonale virtuelle de $W(\bar{K}/K)$, de dimension 0 et de déterminant trivial, sur un corps algébriquement clos quelconque k de caractéristique 0. L'hypothèse « algébriquement clos » n'est pas nécessaire, comme on le voit en remplaçant k par sa clôture algébrique.

(5.5) Soit (V, ρ) une représentation ℓ-adique continue de $W(\bar{K}/K)$, et fixons ψ et dx. Suivant [1] 8.4.2 on lui associe une « représentation » (ρ', N) de $'W(\bar{K}/K)$, consistant en

(a) une représentation ρ' de $W(\bar{K}/K)$ sur V, continue pour la topologie discrète de V ;

(b) un endomorphisme nilpotent N de V, tel que

$$\rho'(w) N \rho'(w)^{-1} = q^{v(w)} N.$$

Si ρ respecte une forme quadratique Q, ρ' aussi, et $N \in \mathrm{Lie}(O(Q))$.

La constante $\varepsilon(V, \psi, dx, t)$ (où t est moralement q^{-s}), définie par [1] 8.12, est le produit de $\varepsilon(\rho', \psi, dx, t)$ par

$$\det\bigl(-Ft,\ V^{\rho'(I)}/\operatorname{Ker}(N)^{\rho'(I)}\bigr).$$

Ce monôme ne dépend que de $V^{\rho'(I)}$, sur lequel agissent F et N (avec $FNF^{-1} = q^{-1}N$). Le lemme ci-dessous montre que si V est orthogonale, il est de degré pair, et vaut 1 en $t = q^{-1/2}$.

Pour V une représentation ℓ-adique orthogonale virtuelle de degré 0 et de déterminant un, le conducteur de V est donc encore d'exposant pair, et on peut définir $W(V)$ comme précédemment. De plus $W(V) = W(V^{\mathrm{ss}})$, où V^{ss} est la semi-simplifiée de V. On peut utiliser ce résultat pour calculer le second membre de (1.2.1), pour V une représentation ℓ-adique orthogonale du groupe de Weil d'un corps global ; la méthode de [2] § 9 permet de calculer le premier membre, et on trouve que l'identité (1.2.1) est encore vraie dans ce cas.

(5.6) Lemme. Soient k un corps, $q \in k^*$, V un espace vectoriel sur k, Q une forme quadratique non dégénérée sur V, $F \in O(V, Q)$ et $N \in \mathrm{Lie}(O(Q))$. On suppose que $FNF^{-1} = q^{-1}N$. Alors, $\dim(V/\operatorname{Ker} N)$ est un entier pair $2m$, et

$$\det(-Ft, V/\operatorname{Ker} N) = q^m t^{2m}.$$

Soit B la forme bilinéaire associée à Q. Par hypothèse, la forme $\langle x, y\rangle = B(Nx, y)$ est alternée, et $\langle Fx, Fy\rangle = q\langle x, y\rangle$. Le noyau de la forme $\langle x, y\rangle$ est $\operatorname{Ker} N$ et F induit une similitude symplectique de multiplicateur q de $V/\operatorname{Ker} N$. Le lemme en résulte.

Bibliographie

1. Deligne, P. : Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions *L*. In : Modular functions of one variable II, Lecture Notes in Mathematics 349, pp. 501–597, Berlin-Heidelberg-New York : Springer 1973
2. Fröhlich, A., Queyrut, J. : On the functional equation of the Artin *L*-function for characters of real representations, Inventiones math. 20, 125–138 (1973)
3. Serre, J-P. : Conducteurs d'Artin des caractères réels. Inventiones math. 14, 173–183 (1971)

Reçu le 20 septembre 1975

Pierre Deligne
I.H.E.S.
35, Route de Chartres
F-91440 Bures-sur-Yvette/France

Annals of Mathematics, 103 (1976), 103-161

Représentations des groupes réductifs sur les corps finis

Par P. DELIGNE et G. LUSZTIG

Introduction

Considérons un groupe algébrique réductif connexe G, défini sur un corps fini $\mathbb{F}_q$, muni de l'endomorphisme de Frobenius F. Nous nous intéresserons à la théorie des représentations du groupe fini G^F, sur des corps de caractéristique 0.

En 1968, Macdonald a conjecturé, sur la base des tables de caractères connues à l'époque (GL_n, Sp_4), qu'il devait exister une correspondance bien définie qui, à tout tore maximal F-stable T de G et à tout caractère θ de T^F en position générale, associe une représentation irréductible de G^F ; de plus, si T modulo le centre de G est anisotrope sur $\mathbb{F}_q$, la représentation correspondante de G^F doit être cuspidale (voir Seminar on algebraic groups and related finite groups, par A. Borel et al., Lecture Notes in Mathematics, 131, p. 117 et 101). Dans cet article, nous démontrons la conjecture de Macdonald. Plus précisément, pour T comme ci-dessus et θ un caractère arbitraire de T^F, nous construisons des représentations virtuelles R_T^θ qui possèdent toutes les propriétés requises.

Elles sont définies au chapitre 1 comme la somme alternée de la cohomologie à support compact de la variété des sous-groupes de Borel de G qui sont dans une position relative fixée avec leur transformé par F, à coefficients dans certains faisceaux l-adiques localement constants de rang un, G^F-équivariants. Cela généralise une construction due à Drinfeld pour SL_2 (voir chap. 2).

Au chapitre 4, nous démontrons une formule de caractère pour R_T^θ, fondée sur la formule des points fixes du chapitre 3. Cette formule de caractère s'exprime au moyen de certaines « fonctions de Green » sur les éléments unipotents ; aux chapitres 6, 7 et 8, nous démontrons que ces fonctions de Green satisfont tous les axiomes prévus par Springer, Kilmoyer et Macdonald ([9], [12]).

D'après 6.8, $\pm R_T^\theta$ est irréductible si θ est en position générale, et le théorème d'annulation (9.9) en fournit un modèle explicite pourvu que q ne soit pas trop petit (si G est un groupe classique ou G_2, tout q convient ; dans le cas général, $q \geq 30$ suffit).

Au chapitre 10, nous étudions les composantes irréductibles de la représentation de Gelfand-Graev de G^F, en supposant que le centre de G est connexe. La démonstration utilise les résultats du chapitre 5 ainsi que le théorème de disjonction (6.2).

Enfin, au chapitre 11, nous examinons le cas des groupes de Suzuki et de Ree.

Il serait très souhaitable de trouver pour les fonctions de Green des formules plus explicites que (4.1.2). De telles formules sont connues pour GL_n (Green [4]), Sp_4 (Srinivasan [13]) et G_2 (Chang, Ree [2]). Tout récemment, Kazhdan a démontré, en utilisant des résultats de Springer, que les fonctions de Green peuvent s'exprimer comme des sommes exponentielles sur l'algèbre de Lie (voir [12]), pourvu que la caractéristique soit bonne et que q ne soit pas trop petit.

Certains des résultats de cet article ont été annoncés dans [7], [8].

Le second auteur tient à remercier l'I.H.E.S. de son hospitalité pendant une partie de la période de préparation de cet article.

TABLE DES MATIÈRES

Conventions et notations standard ..... 104 Chapitre 1. Quelques définitions fondamentales ..... 105 2. Exemples dans les groupes classiques ..... 116 3. Une formule de points fixes ..... 118 4. La formule des caractères ..... 123 5. Caractères des tores ..... 126 6. Nombres d'entrelacement ..... 135 7. Calculs sur les éléments semi-simples ..... 140 8. Représentations induites et cuspidales ..... 146 9. Un théorème d'annulation ..... 147 10. Une décomposition de la représentation de Gelfand-Graev 154 11. Groupes de Suzuki et de Ree 160

Conventions et notations standard

0.1. Dans cet article, k est toujours un corps algébriquement clos et p son exposant caractéristique. Les hypothèses et définitions suivantes seront en vigueur aux chapitres 4 à 8, au chapitre 10, ainsi que dans certaines parties des chapitres 1 et 9.

(0.1.1) p est un nombre premier, et k est une clôture algébrique du corps premier $\mathbb{F}_p$ de caractéristique p. Pour q puissance de p, $\mathbb{F}_q$ est le sous-corps de k à q éléments. G est un groupe algébrique réductif sur k, obtenu par extension des scalaires à partir de G_0 sur $\mathbb{F}_q$. Nous notons F l'endomorphisme de Frobenius correspondant $F : G \to G$ (ainsi que l'endomorphisme de Frobenius de tout k-schéma défini sur $\mathbb{F}_q$).

0.2. l est un nombre premier distinct de p, et $\overline{\mathbb{Q}}_l$ est une clôture algébrique du corps l-adique. Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l, nous écrirons simplement $H_c^i(X)$ (resp. $H^i(X)$) pour $H_c^i(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)$ (resp. $H^i(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)$) (cohomologie l-adique de X, un schéma sur k). Les groupes $\mathbb{Z}/l^n(1)$ sont les groupes $\mu_{l^n}(k)$ des racines l^n-ièmes de l'unité dans k ; ils forment un système projectif, dont les applications de transition sont $x \mapsto x^{l^{n-m}}$; la limite projective est $\mathbb{Z}_l(1)$. On définit $\mathbb{Z}_l(n) = \mathbb{Z}_l(1)^{\otimes n}$, et $\mathbb{Z}_l(-n)$ comme le dual de $\mathbb{Z}_l(n)$. Le symbole (n) désigne un twist de Tate : le produit tensoriel par $\mathbb{Z}_l(n)$. Nous ferons

un usage occasionnel du groupe défini de manière analogue $\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1) = \varprojlim_{(n,p)=1} \mu_n(k)$.

0.3. Pour un groupe fini H, $\mathscr{R}(H)$ est le groupe de Grothendieck des représentations de dimension finie de H sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$. Si f et f' sont des fonctions centrales sur H, à valeurs dans un corps cyclotomique (souvent $\subset \overline{\mathbb{Q}}_l$), le produit scalaire $\langle f, f' \rangle_H$ (ou simplement $\langle f, f' \rangle$) est

$$\frac{1}{|H|} \sum_{x \in H} f(x)\, \overline{f'(x)},$$

où la barre est l'automorphisme qui induit $\zeta \mapsto \zeta^{-1}$ sur les racines de l'unité. La même notation $\langle\ ,\ \rangle$ sera employée pour le produit scalaire d'éléments de $\mathscr{R}(H) \otimes \mathbb{Q}$, identifiés à leurs caractères.

0.4. La fonction longueur d'un groupe de Coxeter W (muni de générateurs canoniques $s_1, \ldots, s_n$) sera notée $l(\ )$. Une expression réduite de $w \in W$ est une décomposition $w = s_{i_1} \cdots s_{i_k}$ telle que $l(w) = k$.

0.5. Divers :

pr_i : i-ième projection (comme dans $\mathrm{pr}_1 : X \times X \to X$) ;

X^T : sous-schéma des points fixes de l'endomorphisme T du schéma X (par exemple : $G^F = G_0(\mathbb{F}_q)$) ;

p' (en indice) : hors de p (comme dans $\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}$, complétion hors de p) ou le sous-groupe des éléments d'ordre premier à p (comme dans $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}$) ;

ad g : l'automorphisme intérieur $x \mapsto gxg^{-1}$, ou les applications qui s'en déduisent ;

1, ou e : l'élément neutre d'un groupe ;

$\mathrm{Tr}(f, V^*)$, pour f endomorphisme d'un espace vectoriel gradué, est

$$\sum (-1)^i \mathrm{Tr}(f, V^i);$$

réductif : les groupes réductifs sont supposés connexes et lisses.

La décomposition de Jordan d'un élément $g \in G$ (G comme en (0.1.1)) est $g = su$, où s est semi-simple et u unipotent, les deux éléments commutant.

0.6. Nous identifierons souvent un schéma sur k à l'ensemble de ses points k-rationnels. Cela ne devrait prêter à aucune confusion.

1. Quelques définitions fondamentales

1.1. Supposons que, dans une certaine catégorie, on se donne une famille $(X_i)_{i \in I}$ d'objets et un système compatible d'isomorphismes $\varphi_{ji} : X_i \xrightarrow{\sim} X_j$. Cela équivaut à se donner un objet unique X, la « valeur commune » ou « limite projective » de la famille. Cette limite projective est munie d'isomorphismes $\sigma_i : X \xrightarrow{\sim} X_i$ tels que $\varphi_{ji}\sigma_i = \sigma_j$. Nous utiliserons une telle construction pour définir le tore maximal $\mathbf{T}$ et le groupe de Weyl $\mathbf{W}$ d'un groupe algébrique réductif connexe G sur k.

Comme ensemble d'indices I, nous prenons l'ensemble des couples (T, B), où T est un tore maximal et B un sous-groupe de Borel contenant T. Pour $i \in I$, $i = (T, B)$, nous posons

$T_i = T, \quad W_i = N(T)/T.$

L'isomorphisme φ_{ji} est celui qu'induit ad g, où g est un élément quelconque de G conjuguant i en j ; ces éléments g forment une seule classe latérale droite modulo T_i, de sorte que φ_{ji} est indépendant du choix de g.

On définit de même le système de racines de **T**, son ensemble de racines simples, l'action de **W** sur **T** et les réflexions fondamentales de **W**.

Soit $F : G \to G$ une isogénie. Pour tout $i \in I$, $i = (T, B)$, $F(i) = (F(T), F(B))$ appartient encore à I ; F induit une isogénie $F : T_i \to T_{F(i)}$ et un isomorphisme $F : W_i \to W_{F(i)}$. L'endomorphisme (resp. l'automorphisme) correspondant $\sigma_{F(i)}^{-1} F \sigma_i$ du tore **T** (resp. des groupes de Weyl **W**) est indépendant du choix de i ; nous disons qu'il est induit par F.

1.2. Soit X (ou X_G) l'ensemble de tous les sous-groupes de Borel de G. Le groupe G agit sur X par conjugaison, et X est un espace homogène projectif lisse de G. Pour chaque sous-groupe de Borel B de G, B est le stabilisateur du point correspondant de X ; il existe donc un isomorphisme naturel $G/B \to X : g \mapsto gBg^{-1}$.

L'ensemble des orbites de G dans $X \times X$ s'identifie au groupe de Weyl **W** de G de la manière suivante : pour tout $i = (T, B)$ comme en (1.1), on utilise la bijection composée

$$\mathbf{W} \underset{\sigma_i}{\tilde{\to}} N(T)/T \tilde{\to} B\backslash G/B \underset{(e,g)}{\tilde{\longrightarrow}} G\backslash(G/B \times G/B) \tilde{\to} G\backslash(X \times X);$$

elle est indépendante du choix de (T, B). Nous notons $O(w)$ l'orbite correspondant à $w \in \mathbf{W}$; c'est l'orbite de $(B, \dot{w}B\dot{w}^{-1})$, où $\dot{w} \in N(T)$ représente w. Nous dirons que deux sous-groupes de Borel B', B'' de G sont en position relative w, $w \in \mathbf{W}$, si et seulement si $(B', B'') \in O(w)$. Dans les diagrammes, nous représenterons cela par

$$B' \overset{w}{\to} B''.$$

Les propriétés fondamentales de la décomposition de Bruhat s'expriment comme suit :

(a) Si $w = w_1 w_2$, avec $l(w) = l(w_1) + l(w_2)$, alors

(a_1) $(B', B'') \in O(w_1)$ et $(B'', B''') \in O(w_2)$ impliquent $(B', B''') \in O(w)$;

(a_2) si $(B', B''') \in O(w)$, il existe un et un seul B'' tel que $(B', B'') \in O(w_1)$ et $(B'', B''') \in O(w_2)$.

Au niveau des schémas :

$$O(w_1) \times_X O(w_2) \tilde{\to} O(w).$$

(b) Soit s une réflexion élémentaire et B un sous-groupe de Borel.

(b_1) $P = B \cup BsB$ est un sous-groupe parabolique minimal, c'est-à-dire que si $(B', B'') \in O(s)$ et $(B'', B''') \in O(s)$, alors soit $(B', B''') \in O(s)$, soit $B' = B'''$.

(b_2) Le quotient $\overline{L}$ de $L = P/U_P$ (où U_P est le radical unipotent de P) par son centre est isomorphe à $PGL(2)$. L'espace $X_{\overline{L}}$ est donc une droite projective. L'application image réciproque $X_{\overline{L}} \to X$ a pour image l'ensemble des sous-groupes de Borel B' en position relative e ou s avec B.

(b_3) Par l'une ou l'autre projection, $\overline{O(s)} = O(s) \cup O(e) \subset X \times X$ est donc un espace fibré

sur X, de fibre P_1. Il est muni de la section $O(e)$; celle-ci réduit son groupe structural du groupe projectif au groupe affine. Le complémentaire $O(s)$ de cette section est un espace fibré de fibre la droite affine.

1.3. Les hypothèses (0.1.1) sont en vigueur dans la suite de ce chapitre. Le schéma X est donc défini sur $\mathbb{F}_q$ et muni d'une application de Frobenius $F : X \to X$.

DÉFINITION 1.4. Pour w dans le groupe de Weyl $\mathbf{W}$ de G, $X(w) \subset X$ est le sous-schéma localement fermé de X constitué de tous les sous-groupes de Borel B de G tels que B et $F(B)$ soient en position relative w.

On peut aussi considérer $X(w)$ comme l'intersection, dans $X \times X$, de $O(w)$ avec le graphe de Frobenius. On vérifie facilement que cette intersection est transverse. L'orbite $O(w)$ étant lisse de dimension $\dim(X) + l(w)$, il s'ensuit que $X(w)$ est lisse et purement de dimension $l(w)$. Le sous-schéma $X(w)$ de X est stable par G^F. Par conséquent, pour tout nombre premier $l \neq p$, G^F agit sur la cohomologie l-adique à supports compacts de $X(w)$.

DÉFINITION 1.5. $R^1(w)$ est la représentation virtuelle

$$\sum (-1)^i H_c^i(X(w), \overline{\mathbb{Q}}_l)$$

de G^F (un élément du groupe de Grothendieck des représentations de G^F sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$).

Pour $w = e$, $X(w)$ est de dimension 0 ; c'est l'ensemble des sous-groupes de Borel rationnels, et $R^1(w)$ est induite par la représentation triviale de B^F, où B est un sous-groupe de Borel F-stable.

Il résultera de (3.3) que le caractère de $R^1(w)$ prend des valeurs entières, indépendantes de l. Cela justifiera l'omission de l dans la notation ; $R^1(w)$ pourra aussi être considérée comme une représentation virtuelle complexe de G^F.

Un élément du groupe de Weyl $\mathbf{W}$ est dit F-conjugué à $w \in \mathbf{W}$ s'il est de la forme $w_1 w F(w_1)^{-1}$, pour un certain $w_1 \in \mathbf{W}$. Nous notons $W_F^{\sim}$ l'ensemble des classes de F-conjugaison dans $\mathbf{W}$. Nous rappellerons en (1.14) que les classes de conjugaison sous G^F de tores maximaux F-stables (c'est-à-dire rationnels sur $\mathbb{F}_q$) de G sont paramétrées par $W_F^{\sim}$.

THÉORÈME 1.6. $R^1(w)$ ne dépend que de la classe de F-conjugaison de w.

Soient w et w' F-conjugués.

Cas 1. $w = w_1 w_2$, $w' = w_2 F(w_1)$ et $l(w) = l(w_1) + l(w_2) = l(w_2) + l(F(w_1)) = l(w')$ (0.4). Pour $B \in X(w)$, il existe un unique sous-groupe de Borel σB tel que $(B, \sigma B) \in O(w_1)$ et $(\sigma B, FB) \in O(w_2)$; nous avons le diagramme des positions relatives :

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{w_1 w_2} & F(B) \\ {\scriptstyle w_1}\downarrow & \nearrow_{w_2} & \downarrow{\scriptstyle F(w_1)} \\ \sigma B & \xrightarrow{w_2 F(w_1)} & F(\sigma B) \end{array}$$

(celle du bas, parce que $l(w_2F(w_1)) = l(w_2) + l(F(w_1)))$, et $\sigma B \in X(w')$. En appliquant le même argument à $w_2F(w_1)$ et à $F(w_1)F(w_2) = F(w)$, on obtient une application $\tau : X(w') \to X(Fw)$. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} X(w) & \overset{\sigma}{\to} & X(w') \\ {\scriptstyle F}\downarrow & \swarrow_{\tau} & \downarrow{\scriptstyle F} \\ X(Fw) & \xrightarrow{\sigma^{(q)}} & X(Fw') \end{array}$$

est commutatif. Les applications verticales induisent des équivalences de sites étales ; il en est donc de même de τ et de σ [SGA 1, IX, 4.10]. L'isomorphisme qui en résulte

$$H_c^*(X(w')) \xrightarrow{\sim} H_c^*(X(w))$$

est G^F-équivariant, d'où (1.6) dans ce cas.

Cas 2. Pour une certaine réflexion fondamentale s, on a $w' = swF(s)$ et $l(w') = l(w)+2$. Pour $B \in X(w')$, on peut trouver deux sous-groupes de Borel γB, δB tels que $(B, \gamma B) \in O(s)$, $(\gamma B, \delta B) \in O(w)$, $(\delta B, FB) \in O(F(s))$; de plus, γB et δB sont déterminés de manière unique par ces conditions. Nous définissons une partition $X(w') = X_1 \cup X_2$ par

$$X_1 = \{B \in X(w') \mid \delta B = F(\gamma B)\}, \qquad X_2 = \{B \in X(w') \mid \delta B \neq F(\gamma B)\}.$$

Remarquons que X_1 est un sous-schéma fermé de $X(w')$, tandis que X_2 est un ouvert. Nous avons $\gamma : X_1 \to X(w)$ et, pour $B' \in X(w)$, $\gamma^{-1}(B')$ est l'ensemble des sous-groupes de Borel B tels que $(B, B') \in O(s)$; ainsi $\gamma^{-1}(B')$ est une droite affine sur k, et X_1 est, via γ, un fibré en droites affines sur $X(w)$. Il s'ensuit que γ induit un isomorphisme

$$H_c^i(X_1) \xrightarrow{\sim} H_c^{i-2}(X(w))(-1), \qquad i \geq 0. \tag{1.6.1}$$

Si $B \in X_2$, nous avons

$$(\delta B, FB) \in O(F(s)), \quad (FB, F(\gamma B)) \in O(F(s)), \quad \delta B \neq F(\gamma B),$$

donc $(\delta B, F(\gamma B)) \in O(F(s))$. Puisque

$$(F(\gamma B), F(\delta B)) \in O(F(w)), \qquad l(F(sw)) = l(F(s)) + l(F(w)),$$

il s'ensuit que $(\delta B, F(\delta B)) \in O(F(sw))$. Nous avons donc $\delta : X_2 \to X(F(sw))$. Posons

$$X_2' = \{(B, \widetilde{B}) \in X_2 \times X(sw) \mid F(\widetilde{B}) = \delta B\}$$

et soit $\delta' : X_2' \to X(sw)$ définie par $\delta'(B, \widetilde{B}) = \widetilde{B}$; nous définissons aussi $\varphi : X_2' \to X_2$ par $\varphi(B, \widetilde{B}) = B$. Nous avons un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} X_2' & \xrightarrow{\delta'} & X(sw) \\ \varphi \downarrow & & \downarrow F \\ X_2 & \xrightarrow{\delta} & X(F(sw)). \end{array} \tag{1.6.2}$$

Pour tout $\widetilde{B} \in X(sw)$, nous notons $s\widetilde{B}$ l'unique sous-groupe de Borel tel que $(\widetilde{B}, s\widetilde{B}) \in O(s)$, $(s\widetilde{B}, F\widetilde{B}) \in O(w)$. On voit facilement que $\delta'^{-1}(\widetilde{B})$ s'identifie à l'ensemble des sous-groupes de Borel B tels que $(\widetilde{B}, B) \in O(s)$, $B \neq s\widetilde{B}$; il s'ensuit que $\delta'^{-1}(\widetilde{B})$ est une droite affine privée d'un point. Ainsi X_2' est, via δ', un fibré en droites sur $X(sw)$ privé de sa section nulle. Puisque les flèches verticales de (1.6.2) induisent des équivalences de sites étales, nous avons une suite exacte canonique (voir [5]) :

$$\cdots \xrightarrow{\partial} H_c^{i-1}(X(sw)) \longrightarrow H_c^i(X_2) \longrightarrow H_c^{i-2}(X(sw))(-1) \xrightarrow{\partial} H_c^i(X(sw)) \longrightarrow \cdots . \tag{1.6.3}$$

On peut démontrer que les applications ∂ de (1.6.3) sont nulles ; ce fait ne sera pas utilisé ici.

Remarquons que (1.6.1) et (1.6.3) sont G^F-équivariantes et que G^F agit trivialement sur $\overline{\mathbb{Q}}_l(-1)$. Il s'ensuit que, pour tout $g \in G^F$,

$$\operatorname{tr}(g^*, H_c^*(X_2)) = 0,$$
$$\operatorname{tr}(g^*, H_c^*(X_1)) = \operatorname{tr}(g^*, H_c^*(X(w))).$$

Si l'on utilise la suite exacte

$$\cdots \longrightarrow H_c^{i-1}(X_1) \longrightarrow H_c^i(X_2) \longrightarrow H_c^i(X(w')) \longrightarrow H_c^i(X_1) \longrightarrow \cdots ,$$

on obtient

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(g^*, H_c^*(X(w'))) &= \operatorname{tr}(g^*, H_c^*(X_1)) + \operatorname{tr}(g^*, H_c^*(X_2)) \\ &= \operatorname{tr}(g^*, H_c^*(X(w))) \end{aligned}$$

et 1.6 est démontré dans ce cas.

Cas général. Il suffit de traiter le cas où $w' = swF(s)$ pour une réflexion fondamentale s. En permutant, si nécessaire, w et w' ($w = sw'F(s)$), nous pouvons même supposer que $l(w') \geq l(w)$. Si $l(w') > l(w)$, nous sommes dans le cas 2. Si $l(w') = l(w)$, le lemme suivant montre que nous sommes soit dans le cas 1 (en échangeant éventuellement w et w'), soit dans le cas où $w = w'$.

LEMME 1.6.4. Soient s, t deux réflexions fondamentales de W, et soit $w \in W$ tel que $l(w) = l(swt)$. Alors soit $w = swt$, soit

$$l(sw) = l(w) - 1, \qquad \text{ou} \qquad l(wt) = l(w) - 1.$$

Soit $w = s_1 s_2 \cdots s_k$ une décomposition réduite de w (0.4). Supposons que $l(wt) = l(w) + 1$; alors $wt = s_1 s_2 \cdots s_k t$ est encore une décomposition réduite. Nous avons $l(swt) = l(wt) - 1$. Il s'ensuit (cf. Bourbaki, [1, chap. IV, §1, lemme 3]) que soit il existe j, $1 \leq j \leq k$, tel que

$$ss_1 \cdots s_{j-1} = s_1 \cdots s_{j-1} s_j,$$

soit

$$ss_1 \cdots s_k = s_1 \cdots s_k t.$$

Dans le premier cas, $w = ss_1 \cdots s_{j-1} s_{j+1} \cdots s_k$ et $l(sw) = l(w) - 1$; dans le second, $w = swt$, et le lemme est démontré.

1.7. Choisissons un tore maximal T^* de G et un sous-groupe de Borel $B^* \subset G$ contenant T^*, de radical unipotent U^*. Le quotient $E = G/U^*$ est un torseur sous T^* (= espace homogène principal à droite sous T^*) sur $X = G/B^*$. Pour $x \in X$, la fibre $E(x)$ de la projection $E \to X$ est

$$E(x) = \{g \in G \mid ge^* = x\}/U^*,$$

où e^* est le point de X correspondant à B^*.

Soit $\dot{w} \in N(T^*)$ représentant l'élément w du groupe de Weyl $\mathbf{W}$ par l'isomorphisme $\sigma(T^*, B^*) : \mathbf{W} \xrightarrow{\sim} N(T^*)/T^*$. Si $x, y \in X$ sont en position relative w, les éléments $g \in G$ tels que $ge^* = x$ et $g\dot{w}e^* = y$ forment un torseur $A(x, y)$ sous

$$B^* \cap \dot{w} B^* \dot{w}^{-1} = T^* \cdot (U^* \cap \dot{w} U^* \dot{w}^{-1}).$$

Pour $g \in A(x, y)$, la classe de $g\dot{w}$ dans $E(y)$ ne dépend que de la classe de g dans $E(x)$. Cela définit une application $E(x) \to E(y)$, que nous appelons multiplication à droite par $\dot{w}$. Nous avons les formules

$$(ut)\dot{w} = (u\dot{w}) \operatorname{ad} \dot{w}^{-1}(t), \tag{1.7.1}$$

$$u(\dot{w}t) = (u\dot{w})t. \tag{1.7.2}$$

Nous exprimerons (1.7.1) en disant que $\cdot\dot{w}$ est un w-morphisme de torseurs sous T^*. Il est induit par un w-morphisme de torseurs sous T^* au-dessus de $O(w)$

$$\cdot\dot{w} : \mathrm{pr}_1^* E \longrightarrow \mathrm{pr}_2^* E.$$

Supposons que $w = w_1 w_2$, $\dot{w} = \dot{w}_1 \dot{w}_2$ et que $l(w) = l(w_1) + l(w_2)$; alors, pour $x, y, z \in X$ tels que $(x, y) \in O(w_1)$ et $(y, z) \in O(w_2)$, on a $(x, z) \in O(w)$ et

$$u\dot{w} = (u\dot{w}_1)\dot{w}_2. \tag{1.7.3}$$

1.8. Nous supposons désormais que T^* et B^* sont F-stables. L'identification $\sigma(T^*, B^*)$ de T^* et de $N(T^*)/T^*$ avec le tore $\mathbf{T}$ et le groupe de Weyl $\mathbf{W}$ est alors compatible avec F. Pour w dans le groupe de Weyl, nous notons $\mathbf{T}(w)$ le tore $\mathbf{T}$, muni de la structure rationnelle dont le Frobenius est $\operatorname{ad}(\dot{w})F$. Nous avons

$$\mathbf{T}(w)^F \simeq \{t \in T^* \mid \operatorname{ad}(\dot{w})F(t) = t\}.$$

Pour $x \in X$, l'application de Frobenius induit $F : E(x) \to E(F(x))$, avec $F(ut) = F(u)F(t)$. Pour $x \in X(w)$, nous posons

$$E(x,\dot{w}) = \{u \in E(x) \mid F(u) = u\dot{w}\}.$$

C'est un torseur sous $\mathbf{T}(w)^F$. Les $E(x,\dot{w})$ sont les fibres d'une application

$$\pi \,:\, \widetilde{X}(\dot{w}) \longrightarrow X(w),$$

où $\widetilde{X}(\dot{w}) \subset E \mid X(w)$ est un torseur sous $\mathbf{T}(w)^F$ sur $X(w)$. L'action de G sur E se restreint en une action de G^F sur $\widetilde{X}(\dot{w})$.

À isomorphisme près, le torseur G^F-équivariant sous $\mathbf{T}(w)^F$, $\widetilde{X}(\dot{w})$ sur $X(w)$, est indépendant du relèvement $\dot{w}$ de w dans $N(T^*)$: pour $\dot{w}' = \dot{w}t$, il existe t_1 tel que $\operatorname{ad}\dot{w}^{-1}(t_1)F(t_1)^{-1} = t$, et l'application $u \mapsto ut_1$ induit un isomorphisme

$$\widetilde{X}(\dot{w}) \xrightarrow{\sim} \widetilde{X}(\dot{w}').$$

Les groupes G^F et $\mathbf{T}(w)^F$ agissent sur $H_c^*(\widetilde{X}(\dot{w}),\overline{\mathbf{Q}}_l)$ par transport de structure. Pour tout $\theta \in \operatorname{Hom}(\mathbf{T}(w)^F,\overline{\mathbf{Q}}_l^*)$, nous notons $H_c^*(\widetilde{X}(\dot{w}),\overline{\mathbf{Q}}_l)_\theta$ le sous-espace de $H_c^*(\widetilde{X}(\dot{w}),\overline{\mathbf{Q}}_l)$ sur lequel $\mathbf{T}(w)^F$ agit par θ.

DÉFINITION 1.9. $R^\theta(w)$ est la représentation virtuelle

$$\sum(-1)^i H_c^i(\widetilde{X}(\dot{w}),\overline{\mathbf{Q}}_l)_\theta$$

de G^F (un élément du groupe de Grothendieck des représentations de G^F sur $\overline{\mathbf{Q}}_l$).

Le caractère θ permet de transformer le torseur sous $\mathbf{T}(w)^F$, $\widetilde{X}(\dot{w})$, en un système local $\mathscr{F}_\theta$ d'espaces vectoriels de rang un sur $\overline{\mathbf{Q}}_l$, au-dessus de $X(w)$, muni de

$$\theta \,:\, \widetilde{X}(\dot{w}) \longrightarrow \mathscr{F}_\theta, \qquad \theta(xt) = \theta(x)\theta(t).$$

Le morphisme $\pi \,:\, \widetilde{X}(\dot{w}) \to X(w)$ est fini et

$$\pi_*\overline{\mathbf{Q}}_l = \bigoplus_\theta \mathscr{F}_\theta.$$

Le faisceau $\mathscr{F}_\theta$ est le sous-faisceau de $\pi_*\overline{\mathbf{Q}}_l$ sur lequel $\mathbf{T}^F$ agit par θ ; ainsi

$$H_c^*(\widetilde{X}(\dot{w}),\overline{\mathbf{Q}}_l)_\theta = H_c^*(X(w),\mathscr{F}_\theta).$$

En particulier, pour $\theta = 1$,

$$R^1(w) = \sum(-1)^i H_c^i(X(w),\overline{\mathbf{Q}}_l),$$

de sorte que la Définition 1.9 est compatible avec (1.5).

Exemple 1.10. Pour $w = \dot{w} = e$, $\pi \,:\, \widetilde{X}(\dot{w}) \to X(w)$ devient la projection

$$\pi \,:\, G^F/U^{*F} \longrightarrow G^F/B^{*F},$$

et $R^\theta(w)$ est la représentation de G^F dans l'espace des fonctions sur G^F satisfaisant

$$f(gtu) = \theta(t)^{-1}f(g),$$

G^F agissant par $(g*f)(x) = f(g^{-1}x)$ (représentation induite).

1.11. Le sous-groupe de Borel $\operatorname{ad} gB^*$ appartient à $X(w)$ si et seulement si $\operatorname{ad} gB^*$ et $\operatorname{ad} FgB^*$ sont en position relative w, c'est-à-dire si et seulement si $g^{-1}Fg \in B^*\dot{w}B^*$ (où $\dot{w} \in N(T^*)$ représente w) :

$$X(w) = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in B^*\dot{w}B^*\}/B^*. \tag{1.11.1}$$

Si un sous-groupe de Borel B appartient à $X(w)$, on peut trouver $g \in G$ tel que $\operatorname{ad} gB^*$ soit

B et $\operatorname{ad} g \operatorname{ad} \dot{w} B^* = FB$:

$$X(w) = \{g \in G \mid g^{-1} F g \in \dot{w} B^*\} / \big(B^* \cap \operatorname{ad} \dot{w} B^*\big), \tag{1.11.2}$$

où

$$B^* \cap \operatorname{ad} \dot{w} B^* = T^* \cdot (U^* \cap \operatorname{ad} \dot{w} U^*).$$

En remplaçant g par gt, on peut normaliser g de manière à avoir aussi $g^{-1} F g \in \dot{w} U^*$:

$$X(w) = \{g \in G \mid g^{-1} F g \in \dot{w} U^*\} / \big(\mathbf{T}(w)^F \cdot (U^* \cap \operatorname{ad} \dot{w} U^*)\big). \tag{1.11.3}$$

Un point de $\widetilde{X}(\dot{w})$ est défini par un sous-groupe de Borel B, ainsi que par $g \in G$ tels que $\operatorname{ad} g B^* = B$, $\operatorname{ad} g \operatorname{ad} \dot{w} B^* = FB$ et $g \dot{w} = F g \bmod U^*$:

$$\widetilde{X}(\dot{w}) = \{g \in G \mid g^{-1} F g \in \dot{w} U^*\} / \big(U^* \cap \operatorname{ad} \dot{w} U^*\big). \tag{1.11.4}$$

COROLLAIRE 1.12. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $X(w)$ est affine ;

(ii) $\widetilde{X}(\dot{w})$ est affine ;

(iii) soit ρ l'action de $U^* \cap \operatorname{ad} \dot{w} U^*$ sur U^* définie par

$$\rho(u) v = \operatorname{ad} \dot{w}^{-1}(u) v F(u^{-1});$$

alors $U^* / \rho(U^* \cap \operatorname{ad} \dot{w} U^*)$ est affine.

Posons $S = \{g \in G \mid g^{-1} F g \in \dot{w} U^*\}$. L'application $f : S \to U^* : g \mapsto \dot{w}^{-1} g^{-1} F g$ induit un isomorphisme $G^F \backslash S \to U^*$ et vérifie, pour $u \in U^* \cap \operatorname{ad} \dot{w} U^*$,

$$f(gu) = \rho(u)^{-1} f(g).$$

Par conséquent,

$$G^F \backslash \widetilde{X}(\dot{w}) \simeq U^* / (U^* \cap \operatorname{ad} \dot{w} U^*).$$

Comme $\widetilde{X}(\dot{w}) / \mathbf{T}(w)^F = X(w)$, il ne reste qu'à utiliser le fait qu'un espace et son quotient par un groupe fini sont simultanément affines ou non.

Nous aurons à utiliser une autre description de $\pi : \widetilde{X}(\dot{w}) \to X(w)$. D'abord, un lemme facile :

LEMME 1.13. Soit J l'ensemble des couples (T, B), où T est un tore maximal F-stable et B un sous-groupe de Borel contenant T. L'application h qui associe à (T, B) la position relative de B et de FB induit une bijection

$$G^F \backslash J \xrightarrow{\sim} \mathbf{W}.$$

La démonstration sera donnée en (1.15).

Si l'on utilise $(T, B) \in J$ pour identifier $\mathbf{W}$ à $N(T)/T$, on a

$$h(T, \operatorname{ad} \dot{w} B) = w^{-1} h(T, B) F(w), \tag{1.13.1}$$

où $\dot{w} \in N(T)$ représente w, d'où

COROLLAIRE 1.14. L'application h induit une bijection

$$\{\text{classes de conjugaison sous } G^F \text{ de tores maximaux } F\text{-stables}\} \xrightarrow{\sim} \mathbf{W}_F^{\sim}.$$

Voici une autre description de h : pour $(T, B) \in J$, si $\sigma : \mathbf{T} \to T$ et $\sigma : \mathbf{W} \to W$

($W = N(T)/T$) sont définis par (T, B), alors

$$\sigma F \sigma^{-1} = \operatorname{ad} h(T, B) \circ F \,:\, \mathbf{T} \longrightarrow \mathbf{T}.$$

Donner $h(T, B)$ revient à donner $\operatorname{ad} h(T, B) \circ F \in \mathbf{W} \circ F \subset \operatorname{End}(\mathbf{T})$, et donner la classe de F-conjugaison de $h(T, B)$ revient à donner $\operatorname{ad} h(T, B) \circ F$ à conjugaison près par $\mathbf{W}$.

1.15. L'espace des tores maximaux de G s'identifie à l'espace homogène $G/N(T^*)$, et l'espace des tores maximaux marqués par un sous-groupe de Borel qui les contient s'identifie à G/T^*. Le groupe T^* étant la composante connexe de $N(T^*)$, (1.13) est un cas particulier du résultat général décrit ci-dessous.

Soit G_0 un groupe algébrique connexe sur $\mathbf{F}_q$, et soit $x \,:\, \widetilde{E}_0 \to E_0$ un morphisme d'espaces homogènes sous G_0. Nous notons $G, \widetilde{E}, E$ les objets correspondants sur k, et nous supposons que le stabilisateur $S(\tilde{e})$ de $\tilde{e} \in \widetilde{E}$ est la composante connexe du stabilisateur $S(\pi(\tilde{e}))$ de $\pi(\tilde{e}) \in E$. Puisque tout espace homogène sous G_0 possède un point rationnel, l'existence de $\widetilde{E}_0$ n'impose aucune condition à E_0.

Les groupes $S(e)/S(e)^0$ forment un système local sur E, qui devient constant sur $\widetilde{E}$; nous notons W sa valeur constante sur $\widetilde{E}$. Pour $\tilde{e} \in \widetilde{E}$, nous avons un isomorphisme

$$\alpha(\tilde{e}) \,:\, W \xrightarrow{\sim} S(\pi(\tilde{e}))/S(\pi(e)),$$

et, pour $\widetilde{f} = g\tilde{e}$, nous avons $\alpha(\widetilde{f}) = \operatorname{ad} g\, \alpha(\tilde{e})$. Nous faisons agir W à droite sur $\widetilde{E}$ par

$$\tilde{e}\, w = \alpha(\tilde{e})(w)\tilde{e};$$

ainsi $\widetilde{E}$ devient un torseur sous W (= espace homogène principal) sur E.

Le groupe W est muni d'une action de F, avec $F(\tilde{e}\, w) = F(\tilde{e})F(w)$. L'ensemble $W_F^{\sim}$ des classes de F-conjugaison dans W est l'ensemble des orbites de l'action de W sur lui-même donnée par

$$w \longmapsto w_1 w F(w_1)^{-1}.$$

PROPOSITION 1.16. Pour $e \in E^F$ et $\tilde{e} \in E$ au-dessus de e, définissons $h(e, \tilde{e}) \in W$ par

$$F(\tilde{e}) = \tilde{e} \cdot h(e, \tilde{e}).$$

(i) L'application h induit une bijection de l'ensemble des orbites de G^F dans

$$\{(e, \tilde{e}) \mid e \in E^F,\ \pi(\tilde{e}) = e\}$$

sur W.

(ii) Nous avons

$$h(e, \tilde{e}w) = w^{-1} h(e, \tilde{e}) F(w).$$

Par conséquent, h induit une bijection de $G^F \backslash E^F$ sur l'ensemble des classes de F-conjugaison dans W.

Nous ne démontrerons que (i). Soit Y l'ensemble des $\tilde{e} \in E$ tels que $\pi(\tilde{e}) \in E^F$. Si $\tilde{e}_0 \in E^F$, l'application $g \mapsto g\tilde{e}_0$ identifie X à

$$\{g \in G \mid g^{-1} F g \in S(\pi(\tilde{e}_0))\}/S(\tilde{e}_0).$$

L'isogénie de Lang $g \mapsto g^{-1} F g$ est un isomorphisme $G^F \backslash G \to G$; l'application $g e_0 \mapsto g^{-1} F g$ induit donc une bijection

$$G^F \backslash X \xrightarrow{\sim} S(\pi(\tilde{e}_0))/\big(S(\tilde{e}_0) \text{ agissant par } x \mapsto s^{-1} x F(s)\big).$$

Les orbites de cette action de $S(\tilde{e}_0)$ sont précisément les classes latérales ordinaires, et la bijection qui en résulte

la bijection $G^F\backslash X \xrightarrow{\sim} W$ est l'application h ci-dessus.

DÉFINITION 1.17. Soit T un tore maximal F-stable et soit B un sous-groupe de Borel contenant T, de radical unipotent U ; soit w la position relative de B et de FB.

(i) $X_{T\subset B}$ est $X(w)$. L'application $g \mapsto \operatorname{ad} gB$ induit des isomorphismes

$$\begin{aligned} X_{T\subset B} &= \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in B \cdot F(B)\}/B \\ &= \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FB\}/(B \cap FB) \\ &= \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FU\}/\big(T^F \cdot (U \cap FU)\big). \end{aligned}$$

(ii) $\widetilde{X}_{T\subset B}$ est

$$\{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FU\}/(U \cap FU).$$

Nous avons une application de projection $\pi : \widetilde{X}_{T\subset B} \to X_{T\subset B}$, pour laquelle $\widetilde{X}_{T\subset B}$ est un torseur sous T^F, équivariant sous G^F, au-dessus de $X_{T\subset B}$; G^F agit par multiplication à gauche et T^F par multiplication à droite (il normalise $U \cap FU$).

1.18. Soit $\dot{w} \in N(T^*)$ un représentant de w. Si $x' \in G$ est tel que $\operatorname{ad} x'(T^*, B^*) = (T, B)$, alors B et $FB = \operatorname{ad} Fx'B^*$ sont en position relative w, et FB contient T ; ainsi $FB = \operatorname{ad} x' \operatorname{ad} \dot{w}B^*$ et

$$x'^{-1}F(x') \in \dot{w}B^* \cap N(T^*) = \dot{w}T^*.$$

En remplaçant x' par $x = x't$ ($t \in T^*$), on peut obtenir $x^{-1}F(x) = \dot{w}$. Les x tels que $\operatorname{ad} x(T^*, B^*) = (T, B)$ et $x^{-1}F(x) = \dot{w}$ forment un torseur sous T^{*F}. Pour un tel x, $\operatorname{ad} x$ induit un isomorphisme $\mathbf{T}(w) \to T$ (donc $\mathbf{T}(w)^F \to T^F$) ; cet isomorphisme est indépendant de x.

PROPOSITION 1.19. Soient T, B, U, w comme en (1.17), et $x, \dot{w}$ comme en (1.18). L'application $g \mapsto gx^{-1}$ induit un isomorphisme du torseur sous $\mathbf{T}(w)^F$, équivariant sous G^F, $\widetilde{X}(\dot{w})$ au-dessus de $X(w)$ (ou plutôt de son modèle (1.11)), vers le torseur sous T^F, équivariant sous G^F, $\widetilde{X}_{T\subset B}$ au-dessus de $X_{T\subset B}$ (ou plutôt de son modèle (1.17)).

C'est un calcul immédiat.

1.20. Les groupes G^F et T^F agissent sur la cohomologie de $\widetilde{X}_{T\subset B}$. Pour tout caractère $\theta : T^F \to \overline{\mathbb{Q}}_l^*$, nous posons, comme en (1.8),

$$R^\theta_{T\subset B} = \sum_i (-1)^i H^i_c(\widetilde{X}_{T\subset B}, \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta$$

(un élément du groupe de Grothendieck des représentations de G^F sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$).

D'après (1.19), pour x comme en (1.18), nous avons

$$R^\theta_{T\subset B} = R^{\theta\circ \operatorname{ad} x}(w).$$

Nous verrons au Chapitre 4 que $R^\theta_{T\subset B}$ est indépendant de B. Pour $g \in G^F$ tel que $\operatorname{ad} g$ transporte T, B, θ sur T', B', θ', nous avons clairement

$$R^\theta_{T\subset B} = R^{\theta'}_{T'\subset B'},$$

de sorte que $R^\theta_{T\subset B}$ ne dépendra finalement que de la classe de conjugaison de T sous G^F et de l'orbite de θ sous $(N(T)/T)^F$.

La fin de ce chapitre ne sera utilisée que dans la démonstration de 7.10.

1.21. Isogénies. Soit T un tore maximal F-stable de G, et soit Z le centre de G. Nous notons $G \times^Z T$ le quotient de $G \times T$ par le sous-groupe

$$\{(z, z^{-1}) \mid z \in Z\}.$$

Soit B un sous-groupe de Borel contenant T. L'action $x \mapsto gxt$ de $G^F \times T^F$ sur $\widetilde{X}_{T\subset B}$ est induite par une action de $(G \times^Z T)^F$, donnée par la même formule.

COROLLAIRE 1.22. Sur $H^*(\widetilde{X}_{T\subset B}, \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta$, Z^F agit par le caractère $\theta \mid Z^F$. En particulier, sur toute représentation irréductible intervenant dans $R^\theta_{T\subset B}$, Z^F agit par $\theta \mid Z^F$.

Soit $\pi : \widetilde{G} \to G$ le revêtement simplement connexe du groupe dérivé de G, $\widetilde{T} = \pi^{-1}(T)$, $\widetilde{B} = \pi^{-1}(B)$, et soit $\widetilde{Z}$ le centre de $\widetilde{G}$.

PROPOSITION 1.23. On a

$$T^F/\pi(\widetilde{T}^F) \xrightarrow{\sim} G^F/\pi(\widetilde{G}^F).$$

L'injectivité est claire ; il faut vérifier la surjectivité de l'application

$$(T \times \widetilde{G})^F \longrightarrow G^F$$

induite par

$$\varphi : T \times \widetilde{G} \longrightarrow G : \quad t, \tilde{g} \longmapsto t\pi(\tilde{g}).$$

Par φ, $T \times \widetilde{G}$ est un torseur sous $\widetilde{T}$ au-dessus de G (avec

$$(t, \tilde{g}) * \tilde{t} = (t\tilde{t}, \tilde{t}^{-1}\tilde{g})),$$

et l'on applique le théorème de Lang au groupe connexe $\widetilde{T}$.

1.24. Soit $h : A \to B$ un homomorphisme de groupes finis et soit X un espace sur lequel A agit. L'espace induit $\mathrm{Ind}_A^B(X)$ (unique à isomorphisme unique près) est un B-espace I, muni d'une application A-équivariante $\varphi : X \to I$, tel que, pour tout B-espace Y,

$$\mathrm{Hom}_B(I, Y) \xrightarrow[\varphi]{\sim} \mathrm{Hom}_A(X, Y).$$

On a

$$\mathrm{Ind}_A^B(X) = \coprod_{b\in B/A} b\varphi(X), \qquad \varphi(X) \simeq \ker(h)\backslash X.$$

PROPOSITION 1.25. Le $(G \times^Z T)^F$-espace $\widetilde{X}_{T\subset B}$ est induit par le $(\widetilde{G} \times^{\widetilde{Z}} \widetilde{T})^F$-espace $\widetilde{X}_{\widetilde{T}\subset\widetilde{B}}$.

LEMME 1.26. Dans le diagramme

$$\begin{array}{ccccccccccc}
0 & \longrightarrow & \ker & \longrightarrow & \widetilde{T}^F & \longrightarrow & T^F & \longrightarrow & \mathrm{coker} & \longrightarrow & 0 \\
 & & {\scriptstyle(1)}\downarrow & & {\scriptstyle(t,1)}\downarrow & & {\scriptstyle(t,1)}\downarrow & & {\scriptstyle(2)}\downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \ker & \longrightarrow & (\widetilde{T} \times^{\widetilde{Z}} \widetilde{G})^F & \longrightarrow & (T \times^Z G)^F & \longrightarrow & \mathrm{coker} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & & & & & \\
 & & (\widetilde{G}/\widetilde{Z})^F & = & (G/Z)^F & & & & & &
\end{array}$$

les applications (1) et (2) sont des isomorphismes.

En effet, $\widetilde{T} \times^{\widetilde{Z}} \widetilde{G}$ (resp. $T \times^Z G$) est un torseur sous $\widetilde{T}$ (resp. T) au-dessus de $\widetilde{G}/\widetilde{Z} = G/Z$. Ainsi, puisque T et $\widetilde{T}$ sont connexes, $(\widetilde{T} \times^{\widetilde{Z}} \widetilde{G})^F$ est un torseur sous $\widetilde{T}^F$ au-dessus de $(\widetilde{G}/\widetilde{Z})^F$, et $(T \times^Z G)^F$ est le torseur sous T^F induit.

Démonstration de 1.25. D'après 1.26, il suffit de montrer que $\widetilde{X}_{T\subset B}$, comme T^F-espace, est induit par le $\widetilde{T}^F$-espace $\widetilde{X}_{\widetilde{T}\subset\widetilde{B}}$. Les espaces $\widetilde{X}_{T\subset B}$ et $\widetilde{X}_{\widetilde{T}\subset\widetilde{B}}$ sont

en effet respectivement des torseurs sous T^F et $\widetilde{T}^F$ au-dessus de $X_{T\subset B} = X_{\widetilde{T}\subset\widetilde{B}}$, et $X_{\widetilde{T}\subset\widetilde{B}}$ est donc le torseur sous T^F induit par le torseur sous $\widetilde{T}^F$, $X_{T\subset B}$.

COROLLAIRE 1.27. Soit θ un caractère de $G^F/\pi(\widetilde{G}^F)$. Nous notons encore θ sa restriction à T^F. On a

$$R^{\theta\eta}_{T\subset B} = \theta \otimes R^{\eta}_{T\subset B}.$$

Il résulte de 1.25 que

$$H^*(\widetilde{X}_{T\subset B}, \overline{\mathbb{Q}}_l) = \mathrm{Ind}^{(G\times^Z T)^F}_{(\widetilde{G}\times^{\widetilde{Z}}\widetilde{T})^F}(\widetilde{X}_{\widetilde{T}\subset\widetilde{B}}, \overline{\mathbb{Q}}_l).$$

Le caractère $\theta(gt)$ de $(G\times^{\widetilde{Z}} T)^F$ est trivial sur l'image de $\widetilde{G}\times^{\widetilde{Z}}\widetilde{T}$. La représentation induite considérée est donc isomorphe à son produit tensoriel par $\theta(gt)$, et 1.27 en résulte formellement.

2. Exemples dans les groupes classiques

2.1. Soit V un espace vectoriel de dimension n sur k, et posons $G = \mathrm{GL}(V)$. Si $b = (b_1, \dots, b_n)$ est une base de V, nous pouvons prendre pour T^* le groupe des matrices diagonales et pour B^* le groupe des matrices triangulaires supérieures. Le groupe de Weyl se relève dans le sous-groupe de $N(T^*)$ formé des $\dot{w}$ qui induisent une permutation des vecteurs de base. Dans ce cas, $\mathbf{T}$, $\mathbf{W}$ (1.1), X (1.2), E, $\cdot\dot{w}$ (1.7), admettent la description suivante.

(a) $\mathbf{T} = \mathbf{G}_m^n$, $\mathbf{W} = \mathfrak{S}_n$, les réflexions fondamentales sont les transpositions $(i, i+1)$, et $\mathbf{W}$ agit sur $\mathbf{T}$ par permutation.

(b) X est l'espace des drapeaux complets $D_1 \subset \cdots \subset D_{n-1}$ dans V : un drapeau D est une filtration croissante de V, avec $\dim D_i = i$ pour $1 \le i \le n-1$.

(c) E est l'espace des drapeaux complets marqués par des vecteurs non nuls

$$e_i \in D_i/D_{i-1} = \mathrm{Gr}_i^D(V) \qquad (1 \le i \le n),$$

où nous adoptons la convention $D_0 = 0$, $D_n = V$; $\mathbf{T}$ agit sur E par

$$(D, (e_i))(\lambda_i) = (D, (\lambda_i e_i)).$$

C'est un torseur sous $\mathbf{T}$, équivariant sous G, au-dessus de X.

(d) Si D' et D'' sont deux drapeaux, leur position relative est étiquetée par la permutation w telle que

$$\mathrm{Gr}^{D'}_{w(i)}\,\mathrm{Gr}_i^{D''}(V) \neq 0.$$

Les isomorphismes

$$\mathrm{Gr}^{D'}_{w(i)}(V) \simeq \mathrm{Gr}_i^{D''}\,\mathrm{Gr}^{D'}_{w(i)}(V) \simeq \mathrm{Gr}^{D'}_{w(i)}\,\mathrm{Gr}_i^{D''}(V) \simeq \mathrm{Gr}_i^{D''}(V)$$

induisent un w-isomorphisme entre le torseur sous $\mathbf{T}$, $E(D')$, des marquages de D', et $E(D'')$:

$$e \longmapsto e\cdot\dot{w}.$$

Lorsque w est le n-cycle $(1, \dots, n)$, D' et D'' sont en position relative w si et seulement si

$$D''_i + D'_i = D'_{i+1} \quad (1 \le i < n-1), \qquad D''_{n-1} + D'_1 = V.$$

2.2. Nous prenons maintenant k et $\mathbb{F}_q$ comme en (0.1.1), et nous supposons V muni d'une structure sur $\mathbb{F}_q$. Les applications de Frobenius sont alors définies. Pour $w = (1, \dots, n)$, la condition pour qu'un drapeau D soit en position relative w avec son image FD par Frobenius est que D soit le drapeau

$$D_1 \subset D_1 + FD_1 \subset D_1 + FD_1 + F^2D_1 \subset \cdots \qquad \text{et que} \qquad V = \bigoplus_0^{n-1} F^i D_1.$$

Si nous notons $\mathbf{P}(V)$ l'ensemble des droites homogènes de V, l'application $D \mapsto D_1$ est un isomorphisme de $X(w)$ sur l'ensemble des $x \in \mathbf{P}(V)$ qui n'appartiennent à aucun hyperplan rationnel sur $\mathbb{F}_q$. Un marquage e de F vérifie $F(e) = e \cdot \dot{w}$ si et seulement si

$$\begin{aligned} &e_2 \equiv F(e_1) \pmod{e_1},\\ &e_3 \equiv F^2(e_1) \pmod{e_1, F(e_1)}, \quad \ldots,\\ &e_n \equiv F^{n-1}(e_1) \pmod{e_1, F(e_1), \ldots, F^{n-2}(e_1)} \end{aligned}$$

et

$$e_1 \equiv F^n(e_1) \pmod{F(e_1), \ldots, F^{n-1}(e_1)};$$

e est déterminé par $e_1 \in D_1$, sous la condition

$$e_1 \wedge F(e_1) \wedge \cdots \wedge F^{n-1}(e_1) = F^n(e_1) \wedge F(e_1) \wedge \cdots \wedge F^{n-1}(e_1),$$

c'est-à-dire :

$$F(e_1 \wedge \cdots \wedge F^{n-1}(e_1)) = (-1)^{n-1}(e_1 \wedge \cdots \wedge F^{n-1}(e_1)). \tag{2.2.1}$$

Si (x_i) sont les coordonnées de e_1 relativement à une base rationnelle, la condition (2.2.1) s'écrit

$$(-1)^{n-1}\left(\det(x_i^{q^{j-1}})_{1\le i,j\le n}\right)^{q-1} = 1. \tag{2.2.2}$$

La forme du membre de gauche est invariante sous $\mathrm{GL}(n, \mathbb{F}_q)$. À un facteur scalaire près, elle est le produit de toutes les formes linéaires rationnelles non nulles sur $\mathbb{F}_q$. L'application $(D, e) \mapsto e_1$ induit un isomorphisme de $\widetilde{X}(\dot{w})$ sur l'hypersurface affine (2.2.2). Cette hypersurface est stable par $x \mapsto \lambda x$, pour $\lambda \in \mathbb{F}_{q^n}^*$, et c'est l'action de $\mathbf{T}(w)^F$.

Nos travaux ont été inspirés par des résultats de Drinfeld, qui a démontré que les représentations de la série discrète de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{F}_q)$ apparaissent dans la cohomologie de la courbe affine

$$xy^q - x^q y = 1$$

(la forme

$$xy^q - x^q y = \begin{vmatrix} x & x^q \\ y & y^q \end{vmatrix}$$

est invariante sous $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_q)$).

Soit $\varphi(q, r, n)$ le nombre de points de $X(w)$ rationnels sur $\mathbb{F}_{q^r}$, $r \ge 1$. Nous avons la proposition suivante.

PROPOSITION 2.3.

$$\varphi(q, r, n) = \prod_{1\le i\le n-1} (q^r - q^i).$$

Démonstration. Nous définissons une partition

$$\mathbf{P}(V) = X_0 \cup X_1 \cup \cdots \cup X_{n-1}$$

comme suit : X_i est l'ensemble des points $x \in \mathbf{P}(V)$ tels que $x, F(x), F^2(x), \ldots$ engendrent un sous-espace linéaire de dimension i de $\mathbf{P}(V)$. Cette partition est invariante sous Frobenius, et X_i possède exactement

$$\varphi(q, r, i+1)\frac{(1-q^{n-i})\cdots(1-q^n)}{(1-q)\cdots(1-q^{i+1})}$$

points rationnels sur $\mathbb{F}_q$. Il en résulte que

$$\frac{q^{nr}-1}{q-1} = \sum_{0\le i\le n-1} \varphi(q,r,i+1)\frac{(1-q^{n-i})\cdots(1-q^n)}{(1-q)\cdots(1-q^{i+1})}.$$

Cela montre que, pour n fixé, $\varphi(q,r,n)$ est un polynôme de degré $(n-1)$ en $Q=q^r$, dont les coefficients sont des polynômes en q, et dont le terme dominant est Q^{n-1}. Comme $\varphi(q,r,n)=0$ pour $1\le r\le n-1$, ce polynôme doit être divisible par $(Q-q)$, $(Q-q^2)$, ..., $(Q-q^{n-1})$. Il s'ensuit que

$$\varphi(q,r,n) = (Q-q)(Q-q^2)\cdots(Q-q^{n-1}),$$

et la proposition est démontrée.

2.4. Soit V un espace vectoriel comme en (2.2), muni d'une forme symplectique non dégénérée $\langle\ ,\ \rangle$ définie sur $\mathbb{F}_q$. On doit avoir $n=2m$. Le groupe symplectique $\mathrm{Sp}(V)$ est alors un groupe comme en (0.1.1). Soit Y l'ensemble de tous les drapeaux isotropes complets $D_1\subset D_2\subset\cdots\subset D_m$ dans V ($\dim D_i=i$) tels que

$$D_1\ne FD_1\subset D_2,\quad D_2\ne FD_2\subset D_3,\quad \ldots,\quad D_{m-1}\ne FD_{m-1}\subset D_m,\quad D_m\ne FD_m.$$

Alors Y s'identifie à $X(w)$, où w est un élément de Coxeter du groupe de Weyl $\mathbf{W}$ de $\mathrm{Sp}(V)$; si nous identifions $\mathbf{W}$ au groupe de toutes les permutations σ de $-m,\ldots,-2,-1,1,2,\ldots,m$ telles que $\sigma(-i)=-\sigma(i)$ pour tout i, alors w est la permutation

$$\begin{aligned} -i &\longmapsto -i+1 \quad (2\le i\le m), & -1 &\longmapsto m,\\ i &\longmapsto i-1 \quad (2\le i\le m), & 1 &\longmapsto -m. \end{aligned}$$

D'autre part, Y (et donc aussi $X(w)$) s'identifie à l'ensemble des $x\in\mathbf{P}(V)$ tels que

$$\langle x,F(x)\rangle = \langle x,F^2(x)\rangle = \cdots = \langle x,F^{m-1}(x)\rangle = 0, \qquad \langle x,F^m(x)\rangle\ne 0.$$

Par exemple, si $\dim V=4$, il s'agit exactement de l'ensemble des $x\in\mathbf{P}(V)$ tels que $\langle x,F(x)\rangle=0$ et $\langle x,F^2(x)\rangle\ne 0$. L'équation $\langle x,F(x)\rangle=0$ définit une surface non singulière S dans $\mathbf{P}(V)$, et $\langle x,F^2(x)\rangle\ne 0$ signifie que l'on retire de S une réunion de courbes rationnelles, une pour chaque plan isotrope de V défini sur $\mathbb{F}_q$. On peut démontrer que, dans ce cas ($n=4$), le nombre de points de $X(w)$ rationnels sur $\mathbb{F}_{q^r}$ est donné par

$$q^{2r}-\frac{q}{2}(1+q)^2q^r+\frac{q}{2}(1-q)^2(-q)^r+q^4 = \begin{cases}(q^r-q^2)^2, & r \text{ pair},\\ (q^r-q)(q^r-q^3), & r \text{ impair}.\end{cases}$$

3. Une formule de points fixes

3.1. Soit X un schéma séparé de type fini sur k, et soit $\sigma : X\to X$ un automorphisme d'ordre fini de X. Nous décomposons σ sous la forme $\sigma=s\cdot u$, où s et u sont des puissances de σ, d'ordres respectivement premier à p et

une puissance de p. Le résultat principal de ce chapitre est le suivant.

THÉORÈME 3.2. Avec les notations ci-dessus (voir aussi 0.5),

$$\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(X^s, \overline{\mathbb{Q}}_l)).$$

La première étape consiste à démontrer que le membre de gauche est un entier indépendant de l. On pourrait conjecturer que, pour tout endomorphisme f de X et tout i, $\mathrm{Tr}(f^*, H_c^i(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est entier et indépendant de l, mais un résultat aussi général et précis n'est connu que lorsque X est propre et lisse (Katz et Messing, Inv. Math. 23 (1974), 73-77).

PROPOSITION 3.3. Avec les notations de 3.1, $\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est un entier indépendant de l ($l \neq p$).

Un argument standard de spécialisation permet de supposer que $p > 1$ et que k est une clôture algébrique du corps premier $\mathbb{F}_p$. C'est de toute façon le seul cas dont nous aurons besoin dans la suite de l'article. Le schéma X et σ peuvent alors être définis sur une extension finie $\mathbb{F}_q \subset k$ de $\mathbb{F}_p$; nous notons $F : X \to X$ l'endomorphisme de Frobenius correspondant.

Supposons d'abord X quasi-projectif. Alors, pour $n \geq 1$, le composé $F^n \circ \sigma$ est l'application de Frobenius relative à une nouvelle façon d'abaisser le corps de définition de X de k à $\mathbb{F}_{q^n}$, et la formule de Lefschetz pour les points fixes de Frobenius ([5] et [11]) montre que $\mathrm{Tr}((F^n\sigma)^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est le nombre de points fixes de $F^n\sigma$ ($n \geq 1$). Les automorphismes F^* et σ^* de la cohomologie commutent ; comme fonction de n, $\mathrm{Tr}((F^n\sigma)^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est donc de la forme $\sum_\lambda \alpha_\lambda \lambda^n$, où λ parcourt le groupe multiplicatif $\overline{\mathbb{Q}}_l^*$ de $\overline{\mathbb{Q}}_l$, et où α_λ est nul sauf pour un nombre fini de λ.

Les fonctions $\mathbb{N}^+ \to \overline{\mathbb{Q}}_l^* : n \mapsto \lambda^n$ (pour $\lambda \in \overline{\mathbb{Q}}_l^*$) sont linéairement indépendantes. On peut le vérifier soit au moyen des déterminants de Vandermonde, soit en invoquant le théorème de Dedekind sur l'indépendance linéaire des caractères (Bourbaki, Algèbre V, § 7, 5). Pour $n \geq 1$, les nombres $\sum_\lambda \alpha_\lambda \lambda^n = |X^{F^n\sigma}|$ sont rationnels ; par conséquent, pour tout automorphisme τ de $\overline{\mathbb{Q}}_l$, on a

$$\sum_\lambda \tau(\alpha_\lambda)\tau(\lambda)^n = \sum_\lambda \tau(\alpha_{\tau^{-1}(\lambda)})\lambda^n = \sum_\lambda \alpha_\lambda \lambda^n \qquad (n \geq 1),$$

et, par l'indépendance linéaire des fonctions λ^n,

$$\alpha_{\tau(\lambda)} = \tau(\alpha_\lambda).$$

En particulier, $\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \sum_\lambda \alpha_\lambda$ est invariant par tout automorphisme de $\overline{\mathbb{Q}}_l$, donc rationnel. De même, puisque $\mathrm{Tr}((F^n\sigma)^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = |X^{F^n\sigma}|$ est indépendant de l, pour tout isomorphisme $\tau : \overline{\mathbb{Q}}_l \to \overline{\mathbb{Q}}_{l'}$, on a

$$\tau\,\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_{l'})),$$

par conséquent, le nombre rationnel $\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est indépendant de l.

Puisque l'automorphisme σ est d'ordre fini, $\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$ est une somme de racines de l'unité, donc un entier algébrique. Étant rationnel, c'est un entier ordinaire.

Si nous ne supposons pas X quasi-projectif, nous pouvons soit reprendre l'argument précédent en travaillant avec des espaces algébriques, soit nous ramener au cas quasi-projectif : si (X_i) est une partition finie de X en sous-schémas localement fermés quasi-projectifs stables sous σ, alors (cf. [5])

$$\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \sum_i \mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X_i, \overline{\mathbb{Q}}_l)). \tag{3.3.1}$$

3.4. Démonstration de 3.2. Soit (X_i) une partition de X en sous-schémas localement fermés stables sous σ et tels que, sur chaque X_i, σ définisse une action libre d'un groupe cyclique. En appliquant (3.3.1) aux décompositions $X = \bigcup X_i$ et $X^s = \bigcup X_i^s$, on se ramène au cas où σ engendre une action libre d'un groupe cyclique H. Dans ce cas, ou bien

(a) σ est d'ordre une puissance de p, donc $s = \mathrm{Id}$, $u = \sigma$, et (3.2) est trivial, ou bien

(b) l'ordre de σ est divisible par un nombre premier $l' \neq p$, et nous devons démontrer que $\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = 0$. Comme

$$\mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l)) = \mathrm{Tr}(\sigma^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_{l'})) \tag{3.3}$$

nous pouvons tout aussi bien supposer que $l = l'$. Admettons maintenant la

PROPOSITION 3.5. Soit H un groupe fini agissant librement sur X. Alors

$$\chi(h) = \mathrm{Tr}(h^*, H_c^*(X, \overline{\mathbb{Q}}_l))$$

est le caractère d'un $\mathbb{Z}_l[H]$-module projectif virtuel.

Si H est abélien et si H' est son plus grand sous-groupe d'ordre premier à l, une représentation de H sur $\mathbb{Z}_l$ donne naissance à un $\mathbb{Z}_l[H]$-module projectif si et seulement si elle est induite par une représentation de H'. Son caractère s'annule alors sur $H - H'$, et l'on obtient l'annulation (b) en appliquant (3.5) au groupe cyclique engendré par σ.

3.6. Soit A un anneau de torsion unitaire, et soit $\mathscr{F}$ un faisceau de A-modules à gauche sur un schéma Y, où Y est séparé et de type fini sur k. Les A-modules $H_c^i(Y, \mathscr{F})$ sont alors les modules de cohomologie d'un objet plus fin $R\Gamma_c(Y, \mathscr{F})$ de la catégorie dérivée $D^b(A)$ de la catégorie des A-modules. L'énoncé suivant est la clé de la démonstration de 3.5.

PROPOSITION 3.7. Supposons A noethérien à droite et à gauche. Si $\mathscr{F}$ est un faisceau constructible de A-modules projectifs, alors $R\Gamma_c(Y, \mathscr{F})$ peut être représenté par un complexe fini de A-modules projectifs de type fini.

Nous reprenons la démonstration de [10, XVII (5.2.10)].

(a) Les $H_c^i(Y, \mathscr{F})$ sont des A-modules de type fini et s'annulent pour $i > 2\dim(Y)$ ([10, XVII (5.2.8.1) et (5.3.6)]).
(b) Pour tout A-module à droite de type fini N, on a

$$R\Gamma_c(Y, N \otimes_A \mathscr{F}) \simeq N \otimes_A^L R\Gamma_c(Y, \mathscr{F})$$

([10, XVII (5.2.9)]) ; la démonstration consiste à remplacer N par une résolution libre de N, afin de se ramener au cas trivial où N est libre de type fini ; nous pouvons employer de telles résolutions infinies à gauche parce que $R\Gamma_c$ est de dimension cohomologique finie. L'hypothèse que N est de type fini est en fait inutile.

(c) D'après (a), nous pouvons représenter $R\Gamma_c(Y, \mathscr{F})$ par un complexe de A-modules $K^\bullet$, avec $K^i = 0$ pour $i \notin [0, 2\dim Y]$ et K^i libre de type fini pour $i > 0$. Pour tout A-module à droite de type fini N et tout $i > 0$,

$$\mathrm{Tor}_i^A(N, K^0) = H^{-i}(N \otimes^L R\Gamma_c(Y, \mathscr{F})) =_{(b)} H^{-i}R\Gamma_c(Y, N \otimes \mathscr{F}) = 0.$$

Le A-module K^0 est donc plat ; il est de type fini puisque $H^0(K^\bullet)$ l'est, donc il est projectif.

3.8. Démonstration de 3.5. Nous supposerons X quasi-projectif (le cas général se traite comme en 3.3). Posons $Y = X/H$ et notons π la projection $\pi : X \to Y$. Le groupe H agit sur $\pi_*\mathbb{Z}/l^n$, et cette action fait de $\pi_*\mathbb{Z}/l^n$ un faisceau localement constant de $\mathbb{Z}/l^n[H]$-modules libres de rang un. D'après 3.7, $R\Gamma_c(Y, \pi_*\mathbb{Z}/l^n)$ peut être représenté par un complexe $K_n^\bullet$ de $\mathbb{Z}/l^n[H]$-modules projectifs de type fini. On a

$$R\Gamma_c(Y, \pi_*\mathbb{Z}/l^n) \simeq R\Gamma_c(Y, \pi_*\mathbb{Z}/l^{n+1}) \otimes^L_{\mathbb{Z}/l^{n+1}} \mathbb{Z}/l^n$$

(3.7 (b)), et l'on vérifie facilement ([11, XV, 3.3, Lemme 1]) qu'une fois $K_n^\bullet$ choisi, on peut choisir $K_{n+1}^\bullet$ de sorte que $K_n^\bullet$ soit la réduction modulo l^n de $K_{n+1}^\bullet$. En passant à la limite projective, on obtient un complexe $K_\infty^\bullet$ de $\mathbb{Z}_l[H]$-modules projectifs et un isomorphisme H-équivariant

$$H_c^*(X, \mathbb{Z}_l) = \varprojlim H_c^*(X, \mathbb{Z}/l^n) = \varprojlim H_c^*(Y, \pi_*\mathbb{Z}/l^n) = H^*(K_\infty^\bullet)$$

(l'égalité du milieu résultant de ce que π est fini). On a alors

$$\chi(h) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}(h, K_\infty^i).$$

3.9. Soit X/k comme en (3.1), T un groupe abélien fini d'ordre premier à p, G un groupe fini et ρ une action de $T \times G$ sur X. Nous supposons que l'action de T sur X est libre. Nous faisons agir $T \times G$ sur $H_c^*(X)$ par transport de structure. Pour tout caractère θ de T à valeurs dans $\overline{\mathbb{Q}}_l^*$, nous notons H_θ^* le sous-espace de $H_c^*(X)$ sur lequel T agit par θ ; sur H_θ^*, t^* est la multiplication par $\theta(t)^{-1}$.

Supposons, pour simplifier, que X est quasi-projectif. Nous notons π la projection $\pi : X \to Y = X/T$. Le groupe G agit sur Y. Pour chaque $g \in G$, nous notons $I(g)$ l'ensemble des composantes connexes de l'ensemble des points fixes Y^g

et Y_i^g la composante correspondant à $i \in I(g)$.

Pour $y \in Y$, $\pi^{-1}(y)$ est un ensemble principal homogène pour l'action du groupe abélien T. Si $y \in Y^g$, g agit sur $\pi^{-1}(y)$ et commute avec T ; il agit donc comme un certain $t(g,y) \in T$:

$$gx = t(g,x)x, \qquad x \in \pi^{-1}(y);$$

$t(g,y)$ est constant lorsque y parcourt chaque composante connexe Y_i^g de Y^g ; nous le notons $t(g,i)$.

Le théorème 3.2 sera utilisé sous la forme suivante.

COROLLAIRE 3.10. Avec les notations ci-dessus, soit $g = su$ la décomposition de $g \in G$ en produit d'éléments commutants d'ordres respectivement premier à p et puissance de p. Alors

$$\mathrm{Tr}(g^*, H_\theta^*) = \sum_{i \in I(s)} \theta(t(s,i)^{-1}) \,\mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(Y_i^s)).$$

Pour $t \in T$, la décomposition 3.1 de $\sigma = t \cdot g$ est $tg = (st) \cdot u$. On a

$$X^{st} = \coprod_{i \in I(s)} \pi^{-1}(Y_i^s)^{st} = \coprod_{\substack{i \in I(s) \\ t = t(s,i)^{-1}}} \pi^{-1}(Y_i^s),$$

d'où

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}(g^*, H_\theta^*) &= \frac{1}{|T|} \sum_t \theta(t)^{-1} \,\mathrm{Tr}(g^* t^{*-1}, H_c^*(X)) \\
&= \frac{1}{|T|} \sum_t \theta(t) \,\mathrm{Tr}(g^* t^*, H_c^*(X)) \\
&= \frac{1}{|T|} \sum_t \theta(t) \sum_{\substack{i \in I(s) \\ t = t(s,i)^{-1}}} \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))) \\
&= \frac{1}{|T|} \sum_{i \in I(s)} \theta(t(s,i)^{-1}) \,\mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))).
\end{aligned}$$

La décomposition (3.1) de l'automorphisme tu de $\pi^{-1}(Y_i^s)$ est $t \cdot u$. Pour $t \neq e$, t n'a pas de point fixe, donc

$$\mathrm{Tr}((tu)^*, H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))) = 0 \qquad (t \neq e).$$

L'endomorphisme

$$\frac{1}{|T|} \sum_t t^* \quad \text{de} \quad H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))$$

est une rétraction sur le sous-espace $\pi^* H_c^*(Y_i^s)$, donc

$$\frac{1}{|T|} \,\mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(\pi^{-1}(Y_i^s))) = \mathrm{Tr}(u^*, H_c^*(Y_i^s))$$

et, en substituant dans l'expression de $\mathrm{Tr}(g^*, H_\theta^*)$, on obtient (3.10).

3.11. La fin de ce chapitre ne sera pas utilisée dans cet article. Soit G

un groupe fini agissant sur X/k comme en (3.1). Pour simplifier, nous supposons X quasi-projectif. Supposons en outre que G agit librement sur X, et posons $Y = X/G$. Le revêtement X de Y est dit modéré si Y peut être plongé comme ouvert dense de Zariski dans un schéma propre $\overline{Y}$, de telle sorte que les sous-groupes de Sylow p de G agissent librement sur la normalisation $\overline{X}$ de $\overline{Y}$ dans X :

$$\begin{array}{ccc} X & \overset{j}{\hookrightarrow} & \overline{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \hookrightarrow & \overline{Y}. \end{array}$$

PROPOSITION 3.12. Avec les notations ci-dessus, si X/Y est modéré, alors la représentation virtuelle $\sum_i (-1)^i H_c^i(X)$ de G est un multiple de la représentation régulière.

Il suffit de démontrer que $\mathrm{Tr}(g^*, H_c^*(X)) = 0$ pour $g \neq e$. Si g n'est pas d'ordre une puissance de p, cela résulte de (3.2). Si g est d'ordre une puissance de p, g agit sans point fixe sur $\overline{X}$ et

$$\mathrm{Tr}(g^*, H_c^*(X)) = \mathrm{Tr}(g^*, H^*(\overline{X}, j_!\overline{\mathbb{Q}}_l)) = 0$$

par le théorème de Lefschetz des points fixes appliqué à $\overline{X}$ et au faisceau $j_!\overline{\mathbb{Q}}_l$.

3.13. Remarque historique. La méthode que nous avons suivie, utilisant (3.5), a été employée pour la première fois par Zarelua (On finite groups of transformations, Proc. Int. Symp. on Topology and its Applications, 1968, pp. 334-339) et indépendamment par J. L. Verdier pour démontrer que, si un groupe fini G agit librement sur un espace topologique X de dimension cohomologique finie, et si les $H^i(X, \mathbb{Z})$ sont de type fini, alors $\sum_i (-1)^i H^i(X, \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Q}$ est un multiple de la représentation régulière de G.

4. La formule des caractères

Les hypothèses (0.1.1) sont en vigueur dans ce chapitre et les quatre suivants.

DÉFINITION 4.1. Soit T un tore maximal F-stable de G. La fonction de Green $Q_{T,G}(u)$ est la restriction aux éléments unipotents du caractère de la représentation virtuelle $R^1_{T\subset B}$, où B est un sous-groupe de Borel quelconque contenant T.

Cette fonction de Green ne dépend pas de B (d'après (1.6) et (1.17 (i))) ; elle ne dépend que des classes de conjugaison sous G^F de T et de u. L'application naturelle $x \mapsto \overline{x}$ de G vers son groupe adjoint induit une bijection sur les ensembles unipotents, et

$$Q_{T,G}(u) = Q_{\overline{T},G^{\mathrm{ad}}}(\overline{u}). \tag{4.1.1}$$

La fonction de Green est à valeurs entières (3.3) et est la restriction d'un caractère

de G^F, donc $Q_{T,G}(u) = Q_{T,G}(u^n)$ si $(n,p) = 1$.

Soit α le plus petit entier ≥ 1 tel que F^α soit l'identité sur $\mathbf{W}$. Il résulte de la démonstration de (3.3) que $\sum_{n\geq 1} X_{T\subset B}^{F^{\alpha n}u} t^n$ est une fonction rationnelle de t, et que

$$Q_{T,G}(u) = -\left\{\sum_{n\geq 1} X_{T\subset B}^{F^{\alpha n}u} t^n\right\}_{t=\infty}. \tag{4.1.2}$$

Dans ce chapitre, nous exprimerons le caractère de $R_{T\subset B}^\theta$ en fonction de θ et des fonctions de Green.

THÉORÈME 4.2. Soit $x = su$ la décomposition de Jordan de $x \in G^F$. Alors

$$\mathrm{Tr}(x, R_{T\subset B}^\theta) = \frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{g\in G^F \\ \mathrm{ad}\, gT\subset Z^0(s)}} Q_{\mathrm{ad}\, gT, Z^0(s)}(u)\, \mathrm{ad}\, g(\theta)(s).$$

Soit ε_x la fonction sur G^F qui vaut 1 en $x \in G^F$ et 0 ailleurs. On peut réécrire 4.2 sous la forme suivante pour le caractère de $R_{T\subset B}^\theta$:

$$\mathrm{Tr}(\ , R_{T\subset B}^\theta) = \sum_{t\in T^F} \frac{1}{|Z^0(t)^F|}\theta(t) \sum_{\substack{u\in Z^0(t)^F \\ g\in G^F}} Q_{T,Z^0(t)}(u)\varepsilon_{\mathrm{ad}\, g(tu)} \tag{4.2.1}$$

où l'on pose $Q_{T,Z^0(t)}(u) = 0$ lorsque u n'est pas unipotent.

COROLLAIRE 4.3. $R_{T\subset B}^\theta$ est indépendant du choix de B ($B \supset T$).

Désormais, nous écrirons R_T^θ pour $R_{T\subset B}^\theta$. Nous déduirons 4.2 de 3.7 et des faits géométriques suivants.

PROPOSITION 4.4. (i) Si un sous-groupe de Borel B_1 de G contient s, alors $B_1 \cap Z^0(s)$ est un sous-groupe de Borel de $Z^0(s)$.

(ii) Fixons $T \subset B$ dans G. Tout sous-groupe de Borel B_1 tel que $s \in B_1$ est de la forme $\mathrm{ad}\, gB$, avec $\mathrm{ad}\, gT \subset Z^0(s)$ (c'est-à-dire $g^{-1}sg \in T$). La classe à gauche

$$\tau_{T,B}(B_1) \overset{\text{déf.}}{=} Z^0(s)\cdot g$$

ne dépend que de T, de B et de B_1.

(iii) L'application $B_1' \mapsto B_1' \cap Z^0(s)$ est un isomorphisme de l'espace des sous-groupes de Borel contenant s, tels que $\tau_{T,B}(B_1') = \tau_{T,B}(B_1)$, sur l'espace des sous-groupes de Borel de $Z^0(s)$.

Démonstration. (i) est bien connu. Posons $B_1 = \mathrm{ad}\, g_1 B$. On a $g_1^{-1}sg_1 \in B$; il existe donc u dans le radical unipotent de B tel que $u^{-1}g_1^{-1}sg_1u \in T$. Prenons $g = g_1u$. Posons $T' = \mathrm{ad}\, gT$. Si $g' = hg$ vérifie également $\mathrm{ad}\, g'B = B_1$ (resp. $\mathrm{ad}\, g'T \subset Z^0(s)$), alors $h \in B_1$ (resp. $h \in Z^0(s)N(T')$, par conjugaison des tores maximaux dans $Z^0(s)$). Si $W = N(T')/T'$ est le groupe de Weyl de G et $W^0 = (N(T') \cap Z^0(s))/T'$ celui de $Z^0(s)$, la décomposition de Bruhat pour $Z^0(s)$ s'écrit

$$Z^0(s) = (B_1 \cap Z^0(s))W^0(B_1 \cap Z^0(s)),$$

et

$$(B_1 Z^0(s)) \cap N(T') = B_1 W^0 (B_1 \cap Z^0(s)) \cap N(T') \subset B_1 W^0 B_1 \cap N(T') = W^0(T') \subset Z^0(s).$$

Par conséquent

$$B_1 \cap (Z^0(s) \cdot N(T')) \subset Z^0(s)$$

et

$$B_1 \cap (Z^0(s) \cdot N(T')) = B_1 \cap Z^0(s).$$

L'élément g tel que $\mathrm{ad}\, gB = B_1$ et $\mathrm{ad}\, gT \subset Z^0(s)$ est unique modulo $B_1 \cap Z^0(s)$, d'où (ii) et (iii).

Une classe à gauche de $Z^0(s)$, $\tau = Z^0(s)g$, avec $\mathrm{ad}\, gT \subset Z^0(s)$, définit un isomorphisme $\overline{\tau}$ du tore maximal de G vers celui de $Z^0(s)$; $\mathrm{ad}\, g$ envoie T (contenu dans le sous-groupe de Borel B) sur $\mathrm{ad}\, gT \subset Z^0(s)$ (contenu dans le sous-groupe de Borel $\mathrm{ad}\, gB \cap Z^0(s)$). Cette construction nous permettra de comparer la position relative des sous-groupes de Borel dans G et dans $Z^0(s)$.

PROPOSITION 4.5. Soient B_1' et B_1'' des sous-groupes de Borel contenant s,

$$\tau' = \tau_{T,B}(B_1'), \qquad \tau'' = \tau_{T,B}(B_1'');$$

soit w la position relative de B_1' et B_1'' (dans G), et w_1 celle de $B_1' \cap Z^0(s)$ et $B_1'' \cap Z^0(s)$ (dans $Z^0(s)$). Alors

$$w_1 = \overline{\tau}' w \overline{\tau}''^{-1}.$$

En remplaçant (T, B) par un conjugué, nous pouvons supposer que $B = B_1'$ et que $T \subset B_1' \cap Z^0(s) \cap B_1''$. Nous identifierons le tore maximal de G et celui de $Z^0(s)$ à T, au moyen de $T \subset B$ et de $T \subset (B \cap Z^0(s))$. On a alors $\overline{\tau}' = \mathrm{Id}$. En remplaçant B_1'' par un conjugué sous $N(T) \cap Z^0(s)$, nous pouvons en outre supposer que $w_1 = 1$, c'est-à-dire $B_1' \cap Z^0(s) = B_1'' \cap Z^0(s)$. Nous devons démontrer que $w = \overline{\tau}''$, ce qui est clair.

LEMME 4.6. Si B et B', contenant T, sont dans la même position relative que B_1 et B_1', qui contiennent s, alors $\tau_{T,B}(B_1) = \tau_{T,B'}(B_1')$.

En remplaçant (B, T, B') par un conjugué, nous pouvons de nouveau supposer que $B = B_1$ et que $T \subset B_1 \cap Z^0(s) \cap B_1'$. Dans ce cas, $B' = B_1'$.

Pour démontrer (4.2), nous calculons d'abord l'espace $X^s_{T\subset B}$ des sous-groupes de Borel B_1 contenant s et tels que B_1 et FB_1 soient dans la même position relative que B et FB.

PROPOSITION 4.7. Soit $X^s_{T\subset B}(g)$ le sous-espace de $X^s_{T\subset B}$ formé des B_1 tels que $\tau_{T,B}(B_1) = Z^0(s)g$. Alors

$$X^s_{T\subset B} = \coprod_{\substack{g \in Z^0(s)^F \backslash G^F \\ \mathrm{ad}\, gT \subset Z^0(s)}} X^s_{T\subset B}(g) \tag{4.7.1}$$

et, pour $g \in G^F$, l'application $B_1 \mapsto B_1 \cap Z^0(s)$ induit un isomorphisme

$$X^s_{T\subset B}(g) \xrightarrow{\sim} X_{\mathrm{ad}\, gT\subset \mathrm{ad}\, gB\cap Z^0(s)}. \tag{4.7.2}$$

D'après 4.6, on a $F\tau_{T,B}(B_1) = \tau_{T,FB}(FB_1) = \tau_{T,B}(B_1)$. Par le théorème de Lang, l'espace homogène principal sous $Z^0(s)$, $\tau_{T,B}(B_1)$, étant F-stable, possède un point rationnel, d'où (4.7.1). D'après (4.4 (iii)) et (4.5), l'application (4.7.2) est un isomorphisme de $X^s_{T\subset B}(g)$ sur un certain $X(w)$ (relatif à $Z^0(s)$) ; pour déterminer quel w intervient, on observe que ad $gB \in X^s_{T\subset B}(g)$.

Démonstration de 4.2. Le théorème est maintenant une application immédiate de (4.7) et de (3.10), appliqué à l'action (1.17) de $G^F \times T^F$ sur $\widetilde{X}_{T\subset B}$.

5. Caractères des tores

Nous supposerons choisis des isomorphismes

$$k^* \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}, \tag{5.0.1}$$

et

$$(\text{racines de l'unité d'ordre premier à } p \text{ dans } \overline{\mathbb{Q}}_l^*) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}. \tag{5.0.2}$$

5.1. Soit T un tore sur k. Outre le groupe des caractères $X(T) = \mathrm{Hom}(T, \mathbb{G}_m)$, nous considérerons son dual $Y(T) = \mathrm{Hom}(\mathbb{G}_m, T)$. La dualité est donnée par

$$\langle \alpha, h\rangle = \alpha \circ h \in \mathrm{Hom}(\mathbb{G}_m, \mathbb{G}_m) = \mathbb{Z}$$

($\alpha \in X(T)$ et $h \in Y(T)$). Les applications $(h, x) \mapsto h(x)$ et $t \mapsto (\alpha \mapsto \alpha(t))$ induisent des isomorphismes

$$Y(T) \otimes k^* = T(k) = \mathrm{Hom}(X(T), k^*). \tag{5.1.1}$$

Si T est un tore maximal de G, les racines de T dans G sont des éléments de $X(T)$, tandis que les coracines appartiennent à $Y(T)$. Si α est une racine, la coracine correspondante H_α est caractérisée comme suit : il existe un homomorphisme $u : \mathrm{SL}(2) \to G$, qui envoie le sous-groupe $\begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sur le sous-groupe de racine U_α, et dont la restriction au groupe des matrices diagonales (identifié à $\mathbb{G}_m$ par $x \mapsto \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x^{-1} \end{pmatrix}$) est H_α.

5.2. À l'aide de l'isomorphisme choisi (5.0.1), on peut réécrire (5.1.1) sous la forme

$$T(k) = Y(T) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'} \simeq (Y(T) \otimes \mathbb{Q}/Y(T))_{p'}. \tag{5.2.1}$$

Si T est obtenu par extension des scalaires à partir d'un tore $T_0/\mathbb{F}_q$, l'application de Frobenius F induit une application $F : Y(T) \to Y(T)$ (Y est un foncteur covariant), et T^F est le sous-groupe $\mathrm{Ker}(F-1)$ de $T(k) = Y(T) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}$; puisque F est divisible par p, c'est aussi le noyau de $F-1$ dans $Y(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$:

$$0 \longrightarrow T^F \longrightarrow Y(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{F-1} Y(T) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0. \tag{5.2.2}$$

En appliquant le lemme du serpent à

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & Y(T) & \longrightarrow & Y(T)\otimes\mathbb{Q} & \longrightarrow & Y(T)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle F-1}\downarrow & & {\scriptstyle F-1}\downarrow & & {\scriptstyle F-1}\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & Y(T) & \longrightarrow & Y(T)\otimes\mathbb{Q} & \longrightarrow & Y(T)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

on obtient une autre suite exacte

$$0 \longrightarrow Y(T) \xrightarrow{F-1} Y(T) \longrightarrow T^F \longrightarrow 0. \tag{5.2.3}$$

Les applications de (5.2.2), (5.2.3) dépendent du choix (5.0.1). Une expression intrinsèque de ces suites serait la suivante : T^F est l'image de l'application médiane dans la suite exacte

$$0 \longrightarrow Y(T)_{\widehat{p'}}(1) \xrightarrow{F-1} Y(T)_{\widehat{p'}}(1) \xrightarrow{(F-1)^{-1}} Y(T)_{\widehat{p'}}(1)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{F-1} Y(T)_{\widehat{p'}}(1)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Appliquons aux suites (5.2.2), (5.2.3) le foncteur à valeurs dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. L'isomorphisme (5.0.2) fournit un isomorphisme

$$(T^F)^\sim \overset{\text{déf.}}{=} \mathrm{Hom}(T^F, \overline{\mathbb{Q}}_l^*) = \mathrm{Hom}(T^F, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}),$$

et l'on obtient les suites exactes

$$^*0 \longrightarrow X(T) \xrightarrow{F-1} X(T) \longrightarrow (T^F)^\sim \longrightarrow 0, \tag{5.2.2}$$

$$^*0 \longrightarrow (T^F)^\sim \longrightarrow X(T)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \xrightarrow{F-1} X(T)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0. \tag{5.2.3}$$

Le tore dual T^* de T est défini par la règle $X(T^*) = Y(T)$, (d'où $Y(T^*) = X(T)$); sa structure sur $\mathbb{F}_q$ est définie par (F sur $Y(T^*)$) = (^tF sur $X(T)$). Au moyen d'un certain isomorphisme

$$(T^F)^\sim = T^{*F}, \tag{5.2.4}$$

les suites (5.2.3), (5.2.2) pour T^* sont identiques à (5.2.2)*, (5.2.3)*.

5.3. Si l'on passe de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}_{q^n}$, F est remplacé par F^n. La composition avec l'application norme

$$N = \frac{F^n - 1}{F - 1} = \sum_0^{n-1} F^i \,:\, T^{F^n} \longrightarrow T^F$$

est une injection $^tN : (T^F)^\sim \to (T^{F^n})^\sim$. On a les diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccccccccccc} 0 & \longrightarrow & Y & \xrightarrow{F^n-1} & Y & \longrightarrow & T^{F^n} & \longrightarrow & Y\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \xrightarrow{F^n-1} & Y\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle N}\downarrow & & \| & & {\scriptstyle N}\downarrow & & {\scriptstyle N=\sum_0^{n-1}F^i}\downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & T^F & \longrightarrow & Y\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & Y\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & X & \longrightarrow & (T^F)^\sim & \longrightarrow & X\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & X\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & {\scriptstyle {}^tN=\sum_0^{n-1}{}^tF^i}\downarrow & & {\scriptstyle {}^tN}\downarrow & & \| & & {\scriptstyle {}^tN}\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & X & \longrightarrow & (T^{F^n})^\sim & \longrightarrow & X\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & X\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

où X et Y désignent $X(T)$ et $Y(T)$. En particulier, si θ est un caractère de T^F, θ et $\theta\circ N$ ont la même image dans $X(T)\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, et (5.2.4) donne le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} (T^F)^\sim & \simeq & (T^*)^F \\ {\scriptstyle {}^tN}\downarrow & & {\scriptstyle N}\downarrow \\ (T^{F^n})^\sim & \simeq & (T^*)^{F^n}. \end{array}$$

PROPOSITION 5.4. Soient T et T' deux tores maximaux F-stables de G, et soient θ,θ' des caractères de $T^F, (T')^F$. Nous les identifions à des caractères de $Y(T)$ et de $Y(T')$, au moyen de (5.2.3). Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Il existe $x\in G$, avec $\mathrm{ad}\,x(T)=T'$, tel que l'application induite par $\mathrm{ad}\,x : Y(T)\to Y(T')$ envoie θ sur θ' ;

(ii) Pour un certain n, les paires $(T,\theta\circ N)$, $(T',\theta'\circ N)$, où N est la norme de T^{F^n} vers T^F (resp. de $(T')^{F^n}$ vers $(T')^F$), sont conjuguées sous G^{F^n}.

D'après 5.3, la condition (i) est invariante lorsqu'on remplace F par F^n et θ,θ' par $\theta\circ N,\theta'\circ N$. Il suffit donc de vérifier (5.4) dans le cas trivial où T et T' sont déployés.

DÉFINITION 5.5. Les paires (T,θ), (T',θ') sont dites géométriquement conjuguées lorsque les conditions équivalentes de (5.4) sont satisfaites.

5.6. Soit (T,θ) comme ci-dessus. Le choix d'un sous-groupe de Borel B contenant T définit un isomorphisme de T avec le tore $\mathbf{T}$; l'isomorphisme correspondant $Y(T)\to Y(\mathbf{T})$ envoie θ sur un caractère de $Y(\mathbf{T})$ à valeurs dans les racines de l'unité d'ordre premier à p de $\overline{\mathbb{Q}}_l$. L'isomorphisme (5.0.2) l'identifie à un élément de $X(\mathbf{T})\otimes(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}$. Sa classe $[\theta]$ dans $(X(\mathbf{T})\otimes(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'})/\mathbf{W}$ est indépendante du choix de B. Elle est invariante par F. Posons

$$\mathcal{S}\overset{\text{déf.}}{=}[(X(\mathbf{T})\otimes(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'})/\mathbf{W}]^F\xrightarrow{\sim}[(X(\mathbf{T})\otimes\mathbb{Q}/\mathbb{Z})/\mathbf{W}]^F.$$

PROPOSITION 5.7. (i) L'application $\theta\mapsto[\theta]$ induit une bijection de l'ensemble des classes de conjugaison géométrique de paires (T,θ) sur $\mathcal{S}$.

(ii) (Comparer Steinberg [15, p. 93].) Le nombre de classes de conjugaison géométrique de paires (T, θ) est $|Z^{0F}|q^l$, où Z^0 est la composante neutre du centre de G et l le rang semi-simple de G.

(i) L'injectivité résulte clairement de 5.4(i). Démontrons la surjectivité. Si la classe modulo $\mathbf{W}$ de $x \in X(\mathbf{T}) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}$ est invariante par F, on a en effet ${}^t(wF)x = x$ pour un certain $w \in \mathbf{W}$, et x correspond à un caractère de $\mathbf{T}(w)^F$, donc de T^F, pour un certain tore maximal F-stable T de G (1.14).

(ii) Comme en (5.2), nous pouvons maintenant identifier les classes de conjugaison géométrique de paires (T, θ) aux points $\mathbb{F}_q$-rationnels du quotient $\mathbf{T}^*/\mathbf{W}$. Il s'agit de calculer

$$|(\mathbf{T}^*/\mathbf{W})^F| = \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F^*, H_c^i(\mathbf{T}^*/\mathbf{W})) = \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F^*, H_c^i(\mathbf{T}^*)^{\mathbf{W}}).$$

Soit G' le groupe dérivé de G ; le tore $\mathbf{T}^*$ est isogène au produit de Z^{0*} par $\mathbf{T}'^*$ (et a donc la même cohomologie), où $\mathbf{T}'$ est le tore de G'. Comme tout tore a autant de points rationnels que son dual, le théorème de Künneth donne

$$|(\mathbf{T}^*/\mathbf{W})^F| = |Z^{0F}| \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F^*, H_c^i(\mathbf{T}'^*)^{\mathbf{W}}).$$

On a

$$H^*(\mathbf{T}'^*, \overline{\mathbb{Q}}_l) = \Lambda^* H^1(\mathbf{T}'^*, \overline{\mathbb{Q}}_l) = \Lambda^*(Y(\mathbf{T}') \otimes \overline{\mathbb{Q}}_l(-1));$$

donc, par dualité de Poincaré,

$$H_c^{2l-i}(\mathbf{T}'^*, \overline{\mathbb{Q}}_l) = \operatorname{Hom}(\Lambda^i Y(\mathbf{T}'), \overline{\mathbb{Q}}_l(i-l)),$$

et

$$\operatorname{Tr}(F^*, H_c^{2l-i}(\mathbf{T}'^*)^{\mathbf{W}}) = q^{l-i} \operatorname{Tr}(F, \Lambda^i Y(\mathbf{T}')^{\mathbf{W}}).$$

Le lemme suivant montre que cette trace est nulle pour $i \neq 0$, d'où le facteur q^l.

LEMME 5.8. Soit $W \subset \operatorname{Aut}(V)$ un groupe fini engendré par des réflexions d'un espace vectoriel réel V de dimension d. Supposons $V^W = 0$. Alors $(\Lambda^i V)^W = 0$ pour $i \neq 0$.

Pour une démonstration, voir Bourbaki [1, Ch. V, Ex. 3 du § 2].

5.9. Soit T un tore maximal F-stable de G, et soit α une racine de T. Pour un caractère θ de T^F, nous dirons que θ est orthogonal à H_α, $\langle H_\alpha, \theta \rangle = 0$, si θ, considéré comme un caractère de $Y(T)$ (5.2.3), vaut identiquement 1 sur H_α. Le caractère θ de $Y(T)$ est alors invariant par la réflexion correspondante s_α.

5.10. Soit $\pi : \widetilde{G} \to G$ le revêtement simplement connexe du groupe dérivé de G, et soit $\widetilde{T}$ l'image réciproque de T dans $\widetilde{G}$. Le groupe $\widetilde{T}$ est

connexe : c'est un tore maximal de $\widetilde{G}$. Il agit sur $T \times \widetilde{G}$ par

$$\tilde{t} * (t, g) = (t\pi(\tilde{t})^{-1}, \tilde{t}g),$$

et l'application $(t, g) \mapsto tg$ induit un isomorphisme $\widetilde{T}\backslash(T \times \widetilde{G}) \xrightarrow{\sim} G$, donc, par le théorème de Lang, $\widetilde{T}^F\backslash(T^F \times \widetilde{G}^F) \xrightarrow{\sim} G^F$. On a

$$T^F/\pi(\widetilde{T}^F) \xrightarrow{\sim} G^F/\pi^F(\widetilde{G}). \tag{5.10.1}$$

PROPOSITION 5.11. (i) Un caractère de T^F est la restriction à T^F d'un caractère de $G^F/\pi(\widetilde{G}^F)$ si et seulement s'il est orthogonal à toutes les coracines.

(ii) Soit θ un caractère de $G^F/\pi(\widetilde{G}^F)$, soient T et T' deux tores maximaux F-stables, et soit $x \in G$ tel que $\operatorname{ad} x(T) = T'$. Alors $\operatorname{ad} x : Y(T) \to Y(T')$ envoie la restriction de θ à T^F (considérée comme un caractère de $Y(T)$) sur la restriction de θ à $(T')^F$: les restrictions de θ aux tores maximaux F-stables sont toutes géométriquement conjuguées.

L'assertion (i) résulte de (5.10.1) et du fait que $Y(\widetilde{T}) \subset Y(T)$ est engendré par les coracines H_α. Pour démontrer (ii), nous utiliserons le critère 5.4 (ii). Soit n tel que $x \in G^{F^n}$. Nous allons démontrer que, si $y \in T^{F^n}$, $N(y)$ et $N(\operatorname{ad} x(y))$ ont la même image dans $G^F/\pi(\widetilde{G}^F)$, et donc que $\operatorname{ad} x$ transforme $(\theta \mid T^F) \circ N$ en $(\theta \mid (T')^F) \circ N$.

L'application

$$t \longmapsto N(t)^{-1}N(\operatorname{ad} x(t)) : T \longrightarrow G$$

se relève de manière unique en une application $\varphi : T \to \widetilde{G}$ envoyant e sur e. En effet,

(a) elle se factorise par T/Z ;

(b) l'application $t \mapsto N(t)^{-1}N(\operatorname{ad} x(t)) : \widetilde{T} \to \widetilde{G}$ se factorise par $\widetilde{T}/\widetilde{Z} = T/Z$, et le relèvement cherché est le composé $T \to T/Z = \widetilde{T}/\widetilde{Z} \to \widetilde{G}$.

De même, l'application

$$(a, t) \longmapsto a^{-1}N(t)^{-1}N(\operatorname{ad} x(t)) \operatorname{ad} x(a) : T \times T \longrightarrow G$$

se relève en $\psi : T \times T \to \widetilde{G}$, avec $\psi(e, t) = \varphi(t)$. L'identité

$$\begin{aligned} F(N(t)^{-1}N(\operatorname{ad} x(t))) &= N(Ft)^{-1}N(F \operatorname{ad} x(t)) \\ &= (t^{-1}F^n t)^{-1}N(t)^{-1}N(\operatorname{ad} x(t)) \operatorname{ad} x(t^{-1})F^n \operatorname{ad} x(t) \\ &= (t^{-1}F^n t)^{-1}N(t)^{-1}N(\operatorname{ad} x(t)) \operatorname{ad} x(t^{-1}F^n t) \end{aligned}$$

se relève en

$$F\varphi(t) = \psi(t^{-1}F^n t, \varphi(t)).$$

En posant $t = y$, on a $y^{-1}F^n y = e$, donc $F\varphi(y) = \varphi(y)$ et $\varphi(y) \in \widetilde{G}^F$. On a $N(y)^{-1}N(\operatorname{ad} x(y)) \in \pi(\widetilde{G}^F)$, comme voulu.

Remarque 5.12. L'argument ci-dessus permet de montrer l'existence d'une application norme

$$N : G^{F^n}/\pi(\widetilde{G}^{F^n}) \longrightarrow G^F/\pi(\widetilde{G}^F)$$

qui, pour chaque tore maximal F-stable T, donne un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} T^{F^n}/\pi(\widetilde{T}^{F^n}) & \xrightarrow{\sim} & G^{F^n}/\pi(\widetilde{G}^{F^n}) \\ {\scriptstyle N}\downarrow & & {\scriptstyle N}\downarrow \\ T^{F}/\pi(\widetilde{T}^{F}) & \xrightarrow{\sim} & G^{F}/\pi(\widetilde{G}^{F}). \end{array}$$

THÉORÈME 5.13. Soit (T, θ) comme ci-dessus. Nous utilisons (5.2.3) pour identifier θ à un caractère de $Y(T)$. Si le centre de G est connexe, le stabilisateur de θ dans le groupe de Weyl $W = N(T)/T$ est engendré par les réflexions s_α, pour H_α une coracine orthogonale à θ.

Le point essentiel de la démonstration est le même que dans le théorème de Steinberg affirmant que, si le groupe dérivé G' est simplement connexe, le centralisateur de tout élément semi-simple est connexe.

Identifions θ à l'élément correspondant de $X(T) \otimes (\mathbb{Q}/\mathbb{Z})_{p'}$ (invariant par F). Soit $\theta_1 \in X(T) \otimes \mathbb{Q}$ un représentant de cet élément. Le dénominateur de θ_1 n'est pas divisible par p. On a le dictionnaire suivant :

(a) $\langle H_\alpha, \theta\rangle = 0 \iff \langle H_\alpha, \theta_1\rangle \in \mathbb{Z}$;

(b) θ est fixé par $w \in W \iff$ il existe $x \in X(T)$ tel que $w\theta_1 + x = \theta_1$.

Soit X^{ad} le sous-groupe de X engendré par les racines. C'est le groupe des caractères de l'image T^{ad} de T dans le groupe adjoint. Le groupe des caractères du centre $Z = \mathrm{Ker}(T \to T^{\mathrm{ad}})$ de G est X/X^{ad} ; le groupe des caractères de Z/Z^0_{red} est le sous-groupe de torsion de X/X^{ad}, d'où

(c) Z est connexe et lisse (resp. connexe) si et seulement si X/X^{ad} est sans torsion (resp. ne possède aucune torsion d'ordre premier à p).

Pour chaque racine α, $s_\alpha(\theta_1) = \theta_1 - \langle H_\alpha, \theta_1\rangle\alpha$. Le nombre $\langle H_\alpha, \theta_1\rangle$ a un dénominateur non divisible par p ; par conséquent, $\langle H_\alpha, \theta_1\rangle\alpha \in X(T)$ si et seulement si $\langle H_\alpha, \theta_1\rangle \in \mathbb{Z}$; $s_\alpha(\theta) = \theta$ si et seulement si $\langle H_\alpha, \theta\rangle = 0$. Il reste à vérifier que le stabilisateur de θ est engendré par les réflexions qu'il contient.

Fixons N tel que $(1/p^N)X^{\mathrm{ad}} \supset X \cap (X^{\mathrm{ad}} \otimes \mathbb{Q})$ et $p^N \equiv 1 \pmod{\text{l'ordre de } \theta}$. Pour tout $w \in W$, $w\theta_1 - \theta_1$ appartient à $X^{\mathrm{ad}} \otimes \mathbb{Q}$; ainsi, si $w\theta_1 - \theta_1$ appartient à X, alors $w(p^N\theta_1) - (p^N\theta_1) \in X^{\mathrm{ad}}$. En remplaçant θ_1 par $p^N\theta_1$, qui est encore un représentant de θ, nous pouvons supposer que θ est fixé par $w \in W$ si et seulement s'il existe $x \in X^{\mathrm{ad}}$ tel que $w\theta_1 + x = \theta_1$. Le stabilisateur de θ dans W est l'image dans W du stabilisateur de θ_1 dans le groupe de Weyl affine. Il reste à appliquer Bourbaki [1, Ch. VI, Ex. 1 du § 2].

Remarque 5.14. La démonstration montre que, si l'on emploie un sous-groupe de Borel convenable $B \supset T$ pour identifier W à $\mathbf{W}$, le stabilisateur de θ devient le sous-groupe de $\mathbf{W}$ engendré par certaines des réflexions correspondant soit à une racine simple, soit à l'opposé de la plus haute coracine.

DÉFINITION 5.15. (i) Le caractère θ de T^F est non singulier s'il n'est pas

orthogonal à aucune coracine.

(ii) θ est en position générale s'il n'est fixé par aucun élément non trivial de $(N(T)/T)^F$.

PROPOSITION 5.16. Si le centre de G est connexe, un caractère est non singulier si et seulement s'il est en position générale.

Le stabilisateur de θ dans $N(T)/T$ est un groupe engendré par des réflexions et stable par Frobenius. Il faut montrer que son sous-groupe fixé par Frobenius est non trivial. Cela résulte du lemme suivant.

LEMME 5.17. Soit $V \neq \{0\}$ un espace vectoriel euclidien, et soit W un groupe fini engendré par des réflexions orthogonales. Supposons que $V^W = \{0\}$. Si a appartient au normalisateur A de W dans $O(V)$, le centralisateur W^a de a dans W est non trivial.

(a) Réduction au cas irréductible. Soit $V = \bigoplus V_i$ la décomposition de V en somme directe de systèmes de racines irréductibles ; on a $W = \prod W_i$. L'automorphisme a permute les V_i ; en prenant un facteur direct, on peut supposer qu'il les permute cycliquement : $V = \bigoplus_{i\in\mathbb{Z}/n} V_i$ et $aV_i = V_{i+1}$. Un élément $w = (w_i) \in W = \prod W_i$ appartient à W^a si et seulement si $w_i = \mathrm{ad}\, a^i(w_0)$ et si w_0 est fixé par a^n ; on est ramené à démontrer que $W_0^{a^n}$ est non trivial.

(b) Dans le cas irréductible, on a toujours soit $A = W \cup -W$, soit $-1 \in W$; les deux cas sont clairs.

COROLLAIRE 5.18. Pour tout G, si θ est en position générale, alors θ est non singulier.

Plongeons G dans un groupe G_1 à centre connexe et ayant le même groupe dérivé. On peut, par exemple, prendre $G_1 = G \times T/\{(z, z^{-1}) \mid z \in Z(G)\}$. Le tore T est alors contenu dans un tore maximal F-stable T_1 de G_1, et θ est la restriction à T^F d'un certain caractère θ_1 de T_1^F. Si θ est en position générale, θ_1 l'est a fortiori, donc est non singulier (5.16). Un caractère θ_1 de T_1^F est non singulier si et seulement si sa restriction à T^F l'est, d'où (5.18).

Lorsque toutes les racines de G ont la même longueur, la conjugaison géométrique peut recevoir la description commode suivante.

DÉFINITION 5.19. (En supposant que toutes les racines ont la même longueur) Soit T un tore maximal F-stable et soit θ un caractère de T^F. Le centralisateur connexe $S(T, \theta)$ de (T, θ) dans G est le sous-groupe réductif F-stable de G ayant pour tore maximal T et pour sous-groupes radiciels relativement à T les U_α tels que $\langle H_\alpha, \theta\rangle = 0$.

Si $\langle H_\alpha, \theta\rangle = \langle H_\beta, \theta\rangle = 0$ et si $\alpha + \beta$ est une racine, alors $H_{\alpha+\beta} = H_\alpha + H_\beta$,

donc $\langle H_{\alpha+\beta}, \theta\rangle = 0$, et la définition a un sens. Soit $\pi : \widetilde{S(T,\theta)} \to S(T,\theta)$ le revêtement simplement connexe du sous-groupe dérivé de $S(T,\theta)$. D'après 5.11 (i), θ se prolonge en un caractère θ_S de $S(T,\theta)^F/\pi(\widetilde{S(T,\theta)}^F)$.

PROPOSITION 5.20. Si le centre de G est connexe et si toutes les racines ont la même longueur, une paire (T',θ') est géométriquement conjuguée à (T,θ) si et seulement si $(S(T,\theta),\theta_S)$ et $(S(T',\theta'),\theta'_{S'})$ sont conjuguées sous G^F.

L'implication « si » résulte de 5.11. Réciproquement, soit (T',θ') géométriquement conjuguée à (T,θ) : pour un certain $x \in G$, $\operatorname{ad} x(T) = T'$, et $\operatorname{ad} x : Y(T) \to Y(T')$ envoie θ sur θ' (par (5.2.3)). Si $F' : T' \to T'$ est l'application de Frobenius de T', on a $\operatorname{ad} x^{-1}(F') = \operatorname{ad} wF$ pour un certain w du groupe de Weyl de T. On a ${}^tF\theta = \theta$ et ${}^t(\operatorname{ad} wF)\theta = \theta$; ainsi θ est fixé par w, lequel appartient, d'après la partie (i), au groupe de Weyl de T dans $S(T,\theta)$. Soit $T'' = \operatorname{ad} y(T)$, avec $y \in S(T,\theta)$, un tore F-stable de $S(T,\theta)$, de Frobenius F'', tel que $(\operatorname{ad} y)^{-1}(F'') = (\operatorname{ad} x)^{-1}(F')$. En remplaçant (T,θ) par $(T'', \operatorname{ad} y(\theta))$ (au moyen de 5.11), et x par xy^{-1}, on se ramène au cas où $\operatorname{ad} xF = F' \operatorname{ad} x$. Dans ce cas, (T,θ) et (T',θ') sont conjuguées sous G^F ; l'identité $\operatorname{ad} x(Ft) = F' \operatorname{ad} x(t)$, pour $t \in T$, équivaut à $x^{-1}Fx \in T$; en remplaçant x par xt^{-1}, où $t \in T$ vérifie $t^{-1}Ft = x^{-1}Fx$, on rend x rationnel.

Lorsque les racines n'ont pas toutes la même longueur, il faut travailler dans le groupe dual G^* de G.

DÉFINITION 5.21. Un groupe G^* dual de G est un groupe réductif G^* défini sur $\mathbb{F}_q$, dont le tore maximal $\mathbf{T}^*$ est muni d'un isomorphisme avec le dual du tore maximal $\mathbf{T}$ de G, cet isomorphisme envoyant les racines simples sur les coracines simples.

Voici quelques propriétés de cette dualité. Soient G et G^* duaux.

(5.21.1) G et G^* ont le même groupe de Weyl $\mathbf{W}$. L'action de $\mathbf{W}$ sur $Y(\mathbf{T}^*)$ est la contragrédiente de son action sur $Y(\mathbf{T})$.

(5.21.2) Toutefois, Frobenius n'agit pas de la même manière sur $\mathbf{W}$ dans G et G^* : il agit de façons inverses (cela provient du fait que F sur $Y(\mathbf{T}^*)$ est la transposée de F sur $Y(\mathbf{T})$).

(5.21.3) Les classes de conjugaison des paires (T,B) (T tore maximal F-stable, B sous-groupe de Borel le contenant) dans G et dans G^* se correspondent. Avec les notations de (1.13), (1.14), on associe à la classe de (T,B) la classe de (T^*,B^*) telle que

$$ {}^t(\operatorname{ad} h(T,B)^{-1} \circ F) = \operatorname{ad} h(T^*,B^*)^{-1} \circ {}^tF; $$

les tores T et T^* sont en dualité.

(5.21.4) On obtient ainsi une bijection entre les classes de conjugaison rationnelle de tores maximaux dans G et G^*. Si T et T' appartiennent à des classes correspondantes, on a une classe naturelle (modulo $(N(T)/T)^F$) d'isomorphismes entre T^* et T'.

(5.21.5) Soit T un tore F-stable de G, et soit θ un caractère de T^F. Fixons T', tore correspondant dans G^*. Le caractère θ définit un élément de T^{*F}, puis une classe de conjugaison sous $(N(T')/T')^F$ d'éléments θ' de T'. On obtient ainsi une bijection entre les classes sous G^F de paires (T,θ) comme ci-dessus et les classes sous G^{*F} de paires (T',θ'), où T' est un tore maximal F-stable de G^* et θ' un élément de T'^F. Cette correspondance est compatible avec l'extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}_{q^n}$ (cf. 5.3.).

(5.21.6) En oubliant T', on voit que chaque classe sous G^F de paires (T,θ) définit un élément $\theta' \in G^{*F}$, bien défini à conjugaison sous G^{*F} près.

PROPOSITION 5.22. Deux paires (T_1,θ_1) et (T_2,θ_2) sont géométriquement conjuguées si et seulement si θ_1' et θ_2' sont géométriquement conjugués.

Une extension des scalaires (cf. 5.4, 5.5) ramène au cas où T_1 et T_2 sont déployés. Après conjugaison, on peut en outre supposer $T_1 = T_2$. Dans ce cas, la conjugaison géométrique est la conjugaison sous W, et la proposition est claire.

PROPOSITION 5.23. Soient G et G^* duaux. Alors le centre de G est connexe et lisse (resp. connexe) si et seulement si le groupe dérivé de G^* est simplement connexe (resp. si son revêtement simplement connexe est inséparable).

Posons $Y = Y(T^*)$, où T^* est le tore maximal de G^* ; soit Y_1 le sous-groupe engendré par les coracines, et posons $Y_2 = Y \cap Y_1 \otimes \mathbb{Q}$. Alors Y_2 est le groupe Y du tore maximal du groupe dérivé, et Y_1 celui du tore maximal de son revêtement universel. Le groupe de ce revêtement est le dual du dual de Pontryagin de Y_2/Y_1, et (5.23) résulte de la comparaison avec le point (c) de la démonstration de (5.13).

COROLLAIRE 5.24. Si le centre de G est connexe, deux paires (T_1,θ_1), (T_2,θ_2) comme en (5.22) sont géométriquement conjuguées si et seulement si θ_1' et θ_2' sont conjugués sous G^{*F}.

En effet, d'après un théorème de Steinberg, la conjugaison géométrique équivaut dans ce cas (5.23) à la conjugaison pour les éléments semi-simples de G^* (leurs centralisateurs sont connexes).

DÉFINITION 5.25. Soit (T',θ') correspondant à (T,θ) comme en (5.21.5). La paire (T,θ) est maximalement déployée si le rang sur $\mathbb{F}_q$ de T est égal à celui du centralisateur de θ', c'est-à-dire si T' est maximalement déployé dans ce centralisateur.

Toute classe de conjugaison géométrique de paires (T,θ) contient des paires maximalement déployées.

PROPOSITION 5.26. Si le centre de G est connexe, deux paires maximalement déployées et géométriquement conjuguées (T_1,θ_1), (T_2,θ_2) sont conjuguées sous G^F.

D'après (5.21.5) et (5.24), cela revient au fait connu que deux tores maximaux maximalement déployés dans le centralisateur $Z(\theta')$ d'un élément semi-simple θ' de G^{*F} sont conjugués par un élément de $Z(\theta)^F$.

PROPOSITION 5.27. Si (T,θ) est maximalement déployée et si l'image de T dans le groupe adjoint est anisotrope, alors θ est non singulier.

Fixons (T',θ') comme en (5.21.5). Par hypothèse, $Z^0(\theta')$ ne contient aucun tore déployé F-stable non central ; ainsi $Z^0(\theta') = T'$. Les racines de T' dans $Z^0(\theta')$ correspondent aux coracines de T orthogonales à θ, d'où la proposition.

COROLLAIRE 5.28. Si (T,θ) est maximalement déployée, T est contenu dans un sous-groupe de Levi F-stable L d'un sous-groupe parabolique F-stable P, et, dans L, (T,θ) est non singulière.

On choisit P et L de telle sorte que l'image de T dans le groupe adjoint de L soit anisotrope. Étant maximalement déployée dans G, la paire (T,θ) l'est a fortiori dans L, et l'on applique (5.27).

Le résultat suivant sera utilisé au chapitre suivant.

PROPOSITION 5.29. Soit T' un sous-tore d'un tore T, avec T défini sur $\mathbb{F}_q$ (sans hypothèse sur T'). Soit θ un caractère de T^F. Il est trivial sur $T' \cap T^F$ si et seulement si, considéré comme caractère de $Y(T)$, il est trivial sur

$$((F-1)Y(T') \otimes \mathbb{Q} \cap Y(T)).$$

La condition est que $\theta(x) = 0$ pour

$$(F-1)^{-1}(x) \in (Y(T') \otimes \mathbb{Q} + Y(T)),$$

c'est-à-dire pour

$$x \in ((F-1)Y(T') \otimes \mathbb{Q} \cap Y(T)) + ((F-1)Y(T)).$$

Le caractère θ étant trivial sur $(F-1)Y(T)$, cela signifie que $\theta(x)$ est trivial pour $x \in ((F-1)Y(T') \otimes \mathbb{Q} \cap Y(T))$.

6. Nombres d'entrelacement

6.1. Soient T, T' deux tores maximaux F-stables de G, et soient θ, θ' des caractères de T^F et T'^F. Posons $N_G(T,T') = \{g \in G \mid Tg = gT'\}$ et

$$W_G(T,T') = T\backslash N_G(T,T') = N_G(T,T')/T'.$$

Nous omettrons l'indice G lorsqu'il n'y aura pas d'ambiguïté. Frobenius agit sur $W(T,T')$, et

$$W(T,T')^F = T^F\backslash N(T,T')^F = N(T,T')^F/T'^F.$$

THÉORÈME 6.2. Si θ^{-1} n'est pas géométriquement conjugué à θ', alors

$$\left[H_c^*(\widetilde{X}_{T\subset B})_\theta \otimes H_c^*(\widetilde{X}_{T'\subset B'})_{\theta'}\right]^{G^F} = 0,$$

c'est-à-dire que, si une représentation irréductible de G^F intervient dans $H_c^*(\widetilde{X}_{T\subset B})_\theta$, sa duale n'intervient pas dans $H_c^*(\widetilde{X}_{T'\subset B'})_{\theta'}$.

La représentation virtuelle $R_T^{\theta^{-1}}$ est la duale de R_T^θ (comme on le voit sur la formule des caractères 4.2) ; on a donc le corollaire suivant :

COROLLAIRE 6.3. Si θ et θ' ne sont pas géométriquement conjugués, aucune représentation irréductible de G^F ne peut intervenir dans les deux représentations virtuelles R_T^θ et $R_{T'}^{\theta'}$.

La démonstration de 6.2 utilisera l'argument d'homotopie suivant :

PROPOSITION 6.4. Soit H un groupe algébrique connexe agissant sur un schéma Y, séparé et de type fini sur k. Pour tout $h \in H$, l'action de h sur $H_c^*(Y, \mathbb{Z}/n)$ est triviale.

Soit π la projection de $H \times Y$ sur H, et soit $f : H \times Y \to H \times Y$ définie par $f(h, y) = (h, hy)$:

$$\begin{array}{ccccc} & & H\times Y & \xrightarrow{f} & H\times Y \\ & & \searrow{\scriptstyle \pi} & & \swarrow{\scriptstyle \pi} \\ [-1ex] & & H & & \end{array}$$

D'après le théorème de changement de base en cohomologie à supports compacts, appliqué à

$$\begin{array}{ccc} H\times Y & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ H & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k, \end{array}$$

$R^i\pi_!\mathbb{Z}/n$ est le faisceau constant $H_c^i(Y, \mathbb{Z}/n)$ sur H. L'automorphisme f agit sur ce faisceau et, au point $h \in H$, il agit comme h agit sur $H_c^i(Y, \mathbb{Z}/n)$. À l'élément neutre de H, l'action de f est triviale. Un endomorphisme d'un faisceau constant sur une base connexe est constant ; par conséquent f agit trivialement partout, et la proposition est démontrée.

COROLLAIRE 6.5. La conclusion de (6.4) vaut en cohomologie l-adique.

La démonstration consiste en un passage à la limite.

6.6. Démonstration de 6.2. Sur $\widetilde{X}_{T\subset B} \times \widetilde{X}_{T'\subset B'}$, on a des actions commutantes de G^F, T^F et T'^F (G^F agit diagonalement). D'après le théorème de Künneth, il faut démontrer que

$$\left[H_c^*(\widetilde{X}_{T\subset B} \times \widetilde{X}_{T'\subset B'})_{\theta,\theta'}\right]^{G^F} = 0,$$

où le symbole $M_{\theta,\theta'}$, appliqué à tout $T^F \times T'^F$-module M, désigne le sous-espace

de M sur lequel T^F et T'^F agissent par θ et θ'.

$$\begin{cases}\text{Soit } U \text{ (resp. } U') \text{ le radical unipotent de } B \text{ (resp. } B').\\ \text{Soit } S_{T\subset B} = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FU\}, \quad S_{T'\subset B'} = \{g' \in G \mid g'^{-1}Fg' \in FU'\}.\end{cases}$$

Le groupe unipotent $(U \cap FU) \times (U' \cap FU')$ agit librement sur $S_{T\subset B} \times S_{T'\subset B'}$, et l'espace quotient est $\widetilde{X}_{T\subset B} \times \widetilde{X}_{T'\subset B'}$ (voir (1.17)). Il en résulte

$$H_c^i(\widetilde{X}_{T\subset B} \times \widetilde{X}_{T'\subset B'})(-d) \simeq H_c^{i+2d}(S_{T\subset B} \times S_{T'\subset B'}),$$

où d est la dimension de $(U \cap FU) \times (U' \cap FU')$. Cet isomorphisme est compatible avec l'action de $G^F \times T^F \times T'^F$; en outre, ce groupe agit trivialement sur $\overline{\mathbb{Q}}_l(-d)$. Il suffit donc de démontrer que

$$H_c^*(S_{T\subset B} \times S_{T'\subset B'})_{\theta,\theta'}^{G^F} = H_c^*((S_{T\subset B} \times S_{T'\subset B'})/G^F)_{\theta,\theta'} = 0.$$

L'application

$$(g, g') \longmapsto (x, x', y), \qquad x = g^{-1}Fg, \quad x' = g'^{-1}Fg', \quad y = g^{-1}g',$$

définit un isomorphisme de $(S_{T\subset B} \times S_{T'\subset B'})/G^F$ sur

$$\bar{S} = \{(x, x', y) \in FU \times FU' \times G \mid xF(y) = yx'\}.$$

Sous cet isomorphisme, $T^F \times T'^F$ agit sur $\bar{S}$ par la formule

$$(x, x', y) \longmapsto (t^{-1}xt, t'^{-1}x't', t^{-1}yt'), \qquad (t, t') \in T^F \times T'^F. \tag{6.6.1}$$

Soit U'^- l'opposé de U' relativement à T'. Tout $g \in G$ s'écrit de manière unique sous la forme $g = u_g n_g u'_g$, avec $u_g \in U \cap n_g U'^- n_g^{-1}$, $n_g \in N(T, T')$ (voir (6.1)) et $u'_g \in U'$; cela résulte aisément du lemme de Bruhat. Pour tout $w \in W(T, T')$, soit G_w l'ensemble des $g \in G$ tels que n_g représente w. Alors $(G_w)_{w\in W(T,T')}$ est une partition finie de G en sous-schémas localement fermés. Elle possède la propriété (6.6.2) ci-dessous, qui exprime que l'adhérence d'une cellule de Bruhat est une réunion de cellules de Bruhat.

(6.6.2.) Pour un ordre convenable sur $W(T, T')$, les réunions

$$\Sigma_w = \bigcup_{w'<w} G_{w'}$$

sont fermées.

Soit $\bar{S}_w = \{(x, x', y) \in \bar{S} \mid y \in G_w\}$. Alors $(\bar{S}_w)_{w\in W(T,T')}$ est une partition finie de $\bar{S}$ en sous-schémas localement fermés, stable sous $T^F \times T'^F$. Elle hérite d'une propriété analogue à (6.6.2), à savoir que les réunions $\bigcup_{w'<w} \bar{S}_{w'}$ sont fermées pour tout w.

La suite spectrale associée à la filtration de $\bar{S}$ par ces réunions montre que, pour prouver $H_c^*(\bar{S})_{\theta,\theta'} = 0$, il suffit de prouver $H_c^*(\bar{S}_w)_{\theta,\theta'} = 0$ pour tout $w \in W(T, T')$.

Soit

$$H_w = \{(t, t') \in T \times T' \mid t'F(t')^{-1} = F(\dot{w})^{-1}tF(t)^{-1}F(\dot{w})\},$$

où $\dot{w} \in N(T, T')$ représente w. Alors H_w est un sous-groupe fermé de $T \times T'$, contenant $T^F \times T'^F$. Définissons une action de H_w sur $\bar{S}_w$ comme suit. Soit $(t, t') \in H_w$; pour $(x, x', y) \in \bar{S}_w$, définissons

$$f_{t,t'}(x,x',y) = (\tilde{x},\tilde{x}',\tilde{y}),$$

où

$$\begin{aligned}\tilde{x} &= t^{-1}xF(u_y)tF(t^{-1}u_y^{-1}t),\\ \tilde{x}' &= t'^{-1}x'F(u_y')^{-1}t'F(t'^{-1}u_y't'),\\ \tilde{y} &= t^{-1}yt'.\end{aligned}$$

On vérifie aisément que $(\tilde{x},\tilde{x}',\tilde{y}) \in \bar{S}_w$, donc $f_{t,t'} : \bar{S}_w \longrightarrow \bar{S}_w$. On vérifie aussi aisément que

$$f_{t_1,t_1'} \circ f_{t_2,t_2'} = f_{t_1t_2,t_1't_2'}$$

pour $(t_i,t_i') \in H_w$, $i = 1,2$; ainsi $f_{t,t'}$ définit une action de H_w sur $\bar{S}_w$. Il est clair que cette action prolonge l'action (6.6.1) de $T^F \times T'^F$ sur $\bar{S}_w$. Le théorème résulte alors de 6.5 et du

LEMME 6.7. Si le caractère $\theta\theta'$ de $T^F \times T'^F$ est trivial sur $H_w^0 \cap (T^F \times T'^F)$, alors $\theta'^{-1} = \theta \circ \mathrm{ad}(F(w))$ (comme caractères de $Y(T')$).

Le sous-groupe H_w de $T \times T'$ est le noyau de l'application composée

$$T \times T' \xrightarrow{x^{-1}Fx} T \times T' \xrightarrow{t^{-1}\,\mathrm{ad}\,F(w)(t')} T.$$

En appliquant le foncteur Y, on obtient que $Y(H_w^0)$ est le noyau K de

$$Y(T) \times Y(T') \xrightarrow{Fx-x} Y(T) \times Y(T') \xrightarrow{\mathrm{ad}\,F(w)(x')-x} Y(T).$$

D'après (5.29), la trivialité de $\theta\theta'$ sur $H_w^0 \cap (T^F \times T'^F)$ signifie que, si l'on considère $\theta\theta'$ comme un caractère de $Y(T) \times Y(T')$, il est trivial sur

$$(F-1)(K \otimes \mathbb{Q}) \cap (Y(T) \times Y(T')).$$

Puisque l'application $F-1$ est injective, cette intersection est

$$\mathrm{Ker}(\mathrm{ad}\,F(w)(x') - x : Y(T) \times Y(T') \longrightarrow Y(T)),$$

et l'hypothèse devient la trivialité de $\theta\theta'$ sur $\mathrm{Ker}(\mathrm{ad}\,F(w)(x') - x)$, c'est-à-dire l'identité

$$\theta \circ \mathrm{ad}\,F(w)(\theta') = 1.$$

Nous allons maintenant conjuguer (6.2) avec la formule des caractères (4.2) afin d'obtenir des résultats quantitatifs.

THÉORÈME 6.8. Soient $\theta \in (T^F)^\vee$, $\theta' \in (T'^F)^\vee$. Alors

$$\langle R_T^\theta, R_{T'}^{\theta'} \rangle_{G^F} = \#\{w \in W(T,T')^F \mid \mathrm{ad}\,w(\theta') = \theta\}.$$

THÉORÈME 6.9.

$$\frac{1}{|G^F|} \sum_{\substack{u \in G^F \\ \text{unipotent}}} Q_{T,G}(u) Q_{T',G}(u) = \frac{|N(T,T')^F|}{|T^F|\,|T'^F|}. \tag{6.9.1}$$

Nous démontrerons simultanément (6.8) et (6.9), par récurrence sur la dimension de G.

LEMME 6.10. Si (6.9) est vraie pour G remplacé par $Z^0(s)$, où $s \in G^F$ est un élément semi-simple quelconque qui n'appartient pas au centre Z de G, alors

$$\langle R_T^\theta, R_{T'}^{\theta'} \rangle_{G^F} = \#\{w \in W(T,T')^F \mid \mathrm{ad}\,w(\theta') = \theta\} + \alpha \tag{6.10.1}$$

où

$$\alpha = \sum_{s\in T^F\cap Z}\theta(s)\theta'(s^{-1})\left(\frac{1}{|G^F|}\sum_{\substack{u\in G^F\\ \text{unipotent}}} Q_{T,G}(u)Q_{T',G}(u) - \frac{|N(T,T')^F|}{|T^F|\,|T'^F|}\right).$$

En particulier, (6.9) implique (6.8).

D'après (4.2), on a :

$$\begin{aligned}\langle R_T^\theta, R_{T'}^{\theta'}\rangle &= \frac{1}{|G^F|}\sum_{g_1\in G^F}\operatorname{Tr}(g_1, R_T^\theta)\operatorname{Tr}(g_1^{-1}, R_{T'}^{\theta'})\\ &= \frac{1}{|G^F|}\sum_{\substack{s\in G^F\\ \text{semi-sim.}}}\frac{1}{|Z^0(s)^F|^2}\sum_{\substack{g,g'\in G^F\\ g^{-1}sg\in T^F\\ g'^{-1}sg'\in T'^F}}\theta(g^{-1}sg)\theta'(g'^{-1}sg')^{-1}\\ &\qquad\times\sum_{\substack{u\in Z^0(s)^F\\ \text{unipotent}}} Q_{gTg^{-1},Z^0(s)}(u)Q_{g'T'g'^{-1},Z^0(s)}(u).\end{aligned}$$

Sous notre hypothèse, cela peut s'écrire

$$\alpha + \frac{1}{|G^F|}\sum_{\substack{s\in G^F\\ \text{semi-sim.}}}\frac{1}{|Z^0(s)^F|}\sum_{\substack{g,g'\in G^F\\ g^{-1}sg\in T^F\\ g'^{-1}sg'\in T'^F}}\theta(g^{-1}sg)\theta'(g'^{-1}sg')^{-1}\times\frac{|N_{Z^0(s)}(gTg^{-1}, g'T'g'^{-1})^F|}{|T^F|\,|T'^F|}.$$

La formule $(g,g',n_1)\longmapsto(g,n,n_1)$, $n=g'^{-1}n_1g$, établit une correspondance biunivoque entre les ensembles

$$\{(g,g',n_1)\in G^F\times G^F\times G^F \mid g^{-1}sg\in T^F,\ g'^{-1}sg'\in T'^F,\ n_1\in N_{Z^0(s)}(gTg^{-1}, g'T'g'^{-1})^F\},$$

$$\{(g,n,n_1)\in G^F\times N_G(T,T')^F\times Z^0(s)^F \mid g^{-1}sg\in T^F\}.$$

Il en résulte

$$\begin{aligned}\langle R_T^\theta, R_{T'}^{\theta'}\rangle &= \alpha + \frac{1}{|G^F|}\sum_{\substack{s\in G^F\\ \text{semi-sim.}}}\frac{1}{|Z^0(s)^F|}\sum_{\substack{g\in G^F\\ n\in N_G(T,T')^F\\ g^{-1}sg\in T^F}}\theta(g^{-1}sg)\theta'(ng^{-1}sgn^{-1})^{-1}\frac{|Z^0(s)^F|}{|T^F|\,|T'^F|}\\ &= \alpha + \frac{1}{|G^F|}\sum_{\substack{t\in T^F\\ n\in N_G(T,T')^F}}\theta(t)\theta'(ntn^{-1})^{-1}\frac{|G^F|}{|T^F|\,|T'^F|}\\ &= \alpha + \frac{1}{|T'^F|}\sum_{n\in N_G(T,T')^F}\frac{1}{|T^F|}\sum_{t\in T^F}\theta(t)\theta'(ntn^{-1})^{-1}\\ &= \alpha + \#\{w\in W(T,T')^F \mid \operatorname{ad} w(\theta')=\theta\},\end{aligned}$$

et (6.10.1) est démontrée.

Preuve de 6.9. Soit $\bar G = G/Z$; le centre de $\bar G$ se réduit à l'élément neutre. Les deux membres de (6.9.1) restent inchangés lorsque G est remplacé par $\bar G$; pour

le membre de gauche, cela résulte de (4.1.1), tandis que, pour le membre de droite, cela se vérifie aisément. Pour démontrer (6.9), on peut donc supposer que le centre de G se réduit à un seul élément ; on peut en outre supposer par récurrence que la conclusion de (6.9) est vraie pour G remplacé par $Z^0(s)$, où $s \in G^F$ est un élément semi-simple non central quelconque, et pour deux tores maximaux F-stables quelconques de $Z^0(s)$. (Pour amorcer la récurrence, on peut prendre pour G le groupe réduit à un seul élément, auquel cas (6.9) est claire.) Il résulte de (6.3) que, pour tout caractère non trivial θ de T^F,

$$\langle R_T^\theta, R_{T'}^1 \rangle = 0.$$

En reportant cette information dans (6.10), on voit que, si T^F possède un caractère non trivial, alors $\alpha = 0$, ce qui démontre (6.9). Un argument analogue s'applique lorsque $|T'^F| \neq 1$. Il reste à examiner le cas particulier où $|T^F| = |T'^F| = 1$. Dans ce cas, on doit avoir $q = 2$, et T, T' doivent être des tores déployés sur $\mathbb{F}_q$. En particulier, T et T' sont conjugués sous G^F, donc

$$\#\{w \in W(T,T')^F \mid \operatorname{ad} w(\theta') = \theta\} = |W(T)^F| = |W(T)|.$$

De plus, R_T^1 et $R_{T'}^1$ sont tous deux égaux à la représentation de G^F induite par la représentation unité de B^F, où B est un sous-groupe de Borel F-stable de G. Il s'ensuit que

$$\langle R_T^1, R_{T'}^1 \rangle = |B^F \backslash G^F / B^F| = |W(T)|. \tag{1.10}$$

En substituant dans (6.10), on obtient (6.9) dans ce cas. Cela achève la démonstration de (6.9) (et de (6.8) par (6.10)).

7. Calculs sur les éléments semi-simples

Le résultat suivant décrit la caractéristique d'Euler du schéma $X_{T\subset B}$. Soit $\sigma(G)$ (resp. $\sigma(T)$) le rang sur $\mathbb{F}_q$ de G (resp. de T).

THÉORÈME 7.1.

$$\chi(X_{T\subset B}) = Q_{T,G}(e) = (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} \frac{|G^F|}{\mathrm{St}_G(e)|T^F|}.$$

(Ici St_G est la représentation de Steinberg de G^F, identifiée à son caractère.)

On peut supposer que le centre de G se réduit à un seul élément et que l'énoncé est vrai lorsque G est remplacé par $Z^0(s)$, où $s \in G^F$ est un élément semi-simple non central quelconque.

Supposons d'abord que T^F possède un caractère non trivial θ. La représentation de Steinberg intervient dans

$$R_{T^*}^1 = \mathrm{Ind}_{B^{*F}}^{G^F}(1)$$

($T^* \subset B^*$ comme en 1.8) ; par (6.3), elle n'intervient donc pas dans R_T^θ : $\langle R_T^\theta, \mathrm{St}_G \rangle = 0$. On sait que

$$\mathrm{St}_G(g) = \begin{cases} (-1)^{\sigma(G)-\sigma(Z^0(g))}\, \mathrm{St}_{Z^0(g)}(e), & g \in G^F \text{ semi-simple}, \\ 0, & g \in G^F \text{ non semi-simple}. \end{cases}$$

En utilisant 4.2, il vient :

$$\sum_{s\in G^F}(-1)^{\sigma(G)-\sigma(Z^0(s))}\frac{\mathrm{St}_{Z^0(s)}(e)}{|Z^0(s)^F|}\sum_{\substack{g\in G^F\\ g^{-1}sg\in T}}Q_{gTg^{-1},Z^0(s)}(e)\theta(g^{-1}sg)=0$$

(somme sur les éléments semi-simples s de G^F).

D'après notre hypothèse, on peut substituer

$$Q_{gTg^{-1},Z^0(s)}(e)=(-1)^{\sigma(Z^0(s))-\sigma(T)}\frac{|Z^0(s)^F|}{\mathrm{St}_{Z^0(s)}(e)|T^F|},$$

pour tout $s\neq e$:

$$\frac{(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}}{|T^F|}\sum_{\substack{s\in G^F\\ s\neq e}}\sum_{\substack{g\in G^F\\ g^{-1}sg\in T^F}}\theta(g^{-1}sg)+\mathrm{St}_G(e)Q_{T,G}(e)=0,$$

$$(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}\frac{|G^F|}{|T^F|}\sum_{\substack{t\in T^F\\ t\neq e}}\theta(t)+\mathrm{St}_G(e)Q_{T,G}(e)=0.$$

Puisque le caractère θ est non trivial, $\sum_{t\in T^F}\theta(t)=0$, et la formule cherchée pour $Q_{T,G}(e)$ en résulte.

Dans le cas où $|T^F|=1$, T doit être un tore déployé sur $\mathbb{F}_q$ et $q=2$. Dans ce cas, $Q_{T,G}(e)=|G^F|/|B^{*F}|$, où B^* est un sous-groupe de Borel F-stable quelconque (1.8). Cela concorde avec l'énoncé du théorème et achève la démonstration.

COROLLAIRE 7.2. Pour tout élément semi-simple $s\in G^F$,

$$\mathrm{Tr}(s,R_T^\theta)=(-1)^{\sigma(Z^0(s))-\sigma(T)}\frac{1}{\mathrm{St}_{Z^0(s)}(e)|T^F|}\sum_{\substack{g\in G^F\\ g^{-1}sg\in T^F}}\theta(g^{-1}sg).$$

Cela résulte de (7.1) et de 4.2. Un énoncé équivalent est :

PROPOSITION 7.3.

$$(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}R_T^\theta\otimes\mathrm{St}_G=\mathrm{Ind}_{T^F}^{G^F}(\theta).$$

PROPOSITION 7.4. Si θ est un caractère non singulier de T^F (5.19), alors $(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}R_T^\theta$ peut être représenté par un véritable G^F-module. Si θ est en position générale (5.15), $(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}R_T^\theta$ est irréductible.

En plongeant G dans un groupe G_1 à centre connexe et ayant le même groupe dérivé, comme en (5.18), on se ramène au cas où θ est en position générale. Il reste à utiliser (6.8) et (7.1).

PROPOSITION 7.5. Soit $s\in G^F$ un élément semi-simple. Le caractère de

$$\frac{1}{\mathrm{St}_G(s)}\sum_{\substack{T\\ s\in T}}\sum_{\theta\in(T^F)^\vee}\theta(s)^{-1}(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}R_T^\theta \tag{7.5.1}$$

vaut $|Z(s)^F|$ sur les éléments conjugués à s dans G^F, et zéro sur tous les autres éléments de G^F.

Soit μ le caractère de (7.5.1), et soit μ' la fonction centrale sur G^F définie par

$$\mu'(g) = \begin{cases} |Z(s)^F|, & g \text{ conjugué à } s \text{ dans } G^F, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Pour démontrer que $\mu = \mu'$, il suffit de montrer que

$$\langle \mu, \mu \rangle = \langle \mu, \mu' \rangle = \langle \mu', \mu' \rangle \qquad \text{(voir (0.3))}.$$

On a $\langle \mu', \mu' \rangle = |Z(s)^F|$; d'après (6.8),

$$\begin{aligned} \langle \mu, \mu \rangle &= \frac{1}{\mathrm{St}_G(s)^2} \sum_{\substack{T \ni s \\ T' \ni s}} \sum_{\substack{\theta \in (T^F)^\vee \\ \theta' \in (T'^F)^\vee}} \theta(s^{-1})\theta'(s) \#\{n \in N(T,T')^F \mid \mathrm{ad}\, n(\theta') = \theta\} |T^F|^{-1} \\ &= \frac{1}{\mathrm{St}_G(s)^2} \sum_{\substack{T \ni s \\ \theta \in (T^F)^\vee \\ n \in G^F \\ nsn^{-1} \in T}} \theta(s^{-1})\theta(nsn^{-1}) |T^F|^{-1} \\ &= \frac{1}{\mathrm{St}_G(s)^2} \#\{T \ni s,\ n \in G^F \mid sn = ns\} \\ &= \frac{|Z(s)^F|}{\mathrm{St}_G(s)^2} \#\{\text{tores maximaux } F\text{-stables de } Z^0(s)\} = |Z(s)^F| \end{aligned}$$

(d'après [15, cor. 14.16]).

Par (7.2), on a

$$\begin{aligned} \langle \mu, \mu' \rangle = \mu(s) &= \frac{1}{\mathrm{St}_G(s)} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \theta(s^{-1}) \frac{(-1)^{\sigma(G)-\sigma(Z^0(s))}}{\mathrm{St}_{Z^0(s)}(e) |T^F|} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} \theta(g^{-1}sg) \\ &= \frac{1}{\mathrm{St}_G(s)^2} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} \sum_{\substack{g \in G^F \\ g^{-1}sg \in T^F}} |T^F|^{-1} \theta(s^{-1})\theta(g^{-1}sg) \\ &= \frac{1}{\mathrm{St}_G(s)^2} \#\{T \ni s,\ g \in G^F \mid sg = gs\} \\ &= \frac{|Z(s)^F|}{\mathrm{St}_G(s)^2} \#\{\text{tores maximaux } F\text{-stables de } Z^0(s)\} = |Z(s)^F|, \end{aligned}$$

et la proposition est démontrée.

COROLLAIRE 7.6. Pour tout $\rho \in \mathscr{R}(G^F)$ et tout élément semi-simple $s \in G^F$,

$$\mathrm{Tr}(s, \rho) = \frac{1}{\mathrm{St}_G(s)} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \theta(s)(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} \langle \rho, R_T^\theta \rangle. \tag{7.6.1}$$

En particulier, si $s \in G^F$ est semi-simple régulier et contenu dans un tore unique T,

$$\mathrm{Tr}(s, \rho) = \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} \theta(s) \langle \rho, R_T^\theta \rangle, \tag{7.6.2}$$

$$\dim \rho = \frac{1}{\mathrm{St}_G(e)} \sum_{T} \sum_{\theta \in (T^F)^\vee} (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} \langle \rho, R_T^\theta \rangle. \tag{7.6.3}$$

COROLLAIRE 7.7. Pour toute représentation irréductible ρ de G^F, il existe un tore maximal F-stable T et un caractère θ de T^F tels que $\langle \rho, R_T^\theta \rangle \neq 0$.

Cela résulte de (7.6.3).

DÉFINITION 7.8. Une représentation irréductible ρ de G^F est dite unipotente si $\langle \rho, R_T^1 \rangle \neq 0$ pour un certain tore maximal F-stable T.

D'après (6.3) et (7.7), ρ est unipotente si et seulement si $\langle \rho, R_T^\theta \rangle = 0$ pour tout tore maximal F-stable T et tout $\theta \in (T^F)^\vee$, $\theta \neq 1$. Par exemple, toute composante irréductible de $\mathrm{Ind}_{B^{*F}}^{G^F}(1)$ (B^{*F} étant un sous-groupe de Borel F-stable) est une représentation unipotente. Pour les représentations unipotentes, (7.6) devient :

PROPOSITION 7.9. Soit ρ une représentation unipotente de G^F, et soit $s \in G^F$ un élément semi-simple. Alors

$$\mathrm{Tr}(s, \rho) = \frac{1}{\mathrm{St}_G(s)} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} \langle \rho, R_T^1 \rangle.$$

En particulier, si $s \in G^F$ est semi-simple régulier et contenu dans un tore maximal unique T, $\mathrm{Tr}(s, \rho) = \langle \rho, R_T^1 \rangle$ et

$$\dim \rho = \frac{1}{\mathrm{St}_G(e)} \sum_{T} (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} \langle \rho, R_T^1 \rangle.$$

Il s'ensuit que, si B est un sous-groupe de Borel F-stable de G et si T est un tore maximal F-stable de B, on a $\mathrm{Tr}(s, \rho) = \langle \rho, \mathrm{Ind}_{B^F}^{G^F}(1) \rangle$; lorsque $\langle \rho, \mathrm{Ind}_{B^F}^{G^F}(1) \rangle \neq 0$, il s'agit d'un résultat de Curtis, Kilmoyer et Seitz (voir C. W. Curtis, On the Values of Certain Irreducible Characters of Finite Chevalley Groups, Ist. Naz. di Alta Mat. Symp. Mat. XIII, 1974, 343–355).

PROPOSITION 7.10. Soit G^{ad} le groupe adjoint de G. Alors la restriction à G^F d'une représentation unipotente de $(G^{\mathrm{ad}})^F$ est irréductible ; des représentations unipotentes non isomorphes ont des restrictions non isomorphes ; et toute représentation unipotente de G est une telle restriction.

Il suffit de vérifier que, si σ, τ sont des représentations unipotentes de $(G^{\mathrm{ad}})^F$, alors $\langle \sigma, \tau \rangle_{G^{\mathrm{ad}}F} = \langle \sigma, \tau \rangle_{G^F}$. Soit G_1 l'image de G^F dans $(G^{\mathrm{ad}})^F$. On a

$$\begin{aligned} \langle \sigma, \tau \rangle_{G^F} = \langle \sigma, \tau \rangle_{G_1} &= \left\langle \mathrm{Ind}_{G_1}^{G^{\mathrm{ad}}F}(\mathrm{Res}\, \sigma), \tau \right\rangle_{G^{\mathrm{ad}}F} \\ &= \sum_{\theta \in (G^{\mathrm{ad}}F/G_1^F)^\vee} \langle \sigma \otimes \theta, \tau \rangle_{G^{\mathrm{ad}}F}. \end{aligned}$$

Par le théorème d'exclusion 6.3 et (1.23), (1.27), $\langle \sigma \otimes \theta, \tau \rangle_{G^{\mathrm{ad}}F} = 0$ pour $\theta \neq 1$, d'où la proposition.

PROPOSITION 7.11. Soit ρ une représentation virtuelle de G^F telle que $\mathrm{Tr}(su, \rho) = \mathrm{Tr}(s, \rho)$ pour tout $s \in G^F$ semi-simple, tout $u \in G^F$ unipotent, avec $su = us$. Soit T un tore maximal F-stable et soit θ un caractère de T. Alors

$$\langle \rho, R_T^\theta \rangle_{G^F} = (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} \langle \rho \otimes \mathrm{St}_G, R_T^\theta \rangle_{G^F} = \langle \rho, \theta \rangle_{T^F}.$$

Le caractère de Steinberg est à valeurs entières ; par (7.3),

$$(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}\langle \rho\otimes \mathrm{St}_G, R_T^\theta\rangle_{G^F} = \langle \rho, (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}\,\mathrm{St}_G \otimes R_T^\theta\rangle_{G^F} = \langle \rho, \mathrm{Ind}_{T^F}^{G^F}(\theta)\rangle_{G^F} = \langle \rho,\theta\rangle_{T^F}.$$

Nous démontrons maintenant l'identité

$$\langle \rho, R_T^\theta\rangle_{G^F} = \langle \rho,\theta\rangle_{T^F}. \tag{7.11.1}$$

Le cas particulier de cette identité

$$\langle 1, R_T^1\rangle_{G^F} = 1 \tag{7.11.2}$$

résulte du fait que la caractéristique d'Euler de $X_{T\subset B}/G^F$ (qui est la même que la caractéristique d'Euler de

$$\{g\in G \mid g^{-1}Fg\in FU\}/G^F\times T^F = FU/T^F$$

d'après (1.17)) est égale à 1. Si l'on utilise (4.2), (7.11.2) peut s'écrire sous la forme

$$\frac{1}{|G^F|}\sum_{\substack{s\in G^F\\ \text{semi-simple}}}\frac{1}{|Z^0(s)^F|}\sum_{\substack{g\in G^F\\ g^{-1}sg\in T^F}}\sum_{\substack{u\in Z^0(s)^F\\ \text{unipotent}}} Q_{gTg^{-1},Z^0(s)}(u) = 1. \tag{7.11.3}$$

Cela implique, par récurrence sur la dimension de G, que

$$\frac{1}{|G^F|}\sum_{\substack{u\in G^F\\ \text{unipotent}}} Q_{T,G}(u) = \frac{1}{|T^F|}. \tag{7.11.4}$$

En effet, en substituant (7.11.4) dans (7.11.3), on obtient une identité vraie :

$$\frac{1}{|G^F|}\sum_{\substack{s\in G^F\\ \text{semi-simple}}}\frac{1}{|T^F|}\#\{g\in G^F \mid g^{-1}sg\in T^F\} = 1.$$

Nous appliquons de nouveau (4.2) et utilisons (7.11.4) pour calculer :

$$\begin{aligned}\langle \rho, R_T^\theta\rangle_{G^F} &= \frac{1}{|G^F|}\sum_{\substack{s\in G^F\\ \text{semi-simple}}}\frac{1}{|Z^0(s)^F|}\sum_{\substack{g\in G^F\\ g^{-1}sg\in T^F}}\sum_{\substack{u\in Z^0(s)^F\\ \text{unipotent}}} Q_{gTg^{-1},Z^0(s)}(u)\theta(g^{-1}sg)^{-1}\,\mathrm{Tr}(s,\rho)\\ &= \frac{1}{|G^F|}\sum_{\substack{s\in G^F\\ \text{semi-simple}}}\sum_{\substack{g\in G^F\\ g^{-1}sg\in T^F}}\frac{1}{|T^F|}\theta(g^{-1}sg)^{-1}\,\mathrm{Tr}(s,\rho)\\ &= \frac{1}{|G^F|}\sum_{t\in T^F}\theta(t)^{-1}\,\mathrm{Tr}(t,\rho) = \langle \rho,\theta\rangle_{T^F}.\end{aligned}$$

PROPOSITION 7.12. Soit ρ comme en (7.11). Alors

$$\rho = \sum_{(T)}\frac{1}{|W(T)^F|}\sum_{\theta\in(T^F)^\vee}\langle \rho,\theta\rangle_{T^F}R_T^\theta, \tag{7.12.1}$$

$$\rho\otimes \mathrm{St}_G = \sum_{(T)}\frac{(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}}{|W(T)^F|}\sum_{\theta\in(T^F)^\vee}\langle \rho,\theta\rangle_{T^F}R_T^\theta, \tag{7.12.2}$$

où $\sum_{(T)}$ désigne la somme sur toutes les classes de conjugaison sous G^F de tores maximaux F-stables T.

Le caractère de $\rho\otimes \mathrm{St}_G$ est une combinaison linéaire de la forme $\sum_{(T,\theta)} c_{T,\theta}R_T^\theta$ (somme sur toutes les classes de conjugaison sous G^F de couples (T,θ)). Les coefficients $c_{T,\theta}$ sont

déterminés par (7.11), et (7.12.2) s'ensuit.

Soit maintenant ρ' (resp. ρ'') le membre de droite de (7.12.1) (resp. de (7.12.2)). On a clairement

$$\langle \rho', \rho' \rangle = \langle \rho'', \rho'' \rangle \tag{7.12.3}$$

et, d'après (7.11),

$$\langle \rho, \rho' \rangle = \langle \rho \otimes \mathrm{St}_G, \rho'' \rangle. \tag{7.12.4}$$

Notons aussi que

$$\langle \rho, \rho \rangle = \langle \rho \otimes \mathrm{St}_G, \rho \otimes \mathrm{St}_G \rangle. \tag{7.12.5}$$

Cela résulte du fait que le nombre d'éléments unipotents de $Z^0(s)^F$ est égal à $\mathrm{St}_G(s)^2$ pour tout élément semi-simple $s \in G^F$ (voir [15, Thm. 15.1]). D'après (7.12.2), on a

$$\langle \rho \otimes \mathrm{St}_G - \rho'', \rho \otimes \mathrm{St}_G - \rho'' \rangle = 0.$$

Ceci, joint à (7.12.3), (7.12.4) et (7.12.5), implique :

$$\langle \rho - \rho', \rho - \rho' \rangle = 0,$$

donc

$$\rho = \rho'.$$

Remarque 7.13. On sait que

$$\langle \rho, \rho \rangle_{G^F} = \sum_{(T)} \frac{1}{|W(T)^F|} \langle \rho, \rho \rangle_{T^F}$$

(N. Kawanaka, A theorem on finite Chevalley groups, Osaka J. Math. 10 (1973), 1–13) ; cela pourrait aussi se déduire de (7.12.1) et (6.8).

COROLLAIRE 7.14.

$$1 = \sum_{(T)} \frac{1}{|W(T)^F|} R_T^1. \tag{7.14.1}$$

$$\mathrm{St}_G = \sum_{(T)} \frac{(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}}{|W(T)^F|} R_T^1. \tag{7.14.2}$$

En particulier,

$$\langle \mathrm{St}_G, R_T^1 \rangle = (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}.$$

Voici une autre démonstration de (7.14.1). Dans le langage de (1.4), (7.14.1) affirme que

$$\sum_{w \in W} R^1(w) = |W| \, 1.$$

Comme $(X(w))_{w \in W}$ est une partition de la variété des drapeaux en sous-schémas localement fermés, on a

$$\sum_{w\in W} R^1(w) = \sum_i (-1)^i H_c^i(X_G)$$

comme représentations virtuelles de G^F. L'action de G^F sur X_G est la restriction de l'action du groupe connexe G ; d'après (6.5), G^F agit trivialement sur $H_c^*(X_G)$, et il reste à utiliser le fait que la caractéristique d'Euler de X_G est égale à $|W|$.

COROLLAIRE 7.15.

$$\mathrm{St}_G = \sum_{(T)} \frac{(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}}{|W(T)^F|} \mathrm{Ind}_{T^F}^{G^F}(1), \tag{7.15.1}$$

$$\mathrm{St}_G \otimes \mathrm{St}_G = \sum_{(T)} \frac{1}{|W(T)^F|} \mathrm{Ind}_{T^F}^{G^F}(1). \tag{7.15.2}$$

Cela résulte de (7.1), en tensorisant par St_G et en utilisant (7.3). La formule (7.15.1) est due à B. Srinivasan (On the Steinberg character of a finite simple group of Lie type, J. Australian Math. Soc. 12 (1971), 1–14).

8. Représentations induites et cuspidales

8.1. Soit P un sous-groupe parabolique F-stable de G, et soit $T \subset P$ un tore maximal F-stable. Nous désignons par U_P le radical unipotent de P. Le groupe quotient P/U_P est un groupe algébrique réductif connexe sur lequel F agit. Soit $\pi : P \to P/U_P$ la projection canonique. π induit un isomorphisme $T \xrightarrow{\sim} \pi(T)$, donc aussi un isomorphisme $T^F \xrightarrow{\sim} \pi(T)^F$. Soit θ un caractère de T^F, et soit $\tilde{\theta}$ le caractère correspondant de $\pi(T)^F$. Nous désignons par $R_{T,P}^{\theta}$ l'image de la représentation virtuelle $R_{\pi(T)}^{\tilde{\theta}}$ de $(P/U_P)^F$ par l'inclusion canonique $\mathscr{R}((P/U_P)^F) \subset \mathscr{R}(P^F)$. Avec ces notations, on a la généralisation suivante de 1.10 :

PROPOSITION 8.2.

$$R_T^{\theta} = \mathrm{Ind}_{P^F}^{G^F}(R_{T,P}^{\theta}).$$

Choisissons dans G un sous-groupe de Borel B tel que $T \subset B \subset P$. Soit $\mathscr{P}$ l'ensemble de tous les sous-groupes paraboliques P' de G tels que P' et P soient conjugués sous G^F ; cet ensemble est fini. On a

$$\widetilde{X}_{T\subset B} = \coprod_{P'\in\mathscr{P}} \widetilde{X}(P')$$

où

$$\widetilde{X}(P') = \{g \in G \mid g^{-1}Fg \in FU,\ gPg^{-1} = P'\}/U \cap FU,$$

U étant le radical unipotent de B.

(Notons que $g^{-1}F(g) \in FU$ implique $F(gPg^{-1}) = gPg^{-1}$.) Soit $P' \in \mathscr{P}$, et soit $g_1 \in G^F$ tel que $g_1 P g_1^{-1} = P'$. Si $g \in G$, $g^{-1}F(g) \in FU$, $gPg^{-1} = P'$, on a

$$g_1^{-1}g \in P, \qquad (g_1^{-1}g)^{-1}F(g_1^{-1}g) \in FU;$$

en envoyant g sur $\pi(g_1^{-1}g)$, on obtient un isomorphisme

$$\widetilde{X}(P') \xrightarrow{\sim} \widetilde{X}_{\pi(T)\subset\pi(B)}.$$

Il en résulte aisément que le G^F-module $H_c^i(\widetilde{X}_{T\subset B})$ est canoniquement isomorphe au G^F-module induit par $H_c^i(\widetilde{X}_{\pi(T)\subset\pi(B)})$, considéré comme un P^F-module ; de plus, cet isomorphisme est compatible avec l'action de T^F. La proposition s'ensuit.

THÉORÈME 8.3. Soit T un tore maximal F-stable de G, qui ne soit contenu dans aucun sous-groupe parabolique propre et F-stable de G. Soit θ un caractère non singulier de T^F (cf. 5.19). Alors $(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}R_T^\theta$ peut être représentée par un G^F-module cuspidal.

En appliquant (7.5) avec s égal à l'élément neutre de G^F, on voit que la représentation régulière de G^F est égale à :

$$\mathrm{Ind}_e^{G^F}(1) = \frac{1}{\mathrm{St}_G(e)} \sum_T \sum_{\theta\in(T^F)^\vee} (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta.$$

Appliquons cette formule à P/U_P à la place de G (P étant comme en (8.1)) ; considérons ensuite la représentation régulière de $(P/U_P)^F$ comme une représentation de P^F sur laquelle U_P^F agit trivialement (c'est-à-dire comme $\mathrm{Ind}_{U_P^F}^{P^F}(1)$), puis induisons-la à G^F :

$$\begin{aligned}\mathrm{Ind}_{U_P^F}^{G^F}(1) &= \mathrm{Ind}_{P^F}^{G^F}\big(\mathrm{Ind}_{U_P^F}^{P^F}(1)\big)\\ &= \frac{1}{\mathrm{St}_{P/U_P}(e)} \sum_{T'\subset P/U_P} \sum_{\theta'\in(T'^F)^\vee} (-1)^{\sigma(P/U_P)-\sigma(T')} \mathrm{Ind}_{P^F}^{G^F}(R_{T'}^{\theta'}),\end{aligned}$$

où $R_{T'}^{\theta'}$ est considéré de manière naturelle comme un élément de $\mathscr{R}(P^F)$. Nous utilisons maintenant (8.2) et le fait que tout tore maximal F-stable T' de P/U_P se relève en un tore maximal F-stable T de P de précisément $|U_P^F|$ manières différentes :

$$\mathrm{Ind}_{U_P^F}^{G^F}(1) = \frac{1}{\mathrm{St}_G(e)} \sum_{T\subset P} \sum_{\theta\in(T^F)^\vee} (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta. \tag{8.3.1}$$

Si $P \neq G$ et si T est comme dans l'énoncé du théorème, il résulte de (8.3.1) et (6.8) que

$$\Big\langle (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} R_T^\theta, \mathrm{Ind}_{U_P^F}^{G^F}(1)\Big\rangle = 0 \qquad \text{pour tout } \theta \in (T^F)^\vee. \tag{8.3.2}$$

Si θ est non singulier, $(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}R_T^\theta$ peut être représentée par un G^F-module effectif (7.4). Ce G^F-module est cuspidal d'après (8.3.2).

9. Un théorème d'annulation

9.1. Soit G un groupe algébrique réductif sur k. Soit $w = s_1 \cdots s_n$ une expression minimale d'un élément du groupe de Weyl W de G (0.4). La désingularisation suivante de l'adhérence $\overline{O(w)}$ de $O(w) \subset X \times X$ (1.2) a été considérée par H. C. Hansen [6] et M. Demazure [3].

DÉFINITION 9.2. $\overline{O}(s_1, \dots, s_n)$ est l'espace des suites $(B_0, \dots, B_n)$ de

sous-groupes de Borel, B_{i-1} et B_i étant en position relative e ou s_i.

Les applications

$$\overline{O}(s_1,\dots,s_n) \longrightarrow \overline{O}(s_1,\dots,s_{n-1}) \longrightarrow \cdots \longrightarrow \overline{O}(\,) = X$$

expriment $\overline{O} = \overline{O}(s_1,\dots,s_n)$ comme un fibré itéré sur X, de fibre $\mathbb{P}^1$ (1.2). Le sous-espace $D_i \subset \overline{O}$, où $B_{i-1} = B_i$, est l'image réciproque d'une section de $\overline{O}(s_1,\dots,s_i) \to \overline{O}(s_1,\dots,s_{i-1})$; c'est un diviseur lisse, et $D = \bigcup D_i$ est un diviseur à croisements normaux. L'application $(B_0,\dots,B_n) \mapsto (B_0,B_n)$ induit un isomorphisme $\overline{O} - D \xrightarrow{\sim} O(w)$, et définit donc une application de $\overline{O}$ vers $\overline{O(w)} : \overline{O}$ est une résolution des singularités de $\overline{O(w)}$.

9.3. Soient T^*, B^* et U^* comme en (1.7). Pour tout caractère $\lambda : T^* \to \mathbb{G}_m$, le T^*-torseur E sur X, défini en (1.7), donne naissance à un fibré en droites E_λ, muni de $\lambda : E \to E_\lambda$ tel que $\lambda(et) = \lambda(e)\lambda(t)$. Pour $\dot{w} \in N(T^*)$, d'image w dans $W = N(T^*)/T^*$, la w-application de T^*-torseurs sur $O(w) \subset X \times X$, construite en (1.7), induit un isomorphisme

$$\Psi(\dot{w}) : \mathrm{pr}_1^* E_\lambda \xrightarrow{\sim} \mathrm{pr}_2^* E_{\lambda\circ \mathrm{ad}\,\dot{w}} = \mathrm{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}$$

qui rend commutatif le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_1^* E & \xrightarrow{\cdot\dot{w}} & \mathrm{pr}_2^* E \\ \lambda\downarrow & & \downarrow w^{-1}(\lambda) \\ \mathrm{pr}_1^* E_\lambda & \xrightarrow{\Psi(\dot{w})} & \mathrm{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}. \end{array}$$

Nous allons étudier son comportement à l'infini.

9.4. Soit $X(T^*)$ le groupe des caractères de T^*, et soit $C \subset X(T^*) \otimes \mathbb{R}$ la chambre fondamentale (correspondant à B^*). Si C_1 et C_2 sont deux chambres, nous notons $D(C_1,C_2)$ l'intersection des demi-espaces radiciels (fermés) contenant à la fois C_1 et C_2, et $D^0(C_1,C_2)$ son intérieur.

PROPOSITION 9.5. Soit $\overline{O(w)}'$ la normalisation de l'adhérence $\overline{O(w)}$ de $O(w)$ dans $X\times X$. L'application $\Psi(\dot{w}) : \mathrm{pr}_1^* E_\lambda \to \mathrm{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}$ se prolonge sur $\overline{O(w)}'$ si et seulement si $\lambda \in D(C,-wC)$. Elle s'annule hors de $O(w)$ si et seulement si $\lambda \in D^0(C,-wC)$.

Considérons $\Psi(\dot{w})$ comme une section rationnelle de $\mathrm{pr}_1^* E_{\lambda^{-1}} \otimes \mathrm{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}$; il suffit de montrer que, avec les notations de (9.2), pour chaque i, l'ordre ν_i de $\Psi(\dot{w})$ le long du diviseur $D_i \subset \overline{O}(s_1,\dots,s_n)$ est ≥ 0 pour $\lambda \in D(C,-wC)$, et > 0 pour $\lambda \in D^0(C,-wC)$. La région convexe $D(C,-wC)$ est l'intersection des demi-espaces radiciels qui contiennent C mais non wC. Posons $w_i = s_1 \cdots s_i$. La galerie $(C, w_1C, w_2C, \dots, wC)$ relie C à wC ; ses murs sont exactement les hyperplans radiciels qui séparent C et wC. Le mur entre $w_{i-1}C$ et w_iC est défini

par la racine $w_{i-1}(\alpha_i)$, où α_i est la racine simple correspondant à s_i ; C et $w_{i-1}C$ sont du même côté de ce mur. La région convexe $D(C, -wC)$ est donc définie par les inégalités

$$\langle \mu, H_{w_{i-1}(\alpha_i)} \rangle \geq 0.$$

(Rappelons que H_α désigne la coracine correspondant à une racine α, cf. (5.1).) Nous allons démontrer que

$$v_i = \langle \lambda, H_{w_{i-1}(\alpha_i)} \rangle. \tag{9.5.1}$$

Relevons la décomposition $w = (s_1 \cdots s_{i-1}) s_i (s_{i+1} \cdots s_n)$ en une décomposition $\dot{w} = \dot{w}_{i-1} \dot{s}_i \dot{w}_i'$ dans $N(T^*)$. On a

$$\Psi(\dot{w}) = \Psi(\dot{w}_i') \Psi(\dot{s}_i) \Psi(\dot{w}_{i-1}).$$

Lorsqu'on approche un point général de D_i, les isomorphismes $\Psi(\dot{w}_i')$ et $\Psi(\dot{w}_{i-1})$ se prolongent, et il reste à montrer que l'ordre le long de D_i de

$$\Psi(\dot{s}_i) \,:\, E_{w_{i-1}^{-1}(\lambda)} \longrightarrow E_{w_i^{-1}(\lambda)}$$

est

$$\langle \lambda, H_{w_{i-1}(\alpha_i)} \rangle = \langle w_{i-1}^{-1}(\lambda), H_{\alpha_i} \rangle;$$

on est ramené au cas où w est une réflexion fondamentale : tous les calculs ont lieu dans un sous-groupe parabolique minimal P, ou dans P/U_P, ou dans le groupe dérivé de P/U_P, ou dans son revêtement universel SL(2). Faisons une vérification directe pour $G = \mathrm{SL}(2)$, $w \neq e$, et λ le poids fondamental.

(a) Prenons SL(2) dans sa représentation évidente k^2, $T^* =$ le groupe des matrices diagonales, et $B^* =$ le groupe des matrices triangulaires supérieures. Le poids λ est

$$\begin{pmatrix} a & * \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} \longmapsto a, \qquad \text{et} \qquad \langle \lambda, H_\alpha \rangle = 1.$$

(b) $X = \mathbb{P}^1$, l'espace des droites homogènes de k^2, et la fibre de E_λ en x est la droite correspondante.

(c) À un scalaire près, $\Psi(\dot{w})$ associe à $u \in (E_\lambda)_x$ la forme linéaire $u \wedge v$ sur $(E_\lambda)_y$, pour $x \neq y$. Elle s'annule simplement lorsque $y \to x$.

9.6. Les hypothèses (0.1.1) sont désormais en vigueur. Sous les hypothèses de (1.8), on a

$$F^* E_\lambda = E_{F^*\lambda} \qquad (\text{où } F^*\lambda = \lambda \circ F).$$

Sur l'image réciproque $\overline{X(w)}'$ du graphe de l'application de Frobenius $F : X \to X$ dans $\overline{O(w)}'$, le fibré en droites $\mathrm{pr}_1^* E_{\lambda^{-1}} \otimes \mathrm{pr}_2^* E_{w^{-1}(\lambda)}$ est donc isomorphe à

$$\mathrm{pr}_1^* (E_{F^* w^{-1}\lambda - \lambda}).$$

Il sera ample si $E_{F^* w^{-1}\lambda - \lambda}$ est ample sur X, c'est-à-dire si $F^* w^{-1}\lambda - \lambda \in -C^0$. D'autre part,

si $\lambda \in D^0(C, -wC)$, la section $\Psi(\dot{w})$ de ce fibré a pour ensemble des zéros le complémentaire de $X(w)$ dans la variété projective $\overline{X(w)}'$. Si les deux conditions peuvent être satisfaites simultanément, alors $X(w)$ est affine. En termes de $\mu = -w^{-1}(\lambda)$, les conditions s'écrivent

$$\mu \in D^0(C, -w^{-1}C), \tag{9.6.1}$$

$$F^*\mu - w\mu \in C^0. \tag{9.6.2}$$

THÉORÈME 9.7. S'il existe $\mu \in X(T^*) \otimes \mathbb{R}$ satisfaisant (9.6.1) et (9.6.2), alors $X(w)$ est affine. Par conséquent, $X(w)$ est affine dès que q est plus grand que le nombre de Coxeter h de G.

Il reste à démontrer que, si $q \geq h$, un certain μ satisfait (9.6.1) et (9.6.2). La première condition sera satisfaite si $\mu \in C^0$, c'est-à-dire si $\langle \mu, H_\alpha \rangle > 0$ pour toute racine simple α. Nous choisissons μ de sorte que $\langle \mu, H_\alpha \rangle = 1$ pour toute racine simple α. On a alors $\langle F\mu, H_\alpha \rangle = q$, et $\langle w\mu, H_\alpha \rangle = \langle \mu, w^{-1}H_\alpha \rangle$. Si $H = \sum n_\alpha H_\alpha$ est la plus haute coracine, $\sum n_\alpha = h - 1$ et

$$\langle F\mu - w\mu, H_\alpha \rangle \geq q - \langle \mu, H \rangle = q - h + 1 > 0,$$

d'où (9.6.2).

THÉORÈME 9.8. Si le caractère $\theta : T(w)^F \to \overline{\mathbb{Q}}_l^*$ est non singulier, alors

$$H_c^*(\widetilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta \xrightarrow{\sim} H^*(\widetilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta.$$

COROLLAIRE 9.9. Si $X(w)$ est affine et si θ est non singulier, alors

$$H_c^i(\widetilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta = 0 \qquad \text{pour } i \neq l(w).$$

Déduisons (9.9) de (9.8). Avec les notations de (1.9), (9.8) signifie que

$$H_c^*(X(w), \mathscr{F}_\theta) \xrightarrow{\sim} H^*(X(w), \mathscr{F}_\theta). \tag{9.9.1}$$

Si $X(w)$ est affine, alors $H^i(X(w), \mathscr{F}_\theta) = 0$ pour $i > \dim X(w) = l(w)$ ([10, XIV, 3.2]). Le faisceau $\mathscr{F}_\theta$ est localement constant, son dual est $\mathscr{F}_{\theta^{-1}}$, et $X(w)$ est lisse et purement de dimension $l(w)$. Par dualité de Poincaré, $H_c^i(X(w), \mathscr{F}_\theta)$ est dual (à une torsion près) de $H^{2l(w)-i}(X(w), \mathscr{F}_{\theta^{-1}})$, donc s'annule lorsque $2l(w) - i > l(w)$, c'est-à-dire lorsque $i < l(w)$. Cela démontre le corollaire.

9.10. Construisons d'abord une bonne compactification de $X(w)$. Soit $w = s_1 \cdots s_n$ une expression minimale de w. Nous définissons $\overline{X}(s_1, \ldots, s_n)$ comme l'espace des suites $(B_0, \ldots, B_n)$ de sous-groupes de Borel de G, avec $B_n = FB_0$, et telles que B_{i-1} et B_i soient en position relative s_i ou e. C'est l'image réciproque du graphe de Frobenius par l'application

$$\alpha : (B_0, \ldots, B_n) \longmapsto (B_0, B_n) : \overline{O}(s_1, \ldots, s_n) \longrightarrow X \times X.$$

Autrement dit, si $\Gamma \xrightarrow{i} X \times X$ est l'inclusion dans $X \times X$ du graphe de Frobenius, il s'agit du produit fibré $\overline{O} \times_{X\times X} \Gamma$:

$$\begin{array}{ccc} \overline{X}(s_1, \dots, s_n) & \longrightarrow & \Gamma \\ \downarrow & & \downarrow i \\ \overline{O}(s_1, \dots, s_n) & \longrightarrow & X \times X. \end{array}$$

LEMME 9.11. Γ est transverse à $\overline{O}(s, \dots, s)$, ainsi qu'à toute intersection des diviseurs D_i. Le produit fibré $\overline{X}(s, \dots, s_n)$ est donc une compactification lisse de $X(w)$, avec à l'infini un diviseur à croisements normaux (somme des traces $\overline{D}_i$ des D_i).

Nous allons montrer que Γ est transverse à tout schéma lisse G-équivariant $\pi : Y \to X \times X$ au-dessus de $X \times X$ (où G agit diagonalement sur $X \times X$) ; autrement dit, si $\pi(y) \in \Gamma$, la somme de l'espace tangent à Γ en $\pi(y)$ et de l'image de $d\pi$ est tout l'espace tangent à $X \times X$ en $\pi(y)$. En effet :

(a) l'espace tangent à Γ en $\pi(y)$ est $T_x \times \{0\}$;

(b) l'image de $d\pi$ contient l'image de Lie(G) par la différentielle en $e \in G$ de $g \mapsto g\pi y$ (par l'équivariance de Y). Comme l'espace X est homogène à stabilisateurs réduits, cette image se projette sur T_x par la seconde projection.

9.12. Étudions maintenant la ramification du revêtement $\widetilde{X}(\dot{w})$, de groupe structural $T(w)^F$, le long du diviseur $\overline{D}_i$. Le groupe structural étant d'ordre premier à p, la ramification est modérée. Sur chaque composante connexe de $\overline{D}_i$, elle donne lieu à un homomorphisme $\tau_i : \widehat{\mathbb{Z}}(1) \to T(w)^F$.

Soit $x(t) \in \overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ une famille à un paramètre telle que $x(0)$ soit un point de $\overline{D}_i$ (n'appartenant à aucun $\overline{D}_j$, $j \neq i$) et que le vecteur tangent $\dot{x}(0)$ soit transverse à $\overline{D}_i$. En termes techniques : pour $S =$ spectrum de l'hensélisé de $k[t]$ en (t), x est un morphisme $x : S \to \overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ tel que le point fermé $t = 0$ soit envoyé sur un point de $\overline{D}_i$ n'appartenant à aucun $\overline{D}_j$, $j \neq i$, et que l'image réciproque de $\overline{D}_i$ soit le schéma réduit $t = 0$. Posons $x(t) = (B_0(t), \dots, B_n(t))$, et soit E_i l'image réciproque, par $t \mapsto B_i(t)$, du T-torseur E sur X (1.7). Si l'on factorise $\dot{w}$ comme en 9.5, l'isomorphisme $\Psi(\dot{w}) : E_0 \to E_n$, sur le point générique de S, se factorise sous la forme

$$\Psi(\dot{w}) = \Psi(\dot{w}_i')\Psi(\dot{s}_i)\Psi(\dot{w}_{i-1}),$$

et $\Psi(\dot{w}_{i-1})$ et $\Psi(\dot{w}_i')$ se prolongent sur S ; $\Psi(\dot{s}_i)$ ne se prolonge pas ; en revanche, le composé $x \mapsto \Psi(\dot{s}_i)(xH_{-\alpha}(t))$ se prolonge (9.5). Ainsi $\Psi(\dot{w})$ est de la forme

$$\Psi(\dot{w})(x) = \Psi_0\big(xH_{w_{i-1}(\alpha_i)}(t)\big),$$

où $\Psi_0 : E_0 \to E_n$ se prolonge sur S. L'image réciproque par x du $T(w)^F$-torseur $\widetilde{X}(\dot{w})$, au point générique de S, est donnée par l'équation

$$F(u) = \Psi_0\big(uH_{w_{i-1}(\alpha_i)}(t)\big). \tag{9.12.1}$$

Soit u_0 une solution, sur S, de l'équation

$$F(u_0) = \Psi_0(u_0)$$

(elle existe, parce que S est strictement hensélien et que F et Ψ_0 se prolongent sur S) ; si l'on pose $u = u_0 y$, (9.12.1) devient

$$y^{-1} \operatorname{ad} \dot{w} F(y) = H_{w_{i-1}(\alpha_i)}(t). \tag{9.12.2}$$

Autrement dit :

LEMME 9.13. Le $T(w)^F$-torseur $\widetilde{X}(\dot{w})$ se ramifie le long de $\overline{D}_i$ de la même manière que l'image réciproque, par $H_{w_{i-1}(\alpha_i)} : \mathbb{G}_m \to T$, du revêtement de Lang de $T(w)$ se ramifie en 0.

Le groupe fondamental modéré de $\mathbb{G}_m$ est $\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1)$, celui de T est $Y^\wedge_{p'}(1)$ (où Y est le dual du groupe des caractères de T), et $H_{w_{i-1}(\alpha_i)}$ induit $x \mapsto x H_{w_{i-1}(\alpha_i)}$:

$$\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1) \longrightarrow Y^\wedge_{p'}(1).$$

Le revêtement de Lang de $T(w)^F$ donne l'application $Y^\wedge_{p'}(1) \to T(w)^F$ décrite en (5.2). L'image réciproque (9.13) correspond donc au composé

$$\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1) \xrightarrow{H_{w_{i-1}(\alpha_i)}} Y^\wedge_{p'}(1) \longrightarrow T(w)^F.$$

Pour un caractère θ de $T(w)^F$, $\mathscr{F}_\theta$ se ramifie le long de $\overline{D}_i$ si et seulement si θ n'est pas trivial sur $H_{w_{i-1}(\alpha_i)}\widehat{\mathbb{Z}}_{p'}(1)$. Dans ce cas, toutes les images directes supérieures $R^i j_* \mathscr{F}_\theta$ de $\mathscr{F}_\theta$ ($i \geq 0$) par $j : X(w) \to \overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ s'annulent sur $\overline{D}_i$. En particulier :

LEMME 9.14. Si θ est non singulier, $j_* \mathscr{F}_\theta = j_! \mathscr{F}_\theta$ (prolongement par zéro) et $R^i j_* \mathscr{F}_\theta = 0$ pour $i > 0$.

Démonstration de 9.8 (sous la forme 9.9.1). D'après (9.14), la suite spectrale de Leray pour j donne

$$H^*(\overline{X}(s_1, \dots, s_n), j_! \mathscr{F}_\theta) \xrightarrow{\sim} H^*(X(w), \mathscr{F}_\theta).$$

Comme $\overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ est une compactification de $X(w)$, le membre de gauche est, par définition, $H^*_c(X(w), \mathscr{F}_\theta)$.

Remarque 9.15.1. En utilisant des arguments parallèles à ceux de (1.6), on peut montrer que la conclusion de (9.9), à savoir « pour θ non singulier, $H^i_c(\widetilde{X}(\dot{w}), \overline{\mathbb{Q}}_l)_\theta = 0$ pour $i \neq l(w)$ », reste vraie dès qu'il existe w' dans la classe de F-conjugaison de w tel que $X(w')$ soit affine. Le critère (9.7) permet de vérifier que c'est toujours le cas pour les groupes classiques et pour G_2, sauf dans le cas ($G_2, q = 2, w =$ Coxeter), auquel une autre méthode s'applique.

Remarque 9.15.2. Soit (T', θ') maximalement déployé (5.17) ; sous un isomorphisme $T(w) \xrightarrow{\sim} T'$, induisant $T(w)^F \xrightarrow{\sim} T'^F$, comme en (1.18), θ' devient un caractère θ de $T(w)^F$. La Proposition 5.24 et la démonstration du Théorème d'induction

8.2 montrent que la conclusion de (9.8) reste vraie pour θ. Il en va de même pour (9.9).

THÉORÈME 9.16. Si $u \in G^F$ est un élément unipotent régulier, alors, pour tout tore maximal F-stable T, on a $Q_{T,G}(u) = 1$.

Nous devons démontrer que, pour tout $w \in \mathbf{W}$, $\mathrm{Tr}(u, H_c^*(X(w))) = 1$. Nous savons que $\mathrm{Tr}(u, H_c^*(X(w)))$ est un entier, et que

$$\sum_{w \in \mathbf{W}} \mathrm{Tr}(u, H_c^*(X(w))) = |\mathbf{W}|$$

(voir (7.14) et sa démonstration). Il suffit donc de démontrer le lemme suivant.

LEMME 9.17. Sous les hypothèses de (9.16), $\mathrm{Tr}(u, H_c^*(X(w))) > 0$, pour tout $w \in \mathbf{W}$.

Prenons $w = s_1 \cdots s_n$ comme en (9.10), et soit $\overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ la compactification correspondante de $X(w)$. Pour $P \subset [1, n]$, notons $\overline{D}_P$ l'intersection, dans $\overline{X}(s_1, \dots, s_n)$, des diviseurs $\overline{D}_i$ ($i \in P$) (9.11). Pour $P = \emptyset$, $\overline{D}_P$ est $\overline{X}(s_1, \dots, s_n)$. L'additivité de la cohomologie à support compact montre que

$$\mathrm{Tr}(u, H_c^*(X(w))) = \sum_{P \subset [1,n]} (-1)^{|P|} \mathrm{Tr}(u, H^*(\overline{D}_P)). \tag{9.17.1}$$

Soit b l'unique point fixe de u dans X. Alors $a = (b, \dots, b)$ est l'unique point fixe de u dans $\overline{X}(s_1, \dots, s_n)$, et il appartient à chaque $\overline{D}_P$. La variété $\overline{D}_P$ étant lisse et compacte, $\mathrm{Tr}(u, H^*(\overline{D}_P))$ est précisément la multiplicité de l'unique point fixe a de l'action de u sur $\overline{D}_P$; pour la calculer, on peut remplacer $\overline{D}_P$ par son complété $\widehat{D}_P$ en a. Soit (x_i) un système de coordonnées formelles pour $\overline{X}(s_1, \dots, s_n)$ en a, tel que $x_i = 0$ soit une équation de $\widehat{D}_i$. Dans ces coordonnées, u envoie le point de coordonnées $x_1, \dots, x_n$ sur le point de coordonnées $P_1(x_1, \dots, x_n), \dots, P_n(x_1, \dots, x_n)$, pour certaines séries formelles P_i. Comme le diviseur $\widehat{D}_i$ est préservé par u, P_i est divisible par x_i. La matrice jacobienne de u en $(0, \dots, 0)$ est donc diagonale ; comme u est d'ordre une puissance de p, elle est l'identité, et l'on a

$$P_i = x_i(1 + Q_i).$$

avec $Q_i(0, \dots, 0) = 0$. Le schéma des points fixes de u est défini par les équations $x_i Q_i = 0$.

Soit E_i le diviseur $Q_i = 0$. Il est non vide. La formule (9.17.1) se réécrit

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}(u, H_c^*(X(w))) &= \sum_{P \subset [1,n]} (-1)^{|P|} \prod_{i \in P} \widehat{D}_i \prod_{j \notin P} (\widehat{D}_j + E_j) \\
&= \sum_{P \subset Q \subset [1,n]} (-1)^{|P|} \prod_{i \in Q} \widehat{D}_i \prod_{j \notin Q} E_j \\
&= \sum_{Q \subset [1,n]} \left(\sum_{P \subset Q} (-1)^{|P|} \right) \prod_{i \in Q} \widehat{D}_i \prod_{j \notin Q} E_j \\
&= \prod_j E_j > 0,
\end{aligned}$$

(le produit de n diviseurs désigne la multiplicité de leur intersection).

PROPOSITION 9.18. Soit $s \in G^F$ un élément semi-simple. Soit ν la fonction centrale sur G^F définie par

$$\nu(g) = \begin{cases} |Z^0 Z^0(s)^F|\, q^{l(Z^0(s))} \dfrac{|Z(s)^F|}{|Z^0(s)^F|}, & \text{si } g \in G^F \text{ est régulier, de partie semi-simple} \\ & \text{conjuguée à } s \text{ dans } G^F, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors ν est le caractère de

$$\frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} |T^F| \sum_{\theta \in (T^F)^\sim} \theta(s)^{-1} R_T^\theta.$$

(Ici $Z^0 Z^0(s)$ est le centre connexe du centralisateur connexe de s, et $l(Z^0(s))$ est le rang semi-simple de $Z^0(s)$.) La démonstration est analogue à celle de (7.5) ; elle utilise (9.16) et (4.2) au lieu de (7.2).

Pour tout $\rho \in \mathscr{R}(G^F)$, on a

$$\langle \rho, \nu \rangle = \frac{|Z^0 Z^0(s)^F|}{|Z^0(s)^F|} q^{l(Z^0(s))} \sum_{u \in A(s)} \rho(su), \tag{9.18.1}$$

où $A(s)$ est l'ensemble des éléments unipotents réguliers de $Z^0(s)^F$.

COROLLAIRE 9.19. Pour tout $\rho \in \mathscr{R}(G^F)$, la valeur moyenne du caractère de ρ sur les éléments réguliers de G^F de partie semi-simple s est égale à

$$\frac{1}{|A(s)|} \sum_{u \in A(s)} \mathrm{Tr}(su, \rho) = \frac{1}{|Z^0(s)^F|} \sum_{\substack{T \\ s \in T}} |T^F| \sum_{\theta \in (T^F)^\sim} \theta(s) \langle \rho, R_T^\theta \rangle.$$

Cela résulte de (9.18), (9.18.1) et du lemme suivant.

LEMME 9.20. Le nombre d'éléments unipotents réguliers de G^F est égal à

$$|G^F| / |Z^{0F}|\, q^l.$$

(Ici Z^0 est le centre connexe de G, et l est le rang semi-simple de G.)

Pour compter les éléments unipotents réguliers de G^F, on observe que chacun d'eux appartient à un unique sous-groupe de Borel, puis on compte ceux de G^F qui appartiennent à un sous-groupe de Borel F-stable fixé.

10. Une décomposition de la représentation de Gelfand-Graev

10.1. Soit $(G^F)^\sim$ l'ensemble des classes d'isomorphisme de représentations irréductibles de G^F (sur $\overline{\mathbb{Q}}_l$). Pour tout $\rho \in (G^F)^\sim$, il existe un tore maximal F-stable T et $\theta \in (T^F)^\sim$ tels que $\langle \rho, R_T^\theta \rangle \neq 0$ (7.7) ; de plus, la classe de conjugaison géométrique $[\theta]$ de (T, θ) (voir 5.5) est déterminée de manière unique par ρ (6.3). On obtient ainsi une application surjective bien définie

$$(G^F)^\sim \longrightarrow \mathfrak{S} \tag{10.1.1}$$

où $\mathfrak{S}$ est l'ensemble de toutes les classes de conjugaison géométrique de paires (T, θ).

10.2. Dans la suite de ce chapitre, nous supposerons que le centre Z de G est connexe. Soient T^*, B^* comme en (1.8). Soit U^* le radical unipotent de B^*, et soit $U_\bullet^*$ le sous-groupe de U^* engendré par les sous-groupes radiciels correspondant aux racines non simples. Le quotient $U^*/U_\bullet^*$ est commutatif et est un produit direct, indexé par les racines simples α, des U_α^*, chacun de dimension un. Soit I l'ensemble des orbites de F sur les racines simples. Pour tout $i \in I$, posons $U_i^* = \prod_{\alpha \in i} U_\alpha^*$; alors $U^*/U_\bullet^* = \prod_{i \in I} U_i^*$. Cette décomposition est F-stable, et l'on a donc aussi $U^{*F}/U_\bullet^{*F} = \prod_{i \in I} U_i^{*F}$.

Nous considérons la représentation de Gelfand-Graev $\Gamma_G = \mathrm{Ind}_{U^{*F}}^{G^F}(\chi)$, où χ est un caractère quelconque de U^{*F}, trivial sur $U_\bullet^{*F}$, et induisant un caractère non trivial de U_i^{*F} pour tout $i \in I$. Tous ces χ sont conjugués sous T^{*F}, puisque Z est connexe ; le G^F-module Γ_G est donc bien défini à isomorphisme près.

Soit Δ_G la fonction centrale sur G^F qui vaut $|Z^F|q^l$ sur tout élément unipotent régulier de G^F et s'annule sur tous les autres éléments. (l est le rang semi-simple de G.) Le résultat suivant montre qu'il s'agit du caractère d'une représentation virtuelle de G^F, que l'on notera également Δ_G :

PROPOSITION 10.3. Pour tout sous-ensemble $J \subset I$, soit $P(J) \supset B^*$ le sous-groupe parabolique engendré par B^* et par les sous-groupes radiciels correspondant aux opposées des racines simples appartenant aux orbites de F contenues dans J. Soit $L(J)$ le quotient de $P(J)$ par son radical unipotent. Alors

$$\Delta_G = \sum_{J \subset I} (-1)^{|J|} \mathrm{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Gamma_{L(J)}). \tag{10.3.1}$$

(Remarquons que le centre de $L(J)$ est connexe, puisque celui de G l'est ; $\Gamma_{L(J)}$ est donc bien définie.)

Remarque 10.4. L'identité suivante est une conséquence formelle de (10.3.1) :

$$\Gamma_G = \sum_{J \subset I} (-1)^{|J|} \mathrm{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Delta_{L(J)}).$$

10.5. Démonstration de 10.3. Pour tout sous-ensemble $J \subset I$, soit $\mathscr{C}(J)$ l'ensemble des caractères χ de U^{*F} tels que $\chi|U_\bullet^{*F} = 1$ et que χ induise un caractère non trivial de U_i^* ($i \in I$) si et seulement si $i \in J$. Il est immédiat que, pour tout $\chi \in \mathscr{C}(J)$,

$$\mathrm{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Gamma_{L(J)}) = \mathrm{Ind}_{U^{*F}}^{G^F}(\chi).$$

Soit $u_0 \in U^{*F}$ un élément unipotent régulier fixé ; autrement dit, l'image de u_0 dans U_i^{*F} est non nulle pour tout $i \in I$. Il en résulte que

$$\sum_{\chi \in \mathscr{C}(J)} \chi(u_0) = (-1)^{|J|}.$$

Ainsi, (10.3.1) équivaut à :

$$\Delta_G = \sum_{\chi\in\mathscr{C}} \chi(u_0)\,\mathrm{Ind}_{U^{*F}}^{G^F}(\chi) \tag{10.5.1}$$

où $\mathscr{C} = \bigcup_{J\subset I}\mathscr{C}(J)$. Le caractère du membre de droite de (10.5.1) s'annule sur les éléments non unipotents. Sa valeur en $u \in U^{*F}$ est :

$$\begin{aligned} &|U^{*F}|^{-1} \sum_{\substack{g\in G^F \\ g^{-1}ug\in U^{*F}}} \sum_{\chi\in\mathscr{C}} \chi(g^{-1}ugu_0) \\ &= q^l|U^{*F}|^{-1}\#\{g\in G^F \mid g^{-1}ug\in U^{*F},\ g^{-1}ugu_0\in U_\bullet^{*F}\}. \end{aligned} \tag{10.5.2}$$

Cette expression est nulle à moins que $u \in U^{*F}$ ne soit unipotent régulier ; supposons désormais que $u \in U^{*F}$ soit unipotent régulier. Pour tout $g \in G^F$ tel que $g^{-1}ug \in U^{*F}$, on a $u \in B^* \cap gB^*g^{-1}$; mais B^* est l'unique sous-groupe de Borel contenant u, donc $g \in B^{*F}$. Si $g = tu'$, $t \in T^{*F}$, $u' \in U^{*F}$, la relation $g^{-1}ugu_0 \in U_\bullet^{*F}$ détermine t de manière unique modulo Z^F et laisse u' arbitraire. Ainsi, l'expression (10.5.2) devient

$$q^l|U^{*F}|^{-1}|Z^F||U^{*F}| = |Z^F|q^l,$$

et (10.3) est démontré.

Nous allons maintenant démontrer le lemme suivant.

LEMME 10.6. Soit M une représentation virtuelle de G^F telle que

$$\langle M, M\rangle = |Z^F|q^l \qquad \text{et} \qquad \langle M, R_T^\theta\rangle = \varepsilon_T^\theta = \pm 1$$

pour tout tore maximal F-stable $T \subset G$ et tout $\theta \in T^{\vee F}$. Alors

$$M = \sum_{x\in\mathfrak{S}} \sigma_x M_x,$$

où $\sigma_x = \pm 1$ et où les M_x sont des représentations irréductibles distinctes de G^F, telles que

$$M_x = \sigma_x \sum_{\substack{(T,\theta)\bmod G^F \\ [\theta]=x}} \frac{\varepsilon_T^\theta}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta\rangle} R_T^\theta.$$

Soit $\{M\}$ l'ensemble des $\rho \in (G^F)^\sim$ tels que $\langle \rho, M\rangle \neq 0$; $\{M\}$ possède au plus $|Z^F|q^l$ éléments. D'après notre hypothèse et 5.7(i), l'application $\{M\} \to \mathfrak{S}$ (restriction de (10.1.1)) est surjective. Comme $|\mathfrak{S}| = |Z^F|q^l$ (5.7), elle est bijective et $\{M\}$ possède exactement $|Z^F|q^l$ éléments. Soit $M_x \in \{M\}$ l'élément correspondant à $x \in \mathfrak{S}$; on doit avoir $M = \sum_{x\in\mathfrak{S}} \sigma_x M_x$, $\sigma_x = \pm 1$, puisque $\langle M, M\rangle = |\{M\}|$. Si (T,θ) vérifie $[\theta] = x$, alors

$$\langle M, R_T^\theta\rangle = \sigma_x\langle M_x, R_T^\theta\rangle = \varepsilon_T^\theta.$$

Par l'orthogonalité des R_T^θ (6.8), on a

$$M_x = \sigma_x \sum_{\substack{(T,\theta)\bmod G^F \\ [\theta]=x}} \frac{\varepsilon_T^\theta}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta\rangle} R_T^\theta + M_x',$$

où M_x' est orthogonale à tous les R_T^θ. Il reste à prouver que $M_x' = 0$. Comme M_x est irréductible, il suffirait de démontrer que $\langle M_x - M_x', M_x - M_x'\rangle = 1$; on a certainement $\langle M_x - M_x', M_x - M_x'\rangle \leq 1$, de sorte qu'il suffit de démontrer

que

$$\sum_{x\in\mathfrak{S}}\langle M_x - M'_x, M_x - M'_x\rangle = |Z^F|q^l,$$

ou, ce qui revient au même,

$$\sum_{(T,\theta)\bmod G^F}\frac{1}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta\rangle} = |Z^F|q^l.$$

D'après (6.8), ceci équivaut à l'identité

$$\sum_{T\bmod G^F}\frac{1}{|W(T)^F|}|T^F| = |Z^F|q^l,$$

qui est la même que

$$\frac{1}{|\mathbf{W}|}\sum_{w\in\mathbf{W}}\det(q-w\tau) = q^l,$$

où w est considéré comme un automorphisme du réseau $X_0 = X(T/Z)$, et où τ est défini par $F^* = q\cdot\tau^{-1}$. Cette dernière identité (comparer Steinberg [15, p. 91]) peut s'écrire

$$\sum_{0\le i\le l}(-1)^i q^{l-i}\frac{1}{|\mathbf{W}|}\sum_{w\in\mathbf{W}}\mathrm{Tr}(w\tau, \Lambda^i(X_0)) = q^l,$$

et résulte du fait que $\Lambda^i(X_0)^{\mathbf{W}} = 0$ pour $i > 0$ (5.8).

THÉORÈME 10.7. Rappelons que Z est connexe. Soit $x\in\mathfrak{S}$, et soit x' un représentant de la classe de conjugaison semi-simple correspondante dans le groupe dual (5.24). Notons δ_x le rang sur $\mathbf{F}_q$ du centralisateur de x'.

(i) Les formules

$$\rho_x = \sum_{\substack{(T,\theta)\bmod G^F\\ [\theta]=x}}\frac{(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta\rangle}R_T^\theta \tag{10.7.1}$$

et

$$\rho'_x = (-1)^{\sigma(G)-\delta_x}\sum_{\substack{(T,\theta)\bmod G^F\\ [\theta]=x}}\frac{1}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta\rangle}R_T^\theta \tag{10.7.2}$$

définissent des représentations irréductibles de G^F. Les $|Z^F|q^l$ éléments $\rho_x\in(G^F)^\sim$, $x\in\mathfrak{S}$ (resp. $\rho'_x\in(G^F)^\sim$, $x\in\mathfrak{S}$) sont distincts. Les applications $x\mapsto\rho_x$ et $x\mapsto\rho'_x$ sont deux sections de l'application (10.1.1).

(ii) On a

$$\Gamma_G = \sum_{x\in\mathfrak{S}}\rho_x = \sum_{(T,\theta)\bmod G^F}\frac{(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta\rangle}R_T^\theta, \tag{10.7.3}$$

$$\Delta_G = \sum_{x\in\mathfrak{S}}(-1)^{\sigma(G)-\delta_x}\rho'_x = \sum_{(T,\theta)\bmod G^F}\frac{1}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta\rangle}R_T^\theta. \tag{10.7.4}$$

(iii) Supposons que toutes les racines aient la même longueur. Fixons (T,θ) dans la classe de conjugaison géométrique x, soit S le centralisateur connexe de (T,θ) (5.19), et soit θ_S le caractère correspondant de S^F. On a

$$\rho_x \otimes \mathrm{St}_G = \mathrm{Ind}_{S^F}^{G^F}(\theta_S \otimes \mathrm{St}_S \otimes \mathrm{St}_S), \tag{10.7.5}$$

$$\rho'_x \otimes \mathrm{St}_G = \mathrm{Ind}_{S^F}^{G^F}(\theta_S \otimes \mathrm{St}_S). \tag{10.7.6}$$

(iv) Soit S^* le centralisateur de x'. On a encore

$$\dim \rho_x = \frac{|G^F|/\mathrm{St}_G(e)}{|S^{*F}|/\mathrm{St}_{S^*}(e)} \cdot \mathrm{St}_{S^*}(e), \tag{10.7.7}$$

$$\dim \rho'_x = \frac{|G^F|/\mathrm{St}_G(e)}{|S^{*F}|/\mathrm{St}_{S^*}(e)}. \tag{10.7.8}$$

Si l'on tensorise le membre de droite de (10.7.1) par St_G, on obtient (d'après 7.3)

$$\sum_{\substack{(T,\theta) \bmod G^F \\ [\theta]=x}} \frac{1}{\langle R_T^\theta, R_T^\theta\rangle} \mathrm{Ind}_{T^F}^{G^F}(\theta). \tag{10.7.9}$$

Supposons d'abord que toutes les racines aient la même longueur. D'après 5.14(ii), les classes de conjugaison sous G^F des paires (T,θ), $T \subset G$, telles que $[\theta] = x$, correspondent bijectivement aux classes de conjugaison sous S^F des paires $(T',\theta_S|_{T'})$, où T' est un tore maximal F-stable de S. En outre, d'après 5.14(i) et (6.8), $\langle R_T^\theta, R_T^\theta\rangle = |W_S(T')^F|$. L'expression (10.7.9) est donc égale à

$$\begin{aligned}
&\sum_{\substack{T'\subset S \\ \bmod S^F}} \frac{1}{|W_S(T')^F|} \mathrm{Ind}_{T'^F}^{G^F}(\theta_S|_{T'}) \\
&= \sum_{\substack{T'\subset S \\ \bmod S^F}} \frac{1}{|W_S(T')^F|} \mathrm{Ind}_{S^F}^{G^F}\left(\mathrm{Ind}_{T'^F}^{S^F}(1) \otimes \theta_S\right) \\
&= \mathrm{Ind}_{S^F}^{G^F}\left(\sum_{\substack{T'\subset S \\ \bmod S^F}} \frac{1}{|W_S(T')^F|} \mathrm{Ind}_{T'^F}^{S^F}(1) \otimes \theta_S\right) \\
&= \mathrm{Ind}_{S^F}^{G^F}(\theta_S \otimes \mathrm{St}_S \otimes \mathrm{St}_S), \qquad \text{d'après 7.14.}
\end{aligned}$$

De même, en tensorisant le membre de droite de (10.7.2) par St_G, on obtient

$$\mathrm{Ind}_{S^F}^{G^F}\left(\sum_{\substack{T'\subset S \\ \bmod S^F}} \frac{(-1)^{\sigma(S)-\sigma(T')}}{|W_S(T')^F|} \mathrm{Ind}_{T'^F}^{S^F}(1) \otimes \theta_S\right) = \mathrm{Ind}_{S^F}^{G^F}(\theta_S \otimes \mathrm{St}_S), \qquad \text{d'après 7.14.}$$

En général, les classes de conjugaison sous G^F des paires (T,θ) telles que $[\theta] = x$ correspondent bijectivement aux classes de conjugaison sous G^{*F} des paires (T',θ'), où θ' est conjugué à x' (5.24), c'est-à-dire aux classes de conjugaison sous S^{*F} des paires (T',x'), avec $T' \subset S^*$. La dimension de (10.7.9) est celle de

$$\sum_{T'\subset S^*} \frac{1}{|W_{S^*}(T')^F|} \mathrm{Ind}_{T'^F}^{G^{*F}}(1),$$

(car $|G^{*F}| = |G^F|$), tandis que celle de (10.7.2) $\otimes\, \mathrm{St}_G$ est

$$\sum_{T'\subset S^*} \frac{(-1)^{\sigma(S)-\sigma(T')}}{|W_{S^*}(T')^F|} \mathrm{Ind}_{T'^F}^{G^F}(1)$$

et la même démonstration que ci-dessus donne (10.7.7) et (10.7.8).

Montrons maintenant que (10.6) s'applique avec $M = \Gamma_G$ ou Δ_G. On a

$$\langle \Delta_G, \Delta_G \rangle = \frac{1}{|G^F|}(|Z^F|q^l)^2 \#\{\text{éléments unipotents réguliers de } G^F\}$$
$$= \frac{1}{|G^F|}(|Z^F|q^l)^2 \frac{|G^F|}{|Z^F|q^l} = |Z^F|q^l \qquad \text{(d'après 9.20).}$$

L'identité analogue $\langle \Gamma_G, \Gamma_G \rangle = |Z^F|q^l$ résulte de R. Steinberg ([14]). Pour toute paire (T, θ), $\langle \Delta_G, R_T^\theta \rangle$ est la valeur moyenne du caractère de R_T^θ sur les éléments unipotents réguliers de G^F, donc vaut 1 d'après (9.16).

Démontrons maintenant que $\langle \Gamma_G, R_T^\theta \rangle = (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}$ pour toute paire (T, θ). En utilisant un résultat de Rodier (cf. T. A. Springer, Caractères de groupes de Chevalley finis, Sém. Bourbaki 429, Fév. 1973) et la formule d'induction 8.2, on se ramène au cas où T n'est contenu dans aucun sous-groupe parabolique propre F-stable de G. En utilisant (10.3.1) et le fait déjà établi que $\langle \Delta_G, R_T^\theta \rangle = 1$, il suffit de démontrer

$$\left\langle \mathrm{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Gamma_{L(J)}), R_T^\theta \right\rangle = 0, \qquad J \neq I. \tag{10.7.8}$$

(Remarquons que, dans ce cas, $(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)} = (-1)^{|I|}$.) Supposons le théorème déjà démontré pour les groupes de dimension strictement inférieure à celle de G, et en particulier pour $L(J)$. D'après (10.7.5) et (8.2), $\mathrm{Ind}_{P(J)^F}^{G^F}(\Gamma_{L(J)})$ est une combinaison linéaire de termes de la forme $R_{T'}^{\theta'}$, avec $T' \subset P(J)$, $FT' = T'$; (10.7.8) résulte alors de la formule d'orthogonalité (6.8).

Les formules (10.7.1), (10.7.2), (10.7.5) et (10.7.6) résultent maintenant directement de (10.6), appliqué à $M = \Gamma_G$ ou Δ_G, à une indétermination de signe près. Pour lever cette indétermination, il suffit de vérifier que les membres de droite de (10.7.1) et (10.7.2) ont une dimension strictement positive ; or ils sont tous deux de la forme $|G^F|/|S^{*F}|$, à une puissance de q près, d'après la première partie de la démonstration. Le théorème est démontré.

COROLLAIRE 10.8. Pour tout $\rho \in (G^F)^\sim$, la valeur moyenne du caractère de ρ sur les éléments unipotents réguliers de G^F est égale à 0, 1 ou -1. Cette valeur est ± 1 si et seulement si $\rho = \rho'_x$ pour un certain $x \in \mathfrak{S}$.

En effet, cette valeur moyenne est précisément $\langle \rho, \Delta_G \rangle$.

Remarque 10.9. Si l'on suppose que p est un bon nombre premier pour G, alors tous les éléments unipotents réguliers de G^F appartiennent à une seule classe de conjugaison sous G^F, de sorte que le caractère de ρ en tout élément unipotent régulier de G^F vaut 0, 1 ou -1. Ce résultat a été démontré pour la première fois dans l'article de J. A. Green, G. I. Lehrer et G. Lusztig (On the degrees of certain group characters, à paraître dans The Quarterly Journal of Mathematics).

PROPOSITION 10.10. Soit $x \in \mathfrak{S}$. Soit (T, θ) une paire maximalement déployée dans x

(voir (5.17) ; (T,θ) est déterminée de manière unique, à conjugaison sous G^F près, par (5.18)). Alors la représentation virtuelle $(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}R_T^\theta$ de G^F peut être réalisée par un véritable G^F-module, dans lequel ρ_x et ρ'_x interviennent avec multiplicité 1.

D'après (5.23), il existe un sous-groupe parabolique F-stable $P \subset G$ tel que T soit contenu dans un sous-groupe de Levi F-stable L de P, et tel que (T,θ) soit non singulière dans L. Le centre de L est connexe ; d'après 5.20, (T,θ) est donc non dégénérée dans L. Soit $R_{T,L}^\theta$ la représentation virtuelle correspondant à (T,θ) relativement à L (voir 1.20). D'après 7.4,

$$(-1)^{\sigma(L)-\sigma(T)}R_{T,L}^\theta = (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}R_{T,L}^\theta$$

est irréductible. D'après 8.2,

$$(-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}R_T^\theta = \mathrm{Ind}_{P^F}^{G^F}\big((-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)}R_{T,L}^\theta\big),$$

de sorte qu'elle peut être réalisée par un véritable G^F-module.

Il reste à observer que, pour toute paire (T,θ) dans x (pas nécessairement maximalement déployée), on a, d'après (10.7.1), (10.7.2) et (6.8),

$$\langle \rho_x, R_T^\theta\rangle = (-1)^{\sigma(G)-\sigma(T)},$$
$$\langle \rho'_x, R_T^\theta\rangle = (-1)^{\sigma(G)-\delta_x}.$$

11. Groupes de Suzuki et de Ree

Nos méthodes s'appliquent également aux groupes de Suzuki et de Ree ${}^2B_2(q)$, ${}^2G_2(q)$, ${}^2F_4(q)$ (où q est une puissance impaire de $\sqrt{2}$, respectivement de $\sqrt{3}$ et de $\sqrt{2}$).

Ces groupes sont les points fixes d'une isogénie exceptionnelle $F' : G \to G$, où G est respectivement de type B_2, G_2 et F_4, et où F'^2 est l'endomorphisme de Frobenius relatif à une structure rationnelle sur le corps à q^2 éléments (R. Steinberg [15]). Pour les besoins de l'induction, il convient de considérer plus généralement les groupes de la forme $G^{F'}$, où G est réductif et où F'^2 est l'endomorphisme de Frobenius relatif à une structure rationnelle sur $\mathbf{F}_{q^2}$ (q étant une puissance impaire de $\sqrt{2}$ ou de $\sqrt{3}$). Outre les groupes de Suzuki et de Ree, cela comprend par exemple les groupes de la forme $G = G_1 \times G_1$, avec $F'(x,y) = (Fy, x)$; pour un tel groupe, $G^{F'} = G_1^F$.

Toutes les définitions et tous les résultats du Chapitre 1 peuvent être formulés en remplaçant partout F par F' ; en particulier, pour tout tore maximal F'-stable T de G et tout sous-groupe de Borel B contenant T, le sous-schéma $X_{T\subset B}$ de X_G et le $T^{F'}$-torseur $\widetilde{X}_{T\subset B}$, $G^{F'}$-équivariant, au-dessus de $X_{T\subset B}$, sont bien définis (1.17). Ainsi, pour tout $\theta \in (T^{F'})^\sim$, la représentation virtuelle $R_{T\subset B}^\theta$ de $G^{F'}$ est bien définie (1.20). Pour $G = G_1 \times G_1$, $F'(x,y) = (Fy,x)$, elle coïncide avec la représentation analogue de $G_1^F = G^{F'}$.

Tous les résultats des Chapitres 4, 5 et 9 (à l'exception de (9.18) et (9.19)), le théorème de disjonction

6.2 (avec son Corollaire 6.3), ainsi que les résultats (7.13) et (8.2), restent vrais. En revanche, les démonstrations des relations d'orthogonalité (6.8), (6.9) et de la formule de dimension (7.1) exigent l'hypothèse $|T^{F'}| > 1$. Si $q > 2$, celle-ci est automatiquement satisfaite : $|T^{F'}|$ est de la forme $\prod(q - \rho_i)$, où $|\rho_i| = 1$, donc $|T^{F'}| > \prod(q-1)$. Ainsi, si l'on exclut le cas où q vaut $\sqrt{2}$ ou $\sqrt{3}$, tous les résultats des Chapitres 6, 7, 8 et 10 sont valables, ainsi que (9.18) et (9.19). Ils se déduisent tous des relations d'orthogonalité (6.8), (6.9). Même dans le cas $q = \sqrt{2}$ ou $\sqrt{3}$, nous pouvons les démontrer pour ${}^2B_2$ et ${}^2G_2$, mais nous ne pouvons pas traiter ${}^2F_4(\sqrt{2})$.

AJOUTÉ AUX ÉPREUVES (2 décembre 1975). Nous pouvons maintenant traiter également ${}^2F_4(\sqrt{2})$; cette question sera étudiée par l'un de nous dans un article ultérieur.

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES SCIENTIFIQUES, FRANCE

MATHEMATICS INSTITUTE, UNIVERSITY OF WARWICK, ENGLAND

RÉFÉRENCES

[1] N. Bourbaki, Groupes et Algèbres de Lie, Chap. 4.5 et 6, Hermann, Paris 1968.
[2] B. Chang, R. Ree, The characters of $G_2(q)$, Instituto Nazionale di Alta Mat., Symp. Mat. Vol. XIII (1974), 395–413.
[3] M. Demazure, Désingularisation des variétés de Schubert généralisées, Annales Sci. E.N.S., t. 7 (1974), 53–88.
[4] J. A. Green, The characters of the finite general linear groups, Trans. A.M.S. 80 (1955), 402–447.
[5] A. Grothendieck, Formule de Lefschetz et rationalité des Fonctions L, Séminaire Bourbaki, 279, Décembre 1964 (Benjamin).
[6] H. C. Hansen, On Cycles on Flag Manifolds, Math. Scand. 33 (1973), 269–274.
[7] G. Lusztig, On the discrete series representations of the classical groups over finite fields. (Proc. of I.C.M., Vancouver 1974).
[8] ———, Sur la conjecture de Macdonald (C. R. Acad. Sci. Paris, t. 280, (10 Fev. 1975), 317–320.
[9] I. G. Macdonald, Principal parts and the degeneracy rule (unpublished manuscript).
[10] Théorie des topos et cohomologie étale des schémas, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie 4 (dirigé par M. Artin, A. Grothendieck, J. L. Verdier) I.H.E.S., 1963–64, Springer Lecture Notes 269, 270, 305.
[11] Cohomologie l-adique et fonctions L, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois Marie 5 ; I.H.E.S., Notes polycopiées.
[12] T. A. Springer, Generalisation of Green's Polynomials, Proc. of Symp. in Pure Math. Vol. XXI (1971), A.M.S., 149–153.
[13] B. Srinivasan, The characters of the finite symplectic group $\mathrm{Sp}(4, q)$, Trans. A.M.S. 131 (1968), 488–525.
[14] R. Steinberg, Lectures on Chevalley groups, Yale University, 1967.
[15] ———, Endomorphisms of linear algebraic groups, Mem. of A.M.S. 80, 1968.

(Reçu le 6 juin 1975)

LES DIFFÉOMORPHISMES DU CERCLE
[d'après M. R. HERMAN]
par Pierre DELIGNE

Soit f un difféomorphisme, respectant l'orientation, du cercle $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$.
Si le nombre de rotation $\alpha \in \mathbf{R}/\mathbf{Z}$ de f est irrationnel (i.e. si f n'a pas de point périodique) et que la dérivée Df de f est à variation bornée (i.e. que la dérivée seconde $D^2 f$ — prise au sens des distributions — est une mesure), Denjoy a montré que f est topologiquement conjugué à la rotation

$$R_\alpha : x \longmapsto x + \alpha :$$

il existe un homéomorphisme $h : \mathbf{R}/\mathbf{Z} \to \mathbf{R}/\mathbf{Z}$, respectant l'orientation, tel que $hfh^{-1} = R_\alpha$. Cet homéomorphisme est unique à composition à gauche par une rotation près car le centralisateur d'une rotation irrationnelle est réduit aux rotations.
Il revient à peu près au même de prouver une propriété de régularité pour h, ou la même propriété, uniformément, pour tous les itérés f^n de f. Pour passer de h aux f^n, on écrit

$$f^n = (h^{-1} R_\alpha h)^n = h^{-1} R_{n\alpha} h.$$

Dans l'autre sens, il est utile de changer de notations et de passer au revêtement universel $\mathbf{R}$ du cercle $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$: f devient un difféomorphisme croissant de $\mathbf{R}$, h un homéomorphisme croissant de $\mathbf{R}$, défini à l'addition d'une constante près, ils sont tous deux de la forme $x + \varphi(x)$ avec φ périodique de période 1, et

$$hfh^{-1} = R_\alpha : x \longmapsto x + \alpha,$$

avec $\alpha \in \mathbf{R}$ (le nombre de rotation). Posons

$$h_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (f^i - i\alpha).$$

On verra que h, convenablement normalisé, est la limite des h_n (3.1). Supposons maintenant que les f^n soient uniformément $C^{r+\beta}$, i.e. que f soit C^r et que les dérivées r-ièmes $D^r f^n$ vérifient uniformément en n une condition de Hölder d'exposant β ($0 < \beta \leq 1$)

$$|D^r f^n(x) - D^r f^n(y)| \leq A|x - y|^\beta.$$

Les $f^i - R_{i\alpha}$ vérifient la même condition, et sont de plus bornés (par un). De même pour les $h_n -$ Id, qui en sont des barycentres. Les $h_n -$ Id forment donc un ensemble relativement compact de fonctions sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, pour la topologie C^r, et on peut extraire de la suite des h_n une sous-suite convergente. La conjugaison h est donc C^r, et on vérifie par passage à la limite que $D^r h$ vérifie la même condition de Hölder que les $D^r f^n$.
Herman a prouvé un théorème un peu meilleur que le suivant.
THÉORÈME.— Si le développement en fraction continue de α est à coefficients bornés, et que f est C^∞, alors h est C^∞.
On montre d'abord (§§ 1 à 6) que, pour q parcourant les dénominateurs des réduites p_n/q_n du développement de α en fraction continue, $|Df^q|$ tend rapidement vers 0 (en $1/q^\varepsilon$, avec $\varepsilon > 0$). Un tel résultat est plausible : la rotation $R_{q\alpha}$ est proche de l'identité, et $f^q = h^{-1} R_{q\alpha} h$.
On en déduit que h est $C^{1+\varepsilon'}$, avec $\varepsilon' > 0$, puis, du fait que f est $C^{1+\varepsilon'}$ conjugué à R_α, on déduit que les conjugués $f_n = h_n f h_n^{-1}$ de f tendant vers R_α dans une $C^{2+\varepsilon''}$ topologie ($\varepsilon'' > 0$) (§§ 7 et 8).
Un théorème de fonctions implicites de Arnold-Moser ([1], [3]), amélioré par Herman en s'inspirant de Rüssmann [4], montre enfin que si f est assez proche de R_α, dans une $C^{2+\varepsilon}$ topologie ($\varepsilon > 0$), alors f est C^∞-conjugué à une rotation.
Terminologie et notations
On note $\|\psi\|_\infty$ et $\|\psi\|_1$ les normes L^∞ et L^1 d'une fonction ψ sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$: $\sup |\psi(x)|$ et $\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} |\psi(x)|\, dx$. Pour $0 \leq \beta \leq 1$, on note $|\psi|_\beta$ sa norme höldérienne d'exposant β

$$|\psi|_\beta = \sup_{x \neq y} \frac{|\psi(x) - \psi(y)|}{|x - y|^\beta}.$$

On note $\mathrm{Var}(\psi)$ la variation totale de ψ. Si ψ est C^1, c'est $\|D\psi\|_1$.
R_s = la « rotation » $x \longmapsto x + s$.
$f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ est un difféomorphisme croissant de la forme $x + \varphi(x)$, avec φ périodique de période 1. On note f^n ($n \in \mathbf{Z}$) ses itérés. Par hypothèse, f et f^{-1} sont C^1 ; on suppose de plus Df (donc $\log Df$) à variation bornée.

$$V = \mathrm{Var}(\log Df).$$

α = nombre de rotation de f. On a $\|f^n - R_{n\alpha}\|_\infty < 1$. On suppose α irrationnel.
μ = la mesure de probabilité sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ invariante par f. Si h conjugue f en R_α, il transforme μ en dx : $\mu = dh$ (dérivée au sens des distributions, ou intégrale de Stieltjes).
h = l'homéomorphisme croissant de $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ qui conjugue f en R_α, normalisé par la condition que

$$\int (h(x) - x)\, \mu = 0.$$

$$h_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} (f^i - i\alpha).$$

C'est un barycentre de difféomorphismes croissants, donc un difféomorphisme croissant. On a $h = \lim h_n$ (3.1).

$$f_n = h_n f h_n^{-1}.$$

Une approximation rationnelle de $s \in \mathbf{R}$ est une fraction irréductible p/q telle que $|s - p/q| < 1/q^2$, i.e. $|qs - p| < 1/q$. Tout nombre irrationnel a une infinité d'approximations rationnelles (Dirichlet).
q désigne le dénominateur d'une approximation rationnelle de α (et p le numérateur).
§ 1. Première majoration de $|Df^q|$; inégalité de Denjoy-Koksma
THÉORÈME 1.1 (Denjoy-Koksma).— Soient $s \in \mathbf{R}$, m le dénominateur d'une approximation rationnelle de s et ψ une fonction à variation bornée sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$. On a

$$\left| \sum_{i=0}^{m-1} \psi(x + is) - m \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(t)\, dt \right| \leq \mathrm{Var}(\psi).$$

Par un changement de variable $t \longmapsto \pm(t-x)$, on se ramène à supposer que $x = 0$ et que $n/m \leq s \leq n/m + 1/m^2$ (avec $(n, m) = 1$). Pour $0 \leq i \leq m-1$, on a $in/m \leq is < in/m + 1/m$, et les in/m parcourent $\frac{1}{m}\mathbf{Z}/\mathbf{Z}$. On a donc (les sommes vont de $i = 0$ à $i = m-1$)

$$\sum_{i=0}^{m-1} \psi(is) - m \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(x)\, dx = \sum_{i=0}^{m-1} \left(\psi(is) - m \int_{in/m}^{in/m+1/m} \psi(x)\, dx \right)$$

et

$$\left| \psi(is) - \int_{in/m}^{in/m+1/m} \psi(x)\, (m\, dx) \right|$$

est majoré par la variation de ψ entre in/m et $in/m + 1/m$, d'où le théorème.
Rappelons que la variation $\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} |d\psi|$ est invariante par changement de variable. Prenons $s = \alpha$, et faisons le changement de variable qui conjugue la rotation R_α en f ; il transforme dx en la mesure μ, et on trouve
COROLLAIRE 1.2.— Pour ψ une fonction variation bornée sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, on a

$$\left| \sum_{i=0}^{q-1} \psi \circ f^i - q \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(x)\, \mu \right| \leq \mathrm{Var}(\psi).$$

1.3. On a

$$Df^n = Df \circ f^{n-1} \cdot Df^{n-1} = Df \circ f^{n-1} \cdot Df \circ f^{n-2} \cdots Df,$$

d'où

$$\log Df^n = \sum_{i=0}^{n-1} \log Df \circ f^i. \tag{1.3.1}$$

La majoration 1.2, pour $\psi = \log Df$, donne

$$\left| \log Df^q - q \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \log Df \cdot \mu \right| \leq V.$$

Si l'intégrale n'était pas nulle, $\log Df^q$ tendrait uniformément vers $\pm\infty$ pour $q \to \infty$, et Df^q tendrait uniformément vers 0 ou ∞. Puisque

$$\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} Df^q(x)\, dx = 1,$$

cela est absurde et on a
COROLLAIRE 1.4

$$\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \log Df \cdot \mu = 0.$$

COROLLAIRE 1.5

$$e^{-V} \leq Df^q \leq e^V \qquad (\text{pour } |\alpha - p/q| < 1/q^2)\,.$$

Remarque 1.6.— La méthode de démonstration du théorème 1.1 permet de prouver directement 1.2 pour tout homéomorphisme croissant f (et pour μ une mesure invariante). Si $V = \int |d \log Df| < \infty$, on en déduit 1.5. Dans sa note [2], c'est à partir de 1.5 que Denjoy prouve que f est topologiquement conjugué à une rotation.

1.7. Soient s un nombre irrationnel, q_i ($i \geq 0$) une suite croissante d'approximations rationnelles de s et a_i la partie entière de q_i/q_{i-1} ($i \geq 1$). On suppose que $q_0 = 1$. Tout entier $N < q_n$ peut s'écrire

$$N = \sum_{i<n} b_i q_i \qquad \text{avec } b_i \leq a_{i+1} :$$

si $n = 0$, c'est clair ; si $n > 0$, on écrit $N = b_{n-1}q_{n-1} + N'$ avec $N' < q_{n-1}$ et on conclut par récurrence. La somme $\sum_{i<N} \psi(x + is)$ se décompose alors en $(\sum b_i)$ sommes partielles, chacune de longueur l'un des q_i, et (1.1) donne

$$\left| \sum_{i=0}^{N-1} \psi(x + is) - N \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(t)\, dt \right| \leq \sum_i b_i \operatorname{Var}(\psi) \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \operatorname{Var}(\psi), \tag{1.7.1}$$

et, pour $s = \alpha$, (1.2) et (1.3) donnent

$$\left\| \sum_{i=0}^{N-1} \psi \circ f^i - N \int \psi\, \mu \right\|_\infty \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \operatorname{Var}(\psi), \tag{1.7.2}$$

$$\| \log Df^N \|_\infty \leq \sum_{q_i \leq N} a_{i+1} V. \tag{1.7.3}$$

§ 2. Majoration de $|D^2 f^q|$

2.1. Dérivons deux fois la formule (1.3.1)

$$\log Df^n = \sum_{i<n} \log Df \circ f^i :$$

$$D \log Df^n = \sum_{i<n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i, \tag{2.1.1}$$

soit

$$D^2 f^n = Df^n \cdot \sum_{i<n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i. \tag{2.1.2}$$

$$\begin{aligned} D^2 \log Df^n &= \sum_{i<n} \left(D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2 + D \log Df \circ f^i \cdot D^2 f^i \right) \\ &= \sum_{i<n} D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2 + \sum_{j<i<n} D \log Df \circ f^i \cdot Df^i \cdot D \log Df \circ f^j \cdot Df^j. \end{aligned} \tag{2.1.3}$$

Dans le dernier terme, on reconnaît (Oh ! miracle) les termes croisés du développement du carré du second membre de (2.1.1). Complétant le carré, on trouve

$$D^2 \log Df^n = \frac{1}{2}(D \log Df^n)^2 - \frac{1}{2} \sum_{i<n} (D \log Df \circ f^i \cdot Df^i)^2 + \sum_{i<n} D^2 \log Df \circ f^i \cdot (Df^i)^2. \tag{2.1.4}$$

Si on majore dans (2.1.4) les $|Df^i|$ par $\sup_{i<n} \|Df^i\|_\infty$, on trouve

$$\|D^2 \log Df^n\|_\infty \leq \frac{1}{2} \|D \log Df^n\|_\infty^2 + \frac{1}{2} An \sup_{i<n} \|Df^i\|_\infty^2, \tag{2.1.5}$$

pour

$$A = \|D \log Df\|_\infty^2 + 2\|D^2 \log Df\|_\infty. \tag{2.1.6}$$

2.2. D'après Hadamard, pour ψ une fonction C^2 sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, on a (cf. 7.1.4)

$$\|D\psi\|_\infty \leq \left(2\|\psi\|_\infty \|D^2 \psi\|_\infty \right)^{1/2}. \tag{2.2.1}$$

Supposons f C^3, et appliquons cette inégalité d'interpolation à $\psi = \log Df^q$, en tenant compte de (1.5) et (2.1.5) :

$$\|D \log Df^q\|_\infty \leq \left(V \|D \log Df^q\|_\infty^2 + qAV \sup_{i<q} \|Df^i\|_\infty^2 \right)^{1/2}. \tag{2.2.2}$$

Si $V < 1$, ceci fournit une estimation pour $\|D \log Df^q\|_\infty$ (qui figure dans les deux membres de la formule) : élevant au carré, on trouve

$$\|D \log Df^q\|_\infty^2 \leq \frac{AV}{1-V} \cdot q \cdot \sup_{i<q} \|Df^i\|_\infty^2.$$

Écrivant que $D \log Df^q = D^2 f^q / Df^q$, et réappliquant 1.5, on trouve enfin le

THÉORÈME 2.3.— Supposons f C^3, et que $V < 1$. Soit

$$B = \left(\frac{AV}{1-V} \right)^{1/2} \cdot e^V$$

où A est défini par (2.1.6). Si q est le dénominateur d'une approximation ration-

nelle de α, on a

$$\|D^2 f^q\|_\infty \leq B\, q^{1/2} \sup_{i<q} \|Df^i\|_\infty.$$

Le gain essentiel dans cette majoration est qu'on a obtenu un facteur $\sqrt{q}$, plutôt que q.

§ 3. Var$(\log Df_n)$ tend vers 0

Pour pouvoir appliquer 2.3, il est nécessaire de se ramener au cas où $V < 1$. Plus tard, pour contrôler les $\|Df^i\|_\infty$, $(i < q)$, on aura même besoin de se ramener au cas où V est petit. Le résultat principal 3.3 de ce paragraphe le permettra.

PROPOSITION 3.1.— Les h_n convergent uniformément vers h.

Posons $\psi(x) = h(x) - x$. Par définition, h est normalisé de telle sorte que

$$\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \psi(x)\, \mu = 0.$$

La formule $R_\alpha h = hf$ s'écrit $h = h \circ f - \alpha = f - \alpha + \psi \circ f$. De même, puisque h conjugue f^i en $R_{i\alpha}$, on a

$$h = f^i - i\alpha + \psi \circ f^i.$$

Prenons la moyenne de ces identités, pour $0 \leq i < n$:

$$h = \frac{1}{n} \sum_{i<n} (f^i - i\alpha) + \frac{1}{n} \sum_{i<n} \psi \circ f^i = h_n + \frac{1}{n} \sum_{i<n} \psi \circ f^i.$$

Il reste à montrer que $\frac{1}{n} \sum_{i<n} \psi \circ f^i$ converge uniformément vers $\int \psi\, \mu = 0$. On peut le déduire de 1.7 (ψ est de variation ≤ 2), ou, par un changement de variable (par h) ramener cette convergence à un théorème d'H. Weyl :

Rappel 3.2 (H. Weyl).— Soient φ une fonction continue sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, et α un nombre irrationnel. Les sommes

$$S_n(\varphi) = \frac{1}{n} \sum_{i<n} \varphi(x + i\alpha)$$

convergent uniformément vers

$$\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \varphi(x)\, dx.$$

On le voit en approchant φ par des polynômes trigonométriques P. On vérifie directement que, pour un polynôme trigonométrique, $S_n(P)$ tend vers $\int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} P(x)\, dx$. Puisque $|S_n(\varphi)| \leq \|\varphi\|_\infty$, on a donc

$$\limsup \left\| S_n(\varphi) - \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} \varphi(x)\,dx \right\|_\infty = \limsup \left\| S_n(\varphi - P) - \int_{\mathbf{R}/\mathbf{Z}} (\varphi(x) - P(x))\,dx \right\|_\infty \leq 2\|\varphi - P\|_\infty,$$

arbitrairement petit.

THÉORÈME 3.3.— Si f est C^2, la variation

$$V_n = \|D \log Df_n\|_1$$

tend vers 0 pour $n \to \infty$.

Calculons Df_n. On a

$$h_n \circ f = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}(f^{i+1} - i\alpha) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(f^i - i\alpha) + \alpha = h_n + \alpha + \frac{1}{n}(f^n - x - n\alpha),$$

d'où

$$f_n = R_\alpha + \frac{1}{n}(f^n - x - n\alpha) \circ h_n^{-1}$$

et

$$Df_n = 1 + \left[\frac{1}{n}(Df^n - 1) \cdot (Dh_n)^{-1}\right] \circ h_n^{-1}.$$

Ainsi

$$Df_n - 1 = \frac{Df^n - 1}{\sum_{i<n} Df^i} \circ h_n^{-1}.$$

Par ailleurs, puisque $Df^n = Df \circ f^{n-1} \cdot Df^{n-1}$ et que

$$(Df^{n-1})^{-1} \circ f^{1-n} = D(f^{1-n}),$$

$$\frac{Df^n}{\sum_{i<n} Df^i} \circ f^{1-n} = \frac{Df}{\sum_{i<n} Df^i \circ f^{1-n} \cdot D(f^{1-n})} = \frac{Df}{\sum_{i<n} Df^{-i}},$$

soit

$$Df_n - 1 = \left(\frac{Df}{\sum_{i<n} Df^{-i}} \circ f^{n-1} - \frac{1}{\sum_{i<n} Df^i}\right) \circ h_n^{-1}. \tag{3.3.1}$$

Lemme 3.4.— La somme $\sum_{i<n} Df^i$ tend uniformément vers ∞.

Les Df^i sont en effet tous positifs, et une infinité d'entre eux est $\geq e^{-V}$ (1.5). Appliquant ce lemme à f et f^{-1}, on déduit de 3.4 que

Lemme 3.5.— Les Df_n tendent uniformément vers 1 ; il revient donc au même de prouver que les V_n tendent vers 0, ou que la variation de Df_n tend vers 0.

La variation étant invariante par changement de variable, on a

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(Df_n) = \mathrm{Var}(Df_n - 1) &\leq \mathrm{Var}\left(\frac{Df}{\sum_{i<n} Df^{-i}}\right) + \mathrm{Var}\left(\frac{1}{\sum_{i<n} Df^{i}}\right)\\ &= \left\| D\frac{Df}{\sum_{i<n} Df^{-i}}\right\|_1 + \left\| D\frac{1}{\sum_{i<n} Df^{i}}\right\|_1\\ &\leq \left\| \frac{D^2 f}{\sum_{i<n} Df^{-i}}\right\|_1 + \|Df\|_\infty \left\| D\frac{1}{\sum_{i<n} Df^{-i}}\right\|_1 + \left\| D\frac{1}{\sum_{i<n} Df^{i}}\right\|_1.\end{aligned}$$

D'après 3.4, la fonction dans le premier terme tend uniformément vers 0. Le théorème 3.1 résulte donc du résultat suivant appliqué à f et f^{-1}.

THÉORÈME 3.6.— Si f est C^2,

$$D\left(\frac{1}{\sum_{i<n} Df^{i}}\right)$$

est uniformément borné, et tend presque partout vers 0. Cette fonction tend donc vers 0 en norme L^1.

Soit G l'automorphisme

$$\varphi \longmapsto \varphi \circ f \cdot Df = f^*(\varphi\, dx)/dx$$

de $L^1(\mathbf{R}/\mathbf{Z})$. Il respecte la norme L^1 et transforme fonctions positives en fonctions positives. On peut donc lui appliquer le théorème ergodique de Chacon-Ornstein (voir par exemple, Garsia, Topics in almost everywhere convergence) : pour tout φ dans L^1, les

$$\psi_n(\varphi) = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} G^i(\varphi)}{\sum_{i=0}^{n-1} G^i(1)} = \frac{\sum_{i=0}^{n-1} \varphi \circ f^i \cdot Df^i}{\sum_{i=0}^{n-1} Df^i}$$

tendent presque partout vers une limite $\psi(\varphi)$.

On appliquera ce théorème à $\varphi = D\log Df$. On pose

$$\psi_n = \frac{\sum_{i<n} D\log Df \circ f^i \cdot Df^i}{\sum_{i<n} Df^i},$$

et on note ψ la limite presque sûre des ψ_n. Les $|\psi_n|$, donc $|\psi|$, sont majorés par $\|D\log Df\|_\infty$.

Lemme 3.7.—

$$D\left(\frac{1}{\sum_{i<n} Df^i}\right)$$

est uniformément borné, et tend presque partout (donc aussi en norme L^1) vers $-\frac{1}{2}\psi$.
Les indices de sommation allant de 0 à $n-1$, on a

$$-D\left(\frac{1}{\sum Df^i}\right) = \frac{\sum D^2 f^i}{(\sum Df^i)^2} = \frac{\sum_{i>j} Df^i \cdot D\log Df\circ f^j \cdot Df^j}{(\sum Df^i)^2}.$$

Les

$$\lambda_{ij} = \frac{Df^i Df^j}{\left(\sum_{i<n} Df^i\right)^2} \qquad (j<i<n)$$

étant positifs, de somme ≤ 1, on voit déjà que

$$-D\left(\frac{1}{\sum Df^i}\right) = \sum \lambda_{ij} D\log Df\circ f^j$$

est majoré, en valeur absolue, par $\|D\log Df\|_\infty$.
Les indices de sommation allant toujours de 0 à $n-1$, on a

$$\begin{aligned}\sum_{i>j} Df^i \cdot D\log Df\circ f^j \cdot Df^j &= \sum_i Df^i\cdot\psi_i\cdot\sum_{j<i} Df^j \\ &= \psi\cdot\sum_{j<i} Df^i Df^j + \sum_i(\psi-\psi_i)Df^i\sum_{j<i}Df^j \\ &= \frac{1}{2}\psi\cdot\left(\sum Df^i\right)^2 - \frac{1}{2}\psi\sum(Df^i)^2 + \sum_i(\psi-\psi_i)Df^i\sum_{j<i}Df^j,\end{aligned}$$

$$D\left(\frac{1}{\sum Df^i}\right) + \frac{1}{2}\psi = \frac{1}{2}\psi\cdot\frac{\sum(Df^i)^2}{(\sum Df^i)^2} + \frac{\sum_i(\psi-\psi_i)Df^i\sum_{j<i}Df^j}{(\sum Df^i)^2}.$$

Majorons $\sum(Df^i)^2 = \sum Df^i\cdot Df^i$ par $\sup Df^i\cdot\sum Df^i$ et $\sum_{j<i}Df^j$ par $\sum Df^j$. On trouve

$$\left|D\left(\frac{1}{\sum Df^i}\right)+\frac{1}{2}\psi\right| \leq \frac{1}{2}|\psi|\frac{\sup Df^i}{\sum Df^i} + \frac{\sum|\psi-\psi_i|Df^i}{\sum Df^i} = A_n + B_n.$$

Quel que soit j entre 0 et $n-1$,

$$\frac{Df^j}{\sum Df^i} = \left(\sum Df^i \cdot (Df^j)^{-1}\right)^{-1} = \left(\sum Df^{i-j} \circ f^j\right)^{-1} \leq \inf\left(\frac{1}{\sum_{i<n-j} Df^i} \circ f^j, \frac{1}{\sum_{i\leq j} Df^{-i}} \circ f^j\right).$$

D'après 3.4, A_n tend donc uniformément vers 0. Quant à B_n, le lemme suivant, de vérification laissée au lecteur, montre que B_n tend vers 0 en tout point où ψ_n tend vers ψ.

Lemme 3.8.— Soient a_n une suite qui tend vers 0, et b_n une série positive divergente. Alors,

$$\frac{\sum_{i<n} a_i b_i}{\sum_{i<n} b_i}$$

tend vers 0.

Déduisons enfin 3.6 de 3.7 : puisque $1/\sum_{i<n} Df^i$ tend vers 0,

$$D\left(1/\sum_{i<n} Df^i\right)$$

tend vers 0, au sens des distributions. D'après 3.7, cette suite tend L^1 vers $-\frac{1}{2}\psi$. On a donc $\psi = 0$, et on applique 3.7.

Complément 3.9.— Herman sait déduire de 3.7 qu'un difféomorphisme croissant de $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, C^2 et à nombre de rotation irrationnel, est dx-ergodique : toute partie borélienne (voire dx-mesurable) de $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ stable par f est de mesure de Lebesgue 0 ou 1.

Remarque 3.10.— Le théorème de Chacon-Ornstein n'est pas effectif : il ne fournit pas d'estimation quant à la rapidité avec laquelle, pour chaque ε, les ψ_n tendent uniformément vers ψ en dehors d'un ensemble de mesure ε. De ce fait, je ne sais pas déduire de la démonstration ci-dessus une majoration effective des V_n.

§ 4. Approximation d'un nombre par les rationnels

Sauf en 4.5, les conventions générales sur α, p, q sont suspendues dans ce paragraphe. Nous commençons par des rappels sur les fractions continues, pour lesquelles on peut consulter Hardy and Wright.

4.1. Soit $[a_0, \ldots, a_n, \ldots] = a_0 + 1/(a_1 + 1/\cdots$ ($a_i \in \mathbf{Z}$, $a_i > 0$ pour

$i > 0$) le développement en fraction continue d'un nombre irrationnel α. Soit $p_n/q_n = [a_0, \ldots, a_n]$ la n-ième réduite. On a $p_n/q_n < \alpha$ pour n pair, $p_n/q_n > \alpha$ pour n impair. Si, pour $i = -1, -2$, on définit (p_i, q_i) par

$$\begin{pmatrix} p_{-2} & p_{-1} \\ q_{-2} & q_{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

on a pour tout $n \geq 0$

$$\begin{pmatrix} p_{n-1} & p_n \\ q_{n-1} & q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{n-2} & p_{n-1} \\ q_{n-2} & q_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & a_n \end{pmatrix}, \tag{4.1.1}$$

soit

$$\begin{cases} p_n = a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \\ q_n = a_n q_{n-1} + q_{n-2}. \end{cases} \tag{4.1.2}$$

De (4.1.2), il résulte que

$$a_{n+1} q_n \leq q_{n+1} \leq (a_{n+1} + 1) q_n, \tag{4.1.3}$$

$$2q_n \leq (a_{n+1} a_{n+2} + 1) q_n \leq q_{n+2}, \tag{4.1.4}$$

$$q_n \geq \sqrt{2}^{\,n} \quad \text{pour } n \geq 2 \quad (\text{car } q_0 = 1,\ q_3 \geq 3 > 2^{3/2}). \tag{4.1.5}$$

De (4.1.1), on déduit par récurrence que $p_{n+1} q_n - p_n q_{n+1} = \pm 1$, i.e.

$$\left| \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| = \frac{1}{q_n q_{n+1}}. \tag{4.1.6}$$

Puisque α est entre p_n/q_n et p_{n+1}/q_{n+1}, il résulte de (4.1.6) que les p_n/q_n sont des approximations rationnelles de α, par défaut pour n pair, par excès pour n impair.

4.2. On a entre réduites et approximations rationnelles les relations suivantes :

(4.2.1) Toute approximation rationnelle de s est soit une réduite, soit de la forme $[a_0, \ldots, a_{n-1}, a_n \pm 1]$. Si on range les approximations rationnelles par dénominateurs croissants, de 3 successives, l'une au moins est une réduite.

(4.2.2) De deux réduites successives, l'une au moins vérifie

$$\left|\alpha - \frac{p}{q}\right| < \frac{1}{2q^2}.$$

Une approximation rationnelle telle que $|s - p/q| < 1/(2q^2)$ est une réduite.

4.3. Posons

$$\|\!|x|\!\| = \inf_{n\in\mathbf{Z}} |x - n|.$$

Les dénominateurs q_n sont les nombres q tels que $\|\!|q\alpha|\!\| < \|\!|q'\alpha|\!\|$ pour tout $q' < q$. Sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$, trois $q_n\alpha$ successifs sont disposés ainsi (le dessin est pour $a_{n+2} = 2$) :

$$q_{n+1}\alpha \quad \Big| \quad 0 \quad \Big| \quad q_{n+2}\alpha \quad \underbrace{\qquad\qquad}_{a_{n+2}(q_{n+1}\alpha)} \quad q_n\alpha. \tag{4.3.1}$$

Si on exclut le cas où $n = 0$, $a_1 = q_1 = 1$, $\|\!|q_n\alpha|\!\|$ est la distance de 0 à $q_n\alpha$, telle qu'elle apparaît sur cette figure, et

$$a_{n+2} \text{ est la partie entière de } \frac{\|\!|q_n\alpha|\!\|}{\|\!|q_{n+1}\alpha|\!\|} \quad (\text{pour } n \geq 1), \tag{4.3.2}$$

$$\|\!|q_{n+2}\alpha|\!\| \leq \frac{1}{a_{n+2}+1}\|\!|q_n\alpha|\!\| \leq \frac{1}{2}\|\!|q_n\alpha|\!\|. \tag{4.3.3}$$

Posons $p'_n/q'_n = [a_0, \ldots, a_n + 1]$. On a la disposition

$$\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \quad \Big| \quad \alpha \quad \Big| \quad \frac{p'_{n+1}}{q'_{n+1}} \quad \Big| \quad \frac{p_n}{q_n}. \tag{4.3.4}$$

d'où, par (4.1.6) et (4.1.3),

$$\frac{1}{q_n q'_{n+1}} \leq \left|\alpha - \frac{p_n}{q_n}\right| \leq \frac{1}{q_n q_{n+1}}, \tag{4.3.5}$$

soit

$$\frac{1}{(a_{n+1}+2)q_n} \leq \|\!|q_n\alpha|\!\| \leq \frac{1}{a_{n+1}q_n} \quad (\text{sauf pour } n = 0,\ q_0 = q_1 = 1). \tag{4.3.6}$$

Comparant (4.1.3) et (4.3.6), et tenant compte de (4.2.2), on voit qu'il revient au même d'exiger
(a) que $\|\!|q\alpha|\!\|$ ne soit jamais trop petit ;
(b) que a_n ne soit jamais trop grand ;
(c) que les dénominateurs des approximations rationnelles de α ne croissent pas trop vite.

DÉFINITION 4.4.— Un nombre irrationnel α est de densité bornée si sa densité

$$d = \sup_{n>0} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} a_i$$

est finie.
Appliquons 1.7, pour $s = \alpha$ de densité $d < \infty$, en prenant pour q_i les dénominateurs des réduites successives. Pour $n \geq 2^{N/2}$, on a $N \leq q_n$ (4.1.5) et

$$\sum_{q_i \leq N} a_{i+1} \leq nd.$$

La formule 1.7.3 nous fournit la
PROPOSITION 4.5.— Il existe des constantes universelles C, D telles que, pour α de densité bornée d, on ait

$$\|D^N f\|_\infty \leq C^{dV} \cdot N^{DdV}.$$

4.6. Soit $T : [0,1[\to [0,1[$, $x \longmapsto$ partie fractionnaire de x^{-1}. La mesure de probabilité

$$\nu = \frac{1}{\log 2} \frac{dx}{1+x}$$

sur $[0,1[$ vérifie $T_*\nu = \nu$. Khintchine a montré que T est ν-ergodique. Le n-ième coefficient du développement en fraction continue de x irrationnel dans $[0,1]$ est

$$a_n(x) = [(T^{n-1}(x))^{-1}] \qquad (n \geq 1).$$

Pour presque tout x (au sens de la mesure ν — ou de celle de Lebesgue, c'est pareil) un entier k apparaît donc dans la suite des $a_n(x)$ ($n \geq 1$) avec une fréquence

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \big(\#\{n \leq N \mid a_n(x) = k\}\big) = \int_{[x^{-1}]=k} \nu \sim \frac{1}{k^2}.$$

Puisque la somme $\sum_k \frac{1}{k^2} \cdot k$ diverge, l'ensemble des nombres de densité bornée est de mesure de Lebesgue nulle. La proposition 4.5 est la seule étape de la démonstration d'Herman où l'on doive faire sur α une hypothèse qui n'est pas vérifiée par presque tout nombre.

§ 5. Majoration de $|f^{q_n} - x - p_n|$

On notera par p_n/q_n la n-ième réduite de α. D'après 4.3.3, on a sur le cercle $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ la disposition



Authority-derived positional diagram P15-A01.

Par conjugaison, la même disposition vaut pour les itérés de f :



Authority-derived positional diagram P15-A02.

Sur $\mathbf{R}$, la même disposition vaut si on remplace f^{q_i} par $f^{q_i} - p_i$. L'axe doit être orienté de gauche à droite pour n impair, de droite à gauche pour n pair.

Puisque $Df^{q_i} \geq e^{-V}$, on en déduit que

$$(1 + e^{-V})\,|f^{q_{n+2}}(x) - p_{n+2} - x| \leq |f^{q_n}(x) - p_n - x|\,,$$

d'où la

PROPOSITION 5.1.— Les $\|f^{q_n} - x - p_n\|_\infty$ décroissent au moins aussi vite qu'une progression géométrique.

Cet argument, un peu affiné, permet de prouver le théorème suivant.

THÉORÈME 5.2.— Supposons que α vérifie la condition

$$(*) \qquad \lim_{A\to\infty} \limsup_{N\to\infty} \frac{\sum\limits_{\substack{a_i>A \\ 1\leq i\leq N}} \log(a_i+1)}{\sum\limits_{1\leq i\leq N} \log(a_i+1)} = 0,$$

soit, ce qui revient au même,

$$(*)' \qquad \text{Pour tout } \varepsilon, \text{ il existe } A \text{ tel que } \prod_{\substack{a_i>A \\ 1\leq i\leq N}} (a_i+1) \leq O(q_N^{\varepsilon}).$$

Il existe alors une fonction $V \longmapsto \varepsilon(V)$, tendant vers 0 avec V, telle que

$$|f^{q_n}(x) - p_n - x| \leq O\Big(q_n^{-1+\varepsilon(V)}\Big)\,.$$

Esquisse de démonstration.
a) Soient p/q et p'/q' deux approximations rationnelles par excès de α, $a = q\alpha - p$, $b = q'\alpha - p'$ et $c = a/b$. Si $0 \leq rb \leq a$ (r entier ≥ 1), on a sur $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ la disposition (dessin pour $r = 3$) :

Authority-derived positional diagram P16-A01.

et, puisque $Df^{q'} \geq e^{-V}$,

$$\left(\sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV}\right)\left|f^{q'}(x) - p' - x\right| \leq |f^q(x) - p - x|\,.$$

b) Plus généralement, si $rb \leq sa$, i.e. si $r/s \leq c$, on a

$$\left(\sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV}\right)\left|f^{q'}(x) - p' - x\right| \leq \left(\sum_{i=0}^{s-1} e^{iV}\right)|f^q(x) - p - x|\,. \tag{5.2.1}$$

Pour $r = 3$, $s = 2$, on a le dessin :



Authority-derived positional diagram P16-A02.

c) Quels que soient ε et A, il existe B tel que

$$\forall x\ (2 \leq x \leq A) \quad \exists r, s \quad (r \leq B,\ s \leq B,\ x^{1-\varepsilon} < r/s < x).$$

Il existe ensuite V_0 tel que si $V < V_0$, on ait pour tout $r, s < B$, avec $r \geq 2s$,

$$\frac{\displaystyle\sum_{i=0}^{s-1} e^{iV}}{\displaystyle\sum_{i=0}^{r-1} e^{-iV}} \leq \left(\frac{s}{r}\right)^{1-\varepsilon}.$$

d) Si $V < V_0$, et que $2 \leq c \leq A$, (5.2.1) donne

$$\left|f^{q'}(x) - p' - x\right| \leq c^{-1+\varepsilon'}\,|f^q(x) - p - x|\,, \tag{5.2.2}$$

avec $(1 - \varepsilon') = (1 - \varepsilon)^2$.

e) Prenons la suite des approximations rationnelles p_{2n+1}/q_{2n+1}, et soit

$$b_n = |q_{2n+1}\alpha - p_{2n+1}| = \|\|\|q_{2n+1}\alpha\|\|\|.$$

On a

$$2 \leq \frac{b_n}{b_{n+1}} \leq (a_{2n+2}+1)(a_{2n+3}+1).$$

Si $V < V_0$, on a donc

$$\begin{cases} |f^{q_{2n+3}}(x) - p_{2n+3} - x| \leq \left(\dfrac{b_{n+1}}{b_n}\right)^{1-\varepsilon'} |f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| & (1) \\ \qquad\qquad \text{si } (a_{2n+2}+1)(a_{2n+3}+1) \leq A, & \\ |f^{q_{2n+3}}(x) - p_{2n+3} - x| \leq |f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| & (2) \\ \qquad\qquad \text{en tout cas.} & \end{cases}$$

Mettant bout à bout ces inégalités, on trouve que

$$|f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| \leq O\left(\left[\prod (a_{2i}+1)(a_{2i+1}+1)\right]^{1-\varepsilon'} \cdot b_n^{1-\varepsilon'}\right),$$

où le produit est étendu aux $i \leq n$ tels que $(a_{2i}+1)(a_{2i+1}+1) \geq A$.
On le majore par le produit $B_n = \prod (a_j+1)^2$ étendu aux $j \leq 2n+1$ tels que $a_j + 1 \geq A^{1/2}$, et on majore b_n par $1/q_{2n+1}$:

$$|f^{q_{2n+1}}(x) - p_{2n+1} - x| \leq O\left(B_n q_{2n+1}^{-1+\varepsilon'}\right).$$

L'hypothèse sur α permet de faire rentrer B_n dans le ε', et de conclure.
Remarque 5.3.— La condition (*) est vérifiée par presque tout nombre, et par les nombres de densité bornée.
Remarque 5.4.— Sauf si les a_i sont bornés, cette méthode ne permet malheureusement pas d'obtenir une minoration de $|f^{q_n}(x) - p_n - x|$.

§ 6. Majoration de $|Df^{q_n} - 1|$

Soit $\varphi_n = f^{q_n} - p_n - x$. Nous allons majorer $|Df^{q_n} - 1| = |D\varphi_n|$ par la formule d'interpolation de Hadamard (2.2.1). On a, pour α de densité bornée, et f C^3,

$$\|\varphi_n\|_\infty \leq O\left(q_n^{-1+\varepsilon(V)}\right) \quad \text{avec } \varepsilon(V) \to 0 \text{ pour } V \to 0 \qquad (5.2),$$

$$\|D^2\varphi_n\|_\infty \leq O\left(q_n^{1/2} \cdot \sup_{i<q_n} \|Df^i\|_\infty\right) \quad \text{pour } V < 1 \qquad (2.3),$$

$$\sup_{i<q_n} \|Df^i\|_\infty \leq O\left(q_n^{\varepsilon'(V)}\right) \quad \text{avec } \varepsilon'(V) \to 0 \text{ pour } V \to 0 \qquad (4.5).$$

On a donc

$$\|D\varphi_n\|_\infty \leq O\left(q_n^{-1/4+\varepsilon''(V)}\right), \qquad \varepsilon''(V) = \tfrac{1}{2}(\varepsilon(V) + \varepsilon'(V)).$$

Quel que soit $\varepsilon > 0$, il existe m tel que

$$\varepsilon''(\text{Var} \log Df_m) < \varepsilon \qquad (3.3),$$

d'où

$$\|Df_m^{q_n} - 1\|_\infty \leq O\left(q_n^{-1/4+\varepsilon}\right).$$

Par conjugaison ($f^{q_n} = h_m f_m^{q_n} h_m^{-1}$, $f_m^{q_n}$ est proche de $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ par 5.2, et h_m est C^3), on obtient enfin le

THÉORÈME 6.1.— Si f est C^3, et α de densité bornée, on a pour tout $\varepsilon > 0$

$$\|Df^{q_n} - 1\|_\infty \leq O\left(q_n^{-1/4+\varepsilon}\right).$$

§ 7. h est $C^{1+\beta}$ pour $\beta < 1/3$

7.1. Nous aurons à utiliser les propriétés suivantes de la norme höldérienne $|\varphi|_\beta$.

(7.1.1) Pour φ périodique de période 1, et $g : \mathbf{R}/\mathbf{Z} \to \mathbf{R}/\mathbf{Z}$, on a

$$|\varphi \circ g|_\beta \leq |\varphi|_\beta \|Dg\|_\infty^\beta.$$

(7.1.2) $|\varphi|_\beta$ est une fonction croissante logarithmiquement convexe de β.

$\log|\varphi|_\beta$ est en effet la borne supérieure des fonctions linéaires croissantes

$$\log\frac{|\varphi(x)-\varphi(y)|}{|x-y|^\beta}.$$

$$|\varphi|_0 \le 2\|\varphi\|_\infty \qquad \text{et} \qquad |\varphi|_1 = \|D\varphi\|_\infty. \tag{7.1.3}$$

$$\|D\varphi\|_\infty \le \left(\frac{1+\beta}{2\beta}\right)^{\beta/(\beta+1)} \cdot \left(|\varphi|_0^\beta |D\varphi|_\beta\right)^{1/(1+\beta)}. \tag{7.1.4}$$

Supposons que le maximum de $|D\varphi|$ soit atteint en x_0, et pour fixer les idées, que $D\varphi(x_0) \ge 0$. On a alors

$$D\varphi(x) \ge \|D\varphi\|_\infty - |D\varphi|_\beta (x-x_0)^\beta$$

et

$$\varphi(x)-\varphi(x_0) \ge \|D\varphi\|_\infty (x-x_0) - |D\varphi|_\beta \frac{(x-x_0)^{1+\beta}}{1+\beta}, \qquad x \ge x_0.$$

On évalue cette minoration en x telle que $\|D\varphi\|_\infty - |D\varphi|_\beta (x-x_0)^\beta = 0$. Joignant le résultat au résultat symétrique, pour $x < x_0$, on trouve que

$$\frac{1}{2}|\varphi|_0 \ge \|D\varphi\|_\infty X - |D\varphi|_\beta \frac{X^{1+\beta}}{1+\beta} = X\left(\|D\varphi\|_\infty - \frac{|D\varphi|_\beta X^\beta}{1+\beta}\right)$$

pour X tel que $\|D\varphi\|_\infty = |D\varphi|_\beta X^\beta$. La formule d'interpolation (7.1.4), dont la formule d'Hadamard (2.2.1) est le cas particulier $\beta = 1$, en résulte.

(7.1.5) $\|\varphi\|_\beta = \|\varphi\|_\infty + |\varphi|_\beta$ est une norme d'algèbre de Banach sur l'algèbre des fonctions C^β. La formule $\|\varphi_1\varphi_2\|_\beta \le \|\varphi_1\|_\beta \|\varphi_2\|_\beta$ se déduit de l'identité

$$\varphi_1(x)\varphi_2(x) - \varphi_1(y)\varphi_2(y) = \varphi_1(x)(\varphi_2(x)-\varphi_2(y)) + (\varphi_1(x)-\varphi_2(x))\varphi_2(y).$$

7.2. On suppose α de densité bornée et f C^3. Soit $\varepsilon < 1/4$. D'après 6.1, on a une majoration

$$|\log Df^{q_n}| \le A \cdot q_n^{-\varepsilon}. \tag{7.2.1}$$

Soit N un entier, et écrivons $N = \sum b_i q_i$ comme en 1.7. Si on brise la somme

$$\log Df^N = \sum_{i<N} \log Df \circ f^i$$

en sommes partielles comme en 1.7, on trouve

$$\log Df^N = \sum_i \left(\sum \text{ de } b_i \text{ termes de la forme } \log Df^{q_i} \circ f^j\right). \tag{7.2.2}$$

Appliquons (7.2.1) :

$$\|\log Df^N\|_\infty \leq A\sum_{i=0}^{\infty} a_{i+1}q_i^{-\varepsilon}. \tag{7.2.3}$$

Cette somme converge si α est à densité bornée (et pour presque tout nombre), d'où la
PROPOSITION 7.3.— $\|\log Df^n\|_\infty$ est uniformément borné.
7.4. Supposons que $V<1$, et interpolons par 7.1.2 entre l'estimation 6.1 de $\|Df^{q_n}-1\|_\infty$ et l'estimation 2.3 de $\|D(Df^{q_n}-1)\|_\infty$. On trouve, pour $\beta<1/3$, une majoration

$$|Df^{q_n}|_\beta \leq O(q_n^{-\varepsilon}) \qquad \text{avec } \varepsilon>0. \tag{7.4.1}$$

Prenons $|\ |_\beta$ de (7.2.2). Les $\circ f^j$ y sont sans importance par (7.1.1) et 7.3, d'où

$$|Df^n|_\beta \leq O\Big(\sum a_{i+1}q_i^{-\varepsilon}\Big) = O(1) :$$

les f^n sont uniformément $C^{1+\beta}$, les h_n le sont aussi, et h est donc $C^{1+\beta}$, comme expliqué dans l'introduction. On se débarrasse enfin de l'hypothèse $V<1$ par 3.3.
PROPOSITION 7.5.— Pour tout $\beta<1/3$, h est $C^{1+\beta}$.
§ 8. $C^{2+\beta}$ convergence des f_n
THÉORÈME 8.1.— Soit $0<\beta'<\beta\leq 1$. On suppose que f est $C^{2+\beta}$ et que h est $C^{1+\beta}$. Alors, les f_n convergent vers R_α dans la $C^{2+\beta'}$-topologie.
On sait déjà que la convergence est C^1 (3.5). C'est d'ailleurs ici évident sur (3.3.1) puisque les Df^i sont bornés inférieurement :

$$Df^i > A > 0.$$

Les formules d'interpolation (7.1.2) et (7.1.4) nous ramènent donc à montrer que les f_n restent bornés dans la $C^{2+\beta}$-topologie, i.e. que les $|D^2 f_n|_\beta$ restent bornés.
Les f^n sont uniformément $C^{1+\beta}$. Les

$$\left|\frac{1}{n}\sum_{i<n} Df^i\right|_\beta$$

sont donc bornés. Puisque les Df^i sont bornés inférieurement, et que

$$|\varphi^{-1}|_\beta \leq \frac{|\varphi|_\beta}{(\inf|\varphi|)^2},$$

les

$$\left| \frac{n}{\sum_{i<n} Df^i} \right|_\beta$$

sont également bornés.
Par la même méthode qu'en 3.6, compte tenu de ce que les h_n et f^n sont uniformément C^1 (ce qui justifie les changements de variable), on se ramène à majorer uniformément en norme $\| \ \|_\beta$ (7.1.5) les fonctions

$$-D\left(\frac{1}{\sum_{i<n} Df^i}\right) = \sum_{j<i<n} \lambda_{ij}\, D\log Df \circ f^j$$

pour

$$\lambda_{ij} = \frac{Df^i Df^j}{\left(\sum_{i<n} Df^i\right)^2} = \frac{1}{n^2}\left[Df^i \cdot Df^j \cdot \left(\frac{n}{\sum_{i<n} Df^i}\right)^2\right] \qquad \text{(preuve de } (3.7)).$$

L'expression entre crochets, et les $D\log Df \circ f^j$, étant uniformément bornés en norme $\| \ \|_\beta$, c'est immédiat.
§ 9. Application d'un théorème des fonctions implicites
Le résultat final d'Herman est le suivant.
THÉORÈME 9.1.— Si α est de densité bornée, et que f est C^r, $r \geq 3$ ($r = n + \beta$, n entier, $0 \leq \beta < 1$), alors h est $C^{r-1-\varepsilon}$ pour tout $\varepsilon > 0$.
Il l'obtient en conjuguant 7.5 et 8.1 avec un théorème des fonctions implicites :
THÉORÈME 9.2.— Soient α un nombre irrationnel, et $1 \leq \theta < \theta'$. On suppose qu'il existe C tel que

$$|q\alpha - p| \geq C \cdot q^{-\theta}$$

pour tous entiers p, q. Il existe alors un voisinage V de R_α dans la $C^{2\theta'}$-topologie tel que pour f dans ce voisinage et C^r (resp. C^∞, C^ω), l'équation

$$f = R_\lambda \circ g \circ R_\alpha \circ g^{-1}$$

($\lambda \in \mathbf{R}$, g homéomorphisme croissant) admette une solution $C^{r-\theta'}$ (resp. C^∞, C^ω).

Pour obtenir 9.1, on prend $1 < \theta < \theta' = 1 + \varepsilon$, on prend pour α le nombre de rotation de f, on se ramène à supposer f dans V par 7.5 et 8.1 et on observe que le nombre de rotation de

$$R_\lambda \circ g \circ R_\alpha \circ g^{-1}$$

ne peut être α que pour $\lambda = 0$.
Comme nous l'avons déjà dit, la preuve de 9.2 est inspirée de [1], [3] et [4].

BIBLIOGRAPHIE

[1] V. I. ARNOLD — Small denominators I, Transl. A.M.S., 2e série, 46 (1965), 213–284.
[2] A. DENJOY — Les trajectoires à la surface du tore, C.R. Acad. Sci. Paris, 1946, vol. 223, 5–8.
[3] J. MOSER — A rapidly convergent iteration method II, Ann. Scuola Norm. Sup. di Pisa, 20 (1966), 499–535.
[4] H. RÜSSMANN — Kleine Nenner II, Bemerkungen zur Newtonschen Methode. Nachr. Akad. Wiss., Göttingen, Math. Phys. Kl., 1972.

Authority page 1 — printed page 203

THÉORIE DES GROUPES. — Extensions centrales non résiduellement finies de groupes arithmétiques. Note (*) de M. Pierre Deligne, Membre de l'Académie.

[[Résumé français imprimé]]

Une variante des méthodes connues pour traiter le problème des sous-groupes de congruence fournit des résultats comme le suivant : pour n ≥ 2, le groupe $\widetilde{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ image inverse de Sp(2n, $\mathbb{Z}$) dans le revêtement universel de Sp(2n, $\mathbb{R}$) (une extension centrale de Sp(2n, $\mathbb{Z}$) par π_1 Sp(2n, $\mathbb{R}$) = $\mathbb{Z}$) n'est pas séparé pour la topologie des sous-groupes d'indice fini. Plus précisément, tout sous-groupe d'indice fini de $\widetilde{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ contient $2\pi_1$ Sp(2n, $\mathbb{R}$).

[[Abstract anglais imprimé dans la source]]

A variant of known methods to handle the congruence subgroup problem yields results like the following. Let $\widetilde{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ be the inverse image of Sp(2n, $\mathbb{Z}$) in the universal covering of Sp(2n, $\mathbb{R}$); it is a central extension of Sp(2n, $\mathbb{Z}$) by π_1 Sp(2n, $\mathbb{R}$) ≃ $\mathbb{Z}$. If n ≥ 2, the group $\widetilde{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ is not residually finite : any subgroup of finite index contains $2\pi_1$ Sp(2n, $\mathbb{R}$).

1. GROUPES S-ARITHMÉTIQUES. — Soit G un groupe presque simple simplement connexe isotrope sur un corps global F. Pour simplifier les énoncés, nous supposerons aussi que G(F) est parfait (i. e. égal à son groupe des commutateurs); c'est le cas, sauf peut-être si G est une forme trialitaire de D_4. Soit par ailleurs S un ensemble fini de places de F, contenant toutes les places à l'infini, et supposons que

(i) $\sum_{v\in S}$ rang(G/F_v) ≥ 2.

Pour chaque place v de F, posons G_v = G(F_v). Pour chaque ensemble fini T de places, posons de même $G_T = \prod_{v\in T} G_v$ et $G_{T'} = \prod_{v\notin T} G_v$ (produit restreint) : pour $\mathbb{A}$ l'anneau des adèles de F, on a G($\mathbb{A}$) = $G_T \times G_{T'}$.

Un sous-groupe de G(F) est dit de S-congruence s'il est l'image inverse d'un sous-groupe compact ouvert de $G_{S'}$. Il est dit S-arithmétique s'il est commensurable à un sous-groupe de S-congruence, i. e. s'il contient, avec un indice fini, un sous-groupe d'indice fini dans un groupe de S-congruence. Les sous-groupes de S-congruence (resp. S-arithmétiques) forment un système fondamental de voisinages de l'origine pour une topologie (de groupe topologique) $\mathcal{T}$(c) [resp. $\mathcal{T}$(a)] sur G(F). Pour Γ un sous-groupe de S-congruence fixe, on obtient encore un système fondamental de voisinages en ne considérant que les sous-groupes de S-congruence distingués dans Γ (resp. que les sous-groupes distingués d'indice fini de Γ). Ceci assure l'existence du complété $\widehat{G(F)}$(c) [resp. $\widehat{G(F)}$(a)] de G(F) pour $\mathcal{T}$(c) [resp. $\mathcal{T}$(a)]. La topologie $\mathcal{T}$(c) est la topologie induite de celle de $G_{S'}$. Puisque G(F) est dense dans $G_{S'}$ (théorème d'approximation forte), on a $\widehat{G(F)}$(c) = $G_{S'}$. Le complété $\widehat{G(F)}$(a) de G(F) est une extension de $\widehat{G(F)}$(c) = $G_{S'}$ par le groupe profini C(S, G) = lim proj Γ/Δ (limite projective sur les couples Δ ⊂ Γ, avec Δ distingué d'indice fini dans Γ et Γ de S-congruence).

Pour G de rang ≥ 2, Raghunathan (1) a montré que :

(ii) $\widehat{G(F)}$(a) est une extension centrale de $\widehat{G(F)}$(c) = $G_{S'}$,

et il achève de vérifier que la même conclusion vaut sous la seule hypothèse (i).

Soient $\widetilde{G}_S$ une extension centrale topologique de G_S par un groupe discret A, et $\widetilde{G(F)}$ l'image inverse de G(F) dans $\widetilde{G}_S$. Un sous-groupe de $\widetilde{G(F)}$ sera dit de S-congruence s'il est image inverse d'un sous-groupe de S-congruence de G(F), et S-arithmétique s'il est commensurable à un sous-groupe de S-congruence. On note encore $\mathcal{T}$(c) et $\mathcal{T}$(a) les topologies correspondantes, et $\widetilde{\widehat{G(F)}}$(c), $\widetilde{\widehat{G(F)}}$(a) les complétés séparés pour ces

Authority page 2 — printed page 204

topologies. On a encore $\widehat{\widetilde{G(F)}}(\mathrm{c}) = G_{S'}$, tandis que $\widehat{\widetilde{G(F)}}(\mathrm{a})$ est extension de $G_{S'}$ par un groupe profini $\widetilde{C}(\mathrm{S}, \mathrm{G})$, lui-même extension de C(S, G) par

$\widehat{A} = \lim \mathrm{proj}\ \mathrm{A}/(\mathrm{A} \cap \Gamma)$ (Γ S-arithmétique).

PROPOSITION 1. — Si la condition (ii) est vérifiée, $\widehat{\widetilde{G(F)}}(\mathrm{a})$ est une extension centrale de $\widehat{\widetilde{G(F)}}(\mathrm{c}) = G_{S'}$.

Rappelons que, si un groupe $\widetilde{H}$ est une extension centrale d'un groupe H, l'application commutateur $\widetilde{H} \times \widetilde{H} \to \widetilde{H}$ se factorise par une application, encore notée (,) : $\mathrm{H} \times \mathrm{H} \to \widetilde{H}$. En particulier, le groupe $\widehat{\widetilde{G(F)}}(\mathrm{a})$ étant une extension centrale de $\widehat{G(F)}(\mathrm{a})$ par $\widehat{A}$, l'application commutateur : $\widetilde{C}(\mathrm{S}, \mathrm{G}) \times \widehat{\widetilde{G(F)}}(\mathrm{a}) \to \widehat{\widetilde{G(F)}}(\mathrm{a})$ se factorise par $\mathrm{C}(\mathrm{S}, \mathrm{G}) \times \widehat{G(F)}(\mathrm{a})$. D'après (ii), elle se factorise par une application bimultiplicative

$\mathrm{C}(\mathrm{S}, \mathrm{G}) \times \widehat{G(F)}(\mathrm{a}) \to \widehat{A}$;

puisque G(F) est parfait, et dense dans $\widehat{G(F)}(\mathrm{a})$, celle-ci est triviale.

En termes plus concrets, la proposition signifie que pour tout sous-groupe S-arithmétique Δ, on a :

(1 a) Pour tout conjugué Δ^g de Δ ($\mathrm{g} \in \widetilde{G(F)}$), il existe un groupe de S-congruence Γ tel que $\Gamma \cap \Delta = \Gamma \cap \Delta^g$.

(1 b) $\widetilde{G(F)}$ agit trivialement sur le groupe fini $C_\Delta = \lim \mathrm{proj}\ \Gamma/(\Gamma \cap \Delta)$.

Ces conditions équivalent encore à

(1 c) Pour tout $\mathrm{g} \in \mathrm{G}(\mathrm{F})$, il existe Γ de S-congruence tel que $(\mathrm{g}, \Gamma) \subset \Delta$.

On a $\widetilde{C}(\mathrm{S}, \mathrm{G}) = \lim \mathrm{proj}\ C_\Delta$.

2. EXTENSIONS CENTRALES DE GROUPES ADÉLIQUES. — Nous supposerons dorénavant que :

(iii) le groupe $\widetilde{G}_S$ est parfait.

Le cas le plus intéressant serait celui où $\widetilde{G}_S$ est l'extension centrale universelle de G_S par un groupe discret (le « revêtement universel » de G_S), mais nous ne tenons pas à supposer l'existence d'une telle extension universelle.

Une extension centrale topologique E de $\mathrm{G}(\mathbb{A})$ par un groupe discret X est déterminée par les extensions E_S et $E_{S'}$ de G_S et $G_{S'}$ par X images inverses de G_S et $G_{S'}$ dans E : parce que G_S est parfait, on a

$\mathrm{E} \leftarrow\sim (E_S \times E_{S'})/\{(\mathrm{x}, -\mathrm{x}) \mid \mathrm{x} \in \mathrm{X}\}$.

Si l'extension E_S est dominée par $\widetilde{G}_S$, i. e. se déduit de $\widetilde{G}_S$ en poussant par $\mathrm{f} : \mathrm{A} \to \mathrm{X}$, l'application f est unique, et la donnée de E revient à celle de l'extension $E_{S'}$, et de f (équivalence de catégorie); on a

$\mathrm{E} \leftarrow\sim \widetilde{G}_S \times E_{S'}/\{(\mathrm{a}, -\mathrm{f}(\mathrm{a})) \mid \mathrm{a} \in \mathrm{A}\}$.

Soit $\mathcal{L}$ la catégorie des extensions centrales topologiques de $\mathrm{G}(\mathbb{A})$ par un groupe fini, scindées au-dessus de G(F), et avec E_S dominé par $\widetilde{G}_S$:

$1 \to \mathrm{X} \to \mathrm{E} \to \mathrm{G}(\mathbb{A}) \to 1$
$\nwarrow \mathrm{s} \uparrow$
G(F)

Il reviendrait au même d'exiger « scindable au-dessus de G(F) » : puisque G(F) est parfait, le scindage, s'il existe, est unique. La catégorie $\mathcal{L}$ est filtrante à gauche. Pour (E, s) dans $\mathcal{L}$, l'adhérence dans E de (image de $\widetilde{G}_S$).s G(F) s'envoie sur $\mathrm{G}(\mathbb{A})$: elle s'envoie sur un fermé, car X est fini, et contient G_S.G(F) qui est dense (approximation forte). La sous-catégorie L de $\mathcal{L}$ formée des (E, s) avec (image de $\widetilde{G}_S$).s G(F) dense dans E est donc cofinale; puisqu'il y a au plus une flèche entre deux objets de L, elle se réduit à un ensemble ordonné filtrant.

Authority page 3 — printed page 205

PROPOSITION 2. — Sous les hypothèses (ii) et (iii), nous construisons un isomorphisme naturel entre $\widetilde{C}$(S, G) et la limite projective sur $\mathcal{L}$, ou L, lim proj X. Via cet isomorphisme, l'application naturelle de A dans $\widetilde{C}$(S, G) est la limite des −f : A → X, f étant tel que E_S se déduise de $\widetilde{G}_S$ par f.

Soit E une extension centrale topologique de G(𝔸) par un groupe discret X. Se donner un scindage s de E au-dessus de G(F) revient à se donner un isomorphisme entre l'extension de G(F) par X déduite de E_S, et l'opposée de celle déduite de $E_{S'}$. Pour E_S dominé par $\widetilde{G}_S$, et f comme ci-dessus, cela revient à se donner un diagramme commutatif

$1 \to X \to E_{S'} \to G_{S'} \to 1$
$\uparrow -f \uparrow t \uparrow$
$1 \to A \to \widetilde{G(F)} \to G(F) \to 1.$

De là une équivalence entre la catégorie $\mathcal{L}$ et celle, $\mathcal{L}'$, des diagrammes commutatifs

(1) $1 \to X \to E_{S'} \text{ —q→ } G_{S'} \to 1$
$\uparrow t \uparrow$
$\widetilde{G(F)} \to G(F)$

($E_{S'}$ extension centrale topologique de $G_{S'}$ par un groupe fini) : on reconstruit E comme étant $\widetilde{G}_S \times E_{S'}/\{(a, ta) \mid a \in A\}$, et le scindage sur G(F) par $s(g) = (\tilde{g}, t\tilde{g})$ mod les (a, ta) pour $\tilde{g} \in \widetilde{G(F)} \subset \widetilde{G}_S$ d'image g dans G(F). La sous-catégorie L de $\mathcal{L}$ correspond à celle, L′, des diagrammes (1) avec t d'image dense.

Soient ($E_{S'}$, t) dans L′, et $\mathcal{T}$ la topologie sur $\widetilde{G(F)}$ induite par celle de $E_{S'}$. Si K est un sous-groupe compact ouvert de $E_{S'}$, disjoint de X, les intersections de $\Delta = t^{-1}K$ avec les sous-groupes de S-congruence forment un système fondamental de voisinages pour $\mathcal{T}$. Pour Γ un sous-groupe de S-congruence défini par un sous-groupe compact ouvert $K_1 \subset qK$, on a de plus

(2) $X \to\sim XK/K \leftarrow\sim q^{-1}K_1/(K \cap q^{-1}K_1) \leftarrow\sim \Gamma/(\Delta \cap \Gamma) \leftarrow\sim C_\Delta$.

Puisque X est fini, Δ est S-arithmétique. Réciproquement, la proposition 1 assure qu'un système fondamental de groupes S-arithmétiques est ainsi obtenu : l'ensemble ordonné filtrant L′ s'identifie à celui des germes (pour la topologie de S-congruence) de groupes S-arithmétiques, et l'isomorphisme de la proposition 2 est défini comme la limite projective des isomorphismes (2).

3. GROUPES QUASI DÉPLOYÉS. — Soit μ le groupe des racines de l'unité de F et; pour chaque place non complexe v de F, soit μ_v le groupe des racines de l'unité de F_v. Pour v complexe, on pose $\mu_v = \{1\}$. Deodhar a montré que, pour G quasi-déployé, il existe une extension topologique centrale universelle $\widetilde{G}_v$ de G_v par un groupe discret (le « revêtement universel »), et que pour v non réelle, son noyau $\pi_1(G_v)$ est canoniquement un quotient de μ_v. J'ai complété ce résultat en montrant qu'en fait $\pi_1(G_v) = \mu_v$. Pour v réelle, on a $\pi_1(G_v) = \mathbb{Z}$, ou $\mathbb{Z}/2$. Dans tous les cas, μ_v apparaît comme un quotient de $\pi_1(G_v)$.

Pour presque tout v, l'extension $\widetilde{G}_v$ se scinde au-dessus du sous-groupe compact maximal naturel de G_v. Ceci permet de définir le produit restreint des $\widetilde{G}_v$, une extension de G(𝔸) par la somme des $\pi_1(G_v)$. Poussons-la par

$R : \oplus_v \pi_1(G_v) \to \oplus_v \mu_v \text{ —}\sigma\text{→ } \mu : \sigma((x_v)) = \prod_v x_v^{[\mu_v:\mu]}$.

Authority page 4 — printed page 206

On obtient une extension centrale de G($\mathbb{A}$) par μ, et il résulte de Deodhar (2) et C. Moore (3) que c'est l'extension centrale topologique universelle de G($\mathbb{A}$) par un groupe discret, qui se scinde au-dessus de G(F) :

(3) $1 \to \mu \to \widetilde{G(\mathbb{A})} \to \mathrm{G}(\mathbb{A}) \to 1$
$\nwarrow \uparrow$
G(F)

Prenons pour $\widetilde{G}_S$ le revêtement universel de G_S, et notons R_S la restriction de R à $\pi_1 G_S = \prod_{v \in S} \pi_1(G_v)$. La proposition 2 identifie le complété $\widehat{\widetilde{G(F)}}$(a) de $\widetilde{G(F)}$ à l'image inverse $\widetilde{G(\mathbb{A})}_{S'}$ de $G_{S'} = \widehat{\widetilde{G(F)}}$(c) dans (3), et fournit un diagramme commutatif exact

(4) $1 \to \mu \to \widetilde{G(\mathbb{A})}_{S'} \to G_{S'} \to 1$
$\uparrow -R_S \uparrow \mathrm{i} \uparrow$
$\prod_{v \in S} \pi_1(G_v) \to \widehat{\widetilde{G(F)}}(\mathrm{a}) \to \widehat{G(F)}(\mathrm{a}) \to 1$

En particulier

THÉORÈME. — Soient G/F quasi déployé, et $\widetilde{G(F)}$ l'image inverse de G(F) dans le revêtement universel de G_S. Si $\sum_{v \in S} \mathrm{rang}(G_v) \geq 2$, l'intersection des sous-groupes S-arithmétiques de $\widetilde{G(F)}$ est le noyau de $R_S : \prod_{v \in S} \pi_1(G_v) \to \mu$.

Pour Sp(2n, $\mathbb{Q}$), et S = ∞, c'est le résultat annoncé dans l'introduction. Pour SL(n, K), avec K quadratique réel, et S = ∞, le résultat obtenu généralise celui de J. Millson (4).

PROBLÈME. — Tout sous-groupe discret de covolume fini du revêtement universel de Sp(2n, $\mathbb{R}$) (n $\geq$ 2) contient-il $2\pi_1$ Sp(2n, $\mathbb{R}$) ? (5).

4. LE SYSTÈME DE FACTEURS DES FONCTIONS θ. — Lorsque la condition (i) n'est pas vérifiée, on ne dispose plus de la proposition 1; il reste néanmoins possible d'étudier les sous-groupes S-arithmétiques vérifiant une condition de type (1 a).

Soient donc S un ensemble fini non vide de places, contenant toutes les places à l'infini, et T $\supset$ S tel que (G, T) vérifie la condition (ii). Le cas intéressant est celui où S est réduit à une place, en laquelle G est de rang 1. Soient encore $\widetilde{G}_S$ une extension centrale topologique de G_S par un groupe discret, et $\widetilde{G(F)}$ l'image inverse de G(F) dans $\widetilde{G}_S$. Pour Δ un sous-groupe S-arithmétique de $\widetilde{G(F)}$, considérons la condition :

($\star$) il existe un sous-groupe T-arithmétique U de $\widetilde{G(F)}$, tel que, pour tout conjugué Δ^g de Δ (g $\in$ U), il existe un groupe de S-congruence Γ tel que $\Gamma \cap \Delta = \Gamma \cap \Delta^g$ (U-invariance du germe de Δ).

PROPOSITION 3. — Le complété $\widehat{\widetilde{G(F)}}$(a*) de $\widetilde{G(F)}$ pour la topologie des sous-groupes S-arithmétiques vérifiant ($\star$) est une extension centrale de $\widehat{\widetilde{G(F)}}$(c) = $G_{S'}$.

En termes plus concrets, il nous faut vérifier que si (U, Δ) vérifie ($\star$), alors Δ vérifie (1 c). Pour le prouver, il est loisible de rapetisser au préalable U et Δ. En particulier, on peut supposer que $\Delta \subset$ U (remplacer Δ par $\Delta \cap$ U). Le groupe U agit alors par conjugaison sur le

Authority page 5 — printed page 207

groupe fini $C_\Delta^U = \lim \text{proj } (\Gamma \cap \mathrm{U})/(\Gamma \cap \Delta)$ (Γ de S-congruence); remplaçant U par le noyau de cette action, et Δ par un $\Delta \cap \Gamma$, on peut supposer de plus que U agit trivialement sur C_Δ^U.

Puisque U est T-arithmétique, son complété $\mathrm{U}(\hat{\mathrm{c}}) \subset G_{S'}$ est d'indice fini dans un sous-groupe $G_{T-S} \times \mathrm{L}$, avec $\mathrm{L} \subset G_{T'}$ compact ouvert; le groupe G_{T-S} n'ayant pas de sous-groupe ouvert d'indice fini, $\mathrm{U}(\hat{\mathrm{c}})$ lui-même est de la forme $G_{T-S} \times \mathrm{L}$. La condition ($\star$) assure que les $\Delta \cap \Gamma$ (Γ de S-congruence) forment un système fondamental de voisinages de l'origine pour une topologie (de groupe topologique) sur U. Le complété $\mathrm{U}(\Delta)$ correspondant est extension de $\mathrm{U}(\hat{\mathrm{c}})$ par C_Δ^U — donc une extension centrale de $G_{T-S} \times \mathrm{L}$. Remplaçons L par un sous-groupe ouvert L_1 au-dessus duquel cette extension soit triviale, et U et Δ par les images inverses de L_1. Puisque G_{T-S} est parfait, une extension centrale de $G_{T-S} \times \mathrm{L}$ est déterminée par ses restrictions aux deux facteurs, et ceci nous ramène au cas où l'extension centrale $\mathrm{U}(\Delta)$ de $G_{T-S} \times \mathrm{L}$ est l'image inverse d'une extension centrale $\widetilde{G}_{T-S}$ de G_{T-S} par C_Δ^U. Par construction, U se relève dans $\widetilde{G}_{T-S}$ et Δ est l'image inverse d'un sous-groupe compact ouvert K de $\widetilde{G}_{T-S} \times \mathrm{L}$:

(5) $\mathrm{K} \hookrightarrow \widetilde{G}_{T-S} \times \mathrm{L}$
$\uparrow\uparrow$
$\Delta \longrightarrow \mathrm{U}$

Soient $\widetilde{G(F)}_T$ l'extension centrale de G(F) image inverse de G(F) dans $\widetilde{G}_T = \widetilde{G}_S \times \widetilde{G}_{T-S}$, et $\widetilde{U}$ le relèvement (5) de U dans $\widetilde{G(F)}_T$. Pour $\mathrm{g} \in \mathrm{G(F)}$, la proposition 1 assure $(\mathrm{g}, \Gamma_T) \subset \widetilde{U}$ pour Γ_T de T-congruence défini par $\mathrm{L}' \subset \mathrm{L}$ assez petit. Si le sous-groupe de S-congruence Γ défini par $\mathrm{K}' \subset G_{T-S} \times \mathrm{L}'$, d'image inverse K″ dans $\widetilde{G}_{T-S} \times \mathrm{L}'$, est assez petit pour que $(\mathrm{g}, \mathrm{K}') \subset \mathrm{K}$, on a $(\mathrm{g}, \Gamma) \subset \Delta$, ce qui vérifie (1 c).

Le noyau $\widetilde{C}^*(\mathrm{S}, \mathrm{G}) = \mathrm{Ker}(\widetilde{\widetilde{G(F)}}(\mathrm{a}^*) \to \widetilde{G(F)}(\mathrm{c}))$ est encore décrit par la proposition 2 (avec la même démonstration), et le calcul peut être mené à terme dans le cas quasi déployé (cf. le n° 3). Voici une application, avec $\mathrm{G} = \mathrm{SL}(2, \mathbb{Q})$, $\mathrm{S} = \{\infty\}$, et $\mathrm{T} = \{\infty, \mathrm{p}\}$. On pose $\widetilde{SL(2,\mathbb{R})}$ = le revêtement double de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$. On peut interpréter les systèmes de facteurs des fonctions θ, restreints à des sous-groupes de congruence arbitrairement petits de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$, comme définissant un germe τ (pour la topologie des sous-groupes de congruence) de relèvements de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ dans $\widetilde{SL(2,\mathbb{R})}$. Ce germe est invariant par $\mathrm{GL}(2, \mathbb{Q})$. Si on définit une forme modulaire de poids demi-entier k/2 comme étant une fonction sur le demi-plan de Poincaré qui, sous l'action d'un sous-groupe de congruence de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$, se transforme comme la fonction θ d'une forme quadratique à k variables, cela revient à dire que, si

$\begin{pmatrix} \mathrm{a} & \mathrm{b} \\ \mathrm{c} & \mathrm{d} \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}(2, \mathbb{Q})$

est de déterminant positif, et que f est modulaire de poids k/2, alors $\mathrm{f}(-z^{-1})$ et $(cz+d)^{k/2}\ \mathrm{f}[(\mathrm{az}+\mathrm{b})/(\mathrm{cz}+\mathrm{d})]$ le sont également. Réciproquement, on a :

PROPOSITION 4. — Quel que soit p premier, le germe τ est l'unique germe de relèvement de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ dans $\widetilde{SL(2,\mathbb{R})}$ qui soit invariant par un sous-groupe d'indice fini de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}[1/\mathrm{p}])$.

Les arguments qui mènent au théorème du n° 3 montrent que tout sous-groupe arithmétique de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$, de germe invariant par un sous-groupe d'indice fini de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}[1/\mathrm{p}])$, est de congruence.

Soient $\Gamma \subset \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ de congruence, et $\tau_1 = \tau_2$ deux relèvements de Γ dans $\widetilde{SL(2,\mathbb{R})}$.

Authority page 6 — printed page 208

Soit Δ le sous-groupe de Γ où $\tau_1 = \tau_2$. Si les germes de τ_1 et τ_2 sont distincts, et invariants par un groupe {p}-arithmétique, Δ vérifie $(\star)$, et n'est pas de congruence.

(*) Séance du 3 juillet 1978.

(1) M. S. Raghunathan, Publ. Math. I.H.E.S., 46, 1976, p. 107-162.

(2) V. V. Deodhar, On central extensions of rational points of algebraic groups (à paraître).

(3) C. C. Moore, Publ. Math. I.H.E.S., 35, 1968, p. 5-70.

(4) J. Millson, Real Vector Bundles with Discrete Structure Groups (à paraître).

(5) J'apprends de Mostow qu'un tel sous-groupe Γ contient en tout cas un sous-groupe d'indice fini de π_1 Sp(2n, $\mathbb{R}$) : on vérifie que la projection de Γ dans Sp(2n, $\mathbb{R}$) est discrète, sans quoi l'algèbre de Lie de son adhérence serait centrale non triviale.

Institut des Hautes Études scientifiques, 91440 Bures-sur-Yvette

PIERRE DELIGNE · D030

Valeurs de fonctions L et périodes d'intégrales

P. Deligne

Édition source française contrôlée

34 authority pages (printed pages 313–346). The main paper is French; the embedded Koblitz–Ogus appendix is reproduced in its source English. The text is organized in exact authority-page units; repeated proceedings copy matter is excluded and documented in the separate apparatus.

Edition note

This maintenance edition is a source-checked, math-typeset reconstruction keyed one-to-one to the controlling 34-page authority scan. The comparator is retained for comparison only. The Koblitz–Ogus appendix on authority pages 31–34 is source-English in both language editions. Page-unit markers preserve the authority and printed-page topology. The certified image fallback for diagram (1.3.1) is embedded at its exact page unit, with both the lossless crop and presentation derivative retained in the source package.

Dans cet article, j'énonce une conjecture (1.8, 2.8) reliant les valeurs de certaines fonctions L en certains points entiers à des périodes d'intégrales.

Les fonctions L considérées sont celles des motifs—un mot auquel on n'attachera pas un sens précis. Ceci inclut notamment les fonctions L d'Artin, les fonctions L attachées à des caractères de Hecke algébriques (= Grössencharakter de type A_0), et celles attachées aux formes modulaires holomorphes sur le demi-plan de Poincaré, supposées primitives (= new forms; on considère toutes les fonctions L, L_k, attachées aux puissances symétriques, Sym^k, de la représentation l-adique correspondante).

Cet article doit le jour à D. Zagier: pour son insistance à demander une conjecture, et pour la confirmation expérimentale qu'il en a donnée, sitôt émise, pour les fonctions L_3 et L_4 attachées à $\Delta = \Sigma\, \tau(n)q^n$ (voir [18]). C'est cette confirmation qui m'a donné la confiance nécessaire pour vérifier que la conjecture était compatible aux résultats de Shimura [13] sur les valeurs de fonctions L de caractères de Hecke algébriques.

0. Motifs. Le lecteur est invité à ne consulter ce paragraphe qu'au fur et à mesure des besoins. On y rappelle une partie du formalisme, dû à Grothendieck, des motifs. Pour les démonstrations, je renvoie à [8].

0.1. La définition de Grothendieck des motifs sur un corps k a la forme suivante. (a) Soit $\mathscr{V}(k)$ la catégorie des variétés projectives et lisses sur k. On construit une catégorie additive $\mathscr{M}'(k)$, pour lesquelles les groupes Hom(M, N) sont des espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$, munie de

α. Un produit tensoriel $\otimes$, associatif, commutatif et distributif par rapport à l'addition des objets ("associatif" et "commutatif" n'est pas une propriété du foncteur $\otimes$, mais une donnée, soumise à certaines compatibilités—cf. Saavedra [19]);

β. Un foncteur contravariant H^*, de $\mathscr{V}(k)$ dans $\mathscr{M}'(k)$, bijectif sur les objets et transformant sommes disjointes en sommes, et produits en produits tensoriels (donnée d'un isomorphisme de foncteurs $H^*(X \times Y) = H^*(X) \otimes H^*(Y)$, compatible à l'associativité et à la commutativité).

Il s'agit, pour l'essentiel, de définir $Hom(H^*(X), H^*(Y))$. Pour la définition, uti-

lisée par Grothendieck, de ce groupe comme un groupe de classes de correspondances entre X et Y, voir 0.6.

(b) Rappelons (SGA 4 IV 7.5) qu'une catégorie additive est karoubienne si tout projecteur (= endomorphisme idempotent) est défini par une décomposition en somme directe, et que chaque catégorie additive a une enveloppe karoubienne, obtenue en lui adjoignant formellement les images des projecteurs. La catégorie $\mathscr{M}_{\text{eff}}(k)$ des motifs effectifs sur k est l'enveloppe karoubienne de $\mathscr{M}'(k)$.

(c) On définit le motif de Tate $\mathbb{Z}(-1)$ comme un facteur direct $H^2(\mathbb{P}^1)$ convenable de $H^*(\mathbb{P}^1)$. On vérifie que la symétrie (déduite de la commutativité de $\otimes$): $\mathbb{Z}(-1) \otimes \mathbb{Z}(-1) \to \mathbb{Z}(-1) \otimes \mathbb{Z}(-1)$ est l'identité, et que le foncteur $M \to M \otimes \mathbb{Z}(-1)$ est pleinement fidèle.

(d) La catégorie $\mathscr{M}(k)$ des motifs sur k se déduit de $\mathscr{M}_{\text{eff}}(k)$ en rendant inversible le foncteur $M \to M \otimes \mathbb{Z}(-1)$.

Notons (n) l'itéré (−n)ième de l'auto-équivalence $M \to M \otimes \mathbb{Z}(-1)$. La catégorie $\mathscr{M}(k)$ admet $\mathscr{M}_{\text{eff}}(k)$ comme sous-catégorie pleine, et tout object de $\mathscr{M}(k)$ est de la forme M(n) pour M dans $\mathscr{M}_{\text{eff}}(k)$ et n un entier.

Par définition, si F est un foncteur additif de $\mathscr{M}'(k)$ dans une catégorie karoubienne $\mathscr{A}$, il se prolonge à $\mathscr{M}_{\text{eff}}(k)$. Si $\mathscr{A}$ est munie d'une auto-équivalence $A \to A(-1)$, et le prolongement de F d'un isomorphisme de foncteurs $F(M(-1)) = F(M)(-1)$, il se prolonge à $\mathscr{M}(k)$.

EXEMPLE 0.1.1. Si k′ est une extension de k, et F le foncteur $H^*(X) \to H^*(X \otimes_k k')$ de $\mathscr{M}'(k)$ dans $\mathscr{M}'(k')$, on obtient le foncteur extension des scalaires de $\mathscr{M}(k)$ dans $\mathscr{M}(k')$. Si k′ est une extension finie de k, on dispose du foncteur de restriction des scalaires à la Grothendieck

$\Pi_{k'/k}$: $\mathscr{V}(k') \to \mathscr{V}(k)$: $(X \to \text{Spec}(k')) \mapsto (X \to \text{Spec}(k') \to \text{Spec}(k))$.

On le prolonge en F: $H^*(X) \mapsto H^*(\Pi_{k'/k}X)$, d'où un foncteur de restriction des scalaires $R_{k'/k}$: $\mathscr{M}(k') \to \mathscr{M}(k)$.

EXEMPLE 0.1.2. Soit $\mathscr{H}$ une "théorie de cohomologie", à valeurs dans une catégorie karoubienne $\mathscr{A}$, fonctorielle pour les morphismes dans $\mathscr{M}'(k)$. Le foncteur $\mathscr{H}$ se prolonge à $\mathscr{M}_{\text{eff}}(k)$. Si $\mathscr{A}$ est muni d'un produit tensoriel, que $\mathscr{H}$ vérifie une formule de Künneth et que la tensorisation avec $\mathscr{H}(\mathbb{Z}(-1))$ est une auto-équivalence de $\mathscr{A}$, il se prolonge à $\mathscr{M}(k)$. Ce prolongement est le foncteur "réalisation d'un motif dans la théorie $\mathscr{H}$".

Nous noterons (n) l'auto-équivalence de $\mathscr{A}$ itéré (−n)ième de la tensorisation avec $\mathscr{H}(\mathbb{Z}(-1))$. Pour la détermination de $\mathscr{H}(\mathbb{Z}(-1))$ dans diverses théories $\mathscr{H}$, voir 3.1.

0.2. Nous utiliserons les réalisations suivantes: 0.2.1. Réalisation de Betti H_B. Correspondant à $k = \mathbb{C}$, $\mathscr{A}$ = espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$, $\mathscr{H}$ = cohomologie rationnelle: $X \mapsto H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$; 0.2.2. Réalisation de de Rham H_{DR}. Correspondant à k de caractéristique 0, $\mathscr{A}$ = espaces vectoriels sur k, $\mathscr{H}$ = cohomologie de de Rham: $X \mapsto H^*(X, \Omega_X{}^*)$; 0.2.3. Réalisation l-adique H_l. Correspondant à k algébriquement clos, de caractéristique $\neq$ l, $\mathscr{A}$ = espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}_l$, $\mathscr{H}$ = cohomologie l-adique: $X \mapsto H^*(X, \mathbb{Q}_l)$.

Et leurs variantes: 0.2.4. Réalisation de Hodge. k est ici une clôture algébrique de $\mathbb{R}$, et $\mathscr{A}$ la catégorie des espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$, de complexifié $V \otimes k$ muni d'une bigraduation

$V \otimes k = \oplus_{p,q} V^{p,q}$ telle que $V^{q,p}$ soit le complexe conjugué de $V^{p,q}$. Pour théorie de cohomologie, on prend le foncteur $X \mapsto H^*(X(k), \mathbb{Q})$ muni de la bigraduation de son complexifié $H^*(X(k), k)$ fournie par la théorie de Hodge. La réalisation de Betti est sous-jacente à celle de Hodge.

0.2.5. Pour k quelconque, et σ un plongement complexe de k, on note $H_\sigma(M)$ la réalisation de Betti du motif sur $\mathbb{C}$ déduit de M par l'extension des scalaires σ: $k \to \mathbb{C}$. Notons c la conjugaison complexe. On obtient par transport de structure un isomorphisme F_∞: $H_\sigma(M) \cong H_{c\sigma}(M)$, et $F_\infty \otimes c$ envoie ${H_\sigma}^{p,q}$ sur ${H_{c\sigma}}^{q,p}$. Pour σ réel, F_∞ est une involution de $H_\sigma(M)$, dont le complexifié échange ${H_\sigma}^{p,q}(M)$ et ${H_\sigma}^{q,p}(M)$.

La σ-réalisation de Hodge est $H_\sigma(M)$, muni de sa bigraduation de Hodge et, si σ est réel, de l'involution F_∞. Pour $k = \mathbb{Q}$, ou $k = \mathbb{R}$ et σ le plongement identique, on remplace l'indice σ par B. Pour $k = \mathbb{R}$, et $M = H^*(X)$, l'involution F_∞ de ${H_B}^*(M) = H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ est l'involution induite par la conjugaison complexe F_∞: $X(\mathbb{C}) \to X(\mathbb{C})$.

0.2.6. Réalisation de de Rham. La cohomologie de de Rham est munie d'une filtration naturelle, la filtration de Hodge, aboutissement de la suite spectrale d'hypercohomologie

${E_1}^{p,q} = H^q(X, \Omega^p) \Rightarrow {H_{DR}}^{p+q}(X)$.

De là, une filtration F sur $H_{DR}(M)$.

0.2.7. Réalisation l-adique. Si X est une variété sur un corps k, de clôture algébrique $\bar{k}$, le groupe de Galois $Gal(\bar{k}/k)$ agit par transport de structure sur $H^*(X_{\bar{k}}, \mathbb{Q}_l)$. Si M est un motif sur k, et qu'on définit $H_l(M)$ comme la réalisation l-adique du motif sur $\bar{k}$ qui s'en déduit par extension des scalaires, ceci fournit une action de $Gal(\bar{k}/k)$ sur $H_l(M)$.

0.2.8. Réalisation adélique finie. Pour k algébriquement clos, de caractéristique 0, on peut rassembler les cohomologies l-adiques en une cohomologie adélique

$H^*(X, \mathbb{A}^f) = (\prod_l H^*(X, \mathbb{Z}_l)) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$.

On peut cumuler les variantes 0.2.7 et 0.2.8.

0.2.9. Dans les exemples 0.2.1, 0.2.2, 0.2.3, et leurs variantes, on peut remplacer la catégorie $\mathscr{A}$ par celle, $\mathscr{A}^*$, des objets gradués de $\mathscr{A}$: utiliser la graduation naturelle de H^*. Pour que la formule de Künneth fournisse un isomorphisme de foncteurs $\mathscr{H}(M \otimes N) \cong \mathscr{H}(M) \otimes \mathscr{H}(N)$, compatible à l'associativité et à la commutativité, il faut prendre pour donnée de commutativité dans $\mathscr{A}^*$ celle donnée par la règle de Koszul.

0.3. Pour $k = \mathbb{C}$, le théorème de comparaison entre cohomologie classique et cohomologie étale fournit un isomorphisme $H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Q}_l \cong H^*(X, \mathbb{Q}_l)$. Si X est défini sur $\mathbb{R}$, cet isomorphisme transforme F_∞ (0.2.5) en l'action (0.2.7) de la conjugaison complexe. Pour un motif, on a de même $H_B(M) \otimes \mathbb{Q}_l \cong H_l(M)$.

0.4. Pour $k = \mathbb{C}$, le complexe de de Rham holomorphe sur X^{an} est une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$. Par GAGA, on a donc un isomorphisme

$H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) \otimes \mathbb{C} = H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{C}) \cong \mathbb{H}^*(X^{an}, \Omega^{*an}) \cong H^*(X, \Omega^*)$.

Pour un motif, on obtient un isomorphisme (compatible aux filtrations de Hodges 0.2.4: $F^p = \oplus_{p' \geq p} V^{p',q'}$ et 0.2.6) $H_B(M) \otimes \mathbb{C} \cong H_{DR}(M)$.

Soit plus généralement M un motif sur un corps k, et σ un plongement complexe de k. Appliquant ce qui précède au motif sur $\mathbb{C}$ déduit de M par extension des scalaires, on trouve un isomorphisme

(0.4.1) I: $H_\sigma(M) \otimes \mathbb{C} \cong H_{DR}(M) \otimes_{k,\sigma} \mathbb{C}$.

Notons le cas particulier $k = \mathbb{Q}$, où on trouve deux $\mathbb{Q}$-structures naturelles sur la réalisation de M en cohomologie complexe: l'une, $H_B(M)$, liée à la description de la cohomologie en terme de cycles, l'autre, $H_{DR}(M)$, liée à sa description en terme de formes différentielles algébriques.

0.5. Ce qu'il advient de ces réalisations et compatibilités par extension du corps des scalaires est clair. Pour la restriction des scalaires, les résultats sont les suivants. Soient k′ une extension finie de k, M′ un motif sur k′, et $M = R_{k'/k}(M')$

(0.5.1) $H_\sigma(M) = \oplus_\tau H_\tau(M')$,

où la somme est étendue à l'ensemble $J(\sigma)$ des plongement complexes de k′ qui prolongent σ. Cet isomorphisme est compatible aux bigraduations de Hodge, et à F_∞.

(0.5.2) $H_{DR}(M) = H_{DR}(M')$ (restriction des scalaires de k′ à k).

Cet isomorphisme est compatible à la filtration de Hodge.

(0.5.3) $H_l(M) = \mathrm{Ind}\, H_l(M')$ (représentation induite de $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k')$ à $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$).

(0.5.4) Via l'isomorphisme $k' \otimes_{k,\sigma} \mathbb{C} = \mathbb{C}^{J(\sigma)}$, et l'isomorphisme $H_{DR}(M') \otimes_{k,\sigma} \mathbb{C} = \oplus_{\tau \in J(\sigma)} H_{DR}(M') \otimes_{k',\tau} \mathbb{C}$ qui s'en déduit, (0.4.1) pour M et σ est la somme des isomorphismes (0.4.1) pour M′ et τ ($\tau \in J(\sigma)$):

```
H_σ(M) ⊗ ℂ                --(0.4.1), ≅-->  H_DR(M) ⊗_{k,σ} ℂ
       ‖ (0.5.1)                                ‖ (0.5.2)
⊕_τ H_τ(M′) ⊗ ℂ            --⊕(0.4.1), ≅--> ⊕_τ H_DR(M′) ⊗_{k′,τ} ℂ.
```

0.6. Pour X projectif et lisse sur k, notons $Z^d(X)$ l'espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$ de base l'ensemble des sous-schémas fermés irréductibles de codimension d de X, et ${Z_R}^d(X)$ son quotient par une relation d'équivalence R. Pour k de caractéristique 0, une des définitions de Grothendieck des motifs s'obtient en faisant (pour X et Y connexes)

$\mathrm{Hom}(H^*(Y), H^*(X)) = {Z_R}^{dim(Y)}(X \times Y)$,

R étant l'équivalence cohomologique. En ce qui concerne la caractéristique p, signalons seulement deux difficultés: on ignore si l'équivalence cohomologique—en cohomologie l-adique ($l \neq p$)—est indépendante de l, et la définition de la classe d'un cycle pose des problèmes en cohomologie cristalline.

0.7. Soit X une variété projective et lisse complexe. Nous appellerons cycle de Hodge de codimension d sur X un élément de $H^{2d}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})$ de type (d, d)—soit, ce qui revient au même, un élément de $H^{2d}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})(d)$ de type (0, 0).

Soient k un corps algébriquement clos et X une variété projective et lisse sur k. Posons

$H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d) = H_{DR}{}^{2d}(X)(d) \times H^{2d}(X, \mathbb{A}^f)(d)$.

Pour $k = \mathbb{C}$, on appelle encore cycle de Hodge l'image dans

$H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d) = H^{2d}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q})(d) \otimes (k \times \mathbb{A}^f)$

d'un cycle de Hodge. Pour k algébriquement clos, admettant des plongements complexes, un cycle de Hodge absolu de codimension d sur X est un élément de $H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d)$, tel que, pour tout plongement complexe σ de k, son image dans $H^{2d}(X \otimes_k \mathbb{C}, \mathbb{C} \times \mathbb{A}^f)(d)$ soit de Hodge. On vérifie que

PROPOSITION 0.8. (i) L'espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$ $Z_{ha}{}^d(X)$ des cycles de Hodge absolu est invariant par extension des scalaires de k à un corps algébriquement clos k′ (admettant encore un plongement complexe).

(ii) Pour k algébriquement clos de caractéristique 0, et X défini sur un sous-corps algébriquement clos k_0 de k, admettant un plongement complexe: $X = X_0 \otimes_{k_0} k$, on pose

$Z_{ha}{}^d(X) = Z_{ha}{}^d(X_0) \subset H^{2d}(X_0, k_0 \times \mathbb{A}^f)(d) \subset H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d)$.

D'après (i), cette définition ne dépend pas des choix de X_0 et k_0.

(iii) Pour X défini sur un sous-corps k_0 de k: $X = X_0 \otimes_{k_0} k$, le groupe $Aut(k/k_0)$ agissant sur $H^{2d}(X, k \times \mathbb{A}^f)(d)$ stabilise $Z_{ha}{}^d(X)$. Il agit sur $Z_{ha}{}^d(X)$ à travers un groupe fini, correspondant à une extension finie k'_0 de k_0. On pose $Z_{ha}{}^d(X_0) = Z_{ha}{}^d(X)^{Aut(k/k_0)}$.

0.9. Une notion utile de motif s'obtient en faisant (pour X et Y connexes)

$Hom(H^*(Y), H^*(X)) = Z_{ha}{}^{dim(Y)}(X \times Y)$.

Les composantes de Künneth de la diagonale de $X \times X$ sont absolument de Hodge. Ceci permet de décomposer $H^*(X)$ en une somme de motifs $H^i(X)$, de munir la catégorie des motifs d'une graduation (avec $H^i(X)$ de poids i) et de modifier la contrainte de commutativité pour $\otimes$ comme en [19, VI, 4.2.1.4]. On vérifie que, ceci fait, la $\otimes$-catégorie des motifs sur k est tannakienne, isomorphe à la catégorie des représentations d'un groupe proalgébrique réductif.

Pour $k = \mathbb{C}$, la conjecture suivante, plus faible que celle de Hodge, équivaut à dire que le foncteur "réalisation de Hodge" est une équivalence de la catégorie des motifs 0.9 avec la catégorie des structures de Hodge facteur direct de la cohomologie de variété algébriques (ou déduites par twist à la Tate de tels facteurs directs).

Espoir 0.10. Tout cycle de Hodge l'est absolument.

Si X est une variété abélienne à multiplication complexe par un corps quadratique imaginaire K, avec Lie(X) libre sur $k \otimes K$, les méthodes de B. Gross [7] prouvent que certains cycles de Hodge non triviaux sont absolument de Hodge.

Ajouté sur épreuves: partant de ce cas particulier, j'ai pu vérifier 0.10 pour les variétés abéliennes. J'ai vérifié aussi que la $\otimes$-catégorie de motifs (0.9) engendrée par les $H^n(X)$, pour X une variété abélienne, contient les motifs $H^*(X)$, pour X une surface K3 ou une hypersurface de Fermat.

0.11. Le principal défaut de la définition 0.9 des motifs est qu'elle ne se prête pas à la réduction mod p. On ignore si un motif 0.9 sur un corps de nombres F fournit un système compatible de représentations l-adiques de $Gal(\bar{F}/F)$.

0.12. Nous utiliserons le mot “motif” de façon libre, sans nous préoccuper de faire rentrer les motifs considérés dans le cadre de Grothendieck. L’essentiel pour nous sera de disposer de réalisations $\mathscr{H}(M)$, pour les théories $\mathscr{H}$ considérées en 0.2, et d’avoir pour ces groupes le même formalisme que pour les $\mathscr{H}^*(X)$.

1. Énoncé de la conjecture (cas rationnel).

1.1. Soit M un motif sur $\mathbb{Q}$. Nous admettrons que les réalisations l-adiques $H_l(M)$ de M forment un système strictement compatible de représentations l-adiques, au sens de Serre [11, I.11]. A savoir: il existe un ensemble fini S de nombres premiers, tel que chaque $H_l(M)$ soit non ramifié en dehors de $S \cup \{l\}$, et que, notant par $F_p \in \mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ un élément de Frobenius géométrique en p (l’inverse d’une substitution de Frobenius φ_p), le polynôme $\det(1 - F_p\, t, H_l(M)) \in \mathbb{Q}_l[t]$ ($p \notin S \cup \{l\}$) soit à coefficients rationnels, et indépendant de l. Notons $Z_p(M, t)$ son inverse, et posons $L_p(M, s) = Z_p(M, p^{-s})$.

La série de Dirichlet à coefficients rationnels donnée par le produit eulérien

$L_S(M, s) = \prod_{p \notin S} L_p(M, s)$

converge pour $\Re$ s assez grand. Pour s quelconque, on définit $L_S(M, s)$ par un prolongement analytique (qu’on espère exister).

Notre but est d’énoncer une conjecture donnant la valeur de $L_S(M, s)$ en certains points entiers, au produit près par un nombre rationnel. Puisque, pour s entier, p^{-s} est rationnel, le choix de S est sans importance—à ceci près qu’aggrandir S peut introduire des zéros mal venus.

1.2. Pour écrire proprement l’équation fonctionnelle conjecturale des fonctions L, il y a lieu de compléter le produit eulérien $L_S(M, s)$ par des facteurs locaux en $p \in S$, et à l’infini. La définition des facteurs locaux en $p \in S$ requiert une hypothèse additionnelle, que nous supposerons vérifiée:

(1.2.1) Soient p un nombre premier, $D_p \subset \mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ un groupe de décomposition en p, $I_p \subset D_p$ son sous-groupe d’inertie et $F_p \in D_p$ un Frobenius géométrique. Le polynôme $\det(1 - F_p\, t, H_l(M)^{I_p}) \in \mathbb{Q}_l[t]$ ($l \neq p$) est à coefficients rationnels, et est indépendant de l.

Posons $Z_p(M, t) = \det(1 - F_p\, t, H_l(M)^{I_p})^{-1} \in \mathbb{Q}(t)$, et $L_p(M, s) = Z_p(M, p^{-s})$. On définit

(1.2.2) $L(M, s) = \prod_p L_p(M, s)$.

Le facteur à l’infini $L_\infty(M, s)$ (essentiellement un produit de fonctions Γ) dépend de la réalisation de Hodge de M—en fait seulement de la classe d’isomorphie de l’espace vectoriel complexe $H_B(M) \otimes \mathbb{C}$, muni de sa décomposition de Hodge et de l’involution F_∞. Sa définition est rappelée en 5.2.

Posant $\Lambda(M, s) = L_\infty(M, s)L(M, s)$, l’équation fonctionnelle conjecturale des fonctions L s’écrit

(1.2.3) $\Lambda(M, s) = \varepsilon(M, s)\Lambda(\check{M}, 1 - s)$

où $\check{M}$ est le dual de M (de réalisations les duales des réalisations de M) et où $\varepsilon(M, s)$, comme fonction de s, est le produit d’une constante par une exponentielle. Sa définition est rappelée en 5.2. Elle dépend d’une hypothèse additionnelle.

DÉFINITION 1.3. Un entier n est critique pour M si ni $L_\infty(M, s)$, ni $L_\infty(\check{M}, 1 - s)$ n’ont de pôle en $s = n$.

Notre but est de conjecturer la valeur de L(M, n) pour n critique, à multiplica-

tion par nombre rationnel près. On a L(M(n), s) = L(M, n + s) (3.1.2), et de même pour L_∞. Ceci nous permet de ne considérer que les nombres L(M) $=_{\text{dfn}}$ L(M, 0). Nous dirons que M est critique si 0 est critique pour M. On vérifie que pour que M soit critique, il faut et il suffit que les nombres de Hodge $h^{pq} =_{\text{dfn}} \dim H^{pq}(M)$ de M, pour $p \neq q$, ne soient non nuls que pour (p, q) dans la partie hachurée du diagramme ci-dessous, et que F_∞ agisse sur $H^{p,p}$, par l'identité si $p < 0$, par -1 si $p \geq 0$.

(1.3.1)



Diagram (1.3.1), certified presentation derivative; the lossless authority crop is retained with the sources.

Supposons M homogène de poids w: $h^{pq} = 0$ pour $p + q \neq w$, et posons $\mathfrak{R}(M) = -w/2$. Il résulte de la conjecture de Weil que, pour S assez grand, la série de Dirichlet $L_S(M, s)$ converge absolument pour $\mathfrak{R}(M) + \mathfrak{R}(s) > 1$. Pour $\mathfrak{R}(M) + \mathfrak{R}(s) = 1$, on est au bord du demi-plan de convergence, et on conjecture (a) que $L_S(M, s)$ ne s'annule pas, (b) que $L_S(M, s)$ est holomorphe, sauf si M est de poids pair $-2n$, et contient $\mathbb{Z}(n)$ en facteur: on s'attend alors à un pôle en $s = 1 - n$ (une valeur non critique).

L'analogie avec le cas des corps de fonctions, et les cas connus, mènent à croire que les facteurs locaux $L_p(M, s)$ (p quelconque, y compris ∞) n'ont de pôle que pour $\mathfrak{R}(M) + \mathfrak{R}(s) \leq 0$. Si tel est le cas, (a), (b) et l'équation fonctionnelle conjecturale (1.2.3) impliquent que $L(M) \neq 0, \infty$ pour M critique et $\mathfrak{R}(M) \neq 1/2$. Pour $\mathfrak{R}(M) = 1/2$, L(M) s'annulle parfois. Notre conjecture (1.8) est alors vide.

PROPOSITION 1.4. Soit M un motif sur $\mathbb{R}$. Via l'isomorphisme (0.4.1)

$H_B(M) \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\cong} H_{DR}(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$,

$H_{DR}(M)$ s'identifie au sous-espace de $H_B(M) \otimes \mathbb{C}$ fixe par $c \to F_\infty \bar{c}$.

Prenons $M = H^*(X)$. La conjugaison complexe sur $H_{DR}(M)_{\mathbb{C}} = H^*(X_{\mathbb{C}}, \Omega^*)$ se déduit par fonctorialité de l'automorphisme antilinéaire F_∞ du schéma $X_{\mathbb{C}}$. Remontant la flèche composée (0.4) qui définit I, on l'identifie à l'involution déduite de l'automorphisme $(F_\infty, F_\infty{}^*)$ de $(X(\mathbb{C}), \Omega^{*an})$, puis au composé de $F_\infty{}^*$: $H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{C}) \to H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{C})$ et de la conjugaison complexe sur les coefficients. Ceci vérifie 1.4.

1.5. Pour M un motif sur $\mathbb{R}$, nous noterons $H_B{}^+(M)$ (resp. $H_B{}^-(M)$) le sous-espace de $H_B(M)$ fixe par F_∞ (resp. où $F_\infty = -1$). Posons $d(M) = \dim H_B(M)$ et $d^\pm(M) = \dim H_B{}^\pm(M)$. Pour M un motif sur k, et σ un plongement complexe de k qui se factorise par $\mathbb{R}$, on note $H_\sigma{}^\pm(M)$, $d_\sigma{}^\pm(M)$ et $d_\sigma(M)$ ces objets pour le motif sur $\mathbb{R}$ déduit de M par σ. Pour $k = \mathbb{Q}$, on omet la mention de σ.

Le corollaire suivant résulte aussitôt de 1.4, et de ce que tant F_∞ que la conjugaison complexe échangent H^{pq} et H^{qp}.

COROLLAIRE 1.6. Soit M un motif sur $\mathbb{R}$. Pour la structure réelle $H_{DR}(M)$ de $H_B(M) \otimes \mathbb{C}$, les sous-espaces H^{pq} sont définis sur $\mathbb{R}$; le sous-espace $H_B{}^+(M) \otimes \mathbb{R}$ est réel, et $H_B{}^-(M) \otimes \mathbb{R}$ est purement imaginaire.

1.7. Dans la fin de ce paragraphe, nous ne considérerons que des motifs sur $\mathbb{Q}$; sauf mention expresse du contraire, nous les supposons homogènes. Si leur poids w est pair, nous supposerons aussi que F_∞ agit sur $H^{pp}(M)$ ($w = 2p$) comme un scalaire: soit $+1$, soit -1. Cette hypothèse est vérifiée pour M critique. Puisque F_∞ échange H^{pq} et H^{qp}, elle assure que les dimensions $d^+(M)$ et $d^-(M)$ sont égales l'une à $\sum_{p>q} h^{pq}$, l'autre à $\sum_{p\geq q} h^{pq}$. En particulier, ces dimensions sont égales à celles de sous-espaces F^+ et F^- figurant dans la filtration de Hodge. Posant $H_{\overline{DR}}{}^\pm(M) = H_{DR}(M)/F^\mp$, on a encore $\dim H_{\overline{DR}}{}^\pm(M) = d^\pm(M)$.

Il résulte de ce que F_∞ échange H^{pq} et H^{qp} que les applications composées

(1.7.1) $I^\pm$: $H_B{}^\pm(M)_{\mathbb{C}} \to H_B(M)_{\mathbb{C}} \xrightarrow{-I,\cong} H_{DR}(M)_{\mathbb{C}} \to H_{\overline{DR}}{}^\pm(M)_{\mathbb{C}}$

sont des isomorphismes. On pose

(1.7.2) $c^\pm(M) = \det(I^\pm)$, (1.7.3) $\delta(M) = \det(I)$,

le déterminant étant calculé dans des bases rationnelles de $H_B{}^\pm$ et $H_{\overline{DR}}{}^\pm$ (resp. H_B et H_{DR}). La définition de $\delta(M)$ ne requiert pas les hypothèses faites sur M.

D'après 1.6, I^+ est réel, i.e. induit I^+: $H_B{}^+(M)_{\mathbb{R}} \to H_{\overline{DR}}{}^+(M)_{\mathbb{R}}$, tandis que I^- est purement imaginaire. Les nombres $c^+(M)$, $i^{d^-(M)}\, c^-(M)$ et $i^{d^-(M)}\, \delta(M)$ sont donc réels non nuls. A multiplication par un nombre rationnel près, il ne dépendent que de M.

Les périodes de M sont classiquement les $\langle \omega, c\rangle$ pour $\omega \in H_{DR}(M)$ et $c \in H_B(M)^\vee$. Par exemple, si X est une variété algébrique sur $\mathbb{Q}$, ω une n-forme sur X, définie sur $\mathbb{Q}$ et que c est un n-cycle sur $X(\mathbb{C})$, $\langle \omega, c\rangle = \int_c \omega$ est une période de $H^n(X)$. Exprimons $c^\pm(M)$ en terme de périodes. Le dual de $H_{\overline{DR}}{}^\pm(M)$ est le sous-espace $F^\pm$ de $H_{DR}(M^\vee)$, où $M^\vee$ est le motif dual de M. Si la base choisie de $H_{\overline{DR}}{}^\pm(M)$ a pour duale la base (ω_i) de $F^\pm(H_{DR}(M^\vee))$, et que (c_i) est la base choisie de $H_B{}^\pm(M)$, la matrice de $I^\pm$ est $(\langle \omega_i, c_j\rangle)$, et $c^\pm(M) = \det((\langle \omega_i, c_j\rangle))$.

Conjecture 1.8. Si M est critique, L(M) est un multiple rationnel de $c^+(M)$.

2. Énoncé de la conjecture (cas général).

2.1. Jusqu'ici, nous n'avons considéré que des fonctions L données par des séries de Dirichlet à coefficients rationnels. Pour faire mieux, il nous faudra considérer des motifs à coefficient dans des corps de nombres.

Voici deux façons, équivalentes, pour construire la catégorie des motifs sur k,

à coefficient dans un corps de nombres E, à partir de la catégorie des motifs sur k. Il s'agit d'une construction valable pour toute catégorie additive karoubienne (0.1(b)) dans laquelle les Hom(X, Y) sont des espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$.

A. Un motif sur k, à coefficient dans E, est un motif M sur k muni d'une structure de E-module: $E \to \mathrm{End}(M)$.

B. La catégorie $\mathscr{M}_{k,E}$ des motifs sur k, à coefficient dans E, est l'enveloppe karoubienne (cf. 0.1(b)) de la catégorie d'objets les motifs sur k—considéré comme objet de $\mathscr{M}_{k,E}$, un motif M se notera M_E—et de morphismes donnés par

$\mathrm{Hom}(X_E, Y_E) = \mathrm{Hom}(X, Y) \otimes E$.

Passage de B à A. Pour X un motif, et V un espace vectoriel sur $\mathbb{Q}$ de dimension finie, on note $X \otimes V$ le motif, isomorphe à une somme de dim(V) copies de X, caractérisé par $\mathrm{Hom}(Y, X \otimes V) = \mathrm{Hom}(Y, X) \otimes V$ (ou par $\mathrm{Hom}(X \otimes V, Y) = \mathrm{Hom}(V, \mathrm{Hom}(X, Y))$). On passe de B à A en associant à M_E le motif $M \otimes E$, muni de sa structure de E-module naturelle.

Passage de A à B. Si M est muni d'une structure de E-module, on récupère sur M_E deux structures de E-module: celle déduite de celle de M, et celle qu'a tout objet de $\mathscr{M}_{k,E}$. L'objet de $\mathscr{M}_{k,E}$ correspondant à M est le plus grand facteur direct de M_E sur lequel ces structures coïncident. En détail: l'algèbre $E \otimes E$ est un produit de corps, parmi lesquels une copie de E dans laquelle $x \otimes 1$ et $1 \otimes x$ se projettent tous deux comme x. L'idempotent correspondant e agit sur M_E (qui est un $E \otimes E$-module) et son image est l'objet de $\mathscr{M}_{k,E}$ qui correspond à M.

Les motifs à coefficient dans E sont le plus souvent donnés sous la forme A. La forme B a l'avantage de rester raisonnable pour E non de rang fini sur $\mathbb{Q}$. Elle est utile pour comprendre le formalisme tensoriel: on peut définir produit tensoriel et dual, pour les motifs à coefficient dans E, par leur fonctorialité et les formules

$X_E \otimes_E Y_E = (X \otimes Y)_E$ et $(X_E)^\vee = (X^\vee)_E$.

Dans le langage A, $X \otimes_E Y$ est le plus grand facteur direct de $X \otimes Y$ sur lequel coïncident les deux structures de E-module de $X \otimes Y$, et $X^\vee$ est le dual usuel de X, muni de la structure de E-module transposée. Si on applique ces remarques à la catégorie des espaces vectoriels sur $\mathbb{Q}$, plutôt qu'à celle des motifs, on retrouve l'isomorphisme du E-dual d'un espace vectoriel sur E avec son $\mathbb{Q}$-dual, donné par

$\omega \mapsto$ la forme $\mathrm{Tr}_{E/\mathbb{Q}}(\langle \omega, v \rangle)$.

Nous avons défini en 0.1.1 des foncteurs de restriction et d'extension du corps k des scalaires. Ils transforment motifs à coefficient dans E en motifs à coefficient dans E. On dispose aussi de foncteurs de restriction et d'extension des coefficients: soit F une extension finie de E:

Extension des coefficients. Dans le langage A, c'est $X \mapsto X \otimes_E F$; dans le langage B, c'est $X_E \mapsto X_F$.

Restriction des coefficients. Dans le langage A, on restreint à E la structure de F-module.

Le lecteur prendra soin de ne pas confondre les rôles de k et E. Un exemple type qu'on peut retenir est celui du H_1 des variétés abéliennes sur k, à multiplication complexe par un ordre de E. En terme de la variété abélienne—prise à isogénie près—les foncteurs ci-dessus deviennent: extension du corps de base, restriction des scalaires à la Weil, construction $\otimes_E F$, qui multiplie la dimension par [F:E], restriction à E de la structure de F-module.

2.2. Soit M un motif sur $\mathbb{Q}$, à coefficient dans un corps de nombres E. Pour chaque nombre premier l, la réalisation l-adique $H_l(M)$ de M est un module sur le complété l-adique E_l de E. Ce complété est le produit des complétés E_λ, pour λ idéal premier au-dessus de l, d'où une décomposition de $H_l(M)$ en un produit de E_λ-modules $H_\lambda(M)$.

On conjecture pour les $H_\lambda(M)$ une compatibilité analogue à 1.2.1; si elle est vérifiée, on peut pour chaque plongement complexe σ de E définir une série de Dirichlet à coefficients dans σE, convergente pour $\Re s$ assez grand:

$L(\sigma, M, s) = \prod_p L_p(\sigma, M, s)$, où

(2.2.1) $L_p(\sigma, M, s) = \sigma Z_p(M, p^{-s})$ avec $Z_p \in E(t) \subset E_\lambda(t)$ donné par $Z_p(M, t) = \det(1 - F_p\, t, H_\lambda(M)^{I_p})^{-1}$ pour $\lambda \nmid p$.

Pour σ variable, ces séries de Dirichlet se déduisent les unes des autres par conjugaison des coefficients. Nous regarderons le système des $L(\sigma, M, s)$ comme une fonction $L^*(M, s)$ à valeurs dans la $\mathbb{C}$-algèbre $E \otimes \mathbb{C}$, identifiée à $\mathbb{C}^{Hom(E,\mathbb{C})}$ par

(2.2.2) $E \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}^{Hom(E,\mathbb{C})}$: $e \otimes z \mapsto (z, \sigma(e))_\sigma$.

Cette fonction peut aussi être définie directement par un produit eulérien. On espère comme en 1.1 qu'elle admet un prolongement analytique en s.

Il y a lieu de compléter le produit eulérien $L(\sigma, M, s)$ par un facteur à l'infini $L_\infty(\sigma, M, s)$ dépendant de la réalisation de Hodge de M. Posant $\Lambda(\sigma, M, s) = L_\infty(\sigma, M, s)L(\sigma, M, s)$, l'équation fonctionnelle conjecturale des fonctions L s'écrit

(2.2.3) $\Lambda(\sigma, M, s) = \varepsilon(\sigma, M, s)\Lambda(\sigma, \check{M}, 1 - s)$,

où $\varepsilon(\sigma, M, s)$, comme fonction de s, est le produit d'une constante par une exponentielle. Les définitions de L_∞ et ε sont rappelées en 5.2. Comme ci-dessus, on regardera le système des Λ et celui des ε, pour σ variable, comme des fonctions Λ^* et ε^* à valeurs dans $E \otimes \mathbb{C}$.

Il résulte de 2.5 ci-dessous que $L_\infty(\sigma, M, s)$ est indépendant de σ, et que la fonction L_∞ pour le motif $R_{E/\mathbb{Q}}\, M$ déduit de M par restriction du corps des coefficients (2.1) est la puissance [E:$\mathbb{Q}$]ième de $L_\infty(\sigma, M, s)$. Ceci justifie la

PROPOSITION-DÉFINITION 2.3. Soit M un motif sur $\mathbb{Q}$ à coefficient dans E. Un entier n est critique pour M si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées (i) l'entier n est critique pour $R_{E/\mathbb{Q}}\, M$; (ii) ni $L_\infty(\sigma, M, s)$, ni $L_\infty(\sigma, \check{M}(1), s)$ n'ont de pôle en $s = n$. On dit que M est critique si 0 est critique pour M.

Notre but est de conjecturer la valeur de $L^*(M) =_{dfn} L^*(M, 0)$, pour M critique, à multiplication par un élément de E près. En d'autres termes, il s'agit de conjecturer simultanément les valeurs des $L(\sigma, M) =_{dfn} L(\sigma, M, 0)$, à multiplication près par un système de nombres $\sigma(e)$, $e \in E$.

2.4. La réalisation $H_B(M)$ de M en cohomologie rationnelle est munie d'une structure de E-espace vectoriel. Sa dimension est le rang sur E de M. L'involution F_∞ est E-linéaire; les parties + et − sont donc des E-sous-espaces vectoriels. On note $d^+(M)$ et $d^-(M)$ leur dimension.

Le complexifié de $H_B(M)$ est un $E \otimes \mathbb{C}$-module libre. Identifiant $E \otimes \mathbb{C}$ à $\mathbb{C}^{Hom(E,\mathbb{C})}$ (2.2.2), on en déduit une décomposition

$H_B(M) \otimes \mathbb{C} = \oplus_\sigma H_B(\sigma, M)$,

avec

$H_B(\sigma, M) = (H_B(M) \otimes \mathbb{C}) \otimes_{E\otimes\mathbb{C},\sigma} \mathbb{C}$,

soit

$H_B(\sigma, M) = H_B(M) \otimes_{E,\sigma} \mathbb{C}$.

Les $H_B{}^{pq}(M)$ de la décomposition de Hodge étant stables par E, chaque $H_B(\sigma, M)$ hérite d'une décomposition de Hodge $H_B(\sigma, M) = \oplus\, H_B{}^{pq}(\sigma, M)$. L'involution F_∞ permute H^{pq} et H^{qp}, en particulier stabilise $H_B{}^{pp}$, qu'elle découpe en des parties + et −. On note $h^{pq}(\sigma, M)$ la dimension de $H_B{}^{pq}(\sigma, M)$, et $h^{pp\pm}(\sigma, M)$ celle de $H_B{}^{pp\pm}(\sigma, M)$. La proposition suivante permet d'omettre σ de la notation.

PROPOSITION 2.5. Les nombres $h^{pq}(\sigma, M)$ et $h^{pp\pm}(\sigma, M)$ sont indépendant de σ.

On peut supposer, et on suppose, que M est homogène. Dans ce cas, $H^{pq}(M)$ s'identifie au complexifié du E-espace vectoriel $Gr_F{}^p(H_{DR}(M))$; c'est un $E \otimes \mathbb{C}$-module libre, et la première assertion en résulte. Pour la seconde, on observe que $h^{pp\pm}(\sigma, M)$ est l'excès de $d^\pm(M)$ sur $\sum_{p>q} h^{pq}(\sigma, M)$.

2.6. Soit M un motif sur $\mathbb{Q}$ à coefficient dans E. Dans la fin de ce paragraphe, sauf mention expresse du contraire, nous supposons que $R_{E/\mathbb{Q}}$ M vérifie les hypothèses de 1.7. Les espaces $F^\pm$ et $H_{\overline{DR}}{}^\pm$ sont cette fois des espaces vectoriels sur E. Les isomorphismes (0.4.1) et (1.7.1)

```
(2.6.1)    I: H_B(M) ⊗ ℂ → H_DR(M) ⊗ ℂ,
(2.6.2)    I^±: H_B^±(M) ⊗ ℂ → H_{D̄R}^±(M) ⊗ ℂ,
```

sont des isomorphismes de $E \otimes \mathbb{C}$-modules entre complexifiés d'espaces vectoriels sur E. On pose

$c^\pm(M) = \det(I^\pm) \in (E \otimes \mathbb{C})^*$, $\delta(M) = \det(I) \in (E \otimes \mathbb{C})^*$,

le déterminant étant calculé dans des bases E-rationnelles de $H_B{}^\pm(M)$ et $H_{\overline{DR}}{}^\pm(M)$ (resp. $H_B(M)$ et $H_{DR}(M)$). La définition de $\delta(M)$ ne requiert pas les hypothèses faites sur M. A multiplication par un élément de E^* près, ces nombres ne dépendent que de M. Il résulte à nouveau de 1.6 que $c^+(M)$, $i^{d^-(M)}$ $c^-(M)$ et $i^{d^-(M)}$ $\delta(M)$ sont dans $(E \otimes \mathbb{R})^*$.

Conjecture 2.7. Posons $\mathfrak{R}(M) = -1/2$ w. Si M est critique, (i) $L(\sigma, M, s)$ n'a jamais de pôle en $s = 0$, et ne peut s'annuler en $s = 0$ que pour $\mathfrak{R}(M) = 1/2$. (ii) La multiplicité du zéro de $L(\sigma, M, s)$ en $s = 0$ est indépendante de σ.

Pour (i), je renvoie à la discussion à la fin de 1.3. Que (ii) soit raisonnable m'a été suggéré par B. Gross.

Conjecture 2.8. Pour M critique et $L(\sigma, M) \neq 0$, $L^*(M)$ est le produit de $c^+(M)$ par un élément de E^*.

REMARQUE 2.9. Un motif M sur un corps de nombres k, à coefficient dans E, définit aussi une fonction $L^*(M, s)$. Ces fonctions sont couvertes par notre conjecture, vu l'identité $L^*(M, s) = L^*(R_{k/\mathbb{Q}} M, s)$, où $R_{k/\mathbb{Q}}$ est la restriction des scalaires de k à $\mathbb{Q}$ (appliquer (0.5.3)).

Les fonctions $L(\sigma, M, s)$ sont des produits eulériens, indexés par les places finies de k. Il y a lieu de les compléter par les facteurs à l'infini $L_v(\sigma, M, s)$, indexés par les places à l'infini, dont la définition est rappelée en 5.2. Ils dépendent en général de σ. Seul $L_\infty(\sigma, R_{k/\mathbb{Q}} M, s)$, produit sur v à l'infini des $L_v(\sigma, M, s)$, est indépendant de σ.

REMARQUE 2.10. Soient F une extension de E, ι le morphisme structural de E dans F et ι_C son complexifié: $E \otimes \mathbb{C} \hookrightarrow F \otimes \mathbb{C}$. On a $L^*(M \otimes_E F, s) = \iota_C L^*(M, s)$ et $c^\pm(M \otimes_E F) = \iota_C c^\pm(M)$. La conjecture est donc compatible à l'extension du corps des coefficients. Pour F une extension galoisienne de E, de groupe de Galois G, le Théorème 90 de Hilbert $H^1(G, F^*) = 0$ assure que $((F \otimes \mathbb{C})^*/F^*)^G = (E \otimes \mathbb{C})^*/E^*$: la conjecture est invariante par extension du corps des coefficients.

REMARQUE 2.11. Si E est une extension de F, on a $L^*(R_{E/F} M, s) = N_{E/F} L^*(M, s)$. Les périodes $c^\pm$ vérifiant la même identité, la conjecture est compatible à la restriction des coefficients.

REMARQUE 2.12. Soit D une algèbre à division de rang d^2 sur E. Un motif M sur $\mathbb{Q}$, muni d'une structure de D-module, et de rang n sur D, définit une série de Dirichlet à coefficients dans E dont les facteurs eulériens sont presque tous de degré nd: pour λ une place finie de E, $H_\lambda(M)$ est un module libre sur le complété $D_\lambda = D \otimes_E E_\lambda$, et on reprend la définition (2.2.1) en posant

$$Z_p(M, t) = \det \mathrm{red}(1 - F_p\, t, H_\lambda(M)^{I_p})^{-1}$$

(si D_λ est une algèbre de matrices sur E_λ, et e un idempotent indécomposable, le déterminant réduit d'un endomorphisme A d'un D_λ-module H est le déterminant, calculé sur E_λ, de la restriction de A à eH; la définition dans le cas général procède par descente).

La liberté que nous donne 2.10 d'étendre le corps des coefficients met ces fonctions L elles aussi sous le chapeau 2.8: choisissant une extension ι: $E \hookrightarrow F$ de E qui neutralise D, et un idempotent indécomposable e de $D \otimes_E F$, on a $\iota_C L^*(M, s) = L^*(e(M \otimes_E F), s)$.

On peut aussi définir $c^+(M)$ directement dans ce cadre. C'est ce qui est expliqué en 2.13 ci-dessous.

La fin de ce paragraphe est inutile pour la suite.

2.13. Soit D une algèbre simple sur un corps E (voire une algèbre d'Azumaya sur un anneau...). Pour le formalisme tensoriel, il est commode de regarder les D-modules comme de "faux E-espaces vectoriels":

(a) Se donner un espace vectoriel V sur E revient à se donner, pour toute extension étale F de E, un F-espace vectoriel V_F, et des isomorphismes compatibles $V_G = V_F \otimes_F G$ pour G une extension de F. On prend $V_F = V \otimes_E F$. Par descente, il suffit de ne se donner les V_F que pour F assez grand.

(b) Soit W un D-module. Pour toute extension étale F de E, et tout F-isomorphisme $D \otimes F \cong \mathrm{End}_F(L)$, avec L libre, posons $W_{F,L} = \mathrm{Hom}_{D\otimes F}(L, W \otimes F)$ (les produits tensoriels sont sur E). On a un isomorphisme de $D \otimes F$-module

$$W \otimes_E F = L \otimes_F W_{F,L}.$$

Si F est assez grand pour neutraliser D, L est unique à isomorphisme non unique près; la non-unicité est due aux homothéties, qui agissent trivialement sur End(L). C'est pourquoi la donnée des $W_{F,L}$ n'est pas du type (a); c'est un "faux espace vectoriel sur E".

Soient (W^{α}) une famille de D-modules, et T une opération tensorielle. Si les homothéties de L agissent trivialement sur $T(W_{F,L}{}^{\alpha})$, le F-espace vectoriel $T(W_{F,L}{}^{\alpha})$ est indépendant du choix de L et on obtient un système du type (a), d'où un espace vectoriel $T(W^{\alpha})$ sur E.

EXEMPLE. Si W′ et W″ sont deux D-modules de rang $n\cdot[D:E]^{1/2}$ sur E, on peut prendre $T = \mathrm{Hom}(\wedge^n W'_{F,L}, \wedge^n W''_{F,L})$; on obtient un espace vectoriel $\delta(W', W'')$ de rang 1 sur E, et tout homomorphisme $f: W' \to W''$ a un déterminant réduit $\det \mathrm{red}(f) \in \delta(W', W'')$.

Pour définir $c^+(M)$, on applique cette construction aux D-modules $H_B{}^+(M)$ et à $H_{\overline{DR}}{}^+(M)$. Posons $\delta = \delta(H_B{}^+(M), H_{\overline{DR}}{}^+(M))$. Le déterminant réduit de l'isomorphisme de $D \otimes \mathbb{C}$-modules I^+: $H_B{}^+(M)_{\mathbb{C}} \to\simeq H_{\overline{DR}}{}^+(M)_{\mathbb{C}}$ est dans le $E \otimes \mathbb{C}$-module libre de rang 1 $\delta \otimes \mathbb{C}$. On pose $\det \mathrm{red}(I^+) = c^+(M)\cdot e$ pour e une base de δ.

3. Exemple: la fonction ζ. 3.1. Pour comprendre les diverses réalisations du motif de Tate $\mathbb{Z}(1)$, le plus simple est de l'écrire $\mathbb{Z}(1) = H_1(\mathbb{G}_m)$. Le groupe multiplicatif n'étant pas une variété projective, ceci ne rentre pas dans le cadre de Grothendieck, qui demande qu'on définisse plutôt $\mathbb{Z}(1)$ comme le dual du facteur direct $H^2(\mathbb{P}^1)$ de $H^*(\mathbb{P}^1)$.

La réalisation en $\mathbb{Z}_l$-cohomologie de $\mathbb{Z}(1)$ est le module de Tate $T_l(\mathbb{G}_m)$ de $\mathbb{G}_m$

$\mathbb{Z}_l(1) = \mathrm{proj\ lim}\ \mu_{l^n}$.

En réalisation de Hodge, on a $H_B(\mathbb{Z}(1)) = H_1(\mathbb{C}^*)$ isomorphe à $\mathbb{Z}$ (à $\mathbb{Q}$ plutôt, en homologie rationnelle). Ce groupe est purement de type $(-1,-1)$ et $F_\infty = -1$.

En réalisation de de Rham, $H_{\mathrm{DR}}(\mathbb{Z}(1))$ est le dual de $H_{\mathrm{DR}}{}^1(\mathbb{G}_m)$, isomorphe à $\mathbb{Q}$, de générateur la classe de dz/z. L'unique période de $H^1(\mathbb{G}_m)$ est

(3.1.1) $\oint dz/z = 2\pi i$.

Sur $\mathbb{Z}_l(1)$, le Frobenius arithmétique φ_p ($p \neq l$) agit par multiplication par p. Le Frobenius géométrique agit donc par multiplication par p^{-1}; ceci justifie l'identité citée en 1.3

(3.1.2) $L(M(n), s) = L(M, n + s)$.

Puisque F_∞ agit sur $(-1)^n$ sur $H_B(\mathbb{Z}(n))$, $H_B{}^{\varepsilon}(\mathbb{Z}(n))$ est nul pour $\varepsilon = -(-1)^n$, et $c^{\varepsilon}(\mathbb{Z}(n)) = 1$. Pour $\varepsilon = (-1)^n$, d'après (3.1.1), $c^{\varepsilon}(\mathbb{Z}(n)) = \delta(\mathbb{Z}(n)) = (2\pi i)^n$:

(3.1.3) $c^{\varepsilon}(\mathbb{Z}(n)) = (2\pi i)^n$ pour $\varepsilon = (-1)^n$, $c^{\varepsilon}(\mathbb{Z}(n)) = 1$, $\delta(\mathbb{Z}(n)) = (2\pi i)^n$ pour $\varepsilon = -(-1)^n$.

3.2. La fonction $\zeta(s)$ est la fonction L attachée au motif unité $\mathbb{Z}(0) = H^*(\mathrm{Point})$. Les entiers critiques pour $\mathbb{Z}(0)$ sont les entiers pair > 0, et les entiers impairs ≤ 0. A cause du pôle de $\zeta(s)$ en $s = 1$, 0 n'est pas un zéro trivial et il serait raisonnable de définir les entiers critiques comme incluant 0. La équation (3.1.3) et les valeurs

connues de $\zeta(n) = L(\mathbb{Z}(n))$ pour n critique vérifient 1.8: $\zeta(n)$ est rationnel pour n impair ≤ 0, et un multiple rationnel de $(2\pi i)^n$ pour n pair ≥ 0.

4. Compatibilité à la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer. 4.1. Soient A une variété abélienne sur $\mathbb{Q}$, et d sa dimension. La conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer [15] affirme notamment: (a) $L(H^1(A), 1)$ est non nul si et seulement si $A(\mathbb{Q})$ est fini. (b) Soit ω un générateur de $H^0(A, \Omega^d)$. Alors, $L(H^1(A), 1)$ est le produit de $\int_{A(\mathbb{R})} |\omega|$ par un nombre rationnel.

Le motif $H^1(A)(1)$ est isomorphe au dual $H_1(A)$ de $H^1(A)$: ceci traduit l'existence d'une polarization, autodualité de $H^1(A)$ à valeurs dans $\mathbb{Z}(-1)$. D'après 1.7, $c^+(H^1(A)(1))$ se calcule donc comme suit: si $\omega_1,\cdots,\omega_d$ est une base de $H^0(A, \Omega^1) = F^+H_{DR}{}^1(A)$, et $c_1,\cdots,c_d$ une base de $H_1(A(\mathbb{C}), \mathbb{Q})^+$, on a

(4.1.1) $c^+(H^1(A)(1)) = \det\langle \omega_i, e_j\rangle$.

Désignant encore par e_i un cycle représentatif, on a $\langle \omega_i, e_j\rangle = \int_{e_j} \omega_i$. Prenons pour base (e_i) une base sur $\mathbb{Z}$ de $H_1(A(\mathbb{R})^\circ, \mathbb{Z}) \subset H_1(A(\mathbb{C}), \mathbb{Z})$. Le produit de Pontryagin des e_i est représenté par le d-cycle $A(\mathbb{R})^\circ$ dans $A(\mathbb{C})$, pour une orientation convenable, et, si ω est le produit extérieur des ω_i, le déterminant (4.1.1) est l'intégrale $\int_{A(\mathbb{R})^\circ} \omega$. On a

$\int_{A(\mathbb{R})} |\omega| = [A(\mathbb{R}): A(\mathbb{R})^\circ] \, |\int_{A(\mathbb{R})^\circ} \omega|$,

et 1.8 pour $H^1(A)(1)$ équivaut donc à 4.1(b) ci-dessus.

4.2. La conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer donne la valeur exacte de $L(H^1(A), 1)$; la description du facteur rationnel en 4.1(b) à partir du motif $H^1(A)(1)$ a la forme suivante: (a) La donnée de $M = H^1(A)(1)$ équivaut à celle de A à isogénie près. Il faut commencer par choisir A. Cela revient à choisir un réseau entier dans $H_B(M)$, dont les l-adifiés soient stables sous l'action de $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. (b) On choisit alors ω, par exemple comme produit extérieur des éléments d'une base d'un réseau entier dans $H_{DR}(M)$. Cet ω détermine la période, $c^+(M)$, et, pour chaque nombre premier p, un facteur rationnel $c_p(M)$. Les $c_p(M)$ sont presque tous égaux à 1, et la formule du produit assure que $c^+(M)\cdot\prod_p c_p(M)$ est indépendant de ω. (c) Un autre nombre rationnel, h(M), est défini en terme d'invariants cohomologiques de A; le nombre rationnel cherché est $h(M)\cdot\prod_p c_p(M)^{-1}$.

L'invariance de la conjecture par isogénie est par ailleurs un théorème non trivial.

4.3. Pour généraliser 4.1(a) à un motif de poids -1 M quelconque, il faudrait disposer d'un analogue de $A(\mathbb{Q})$. Le groupe $A(\mathbb{Q})$ peut s'interpréter comme le groupe des extensions de $\mathbb{Z}(0)$ par $H_1(A)$, dans la catégorie des 1-motifs [6, §10] sur $\mathbb{Q}$. Ceci suggère de considérer le groupe des extensions de $\mathbb{Z}(0)$ par M, dans une catégorie de motifs mixtes, parallèles aux structures de Hodge mixtes, mais on ne dispose même pas d'une définition conjecturale d'une telle catégorie!

J'observerai seulement que, dans toutes les théories cohomologiques usuelles, un cycle Y de dimension d, cohomologue à zéro, sur une variété algébrique propre et

lisse X détermine un torseur sous $H^{2d-1}(X)(d)$: on dispose d'une suite exacte de cohomologie

$0 \to H^{2d-1}(X)(d) \to H^{2d-1}(X - Y)(d) \xrightarrow{-\partial} H_Y{}^{2d}(X)(d) \to H^{2d}(X)(d)$,

Y définit une classe de cohomologie $cl(Y) \in H_Y{}^{2d}(X)(d)$, d'image nulle dans $H^{2d}(X)(d)$, et on prend $\partial^{-1}cl(Y)$. Cette construction correspond à celle qui à un diviseur de degré 0 sur une courbe associe un point de sa jacobienne.

5. Compatibilité à l'équation fonctionnelle. Soit E un corps de nombres. Dans $(E \otimes \mathbb{C})^*$, nous noterons $\sim$ la relation d'équivalence définie par le sous-groupe E^*.

PROPOSITION 5.1. Soit M un motif sur $\mathbb{Q}$, à coefficient dans E. On suppose vérifiées les hypothèses de 1.7. On a alors

$c^+(M) \sim (2\pi i)^{-d^-(M)} \cdot \delta(M) \cdot c^+(\check{M}(1))$.

Pour L un module libre de rang n sur un anneau commutatif A (A sera E, ou $E \otimes \mathbb{C}$), posons $\det L = \wedge^n L$. On étend par localisation cette définition au cas où L est seulement projectif de type fini (cette généralisation n'est pas indispensable à la preuve de 5.1). On a des isomorphismes canoniques

(5.1.1) $\det(L^\vee) = \det(L)^{-1}$

et, pour tout facteur direct P et L,

(5.1.2) $\det(L) = \det(P) \cdot \det(L/P)$

(on a désigné par $\cdot$ un produit tensoriel, et par $^{-1}$ un dual). Il y a ici des problèmes de signe, qu'on résoud au mieux en considérant det(L) comme un module gradué inversible, placé en degré le rang de L. Nos résultats finaux étant modulo $\sim$, nous ne nous en inquiéterons pas.

Pour X et Y de même rang, posons $\delta(X, Y) = \mathrm{Hom}(\det X, \det Y) = \det(X)^{-1} \cdot \det(Y)$. Le déterminant de $f: X \to Y$ est dans $\delta(X, Y)$. On déduit de (5.1.1) et (5.1.2) des isomorphismes

(5.1.3) $\delta(X, Y) = \delta(Y^\vee, X^\vee)$

et, pour $F \subset X$ et $G \subset Y$,

(5.1.4) $\delta(X, Y) = \delta(F, Y/G) \cdot \delta(G, X/F)^{-1}$.

LEMME 5.1.5. Via l'isomorphisme (5.1.3), on a $\det(u) = \det({}^t u)$.

LEMME 5.1.6. Soient F et G des facteurs directs de X et Y. On suppose que l'isomorphisme $f: X \to Y$ induit des isomorphismes $f_F: F \to Y/G$ et ${f_G}^{-1}: G \to X/F$. Via l'isomorphisme (5.1.4), on a $\det(f) = \det(f_F)\ \det({f_G}^{-1})^{-1}$.

La vérification de ces lemmes est laissée au lecteur. Pour 5.1.6, notons seulement que, pour $G^1 = f^{-1}(G)$ et $F^1 = f(F)$, on a $X = F \oplus G^1$, $Y = G \oplus F^1$, et que f échange F et F^1, G et G^1.

Appliquons le Lemme 5.1.6 aux complexifiés de ${H_B}^+(M) \subset H_B(M)$ et de $F^- \subset H_{DR}(M)$. On trouve que, via l'isomorphisme (5.1.4), le déterminant de $I: H_B(M) \otimes \mathbb{C} \to H_{DR}(M) \otimes \mathbb{C}$ est le produit du déterminant de $I^+: {H_B}^+(M) \otimes \mathbb{C} \to$

$(H_{DR}(M)/F^-) \otimes \mathbb{C}$ et de l'inverse du déterminant du morphisme induit par l'inverse de I:

$J^-: F^- \otimes \mathbb{C} \to (H_B(M)/{H_B}^+(M)) \otimes \mathbb{C}$.

Le morphisme J^- est le transposé du morphisme I^- pour le motif $\check{M}$ dual de M. Appliquant 5.1.5, et prenant des bases sur E des espaces $\delta(X, Y)$ en jeu, on obtient finalement que

(5.1.7) $\delta(M) \sim c^+(M) \cdot c^-(\check{M})^{-1}$.

On en déduit 5.1 en appliquant au motif $\check{M}$ la formule suivante, conséquence de 3.1:

(5.1.8) $c^{\pm}(M) = (2\pi i)^{-d^{\pm}(M)\cdot n}\ c^{\pm(-1)^n}(M(n))$.

Notons aussi, pour usage ultérieur, la formule analogue

(5.1.9) $\delta(M) = (2\pi i)^{-d(M)\cdot n}\ \delta(M(n))$,

5.2. Rappelons la forme exacte de l'équation fonctionnelle conjecturale des fonctions L des motifs ([12], [4]). Nous nous placerons dans le cas général d'un motif sur un corps de nombres k, à coefficient dans un corps E muni d'un plongement complexe σ (cf. 2.9). La forme générale d'abord: (a) Pour chaque place v de k, on définit un facteur local $L_v(\sigma, M, s)$. Pour v fini, la définition de $L_v(\sigma, M, s) = \sigma Z_v(M, Nv^{-s})$ ($Z_v(M, t) \in E(t)$) dépend d'une hypothèse de compatibilité analogue à (1.2.1). On a $Z_v(M, t) = \det(1 - F_{vt}, H_\lambda(M)^{I_v})^{-1}$. Pour v infini, induit par un plongement complexe τ, on obtient $L_v(\sigma, M, s)$ en décomposant $H_\tau(M) \otimes_{E,\sigma} \mathbb{C}$ en somme directe de sous-espaces minimaux stables par les projecteurs qui donnent la décomposition de Hodge, et par F_∞ pour v réel, en associant à chacun le "facteur Γ" de la Table (5.3), et en prenant leur produit. Pour v complexe, les sous-espaces minimaux sont de dimension un, d'un type (p, q). Pour v réel, ils sont soit de dimension 2, de type $\{(p, q), (q, p)\}$, $p \neq q$, soit de dimension 1, de type (p, p), avec $F_\infty = \pm 1$. On note $\Lambda(\sigma, M, s)$ le produit des $L_v(\sigma, M, s)$. (b) Soient Ψ un caractère non trivial du groupe $\mathbb{A} \otimes k/k$ des classes d'adèles de k, et Ψ_v ses composantes. Soient aussi, pour chaque place v de k, une mesure de Haar dx_v sur k_v. On suppose que, pour presque tout v, dx_v donne aux entiers de k_v la masse 1, et que le produit $\otimes\, dx_v$ des dx_v est la mesure de Tamagawa, donnant la masse 1 au groupe des classes d'adèles.

On définit des constantes locales $\varepsilon_v(\sigma, M, s, \Psi_v, dx_v)$, presque toutes égales à 1 et toutes, comme fonction de s, produit d'une constante par une exponentielle. Soit $\varepsilon(\sigma, M, s)$ leur produit (indépendant de Ψ et des dx_v). (c) L'équation fonctionnelle conjecturale est

$\Lambda(\sigma, M, s) = \varepsilon(\sigma, M, s)\Lambda(\sigma, \check{M}, 1 - s)$.

Pour définir les ε_v, une hypothèse additionnelle de compatibilité entre les $H_\lambda(M)$ est requise. Elle permet d'associer à v, σ, M une classe d'isomorphie de représentations complexes du groupe de Weil $W(\bar{k}_v/k_v)$ pour v infini, du groupe de Weil épaissi $W'(\bar{k}_v/k_v)$ pour v fini, et on prend le ε de [4, 8.12.4], avec $t = p^{-s}$.

Pour v infini, ceci revient à décomposer $H_\tau(M) \otimes_{E,\sigma} \mathbb{C}$ comme en (a), à associer

à chaque sous-espace de la décomposition un facteur ε'_v, et à prendre leur produit. La table des ε'_v, pour un choix particulier de Ψ_v et de dx_v, est donnée en 5.3.

Pour v fini, on commence par restreindre les représentations $H_\lambda(M)$ à un groupe de décomposition $\mathrm{Gal}(\bar{k}_v/k_v) \subset \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$, puis au groupe de Weil $W(\bar{k}_v/k_v)$. Appliquant [4, 8.3, 8.4], on déduit de $H_\lambda(M)$ une classe d'isomorphie ρ_λ de représentations de $W'(\bar{k}_v/k_v)$ sur E_λ. Il est loisible ici, et utile, de la remplacer par sa F-semi-simplifiée [4, 8.6]. On demande que ces représentations, pour λ variable, soient compatibles, i.e., que si on étend les scalaires de E_λ à $\mathbb{C}$, par $\tilde{\sigma}$: $E_\lambda \to \mathbb{C}$ prolongeant σ, la classe d'isomorphie de la représentation obtenue soit indépendante de λ et de σ. C'est la classe d'isomorphie cherchée.

Remontons pour le lecteur les renvois internes de [4]. Une représentation de W′ est donnée par une représentation ρ du groupe de Weil dans GL(V), et par un endomorphisme nilpotent N de V. En terme de la constante locale [4, 4.1], de ρ, celle de (ρ, N) est donnée par

$\varepsilon((\rho, N), s, \Psi, dx) = \varepsilon(\rho \otimes \omega_s, \Psi\, dx) \cdot \det(-F\, Nv^{-s}, V^{\rho(I)}/\mathrm{Ker}(N)^{\rho(I)})$.

REMARQUE 5.2.1. La fonction de s

$\varepsilon((\rho, N), s, \Psi, dx)L((\rho, N)^\vee, 1-s)L((\rho, N), s)^{-1}$

est la même pour (ρ, N) et pour $(\rho, 0)$. Ceci permet d'énoncer l'équation fonctionnelle conjecturale des fonctions L en supposant seulement une compatibilité entre les semi-simplifiées des restrictions des $H_l(M)$ à un groupe de décomposition.

5.3. Dans la table ci-dessous, on donne les facteurs locaux, et les constantes, associés aux divers types de sous-espaces minimaux de la réalisation de Hodge. Pour les constantes, on a supposé Ψ_v et la mesure dx_v choisis comme suit: v réel: $\Psi_v(x) = \exp(2\pi i x)$, mesure dx, v complexe: $\Psi_v(z) = \exp(2\pi i\, \mathrm{Tr}_{\mathbb{C}/\mathbb{R}}(z))$, mesure $|dz \wedge d\bar{z}|$, soit pour $z = x + iy$, $\exp(4\pi i x)$ et $2dxdy$.

On utilise les notations $\Gamma_\mathbb{R}(s) = \pi^{-s/2}\,\Gamma(s/2)$, $\Gamma_\mathbb{C}(s) = 2 \cdot (2\pi)^{-s}\,\Gamma(s)$.

place type facteur Γ constante (pour Ψ, dx ci-dessus) complexe (p, q) ou (q, p), $p \le q$ $\Gamma_\mathbb{C}(s-p)\, i^{q-p}$ réelle {(p, q), (q, p)}, $p < q$ $\Gamma_\mathbb{C}(s-p)\, i^{q-p+1}$ (p, p), $F_\infty = (-1)^{p+\varepsilon}$, $\varepsilon = 0$ ou 1 $\Gamma_\mathbb{R}(s+\varepsilon-p)\, i^\varepsilon$

Le cas qui nous intéresse est celui où $k = \mathbb{Q}$. On peut dans ce cas prendre $\Psi_\infty(x) = \exp(2\pi i x)$, $\Psi_p(x) = \exp(-2\pi i x)$ (via l'isomorphisme $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ = partie p-primaire de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$), dx_∞ = mesure de Lebesgue dx, dx_p = la mesure de Haar sur $\mathbb{Q}_p$ donnant à $\mathbb{Z}_p$ la masse 1.

PROPOSITION 5.4. Si M est critique de poids w, on a, modulo un nombre rationnel indépendant de σ,

$L_\infty(\sigma, \check{M}(1))L_\infty(\sigma, M)^{-1} \sim (2\pi)^{-d^-(M)} \cdot (2\pi)^{-wd(M)/2}$.

D'après 2.5, les $L_\infty(\sigma,)$ sont indépendants de σ. Ceci nous permet de ne vérifier 5.4 que pour σ fixé. La formule est compatible à la substitution $M \mapsto \check{M}(1)$: $\check{M}(1)$ est

de poids $-2-w$, son d^- est $d^+(M)$ et abrégeant $d(M)$ et $d^\pm(M)$ en d et $d^\pm$, on a $d = d^+ + d^-$ et

$(-d^- - wd/2) + (-d^+ - ((-2-w)d)/2) = 0$.

Ceci permet de ne vérifier 5.4 que pour $w \geq -1$. Pour s entier, on a, modulo $\mathbb{Q}^*$,

(5.4.1) $\Gamma_{\mathbb{R}}(s) \sim (2\pi)^{-s/2}$ pour s pair > 0, $\Gamma_{\mathbb{R}}(s) \sim (2\pi)^{(1-s)/2}$ pour s impair, $\Gamma_{\mathbb{C}}(s) \sim (2\pi)^{-s}$ pour $s > 0$.

Pour $w \geq -1$, la puissance de 2π dans la contribution de chaque sous-espace de $H_B(M) \otimes \mathbb{C}$, comme en 5.2(a), est donc donnée par

$L_\infty(M)\, L_\infty(\check{M}(1))\, L_\infty(\check{M}(1))L_\infty(M)^{-1}$ {(pq), (qp)}, $p \leq q$ p $-1-p$ $-1-w$ (pp), p pair ≥ 0, $F_\infty = -1$ p/2 $-1-p/2$ $-1-w/2$ (pp), p impair ≥ 0, $F_\infty = -1$ $(1+p)/2$ $(-1-p)/2$ $-1-w/2$

La proposition en résulte aussitôt. Posons $\det M = \wedge^{d(M)} M$ (puissance extérieure sur E).

PROPOSITION 5.5. $\varepsilon^*(M) \sim \varepsilon^*(\det M)$.

Pour des dx_v choisis comme suggéré en 5.4, nous prouverons plus précisément des équivalences

(5.5.1) ${\varepsilon_v}^*(M, \Psi_v, dx_v) \sim {\varepsilon_v}^*(\det M, \Psi_v, dx_v)$.

Posant $\eta_v(\sigma, M, \Psi_v) = \varepsilon_v(\sigma, M, \Psi_v, dx_v)\, {\varepsilon_v}^{-1}(\sigma, \det M, \Psi_v, dx_v)$, ceci équivaut à

(5.5.2) $\tau\eta_v(\sigma, M, \Psi_v) = \eta_v(\tau\sigma, M, \tau\Psi_v)$

pour tout automorphisme τ de $\mathbb{C}$.

Il résulte de [4, 5.4] que, si $a \in {\mathbb{Q}_v}^*$ est de valeur absolue 1, et qu'on pose $(\Psi_v \cdot a)(x) = \Psi_v(ax)$, on a

(5.5.3) $\eta_v(\sigma, M, \Psi_v) = \eta_v(\sigma, M, \Psi_v \cdot a)$ (pour $\|a\|_v = 1$).

Pour τ un automorphisme de $\mathbb{C}$, et v fini, $\tau\Psi_v$ est de cette forme $\Psi_v \cdot a$ avec $\|a\|_v = 1$; de même, $\bar{\Psi}_\infty = \Psi_\infty \cdot (-1)$.

Pour v fini, la définition de ε_v est purement algébrique, d'où $\tau\eta_v(\sigma, M, \Psi_v) = \eta_v(\tau\sigma, M, \tau\Psi_v)$ et (5.5.2) résulte de (5.5.3).

Pour $v = \infty$, on a encore $\bar{\eta}_\infty(\sigma, M, \bar{\Psi}_\infty) = \eta_\infty(\bar{\sigma}, M, \bar{\Psi}_\infty) = \eta_\infty(\bar{\sigma}, M, \Psi_\infty)$; si on prend Ψ_∞ comme suggéré en 5.3, η_∞ est une puissance de i indépendante de σ, d'où $\eta_\infty(\sigma, M, \Psi_\infty) = \pm 1$, indépendant de σ, ce qui vérifie (5.5.2).

THÉORÈME 5.6. Modulo la Conjecture 6.6 sur la nature des motifs de rang 1, la Conjecture 2.8 est compatible à l'équation fonctionnelle conjecturale des fonctions L: on a

$L_\infty{}^*(M)c^+(M) \sim \varepsilon^*(M)L_\infty{}^*(\check{M}(1))c^+(\check{M}(1))$.

D'après 5.1, 5.3 et 5.5, cette formule équivaut à

$(2\pi i)^{-d^-(M)} \cdot \delta(M) \sim (2\pi)^{-d^-(M)} \cdot (2\pi)^{-wd(M)/2} \cdot \varepsilon^*(\det M)$.

Posons $D = \det M$ et $\varepsilon = d^-(D)$. On a $\delta(M) = \delta(D)$, $d^-(M) \equiv \varepsilon \pmod 2$, et $wd(M)$ est le poids $w(D)$ de D, de sorte que la formule équivaut encore à

(5.6.1) $\varepsilon^*(D) \sim (2\pi)^{w(D)/2} \cdot i^\varepsilon \cdot \delta(D)$.

Nous prouverons en 6.5 que (5.6.1) vaut pour une classe de motifs de rang 1 qui, conjecturalement (6.6), les englobe tous.

6. Exemple: les fonctions L d'Artin. DÉFINITION 6.1. La catégorie des motifs d'Artin est l'enveloppe karoubienne de la duale de la catégorie d'objets les variétés sur $\mathbb{Q}$ de dimension 0, de morphismes les correspondances définies sur $\mathbb{Q}$.

Par définition, chaque variété de dimension 0, X, définit un motif d'Artin H(X), le foncteur H est un foncteur contravariant pleinement fidèle,

H: (variétés de dim 0, correspondances) ⟶ (motifs d'Artin)

et tout motif d'Artin est facteur direct d'un H(X).

6.2. Explicitons cette définition. Soient $\bar{\mathbb{Q}}$ une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$, et G le groupe de Galois $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Une variété de dimension 0 est le spectre d'un produit fini A de corps de nombres, et la théorie de Galois (sous la forme que lui a donnée Grothendieck) dit que le foncteur

$X = spec(A) \mapsto X(\bar{\mathbb{Q}}) = Hom(A, \bar{\mathbb{Q}})$:

(catégorie des variétés de dimension 0, sur $\mathbb{Q}$, et des morphismes de schémas) ⟶ (catégorie des ensembles finis munis d'une action continue de G)

est une équivalence de catégorie. Le foncteur inverse est I ↦ spectre de l'anneau des fonctions G-invariantes de I dans $\bar{\mathbb{Q}}$.

Une correspondance d'une variété de dimension 0, X dans une autre, Y, est une combinaison linéaire formelle à coefficients dans $\mathbb{Q}$ de composantes connexes de $X \times Y$. L'application

$\sum a_i Z_i \mapsto \sum a_i$(fonction caractéristique de $Z_i(\bar{\mathbb{Q}}) \subset (X \times Y)(\bar{\mathbb{Q}})$)

identifie correspondances et fonctions G-invariantes, à valeurs rationnelles, sur $(X \times Y)(\bar{\mathbb{Q}}) = X(\bar{\mathbb{Q}}) \times Y(\bar{\mathbb{Q}})$, et la composition des correspondances au produit matriciel.

Notons H le foncteur contravariant X ↦ espace vectoriel $\mathbb{Q}^{X(\bar{\mathbb{Q}})}$, muni de l'action naturelle de G; (correspondance F: X → Y) ↦ le morphisme F^*: $\mathbb{Q}^{Y(\bar{\mathbb{Q}})} \to \mathbb{Q}^{X(\bar{\mathbb{Q}})}$ de matrice ${}^tF$. Il est pleinement fidèle, et identifie la catégorie des motifs d'Artin à celle des représentations rationnelles de G.

6.3. Dans ce modèle, si $\bar{\mathbb{Q}}$ est la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$, le foncteur "réalisation de Betti" H_B est le foncteur "espace vectoriel sous-jacent". La structure de Hodge est purement de type (0, 0), et l'involution F_∞ est l'action de la conjugaison complexe $F_\infty \in G$. On a en effet un isomorphisme, fonctoriel pour les correspondances,

$H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Q}) = \mathbb{Q}^{X(\mathbb{C})} = \mathbb{Q}^{X(\bar{\mathbb{Q}})} = H(X)$.

Le foncteur "réalisation l-adique" H_l est le foncteur $H_l(V) = V \otimes \mathbb{Q}_l$. On a en effet un isomorphisme, fonctoriel pour les correspondances,

$H^*(X(\bar{\mathbb{Q}}), \mathbb{Q}_l) = {\mathbb{Q}_l}^{X(\bar{\mathbb{Q}})} = \mathbb{Q}^{X(\bar{\mathbb{Q}})} \otimes \mathbb{Q}_l$.

Calculons de même la réalisation de de Rham. Pour $X = \mathrm{Spec}(A)$, on a ${H_{DR}}^*(X) = A$. Écrivant que $A = \mathrm{Hom}_G(X(\bar{\mathbb{Q}}), \bar{\mathbb{Q}}) = (\mathbb{Q}^{X(\bar{\mathbb{Q}})} \otimes \bar{\mathbb{Q}})^G$, on obtient que

(6.3.1) $H_{DR}(V) = (V \otimes \bar{\mathbb{Q}})^G$.

La formule (6.3.1) réalise $H_{DR}(V)$ comme un sous-espace de $V \otimes \bar{\mathbb{Q}}$. Ce sous-espace est une $\mathbb{Q}$-structure: on a $(V \otimes \bar{\mathbb{Q}})^G \otimes \bar{\mathbb{Q}} \to\simeq V \otimes \bar{\mathbb{Q}}$. Après extension des scalaires à $\bar{\mathbb{Q}}$, $H_B(V)$ et $H_{DR}(V)$ sont donc canoniquement isomorphes. Étendant les scalaires jusqu'à $\mathbb{C}$, on trouve l'isomorphisme (0.4.1) (le vérifier pour $V = H(X)$).

6.4. Soit E une extension finie de $\mathbb{Q}$. La catégorie des motifs d'Artin à coefficient dans E est la catégorie déduite de celle des motifs d'Artin comme en 2.1. Nous l'identifierons à la catégorie des E-espaces vectoriels de dimension finie, munis d'une action de G.

Les motifs d'Artin à coefficient dans E, de rang 1 sur E, correspondent aux caractères ε: $G \to E^*$. Nous allons calculer leurs périodes. Soient donc ε: $G \to E^*$ et f le conducteur de ε: ε se factorise par un caractère, encore noté ε, du quotient $(\mathbb{Z}/f\mathbb{Z})^* = \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\exp(2\pi i/f))/\mathbb{Q})$ de G. Notons $[\varepsilon]$ l'espace vectoriel E_ε, de dimension 1 sur E, sur lequel G agit par ε. La somme de Gauss

$g = \sum \varepsilon(u) \otimes \exp(2\pi i u/f) \in [\varepsilon] \otimes \bar{\mathbb{Q}}$

est non nulle, et invariante par G: c'est une base, sur E, de $H_{DR}([\varepsilon])$. Le déterminant de I: $H_B([\varepsilon]) \otimes \mathbb{C} \to\simeq H_{DR}([\varepsilon]) \otimes \mathbb{C}$, calculé dans les bases 1 et g, vaut g^{-1}. On sait que, pour tout plongement complexe σ de E, on a $\sigma g \cdot \bar{\sigma} g = f$, nombre rationnel indépendant de σ, d'où

(6.4.1) $\delta([\varepsilon]) \sim \sum \varepsilon^{-1}(u) \otimes \exp(-2\pi i u/f) \in (E \otimes \mathbb{C})^*$.

PROPOSITION 6.5. Soit D le motif $[\varepsilon](n)$. C'est un motif sur $\mathbb{Q}$, à coefficients dans E, de rang 1 et de poids $-2n$. Posant $\varepsilon(-1) = (-1)^\eta$, avec $\eta = 0$ ou 1, on a

$\varepsilon^*(D) \sim (2\pi)^{-n}\, i^{\eta - n}\, \delta(D)$.

On sait que la constante de l'équation fonctionnelle de la fonction L de Dirichlet

$L(\sigma, [\varepsilon], s) = \sum \sigma\varepsilon^{-1}(n) \cdot n^{-s}$

(σ plongement complexe de E) est donnée par

$\varepsilon(\sigma, [\varepsilon], s) = i^\eta \cdot f^s \cdot \sum \sigma\varepsilon(u)^{-1} \exp(-2\pi i u/f)$.

D'après (5.1.9), on a par ailleurs $\delta(D) = (2\pi i)^n\, \delta([\varepsilon])$. On conclut en appliquant (6.4.1) et en notant que pour s entier ($s = n$), f^n est rationnel indépendant de σ.

Cette proposition vérifie (5.6.1) pour les motifs $[\varepsilon](n)$. Pour achever la preuve de 5.6, il ne reste qu'à énoncer la

Conjecture 6.6. Tout motif sur $\mathbb{Q}$, à coefficient dans E et de rang 1 est de la forme $[\varepsilon](n)$, pour ε un caractère de $G = \mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ à valeurs dans les racines de l'unité de E et n un entier.

PROPOSITION 6.7. La Conjecture 2.8 est vraie pour les fonctions L d'Artin.

Pour les motifs d'Artin, on dispose de l'équation fonctionnelle des fonctions L. De plus, le déterminant d'un motif d'Artin, tordu à la Tate, est du type prédit en 6.6. Les arguments des paragraphes 5, 6 montrent donc la compatibilité de 2.8 à l'équation fonctionnelle, et il suffit de prouver 2.8 pour les motifs V(n), pour V un motif d'Artin et n un entier ≤ 0. Si V(n) est critique, F_∞ agit alors sur V par multiplication par $-(-1)^n$, et $c^+ = 1$ (cf. 3.1), et il s'agit de prouver que, pour tout plongement σ de E dans $\mathbb{C}$ et tout automorphisme τ de $\mathbb{C}$, on a

$\tau L(\sigma, V(n)) = L(\tau\sigma, V(n))$.

On le déduit des résultats de Siegel [14]. Voir [2, 1.2].

7. Fonctions L attachées aux formes modulaires. 7.1. Posons $q = e^{2\pi iz}$, et soit $f = \sum a_{nq}{}^n$ une forme modulaire holomorphe cuspidale primitive (new form) de poids $k \geq 2$, conducteur N et caractère ε. La série de Dirichlet $\sum a_{nn}{}^{-s}$ admet un développement en produit eulérien, de facteur local en $p \nmid N$ égal à

$(1 - a_{pp}{}^{-s} + \varepsilon(p)p^{k-1}p^{-2s})^{-1}$.

Soit E le sous-corps de $\mathbb{C}$ engendré par les a_n. La forme f doit donner lieu à un motif M(f) de rang 2 à coefficient dans E, de type de Hodge $\{(k-1, 0), (0, k-1)\}$, de déterminant $[\varepsilon^{-1}](1-k)$ (notations de 6.4) et de fonction L la série de Dirichlet $\sum a_{nn}{}^{-s}$.

Je n'ai pas essayé de définir M(f) comme étant un motif au sens de Grothendieck. Une difficulté est que M(f) apparaît de façon naturelle comme facteur direct dans la cohomologie d'une variété non compacte, ou encore comme facteur direct dans la cohomologie d'une courbe modulaire complète, à coefficient dans l'image directe d'un faisceau localement constant (plutôt, un système local de motifs!) sur la partie à distance finie de cette courbe modulaire. Ceci échappe au formalisme de Grothendieck, mais permet de définir les réalisations du motif M(f).

7.2. Supposons tout d'abord que $k = 2$, et que ε est trivial. Soient X le demi-plan de Poincaré, N le conducteur de f, $\Gamma_0(N)$ le sous-groupe de $SL(2, \mathbb{Z})$ formé des matrices dont la réduction mod N est de la forme $((*, *), (0, *))$, et posons

$\omega_f = \sum a_{nq}{}^n \cdot dq/q = \sum a_{nq}{}^n \cdot 2\pi i\, dz$.

La forme ω_f est une forme différentielle holomorphe sur la courbe complétée $\bar{M}(\Gamma_0(N))$ de $M(\Gamma_0(N)) = X/\Gamma_0(N)$. Elle est vecteur propre des correspondances de Hecke:

(7.2.1) ${T_n}^*\omega_f = a_n\omega_f$ (pour n premier à N)

et est caractérisée à un facteur près par (7.2.1). Ce fait résulte du théorème fort de multiplicité 1 et de la théorie des formes primitives; le lecteur peut, s'il le préfère, compléter (7.2.1) par une condition analogue pour n non premier à N, et faire de même ci-dessous; l'assertion devient alors élémentaire, car la condition (7.2.1) ainsi complétée détermine (à un facteur près) le développement de Taylor de ω_f en la pointe $i\infty$.

Abrégeons $M(\Gamma_0(N))$ en M et $\bar{M}(\Gamma_0(N))$ en $\bar{M}$. Ces courbes ont une $\mathbb{Q}$-structure naturelle, pour laquelle les correspondances de Hecke sont définies sur $\mathbb{Q}$. La forme ω_f est définie sur E, et sa conjuguée par un automorphisme σ de $\mathbb{C}$ est $\omega_{\sigma f}$ (appliquer σ aux coefficients).

Définissons le motif M(f) comme étant, dans le langage 2.1(B), le sous-motif de $H^1(\bar{M})_E$ noyau des endomorphismes ${T_n}^* - a_n$ — si on veut ne considérer que des

noyaux de projecteurs, remplacer $T_n{}^* - a_n$ par $P(T_n - a_n\Delta)^*$ pour P un polynôme convenable. On sait que M(f) a les propriétés énoncées en 7.1.

Dans chacune des théories cohomologiques $\mathscr{H}$ qui nous intéressent, l'application

(7.2.2) $\mathscr{H}_c{}^1(M) \longrightarrow \mathscr{H}^1(\bar{M})$

est surjective, et les systèmes de valeurs propres des $T_n{}^*$ sur le noyau n'apparaissent pas dans $\mathscr{H}^1(\bar{M})$. La $\mathscr{H}$-réalisation de M(f) est donc encore le noyau commun, dans $\mathscr{H}_c{}^1(M) \otimes E$, des $T_n{}^* - a_n$.

Le groupe de cohomologie $H_c{}^1(M, \mathbb{Q})$ est muni d'une structure de Hodge mixte, de type $\{(0, 0), (0, 1), (1, 0)\}$, dont $H^1(\bar{M}, \mathbb{Q})$ est le quotient de type $\{(0, 1), (1, 0)\}$. En particulier, (7.2.2) induit un isomorphisme sur les sous-espaces F^1 de la filtration de Hodge; toute forme différentielle holomorphe ω sur $\bar{M}$ définit ainsi une classe de cohomologie à support propre sur M. Ceci peut se voir directement: si $\mathscr{J} \subset \mathscr{O}$ est l'idéal des pointes, $H_c{}^*(M)$, en cohomologie de de Rham, est l'hypercohomologie sur $\bar{M}$ du complexe $\mathscr{J} \to \Omega^1$ (analytiquement, ce complexe est une résolution du faisceau constant $\mathbb{C}$ sur M, prolongé par 0 sur $\bar{M}$), et le H^1 reçoit $H^0(\bar{M}, \Omega^1)$.

Supposons pour simplifier que $E = \mathbb{Q}$, et calculons $c^+(M(f)(1))$. Le motif M(f)(1) est le dual de M(f) et c^+ est donc une période de M(f) (1.7): il faut intégrer ω_f contre une classe d'homologie rationnelle de $\bar{M}$, fixe par F_∞. Relevant M(f) dans $\mathscr{H}_c{}^1(M)$, on voit qu'on peut plutôt intégrer ω_f contre une classe d'homologie sans support de M, fixe par F_∞. Toutes les intégrales non nulles de ce type seront commensurables.

Pour calculer F_∞, il est utile d'écrire M comme quotient de $X^\pm = \mathbb{C} - \mathbb{R}$ par le sous-groupe de GL(2, $\mathbb{Z}$) formé des matrices ayant pour réduction mod N une matrice ((*, *), (0, *)). La conjugaison complexe est alors induite par $z \mapsto \bar{z}$, et l'image dans $M(\mathbb{C})$ de $i\mathbb{R}^+$ est un cycle sans support fixe par F_∞. La formule

$L(M(f), 1) = -\int_0^{i\infty} \omega_f$

justifie 1.8 pour M(f)(1): le second membre est, ou bien nul, ou bien $\sim c^+(M(f)(1))$.

REMARQUE 7.3. On a aussi

$c^\pm(M(f)(1)) \sim \int_{a/b}^{i\infty} \omega_f \pm \int_{-a/b}^{i\infty} \omega_f$.

7.4. Pour ε (et E) quelconque, il faut remplacer $\Gamma_0(N)$ par $\Gamma_1(N)$: le sous-groupe de SL(2, $\mathbb{Z}$) formé des matrices de réduction mod N de la forme ((1, *), (0, 1)). Comme ci-dessus, pour calculer F_∞, il est plus commode de travailler avec $X^\pm$ et le sous-groupe de GL(2, $\mathbb{Z}$) formé des matrices de réduction mod N de la forme ((1, *), (0, *)). Par ailleurs, une dualisation apparaît, cachée en 7.2 par la symétrie de la correspondance T_n. Pour une définition convenable de T_n, on a

(a) M(f) est le noyau commun des $T_n{}^* - a_n$ dans $H^1(\bar{M})$, $\bar{M} = X/\Gamma_1(N)$.

(b) On a ${}^tT_n{}^*\omega_f = a_n\omega_f$, et $T_n{}^*\omega_f = \bar{a}_n\omega_f$ (noter la formule $\bar{a}_n = \varepsilon(n)^{-1}a_n$), de sorte que ω_f est dans la réalisation de de Rham de $M(f) = M(f)^\vee(-1)$.

On trouve que $c^+(M(f)(1)) \in (E \otimes \mathbb{C})^*/E^* \cong \mathbb{C}^{Hom(E,\mathbb{C})}/E^*$ est donné par le système de périodes

$c^+(M(f)(1)) \sim (\int_0^{i\infty} \omega_{\sigma f})_\sigma$,

si ce dernier est non nul. Noter que si l'une de ces intégrales s'annule, elles s'annulent toutes. Tel est le cas si et seulement si, dans la partie de l'homologie sans support

tendue par le cycle $i\mathbb{R}^+$ et ses transformés par les T_n, le système de valeurs propres a_n pour les T_n n'apparaît pas. Ceci justifie 2.8, et partiellement 2.7, pour M(f)(1).

REMARQUE 7.5. Les systèmes de valeurs propres des T_n dans $\mathrm{Ker}(\mathscr{H}_c{}^1(M) \to \mathscr{H}^1(\bar{M}))$ sont liés aux séries d'Eisenstein, alors que ceux qui apparaissent dans $\mathscr{H}^1(\bar{M})$ sont liés aux formes paraboliques. C'est pourquoi ces ensembles sont disjoints. Il en résulte que la structure de Hodge mixte de $H_c{}^1(M, \mathbb{Q})$ est somme de structures de Hodge: l'extension de $H^1(\bar{M}, \mathbb{Q})$ par $\mathrm{Ker}(H_c{}^1(M, \mathbb{Q}) \to H^1(\bar{M}, \mathbb{Q}))$ splitte. Ceci, généralisé au cas de n'importe quel sous-groupe de congruence de $SL(2, \mathbb{Z})$, équivaut au théorème de Manin [9] selon lequel la différence entre deux pointes est toujours d'ordre fini dans la jacobienne (cf. [6, 10.3.4, 10.3.8 et 10.1.3]). La démonstration donnée ne diffère d'ailleurs pas en substance de celle de Manin.

7.6. En poids k quelconque, il faut remplacer la cohomologie de $\bar{M}$ par la cohomologie de $\bar{M}$ à coefficient dans un faisceau convenable. Pour décrire ce qui se passe, je remplacerai M et $\bar{M}$ par M_n et $\bar{M}_n$, relatifs au groupe de congruence $\Gamma(n)$, avec n multiple de N et ≥ 3. On redescend ensuite à M et $\bar{M}$ en prenant les invariants par un groupe fini convenable. Soient $g: \mathscr{E} \to M_n$ la courbe elliptique universelle et j l'inclusion de M_n dans $\bar{M}_n$. La cohomologie à considérer est

$H^1(\bar{M}_n, j_*\mathrm{Sym}^{k-2}(R^1g_*\mathbb{Q}))$.

Les réalisations de M(f) sont facteur direct de ce groupe, calculé dans la théorie de cohomologie correspondante. On peut comme précédemment les relever dans

$H_c{}^1(M_n, \mathrm{Sym}^{k-2}(R^1g_*\mathbb{Q}))$.

Pour calculer $c^{\pm}$ du dual de M(f), il faut alors intégrer la classe dans $H_c{}^1$ définie par f contre des classes d'homologie sans support de M_n à coefficient dans le système local dual de $\mathrm{Sym}^{k-2}(R^1g_*\mathbb{Q})$. Si on prend le cycle image de $i\mathbb{R}^+$, muni de diverses sections du dual (une base), on trouve les intégrales d'Eichler

$\int_0^{i\infty} f(q) \cdot dq/q \cdot (2\pi iz)^l$ $(0 \leq l \leq k-2)$

(périodes paires pour l pair, impaires pour l impair) — et on sait comment écrire L(M(f), n) pour n critique en terme de ces périodes.

PROPOSITION 7.7. Soit M un motif de rang 2, à coefficient dans E, de type de Hodge {(a, b), (b, a)} avec $a \neq b$. Alors, $d^{\pm}\mathrm{Sym}^n(M)$ et $c^{\pm}\mathrm{Sym}^{nM}$ sont donnés par les formules suivantes:

(1) si $n = 2l + 1$: $d^{\pm} = l + 1$, et

$c^{\pm}\mathrm{Sym}^{nM} = c^{\pm}(M)^{(l+1)(l+2)/2}\, c^{\mp}(M)^{l(l+1)/2}\, \delta(M)^{l(l+1)/2}$;

(2) si $n = 2l$: $d^+ = l + 1$, $d^- = l$, et

$c^+\mathrm{Sym}^{nM} = (c^+(M)c^-(M))^{l(l+1)/2}\, \delta(M)^{l(l+1)/2}$, $c^-\mathrm{Sym}^{nM} = (c^+(M)c^-(M))^{l(l+1)/2}\, \delta(M)^{l(l-1)/2}$.

C'est une question de simple algèbre linéaire, que nous traiterons par "analyse dimensionnelle".

(a) $H_B(M)$ est un espace vectoriel de rang 2 sur E, muni d'une involution F_∞, de la forme ((0, 1), (1, 0)) dans une base e^+, e^- convenable. Les $d^{\pm}\mathrm{Sym}^{nM}$ sont les dimensions des parties + et − de la puissance symétrique n-ième, de bases respectives

$\{(e^+)^n, (e^+)^{n-2}(e^-)^2, \ldots\}$ et $\{(e^+)^{n-1}e^-, (e^+)^{n-3}(e^-)^3, \ldots\}$

— d'où les valeurs annoncées.

(b) Soit ω, η une base du dual de $H_{DR}(M)$, telle que ω annule $F^+H_{DR}(M)$. Le sous-espace $F^{\pm}$ de $H_{DR}(Sym^{nM})^\vee \sim Sym^{nH}{}_{DR}(M)^\vee$ admet pour base les ω^n, $\omega^{n-1}\eta$, ..., $\omega^{n-d^{\pm}+1}\eta^{d^{\pm}-1}$, et

$(7.7.1)^+$ $c^+Sym^{nM} = \langle \omega^n \wedge (\omega^{n-1}\eta) \wedge ..., (e^+)^n \wedge ((e^+)^{n-2}(e^-)^2) \wedge ... \rangle$,

$(7.7.1)^-$ $c^-Sym^{nM} = \langle \omega^n \wedge (\omega^{n-1}\eta) \wedge ..., ((e^+)^{n-1}e^-) \wedge ((e^+)^{n-3}(e^-)^3) \wedge ... \rangle$.

(c) Posons $V = H_B(M) \otimes \mathbb{C} \sim H_{DR}(M) \otimes \mathbb{C}$; c'est un $E \otimes \mathbb{C}$-module. Les formules ci-dessus montrent que $c^{\pm}Sym^{nM}$ ne dépend que du $E \otimes \mathbb{C}$-module V, de sa base e^+, e^-, de $\omega \in V^*$, et de l'image $\bar\eta$ de η dans $V^*/\langle\omega\rangle$: le $d^{\pm}$-vecteur à gauche du produit scalaire (7.7.1) ne change pas si on remplace η par $\eta + \lambda\omega$. Par ailleurs, $\langle \omega, e^+ \rangle$ et $\langle \omega, e^- \rangle$ sont inversibles, et $\bar\eta$ est une base de $V^*/\langle\omega\rangle$. Le système $(V, e^+, e^-, \omega, \bar\eta)$ est donc décrit à isomorphisme près par les quantités

$c^+ = \langle \omega, e^+ \rangle$, $c^- = \langle \omega, e^- \rangle$, $\delta = \langle \omega \wedge \eta, e^+ \wedge e^- \rangle$,

dans $(E \otimes \mathbb{C})^*$. Remplacer e^+, e^-, ω, $\bar\eta$ par λe^+, μe^-, $\alpha\omega$, $\nu\bar\eta/\lambda\mu$ remplace c^+, c^- et δ par $\lambda\alpha c^+$, $\mu\alpha c^-$ et $\nu\delta$. Pour $c^+ = c^- = \delta = 1$, le second membre de $(7.7.1)^{\pm}$ est dans $\mathbb{Q}^*$. Dans le cas général $c^{\pm}Sym^{nM}$ est donc un multiple rationnel du produit de $c^+(M)$, $c^-(M)$ et $\delta(M)/c^+(M)c^-(M)$ aux puissances respectives les degrés auxquels figurent e^+, e^- et $\bar\eta$ dans (7.7.1). On s'épargne la moitié du calcul en notant que remplacer F_∞ par $-F_\infty$ échange e^+ et e^-, donc c^+ et c^-, respecte δ, et échange les $(7.7.1)^{\pm}$ pour n impair, les conserve pour n pair.

$n = 2l + 1$: $d^+ = d^- = l + 1$,

deg $\bar\eta$ dans $(7.7.1)^{\pm} = 0 + 1 + \cdots + l = l(l + 1)/2$, deg e^+ dans $(7.7.1)^+ = (2l + 1) + (2l - 1) + \cdots + 1 = (l + 1)^2 =$ deg e^- dans $(7.7.1)^-$, deg e^+ dans $(7.7.1)^- = 2l + (2l - 2) + \cdots + 0 = l(l + 1) =$ deg e^- dans $(7.7.1)^+$;

$n = 2l$: $d^+ = l + 1$, $d^- = l$,

deg $\bar\eta$ dans $(7.7.1)^+ = 0 + 1 + \cdots + l = l(l + 1)/2$, deg $\bar\eta$ dans $(7.7.1)^- = 0 + 1 + \cdots + (l - 1) = l(l - 1)/2$, deg $e^{\pm}$ dans $(7.7.1)^+ = 2l + (2l - 2) + \cdots + 0 = l(l + 1)$, deg $e^{\pm}$ dans $(7.7.1)^- = (2l - 1) + (2l - 3) + \cdots + 1 = l^2$.

7.8. Cette proposition nous fournit une conjecture pour les valeurs aux entiers critiques de $L(Sym^{nM}(f), s)$. Voici les formules:

(7.8.1) $L(\sigma, M(f), s) = \sum \sigma a_n\, n^{-s} = \prod_p L_p(\sigma, M(f), s)$

où pour presque tout p

$L_p(M(f), s) = (1 - a_{pp}{}^{-s} + \varepsilon(p)p^{k-1-2s})^{-1} = ((1 - \alpha'_{pp}{}^{-s})(1 - \alpha''_{pp}{}^{-s}))^{-1}$,

avec ε un caractère de Dirichlet. On a $\wedge^2 M(f) = [\varepsilon^{-1}](1 - k)$, d'où

(7.8.2) $\delta(M(f)) \sim (2\pi i)^{1-k} \cdot \sum_{u \bmod F} \varepsilon(u) \otimes \exp(-2\pi iu/F)$,

si ε est de conducteur F, et

(7.8.3) $L^*(M(f), m) \sim (2\pi i)^m\, c^{\pm}(M(f))$, $\pm = (-1)^m$, pour $1 \le m \le k - 1$.

(7.8.4) $L(\sigma, Sym^{nM}(f), s) = \prod_p L_p(\sigma, Sym^{nM}(f), s)$

où pour presque tout p

$L_p(Sym^{nM}(f), s)^{-1} = \prod_{i=0}^{n} (1 - \alpha'_p{}^{i}\, \alpha''_p{}^{n-i}\, p^{-s})$;

conjecturalement, pour m critique, on a

$L^*(Sym^{nM}(f), m) \sim (2\pi i)^{m\, d^{\pm} Sym^n M(f)} \cdot c^{\pm} Sym^{nM}(f), \pm = (-1)^m$,

où $c^{\pm}$ et $d^{\pm}$ sont donnés en terme de $c^{\pm}(M)$ et $\delta(M)$ (caractérisés par (7.8.2), (7.8.3)) par les formules 7.7.

Pour l'évidence numérique en faveur de cette conjecture, voir [18].

8. Caractères de Hecke algébriques. Le lecteur trouvera dans [3, paragraphe 5], dont nous utiliserons les notations, les définitions essentielles relatives aux caractères de Hecke algébriques (= grössencharaktere de type A_0).

Conjecture 8.1. Soient k et E deux extensions finies de $\mathbb{Q}$, et χ un caractère de Hecke algébrique de k à valeurs dans E.

(i) Il existe un motif $M(\chi)$ de rang un sur k, à coefficients dans E, tel que, pour toute place λ de E, la représentation λ-adique $H_\lambda M(\chi)$ soit celle définie par χ: le Frobenius géométrique en $\mathfrak{P}$ premier au conducteur de χ et à la caractéristique résiduelle l de λ agit par multiplication par $\chi(\mathfrak{P})$.

(ii) Ce motif est caractérisé à isomorphisme près par cette propriété.

(iii) Tout motif de rang 1 est de la forme $M(\chi)$.

(iv) Décomposons $k \otimes E$ en produit de corps: $k \otimes E = \prod K_i$, et écrivons la partie algébrique χ_{alg}: $k^* \to E^*$ de χ sous la forme

$\chi_{alg}(x) = \prod N_{K_i/E}(x)^{n_i}$.

La décomposition de $k \otimes E$ induit une décomposition de $H_{DR}(M(\chi))$ en les

$H_{DR}(M(\chi))_i := H_{DR}(M(\chi)) \otimes_{k\otimes E} K_i$;

avec cette notation, la filtration de Hodge est la filtration par les

$\oplus_{n_i \geq p} H_{DR}(M(\chi))_i$.

L'unicité 8.1(ii) impose aux $M(\chi)$ le formalisme suivant

(8.1.1) $M(\chi'\chi'') \sim M(\chi') \otimes M(\chi'')$.

(8.1.2) Si ι: $E \to E'$ est une extension finie de E, $M(\iota\chi)$ se déduit de $M(\chi)$ par extension des coefficients de E à E′.

(8.1.3) Si k′ est une extension finie de k, $M(\chi \circ N_{k'/k})$ se déduit de $M(\chi)$ par extension des scalaires de k à k′.

REMARQUE 8.2. Posons les notations: c = la conjugaison complexe, $\bar{\mathbb{Q}}$ = la clôture algébrique de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$, $S = Hom(k, \bar{\mathbb{Q}}) = Hom(k, \mathbb{C})$, $J = Hom(E, \bar{\mathbb{Q}}) = Hom(E, \mathbb{C})$. La décomposition de $k \otimes E$ en les K_i correspond à la partition de $S \times J$ en les orbites de $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$.

Tout homomorphisme algébrique η: $k^* \to E^*$ s'écrit sous la forme $\prod N_{K_i/E}(x)^{n_i}$. Si l'orbite sous $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ de $(\sigma, \tau) \in S \times J$ correspond à K_i, i.e., si $\sigma \otimes \tau$: $k \otimes E \to \mathbb{C}$ se factorise par K_i, nous noterons $n(\eta; \sigma, \tau)$, ou simplement $n(\sigma, \tau)$, l'entier n_i. La fonction $n(\sigma, \tau)$ est constante sur les orbites de $Gal(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. Si η est la partie algébrique d'un caractère de Hecke χ, on a de plus

(8.2.1) L'entier $w = n(\eta; \sigma, \tau) + n(\eta; c\sigma, \tau)$ est indépendant de σ et τ.

C'est le poids de χ (et de $M(\chi)$). On écrira parfois $n(\chi;\sigma,\tau)$ pour $n(\chi_{alg};\sigma,\tau)$.

Réciproquement, un homomorphisme η vérifiant (8.2.1) est presque de la forme χ_{alg}, pour χ un caractère de Hecke convenable: (a) une de ses puissances l'est; (b) il existe une extension finie ι: $E \to E'$ de E telle que $\iota\eta$ le soit; (c) il existe une extension finie k' de k telle que $\eta \circ N_{k'/k}$ le soit.

La règle 8.1(iv) permet de déduire la bigraduation de Hodge de $H_\sigma M(\chi)$ de sa structure de E-module: le facteur direct $H_\sigma M(\chi) \otimes_{E,\tau} \mathbb{C}$ de $H_\sigma M(\chi) \otimes \mathbb{C}$ est de type de Hodge (p, q), avec $p = n(\chi;\sigma,\tau)$ et $q = w - p = n(\chi;\sigma,c\tau)$.

EXEMPLE 8.3. Soit A une variété abélienne sur k, à multiplication complexe par E. On suppose $H_1(A)$ de rang 1 sur E (type CM). Il résulte de la théorie de Shimura et Tanayama que $H_1(A)$ vérifie la condition de 8.1(i), pour un caractère de Hecke algébrique χ de k à valeurs dans E, et que la partie algébrique χ_{alg} de χ se lit sur le $k \otimes E$-module Lie(A):

$\chi_{alg}(x) = \det_E(x \otimes 1, \mathrm{Lie}(A))^{-1}$.

EXEMPLE 8.4. Prenons pour k le corps des racines n-ièmes de l'unité, soit V l'hypersurface de Fermat d'équation projective $\sum_{i=0}^{m} X_i^n = 0$ et soit M le motif "cohomologie primitive de dimension moitié de V^m". Soit G le quotient de μ_n^{m+1} par son sous-groupe diagonal. Ce groupe agit sur V par $(\alpha_i) * (X_i) = (\alpha_{iX}{}_i)$, et sur M par transport de structure. Décomposant M à l'aide de la décomposition de l'algèbre de groupe $\mathbb{Q}[G]$ en produit de corps, on obtient des motifs vérifiant 8.1(i) pour des caractères de Hecke algébriques convenables: ceux introduits par Weil dans son étude des sommes de Jacobi.

EXEMPLE 8.5. Le motif $\mathbb{Z}(-1)$ vérifie 8.1(i) pour χ = la norme. Pour χ d'ordre fini, un motif d'Artin convenable vérifie 8.1(i).

8.6. Pour chaque $\sigma \in S$, $H_\sigma(M(\chi))$ est de rang 1 sur E. Choisissons une base e_σ de chaque $H_\sigma(M(\chi))$. Outre sa structure de E-module, la somme des $H_\sigma(M(\chi)) \otimes \mathbb{C}$ a une structure naturelle de $k \otimes \mathbb{C} = \mathbb{C}^S$-module — au total, une structure de $k \otimes E \otimes \mathbb{C}$-module libre de rang 1, pour laquelle $e = \sum e_\sigma$ est une base.

8.7. La réalisation de de Rham $H_{DR}(M(\chi))$ est un $k \otimes E$-module libre de rang 1. Choisissons-en une base ω. La somme des I_σ: $H_\sigma(M(\chi)) \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H_{DR}(M(\chi)) \otimes_{k,\sigma} \mathbb{C}$ est l'isomorphisme (0.4) de $k \otimes E \otimes \mathbb{C}$-module

I: $\oplus_\sigma H_\sigma(M(\chi)) \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H_{DR}(M(\chi)) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C}$.

Soit ω une base du $k \otimes E$-module $H_{DR}(M(\chi))$, et posons $p'(\chi) = \omega/I(e) \in (k \otimes E \otimes \mathbb{C})^*$. Cette période dépend de χ, ω et e. Prise modulo $(k \otimes E)^*$ et E^{*S}, elle ne dépend que de χ. Nous noterons $p'(\chi;\sigma,\tau)$ — ou simplement $p'(\sigma,\tau)$ — la composante d'indice (σ,τ) de son image par l'isomorphisme $k \otimes E \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}^{S \times J}$.

8.8. Soit A comme en 8.3 et calculons les périodes $p'(\sigma,\tau)$, modulo $\bar{\mathbb{Q}}^*$, pour le motif $H^1(A)$. On commence par étendre les scalaires de k à $\bar{\mathbb{Q}}$, à l'aide de σ. Si $n(\sigma,\tau) = 1$, il existe alors une 1-forme holomorphe ω définie sur $\bar{\mathbb{Q}}$ telle que $u^*\omega = \tau(u)\omega$ pour $u \in E$, et, pour $Z \in H_1(A(\mathbb{C}))$, on a $p'(\sigma,\tau) \sim \int_Z \omega$. On peut passer de là au cas général à l'aide de la formule

$p'(\sigma,\tau) \cdot p'(\sigma,c\tau) \sim 2\pi i$.

8.9. La conjecture 8.1(ii) affirme en particulier que si deux motifs vérifient la condition de 8.1(i), ils ont même période p. Pour les motifs 8.4, les périodes s'expriment

en terme de valeurs de la fonction Γ et, si on travaille mod $\bar{\mathbb{Q}}^*$, 8.1 suggère la conjecture de B. Gross [7] reliant certaines périodes à des produits de valeurs de la fonction Γ.

La comparaison de 8.4 et 8.5 mène à la Conjecture 8.11, 8.13 suivante. Le résultat annoncé après 0.10 permet de la démontrer.

8.10. Soient N un entier, $k = \mathbb{Q}(\exp(2\pi i/N))$, $\mathfrak{P}$ un idéal premier de k, premier à N, $k_{\mathfrak{P}}$ le corps résiduel et $q = N\mathfrak{P} = |k_{\mathfrak{P}}|$. On notera t l'inverse de la réduction mod $\mathfrak{P}$, des racines N-ièmes de 1 dans $k_{\mathfrak{P}}$ à celles de k.

Pour $a \in N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$, $a \neq 0$, considérons la somme de Gauss

$g(\mathfrak{P}, a, \Psi) = -\sum_{x \in k_{\mathfrak{P}}^*} t(x^{-a(q-1)})\, \Psi(x)$.

La somme est étendue à $k_{\mathfrak{P}}^*$ et $\Psi: k_{\mathfrak{P}} \to \mathbb{C}^*$ est un caractère additif non trivial.

Soit $\mathbf{a} = \sum n(a)\delta_a$ dans le groupe abélien libre de base $N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} - \{0\}$. Si $\sum n(a)a = 0$, le produit des $g(\mathfrak{P}, a, \Psi)^{n(a)}$ est indépendant de Ψ et on pose

$g(\mathfrak{P}, \mathbf{a}) = \prod_a g(\mathfrak{P}, a, \Psi)^{n(a)}$.

Weil [16] a montré que, comme fonction de $\mathfrak{P}$, $g(\mathfrak{P}, \mathbf{a})$ est un caractère de Hecke algébrique $\chi_{\mathbf{a}}$ de k à valeurs dans k. Notons $\langle a \rangle$ le représentant entre 0 et 1 de a dans $\mathbb{Z}/N$. Si $\mathbf{a} = \sum n(a)\delta_a$ vérifie

(*) Pour tout $u \in (\mathbb{Z}/N)^*$, on a $\sum n(a)\langle ua \rangle = 0$,

il résulte de la détermination par Weil de la partie algébrique de $\chi_{\mathbf{a}}$ que $\chi_{\mathbf{a}}$ est d'ordre fini; on note encore $\chi_{\mathbf{a}}$ le caractère de $\mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/k)$ valant $\chi_{\mathbf{a}}(\mathfrak{P})$ sur le Frobenius géométrique en $\mathfrak{P}$.

Posons $\Gamma(\mathbf{a}) = \prod \Gamma(\langle a \rangle)^{n(a)}$. Une première partie de la conjecture: algébricité de $\Gamma(\mathbf{a})$ lorsque $\mathbf{a}$ vérifie (*), a été prouvée par Koblitz et Ogus: voir l'appendice. On désire avoir, plus précisément:

Conjecture 8.11. Si $\mathbf{a}$ vérifie (*), on a $\sigma\Gamma(\mathbf{a}) = \chi_{\mathbf{a}}(\sigma) \cdot \Gamma(\mathbf{a})$ pour tout $\sigma \in \mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/k)$.

Si $\mathbf{a}$ est invariant par un sous-groupe H de $(\mathbb{Z}/N)^*$, on peut préciser 8.11 en remplaçant $\mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/k)$ par $\mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/k^H)$, et en utilisant SGA $4^{1/2}$ 6.5 pour définir un caractère de ce groupe, à valeur dans les racines de l'unité de k^H. C'est ce que nous faisons ci-dessous.

8.12. Soient H un sous-groupe de $(\mathbb{Z}/N)^*$, $\mathfrak{P}$ un idéal premier de k^H, premier à N, κ son corps résiduel et $\Psi: \kappa \to \mathbb{C}^*$ un caractère additif non trivial. Pour $a \in N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} - \{0\}$, soient $\mathfrak{P}_{a,i}$ les idéaux premiers de $k^H(\exp(2\pi i a))$ au-dessus de $\mathfrak{P}$. Si κ' est le corps résiduel en $\mathfrak{P}_{a,i}$ et que $|\kappa'| = q'$, on note $g(\mathfrak{P}_{a,i}, a, \Psi)$ la somme de Gauss

$-\sum_{x \in \kappa'^*} t(x^{-a(q'-1)})\, \Psi(\mathrm{Tr}_{\kappa'/\kappa} x)$.

Le produit $g(\mathfrak{P}, a, \Psi) = \prod_i g(\mathfrak{P}_{a,i}, a, \Psi)$ ne dépend que de l'orbite de a sous H.

Soit $\mathbf{a} = \sum n(a)\delta_a$, invariant par H, et vérifiant $\sum n(a)a = 0$. Pour chaque orbite O de H dans $N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} - \{0\}$, on note n(O) la valeur constante de n(a) sur O. On pose

$g(\mathfrak{P}, \mathbf{a}) = \prod_{a \bmod H} g(\mathfrak{P}, a, \Psi)^{n(a)}$.

Comme fonction de $\mathfrak{P}$, $g(\mathfrak{P}, \mathbf{a})$ est un caractère de Hecke algébrique $\chi_{\mathbf{a}}$ de k^H à valeurs dans k^H. Pour le prouver, on se ramène par additivité à supposer les $n(a) \geq 0$. On applique alors [3, 6.5] pour $F = k^H$, $\bar{F} = \bar{\mathbb{Q}}$, k = notre k, et I = une somme disjointe de copies d'orbites H: n(O) copies de O; pour $i \in I$, d'image a/N dans $N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$, on prend pour λ_i le composé

$\widehat{\mathbb{Z}}(1)_F \to (\mathbb{Z}/N)(1)_F = \mu_N(k) \to^{x \mapsto x^a} k^*$;

le caractère de Hecke obtenu est le produit de $\chi_{\mathbf{a}}$ par le caractère “signature de la

représentation de permutation de H sur I″″. Un cas particulier de ce résultat figure déjà dans Weil [17]. Le caractère $\chi_{\mathbf{a}}$ de 8.10 est le composé de $\chi_{\mathbf{a}}$ ci-dessus avec la norme N_{k/k^H}.

Conjecture 8.13. Soient $\mathfrak{P}$ un idéal premier de k^H, premier à N et $F_{\mathfrak{P}}$ un Frobenius géométrique en $\mathfrak{P}$. Si **a** invariant sous H vérifie (*), on a

$F_{\mathfrak{P}}\Gamma(\mathbf{a}) = g(\mathfrak{P}, \mathbf{a}) \cdot \Gamma(\mathbf{a})$.

En particulier, si le groupe des racines de l'unité de k^H est d'ordre N′, on a $\Gamma(\mathbf{a})^{N'} \in k^H$.

On peut de 8.13 déduire la variante suivante, apparemment plus générale. On remplace la condition (*) par

(*′) $\sum n(a)\langle ua\rangle = k$ est un entier indépendant de $u \in (\mathbb{Z}/N)^*$.

Le caractère de Hecke $N\mathfrak{P}^{-k} \cdot g(\mathfrak{P}, \mathbf{a})$ est alors d'ordre fini. On l'identifie à un caractère χ de $\mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/k^H)$, et on espère avoir

$\sigma((2\pi i)^{-k}\,\Gamma(\mathbf{a})) = \chi(\sigma) \cdot ((2\pi i)^{-k}\,\Gamma(\mathbf{a}))$.

8.14. Si k est un corps extension quadratique totalement imaginaire d'un corps totalement réel, soit, comme nous dirons, un corps de type CM, Shimura [13] a déterminé les valeurs critiques des fonctions L des caractères de Hecke algébriques de k, au produit près par un nombre algébrique. Il les exprime en terme de périodes de variétés abéliennes de type CM, à multiplication complexe par k. Dans la fin du paragraphe, nous montrons que son théorème est compatible à la Conjecture 2.8, qui les exprime en terme de périodes de motifs sur k, de rang 1.

8.15. Soient χ et $M(\chi)$ comme en 8.1. Excluons le cas 8.5, et supposons que $R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi)$ vérifie 1.7. Le corps k est alors totalement imaginaire, et les nombres de Hodge $h^{p,p}$ sont nuls: avec les notations de 8.1 et 8.2, aucun n_i n'est égal à w/2. Notre première tâche est de calculer $c^+R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi)$ en terme des périodes $p'(\chi; \sigma, \tau)$. Rappelons que c'est le déterminant de l'isomorphisme de $E \otimes \mathbb{C}$-module

I^+: ${H_B}^+R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} {H_{DR}}^+R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) \otimes \mathbb{C}$,

calculé dans des bases définies sur E.

Choisissons les e_σ de 8.6 de sorte que $F_\infty e_\sigma = e_{c\sigma}$. Les $e_\sigma \pm e_{c\sigma}$ forment alors une base de ${H_B}^{\pm}R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) \subset H_{BRk/\mathbb{Q}}M_\chi = \oplus_{\sigma\in S}H_\sigma M(\chi)$. Notons au passage que $d^+ = d^- = \frac{1}{2}[k{:}\mathbb{Q}]$. Soit $\bar{S}$ le quotient de S par $\mathrm{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R})$. Pour calculer $c^+ = \det(I^+)$, nous utiliserons la base $(e_\sigma + e_{c\sigma})$ de ${H_B}^+$. Elle est indexée par $\bar{S}$.

D'après 8.1(iv), la filtration de Hodge de $H_{DRRk/\mathbb{Q}}M(\chi) = H_{DRM}(\chi)$ se lit sur sa structure de $k \otimes E$-module: si on note $(k \otimes E)^+$ le facteur direct de $k \otimes E$ produit des K_i tels que $n_i < w/2$, le quotient ${H_{DR}}^+R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi)$ de $H_{DRRk/\mathbb{Q}}M(\chi)$ est le facteur direct correspondant:

${H_{DR}}^+R_{k/\mathbb{Q}}M(\chi) = H_{DRM}(\chi) \otimes_{k\otimes E} (k \otimes E)^+$.

Soit ω comme en 8.7, et utilisons la structure de $k \otimes E \otimes \mathbb{C} = \mathbb{C}^{S\times J}$-module de $H_{DRM}(\chi)$ pour décomposer ω: $\omega = \sum\omega_{\sigma,\tau}$. On a par définition $I(e_\sigma) = \sum_\tau p'(\sigma,\tau)^{-1}\omega_{\sigma,\tau}$, et donc

$I^+(e_\sigma + e_{c\sigma}) = \sum_{n(\sigma,\tau)<w/2} p'(\sigma,\tau)^{-1}\omega_{\sigma,\tau} + \sum_{n(c\sigma,\tau)<w/2} p'(c\sigma,\tau)^{-1}\omega_{c\sigma,\tau}$;

c'est la somme, indexée par $\tau \in J$, de termes égaux à $p'(\sigma, \tau)^{-1}\omega_{\sigma,\tau}$ pour $n(\sigma, \tau) < w/2$, et à $p'(c\sigma, \tau)^{-1}\omega_{c\sigma,\tau}$ pour $n(\sigma, \tau) > w/2$. Pour $\bar{\sigma} \in \bar{S}$, de représentant σ, posons

$\omega_{\bar{\sigma}} = \sum_{n(\sigma,\tau)<w/2} \omega_{\sigma,\tau} + \sum_{n(c\sigma,\tau)<w/2} \omega_{c\sigma,\tau}$.

Les $I^+(e_\sigma + e_{c\sigma})$ sont des multiples des $\omega_{\bar{\sigma}}$ par des éléments de $E \otimes \mathbb{C}$; les $\omega_{\bar{\sigma}}$ forment donc une base de ${H_{DR}}^+$. Dans les bases $e_\sigma + e_{c\sigma}$ et $\omega_{\bar{\sigma}}$, la matrice de I^+ est diagonale; son déterminant $\det'(I^+) \in (E \otimes \mathbb{C})^* = \mathbb{C}^{*J}$ a pour coordonnées

$\det'(I^+)_\tau = \prod_{n(\sigma,\tau)<w/2} p'(\sigma, \tau)^{-1}$.

Soient les applications $E^{\bar{S}} \to E^S$: $1_{\bar{\sigma}} \mapsto 1_\sigma + 1_{c\sigma}$, pour $\bar{\sigma}$ image de σ, $E^S \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} k \otimes E \otimes \mathbb{C}$, déduite de l'isomorphisme de $k \otimes \mathbb{C}$ avec $\mathbb{C}^S$, et la projection de $k \otimes E$ sur $(k \otimes E)^+$. Par composition, on obtient un isomorphisme de $E \otimes \mathbb{C}$-modules:

$E^{\bar{S}} \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} (k \otimes E)^+ \otimes \mathbb{C}$.

Nous noterons $D(\chi)$ son déterminant, calculé dans des bases définies sur E des deux membres. Identifiant ${H_{DR}}^+$ à $k \otimes E$ à l'aide de la base ω, on voit que c'est le déterminant de l'application identique de ${H_{DR}}^+ \otimes \mathbb{C}$, calculé dans la base $\omega_{\bar{\sigma}}$, à la source, et une base définie sur E, au but. Notant $D_\tau(\chi)$ ses composantes dans $\mathbb{C}^J$, on trouve pour $c^+ = \det'(I^+) \cdot D(\chi)$ la formule suivante.

PROPOSITION 8.16. On a

$c^+ R_{k/\mathbb{Q}} M(\chi) = (\prod_{n(\sigma,\tau)<w/2} p'(\sigma, \tau)^{-1} \cdot D_\tau(\chi))_{\tau \in J}$.

REMARQUE 8.17. Supposons k de type CM, extension quadratique de k_0 totalement réel. Le quotient $\bar{S}$ de S s'identifie alors à l'ensemble des plongements complexes de k_0, et le diagramme

```
E^{S̄} ⊗ ℂ  ——~——►  k₀ ⊗ E ⊗ ℂ
    |                    |
    ▼                    ▼
E^S ⊗ ℂ    ——~——►  k ⊗ E ⊗ ℂ  —►  (k ⊗ E)^+ ⊗ ℂ
```

est commutatif. L'application composée $k_0 \otimes E \to (k \otimes E)^+$ est donc un isomorphisme, et $D(\chi)$ est encore le déterminant de $E^{\bar{S}} \otimes \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} k_0 \otimes E \otimes \mathbb{C}$, déduit par extension des scalaires de $\mathbb{Q}$ à E de l'isomorphisme $\mathbb{C}^{\bar{S}} \xrightarrow{\sim} k_0 \otimes \mathbb{C}$. Ceci fournit pour $D(\chi)$, bien défini mod E^*, un représentant dans $(\mathbb{Q} \otimes \mathbb{C})^* = \mathbb{C}^* \subset (E \otimes \mathbb{C})^*$, à savoir le déterminant de l'inverse de la matrice $(\sigma\alpha)$, pour $\sigma \in \bar{S}$ et α parcourant une base de k_0 sur $\mathbb{Q}$. L'isomorphisme $\mathbb{C}^{\bar{S}} \xrightarrow{\sim} k_0 \otimes \mathbb{C}$ transforme la forme quadratique $\sum {x_\sigma}^2$ en la forme Tr(xy). Ceci permet d'identifier $(\det(\sigma\alpha))^2$ au discriminant de k_0:

$D(\chi) \sim$ racine carrée du discriminant de k_0.

8.18. Notons $p''(\chi; \sigma, \tau)$ l'image de $p'(\chi; \sigma, \tau)$ dans $\mathbb{C}^*/\bar{\mathbb{Q}}^*$. Elle ne dépend que de χ, σ et τ. Si un homomorphisme algébrique η: $k^* \to E^*$ vérifie (8.2.1), une de ses puissances est la partie algébrique d'un caractère de Hecke: $\eta^N = \chi_{\text{alg}}$. De plus, si ${\chi'}_{\text{alg}} = {\chi''}_{\text{alg}}$, χ' et χ'' ne diffèrent que par un caractère d'ordre fini et ${\chi'}^M = {\chi''}^M$ pour M convenable. On déduit de (8.1.1) que $p''(\chi^M; \sigma, \tau) = p''(\chi; \sigma, \tau)^M$, et ceci permet de poser sans ambiguïté

$p(\eta; \sigma, \tau) = p(\chi; \sigma, \tau)^{1/N}$, pour $\eta^N = \chi_{\text{alg}}$.

Ces périodes obéissent au formalisme suivant:

(8.18.1) $p(\eta'\eta''; \sigma, \tau) = p(\eta'; \sigma, \tau)p(\eta''; \sigma, \tau)$.

(8.18.2) $p(\eta; \sigma, \tau)$ ne change pas quand on remplace E par une extension E′ de E, et τ par un de ses prolongements à E′.

(8.18.3) $p(\eta; \sigma, \tau)$ ne change pas quand on remplace k par une extension k′ de k, σ par un de ses prolongements à k′, et χ par $\chi \circ N_{k'/k}$.

(8.18.4) Si α est un automorphisme de k, et β un automorphisme de E, on a

$p(\eta; \sigma, \tau) = p(\beta\eta\alpha^{-1}; \sigma\alpha^{-1}, \tau\beta^{-1})$.

(8.18.5) Le complexe conjugué de $p(\eta; \sigma, \tau)$ est $p(\eta; \bar{\sigma}, \bar{\tau})$.

(8.18.6) Pour $k = F = \mathbb{Q}$, $p(\mathrm{Id}; \mathrm{Id}, \mathrm{Id}) = 2\pi i$.

Les formules (8.15.1) à (8.15.3) résultent de (8.1.1) à (8.1.3), (8.18.4) et (8.18.5) se voient par transport de structure, et (8.18.6) résulte de (8.5).

8.19. Soit η: $k^* \to E^*$ un homomorphisme vérifiant (8.2.1). On suppose aussi que $n(\eta; \sigma, \tau)$ ne vaut jamais w/2, ce qui permet de définir $(k \otimes E)^+$ comme en 8.15. Définissons η^*: $E^* \to k^*$ par

$\eta^*(y) = \det_k(1 \otimes y, (k \otimes E)^+)$.

Cet homomorphisme vérifie encore (8.2.1), et

$n(\eta^*; \sigma, \tau) = 1$ si $n(\eta; \sigma, \tau) < w/2$, 0 si $n(\eta; \sigma, \tau) > w/2$.

Si η^* est la partie algébrique d'un caractère de Hecke χ^*, $M(\chi^*)$ est le H^1 d'une variété abélienne sur E, à multiplication complexe par k, dont l'algèbre de Lie, comme $k \otimes E$-module, est isomorphe à $(k \otimes E)^+$.

PROPOSITION 8.20. Avec les hypothèses et notations de 8.19, prenons pour E un sous-corps de $\mathbb{C}$, et notons 1 l'inclusion identique de E dans $\mathbb{C}$. On a

$\prod_{n(\sigma,1)<w/2} p(\eta; \sigma, 1) = \prod_\sigma p(\eta^*; 1, \sigma)^{n(\eta;\sigma,1)}$.

Si ι: $E \to E' \subset \mathbb{C}$ est une extension finie de E, le membre de gauche ne change pas quand on remplace η par $\iota\eta$ (8.18.2). On a $(\iota\eta)^* = \eta^* \circ N_{E'/E}$ et, par (8.18.3), le membre de droite ne change pas non plus.

Si ι: $k \to k'$ est une extension finie de degré d de k, le membre de gauche est élevé à la puissance d quand on remplace k par k′, et η par $\eta \circ N_{k'/k}$: un plongement complexe de k est induit par d plongements de k′, et on applique (8.18.3). De même pour le membre de droite, par (8.18.2) et l'égalité $(\eta \circ N_{k'/k})^* = \iota\eta^*$.

Ces compatibilités nous ramènent à supposer que E est galoisien et que k est isomorphe à E. Pour chaque isomorphisme ω de k dans E, posons $n(\omega) = n(\eta; 1 \circ \omega, 1)$. Notant additivement le groupe des homomorphismes de k^* dans E^*, on a $\eta = \sum n(\omega)\omega$. Puisque $p(\eta; 1 \circ \omega, 1) = p(\eta \circ \omega^{-1}; 1, 1)$ (8.15.4), on a

(8.20.1) $\prod_{n(\sigma,1)<w/2} p(\eta; \sigma, 1) = \prod_{n(\omega)<w/2} p(\eta \circ \omega^{-1}; 1, 1) = p(\sum_{n(\omega)<w/2} \eta \circ \omega^{-1}; 1, 1)$.

Par ailleurs,

$\sum_{n(\omega)<w/2} \eta \circ \omega^{-1} = \sum_{n(\omega_1)<w/2;\,\omega_2} n(\omega_2)\, \omega_2 \circ {\omega_1}^{-1} = \sum_{\omega_2} n(\omega_2) \sum_{n(\omega_1)<w/2} \omega_2 \circ {\omega_1}^{-1} = \sum_{\omega_2} n(\omega_2)\, \omega_2 \circ \eta^*$.

Ceci permet de continuer (8.20.1) par

$= \prod_\omega p(\omega \circ \eta^*; 1, 1)^{n(\omega)} = \prod_\omega p(\eta^*; 1, 1 \circ \omega)^{n(\omega)} = \prod_\sigma p(\eta^*; 1, \sigma)^{n(\eta;\sigma,1)}$,

(nouvelle application de 8.15.4), et prouve 8.20.

8.21. Combinant 8.16 et 8.20, on trouve pour la composante d'indice 1 de

$c^+ R_{k/\mathbb{Q}} M(\chi) \in (E \otimes \mathbb{C})^*/E^* = \mathbb{C}^{*J}/E^*$,

l'expression suivante, mod $\bar{Q}^*$:

${c_1}^+ R_{k/\mathbb{Q}} M(\chi) \sim \prod_\sigma p({\chi^*}_{alg}; 1, \sigma)^{-n(\chi;\sigma,1)}$.

Si χ (i.e., $M(\chi)$) est critique, la Conjecture 2.8 affirme donc que

$L(1 \circ \chi, 0) \sim \prod_\sigma p({\chi^*}_{alg}; 1, \sigma)^{-n(\chi;\sigma,1)} \pmod{\bar{Q}^*}$.

Pour E assez grand, ${\chi^*}_{alg}$ est la partie algébrique d'un caractère de Hecke χ^*, et les périodes s'interprètent comme périodes d'intégrales abéliennes (8.19), (8.3). L'énoncé obtenu est celui que Shimura a prouvé pour k de type CM, ou abélien sur un corps de type CM (avec une restriction sur le poids).

REMARQUE 8.22. Si $\eta : k^* \to E^*$ vérifie (8.2.1), il existe des sous-corps k' de k et $\iota : E' \to E$ de E, soit de type CM, soit égaux à $\mathbb{Q}$, et une factorisation $\eta = \iota\eta' N_{k/k'}$. On a alors $p(\eta; \sigma, \tau) = p(\eta'; \sigma \mid k', \tau \mid E')$.

Si maintenant k et E sont de type CM (ou $\mathbb{Q}$), et qu'on note encore c leur conjugaison complexe, on a $c\sigma = \sigma c$, $c\tau = \tau c$, et $\eta c = c\eta$, d'où

$p(\eta; \sigma, \tau\bar{)} = p(\eta; c\sigma, c\tau) = p(\eta; \sigma c, \tau c) = p(c\eta c^{-1}; \sigma, \tau) = p(\eta; \sigma, \tau)$;

les périodes, a priori dans $\mathbb{C}^*/\bar{Q}^*$, sont réelles, i.e., dans $\mathbb{R}^*/(\bar{Q}^* \cap \mathbb{R}^*)$.

REMARQUE 8.23. Soient G le groupe de Galois de la réunion des extensions de type CM de $\mathbb{Q}$ dans $\bar{Q} \subset \mathbb{C}$, et $c \in G$ la conjugaison complexe. C'est un élément central de G. Si φ est une fonction localement constante à valeurs entières sur G, nous poserons $\varphi^*(x) = \varphi(xc)$. Supposons que $\varphi + \varphi^*$ est constante. Soient G_1 un quotient fini de G tel que φ se factorise par une fonction φ_1 sur G_1, et k le corps correspondant. L'hypothèse faite signifie que l'endomorphisme $\sum \varphi_1(\sigma)\sigma$ de k^* vérifie (8.2.1). La période $p(\sum \varphi_1(\sigma)\sigma; 1, 1)$ ne dépend pas du choix de G_1; on pose $P(\varphi) = p(\sum \varphi_1(\sigma)\sigma; 1, 1)$. La fonctionnelle P est un homomorphisme dans $\mathbb{C}^*/\bar{Q}^*$ du groupe des fonctions localement constantes à valeurs entières sur G qui vérifient $\varphi + \varphi^* =$ constante.

Appendix by N. Koblitz and A. Ogus. Algebraicity of some products of values of the Γ function. Let $A_N = N^{-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} - \{0\}$, and let $U_N = (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^*$ operate on A_N in the obvious way. If $f : A_N \to \mathbb{C}$, define $\langle f\rangle : U_N \to \mathbb{C}$ by

$\langle f\rangle(u) = \sum_{a \in A_N} \langle a\rangle f(ua)$,

where $\langle a\rangle$ denotes the representative of a between 0 and 1.

We first compute $H_Q = \{f : A_N \to \mathbb{Q} : \langle f\rangle \text{ is constant}\}$.

EXAMPLE. If n is a divisor of N and $a \in A_N$, consider the set

$S_{n,a} = [\{a + k/n : k = 0, 1, \ldots, n-1\} \cup \{-na\}] \cap A_N$.

It is easy to see that its characteristic function $\varepsilon_{n,a}$ is in H_Q. Note that $S_{1,a} = \{a, -a\}$.

PROPOSITION. H_Q is generated by $\{\varepsilon_{n,a} : n = 1$ or n is prime and $na \neq 0\}$.

PROOF. The orbits of A_N under the action of U_N correspond to the divisors d of N with $1 < d \leq N$: each orbit can be written uniquely in the form $U_N(1/d)$. The stabilizer subgroup I_d of 1/d is $\{u \in U_N : u \equiv 1 \bmod d\}$ and the orbit of 1/d is canonically isomorphic to U_d. Thus, a function f on A_N is determined by the collection of functions $f_d : U_d \to \mathbb{Q}$ defined by $f_d(v) = f(v/d)$.

To prove the proposition, we first complexify, so as to be able to work with characters of U_N.

LEMMA. If $f : A_N \to \mathbb{C}$ and if χ is a character of U_N, then the inner product of $\langle f\rangle$ and χ is given by:

$(\langle f\rangle \mid \chi) = -\sum_d L(0, \chi_d)|I_d| \cdot (f_d \mid \chi_d)$,

where the sum is taken over those divisors d of N such that χ is pulled back from a character χ_d of U_d.

PROOF. We have

$(\langle f\rangle \mid \chi) = \sum_{u\in U_N} \langle f\rangle(u)\bar{\chi}(u) = \sum_{a\in A_N} \sum_{u\in U_N} \langle a\rangle f(ua)\bar{\chi}(u) = \sum_{d|N} \sum_{v\in U_d} \sum_{u\in U_N} \langle v/d\rangle f_d(u_{dv})\bar{\chi}(u)$,

where $u_d \in U_d$ is the image of u.

Now if we choose a set $U'_d \subseteq U_N$ of coset representatives for $U_N \to U_d$, we can write:

$\sum_{u\in U_N} f_d(u_{dv})\bar{\chi}(u) = \sum_{u'\in U'_d} \sum_{u\in I_d} f_d(u'_{dv})\bar{\chi}(u')\bar{\chi}(u) = \sum_{u'\in U'_d} f_d(u'_{dv})\bar{\chi}(u') \sum_{u\in I_d} \bar{\chi}(u)$.

Of course, this sum is zero unless χ is trivial on I_d, i.e., unless χ is pulled back from a character χ_d of U_d, in which case it is

$\sum_{u'\in U'_d} f_d(u'_{dv})\bar{\chi}_d(u')|I_d| = \sum_{w\in U_d} f_d(wv)\bar{\chi}_d(w)\chi_d(v)|I_d| = \chi_d(v)|I_d|(f_d \mid \chi_d)$.

If we substitute this into the above expression for $(\langle f\rangle \mid \chi)$ and note that $\langle v/d\rangle = |v|/d$, where $|v|$ is the smallest positive representative of $v \in U_d$, we find:

$(\langle f\rangle \mid \chi) = \sum_d \sum_{v\in U_d} |v|\chi_d(v)|I_d|d^{-1}(f_d \mid \chi_d) = -\sum_d L(0, \chi_d)|I_d|(f_d \mid \chi_d)$,

as claimed. □

To prove the proposition, we let d_f be the largest divisor of N such that $f_{d_f} \neq 0$; it suffices to prove that any f in H_Q can be written as $g + f'$, with g a linear combination of the ε's and $d_{f'} < d_f$. Let $d = d_f$; we shall show below that f_d is a linear combination of functions h_1 which factor through $U_d \to U_d/\{\pm 1\}$, and functions h_p which factor through $U_d \to U_{d/p}$ for some prime divisor p of d, $p \neq d$. Any function of the first type is invariant under ± 1, and hence the corresponding function on the orbit $U_N(1/d)$ is a linear combination of $\varepsilon_{1,a}$'s. A function of the second type is invariant under the kernel K of $U_d \to U_{d/p}$, which has order p if p divides d/p and order $p - 1$ otherwise. In the first case, $K = \{1 + kd/p : k = 0, \ldots, p - 1\}$, and in

the second, it is this same set with one element deleted, namely, the value of 1 + kd/p which is divisible by p. Thus, the set $S_{p,w/d}$ = (Kw)/d, with the addition of one or two elements in the orbit U_N(p/d). Hence it is clear that the corresponding function on the orbit U_N(1/d) can be written as a linear combination of $\varepsilon_{p,a}$'s and functions supported on the orbit of p/d, and we have obtained our desired decomposition f = g + f′.

It remains for us to prove the claim about f_d. If d is twice an odd number the map $U_d \to U_{d/2}$ is an isomorphism, and the claim is trivial. In the other cases, choose a primitive odd character χ_d of U_d, and let χ be the pull-back of χ_d to U_N. Since χ is nontrivial and ⟨f⟩ is constant, (⟨f⟩ | χ) = 0. Let us look at the expression for this inner product provided by the lemma; the only nonzero terms come from those f_e such that $f_e \neq 0$ and $I_e \subseteq \mathrm{Ker}(\chi)$. But then Ker($\chi$) contains I_e and I_d, hence also $I_{\mathrm{dI}e} = I_m$, where m = g.c.d.(d, e). Since χ is primitive, m = d and d divides e, and since f_e = 0 for e > d,

$0 = (\langle f\rangle \mid \chi) = -L(0, \chi_d)|I_d|(f_d \mid \chi_d)$.

Since χ_d is odd and primitive, we conclude that $(f_d \mid \chi_d) = 0$, i.e., f_d is orthogonal to every odd primitive character of U_d. It follows that f_d can be written as a linear combination of characters which are even (factor through $U_d/\{\pm 1\}$) or imprimitive (factor through some $U_{d/p}$). When d = p, we should also remark that the constant functions on U_p are also invariant under ±1, and hence are already covered by the first case. □

THEOREM. Suppose that f : $A_N \to \mathbb{Q}$ is such that ⟨f⟩ is constant: $\sum_a \langle a\rangle f(ua) = k$ for all $u \in U_N$. Then

$\Gamma(f) := \pi^{-k} \prod_a \Gamma(\langle a\rangle)^{f(a)}$

is an algebraic number.

PROOF. The map ⟨ ⟩ : $H_Q \to \mathbb{Q}$ sending any f to $\sum_a \langle a\rangle f(a)$ is evidently linear, and hence Γ(f + g) = Γ(f)Γ(g), for f and g in H_Q. By the proposition, any f in H_Q is a $\mathbb{Q}$-linear combination of the ε's; hence nf is a sum of ε's for some n. Since $\Gamma(f)^n = \Gamma(nf)$, we are reduced to checking the theorem for the ε's described in the proposition. Noting that $\langle \varepsilon_{1,a}\rangle = 1$ and that $\langle \varepsilon_{p,a}\rangle$ = (p + 1)/2 if pa ≠ 0, one has only to appeal to the identities:

$\Gamma(x)\Gamma(1 - x) = \pi(\sin \pi x)^{-1}$,

$\sum_{k=1}^{p-1} \Gamma(x + k/p) = p^{1/2-x}(2\pi)^{(p-1)/2}\, \Gamma(px)$. □

REMARK. Kubert has recently obtained a much more precise result expressed in a different terminology from which it follows that, if H_Q is $\mathbb{Z}$-valued, then 2f is a $\mathbb{Z}$-linear combination of the ε's (to appear).

BIBLIOGRAPHIE

1. M. V. Borovoi, Sur l'action du groupe de Galois sur les classes de cohomologie rationnelles de type (p, p) des variétés abéliennes, Mat. Sb. 94 (1974), 649–652. (Russian)

2. J. Coates and S. Lichtenbaum, On l-adic zeta functions, Ann. of Math. (2) 98 (1973), 498–550.

3. P. Deligne, Applications de la formule des traces aux sommes trigonométriques, dans SGA $4^{1/2}$, 168–232.

4. ———, Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L, Modular Functions of One Variable. II, Lecture Notes in Math., vol. 349, Springer-Verlag, New York, 1973, pp. 501–595.

5. ———, Formes modulaires et représentations l-adiques, Séminaire Bourbaki 355 (Février 1969), Lecture Notes in Math., vol. 179, Springer-Verlag, New York, 139–172.

6. P. Deligne, Théorie de Hodge. III, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. 44 (1974), 5–77.

7. B. Gross, On the periods of abelian integrals and a formula of Chowla and Selberg, Invent. Math. 45 (1978), 193–211.

8. Ju. I. Manin, Correspondences, motifs and monoidal transformations.

9. ———, Points paraboliques et fonction zeta des courbes modulaires, Izv. 36 (1972), 19–66. (Russian)

10. I. I. Piateckii-Shapiro, Relations entre les conjectures de Tate et de Hodge pour les variétés abéliennes, Mat. Sb. 85(4) (1971), 610–620 = Math. USSR-Sb. 14 (1971), 615–625.

11. J. P. Serre, Abelian l-adic representations and elliptic curves (Mc Gill), Benjamin, New York, 1968.

12. ———, Facteurs locaux des fonctions zêta des variétés algébriques (définitions et conjectures), Sém. Delange-Pisot-Poitou 1969/70, exposé 19.

13. G. Shimura, On some arithmetic properties of modular forms of one and several variables, Ann. of Math. (2) 102 (1975), 491–515.

14. C. L. Siegel, Berechnung von Zetafunktionen an ganzzahligen Stellen, Nachr. Akad. Wiss. Göttingen Math. Phys. Kl. II 10 (1969), 87–102.

15. J. Tate, On the conjecture of Birch and Swinnerton-Dyer and a geometric analogue, Séminaire Bourbaki 306 (1965/66), Benjamin, New York; reproduit dans 10 exposés sur la théorie des schémas, North-Holland, Amsterdam, 1968.

16. A. Weil, Jacobi sums as grössencharaktere, Trans. Amer. Math. Soc. 73 (1952), 487–495.

17. ———, Sommes de Jacobi et caractères de Hecke, Nachr. Akad. Wiss. Göttingen Math. Phys. Kl. II 1 (1974), 1–14.

18. D. Zagier, Modular forms whose Fourier coefficients involve zeta functions of quadratic fields, Modular Forms of One Variable. VI, Lecture Notes in Math., vol. 627, Springer-Verlag, New York, 1977, pp. 105–169.

19. N. Saavedra, Catégories tannakiennes, Lecture Notes in Math., vol. 265, Springer-Verlag, New York, 1972.

SGA. Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie.

SGA 4. par M. Artin, A. Grothendieck et J. L. Verdier, Théorie des topos et cohomologie étale des schémas, Lecture Notes in Math., vols. 259, 270, 305, Springer-Verlag, New York.

SGA $4^{1/2}$. par P. Deligne, Cohomologie étale, Lecture Notes in Math., vol. 569, Springer-Verlag, New York, 1977.

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES SCIENTIFIQUES, BURES SUR YVETTE, FRANCE

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE
2e série. Mémoire n° 2, 1980, p. 23-33

CYCLES DE HODGE ABSOLUS ET PÉRIODES DES INTÉGRALES DES VARIÉTÉS ABÉLIENNES

par

Pierre DELIGNE

rédigé par J. L. BRYLINSKI

On montre ici comment une théorie convenable des "motifs" permet de retrouver certains des résultats de Shimura sur les périodes des variétés abéliennes de type C-M [5]. Il a paru instructif de commencer par une description informelle des propriétés des motifs et de leurs réalisations : c'est ce qui est fait au paragraphe 1. Le paragraphe 2 interprète certains résultats de Shimura à l'aide de motifs. Le paragraphe 3 définit les cycles de Hodge absolus, et la théorie des motifs qui leur est subordonnée. Le paragraphe 4 donne une majoration du degré de transcendance du corps engendré par les périodes d'une variété abélienne quelconque.

§ 1. LE LANGAGE DES MOTIFS

Soit k un corps de caractéristique 0. Il existe des "motifs sur k" plusieurs définitions, dont on ignore si elles sont équivalentes, et ayant chacune

leurs vertus. Nous préciserons au paragraphe 3 laquelle nous est utile.

Les motifs sur k forment une catégorie additive, munie d'un produit tensoriel. Chaque variété projective et lisse X sur k définit un motif $h(X)$ sur k, la cohomologie motivique de X, et tout motif sur k se déduit d'un motif de cette forme (par découpage en morceaux et twist à la Tate). Enfin, à diverses théories de cohomologie pour les variétés algébriques correspondent des foncteurs "réalisation" pour les motifs.

Chaque variété abélienne A sur k définit un motif $T(A)$ sur k, son H_1 motivique, et le foncteur $A \mapsto T(A)$ est pleinement fidèle. Plonger la catégorie des variétés abéliennes dans celle des motifs a pour intérêt de pouvoir prendre des $\otimes$. Mais les objets obtenus ne sont pas géométriques : il n'y a pas de "fonctions" sur un motif.

Le rang d'un motif est la dimension de l'une quelconque de ses réalisations, que nous allons maintenant décrire.

Si $k = \mathbf{C}$, la réalisation de Betti d'un motif M est un groupe abélien libre de rang fini $H_B(M)$, qui est muni d'une structure de Hodge, c'est-à-dire d'une décomposition :

$$H_B(M) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{C} = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q} \qquad (\text{avec } \overline{H^{p,q}} = H^{q,p}).$$

Illustrons ceci sur le motif $T(A)$, qui est le H_1 d'une variété abélienne A. On définit $H_B(T(A)) = H_1(A, \mathbf{Z})$, homologie de $A = A(\mathbf{C})$ vu comme espace topologique.

Soit $\mathrm{Lie}(A)$ l'algèbre de Lie du groupe analytique A, et soit $\int : H_1(A, \mathbf{Z}) \to \mathrm{Lie}(A)$ l'homomorphisme "intégration sur un 1-cycle". On a une suite exacte de groupes analytiques complexes :

$$0 \longrightarrow H_1(A, \mathbf{Z}) \xrightarrow{\int} \mathrm{Lie}(A) \xrightarrow{\exp} A \longrightarrow 0.$$

La structure de Hodge de $H_1(A, \mathbf{C})$ est telle que $H_1(A, \mathbf{C}) = H^{0,-1} \oplus H^{-1,0}$. On obtient $H^{0,-1}$ comme noyau de l'application $H_1(A, \mathbf{C}) \to \mathrm{Lie}(A)$, prolongement $\mathbf{C}$-linéaire de

$\int : H_1(A, \mathbf{Z}) \to \mathrm{Lie}(A)$.

Plaçons-nous maintenant sur un corps de caractéristique 0 et donnons-nous une clôture algébrique $\bar{k}$ de k. Pour tout nombre premier ℓ, la réalisation ℓ-adique d'un motif M est un $\mathbf{Z}_\ell$-module libre de type fini $H_\ell(M)$ (muni d'ailleurs d'une action du groupe de Galois de $\bar{k}$ sur k). Lorsque $k = \mathbf{C}$, on dispose d'un isomorphisme :

$$H_\ell(M) \simeq H_B(M) \otimes \mathbf{Z}_\ell.$$

Si A est une variété abélienne sur k, si $\bar{k}$ est une clôture algébrique de k, la réalisation ℓ-adique de $T(A)$ est notée $T_\ell(A)$; c'est le $\mathbf{Z}_\ell$-module :

$$T_\ell(A) = \varprojlim_n A_{\ell^n}(\bar{k}) \quad \big(\text{où } A_{\ell^n}(\bar{k}) \text{ est le groupe des points d'ordre } \ell^n \text{ de } A(\bar{k})\big).$$

Si $k = \mathbf{C}$, l'isomorphisme $T_\ell(A) \simeq H_B(T(A)) \otimes \mathbf{Z}_\ell$ est facile à décrire. Pour tout n, la projection de $\gamma \otimes x \in H_B(T(A)) \otimes \mathbf{Z}_\ell$ sur $A_{\ell^n}(\mathbf{C})$ se calcule ainsi ; si $m \in H_B(T(A))$ est tel que $x - m \in \ell^n(H_B(T(A)) \otimes \mathbf{Z}_\ell)$, l'exponentielle de l'élément $m/\ell^n \in H_1(A, \mathbf{Q})$ est le point d'ordre ℓ^n voulu.

La réalisation de De Rham de M est un espace vectoriel sur k de dimension finie $H_{DR}(M)$, muni d'une filtration décroissante $F^\bullet$ (la filtration de Hodge). Lorsque $k = \mathbf{C}$, on a un isomorphisme

$$H_B(M) \otimes \mathbf{C} \simeq H_{DR}(M).$$

Par cet isomorphisme, la filtration de Hodge est telle que $F^p = \bigoplus_{p' > p} H^{p',q}$. Dans le cas du motif $T(A)$, rappelons [7] l'existence d'une "extension universelle" E de A par un groupe vectoriel, qui s'inscrit dans une suite exacte de groupes algébriques :

$$0 \longrightarrow H^1(A, \mathcal{O}_A)^* \longrightarrow E \longrightarrow A \longrightarrow 0.$$

On a $H_{DR}(T(A)) = \mathrm{Lie}(E)$, et la filtration de Hodge est donnée par :

$$0 = F^1 \subset F^0 = H^1(A, \mathcal{O}_A)^* \subset F^{-1} = \mathrm{Lie}(E).$$

Si $k = \mathbf{C}$, on a $H_1(E, \mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} H_1(A, \mathbf{Z})$, d'où un morphisme :

$$H_1(A, \mathbf{C}) \xleftarrow{\sim} H_1(E, \mathbf{C}) \xrightarrow{\int} \mathrm{Lie}(E) = H_{DR}(T(A)).$$

C'est l'isomorphisme voulu.

Exemples : **1)** Ici, $k = \mathbf{Q}$. On va définir le motif de Tate $\mathbf{Z}(1)$; c'est le H_1 du groupe algébrique $\mathbf{G}_m$. Pour trouver ses diverses réalisations, on substitue $\mathbf{G}_m$ à A dans la définition de $T(A)$. On obtient :

- $H_B(\mathbf{Z}(1)) = 2\pi i \cdot \mathbf{Z}$, noyau de $\exp : \mathbf{C} \longrightarrow \mathbf{C}^\times$;
  $H_B(\mathbf{Z}(1)) \otimes \mathbf{C} = H^{-1,-1}$;
- $H_\ell(\mathbf{Z}(1)) = \mathbf{Z}_\ell(1) = T_\ell(\mathbf{G}_m) = \varprojlim_n \mu_{\ell^n}(\bar{\mathbf{Q}})$;
- $H_{DR}(\mathbf{Z}(1)) = \mathbf{Q}$.

L'isomorphisme $H_B(\mathbf{Z}(1)) \otimes \mathbf{C} \xrightarrow{\sim} H_{DR}(\mathbf{Z}(1)) \otimes \mathbf{C}$ envoie $(2\pi i) \otimes 1$ sur $2\pi i$. On rappelle les isomorphismes $H_1(\mathbf{G}_m) \simeq H_1(\mathbf{P}^1 - \{0, \infty\}) \simeq H_2(\mathbf{P}^1)$. De plus, pour toute courbe algébrique propre lisse et connexe sur $\mathbf{Q}$, $H_2(X)$ est isomorphe à $H_2(\mathbf{P}^1)$ (donc à $\mathbf{Z}(1)$). Pour tout entier d, on définit un motif $\mathbf{Z}(d)$ de sorte que $\mathbf{Z}(d) = \mathbf{Z}(d-1) \otimes \mathbf{Z}(1)$. On a $\mathbf{Z}(m+n) \simeq \mathbf{Z}(m) \otimes \mathbf{Z}(n)$ pour $m, n \in \mathbf{Z}$.

2) Soit E une courbe elliptique sur $\mathbf{Q}$. Le motif $T(E)$ est de rang 2. Donc le motif $\bigwedge^2 T(E)$ est de rang 1, et on a

$$\bigwedge^2 T(E) = \bigwedge^2 H_1(E) = H_2(E) = \mathbf{Z}(1).$$

Précisons l'isomorphisme $\bigwedge^2 T(E) \simeq \mathbf{Z}(1)$ dans les différentes réalisations.

Sur $H_1(E(\mathbf{C}), \mathbf{R}) \simeq \mathrm{Lie}(E)$, la structure complexe définit une orientation. Si (e_1, e_2) est une $\mathbf{Z}$-base orientée de $H_B(T(E)) = H_1(E(\mathbf{C}), \mathbf{Z})$, alors $e_1 \wedge e_2$ est une base de $H_B(\bigwedge^2 T(E))$; on lui associe $2\pi i \in H_B(\mathbf{Z}(1))$.

L'isomorphisme $\bigwedge^2(T_\ell(E)) \simeq \mathbf{Z}_\ell(1)$ est donné par la forme alternée de Weil [6]. Enfin, on a :

$$\bigwedge^2 H_{DR}(T(E)) = \mathrm{Hom}(H^2_{DR}(E), \mathbf{Q}).$$

Soient ω et η les formes différentielles habituelles de première et deuxième espèce. $H^2_{DR}(E)$ est engendré par le cup-produit $\omega \wedge \eta$ de leurs classes de cohomologie. Par l'isomorphisme

$$H_B(\bigwedge^2 T(E)) \otimes \mathbf{C} \longrightarrow H_{DR}(\bigwedge^2 T(E)) \otimes \mathbf{C},$$

$e_1 \wedge e_2$ a pour image l'homomorphisme qui envoie $\omega \wedge \eta \in H^2_{DR}(E)$ sur

$$\begin{vmatrix} \omega_1 & \omega_2 \\ \eta_1 & \eta_2 \end{vmatrix} \in \mathbf{C}.$$

La compatibilité des réalisations de Betti et de De Rham de l'isomorphisme $\bigwedge^2(T(E)) \simeq \mathbf{Z}(1)$ équivaut à la relation de Legendre

$$\omega_1 \cdot \eta_2 - \omega_2 \cdot \eta_1 = 2\pi i.$$

3) Soit A une variété abélienne sur $\mathbf{Q}$. A la classe de cohomologie d'une section hyperplane de A dans un plongement projectif, correspond un morphisme de motifs $\bigwedge^2 T(A) \to \mathbf{Z}(1)$. En cohomologie de Betti, ceci correspond à une forme alternée $2\pi i \cdot E$ sur $H_B(T(A))$, à valeurs dans $2\pi i \cdot \mathbf{Z}$. En cohomologie de De Rham, on a de même une forme alternée E_{DR} sur $H_{DR}(T(A))$ à valeurs dans $\mathbf{Q}$. Il est classique que F^0 est un sous-espace totalement isotrope. On en déduit qu'on peut trouver des différentielles de première espèce $\omega_1, \ldots, \omega_g$ sur A, des différentielles de deuxième espèce $\eta_1, \ldots, \eta_g$ sur A, telles que l'on ait :

$$E_{DR}(x,y) = \sum_{i=1}^{g} \big((\omega_i, x)(\eta_i, y) - (\omega_i, y) \cdot (\eta_i, x) \big).$$

La compatibilité entre E et E_{DR} se traduit comme suit. Soit $(e_1, \ldots, e_{2g})$ une base de $H_B(T(A))$, soit Ω la matrice $n \times 2n$ telle que $\Omega_{ij} = \int_{e_j} \omega_i$, et N la matrice $n \times 2n$ telle que $N_{ij} = \int_{e_j} \eta_i$. On a :

$$^t N \cdot \Omega - {}^t\Omega \cdot N = 2i\pi \cdot E.$$

Enfin, pour la réalisation ℓ-adique on trouve une forme alternée sur $T_\ell(A)$ à valeurs dans $\mathbf{Z}_\ell(1)$: c'est la forme alternée de Weil associée au diviseur de la section hyperplane [6].

§ 2. MOTIFS LIÉS AUX VARIÉTÉS ABÉLIENNES DE TYPE C-M

Soit k un sous-corps algébriquement clos de $\mathbf{C}$ – par exemple $\bar{\mathbf{Q}}$ – et soit $\mathcal{A}$ la sous-catégorie de la catégorie des motifs sur k, engendrée par les $T(A)$ des variétés abéliennes (pour les opérations de produit tensoriel, passage au dual et facteurs directs). Le foncteur "réalisation de Betti de motif déduit de M/k par extension des scalaires à $\mathbf{C}$" envoie $\mathcal{A}$ dans la catégorie des structures de Hodge. Il résulte formellement du Théorème 1 du § 3 que ce foncteur est pleinement fidèle.

Soient E un corps CM, S l'ensemble de ces plongements complexes et $- : S \to S$ la conjugaison complexe. A chaque fonction $\varphi : S \to \mathbf{Z}$ vérifiant

$$(*) \qquad \varphi(\sigma) + \varphi(\bar{\sigma}) \quad \text{est indépendant de } \sigma \in S,$$

attachons une structure de Hodge H_φ, munie d'une structure de module sur l'anneau $\mathcal{O}_E$ des entiers de E :

$$H_\varphi = \mathcal{O}_E, \quad \text{muni de la structure de module évidente, et dans la décomposition}$$
$$H_\varphi \otimes \mathbf{C} = E \otimes \mathbf{C} \simeq \mathbf{C}^S, \quad \text{le facteur } \mathbf{C} \text{ d'indice } \sigma \in S \text{ est de type de Hodge}$$
$$(\varphi(\sigma), \varphi(\bar{\sigma})).$$

On vérifie que les H_φ sont dans l'image de $\mathcal{A}$, et même dans l'image de la sous-catégorie engendrée par les variétés abéliennes de type CM. Ceci permet de définir le motif M_φ sur $\bar{\mathbf{Q}}$ comme étant celui de réalisation de Betti H_φ.

La réalisation de De Rham $H_{DR}(M_\varphi)$ est un espace vectoriel sur $\bar{\mathbf{Q}}$, muni d'une action de E. Pour tout $\sigma \in S$, soit $H_{DR}(M_\varphi)_\sigma$ le sous-$\bar{\mathbf{Q}}$-espace vectoriel sur lequel $x \in E$ agit comme $\sigma^{-1}(x) \in \bar{\mathbf{Q}}$. Chacun de ces espaces vectoriels est de dimension 1 engendré par un élément ω_σ, et $H_{DR}(M_\varphi)$ en est la somme. Via l'isomorphisme

$$H_B(M_\varphi) \otimes \mathbf{C} \xrightarrow{\sim} H_{DR}(M_\varphi) \otimes \mathbf{C},$$

un élément e de $E = H_B(M_\varphi) \otimes \mathbf{Q}$ correspond à une famille (e_σ) avec $e_\sigma \in H_{DR}(M_\varphi)_\sigma$. On vérifie immédiatement que le nombre complexe $p(\sigma, \varphi)$ tel que $p(\sigma, \varphi)e_\sigma = \omega_\sigma$ ne dépend, à multiplication près par $\bar{\mathbf{Q}}^\times$, ni de e ni du choix de ω_σ. Ceci justifie la notation.

Entre les $p(\sigma, \varphi)$ et les invariants de Shimura $p_E(\sigma, \varphi)$ (voir [5]), on a la relation :

$$p_E(\sigma, \varphi) = \frac{p(\sigma, \varphi)}{(2\pi i)^{\varphi(\sigma)}} \quad (\text{modulo } \bar{\mathbf{Q}}^\times),$$

(qui n'est qu'une traduction des définitions).

Les identités entre les périodes de Shimura, correspondent à des propriétés algébriques des motifs M_φ. Avant de les résumer en un tableau, introduisons quelques notations relatives à une extension $F|E$ de corps CM. On note S_F (resp. S_E) l'ensemble des plongements complexes de F (resp. E). Pour $\sigma \in S_F$, on note $\sigma|E \in S_E$ la restriction à E du plongement σ.

Pour $\varphi : S_E \to \mathbf{Z}$ satisfaisant $(*)$, on note $\mathrm{Inf}(\varphi)$ la fonction de S_F vers $\mathbf{Z}$ telle que $\mathrm{Inf}(\varphi)(\sigma) = \varphi(\sigma|E)$. Cette fonction satisfait $(*)$. Pour $\varphi : S_F \to \mathbf{Z}$ satisfaisant $(*)$, on note $\mathrm{Res}(\varphi)$ la fonction de S_E vers $\mathbf{Z}$ telle que

$$\mathrm{Res}(\varphi)(\sigma) = \sum_{\tau|E=\sigma} \varphi(\tau);$$

elle satisfait $(*)$.

Identités entre périodes	**Relations entre motifs**
1. $p(\sigma, \varphi' + \varphi'') = p(\sigma, \varphi') \cdot p(\sigma, \varphi'')$	1. $M_{\varphi'+\varphi''} = M_{\varphi'} \otimes_E M_{\varphi''}$
2. $F\|E$ extension de corps CM, $\sigma \in S_F$, $\varphi : S_E \to \mathbf{Z}$ satisfaisant $(*)$: $p(\sigma, \mathrm{Inf}(\varphi)) = p(\sigma\|E, \varphi)$	2. $M_{\mathrm{Inf}(\varphi)} = M_\varphi \otimes_E F$
3. $\sigma \in S_E$, $\varphi : S_F \to \mathbf{Z}$ satisfaisant $(*)$: $p(\sigma, \mathrm{Res}\,\varphi) = \prod_{\tau\|E=\sigma} p(\tau, \varphi)$	3. M_φ est un F-motif de rang 1, donc un E-motif de rang $d = [F : E]$ $M_{\mathrm{Res}(\varphi)} = \bigwedge_E^d M_\varphi$
4. $p(\sigma, \underline{1}) = 2\pi i$	4. $M_{\underline{1}} = \mathbf{Z}(-1)$ (dual du motif de Tate)

Ces identités entre périodes permettent de retrouver les théorèmes 1 à 4 de l'exposé de Shimura [5]. Notons que dans [5] Shimura relie les périodes $p_K(\sigma, \varphi)$ aux valeurs en un point spécial de formes modulaires de Hilbert, rationnelles sur $\bar{\mathbf{Q}}$.

§ 3. CYCLES DE HODGE ABSOLUS ET MOTIFS

Soit X une variété projective et lisse sur $\mathbf{C}$. Un cycle de Hodge de codimension d sur X est un élément de $H^{2d}(X, \mathbf{Q})$ de type (d, d), ou, ce qui revient au même, un élément de

$$H^{2d}(X, \mathbf{Q})(d) \overset{\mathrm{def}}{=} H^{2d}(X, \mathbf{Q}) \otimes \mathbf{Z}(d)$$

de type $(0, 0)$. Remarquons que pour $x \in H^{2d}(X, \mathbf{Q})(d)$, il est équivalent de dire que x est de type $(0, 0)$ ou que x est dans F^0. Une classe de cohomologie d'une sous-variété algébrique de X est un cycle de Hodge. Hodge a conjecturé que tout cycle de Hodge serait combinaison

linéaire de classes de cohomologie de sous-variétés. Cette conjecture paraissant inaccessible, on introduit une notion qui "arithmétise" celle de cycle de Hodge.

Les cycles qu'on définit auront tous les attributs visibles des cycles algébriques, à savoir des réalisations en cohomologie ℓ-adiques et de De Rham. Un cycle de Hodge absolu de codimension d sur une variété projective lisse X, sur un corps k de caractéristique 0, sera une collection de classes de cohomologie dans les groupes

$$H^{2d}(X, \mathbf{Q}_\ell)(d) \quad (\text{resp. } H^{2d}_{DR}(X)(d))$$

satisfaisant les deux conditions

- l'élément de $H^{2d}_{DR}(X)(d)$ est dans F^0 ;
- pour tout plongement $k \hookrightarrow \mathbf{C}$, les différentes classes de cohomologie correspondent (via les isomorphismes du § 1) à une classe rationnelle de la cohomologie de Betti de $X \otimes_k \mathbf{C}$.

On a les inclusions : (cycles algébriques) $\subset$ (cycles de Hodge absolus) $\subset$ (cycles de Hodge). Utilisons cette définition pour préciser la catégorie des motifs sur laquelle on a travaillé dans les § 1 et 2. Soit d'abord $\mathcal{V}(k)$ la catégorie des variétés projectives et lisses sur k. On construit une catégorie additive $\mathcal{M}(k)$, dans laquelle les groupes $\mathrm{Hom}(M, N)$ sont des espaces vectoriels sur $\mathbf{Q}$, qui est munie des données suivantes :

a) un produit tensoriel $\otimes$, associatif, commutatif, distributif par rapport à l'addition des objets ;

b) un foncteur contravariant H^* de $\mathcal{V}(k)$ dans $\mathcal{M}(k)$, bijectif sur les objets, compatible aux sommes, transformant produits en produits tensoriels.

Dans $\mathcal{M}(k)$, on a, pour X et Y connexes :

$$\mathrm{Hom}(H^*(X), H^*(Y)) = Z^{\dim(Y)}_{h.a}(X \times Y),$$

où on note $Z^d_{h.a}(Z)$ l'espace vectoriel sur $\mathbf{Q}$ des cycles de Hodge absolus de codimension d sur Z. La construction de la catégorie de motifs $\mathcal{M}(k)$ se fait alors tout comme dans [2], les cycles algébriques étant remplacés par les cycles de Hodge absolus. Grâce à cette nouvelle définition, les composantes de Künneth de la diagonale de $X \times X$ étant de Hodge absolues, on a dans $\mathcal{M}(k)$ une décomposition :

$$H^*(X) = \bigoplus_i H^i(X).$$

Le résultat qui suit a fait l'objet d'exposés à l'I. H. E. S. en 1979.

Théorème 1 : Tout cycle de Hodge sur une variété abélienne est de Hodge absolu.

Signalons le

Corollaire (Borovoï) : Soit A une variété abélienne sur un corps k de caractéristique 0, ξ un cycle de Hodge sur A. Les correspondants ℓ-adiques ξ_ℓ de ξ sont fixés par un sous-groupe ouvert de $\mathrm{Gal}(\bar{k}|k)$.

§ 4. PÉRIODES DES INTÉGRALES DES VARIÉTÉS ABÉLIENNES

Soit A une variété abélienne complexe, $H_1(A, \mathbf{C}) = H^{0,-1} \oplus H^{-1,0}$ la décomposition de Hodge de $H_B(A)$ (cf. § 1). Considérons $GL(H_1(A))$ comme groupe algébrique sur $\mathbf{Q}$. On a un morphisme de groupes algébriques complexes :

$$\mathbf{G}_m \xrightarrow{\mu} GL(H_1(A, \mathbf{C}))$$

tel que $\mu(z)$ agisse par l'homothétie de rapport z sur $H^{-1,0}$, par l'identité sur $H^{0,-1}$. Le groupe de Hodge G de A est l'adhérence de Zariski du sous-groupe $\mu(\mathbf{G}_m)$ de $GL(H_1(A))$. En d'autres termes, G est un sous-groupe algébrique sur $\mathbf{Q}$ de $GL(H_1(A))$. Une fonction régulière sur un ouvert de Zariski de G, et $\mathbf{Q}$-rationnelle, est nulle sur G si et seulement si elle est nulle sur $\mu(\mathbf{G}_m)$. On vérifie aisément que G contient les homothéties de $H_1(A)$. Voici une seconde description de G, très utile : on considère tous les tenseurs rationnels de type $(-N/2, -N/2)$ dans les produits tensoriels $\bigotimes^N H_1(A)$. Alors G est le sous-groupe de $GL(H_1(A))$ formé des transformations linéaires g pour lesquelles il existe un scalaire μ tel que : $g \cdot t = \mu^m t$, pour tout tenseur t de type (m, m). Enfin, on montre que G est le groupe qui fixe tous les cycles de Hodge absolus de type $(0, 0)$ dans les espaces de tenseurs mixtes sur $H_1(A)$ (mixtes = covariants et contravariants).

Supposons maintenant A définie sur un sous-corps k de $\mathbf{C}$. Posons $g = \dim(A)$.

Théorème 2 : Soit $\omega_1, \ldots, \omega_g$ des différentielles de première espèce sur A, $\eta_1, \ldots, \eta_g$ des différentielles de deuxième espèce sur A, telles que

$(\omega_1, \ldots, \omega_g, \eta_1, \ldots, \eta_g)$ soit une base de $H^1_{DR}(A)$. Soit K le sous-corps de $\mathbf{C}$ engendré par k et par les périodes $\int_\gamma \omega_i$, $\int_\gamma \eta_i$ $(1 \leq i \leq g,\ \gamma \in H_1(A, \mathbf{Z}))$; le degré de transcendance de K sur k est majoré par la dimension de G.

Démonstration : K est le corps de rationalité de l'isomorphisme

$$H_{1,B}(A) \otimes_{\mathbf{Q}} \mathbf{C} \xrightarrow{\sim} H_{1,DR}(A) \otimes_k \mathbf{C}$$

donné par "intégration" sur un cycle. Cet isomorphisme préserve les classes de cohomologie des cycles de Hodge absolus. Soit P la variété algébrique formée des isomorphismes qui ont cette propriété. De la définition de G, et du théorème 1 résulte que P est un espace principal homogène sous G, défini sur k, donc $\dim(P) = \dim(G)$. On conclut par le lemme suivant :

Lemme : Soit z un point de $\mathbb{A}^N(\mathbf{C})$; le degré de transcendance de $k(z)$ sur k est égal à la dimension de la k-adhérence de Zariski de $\{z\}$;

C'est une tautologie. C.Q.F.D.

Remarque : De l'exemple 3 du § 1, résulte que $2\pi i \in K$. On peut d'ailleurs montrer que le degré de transcendance de K sur $k(2\pi i)$ est majoré par $\dim(G) - 1$.

Corollaire : Avec les notations du Théorème 2, supposons de plus A simple de type C-M. Le degré de transcendance de K sur k est majoré par $g + 1$.

Preuve : Il suffit de montrer : $\dim(G) < g+1$. Or $\mu(\mathbf{G}_m)$ commute à l'action sur $H_1(A, \mathbf{Q})$ du corps E. Il en résulte que G commute aussi à cette action, et que G est un tore algébrique. Par ailleurs G préserve, à un facteur près, la forme alternée associée à une section hyperplane (voir l'exemple 3 du § 1). D'où l'assertion.

Remarquons que, dans ce dernier cas, on dispose de la minoration suivante :

$$\dim(G) > 2 + \log_2(g),$$

due à Ribet [3].

RÉFÉRENCES

[1] P. Deligne : Valeurs de fonctions L et périodes d'intégrales, in Proceedings of symposia in Pure Mathematics, Volume 33, 1978.

[2] M. Demazure : Exposé au séminaire Bourbaki n° 365, in Springer Lecture Notes, 180 (1971).

[3] K. Ribet : Division fields of abelian varieties with complex multiplications, dans ce volume.

[4] G. Shimura : On the derivatives of modular forms, Duke Math. Journal 44 (1977), 365-387.

[5] G. Shimura : The periods of abelian varieties with complex multiplication and the special values of certain zeta functions, dans ce volume.

[6] A. Weil : Courbes algébriques et variétés abéliennes, Hermann 1971 (réimpression).

[7] A. Weil : Variétés abéliennes, in "Algèbre et Théorie des Nombres", Colloque international du C.N.R.S., 24, 1950, p.124-127.

P. Deligne
Institut des Hautes Etudes Scientifiques
91440 Bures-sur-Yvette

J.-L. Brylinski
Ecole polytechnique, Centre de Mathématiques
91128 Palaiseau cedex

Séminaire Bourbaki, 31e année, 1978/79, no 539 — juin 1979

SOMMES DE GAUSS CUBIQUES ET REVÊTEMENTS DE SL(2), D'APRÈS S. J. PATTERSON

par P. DELIGNE

0. Introduction.

Une somme de Gauss est le produit scalaire d'un caractère additif et d'un caractère multiplicatif d'un corps fini. Si F_q est un corps fini à q éléments, χ un caractère de F_q^*, et ψ un caractère du groupe additif de F_q, on pose

$$g(\chi,\psi) = \sum_{x \in F_q^*} \chi(x)\ \psi(x).$$

On suppose en principe χ et ψ non triviaux; la somme $g(\chi,\psi)$ est alors de valeur absolue $q^{1/2}$. On parle de somme n-ique si χ est d'ordre n. Pour $a \in F_q^*$, on a

(0.1) $g(\chi,\psi(ax)) = \chi(a)^{-1}\ g(\chi,\psi)$

En particulier, si χ est d'ordre n, $g(\chi,\psi)^n$ est indépendant de ψ.

A chaque nombre premier p ≠ 2, on peut attacher la somme de Gauss quadratique

$$g_p = \sum_{x \in F_p^*} (x/p)\ \exp(2\pi i\, x/p)$$

où (x/p) est le symbole de Legendre : +1 si x est un carré mod p et -1 sinon. Cette somme a été calculée par Gauss : c'est $\sqrt{p}$ ou $i\sqrt{p}$ selon que p ≡ 1 ou -1 mod 4.

Si on veut, de même, attacher une somme de Gauss n-ique à un idéal premier $\mathfrak{p}$ de l'anneau des entiers O d'un corps de nombres F, il s'agit de définir un caractère multiplicatif, et d'un caractère additif du corps résiduel $O/\mathfrak{p}$.

Supposons que F contienne une racine primitive n ième de l'unité, et posons $\mu := \mu_n(F)$. Si $\mathfrak{p}$ est premier à n, on a $\mu \simeq \mu_n(O/\mathfrak{p})$.

Notons t l'isomorphisme réciproque, et posons $q = N\mathfrak{p}$. On note $(x/\mathfrak{p})_n$, ou simplement $(x/\mathfrak{p})$, le caractère $t(x^{(q-1)/n})$ de $(O/\mathfrak{p})^*$ à valeurs dans μ. Plus généralement, pour $\mathfrak{a}$ un idéal de O premier à x, de factorisation en idéaux premiers $\mathfrak{a} = \prod \mathfrak{p}_i^{a_i}$, on note $(x/\mathfrak{a})_n$, ou simplement $(x/\mathfrak{a})$, le produit $\prod (x/\mathfrak{p}_i)^{a_i}$ (pour x premier à $\mathfrak{a}$). Pour $\mathfrak{a} = (a)$, on écrit aussi (x/a). Le lien avec le symbole de Hilbert (section 2) est la formule

$$(x/a) = \prod_{v|a} (x,a)_v$$

La loi de réciprocité pour le symbole de Hilbert fournit une loi de réciprocité pour ces symboles.

(*) texte remanié en juillet 1979.

359-02

Le symbole $(x/\mathfrak{a})$ est un caractère de $(O/\mathfrak{a})^*$ (et déjà de $(O/\prod \mathfrak{p}_i)^*$) à valeurs dans μ. Pour en déduire un caractère à valeurs complexes, il suffit de le composer avec un isomorphisme ε de μ avec le groupe des racines n ièmes de l'unité de C.

Nous noterons e le caractère $\exp(2\pi i x)$ de R/Z, le caractère induit sur Q/Z, ceux qui s'en déduisent sur les Q_p/Z_p, via l'isomorphisme $Q/Z \simeq \oplus\, Q_p/Z_p$, et ceux qui s'en déduisent par des traces : par exemple le caractère $\exp(2\pi i\, Tr_{F/Q}\, x)$ de F.

Pour construire des caractères additifs des corps résiduels, on dispose de deux méthodes.

1ère méthode : Pour $\mathfrak{p}$ un idéal de O, de corps résiduel $O/\mathfrak{p}$ de caractéristique p, on définit le caractère additif ψ comme composé de la trace : $O/\mathfrak{p} \to Z/pZ$, et du caractère $e(x/p)$ de Z/pZ.

2ème méthode : Nous ne l'expliciterons que dans le cas particulier suivant : n = 3, et F est le corps $Q(\sqrt{}-3)$ des racines cubiques de l'unité. Dans toute l'introduction, sauf mention expresse du contraire nous ne considérerons plus que ce cas. Chaque idéal $\mathfrak{a}$ premier à 3 a un unique générateur a congru à 1mod 3 et on prend comme caractère additif de $O/\mathfrak{a}$ le caractère $e(a^{-1}x)$.

Pour $\mathfrak{p}$ premier, les sommes de Gauss cubiques obtenues en utilisant les caractères additifs de l'une ou l'autre méthode coïncident : pour $\mathfrak{p} = (\pi)$, avec $\pi \equiv 1(3)$, un calcul facile (cf(0.1)) montre que l'une est le produit de l'autre par $(-1/\pi)$ si $\mathfrak{p}$ est de degré 2, et par $(\overline{\pi}/\pi)$ si $\mathfrak{p}$ est de degré 1. Ces racines cubiques de l'unité sont triviales : $(-1/\pi)$ parce que $(-1)^2 = 1$, et $(\overline{\pi}/\pi)$ pour être réelle : on a à la fois $(\overline{\pi}/\pi) = (\pi/\overline{\pi})$ (par transport de structure) et $(\overline{\pi}/\pi) = (\pi/\overline{\pi})$ (réciprocité cubique).

La seconde méthode permet d'attacher une somme, encore dite"de Gauss", à un idéal $\mathfrak{a}$ non nécessairement premier : Pour $\mathfrak{a}$ = (a), avec a $\equiv$ 1(3), on pose

$$(0.2)\quad g(\mathfrak{a}) = \sum_{x \in (O/\mathfrak{a})^*} (x/\mathfrak{a}) e(a^{-1}x).$$

On a :

(0.3) Si $\mathfrak{a}$ est sans facteur carré, $g(\mathfrak{a}) = (N\mathfrak{a})^{1/2}$. Sinon, $g(\mathfrak{a}) = 0$. (0.4) Multiplicativité tordue : Si $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}'.\ \mathfrak{a}''$, avec $\mathfrak{a}'$ et $\mathfrak{a}''$ premiers entre eux, de générateurs a' et a" congrus à 1mod3, on a

$$g(\mathfrak{a}) = (a'/\mathfrak{a}'')(a''/\mathfrak{a}')\, g(\mathfrak{a}')\, g(\mathfrak{a}'')$$

La réciprocité cubique assure que $(a'/\mathfrak{a}'') = (a''/\mathfrak{a}')$. On peut donc remplacer le facteur $(a'/\mathfrak{a}'')(a''/\mathfrak{a}')$ par $(a'/\mathfrak{a}'')^2$.

Pour F et n quelconques, d'après Weil [22], la puissance n ième de la somme de Gauss $g(\mathfrak{p})$, comme fonction de $\mathfrak{p}$, est un caractère de Hecke algébrique. On notera que cette puissance n ième ne dépend pas du choix du caractère additif. Si on considère ce caractère de Hecke comme connu, il s'agit, pour calculer la somme $g(\mathfrak{p})$ elle-même, de déterminer quelle racine n ième de $g(\mathfrak{p})^n$

C'est ce que fait Gauss dans le cas quadratique, et, pour n pair, n = 2m, son résultat ramène le calcul de $g(\mathfrak{p})^m$ à celui d'un caractère de Hecke algébrique. On dispose aussi de résultats p-adiques(Stickelberger, récemment précisé par Gross- Koblitz [4]), et, pour n = 3,4 et F = $Q(\sqrt[n]{1})$, d'une expression en terme de produit de valeurs de division de fonctions elliptiques(Matthews [13]).

Dans [19], Patterson montre que l'argument $g(\mathfrak{a})/|g(\mathfrak{a})|$ de $g(\mathfrak{a})$, pour $\mathfrak{a}$ premier à 3 et sans facteur carré, est équidistribué sur le cercle unité. Il utilise le critère de Weyl, et doit donc prouver que pour T entier non nul, on a

$$(0.5)\ |\sum_{N\mathfrak{a} \le x} (g(\mathfrak{a})/|g(\mathfrak{a})|)^T| \le o(X).$$

Le théorème taubérien de Wiener-Ikehara permet de déduire une telle estimation de l'holomorphie pour Rs ≥ 1 de la série de Dirichlet

(0.6) $\sum (g(\mathfrak{a})/|g(\mathfrak{a})|)^T \cdot N(\mathfrak{a})^{-s}$.

L'étude de ces séries est le coeur du problème.

En principe, les mêmes arguments s'appliquent au produit $g(\mathfrak{a})\chi(\mathfrak{a})$, pour χ un caractère de Hecke. La conclusion devient la suivante. Ne considérons que les idéaux sans facteur carré $\mathfrak{a}$ = (a), avec a ≡ 1(3), tels que l'argument de a soit dans un intervalle I du cercle unité. L'argument de $g(\mathfrak{a})^3 = -a^2\overline{a}$ est alors dans l'intervalle opposé (-1) I, et celui de $g(\mathfrak{a})$ dans $\{z|z^3 \in$ (-1) I$\}$, ie dans la réunion de 3 intervalles disjoints $I_i (i$ = 1,2,3). On trouve que l'argument de $g(\mathfrak{a})$ est une fois sur trois dans chacun d'eux : pour $N\mathfrak{a} <$ X, le nombre de fois qu'il est dans l'un d'eux est $1/3(nombre$ de $\mathfrak{a})$ + o(X). La même conclusion vaut si impose de plus à a une condition de congruence. On peut interpréter ce résultat comme signifiant qu'il n'y a pas de règle "simple", même statistique, pour déterminer l'argument de la somme de Gauss.

Dans [5], Heath-Brown et Patterson prouvent des résultats analogues pour la somme de Gauss cubique $g(\mathfrak{p})$ ($\mathfrak{p}$ premier) ; ceci contredit une suggestion de Kummer, imprudemment élevée au rang de conjecture par Hasse. Un rôle essentiel est encore joué par la série de Dirichlet (0.6) pour T = 1. Après un décalage en s, elle se récrit

(0.7) $\sum g(\mathfrak{a})\, N(\mathfrak{a})^{-s}$;

c'est d'elle que nous parlerons.

La série de Dirichlet (0.7) n'est pas multiplicative. Nous allons donner à la multiplicativité tordue (0.4) une écriture adélique. Notations : voir 0.0 et le section 2. Soient A^f l'anneau des adèles à distance finie de F et (,) le symbole de Hilbert cubique sur $(A^f)^*$. On définit une extension centrale $\widetilde{(A^f)^*}$ de $(A^f)^*$ par μ, munie d'une section a → [a] = (a,1), en posant $(a,\zeta')(b,\zeta'') = (ab,(a,b)\zeta'\zeta'')$. On a

(0.8) [a] [b] = [ab] · (a,b).

C'est l'extension définie par le 2-cocycle (a,b). La loi de réciprocité pour les symboles de Hilbert assure que $[\alpha]\,[\beta] = [\alpha\beta]$ pour $\alpha, \beta \in F^*$: [ ] scinde

l'extension au-dessus de F^*. Pour chaque place finie ν de F, on définit de même une extension $\widetilde{F_\nu{}^*}$ de $F_\nu{}^*$ par μ ; si $\nu \nmid 3$, on a [a] [b] = [ab] pour a,b $\in O_\nu{}^*$; si $\nu|3$ il faut supposer a,b $\equiv \pm 1$ (3). Le produit restreint des $\widetilde{F_\nu{}^*}$, rel. aux $[O_\nu{}^*]$, est une extension de $(A^f)^*$ par $\mu^{(\Sigma)}$ ($\sum$ l'ensemble des places finies). Poussant par l'application "produit" : $\mu^{(\Sigma)} \to \mu$, on trouve l'extension $\widetilde{(A^f)^*}$.

Pour ε un caractère de μ, une fonction f sur $\widetilde{F_\nu{}^*}$ (resp. $\widetilde{(A^f)^*}$) sera appelée une ε-fonction si $f(\zeta x) = \varepsilon(\zeta)$ f(x) pour $\zeta \in \mu$. Une ε-fonction est uniquement déterminée par sa restriction à $[F_\nu{}^*]$ (resp. $[(A^f)^*]$), et on l'identifiera souvent à sa restriction : on décrira son support comme une partie de $F_\nu{}^*$ (resp. $(A^f)^*$)...

Soit, pour chaque ν, une ε-fonction f_ν sur $\widetilde{F_\nu{}^*}$, invariante à droite par un sous-groupe ouvert de $\widetilde{F_\nu{}^*}$. On suppose que, pour presque tout ν, f_ν est invariante à droite par $[O_\nu{}^*]$, et vaut 1 sur $[O_\nu{}^*]$. Sous ces hypothèses, le produit des f_ν — une fonction sur le produit restreint des $\widetilde{F_\nu{}^*}$ — provient d'une ε-fonction f sur $\widetilde{(A^f)^*}$, invariante à droite par un sous-groupe ouvert. On appellera multiplicative une ε-fonction ainsi obtenue, et on écrira f = $\prod f_\nu$.

(0.9) Exemple : Prenons pour ε le prolongement identique de μ. Pour $\nu \nmid 3$, soit f_ν la ε-fonction sur $\widetilde{F_\nu{}^*}$, de support $\{x|\nu(x) = 0 \text{ ou } 1\}$, valant 1 sur $[O_\nu{}^*]$, et donnée sur les uniformisantes par

$$f_\nu([a]) = \sum_{\substack{x \in (O_\nu/(a))^*}} (\mathrm{x,a})\, e(a^{-1}x)$$

Pour a une uniformisante, et u $\in O_\nu{}^*$, on a $f_\nu([au]) = (\mathrm{u,a}) f_\nu([a])$: la fonction f_ν est invariante à droite sous $[O_\nu{}^*]$. Pour $\nu|3$, on prend $f_\nu([a]) = 1$ si a $\equiv 1$ (3) et $f_\nu([a]) = 0$ sinon. Soit f = $\prod f_\nu$. La série de Dirichlet (0.7) est

$$\sum_{\lambda \in F^*} f([\lambda])\, N\lambda^{-s}.$$

Les propriétés analytiques de la série de Dirichlet (0.7) sont déduites de liens avec certaines fonctions "automorphes" sur $\mathrm{GL}(2, C)$. Identifions l'espace homogène $\mathrm{PGL}(2, C)$ / U(2) au demi-espace supérieur H = $\{(z,v) \mid z \in C, v \in R, v > 0\}$ par la décomposition d'Iwasawa :

$$(\mathrm{z,v}) \mapsto \begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} v & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = (\mathrm{v\ z}).$$

Dans ce modèle, le groupe unipotent supérieur agit par les (z,v) $\to$ (z+t,v), et

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}(\mathrm{z,v}) = (\mathrm{az}, |a|v) \text{ pour a} \in C^*.$$

Soit $\Gamma(3)$ le sous-groupe de $\mathrm{GL}(2, O)$ formé des matrices $\equiv 1$ (mod 3). Kubota a découvert que l'on obtenait un caractère de ce groupe en posant, pour

γ = (a b),
(c d)

$\chi(\gamma) = (c/a)_3$ si c $\neq$ 0, et $\chi(\gamma) = 1$ sinon.

Si on pose $\Gamma_2 = \Gamma(3)$. $GL(2, Z)$, Patterson vérifie que χ se prolonge en un caractère de Γ_2 trivial sur $GL(2, Z)$, qu'on notera encore χ. Le noyau de χ n'est visiblement pas un sous-groupe de congruence. Toutefois

(0.10) Quel que soit $\delta \in GL(2, F)$, les caractères $\chi(\gamma)$ et $\chi(\delta^{-1}\ \gamma\ \delta)$ coïncident sur un sous-groupe de congruence de $\Gamma_2 \cap \delta\Gamma_2\ \delta^{-1}$.

Notons encore ε le plongement identique de μ et introduisons la $\varepsilon^2 fonction$ multiplicative $\tau = \prod\ \tau_\nu$ caractérisée par les propriétés suivantes (cf [18] I, Th 8.1 p. 152). (a) Pour $\nu \nmid 3$, τ_ν est à support dans O_ν et invariante à droite par $[O_\nu{}^*]$. (b) Pour $\nu|3$, τ_ν est à support dans $\{x|v(x) \geq$ -3$\}$ et invariante à droite par $[\{x|x \equiv \pm 1\ (3)\}]$. (c) Pour d dans O_ν, et x respectivement au-dessus de O_ν, pour $\nu \nmid 3$, et de $\{x|v(x) \geq$ -3$\}$, pour $\nu|3$, on a $\tau_\nu(x[d^3]) = \tau(x)\ \|d\|_\nu$. (d) Si $\nu \nmid 3$, τ_ν vaut 1 sur $[O_\nu{}^*]$, $\|a\|_\nu\ f_\nu(a)^-$ sur les uniformisantes (f_ν comme en 0.10), et 0 sur les éléments de valuation 2. (e) Si $\nu|3$, et que x = $\pm\ \omega^j\ \lambda^k$, avec $\omega = \exp(2\pi i/3)$ et $\lambda = \sqrt{-3}$, on a

$\tau_\nu(x) = 1$ si x = $\pm\ \lambda^{-3}$;
$\tau_\nu(x) = 1/3 \exp(-j\ 2\pi i/9)$ si x = $\pm\ \omega^j\ \lambda^{-1}$, j = -1, 0 ou 1;
$\tau_\nu(x) = 0$ si (j,k) n'est pas congru mod 3 à
(0,0) (0,2) (1,2) ou (2,2).

Posons par ailleurs, pour w = (z,v) $\in$ H

$$K(w) = v\ K_{1/3}(4\pi v)\ e(z),$$

où $K_{1/3}$ est la "fonction de Bessel de seconde espèce usuelle" ([18] I p. 129,134)

Un des résultats principaux de [18] est que la série

$$(0.11)\ \theta(w) = \sigma v^{2/3} + \sum_{\mu \in F^*/(0\ 1)}\ \tau([\mu])\ K(\ (\mu\ 0)\ w)$$

$$\sigma = 2^{-1}3^{-3/2}$$

vérifie $\theta(\gamma w) = \chi(\gamma)\theta(w)$ pour $\gamma \in \Gamma_2$ (et en particulier $\theta(0, v) = \theta(0, v^{-1})$), et est le résidu (en s) d'une série d'Eisenstein E_s -définie par prolongement analytique en un paramètre s - en une valeur de s où apparaît un pôle simple. A un facteur près, la série d'Eisenstein s'obtient en partant de la fonction $\varphi_s(w) = v^s$, et en prenant la somme des $\overline{\chi(\gamma)}\ \varphi_s(\gamma w)$ pour $\gamma \in \Gamma_2/\Gamma_2 \cap B^+$ (notation : voir 0.0.1). Le pôle est en s = 4/3.

A des facteurs élémentaires, Γ et ζ près, la série de Dirichlet (0.7) se déduit de $\theta(w)$ par transformation de Mellin. Ceci fournit son comportement analytique, et une équation fonctionnelle.

Patterson appelle θ une "série θ-cubique" par analogie avec le cas classique des formes modulaires holomorphes de poids 1/2, où la série $\theta(z) = \sum q^{n^2}$ (q = $e^{2\pi iz}$) admet une description analogue comme résidu de séries d'Eisenstein.

Une partie de ces résultats peut être prédite par la théorie des représentations de revêtements de groupes GL(2, F_v). Voici la méthode. Posons comme plus haut $\varphi_s(w) = v^s$, et, pour Γ un sous-groupe de congruence, considérons la série d'Eisenstein.

$$E_{s,\Gamma}(w) = \sum_{\gamma \in \Gamma/\Gamma \cap B^+} \varphi_s(\gamma w).$$

Elle converge pour Rs grand, et admet un prolongement analytique comme fonction méromorphe de s. L'étude des "termes constants" montre que pour Rs $\geq 4/3$, elle est méromorphe en s, sauf au pis un pôle simple en s = 4/3. Notons E_Γ le résidu en s = 4/3, et $\mathcal{E}$ l'espace des combinaisons linéaires des fonctions $E(\gamma w)$ pour Γ de congruence et $\gamma \in$ GL(2, F).

Le groupe GL(2, F) agit sur $\mathcal{E}$, par $(\gamma * f)(w) = f(\gamma^{-1}w)$, et pour tout f dans $\mathcal{E}$, il existe un sous-groupe de congruence $\Gamma \subset \Gamma(3)$ tel que $\gamma * f = \chi(\gamma) f$ pour $\gamma \in \Gamma$. Ceci résulte de (0.10). En particulier, $\gamma * f =$ f pour $\gamma \in \Gamma \cap \mathrm{Ker}(\chi)$, ce qui permet de prolonger par continuité l'action de GL(2, F) sur $\mathcal{E}$ en une action du complété GL(2, F)$^\wedge$ de GL(2, F) pour la topologie des sous-groupes $\Gamma \cap$ Ker(χ) ($\Gamma \subset \Gamma(3)$ de congruence). L'étude des "termes constants" jointe à une étude "locale" permet de montrer que la représentation $\mathcal{E}$ est irréductible, et de déterminer sa classe d'isomorphie.

Pour f $\in \mathcal{E}$, vérifiant f(z,v) = f(z + λ, v) pour λ dans un réseau L $\subset$ O, définissons la fonction $W^*(f)$ sur H par

$W^*(f)(z, v) = 1/vol(C/L) \int_{C/L}$ f(z + z_1, v) $e(-z_1)\, dz_1$

Cette fonction est indépendante du choix de L. De ce que φ_s, et donc les $E_{s,\Gamma}$ sont des fonctions propres du laplacien, on déduit que $W^*(f)$ est le produit de K(w) par une constante W(f). Par ailleurs, la formule d'inversion de Fourier sur C/L, et une étude des termes constants, fournissent un développement

$$\mathrm{f} = \sigma(f)\, v^{2/3} + \sum_{\mu \in F^*/(0\ 1)(0\ 1)} \mathrm{W}(\ (\mu\ 0) * \mathrm{f}\ )\, \mathrm{K}(\ (\mu\ 0)\ \mathrm{w})$$

Pour une constante $\sigma(f)$ convenable.

La fonctionnelle W est une forme linéaire sur $\mathcal{E}$. Elle vérifie

$$\mathrm{W}(\ (1\ \nu) * \mathrm{f}\ ) = e(\nu)\ \mathrm{W(f)}.$$
$$(0\ 1)$$

pour $\nu \in$ F. Ceci, pour l'essentiel (= à un ennui près dû à la place divisant 3), la détermine à un facteur près - d'où une détermination des termes non constants des développements de Fourier des f dans $\mathscr{C}$.

Ces méthodes fournissent le résultat suivant. Soit T l'ensemble des combinaisons linéaires des ε^2-fonctions multiplicatives $\tau' = \prod \tau'_\nu$ sur $(\widehat{A^f})^*$, où a) pour presque tout ν, on a $\tau'_\nu = \tau_\nu$;

b) pour tout ν, τ'_ν est à support compact, ou un translaté à droite de τ_ν. Pour chaque $\tau' \in$ T, il existe alors une unique constante $\sigma(\tau')$, telle que la fonction

$$\theta(\tau'; w) = \sigma(\tau')\, v^{2/3} + \sum_{\mu \in F^*} \tau'([\mu])\, \mathrm{K}(\,(\mu\ 0)\ \mathrm{w})\ (0\ 1)$$

vérifie $\theta(\tau'; \gamma w) = \chi(\gamma)\, \theta(\tau'; w)$, pour γ dans un sous-groupe de congruence convenable. L'espace $\mathscr{C}$ est l'ensemble des $\theta(\tau'; w)$.

Le groupe $\mathrm{GL}(2, F)^\wedge$ n'est pas un produit restreint de groupes locaux. On peut toutefois le comparer à un tel produit, et ramener la démonstration des résultats qui précèdent à l'étude de groupes locaux, et de la "série principale" de leurs représentations. C'est à cette étude qu'est consacré l'essentiel de l'exposé.

La méthode suivie par Patterson [18] est différente. Il commence par prouver des équations fonctionnelles pour des séries de Dirichlet telles que (0.7), et en déduit le caractère automorphe de θ par une variante ([18] 7.1) de la méthode de Weil [23]. Il déduit les équations fonctionnelles requises de l'équation fonctionnelle (pour s $\to$ 2 - s) des séries d'Eisenstein ([11],[12]), en voyant ce qu'elle implique sur les coefficients de Fourier : chacun d'eux, comme fonction de s, est une série de Dirichlet réminiscente de (0.7). Il espère que cette méthode lui fournira encore les propriétés analytiques requises de séries de Dirichlet analogues à (0.7), pour généraliser [5] à des cas où n > 3. La méthode exposée ici, par contre, dépend de façon cruciale de ce que n est impair et que $(n-1)/2 = 1$.

Dans le texte, nous nous appesantirons sur la théorie locale, et ne ferons qu'esquisser comment elle s'applique aux résidus de séries d'Eisenstein. Nous ne parlerons ni du double rôle, indiqué ci-dessus, de la série (0.7), pour moi un des grands mystères de la théorie, ni de la détermination du terme constant, ni de la méthode ingénieuse par laquelle Patterson [18] identifie θ, prouvé automorphe, au résidu de la série d'Eisenstein.

0.0 **Notations :**

0.0.1 Nous désignerons comme suit des sous-groupes de GL(2) :
Z : le centre (matrices scalaires).
T : matrices diagonales. On pose diag (a,b) = (a 0).
(0 b)
B,U : sous-groupe de Borel ; son radical unipotent. En particulier :

B^+ : (* *) ; B^- : (* 0) ; U^+ : (1 *) ; U^- : (1 0).
(0 *) (* *) (0 1) (* 1)

0.0.2 A partir du section 2 on désigne par F soit un corps local (= localement compact non discret), soit un corps global (= extension finie de Q ou d'un corps $F_p(t)$). On suppose choisi un entier n, non divisible par la caractéristique de F, et tel que F contienne une racine primitive n ième de l'unité. On note $\mu_n(F)$, ou simplement μ, le groupe des racines n ièmes de l'unité de F.

Pour F global, et ν une place de F, l'inclusion de F dans son complété F_ν induit un isomorphisme de $\mu_n(F)$ avec $\mu_n(F_\nu)$, à l'aide duquel nous identifierons ces deux groupes.

0.0.3 Pour F un corps global, on note A l'anneau de ses adèles, F_∞ le produit des F_ν pour ν place réelle ou complexe, et A^f l'anneau des adèles finis :

$$\mathrm{A} = F_\infty \times A^f .$$

Si F est un corps de nombres on note O l'anneau de ses de ses entiers. Si F est un corps local non archimédien, on note O l'anneau de sa valuation. Variante : notations F_ν, O_ν.

0.0.4 Pour F un corps local (resp. global), nous aurons, à partir du section 3, à considérer une extension centrale de G(F) (resp. G(A)) par μ. On note par un ~ l'image inverse d'un sous-groupe dans cette extension. Par exemple : $T(F)^\sim$, $T(A)^\sim$, $G(A^f)^\sim$, ...

0.0.5 A partir du section 4, on fixe un caractère fidèle $\varepsilon : \mu \hookrightarrow C^*$. Une représentation d'une extension centrale d'un groupe par μ sera appelée une ε-représentation si chaque $\zeta \in \mu$ agit par multiplication par $\varepsilon(\zeta)$. Une fonction sur l'extension sera appelée une ε-fonction si $f(\zeta x) = \varepsilon(\zeta)$ f(x) pour $\zeta \in \mu$.

0.0.6 Une représentation π d'un groupe localement compact totalement discontinu est dite algébrique si le fixateur d'un vecteur est toujours un sous-groupe ouvert, et admissible si de plus le sous-espace fixé par un sous-groupe ouvert est de dimension finie. Pour l'extension de la terminologie à d'autres groupes, tels $\mathrm{GL}(2, A)^\sim$, je renvoie à [6].

0.0.7 A partir du section 5, il nous sera parfois utile de noter additivement la multiplication des caractères, et de noter s le caractère $\|x\|^s$; par exemple, d'écrire $(\alpha_2 - \alpha_1 - 1)(\lambda)$ pour $\alpha_2(\lambda)\ \alpha_1(\lambda)^{-1}\ \|\lambda\|^{-1}$. On appelle partie réelle d'un caractère σ le nombre réel s tel que $\sigma(x)\ \|x\|^{-s}$ soit unitaire.

1. Extensions centrales de SL(2)

Soit F un corps. Rappelons la

Définition 1.1 : (i) Un symbole est une application s de $F^* \times F^*$ dans un groupe abélien (noté multiplicativement), qui est bimultiplicative, et vérifie s(a,b) = 1 pour a + b = 1.

(ii) On note $K_2(F)$ le quotient de $F^* \otimes F^*$ par le sous-groupe engendré par les a ⊗ b, pour a,b ∈ F^* et a + b = 1, et {x,y} l'image dans $K_2(F)$ de x ⊗ y ; c'est le symbole universel.

Exemple 1.2 Soit n un entier ≥ 1, premier à l'exposant caractéristique de F, et tel que F contienne les racines n ièmes de l'unité. Soit F une clôture séparable de F. La suite exacte longue de $\mathrm{Gal}(\overline{F}/F)$-cohomologie déduite de la suite exacte de Kummer $1 \to \mu_n \to \overline{F}^* \to \overline{F}^* \to 1$ fournit des isomorphismes $F^*/F^{*n} \simeq H^1(\mu_n)$ et $H^2(\mu_n) \simeq \mathrm{Br}(F)_n$, et le cup-produit

$$H^1(\mu_n) \otimes H^1(\mu_n) \to H^2(\mu_n \otimes \mu_n) = H^2(\mu_n) \otimes \mu_n$$

fournit une application bimultiplicative de $F^* \times F^*$ dans $\mathrm{Br}(F)_n \otimes \mu_n$. C'est un symbole ([21] XIV 2).

1.3 Soit G un groupe algébrique sur F, isomorphe à SL(2). On dispose alors d'une extension centrale canonique $G(F)^\wedge$ de G(F) par $K_2(F)$. Pour tout symbole s : $F^* \times F^* \to$ A, on en déduit une extension centrale $G(F)^s$ de G(F) par A.

Je n'ai pas pris d'emblée G = SL(2) pour pouvoir dire que le groupe adjoint $\mathrm{PGL}(2,F)$ agit sur $\mathrm{SL}(2,F)^s$ par transport de structures. Cette action relève l'action par automorphismes "intérieurs" de $\mathrm{PGL}(2,F)$ sur $\mathrm{SL}(2,F)$ (plutôt que "intérieur", il faudrait dire : induit par un automorphisme intérieur de $\mathrm{GL}(2,F)$). Elle est triviale sur A.

Remarque 1.4 (Inutile pour la suite). Excluons les cas où F est un corps à 2 ou 3 éléments. Le groupe $\mathrm{SL}(2,F)$ est alors parfait, et d'après Moore [17] et Matsumoto [14], l'extension centrale universelle de $\mathrm{SL}(2,F)$ est une extension centrale par l'analogue symplectique ${}_{-1}L_2(F)$ de $K_2(F)$. Le groupe $\mathrm{PGL}(2,F)$ agit sur ${}_{-1}L_2(F)$ (via son quotient par $\mathrm{PSL}(2,F)$), et $K_2(F)$ est le groupe des coinvariants (le plus grand quotient héritant d'une action triviale). D'après Karoubi [24] III p. 78, si F n'est pas de caractéristique 2, le groupe ${}_{-1}L_2' := \mathrm{Ker}({}_{-1}L_2(F) \to K_2(F))$ est coincé dans une suite exacte

$F^* \dashrightarrow -1, x \dashrightarrow >$ (2-torsion de $K_2(F)$) $\to {}_{-1}L_2' \to$ W $\dashrightarrow r \dashrightarrow > K_2(F)/2K_2(F) \to 0$,

où W est le groupe des formes quadratiques virtuelles de dimension 0 et discriminant 1. J'imagine que r coïncide avec la classe de Stiefel-Whitney définie par Milnor [15] ; d'après Milnor, $\mathrm{Ker}(r)$ serait alors le cube de l'idéal d'augmentation (dim = 0) dans l'anneau des formes quadratiques virtuelles.

1.5 Le groupe $GL(2,F)$ est le produit semi-direct du sous-groupe des matrices diagonales $\mathrm{diag}(a,1)$ par le sous-groupe distingué $SL(2,F)$. Prenons de même le produit semi-direct de F^* par $SL(2,F)^s$, l'action de a $\in F^*$ étant celle de la matrice diagonale $\mathrm{diag}(a,1)$ de $PGL(2,F)$. C'est une extension centrale $GL(2,F)^s$ de $GL(2,F)$ par A. Pour s le symbole universel, on la notera $GL(2,F)^\wedge$.

Après les préliminaires 1.6, nous donnerons en 1.7-1.9, quelques propriétés de ces extensions centrales. Elles suffisent à les caractériser.

1.6 Préliminaires : (a) Si $H^\sim$ est une extension centrale d'un groupe H, et que a,b $\in$ H, le commutateur (ã,b̃) de relèvements ã et b̃ de a et b ne dépend que de a et b. On le note simplement (a,b). De même, l'automorphisme intérieur $int_{\tilde a}$ de $H^\sim$ ne dépend que de a. On le note simplement int_a.

(b) Si U est un sous-groupe de H, normalisé par B $\subset$ H, et engendré par les commutateurs (b,u) (b $\in$ B, u $\in$ U), il existe au plus un relèvement u $\to$ ũ de U dans $H^\sim$, normalisé par B. Si l'homomorphisme u $\to$ ũ commute à int_b (b $\in$ B), le relèvement d'un commutateur (b,u) est en effet nécessairement comme en (a) ci-dessus :

$$(b,u)^\sim = int_b(u)^\sim\ \tilde u^{-1} = int_b(\tilde u)\cdot\tilde u^{-1} = (\tilde b,\tilde u).$$

1.7 Excluant les cas où F est un corps à 2 ou 3 éléments, 1.6 (b) s'applique à un sous-groupe de Borel B de $SL(2,F)$, et à son radical unipotent U, i.e. au stabilisateur B d'une droite (homogène) D $\subset F^2$, et à son fixateur U. On montre aisément que, pour toute extension centrale de $SL(2,F)$, U admet un relèvement normalisé par B (unique par 1.3). On le note u $\to$ ũ. On a ẽ = e, et, si u $\neq$ e fixe une droite, celle-ci est uniquement déterminée. L'application u $\to$ ũ est donc bien définie sur la réunion des conjugués de U (éléments unipotents). Elle est invariante par conjugaison. Dans le cas de l'extension 1.3, elle commute à l'action de $PGL(2,F)$.

1.8 Le groupe $GL(2,F)^s$ a été défini comme un produit semi-direct $F^*\times SL(2,F)^s$. Nous noterons d_1 l'inclusion correspondante de F^*, et d_2 son conjugué par

$$\mathrm{w} = \begin{pmatrix} 0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}\ \text{(cf. 1.9)}.$$

Pour a,b $\in F^*$, $d_1(a)$ et $d_2(b)$ sont respectivement des relèvements de $\mathrm{diag}(a,1)$ et $\mathrm{diag}(1,b)\in GL(2,F)$. Ces matrices commutent. Le commutateur de $d_1(a)$ et $d_2(b)$ est donc dans A. On a

$$(d_1(a),d_2(b)) = \mathrm{s(a,b)},$$

et cette formule détermine uniquement l'extension considérée de $SL(2,F)$.

Voici un formulaire plus complet.

1.9 **Formulaire : On pose**

$$e^+(a) := \text{relèvement 1.7 de } \begin{pmatrix} 1 & a\\ 0 & 1\end{pmatrix}\qquad e^-(a) := \text{relèvement 1.7 de } \begin{pmatrix} 1 & 0\\ a & 1\end{pmatrix}$$

$$w(a) := e^+(a)e^-(-1/a)e^+(a), \text{ relèvement de } \begin{pmatrix} 0 & a \\ a^{-1} & 0 \end{pmatrix}$$

$d_2(a) := w(1)\, d_1(a)\, w(1)^{-1}$

$h(a) := d_1(a)\, d_2(a^{-1})$

Quel que soit $a \in F^*$, les images dans $SL(2,F)$ de $e^+ = e^+(a)$, $e^- = e^-(-1/a)$ et $w = w(a)$ sont dans la trijection de Tits. On a dans $SL(2,F)^\wedge$ les identités

(1.9.1) $e^\pm = int_w(e^\mp)$

(1.9.2) $w = e^+ e^- e^+ = e^- e^+ e^-$

(exprimer que $int_w(w) = w$). Chacun des éléments w, e^+, e^- détermine les deux autres. On en déduit que $w(a) = d_1(a)\, w(1)\, d_1(a)^{-1}$, et

(1.9.3) $w(a)\, w(1)^{-1} = d_1(a)\, d_2(a^{-1}) =: h(a)$.

En terme de h, on peut récrire la formule

(1.9.4) $(d_1(a), d_2(b)) = s(a,b)$

comme

(1.9.5) $h(ab) = s(a,b)\, h(a)\, h(b)$.

Exemple 1.10 Prenons F = R, $A = \pm 1$ et s(a,b) = 1 pour a ou b > 0, -1 sinon. L'extension $SL(2,R)^s$ est alors le revêtement double non trivial $SL(2,R)^\sim$ de $SL(2,R)$. Il admet la description suivante :

(a) Soit $(R^2 - 0)^\sim$ un revêtement double non trivial de $R^2 - \{0\}$. Puisque $\pi_1(R^2 - \{0\}) = Z$, il est unique à isomorphisme près.

(b) Le groupe $SL(2,R)^\sim$ est le groupe des éléments de $SL(2,R)$, munis d'un relèvement à $(R^2 - 0)^\sim$ de leur action sur R^2.

La même description vaut pour le revêtement $GL(2,R)^s$ de $GL(2,R)$.

1.11 Une description analogue vaut sur un corps quelconque, et,sans être indispensable est commode pour calculer. Elle requiert une partie de la théorie générale des faisceaux zariskiens $\underline{a}K_q$ sur un schéma S, associé aux préfaisceaux $U \to K_q(\Gamma(U,O))$. Spécifiquement : nous utiliserons des cas particuliers de l'isomorphisme suivant, déduit de la résolution de Quillen de $\underline{a}K_q$ (conjecture de Gersten) : pour T lisse purement de codimension d dans un schéma S lisse sur F, on a

$$(1.11.1)\ \underline{H}^i_T(S, \underline{a}K_q) = \begin{cases} \underline{a}K_{q-d} \text{ pour } i = d \\ 0 \text{ pour } i \neq d \text{ (et si } d > q). \end{cases}$$

Cas particulier : (a) pour A^2 = Spec F[X,Y] le plan affine,

(1.11.2) $H^0(A^2 - \{0\}, \underline{a}K_2) = K_2(F)$

(1.11.3) $H^1(A^2 - \{0\}, \underline{a}K_2) = \mathrm{Z}\ (= K_0(F))$.

(b) pour T de codimension 1 dans S, le cas i = 1 de (1.11.1) fournit un morphisme résidu Res : $H^0(S - T, \underline{a}K_2) \to H^0(T, \underline{a}K_1) = H^0(T, O_T^*)$. Supposons T connexe, et notons v la valuation correspondante ; on a

$$\mathrm{Res}\{f,g\} = (-1)^{v(f)v(g)} f^{v(g)}\ g^{-v(f)} \text{ restreint à T.}$$

Le morphisme résidu s'annulle sur l'image de $H^0(S, \underline{a}K_2)$. Pour P sur S un torseur sous $\underline{a}K_2$ et e une section de P sur S - T, ceci permet encore de définir Res e $\in H^0(T, O_T^*)$, nul si et seulement si e se prolonge à travers T.

Ceci dit, soit P sur $A^2 - \{0\}$ un torseur sous $\underline{a}K_2$. l'isomorphisme (1.11.3) étant canonique, il est isomorphe à son transformé par un quelconque élément de $\mathrm{GL}(2, F)$ et, d'après (1.11.2), le groupe des éléments de $\mathrm{GL}(2, F)$, munis d'un relèvement au torseur P de leur action sur $A^2 - \{0\}$, est une extension centrale de $\mathrm{GL}(2, F)$ par $K_2(F)$. Nous allons vérifier que, pour P de classe un générateur de $H^1(A^2 - 0, \underline{a}K_2) = \mathrm{Z}$, c'est l'extension $\mathrm{GL}(2, F)^\wedge$.

1.12 Relativement au recouvrement de $A^2 - \{0\}$ par les ouverts Y $\neq$ 0 et X $\neq$ 0, le générateur du H^1 est représenté par le cocycle de Čech {X,Y}. On prend pour P le torseur muni d'une section e_X sur X $\neq$ 0 et d'une section e_Y sur Y $\neq$ 0, avec

$$e_X - e_Y = \{X,Y\}.$$

On notera que $e_Y - e_X = \{Y,X\}$, de sorte que cette description de P est symétrique en les coordonnées X et Y. On a

$$\mathrm{Res}\ e_X = \mathrm{Res}\{X,Y\} = Y^{-1} \text{ (sur X = 0)}$$

et symétriquement. Pour identifier l'extension centrale de $\mathrm{GL}(2, F)$ définie par P à l'extension $\mathrm{GL}(2, F)^\wedge$, on pose

$$d_1(a) = \text{le relèvement à P de diag}(a, 1) \text{ qui soit l'identité}$$

au point fixe (0,1), d'où puisque w transforme le point (0,1) en (1,0),

$$d_2(a) = \text{de même pour diag}(1, a) \text{ et (1,0).}$$

Pour vérifier (1.9.4), on note que $d_1(a)$ transforme e_Y en $e_Y + \{a,Y\}$ (de résidu le transformé aX^{-1} du résidu X^{-1} de e_Y), tandis que $d_2(a)$ transforme e_Y en lui-même.

1.13 Soit $A^{2\vee}$ le schéma affine Spec F[a,b], correspond au dual de la représentation naturelle de $\mathrm{GL}(2, F)$. A $\ell \in A^{2\vee} - \{0\}$, associons le groupe des trivialisations de P sur $\ell = 1$. C'est un espace principal homogène sous $K_2(F)$ et, faisceautisant cette construction, on obtient un torseur $P^\vee$ sous $\underline{a}K_2$ sur $A^{2\vee} - \{0\}$. Par construction, P et $P^\vee$ deviennent isomorphe sur le lieu $\ell(x) = 1$

de $A^{2\vee} \times A^2$, et $\mathrm{GL}(2, F)$ agit sur P et $P^\vee$ en respectant cet isomorphisme.
Voici un formulaire plus complet

1.14 **Formulaire :**

P : torseur sur A^2 - {0}, où A^2 est le plan de coordonnées X, Y. $P^\vee$: torseur sur $A^{2\vee}$ - {0}, où $A^{2\vee}$ est le plan dual, de coordonnées a,b. e_X, e_Y : sections de P sur X $\neq$ 0, Y $\neq$ 0. e_a, e_b : sections de $P^\vee$ sur a $\neq$ 0, b $\neq$ 0.

Les formules de définition sont (a) e_X - e_Y = {X,Y}, (b) P et $P^\vee$ deviennent isomorphe sur le lieu aX + bY = 1 de $A^2 \times A^{2\vee}$. Via cet isomorphisme, e_a en (a,b) coïncide avec e_X en $(1/a, 0)$, et e_b en (a,b) coïncide avec e_Y en $(0, 1/b)$.

On vérifie que le formulaire obtenu est symétrique en P et $P^\vee$, et en les coordonnées : il est respecté par les substitutions (X,Y;a,b) $\mapsto$ (a,b;X,Y) et (Y,X;b,a). On a

(1.14.1) e_X - e_Y = {X,Y} et e_a - e_b = {a,b} ;

(1.14.2) e_a - e_Y = -{a,Y} sur le lieu aX + bY = 1, et de même

$$e_b \text{ - } e_X = \text{-}\{b,X\}$$

(1.14.3) $d_1(x)_*$ et $e^-(y)_*$ fixent e_X et e_a,
et de même

$$d_2(x)_* \text{ et } e^+(y)_* \text{ fixent } e_Y \text{ et } e_b.$$

2. Rappels : le symbole de Hilbert

Les notations 0.0.2 sont en vigueur.

2.1 Soit F un corps local. Pour F non complexe, on a $\mathrm{Br}(F)_n = Z/nZ$, et le symbole 1.2 est le symbole de Hilbert

$$\{\ ,\ \} : F^* \times F^* \to\ \mu$$

Pour F complexe, on définit le symbole de Hilbert comme étant trivial. Pour n variable, ces symboles, notés $\{\ ,\ \}_n$, vérifient $a, b_n = a, b^m_{nm}$.

Rappel 2.2 : L'accouplement induit par le symbole de Hilbert :

$$\{\ ,\ \} : F^*/F^{*n} \times F^*/F^{*n} \to\ \mu$$

est non dégénéré : il identifie chaque facteur F^*/F^{*n} au dual de Pontrjagin $\mathrm{Hom}(F^*/F^{*n},\ \mu_n(F))$ de l'autre.

Dans la définition de $\{\ ,\ \}_n$, nous adoptons les signes de Serre [21], i.e. ceux pour lesquels (2.4.1) ci-dessous est vrai.

Exemple 2.3 : F = R, n = 2 : c'est le symbole 1.10.

Exemple 2.4 : Le cas modéré est celui où F est non archimédien, et où n est pre-mier à sa caractéristique résiduelle. Plaçons nous dans ce cas, et soient O l'anneau de la valuation v de F, $k = O/m$ le corps résiduel, q = |k| et r l'application de réduction mod m. On a n | q-1, r induit un isomorphisme $\mu_n(F) \simeq\ \mu_n(k)$, et

(2.4.1) $ra, b_n = r((-1)^{v(a)v(b)}\ a^{v(b)}\ b^{-v(a)})^{(q-1)/n}$.

2.5 Soit F un corps global. On note $\{\ ,\ \}_v\{\}$ le symbole de Hilbert pour le complété F_v de F en une place v. Il est à valeurs dans $\mu_n(F_v)$, identifié à μ (0.0.2). Pour x et y deux idèles de F, on a $x_v, y_{v\,v} = 1$ pour presque toute place v (cf 2.4). Ceci permet de définir {x,y} comme le produit des $x_v, y_{v\,v}$, produit étendu à toutes les places.

Rappel 2.6 : L'accouplement induit

$$\{\ ,\ \} : A^*/A^{*n} \times A^*/A^{*n} \to\ \mu$$

est non dégénéré. Il identifie le groupe localement compact A^*/A^{*n} à son propre dual de Pontrjagin $\mathrm{Hom}(A^*/A^{*n},\ \mu)$.

Résulte de 2.2 et de ce que dans le cas modéré 2.4, donc pour presque chaque v, l'image de ${O_v}^*$ dans ${F_v}^*/{F_v}^{*n}$ est totalement isotrope maximale pour $\{\ ,\ \}_v\{\}$.

La loi de réciprocité des symboles de Hilbert dit que si les idèles x et y sont principaux (x,y $\in\ F^*$), alors {x,y} = 1. Plus précisément :

Rappel 2.7 : (i) $F^{*n} = F^* \cap A^{*n}$. (ii) L'image F^*/F^{*n} de F^* dans A^*/A^{*n} est totalement isotrope maximale. C'est un sous-groupe discret à quotient compact, et $\{\ ,\ \}$ identifie le dual de Pontrjagin

du groupe discret F^*/F^{*n} au quotient $A^*/A^{*n} \cdot F^*$.

(ii) L'Image F^*/F^{*n} de F^* dans A^*/A^* est totalement isotrope maximale. C'est un sous-groupe discret à quotient compact, et $\{\ ,\ \}$ identifie le dual de Pontrjagin de groupe discret F^*/F^{*n} au quotient $A^*/A^{*n} \cdot F^*$.

Exemple 2.8 Prenons pour F le corps $Q(\sqrt{}-3)$ des racines cubiques de l'unité, et n = 3. Soit K le sous-groupe compact ouvert de $A^*/A^{*3} = A^{f*}/A^{f*3}$ image du produit des $O_\nu{}^* \subset F_\nu{}^*$, pour $\nu \nmid 3$, et de $\{x \in F_\nu{}^* \mid x \equiv 1(3)\}$ pour $\nu \mid 3$. Le groupe A^*/A^{*3} est le produit du groupe discret F^*/F^{*3} par le groupe compact K, chacun de ces deux sous-groupes est isotrope maximal, et $\{\ ,\ \}$ identifie l'un au dual de Pontrjagin de l'autre.

3. Le groupe métaplectique

3.1 Soit F un corps local. On note par un ~ les extensions centrales de $SL(2, F)$ et $GL(2, F)$ par μ déduites du symbole de Hilbert.

3.2 Dans le cas modéré (2.4), l'extension centrale $SL(2, F)^{\sim}$ de $SL(2, F)$ est triviale au-dessus des sous-groupes compacts maximaux. La trivialisation est d'ailleurs unique : si le corps résiduel n'a pas 2 ou 3 éléments, $SL(2, O)$ est parfait et, dans tous les cas, son plus grand quotient abélien est d'ordre premier à n. Au dessus des matrices (1 a) et (1 0) (a $\in$ O), elle coïncide avec la trivialisa- (0 1) (a 1) tion 1.7.

De même l'extension centrale $GL(2, F)^{\sim}$ de $GL(2, F)$ est trivialisée au-dessus de $GL(2, O)$, pour une unique trivialisation prolongeant $\mathrm{diag}(a, 1) \mapsto d_1(a)$ (a $\in O^*$).

3.3 Prenons maintenant F global. Pour presque chaque place ν, on est dans le cas modéré, et 3.2 permet de définir le produit restreint $SL(2, A)^{\sim}$ des $SL(2, F_\nu)^{\sim}$, rel. aux sous-groupes compacts relevant les $SL(2, O_\nu)$. C'est une extension de $SL(2, A)$ par la somme des $\mu_n(F_\nu)$. Poussant par l'application produit $\prod : \oplus\, \mu_n(F_\nu) \to \mu_n(F) =: \mu$, on obtient une extension centrale $SL(2, A)^{\sim}$ de $SL(2, A)$ par μ, et la loi de réciprocité des symboles de Hilbert assure que cette extension splitte au-dessus de $SL(2, F)$. Puisque $SL(2, F)$ est parfait, le scindage est unique. Sur le radical unipotent d'un sous-groupe de Borel, il est induit par le scindage déduit des scindages locaux (1.7)

$$
\begin{array}{ccccccccc}
 & & 1 & \to & \mu & \to & SL(2, F_\nu)^{\sim} & \to & SL(2, F_\nu) \to 1 \\
 & & & & \| & & \downarrow & & \downarrow \\
(3.3.1) & & 1 & \to & \mu & \to & SL(2, A)^{\sim} & \to & SL(2, A) \to 1 \\
 & & & & & \nwarrow & [\,] & \uparrow & \\
 & & & & & & SL(2, F) & &
\end{array}
$$

3.4 Prenons n = 3, F = $Q(\sqrt[3]{1}) \subset$ C et ε = Id. On a $SL(2, A)^{\sim} = SL(2, C) \times SL(2, A^f)^{\sim}$, d'où, avec les notations de l'introduction,

$$SL(2, A)^{\sim} / SU(2) \times \{1\} \simeq H \times SL(2, A^f)^{\sim} ;$$

puisque $SL(2, C)$ / SU(2) $\simeq$ $PGL(2, C)$ / U(2). Par restriction à H × {1}, ceci permet d'associer à chaque fonction f sur $SL(2, A)^{\sim}$, invariante à droite par SU(2), une fonction sur H.

Scholie 3.5 L'application de restriction ci-dessus met en correspondance biunivoque (a) l'espace des ε-fonctions sur $SL(2, A)^{\sim}$, invariantes à gauche par $[SL(2, F)]$ et à droite par SU(2) × (un sous-groupe ouvert convenable K de $SL(2, A^f)^{\sim}$),

(b) l'espace des fonctions sur H qui, pour γ dans un sous-groupe de congruence convenable Γ de $SL(2, O)$, vérifient

$$f(\gamma w) = \chi(\gamma)\ \mathrm{f(w)}.$$

Le point est que $\mathrm{SL}(2, A^f)^{\sim}$ s'identifie au complété de $\mathrm{SL}(2, F)$ pour la topologie des sous-groupes noyau de χ dans un sous-groupe de congruence de $\mathrm{SL}(2, O)$. Voir [14].

Le groupe $\mathrm{SL}(2, A^f)^{\sim}$ agit par translations à droite sur l'espace (a). Du point de vue classique (b), ceci correspond à, et précise, l'existence d'opérateurs de Hecke. Pour exprimer, et utiliser (0.11), il y a par ailleurs intérêt à passer à $\mathrm{GL}(2)$.

3.6 Pour F un corps global, à nouveau quelconque, on définit $\mathrm{GL}(2, A)^{\sim}$, au choix (a) en poussant par $\sum : \oplus\ \mu_n(F_v) \to\ \mu$ le produit restreint des $\mathrm{GL}(2, F_v)^{\sim}$; (b) comme produit semi-direct de A^* par $\mathrm{SL}(2, A)^{\sim}$.

On dispose encore d'un diagramme (3.3.1), avec SL remplacé par GL ; le scindage [ ] coïncide avec d_1 sur $\mathrm{diag}(a, 1)$.

3.7. On suppose à nouveau que F est un corps local. On déduit du symbole de Hilbert un morphisme de faisceaux zariskiens sur $A^2 - 0$, de $\underline{a}K_2$ dans le faisceau des fonctions localement constantes sur $F^2 - 0$, pour la topologie usuelle, à valeurs dans μ. Ceci permet de déduire de P (1.11) un torseur P_n sous μ, sur $F^2 - 0$ muni de sa topologie usuelle. Pour chaque droite homogène D, on dispose d'un ensemble de trivialisations privilégiées de P_n sur F^2-D : celles images d'une trivialisation de P sur A^2-D. Si d = 0 est une équation de D, deux quelconques diffèrent par une fonction $\zeta \cdot a, d(x)$, à valeurs dans μ.

La description 1.11 de $\mathrm{GL}(2, F)^{\wedge}$ fournit ici : le groupe $\mathrm{GL}(2, F)^{\sim}$ est le groupe des éléments de $\mathrm{GL}(2, F)$, munis d'un relèvement à P_n de leur action sur F^2, ce relèvement respectant le système des trivialisations privilégiées ci-dessus.

3.8 En particulier, $Z(F)^{\sim}$ agit sur P_n. L'action se notera comme la multiplication par un scalaire : $z \cdot p$. Pour a,b $\in\ F^{*n}$, on pose $diag^{\sim}(a, b) = d_1(a)d_2(b)$; $diag^{\sim}$ est un homomorphisme $F^{*n} \times F^{*n} \to\ T(F)^{\sim}$. Pour a $\in\ F^{*n}$ et p $\in\ P_n$, on pose $a \cdot p = diag^{\sim}(a, a)p$. Cette formule relève à P_n l'homothétie de rapport a de F^2.

3.9 On dispose comme en 1.13 d'un torseur $P_n^{\vee}$ sur le dual, et d'un isomorphisme entre P_n et $P_n^{\vee}$ sur le lieu $\ell(x) = 1$, le tout $\mathrm{GL}(2, F)^{\sim}$-équivariant. Le formulaire 1.14 reste valable.

Pour a $\in\ F^{*n}$, on notera $a \cdot p$ l'action de $\mathrm{diag}(a^{-1}, a^{-1})$ sur $P_n^{\vee}$; elle relève à $P_n^{\vee}$ l'homothétie v $\mapsto$ av de $F^{2\vee}$.

3.10 **Dans la suite de l'exposé, on notera simplement P et $P^{\vee}$ les torseurs P_n et $P_n^{\vee}$.**

3.11 Pour F global, et presque chaque place ν, on dispose d'une trivialisation de P_ν sur $(A^2 - 0)(O_\nu) = (O_\nu{}^* \times O_\nu) \cup (O_\nu \times O_\nu{}^*)$: pour ν modéré, e_X sur $O_\nu{}^* \times O_\nu$ et e_Y sur $O_\nu \times O_\nu{}^*$ coïncident sur $O_\nu{}^* \times O_\nu{}^*$. Ceci permet d'adéliser 3.7 et d'obtenir un torseur P sous μ sur $(A^2 - 0)(A)$. L'action de $\mathrm{GL}(2, A)$ sur A^2 se relève en une action de $\mathrm{GL}(2, A)^\sim$ sur ce torseur. Ce torseur est trivialisé sur $(A^2 - 0)(F) = F^2 - 0$, par e_X et e_Y, et $[\mathrm{GL}(2, F)]$ respecte cette trivialisation.

4. Le groupe des matrices diagonales.

4.1 Groupes de Heisenberg : Soit $H^{\sim}$ un groupe localement compact extension d'un groupe localement compact totalement discontinu commutatif H par son centre Z. On fixe un caractère ω de Z. On suppose que ω est unitaire sur les commutateurs, et que le bicaractère $\omega((x,y))$ de H identifie H à son propre dual de Pontrjagin. Ceci implique que Z / Ker(ω) soit le centre de $H^{\sim}$ / Ker(ω).

Pour tout sous-groupe fermé L de H, nous noterons $L^{\sim}$ son image inverse dans $H^{\sim}$. Nous dirons que L est totalement isotrope si $\omega((x,y))$ est trivial sur L, i.e. si $L^{\sim}$ / Ker(ω) est commutatif.

Nous nous intéressons aux représentations de $H^{\sim}$, de caractère central ω. Une telle représentation sera dite admissible si, pour K $\subset$ H un sous-groupe compact ouvert totalement isotrope, sa restriction à $K^{\sim}$ est somme de représentations de dimension 1, chacune apparaissant avec multiplicité finie.

Une fonction f sur $H^{\sim}$ sera dite ω-localement constante si pour tout x dans $H^{\sim}$, il existe K comme ci-dessus, et un caractère χ de $K^{\sim}$ prolongeant ω, tel que f(kx) = $\chi(k)$ f(x) pour k $\in K^{\sim}$.

Fixons enfin un sous-groupe totalement isotrope maximal L de H, et un caractère ω' de $L^{\sim}$ prolongeant ω. Il est connu que, sous les hypothèses précédentes :

(4.1.1) Le groupe $H^{\sim}$ admet une représentation admissible irréductible V de caractère central ω. Elle est unique à isomorphisme près.

(4.1.2) Il existe sur V une forme linéaire a $\neq$ 0 telle que $a(\ell v) = \omega'(\ell)a(v)$ pour $\ell \in L^{\sim}$. Elle est unique à un facteur près.

(4.1.3) L'application v $\mapsto$ la fonction a(gv) sur $H^{\sim}$ est un isomorphisme de V avec l'espace des fonctions ω-localement constantes sur $H^{\sim}$, vérifiant $f(\ell g) = \omega'(\ell)f(g)$ pour $\ell \in L^{\sim}$, et à support compact modulo $L^{\sim}$.

En particulier, si H est fini, V est de dimension l'indice d'un sous-groupe totalement isotrope maximal de H, i.e. la racine carrée de l'ordre de H.

(4.2) Soit F un corps local, et écrivons simplement $T^{\sim}$ pour $T(F)^{\sim}$. D'après 1.8.1 et 2.2, le centre de $T^{\sim}$ est le sous-groupe diag$(F^{*n} \times F^{*n})^{\sim}$. Le quotient de $T^{\sim}$ par son centre est fini et commutatif, et l'application commutateur est à valeurs dans μ. La théorie des groupes d'Heisenberg fournit la

Proposition 4.3 (i) La classe d'isomorphie d'une ε-représentation admissible irréductible du groupe $T^{\sim}$ est uniquement déterminée par son caractère central. (ii) Soient ω un ε-caractère du centre de $T^{\sim}$, T' un sous-groupe de T tel que $T'^{\sim}$ soit un groupe commutatif maximal de $T^{\sim}$ et ω' une extension de ω à $T'^{\sim}$

La représentation induite $Ind_{T'^{\sim}}^{T^{\sim}}(\omega')$ est irréductible, de caractère central ω.

4.4 Le centre de $T^{\sim}$ est $(F^{*n} \times F^{*n})^{\sim}$. Il est l'indice $[F^* : F^{*n}]^2$ dans $T^{\sim}$, et les ε-représentations admissibles irréductibles de $T^{\sim}$ sont donc de dimension $[F^* : F^{*n}]$. L'extension $(F^{*n} \times F^{*n})^{\sim}$ de $F^{*n} \times F^{*n}$ par μ est splittée par $diag^{\sim}$ (3.8). Ceci permet d'identifier ε-caractères ω du centre de $T^{\sim}$ et couples (α_1, α_2) de caractères de F^{*n}, par

(4.4.1) $\omega(diag^{\sim}(a,b)) = \alpha_1(a)\ \alpha_2(b)$.

Nous le ferons. D'après 4.3 les ε-représentations admissibles irréductibles de $T^{\sim}$ sont paramétrées par ces couples (α_1, α_2). Il est parfois plus commode de les paramétrer par les couples (χ_1, χ_2) de caractères de F^*, triviaux sur $\mu_n(F) \subset F^*$, en posant

(4.4.2) $\chi_i(x) = \alpha_i(x^n)$ (i = 1,2).

Pour réaliser les ε-représentations de $T^{\sim}$, deux choix de T' comme en 4.3(ii) sont commodes. Pour chacun d'eux, on dispose d'un splittage naturel de l'extension $T'^{\sim}$ de T' par μ, de sorte que la donnée d'un prolongement ω' de ω à $T'^{\sim}$ revient à celui d'un prolongement de (α_1, α_2) de $F^{*n} \times F^{*n}$ à T'.

a) Sous-groupe $F^* \times F^{*n}$; splittage (a,b) $\mapsto\ d_1(a)\ d_2(b)$. b) Dans le cas modéré : sous-groupe $O^*F^{*n} \times O^*F^{*n}$; splittage (a,b) $\mapsto\ d_1(a)\ d_2(b)$.

Dans le cas (b), avec χ_1 et χ_2 non ramifiés, on dispose d'une unique extension ω' de ω triviale sur $d_1(O^*)\ d_2(O^*)$.

4.5 Supposons maintenant F global. Le groupe $T(A)^{\sim}$ a pour centre l'image inverse de T(A) = diag$(A^{*n} \times A^{*n})$, et l'image inverse de T(F) $T(A)^n$ en est un sous-groupe commutatif maximal. D'après 4.1, on a

Théorème 4.6. Soient α_1 et α_2 deux caractères de A^{*n}/F^{*n}, et soit V_{α_1,α_2} l'espace des ε-fonctions sur $[T(F)]\backslash T(A)^{\sim}$, invariantes à droite par un sous-groupe ouvert de $T(A^f)^{\sim}$ et telles que

$$f(g \cdot diag^{\sim}(a_1, a_2)) = \text{f(g)}\ \alpha_1(a_1)\alpha_2(a_2) \text{ si } a_1, a_2 \in A^{*n}.$$

Alors V_{α_1,α_2} est une ε-représentation admissible irréductible de $T(A)^{\sim}$.

Ces représentations sont les représentations automorphes de T(A). Il est parfois plus commode de les indexer par les couples (χ_1, χ_2) de caractères de Hecke, triviaux sur les racines n ièmes de l'unité locales : on pose : $\chi_i(a) = \alpha_i(a^n)$.

5. La série principale

5.0. Soit F un corps local. On écrit G pour $\mathrm{GL}(2, F)$, et on simplifie les notations en omettant F : on écrira $T^{\sim}$ pour $T(F)^{\sim}$, ...

Pour F = C, on a $G^{\sim} = \mathrm{G} \times \mu$, et la théorie des représentations de $G^{\sim}$ se réduit à celle de G. Pour F = R, on a n = 1 ou 2. Nous ne nous attarderons pas à ces cas bien connus : dans la suite de ce section , sauf 5.12, on suppose F non archimédien.

5.1. De la théorie des représentations des groupes réductifs sur F, certains arguments se généralisent tels quels à des extensions centrales telles que $\mathrm{SL}(2, F)^{\sim}$ ou $\mathrm{GL}(2, F)^{\sim}$. D'autres non. Se généralisent ceux basés sur : la décomposition de Bruhat ; la structure du radical unipotent U d'un parabolique P (sous-groupes radiciels,...), la décomposition de Levi P = MU et l'aspect $contractant/dilatant$ de l'action de M sur U ; la relation entre le groupe et son algèbre de Lie. Par exemple : résultats généraux sur les modules de Jacquet, les représentations supercuspidales,.... Posent problèmes : la commutativité des tores, la structure d'algèbres de Hecke,....

5.2. Ecrivons simplement B et U pour B^+ et U^+. Le groupe $B^{\sim}$ est le produit semi-direct $T^{\sim} \cdot U$ de $T^{\sim}$ par le relèvement (1.7) de U. Si ρ est une représentation de $T^{\sim}$, on note encore ρ la représentation de $B^{\sim}$ triviale sur U qui s'en déduit : $\rho(tu) = \rho(t)$.

Le module de $B^{\sim}$ se déduit ainsi du quasi-caractère δ de $T^{\sim}$, donné par $\delta(t) = \|ab^{-1}\|$ pour t au-dessus de $\mathrm{diag}(a, b) \in$ T. Si $\rho : T^{\sim} \to \mathrm{GL}(V)$ est une représentation algébrique de $T^{\sim}$, la représentation induite $Ind_{B^{\sim}}^{G^{\sim}}(V, \rho)$, ou simplement Ind(V), est la représentation par translations à droite de $B^{\sim}\backslash G^{\sim}$ sur l'espace des fonctions localement constantes f : $G^{\sim} \to$ V telles que

(5.2.1) f(utg) = $\delta(t)^{1/2}\ \rho(t)$ f(g).

5.3. Interprétons cette définition en terme du dictionnaire entre :

(a) faisceaux localement constants d'espaces vectoriels complexes sur P^1, munis d'une action ("algébrique") de $G^{\sim}$;

(b) représentations algébriques (V, ρ) de $B^{\sim}$;

donné par l'équivalence de catégories $\mathcal{F} \mapsto$ fibre de $\mathcal{F}$ en le point (1,0) de P^1, de stabilisateur $B^{\sim}$.

Si, à une section f de $\mathcal{F}$ on associe la fonction f(g) = germe en (1,0) de $g^{-1}f$, on identifie $\Gamma(\mathcal{F})$ à l'espace des fonctions localement constantes f : $G^{\sim} \to$ V telles que f(bg) = $\rho(b)f(g)$. Pour V = C, et la représentation donnée par le caractère ut $\mapsto\ \delta(t)$, on trouve le faisceau des mesures localement constantes, i.e. localement de la forme $\|\omega\|$, pour ω une forme différentielle. Finale-

ment, l'espace des fonctions 2.2.1 s'interprète comme celui des densités localement constantes de poids $1/2$ à valeurs dans le faisceau équivariant défini par V.

5.4. Explicitons, pour le groupe $G^{\sim}$, ce que donne la théorie générale des modules de Jacquet. Pour un exposé très clair, je renvoie à [1] (on y parle de $\mathrm{GL}(n)$, mais les arguments sont généraux).

(A) Sur la catégorie des représentations algébriques de U, le foncteur des coinvariants : $W \mapsto W_U$ est exact.

Cette exactitude permet un calcul facile, à une extension près, de $Ind(V, \rho)_U$. Nous noterons proj la projection sur les coinvariants. Comme en 2.3, écrivons $Ind(V, \rho) = H^0(P^1, \mathscr{F})$, pour un faisceau équivariant convenable. La suite exacte

$$0 \to H^0_c(P^1 - (1,0), \mathscr{F}) \to H^0(P^1, \mathscr{F}) \to \mathscr{F}_{(1,0)} \to 0$$

est $B^{\sim}$-équivariante. On en déduit une suite exacte analogue par passage aux coinvariants. En quotient, $\mathscr{F}_{(1,0)} \simeq \mathscr{F}_{(1,0),U}$, identifié à V par proj $f \mapsto f(e)$. En sous-objet, $H^0_c(P^1 - (1,0), \mathscr{F})_U$ qui s'identifie encore à V, par intégration sur U (dont $P^1 - (1,0)$ est espace principal homogène). La fonctorialité sera explicitée plus bas.

(B) Le foncteur d'induction, des représentations algébriques de $T^{\sim}$ dans celle de $G^{\sim}$ admet pour adjoint à gauche le foncteur $r : W \mapsto$ quotient W_U des coinvariants, avec action de $T^{\sim}$ donnée par $t\,\mathrm{proj}(w) = \delta(t)^{-1/2}\,\mathrm{proj}(tw)$.

Une fois choisis $w \in N(T^{\sim}) - T^{\sim}$ et une mesure de Haar sur U, le calcul (A) donne une suite exacte de représentations de $T^{\sim}$,

(5.4.1) $0 \to (V, \rho \circ int_w) \to r\,Ind(V, \rho) \to (V, \rho) \to 0$

où la projection sur (V, ρ) est la flèche d'adjonction $\mathrm{proj}(f) \mapsto f(e)$ et où, pour $f(e) = 0$, l'image de $\mathrm{proj}(f)$ dans $(V, \rho \circ int_w)$ est donnée par

(5.4.2) $\mathrm{proj}(f) \mapsto \int f(wu)du$ (pour $f(e) = 0$).

L'hypothèse $f(e) = 0$ assure que la fonction intégrée est à support compact.

(C) Soit (V, ρ) une représentation admissible irréductible de $T^{\sim}$. Alors, quel que soit le sous-quotient non nul W de $Ind(V, \rho)$, on a $rW \neq 0$.

L'idée de la démonstration (cf. [2], 2.9) est que, si $rW = 0$, alors W est projective, donc aussi une sous-représentation de $Ind(V, \rho)$, ce qui contredit :

(D) Pour (V, ρ) comme ci-dessus, et W $\subset$ $Ind(V, \rho)$ une sous-représentation non nulle, rW s'envoie sur (V, ρ). Sinon, en effet, les f $\in$ W seraient des fonctions partout nulles !

5.5. Soit (V, ρ) une ε-représentation admissible irréductible de $T^{\sim}$, de caractère central (α_1, α_2) (4.3, 4.4).

Si $\alpha_1 \neq \alpha_2$, les représentations ρ et $\rho \circ int_w$ ont des caractères centraux distincts, et la suite 5.4.1 se scinde, de façon unique. Le scindage

(5.5.1) r $Ind(V, \rho) \to (V, \rho \circ int_w)$

est une régularisation de l'intégrale 5.4.2 pour f ne vérifiant pas nécessairement f(e) = 0. Elle est donnée, pour $\alpha_1(a) \neq \alpha_2(a)$, par

(5.5.2) f $\mapsto$ $(1 - \alpha_1(a)^{-1} \alpha_2(a))^{-1} \int f_a(wu)$ du, avec

$$f_a(g) = \text{f(g) - } \alpha_1(a)^{-1} \|a\|^{-1/2} f(gd_1(a)) \text{ (nul en g = e).}$$

Par adjonction, (5.5.1) fournit un morphisme

(5.5.3) I : $Ind(V, \rho) \to Ind(V, \rho \circ int_w)$,

donné par l'intégrale d'entrelacement f $\mapsto$ $\int f(wug)du$, régularisée par (5.5.2). On notera que 5.5.2 fournit une définition inconditionnelle (même pour $\alpha_1 = \alpha_2$) de "$(1 - \alpha_1(a)^{-1} \alpha_2(a))I$". On vérifie :

Lemme 5.6. Si $\alpha_1 = \alpha_2$, et pour a de valuation $\neq 0$, on a

(i) r $Ind(V, \rho)$ est une représentation indécomposable de $T^{\sim}$;

(ii) "$(1 - \alpha_1(a)^{-1} \alpha_2(a))I$" ci-dessus est un multiple non nul de l'identité.

5.7. Soient (V, ρ) et (α_1, α_2) comme en 5.5. D'après 5.4 (A) (C), le foncteur r injecte le lattis des sous-représentations de $Ind(V, \rho)$ dans celui des sous-représentations de r $Ind(V, \rho)$ et, d'après (D), si W est une sous-représentation propre, rW définit un scindage de la suite exacte 5.4.1. Dès lors

a) si $\alpha_1 = \alpha_2$, 5.6 assure l'irréductibilité de $Ind(V, \rho)$;

b) si $\alpha_1 \neq \alpha_2$, $Ind(V, \rho)$ admet au plus une sous-représentation propre, donc est indécomposable ;

c) si W est une sous-représentation propre de $Ind(V,\rho)$, rW est le noyau de 5.5.1 et W est dans le noyau de l'opérateur d'entrelacement I. Le $T^{\sim}$-morphisme rI annulle rW $\simeq (V,\rho)$, et a pour image un scindage de la suite (5.4.1) pour $(V, \rho\circ int_w)$. L'image de I est donc une sous-représentation propre de $Ind(V,\rho\circ int_w)$.

Si α est un caractère de F^*, on note $\alpha\circ det$ le caractère $G^{\sim}\to \mathrm{GL}(2,F)\to F^*$ de $G^{\sim}$. On a $Ind(V,\rho)\otimes(\alpha\circ det) = Ind(V,\rho\cdot\alpha\circ det)$ et le caractère central de $\rho\cdot\alpha\circ det$ est donné par $(\alpha_1\alpha,\alpha_2\alpha)$. Une telle translation ne modifie pas le caractère réductible ou irréductible de $Ind(V,\rho)$. Si $\sigma=\alpha_1\alpha_2^{-1}$ est unitaire, elle permet de transformer (V,ρ), donc $Ind(V,\rho)$ en une représentation unitaire. Au total

Proposition 5.8 (i) La représentation $Ind(V,\rho)$ est indécomposable. Si $\sigma=\alpha_1\alpha_2^{-1}$ est unitaire, elle est irréductible.

(ii) Si $\sigma\neq 1$, de deux choses l'une :

(a) $Ind(V,\rho)$ est irréductible, et I est un isomorphisme ;

(b) $Ind(V,\rho)$ et $Ind(V,\rho\circ int_w)$ sont réductibles, et I induit un isomorphisme de l'unique quotient non trivial de $Ind(V,\rho)$ avec l'unique sous-représentation non triviale de $Ind(V,\rho\circ int_w)$.

5.9. Le module de Jacquet d'une représentation contrôle le comportement asymptotique des coefficients. Il est facile d'en déduire que, lorsque $Ind(V,\rho)$ est réductible, une et une seule des deux représentations dont elle est extension a des coefficients de carré sommable (ie. est de la série discrète). Elle sera appelée spéciale. Les représentations $Ind(V,\rho)$ irréductibles, et les constituants non spéciaux des $Ind(V,\rho)$ réductibles, forment la série principale.

5.10. Pour Re $\sigma>1$ (notation 0.0.7), l'intégrale d'entrelacement converge. Des procédés bien connus permettent de considérer σ comme un paramètre ; on peut alors regarder 5.5.2 comme donnant le prolongement analytique de cette intégrale. Une façon élégante de procéder m'a été signalée par Bernstein. Elle consiste à considérer des représentations à coefficients non pas dans C, mais dans une algèbre telle que $C[T,T^{-1}]$. Elle a l'avantage sur le prolongement analytique habituel de montrer que l'intégrale d'entrelacement I dépend rationnellement de σ et non seulement de façon méromorphe. La formule de régularisation 5.5.2 montre que, si on pose $L(\sigma)=1$ pour $\sigma(x^n)$ ramifié, et $L(\sigma)=(1-\sigma(\pi^n))^{-1}$ pour σ non ramifié et π une uniformisante, l'opérateur $I/L(\sigma)$ dépend même polynomialement de σ.

Si on itère l'intégrale d'entrelacement, on trouve un endomorphisme de $Ind(V,\rho)$. Pour $Ind(V,\rho)$ irréductible, c'est la multiplication par un scalaire $\neq 0$.

Pour $Ind(V, \rho)$ réductible, c'est encore un scalaire (par prolongement analytique) ; c'est donc 0.

5.10. C. Moen a déterminé quand $Ind(V, \rho)$ est réductible. Je préfère exprimer son résultat en terme des caractères χ_i de F^*, définis par $\chi_i(x) = \alpha_i(x^n)$.

Théorème 5.11 (C. Moen). La représentation $Ind(V, \rho)$ est irréductible, sauf pour

$$\chi_1 \chi_2^{-1} = \|x\|^{\pm 1}.$$

Pour $\chi_1 \chi_2^{-1} = \|x\|$, c'est la sous-représentation de $Ind(V, \rho)$ qui est de la série discrète. Pour $\chi_1 \chi_2^{-1} = \|x\|^{-1}$, c'est la représentation quotient.

5.12. Ce théorème permet la détermination de la série complémentaire : si la représentation $Ind(V, \rho)$ est unitaire, elle est isomorphe à la duale de sa complexe conjuguée, et soit χ_1 et χ_2 sont unitaires (série principale proprement dite), soit $\chi_2 = \overline{\chi_1}^{-1}$. Une translation (5.7) ramène le cas où $\chi_2 = \overline{\chi_1}^{-1}$ à celui où $\chi_1 = \|x\|^s$ et $\chi_2 = \|x\|^{-s}$, avec s $\in$ R. La représentation induite correspondante π_s est réelle, de duale π_{-s}, et l'opérateur d'entrelacement $I/L(\sigma)$ fournit une forme bilinéaire invariante pour π_s. Pour s = 0, elle est définie > 0. Par prolongement analytique, elle le reste tant que $I/L(\sigma)$ est inversible, ie. pour $|s| < 1$. En s = 1, on trouve que les deux constituants de π_s sont unitaires (faire s = 1 pour l'un, s = -1 pour l'autre). Au-delà, π_s ne peut être unitaire, sans quoi elle le serait pour s $\to \infty$, ce qui est absurde : les coefficients ne sont pas bornés pour s grand.

5.13. Y. Flicker [3] a ramené la classification des ε-représentations de $G^\sim$ à celle des représentations de G : il établit une correspondance biunivoque, caractérisée en terme de caractères, entre l'ensemble des classes d'isomorphie de ε-représentations admissibles irréductibles de $G^\sim$, et l'ensemble des classes d'isomorphie de celles des représentations admissibles irréductibles π de G, telles que

a) si π est de la série principale, $\pi = \pi(\chi_1, \chi_2)$, χ_1 et χ_2 sont triviaux sur $\mu_n(F) \subset F^*$;

b) si π est de la série discrète, le caractère central ω_π de π est trivial sur $\mu_n(F) \subset F^*$.

Si $\pi^\sim$ correspond à π, le caractère central de $\pi^\sim$ (un caractère de F^{*n}) est $\omega_\pi(x^n)$. Si $\pi^\sim$ est de la série principale défini par la représentation de $T^\sim$ de caractère central (α_1, α_2), et que $\chi_i = \alpha_i(x^n)$, π est $\pi(\chi_1, \chi_2)$. En particulier, si $(\chi_1, \chi_2) = (\|x\|^{1/2}, \|x\|^{-1/2})$, au quotient irréductible de $Ind(V, \rho)$ correspond la représentation triviale de G.

5.14. Soit ψ un caractère non trivial de U, et reprenons le calcul 5.7 de $(Ind(V,\rho))_U$ pour calculer $(Ind(V,\rho)\otimes\overline{\psi})_U$. Avec les notations de 5.7, $\mathscr{F}_{(1,0)}$ ne contribue rien, car l'action de U y est triviale. Le terme $H_c^0(P^1-(1,0),\mathscr{F})$ fournit encore par intégration, une copie de V :

Proposition 5.15. Il existe une et une seule application linéaire

$$\varphi : Ind(V,\rho) \to \text{V}$$

donnée par $\varphi(f)=\int f(wu)\psi(u)du$ pour f(e) = 0, et telle que $\varphi(uf)=\psi(u)\varphi(f)$. Elle identifie V à $(Ind(V,\rho)\otimes\overline{\psi})_U$.

Si $\psi(u_1)\neq 1$, on a encore

(5.15.1) $\varphi(f)=(1-\psi(u_1))^{-1}\int(f(wu)-f(wuu_1))\overline{\psi}(u)du$.

On peut, comme en 5.10, regarder cette formule comme un prolongement analytique en σ de l'intégrale $\int f(wu)du$, convergente pour Re $\sigma > 1$.

5.16 Pour W une représentation de $G^{\sim}$, on dispose sur $(\text{W}\otimes\overline{\psi})_U$, si pas d'une d'une action $T^{\sim}$, du moins d'une action du centralisateur $Z^{\sim}$ de ψ dans $T^{\sim}$; on définit τ_ψ W comme étant la représentation de $Z^{\sim}$ sur $(\text{W}\otimes\overline{\psi})_U$ donnée par $z\cdot proj(f)=proj(z\cdot f)$. Le caractère δ étant trivial sur Z, le morphisme $\varphi : \tau_\psi\, Ind(V,\rho)\to$ V de 5.15 est un morphisme de représentations de $Z^{\sim}$.

5.17 Comme en 4.2, on vérifie que les ε-représentations irréductibles de $Z^{\sim}$ sont classifiées par leur caractère central. Si n est impair (resp. si n = 2m), le centre de $Z^{\sim}$ est l'image inverse du sous-groupe F^{*n} (resp. F^{*m}) du centre F^* de G. En tant que représentation de $Z^{\sim}$, la représentation V

(a) pour n impair : est somme de $[F^* : F^{*n}]^{1/2}$ représentations irréductibles toutes isomorphes, de caractère central induit par ω_ρ ;

(b) pour n pair, n = 2m : admet pour sous-représentations irréductibles les représentations irréductibles de $Z^{\sim}$ de caractère central prolongeant ω_ρ (il y en a $[F^{*m} : F^{*n}]$ non isomorphes). Chacune apparaît avec la multiplicité $[F^* : F^{*m}]^{1/2}$.

5.18. Pour calculer le foncteur r_ψ sur les sous-quotients de la série principale, il suffit, d'après 5.8, de calculer le morphisme induit par l'intégrale d'entrelace-

ment

(5.18.1) $r_\psi\ \mathrm{I} : r_\psi\ Ind(V, \rho) \to\ r_\psi\ Ind(V, \rho \circ int_w)$

pour ρ de caractère central ω_ρ défini par (χ_1, χ_2), avec $\chi_1 \chi_2^{-1} = \|x\|$. D'après 2.14, ce $Z^\sim$-morphisme s'identifie à un endomorphisme de V.

Théorème 5.19. Soient ρ une représentation de $T^\sim$ de caractère central $(\alpha_1, \alpha_2) = (\alpha \cdot \|x\|^{1/n}, \alpha)$: posant $\chi_i = \alpha_i(x^n)$, on a $(\chi_1, \chi_2) = (\chi \cdot \|x\|, \chi)$. Soit W le quotient irréductible de $Ind(\rho)$. Dans le cas modéré et pour n impair, la représentation $(\mathrm{W} \otimes \overline{\psi})_U$ de $Z^\sim$ est somme de $(n-1)/2$ représentations toutes isomorphes.

Si n = 3, on a $(n-1)/2 = 1$, et c'est ce résultat d'unicité qui explique l'aspect "multiplicatif" des énoncés de l'introduction.

6. Modèles, et preuves.

6.1 Soient α_1 et α_2 deux caractères de F^{*n}. Nous nous proposons de décrire une ε-représentation irréductible ρ de $T^{\sim}$, de caractère central (α_1, α_2) et de décrire l'espace de la représentation induite $Ind(\rho)$ comme un espace de fonctions sur le revêtement P de $F^2 - 0$. Il s'agira de l'espace des ε^{-1}-fonctions $(f(\zeta p) = \varepsilon(\zeta)^{-1} f(p))$, localement constantes, et ayant une homogénéité convenable rel. aux "homothéties" $v \mapsto \lambda v$ pour $\lambda \in F^{*n}$ (3.8).

On choisit une extension, encore notée α_2, du caractère α_2 à F^*, et on décrit ρ par 4.4 (a). La représentation $Ind(\rho)$ est alors obtenue par induction itérée : de $d_1(F^{*n})d_2(F^*)\mu$ à $T^{\sim}$, puis de $B^{\sim}$ à $G^{\sim}$, de (α_1, α_2). C'est l'espace des ε-fonctions f sur $G^{\sim}$ telles que

$$\text{f(u } d_1(a)d_2(b)g) = \alpha_1(a)\alpha_2(b)\|a/b\|^{1/2} f(g)$$

pour u $\in$ U, a $\in F^{*n}$ et b $\in F^*$. Si le caractère $\alpha_2(b)\|b\|^{-1/2}$ est trivial, il s'identifie à un espace de fonctions sur $d_2(F^*) \cdot U \backslash \mathrm{GL}(2, F)^{\sim}$. Ce quotient n'est autre que le revêtement P de $F^2 - 0$: à g $\in \mathrm{GL}(2, F)^{\sim}$ associer $g^{-1}((1, 0), e_X)$. Se ramenant à ce cas en tordant par un caractère du déterminant : det : $\mathrm{GL}(2, F)^{\sim} \to \mathrm{GL}(2, F) \to F^*$, on obtient le modèle suivant.

a) L'espace de la représentation est celui des ε^{-1}-fonctions localement constantes sur P, d'homogénéité $(\alpha_2 - \alpha_1 - 1)$:

$$f(\lambda v) = (\alpha_2 - \alpha_1 - 1)(\lambda)\ \text{f(v) pour } \lambda \in F^{*n}, \text{ avec la notation } 0.0.7.$$

b) Le groupe agit par

$$\text{(g*f)(v)} = f(g^{-1}v) \cdot (\alpha_2 - 1/2)(det\ \text{g}).$$

6.2 Un autre modèle de la même représentation s'obtient en utilisant le plan dual. On se donne cette fois une extension de α_1 à F^*, et on prend

a) pour espace : les ε^{-1}-fonctions localement constantes f sur $P^{\vee}$ telle que

$$f(\lambda v) = (\alpha_2 - \alpha_1 - 1)(\lambda)\ \text{f(v) pour } \lambda \in F^{*n} \text{ (0.7,3.9).}$$

b) pour action :

$$(g * \varphi)(v) = \varphi(g^{-1}v)(\alpha_1 + 1/2)(det\ \text{g}).$$

6.3 Dans ces modèles, l'opérateur d'entrelacement, de la représentation induite de paramètres (α_1, α_2) dans celle de paramètres (α_2, α_1) s'écrit comme une transformée de Radon : à f sur P, d'homogénéité $(\alpha_2 - \alpha_1 - 1)$, elle associe Rf sur $P^\vee$, d'homogénéité $(\alpha_1 - \alpha_2 - 1)$. L'opérateur R est le suivant : Un point $\ell \in P^\vee$ définit

a) un point $\overline{\ell}$ dans $A^{2\vee} - 0$, et une droite $\overline{\ell}(\overline{v}) = 1$ dans A^2.

b) une trivialisation de P au-dessus de cette droite ; on écrira $< \ell, v > = 1$ la relation : $\overline{\ell}(\overline{v}) = 1$ et v est dans la section de P au-dessus de la droite $\overline{\ell}(\overline{v}) = 1$ définie par ℓ.

On pose

$$(Rf)(\ell) = \int_{<\ell,v>=1} \mathrm{f(v)}\ (dxdy/d\ell)$$

Cette formule suppose le choix d'une menue de Haar sur F. Avec un pardonnable abus de notation, on l'écrit encore

$$(Rf)(\ell) = \iint \mathrm{f(v)}\ \delta(<\ell, v> - 1)\ \mathrm{dxdy}.$$

La même formule définit la transformée de Radon des fonctions sur $P^\vee$ dans les fonctions sur P ; c'est encore un modèle pour l'opérateur d'entrelacement.

La régularisation (5.5.2) de l'intégrale est la "partie finie" habituelle sauf pour $\alpha_1 = \alpha_2$, cas correspondant au pôle de l'opérateur d'entrelacement.

6.4 Déterminons l'application Φ de 5.15. Nous noterons f(x,y;p) une fonction sur P, p étant dans P, au-dessus de (x,y). Pour f une ε^{-1}-fonction sur P, d'homogénéité $(\alpha_2 - \alpha_1 - 1)$, comme en 6.2, posons

$$\mathrm{L(f;y)} = \int f(x, y; e_y)\ \psi(x/y)\ \mathrm{dx}.$$

Pour x grand, et λ dans un sous-groupe ouvert convenable de O^{*n}, on a $f(x, y; e_y) = f(\lambda x, y; e_y)$. Ceci permet de régulariser l'intégrale comme en 5.15.1. On a

(6.4.1) $L(e^+(u)f; y) = \psi(u)L(f; y)$ et

(6.4.2) $L(f; \lambda y) = (\alpha_2 - \alpha_1)(\lambda)L(f; y)$ pour $\lambda \in F^{*n}$

(6.4.3) $L(d_1(z)d_2(z)f; y) = \|z\|\varepsilon(z, y)^{-1}L(f; z^{-1}y)$, pour $z \in F^*$.

L'espace des fonctionnelles vérifiant 6.4.1 a pour base les L(f;y) pour y parcourant F^*/F^{*n}. Ce sont les coordonnées de Φ (5.15) dans une base convenable.

6.5 **Dans le modèle du plan dual, Φ a de même pour coordonnées les**

$$\mathrm{L(f;a)} = \int f(a, b; e_a)\ \overline{\psi}(b/a)\ \mathrm{db}.$$

On a

(6.5.1) $L(e^+(u)f;a) = \psi(u)L(f;a)$,

(6.5.2) $L(f;\lambda a) = (\alpha_2 - \alpha_1)(\lambda)L(f;a)$ pour $\lambda \in F^{*n}$,

(6.5.3) $L(d_1(z)d_2(z)f;a) = \|z\|\varepsilon(z,z^{-1}a)^{-1}L(f;z^{-1}a)$.

L'action 5.18 de l'opérateur d'entrelacement est donnée par

(6.5.4) $\mathrm{L(Rf;a)} = \int \varepsilon(a,y)\,\overline{\psi}(1/ay)\,\mathrm{L(f;y)}\,d^*y$,

$$= \sum_{y \in F^*/F^{*n}} \mathrm{L(f;y)}\,\varepsilon(a,y)$$

$$\cdot \int_{F^{*n}} \overline{\psi}(\lambda/ay)(\alpha_1 - \alpha_2)(\lambda)d^*\lambda,$$

avec une intégrale définie par prolongement analytique en $(\alpha_1 - \alpha_2)$. On a un pôle en $\alpha_1 = \alpha_2$, comme requis.

6.6 **D'après** 5.18**, ceci ramène la preuve de** 5.19 **au problème suivant : on considère**

V' : espace des fonctions localement constantes L(y) sur F^*, telles que (6.4.2), sur lequel $Z^\sim$ agit par la formule membre de droite de 6.4.3 ;

V" : espace des fonctions localement constantes L(a) sur F^*, telles que (6.5.2), sur lequel $Z^\sim$ agit par la formule membre de droite de 6.5.3 ;

R : V' → V", donné par 6.5.4 :

$$\mathrm{(RL)(a)} = \sum_{y \in F^*/F^{*n}} \mathrm{L(y)}\,\varepsilon(a,y)$$

$$\cdot \int_{F^*} \overline{\psi}(\lambda/ay)(\alpha_1 - \alpha_2)(\lambda)d^*\lambda\ ;$$

et on cherche à déterminer la représentation Im R de $Z^\sim$, lorsque R n'est pas un isomorphisme, ie. lorsque le caractère $(\alpha_1 - \alpha_2)$ est $\|\lambda\|^{\pm 1/n}$.

6.7 Sous les hypothèses de 5.19, il suffit de considérer la restriction de R aux invariants de $d_1(a)d_2(a)|a \in O^*$. Prenant pour base de ces espaces les fonctions L(y) ou L(a) de support une classe latérale sous $O^* \cdot F^{*n}$, R est représenté par une matrice qui se décompose en un bloc 1×1, et $(n-1)/2$ blocs 2×2, le long de la diagonale (pour un ordre convenable). Le calcul est alors facile.

7. Séries d'Eisenstein.

7.1 L'opérateur "série d'Eisenstein" E est un opérateur d'entrelacement, de

$$Ind_{B^+(A)^-}^{G(A)^-}(V_{\alpha_1,\alpha_2})$$

dans l'espace des fonctions sur $G(F)\backslash G(A)^-$. L'espace de la représentation induite s'identifie à l'espace des ε-fonctions sur $U(A)T(F)\backslash G(A)^-$, invariantes à droite par un sous-groupe compact ouvert de $G(A^f)^-$ et K_∞-finies, et vérifiant

$$f(diag^-(a_1,a_2)g) = \alpha_1(a_1)\alpha_2(a_2)\|a_1a_2^{-1}\|^{1/2}\ \mathrm{f(g)}$$
$$(a_1,a_2 \in A^{*n}).$$

L'opérateur est

$$\sum_{\gamma \in B(F)\backslash G(F)} f(\gamma g),$$

quand cela converge, et est en général obtenu par prolongement analytique en α_1, α_2. Posons $\chi(x) = \alpha_1(x^n)\alpha_2(x^n)^{-1}$. Des arguments classiques ([11]) fournissent un pôle en $\chi = \|x\|$. Si $\bar{E}$ est le résidu de E, $\bar{E}$ entrelace le quotient irréductible de $Ind_{B^+(A)^-}^{G(A)^-}(V_{\alpha_1,\alpha_2})$, pour $\chi = \|x\|$, dans l'espace des fonctions sur $G(F)\backslash G(A)^-$.

7.2 Ceci détermine la classe d'isomorphie de la représentation de $G(A)^-$ image de $\bar{E}$. Soit ψ un caractère additif de A/F. L'opérateur "coefficient de Fourier"

$\mathrm{f} \mapsto\ \mathrm{W(f;g)} = \int_{U(F)\backslash U(A)} \mathrm{f(ug)}\ \overline{\psi}(u)\ \mathrm{du}$

commute aux translations à droite, et vérifie $\mathrm{W(f;ug)} = \psi(u)W(f;g)$. On a aussi $\mathrm{W(f;zg)} = \mathrm{W(f;g)}$ pour $\mathrm{z} \in\ \mathrm{Z(F)}$.

7.3 Pour n = 3, ces propriétés, et les résultats d'unicité 5.19 devraient permettre de l'identifier - et d'obtenir les résultats annoncés dans l'introduction. Une autre méthode consiste à changer son fusil d'épaule, et à systématiquement remplacer $GL(2,F)$, $GL(2,F_v)$ ou $GL(2,A)$ par le sous-groupe des éléments dont le déterminant est un cube. On gagne que, pour ce nouveau groupe, l'image inverse du centre est commutative, ce qui simplifie les résultats d'unicité : les espaces $V_{U,\psi}$, précédemment représentations irréductibles de l'image inverse du centre, deviennent de dimension 1. Posant

$f^0(g) = \int_{U(F)\backslash U(A)} \mathrm{f(ug)\ du}$ (terme constant),

on a par ailleurs

$$\mathrm{f(g)} = f^0(g) + \sum_{\lambda \in F^*} \mathrm{W(f;\ diag}(\lambda^2, \lambda)g).$$

Si f, comme vecteur dans la représentation de $G(A)^{\sim}$ dans l'image de Ē, est décomposable; la fonction sur $A^{f *\sim}$ $W(f ; d_1(a^2) d_2(a))$ est multiplicative, au sens de l'introduction, dont on obtient les résultats.

BIBLIOGRAPHIE

[1] I.N. Bernstein and A.V. Zelevinsky - Representations of the group $GL(n, F)$, where F is a local non archimedian field - Uspekhi Math. Nauk. 31 3 (1976) p 5-70.
[2] I.N. Bernstein and A.V. Zelevinsky - Induced representations of reductive p-adic groups I - Ann. Sc. ENS 10 (1977) p 441-472.
[3] Y. Flicker - Automorphic forms on covering groups of $GL(2)$ - preprint IAS.
[4] B. Gross and N. Koblitz - Gauss sums and the p-adic Γ-function.
[5] D.R. Heath-Brown and S.J. Patterson - The distribution of Kummer sums at prime arguments.
[6] H. Jacquet and R.P. Langlands - Automorphic forms on $GL(2)$ - Springer Lecture Notes. 114 (1970).
[7] T. Kubota - On automorphic functions and the reciprocity law in a number field - Lectures Notes in Math. 2, Kyoto Univ. 1969.
[8] T. Kubota - Some results concerning reciprocity law and real analytic automorphic functions. Proc. Symp. Pure Math. 20 (1971) p 382-395.
[9] T. Kubota - Some number theoretical results on real analytic automorphic forms- Several complex variables, Maryland (1970). Springer Lecture Notes 185 p 87-96.
[10] T. Kubota - On an analogy to the Poisson summation formula for generalized Fourier transforms - J. Crelle 268 (1974) p 180-189.
[11] T. Kubota - Elementary theory of Eisenstein series - Kodanska 1973.
[12] R.P. Langlands - On the functional equations satisfied by Eisenstein series - Springer Lecture Notes 544.

[13] C.R. Matthews - Gauss sums and elliptic functions - I the Kummer sum, Inv. Math 52 2(1979) p163-186; II the quartic sum. Preprint IHES.
[14] H. Matsumoto - Sur les sous-groupes arithmétiques des groupes semi-simples déployés - Ann. Sc. ENS 2 (1969) p 1-62.
[15] J. Milnor - Algebraic K-theory and quadratic forms - Inv. Math. (1970) p 318-344.
[16] C.Moen - Intertwining operators for covering groups of SL(2) over a local field. Thesis. University of Chicago 1979.
[17] C. Moore - Group extensions of p-adic and adelic linear groups - Publ. Math. IHES 35 (1968) p 5-70.
[18] S.J. Patterson - A cubic analogue of the theta series - I,II - J. Crelle 296 (1977) p 125-161 et 217-220.
[19] S.J. Patterson - On the distribution of Kummer sums - J. Crelle 303/304 (1978) p 126-143.
[20] S.J. Patterson - On Dirichlet series associated with cubic Gauss sums - J. Crelle 303/304 (1978) p 102-125.
[21] J.P. Serre - Corps locaux - Publ. Ins. Math. Univ. Nancago VIII - Hermann 1962.
[22] A. Weil - Jacobi sums as ”grössencharaktere” - Trans. AMS 73 (1952) p 487-495.
[23] A. Weil - Dirichlet series and automorphic forms - Springer Lecture Note 189 (1971).
[24] Algebraic K-theory I,II,III - Springer Lecture Notes 341, 342, 343.

Séminaire BOURBAKI
32e année, 1979/80, n° 543
Novembre 1979

LE GROUPE FONDAMENTAL DU COMPLÉMENT D'UNE COURBE PLANE N'AYANT QUE DES POINTS DOUBLES ORDINAIRES EST ABÉLIEN

[d'après W. FULTON]

par Pierre DELIGNE

Introduction

THÉORÈME 1.- Soit $C \subset \mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ une courbe plane, dont les seules singularités sont des points doubles à tangentes distinctes. Alors, le groupe fondamental de $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ - C est abélien.

Ce théorème a été énoncé par Zariski en 1929 ([8]). Voir aussi [9] Ch. VIII. Sa démonstration utilisait le théorème de Severi, selon lequel l'espace des courbes planes irréductibles de degré donné, ayant un nombre donné de points doubles, est irréductible (Vorlesungen über algebraische Geometrie, 1921, Anhang F). On ignore toujours si l'assertion de Severi est vraie ou non.

Le π_1 considéré dans le théorème est le vrai groupe fondamental, celui des topologues. Si $\mathbb{C}$ est remplacé par un corps algébriquement clos k de caractéristique 0 quelconque, le même énoncé vaut pour le groupe fondamental algébrique, celui qui classifie les revêtements étales : le principe de Lefschetz nous ramène à supposer que $k = \mathbb{C}$, auquel cas le groupe fondamental algébrique est le complété profini du vrai groupe fondamental. En caractéristique quelconque, on a la variante :

THÉORÈME 2 (Fulton [3]).- Soient k un corps algébriquement clos et, sur k, $C \subset \mathbb{P}^2$ une courbe plane, dont les seules singularités sont des points doubles à tangentes distinctes. Alors, le groupe fondamental modéré de $\mathbb{P}^2$ - C est abélien.

En d'autres termes, les revêtements (au sens 0.2) de $\mathbb{P}^2$, ramifiés seulement le long de C, et modérément ramifiés, sont abéliens. Rappelons que le caractère modéré de la ramification se teste après changement de base, de $\mathbb{P}^2$ à ses localisés en les points génériques des composantes irréductibles de C. Ces localisés sont des traits (= spectre d'anneau de valuation discrète).

Supposons k de caractéristique $p > 0$. Si C est comme dans le théorème 2, il existe toujours dans l'espace projectif relatif $\mathbb{P}^2$ sur Spec(W(k)) un diviseur à croisements normaux relatif $\widetilde{C}$, dont C se déduise par passage à la fibre spéciale (voir par exemple Mumford, App. au chap. VIII de [9]). Ceci permet de déduire le théorème 2 du théorème 1 par un argument de sécialisation.

Une fois que l'on sait que $\pi_1(\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ - C) est abélien, des arguments homologiques donnent immédiatement sa structure : si C est réunion de courbes irréductibles de degrés d_1, ..., d_r, le groupe $\pi_1(\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ - C) est le quotient de $\mathbb{Z}^r$ par le sous-groupe engendré par l'élément (d_1, ..., d_r).

Dans sa démonstration du théorème 2, Fulton utilise d'une part des méthodes introduites par Abhyankar [1] pour prouver le cas particulier du théorème 2 où l'on suppose les composantes irréductibles de C lisses - méthodes dont un exposé très clair a été donné ici par Serre ([7]) - d'autre part le théorème 3 ci-dessous. Une analyse de la démonstration a ensuite permis au rédacteur d'en donner une variante qui fournisse le théorème 1.

Abhyankar et Fulton utilisent tous deux des instances du principe selon lequel, en géométrie algébrique, ce qui est très mobile est connexe. Soient $C \subset \mathbb{P}^2$ comme dans le théorème 2, D une composante irréductible de C et $f : X \to \mathbb{P}^2$ un revêtement ramifié seulement le long de C, et de ramification modérée. Puisque $D \subset \mathbb{P}^2$ est très mobile, $f^{-1}(D)$ est connexe. Plus précisément, le diviseur $D \subset \mathbb{P}^2$ est ample, le diviseur $f^{-1}(D) \subset X$ l'est donc aussi, puisque f est fini, et on applique Bertini. Par une étude locale de f, Abhyankar montre que, si D est lisse, alors $(f^{-1}(D))_{red}$ l'est aussi, et conclut que $f^{-1}(D)$ est irréductible.

Dans le cas général, soit $g : \widetilde{D} \to D$ le normalisé de D. La même étude locale montre que le produit fibré réduit $(X \times_{\mathbb{P}^2} \widetilde{D})_{red}$ est lisse. C'est donc le normalisé de $f^{-1}(D)$. Si on peut montrer qu'il est connexe, on en déduira que $f^{-1}(D)$ est irréductible, et on peut recopier la fin de la démonstration d'Abhyankar, telle qu'elle figure dans [7].

Rappelons la définition du produit fibré : si $h : X \times \widetilde{D} \to \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$ est le produit des applications $f : X \to \mathbb{P}^2$ et $g : \widetilde{D} \to D \subset \mathbb{P}^2$, le produit fibré $X \times_{\mathbb{P}^2} \widetilde{D}$ est l'image inverse $h^{-1}(\Delta)$ de la diagonale. Puisque $\mathbb{P}^2$ a beaucoup d'automorphismes, la diagonale $\Delta \subset \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$ est très mobile, et $h^{-1}(\Delta)$ est connexe. Ceci termine la démonstration. Plus précisément, on applique à h le cas particulier $r = 2$, $m = 2$ du théorème suivant :

THÉORÈME 3 (W. Fulton et J. Hansen [4]).- Soient $P = (\mathbb{P}^m)^r$ le produit de r copies de l'espace projectif $\mathbb{P}^m$, δ l'application diagonale de $\mathbb{P}^m$ dans P, $\Delta = \delta(\mathbb{P}^m)$ la diagonale, Z une variété complète irréductible, $h : Z \to P$, $n = \dim h(Z)$ et $c = (r - 1)m$ la codimension de Δ dans P. Si $n - c \geq 1$, alors $h^{-1}(\Delta)$ est connexe.

Ce théorème a de nombreuses autres applications, pour lesquelles je renvoie à [4], et à l'article de T. Gaffney et R. Lazarsfeld [5].

Dans la fin de cette introduction, nous expliquons sur un exemple la méthode suivie pour transposer la démonstration de Fulton du théorème 2 en une démonstration

du théorème 1. L'exemple est : comment transposer les arguments d'Abhyankar pour prouver le théorème 1 dans le cas particulier où C est lisse (donc irréductible).

Soient U un voisinage tubulaire de C dans $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, U* = U - C et u ∈ U*. Pour tout revêtement f : X → $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ ramifié seulement le long de C, on a

(f^{-1}(C) connexe) ⇔ (f^{-1}(U) connexe) ⇔ (f^{-1}(U*) connexe).

Le résultat clef : quel que soit le revêtement X, la courbe f^{-1}(C) est connexe, équivaut donc à celui-ci : pour tout quotient fini H de $\pi_1(\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ - C, u), le morphisme composé

π_1(U*,u) —j*→ $\pi_1(\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ - C,u) → H

est surjectif. Un argument de théorie de Morse permet de prouver mieux : la surjectivité du morphisme j* : π_1(U*,u) → $\pi_1(\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ - C,u).

Une métrique riemannienne étant choisie sur $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, on peut, pour $\varepsilon > 0$ assez petit, prendre pour U l'image par l'application exponentielle exp du sous-fibré en boules de rayon ε du fibré normal de C dans $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$. Pour ε assez petit, exp identifie U* à un fibré en disques épointés orientés sur C, d'où une suite exacte :

$\mathbb{Z} \to \pi_1(U^*,u) \to \pi_1(C,\bar{u}) \to 1$

($\bar{u}$ image de u). L'image de $\mathbb{Z}$ est centrale ; celle de $1 \in \mathbb{Z}$ est représentée par un petit lacet γ tournant une fois, dans le sens positif, autour de C.

Puisque j* est surjectif, γ définit encore un élément central de $\pi_1(\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ - C,u). Le quotient de $\pi_1(\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ - C,u) par le sous-groupe distingué engendré par γ (en l'occurrence, le sous-groupe cyclique engendré par γ) est $\pi_1(\mathbb{P}^2(\mathbb{C}),u) = \{e\}$ et le cas particulier considéré du théorème s'ensuit.

0. Terminologie

0.1. Connexe signifie connexe et non vide. De même pour irréductible.

0.2. Un revêtement d'un schéma S, supposé normal et connexe, est un morphisme f : T → S, de source T normale et connexe, dont la restriction à un ouvert dense de T est étale.

0.3. Dans toute la suite de cet exposé, nous nous plaçons sur $\mathbb{C}$. Nous écrirons simplement $\mathbb{P}^n$ pour $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$. Les schémas considérés sont tous supposés séparés.

1. Théorèmes du type de Lefschetz et Bertini

Le cas particulier de 1.1, ci-dessous, où Z $\subset \mathbb{P}^n$ est le complément d'une hypersurface est démontré par Hamm et Lê [6], à l'aide de la théorie de Morse. Notre but dans ce § est d'en déduire la variante 1.6 du théorème 3.

Assertion 1.1.- Soit Z $\subset \mathbb{P}^n$ un ouvert de Zariski non vide. Si H est un hyperplan général, le morphisme naturel π_i(Z $\cap$ H) $\to \pi_i$(Z) est bijectif pour i < n - 1, et surjectif pour i = n - 1.

L'assertion 1.1 est énoncée dans [2], mais la démonstration de Cheniot ne couvre que le cas où le complément de Z est de codimension ≥ 2. Sous cette hypothèse, Z et Z $\cap$ H sont simplement connexes, et il est innocent de travailler, comme il le fait, avec les H_i plutôt qu'avec les π_i. Le cas i = 1 peut aussi se déduire de [6] ou [2 bis].

Rappelons que l'adjectif "général", qualifiant un élément H d'une variété algébrique irréductible S (ici, l'espace projectif dual $\mathbb{P}^n\vee$), est un quantificateur. Il signifie l'existence d'un ouvert de Zariski non vide (et donc dense) S' de S, tel que pour tout H dans S', ...

1.2.- Soit Y $\subset \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n\vee$ l'espace des couples (z,H) tels que z $\in$ Z et z $\in$ H. Le théorème d'isotopie, appliqué à la seconde projection pr_2 : Y $\to \mathbb{P}^n\vee$, fournit l'existence d'un ouvert de Zariski non vide U de $\mathbb{P}^n\vee$, au-dessus duquel Y est un espace fibré - topologiquement localement trivial. Il suffit de prendre pour U l'ensemble des hyperplans transverses aux strates d'une stratification de Whithney algébrique du complément de Z dans $\mathbb{P}^n$. Localement sur U et si on choisit une trivialisation locale de ce fibré, l'inclusion de Z $\cap$ H = $\mathrm{pr}_2^{-1}(\{\mathrm{H}\})$ dans Z apparaît comme une application dépendant continûment de H d'un espace fixe dans Z. La conclusion de 1.1 ne peut donc valoir pour un H dans U que si elle vaut pour tous, et 1.1 équivaut à dire qu'elle vaut pour tout H dans U.

Supposons que Z dépende de paramètres : on se donne un schéma irréductible S, un ouvert Z de S $\times \mathbb{P}^n$; on pose pr_2 $\mathrm{pr}_1^{-1}(\{\mathrm{s}\})$ = Z(s) et on suppose chaque Z(s) non vide. Soit Y $\subset$ S $\times \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n\vee$ l'espace des triples (s,z,H) tels que z $\in$ Z(s) et z $\in$ H. Le théorème d'isotopie, appliqué à la projection de Y sur S $\times \mathbb{P}^n\vee$ (resp. de Z sur S), fournit l'existence d'un ouvert de Zariski non vide U de S $\times \mathbb{P}^n\vee$ (resp. V de S), au-dessus duquel Y (resp. Z) est un espace fibré - topologiquement local trivial.

Comme ci-dessus, si s $\in$ V et que (s,H) $\in$ U, la conclusion de 1.1 vaut pour Z(s) et H. Cette variante - avec paramètres - de 1.1 sera utilisée implicitement dans la preuve de 1.4.

Je conjecture que, plus généralement :

Conjecture 1.3.- Soient Z lisse et connexe, de dimension n, f : Z $\to \mathbb{P}^N$ un morphisme à fibres finies, c un entier, L un sous-espace linéaire de $\mathbb{P}^N$, de

codimension c et n* = n - c. Choisissons une métrique riemannienne sur $\mathbb{P}^N$, et soit V(ε) l'ensemble des points p de $\mathbb{P}^N$ tels que d(p,L) < ε. Alors, pour ε assez petit, le morphisme naturel

$\pi_i(f^{-1}(V(\varepsilon))) \to \pi_i(Z)$

est bijectif pour i < n*, et surjectif pour i = n*.

On notera que pour L général, l'inclusion de $f^{-1}(L)$ dans $f^{-1}(V(\varepsilon))$ est, pour ε assez petit, une équivalence d'homotopie : 1.3 est bien une généralisation de 1.1.

Si on ne suppose plus f quasi-fini, et que l'ensemble des points de $\mathbb{P}^N$ où la fibre de f est de dimension k est de dimension φ(k), il y a lieu de redéfinir n* comme étant

n* = 2 dim Z - sup(2k + φ(k) + inf(φ(k), c - 1)) - 1.

La conjecture 1.3 devrait par ailleurs se déduire d'un énoncé plus précis, comme quoi Z se déduit de $f^{-1}(V(\varepsilon))$ par adjonction d'anses tuant des sphères de dimension $\geq$ n*.

Nous nous contenterons de résultats plus faibles que 1.3. Nous les déduirons du cas particulier de 1.1 où Z est le complément d'une hypersurface.

Lemme 1.4.- Soient Z normal et connexe, f : Z $\to \mathbb{P}^N$ un morphisme, n la dimension de f(Z) et c un entier. On suppose que n - c $\geq$ 1. Si L est un sous-espace linéaire de codimension c général de $\mathbb{P}^N$, alors f^{-1}(L) est connexe et, pour z $\in$ f^{-1}(L), le morphisme naturel de $\pi_1(f^{-1}(L),z)$ dans π_1(Z,z) est surjectif.

Il est loisible de remplacer Z par un ouvert de Zariski non vide Z' : pour L général, f^{-1}(L) est encore normal, et Z' (resp. Z' $\cap$ f^{-1}(L)) se déduit de Z (resp. f^{-1}(L)) par soustraction d'une partie algébrique d'intérieur vide. Vu l'hypothèse de normalité, ceci ne change pas les π_0, ne peut qu'augmenter le π_1 et on contemple le diagramme commutatif

$\pi_1(Z' \cap f^{-1}(L),z) \twoheadrightarrow \pi_1(f^{-1}(L),z)$
$\downarrow \downarrow$
$\pi_1(Z',z) \twoheadrightarrow \pi_1(Z,z)$.

En particulier, on peut supposer, et on suppose, que Z est lisse. Le lecteur intéressé seulement par la preuve du théorème 1 aurait d'ailleurs pu le supposer d'emblée ; il remplacera "normal" par "lisse" dans la suite du §.

Rétrécissant Z, on peut supposer, et on suppose, que f(Z) est localement fermé et que Z est un espace fibré - topologiquement localement trivial - sur f(Z).

Si c = 1 et que f est dominant, f(Z) est un ouvert de Zariski de $\mathbb{P}^N$ - rétrécissant Z, on peut supposer que c'est le complément d'une hypersurface - et il ne reste qu'à appliquer 1.1 à f(Z), et à comparer les suites exactes longues d'homotopie pour Z $\to$ f(Z) et f^{-1}(L) $\to$ L $\cap$ f(Z).

Continuons à supposer que c = 1. Si f n'est pas dominant, soient A un

sous-espace linéaire de dimension N - n - 1, B l'espace projectif des sous-espaces linéaires de dimension N - n contenant A et q : $\mathbb{P}^N$ - A $\to$ B : x $\mapsto$ le sous-espace le contenant. Pour A disjoint de $\overline{f(Z)}$, la restriction de q à $\overline{f(Z)}$ est un morphisme fini, donc dominant puisque dim $\overline{f(Z)}$ = dim B, et qf : Z $\to$ B est dominant. Du lemme, appliqué à qf et à c = 1, on déduit la conclusion du lemme pour L un hyperplan général parmi ceux contenant A. Le sous-espace A étant seulement assujetti à se trouver dans un ouvert dense d'une grassmannienne convenable, la conclusion du lemme vaut aussi pour L général (cf. 1.2).

On finit la démonstration par une récurrence sur c : un sous-espace linéaire général de codimension c - 1 d'un hyperplan général est un sous-espace linéaire de codimension c général (cf. 1.2).

Lemme 1.5.- Soient Z, f, n et c comme en 1.4. Tout sous-espace linéaire L de codimension c de $\mathbb{P}^N$ admet un système fondamental de voisinages ouverts V tels que f^{-1}(V) soit connexe, et que, pour z $\in f^{-1}$(V), le morphisme naturel de $\pi_1(f^{-1}(V),z)$ dans π_1(Z,z) soit surjectif.

Soient Gr la grassmannienne des sous-espaces linéaires de codimension c de $\mathbb{P}^N$, Y $\subset$ Z $\times$ Gr l'ensemble des couples (z,L) tels que f(z) $\in$ L, et G un ouvert de Zariski non vide de Gr tel que, au-dessus de G, Y soit un fibré - topologiquement localement trivial. La conclusion de 1.4 vaut alors pour L $\in$ G (cf. 1.2).

Pour chaque ouvert U de Gr, nous noterons U* l'ouvert de $\mathbb{P}^N$ réunion des L $\in$ U. Nous allons prouver que si U est connexe, la conclusion de 1.5 vaut pour V = U*. Le lemme en suivra.

Prouvons que, si U est connexe, f^{-1}(U*) l'est aussi. L'intersection U' = U $\cap$ G est connexe, car déduite de U par soustraction d'une partie (triangulable) de codimension réelle $\geq$ 2. D'après 1.4, la réunion f^{-1}(U'*) des f^{-1}(L) pour L $\in$ U' est donc connexe. Nous allons montrer qu'elle est dense dans f^{-1}(U*).

L'image f(Z) de Z n'est pas dans le complément F de G* : puisque n - c $\geq$ 0, les L $\in$ G rencontrent f(Z). Si z $\in$ Z, l'image d'un quelconque voisinage de z n'est pas dans F, sinon celle de Z le serait, par prolongement analytique. Si z $\in f^{-1}$(U*), il existe donc arbitrairement près un point z' tel que f(z') $\in$ G*. Dans l'ensemble des L $\in$ Gr contenant z', la trace de G est dense, puisque non vide. Si z $\in f^{-1}$(L), avec L $\in$ U, ceci permet de trouver z' comme ci-dessus, contenu dans un f^{-1}(L'), avec L' dans G arbitrairement proche de L. En particulier, on peut prendre L' $\in$ U', auquel cas z' $\in f^{-1}$(U'*). Ceci prouve la densité de f^{-1}(U'*) dans f^{-1}(U*), et la connexité de f^{-1}(U*).

Soit enfin L $\in$ U'. On a f^{-1}(L) $\subset f^{-1}$(U*) $\subset$ Z. D'après 1.4, le π_1 de f^{-1}(L) s'envoie sur celui de Z. A fortiori celui de f^{-1}(U*).

Nous allons en déduire une variante du théorème 3.

THÉORÈME 1.6.- Soient P = $(\mathbb{P}^m)^r$ le produit de r copies de l'espace projectif $\mathbb{P}^m$, δ l'application diagonale de $\mathbb{P}^m$ dans P, $\Delta = \delta(\mathbb{P}^m)$ la diagonale, Z normal et connexe, h : Z $\to$ P, n = dim h(Z) et c = (r - 1)m la codimension de Δ dans P. Si n - c $\geq$ 1, Δ admet un système fondamental de voisinages ouverts V, tels que h^{-1}(V) soit connexe. Si h^{-1}(V) est connexe, et que z $\in h^{-1}$(V), le morphisme naturel de $\pi_1(h^{-1}$(V),z) dans π_1(V,z) est surjectif.

Comme en 1.4, il est loisible de rétrécir Z, et en particulier de supposer Z lisse. Supposons-le. Soit $(H_\alpha)_0 \leq \alpha \leq$m une famille d'hyperplans de $\mathbb{P}^m$, telle que

a) l'intersection des H_α est vide : dans un système de coordonnées projectives convenable (X_α), ils s'écrivent $X_\alpha = 0$;

b) h(Z) n'est contenu dans aucun des pr_$i^{-1}(H_\alpha)$. Rétrécissant Z, on peut alors supposer - et on suppose - que $\overline{h(Z)}$ est disjoint des pr_$i^{-1}(H_\alpha)$;

c) $\overline{h(Z)} \cap \Delta$ n'est pas contenu dans la réunion des $\delta(H_\alpha)$: puisque Δ est membre d'une famille connexe de cycles remplissant P tout entier, on a $\overline{h(Z)} \cap \Delta \neq \emptyset$, et il est possible de choisir des H_α vérifiant c).

Soient $A_\alpha = \mathbb{P}^m$ - H_α, $B_\alpha = A_\alpha^r \subset$ P et $\Delta_\alpha = \delta(A_\alpha)$ la diagonale de B_α. Les espaces A_α et B_α sont des espaces affines et Δ_α est un sous-espace affine de B_α. La complétion projective de A_α est $\mathbb{P}^m$. Notons $\bar{B}$_α celle de B_α, et $\bar{\Delta}$_$\alpha \subset \bar{B}$ _α celle de Δ_α.

Fixons α, et écrivons simplement H, A, B, Δ_A, $\bar{B}$, $\bar{\Delta}$_A pour H_α, A_α, B_α, Δ_α, $\bar{B}$_α et $\bar{\Delta}$_α.

Lemme 1.7.- Pour tout voisinage U de $\Delta \subset$ P, il existe un voisinage V de $\bar{\Delta}$_A dans $\bar{B}$ tel que V $\cap$ B $\subset$ U $\cap$ B.

Choisissons sur A une structure d'espace vectoriel hermitien, compatible à sa structure affine. Un système fondamental de voisinages U de Δ (resp. V de $\bar{\Delta}$_A) admet alors pour trace sur B les ensembles de la forme suivante :

U $\cap$ B = $\{(x_i)$ | Si $|x_i| \leq$ R pour un i, on a $\forall$j $\forall$k $|x_j - x_k| < \varepsilon$; si les $|x_i|$ sont $\geq$ R, on a $\forall$j $\forall$k l'angle entre les droites complexes engendrées par x_j et x_k est $< \varepsilon\}$

V $\cap$ B = $\{(x_i)$ | Si $|x_i| \leq$ R pour un i, on a $\forall$j $\forall$k $|x_j - x_k| < \varepsilon$; si les $|x_i|$ sont $\geq$ R, on a $\forall$j $\forall$k $|x_j - x_k| \leq \varepsilon$ inf$\{|x_i|\}\}$

Le lemme en résulte.

Dans le cas où r = m = 1, les deux compactifications $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ et $\mathbb{P}^2$ de $\mathbb{A}^2$ sont coiffées par une troisième comme suit : le dessin représente le lieu à l'infini, et la diagonale ; les points entourés sont ceux qu'il faut éclater pour obtenir la troisième compactification ; U et V sont suggérés par les pointillés :



Une construction similaire peut être faite pour r et m quelconques.

Reprenons la preuve de 1.6. Appliquons 1.5 à h : Z $\to \bar{B}_\alpha$ et à Δ_α. On trouve que Δ_α admet un voisinage ouvert arbitrairement petit V_α tel que $h^{-1}(V_\alpha) = h^{-1}(V_\alpha \cap B_\alpha)$ soit connexe, de π_1 s'envoyant sur celui de Z. D'après 1.7, quel que soit le voisinage U de Δ dans P, on peut prendre V_α tel que $V_\alpha \cap B_\alpha \subset$ U.

La réunion V des ouverts $V_\alpha \cap B_\alpha$ de P est un voisinage, arbitrairement petit de Δ. L'hypothèse b) sur les H_α assure que l'intersection des $V_\alpha \cap B_\alpha$ rencontre h(Z). Dès lors, h^{-1}(V), réunion des ouverts connexes $h^{-1}(V_\alpha)$, d'intersection non vide, est connexe. Puisque le π_1 de l'un des $h^{-1}(V_\alpha)$ s'envoie sur celui de Z, a fortiori celui de h^{-1}(V), et ceci achève la démonstration.

2. Preuve du théorème 1

2.1.- Soient C $\subset \mathbb{P}^2$ une courbe plane réduite, D une composante irréductible de C, C' = $\overline{(C-D)}$ la réunion des autres composantes, Sing(C) l'ensemble des points singuliers de C et D* = D - Sing(C). Choisissons un point base O $\in \mathbb{P}^2$ - C, et soit γ un lacet dans $\mathbb{P}^2$ - C du type suivant : γ va de O à un point p' proche d'un point p de D* par un chemin ch, tourne une fois autour de D* dans le sens positif, et revient à O par ch$\hat{}${-1}. La courbe D* étant connexe, les lacets de ce type sont tous conjugués entre eux. Le quotient de $\pi_1(\mathbb{P}^2$ - C,O) par le sous-groupe distingué qu'ils engendrent est $\pi_1(\mathbb{P}^2$ - C').

PROPOSITION 2.2.- Supposons que ceux des points singuliers de C qui sont sur D sont des points doubles à tangentes distinctes. Alors, γ est central dans $\pi_1(\mathbb{P}^2$ - C,O).

Soient j l'inclusion de $\mathbb{P}^2$ - C dans $\mathbb{P}^2$, g : $\widetilde{D} \to$ D la normalisée de D et appliquons 1.6 à

h = j $\times$ g : ($\mathbb{P}^2$ - C) $\times \widetilde{D} \to \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$.

Pour présenter commodément l'image inverse de certains voisinages de la diagonale, nous choisissons sur $\mathbb{P}^2$ une structure riemannienne telle que, au voisinage de chaque

point P ∈ D ∩ Sing(C), $\mathbb{P}^2$ soit euclidien, et que les deux branches de C par P soient des 2-plans (réels) orthogonaux.

Si (u,v) ∈ ($\mathbb{P}^2$ - C) × $\widetilde{D}$ est dans l'image inverse d'un voisinage assez petit de la diagonale, i. e. si u et v sont assez proches, le point u est près de D, et on peut abaisser une courte perpendiculaire de u sur D. Pour u près de Sing(D), on en a même deux, une par branche. On choisit celle dont le pied $\bar{u}$ est proche de v sur $\widetilde{D}$:



Le point $\bar{u}$ est dans D*.

Réciproquement, soient $\varepsilon > 0$ assez petit, q : U* → D* le sous-fibré en disques épointés du fibré normal de D* dans $\mathbb{P}^2$ formé des vecteurs normaux non nuls de longueur $< \varepsilon$, et E l'ensemble des couples (x,v) avec x ∈ U*, v ∈ $\widetilde{D}$ et d(q(x),v) $< \varepsilon$ (distance calculée sur $\widetilde{D}$). L'application pr_1 : E → U* est une équivalence d'homotopie et admet pour section l'espace des (x,q(x)). L'application exp : (x,v) ↦ (exp(x),v) de E dans ($\mathbb{P}^2$ - C) × $\widetilde{D}$ identifie E à l'image inverse d'un voisinage de Δ, et, pour $\varepsilon \to 0$, on obtient les images inverses d'un système fondamental de voisinage. Appliquant 1.6, on trouve que, quel que soit O ∈ U*, exp et q induisent une surjection

$(\exp,q)^* : \pi_1(U^*,O) \twoheadrightarrow \pi_1(\mathbb{P}^2 - C,\exp(O)) \times \pi_1(\widetilde{D},q(O))$.

On dispose d'une suite exacte d'homotopie

$\mathbb{Z} \to \pi_1(U^*,O) \to \pi_1(D^*,q(O)) \to 1$.

L'image de $\mathbb{Z}$ est centrale ; celle de $1 \in \mathbb{Z}$ est représentée par un petit lacet tournant une fois, dans le sens positif, autour de D*. Puisque $(\exp,q)^*$, donc $\exp^* : \pi_1(U^*,O) \to \pi_1(\mathbb{P}^2 - C,\exp(O))$ est surjectif, ce lacet définit encore un élément central de $\pi_1(\mathbb{P}^2 - C,\exp(O))$. C'est γ.

2.3 Preuve du théorème 1 : Pour chaque composante irréductible D de C, soit γ(D) l'élément central correspondant de $\pi_1(\mathbb{P}^2 - C,O)$. Le quotient de $\pi_1(\mathbb{P}^2 - C,O)$ par le sous-groupe - central - engendré par les γ(D) est $\pi_1(\mathbb{P}^2,O) = \{e\}$. Le théorème en résulte.

BIBLIOGRAPHIE

[1] S. ABHYANKAR - Tame coverings and fundamental groups of algebraic varieties I, Amer. J. of Math., 81(1959), 46-94.

[2] D. CHENIOT - Un théorème du type de Lefschetz, Annales de l'Institut Fourier, 25 1(1975), 195-213.

[2 bis] D. CHENIOT - Une démonstration du théorème de Zariski sur les sections hyperplanes d'une hypersurface projective et du théorème de Van Kampen sur le groupe fondamental du complémentaire d'une courbe plane, Comp. Math., 27 2(1973), 141-158.

[3] W. FULTON - On the fundamental group of the complement of a node curve, Ann. of Math., 111 2(1980), 407-409.

[4] W. FULTON and J. HANSEN - A connectedness theorem for projective varieties, with applications to intersections and singularities of mappings, Ann. of Math., 109 1(1979), 159-166.

[5] T. GAFFNEY and R. LAZARSFELD - On the ramification of branched coverings of $\mathbb{P}^n$, Inv. Math., 59 1(1980), 53-58.

[6] H. HAMM et LÊ D$\widetilde{U}$NG TRANG - Un théorème de Zariski du type de Lefschetz, Ann. Sci. E.N.S., 6 3(1973), 317-366.

[7] J.-P. SERRE - Revêtements ramifiés du plan projectif (d'après S. Abhyankar), Sém. Bourbaki 204, mai 1960.

[8] O. ZARISKI - On the problem of existence of algebraic functions of two variables possessing a given branch curve, Amer. J. of Math., 51(1929), 305-328.

[9] O. ZARISKI - Algebraic surfaces, second supplemented edition, Ergebnisse 61, Springer-Verlag.

Je viens (1/10/80) de recevoir un très bel exposé, faisant le point sur les méthodes étudiées ici, leurs variantes et leurs nombreuses applications : W. FULTON and R. LAZARSFELD - Connectivity and its applications in algebraic geometry.

Pierre DELIGNE
Institut des Hautes Etudes
Scientifiques
35 route de Chartres
F-91440 BURES-SUR-YVETTE

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 1

Exposé V

CRISTAUX ORDINAIRES ET COORDONNÉES CANONIQUES

par P. DELIGNE
avec la collaboration de L. ILLUSIE (*)

SOMMAIRE

0. INTRODUCTION

1. PARAMÈTRES CANONIQUES DES F − CRISTAUX DE HODGE ORDINAIRES
1.1. Rappels de définitions
1.2. F − cristaux unités
1.3. F − cristaux ordinaires
1.4. F − cristaux de Hodge ordinaires de niveau ≤ 1

2. APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES
2.1. Coordonnées canoniques
A. Variétés abéliennes
B. Surfaces K3
2.2. Relèvements de faisceaux inversibles

Dans tout l'exposé, k désigne un corps algébriquement clos de car. $p > 0$, et W l'anneau des vecteurs de Witt sur k.

———————

(*) Équipe de Recherche Associée au C.N.R.S. n° 653

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p001.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 674DC33503B22430… Authority evidence: 595EC8D5694949F3…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 2

0. INTRODUCTION

Soit X_0/k une courbe elliptique ordinaire. D'après la théorie de Serre-Tate [14, V], la variété modulaire formelle M des déformations de X_0 sur les W-algèbres artiniennes locales de corps résiduel k est isomorphe au groupe multiplicatif formel $\widehat{G}_m/W$. Plus précisément, le groupe p-divisible

$$G_0 = \cup \operatorname{Ker}(p^n : X_0 \to X_0)$$

est isomorphe à $(\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p) \times \mu_{p^\infty}$, et le choix d'un isomorphisme α entre la partie étale de G_0 et $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ permet d'identifier canoniquement, pour toute W-algèbre R artinienne locale de corps résiduel k, l'ensemble des relèvements de X_0 sur R au groupe $\operatorname{Ext}^1((\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p)_R, (\mu_{p^\infty})_R)$, à son tour isomorphe canoniquement au groupe des unités de R congrues à 1 modulo l'idéal maximal : on obtient donc ainsi un isomorphisme (ne dépendant que de α) entre M et $(\widehat{G}_m)_W$, et en particulier la déformation universelle X de X_0 sur M définit une "coordonnée canonique" q sur M, telle que $M \simeq \operatorname{Spf} W[[q-1]]$. De ce paramètre q, qui décrit le groupe p-divisible G associé à X comme extension de $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ par μ_{p^∞}, on peut donner une autre interprétation, en termes du module $H^1_{\mathrm{DR}}(X/M)$, muni de sa structure de F-cristal et de sa filtration de Hodge $H^0(X, \Omega^1_{X/M}) \subset H^1_{\mathrm{DR}}(X/M)$. La donnée d'un isomorphisme α comme ci-dessus fournit en effet par dualité un isomorphisme α' entre le groupe formel $\widehat{X}/M$ associé à X et le groupe formel $(\widehat{G}_m)_M$, d'où une forme $b \in H^0(X, \Omega^1_{X/M})$, correspondant par α' à la forme invariante sur $(\widehat{G}_m)_M$. Soit a $\in H^1_{\mathrm{DR}}(X/M)$ tel que $\nabla a = 0$ et (a, b) soit une base symplectique de $H^1_{\mathrm{DR}}(X/M)$, i.e. $\langle a, b\rangle = 1$, $\langle a, a\rangle = 0$. Si

$$\nabla : H^1_{\mathrm{DR}}(X/M) \to \Omega^1_{M/W} \otimes H^1_{\mathrm{DR}}(X/M)$$

désigne la connexion de Gauss-Manin, on a nécessairement

$$\nabla b = \eta \otimes a, \tag{0.1}$$

avec $\eta \in \Omega^1_{M/W}$. On peut montrer (voir Appendice et Exposé suivant, par N. Katz) que l'on a

$$\eta = d \log q, \tag{0.2}$$

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 3

où q est le paramètre défini plus haut, qui se trouve donc coïncider avec celui défini indépendamment par Dwork ([8], [6]) à l'aide de (0.2). La base (a, b) ci-dessus jouit par ailleurs de propriétés remarquables vis-à-vis de l'opération de Frobenius F sur $H^1_{\mathrm{DR}}(X/M)$: si l'on choisit comme endomorphisme de M relevant le Frobenius de $M \otimes k$ celui donné par $q \mapsto q^p$, alors F s'exprime par

$$F\,a = a, \qquad F\,b = p\,b. \tag{0.3}$$

Les constructions précédentes se généralisent aux variétés abéliennes ordinaires [8], voir aussi [9], [11] pour des applications arithmétiques dans le cas des courbes elliptiques.

L'objet de l'exposé est de montrer qu'on peut développer une théorie analogue pour les surfaces K3 ordinaires, du moins si $p \neq 2$. Soit X_0/k une surface K3 ordinaire, i.e. telle que le Frobenius de $H^2(X_0, \mathcal{O})$ soit non nul, et soit S la variété modulaire formelle des déformations de X_0 sur les W-algèbres artiniennes locales de corps résiduel k (IV 1.2). Si $p \neq 2$, on prouve que S est munie canoniquement d'une structure de groupe formel, isomorphe à $(\widehat{G}_m)^{20}_W$; en particulier, la déformation universelle X de X_0 sur S définit des "coordonnées canoniques" q_i $(1 \leq i \leq 20)$ telles que

$$S \simeq \mathrm{Spf}\, W[[q_1 - 1, \ldots, q_{20} - 1]],$$

formant une base des caractères de S. On montre de plus que, si L_0 est un faisceau inversible non trivial sur X_0, l'hypersurface $\Sigma(L_0)$ de S telle que L_0 se prolonge à $X \times_S \Sigma(L_0)$ (IV 1.5) est le noyau d'un caractère de S, défini de façon presque tautologique par la classe de Chern cristalline de L_0.

En l'absence d'une théorie de Serre-Tate pour les relèvements des surfaces K3, c'est en termes de la structure de F-cristal de $H^2_{\mathrm{DR}}(X/S)$ que l'on définit la structure de groupe formel de S. En fait, on peut englober le cas des variétés abéliennes et celui des surfaces K3 dans un même théorème de structure pour une certaine classe de F-cristaux ordinaires. L'étude de ces cristaux fait l'objet du

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p003.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 74E81277FEC0DCAE… Authority evidence: 955CB3D1E7738A39…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 4

n° 1. Les applications géométriques sont données au n° 2. En ce qui concerne le théorème relatif aux hypersurfaces $\Sigma(L_0)$, l'ingrédient essentiel est l'utilisation de la classe de Chern cristalline pour contrôler l'obstruction au prolongement.

1. PARAMÈTRES CANONIQUES DES F-CRISTAUX DE HODGE ORDINAIRES

1.1. Rappels de définitions.

1.1.1. Pour les définitions et propriétés générales des F-cristaux, voir Katz [8], [10]. On fixe pour toute la suite du n° 1 des anneaux de séries formelles

$$A_0 = k[[t_1, \dots, t_n]], \qquad A = W[[t_1, \dots, t_n]],$$

où $(t_1, \dots, t_n)$ est une suite finie d'indéterminées (pour $n = 0$, on convient que $A_0 = k$, $A = W$). Un cristal (sous-entendu, en modules libres de type fini) sur A_0 est par définition un A-module libre de type fini H, muni d'une connexion

$$\nabla : H \to \Omega^1_{A/W} \otimes H,$$

intégrable et p-adiquement topologiquement nilpotente. Que ∇ soit intégrable signifie que, si l'on pose $D_i = d/\mathrm{d}t_i$, on a

$$\nabla(D_i)\nabla(D_j) = \nabla(D_j)\nabla(D_i)$$

quels que soient $i \neq j$. Cela permet de faire opérer sur H les opérateurs PD-différentiels sur A, i.e. les polynômes en les D_i à coefficients dans A, par la formule

$$\nabla(\textstyle\sum_m a_m D^m) = \sum_m a_m (\nabla(D))^m,$$

avec les notations condensées habituelles $D^m = D_1^{m_1} \cdots D_n^{m_n}$, etc. Quant à la nilpotence topologique de ∇, elle s'exprime par le fait que, pour tout i, $\nabla(D_i)^m$ tend vers zéro pour la topologie p-adique de $\mathrm{End}_W(H)$ quand m tend vers $+\infty$. D'après Berthelot [1, II 4], la

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p004.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: FD485662C7B292E1… Authority evidence: 0DF7A5B6C2C3ECDF…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 5

donnée d'une connexion ∇ comme ci-dessus équivaut à la donnée, pour tout couple de W-homomorphismes (f, g) de A dans une W-algèbre B locale, noethérienne et complète, tels que f et g soient congrus modulo un idéal I de B muni de puissances divisées compatibles aux puissances divisées standard de p, d'un isomorphisme

$$\chi(f, g) : f^*H \simeq g^*H, \qquad (*)$$

ces isomorphismes étant assujettis à vérifier certaines conditions de transitivité explicitées dans [8, 1.2], i.e. $\chi(g, h)\chi(f, g) = \chi(f, h)$, $\chi(\mathrm{fk}, \mathrm{gk}) = k^*\chi(f, g)$, $\chi(\mathrm{id}, \mathrm{id}) = \mathrm{id}$. La formule suivante décrit concrètement ce dictionnaire dans le sens qui nous intéresse :

LEMME 1.1.2. Avec les notations ci-dessus, désignons par

$$f^* : H \to f^*H$$

la flèche d'adjonction, où $f^*H = f_*f^*H$ par abus. L'homomorphisme A-linéaire composé

$$\chi(f, g)f^* : H \xrightarrow{f^*} f^*H \xrightarrow{\chi(f, g)} g^*H$$

est donné par la formule

$$(1.1.2.1) \qquad \chi(f, g)f^*(x) = \sum_m (f(t) - g(t))^{[m]}\, g^*(\nabla(D)^m x),$$

la somme portant sur tous les multi-indices $m = (m_1, \ldots, m_n) \in N^n$, avec les notations condensées

$$(f(t) - g(t))^{[m]} = (f(t_1) - g(t_1))^{[m_1]} \cdots (f(t_n) - g(t_n))^{[m_n]}$$

(le crochet désignant une puissance divisée dans I), et

$$\nabla(D)^m = \nabla(D_1)^{m_1} \cdots \nabla(D_n)^{m_n}$$

(N.B. la série au second membre de (1.1.2.1) est convergente grâce à la nilpotence topologique de ∇).

Cet énoncé est essentiellement contenu dans [1, II 4.3]. Il suffit de le vérifier après réduction mod p^r pour tout r. Nous noterons

———————

(*) On note encore f (resp. g) : Spec(B) → Spec(A) le morphisme de schémas correspondant.

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p005.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 477ED68FF572C313… Authority evidence: 1EB5DB5D796B31E6…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 6

encore par abus $(f, g) : A \rightrightarrows B$ les $W_r -$homomorphismes déduits de ceux donnés par réduction mod p^r. Soit D l'enveloppe à puissances divisées de l'idéal d'augmentation J de $A \widehat{\otimes}_{W_r} A$ (= $W_r[[t_1, \dots, t_n, u_1, \dots, u_n]]$), notons d_0 (resp. d_1) : $A \to D$ l'homomorphisme donné par a $\mapsto$ a $\otimes$ 1 (resp. 1 $\otimes$ a), définissant la structure de A-module "à gauche" (resp. "à droite") de D. Comme J, engendré par les $t_i - u_i$, est régulier, il résulte de [1, I 4.5.1] que D s'identifie pour la structure gauche à l'algèbre à puissances divisées
$A\langle \xi_1, \dots, \xi_n \rangle$,
où $\xi_i = d_1 t_i - d_0 t_i$ = image de $u_i - t_i$ dans D. Par la propriété universelle des enveloppes à puissances divisées, et du fait que B est complet, il existe un PD-morphisme $s : D \to B$ tel que $s\, d_0 = g$, $s\, d_1 = f$. D'autre part, d'après [1, II 4.3.8], la connexion ∇ définit une PD-stratification

$$\varepsilon : D \otimes_A H\,(= d_1^* M) \simeq H \otimes_A D\,(= d_0^* M)$$

telle que l'homomorphisme $d_1 -$linéaire composé

$$\theta : H \xrightarrow{d_1^*} d_1^* H \xrightarrow{\varepsilon} d_0^* H$$

soit donné par la formule

$$(*) \qquad \theta(x) = \sum_m \nabla(D^m) x \otimes \xi^{[m]},$$

avec les notations condensées évidentes. Par définition, $\chi(f, g)$ est l'isomorphisme déduit de ε par image inverse par s :

$$\chi(f, g) = s^* \varepsilon : f^* H \simeq g^* H.$$

Si l'on convient de regarder f (resp. g) comme définissant une structure de A-module à droite (resp. gauche) sur B, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & \xrightarrow{d_1^*} & & \xrightarrow{\varepsilon} \\ H & \longrightarrow & D \otimes_A H & \longrightarrow & H \otimes_A D \\ & & \| & & \downarrow s \otimes 1 \quad \downarrow 1 \otimes s \\ H - f^* & \longrightarrow & B \otimes_A H - \chi(f, g) & \longrightarrow & H \otimes_A B, \end{array}$$

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p006.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 7DD7F38B566767D4… Authority evidence: 1B45C95468391C98…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 7

qui montre, compte tenu de (*), que le composé horizontal inférieur est donné par

$$\chi(f,g)f^*(x) = \sum_m \nabla(D)^m x \otimes s(\xi)^{[m]}.$$

Mais

$$s(\xi_i) = s(d_1 t_i - d_0 t_i) = f(t_i) - g(t_i),$$

donc

$$\chi(f,g)f^*(x) = \sum_m \nabla(D)^m x \otimes (f(t) - g(t))^{[m]}$$
$$= \sum_m (f(t) - g(t))^{[m]}\, g^*(\nabla(D)^m x).$$

1.1.3. Un F-cristal sur A_0 est par définition un cristal (H, ∇) sur A_0, muni, pour chaque relèvement $\varphi : A \to A$ du Frobenius de A_0 compatible à l'endomorphisme de Frobenius σ de W, d'un homomorphisme horizontal

$$F(\varphi) : \varphi^* H \to H$$

($\varphi^* H$ étant muni de la connexion $\varphi^*\nabla$), tel que $F(\varphi) \otimes \mathbb{Q}_p$ soit un isomorphisme, et que, pour tout couple de relèvements (φ, ψ), on ait un triangle commutatif
(1.1.3.1)

$$\begin{array}{ccc} & \overset{F(\varphi)}{} & \\ \varphi^* H & \longrightarrow & H \\ & \searrow^{\chi(\varphi,\psi)} & \nearrow_{F(\psi)} \\ & \psi^* H, & \end{array}$$

où $\chi(\varphi, \psi)$ est l'isomorphisme canonique défini par ∇ grâce au fait que φ est congru à ψ modulo l'idéal à puissances divisées pA.
L'horizontalité de $F(\varphi)$ s'exprime par la commutativité du carré
(1.1.3.2)

$$\begin{array}{ccc} \varphi^* H & \xrightarrow{\varphi^*\nabla} & \Omega^1_{A/W} \otimes \varphi^* H \\ \downarrow F(\varphi) & & \downarrow 1 \otimes F(\varphi) \\ H & & -\nabla \longrightarrow \Omega^1_{A/W} \otimes H. \end{array}$$

Comme par définition $\varphi^*\nabla$ rend commutatif le carré

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p007.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: DDE72D96FE0CFE73… Authority evidence: 94C907905D959937…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 8

$$\begin{array}{ccc} & \overset{\nabla}{} & \\ H & \longrightarrow & \Omega^1_{A/W} \otimes H \\ & \downarrow \varphi^* & \qquad\qquad \downarrow \varphi^* \otimes \varphi^* \\ & \downarrow & \\ \varphi^* H - \varphi^* \nabla & \longrightarrow & \Omega^1_{A/W} \otimes \varphi^* H, \end{array}$$

on en déduit la formule

$$(1.1.3.3) \qquad \nabla F(\varphi)\varphi^* x = \sum_i \varphi^* \omega_i \otimes F(\varphi)\varphi^* h_i,$$

pour $x \in H$ tel que $\nabla x = \sum_i \omega_i \otimes h_i$.
D'autre part, la loi de variation de $F(\varphi)$ (1.1.3.1) se traduit par la formule

$$(1.1.3.4) \qquad F(\psi)\psi^* x = F(\varphi)\varphi^* x + \sum_{|n|>0} (\psi(t) - \varphi(t))^{[n]} F(\varphi)\varphi^*(\nabla(D)^n x),$$

avec les notations de 1.1.2. On a en effet, d'après les conditions de transitivité vérifiées par χ,

$$\begin{aligned} F(\psi)\psi^* x &= F(\psi)\chi(\varphi,\psi)\chi(\psi,\varphi)\psi^* x \\ &= F(\varphi)\chi(\psi,\varphi)\psi^* x \qquad (1.1.3.1), \end{aligned}$$

d'où 1.1.3.4, grâce à 1.1.2.1 appliqué à $f = \psi$, $g = \varphi$.

1.1.4. Soit $s_0 : A_0 \to k'$ un point de $\mathrm{Spec}(A_0)$ à valeurs dans une extension algébriquement close de k. Si φ relève Frobenius comme ci-dessus, on sait [8, 1.1] qu'il existe un unique relèvement de s_0 en $s : A \to W(k')$ tel que $s\varphi = \sigma s$ (σ désignant le Frobenius de $W(k')$), appelé relèvement de Teichmüller de s_0 relatif à φ.
Soit H un F-cristal sur A_0. Alors $F(\varphi)$ fournit un endomorphisme $\sigma-$linéaire de s^*H, d'où un F-cristal s^*H sur k'. Si φ' est un autre relèvement de Frobenius, et s' le relèvement de Teichmüller de s_0 correspondant, les F-cristaux s^*H et s'^*H sont canoniquement isomorphes grâce à (1.1.3.1) (cf. [8, 1.4]). On écrira s_0^*H pour s^*H, et on dira que s_0^*H est le F-cristal induit par H au point s_0.
1.1.5. Rappelons enfin qu'à tout F-cristal sur k on associe un polygone de Newton et un polygone de Hodge, pour les définitions et propriétés desquels nous renvoyons le lecteur à [12], [8], et [10].

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p008.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 1245D5222DC7A4C3… Authority evidence: D2D39E62A8D9AEBE…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 9

1.2. F-cristaux unités.

1.2.1. On dit qu'un F-cristal (H, ∇) sur A_0 est un F-cristal unité si, pour un relèvement φ à A du Frobenius de A_0, $F(\varphi)$ est un isomorphisme. D'après (1.1.3.1), il revient au même de dire que $F(\varphi)$ est un isomorphisme pour tout relèvement φ.

Tout $\mathbb{Z}_p -$ module libre de type fini M fournit un F-cristal unité sur A_0, à savoir $(H = M \otimes A, \nabla = 1 \otimes d, F(\varphi) = 1 \otimes \varphi)$. En fait, tout F-cristal unité sur A_0 est de ce type :

PROPOSITION 1.2.2 (cf. [8, §3]). Soit H un F-cristal unité sur A_0. Il existe une base (e_i) $(1 \leq i \leq r)$ de H sur A telle que $\nabla e_i = 0$ et $F(\varphi)\varphi^* e_i = e_i$ pour tout relèvement φ du Frobenius de A_0.

Autrement dit, la base (e_i) définit un isomorphisme du F-cristal trivial $\mathbb{Z}_p^r \otimes A$ défini ci-dessus sur H.

Avant de démontrer 1.2.2, faisons d'abord deux remarques.

a) Si $x \in H$ est tel que, pour un relèvement φ, $F(\varphi)\varphi^* x = x$, alors $\nabla x = 0$. En effet, comme φ relève Frobenius, on a

$$\varphi^*(\Omega^1_{A/W}) \subset p\Omega^1_{A/W},$$

donc p divise $\nabla x = \nabla F(\varphi)\varphi^* x$ d'après (1.1.3.3). Le même raisonnement montre, par récurrence, que ∇x est divisible par p^n pour tout n, donc que $\nabla x = 0$.

b) Si $x \in H$ est tel que $F(\varphi)\varphi^* x = x$ pour un relèvement φ, alors $F(\psi)\psi^* x = x$ pour tout relèvement ψ. Compte tenu de a), cela résulte en effet de la loi de variation de $F(\varphi)$ (1.1.3.4).

Il suffit donc de trouver une base (e_i) de H sur A telle que $F(\varphi)\varphi^* e_i = e_i$ pour un relèvement φ choisi, par exemple celui donné par $t_j \mapsto t_j^p$ $(1 \leq j \leq n)$. Soit $s : A \to W$ l'augmentation donnée par $s(t_i) = 0$. Comme $s\varphi = \sigma s$, $F(\varphi)\varphi^*$ induit sur s^*H un automorphisme $\sigma -$ linéaire Φ. Le corps k étant algébriquement clos, il existe une base de s^*H fixe par Φ (partir d'une base fixe par Φ mod p, qui existe grâce au lemme de Lang, et la modifier de proche en proche pour

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p009.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: DE796965F8A1F6CB... Authority evidence: F668C78BBDAA4F04...

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 10

la rendre fixe par Φ mod p^n pour tout n). Autrement dit, il existe une base (f_i) $(1 \leq i \leq r)$ de H telle que, si l'on pose $F(\varphi)\varphi^* = F$, on ait

Ff = (I+M)f,

avec $M \in M_r(A)$ tel que $M = 0$ mod(t) $(= (t_1, \ldots, t_n)A)$. Il suffit de montrer qu'on peut remplacer f par e = (I+N)f, avec $N \in M_r(A)$ tel que $N = 0$ mod(t), de manière à satisfaire à Fe = e. Explicitant, on trouve l'équation

$$(*) \qquad N = M + \varphi(N) + \varphi(N)M.$$

Or l'application $N \mapsto M + \varphi(N) + \varphi(N)M$ est contractante pour la topologie (t)-adique, car $\varphi((t)) \subset (t)^p$, donc (*) possède une solution unique, ce qui achève la démonstration de 1.2.2.

1.2.3. Nous dirons qu'un F-cristal (H, ∇) sur A_0 est topologiquement nilpotent si, pour un relèvement φ du Frobenius de A_0, $F(\varphi)\varphi^*$ est p-adiquement topologiquement nilpotent ; cette condition ne dépend pas du choix de φ, comme le montre (1.1.3.4) (ou plus exactement l'analogue de (1.1.3.4) pour des itérés de $F(\varphi)\varphi^*$, $F(\psi)\psi^*$). Il n'est pas vrai que tout F-cristal sur A_0 soit extension d'un F-cristal topologiquement nilpotent par un F-cristal unité. Plus précisément, on a le critère suivant, cas particulier d'un théorème de Katz [10, 2.4.2] :

PROPOSITION 1.2.4. Soit H un F-cristal sur A_0. Notons F_0 l'endomorphisme de $H_0 = H \otimes_A A_0$ induit par $F(\varphi)\varphi^*$, où φ relève le Frobenius F_{A_0} de A_0 (F_0 est $F_{A_0}-$linéaire, et indépendant de φ). Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) Les rangs stables de (H_0, F_0) au point fermé et en un point géométrique algébriquement clos localisé au point générique de Spec(A_0) sont égaux.

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p010.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 5C3581DC856BEF9F… Authority evidence: B0C60AC6C21AF3C5…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 11

(ii) Il existe une extension de F-cristaux sur A_0,

$$0 \to U \to H \to E \to 0,$$

où U est un F-cristal unité et E un F-cristal topologiquement nilpotent.

Rappelons ce qu'on entend par « rang stable » : si L est un espace vectoriel de dimension finie sur un corps parfait de car. p, muni d'un endomorphisme p-linéaire Φ, L se décompose canoniquement en

$$L = L^{ss} \oplus L^{nilp},$$

où $L^{ss} = \bigcap_n \mathrm{Im}\ \Phi^n$, $L^{nilp} = \bigcup_n \mathrm{Ker}\ \Phi^n$; la dimension de L^{ss} est par définition le rang stable de (L, Φ).

Bien qu'il s'agisse d'un cas particulier de [10, 2.4.2], indiquons rapidement une démonstration de 1.2.4 (*), la situation envisagée ici étant nettement plus simple que celle de (loc. cit.). Il est clair que (ii) implique (i). Inversement, posons $\overline{H}_0 = H_0 \otimes_{A_0} k = H \otimes_A k$. Relevons dans H_0 une base de $\overline{H}_0$ adaptée à la décomposition de $\overline{H}_0$ sous $F_0 \otimes k$,

$$\overline{H}_0 = \overline{H}_0^{ss} \oplus \overline{H}_0^{nilp} :$$

F_0 est alors donné par une matrice

(a c)
(b d),

avec $b = 0$ mod(t), et a inversible de rang $r = \dim \overline{H}_0^{ss}$. Dans une nouvelle base de H_0, donnée par une matrice de passage

$$P = \begin{pmatrix} 1_r & 0 \\ x & 1 \end{pmatrix},$$

la matrice de F_0 est

(a' c') (a c)
(b' d') = P^{-1} (b d) $P^{(p)}$,

et l'on peut déterminer $x = 0$ mod(t) de manière que $b' = 0$: en effet, on obtient pour x l'équation x = f(x), où

$$f(x) = b\,a^{-1} - \mathrm{xcx}^{(p)}a^{-1} + d\,x^{(p)}a^{-1},$$

et cette équation possède une solution unique car f est une application contractante pour la topologie (t)-adique. Dans cette nouvelle base, la matrice de F_0 prend donc la forme

(a' c')
(0 d'),

avec a' inversible de rang r. L'hypothèse (i) entraîne alors que l'endomorphisme d' est nilpotent, car il en est ainsi de d' localisé en une extension algébriquement close du corps des fractions de A_0. Choisissons un relèvement φ de F_{A_0}. Dans une base de H relevant la base de H_0

———————

(*) figurant dans des notes de Katz antérieures à (loc. cit.), non publiées.

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p011.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 1611246B299FBCCD… Authority evidence: B74E581C921F133F…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 12

choisie ci-dessus, la matrice de $F = F(\varphi)\varphi^*$ s'écrit (avec des notations changées)

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix},$$

où $b = 0 \bmod p$, et d topologiquement nilpotent. Appliquant à nouveau la méthode du point fixe (avec cette fois une application contractante pour la topologie p-adique), on voit qu'on peut trouver une nouvelle base $(e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_{r+s})$ de H, donnée par une matrice de passage

$$\begin{pmatrix} 1_r & 0 \\ x & 1_s \end{pmatrix},$$

avec $x = 0 \bmod p$, de manière que dans cette nouvelle base, la matrice de F s'écrive

$$\begin{pmatrix} a' & c' \\ 0 & d' \end{pmatrix},$$

avec a' inversible (de rang r) et d' topologiquement nilpotent. Le sous-F-module

$$U = \oplus_{1 \le i \le r} \mathrm{A}e_i$$

est égal à $\bigcap_{n \ge 0} \mathrm{Im}\ F^n$, donc (grâce à (1.1.3.2)) horizontal, i.e. tel que

$$\nabla U \subset \Omega^1_{A/W} \otimes U.$$

D'après (1.1.3.1), U est donc un sous-F-cristal unité de H, et par construction le F-cristal H/U est topologiquement nilpotent, ce qui achève la démonstration.

REMARQUE 1.2.5. Sous les hypothèses de 1.2.4, le F-cristal U est caractérisé, en termes de H, par $U = \bigcap \mathrm{Im}\ F^n$ (où $F = F(\varphi)\varphi^*$). Nous dirons que U est le sous-F-cristal unité de H.

1.3. F-cristaux ordinaires.

1.3.1. Soient H un $F-$cristal sur A_0, $H_0 = H \otimes_A A_0$. Soit φ un relèvement à A du Frobenius F_{A_0}, posons

$$H_0^{(p)} = F^*_{A_0} H_0 = \varphi^* H \otimes_A A_0,$$

et, pour $i \in \mathbb{N}$,

$$(1.3.1.1) \qquad M^i H_0^{(p)} = \{x \in H_0^{(p)} \mid \text{il existe } y \in \varphi^* H \text{ relevant } x \text{ et tel que } F(\varphi)\, y \in p^i H\},$$

$$(1.3.1.2) \qquad \mathrm{Fil}^i H_0 = H_0 \cap M^i H_0^{(p)}$$

(où H_0 est considéré comme sous-module de $(F_{A_0})_* H_0^{(p)}$ par la flèche d'adjonction),

$$(1.3.1.3) \qquad \mathrm{Fil}_i H_0 = \{x \in H_0 \mid \text{il existe } y \in H \text{ relevant } x \text{ et tel que } p^i y \in \mathrm{Im}\ F(\varphi)\}.$$

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p012.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 5C99A788EEF8D263… Authority evidence: 504614F13B707BF0…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 13

D'après (1.1.3.1), les sous-modules $\mathrm{Fil}^i H_0$ (resp. $\mathrm{Fil}_i H_0$) ne dépendent pas du choix de φ ; ils forment une filtration décroissante (resp. croissante) de H_0, qu'on appelle filtration de Hodge (resp. filtration conjuguée), cf. [15, 1.9], où cette filtration est notée F^i_{Hodge} (resp. F^{-i}_{con}). On peut montrer [15, 2.2] que l'on a aussi

$$(1.3.1.4) \qquad \mathrm{Fil}^i H_0 = \{x \in H_0 \mid \text{il existe } y \in H \text{ relevant } x \text{ et tel que } F(\varphi)\varphi^* y \in p^i H\}.$$

La terminologie provient du théorème de Mazur-Ogus [3, 8.26] affirmant que si X_0/A_0 est un schéma (ou schéma formel) propre et lisse tel que

(i) la cohomologie cristalline $H^*(X_0/A)$ soit un A-module libre,

(ii) la suite spectrale

$$E_1^{ij} = H^j(X_0, \Omega^i_{X_0/A_0}) \Rightarrow H^*_{\mathrm{DR}}(X_0/A_0)$$

dégénère en E_1 et E_1 soit libre sur A_0 et de formation compatible au changement de base, alors si l'on pose $H = H^n(X_0/A)$ (donc $H_0 = H^n_{\mathrm{DR}}(X_0/A_0)$) ($n$ entier fixé) la filtration $\mathrm{Fil}^i H_0$ (resp. $\mathrm{Fil}_i H_0$) coïncide avec la filtration canonique sur l'aboutissement de la suite spectrale ci-dessus (resp. la suite spectrale conjuguée

$$E_2^{ij} = H^i(X_0, H^j(\Omega^\bullet{}_{X_0/A_0})) \Rightarrow H^*_{\mathrm{DR}}(X_0/A_0)).$$

Rappelons [15, 1.6] que les filtrations 1.3.1.2 et 1.3.1.3 sont finies, séparées et exhaustives, et que pour n donné les conditions $\mathrm{Fil}^{n+1} H_0 = 0$ et $\mathrm{Fil}_n H_0 = H_0$ sont équivalentes : on dit alors que H est de niveau $\leq n$.

On notera

$$(1.3.1.5) \qquad \mathrm{gr}^i H_0 \qquad (\text{resp. } \mathrm{gr}_i H_0)$$

le gradué associé à la filtration $\mathrm{Fil}^i H_0$ (resp. $\mathrm{Fil}_i H_0$). Si $\mathrm{gr}_i H_0$ est libre sur A_0, il en est de même de $\mathrm{gr}^i H_0$, la formation de $\mathrm{gr}_i H_0$ et $\mathrm{gr}^i H$ commute au changement de base, et, pour tout i, $\mathrm{gr}_i H_0$ et $\mathrm{gr}^i H_0$ sont canoniquement isomorphes, en particulier ont même rang h_i, qu'on appellera i-ième nombre de Hodge de H [15, 1.12, 2.3].

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p013.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 3E86CB3688D32105… Authority evidence: 82640F1B95F6EFC1…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 14

Rappelons d'autre part [15, 1.6, 2.6] que la filtration conjuguée est horizontale pour la connexion ∇_0 induite sur H_0 (et de gradué associé de p-courbure nulle), tandis que la filtration de Hodge vérifie la condition de transversalité de Griffiths

$$(1.3.1.6) \qquad \nabla_0 \operatorname{Fil}^i H_0 \subset \Omega^1_{A_0/k} \otimes \operatorname{Fil}^{i-1} H_0.$$

La notion de F-cristal ordinaire a été dégagée par Mazur [12] et Ogus, à qui est due la caractérisation suivante [15, 3.1.3] :

PROPOSITION 1.3.2. Soit H un F-cristal sur A_0 tel que $\operatorname{gr}\bullet H_0$ soit libre sur A_0. Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) les polygones de Newton et de Hodge du F-cristal $e_0^* H$ induit par H au point fermé $e_0 : A_0 \to k$ (1.1.4) coïncident ;

(i') pour tout point s_0 de $\operatorname{Spec}(A_0)$ à valeurs dans une extension algébriquement close k' de k, les polygones de Newton et de Hodge du F-cristal $s_0^*(H)$ (1.1.4) coïncident ;

(ii) les filtrations de Hodge et conjuguée de H_0 sont opposées, i.e. on a, pour tout i,

$$H_0 = \operatorname{Fil}_i H_0 \oplus \operatorname{Fil}^{i+1} H_0 ;$$

(iii) il existe une unique filtration de H par des sous-F-cristaux

$$(1.3.2.1) \qquad 0 \subset U_0 \subset U_1 \subset \ldots \subset U_i \subset U_{i+1} \subset \ldots$$

tels que U_i relève $\operatorname{Fil}_i H_0$, et que U_i/U_{i-1} soit de la forme $V_i(-i)$, où V_i est un F-cristal unité et $(-i)$ désigne la torsion à la Tate consistant à remplacer F par $p^i F$.

DÉFINITION 1.3.3. On dit qu'un F-cristal H sur A_0 est ordinaire si $\operatorname{gr}\bullet H_0$ est libre et H vérifie les conditions équivalentes de 1.3.2.

Démontrons 1.3.2. L'implication (i') $\Rightarrow$ (i) est triviale, et il est clair que (iii) entraîne (i'). Prouvons (i) $\Rightarrow$ (ii). Supposons H de niveau $\leq n$, et la conclusion établie pour les F-cristaux de niveau $\leq n-1$. Notons F l'endomorphisme p-linéaire de H_0 induit

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p014.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: E124A1953D646FAE… Authority evidence: 965C4C608242170F…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 15

par $F(\varphi)$ pour un relèvement φ (F ne dépend pas de ce choix). Par définition (1.3.1), on a

$$(1.3.3.1) \qquad \mathrm{Fil}_0 H_0 = \mathrm{Im}\ F : H_0^{(p)} \to H_0, \qquad \mathrm{Fil}^1 H_0 = \mathrm{Ker}\ F : H_0 \to H_0.$$

L'hypothèse (i) entraîne d'abord que le rang stable de $e_0^* H_0$ est $h_0 = \mathrm{rg}\ \mathrm{Fil}_0 H_0$ (coïncidence des parties de pente 0 des polygones de Newton et de Hodge de $e_0^* H$). Soit s_0 un point de $\mathrm{Spec}(A_0)$ à valeurs dans une extension algébriquement close du corps des fractions de A_0. La démonstration de 1.2.4 montre que l'on a

$$\mathrm{rg.st}(s_0^* H_0) \geq \mathrm{rg.st}(e_0^* H_0)$$

$$(\mathrm{rg.st} = \text{rang stable}),\ \text{mais comme on } a \text{ aussi}$$

$$\mathrm{rg.st}(s_0^* H_0) \leq h_0$$

d'après (1.3.3.1), on en déduit

$$\mathrm{rg.st}(e_0^* H_0) = \mathrm{rg.st}(s_0^* H_0) = h_0.$$

Il en résulte d'une part que l'on a

$$\mathrm{Fil}_0(s_0^* H_0) = (s_0^* H_0)^s s, \qquad \mathrm{Fil}^1(s_0^* H_0) = (s_0^* H_0)^n \mathrm{ilp},$$

donc $s_0^* \mathrm{Fil}_0 H_0 \cap s_0^* \mathrm{Fil}^1 H_0 = 0$, donc

$$(1.3.3.2) \qquad H_0 = \mathrm{Fil}_0 H_0 \oplus \mathrm{Fil}^1 H_0.$$

D'autre part, d'après 1.2.4, on a une suite exacte de F-cristaux sur A_0,

$$(1.3.3.3) \qquad 0 \to U_0 \to H \to E \to 0,$$

où U_0 est le sous-F-cristal unité de H, et E un F-cristal topologiquement nilpotent. Comme par définition $\mathrm{rg}(U_0) = \mathrm{rg.st}(e_0^* H_0) = h_0$, U_0 relève $\mathrm{Fil}_0 H_0$, donc la projection $H \to E$ induit un isomorphisme $\mathrm{Fil}^1 H_0 \simeq E_0$, ce qui signifie que $F(\varphi) : \varphi^* E \to E$ est divisible par p, donc que $E = E'(-1)$, où E' est un F-cristal de niveau $\leq n-1$. Il est clair que $e_0^* E$, donc aussi $e_0^* E'$, a mêmes polygones de Newton et de Hodge, donc par l'hypothèse de récurrence appliquée à E', on

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p015.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: C0F741FB66F5F641… Authority evidence: 69E52138BFD03F53…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 16

en conclut que les filtrations de Hodge et conjuguée de $E_0 = E \otimes A_0$ sont opposées. On aura donc prouvé (ii) si l'on vérifie que la projection $H \to E$ induit des isomorphismes (pour $i \geq 0$)

$$\mathrm{Fil}_i H_0 / \mathrm{Fil}_0 H_0 \simeq \mathrm{Fil}_i E_0, \qquad \mathrm{Fil}^{i+1} H_0 \simeq \mathrm{Fil}^{i+1} E_0.$$

Or il est clair que ces flèches sont injectives, et leur surjectivité résulte aisément de ce que U_0 est un F-cristal unité. Prouvons maintenant (ii) $\Rightarrow$ (iii). On suppose à nouveau H de niveau $\leq n$, et la conclusion établie pour les F-cristaux de niveau $\leq n-1$. L'unicité de (1.3.2.1) est claire, compte tenu de l'hypothèse de récurrence, car U_0 est nécessairement le sous-F-cristal unité de H. Pour l'existence, notons qu'on a (1.3.3.2) par hypothèse. D'après (1.3.3.1), on en déduit

$$e_0^* \mathrm{Fil}_0 H_0 = (e_0^* H_0)^s s, \qquad s_0^* \mathrm{Fil}_0 H_0 = (s_0^* H_0)^s s$$

(car la décomposition en partie semi-simple et partie nilpotente est unique), donc les rangs stables de $e_0^* H_0$ et $s_0^* H_0$ sont égaux. Grâce à 1.2.4, on obtient donc encore une suite exacte 1.3.3.3. On a vu ci-dessus que les filtrations de Hodge et conjuguées de E_0 se déduisent de celles de H_0 par passage au quotient : elles sont donc opposées. Comme $E = E'(-1)$, avec E' de niveau $\leq n-1$, l'hypothèse de récurrence entraîne l'existence d'une filtration de E par des sous-F-cristaux

$$0 = W_0 \subset W_1 \subset \ldots \subset W_i \subset W_{i+1} \subset \ldots$$

tels que W_i relève $\mathrm{Fil}_i E_0$, et W_i / W_{i-1} soit de la forme $T_i(-i)$, avec T_i un F-cristal unité. Pour $i \geq 1$, notons U_i l'image inverse de W_i dans H. Les U_i, pour $i \geq 1$, et U_0 forment une filtration (1.3.2.1), qui satisfait visiblement aux conditions énoncées en (iii). Ceci achève la démonstration de 1.3.2.

REMARQUE 1.3.4. Si $A_0 = k$, la filtration (1.3.2.1) admet un scindage unique

$$(1.3.4.1) \qquad U_i = \oplus_{j \leq i} V_j(-j),$$

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p016.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: C4CD5A66973E223B… Authority evidence: 20D7A8915B9E9479…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 17

où V_j est un F-cristal unité. C'est un cas particulier du théorème de Katz [10, 1.6.1], mais il est facile de vérifier ce point directement : l'unicité est claire, car, pour $j < i$, $\mathrm{Hom}(V_i(-i), V_j(-j)) = 0$, quant à l'existence du scindage, elle s'établit aisément par récurrence sur le niveau, à l'aide d'un argument de point fixe analogue à ceux utilisés dans la démonstration de 1.2.4.

1.3.5. Soit H un F-cristal sur A_0. On appellera filtration de Hodge sur H une filtration finie décroissante par des sous-A-modules libres

$$\mathrm{Fil}^0 H = H \supset \mathrm{Fil}^1 H \supset \ldots \supset \mathrm{Fil}^i H \supset \mathrm{Fil}^{i+1} H \supset \ldots$$

vérifiant les deux conditions suivantes :

(i) pour tout i, $\mathrm{Fil}^i H$ relève $\mathrm{Fil}^i H_0$,

(ii) (« transversalité ») pour tout i, on a

$$(1.3.5.1) \qquad \nabla \mathrm{Fil}^i H \subset \Omega^1_{A/W} \otimes \mathrm{Fil}^{i-1} H.$$

On appellera F-cristal de Hodge sur A_0 un F-cristal sur A_0 muni d'une filtration de Hodge.

Un exemple standard est fourni, dans la situation géométrique envisagée en 1.3.1, par la donnée d'un relèvement de X_0/A_0 en un schéma formel propre et lisse X/A tel que la suite spectrale de Hodge de X/A,

$$E_1^{ij} = H^j(X, \Omega^i_{X/A}) \Rightarrow H^*_{\mathrm{DR}}(X/A) (= H^*(X_0/A)),$$

dégénère en E_1, avec un terme E_1 libre sur A. La filtration de Hodge de $H^n_{\mathrm{DR}}(X/A)$, aboutissement de cette suite spectrale, vérifie les conditions (i) et (ii) ci-dessus.

PROPOSITION 1.3.6. Soit $(H, \mathrm{Fil}^\bullet H)$ un F-cristal de Hodge sur A_0. Si H est ordinaire (1.3.3), les filtrations U_i (1.3.2.1) et $\mathrm{Fil}^\bullet H$ sont opposées, i.e. on a, pour tout i, $H = U_i \oplus \mathrm{Fil}^{i+1} H$, d'où une décomposition

$$(1.3.6.1) \qquad H = \oplus_i H^i, \qquad H^i = U_i \cap \mathrm{Fil}^i H,$$

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p017.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 2EAD9ED926F2F86D… Authority evidence: 3DF76B782534E454…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 18

avec H^i de rang h_i (1.3.1.5).

C'est une conséquence immédiate de 1.3.2 et 1.3.5 (i) (la condition (ii) ne sert pas).

Dans l'exemple ci-dessus, supposons le F-cristal $H = H^n_{\mathrm{DR}}(X/A)$ ordinaire. Pour chaque $r \geq 1$, la suite spectrale conjuguée

$$(*)_r \qquad E_2^{ij} = H^i(X \otimes W_r,\ H^j(\Omega^\bullet_{X\otimes W_r/A\otimes W_r})) \Rightarrow H^*_{\mathrm{DR}}(X \otimes W_r/A \otimes W_r)$$

définit une filtration $(U_{i,r})$ sur $H^n_{\mathrm{DR}}(X \otimes W_r/A \otimes W_r)$. On peut espérer que la limite projective des suites spectrales $(*)_r$ est une suite spectrale, dont la filtration aboutissement sur H^n est la limite des $(U_{i,r})$ et coïncide avec la filtration (U_i).

1.4. F − cristaux de Hodge ordinaires de niveau ≤ 1.

1.4.1. Soit H un F − cristal de Hodge ordinaire de niveau ≤ 1 sur A_0. D'après 1.3.2, on a donc une extension de F − cristaux

$$(1.4.1.1) \qquad 0 \to U \to H \to V(-1) \to 0,$$

où U et V sont des F-cristaux unités, et U relève $\mathrm{Fil}_0 H_0$.

On notera r (resp. s) le rang de U (resp. V). D'autre part, H est muni du sous-module libre $\mathrm{Fil}^1 H$, qui relève $\mathrm{Fil}^1 H_0$, donc vérifie, d'après (1.3.1.4),

$$(1.4.1.2) \qquad F(\varphi)\varphi^* \mathrm{Fil}^1 H \subset \mathrm{pH}$$

pour tout relèvement φ de Frobenius. De plus, d'après 1.3.6, H, en tant que A-module, se décompose en somme directe

$$(1.4.1.3) \qquad H = U \oplus \mathrm{Fil}^1 H.$$

En particulier, $\mathrm{Fil}^1 H$ est de rang s, et se projette isomorphiquement sur V.

THÉORÈME 1.4.2. Avec les notations de 1.4.1 : (i) Il existe une base a $= (a_i)_{1 \leq i \leq r}$ du A-module U et $b = (b_i)_{1 \leq i \leq s}$ du A-module $\mathrm{Fil}^1 H$ vérifiant les conditions

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p018.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 7AFD8C046DE3DBB5... Authority evidence: B8AED4F403301764...

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 19

$$(1.4.2.1) \qquad \nabla a_i = 0, \qquad 1 \le i \le r,$$

$$(1.4.2.2) \qquad \nabla b_i = \sum_{1 \le j \le r} \eta_{ij} \otimes a_j, \qquad \eta_{ij} \in \Omega^1_{A/W}, \qquad 1 \le i \le s,$$

$$(1.4.2.3) \qquad F(\varphi)\varphi^* a_i = a_i, \qquad 1 \le i \le r,$$

$$(1.4.2.4) \qquad F(\varphi)\varphi^* b_i = p\, b_i + p \sum_{1 \le j \le r} u_{ij}(\varphi) a_j, \qquad u_{ij}(\varphi) \in A, \qquad 1 \le i \le s,$$

pour tout relèvement φ de Frobenius. De plus, les formes η_{ij} sont fermées, et vérifient, pour tout relèvement φ de Frobenius,

$$(1.4.2.5) \qquad \varphi^* \eta_{ij} = p\eta_{ij} + p\, \mathrm{d}u_{ij}(\varphi).$$

(ii) Les bases a et b étant choisies comme en (i), il existe une unique famille de séries formelles $\tau_{ij} \in$ K[[t]] (où K est le corps des fractions de W) telles que, quels que soient i et j,

$$(1.4.2.6) \qquad \eta_{ij} = d\tau_{ij},$$

$$(1.4.2.7) \qquad \varphi^* \tau_{ij} - p\tau_{ij} - \mathrm{pu}_{ij}(\varphi) = 0$$

pour tout relèvement φ de Frobenius. On a

$$(1.4.2.8) \qquad \tau_{ij}(0) \in \mathrm{pW}.$$

De plus, si $p \neq 2$, les séries

$$(1.4.2.9) \qquad q_{ij} = \exp(\tau_{ij})$$

sont définies, appartiennent à A, et vérifient $q_{ij}(0) = 1$ mod pW.

Prouvons (i). Vu la structure des F-cristaux unités (1.2.2), il existe une base a = $(a_i)_{1 \le i \le r}$ de U vérifiant (1.4.2.1) et (1.4.2.3), et une base $b = (b_i)_{1 \le i \le s}$ de Fil^1 H telle que, si b'_i désigne l'image de b_i dans $V(-1)$, on ait $\nabla b'_i = 0$ et $F(\varphi)\varphi^* b'_i = p\, b'_i$ pour tout i et tout relèvement φ de Frobenius. Par suite ∇b_i et $F(\varphi)\varphi^* b_i$ s'écrivent sous les formes (1.4.2.2) et (1.4.2.4). L'intégrabilité de ∇ entraîne, par application de ∇ à (1.4.2.2), que $d\eta_{ij} = 0$ quels que soient i et j. D'autre part, appliquant ∇ à (1.4.2.4), et utilisant l'horizontalité de F (1.1.3.3), on obtient les relations (1.4.2.5).

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p019.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: FF351EE8E2034B5D… Authority evidence: B663C12093488C0A…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 20

Prouvons (ii). Les formes η_{ij} étant fermées, il existe, en vertu du lemme de Poincaré, des séries $\tau_{ij} \in K[[t]]$, déterminées à une constante près, telles que l'on ait (1.4.2.6). La relation (1.4.2.5) entraîne alors que

$$\varphi^*\tau_{ij} - p\tau_{ij} - \mathrm{pu}_{ij}(\varphi) \in K,$$

donc

$$(1.4.2.10) \qquad \varphi^*\tau_{ij} - p\tau_{ij} - \mathrm{pu}_{ij}(\varphi) = (\varphi^*\tau_{ij})(0) - p\tau_{ij}(0) - \mathrm{pu}_{ij}(\varphi)(0).$$

Notons $x \mapsto x^\sigma$ l'automorphisme de Frobenius de K. Fixons tout d'abord le relèvement φ de Frobenius tel que $\varphi(t_i) = t_i^p$, et normalisons τ_{ij} par la condition

$$(1.4.2.11) \qquad (\varphi^*\tau_{ij})(0) - p\tau_{ij}(0) - \mathrm{pu}_{ij}(\varphi)(0) = 0,$$

qui s'écrit encore (car $(\varphi^*\tau_{ij})(0) = \tau_{ij}(0)^\sigma$)

$$(1.4.2.12) \qquad \tau_{ij}(0) = \sum_{n\geq 1} V^n u_{ij}(\varphi)(0)$$

(où $\mathrm{Vx} = \mathrm{pF}^{-1}x = \mathrm{px}^{\sigma^{-1}}$). En particulier, on a (1.4.2.8). Montrons que, si ψ est un relèvement quelconque de Frobenius, la condition (1.4.2.7), avec φ remplacé par ψ, est satisfaite. Compte tenu de (1.4.2.10) (avec φ remplacé par ψ), il revient au même de vérifier que l'on a

$$(1.4.2.13) \qquad (\psi^*\tau_{ij})(0) - p\tau_{ij}(0) - \mathrm{pu}_{ij}(\psi)(0) = 0.$$

Si $\psi(0) = 0$ (i.e. ψ est compatible à l'augmentation $e : \mathrm{W}[[t]] \to W$), on a $(\psi^*\tau_{ij})(0) = \tau_{ij}(0)^\sigma$, et (1.4.2.13) équivaut à (1.4.2.12) avec φ remplacé par ψ. Il suffit donc de vérifier que $u_{ij}(\varphi)(0) = u_{ij}(\psi)(0)$. Or l'augmentation e est le relèvement de Teichmüller (1.1.4) de l'augmentation $k[[t]] \to k$ simultanément pour φ et pour ψ, donc $F(\varphi)\varphi^*$ et $F(\psi)\psi^*$ induisent le même endomorphisme $\sigma-$linéaire F de e^*H. Appliquant e^* à (1.4.2.4) écrit pour φ et pour ψ, on obtient donc

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 21

$$F(e^*b_i) = p(e^*b_i) + p\sum_{1\le j\le r} u_{ij}(\varphi)(0)(e^*a_j)$$
$$= p(e^*b_i) + p\sum_{1\le j\le r} u_{ij}(\psi)(0)(e^*a_j),$$

d'où $u_{ij}(\varphi)(0) = u_{ij}(\psi)(0)$, ce qui prouve (1.4.2.13) dans ce cas.

Si maintenant ψ est un relèvement quelconque de Frobenius, on peut écrire

$$\psi(t_i) = \psi_0(t_i) + \mathrm{pw}_i, \qquad 1 \le i \le n,$$

avec $w = (w_1, \dots, w_n) \in W^n$, où $\psi_0 : A \to A$ est un relèvement de Frobenius tel que $\psi_0(0) = 0$. Appliquant (1.1.3.4), avec $\varphi = \psi_0$, à $x = b_i$, on obtient, compte tenu de (1.4.2.4),

$$(*) \qquad \sum_{1\le j\le r} \mathrm{pu}_{ij}(\psi)a_j = \sum_{1\le j\le r} \mathrm{pu}_{ij}(\psi_0)a_j$$
$$+ \sum_{|n|>0} p^{[n]}(w^\sigma)^n F(\psi_0)\psi_0^*(\nabla(D)^n b_i).$$

Calculons $\nabla(D)^n b_i$: si $D_k = \partial/\partial t_k$, on a, d'après (1.4.2.2), (1.4.2.6),

$$\nabla(D_k)b_i = \langle D_k, \sum_j d\tau_{ij} \otimes a_j\rangle = \sum_j (D_k\tau_{ij})a_j,$$

d'où, comme $\nabla a_j = 0$,

$$\nabla(D^n)b_i = \sum_j (D^n\tau_{ij})a_j$$

pour tout multi-exposant n tel que $|n| > 0$. Reportant dans (*), on obtient
$\mathrm{pu}_{ij}(\psi) = \mathrm{pu}_{ij}(\psi_0) + \sum_{|n|>0} p^{[n]}(w^\sigma)^n\ \psi_0^*(D^n\tau_{ij})$,
et par suite la formule (1.4.2.13) à vérifier s'écrit

$$(**) \qquad (\psi^*\tau_{ij})(0) - p\tau_{ij}(0) - \mathrm{pu}_{ij}(\psi_0)(0)$$
$$- \sum_{|n|>0} p^{[n]}(w^n(D^n\tau_{ij})(0))^\sigma = 0.$$

Notons que $\psi = \psi_0 \circ$ a, où a est l'endomorphisme de W-algèbre de A tel que $a(t_i) = t_i + \mathrm{pw}_i$, donc que

$$(\psi^*\tau_{ij})(0) = (\psi_0^*(a^*\tau_{ij}))(0) = (a^*\tau_{ij})(0)^\sigma = \tau_{ij}(\mathrm{pw})^\sigma.$$

D'autre part, ψ_0 vérifie (1.4.2.13) comme on l'a vu plus haut, car $\psi_0(0) = 0$, et $(\psi_0^*\tau_{ij})(0) = \tau_{ij}(0)^\sigma$, donc

$$p\tau_{ij}(0) = \tau_{ij}(0)^\sigma - \mathrm{pu}_{ij}(\psi_0)(0).$$

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p021.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 1E4CF5B373CF50E8... Authority evidence: 51A625DA813BD534...

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 22

On peut donc récrire (**) sous la forme

$$\tau_{ij}(pw)^{\sigma} = \tau_{ij}(0)^{\sigma} + \sum_{|n|>0} p^{[n]}(w^n(D^n\tau_{ij})(0))^{\sigma},$$

i.e.

$$\tau_{ij}(pw) = \tau_{ij}(0) + \sum_{|n|>0} p^{[n]} w^n(D^n\tau_{ij})(0).$$

Or on reconnaît ici le développement de Taylor de $\tau_{ij}(pw)$. Cela établit (**), donc (1.4.2.13) dans tous les cas. Pour démontrer la dernière assertion de 1.4.2, nous aurons besoin du résultat suivant de Dwork :

LEMME 1.4.3 ([5], Lemma 1) (*). Notons φ l'automorphisme $\sigma-$linéaire de K[[t]] (où $t = (t_1, \dots, t_n)$ et K est le corps des fractions de W) donné par $t_i \mapsto t_i^p$. Soit $f \in$ K[[t]] tel que f(0) = 1. Les conditions suivantes sont équivalentes :

$$(i)\ f \in W[[t]],$$

(ii) $(\varphi^* f)/f^p = 1 + pu$, avec $u \in$ W[[t]], u(0) = 0.

L'implication $(i) \Rightarrow$ (ii) est immédiate. Rappelons la démonstration de (ii) $\Rightarrow$ (i). Écrivons $f = \sum_i a_i t^i$ $(a_0 = 1)$, et supposons prouvé que $a_i \in W$ pour |i| < r (où $|i| = i_1 + \dots + i_n$). Notant ( )<j la partie de degré total < j, on calcule

$((\sum_{|i|\geq 0} a_i t^i)^p) < r$

$= ((\sum_{|i|\leq r-1} a_i t^i)^p) < r + p\sum_{|i|=r} a_i t^i$

$= (\sum_{|i|\leq r-1} a_i^p t^{pi}) < r + p\sum_{|i|=r} a_i t^i \bmod pW[[t]]$,

puis, posant $f^p/(\varphi^* f) = 1 + p\sum_{|i|\geq 1} d_i t^i$ $(d_i \in W)$,

$((\sum_{|i|\geq 0} a_i^{\sigma} t^{pi})(1 + p\sum_{|i|\geq 1} d_i t^i)) < r$

$= ((\sum_{|i|\leq r-1} a_i^{\sigma} t^{pi})(1 + p\sum_{|i|\geq 1} d_i t^i)) < r$

$= (\sum_{|i|\leq r-1} a_i^{\sigma} t^{pi}) < r \bmod pW[[t]]$

$= (\sum_{|i|\leq r-1} a_i^p t^{pi}) < r \bmod pW[[t]]$.

———————

(*) Voir aussi Hazewinkel [7] pour une généralisation.

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p022.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 40449B09BA29FBDD… Authority evidence: 3C49147173448D73…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 23

Comparant les deux expressions obtenues pour $(f^p) < r$, on trouve

$$p \sum_{|i|=r} a_i t^i \in \mathrm{pW}[[t]],$$

donc $a_i \in W$ pour tout i tel que |i| = r, ce qui prouve (ii) $\Rightarrow$ (i).

Avant de revenir à la démonstration de 1.4.2, indiquons deux conséquences immédiates de 1.4.3.

COROLLAIRE 1.4.4. Soit $g \in$ K[[t]] tel que g(0) = 0. Les conditions suivantes sont équivalentes :

$$(i)\ \exp(g) \in W[[t]],$$

(ii) $\varphi^* g - \mathrm{pg} \in$ pW[[t]].

En effet, posons $f = \exp(\mathrm{g})$. Comme, pour $n \geq 1$, $p^n/n!$ (et a fortiori p^n/n) appartiennent à pW, la condition (ii) équivaut à dire que $\varphi^* f / f^p = 1 + \mathrm{pu}$, avec $u \in$ W[[t]], u(0) = 0.

COROLLAIRE 1.4.5. Supposons $p \neq 2$. Soit $g \in$ K[[t]], tel que g(0) $\in$ pW, et $\varphi^* g - \mathrm{pg} \in$ pW[[t]]. Alors la série $f = \exp(\mathrm{g})$ est définie, appartient à W[[t]], et vérifie f(0) = 1 mod p.

En effet, soit $h = g - \mathrm{g}(0)$. Comme $p \neq 2$ et que g(0) $\in$ pW, exp(g(0)) est défini, donc aussi exp(g) = exp(g(0))exp(h). Posons g(0) = a (a $\in W$). On a

$$\varphi^* h - \mathrm{ph} = \varphi^* g - \mathrm{pg} - (a^\sigma - \mathrm{pa}) \in \mathrm{pW}[[t]]$$

(car $a^\sigma - \mathrm{pa} \in$ pW et $\varphi^* g - \mathrm{pg} \in$ pW[[t]]). Donc, par 1.4.4 appliqué à h, on a exp(h) $\in$ W[[t]], et comme exp(a) = 1 mod pW, on en conclut que $f = \exp(\mathrm{g}) \in$ W[[t]] et f(0) = 1 mod pW.

Fin de la démonstration de 1.4.2. Il suffit d'appliquer 1.4.5 à τ_{ij} : les hypothèses de 1.4.5 sont vérifiées en vertu de (1.4.2.7) et (1.4.2.8).

1.4.6. Si H est un F-cristal de Hodge, comme en 1.3.5, la connexion ∇ induit, grâce à (1.3.5.1), un homomorphisme A-linéaire

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p023.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 280355AEFC2B4BFD… Authority evidence: BA0CCFFF4DE46160…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 24

$$(1.4.6.1) \qquad \operatorname{gr}\nabla : \operatorname{gr}^i H \to \Omega^1_{A/W} \otimes \operatorname{gr}^{i-1} H$$

(où $\operatorname{gr}^i = \operatorname{Fil}^i / \operatorname{Fil}^{i+1}$). En particulier, dans la situation de 1.4.1, ∇ induit un homomorphisme A-linéaire

$$(1.4.6.2) \qquad \operatorname{gr}\nabla : \operatorname{Fil}^1 H \to \Omega^1_{A/W} \otimes U,$$

puisque $U \simeq H / \operatorname{Fil}^1 H$ (1.4.1.3), d'où un homomorphisme A-linéaire

$$(1.4.6.3) \qquad \operatorname{gr}\nabla : T_{A/W} \to \operatorname{Hom}_A(\operatorname{Fil}^1 H, U),$$

où $T_{A/W} = (\Omega^1_{A/W})\vee$.

COROLLAIRE 1.4.7. Sous les hypothèses de 1.4.1, supposons que (1.4.6.3) soit un isomorphisme, et que p soit différent de 2. Alors les éléments $q_{ij} - 1$ ($1 \le i \le s$, $1 \le j \le r$) définis en (1.4.2.9) forment avec p un système régulier de paramètres de $A = \mathrm{W}[[t]]$, i.e. le W-homomorphisme

$$W[[x_{ij}]]_{(1\le i\le s, 1\le j\le r)} \to A$$

envoyant x_{ij} sur $q_{ij} - 1$ est un isomorphisme, et si l'on note φ le relèvement de Frobenius défini par $\varphi(q_{ij}) = q_{ij}^p$, on a

$$(1.4.7.1) \qquad F(\varphi)\varphi^* b_i = p\, b_i$$

pour tout i (avec les notations de 1.4.2).

Notons $m = (p, t_1, \dots, t_n)$ l'idéal maximal de $A = \mathrm{W}[[t]]$. Comme $q_{ij}(0) = 1 \bmod \mathrm{pW}$, les q_{ij} sont des unités de A congrues à 1 mod m. Pour prouver la première assertion, il suffit de montrer que les formes $\eta_{ij} = d \log q_{ij}$ forment une base (sur A) de $\Omega^1_{A/W}$.

Tout homomorphisme $f : \operatorname{Fil}^1 H \to U$ est déterminé par une matrice (f_{ij}) telle que $f(b_i) = \sum_j f_{ij} a_j$. Notons D_{ij} la base de $T_{A/W}$ telle que

$$(\operatorname{gr}\nabla)(D_{ij})_k \ell = \{\, 0 \text{ si } (k,\ell) \ne (i,j),$$
$$1 \text{ si } (k,\ell) = (i,j).\,\}$$

Pour tout $D \in T_{A/W}$, on a, d'après (1.4.2.2),

$(\operatorname{gr}\nabla)(D) b_i = \sum_j \eta_{ij}(D) a_j$,

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p024.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 3D4589DF546A411F… Authority evidence: 0305B7D8B36E6BD8…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 25

donc
(gr ∇)$(D_{ij})_k \ell = \eta_k \ell(D_{ij})$.

Les η_{ij} forment donc une base de $\Omega^1_{A/W}$, à savoir la base duale de la base D_{ij}. D'autre part, la relation $\varphi^* q_{ij} = q_{ij}^p$ entraîne $\varphi^* \log q_{ij} = p \log q_{ij}$, mais comme $\log q_{ij} = \tau_{ij}$, (1.4.2.7) entraîne $u_{ij}(\varphi) = 0$, donc (1.4.7.1) résulte de (1.4.2.4).

1.4.8. Soit, comme en 1.3.6, $(H, \mathrm{Fil}^\bullet H)$ un F-cristal de Hodge sur A_0 (= k[[t]]) tel que H soit ordinaire. Supposons H de niveau $\leq N$, i.e. (1.3.1) $\mathrm{Fil}^i H_0 = 0$ pour $i \geq$ n+1, de sorte que la décomposition (1.3.6.1) s'écrit

$$(1.4.8.1) \qquad H = \oplus_{0 \leq i \leq N} H^i, \qquad H^i = U_i \cap \mathrm{Fil}^i H, \qquad \mathrm{rg}(H^i) = h_i.$$

Supposons d'autre part $p \neq 2$. Appliquant 1.4.2 aux F-cristaux de Hodge ordinaires (de niveau ≤ 1) $(U_{i+2}/U_i, (\mathrm{Fil}^\bullet H \cap U_{i+2})/(\mathrm{Fil}^\bullet H \cap U_i))$, on obtient :

COROLLAIRE 1.4.9. Sous les hypothèses de 1.4.8, il existe une base $(e_1^i, \ldots, e_{h_i}^i)_{0 \leq i \leq N}$ de H, et des éléments $q_{i;\alpha,\beta}$ de A ($i \leq N-1$, $\alpha \leq h_{i+1}$, $\beta \leq h_i$) tels que

$$(1.4.9.1) \qquad \{ q_{i;\alpha,\beta}(0) \in 1 + \mathrm{pW},$$
$$\nabla e_i^0 = 0 \qquad (1 \leq i \leq h_0),$$
$$\nabla e_i^m = \textstyle\sum_{1 \leq j \leq h_{m-1}} (d \log q_{m-1;i,j}) e_j^{m-1} \qquad (1 \leq m \leq N,\ 0 \leq i \leq h_m). \}$$

On peut utiliser 1.4.9 pour majorer la croissance des sections horizontales de H. Rappelons [8, 3.1] que celles-ci "convergent dans le polydisque unité ouvert", et plus précisément que le module $(H \otimes_A K\{\{t_1, \ldots, t_n\}\}, \nabla)$ possède une base de sections horizontales : il s'agit d'une propriété valable pour tout F-cristal, indépendamment de toute hypothèse d'ordinarité. Cela dit, il résulte aisément de 1.4.9 que, pour tout i, les sections horizontales de $U_i \otimes_A$ K{{t}} appartiennent à $U_i \otimes_A L_i$, où

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p025.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 5061EF887AA2CF62… Authority evidence: 8EDF896301FF201E…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 26

$$0 = L_{-1} \subset L_0 \subset \ldots \subset L_i \subset \ldots$$

est la suite de sous-A-modules de K{{t}} définie par récurrence par

$$\begin{aligned}&(f \in L_i) \Leftrightarrow (f \text{ appartient au sous} - A - \text{module de } K\{\{t\}\} \text{ engendré}\\ &\text{par les séries } g \text{ telles que } \mathrm{dg} = \sum a_\alpha\, d\log u_\alpha,\\ &\text{avec } a_\alpha \in L_{i-1}, \text{ et } u_\alpha \in A,\ u_\alpha(0) \in 1 + \mathrm{pW}).\end{aligned}$$

Dans la situation de 1.4.8, on ne peut espérer toutefois d'énoncé analogue à 1.4.7 (l'hypothèse que (1.4.6.3) est un isomorphisme n'a pas de généralisation en niveau ≥ 2).

2. APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES

On conserve les notations A_0, A de 1.1.1.

2.1. Coordonnées canoniques.

A) Variétés abéliennes (cf. [8, §8]).

2.1.1. Soit X/A un schéma abélien formel de dimension relative g. Le A-module

$$H = H^1_{\mathrm{DR}}(X/A),$$

muni de la connexion de Gauss-Manin ∇, est un F-cristal sur A_0, de rang 2g. On sait (voir par exemple [13, Addendum]) que la suite spectrale de Hodge

$$E_1^{ij} = H^j(X, \Omega^i_{X/A}) \Rightarrow H^*_{\mathrm{DR}}(X/A)$$

dégénère en E_1, et que le terme E_1^{ij} est libre sur A, de formation compatible à tout changement de base. Il en résulte (1.3.5) que H, muni de la filtration de Hodge

$$H = \mathrm{Fil}^0 H \supset \mathrm{Fil}^1 H\ (= H^0(X, \Omega^1_{X/A})) \supset 0$$

est un F-cristal de Hodge sur A_0. Notons aussi que, si $X_0 = X \otimes A_0$, la suite spectrale de Hodge et la suite spectrale conjuguée de X_0/A_0 dégénèrent (en E_1 et E_2 resp.) et que leurs termes initiaux sont

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p026.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 2DB77F523FA1AE42… Authority evidence: DA2B390F70C97498…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 27

libres et de formation compatible à tout changement de base. En particulier, le gradué associé à la filtration conjuguée $\mathrm{gr}_\bullet(H \otimes A_0)$ est libre. D'autre part, si $e_0 : A_0 \to k$ est l'augmentation, le F-cristal $e_0^* H$ induit sur k (1.1.4) n'est autre que $H^1(X \otimes k/W)$, car si $e : A \to W$ est l'augmentation, $e^* H = H^1_{\mathrm{DR}}(X \otimes W/W) = H^1(X \otimes k/W)$ par définition de la cohomologie cristalline.

2.1.2. Supposons la variété abélienne $X \otimes k$ ordinaire, ce qui signifie, au choix, que $(X \otimes \mathrm{k})(\mathrm{k}) \simeq (\mathbb{Z}/p)^g$, ou que Frobenius sur $H^1(X \otimes k, \mathcal{O})$ est bijectif, ou que $H^1(X \otimes k/W)$ a mêmes polygones de Newton et de Hodge. D'après ce qu'on vient de rappeler, le F-cristal H est alors ordinaire au sens de 1.3.3, et comme il est de Hodge de niveau ≤ 1, on peut lui appliquer 1.4.2. Notons que, dans la décomposition $H = U \oplus \mathrm{Fil}^1 H$, U et $\mathrm{Fil}^1 H$ sont libres de rang g. Il existe donc une base $(a_i)_{1 \leq i \leq g}$ de U, une base $(b_i)_{1 \leq i \leq g}$ de $\mathrm{Fil}^1 H$, et des séries $\tau_{\mathrm{ij}} \in \mathrm{K}[[\mathrm{t}]]$ $(1 \leq j \leq g, 1 \leq j \leq g)$ vérifiant les conditions (1.4.2.1) à (1.4.2.8). De plus, si $p \neq 2$, on dispose des séries $q_{\mathrm{ij}} = \exp(\tau_{\mathrm{ij}}) \in A$, telles que $q_{\mathrm{ij}}(0) = 1 \bmod \mathrm{pW}$.

2.1.3. Supposons que X/A soit la déformation formelle verselle de $X \otimes k$, donc que $A = W[[t_1, \ldots, t_{g^2}]]$. Alors (1.4.6.3) est un isomorphisme, qui s'identifie à l'isomorphisme de Kodaira-Spencer

$$T_{A/W} \simeq H^1(X, T_{X/A}) \simeq \mathrm{Hom}(H^0(X, \Omega^1_{X/A}), H^1(X, \mathcal{O}))$$

(cf. (IV 2.3)). Donc, si $p \neq 2$, les éléments $q_{\mathrm{ij}} - 1 \in A$ forment, en vertu de 1.4.7, des coordonnées "canoniques" sur A (i.e. $A \simeq W[[q_{\mathrm{ij}} - 1]]$), et, si l'on note φ le relèvement de Frobenius donné par $\varphi(q_{\mathrm{ij}}) = q_{\mathrm{ij}}^p$, on a, avec les notations de 2.1.2,

$$F(\varphi)\varphi^* a_i = a_i, \qquad F(\varphi)\varphi^* b_i = p\, b_i \qquad (1 \leq i \leq g).$$

Soit $e : A \to W$ le relèvement de Teichmüller de e_0 correspondant à φ, i.e. tel que $e(q_{\mathrm{ij}}) = 1$. Il n'est pas difficile de montrer - nous

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 28

établirons un résultat analogue ci-dessous pour les surfaces K3 - que e est indépendant du choix de (a, b, q), et qu'on a un isomorphisme canonique (défini à l'aide de (a, b, q) mais n'en dépendant pas) entre S et G_W, où G est le tore formel sur $\mathbb{Z}_p$ de groupe de caractères $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(P_0, P_1)$, P_0 (resp. P_1) désignant le sous $-\mathbb{Z}_p-$module (libre de rang g) de $H^1(X \otimes k/W)$ formé des x tels que Fx = x (resp. Fx = px). Cet isomorphisme envoie e sur l'élément neutre de G_W. On peut montrer (voir Appendice et Exposé suivant, par N. Katz) que cette structure de groupe formel sur S coïncide avec celle définie, à la Serre-Tate, par le relèvement formel versel du groupe p-divisible associé à $X \otimes k$. En particulier, la variété abélienne e^*X/W est le relèvement canonique de $(X \otimes$ k)/k [14, V §3]. Rappelons que ce relèvement correspond au relèvement trivial (i.e. comme produit) du groupe p-divisible associé à $X \otimes k$, ou, ce qui revient au même, au relèvement de $\mathrm{Fil}^1_{\mathrm{Hdg}}\ H^1_{\mathrm{DR}}(X \otimes k/k)$ en le facteur direct $P_1 \otimes W$ de pente 1 de $H^1(X \otimes k/W)$ (cf. 1.3.4).

2.1.4. Variante. Soit X/A une courbe propre et lisse à fibres géométriquement connexes de genre $g \geq 1$. Alors $H = H^1_{\mathrm{DR}}(X/A)$, muni de la connexion de Gauss-Manin ∇ et de la filtration de Hodge $\mathrm{Fil}^1\ H = H^0(X, \Omega^1_{X/A})$, est un F-cristal de Hodge de niveau 1. Si l'on suppose $X \otimes k$ ordinaire, on peut appliquer 1.4.2, et l'on obtient les résultats de Katz [8, §8] : si $(a_i)_{1 \leq i \leq g}$ est une base de sections horizontales fixes par F du sous-cristal unité U, on peut en effet prendre comme base $(b_i)_{1 \leq i \leq g}$ de $\mathrm{Fil}^1\ H$ la base duale de (a_i) pour la dualité de Poincaré ((a, b) est alors une base symplectique de H), car la compatibilité de la dualité à F et ∇ montre aussitôt que les conditions de (1.2.4 (i)) sont vérifiées.

B) Surfaces K3.

2.1.5. Soit X/A un schéma formel propre et lisse tel que $X_k = X \otimes k$ soit une surface K3. Alors, d'après (IV 2.2, 2.3), le

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p028.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: CD2627B1B9CB8B45… Authority evidence: B82FB0A38F08E44A…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 29

A-module

$$H = H^2_{\mathrm{DR}}(X/A),$$

muni de la connexion de Gauss-Manin ∇, et de la filtration de Hodge

$$H = \mathrm{Fil}^0 H \supset \mathrm{Fil}^1 H \supset \mathrm{Fil}^2 H \supset 0$$

est un F-cristal de Hodge sur A_0. Les sous-modules $\mathrm{Fil}^i H$ sont libres de rangs 22, 21, 1 pour $i =$ 0,1,2, et le gradué associé $\mathrm{gr}^\bullet H$ est libre. De plus, le cup-produit

$$\langle , \rangle : H \otimes H \to H^4_{\mathrm{DR}}(X/A) \simeq A$$

est une dualité parfaite, horizontale pour ∇, i.e. vérifiant

$$\langle \nabla x, y\rangle + \langle x, \nabla y\rangle = \nabla\langle x, y\rangle,$$

et compatible à F, i.e. telle que, pour tout relèvement de Frobenius φ, on ait

$$\langle F(\varphi)\varphi^* x, F(\varphi)\varphi^* y\rangle = F(\varphi)\varphi^*\langle x, y\rangle.$$

Noter que $F(\varphi)\varphi^*|_{H^4_{\mathrm{DR}}(X/A)} = p^2\alpha$, où α est un automorphisme, i.e. $H^4_{\mathrm{DR}}(X/A)(2)$ est un F-cristal unité (de rang 1), qu'on identifiera au F-cristal trivial A au moyen d'une base horizontale fixe par F. Rappelons d'autre part que l'on a

$$\mathrm{Fil}^1 H = (\mathrm{Fil}^2 H)^\perp .$$

Rappelons enfin que, si $e_0 : A_0 \to k$ est l'augmentation, le F-cristal $e_0^* H$ (1.1.4) n'est autre que la cohomologie cristalline $H^2(X_k/W)$.

2.1.6. Supposons maintenant X_k ordinaire, ce qui signifie, par définition, que le polygone de Newton de $H^2(X_k/W)$ coïncide avec le polygone de Hodge, i.e. a pour pentes (0,1,2) avec les multiplicités (1,20,1). Il revient au même de dire que Frobenius sur $H^2(X_k, \mathcal{O})$ est non nul. Du fait que $e_0^* H = H^2(X_k/W)$ et que $\mathrm{gr}^\bullet H$ est libre, le F-cristal H est alors ordinaire au sens de 1.3.3, et admet par conséquent une filtration par des sous-F-cristaux

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p029.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 1A18F06112F4F99E... Authority evidence: C4CE35BB5DB006F8...

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 30

$$0 \subset U_0 \subset U_1 \subset U_2 = H$$

tels que U_i/U_{i-1} soit de la forme $V_i(-i)$, où V_i est un F-cristal unité de rang 1, 20, 1, pour $i =$ 0,1,2. De plus, comme U_i relève $\mathrm{Fil}_i H_0$, la compatibilité de F à la dualité entraîne que l'on a

$$U_1 = U_0 \perp .$$

Enfin (1.3.6) les filtrations (U_i) et $(\mathrm{Fil}^i H)$ sont opposées, i.e. on a

$$H = H_0 \oplus H_1 \oplus H_2,$$

avec

$$H_0 = U_0, \qquad H_1 = U_1 \cap \mathrm{Fil}^1 H, \qquad H_2 = \mathrm{Fil}^2 H, \qquad H_1 \simeq U_1/U_0.$$

THÉORÈME 2.1.7. On suppose $p \neq 2$. Soit $X/A = W[[t_1, \ldots, t_{20}]]$ la déformation formelle universelle d'une surface K3 ordinaire X_k/k (IV 1.3). Alors, avec les notations de 2.1.5, 2.1.6, il existe une base $(a, b_1, \ldots, b_{20}, c)$ de H adaptée à la décomposition $H = H_0 \oplus H_1 \oplus H_2$, et telle que $\langle a, c \rangle = 1$, et des éléments $q_i \in A$ $(1 \leq i \leq 20)$ possédant les propriétés suivantes :

$$(i)\ q_i(0) = 1 \bmod \mathrm{pW} \text{ et les } q_i \text{ définissent un isomorphisme}$$

$$A \simeq W[[q_1 - 1, \ldots, q_{20} - 1]]$$

(i.e. les formes $d \log q_i$ forment une base de $\Omega^1_{A/W}$).

$$\text{(ii)} \begin{cases} \nabla a = 0, \\ \nabla b_i = (d \log q_i) a \qquad (1 \leq i \leq 20), \\ \nabla c = -\sum (d \log q_i) b_i \vee , \end{cases}$$

où $(b_i \vee)$ désigne la base de H_1 duale de (b_i) (pour la restriction à H_1 de la forme cup-produit).
(iii) Si $\varphi : A \to A$ désigne le relèvement de Frobenius tel que $\varphi(q_i) = q_i^p$, alors

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p030.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: D4CA3278FA52EEA9… Authority evidence: 701CA571A98DAC16…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 31

{ $F(\varphi)\varphi^* a = \mathrm{a}$,
$F(\varphi)\varphi^* b_i = p\, b_i$ $(1 \leq i \leq 20)$,
$F(\varphi)\varphi^* c = p^2 c$. }

D'après 2.1.6, le F-cristal U_1, muni de la filtration $\mathrm{Fil}^i H \cap U_1$, est un F-cristal de Hodge ordinaire de niveau 1. D'autre part, comme X/A est la déformation formelle universelle de X_k, l'application

$$\mathrm{gr}^1 \nabla : T_{A/W} \to \mathrm{Hom}_A(H_1, H_0) = \mathrm{Hom}_A(\mathrm{gr}^1 H, \mathrm{gr}^0 H)$$

est un isomorphisme d'après (IV 2.4). En vertu de 1.4.2 et 1.4.7 appliqués à U_1, il existe donc une base $(a, b_1, \ldots, b_{20})$ de U_1 adaptée à la décomposition $U_1 = H_0 \oplus H_1$, et des éléments $q_i \in A$ vérifiant les conditions (i) à (iii) de 2.1.7. Il reste à montrer que, si l'on choisit la base c de H_2 telle que $\langle a, c\rangle = 1$, les dernières formules de (ii) et (iii) sont satisfaites. Tout d'abord, par la condition de transversalité (1.3.5.1), on a

$$\nabla c = \alpha \otimes c + \sum_{1 \leq i \leq 20} \beta_i \otimes b_i \vee .$$

La relation

$$0 = \nabla\langle a, c\rangle = \langle \nabla a, c\rangle + \langle a, \nabla c\rangle = \langle a, \nabla c\rangle$$

entraîne $\alpha = 0$. Puis, de

$$0 = \nabla\langle b_i, c\rangle = \langle \nabla b_i, c\rangle + \langle b_i, \nabla c\rangle$$

et de la deuxième formule de (ii) on tire $\beta_i = -\, d \log q_i$, d'où la dernière formule de (ii). D'autre part, de la formule $F(\varphi)\varphi^* a = \mathrm{a}$ et de la relation

$$\langle F(\varphi)\varphi^* a, F(\varphi)\varphi^* c\rangle = p^2\langle a, c\rangle = p^2$$

on déduit $F(\varphi)\varphi^* c = p^2 c$, ce qui achève la démonstration de 2.1.7.

2.1.8. Soit X_k/k une surface K3 ordinaire. Posons

$$(2.1.8.1) \qquad P_0 = H^2(X_k/W)_{F=1}, \qquad P_1 = H^2(X_k/W)_{F=p}, \qquad P_2 = H^2(X_k/W)_{F=p^2},$$

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p031.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 2FC5BFCFA43548C8… Authority evidence: CE282782183F124D…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 32

où la notation $M_{F=a}$ désigne {x ∈ M | Fx = ax}. D'après 1.3.4, P_i est un $\mathbb{Z}_p$ − module libre de rang 1, 20, 1 pour i = 0,1,2, et le F-cristal $H^2(X_k/W)$ admet une décomposition unique

$$(2.1.8.2) \qquad H^2(X_k/W) = ((W,\sigma)\otimes P_0) \oplus ((W,p\sigma)\otimes P_1) \oplus ((W,p^2\sigma)\otimes P_2).$$

Supposons de plus $p \neq 2$. Avec les notations de 2.1.7, désignons par

$$(2.1.8.3) \qquad e_q : A \to W$$

le relèvement de Teichmüller de l'augmentation $e_0 : A_0 \to k$ correspondant au relèvement φ considéré en (iii), donc donné par $e_q(q_i) = 1$. Alors X induit un schéma formel $e_q^* X/W$ et l'on a

$$(2.1.8.4) \qquad e_q^* H = H^2_{\mathrm{DR}}(e_q^* X/W) = H^2(X_k/W).$$

De plus, d'après (2.1.7 (iii)), $e_q^* a$ est une base de P_0, $(e_q^* b_i)_{1\le i\le 20}$ une base de P_1, et $e_q^* c$ une base de P_2, et $\langle e_q^* a, e_q^* c\rangle = 1$. En particulier, la filtration de Hodge de $H^2_{\mathrm{DR}}(e_q^* X/W)$ est donnée par

$$(2.1.8.5) \qquad \mathrm{Fil}^1 H^2_{\mathrm{DR}}(e_q^* X/W) = (W\otimes P_1)\oplus(W\otimes P_2), \qquad \mathrm{Fil}^2 H^2_{\mathrm{DR}}(e_q^* X/W) = W\otimes P_2.$$

Nous allons en déduire :

PROPOSITION 2.1.9. Sous les hypothèses de 2.1.7, le relèvement e_q (2.1.8.3) est indépendant de la famille $q = (q_i)$ définie en 2.1.7.

On écrira donc e au lieu de e_q. Par analogie avec la théorie du relèvement canonique des variétés abéliennes ordinaires [14, V §3], on dira que le schéma formel $e^* X/W$, qu'on notera simplement X_W, est le relèvement canonique de X_k.

2.1.10. Pour démontrer 2.1.9, nous utiliserons une description « linéaire » des relèvements formels sur W d'une surface K3 sur k. Soit Y/W un schéma formel propre et plat tel que $Y_k = Y\otimes k$ soit une K3. Alors $H^2_{\mathrm{DR}}(Y/W)$ s'identifie canoniquement à $H = H^2(Y_k/W)$, et $\mathrm{Fil}^2 H^2_{\mathrm{DR}}(Y/W)$ est une droite ($\overset{\text{dfn}}{=}$ facteur direct de rang 1) de H, isotrope (i.e. contenue dans son orthogonal), relevant $\mathrm{Fil}^2 H^2_{\mathrm{DR}}(Y_k/k)$.

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p032.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: E42629F16A9203B8… Authority evidence: 8ED0C928D83F01CF…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 33

THÉORÈME 2.1.11. Supposons $p \neq 2$. Soit Y_0 une surface K3 sur k. Posons $H = H^2(Y_0/W)$. L'application qui à un schéma formel propre et plat Y/W relevant Y_0 associe la droite $\mathrm{Fil}^2 H^2_{\mathrm{DR}}(Y/W)$ est une bijection de l'ensemble des relèvements de Y_0 sur W (i.e. des points à valeurs dans W du schéma modulaire formel de Y_0) sur l'ensemble des relèvements de $\mathrm{Fil}^2 H^2_{\mathrm{DR}}(Y_0/k)$ en une droite isotrope de H.

Notons tout d'abord que les deux types de relèvements envisagés (relèvements de Y_0 et relèvements de $\mathrm{Fil}^2 H^2_{\mathrm{DR}}(Y_0/k)$) sont rigides, i.e. n'ont pas d'automorphismes infinitésimaux. Soit Y_n un relèvement de Y_0 sur W_{n+1}. L'ensemble des relèvements de Y_n sur W_{n+2} est un torseur sous $H^1(Y_0, T_{Y_0/k})$. D'autre part, soit L_n une droite isotrope de $H \otimes W_{n+1}$ relevant $L_0 = \mathrm{Fil}^2 H^2_{\mathrm{DR}}(Y_0/k)$. Alors l'ensemble des relèvements de L_n en une droite isotrope de $H \otimes W_{n+2}$ est un torseur sous $\mathrm{Hom}(L_0, L_0{}^{\perp}/L_0)$: sans condition d'isotropie, on trouverait un torseur sous $\mathrm{Hom}(L_0, H_0/L_0)$ (où $H_0 = H \otimes k = H^2_{\mathrm{DR}}(Y_0/k)$); comme $p \neq 2$, la condition d'isotropie imposée au relèvement conduit au résultat indiqué (si $H \otimes W_{n+2} = L_{n+1} \oplus M_{n+1}$, avec L_{n+1} isotrope relevant L_n, une droite isotrope relevant L_n est engendrée par un vecteur $x + p^{n+1}y$, où x est une base de L_n, et l'on doit avoir $2\langle x, y\rangle = 0 \bmod p$). Or $L_0{}^{\perp} = \mathrm{Fil}^1 H^2(Y_0/k)$, donc

$$\mathrm{Hom}(L_0, L_0{}^{\perp}/L_0) = \mathrm{Hom}(\mathrm{Fil}^2 H^2_{\mathrm{DR}}(Y_0/k), \mathrm{gr}^1 H^2_{\mathrm{DR}}(Y_0/k)),$$

et, d'après (IV 2.4), on a un isomorphisme canonique (donné par le cup-produit)

$$H^1(Y_0, T_{Y_0/k}) \simeq \mathrm{Hom}(\mathrm{Fil}^2 H^2_{\mathrm{DR}}(Y_0/k), \mathrm{gr}^1 H^2_{\mathrm{DR}}(Y_0/k)).$$

La conclusion de 2.1.11 en découle facilement.

REMARQUE 2.1.12. On notera l'analogie de 2.1.11 avec la théorie des relèvements des groupes p-divisibles et des variétés abéliennes (relèvement de la filtration de Hodge dans le « cristal » extension

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 34

universelle) [14].

Démonstration de 2.1.9. Compte tenu de 2.1.11, il suffit d'observer que $e_q^* X$, donc e_q, est entièrement caractérisé par la seconde égalité de (2.1.8.5).

Nous allons voir maintenant qu'à l'aide de 2.1.7 on peut munir canoniquement la variété modulaire formelle $S = \mathrm{spf}(A)$ d'une structure de groupe formel sur W, d'origine le relèvement canonique X_W (2.1.9). Nous aurons besoin pour cela du lemme suivant :

LEMME 2.1.13. Soient $(a', b'_1, \dots, b'_{20}, c')$ une base de H et $(q'_i)_{1\le i\le 20}$ une famille d'éléments de A vérifiant les mêmes conditions (i), (ii), (iii) de 2.1.7 que $(a, (b_i), c)$ et (q_i). Il existe alors $\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$ et $\beta = (\beta_{ij}) \in \mathrm{GL}(20, \mathbb{Z}_p)$ tels que

$$
\begin{aligned}
(2.1.13.1) \qquad & \{a' = \alpha a, \qquad c' = c/\alpha, \\
& q'_i = \textstyle\prod_{1\le j\le 20} q_j^{(\beta_{ji}/\alpha)}, \\
& b'_i = \textstyle\sum_{1\le j\le 20} \beta_{ji} b_j .\}
\end{aligned}
$$

Tout d'abord, comme $(a', (b'_i), c')$ est une base de H adaptée à la décomposition $H = H_0 \oplus H_1 \oplus H_2$ et que $\langle a', c'\rangle = 1$, il existe $\alpha \in A^*$ et $\beta = (\beta_{ij}) \in \mathrm{GL}(20,A)$ tels que

$$
a' = \alpha a, \qquad c' = c/\alpha, \qquad b'_i = \textstyle\sum_{1\le j\le 20} \beta_{ji} b_j .
$$

Grâce à 2.1.9, notons $e = e_q = e_{q'} : A \to W$ le relèvement (2.1.8.3). Comme $\nabla a = \nabla a' = 0$, on a $d\alpha = 0$, donc α est « constant », de valeur $e^*\alpha \in W$. Soit φ' le relèvement de Frobenius tel que $\varphi'(q'_i) = q_i'^p$. On a

$$
a' = F(\varphi')\varphi'^* a' = F(\varphi)\varphi^* a = \alpha^\sigma F(\varphi)\varphi^* a = \alpha^\sigma a = \alpha a,
$$

donc $\alpha^\sigma = \alpha$, i.e. $\alpha \in \mathbb{Z}_p$. D'autre part,

$$
\begin{aligned}
\nabla b'_i &= \textstyle\sum_j (d\beta_{ji}) \otimes b_j + \sum_j \beta_{ji} (d \log q_j) \otimes a \\
&= (d \log q'_i) \otimes a' = (d \log q'_i) \otimes \alpha a,
\end{aligned}
$$

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p034.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 108FD34991E93FD1… Authority evidence: F1A7542595028439…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 35

donc

$$(*) \qquad d\,\beta_{ji} = 0 \qquad \forall i, j$$

et

$$(**) \quad \alpha\, d \log q'_i = \sum_j \beta_{ji}\, d \log q_j \qquad (1 \le i \le 20).$$

La formule (*) signifie que β_{ji} est constant, de valeur $e^*\beta_{ji} \in W$. Mais
$p\, b'_i = F(\varphi')\varphi'^* b'_i = \sum_j \beta^{\sigma}_{ji}\ F(\varphi')\varphi'^* b_j$.
Appliquant e^* et tenant compte de ce que

$$e^* F(\varphi')\varphi'^* b_j = e^* F(\varphi)\varphi^* b_j = e^* p\, b_j,$$

on obtient $\beta^{\sigma}_{ji} = \beta_{ji}\ \forall i, j$, donc $\beta \in \mathrm{GL}(20, \mathbb{Z}_p)$. De (**) on déduit qu'il existe $C \in W^*$ tel que

$$q'_i = C \prod_j q_j^{(\beta_{ji}/\alpha)}.$$

Mais comme $e^* q'_i = e^* q_i = 1$, on a $C = 1$, ce qui achève la démonstration.
THÉORÈME 2.1.14. Supposons $p \neq 2$. Soient X_k une surface K3 ordinaire sur k, et $S = \mathrm{Spf}(A)$ la variété modulaire formelle sur W correspondante. Soit G le tore formel sur $\mathbb{Z}_p$ de groupe de caractères $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(P_0, P_1)$, avec les notations de 2.1.8. Il existe un isomorphisme canonique entre S et G_W, par lequel le relèvement canonique $X_W \in S$ (2.1.9) correspond à l'élément neutre $1 \in G_W$.
Soit a = $(a, b, (q_i))$ comme en 2.1.7. La famille (q_i) fournit un isomorphisme $u_a : S \simeq (\widehat{G}_m)^{20}_W$ = $\mathrm{Spf}(W[[T_i - 1]])$, $T_i \mapsto q_i$, tandis que la base (a, b) fournit un isomorphisme $\nu_a : \mathbb{Z}_p^{20} \simeq \mathrm{Hom}(P_0, P_1)$, tel que $\nu_a(x_1, \ldots, x_{20})(a) = \sum x_i b_i$. Si a' = $(a', b', (q'_i))$ est un autre choix, alors, il existe $\alpha \in \mathbb{Z}_p^*$ et $\beta = (\beta_{ij}) \in \mathrm{GL}(20, \mathbb{Z}_p)$ vérifiant (2.1.13.1). Notons

$$f : (\widehat{G}_m)^{20}_{\mathbb{Z}_p} \simeq (\widehat{G}_m)^{20}_{\mathbb{Z}_p}$$

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p035.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: C0A7AC184FDBFDD8… Authority evidence: 1BBEC70A4A82E3BE…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 36

l'isomorphisme donné par $T_i \mapsto \prod_j T_j^{(\beta_{ji}/\alpha)}$. L'isomorphisme

$$\mathrm{Hom}(f, \widehat{G}_m) : \mathbb{Z}_p^{20} \simeq \mathbb{Z}_p^{20}$$

induit par f sur les groupes de caractères est la multiplication par la matrice β/α. Les formules (2.1.13.1) entraînent qu'on a des carrés commutatifs

$$\begin{array}{ccccc} u_a & & v_a & & \\ S & \simeq \to & (\widehat{G}_m)^{20} & \mathbb{Z}_p^{20} & \simeq \to \mathrm{Hom}(P_0, P_1) \\ \| & & \downarrow f_W & \uparrow \beta/\alpha & \| \\ S & \simeq \to & (\widehat{G}_m)^{20} & \mathbb{Z}_p^{20} & \simeq \to \mathrm{Hom}(P_0, P_1). \\ u_{a'} & & v_{a'} & & \end{array}$$

En d'autres termes, l'isomorphisme $S \simeq G_W$ donné par (u_a, v_a) est indépendant de a, c'est l'isomorphisme canonique annoncé. Comme par définition X_W correspond à l'augmentation $q_i \mapsto 1$, 2.1.14 est démontré.

DÉFINITION 2.1.15. Nous dirons qu'un système a = (a, b, c, q) vérifiant les conditions de 2.1.7 est un système de coordonnées (ou paramètres) canoniques sur S.

Noter que le choix de a correspond à celui d'une base de P_0 (donc est défini à un facteur $\in \mathbb{Z}_p^*$ près) et détermine celui de c, et que, d'autre part, une fois a choisi, la donnée de b correspond à celle d'une base de P_1 (qui est donc définie à un facteur $\in \mathrm{GL}(20, \mathbb{Z}_p)$ près) et détermine l'isomorphisme $(q_i) : S \simeq (\widehat{G}_m)_W^{20}$.

Problèmes 2.1.16. a) Peut-on donner une définition « intrinsèque » de la structure de groupe formel sur S construite en 2.1.14, par exemple comme représentant un foncteur convenable ? (*)

b) Etendre la théorie des coordonnées canoniques au cas $p = 2$. Cela présente plusieurs difficultés. Tout d'abord, bien entendu, trouver un substitut adéquat à la définition des q_{ij} de 1.4.2. D'autre part, dans le cas des K3, il y a des difficultés supplémentaires, liées au fait qu'on ignore, pour $p = 2$, si la forme quadra-

(*) (ajoutée en janvier 1981), cette question vient d'être résolue affirmativement par Nygaard.

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p036.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 913776A8386A39FA… Authority evidence: 4FBC5448AE91D9DA…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 37

tique $\langle x, x\rangle$ sur $H^2_{\mathrm{DR}}(X_k/k)$ est identiquement nulle (rappelons que, si X est une surface K3 sur le corps des complexes, la forme $\langle x, x\rangle$ sur $H^2(X, \mathbb{Z})$ est paire [17]). On peut montrer toutefois [4] que, pour Y_0/k ordinaire, ou plus généralement si le noyau de la forme $\langle x, x\rangle$ sur $H^2_{\mathrm{DR}}(Y_0/k)$ n'est pas égal à $\mathrm{Fil}^1\ H^2_{\mathrm{DR}}(Y_0/k)$, l'application envisagée en 2.1.11, associant à un relèvement formel Y la droite isotrope $\mathrm{Fil}^2\ H^2_{\mathrm{DR}}(Y/W) \subset\ H^2(Y_0/W)$, est surjective et à fibres finies : pour Y_0 ordinaire, la droite $W \otimes P_2$ de (2.1.8.5) définit alors une famille finie de « relèvements canoniques » de Y_0.

2.2. Relèvements de faisceaux inversibles.

2.2.1. Soit $X/S = \mathrm{Spf}(A)$ la déformation formelle universelle d'une surface K3 X_k/k, et soit L_0 un faisceau inversible non trivial sur X_k. On sait (IV 1.6) qu'il existe un plus grand sous-schéma formel fermé $T = \Sigma(L_0) \subset\ S$ tel que L_0 se prolonge en un faisceau inversible L sur X_T (*) et que T est défini par une équation $f = 0$ telle que p ne divise pas f. Supposons $p \neq\ 2$ et X_k ordinaire. On va montrer qu'on peut alors expliciter f en termes de la classe de Chern cristalline

$$(2.2.1.1) \qquad c_1(L_0) \in H^2(X_k/k).$$

Rappelons (IV 2.9) qu'avec les notations de (2.1.8.1) on a

$$(2.2.1.2) \qquad c_1(L_0) \in P_1.$$

En particulier, si (a, b, c, q) est un système de coordonnées canoniques sur S (2.1.15), et $e : A \to W$ est l'augmentation donnée par $q_i \mapsto\ 1$, on peut écrire

$$(2.2.1.3) \qquad c_1(L_0) = \sum\nolimits_{1\leq i\leq 20} x_i(e^* b_i),$$

avec $x_i \in\ \mathbb{Z}_p$. On a alors le résultat suivant, dont la démonstration va occuper le reste de l'exposé :

(*) On note $X_{S'}$, le schéma formel déduit de X par un changement de base $S' \to\ S$.

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p037.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 0E1724A2B47EC85E... Authority evidence: 87519D1AA60ABC68...

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 38

THÉORÈME 2.2.2. Avec les hypothèses et notations de 2.2.1, T est défini par l'équation

$$(2.2.2.1) \qquad \prod_{1\leq i\leq 20} q_i^{x_i} = 1.$$

En d'autres termes, si, grâce à la base e^*a de P_0, on identifie $c_1(L_0)$ à un caractère x du tore formel S (2.1.14), T est le sous-groupe formel défini par

$$(2.2.2.2) \qquad T = \mathrm{Ker}(x).$$

En particulier, si p ne divise pas $c_1(L_0)$ (ce qui signifie encore [16, 1.4] que p ne divise pas la classe de L_0 dans $\mathrm{NS}(X_k)$), T est un sous-tore formel lisse sur W de dimension relative 19.

2.2.3. Indiquons d'abord comment on peut, heuristiquement, se persuader de la validité de 2.2.2. Si l'on était sur le corps des complexes, on saurait que T est le lieu où la section horizontale de H^2_{DR} passant par $c_1(L_0)$ reste de type (1,1), i.e. dans $\mathrm{Fil}^1 H^2_{\mathrm{DR}}$. Or, soit $\underline{x} \in H^2_{\mathrm{DR}}(X/S) \otimes K[[q_i - 1]]$ la section horizontale telle que $e^*\underline{x} = c_1(L_0)$. Un calcul immédiat, à partir de (2.1.7 (ii)), montre que l'on a

$$(2.2.3.1) \qquad \underline{x} = (-\sum_{1\leq i\leq 20} x_i \log q_i)a + \sum_{1\leq i\leq 20} x_i b_i.$$

Donc, heuristiquement, $-\sum x_i \log q_i = 0$, « i.e. » $\prod q_i^{x_i} = 1$ est l'équation cherchée. Naturellement, cet argument est insuffisant, mais on peut l'adapter en utilisant la classe de Chern cristalline pour contrôler, pas à pas, l'obstruction au prolongement de L_0.

Nous aurons besoin pour cela de quelques rappels sur les classes de Chern et les obstructions, complétant (IV 2.8, 2.9).

2.2.4. Soient $i : Y_0 \hookrightarrow Y$ une immersion fermée de schémas (ou schémas formels) définie par un idéal I, et E_0 un faisceau inversible sur Y_0, de classe $c\ell(E_0) \in H^1(Y_0, \mathcal{O}^*_{Y_0})$. La suite exacte de faisceaux abéliens sur Y

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p038.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 9DBC40BF1F630FE2… Authority evidence: 075F3890B4F76827…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 39

$$(2.2.4.1) \qquad 0 \to (1+I)^* \to \mathcal{O}_Y^* \to \mathcal{O}_{Y_0}^* \to 0$$

montre que l'obstruction $\omega^*(E_0, i)$ à prolonger E_0 en un faisceau inversible sur Y est l'image de $c\ell(E_0)$ par le cobord de la suite exacte de cohomologie déduite de (2.2.4.1)

$$(2.2.4.2) \qquad \omega^*(E_0, i) = d\, c\ell(E_0) \in H^2(Y, (1+I)^*).$$

Si $Y \to Z$ est un morphisme, on peut considérer le complexe de de Rham « multiplicatif »

$$\Omega^{\bullet *}_{Y/Z} = (\mathcal{O}_Y^* \text{—dlog} \to \Omega^1_{Y/Z} \text{—}d \to \Omega^2_{Y/Z} \text{—}d \to \cdots),$$

et (2.2.4.1) se raffine en une suite exacte de complexes

$$(2.2.4.3) \qquad 0 \to (1+I)\Omega^{\bullet *}_{Y/Z} \to \Omega^{\bullet *}_{Y/Z} \to \mathcal{O}_{Y_0}^* \to 0,$$

où

$$(1+I)\Omega^{\bullet *}_{Y/Z} \quad := \quad ((1+I)^* \text{—dlog} \to \Omega^1_{Y/Z} \text{—}d \to \Omega^2_{Y/Z} \text{—}d \to \cdots).$$

L'obstruction $\omega^*(E_0, i)$ est l'image, par la flèche naturelle, de la classe

$$(2.2.4.4) \qquad c^*(E_0, i, Y/Z) \in H^2(Y, (1+I)\Omega^{\bullet *}_{Y/Z})$$

obtenue à partir de $c\ell(E_0)$ comme cobord de la suite exacte de cohomologie associée à (2.2.4.3).

2.2.5. Supposons que $I^2 = 0$. Alors on a

$$(1+I)^* = 1 + I \quad \simeq \quad I, \qquad \log(1+x) = x,$$

et, de la même manière, $(1+I)\Omega^{\bullet *}_{Y/Z}$ s'identifie à

$$I\Omega^{\bullet}_{Y/Z} \quad := \quad (I \text{—}d \to \Omega^1_{Y/Z} \text{—}d \to \Omega^2_{Y/Z} \text{—}d \to \cdots).$$

Notons

$$(2.2.5.1) \qquad \omega(E_0, i) \in H^2(Y, I), \qquad c(E_0, i, Y/Z) \in H^2(Y, I\Omega^{\bullet}_{Y/Z})$$

les images de $\omega^*(E_0, i)$ et $c^*(E_0, i, Y/Z)$ définies par ces identifications. L'obstruction $\omega(E_0, i)$ est encore l'image de $c(E_0, i, Y/Z)$ par la flèche naturelle.

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 40

Supposons de plus que $Z = (Z, K, \delta)$ soit un PD-schéma où p est nilpotent [1], ou que Z soit une base P-adique (avec $p \in P$) au sens de [3, 7.17] : le cas qui nous intéresse en fait est celui où Z est un W-schéma formel p-adiquement complet, muni des puissances divisées standard sur $p\mathcal{O}_Z$. Alors, si Y est lisse sur Z, et si les puissances divisées γ triviales sur I (i.e. telles que $\gamma^i(x) = 0$ pour i>1) sont compatibles à celles de Z, on a

$$H^2(Y, I\Omega^{\cdot}_{Y/Z}) = H^2(Y_0/Z, J_{Y_0/Z})$$

(où $J_{Y_0/Z}$ désigne, comme d'habitude, l'idéal cristallin noyau de $\mathcal{O}_{Y_0/Z} \to \mathcal{O}_{Y_0}$), et la classe $c(E_0, i, Y/Z)$ de (2.2.5.1) n'est autre que la classe de Chern cristalline de L_0 relativement à Y_0/Z, définie dans [2] :

$$(2.2.5.2) \qquad c(E_0, i, Y/Z) = c_1(E_0)_{Y_0/Z} \in H^2(Y_0/Z, J_{Y_0/Z}).$$

Nous appliquerons ces remarques au cas où l'on a des carrés cartésiens

$$\begin{array}{ccccc} & & \overset{i}{} & & \\ Y_0 & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & X \\ & & \downarrow f_0 & & \downarrow f \quad \downarrow \\ & & \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \\ Z_0 & \xrightarrow{j} & Z & \longrightarrow & S, \end{array}$$

(2.2.5.3)
X/S étant la déformation formelle universelle de X_k, Z désignant un W-schéma formel affine p-adiquement complet, j désignant une immersion fermée définie par un idéal J de carré nul, de sorte que $I = f^*(J)$. Comme $R^1 f_{0*}(\mathcal{O}_{Y_0}) = 0$, donc $H^1(Y_0, \mathcal{O}) = 0$, les flèches canoniques

$$H^2(Y, I) \to H^2(Y, \mathcal{O}), \qquad H^2(Y, I\Omega^{\cdot}_{Y/Z}) \to H^2_{\mathrm{DR}}(Y/Z)$$

sont injectives, nous considérerons donc $\omega(E_0, i)$ (resp. $c(E_0, i, Y/Z)$) comme un élément de $H^2(Y, \mathcal{O})$ (resp. $H^2_{\mathrm{DR}}(Y/Z)$). D'autre part, pour $p \neq 2$, ou si $p\mathcal{O}_Z = 0$, les puissances divisées triviales sur I sont compatibles aux puissances divisées standard sur $p\mathcal{O}_Z$. D'après ce

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p040.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 69F523240E09FC97… Authority evidence: 4D54BD44C026B9EE…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 41

qu'on vient de voir, l'obstruction $\omega(E_0, i)$ est alors donnée par la recette suivante :

LEMME 2.2.6. Dans la situation de (2.2.5.3), si $p \neq 2$, ou si $p\mathcal{O}_Z = 0$, l'obstruction $\omega(E_0, i)$ à prolonger E_0 en un faisceau inversible sur Y est l'image, par l'application canonique $H^2_{\mathrm{DR}}(Y/Z) \to H^2(Y, \mathcal{O}_Y)$, de la classe de Chern cristalline de E_0 relativement à Z, $c_1(E_0)_{Y_0/Z} \in H^2_{\mathrm{DR}}(Y/Z)$.

En d'autres termes, sous les hypothèses de 2.2.6, E_0 se prolonge en un faisceau inversible sur Y si et seulement si

$$c_1(E_0)_{Y_0/Z} \in \mathrm{Fil}^1 H^2_{\mathrm{DR}}(Y/Z).$$

2.2.7. L'intérêt de la recette 2.2.6 est qu'on dispose d'un principe de calcul pour la classe de Chern $c_1(E_0)_{Y_0/Z}$, que nous allons rappeler.

Sous les hypothèses de 2.2.6, on peut considérer la classe de Chern

$$(2.2.7.1) \qquad c_1(E_0)_{f_0/W} \in H^2(Y_0/W),$$

et son image

$$(2.2.7.2) \qquad c_1(E_0)_{f_0/W} \in H^0(Z_0/W, R^2 f_{0*}(\mathcal{O}_{Y_0/W}))$$

par l'application canonique

$$H^2(Y_0/W) \to H^0(Z_0/W, R^2 f_{0*}(\mathcal{O}_{Y_0/W})).$$

D'autre part, pour tout PD-épaississement Z_1 de Z_0 on peut considérer la classe de Chern

$$(2.2.7.3) \qquad c_1(E_0)_{Y_0/Z_1} \in H^2(Y_0/Z_1).$$

Le lien entre les classes (2.2.7.2) et (2.2.7.3) est le suivant : le cristal $R^2 f_{0*}(\mathcal{O}_{Y_0/W})$ a une « valeur » $R^2 f_{0*}(\mathcal{O}_{Y_0/W})(Z_1)$ sur Z_1, et, pour Z_1 affine, la section

$$c_1(E_0)_{f_0/W}(Z_1) \in H^0(Z_1, R^2 f_{0*}(\mathcal{O}_{Y_0/W})(Z_1)) = H^2(Y_0/Z_1)$$

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 42

définie par (2.2.7.2) est (2.2.7.3). Supposons maintenant que l'on dispose d'une factorisation de la flèche $Z_0 \to S$ de (2.2.5.3) en

$$(2.2.7.4) \qquad Z_0 - j' \to Z' \to S,$$

où Z' est un W-schéma formel lisse, p-adiquement complet, et j' une immersion fermée. Soit $\widehat{Z'} = D_{Z_0}(Z')$ la PD-enveloppe, p-complétée, de Z_0 dans Z'. D'après Berthelot [1] (ou [3, §7]), on sait que le cristal $R^2 f_{0*}(\mathcal{O}_{Y_0/W})$ est décrit par un $\mathcal{O}_{\widehat{Z'}}-$module à connexion intégrable relativement à W. Dans le cas présent, comme on a des carrés cartésiens

$$\begin{array}{ccccc} Y_0 & \longrightarrow & \widehat{Y'} & \longrightarrow & X \\ & & \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \\ & & \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \\ Z_0 & \longrightarrow & \widehat{Z'} & \longrightarrow & S, \end{array}$$

(2.2.7.5)

on voit que ce module n'est autre que $H^2_{\mathrm{DR}}(X/S) \otimes \mathcal{O}_{\widehat{Z'}}$, muni de la connexion de Gauss-Manin. La classe (2.2.7.2) s'interprète comme une section horizontale de ce module. Quand, dans la situation de (2.2.5.3), Z est un sous-schéma fermé de Z', Z s'envoie dans $\widehat{Z'}$ par la propriété universelle des PD-enveloppes, et la section de $H^2_{\mathrm{DR}}(X/S) \otimes \mathcal{O}_Z = H^2_{\mathrm{DR}}(Y/Z)$ induite par la classe (2.2.7.2) n'est autre que $c_1(E_0)_{Y_0/Z}$. Nous verrons plus loin comment exploiter l'horizontalité de la section (2.2.7.2) de $H^2_{\mathrm{DR}}(X/S) \otimes \mathcal{O}_{\widehat{Z'}}$ pour la calculer lorsque E_0 prolonge le faisceau donné L_0 sur X_k, en utilisant des plongements j' (2.2.7.4) bien choisis.

2.2.8. À cet effet, nous aurons besoin d'un dernier ingrédient, un peu technique, concernant les PD-enveloppes. Notons

$$(2.2.8.1) \qquad W\langle\langle t\rangle\rangle = W\langle\langle t_1, \dots, t_n\rangle\rangle$$

la PD-enveloppe, p-complétée, de l'idéal $(t_1, \dots, t_n)$ de W[[t]] = $W[[t_1, \dots, t_n]]$: c'est le sous-anneau de K[[t]] formé des séries $\sum a_i t^i/i!$ avec $a_i \in W$ tendant vers 0. Considérons maintenant

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 43

$$l'\text{idéal}\ t^r = (t_1^{r_1}, \dots, t_n^{r_n})\ \text{de}\ W[[t]],\ \text{et la PD} - \text{enveloppe},\ p - \text{complétée},\ \text{de}\ t^r\ \text{dans}\ W[[t]]\ :$$

$$(2.2.8.2) \qquad D_{(t^r)}(W[[t]]).$$

Utilisant la compatibilité de la formation des PD-enveloppes aux extensions plates [1, I 2.7.4] dans le cas du morphisme fini et plat W[[t]] → W[[t]], $t_i \mapsto t_i^{r_i}$, on obtient pour (2.2.8.2) la description suivante : le groupe additif sous-jacent est celui des séries formelles à coefficients dans W, tendant vers 0, en les $t^{(m)}$, où

$$t^{(m)} = t^s (t^r)^{[q]}, \qquad \text{si}\ m = r\,q + s, \qquad 0 \le s < r,$$

et la multiplication est la multiplication évidente donnée formellement par $(t^r)^{[q]} = t^{r\,q}/q!$.
L'application

$$(2.2.8.3) \qquad D_{(t^r)}(W[[t]]) \to W\langle\langle t\rangle\rangle$$

définie par l'inclusion $(t^r) \subset (t)$ envoie l'élément de base $t^{(m)}$ de multi-degré m sur $(m!/q!)t^{[m]}$, en particulier est injective.
2.2.9. Démonstration de 2.2.2. Comme L_0 est non trivial, on sait (IV 3.4) que $c_1(L_0) \neq 0$. Soit p^m la plus grande puissance de p divisant $x = c_1(L_0)$, de sorte que $x = p^m y$, avec $p \nmid y$. Donc y fait partie d'une base du groupe des caractères de S, et l'on peut supposer les coordonnées (a, b, q) choisies de manière que $y = (1, 0, \dots, 0)$, i.e. $x = p^m(e^* b_1)$. Posons

$$T' = \text{Spf}(W[[q_i - 1]]/(q_1^{p^m} - 1)).$$

Il s'agit de démontrer que $T = T'$. On va procéder en quatre étapes.
a) Prolongement de L_0 sur $X_{\text{Spec}(k[q_1-1]/(q_1^{p^m}-1))}$. On peut le faire de deux méthodes. La plus rapide consiste à observer que, d'après [16, 1.4], puisque p^m divise $c_1(L_0)$, p^m divise aussi la classe de L_0 dans $\text{NS}(X_k)$. Si F désigne le Frobenius de X_k, L_0 est donc l'image inverse par F^m d'un faisceau inversible L_0', et

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p043.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 94DAA380DAA93593… Authority evidence: 0BE621561B9BEE78…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 44

par suite L_0 se prolonge à tout k-voisinage infinitésimal de X_k d'ordre $\leq p^m - 1$. On peut aussi procéder directement, en prolongeant L_0 pas à pas sur X_{Y_n}, où $Y_n = \mathrm{Spec}(k[t_1]/t_1^n)$, $q_1 - 1 = t_1$. Supposons en effet $m > 0$ et L_0 prolongé en un faisceau inversible L_{Y_n} sur X_{Y_n} pour $n < p^m$, et montrons que L_{Y_n} se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{Y_{n+1}}$. Notons $c(L_{Y_n})_{Y_{n+1}} \in H^2_{\mathrm{DR}}(X_{Y_{n+1}}/Y_{n+1})$ la classe de Chern cristalline de L_{Y_n}. D'après 2.2.6, il s'agit de voir que l'image de cette classe dans $H^2(X_{Y_{n+1}}, \mathcal{O})$ est nulle. Or Y_n est le sous-schéma formel de $\mathrm{Spf}(W[[t_1]])$ défini par l'idéal (p, t_1^n), et, d'après 2.2.7, si D_n désigne la PD-enveloppe, p-complétée, de cet idéal dans $W[[t_1]]$, i.e. $D_n = D_{(t_1^n)}(W[[t_1]])$, $c(L_{Y_n})_{Y_{n+1}}$ est induit par la section horizontale $c(L_{Y_n})_{D_n} \in H^2_{\mathrm{DR}}(X/S) \otimes D_n$ du type (2.2.7.2). Comme, d'après 2.2.8, l'application $D_n \to D_1 = W\langle\langle t_1 \rangle\rangle$ est injective, $c(L_{Y_n})_{D_n}$ est déterminé par son image dans $H^2_{\mathrm{DR}}(X/S) \otimes D_1$. Or cette image n'est autre que la section horizontale $c(L_0)_{D_1}$ définie par L_0 : cela résulte de la fonctorialité de la classe (2.2.7.1), compte tenu du fait que l'on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y_n & \longrightarrow & \mathrm{Spf}(W[[t_1]]) \\ & & \downarrow \quad \nearrow \uparrow \quad \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(W) \end{array}$$

et que L_{Y_n} prolonge L_0. Comme $c(L_0)$ est la classe horizontale qui prolonge $c_1(L_0) = p^m e^* b_1$, un calcul immédiat (utilisant 2.1.7) montre que l'on a

$$c(L_0)_{D_1} = -(p^m \log q_1) a_{D_1} + p^m (b_1)_{D_1}$$

(où $(a_{S'}, b_{S'})$ désigne l'image inverse de (a, b) sur S' pour $S' \to S$). Donc, par l'injectivité de $D_n \to D_1$,

$$c(L_{Y_n})_{D_n} = -(\log q_1^{p^m}) a_{D_n} + p^m (b_1)_{D_n}$$

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p044.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: B68B4F18A1EC1F7D… Authority evidence: E9E6B67D9A7EBBCF…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 45

(noter que $q_1^{p^m} - 1$ appartient à l'idéal engendré par p et $t_1^n = (q_1 - 1)^n$, de sorte que le log a un sens grâce aux puissances divisées sur (p, t_1^n)). L'application $D_n \to \mathcal{O}_{Y_{n+1}}$ définie par la propriété universelle des PD-enveloppes envoie $x^{[i]}$ (pour $x \in (p, t_1^n)$) sur x mod (p, t_1^{n+1}) pour $i = 1$ et sur 0 pour $i \geq 2$. En particulier, elle envoie $\log q_1^{p^m}$ sur $(q_1^{p^m} - 1)$ mod $(p, t_1^{n+1}) = 0$, puisque $n < p^m$. En d'autres termes, l'image $c(L_{Y_n})_{Y_{n+1}} \in H^2_{\mathrm{DR}}(X/S) \otimes \mathcal{O}_{Y_{n+1}}$ de $c(L_{Y_n})_{D_n}$ appartient à Fil^1, donc, d'après ce qu'on a dit plus haut, L_{Y_n} se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{Y_{n+1}}$.

b) Prolongement de L_0 sur X_Z, où $Z =$ $\mathrm{Spf}(W[[q_1 - 1]]/(q_1^{p^m} - 1))$. Notons L_Y le prolongement, obtenu en a), de L_0 sur X_Y. Posons

$$Z_n = \mathrm{Spec}(W_n[[q_1 - 1]]/(q_1^{p^m} - 1)).$$

Supposons L_Y prolongé en un faisceau inversible L_{Z_n} sur X_{Z_n}, et montrons que L_{Z_n} se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{Z_{n+1}}$. D'après 2.2.6 (qui s'applique grâce à l'hypothèse $p \neq 2$), il suffit de vérifier que la classe de Chern $c(L_{Z_n})_{Z_{n+1}} \in H^2_{\mathrm{DR}}(X_{Z_{n+1}}/Z_{n+1})$ appartient à Fil^1. Or celle-ci est induite par la classe $c(L_{Z_n})_D \in H^2_{\mathrm{DR}}(X_D/D)$, où D est la PD-enveloppe, p-complétée, de Y_n dans $W[[q_1 - 1]]$. Si $D_I(\ )$ désigne la PD-enveloppe, p-complétée, de l'idéal I, on a
$D \coloneqq D_{(p^n, q_1^{p^m} - 1)}(W[[q_1 - 1]])$
$= D_{(p, q_1^{p^m} - 1)}(W[[q_1 - 1]])$
$= D_{(p, (q_1 - 1)^{p^m})}(W[[q_1 - 1]])$
$= D_{(t_1^{p^m})}(W[[t_1]])$
où $t_1 = q_1 - 1$. D'après 2.2.8, l'application $D \to D_{(t_1)}(W[[t_1]]) = W\langle\langle t_1 \rangle\rangle$ définie par l'inclusion $(p^n, q_1^{p^m} - 1) \subset (p, q_1 - 1)$ est donc injective, et l'on voit, par le même argument qu'en a), que

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p045.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 12255BA6D4A40955… Authority evidence: 1542810638B0DAA2…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 46

$$c(L_{Z_n})_D = -(\log q_1^{p^m})a_D + p^m(b_1)_D.$$

Par suite, $c(L_{Z_n})_{Z_{n+1}}$, image de $c(L_{Z_n})_D$ par l'application $D \to \mathcal{O}_{Z_{n+1}}$ définie par la propriété universelle des PD-enveloppes (qui envoie $x^{[i]}$ (pour $x \in (p^n, q_1^{p^m} - 1)$) sur l'image de x dans $\mathcal{O}_{Z_{n+1}}$ pour $i = 1$ et sur 0 pour $i > 1$), est donnée par

$$\begin{aligned} c(L_{Z_n})_{Z_{n+1}} &= -(q_1^{p^m} - 1)a_{Z_{n+1}} + p^m(b_1)_{Z_{n+1}} \\ &= p^m(b_1)_{Z_{n+1}} \end{aligned}$$

(car $q_1^{p^m} - 1 = 0$ sur Z_{n+1}). Donc $c(L_{Z_n})_{Z_{n+1}}$ appartient à $\mathrm{Fil}^1 H^2_{\mathrm{DR}}(X_{Z_{n+1}}/Z_{n+1})$, et par conséquent L_{Z_n} se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{Z_{n+1}}$. Donc L_Y se prolonge en un faisceau inversible L_Z sur X_Z.

c) Prolongement de L_0 sur $X_{T'}$. Posons $t_i = q_i - 1$. Soit $n = (n_2, \dots, n_{20})$ une suite d'entiers ≥ 1, posons

$$T'_n = \mathrm{Spf}(W[[t]]/(q_1^{p^m} - 1, t_2^{n_2}, \dots, t_{20}^{n_{20}}))$$

(donc $T'_{(1,\dots,1)} = Z$). Supposons L_Z prolongé en un faisceau inversible $L_{T'_n}$ sur $X_{T'_n}$. Alors, par un argument analogue à celui utilisé en *b*), on voit que, si $2 \leq i \leq 20$, et $n + 1_i = (n_2, \dots, n_{i-1}, n_i + 1, n_{i+1}, \dots, n_{20})$, $L_{T'_n}$ se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{T'_{(n+1_i)}}$. On en déduit, par récurrence, que L_Z se prolonge en un faisceau inversible $L_{T'}$ sur $X_{T'}$.

d) Fin de la démonstration. Pour prouver que $T' = T$, il reste à vérifier que, si $T'' \supset T'$ est un sous-schéma formel fermé de S, défini par un idéal I, tel que $L_{T'}$ se prolonge en un faisceau inversible sur $X_{T''}$, alors $T'' = T'$. Il revient au même de montrer que, si $T'' \neq T'$ et $I^2 = 0$, l'obstruction à prolonger $L_{T'}$ en un faisceau inversible sur $X_{T''}$ est non nulle, i.e. que la classe de Chern $c(L_{T'})_{T''} \in H^2_{\mathrm{DR}}(X_{T''}/T'')$ n'appartient pas à Fil^1. Or, le même

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p046.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: D1B7591B6E5DF8CA… Authority evidence: CBD5D6551259D512…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 47

calcul que précédemment fournit

$$c(L_{T'})_{T''} = -(q_1^{p^m} - 1)a_{T''} + p^m(b_1)_{T''}.$$

Comme $T'' \neq T'$, l'image de $q_1^{p^m} - 1$ dans T'' est non nulle, donc $c(L_{T'})_{T''} \notin \mathrm{Fil}^1$, ce qui achève la démonstration.

BIBLIOGRAPHIE

[1] P. BERTHELOT.- Cohomologie cristalline des schémas de caractéristique $p > 0$. Lecture Notes in Math. 407, Springer-Verlag (1974).

[2] P. BERTHELOT et L. ILLUSIE.- Classes de Chern en cohomologie cristalline. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 270, p. 1695-1697 et 1750-1752 (1970).

[3] P. BERTHELOT et A. OGUS.- Notes on crystalline cohomology. Mathematical Notes 21, Princeton U. Press (1978).

[4] P. DELIGNE. Lettre à I. Shafarevitch, 7.10.1976.

[5] B. DWORK.- Norm residue symbol in local number fields. Abh. Math. Sem. Univ. Hamburg, 22, p. 180-190 (1958).

[6] B. DWORK.- Normalized Period Matrices. Ann. of Math., 94, p. 337-388 (1971).

[7] M. HAZEWINKEL.- On formal groups. The functional equation lemma and some of its applications, Journées de Géométrie algébrique de Rennes, juillet 78, S.M.F., Astérisque 63, p. 73-82 (1979).

[8] N. KATZ.- Travaux de Dwork, Séminaire Bourbaki, exp. 409, Lecture Notes in Math. 383, Springer-Verlag (1973).

[9] N. KATZ.- p-adic L-functions via moduli of elliptic curves. In Algebraic Geometry Arcata 1974, Proc. of Symp. in Pure Math. AMS 29 (1975).

[10] N. KATZ.- Slope filtration of F-crystals. Journées de Géométrie algébrique de Rennes, juillet 78, S.M.F., Astérisque 63, p. 113-163 (1979).

[11] N. KATZ.- p-adic L-functions. Cong. int. Math. Helsinki, 1978, p. 365-371.

[12] B. MAZUR.- Frobenius and the Hodge filtration. BAMS 78, p. 653-667 (1972).

[13] B. MAZUR et W. MESSING.- Universal extensions and one dimensional crystalline cohomology. Lecture Notes in Math. 370, Springer-Verlag (1974).

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p047.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 43811DD4DEF84A60… Authority evidence: 67449D8273A73E97…

Canonical source-language edition

diplomatic source; exact one-page correspondence to authority physical 48

[14] *W*. MESSING.- The crystals associated to Barsotti-Tate groups, with applications to abelian schemes. Lecture Notes in Math. 264, Springer-Verlag (1972).

[15] A. OGUS.- F-crystals and Griffiths transversality. Intl. Symp. on Alg. Geometry Kyoto, *p*. 15-44 (1977).

[16] A. OGUS.- Supersingular K3 crystals. Journées de Géométrie algébrique de Rennes, juillet 1978, S.M.F., Astérisque 64, *p*. 3-86 (1979).

[17] I. SHAFAREVITCH.- Algebraic surfaces. Proc. Steklov Inst. of Math. 75 (1965).

P. DELIGNE
Institut des Hautes Etudes
Scientifiques
35, Route de Chartres
91440 BURES/YVETTE (France)

L. ILLUSIE
Université de Paris-Sud
Centre d'Orsay
Mathématique, bât. 425
91405 ORSAY (France)

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): `assets/authority_pages/p048.png`. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: `A352FC60D42A84B6…` Authority evidence: `5CC2C76E8D368E99…`

Canonical source-language edition

source replay (not translation); exact one-page correspondence to authority physical 49

APPENDIX TO EXPOSE *V*

Nicholas *M*. Katz

A1. UNIQUENESS OF GROUP STRUCTURES

Let k be a perfect field, $W = W(k)$ its ring of Witt vectors, and $\sigma : W \cong \to W$ the absolute Frobenius automorphism of W. Let M be a finite-dimensional formal Lie variety over W, i.e. $M = \mathrm{Spf}(A)$ with A non-canonically isomorphic to $W[[T_1, \dots, T_n]]$, $n = \dim M$. Suppose we are given a W-morphism of formal Lie varieties

$$\Phi : M \to M^{(\sigma)}$$

whose reduction modulo p is the absolute Frobenius endomorphism

$$\mathrm{Frob} : M \otimes_W k \to (M \otimes_W k)^{(\sigma)}.$$

UNIQUENESS LEMMA A1.1.(1) Given (M, Φ) as above, there exists at most one structure of commutative formal Lie group over W on the formal Lie variety M for which the given map $\Phi : M \to M^{(\sigma)}$ is a group homomorphism. (2) If this structure exists, it makes M into a toroidal formal group, and the given $\Phi : M \to M^{(\sigma)}$ is the unique group homomorphism lifting Frobenius. (3) If (M_1, Φ_1) and (M_2, Φ_2) both admit group structures as in (2) above, then a morphism

$$f : M_1 \to M_2$$

of formal Lie varieties over W is a group homomorphism if and only if the diagram

$$\begin{array}{ccc} & f & \\ M_1 & \longrightarrow & M_2 \\ \downarrow \Phi_1 & & \downarrow \Phi_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_1^{(\sigma)} & -f^{(\sigma)} \to & M_2^{(\sigma)} \end{array}$$

commutes.

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p049.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 4CA73A5F63ED08BE... Authority evidence: EA899261C778615B...

Canonical source-language edition

source replay (not translation); exact one-page correspondence to authority physical 50

PROOF. We begin by proving (2). Thus let G be a finite-dimensional commutative formal Lie group over W, together with a homomorphism

$$\Phi : G \to G^{(\sigma)}$$

which lifts Frobenius. We must show that G is toroidal, and that Φ is unique. By the rigidity of toroidal groups, it suffices to show that $G \otimes k$ is toroidal, and for this it suffices to show that Ker(Frob) is toroidal. For this, we first observe that $\Phi : G \to G^{(\sigma)}$ is finite (because it is finite modulo p, being a lifting of Frobenius) and flat (because it is a finite morphism between regular local rings of the same dimension). Therefore Ker(Φ) is a finite flat commutative group-scheme over W whose reduction mod p is Ker(Frob). According to Fontaine, if we denote by N the contravariant Dieudonné module of Ker(Frob), then the lifting Ker(Φ) is described by a W-submodule $L \subset N$ which satisfies

$$a) \quad L/\mathrm{pL} \cong N/\mathrm{FN}$$
$$b) \quad V|L \text{ is injective.}$$

But N is killed by F, and is of finite length over W. Therefore a) implies that $L = N$, and b) then shows that V is injective, and hence bijective on N. Therefore Ker(Frob) is toroidal, as required.
We next prove (3). By extending scalars $W(k) \to W(\overline{k})$, we may suppose k algebraically closed. Then M_1 and M_2 become isomorphic to products of $\widehat{G}_m$, and our commutative diagram - in the category of formal Lie varieties - becomes

$$\begin{array}{ccc} & f & \\ (\widehat{G}_m)^{n_1} & \longrightarrow & (\widehat{G}_m)^{n_2} \\ \downarrow p & & \downarrow p \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\widehat{G}_m)^{n_1} & -f^{(\sigma)} \longrightarrow & (\widehat{G}_m)^{n_2}. \end{array}$$

If f is a group homomorphism, then $f = f^{(\sigma)}$, and the diagram commutes. To prove the converse, we argue as follows.
In terms of "multiplicative" coordinates T on $(\widehat{G}_m)^{\mathrm{hi}}$, $i = 1,2$, our

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p050.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: E7BE2F65147F998C... Authority evidence: 8AAE60C81FC793DB...

Canonical source-language edition

source replay (not translation); exact one-page correspondence to authority physical 51

hypothesis on f is:

$$f^{(\sigma)}(T^p) = (f(T))^p, \quad f(1) \equiv 1 \bmod p.$$

Iterating, we find

$$f^{(\sigma^n)}(T^{\mathrm{pn}}) = (f(T))^{\mathrm{pn}},$$

so in particular

$$f^{(\sigma^n)}(1) = (f(1))^{\mathrm{pn}} \to 1 \text{ as } n \to \infty.$$

Therefore f(1) = 1. Now take logarithms, i.e. let

$$F : (\widehat{G}_a)^{n_1} \to (\widehat{G}_a)^{n_2}$$

be the unique pointed morphism (over the fraction field of W) for which

$$F(\log T) = \log(f(T));$$

then we have

$$F^{(\sigma)}(\mathrm{pX}) = \mathrm{pF}(X).$$

Therefore F is linear, and has coefficients in Q_p. As these coefficients are intrinsically the matrix entries of the tangent map of f at the origin, they lie in W as well, hence F is a linear map with coefficients in $Z_p = W \cap Q_p$. Therefore f(T) = exp(F(log T)) is a homomorphism.

Finally, we obtain (1) as the special case $(M_1, \Phi_1) = (M_2, \Phi_2)$, $f = \mathrm{id}$, of (3). Q.E.D.

COROLLARY A1.2. Suppose that k is algebraically closed, and that (M, Φ) admits a group structure as above. Then

(1) The character group $X(M) = \mathrm{Hom}_{W-\mathrm{gp}}(M, \widehat{G}_m)$ is a free $Z_p -$ module of rank $n = \dim M$, and the natural map (of functors in $Z_p -$ modules)

$$M \to \mathrm{Hom}_{Z_p}(X(M), \widehat{G}_m)$$

is an isomorphism.

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p051.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: B65D07BA41E15852… Authority evidence: F07553EE768639F6…

Canonical source-language edition

source replay (not translation); exact one-page correspondence to authority physical 52

(2) Let q be a function on M (i.e. $q \in A$ where $M = \mathrm{Spf}(A)$) with $q = 1$ modulo the maximal ideal of A. Then $q \in X(M)$ if and only if q transforms under Φ by

$$\Phi^*(q^{(\sigma)}) = q^p.$$

(3) Let ω be a (continuous) one-form on A, i.e. $\omega \in (\Omega^1_{A/W})^{\mathrm{contin}}$. Then $\omega = \mathrm{dq}/q$ with $q \in X(M) = \mathrm{Hom}(M, \widehat{G}_m)$ if and only if

$$\Phi^*(\omega^{(\sigma)}) = p\omega.$$

If ω satisfies this, the associated $q \in X(M)$ is unique; it is given by the formula

$$q(X) = \exp(\textstyle\int_O^X \omega), \quad O = \text{the origin in } M.$$

(4) Let $\tau \in A \,\widehat{\otimes}_W$ W[1/p] be a function on $M \otimes_W$ W[1/p]. Then $\tau = \log(\mathrm{q})$ for some $q \in X(M)$ if and only if τ satisfies

$$\tau(O) = 0, \quad \Phi^*(\tau^{(\sigma)}) = p\tau.$$

If τ satisfies this, then the associated q is unique; it is given by the formula

$$q = \exp(\tau).$$

(5) Let $q_1, \ldots, q_n$ be $n = \dim M$ elements of $X(M)$, $\omega_1, \ldots, \omega_n$ the corresponding differentials $\omega_i = \mathrm{dq}_i/q_i$ and $\tau_1, \ldots, \tau_n$ the corresponding "functions with denominators" $\tau_i = \log q_i$. Then the following conditions are equivalent:

a) $q_1, \ldots, q_n$ form a Z_p base of $X(M)$

b) the natural map

$$M \to \mathrm{Spf}(W[[q_1 - 1, \ldots, q_n - 1]])$$

is an isomorphism

c) $\omega_1, \ldots, \omega_n$ form an $A-$base of $(\Omega^1_{A/W})^{\mathrm{contin}}$

Canonical source-language edition

source replay (not translation); exact one-page correspondence to authority physical 53

$$d)\ \omega_1, \dots, \omega_n \text{ form a } Z_p - \text{base of}$$

$$\{\omega \in \Omega^1 \mid \Phi^*(\omega^{(\sigma)}) = p\omega\}$$

$$e)\ \tau_1, \dots, \tau_n \text{ form a } Z_p - \text{base of}$$

$$\{\tau \in A \hat{\otimes} W[1/p] \mid \tau(O) = 0,\ \Phi^*(\tau^{(\sigma)}) = p\tau\}.$$

PROOF. Because M is toroidal, and k is algebraically closed, M is (non-canonically) isomorphic to $(\widehat{G}_m)^n$. This makes (1) obvious. Assertion (2) is a particular case of part (3) of the uniqueness lemma, namely $M_1 = M$, $M_2 = \widehat{G}_m$. Assertion (3) becomes obvious if we choose a Z_p − basis $q_1, \dots, q_n$ of $X(M)$, i.e. if we choose an isomorphism

$$M \cong (\widehat{G}_m)^n,$$

and write ω as an A-linear combination of the differentials dq_i/q_i:

$$\omega = \Sigma f_i \, \mathrm{dq}_i/q_i.$$

The condition

$$\Phi^*(\omega^{(\sigma)}) = p\omega$$

means precisely that the coefficient functions f_i each satisfy

$$\Phi^*(f_i^{(\sigma)}) = f_i,$$

which in turn implies that each coefficient function f_i is simply a constant in Z_p. Therefore

$$\omega = \mathrm{dq}/q \quad \text{for} \quad q = \prod (q_i)^{\mathrm{fi}};$$

because q(O) = 1, we obtain by integration the formula

$$\exp(\textstyle\int_O^X \omega) = q(X).$$

For assertion (4), first note that the Dieudonné-Dwork integrality criterion (cf. 1.4.4) guarantees that the series q, defined as

$$q \quad \mathrm{dfn} = \quad \exp(\tau)$$

is integral (i.e. lies in A) and lies q(O) = 1. From the equality

$$\Phi^*(\tau^{(\sigma)}) = p\tau$$

Canonical source-language edition

source replay (not translation); exact one-page correspondence to authority physical 54

(and not simply their congruence modulo pA) we see that

$$\Phi^*(q^{(\sigma)}) = q^p,$$

and we conclude by (2) that q lies in $X(M)$.
In assertion (5), the equivalence of a), b) and c) is physically obvious for $(\widehat{G_m})^r$, and the equivalence of a) with d) and e) is obvious from parts 3) and 4) above. Q.E.D.

A2. SHARPENINGS OF 1.4

COROLLARY A2.1 OF 1.4.2. With the hypotheses and notations of 1.4.2, suppose that there exists a lifting Φ_{can} of Frobenius on $\mathrm{Spf}(A)$ such that

$$F(\Phi_{\text{can}})(\Phi^*_{\text{can}}(\mathrm{Fil}^1)^{(\sigma)}) \subset \mathrm{Fil}^1 .$$

Let O denote the W-valued point of $\mathrm{Spf}(A)$ which is the $\Phi_{\text{can}}-$ Teichmuller representative of the augmentation $A \to k$. Then in formulaire 1.4.2.1-7 we have the further precisions

$$\begin{cases} \nabla a_i = 0 \\ \nabla b_i = \sum_j \eta_{ij} \otimes a_j \\ F(\Phi_{\text{can}})(\Phi^*_{\text{can}}(a_i^{(\sigma)})) = a_i \\ F(\Phi_{\text{can}})(\Phi^*_{\text{can}}(b_i^{(\sigma)})) = p\, b_i \\ \Phi^*_{\text{can}}(\eta_{ij}^{(\sigma)}) = p\eta_{ij}, \quad d\eta_{ij} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} d\tau_{ij} = \eta_{ij} \\ \Phi^*_{\text{can}}(\tau_{i,j}^{(\sigma)}) = p\tau_{ij} \\ \tau_{ij}(O) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} q_{ij} = \exp(\tau_{ij}) \text{ is defined, lies in } A, \text{ and} \\ q_{ij}(O) = 1 \\ \Phi^*_{\text{can}}(q_{ij}^{(\sigma)}) = q_{ij}^p. \end{cases}$$

Layout/math fallback asset (evidence only; not reader prose): assets/authority_pages/p054.png. Full-resolution image retained beside this TeX source; running headers, printed folios, and scanner/library copy matter are excluded from canonical prose.

Record: 77CA1A539DAB294E... Authority evidence: 277A8B678DEAB5FB...

Canonical source-language edition

source replay (not translation); exact one-page correspondence to authority physical 55

FURTHER COROLLARY A2.2. (Analogue of (4.7)(1) Given Φ_{can} as above, suppose in addition that (1.4.6.3) : $T_{A/W} \to \text{Hom}_A(\text{Fil}^1, U)$ is an isomorphism. Then $(\text{Spf}(A), \Phi_{\text{can}})$ admits a group structure, and the morphism

$$\text{Spf}(A) \to \prod_{i,j} \widehat{G}_m$$

defined by the $q_{i,j}$ is an isomorphism of groups.

(2) If $p \neq 2$, then Φ_{can} is the unique lifting of Frobenius such that

$$F(\Phi_{\text{can}})(\Phi^*_{\text{can}}(\text{Fil}^1)^{(\sigma)}) \subset \text{Fil}^1 .$$

PROOF. The formulaire is simply obtained from the one given in 1.4.2.1-7 by noting that the $u_{i,j}(\Phi_{\text{can}})$ all vanish. The first assertion of the further corollary has already been proven when $p \neq 2$, but the condition $p \neq 2$ was used only to assure that $\exp(\tau_{i,j}(O))$ make sense. As our hypotheses on Φ_{can} give $\tau_{i,j}(O) = 0$, this problem will not arise, and the proof given goes through tel quel. The unicity of Φ_{can} in case $p \neq 2$ resulte from the observation that the series $q_{\text{ij}} = \exp(\tau_{\text{ij}})$ are then definible without reference to a particular choice of Φ, and furnish an isomorphism

$$M \cong \text{Spf}(W[[q_{\text{ij}} - 1]]);$$

our Φ_{can} is the lifting of Frobenius given by

$$\Phi_{\text{can}}(q_{\text{ij}}^{(\sigma)}) = (q_{\text{ij}})^p . \quad Q.E.D.$$

Canonical source-language edition

source replay (not translation); exact one-page correspondence to authority physical 56

A3. FORMAL MODULI OF ORDINARY ABELIAN VARIETIES ; THE SERRE-TATE & DWORK GROUP STRUCTURES

Let k be an algebraically closed field of characteristic $p > 0$, and X_o/k an ordinary abelian variety over k. Let M be its formal deformation space, and X/M the corresponding formal abelian scheme. One knows that M is a $g^2 -$ dimensional formal Lie variety over $W = W(k)$. Because X_o/k is ordinary, the formal group $\widehat{X}$ of X/M is non-canonically isomorphic to $(\widehat{G}_m)^g$ over M. The "canonical subgroup" $H_{\text{can}} \subset X$ is defined to be the kernel of $[p]$ in $\widehat{X}$; it is the unique finite flat subgroup-scheme of X/M which mod p becomes the kernel of the relative Frobenius endomorphism of $X \otimes_W k/M \otimes_W k$. We denote by

$$F_{\text{can}} : X \to X/H_{\text{can}}$$

the projection onto the quotient by H_{can}. The quotient X/H_{can} over M is a deformation of $X_o^{(p)}/k$, so its "classifying map" is a morphism of formal Lie varieties

$$\Phi_{\text{can}} : M \to M^{(\sigma)},$$

"defined by" an isomorphism of formal abelian schemes over M

$$\Phi_{\text{can}}^*(X^{(\sigma)}) \cong X/H_{\text{can}}.$$

Thus Φ_{can} is a lifting of the absolute Frobenius endomorphism of $M \otimes k$, and

$$F_{\text{can}} : X \to X/H_{\text{can}} \cong \Phi_{\text{can}}^*(X^{(\sigma)}) \quad \swarrow \text{(over } M\text{)}$$

is a lifting of the relative (to $M \otimes k$) Frobenius endomorphism of $X \otimes k/M \otimes k$. Therefore this morphism induces on H^1_{DR} an M-linear map

$$F^*_{\text{can}} : \Phi^*_{\text{can}}\, \sigma^*\, H^1_{\text{DR}}(X/M) \to H^1_{\text{DR}}(X/M)$$

which is none other than the crystalline map $F(\Phi_{\text{can}})$. Because F_{can} is

Canonical source-language edition

source replay (not translation); exact one-page correspondence to authority physical 57

a physical morphism, the induced map F^*_{can} respects the Hodge filtration of H^1_{DR}'s. Therefore we have

$$F(\Phi_{\text{can}})(\Phi^*_{\text{can}}(\text{Fil}^1)^{(\sigma)}) \subset \text{Fil}^1 .$$

THEOREM A3.1. The structure of group imposed on M by the Serre-Tate description of M as

$$\text{Ext}(X_o(p^\infty)^{\text{et}},\ X_o(p^\infty)^{\text{conn}})$$

coincides with the structure of group on M for which the $q_{\text{ij}} = \exp(\tau_{\text{ij}})$ define an isomorphism of groups

$$M \cong \prod_{i,j} \widehat{G}_m .$$

PROOF. The morphism $\Phi_{\text{can}} : M \to M^{(\sigma)}$ is also a group homomorphism for the Serre-Tate group structure on M. Q.E.D.

A4. FORMAL MODULI OF ORDINARY K3 SURFACES ; SHARPENING OF 2.1.7, 2.1.14

COROLLARY A4.1 (of 2.1.7, 2.1.14). With the hypotheses and notations of 2.1.7 and 2.1.14, there exists a unique morphism

$$\Phi_{\text{can}} : \text{Spf}(A) \to \text{Spf}(A)^{(\sigma)}$$

lifting Frobenius for which the induced crystalline map $F(\Phi_{\text{can}})$ on $H^2_{\text{DR}}(X/A)$

$$F(\Phi_{\text{can}}) : \Phi^*_{\text{can}}\,\sigma^*\,H^2_{\text{DR}}(X/A) \to H^2_{\text{DR}}(X/A)$$

preserves the Hodge filtration, i.e. satisfies

$$\begin{cases} F(\Phi_{\text{can}})\Phi^*_{\text{can}}((\text{Fil}^2)^{(\sigma)}) \subset \text{Fil}^2 \\ F(\Phi_{\text{can}})\Phi^*_{\text{can}}((\text{Fil}^2)^{(\sigma)}) \subset \text{Fil}^1 . \end{cases}$$

The group structure on $\text{Spf}(A)$ defined by $q_1, \dots, q_{20}$ is the unique one for which Φ_{can} is a group homomorphism.

Canonical source-language edition

source replay (not translation); exact one-page correspondence to authority physical 58

PROOF. The proof of 2.1.7 shows that any Φ_{can} whose associated $F(\Phi_{\text{can}})$ preserves the Hodge filtration satisfies

$$\Phi_{\text{can}}^{*}(q_i^{(\sigma)}) = (q_i)^p \quad \text{for} \quad i = 1, \ldots, 20.$$

Therefore Φ_{can} is a group homomorphism; as it is completely specified by its effect on the q_i, it is unique. Part (iii) of 2.1.7 shows that such a Φ_{can}, preserving the Hodge filtration, does in fact exist. Q.E.D.

EXPOSÉ IV

RELÈVEMENT DES SURFACES K3 EN CARACTÉRISTIQUE NULLE

par P. DELIGNE
(rédigé par Luc ILLUSIE) *

Rudakov et Shafarevitch [14] (cf. aussi Nygaard [12]) ont établi que les surfaces K3 n'admettent pas de champs de vecteurs non nuls.

L'objet de cet exposé est de prouver, à partir de là, que toute surface K3 polarisée en car. $p > 0$ se relève en car. nulle (1.8). La démonstration repose sur le fait que le résultat de Rudakov-Shafarevitch entraîne, pour les surfaces K3, l'existence d'une bonne théorie de déformations, permettant notamment de "contrôler" le lieu de la variété formelle verselle où se déforme un faisceau inversible non trivial donné. Les seuls ingrédients utilisés sont d'une part les relations habituelles, pour la cohomologie de de Rham, entre la connexion de Gauss-Manin et l'opération de Kodaira-Spencer, d'autre part l'existence d'une classe de Chern cristalline pour les faisceaux inversibles.

On désigne par k un corps algébriquement clos de car. $p > 0$, et l'on note $W = W(k)$ l'anneau des vecteurs de Witt sur k.

∗. Équipe de Recherche Associée au C.N.R.S. n° 653.

1. ÉNONCÉ DU THÉORÈME DE RELÈVEMENT

Dans ce numéro, X_0 désigne une surface K3 sur k.

PROPOSITION 1.1.

a) La suite spectrale de Hodge $E_1^{i,j} = H^j(X_0, \Omega^i_{X_0/k}) \Rightarrow H^*_{\mathrm{DR}}(X_0/k)$ dégénère en E_1, et la matrice des nombres de Hodge $h^{ij} = \dim_k H^j(X_0, \Omega^i_{X_0/k})$ est

$$\begin{matrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 20 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{matrix}$$

b) Soit $T = T_{X_0/k} = (\Omega^1_{X_0/k})^\vee$ le fibré tangent à X_0. On a $H^i(X_0, T) = 0$ si $i = 0$ ou 2, et $\dim_k H^1(X_0, T) = 20$.

c) Les W-modules de cohomologie cristalline $H^i_{\mathrm{cris}}(X_0/W)$ sont libres, de rang $1, 0, 22, 0, 1$ pour $i = 0, 1, 2, 3, 4$.

Démonstration. D'après [14], $H^0(X_0, T) = 0$. Par définition d'une surface K3, $\Omega^2_{X_0/k}$ est trivial, donc on a

$$T_{X_0/k} \xrightarrow{\sim} \Omega^1_{X_0/k}, \tag{1.1.1}$$

et par suite $H^0(X_0, \Omega^1_{X_0/k}) = 0$, donc $H^2(X_0, \Omega^1_{X_0/k}) = 0$ par dualité de Serre. D'autre part, on a $H^1(X_0, \mathcal{O}) = 0$ et $H^2(X_0, \mathcal{O}) \simeq k$ par définition d'une surface K3. Le tableau des nombres de Hodge h^{ij}, pour $(i, j) \neq (1, 1)$, est donc celui donné en 1.1 a). Il en résulte que la suite spectrale de Hodge dégénère en E_1. Rappelons par ailleurs (SGA 5 VII 4.11) que $\sum(-1)^{i+j} h^{ij} = c_2$ et que $c_2 = 24$ par Riemann-Roch. Donc $h^{11} = 20$, d'où b), compte tenu de (1.1.1). Il résulte de a) que les espaces $H^i_{\mathrm{dR}}(X_0/k)$ sont de dimension

$1, 0, 22, 0, 1$ pour $i = 0, 1, 2, 3, 4$. L'assertion c) en découle grâce à la suite exacte "des coefficients universels" [2, VII 1.1.1] :

$$0 \to H^i_{\mathrm{cris}}(X_0/W) \otimes k \to H^i_{\mathrm{dR}}(X_0/k) \to \mathrm{Tor}_1^W(H^{i+1}_{\mathrm{cris}}(X_0/W), k) \to 0. \qquad \square$$

COROLLAIRE 1.2. *La variété formelle verselle S des déformations de X_0 sur les W-algèbres artiniennes locales de corps résiduel k [15] est universelle, et formellement lisse de dimension* 20*, i.e. W-isomorphe à* $\mathrm{Spf}(W[[t_1, \ldots, t_{20}]])$.

C'est une conséquence immédiate de 1.1 b).

Dans la suite de ce numéro, on notera

$$\underline{X}/S \tag{1.3}$$

la déformation universelle de X_0 sur S.

1.4. Soit L_0 un faisceau inversible sur X_0. Notons $\mathrm{Def}(X_0, L_0)$ le foncteur sur la catégorie $\mathcal{A}$ des W-algèbres artiniennes locales de corps résiduel k associant à chaque objet A de $\mathcal{A}$ l'ensemble des classes d'isomorphie de couples (X, L) formés d'une déformation plate (donc lisse) X de X_0 sur A et d'un prolongement de L_0 en un faisceau inversible L sur X. Notons d'autre part $\mathrm{Def}(X_0)$ le foncteur associant à chaque $A \in \mathrm{Ob}\ \mathcal{A}$ l'ensemble des classes d'isomorphie de déformations plates de X_0 sur A : d'après 1.2, ce foncteur est (pro-)représenté par S. On a un morphisme "oubli du prolongement de L_0" :

$$\mathrm{Def}(X_0, L_0) \to \mathrm{Def}(X_0). \tag{1.4.1}$$

PROPOSITION 1.5. *Le foncteur* $\mathrm{Def}(X_0, L_0)$ *est pro-représentable, et le morphisme* (1.4.1) *est une immersion fermée, définie par une équation.*

La première assertion signifie qu'il existe un plus grand sous-schéma formel fermé

$$\Sigma(L_0) \subset S \tag{1.5.0}$$

tel que L_0 se prolonge en un faisceau inversible au-dessus de $\underline{X} \times_S \Sigma(L_0)$, et que ce prolongement est unique.

On vérifie aisément que le foncteur $\mathrm{Def}(X_0, L_0)$ satisfait aux conditions de Schlessinger d'existence d'une enveloppe. On dispose donc d'un schéma formel $S' = \mathrm{Spf}(R')$, où R' est une W-algèbre locale noethérienne complète de corps résiduel k, et d'une déformation $(\underline{X}', \underline{L}')$ de (X_0, L_0) sur S' telle que, pour tout $A \in \mathrm{Ob}\ \mathcal{A}$, la flèche associée

$$\mathrm{Hom}(R', A) \to \mathrm{Def}(X_0, L_0)(A) \tag{1.5.1}$$

soit surjective, et bijective pour $A = k[\epsilon]$, $\epsilon^2 = 0$. Soit R l'anneau de S. Comme S pro-représente $\mathrm{Def}(X_0)$, $\underline{X}'$ définit un homomorphisme $u : R \to R'$ tel que le composé

$$\mathrm{Hom}(R', A) \xrightarrow{(1.5.1)} \mathrm{Def}(X_0, L_0)(A) \xrightarrow{(1.4.1)} \mathrm{Def}(X_0)(A) = \mathrm{Hom}(R, A) \tag{1.5.2}$$

soit $\mathrm{Hom}(u, A)$. Pour établir la première assertion de 1.5, il suffit donc de prouver que u est surjectif, car alors (1.5.2) sera injectif, donc (1.5.1) bijectif. D'après un lemme bien connu [15, 1.1], il revient au même de prouver que, si $\mathfrak{m}$ (resp. $\mathfrak{m}'$) est l'idéal maximal de R (resp. R'), l'application $\mathfrak{m}/pR+\mathfrak{m}^2 \to \mathfrak{m}'/pR'+\mathfrak{m}'^2$ induite par u est surjective, ou encore que l'application linéaire tangente à l'origine à (1.4.1),

$$\mathrm{Hom}(u, k[\epsilon]) : \mathrm{Def}(X_0, L_0)(k[\epsilon]) \to \mathrm{Def}(X_0)(k[\epsilon]) \tag{1.5.3}$$

est injective. Soit T' le faisceau sur X_0 des automorphismes de la déformation triviale de (X_0, L_0) au-dessus de $k[\epsilon]$. On a une suite exacte

$$0 \to \mathcal{O}_{X_0} \to T' \to T \to 0, \tag{1.5.4}$$

où $T' \to T$ est défini par oubli de L_0, $T = T_{X_0}$ étant considéré comme faisceau des automorphismes de la déformation triviale de X_0 au-dessus de $k[\epsilon]$. Il est standard que (1.5.3) s'identifie canoniquement à la

flèche $H^1(X_0, T') \to H^1(X_0, T)$ déduite de $T' \to T$. Comme $H^1(X_0, \mathcal{O}) = 0$, la suite exacte de cohomologie de (1.5.4) montre donc que (1.5.3) est injective.

Il reste à prouver que l'immersion fermée $S' \hookrightarrow S$ est définie par une seule équation, i.e. que l'idéal $I = \mathrm{Ker}(u)$ est monogène. Pour cela, considérons $S'' = \mathrm{Spf}(R/\mathfrak{m}I)$; c'est un épaississement de S' dans S, d'idéal de carré nul $I/\mathfrak{m}I$. L'obstruction à étendre le faisceau $\underline{L}'$ défini plus haut au-dessus de $\underline{X} \times_S S''$ est un élément

$$a \in H^2(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) \otimes I/\mathfrak{m}I,$$

qu'on regardera comme un élément de $I/\mathfrak{m}I$ par le choix d'une base de $H^2(X_0, \mathcal{O}_{X_0})$. Soit $\Sigma = \mathrm{Spf}(R/\mathfrak{m}I + (f))$ où $f \in I$ relève a. On a donc $S' \subset \Sigma \subset S'' \subset S$, et par construction (et fonctorialité de l'obstruction), $\underline{L}'$ se prolonge à $\underline{X} \times_S \Sigma$. Mais la propriété universelle de S' entraîne que $S' = \Sigma$, i.e. $\mathfrak{m}I + (f) = I$. Donc, par Nakayama, f engendre I, ce qui achève la démonstration.

Nous pouvons maintenant énoncer le résultat principal de l'exposé :

THÉORÈME 1.6. *Soit L_0 un faisceau inversible non trivial sur X_0. Alors, avec les notations de 1.5, le schéma formel $\Sigma(L_0)$, pro-représentant $\mathrm{Def}(X_0, L_0)$, est plat sur W, de dimension relative* 19.

En d'autres termes, si f est une équation de $\Sigma(L_0)$ dans S (1.5), p ne divise pas f. Cela signifie encore que $\Sigma(L_0)$ ne contient pas la réduction S_0 de S mod p, i.e. que L_0 ne peut se prolonger au-dessus de $\underline{X} \times_S S_0$.

La démonstration de 1.6 sera donnée au n°2. Nous terminerons ce numéro par quelques conséquences de 1.6.

COROLLAIRE 1.7. *Soit L_0 un faisceau inversible non trivial sur X_0. Il existe un trait T fini sur W, une déformation de X_0 en un schéma formel $\underline{X}$ plat sur T, et un prolongement de L_0 en un faisceau inversible $\underline{L}$ sur $\underline{X}$.*

Il s'agit de prouver qu'il existe un W-morphisme $T \to \Sigma(L_0)$, où T est un trait fini sur W. Comme p est non diviseur de zéro dans l'anneau R' de $\Sigma(L_0)$, il existe (EGA 0_{IV} 16.4.1) des éléments $x_1, \ldots, x_n$ de l'idéal maximal de R' formant avec p un système de paramètres de R' (donc $n = 19$). Le quotient $B = R'/(x_1, \ldots, x_n)$ est quasi-fini sur W, donc fini sur W. Il existe par suite un W-homomorphisme local de B dans un anneau de valuation discrète complet C fini sur W, et l'homomorphisme composé $R' \to B \to C$ répond à la question.
Appliquant le théorème d'algébrisation de Grothendieck (EGA III 5.4.5), on déduit de 1.7 le théorème de relèvement annoncé.

COROLLAIRE 1.8. *Soit L_0 un faisceau inversible ample sur X_0. Il existe un trait T fini sur W, une déformation de X_0 en un schéma propre et lisse X sur T, et un prolongement de L_0 en un faisceau inversible ample $\underline{L}$ sur X.*

REMARQUE 1.9. *On ignore si toute surface K3 sur k se relève en un schéma propre et lisse sur W. Ogus [13, §2] montre que : a) toute surface K3 sur k se relève sur W sauf peut-être dans le cas "superspécial", non elliptique, qui en fait n'existe pas si l'on admet la conjecture d'Artin [1] ; b) si $p > 2$, toute surface K3 sur k se relève sur $W[\sqrt{p}]$. Pour l'instant donc, seul le cas particulier de 1.8 où $p = 2$ et X_0 est superspéciale n'est pas absorbé par ces résultats. Signalons d'autre part que l'article d'Ogus précité contient des compléments intéressants sur la structure de $\Sigma(L_0)$, cf. aussi l'exposé suivant pour le cas où X_0 est ordinaire.*

COROLLAIRE 1.10. *Si k est la clôture algébrique d'un corps fini sur lequel la surface X_0 est définie, le Frobenius correspondant agit de façon semi-simple sur $H^2_{\text{ét}}(X_0, \mathbb{Q}_\ell)$ (ℓ premier à p).*

Cela résulte de [5] : avec les notations de 1.8, la fibre générique de X est une surface K3 (le fait pour une surface d'être une surface K3 est stable par générisation, car il s'exprime par "K algébriquement équivalent à zéro et $\chi(\mathcal{O}) = 2$"), donc X_0 vérifie l'hypothèse de [5, 1.2] ; la conclusion découle de [5, 6.6] et du fait que l'action de Frobenius sur le H^1 ℓ-adique d'une variété abélienne sur un corps fini est semi-simple ([16], [11, p. 203]).
Noter que 1.10 est en réalité indépendant du fait que $H^0(X_0, T_{X_0}) = 0$, car s'il existait sur X_0 un champ de vecteurs non nul, X_0 serait unirationnelle d'après [14], et la conclusion de 1.10 serait encore vraie (argument de trace).

2. COHOMOLOGIE DE DE RHAM DE $\underline{X}/S$ ET DÉMONSTRATION DE 1.6

On conserve les notations du n°1 : X_0 est une surface K3 sur k, et $\underline{X}/S$ désigne sa W-déformation universelle ((1.3)). Le lecteur familier avec la cohomologie de de Rham est invité à sauter les numéros 2.1–2.10, qui ne font que rappeler des faits standard concernant la connexion de Gauss-Manin, la filtration de Hodge, l'opération de Frobenius, et la classe de Chern d'un faisceau inversible.

2.1. Pour chaque i, $\Omega^i_{\underline{X}/S}$ est la limite projective des modules de différentielles usuels $\Omega^i_{(\underline{X}\times_S S')/S'}$, où S' parcourt les voisinages infinitésimaux de $\mathrm{Spec}(k)$ dans S ; ces termes forment le complexe de de Rham $\Omega^\bullet_{\underline{X}/S}$ du schéma formel relatif $\underline{X}/S$. Soit $f : \underline{X} \to S$ la projection. Par définition, la cohomologie de de Rham de $\underline{X}/S$ est formée des $\mathcal{O}_S$-modules

$$H^i_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \overset{\text{déf}}{=} R^i f_*(\Omega^\bullet_{\underline{X}/S}), \tag{2.1.1}$$

tandis que la cohomologie de Hodge de $\underline{X}/S$ est formée des $\mathcal{O}_S$-modules

$$H^i(\underline{X}, \Omega^j_{\underline{X}/S}) \overset{\text{déf}}{=} R^i f_*(\Omega^j_{\underline{X}/S}). \tag{2.1.2}$$

Comme les $\mathcal{O}_{\underline{X}}$-modules $\Omega^i_{\underline{X}/S}$ sont localement libres de type fini, les $\mathcal{O}_S$-modules (2.1.1) et (2.1.2) sont cohérents en vertu du théorème de finitude de Grothendieck (EGA III 3.4.2). On a d'autre part la suite spectrale habituelle ("suite spectrale de Hodge") :

$$E_1^{i,j} = H^j(\underline{X}, \Omega^i_{\underline{X}/S}) \Rightarrow H^{i+j}_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S). \tag{2.1.3}$$

PROPOSITION 2.2.

a) La suite spectrale (2.1.3) *dégénère en E_1 ; les $\mathcal{O}_S$-modules $H^j(\underline{X}, \Omega^i_{\underline{X}/S})$ sont libres de type fini, et les flèches canoniques $H^j(\underline{X}, \Omega^i_{\underline{X}/S}) \otimes k \to H^j(X_0, \Omega^i_{X_0/k})$ sont des isomorphismes.*

b) Les $\mathcal{O}_S$-modules $H^i_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$ sont libres de type fini, et les flèches canoniques $H^i_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \otimes k \to H^i_{\mathrm{dR}}(X_0/k)$ sont des isomorphismes.

c) Le cup-produit $H^i_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \otimes H^{4-i}_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \to H^4_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \simeq \mathcal{O}_S$ est une dualité parfaite.

Comme le tableau des nombres de Hodge de X_0/k est "entrelardé de zéros" (1.1 a)), le critère usuel (EGA III 7.5.4), appliqué aux foncteurs cohomologiques $M \mapsto H^\bullet(\underline{X}, \Omega^i_{\underline{X}/S} \otimes f^*M)$ entraîne aussitôt la seconde assertion de a) ; la première en résulte. L'assertion b) découle de a), et implique c), par la dualité de Poincaré pour $H^i_{\mathrm{dR}}(X_0/k)$.

2.3. Notons $\Omega^\bullet_{S/W}$ le complexe de de Rham des différentielles "formelles" de S/W : $\Omega^0_{S/W} = \varprojlim \mathcal{O}_{S_n}$, $\Omega^1_{S/W} = \varprojlim \Omega^1_{S_n/W_n}$ et $\Omega^i_{S/W} = \bigwedge^i \Omega^1_{S/W}$, où S_n est la réduction $\mathrm{mod} p^{n+1}$ de S/W, est libre sur $\mathcal{O}_S$, de base $dt_1, \ldots, dt_{20}$, si $S \simeq \mathrm{Spf}\, W[[t_1, \ldots, t_{20}]]$. Les $H^i_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$ sont munis d'une connexion intégrable canonique, la connexion de Gauss-Manin,

$$\nabla : H^i_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \to H^i_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \otimes \Omega^1_{S/W}. \tag{2.3.1}$$

La définition la plus simple de (2.3.1) consiste à paraphraser la construction de Katz-Oda [ ], en partant de l'extension canonique

$$0 \to f^*\Omega^1_{S/W} \to \Omega^1_{\underline{X}/W} \to \Omega^1_{\underline{X}/S} \to 0, \tag{2.3.0}$$

où $\Omega^1_{\underline{X}/W}$ est le module des différentielles complété. On peut aussi utiliser le fait que $H^i_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$ est la valeur en S d'un cristal en $\mathcal{O}$-modules sur le site cristallin de S_0/W :

$$H^i_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) = R^i(f_0)_{\mathrm{cris}*}(\mathcal{O}_{\underline{X}_0/W})(S), \tag{2.3.2}$$

où

$$(f_0 : \underline{X}_0 \to S_0) = f \times_S S_0, \quad S_0 = S \otimes_W k \ (= \mathrm{Spf}(k[[t_1, \ldots, t_{20}]])) \tag{2.3.2.1}$$

et $(f_0)_{\mathrm{cris}} : (\underline{X}_0/W)_{\mathrm{cris}} \to (S_0/W)_{\mathrm{cris}}$ est le morphisme correspondant des sites cristallins : il s'agit ici d'une "variante formelle" du résultat de Berthelot [2, V 3.6], qu'il est facile de déduire de (loc. cit.), appliqué aux morphismes induits par f sur les voisinages infinitésimaux de $\mathrm{Spec}(k)$ dans S_0.
Sur l'une ou l'autre des définitions précédentes, on voit que le cup-produit 2.2 c) est horizontal : on a

$$\langle \nabla x, y\rangle + \langle x, \nabla y\rangle = \nabla\langle x, y\rangle, \tag{2.3.3}$$

quels que soient $x, y \in H^\bullet_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$.
Notons $F^\bullet_{\mathrm{Hdg}} H^\bullet_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$ la filtration de Hodge de $H^\bullet_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$, aboutissement de (2.1.3) : si $\tau_{\geqslant i}\Omega^\bullet_{\underline{X}/S}$ (resp. $\sigma_{\geqslant i}\Omega^\bullet_{\underline{X}/S}$) désigne le complexe de de Rham tronqué (par zéro en degré $< i$), l'inclusion $\sigma_{\geqslant i} \hookrightarrow \Omega^\bullet_{\underline{X}/S}$ donne donc (en vertu de 2.2 a)) un isomorphisme

$$H^2(\underline{X}, \sigma_{\geqslant i}\Omega^\bullet_{\underline{X}/S}) \xrightarrow{\sim} F^i_{\mathrm{Hdg}} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S). \tag{2.3.4}$$

On a

$$H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) = F^0_{\mathrm{Hdg}} \supset F^1_{\mathrm{Hdg}} \supset F^2_{\mathrm{Hdg}} \supset F^3_{\mathrm{Hdg}} = 0; \tag{2.3.5}$$

les F^i_{Hdg} sont des $\mathcal{O}_S$-modules libres, et la dégénérescence de (2.1.3) fournit des isomorphismes

$$H^{2-i}(\underline{X}, \Omega^i_{\underline{X}/S}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{gr}_{F^i_{\mathrm{Hdg}}} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \quad (\text{où } \mathrm{gr} = \mathrm{gr}_{\mathrm{Hdg}}), \tag{2.3.6}$$

En particulier, F^1_{Hdg} (resp. F^2_{Hdg}) est libre de rang 21 (resp. 1).
Sur (2.3.4) on voit que l'orthogonal de F^2_{Hdg} pour le cup-produit 2.2 c) contient F^1_{Hdg}, donc est égal à F^1_{Hdg} :

$$F^1_{\mathrm{Hdg}} = (F^2_{\mathrm{Hdg}})^{\perp} \quad \text{(donc on a aussi } F^2_{\mathrm{Hdg}} = (F^1_{\mathrm{Hdg}})^{\perp}\text{).} \tag{2.3.7}$$

La description de Katz-Oda de la connexion de Gauss-Manin montre que l'on a

$$\nabla F^i_{\mathrm{Hdg}} \subset \Omega^1_{S/W} \otimes F^{i-1}_{\mathrm{Hdg}} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \tag{2.3.8}$$

("transversalité de Griffiths") (voir par exemple [8, 1.4]). Par suite, ∇ induit par passage au quotient une application $\mathcal{O}_S$-linéaire

$$\mathrm{gr}^i \nabla : \mathrm{gr}_{F^i} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \to \Omega^1_{S/W} \otimes \mathrm{gr}_{F^{i-1}} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S), \tag{2.3.9}$$

qui est $\mathcal{O}_S$-linéaire en vertu de la formule de Leibniz. L'application (2.3.9) correspond à une application $\mathcal{O}_S$-linéaire que nous noterons

$$\nabla_i : T_{S/W} \to \mathrm{Hom}(\mathrm{gr}_{F^i} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S), \mathrm{gr}_{F^{i-1}} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)), \tag{2.3.10}$$

où $T_{S/W} = (\Omega^1_{S/W})^{\vee}$ est le fibré tangent de S/W. Le second membre de (2.3.10) s'identifie canoniquement, par (2.3.6), à $\mathrm{Hom}(H^{2-i}(\underline{X}, \Omega^i_{\underline{X}/S}), H^{3-i}(\underline{X}, \Omega^{i-1}_{\underline{X}/S}))$. Soit $T_{\underline{X}/S} = (\Omega^1_{\underline{X}/S})^{\vee}$ le fibré tangent de $\underline{X}/S$. Si

$$\mathrm{Kod}(\underline{X}/S) : T_{S/W} \to H^1(\underline{X}, T_{\underline{X}/S}) \tag{2.3.11}$$

désigne l'application de Kodaira-Spencer associée à $\underline{X}/S/W$, définie par l'extension (2.3.0) (cf. [8, 1.3]), alors, avec l'identification précédente, (2.3.10) s'insère dans un triangle commutatif

$$\begin{array}{ccc} & T_{S/W} & \\ {\scriptstyle \mathrm{Kod}(\underline{X}/S)} \swarrow & & \searrow {\scriptstyle \nabla_i} \\ H^1(\underline{X}, T_{\underline{X}/S}) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(H^{2-i}(\underline{X}, \Omega^i_{\underline{X}/S}), H^{3-i}(\underline{X}, \Omega^{i-1}_{\underline{X}/S})) \end{array} \tag{2.3.12}$$

où la flèche verticale est définie par le cup-produit (via le produit intérieur $T_{\underline{X}/S} \otimes \Omega^i_{\underline{X}/S} \to \Omega^{i-1}_{\underline{X}/S}$) : cette compatibilité se vérifie comme

en [8, 1.4.1.7].
Notons que, d'après (2.3.7), le cup-produit 2.2 c) induit, par passage à gr_F, une dualité parfaite

$$\mathrm{gr}_{F^i} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \times \mathrm{gr}_{F^{2-i}} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \to \mathcal{O}_S \tag{2.3.13}$$

(correspondant par (2.3.6) au cup-produit $H^{2-i}(\underline{X}, \Omega^i_{\underline{X}/S}) \otimes H^i(\underline{X}, \Omega^{2-i}_{\underline{X}/S}) \to H^2(\underline{X}, \Omega^2_{\underline{X}/S})$).
Il résulte de (2.3.3) que, pour tout $D \in T_{S/W}$, on a

$$\nabla_1(D) = -\nabla_2(D)^\vee, \tag{2.3.14}$$

i.e. $\langle \nabla_2(D)x, y\rangle + \langle x, \nabla_1(D)y\rangle = 0$ pour $x \in \mathrm{gr}_{F^2}$, $y \in \mathrm{gr}_{F^1}$.
L'énoncé ci-après exprime la mobilité de la filtration de Hodge sous l'action de Gauss-Manin :

PROPOSITION 2.4. *Les applications* (2.3.10) *et* (2.3.11) *sont des isomorphismes.*

Démonstration. Notons d'abord que le faisceau $\Omega^2_{\underline{X}/S}$, qui est le prolongement à $\underline{X}$ du faisceau trivial $\Omega^2_{X_0/k}$, est nécessairement trivial (1.5), donc qu'on a

$$T_{\underline{X}/S} \simeq \Omega^1_{\underline{X}/S}, \tag{2.4.1}$$

et que par suite, d'après 2.2 a), $H^1(\underline{X}, T_{\underline{X}/S})$ est libre (de rang 20) et la flèche canonique $H^1(\underline{X}, T_{\underline{X}/S}) \otimes k \to H^1(X_0, T_{X_0/k})$ un isomorphisme.
Cela étant, un argument standard montre que

$$\mathrm{Kod}(\underline{X}/S) \otimes_W k : T_{S/W} \otimes k \to H^1(X_0, T_{X_0/k}) \tag{2.4.2}$$

n'est autre que l'application linéaire tangente à l'origine à l'isomorphisme canonique $S \xrightarrow{\sim} \mathrm{Def}(X_0)$ ((1.4.1)), donc $\mathrm{Kod}(\underline{X}/S)$ est un isomorphisme. Compte tenu de (2.3.12), il reste donc à prouver que la flèche verticale de (2.3.12) est un isomorphisme, et, grâce à (2.3.14), on peut se borner à le faire pour $i = 1$. D'après 2.2 a) et la remarque faite au début de la démonstration, il suffit de montrer que le cup-produit

$$H^1(X_0, T_{X_0/k}) \otimes H^1(X_0, \Omega^1_{X_0/k}) \to H^2(X_0, \Omega^2_{X_0/k}) \tag{2.4.3}$$

est non dégénéré. Mais la donnée d'une base de $H^0(X_0, \Omega^2_{X_0/k})$ identifie $T_{X_0/k}$ à $\Omega^1_{X_0/k}$ et (2.4.3) à la dualité de Serre

$$H^1(X_0, \Omega^1_{X_0/k}) \otimes H^1(X_0, \Omega^1_{X_0/k}) \to H^2(X_0, \Omega^2_{X_0/k}),$$

d'où la conclusion. □

COROLLAIRE 2.4.4. *L'application* $\mathrm{gr}^1 \nabla$ *(resp.* $\mathrm{gr}^2 \nabla$*)* (2.3.9) *est un isomorphisme (resp. est injective et de conoyau libre).*

Noter que, par suite, la même propriété est vraie pour l'application $\mathrm{gr}^1(\nabla|S_0)$ (resp. $\mathrm{gr}^2(\nabla|S_0)$), où $\nabla|S_0$ est la connexion de Gauss-Manin sur $H^\bullet_{\mathrm{dR}}(X_0/S_0)$.

Démonstration. Compte tenu de la dualité (2.3.13), 2.4.4 résulte aussitôt de ce que (2.3.10) est un isomorphisme. □

2.5. Avec les notations (2.3.2.1), soit $F_{\underline{X}_0/S_0} : \underline{X}_0 \to \underline{X}_0^{(p)}$ le Frobenius relatif de X_0/S_0, défini par le diagramme habituel à carré cartésien

$$\begin{array}{ccccc} \underline{X}_0 & \longleftarrow & \underline{X}_0^{(p)} & \xleftarrow{F_{\underline{X}_0/S_0}} & \underline{X}_0 \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ S_0 & \longleftarrow & S_0 & & \end{array} \tag{2.5.1}$$

(où les composés horizontaux sont les Frobenius absolus). L'interprétation cristalline (2.3.2) de $H^\bullet_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$ montre, par la fonctorialité de la cohomologie cristalline, que $F_{\underline{X}_0/S_0}$ induit, pour tout relèvement $\Phi : S \to S$ du Frobenius (absolu) de S_0, compatible au Frobenius canonique σ de W, un homomorphisme $\mathcal{O}_S$-linéaire horizontal (pour Gauss-Manin)

$$F(\Phi) : \Phi^* H^\bullet_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \to H^\bullet_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S). \tag{2.5.2}$$

Cet homomorphisme est une isogénie (i.e. $F(\Phi)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}_p$ est un isomorphisme) et sa dépendance en Φ est contrôlée par ∇ (cf. [7] et l'exposé suivant). Dans ce qui suit, nous fixerons un relèvement Φ, par exemple celui donné par $\Phi(t_i)=t_i^p$ $(1\leqslant i\leqslant 20)$ ($S=\operatorname{Spf} W[[t_1,\dots,t_{20}]]$ donc $\Phi(\sum a_{\underline{\alpha}}t^{\underline{\alpha}})=\sum a_{\underline{\alpha}}^{\sigma}t^{p\underline{\alpha}}$), nous poserons $F(\Phi)=:F$, et noterons

$$F : H^{\bullet}_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)\to H^{\bullet}_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \tag{2.5.3}$$

l'homomorphisme σ-linéaire composé de Φ^* et de la flèche d'adjonction $\Phi^*H^{\bullet}_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)\to H^{\bullet}_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$, $x\mapsto 1\otimes x$. Par construction, F est compatible au cup-produit 2.2 c) : on a

$$\langle Fx,Fy\rangle = F\langle x,y\rangle, \tag{2.5.4}$$

quels que soient $x,y\in H^{\bullet}_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$.

L'énoncé suivant est cas particulier d'un théorème de Mazur-Ogus ([10], [4, 8.26]) † :

PROPOSITION 2.6. *Avec les notations de 2.3 et 2.5, on a*

$$F^1_{\mathrm{Hdg}}H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)\subset\{x\in H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)\mid Fx\in pH^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)\},$$

et les deux membres ont même image dans $H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)$.

En d'autres termes, si l'on note $F : H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)\to H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)$ l'endomorphisme p-linéaire de Frobenius (réduction modulo p de (2.5.3)), et $F^i_{\mathrm{Hdg}}H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)$ la filtration de Hodge (réduction modulo p de celle de $H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$), on a

$$F^1_{\mathrm{Hdg}}H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)=\operatorname{Ker}\big(F : H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)\to H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)\big). \tag{2.6.1}$$

Démonstration. Rappelons la démonstration. Par définition, F est le composé de l'injection canonique p-linéaire $H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)\to H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0^{(p)}/S_0)=F^*_{S_0}H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)$ définie par le carré cartésien (2.5.1), et de la flèche $\mathcal{O}_{S_0}$-linéaire $\widetilde{F} : H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0^{(p)}/S_0)\to H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)$ définie par le Frobenius relatif $F_{\underline{X}_0/S_0}$. Il est immédiat que l'on a

†. Il s'agit d'une variante formelle de [4, 8.26], qui s'en déduit facilement.

$$F^1_{\mathrm{Hdg}}H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0) = H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0) \cap F^1_{\mathrm{Hdg}}H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0^{(p)}/S_0),$$

donc il suffit de prouver que

$$F^1_{\mathrm{Hdg}}H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0^{(p)}/S_0) = \mathrm{Ker}\big(\widetilde{F} : H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0^{(p)}/S_0) \to H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)\big). \tag{2.6.2}$$

D'après 2.2, la suite spectrale de Hodge de $\underline{X}_0^{(p)}/S_0$ dégénère en E_1, donc on a une suite exacte

$$0 \to F^1_{\mathrm{Hdg}}H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0^{(p)}/S_0) \to H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0^{(p)}/S_0) \xrightarrow{\pi} H^2(\underline{X}_0^{(p)}, \mathcal{O}) \to 0. \tag{2.6.3}$$

Comme $F_{\underline{X}_0/S_0}$ s'annule sur $\Omega^i_{\underline{X}_0^{(p)}/S_0}$ pour $i \geq 1$, on a un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0^{(p)}/S_0) & \xrightarrow{\quad\pi\quad} & H^2(\underline{X}_0^{(p)}, \mathcal{O}) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \widetilde{F}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \widetilde{F}} \\ H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0) & \xleftarrow{\quad(*)\quad} & H^2(\underline{X}_0, \mathcal{H}^0(\Omega^\bullet_{\underline{X}_0/S_0})) \end{array}$$

où $(*)$ est défini par l'inclusion $\mathcal{H}^0(\Omega^\bullet_{\underline{X}_0/S_0}) \hookrightarrow \Omega^\bullet_{\underline{X}_0/S_0}$. La dégénérescence en E_1 de la suite spectrale de Hodge de $\underline{X}_0/S_0$ entraîne, par l'argument usuel utilisant l'opération de Cartier, la dégénérescence en E_2 de la suite spectrale conjuguée. En particulier, $(*)$ est injective. La flèche verticale de droite est un isomorphisme ; $\widetilde{F}$ et π ont donc même noyau, ce qui prouve l'assertion compte tenu de (2.6.3). □

REMARQUES 2.7. *a) D'après [4, 8.26], on a également*

$$F^2_{\mathrm{Hdg}}H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0) = \mathrm{Im}\big(\{x \in H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \mid Fx \in p^2 H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)\} \longrightarrow H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)\big)\,, \tag{2.7.1}$$

mais nous n'en aurons pas besoin.
b) Le F-cristal $H^4_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$ est isomorphe au "cristal de Tate" $\mathcal{O}_S(-2)$, c'est-à-dire $\mathcal{O}_S$ muni de $\nabla = d$ et $F = p^2\Phi$. Faute de disposer dans la littérature d'un morphisme trace $H^4_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \to \mathcal{O}_S$, on peut néanmoins

s'en convaincre de la manière suivante : $H^4_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$ est l'image par le cup-produit de $F^1H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \otimes F^1H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$. Grâce à (2.5.4) et 2.6, on en déduit que $F(H^4_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)) \subset p^2H^4_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$. Comme $H^4_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \otimes W = H^4(X_0/W)$ est isomorphe à $W(-2)$, ce cristal est de la forme $U(-2)$, où U est un F-cristal unité ; tout F-cristal unité sur S est trivial [7], d'où l'assertion.

2.8. Le dernier ingrédient dont on aura besoin pour la démonstration de 1.6 est la notion de classe de Chern cristalline d'un faisceau inversible (cf. [3]). Notons $\mathrm{Fil}^1\,\Omega^\bullet_{\underline{X}/S}$ le sous-complexe de $\Omega^\bullet_{\underline{X}/S}$ noyau de la projection canonique $\Omega^\bullet_{\underline{X}/S} \to \mathcal{O}_{\underline{X}}$, i.e.

$$\mathrm{Fil}^1\,\Omega^\bullet_{\underline{X}/S} = (p\mathcal{O}_{\underline{X}} \xrightarrow{d} \Omega^1_{\underline{X}/S} \xrightarrow{d} \Omega^2_{\underline{X}/S}). \tag{2.8.1}$$

La suite exacte de définition de Fil^1 :

$$0 \to \mathrm{Fil}^1\,\Omega^\bullet_{\underline{X}/S} \to \Omega^\bullet_{\underline{X}/S} \to \mathcal{O}_{\underline{X}_0} \to 0 \tag{2.8.2}$$

fournit une suite exacte

$$0 \to 1 + \mathrm{Fil}^1\,\Omega^\bullet_{\underline{X}/S} \to (\Omega^\bullet_{\underline{X}/S})^* \to \mathcal{O}^*_{\underline{X}_0} \to 0, \tag{2.8.3}$$

où

$$(\Omega^\bullet_{\underline{X}/S})^* = (\mathcal{O}^*_{\underline{X}} \xrightarrow{\mathrm{dlog}} \Omega^1_{\underline{X}/S} \xrightarrow{d} \Omega^2_{\underline{X}/S} \to \cdots)$$

est le complexe de de Rham "multiplicatif". Par définition, l'homomorphisme classe de Chern

$$c_1 : \mathrm{Pic}(\underline{X}_0) = H^1(\underline{X}_0, \mathcal{O}^*_{\underline{X}_0}) \to H^2(\underline{X}, \mathrm{Fil}^1\,\Omega^\bullet_{\underline{X}/S}) \tag{2.8.4}$$

est composé du cobord de (2.8.3) et de la flèche déduite de l'homomorphisme de complexes

$$\log : 1 + \mathrm{Fil}^1\,\Omega^\bullet_{\underline{X}/S} \to \mathrm{Fil}^1\,\Omega^\bullet_{\underline{X}/S} \tag{2.8.5}$$

doné par l'identité en degré $\geqslant 1$ et $1 + x \mapsto \sum(-1)^i x^{i+1}/(i+1)$ en degré zéro (on vérifie immédiatement que la définition de (2.8.5) est légitime).

Noter que, comme $H^1(\underline{X}_0, \mathcal{O}_{\underline{X}_0}) = 0$ (2.2 a)), la flèche canonique

$$H^2(\underline{X}, \mathrm{Fil}^1\, \Omega^\bullet_{\underline{X}/S}) \to H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \tag{2.8.6}$$

est injective : nous nous permettrons donc parfois de regarder c_1 (2.8.4) comme à valeurs dans $H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$.

PROPOSITION 2.9. *Soit $\underline{L}_0 \in \mathrm{Pic}(\underline{X}_0)$, et soit $x = c_1(\underline{L}_0)$. On a :*
a) $Fx = px$,
b) $\nabla x = 0$.

Démonstration. Pour prouver ces formules, il est commode d'interpréter c_1 de façon cristalline. La construction [3, 2.1] fournit en effet un homomorphisme

$$c_1^{\mathrm{cris}/W} : \mathrm{Pic}(\underline{X}_0) \to H^2_{\mathrm{cris}}(\underline{X}_0, J_{\underline{X}_0/W}), \tag{2.9.1}$$

où $J_{\underline{X}_0/W}$ est le faisceau cristallin défini par la suite exacte canonique

$$0 \to J_{\underline{X}_0/W} \to \mathcal{O}_{\underline{X}_0/W} \to \mathcal{O}_{\underline{X}_0} \to 0. \tag{2.9.2}$$

D'après (2.3.2), on a

$$H^2(\underline{X}, \mathrm{Fil}^1\, \Omega^\bullet_{\underline{X}/S}) = R^2(f_0)_{\mathrm{cris}*}(J_{\underline{X}_0/W})(S),$$

d'où

$$H^0_{\mathrm{cris}}(S_0, R^2(f_0)_{\mathrm{cris}*} J_{\underline{X}_0/W}) = \{x \in H^2(\underline{X}, \mathrm{Fil}^1\, \Omega^\bullet_{\underline{X}/S}) \mid \nabla x = 0\}. \tag{2.9.3}$$

On vérifie facilement que (2.8.4) n'est autre que le composé de (2.9.1) et de l'homomorphisme canonique

$$H^2_{\mathrm{cris}}(X_0, J_{\underline{X}_0/W}) \to H^0_{\mathrm{cris}}(S_0, R^2(f_0)_{\mathrm{cris}*} J_{\underline{X}_0/W}) \tag{2.9.4}$$

(modulo l'identification (2.9.3)). Cela prouve en particulier 2.9 b).
La description précédente montre aussi la fonctorialité en X_0/S_0 de (2.8.4), ce qui entraîne 2.9 a), car, si F_{X_0} est le Frobenius absolu de X_0, on a

$$c_1(F^*_{\underline{X}_0} \underline{L}_0) = c_1(\underline{L}_0^{\otimes p}) = p\, c_1(\underline{L}_0) = px.$$

□

REMARQUE 2.9.5. *En ce qui concerne le point b), le lecteur qui répugne aux considérations cristallines pourra le vérifier "à la main" en utilisant la description explicite de Katz-Oda [9] de la connexion de Gauss-Manin. Voici comment se présente le calcul. Soit D une dérivation de S/W. On choisit un recouvrement ouvert affine $\mathcal{U}$ de $\underline{X}_0$, un cocycle (g_{ij}) à valeurs dans $\mathcal{O}^*_{\underline{X}_0}$ représentant $\underline{L}_0$, un relèvement D_i de D en une dérivation de $\underline{X}/W$ sur U_i. La donnée d'un relèvement de g_{ij} en une section $\tilde{g}_{ij}$ de $\mathcal{O}^*_{\underline{X}}$ sur $U_i \cap U_j$, définit un 2-cocycle h_{ijk} à valeurs dans $1 + p\mathcal{O}_{\underline{X}}$, et $x = c_1(\underline{L}_0)$ est la classe du 2-cocycle*

$$(\log h_{ijk}) + (\mathrm{dlog} g_{ij}) \in Z^2(\mathcal{U}, \mathrm{Fil}^1\, \Omega^\bullet_{\underline{X}/S}).$$

D'autre part, d'après [9], $\nabla(D)x$ est la classe du 2-cocycle ($i < j < k$)

$$y = (D_i \log h_{ijk}) + (dD_i \log g_{ij}) - ((D_i \log - D_j \log) g_{jk}).$$

On constate que y est le cobord de la 1-cochaîne $(D_i \log \tilde{g}_{ij}) \in C^1(\mathcal{U}, \Omega^1_{\underline{X}/S})$, donc $\nabla(D)x = 0$.

2.10. La fonctorialité de la classe de Chern cristalline entraîne que, pour tout point e de S à valeurs dans W, on a un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}(\underline{X}_0) & \xrightarrow{c_1} & H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) = H^2_{\mathrm{cris}}(\underline{X}_0/S) \\ \| & & \downarrow \\ \mathrm{Pic}(X_0) & \xrightarrow[c_1]{} & H^2_{\mathrm{dR}}(X/W) = H^2_{\mathrm{cris}}(X_0/W) \end{array} \tag{2.10.1}$$

où $\underline{X}_e/W$ est déduit de $\underline{X}/S$ par le changement de base e.
On notera que, comme X_0 est une surface K3, $\mathrm{Pic}(X_0)$ coïncide avec le groupe de Néron-Severi $\mathrm{NS}(X_0)$, et est sans torsion, et que par suite la flèche horizontale inférieure de (2.10.1) est injective (3.4).

2.11. Démonstration de 1.6.

Supposons que L_0 se prolonge en un faisceau inversible $\underline{L}_0$ sur $\underline{X}_0$, et soit $x = c_1(\underline{L}_0) \in H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S)$. La commutativité de (2.10.1) entraîne que $e^*x = c_1(L_0)$; comme L_0 est non trivial par hypothèse, on a $c_1(L_0) \neq 0$ d'après la remarque ci-dessus, donc $x \neq 0$. D'après 2.9, on a $Fx = px$, $\nabla x = 0$. Soit p^n la plus grande puissance de p divisant x, posons $y = p^{-n}x$; l'image y_0 de y dans $H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0) = H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}/S) \bmod p$ est donc non nulle. D'autre part, on a encore $Fy = py$, $\nabla y = 0$. La première de ces relations entraîne, d'après (2.6.1), que $y_0 \in F^1_{\mathrm{Hdg}} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)$. Comme on a $y_0 \neq 0$ et $\nabla y_0 = 0$, on ne peut avoir $y_0 \in F^2_{\mathrm{Hdg}} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)$, car cela contredirait l'injectivité de $\mathrm{gr}^2\,\nabla : F^2_{\mathrm{Hdg}} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0) \to \Omega^1_{S_0/k} \otimes \mathrm{gr}_{F^1} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)$ (2.4.4). Donc l'image de y_0 dans $\mathrm{gr}_{F^1} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)$ est non nulle, mais comme $\nabla y_0 = 0$, cela contredit le fait que $\mathrm{gr}^1\,\nabla : \mathrm{gr}_{F^1} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0) \to \Omega^1_{S_0/k} \otimes \mathrm{gr}_{F^0} H^2_{\mathrm{dR}}(\underline{X}_0/S_0)$ est un isomorphisme. Cette contradiction achève la démonstration de 1.6.

3. APPENDICE ; CLASSES DE CHERN CRISTALLINES ET INTERSECTIONS ‡

Le but de cet appendice est d'établir que, sur une surface propre et lisse sur k, le nombre d'intersection de deux diviseurs est la trace du cup-produit de leurs classes de Chern cristallines (cette compatibilité ne figure apparemment pas dans la littérature).

3.1. Soit X un schéma propre et lisse sur k. Rappelons [2, VI 3.3.6] qu'on sait associer à tout sous-schéma fermé Y de X, lisse sur k, de codimension d dans X, une classe de cohomologie

$$c\ell(Y) \in H^{2d}_{\mathrm{cris}}(X/W). \tag{3.1.1}$$

Si Y', Y'' sont des sous-schémas fermés lisses de codimensions d', d'', se coupant transversalement, on a [2, VI 4.3.15]

‡. par P. Deligne et L. Illusie.

$$c\ell(Y') \cdot c\ell(Y'') = c\ell(Y' \cap Y'') \tag{3.1.2}$$

(dans $H^{2(d'+d'')}_{\text{cris}}(X/W)$). D'autre part, si X' est un schéma propre et lisse sur k, $f : X' \to X$ un k-morphisme, Y un sous-schéma fermé lisse de codimension d tel que $Y \times_X X'$ soit lisse de codimension d dans X', alors on a [2, VI 4.3.13]

$$c\ell(Y \times_X X') = f^* c\ell(Y). \tag{3.1.3}$$

Enfin, si a est un point rationnel de X/k, on a [2, VII 3.1.7]

$$\text{Tr}_{X/W}(c\ell(a)) = 1. \tag{3.1.4}$$

En particulier, si X est connexe, $c\ell(a)$ ne dépend pas de a, puisque $\text{Tr}_{X/W} : H^{2n}_{\text{cris}}(X/W) \to W$ est un isomorphisme ($n = \dim X$) [2, VII 2.1.1].

3.2. A tout fibré vectoriel L sur X on sait associer des classes de Chern [3, 2.4]

$$c_i(L) \in H^{2i}_{\text{cris}}(X/W), \tag{3.2.1}$$

nulles pour $i > \text{rg}(L)$. Ces classes dépendent fonctoriellement de L : si $f : X' \to X$ est un k-morphisme, on a (loc. cit.)

$$c_i(f^* L) = f^* c_i(L). \tag{3.2.2}$$

Si D est un diviseur effectif lisse sur X, on dispose donc d'une part de la classe de cohomologie $c\ell(D) \in H^2_{\text{cris}}(X/W)$, d'autre part de la classe de Chern $c_1(\mathcal{O}_X(D)) \in H^2_{\text{cris}}(X/W)$.

PROPOSITION 3.2.3. *Soit D un diviseur effectif lisse sur X. Si $\mathcal{O}_X(D)$ est très ample, on a*

$$c\ell(D) = c_1(\mathcal{O}_X(D)). \tag{3.2.3.1}$$

REMARQUE 3.2.4. *Berthelot (non publié) a vérifié que* (3.2.3.1) *vaut sans l'hypothèse que $\mathcal{O}_X(D)$ soit très ample. La démonstration est assez compliquée. Pour ce que nous avons en vue, 3.2.3 nous suffira.*

Démonstration de 3.2.3. Grâce à (3.1.3) et (3.2.2), on se ramène aussitôt au cas où X est un espace projectif $\mathbb{P}^N_k$ et D un hyperplan. Posons $\mathbb{P}^N_W = X'$, et soit D' un hyperplan de X' relevant D. On a $H^2_{\mathrm{cris}}(X/W) = H^2_{\mathrm{dR}}(X'/W)$. D'après [2, VI 3.3.5], $c\ell(D)$ est la classe de cohomologie de de Rham de D', laquelle se calcule à l'aide de l'extension de $\Omega^\bullet_{D'/W}[-1]$ par $\Omega^\bullet_{X'/W}$ donnée par le complexe de de Rham de X'/W à pôles logarithmiques le long de D'. Si $(t_0, \ldots, t_N)$ sont des coordonnées homogènes sur X', on en déduit facilement que $c\ell(D)$ est la classe du 1-cocycle $(dt_j/t_j - dt_i/t_i)$ $(i < j)$ du recouvrement standard. D'autre part, la classe de Chern $c_1(\mathcal{O}_{X'}(1)) \in H^2_{\mathrm{dR}}(X'/W)$ se déduit, d'après [3, 2.3], du cocycle t_j/t_i par l'homomorphisme dlog : $\mathcal{O}^*_{X'} \to \Omega^\bullet_{X'/W}[1]$ [1]. On a donc bien $c_1(\mathcal{O}_X(D)) = c\ell(D)$. □

THÉORÈME 3.3. *Soit X une surface propre et lisse sur k. Si D_1, D_2 sont des diviseurs sur X, on a*

$$(D_1 \cdot D_2) = \mathrm{Tr}_{X/W}(c_1(\mathcal{O}_X(D_1)) \cdot c_1(\mathcal{O}_X(D_2)))$$

(où $(D_1 \cdot D_2)$ désigne le nombre d'intersection de D_1, D_2).

Démonstration. Si D_1, D_2 sont effectifs, lisses, très amples, et transverses, la conclusion résulte de (3.1.2), (3.1.4), et 3.2.3. Pour nous ramener à ce cas, choisissons un diviseur H très ample sur X. Pour n assez grand, $D_1 + nH$ et $D_2 + nH$ sont très amples. Par Bertini, il existe donc des diviseurs effectifs lisses, très amples, D'_1, D''_1, D'_2, D''_2 tels que

$$\mathcal{O}_X(D_1) = \mathcal{O}_X(D'_1 - D''_1), \qquad \mathcal{O}_X(D_2) = \mathcal{O}_X(D'_2 - D''_2),$$

et l'on peut supposer de plus que les quatre couples

$$(D'_1, D'_2), \quad (D'_1, D''_2), \quad (D''_1, D'_2), \quad (D''_1, D''_2)$$

sont transverses. Par additivité de c_1 et bilinéarité de $(\cdot)$, on est ramené au cas particulier envisagé, ce qui achève la démonstration. □

3.4. Soit à nouveau X un schéma propre et lisse sur k. On ignore si, pour deux sous-schémas fermés lisses de X, de même codimension, le fait d'être algébriquement équivalents entraîne qu'ils ont même classe de cohomologie cristalline (on le sait seulement pour des sous-schémas de dimension 0, cf. 3.1.4 !). En revanche, si

$$\mathrm{NS}(X) = \mathrm{Pic}(X)/\mathrm{Pic}^0(X)$$

désigne le groupe de Néron-Severi de X, l'homomorphisme

$$c_1 : \mathrm{Pic}(X) \to H^2_{\mathrm{cris}}(X/W)$$

s'annule sur $\mathrm{Pic}^0(X)$, car $\mathrm{Pic}^0(X)$ est p-divisible et $H^2_{\mathrm{cris}}(X/W)$ de type fini sur W, donc donne par passage au quotient un homomorphisme

$$c_1 : \mathrm{NS}(X) \to H^2_{\mathrm{cris}}(X/W). \tag{3.4.1}$$

Supposons maintenant que X soit une surface. D'après le théorème de l'index de Hodge, la forme d'intersection sur $\mathrm{NS}(X) \otimes \mathbb{Q}$ est non dégénérée. Compte tenu de 3.3, il en résulte que l'homomorphisme

$$c_1 \otimes \mathbb{Q} : \mathrm{NS}(X) \otimes \mathbb{Q} \to H^2_{\mathrm{cris}}(X/W) \otimes \mathbb{Q} \tag{3.4.2}$$

est injectif.

REMARQUE 3.5. *On peut montrer [6, II 5.10] que* (3.4.1) *définit une injection de* $\mathrm{NS}(X) \otimes \mathbb{Z}_p$ *dans* $H^2_{\mathrm{cris}}(X/W)$. *Il n'est sans doute pas vrai en général que* (3.4.1) *induise une injection de* $\mathrm{NS}(X)/p\,\mathrm{NS}(X)$ *dans* $H^2_{\mathrm{cris}}(X/W)/pH^2_{\mathrm{cris}}(X/W)$, *i.e. que l'application classe de Chern en cohomologie de de Rham envoie injectivement* $\mathrm{NS}(X)/p\,\mathrm{NS}(X)$ *dans* $H^2_{\mathrm{dR}}(X/k)$. *C'est cependant le cas si* $H^*_{\mathrm{cris}}(X/W)$ *est sans torsion et que la suite spectrale de Hodge vers de Rham de* X/k *dégénère en* E_1, *cf. [13, 1.4] et [6, II 5.18], conditions réalisées par exemple par une surface K3.*

P. DELIGNE
Institut des Hautes Etudes
Scientifiques
35, Route de Chartres
91440 BURES/YVETTE (France)

L. ILLUSIE
Université de Paris-Sud
Centre d'Orsay
Mathématique, bât. 425
91405 ORSAY (France)

BIBLIOGRAPHIE

[1] M. ARTIN.- Supersingular K3 surfaces. Ann. Sc. ENS, 4ème série, t. 7 (1974), p. 543-568.

[2] P. BERTHELOT.- Cohomologie cristalline des schémas de caractéristique $p > 0$. Lecture Notes in Math. 407, Springer-Verlag (1974).

[3] P. BERTHELOT et L. ILLUSIE.- Classes de Chern en cohomologie cristalline. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 270, p. 1695-1697 et 1750-1752, 22 et 29 juin 1970.

[4] P. BERTHELOT et A. OGUS.- Notes on crystalline cohomology. Mathematical Notes 21, Princeton U. Press (1978).

[5] P. DELIGNE.- La conjecture de Weil pour les surfaces K3. Inv. math. 15, p. 206-226 (1972).

[6] L. ILLUSIE.- Complexe de de Rham-Witt et cohomologie cristalline, Ann. Sc. ENS, 4e série, t. 12 (1979), p. 501-661.

[7] N. KATZ.- Travaux de Dwork, Séminaire Bourbaki, exp. 409, Lecture Notes in Math. 383, Springer-Verlag (1973).

[8] N. KATZ.- Algebraic solutions of differential equations, p-curvature and the Hodge filtration. Inv. math. 18, p. 1-118 (1972).

[9] N. KATZ and T. ODA.- On the differentiation of De Rham cohomology classes with respect to parameters. J. of Math. of Kyoto Univ., vol. 8, n° 2, p. 199-213 (1968).

[10] B. MAZUR.- Frobenius and the Hodge filtration, estimates. Ann. of Math. 98, p. 58-95 (1973).

[11] D. MUMFORD.- Abelian Varieties. Tata Inst., Oxford Univ. Press (1970).

[12] N. NYGAARD.- A p-adic proof of the Rudakov-Shafarevitch theorem. Ann. of Math. 110, p. 515-528 (1979).

[13] A. OGUS.- Supersingular K3 crystals. Journées de Géométrie Algébrique de Rennes, juillet 78, S.M.F. Astérisque 64, p. 3-86 (1979).

[14] A. RUDAKOV and I. SHAFAREVITCH.- Inseparable morphisms of algebraic surfaces. Akad. Sc. SSSR, t. 40, n° 6, p. 1264-1307 (1976).

[15] M. SCHLESSINGER.- Functors of Artin rings. Trans. Amer. Soc. 130, p. 205-222 (1968).

[16] A. WEIL.- Variétés abéliennes et courbes algébriques. Hermann (1948).

Dualité pour les représentations d'un groupe réductif sur un corps fini

Pierre Deligne
I.H.E.S., Bures-sur-Yvette, France
George Lusztig
Department of Mathematics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139

Communiqué par W. Feit; reçu le 6 avril 1981.

1

Le but de cet article est de construire une opération de dualité pour les représentations d'un groupe réductif sur un corps fini. Très grossièrement parlant, elle a pour effet d'échanger les représentations irréductibles de petit degré avec celles de grand degré (par exemple, la représentation unité et celle de Steinberg). Au niveau des caractères, cette opération a également été considérée par Alvis [1], Curtis [2] et Kawanaka [4].

Fixons maintenant quelques notations. $\mathbf{G}$ désignera un groupe réductif connexe défini sur un corps fini $\mathbb{F}_q$, (W, S) son groupe de Weyl et $\bar{S}$ l'ensemble des orbites de l'application de Frobenius sur S. Les sous-ensembles de $\bar{S}$ paramètrent les classes de sous-groupes paraboliques de $\mathbf{G}$ qui sont définis sur $\mathbb{F}_q$; soit $\mathcal{P}_I$ la classe correspondant à $I \subset \bar{S}$. (Ainsi, $\mathcal{P}_\varnothing$ est la classe des sous-groupes de Borel et $\mathcal{P}_{\bar{S}} = \{\mathbf{G}\}$.) Nous désignons par G le groupe des points $\mathbb{F}_q$-rationnels de $\mathbf{G}$, et par $\mathcal{P}_I$ l'ensemble des sous-groupes paraboliques définis sur $\mathbb{F}_q$ dans cette classe. Si $\mathbf{P} \in \mathcal{P}_I$, nous désignons par P son groupe de points $\mathbb{F}_q$-rationnels et par U_P le groupe des points $\mathbb{F}_q$-rationnels de son radical unipotent. Les lettres grasses désignent les sous-groupes algébriques ; les lettres romaines correspondantes désignent leurs groupes de points rationnels. Soit K un corps algébriquement clos de caractéristique zéro. Tous les G-modules seront définis sur K.

Soit E un G-module. Pour tout $I \subset \bar{S}$, nous définissons

$$E_{(I)} = \bigoplus_{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_I} E^{U_P},$$

où E^{U_P} désigne l'ensemble des vecteurs de E invariants par U_P. Nous considérons $E_{(I)}$ comme un

G-module de manière naturelle. Si $I \subset I'$, il existe une application linéaire canonique $\varphi^I_{I'} : E_{(I)} \to E_{(I')}$. Elle est définie comme suit : si $e \in E^{U_P}$ ($\mathbf{P} \in \mathcal{P}_I$), on peut aussi considérer e comme un élément de $E^{U_{P'}}$, où $\mathbf{P}' \in \mathcal{P}_{I'}$ est uniquement déterminé par la condition $\mathbf{P} \subset \mathbf{P}'$. (Notons que $U_P \supset U_{P'}$, d'où $E^{U_P} \subset E^{U_{P'}}$.) L'application $\varphi^I_{I'}$ envoie $e \in E^{U_P}$ sur e considéré comme élément de $E^{U_{P'}}$. Il est clair que, si $I \subset I' \subset I''$, alors

$$\varphi^{I'}_{I''}\varphi^I_{I'} = \varphi^I_{I''}. \tag{1.1}$$

Posons maintenant $\tilde{E}_{(I)} = E_{(I)} \otimes \Lambda^{|I|}(K^I)$. (Nous considérons $\Lambda^{|I|}(K^I)$ comme un G-module muni de l'action triviale.) Si $I \subset I'$ et $|I'| = |I| + 1$, nous disposons d'une application naturelle $\varepsilon^I_{I'} : \Lambda^{|I|}(K^I) \xrightarrow{\sim} \Lambda^{|I'|}(K^{I'})$ donnée par $\omega \mapsto \omega \wedge f$, où f est l'unique élément de $I' - I$. Nous définissons $\tilde{\varphi}^I_{I'} : \tilde{E}_{(I)} \to \tilde{E}_{(I')}$ par $\tilde{\varphi}^I_{I'} = \varphi^I_{I'} \otimes \varepsilon^I_{I'}$.

Considérons à présent la suite d'applications de G-modules :

$$0 \to \tilde{E}_{(\varnothing)} \xrightarrow{d_0} \bigoplus_{|I|=1} \tilde{E}_{(I)} \xrightarrow{d_1} \bigoplus_{|I|=2} \tilde{E}_{(I)} \xrightarrow{d_2} \cdots \to \tilde{E}_{(\bar{S})} \to 0 \tag{1.2}$$

où les applications d ont pour composantes les $\tilde{\varphi}^I_{I'}$ ($I \subset I'$, $|I'| = |I| + 1$). En utilisant (1.1), on voit que (1.2) est un complexe.

2

Nous avons le résultat suivant :

THÉORÈME. Supposons E irréductible. Soit i_0 le plus petit entier ≥ 0 tel que $\bigoplus_{|I|=i_0} \tilde{E}_{(I)} \neq 0$. Alors la suite

$$\bigoplus_{|I|=i_0} \tilde{E}_{(I)} \xrightarrow{d_{i_0}} \bigoplus_{|I|=i_0+1} \tilde{E}_{(I)} \xrightarrow{d_{i_0+1}} \cdots \to \tilde{E}_{(\bar{S})} \to 0 \tag{2.1}$$

est exacte.

En particulier, l'homologie du complexe (1.2) est concentrée en un seul degré.

3

Nous allons démontrer que la conclusion du théorème 2 reste vraie si, au lieu de supposer E irréductible, nous supposons que :

$$E \text{ admet une décomposition en somme directe } E = \bigoplus_{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0}} E_{\mathbf{P}} \text{ (pour un certain } I_0 \subset \bar{S}) \tag{3.1}$$

telle que

(a) $gE_{\mathbf{P}} = E_{g\mathbf{P}g^{-1}}$ $(\forall g \in G,\, \mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0})$;
(b) pour tout $\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0}$, le P-module $E_{\mathbf{P}}$ se factorise par P/U_P et est irréductible et cuspidal comme P/U_P-module.
Cela impliquera le théorème, puisque tout G-module irréductible est un facteur direct d'un G-module E comme dans (3.1).

Dans cette section et la suivante, nous supposons que E est comme dans (3.1).

Étant donné $J \subset \bar{S}$, nous définissons $\mathcal{Z}_J$ comme l'ensemble des orbites σ de G sur $\mathcal{P}_J \times \mathcal{P}_{I_0}$ qui possèdent la propriété suivante. Il existe $\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0}$ et $\mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J$, avec $(\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \in \sigma$, tels que $\mathbf{Q}$ contienne un sous-groupe de Levi de $\mathbf{P}$.

Si $\mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J$, nous avons

$$E^{U_Q} = \Big(\bigoplus_{\mathbf{P}\in\mathcal{P}_{I_0}} E_{\mathbf{P}}\Big)^{U_Q} = \Big(\bigoplus_{\substack{\mathbf{P}\in\mathcal{P}_{I_0}\\(\mathbf{Q}\cap\mathbf{P})U_P=P}} E_{\mathbf{P}}\Big)^{U_Q} \oplus \Big(\bigoplus_{\substack{\mathbf{P}\in\mathcal{P}_{I_0}\\(\mathbf{Q}\cap\mathbf{P})U_P\subsetneq P}} E_{\mathbf{P}}\Big)^{U_Q}.$$

Le second terme est nul (puisque $E_{\mathbf{P}}$ est cuspidal pour P/U_P, de sorte que $E_{\mathbf{P}}^{U_Q\cap P} = 0$). Ainsi,

$$E_{(J)} = \bigoplus_{\mathbf{Q}\in\mathcal{P}_J} E^{U_Q} = \bigoplus_{\mathbf{Q}\in\mathcal{P}_J} \Big(\bigoplus_{\substack{\mathbf{P}\in\mathcal{P}_{I_0}\\(\mathbf{Q}\cap\mathbf{P})U_P=P}} E_{\mathbf{P}}\Big)^{U_Q} = \bigoplus_{\sigma\in\mathcal{Z}_J} E^{\sigma} \tag{3.2}$$

où

$$E^{\sigma} = \bigoplus_{\mathbf{Q}\in\mathcal{P}_J} \Big(\bigoplus_{\substack{\mathbf{P}\in\mathcal{P}_{I_0}\\(\mathbf{Q},\mathbf{P})\in\sigma\\(\mathbf{Q}\cap\mathbf{P})U_P=P}} E_{\mathbf{P}}\Big)^{U_Q} \qquad (\sigma \in \mathcal{Z}_J).$$

Supposons maintenant $J \subset J'$ et $\sigma \in \mathcal{Z}_J$; nous définissons $\delta^J_{J'}(\sigma) = \sigma' = \{(\mathbf{Q}', \mathbf{P}) \in \mathcal{P}_{J'} \times \mathcal{P}_{I_0} \mid \exists \mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J,\ \mathbf{Q} \subset \mathbf{Q}',\ (\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \in \sigma\}$. Alors $\sigma' \in \mathcal{Z}_{J'}$ et nous disons que σ' est la face de type J' de σ. Dans ce cas, nous définissons une application linéaire $\Psi^{\sigma}_{\sigma'} : E^{\sigma} \to E^{\sigma'}$ comme suit. Si $e = (e_{\mathbf{Q},\mathbf{P}}) \in E^{\sigma}$, avec $e_{\mathbf{Q},\mathbf{P}} \in E_{\mathbf{P}}$ pour tout $(\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \in \sigma$, nous posons $\Psi^{\sigma}_{\sigma'}(e) = (e'_{\mathbf{Q}',\mathbf{P}}) \in E^{\sigma'}$, où, pour tout $(\mathbf{Q}', \mathbf{P}) \in \sigma'$, nous avons

$$e'_{\mathbf{Q}',\mathbf{P}} = \sum_{\substack{\mathbf{Q}\in\mathcal{P}_J\\\mathbf{Q}\subset\mathbf{Q}'\\(\mathbf{Q},\mathbf{P})\in\sigma}} e_{\mathbf{Q},\mathbf{P}} \in E_{\mathbf{P}}.$$

Admettons le lemme suivant.

LEMME 3.3. Pour tous σ, σ' comme ci-dessus, l'application $\Psi^{\sigma}_{\sigma'} : E^{\sigma} \to E^{\sigma'}$ est un isomorphisme.

Notons aussi qu'étant donnés $J \subset J' \subset J''$ et $\sigma \in \mathcal{Z}_J$, $\sigma' \in \mathcal{Z}_{J'}$ comme ci-dessus, nous pouvons

définir $\sigma'' \in \mathcal{Z}_{J''}$ comme la face de type J'' de σ (ou de σ'), et nous avons

$$\Psi^{\sigma}_{\sigma''} = \Psi^{\sigma'}_{\sigma''}\Psi^{\sigma}_{\sigma'}.$$

En utilisant (3.2), le complexe (1.2) peut se récrire sous la forme

$$0 \to \cdots \to 0 \to \bigoplus_{|J|=|I_0|} \bigoplus_{\sigma\in\mathcal{Z}_J} E^{\sigma} \otimes \Lambda^{|J|}(K^J) \xrightarrow{d} \bigoplus_{|J|=|I_0|+1} \bigoplus_{\sigma\in\mathcal{Z}_J} E^{\sigma} \otimes \Lambda^{|J|}(K^J) \xrightarrow{d} \cdots \tag{3.4}$$

où les applications d ont pour composantes $\Psi^{\sigma}_{\sigma'} \otimes \varepsilon^J_{J'}$ ($J \subset J'$, $|J'| = |J| + 1$, $\sigma \in \mathcal{Z}_J$, et $\sigma' \in \mathcal{Z}_{J'}$ est la face de type J' de σ). Soit ρ l'unique élément de $\mathcal{Z}_{\bar{S}}$. Nous avons $E^{\rho} = E$. Par le lemme 3.3, nous pouvons identifier E^{σ} à E pour tout $\sigma \in \mathcal{Z}_J$, au moyen de l'isomorphisme Ψ^{σ}_{ρ} ; le complexe (3.4) devient le produit tensoriel de E et du complexe

$$0 \to \cdots \to 0 \to \bigoplus_{|J|=|I_0|} K^{\mathcal{Z}_J} \otimes \Lambda^{|J|}(K^J) \to \bigoplus_{|J|=|I_0|+1} K^{\mathcal{Z}_J} \otimes \Lambda^{|J|}(K^J) \to \cdots \tag{3.5}$$

dont la différentielle a pour composantes $\delta^J_{J'} \otimes \varepsilon^J_{J'}$ ($J \subset J'$, $|J'| = |J| + 1$). Ce complexe admet l'interprétation simple suivante. Soit T un tore $\mathbb{F}_q$-déployé de dimension maximale dans le groupe adjoint $\mathbf{G}_{\mathrm{ad}}$. Soit Y le réseau des sous-groupes à un paramètre de T. Les hyperplans radiciels de l'espace vectoriel réel $Y \otimes \mathbb{R}$ induisent une partition de $Y \otimes \mathbb{R}$ en cônes simpliciaux. Ceux-ci sont en correspondance biunivoque naturelle avec les sous-groupes paraboliques de $\mathbf{G}$ qui sont définis sur $\mathbb{F}_q$ et dont l'image dans $\mathbf{G}_{\mathrm{ad}}$ contient T. Fixons $\mathbf{P}_0 \in \mathcal{P}_{I_0}$. Il correspond à un cône de $Y \otimes \mathbb{R}$, qui engendre un sous-espace vectoriel $L \subset Y \otimes \mathbb{R}$ de codimension $|I_0|$. Les cônes contenus dans L sont en correspondance biunivoque avec les sous-groupes paraboliques $\mathbf{Q} \subset \mathbf{G}$ (définis sur $\mathbb{F}_q$) qui contiennent un sous-groupe de Levi de $\mathbf{P}_0$ et dont l'image dans $\mathbf{G}_{\mathrm{ad}}$ contient T ; ils sont donc en correspondance biunivoque avec $\bigcup_J \mathcal{Z}_J$. Ainsi, $\bigcup_{J\neq\bar{S}} \mathcal{Z}_J$ peut être considéré comme l'ensemble des simplexes d'une triangulation d'une sphère unité de centre 0 dans L ; et (3.5) est le complexe de chaînes (réduit) de cette triangulation. Il s'ensuit que son homologie est concentrée en un seul degré (correspondant à $|J| = |I_0|$), où elle est isomorphe à K.

4

Il reste à démontrer le lemme 3.3. Nous donnerons la démonstration en six étapes. Certaines parties du raisonnement sont analogues, dans leur esprit, à des arguments de [3].

Étape 1. Étant donnés $\sigma \in \mathcal{Z}_J$ et $(\mathbf{Q}, \mathbf{P}) \in \sigma$, considérons le sous-groupe parabolique $\mathbf{R} = (\mathbf{Q} \cap \mathbf{P})U_Q \subset \mathbf{Q}$. Alors $(\mathbf{R}, \mathbf{P}) \in \widetilde{\sigma} \in \mathcal{Z}_{\widetilde{J}}$ pour un certain $\widetilde{J} \subset J$, et σ est la face de

type J de $\widetilde{\sigma}$. De plus, $\mathbf{R}$ et $\mathbf{P}$ ont un sous-groupe de Levi commun et sont donc associés. Nous montrons d'abord que

$$\widetilde{\Psi}_{\sigma}^{\widetilde{\sigma}}\colon \bigoplus_{\mathbf{R}\in\mathcal{P}_{\widetilde{J}}} \Big(\bigoplus_{\substack{\mathbf{P}\in\mathcal{P}_{I_0}\\(\mathbf{R},\mathbf{P})\in\widetilde{\sigma}}} E_{\mathbf{P}} \Big)^{U_R} \longrightarrow \bigoplus_{\mathbf{Q}\in\mathcal{P}_J} \Big(\bigoplus_{\substack{\mathbf{P}\in\mathcal{P}_{I_0}\\(\mathbf{Q},\mathbf{P})\in\sigma}} E_{\mathbf{P}} \Big)^{U_Q}$$

est un isomorphisme.

Les couples $(\mathbf{R},\mathbf{P})$ tels que $(\mathbf{R},\mathbf{P})\in\widetilde{\sigma}$ sont en correspondance biunivoque avec les couples $(\mathbf{Q},\mathbf{P})$ tels que $(\mathbf{Q},\mathbf{P})\in\sigma$. Par conséquent, $\widetilde{\Psi}_{\sigma}^{\widetilde{\sigma}}$ est injective. Si nous fixons $\mathbf{Q}\in\mathcal{P}_J$, il existe une correspondance biunivoque naturelle entre l'ensemble $\{\mathbf{R}\in\mathcal{P}_{\widetilde{J}} \mid \mathbf{R}\subset\mathbf{Q}\}$ et l'ensemble des orbites de U_Q sur $\{\mathbf{P}\in\mathcal{P}_{I_0} \mid (\mathbf{Q},\mathbf{P})\in\sigma\}$. Par conséquent, l'espace E^{σ} est une somme directe, prise sur tous les couples $\mathbf{R}\subset\mathbf{Q}$ ($\mathbf{R}\in\mathcal{P}_{\widetilde{J}}$, $\mathbf{Q}\in\mathcal{P}_J$), de morceaux de la forme $\big(\bigoplus_{\mathbf{P}\in B} E_{\mathbf{P}}\big)^{U_Q}$, où $\mathbf{P}$ parcourt une orbite fixée de U_Q. Or ce morceau a la même dimension que $E_{\mathbf{P}}$. (Notons que, pour $\mathbf{P}$ dans cette orbite de U_Q, nous avons $P\cap U_Q\subset U_P$ et U_P agit trivialement sur $E_{\mathbf{P}}$.) Ainsi, $\dim E^{\sigma} = \dim E_{\mathbf{P}}\cdot\#(\mathcal{P}_{\widetilde{J}}) = \dim E_{\mathbf{P}}\cdot\#(\mathcal{P}_{I_0}) = \dim E$. De même, $\dim E^{\widetilde{\sigma}} = \dim E$. Il s'ensuit que $\varphi_{\sigma}^{\widetilde{\sigma}}$ est un isomorphisme.

Étape 2. Supposons que $|I_0| = |\bar{S}| - 1$. Soit $\mathcal{P}_J$ la classe des sous-groupes paraboliques opposés à ceux de $\mathcal{P}_{I_0}$, et soit $\sigma = \{(\mathbf{Q},\mathbf{P})\in\mathcal{P}_J\times\mathcal{P}_{I_0} \mid \mathbf{Q} \text{ est opposé à } \mathbf{P}\}$. Nous allons montrer que $\varphi_{\rho}^{\sigma}\colon E^{\sigma}\to E^{\rho} = E$ est un isomorphisme. Cette application est certainement non nulle. Ainsi, si E est irréductible, φ_{ρ}^{σ} est bien un isomorphisme. Si E est réductible, il a exactement deux facteurs de composition, et J est nécessairement égal à I_0. Pour tout $\mathbf{P}\in\mathcal{P}_{I_0}$, il existe un isomorphisme

$$\eta_{\mathbf{P}}\colon E_{\mathbf{P}} \xrightarrow{\sim} \Big(\bigoplus_{\substack{\mathbf{P}'\\(\mathbf{P}',\mathbf{P})\in\sigma}} E_{\mathbf{P}'} \Big)^{U_P}$$

de P/U_P-modules, unique à un scalaire près. Nous pouvons supposer que $\eta_{g\mathbf{P}g^{-1}} = g\eta_{\mathbf{P}}g^{-1}$ ($\forall\mathbf{P}\in\mathcal{P}_{I_0}$, $\forall g\in G$). Ensemble, ces applications définissent un isomorphisme de G-modules $\eta = \bigoplus_{\mathbf{P}\in\mathcal{P}_{I_0}}\eta_{\mathbf{P}}$:

$$E = \bigoplus_{\mathbf{P}\in\mathcal{P}_{I_0}} E_{\mathbf{P}} \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{\mathbf{P}\in\mathcal{P}_{I_0}} \Big(\bigoplus_{\substack{\mathbf{P}'\\(\mathbf{P}',\mathbf{P})\in\sigma}} E_{\mathbf{P}'} \Big)^{U_P}.$$

La composée $\varphi_{\rho}^{\sigma}\circ\eta$ est un G-endomorphisme semi-simple de E. Sa trace est clairement nulle (ses blocs diagonaux sont nuls). Soient λ' et λ'' ses valeurs propres sur les deux composantes irréductibles E' et E'' de E. Alors $\lambda'\dim E' + \lambda''\dim E'' = 0$. Comme $\dim E'\neq 0$ et $\dim E''\neq 0$, λ' et λ'' sont soit toutes deux nulles, soit toutes deux non nulles. Elles ne peuvent être toutes deux nulles puisque $\varphi_{\rho}^{\sigma}\circ\eta\neq 0$. Elles sont donc toutes deux non nulles. Il s'ensuit que $\varphi_{\rho}^{\sigma}\circ\eta$, et donc φ_{ρ}^{σ}, sont des isomorphismes.

Étape 3. Supposons que $|I_0|\leq|\bar{S}| - 1$. Soit $J\subset\bar{S}$ tel que $|J| = |I_0| + 1$,

et soit $\tau \in \mathcal{Z}_J$. Il existe exactement deux éléments $\sigma' \in \mathcal{Z}_{J'}$, $\sigma'' \in \mathcal{Z}_{J''}$ tels que $J', J'' \subset J$, $|J'| = |J''| = |I_0|$, et tels que τ soit la J-face de σ' et la J-face de σ''. Nous allons démontrer que $\varphi_\tau^{\sigma'}$ et $\varphi_\tau^{\sigma''}$ sont des isomorphismes. L'une de ces applications, disons $\varphi_\tau^{\sigma'}$, est du type considéré à l'étape 1 ($\sigma = \tau$) ; on sait donc que c'est un isomorphisme. Considérons maintenant $\varphi_\tau^{\sigma''}$. Définissons

$$E' = \bigoplus_{\mathbf{R}' \in \mathcal{P}_{J'}} E'_{\mathbf{R}'}$$

où, par définition,

$$E'_{\mathbf{R}'} = \Big(\bigoplus_{\substack{\mathbf{P} \in \mathcal{P}_{I_0} \\ (\mathbf{R}', \mathbf{P}) \in \sigma'}} E_{\mathbf{P}} \Big)^{U_{R'}}.$$

Alors E' est naturellement un G-module. Il vérifie une propriété analogue à la propriété (3.1) de E. Soit α l'ensemble des couples $(\mathbf{R}'', \mathbf{R}') \in \mathcal{P}_{J''} \times \mathcal{P}_{J'}$ tels que $\mathbf{R}''$ et $\mathbf{R}'$ soient tous deux contenus dans un même $\mathbf{Q} \in \mathcal{P}_J$ et soient opposés dans $\mathbf{Q}$. Nous définissons E'^{α} et $\Psi^\alpha \colon E'^{\alpha} \to E'$ de la même manière que E^σ et $\varphi_\rho^\sigma \colon E^\sigma \to E$. Nous avons un diagramme commutatif naturel

$$\begin{array}{ccc} E'^{\alpha} & \xrightarrow{\Psi^\alpha} & E' \ (= E^{\sigma'}) \\ \big\downarrow & & \big\downarrow \varphi_\tau^{\sigma'} \\ E^{\sigma''} & \xrightarrow{\varphi_\tau^{\sigma''}} & E^\tau \end{array}$$

(Notons que, étant donné $(\mathbf{R}'', \mathbf{P}) \in \sigma''$, il existe un unique $\mathbf{R}' \in \mathcal{P}_{J'}$ tel que $(\mathbf{R}'', \mathbf{R}') \in \alpha$ et $(\mathbf{R}', \mathbf{P}) \in \sigma'$; réciproquement, si $(\mathbf{R}'', \mathbf{R}') \in \alpha$ et $(\mathbf{R}', \mathbf{P}) \in \sigma'$, alors $(\mathbf{R}'', \mathbf{P}) \in \sigma''$. Cela donne l'isomorphisme $E'^{\alpha} \xrightarrow{\sim} E^{\sigma''}$.) Or l'application verticale de droite du diagramme est connue pour être un isomorphisme ; de plus, d'après l'étape 2, l'application horizontale supérieure est un isomorphisme. Il s'ensuit que l'application horizontale inférieure $\varphi_\tau^{\sigma''}$ est un isomorphisme.

Étape 4. Soient $\sigma \in \mathcal{Z}_J$ et $|J| = |I_0|$. (Ainsi, σ correspond à un cône ouvert de L.) Nous montrons que $\varphi_\rho^\sigma \colon E^\sigma \to E$ est un isomorphisme. On peut trouver une suite $\sigma = \sigma_1, \sigma_2, \ldots, \sigma_n = \rho$ d'éléments correspondant à des cônes ouverts de L, telle que (lorsqu'on les considère comme des cônes de L) deux cônes consécutifs aient une face commune de codimension 1 ; choisissons de plus n aussi petit que possible. Soit τ l'élément correspondant à la face commune de codimension 1 de $\sigma = \sigma_1$ et σ_2. Par récurrence sur n, nous pouvons supposer que $\varphi_\rho^{\sigma_2}$ est un isomorphisme. L'étape 3 montre que φ_τ^σ et $\varphi_\tau^{\sigma_2}$ sont des isomorphismes. De $\varphi_\rho^{\sigma_2} = \varphi_\rho^\tau \varphi_\tau^{\sigma_2}$, il résulte que φ_ρ^τ est un isomorphisme. De $\varphi_\rho^\sigma = \varphi_\rho^\tau \varphi_\tau^\sigma$, il résulte que φ_ρ^σ est un isomorphisme.

Étape 5. Soient $J \subset \bar{S}$ et $\sigma \in \mathcal{Z}_J$. Nous voulons montrer que φ_ρ^σ est un isomorphisme. On peut trouver $\widetilde{J} \subset J$ et $\widetilde{\sigma} \in \mathcal{Z}_{\widetilde{J}}$ tels que $|\widetilde{J}| = |I_0|$, que σ soit la face de type J de $\widetilde{\sigma}$, et que $\varphi_\sigma^{\widetilde{\sigma}}$ soit du type considéré à l'étape 1 (et soit donc un isomorphisme).

Nous avons $\varphi_\rho^\sigma \varphi_\sigma^{\tilde{\sigma}} = \varphi_\rho^{\tilde{\sigma}}$. D'après l'étape 4, $\varphi_\rho^{\tilde{\sigma}}$ est un isomorphisme. Il s'ensuit que φ_ρ^σ est un isomorphisme.

Étape 6. Soient $J \subset J'$ et $\sigma \in \mathcal{Z}_J$; soit $\sigma' \in \mathcal{Z}_{J'}$ la face de type J' de σ. Nous voulons montrer que $\varphi_{\sigma'}^\sigma$ est un isomorphisme. Nous avons $\varphi_\rho^{\sigma'} \varphi_{\sigma'}^\sigma = \varphi_\rho^\sigma$. D'après l'étape 5, φ_ρ^σ et $\varphi_\rho^{\sigma'}$ sont des isomorphismes. Il s'ensuit que $\varphi_{\sigma'}^\sigma$ est un isomorphisme.

Ceci achève la démonstration du lemme 3.3, et donc celle du théorème.

5

Nous avons le corollaire suivant.

COROLLAIRE (voir Alvis [1]). Dans la situation du théorème, soit $E^\#$ le noyau de d_{i_0} dans (2.1). Alors
(a) $E^\#$ est un G-module irréductible,
(b) $(E^\#)^\#$ est isomorphe à E comme G-module,
(c) $(-1)^{i_0} E^\# = \sum_{I \subset \bar{S}} (-1)^{|I|} E_{(I)}$ dans le groupe de Grothendieck des G-modules virtuels.

L'assertion (c) est évidente.

Soit E' un G-module du type considéré dans (3.1), admettant une décomposition en somme directe $E' = E_1 \oplus \cdots \oplus E_n$, où les E_i sont des G-modules irréductibles et $E_1 \cong E$. La démonstration du théorème 2 montre que $(E')^\#$ peut être défini de la même manière que $E^\#$ et qu'il possède les propriétés suivantes :

$$(E')^\# \cong E_1^\# \oplus \cdots \oplus E_n^\#, \qquad E'^\# \cong E'. \tag{5.1}$$

Pour tous $1 \le i, j \le n$, nous obtenons de (c)

$$\langle E_i, E_j^\# \rangle = \langle E_i^\#, E_j \rangle = \sum_{I \subset \bar{S}} (-1)^{|I|+i_0} \langle E_i^{U_{P_I}}, E_j^{U_{P_I}} \rangle_{P_I} \tag{5.2}$$

(où $\mathbf{P}_I \in \mathcal{P}_I$). Il s'ensuit que

$$\langle E_i^\#, E' \rangle = \sum_j \langle E_i^\#, E_j \rangle = \sum_j \langle E_i, E_j^\# \rangle = \langle E_i, (E')^\# \rangle = \langle E_i, E' \rangle$$

et, en particulier, $E_i^\# \neq 0$. Si $E_i^\#$ n'était pas irréductible pour un certain i, alors $E_1^\# \oplus \cdots \oplus E_n^\#$ aurait plus de composantes irréductibles que $E_1 \oplus \cdots \oplus E_n$, ce qui contredirait (5.1). Ainsi, $E_i^\#$ est irréductible pour tout i. Il existe donc une permutation π de $\{1, 2, \ldots, n\}$ telle que $E_i^\# = E_{\pi(i)}$ pour tout i. D'après (5.2), nous avons

$$\langle E_{\pi^2(i)}, E_i \rangle = \langle (E_i^\#)^\#, E_i \rangle = \langle E_i^\#, E_i^\# \rangle = \langle E_{\pi(i)}, E_{\pi(i)} \rangle = 1.$$

Il s'ensuit que $E_{\pi^2(i)}$ est isomorphe à E_i. Le corollaire est démontré.

Références

1. D. Alvis, The duality operation in the character ring of a finite Chevalley group, *Bull. Amer. Math. Soc.* **1** (1979), 907–911.
2. C. W. Curtis, Truncation and duality in the character ring of a finite group of Lie type, *J. Algebra* **62** (1980), 320–332.
3. R. Howlett et G. I. Lehrer, Induced cuspidal representations and generalized Hecke rings, *Invent. Math.* **58** (1980), 37–64.
4. N. Kawanaka, Fourier transforms of nilpotently supported invariant functions on a simple Lie algebra over a finite field, prépublication, université d'Osaka.

L'Enseignement Mathématique, t. 29 (1983), p. 145-150

ALGÈBRES À DIVISION ET LE PARADOXE DE HAUSDORFF-BANACH-TARSKI

par Pierre DELIGNE et Dennis SULLIVAN

Dans cette note, nous observons qu'une question posée par Dekker (1956) sur les rotations inspirées du paradoxe de Hausdorff-Banach-Tarski peut être résolue par la théorie algébrique des nombres. Pour la motivation, rappelons une forme du paradoxe.

Partageons le groupe libre à deux générateurs F en cinq ensembles E, X, $\bar{X}$, Y, $\bar{Y}$, formés respectivement de l'identité et des éléments qui, sous forme réduite, commencent par x, x^{-1}, y ou y^{-1}. Si F agit librement sur une sphère S par rotations rigides et si, au moyen de l'axiome du choix, nous choisissons une transversale T, c'est-à-dire un ensemble ayant exactement un point dans chaque orbite, les cinq sous-ensembles T, XT, $\bar{X}T$, YT, $\bar{Y}T$ forment une partition de S. Pour alléger les notations, nous écrirons encore E, X, $\bar{X}$, Y, $\bar{Y}$ pour T, XT, $\bar{X}T$, YT, $\bar{Y}T$. La rotation par x envoie $\bar{X}$ sur

$$S - X = E \cup \bar{X} \cup Y \cup \bar{Y}.$$

De même, y envoie $\bar{Y}$ sur

$$S - Y = E \cup X \cup \bar{X} \cup \bar{Y}.$$



Ainsi, à partir de ces 11 (en réalité 5) morceaux, nous pouvons réassembler 2 sphères congruentes, plus une copie congruente de l'ensemble E. C'est une forme du paradoxe de Hausdorff-Banach-Tarski qui découle rapidement d'une action libre d'un groupe libre

à deux générateurs (voir l'Appendice A pour la forme plus précise). Nous sommes ainsi ramenés à la question de Dekker (communiquée par Jan Mycielski) : de telles actions existent-elles réellement ? La sphère doit être de dimension impaire pour des raisons topologiques : une application sans point fixe $f : S^d \to S^d$ doit avoir un nombre de Lefschetz nul

$$L(f) = \sum (-1)^i \operatorname{Trace}\big(f; H_i(S^d)\big) = 1 + (-1)^d \deg(f).$$

Pour une action libre d'un groupe libre, le carré d'un élément non trivial agit par une application de degré +1, ce qui impose que d soit impair. La dimension doit être > 1. Ce sont les seules conditions.

Théorème. *Pour $n \geq 2$, il existe un groupe libre non abélien de rotations rigides agissant librement sur la sphère de dimension impaire S^{2n-1}.*

Remarque. Les matrices orthogonales correspondantes peuvent être choisies à coefficients algébriques, et le groupe de matrices correspond alors à un sous-groupe des éléments non nuls d'une algèbre à division sur un corps de nombres.

Remarque. Le théorème a été démontré par Dekker lorsque n est pair [D].

Remarque. Soit $u : O(p) \times O(q) \to O(p+q)$ le plongement naturel :

$$u(A, B) = \text{matrix} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Si $A \in O(p)$ et $B \in O(q)$ n'ont aucun vecteur fixe non nul, il en va de même de $u(A, B)$. Si $\sigma_1 : F \to O(p)$ et $\sigma_2 : F \to O(q)$ définissent des actions libres sur S^{p-1} et S^{q-1}, $u(\sigma_1, \sigma_2)$ définit donc une action libre de F sur S^{p+q-1}. Par cette remarque, on pourrait ramener le théorème aux deux cas particuliers $n = 2$ et $n = 3$.

Démonstration. Soit $k \subset \mathbf{R}$ un corps de nombres algébriques réel, et soit $k' \subset \mathbf{C}$ une extension quadratique de k. Supposons que $k' \not\subset \mathbf{R}$, c'est-à-dire que $k' \otimes_k \mathbf{R} = \mathbf{C}$. Soit D une algèbre à division de dimension n^2 sur son centre k', munie d'une anti-involution $*$ induisant sur k' la conjugaison complexe. La $\mathbf{R}$-algèbre $D \otimes_k \mathbf{R}$ est une algèbre simple sur son centre $k' \otimes_k \mathbf{R} = \mathbf{C}$, donc isomorphe à $M(n, \mathbf{C})$. Nous supposons que, pour un isomorphisme convenable entre $D \otimes_k \mathbf{R}$ et $M(n, \mathbf{C})$, $*$ devient la transposition conjuguée.

Pour un tel isomorphisme, les éléments u de D vérifiant $uu^* = 1$ deviennent des matrices unitaires. Ils opèrent sur la sphère unité de $\mathbf{C}^n$. De plus, si $u \neq 1$, $u - 1$ est inversible dans D, de sorte que la matrice correspondante n'a pas 1 pour valeur propre. Elle agit donc sans point fixe sur la sphère.

Le groupe $\Gamma := \{u \in D \mid uu^* = 1\}$ est le groupe des points k-rationnels d'une k-forme du groupe algébrique réel $U(n)$. Pour $n > 1$, le sous-groupe parfait $SU(n)$

de $U(n)$ n'est pas trivial, et $U(n)$ n'est pas résoluble. Le groupe Γ est dense dans $U(n)$: les éléments anti-adjoints de D sont denses dans les matrices anti-adjointes de $M(n, \mathbf{C})$, et la transformation de Cayley $t \mapsto \dfrac{t-1}{t+1}$ est un homéomorphisme de l'espace des matrices anti-adjointes de $M(n, \mathbf{C})$ sur un ouvert dense de $U(n)$, qui envoie les éléments anti-adjoints de D dans Γ. Il résulte de cette densité que, si $n > 1$, le groupe linéaire Γ n'est pas résoluble. D'après [Tits], il contient un sous-groupe libre non abélien.

Il reste à construire des couples $(D, *)$. Une algèbre à division D de centre k' admet une anti-involution $*$ induisant sur k' l'élément non trivial $\mathrm{Gal}(k'/k)$ si, et seulement si, sa classe $\mathrm{cl}(D)$ dans le groupe de Brauer $\mathrm{Br}(k')$ de k' a une image nulle par l'application norme $N_{k'/k} : \mathrm{Br}(k') \to \mathrm{Br}(k)$—voir l'Appendice B. La théorie du corps de classes donne un calcul explicite de $\mathrm{Br}(k)$ et de $N_{k'/k}$, et indique quels éléments de $\mathrm{Br}(k')$ proviennent d'algèbres à division. L'existence d'un tel D découle de cette description explicite. Une construction directe est donnée dans l'Appendice C. Lorsque nous choisissons un isomorphisme de $D \otimes_k \mathbf{R}$ avec $M(n, \mathbf{C})$, l'involution $*$ devient l'adjonction relativement à une forme hermitienne ϕ sur $\mathbf{C}^n$, non nécessairement définie positive : $\phi(ax, y) = \phi(x, a^* y)$. Si h est auto-adjoint dans D, $\mathrm{int}(h^{-1}) \circ *$ est l'adjonction relativement à la forme $\phi_h(x, y) = \phi(hx, y)$. Pour un h convenable, ϕ_h est définie positive, et $(D, \mathrm{int}(h^{-1}) \circ *)$ est du type cherché.

Appendice A

Considérons $\phi : S' \cup S'' \to S - E$ comme dans l'introduction, où S' et S'' sont deux copies de la sphère S, et $\psi : S \to S'$ la bijection évidente. Considérons, comme dans le théorème de Schröder-Bernstein, l'ensemble S_e des points p de S ayant un nombre pair d'ancêtres, c'est-à-dire pour lesquels il existe un entier $n \geq 0$ tel que $p \in \mathrm{Im}(\phi \circ \psi)^n$ et $p \notin \mathrm{Im}(\psi \circ (\phi \circ \psi)^n)$. Considérons aussi l'ensemble S_o des p de S pour lesquels il existe $n \geq 0$ tel que $p \in \mathrm{Im}(\psi \circ (\phi \circ \psi)^n)$ et $p \notin \mathrm{Im}(\phi \circ \psi)^{n+1}$, et enfin l'ensemble S_∞ des p tels que $p \in \mathrm{Im}(\phi \circ \psi)^n$ pour tout $n \geq 0$. De même, considérons

$$S' \cup S'' = (S' \cup S'')_e \cup (S' \cup S'')_o \cup (S' \cup S'')_\infty.$$

Alors ψ induit une bijection de $S_e \cup S_\infty$ sur $(S' \cup S'')_o \cup (S' \cup S'')_\infty$, et ϕ^{-1} une bijection de S_o sur $(S' \cup S'')_e$. En les combinant, nous obtenons une bijection $\chi : S \to S' \cup S''$ et une partition de S en un nombre fini de morceaux, la restriction de χ à chacun d'eux étant une rotation.

Appendice B

Soit K une extension quadratique séparable d'un corps k. Nous notons $x \mapsto \bar{x}$ l'élément non trivial de $\mathrm{Gal}(K/k)$. Soit D une algèbre simple de dimension n^2 sur son centre K. Vérifions le critère du texte pour l'existence d'une involution de seconde espèce sur D, c'est-à-dire d'une anti-involution $*$ de D induisant $x \mapsto \bar{x}$ sur K. Le critère est que $N_{K/k}\,\mathrm{cl}(D) = 0$ dans $\mathrm{Br}(k)$.

Localisons-nous pour la topologie étale sur $\mathrm{Spec}(k)$. Cela signifie effectuer des extensions étales de scalaires $\otimes_k k'$ assez grandes, tout en suivant la fonctorialité en k'. Le corps K devient l'extension quadratique séparable $K' = K \otimes_k k'$ de k'. L'algèbre D devient $D' = D \otimes_k k'$, et est de la forme $D' = \mathrm{End}_{K'}(V')$, où V' est un module libre sur K'. Le module V' n'est déterminé par D' qu'à homothétie près (l'espace projectif correspondant est déterminé de façon unique).

Pour tout K-module M, soit $\bar{M}$ le module déduit de M par l'extension des scalaires $\bar{} : K \to K$, c'est-à-dire le module, unique à isomorphisme unique près, muni d'un isomorphisme anti-linéaire $x \mapsto \bar{x} : M \xrightarrow{\sim} \bar{M}$. De même pour les K'-modules. Si $D' = \mathrm{End}(V')$, alors $\bar{D}' = \mathrm{End}(\bar{V}')$, et

$$(D \otimes_K \bar{D})' = \mathrm{End}(V' \otimes \bar{V}').$$

Soit W' le sous-espace fixe de l'automorphisme anti-linéaire de $V' \otimes \bar{V}'$ défini par $v \otimes \bar{w} \mapsto w \otimes \bar{v}$. C'est l'espace des formes hermitiennes sur le dual de V'. On a $W' \otimes_{k'} K' = V' \otimes \bar{V}'$. Si $D_1 \subset D \otimes_K \bar{D}$ est le sous-espace fixe de l'automorphisme anti-linéaire de $D \otimes_K \bar{D}$ défini par $x \otimes \bar{y} \mapsto y \otimes \bar{x}$, alors D'_1 est la k'-forme de la K'-algèbre $(D \otimes_K \bar{D})' = \mathrm{End}(V' \otimes \bar{V}')$ déduite de la k'-forme W' du K'-module $V' \otimes \bar{V}'$: $D'_1 = \mathrm{End}_{k'}(W')$.

Les involutions de seconde espèce sur D' correspondent bijectivement aux formes hermitiennes non dégénérées sur V', prises à un facteur près (dans k'^*). Celles-ci, à leur tour, correspondent, par la construction de la « forme duale », aux éléments « non dégénérés » de W', là encore à un facteur près. L'espace projectif $\mathbf{P}(W')$ sur k' est déterminé à isomorphisme unique près par D'. Il est donc (c'est le point de la localisation) défini sur k : $\mathbf{P}(W') = P \otimes_k k'$, fonctoriellement en k'. Les points sur k de P (plus exactement, les points non dégénérés) paramètrent les involutions de seconde espèce sur D.

L'isomorphisme fonctoriel $D'_1 = \mathrm{End}_{k'}(W')$ montre que P est la forme de l'espace projectif (variété de Severi-Brauer) attachée à D_1. Elle possède un point rationnel, et est alors l'espace projectif ordinaire, si et seulement si D_1 est une algèbre de matrices.

Ceci montre que D possède des involutions de seconde espèce si et seulement si la classe de D_1 dans $\mathrm{Br}(k)$ est nulle. Cette classe est la norme cherchée $N_{K/k}(\mathrm{cl}(D))$. Dans l'esprit de la localisation, on peut le déduire du fait que l'homothétie de rapport $\lambda \in K'^*$ de V' induit sur W' l'homothétie de rapport $N_{K'/k'}(\lambda) \in k'^*$.

Appendice C

Pour $n \geq 3$, on peut obtenir des exemples ainsi : prenons $k' = \mathbf{Q}[\zeta]$, avec $\zeta = \exp(2\pi i/n)$, et $k = k' \cap \mathbf{R}$. Fixons $a, b \in k^*$ et soit D la k'-algèbre engendrée par X, Y, soumise aux relations

$$X^n = a, \qquad Y^n = b$$

$$XY = \zeta YX.$$

Elle admet l'anti-involution $*$, induisant la conjugaison complexe sur k', définie par $\zeta^* = \zeta^{-1}$, $X^* = X$, $Y^* = Y$. L'algèbre D est du type voulu, pourvu que ce soit une algèbre à division. Cela se produit déjà avec $a, b \in \mathbf{Z}$: prenons pour a un nombre premier congru à 1 mod n, et pour b un entier dont le résidu mod a a, dans le groupe cyclique d'ordre n $(\mathbf{Z}/(a))^*/(\mathbf{Z}/(a))^{*n}$, une image d'ordre exact n. Par exemple $n = 3$, $a = 7$, $b = 2$. Pour $n = 2$, on procède de même avec $k' = \mathbf{Q}[i]$, $\zeta = -1$, a congru à 1 mod 4 et b non carré mod a. Par exemple, $a = 5$ et $b = 2$. Dans chaque cas, l'hypothèse sur a assure que k' se plonge dans le complété a-adique $\mathbf{Q}_a$ de $\mathbf{Q}$, et le fait que D soit une algèbre à division se voit localement en a : $D \otimes_{k'} \mathbf{Q}_a$ est une algèbre à division de centre $\mathbf{Q}_a$.

Bibliographie

[A] Albert, A. *Structure of algebras.* A.M.S. Colloquium Publ. 24 (1939).

[Sch] Scharlau, W. Zur Existenz von Involutionen auf einfachen Algebren. *Math. Zeitschr.* 145 (1975), 29-32.

[Myc] Mycielkski, Jan. Can one solve equations in groups? *Amer. Math. Monthly* 84 (1977), 723-726.

[Tits] Tits, J. Free subgroups in linear groups. *Journal of Algebra* 20 (1972), 250-270.

[D] Dekker, Th. J. Decomposition of sets and spaces I, II. *Indig. Math.* 18 (1956), 581-595, and 19 (1957), 104-107.

(Reçu le 8 mars 1982)

Pierre Deligne
Dennis Sullivan

Institut des Hautes Etudes Scientifiques
35, route de Chartres
91440 Bures-sur-Yvette
France