

خلاص منطق

پښتو — پاکستان

له بنسټونو تر محاسبویت او د تیورینگ ماشینونو پېژندګلو

د ماشینې ژباړې د روان کار ټولیزه نسخه

په دې ټولیزه لوستیزه نسخه کېنې له OLP-0001 څخه تر OLP-0255 پورې ټول ژباړل شوي سرچینیز واحدونه شامل دي. دا 255 واحدونه د خلاص منطق د پروژې لومړنۍ مادې، ساده سټ نظریه، بیاني او لومړۍ درجې منطق، د ثبوت نظامونه، موډل نظریه، محاسبویت، او د تیورینگ ماشینونو لومړنۍ پېژندګلو رانغاړي. د ۷۲۲ واحدونو بشپړه ژباړه لا روانه ده.

Independent Pashto (Pakistan) machine translation of Open Logic Project revision 9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0. This cumulative work-in-progress reader contains 255 source units (OLP-0001 through OLP-0255). It uses the frozen upstream default profile: first-order logic, all primitive connectives and quantifiers, all four proof systems, and the default mathematics, computer-science, philosophy, novice, lambda, and Turing-machine selections. Pakistani usage is primary; Afghan Pashto sources are labelled regional comparators. Specialist terminology remains openly reviewable where exact native technical attestation is sparse. No native-reader review or upstream endorsement is claimed.

Original text and adaptation: Creative Commons Attribution 4.0 International, subject to the component notices preserved with the source snapshot. [Open Logic Project](#). [Translation catalogue](#). [Edition lineage](#).

فهرست

10	د خلاص منطق پروژې په اړه
12	I د ستونو ساده نظريه
14	1 ستونه
14	1.1 د غړوله مخې برابري
15	1.2 فرعي ستونه او د فرعي ستونو ستونه
16	1.3 ځينې مهم ستونه
17	1.4 اتحادونه او تقاطعې
19	1.5 جوړې، څوگونې او کارټيزي حاصل ضربونه
21	1.6 د رسل پارادوکس
22	2 اړيکې
22	2.1 اړيکې د ستونو په توګه
23	2.2 فلسفي غور
24	2.3 د اړيکو خاص خاصيتونه
25	2.4 د هم ارزښتي اړيکې
25	2.5 ترتيبونه
27	2.6 ګرافونه
28	2.7 ونې
29	2.8 په اړيکو باندې عمليات
31	3 تابعې
31	3.1 بنسټونه
32	3.2 د تابعو ډولونه
34	3.3 تابعې د اړيکو په توګه
35	3.4 د تابعو معکوسونه
37	3.5 د تابعو ترکيب
38	3.6 جزوي تابعې

39	4	د ستونو اندازه
39	4.1	پېژندنه
39	4.2	شمېرنې او د شمېر وړ ستونه
43	4.3	د کانتور د زیځواک طریقه
44	4.4	جوړوونکې تابعې او کودونه
45	4.5	یوه بله جوړوونکې تابع
46	4.6	د شمېر نه وړ ستونه
49	4.7	راکونه
50	4.8	همشمېر والی
51	4.9	د بېلو اندازه ستونه او د کانتور قضیه
53	4.10	د اندازې مفکوره او شروډر-برنشتاین
53	4.11	شمېرنې او د شمېر وړ ستونه
54	4.12	د شمېر نه وړ ستونه
56	4.13	راکونه
58	5	د شمېر نظامونو سټي جوړونه
58	5.1	له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Z}$ ته
59	5.2	له $\mathbb{Z}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته
60	5.3	د حقیقي عددونو کرښه
61	5.4	له $\mathbb{Q}$ څخه $\mathbb{R}$ ته
63	5.5	ځینې فلسفي غورونه
64	5.6	مرتبې حلقې او میدانونه
67	5.7	ضمیمه: حقیقي عددونه د کوشي د لړیو په توګه
71	6	نامتناهي ستونه
71	6.1	د هیلبرت هوټل
71	6.2	د ډېډېکینډ الجبرونه
73	6.3	ریاضي استقرا
74	6.4	د ډېډېکینډ «ثبوت»
75	6.5	ضمیمه: د شروډر-برنشتاین ثبوت
77	II	بیاني منطق
79	7	نحو او معنی پوهنه
79	7.1	پېژندنه
80	7.2	بیاني فارمولونه
81	7.3	لومړنۍ پایلې

82	جورښتي لړۍ	7.4
84	ارزښت ټاکنې او صدق	7.5
86	معنايي مفهومونه	7.6
88	8 د اشتقاق نظامونه	
88	8.1 پېژندنه	
89	8.2 د سپکوپنټ حساب	
90	8.3 طبيعي استنتاج	
91	8.4 تابلوکاني	
92	8.5 بديهي اشتقاقونه	
93	9 د سپکوپنټ حساب	
93	9.1 قاعدې او اشتقاقونه	
94	9.2 بياني قاعدې	
94	9.2.1 د $\neg$ دپاره قاعدې	
94	9.2.2 د $\wedge$ دپاره قاعدې	
94	9.2.3 د $\vee$ دپاره قاعدې	
94	9.2.4 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې	
94	9.3 د سورونو قاعدې	
94	9.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې	
95	9.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې	
95	9.4 جورښتي قاعدې	
95	9.4.1 کمزوري کول	
96	9.4.2 انقباض	
96	9.4.3 تبادله	
96	9.5 اشتقاقونه	
97	9.6 د اشتقاقونه بېلگې	
101	9.7 له سورونو سره اشتقاقونه	
103	9.8 د ثبوت-تيوريکي مفاهيم	
104	9.9 د اشتقاق وړتيا او سازگاري	
106	9.10 د اشتقاق وړتيا او قضيز نښلونکي	
107	9.11 د اشتقاق وړتيا او سورونه	
107	9.12 سموالے	
112	9.13 له عينيت سره اشتقاقونه	
112	9.14 له عينيت سره سموالے	
113	10 فطري استنتاج	

113	10.1 قاعدې او اشتقاقونه
113	10.2 قضیې قاعدې
113	10.2.1 $\wedge$ د ډپاره قاعدې
114	10.2.2 $\vee$ د ډپاره قاعدې
114	10.2.3 $\rightarrow$ د ډپاره قاعدې
114	10.2.4 $\neg$ د ډپاره قاعدې
114	10.2.5 $\perp$ د ډپاره قاعدې
115	10.3 د سورونو قاعدې
115	10.3.1 $\forall$ د ډپاره قاعدې
115	10.3.2 $\exists$ د ډپاره قاعدې
116	10.4 اشتقاقونه
117	10.5 د اشتقاقونه بېلګې
121	10.6 له سورونو سره اشتقاقونه
124	10.7 ثبوت-تیوريکي مفاهیم
125	10.8 د اشتقاق وړتیا او سازګاري
127	10.9 د اشتقاق وړتیا او قضیې رابطونه
128	10.10 د اشتقاق وړتیا او سورونه
128	10.11 سموالے
132	10.12 له عینیت سره اشتقاقونه
133	10.13 له عینیت سره سموالے

11 تابلوګانې

134	11.1 قاعدې او تابلوګانې
135	11.2 قضیوي قاعدې
135	11.2.1 $\neg$ قاعدې
135	11.2.2 $\wedge$ قاعدې
135	11.2.3 $\vee$ قاعدې
135	11.2.4 $\rightarrow$ قاعدې
135	11.2.5 د پرېکون قاعده
135	11.3 د سورونو قاعدې
135	11.3.1 $\forall$ قاعدې
136	11.3.2 $\exists$ قاعدې
136	11.4 تابلوګانې
137	11.5 د تابلوګانې بېلګې
142	11.6 له سورونو سره تابلوګانې
145	11.7 ثبوت-تیوريکي مفاهیم

147	11.8 د اشتقاق وړتیا او سازګاري
149	11.9 د اشتقاق وړتیا او قضیوي رابطونه
151	11.10 د اشتقاق وړتیا او سورونه
152	11.11 سموال
154	11.12 له عینیت سره تابلوګانې
155	11.13 له عینیت سره سموال

12 بدیهي اشتقاقونه

156	12.1 قاعدې او اشتقاقونه
157	12.2 د قضیې نښلونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې
158	12.3 د کمیت ټاکونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې
158	12.4 د اشتقاقونه بېلګې
159	12.5 له کمیت ټاکونکو سره اشتقاقونه
160	12.6 ثبوت-تیوريکي مفاهیم
161	12.7 د استنتاج قضیه
163	12.8 له کمیت ټاکونکو سره د استنتاج قضیه
164	12.9 د اشتقاق وړتیا او سازګاري
164	12.10 د اشتقاق وړتیا او د قضیې نښلونکي
165	12.11 د اشتقاق وړتیا او کمیت ټاکونکي
166	12.12 سموال
167	12.13 له عینیت سره اشتقاقونه

13 د بشپړتیا قضیه

168	13.1 سریزه
169	13.2 د ثبوت لنډیز
170	13.3 د ترلې فارمولونه بشپړ سازګار ستونه
171	13.4 د هنګین غځونه
173	13.5 د لینډنباوم له
174	13.6 د یو مدل جوړونه
176	13.7 عینیت
178	13.8 د بشپړتیا قضیه
179	13.9 د متناهي شاهد قضیه
181	13.10 د متناهي شاهد قضیې نېغ ثبوت
182	13.11 د لوښېايم-سکولم قضیه

183

III د لومړۍ درجې منطق

185

14 د لومړۍ درجې منطق پېژندنه

- 185 14.1 د لومړۍ درجې منطق
- 186 14.2 نحو
- 186 14.3 فارمولونه
- 187 14.4 صدق
- 188 14.5 ترلي فارمولونه
- 189 14.6 معنایي مفاهیم
- 190 14.7 ځایناستی
- 190 14.8 مدلوله او تیوری
- 191 14.9 سموالې او بشپړتیا

192

15 د لومړۍ درجې منطق نحوه

- 192 15.1 پېژندنه
- 192 15.2 د لومړۍ درجې ژبې
- 193 15.3 ترمونه او فارمولونه
- 195 15.4 یوازینۍ لوست
- 198 15.5 د فارمول اصلي عملگر
- 199 15.6 فرعي فارمولونه
- 200 15.7 جوړښتي لړۍ
- 203 15.8 ازاد متغیرونه او ترلي فارمولونه
- 204 15.9 ځایناستی

206

16 د لومړۍ درجې منطق معنی پوهنه

- 206 16.1 پېژندنه
- 206 16.2 د لومړۍ درجې ژبو جوړښتونه
- 208 16.3 پوښل شوي جوړښتونه د لومړۍ درجې ژبو دپاره
- 208 16.4 په جوړښت کېنې د فارمول صدق
- 212 16.5 د متغیرونو ګومارنې
- 216 16.6 امتدادیتوب
- 218 16.7 معنایي مفهومونه

220

17 تیوری او د هغو مدلوله

- 220 17.1 پېژندنه
- 221 17.2 د جوړښتونه د خاصیتونو بیانول
- 222 17.3 د لومړۍ درجې تیوریو بېلګې

223	17.4 په جوړښت کښې د اړیکو بیانول
225	17.5 د ستونو تیوري
227	17.6 د جوړښتونه د پکې بیانول
229	18 د لومړۍ درجې له منطق څخه وړاندې
229	18.1 ټولیزه کتنه
230	18.2 د ډېرو ډولونو منطق
230	18.3 د دویمې درجې منطق
233	18.4 د لورې درجې منطق
235	18.5 شهودي منطق
237	18.6 مودالي منطقونه
239	18.7 نور منطقونه
240	IV مدل تیوري
242	19 د مدل تیوري بنسټونه
242	19.1 راکموني او غځوني
243	19.2 فرعي جوړښتونه
243	19.3 له بریده اوښتنه
243	19.4 آیزومورف جوړښتونه
245	19.5 د یوه جوړښت تیوري
246	19.6 جزوي آیزومورفیزمونه
248	19.7 بې له سرحدې ټکو ګڼ خطي ترتیبونه
250	20 د حساب مدلولونه
250	20.1 سریزه
251	20.2 د حساب معیاري مدلولونه
253	20.3 نامعیاري مدلولونه
254	20.4 د Q مدلولونه
256	20.5 د PA مدلولونه
259	20.6 د حساب محاسبه کېدونکي مدلولونه
261	21 د منځګړیتوب قضیه
261	21.1 سریزه
261	21.2 د ترلي فارمولونه بېلول
262	21.3 د کرېګ د منځګړیتوب قضیه
265	21.4 د تعریف وړتیا قضیه

267	22 د لیندستروم قضیه
267	22.1 پېژندګلو
267	22.2 انتزاعي منطقونه
268	22.3 د متناهي شاهد او لوېنهام-سکولم خاصیتونه
270	22.4 د لیندستروم قضیه
272	V محاسبه کېدنه
274	23 بازګشتي تابعي
274	23.1 پېژندګلو
275	23.2 بنسټيز بازګښت
276	23.3 ترکیب
278	23.4 بنسټيزې بازګشتي تابعي
280	23.5 د بنسټيز بازګښت نښې
280	23.6 بنسټيزې بازګشتي تابعي محاسبه کېدونکې دي
281	23.7 د بنسټيزو بازګشتي تابعو بېلګې
283	23.8 بنسټيزې بازګشتي اړیکې
285	23.9 محدوده کمینه موندنه
286	23.10 اولیه عددونه
287	23.11 لړۍ
290	23.12 ونې
291	23.13 نور بازګښتونه
292	23.14 بنسټيزې بازګشتي تابعي
293	23.15 جزوي بازګشتي تابعي
294	23.16 نورمال شکل قضیه
294	23.17 درېدني مسئله
296	23.18 عمومي بازګشتي تابعي
297	24 د محاسبه کېدنې تيوري
297	24.1 پېژندنه
298	24.2 د محاسبو کوډول
298	24.3 د نورمال شکل قضیه
299	24.4 $n-m-s$ قضیه
300	24.5 نړيواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع
300	24.6 هېڅ نړيواله محاسبه کېدونکې تابع نشته
301	24.7 د درېدني مسئله

302	24.8 د رسل له تناقض سره پرتله
303	24.9 محاسبه کېدونکي ستونه
303	24.10 په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه
304	24.11 د c.e. ستونو تعریفونه
306	24.12 محاسبه نه کېدونکي ستونه شته
307	24.13 د c.e. ستونو اتحاد او اشتراک
308	24.14 په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه د متمم لاندې تړلي نه دي
308	24.15 را کېدنه
309	24.16 را کېدني خاصیتونه
310	24.17 بشپړ په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه
311	24.18 را کېدني يوه بېلگه
312	24.19 د هرځای تعریف کېدو مسئله ناپېرې کېدونکې ده
313	24.20 د رایس قضیه
314	24.21 د ثابت ټکي قضیه
317	24.22 د ثابت ټکي د قضیې کارول
318	24.23 د ځان-مراجعي په کارولو د تابعو تعریف

319 VI تیورینگ ماشینونه

320	25 د تیورینگ ماشین محاسبې
320	25.1 پېژندنه
322	25.2 د تیورینگ ماشینونو څرګندونه

د خلاص منطق پروژې په اړه

د خلاص منطق متن د صوري مابعدمنطق او صوري طريقو د خلاصې سرچينې يو گډ درسي کتاب دے، چې له منځنۍ کچې پيل کوي (يعنې د صوري منطق له يوه لومړني کورس وروسته) - که څه هم د رياضي د غيرمتخصصو لوستونکو دپاره دے (په تېره د فلسفې او کمپيوټر ساينس د زده کوونکو دپاره)، خو دقيق دے.

د ځينو هغو موضوعاتو بيان چې اوس پکښې شامل دي، ښائي لا بشپړ نه وي، او ډېرې برخې لا هم پراخې بياکتې ته اړتيا لري. مونږ اراده لرو چې په راتلونکي کښې متن پراخ کړو او نور موضوعات پکښې شامل کړو. دا اراده هم لرو چې متن ته نورې اسانتياوې ورزياتې کړو، لکه اصطلاحنامه، د نورې لوستنې لست، تاريخي يادښتونه، انځورونه، غوره وضاحتونه، هغه برخې چې د پايلو تړاو له فلسفې، کمپيوټر ساينس او رياضي سره بيانوي، او نور تمرينونه او بېلگې. که کومه تېروتنه وموئ، يا وړانديز لرئ، مهرباني وکړئ د پروژې ډلې ته ښې خبر ورکړئ.

پروژه د خلاصې سرچينې په روحيه کار کوي. يوازې متن په ازاده توگه نه وړاندې کوو، بلکې د لاتيک سرچينه هم د کريپټيو کامنز د نوم اخيستنې د جواز لاندې ورکوو. دا جواز هر چا ته حق ورکوي چې زمونږ کار ښکته کړي، وکاروي، بدل کړي، بيا ښې ترتيب کړي، ښې ښې واري او بيا ښې ووېشي، په دې شرط چې مناسب نسبت ورکړي. د نورو معلوماتو دپاره، مهرباني وکړئ په openlogicproject.org د خلاص منطق پروژې وېبپاڼه وگورئ.

ادارتي يادونه. دا دوتنه ټول هغه مطالب راخلي چې د خلاص منطق په پروژه کې شامل دي. که دا ډول ادارتي يادښتونه ښکاري، نو دا څرګندوي چې دوتنه د دې مطالبو د وړاندې کولو طريقې ته له پام کولو پرته جوړه شوې ده. که دا لولئ، نو غالباً له دې پي ډي اېف څخه درس ورکول يا مطالعه کول مناسب نه دي.

د خلاص منطق پروژه ډېرې داسې طريقې وړاندې کوي چې د هغو په وسيله د درس ورکولو يا ځان زده کړې دپاره مناسب متن جوړېدل ممکن وي. د بېلګې په توګه، په اصلي تنظيم کې متن ټول منطقي عملګر بنسټيز کني، او په ښوونو کې د ټولو عملګرو ټول حالتونه څېړي. خو دا ډېر غوره دي چې ځينې حالتونه د تمرينونو په توګه پرېښودل شي. د خلاص منطق پروژه پخپله هم روان کار دے. د کچه کار او ښه والي د هڅولو دپاره، مطالب آن هغه وخت هم شاملېږي چې يوازې د مسودې په بڼه وي، تمرينونه نه لري، او داسې نور. هغه پي ډي اېف چې د يو کورس دپاره جوړېږي، دا برخې به ترې وباسي.

د درس او مطالعې دپاره د لا مناسبو پي ډي اېفونو د موندلو دپاره، د خلاص منطق پروژې په وېبپاڼه شته نمونوي کورسونه وګورئ. د خپل متن د جوړولو دپاره، له نمونوي چلوونکې دوتنې څخه پيل کولې شئ، يا د لا پرمختللو او مفصلو بېلګو دپاره له دې پروژې څخه د جوړو شوو درسي کتابونو سرچينې ګلے شئ.

برخه I

د ستونو ساده نظريه

ادارتي يادونه - د دې برخې مطالب د ستونو د بنسټيزې ساده نظريې يوه پېژندګلو ده. د ټېم بتن د ستونو د خلاصې نظريې په شاملېدو سره، دا برخه د عددونو د نظامونو جوړول او د نامتناهي والي بحث هم رانغاړي، چې د خلاص منطق پروژې د منطقي برخو دپاره اړين نه دي.

باب 1

ستونه

1.1 د غرو له مخې برابري

سټ د څيزونو يوه ټولګه ده چې د يوه څيز په توګه ورته ګڼل کېږي. هغه څيزونه چې سټ ترې جوړ وي، د سټ عناصر يا غړي بللې شي. که x د يو سټ A غړی وي، $x \in A$ لیکو؛ که نه وي، $x \notin A$ لیکو. هغه سټ چې هېڅ غړي نه لري، تش سټ بللې شي او په $\emptyset$ ښودلې کېږي.

دا مهمه نه ده چې سټ څنګه ټاکو، د هغه غړي څنګه ترتيبوو، يا په رښتيا د هغه غړي څو ځله شمارو. يوازې دا مهم دي چې د هغه غړي کوم دي. دا خبره په لاندې اصل کېنې راټولوو.

تعريف 1.1 (د غرو له مخې برابري). که A او B ستونه وي، نو $A = B$ هله او يوازې هله وي چې د A هر غړی د B هم غړی وي، او برعکس.

د غرو له مخې برابري د ځينو نښو د کارولو جواز راکوي. په عمومي توګه، چې کله ځينې څيزونه $a_1, \dots, a_n$ ولرو، نو $\{a_1, \dots, a_n\}$ هم هغه سټ دے چې غړي ئې $a_1, \dots, a_n$ دي. په "هم هغه" ټينګار کوو، ځکه چې د غرو له مخې برابري راته وائي چې داسې سټ يوازې يو کېدے شي. په حقيقت کېنې، د غرو له مخې برابري د لاندې خبرې جواز هم راکوي:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

دا هم هغه خبره څرګندوي چې د ستونو په پام کېنې نيولو پر وخت، د هغو د غرو ترتيب يا دا چې څو ځله ښودل شوي دي، مهم نه دي.

بېلګه 1.2. چې کله د څيزونو يوه ډله ولرئ، هغه په يو سټ کېنې راټولولے شئ. د بېلګې په توګه، د رېچرډ د وروڼو او خويندو سټ يو داسې سټ دے چې يو کس لري، او هغه د $S = \{\text{Ruth}\}$ په بڼه ليکلے شو. له 4 څخه د کوچنيو مثبتو صحيح عددونو سټ $\{1, 2, 3\}$ دے، خو د $\{3, 2, 1\}$ يا آن د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ په بڼه هم ليکل کېدے شي. د غرو له مخې د برابري له مخې، دا ټول هم يو سټ دے. ځکه چې د $\{1, 2, 3\}$ هر غړی د $\{3, 2, 1\}$ (او د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$) هم غړی دے، او برعکس.

ډېر ځله به يو سټ د يو داسې خاصيت په وسيله ټاکو چې د هغه غړي ئې په ګډه لري. د دې دپاره به دا لنډه نښه کاروو: $\{x : \varphi(x)\}$ ، چې پکښې $\varphi(x)$ د هغه خاصيت استازيتوب کوي چې x ئې بايد ولري، خو د سټ په غړو کېنې وشمېرل شي.

بېلګه 1.3. زمونږ په بېلګه کېنې، S په دې بڼه هم ټاکلے شو:

$$S = \{x : x \text{ د رېچرډ وروڼه يا خور دے}\}.$$

بېلګه 1.4. يو عدد هله او يوازې هله کامل بللے شي چې د خپلو حقيقي قاسمونو له مجموعې سره برابر وي (يعنې هغه عددونه چې دا عدد پرې پوره وېشل کېږي، خو پخپله له دې عدد سره برابر نه وي). د بېلګې په توګه، 6 کامل دے ځکه چې حقيقي قاسمونه ئې 1، 2 او 3

دي، او $6 = 1 + 2 + 3$ په حقيقت کښې، 6 له 10 څخه يوازېنې کوچنې مثبت صحيح عدد دے چې کامل دے. نو د غړو له مخې د برابري په کارولو سره وئيلے شو:

$$\{6\} = \{x : x \text{ کامل دے او } 0 \leq x \leq 10\}$$

بني لاس ته لنډه داسې لولو: “د هغو x گانو سټ چې x کامل وي او $0 \leq x \leq 10$ وي” دلته برابري دا خبره تائيدوي چې د ستونو په پام کښې نيولو پر وخت، د هغو د ټاکلو طريقه مهمه نه ده. او په لا عمومي توگه، د غړو له مخې برابري ډاډ راکوي چې تل د هغو x گانو يوازې يو سټ وي چې $\varphi(x)$ وي. نو د غړو له مخې برابري دا جواز راکوي چې $\{x : \varphi(x)\}$ ته د هغو x گانو هم هغه سټ ووايو چې $\varphi(x)$ وي.

د غړو له مخې برابري راته د دې ښودلو يوه طريقه راکوي چې ستونه برابر دي: د $A = B$ د ښودلو دپاره، وښايي چې هر کله $x \in A$ وي نو $x \in B$ هم وي، او هر کله $y \in B$ وي نو $y \in A$ هم وي.

تمرین 1.5. ثابت کړئ چې له يو څخه زيات تش ستونه نه شي کېدے، يعنې وښايي چې که A او B داسې ستونه وي چې هېڅ غړي نه لري، نو $A = B$.

1.2 فرعي ستونه او د فرعي ستونو ستونه

مونږ به ډېر ځله ستونه سره پرتله کول غواړو. د پرتله کولو يو څرکند ډول داسې دے: هر هغه څيز چې په يو سټ کښې وي، په بل کښې هم وي. دا حالت دومره مهم دے چې د دې دپاره نوې نښې معرفي کړو.

تعريف 1.6 (فرعي سټ). که د يو سټ A هر غړے د B هم غړے وي، نو وايو چې A د B يو فرعي سټ دے، او $A \subseteq B$ ليکو. که A د B فرعي سټ نه وي، $A \not\subseteq B$ ليکو. که $A \subseteq B$ وي خو $A \neq B$ وي، $A \subset B$ ليکو او وايو چې A د B يو خاص فرعي سټ دے.

بېلگه 1.7. هر سټ د خپل ځان فرعي سټ دے، او $\emptyset$ د هر سټ فرعي سټ دے. د جفتو طبيعي عددونو سټ د طبيعي عددونو د سټ فرعي سټ دے. همدارنگه، $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$ خو $\{a, b, e\}$ د $\{a, b, c\}$ فرعي سټ نه دے.

بېلگه 1.8. عدد 2 د صحيح عددونو د سټ يو غړے دے، حال دا چې د جفتو عددونو سټ د صحيح عددونو د سټ فرعي سټ دے. خو يو سټ کېدے شي د بل سټ هم غړے وي او هم فرعي سټ، د بېلگې په توگه، $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ او هم $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

د غړو له مخې برابري د ستونو د برابري معيار راکوي: $A = B$ هله او يوازې هله وي چې A هر غړے د B هم غړے وي، او برعکس. د “فرعي سټ” تعريف $A \subseteq B$ بالکل د دې معيار د لومړۍ نېټې په توگه تعريفوي: د A هر غړے د B هم غړے وي. البته، که A او B سره بدل کړو، تعريف بيا هم عملي کېږي: يعنې $B \subseteq A$ هله او يوازې هله وي چې B هر غړے د A هم غړے وي. او دا بيا بالکل د غړو له مخې د برابري “برعکس” برخه ده. په نورو ټکو، د غړو له مخې له برابري نه دا نتيجه راوځي چې ستونه هله او يوازې هله برابر وي چې د يو بل فرعي ستونه وي.

قضيه 1.9. $A = B$ هله او يوازې هله وي چې $A \subseteq B$ او $B \subseteq A$ دواړه وي.

اوس د ځينو نورو کټورو نښو د معرفي کولو دپاره هم ښه موقع ده. د دې په تعريف کښې چې A کله د B فرعي سټ وي، مونږ ووييل چې “د A هر غړے... دے”، او د “... ځای مو په” د B غړے “ډک کړ. خو دا د عبارت دومره عامه بڼه ده چې د دې دپاره د صوري نښو معرفي کول به گټور وي.

تعريف 1.10. $\forall x (x \in A \rightarrow \varphi)$ د $\forall x (x \in A \rightarrow \varphi)$ لنډه بڼه ده. همدارنگه، $\exists x (x \in A \wedge \varphi)$ د $\exists x (x \in A \wedge \varphi)$ لنډه بڼه ده.

د دې نښو په کارولو سره وئيلے شو چې $A \subseteq B$ هله او يوازې هله وي چې $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$ وي.

اوس د يو ځانگړي ډول سټ څېړنې ته څو: د يو ټاکلي سټ د ټولو فرعي ستونو سټ.

تعریف 1.11 (د فرعي ستونو سټ). هغه سټ چې د یو سټ A ټول فرعي ستونه پکښې وي، د A د فرعي ستونو سټ بللې شي، او $\wp(A)$ لیکل کېږي.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

بېلگه 1.12. د $\{a, b, c\}$ ټول ممکن فرعي ستونه کوم دي؟ دا دي: $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$. د دې ټولو فرعي ستونو سټ $\wp(\{a, b, c\})$ دے:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

تمرین 1.13. د $\{a, b, c, d\}$ ټول فرعي ستونه ولیکئ.

تمرین 1.14. وښائئ چې که A د n په شمېر غړي ولري، نو $\wp(A)$ د 2^n په شمېر غړي لري.

1.3 ځینې مهم ستونه

بېلگه 1.15. مونږ به زیاتره له هغو ستونو سره کار لرو چې غړي ئې ریاضیکي څیزونه وي. څلور داسې ستونه دومره مهم دي چې ځانګړي نومونه لري:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

د طبیعي عددونو سټ

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

د صحیح عددونو سټ

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ او } n \neq 0\}$$

د ناطقو عددونو سټ

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

د حقیقي عددونو سټ (پوسټار)

دا ټول نامتناهي ستونه دي، یعنې د هر یوه غړي په نامتناهي شمېر دي.

چې کله د دې ستونو له یوه نه بل ته څو، خپلې زېرمې ته نور عددونه ورزیاتوو. په حقیقت کې، دا باید څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: ځکه چې هر طبیعي عدد صحیح عدد دے؛ هر صحیح عدد ناطق عدد دے؛ او هر ناطق عدد حقیقي عدد دے. همدارنګه، دا هم باید څرګنده وي چې $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ ، ځکه چې -1 صحیح عدد دے خو طبیعي عدد نه دے، او $1/2$ ناطق عدد دے خو صحیح عدد نه دے. دا لږه ناڅرګنده خبره ده چې $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ ، یعنې داسې حقیقي عددونه شته چې ناطق نه دي.

کله ناکله به د مثبتو صحیح عددونو سټ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ او هغه سټ هم کاروو چې یوازې لومړي دوه طبیعي عددونه لري، یعنې $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.


بېلگه 1.16 (توریز تسلسلونه). یوه بله په زړه پورې بېلگه د یوې الفبا A د متناهي توریزو تسلسلونو سټ A^* دے: د A د عناصرو هره متناهي لړۍ د A یو توریز تسلسل دے. د هرې الفبا A دپاره، تش توریز تسلسل Λ هم د A په توریزو تسلسلونو کېنې شاملوو. د بېلګې په توګه،

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

که $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ یو داسې توریز تسلسل وي چې د A له n "تورو" جوړ وي، نو وایو چې د دې تسلسل اوږدوالی n دے او $\text{len}(x) = n$ لیکو.

بېلگه 1.17 (نامتناهي لړۍ). د هر سټ A دپاره، د A د غړو د نامتناهي لړیو سټ A^ω هم په پام کېنې نیولے شو. یوه نامتناهي لړۍ $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ د څیزونو له داسې لست نه جوړه وي چې په یو لوري نامتناهي غځېږي، او هر څیز ئې د A یو غړی وي.



شکل 1.1: د دوو ستونو اتحاد $A \cup B$ د A د غرو او د B د غرو کچه سټ ده.

1.4 اتحادونه او تقاطعي

په 1.1 کښې مو د تجريد په وسيله د ستونو تعريفونه معرفي کړل، يعنې د $\{x : \varphi(x)\}$ په بڼه تعريفونه. دلته يو خاصيت φ په کار راوړو، او دا خاصيت د هغو ستونو يادونه کوله شي چې مخکې مو تعريف کړي دي. نو د بېلگې په توگه، که A او B ستونه وي، د $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ سټ له هغو ټولو څيزونو جوړ دے چې د A يا B غړي وي، يعنې دا هغه سټ دے چې د A او B غړي سره يوځای کوي. دا لکه په 1.1 کښې انځورول شوی، چې رنگ شوې ساحه د دواړو ستونو A او B غړي په کچه ښيي. په ستونو دا عمل، يعنې يوځای کول ئې، ډېر کنټرول او عام دے، نو يو صوري نوم او ښه ورکوو.

تعريف 1.18 (اتحاد). د دوو ستونو A او B اتحاد، چې $A \cup B$ ليکل کېږي، د ټولو هغو څيزونو سټ دے چې د A ، B ، يا د دواړو غړي وي.

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

بېلگه 1.19. څرنگه چې د غرو تکرار مهم نه دے، د هغو دوو ستونو اتحاد چې گډ غړي ولري، هغه غړي يوازې يو ځل لري؛ د بېلگې په توگه، $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$.

د يو سټ او د هغه د يو فرعي سټ اتحاد هم هغه لوی سټ دے: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$.
له تش سټ سره د يو سټ اتحاد له هم هغه سټ سره برابر دے: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$.

تمرين 1.20. ثابت کړئ چې که $A \subseteq B$ وي، نو $A \cup B = B$.


د اتحاد يو “دوه کول” عمل هم په پام کېښي نيول شوی. دا هغه عمل دے چې د هغو ټولو غرو سټ جوړوي چې د A غړي وي او د B هم غړي وي. دې عمل ته تقاطع وئيل کېږي، او لکه په 1.2 کښې ښودل کېدے شي.

تعريف 1.21 (تقاطع). د دوو ستونو A او B تقاطع، چې $A \cap B$ ليکل کېږي، د ټولو هغو څيزونو سټ دے چې د A او B دواړو غړي وي.

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

دوه ستونه هله بېل بللے شي چې تقاطع ئې تشه وي. مطلب دا چې هېڅ گډ غړي نه لري.

بېلگه 1.22. که دوه ستونه هېڅ گډ غړي ونه لري، تقاطع ئې تشه ده: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$.
که دوه ستونه گډ غړي ولري، تقاطع ئې د هغو ټولو سټ دے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$.
د يو سټ او د هغه د يو فرعي سټ تقاطع هم هغه کوچنۍ سټ دے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$.
له تش سټ سره د هر سټ تقاطع تشه ده: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$.



شکل 1.2: د دوو سټونو تقاطع $A \cap B$ د هغو د کډو غرو سټ دے۔

تمرین 1.23. په دقیقه توګه ثابت کړئ چې که $A \subseteq B$ وي، نو $A \cap B = A$ ۔

له دوو څخه د زیاتو سټونو اتحاد یا تقاطع هم جوړول شوی۔ په عمومي توګه د دې د بیانولو یوه ښکلې طریقه دا ده: فرض کړئ چې ټول هغه سټونه چې اتحاد (یا تقاطع) یې جوړول غواړئ، په یو سټ کېنې راټول کړئ۔ بیا د ټولو اصلي سټونو اتحاد د هغو ټولو څیزونو د سټ په توګه تعریفول شو چې لږ تر لږه د دې سټ د یو غړي غړي وي، او تقاطع د هغو ټولو څیزونو د سټ په توګه چې د دې سټ د هر غړي غړي وي۔

تعریف 1.24. که A د سټونو یو سټ وي، نو $\bigcup A$ د A د غرو د غرو سټ دے:

$$\begin{aligned}\bigcup A &= \{x : x \text{ د دې سټ د یو غړي غړی دے} : x \in A\} \\ &= \{x : x \text{ شته چې } B \in A \text{ داسې یو } x \in B\}\end{aligned}$$

تعریف 1.25. که A د سټونو یو سټ وي، نو $\bigcap A$ د هغو څیزونو سټ دے چې د A ټول عناصر یې په کې لري:

$$\begin{aligned}\bigcap A &= \{x : x \text{ د دې سټ د هر غړي غړی دے} : x \in A\} \\ &= \{x : B \in A, x \in B\}\end{aligned}$$

بېلګه 1.26. فرض کړئ چې $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$ بیا $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ او $\bigcap A = \{a\}$ ۔


تمرین 1.27. وښايئ چې که A یو سټ وي او $A \in B$ وي، نو $A \subseteq \bigcup B$ ۔

د سټونو د یوې لړۍ $A_1, A_2, \dots$ دپاره هم دا کار کول شو:

$$\begin{aligned}\bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ د دې سټونو څخه د یوه غړی دے} : x \in A_i\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ د دې هر سټ غړی دے} : x \in A_i\}.\end{aligned}$$

چې کله د سټونو یو انډکس ولرو، یعنې داسې یو سټ I چې د هر $i \in I$ دپاره A_i په پام کېنې نيسو، دا لنډې ښي هم کارول شو:

$$\begin{aligned}\bigcup_{i \in I} A_i &= \bigcup \{A_i : i \in I\} \\ \bigcap_{i \in I} A_i &= \bigcap \{A_i : i \in I\}\end{aligned}$$



شکل 1.3: د دوو ستونو تفاضل $A \setminus B$ د A د هغو غړو سټ دے چې د B غړي نه وي.

په پای کښې، کېدے شي د A د هغو ټولو غړو سټ په پام کښې نیول وغواړو چې په B کښې نه وي. دا لکه په 1.3 کښې انځورولے شو.

تعریف 1.28 (تفاضل). د ستونو تفاضل $A \setminus B$ د A د هغو ټولو غړو سټ دے چې د B غړي نه وي، یعنې،

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ او } x \notin B\}.$$

تمرین 1.29. ثابت کړئ چې که $A \subsetneq B$ وي، نو $B \setminus A \neq \emptyset$.

1.5 جوړې، څوگونې او کارټیزي حاصل ضربونه

د غړو له مخې له برابری نه دا نتیجه راوځي چې د ستونو عناصر ترتیب نه لري. نو که د ترتیب استازیتوب کول غواړو، مرتبې جوړې $\langle x, y \rangle$ کاروو. په یوه نامرتبه جوړه $\{x, y\}$ کښې ترتیب مهم نه دے: $\{x, y\} = \{y, x\}$. په مرتبه جوړه کښې ترتیب مهم دے: که $x \neq y$ وي، نو $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

د ستونو په نظریه کښې مرتبې جوړې څنګه په پام کښې ونیسو؟ بنیادي خبره دا ده چې دا نظر وساتو: مرتبې جوړې هله او یوازې هله برابري وي چې لومړۍ عنصر یې هم یو وي او دویم عنصر یې هم یو وي، یعنې:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ هله او یوازې هله چې دواړه } a = c \text{ او } b = d.$$

د وینر-کوراتوسکي تعریف په کارولو سره د ستونو په نظریه کښې مرتبې جوړې تعریفولے شو.

تعریف 1.30 (مرتبه جوړه). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

تمرین 1.31. د 1.30 په کارولو سره ثابت کړئ چې $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ هله او یوازې هله وي چې $a = c$ او $b = d$ دواړه وي.

چې د مرتبې جوړې تعریف مو وټاکلو، د نورو ستونو د تعریف دپاره یې کارولے شو. د بېلګې په توګه، کله کله له دوو څخه د زیاتو څیزونو مرتبې لړۍ هم غواړو، لکه درې ګونې $\langle x, y, z, u \rangle$ ، څلورګونې $\langle x, y, z, u \rangle$ ، او داسې نورې. درې ګونې د ځانګړو مرتبو جوړو په توګه ګڼلے شو، چې لومړۍ عنصر یې پخپله یوه مرتبه جوړه وي: $\langle x, y, z \rangle$ هم $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ دے. د څلورګونو دپاره هم همداسې ده: $\langle x, y, z, u \rangle$ هم $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ دے، او داسې نور. په عمومي توګه، د مرتبو n -ګونو $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ خبره کوو.

د مرتبو جوړو، یا د نورو مرتبو n -ګونو، ځینې ستونه به ګټور وي.

تعريف 1.32 (کارتيزي حاصل ضرب). د ورکړل شوو ستونو A او B کارتيزي حاصل ضرب $A \times B$ داسې تعريفېږي:

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle : x \in A \text{ او } y \in B \}.$$

بېلگه 1.33. که $A = \{0, 1\}$ او $B = \{1, a, b\}$ وي، نو حاصل ضرب ئې دا ده:

$$A \times B = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle \}.$$

بېلگه 1.34. که A يو ست وي، له خپل ځان سره د A حاصل ضرب، $A \times A$ ، د A^2 په بڼه هم ليکل کېږي. دا د هغو ټولو جوړو $\langle x, y \rangle$ ست ده چې $x, y \in A$ وي. د ټولو درې کونو $\langle x, y, z \rangle$ ست A^3 ده، او داسې نور. يو بازگشتي تعريف ورکول شو:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

تمرين 1.35. د $\{1, 2, 3\}^3$ ټول غړي وليکئ.

قضيه 1.36. که A د n په شمېر غړي او B د m په شمېر غړي ولري، نو $A \times B$ د $n \cdot m$ په شمېر عناصر لري.

ثبوت. په A کېنې د هر غړي x دپاره، د $\langle x, y \rangle \in A \times B$ په بڼه د m په شمېر غړي شته. فرض کړئ چې $B_x = \{ \langle x, y \rangle : y \in B \}$. څرنګه چې هر کله $x_1 \neq x_2$ وي، $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ وي، نو $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$ خو که $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ وي، نو $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ او ځکه د $n \cdot m$ په شمېر غړي لري. د دې د انځورولو دپاره، د $A \times B$ غړي په يوه جالۍ کېنې ترتيب کړئ:

$$\begin{aligned} B_{x_1} &= \{ \langle x_1, y_1 \rangle \quad \langle x_1, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_1, y_m \rangle \} \\ B_{x_2} &= \{ \langle x_2, y_1 \rangle \quad \langle x_2, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_2, y_m \rangle \} \\ &\vdots \\ B_{x_n} &= \{ \langle x_n, y_1 \rangle \quad \langle x_n, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_n, y_m \rangle \} \end{aligned}$$

څرنګه چې ټول x_i يو له بله بېل دي، او ټول y_j يو له بله بېل دي، په دې جالۍ کېنې هېڅ دوه جوړې يو شان نه دي، او شمېر ئې $n \cdot m$ ده. □

تمرين 1.37. په k د استقرا په وسيله وښايئ چې د هر $k \geq 1$ دپاره، که A د n په شمېر غړي ولري، نو A^k د n^k په شمېر غړي لري.

بېلگه 1.38. که A يو ست وي، په A يوه کلمه د A د غړو هره لړۍ ده. يوه لړۍ د A د غړو د يوې n -گونې په توګه ګڼل کېده شي. د بېلګې په توګه، که $A = \{a, b, c\}$ وي، نو لړۍ "bac" د درې ګونې $\langle b, a, c \rangle$ په توګه ګڼل کېده شي. کلمې، يعنې د لنډو لړۍ، په کمپيوټر ساينس کېنې بنيادي اهميت لري. د منل شوي دود له مخې، د A غړي د 1 اوږدوالي لرونکې لري ګڼو، او 0 د 0 اوږدوالي لرونکې لري ګڼو. بيا په A د ټولو کلمو ست دا ده:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

1.6 د رسل پارادوکس

د غړو له مخې برابري د هغو x کانو د هم هغه سټ دپاره د $\{x : \varphi(x)\}$ ښې د کارولو جواز راکوي چې $\varphi(x)$ وي. خو د غړو له مخې برابري په اصل کې یوازې د دې خبرې جواز راکوي: که داسې یو سټ وي چې غړي یې ټول او یوازې هغه څېرونه وي چې φ وي، نو داسې سټ یوازې یو وي. په بل عبارت: د یو φ له ټاکلو وروسته، سټ $\{x : \varphi(x)\}$ یوازینې دے، که موجود وي.

خو دا شرط مهم دے! بنیادي خبره دا ده چې له هر خاصیت څخه د سټ جوړول ممکن نه دي. یعنې ځینې خاصیتونه ستونه نه تعریفوي. که ټولو تعریفول، نو له ښکاره تناقضونو سره به مخ شوو. د دې تر ټولو مشهوره بېلګه د رسل پارادوکس دے.

ستونه د نورو ستونو غړي کېدے شي؛ د بېلګې په توګه، د یو سټ A د فرعي ستونو سټ له ستونو جوړ وي. نو دا پوښتل یا څېړل معقول دي چې یو سټ د بل سټ غړې دے که نه. آیا یو سټ د خپل ځان غړې کېدے شي؟ د سټ په تصور کېنې ظاهراً هېڅ داسې خبره نشته چې دا ناممکنه کړي. د بېلګې په توګه، که ټول ستونه د څیزونو یوه ټولګه جوړوي، یو څوک ښايي فکر وکړي چې دا ټول په یو سټ کېنې راټولېدے شي، یعنې د ټولو ستونو په سټ کېنې. او دا چې پخپله یو سټ دے، نو د ټولو ستونو د سټ غړې به وي.

د رسل پارادوکس هغه وخت راولاړېږي چې دا خاصیت په پام کېنې ونیسو چې یو سټ خپل ځان د غړې په توګه ونه لري، یعنې د خپل ځان غړې نه وي. که فرض کړو چې د ټولو هغو ستونو یو سټ شته چې خپل ځان د غړې په توګه نه لري، نو څه به وشي؟ آیا

$$R = \{x : x \notin x\}$$

شته؟ څرګندېږي چې ثابتولے شو دا نشته.

قضیه 1.39 (د رسل پارادوکس). د $R = \{x : x \notin x\}$ په بڼه هېڅ سټ نشته.

ثبوت. که $R = \{x : x \notin x\}$ موجود وي، نو $R \in R$ هله او یوازې هله وي چې $R \notin R$ وي، او دا یو تناقض دے. □

راځئ دا ثبوت لږ ورو وګورو. که R موجود وي، دا پوښتنه معقوله ده چې $R \in R$ دے که نه. فرض کړئ چې په رښتیا $R \in R$ اوس، R د هغو ټولو ستونو د سټ په توګه تعریف شوے ؤ چې د خپلو ځانونو غړي نه دي. نو که $R \in R$ وي، بیا R پخپله د R تعریفونکې خاصیت نه لري. خو یوازې هغه ستونه په R کېنې دي چې دا خاصیت لري؛ ځکه R د R غړې نه شي کېدے، یعنې $R \notin R$. خو R په یو وخت د R غړې هم نه شي کېدے او ناغړې هم، نو له تناقض سره مخ یو.

څرګه چې د $R \in R$ فرض تناقض ته رسوي، نو $R \notin R$ لرو. خو دا هم تناقض ته رسوي! ځکه که $R \notin R$ وي، نو R پخپله د R تعریفونکې خاصیت لري، او ځکه R به د هغو ټولو نورو ستونو په شان د R غړې وي چې د خپل ځان غړي نه دي. او بیا هم، په یو وخت د R ناغړې او غړې دواړه نه شي کېدے.

د ستونو داسې نظریه څنګه جوړه کړو چې د رسل له پارادوکس څخه ځان وساتي، یعنې له دې متناقضې دعویٰ څخه ځان وساتي چې $R = \{x : x \notin x\}$ موجود دے؟ د دې دپاره داسې بدیهي اصولونه ټاکل پکار دي چې دا بیان کړي چې ستونه کله موجود وي (او کله نه وي)، او ډېر دقیق شرطونه ورکړي.

د ستونو هغه نظریه چې په دې باب کېنې په لنډه توګه بیان شوې، دا کار نه کوي. دا په رښتیا ساده نظریه ده. دا یوازې درته وائي چې ستونه د غړو له مخې د برابري پابند دي، او که ځینې ستونه ولری، د هغو اتحاد، تقاطع او داسې نور جوړولے شي. د ستونو نظریه له دې نه په زیات دقت هم جوړېدل ممکن دي.

باب 2

اړیکې

2.1 اړیکې د ستونو په توګه

په 1.3 کېنې مو د ځینو مهمو ستونو یادونه کړې وه: $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}$. بې شکې به تاسو ته د دې ستونو د ځینو د غړو ترمنځ په زړه پورې اړیکې یادې وي. د بېلګې په توګه، په دې هر سټ باندې یوه پوره معیاري ترتیبي اړیکه شته. د هماغه شته کېدو اړیکه هم شته چې هر څیز ئې له خپل ځان سره لري او له بل هېڅ څیز سره ئې نه لري. مونږ به له ډېرو نورو په زړه پورو اړیکو سره هم مخامخ شو، او ممکنې اړیکې تر دې هم ډېرې دي. خو تر کتنې وړاندې به په دې خبره پیل وکړو چې اړیکې د سټ یو خاص ډول ګڼلې شو.

د دې دپاره له 1.5 څخه دوه خبرې راپادې کړئ. لومړۍ، د مرتبې جوړې مفهوم: که a او b راکړل شي، نو $\langle a, b \rangle$ جوړولې شو. دلته د غړو ترتیب خالص اهمیت لري. نو که $a \neq b$ وي، $\langle a, b \rangle \neq \langle b, a \rangle$. (دا له نامرتبو جوړو، یعنې له 2-غړیزو ستونو، سره پرتله کړئ؛ هلته $\{a, b\} = \{b, a\}$) دویم، د کارټیزي حاصل ضرب مفهوم راپاد کړئ: که A او B ستونه وي، نو $A \times B$ جوړولې شو. دا د ټولو هغو جوړو $\langle x, y \rangle$ سټ دے چې $x \in A$ او $y \in B$ وي. په تېره بیا، $A^2 = A \times A$ د A د ټولو مرتبو جوړو سټ دے. اوس به په یو سټ باندې یوه خاصه اړیکه وګورو: د طبیعي عددونو په سټ $\mathbb{N}$ باندې د $<$ اړیکه. د عددونو د ټولو هغو جوړو $\langle n, m \rangle$ سټ په پام کېنې ونیسئ چې $n < m$ وي، یعنې:

$$R = \{ \langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m \}.$$

د n له m څخه د کوچني کېدو او په R کېنې د جوړې $\langle n, m \rangle$ د غړي کېدو ترمنځ نژدې تړاو شته، یعنې:

$$\langle n, m \rangle \in R \text{ هله او یوازې هله چې } n < m.$$

په رښتیا، د معلوماتو له هېڅ ضایع کېدو پرته، سټ R په $\mathbb{N}$ باندې د $<$ اړیکه ګڼلې شو.

په همدې طریقه، د عددونو ترمنځ د هرې اړیکې دپاره د $\mathbb{N}^2$ یو فرعي سټ جوړولې شو. برعکس، که د عددونو د جوړو هر سټ $S \subseteq \mathbb{N}^2$ راکړل شي، نو د عددونو ترمنځ ورسره سمه یوه اړیکه شته: n له m سره دا اړیکه هله او یوازې هله لري چې $\langle n, m \rangle \in S$ وي. دا خبره لاندې تعریف ته جواز ورکوي:

تعریف 2.1 (دوه ځاییزه اړیکه). په سټ A باندې یوه دوه ځاییزه اړیکه د A^2 یو فرعي سټ دے. که $R \subseteq A^2$ په A باندې یوه دوه ځاییزه اړیکه وي او $x, y \in A$ وي، نو کله کله د $\langle x, y \rangle \in R$ پر ځای Rxy (یا xRy) لیکو.

بېلګه 2.2. د طبیعي عددونو د جوړو سټ $\mathbb{N}^2$ په یوه دوه بعدي جدول کېنې داسې لیکلې شو:

$$\begin{array}{ccccccc} \langle 0, 0 \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 1, 0 \rangle & \langle 1, 1 \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \langle 1, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 2, 0 \rangle & \langle 2, 1 \rangle & \langle 2, 2 \rangle & \langle 2, 3 \rangle & \dots & & \\ \langle 3, 0 \rangle & \langle 3, 1 \rangle & \langle 3, 2 \rangle & \langle 3, 3 \rangle & \dots & & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \end{array}$$

دلته مو قطر په پنډ لیک بنودله، ځکه د $\mathbb{N}^2$ هغه فرعي سټ چې پر قطر پرتې جوړې لري، یعنې:

$$\{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots\},$$

په $\mathbb{N}$ باندې د عینیت اړیکه ده. (د عینیت اړیکه ډېره کارېږي؛ راځئ د هر سټ A دپاره $\text{Id}_A = \{\langle x, x \rangle : x \in A\}$ تعریف کړو.) د قطر له پاسه د ټولو پرتو جوړو فرعي سټ، یعنې:

$$L = \{\langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \dots, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \dots, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \dots\},$$

د کوچني کېدو اړیکه ده؛ یعنې Lnm هله او یوازې هله چې $n < m$ وي. د قطر لاندې د پرتو جوړو فرعي سټ، یعنې:

$$G = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \dots\},$$

د لوییدو اړیکه ده؛ یعنې Gnm هله او یوازې هله چې $n > m$ وي. د L او I اتحاد، چې $K = L \cup I$ ئې بللې شو، د کوچني یا برابر کېدو اړیکه ده: Knm هله او یوازې هله چې $n \leq m$ وي. همدارنګه، $H = G \cup I$ د لوي یا برابر کېدو اړیکه ده. دا اړیکې، L ، G ، K او H ، د اړیکو خاص ډولونه دي چې ترتیبونه بللې شي. L او G دا خاصیت لري چې هېڅ عدد له خپل ځان سره L یا G اړیکه نه لري (یعنې، د هر n دپاره، نه Lnn شته او نه Gnn). د دې خاصیت لرونکې اړیکې نفي انعکاسي بللې شي، او که ترتیبونه هم وي، نو سخت ترتیبونه بللې شي.

که څه هم ترتیبونه او عینیت مهمې او طبیعي اړیکې دي، باید ټینګار وشي چې زموږ د تعریف له مخې د A^2 هر فرعي سټ په A باندې یوه اړیکه ده، که هر څومره غیرطبیعي یا په تکلف جوړه شوې ښکاري. په تېره بیا، $\emptyset$ په هر سټ باندې یوه اړیکه ده (تښه اړیکه، چې د غرو هېڅ جوړه ئې نه لري). پخپله A^2 هم په A باندې یوه اړیکه ده (چې هره جوړه ئې لري)، او ټولشموله اړیکه بللې شي. خو د دې په شان یو څیز هم اړیکه شمېرلې شي: $E = \{\langle n, m \rangle : n > 5 \text{ یا } n \times m \geq 34\}$.

تمرین 2.3. په سټ $\wp(\{a, b, c\})$ باندې د $\subseteq$ اړیکې غړي په لړ کېږي ولیکئ.

2.2 فلسفي غور

په 2.1 کېږي مو اړیکې د خاصو ستونو په توګه تعریف کړې. لږ تم کېږو او یوه لنډه فلسفي پوښتنه کوو: داسې تعریف څه کوي؟ دا ډېره د شک خبره ده چې موږ دې ووايو چې د ماوراءالطبیعي عینیت څینې حقیقتونه مو کشف کړي دي؛ مثلاً، دا چې په $\mathbb{N}$ باندې ترتیبي اړیکه په اصل کېږي هغه سټ $R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}$ وختله چې په 2.1 کېږي مو تعریف کړې و. د دې خبرې درې وجې دا دي.

لومړۍ: په 1.30 کېږي مو $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ تعریف کړې و. د دې پر ځای دا تعریف وګورئ: $\langle b, a \rangle = \{\{b\}, \{a, b\}\} = \|a, b\|$. کله چې $a \neq b$ وي، نو $\langle a, b \rangle \neq \|a, b\|$. خو د $\langle a, b \rangle$ پر ځای مو همداسې $\|a, b\|$ هم د مرتبې جوړې تعریف کولې شو. دواړو تعریفونو به یو شان ښه کار کړې و. نو اوس د طبیعي عددونو ترتیبي اړیکه “کېدو” ته دوه یو شان ښه نوماندان لرو:

$$R = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}$$

$$S = \{\|n, m\| : n, m \in \mathbb{N} \text{ او } n < m\}.$$

ځکه چې د غرو له مخې د برابری د اصل له مخې $R \neq S$ دي، ښکاره ده چې دواړه په $\mathbb{N}$ باندې له ترتیبي اړیکې سره عینیت نه شي لرل. خو دا به محض خپله خوښه، او له دې امله یو څه د شرم خبره وي، چې ادعا وکړو چې په واقعیت کېږي R ، د S پر ځای (یا برعکس)، ترتیبي اړیکه ده. (دا د ستونو ته د راکوڼي د نظر خلاف د هغه دلیل یوه ډېره ساده بېلګه ده چې بناسراف په 1965 کېږي مشهور کړې و. موږ به څو ځله بیا دې ته راکړځو.)

دویمه: که فکر کوو چې هره اړیکه باید له یو سټ سره عینیت ولري، نو پخپله د سټ د غړیتوب اړیکه، $\in$ ، هم باید یو خاص سټ وي. په رښتیا، هغه به خاځا سټ $\{\langle x, y \rangle : x \in y\}$ وي. خو آیا دا سټ شته؟ د رسل پاراډوکس ته په کتو، د داسې سټ د موجودیت

ادعا ساده خبره نه ده. په حقیقت کې، د ستونو نظریه په یوه دقیقه طریقه، د بدیهي اصولو د یوې نظریې په توګه، جوړول ممکن دي، او هغه نظریه به په رښتیا د دې سټ موجودیت رد کړي. نو که ځینې اړیکې د ستونو په توګه هم ګڼلې شو، د سټ د غړیتوب اړیکه به یوه خاصه پېښه وي.

درېمه: که چې اړیکې له ستونو سره “یوې” کڼو، ومو وئیل چې ځان ته به د $\langle x, y \rangle \in R$ پر ځای د Rxy لیکلو اجازه ورکړو. دا سمه ده، په دې شرط چې د غړیتوب اړیکه، “ $\in$ ”، د یو پریدیکات په توګه وکارول شي. خو که فکر کوو چې “ $\in$ ” د سټ د یو خاص ډول نښه ده، نو عبارت “ $\langle x, y \rangle \in R$ ” یوازې له دریو مفردو اصطلاحاتو جوړ دے چې ستونه ښیي: “ $\langle x, y \rangle$ ”، “ $\in$ ” او “ R ”. د نومونو دا ډول لږ، لکه ېې معنا توریز تسلسل “پاله قلمدان مېز”، د یو بیان د څرګندولو وس نه لري. نو بیا هم، که ځینې اړیکې د ستونو په توګه ګڼلې شو، د سټ د غړیتوب اړیکه باید یوه خاصه پېښه وي. (په دې کې چې د فرېکه د آس د مفهوم د پاراډوکس یوه ساده بڼه او هغه مشهور اعتراض سره یوځای شوي چې وېټکنشټاین یو وخت پر رسل کړے و.)

نو دې خبرې مونږ کوم ځای ته ورسولو؟ دا وئیل چې په عددونو باندې اړیکې ستونه دي، هېڅ غلط نه دي. یوازې باید په هغې موخې پوه شو چې دا خبره ورسره کوو. مونږ د ماوراءالطبیعی عینیت یو حقیقت نه بیانوو. یوازې دا یادونه کوو چې په ځینو سیاقونو کې (ځینې) اړیکې خاص ستونه ګڼلې شو (او کڼو به ئې).

2.3 د اړیکو خاص خاصیتونه

د اړیکو ځینې ډولونه دومره عام دي چې خاص نومونه ورکړل شوي دي. د بېلګې په توګه، $\leq$ او $\subseteq$ دواړه په خپلو خپلو ساحو کېښي (مثلاً، د $\leq$ دپاره په $\mathbb{N}$ او د $\subseteq$ دپاره په $\wp(A)$ کېښي) په یو شان طریقو اړیکه جوړوي. د دې اړیکو د ورته والي او توپیر د دقیق معلومولو دپاره، د هغو خاصو خاصیتونو له مخې ئې وېشو چې اړیکې ئې لرلې شي. څرګندېږي چې د دې ځینو خاصو خاصیتونو (ترکیبونو) په تېره بیا مهم دي: ترتیبونه او د هم ارزښتی اړیکې.

تعریف 2.4 (انعکاس). اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله انعکاسي ده چې د هر $x \in A$ دپاره Rxx وي.

تعریف 2.5 (انتقال). اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله انتقالي ده چې که هم Rxy او Ryz وي، نو Rxz هم وي.

تعریف 2.6 (تناظر). اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله متناظره ده چې که هم Rxy وي، نو Ryx هم وي.

تعریف 2.7 (ضد تناظر). اړیکه $R \subseteq A^2$ هله او یوازې هله ضد متناظره ده چې که هم Rxy او Ryx دواړه وي، نو $x = y$ وي (په نورو ټکو: که $x \neq y$ وي، نو یا $\neg Rxy$ وي او یا $\neg Ryx$).

په متناظره اړیکه کېښي Rxy او Ryx تل یوځای وي، یا یو هم نه وي. په ضد متناظره اړیکه کېښي Rxy او Ryx یوازې هله یوځای کېدلې شي چې $x = y$ وي. پام وکړئ چې دا خبره د $x = y$ په وخت د Rxy او Ryx موجودیت نه لازمي، یوازې دا چې مخه ئې نه نیول کېږي. نو ضد متناظره اړیکه انعکاسي کېدلې شي، خو هره ضد متناظره اړیکه انعکاسي نه وي. دا هم په پام کېښي وساتئ چې ضد متناظره کېدل او محض متناظره نه کېدل بېل شرطونه دي. په رښتیا، یوه اړیکه په یوه وخت متناظره او ضد متناظره دواړه کېدلې شي (مثلاً، د عینیت اړیکه داسې ده).

تعریف 2.8 (ترتلیا). اړیکه $R \subseteq A^2$ ترې ده که د ټولو $x, y \in A$ دپاره، که $x \neq y$ وي، نو یا Rxy وي او یا Ryx .

تمرین 2.9. د داسې اړیکو بېلګې ورکړئ چې (الف) انعکاسي او متناظرې وي، خو انتقالي نه وي؛ (ب) انعکاسي او ضد متناظرې وي؛ (ج) ضد متناظرې او انتقالي وي، خو انعکاسي نه وي؛ او (د) انعکاسي، متناظرې او انتقالي وي. پر عددونو یا ستونو باندې اړیکې مه کاروئ.

تعریف 2.10 (د انعکاس نفی). اړیکه $R \subseteq A^2$ نفی انعکاسي بللې شي که د هر $x \in A$ دپاره Rxx نه وي.

تعریف 2.11 (نامتناظریتا). اړیکه $R \subseteq A^2$ نامتناظره بللې شي که د هېڅ جوړې $x, y \in A$ دپاره Rxy او Ryx دواړه ونه لرو.

پام وکړئ: که $A \neq \emptyset$ وي، نو په A باندې هېڅ نفی انعکاسي اړیکه انعکاسي نه ده، او په A باندې هره نامتناظره اړیکه ضد متناظره هم ده. خو داسې $R \subseteq A^2$ شته چې نه انعکاسي دي او نه نفی انعکاسي، او داسې ضد متناظرې اړیکې شته چې نامتناظرې نه دي.

2.4 د هم ارزښتی اړیکې

په یوه سټ باندې د عینیت اړیکه انعکاسي، متناظره او انتقالي ده. هغه اړیکې R چې دا درې واړه خاصیتونه لري، ډېرې عامې دي.

تعریف 2.12 (د هم ارزښتی اړیکه). هغه اړیکه $R \subseteq A^2$ چې انعکاسي، متناظره او انتقالي وي، د هم ارزښتی اړیکه بللې شي. د A غړي، x او y ، د R له مخې هم ارزښته بللې شي که Rxy وي.

د هم ارزښتی اړیکې د هم ارزښتی د ټولګي مفهوم راپیدا کوي. د هم ارزښتی یوه اړیکه ساحه په بېلو برخو “ټوټه کوي” — په هره برخه کې ټول څیزونه یو له بل سره اړیکه لري؛ او د بېلو برخو څیزونه یو له بل سره اړیکه نه لري. کله کله د همدې برخو په اړه نڅ په نڅه خبرې کول ګټور وي. د دې دپاره یو تعریف راوړو:

تعریف 2.13. فرض کړئ $R \subseteq A^2$ د هم ارزښتی اړیکه ده. د هر $x \in A$ دپاره، په A کې x د هم ارزښتی ټولګې دا سټ دے: $[x]_R = \{y \in A : Rxy\}$. د R له مخې د A خارج قسمت دا دے: $A/R = \{[x]_R : x \in A\}$ ، یعنې د هم ارزښتی د دې ټولګیو سټ.

راتلونکې نتیجه د هم ارزښتی د ټولګي د تعریف سموالی ښیي: ثابتوي چې د هم ارزښتی ټولګي په رښتیا د A وېشونکې برخې دي.

قضیه 2.14. که $R \subseteq A^2$ د هم ارزښتی اړیکه وي، نو Rxy هله او یوازې هله چې $[x]_R = [y]_R$ وي.

ثبوت. د کینې خوا نه ښی. خوا ته د لوري دپاره، فرض کړئ Rxy او $z \in [x]_R$ وي. نو د تعریف له مخې Rxz . ځکه چې R د هم ارزښتی اړیکه ده، Ryz (په تفصیل سره: له Rxy او د R له تناظر څخه Ryx لرو، او له Rxz او د R له انتقالي والي څخه Ryz لرو). نو $z \in [y]_R$ — په عمومي توګه، $[x]_R \subseteq [y]_R$ — خو بالکل په همدې ډول، $[y]_R \subseteq [x]_R$ — نو د غړو له مخې د برابری د اصل له مخې، $[x]_R = [y]_R$.

د ښی خوا نه کینې خوا ته د لوري دپاره، فرض کړئ $[x]_R = [y]_R$. ځکه چې R انعکاسي ده، Ryy ، نو $y \in [y]_R$ — له دې فرضيې څخه چې $[x]_R = [y]_R$ ، دا هم لرو چې $y \in [x]_R$ — نو Rxy . $\square$

بېلګه 2.15. د هم ارزښتی د اړیکو یوه ښه بېلګه د باقي له حساب په رښتیا ده. د هر a, b او $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، وایو چې $a \equiv_n b$ هله او یوازې هله چې د a په n وېش باقي د b په n وېش له باقي سره یو شان وي. (په یو څه زیاته نښیزه ژبه: $a \equiv_n b$ هله او یوازې هله چې د کوم $k \in \mathbb{Z}$ دپاره $a - b = kn$ وي.) اوس د هر n دپاره $\equiv_n$ د هم ارزښتی اړیکه ده. او د $\equiv_n$ له مخې جوړ شوي د هم ارزښتی ټولګي په شمېر پوره n بېل ټولګي دي، یعنې $\mathbb{N}/\equiv_n$ په شمېر n غړي لري. دا ټولګي دي: د هغو عددونو سټ چې n له باقي پر n وېش کېږي، یعنې $[0]_{\equiv_n}$ ؛ د هغو عددونو سټ چې پر n د وېش باقي 1 وي، یعنې $[1]_{\equiv_n}$ ؛ ... او د هغو عددونو سټ چې پر n د وېش باقي $n-1$ وي، یعنې $[n-1]_{\equiv_n}$.

تمرین 2.16. وښیئ چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\equiv_n$ د هم ارزښتی اړیکه ده، او $\mathbb{N}/\equiv_n$ په شمېر پوره n غړي لري.

2.5 ترتیبونه

په ډېرو پرتلو کېنې ځینې څیزونه، له یوه پلوه، تر نورو “کوچني”، ورسره “برابر” یا ترې “لوي” بولو. په دې کېنې د ترتیب اړیکې شاملې دي. خو د ترتیبې اړیکو بېل ډولونه شته. مثلاً، ځینې لازمي چې هر دوه څیزونه د پرتلې وړ وي، خو نورې داسې نه دي. ځینې عینیت هم رانغاړي (لکه $\leq$)، او ځینې ئې باسي (لکه $<$). دلته د ډولونو وېش لرل راسره مرسته کوي.

تعریف 2.17 (مقدماتي ترتیب). هغه اړیکه چې انعکاسي او انتقالي دواړه وي، مقدماتي ترتیب بللې شي.

تعریف 2.18 (جزوي ترتیب). هغه مقدماتي ترتیب چې ضد متناظر هم وي، جزوي ترتیب بللې شي.

تعریف 2.19 (خطي ترتیب). هغه جزوي ترتیب چې ترله هم وي، کلي ترتیب يا خطي ترتیب بللے شي.

بېلگه 2.20. هر خطي ترتیب جزوي ترتیب هم ده، او هر جزوي ترتیب مقدماتي ترتیب هم ده؛ خو برعکس خبرې سمې نه دي. په A باندې ټولشموله اړیکه مقدماتي ترتیب ده، ځکه انعکاسي او انتقالي ده. خو که A له يوه غړي څخه زیات ولري، نو ټولشموله اړیکه ضد متناظره نه ده، او له دې امله جزوي ترتیب هم نه ده.

بېلگه 2.21. په $\mathbb{B}^*$ باندې د تر بل نه اوږدېدو اړیکه $\preceq$ وگورئ: $x \preceq y$ هله او يوازې هله چې $\text{len}(x) \leq \text{len}(y)$ وي. دا مقدماتي ترتیب ده (انعکاسي او انتقالي ده)، او ترله هم ده؛ خو جزوي ترتیب نه ده، ځکه ضد متناظره نه ده. مثلاً، $01 \preceq 10$ خو $10 \not\preceq 01$.

بېلگه 2.22. د ستونو په يوه سټ باندې د $\subseteq$ اړیکه يو مهم جزوي ترتیب ده. دا په عمومي توگه خطي ترتیب نه ده، ځکه که $a \neq b$ وي او $\wp(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ وگورو، نو وينو چې $\{a\} \not\subseteq \{b\}$ ، $\{a\} \neq \{b\}$ او $\{a\} \not\subseteq \{a\}$ ځکه $a \neq b$.

بېلگه 2.23. د بې له باقي وېشل کېدو اړیکه داسې جزوي ترتیب را کوي چې خطي ترتیب نه ده. د صحيح عددونو n او m دپاره، $n \mid m$ په دې معنا لیکو چې m, n (بې له باقي) وېشي، يعنې هله او يوازې هله چې داسې صحيح عدد k شته چې $m = kn$ وي. په $\mathbb{N}$ باندې دا جزوي ترتیب ده، خو خطي ترتیب نه ده: مثلاً، $3 \nmid 2$ او $2 \nmid 3$ هم. که وېشمنتيا په $\mathbb{Z}$ باندې اړیکه وکنو، يوازې مقدماتي ترتیب ده، ځکه ضد متناظره نه ده: $-1 \mid 1$ او $1 \mid -1$ ، خو $-1 \neq 1$.

بېلگه 2.24. د لړيو په سټ A^* باندې د غځونې اړیکه دا ده: $s \sqsubseteq s'$ هله او يوازې هله چې $s = \Lambda$ (تښه لړۍ) وي، $s = s'$ وي، يا $s = \langle s_1, \dots, s_n \rangle$ او $s' = \langle s_1, \dots, s_n, s_{n+1}, \dots, s_m \rangle$ وي. که $s \sqsubseteq s'$ وي، دا هم وايو چې s د s' پيلنۍ برخه ده. په A^* باندې د غځونې اړیکه جزوي ترتیب ده، خو خطي ترتیب نه ده؛ مثلاً، که $a \neq b$ وي، نو $ab \not\sqsubseteq ba$ او $ba \not\sqsubseteq ab$.

تعریف 2.25 (سخت ترتیب). سخت ترتیب هغه اړیکه ده چې نفي انعکاسي، نامتناظره او انتقالي وي.

تعریف 2.26 (سخت خطي ترتیب). هغه سخت ترتیب چې ترله هم وي، سخت کلي ترتیب يا سخت خطي ترتیب بللے شي.

بېلگه 2.27. $\leq$ هغه خطي ترتیب ده چې له سخت خطي ترتیب $<$ سره سمون خوري. $\subseteq$ هغه جزوي ترتیب ده چې له سخت ترتیب $\subset$ سره سمون خوري.

په A باندې هر سخت ترتیب R د قطر Id_A په ورزياتولو، يعنې د ټولو جوړو $\langle x, x \rangle$ په ورزياتولو، جزوي ترتیب گرځولے شو. (دې ته د R انعکاسي بندښت وايي.) برعکس، له جزوي ترتيبه په پيل کولو، د Id_A په لرې کولو سخت ترتیب ترلاسه کولے شو. لاندې دوه نتيجه دا خبره دقيقه کوي.

قضيه 2.28. که R په A باندې سخت ترتیب وي، نو $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ جزوي ترتیب ده. سرېره پر دې، که R سخت خطي ترتیب وي، نو R^+ خطي ترتیب ده.

ثبوت. فرض کړئ R سخت ترتیب ده، يعنې $R \subseteq A^2$ او R نفي انعکاسي، نامتناظر او انتقالي ده. $R^+ = R \cup \text{Id}_A$ کېږدئ. بايد وښيو چې R^+ انعکاسي، ضد متناظر او انتقالي ده.

ښکاره ده چې R^+ انعکاسي ده، ځکه د هر $x \in A$ دپاره $\langle x, x \rangle \in \text{Id}_A \subseteq R^+$.

د دې د ښودلو دپاره چې R^+ ضد متناظر ده، د تناقض له لارې د ثبوت دپاره فرض کړئ R^+xy او R^+yx ، خو $x \neq y$. ځکه چې $\langle x, y \rangle \in R \cup \text{Id}_A$ ، خو $\langle x, y \rangle \notin \text{Id}_A$ ، نو ځانګړي $\langle x, y \rangle \in R$ لرو، يعنې Rxy . همدارنګه، Ryx خو دا له دې فرضيې سره تناقض لري چې R نامتناظر ده.

د انتقالي والي د ثابتولو دپاره، فرض کړئ R^+xy او R^+yz . که $\langle x, y \rangle \in R$ او $\langle y, z \rangle \in R$ دواړه وي، نو $\langle x, z \rangle \in R$ ځکه R انتقالي ده. که داسې نه وي، نو يا $\langle x, y \rangle \in \text{Id}_A$ ، يعنې $x = y$ ، يا $\langle y, z \rangle \in \text{Id}_A$ ، يعنې $y = z$. په لومړي حالت کېنې د فرضيې له مخې R^+yz لرو، او $x = y$ ، نو R^+xz په دويم حالت کېنې هم همداسې ده. په هر حالت کېنې R^+xz ، نو R^+ انتقالي هم ده.

د “سرېره پر دې” برخې په اړه، فرض کړئ R ترله هم ده. نو د ټولو $x \neq y$ دپاره يا Rxy يا Ryx ، يعنې $\langle x, y \rangle \in R$ يا $\langle y, x \rangle \in R$. ځکه چې $R \subseteq R^+$ ، دا خبره د R^+ دپاره هم سمه پاتې کېږي. نو R^+ ترله هم ده. $\square$

قضیه 2.29. که R په A باندې جزوي ترتیب وي، نو $R^- = R \setminus \text{Id}_A$ سخت ترتیب دے. سرېره پر دې، که R خطي ترتیب وي، نو R^- سخت خطي ترتیب دے.

□

ثبوت. دا د تمرین په توګه پرېښودل شوے دے.

تمرین 2.30. د 2.29 ثبوت ورکړئ.

لاندې ساده نتیجه ثابتوي چې سخت خطي ترتیبونه د غړو له مخې د برابري په شان یو خاصیت پوره کوي:

قضیه 2.31. که $<$ په A باندې سخت خطي ترتیب وي، نو:

$$(\forall a, b \in A)((\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b) \rightarrow a = b).$$

ثبوت. فرض کړئ $(\forall x \in A)(x < a \leftrightarrow x < b)$. که $a < b$ وي، نو $a < a$ ، چې د $<$ له نفي انعکاسي والي سره تناقض لري؛ نو $b < a$. بالکل په همدې ډول $a < b$ نو $a = b$ ، ځکه $<$ ترله دے.

□


2.6 گرافونه

گراف داسې شکل دے چې ټکي-چې "غوټې" یا "خوکې" (د "خوکه" جمع) بللې شي-پکښې د خنډو په ذریعه سره نښتي وي. گرافونه په منفصل ریاضي او کمپیوټرپوهنه کې هر ځای کارېدونکې وسیلې دي. د اړیکو او جوړښتونو د ښودلو او انځورولو دپاره ډېر ګټور دي؛ له محسوسو څیزونو، لکه د بېلو ډولونو له شبکو، نیولې تر مجردو جوړښتونو، لکه د پرېکړو تر ممکنو پایلو پورې. په علمي لیکنو کې د گرافونو ډېر بېل ډولونه شته. مثلاً، په دې سره توپیر کوي چې خنډې لوری لري که نه، نوم نښې لري که نه، آیا له یوې غوټې پرته هماغې غوټې ته خنډې کېدل شي، د هماغو غوټو ترمنځ څو خنډې کېدل شي، او داسې نور. لوری لرونکي گرافونه له اړیکو سره یو خاص تړاو لري.


تعریف 2.32. (لوری لرونکې گراف). لوری لرونکې گراف $G = \langle V, E \rangle$ د څوکو یو سټ V او د خنډو یو سټ $E \subseteq V^2$ دے.

زمونږ د تعریف له مخې، گراف یوازې یو سټ او په همدغه سټ باندې یوه اړیکه ده. البته، د گرافونو په اړه د خبرو پر وخت، په شکل کې د ښودلو تمه ئې طبیعي ده: گراف داسې رسمول شو چې دوه څوکې v_1 او v_2 په یو غشي هله او یوازې هله سره ونښلوو چې $\langle v_1, v_2 \rangle \in E$ وي. د یوازې اړیکې او گراف ترمنځ توپیر یوازې دا دے چې گراف د څوکو سټ ټاکي؛ یعنې گراف کوښې څوکې هم لرل شي. خو مهمه خبره دا ده چې په سټ X باندې هره اړیکه R د یو لوری لرونکي گراف $\langle X, R \rangle$ په توګه ګلے شو. برعکس، یو لوری لرونکې گراف $\langle V, E \rangle$ د اړیکې $E \subseteq V^2$ په توګه ګلے شو چې سټ V پکښې په څرګنده ټاکل شوے وي.

بېلګه 2.33. هغه گراف $\langle V, E \rangle$ چې $V = \{1, 2, 3, 4\}$ او $E = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$ وي، داسې ښکاري:



دا له هغه گراف $\langle V', E \rangle$ څخه بېل دے چې $V' = \{1, 2, 3\}$ وي، او داسې ښکاري:




تمرین 2.34. په سټ $\{1, 2, 3, 4\}$ باندې د کوچني یا برابر کېدو اړیکه $\leq$ د گراف په توګه وګورئ او ورسره سم شکل رسم کړئ.

2.7 ونې

د جزوي ترتیب یو خاص ډول چې د منطق په ټولو برخو کې مهم رول لري، ونه ده. متناهي ونې د منطق په لومړنیو برخو کې راځي: مثلاً، فارمولونه په نحوي ونه کې د خپلو برخو په بېلولو پوهېدلې شو، او په ډېرو اشتقاق نظامونو کې اشتقاقونه هم د متناهي ونو بڼه خپلوي. نامتناهي ونې د بیاني منطق او د لومړۍ درجې منطق د بشپړتیا د قضیو په ثبوت کې لا راڅرګندېږي، او په ټول ریاضي منطق کې کارول کېږي.

د ستونو د نظریې د ونې مفهوم د گرافونو په نظریه کې د ونې له مفهوم سره نژدې تړاو لري. دا د یوې (متناهي) ونې انځور دے:



تر ټولو لاندې غوټه r رېښه ده. له r پرته د هرې غوټې سمداستي لاندې پوره یوه مور غوټه شته. که له غوټې x څخه د خنډو په تعقیب پورته تلو سره غوټې y ته رسېدلې شو، نو د x او y ترمنځ دا اړیکه داسې ځکه شو چې x د y یو نیکه دے.

په یوه ونه کې د نیکه اړیکه سخت جزوي ترتیب دے. دا د ستونو د نظریې تعریف ته لاره هواروي. د هغه د بیانولو دپاره دوه مفهومونو ته اړتیا لرو. په سټ A کې، چې د $\leq$ په ذریعه جزوي مرتب شوی وي، تر ټولو کوچنۍ غړې هغه غړې $x \in A$ دے چې د هر $y \in A$ دپاره $x \leq y$ ولرو. یو سټ d په ذریعه بڼه مرتب دے که هر نانتش فرعي سټ u تر ټولو کوچنۍ غړې ولري.

تعریف 2.35 (ونه). ونه داسې جوړه $T = \langle A, \leq \rangle$ ده چې A یو سټ وي، او په A باندې داسې جزوي ترتیب وي چې یوازینې تر ټولو کوچنۍ غړې $r \in A$ ولري (چې رېښه بللې شي)، او د هر $x \in A$ دپاره سټ $\{y : y \leq x\}$ د $\leq$ په ذریعه بڼه مرتب وي.

تعریف 2.36 (ځایناستي). فرض کړئ $T = \langle A, \leq \rangle$ یوه ونه ده. که $x < y$ ، $x, y \in A$ ، او داسې $z \in A$ نه وي چې $x < z < y$ وي، نو وایو چې x د y ځایناسته دے.

د $x \in A$ ځایناستي د هغې اولادونه هم بللې شي. که y د x ځایناسته وي، نو x د y مخکښ یا مور بولو.

قضیه 2.37. که $\langle A, \leq \rangle$ یوه ونه وي، نو له رېښې پرته د هر $x \in A$ له یوه څخه زیات مخکښي نه شي کېدل.

ثبوت. فرض کړئ $y_1 < x$ ، $y_2 < x$ او $y_1 \neq y_2$. نو $\{z : z < x\} - \{y_1, y_2\}$ ځکه چې $\{z : z < x\}$ د $\leq$ په ذریعه بڼه مرتب دے، د دې فرعي سټ $\{y_1, y_2\}$ تر ټولو کوچنۍ غړې لري، چې ښکاره ده یا به y_1 وي یا y_2 . نو یا $y_1 \leq y_2$ یا $y_2 \leq y_1$. فرض مو کړو چې $y_1 \neq y_2$ ، نو په حقیقت کې $y_1 < y_2$ یا $y_2 < y_1$ ځکه چې $y_1 < x$ او $y_2 < x$ مو هم فرض کړي وو، دا هم لرو چې یا $y_1 < y_2 < x$ یا $y_2 < y_1 < x$. نو y_1 او y_2 دواړه د x مخکښي نه شي کېدل. □

تعریف 2.38. ونه $T = \langle A, \leq \rangle$ نامتناهي بللې شي که A نامتناهي سټ وي، او که نه نو متناهي ده. که په T کې هر $x \in A$ یوازې متناهي شمېر ځایناستي ولري، نو وایو چې T متناهي ځانګېدونکې ده.

تعریف 2.39 (ځانګې). که ونه $T = \langle A, \leq \rangle$ را ګړل شي، نو د T یوه څانګه په T کېنې یوه اعظمي څنځیر ده؛ یعنې داسې سټ $B \subseteq A$ چې د هر $x, y \in B$ دپاره یا $x \leq y$ یا $y \leq x$ وي، او د هر $z \in X \setminus B$ دپاره داسې $u \in B$ شته چې نه $z \leq u$ وي او نه $u \leq z$. د T د ټولو څانګو د سټ د ښودلو دپاره $[T]$ کاروو.

بېلګه 2.40. د متناهي څانګېدونکې ونې یوه مشهوره بېلګه د 0 کانو او 1 کانو د متناهي لړیو نامتناهي دوه ګونې ونه ده. کله کله په $\{0, 1\}^*$ یا $\mathbb{B}^*$ ښودل کېږي، او د غځونې د اړیکې $\sqsubseteq$ په ذریعه مرتب شوې ده (مثلاً، $101101 \sqsubseteq 101$). ځکه چې هر دوه ګونې توریز تسلسل په پای کېنې د 0 یا 1 په ورزیاتولو تل غځول شوي، دا ونه نامتناهي ډېر غړي لري: هر غړی s پوره دوه ځایناستي لري، $s0$ او $s1$. رېښه ئې تشه لري Λ ده.

بېلګه 2.41. په یو څه زیاته عمومي توګه، د طبیعي عددونو د متناهي لړیو سټ $\mathbb{N}^*$ د غځونې له اړیکې $\sqsubseteq$ سره هم یوه ونه ده. ښکاره ده چې دا متناهي څانګېدونکې نه ده: هر $s \in \mathbb{N}^*$ نامتناهي ډېر ځایناستي sn لري، د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره یو. هر $A \subseteq \mathbb{N}^*$ چې د $\sqsubseteq$ لاندې ترلې وي، د $\mathbb{N}^*$ یوه فرعي ونه ده. (یعنې A داسې دے چې که $s \in A$ او $s' \sqsubseteq s$ وي، نو $s' \in A$ هم وي.) ټولې متناهي ونې د $\mathbb{N}^*$ د متناهي فرعي ونو په توګه ښودل کېدلې شي.

قضیه 2.42 (د کونینګ مرستندویه قضیه). که $T = \langle A, \leq \rangle$ متناهي څانګېدونکې نامتناهي ونه وي، نو T یوه نامتناهي څانګه لري.

د کونینګ د مرستندويې قضیې یوه خاصه بڼه چې د محاسبه کېدنې په نظریه کېنې ډېره کارېږي، د کونینګ کمزورې مرستندویه قضیه بللې شي: د $\{0, 1\}^*$ هره نامتناهي فرعي ونه یوه نامتناهي څانګه لري.

2.8 په اړیکو باندې عملیات

اړیکې بدلول یا سره یوځای کول ډېر وخت کتور وي. په 2.28 کېنې مو د اړیکو اتحاد په پام کېنې نیولې و؛ دا یوازې د دوو اړیکو اتحاد دے چې د جوړو د ستونو په توګه ګڼل شوې وي. همدارنګه، په 2.29 کېنې مو د اړیکو نسبي تفاضل په پام کېنې نیولې و. لاندې ځینې نور عملیات دي چې په اړیکو باندې ئې کول شوي.

تعریف 2.43. فرض کړئ R او S اړیکې دي، او A هر یو سټ دے.

د R معکوس دا دے: $R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle : \langle x, y \rangle \in R \}$.

د R او S نسبي حاصل ضرب دا دے: $(R \mid S) = \{ \langle x, z \rangle : \exists y (Rxy \wedge Syz) \}$.

تر A پورې د R محدودونه دا دے: $R \upharpoonright_A = R \cap A^2$.

په A باندې د R تطبیق دا دے: $R[A] = \{ y : (\exists x \in A) Rxy \}$.

بېلګه 2.44. فرض کړئ $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ په $\mathbb{Z}$ باندې د ځایناستي اړیکه ده؛ یعنې $S = \{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 1 = y \}$ ، نو Sxy هله او یوازې هله چې $x + 1 = y$ وي.

S^{-1} په $\mathbb{Z}$ باندې د مخکینې اړیکه ده، یعنې: $\{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x - 1 = y \}$.

$S \mid S$ دا دے: $\{ \langle x, y \rangle \in \mathbb{Z}^2 : x + 2 = y \}$.

$S \upharpoonright_{\mathbb{N}}$ په $\mathbb{N}$ باندې د ځایناستي اړیکه ده.

$S[\{1, 2, 3\}]$ دا دے: $\{2, 3, 4\}$.

تعریف 2.45 (انتقالي بندښت). فرض کړئ $R \subseteq A^2$ یوه دوه ځایزه اړیکه ده.

د R انتقالي بندښت دا دے: $R^+ = \bigcup_{0 < n \in \mathbb{N}} R^n$ ، دلته په بازکشي ډول $R^1 = R$ او $R^{n+1} = R^n \mid R$ تعریفوو.

د R انعکاسي انتقالي بندښت دا دے: $R^* = R^+ \cup \text{Id}_A$.

بېلگه 2.46. د ځایناستی اړیکه $S \subseteq \mathbb{Z}^2$ واخلي. S^2xy هله او یوازې هله چې $x + 2 = y$ وي، S^3xy هله او یوازې هله چې $x + 3 = y$ وي، او داسې نور. نو S^+xy هله او یوازې هله چې د کوم $n \geq 1$ دپاره $x + n = y$ وي. په نورو ټکو، S^+xy هله او یوازې هله چې $x < y$ وي، او S^*xy هله او یوازې هله چې $x \leq y$ وي.

تمرین 2.47. وښیئ چې د R انتقالی بندښت په رښتیا انتقالی دے.

باب 3

تابعی

3.1 بنسټونه

تابع داسې نگاشت دے چې د یوه ورکړل شوي سټ هر غړی د کوم ورکړل شوي (بل) سټ له یوه ټاکلي غړي سره تړي. د بېلګې په توګه، د 1 ورزیاتولو عمل یوه تابع ټاکي: هر عدد n له یوه یوازيني عدد $n + 1$ سره تړل کېږي.

په عمومي ډول، تابعی جوړې، درې کونې او داسې نور د ننوتونو په توګه اخیستلې شي او یو ډول وت پورته ورکوي. له بنسټیز حساب ډېرې تابعی پېژنو. د بېلګې په توګه، جمع او ضرب تابعی دي. دوی دوه عددونه اخلي او درېم عدد پورته ورکوي.

په دې ریاضیکي، تجریدي معنی، تابع یو تور بکس دے: یوازې دا خبره اهمیت لري چې کوم وت له کوم ننوت سره تړل شوی دے، نه دا چې وت په کومه طریقه حسابېږي.


تعریف 3.1 (تابع). تابع $f: A \rightarrow B$ د A د هر غړي B له یوه غړي سره تړون دے.

A د f د تعریف ساحه او B د f هدف سټ بولو. د A غړي د f ننوتونه یا ارګومېنټونه بلل کېږي، او د B هغه غړی چې f ټی له ارګومېنټ x سره تړي، د ارګومېنټ x دپاره د f قیمت بلل کېږي او په $f(x)$ لیکل کېږي.

د f د قیمتونو سټ $\text{ran}(f)$ د هدف سټ هغه فرعي سټ دے چې د f له هغو قیمتونو جوړ دے چې د کوم ارګومېنټ دپاره ترلاسه کېږي؛ $\text{ran}(f) = \{f(x) : x \in A\}$.

په 3.1 کېنې انځوریز شکل د تابعو په پوهېدو کېنې مرسته کول شي. کېنې خواته بیضوي شکل د تابعی د تعریف ساحه ښيي؛ ښي خوا ته بیضوي شکل د تابعی هدف سټ ښيي؛ او غشې د تعریف په ساحه کېنې له یوه ارګومېنټ څخه په هدف سټ کېنې ورته قیمت ته ځي.

بېلګه 3.2. ضرب د طبیعي عددونو جوړې د ننوتونو په توګه اخلي او طبیعي عددونه د وتونو په توګه ورکوي؛ نو له $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ (د تعریف له ساحې) څخه $\mathbb{N}$ (هدف سټ) ته ځي. د قیمتونو سټ هم $\mathbb{N}$ دے، ځکه چې هر $n \in \mathbb{N}$ د $n \times 1$ په توګه ترلاسه کېږي.



شکل 3.1: تابع د یوه سټ د هر غړي د بل سټ له یوه غړي سره تړون دے. غشې د تعریف په ساحه کېنې له یوه ارګومېنټ څخه په هدف سټ کېنې ورته قیمت ته ځي.

بېلگه 3.3. ضرب تابع ده، ځکه چې هر ننوت — د طبیعي عددونو هره جوړه — له یوه یوازیني وت سره تړي: $\times: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$. خو له یوه طبیعي عدد n سره داسې حقیقي عدد x تړل چې $x^2 = n$ وي، تابع نه جوړوي، ځکه چې هر مثبت صحیح عدد n دوه مربع جذرونه لري: $\sqrt{n}$ او $-\sqrt{n}$. که یوازې غیر منفي (اصلي) مربع جذر پورته ورکړو، تابع ترې جوړول شو: $\sqrt{\cdot}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

بېلگه 3.4. هغه اړیکه چې د یوه ټولګي هر زده کوونکي د هغه له وروستی درجې سره تړي، تابع ده — یو زده کوونکي په هماغه ټولګي کښې دوه بېلې وروستی درجې نه شي اخیستلې. هغه اړیکه چې د یوه ټولګي هر زده کوونکي د هغه له والدينو سره تړي، تابع نه ده: زده کوونکي کېدې شي هېڅ، یا دوه، یا تر دوو زیات والدين ولري.

تابعې داسې تعریفولې شو چې په یوه کره طریقه د هر ممکن ارګومېنټ دپاره د تابعې قیمت وټاکو. د دې بېلې لارې دا دي چې یو فورمول ورکړو، د قیمت د حسابولو طریقه بیان کړو، یا د هر ارګومېنټ قیمت په فهرست کښې ولیکو. تابعې چې په هره طریقه تعریفوو، باید داډمن شو چې د هر ارګومېنټ دپاره یو، او یوازې یو، قیمت ټاکو.

بېلگه 3.5. فرض کړئ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ داسې تعریف شوې ده چې $f(x) = x + 1$ وي. دا تعریف f د داسې تابعې په توګه ټاکي چې طبیعي عددونه اخلي او طبیعي عددونه ورکوي. تعریف وایي چې د ورکړل شوي طبیعي عدد x دپاره به f د هغه ځایناسته $x + 1$ ورکړي. په دې حالت کښې هدف سټ $\mathbb{N}$ د f د قیمتونو سټ نه دے، ځکه چې طبیعي عدد 0 د هېڅ طبیعي عدد ځایناسته نه دے. د f د قیمتونو سټ د ټولو مثبتو صحیح عددونو سټ، $\mathbb{Z}^+$ ، دے.

بېلگه 3.6. فرض کړئ $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ داسې تعریف شوې ده چې $g(x) = x + 2 - 1$ وي. دا وایي چې g یوه تابع ده چې طبیعي عددونه اخلي او طبیعي عددونه ورکوي. د ورکړل شوي طبیعي عدد دپاره به g د x د ځایناستي د ځایناستي مخکښه عدد، یعنې $x + 1$ ، ورکړي.

اوس مو دوه تابعې، f او g ، له بېلو تعریفونو سره په پام کښې ونیولې. خو دا هماغه یوه تابع ده. ځکه چې د هر طبیعي عدد n دپاره $f(n) = n + 1 = n + 2 - 1 = g(n)$ لرو. په بله وینا: د f او g تعریفونه مو په بېلو معادلو هماغه یو نگاشت ټاکي. نو په ضمني ډول د تابعو د قیمتونو له مخې د برابری په یوه اصل تکیه کوو:

$$\text{که } \forall x \, f(x) = g(x) \text{ نو } f = g$$

په دې شرط چې د f او g د تعریف ساحه او هدف سټ یو شان وي.

بېلگه 3.7. تابعې د حالتونو په وېشلو هم تعریفولې شو. د بېلګې په توګه، $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ داسې تعریفولې شو:


$$h(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ \frac{x+1}{2} & \text{که } x \text{ طاق وي} \end{cases}$$

ځکه چې هر طبیعي عدد یا جفت دے یا طاق، د دې تابعې وت به تل طبیعي عدد وي. یوازې دا په یاد وساتئ چې که تابع د حالتونو په وېشلو تعریفوئ، هر ممکن ننوت باید په دقیقه توګه په یوه حالت کښې راشي. ځینې وختونه د دې ثبوت ته اړتیا وي چې حالتونه ټول امکانات رانغاړي او یو له بل سره ګډ نه دي.


3.2 د تابعو ډولونه

د تابعو د هغو ځینو ډولونو دپاره چې ډېر ورسره مخ کېږو، د یو ډول ډلبندي پېژندل به ګټور وي.

په پیل کښې داسې تابعې په پام کښې نیول غواړو چې د هدف سټ هر غړی د تابعې یو قیمت وي. دې تابعو ته پر هدف سټ بشپړه ویل کېږي، او د 3.2 په شان ئې ښودلې شو.



شکل 3.2: پر هدف سټ بشپړه تابع د هدف سټ هر غړی د قیمت په توګه لري.



شکل 3.3: یو پریو تابع هېڅکله دوه بېل ارګومېنټونه له یوه قیمت سره نه تری.

تعریف 3.8 (پر هدف سټ بشپړه تابع). تابع $f: A \rightarrow B$ هله او یوازې هله پر هدف سټ بشپړه ده چې f د B د قیمتونو سټ هم وي، یعنې د هر $y \in B$ دپاره لږ تر لږه یو $x \in A$ وي چې $f(x) = y$ وي، یا په لنډو:

$$(\forall y \in B)(\exists x \in A)f(x) = y.$$

داسې تابع له A څخه B ته پر هدف سټ بشپړه تابع بولو.

که ښودل غواړئ چې f یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده، نو باید وښیئ چې د f د هدف سټ هر څیز د کوم نوت x دپاره د $f(x)$ قیمت دے.

پام وکړئ چې هره تابع یوه پر هدف سټ بشپړه تابع رامنځته کوي. ځکه، د ورکړل شوې تابعې $f: A \rightarrow B$ دپاره، فرض کړئ $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ په $f'(x) = f(x)$ تعريف شوې ده. ځکه چې $\text{ran}(f)$ د $\{f(x) \in B : x \in A\}$ په توګه تعريف شوی دے، دا تضمین شوی دے چې تابع f' به پر هدف سټ بشپړه تابع وي.

اوس، هره تابع هر ممکن نوت له یوه یوازیني وټ سره تری. خو داسې تابعې هم شته چې بېل نوتونه هېڅکله له یو شان وټ سره نه تری. دې تابعو ته یو پریو ویل کېږي، او د 3.3 په شان ئې ښودل شو.


تعریف 3.9 (یو پریو تابع). تابع $f: A \rightarrow B$ هله او یوازې هله یو پریو ده چې د هر $y \in B$ دپاره تر یوه زیات داسې $x \in A$ نه وي چې $f(x) = y$ وي. داسې تابع له A څخه B ته یو پریو تابع بولو.

که ښودل غواړئ چې f یوه یو پریو تابع ده، باید وښیئ چې د f د تعريف د ساحې د هر دوو غړو x او y دپاره، که $f(x) = f(y)$ وي، نو $x = y$ وي.

بېلګه 3.10. ثابتۀ تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ چې په $f(x) = 1$ ورکړل شوې، نه یو پریو ده او نه پر هدف سټ بشپړه.

د عینیت تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ چې په $f(x) = x$ ورکړل شوې، هم یو پریو ده او هم پر هدف سټ بشپړه.

د ځایناستي تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ چې په $f(x) = x + 1$ ورکړل شوې، یو پریو ده خو پر هدف سټ بشپړه نه ده.



شکل 3.4: دوه اړخیزه یو پر یو تابع د هدف سټ غړي د تعریف د ساحې له غړو سره په یوازیني ډول جوړوي.

تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ چې داسې تعریف شوې ده:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ \frac{x+1}{2} & \text{که } x \text{ طاق وي} \end{cases}$$

پر هدف سټ بشپړه ده، خو یو پر یو نه ده.

ډېر وخت داسې تابعې په پام کېنې نیول غواړو چې هم یو پر یو وي او هم پر هدف سټ بشپړه. دا تابعې دوه اړخیزه یو پر یو بولو. دوی په 3.4 کېنې ښودل شوې تابعې ته ورته دي. دوه اړخیزې یو پر یو تابعې کله کله یو پر یو مطابقتونه هم بلل کېږي، ځکه چې د هدف سټ غړي د تعریف د ساحې له غړو سره په یوازیني ډول جوړوي.

تعریف 3.11 (دوه اړخیزه یو پر یو تابع). تابع $f: A \rightarrow B$ هله او یوازې هله دوه اړخیزه یو پر یو ده چې هم پر هدف سټ بشپړه وي او هم یو پر یو. داسې تابع له A څخه B ته (یا د A او B ترمنځ) دوه اړخیزه یو پر یو تابع بولو.

3.3 تابعې د اړیکو په توګه

هغه تابع چې د A غړي د B له غړو سره تړي، په ښکاره د A او B ترمنځ یوه اړیکه ټاکي، یعنې هغه اړیکه چې د x او y ترمنځ هله او یوازې هله وي چې $f(x) = y$ وي. په حقیقت کېنې، که د بېلګې په توګه د ریاضیاتو د بنسټیزو توکو په کولو کېنې دلچسپي لرو، ان تابع f له دې اړیکې سره، یعنې د جوړولو یوه سټ سره، یوه ګڼه شو. بیا دا پوښتنه راپورته کېږي: کومې اړیکې په دې ډول تابعې ټاکي؟

تعریف 3.12 (د تابعې ګراف). فرض کړئ $f: A \rightarrow B$ یوه تابع ده. د f ګراف هغه اړیکه $R_f \subseteq A \times B$ ده چې داسې تعریف شوې ده:

$$R_f = \{ \langle x, y \rangle : f(x) = y \}.$$

د غړو له مخې د برابری په اصل، د تابعې ګراف په یوازیني ډول ټاکل کېږي. سرېره پر دې، د ستونو د غړو له مخې د برابری اصل سملاسي د تابعو د قیمتونو له مخې د برابری ضمني اصل هم توجیه کوي: که د f او g د تعریف ساحه او هدف سټ یو شان وي او په ټولو قیمتونو کېنې سره موافقې وي، نو هماغه یوه تابع ده.

همدارنګه، که یوه اړیکه «د تابعې خاصیت ولري»، نو د یوې تابعې ګراف ده.

قضیه 3.13. فرض کړئ $R \subseteq A \times B$ داسې ده چې:

1. که Rxy او Rxz وي، نو $y = z$ وي؛ او

2. د هر $x \in A$ دپاره داسې $y \in B$ شته چې $\langle x, y \rangle \in R$ وي.

نو R د هغې تابعې $f: A \rightarrow B$ ګراف ده چې په دې ډول تعریف شوې ده: $f(x) = y$ هله او یوازې هله چې Rxy وي.

ثبوت. فرض کړئ داسې y شته چې Rxy وي. که یو بل $z \neq y$ هم وای چې Rxz وای، پر R لگېدلی شرط به مات شوی و. نو که داسې y شته چې Rxy وي، دا y یوازینۍ دے؛ له دې کبله f په سمه توګه تعریف شوې ده. په ښکاره، $R_f = R$. □

هره تابع $f: A \rightarrow B$ ګراف لري؛ یعنې د همدې د تعریف ساحې او هدف سټ ترمنځ یوه اړیکه، چې د $A \times B$ فرعي سټ دے او په $f(x) = y$ تعریف شوې ده. بل خوا، هره اړیکه $R \subseteq A \times B$ چې په 3.13 کېنې ورکړل شوي خاصیتونه ولري، د یوې تابعې $f: A \rightarrow B$ ګراف ده. د تابعو او د هغو د ګرافونو د دې نږدې تړاو له کبله، تابع یوازې د هغې د ګراف په توګه ګڼل شو. په بله وینا، تابعې له ځینو اړیکو، یعنې د مرتبو څوګونو له ځینو ستونو، سره یوې ګڼلې شو. خو پام وکړئ چې د دې «یو ګڼلو» مطلب هماغه دے چې په 2.2 کېنې و: دا د تابعو د مابعدالطبیعي ماهیت په اړه ادعا نه ده، بلکې دا مشاهده ده چې تابعې د ځینو ستونو په توګه ګڼل اسانتیا لري. د دې اسانتیا یو لامل دا دے چې اوس پر تابعو هم هغو ته ورته عملیات په پام کېنې نیول شوي چې پر اړیکو مو وکړل (وکورئ 2.8). په ځانګړي ډول:

تعریف 3.14. فرض کړئ $f: A \rightarrow B$ یوه تابع ده او $C \subseteq A$.

تر C پورې د f محدودونه هغه تابع $f|_C: C \rightarrow B$ ده چې د ټولو $x \in C$ دپاره په $(f|_C)(x) = f(x)$ تعریف شوې ده. په بله وینا، $f|_C = \{ \langle x, y \rangle \in R_f : x \in C \}$.

په C باندې د f تطبیق دا دے: $f[C] = \{ f(x) : x \in C \}$. دې ته د f لاندې د C انځور هم وایو.

له دې تعریفونو څرګندېږي چې د هرې تابعې f دپاره $\text{ran}(f) = f[\text{dom}(f)]$ په 2.8 کېنې د تعریفونو او له اړیکو سره د تابعو د یو ګڼلو له مخې، ورته مفهومونه موندلای شئ. دلته د تابعې محدودونه یوازې د ننوت مختصات محدودوي؛ د اړیکې مخکښ تعریف دواړه مختصات محدودوي. خو دوه نور عملیات — معکوسونه او نسبي حاصل ضربونه — لږ زیات تفصیل غواړي. هغه به په 3.4 او 3.5 کېنې وړاندې کړو.

3.4 د تابعو معکوسونه

تابعې د نگاشتونو په توګه ګڼو. نو د تابعو په اړه یوه څرګنده پوښتنه دا ده چې ایا نگاشت «سرچپه» کېدای شي. د بېلګې په توګه، د ځایناستي تابع $f(x) = x + 1$ په دې معنی سرچپه کېدای شي چې تابع $g(y) = y - 1$ د f کرې کار «بېرته اړوي».

خو باید احتیاط وکړو. که څه هم د g تعریف یوه تابع $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ټاکي، یوه تابع $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ نه ټاکي، ځکه چې $g(0) \notin \mathbb{N}$. نو په ساده حالتونو کېنې هم دا خبره پوره څرګنده نه ده چې تابع سرچپه کېدای شي که نه؛ دا د تعریف په ساحه او هدف سټ پورې تړلې کېدای شي.

د تابعې د معکوس مفهوم دا خبره لا کره کوي.

تعریف 3.15. تابع $g: B \rightarrow A$ د تابعې $f: A \rightarrow B$ معکوس ده که د ټولو $x \in A$ او $y \in B$ دپاره $f(g(y)) = y$ او $g(f(x)) = x$ وي.

که f معکوس g ولري، ډېر وخت د g پر ځای f^{-1} لیکو.

اوس به معلومه کړو چې تابعې کله معکوسونه لري. د $f: A \rightarrow B$ د معکوس دپاره یو مناسب نوماند $g: B \rightarrow A$ دے چې «په دې تعریف شوی» وي:

$$g(y) = - \text{«هغه یوازینۍ» } x \text{ چې } f(x) = y \text{ وي.}$$

خو د «په دې تعریف شوی» (او «هغه یوازینۍ») شاوخوا احتیاطي ښې اشاره کوي چې دا تعریف نه دے. لږ تر لږه، تل او په بشپړ عموميته سره کار نه ورکوي. ځکه د دې دپاره چې دا تعریف یوه تابع وټاکي، باید یو او یوازې یو x وي چې $f(x) = y$ وي. د g وټ باید په یوازیني ډول ټاکل شوی وي. سرېره پر دې، د هر $y \in B$ دپاره باید ټاکل شوی وي. که داسې x_1 او $x_2 \in A$ وي چې $x_1 \neq x_2$ خو $f(x_1) = f(x_2)$ وي، نو د $y = f(x_1) = f(x_2)$ دپاره به $g(y)$ په یوازیني ډول نه وي ټاکل شوی. او که هېڅ داسې x نه وي چې $f(x) = y$ وي، نو $g(y)$ به بېخي نه وي ټاکل شوی. په بله وینا، د g د تعریف کېدو دپاره باید f هم یو پریو وي او هم پر هدف سټ بشپړه.

راځئ ګام په ګام لار شو. پوښتنه به په دوو برخو ووېشو: د ورکړل شوې تابعې $f: A \rightarrow B$ دپاره، کله داسې تابع $g: B \rightarrow A$ شته چې $g(f(x)) = x$ وي؟ داسې g د f کره کار «بېرته اړوي» او د f کین معکوس بلل کېږي. دویمه دا چې کله داسې تابع $h: B \rightarrow A$ شته چې $f(h(y)) = y$ وي؟ داسې h د f بڼي معکوس بلل کېږي — f د h کره کار «بېرته اړوي».

قضیه 3.16. که د تعریف ساحه ناشه وي او $f: A \rightarrow B$ یوه یو پر یو تابع وي، نو د f یو کین معکوس $g: B \rightarrow A$ شته چې د ټولو $x \in A$ دپاره $g(f(x)) = x$ وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLFUN-001) په انګرېزي سرچینه کېنې د ناشې تعریف ساحې شرط نه و؛ خو لاندې ثبوت یو غږه ترې ټاکي.

ثبوت. فرض کړئ $f: A \rightarrow B$ یوه یو پر یو تابع ده. یو $y \in B$ په پام کېنې ونیسئ. که $y \in \text{ran}(f)$ وي، نو داسې $x \in A$ شته چې $f(x) = y$ وي. ځکه چې f یو پر یو ده، یوازې یو داسې $x \in A$ شته. بیا داسې تعریفو له شو: $g(y) = x$ ؛ یعنې «هغه یوازینۍ» $x \in A$ دے چې $f(x) = y$ وي. که $y \notin \text{ran}(f)$ وي، که $a \in A$ سره ئې ترله شو. نو یو $a \in A$ ټاکله او $g: B \rightarrow A$ داسې تعریفو له شو:

$$g(y) = \begin{cases} x & \text{که } f(x) = y \text{ وي} \\ a & \text{که } y \notin \text{ran}(f) \text{ وي} \end{cases}$$

دا د ټولو $y \in B$ دپاره تعریف شوې ده، ځکه چې د هر داسې $y \in \text{ran}(f)$ دپاره په دقیقه توګه یو $x \in A$ شته چې $f(x) = y$ وي. د تعریف له مخې، که $y = f(x)$ وي، نو $g(y) = x$ وي؛ یعنې $g(f(x)) = x$. □

تمرین 3.17. وښیئ چې که $f: A \rightarrow B$ کین معکوس g ولري، نو f یو پر یو ده.

قضیه 3.18. که $f: A \rightarrow B$ یوه پر هدف سټ بشپړه تابع وي، نو د f یو بڼي معکوس $h: B \rightarrow A$ شته چې د ټولو $y \in B$ دپاره $f(h(y)) = y$ وي.

ثبوت. فرض کړئ $f: A \rightarrow B$ یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده. یو $y \in B$ په پام کېنې ونیسئ. ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، داسې $x_y \in A$ شته چې $f(x_y) = y$ وي. بیا داسې تعریفو له شو: $h(y) = x_y$ ؛ یعنې د هر $y \in B$ دپاره یو داسې $x \in A$ ټاکو چې $f(x) = y$ وي؛ ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، تل لږ تر لږه یو د ټاکلو دپاره شته.¹ د تعریف له مخې، که $x = h(y)$ وي، نو $f(x) = y$ وي؛ یعنې د هر $y \in B$ دپاره $f(h(y)) = y$. □

تمرین 3.19. وښیئ چې که $f: A \rightarrow B$ بڼي معکوس h ولري، نو f پر هدف سټ بشپړه ده.

د مخکیني ثبوت د مفکورو په یوځای کولو اوس دا ترلاسه کوو چې هره دوه اړخیزه یو پر یو تابع معکوس لري؛ یعنې یوه واحده تابع شته چې هم د f کین معکوس دے او هم بڼي معکوس.

قضیه 3.20. که $f: A \rightarrow B$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع وي، داسې تابع $f^{-1}: B \rightarrow A$ شته چې د ټولو $x \in A$ دپاره $f^{-1}(f(x)) = x$ او د ټولو $y \in B$ دپاره $f(f^{-1}(y)) = y$ وي.

ثبوت. تمرین. □

¹ ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، د هر $y \in B$ دپاره سټ $\{x: f(x) = y\}$ نش نه دے. زموږ د h تعریف غواړي چې له دې هر سټ څخه یو یوازینۍ x وټاکو. دا چې دا کار تل ممکن دے، په حقیقت کېنې څرګنده خبره نه ده — د دې ټاکنو امکان په ساده ډول د یوه بډیې اصل په توګه فرض کېږي. په بله وینا، دا قضیه د ټاکنې په نامه بډیې اصل فرض کوي؛ دا مسئله به په لنډه پرېږدو. خو په ډېرو ځانګړو حالتونو کېنې، لکه چې $A = \mathbb{N}$ وي یا متناهي وي، یا f یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع وي، د ټاکنې بډیې اصل ته اړتیا نه وي. (په هغه ځانګړي حالت کېنې چې f دوه اړخیزه یو پر یو وي، د هر $y \in B$ دپاره سټ $\{x: f(x) = y\}$ په دقیقه توګه یو غږه لري؛ نو د انتخاب دپاره څو بدیلونه نشته.)

تمرین 3.21، 3.20 ثابتہ کړئ۔ باید f^{-1} تعریف کړئ، وښیئ چې تابع ده، او وښیئ چې د f معکوس ده؛ یعنې د ټولو $x \in A$ او $y \in B$ دپاره $f^{-1}(f(x)) = x$ او $f(f^{-1}(y)) = y$ وي۔

د معکوسونو د ترلاسه کولو یوه لږه زیاته عمومي لار هم شته۔ په 3.2 کښې مو ولیدل چې هره تابع f د ټولو $x \in A$ دپاره $f'(x) = f(x)$ په ټاکلو سره یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f': A \rightarrow \text{ran}(f)$ رامنځته کوي۔ په ښکاره، که f یو پریو وي، نو f' دوه اړخیزه یو پریو ده، او له دې کبله د 3.20 له مخې یوازینۍ معکوس لري۔ د ښو په کارولو کښې په یو ډېر واړه تسامح سره، کله کله د f' معکوس یوازې «د f معکوس» بولو۔

قضیه 3.22، وښیئ چې که $f: A \rightarrow B$ کښې معکوس g او ښې معکوس h ولري، نو $h = g$ ۔

□

ثبوت، تمرین۔

تمرین 3.23، 3.22 ثابتہ کړئ۔

قضیه 3.24، هره تابع f تر یوه زیات معکوس نه لري۔

ثبوت، فرض کړئ g او h دواړه د f معکوسونه دي۔ نو په ځانګړي ډول g د f کښې معکوس او h ښې معکوس دے۔ د 3.22 له مخې، $g = h$ ۔

□

3.5 د تابعو ترکیب

په 3.4 کښې مو ولیدل چې د یوې دوه اړخیزې یو پریو تابعې f معکوس f^{-1} پخپله یوه تابع ده۔ پر تابعو یو بل عمل ترکیب دے: موږ دوه تابعې، f او g ، سره ترکیبولې او نوې تابع تعریفولې شو؛ یعنې لومړۍ f او بیا g تطبیق کړو۔ البته، دا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې د قیمتونو ستونه او د تعریف ساحې سره برابر راشي؛ یعنې د f د قیمتونو سټ باید د g د تعریف د ساحې فرعي سټ وي۔ پر تابعو دا عمل، پر اړیکو د نسبي حاصل ضرب له هغه عمل سره ورته دے چې په 2.8 کښې راغلې دے۔

انځوریز شکل د ترکیب د مفکورې په تشریح کښې مرسته کولې شي۔ په 3.5 کښې دوه تابعې $f: A \rightarrow B$ او $g: B \rightarrow C$ او د هغو ترکیب $(g \circ f)$ ښیو۔ تابع $(g \circ f): A \rightarrow C$ د A هر غړۍ د C له یوه غړي سره تړي۔ دا چې د A یو غړۍ د C له کوم غړي سره تړل کېږي، داسې ئې ټاکو: د ورکړل شوي نوت $x \in A$ دپاره، لومړۍ تابع f پر x تطبیق کړئ، چې یو $y \in B$ ته $f(x) = y$ به ورکړي، بیا تابع g پر y تطبیق کړئ، چې یو $z \in C$ ته $g(y) = z$ به ورکړي۔


تعریف 3.25 (ترکیب)، فرض کړئ $f: A \rightarrow B$ او $g: B \rightarrow C$ تابعې دي۔ له g سره د f ترکیب دا دے: $g \circ f: A \rightarrow C$ چې $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ وي۔

بېلګه 3.26، تابعې $f(x) = x + 1$ او $g(x) = 2x$ په پام کښې ونیسئ۔ ځکه چې $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ ، نو د هر نوت x دپاره باید لومړۍ د هغه ځایناسته واخلي، بیا پایله په دوو ضرب کړئ۔ نو د هغو ترکیب په $(g \circ f)(x) = 2(x + 1)$ ورکړل شوی دے۔

تمرین 3.27، وښیئ چې که $f: A \rightarrow B$ او $g: B \rightarrow C$ دواړه یو پریو وي، نو $g \circ f: A \rightarrow C$ هم یو پریو ده۔

تمرین 3.28، وښیئ چې که $f: A \rightarrow B$ او $g: B \rightarrow C$ دواړه پر هدف سټ بشپړه وي، نو $g \circ f: A \rightarrow C$ هم پر هدف سټ بشپړه ده۔

تمرین 3.29، فرض کړئ $f: A \rightarrow B$ او $g: B \rightarrow C$ ۔ وښیئ چې د $g \circ f$ کراف $R_f \mid R_g$ دے۔

شکل 3.5: د دوو تابعو f او g ترکیب $g \circ f$.

3.6 جزوي تابعي

کله کله کتوره وي چې د تابعي په تعريف کښې نرمي راولو، خو د ټولو ممکنو نوتونو دپاره د تابعي د وت تعريف کېدل لازم نه وي. داسې نگاشتونه جزوي تابعي بلل کېږي.

تعريف 3.30. جزوي تابع $f: A \rightarrow B$ داسې نگاشت ده چې د A له هر غړي سره د B تر يوه زيات غړي نه تړي. که f له $x \in A$ سره د B يو غړي وتړي، وايو چې $f(x)$ تعريف شوی ده، او که داسې نه وي، تعريف نه شوی ده. که $f(x)$ تعريف شوی وي، $f(x) \downarrow$ لیکو؛ کنه، $f(x) \uparrow$ لیکو. د جزوي تابعي f د تعريف ساحه د A هغه فرعي سټ ده چې تابع پرې تعريف شوې ده؛ يعنې $\text{dom}(f) = \{x \in A : f(x) \downarrow\}$.

بېلگه 3.31. هره تابع $f: A \rightarrow B$ يوه جزوي تابع هم ده. هغه جزوي تابعي چې پر A هرځای تعريف شوې وي—يعنې هغه څه چې تر دې دمه مويوازي تابع بلل—هرځای تعريف شوې تابعي هم بلل کېږي.

بېلگه 3.32. جزوي تابع $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ چې په $f(x) = 1/x$ ورکړل شوې، د $x = 0$ دپاره تعريف شوې نه ده، او په نورو ټولو ځايونو کېني تعريف شوې ده.

تمرين 3.33. د ورکړل شوې $f: A \rightarrow B$ دپاره، جزوي تابع $g: B \rightarrow A$ داسې تعريف کړئ: د هر $y \in B$ دپاره، که يو يوازينی $x \in A$ وي چې $f(x) = y$ وي، نو $g(y) = x$ ؛ کنه، $g(y) \uparrow$ وښئ چې که f يو پر يو وي، نو د ټولو $x \in \text{dom}(f)$ دپاره $g(f(x)) = x$ ، او د ټولو $y \in \text{ran}(f)$ دپاره $f(g(y)) = y$ وي.

تعريف 3.34. (د جزوي تابعي کراف). فرض کړئ $f: A \rightarrow B$ يوه جزوي تابع ده. د f کراف هغه اړيکه $R_f \subseteq A \times B$ ده چې داسې تعريف شوې ده:

$$R_f = \{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}.$$

قضيه 3.35. فرض کړئ $R \subseteq A \times B$ دا خاصيت لري چې هرکله Rxy او Rxy' وي، نو $y = y'$ وي. بيا R د هغې جزوي تابعي $f: A \rightarrow B$ کراف ده چې داسې تعريف شوې ده: که داسې y وي چې Rxy وي، نو $f(x) = y$ ؛ کنه، $f(x) \uparrow$. که R مسلسل ده، يعنې د هر $x \in A$ دپاره داسې $y \in B$ وي چې Rxy وي، نو f هرځای تعريف شوې ده.

ثبوت. فرض کړئ داسې y شته چې Rxy وي. که يو بل $y' \neq y$ هم وای چې Rxy' وای، پر R لگېدلې شرط به مات شوی و. نو که داسې y شته چې Rxy وي، هغه y يوازينی ده؛ له دې کبله f په سمه توګه تعريف شوې ده. په ښکاره، $R_f = R$ ، او که R مسلسل وي، نو f هرځای تعريف شوې ده. $\square$

باب 4

د ستونو اندازه

اداري يادونه - دا باب شمېرنې، د شمېر وړ والې او د شمېر نه وړ والې څېرې - ځينې برخې دوه بڼې لري: يوه زياته ابتدايي بڼه، چې شمېرنې د لرونو يا له $\mathbb{Z}^+$ څخه د هغو تابعو په توګه اخلي چې پر هدف سټ بشپړې وي؛ او يوه زياته تجریدي بڼه، چې شمېرنې له $\mathbb{N}$ سره د دوه اړخيزو يو پر يو تابعو په توګه تعريفوي.

اداري يادونه - لاندې 4.11، 4.12 او 4.13 د 4.2، 4.6 او 4.7 بدیلې بڼې دي چې ټیم بتن د خپل «د ستونو خلاصه نظریه» متن کېنې د کارولو دپاره برابرې کړې دي. د دې لږې زياتې پرمختللي دي او د شمېر وړ والي يو بېل تعريف کاروي چې د ستونو د نظريې په سياق کېنې زيات مناسب دے؛ يعنې له $\mathbb{N}$ يا د هغې له پيلنې برخې سره دوه اړخيزه يو پر يو تابع لرل، د دې پر ځای چې په لږ کېنې د راورلو وړ وي يا له $\mathbb{Z}^+$ څخه د يوې پر هدف سټ بشپړې تابعې د قيمتونو سټ وي.

4.1 پېژندنه

کله چې کېورک کانتور په 1870 مو کلونو کېنې د ستونو نظريې ته وده ورکړه، د هغه يو مقصد دا و چې د نامتناهي مجموعې مفکوره د منلو وړ کړي - هغه څه چې د منځنيو پېړيو پوهانو به فعلي نامتناهي والې بللو. د دې يوه مهمه برخه د بېلو ستونو د اندازې په اړه د هغه څېړنه وه. که a, b, c او c ټول بېل وي، نو په وجداني ډول سټ $\{a, b, c\}$ له $\{a, b\}$ څخه لږ دے - خو د نامتناهي ستونو په اړه څه وايو؟ ايا ټول د يو بل هومره لږ دي؟ معلومېږي چې داسې نه ده.

دلته لومړۍ مهمه مفکوره د شمېرنې ده. هر متناهي سټ د هغه د ټولو غړو په ليکلو په لږ کېنې راورلے شو. د ځينو نامتناهي ستونو ټول غړي هم په لږ کېنې راورلے شو، که اجازه ورکړو چې لږ پخپله نامتناهي وي. داسې ستونه د شمېر وړ بلل کېږي. د کانتور حيرانوونکې پايله، چې د دې باب تر پايه به ئې پوره وپېژنو، دا وه چې ځينې نامتناهي ستونه د شمېر وړ نه دي.

4.2 شمېرنې او د شمېر وړ ستونه

اداري يادونه - دا برخه د ستونو شمېرنې څېرې او له $\mathbb{Z}^+$ څخه د پر هدف سټ بشپړو تابعو په توګه ئې تعريفوي. د هغو لوستونکو دپاره چې لږ رياضيکي شاليد لري، خبرې ګام په ګام وړاندې کوي. يوه بديله، لنډه بڼه په 4.11 کېنې ورکړل شوې، چې شمېرنې په بېل ډول تعريفوي: له $\mathbb{N}$ (يا د هغې له پيلنې برخې) سره د دوه اړخيزو يو پر يو تابعو په توګه.

مخکېنې مو د ستونو بېلګې د هغو د غړو په ليکلو ورکړې دي. راځئ په زياته عمومي توګه بحث وکړو چې د يوه سټ غړي څنګه او کله په لږ کېنې راورلے شو، که هغه سټ نامتناهي هم وي.

تعریف 4.1 (شمبرنه، په غیر صوري ډول). په غیر صوري ډول، د سټ A شمېرته د A د غړو یو (کېدے شي نامتناهي) لړ دے، داسې چې د A هر غړے د لړ په یوه متناهي مقام کېنې راځي. که A شمېرته ولري، نو A ته د شمېر وړ ویل کېږي. د شمېرنو په اړه خو ټکي:

1. یوازې هغه لرونه شمېرنې گڼو چې پیل ولري او له لومړني غړي پرته د هر غړي سمدستي مخکېنې یو یوازینے غړے وي. په بله وینا، د لړ د لومړي غړي او هر بل غړي ترمنځ یوازې متناهي شمېر غړي وي. په ځانگړي ډول، دا معنی لري چې د شمېرنې هر غړے متناهي مقام لري: لومړے غړے په مقام 1 کېنې وي، دویم په مقام 2 کېنې، او داسې نور.
2. د هماغه سټ A بېلې شمېرنې لرلے شو چې د غړو د راتلو په ترتیب کېنې سره بېلې وي: 4، 1، 25، 16، 9 د لومړیو پنځو مربع عددونو (د سټ) هومره ښه شمېرته ده لکه 1، 4، 9، 16، 25.
3. تکراري شمېرنې هم شمېرنې دي: 1، 1، 2، 2، 3، 3، ... د هماغه سټ شمېرته ده چې 1، 2، 3، ... ئې شمېرته کوي.
4. کله چې یوه شمېرته ټاکو، ترتیب او تکرار اهمیت لري: د مثبتو صحیح عددونو شمېرته په 1، 2، 3، 1، ... پېلولے شو، خو نمونه هغه وخت په اسانه ښکاري چې په معمولي ډول ئې په 1، 2، 3، 4، ... وشمېرو.
5. شمېرنې باید پیل ولري: ...، 3، 2، 1 د مثبتو صحیح عددونو شمېرته نه ده، ځکه چې لومړے غړے نه لري. د دې د لیدلو دپاره چې دا له غیر صوري تعریفه څنګه راځي، له ځانه وپوښئ: «عدد 76 د لړ په کوم مقام کېنې راځي؟»
6. لاندې لړ د مثبتو صحیح عددونو شمېرته نه ده: 1، 3، 5، ...، 2، 4، 6، ... ستونزه دا ده چې جفت عددونه د متناهي مقامونو پر ځای په $1 + \infty$ ، $2 + \infty$ ، $3 + \infty$ مقامونو کېنې راځي.
7. تش سټ د شمېر وړ دے: تش لړ ئې شمېري!

قضیه 4.2. که A شمېرته ولري، ئې له تکراره شمېرته هم لري.

ثبوت. فرض کړئ A شمېرته $x_1, x_2, \dots$ لري، چې هر x_i د A یو غړے دے. له شمېرنې څخه د تکراري غړو په لړې کولو تکرارونه لړې کولے شو. د بېلګې په توګه، شمېرته داسې نوې شمېرنې ته اړولے شو چې x_i پکېنې هله ولیکو چې د A داسې غړے وي چې په $x_1, \dots, x_{i-1}$ کېنې نه وي، یا x_i له لړه لړې کړو که له مخکېنې په $x_1, \dots, x_{i-1}$ کېنې راغلے وي. □

وروستے استدلال ښیي چې د شمېرنو او د شمېر وړ ستونو د ښه پوهېدو او د هغو په اړه د خبرو د ثابتولو دپاره یو زیات کره تعریف ته اړتیا لرو. لاندې تعریف دا اړتیا پوره کوي.

تعریف 4.3 (شمبرنه، په صوري ډول). د سټ $A \neq \emptyset$ شمېرته هره پر هدف سټ بشپړه تابع $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ ده.

راځئ ځان ډاډمن کړو چې صوري تعریف او هغه غیر صوري تعریف چې یو ممکن نامتناهي لړ کاروي، همارزښته دي. لومړے، له $\mathbb{Z}^+$ څخه سټ A ته هره پر هدف سټ بشپړه تابع د A شمېرته کوي. داسې تابع د پاسني غیر صوري تعریف له مخې یوه شمېرته ټاکي: لړ $f(1)$ ، $f(2)$ ، $f(3)$ ، ... ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، دا تضمین شولے چې د A هر غړے به د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره د $f(n)$ قیمت وي. نو د A هر غړے په لړ کېنې په کوم متناهي مقام راځي. ځکه چې کېدے شي تابع یو پر یو نه وي، لړ تکرار لرلے شي، خو دا د منلو وړ دي، لکه چې پورته یاد شول.

بل خوا، که داسې لړ راکړل شولے وي چې د A ټول غړي شمېري، یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ داسې تعریفولے شو چې $f(n)$ د لړ n م غړے وټاکو، یا که n م غړے نه وي، نو د لړ وروستے غړے وټاکو. یوازې په هغه حالت کېنې له دې څخه پر هدف سټ بشپړه تابع نه جوړېږي چې A تش وي او له دې کبله لړ هم تش وي. نو هر نانش لړ یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ ټاکي.

تعریف 4.4. سټ A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي یا شمېرته ولري.

بېلگه 4.5. د مثبتو صحیح عددونو ($\mathbb{Z}^+$) شمېرونکې تابع یوازې د عینیت هغه تابع ده چې په $f(n) = n$ ورکړل شوې ده. د طبیعي عددونو $\mathbb{N}$ شمېرونکې تابع $g(n) = n - 1$ ده.

بېلگه 4.6. تابعې $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ او $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ چې داسې ورکړل شوې دي:

$$\begin{aligned} f(n) &= 2n \\ g(n) &= 2n - 1 \end{aligned}$$

په ترتیب سره د جفتو مثبتو صحیح عددونو او د طاقو مثبتو صحیح عددونو شمېرته کوي. خو له دوو هېڅ یوه د $\mathbb{Z}^+$ شمېرته نه ده، ځکه چې هېڅ یوه پر هدف سټ بشپړه نه ده.

تمرین 4.7. د مثبتو مربع عددونو 1، 4، 9، 16، ... یوه شمېرته تعریف کړئ.

بېلگه 4.8. تابع $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n-1}{2} \rceil$ (چې $\lceil x \rceil$ د پاسني صحیح عدد تابع ښيي، یعنې x پورته تر ټولو نږدې صحیح عدد ته گردوي) د صحیح عددونو $\mathbb{Z}$ د سټ شمېرته کوي. پام وکړئ چې f د مثبتو او منفي صحیح عددونو ترمنځ په تګ راتګ سره د $\mathbb{Z}$ قیمتونه څنګه راوباسي:

$$\begin{array}{cccccccc} f(1) & f(2) & f(3) & f(4) & f(5) & f(6) & f(7) & \dots \\ -\lceil \frac{0}{2} \rceil & \lceil \frac{1}{2} \rceil & -\lceil \frac{2}{2} \rceil & \lceil \frac{3}{2} \rceil & -\lceil \frac{4}{2} \rceil & \lceil \frac{5}{2} \rceil & -\lceil \frac{6}{2} \rceil & \dots \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -2 & 3 & -3 & \dots \end{array}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLSIZ-001) د انګرېزي جدول سرلیک او د فارمول قطار $f(7)$ لري، خو د قیمتونو قطار ئې اړین قیمت 3-پرېښی و، دلته د هماغه فارمول له مخې ورزیات شوی دے. f د حالتونو له مخې داسې تعریف شوې هم ګلې شئ:

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{که } n = 1 \text{ وي} \\ n/2 & \text{که } n \text{ جفت وي} \\ -(n-1)/2 & \text{که } n \text{ طاق او } n > 1 \text{ وي} \end{cases}$$

تمرین 4.9. وښئ چې که A او B د شمېر وړ وي، نو $A \cup B$ هم داسې دے. د دې دپاره فرض کړئ چې پر هدف سټ بشپړه تابعې $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ او $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ شته، یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A \cup B$ تعریف کړئ او ثابته کړئ چې پر هدف سټ بشپړه ده. هغه حالتونه هم په پام کېښئ چې A یا $B = \emptyset$ وي.

تمرین 4.10. وښئ چې که $B \subseteq A$ او A د شمېر وړ وي، نو B هم داسې دے. د دې دپاره فرض کړئ چې یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ شته. یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ تعریف کړئ او ثابته کړئ چې پر هدف سټ بشپړه ده. که $B = \emptyset$ وي، څه پېښېږي؟

تمرین 4.11. پر n د استقرا په وسیله وښئ چې که $A_1, A_2, \dots, A_n$ ټول د شمېر وړ وي، نو $A_1 \cup \dots \cup A_n$ هم داسې دے. دا حقیقت فرضو له شئ چې که دوه ستونه A او B د شمېر وړ وي، نو $A \cup B$ هم داسې دے.

که څه هم د یوه سټ د غړو د لړ کولو پر وخت ښايي له 1م غړي څخه شمېر پیلول زیات طبیعي ښکاري، ریاضي پوهان د څیزونو د شمېرلو دپاره طبیعي عددونه $\mathbb{N}$ کارول خوښوي. دوه د لړ د 0، 1، 2، ... او داسې نورو غړو خبرې کوي. له دې سره سم، شمېرته له $\mathbb{N}$ څخه A ته د یوې پر هدف سټ بشپړې تابعې په توګه تعریفول شوي. البته، دواړه تعریفونه همارزښته دي.

قضیه 4.12. یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ هله او یوازې هله شته چې یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ شته وي.

ثبوت. د ورکړل شوې پر هدف سټ بشپړې تابعې $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ دپاره، د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره $g(n) = f(n+1)$ تعريفولې شو. په اسانه ښکاري چې $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ يوه پر هدف سټ بشپړه تابع ده. برعکس، د ورکړل شوې پر هدف سټ بشپړې تابعې $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ دپاره، $f(n) = g(n-1)$ تعريف کړئ. □

له دې لاندې پايله ترلاسه کېږي:

نتیجه 4.13. سټ A هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي يا يوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ شته وي.

پورته مو بحث وکړ چې د سټ A د غړو لږ په بې تکراره لږ اړول کېدے شي. دا د شمېرنو دپاره هم رښتيا ده، خو په کره ډول ئې بيانول او ثابتول لږ گران دي. هره تابع $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ بايد د ټولو $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره تعريف شوې وي. که په A کېنې يوازې متناهي شمېر غړي وي، نو په ښکاره داسې تابع نه شو لرل چې د $\mathbb{Z}^+$ په نامتناهي شمېر غړو تعريف شوې وي، د A ټول غړي د قيمتونو په توگه واخلي، خو هېڅکله يو قيمت دوه ځله واخلي. په دې حالت کېنې، يعنې کله چې بې تکراره لږ متناهي وي، بايد د f دپاره د تعريف يوه بېله ساحه وټاکو، چې يوازې متناهي شمېر غړي ولري. د تکرارونو نه لرل دا معنی لري چې f بايد يو پړيو وي. ځکه چې پر هدف سټ بشپړه هم ده، نو د کوم متناهي سټ $\{1, \dots, n\}$ يا $\mathbb{Z}^+$ او A ترمنځ يوه دوه اړخيزه يو پړيو تابع لټوو.

قضيه 4.14. که $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ يوه پر هدف سټ بشپړه تابع وي (يعنې د A شمېرنه وي)، نو يوه دوه اړخيزه يو پړيو تابع $g: \mathbb{Z} \rightarrow A$ شته چې $\mathbb{Z}$ يا $\mathbb{Z}^+$ وي يا د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\{1, \dots, n\}$ وي.

ثبوت. تابع g په بازگشتي ډول تعريفوو: فرض کړئ $g(1) = f(1)$. که $g(i)$ له مخکېنې تعريف شوی وي، نو $g(i+1)$ د $f(1)$ ، $f(2)$ ، ... لومړۍ هغه قيمت وټاکئ چې تر اوسه په $g(1)$ ، ...، $g(i)$ کېنې نه وي، که داسې قيمت شته وي. که A يوازې n غړي ولري، نو $g(1)$ ، ...، $g(n)$ ټول تعريف شوي دي، او په دې ډول مو يوه تابع $g: \{1, \dots, n\} \rightarrow A$ تعريف کړې ده. که A نامتناهي شمېر غړي ولري، نو د هر i دپاره بايد د $f(1)$ ، $f(2)$ ، ... په شمېرنه کېنې د A يو داسې غړی وي چې تر اوسه په $g(1)$ ، ...، $g(i)$ کېنې نه وي. په دې حالت کېنې مو يوه تابع $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ تعريف کړې ده.

تابع g پر هدف سټ بشپړه ده، ځکه چې د A هر غړی په $f(1)$ ، $f(2)$ ، ... کېنې دے (ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده) او له دې کبله به بالاخره د کوم i دپاره د $g(i)$ قيمت شي. دا يو پړيو هم ده، ځکه چې که داسې $j < i$ وای چې $g(j) = g(i)$ وای، نو $g(i)$ به له مخکېنې په $g(1)$ ، ...، $g(i-1)$ کېنې و، چې زموږ د g له تعريف سره په ټکر کېنې دے. □

نتیجه 4.15. سټ A هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې تش وي يا يوه دوه اړخيزه يو پړيو تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ شته وي، چې يا $N = \mathbb{N}$ وي يا د کوم $n \in \mathbb{N}$ دپاره $N = \{0, \dots, n\}$ وي.

ثبوت. A هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې A تش وي يا يوه پر هدف سټ بشپړه $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ شته وي. د 4.14 له مخې، وروستۍ خبره هله او يوازې هله سمه ده چې يوه دوه اړخيزه يو پړيو تابع $f: \mathbb{Z} \rightarrow A$ شته وي، چې $\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^+$ يا د کوم $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\mathbb{Z} = \{1, \dots, n\}$ وي. د 4.12 د ثبوت د هماغه استدلال له مخې، دا بيا هله او يوازې هله سمه ده چې يوه دوه اړخيزه يو پړيو تابع $g: \mathbb{N} \rightarrow A$ شته وي، چې يا $N = \mathbb{N}$ وي يا $N = \{0, \dots, n-1\}$ وي. □

تمرین 4.16. د 4.4 له مخې، سټ A هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې $A = \emptyset$ وي يا يوه پر هدف سټ بشپړه $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ شته وي. «د شمېر وړ سټ» په کره ډول داسې هم تعريفولې شو: سټ هله او يوازې هله د شمېر وړ دے چې يوه يو پړيو تابع $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ شته وي. وښئ چې تعريفونه همارزښته دي، يعنې وښئ چې يوه يو پړيو تابع $g: A \rightarrow \mathbb{Z}^+$ هله او يوازې هله شته چې يا $A = \emptyset$ وي يا يوه پر هدف سټ بشپړه $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ شته وي.

4.3 د کانتور د زیځراک طریقه

مخکنې مو ځینې «اسانې» شمېرنې په پام کېنې نیولې دي. اوس به یو لږ ګران کار په پام کېنې ونیسو. د طبیعي عددونو د جوړو سټ په پام کېنې ونیسئ، چې په 1.5 کېنې مو داسې تعریف کړئ و:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m \rangle : n, m \in \mathbb{N}\}$$

دا مرتبې جوړې په یوه جدولې ترتیب کېنې داسې برابرولې شو:

	0	1	2	3	...
0	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 3 \rangle$	...
1	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$	$\langle 1, 3 \rangle$	...
2	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 2 \rangle$	$\langle 2, 3 \rangle$	...
3	$\langle 3, 0 \rangle$	$\langle 3, 1 \rangle$	$\langle 3, 2 \rangle$	$\langle 3, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

په ښکاره، په $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ کېنې هره مرتبه جوړه به په دې جدول کېنې په دقیقه توګه یو ځل راشي. په ځانګړې ډول، $\langle n, m \rangle$ به په n م قطار او m م ستون کېنې راشي. خو د داسې جدول غړي په یوه «یو بعدی» لړ کېنې څنګه برابر کړو؟ په لاندې جدول کېنې نمونه د دې کار یوه لار ښيي، که څه هم البته ډېرې نورې لارې هم شته:

	0	1	2	3	4	...
0	0	1	3	6	10	...
1	2	4	7	11	...	...
2	5	8	12	...	...	...
3	9	13	...	...	...	...
4	14	...	...	...	...	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	...	$\ddots$

دا نمونه د کانتور د زیځراک طریقه بلل کېږي. دا د $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ شمېرنه داسې کوي:

$$\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 0, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle, \dots$$

او له دې لاندې خبره ثابتېږي:

قضیه 4.17. $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ یو د شمېر وړ سټ ده.

ثبوت. فرض کړئ $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ هر $k \in \mathbb{N}$ له هغې مرتبې څوګونې $\langle n, m \rangle \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ سره تړي چې k د کانتور د زیځراک په جدول کېنې د n م قطار او m م ستون قیمت وي. □

دا تخنیک په ښه ډول عمومي کېدو ته هم شي. د بېلګې په توګه، د طبیعي عددونو د مرتبو درې ګونو د سټ د شمېرنې دپاره ئې کارولې شو؛ یعنې:

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} = \{\langle n, m, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ له $\mathbb{N}$ سره د $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ د کارټیزي حاصل ضرب په توګه ګڼو؛ یعنې:

$$\mathbb{N}^3 = (\mathbb{N} \times \mathbb{N}) \times \mathbb{N} = \{\langle \langle n, m \rangle, k \rangle : n, m, k \in \mathbb{N}\}$$

نو د یوه محور د $\mathbb{N}$ په شمېرني او د بل محور د $\mathbb{N}^2$ په شمېرني په نښه کولو سره، د یوه جدول په وسیله د $\mathbb{N}^3$ شمېرنه کول شوي:

	0	1	2	3	...
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 0 \rangle$	$\langle 0, 1, 1 \rangle$	$\langle 0, 1, 2 \rangle$	$\langle 0, 1, 3 \rangle$	...
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0, 2 \rangle$	$\langle 1, 0, 3 \rangle$	...
$\langle 0, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 2, 2 \rangle$	$\langle 0, 2, 3 \rangle$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

نو د کانتور د زیځاک طریقي ته ورته طریقي په کارولو سره د $\mathbb{N}^3$ شمېرنه هم ترلاسه کول شو. او همداسې مخ په وړاندې تللې شو، چې د هر طبیعي عدد n دپاره د $\mathbb{N}^n$ شمېرني ترلاسه کړو. نو لرو:

قضیه 4.18. د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره، $\mathbb{N}^n$ یو د شمېر وړ سټ ده.

تمرین 4.19. وښیئ چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره، $(\mathbb{Z}^+)^n$ یو د شمېر وړ سټ ده.

تمرین 4.20. وښیئ چې $(\mathbb{Z}^+)^*$ یو د شمېر وړ سټ ده. **قضیه 4.19** فرضو له شئ.

4.4 جوړوونکي تابعي او کوډونه

د کانتور د زیځاک طریقه د $\mathbb{N}^n$ د شمېر وړ والې په انځوریز ډول څرګندوي. خورائځي پر هغه جدول تمرکز وکړو چې $\mathbb{N}^2$ ښیي. په جدول کښې د زیځاک کرښه تعقیبول او مقامونه شمېرل راښیي چې $\langle 1, 2 \rangle$ له عدد 7 سره تړل شوې ده. خو ښه به وي که دا په لا نېغه توګه حسابول شو. یعنې ښه به وي چې د زیځاک شمېرني معکوس تابع $g: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ په لاس کښې ولرو، داسې چې:

$$g(\langle 0, 0 \rangle) = 0, \quad g(\langle 0, 1 \rangle) = 1, \quad g(\langle 1, 0 \rangle) = 2, \quad \dots, \quad g(\langle 1, 2 \rangle) = 7, \quad \dots$$

په دې سره په دقیق ډول حسابول شو چې $\langle n, m \rangle$ به زموږ په شمېرنه کښې چېرته راشي.

په حقیقت کښې، په دوو مشاهدو سره g په نېغه توګه تعریفول شو. لومړی: که د m قطار او m ستون قیمت v وي، نو د $(n+1)$ قطار او $(m-1)$ ستون قیمت $v+1$ ده. دویم: زموږ د شمېرني لومړی قطار له مثلي عددونو جوړ ده چې له 0، 1، 3، 6 او داسې نورو پیلېږي. k مثلي عدد د هغو طبیعي عددونو جمع ده چې $k < k$ دي، او په $k(k+1)/2$ حسابېږي. د دې دوو مشاهدو په یوځای کولو لاندې تابع په پام کښې ونیسئ:

$$g(n, m) = \frac{(n+m+1)(n+m)}{2} + n$$

ډېر وخت د $g(\langle n, m \rangle)$ پر ځای یوازې $g(n, m)$ لیکو، ځکه چې سترګو ته اسانه ده. دا لومړی د $(n+m)^{\text{th}}$ مثلي عدد ټاکل او بیا n ورزیاتول درته وایي. او دا جدول په هماغه طریقه ډکوي چې غواړو ئې. نو په ځانګړي ډول، جوړه $\langle 1, 2 \rangle$ له $7 = \frac{4 \times 3}{2} + 1$ سره تړل کېږي.

دا تابع g د جوړو د یوه سټ د شمېرني معکوس ده. داسې تابعي جوړوونکي تابعي بلل کېږي.

تعریف 4.21 (جوړوونکي تابع). تابع $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ یوه حسابي جوړوونکي تابع ده که f یو پریو وي. دا هم وایو چې f د $A \times B$ کوډول کوي، او $f(x, y)$ د $\langle x, y \rangle$ کوډ ده.

جوړوونکي تابعي د بېلګې په توګه د طبیعي عددونو د جوړو د کوډولو دپاره کارول شو، یا په بله وینا، د غړو هره جوړه په یوه واحد عدد ښودل شو. د جوړوونکي تابعي په معکوس عدد بېرته لوستل شو، یعنې معلومول شو چې کومه جوړه ښیي.

تمرین 4.22. د ټولو غیر منفي ناطقو عددونو د سټ یوه شمېرنه ورکړئ.

تمرین 4.23. وښیئ چې $\mathbb{Q}$ د شمېر ور دے. په یاد ولریئ چې هر ناطق عدد د کسر z/m په توګه لیکل کېدای شي، چې $z \in \mathbb{Z}$ او $m \in \mathbb{N}^+$ وي.

تمرین 4.24. د $\mathbb{B}^*$ یوه شمېرنه تعریف کړئ.

تمرین 4.25. د منطق له پېژندنیز کورس په یاد ولریئ چې د رښتیاوالي هر ممکن جدول د رښتیاوالي یوه تابع څرګندوي. په بله وینا، د کوم k دپاره د رښتیاوالي تابعي ټولې تابعي له $\mathbb{B}^k \rightarrow \mathbb{B}$ څخه دي. ثابته کړئ چې د رښتیاوالي د ټولو تابعو سټ د شمېر ور دے.

تمرین 4.26. وښیئ چې د یوه خپل سري نامتناهي د شمېر ور سټ د ټولو متناهي فرعي ستونو سټ د شمېر ور دے.

تمرین 4.27. د $\mathbb{N}$ یوه فرعي سټ ته هله د متناهي متمم لرونکې ویل کېږي چې متمم ئې په $\mathbb{N}$ کېنې متناهي سټ وي؛ یعنې $A \subseteq \mathbb{N}$ هله د متناهي متمم لرونکې دے چې $A \setminus \mathbb{N}$ متناهي وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLSIZ-002) د انګرېزي سرچینې په تعریف کېنې د متناهي فرعي سټ او طبیعي عددونو د سټ تر منځ اړیکه پاتې وه؛ ورپسې هم ارز فارمول ښیي چې مطلب په طبیعي عددونو کېنې متناهي متمم دے. فرض کړئ I هغه سټ دے چې غړي ئې په دقیقه توګه د $\mathbb{N}$ متناهي او د متناهي متمم لرونکي فرعي ستونه دي. وښیئ چې I د شمېر ور دے.

تمرین 4.28. وښیئ چې د د شمېر ور ستونو د شمېر ور اتحاد د شمېر ور دے. یعنې، هرکله چې $A_1, A_2, \dots$ ستونه وي او هر A_i د شمېر ور وي، نو د هغو ټولو اتحاد $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ هم د شمېر ور دے. [یادونه: دا ګران دے!]

تمرین 4.29. فرض کړئ $f: A \times B \rightarrow \mathbb{N}$ یوه خپله سري جوړوونکې تابع ده او د جوړو سټ نانتش دے. وښیئ چې د f معکوس پر خپلې د تعریف ساحې دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده چې د قیمتونو سټ ئې $A \times B$ دے، او د هغې له ساحې څخه بهر د یوې ثابتې جوړې په ورکولو د طبیعي عددونو پر ټولو غړو څڅېدے شي. د ژباړې د نسخې سمون: (PSSIZ-001) انګرېزي تمرین د معکوس تابع د تعریف ساحه د اصلي تابعي له قیمتونو سټ څخه ټولو طبیعي عددونو ته نه وه څڅولې، او د ش جوړو سټ حالت ئې هم نه و بیل کړے.

تمرین 4.30. داسې تابع وټاکئ چې $\mathbb{N}^3$ کوډ کړي.

4.5 یوه بله جوړوونکې تابع

د $\mathbb{N}^2$ داسې نورې شمېرنې هم شته چې د هغو د معکوس تابعو معلومول اسانه کوي. یوه ئې دا ده. د شمېرنې پر جدولې ترتیب د انځورولو پر ځای، د مثبتو صحیح عددونو له داسې لړ څخه پیل وکړئ چې په سر کېنې له تشو ځایونو سره تړلے وي. وانګېړئ چې دا ځایونه یو په بل پسې په لاندې ډول په جوړو $\langle n, m \rangle$ ډکوو. لومړے له هغو جوړو پیل وکړئ چې په لومړي مقام کېنې 0 لري (یعنې جوړې $\langle 0, m \rangle$)؛ لومړۍ جوړه (یعنې $\langle 0, 0 \rangle$) په لومړي تش مقام کېنې کېږدئ، بیا یو تش مقام پرېږدئ، دویمه جوړه (یعنې $\langle 0, 1 \rangle$) په ورپسې تش مقام کېنې کېږدئ، بیا یو مقام پرېږدئ، او همداسې ځنګېنې لار شئ. د ژباړې د نسخې سمون: (PSSIZ-002) انګرېزي نثر دویمه جوړه په تېروتنه د درېیمې جوړې په لنډه ښیي؛ لاندې اصلي جدول ئې سمه، دویمه جوړه څرګندوي. زموږ د شمېرنې (نیمګړے) پیل اوس داسې دے:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

$\langle 0, 0 \rangle$ $\langle 0, 1 \rangle$ $\langle 0, 2 \rangle$ $\langle 0, 3 \rangle$ $\langle 0, 4 \rangle$...

همدا کار د $\langle 1, m \rangle$ جوړو دپاره په هغو مقامونو کېنې تکرار کړئ چې لا تش پاتې دي، بیا هم هر بل تش مقام پرېږدئ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

$\langle 0, 0 \rangle$ $\langle 1, 0 \rangle$ $\langle 0, 1 \rangle$ $\langle 0, 2 \rangle$ $\langle 1, 1 \rangle$ $\langle 0, 3 \rangle$ $\langle 0, 4 \rangle$ $\langle 1, 2 \rangle$...

په همدې طریقه $\langle 2, m \rangle$ ، $\langle 3, m \rangle$ او داسې نورې جوړې ور دننه کړئ. د ژباړې د نسخې سمون: (OLSIZ-003) انگرېزي نثر د دوو پرله پسې قطارونو پر ځای د یوه قطار نښه دوه ځله تکراروي؛ بشپړ اصلي جدول د پرله پسې قطارونو لوستل تاییدوي. نو زموږ بشپړه شمېرنه داسې پیلېږي:

$$\begin{array}{cccccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & \dots \\ \langle 0, 0 \rangle & \langle 1, 0 \rangle & \langle 0, 1 \rangle & \langle 2, 0 \rangle & \langle 0, 2 \rangle & \langle 1, 1 \rangle & \langle 0, 3 \rangle & \langle 3, 0 \rangle & \langle 0, 4 \rangle & \langle 1, 2 \rangle & \dots \end{array}$$

که د پورته جدول جړې د همدې شمېرنې له مخې وشمېرو، د زیږاک پاکه کرښه به ونه مومو، بلکې دا ترتیب به ومومو:

	0	1	2	3	4	5	...
0	1	3	5	7	9	11	...
1	2	6	10	14	18	...	...
2	4	12	20	28	...	...	...
3	8	24	40	...	...	...	...
4	16	48	...	...	...	...	...
5	32	...	...	...	...	...	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

وینو چې په 0 قطار کښې جوړې زموږ د شمېرنې په طاق شمېره لرونکو مقامونو کښې دي؛ یعنې جوړه $\langle 0, m \rangle$ په $2m + 1$ مقام کښې ده. د دویم قطار جوړې، $\langle 1, m \rangle$ ، په هغو مقامونو کښې دي چې شمېرې د یوه طاق عدد دوه چنده دے، په ځانګړي ډول $2 \cdot (2m + 1)$ ؛ د درېیم قطار جوړې، $\langle 2, m \rangle$ ، په هغو مقامونو کښې دي چې شمېرې د یوه طاق عدد څلور چنده، $4 \cdot (2m + 1)$ ، دے؛ او همداسې نور. په هر قطار کښې د $(2m + 1)$ ضربي عوامل، 1، 2، 4، 8، ...، په دقیقه توګه د 2 طاقتونه دي: $2^0 = 1$ ، $2^1 = 2$ ، $2^2 = 4$ ، $2^3 = 8$ ، ... په حقیقت کښې، اړوند توان ښودونکې تل د پام وړ جوړې لومړۍ غړۍ وي. نو د جوړې $\langle n, m \rangle$ دپاره عامل 2^n دے. په دې توګه عمومي فارمول لاس ته راځي: $2^n \cdot (2m + 1)$. خو دا له جوړو څخه مثبتو صحیح عددونو ته نقشه ده؛ یعنې $\langle 0, 0 \rangle$ مقام 1 لري. که وغواړو له مقام 0 څخه پیل وکړو، باید له پایلې څخه 1 منفي کړو. نو دا لاس ته راوړو:

بېلګه 4.31. تابع $h: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده،

$$h(n, m) = 2^n(2m + 1) - 1$$

د طبیعي عددونو د جوړو د سټ $\mathbb{N}^2$ یوه جوړوونکې تابع ده.

له دې سره سم، زموږ د $\mathbb{N}^2$ په دویمه شمېرنه کښې جوړه $\langle 0, 0 \rangle$ کوډ $h(0, 0) = 2^0(2 \cdot 0 + 1) - 1 = 0$ لري؛ $\langle 1, 2 \rangle$ کوډ $2^1 \cdot (2 \cdot 2 + 1) - 1 = 2 \cdot 5 - 1 = 9$ لري؛ او $\langle 2, 6 \rangle$ کوډ $2^2 \cdot (2 \cdot 6 + 1) - 1 = 51$ لري.

ځینې وخت د طبیعي عددونو د جوړو $\mathbb{N}^2$ کوډول دومره بس وي، بې له دې چې کوډونه پر هدف سټ بشپړ وي. د داسې کوډولو معکوسې تابعې یوازې جزوي تابعې وي.

بېلګه 4.32. تابع $j: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}^+$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده،

$$j(n, m) = 2^n 3^m$$

یوه یو پریو تابع $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ ده.

4.6 د شمېرنه وړ سټونه

اداري يادونه - دا برخه په 4.2 کښې د ورکړل شوي تعريف په کارولو د $\mathbb{B}^\omega$ او $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نه وړ والې ثابتوي. دا د 4.11 له بڼې څخه لږه ابتدايي او لږه زياته تفصيلي جوړه شوې ده.

ځينې ستونه، لکه د مثبتو صحيح عددونو سټ $\mathbb{Z}^+$ ، نامتناهي دي. تر اوسه مو د نامتناهي ستونو داسې بېلګې ليدلې چې ټولې د شمېر وړ وي. خو داسې نامتناهي ستونه هم شته چې دا خاصيت نه لري. داسې ستونه د شمېر نه وړ بلل کېږي.

تر هر څه لومړۍ بڼايي همدا خبره لا حيرانوونکې وي چې د شمېر نه وړ ستونه شته. د هر د شمېر وړ سټ A دپاره يوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ شته. که يو سټ د شمېر نه وړ وي، داسې تابع نه شته. يعنې هېڅ هغه تابع چې د $\mathbb{Z}^+$ بې شمېره غړي پر A نقشوي، ټول A نه شي پوره کول. نو په A کښې د بې شمېره مثبتو صحيح عددونو په پرتله «زيات» غړي شته.

څنگه به ثابتوو چې يو سټ د شمېر نه وړ دے؟ بايد وښيي چې داسې پر هدف سټ بشپړه تابع وجود نه شي لرل. په مساوي ډول، بايد وښيي چې د A غړي په يو اړخيز نامتناهي لړ کښې نه شي شمېرل کېدے. د دې تر ټولو ښه لار دا ده چې وښيي د A د غړي هر لړ بايد لږ تر لږه يو غړۍ پرېږدي، يا دا چې هېڅ تابع $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ پر هدف سټ بشپړه نه شي کېدے. دا د کانتور په قطري طريقه کول شو. د A د غړي يو لړ، د بېلګې په ډول $x_1, x_2, \dots$ ، چې راکړل شي، موږ د A يو بل غړۍ جوړوو چې د خپل جوړښت له مخې په هېڅ ډول په هغه لړ کښې نه شي راتلے.

زموږ لومړۍ بېلګه د ټولو هغو بې شمېرې نامتناهي تسلسلونو سټ $\mathbb{B}^\omega$ دے چې له 0 کانو او 1 کانو جوړ دي.

قضيه 4.33. $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نه وړ دے.

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر وړ دے، يعنې فرض کړئ چې د $\mathbb{B}^\omega$ د ټولو غړي يو لړ $s_1, s_2, s_3, s_4, \dots$ شته. له دې هر يو s_i پخپله د 0 کانو او 1 کانو يو نامتناهي تسلسل دے. د دې لړ د i م تسلسل i م غړۍ به $s_i(j)$ ويولو. نو i م تسلسل s_i دا دے:

$$s_i(1), s_i(2), s_i(3), \dots$$

دا لړ، او په کښې د هر تسلسل s_i غړي، په يوه جدولي ترتيب کښې اېښودلے شو:

	1	2	3	4	...
1	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	$s_1(4)$	...
2	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	$s_2(4)$	...
3	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	$s_3(4)$	...
4	$s_4(1)$	$s_4(2)$	$s_4(3)$	$s_4(4)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

د څنگ پر خوا ښيي په لړ کښې د تسلسلونو شمېرې $s_1, s_2, \dots$ راګوي؛ د پاسنۍ خوا شمېرې د هر يوه تسلسل غړي په ښه کوي. د بېلګې په ډول، $s_1(1)$ د هغه عدد نوم دے چې، که 0 وي يا 1، په تسلسل s_1 کښې لومړۍ غړۍ دے؛ او همدا سې نور.

اوس د 0 کانو او 1 کانو يو داسې نامتناهي تسلسل $\bar{s}$ جوړوو چې په هېڅ ډول په دې لړ کښې نه شي راتلے. د $\bar{s}$ تعريف به په لړ $s_1, s_2, \dots$ پورې تړلے وي. د 0 کانو او 1 کانو د نامتناهي تسلسلونو هر نامتناهي لړ يو داسې نامتناهي تسلسل $\bar{s}$ راپيدا کوي چې په ډاډه توګه په هغه لړ کښې نه راځي.

د $\bar{s}$ د تعريفولو دپاره د هغه ټول غړي ټاکو؛ يعنې د ټولو $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\bar{s}(n)$ ټاکو. دا کار د پورته جدولي ترتيب پر قطر د لاندې تلوو (ځکه ورته «قطري طريقه» وايي)، بيا د هر 1 په 0 او د هر 0 په 1 بدلولو کوو. په لا مجرد ډول، $\bar{s}(n)$ د دې له مخې 0 يا 1 تعريفوو چې د قطر n م غړۍ، $s_n(n)$ ، دے که 0:

$$\bar{s}(n) = \begin{cases} 1 & \text{که } s_n(n) = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که } s_n(n) = 1 \text{ وي} \end{cases}$$

که فارمولونه مو د حالتونو تر تعریف زیات خوښه‌یږي، دا هم تعریفولې شی چې $\bar{s}(n) = 1 - s_n(n)$.

په څرکند ډول $\bar{s}$ د 0 کانو او 1 کانو یو نامتناهي تسلسل دے، ځکه دا یوازې د هغو 0 کانو او 1 کانو مخالف تسلسل دے چې زموږ د جدولی ترتیب پر قطر راځي. نو $\bar{s}$ د $\mathbb{B}^\omega$ یو غړی دے. خو دا په لږ $s_1, s_2, \dots$ کښې نه شي راتلے. ولې؟

دا په لږ کښې لومړۍ تسلسل s_1 نه شي کېدے، ځکه په لومړي غړی کښې له s_1 څخه توپیر لري. $s_1(1)$ چې هر څه وي، موږ $\bar{s}(1)$ د هغه مخالف تعریف کړے دے. دا په لږ کښې دویم تسلسل نه شي کېدے، ځکه $\bar{s}$ په دویم غړي کښې له s_2 څخه توپیر لري: که $(s_2(2), 0, \bar{s}(2), 1)$ دے، او برعکس. او همداسې نور.

په لا دقیقه توګه: که $\bar{s}$ په لږ کښې وے، یو k به داسې وے چې $\bar{s} = s_k$. دوه تسلسلونه هله او یوازې هله یو شان وي چې په هر مقام کښې سره سمون ولري؛ یعنې د هر n دپاره $\bar{s}(n) = s_k(n)$ وي. نو په ځانګړي ډول چې $n = k$ واخلو، باید $\bar{s}(k) = s_k(k)$ وي. $s_k(k)$ یا 0 دے یا 1. که 0 وي، $\bar{s}(k)$ باید 1 وي؛ همداسې مو $\bar{s}$ تعریف کړے دے. خو که $s_k(k) = 1$ وي، بیا هم د $\bar{s}$ د تعریف له مخې $\bar{s}(k) = 0$. په هر حالت کښې $\bar{s}(k) \neq s_k(k)$.

موږ د $\mathbb{B}^\omega$ د غړي د یوه لږ $s_1, s_2, \dots$ په فرضولو پیل وکړ. له دې لږ څخه مو تسلسل $\bar{s}$ جوړ کړ چې ثابت مو کړه په لږ کښې نه شي راتلے. خو که ټول s_i د 0 کانو او 1 کانو تسلسلونه وي، دا خاخوا د 0 کانو او 1 کانو یو تسلسل دے؛ یعنې $\bar{s} \in \mathbb{B}^\omega$. دا په ځانګړي ډول ښیي چې د $\mathbb{B}^\omega$ د ټولو غړي هېڅ لږ نه شي کېدے، ځکه د هر داسې لږ دپاره یو داسې تسلسل $\bar{s}$ هم جوړولے شو چې په داده توګه په لږ کښې نه راتلے؛ نو دا فرض چې په $\mathbb{B}^\omega$ کښې د ټولو تسلسلونو یو لږ شته، تناقض ته رسېږي. □

د ثبوت دې طریقې ته «قطرول» ویل کېږي، ځکه د $\bar{s}$ د تعریف دپاره د جدولی ترتیب قطر کاروي. په قطرولو کښې د جدول شتون لازم نه دے: په ورته مفکوره ښودلے شو چې ستونه د شمېر وړ نه دي، ان هغه وخت چې هېڅ جدول او رښتینۍ قطر نه وي.

قضیه 4.34. $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر وړ نه دے.

ثبوت. په هماغه طریقه ځنګښې څو: ښیو چې د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي ستونو د هر لږ دپاره د $\mathbb{Z}^+$ یو داسې فرعي سټ شته چې په هغه لږ کښې نه شي راتلے. فرض کړئ دا د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي ستونو یو ورکړل شوی لږ دے:

$$Z_1, Z_2, Z_3, \dots$$

اوس یو سټ $\bar{Z}$ داسې تعریفوو چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، $n \in \bar{Z}$ هله او یوازې هله چې $n \notin Z_n$:

$$\bar{Z} = \{n \in \mathbb{Z}^+ : n \notin Z_n\}$$

$\bar{Z}$ په څرکند ډول د مثبتو صحیح عددونو یو سټ دے، ځکه د فرض له مخې هر Z_n داسې دے؛ او له دې امله $\bar{Z} \in \wp(\mathbb{Z}^+)$. خو $\bar{Z}$ په لږ کښې نه شي راتلے. د دې د ښودلو دپاره به ثابت کړو چې د هر $k \in \mathbb{Z}^+$ دپاره $\bar{Z} \neq Z_k$.

نو $k \in \mathbb{Z}^+$ خپله سرے ونیسئ. موږ $\bar{Z}$ داسې تعریف کړے چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، $n \in \bar{Z}$ هله او یوازې هله چې $n \notin Z_n$. په ځانګړي ډول چې $n = k$ واخلو، $k \in \bar{Z}$ هله او یوازې هله چې $k \notin Z_k$. خو دا ښیي چې $\bar{Z} \neq Z_k$ ، ځکه k د یوه سټ غړی دے خو د بل نه دے، او له دې امله $\bar{Z}$ او Z_k بېل غړي لري. ځکه چې k خپله سرے و، $\bar{Z}$ په لږ $Z_1, Z_2, \dots$ کښې نه دے. □

تېر ثبوت د قطر نوم وانه خپست، خو که داسې ئې انځور کړئ، قطري طریقه په کښې لیدلے شی: وانګېرئ چې ستونه $Z_1, Z_2, \dots$ په یوه جدولی ترتیب کښې لیکل شوي، چې هر غړی $Z_i \in \bar{Z}$ په $\bar{Z}$ ژم ستون کښې لیکل کېږي. فرض کړئ په هغه لږ کښې لومړي څلور ستونه $\{1, 2, 3, \dots\}$ ، $\{2, 4, 6, \dots\}$ ، $\{1, 2, 5\}$ او $\{3, 4, 5, \dots\}$ دي. نو جدولی ترتیب به داسې پیل شي:

$$\begin{aligned} Z_1 &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\} \\ Z_2 &= \{2, 4, 6, \dots\} \\ Z_3 &= \{1, 2, 5\} \\ Z_4 &= \{3, 4, 5, 6, \dots\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

بيا $\bar{Z}$ هغه سټ دے چې د قطر پر لاندې ټلو جوړېږي: هغه شمېرې پرېږدو چې پر قطر راځي، او هغه Z کاني ور شاملوو چې د جدول په Z م قطار/ستون کښې تش ځای لري. په پورته حالت کښې به 1 او 2 پرېږدو، 3 به ور شاملوو، 4 به پرېږدو، او همداسې نور.

تمرین 4.35. په قطري استدلال وښیئ چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نه وړ دے.

تمرین 4.36. په څرګند قطري استدلال وښیئ چې د تابعو سټ $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ د شمېر نه وړ دے. یعنې وښیئ چې که $f_1, f_2, \dots$ تابعو یو لړ وي او هر $f_i: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ وي، نو یوه $\bar{f}: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$ شته چې په دې لړ کښې نه ده.

4.7 راکونه

اداري یادونه. دا برخه په راکونه د شمېر نه وړ والې ثابتوي، او پایلې ئې د 4.6 له پایلو سره سمون خوري. یوه بله، لږه لنډه بڼه چې د 4.12 له پایلو سره سمون خوري، په 4.13 کښې ورکړل شوې ده.

موږ په قطري استدلال وښودل چې $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نه وړ دے. له دې مخکښې مو ثابتې کړې وه چې $\mathbb{B}^\omega$ ، یعنې د 0 کانو او 1 کانو د ټولو نامتناهي تسلسلونو سټ، د شمېر نه وړ دے. دا د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د د شمېر نه وړ کېدو د ثابتولو یوه بله لار ده: وښیئ چې که $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر وړ وي، نو $\mathbb{B}^\omega$ هم د شمېر وړ دے. ځکه پوهېږو چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر وړ نه دے، هم داسې نه شي کېدے. دې ته د یوې مسئلې بلې ته راکونه ویل کېږي، په دې حالت کښې د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېرلو مسئلې ته راکوو. د وروستۍ مسئلې یو حل، یعنې د $\wp(\mathbb{Z}^+)$ یوه شمېرنه، به د لومړۍ مسئلې حل، یعنې د $\mathbb{B}^\omega$ یوه شمېرنه، راکړي.

د یوه سټ B د شمېرلو مسئله څنګه د یوه سټ A د شمېرلو مسئلې ته راکوو؟ د یوې شمېرنې د B په شمېرنه د اړولو یوه لار ورکوو. د دې تر ټولو اسانه لار د یوې پر هدف سټ بشپړه تابع $f: A \rightarrow B$ تعریفول دي. که $x_1, x_2, \dots$ د A شمېرنه وي، نو $f(x_1), f(x_2), \dots$ به د B شمېرنه وي. زموږ په حالت کښې د یوې پر هدف سټ بشپړې تابع $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ په لټه کښې یو.

تمرین 4.37. وښیئ چې که یوه یو پر یو تابع $g: B \rightarrow A$ وي او B د شمېر نه وړ وي، نو A هم همداسې دے. دا په ښودلو وکړئ چې څنګه د g په کارولو د A یوه شمېرنه د B په شمېرنه اړولې شي.

په راکونه د 4.34 ثبوت. فرض کړئ چې $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر وړ وے، اوله دې امله د هغه یوه شمېرنه $Z_1, Z_2, Z_3, \dots$ وے.

تابع $f: \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ داسې تعریف کړئ چې $f(Z)$ هغه تسلسل s وي چې $s(n) = 1$ هله او یوازې هله چې $n \in Z$ وي، او په بل حالت کښې $s(n) = 0$ وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLSIZ-004) په انګریزي نثر کښې د تسلسل بې تراوه شاخص د خپل سري ورودي سټ له لنډې سره بدل شو، خو د تابع تعریف روښانه وي. دا په څرګند ډول تابع تعریفوي، ځکه کله چې $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ وي، هر $n \in \mathbb{Z}^+$ یا د Z یو غړی وي یا نه وي. د بېلګې په ډول، د مثبتو جفتو عددونو سټ $2\mathbb{Z}^+ = \{2, 4, 6, \dots\}$ تسلسل $010101\dots$ ته نقشېږي، تش سټ $0000\dots$ ته او پخپله سټ $\mathbb{Z}^+$ ته $1111\dots$ ته نقشېږي.

دا پر هدف سټ بشپړه هم ده: د 0 کانو او 1 کانو هر تسلسل د مثبتو صحیح عددونو له یوه سټ سره سمون خوري، یعنې له هغه سټ سره چې غړي ئې هغه صحیح عددونه دي کوم چې د تسلسل د 1 لرونکو مقامونو سره سمون خوري. په لا دقیقه توګه، فرض کړئ $s \in \mathbb{B}^\omega$ ، $Z \subseteq \mathbb{Z}^+$ په لاندې ډول تعریف کړئ:

$$Z = \{n \in \mathbb{Z}^+ : s(n) = 1\}$$

بيا $f(Z) = s$ ، لکه چې د f تعریف ته په ځلو تاپیدولے شو.

اوس دا لږ په پام کښې ونیسئ:

$$f(Z_1), f(Z_2), f(Z_3), \dots$$

ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، د $\mathbb{B}^\omega$ هر غړی باید د کوم ورودي دپاره د f د قیمت په توګه راشي، او نو باید په لړ کښې راشي. له دې امله دا لړ باید ټول $\mathbb{B}^\omega$ وشمېري.

نو که $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر وړ وے، $\mathbb{B}^\omega$ به د شمېر وړ وے. خو $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نه وړ دے (4.33). له دې امله $\wp(\mathbb{Z}^+)$ د شمېر نه وړ دے. □

د راکوڼي په لوري کښې کډوډېدل اسانه دي. د بېلګې په ډول، یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow B$ دا نۀ ثابتوي چې B د شمېر نۀ وړ دے. (تابع $g: \mathbb{B}^\omega \rightarrow \mathbb{B}$ په پام کښې ونیسئ چې په $g(s) = s(1)$ تعریف شوې؛ دا تابع د 0 کانو او 1 کانو یو تسلسل د هغه لومړي غړې ته نقشوي. دا پر هدف سټ بشپړه ده، ځکه ځینې تسلسلونه په 0 او ځینې په 1 پیلېږي. خو $\mathbb{B}$ متناهي دے.) دا هم په یاد ولرئ چې تابع f باید پر هدف سټ بشپړه وي، کڼې استدلال مخکښې نۀ ځي: بیا به دا ډاډ نۀ وي چې $f(x_1), f(x_2), \dots$ د B ټول غړي لري. د بېلګې په ډول،

$$h(n) = \underbrace{000 \dots 0}_{0 \text{ کاني}} 111 \dots$$

تابع $h: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ تعریفوي، خو $\mathbb{Z}^+$ د شمېر وړ دے. د ژباړې د نسخې سمون: (OLSIZ-005) اصلي ښودل شوې حاصل متناهي توریز تسلسل و، نو د یادې تابع د هدف غړې نۀ و. دلته تر لومړنیو صفرونو وروسته د یوونو نامتناهي لکۍ ورزیاته شوې؛ د راکوڼي د لوري په اړه پایله هماغه پاتې کېږي.

تمرین 4.38. په راکوڼي استدلال وښیئ چې د مثبتو صحیح عددونو د جوړو د ستونو سټ د شمېر نۀ وړ دے.

تمرین 4.39. په راکوڼي استدلال وښیئ چې د ټولو تابعو $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ سټ X د شمېر نۀ وړ دے. (لارښوونه: له X څخه $\mathbb{B}^\omega$ ته یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ورکړئ.)

تمرین 4.40. وښیئ چې $\mathbb{N}^\omega$ ، یعنې د طبیعي عددونو د نامتناهي تسلسلونو سټ، په راکوڼي استدلال د شمېر نۀ وړ دے.

تمرین 4.41. فرض کړئ P له مثبتو صحیح عددونو څخه سټ $\{0\}$ ته د تابعو سټ دے، او Q له مثبتو صحیح عددونو څخه سټ $\{0\}$ ته د جزوي تابعو سټ دے. وښیئ چې P د شمېر وړ دے او Q نۀ دے. (لارښوونه: د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د Q شمېرلو ته راکه کړئ.)

تمرین 4.42. فرض کړئ S له مثبتو صحیح عددونو څخه سټ $\{0, 1\}$ ته د ټولو پر هدف سټ بشپړه تابعو سټ دے؛ یعنې S له ټولو پر هدف سټ بشپړه $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{B}$ څخه جوړ دے. وښیئ چې S د شمېر نۀ وړ دے. د ژباړې د نسخې سمون: (PSSIZ-003) په انګرېزي نثر کښې د دوه غړیز سټ نښه له ریاضي حالت څخه بهر وه؛ دلته د نورو ستونو په شان په ریاضي حالت کښې لیکل شوې ده.

تمرین 4.43. وښیئ چې د ټولو حقیقي عددونو سټ $\mathbb{R}$ د شمېر نۀ وړ دے.

4.8 هشمېر والی

موږ د ستونو د «اندازې» یوه شهودي مفکوره لرو چې د متناهي ستونو دپاره سمه کار کوي. خو د نامتناهي ستونو څه؟ که وغواړو د هرې اندازې د دوو ستونو د اندازو د پرتله کولو یوه صوري لار جوړه کړو، ښه به وي چې لومړۍ تعریف کړو ستونه کله یوه اندازه لري. دا ئې د فرېګه وینا ده:

که یو خدمتګار غواړي ډاډه شي چې پر مېز ئې د پلټونو هومره چارې په دقیقه توګه اېښي دي، د دواړو له شمېرلو پرته هم دا کار کولې شي: یوازې د هر پلټې ښي لوري ته یوه چاره کېږدي، داسې چې پر مېز هره چاره د کوم پلټې ښي لوري ته پرته وي. په دې توګه پلټونه او چارې په ځانګړې توګه یو له بل سره، او په رښتیا هم د هماغې مکاني اړیکې له لارې، تړل کېږي. (Frege, 1884, §70)

د دې عبارت بصیرت په یوه صوري تعریف کښې څرګندولې شو:

تعریف 4.44. A له B سره هشمېره دے، چې $A \approx B$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f: A \rightarrow B$ وي.

قضیه 4.45. هشمېر والی یوه د معادلتوب اړیکه ده.

ثبوت. باید وښیو چې همشمېر والی انعکاسي، متناظر او انتقالي دے. فرض کړئ A, B او C ستونه دي.

انعکاسیتوب. عیني نقشه $\text{Id}_A: A \rightarrow A$ چې د ټولو $x \in A$ دپاره $\text{Id}_A(x) = x$ وي، یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده. نو $A \approx A$.
تناظر. فرض کړئ $A \approx B$ ؛ یعنې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f: A \rightarrow B$ شته. ځکه چې f دوه اړخیزه یو پر یو ده، د هغې معکوس f^{-1} شته او هغه هم دوه اړخیزه یو پر یو دے. له دې امله $f^{-1}: B \rightarrow A$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، نو $B \approx A$.

انتقالي توب. فرض کړئ چې $A \approx B$ او $B \approx C$ ؛ یعنې دوه اړخیزې یو پر یو تابعې $f: A \rightarrow B$ او $g: B \rightarrow C$ شته. بیا ترکیب $g \circ f: A \rightarrow C$ دوه اړخیزه یو پر یو دے، نو $A \approx C$.
□

قضیه 4.46. که $A \approx B$ وي، نو A هله او یوازې هله د شمېر وړ دے چې B داسې وي.

اداري یادونه. لاندې ثبوت که 4.2 شامل وي، 4.4 کاروي، او که نه وي 4.55 کاروي.

ثبوت. فرض کړئ $A \approx B$ ، نو کومه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f: A \rightarrow B$ شته، او فرض کړئ چې A د شمېر وړ دے.

بیا یا $A = \emptyset$ دے، یا یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ شته. که $A = \emptyset$ وي، نو $B = \emptyset$ هم دے (کې یو غږه $y \in B$ به وے، خو هېڅ $x \in A$ به نه وے چې $f(x) = y$). د ژباړې د نسخې سمون: (OLSIZ-006) د انگرېزي ثبوت په دواړو مشروطو بنو کېنې د تش حالت معادله ناسمې تابعې ته منسوبه وه؛ دلته هغه دوه اړخیزې تابعې ته سمه شوې چې د ستونو همشمېر والی شاهدي کوي. له بلې خوا، که $g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow A$ پر هدف سټ بشپړه وي، نو $f \circ g: \mathbb{Z}^+ \rightarrow B$ پر هدف سټ بشپړه ده. د دې د لیدلو دپاره $y \in B$ ونیسئ. ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، یو $x \in A$ شته چې $f(x) = y$. ځکه چې g پر هدف سټ بشپړه ده، یو $n \in \mathbb{Z}^+$ شته چې $g(n) = x$ له دې امله

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(x) = y$$

او نو $f \circ g$ پر هدف سټ بشپړه ده. موږ لرو چې $f \circ g$ یوه شمېرنه ده، نو B د شمېر وړ دے.

که B د شمېر وړ وي، د f پر ځای د دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f^{-1}: B \rightarrow A$ په کارولو د استدلال په تکرارولو موږ چې A د شمېر وړ دے. □

تمرین 4.47. وښیئ چې که $A \approx C$ او $B \approx D$ وي، او $A \cap B = C \cap D = \emptyset$ وي، نو $A \cup B \approx C \cup D$.

تمرین 4.48. وښیئ چې که A نامتناهي او د شمېر وړ وي، نو $A \approx \mathbb{N}$.

4.9 د بېلو اندازو ستونه او د کانتور قضیه

موږ دا مفکوره په دقیقه وینا کېنې وړاندې کړې چې دوه ستونه یوه اندازه لري. دا مفکوره هم په دقیقه وینا کېنې وړاندې کول شو چې یو سټ له بل څخه کوچنۍ دے. زموږ د «له ... څخه کوچنۍ» (یا همشمېره) دے» تعریف به د ستونو تر منځ د دوه اړخیزه یو پر یو تابع پر ځای، له لومړي سټ څخه دویم ته یوه یو پر یو تابع وغواړي. که داسې تابع وي، د لومړي سټ اندازه د دویم سټ له اندازې څخه کوچنۍ یا ورسره مساوي ده. په شهودي ډول، له یوه سټ څخه بل ته یو پر یو تابع دا ډاډ راکوي چې د تابعې د قیمتونو سټ لږ تر لږه د تعریف د ساحې هومره غړي لري، ځکه د تعریف د ساحې هېڅ دوه غړي د قیمتونو د سټ یوه غړه ته نه نقشېږي.

تعریف 4.49. له A څخه لږه نه دے، چې $A \preceq B$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې یوه یو پر یو تابع $f: A \rightarrow B$ وي.

څرګنده ده چې دا یوه انعکاسي او انتقالي اړیکه ده، خو متناظره نه ده (دا د تمرین په توګه پرېښوول شوې ده). یوه داسې مفکوره هم معرفي کول شو چې وایي یو سټ له بل څخه (په ټینګه) کوچنۍ دے.

تعريف 4.50. A له B څخه کوچنۍ دے، چې $A < B$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې یوه یو پریو تابع $f: A \rightarrow B$ وي، خو هېڅ دوه اړخیزه یو پریو تابع $g: A \rightarrow B$ نه وي؛ یعنې $A \leq B$ او $A \not\leq B$ وي.

څرګنده ده چې دا اړیکه ناانعکاسي او انتقالي ده. (دا د تمرین په توګه پرېښوول شوې ده.) په دې لنډه ویله شو چې یو سټ A هله او یوازې هله د شمېر ور دے چې $A \leq \mathbb{N}$ وي، او A هله او یوازې هله د شمېر نه ور دے چې $\mathbb{N} < A$ وي. د ژباړې د نسخې سرچینیز شرط: (PSSIZ-004) وروسته هم ارز بیان دا فرض کاروي چې هر نامتناهي سټ د طبیعي عددونو یوه یو پریو کاپي لري؛ دا د انتخاب له اصل پرته په عمومي سټ تیوري کېنې نه ثابتېږي. په دې سره دا بیا ویله شو: 4.64 د دې مشاهدې په توګه چې $\mathbb{N} < \wp(\mathbb{N})$. په حقیقت کېنې، Cantor (1892) ثابته کړه چې دا وروستی خبره بشپړه عمومي ده:

قضیه 4.51. (کانتور). د هر سټ A دپاره $A < \wp(A)$.

ثبوت. نقشه $f(x) = \{x\}$ یوه یو پریو تابع $f: A \rightarrow \wp(A)$ ده، ځکه که $x \neq y$ وي، نو د غړو له مخې د برابری په سبب $\{x\} \neq \{y\}$ هم وي، او نو $f(x) \neq f(y)$. له دې امله $A \leq \wp(A)$ لرو.

اداري یادونه. که 4.6 موجوده وي، تفصیلي ثبوت وړاندې کوو؛ کېنې یو چټک ثبوت وړاندې کوو چې د 4.12 سره سمون خوري.

اوس به وښیو چې هېڅ پر هدف سټ بشپړه تابع $g: A \rightarrow \wp(A)$ نه شي کېدے، نو یوه دوه اړخیزه یو پریو تابع خولا پرېږده؛ او له دې امله $A \not\leq \wp(A)$. ځکه فرض کړئ چې $g: A \rightarrow \wp(A)$. دا چې g بشپړه ده، هر $x \in A$ د یوه فرعي سټ $g(x) \subseteq A$ سره نقشېږي. موږ ښودله شو چې g پر هدف سټ بشپړه نه شي کېدے. د دې دپاره یو فرعي سټ $\bar{A} \subseteq A$ تعریفوو چې د تعریف له مخې د g په قیمتونو سټ کېنې نه شي راتلے. کېږدئ:

$$\bar{A} = \{x \in A : x \notin g(x)\}.$$

ځکه چې $g(x)$ د هر $x \in A$ دپاره تعریف شوی، $\bar{A}$ په څرګند ډول د A یو سم تعریف شوی فرعي سټ دے. خو دا د g د قیمتونو په سټ کېنې نه شي راتلے. یو خپل سری $x \in A$ وښیئ؛ موږ به وښیو چې $\bar{A} \neq g(x)$. که $x \in g(x)$ وي، نو $x \notin \bar{A}$ پوره کوي، او د $\bar{A}$ د تعریف له مخې $x \notin \bar{A}$ لرو. که $x \in \bar{A}$ وي، د $\bar{A}$ تعریفی خاصیت باید پوره کړي؛ یعنې $x \in A$ او $x \notin g(x)$ وي. دا چې x خپل سری و، دا ښیي چې د هر $x \in A$ دپاره، $x \in g(x)$ هله او یوازې هله چې $x \notin \bar{A}$ وي، او نو $\bar{A} \neq g(x)$. د ژباړې د نسخې سمون: (OLSIZ-007) انګریزي ثبوت په دې عمومي پایله کېنې وړودي د ټول سټ پر ځای یوازې قطري فرعي سټ ته محدود کړے و؛ دلته ئې د مخکېنې ټاکل شوي خپل سري وړودي ساحه راوګرځول شوه. په بله وینا، $\bar{A}$ د g په قیمتونو سټ کېنې نه شي راتلے، او دا له دې فرض سره تناقض لري چې g پر هدف سټ بشپړه ده. □

4.51 ثبوت د 4.34 له ثبوت سره پرتله کول ګټور دي. هلته مو وښودل چې د $\mathbb{Z}^+$ د فرعي ستونو د هر لړ $Z_1, Z_2, \dots$ دپاره د عددونو یو سټ $\bar{Z}$ جوړولے شو چې په ډاډه توګه په لړ کېنې نه وي. په لړ کېنې نه و، ځکه چې د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره، $n \in Z_n$ هله او یوازې هله چې $n \notin \bar{Z}$ وي. په دې توګه تل کوم عدد د Z_n او $\bar{Z}$ له یوه څخه غړے وي خو د بل نه وي. دلته هماغه مفکوره تعقیبوو، خو شاخصونه n اوس د $\mathbb{Z}^+$ پر ځای د A غړي دي. سټ $\bar{A}$ داسې تعریف شوی چې د هر $x \in A$ دپاره له $g(x)$ څخه بېل وي، ځکه $x \in g(x)$ هله او یوازې هله چې $x \notin \bar{A}$ وي. بیا هم تل د A یو غړے شته چې له $g(x)$ او $\bar{A}$ څخه د یوه غړے وي خو د بل نه وي. او لکه څنګه چې له دې امله $\bar{Z}$ په لړ $Z_1, Z_2, \dots$ کېنې نه شي راتلے، $\bar{A}$ د g په قیمتونو سټ کېنې نه شي راتلے.

4.51 ثبوت د 4.64 له ثبوت سره پرتله کول ګټور دي. هلته مو وښودل چې د $\mathbb{N}$ د فرعي ستونو د هر لړ $N_0, N_1, N_2, \dots$ دپاره د عددونو یو سټ D جوړولے شو چې په ډاډه توګه په لړ کېنې نه وي. په لړ کېنې نه و، ځکه چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $n \in N_n$ هله او یوازې هله چې $n \notin D$ وي. دلته هماغه مفکوره تعقیبوو، خو شاخصونه n اوس د $\mathbb{N}$ پر ځای د A غړي دي. سټ D داسې تعریف شوی چې د هر $x \in A$ دپاره له $g(x)$ څخه بېل وي، ځکه $x \in g(x)$ هله او یوازې هله چې $x \notin D$ وي.

دا ثبوت د رسل د پاراډوکس له ثبوت، 1.39، سره هم د پرتله کولو وړ دے. په حقیقت کېنې، د کانتور قضیه د رسل د خپل پاراډوکس الهام و.

تمرین 4.52. وښیئ چې د هر سټ A دپاره هېڅ یو پر یو تابع $g: \wp(A) \rightarrow A$ نه شي کېدے. لارښوونه: فرض کړئ $g: \wp(A) \rightarrow A$ یو پر یو ده. $D = \{g(B) : B \subseteq A \text{ او } g(B) \notin B\}$ په پام کېنې ونیسئ. کېږدئ $x = g(D)$. د تناقض د رالیستلو دپاره دا حقیقت وکاروئ چې g یو پر یو ده.

4.10 د اندازې مفکوره او شرودر-برنشتاین

دا یوه شهودي مفکوره ده: که A له B څخه لږه وي او B له A څخه لږه نه وي، نو A او B همشمېره دي. رښتیا دا چې که دا مفکوره ناسمه وے، موږ به په ډېره گرانه توجیه کړے شوے چې زموږ تعریف شوې د همشمېره والي مفکوره د ستونو تر منځ د «اندازو» له پرتله کولو سره څه اړیکه لري! خو له نېکه مرغه، شهودي مفکوره سمه ده. دا د شرودر-برنشتاین په قضیې توجیه کېږي.

قضیه 4.53 (شرودر-برنشتاین). که $A \leq B$ او $B \leq A$ وي، نو $A \approx B$.

په بله وینا، که له A څخه B ته یو پر یو تابع، او له B څخه A ته یو پر یو تابع وي، نو له A څخه B ته یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع شته.

خو د دې پایلې ثبوت په رښتیا خورا گران دے. په حقیقت کېنې، که څه هم کانتور دا پایله بیان کړه، نورو ثابته کړه.¹ اوس مهال باید دا په باور ومنئ.

له نېکه مرغه، شرودر-برنشتاین سمه ده او دا فکر مو تاییدوي چې زموږ تعریف شوې اړیکې، یعنې $A \approx B$ او $A \leq B$ ، له «اندازې» سره څه اړیکه لري. پر دې سربېره، د شرودر-برنشتاین قضیه ډېره گټوره ده. د دوو همشمېره ستونو تر منځ د دوه اړخیزه یو پر یو تابع تصورول گرانېدلای شي. د شرودر-برنشتاین قضیه اجازه راکوي چې پرتله په حالتونو ووېشو، خو یوازې له لومړي څخه دویم ته د یو پر یو تابع، او بیا برعکس، تصور وکړو.

4.11 شمېرنې او د شمېر وړ ستونه

اداري یادونه. دا برخه شمېرنې له $\mathbb{N}$ (پېلینو ټوټو) سره د دوه اړخیزو یو پر یو تابعو په توگه تعریفوي، لکه په سټ تیوري کېنې چې کېږي. نو د 4.2 له تعریفونو سره لږ ټکر لري، او هلته ټولې بېلګې تکراروي. دا د هغې برخې په پرتله لږه لنډه هم ده.

یو متناهي سټ یوازې د هغه د غړي په شمېرلو ټاکلے شو. دا هغه وخت کوو چې یو سټ داسې تعریفوو:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}.$$

که فرض کړو چې غړي $a_1, \dots, a_n$ ټول سره بېل دي، دا د A او لومړنیو n طبیعي عددونو $0, \dots, n-1$ تر منځ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع راکوي. برعکس، ځکه هر متناهي سټ یوازې متناهي شمېر غړي لري، هر متناهي سټ په داسې سمون کېنې اېښودلے شو. په بله وینا، که A متناهي وي، د A او $\{0, \dots, n-1\}$ تر منځ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع شته، چې n د A د غړي شمېر دے.

که د نامتناهي ستونو ځینې ډولونه ومنو، نو ځینې نامتناهي ستونه به هم شمېرل کېدے شي. دا په دې وینا دقیقولے شو چې یو نامتناهي سټ د هغه او ټول $\mathbb{N}$ تر منځ د دوه اړخیزه یو پر یو تابع په وسیله شمېرل کېږي.

تعریف 4.54 (شمېرنه، سټ تیوريکي). د یوه سټ A شمېرنه یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده چې د قیمتونو سټ $\mathbb{N}$ او د تعریف ساحه $\mathbb{N}$ یا د طبیعي عددونو یو پېلنی سټ $\{0, 1, \dots, n\}$ یا د طبیعي عددونو ټول سټ $\mathbb{N}$ وي.

د شمېرنې د وېي د دې کارونې تر شا یو شهودي بنسټ شته. دا ویل چې موږ یو سټ A شمېرلے دے، په دې معنا دي چې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع f شته چې پرې د سټ A غړي شمېرلے شو. 0 م غړے $f(0)$ دے، لومړے $f(1)$ ، $\dots$ ، $f(n)$ ، $\dots$ د دې دلیل د لاندې خبرې په ورزیاتولو لا روښانه کېدے شي:

¹ د تاریخ په اړه د نورو معلوماتو دپاره، د بېلګې په ډول Potter (2004, pp. 165-6) وگورئ.
² هو، موږ له 0 څخه شمېرو. البته له 1 څخه هم پیلولے شو. په دې سره به لږه توپیر رانه شي. یوازې به مو $\mathbb{N}$ په $\mathbb{Z}^+$ بدلولے.

تعریف 4.55. یو سټ A هله او یوازې هله د شمېر ور دے چې یا $A = \emptyset$ وي یا د A یوه شمېر نه وي. وایو چې A هله او یوازې هله د شمېر نه ور دے چې A د شمېر ور نه وي.

نو یو سټ هله او یوازې هله د شمېر ور دے چې تش وي یا ئې غړي په یوه شمېر نه شمېر لے شئ.

بېلگه 4.56. هغه تابع چې طبیعي عددونه شمېرې یوازې عیني تابع $\text{Id}_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ده چې په $\text{Id}_{\mathbb{N}}(n) = n$ ورکړل شوې. هغه تابع چې مثبت طبیعي عددونه شمېرې، $\mathbb{N}^+ = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ، تابع $g(n) = n + 1$ ده؛ یعنې راتلونکې تابع.

تمرین 4.57. وښیئ چې یو سټ A هله او یوازې هله د شمېر ور دے چې یا $A = \emptyset$ وي یا یوه پر هدف سټ بشپړه تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ وي. وښیئ چې A هله او یوازې هله د شمېر ور دے چې یوه یو پر یو تابع $g: A \rightarrow \mathbb{N}$ وي.

بېلگه 4.58. تابعې $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ او $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ چې په ترتیب سره په لاندې ډول ورکړل شوې دي:

$$f(n) = 2n$$

$$g(n) = 2n + 1$$

جنت طبیعي عددونه او طاق طبیعي عددونه شمېرې. خو له دواړو یوه هم پر هدف سټ بشپړه نه ده، نو یوه هم د $\mathbb{N}$ شمېر نه ده.

تمرین 4.59. د مربع عددونو 1، 4، 9، 16، ... یوه شمېر نه تعریف کړئ.

بېلگه 4.60. فرض کړئ $[x]$ د پاسني صحیح عدد تابع ده، چې x تر ټولو نږدې صحیح عدد ته پورته گردوي. بیا تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ چې په لاندې ډول ورکړل شوې ده:

$$f(n) = (-1)^n \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

د صحیح عددونو سټ $\mathbb{Z}$ په لاندې ډول شمېرې:

$$f(0) \quad f(1) \quad f(2) \quad f(3) \quad f(4) \quad f(5) \quad f(6) \quad \dots$$

$$\left\lfloor \frac{0}{2} \right\rfloor \quad -\left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor \quad \left\lfloor \frac{2}{2} \right\rfloor \quad -\left\lfloor \frac{3}{2} \right\rfloor \quad \left\lfloor \frac{4}{2} \right\rfloor \quad -\left\lfloor \frac{5}{2} \right\rfloor \quad \left\lfloor \frac{6}{2} \right\rfloor \quad \dots$$

$$0 \quad -1 \quad 1 \quad -2 \quad 2 \quad -3 \quad 3 \quad \dots$$

پام وکړئ چې f څنګه د مثبتو او منفي صحیح عددونو تر منځ په «ټوپونو» د $\mathbb{Z}$ قیمتونه پیدا کوي. f په حالتونو هم داسې تعریفول شئ:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{که } n \text{ جنت وي} \\ -\frac{n+1}{2} & \text{که } n \text{ طاق وي} \end{cases}$$

تمرین 4.61. وښیئ چې که A او B د شمېر ور وي، نو $A \cup B$ هم دے.

تمرین 4.62. پر n په استقرا وښیئ چې که $A_1, A_2, \dots, A_n$ ټول د شمېر ور وي، نو $A_1 \cup \dots \cup A_n$ هم دے.

4.12 د شمېر نه ور ستونه

ادارتي یادونه. دا برخه په 4.11 کښې د تعریفونو په کارولو، یعنې له $\mathbb{Z}^+$ څخه د پر هدف سټ بشپړې تابع پر ځای له $\mathbb{N}$ سره د دوه اړخیزې یو پر یو تابع په غوښتلو، د $\mathbb{B}^{\omega}(\mathbb{N})$ او $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نه ور والے ثابتوي.

د طبیعي عددونو سټ $\mathbb{N}$ نامتناهي دے۔ دا په څرګند ډول د شمېر وړ هم دے۔ خو د پام وړ حقیقت دا دے چې د شمېر نه وړ ستونه، یعنې هغه ستونه چې د شمېر وړ نه دي، شته (4.55 وګورئ)۔

دا ښايي حیرانونکې وي۔ بالاخره، دا ویل چې A د شمېر نه وړ دے، دا ویل دي چې هېڅ دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ شته؛ یعنې هېڅ هغه تابع چې د $\mathbb{N}$ په شمېره غړي پر A نقشي، ټول A نه شي پوره کولے۔ نو که A د شمېر نه وړ وي، د طبیعي عددونو په پرتله د A «زیات» غړي شته۔

د دې د ثابتولو دپاره چې یو سټ د شمېر نه وړ دے، باید وښيي چې هېڅ مناسبه دوه اړخیزه یو پر یو تابع نه شي موجودېدلای۔ د دې تر ټولو ښه لار دا ده چې وښيي د A د غړي د شمېرلو هره څخه باید لږ تر لږه یو غړے پرېږدي؛ دا ښيي چې هېڅ تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow A$ پر هدف سټ بشپړه نه ده۔ د دې د ثابتولو یوه عمومي تګلاره د کانتور قطري طریقه ده۔ د A د غړي یو لړ، د بېلګې په ډول $x_1, x_2, \dots$ ، چې راکړل شي، موږ د A یو بل غړے جوړوو چې د خپل جوړښت له مخې په هېڅ ډول په هغه لړ کېنې نه شي راتلے۔

خو دا هر څه په بېلګه تر ټولو ښه پوهېدل کېږي۔ نو زموږ لومړۍ بېلګه د 0 کانو او 1 کانو د ټولو نامتناهي توريو تسلسلونو سټ $\mathbb{B}^\omega$ دے۔ ($\mathbb{B}$ د دوه کوني دپاره دے، او یوازې ئې د دوه غړیز سټ $\{0, 1\}$ په توګه ګڼلے شو)۔ خو اوس مهال دا لږ نرم بیان باید هېڅ ګډوي جوړه نه کړي۔

قضیه 4.63. $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نه وړ دے۔

ثبوت. د $\mathbb{B}^\omega$ د یوه فرعي سټ هره شمېر په پام کېنې وښیئ۔ نو کوم لړ $s_0, s_1, s_2, \dots$ لرو چې هر s_n د 0 کانو او 1 کانو یو نامتناهي توريو تسلسل دے۔ فرض کړئ $s_n(m)$ په دې لړ کېنې د n م توريو تسلسل m م رقم دے۔ د ژباړې د نسخې سمون: (OLSIZ-008) انګریزي نثر د تسلسل او رقم د شاخصونو رولونه سرچېه بیان کړي وو؛ لاندې اصلي جدول لومړے شاخص د قطار او دویم شاخص د ستون په توګه ټاکي۔ نو اوس خپل لړ د یوه جدولی ترتیب په توګه ګڼلے شو، چې $s_n(m)$ په n م قطار او m م ستون کېنې اېښودل شوے دے:

	0	1	2	3	...
0	$s_0(0)$	$s_0(1)$	$s_0(2)$	$s_0(3)$	...
1	$s_1(0)$	$s_1(1)$	$s_1(2)$	$s_1(3)$	...
2	$s_2(0)$	$s_2(1)$	$s_2(2)$	$s_2(3)$	...
3	$s_3(0)$	$s_3(1)$	$s_3(2)$	$s_3(3)$	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

اوس د 0 کانو او 1 کانو یو داسې نامتناهي توريو تسلسل d جوړوو چې په دې لړ کېنې نه وي۔ دا د هغه د هرې خانې په ټاکلو، یعنې د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره $d(n)$ په ټاکلو، کوو۔ په شهودي ډول، د پورته جدول پر قطر لاندې څو «ځکه ورته» «قطري طریقه» وایو، او بیا هر 1 په 0 او هر 0 په 1 بدلوو۔ د ژباړې د نسخې سمون: (OLSIZ-009) انګریزي نثر د دویم بدلون پر ځای لومړے بدلون بیا تکرار کړے و؛ لاندې اصلي حالت تعریف د صفر او یو دواړه اړخونه ټاکي۔ په لا مجرد ډول، $d(n)$ د دې له مخې 0 یا 1 تعریفوو چې د قطر n م غړے، $s_n(n)$ ، 1 دے که 0؛ یعنې:

$$d(n) = \begin{cases} 1 & \text{که } s_n(n) = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که } s_n(n) = 1 \text{ وي} \end{cases}$$

په څرګند ډول $d \in \mathbb{B}^\omega$ ، ځکه دا د 0 کانو او 1 کانو یو نامتناهي توريو تسلسل دے۔ خو موږ d داسې جوړ کړے چې د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $s_n(n) \neq d(n)$ ۔ یعنې d له s_n څخه په خپل n م مقام کېنې توپیر لري۔ نو د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $d \neq s_n$ ۔ ځکه d په لړ $s_0, s_1, s_2, \dots$ کېنې نه شي راتلے۔

موږ وښودل چې د $\mathbb{B}^\omega$ د کوم فرعي سټ هره خپله سرې شمېر نه به د $\mathbb{B}^\omega$ کوم غړے پرېږدي۔ نو د سټ $\mathbb{B}^\omega$ هېڅ شمېر نه شته؛ یعنې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نه وړ دے۔ $\square$

د ثبوت دې طریقې ته «قطرول» ویل کېږي، ځکه د d د تعریف دپاره د جدول قطر کاروي۔ خو قطرول د جدول شتون ته اړتیا نه لري۔ په حقیقت کېنې، په ورته مفکوره ښودلے شو چې ځینې ستونه د شمېر نه وړ دي، ان چې هېڅ جدول او رښتینې قطر نه وي۔ لاندې پایله ښيي چې څنګه۔

قضيه 4.64. $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر وړ نه دے۔

ثبوت. په هماغه طريقه مخکښې څو: ښيو چې د $\mathbb{N}$ د فرعي ستونو هر لړ د $\mathbb{N}$ کوم فرعي سټ پرېږدي۔ نو فرض کړئ چې د $\mathbb{N}$ د فرعي ستونو کوم لړ $N_0, N_1, N_2, \dots$ لرو۔ سټ D داسې تعريفوو: $n \in D$ هله او يوازې هله چې $n \notin N_n$:

$$D = \{n \in \mathbb{N} : n \notin N_n\}$$

په څرکند ډول $D \subseteq \mathbb{N}$ ۔ خو D په لړ کښې نه شي راتلے۔ بالاخره، د جوړښت له مخې $n \in D$ هله او يوازې هله چې $n \notin N_n$ ؛ نو د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $D \neq N_n$ ۔ □

تېر ثبوت د قطر نوم وانه خيست۔ بيا هم که داسې ئې انځور کړئ، قطري طريقه په کښې ليدلے شي: وانگېرئ چې ستونه $N_0, N_1, \dots$ په جدولې ترتيب کښې ليکل شوي، چې N_n په n م قطار کښې داسې ليکو چې m په m م ستون کښې هله او يوازې هله ليکو که $m \in N_n$ ۔ د بيلگې په ډول، فرض کړئ په هغه لړ کښې لومړي څلور ستونه $\{0, 1, 2, \dots\}$ ، $\{1, 3, 5, \dots\}$ ، $\{0, 1, 4\}$ او $\{2, 3, 4, \dots\}$ دي؛ نو زموږ جدولې ترتيب به داسې پيل شي:

$$\begin{array}{llll} N_0 = \{0, & 1, & 2, & \dots\} \\ N_1 = \{ & 1, & 3, & 5, \dots\} \\ N_2 = \{0, & 1, & & 4, \dots\} \\ N_3 = \{ & & 2, & 3, 4, \dots\} \\ & & \vdots & \ddots \end{array}$$

بيا D هغه سټ دے چې پر قطر د لاندې ټلو له لارې تر لاسه کېږي: $n \in D$ هله او يوازې هله اېږدو چې n پر قطر نه وي۔ نو په پورته حالت کښې 0 او 1 پرېږدو، 2 شاملوو، 3 پرېږدو، او همداسې نور۔

تمرين 4.65. په څرکند قطري استدلال وښئ چې د ټولو تابعو $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ سټ د شمېر نه وړ دے۔ يعنې وښئ چې که $f_1, f_2, \dots$ تابعو يو لړ وي او هر $f_i: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ وي، نو کومه $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ شته چې په دې لړ کښې نه ده۔

4.13 راکونه

ادارتي يادونه۔ دا برخه په راکونه د شمېر نه وړ والے ثابتوي، او پايلې ئې د 4.12 له پايلو سره سمون خوري۔ يوه بله، لږه تفصيلي بڼه چې د 4.6 له پايلو سره سمون خوري، په 4.7 کښې ورکړل شوې ده۔

موږ په يوه قطري استدلال وښودل چې $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نه وړ دے۔ په ورته قطري استدلال مو وښودل چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نه وړ دے۔ خو د $\wp(\mathbb{N})$ د د شمېر نه وړ کېدو يوه بله لار دا ده: وښئ چې که $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر وړ وي، نو $\mathbb{B}^\omega$ هم د شمېر وړ دے۔ ځکه چې پوهېږو $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نه وړ دے، دا به وښيي چې $\wp(\mathbb{N})$ هم همداسې دے۔

دې ته د يوې مسئلې بلي ته راکونه ويل کېږي۔ په دې حالت کښې د $\mathbb{B}^\omega$ د شمېرلو مسئله د $\wp(\mathbb{N})$ د شمېرلو مسئلې ته راکوو۔ د وروستۍ مسئلې يو حل، يعنې د $\wp(\mathbb{N})$ يوه شمېرنه، به د لومړۍ مسئلې حل، يعنې د $\mathbb{B}^\omega$ يوه شمېرنه، راکړي۔

د يوه سټ B د شمېرلو مسئله د يوه سټ A د شمېرلو مسئلې ته د راکولو دپاره، د A د يوې شمېرنې د B په شمېرنه د اړولو يوه لار ورکوو۔ د دې تر ټولو اسانه لار د يوې پر هدف سټ بشپړه تابع تابع $f: A \rightarrow B$ تعريفول دي۔ که $x_1, x_2, \dots$ د A شمېرنه وي، نو $f(x_1), f(x_2), \dots$ به د B شمېرنه وي۔ زموږ په حالت کښې د يوې پر هدف سټ بشپړه تابع تابع $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ په لټه کېږي يو۔

تمرين 4.66. وښئ چې که يوه يو پر يو تابع $g: B \rightarrow A$ وي او B د شمېر نه وړ وي، نو A هم همداسې دے۔ دا په ښودلو وکړئ چې څنگه د g په کارولو د A يوه شمېرنه د B په شمېرنه اړولے شي۔

په را کونه د 4.64 ثبوت. فرض کړئ چې $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر ور وړ، او له دې امله د هغه یوه شمېر نه $N_1, N_2, N_3, \dots$ وړی.

تابع $f: \wp(\mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{B}^\omega$ داسې تعریف کړئ چې $f(N)$ هغه تسلسل s وي چې $s(n) = 1$ هله او یوازې هله چې $n \in N$ وي، او په بل حالت کې $s(n) = 0$ وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLSIZ-010) په انگریزي نثر کې د تسلسل بې تراوه شاخص د خپل سري وروډي سټ له نښې سره بدل شو، خو د تابع تعریف روښانه وي.

دا په څرګند ډول تابع تعریفوي، ځکه کله چې $N \subseteq \mathbb{N}$ وي، هر $n \in \mathbb{N}$ یا د N یو غړی وي یا نه وي. د بېلګې په ډول، د طبیعي جفتو عددونو سټ $2\mathbb{N} = \{2n : n \in \mathbb{N}\} = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$ تسلسل $1010101\dots$ ته نقشېږي، $\emptyset$ سټ $0000\dots$ ته او پخپله $\mathbb{N}$ سټ $1111\dots$ ته نقشېږي.

دا پر هدف سټ بشپړه هم ده: د 0 ګانو او 1 ګانو هر تسلسل د طبیعي عددونو له یوه سټ سره سمون خوري، یعنې له هغه سټ سره چې غړي یې هغه طبیعي عددونه دي کوم چې د تسلسل د 1 لرونکو مقامونو سره سمون خوري. په لا دقیقه توګه، که $s \in \mathbb{B}^\omega$ وي، نو $N \subseteq \mathbb{N}$ داسې تعریف کړئ:

$$N = \{n \in \mathbb{N} : s(n) = 1\}$$

بیا $f(N) = s$ ، لکه چې د f تعریف ته په ګډو تاییدو ل شو.

اوس دا لړ په پام کې ونیسئ:

$$f(N_1), f(N_2), f(N_3), \dots$$

ځکه چې f پر هدف سټ بشپړه ده، د $\mathbb{B}^\omega$ هر غړی باید د کوم وروډي ډپاره د f د قیمت په توګه راشي، او نو باید په لړ کې راشي. له دې امله دا لړ باید ټول $\mathbb{B}^\omega$ وشمېري.

نو که $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر ور وړ، $\mathbb{B}^\omega$ به د شمېر ور وړی. خو $\mathbb{B}^\omega$ د شمېر نه وړ دی (4.63). له دې امله $\wp(\mathbb{N})$ د شمېر نه وړ دی. □

تمرین 4.67. په را کونې استدلال وښیئ چې د ټولو تابعو $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ سټ X د شمېر نه وړ دی. (لارښوونه: له X څخه $\mathbb{B}^\omega$ ته یوه پر هدف سټ بشپړه تابع ورکړئ.)

تمرین 4.68. په را کونې استدلال وښیئ چې د طبیعي عددونو د جوړو د ستونو سټ، یعنې $\wp(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ ، د شمېر نه وړ دی.

تمرین 4.69. په را کونې استدلال وښیئ چې $\mathbb{N}^\omega$ ، یعنې د طبیعي عددونو د نامتناهي تسلسلونو سټ، د شمېر نه وړ دی.

تمرین 4.70. فرض کړئ S له $\mathbb{N}$ څخه سټ $\{0, 1\}$ ته د ټولو پر هدف سټ بشپړې تابعې سټ دی، یعنې S له ټولو پر هدف سټ بشپړې تابعې $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{B}$ څخه جوړ دی. وښیئ چې S د شمېر نه وړ دی.

تمرین 4.71. وښیئ چې د ټولو حقیقي عددونو سټ $\mathbb{R}$ د شمېر نه وړ دی.

باب 5

د شمېر نظامونو سټي جوړونه

اداري يادونه. په دې څپرکي کې مواد د ساده سټ نظريې په دننه کې د شمېر نظامونو جوړښت وړاندې کوي. دا د تم بقن له اړخه سټ تيوري متن څخه اخیستل شوي دي.

5.1 له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Z}$ ته

دا دوه بنسټيزې خبرې په پام کې ونیسئ:

1. هر صحیح عدد د $n - m$ په بڼه لیکل کېدای شي، چې $n, m \in \mathbb{N}$ وي.

2. په عبارت $n - m$ کې زېرمه شوي معلومات په هماغه ډول په مرتبه جوړه $\langle n, m \rangle$ کې زېرمه کېدای شي.

موږ لا پوهېږو چې د طبیعي عددونو مرتبې جوړې د $\mathbb{N}^2$ غړې دي. او دا فرضوو چې په $\mathbb{N}$ پوهېږو. نو پر دغو دوو خبرو ولاړ یو ساده وړاندیز دا ده: صحیح عددونه دې د طبیعي عددونو د مرتبو جوړو په توګه وګڼو.

په حقیقت کې دا وړاندیز ډېر ساده ده. ښکاره ده چې غواړو $0 - 2 = 4 - 6$ وي. خو په څرګند ډول $\langle 4, 6 \rangle \neq \langle 0, 2 \rangle$ ده. نو په ساده ډول نه شو ویل چې $\mathbb{N}^2$ د صحیح عددونو سټ ده.

د مخکېني ستونزې په عمومي کولو، موږ لاندې خاصیت غواړو:

$$a + d = c + b \text{ هله او یوازې هله چې } a - b = c - d$$

(دا باید څرګنده وي چې صحیح عددونه په همدې ډول چلېدل غواړي: یوازې دواړو خواوو ته b او d ورزیات کړئ.) د دې چلند د یقیني کولو اسانه لار دا ده چې د مرتبو جوړو تر منځ د هم ارزښتی یوه اړیکه $\sim$ داسې تعریف کړو:

$$a + d = c + b \text{ هله او یوازې هله چې } \langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$$

اوس باید وښیو چې دا د هم ارزښتی اړیکه ده.

قضیه 5.1. $\sim$ د هم ارزښتی اړیکه ده.

ثبوت. باید وښیو چې $\sim$ انعکاسي، تناظري او انتقالی ده.

انعکاسیت: په څرګند ډول $\langle a, b \rangle \sim \langle a, b \rangle$ ، ځکه چې $a + b = b + a$.

تناظر: فرض کړئ $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ ، نو $a + d = c + b$. بیا $c + b = a + d$ ، نو $\langle c, d \rangle \sim \langle a, b \rangle$.

انتقالیت: فرض کړئ $\langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$ او $a + d = c + b$ او $c + n = m + d$ له دې امله $a + d + c + n = m + d + c + n$ او $a + n = m + b$ په پایله کې $\langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle$.

□

اوس په دې د هم ارزښتی اړیکه د هم ارزښتی ټولګي اخیستلې شو:

تعریف 5.2. صحیح عددونه د $\sim$ له مخې د طبیعي عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتی ټولګي دي، یعنې $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim$.

د دې ټاکلي تعریف په اړه ښايي بېلابېل فلسفي غبرګونونه وي. خو د هغو غبرګونونو تر څېړلو مخکښې، ښه ده چې ځینې فني جزئیات پرمخ یوسو.

چې صحیح عددونه مو تعریف کړل، پر هغو به بنسټیزې تابعې او اړیکې هم تعریفول غواړو. $[m, n]_\sim$ دې د $\sim$ له مخې هغه د هم ارزښتی ټولګې وي چې $\langle m, n \rangle$ یې یو غړی دے. ¹ یعنې:

$$[m, n]_\sim = \{ \langle a, b \rangle \in \mathbb{N}^2 : \langle a, b \rangle \sim \langle m, n \rangle \}$$

نو اوس لاندې تعریفونه وړاندې کوو:

$$[a, b]_\sim + [c, d]_\sim = [a + c, b + d]_\sim$$

$$[a, b]_\sim \times [c, d]_\sim = [ac + bd, ad + bc]_\sim$$

$$[a, b]_\sim \leq [c, d]_\sim \text{ چې } a + d \leq b + c$$

(لکه چې دود دے، د اصولو د اسانه لوستلو دپاره 'ab' د 'a × b' پر ځای کاروم.) اوس باید ډاډمن شو چې دا تعریفونه لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي. د دې مطلب په تفصیل بیانول او بیا یې ارزول ډېر اوږد کار دے؛ جزئیات 5.6 ته پرېږدو. خو لنډه خبره دا ده: هر څه سم کار کوي!

یو وروسته کار پاتې دے. موږ صحیح عددونه د طبیعي عددونو په کارولو جوړ کړي دي. خو د دې معنا به دا وي چې طبیعي عددونه پخپله صحیح عددونه نه دي. د دې فلسفي ارزښت ته به په 5.5 کښې ورستائه شو. خو په سوچه فني کچه به یوې داسې لارې ته اړتیا لرو چې طبیعي عددونه د صحیح عددونو په توګه وکارولې شو. مفکوره ډېره اسانه ده: د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره ټاکو چې $n\mathbb{Z} = [n, 0]_\sim$ باید تایید کړو چې دا تعریف سم چلند کوي؛ یعنې د هر $m, n \in \mathbb{N}$ دپاره

$$(m + n)\mathbb{Z} = m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z}$$

$$(m \times n)\mathbb{Z} = m\mathbb{Z} \times n\mathbb{Z}$$

$$m \leq n \leftrightarrow m\mathbb{Z} \leq n\mathbb{Z}$$

خو دا ټول پوره ساده دي. د بېلګې په ډول، د دې د ښودلو دپاره چې دویم خاصیت سم دے، د طبیعي عددونو له چلنده په ساده ډول کار اخلو او لاندې استدلال کوو:

$$\begin{aligned} (m \times n)\mathbb{Z} &= [m \times n, 0]_\sim \\ &= [m \times n + 0 \times 0, m \times 0 + 0 \times n]_\sim \\ &= [m, 0]_\sim \times [n, 0]_\sim \\ &= m\mathbb{Z} \times n\mathbb{Z} \end{aligned}$$

د نورو دوو شرطونو تایید د تمرین په توګه پرېږدو.

تمرین 5.3. وښیئ چې د هر $m, n \in \mathbb{N}$ دپاره $(m + n)\mathbb{Z} = m\mathbb{Z} + n\mathbb{Z}$ او $m \leq n \leftrightarrow m\mathbb{Z} \leq n\mathbb{Z}$.

5.2 له $\mathbb{Z}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته

همدا اوس مو ولیدل چې په ساده سټ نظریه څنګه له طبیعي عددونو څخه صحیح عددونه جوړېږي. اوس به په ډېرې ورته لارې له صحیح عددونو څخه ناطق عددونه جوړول وګورو. زموږ لومړنۍ خبرې دا دي:

¹ یادونه: په 2.13 کښې د معرفي شوې ښې په کارولو به مو د همدې څیز دپاره $[m, n]_\sim$ لیکل. خو هغه لوستل لږ ګران دي.

1. هر ناطق عدد د i/j په بڼه لیکل کېدای شي، چې i او j دواړه صحیح عددونه وي خو j صفر نه وي.

2. په عبارت i/j کېنې زېرمه شوي معلومات په هماغه ډول په مرتبه جوړه $\langle i, j \rangle$ کېنې زېرمه کېدای شي.

ښکاره لار به دا وي چې ناطق عددونه د $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ څخه د اخیستل شوو مرتبو جوړو په توګه وګڼو. خو لکه مخکېنې، دا به لږ ډېر ساده وي، ځکه موږ غواړو $3/2 = 6/4$ وي، خو $\langle 6, 4 \rangle \neq \langle 3, 2 \rangle$. په عمومي ډول لاندې خاصیت غواړو:

$$a/b = c/d \text{ هله او یوازې هله چې } a \times d = b \times c$$

د دې د ترلاسه کولو دپاره پر $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ د هم ارزښتی یوه اړیکه داسې تعریفوو:

$$a \times d = b \times c \text{ هله او یوازې هله چې } \langle a, b \rangle \sim \langle c, d \rangle$$

باید وارزو چې دا د هم ارزښتی اړیکه ده. دا د $\sim$ حالت ته ډېر ورته ده، او موږ یې د تمرین په توګه پرېږدو.

تمرین 5.4. وښیئ چې $\sim$ د هم ارزښتی اړیکه ده.

خو دا موږ ته د لاندې خبرې اجازه راکوي:

تعریف 5.5. ناطق عددونه د $\sim$ له مخې د صحیح عددونو د جوړو د هم ارزښتی ټولګې دي (چې دویم غړی یې صفر نه وي). یعنې $_{\sim} \mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})) / \sim$.

لکه د صحیح عددونو په شان، ځینې بنسټیزې عمليې هم تعریفول غواړو. چې $_{\sim} [i, j]$ د $\sim$ له مخې هغه د هم ارزښتی ټولګې وي چې $\langle i, j \rangle$ یې یو غړی ده، وایو:

$$_{\sim} [a, b] + _{\sim} [c, d] = _{\sim} [ad + bc, bd]$$

$$_{\sim} [a, b] \times _{\sim} [c, d] = _{\sim} [ac, bd].$$

پر دې ناطقو عددونو د $r \leq s$ د تعریفولو دپاره دا حقیقت کاروو چې $r \leq s$ هله او یوازې هله چې $s - r$ منفي نه وي، یعنې $r - s$ د i/j په بڼه لیکل کېدای شي چې i نامنفي او j مثبت وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLARI-001) په انګرېزي نثر کېنې د وروستي توپیر ترتیب سرچپه لیکل شوی، لاندې معادله د نامنفي توپیر سم ترتیب ښیي:

$$_{\sim} [a, b] \leq _{\sim} [c, d] \text{ هله او یوازې هله چې } [c, d]_{\sim} - [a, b]_{\sim} = [i_{\mathbb{Z}}, j_{\mathbb{Z}}]_{\sim}$$

د ځینو $i \in \mathbb{N}$ او $j \in \mathbb{N}$ دپاره.

بیا باید وارزو چې دا تعریفونه لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي، او دا کار 5.6 ته پرېږدو. خو رښتیا هم سم چلېږي! په پای کې صحیح عددونه د ناطقو عددونو په توګه د کارولو یوه لار غواړو، نو د هر $i \in \mathbb{Z}$ دپاره ټاکو چې $_{\sim} i_{\mathbb{Q}} = [i, 1_{\mathbb{Z}}]_{\sim}$. یو ځل بیا په 5.6 کېنې ارزوو چې دا ټول سم چلند کوي.

تمرین 5.6. وښیئ چې د هر $i, j \in \mathbb{Z}$ دپاره $i_{\mathbb{Q}} + j_{\mathbb{Q}} = (i + j)_{\mathbb{Q}}$ او $i_{\mathbb{Q}} \times j_{\mathbb{Q}} = (i \times j)_{\mathbb{Q}}$ او $i_{\mathbb{Q}} \leq j_{\mathbb{Q}} \leftrightarrow i \leq j$.


5.3 د حقیقي عددونو کرښه

بل کام دا ښودل دي چې له ناطقو عددونو څخه حقیقي عددونه څنګه جوړېږي. تر هغې مخکېنې باید پوه شو چې د حقیقي عددونو ځانګړتیا څه ده.

حقیقي عددونه ناطقو عددونو ته ډېر ورته چلند کوي. (په فني ډول، دواړه د مرتبو میدانونو بېلګې دي؛ د دې د تعریف دپاره 5.14 وګورئ.) اوس که مو د 4 تمرینونه حل کړي وي، نو پوهېږئ چې حقیقي عددونه له ناطقو عددونو په کلکه زیات دي، یعنې $\mathbb{Q} \prec \mathbb{R}$. دا خبره لومړۍ کانتور ثابته کړه. خو شاوخوا دوه نیم زره کاله کېږي چې غیر ناطق عددونه، یعنې هغه حقیقي عددونه چې ناطق نه دي، پېژندل شوي دي. په رښتیا:

قضيه 5.7. $\sqrt{2}$ ناطق نه دے، يعني $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې $\sqrt{2}$ ناطق دے. نو د ځينو طبيعي عددونو m او n دپاره $\sqrt{2} = m/n$. په حقيقت کې m او n داسې ټاکلې شو چې کسر نور نه شي ساده کېدے. په بيا ترتيبولو $m^2 = 2n^2$ له دې ځايه ثبوت په دوو لارو بشپړولې شو: لومړۍ، په هندسي ډول (د ټېنباوم په پيروي) ² - دا مربعګانې په پام کېني ونيسئ:



ځکه چې $m^2 = 2n^2$ ، هغه سيمه چې د ضلعي n دواړه مربعګانې يو پر بل راځي، له هغې سيمې سره مساوي مساحت لري چې له دغو دواړو مربعګانو هېڅ يو نه ده پوښلې، يعني د نارنجي مربع مساحت د دواړو بې رنگه مربعګانو د مساحتونو له مجموعې سره مساوي دے. نو که د نارنجي مربع ضلعه p او د هر بې رنگه مربع ضلعه q وي، نو $p^2 = 2q^2$ خو اوس $\sqrt{2} = p/q$ ، چې $p < m$ ، $q < n$ او $p, q \in \mathbb{N}$ دي. دا له دې خبرې سره تناقض لري چې m او n تر ټولو واړه ممکن عددونه ټاکل شوي وو. دويم، په صوري ډول. ځکه چې $m^2 = 2n^2$ ، نو m جفت دے. (دا ښودل اسانه دي چې که x طاق وي، نو x^2 هم طاق وي.) نو د کوم $r \in \mathbb{N}$ دپاره $m = 2r$. په بيا ترتيبولو $n^2 = 2r^2$ ، نو n هم جفت دے. په دې توګه m او n دواړه جفت دي، او له دې امله کسر m/n نور ساده کېدے شي. تناقض! □

په ضمن کېني دا انځوريز ثبوت موږ ته اجازه راکوي چې د $OpenLogic$ اړونده سرچينهزه برخه [OLP] مواد بيا وګورو. ټېنباوم (1927-2006) بشپړ معاصر رياضي پوه و، خو ثبوت يې شکه ښکله، پوره دقيق او پر هندي پوهېدنه ولاړ دے!

په هر حال، حقيقي عددونه تر ناطقو عددونو «ډېر پراخ» دي. په يوه معنا په ناطقو عددونو کېني «تشيالونه» شته چې حقيقي عددونه يې ډکوي. وېرسټراس وپېژندله چې دا د حقيقي عددونو يو خاصيت بيانوي، کوم چې هغو له ناطقو عددونو بېلوي؛ يعني د بشپړتيا خاصيت: د حقيقي عددونو هر نالشي سب چې پاسنی حد لري، تر ټولو لږ پاسنی حد هم لري.

دا ليدل اسانه دي چې ناطق عددونه د بشپړتيا خاصيت نه لري. د بېلګې په ډول له $\sqrt{2}$ څخه د وړو ناطقو عددونو دا سب په پام کېني ونيسئ:

$$\{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2 \text{ يا } p < 0\}$$

دا په ناطقو عددونو کېني پاسنی حد لري؛ د بېلګې په ډول د دې ټول غړي له 3 څخه واړه دي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLARI-002) په انګريزي سرچينه کېني د غړي له نښان وروسته يو بې ځايه «کم تر» نښان پاتې و؛ دلته حذف شوی دے. خو د دې تر ټولو لږ پاسنی حد څه دے؟ غواړو ووايو $\sqrt{2}$ ؛ خو همدا اوس مو وليدل چې $\sqrt{2}$ ناطق نه دے. او له $\sqrt{2}$ څخه لوړ تر ټولو لږ ناطق عدد نشته. نو دا سب پاسنی حد لري خو تر ټولو لږ پاسنی حد نه لري. له دې امله ناطق عددونه د بشپړتيا خاصيت نه لري.

د دې پر خلاف، پيوستار «له معنوي پلوه بايد» د بشپړتيا خاصيت ولري. موږ يوازې دا نه غواړو چې $\sqrt{2}$ يو حقيقي عدد وي؛ غواړو د ناطقو عددونو د کرښې ټول «تشيالونه» ډک کړو. په رښتيا غواړو چې پخپله پيوستار هېڅ «تشيال» ونه لري. همدا هغه څه دي چې د بشپړتيا له لارې به يې ترلاسه کړو.

5.4 له $\mathbb{Q}$ څخه $\mathbb{R}$ ته

په اصل کېني د بشپړتيا خاصيت ښيي چې د حقيقي عددونو د کرښې هر ټکی α دا کرښه په بشپړ ډول پر دوو برخو وېشي: هغه عددونه چې α يې تر ټولو لږ پاسنی حد دے، او هغه عددونه چې α يې تر ټولو لوړ لاندینی حد دے. دېدېکېدو وړانديز وکړ چې له ناطقو عددونو څخه

² دا ثبوت Conway (2006) روايت کړے دے.

د حقيقي عددونو د جوړولو دپاره، حقيقي عددونه يوازې د هغو پرېکونونو په توګه وګڼو چې ناطق عددونه وېشي. يعنې $\sqrt{2}$ له هغه پرېکون سره يو ګڼو چې ناطق عددونه $\sqrt{2} < \text{له ناطق عددونو } \sqrt{2} > \text{نڅخه بېلوي}$.

راځئ دا خبره سمه منظمه کړو. که ناطق عددونه پر دوو برخو پرې کړو، نو يوازې د هغې لاندېنۍ برخې په ګڼو خپل وېش په يوازېني ډول پېژندل شو. نو په دقيق ډول لاندې تعريف وړاندې کوو:

تعريف 5.8 (پرېکون). يو پرېکون α د ناطقو عددونو هره نانتشه خاصه پيلنۍ برخه ده چې تر ټولو لږ غږې نۀ لري. يعنې α هله او يوازې هله پرېکون دے چې:

1. نانتش، خاص: $\emptyset \neq \alpha \subseteq \mathbb{Q}$

2. پيلنۍ: د ټولو $p, q \in \mathbb{Q}$ دپاره: که $p < q \in \alpha$ وي، نو $p \in \alpha$

3. تر ټولو لږ غږې نۀ لري: د هر $p \in \alpha$ دپاره داسې $q \in \alpha$ شته چې $p < q$ وي

بيا $\mathbb{R}$ د پرېکونونو سټ دے.

نو اوس ويلے شو چې $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p^2 < 2\}$ يا $p < 0$ البته بايد وارزوو چې دا په رښتيا يو پرېکون دے، خو دا کار 5.6 ته پرېږدو.

لکه مخکېنې، چې ځينې څيزونه مو تعريف کړل، بيا بايد پر هغو بنسټيزې تابعې او اړيکې تعريف کړو. په يوه اسانه تعريف پيل کوو:

$$\alpha \subseteq \beta \text{ هله او يوازې هله چې } \alpha \leq \beta$$

د مرتبې دا تعريف موږ ته اجازه راکوي چې مرکزي پايله بيان کړو: د پرېکونونو سټ د بشپړتيا خاصيت لري. په بشپړ ډول د بيان بڼه داسې ده. که S د پرېکونونو يو نانتش سټ وي چې پاسنی حد لري، نو S تر ټولو لږ پاسنی حد لري. په لا تفصيل: يو پرېکون λ شته چې د S پاسنی حد دے، يعنې $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \lambda$ ، او λ تر ټولو لږ داسې پرېکون دے، يعنې $(\forall \beta \in \mathbb{R}) ((\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta \rightarrow \lambda \subseteq \beta)$. اوس د پايلې ثبوت دا دے:

قضيه 5.9. د پرېکونونو سټ د بشپړتيا خاصيت لري.

ثبوت. فرض کړئ S د پرېکونونو هر نانتش سټ دے چې پاسنی حد لري. وټاکئ $\lambda = \bigcup S$. لومړے ادعا کوو چې λ يو پرېکون دے:

1. ځکه چې S نانتش دے، لږ تر لږه يو پرېکون په S کېنې دے، نو $\lambda \neq \emptyset$. د ژباړې د نسخې سمون: (OLARI-003) انګريزي سرچينه دا ګام په تېروتنه د پاسني حد له فرض سره تري؛ اړين دليل د همدې سټ نانتش والے دے. ځکه چې S د پرېکونونو سټ دے، $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$. ځکه چې S پاسنی حد لري، کوم $p \in \mathbb{Q}$ د هر پرېکون $\alpha \in S$ نڅخه بهر دے. نو $p \notin \lambda$ ، اوله دې امله $\lambda \subseteq \mathbb{Q}$.

2. فرض کړئ $p < q \in \lambda$. نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $q \in \alpha$. ځکه چې α يو پرېکون دے، $p \in \alpha$. نو $p \in \lambda$.

3. فرض کړئ $p \in \lambda$. نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $p \in \alpha$. ځکه چې α يو پرېکون دے، داسې $q \in \alpha$ شته چې $p < q$. نو $q \in \lambda$.

په دې سره ادعا ثابته شوه. برسېره پر دې، په څرګند ډول $\lambda = \bigcup S$ ؛ يعنې λ د S يو پاسنی حد دے. اوس فرض کړئ $\beta \in \mathbb{R}$ هم پاسنی حد دے؛ يعنې $(\forall \alpha \in S) \alpha \subseteq \beta$. د هر $p \in \mathbb{Q}$ دپاره، که $p \in \lambda$ وي، نو داسې $\alpha \in S$ شته چې $p \in \alpha$ ، او په دې توګه $p \in \beta$. په عمومي کولو $\lambda \subseteq \beta$. نو λ د S تر ټولو لږ پاسنی حد دے. $\square$

نو موږ داسې ډېر څيزونه لرو چې د بشپړتيا خاصيت پوره کوي. د دې د ويلو يوه لار دا ده: زموږ په پرېکونونو کېنې هېڅ «نشيال» نشته. (نو د ناطقو عددونو پر ځای د حقيقي عددونو نور «پرېکونونه» اخيستل به هېڅ په زړه پورې نوي څيزونه رانه کړي.)

بیا باید پر حقیقي عددونو ځینې عمليې تعریف کړو. ناطق عددونه په حقیقي عددونو کښې په دې ټاکنه ورکړو چې د هر $p \in \mathbb{Q}$ دپاره $-p_{\mathbb{R}} = \{q \in \mathbb{Q} : q < p\}$ بیا تعریفوو:

$$\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$$

$$\alpha \times \beta = \{p \times q : 0 \leq p \in \alpha \wedge 0 \leq q \in \beta\} \cup 0_{\mathbb{R}} \quad \text{که } \alpha, \beta \geq 0_{\mathbb{R}}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLARI-004) سرچینې ناطق عددونه حقیقي عددونو ته په لاندې لیک نښه ورکړې، خو په دې اتحاد کښې د حقیقي صفر نښه په پورته لیک لیکي. د فورمول د برابرۍ دپاره اصلي نښه ساتل شوې، دلته ئې ټاکل شوې معنا د حقیقي صفر پرېکون دے. د ضرب د نورو حالتونو د سمبالولو دپاره لومړۍ وټاکي:

$$-\alpha = \{p - q : p < 0 \wedge q \notin \alpha\}$$

او بیا وټاکي:

$$\alpha \times \beta = \begin{cases} -\alpha \times -\beta & \text{که } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta < 0_{\mathbb{R}} \\ -(-\alpha \times \beta) & \text{که } \alpha < 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta > 0_{\mathbb{R}} \\ -(\alpha \times -\beta) & \text{که } \alpha > 0_{\mathbb{R}} \text{ او } \beta < 0_{\mathbb{R}} \end{cases}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLARI-005) فعاله انگریزي سرچینه هغه د ضرب حالتونه نه تعریفوي چې یو عامل صفر او بل منفي وي، د صفر قاعده یوازې په غیر فعاله تبصره کښې پاتې ده. نو تر هغې قاعدې پرته پورته ټوټه ییز تعریف بشپړ ضرب نه تعریفوي. بیا باید وارزوو چې دا هر تعریف تل یو پرېکون ورکوي. په پای کې باید په یوه اسانه (خو اوږده) څرګندونه کښې ونښو چې په دې ډول تعریف شوي پرېکونونه کټ مټ لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي. خو دا ټول 5.6 ته پرېږدو.

5.5 ځینې فلسفي غورونه

فني خبرې تر دې ځایه بس دي. خو هغو څه ترلاسه کړل؟

ښه، دا خبره تقریباً له اختلافه پاکه ده چې هغو موږ ته څه ښکلي سوچه ریاضي را کړه. برسېره پر دې، ځینې ژورې تصوري لاسته راوړنې هم وې. دا پېژندنه ژوره وه چې د بشپړتیا خاصیت د حقیقي او ناطقو عددونو تر منځ بنسټیز توپیر بیانوي. همدارنګه د ډېډېکېنډ د پرېکونونو په توګه د حقیقي عددونو ښکاره جوړښت د تحلیل موضوع ته کلک بنسټ ورکوي. پوهېږو چې د بشپړ مرتب میدان تصور یې تناقضه دے، ځکه پرېکونونه کټ مټ همداسې یو میدان جوړوي.

له دې ټولو سره، د دغو لاسته راوړنو په اړه باید خو تحفظات څرګند کړو.

لومړۍ، دا څرګنده نه ده چې د پرېکونونو په توګه د حقیقي عددونو ټکل د هغو د پېژندل شوو (ښايي نامتناهي) اعشاري پراختیاوو په توګه تر ټولو څومره زیات دقیق دي. د حقیقي عددونو دا وروسته «جوړښت» د کوشي تسلسلونو له لارې د حقیقي عددونو جوړښت ته څه ورته والې لري، خو په حقیقت کې ریاضي پوهان د اوولسمې پېړۍ له پیله په بنسټیز ډول پرې پوهېدل (5.7 وګورئ). په دقت کې رښتینې زیاتواله له دې پېژندنې راغې چې حقیقي عددونه د بشپړتیا خاصیت لري، یوازې دا وړتیا چې حقیقي عددونه د ځانګړو ستونو په توګه جوړ کړو، ښايي پخپله دومره په زړه پورې نه وي.

دا لا هم لږ څرګنده ده چې د صحیح یا ناطقو عددونو (ډېرې اسانه) سټي جوړونه په دغو ډګرونو کې دقت زیاتوي. دلته یوه ساده خبره د یادولو وړ ده. صحیح عددونه مو د طبیعي عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتی ټولګیو په توګه جوړ کړل، بیا مو ناطق عددونه د صحیح عددونو د مرتبو جوړو د هم ارزښتی ټولګیو په توګه جوړ کړل، او بیا مو حقیقي عددونه د ناطقو عددونو د ستونو په توګه جوړ کړل، خو سمدستي دا جوړښتونه هېروو. په ځانګړي ډول هېڅوک به کله هم ونه غواړي چې په یوه ریاضیاتي ثبوت کې دا جوړښتونه وکاروي (البته د دې ثبوت پرته چې جوړښتونه لکه څنګه چې ټاکل شوي وو، هماغسې چلېږي). د یوه حقیقي عدد په اړه ښه په ښه خبرې کول د طبیعي عددونو د ستونو د ستونو د ستونو د ستونو د کوم سټ په اړه تر خبرو ډېر اسانه دي.

تر ټولو زیات شک په دې دے چې دا تعریفونه موږ ته وایي چې صحیح، ناطق یا حقیقي عددونه په ماوراءالطبیعي معنا څه دي. یعنې په دې شک دے چې حقیقي عددونه (مثلاً) ځینې ځانګړي ستونه (د ستونو د ستونو ...) دي. د دې نظر پر وړاندې ستر خنډ دا دے چې

جورښت په ډېرو بېلابېلو لارو کېدلې شو. د حقيقي عددونو په حالت کېنې ځينې په رښتيا په زړه پورې بېلابېل جورښتونه شته (5.7 وگورئ). خو د بېلابېلو جورښتونو د ترلاسه کولو يوه ډېره ساده لار دا ده: لکه په 2.2 کېنې، مرتبې جورې مو لږ په بله توګه تعريفولې شوې، که مو د مرتبې جورې دا بدیل تصور کارولې وې، زموږ جورښتونو به کېت مټ همدومره سم کار کړې وې، خو په پای کېنې به مو بېل څيزونه ترلاسه کړي وو. له دې امله د صحيح، ناطقو او حقيقي عددونو ډېر سيال سټي جورښتونه شته. اوس دا ادعا چې صحيح عددونه (مثلاً) دا ستونه دي، نه هغه، يوازې خپلسرې (او شرمونکې) به وي. (لکه په 2.2 کېنې، دا د هغه استدلال يوه بېلګه ده چې Benacerraf 1965 مشهور کړه.)

يو بل ټکی هم د راپورته کولو وړ دے: زموږ په جورښتونو کېنې يو ډېر عجيب څيز شته. موږ په طبيعي عددونو پيل وکړ. بيا صحيح عددونه جوړوو، او «د صحيح عددونو 0»، يعنې $[0, 0]$ ، جوړوو. خو $0 \neq [0, 0]$ په حقيقت کېنې زموږ د جورښتونو له مخې هېڅ طبيعي عدد صحيح عدد نه دے. خو دا د شهودي پوهې سخت خلاف ښکاري. همدارنګه په 1.3 کېنې مو له ډېر استدلال پرته ادعا وکړه چې $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$. که جورښتونه موږ ته په دقيق ډول وايي چې عددونه څه دي، نو دا ادعا به څرګند ډول ناسمه وه.

نو چې يو ګام شاته ودرېږو، کوم ځای ته رسېږو؟ په ساده سټ نظريه کېنې په کار کولو او طبيعي عددونو ته په ورکړل شوو څيزونو ګڼلو، صحيح، ناطق او حقيقي عددونه د ځينو ستونو په توګه کارولې شو. په دې معنا د دغو څيزونو نظريې په سټ نظريه کېنې ورګډولې شو. خو د دې ورګډولو فلسفي ارزښت دومره ساده نه دے.

البتہ دا هېڅ د بحث وروستۍ خبره نه ده! ټکي يوازې دا دے: د دې د ښودلو دپاره چې د حقيقي عددونو سټي جورښت ژور فلسفي ارزښت لري، يو څه نور فلسفي استدلال ته اړتيا ده.

5.6 مرتبې حلقې او ميدانونه

په دې ټول څېړنې کېنې مو ادعا وکړه چې ځينې تعريفونه «لکه څنګه چې بايد» هماغسې چلېږي. په دې فني ضميمه کېنې به روښانه کړو چې مطلب مو څه دے، او (لنډه ځاګه به ورکړو چې څنګه) وښيو تعريفونه «سم» چلېږي. د ژباړې د نسخې بشپړتيا يادونه: (OLARI-006) سرچينه د حلقې قوانين ارزوي، خو تر هغو مخکېنې دا نه ثابتوي چې د صحيح او ناطقو عددونو پر ټولګيو تعريف شوې عمليې د استازي له انتخابه خپلواکې دي؛ لاندې محاسبې دا اړين ښه تعريف والې له مخکېنې فرضوي.

په 5.1 کېنې مو پر $\mathbb{Z}$ جمع او ضرب تعريف کړل. غواړو وښيو چې دا عمليې، لکه څنګه چې تعريف شوې دي، $\mathbb{Z}$ ته هغه جورښت ورکوي چې موږ ئې «غواړو». په ځانګړي ډول دا جورښت يوه تبادلي حلقه ده.

تعريف 5.10. يوه تبادلي حلقه يو سټ S دے چې ځانګړې غړي 0 او 1 او عمليې $+$ او $\times$ لري، او دا اته فارمولونه پوره کوي:

اتحاديت

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

تبادليت

$$a + b = b + a$$

$$a \times b = b \times a$$

غړي عيني

$$a + 0 = a$$

$$a \times 1 = a$$

معکوس جمعي

$$(\exists b \in S) 0 = a + b$$

توزيعيت

$$a \times (b + c) = (a \times b) + (a \times c)$$

په ضمني ډول دا ټول په هغو کلي مقداري نښو تړل شوي چې ساحه ئې تر S محدوده ده. او پام وکړئ چې دلته د 0 او 1 غړي لازماً په همدې نومونو طبيعي عددونه نه دي.

نو د دې د ارزولو دپاره چې صحيح عددونه تبادلي حلقه جوړوي، يوازې دا اته شرطونه ارزول غواړو. د شرطونو ثابتول ګران نه دي، خو لږ اوږد کار دے. د بېلګې په ډول د جمع په حالت کېنې اتحاديت داسې ثابتوو:

ثبوت. $i, j, k \in \mathbb{Z}$ ثابت ونیسئ. نو داسې $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3 \in \mathbb{N}$ شته چې $i = [a_1, b_1]$ او $j = [a_2, b_2]$ او $k = [a_3, b_3]$.
(د لوستلو د اسانتیا دپاره د “ $[x, y]$ پر ځای” لیکو؛ په دې ټوله برخه کې به همداسې کوو.) اوس:

$$\begin{aligned} i + (j + k) &= [a_1, b_1] + ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\ &= [a_1, b_1] + [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\ &= [a_1 + (a_2 + a_3), b_1 + (b_2 + b_3)] \\ &= [(a_1 + a_2) + a_3, (b_1 + b_2) + b_3] \\ &= [a_1 + a_2, b_1 + b_2] + [a_3, b_3] \\ &= ([a_1, b_1] + [a_2, b_2]) + [a_3, b_3] \\ &= (i + j) + k \end{aligned}$$

او د $\mathbb{N}$ پر جمع له چلنده ازاد کار اخلو. $\square$

په همدې ډول جمعي معکوس داسې ثابتوو:

ثبوت. $i \in \mathbb{Z}$ ثابت ونیسئ، نو د ځینو $a, b \in \mathbb{N}$ دپاره $i = [a, b]$ وټاکئ؛ $j = [b, a] \in \mathbb{Z}$ د طبیعي عددونو له چلنده په کار اخیستلو
($(a + b) + 0 = 0 + (a + b)$)، نو د تعریف له مخې $\langle a + b, b + a \rangle \sim_{\mathbb{Z}} \langle 0, 0 \rangle$ ، او له دې امله $0_{\mathbb{Z}} = [0, 0] = [a + b, b + a]$.
نو اوس $-i + j = [a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0] = 0_{\mathbb{Z}}$ $\square$

او د توزیعت ثبوت دا دے:

ثبوت. لکه پورته، $i = [a_1, b_1]$ ، $j = [a_2, b_2]$ او $k = [a_3, b_3]$ ثابت ونیسئ. اوس:

$$\begin{aligned} i \times (j + k) &= [a_1, b_1] \times ([a_2, b_2] + [a_3, b_3]) \\ &= [a_1, b_1] \times [a_2 + a_3, b_2 + b_3] \\ &= [a_1(a_2 + a_3) + b_1(b_2 + b_3), a_1(b_2 + b_3) + b_1(a_2 + a_3)] \\ &= [a_1a_2 + a_1a_3 + b_1b_2 + b_1b_3, a_1b_2 + a_1b_3 + a_2b_1 + a_3b_1] \\ &= [a_1a_2 + b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1] + [a_1a_3 + b_1b_3, a_1b_3 + a_3b_1] \\ &= ([a_1, b_1] \times [a_2, b_2]) + ([a_1, b_1] \times [a_3, b_3]) \\ &= (i \times j) + (i \times k) \end{aligned}$$

$\square$

د پاتې پنځو شرطونو ثبوت د تمرین په توګه پرېږدو. چې دا مو وکړل، ښودلې مو دي چې $\mathbb{Z}$ یوه تبادلي حلقه جوړوي؛ یعنې جمع او ضرب (لکه څنګه چې تعریف شوي) هماغسې چلېږي چې باید.

تمرین 5.11. ثابت کړئ چې $\mathbb{Z}$ یوه تبادلي حلقه ده.

خو زموږ کار لا ختم نه دے. پر $\mathbb{Z}$ مو له جمع او ضرب سره یوه ترتیبي اړیکه $\leq$ هم تعریف کړې، او باید وارزوو چې دا لکه څنګه چې باید، هماغسې چلېږي. په لا تفصیل باید وښیو چې $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه جوړوي.³

تعریف 5.12. یوه مرتبه حلقه هغه تبادلي حلقه ده چې یوه کلي ترتیبي اړیکه $\leq$ هم لري، داسې چې:

$$\begin{aligned} a \leq b &\rightarrow a + c \leq b + c \\ (a \leq b \wedge 0 \leq c) &\rightarrow a \times c \leq b \times c \end{aligned}$$

³ له 2.19 مخه په یاد ولرئ چې کلي ترتیب هغه اړیکه ده چې انعکاسي، انتقالي، ضد تناظري او وصل شوې وي. د ترتیبي اړیکو په متن کې وصل والې کله کله درېګونې بلل کېږي، ځکه د هر a او b دپاره $b \vee a = a \vee b$ لرو.

تمرین 5.13. ثابت کړئ چې $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه ده.

لکه مخکښې، دا ښودل چې جوړ شوی $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه ده، اوږد خو معمولي کار دے. دا تاسو ته پرېږدو.

په دې سره د صحیح عددونو کار بشپړېږي. خو اوس د ناطقو عددونو په اړه ورته خبرې ښودل غواړو. په ځانګړي ډول باید وښیو چې زموږ $+$ ، $\times$ او $\leq$ د ورکړل شوو تعریفونو له مخې ناطق عددونه یو مرتب میدان جوړوي:

تعریف 5.14. یو مرتب میدان هغه مرتبه حلقه ده چې دا شرط هم پوره کوي:

$$(\forall a \in S \setminus \{0\})(\exists b \in S)a \times b = 1$$

معکوس ضربی

د ژباړې د نسخې بشپړتیا یادونه: (OLARI-008) د میدان په دودیز تعریف کېنې جمعي او ضربی عیني غړي باید پیل وي؛ سرچینې دا شرط نه دے بیان کړے، نو لیکل شوی تعریف صفر حلقه هم په تشه توګه مني.

چې مو وښودل $\mathbb{Z}$ یوه مرتبه حلقه جوړوي، بیا دا ښودل اسانه خو اوږد دي چې $\mathbb{Q}$ یو مرتب میدان جوړوي.

تمرین 5.15. ثابت کړئ چې $\mathbb{Q}$ یو مرتب میدان دے.

د صحیح او ناطقو عددونو له سمبالولو وروسته یوازې حقیقي عددونه پاتې دي. په ځانګړي ډول باید وښیو چې $\mathbb{R}$ یو بشپړ مرتب میدان جوړوي، یعنې یو مرتب میدان چې د بشپړتیا خاصیت لري. 5.9 ثابته کړه چې $\mathbb{R}$ د بشپړتیا خاصیت لري. خو لا د دې ارزولو (سترے) کار پاتې دے چې $\mathbb{R}$ یو مرتب میدان دے. د ژباړې د نسخې سمون: (OLARI-007) په انګرېزي جمله کېنې د «ستري» او «ارزولو» تر منځ اړین نوم پاتې شوی و، دلته جمله د همدې کار په څرګند نوم بشپړه شوې ده.

مخکښې له دې چې هغه اوږد تمرین پیل کړو، باید ځینې نورې «سمدستي» خبرې وارزوو. د بېلګې په ډول باید ډاډ ولرو چې د هر دوو پرېکونونو α او β دپاره، تعریف شوی $\alpha + \beta$ په رښتیا یو پرېکون دے. د دې حقیقت ثبوت دا دے:

ثبوت. ځکه چې α او β دواړه پرېکونونه دي، $\alpha + \beta = \{p + q : p \in \alpha \wedge q \in \beta\}$ د $\mathbb{Q}$ یو نائش خاص فرعي سټ دے. اوس فرض کړئ د ځینو $p \in \alpha$ او $q \in \beta$ دپاره $x < p + q$ بیا $x - p < q$ ، نو $x - p \in \beta$ ، او $x - p \in \alpha + \beta$ ، نو $x = p + (x - p) \in \alpha + \beta$. د $\alpha + \beta$ د $\mathbb{Q}$ یوه پیلنۍ برخه ده. په پایله کېنې، د هر $p + q \in \alpha + \beta$ دپاره، ځکه چې α او β دواړه پرېکونونه دي، داسې $p_1 \in \alpha$ او $q_1 \in \beta$ شته چې $p < p_1$ او $q < q_1$ ، نو $p + q < p_1 + q_1 \in \alpha + \beta$ ، نو $\alpha + \beta$ تر ټولو لوی غړی نه لري. $\square$

ورته هڅې به درته اجازه وکړي چې وارزوی $\alpha - \beta$ ، $\alpha \times \beta$ او $\alpha \div \beta$ پرېکونونه دي (په وروستي حالت کېنې هغه حالت نه شمېرو چې β صفر پرېکون وي). خو یو ځل بیا دا یوازې تاسو ته پرېږدو. د ژباړې د نسخې بشپړتیا یادونه: (OLARI-009) د پرېکونونو په برخه کېنې د تفریق او وېش فارمولونه غېر فعالې تبصرې دي، نو فعاله سرچینه هغه دوه عمليې نه تعریفوي چې دا دعوه او راتلونکې میدان تمرین ورته اړتیا لري.

تمرین 5.16. ثابت کړئ چې $\mathbb{R}$ یو مرتب میدان دے.

خو یوه وړه نيمکړې خبره لا سمول غواړي. په 5.4 کېنې مو وړاندیز وکړ چې $\sqrt{2} = \{p \in \mathbb{Q} : p < 0 \text{ یا } p^2 < 2\}$ اخيستلے شو. خو باید وښیو چې دا سټ یو پرېکون دے. د دې حقیقت ثبوت دا دے:

ثبوت. په څرګند ډول دا د ناطقو عددونو یوه نائشه خاصه پیلنۍ برخه ده؛ نو دومره ښودل بس دي چې تر ټولو لوی غړی نه لري. په ځانګړي ډول دا ښودل بس دي چې که p یو مثبت ناطق عدد وي، $p^2 < 2$ وي او $q = \frac{2p+2}{p+2}$ وي، نو $p < q$ او $q^2 < 2$ دواړه دي. د $p < q$ د لیدلو دپاره یوازې پام وکړئ:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ p^2 + 2p &< 2 + 2p \\ p(p+2) &< 2 + 2p \\ p &< \frac{2+2p}{p+2} = q \end{aligned}$$

د $q^2 < 2$ د لیدلو دپاره یوازې پام وکړئ:

$$\begin{aligned} p^2 &< 2 \\ 2p^2 + 4p + 2 &< p^2 + 4p + 4 \\ 4p^2 + 8p + 4 &< 2(p^2 + 4p + 4) \\ (2p + 2)^2 &< 2(p + 2)^2 \\ \frac{(2p+2)^2}{(p+2)^2} &< 2 \\ q^2 &< 2 \end{aligned}$$

□

5.7 ضمیمه: حقیقي عددونه د کوشي د لړیو په توګه

په 5.4 کېنې مو حقیقي عددونه د ډېډېکېنډ د پرېکونونو په توګه جوړ کړل. په دې برخه کېنې یوه بله جوړونه تشرېح کوو. دا د کوشي پر هغه تعریف ولاړه ده چې اوس ئې د کوشي لړۍ بولو، خو له دې تعریف څخه د حقیقي عددونو د جوړولو کار د نولسمې پېړۍ نورو لیکوالانو، په ځانګړې توګه وایرشتراس، هابې، مېرلې او کانټور، کړې دے. (د نېټه تاریخ دپاره [2005 Robertson and O'Connor](#) وګورئ.)

مخکېنې له دې چې نولسمې پېړۍ ته ورسېږو، د ساین سټېون (1548-1620) خبره د پام وړ ده. په لنډ ډول، سټېون پوه شو چې هر حقیقي عدد د هغه د اعشاري پراختیا له مخې ګڼلې شو. نو آن یو غیر ناطق عدد لکه $\sqrt{2}$ هم یوه نېټه اعشاري پراختیا لري، چې پیل ئې داسې دے:

$$1.41421356237 \dots$$

په سټ نظریه کېنې د اعشاري پراختیاوو نمونه جوړول ډېر اسان دي: یوازې داسې تابعې $d: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ئې وګڼئ چې $d(n)$ هغه n م اعشاري ځای وي چې موږ ئې څېرو. بیا لږ بدلون ته اړتیا لرو، څو د حقیقي عدد هغه برخه هم سمبال کړو چې له اعشاري ټکي مخکېنې راځي (دلته یوازې 1). یو بل بدلون، یعنې د هم ارزښتی اړیکه، هم پکار ده څو د بېلګې په توګه یقیني کړو چې $1 = 0.999 \dots$. خو په سټ نظریه کېنې د سټېون په لار د حقیقي عددونو بشپړه دقیقه جوړونه وړاندې کول ګران نه دي.

سټېون زموږ اصلي موضوع نه ده. (د سټېون په اړه نور معلومات په [2012 Katz and Katz](#) کېنې وګورئ.) خو دا ډېره ورته خبره وګورئ. د $\sqrt{2}$ اعشاري پراختیا په نېغه د څېړلو پر ځای، د $\sqrt{2}$ د لا کړه پراختیاوو په اخیستلو د هغو ناطقو اټکلونو یوه لړۍ ګڼلې شو چې کړه والې ئې پرله پسې زیاتېږي:

$$1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \dots$$

دا نظر چې حقیقي عددونه د «پرله پسې بنو اټکلونو» له لارې ګڼلې شو، د یوې بېلې پوهېدنې بنسټ راکوي (هغو پوهېدنو ته ورته چې $\mathbb{Q}$ مو له $\mathbb{Z}$ ، یا $\mathbb{Z}$ مو له $\mathbb{N}$ څخه جوړول). بنسټیزې خبرې دا دي:

- هر حقیقي عدد د یوې (کېدې شي نامتناهي) اعشاري پراختیا په بڼه لیکل کېدای شي.
- په یوه (کېدې شي نامتناهي) اعشاري پراختیا کېنې زېرمه شوي معلومات په هماغه ډول د ناطقو عددونو په یوه لړۍ کېنې زېرمه کېدای شي.
- د ناطقو عددونو لړۍ له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته یوه تابع ګڼلې شو، یوازې $f(n)$ په لړۍ کېنې n م ناطق عدد وټاکئ.

البت له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{Q}$ ته هر تابع حقیقي عدد نه راکوي. د بېلګې په توګه دا تابع وګورئ:

$$f(n) = \begin{cases} 1 & \text{طاق وي } n \text{ که} \\ 0 & \text{جفت وي } n \text{ که} \end{cases}$$

اصلي اندېښنه دا ده چې د $0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots$ لړۍ هېڅ حقيقي عدد ته «نژدې کېدونکې» نه ښکاري. نو د دې د يقيني کولو دپاره چې هغه لړۍ څېړو چې کوم حقيقي عدد ته ورژدې کېږي، بايد خپل پام هغو لړيو ته محدود کړو چې کوم حد لري.

موږ د حد له نظر سره په د $OpenLogic$ اړونده سرچينه برخه [OLP] کېنې مخکېنې هم مخامخ شوي يو. خو کټ مټ هماغه پخوانۍ تعريف نشو کارولې. هلته عبارت « $(\forall \varepsilon > 0)$ » په پټه پر حقيقي عددونو کېت اېښودنه درلوده؛ او موږ د حقيقي عددونو پر تابعو حدونه څېړل؛ نو د هغه تعريف کارول به دا وي چې حقيقي عددونه لا له مخکېنې ومنو، حال دا چې موږ کټ مټ د هغو جوړول غواړو. نېکمرغي ده چې د حد له يوه ډېر نژدې نظر سره کار کولې شو.

تعريف 5.17. يوه تابع $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ هله او يوازې هله د کوشي لړۍ ده چې د هر مثبت $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ دپاره $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall m, n > \ell) |f(m) - f(n)| < \varepsilon$ وي.

د حد عمومي نظر د پخوا په شان دے: که د کره والي يوه ټاکلې کچه (چې په ε اندازه کېږي) وغواړئ، د ټولو يوه «سيمه» شته (هره وړودي چې له ℓ څخه لويه وي). دا هم په اسانۍ ليدل کېږي چې زموږ لړۍ $1, 1.4, 1.414, 1.4142, 1.41421, \dots$ حد لري: که غواړئ $\sqrt{2}$ د $1/10^n$ له خطا دننه اټکل کړئ، نو يوازې له m غړي وروسته هر غړی وگورئ.

نو څرکند فکر به دا وي چې حقيقي عدد هماغه هره د کوشي لړۍ ده. خو لکه د $\mathbb{Z}$ او $\mathbb{Q}$ په جوړونو کېنې، دا خبره به بېخي ساده وي: د هر ورکړل شوي حقيقي عدد دپاره څو بېلې د کوشي لړۍ هماغه حقيقي عدد ښيي. د دې د ليدلو يوه اسانه لار داسې ده. يوه د کوشي لړۍ f واخلي او g کټ مټ د f په شان تابع تعريف کړئ، يوازې دومره توپير چې $f(0) \neq g(0)$. ځکه دواړه لړۍ له لومړي عدد وروسته په هر ځای کېنې سره برابري دي، نو په پای کېنې به ووايو چې د **5.17** په معنا يو حد لري، او بايد د هماغه حقيقي عدد «تعريفونکې» وکړل شي. نو په رښتيا بايد دا د کوشي لړۍ هماغه يو حقيقي عدد وگڼو.

په پايله کېنې بيا بايد د کوشي پر لړيو د هم ارزښتۍ يوه اړيکه تعريف کړو او حقيقي عددونه د هم ارزښتۍ له ټولگيو سره يو وگڼو. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLARI-010)** انگرېزي سرچينه په دې ځای «د هم ارزښتۍ اړيکې» وايي، خو جوړېدونکي حقيقي عددونه د اړيکې ټولگي دي؛ د لاندې تعريف او فورمول سره سم دلته هماغه ټولگي ليکل شوي. لومړۍ داسې تابع پکار ده چې په حد کېنې 0 ته ورژدې شي. د هرې تابع $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ دپاره ووايو چې h ته ورژدې کېږي هله او يوازې هله چې د هر مثبت $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ دپاره $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) |h(n)| < \varepsilon$ وي. ⁴ برسېره پر دې، چې f او g د $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ تابعي وي، $(f - g)(n) = f(n) - g(n)$ وټاکئ. اوس تعريف کړئ:

. هله او يوازې هله چې $(f - g)$ ته ورژدې کېږي $f \approx g$.

بايد وارزوو چې $\approx$ د هم ارزښتۍ اړيکه ده؛ او رښتيا هم ده. بيا، که وغواړو، حقيقي عددونه د $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ د ټولو کوشي لړيو هغه د هم ارزښتۍ ټولگي تعريفولې شو چې د $\approx$ له مخې جوړېږي.

تمرین 5.18. د هر n دپاره $f(n) = 0$ وټاکئ. او $g(n) = \frac{1}{(n+1)^2}$ وټاکئ. وښئ چې دواړه د کوشي لړۍ دي او په رښتيا د دواړو تابعو حد 0 دے، نو $f \approx g$ هم دے. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLARI-011)** دلته سرچينه د تازه تعريف شوې لنډې پر ځای بېله نښه کاروي؛ د تمرین معنا د هماغې تازه تعريف شوې اړيکې له مخې هم ارزښت دے.

له دې وروسته، د معمول په شان، $[f] \approx [g]$ د هغه د هم ارزښتۍ ټولگي دپاره لیکو چې f ئې يو غړی دے. خو د لوست د اسانولو دپاره به په راتلونکو برخو کېنې لاندې لیک پرېږدو او يوازې $[f]$ لیکو. دا هم ټاکو چې د هر $q \in \mathbb{Q}$ دپاره $q_{\mathbb{R}} = [c_q]$ وي، چې c_q ثابته تابع ده او د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $c_q(n) = q$ وي. بيا پر حقيقي عددونو بنسټيزې اړيکې او عمليې داسې تعريفوو، د بېلگې په توگه:

$$[f] + [g] = [(f + g)]$$

$$[f] \times [g] = [(f \times g)]$$

چې $(f + g)(n) = f(n) + g(n)$ او $(f \times g)(n) = f(n) \times g(n)$. البته بايد دا هم وارزوو چې که f او g د کوشي لړۍ وي، نو هره يوه $(f + g)$ ، $(f - g)$ او $(f \times g)$ هم د کوشي لړۍ ده؛ او داسې ده، خو ثبوت ئې تاسو ته پرېږدو.

په پای کېنې د مرتبې يو مفهوم تعريفوو. ووايو $[f]$ مثبت دے هله او يوازې هله چې هم $[f] \neq 0_{\mathbb{R}}$ وي او هم $(\exists \ell \in \mathbb{N})(\forall n > \ell) 0 < f(n)$ وي. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLARI-012)** سرچينه په دې شرط کېنې ناطق صفر لیکي، خو کينه خوا د حقيقي

⁴ دا د $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ له تعريف سره پرتله کړئ چې په د $OpenLogic$ اړونده سرچينه برخه [OLP] کېنې راغلې.

عدد ټولگي دے او همدلته پورته ثابته ناطقه تابع حقيقي عدد ته ورکده شوې؛ نو د ډول له مخې سم صفر حقيقي صفر دے. بيا ووايئ $[g] < [f]$ هله او يوازې هله چې $[(g - f)]$ مثبت وي. بايد وارزوو چې دا سم تعريف شوه دے (يعني د هم ارزښتي له ټولگي څخه د «ثابته» تابعې پر ټاکنه پورې اړه نه لري). خو له دې ارزونې وروسته په ډېرې اسانۍ بنودل کېدے شي چې دا تعريفونه سم الجبري خاصيتونه راکوي؛ يعني:

قضيه 5.19. د کوشي د لړيو د هم ارزښتي ټولگي يو مرتب ميدان جوړوي.

د ژباړې د نسخې سمون: (OLARI-013) انگرېزي سرچينه دلته او د بشپړتيا په راتلونکې قضيه کېنې په لنډه «د کوشي لړۍ» وايي؛ په لفظي ډول يوازې خامې لړۍ ميدان نه جوړوي. دا پايلې د تعريف شوې اړيکې له مخې د هغو د هم ارزښتي ټولگيو په اړه دي، لکه مخکېني تعريف شول.

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 5.20. ثابته کړئ چې د کوشي د لړيو د هم ارزښتي ټولگي يو مرتب ميدان جوړوي.

دا ثابته لږ گران دي چې په دې ډول جوړ شوي حقيقي عددونه د بشپړتيا خاصيت لري، نو ثبوت ئې وړاندې کوو.

قضيه 5.21. د کوشي د لړيو د هم ارزښتي د ټولگيو هر نائش سټ چې پاسني حد لري، تر ټولو لږ پاسني حد هم لري.

د ثبوت ځا که. فرض کړئ S د کوشي د لړيو هر داسې نائش سټ دے چې پاسني حد لري. نو داسې $p \in \mathbb{Q}$ شته چې $p \in \mathbb{R}$ د S پاسني حد دے. يو $r \in S$ واخلي؛ بيا داسې $q \in \mathbb{Q}$ شته چې $q \in \mathbb{R}$ وي. نو که S تر ټولو لږ پاسني حد موجود وي، د $q \in \mathbb{R}$ او $p \in \mathbb{R}$ تر منځ (دواړه سرونه پکې شامل) دے. د ژباړې د نسخې سمون: (OLARI-014) له يوه خپل سري حقيقي پاسني حد څخه د ناطق پاسني حد، او د ټاکلي غړي څخه لاندې د ناطق حد شتون د ناطقو عددونو د ارشميدي/کثافت خاصيت ته اړتيا لري. سرچينه دا منځني دليل نه وړاندې کوي؛ لاندې نيمه کولو جوړونه همدا ناطق سرونه فرضوي.

موږ به تر ټولو لږ پاسني حد ته په يوه وخت له لاندې او پورته څخه ورنژدې شو. په ځانگړې توگه دوه تابعې $f, g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ داسې تعريفوو چې موخه مو دا وي چې f له پورته او g له لاندې څخه تر ټولو لږ پاسني حد ته ورنژدې شي. په دې تعريف پيل کوو:

$$f(0) = p$$

$$g(0) = q$$

بيا، چې $a_n = \frac{f(n)+g(n)}{2}$ وي، وټاکئ:⁵

$$f(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{که } (\forall h \in S)[h] \leq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ f(n) & \text{که نه} \end{cases}$$

$$g(n+1) = \begin{cases} a_n & \text{که } (\exists h \in S)[h] \geq (a_n)_{\mathbb{R}} \\ g(n) & \text{که نه} \end{cases}$$

f او g دواړه د کوشي لړۍ دي. (دا په نسبتاً اسانۍ ارزول کېدے شي، خو د تمرين په توگه ئې پرېږدو.) پام وکړئ چې تابع $(f - g)$ 0 ته ورنژدې کېږي، ځکه د f او g تر منځ توپير په هر کام کېنې نيم کېږي. نو $[f] = [g]$.

لومړۍ ښيو چې $[f]$ د S پاسني حد دے، يعني $(\forall h \in S)[h] \leq [f]$. (په لار کېنې به 5.19 کاروو.) $h \in S$ واخلي او د نقیض دپاره فرض کړئ چې $[f] < [h]$ ، نو $[(h - f)] < 0_{\mathbb{R}}$. ځکه f يوه يکنواخته کمونکې د کوشي لړۍ ده، داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $[(h - f)] < [(c_{f(n)} - f)]$ نو:

$$(f(n))_{\mathbb{R}} = [c_{f(n)}] < [f] + [(h - f)] = [h],$$

⁵ دا يو بازگشتي تعريف دے. خو تر اوسه مو هيڅ دليل نه دے ورکړے چې بازگشتي تعريفونه سم دي.

خو دا له دې جوړښتي حقیقت سره په ټکر کېږي دے چې $[h] \leq (f(n))_{\mathbb{R}}$.

اوس ښیو چې $[f] = [g]$ د S تر ټولو لږ پاسنی حد دے. نو j دې هره د کوشې لړۍ وي او فرض کړئ $[j] < [g]$. لکه پورته (د) دې حقیقت په کارولو چې g زیاتېدونکې ده) داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $[j] < (g(n))_{\mathbb{R}}$. خو د جوړونې له مخې داسې $h \in S$ شته چې $[h] \leq (g(n))_{\mathbb{R}}$ ، نو $[j] < [h]$ او له دې امله $[j]$ د S پاسنی حد نه دے. $\square$

باب 6


نامتناهي ستونه

ادارتي يادونه - د نامتناهي ستونو دا څپرک د ټيم بتن له اوپن سپټ تيوري څخه اخيستل شوی دے۔

6.1 د هيلبرټ هوټل

د طبيعي عددونو سټ په څرگند ډول نامتناهي دے۔ نو که نه غواړو طبيعي عددونه له مخکښې ومنو، زموږ لومړی کام بايد دا وي چې نامتناهي سټ په داسې اصطلاحاتو کښې وپېژنو چې خپله د طبيعي عددونو يادولو ته اړتيا ونه لري۔ دا يوه نښه لار ده چې هيلبرټ په 1924 کال کښې په يوه وينا کښې وړاندې کړه۔ هغه غواړي چې داسې تصور وکړو:

[...] يو هوټل چې متناهي شمېر کوټې لري۔ په دې هره کوټه کښې دې کټ مټ يو مېله اوسېږي۔ که مېلانه اوس خپلې کوټې په کوم ډول سره بدلې کړي، [خو] داسې چې په هره کوټه کښې بيا هم تر يوه زيات کس نه وي، نو هېڅ کوټه به خالي نشي، او د هوټل خاوند په دې توگه د نوي رارسېدونکي مېله دپاره نوے ځای نشي پيدا کولے [...] اوس ټاکو چې هوټل به نامتناهي ډېرې شمېرل شوې کوټې 1، 2، 3، 4، 5، ... ولري او په هره کښې کټ مټ يو مېله وي۔ که چېرې يو نوے مېله راشي، خاوند ته يوازې دا پکار دي چې هر پخوانی مېله هغې کوټې ته ولېږي چې شمېر ئې يو زيات وي، بيا کوټه 1 د نوي رارسېدونکي مېله دپاره خالي کېږي۔



(په Hilbert 2013, 730 کښې خپور شوی، ژباړه زموږ ده)

مهم ټکی دا دے چې د هيلبرټ هوټل نامتناهي ډېرې کوټې لري؛ او د هغه تشرېح د دې خبرې تعريف کله شو چې دا څه معنا لري۔ په رښتيا، د ډېډېکېنډ لار همدا وه (البته دلته په لوی زماني بې ځايه والي سره وړاندې شوې، د ډېډېکېنډ تعريف د 1888 کال دے):

تعريف 6.1. يو سټ A هله او يوازې هله د ډېډېکېنډ له مخې نامتناهي دے چې له A څخه د A يو حقيقي فرعي سټ ته کومه يو پر يو تابع موجوده وي۔ يعنې داسې $o \in A$ او يو پر يو تابع $f: A \rightarrow A$ شته چې $o \notin \text{ran}(f)$ وي۔

6.2 د ډېډېکېنډ الجبرونه

موږ يوازې دا نه غواړو چې طبيعي عددونه نامتناهي وي؛ غواړو چې ځينې (الجبري) خاصيتونه هم ولري: بايد د جمع، ضرب او نورو عملياتو له مخې سم چلند وکړي۔

د دېدېکېنډ نظر دا و چې د تالي تابعي مفهوم بنسټيز وکني، او بيا عددونه د هغو څيزونو په توگه وپېژني چې لاندې خاصيتونه لري:

1. يو عدد، 0، شته چې د هېڅ عدد تالي نه دے

يعنې $0 \notin \text{ran}(s)$

يعنې $\forall x \ s(x) \neq 0$

2. بېل عددونه بېل تالي لري

يعنې s يوه يو پر يو تابع ده

يعنې $\forall x \forall y (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$

3. هر عدد پر 0 د تالي تابعي له بيا بيا تطبيق څخه ترلاسه کېږي.

لومړي دوه شرطونه د لومړۍ مرتبې د منطق په کارولو په اسانۍ سمبالېږي (پورته وکړئ). خو يوازې د لومړۍ مرتبې په منطق سره 3 نشو سمبالولۍ. د دېدېکېنډ ستره بريا دا وه چې شرط 3 ئې په سټي بنه داسې بيا بيان کړ:

3'. طبيعي عددونه تر ټولو کوچنۍ سټ دے چې د تالي تابعي له مخې بند دے. يعنې که s د سټ پر هر غړي تطبيق کړو، د سټ يو بل غړي ترلاسه کوو.

خو دا خبره بايد ورو ورو په تفصيل وليکو.

تعريف 6.2. د هرې تابع f دپاره، سټ X د f له مخې بند هله او يوازې هله چې $(\forall x \in X) f(x) \in X$ وي. اوس د هر o دپاره تعريف کړئ:

$$\text{clo}_f(o) = \bigcap \{X : o \in X \text{ او } X \text{ د } f \text{ له مخې بند دے}\}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLINF-001) د «هرې تابع» دا بيان په پټه دا فرضوي چې تابع د يوه چاپېريال سټ له ځان څخه ځان ته ده او ټول څېرل شوي ستونه ئې د ډومېن دننه دي. که دا شرط ونه منل شي، د ډومېن څخه بهر د غړي د تابعي قيمت تعريف نه لري او د رېنچ او ټاکلي غړي اتحاد هم لازماً د تابعي له مخې بند نه وي. لاندې کارونې همدا ځان-ته-تابع حالت لري.

نو $\text{clo}_f(o)$ د ټولو هغو ستونو اشتراک دے چې د f له مخې بند دي او o ئې يو غړي دے. په وجداني ډول، نو $\text{clo}_f(o)$ تر ټولو کوچنۍ داسې f له مخې بند سټ دے چې o ئې يو غړي دے. راتلونکې پايله دا وجداني خبره دقيقه کوي،

لم 6.3. د هرې تابع f او هر $o \in A$ دپاره:

1. $o \in \text{clo}_f(o)$ او

2. $\text{clo}_f(o)$ د f له مخې بند دے، او

3. که X د f له مخې بند وي او $o \in X$ وي، نو $\text{clo}_f(o) \subseteq X$

ثبوت. پام وکړئ چې لږ تر لږه يو داسې سټ شته چې د f له مخې بند دے او o ئې يو غړي دے، يعنې $\text{ran}(f) \cup \{o\}$. نو $\text{clo}_f(o)$ ، چې د دې ټولو ستونو اشتراک دے، شتون لري. اوس بايد 1-3 و ارزوو.

د 1 په اړه: $o \in \text{clo}_f(o)$ ، ځکه دا د هغو ستونو اشتراک دے چې په ټولو کېنې o يو غړي دے.

د 2 په اړه: فرض کړئ $x \in \text{clo}_f(o)$. نو که $o \in X$ او f له مخې بند وي، $x \in X$ او ځکه X د f له مخې بند دے، اوس $f(x) \in \text{clo}_f(o)$ نو $f(x) \in X$.

د 3 په اړه: په بشپړ عموميته کېنې، که $X \in C$ وي، نو $\bigcap C \subseteq X$.

□

د دې په کارولو ويلے شو:

تعریف 6.4. د ډېډېکېنډ الجبر یو سټ A ، یوه تابع $f: A \rightarrow A$ او یو $o \in A$ دي چې لاندې شرطونه پوره کوي:

$$1. o \notin \text{ran}(f)$$

$$2. f \text{ یوه یو پر یو تابع ده}$$

$$3. A = \text{clo}_f(o)$$

ځکه $A = \text{clo}_f(o)$ دے، زموږ پخوانۍ پایله وایي چې A تر ټولو کوچنۍ داسې f له مخې بند سټ دے چې o ئې یو غړې دے. په څرکند ډول هر ډېډېکېنډ الجبر د ډېډېکېنډ له مخې نامتناهي دے؛ یوازې د تعریف 1 او 2 مادې وگورئ. خو تر دې په زړه پورې حقیقت دا دے چې هر د ډېډېکېنډ له مخې نامتناهي سټ په ډېډېکېنډ الجبر بدلېدے شي.

قضیه 6.5. که کوم د ډېډېکېنډ له مخې نامتناهي سټ وي، نو یو ډېډېکېنډ الجبر شته.

ثبوت. فرض کړئ D د ډېډېکېنډ له مخې نامتناهي دے. نو یوه یو پر یو تابع $g: D \rightarrow D$ او یو غړې $o \in D \setminus \text{ran}(g)$ شته. اوس $A = \text{clo}_g(o)$ وټاکئ؛ د 6.3 له مخې A شته او $o \in A$ ، $f = g|_A$ وټاکئ. ښیو چې A, f, o یو ډېډېکېنډ الجبر جوړوي.

د 1 په اړه: $o \notin \text{ran}(g)$ او $\text{ran}(f) \subseteq \text{ran}(g)$ نو $o \notin \text{ran}(f)$.

د 2 په اړه: g پر D یوه یو پر یو تابع ده؛ نو $f \subseteq g$ باید یوه یو پر یو تابع وي.

د 3 په اړه: د 6.3 له مخې A د g له مخې بند دے؛ نو په لا قوي ډول A د f له مخې بند دے. په دې توګه د 6.3 له مخې $\text{clo}_f(o) \subseteq A$. ځکه $\text{clo}_f(o)$ هم د f له مخې بند دے او $f = g|_A$ ، نو $\text{clo}_f(o)$ د g له مخې بند دے. بیا د 6.3 له مخې $A \subseteq \text{clo}_f(o)$. $\square$

6.3 د ډېډېکېنډ الجبرونه او ریاضي استقرا

اوس مهمه خبره دا ده چې یو ډېډېکېنډ الجبر—بلکې هر ډېډېکېنډ الجبر—د طبیعي عددونو د بدل په توګه کار کولے شي. دا د لاندې اسانې نتیجې له برکته ده:

قضیه 6.6 (ریاضي استقرا). فرض کړئ N, s, o یو ډېډېکېنډ الجبر جوړوي. بیا د هر سټ X دپاره:

$$\text{که } o \in X \text{ او } (\forall n \in N \cap X) s(n) \in X \text{ وي، نو } N \subseteq X.$$

ثبوت. د ډېډېکېنډ الجبر د تعریف له مخې $N = \text{clo}_s(o)$. اوس که هم $o \in X$ او هم $(\forall n \in N)(n \in X \rightarrow s(n) \in X)$ وي، نو $N = \text{clo}_s(o) \subseteq X$. $\square$

ځکه استقرا د طبیعي عددونو ځانګړنه ده، مقصد دا دے. هر د ډېډېکېنډ له مخې نامتناهي سټ را کړل شي، ترې یو ډېډېکېنډ الجبر جوړولے شو او دا الجبر د طبیعي عددونو د بدل په توګه کارولے شو.

دا منو چې 6.6 استقرا په سټي اصطلاحاتو کېنې بیانوي. خو دا اصل په اسانۍ په هغو اصطلاحاتو کېنې هم بیانولے شو چې ښايي ډېرې اشنا وي:

نتیجه 6.7. فرض کړئ N, s, o یو ډېډېکېنډ الجبر جوړوي. بیا د هر فارمول $\varphi(x)$ دپاره، چې پارامیترونه لرلے شي:

$$\text{که } \varphi(o) \text{ او } (\forall n \in N)(\varphi(n) \rightarrow \varphi(s(n))) \text{ وي، نو } (\forall n \in N)\varphi(n)$$

ثبوت. $X = \{n \in N : \varphi(n)\}$ وټاکئ، او اوس 6.6 وکاروئ. $\square$

په دې پایله کېنې مو وویل چې یو فارمول «پارامیټرونه لري»- په لنډه معنا ئې دا ده چې د هر ډول څیزونو $c_1, \dots, c_k$ دپاره له $\varphi(x, c_1, \dots, c_k)$ سره کار کول شول. په لا دقیق ډول، پایله ېې له دې چې «پارامیټرونه» یاد کړو، داسې بیانول شول. د هر فارمول $\varphi(x, v_1, \dots, v_k)$ دپاره، چې ټول ازاد متغیرونه ئې بنودل شوي وي، لرو:

$$\begin{aligned} & \forall v_1 \dots \forall v_k ((\varphi(o, v_1, \dots, v_k) \wedge \\ & (\forall x \in N)(\varphi(x, v_1, \dots, v_k) \rightarrow \varphi(s(x), v_1, \dots, v_k))) \rightarrow \\ & (\forall x \in N)\varphi(x, v_1, \dots, v_k)) \end{aligned}$$

په څرګند ډول، د «پارامیټرونو لرلو» خبره لوستل ډېر اسانه کول شي. (په د *OpenLogic* اړونده سرچینیزه برخه [OLP] کېنې به دا طریقه ډېره وکاروو.)

بېرته د ډېډېکېنډ الجبرونو خبرې ته راځو: هر ډېډېکېنډ الجبر را ګړل شي، د جمع، ضرب او طاقت معمول حسابي تابعې هم تعریفول شول. خو دا اسان کار نه دے او د بازګشتي تعریف طریقه کاروي. دا هغه طریقه ده چې ډېر وروسته، په ډېر عمومي چوکاټ کېنې، معرفي او توجیه کوو. (مینوال بنایي له د *OpenLogic* اړونده سرچینیزه برخه [OLP] وروسته دې موضوع ته بیا راشي، یا د *Potter 2004*, 8-95 pp. په څېر کومه بله شننه ولولي.) خو چې N, s, o یو ډېډېکېنډ الجبر جوړوي، په پایله کېنې به لاندې ټاکنې کول شول:

$$\begin{array}{lll} a + o = a & a \times o = o & a^o = s(o) \\ a + s(b) = s(a + b) & a \times s(b) = (a \times b) + a & a^{s(b)} = a^b \times a \end{array}$$

او بنودل شول چې دا تابعې لکه څنګه چې هیله کېږي، هماغسې چلند کوي.

6.4 د نامتناهي سټ د شتون په اړه د ډېډېکېنډ «ثبوت»

په دې څېړنې کېنې مو د طبیعي عددونو سټي شننه د ډېډېکېنډ د الجبرونو له مخې وړاندې کړه. په 5.5 کېنې مو (له نورو خبرو سره) د تحلیل د سټي جوړونې پر فلسفي اهمیت غور وکړ. اوس باید د هغه څه اهمیت وارزو چې دلته مو ترلاسه کړل.

د 5 په ټوله موده کېنې مو طبیعي عددونه را ګړل شوي وکړل او په څرګند ډول مو ترې صحیح، ناطق او حقیقي عددونه جوړ کړل. په دې څېړنې کېنې مو د طبیعي عددونو کوم څرګند جوړښت نه دے وړاندې کړے. یوازې مو وښودل چې هر د ډېډېکېنډ له مخې نامتناهي سټ را ګړل شي، داسې سټ تعریفول شول چې کټ مټ لکه څنګه چې غواړو $\mathbb{N}$ وچلېږي، هماغسې به وچلېږي.

نو څرګنده ده چې دا ادعا نشو کول چې کومې ماوراءالطبیعتي پوښتنې ته مو ځواب ورکړے، لکه دا چې طبیعي عددونه کوم څیزونه دي. خو دا نېټه کار دے. په 5.5 کېنې مو ټینګار کړے و چې د ډېډېکېنډ د پرېکړونو د سټ په توګه د $\mathbb{R}$ تعریف باید یوه اسانه ټاکنه وګڼو، نه یوه موندنه. مهمه مشاهده دا ده چې د ډېډېکېنډ پرېکړونو د حقیقي عددونو بنسټیز ریاضي خاصیتونه لري. دلته هم همدا خبره ده: مهمه مشاهده دا ده چې هر ډېډېکېنډ الجبر د طبیعي عددونو بنسټیز ریاضي خاصیتونه لري. (په رښتیا، ډېډېکېنډ دا ټکي په دې ثبوت لا پیاوړے کړ چې ټول ډېډېکېنډ الجبرونه آیزومورف دي (1888, Theorems 132-3). نو دا هېڅ د حیرانۍ خبره نه ده چې اوسني ډېر «جوړښت پال» ډېډېکېنډ خپل مخکښ بولي.)

برسېره پر دې، موږ وښودل چې د طبیعي عددونو نظریه څنګه په ساده سټ نظریه کېنې ورګډېږي؛ دا ساده نظریه خپله لا هم یو څه غېر رسمي ده، خو (لکه چې ښکاري) طبیعي عددونه له مخکښې را ګړل شوي نه ګڼي. نو کېدے شي د ډېډېکېنډ د خپلې سترې پروژې د پوره کولو پر لاریو، چې هغه داسې تشریح کړي وه:

په ساینس کېنې هېڅ د ثبوت وړ خبره باید ېې له ثبوت نه منل شي. که څه هم دا غوښتنه معقوله ښکاري، زه دا نشم منلے چې آن د تر ټولو ساده ساینس د بنسټ ایښودلو په وروستیو طریقو کېنې پوره شوې ده؛ یعنې د منطق په هغې برخې کېنې چې د عددونو نظریه څېري. کله چې حساب (الجبر، تحلیل) یوازې د منطق یوه برخه بولم، مقصد ېې دا دے چې د عدد مفهوم د مکان او زمان له تصوراتو یا شهود څخه بشپړ خپلواک ګڼم — بلکې دا د فکر د خالصو قوانینو نېغه پایله ګڼم. (Dedekind, 1888, preface)

د ډېډېکېنډ زړه ووره مفکوره دا ده. همدا اوس مو وښودل چې یوازې د (ساده) سټ نظریې په کارولو طبیعي عددونه څنګه جوړېږي. په 5 کښې مو ولیدل چې د طبیعي عددونو او یوې اندازې سټ نظریې په راکړه کېدو سره حقیقي عددونه څنګه جوړېږي. نو ښايي «حساب (الجبر، تحلیل)» «یوازې د منطق یوه برخه» وګرځي (د ډېډېکېنډ د «منطق» کلمې په پراخه معنا).

نظر همدا دے. خو یوه شبهه تم شی. زموږ د ډېډېکېنډ الجبر جوړول (چې د طبیعي عددونو بدل دے) د یوه د ډېډېکېنډ له مخې نامتناهي سټ د شتون پر شرط ولاړ دي. (یوازې 6.5 ته بېرته وګورئ.) تر څو چې د ډېډېکېنډ له مخې د نامتناهي سټ شتون د «منطق» یا «د فکر د خالصو قوانینو» له لارې ثابت نشي، پروژه درېږي.

نو، ایا د ډېډېکېنډ له مخې د نامتناهي سټ شتون «د فکر د خالصو قوانینو» له لارې ثابتېدے شي؟ د ډېډېکېنډ هڅه دا وه:

زما د فکرونو خپله نړۍ، یعنې د ټولو هغو څیزونو بشپړتیا S چې زما د فکر موضوع کېدے شي، نامتناهي ده. ځکه که s د S یو غړی وي، نو دا فکر s' چې s زما د فکر موضوع کېدے شي، خپله د S یو غړی دے. که دا د غړي s یو تصویر $\varphi(s)$ وګڼو، نو $S \dots$ [د ډېډېکېنډ له مخې] نامتناهي دے، او همدا باید ثابت شوي وے. (Dedekind, 1888, §66)

داسې خبره د یوه داسې کتاب په منځ کې لیدل رښتیا هم ډېره حیرانونکې ده چې زیاته برخه یې له بشپړو دقیقو ریاضي ثبوتونو جوړه ده. دوه تبصرې د پام وړ دي.

لومړی: دا «ثبوت» هغه بڼه نږدې هېڅ نه لري چې اوس به یې «ریاضي» وبولو. دا د نفسیاتي څیزونو (فکرونو) خبره کوي، او هغه هم یوازې ممکن څیزونه.

دویمه: لږ تر لږه لکه څنګه چې موږ د ډېډېکېنډ الجبرونه وړاندې کړي، دا «ثبوت» یوه څرګنده فني نیګړتیا لري. که د ډېډېکېنډ استدلال بریالۍ وي، یوازې دا ثابتوي چې نامتناهي ډېر څیزونه (په ځانګړې توګه نامتناهي ډېر فکرونه) شته. خو ډېډېکېنډ باید دا دلیل هم راکړي چې S ولې یو یوازینۍ سټ وګڼو چې نامتناهي ډېر غړي لري، نه دا چې S څه څیزونه (په جمع بڼه) وګڼو.

دا حقیقت چې ډېډېکېنډ دلته تشه نه لیدله، ښايي وښيي چې د هغه د «بشپړتیا» کلمه کټ مټ زموږ د «سټ» کلمې له کارونې سره برابره نه ده.¹ خو دا به ډېره د حیرانۍ خبره نه وي. هغه پروژه چې په تېرو دوو څپرکیو کې مو مخ ته پورته—د طبیعي عددونو «جوړول»، او له هغو څخه د صحیح، حقیقي او ناطقو عددونو «جوړول»—توله په ساده ډول شوې ده. کله مو چې کوم سټ ته اړتیا لرله، هماغه سټ مو منلے، خو د دې په اړه مو ډېر عمومي اصولونه نه دي ټاکلي چې کټ مټ کوم ستونه کله شتون لري. خو پوهېږو چې ځینې عمومي اصولونه پکار دي، ځکه له هغو پرته به د رسل په پارادوکس کېنې ولوېږو.

اوس د دې وخت دے چې له خپلې ساده کۍ څخه ووځو.

6.5 ضمیمه: د شروډر-برنشتاین ثبوت

له ساده سټ نظریې څخه د وتلو مخکېنې یو وروستۍ ساده (خو ډېر فني!) ثبوت څېړو. دا د شروډر-برنشتاین ثبوت دے (4.53): که $A \preceq B$ او $A \approx B$ وي، نو $A \preceq B$ ؛ یعنې که یو پر یو تابعي $f: A \rightarrow B$ او $g: B \rightarrow A$ راکړل شي، نو یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $h: A \rightarrow B$ شته.

په دې څپرکي کېنې مو د ډېډېکېنډ د بندښتونو مفهوم وکاراوه. په رښتیا، ډېډېکېنډ په همدې مفهوم د شروډر-برنشتاین یو ښکلی ثبوت ورکړ، چې دلته یې وړاندې کوو. که لږ بېله خو په اصل کېنې ورته شننه غواړئ، دا ثبوت په نژدې ډول د Potter (2004, pp. 8–157) پیروي کوي. په انټرنېټ کېنې لږه پلټنه به هم درته وښيي چې دا—لکه د $\sqrt{2}$ غیر ناطق والے—هغه قضیه ده چې ډېر په زړه پورې او بېل ثبوتونه لري.

د 6.2 په شان ښه وکاروئ او د هر سټ B او تابعي f دپاره وټاکئ:

$$\text{Clo}_f(B) = \bigcap \{X : B \subseteq X \text{ د } f \text{ له مخې بند دے}\}$$

په دې ډول تعریف شوے $\text{Clo}_f(B)$ تر ټولو کوچنۍ داسې f له مخې بند سټ دے چې B راغاري، یعنې:

¹ په رښتیا، د دې د باور دپاره نور دلیلونه هم لرو؛ Potter (2004, p. 23) وګورئ.

لم 6.8. د هرې تابع f او هر B دپاره:

$$1. B \subseteq \text{Clo}_f(B) \text{ او}$$

$$2. \text{Clo}_f(B) \text{ د } f \text{ له مخې بند دے، او}$$

$$3. \text{Clo}_f(B) \subseteq X \text{ که } f \text{ له مخې بند وي او } B \subseteq X \text{ وي، نو}$$

□

ثبوت. کټ مټ لکه په 6.3 کښي.

شروډر-برنشتاین ته د رسېدو دپاره یو وروسته حقیقت پکار دے:

قضیه 6.9. که $A \subseteq B \subseteq C$ او $A \approx C$ وي، نو $A \approx B \approx C$.

ثبوت. یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $f: C \rightarrow A$ راکړل شي، وټاکئ $F = \text{Clo}_f(C \setminus B)$ او له دوهمې C سره تابع g داسې تعریف کړئ:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{که } x \in F \text{ وي} \\ x & \text{که نه} \end{cases}$$

ښیو چې g له $C \rightarrow B$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده؛ له دې به راوړئ چې $g \circ f^{-1}: A \rightarrow B$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، او ثبوت بشپړېږي.

لومړۍ ادعا کوو چې که $x \in F$ خو $y \notin F$ وي، نو $g(x) \neq g(y)$. د نقیض دپاره فرض کړئ چې برابر دي؛ نو $y = g(y) = f(y)$ ځکه $x \in F$ او د 6.8 له مخې f له مخې بند دے، $y = f(x) \in F$ لرو، چې ټکر دے.

اوس فرض کړئ $g(x) = g(y)$. د پورته خبرې له مخې، $x \in F$ هله او یوازې هله چې $y \in F$ وي. که $x, y \in F$ وي، نو $f(x) = f(y)$ او ځکه $g(x) = g(y) = f(y)$ او ځکه f یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، $x = y$ که $x, y \notin F$ وي، نو $x = g(x) = g(y) = y$. نو $x = g(x) = g(y) = y$ یوه یو پر یو تابع ده.

دا پاتې ده چې وښیو $\text{ran}(g) = B$. یو $x \in B \subseteq C$ وټاکئ. که $x \notin F$ وي، نو $g(x) = x$ که $x \in F$ وي، نو د کوم $y \in F$ دپاره $x = f(y)$ ځکه که داسې نه وي، نو $x \in F \setminus \{x\}$ به د f له مخې بند وي او $C \setminus B$ به ونځوي، چې د 6.8 له مخې ناشونې ده؛ اوس $g(y) = f(y) = x$.

□

په پای کې د اصلي پایلې ثبوت دا دے. یاد کړئ چې د تابعې h او سټ D دپاره $h[D] = \{h(x) : x \in D\}$ تعریفوو.

د شروډر-برنشتاین ثبوت. فرض کړئ $f: A \rightarrow B$ او $g: B \rightarrow A$ یو پر یو تابعې دي. ځکه $f[A] \subseteq B$ نو $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. برسېره پر دې، $g \circ f: A \rightarrow g[f[A]]$ یوه یو پر یو تابع ده، ځکه g او f دواړه همداسې دي؛ او په رښتیا $g \circ f$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده، یوازې په دې سبب چې مقابل دوهمې مو همداسې تعریف کړې. نو $g[f[A]] \approx A$ او په دې توګه د 6.9 له مخې یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع $h: A \rightarrow g[B]$ شته. برسېره پر دې، $g^{-1}: g[B] \rightarrow B$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده. نو $g^{-1} \circ h: A \rightarrow B$ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع ده.

□

برخه II

بیانی منطق

ادارتي يادونه- په دې برخه کې د کلاسيکي بيانې منطق مواد دي- لومړۍ څپرکې نسبتاً بنسټيز دے او يوازې تعريفونه او پايلې راغونډوي؛ ډېر ثبوتونه نه دي بشپړ شوي، بلکې د تمرينونو په توگه پرېښودل شوي دي- د ثبوت د نظامونو او د بشپړتيا د قضيې مواد د لومړۍ درجې منطق له برخې څخه راوړل شوي، چې د لومړۍ درجې منطق ټېک پکې ناسم ټاکل شوي دے- په دې توگه د محمولونو، اصطلاحاتو او سورونو اړوند هر څه ترې وځي، او د جوړښتونه $\mathcal{M}$ پر ځاے د ارزښت ټاکنې $\mathcal{V}$ خبره راځي-
 پلان دا دے چې دا برخه لا په تفصيل پراخه شي، او نورې موضوعگانې او پايلې، لکه د رښتياوالي تابعوي بشپړتيا، هم ورزياتې شي-

باب 7

نحو او معنی پوهنه

ادارتي یادونه - دا یوازې د تعریفونو ډېره لنډه لنډیزه ده. باید پراخه شي، خو د فارمولونو پر جوړښت د استقرا د ثبوتونو اسانه پېژندنه او ډېرې نورې بېلګې پکې راشي -

7.1 پېژندنه

بیاني منطق له هغو فارمولونه سره کار لري چې له بیاني متغیرونه څخه د $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ ، $\rightarrow$ او $\leftrightarrow$ بیاني نښلونکو په کارولو جوړېږي. د تصور له مخې، بیاني متغیر p د داسې یوې جملې یا بیان ځای نیسي چې رښتونه یا دروغن وي. هر کله چې په فارمول کې د بیاني متغیر “د رښتیاوالي قیمت” وټاکل شي، نو د بیاني نښلونکو په کارولو ترې د جوړو شویو ټولو فارمولونه د رښتیاوالي قیمت هم ټاکل کېږي. وایو چې بیاني منطق د رښتیاوالي تابعوي دے، ځکه چې معنی پوهنه یې د رښتیاوالي د قیمتونو د تابعو له مخې ورکول کېږي. په تېره بیا، په بیاني منطق کې دا نه څېړو چې رښتیاوالی او دروغوالی نور څنګه ټاکل کېږي؛ مثلاً دا چې یو څه د یوازې اتفاقي رښتیاوالي پر ځای بالضروره رښتیا دي، یا څوک پرې پوهېږي چې رښتیا دي، یا اوس رښتیا دي نه دا چې پخوا رښتیا وو یا وروسته به رښتیا وي. موږ یوازې د رښتیا ($\mathbb{T}$) او دروغو ($\mathbb{F}$) دوه قیمتونه په پام کې نیسو، نو دا امکان له بحثه وباسو چې یو بیان دې نه رښتونه وي نه دروغن، یا دې نیم رښتونه وي. موږ یوازې هغو نښلونکو ته هم پام کوو چې ترې د جوړ شوي فارمول د رښتیاوالي قیمت د هغې د برخو د رښتیاوالي په قیمتونو پوره ټاکل کېږي، نه مثلاً د هغې په معنی. په تېره بیا، دا لاندې ده چې په انګرېزي کې د شرطیو رښتیاوالي قیمت په دې معنی تابعوي دے که نه. مادي شرطی $\rightarrow$ تابعوي دے؛ نور منطقونه له هغو شرطیو سره کار کوي چې د رښتیاوالي تابعوي نه وي.

د رښتیاوالي د تابعوي بیاني منطق د نظريې او مابعد منطق د ودې دپاره باید لومړی د هغه د عبارتونو نحو او معنی پوهنه تعریف کړو. موږ به له بیاني متغیرونه څخه د نښلونکو په کارولو د فارمولونه د جوړولو یوه لار بیان کړو. نور تعریفونه هم ممکن دي. نور نظامونه به بېلې نښې غوره کړي، د بنسټیزو نښلونکو بېل ستونې به وټاکي او قوسونه به په بېله توګه وکاروي، یا به یې هېڅ ونه کاروي، لکه په تش په نامه پولنډي نښه اېښودنه کېږي. خو په ټولو لارو کې یو ګډ شے دا دے چې د جوړېدو قاعدې د فارمولونه سټ په استقرایي ډول تعریفوي. که کار په سمه توګه وشي، هر عبارت د جوړېدو د قاعدو له مخې په اصل کې یوازې په یوه لار ترلاسه کېدے شي. هغه استقرایي تعریف چې په یګا ډول لوستل کېدونکي عبارتونه ورکوي، موږ ته اجازه راکوي چې په هماغه طریقه، یعنې په استقرایي تعریف، دغو عبارتونو ته معنی ورکړو.

عبارتونو ته معنی ورکول د معنی پوهنې ډګر دے. د بیاني منطق په معنی پوهنه کې مرکزي مفهوم په ارزښت ټاکنه کې صدق دے. ارزښت ټاکنه v بیاني متغیرونه ته د رښتیاوالي $\mathbb{T}$ او قیمتونه ورکوي. هر ارزښت ټاکنه د هر فارمول A دپاره د رښتیاوالي قیمت $v(A)$ ټاکي. فارمول په ارزښت ټاکنه v کې هله او یوازې هله صادق دے چې $v(A) = \mathbb{T}$ وي، دا په $v \models A$ لیکو. دا اړیکه د A پر جوړښت د استقرا له مخې هم تعریفېدے شي: د منطقي نښلونکو د رښتیاوالي تابعي کاروو، څو مثلاً د $A \wedge B$! صدق د A ! او B ! د صدق یا نه صدق له مخې تعریف کړو.

د جملو د صدق د اړیکې $v \models A$ پر بنسټ بیا د تاوتولوژۍ، استلزام او د صدق وړتیا بنسټیز معنایي مفهومونه تعریفولے شو. فارمول هله

تاوتولوژي، $\models A$ ، ده چې هر ارزښت ټاکنه ئې صادق کړي، يعنې د هر v دپاره $\mathbb{T} = \overline{v}(A)$ وي. د فارمولونه يو سټ هله هغې ته استلزام ورکوي، $\Gamma \models A$ ، چې هر هغه ارزښت ټاکنه چې د Γ ټول فارمولونه صادق کړي، A هم صادق کړي. او د فارمولونه يو سټ هله د صدق وړ دے چې کوم ارزښت ټاکنه ئې ټول فارمولونه په يو وخت صادق کړي. ځکه چې فارمولونه په استقرائي ډول تعريف شوي او صدق بيا د فارمولونه پر جوړښت د استقرا له مخې تعريف شوي، موږ استقرا کارولې شو چې د خپلې معنې پوهنې خاصيتونه ثابت او تعريف شوي معنایي مفهومونه يو له بل سره وتړو.

7.2 بياني فارمولونه

د بياني منطق فارمولونه له بياني متغیرونه، د دروغوالي له بياني ثابت $\perp$ او د رښتياوالي له بياني ثابت $\top$ څخه د منطقي نښلونکو په کارولو جوړېږي.

1. د بياني متغیرونه $p_0, p_1, \dots$ يو شمېرېدونکې لامتناهي سټ At_0
2. د دروغوالی بياني ثابت $\perp$.
3. د رښتياوالی بياني ثابت $\top$.
4. منطقي نښلونکي: $\neg$ (نفي)، $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\rightarrow$ (شرطي)، $\leftrightarrow$ (دوه اړخيز شرطي)
5. د وقف نښې: $(,)$ او کامه.

د بياني منطق دا ژبه په $\mathcal{L}_0$ نښو.

کېدے شي تاسو له هغو اصطلاحاتو او نښو سره بلد یئ چې زموږ له پورته کارولو سره توپیر لري. د منطق متنونه، او ښوونکي، عموماً د “نفي” دپاره $\sim$ ، او $\neg$ ، او د “عطف” دپاره $\wedge$ ، او $\&$ کاروي. د “شرطي” يا “استلزام” عامې نښې $\rightarrow$ ، $\Rightarrow$ او $\supset$ دي. د “دوه اړخيز شرطي”، “دوه اړخيز استلزام” يا “(مادي) هم ارزښت” نښې $\leftrightarrow$ ، $\Leftrightarrow$ او $\equiv$ دي. د $\perp$ نښې ته په بېلو ځایونو کېنې “دروغوالی”، “فالسوم”، “محال” يا “ښکته” ويل کېږي. د $\top$ نښې ته په بېلو ځایونو کېنې “رښتياوالی”، “وېروم” يا “پورته” ويل کېږي.

تعريف 7.1 (فارمول). د بياني منطق د فارمولونه سټ $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ په استقرائي ډول داسې تعريفېږي:

1. $\perp$ يو اټومي فارمول دے.
2. $\top$ يو اټومي فارمول دے.
3. هر بياني متغير p_i يو اټومي فارمول دے.
4. که A يو فارمول وي، نو $\neg A$ هم يو فارمول دے.
5. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \wedge B)$ يو فارمول دے.
6. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \vee B)$ يو فارمول دے.
7. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \rightarrow B)$ يو فارمول دے.
8. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \leftrightarrow B)$ يو فارمول دے.
9. بل هېڅ شے فارمول نه دے.

د فارمولونه تعريف يو استقرائي تعريف دے. په اصل کېنې موږ د فارمولونه سټ په نامتناهي ډېرو پړاوونو کېنې جوړوو. په لومړني پړاو کېنې ټول اټومي فارمولونه فارمولونه گڼو، دا د تعريف له لومړنيو څو حالتونو سره سمون لري، يعنې د $\perp$ ، $\top$ ، p_i حالتونه. په دې توگه “اټومي فارمول” د همدې بڼې هر فارمول ته وايي.

د تعريف نور حالتونه له هغو فارمولونه څخه د نويو فارمولونه د جوړولو قاعدې راکوي چې له مخکېنې جوړ شوي وي. په دويم پړاو کېنې له دغو قاعدو څخه په کار اخيستو له اتومي فارمولونه څخه فارمولونه جوړولې شو. په درېيم پړاو کېنې له اتومي فارمولونو او په دويم پړاو کېنې له ترلاسه شويو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، او همداسې مخکېنې څو. فارمول هر هغه شے دے چې بالاخره په داسې کوم پړاو کېنې جوړ شي، او بل هېڅ شے نه دے.

کله چې د دوه ځايه نښلونکي * په کارولو له B او C څخه جوړ شوي فارمول $(B * C)$ لیکو، ډېر ځله د قوسونو تر ټولو بهرنی جوړ پرېږدو او يوازې $B * C$ لیکو.

تعريف 7.2 (نځوي يوشانوالی). د $\equiv$ نښه د نښو د توړيزو لړيو ترمنځ نځوي يوشانوالی څرګندوي؛ يعنې $A \equiv B$ هله او يوازې هله چې A او B د نښو د يوشان اوږدوالي توړيزې لړۍ وي او په هر ځای کېنې يوه نښه ولري.

د $\equiv$ نښې دواړو خواوو ته د يو ځای کولو له لارې ترلاسه شوې توړيزې لړۍ هم راتلې شي. مثلاً $A \equiv (B \vee C)$ دا معنی لري: د نښو توړيزه لړۍ A هماغه توړيزه لړۍ ده چې په همدې ترتيب د پرانيستي قوس، د B توړيزې لړۍ، د $\vee$ نښې، د C توړيزې لړۍ او د تري قوس په يو ځای کولو ترلاسه کېږي. که داسې وي، نو پوهېږو چې د A لومړۍ نښه پرانيستې قوس دے، A د B توړيزه لړۍ د فرعي توړيزې لړۍ په توګه لري چې له دويمې نښې پيلېږي، ورپسې $\vee$ راځي، او داسې نور.

7.3 لومړنۍ پايلې

قضيه 7.3 (د فارمولونه دپاره د استقرا اصل). که کوم خاصيت P د ټولو اتومي فارمولونه دپاره صدق کوي او داسې وي چې

1. هر کله چې د A دپاره صدق کوي، د $\neg A$ دپاره هم صدق کوي؛
2. هر کله چې د A او B دپاره صدق کوي، د $(A \wedge B)$ دپاره هم صدق کوي؛
3. هر کله چې د A او B دپاره صدق کوي، د $(A \vee B)$ دپاره هم صدق کوي؛
4. هر کله چې د A او B دپاره صدق کوي، د $(A \rightarrow B)$ دپاره هم صدق کوي؛
5. هر کله چې د A او B دپاره صدق کوي، د $(A \leftrightarrow B)$ دپاره هم صدق کوي؛

نو P د ټولو فارمولونه دپاره صدق کوي.

ثبوت. S دې د هغو ټولو فارمولونه مجموعه وي چې خاصيت P لري. په څرګنده $S \subseteq \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د 7.1 ټول شرطونه پوره کوي: ټول اتومي فارمولونه لري او د منطقي عملګرو نه له مخې بند دے. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د دې ډول تر ټولو وروکې ټولګې دے، نو $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$. له دې امله $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) = S$ او هر فارمول خاصيت P لري. □

قضيه 7.4. په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کېنې هر فارمول متوازن دے؛ يعنې د کينو قوسونو شمېر ئې د نښو قوسونو له شمېر سره برابر دے.

تمرين 7.5. د 7.4 ثبوت ورکړئ.

قضيه 7.6. د فارمول هېڅ خاصه پيلۍ برخه فارمول نه دے.

تمرين 7.7. د 7.6 ثبوت ورکړئ.

قضيه 7.8 (يګا لوستونټيا). په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کېنې هر فارمول A په لاندې بڼو کېنې د يوې په توګه پوره يوه تجزيه لري:

2. $\neg$ 3. د کوم $p_n \in At_0$ دپاره $\neg p_n$.4. د کوم فارمول B دپاره $\neg B$.5. د کومو فارمولونه B او C دپاره $(B \wedge C)$.6. د کومو فارمولونه B او C دپاره $(B \vee C)$.7. د کومو فارمولونه B او C دپاره $(B \rightarrow C)$.8. د کومو فارمولونه B او C دپاره $(B \leftrightarrow C)$.

سرپرته پر دې، دا تجزیه یځا ده.

ثبوت. پر A ! استقرا کوو. مثلاً فرض کړئ چې A د $(B \rightarrow C)$ او $(B' \rightarrow C')$ په توګه دوه بېلې لوستنې لري. نو B او B' باید یو شان وي، ګڼې یو به د بل خاصه پیلنې برخه وي، نو که د A ! دواړه لوستنې بېلې وي، علت ئې خامخا دا ده چې C او C' د نښو د هماغې یوې بېلې لوستنې دي، چې د استقرايي فرض له مخې ناشونې ده. $\square$

تعریف 7.9 (یو شان ځایناستی). که A او B فارمولونه وي او p_i یو بیاني متغیر وي، نو $A[B/p_i]$ هغه پایله ښيي چې په A ! کېنې د p_i هر راتګ د B ! په یوه راتګ بدل شي؛ همدارنګه، د $p_1, \dots, p_n$ پر ځای په یو وخت د فارمولونه $B_1, \dots, B_n$ ځایناستی په $A[B_1/p_1, \dots, B_n/p_n]$ ښودل کېږي.

تمرین 7.10. د لاندې پنځو فارمولونه په هر یوه کېنې وټاکئ چې آیا فارمول د $A[B/p_i]$ د ځایناستی په توګه څرګندېدلی شي، چې A ! په دې کېنې یو وي: (الف) p_0 ؛ (ب) $(\neg p_0 \wedge p_1)$ ؛ او (ج) $((\neg p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$. په هر حالت کېنې اړونده ځایناستی په ګوته کړئ.

1. p_1 2. $(\neg p_0 \wedge p_0)$ 3. $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$ 4. $\neg((p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$ 5. $((\neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$

تمرین 7.11. د $A[B/p]$ یو له ریاضي پلوه کره تعریف د استقرا له مخې ورکړئ.

7.4 جوړښتي لړۍ

په استقرايي تعریف سره د فارمولونه تعریفول، او د استقرا له لارې د فارمولونه د خاصیتونو د ثابتولو بشپړوونکې طریقه، ښکېلې او اغېزمنه لار ده. خو ګله ګله دا هم کټوره وي چې د فارمولونه جوړول له بېخه پورته، ګام په ګام وڅېړو. دلته د جوړښتي لړۍ په مفهوم همدا کار کوو.

تعریف 7.12 (د فارمولونو جوړښتي لړۍ). د ژبې $\mathcal{L}_0$ د نښو د توزیو لړیو یوه متناهي لړۍ $\langle A_0, \dots, A_n \rangle$ د A ! دپاره جوړښتي لړۍ ده که $A_n \equiv A$! وي او د هر $i \leq n$ دپاره یا A_i ! اتومي فارمول وي، یا داسې $j, k < i$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

$$1. \neg A_i \equiv \neg A_j$$

$$2. \neg A_i \equiv (\neg A_j \wedge \neg A_k)$$

$$3. \neg A_i \equiv (\neg A_j \vee \neg A_k)$$

$$4. \neg A_i \equiv (\neg A_j \rightarrow \neg A_k)$$

$$5. \neg A_i \equiv (\neg A_j \leftrightarrow \neg A_k)$$

پیلکه 7.13

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle$$

د $\neg(p_1 \wedge p_0)$ یوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \rightarrow p_1), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle.$$

لکه چې له دویمې بېلګې ښکاري، په جوړښتي لړیو کېنې “بې کټې توکي” هم راتلې شي: داسې فارمولونه چې زیاتي وي یا په جوړښتي کېنې ونډه نه لري.

قضیه 7.14. په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کېنې هر فارمول A یوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. فرض کړئ A اتومي ده. نو لړۍ $\langle A \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده. اوس فرض کړئ چې B او C په ترتیب سره جوړښتي لړۍ $\langle B_0, \dots, B_n \rangle$ او $\langle C_0, \dots, C_m \rangle$ لري.

1. که $A \equiv \neg B$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, \neg B_n \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

2. که $A \equiv (B \wedge C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \wedge C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

3. که $A \equiv (B \vee C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \vee C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

4. که $A \equiv (B \rightarrow C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \rightarrow C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

5. که $A \equiv (B \leftrightarrow C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \leftrightarrow C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

د فارمولونه دپاره د استقرا د اصل له مخې، هر فارمول یوه جوړښتي لړۍ لري. $\square$

د دې عکس هم ثابتولې شو. دا ځکه مهم ده چې ښيي د فارمولونو د تعریف زموږ دواړه لارې همارزښته دي: دواړه یو شان پایلې ورکوي. دا هم ترې معلومېږي چې د جوړښتي لړیو پر اوږدوالي عادي استقرا کارولې شو او د فارمولونو په اړه قضیې ثابتولې شو.

لم 7.15. فرض کړئ $\langle A_0, \dots, A_n \rangle$ د A_n جوړښتي لړۍ ده او $k \leq n$ ده. نو $\langle A_0, \dots, A_k \rangle$ د A_k جوړښتي لړۍ ده.

ثبوت. تمرین. $\square$

قضیه 7.16. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ښو د ټولو هغو توریزو لړیو سټ ده چې یوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. F دې د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ښو د هغو ټولو توریزو لړیو سټ وي چې جوړښتي لړۍ لري. په 7.14 کېنې مو ولیدل چې $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$ اوس ئې عکس ثابتوو.

فرض کړئ A یوه جوړښتي لړۍ $\langle A_0, \dots, A_n \rangle$ لري. پر n د قوي استقرا له لارې ثابتوو چې $A \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. زموږ استقرایي فرض دا ده چې د ښو هره هغه توریزه لړۍ چې $m < n$ اوږدوالي جوړښتي لړۍ لري، په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کېنې ده. د جوړښتي لړۍ د تعریف له مخې، یا A_n اتومي ده، یا باید داسې $j, k < n$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

$$1. \neg!A_n \equiv \neg!A_j$$

$$2. \neg!A_n \equiv (!A_j \wedge !A_k)$$

$$3. \neg!A_n \equiv (!A_j \vee !A_k)$$

$$4. \neg!A_n \equiv (!A_j \rightarrow !A_k)$$

$$5. \neg!A_n \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$$

اوس حالت په حالت استدلال کوو. که A_n اتومي وي، نو $A_n \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ بل حالت کېنې فرض کړئ چې $\neg!A \equiv (!A_j \wedge !A_k)$. د 7.15 له مخې، $\langle !A_0, \dots, !A_j \rangle$ او $\langle !A_0, \dots, !A_k \rangle$ په ترتیب سره د A_j او A_k جوړښتي لړۍ دي. ځکه چې دا د A د جوړښتي لړۍ خاصې پیلۍ فرعي لړۍ دي، د دواړو اوږدوالی له n څخه لږ دے. نو د استقرایي فرض له مخې A_j او A_k په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کېنې دي؛ او بیا د فارمول د تعریف له مخې $(!A_j \wedge !A_k)$ هم پکې دے. نور حالتونه په ورته استدلال ثابتېږي. د ژباړې د نسخې سمون (OLPL-002): سرچینه په دې یوه کرښه کېنې د نخوي یوشانوالی د ښې پر ځای د معنایي هم ارزښت ښه کاروي، حال دا چې تعریف، ټول نور حالتونه او ثبوت د توریزو لړیو یوشانوالی غواړي. دلته د هماغه تعریف ښه بېرته کارول شوې ده. $\square$

7.5 ارزښت ټاکنې او صدق

تعریف 7.17 (ارزښت ټاکنې). $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ دې د رښتیاوالي د دوو قیمتونو، “رښتیا” او “دروغ”، سټ وي. د $\mathcal{L}_0$ دپاره ارزښت ټاکنه یوه تابع v ده چې د ژبې بیاني متغیرونه ته یا $\mathbb{T}$ ورکوي یا $\mathbb{F}$ ، یعنې $v: \text{At}_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

تعریف 7.18. چې ارزښت ټاکنه v راکړل شوه وي، د ارزونې تابع $\bar{v}: \text{Frm}(\mathcal{L}_0) \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ په استقرایي ډول داسې تعریف کړئ:

$$\bar{v}(\perp) = \mathbb{F};$$

$$\bar{v}(\top) = \mathbb{T};$$

$$\bar{v}(\rho_n) = v(\rho_n);$$

$$\bar{v}(\neg!A) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{که داسې نه وي.} \end{cases}$$

$$\bar{v}(!A \wedge !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{T} \text{ او } \bar{v}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{F} \text{ یا } \bar{v}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$

$$\bar{v}(!A \vee !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{T} \text{ یا } \bar{v}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{F} \text{ او } \bar{v}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$

$$\bar{v}(!A \rightarrow !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{F} \text{ یا } \bar{v}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{T} \text{ او } \bar{v}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$

$$\bar{v}(!A \leftrightarrow !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \bar{v}(!B) \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \bar{v}(!A) \neq \bar{v}(!B) \text{ وي.} \end{cases}$$

دا مادې د رښتیاوالي له لاندې جدولونو سره سمون لري:

$\neg!A$	$!A$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\neg A \wedge \neg B$	$\neg B$	$\neg A$
T	T	T
F	F	T
F	T	F
F	F	F

$\neg A \vee \neg B$	$\neg B$	$\neg A$
T	T	T
T	F	T
T	T	F
F	F	F

$\neg A \rightarrow \neg B$	$\neg B$	$\neg A$
T	T	T
F	F	T
T	T	F
T	F	F

$\neg A \leftrightarrow \neg B$	$\neg B$	$\neg A$
T	T	T
F	F	T
F	T	F
T	F	F

تمرین 7.19. فرض کړئ چې $\mathcal{L}_0$ ته یو درې ځایه نښلونکې $\Diamond$ ورزیاتوو چې ارزونه یې داسې ورکول شوې ده:

$$\bar{v}(\Diamond(\neg A, \neg B, \neg C)) = \begin{cases} \bar{v}(\neg B) & \text{که } \bar{v}(\neg A) = \mathbb{T} \text{ وي;} \\ \bar{v}(\neg C) & \text{که } \bar{v}(\neg A) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$

د دې نښلونکې د رښتیاوالي جدول ولیکئ.

قضیه 7.20 (ځایي ټاکنه). فرض کړئ v_1 او v_2 داسې ارزښت ټاکنې دي چې په $\neg A$ کېنې په راتلونکو بیاني متغیرونه یو له بل سره موافق دي؛ یعنې هر کله چې p_n په فارمول $\neg A$ کېنې راشي، $v_1(p_n) = v_2(p_n)$ وي. نو $\bar{v}_1$ او $\bar{v}_2$ هم پر $\neg A$ موافق دي؛ یعنې $\bar{v}_1(\neg A) = \bar{v}_2(\neg A)$.

د ژباړې د نسخې سمون: (OLPL-003) سرچینه د فرض په دویمه وینا کېنې “په کوم فارمول کېنې” لیکي، خو قضیه هماغه له مخکېنې ټاکلې شوې فارمول ارزوي. ژباړه د لومړۍ وینا سره سم د هماغه فارمول متغیرونه اخلي؛ په دې سره د قضیې مقصود شرط څرګند پاتې کېږي.

□

ثبوت. پر $\neg A$ استقرا کوو.

تعریف 7.21 (صدق). د فارمول $\neg A$ صدق په ارزښت ټاکنه v کېنې، یعنې $v \models \neg A$ ، په استقرایي ډول داسې تعریفولې شو. (د “ $v \models \neg A$ ” نه دے “د څرګندولو دپاره $\neg A$ لیکو-))

$$1. \neg A \equiv \perp : \neg A \not\models \neg A$$

$$2. \neg A \equiv \top : \neg A \models \neg A$$

$$3. \neg A \equiv p_i : \neg A \models \neg A \text{ هله او یوازې هله چې } v(p_i) = \mathbb{T} \text{ وي.}$$

4. $A \equiv \neg B$: $A \models B$ هله او يوازې هله چې $B \models A$ وي.

5. $A \equiv (B \wedge C)$: $A \models B$ هله او يوازې هله چې $B \models C$ او $C \models B$ دواړه وي.

6. $A \equiv (B \vee C)$: $A \models B$ هله او يوازې هله چې $B \models C$ يا $C \models B$ ، يا دواړه، وي.

7. $A \equiv (B \rightarrow C)$: $A \models B$ هله او يوازې هله چې $B \models C$ يا $C \models B$ ، يا دواړه، وي.

8. $A \equiv (B \leftrightarrow C)$: $A \models B$ هله او يوازې هله چې $B \models C$ او $C \models B$ ، يا نه $B \models C$ وي او نه $C \models B$.

که Γ د فارمولونه يو سټ وي، نو $\Gamma \models A$ هله او يوازې هله چې د هر $A \in \Gamma$ دپاره $A \models A$ وي.

قضيه 7.22. $A \models A$ هله او يوازې هله چې $\neg(A) = \top$ وي.

□

ثبوت. پر A استقرا کوو.

تمرین 7.23. د 7.22 ثبوت ورکړئ.

7.6 معنایي مفهومونه

لاندې معنایي مفهومونه تعريفوو:

تعريف 7.24. 1. فارمول A هله د صدق وړ دے چې د کوم $\Gamma \models A$ دپاره وي؛ او هله د صدق نه وړ دے چې د هېڅ Γ دپاره $\Gamma \models A$ نه وي؛

2. فارمول A هله تاوتولوژي ده چې د ټولو ارزښت ټاکنې $\Gamma \models A$ دپاره وي؛

3. فارمول A هله اتفاقي دے چې د صدق وړ وي خو تاوتولوژي نه وي؛

4. که Γ د فارمولونه يو سټ وي، نو $\Gamma \models A$ (" A ته استلزام ورکوي") هله او يوازې هله چې د هر هغه ارزښت ټاکنه Γ دپاره $\Gamma \models A$ وي چې $\Gamma \models \Gamma$ وي.

5. که Γ د فارمولونه يو سټ وي، نو Γ هله د صدق وړ دے چې داسې ارزښت ټاکنه Γ موجود وي چې $\Gamma \models \Gamma$ وي؛ او که داسې نه وي، Γ د صدق نه وړ دے.

تمرین 7.25. د لاندې څلورو فارمولونه په هريوه کښې وټاکئ چې آیا هغه (الف) د صدق وړ، (ب) تاوتولوژي او (ج) اتفاقي دے.

$$1. (p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0))$$

$$2. ((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$$

$$3. (p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$$

$$4. ((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \rightarrow (p_0 \leftrightarrow p_1)))$$

قضيه 7.26. 1. A هله او يوازې هله تاوتولوژي ده چې $\emptyset \models A$ وي؛

2. که $\Gamma \models A$ او $\Gamma \models A \rightarrow B$ وي، نو $\Gamma \models B$ ؛

3. که Γ د صدق وړ وي، نو د Γ هر متناهي فرعي سټ هم د صدق وړ دے؛

4. يو اړخيز زياتوالی: که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \models A$ وي، نو $\Delta \models A$ هم؛

5. تعدی: که $\Gamma \models A$ او $\Delta \cup \{A\} \models B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \models B$.

□

ثبوت. تمرین.

تمرین 7.27. د 7.26 ثبوت ورکړئ.

قضیه 7.28. $\Gamma \models A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg A\}$ د صدق نه وړ وي.

□

ثبوت. تمرین.

تمرین 7.29. د 7.28 ثبوت ورکړئ.

قضیه 7.30 (د معنایي استنتاج قضیه). $\Gamma \models A \rightarrow B$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{A\} \models B$ وي.

□

ثبوت. تمرین.

تمرین 7.31. د 7.30 ثبوت ورکړئ.

باب 8

د اشتقاق نظامونه

اداري يادونه - دا څپرک د اشتقاق د نظامونو عمومي مواد راغونډوي. کوم درسي کتاب چې يو ځانگړی نظام کاروي، د هغه نظام د معرفي کونکي څپرکي په پيل کېنې د پېژندنې برخه او د اړوندې ټولگنې برخه ورکېدوې شي.

8.1 پېژندنه

منطقونه عموماً معنی پوهنه او اشتقاق نظام دواړه لري. معنی پوهنه د رېښتياوالي، د صدق وړتيا، اعتبار او استلزام په څېر مفهومونو سره کار لري. د اشتقاق د نظامونو موخه دا ده چې د استلزام او اعتبار د ثابتولو يوه بشپړه نخوي طريقه ورکړي. دا نظامونه په دې معنی بشپړ نخوي دي چې په داسې يوه نظام کېنې اشتقاق يو متناهي نخوي څيز وي، چې عموماً د ترلي فارمولونه يا فارمولونه يوه لړۍ يا بل متناهي ترتيب وي. د اشتقاق ښه نظامونه دا خاصيت لري چې د ترلي فارمولونه يا فارمولونه د هرې ورکړل شوې لړۍ يا ترتيب “سمواله” په ميخانيکي توگه گڼل کېدای شي.

د لومړۍ درجې منطق تر ټولو ساده، او له تاريخي پلوه لومړنی، اشتقاق نظامونه بدیهي وو. په داسې يوه نظام کېنې د فارمولونه يوه لړۍ هله اشتقاق گڼل کېږي چې په هغې کېنې هر فارمول يا د “بدیهي اصولو” په يوه ټاکلي سټ کېنې وي، يا د ټاکلو “استنتاجي قاعدو” له يوې څخه په کار اخيستو په لړۍ کېنې له مخکښو فارمولونه څخه ترې راووتی، او په ميخانيکي توگه گڼل کېدای شي چې آيا فارمول بدیهي اصل دے او آيا د استنتاج له کومې قاعدې سره سم له نورو فارمولونه څخه راوتلی دے. د اشتقاق بدیهي نظامونه تشرېح کول اسانه دي، او له مابعدمنطقي پلوه پرې کار کول هم اسانه دي، خو په هغو کېنې اشتقاقونه لوستل او پوهېدل گران دي او جوړول ئې هم گران دي.

د اشتقاق نور نظامونه د دې موخې دپاره جوړ شوي چې د اشتقاقونه جوړول يا له بشپړېدو وروسته پر اشتقاقونه پوهېدل اسانه کړي. بېلگې ئې طبيعي استنتاج، د رېښتياوالي ونې چې د تابلو ثبوتونو په نامه هم پېژندل کېږي، او د سپکوېنټ حساب دي. د اشتقاق ځينې نظامونه په ځانگړې توگه د ميخانيکي کولو دپاره طرح شوي دي، مثلاً د حل طريقه په سافټویر کېنې په اسانۍ پلي کېږي، خو پر اشتقاقونه ئې پوهېدل تقريباً ناشوني دي. د اشتقاق دا نور نظامونه زياتره اشتقاقونه د لږيو پر ځای د فارمولونه د ونو په توگه ښيي. په دې سره په اسانۍ ليدل کېږي چې د اشتقاق کومې برخې پر کومو نورو برخو تکیه لري.

نو د يوه ورکړل شوي منطق، لکه د لومړۍ درجې منطق، د اشتقاق بېل نظامونه به دا په بېلو ډولونو روښانه کړي چې ترلے فارمول کله قضيه ده او د نورو له ځينو څخه د ترلے فارمول د د اشتقاق وړ کېدو معنی څه ده. دا که په بدیهي اشتقاقونه، طبيعي استنتاجونو، سپکوېنټي اشتقاقونه، د رېښتياوالي په ونو يا د حل په ابطالونو ترسره شي، غواړو چې دا اړیکې د اعتبار او استلزام له معنایي مفهومونو سره سمون ولري. د “ $A!$ قضيه ده” دپاره “ $A!$ او د “ $A!$ له “ Γ څخه د اشتقاق وړ دے” دپاره “ $\Gamma \vdash A!$ ” لیکو. $\vdash$ چې هر ډول تعريف شي، غواړو له “ $\models$ سره سمون ولري؛ يعنې:

$$1. \vdash A \text{ هله او يوازې هله چې } A!$$

$$2. \Gamma \vdash A \text{ هله او يوازې هله چې } \Gamma \models A$$

د پورته دواړو د “یوازې هله” لوري ته سمواله ویل کېږي. اشتقاق نظام هله سم دے چې د اشتقاق وړتیا استلزام یا اعتبار تضمین کړي. د اشتقاق هر د کار وړ نظام باید سم وي؛ د اشتقاق ناسم نظامونه هېڅ کټه نه لري. په اصل کېنې د اشتقاق ټوله موخه دا ده چې د اعتبار یا استلزام نخوي تضمین ورکړي. موږ به د وړاندې شویو اشتقاق نظامونو سمواله ثابت کړو.

د دې عکس، یعنې “هله” لورے، هم مهم دے: دې ته بشپړتیا ویل کېږي. د اشتقاق بشپړ نظام دومره ځواکمن وي چې هر کله A ! معتبر وي، وښيي چې A ! قضیه ده؛ او هر کله چې $\Gamma \models A$ وي، وښيي چې $\Gamma \vdash A$! بشپړتیا ثابتول کران دي، او ځینې منطقونه د اشتقاق هېڅ بشپړ نظام نه لري. د لومړۍ درجې منطق ئې لري. کورت کوډل لومړۍ کس و چې د لومړۍ درجې منطق د اشتقاق د یوه نظام بشپړتیا ئې په خپله ۱۹۲۹ز کال څېړنیزه رساله کېنې ثابته کړه.

له اشتقاق نظامونو سره یو بل ترلے مفهوم سازکاري ده. د ترلي فارمولونه یو سټ هله ناسازکار بلل کېږي چې هر څه ترې اشتقاق کېدے شي؛ او که داسې نه وي، سازکار دے. ناسازکاري د صدق د نه وړتیا نخوي سیاله ده: لکه د صدق نه وړ ستونو غوندې، د ترلي فارمولونه ناسازکار ستونه ښې نظریې نه جوړوي او په بنسټیز ډول نیککړي وي. د ترلي فارمولونه سازکار ستونه کېدے شي رښتوني یا کټور نه وي، خو لږ تر لږه د منطقي کټورتیا له دې تر ټولو ټیټ برید څخه تېرېږي. د اشتقاق په بېلو نظامونو کېنې د ترلي فارمولونه د ستونو د سازکاري ځانگړے تعریف توپیر کولے شي؛ خو لکه $\vdash$ ، غواړو سازکاري د خپل معنایي سیال، د صدق وړتیا، سره سمه وي. غواړو تل داسې وي چې Γ هله او یوازې هله سازکار وي چې د صدق وړ وي. دلته د “یوازې هله” لورے له بشپړتیا سره برابر دے، ځکه سازکاري د صدق وړتیا تضمینوي؛ او “هله” لورے له سموالي سره برابر دے، ځکه د صدق وړتیا سازکاري تضمینوي. په حقیقت کېنې د کلاسیکي لومړۍ درجې منطق دپاره د سموالي او بشپړتیا دواړه ښې همارزښته دي.

8.2 د سپکوښت حساب

د اشتقاق ډېر نظامونه د ترلي فارمولونه له ترتیبونو سره کار کوي، خو د سپکوښت حساب له سپکوښتونو سره کار کوي. سپکوښت د دې ښې یو عبارت دے:

$$!A_1, \dots, !A_m \Rightarrow !B_1, \dots, !B_n,$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLPF-001) سرچینه د سپکوښت دواړو خواوو ته یو شان وروسته اندېکس کاروي، چې دواړه لړۍ په ناپامۍ یو شان اوږدوي؛ خو ورپسې څرکندوي چې هره لړۍ په خپلواکه توگه تشه کېدے شي. دلته د ښۍ لړۍ وروسته اندېکس بېل شوے، څو دواړه متناهي لړۍ خپلواکه اوږدوالی ولري. یعنې دا د ترلي فارمولونه د لړیو یوه جوړه ده چې د سپکوښت په نښه $\Rightarrow$ بېله شوې ده. له دواړو لړیو هره یوه تشه کېدے شي. د سپکوښت په حساب کېنې اشتقاق د سپکوښتونو یوه ونه ده. تر ټولو پاسني سپکوښتونه ځانگړې بڼه لري، او “لومړني سپکوښتونه” یا “بدیهي اصول” بلل کېږي؛ هر بل سپکوښت د استنتاج د کومې قاعدې له لارې سم له پاسه سپکوښتونو څخه راځي. د استنتاج قاعدې یا په سپکوښتونو کېنې ترلي فارمولونه سمبالوي، یعنې کېنې یا ښۍ خوا ته ئې ورزیاتوي، ترې لري کوي یا ئې بیا ترتیبوي؛ او یا د قاعدې په پایله کېنې یو مرکب فارمول معرفي کوي. مثلاً $\wedge L$ قاعده اجازه راکوي چې له $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ څخه $A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ استنتاج کړو، او $\rightarrow R$ اجازه راکوي چې د هر A, Δ, Γ له $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، دپاره له B څخه $A \rightarrow B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ استنتاج کړو. (په تېره بیا، Γ او Δ تش کېدے شي.)

د سپکوښت پر حساب ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash A$ هله او یوازې هله چې داسې کومه لړۍ Γ_0 موجوده وي چې په Γ_0 کېنې هر A په Γ کېنې وي، او داسې اشتقاق موجود وي چې سپکوښت $\Gamma_0 \Rightarrow A$ ئې په جرړه کېنې وي. A ! هله د سپکوښت په حساب کېنې قضیه ده چې سپکوښت $A \Rightarrow$ کوم اشتقاق ولري. مثلاً دا اشتقاق ښيي چې $\vdash (A \wedge B) \rightarrow A$:

$$\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{!A \wedge B \Rightarrow !A} \wedge L}{\Rightarrow (A \wedge B) \rightarrow A} \rightarrow R$$

یو سټ Γ د سپکوښت په حساب کېنې هله ناسازکار دے چې د $\Gamma_0 \Rightarrow$ کوم اشتقاق موجود وي، چې په کېنې هر $A \in \Gamma_0$ په Γ کېنې وي او د سپکوښت ښۍ خوا تشه وي. د WR قاعدې په کارولو له ناسازکار سټ څخه هر ترلے فارمول اشتقاق کېدے شي.

د سپکوښت حساب په ۱۹۳۰مو کلونو کېنې گیرهارډ کېنټشن جوړ کړ. د منظمې او متناظرې طرحې له امله دا د اشتقاقونه د نظریې د ودې دپاره ډېر کټور صوري نظام دے. د سپکوښت په حساب کېنې د اشتقاقونه موندل نسبتاً آسانه دي، خو دا اشتقاقونه ډېر ځله په

سخنۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تراو کله کله په اسانۍ نه ښکاري. بیا هم، دا د اشتقاق نظامونو ډېره ښکلې لار ثابته شوې، او ډېر منطقونه د سپکوېنټ حساب نظامونه لري.

8.3 طبعي استنتاج

طبعي استنتاج د اشتقاق داسې نظام دے چې موخه ئې د رښتیني استدلال، په تېره بیا د ریاضي پوهانو د منظم استدلال، انځورول دي. رښتینۍ استدلال د یو شمېر “طبعي” بڼو له مخې مخکېنې ځي. مثلاً د حالتونو ثبوت موږ ته اجازه راکوي چې د یوه فصلي فرض پر بنسټ پایله ثابته کړو، په دې چې وښیو پایله د فصل له هرې برخې څخه راځي. نامستقیم ثبوت اجازه راکوي چې پایله په دې سره ثابته کړو چې نفې ئې تناقض ته رسېږي. شرطی ثبوت د “که...نو...” شرطی ادعا په دې سره ثابتوي چې تالي له مقدم څخه راځي. طبعي استنتاج د دغو طبعي استنتاجونو د ځینو صوري کول دي. هر منطقي ښلولونکې او هر سور دوه قاعدې لري، یوه د معرفي کولو او بله د لرې کولو قاعده، او هره یوه ئې د داسې طبعي استنتاج له یوې بڼې سره سمه ده. مثلاً $\text{Intro} \rightarrow$ له شرطی ثبوت سره او Elim د حالتونو له ثبوت سره سمون لري. یوه په تېره ساده قاعده $\wedge \text{Elim}$ ده، چې اجازه راکوي له $A \wedge B$ څخه A یا B استنتاج کړو.

یو خاصیت چې طبعي استنتاج د اشتقاق له نورو نظامونو څخه بېلوي، د فرضونو کارول دي. په طبعي استنتاج کېنې اشتقاق د فارمولونه یوه ونه ده. یو فارمول د فارمولونه د ونې په جرړه کېنې وي، او د ونې “پاتې” هغه فارمولونه وي چې پایله ترې رالیستل کېږي. په طبعي استنتاج کېنې ځینې پاته-فارمولونه د اشتقاق دننه ونډه لري، خو تر هغې “کارول شوي وي” چې اشتقاق پایلې ته رسېږي. دا په رښتیني استدلال کېنې د هغو فرضیو د معرفي کولو له دود سره سمون لري چې یوازې لږ وخت نافذې پاتې کېږي. مثلاً د حالتونو په ثبوت کېنې د فصل د هرې برخې رښتیاوالې فرضوو، په شرطی ثبوت کېنې د مقدم رښتیاوالې فرضوو، او په نامستقیم ثبوت کېنې د پایلې د نفې رښتیاوالې فرضوو. د فرضي فرضونو د معرفي کولو او بیا د یوه منځني گام د ثابتولو دپاره د هغو ختمولو دا طریقه د طبعي استنتاج څرگنده نښه ده. د طبعي استنتاج د یوه اشتقاق په پاتو کېنې فارمولونه فرضونه بلل کېږي، او د استنتاج ځینې قاعدې کېدې شي هغه “ایستل” کړي. مثلاً که مو له ځینو فرضونو څخه د B کوم اشتقاق درلود چې A هم پکې شامل و، نو د $\text{Intro} \rightarrow$ قاعده اجازه راکوي چې $A \rightarrow B$ استنتاج کړو او د A بڼې هر فرض ختم کړو. (د دې ثابتولو دپاره چې کوم فرضونه په کومو استنتاجونو کېنې ختمېږي، استنتاج او هغه فرضونه چې ختموي ئې په یوه شمېره نښه کوو.) هغه فرضونه چې د اشتقاق په پای کېنې نه ایستل شوې پاتې کېږي، په کچه د پایلې د رښتیاوالي دپاره بس دي؛ نو اشتقاق ثابتوي چې د هغه نه ایستل شوي فرضونه پایلې ته استلزام ورکوي.

د طبعي استنتاج پر بنسټ اړیکه $\Gamma \vdash A$ هله صدق کوي چې داسې اشتقاق موجود وي چې A د ونې وروستی تړلې فارمول وي، او هره نه ایستل شوې پاته په Γ کېنې وي. A په طبعي استنتاج کېنې هله قضیه ده چې داسې اشتقاق موجود وي چې A وروستی تړلې فارمول وي او ټول فرضونه ایستل شوي وي. مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $A \rightarrow A$ ($A \wedge B$):

$$\frac{\frac{[A \wedge B]^1}{!A} \wedge \text{Elim}}{1 \frac{!A}{(A \wedge B) \rightarrow A} \rightarrow \text{Intro}}$$

نښه 1 څرگندوي چې فرض $A \wedge B$ د $\text{Intro} \rightarrow$ په استنتاج کېنې ایستل کېږي.

یو سټ Γ هله ناسازگار دے چې په طبعي استنتاج کېنې $\Gamma \vdash \perp$ وي. د $\perp$ قاعده دا یقیني کوي چې له ناسازگار سټ څخه هر تړلې فارمول اشتقاق کېدې شي.

د طبعي استنتاج نظامونه گیرهارد گېنتشن او ستانیسواف یاشکوفسکي په ۱۹۳۰ مو کلونو کېنې جوړ کړل، او وروسته ډاک پراوېچ او فریدرېک فېچ لا پراخ کړل. ځکه چې استنتاجونه ئې د ثبوت طبعي لارې انځوروي، فلسفيان ئې خوشوي. د فېچ جوړې شوې بڼې زیاتره د منطق په پېژندنیزو درسي کتابونو کېنې کارول کېږي. د منطق په فلسفه کېنې کله کله د طبعي استنتاج قاعدې د منطقي عملکرو معنی ورکوي، چې دې ته “ثبوت-نظري معنایي پوهنه” ویل کېږي.

8.4 تابلوکاني

د اشتقاق ډېر نظامونه د ترلي فارمولونه له ترتيبونو سره کار کوي، خو تابلوکاني له نښه لرونکي فارمولونه سره کار کوي. نښه لرونکي فارمول يوه جوړه ده چې د رښتياوالي له يوې نښې ($\mathbb{F}$ يا $\mathbb{T}$) او ترلې فارمول څخه جوړه ده:

$$\mathbb{T}!A \text{ يا } \mathbb{F}!A.$$

تابلو له هغو نښه لرونکي فارمولونه څخه جوړ وي چې د لاندې خوا ته ځانگېدونکې ونه کښې ترتيب شوي وي. دا له يو شمېر فرضونو پيلېږي او په هغو نښه لرونکي فارمولونه دوام کوي چې د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو تر ځان له پاسه له يوه نښه لرونکي فارمولونه څخه راوتلي وي. هره قاعده اجازه راکوي چې د يوې ځانگې په پای کښې يو يا څو نښه لرونکي فارمولونه ورزيات کړو، يا دوه نښه لرونکي فارمولونه يو د بل تر څنګ ورزيات کړو؛ په وروستي حالت کښې ځانگه په دوو وېشل کېږي او دوه ورزيات شوي نښه لرونکي فارمولونه د دواړو ځانگو سره جوړوي.

په يوه مرکب نښه لرونکي فارمول د قاعدې له پلي کولو څخه داسې نښه لرونکي فارمولونه ورزياتېږي چې سمديستي فرعي-فارمولونه وي. د هرې قاعدې يوه جوړه راځي، د دواړو نښو هرې يوې دپاره يوه قاعده. مثلاً د $\mathbb{T}!A \wedge \mathbb{T}!B$ قاعده پر $\mathbb{T}!A$ پلي کېږي او اجازه راکوي چې د هرې هغې ځانگې په پای کښې دواړه نښه لرونکي فارمولونه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{T}!B$ ورزيات کړو چې $\mathbb{T}!A \wedge \mathbb{T}!B$ لري، او د $\mathbb{F}!A \wedge \mathbb{F}!B$ قاعده اجازه راکوي چې يوه ځانگه د $\mathbb{F}!A$ او $\mathbb{F}!B$ يو د بل تر څنګ په ورزياتولو وېشو. د ژباړې د نسخې سمون: (OLPF-002) په سرچينه کښې د دروغې عطف قاعدې دويم ارکومېنټ ټول مرکب فارمول دے، خو د رښتوني عطف موازي قاعده او د لاندې بېلگې ټولې قاعدې هلته يوازې نښلوونکې اخلي. دلته هماغه د عطف نښلوونکې کارول شوې، خو د قاعدې نښه په يو شان بڼه جوړه شي. تابلو هله ترلې دے چې د هغه هره ځانگه د نښه لرونکي فارمولونه سره برابره جوړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ ولري.

پر تابلوکاني ولاړه $\vdash$ اړيکه داسې تعريفېږي: $\Gamma \vdash A$ هله او يوازې هله چې داسې کوم متناهي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \dots, !B_n\} \subseteq \Gamma$ موجود وي چې د لاندې فرضونو دپاره يو ترلې تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

مثلاً دا ترلې تابلو نښي چې $\vdash (!A \wedge !B) \rightarrow !A$:

1.	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\psi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

يو سټ Γ د تابلو په حساب کښې هله ناسازگار دے چې د لاندې فرضونو دپاره يو ترلې تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

د کوم $!B_i \in \Gamma$ دپاره.

تابلوکاني په ۱۹۵۰ مو کلونو کښې اېورټ بېټ او ياکو هېنټيکا هر يوه په خپلواکه توگه جوړ کړل، او رېموند سموليان ساده او عام کړل. دا کارول ډېر اسانه دي، ځکه چې د تابلو جوړول ډېره منظمه طريقه ده. د تابلوکاني د منظم طبيعت له امله په کمپيوټر کښې هم په اسانۍ پلي کېږي. خو تابلو زياتره په سختې لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تراو کله کله په اسانۍ نه ښکاري. دا تگلاره هم ډېره عامه ده، او ډېر بېل منطقونه د تابلو نظامونه لري. تابلوکاني له موږ سره د هغو جوړښتونه په موندلو کښې هم مرسته کوي چې ورکړل شوي ترلي فارمولونه، يا د هغو ستونه، صادقوي: که سټ د صدق وړ وي، ترلې تابلو به ونه لري، يعنې هر تابلو به يوه پرانيستې ځانگه ولري. په دې شرط چې پر هغې ځانگه هره ممکنه قاعده پلي شوې وي، صادقونکې جوړښت له يوې پرانيستې ځانگې څخه “لوستل کېدے” شي. له سپکوېنټ حساب سره هم ډېر نږدې تړاو شته: په اصل کښې يو ترلې تابلو د سپکوېنټ په حساب کښې يو لنډ شوے اشتقاق دے چې سرچپه ليکل شوے وي.

8.5 بدیهي اشتقاقونه

بدیهي اشتقاقونه د اشتقاق تر ټولو زاړه او ساده منطقي نظامونه دي. د هغو اشتقاقونه یوازې د ترلي فارمولونه لري دي. د ترلي فارمولونه یوه لړۍ هله سم اشتقاق ګڼل کېږي چې په هغې کې هر ترلې فارمول A له لاندې شرطونو څخه یو پوره کړي:

1. A بدیهي اصل وي، یا

2. A د ترلي فارمولونه د ورکړل شوي سټ Γ یو غړی وي، یا

3. A د استنتاج په کومه قاعده توجیه شوی وي.

د بدیهي اصل کېدو دپاره A باید د یو شمېر ټاکلو ترلې فارمول شېماوو له یوې سره ښه ولري. د بدیهي اصولونو د شېماوو ډېر داسې ستونه شته چې د لومړۍ درجې منطق دپاره د اشتقاق د قناعت وړ، سم او بشپړ نظام ورکوي. ځینې د هغو ښوونکو له مخې ترتیب شوي وي چې واک پرې چلوي، مثلاً دا شېماوې

$$!A \rightarrow (!B \rightarrow !A) \quad !B \rightarrow (!B \vee !C) \quad (!B \wedge !C) \rightarrow !B$$

هغه عام بدیهي اصول دي چې پر $\rightarrow$ ، $\vee$ او $\wedge$ واک چلوي. د بدیهي اصولو ځینې نظامونه غواړي د اصولو شمېر تر ټولو لږ وي. دا چې کوم ښوونکي بنسټیز وټاکل شي، ان داسې نظامونه هم موندل کېدای شي چې یوازې له یوه بدیهي اصل څخه جوړ وي.

د استنتاج قاعده یوه شرطی وینا ده چې په اشتقاق کې د ترلې فارمول د توجیه کېدو دپاره بس شرط ورکوي. مودوس پوننس یوه ډېره عامه داسې قاعده ده: وایي که A او $A \rightarrow B$ له مخکینې توجیه شوي وي، نو B توجیه شوی دے. دا معنی لري چې په اشتقاق کې هغه کرښه چې ترلې فارمول B لري، په دې شرط توجیه شوې ده چې A او $A \rightarrow B$ دواړه، د کوم ترلې فارمول A دپاره، په اشتقاق کې له B څخه مخکینې راغلي وي.

پر بدیهي اشتقاقونه ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash A$ هله او یوازې هله چې داسې اشتقاق موجود وي چې ترلې فارمول A ئې وروسته فارمول وي، او Γ په هغه اشتقاق کې د هغو ترلي فارمولونه سټ ونیول شي چې د پورته (۲) له مخې توجیه شوي وي. A هله قضیه ده چې A داسې اشتقاق ولري چې Γ پکې نشي وي؛ یعنې په اشتقاق کې هر ترلې فارمول یا د (۱) له مخې توجیه شوې وي یا د (۳) له مخې. مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $\vdash A \rightarrow (!B \rightarrow (!B \vee !A))$:

1. $!B \rightarrow (!B \vee !A)$
2. $(!B \rightarrow (!B \vee !A)) \rightarrow (!A \rightarrow (!B \rightarrow (!B \vee !A)))$
3. $!A \rightarrow (!B \rightarrow (!B \vee !A))$

په ۱ مه کرښه ترلې فارمول د بدیهي اصل $A \rightarrow (!A \vee !B)$ ښه لري، چې د A او B ونډې پکې بدلې شوې دي. په ۲ مه کرښه جمله د بدیهي اصل $A \rightarrow (!B \rightarrow A)$ ښه لري. نو دواړه کرښې توجیه شوې دي. ۳ مه کرښه د مودوس پوننس له مخې توجیه شوې ده: که په لنډه ئې D ولیکو، نو ۲ مه کرښه د $C \rightarrow !D$ ښه لري، چې C هم $!B \rightarrow (!B \vee !A)$ ، یعنې ۱ مه کرښه، ده.

یو سټ Γ هله ناسازګار دے چې $\Gamma \vdash \perp$. د بدیهي اصولو یو بشپړ نظام به دا هم ثابتوي چې د هر A دپاره $\perp \rightarrow A$ ؛ نو که Γ ناسازګار وي، د هر A دپاره $\Gamma \vdash A$.

د منطق د بدیهي اشتقاقونه نظامونه لومړۍ ګوټلوب فرېګه په خپل ۱۸۷۹ز اثر بېګریشرفټ کې وړاندې کړل، چې له همدې امله زیاتره د معاصر منطق لومړۍ اثر ګڼل کېږي. بیا الفریډ نارت وایت هېډ او برترېنډ رسل په پرېنسیپیا ماتیماتیکا کې، او ډیوېډ هیلبرټ او شاګردانو ئې په ۱۹۲۰ مو کلونو کې بشپړ کړل. ځکه ورته زیاتره “د فرېګه نظامونه” یا “د هیلبرټ نظامونه” ویل کېږي. دا ډېر انعطاف منونکي دي، ځکه چې د یو منطق دپاره بدیهي نظام زیاتره په اسانۍ موندل کېږي. دا چې اشتقاقونه ډېر ساده جوړښت او یوازې یوه یا دوه استنتاجي قاعدې لري، د هغو په اړه د څیزونو ثابتول هم نسبتاً اسانه دي. خو په عمل کې ئې کارول ډېر ګران دي؛ یعنې ثبوتونه موندل او لیکل ګران دي.

باب 9

د سپکوبنت حساب

ادارتي يادونه - دا څپرک د کلاسیک د لومړۍ درجې منطق دپاره د کښتنې معیاري سپکوبنت حساب LK وړاندې کوي. دې ته نور مثالونه او تمرینونه هم پکار دي. د ثبوت د نظام په توګه د سپکوبنت له حساب سره د اړوندو موادو د شاملولو یا اېستلو دپاره د prfLK ټپک وکاروئ.

9.1 قاعدې او اشتقاقونه

د راتلونکو خبرو دپاره، پرېږدئ چې $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ د ترلي فارمولونه متناهي لری وښيي.

تعریف 9.1 (سپکوبنت). سپکوبنت د لاندې څرګندنه ده:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

دلته Γ او Δ د ژبې $\mathcal{L}$ د ترلي فارمولونه متناهي (او کېدے شي تشې) لری دي. Γ ته مقدم او Δ ته تالي ويل کېږي.

د يوه سپکوبنت تر شا شهودي مفکوره دا ده: که د مقدم ټولې ترلي فارمولونه صدق کوي، نو د تالي لږ تر لږه يوه ترلي فارمولونه صدق کوي. يعنې که $\Gamma = \langle !A_1, \dots, !A_m \rangle$ او $\Delta = \langle !B_1, \dots, !B_n \rangle$ وي، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې

$$(!A_1 \wedge \dots \wedge !A_m) \rightarrow (!B_1 \vee \dots \vee !B_n)$$

صدق کوي. دوه خاص حالتونه شته: يو هغه چې Γ تش وي، او بل هغه چې Δ تش وي. کله چې Γ تش وي، يعنې $m = 0$ ، نو $\Delta \Rightarrow$ هله صدق کوي چې $!B_1 \vee \dots \vee !B_n$ صدق کوي. کله چې Δ تش وي، يعنې $n = 0$ ، نو $\Gamma \Rightarrow$ هله صدق کوي چې $\neg(!A_1 \wedge \dots \wedge !A_m)$ صدق کوي. موږ يو سپکوبنت هله معتبر بولو چې ورسره سمون لرونکې ترلې فارمول معتبره وي.

که Γ د ترلي فارمولونه يوه لری وي، نو $\Gamma, !A$ د هغې پايلې دپاره لیکو چې A د Γ بني پاے ته ورزيات شي (او $\Gamma, !A$ د هغې پايلې دپاره چې A د Γ کين پاے ته ورزيات شي). که Δ هم د ترلي فارمولونه يوه لری وي، نو Γ, Δ د دواړو لړيو نښلول دي.

تعریف 9.2 (لومړنۍ سپکوبنت). لومړنۍ سپکوبنت داسې سپکوبنت دے چې له لاندې ښو څخه يوه لري:

$$1. !A \Rightarrow !A$$

$$2. \Rightarrow \top$$

$$3. \perp \Rightarrow$$

، او A د ژبې هره ترلې فارمول کېدے شي.

په سېکونېټ حساب کېنې اشتقاقونه د سېکونېټونو داسې ټاکلې وې چې تر ټولو پرې سېکونېټونه ئې لومړني سېکونېټونه وي؛ او که یو سېکونېټ د یوه یا دوو نورو سېکونېټونو لاندې راشي، باید د استنتاج د یوې قاعدې له مخې ترې په سمه توګه راووتې. د LK قاعدې پر دوو اصلي ډولونو وېشل کېږي: منطقي قاعدې او جوړښتي قاعدې. منطقي قاعدې د لاندې سېکونېټ د هغې ترلې فارمول د اصلي عملګر په نوم نومول کېږي چې A! او/یا B! لري. هره قاعده دوه ښې لري: یوه د داسې سېکونېټ د استنتاج دپاره چې د منطقي عملګر لرونکې ترلې فارمول ئې کین لوري ته وي، او بله د هغه سېکونېټ دپاره چې دا ترلې فارمول ئې ښې لوري ته وي.

9.2 بیاني قاعدې

9.2.1 د $\neg$ دپاره قاعدې

$$\neg R \frac{\Delta!A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg!A\Gamma \Rightarrow} \quad \neg L \frac{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg!A, \Gamma \Rightarrow}$$

9.2.2 د $\wedge$ دپاره قاعدې

$$\wedge R \frac{\Delta, !B\Gamma \Rightarrow \quad \Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\wedge!B\Gamma \Rightarrow} \quad \wedge L \frac{\Delta!A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta!A\wedge!B, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge L \frac{\Delta!B, \Gamma \Rightarrow}{\Delta!A\wedge!B, \Gamma \Rightarrow}$$

9.2.3 د $\vee$ دپاره قاعدې

$$\vee R \frac{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\vee!B\Gamma \Rightarrow} \quad \vee L \frac{\Delta!B, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta!A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta!A\vee!B, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee R \frac{\Delta, !B\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\vee!B\Gamma \Rightarrow}$$

9.2.4 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې

$$\rightarrow R \frac{\Delta, !B!A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\rightarrow!B\Gamma \Rightarrow} \quad \rightarrow L \frac{\Delta!B, \Pi \Rightarrow \quad \Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \Lambda!A\rightarrow!B, \Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

9.3 د سورونو قاعدې

9.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې

$$\forall R \frac{\Delta, !A(a)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x!A(x)\Gamma \Rightarrow} \quad \forall L \frac{\Delta!A(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta\forall x!A(x), \Gamma \Rightarrow}$$

په $\forall L$ کېنې t یوه تړلې اصطلاح ده (یعنې داسې اصطلاح چې متغیرونه نه لري). په $\forall R$ کېنې a ثابت سمبول دے چې باید د $\forall R$ قاعدې په لاندې سېکونې کېنې هېڅ ځای نه وي راغلې. موږ a د $\forall R$ استنتاج ځانګړې متغیر بولو-¹

9.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$$\boxed{\begin{array}{c} \exists R \frac{\Delta, !A(t)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x !A(x)\Gamma \Rightarrow} \qquad \exists L \frac{\Delta !A(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x !A(x), \Gamma \Rightarrow} \end{array}}$$

بیا هم، t یوه تړلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists L$ قاعدې په لاندې سېکونې کېنې نه راځي. موږ a د $\exists L$ استنتاج ځانګړې متغیر بولو.

دا شرط چې ځانګړې متغیر د $\forall R$ یا $\exists L$ استنتاج په لاندې سېکونې کېنې نه راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي. هغه دود ریاډ کړی چې کله $!A$ داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، نو دا په $!A(x)$ لیکلو نښو. په همدې چوکاټ کېنې بیا $!A(t)$ د $!A[t/x]$ لاندون دے. نو د $\exists R$ قاعده داسې هم لیکل شو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x !A} \exists R$$

پام وکړئ چې t کېدے شي له مخکېنې په $!A$ کېنې راغلې وي، مثلاً $!A$ کېدے شي $P(t, x)$ وي. له دې امله، له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x P(t, x)$ استنتاج د $\exists R$ سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t یوه یا زیاتې پېښې په تړلي متغیر x بدلولے “شي، او اړینه نه ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ. خو د $\forall R$ او $\exists L$ د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په $!A$ کېنې نه راځي. نو د $\forall R$ په کارولو سره له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x P(a, x)$ په سمه توګه نه شي استنتاجولے.

په $\exists R$ او $\forall L$ کېنې پر اصطلاح t هېڅ بندیز نشته. بل لوري ته، د $\exists L$ او $\forall R$ په قاعدو کېنې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پورتنۍ سېکونې کېنې د $!A(a)$ څخه بهر هېڅ ځای نه راځي. دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے، یعنې نظام یوازې معتبر سېکونې ته اشتقاق کړي. له دې شرط پرته لاندې استنتاجونه روا کېدل:

$$\frac{!A(a) \Rightarrow !A(a)}{\exists x !A(x) \Rightarrow !A(a)} * \exists L \qquad \frac{!A(a) \Rightarrow !A(a)}{!A(a) \Rightarrow \forall x !A(x)} * \forall R$$

$$\frac{\exists x !A(x) \Rightarrow !A(a)}{\exists x !A(x) \Rightarrow \forall x !A(x)} \forall R \qquad \frac{!A(a) \Rightarrow \forall x !A(x)}{\exists x !A(x) \Rightarrow \forall x !A(x)} \exists L$$

خو $\exists x !A(x) \Rightarrow \forall x !A(x)$ معتبر نه دے.

9.4 جوړښتي قاعدې

موږ څو داسې قاعدو ته هم اړتیا لرو چې د یوه سېکونې په کین او ښي لوري کېنې د تړلي فارمولونه د بیا ترتیبولو اجازه را کړي. ځکه چې منطقي قاعدې غواړي هغه تړلي فارمولونه چې قاعده پرې کار کوي، یا په بشپړ کین او یا په بشپړ ښي پاي کېنې وي، نو د “تبادلې” داسې قاعدې ته اړتیا لرو چې تړلي فارمولونه سم ځای ته یوسي. کله کله دا هم مهمه وي چې دوه یو شان تړلي فارمولونه سره یو کړو او هر لوري ته ترلے فارمول ورزیاته کړو.

9.4.1 کمزوري کول

¹ موږ د “ځانګړي متغیر” اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کېنې a ثابت سمبول دے. دا نوم تاریخي لاملونه لري.

$$\text{WR} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}$$

9.4.2 انقباض

$$\text{CR} \frac{\Delta, !A, !A \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{CL} \frac{\Delta !A, !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}$$

9.4.3 تبادلہ

$$\text{XR} \frac{\Delta, !A, !B, \Lambda \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !B, !A, \Lambda \Gamma \Rightarrow}$$

$$\text{XL} \frac{\Delta \Gamma, !A, !B, \Pi \Rightarrow}{\Delta \Gamma, !B, !A, \Pi \Rightarrow}$$

د کمزوري کولو، انقباض او تبادلې د استنتاجونو يوه لړۍ به زیاتره د استنتاج په دوو کرښو ښوول کېږي. لاندې قاعده چې “پرېکون” بلل کېږي، په کره توګه اړینه نه ده، خو د اشتقاقونه بیا کارول او یو ځای کول ډېر اسانوي.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \quad !A, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

9.5 اشتقاقونه

موږ وویل چې لومړنۍ سپکوېنټ څنګه وي او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. په سپکوېنټ حساب کېنې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرایي توګه جوړېږي: هر اشتقاق یا په یوازې ځان یو لومړنۍ سپکوېنټ وي، او یا له یوه یا دوو اشتقاقونه او ورپسې یوه استنتاج څخه جوړ وي. **تعریف 9.3 (LK اشتقاق).** د یوه سپکوېنټ S -LK اشتقاق د سپکوېنټونو داسې متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو بره سپکوېنټونه لومړني سپکوېنټونه دي.
2. د ونې تر ټولو لاندې سپکوېنټ S دے.
3. له S پرته د ونې هر سپکوېنټ د استنتاج د یوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه ده، او د هغې کارونې پایله په ونه کېنې د هماغه سپکوېنټ مخامخ لاندې ولاړه وي.

بیا وایو چې S د اشتقاق وروستۍ سپکوېنټ دے او S په LK کېنې د اشتقاق وړ دے (یا LK -د اشتقاق وړ دے).

بېلګه 9.4. هر لومړنۍ سپکوېنټ، مثلاً $C \Rightarrow C$ ، اشتقاق دے. له دې څخه د یوې بلې قاعدې، مثلاً د WL قاعدې، په کارولو نوسه اشتقاق ترلاسه کول شو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{!A, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

خو قاعده عمومي مراد لري: په قاعده کېنې A د هرې ترلې فارمول، مثلاً د D ، په ځای راوستل شو. که مقدمه زموږ له لومړني سپکوېنټ $C \Rightarrow C$ سره سمون خوري، نو Γ او Δ دواړه یوازې C دي، او پایله به بیا $C \Rightarrow C$ ، D ، وي. نو لاندې اشتقاق دے:

$$\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C} \text{WL}$$

اوس یوه بله قاعده، مثلاً XL، کارولې شو چې په کښې لوري کښې د دوو ترې فارمولونه د ځای بدلولو اجازه راکوي. نو لاندې هم سم اشتقاق دے:

$$\frac{\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C} \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C} \text{XL}$$

د دې قاعدې په دې کارونه کښې، چې داسې ورکړل شوې وه:

$$\frac{\Gamma, !A, !B, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, !B, !A, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL}$$

Γ او Π دواړه تش وو، Δ هم C دے، او د A او B ونډې په همدې ترتیب D او C لوبوي. نژدې په همدې طریقه وینو چې

$$\frac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D} \text{WL}$$

هم اشتقاق دے. اوس دا دواړه اشتقاقونه اخلو او د $\wedge R$ په کارولو ئې یو ځای کوو. هغه قاعده داسې وه:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, !B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B} \wedge R$$

زموږ په حالت کښې مقدمې باید د هغو اشتقاقونه له وروستیو سېکونونو سره سمون وڅوري چې په مقدمو پای ته رسېږي. یعنې Γ د $!C, !D$ ، Δ نشه، A د C او B د D سره برابره ده. نو که استنتاج سم وي، پایله $C \wedge D \Rightarrow !C \wedge !D$ ده.

$$\frac{\frac{\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C} \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C} \text{XL} \quad \frac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D} \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C \wedge !D} \wedge R$$

البته مقدمې سرچېه کولې هم شو، بیا A به D او B به C وي.

$$\frac{\frac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D} \text{WL} \quad \frac{\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C} \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C} \text{XL}}{!C, !D \Rightarrow !D \wedge !C} \wedge R$$

9.6 د اشتقاقونه بېلگې

بېلگه 9.5، د سېکونېټ $A \Rightarrow !A \wedge !B$ یو LK-اشتقاق ورکړئ.

د اشتقاق په لاندې برخه کښې د غوښتل شوي وروستي سېکونېټ په لیکلو پیل کوو.

$$\overline{!A \wedge !B \Rightarrow !A}$$

بیا باید معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج لاندې سېکونېټ دا بڼه لرل شي. دا یوه جوړښتي قاعده کېدای شي، خو غوره ده چې لومړۍ کومه منطقي قاعده ولټوو. په لاندې سېکونېټ کښې یوازینۍ منطقي ښلولونکې $\wedge$ دے، نو د $\wedge$ قاعده لټوو، او ځکه چې د $\wedge$ نښه په مقدم کښې راځي، د $\wedge L$ قاعده گورو.

$$\overline{!A \wedge !B \Rightarrow !A} \wedge L$$

د $\wedge L$ استنتاج د پورتنی سېکونټ دپاره دوه امکانونه شته: یا $!A \Rightarrow !A$ او یا $!B \Rightarrow !A$ ۔ شرکتده ده چې $!A \Rightarrow !A$ یو لومړی سېکونټ دے، او دا ښه خبره ده، خو $!B \Rightarrow !A$ په عمومي توګه د اشتقاق وړ نه دے۔ پورتنی سېکونټ وردکوو:

$$\frac{!A \Rightarrow !A}{!A \wedge !B \Rightarrow !A} \wedge L$$

اوس د سېکونټ $!A \wedge !B \Rightarrow !A$ سم LK-اشتقاق لرو۔

بېلګه 9.6. د سېکونټ $\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \rightarrow !B$ یو LK-اشتقاق ورکړئ۔

د اشتقاق په لاندې برخه کې د غوښتل شوي وروستي سېکونټ په لیکلو پیل وکړئ۔

$$\overline{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \rightarrow !B}$$

د داسې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا وروستنی سېکونټ راکړي، د وروستي سېکونټ منطقي ښلولونکي کورو: $\neg$ ، $\vee$ او $\rightarrow$ ۔ اوس مهال یوازې $\vee$ او $\rightarrow$ مهم دي، ځکه چې د وروستي سېکونټ د ترلي فارمولونه اصلي عملګرڼه دي، خو $\neg$ د بل ښلولونکي د چاپېریال دننه دے، نو وروسته به ئې وڅېړو۔ له دې امله د وروستي استنتاج د منطقي قاعدې امکانونه $\vee L$ او $\rightarrow R$ دي۔ په رښتیا هره یوه غوره کول شو، خو $\rightarrow R$ غوره کوو، یوازې د دې دپاره چې په دوو څانګو وېشل لږ وروسته کړو۔ د هغو $\rightarrow R$ استنتاجونو د ښې له مخې چې دا لاندې سېکونټ ورکول شي، ښه باید داسې وي:

$$\frac{\overline{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B}}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \rightarrow !B} \rightarrow R$$

که $\neg !A \vee !B$ د مقدم بهرني پای ته یوسو، د $\vee L$ قاعده کارول شو۔ د شېما له مخې دا باید په لاندې ډول پر دوو پورتنیو سېکونټونو ووېشل شي۔ د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-001) د سرچینې په هغو څلورو قاعدوي ونو کېنې چې د مقدم دوه فارمولونه سره بدلوي، د ښي لوري د تبادلې ښه راغلي ده؛ دلته د قاعدې له واقعي لوري سره سمه د کېن لوري د تبادلې ښه کارول کېږي۔

$$\frac{\frac{\overline{\neg !A, !A \Rightarrow !B} \quad \overline{!B, !A \Rightarrow !B}}{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B} \vee L}{\frac{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \rightarrow !B} \rightarrow R} XL$$

رایاد کړئ چې موږ هڅه کوو تر لومړنیو سېکونټونو پورې په پورته لوري لار پیدا کړو؛ داسې ښکاري چې ډېر ورنژدې یو! ښی څانګه له لومړني سېکونټ څخه یوازې یو کمزوري کول او یوه تبادله لرې ده، او بیا بشپړېږي:

$$\frac{\frac{\frac{\overline{!B \Rightarrow !B}}{!A, !B \Rightarrow !B} WL}{\frac{!B, !A \Rightarrow !B}{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B} XL} \vee L}{\frac{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \rightarrow !B} \rightarrow R} XL$$

اوس کینه څانګه کورو۔ په هره ترلې فارمول کېنې یوازینې منطقي ښلولونکې د مقدم د ترلي فارمولونه د $\neg$ ښه ده، نو د $\neg L$ قاعدې یوه کارونه کورو۔

$$\frac{\frac{\frac{\overline{!A \Rightarrow !B, !A}}{\neg !A, !A \Rightarrow !B} \neg L}{\frac{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \rightarrow !B} \rightarrow R} \vee L}{\frac{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \rightarrow !B} \rightarrow R} XL$$

لکه ښی څانګه چې موښپړه کړه، له دې کینې څانګې څخه هم یوازې یو کمزوري کول او یوه تبادله لرې یو.

$$\frac{\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{!A \Rightarrow !A, !B} \text{WR}}{!A \Rightarrow !B, !A} \text{XR}}{\neg !A, !A \Rightarrow !B} \neg L \quad \frac{\frac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B} \text{WL}}{!B, !A \Rightarrow !B} \text{XL} \quad \frac{\neg !A, !A \Rightarrow !B}{!B, !A \Rightarrow !B} \text{VL}$$

$$\frac{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B}{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B} \text{XL} \quad \frac{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \Rightarrow !B}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \Rightarrow !B} \rightarrow R$$

بېلګه 9.7. د سپکونټ $\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg (!A \wedge !B)$ یو LK-اشتقاق ورکړئ.

د پورته طریقو په کارولو، غوښتل شوی وروستنی سپکونټ په لاندې برخه کینې لیکو.

$$\frac{}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg (!A \wedge !B)}$$

په وروستي سپکونټ کینې د ترې فارمولونه شته اصلي نښلونکي د $\vee$ او $\neg$ نښې دي. دلته هم $\vee L$ او هم $\neg R$ کار ورکوي، خو په $\neg R$ پیل کوو، ځکه چې د یوې شپې دپاره پر دوو څانګو وېشل ځنډوي:

$$\frac{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg (!A \wedge !B)} \neg R$$

اوس د $\wedge L$ او $\vee L$ تر منځ ټاکنه لرو. کورو چې د $\wedge L$ قاعدې په کارولو څه کېږي: یا په سپکونټ $!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow$ او یا په سپکونټ $!B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow$ پیل کول شوی. ځکه چې اشتقاق د $!A$ او $!B$ له پلوه متناظر دے، لومړنۍ غوره کوو. د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-002) د سرچینې په دغو دوو امکاني پورتنیو سپکونټونو کینې له دویمې جملې څخه نفې پاتې شوې وه؛ دلته د وروستي سپکونټ او ورپسې قاعدوي ونې له مخې په دواړو جملو کینې نفې ساتل کېږي.

$$\frac{\frac{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow} \wedge L}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg (!A \wedge !B)} \neg R$$

د اشتقاق د ډکولو په دوام وینو چې له یوې ستونزې سره مخ کېږو:

$$\frac{\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow} \neg L \quad \frac{!A \Rightarrow !B}{\neg !B, !A \Rightarrow} ?}{\neg !A \vee \neg !B, !A \Rightarrow} \vee L \quad \frac{\neg !A \vee \neg !B, !A \Rightarrow}{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow} \text{XL} \quad \frac{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg (!A \wedge !B)} \neg R$$

د ښی څانګې پورته برخه نوره نۀ شي را کېدلې او د جوړښتي استنتاجونو له لارې لومړني سپکونټ ته نۀ شي رسول کېدے؛ نو دا سمه لار نۀ ده. له دې امله پورته د $\wedge L$ قاعدې کارول تېروتنه وه. بېرته مخکیني حالت ته ځو او پر ځای ئې $\vee L$ قاعده پلي کوو، نو ترلاسه کوو:

$$\frac{\frac{\neg !A, !A \wedge !B \Rightarrow \quad \neg !B, !A \wedge !B \Rightarrow}{\neg !A \vee \neg !B, !A \wedge !B \Rightarrow} \vee L \quad \frac{\neg !A \vee \neg !B, !A \wedge !B \Rightarrow}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow} \text{XL}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg (!A \wedge !B)} \neg R$$

هره څانګه د مخکینې په شان بشپړه کړو، نو ترلاسه کوو:

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{!A \wedge !B \Rightarrow !A} \wedge L}{\neg !A, !A \wedge !B \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\frac{!B \Rightarrow !B}{!A \wedge !B \Rightarrow !B} \wedge L}{\neg !B, !A \wedge !B \Rightarrow} \neg L \\
\hline
\neg !A \vee \neg !B, !A \wedge !B \Rightarrow \vee L \\
\frac{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg (!A \wedge !B)} \neg R
\end{array}$$

(په دغو گامونو کېنې د $\wedge$ قاعدې د $\neg$ له قاعدو څخه لاندې هم پلي کېدې شوې او بیا به هم سم اشتقاق ترلاسه شوی و-)

بېلگه 9.8. تراوسه مو د انقباض قاعده نه ده کارولې، خو کله کله اړینه وي- دا ئې یوه بېلگه ده- فرض کړئ غواړو $!A \vee \neg !A$ ثابت کړو- د $\vee R$ سرچېه پلي کول به له دغو دوو اشتقاقونه څخه یو را کړي:

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{!A \Rightarrow}{\Rightarrow !A} \neg R}{\Rightarrow !A \vee \neg !A} \vee R \quad \frac{\frac{!A \Rightarrow}{\Rightarrow \neg !A} \neg R}{\Rightarrow !A \vee \neg !A} \vee R
\end{array}$$

البته له دغو څخه هېڅ یو په لومړني سېکونېټ نه پاي ته رسېږي- چل دا دے چې پوه شو د انقباض قاعده د ترلے فارمول دوه نقلونه سره یو کول شي- او کله چې د ثبوت لټون کوو، یعنې له لاندې څخه پورته څو، د $!A \vee \neg !A$ یوه کاپي په مقدمه کېنې ساتلې شو، مثلاً:

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A}{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A \vee \neg !A} \vee R}{\Rightarrow !A \vee \neg !A} CR
\end{array}$$

اوس $\vee R$ دویم ځل کارولې شو او $\neg !A$ هم ترلاسه کوو، چې بشپړ اشتقاق ته رسېږي-

$$\begin{array}{c}
\frac{!A \Rightarrow !A}{\Rightarrow !A, \neg !A} \neg R \\
\frac{\Rightarrow !A, \neg !A}{\Rightarrow !A, !A \vee \neg !A} \vee R \\
\frac{\Rightarrow !A, !A \vee \neg !A}{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A} XR \\
\frac{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A \vee \neg !A}{\Rightarrow !A \vee \neg !A} \vee R \\
\frac{\Rightarrow !A \vee \neg !A}{\Rightarrow !A \vee \neg !A} CR
\end{array}$$

تمرین 9.9. د لاندې سېکونېټونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. !A \wedge (!B \wedge !C) \Rightarrow (!A \wedge !B) \wedge !C$$

$$2. !A \vee (!B \vee !C) \Rightarrow (!A \vee !B) \vee !C$$

$$3. !A \rightarrow (!B \rightarrow !C) \Rightarrow !B \rightarrow (!A \rightarrow !C)$$

$$4. !A \Rightarrow \neg \neg !A$$

تمرین 9.10. د لاندې سېکونېټونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. (!A \vee !B) \rightarrow !C \Rightarrow !A \rightarrow !C$$

$$2. (!A \rightarrow !C) \wedge (!B \rightarrow !C) \Rightarrow (!A \vee !B) \rightarrow !C$$

$$3. \Rightarrow \neg (!A \wedge \neg !A)$$

$$4. !B \rightarrow !A \Rightarrow \neg !A \rightarrow \neg !B$$

$$5. \Rightarrow (!A \rightarrow \neg !A) \rightarrow \neg !A$$

$$.6 \quad \Rightarrow \neg(!A \rightarrow !B) \rightarrow \neg !B$$

$$.7 \quad !A \rightarrow !C \Rightarrow \neg(!A \wedge \neg !C)$$

$$.8 \quad !A \wedge \neg !C \Rightarrow \neg(!A \rightarrow !C)$$

$$.9 \quad !A \vee !B, \neg !B \Rightarrow !A$$

$$.10 \quad \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)$$

$$.11 \quad \Rightarrow (\neg !A \wedge \neg !B) \rightarrow \neg(!A \vee !B)$$

$$.12 \quad \Rightarrow \neg(!A \vee !B) \rightarrow (\neg !A \wedge \neg !B)$$

تمرین 9.11. د لاندې سپکونونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$.1 \quad \neg(!A \rightarrow !B) \Rightarrow !A$$

$$.2 \quad \neg(!A \wedge !B) \Rightarrow \neg !A \vee \neg !B$$

$$.3 \quad !A \rightarrow !B \Rightarrow \neg !A \vee !B$$

$$.4 \quad \Rightarrow \neg \neg !A \rightarrow !A$$

$$.5 \quad !A \rightarrow !B, \neg !A \rightarrow !B \Rightarrow !B$$

$$.6 \quad (!A \wedge !B) \rightarrow !C \Rightarrow (!A \rightarrow !C) \vee (!B \rightarrow !C)$$

$$.7 \quad (!A \rightarrow !B) \rightarrow !A \Rightarrow !A$$

$$.8 \quad \Rightarrow (!A \rightarrow !B) \vee (!B \rightarrow !C)$$

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري.)

9.7 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلګه 9.12. د سپکونېټ $\exists x \neg !A(x) \Rightarrow \neg \forall x !A(x)$ یو LK-اشتقاق ورکړئ.

کله چې له سورونو سره کار کوو، باید ډاډمن شو چې د ځانګړي متغیر شرط نه ماتوو، او کله کله د دې دپاره اړیو چې د ځینو استنتاجونو د پلي کولو ترتیب بدل کړو. په عمومي توګه دا کتوره ده چې لومړۍ هغه قاعدې وڅېړو چې د ځانګړي متغیر د شرط تابع دي (په بشپړ شوي ثبوت کېنې به لاندې وي). همدارنګه، غوره ده لږ وړاندې وګورو او اټکل وکړو چې لومړنۍ سپکونېټ به څنګه وي. زموږ په حالت کېنې باید د $A(a) \Rightarrow !A(a)$ په شان وي. یعنې کله چې د سورونو قاعدې “سرچپه” کوو، باید د $\forall$ او $\exists$ دواړو قاعدو دپاره هماغه اصطلاح—چې a به ئې وېلو—غوره کړو. که د هرې قاعدې دپاره بېله اصطلاح غوره کړو، د $A(a) \Rightarrow !A(b)$ په شان څه ته رسېږو، چې البته د اشتقاق وړ نه دے. د معمول په شان په دې لیکلو پیل کوو:

$$\overline{\exists x \neg !A(x) \Rightarrow \neg \forall x !A(x)}$$

یا د $\exists$ ل قاعده پلي کول شو او یا د $\neg$ ر قاعده. ځکه چې $\exists$ ل د ځانګړي متغیر د شرط تابع ده، ښه ده چې دا ژر تر ژره وڅېړو، نو لومړۍ همدا پلي کوو.

$$\frac{\overline{\neg !A(a) \Rightarrow \neg \forall x !A(x)}}{\exists x \neg !A(x) \Rightarrow \neg \forall x !A(x)} \exists L$$

د $\neg L$ او $\neg R$ قاعدو په سرچپه پلي کولو ترلاسه کوو:

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\forall x !A(x)} \Rightarrow !A(a)}{\neg !A(a), \forall x !A(x) \Rightarrow} \neg L}{\forall x !A(x), \neg !A(a) \Rightarrow} XL}{\frac{\neg !A(a) \Rightarrow \neg \forall x !A(x)}{\exists x \neg !A(x) \Rightarrow \neg \forall x !A(x)} \neg R} \exists L$$

په دې ځای کې یوازینۍ امکان د $\forall L$ قاعدې پلي کول دي. ځکه چې دا قاعده د ځانګړي متغیر د بندیز تابع نه ده، نو کومه ستونزه نشته. ریاډ کړئ چې غواړو یو لومړنۍ سپکوېنټ، یعنې د $!A(a) \Rightarrow !A(a)$ په بڼه، ترلاسه کړو؛ نو د قاعدې د کارولو پر مهال باید a د A د ارکوېنټ په توګه غوره کړو.

$$\frac{\frac{\frac{\overline{!A(a) \Rightarrow !A(a)}}{\forall x !A(x) \Rightarrow !A(a)} \forall L}{\neg !A(a), \forall x !A(x) \Rightarrow} \neg L}{\frac{\forall x !A(x), \neg !A(a) \Rightarrow} \neg L} XL}{\frac{\neg !A(a) \Rightarrow \neg \forall x !A(x)}{\exists x \neg !A(x) \Rightarrow \neg \forall x !A(x)} \neg R} \exists L$$

په تېره بیا له سورونو سره د کار پر مهال مهمه ده چې په دې ځای کې بیا وګورو چې د ځانګړي متغیر شرط خو نه د مات شوی. ځکه چې زموږ له کارول شوو قاعدو څخه یوازې $\exists L$ د ځانګړي متغیر د شرط تابع وه، او ځانګړې متغیر a د هغې په لاندې سپکوېنټ (وروستي سپکوېنټ) کې نه راځي، نو دا سم اشتقاق دی.

تمرین 9.13. د لاندې سپکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow (\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall z (!A(z) \wedge !B(z))$
2. $\Rightarrow (\exists x !A(x) \vee \exists y !B(y)) \rightarrow \exists z (!A(z) \vee !B(z))$
3. $\forall x (!A(x) \rightarrow !B) \Rightarrow \exists y !A(y) \rightarrow !B$
4. $\forall x \neg !A(x) \Rightarrow \neg \exists x !A(x)$
5. $\Rightarrow \neg \exists x !A(x) \rightarrow \forall x \neg !A(x)$
6. $\Rightarrow \neg \exists x \forall y ((!A(x, y) \rightarrow \neg !A(y, y)) \wedge (\neg !A(y, y) \rightarrow !A(x, y)))$

تمرین 9.14. د لاندې سپکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow \neg \forall x !A(x) \rightarrow \exists x \neg !A(x)$
2. $(\forall x !A(x) \rightarrow !B) \Rightarrow \exists y (!A(y) \rightarrow !B)$
3. $\Rightarrow \exists x (!A(x) \rightarrow \forall y !A(y))$

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري.)

اداري یادونه. دا برخه د سپکوېنټ حساب د اشتقاق وړتیا د اړیکې او سازګارۍ تعریفونه راغونډوي. د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-003) په سرچینه کې د طبیعي استنتاج نوم راغلی و؛ دلته د څپرکي او ورپسې تعریفونو له مخې د سپکوېنټ حساب نوم کارول کېږي.

9.8 د ثبوت-تیوریکي مفاهیم

لکه څنګه چې موږ شمېر مهم معنایي مفاهیم (اعتبار، معنایي استلزام او د صدق وړتیا) تعریف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو. دا مفاهیم په جوړښتونه کېنې د ترلي فارمولونه د صدق پر بنسټ نه، بلکې د ځینو سپکوښتونو د د اشتقاق وړتیا یا د اشتقاق نه وړتیا پر بنسټ تعریفېږي. دا یوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیه ده.

تعریف 9.15 (قضیې). ترلې فارمول A هله قضیه ده چې په LK کېنې د سپکوښت A $\Rightarrow$ اشتقاق موجود وي. که A قضیه وي، $A \vdash$ لیکو؛ او که نه وي، $A \not\vdash$ لیکو.

تعریف 9.16 (د اشتقاق وړتیا). ترلې فارمول A د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه د اشتقاق وړ ده، یعنې $\Gamma \vdash A$ ، هله او یوازې هله چې یو متناهی فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او په Γ_0 کېنې د ترلي فارمولونه یو لړ Γ'_0 موجود وي، داسې چې LK د $A \Rightarrow \Gamma'_0$ سپکوښت اشتقاق کړي. که A له Γ څخه د اشتقاق وړ نه وي، $\Gamma \not\vdash A$ لیکو.

د انقباض، کمزوري کولو او تبادلې د قاعدو له امله، په Γ'_0 کېنې د ترلي فارمولونه ترتیب او شمېر اهمیت نه لري: که سپکوښت $A \Rightarrow \Gamma'_0$ د اشتقاق وړ وي، نو د هر داسې Γ''_0 دپاره $A \Rightarrow \Gamma''_0$ هم د اشتقاق وړ ده چې د Γ'_0 هماغه ترلي فارمولونه لري. مثلاً که $\Gamma_0 = \{B, C\}$ وي، نو هم $\Gamma'_0 = \{B, C, B\}$ او هم $\Gamma''_0 = \{C, C, B\}$ داسې لرونه دي چې یوازې د Γ_0 ترلي فارمولونه لري. که د یوه لړ لرونکې سپکوښت د اشتقاق وړ وي، د بل لړ لرونکې هم ده، مثلاً:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \frac{!B, !B, !C \Rightarrow !A}{!B, !C \Rightarrow !A} \text{CL} \\ \frac{!B, !C \Rightarrow !A}{!C, !B \Rightarrow !A} \text{XL} \\ \frac{!C, !B \Rightarrow !A}{!C, !C, !B \Rightarrow !A} \text{WL} \end{array}$$

له دې وروسته به وایو چې که Γ_0 د ترلي فارمولونه یو متناهی سټ وي، نو $A \Rightarrow \Gamma_0$ هر هغه سپکوښت ده چې مقدم ئې په Γ_0 کېنې د ترلي فارمولونه یو لړ وي، او د اړتیا په وخت کېنې انقباضونه، تبادلې او کمزوري کول په ناوېلي توګه ورګډوو.

تعریف 9.17 (سازګاري). د جملو سټ Γ هله او یوازې هله سازګار ده چې یو متناهی فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ موجود وي، داسې چې LK د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سپکوښت اشتقاق کړي. که Γ سازګار نه وي، یعنې که د هر متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره LK د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سپکوښت اشتقاق نه کړي، نو هغه سازګار بولو.

قضیه 9.18 (انعکاسیت). که $A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash A$.

ثبوت. لومړنۍ سپکوښت $A \Rightarrow A$ د اشتقاق وړ ده، او $\{A\} \subseteq \Gamma$.

قضیه 9.19 (یکنواختي). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Delta \vdash A$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash A$ ، یعنې یو متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $A \Rightarrow \Gamma_0$ د اشتقاق وړ ده. ځکه چې $\Gamma \subseteq \Delta$ ، نو $\Gamma_0 \subseteq \Delta$ هم یو متناهی فرعي سټ ده. له دې امله د $A \Rightarrow \Gamma_0$ اشتقاق هم $\Delta \vdash A$ ښيي.

قضیه 9.20 (انتقالیت). که $\Gamma \vdash A$ او $\{A\} \cup \Delta \vdash B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash B$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق π_0 شته. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Delta_0 \subseteq \Delta$ دپاره د $!A, \Delta_0 \Rightarrow !B$ اشتقاق π_1 شته. لاندې اشتقاق وکړئ:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow !A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ !A, \Delta_0 \Rightarrow !B \end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow !B} \text{Cut}$$

□ خټکه چې $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$ ، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$ ښيي.

پام وکړئ، په ځانګړې توګه د دې معنی دا ده چې که $\Gamma \vdash !A$ او $A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. همدارنګه ترې دا هم راضي چې که $!A_1, \dots, !A_n \vdash !B$ وي او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضيه 9.21. Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هرې جملې A دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

□ ثبوت. تمرین.

تمرین 9.22، 9.21 ثابت کړئ.

قضيه 9.23 (متناهي شاهد). 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ سپکوېنټ اشتقاق لري. له دې امله $\Gamma_0 \vdash !A$.

2. که Γ ناسازګار وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې LK د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سپکوېنټ اشتقاق کړي. خو بیا Γ_0 د یو ناسازګار متناهي فرعي سټ دے.

□

9.9 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دا خاصیتونه په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا د قضیې په ثبوت کې ونډه ولري.

قضيه 9.24. که $\Gamma \vdash !A$ وي او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي Γ_0 او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ شته چې LK د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ او $!A, \Gamma_1 \Rightarrow$ سپکوېنټونه اشتقاق کړي. د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ د LK -اشتقاق نوم π_0 او د $\Gamma_1, !A \Rightarrow$ اشتقاق نوم π_1 کېږدو. بیا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow !A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ !A, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

□ خټکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ؛ له دې امله Γ ناسازګار دے.

قضیه 9.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار وي.

ثبوت. لومړۍ فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ ، یعنې د $\Gamma \Rightarrow !A$ اشتقاق π_0 شته. د $\neg L$ قاعدې په ورزیاتولو د $\neg !A, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق ترلاسه کوو؛ یعنې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار دے.

که $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار وي، نو د $\neg !A, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق π_1 شته. لاندې د $\Gamma \Rightarrow !A$ اشتقاق دے:

$$\frac{\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{\Rightarrow !A, \neg !A} \neg R \quad \neg !A, \Gamma \Rightarrow}{\Gamma \Rightarrow !A} \text{Cut} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \end{array}}$$

□

تمرین 9.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي.

قضیه 9.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$. بیا د کوم سپکونېټ $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق π شته. سپکونېټ $\neg !A, \Gamma_0 \Rightarrow$ هم د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\vdots \pi}{\Gamma_0 \Rightarrow !A} \quad \frac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow} \neg L}{!A, \neg !A \Rightarrow} \text{XL} \quad \neg !A \in \Gamma}{\Gamma_0, \neg !A \Rightarrow} \text{Cut}$$

□

ځکه چې $\neg !A \in \Gamma$ او $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، نو دا ښیي چې Γ ناسازگار دے.

قضیه 9.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. داسې متناهي ستونه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ او داسې LK-اشتقاقونه π_0 او π_1 شته چې په همدې ترتیب د $\neg !A, \Gamma_0 \Rightarrow$ او $\neg !A, \Gamma_1 \Rightarrow$ اشتقاقونه دي. بیا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_0}{!A, \Gamma_0 \Rightarrow} \quad \neg !A \in \Gamma}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg !A} \neg R \quad \neg !A, \Gamma_1 \Rightarrow}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \end{array}$$

□

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. له دې امله Γ ناسازگار دے.

9.10 د اشتقاق وړتیا او قضییز نښلوونکي

موږ ثابتوو چې د سپکونټ حساب د د اشتقاق وړتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضییزو نښلوونکو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي، لکه $A \wedge !B \vdash !A$ او $A \wedge !B \vdash !B$ (مودوس پونېس) - دغه حقیقتونه د بشپړتیا د قضیې د ثبوت دپاره اړین دي -

قضیه 9.29. 1. هم $A \wedge !B \vdash !A$ او هم $A \wedge !B \vdash !B$.

2. $!A, !B \vdash A \wedge !B$.

ثبوت. 1. دواړه سپکونټونه $A \wedge !B \Rightarrow !A$ او $A \wedge !B \Rightarrow !B$ د اشتقاق وړ دي:

$$\frac{!A \Rightarrow !A}{!A \wedge !B \Rightarrow !A} \wedge L \quad \frac{!B \Rightarrow !B}{!A \wedge !B \Rightarrow !B} \wedge L$$

2. دا د سپکونټ $A, !B \Rightarrow A \wedge !B$ یو اشتقاق دے - د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-004) د سرچینې په ونه کښې د عطف-بنی قاعدې دواړو مقدمو یو شان مقدم نه درلود؛ دلته د جوړښتي استنتاجونو دوه کونې کړنې دواړه مقدمې له پایلې سره سموي -

$$\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{!A, !B \Rightarrow !A} \quad \frac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B}}{!A, !B \Rightarrow A \wedge !B} \wedge R$$

□

قضیه 9.30. 1. $A \vee !B, \neg !A, \neg !B$ ناسازگار دے -

2. هم $A \vdash A \vee !B$ او هم $!B \vdash A \vee !B$.

ثبوت. 1. موږ د سپکونټ $A \vee !B, \neg !A, \neg !B \Rightarrow$ یو اشتقاق ورکوو:

$$\frac{\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow} \neg L}{!A, \neg !A, \neg !B \Rightarrow} \quad \frac{\frac{!B \Rightarrow !B}{\neg !B, !B \Rightarrow} \neg L}{!B, \neg !A, \neg !B \Rightarrow}}{!A \vee !B, \neg !A, \neg !B \Rightarrow} \vee L$$

(رایاد کړئ چې د استنتاج دوه کونې کړنې څو کمزوري کول، انقباضونه او تبادلې ښيي -)

2. دواړه سپکونټونه $A \Rightarrow A \vee !B$ او $!B \Rightarrow A \vee !B$ اشتقاقونه لري:

$$\frac{!A \Rightarrow !A}{!A \Rightarrow A \vee !B} \vee R \quad \frac{!B \Rightarrow !B}{!B \Rightarrow A \vee !B} \vee R$$

□

قضیه 9.31. 1. $!A, !A \rightarrow !B \vdash !B$.

2. هم $\neg !A \vdash !A \rightarrow !B$ او هم $!B \vdash !A \rightarrow !B$.

ثبوت. 1. سپکونټ $A \rightarrow !B, !A \Rightarrow !B$ د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{!A \Rightarrow !A \quad !B \Rightarrow !B}{!A \rightarrow !B, !A \Rightarrow !B} \rightarrow L$$

2. دواړه سپکونېتونه $B \Rightarrow A \rightarrow B$ او $\neg A \Rightarrow A \rightarrow B$ د اشتقاق وړ دي:

$$\begin{array}{c} \frac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow} \neg L \\ \frac{\neg !A, !A \Rightarrow}{!A, \neg !A \Rightarrow} XL \\ \frac{!A, \neg !A \Rightarrow !B}{\neg !A \Rightarrow !A \rightarrow !B} WR \end{array} \rightarrow R \quad \begin{array}{c} \frac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B} WL \\ \frac{!A, !B \Rightarrow !B}{!B \Rightarrow !A \rightarrow !B} \rightarrow R \end{array}$$

□

9.11 د اشتقاق وړتیا او سورونه

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د سپکونېت حساب قاعدې په دې برخه کې د $\vdash$ په اړه ثابت شوي حقیقتونه را کړي.

قضیه 9.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $A(x)$ کېنې نه راځي، او $\Gamma \vdash A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x !A(x)$.

ثبوت. د کوم متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\Gamma_0 \Rightarrow A(c)$ د LK -اشتقاق نوم π_0 کېږدئ. د $\forall R$ استنتاج په ورزیاتولو د $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x !A(x)$ اشتقاق ترلاسه کوو، ځکه c په Γ یا $A(x)$ کېنې نه راځي، نو د ځانګړي متغیر شرط پوره کېږي.

□

قضیه 9.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x !A(x)$.

2. $\forall x !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. سپکونېت $!A(t) \Rightarrow \exists x !A(x)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{!A(t) \Rightarrow !A(t)}{!A(t) \Rightarrow \exists x !A(x)} \exists R$$

2. سپکونېت $\forall x !A(x) \Rightarrow !A(t)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{!A(t) \Rightarrow !A(t)}{\forall x !A(x) \Rightarrow !A(t)} \forall L$$

□

9.12 سمواله

د سپکونېت حساب په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نه کړي چې په حقیقت کېنې نه وي. نو سمواله د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خونديتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوريکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ A معتبر ده؛

2. که ترله فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛

3. که د ترې فارمولونه یو سټ ناسازگار وي، د صدق وړ نه دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نه وي، اشتقاق نظام نیکرې دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سمواله ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

ځکه دغه ټول ثبوت-تیوريکي خاصیتونه په سپکوېنټ حساب کېنې د ځینو سپکوېنټونو د د اشتقاق وړتیا له لارې تعریف شوي دي، د پورته (۱)–(۳) ثابتول غواړي چې د د اشتقاق وړ سپکوېنټونو د معنایي خاصیتونو په اړه یو څه ثابت کړو. لومړۍ به تعریف کړو چې د سپکوېنټ معتبر کېدل څه معنی لري، او بیا به وښیو چې هر د اشتقاق وړ سپکوېنټ معتبر دے. وروسته (۱)–(۳) د دې پایلې د لازمو نتیجه په توګه راځي.

تعریف 9.34. جوړښت $\mathcal{M}$ یو سپکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله او یوازې هله پوره کوي چې یا د کوم $A \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \not\models A$ وي، یا د کوم $A \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models A$ وي.

یو سپکوېنټ هله او یوازې هله معتبر دے چې هر جوړښت $\mathcal{M}$ هغه پوره کړي.

قضیه 9.35. (سمواله). که $\Theta \Rightarrow \Xi$ د LK د سپکوېنټ اشتقاق کړي، نو $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے.

ثبوت. فرض کړئ π د $\Theta \Rightarrow \Xi$ اشتقاق دے. موږ په π کېنې د استنتاجونو پر شمېر n استقرا کوو.

که د استنتاجونو شمېر 0 وي، نو π یوازې له یوه لومړني سپکوېنټ څخه جوړ دے. هر لومړنۍ سپکوېنټ $A \Rightarrow A$ په څرګند ډول معتبر دے، ځکه د هر $\mathcal{M}$ دپاره یا $\mathcal{M} \not\models A$ وي یا $\mathcal{M} \models A$.

که د استنتاجونو شمېر له 0 څخه زیات وي، د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو. د استقرا د فرضیې له مخې منلې شو چې د دغه استنتاج مقدمې معتبرې دي، ځکه د هرې مقدمې په اشتقاق کېنې د استنتاجونو شمېر له n څخه کم دے.

لومړۍ هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې یوازې یوه مقدمه لري.

1. وروستۍ استنتاج کمزوري کول دي. بیا $\Theta \Rightarrow \Xi$ یا $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دے (که وروستۍ استنتاج WL وي) یا $A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ دے (که WR وي)، او اشتقاق له لاندې دواړو بنو څخه په یوه پای ته رسېږي:

$$\frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \quad \frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A} \text{WR}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، یعنې د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره یا کوم $C \in \Gamma$ شته چې $\mathcal{M} \not\models C$ وي، یا کوم $C \in \Delta$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ وي.

که د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \not\models C$ وي، نو $C \in \Theta$ هم دے، ځکه $\Theta = A, \Gamma$ ، نو د کوم $C \in \Theta$ دپاره $\mathcal{M} \not\models C$ دے. همدارنګه، که د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ وي، ځکه $C \in \Xi$ ، نو د کوم $C \in \Xi$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ دے. له دې امله $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے.

2. وروستۍ استنتاج $\neg L$ دے: بیا د وروستۍ استنتاج مقدمه $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ او پایله $\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ده، یعنې اشتقاق داسې پای ته رسېږي:

$$\frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A} \neg L$$

او $\Theta = \neg!A, \Gamma$ ، په داسې حال کې چې $\Xi = \Delta$ ۔

د استقرا فرضیه وایي چې $\Delta, !A$ ، $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، یعنې د هر $\mathcal{M}$ دپاره یا (الف) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، یا (ب) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، یا (ج) $\mathcal{M} \models !A$ وي۔ غواړو وښیو چې $\Theta \Rightarrow \Xi$ هم معتبر دے۔ فرض کړئ $\mathcal{M}$ جوړښت دے۔ که (الف) سم وي، نو داسې $C \in \Gamma$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ ، خو $C \in \Theta$ هم دے۔ که (ب) سم وي، نو داسې $C \in \Delta$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ ، خو $C \in \Xi$ هم دے۔ په پای کې، که $\mathcal{M} \models !A$ وي، نو $\mathcal{M} \models \neg!A$ دے۔ ځکه $\neg!A \in \Theta$ ، نو داسې $C \in \Theta$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ وي۔ له دې امله $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے۔

3. وروستنه استنتاج $\neg R$ دے: تمرین۔

4. وروستنه استنتاج $\wedge L$ دے: دوه ښې شته؛ $!A \wedge !B$ په کین لوري کې د مقدمې له $!A$ یا $!B$ څخه استنتاج کېدے شي۔ په لومړي حالت کې π داسې پای ته رسېږي:

$$\frac{\vdots}{!A, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

او $\Theta = !A \wedge !B, \Gamma$ ، په داسې حال کې چې $\Xi = \Delta$ ۔ یو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کې ونیسئ۔ ځکه د استقرا د فرضیې له مخې $\Delta, !A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، یا (الف) $\mathcal{M} \models !A$ ، یا (ب) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، یا (ج) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ وي۔ په (الف) حالت کې $\mathcal{M} \models !A \wedge !B$ ، نو داسې $C \in \Theta$ (یعنې $!A \wedge !B$) شته چې $\mathcal{M} \models C$ وي۔ په (ب) حالت کې داسې $C \in \Gamma$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ ، او $C \in \Theta$ هم دے۔ په (ج) حالت کې داسې $C \in \Delta$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ ، او ځکه $\Xi = \Delta$ ، نو په هر حالت کې $\mathcal{M} \models \Delta$ د $!A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ سپکوښت پوره کوي۔ د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-005) د سرچینې په ورپسې پایله کې عطف لرونکې مقدمه پاتې شوې وه؛ دلته د همدغه ثابت شوي بشپړ سپکوښت اعتبار لیکل کېږي۔ ځکه $\mathcal{M} \models !A \wedge !B$ ، خو اختیاري و، $\Delta, !A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے۔ هغه حالت چې $!A \wedge !B$ له $!B$ څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د $!A$ پر ځای د $!B$ په راوړلو، حل کېږي۔

5. وروستنه استنتاج $\vee R$ دے: دوه ښې شته؛ $!A \vee !B$ په ښې لوري کې د مقدمې له $!A$ یا $!B$ څخه استنتاج کېدے شي۔ په لومړي حالت کې π داسې پای ته رسېږي:

$$\frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A} \vee R$$

اوس $\Theta = \Gamma$ او $\Xi = \Delta, !A \vee !B$ دي۔ یو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کې ونیسئ۔ ځکه $\Delta, !A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، یا (الف) $\mathcal{M} \models !A$ ، یا (ب) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، یا (ج) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ وي۔ په (الف) حالت کې $\mathcal{M} \models !A \vee !B$ ، په (ب) حالت کې داسې $C \in \Gamma$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ ، په (ج) حالت کې داسې $C \in \Delta$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ ، نو په هر حالت کې $\mathcal{M} \models \Delta$ د $\Delta, !A \vee !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، یعنې $\Theta \Rightarrow \Xi$ ، پوره کوي۔ ځکه $\mathcal{M} \models !A \vee !B$ ، خو اختیاري و، $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے۔ هغه حالت چې $!A \vee !B$ له $!B$ څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د $!A$ پر ځای د $!B$ په راوړلو، حل کېږي۔

6. وروستنه استنتاج $\rightarrow R$ دے: بیا π داسې پای ته رسېږي:

$$\frac{\vdots}{!A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B} \rightarrow R$$

بيا هم د استقرا فرضيه وايي چې مقدمه معتبره ده؛ غواړو وښيو چې پايله هم معتبره ده. يو اختياري $\mathcal{M}$ ونيسئ. ځکه $A, \Gamma \Rightarrow$ معتبر دے، لږ تر لږه يو له دغو حالتونو څخه سم دے: (الف) $\mathcal{M} \models A$ ، (ب) $\mathcal{M} \models B$ ، (ج) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (د) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$. په (الف) او (ب) حالتونو کېنې $\mathcal{M} \models A \rightarrow B$ ، نو داسې $\mathcal{M} \models C$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ وي. په (ج) حالت کېنې د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ دے. په (د) حالت کېنې د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ دے. په هر حالت کېنې $\mathcal{M}$ د $A \rightarrow B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ سپکونېټ پوره کوي. ځکه $\mathcal{M}$ اختياري و، $\Gamma \Rightarrow \Delta, A \rightarrow B$ معتبر دے.

7. وروستنه استنتاج $\forall L$ دے: بيا داسې فارمول $A(x)$ او تړلې اصطلاح t شته چې π داسې پاڼے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\forall x A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$$

غواړو وښيو چې پايله $\forall x A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده. يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کېنې ونيسئ. ځکه چې مقدمه $A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده، يا (الف) $\mathcal{M} \models A(t)$ ، (ب) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (ج) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ دے. په (الف) حالت کېنې، د 16.40 له مخې، که $\mathcal{M} \models \forall x A(x)$ وي، نو $\mathcal{M} \models A(t)$ دے. ځکه $\mathcal{M} \models A(t)$ ، نو $\mathcal{M} \models \forall x A(x)$ په (ب) او (ج) حالتونو کېنې $\mathcal{M}$ هم $\forall x A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کوي. ځکه $\mathcal{M}$ اختياري و، $\forall x A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے.

8. وروستنه استنتاج $\exists R$ دے: تمرين.

9. وروستنه استنتاج $\forall R$ دے: بيا داسې فارمول $A(x)$ او ثابت سمبول a شته چې π داسې پاڼے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, A(a) \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x A(x)} \forall R$$

دلته د ځانگړي متغير شرط پوره کېږي؛ يعنې a په $A(x)$ ، Γ يا Δ کېنې نه راځي. د استقرا د فرضيې له مخې د وروستي استنتاج مقدمه معتبره ده. بايد وښيو چې پايله هم معتبره ده؛ يعنې د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره يا (الف) $\mathcal{M} \models \forall x A(x)$ ، يا (ب) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (ج) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ وي.

فرض کړئ $\mathcal{M}$ يو اختياري جوړښت دے. که (ب) يا (ج) سم وي، کار بشپړ دے؛ نو فرض کړئ يو هم سم نه دے: د هر $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، او د هر $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \not\models C$. بايد وښيو چې (الف) سم دے، يعنې $\mathcal{M} \models \forall x A(x)$. د 16.22 له مخې کافي ده وښيو چې د ټولو متغير-ټاکنو s دپاره $\mathcal{M}, s \models A(x)$. نو يو اختياري متغير-ټاکنه s ونيسئ. داسې جوړښت $\mathcal{M}'$ په پام کېنې ونيسئ چې د $\mathcal{M}$ په شان دے، پرته له دې چې $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$ د 16.28 له مخې، د هر $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M}' \models C$ ؛ ځکه a په Γ کېنې نه راځي، او د هر $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M}' \not\models C$. خو مقدمه معتبره ده، نو $\mathcal{M}' \models A(a)$. د 16.20 له مخې $\mathcal{M}', s \models A(a)$ ، ځکه $A(a)$ يوه جمله ده. اوس $s \sim_x s$ او $s(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}'}(a)$ ، ځکه $\mathcal{M}'$ مو همداسې تعريف کړے دے. نو 16.30 پلي کېږي او $\mathcal{M}', s \models A(x)$ ترلاسه کوو. ځکه a په $A(x)$ کېنې نه راځي، د 16.26 له مخې $\mathcal{M}, s \models A(x)$. ځکه s اختياري و، دا مو ثابت کړل چې د ټولو متغير-ټاکنو دپاره $\mathcal{M}, s \models A(x)$.

10. وروستنه استنتاج $\exists L$ دے: تمرين.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې دوه مقدمې لري.

1. وروستنه استنتاج پرېکون دے: بيا π داسې پاڼے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ !A, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

فرض کړئ $\mathcal{M}$ جوړښت دے۔ د استقرا د فرضيې له مخې دواړه مقدمې معتبرې دي، نو $\mathcal{M}$ دواړه پوره کوي۔ دوه حالتونه بېلوو: (الف) $\mathcal{M} \models !A$ او (ب) $\mathcal{M} \not\models !A$ ۔ په (الف) حالت کې، د دې دپاره چې $\mathcal{M}$ کينه مقدمه پوره کړي، بايد $\Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کړي۔ بيا پایله هم پوره کوي۔ په (ب) حالت کې، د دې دپاره چې $\mathcal{M}$ بنې مقدمه پوره کړي، د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-006): سرچينې دلته د سپکونټ د لنډې پر ځای د سټ-توپير لنډه لرله؛ د قاعدې له مقدمو سره سمه لنډه راوستل کېږي۔ بايد $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کړي۔ بيا هم $\mathcal{M}$ پایله پوره کوي۔

2. وروستنه استنتاج $\wedge R$ دے۔ بيا π داسې پای ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !B \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B} \wedge R$$

يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کېنې ونیسئ۔ که $\mathcal{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ سپکونټ پوره کوي، کار بشپړ دے۔ نو فرض کړئ نۀ پوره کوي۔ ځکه د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، $\mathcal{M} \models !A$ همدارنګه، ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ معتبر دے، $\mathcal{M} \models !B$ ۔ نو $\mathcal{M} \models !A \wedge !B$ ۔

3. وروستنه استنتاج $\vee L$ دے: تمرین۔

4. وروستنه استنتاج $\rightarrow L$ دے۔ بيا π داسې پای ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ !B, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{!A \rightarrow !B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L$$

بيا هم يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کېنې ونیسئ او فرض کړئ چې $\mathcal{M}$ د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سپکونټ نۀ پوره کوي۔ بايد وښيو چې $\mathcal{M} \not\models !A \rightarrow !B$ ۔ که $\mathcal{M} \models !A \rightarrow !B$ ، نو $\mathcal{M} \models !A$ او ځکه $\mathcal{M} \models !B$ ، خو بيا $\mathcal{M} \not\models !A \rightarrow !B$ ، او همدا مو غوښتل۔

□

تمرین 9.36. د 9.35 ثبوت بشپړ کړئ۔

نتیجه 9.37. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبر ده۔

نتیجه 9.38. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \models !A$ ۔

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق شته۔ د 9.35 له مخې، هر جوړښت $\mathcal{M}$ يا کوم $B \in \Gamma_0$ ناسموي يا $!A$ رښتيا کوي۔ نو که $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، بيا $\mathcal{M} \models !A$ هم دے۔

□

نتیجه 9.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازگار دے۔

ثبوت. موږ مقابل عکس ثابتوو۔ فرض کړئ سازگار نۀ دے۔ بيا يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow$ اشتقاق شته۔ د 9.35 له مخې $\Gamma_0 \Rightarrow$ معتبر دے۔ په بله وينا، د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره داسې $C \in \Gamma_0$ شته چې $\mathcal{M} \not\models C$ ، او ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، دغه C په Γ کېنې هم دے۔ نو هېڅ $\mathcal{M}$ د Γ سټ نۀ پوره کوي، او Γ د صدق وړ نۀ دے۔

□

9.13 له عینیت سره اشتقاقونه

له عینیت سره اشتقاقونه اضافي لومړنيو سپکوښتونو او استنتاجي قاعدو ته اړتیا لري۔
 تعریف 9.40 (د = دپاره لومړني سپکوښتونه)۔ که t ترې اصطلاح وي، نو $t = t \Rightarrow$ یو لومړنی سپکوښت دے۔
 د = قاعدې دا دي (t_1 او t_2 ترې اصطلاحګانې دي):

$$\frac{\Delta, !A(t_2)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A(t_1)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} = \frac{\Delta, !A(t_1)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A(t_2)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}$$

پیلګه 9.41. که s او t ترې اصطلاحګانې وي، نو $s = t, !A(s) \vdash !A(t)$:

$$\frac{\frac{!A(s) \Rightarrow !A(s)}{s = t, !A(s) \Rightarrow !A(s)} \text{WL}}{s = t, !A(s) \Rightarrow !A(t)} =$$

دا به د یو شان څیزونو د تعویض د اصل یا د لایښځ د قانون په نامه اشنا وي۔
 LK ثابتوي چې = متناظره او انتقالي ده:

$$\frac{\frac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1} \text{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1} = \frac{\frac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2} \text{WL}}{\frac{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3} \text{XL}}$$

په کین اشتقاق کښې فارمول $x = t_1$ زموږ $!A(x)$ دے۔ په بڼې اړخ کښې $!A(x)$ د $t_1 = x$ په توګه اخلو۔

تمرین 9.42. د لاندې سپکوښتونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$\Rightarrow \forall x \forall y ((x = y \wedge !A(x)) \rightarrow !A(y)) \quad 1.$$

$$\exists x !A(x) \wedge \forall y \forall z ((!A(y) \wedge !A(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x (!A(x) \wedge \forall y (!A(y) \rightarrow y = x)) \quad 2.$$

9.14 له عینیت سره سموالے

قضیه 9.43. LK د عینیت له لومړنيو سپکوښتونو او قاعدو سره سم دے۔

ثبوت. د $t = t \Rightarrow$ په بڼه لومړني سپکوښتونه معتبر دي؛ ځکه د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \models t = t$ (پام وکړئ، فرض کوو چې اصطلاح t ترې ده، یعنې هېڅ متغیر نه لري، نو متغیر-ټاکنې اهمیت نه لري)۔

فرض کړئ په اشتقاق کښې وروستۍ استنتاج = دے۔ بیا مقدمه $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, !A(t_1)$ او پایله $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, !A(t_2)$ ده۔ یو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کښې ونیسئ۔ باید وښو چې پایله معتبره ده؛ یعنې که $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ او $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، نو یا د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models !A(t_2)$ یا $\mathcal{M} \models !A(t_1)$ دے۔

د استقرا د فرضیې له مخې مقدمه معتبره ده۔ د دې معنی دا ده چې که $\mathcal{M} \models \Gamma$ او $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ وي، نو یا (الف) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models !A(t_1)$ یا (ب) $\mathcal{M} \models !A(t_2)$ دے۔ په (الف) حالت کښې کار بشپړ دے۔ (ب) حالت وګورئ۔ داسې متغیر-ټاکنه s ونیسئ چې $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$ د 16.20 له مخې $\mathcal{M}, s \models !A(t_1)$ ځکه $s \sim_x s$ ، د 16.30 له مخې $\mathcal{M}, s \models !A(x)$ ځکه $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ ، نو $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ ، او له دې امله $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ د 16.30 په بیا پلي کولو $\mathcal{M}, s \models !A(t_2)$ هم لرو۔ د 16.20 له مخې $\mathcal{M} \models !A(t_2)$ ۔
 $\square$

باب 10

فطري استنتاج

اداري يادونه - دا څپرک د گڼتخن/پراوځ په طريقه د فطري استنتاج يو نظام وړاندې کوي -
د ثبوت د يوه نظام په توگه له فطري استنتاج سره اړوند مواد د شاملولو يا ايستلو دپاره د prfND ټک وکاروئ -

10.1 قاعدې او اشتقاقونه

د فطري استنتاج له نظامونو څخه موخه دا ده چې په رياضيکي ثبوت کېنې له کارېدونکي غير رسمي استدلال سره نژدې موازي وي (همدا وجه ده چې تر يوه حده "فطري" دے) - د فطري استنتاج ثبوتونه له فرضيو پېلېږي - بيا د استنتاج قاعدې وړباندې کارول کېږي - فرضيې $\text{Intro} \rightarrow$ ، $\text{Intro} \rightarrow$ ، $\text{Elim} \vee$ او $\text{Elim} \exists$ د استنتاج د قاعدو په وسيله "ايستل" کېږي، او د روښانتيا دپاره د ايستل شوې فرضيې لښان د استنتاج تر څنګ ليکل کېږي -

تعريف 10.1 (فرضيه). يوه فرضيه هره هغه ترلے فارمول ده چې د هرې ځانګې په ترټولو پورتي ځاے کېنې وي -

په فطري استنتاج کېنې اشتقاقونه د ترلي فارمولونه ځانګړې ونې دي، ترټولو پورتي ترلي فارمولونه فرضيې وي، او که يوه ترلے فارمول تر يوې، دوو يا دريو نورو جملو لاندې وي، بايد په سمه توګه د استنتاج له يوې قاعدې څخه پايله شي - د استنتاج په سر کېنې ترلي فارمولونه د هغې مقدمې او لاندې ترلے فارمول د استنتاج پايله بلل کېږي - قاعدې په جوړو کېنې راځي: د هر منطقي عملګر دپاره يوه د داخلولو او يوه د ايستلو قاعده - دوی په پايله کېنې منطقي عملګر داخلوي يا منطقي عملګر د قاعدې له يوې مقدمې څخه باسي - ځينې قاعدې اجازه ورکوي چې د يوه ټاکلي ډول فرضيه ايستل شي - د دې د ښودلو دپاره چې کومه فرضيه د کوم استنتاج په وسيله ايستل کېږي، فرضيې او استنتاج دواړو ته لښانونه ورکوي - دا د فرضيې په $[A]^n$ لیکلو ښودل کېږي - د ژباړې د نسخې سمون: (OLND-001) سرچينه په دې ونه کېنې لاندې ولاړ توکي "سېکوېنټونه" بولي؛ دلته "جملې" راوړل شوې، ځکه خپله سرچينه ونه د جملو ونه تعريفوي او قاعدې پر جملو لګېږي -

دا دود دے چې د ټولو منطقي عملګرونه $\wedge$ ، $\vee$ ، $\rightarrow$ ، $\neg$ او $\perp$ دپاره قاعدې په پام کېنې ونيول شي، که څه هم ځينې ئې تعريف شوي وي -

10.2 قضیې قاعدې

10.2.1 د $\wedge$ دپاره قاعدې

$$\wedge\text{Elim} \frac{!A \wedge !B}{!A}$$

$$\wedge\text{Elim} \frac{!A \wedge !B}{!B}$$

$$\wedge\text{Intro} \frac{!B \quad !A}{!A \wedge !B}$$

10.2.2 د $\vee$ دپاره قاعدې

$$\vee\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} [!B]^n \\ \vdots \\ !C \end{array} \quad \begin{array}{c} [!A]^n \\ \vdots \\ !C \end{array} \quad !A \vee !B}{!C} n$$

$$\vee\text{Intro} \frac{!A}{!A \vee !B}$$

$$\vee\text{Intro} \frac{!B}{!A \vee !B}$$

10.2.3 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{!A \quad !A \rightarrow !B}{!B}$$

$$\rightarrow\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} [!A]^n \\ \vdots \\ !B \end{array}}{!A \rightarrow !B} n$$

10.2.4 د $\neg$ دپاره قاعدې

$$\neg\text{Elim} \frac{!A \quad \neg !A}{\perp}$$

$$\neg\text{Intro} \frac{\begin{array}{c} [!A]^n \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{\neg !A} n$$

10.2.5 د $\perp$ دپاره قاعدې

$$\perp_C \frac{\begin{array}{c} [\neg !A]^n \\ \vdots \\ \perp \end{array}}{!A} n$$

$$\perp_I \frac{}{!A}$$

پام وکړئ چې $\neg\text{Intro}$ او $\perp_C$ ډېر سره ورته دي: توپیر دا دے چې $\neg\text{Intro}$ یوه نفي شوې ترلے فارمول $\neg !A$ راوباسي، خو $\perp_C$ یوه مثبت ترلے فارمول $!A$ راوباسي.

کله چې یوه قاعده ښيي چې کومه فرضیه ایستل کېدے شي، موږ دا اجازه بولو، شرط ئې نه بولو. مثلاً د $\rightarrow\text{Intro}$ په قاعده کېنې د مقدمې $!B$ په اشتقاق کېنې د $!A$ په بڼه هر شمېر فرضيې ایستلے شو، چې صفر هم پکې شامل دے.

10.3 د سورونو قاعدې

10.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې

$$\forall\text{Intro} \frac{!A(a)}{\forall x !A(x)} \quad \forall\text{Elim} \frac{\forall x !A(x)}{!A(t)}$$

د $\forall$ په قاعدو کېنې t یوه تړلې اصطلاح ده (یعنې داسې اصطلاح چې هېڅ متغیر نه لري)، او a داسې ثابت سمبول دے چې په پایله $\forall x !A(x)$ یا په هرې هغې فرضيې کېنې نه راځي چې د مقدمې $!A(a)$ په پای ته رسېدونکي اشتقاق کېنې نه ایستل شوې پاتې وي. موږ a د $\forall\text{Intro}$ استنتاج ځانګړې متغیر بولو-¹

10.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$$\exists\text{Intro} \frac{!A(t)}{\exists x !A(x)} \quad \exists\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} n[!A(a)] \\ \vdots \\ !C \end{array} \quad \frac{\exists x !A(x)}{!C} n}{!C}$$

بیا هم، t یوه تړلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې په مقدمه $\exists x !A(x)$ ، پایله $!C$ ، یا په هرې هغې فرضيې کېنې نه راځي چې د دواړو مقدمو په پای ته رسېدونکو اشتقاقونه کېنې نه ایستل شوې پاتې وي (د $!A(a)$ فرضیو پرته). موږ a د $\exists\text{Elim}$ استنتاج ځانګړې متغیر بولو.

هغه شرط چې په $\forall\text{Intro}$ یا $\exists\text{Elim}$ استنتاج کېنې ځانګړې متغیر په پایله یا په هرې هغې فرضيې کېنې نه راځي چې مقدمو ته په رسېدونکو اشتقاقونه کېنې نه ایستل شوې وي، او د په وجودي مقدمه کېنې هم نه راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي. د ژباړې د نسخې سمون (OLND-002) سرچینه په دې عمومي جمله کېنې وايي چې ځانګړې متغیر په “مقدمو” کېنې نه راځي، خو د دواړو قاعدو مرستندویه مقدمه همدا ځانګړې ثابت لري؛ دلته د سرچینې له مخکېنې کره شرطونو سره سم پایله، نه ایستل شوې فرضيې او د وجود ایستلو وجودي مقدمه ټاکل شوې دي.

هغه دود ریاډ کړی چې کله $!A$ داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، نو دا په $!A(x)$ لیکلو نښو. په همدې چوکاټ کېنې بیا $!A(t)$ د $!A[t/x]$ لنډون دے. نو د $\exists\text{Intro}$ قاعده داسې هم لیکل شو:

$$\frac{!A[t/x]}{\exists x !A} \exists\text{Intro}$$

پام وکړئ چې t کېدے شي له مخکېنې په $!A$ کېنې راغلې وي؛ مثلاً $!A$ کېدے شي $P(t, x)$ وي. له دې امله، له $P(t, t)$ څخه $\exists x P(t, x)$ استنتاجول د $\exists\text{Intro}$ سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t یوه یا زیاتې پېښې په تړلي متغیر x بدلولے “شي، او اړینه نه ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ. خو د $\forall\text{Intro}$ او $\exists\text{Elim}$ د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په $!A$ کېنې نه راځي. نو د $\forall\text{Intro}$ په کارولو سره له $P(a, a)$ څخه $\forall x P(a, x)$ په سمه توګه نه شي استنتاجولے.

په $\exists\text{Intro}$ او $\forall\text{Elim}$ کېنې له ترتیا پرته بل بنديز نشته، او اصطلاح t هره تړلې اصطلاح کېدے شي؛ نو د بل شرط اندېښنه نه شته. بل لوري ته، د $\exists\text{Elim}$ او $\forall\text{Intro}$ په قاعدو کېنې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پایله یا کومې نه ایستل شوې فرضيې کېنې هېڅ ځای نه راځي. دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے؛ یعنې نظام له هغو نه ایستل شوې فرضیو څخه یوازې هغه تړلي فارمولونه اشتقاق کړي چې ترې معنایي پایله کېږي. له دې شرط پرته لاندې به روا و:

¹ موږ د “ځانګړي متغیر” اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتني قاعده کېنې a یو ثابت دے. دا نوم تاریخي لاملونه لري.

$$\frac{\frac{[!A(a)]^1}{\forall x !A(x)} * \forall \text{Intro}}{\exists x !A(x)} \exists \text{Elim}$$

خو $\exists x !A(x) \not\models \forall x !A(x)$.

ځکه چې د سورونو د ایستلو قاعدې د متغیرونه پر ځای یوازې د تړلو اصطلاحاتو ایښوولو اجازه ورکوي، نو هره هغه فارمول چې د تړلي فارمولونه له یوه سټ څخه وایستل شي، پخپله ترلې فارمول ده.

10.4 اشتقاقونه

موږ وویل چې فرضیه څه ده او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. په فطري استنتاج کېني اشتقاقونه له دغو څخه په استقرایي ډول جوړېږي: هر اشتقاق یا یوازې یوه فرضیه وي، یا له یو، دوو یا دریو اشتقاقونه او ورپسې له یوه سم استنتاج څخه جوړ وي.

تعریف 10.2 (اشتقاق). له فرضیو Γ څخه د ترلې فارمول A یو اشتقاق د تړلي فارمولونه یوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو پورتنۍ تړلي فارمولونه یا په Γ کېني وي یا په ونه کېني د یوه استنتاج په وسیله ایستل شوي وي.

2. د ونې تر ټولو لاندې ترلې فارمول A ده.

3. په ونه کېني هره ترلې فارمول، پرته له لاندېنۍ جملې A څخه، د استنتاج د یوې قاعدې د سې کارونې مقدمه وي چې پایله یې په ونه کېني نېغ د هغې ترلې فارمول لاندې ولاره وي.

بیا وایو چې A ! د اشتقاق پایله او Γ یې نه ایستل شوې فرضیې دي.

که له Γ څخه د A ! کوم اشتقاق وي، وایو چې A ! له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، یا په ښو کېني: $\Gamma \vdash A$. که د A ! داسې اشتقاق وي چې هره فرضیه پکې ایستل شوې وي، نو $\vdash A$ لیکو.

بېلګه 10.3. هره فرضیه په یوازې ځان اشتقاق ده. نو مثلاً A ! په یوازې ځان اشتقاق دے او B ! هم په یوازې ځان همداسې دے. له دغو څخه د، مثلاً، $\wedge \text{Intro}$ قاعدې په کارولو یو نوے اشتقاق اخستلے شو:

$$\frac{!A \quad !B}{!A \wedge !B} \wedge \text{Intro}$$

دا قاعدې عامې دي: پکې A ! او B ! په هر ډول تړلي فارمولونه، مثلاً په C ! او D ! بدلولے شو. بیا به پایله $C \wedge D$! وي، نو

$$\frac{!C \quad !D}{!C \wedge !D} \wedge \text{Intro}$$

یو سم اشتقاق دے. البته فرضیې سره اړولے هم شو، خو D ! د A ! او C ! د B ! ونډه واخلي. له دې امله

$$\frac{!D \quad !C}{!D \wedge !C} \wedge \text{Intro}$$

هم یو سم اشتقاق دے.

اوس بله قاعده، مثلاً $\rightarrow \text{Intro}$ ، کارولے شو. دا اجازه راکوي چې یو شرطی قضیه پایله کړو او هره هغه فرضیه ایستل کړو چې له دغه شرطی قضیې له مقدم سره یو شان وي. نو لاندې دواړه سم اشتقاقونه دي:

$$1 \frac{\frac{[!C]^1 \quad !D}{!C \wedge !D} \wedge \text{Intro}}{!C \rightarrow (!C \wedge !D)} \rightarrow \text{Intro} \quad 1 \frac{\frac{!C \quad [!D]^1}{!C \wedge !D} \wedge \text{Intro}}{!D \rightarrow (!C \wedge !D)} \rightarrow \text{Intro}$$

دوئ په ترتیب سره ښيي چې $!D \vdash C \rightarrow (!C \wedge !D)$ او $!C \vdash D \rightarrow (!C \wedge !D)$.

رایاد کړئ چې د فرضیو ایستل اجازه ده، شرط نه دے: لازم نه ده چې فرضیې وباسو. په ځانګړي ډول، یوه قاعده هله هم کارولې شو چې فرضیې په اشتقاق کېنې موجودې نه وي. مثلاً لاندې اشتقاق روا دے، که څه هم د ایستل کېدو دپاره هېڅ فرضیه A نه شته:

$$1 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}$$

10.5 د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 10.4. رائجې چې د ترلے فارمول $!A \rightarrow (!A \wedge !B)$ یو اشتقاق ورکړو.

په پیل کېنې مطلوبه پایله د اشتقاق په لاندې برخه کېنې لیکو.

$$\overline{(!A \wedge !B) \rightarrow !A}$$

اوس باید معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج پایله د دې ښې ترلے فارمول کېدے شي. د پایلې اصلي عملګر $\rightarrow$ دے، نو هڅه کوو چې $\rightarrow \text{Intro}$ قاعدې په کارولو پایلې ته ورسېږو. غوره ده چې اړوندې فرضیې ولیکو او د پرمختګ پر مهال د استنتاج قاعدو ته نښانونه ورکړو، څو د ثبوت په پای کېنې په اسانۍ وویو چې ټولې فرضیې ایستل شوې دي که نه.

$$\begin{array}{c} [!A \wedge !B]^1 \\ \vdots \\ !A \\ 1 \frac{!A}{(!A \wedge !B) \rightarrow !A} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

اوس باید له فرضیې $!A \wedge !B$ څخه تر $!A$ پورې پړاوونه ډک کړو. ځکه چې یوازې له یوه رابط $\wedge$ سره کار لرو، باید د $\wedge$ د ایستلو قاعده وکاروو. له دې څخه لاندې ثبوت لاس ته راځي:

$$1 \frac{\frac{[!A \wedge !B]^1}{!A} \wedge \text{Elim}}{(!A \wedge !B) \rightarrow !A} \rightarrow \text{Intro}$$

اوس د $!A \rightarrow (!A \wedge !B)$ یو سم اشتقاق لرو.

بېلګه 10.5. اوس رائجې چې د $(!A \rightarrow !B) \rightarrow (!A \vee !B)$ یو اشتقاق ورکړو.

په پیل کېنې مطلوبه پایله د اشتقاق په لاندې برخه کېنې لیکو.

$$\overline{(!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)}$$

د هغې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا پایله راکولې شي، په پایله کېنې منطقي رابطونو $\neg$ ، $\vee$ او $\rightarrow$ ته ګورو. اوس یوازې د $\rightarrow$ لومړۍ پېښه راته مهمه ده، ځکه همدا د وروستۍ پایلې د ترلے فارمول اصلي عملګر دے، $\neg$ ، $\vee$ او د $\rightarrow$ دویمه پېښه د بل رابط په ساحه کېنې دي، نو وروسته به ئې وڅېړو. له دې امله د $\rightarrow \text{Intro}$ له قاعدې پیل کوو. سمه کارونه ئې باید داسې وي: د ژباړې د نسخې سمون (OLND-004) سرچینه دلته د فطري استنتاج وروستۍ جمله “په وروستي سېکونټ کېنې” بولي؛ دلته “وروستۍ پایله” راورل شوې، ځکه دا ونه د جملو ثبوت دے او سېکونټ نه لري.

$$\begin{array}{c}
 [\neg!A \vee !B]^1 \\
 \vdots \\
 1 \frac{!A \rightarrow !B}{(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)} \rightarrow \text{Intro}
 \end{array}$$

له دې وروسته د دوام دوه لارې لرو. یا له لاندې څخه پورته کار روان ساتلې او د $\rightarrow$ Intro بله کارونه لټولې شو، یا له پاسه لاندې کار کولې او د $\vee$ Elim قاعده کارولې شو. دویمه لار اخلو. فرضیه $\neg!A \vee !B$ د $\vee$ Elim د تر ټولو کینې مقدمې په توګه کاروو. د $\vee$ Elim د سې کارونې دپاره نورې دوه مقدمې باید له پایلې $!A \rightarrow !B$ سره یو شان وي، خو هره یوه په خپل وار له بلې فرضیې، یعنې د $\neg!A \vee !B$ له دوو بېلګونو څخه له یوه، راپستل کېدې شي. نو اشتقاق به داسې وي:

$$\begin{array}{c}
 [\neg!A]^2 \quad [!B]^2 \\
 \vdots \quad \vdots \\
 2 \frac{[\neg!A \vee !B]^1 \quad !A \rightarrow !B \quad !A \rightarrow !B}{!A \rightarrow !B} \vee \text{Elim} \\
 1 \frac{!A \rightarrow !B}{(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)} \rightarrow \text{Intro}
 \end{array}$$

په بڼې لوري دواړو څانګو کینې غواړو $!A \rightarrow !B$ اشتقاق کړو، غوره لارې د $\rightarrow$ Intro کارول دي.

$$\begin{array}{c}
 [\neg!A]^2, [!A]^3 \quad [!B]^2, [!A]^4 \\
 \vdots \quad \vdots \\
 2 \frac{[\neg!A \vee !B]^1 \quad 3 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \quad 4 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}}{!A \rightarrow !B} \vee \text{Elim} \\
 1 \frac{!A \rightarrow !B}{(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)} \rightarrow \text{Intro}
 \end{array}$$

د اشتقاق په دوو تشو برخو کینې له $\neg!A$ او $!A$ څخه، او له $!A$ او $!B$ څخه، د $!B$ اشتقاقونه غواړو. لومړۍ برخه اخلو. $\neg!A$ او $!A$ د $\neg$ Elim دوه مقدمې دي:

$$\begin{array}{c}
 [\neg!A]^2 \quad [!A]^3 \\
 \vdots \\
 \perp \\
 \vdots \\
 !B
 \end{array}
 \neg \text{Elim}$$

د $\perp$ په کارولو $!B$ د پایلې په توګه اخستلې او څانګه بشپړولې شو.

$$\begin{array}{c}
 [!B]^2, [!A]^4 \\
 \vdots \\
 2 \frac{[\neg!A \vee !B]^1 \quad 3 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \quad 4 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}}{!A \rightarrow !B} \vee \text{Elim} \\
 1 \frac{!A \rightarrow !B}{(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)} \rightarrow \text{Intro}
 \end{array}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLND-003) سرچینه په دې بشپړه ونه کینې له نفې شوې مقدمې او مثبتې مقدمې څخه کاږي. ته استنتاج کاږي. د داخلولو په نښان بڼې؛ د مخکینې جزوي ونې او ټاکلې قاعدې سره سم دلته د نفې ایستلو نښان راوړل شوی دی.

اوس تر ټولو بڼې څانګې ته کورو. دلته باید پوه شو چې د اشتقاق تعریف د فرضیو ایستل روا بولي خو لازمي ئې نه بولي. په بله وینا، که له فرضیو $!A$ او $!B$ څخه د یوې په کارولو $!B$ راوباسو او بله ونه کاروو، دا روا ده. له $!B$ څخه د $!B$ اشتقاق کول څرګند دي: $!B$ په یوازې ځان داسې اشتقاق دی او هېڅ استنتاج نه غواړي. نو فرضیه $!A$ ساده رنګولې شو.

پام وکړی چې په بشپړ اشتقاق کې د تر ټولو ښې اړخ Intro → استنتاج په حقیقت کې هېڅ فرضیه نه باسي -

$$\begin{array}{c} [\neg(!A \vee \neg!A)]^1 \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{}{!A \vee \neg!A} \perp_C \end{array}$$
$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(!A \vee \neg!A)]^1 \\ \vdots \\ \neg!A \end{array} \quad \begin{array}{c} [\neg(!A \vee \neg!A)]^1 \\ \vdots \\ !A \end{array}}{1 \quad \frac{\perp}{!A \vee \neg!A} \quad \perp_C} \neg\text{Elim}$$
$$\frac{\begin{array}{c} [\neg(!A \vee \neg!A)]^1, [!A]^2 \\ \vdots \\ 2 \frac{\perp}{\neg!A} \neg\text{Intro} \end{array} \quad \begin{array}{c} [\neg(!A \vee \neg!A)]^1 \\ \vdots \\ !A \end{array} \neg\text{Elim}}{1 \frac{\perp}{!A \vee \neg!A} \perp_C} \neg\text{Elim}$$
$$\begin{array}{c}
\frac{[\neg(!A \vee \neg!A)]^1}{\frac{2 \frac{\perp}{\neg!A} \neg\text{Intro}}{1 \frac{\perp}{!A \vee \neg!A} \perp_C} \neg\text{Elim} \quad \frac{[!A]^2}{!A \vee \neg!A} \vee\text{Intro} \quad \frac{[\neg(!A \vee \neg!A)]^1}{\vdots} \neg\text{Elim} \\
\vdots \\
!A
\end{array}$$

119

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{[\neg(!A \vee \neg!A)]^1}{\neg!A} \neg\text{Intro} \quad \frac{[\neg!A]^2}{!A \vee \neg!A} \vee\text{Intro} \quad \frac{[\neg(!A \vee \neg!A)]^1}{\neg!A} \neg\text{Elim} \quad \frac{[\neg!A]^3}{!A \vee \neg!A} \vee\text{Intro} \quad \frac{[\neg(!A \vee \neg!A)]^1}{\neg!A} \neg\text{Elim}}{1 \frac{\perp}{!A \vee \neg!A} \perp_C}
\end{array}$$

تمرین 10.7. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې ونښي:

$$1. !A \wedge (!B \wedge !C) \vdash (!A \wedge !B) \wedge !C$$

$$2. !A \vee (!B \vee !C) \vdash (!A \vee !B) \vee !C$$

$$3. !A \rightarrow (!B \rightarrow !C) \vdash !B \rightarrow (!A \rightarrow !C)$$

$$4. !A \vdash \neg\neg!A$$

تمرین 10.8. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې ونښي:

$$1. (!A \vee !B) \rightarrow !C \vdash !A \rightarrow !C$$

$$2. (!A \rightarrow !C) \wedge (!B \rightarrow !C) \vdash (!A \vee !B) \rightarrow !C$$

$$3. \vdash \neg(!A \wedge \neg!A)$$

$$4. !B \rightarrow !A \vdash \neg!A \rightarrow \neg!B$$

$$5. \vdash (!A \rightarrow \neg!A) \rightarrow \neg!A$$

$$6. \vdash \neg(!A \rightarrow !B) \rightarrow \neg!B$$

$$7. !A \rightarrow !C \vdash \neg(!A \wedge \neg!C)$$

$$8. !A \wedge \neg!C \vdash \neg(!A \rightarrow !C)$$

$$9. !A \vee !B, \neg!B \vdash !A$$

$$10. \neg!A \vee \neg!B \vdash \neg(!A \wedge !B)$$

$$11. \vdash (\neg!A \wedge \neg!B) \rightarrow \neg(!A \vee !B)$$

$$12. \vdash \neg(!A \vee !B) \rightarrow (\neg!A \wedge \neg!B)$$

تمرین 10.9. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې ونښي:

$$1. \neg(!A \rightarrow !B) \vdash !A$$

$$2. \neg(!A \wedge !B) \vdash \neg!A \vee \neg!B$$

$$3. !A \rightarrow !B \vdash \neg!A \vee !B$$

$$4. \vdash \neg\neg!A \rightarrow !A$$

$$5. !A \rightarrow !B, \neg!A \rightarrow !B \vdash !B$$

$$6. (!A \wedge !B) \rightarrow !C \vdash (!A \rightarrow !C) \vee (!B \rightarrow !C)$$

$$7. (!A \rightarrow !B) \rightarrow !A \vdash !A$$

$$8. \vdash (!A \rightarrow !B) \vee (!B \rightarrow !C)$$

(دا ټول د $\perp_C$ قاعده غواړي-)

10.6 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلگه 10.10. له سورونو سره د کار پر مهال باید ډاډ واخلو چې د ځانګړي متغیر شرط نه ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځینو استنتاجونو د عملي کولو ترتیب بدلول را بدلول غواړي. په عمومي توګه کوي چې لومړۍ د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانګړي متغیر شرط ورباندې لګېږي (په بشپړ ثبوت کېنې به دوی لاندې راځي)۔

راځئ وګورو چې د فارمول $\exists x \neg!A(x) \rightarrow \neg\forall x!A(x)$ یو اشتقاق څنګه ورکوو۔ د معمول په شان داسې پیل کوو:

$$\overline{\exists x \neg!A(x) \rightarrow \neg\forall x!A(x)}$$

لومړۍ لیکو چې د $\rightarrow$ Intro د قاعدې په وسیله د وروستي پړاو د توجیه کولو دپاره څه پکار دي۔

$$\begin{array}{c} [\exists x \neg!A(x)]^1 \\ \vdots \\ \neg\forall x!A(x) \\ 1 \frac{}{\exists x \neg!A(x) \rightarrow \neg\forall x!A(x)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

ځکه پر $\neg\forall x!A(x)$ د کارولو دپاره څرګنده قاعده نه شته، اشتقاق داسې برابرو چې د $\exists$ Elim قاعده وکارولې شو۔ دلته باید د ځانګړي متغیر شرط ته پام وکړو او داسې ثابت وټاکو چې په $\exists x!A(x)$ یا د هغې په هرې اړوندې فرضيې کېنې نه راځي۔ (خو ځکه چې هېڅ ثابت سمبولونه نه دي راغلي، هر انتخاب سم دے۔)

$$\begin{array}{c} [\neg!A(a)]^2 \\ \vdots \\ 2 \frac{[\exists x \neg!A(x)]^1 \quad \neg\forall x!A(x)}{\neg\forall x!A(x)} \exists \text{Elim} \\ 1 \frac{}{\exists x \neg!A(x) \rightarrow \neg\forall x!A(x)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

د $\neg\forall x!A(x)$ د رالاستلو دپاره د $\neg$ Intro قاعده کارول غواړو: دا غواړي چې یو تناقض راوباسو، او کېدے شي $\forall x!A(x)$ د یوې اضافي فرضيې په توګه وکاروو۔ البته په دې تناقض کېنې هغه فرضیه $\neg!A(a)$ هم راتلے شي چې د $\exists$ Elim استنتاج به ئې وباسي۔ داسې ئې برابروو:

$$\begin{array}{c} [\neg!A(a)]^2, [\forall x!A(x)]^3 \\ \vdots \\ \perp \\ 3 \frac{}{\neg\forall x!A(x)} \neg \text{Intro} \\ 2 \frac{[\exists x \neg!A(x)]^1 \quad \neg\forall x!A(x)}{\neg\forall x!A(x)} \exists \text{Elim} \\ 1 \frac{}{\exists x \neg!A(x) \rightarrow \neg\forall x!A(x)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

داسې ښکاري چې تناقض ته نژدې یو۔ تر ټولو اسانه قاعده $\forall$ Elim ده چې د ځانګړي متغیر هېڅ شرط نه لري۔ ځکه د عمومي سور لرونکي x پر ځای هره ترې اصطلاح کارولې شو، ښه ده چې هماغه a وکاروو څو تناقض ته ورسېږو۔

$$\begin{array}{c} [\forall x!A(x)]^3 \\ \vdots \\ \forall \text{Elim} \\ [\neg!A(a)]^2 \quad !A(a) \\ \neg \text{Elim} \\ 3 \frac{}{\neg\forall x!A(x)} \neg \text{Intro} \\ 2 \frac{[\exists x \neg!A(x)]^1 \quad \neg\forall x!A(x)}{\neg\forall x!A(x)} \exists \text{Elim} \\ 1 \frac{}{\exists x \neg!A(x) \rightarrow \neg\forall x!A(x)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

په ځانګړي ډول له سورونو سره د کار پر مهال اوس دا بیا ګل مهم دي چې د ځانګړي متغیر شرط نه دے مات شوے۔ دلته دغه شرط یوازې پر $\exists\text{Elim}$ لګېده، او ځانګړې متغیر a په هغو فرضیو کېنې نه راځي چې استنتاج ورپورې تر لے دے؛ نو دا سم اشتقاق دے۔

بېلګه 10.11. کله کله له نورو فارمولونه څخه فارمول رابستلے شو۔ په دغو حالتونو کېنې کېدے شي نه ایستل شوې فرضیې ولرو۔ د خپلې وروستۍ موخې تر څنګ د فرضیو حساب ساتل هم مهم دي۔

راځئ وګورو چې له فرضیو $\exists x (!A(x) \wedge !B(x))$ او $\forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b))$ څخه د فارمول $\exists x !C(x, b)$ یو اشتقاق څنګه ورکړو۔ د معمول په شان پایله لاندې لیکو۔

$$\overline{\exists x !C(x, b)}$$

د کار دپاره دوه مقدمې لرو۔ د لومړۍ د کارولو، یعنې له $\exists x (!A(x) \wedge !B(x))$ څخه د $\exists x !C(x, b)$ د اشتقاق موندلو دپاره به د $\exists\text{Elim}$ قاعده کاروو۔ ځکه د ځانګړي متغیر شرط لري، دا قاعده لومړۍ کاروو۔ لاندې لاس ته راځي:

$$\begin{array}{c} [!A(a) \wedge !B(a)]^1 \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (!A(x) \wedge !B(x)) \quad \exists x !C(x, b)}{\exists x !C(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

هغه دوه فرضیې چې ورسره کار کوو، B شریکوي۔ بنیایي اوس د $\wedge\text{Elim}$ په کارولو د $B(a)$ بېلول ګټور وي۔

$$\begin{array}{c} \frac{[!A(a) \wedge !B(a)]^1}{!B(a)} \wedge\text{Elim} \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (!A(x) \wedge !B(x)) \quad \exists x !C(x, b)}{\exists x !C(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

د کار دپاره دویمه فرضیه $\forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b))$ ده۔ ځکه د ځانګړي متغیر شرط نه لري، د $\forall\text{Elim}$ په کارولو د ثابت سمبول a په وسیله x بېلګه کولے او $!B(a) \rightarrow !C(a, b)$ اخستلے شو۔ اوس $!B(a) \rightarrow !C(a, b)$ او $!B(a)$ دواړه لرو۔ بل ګام باید د $\rightarrow\text{Elim}$ نېغه کارونه وي۔

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{\forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b))}{!B(a) \rightarrow !C(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[!A(a) \wedge !B(a)]^1}{!B(a)} \wedge\text{Elim}}{!C(a, b)} \rightarrow\text{Elim} \\ \vdots \\ 1 \frac{\exists x (!A(x) \wedge !B(x)) \quad \exists x !C(x, b)}{\exists x !C(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

موخې ته ډېر نژدې یو! د $\exists\text{Intro}$ یوه کارونه موخې ته مرسوي۔

$$\begin{array}{c} \frac{\frac{\forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b))}{!B(a) \rightarrow !C(a, b)} \forall\text{Elim} \quad \frac{[!A(a) \wedge !B(a)]^1}{!B(a)} \wedge\text{Elim}}{!C(a, b)} \rightarrow\text{Elim} \\ \frac{\frac{\exists x (!A(x) \wedge !B(x)) \quad \frac{!C(a, b)}{\exists x !C(x, b)} \exists\text{Intro}}{\exists x !C(x, b)} \exists\text{Elim} \end{array}$$

څکه په هر پړاو کېنې مو ډاډ اخستې چې د ځانګړي متغیر شرطونه نه دي مات شوي، باور کولې شو چې دا سم اشتقاق دے۔

بېلګه 10.12. له فرضیو $\forall x!A(x) \rightarrow \exists y!B(y)$ او $\neg \exists y!B(y)$ څخه د فارمول $\neg \forall x!A(x)$ یو اشتقاق ورکړئ۔ د معمول په شان موخې فارمول لاندې لیکو۔

$$\overline{\neg \forall x!A(x)}$$

د اشتقاق وروستی کرښه نفي ده، نو $\neg$ Intro کارول غواړو۔ دا غواړي چې معلومه کړو تناقض څنګه اشتقاق کړو۔

$$\begin{array}{c} [\forall x!A(x)]^1 \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{}{\neg \forall x!A(x)} \neg\text{Intro} \end{array}$$

تر دې ځایه ښه یو۔ $\forall$ Elim کارولې شو، خو څرګنده نه ده چې موخې ته به مو ورسوي۔ پر ځای یې خپله یوه فرضیه کاروو۔ $\forall x!A(x) \rightarrow \exists y!B(y)$ له $\forall x!A(x)$ سره د $\rightarrow$ Elim قاعدې کارول راګوي۔

$$\begin{array}{c} \frac{\forall x!A(x) \rightarrow \exists y!B(y) \quad [\forall x!A(x)]^1}{\exists y!B(y)} \rightarrow\text{Elim} \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \frac{}{\neg \forall x!A(x)} \neg\text{Intro} \end{array}$$

اوس د کار دپاره یوه وروستی فرضیه لرو، او ښکاري چې د $\neg$ Elim په کارولو تناقض ته مو رسولې شي۔

$$\begin{array}{c} \frac{\neg \exists y!B(y) \quad \frac{\forall x!A(x) \rightarrow \exists y!B(y) \quad [\forall x!A(x)]^1}{\exists y!B(y)} \rightarrow\text{Elim}}{\perp} \neg\text{Elim} \\ 1 \frac{}{\neg \forall x!A(x)} \neg\text{Intro} \end{array}$$

تمرین 10.13. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\vdash (\forall x!A(x) \wedge \forall y!B(y)) \rightarrow \forall z (!A(z) \wedge !B(z))$
2. $\vdash (\exists x!A(x) \vee \exists y!B(y)) \rightarrow \exists z (!A(z) \vee !B(z))$
3. $\forall x (!A(x) \rightarrow !B) \vdash \exists y !A(y) \rightarrow !B$
4. $\forall x \neg !A(x) \vdash \neg \exists x !A(x)$
5. $\vdash \neg \exists x !A(x) \rightarrow \forall x \neg !A(x)$
6. $\vdash \neg \exists x \forall y ((!A(x, y) \rightarrow \neg !A(y, y)) \wedge (\neg !A(y, y) \rightarrow !A(x, y)))$

تمرین 10.14. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\vdash \neg \forall x !A(x) \rightarrow \exists x \neg !A(x)$
2. $(\forall x !A(x) \rightarrow !B) \vdash \exists y (!A(y) \rightarrow !B)$
3. $\vdash \exists x (!A(x) \rightarrow \forall y !A(y))$

(دا ټول د $\perp_C$ قاعده غواړي۔)

10.7 ثبوت-تیوریکي مفاهیم

اداري یادونه. دا برخه د فطري استنتاج د اثبات‌پذیری اړیکې او سازګاری تعریفونه راټولوي.

لکه څنګه چې موږ یو شمېر مهم معنایي مفاهیم (اعتبار، معنایي استلزام، د صدق وړتیا) تعریف کړل، اوس ورسره سم ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو. دا مفاهیم په جوړښتونه کېنې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له لارې نه، بلکې له نورو څخه د ځینو ترلي فارمولونه د د اشتقاق وړتیا یا د اشتقاق نه وړتیا له لارې تعریفېږي. دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیې دي.

تعریف 10.15 (قضیې). یوه ترلې فارمول A هله قضیه ده چې په فطري استنتاج کېنې د A داسې اشتقاق وي چې ټولې فرضیې پکې ایستل شوې وي. که A قضیه وي، $A \vdash$ لیکو، او که نه وي $A \nvdash$ لیکو.

تعریف 10.16 (د اشتقاق وړتیا). ترلې فارمول A د ترلي فارمولونه له سب Γ څخه، $\Gamma \vdash A$ ، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې اشتقاق وي چې پایله A وي او هره فرضیه پکې یا ایستل شوې وي یا په Γ کېنې وي. که A له Γ څخه د اشتقاق وړ نه وي، $\Gamma \nvdash A$ لیکو.

تعریف 10.17 (سازګاري). د ترلي فارمولونه یو سب Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې $\Gamma \vdash \perp$ وي. که Γ ناسازګار نه وي، یعنې $\Gamma \nvdash \perp$ وي، نو سازګار ئې بولو.

قضیه 10.18 (انعکاسیت). که $A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash A$.

ثبوت. فرضیه A په یوازې ځان د A داسې اشتقاق دے چې هره نه ایستل شوې فرضیه ئې (یعنې A) په Γ کېنې ده. □

قضیه 10.19 (یکنواختي). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Delta \vdash A$.

ثبوت. له Γ څخه د A هر اشتقاق له Δ څخه هم د A اشتقاق دے. □

قضیه 10.20 (انتقالیت). که $\Gamma \vdash A$ او $\{A\} \cup \Delta \vdash B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash B$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash A$ وي، د A داسې اشتقاق δ_0 شته چې ټولې نه ایستل شوې فرضیې ئې په Γ کېنې دي. که $\{A\} \cup \Delta \vdash B$ وي، د B داسې اشتقاق δ_1 شته چې ټولې نه ایستل شوې فرضیې ئې په $\{A\} \cup \Delta$ کېنې دي. اوس لاندې وګورئ:

$$\begin{array}{c}
 \Delta, [A]^1 \\
 \vdots \\
 \delta_1 \\
 \vdots \\
 !B \\
 \hline
 1 \frac{}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \\
 \hline
 !B
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \Gamma \\
 \vdots \\
 \delta_0 \\
 \vdots \\
 !A \\
 \hline
 \rightarrow \text{Elim}
 \end{array}$$

اوس ټولې نه ایستل شوې فرضیې په $\Gamma \cup \Delta$ کېنې دي؛ نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash B$ ښيي. □

کله چې $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ یو متناهي سب وي، د $\Gamma \vdash B$ دپاره لنډه ښه $A_1, A_2, \dots, A_k \vdash B$ کارول شو؛ په ځانګړي ډول $A \vdash B$ دا معنی لري چې $\{A\} \vdash B$.

پام وکړئ که $\Gamma \vdash A$ او $A \vdash B$ وي، نو $\Gamma \vdash B$. همدارنګه، که $A_1, \dots, A_n \vdash B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash B$.

قضیه 10.21. لاندې شرطونه معادل دي.

1. Γ ناسازگار دے.

2. د هرې ترلے فارمول A دپاره $\Gamma \vdash A$.

3. د کومې ترلے فارمول A دپاره $\Gamma \vdash A$ او $\Gamma \vdash \neg A$.

□

ثبوت. تمرین.

تمرین 10.22، 10.21 ثابت کړئ.

قضیه 10.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو داسې متناهی فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash A$ وي.

2. که Γ د هر متناهی فرعي سټ سازگار وي، نو Γ سازگار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو له Γ څخه د A کوم اشتقاق δ شته. $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د δ د نه ایستل شوې فرضیو سټ ونیسئ. ځکه هر اشتقاق متناهی دے، Γ_0 یوازې متناهی ډېرې ترلې فارمولونه لرل شي. نو δ له متناهی $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ څخه د A اشتقاق دے.

2. دا د (1) د هغه ځانګړي حالت نقیض عکس دے چې $A \equiv \perp$ وي.

□

10.8 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دوی په خپلواکه توګه په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا قضیې په ثبوت کېنې ونډه ولري.

قضیه 10.24. که $\Gamma \vdash A$ وي او $\Gamma \cup \{A\}$ ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. له Γ څخه د A اشتقاق δ_1 او له $\Gamma \cup \{A\}$ څخه د $\perp$ اشتقاق δ_2 ونوموئ. بیا داسې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [A]^1 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ \perp \\ 1 \end{array} \quad \neg\text{Intro} \quad \begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ A \\ \neg\text{Elim} \end{array}}{\perp}$$

□

په نوي اشتقاق کېنې فرضیه A ایستل شوې ده، نو دا له Γ څخه اشتقاق دے.

قضیه 10.25. $\Gamma \vdash A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ناسازگار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash A$ ؛ یعنې د A داسې اشتقاق δ_0 شته چې نه ایستل شوې فرضیې ئې Γ دي. له $\Gamma \cup \{\neg A\}$ څخه د $\perp$ یو اشتقاق داسې اخلو:

$$\frac{\frac{\Gamma}{\vdots \delta_0} \quad \frac{\neg!A}{\perp}}{!A} \neg\text{Elim}$$

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg!A\}$ ناسازگار دے، او δ_1 له $\Gamma \cup \{\neg!A\}$ کښې له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه د $\perp$ اړوند اشتقاق دے۔ یوازې له Γ څخه د $!A$ یو اشتقاق د $\perp_C$ په کارولو اخلو:

$$\frac{\Gamma, [\neg!A]^1 \quad \vdots \delta_1}{\perp} \perp_C$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLND-005) سرچینه په دې ونه کښې له ایستلو نښان سره د همدې قاعدې یو دویم ښې نښان هم بردي؛ زیات نښان لرې شوی او د فرضیې ایستل او د قاعدې نوم په ټاکلي کچه نښان کښې ساتل شوي دي۔ □

تمرین 10.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg!A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي۔

قضیه 10.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg!A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازگار دے۔

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg!A \in \Gamma$ ۔ بیا له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق δ شته۔ د $\neg\text{Elim}$ قاعدې دا ساده کارونه وگورئ:

$$\frac{\frac{\Gamma}{\vdots \delta} \quad \frac{\neg!A}{\perp}}{!A} \neg\text{Elim}$$

ځکه $\neg!A \in \Gamma$ او ټولې نۀ ایستل شوې فرضیې په Γ کښې دي، دا $\Gamma \vdash \perp$ ښي۔ □

قضیه 10.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg!A\}$ دواړه ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے۔

ثبوت. په ترتیب سره له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $\perp$ او له $\Gamma \cup \{\neg!A\}$ څخه د $\perp$ اشتقاقونه δ_1 او δ_2 شته۔ بیا داسې اشتقاق کولای شو:

$$\frac{\frac{\Gamma, [\neg!A]^2 \quad \vdots \delta_2}{\perp} \neg\text{Intro} \quad \frac{\Gamma, [!A]^1 \quad \vdots \delta_1}{\perp} \neg\text{Intro}}{\perp} \neg\text{Elim}$$

ځکه فرضیې $!A$ او $\neg!A$ ایستل شوې دي، دا یوازې له Γ څخه د $\perp$ یو اشتقاق دے۔ نو Γ ناسازگار دے۔ □

10.9 د اشتقاق وړتیا او قضیې رابطنه

موږ ثابتوو چې د فطري استنتاج د د اشتقاق وړتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضیې رابطنو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه، لکه $A \wedge B \vdash A$ او $A \wedge B \vdash B$ (قیاسي استنتاج)، ثابت کړي. دا حقیقتونه د بشپړتیا قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 10.29. 1. دواړه $A \wedge B \vdash A$ او $A \wedge B \vdash B$.

2. $A, B \vdash A \wedge B$.

ثبوت. 1. دواړه داسې اشتقاق کول شوي:

$$\frac{A \wedge B}{A} \wedge \text{Elim} \quad \frac{A \wedge B}{B} \wedge \text{Elim}$$

2. داسې ئې اشتقاق کول شوي:

$$\frac{A \quad B}{A \wedge B} \wedge \text{Intro}$$

□

قضیه 10.30. 1. $A \vee B, \neg A, \neg B$ ناسازگار دے.

2. دواړه $A \vdash A \vee B$ او $B \vdash A \vee B$.

ثبوت. 1. لاندې اشتقاق وکړئ:

$$\begin{array}{c} \frac{\neg A \quad [A]^1}{\perp} \neg \text{Elim} \quad \frac{\neg B \quad [B]^1}{\perp} \neg \text{Elim} \\ \frac{1 \quad A \vee B \quad \perp}{\perp} \vee \text{Elim} \end{array}$$

دا له نۀ ایستل شوې فرضیو $A \vee B, \neg A, \neg B$ او څخه د $\perp$ یو اشتقاق دے.

2. دواړه داسې اشتقاق کول شوي:

$$\frac{A}{A \vee B} \vee \text{Intro} \quad \frac{B}{A \vee B} \vee \text{Intro}$$

□

قضیه 10.31. 1. $A, A \rightarrow B \vdash B$.

2. دواړه $\neg A \vdash A \rightarrow B$ او $B \vdash A \rightarrow B$.

ثبوت. 1. داسې ئې اشتقاق کول شوي:

$$\frac{A \rightarrow B \quad A}{B} \rightarrow \text{Elim}$$

2. دا د لاندې دوو اشتقاقونو په وسیله ښودل کېږي:

$$\frac{\neg!A \quad [!A]^1}{\neg!A} \neg\text{Elim} \quad \frac{\frac{\perp}{!B} \quad \perp_I}{!A \rightarrow !B} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow\text{Intro}$$

پام وکړئ چې $\rightarrow\text{Intro}$ د فرضيې $!A$ ایستل کول شي، خو لازمه نه ده چې وې باسي.

□

10.10 د اشتقاق وړتیا او سورونه

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د فطري استنتاج قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقیقتونه ورکړي چې په دې برخه کې ثابتېږي.

قضیه 10.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $!A(x)$ کېنې نه راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x !A(x)$.

ثبوت. δ له Γ څخه د $!A(c)$ یو اشتقاق ونیسئ. د $\forall\text{Intro}$ استنتاج په زیاتولو د $\forall x !A(x)$ یو اشتقاق اخلو. ځکه c په Γ یا $!A(x)$ کېنې نه راځي، د ځانګړي متغیر شرط پوره کېږي.

□

قضیه 10.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x !A(x)$.

2. $\forall x !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. لاندې له $!A(t)$ څخه د $\exists x !A(x)$ یو اشتقاق دے:

$$\frac{!A(t)}{\exists x !A(x)} \exists\text{Intro}$$

2. لاندې له $\forall x !A(x)$ څخه د $!A(t)$ یو اشتقاق دے:

$$\frac{\forall x !A(x)}{!A(t)} \forall\text{Elim}$$

□

10.11 سوال

د فطري استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نه کړي چې په حقیقت کېنې ترې نه لازمېږي. نو سوال د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خونديتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوريکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هره د اشتقاق وړ ترله فارمول معتبره ده؛

2. که ترله فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛

3. که د ترلي فارمولونه یو سټ ناسازګار وي، د صدق وړ نه دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نه وي، اشتقاق نظام نیکوږی دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سمواله ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

قضیه 10.34 (سمواله). که $A!$ له نه ایستل شوې فرضیو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، نو $\Gamma \vdash A!$.

ثبوت. فرض کړئ δ د $A!$ یو اشتقاق دے. موږ په δ کېنې د استنتاجونو پر شمېر استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره هغه حالت ثابتوو چې د استنتاجونو شمېر 0 وي. په دې حالت کېنې δ یوازې له یوې ترلې فارمول $A!$ څخه جوړ دے، یعنې یوه فرضیه ده. دغه فرضیه نه ایستل شوې ده؛ ځکه فرضیې یوازې د استنتاجونو په وسیله ایستل کېدای شي، او دلته هېڅ استنتاج نشته. نو هر جوړښت $\mathcal{M}$ چې د ثبوت ټولې نه ایستل شوې فرضیې پوره کوي، $A!$ هم پوره کوي.

اوس د استقرا پړاو اخلو. فرض کړئ δ ، n استنتاجونه لري. د تر ټولو لاندې استنتاج مقدمه یا مقدمې د فرعي-اشتقاقونه په وسیله اشتقاق شوې دي، او په هر یوه کېنې تر n کم استنتاجونه دي. د استقرا فرضیه منو: د تر ټولو لاندې استنتاج مقدمې د هغو فرعي-اشتقاقونه له نه ایستل شوې فرضیو څخه لازميږي چې په دغو مقدمو پای ته رسېږي. باید وښیو چې پایله $A!$ د ټول ثبوت له نه ایستل شوې فرضیو څخه لازميږي.

د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو. لومړۍ هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې یوازې یوه مقدمه لري.

1. فرض کړئ وروستنی استنتاج $\neg$ Intro دے: اشتقاق دا بڼه لري:

$$\frac{\Gamma, [A]^n \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg A} \neg\text{Intro}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $\perp$ له نه ایستل شوې فرضیو $\Gamma \cup \{A\}$ څخه لازميږي. یو جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ. باید وښیو چې که $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، نو $\mathcal{M} \models \neg A!$ دے. د خلف په توګه فرض کړئ $\mathcal{M} \models A$ ، خو $\mathcal{M} \not\models \neg A!$ ، یعنې $\mathcal{M} \models A!$ له دې به $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{A\}$ لازم شي. دا زموږ د استقرا د فرضیې خلاف دے. نو $\mathcal{M} \models \neg A!$.

2. وروستنی استنتاج $\wedge$ Elim دے: دوه بڼې لري؛ له مقدمې $A \wedge B!$ څخه یا $A!$ یا $B!$ رالیستل کېدای شي. لومړۍ حالت ونیسئ. اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\frac{\Gamma \vdash A \wedge B!}{\Gamma \vdash A!} \wedge\text{Elim}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $A \wedge B!$ له نه ایستل شوې فرضیو Γ څخه لازميږي. یو جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ. باید وښیو چې که $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، نو $\mathcal{M} \models A!$ دے. فرض کړئ $\mathcal{M} \models \Gamma$ (که $\Gamma \vdash A \wedge B!$) له مخې پوهېږو چې $\mathcal{M} \models A \wedge B!$ د تعریف له مخې $\mathcal{M} \models A!$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M} \models A$ او $\mathcal{M} \models B!$ دواړه وي. (هغه حالت چې له $A \wedge B!$ څخه $B!$ رالیستل کېږي، په ورته ډول څېړل کېږي.)

3. وروستنی استنتاج $\vee$ Intro دے: دوه بڼې لري؛ $A \vee B!$ یا له مقدمې $A!$ یا له مقدمې $B!$ څخه رالیستل کېدای شي. لومړۍ حالت ونیسئ. اشتقاق دا بڼه لري:

$$\frac{\Gamma \vdash A!}{\Gamma \vdash A \vee B!} \vee\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې A د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ څخه لازمېږي. یو جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ. باید ونښو چې که $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، نو $\mathcal{M} \models A \vee B$ دے. فرض کړئ $\mathcal{M} \models \Gamma$ بیا $\mathcal{M} \models A$ ، ځکه $\Gamma \models A$ (د استقرا فرضیه). نو $\mathcal{M} \models A \vee B$ هم باید وي. (هغه حالت چې $A \vee B$ له B څخه رالیستل کېږي، په ورته ډول خپرل کېږي.)

4. وروستنه استنتاج $\rightarrow$ Intro دے: $A \rightarrow B$ له داسې فرعي ثبوت څخه رالیستل کېږي چې فرضیه یې A او پایله یې B ده، یعنې:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [A]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ n \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

د استقرا د فرضيې له مخې B د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه لازمېږي، یعنې $\Gamma \cup \{A\} \models B$. یو جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ. د δ نۀ ایستل شوې فرضيې یوازې Γ دي، ځکه A په وروستي استنتاج کېږي ایستل شوې ده. نو باید ونښو چې $\Gamma \models A \rightarrow B$ د خلف په توګه فرض کړئ چې د کوم جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، خو $\mathcal{M} \models A \rightarrow B$ وي. نو $\mathcal{M} \models A$ او $\mathcal{M} \models B$ خو د فرضيې له مخې B د $\Gamma \cup \{A\}$ معنایي پایله ده، یعنې $\mathcal{M} \models B$ ، او دا تناقض دے. نو $\Gamma \models A \rightarrow B$.

5. وروستنه استنتاج $\perp$ I دے: دلته δ داسې پای ته رسېږي:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \frac{\perp}{!A} \perp I \end{array}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\perp$ باید ونښو چې $\Gamma \models \perp$. فرض کړئ داسې نۀ وي، بیا د کوم $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \models \Gamma$ او $\mathcal{M} \not\models \perp$ دي. خو کاذبي هېڅ جوړښت یا ارزونه نۀ پوره کوي، یعنې تل $\mathcal{M} \models \perp$ وي؛ نو له دې به $\Gamma \models \perp$ لازم شي، چې د استقرا د فرضيې خلاف دے.

6. وروستنه استنتاج $\perp$ C دے: تمرین.

7. وروستنه استنتاج $\forall$ Intro دے: بیا δ دا ښه لري:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \frac{!A(a)}{\forall x !A(x)} \forall \text{Intro} \end{array}$$

د استقرا د فرضيې له مخې مقدمه $A(a)$ د نۀ ایستل شوې فرضیو Γ معنایي پایله ده. داسې جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي. باید ونښو چې $\mathcal{M} \models \forall x !A(x)$. ځکه $\forall x !A(x)$ یوه ترلے فارمول ده، د دې معنی دا ده چې د هرې متغیر-ګومارنې s دپاره باید $\mathcal{M}, s \models A(x)$ ونښو (16.22). ځکه Γ ټول له جملو جوړ دے، د هر $B \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M}, s \models B$ د 16.12 له مخې دے. $\mathcal{M}'$ داسې جوړښت ونیسئ چې د $\mathcal{M}$ په شان وي، خو $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$ وي. ځکه a په Γ کېږي نۀ راځي، د 16.28 له مخې $\mathcal{M}' \models \Gamma$. ځکه $\Gamma \models A(a)$ ، $\mathcal{M}' \models A(a)$. ځکه $A(a)$ یوه ترلے فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathcal{M}', s \models A(a)$. د 16.30 له مخې $\mathcal{M}', s \models A(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}' \models A(a)$ (یاد ولرئ $A(a)$ هماغه $A(x)[a/x]$ دے). نو $\mathcal{M}', s \models A(x)$ ځکه a په $A(x)$ کېږي نۀ راځي، د 16.26 له مخې $\mathcal{M}, s \models A(x)$ خو s خپل سړی متغیر-ګومارنه وه؛ نو $\mathcal{M} \models \forall x !A(x)$.

8. وروستنه استنتاج $\exists$ Intro دے: تمرین.

9. وروستنه استنتاج $\forall$ Elim دے: تمرین.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څو مقدمې لري: $\exists$ Elim، $\rightarrow$ Elim، $\neg$ Elim، $\wedge$ Intro، $\vee$ Elim. د ژباړې د نسخې سمون (OLND-006) سرچینې د څو-مقدمې قاعدو له دې بشپړ لړ څخه د نفې ایستلو قاعده غورځولې ده، سره له دې چې لاندې تمرین ئې هم راوړي؛ دلته بېرته شامله شوه.

1. وروستنه استنتاج $\wedge$ Intro دے- $A \wedge B$ له مقدمو A او B څخه رالیستل کېږي او δ دا بڼه لري:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ A \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ B \end{array}}{A \wedge B} \wedge \text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې A د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_1 څخه، او B د δ_2 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_2 څخه لازمېږي. د δ له نۀ ایستل شوې فرضيې $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ دي؛ نو باید $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models A \wedge B$ ونیسو. داسې جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي. ځکه $\mathcal{M} \models \Gamma_1$ او $\mathcal{M} \models \Gamma_2$ ، نو $\mathcal{M} \models A$ او $\mathcal{M} \models B$ ، همدارنګه، ځکه $\mathcal{M} \models \Gamma_2$ او $\mathcal{M} \models B$ ، دواړه یو ځای $\mathcal{M} \models A \wedge B$ راکوي.

2. وروستنه استنتاج $\vee$ Elim دے: تمرین.

3. وروستنه استنتاج $\rightarrow$ Elim دے- B له مقدمو $A \rightarrow B$ او A څخه رالیستل کېږي. اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ A \rightarrow B \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ A \end{array}}{B} \rightarrow \text{Elim}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $A \rightarrow B$ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_1 څخه، او A د δ_2 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_2 څخه لازمېږي. یو جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ. باید ونیسو چې که $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي، نو $\mathcal{M} \models B$ دے. فرض کړئ $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. ځکه $\mathcal{M} \models A \rightarrow B$ ، نو $\mathcal{M} \models A \rightarrow B$ ، ځکه $\mathcal{M} \models A$ ، نو $\mathcal{M} \models B$. له دې څخه $\mathcal{M} \models B$ لازمېږي (ځکه که $\mathcal{M} \models B$ وے، نو له $\mathcal{M} \models A$ سره به $\mathcal{M} \models A \rightarrow B$ وے، چې د $\mathcal{M} \models A \rightarrow B$ خلاف دے).

4. وروستنه استنتاج $\neg$ Elim دے: تمرین.

5. وروستنه استنتاج $\exists$ Elim دے: تمرین.

□

تمرین 10.35، د 10.34 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 10.36. که $\vdash A$ وي، نو A معتبره ده.

نتیجه 10.37. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے.

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے. بیا $\Gamma \vdash \perp$ ، یعنې له Γ څخه د نۀ ایستل شوې فرضیو پر بنسټ د $\perp$ یو اشتقاق شته. د 10.34 له مخې هر جوړښت $\mathcal{M}$ چې Γ پوره کوي، باید $\perp$ هم پوره کړي. ځکه د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \models \perp$ ، نو هېڅ $\mathcal{M}$ نۀ شي پوره کولې؛ یعنې Γ د صدق وړ نۀ دے.

□

10.12 له عینیت سره اشتقاقونه

له عینیت سره اشتقاقونه اضافي استنتاجي قاعدو ته اړتیا لري.

$$\begin{array}{c} =\text{Elim} \frac{!A(t_1) \quad t_1 = t_2}{!A(t_2)} \\ =\text{Elim} \frac{!A(t_2) \quad t_1 = t_2}{!A(t_1)} \end{array} \qquad =\text{Intro} \frac{}{t = t}$$

په پورته قاعدو کېنې t ، t_1 او t_2 ترې اصطلاحکاني دي. د $=\text{Intro}$ قاعده راکوي چې د $t = t$ په بڼه هره د یووالي جمله نېغ په نېغه، له هېڅ فرضيې پرته، اشتقاق کړو.

بېلګه 10.38. که s او t ترې اصطلاحکاني وي، نو $!A(s), s = t \vdash !A(t)$:

$$\frac{s = t \quad !A(s)}{!A(t)} =\text{Elim}$$

دا به د «یو شان څیزونو د تعویض د اصل» یا د لاینېڅ د قانون په نامه اشنا وي.

تمرین 10.39. ثابت کړئ چې $=$ متناظره او انتقالي دواړه ده؛ یعنې د $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$ او $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z)$ اشتقاقونه ورکړئ.

بېلګه 10.40. موږ دا ترې فارمول اشتقاق کوو:

$$\forall x \forall y ((!A(x) \wedge !A(y)) \rightarrow x = y)$$

له دې ترې فارمول څخه:

$$\exists x \forall y (!A(y) \rightarrow y = x)$$

اشتقاق له لاندې څخه پورته جوړوو:

$$\begin{array}{c} \exists x \forall y (!A(y) \rightarrow y = x) \quad [!A(a) \wedge !A(b)]^1 \\ \vdots \\ a = b \\ \frac{1 \quad (!A(a) \wedge !A(b)) \rightarrow a = b}{\forall y ((!A(a) \wedge !A(y)) \rightarrow a = y)} \rightarrow\text{Intro} \\ \frac{\forall y ((!A(a) \wedge !A(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((!A(x) \wedge !A(y)) \rightarrow x = y)} \forall\text{Intro} \end{array}$$

اوس باید اصلي فرضیه وکاروو: ځکه دا وجودي فارمول ده، د منځنۍ پایلې $a = b$ د اشتقاق کولو دپاره $\exists\text{Elim}$ کاروو.

$$\begin{array}{c} [\forall y (!A(y) \rightarrow y = c)]^2 \\ [!A(a) \wedge !A(b)]^1 \\ \vdots \\ a = b \\ \frac{2 \quad \exists x \forall y (!A(y) \rightarrow y = x) \quad a = b}{\frac{1 \quad (!A(a) \wedge !A(b)) \rightarrow a = b}{\forall y ((!A(a) \wedge !A(y)) \rightarrow a = y)} \rightarrow\text{Intro}} \exists\text{Elim} \\ \frac{\forall y ((!A(a) \wedge !A(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((!A(x) \wedge !A(y)) \rightarrow x = y)} \forall\text{Intro} \end{array}$$

د پاس په بني لوري کښې فرعي-اشتقاق د خپلو فرضيو په کارولو بشپړېږي، خو $a = c$ او $b = c$ وښي. دا دوه جلا اشتقاقونه غواړي. د $a = c$ اشتقاق داسې دے:

$$\frac{\frac{[\forall y (!A(y) \rightarrow y = c)]^2}{!A(a) \rightarrow a = c} \forall\text{Elim} \quad \frac{[!A(a) \wedge !A(b)]^1}{!A(a)} \wedge\text{Elim}}{a = c} \rightarrow\text{Elim}$$

له $a = c$ او $b = c$ څخه $a = b$ د $=\text{Elim}$ په وسيله اشتقاق کوو.

تمرین 10.41. د لاندې فارمولونه اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. \forall x \forall y ((x = y \wedge !A(x)) \rightarrow !A(y))$$

$$2. \exists x !A(x) \wedge \forall y \forall z ((!A(y) \wedge !A(z)) \rightarrow y = z) \rightarrow \exists x (!A(x) \wedge \forall y (!A(y) \rightarrow y = x))$$

10.13 له عينيت سره سموالے

قضيه 10.42. د $=$ له قاعدو سره فطري استنتاج سم دے.

ثبوت. د $t = t$ په بڼه هره فارمول معتبره ده؛ ځکه د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \models t = t$ (پام وکړئ چې اصطلاح t تړلې فرضوو، يعنې هېڅ متغير نه لري؛ نو متغير-کومارنې اغېز نه لري.)

فرض کړئ په کوم اشتقاق کښې وروستۍ استنتاج $=\text{Elim}$ دے، يعنې اشتقاق لاندې بڼه لري:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ t_1 = t_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ !A(t_1) \end{array}}{!A(t_2)} =\text{Elim}$$

مقدمې $t_1 = t_2$ او $!A(t_1)$ په خپل وار له نۀ ایستل شوې فرضيو Γ_1 او Γ_2 څخه اشتقاق شوې دي. غواړو وښيو چې $!A(t_2)$ له $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ څخه لازمېږي. داسې جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي. د استقرا د فرضيې له مخې $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ او $\mathcal{M} \models !A(t_1)$. نو $\mathcal{M}, s \models !A(t_1)$ له مخې 16.30 د $m = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ او هره متغير-کومارنه ونیسئ، او $\mathcal{M}, s[m/x] \models !A(x)$ او دا هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}, s[m/x] \models !A(x)$ ، او دا هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}, s \models !A(t_2)$ ، ځکه $\mathcal{M} \models !A(t_1)$ ، نو $\mathcal{M} \models !A(t_2)$. □

باب 11

تابلوگاني

اداري يادونه - دا څپرک يونه لرونکې تحليلي تابلو نظام وړاندې کوي -

د ثبوت د يوه نظام په توگه له تابلو سره اړوند مواد د شاملولو يا ايستلو دپاره د prfTab ټک وکاروئ. د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-001) سرچينه دلته په تېروتنه فطري استنتاج يادوي، د څپرکي، ټک او ټول وارد شوي موادو له مخې مطلب تابلو نظام دے، نو نوم يې دلته سم شوی دے -

11.1 قاعدې او تابلوگاني

تابلو په جوړښت کښې د ترلې فارمول د رښتيا يا دروغ کېدو د ممکنو لارو منظمه پلټنه ده. د تابلو بنسټيز توکي لښه لرونکي فارمولونه دي: ترلي فارمولونه له يوه رښتياوالي ارزښت «لښې» سره، چې يا $\mathbb{T}$ وي يا $\mathbb{F}$. دا لښه لرونکي فارمولونه په داسې ونه کښې ترتيبېږي چې لاندې خوا ته غځېږي -

تعريف 11.1. لښه لرونکې فارمول له يوه رښتياوالي ارزښت او ترلې فارمول څخه جوړه ده، يعنې له دې دواړو څخه يوه:

$$\mathbb{T}!A \text{ يا } \mathbb{F}!A.$$

په شهودي ډول $\mathbb{T}!A$ داسې لوستل شو چې «کېدے شي A رښتيا وي»، او $\mathbb{F}!A$ داسې چې «کېدے شي A ! دروغ وي» (په کوم جوړښت کښې) -

په ونه کښې هر لښه لرونکې فارمول يا فرض دے (چې د ونې په ترټولو پاسنۍ برخه کښې ليکل کېږي)، يا تر ځان له پاسه له کوم لښه لرونکې فارمول څخه د يوې استنتاجي قاعدې په وسيله اخستل شوے دے. د مخکښې فارمول د هر ممکن اصلي عملگر دپاره دوه قاعدې شته: يوه د هغه حالت دپاره چې لښه $\mathbb{T}$ وي، او بله د هغه حالت دپاره چې لښه $\mathbb{F}$ وي. ځينې قاعدې ونې ته ځانگې ورکوي او ځينې يوازې ځانگې ته لښه لرونکي فارمولونه ورزياتوي. يوه قاعده کېدے شي (او ډېر ځله بايد) سمديتي پر مخکښې لښه لرونکې فارمول نه، بلکې له رښتيا څخه د قاعدې د پلي کېدو تر ځاي پورې په ځانگه کښې پر هر لښه لرونکې فارمول پلي شي -

يوه ځانگه هله ترلې ده چې $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ دواړه ولري. ترلې تابلو هغه دے چې هره ځانگه يې ترلې وي. د شهودي تعبير له مخې هره ځانگه يو گډ امکان بيانوي، خو $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ يو ځاي ممکن نه دي. په بله وينا، که يوه ځانگه ترلې وي، هغه امکان رد شوے دے چې ځانگه يې بيانوي. په ځانگړي ډول، د دې معنی دا ده چې ترلې تابلو هغه ټول امکانات ردوي چې د $\mathbb{T}!A$ په بڼه هر فرض په يو وخت رښتيا او د $\mathbb{F}!A$ په بڼه هر فرض دروغ کړي -

د A دپاره ترلې تابلو داسې ترلې تابلو دے چې رښه يې $\mathbb{F}!A$ وي. که داسې ترلې تابلو موجود وي، د A ! د دروغ کېدو ټول امکانات رد شوي؛ يعنې A ! بايد په هر جوړښت کښې رښتيا وي -

11.2 قضیوي قاعدې

11.2.1 د $\neg$ قاعدې

$$\neg F \frac{F \neg!A}{T!A}$$

$$\neg T \frac{T \neg!A}{F!A}$$

11.2.2 د $\wedge$ قاعدې

$$\wedge F \frac{F!A \wedge!B}{F!A \mid F!B}$$

$$\wedge T \frac{T!A \wedge!B}{T!A \mid T!B}$$

11.2.3 د $\vee$ قاعدې

$$\vee F \frac{F!A \vee!B}{F!A \mid F!B}$$

$$\vee T \frac{T!A \vee!B}{T!A \mid T!B}$$

11.2.4 د $\rightarrow$ قاعدې

$$\rightarrow F \frac{F!A \rightarrow!B}{T!A \mid F!B}$$

$$\rightarrow T \frac{T!A \rightarrow!B}{F!A \mid T!B}$$

11.2.5 د پرېکون قاعده

$$\text{Cut} \frac{}{T!A \mid F!A}$$

د Cut قاعده پر مخکښ نښه لرونکې فارموله نۀ «پلي کېږي»؛ بلکې راکوي چې په تابلو کېنې هره ځانګه په دوو ووېشو: يوه ځانګه $T!A$ او بله $F!A$ لري. دا اړينه نۀ ده—د نښه لرونکې فارمولونه هر هغه سب چې ترلے تابلو ولري، له Cut پرته هم يو ترلے تابلو لري—خو راکوي چې تابلوګانې په اسانه طريقه سره يو ځای کړو.

11.3 د سورونو قاعدې

11.3.1 د $\forall$ قاعدې

$$\forall F \frac{F \forall x!A(x)}{F!A(a)}$$

$$\forall T \frac{T \forall x!A(x)}{T!A(t)}$$

په $\forall T$ کېنې t تړلې اصطلاح ده (یعنې متغیرونه نه لري). په $\forall F$ کېنې a داسې ثابت سمبول دے چې باید د $\forall F$ تر قاعدې پاس په څانګه کېنې هېڅ ځای نه وي راغلې. a د $\forall F$ استنتاج څانګړې متغیر بولو-¹

11.3.2 د $\exists$ قاعدې

$\frac{\mathbb{F} \exists x !A(x)}{\mathbb{F} !A(t)} \quad \exists F$	$\frac{\mathbb{T} \exists x !A(x)}{\mathbb{T} !A(a)} \quad \exists T$
---	---

بیا هم t تړلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists T$ تر قاعدې پاس په څانګه کېنې نه راځي. a د $\exists T$ استنتاج څانګړې متغیر بولو.

هغه شرط چې څانګړې متغیر د $\forall F$ یا $\exists T$ استنتاج تر پاسه په څانګه کېنې نه راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي. هغه قرارداد را یاد کړئ چې کله A داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، دا د $A(x)$ په لیکلو نښو. په همدې سیاق کېنې $A(t)$ د $A[t/x]$ لنډه بڼه ده. نو د $\exists F$ قاعده داسې هم لیکل شو:

$$\frac{\mathbb{F} \exists x !A}{\mathbb{F} !A[t/x]} \quad \exists F$$

پام وکړئ چې t له مخکېنې په A کېنې راتلې شي؛ مثلاً A کېدے شي $P(t, x)$ وي. نو له $\mathbb{F} \exists x P(t, x)$ څخه $\mathbb{F} P(t, t)$ استنتاجول د $\exists F$ سمه کارونه ده. خو په $\forall F$ او $\exists T$ کېنې د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په A کېنې نه راځي. نو له $\mathbb{F} \forall x P(a, x)$ څخه د $\forall F$ په کارولو $\mathbb{F} P(a, a)$ په سمه توګه نه شی استنتاجولے.

په $\forall T$ او $\exists F$ کېنې د تړلې اصطلاح t پر انتخاب نور بندیز نشته. بل لوري ته، د $\exists T$ او $\forall F$ په قاعدو کېنې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a د اړوند استنتاج تر پاسه په څانګو کېنې هېڅ ځای نه راځي. دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے. له دې شرط پرته لاندې به د $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ دپاره یو تړلے تابلو و:

1	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$	Assumption
2	$\mathbb{T} \exists x \varphi(x)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\exists T 2$
5	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\forall F 3$
	$\otimes$	

خو $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ معتبر نه دے.

11.4 تابلوګانې

و مو ویل چې فرض څه دے، او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. له دغو څخه تابلوګانې په استقرایي ډول جوړېږي: هر تابلو یا یوه یوازېنۍ څانګه ده چې له یوه یا زیاتو فرضونو جوړه وي، یا پر یوه څانګه د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو له بل تابلو څخه اخستل کېږي.

تعریف 11.2 (تابلو). د فرضونو $S_1!A_1, \dots, S_n!A_n$ دپاره (چې هر S_i یا $\mathbb{T}$ وي یا $\mathbb{F}$) تابلو د نښه لرونکي فارمولونه یوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو پاسني n نښه لرونکي فارمولونه $S_i!A_i$ دي، یو تر بل لاندې.

¹ د «ځانګړي متغیر» اصطلاح کاروو، سره له دې چې په پورته قاعده کېنې a یو ثابت سمبول دے. دا تاریخي لاملونه لري.

2. په ونه کښې هر نښه لرونکې فارمول چې له فرضونو څخه نه وي، تر ځان پاس په ځانګه کښې پر نښه لرونکې فارمول د یوې استنتاجي قاعدې له سې کارونې څخه راوتلې وي۔

د تابلو یوه ځانګه هله او یوازې هله ترې ده چې $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ دواړه ولري؛ که نه وي پرانیستې ده۔ هغه تابلو چې هره ځانګه ئې ترې وي، د خپلو فرضونو د سټ تر لاندې تابلو ده۔ که تابلو تر لاندې نه وي، یعنې لږ تر لږه یوه پرانیستې ځانګه ولري، نو پرانیستې ده۔

بېلګه 11.3. د فرضونو هر سټ په یوازې ځان تابلو ده، خو په عام ډول به تر لاندې نه وي۔ (په څرګند ډول یوازې هله تر لاندې ده چې فرضونه له مخکښې د نښه لرونکي فارمولونه یوه جوړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ ولري۔)

له یوه تابلو (پرانیستې یا ترې) څخه د کومې استنتاجي قاعدې په پلي کولو یو نوې، لوی تابلو اخستل شو۔ قاعده په هغه کښې پر نښه لرونکې فارمول $A!$ پلي کوو۔ دا قاعده به د هرې هغې ځانګې په پای کې یو یا زیات نښه لرونکي فارمولونه ورزیات کړي چې د $A!$ هغه پښه لري چې قاعده مو پرې پلي کړې ده۔

مثلاً فرض $\mathbb{T}!A \wedge \neg A!$ ونیسئ۔ لاندې هغه (پرانیستې) تابلو ده چې یوازې له همدې فرض څخه جوړ ده:

$$.1 \quad \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi \quad \text{Assumption}$$

د $\mathbb{T}!A$ قاعده پر فرض پلي کوو او ترې نوې تابلو اخلو۔ دا قاعده راکوي چې تابلو ته دوه نوې کښې، $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{T}\neg A!$ ، ورزیاتې کړو:

$$\begin{array}{lll} .1 & \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi & \text{Assumption} \\ .2 & \mathbb{T} \varphi & \wedge \mathbb{T} 1 \\ .3 & \mathbb{T} \neg \varphi & \wedge \mathbb{T} 1 \end{array}$$

کله چې تابلوګانې لیکو، پلي شوې قاعدې په ښي لوري کښې ثبتوو (مثلاً $\wedge \mathbb{T} 1$ دا معنی لري چې پر دې کرښه نښه لرونکې فارمول د $\wedge \mathbb{T}$ قاعدې د هغې کارونې پایله ده چې د 1 پر کرښه نښه لرونکې فارمول ته شوې ده)۔ دا نوې تابلو اوس نور نښه لرونکي فارمولونه لري، خو یوازې پر یوه ($\mathbb{T}\neg A!$) قاعده پلي کول شو (په دې حالت کې $\mathbb{T}\neg$ قاعده)۔ له دې څخه لاندې تر لاندې تابلو راځي:

$$\begin{array}{lll} .1 & \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi & \text{Assumption} \\ .2 & \mathbb{T} \varphi & \wedge \mathbb{T} 1 \\ .3 & \mathbb{T} \neg \varphi & \wedge \mathbb{T} 1 \\ .4 & \mathbb{F} \varphi & \neg \mathbb{T} 3 \\ & \otimes & \end{array}$$

11.5 د تابلوګانې بېلګې

بېلګه 11.4. راځئ د تر لاندې فارمول $(A \wedge B) \rightarrow A!$ دپاره یو تر لاندې تابلو ومومو۔
لومړۍ اړوند فرض د تابلو په سر کې لیکو۔

$$.1 \quad \mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \quad \text{Assumption}$$

یوازې یو فرض شته، نو یوازې یو نښه لرونکې فارمول ده چې قاعده پرې پلي کول شو۔ (د هر نښه لرونکې فارمول دپاره تل تر ټولو زیاته یوه قاعده پلي کېدای شي: دا د تر لاندې فارمول د اړوندې نښې او اصلي عملګر قاعده ده)۔ په دې حالت کې باید $\mathbb{F} \rightarrow$ پلي کړو۔

$$\begin{array}{lll} .1 & \mathbb{F} (\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi & \text{Assumption} \\ .2 & \mathbb{T} \varphi \wedge \psi & \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ .3 & \mathbb{F} \varphi & \rightarrow \mathbb{F} 1 \end{array}$$

د دې حساب ساتلو دپاره چې پر کومو نښه لرونکي فارمولونه مو اړوندې قاعدې پلي کړې دي، د جملې تر څنګ د سم نښان لیکو. خو د سم نښان یوازې هله ولیکئ چې قاعده پر ټولو پرانیستو څانګو پلي شوې وي. کله چې پر کوم نښه لرونکې فارمول په هره پرانیستې څانګه کېنې اړونده قاعده پلي شي، بیا ورته د بېرته ورګرځېدو او د قاعدې د بیا پلي کولو اړتیا نه لرو. په دې حالت کېنې یوازې یوه څانګه ده، نو قاعده یوازې یو ځل پلي کول غواړي. (پام وکړئ چې د سم نښانونه یوازې د تابلوګانو د جوړولو اسانتیا ده او په رسمي ډول د تابلوګانو د نحوې برخه نه ده.)

یو نوې نښه لرونکې فارمول شته چې قاعده پرې پلي کول شوي: پر 2 کرښه $\neg A \wedge B$ د $\neg T$ قاعدې له پلي کولو څخه دا رائجي:

1.	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

ځکه اوس څانګه $\mathbb{T}!A$ (پر 4 کرښه) او $\mathbb{F}!A$ (پر 3 کرښه) دواړه لري، ځانګه ترې ده. ځکه همدا یوازېنې څانګه ده، تابلو ترې دے. د $\neg A \wedge B \rightarrow A$ دپاره مو یو ترې تابلو وموند.

بېلګه 11.5. اوس رائجي د $(\neg A \vee B) \rightarrow (A \rightarrow B)$ دپاره یو ترې تابلو ومومو.

له اړوند فرض څخه پیل کوو:

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	Assumption
----	--	------------

په دې تابلو کېنې د یوازېنې نښه لرونکې فارمول اصلي عملګر $\rightarrow$ او نښه $\mathbb{F}$ ده، نو د $\rightarrow \mathbb{F}$ قاعده پرې پلي کوو او دا اخلو:

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$

اوس دا ټاکنه لرو چې پر 2 کرښه $\vee \mathbb{T}$ پلي کړو که پر 3 کرښه $\rightarrow \mathbb{F}$ په حقیقت کېنې د ترتیب ټاکنه توپیر نه کوي، تر هغې چې د هر نښه لرونکې فارمول اړونده قاعده په هره څانګه کېنې پلي شي. نولومړۍ اخلو. د $\vee \mathbb{T}$ قاعده تابلو ته څانګې ورکوي، او د قاعدې دوه پایلې به هغه نوي نښه لرونکي فارمولونه وي چې دوو نویو څانګو ته ورزیاتېږي. له دې څخه دا رائجي:

1.	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi \end{array}$	$\vee \mathbb{T} 2$

لا مو پر 3 کرښه د $\rightarrow \mathbb{F}$ قاعده نه ده پلي کړې، اوس ئې کوو. د وخت د سپما دپاره ئې پر دواړو څانګو پلي کوو. رایاد کړئ چې د کوم نښه لرونکې فارمول تر څنګ یوازې هله د سم نښان لیکو چې اړونده قاعده مو په هره پرانیستې څانګه کېنې پلي کړې وي. نو غوره ده چې قاعده د هرې هغې څانګې په پای کېنې پلي کړو چې اړوند نښه لرونکې فارمول لري. په دې توګه به په بېلابېلو څانګو کېنې لاندې هماغه نښه لرونکې فارمول ته بېرته نه ورګرځو.

.1	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.3	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\swarrow \quad \searrow$	
.4	$\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\vee \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
.6	$\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
	$\otimes$	

اوس بڼی څانګه تړلې ده. په کینه څانګه کېنې لا هم پر 4 کرښه د $\neg \mathbb{T}$ قاعده پلي کول شو. له دې څخه $\mathbb{F}!A$ راځي او کینه څانګه تړل کېږي:

.1	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.3	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\swarrow \quad \searrow$	
.4	$\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\vee \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
.6	$\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
.7	$\mathbb{F}\varphi \quad \otimes$	$\neg \mathbb{T} 4$
	$\otimes$	

بېلګه 11.6. د فرضونو په توګه د هر شمېر نښه لرونکي فارمولونه دپاره تابلوګانې ورکول شو. ډېر ځله له یوې زیاتې داسې قاعدې پلي کول هم اړین وي چې څانګې ورکوي؛ او په عام ډول تابلو هر شمېر څانګې لرل شي. مثلاً د $\{\mathbb{T}!A \vee (!B \wedge !C), \mathbb{F}(!A \vee !B) \wedge (!A \vee !C)\}$ دپاره تابلو ونیسئ. لومړۍ پر لومړي فرض د $\vee \mathbb{T}$ قاعده پلي کوو:

.1	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
	$\swarrow \quad \searrow$	
.3	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$

اوس پر 2 کرښه د $\wedge \mathbb{F}$ قاعده پلي کول شو. دا په دواړو څانګو کېنې په یو وخت کوو، نو پر 2 کرښه د سم نښان وهله شو:

.1	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
	$\swarrow \quad \searrow$	
.3	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
	$\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$	
.4	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \quad \mathbb{F}\varphi \vee \chi \quad \mathbb{F}\varphi \vee \psi \quad \mathbb{F}\varphi \vee \chi$	$\wedge \mathbb{F} 2$

اوس $\vee \mathbb{F}$ پر ټولو هغو څانګو پلي کول شو چې $!A \vee !B$ لري:

.1	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
.4	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi$	$\wedge \mathbb{F} 2$
.5	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
.6	$\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
	$\otimes$	

اوس تر ټولو کینه څانګه تړلې ده. رائجي $\vee \mathbb{F}$ پر $AV!C$ پلي کړو:

.1	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
.4	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
.5	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
.6	$\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
.7	$\otimes$ $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
.8	$\otimes$ $\mathbb{F} \chi$ $\mathbb{F} \chi$ $\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 4$

پام وکړئ چې د روښانتيا دپاره مو د $\vee \mathbb{F}$ د دويم ځل کارونې پايله لاندې يوره. په دې حالت کېنې دې ته اړتيا نه وه؛ ځکه توجهونه به يوشان وو.

دوه څانګې پرانيستې پاتې دي، او پر 3 کرښه $\mathbb{T}!B \wedge C$ لا بې د سم نښانه دے. پر هغې $\wedge \mathbb{T}$ پلي کوو او ترلے تابلو اخلو:

.1	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 1$
.4	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$ $\mathbb{F} \varphi \vee \chi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
.5	$\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$ $\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
.6	$\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \chi$ $\mathbb{F} \psi$ $\mathbb{F} \chi$	$\vee \mathbb{F} 4$
.7	$\otimes$ $\otimes$ $\mathbb{T} \psi$ $\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 3$
.8	$\otimes$ $\mathbb{T} \chi$ $\mathbb{T} \chi$ $\mathbb{T} \chi$	$\wedge \mathbb{T} 3$

د پرتلې دپاره، لاندې د فرضونو د همدې سټ يو ترلے تابلو دے چې قاعدې پکې په بل ترتيب پلي شوې دي:

.1	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
.4	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 3$
.5	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 3$
.6	$\mathbb{T} \varphi$ $\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\vee \mathbb{T} 1$
.7	$\otimes$ $\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 6$
.8	$\otimes$ $\mathbb{T} \chi$	$\wedge \mathbb{T} 6$

تمرین 11.7. د لاندې دپاره ترلي تابلوکاني ورکړئ:

$$.1 \quad \mathbb{T}!A \wedge (!B \wedge !C), \mathbb{F} (!A \wedge !B) \wedge !C$$

$$.2 \quad \mathbb{T}!A \vee (!B \vee !C), \mathbb{F} (!A \vee !B) \vee !C$$

$$.3 \quad \mathbb{T}!A \rightarrow (!B \rightarrow !C), \mathbb{F} !B \rightarrow (!A \rightarrow !C)$$

$$.4 \quad \mathbb{T}!A, \mathbb{F} \neg \neg !A$$

تمرین 11.8. د لاندې دپاره ترلي تابلوکاني ورکړئ:

$$.1 \quad \mathbb{T}(!A \vee !B) \rightarrow !C, \mathbb{F} !A \rightarrow !C$$

$$.2 \quad \mathbb{T}(!A \rightarrow !C) \wedge (!B \rightarrow !C), \mathbb{F} (!A \vee !B) \rightarrow !C$$

$$.3 \quad \mathbb{F} \neg(!A \wedge \neg !A)$$

$$.4 \quad \mathbb{T}!B \rightarrow !A, \mathbb{F} \neg !A \rightarrow \neg !B$$

$$.5 \quad \mathbb{F} (!A \rightarrow \neg !A) \rightarrow \neg !A$$

$$.6 \quad \mathbb{F} \neg(!A \rightarrow !B) \rightarrow \neg !B$$

$$.7 \quad \mathbb{T}!A \rightarrow !C, \mathbb{F} \neg(!A \wedge \neg !C)$$

$$.8 \quad \mathbb{T}!A \wedge \neg !C, \mathbb{F} \neg(!A \rightarrow !C)$$

.9. $\mathbb{T}!A \vee !B, \mathbb{T} \neg !B, \mathbb{F} !A$. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-002) سرچينې دوه رښتوني فرضونه د يو نښه لرونکي فارمول په دننه کښې سره يو ځای کړي وو؛ دلته هر فرض خپله رښتيا نښه لري، لکه د مسئلې په اړوند استلزام کښې.

$$.10 \quad \mathbb{T} \neg !A \vee \neg !B, \mathbb{F} \neg(!A \wedge !B)$$

$$.11 \quad \mathbb{F} (\neg !A \wedge \neg !B) \rightarrow \neg(!A \vee !B)$$

$$.12 \quad \mathbb{F} \neg(!A \vee !B) \rightarrow (\neg !A \wedge \neg !B)$$

تمرین 11.9. د لاندې دپاره ترلي تابلوکاني ورکړئ:

$$.1 \quad \mathbb{T} \neg(!A \rightarrow !B), \mathbb{F} !A$$

$$.2 \quad \mathbb{T} \neg (!A \wedge !B), \mathbb{F} \neg !A \vee \neg !B$$

$$.3 \quad \mathbb{T} !A \rightarrow !B, \mathbb{F} \neg !A \vee !B$$

$$.4 \quad \mathbb{F} \neg \neg !A \rightarrow !A$$

$$.5 \quad \mathbb{T} !A \rightarrow !B, \mathbb{T} \neg !A \rightarrow !B, \mathbb{F} !B$$

$$.6 \quad \mathbb{T} (!A \wedge !B) \rightarrow !C, \mathbb{F} (!A \rightarrow !C) \vee (!B \rightarrow !C)$$

$$.7 \quad \mathbb{T} (!A \rightarrow !B) \rightarrow !A, \mathbb{F} !A$$

$$.8 \quad \mathbb{F} (!A \rightarrow !B) \vee (!B \rightarrow !C)$$

11.6 له سورونو سره تابلو کافي

بېلگه 11.10. له سورونو سره د کار پر مهال باید ډاډ واخلو چې د ځانګړي متغیر شرط نه ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځینو استنتاجونو د پلي کولو ترتیب بدلول را بدلول غواړي. په عام ډول کټه کوي چې لومړۍ د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانګړي متغیر شرط ورباندې لګېږي (په بشپړ تابلو کښې به دوی پاس راځي).

راځئ وګورو چې د ترلے فارمول $\exists x \neg !A(x) \rightarrow \neg \forall x !A(x)$ دپاره تابلو څنګه ورکوو. د معمول په شان د فرض له ثبتولو پیل کوو:

$$.1 \quad \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \quad \text{Assumption}$$

ځکه اصلي عملګر $\rightarrow$ دے، نو $\mathbb{F} \rightarrow$ پلي کوو:

$$.1 \quad \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \quad \checkmark \quad \text{Assumption}$$

$$.2 \quad \mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1$$

$$.3 \quad \mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1$$

راتلونکې د کار کرښه 2 ده. $\exists \mathbb{T}$ کاروو. دا یو نوے ثابت سمبول غواړي؛ ځکه لا هېڅ ثابت سمبولونه نه دي راغلي، هر یو ټاکلے شو، مثلاً a .

$$.1 \quad \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \quad \checkmark \quad \text{Assumption}$$

$$.2 \quad \mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \quad \checkmark \quad \rightarrow \mathbb{F} 1$$

$$.3 \quad \mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1$$

$$.4 \quad \mathbb{T} \neg \varphi(a) \quad \exists \mathbb{T} 2$$

اوس پر 3 کرښه $\neg \mathbb{F}$ پلي کوو:

$$.1 \quad \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \quad \checkmark \quad \text{Assumption}$$

$$.2 \quad \mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \quad \checkmark \quad \rightarrow \mathbb{F} 1$$

$$.3 \quad \mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \quad \checkmark \quad \rightarrow \mathbb{F} 1$$

$$.4 \quad \mathbb{T} \neg \varphi(a) \quad \exists \mathbb{T} 2$$

$$.5 \quad \mathbb{T} \forall x \varphi(x) \quad \neg \mathbb{F} 3$$

پر 4 کرښه د $\neg \mathbb{T}$ او ورپسې پر 5 کرښه د $\forall \mathbb{T}$ په پلي کولو ترلے تابلو اخلو.

.1	$\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.3	$\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{T} \neg \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	$\neg \mathbb{F} 3$
.6	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\neg \mathbb{T} 4$
.7	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\forall \mathbb{T} 5$
	$\otimes$	

بېلگه 11.11. رائجي وگورو چې د لاندې سټ دپاره تابلو څنگه ورکوو:

$$\mathbb{F} \exists x !C(x, b), \mathbb{T} \exists x (!A(x) \wedge !B(x)), \mathbb{T} \forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b)).$$

د معمول په شان له فرضونو پیل کوو:

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption

تل باید لومړۍ هغه قاعده پلي کړو چې د ځانگړي متغیر شرط لري؛ په دې حالت کېنې هغه پر 2 کرښه $\exists \mathbb{T}$ ده. ځکه فرضونه ثابت سمبول b لري، باید بل یو وکاروو؛ بیا a اخلو.

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$

که اوس پر 1 کرښه $\exists \mathbb{F}$ یا پر 3 کرښه $\forall \mathbb{T}$ پلي کړو، باید وټاکو چې د x پر ځای کومه اصطلاح t کېږدو. ځکه دا قاعدې د ځانگړي متغیر شرط نه لري، هره خوښه اصطلاح ټاکلې شو. په ځینو حالتونو کېنې ښايي قاعده څو ځله له بېلابېلو st سره پلي کول هم لازم شي. خو د عمومي قاعدې په توگه کټه کوي چې له هغو اصطلاحگانو څخه یوه واخلو چې له مخکېنې په تابلو کېنې راغلې وي—دلته a او b —او په دې حالت کېنې اټکل کول شو چې له a سره د تړلې ځانگړې لاس ته راتلل ډېر ممکن دي.

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
.6	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall \mathbb{T} 3$

پر 1 او 3 کرښو نښه لرونکي فارمولونه ته د سم نښان نه ورکوو، ځکه ښايي بیا ئې وکاروو. اوس پر 4 کرښه $\wedge \mathbb{T}$ پلي کړئ:

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
.6	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall \mathbb{T} 3$
.7	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
.8	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$

که اوس پر 6 کرښه $\rightarrow T$ پلي کړو، تابلو ترل کېږي:

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists T 2$
.5	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists F 1$
.6	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \checkmark$	$\forall T 3$
.7	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge T 4$
.8	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge T 4$
$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \psi(a) \quad \mathbb{T} \chi(a, b) \\ \otimes \quad \quad \otimes \end{array}$		$\rightarrow T 6$

بېلگه 11.12. د لاندې سټ دپاره تابلو جوړوو:

$$\mathbb{T} \forall x !A(x), \mathbb{T} \forall x !A(x) \rightarrow \exists y !B(y), \mathbb{T} \neg \exists y !B(y).$$

د معمول په شان فرضونه لیکو:

.1	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y)$	Assumption

لومړۍ پر 3 کرښه د $\neg T$ قاعده پلي کوو. د «تل لومړۍ د ځانګړي متغیر شرط لرونکې قاعدې پلي کړی» قاعدې یوه پایله دا ده: «بې د ځانګړي متغیر شرطه د سورونو قاعدې تر اړتیا پورې وځنډوئ.» همدارنګه هغه قاعدې هم وځنډوئ چې وېش رامنځته کوي.

.1	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.4	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg T 3$

نوي 4 کرښه $\exists F$ غواړي، چې د ځانګړي متغیر له شرط پرته د سور قاعده ده. نو دا ځنډوو او پر 2 کرښه $\rightarrow T$ کاروو.

.1	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.4	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg T 3$
$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \forall x \varphi(x) \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \end{array}$		$\rightarrow T 2$

دواړه نوي نښه لرونکي فارمولونه د ځانګړي متغیر د شرط لرونکې قاعدې غواړي، نو راتلونکې کام باید همدا وي:

.1	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.4	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg T 3$
$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark \quad \mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark \end{array}$		$\rightarrow T 2$
.5	$\mathbb{F} \varphi(b)$	$\forall F 5; \exists T 5$
.6	$\mathbb{T} \psi(c)$	

د څانگو د ترلو دپاره باید پر 1 او 4 کرښو نښه لرونکي فارمولونه وکاروو. د هغو اړوندې قاعدې ($\forall\mathbb{T}$ او $\exists\mathbb{F}$) د ځانګړي متغیر شرط نه لري، نو هرې مناسبې اصطلاحګانې ټاکلې شو. په دې حالت کېنې په خپل وار همدا b او c دي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-003) سرچینه دلته د دروغ-وجودي نښه لرونکي فارمول د کرښې شمېر درې ښیي، خو درېمه کرښه د نفی مقدمه ده؛ اړونده دروغ-وجودي قاعده او وروستی ونه دواړه څلورمه کرښه کاروي، نو اشاره سمه شوه.

1.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
4.	$\mathbb{F} \exists y \psi(y)$	$\neg\mathbb{T} 3$
5.	$\mathbb{F} \forall x \varphi(x) \checkmark$ $\mathbb{T} \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow\mathbb{T} 2$
6.	$\mathbb{F} \varphi(b)$ $\mathbb{T} \psi(c)$	$\forall\mathbb{F} 5; \exists\mathbb{T} 5$
7.	$\mathbb{T} \varphi(b)$ $\mathbb{F} \psi(c)$	$\forall\mathbb{T} 1; \exists\mathbb{F} 4$
	$\otimes$ $\otimes$	

تمرین 11.13. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

$$1. \mathbb{F} (\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall z (!A(z) \wedge !B(z))$$

$$2. \mathbb{F} (\exists x !A(x) \vee \exists y !B(y)) \rightarrow \exists z (!A(z) \vee !B(z))$$

$$3. \mathbb{T} \forall x (!A(x) \rightarrow !B), \mathbb{F} \exists y !A(y) \rightarrow !B$$

$$4. \mathbb{T} \forall x \neg !A(x), \mathbb{F} \neg \exists x !A(x)$$

$$5. \mathbb{F} \neg \exists x !A(x) \rightarrow \forall x \neg !A(x)$$

$$6. \mathbb{F} \neg \exists x \forall y ((!A(x, y) \rightarrow \neg !A(y, y)) \wedge (\neg !A(y, y) \rightarrow !A(x, y)))$$

تمرین 11.14. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

$$1. \mathbb{F} \neg \forall x !A(x) \rightarrow \exists x \neg !A(x)$$

$$2. \mathbb{T} (\forall x !A(x) \rightarrow !B), \mathbb{F} \exists y (!A(y) \rightarrow !B)$$

$$3. \mathbb{F} \exists x (!A(x) \rightarrow \forall y !A(y))$$

11.7 ثبوت-تیوريکي مفاهيم

اداري يادونه. دا برخه د تابلوګانو د اثبات پښی اړیکې او سازګاری تعریفونه راټولوي.

لکه څنګه چې مویو شمېر مهم معنایي مفاهيم (اعتبار، استلزام او د صدق وړتیا) تعریف کړل، اوس ورته ثبوت-تیوريکي مفاهيم تعریفوو. دا مفاهيم په جوړښتونه کېنې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له مخې نه، بلکې د ځینو ترلو تابلوګانې د موجودیت له مخې تعریفېږي. دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیې دي.

تعریف 11.15 (قضیې). یوه ترلې فارمول A هله قضیه ده چې د $\mathbb{F} !A$ دپاره ترلې تابلو موجود وي. که A قضیه وي، $\vdash !A$ لیکو، او که نه وي $\nvdash !A$ لیکو.

تعریف 11.16 (د اشتقاق وړتیا). تر لے فارمول $A!$ د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash A!$ ، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې متناهي سټ $\Gamma \supseteq \{!B_1, \dots, !B_n\}$ او د لاندې سټ دپاره تر لے تابلو موجود وي:

$$\{F!A, T!B_1, \dots, T!B_n\}.$$

که $A!$ له Γ څخه د اشتقاق وړ نه وي، $\Gamma \not\vdash A!$ لیکو.

تعریف 11.17 (سازگاري). د ترلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله ناسازگار دے چې داسې متناهي سټ $\Gamma \supseteq \{!B_1, \dots, !B_n\}$ او د لاندې سټ دپاره تر لے تابلو موجود وي:

$$\{T!B_1, \dots, T!B_n\}.$$

که Γ ناسازگار نه وي، سازگار ئې بولو.

قضیه 11.18 (انعکاسیت). که $A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash A!$.

ثبوت. که $A \in \Gamma$ وي، نو $\{A!\}$ د Γ یو متناهي فرعي سټ دے، او لاندې تابلو تر لے دے:

- | | | |
|----|------------|------------|
| 1. | $F\varphi$ | Assumption |
| 2. | $T\varphi$ | Assumption |
| | $\otimes$ | |

□

قضیه 11.19 (یکنواختي). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash A!$ وي، نو $\Delta \vdash A!$.

□

ثبوت. د Γ هر متناهي فرعي سټ د Δ هم متناهي فرعي سټ دے.

قضیه 11.20 (انتقالیت). که $\Gamma \vdash A!$ او $\{A!\} \cup \Delta \vdash B!$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash B!$.

ثبوت. که $\{A!\} \cup \Delta \vdash B!$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Delta_0 = \{!C_1, \dots, !C_n\} \subseteq \Delta$ شته چې

$$\{F!B, T!A, T!C_1, \dots, T!C_n\}$$

تر لے تابلو لري. که $\Gamma \vdash A!$ وي، نو داسې $D_1, \dots, D_m \in \Gamma$ شته چې

$$\{F!A, T!D_1, \dots, T!D_m\}$$

تر لے تابلو لري. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-004) سرچینه په منځنۍ جمله کېنې د ډي-لړ یوازې وروستی جمله د کاما فرعي سټ بولي؛ دلته د لړ ټولې جملې د کاما غړي ښودل شوې، لکه د انتقالیت تعریف چې غواړي.

اوس د لاندې فرضونو تابلو ونیسئ:

$$F!B, T!C_1, \dots, T!C_n, T!D_1, \dots, T!D_m.$$

پر $A!$ د Cut قاعده پلي کړئ. دا دوه څانګې جوړوي: یوه پکې $T!A$ ، او بله پکې $F!A$ لري. نو په یوه څانګه کېنې دا ټول موجود دي:

$$\{F!B, T!A, T!C_1, \dots, T!C_n\}$$

ځکه د دغو فرضونو دپاره تر لے تابلو شته، هغه له دې څانګې سره نښلولې شو، هره هغه څانګه ترل کېږي چې له $T!A$ څخه تېرېږي. په بله څانګه کېنې دا ټول موجود دي:

$$\{F!A, T!D_1, \dots, T!D_m\}$$

□

نو بل لورے هم بشپړولے او تر لے تابلو اخستلے شو. دا $\Gamma \cup \Delta \vdash B!$ ښيي.

پام وکړئ د دې یوه ځانګړې پایله دا ده: که $\Gamma \vdash !A$ او $A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$ له دې څخه دا هم لازمه پري چې که $A_1, \dots, A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضیه 11.21. هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هرې ترلے فارمول A دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

□

ثبوت. تمرین.

تمرین 11.22. 11.21 ثابت کړئ.

قضیه 11.23. (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$ وي.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \dots, !B_n\}$ او د لاندې دپاره ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

همدا تابلو، $\Gamma_0 \vdash !A$ هم ښيي.

2. که Γ ناسازګار وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \dots, !B_n\}$ دپاره د لاندې یو ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

دا ترلے تابلو ښيي چې Γ_0 ناسازګار دے.

□

11.8 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابتوو. دوی په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا قضیې په ثبوت کېږي ونډه ولري.

قضیه 11.24. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي $\Gamma_0 = \{!B_1, \dots, !B_n\}$ او $\Gamma_1 = \{!C_1, \dots, !C_m\} \subseteq \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

$$\{\mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \dots, \mathbb{T}!C_m\}$$

ترلي تابلوکاني لري. پر A د Cut قاعدې په کارولو دا په یوه ترلي تابلو کېږي یو ځای کول شو چې د $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ ناسازګاري ښيي. ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، له دې امله Γ ناسازګار دے. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-005) سرچینه د دویم متناهي سټ په تعریف کېږي لږ په اړه شاخص پای ته رسوي، خو په تابلو کېږي ټي وروسته غږے د اړه شاخص لري، دلته د لږ وروسته شاخص یو شان شوی دے.

□

قضیه 11.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړۍ فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ ، یعنې د لاندې دپاره ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

د $\mathbb{T}$ قاعدې په کارولو دا د لاندې دپاره په ترلي تابلو اړولے شو:

$$\{\mathbb{T}\neg!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}.$$

بل لوري ته، که د وروستي سټ دپاره ترلے تابلو وي، د لومړي سټ په ترلي تابلو ئې اړولے شو: هغه هر فارمول رنگوو چې پر لومړي فرض $\mathbb{T}\neg!A$ د $\mathbb{T}$ له کارونې راولټلے وي، خپله دغه فرض هم رنگوو، او فرض $\mathbb{F}!A$ ورزياتوو. ځکه که کومه څانگه مخکېني د $\mathbb{T}$ د هغې پايلې له امله ترلې وه چې پر $\mathbb{T}\neg!A$ پلي شوې، یعنې $\mathbb{F}!A$ ، نو په نوي تابلو کېني اړونده څانگه هم ترلې ده. که په زور تابلو کېني کومه څانگه د فرض $\mathbb{T}\neg!A$ او $\mathbb{F}\neg!A$ دواړو له امله ترلې وه، پر $\mathbb{F}\neg!A$ په پلي کولو او د $\mathbb{T}!A$ په اخستلو ئې په ترلې څانگه اړولے شو. دا څانگه ځکه ترل کېږي چې $\mathbb{F}!A$ مو د فرض په توگه ورزيات کړے دے. □

تمرین 11.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg!A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي.

قضيه 11.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg!A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg!A \in \Gamma$ بيا داسې $B_1, \dots, B_n \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

ترلے تابلو لري. فرض $\mathbb{F}!A$ په $\mathbb{T}\neg!A$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته هغه $\mathbb{F}!A$ پايله ورننښاي چې پر $\mathbb{T}\neg!A$ د $\mathbb{T}$ له کارونې راځي. په زور تابلو کېني هره ترلے فارمول چې د 1 کېني په حواله توجیه شوې وه، اوس د $n+1$ کېني په حواله توجیه کېږي. نو که زور تابلو ترلے و، نوے تابلو هم ترلے دے. دا د Γ ناسازگاري ښيي؛ ځکه ټول فرضونه په Γ کېني دي. د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-006) سرچينه د «داسې چې» وروسته يو بې دليله تېک شاتګې پردي؛ دلته لرې شولے دے. د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-007) سرچينه وايي د رښتوني نفي قاعده پر دروغې جملې پلي کېږي؛ قاعده په حقيقت کېني پر رښتوني نفي شوې جملې پلي کېږي او دروغ مثبت فارمول راوباسي، لکه د همدې ثبوت په راتلونکې جمله کېني. □

قضيه 11.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg!A\}$ دواړه ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. که داسې $B_1, \dots, B_n \in \Gamma$ او $C_1, \dots, C_m \in \Gamma$ وي چې

$$\{\mathbb{T}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

$$\{\mathbb{T}\neg!A, \mathbb{T}!C_1, \dots, \mathbb{T}!C_m\}$$

دواړه ترلي تابلوګانې ولري، يو داسې که تابلو جوړولے شو چې د Γ ناسازگاري ښيي. د فرضونو په توگه $\mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n$ له $\mathbb{T}!C_1, \dots, \mathbb{T}!C_m$ سره يو ځای کاروو، او بيا د Cut قاعده پلي کوو. دا دوه څانګې ورکوي: يوه په $\mathbb{T}!A$ او بله په $\mathbb{F}!A$ پيلېږي.

په کين لوري کېني د لومړي تابلو د فرضونو لاندې برخه ورزياته کړئ. دلته د قاعدې هره کارونه لا هم سمه ده؛ ځکه د لومړي تابلو هر فرض، د $\mathbb{T}!A$ په شمول، موجود دے. نو د $\mathbb{T}!A$ لاندې هره څانگه ترل کېږي.

په ښي لوري کېني د دويم تابلو د فرض لاندې برخه ورزياته کړئ، خو د $\mathbb{T}\neg!A$ پر فرض د $\mathbb{T}$ د هرې کارونې پايلې ترې لرې کړئ. پر $\mathbb{T}\neg!A$ د $\mathbb{T}$ پايله $\mathbb{F}!A$ ده، چې بيا هم موجوده ده؛ ځکه د که تابلو په ښي لوري کېني د Cut قاعدې پايله ده.

که په دويم تابلو کېني کومه څانگه د فرض $\mathbb{T}\neg!A$ (چې په که تابلو کېني نور فرض نه دے) او $\mathbb{F}\neg!A$ دواړو له امله ترلې وه، پر $\mathbb{F}\neg!A$ په پلي کولو $\mathbb{T}!A$ اخستلے شو. اوس په که تابلو کېني اړونده څانگه هم ترل کېږي؛ ځکه د Cut قاعدې ښي پايله، $\mathbb{F}!A$ ، پکې ده. که په دويم تابلو کېني يوه څانگه د بل کوم لامل له امله ترلې وه، په که تابلو کېني اړونده څانگه هم ترلې ده؛ ځکه په زور، دويم تابلو کېني پر څانگه له $\mathbb{T}\neg!A$ پرته هر بل ښه لرونکي فارمولونه د که تابلو پر اړوندې څانګې هم راځي. □

11.9 د اشتقاق وړتیا او قضیوي رابطونه

ثابتو چې د تابلوگانو د اشتقاق وړتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضیوي رابطونو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي؛ لکه $A \wedge !B \vdash !A$ او $A \rightarrow !B \vdash !B$ (مودوس پوننس) - دا حقیقتونه د بشپړتیا قضیې د ثبوت دپاره پکار دي -

قضیه 11.29. 1. دواړه $A \wedge !B \vdash !A$ او $A \wedge !B \vdash !B$ -

2. $!A, !B \vdash A \wedge !B$ -

ثبوت. 1. د $\{!A, T!A \wedge !B\}$ او $\{!B, T!A \wedge !B\}$ دواړو دپاره ترلې تابلوگانې شته:

.1	$\mathbb{F} \varphi$	Assumption
.2	$T \varphi \wedge \psi$	Assumption
.3	$T \varphi$	$\wedge T 2$
.4	$T \psi$	$\wedge T 2$
	$\otimes$	

.1	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
.2	$T \varphi \wedge \psi$	Assumption
.3	$T \varphi$	$\wedge T 2$
.4	$T \psi$	$\wedge T 2$
	$\otimes$	

2. د $\{T!A, T!B, \mathbb{F}!A \wedge !B\}$ دپاره لاندې ترلې تابلو دے:

.1	$\mathbb{F} \varphi \wedge \psi$	Assumption
.2	$T \varphi$	Assumption
.3	$T \psi$	Assumption
.4	$\begin{array}{cc} \swarrow & \searrow \\ \mathbb{F} \varphi & \mathbb{F} \psi \end{array}$	$\wedge \mathbb{F} 1$
	$\otimes \quad \otimes$	

د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-008) سرچینه په لومړیو څلورو تابلوگانو کېنې د اتو نښه لرونکو فارمولونو د نښې او فارمول تر منځ جلا کونکې قوس غورځوي؛ دلته د تعریف شوې دوه-ارگومېنټه د $\mathbb{F} \varphi \wedge \psi$ دوه-ارگومېنټه بڼه بېرته راوړل شوې ده. □

قضیه 11.30. 1. $!A \vee !B, \neg !A, \neg !B$ ناسازگار دے -

2. دواړه $A \vdash !A \vee !B$ او $B \vdash !A \vee !B$ -

ثبوت. 1. د $\{T!A \vee !B, T\neg !A, T\neg !B\}$ ترلې تابلو ورکړو:

.1	$T \varphi \vee \psi$	Assumption
.2	$T \neg \varphi$	Assumption
.3	$T \neg \psi$	Assumption
.4	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg T 2$
.5	$\mathbb{F} \psi$	$\neg T 3$
.6	$\begin{array}{cc} \swarrow & \searrow \\ T \varphi & T \psi \end{array}$	$\vee T 1$
	$\otimes \quad \otimes$	

2. د $\{\mathbb{F}!A \vee !B, \mathbb{T}!B\}$ او $\{\mathbb{F}!A \vee !B, \mathbb{T}!A\}$ دواړو دپاره ترلي تابلوگانې شته:

.1	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
.3	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

.1	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
.3	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

□

قضيه 11.31. 1. $\neg!A, !A \rightarrow !B \vdash B$

2. دواړه $\neg!A \vdash !A \rightarrow !B$ او $\neg!B \vdash !A \rightarrow !B$

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!A \rightarrow !B, \mathbb{T}!A\}$ يو ترلې تابلو شته:

.1	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
	$\swarrow \quad \searrow$	
.4	$\mathbb{F} \varphi \quad \mathbb{T} \psi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
	$\otimes \quad \otimes$	

2. د $\{\mathbb{F}!A \rightarrow !B, \mathbb{T}!B\}$ او $\{\mathbb{F}!A \rightarrow !B, \mathbb{T}\neg!A\}$ دواړو دپاره ترلي تابلوگانې شته:

.1	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.5	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

.1	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

□

11.10 د اشتقاق وړتیا او سورونه

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د تابلو قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقیقتونه ورکړي چې په دې برخه کې ثابتېږي.

قضیه 11.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $A(x)$ کېنې نه راځي، او $\Gamma \vdash A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x A(x)$.


ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash A(c)$ ، یعنې داسې $B_1, \dots, B_n \in \Gamma$ او د لاندې دپاره ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F} A(c), \mathbb{T} B_1, \dots, \mathbb{T} B_n\}.$$

باید وښیو چې د لاندې دپاره هم ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F} \forall x A(x), \mathbb{T} B_1, \dots, \mathbb{T} B_n\}.$$

ترلے تابلو واخلي، لومړۍ فرض ئې په $\mathbb{F} \forall x A(x)$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته $\mathbb{F} A(c)$ ورننښای.



تابلو لا هم ترلے دے؛ ځکه ټولې هغه ترلې فارمولونه چې مخکېنې د فرضونو په توګه موجودې وې، اوس هم د تابلو په سر کېنې موجودې دي. ننوېستل شوې کرښه د $\forall \mathbb{F}$ قاعدې د سمې کارونې پایله ده؛ ځکه ثابت سمبول c په $B_1, \dots, B_n$ یا $\forall x A(x)$ کېنې نه راځي، یعنې په نوي تابلو کېنې د ننوېستل شوې کرښې پاس نه راځي.

□

قضیه 11.33.1. $A(t) \vdash \exists x A(x)$.

2. $\forall x A(x) \vdash A(t)$.

ثبوت. **1.** د $\mathbb{F} \exists x A(x), \mathbb{T} A(t)$ دپاره ترلے تابلو دا دے:

.1	$\mathbb{F} \exists x \varphi(x)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \varphi(t)$	Assumption
.3	$\mathbb{F} \varphi(t)$	$\exists \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

2. د $\mathbb{F} \varphi(t), \mathbb{T} \forall x A(x)$ دپاره ترلے تابلو دا دے:

.1	$\mathbb{F} \varphi(t)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \varphi(t)$	$\forall \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

□

11.11 سموله

د تابلوگانو په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نه کړي چې په حقیقت کېنې نه وي. نو سموله د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خونديتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تئوریکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ A ! معتبر دے؛

2. که ترله فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛

3. که د ترلي فارمولونه یو سټ ناسازگار وي، د صدق وړ نه دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نه وي، اشتقاق نظام نیکه دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموله ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

ځکه دغه ټول ثبوت-تئوریکي خاصیتونه د یو یا بل ډول د ترلو تابلوگانې له لارې تعریف شوي دي، د پورته (۱)–(۳) ثابتول غواړي چې د ترلو تابلوگانې د معنایي خاصیتونو په اړه یو څه ثابت کړو. لومړۍ به تعریف کړو چې د یو نښه لرونکې فارمول پوره کېدل په یو جوړښت کېنې څه معنی لري؛ بیا به وښیو چې که یو تابلو ترله وي، هېڅ جوړښت ئې ټول فرضونه نه پوره کوي. وروسته (۱)–(۳) د دې پایلې د لازمو نتیجو په توګه راځي.

تعریف 11.34. جوړښت $\mathcal{M}$ یو نښه لرونکې فارمول $T!A$ هله او یوازې هله پوره کوي چې $\mathcal{M} \models A$ ، او $\mathbb{F}!A$ هله او یوازې هله پوره کوي چې $\mathcal{M} \not\models A$. د نښه لرونکې فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله پوره کوي چې هر $S!A \in \Gamma$ پوره کړي. Γ هله د صدق وړ دے چې کوم جوړښت ئې پوره کړي، او که داسې نه وي د صدق وړ نه دے.

قضیه 11.35 (سموله). که Γ یو ترله تابلو ولري، نو Γ د صدق وړ نه دے.

ثبوت. د یو تابلو څانګه هله او یوازې هله د صدق وړ بولو چې پر هغې د نښه لرونکې فارمولونه سټ د صدق وړ وي؛ او تابلو هله د صدق وړ بولو چې لږ تر لږه یوه د صدق وړ څانګه ولري.

دا خبره ښیو: د استنتاج د کومې قاعدې په وسیله د یو د صدق وړ تابلو پراخول تل یو د صدق وړ تابلو ورکوي. دا به قضیه ثابته کړي: هر ترله تابلو د Γ یوازې له فرضونو څخه جوړ تابلو ته د استنتاج د قاعدو په پلي کولو تر لاسه کېږي. نو که Γ د صدق وړ وای، د هغې هر تابلو به د صدق وړ و. خو ترله تابلو په څرګند ډول د صدق وړ نه دے: هر څانګه دواړه $T!A$ او $\mathbb{F}!A$ لري، او هېڅ جوړښت نه شي کولې چې A ! هم پوره او هم نه پوره کړي.

فرض کړئ یو د صدق وړ تابلو لرو، یعنې داسې تابلو چې لږ تر لږه یوه د صدق وړ څانګه لري. د استنتاج قاعده یا یوې څانګې ته نښه لرونکې فارمولونه ورزیاتوي یا یوه څانګه په دوو وېشي. که په تابلو کېنې کومه د صدق وړ څانګه وي چې اړوند قاعدوي تطبیق ئې نه پراخوي، هغه په پراخ شوي تابلو کېنې هم د صدق وړ پاتې کېږي؛ نو پراخ شوی تابلو د صدق وړ دے. ځکه یوازې هغه حالت څېړل پکار دي چې قاعده پر یوې د صدق وړ څانګې پلي کېږي.

Γ پر هغې څانګې د نښه لرونکې فارمولونه سټ وېلي، او $S!A \in \Gamma$ هغه نښه لرونکې فارمول وېلي چې قاعده پرې پلي کېږي. که قاعده څانګه نه وېشي، باید وښیو چې پراخه شوې څانګه، یعنې Γ له قاعدوي پایلو سره، لا هم د صدق وړ ده. که قاعده څانګه وېشي، باید وښیو چې له دوو ترلاسه شوو څانګو لږ تر لږه یوه د صدق وړ ده.

لومړۍ هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څانګه نه وېشي.

1. څانګه پر $\neg B \in \Gamma$ یا $\neg B \in \Gamma$ په پلي کولو پراخېږي. بیا پراخه شوې څانګه د $\Gamma \cup \{\mathbb{F}!B\}$ نښه لرونکې فارمولونه لري. فرض کړئ

$\mathcal{M} \models \Gamma$ په ځانګړي ډول $\mathcal{M} \models \neg B$. نو $\mathcal{M} \not\models B$ ، یعنې $\mathcal{M} \models \mathbb{F}!B$ پوره کوي.

2. څانګه پر $\neg B \in \Gamma$ یا $\neg B \in \Gamma$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

3. څانګه پر $\mathbb{T}!B \wedge C \in \Gamma$ د $\mathbb{T}!B$ په پلي کولو پراخېږي؛ له دې څخه پر څانګه دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{T}!C$ - فرض کړئ $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانګړي ډول $\mathbb{M} \models B \wedge C$ - بیا $\mathbb{M} \models B$ او $\mathbb{M} \models C$ - یعنې $\mathbb{M}$ دواړه $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{T}!C$ پوره کوي.

4. څانګه پر $\mathbb{F}!B \vee C \in \Gamma$ د $\mathbb{F}!B$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

5. څانګه پر $\mathbb{F}!B \rightarrow C \in \Gamma$ د $\mathbb{F}!B$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر څانګه دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{F}!C$ - فرض کړئ $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانګړي ډول $\mathbb{M} \models B \rightarrow C$ - بیا $\mathbb{M} \models B$ او $\mathbb{M} \not\models C$ - یعنې $\mathbb{M}$ دواړه $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{F}!C$ پوره کوي.

د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-009) سرچینې په دواړو کلي-کمیت ټاکونکو قاعدوي حالتونو کېنې د قاعدې په مقدمه کېنې د بي میتا-فارمول لیکلې و، خو پایله او ټول ورپسې معنایي استدلال د ای میتا-فارمول کاروي. دلته ای په هر حالت کېنې یو شان ساتل کېږي.

6. څانګه پر $\mathbb{T} \forall x!A(x) \in \Gamma$ د $\mathbb{T} \forall x!A(x)$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر څانګه یو نوې نښه لرونکې فارمول $\mathbb{T}!A(t)$ ترلاسه کېږي. فرض کړئ $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانګړي ډول $\mathbb{M} \models \forall x!A(x)$ د 16.40 له مخې $\mathbb{M} \models A(t)$ نو $\mathbb{M}$ ، $\mathbb{T}!A(t)$ پوره کوي.

7. څانګه پر $\mathbb{F} \forall x!A(x) \in \Gamma$ د $\mathbb{F} \forall x!A(x)$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر څانګه یو نوې نښه لرونکې فارمول $\mathbb{F}!A(a)$ ترلاسه کېږي، چې a داسې ثابت سمبول دے چې په Γ کېنې نه راځي. ځکه Γ د صدق وړ دے، داسې $\mathbb{M}$ شته چې $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانګړي ډول $\mathbb{M} \not\models \forall x!A(x)$ باید ونښو چې $\Gamma \cup \{\mathbb{F}!A(a)\}$ د صدق وړ دے. د دې دپاره مناسب $\mathbb{M}'$ داسې تعریفوو. د 16.22 له مخې $\mathbb{M} \not\models \forall x!A(x)$ هله او یوازې هله چې د کوم s دپاره $\mathbb{M}, s \not\models A(x)$ - اوس $\mathbb{M}'$ د $\mathbb{M}$ په شان وټولئ، خو $a^{\mathbb{M}'} = s(x)$ د 16.28 له مخې، د هر $\mathbb{T}!C \in \Gamma$ دپاره $\mathbb{M}' \models C$ ، او د هر $\mathbb{F}!C \in \Gamma$ دپاره $\mathbb{M}' \not\models C$ ؛ ځکه a په Γ کېنې نه راځي.

د 16.26 له مخې $\mathbb{M}', s \not\models A(x)$ د 16.30 له مخې $\mathbb{M}', s \not\models A(a)$ ځکه $A(a)$ یوه ترلې فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathbb{M}' \not\models A(a)$ ، یعنې $\mathbb{M}' \models \mathbb{F}!A(a)$ پوره کوي.

8. څانګه پر $\mathbb{T} \exists x!B(x) \in \Gamma$ د $\mathbb{T} \exists x!B(x)$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

9. څانګه پر $\mathbb{F} \exists x!B(x) \in \Gamma$ د $\mathbb{F} \exists x!B(x)$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څانګه وېشي.

1. څانګه پر $\mathbb{F}!B \wedge C \in \Gamma$ د $\mathbb{F}!B$ په پلي کولو پراخېږي؛ له دې څخه دوه ځانګړي ترلاسه کېږي: کینه څانګه د $\mathbb{F}!B$ له لارې او بڼې څانګه د $\mathbb{F}!C$ له لارې دوام کوي. فرض کړئ $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانګړي ډول $\mathbb{M} \models B \wedge C$ - بیا یا $\mathbb{M} \not\models B$ یا $\mathbb{M} \not\models C$ - په لومړي حالت کېنې $\mathbb{M}$ ، $\mathbb{F}!B$ پوره کوي؛ یعنې $\mathbb{M}$ د کینې څانګې فارمولونه پوره کوي. په دویم حالت کېنې $\mathbb{M}$ ، $\mathbb{F}!C$ پوره کوي؛ یعنې $\mathbb{M}$ د بڼې څانګې فارمولونه پوره کوي.

2. څانګه پر $\mathbb{T}!B \vee C \in \Gamma$ د $\mathbb{T}!B$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

3. څانګه پر $\mathbb{T}!B \rightarrow C \in \Gamma$ د $\mathbb{T}!B$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

4. څانګه د Cut په وسیله پراخېږي. له دې څخه دوه ځانګړي ترلاسه کېږي: یوه $\mathbb{T}!B$ او بله $\mathbb{F}!B$ لري. ځکه $\mathbb{M} \models \Gamma$ او یا $\mathbb{M} \models B$ یا $\mathbb{M} \not\models B$ - کینه یا بڼې څانګه پوره کوي.

□

تمرین 11.36، د 11.35 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 11.37. که $A \vdash A$ وي، نو $A!$ معتبر دے.

نتیجه 11.38. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \models !A$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د ځینو $B_1, \dots, B_n \in \Gamma$ دپاره $\{!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$ یو ترله تابلو لري. د 11.35 له مخې، هر جوړښت $\mathcal{M}$ یا کوم B_i ناسموي یا A رښتیا کوي. نو که $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، بیا $\mathcal{M} \models !A$ هم ده. □

نتیجه 11.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازگار ده.

ثبوت. مقابل عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازگار نه ده. بیا $B_1, \dots, B_n \in \Gamma$ شته او د $\{\mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$ دپاره یو ترله تابلو شته. د 11.35 له مخې، داسې $\mathcal{M}$ نشته چې د ټولو $i = 1, \dots, n$ دپاره $\mathcal{M} \models !B_i$ وي. خو بیا Γ د صدق وړ نه ده. □

11.12 له عینیت سره تابلوګانې

له عینیت سره تابلوګانې د استنتاج اضافي قاعدې غواړي. د $=$ قاعدې دا دي $(t, t_1$ او t_2 ترلي ترمونه دي):

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{T} t_1 = t_2 & \mathbb{T} t_1 = t_2 & \\ =\mathbb{F} \frac{\mathbb{F} !A(t_1)}{\mathbb{F} !A(t_2)} & =\mathbb{T} \frac{\mathbb{T} !A(t_1)}{\mathbb{T} !A(t_2)} & = \frac{}{\mathbb{T} t = t} \end{array}$$

پام وکړئ چې له نورو ټولو قاعدو سره په توپیر کېنې، $=\mathbb{T}$ او $=\mathbb{F}$ غواړي چې دوه نښه لرونکي فارمولونه له وړاندې پر څانګه وي؛ یعنې دواړه $\mathbb{T} t_1 = t_2$ او $S!A(t_1)$.

بېلګه 11.40. که s او t ترلي ترمونه وي، نو $s = t, !A(s) \vdash !A(t)$.

1. $\mathbb{F} \varphi(t)$ Assumption
 2. $\mathbb{T} s = t$ Assumption
 3. $\mathbb{T} \varphi(s)$ Assumption
 4. $\mathbb{T} \varphi(t)$ $=\mathbb{T} 2, 3$
- ⊗

کېده شي دا د یو شان څیزونو د تعویض د اصل یا د لایښځ د قانون په نوم درته اشنا وي.

تابلوګانې ثابتوي چې $=$ متناظره ده، یعنې $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$.

1. $\mathbb{F} s_2 = s_1$ Assumption
 2. $\mathbb{T} s_1 = s_2$ Assumption
 3. $\mathbb{T} s_1 = s_1$ $=$
 4. $\mathbb{T} s_2 = s_1$ $=\mathbb{T} 2, 3$
- ⊗

دلته کرښه 2 د $\mathbb{T} s_1 = s_2$ لومړنۍ اړین فارمول ده. کرښه 3 دویم اړین فارمول ده، چې د $\mathbb{T} !A(s_1)$ ښه لري. $A(x)$ د $s_1 = x$ په توګه وګڼئ؛ بیا $!A(s_1)$ ، $s_1 = s_1$ او $!A(s_2)$ ، $s_2 = s_1$ کېږي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-010) سرچینې کرښه درې د اې د دویم ترم ښه بللې وه، خو د قاعدې په دې تطبیق کېنې هغه د اې د لومړي ترم ښه ده، لکه ورپسې تشریح چې هم ښیي.

تابلوګان دا هم ثابتوي چې $=$ انتقالی ده، یعنې $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$.

- | | | |
|----|------------------------|--------------------|
| 1. | $\mathbb{F} s_1 = s_3$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} s_1 = s_2$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} s_2 = s_3$ | Assumption |
| 4. | $\mathbb{T} s_1 = s_3$ | $=\mathbb{T} 3, 2$ |
- $\otimes$

په دې ټابلو کښې د $\mathbb{T} =$ لومړنۍ اړین فارمول کرښه 3، $\mathbb{T} s_2 = s_3$ ده (s_2 د t_1 او s_3 د t_2 ونډه لري). دویم اړین فارمول چې د $\mathbb{T} !A(s_2)$ ښه لري، کرښه 2 ده. دلته $A(x)$ د $s_1 = x$ په توګه وګڼئ؛ په دې سره $!A(s_2)$ ، $s_1 = s_2$ (یعنې کرښه 2) او $!A(s_3)$ په پایله کښې فارمول $s_1 = s_3$ کېږي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-011) سرچینې د اې د دویم ترم د بڼې د پراخولو پر ځای د قاعدې عمومي برابري لیکلې وه؛ خو د همدلته ټاکل شوي اې له مخې اړوند فارمول د لومړي او دویم ترم برابري ده.

تمرین 11.41. د لاندې دپاره ترلې ټابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F} \forall x \forall y ((x = y \wedge !A(x)) \rightarrow !A(y))$
2. $\mathbb{F} \exists x (!A(x) \wedge \forall y (!A(y) \rightarrow y = x))$
- $\mathbb{T} \exists x !A(x) \wedge \forall y \forall z ((!A(y) \wedge !A(z)) \rightarrow y = z)$

11.13 له عینیت سره سمواله

قضیه 11.42. د عینیت له قاعدو سره ټابلوګانې سم دي: هېڅ ترلې ټابلو د صدق وړ نه دے.

ثبوت. یوازې باید د پخوا په شان وښیو چې که یو ټابلو د صدق وړ څانګه ولري، نو د $=$ له قاعدو څخه د یوې په پلي کولو ترلاسه شوې څانګه هم د صدق وړ ده. Γ پر څانګه د نښه لرونکو فارمولونه سټ وېوئ، او $\mathcal{M}$ داسې جوړښت وېوئ چې Γ پوره کوي.

فرض کړئ څانګه د $=$ په کارولو، یعنې د نښه لرونکي فارمول $\mathbb{T} t = t$ په زیاتولو پراخېږي. په څرګند ډول $\mathcal{M} \models t = t$ ؛ نو $\mathcal{M}, \Gamma \cup \{\mathbb{T} t = t\}$ هم پوره کوي.

که څانګه د $\mathbb{T} =$ په کارولو پراخېږي، موږ یو نښه لرونکي فارمول $\mathbb{T} !A(t_2)$ ورزیاتوو، خو Γ دواړه $\mathbb{T} !A(t_1)$ او $\mathbb{T} t_1 = t_2$ لري. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-012) سرچینې د رښتوني-عینیت قاعدې پایلې ته عمومي S نښه ورکړې وه؛ د قاعدې، دواړو مقدمو او لاندې معنایي ثبوت له مخې دا رښتوني نښه ده. نو $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ او $\mathcal{M} \models !A(t_1)$ لرو. داسې متغیر-ټاکنه s واخلي چې $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$ د 16.20 له مخې $\mathcal{M}, s \models !A(t_1)$ ځکه $s \sim_x s$ ، د 16.30 له مخې $\mathcal{M}, s \models !A(x)$ ځکه $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ ، نو $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ ، او ځکه $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ د 16.30 په بیا پلي کولو $\mathcal{M}, s \models !A(t_2)$ هم لرو. د 16.20 له مخې $\mathcal{M} \models !A(t_2)$ د $\mathbb{F} =$ حالت هم په همدې ډول حل کېږي.

□

باب 12

بديهي اشتقاقونه

ادارقي يادونه- لا تراوسه دا څه نه ده شوې چې ډاډ ترلاسه شي چې د دې څپرکي مواد د هغو بېلابېلو ټاکنو درناوې کوي چې بڼي کوم نښلوانکي او کمیت ټاکنو بڼستيز يا تعريف شوي دي: له $\leftrightarrow$ پرته، چې تعريف شوې ګڼل کېږي، ټول بڼستيز ګڼل شوي دي- که د لومړۍ درجې منطق ټاک رښتونه وي، له کمیت ټاکنو سره بڼه جوړوو؛ که نه وي، بې له هغو بڼه جوړوو-

12.1 قاعدې او اشتقاقونه

بديهي اشتقاقونه بڼايي د منطق د اشتقاق تر ټولو ساده نظام وي- اشتقاق يوازې د فارمولونه يوه لړۍ ده- د اشتقاق ګڼل کېدو دپاره، په لړۍ کېنې هر فارمول بايد يا د کوم بديهي اصل يوه بېلګه وي، يا د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له يوه يا زياتو هغو فارمولونه څخه راشي چې په لړۍ کېنې ترې وړاندې دي- اشتقاق خپل وروسته فارمول، اشتقاق کوي-

تعريف 12.1 (د اشتقاق وړتيا). که Γ د $\mathcal{L}$ د فارمولونه يو سټ وي، نو له Γ څخه يو اشتقاق د فارمولونه يوه متناهي لړۍ $A_1, \dots, A_n$ ده، چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه يو شرط پوره کېږي:

1. $A_i \in \Gamma$ ؛ يا

2. A_i يو بديهي اصل دے؛ يا

3. A_i د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له کوم A_j (او A_k) څخه راځي، چې $j < i$ (او $k < i$) -

دا چې سم اشتقاق څه ګڼل کېږي، په دې پورې اړه لري چې موږ کومې استنتاجي قاعدې منو (او البته کوم څيزونه بديهي اصول ګڼو)- استنتاجي قاعده يوه که-نو وينا ده چې راته وايي د ځينو شرطونو لاندې په اشتقاق کېنې يو ګام A_i سم استنتاجي ګام دے- د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-001) سرچينې په دې يو ځای کېنې د اې-آی د ميتا-فارمول لښه پرېښې وه؛ تعريف او د همدې پاراګراف نورې ټولې کارونې هغه د فارمول په توګه ليکي، نو لښه دلته بېرته راوستل شوه-

تعريف 12.2 (د استنتاج قاعده). د استنتاج قاعده يو بس شرط ورکوي چې له Γ څخه په اشتقاق کېنې څه شی سم استنتاجي ګام ګڼل کېږي-

د بېلګې په توګه، ځکه چې هره يو-غږيزه لړۍ A چې $A \in \Gamma$ وي، په څرګند ډول اشتقاق ګڼل کېږي، لاندې ډېره ساده استنتاجي قاعده کېدے شي:

که $A \in \Gamma$ وي، نو A له Γ څخه په هر اشتقاق کېنې تل سم استنتاجي ګام دے-

همدارنګه که A له بديهي اصولو څخه يو وي، نو يوازې A هم اشتقاق دے؛ ځکه دا هم يوه استنتاجي قاعده ده:

که A ! بدیهي اصل وي، نو A ! سم استنتاجي کام دے۔

خبره هغه وخت لا په زړه پورې شي چې استنتاجي قاعده هغو فارمولونه ته رجوع کوي چې تر خپرل شوي کام وړاندې راغلي وي۔ لاندې قاعده مودوس پونس بلل کېږي:

که $A \rightarrow B$! او B ! په اشتقاق کېنې وړاندې راغلي وي، نو A ! سم استنتاجي کام دے۔

که همدا یوازینی استنتاجي قاعده وي، نو د اشتقاق پورته تعریف مو داسې کېږي: $A_1, \dots, A_n$! هله او یوازې هله اشتقاق دے چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه یو شرط پوره کېږي:

1. $A_i \in \Gamma$!؛ یا

2. A_i ! یو بدیهي اصل دے؛ یا

3. د کوم $j < i$ دپاره A_j !، $A_i \rightarrow B$! وي، او د کوم $k < i$ دپاره A_k !، B ! وي۔

وروسته بند وایي چې A_i ! له A_j ! ($A_i \rightarrow B$!) او A_k ! (B !) څخه د مودوس پونس په وسیله راځي۔ که له 1 څخه تر n پورې تېرېدے شو، او هر ځل داسې فارمول A_i ! ومومو چې یا په Γ کېنې وي، یا بدیهي اصل وي، یا استنتاجي قاعده راته وایي چې سم استنتاجي کام دے، نو ټوله لړۍ سم اشتقاق ګڼل کېږي۔

تعریف 12.3 (د اشتقاق وړتیا). یو فارمول A ! هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash A$! لیکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په A ! پاي ته رسېږي۔

تعریف 12.4 (قضیې). فارمول A ! هله قضیه ده چې له تش سب څخه د A ! یو اشتقاق وي۔ که A ! قضیه وي A !، او که نه وي A ! لیکو۔

12.2 د قضیې نښلونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 12.5 (بدیهي اصول). د قضیې نښلونکو د بدیهي اصولو سب Ax_0 د لاندې ټولو بنو فارمولونه لري:

$$(A \wedge B) \rightarrow A \quad)12.1($$

$$(A \wedge B) \rightarrow B \quad)12.2($$

$$A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B)) \quad)12.3($$

$$A \rightarrow (A \vee B) \quad)12.4($$

$$A \rightarrow (B \vee A) \quad)12.5($$

$$(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \vee B \rightarrow C)) \quad)12.6($$

$$A \rightarrow (B \rightarrow A) \quad)12.7($$

$$(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C)) \quad)12.8($$

$$(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A) \quad)12.9($$

$$\neg A \rightarrow (A \rightarrow B) \quad)12.10($$

$$\top \quad)12.11($$

$$\perp \rightarrow A \quad)12.12($$

$$(A \rightarrow \perp) \rightarrow \neg A \quad)12.13($$

$$\neg \neg A \rightarrow A \quad)12.14($$

تعریف 12.6 (مودوس پونس). که B ! او $A \rightarrow B$! له وړاندې په اشتقاق کېنې راغلي وي، نو A ! سم استنتاجي کام دے۔

د مودوس پونس قاعده به په “MP” لنډوو۔

12.3 د کټیت ټاکونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 12.7 (د کټیت ټاکونکو بدیهي اصول). پر کټیت ټاکونکو واکمن بدیهي اصول د لاندې ټولو بنو بېلګې دي:

$$\forall x !B \rightarrow !B(t), \quad (12.15)$$

$$!B(t) \rightarrow \exists x !B. \quad (12.16)$$

د هر ترلي ترم t دپاره.

تعریف 12.8 (د کټیت ټاکونکو قاعدې).

که $B \rightarrow !A(a)$ له وړاندې په اشتقاق کېنې راغله وي او a په Γ یا B کېنې نه راځي، نو $B \rightarrow \forall x !A(x)$ سم استنتاجي کلام دے.

که $A(a) \rightarrow !B$ له وړاندې په اشتقاق کېنې راغله وي او a په Γ یا B کېنې نه راځي، نو $\exists x !A(x) \rightarrow !B$ سم استنتاجي کلام دے.

له دغو دواړو هره یوه به په "QR" لندوو.

12.4 د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 12.9. فرض کړئ غواړو $(\neg !D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ ثابت کړو. دا په څرګند ډول زموږ د هېڅ بدیهي اصل بېلګه نه ده، نو د هغې د اشتقاق کولو دپاره د MP قاعده کارول پکار دي. زموږ یوازینی قاعده مودوس پوننس ده، چې A او $A \rightarrow !B$ را کړل شي، د B توجیه راکوي. یوه تګلاره دا ده چې 12.6 داسې وکاروو چې A ، $\neg !D$ ، B ، E ، او C ، $D \rightarrow !E$ وي، یعنې دا بېلګه:

$$(\neg !D \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow ((!E \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow ((\neg !D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E))).$$

ولې؟ د مودوس پوننس دوه تطبیقونه وروستی برخه راکوي، او همدا مو غوښتي ده. په اسانۍ وینو چې $\neg !D \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ د 12.10، او $E \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ د 12.7 بېلګه ده. نو زموږ اشتقاق دا دے:

1. $\neg !D \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ 12.10
2. $(\neg !D \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow$
 $((!E \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow ((\neg !D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E)))$ 12.6
3. $(!E \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow ((\neg !D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E))$ 1, 2 MP
4. $!E \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ 12.7
5. $(\neg !D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ 3, 4 MP

بېلګه 12.10. راځئ د $D \rightarrow !D$ یو اشتقاق ولټوو. دا د بدیهي اصل بېلګه نه ده، نو په MP ئې اشتقاق کول پکار دي. 12.7 د $A \rightarrow !B$ په بڼه یو بدیهي اصل دے چې MP پرې پلي کېدے شي. د کټي دپاره، البته، هغه B چې MP ئې په دې حالت کېنې د سم کلام په توګه توجیه کوي باید $D \rightarrow !D$ وي؛ ځکه همدا مو غوښتل چې اشتقاق ئې کړو. په دې سره A هم باید D وي، یعنې د 12.7 دې بېلګې ته ګلے شو:

$$!D \rightarrow (!D \rightarrow !D)$$

د MP د پلي کولو دپاره به د دویمې اړوندې مقدمې، یعنې A ، توجیه هم پکار وي. خو زموږ په حالت کېنې هغه D دے، او D په یوازې ځان اشتقاق کولے نه شو. نو بله تګلاره پکار ده.

بل بدیهي اصل چې یوازې $\rightarrow$ لري 12.8 دے، یعنې

$$(!A \rightarrow (!B \rightarrow !C)) \rightarrow ((!A \rightarrow !B) \rightarrow (!A \rightarrow !C))$$

د MP په دوه ځله پلي کولو وروستی دننې شرطی ته رسېدے شو. بیا دا معنی لري چې د 12.8 داسې بېلګه غواړو چې $A \rightarrow !C$ پکې $D \rightarrow !D$ ، یعنې زموږ موخه فارمول وي. نو A او C دواړه D دي. B څنګه وټاکو چې دواړه $A \rightarrow (!B \rightarrow !C)$ او $A \rightarrow !B$ ،

یعنې زموږ په حالت کېنې $(!B \rightarrow !D)$ او $!D \rightarrow !B$ ، هم د اشتقاق وړ وي؟ له دغو لومړنۍ، هر $!B$ چې وټاکو، لا د 12.7 بېلگه ده. او که $!B$ ، $(!D \rightarrow !D)$ وي، نو $!D \rightarrow !B$ به هم د 12.7 بله بېلگه وي. نو زموږ اشتقاق دا دے:

1. $!D \rightarrow ((!D \rightarrow !D) \rightarrow !D)$ 12.7
2. $(!D \rightarrow ((!D \rightarrow !D) \rightarrow !D)) \rightarrow$
 $((!D \rightarrow (!D \rightarrow !D)) \rightarrow (!D \rightarrow !D))$ 12.8
3. $(!D \rightarrow (!D \rightarrow !D)) \rightarrow (!D \rightarrow !D)$,1, 2 MP
4. $!D \rightarrow (!D \rightarrow !D)$ 12.7
5. $!D \rightarrow !D$,3, 4 MP

بېلگه 12.11. کله کله غواړو وښیو چې له ځینو نورو فارمولونه Γ څخه د کوم فارمول یو اشتقاق شته. مثلاً رائجی وښیو چې له $\Gamma = \{!A \rightarrow !B, !B \rightarrow !C\}$ څخه $!A \rightarrow !C$ اشتقاق کولې شو.

1. $!A \rightarrow !B$ Hyp
2. $!B \rightarrow !C$ Hyp
3. $(!B \rightarrow !C) \rightarrow (!A \rightarrow (!B \rightarrow !C))$ 12.7
4. $!A \rightarrow (!B \rightarrow !C)$,2, 3 MP
5. $(!A \rightarrow (!B \rightarrow !C)) \rightarrow$
 $((!A \rightarrow !B) \rightarrow (!A \rightarrow !C))$ 12.8
6. $((!A \rightarrow !B) \rightarrow (!A \rightarrow !C))$,4, 5 MP
7. $!A \rightarrow !C$,1, 6 MP

هغه کرښې چې “Hyp” (د “فرضي” دپاره) پرې لیکل شوي دي، ښیي چې په هغې کرښه فارمول د Γ یو غړی دے.

قضیه 12.12. که $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$ او $\Gamma \vdash !B \rightarrow !C$ وي، نو $\Gamma \vdash !A \rightarrow !C$

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$ او $\Gamma \vdash !B \rightarrow !C$. بیا له Γ څخه د $!A \rightarrow !B$ یو اشتقاق شته؛ او له Γ څخه د $!B \rightarrow !C$ یو اشتقاق هم شته. د هغو په یو بل پسې نښلولو ئې په یو اشتقاق کېنې یو ځایه کړئ. اوس د مخکېنې بېلگې د اشتقاق 3-7 کرښې ورزیاتې کړئ. دا له Γ څخه د $!A \rightarrow !C$ یو اشتقاق دے—او همدا د نوي اشتقاق وروستی کرښه ده. پام وکړئ چې د 4مې او 7مې کرښې توجیه لا هم سمه پاتې کېږي که د 1مې کرښې حواله د $!A \rightarrow !B$ د اشتقاق د وروستی کرښې په حواله، او د 2مې کرښې حواله د $!B \rightarrow !C$ د اشتقاق د وروستی کرښې په حواله بدله شي. □

تمرین 12.13. له بدیهي اصولو څخه د اشتقاقونه په وړاندې کولو وښیئ چې لاندې خبرې سمې دي:

1. $(!A \wedge !B) \rightarrow (!B \wedge !A)$
2. $((!A \wedge !B) \rightarrow !C) \rightarrow (!A \rightarrow (!B \rightarrow !C))$
3. $\neg(!A \vee !B) \rightarrow \neg !A$

12.5 له کمیت ټاکونکو سره اشتقاقونه

بېلگه 12.14. رائجی د $(\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall x (!A(x) \wedge !B(x))$ یو اشتقاق ورکړو. لومړۍ پام وکړئ چې

$$(\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall x !A(x)$$

د 12.1 یوه بېلگه ده، او

$$\forall x !A(x) \rightarrow !A(a)$$

د 12.15 بېلگه ده. نو د 12.12 له مخې پوهېږو چې

$$(\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow !A(a)$$

د اشتقاق وړ دے. همدارنګه، ځکه

$$\begin{aligned} (\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) &\rightarrow \forall y !B(y) \quad \text{او} \\ \forall y !B(y) &\rightarrow !B(a) \end{aligned}$$

په ترتیب د 12.2 او 12.15 بېلګې دي،

$$(\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow !B(a)$$

د 12.12 په وسیله د ثبوت وړ دے. د 12.3 د یوې مناسبې بېلګې او د MP د دوو تطبیقونو په کارولو وینو چې

$$(\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow (!A(a) \wedge !B(a))$$

د ثبوت وړ دے. اوس QR پلي کول شو او دا ترلاسه کوو:

$$(\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall x (!A(x) \wedge !B(x)).$$

12.6 ثبوت-تیوريکي مفاهیم

لکه څنګه چې موږ شمېر مهم معنایي مفاهیم (اعتبار، معنایي لازمیت او د صدق وړتیا) تعریف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تیوريکي مفاهیم تعریفوو. دا د جوړښتونه په دننه کې د ترلي فارمولونه پوره کېدو ته په رجوع نۀ، بلکې د ځینو فارمولونو د اشتقاق وړتیا یا د اشتقاق نۀ وړتیا ته په رجوع تعریفېږي. دا یوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم یو شان راځي. د هغو یو شان راتلل د سموالي او بشپړوالي د قضیو منځپانګه ده.

تعریف 12.15 (د اشتقاق وړتیا). فارمول A هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash A$ لیکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په A پاي ته رسېږي.

تعریف 12.16 (قضی). فارمول A هله قضیه ده چې له تش سټ څخه د A یو اشتقاق وي. که A قضیه وي $\vdash A$ ، او که نۀ وي $\nvdash A$ لیکو.

تعریف 12.17 (سازګاري). د فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله سازګار دے چې $\Gamma \not\vdash \perp$ ؛ که داسې نۀ وي ناسازګار دے.

قضیه 12.18 (انعکاس). که $A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash A$.

□

ثبوت. یوازې فارمول A له Γ څخه د A یو اشتقاق دے.

قضیه 12.19 (زیاتېدنه). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Delta \vdash A$.

□

ثبوت. له Γ څخه د A هر اشتقاق له Δ څخه هم د A یو اشتقاق دے.

قضیه 12.20 (انتقال). که $\Gamma \vdash A$ او $\{A\} \cup \Delta \vdash B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash B$.

ثبوت. فرض کړئ $\{A\} \cup \Delta \vdash B$. بیا له $\{A\} \cup \Delta$ څخه یو اشتقاق $B_1, \dots, B_l = B$ شته. په دې اشتقاق کېنې ځینې کامونه به د هغې قاعدې له مخې سم وي چې کومې مخکېنې کرښې $B_i = A$ ته رجوع کوي. د فرض له مخې له Γ څخه د A یو اشتقاق شته؛ یعنې داسې اشتقاق $A_1, \dots, A_k = A$ چې هر A_i یا بدیهي اصل وي، یا د Γ یو غړی وي، یا د استنتاج د قاعدې له مخې سم وي. اوس دا لړۍ په پام کېنې ونیسئ:

$$A_1, \dots, A_k = A, B_1, \dots, B_l = B.$$

دا له $\Gamma \cup \Delta$ څخه د B سم اشتقاق دے؛ ځکه هر $B_i = A$ اوس د هماغې قاعدې له مخې توجیه کېږي چې $A_k = A$ توجیه کوي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-002) سرچینې په وروستۍ جمله کېنې یوازې له بي-آی څخه د میتا-فارمول ښه پرېښې وه؛ هماغه کرښه پورته او په ښلول شوې لړۍ کېنې په ښه لرلې بڼه تعریف شوې ده. □

پام وکړئ چې په ځانګړې ډول دا معنی لري: که $\Gamma \vdash A$ او $A \vdash B$ وي، نو $\Gamma \vdash B$. له دې څخه دا هم راضي چې که $A_1, \dots, A_n \vdash B$ او $A \vdash B$ وي، نو $\Gamma \vdash B$ دی. □

قضیه 12.21. هله Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هر A دپاره $\Gamma \vdash A$ وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 12.22، 12.21 ثابت کړئ.

قضیه 12.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash A$.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو د فارمولونه داسې متناهي لړۍ $A_1, \dots, A_n$ شته چې $A_n \equiv A$ ؛ او هر A_i یا منطقي بدیهي اصل وي، یا د Γ یو غړی وي، یا د مودوس پونس له مخې له مخکېنو فارمولونه څخه راضي. Γ_0 د هغو A_i سټ ونیسئ چې په Γ کېنې دي. بیا همدا اشتقاق له Γ_0 څخه هم یو اشتقاق دے، نو $\Gamma_0 \vdash A$.

2. دا د ځانګړې حالت $A \equiv \perp$ دپاره د (1) مقابل عکس دے.

□

12.7 د استنتاج قضیه

لکه چې مو ولیدل، په بدیهي نظام کېنې اشتقاقونه ورکول ستونزمن دي، او اشتقاقونه موندل هم ګرانېږي. د فارمولونه اوږدې لړۍ په رښتیا لیکلو پر ځای، زیاتره دا استدلال اسانه وي چې داسې اشتقاقونه شته؛ د دې دپاره څو ساده پایلې کاروو. درې داسې پایلې مو لا ثابتې کړې دي: 12.18 وایي کله چې $A \in \Gamma$ پوهېږو، تل $\Gamma \vdash A$ ویلې شو. 12.19 وایي که $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Gamma \cup \{B\} \vdash A$ هم دے. او 12.20 ښیي که $\Gamma \vdash A$ او $A \vdash B$ وي، نو $\Gamma \vdash B$. دا د مودوس پونس یوه بله ساده، “میتا” بڼه ده:

قضیه 12.24. که $\Gamma \vdash A$ او $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ وي، نو $\Gamma \vdash B$.

ثبوت. موږ $\{!A, !A \rightarrow !B\} \vdash !B$ لرو:

1. $!A$ فرض
2. $!A \rightarrow !B$ فرض
3. $!B$ پونښ مودوس 1, 2

□

د 12.20 له مخې $\Gamma \vdash !B$.

په دې برخه کې تر ټولو مهمه پایله چې کاروو ئې د استنتاج قضیه ده:

قضیه 12.25 (د استنتاج قضیه). $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !B$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$.

ثبوت. د “که” لوری سمډستي دے. که $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$ وي، د 12.19 له مخې $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !A \rightarrow !B$ هم دے. همدارنګه د 12.18 له مخې $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !A$ نو د 12.24 له مخې $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !B$.

د “یوازې” که” لوري دپاره له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره دعوه د اوږدوالي 1 د هر اشتقاق دپاره ثابتوو. له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ د اوږدوالي 1 اشتقاق یوازې له $!B$ څخه جوړ وي، او که سم وي، یا $!B \in \Gamma \cup \{!A\}$ وي یا $!B$ بدیهي اصل وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-003) سرچینې په دې غږیتوب کې له ای-مټا فارمول څخه مخکې یوازې د غږیتوب نښه لیکلې وه؛ د جملې فاعل دلته د بشپړ فارمول په دننه کې راوستل شو. که $!B \in \Gamma$ وي یا بدیهي اصل وي، نو $\Gamma \vdash !B$ همدارنګه د 12.7 له مخې $\Gamma \vdash !B \rightarrow (!A \rightarrow !B)$ ، او 12.24 موږ ته $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$ راکوي. که $!B \in \{!A\}$ وي، نو $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$ ؛ ځکه وروستی ترلے فارمول $!A \rightarrow !B$ د $!A \rightarrow !A$ هماغه جمله ده، او په 12.10 کې مو هغه اشتقاق کړې ده.

د استقرا په پړاو کې فرض کړئ له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ یو اشتقاق په داسې ګام $!B$ پای ته رسېږي چې په مودوس پونښ توجیه شوی دے. (که په مودوس پونښ توجیه شوی نه وي، نو $!B \equiv !A$ ، یا $!B$ بدیهي اصل دے، او د استقرا د بنسټ هماغه استدلال پرې پلي کېږي.) بیا د کوم فارمول $!C$ دپاره په اشتقاق کې ځینې مخکې ګامونه $!C \rightarrow !B$ او $!C$ دي، یعنې $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !C \rightarrow !B$ او $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !C$ ، او اړوند اشتقاقونه لاند دي، نو د استقرا فرضیه پرې پلي کېږي. ځکه دواړه دا لرو:

$$\Gamma \vdash !A \rightarrow (!C \rightarrow !B);$$

$$\Gamma \vdash !A \rightarrow !C.$$

خو د 12.8 له مخې دا هم لرو:

$$\Gamma \vdash (!A \rightarrow (!C \rightarrow !B)) \rightarrow ((!A \rightarrow !C) \rightarrow (!A \rightarrow !B)),$$

□

او د 12.24 دوه تطبیقونه، لکه چې پکار ده، $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$ راکوي.

پام وکړئ چې 12.7 او 12.8 په عین دې موخه ټاکل شوي وو چې د استنتاج قضیه سمه وي.

لاندې د د اشتقاق وړتیا په اړه ځینې ګټور حقیقتونه دي چې د تمرینونو په توګه ئې پرېږدو.

قضیه 12.26. 1. $(!A \rightarrow !B) \rightarrow ((!B \rightarrow !C) \rightarrow (!A \rightarrow !C))$ ، د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-004) سرچینې د لومړۍ دعوي د بهرني وروستي قوس د ترلو نښه پرېږني وه؛ دلته د پرایستو قوسونو سره سمه یوه تړونکې نښه پرته راوستل شوې ده.

2. که $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \{!B\} \vdash !A$ (مقابل عکس)؛

3. $\{!A, \neg !A\} \vdash !B$ (له کاډې هر څه، انفجار)؛

4. $\{\neg !A\} \vdash !A$ (دوه ګونې نفي حذف)؛

5. که $\Gamma \vdash \neg !A$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$ ؛

تمرین 12.26، 12.27 ثابت کړئ.

12.8 له کیمیت ټاکونکو سره د استنتاج قضیه

قضیه 12.28 (د استنتاج قضیه). که $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$.

ثبوت. یو ځل بیا له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ ثبوت د 12.25 په ثبوت کېنې له بنسټ سره یو شان ده.

د استقرا په پړاو کېنې بیا فرض کړئ له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ اشتقاق په داسې کلام $!B$ پای ته رسېږي چې په استنتاجي قاعده توجیه شوې ده. که استنتاجي قاعده مودوس پونښ وي، د 12.25 د ثبوت په شان مخکېنې څو. که قاعده QR وي، پوهېږو چې $B \equiv C \rightarrow \forall x !D(x)$ او د $C \rightarrow !D(a)$ بې فارمول په اشتقاق کېنې له مخکېنې راغله ده، چې a په C ، A یا Γ کېنې نه راځي. نو دا لرو:

$$\Gamma \cup \{!A\} \vdash C \rightarrow !D(a),$$

او د استقرا فرضیه پلي کېږي، یعنې دا لرو:

$$\Gamma \vdash !A \rightarrow (C \rightarrow !D(a)).$$

له دې څخه

$$\vdash (!A \rightarrow (C \rightarrow !D(a))) \rightarrow ((!A \wedge C) \rightarrow !D(a))$$

او مودوس پونښ سره ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (!A \wedge C) \rightarrow !D(a).$$

ځکه د ځانګړي متغیر شرط لا هم پلي کېږي، دې اشتقاق ته په QR توجیه شوې کلام ورزیاتولې شو، او ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (!A \wedge C) \rightarrow \forall x !D(x).$$

دا هم لرو:

$$\vdash ((!A \wedge C) \rightarrow \forall x !D(x)) \rightarrow (!A \rightarrow (C \rightarrow \forall x !D(x))),$$

نو د مودوس پونښ له مخې،

$$\Gamma \vdash !A \rightarrow (C \rightarrow \forall x !D(x)),$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-005) سرچینې د پورته ماقبل وروستی بدیهي بېلګه کېنې د بهرني شرطی یو تړونکې قوس پرېښه و؛ هغه قوس دلته د بشپړې شېما دپاره بېرته راوستل شو. یعنې $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-006) سرچینې وروستی پایله یوازې د بي د ثبوت په توګه لیکلې وه؛ خو د قضیې موخه او سمدستي مخکېنې کرښه د ای-که-بي ثبوت ورکوي، نو هماغه بشپړه پایله راوستل شوې ده.

هغه حالت د تمرین په توګه پرېږدو چې $!B$ د QR قاعدې په وسیله توجیه کېږي، خو د $\exists x !D(x) \rightarrow !C$ بڼه لري. □

تمرین 12.29. د 12.28 ثبوت بشپړ کړئ.

12.9 د اشتقاق وړتیا او سازگاري

اوس به د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دا په خپلواکه توګه په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړوالي د قضیې په ثبوت کېنې ونډه ولري.

قضیه 12.30. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. که $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي، نو $\Gamma \cup \{!A\} \vdash \perp$ د 12.18 له مخې د هر $B \in \Gamma$ دپاره $\Gamma \vdash !B$ د فرض له مخې $\Gamma \vdash !A$ هم دے، نو د هر $B \in \Gamma \cup \{!A\}$ دپاره $\Gamma \vdash !B$ د 12.20 له مخې $\Gamma \vdash \perp$ یعنې Γ ناسازگار دے. $\square$

قضیه 12.31. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار وي.

ثبوت. لومړۍ فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ د 12.19 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash !A$ د 12.18 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \neg !A$ د 12.10 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \neg !A \rightarrow (!A \rightarrow \perp)$ د 12.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \perp$ لرو.

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار دے، یعنې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \perp$ د استنتاج د قضیې له مخې $\Gamma \vdash \neg !A \rightarrow \perp$ د 12.13 له مخې $\Gamma \vdash (\neg !A \rightarrow \perp) \rightarrow \neg \neg !A$ د 12.24 له مخې $\Gamma \vdash \neg \neg !A$ ځکه $\Gamma \vdash \neg \neg !A \rightarrow !A$ (12.14)، د 12.24 په بیا پلي کولو $\Gamma \vdash !A$ لرو. $\square$

تمرین 12.32. ثابته کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي.

قضیه 12.33. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. د 12.10 له مخې $\Gamma \vdash \neg !A \rightarrow (!A \rightarrow \perp)$ د 12.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \vdash \perp$ لرو. $\square$

قضیه 12.34. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. تمرین. $\square$

تمرین 12.35، 12.34. ثابت کړئ.

12.10 د اشتقاق وړتیا او د قضیې نښلوونکي

ثابتو چې د بدیهي استنتاج د $\vdash$ د اشتقاق وړتیا اړیکه دومره پیاوړې ده چې د قضیې د نښلوونکو ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي؛ لکه $A \vdash A$ او $A \vdash !A \rightarrow !B$ (مودوس پوننس) - دغه حقیقتونه د بشپړوالي د قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 12.36. 1. دواړه $A \vdash !A$ او $A \vdash !B$ لکه

2. $A \vdash !A \wedge !B$ لکه

ثبوت. 1. د 12.1 او 12.2 څخه په مودوس پوننس - د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-007) سرچینې د دواړو جلا عطف-ایستو دپاره لومړني بدیهي اصل ته دوه ځله حواله کړې وه؛ دویمه دعوه د دویم عطف-ایستني بدیهي اصل کاروي.

2. د 12.3 څخه د مودوس پوننس په دوه تطبیقونو.

□

قضیه 12.37. 1. $!A \vee !B, \neg !A, \neg !B$ ناسازگار دے.

2. دواړه $!A \vdash !A \vee !B$ او $!B \vdash !A \vee !B$.

ثبوت. 1. له 12.10 څخه $\neg !A \rightarrow (!A \rightarrow \perp)$ او $\neg !B \rightarrow (!B \rightarrow \perp)$ ترلاسه کوو. نو د استنتاج د قضیې له مخې $\{\neg !A, \neg !B\} \vdash !A \rightarrow \perp$ او $\{\neg !B\} \vdash !B \rightarrow \perp$ لرو. له 12.6 څخه $(!A \vee !B) \rightarrow \perp$ ترلاسه کوو. د استنتاج د قضیې له مخې $\neg !A \vee !B, \neg !A, \neg !B \vdash \perp$. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-008) سرچینې دلته د نفي لومړني بدیهي اصل ته حواله کړې وه؛ ښودل شوې انفجاري شېماوې د نفي دویم بدیهي اصل بېلګې دي.

2. له 12.4 او 12.5 څخه په مودوس پوننس.

□

قضیه 12.38. 1. $!A, !A \rightarrow !B \vdash !B$.

2. دواړه $\neg !A \vdash !A \rightarrow !B$ او $!B \vdash !A \rightarrow !B$.

ثبوت. 1. دا اشتقاق کولې شو:

- 1. $!A$ Hyp
- 2. $!A \rightarrow !B$ Hyp
- 3. $!B$,1, 2 MP

2. په ترتیب د 12.10 او 12.7، او د استنتاج د قضیې له مخې.

□

12.11 د اشتقاق وړتیا او کمیت ټاکونکي

د بشپړوالي قضیه دا هم غواړي چې بدیهي استنتاجونه د $\vdash$ په اړه په دې برخه کې ثابت شوي حقیقتونه ورکړي.

قضیه 12.39. که c داسې ثابت سمبول وي چې په Γ یا $!A(x)$ کې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x !A(x)$.

ثبوت. د استنتاج د قضیې له مخې $\Gamma \vdash \top \rightarrow !A(c)$ ځکه c په Γ یا $\top$ کې نۀ راځي، ترلاسه کوو چې $\Gamma \vdash \top \rightarrow \forall x !A(x)$ ځکه رښتیا یو بدیهي اصل دے، د میتا-مودوس پوننس له مخې $\Gamma \vdash \forall x !A(x)$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-009) سرچینې وروسته کام د استنتاج قضیې ته یو ځل بیا منسوب کړے و؛ هغه قضیه یوازې د رښتیا فرض ورزیاتوي، حال دا چې دلته رښتیا بدیهي اصل او مودوس پوننس فرض پورته لري کوي.

□

قضیه 12.40. 1. $!A(t) \vdash \exists x !A(x)$.

2. $\forall x !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. د 12.16 او د استنتاج د قضیې له مخې.

2. د 12.15 او د استنتاج د قضیې له مخې.

□

12.12 سموله

د بدیهي استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نه کړي چې په حقیقت کېنې نه صدق کېږي. نو سموله د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خوندیتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تئوريکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ A معتبر دے؛

2. که A له ځینو نورو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛

3. که د فارمولونه یو سټ Γ ناسازگار وي، د صدق وړ نه دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نه وي، اشتقاق نظام نیکږه دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموله ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

قضیه 12.41. که A یو بدیهي اصل وي، نو د هر جوړښت $\mathcal{M}$ او متغیر-کومارنې s دپاره $\mathcal{M}, s \models A$.

ثبوت. باید تصدیق کړو چې ټول بدیهي اصول معتبر دي. د بېلګې په توګه د 12.15 حالت دا دے: فرض کړئ t په A کېنې د x دپاره ازاد وي، او $\mathcal{M}, s \models \forall x!A$ ومنئ. بیا د پوره کېدو د تعریف له مخې، د هرې $s \sim_x s'$ دپاره $\mathcal{M}, s' \models A$ هم دے، او په ځانګړې ډول دا هله سم دے چې $s'(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)$ وي. د 16.30 له مخې $\mathcal{M}, s \models A[t/x]$ دا ښیي چې $\mathcal{M}, s \models (\forall x!A \rightarrow A[t/x])$. □

قضیه 12.42 (سموله). که $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Gamma \models A$.

ثبوت. له Γ څخه د A د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو. که داسې هېڅ ګام نه وي چې په استنتاج توجیه شوی وي، نو په اشتقاق کېنې ټول فارمولونه یا د بدیهي اصولو بېلګې دي یا په Γ کېنې دي. د مخکېنې قضیې له مخې ټول بدیهي اصول معتبر دي، نو که A بدیهي اصل وي، $\Gamma \models A$ که $A \in \Gamma$ وي، نو په څرګنده $\Gamma \models A$.

که د A د اشتقاق وروستنه ګام په مودوس پونس توجیه شوی وي، نو په اشتقاق کېنې فارمولونه B او $A \rightarrow B$ شته، او د استقرا فرضیه د اشتقاق پر هغو برخو پلي کېږي چې په دغو فارمولونه پاته ته رسېږي (ځکه په هره برخه کېنې لږ تر لږه یو په استنتاج توجیه شوی ګام کم دے). نو د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \models B$ او $\Gamma \models A \rightarrow B$ بیا د 16.39 له مخې $\Gamma \models A$.

اوس فرض کړئ وروستنه ګام په QR توجیه شوی دے. بیا هغه ګام د $C \rightarrow \forall x B(x)$ بڼه لري، او ترې مخکېنې ګام $C \rightarrow B(c)$ دے، چې c په Γ ، یا $\forall x B(x)$ کېنې نه راځي. د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \models C \rightarrow B(c)$ د 16.39 له مخې $\Gamma \cup \{C\} \models B(c)$.

داسې یو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کېنې ونیسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{C\}$ وي. باید وښیو چې $\mathcal{M} \models \forall x!B(x)$ ځکه $\forall x!B(x)$ یوه ترلے فارمول ده، د دې معنی دا ده چې د هرې متغیر-کومارنې s دپاره باید $\mathcal{M}, s \models B(x)$ وښیو (16.22). ځکه $\Gamma \cup \{C\}$ ټول له جملو جوړ دے، د هر $D \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M}, s \models D$ د 16.12 له مخې دے. $\mathcal{M}'$ داسې جوړښت ونیسئ چې د $\mathcal{M}$ په شان وي، خو $c^{\mathcal{M}'} = s(x)$ وي. ځکه c په Γ یا C کېنې نه راځي، د 16.28 له مخې $\mathcal{M}' \models \Gamma \cup \{C\}$ ځکه $\mathcal{M}' \models B(c)$ ، نو $\mathcal{M}' \models B(c)$ د ژباړې د نسخې سمون (OLAX-010) سرچینې په دې پوره کېدو ادعا کېنې د بي-سي د میتا-فارمول ښه پربنې وه؛ په مخکېنې لازمت او ورپسې ټولو استعمالونو کېنې همدا ښه موجوده ده، نو دلته بېرته راوستل شوه. ځکه $B(c)$ یوه ترلے فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathcal{M}' \models B(c)$ د 16.30 له مخې $\mathcal{M}' \models B(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}', s \models B(c)$ (یاد ولرئ چې $B(c)$ هماغه $B(x)[c/x]$) دے. نو $\mathcal{M}' \models B(x)$ ځکه c په $B(x)$ کېنې نه راځي، د 16.26 له مخې $\mathcal{M}, s \models B(x)$ خو s اختیاري متغیر-کومارنه وه؛ نو $\mathcal{M} \models \forall x!B(x)$ له دې امله $\Gamma \cup \{C\} \models \forall x!B(x)$ د 16.39 له مخې $\Gamma \models C \rightarrow \forall x!B(x)$.

هغه حالت د تمرین په توګه پرېږدو چې A په QR توجیه کېږي، خو د $\exists x!B(x) \rightarrow C$ بڼه لري. □

تمرین 12.43. د 12.42 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 12.44. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو A ! معتبر دے.

نتیجه 12.45. که Γ د صدق وړ وي، نو سازگار دے.

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازگار نه دے. بیا $\Gamma \vdash \perp$ یعنې له Γ څخه د $\perp$ یو اشتقاق شته. د 12.42 له مخې هر جوړښت $\mathcal{M}$ چې Γ پوره کوي، باید $\perp$ هم پوره کړي. ځکه د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \not\models \perp$ ، نو هېڅ $\mathcal{M}$ ، Γ نه شي پوره کولای؛ یعنې Γ د صدق وړ نه دے. $\square$

12.13 له عینیت سره اشتقاقونه

په اشتقاقونه کېنې د $=$ د شاملولو دپاره یوازې نوې بدیهې شېماوې ورزیاتوو. د اشتقاق او $\vdash$ تعریف هماغسې پاتې کېږي؛ یوازې نوي بدیهې اصول هم منو.

تعریف 12.46 (د عینیت بدیهې اصول).

$$t = t, \quad (12.17)$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (!B(t_1) \rightarrow !B(t_2)), \quad (12.18)$$

د هر تړلي ترم t ، t_1 او t_2 دپاره.

قضیه 12.47. بدیهې اصول 12.17 او 12.18 معتبر دي.

$\square$

ثبوت. تمرین.

تمرین 12.48. 12.47 ثابت کړئ.

قضیه 12.49. د هر تړلي ترم t او سټ Γ دپاره $\Gamma \vdash t = t$. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-011) سرچینې دلته «هر ترم» ویلي وو، خو د یووالي لومړۍ بدیهې اصل یوازې پر تړلو ترمونو شېما ده؛ هماغه لازم قید پرته څرګند شو.

قضیه 12.50. که $\Gamma \vdash !A(t_1)$ او $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ وي، نو $\Gamma \vdash !A(t_2)$ ، په دې شرط چې دواړه ښودل شوي ترمونه تړلي وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-012) سرچینې په دې قضیه کېنې د تړلو ترمونو شرط نه و بیان کړی، سره له دې چې ثبوت یې ښخ په ښخه د یووالي دویم بدیهې اصل کاروي او هغه شېما یوازې تړلي ترمونه مني.

ثبوت. دا فارمول

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (!A(t_1) \rightarrow !A(t_2)))$$

$\square$

د 12.18 یوه بېلګه ده. پایله د MP په دوه پلي کولو سره ترلاسه کېږي.

باب 13

د بشپړتيا قضيه

13.1 سرېزه

د بشپړتيا قضيه د منطق په اړه له تر ټولو بنسټيزو پايلو څخه يوه ده. دا په دوو بنو وړاندې کېږي، او موږ به د دواړو همارزښت ثابت کړو. په لومړۍ بڼه کېږي دا زموږ د معنې پوهنې د پايلې او د اشتقاق نظام ترمنځ د اړيکې په اړه يو بنسټيز حقيقت وايي: که ترلې فارمول A د ځينو ترلې فارمولونه Γ معنایي پايله وي، نو داسې اشتقاق هم شته چې $\Gamma \vdash A$ ثابتوي. په دې توګه، د اشتقاق نظام هغومره پياوړې دے څومره چې د هغو خبرو له ثابتولو پرته کېدے شي چې په رښتيا نه لازمېږي.

په دويمه بڼه کېږي دا د مدل د شتون د پايلې په توګه ويل کېدے شي: د ترلې فارمولونه هر سازګار سټ د صدق وړ دے. سازګاري يو ثبوت-تيوريکي مفهوم دے: دا وايي چې زموږ د اشتقاق نظام د يو ټاکلي ډول اشتقاقونه نه شي جوړولے. خو دا څوک تضمینوي چې يوازې ځکه چې له Γ څخه د يو ټاکلي ډول هېڅ اشتقاقونه نشته، خامخا داسې جوړښت $\mathcal{M}$ ؟ د بشپړتيا د قضیې تر لومړي ثبوت وړاندې—بلکې د هغو اشتقاق نظامونو تر رامنځته کېدو هم وړاندې چې اوس ئې لرو—ستر جرمن رياضي پوه ډېوېډ هيلبرټ دا نظر درلود چې د رياضي نظريو سازګاري د هغو څيزونو شتون تضمینوي چې نظريې ئې په اړه دي. هغه ګوتلوب فرېګه ته په يو ليک کېږي داسې وويل:

که په خپل سري ډول ورکړل شوي بديهي اصول له خپلو ټولو پايلو سره يو بل نه نقضوي، نو رښتوني دي او هغه څيزونه چې بديهي اصول ئې تعريفوي شتون لري. زما دپاره همدا د رښتياوالي او شتون معيار دے.

فرېګه سخت مخالفت وکړ. د بشپړتيا د قضیې دويمه بڼه ښيي چې هيلبرټ لږ تر لږه په دې معنی سم و چې که بديهي اصول سازګار وي، نو داسې کوم جوړښت شته چې ټول رښتوني کوي.

دا يوازيني لاملونه نه دي چې د بشپړتيا قضیه—يا لا کره، د هغې ثبوت—مهمه ده. دا يو شمېر مهمې پايلې لري چې ځينې به ئې جلا وڅېړو. د بېلګې په توګه، ځکه هر اشتقاق چې $\Gamma \vdash A$ ښيي متناهي دے، نو له Γ څخه يوازې متناهي ډېر ترلې فارمولونه کارولے شي. له دې امله د بشپړتيا له قضیې څخه لازمېږي چې که A د Γ معنایي پايله وي، نو لا له وړاندې د Γ د کوم متناهي فرعي سټ معنایي پايله ده. دې ته د متناهي شاهد خاصيت ويل کېږي. په همارز ډول، که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو په خپله Γ هم سازګار دے.

که څه هم د متناهي شاهد قضیه د بشپړتيا له قضیې څخه د اشتقاقونه د منځنۍ لارې په تېرېدو لازمېږي، د بشپړتيا د قضیې خپله ثبوت هم نېغ په نېغه د هغې د ثابتولو دپاره کارول کېدے شي. ځکه ثبوت د ترلې فارمولونه داسې سټ اخلي چې يو ټاکلے خاصيت—سازګاري—لري، او له دې سټه داسې جوړښت جوړوي چې ټاکلي خاصيتونه لري (په دې حالت کېږي، سټ پوره کوي). کابو همدا جوړونه د متناهي شاهد خاصيت د نېغ ثبوت دپاره کارېږي، که د سازګارو ستونو پر ځاے د ترلې فارمولونه له «په متناهي ډول د صدق وړ» ستونو څخه پيل وکړو. دا جوړونه نورې پايلې هم ورکوي، د بېلګې په توګه، د ترلې فارمولونه هر د صدق وړ سټ يو متناهي يا شمېرېدونکے لامتناهي مدل لري. (دې پايلې ته د لوېنهایم-سکولم قضیه ويل کېږي.) په عمومي ډول، د ترلې فارمولونه له ستونو څخه د جوړښتونه جوړول په منطق کېږي ډېر ځله، او کله کله حتی په فلسفه کېږي هم، کارول کېږي.

13.2 د ثبوت لنډیز

د بشپړتیا د قضیې ثبوت یو څه پخپله دے، او په لومړي لوست کښې ترې لار ورکېدل اسانه دي. نو راځئ د ثبوت لنډیز وړاندې کړو. لومړۍ کام د نظر د زاوې داسې بدلون دے چې د ثبوت لاره رانښيي. که بشپړتیا داسې وکنو چې «هر کله $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Gamma \vdash A$ وي»، ښايي د کومې مفکورې موندل هم گران وي: ځکه د $\Gamma \vdash A$ د ښودلو دپاره باید اشتقاق ومومو، او داسې نه ښکاري چې فرضیه $\Gamma \vdash A$ په دې کښې څه مرسته راسره کوي. د ځینو ثبوتي نظامونو دپاره اشتقاق نېغ جوړېدے شي، خو موږ لږه بله لار نیسو. د نظر اړین بدلون دا دے: بشپړتیا داسې هم ویل کېدے شي چې «که Γ سازگار وي، نو د صدق وړ دے». ښايي د Γ معلومات له دې فرضیې سره یو ځای وکاروو چې هغه سازگار دے، او داسې جوړښت جوړ کړو چې په Γ کښې هر ترلے فارمول پوره کړي. بالاخره موږ پوهېږو چې د کوم ډول جوړښت په لټه کښې یو: هغه چې هماغسې وي لکه Γ چې ئې بیانوي!

که Γ یوازې اتومي ترلي فارمولونه ولري، نو د هغې دپاره مدل جوړول اسانه دي. فرض کړئ ټولې اتومي ترلي فارمولونه د $P(a_1, \dots, a_n)$ بڼه لري، چې a_i کافي ثابت سمبولونه دي. یوازې دومره پکار دي چې د تعریف ساحه $|\mathcal{M}|$ او د P دپاره داسې گومارنه پیدا کړو چې $\mathcal{M} \models P(a_1, \dots, a_n)$ وي. دا ډېره گرانه نه ده: $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ ، $c_i^{\mathcal{M}} = i$ ، وټاکئ، او د هر $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$ دپاره جوړه $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ په $P^{\mathcal{M}}$ کښې واچوئ، چې k_i د ثابت سمبول a_i شمېر دے (یعنې $a_i \equiv c_{k_i}$).

اوس فرض کړئ Γ کوم داسې فارمول $\neg B$ لري چې B اتومي دے. ښايي اندېښنه وکړو چې د $\mathcal{M}$ جوړونه د B د رښتوني کولو له امکان سره ټکر کوي. خو دلته د Γ سازگاري کار راځي: که $\neg B \in \Gamma$ وي، نو $B \notin \Gamma$ ، کنه Γ به ناسازگار و. او که $B \notin \Gamma$ وي، نو زموږ د $\mathcal{M}$ د جوړونې له مخې $\mathcal{M} \models \neg B$ ، نو $\mathcal{M} \models \neg B$ تر دې ځایه هر څه سم دي.

که Γ پخپلي، نااتومي فارمولونه ولري نو څه؟ فرض کړئ $A \wedge B$ لري. د دې د رښتوني کولو دپاره باید داسې پرمخ لاړ شو لکه دواړه A او B چې په Γ کښې وي. او که $A \vee B \in \Gamma$ وي، باید لږ تر لږه یو ئې رښتونه کړو؛ یعنې داسې پرمخ لاړ شو لکه یو ئې چې په Γ کښې وي.

دا لاندې مفکوره رانښيي: په Γ کښې نور فارمولونه داسې ورزیاتوو چې (الف) ترې جوړېدونکې سټ سازگار وساتو، (ب) ډاډ ترلاسه کړو چې د هرې ممکنې ترلے فارمول A دپاره یا A ! په جوړ شوي سټ کښې وي یا $\neg A$!، او (ج) که هر کله $A \wedge B$! په سټ کښې وي، دواړه A ! او B ! هم پکښې وي؛ که $A \vee B$! په سټ کښې وي، لږ تر لږه یو له A ! او B ! څخه هم پکښې وي؛ او داسې نور. د ژباړې د نسخې سمون (OLCOM-001) سرچینې په شرط (ب) کښې «اتومي جمله» لیکلې وه، خو همدا پاراگراف دا شرط د بشپړ سټ تعریف بولي او ورپسې رسمي تعریف ئې د هرې جملې دپاره ټاکي، نو ناسمه «اتومي» ځانگړنه لرې شوه. موږ دې کار ته (که اړینه وي، تر ابده) دوام ورکړو. د ټولو داسې زیاتو شوو فارمولونه سټ Γ^* وبلل. بیا به پورته جوړونه داسې جوړښت $\mathcal{M}$ را کړي چې په استقرا سره ثابتولے شو په Γ^* کښې ټولې جملې پوره کوي، او ځکه چې $\Gamma \subseteq \Gamma^*$ ، په Γ کښې ټولې جملې هم پوره کوي. څرگندېږي چې د (الف) او (ب) تضمین بس دے. د جملو هغه سټ چې (ب) پوره کوي بشپړ بلل کېږي. نو زموږ کار به دا وي چې سازگار سټ Γ یو سازگار او بشپړ سټ Γ^* ته وغځوو.

په دې پلان کښې یوه ستونزه شته: که $\exists x! A(x) \in \Gamma$ وي، غواړو په دې بهیر کښې کوم ثابت سمبول c وټاکو او $A(c)$! ورزیات کړو. خو څنګه پوهېږو چې دا کار تل کېدے شي؟ ښايي زموږ په ژبه کښې یوازې څو ثابت سمبولونه وي، او د هر یوه دپاره $\neg A(c) \in \Gamma$ ولرو. ورسره $A(c)$! هم نه شو زیاتولے، ځکه سټ به ناسازگار کړي؛ بیا به نه پوهېدو چې $\mathcal{M}$ باید $A(c)$! رښتونه کړي که $\neg A(c)$! لا دا هم کېدے شي چې Γ یوازې د داسې ژبې جملې ولري چې هېڅ ثابت سمبول نه لري (د بېلګې په توګه، د ستونو د تیورۍ ژبه).

د دې ستونزې حل دا دے چې په پیل کښې ېڅې نامتناهي ډېر ثابتونه، او ورسره داسې جملې، زیاتې کړو چې په سم ډول ئې له کیت ټاکنوکو سره وتړي. (البته باید تصدیق کړو چې دا کار ناسازگاري نه شي رامنځته کولے).

زموږ لومړنۍ جوړونه هغه وخت ښه کار کوي چې په اتومي جملو کښې یوازې ثابت سمبولونه ولرو. خو ژبه ښايي تابعې هم ولري. په هغه حالت کښې ښايي پر $\mathbb{N}$ د سې تابعې موندل، چې دغو تابعې ته ئې وګومارو او هر څه سم شي، ستونزمن وي. نو بله چاره دا ده: د c_i د تفسیر دپاره د i د کارولو پر ځای، د ثابت سمبولونه خپله سټ د تعریف ساحه وټاکئ. بیا $\mathcal{M}$ هر ثابت سمبول خپل ځان ته ګومارلے شي: $c_i^{\mathcal{M}} = c_i$. خو ولې دا کار تر پایه نه رسوو: د ژبې ټول ترمونه $|\mathcal{M}|$ وټاکئ! په دې صورت کښې تابعې ته د تابعو څرګنده ګومارنه شته (دغه تابعې ترمونه د ارګومېنټونو په توګه اخلي او ترمونه د قیمتونو په توګه لري): تابع f_i^n ته هغه تابع ګومارو چې n ترمونه $t_1, \dots, t_n$ د t_n نښت په توګه واخلي او ترم $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$ د قیمت په توګه ورکړي.

د معما وروستی ټوټه دا ده چې له = سره څه وکړو. پریدیکات = ثابت تفسیر لري: $\mathcal{M} \models t = t'$ هله او یوازې هله چې $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t')$ وي. اوس که هر څه داسې وټاکو چې د ترم t قیمت په خپله t وي، نو دا جوړښت به د $t = t'$ په بڼه هېڅ جمله رښتونی نه کړي، مګر دا چې t او t' یو او هماغه ترم وي. څرګنده ده چې دا ستونزه ده، ځکه د تابعی لرونکې ژبې کابو هره په زړه پورې تیوري به داسې جملې $t = t'$ د قضیو په توګه ولري چې t او t' یو ترم نه وي (د بېلګې په توګه، د حساب په تیوريو کې: $((0 + 0) = 0)$). د دې ستونزې د هوارولو دپاره د $\mathcal{M}$ تعریف ساحه بدلوو: په $|\mathcal{M}|$ کې د څیزونو په توګه د ترمونو پر ځای د ترمونو ستونو کاروو، او هر سټ ټول هغه ترمونه لري چې د Γ جملې ئې برابر کتل غواړي. نو د بېلګې په توګه، که Γ د حساب تیوري وي، له دغو ستونو څخه یو به 0 ، $(0 + 0)$ ، (0×0) ، او داسې نور ولري. همدا سټ به 0 ته ګومارو، او څرګنده به شي چې همدا سټ په دې کې د ټولو ترمونو قیمت هم دے، لکه د $(0 + 0)$ قیمت. نو په دې بدله شوې جوړښت کې به جمله $(0 + 0) = 0$ رښتونی وي.

نو دا کارونه به کوو. لومړۍ د بشپړ سازګارو ستونو خاصیتونه څېړو، په ځانګړي ډول ثابتو چې بشپړ سازګار سټ $A \wedge B$ هله او یوازې هله لري چې دواړه A او B ولري، او $A \vee B$ هله او یوازې هله لري چې لږ تر لږه یو ئې ولري؛ او داسې نور (13.2). بیا د جملو «مشیوع» ستونه تعریفوو او څېړو. مشیوع سټ داسې شرطی فارمولونه لري چې هره کمیت ټاکونکې ترلے فارمول د هغې له بېلګو سره تړي (13.6). - بنیو چې هر سازګار سټ Γ تل مشیوع سټ Γ' ته څڅېدے شي (13.7). - که یو سټ سازګار، مشیوع او بشپړ وي، دا خاصیت هم لري چې $\exists x!A(x)$ هله او یوازې هله لري چې د کوم تړلي ترم t دپاره $A(t)$ ولري او $\forall x!A(x)$ هله او یوازې هله لري چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $A(t)$ ولري (13.8). - بیا مشیوع سازګار سټ Γ' اخلو، او بنیو چې داسې مشیوع، سازګار او بشپړ سټ Γ^* ته څڅېدے شي (13.9). - همدا سټ Γ^* د خپل ترمي مدل $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ د تعریف دپاره کاروو. د ترمي مدل تعریف ساحه د تړلو ترمونو سټ دے، او د هغه د پریدیکاتونه تفسیر د هغو اتومي تړلي فارمولونه له مخې ټاکل کېږي چې په Γ^* کې دي (13.10). - د مشیوع، بشپړو سازګارو ستونو خاصیتونه کاروو، څو وښیو چې په رښتیا $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ هله او یوازې هله چې $A \in \Gamma^*$ (13.13)، نو په ځانګړي ډول $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \Gamma$ په پای کې دا هم څېړو چې که Γ ، = هم ولري، ترمي مدل څنګه تعریف کړو (13.18)، او بنیو چې هغه Γ^* پوره کوي (13.22).

13.3 د تړلي فارمولونه بشپړ سازګار ستونه

تعریف 13.1 (بشپړ سټ). د تړلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله بشپړ دے چې د هرې ترلے فارمول A دپاره یا $A \in \Gamma$ وي یا $\neg A \in \Gamma$.

د جملو بشپړ ستونه هېڅ پوښتنه ئې ځوابه نه پرېږدي. د هرې ترلے فارمول A دپاره Γ «وايي» چې A رښتونه دے که کاذب. د بشپړ ستونو ارزښت د بشپړتیا د قضیې له ثبوت څخه هم اوري. د بېلګې په توګه، هغه تیوري چې بشپړ او د بدیهي اصولو له لارې څرګندېدونکې وي، تل د پرېکړې وړ وي.

بشپړ سازګار ستونه د بشپړتیا په ثبوت کې مهم دي، ځکه تضمینولے شو چې د تړلي فارمولونه هر سازګار سټ Γ په بشپړ سازګار سټ Γ^* کې شامل دے. بشپړ سازګار سټ د هرې ترلے فارمول A دپاره یا A لري یا د هغې نفی $\neg A$ ، خو دواړه نه لري. دا په ځانګړي ډول د اتومي تړلي فارمولونه دپاره هم سم دي؛ نو له بشپړ سازګار سټ څخه په داسې ژبه کې چې ثابت سمبولونه په مناسبه توګه ورزیات شوي وي، داسې جوړښت جوړولے شو چې پکښې د پریدیکاتونه تفسیر د هغو اتومي تړلي فارمولونه له مخې تعریفېږي چې په Γ^* کې دي. بیا ښودل کېدے شي چې دا جوړښت په Γ^* کې ټولې تړلي فارمولونه (او ځکه په Γ کې ټولې) رښتونی کوي. د دې وروستی حقیقت ثبوت دا غواړي چې $\neg A \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $A \notin \Gamma^*$ ، او $(A \vee B) \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $A \in \Gamma^*$ یا $B \in \Gamma^*$ ؛ او داسې نور.

په لاندې بحث کې کې به ډېر ځله د $\vdash$ د انعکاسیت، یکنواختی او انتقالیت خاصیتونه په ناڅرګند ډول کاروو (وګورئ برخې 9.8، 10.7، 11.7 او 12.6).

قضیه 13.2. فرض کړئ Γ بشپړ او سازګار دے. بیا:

1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو $A \in \Gamma$.
2. $A \wedge B \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې دواړه $A \in \Gamma$ او $B \in \Gamma$ وي.
3. $A \vee B \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $A \in \Gamma$ وي یا $B \in \Gamma$.

4. $A \rightarrow B \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې $A \notin \Gamma$ وي يا $B \in \Gamma$!

ثبوت. په لاندې ټولو برخو کېنې فرض کوو چې Γ بشپړ او سازگار دے.

1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو $A \in \Gamma$!

فرض کړئ $\Gamma \vdash A$ د نقیض په توګه فرض کړئ چې $A \notin \Gamma$! ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg A \in \Gamma$! د قضیې 9.27، 10.27، 11.27 او 12.33 له مخې Γ ناسازگار دے. دا له دې فرضي سره تناقض دے چې Γ سازگار دے. نو $A \notin \Gamma$ نه شي کېدے، او ځکه $A \in \Gamma$!

2. $A \wedge B \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې دواړه $A \in \Gamma$ او $B \in \Gamma$ وي:

د مخامخ لوري دپاره، فرض کړئ $A \wedge B \in \Gamma$! بيا د قضیې 9.29، 10.29، 11.29 او 12.36، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash A$ او $\Gamma \vdash B$! د 1 له مخې $A \in \Gamma$ او $B \in \Gamma$!، لکه څنګه چې پکار وو.

د عکس لوري دپاره، $A \in \Gamma$ او $B \in \Gamma$ ونیسئ. د قضیې 9.29، 10.29، 11.29 او 12.36، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash A \wedge B$! د 1 له مخې $A \wedge B \in \Gamma$!

3. لومړۍ بنیو چې که $A \vee B \in \Gamma$ وي، نو یا $A \in \Gamma$ وي یا $B \in \Gamma$! فرض کړئ $A \vee B \in \Gamma$ ، خو $A \notin \Gamma$ او $B \notin \Gamma$! ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg A \in \Gamma$ او $\neg B \in \Gamma$! د قضیې 9.30، 10.30، 11.30 او 12.37، د توکي (۱) له مخې Γ ناسازگار دے، دا تناقض دے. نو یا $A \in \Gamma$ وي یا $B \in \Gamma$!

د عکس لوري دپاره، فرض کړئ یا $A \in \Gamma$ وي یا $B \in \Gamma$! د قضیې 9.30، 10.30، 11.30 او 12.37، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash A \vee B$! د 1 له مخې $A \vee B \in \Gamma$!، لکه څنګه چې پکار وو.

4. د مخامخ لوري دپاره، فرض کړئ $A \rightarrow B \in \Gamma$ ، او د نقیض په توګه فرض کړئ چې $A \in \Gamma$ او $B \notin \Gamma$! د دغو فرضونو له مخې $A \rightarrow B \in \Gamma$ او $A \in \Gamma$! د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash B$! خو بيا د 1 له مخې $B \notin \Gamma$!، دا له $B \notin \Gamma$ سره تناقض دے.

د عکس لوري دپاره، لومړۍ هغه حالت وڅېړئ چې $A \notin \Gamma$ وي. ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg A \in \Gamma$! د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash A \rightarrow B$! بيا د 1 له مخې $A \rightarrow B \in \Gamma$!، لکه څنګه چې پکار وو.

اوس هغه حالت وڅېړئ چې $B \in \Gamma$ وي. بيا د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash A \rightarrow B$! د 1 له مخې $A \rightarrow B \in \Gamma$!

□

تمرین 13.3. د 13.2 ثبوت بشپړ کړئ.

13.4 د هنکین غځونه

د بشپړتیا د قضیې د ثابتولو د ستونزې یوه برخه دا ده چې هغه مدل چې له بشپړ سازگار سټ Γ څخه ئې جوړوو باید په Γ کېنې ټول کمیت ټاکونکي لرونکي فارمولونه رښتوني کړي. د دې د تضمین دپاره د لیون هنکین یو چل کاروو. په اصل کېنې دا چل د ژبې په لامتناهي ډېرو ثابت سمبولونه غځول او د هر داسې فارمول $A(x)$ دپاره چې یو ازاد متغیر لري، د لاندې بڼې یو فارمول ورزیاتول دي: $\exists x!A(x) \rightarrow A(c)$ ، چې c یو له نوو ثابت سمبولونه څخه دے. کله چې هغه جوړښت جوړوو چې Γ پوره کوي، دا به تضمین کړي چې د نوو ثابت سمبولونو په منځ کېنې هره رښتوني وجودي جمله یو شاهد ولري.

قضیه 13.4. که Γ په L کېنې سازگار وي او L' له L څخه د نوو ثابت سمبولونه د شپږېدونکې لامتناهي سټ $d_0, d_1, \dots$ په ورزیاتولو ترلاسه شي، نو Γ په L' کېنې سازگار دے.

تعریف 13.5 (مشبوع سټ). د ژبې $\mathcal{L}$ د فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله مشبوع دے چې د هر داسې فارمول $A(x) \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ دپاره چې یو ازاد متغیر x لري، داسې ثابت سمبول $c \in \mathcal{L}$ موجود وي چې $\exists x!A(x) \rightarrow !A(c) \in \Gamma$.

لاندې تعریف به د ورپسې قضیې په ثبوت کې وکارول شي.

تعریف 13.6. فرض کړئ $\mathcal{L}'$ هماغسې وي لکه په 13.4 کې. د $\mathcal{L}'$ د ټولو هغو فارمولونه $!A_i(x_i)$ یوه شمېرنه $!A_0(x_0)$ ، $!A_1(x_1)$ ، ... وټاکئ چې یو متغیر (x_i) پکښې ازاد راځي. ترې فارمولونه D_n پر n د استقرا له لارې تعریفوو.

c_0 دې د هغو d_i په منځ کې لومړنۍ ثابت سمبول وي چې مونږ $\mathcal{L}$ ته ورزیات کړي دي او په $!A_0(x_0)$ کېنې نه راځي. په دې فرض چې D_0 ، $...$ ، D_{n-1} له مخکښې تعریف شوي دي، c_n دې د نوو ثابت سمبولونه d_i په منځ کې لومړنۍ هغه وي چې نه په D_0 ، $...$ ، D_{n-1} کېنې راځي او نه په $!A_n(x_n)$ کېنې.

اوس D_n دا فارمول وټاکئ: $\exists x_n!A_n(x_n) \rightarrow !A_n(c_n)$.

لم 13.7. هر سازگار سټ Γ یوه مشبوع سازگار سټ Γ' ته غځېدے شي.

ثبوت. د ژبې $\mathcal{L}$ د جملو یو سازگار سټ Γ راکړل شوے دے؛ ژبه د نوو ثابت سمبولونه د شمېرېدونکې لامتناهي سټ په ورزیاتولو وغځوئ، خو $\mathcal{L}'$ جوړ شي. د 13.4 له مخې Γ لا هم په بډایه ژبه کېنې سازگار دے. همدارنګه، D_i دې هماغسې وي لکه په 13.6 کېنې. وټاکئ:

$$\Gamma_0 = \Gamma$$

$$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{D_n\}$$

یعنې $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{D_0, \dots, D_n\}$ ، او $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$ وټاکئ. Γ' په څرګند ډول مشبوع دے.

که Γ' ناسازگار وے، نو د کوم n دپاره به Γ_n ناسازگار وے (ثمرین: څرګنده کړئ چې ولې). نو د Γ' د سازګارۍ د ښودلو دپاره دا بسنه کوي چې پر n د استقرا له لارې وښیو چې هر سټ Γ_n سازگار دے.

د استقرا بنسټ یوازې دا ادعا ده چې $\Gamma_0 = \Gamma$ سازگار دے، او دا د قضیې فرضیه ده. د استقرا د کام دپاره، فرض کړئ چې Γ_n سازگار دے، خو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{D_n\}$ ناسازگار دے. در په یاد کړئ چې D_n دا دے: $\exists x_n!A_n(x_n) \rightarrow !A_n(c_n)$ ، چې $!A_n(x_n)$ د $\mathcal{L}'$ داسې فارمول دے چې یوازې متغیر x_n ئې ازاد دے. د c_n د غوره کولو د طریقې له مخې (وګورئ 13.6)، c_n نه په $!A_n(x_n)$ کېنې راځي او نه په Γ_n کېنې.

که $\Gamma_n \cup \{D_n\}$ ناسازگار وي، نو $\Gamma_n \vdash \neg !D_n$ ، او ځکه لاندې دواړه سم دي:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n!A_n(x_n) \quad \Gamma_n \vdash \neg !A_n(c_n)$$

ځکه چې c_n نه په Γ_n کېنې راځي او نه په $!A_n(x_n)$ کېنې، د قوي تعمیم قضیې 9.32، 10.32، 11.32 او 12.39 پلي کېږي. له $\Gamma_n \vdash \neg !A_n(c_n)$ څخه دا ترلاسه کوو: $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg !A_n(x_n)$. نو دواړه دارو: $\Gamma_n \vdash \exists x_n!A_n(x_n)$ او $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg !A_n(x_n)$ ؛ نو Γ_n پخپله ناسازگار دے. (پام وکړئ چې $(\forall x_n \neg !A_n(x_n)) \vdash \neg \exists x_n!A_n(x_n)$) تناقض: فرض دا و چې Γ_n سازگار دے. نو $\Gamma_n \cup \{D_n\}$ سازگار دے. □

اوس به وښیو چې مشبوع، سازگار او بشپړ ستونه دا خاصیت لري چې یوه عمومي کمیت ټاکونکې ترلے فارمول هله او یوازې هله لري چې د هغې ټولې بېلګې ولري او یوه وجودي کمیت ټاکونکې ترلے فارمول هله او یوازې هله لري چې لږ تر لږه د هغې یوه بېلګه ولري. له دې څخه به د دې ښودلو دپاره کار واخلو چې هغه جوړښت چې له مشبوع، سازگار او بشپړ سټ څخه ئې جوړوو، د هغه ټولې کمیت ټاکونکې جملې رښتوني کوي.

قضیه 13.8. فرض کړئ Γ بشپړ، سازگار او مشبوع دے.

1. $\exists x!A(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه ترې ترم t دپاره $A(t) \in \Gamma$ وي.

2. $\forall x!A(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $A(t) \in \Gamma$ وي.

ثبوت. 1. لومړۍ فرض کړئ چې $\exists x!A(x) \in \Gamma$ ځکه Γ مشبوع دے، نو د کوم ثابت سمبول c دپاره $(\exists x!A(x) \rightarrow !A(c)) \in \Gamma$ د قضیې 9.31، 10.31، 11.31 او 12.38، د توکي (۱)، او 113.2 له مخې $!A(c) \in \Gamma$.

د بل لوري دپاره مشبوع والی لازم نه دے: فرض کړئ $A(t) \in \Gamma$ بیا د قضیې 9.33، 10.33، 11.33 او 12.40، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash \exists x!A(x)$ د 113.2 له مخې $\exists x!A(x) \in \Gamma$.

2. فرض کړئ چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $A(t) \in \Gamma$ د نقیض په توګه فرض کړئ چې $\forall x!A(x) \notin \Gamma$ ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg \forall x!A(x) \in \Gamma$ د مشبوع والی له مخې، د کوم ثابت سمبول c دپاره $(\exists x \neg !A(x) \rightarrow \neg !A(c)) \in \Gamma$ د فرض له مخې، ځکه چې c یو ترلے ترم دے، نو $A(c) \in \Gamma$ خو له دې څخه به Γ ناسازګار شي. (تمرین: هغه اشتقاق ورکړئ چې ښیي

$$\neg \forall x!A(x), \exists x \neg !A(x) \rightarrow \neg !A(c), !A(c)$$

ناسازګار دے.)

د عکس لوري دپاره مشبوع والی لازم نه دے: فرض کړئ $\forall x!A(x) \in \Gamma$ بیا د قضیې 9.33، 10.33، 11.33 او 12.40، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A(t)$ د 13.2 له مخې $!A(t) \in \Gamma$.

□

13.5 د لینډنباوم له

اوس یوه مرستندویه قضیه ثابتوو چې ښیي د ترلي فارمولونه هر سازګار سټ د جملو په داسې سټ کېښي شامل دے چې یوازې سازګار نه، بلکې بشپړ هم وي. ثبوت په هر ځل د یوې ترلے فارمول په زیاتولو کار کوي، او په هر پړاو کېښي تضمینوي چې سټ سازګار پاتې شي. دا ځکه کوو چې د هر $A!$ دپاره یا $A!$ یا $\neg A!$ په کوم پړاو کېښي ورزیات شي. بیا د دې جوړونې د ټولو پړاوونو اتحاد یا $A!$ لري یا $\neg A!$ ، او په دې توګه بشپړ دے. دا سازګار هم دے، ځکه په هر پړاو کېښي پام کوو چې ناسازګاري رامنځته نه کړو.

لم 13.9 (د لینډنباوم له). په ژبه $\mathcal{L}$ کېښي هر سازګار سټ Γ داسې غځېدے شي چې یو بشپړ او سازګار سټ Γ^* شي.

ثبوت. فرض کړئ Γ سازګار دے. د $\mathcal{L}$ د ټولو ترلي فارمولونه یوه شمېرته $A_0!$ ، $A_1!$ ، ... وي. $\Gamma_0 = \Gamma$ تعریف کړئ، او

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{!A_n\} & \text{که } \Gamma_n \cup \{!A_n\} \text{ سازګار وي،} \\ \Gamma_n \cup \{\neg !A_n\} & \text{کېښي. صورت بل په} \end{cases}$$

$$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n \text{ وټاکئ.}$$

هر Γ_n سازګار دے: Γ_0 د تعریف او فرض له مخې سازګار دے. که $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!A_n\}$ وي، لامل ئې دا دے چې وروستنه سټ سازګار دے. که دا سازګار نه وي، نو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg !A_n\}$ باید تصدیق کړو چې $\Gamma_n \cup \{\neg !A_n\}$ سازګار دے. فرض کړئ چې سازګار نه دے. بیا دواړه $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ او $\Gamma_n \cup \{\neg !A_n\}$ ناسازګار دي. دا په دې معنا ده چې Γ_n به د قضیې 9.28، 10.28، 11.28 او 12.34 له مخې ناسازګار وے، چې دا د استقرا له فرضیې سره تناقض دے.

د هر n او هر $i < n$ دپاره، $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. دا پر n د ساده استقرا له لارې ترلاسه کېږي. د $n = 0$ دپاره هېڅ $i < 0$ نشته، نو ادعا په خپله سمه ده. د استقرا د ګام دپاره فرض کړئ چې ادعا د n دپاره سمه ده. ښیو چې که $i < n + 1$ وي، نو $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. د جوړونې له مخې یا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!A_n\}$ ده یا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg !A_n\}$. که $i < n + 1$ وي، نو د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ (که $i < n$ وي)، یا دا ساده حقیقت لرو چې $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (که $i = n$ وي). د $\subseteq$ د انتقالیت له مخې $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ ترلاسه کوو.

له دې څخه څرګندېږي چې Γ^* سازګار دے۔ لامل دا دے: فرض کړئ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ متناهي دے۔ د ژباړې د نسخې سمون (OLCOM-002): سرچينې د تش متناهي فرعي سټ حالت نه و بيل کړے، حال دا چې «تر ټولو لوه» پړاو يوازې د نا تش سټ دپاره ټاکل کېدے شي؛ د تش حالت څرګنده سازګاري ورزياته شوه۔ نو فرض کړئ چې دا فرعي سټ نا تش دے۔ هر $B \in \Gamma'$ د کوم i دپاره په Γ_i کېږي هم دے۔ n دې د دغو شاخصونو تر ټولو لوه وي۔ ځکه که $i \leq n$ وي نو $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ ، هر $B \in \Gamma'$ هم $B \in \Gamma_n$ دے؛ يعنې $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$ او سازګار دے۔ نو هر متناهي فرعي سټ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ سازګار دے۔ د قضیې 9.23، 10.23، 11.23 او 12.23 له مخې، Γ^* سازګار دے۔

د $\text{Frm}(\mathcal{L})$ هره ترلے فارمول په هغه لړ کېږي راځي چې د Γ^* د تعريف دپاره کارول شوے دے۔ که $A_n \notin \Gamma^*$ وي، لامل ئې دا دے چې $\Gamma_n \cup \{A_n\}$ ناسازګار و۔ خو بيا $A_n \in \Gamma^*$ ، نو Γ^* بشپړ دے۔ □

13.6 د يو مدل جوړونه

اوس مهال مو له = سره کار نشته؛ يعنې يوازې دا ښودل غواړو چې د ترلي فارمولونه يو سازګار سټ Γ چې نه لري ، د صدق وړ دے۔ لومړے Γ يوه سازګار، بشپړ او مشبوع سټ Γ^* ته غځوو۔ په دې حالت کېږي د مدل $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ تعريف ساده دے: د $\mathcal{L}'$ د ترلو ترمونو سټ د تعريف ساحه ګرځوو۔ هر ثابت سمبول پخپله ځان ته ورګومارو، او په عمومي ډول دا باوري کوو چې د هر ترلي ترم t دپاره $\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ پرېديکاتونه داسې تفسيروو چې يوه اتومي ترلے فارمول په $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ کېږي هله او يوازې هله رښتوني وي چې په Γ^* کېږي وي۔ دا به څرګنده توګه په Γ^* کېږي ټولې اتومي ترلي فارمولونه په $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ کېږي رښتوني کړي۔ نورې جملې هم رښتوني دي، په دې شرط چې هغه Γ^* چې ترې پيل کوو، سازګار، بشپړ او مشبوع وي۔

تعريف 13.10 (ترمي مدل). فرض کړئ Γ^* په ژبه $\mathcal{L}$ کېږي د ترلي فارمولونه يو بشپړ، سازګار او مشبوع سټ دے۔ د Γ^* ترمي مدل $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ هغه جوړښت ده چې په لاندې ډول تعريفېږي:

1. د د تعريف ساحه $|\mathcal{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ د ټولو ترلو ترمونو سټ دے۔

2. د ثابت سمبول c تفسير پخپله c دے: $c^{\mathcal{M}(\Gamma^*)} = c$ ۔

3. تابع f ته هغه تابع ګومارل کېږي چې ترلي ترمونه $t_1, \dots, t_n$ د ارګومېنتونو په توګه واخلي او ترلے ترم $f(t_1, \dots, t_n)$ د قيمت په توګه ولري:

$$f^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$$

4. که R يو n -مقامي پرېديکات وي، نو

$$\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathcal{M}(\Gamma^*)} \text{ هله او يوازې هله چې } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

اوس به وګورو چې په رښتيا $\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ لرو۔

لم 13.11. فرض کړئ $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ د 13.10 ترمي مدل دے؛ بيا د هر ترلي ترم دپاره $\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ ۔

ثبوت. ثبوت پر t د استقرا له لارې دے۔ د بنسټ حالت، چې t يو ثابت سمبول وي، ښه په ښه د ترمي مدل له تعريف څخه ترلاسه کېږي۔ د استقرا د کام دپاره فرض کړئ $t_1, \dots, t_n$ داسې ترلي ترمونه دي چې $\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$ ، او f يوه n -مقامي تابع ده۔ بيا

$$\begin{aligned} \text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(f(t_1, \dots, t_n)) &= f^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t_n)) \\ &= f^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) \\ &= f(t_1, \dots, t_n), \end{aligned}$$

□

او نو د استقرا له مخې دا د هر ترلي ترم t دپاره سم دي۔

د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-008) په سرچینه کېنې د دې ټاکنیز شرط درېیم (د لومړۍ درجې منطق د نه ټاکل کېدو) تش ارکومېنټ پاتې شوی و؛ دلته په څرګنده توګه ورزیات شو، خو راتلونکې شرط د هغه پر ځای وانه خيستل شي.

جوړښت $\mathcal{M}$ ښايي يوه په وجودي ډول کمیت ټاکونکې ترلے فارمول $\exists x!A(x)$ رښتوني کړي، ښي له دې چې کومه بېلګه $A(t)$ ئې رښتوني کړې وي. جوړښت $\mathcal{M}$ ښايي د يوې په عمومي ډول کمیت ټاکونکې ترلے فارمول $\forall x!A(x)$ ټولې بېلګې $A(t)$ رښتوني کړي، خو پخپله $\forall x!A(x)$ رښتوني نه کړي. لامل دا دے چې په عمومي ډول د $|\mathcal{M}|$ هر غړے د کوم ترلي ترم قیمت نه وي ($\mathcal{M}$ ښايي پوښلے نه وي). همدا لامل دے چې د صدق اړيکه د متغير-ګومارنو له لارې تعريفېږي. خو زموږ د ترمي مدل $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ دپاره دا اړينه نه ده، ځکه هغه پوښلے دے. راتلونکې نتيجه همدا وايي.

قضيه 13.12. فرض کړئ $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ د 13.10 ترمي مدل دے.

1. $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \exists x!A(x)$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه ترلي ترم t دپاره $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A(t)$ وي.

2. $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \forall x!A(x)$ هله او يوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A(t)$ وي.

ثبوت. 1. د 16.22 له مخې، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \exists x!A(x)$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوې متغير-ګومارنې s دپاره $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(x)$ وي. ځکه $|\mathcal{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ له ترلو ترمونو جوړ دے، دا هله او يوازې هله کېږي چې لږ تر لږه يو ترلے ترم t وي، داسې چې $s(x) = t$ او $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(x)$ د 16.30 له مخې، چې $s(x) = t$ وي، $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(t)$ وي. د 16.20 له مخې، $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(t)$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A(t)$ وي، ځکه $A(t)$ يوه جمله ده.

2. د 16.22 له مخې، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \forall x!A(x)$ هله او يوازې هله چې د هرې متغير-ګومارنې s دپاره $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(x)$ وي. راياد کړئ چې $|\mathcal{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ له ترلو ترمونو جوړ دے؛ نو د هر ترلي ترم t دپاره $s(x) = t$ داسې يوه متغير-ګومارنه ده، او د هرې متغير-ګومارنې دپاره $s(x)$ کوم ترلے ترم t دے. د 16.30 له مخې، چې $s(x) = t$ وي، $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(t)$ وي. د 16.20 له مخې، $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(t)$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A(t)$ وي، ځکه $A(t)$ يوه جمله ده.

□

لم 13.13 (د صدق له). فرض کړئ $A!$ ، نه لري. بيا $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A!$ هله او يوازې هله چې $A \in \Gamma^*$ وي.

ثبوت. دواړه لوري په يو وخت، او پر $A!$ د استقرا له لارې ثابتوو.

1. $A \equiv \perp$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models \perp$ د صدق د تعريف له مخې. له بلې خوا، ځکه Γ^* سازګار دے، نو $\perp \notin \Gamma^*$.

2. $A \equiv \top$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \top$ د صدق د تعريف له مخې. له بلې خوا، ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، او $\top \in \Gamma^*$ ، نو $\top \in \Gamma^*$.

3. $A \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models R(t_1, \dots, t_n)$ هله او يوازې هله چې $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}$ وي (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ وي (د $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ د جوړونې له مخې).

4. $A \equiv \neg B$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models B$ وي (د صدق د تعريف له مخې). د استقرا د فرضيې له مخې، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models B$ هله او يوازې هله چې $B \notin \Gamma^*$ وي. ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، $B \notin \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې $\neg B \in \Gamma^*$ وي.

5. $A \equiv B \wedge C$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ هله او يوازې هله چې دواړه $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models B$ او $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models C$ ولرو (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې دواړه $B \in \Gamma^*$ او $C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې). د 213.2 له مخې، دا هله او يوازې هله کېږي چې $(B \wedge C) \in \Gamma^*$.

6. $A \equiv B \vee C$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models B$ يا $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models C$ وي (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې $B \in \Gamma^*$ يا $C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې). دا هله او يوازې هله کېږي چې $(B \vee C) \in \Gamma^*$ وي (د 313.2 له مخې).

7. $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A \equiv B \rightarrow C$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models B$ یا $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models C$ وي (د صدق د تعریف له مخې)، او دا هله او یوازې هله چې $B \notin \Gamma^*$ یا $C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې). دا هله او یوازې هله کېږي چې $(B \rightarrow C) \in \Gamma^*$ وي (د 413.2 له مخې).

8. $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A \equiv \forall x!B(x)$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ هله او یوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models B(t)$ وي (13.12). د استقرا د فرضيې له مخې، دا هله او یوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $B(t) \in \Gamma^*$ وي؛ د 13.8 له مخې بیا دا هله او یوازې هله چې $\forall x!B(x) \in \Gamma^*$ وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-003) د سرچینې په وروستی فورمول کېږي د استقرا له اوسني حالت سره ناسمه فورمول-نښه راغلي؛ دلته د همدې حالت نښه کارول شوې.

9. $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A \equiv \exists x!B(x)$: $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه ترلي ترم t دپاره $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models B(t)$ وي (13.12). د استقرا د فرضيې له مخې، دا هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه ترلي ترم t دپاره $B(t) \in \Gamma^*$ وي. د 13.8 له مخې بیا دا هله او یوازې هله چې $\exists x!B(x) \in \Gamma^*$ وي.

□

13.7 عینیت

په مخکښې برخه کېږي د ترمي مدل ورکړل شوې جوړونه د هغو ستونو Γ دپاره د اول مرتبې د منطق د بشپړوالي ثابتولو ته بس ده چې $=$ نڅه لري. ترمي مدل هر داسې $A \in \Gamma^*$ رښتونه کوي چې $=$ نڅه لري (او په دې توګه ټول $A \in \Gamma$ هم). خو که $=$ موجود وي، دا کار نڅه کوي. لامل دا دے چې بیا ښائي Γ^* داسې یوه ترلے فارمول $t = t'$ ولري، خو په ترمي مدل کېږي د هر ترم قیمت پخپله هماغه ترم دے. نو که t او t' بیل ترمونه وي، په ترمي مدل کېږي ئې قیمتونه، یعنې په ترتیب سره t او t' ، هم بیل دي؛ ځکه $t = t'$ ناسم دے. خو دا ستونزه د هغې جوړونې په کارولو هوارولے شو چې «خارج قسمت جوړونه» بللے شي.

تعریف 13.14. فرض کړئ Γ^* په $\mathcal{L}$ کېږي د جملو یو سازګار او بشپړ سټ دے. د $\mathcal{L}$ د ترلو ترمونو پر سټ اړیکه $\approx$ داسې تعریفوو:

$$t \approx t' \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad t = t' \in \Gamma^*$$

قضیه 13.15. اړیکه $\approx$ لاندې خاصیتونه لري:

1. $\approx$ انعکاسي ده.

2. $\approx$ متناظره ده.

3. $\approx$ انتقالی ده.

4. که $t \approx t'$ وي، f یوه تابع وي، او $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ ترلي ترمونه وي، نو

$$f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \approx f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n).$$

5. که $t \approx t'$ وي، R یو پریدیکات وي، او $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ ترلي ترمونه وي، نو

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*$$

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

ثبوت. ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، نو $t = t' \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي. نو د لاندې خبرو ښودل کافي دي:

1. د هر ترلي ترم t دپاره $\Gamma^* \vdash t = t$.

2. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي، نو $\Gamma^* \vdash t' = t$.

3. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ او $\Gamma^* \vdash t' = t''$ وي، نو $\Gamma^* \vdash t = t''$.

4. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي، نو

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-004) د سرچینې په لومړي تابعي ترم کښې یوه تکراري کامه وه، دلته لرې شوې ده. دا د هرې n -مقامي تابع f او ترلو ترمونو $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ دپاره سم دي.

5. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ او $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n)$ وي، نو $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$ د هر n -مقامي پریدیکات R او ترلو ترمونو $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ دپاره.

□

تمرین 13.16. د 13.15 ثبوت بشپړ کړئ.

تعریف 13.17. فرض کړئ Γ^* په یوه ژبه $\mathcal{L}$ کښې یو سازگار او بشپړ سټ دے، t یو ترلے ترم دے، او $\approx$ د مخکښې تعریف اړیکه ده. بیا:

$$[t]_{\approx} = \{t' : t' \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \approx t'\}$$

$$\text{Trm}(\mathcal{L})/\approx = \{[t]_{\approx} : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\} \text{ او}$$

تعریف 13.18. فرض کړئ $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\Gamma^*)$ د Γ^* هغه ترمي مدل دے چې په 13.10 کښې راغلے. بیا $\mathcal{M}/\approx$ لاندې جوړښت ده:

$$1. |\mathcal{M}/\approx| = \text{Trm}(\mathcal{L})/\approx$$

$$2. c^{\mathcal{M}/\approx} = [c]_{\approx}$$

$$3. f^{\mathcal{M}/\approx}([t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx}) = [f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx}$$

$$4. \langle [t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx} \rangle \in R^{\mathcal{M}/\approx} \text{ هله او یوازې هله چې } \mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n) \text{ وي؛ یعنې هله او یوازې هله چې } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ وي.}$$

پام وکړئ چې $f^{\mathcal{M}/\approx}$ او $R^{\mathcal{M}/\approx}$ مو د $\text{Trm}(\mathcal{L})/\approx$ پر عناصرو داسې تعریف کړي چې هغوی مو د $[t]_{\approx}$ په بڼه یاد کړي؛ یعنې د استازو $t \in [t]_{\approx}$ له لارې. باید باوري کړو چې دا تعریفونه د دې استازو پر انتخاب پورې تړلي نه دي؛ یعنې د نورو داسې انتخابونو t' دپاره چې هماغه د هم ارزښتی ټولګې ټاکي ($[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$)، تعریفونه هماغه پایله ورکړي. د بېلګې په توګه، که R یو یو-مقامي پریدیکات وي، د تعریف وروستی فقره وایي چې $[t]_{\approx} \in R^{\mathcal{M}/\approx}$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M} \models R(t)$ وي. که د کوم بل ترم t' دپاره چې $t \approx t'$ وي، $\mathcal{M} \not\models R(t')$ ، نو تعریف به وغواړي چې $[t']_{\approx} \notin R^{\mathcal{M}/\approx}$. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-005) د سرچینې په منفي صدق فورمول کښې د لومړي استازي ښه راغلې وه؛ د جملې د «بل ترم» او ورپسې ټولګې له مخې دلته د بل استازي ښه کارول شوې ده. که $t \approx t'$ وي، نو $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ ؛ خو نه شو کولې چې هم $[t]_{\approx} \in R^{\mathcal{M}/\approx}$ او هم $[t]_{\approx} \notin R^{\mathcal{M}/\approx}$ ولرو. خو 13.15 تضمینوي چې دا نه شي پېښېدلے.

قضیه 13.19. $\mathcal{M}/\approx$ په ښه ډول تعریف شوی دے؛ یعنې که $t'_1, \dots, t'_n$ ترلي ترمونه وي، او د هرې اړوندې جوړې دپاره $t_i \approx t'_i$ وي، نو

$$1. [f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx} = [f(t'_1, \dots, t'_n)]_{\approx} \text{ یعنې}$$

$$f(t_1, \dots, t_n) \approx f(t'_1, \dots, t'_n)$$

او

2. $\mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n)$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M} \models R(t'_1, \dots, t'_n)$ وي، يعنې

$$R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ هله او يوازې هله چې } R(t'_1, \dots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

ثبوت. له 13.15 څخه پر n د استقرا له لارې ترلاسه کېږي. □

د ترمي مدل د حالت په څېر، د صدق لمې تر ثبوت مخکېنې لاندې لمې ته اړتيا لرو.

لم 13.20. فرض کړئ $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\Gamma^*)$ ؛ بيا $\text{Val}^{\mathcal{M}/\approx}(t) = [t]_{\approx}$.

ثبوت. ثبوت د 13.11 له ثبوت سره ورته دے. □

تمرین 13.21. د 13.20 ثبوت بشپړ کړئ.

لم 13.22. د ټولو جملو A دپاره $\mathcal{M}/\approx \models A$ هله او يوازې هله چې $A \in \Gamma^*$ وي.

ثبوت. پر A د استقرا له لارې، کټ مټ د 13.13 د ثبوت په څېر. يوازې هغه حالت زيات پام غواړي چې $A \equiv t = t'$ وي.

وي (د $\mathcal{M}/\approx$ د تعريف له مخې) $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}/\approx \models t = t'$

وي (د $[t]_{\approx}$ د تعريف له مخې) $t \approx t'$ هله او يوازې هله چې

وي (د $\approx$ د تعريف له مخې). $t = t' \in \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې

□

پام وکړئ: سره له دې چې $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ تل د شمېر ور او نامتناهي دے، $\mathcal{M}/\approx$ بنايي متناهي وي، ځکه کېدلې شي چې د $[t]_{\approx}$ ټولگي يوازې متناهي شمېر وي. دا تمه کېدونکې ده، ځکه بنايي Γ داسې ترلي فارمولونه ولري چې هره هغه جوړښت چې دوی پکښې رښتوني وي، بايد متناهي وي. د بېلگې په توگه، $\forall x \forall y x = y$ يوه سازگار تړل فارمول ده، خو يوازې په هغو جوړښتونه کېنې رښتوني کېږي چې د تعريف ساحه ئې کټ مټ يو غړی لري.

13.8 د بشپړتيا قضيه

راځئ خپلې پايلې سره يوځای کړو: د بشپړتيا قضیې ته رسېږو.

قضيه 13.23 (د بشپړتيا قضيه). فرض کړئ Γ د ترلي فارمولونه يو سټ دے. که Γ سازگار وي، نو د صدق وړ دے.

ثبوت. فرض کړئ Γ سازگار دے. د 13.7 له مخې، يو مشبوع سازگار سټ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ شته. د 13.9 له مخې، داسې $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ شته چې سازگار او بشپړ دے.

ځکه $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ ، نو د هرې فارمول $A(x)$ دپاره Γ^* په لاندې بڼه يوه تړل فارمول لري: $\exists x!A(x) \rightarrow !A(c)$ او په دې توگه Γ^* مشبوع دے. که Γ ، $=$ نه لري، نو د 13.13 له مخې، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ هله او يوازې هله چې $A \in \Gamma^*$ وي. له دې څخه په تېره بيا دا ترلاسه کېږي چې د ټولو $A \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ ؛ نو Γ د صدق وړ دے. که Γ ، $=$ ولري، نو د 13.22 له مخې د ټولو ترلي فارمولونه A دپاره $\mathcal{M}/\approx \models A$ هله او يوازې هله چې $A \in \Gamma^*$ وي. په تېره بيا، د ټولو $A \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M}/\approx \models A$ ؛ نو Γ د صدق وړ دے. □

نتيجه 13.24 (د بشپړتيا قضيه، دويمه بڼه). د ټولو Γ او ترلي فارمولونه A دپاره: که $\Gamma \models A$ وي، نو $\Gamma \vdash A$.

ثبوت. پام وکړئ چې په 13.24 او 13.23 کېنې Γ گاڼې په کلي ډول کمیت ټاکل شوې دي. د دې دپاره چې ځان کېږد نه کړو، 13.23 د یوه بېل متغیر په کارولو بیا بیانوو: د ترلي فارمولونه د هر سټ Δ دپاره، که Δ سازگار وي، نو د صدق وړ دے. د نقیض عکس له مخې، که Δ د صدق وړ نه وي، نو Δ ناسازگار دے. دا به د لازمي نتیجې په ثبوت کېنې وکاروو.

فرض کړئ $\Gamma \models A$. بیا د 16.36 له مخې $\Gamma \cup \{\neg A\}$ د صدق وړ نه دے. که $\Gamma \cup \{\neg A\}$ خپل Δ ونیسو، د 13.23 مخکېنې بڼه راکوي چې $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ناسازگار دے. د قضیې 9.25، 10.25، 11.25 او 12.31، له مخې $\Gamma \models A$. $\square$

تمرین 13.25، 13.24 وکاروئ چې 13.23 ثابت کړئ، او په دې توګه وښیئ چې د بشپړتیا قضیې دواړه بیانونه هم ارزښته دي.

تمرین 13.26. د دې دپاره چې د اشتقاق نظام بشپړ وي، قاعدې ئې باید دومره پیاوړې وي چې هر د صدق وړ نه سټ ناسازگار ثابت کړي. د بشپړتیا د ثبوت دپاره د اشتقاق کومې قاعدې اړینې وې؟ آیا له دې قاعدو څخه کومه یوه د ثبوت په هېڅ ځای کېنې نه ده کارول شوې؟ د دې پوښتنو د ځواب دپاره داسې یو لړ یا شکل جوړ کړئ چې وښیي د اشتقاق کومې قاعدې په هغو کومو پایلو کېنې کارول شوې چې د 13.23 ثبوت ته رسېږي. په دې ثبوتونو کېنې د قاعدو هر ضمني استعمال هم ځانګړی یاد کړئ.

13.9 د متناهي شاهد قضیه

د بشپړتیا قضیې یوه مهمه پایله د متناهي شاهد قضیه ده. د متناهي شاهد قضیه وايي چې که د ترلي فارمولونه د یوه سټ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ وي، نو ټول سټ د صدق وړ دے، حتی که سټ پخپله نامتناهي وي. دا هېڅ څرګنده خبره نه ده. لږ تر لږه په لومړي نظر داسې هېڅ څه نه ښکاري چې د ترلي فارمولونه د داسې نامتناهي ستونو امکان رد کړي چې متناقض وي، خو تناقض ئې، په اصطلاح، یوازې له نامتناهي شمېر څخه راوړل کېږي. د متناهي شاهد قضیه وايي چې داسې حالت ردېدل شي: د ترلي فارمولونه داسې د صدق وړ نه نامتناهي ستونه نشته چې هر متناهي فرعي سټ ئې د صدق وړ وي. د بشپړتیا قضیې په څېر، د دې یوه بڼه هم له استلزام سره تړاو لري: که د ترلي فارمولونه یو نامتناهي سټ کوم څه لازمي، نو لا له وړاندې ئې یو متناهي فرعي سټ لازمي.

تعریف 13.27. د فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله په متناهي ډول د صدق وړ دے چې هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د صدق وړ وي.

قضیه 13.28 (د متناهي شاهد قضیه). د هرې د جملو ټولګې Γ او هرې جملې A دپاره لاندې خبرې سمې دي:

1. $\Gamma \models A$ هله او یوازې هله چې یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وي، داسې چې $\Gamma_0 \models A$.

2. Γ هله او یوازې هله د صدق وړ دے چې په متناهي ډول د صدق وړ وي.

ثبوت. موږ (2) ثابتوو. که Γ د صدق وړ وي، نو داسې جوړښت $\mathcal{M}$ شته چې د ټولو $A \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models A$. څرګنده ده چې همدا $\mathcal{M}$ د هر متناهي فرعي سټ هم پوره کوي؛ نو Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے.

اوس فرض کړئ Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے. بیا هر متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د صدق وړ دے. د سموالي له مخې (قضیې 9.39، 10.37، 11.39 او 12.45)، هر متناهي فرعي سټ سازگار دے. بیا د لاندې پایلې له مخې Γ پخپله هم باید سازگار وي: قضیې 9.23، 10.23، 11.23 او 12.23. د بشپړتیا له مخې (13.23)، ځکه Γ سازگار دے، نو د صدق وړ دے. $\square$

تمرین 13.29. د 13.28 برخه (1) ثابته کړئ.

بېلګه 13.30. د یوې تیورۍ Γ په هر مدل $\mathcal{M}$ کېنې، هر ترم t ځانګړي $|\mathcal{M}|$ یو غړی ټاکي. آیا دا هم تضمینول شو چې د $|\mathcal{M}|$ هر غړی کوم ترم ټاکلی وي؟ په بله وینا، آیا داسې تیورۍ Γ شته چې ټول مدلولونه ئې پوښلي وي؟ د متناهي شاهد قضیه ښیي چې که Γ نامتناهي مدلولونه ولري، داسې نه ده. دا داسې لیدل شو: فرض کړئ $\mathcal{M}$ د Γ یو نامتناهي مدل دے، او c داسې یو ثابت سمبول دے چې د Γ په ژبه کېنې نشته. فرض کړئ Δ د ټولو هغو جملو $c \neq t$ سټ دے چې t د Γ په ژبه $\mathcal{L}$ کېنې یو ترم وي؛ یعنې

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\}.$$

د $\Gamma \cup \Delta$ یو متناهي فرعي سټ د $\Gamma' \cup \Delta'$ په بڼه لیکل کېدای شي، چې $\Gamma' \subseteq \Gamma$ او $\Delta' \subseteq \Delta$ وي. ځکه Δ' متناهي ده، یوازې متناهي ډېر ترمونه لرلای شي. داسې $a \in |\mathcal{M}|$ واخلئ چې د $|\mathcal{M}|$ یو غړی وي او له هغوی څخه ئې هېڅ یو نه ټاکي، او داسې جوړښت واخلئ چې کټ مټ د $\mathcal{M}$ په څېر وي، خو $c^{\mathcal{M}'} = a$ هم ولري. ځکه په Δ' کېنې د راغلو ټولو t دپاره $a \neq \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$ ، نو $\mathcal{M}' \models \Delta'$. ځکه $\Gamma' \subseteq \Gamma$ ، او c په Γ کېنې نه راځي، نو $\mathcal{M}' \models \Gamma'$ هم. دواړه سره یوځای راکوي چې د $\Gamma \cup \Delta$ د هر متناهي فرعي سټ $\Gamma' \cup \Delta'$ دپاره $\mathcal{M}' \models \Gamma' \cup \Delta'$. نو د $\Gamma \cup \Delta$ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ ده. د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \Delta$ پخپله د صدق وړ ده. نو داسې مدونه شته چې $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \Delta$. هر داسې $\mathcal{M}$ د Γ مدل ده، خو پوښلې نه ده، ځکه د $\mathcal{L}$ د ټولو ترمونو t دپاره $\text{Val}^{\mathcal{M}}(c) \neq \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$.

بېلگه 13.31. داسې یوه ژبه $\mathcal{L}$ په پام کېنې ونیسئ چې پریدیکات $<$ ، ثابت سمبولونه 0 او 1 ، او تابعې $+$ ، $\times$ او $-$ ولري. فرض کړئ Γ په دې ژبه کېنې د ټولو هغو ترلي فارمولونه سټ ده چې په جوړښت Ω کېنې رښتوني دي، چې د تعریف ساحه ئې $\mathbb{Q}$ او تفسیرونه ئې څرګند دي. Γ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو ترلي فارمولونه سټ ده چې د ناطقو عددونو په اړه رښتوني دي. څرګنده ده چې په $\mathbb{Q}$ (او حتی په $\mathbb{R}$) کېنې داسې عددونه r نشته چې له 0 څخه لوی، خو د ټولو $k \in \mathbb{Z}^+$ دپاره له $1/k$ څخه کوچني وي. که داسې عدد موجود وای، یو بې حده کوچنۍ عدد به و: له صفره بېل، خو بې حده کوچنۍ. د متناهي شاهد قضیه د دې ښودلو دپاره کارېدلای شي چې د Γ داسې مدونه شته چې بې حده کوچني عددونه پکېنې موجود دي. زموږ په ژبه کېنې د تقسیم تابع نشته (پر صفر تقسیم ناتعریف ده، او تابعې باید په بشپړو تابعو تفسیر شي). خو بیا هم څرګندولې شو چې $r < 1/k$ ، ځکه دا هله او یوازې هله سم دي چې $r \cdot k < 1$. اوس c یو نوی ثابت سمبول ونیسئ او Δ داسې وټاکئ:

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \bar{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(چې $\bar{k} = (1 + (1 + \dots + (1 + 1) \dots))$ کېنې k ځله 1 راغلی). د Δ د هر متناهي فرعي سټ Δ_0 دپاره داسې K شته چې په Δ_0 کېنې د ټولو ترلي فارمولونه $c \times \bar{k} < 1$ دپاره $k < K$ وي. که Ω داسې Ω' ته پراخه کړو چې $c^{\Omega'} = 1/K$ ولري، نو د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \models \Omega'$ (لرو؛ نو $\Gamma \cup \Delta$ په متناهي ډول د صدق وړ ده (تمرین: دا په تفصیل ثابت کړئ)). د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \Delta$ د صدق وړ ده. د $\Gamma \cup \Delta$ هر مدل $\mathcal{S}$ یو بې حده کوچنۍ عدد لري، یعنې $c^{\mathcal{S}}$.

تمرین 13.32. د حساب په معیاري مدل $\mathcal{M}$ کېنې داسې هېڅ غړی $k \in |\mathcal{M}|$ نشته چې هره صیغه $\bar{n} < x$ پوره کړي (چې $\bar{n}$ هغه $0 \dots'$ ده چې n دانې لري). د متناهي شاهد قضیه وکاروئ او وښیئ چې د حساب په ژبه کېنې هغه ترلي فارمولونه چې د حساب په معیاري مدل $\mathcal{M}$ کېنې رښتوني دي، په داسې جوړښت Ω' کېنې هم رښتوني دي چې یو داسې غړی لري چې په رښتیا هره صیغه $\bar{n} < x$ پوره کوي.

بېلگه 13.33. پوهېږو چې له عینیت سره د اول مرتبې منطق دا څرګندولې شي چې د د تعریف ساحه کچه باید لږ تر لږه ټاکلې اندازه ولري: جمله $A \geq n$! (چې وایي «لږ تر لږه n بېل څیزونه شته») یوازې په هغو جوړښتونو کېنې رښتوني ده چې $|\mathcal{M}|$ لږ تر لږه n څیزونه ولري. نو که داسې وټاکو:

$$\Delta = \{A \geq n : n \geq 1\}$$

بیا د Δ هر مدل باید نامتناهي وي. په دې توګه یوې تیورۍ ته د Δ په ورزیاتولو تضمینولې شو چې یوازې نامتناهي مدونه ولري: د $\Gamma \cup \Delta$ مدونه کټ مټ د Γ نامتناهي مدونه دي.

نو د اول مرتبې منطق نامتناهي والې څرګندولې شي. خو د متناهي شاهد قضیه ښیي چې متناهي والې نه شي څرګندولې. ځکه فرض کړئ د جملو کوم سټ Λ په ټولو او یوازې متناهي جوړښتونه کېنې رښتوني وي. بیا $\Delta \cup \Lambda$ په متناهي ډول د صدق وړ ده. ولې؟ فرض کړئ $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ متناهي ده، چې $\Delta' \subseteq \Delta$ او $\Lambda' \subseteq \Lambda$ وي. که لومړۍ فرعي سټ خالي وي، د اندېکس ارزښت یو ټاکو؛ او که خالي نه وي، n دې تر ټولو لوی هغه عدد وي چې $A \geq n$! د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-006) سرچینه سمدستي تر ټولو لوی اندېکس ټاکي، خو خالي متناهي فرعي سټ داسې اندېکس نه لري، دلته خالي حالت جلا ونيول شو. ځکه Λ په ټولو متناهي جوړښتونو کېنې رښتوني ده، داسې مدل $\mathcal{M}$ لري چې متناهي ډېر، خو $n \geq$ ، غړي ولري. خو بیا $\Delta' \cup \Lambda' \models \mathcal{M}$. د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Delta \cup \Lambda$ یو نامتناهي مدل لري، او دا له هغې فرضیې سره تناقض لري چې Λ یوازې په متناهي جوړښتونه کېنې رښتوني ده.

13.10 د متاهي شاهد قضیې نېغ ثبوت

د بشپړتیا قضیې له کارولو پرته، د بشپړتیا قضیې د ثبوت د هماغو نظرونو په کارولو، د متاهي شاهد قضیه نېغ په نېغه ثابتول شو. د بشپړتیا قضیې په ثبوت کېنې مو د ترلي فارمولونه له یوه سازکار سټ Γ څخه پیل وکړ، هغه مو د ترلي فارمولونه یوه سازکار، مشوع او بشپړ سټ Γ^* ته پراخ کړ، او بیا مو وښودله چې له Γ^* څخه په جوړ شوي ترمي مدل $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ کېنې د Γ ټولې ترلي فارمولونه رښتوني دي، نو Γ د صدق وړ دے.

همدا طریقه د دې ښودلو دپاره کارول شو چې د جملو یو په متاهي ډول د صدق وړ سټ، د صدق وړ دے. یوازې د هغو پایلو اړوندې بڼې ثابتول پکار دي چې د صدق لمې ته رسېږي، او پکښې «سازکار» په «په متاهي ډول د صدق وړ» بدلوو.

قضیه 13.34. فرض کړئ Γ ، بشپړ او په متاهي ډول د صدق وړ دے. بیا:

1. $(A \wedge B) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې دواړه $A \in \Gamma$ او $B \in \Gamma$ وي.

2. $(A \vee B) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $A \in \Gamma$ یا $B \in \Gamma$ وي.

3. $(A \rightarrow B) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $A \notin \Gamma$ یا $B \in \Gamma$ وي.

تمرین 13.35، 13.34. ثابت کړئ. $\vdash$ مه کاروئ.

لم 13.36. هر په متاهي ډول د صدق وړ سټ Γ یو مشوع، په متاهي ډول د صدق وړ سټ Γ' ته غځېدلی شي.

تمرین 13.37، 13.36. ثابت کړئ. (اشاره: مهم کام دا ښودل دي چې که Γ_n په متاهي ډول د صدق وړ وي، نو $\Gamma_n \cup \{!D_n\}$ هم همداسې دے؛ بې له دې چې اشتقاقونه یا سازکاری ته مراجعه وشي.)

قضیه 13.38. فرض کړئ Γ بشپړ، په متاهي ډول د صدق وړ، او مشوع دے.

1. $\exists x !A(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه ترلي تم t دپاره $A(t) \in \Gamma$ وي.

2. $\forall x !A(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $A(t) \in \Gamma$ وي.

تمرین 13.39، 13.38. ثابت کړئ.

لم 13.40. هر په متاهي ډول د صدق وړ سټ Γ یو بشپړ او په متاهي ډول د صدق وړ سټ Γ^* ته غځېدلی شي.

تمرین 13.41، 13.40. ثابت کړئ. (اشاره: مهم کام دا ښودل دي چې که Γ_n په متاهي ډول د صدق وړ وي، نو یا $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ یا $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ په متاهي ډول د صدق وړ دے.)

قضیه 13.42. (د متاهي شاهد خاصیت). Γ هله او یوازې هله د صدق وړ دے چې په متاهي ډول د صدق وړ وي.

ثبوت. که Γ د صدق وړ وي، نو داسې جوړښت $\mathcal{M}$ شته چې د ټولو $A \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models A$ وي. څرګنده ده چې همدا $\mathcal{M}$ د Γ هر متاهي فرعي سټ هم پوره کوي؛ نو Γ په متاهي ډول د صدق وړ دے.

اوس فرض کړئ Γ په متاهي ډول د صدق وړ دے. د 13.36 له مخې، داسې په متاهي ډول د صدق وړ مشوع سټ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ شته. د 13.40 له مخې، Γ' یو بشپړ او په متاهي ډول د صدق وړ سټ Γ^* ته غځېدلی شي، او Γ^* لا هم مشوع دے. که عینیت موجود نه وي، د ترمي مدل $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ ؛ او که عینیت موجود وي، د مخکښې برخې خارج قسمت شوې ترمي مدل د 13.10 د جوړونې پر بنسټ جوړ کړئ. پام وکړئ چې 13.12 د Γ^* پر سازکاری (یا، په دې حساب، پر بشپړ والي یا مشوع والي) تکیه نه کوله؛ یوازې پر دې ئې تکیه کوله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ پوښلی دے. د عینیت په حالت کېنې د هم ارزښتی او سازکارتیا شرطونه هم نېغ له متاهي صدق وړتیا څخه ترلاسه

کېږي: د هر شرط ناکامي به یو د صدق وړ نه متناهي فرعي سټ ورکړي. د صدق لمې ثبوت (13.13) هغه وخت هم سم پر مخ ځي چې 13.2 او 13.8 ته مراجعې په ترتیب سره 13.34 او 13.38 ته په مراجعو بدلې کړو. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-009) په سرچینه کې د دې ټاکنیز شرط درېم تش ارګومېنټ پاتې شوی و؛ دلته په څرګنده توګه ورزیات شو، خو ورپسې متن د هغه پر ځای وانه خيستل شي. د عينیت په حالت کې د برابری استقرایي حالت د خارج قسمت له تعريف څخه نېغ ترلاسه کېږي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-007) د سرچینې د اول مرتبې نېغ ثبوت یوازې عادي ترمي مدل یادوي، چې د عينیت لرونکې جملې نه پوښي؛ دلته د عينیت دپاره اړینه خارج قسمت جوړونه او د هغې متناهي صدق-ورتيابي دليل څرګند شو. □

تمرین 13.43. د صدق لمې (13.13) بشپړ ثبوت په هغه بڼه وليکئ چې د 13.42 د ثبوت دپاره اړینه ده.

13.11 د لوېنهام-سکولم قضیه

د لوېنهام-سکولم قضیه وايي چې که یوه تیوري نامتناهي مدل ولري، نو داسې یو مدل هم لري چې تر ډېره شمېرېدونکې لامتناهي وي. د دې خبرې یوه سملاسي پایله دا ده چې د اول مرتبې منطق دا نه شي څرګندولې چې د جوړښت کچه د شمېر نه وړ ده: هره ترلې فارمول یا د ترلې فارمولونه هر سټ چې په ټولو د شمېر نه وړ جوړښتونه کېږي رښتونه وي، په کوم د شمېر وړ جوړښت کېږي هم رښتونه دے.

قضیه 13.44. که Γ سازګار وي، نو یو د شمېر وړ مدل لري؛ یعنې په داسې جوړښت کې د صدق وړ دے چې د تعريف ساحه ئې یا متناهي یا شمېرېدونکې لامتناهي وي.

ثبوت. که Γ سازګار وي، د بشپړتیا قضیې ثبوت چې کوم جوړښت $\mathcal{M}$ ورکوي، د هغه د تعريف ساحه $|\mathcal{M}|$ د ژبې $\mathcal{L}$ د ترمونو له سټ څخه لویه نه ده. نو $\mathcal{M}$ تر ډېره شمېرېدونکې لامتناهي دے. □

قضیه 13.45. که Γ د عينیت پرته د اول مرتبې د منطق په ژبه کېږي د ترلې فارمولونه یو سازګار سټ وي، نو یو شمېرېدونکې لامتناهي مدل لري؛ یعنې په داسې جوړښت کې د صدق وړ دے چې د تعريف ساحه ئې نامتناهي او د شمېر وړ وي.

ثبوت. که Γ سازګار وي او داسې هېڅ جمله نه لري چې عينیت پکېږي راغلی وي، نو د بشپړتیا قضیې ثبوت چې کوم جوړښت $\mathcal{M}$ ورکوي، د هغه د تعريف ساحه $|\mathcal{M}|$ کټ مټ د ژبې $\mathcal{L}'$ د ترمونو سټ دے. نو $\mathcal{M}$ شمېرېدونکې لامتناهي دے، ځکه $\text{Trm}(\mathcal{L}')$ هم داسې دے. □

بېلګه 13.46 (د سکولم پارادوکس). د زرمولو-فرېنکل سټ تیوري ZFC یو ډېر پیاوړې چوکاټ دے چې کابو ټولې ریاضيکي خبرې پکېږي څرګندېدلې شي، د ستونو د کچو په اړه حقیقتونه هم. نو د بېلګې په توګه، ZFC ثابتولې شي چې د حقیقي عددونو سټ $\mathbb{R}$ ، د شمېر نه وړ دے؛ د کانتور قضیه ثابتولې شي چې د هر سټ تواني سټ پخپله له هغه سټ څخه لوی دے، او داسې نور. که ZFC سازګاره وي، ټول مدلونه ئې نامتناهي دي؛ او سربېره پر دې، ټول داسې غړي لري چې تیوري ئې په اړه وايي چې د شمېر نه وړ دي، لکه هغه عنصر چې د ZFC دا قضیه رښتوني کوي چې د طبیعي عددونو تواني سټ موجود دے. د لوېنهام-سکولم قضیې له مخې، ZFC، د شمېر وړ مدلونه هم لري: داسې مدلونه چې «د شمېر نه وړ» ستونه لري، خو پخپله د شمېر وړ دي.

برخه III

د لومړۍ درجې منطق

ادارتي یادونه. په دې برخه کېنې د لومړۍ درجې منطق مابعد منطق تر بشپړتیا پورې څېړل کېږي. اوس مهال دا برخه د بیاني منطق پر جلا بیان تکیه نه کوي؛ هر څه پکښې ثابتېږي. که د FOL تېگ ناسم وي، د سرچینې فایلونه به د کمیت ټاکونکو اړوند مواد وباسي (او "جوړښت" به په "ارزښت ټاکنه"، $\mathcal{M}$ به په $\mathcal{V}$ ، او داسې نورو بدل کړي). په حقیقت کېنې، د بیاني منطق د برخې زیاتره مواد همدا د لومړۍ درجې منطق مواد دي چې د FOL تېگ پکښې بند کړې شوي دي.

که د بیاني منطق برخه هم شامله وي، نو ډېر تکرار ترې جوړېږي. خو پلان دا دې چې دا برخه د بیاني منطق مواد په پام کېنې نیول شي (او مخکښې څېړل شوي مواد وباسي، او همدارنګه شونتونه د بیاني برخې اړوندو ځایونو ته په حوالو لنډ کړي).

باب 14

د لومړۍ درجې منطق پېژندنه

14.1 د لومړۍ درجې منطق

تاسو غالباً د صوري منطق په لومړۍ پېژندنه کېنې د لومړۍ درجې له منطق سره بلد یئ.¹ ښايي تاسو دا د “کمیت ټاکونکو منطق” یا “پريديکاتي منطق” په نامه پېژنئ. د لومړۍ درجې منطق تر هر څه مخکېنې یوه صوري ژبه ده. یعنې یو ټاکلی لغتخوند لري، او عبارتونه یې د همدې لغتخوند تارونه دي. خو هر تار جایز نه دے. د جایزو عبارتونو بېلابېل ډولونه شته: ترمونه، فارمولونه او ترلي فارمولونه. موږ په اصل کېنې د لومړۍ درجې منطق له ترلي فارمولونه سره لېوال یو: هغوی د انگرېزي ژبې د جملو صوري سیال راکوي، او د هغوی په باب هغه پوښتني کولې شو چې منطقپوه عموماً ورسره لېوال وي. مثلاً:

• ایا B ! له A ! څخه په منطقي ډول لازمهېږي؟

• ایا A ! په منطقي ډول رښتونی، په منطقي ډول دروغنه، که اتفاقي ده؟

• ایا A ! او B ! هم ارزښته دي؟

دا پوښتني په بنسټیز ډول د لومړۍ درجې منطق د ترلي فارمولونه د “معنی” په باب دي. مثلاً یو فیلسوف به دا پوښتنه، چې ایا B ! له A ! څخه په منطقي ډول لازمهېږي، داسې وڅېړي: ایا کوم داسې حالت شته چې A ! پکېنې رښتونی خو B ! دروغنه وي (B ! له A ! څخه نه لازمهېږي)، که هر هغه حالت چې A ! رښتونی کوي B ! هم رښتونی کوي (B ! له A ! څخه لازمهېږي)؟ خو لا راته نه دي ویل شوي چې “حالت” څه دے—دا د معنی پوهنې کار دے. د لومړۍ درجې منطق معنی پوهنه د فیلسوف د “حالت” د وجداني مفکورې، او هم—چې دا مهمه ده—په یوه حالت کېنې د ترلي فارمول A ! د رښتوني کېدو ریاضیکي دقیق مدل راکوي. هغه ریاضیکي دقیق مدل چې جوړوو یې جوړښت بولو. هغه اړیکه چې “پکېنې رښتونی” په دقیق ډول بیانوي، د صدق اړیکه بلل کېږي. نو موږ به د ترلي فارمولونه A ! او جوړښتونه $\mathcal{M}$ دپاره دا تعریفوو چې “ A ! په $\mathcal{M}$ کېنې صدق کوي” (په سمبولونو کېنې: $\mathcal{M} \models A$)—له دې وروسته نور معنایي اصطلاحات، لکه “ترې لازمهېږي” یا “په منطقي ډول رښتونی ده”، هم په دقیق ډول تعریفولې شو. دا تعریفونه به ممکنه کړي چې په ریاضیکي دقت سره، مثلاً، فیصله وکړو چې ایا $\forall x (A(x) \rightarrow B(x)), \exists x A(x) \models \exists x B(x)$ ده که نه. ځواب به طبعاً “هو” وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-001) په سرچینه کېنې د دې استلزام د لومړۍ عمومي جملې تړونکی قوس تر وروستۍ پایلې پورې ځنډېدلې او کمیت ټاکونکی یې په نام ډول پر ټول استلزام خور کړی و؛ دلته قوس د شرطی فارمول سمدستي وروسته تړل شو. که تاسو مخکېنې د انگرېزي جملو د لومړۍ درجې منطق په سمبولونو اړولوزده کړه کړې وي، دا به مثلاً د “ټولې مېرې حشرات دي، مېرې شته، نو حشرات شته” د سمبولونو بڼه وپېژنئ. دا په څرګند ډول معتبر استدلال دے، نو زموږ د صوري ژبې د “ترې لازمهېږي” ریاضیکي مدل هم باید همدا ځواب ورکړي.

¹ په حقیقت کېنې موږ لږ و ډېر دا فرضوو چې تاسو ورسره بلد یئ! که نه یئ، نو یو لا ابتدايي درسي کتاب، لکه *forall x* (al. et Magnus, 2021)، بیا کله شی.

بله موضوع چې غالباً د صوري منطق له لومړۍ پېژندنې څخه مو یاده ده، اشتقاقونه دي. که مو د صوري منطق لومړۍ کورس لوستلې وي، ښوونکي به در باندې د داسې اشتقاقونه د موندلو تمرین کړي وي؛ ښايي حتی داسې اشتقاق مو موندلې وي چې پورته استلزام ښيي. د اشتقاقونه د ورکولو ډېرې بېلابېلې لارې شته: ښايي تاسو “فطري استنتاج” یا “د رښتیاوالي ونې” کارولې وي، خو نورې ډېرې لارې هم شته. د اشتقاق د نظامونو موخه داسې وسیلې برابرول دي چې د منطقپوهانو پورته پوښتنې پرې ځواب شي: مثلاً د فطري استنتاج داسې اشتقاق چې $(A(x) \rightarrow B(x))$ او $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ او $\exists x A(x)$ یې مقدمې وي او $\exists x B(x)$ یې پایله (وروستۍ کړننه) وي، دا تصدیقوي چې $\exists x B(x)$ په منطقي ډول له $(A(x) \rightarrow B(x))$ او $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ څخه لازمه پرې. په دې پاراګراف کېنې هم د OLFOL-001 له مخې د هماغې عمومي جملې تړونکي قوس او د پایلې زیات قوس سم شوي دي.

خو دا ولې؟ په ظاهره د اشتقاق نظامونه له معنی پوهنې سره هېڅ تړاو نه لري: د یوه صوري اشتقاق ورکول یوازې دا غواړي چې سمبولونه د ځینو قاعدو له مخې سره منظم شي؛ هلته د “حالتونو” یا “پکښې رښتوني” هېڅ یادونه نشته. د اشتقاق د نظامونو او معنی پوهنې تر منځ تړاو باید په مابعدمنطقي څېړنه ثابت شي. پکار دا ده چې مثلاً په ریاضیکي ډول ثابته کړو: له مقدمو $\forall x (A(x) \rightarrow B(x))$ او $\exists x A(x)$ څخه د $\exists x B(x)$ صوري اشتقاق هله او یوازې هله ممکن دے چې $(A(x) \rightarrow B(x))$ او $\exists x A(x)$ په ګډه $\exists x B(x)$ لازم کړي. د OLFOL-001 له مخې دلته هم د تکرار شوې شېما دوه ناسمه قوسونه سم شوي دي. خو تر دې مخکښې چې دا کار وشي، د نحو او معنی پوهنې د تعریفونو د سمولو دپاره ډېر زیارکښ کار کول پکار دي.

14.2 نحو

لومړۍ باید دا په دقیق ډول وټاکو چې د سمبولونو کوم تارونه د لومړۍ درجې منطق ترې فارمولونه ګڼل کېږي. دا کار به وروسته وکړو؛ اوس به یوازې د بېلګو له مخې مخکښې ځو. د لومړۍ درجې منطق بنسټیزې جوړښتي څښتنۍ — یعنې لغتڅوند — په دوو برخو وېشل کېږي. لومړۍ برخه هغه سمبولونه دي چې په وسیله یې ځانګړي څیزونه ټاکو یا د هغوی په باب ځانګړې خبرې کوو. څیزونه په ثابت سمبولونه ټاکو، او بیا د ټاکلو شوو څیزونو په باب په پریدیکاتونه څه وایو. مثلاً ښايي a د ثابت سمبول په توګه د یوه څیز د ټاکلو دپاره وکاروو، او بیا د ترلې فارمول $P(a)$ په وسیله د هغه په باب څه ووايو. که د “ a ” او “ P ” معناوې په ذهن کېنې ولری، $P(a)$ د انګرېزي ژبې د یوې جملې په توګه لوستلې شی (او غالباً مو د صوري منطق د لومړۍ زده کړې پر وخت همداسې کړي دي). کله چې د لومړۍ درجې منطق داسې ساده ترې فارمولونه ولرو، د لغتڅوند په دویمه برخه، یعنې منطقي سمبولونو (ښلولونکو او کمیت ټاکونکو)، ترې نورې پېچلې جملې جوړولې شو. نو مثلاً داسې عبارتونه جوړولې شو لکه $(P(a) \wedge Q(b))$ یا $\exists x P(x)$.

د معنی پوهنې د دقیقو تعریفونو او د هغو د اشتقاق د نظامونو د قاعدو د ورکولو دپاره چې سخته مابعدمنطقي څېړنه یې غواړي، تر هر څه مخکښې باید په دقیق ډول تعریف کړو چې د لومړۍ درجې منطق ترلې فارمول څه ګڼل کېږي. بنسټیزه مفکوره دومره اسانه ده: ځینې ساده ترې فارمولونه یوازې له پریدیکاتونه او ثابت سمبولونه څخه جوړولې شو، لکه $P(a)$. بیا له دغو څخه د ښلولونکو او کمیت ټاکونکو په وسیله پېچلې جملې جوړوو. خو هغه قواعد په دقیق ډول کوم دي چې له مخې یې د پېچلو ترې فارمولونه جوړول راته جایز دي؟ دا باید وټاکل شي، کنه “د لومړۍ درجې منطق ترلې فارمول” مو په کافي دقت نه دے تعریف کړے. خو مسټلې شته. لومړۍ دا چې سم تارونه د ترې فارمولونه په توګه وشمېرو. دویمه دا چې کار په داسې ډول وکړو چې د ټولو ترې فارمولونه په باب ریاضیکي ثبوتونه ورکولې شو. په پای کې باید پر ترې فارمولونه د ځینو لومړنیو عملیاتو دقیق تعریفونه هم ورکړو، لکه “په A کېنې هر x په b بدل کړه” — ستونزه دا ده چې د لومړۍ درجې منطق کمیت ټاکونکي او متغیرونه دا کار بشپړ څرګند نه پرېږدي. مثلاً ایا $\exists x P(a)$ باید ترلې فارمول وګڼل شي؟ او $\exists x \exists x P(x)$ څنګه؟ “په $(P(x) \wedge \exists x P(x))$ کېنې x په b بدل کړه” پایله باید څه وي؟

14.3 فارمولونه

د لومړۍ درجې منطق د ترې فارمولونه د سخت تعریف او د متغیرونه له کارولو څخه راولاړو شوو مسئلو د هوارولو دپاره به لاندې لاره کاروو. لومړۍ د عبارتونو یو بل سټ تعریفوو: فارمولونه — له دې وروسته پکښې د متغیرونه ونډه څېړلې شو — او د ځینو نورو مفکورو، یعنې “ازادو” او “ترلو” متغیرونه، پر بنسټ تعریفولې شو چې ترلې فارمول څه ده (یعنې داسې فارمول چې ازاد متغیرونه نه لري). دا کار یوازې د “ترلې فارمول” د تعریف د اسانه کولو دپاره نه کوو؛ بلکې د صدق د معنایي مفهوم د تعریف په طریقه کېنې به هم ډېر اړین

وي-

راځئ “فارمول” د لومړۍ درجې د يوې ساده ژبې دپاره تعريف کړو: داسې ژبه چې يوازې يو پريديکات P ، يو ثابت سمبول a ، او يوازې منطقي سمبولونه $\neg$ او $\wedge$ لري. زموږ بشپړ تعريفونه به ډېر عام وي: نامتناهي ډېر پريديکاتونه او ثابت سمبولونه به جايز کړو. په حقيقت کېنې هغه تابعې به هم څېړو چې له ثابت سمبولونه او متغیرونه سره يوځای “ترمونه” جوړوي. اوس دپاره a او متغیرونه زموږ يوازیني ترمونه دي. البته نامتناهي ډېرو متغیرونه ته اړتیا لرو. په رسمي ډول به $v_0, v_1, \dots$ د متغیرونو په توګه کاروو.

تعريف 14.1. د فارمولونه سټ Frm داسې تعريفېږي:

1. $P(a)$ او $P(v_i)$ فارمولونه دي ($i \in \mathbb{N}$).

2. که A فارمول وي، نو $\neg A$ فارمول ده.

3. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \wedge B)$ فارمول ده.

4. که A فارمول او x متغیر وي، نو $\exists x A$ فارمول ده.

5. بل هېڅ څيز فارمول نه دے.

1 راته وايي چې د هر $i \in \mathbb{N}$ دپاره $P(a)$ او $P(v_i)$ فارمولونه دي. دا تش په نامه اټومي فارمولونه دي. هغوی د پیل دپاره څه راکوي. نور شرطونه له هغو څخه چې لا مو جوړ کړي، د نويو فارمولونه د جوړولو لارې راکوي. نو مثلاً د 2 له مخې $\neg P(v_2)$ فارمول ده، ځکه $P(v_2)$ د 1 له مخې لا فارمول ده. بیا د 4 له مخې $\exists v_2 \neg P(v_2)$ بله فارمول ده، او همداسې مخکېنۍ. 5 راته وايي چې يوازې هغه تارونه فارمولونه ګڼل کېږي چې په همدې طريقه ئې جوړولې شو. په ځانګړي ډول $\exists v_0 P(a)$ او $\exists v_0 \exists v_1 P(a)$ په رښتیا فارمولونه ګڼل کېږي، خو $(\neg P(a))$ نه ګڼل کېږي، ځکه دباندي قوسونه ئې زیات دي.

د فارمولونه د تعريف دا طريقه استقرايي تعريف بلل کېږي، او اجازه راکوي چې د استقرايي ثبوت په هغه بڼه د فارمولونه په باب څه ثابت کړو چې جوړښتي استقرا بلل کېږي. دا دواړه په عمومي ډول په د $OpenLogic$ اړونده سرچینيزه برخه [OLP] او د $OpenLogic$ اړونده سرچینيزه برخه [OLP] کېنې څېړل شوي دي، وروسته ثبوتونو ته له ننوتلو مخکېنې ئې بیا وګورئ. بنسټيزه مفکوره دا ده: که غواړئ ثابته کړئ چې یو څه د ټولو فارمولونه دپاره رښتیا دي، لومړۍ ښیئ چې د اټومي فارمولونه دپاره رښتیا دي، بیا ښیئ چې که د هر فارمول A (او B) دپاره رښتیا وي، د $\neg A$ ، $(A \wedge B)$ او $\exists x A$ دپاره هم رښتیا دي. مثلاً په دې سره ثابتېږي چې دا د $\exists v_2 \neg P(v_2)$ دپاره رښتیا دي: له لومړۍ برخې پوهېږئ چې د اټومي فارمول $P(v_2)$ دپاره رښتیا دي. بیا له دویمې برخې ترلاسه کوئ چې د $\neg P(v_2)$ دپاره رښتیا دي، او ورپسې بیا د $\exists v_2 \neg P(v_2)$ په خپله دپاره رښتیا دي. ځکه چې ټول فارمولونه په استقرايي ډول له اټومي فارمولونه څخه جوړېږي، دا طريقه د هر فارمول دپاره کار کوي.

14.4 صدق

کله چې پوه شو فارمولونه څه دي، سمدستي د لومړۍ درجې منطق معنی پوهنې ته وړاندې تللې شو: دلته بنسټيز تعريف د جوړښت دے. زموږ د ساده ژبې دپاره جوړښت $\mathcal{M}$ يوازې درې برخې لري: يو نانش سټ $|\mathcal{M}|$ چې د تعريف ساحه بلل کېږي، هغه څيز چې a ئې په $\mathcal{M}$ کېنې ټاکي، او هغه څيزونه چې P ورباندې په $\mathcal{M}$ کېنې رښتونه دے. د a ټاکلې څيز په $a^{\mathcal{M}}$ ، او د هغو څيزونو سټ چې P ورباندې رښتونه دے په $P^{\mathcal{M}}$ ښودل کېږي. جوړښت $\mathcal{M}$ همدا درې څيزونه لري: $|\mathcal{M}|$ ، $a^{\mathcal{M}}$ او $P^{\mathcal{M}}$. عمومي حالت به لا پېچلې وي، ځکه ډېر پريديکاتونه او ثابت سمبولونه به وي، پريديکاتونه له يوه څخه زیات ځایونه لرل شي، او تابعې به هم وي. د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL-002) سرچینې دلته په تېروتنه کېنې ويلي چې ثابت سمبولونه له يوه څخه زیات ځایونه لرل شي، د خوځایيزوالي خاصیت د پريديکاتونو دے، لکه د همدې څپرکي دوه ځایيزه اړیکه.

دا د هغو فارمولونه د صدق د تعريف دپاره بس ده چې متغیرونه نه لري. مفکوره دا ده چې داسې استقرايي تعريف ورکړو چې د فارمولونه زموږ د تعريف طريقه منعکس کړي. ټاکو چې یو اټومي فارمول کله په $\mathcal{M}$ کېنې صدق کوي؛ بیا مثلاً دا ټاکو چې $\neg A$ کله په $\mathcal{M}$ کېنې صدق کوي، د دې پر بنسټ چې A په $\mathcal{M}$ کېنې صدق کوي که نه. مثلاً داسې تعريفولې شو:

1. $P(a)$ په $\mathcal{M}$ کېنې هله صدق کوي چې $a^{\mathcal{M}} \in P^{\mathcal{M}}$ وي.

2. $\neg!A$ په $\mathcal{M}$ کېنې هله صدق کوي چې A په $\mathcal{M}$ کېنې صدق نه کوي.

3. $(A \wedge !B)$ په $\mathcal{M}$ کېنې هله صدق کوي چې A په $\mathcal{M}$ کېنې صدق وکړي، او B هم په $\mathcal{M}$ کېنې صدق وکړي.

فرض کړئ $a^{\mathcal{M}} = 1$ ، $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2\}$ ، او $P^{\mathcal{M}} = \{1, 2\}$ دي. دا تعريف راته وايي چې $P(a)$ په $\mathcal{M}$ کېنې صدق کوي (ځکه $a^{\mathcal{M}} = 1 \in \{1, 2\} = P^{\mathcal{M}}$). ورپسې راته وايي چې $\neg P(a)$ په $\mathcal{M}$ کېنې صدق نه کوي؛ نو په خپل وار $\neg\neg P(a)$ صدق کوي او $(\neg P(a) \wedge P(a))$ صدق نه کوي، او همداسې مخکېنې.

ستونزه هغه وخت پيدا کېږي چې د کيټ ټاکونکو دپاره تعريف ورکول غواړو: زړه مو غواړي داسې ووايو چې “ $\exists v_0 P(v_0)$ هله صدق کوي چې $P(v_0)$ صدق وکړي” خو جوړښت $\mathcal{M}$ راته نه وايي چې له متغیرونه سره څه وکړو. په اصل کېنې غواړو ووايو چې $P(v_0)$ د v_0 د کوم قيمت دپاره صدق کوي. د دې د دقيق کولو دپاره داسې لارې ته اړتيا لرو چې د $|\mathcal{M}|$ غړي يوازې a ته نه، بلکې v_0 ته هم وگومارو. د همدې دپاره د متغیر گومارنې ورپېژنو. د متغیر گومارنه يوازې داسې تابع s ده چې متغیرونه د $|\mathcal{M}|$ غړي ته وړي (زموږ په بېلگه کېنې له 0 ، 1 يا 2 څخه يوه ته). د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-003) سرچينې دلته يو، دوه او درې ليکلي وو، خو پورته ټاکلې د تعريف ساحه صفر، يو او دوه لري؛ نو لږ د هماغې ساحې غړو ته سم شو. ځکه مخکېنې نه پوهېږو چې په فارمول کېنې به کوم متغیرونه راشي، دا نه شو محدودولې چې s کومو متغیرونه ته قيمتونه وټاکي. ساده حل دا دے چې غواړو s ټولو متغیرونه $v_0, v_1, \dots$ ته قيمتونه وگوماري. موږ به يوازې د اړينو هغو قيمتونه کاروو.

د دې پر ځای چې د فارمولونه صدق يوازې د جوړښت په نسبت تعريف کړو، دا به د جوړښت $\mathcal{M}$ او د متغیر گومارنې s دواړو په نسبت تعريف کړو، او په لنډ ډول به $s \models A$ لیکو. اوس به زموږ تعريف د هغو اتومي فارمولونه دپاره يو اضافي شرط هم ولري چې متغیرونه لري:

1. $\mathcal{M}, s \models P(a)$ هله او يوازې هله چې $a^{\mathcal{M}} \in P^{\mathcal{M}}$ وي.

2. $\mathcal{M}, s \models P(v_i)$ هله او يوازې هله چې $s(v_i) \in P^{\mathcal{M}}$ وي.

3. $\mathcal{M}, s \models \neg!A$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}, s \models A$ نه وي.

4. $\mathcal{M}, s \models (!A \wedge !B)$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}, s \models !A$ او $\mathcal{M}, s \models !B$ دواړه وي.

ښه، په دې سره يوه ستونزه هواره شوه: اوس ويله شو چې $\mathcal{M}$ د $s(v_0)$ قيمت دپاره $P(v_0)$ کله پوره کوي. د $\exists v_0 P(v_0)$ تعريف د سمولو دپاره يو بل کار پکار دے: غواړو $\mathcal{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ هله او يوازې هله وي چې د v_0 د قيمت د گومارلو د کومې لارې s' دپاره $\mathcal{M}, s' \models P(v_0)$ وي. خو v_0 ته گومارلې قيمت لازماً هغه قيمت نه دے چې $s(v_0)$ ئې ټاکي. د دې دپاره يوه ښه ورپېژنو: که $m \in |\mathcal{M}|$ وي، نو $s[m/v_0]$ هغه گومارنه ده چې (له v_0 پرته د ټولو متغیرونه دپاره) کټ مټ د s په شان وي، خو v_0 ته m گوماري. اوس زموږ تعريف داسې کېدے شي:

5. $\mathcal{M}, s \models \exists v_i !A$ هله او يوازې هله چې د کوم $m \in |\mathcal{M}|$ دپاره $\mathcal{M}, s[m/v_i] \models !A$ وي.

ايا دا کار کوي؟ فرض کړئ د ټولو $i \in \mathbb{N}$ دپاره $s(v_i) = 0$ ټاکو. $\mathcal{M}, s \models \exists v_0 P(v_0)$ هله او يوازې هله چې داسې $m \in |\mathcal{M}|$ وي چې $\mathcal{M}, s[m/v_0] \models P(v_0)$ وي. او داسې غږے شته: $m = 1$ يا $m = 2$ ټاکلے شو. پام وکړئ دا حتی هغه وخت رښتيا دي چې s پخپله v_0 ته گومارلے قيمت $s(v_0) = 0$ دلته کار نه کوي. $\mathcal{M}, s[1/v_0] \models P(v_0)$ لرو، خو $\mathcal{M}, s \models P(v_0)$ نه لرو. که دا مغشوش او دروند ښکاري، همداسې دے. خو دا زياته پچلتيا د ټولو فارمولونه د صدق د دقيق، استقرائي تعريف دپاره اړينه ده، او د معنایي مفاهيمو د دقيق تعريف دپاره ورته څه پکار دي. نورې لارې هم شته، خو ټولې په همدې کچه ښکلې (يا ناشاعرانه) دي.

14.5 ترلي فارمولونه

ښه، اوس د جوړښتونه او فارمولونه دپاره د صدق (“کېنې رښتوني”) د تعريف يوه طرحه لرو. خو دا يو اضافي څيز—د متغیر گومارنه—غواړي، حال دا چې زموږ غوښتنه د ترلي فارمولونه تعريف و. له گومارنو څنگه ځان خلاصوو، او ترلي فارمولونه څه دي؟

غالباً د صوري منطق له لومړۍ پېژندنې څخه مو د متغیرونه او کمیت ټاکونکو د اړیکې بحث یاد وي. له کمیت ټاکونکي څخه تل یو متغیر وروسته راځي، او بیا د ترله فارمول په هغه برخه کې چې کمیت ټاکونکي ورباندې پلي کېږي (د هغه “ساحه”)، متغیر د هماغه کمیت ټاکونکي له خوا “ترله” کېږي. په فارمولونه کې چې دا شرط نه و چې هر متغیر دې ورته برابر کمیت ټاکونکي ولري؛ بې له برابر کمیت ټاکونکي متغیرونه “ازاد” یا “نا تړلي” دي. موږ به ټول هغه فارمولونه تړلي فارمولونه بولو چې ازاد متغیرونه نه لري.

په فارمول $A!$ کې چې د متغیر د یوې پېښې د تړل کېدو، د هغې د تړونکي کمیت ټاکونکي، او د هغې د ازاد پاتې کېدو وجداني مفکوره بیا هم ګرانه نه ده. ښايي د دې د ازموینې کومه طریقه موزده کړې وي، چې ښايي د قوسونو شمېرل هم پکېږي وي. خو موږ باید پر دقیق تعریف ټینګار وکړو—او ځکه چې فارمولونه مو په استقرا تعریف کړي، په فارمول $A!$ کې چې د متغیر x ازادې او تړلې پېښې هم په استقرا تعریفولې شو. مثلاً زموږ د ساده شوې ژبې دپاره داسې کېدای شي:

1. که $A!$ اتومي وي، د x ټولې پېښې پکې چې ازادې دي (یعنې په $P(x)$ کې چې د x پېښه ازاده ده) —
 2. که $A!$ د $B!$ بڼه ولري، نو په $B!$ کې چې د x یوه پېښه هله او یوازې هله ازاده ده چې په $B!$ کې چې د x ورته پېښه ازاده وي (یعنې په $B!$ کې چې د متغیرونو ازادې پېښې کې کېدای شي په $B!$ کې چې ورته پېښې دي) —
 3. که $A!$ د $(B \wedge C)!$ بڼه ولري، نو په $(B \wedge C)!$ کې چې د x یوه پېښه هله او یوازې هله ازاده ده چې په $B!$ یا $C!$ کې چې د x ورته پېښه ازاده وي —
 4. که $A!$ د $\exists x B!$ بڼه ولري، نو په $A!$ کې چې د x هېڅ پېښه ازاده نه ده؛ او که د $\exists y B!$ بڼه ولري، چې y له x څخه بېل متغیر وي، نو په $\exists y B!$ کې چې د x یوه پېښه هله او یوازې هله ازاده ده چې په $B!$ کې چې د x ورته پېښه ازاده وي —
- کله چې د متغیرونو د ازادو او تړلو پېښو دقیق تعریف ولرو، په ساده ډول ویلې شو: ترله فارمول هر هغه فارمول ده چې د متغیرونه ازادې پېښې نه لري.

14.6 معنایي مفاهیم

پورته مو یادونه وکړه چې کله کوروا یا $\mathcal{M}, s \models A!$ صدق کوي، د اسانتیا دپاره s ته پرېږدو چې ټولو متغیرونه ته قیمتونه وګوماري، خو یوازې هغه قیمتونه کارېږي چې په $A!$ کې چې متغیرونه ته ئې ګوماري. په حقیقت کې، یوازې په $A!$ کې چې د ازادو متغیرونو قیمتونه اهمیت لري. البته ځکه چې موږ احتیاط کوو، دا حقیقت به ثابتوو — ځکه چې تړلي فارمولونه ازاد متغیرونه نه لري، نو په جوړښت کې چې د هغوی د صدق دپاره s هېڅ اهمیت نه لري. نو کله چې $A!$ ترله فارمول وي، $\mathcal{M} \models A!$ داسې تعریفولې شو چې معنی ئې “د ټولو s دپاره $\mathcal{M}, s \models A!$ ” ده؛ او تصادفاً دا هله او یوازې هله رښتیا دي چې لږ تر لږه د یوه s دپاره $\mathcal{M}, s \models A!$ وي. د فارمولونه د صدق د کار وړ تعریف دپاره د متغیر ګومارنې وړ پېژندل پکار دي، خو د تړلي فارمولونه صدق د متغیر له ګومارنو څخه خپلواک دي.

کله چې د “ $\mathcal{M} \models A!$ ” تعریف ولرو، د لومړۍ درجې منطق د تړلي فارمولونه په باب پوهېږو چې “حالت” او “پکېښې رښتوني” څه معنی لري. د تړلي فارمولونه دپاره د $\mathcal{M} \models A!$ د تعریف پر بنسټ بیا د اعتبار، استلزام او صدق وړتیا بنسټیز معنایي مفاهیم تعریفولې شو. یوه جمله، $\models A!$ ، هله معتبره ده چې هره جوړښت ئې پوره کړي. د تړلي فارمولونه د یوه سټ له خوا، $\Gamma \models A!$ ، هله لازميږي چې هره هغه جوړښت چې په Γ کې ټولې تړلي فارمولونه پوره کوي، $A!$ هم پوره کړي. او د تړلي فارمولونه یو سټ هله د صدق وړ دے چې کومه جوړښت پکې ټولې تړلي فارمولونه په یو وخت پوره کړي.

ځکه چې فارمولونه په استقرا تعریف شوي، او صدق بیا د فارمولونه پر جوړښت په استقرا تعریفېږي، د خپلې معنې پوهنې د خاصیتونو د ثبوت او د تعریف شوو معنایي مفاهیمو د تړلو دپاره استقرا کارولې شو. ځینې دغه خاصیتونه به راټول او ثابت کړو، یوه وجه دا ده چې هر یو پخپله په زړه پورې دے، خو اصلي وجه دا ده چې وروسته د معنې پوهنې او د اشتقاق د نظامونو د اړیکې په څېړنه کې ډېر راپکارېږي. د دې کار دپاره به ځینې داسې نحوي مفاهیم او عملیات هم په دقیق ډول (یعنې په استقرا) تعریفول پکار وي چې لا مونږ دي یاد کړي.

14.7 ځایناستی

یوه بېلگه څېړو څو څرګنده شي چې خبرې څنګه سره تړلې دي، او د نحو او معنی پوهنې وده زموږ د وروستیو پرمختللو څېړنو بنسټ څنګه جوړوي. زموږ د اشتقاق نظامونه باید اجازه راکړي چې $P(a)$ له $\forall v_0 P(v_0)$ څخه اشتقاق کړو. د ژباړې د نسخې سمون (OLFOL) (004): د سرچینې په عمومي مقدمه کېني اتومي فارمول په ناسم ډول د عمومي کمیت ټاکونکي له دویم ارګومېنټ څخه بهر ایستل شوی و؛ دلته اتومي فارمول د کمیت ټاکونکي بشپړه بدنه ده، لکه د همدې پاراکراف عمومي فارمول. ښايي وغواړو دا حتی د استنتاج د قاعدې په توګه بیان کړو. خو د دې دپاره باید په ترټولو عامو اصطلاحاتو کېني ئې ویله شو: یوازې د P ، a او v_0 دپاره نه، بلکې د هر فارمول A ، t او متغیر x دپاره. (یاد مو وي چې ثابت سمبولونه ترمونه دي، خو له ثابت سمبولونه او تابعي څخه جوړ شوي لا پېچلي ترمونه به هم څېړو.) نو غواړو داسې څه ووايو: “هر کله چې مو $\forall x!A(x)$ اشتقاق کړی وي، د $A(t)$ په استنتاج کېني په حقه یی—یعنې هغه پایله چې $\forall x$ لري او x په t بدل کړي” — خو “ x په t بدلول” په دقیق ډول څه معنی لري؟ د $A(x)$ او $A(t)$ تر منځ اړیکه څه ده؟ ایا دا تل کار کوي؟

د دې د دقیق کولو دپاره د ځایناستی عمل تعریفوو. ځایناستی په اصل کېني نازکه ده، ځکه په A کېني ټول x کاني په ساده ډول په t نه شو بدلول، او هر t د هر x پر ځای نه شي راتلې. دا به بیا په استقرایي تعریفونو حل کوو. خو چې دا کار وشي، د استنتاج د قاعدې داسې ټاکل چې “له $\forall x!A(x)$ څخه $A(t)$ استنتاج کړه” په دقیق تعریف بدلېږي. سربېره پر دې به وښودلې شو چې دا په دې معنی د استنتاج ښه قاعده ده چې $\forall x!A(x)$ ، $A(t)$ لازمي. خو د دې د ثبوت دپاره بیا داسې څه ثابتول پکار دي چې په لومړي نظر مو دې پوښتنې ته هڅوي: “دا ولې کوو؟” له $\forall x!A(x)$ څخه د $A(t)$ لازمېدل پر دې حقیقت ولاړ دي چې $\mathcal{M} \models A(t)$ صدق کوي که نه، دا یوازې د ترم t په قیمت پورې تړلې ده؛ یعنې که m د $|\mathcal{M}|$ هر هغه غړی وټاکو چې t ئې ټاکي، نو $\mathcal{M}, s \models A(t)$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}, s[m/x] \models A(x)$ وي. دا حتی هغه وخت هم صدق کوي چې t متغیرونه ولري، خو باید د پایلې په دقیق بیان کېني احتیاط وکړو.

14.8 مدلوله او تیوري

کله چې د لومړۍ درجې منطق نحو او معنی پوهنه تعریف کړو، د جوړښتونه او معنایي مفاهیمو د خاصیتونو څېړل پیلولې شو. د اشتقاق نظامونه هم تعریف او وڅېړلې شو. د تړلي فارمولونه د یوه سټ په باب پوښتلې شو: کومې جوړښتونه د هغه سټ ټولې تړلي فارمولونه رښتوني کوي؟ د تړلي فارمولونه یو سټ Γ چې راکړل شي، هغه جوړښت $\mathcal{M}$ چې هغوی پوره کوي د Γ مدل بلل کېږي. ښايي له Γ څخه پیل او د هغې مدلوله ولټوو—هغوی څنګه دي؟ باید څومره لوی یا واړه وي؟ خو ښايي له یوې جوړښت یا د جوړښتونه له یوې ټولګې څخه هم پیل او پوښتنه وکړو: کومې تړلي فارمولونه پکښې رښتوني دي؟ ایا داسې تړلي فارمولونه شته چې دا جوړښتونه په دې معنی ځانګړې کړي چې هغوی، او یوازې هغوی، پکښې رښتوني وي؟ دا ډول پوښتنې د مدل تیوري ډګر دے. همدغه پوښتنې د بدیهي طریقې بنسټ هم جوړوي: د جوړښتونه د یوې ټولګې بیانول د تړلي فارمولونه په یوه سټ، یعنې د یوې تیوري په بدیهي اصولو. دا د دې مشاهدې له امله ممکنېږي چې کټ مټ هغه تړلي فارمولونه د بدیهي اصولو په ټولو مدلولو کېني رښتوني دي چې د لومړۍ درجې منطق کېني له هغو بدیهي اصولو څخه لازمېږي.

د یوې ډېرې ساده بېلګې په توګه مخکښ مرتبې وګورئ. مخکښ مرتبه پر کوم سټ A داسې اړیکه R ده چې انعکاسي او انتقالي دواړه وي. سټ A چې دوه ځاییزه اړیکه $R \subseteq A \times A$ ورباندې وي، کټ مټ هغه څه دي چې د یوه دوه ځاییز اړوند سمبول P لرونکي د لومړۍ درجې ژبې د جوړښت دپاره ئې غواړو: $|\mathcal{M}| = A$ او $P^{\mathcal{M}} = R$ ټاکو. ځکه R مخکښ مرتبه ده، انعکاسي او انتقالي ده، او د لومړۍ درجې منطق د تړلي فارمولونه داسې سټ Γ موندلې شو چې دا خبره وایي:

$$\forall v_0 P(v_0, v_0)$$

$$\forall v_0 \forall v_1 \forall v_2 ((P(v_0, v_1) \wedge P(v_1, v_2)) \rightarrow P(v_0, v_2))$$

دا تړلي فارمولونه یوازې د “د هر x دپاره Rxx ” (R انعکاسي ده) او “هر کله چې Rxy او Ryz وي، نو Rxz هم وي” (R انتقالي ده) سمبولي بڼې دي. وینو چې جوړښت $\mathcal{M}$ د دغو دوو تړلي فارمولونه Γ هله او یوازې هله مدل دے چې R (یعنې $P^{\mathcal{M}}$) پر A (یعنې $|\mathcal{M}|$) مخکښ مرتبه وي. په بل عبارت، د Γ مدلوله کټ مټ مخکښ مرتبې دي. د ټولو مخکښ مرتبو هر هغه خاصیت چې د P یوازیني پریدیکات

لرونکې د لومړۍ درجې ژبه کښې بیانېدې شي (لکه پورته انعکاسیت او انتقالیت)، په Γ کښې له دوو ترې فارمولونه څخه لازمېږي، او برعکس. نو د Γ د مدلونو په باب چې څه ثابتولې شو، د ټولو مخکښ مرتبو په باب مو ثابت کړي دي.

د هرې ځانګړې تیورۍ او د مدلونو د ټولګې (لکه Γ او ټولې مخکښ مرتبې) دپاره به په اړونده د لومړۍ درجې ژبه کښې د بیانېدونکو او نه بیانېدونکو څیزونو په باب په زړه پورې پوښتنې وي. د جوړښتونه ځینې داسې خاصیتونه شته چې د ټولو ژبو او د مدلونو د ټولګیو دپاره په زړه پورې دي، یعنې د د تعریف ساحه د کچې اړوند خاصیتونه. مثلاً د هر $n \in \mathbb{Z}^+$ دپاره تل بیانولې شو چې د تعریف ساحه کټ مټ n غړي لري. د نامتناهي ډېرو ترې فارمولونه د یوه سټ په کارولو دا هم بیانولې شو چې د تعریف ساحه نامتناهي ده. خو دا نه شو بیانولې چې د تعریف ساحه متناهي یا د شمېر نه وړ ده. د لومړۍ درجې ژبو د محدودیتونو دا پایلې د متناهي شاهد او د لوېنهام-سکولم له قضیو څخه راځي.

14.9 سوال او بشپړتیا

د لومړۍ درجې منطق دپاره به د اشتقاق نظامونه هم ورپېژنو. منطقپوهانو ډېر د اشتقاق نظامونه جوړ کړي دي، خو هغوی ټول د ترې فارمولونه تر منځ همغه د د اشتقاق وړتیا اړیکه تعریفوي. وایو چې Γ, A اشتقاق کوي، $\Gamma \vdash A$ ، که د یوه ټاکلي، په دقیق ډول تعریف شوي ډول اشتقاق موجود وي. اشتقاقونه تل د سمبولونو متناهي ترتیبونه دي—ښایي د ترې فارمولونه لر وي، یا کوم لا پېچلې جوړښت. د اشتقاق د نظامونو موخه داسې وسیله برابرول دي چې وټاکي ایا کوم سټ Γ ترې فارمول لازمي که نه. د دې موخې د پوره کولو دپاره باید $\Gamma \vdash A$ هله او یوازې هله وي چې $\Gamma \vdash A$ وي.

که $\Gamma \vdash A$ وي خو $\Gamma \models A$ نه وي، زموږ د اشتقاق نظام به ډېر پیاوړې وي او له حده زیات څه به ثابتوي. هغه خاصیت چې له $\Gamma \vdash A$ څخه $\Gamma \models A$ لازمېږي، سوال بلل کېږي، او د اشتقاق د هر ښه نظام لږ تر لږه غوښتنه ده. له بلې خوا، که $\Gamma \models A$ وي خو $\Gamma \vdash A$ نه وي، نو زموږ د اشتقاق نظام ډېر کمزور د دې او کافي څه نه ثابتوي. هغه خاصیت چې له $\Gamma \vdash A$ څخه $\Gamma \vdash A$ لازمېږي، بشپړتیا بلل کېږي. سوال عموماً نسبتاً اسانه ثابتېږي (د اشتقاقونه پر جوړښت د استقرا له لارې، ځکه هغوی په استقرا تعریف شوي دي). بشپړتیا ثابتول کران دي.

سوال او بشپړتیا څو مهمې پایلې لري. که د ترې فارمولونه یو سټ Γ کوم تناقض (لکه $A \wedge \neg A$) اشتقاق کړي، ناسازګار بلل کېږي. ناسازګار Γ هېڅ مدل نه شي لرلې؛ د صدق وړ نه دے. له بشپړتیا څخه ئې عکس لازمېږي: هر هغه Γ چې ناسازګار نه وي—یا، لکه موږ چې به وایو، سازګار وي—یو مدل لري. په حقیقت کښې دا له بشپړتیا سره هم ارزښته ده، او موږ به د بشپړتیا همدا بڼه په اصل کښې ثابتوو. دا ژوره او ښایي حیرانونکې پایله ده: یوازې دا چې له Γ څخه $A \wedge \neg A$ نه شئ ثابتولې، تضمینوي چې داسې جوړښت شته چې کټ مټ د Γ د بیان په شان ده. نو بشپړتیا دې پوښتنې ته ځواب ورکوي: د ترې فارمولونه کوم ستونه مدلوله لري؟ ځواب: ټول او یوازې سازګار ستونه.

د سموالي او بشپړتیا قضیې دوه مهمې پایلې لري: د متناهي شاهد قضیه او د لوېنهام-سکولم قضیه. دا د مدلونو په تیورۍ کښې مهمې پایلې دي او د ډېرو په زړه پورې پایلو د ثبوت دپاره کارېدې شي. دوه مو لا یادې کړې دي: د لومړۍ درجې منطق دا نه شي بیانولې چې د جوړښت د تعریف ساحه متناهي یا د شمېر نه وړ ده.

په تاریخي ډول د دې ټولو کارونو سم معلومول ډېر وخت ونیو—د لومړۍ درجې منطق نحو او معنی پوهنه څنګه تعریف شي، د اشتقاق بڼه نظامونه څنګه تعریف شي، د هغوی سوال او بشپړتیا څنګه ثابت شي، او د لومړۍ درجې ژبو د بیانېدونکو او نه بیانېدونکو څیزونو توپیر څنګه روښانه شي. اوس پوهېږو چې دا هر څه څنګه وکړو، خو په ټولو جزئیاتو تېرېدل لا هم مغشوشوونکي او ستومانوونکي کېدې شي. بیا هم مهم دي، ځکه دلته د لومړۍ درجې منطق د صوري ژبې دپاره جوړې شوې طریقې په منطق، کمپیوټر ساینس او ژبپوهنه کښې هر ځای پلي کېږي. نو د جزئیاتو زیار په اوږده موده کښې ګټه کوي.

باب 15

د لومړۍ درجې منطق نحوه

15.1 پېژندنه

د لومړۍ درجې منطق د تیورۍ او میتاتیورۍ د پراختیا دپاره باید تر هر څه مخکې د دې منطق د عبارتونو نحوه او معنی پوهنه تعریف کړو. د لومړۍ درجې منطق عبارتونه ترمونه او فارمولونه دي. ترمونه له متغیرونه، ثابت سمبولونه او تابعې څخه جوړېږي. فارمولونه بیا له پریدیکاتونه او ترمونو څخه جوړېږي (په دې ډول ترټولو وړه، یعنې "اتومي" فارمولونه جوړېږي)، او بیا له اتومي فارمولونه څخه د منطقي ترونکو او کمیت ټاکونکو په وسیله نور پېچلي فارمولونه جوړول شوي. د جوړېدو د قاعدو د ټاکلو دېرې بېلابېلې لارې شته؛ موږ یوازې یوه ممکنه لاره وړاندې کوو. نور نظامونه بېل سمبولونه غوره کوي، د ترونکو بېل ټولګې د لومړنیو په توګه ټاکي، او قوسونه په بله طریقه کاروي (یا، لکه د تش په نامه پولنډۍ لیکنې په حالت کېنې، ئې یخې نځه کاروي). خو ټولې لارې په دې کېنې شریکې دي چې د جوړېدو قواعد د ترمونو او فارمولونه ټولګه په استقرایي ډول تعریفوي. که دا کار سم وشي، نو هر عبارت د جوړېدو د قواعدو له مخې په بنسټیز ډول یوازې په یوه طریقه تر لاسه کېږي. هغه استقرایي تعریف چې یوازېنۍ لوستنې وړ عبارتونه رامنځته کوي، موږ ته دا امکان راکوي چې همدې طریقي—یعنې استقرایي تعریف—سره دغو عبارتونو ته معناوې هم ورکړو.

15.2 د لومړۍ درجې ژبې

د لومړۍ درجې د منطق عبارتونه له یوه بنسټیز لغت څخه جوړېږي چې متغیرونه، ثابت سمبولونه، پریدیکاتونه او کله ناکله تابعې لري. له دغو سمبولونو سره، د منطقي نښلونکو، سوږو او د وقف د نښو لکه قوسونو او کامو په کارولو، ترمونه او فارمولونه جوړېږي. په غیر رسمي ډول، پریدیکاتونه د ځانګړنو او اړیکو نومونه دي، ثابت سمبولونه د انفرادي څیزونو نومونه دي، او تابعې د نقشو نومونه دي. دا ټول، له عینیت = پرته، غیر منطقي سمبولونه دي او په ګډه یوه ژبه جوړوي. هره د لومړۍ درجې ژبه L د خپلو غیر منطقي سمبولونو له مخې ټاکل کېږي. په ترټولو عام حالت کېنې، L د هر ډول سمبولونه په بې نهایت شمېر لري. په عام حالت کېنې موږ په لومړۍ درجې منطق کېنې لاندې سمبولونه کاروو:

1. منطقي سمبولونه

(a) منطقي نښلونکي: $\neg$ (نفي)، $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\rightarrow$ (شرطي)، $\leftrightarrow$ (دوه اړخیز شرطي)، $\forall$ (عمومي سور)، $\exists$ (وجودي سور).

(b) د دروغوالی $\perp$ لپاره بیاني ثابت.

(c) د رښتیاوالی $\top$ لپاره بیاني ثابت.

(d) دوه ځایه عینیت $=$.

(e) د متغیرونه یو شمېرېدونکې لامتناهي سټ: $v_0, v_1, v_2, \dots$

2. غیر منطقي سمبولونه، چې د لومړۍ درجې منطق معیاري ژبه جوړوي

(a) د هر $n > 0$ لپاره n -ځایه پریډیکاتورونه یو شمېرېدونکې لامتناهي سټ: $A_0^n, A_1^n, A_2^n, \dots$

(b) د ثابت سمبولونه یو شمېرېدونکې لامتناهي سټ: $C_0, C_1, C_2, \dots$

(c) د هر $n > 0$ لپاره n -ځایه تابعي یو شمېرېدونکې لامتناهي سټ: $f_0^n, f_1^n, f_2^n, \dots$

3. د وقف لښې: پرايسته قوس (، تر لے قوس)، او کامه -

زموږ ډېری تعریفونه او پایلې به د لومړۍ درجې منطق د بشپړې معیاري ژبې لپاره بیانېږي. خو د کارونې له ډول سره سم ژبه یوازې څو پریډیکاتورونه، ثابت سمبولونه او تابعي ته هم محدودولې شو.

بېلگه 15.1. د حساب ژبه $\mathcal{L}_A$ یو دوه ځایه پریډیکات $<$ ، یو ثابت سمبول 0 ، یو یو ځایه تابع $/$ ، او دوه دوه ځایه تابعي $+$ او $\times$ لري.

بېلگه 15.2. د سټ تیورۍ ژبه $\mathcal{L}_Z$ یوازې یو دوه ځایه پریډیکات $\in$ لري.

بېلگه 15.3. د ترتیبونو ژبه $\mathcal{L}_{\leq}$ یوازې یو دوه ځایه پریډیکات $\leq$ لري.

دا بیا هم یوازې دودونه دي: په رسمي ډول دا سمبولونه مستعار نومونه دي؛ د بېلگې په توګه، $<$ ، $\in$ او $0 \leq A_0^2$ ، $0 \leq C_0$ د f_0^1 ، $+$ د f_0^2 ، او $\times$ د f_1^2 مستعار نومونه دي.

کېدے شي تاسو له هغو اصطلاحاتو او سمبولونو سره بلد یئ چې زموږ له پورته کارولو سره توپیر لري. د منطق متنونه، او ښوونکي، عموماً د “نفي” دپاره $\neg$ ، او $!$ ، او د “عطف” دپاره $\wedge$ ، او $\&$ کاروي. د “شرطي” یا “استلزام” عام سمبولونه $\rightarrow$ ، $\Rightarrow$ او $\supset$ دي. د “دوه اړخیز شرطي”، “دوه اړخیز استلزام” یا “(مادي) هم ارزښت” سمبولونه $\leftrightarrow$ ، $\Leftrightarrow$ او $\equiv$ دي. د $\perp$ سمبول ته په بېلو ځایونو کېنې “دروغواله”، “فالسوم”، “محال” یا “ښکته” ویل کېږي. د $\top$ سمبول ته په بېلو ځایونو کېنې “رښتیاواله”، “ویروم” یا “پورته” ویل کېږي.

دود دا دے چې د لایني الفبا د پیل واړه توري (لکه a, b, c) د ثابت سمبولونه لپاره (چې کله ناکله نومونه بلل کېږي)، او د الفبا د پای واړه توري (لکه x, y, z) د متغیرونه لپاره وکارول شي. سورونه له متغیرونه سره یوځای راځي، لکه x ؛ د لیکدود په بدیلونو کېنې د عمومي سور لپاره $\forall x$ ، $(\forall x)$ ، Πx ، (Πx) ، او د وجودي سور لپاره $\exists x$ ، $(\exists x)$ ، Σx ، (Σx) شامل دي.

موږ ټول بیاني عملګرونه او دواړه سورونه د ژبې بنسټیز سمبولونه ګڼلے شو. یا د بنسټیزو سمبولونو یوه کوچنۍ ټولګه غوره کولے او نور منطقي عملګرونه تعریف شوي ګڼلے شو. د بولیني عملګرونو په هغو ټولګو کېنې چې “د رښتیاوالي د تابع له مخې بشپړې” دي، $\{\neg, \vee\}$ ، $\{\neg, \wedge\}$ او $\{\neg, \rightarrow\}$ شامل دي. په بیاني ځواک کېنې د بشپړې لومړۍ درجې ژبې دپاره له دې هره ټولګه له هر یوه سور سره یوځای کېدے شي.

کېدے شي تاسو له دوو نورو منطقي عملګرونه سره هم اشنا یئ: د شېفر کرښه $|$ (چې د هنري شېفر په نوم نومول شوې ده)، او د پیرس غشۍ $\downarrow$ ، چې د کواین خنجر هم بلل کېږي. کله چې دې عملګرونو ته په ترتیب سره د “نېنډ” او “نور” معمولې لوستنې ورکړل شي، هر یو ئې په یوازې ځان د رښتیاوالي د تابع له مخې بشپړ وي.

15.3 ترمونه او فارمولونه

یوه د لومړۍ درجې ژبه $\mathcal{L}$ چې راکړل شي، د $\mathcal{L}$ له بنسټیز لغت څخه جوړ شوي عبارتونه تعریفولے شو. په دغو کېنې په ځانګړي ډول ترمونه او فارمولونه شامل دي.

تعریف 15.4 (ترمونه). د $\mathcal{L}$ د ترمونو سټ $\text{Trm}(\mathcal{L})$ په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. هر متغیر یو ترم دے.

2. د $\mathcal{L}$ هر ثابت سمبول یو ترم دے.

3. که f یو n -ځایه تابع وي او $t_1, \dots, t_n$ ترمونه وي، نو $f(t_1, \dots, t_n)$ یو ترم دے.

4. بل هېڅ څیز ترم نه دے۔

هغه ترم چې هېڅ متغیرونه نه لري، تر ټولو بلل کېږي۔

ثابت سمبولونه زموږ د ژبې په مشخصاتو او د ترمونو په تعریف کېنې د سمبولونو د یوې جلا ډلې په توګه راځي، خو د صفر ځایه تابعې په توګه هم ور شاملېدې شول۔ بیا د ترمونو د تعریف دویم شرط ته اړتیا نه وه۔ یوازې دا باید ومانو چې که $n = 0$ وي، نو $f(t_1, \dots, t_n)$ پخپله یوازې f معنا لري۔

تعریف 15.5 (فارمولونه). د ژبې $\mathcal{L}$ د فارمولونه سټ $\text{Frm}(\mathcal{L})$ په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\perp$ یو اتومي فارمول دے۔

2. $\top$ یو اتومي فارمول دے۔

3. که R د $\mathcal{L}$ یو n -ځایه پریدیکات وي او $t_1, \dots, t_n$ د $\mathcal{L}$ ترمونه وي، نو $R(t_1, \dots, t_n)$ یو اتومي فارمول دے۔

4. که t_1 او t_2 د $\mathcal{L}$ ترمونه وي، نو (t_1, t_2) یو اتومي فارمول دے۔

5. که A فارمول وي، نو $\neg A$ هم فارمول دے۔

6. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \wedge B)$ فارمول دے۔

7. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \vee B)$ فارمول دے۔

8. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \rightarrow B)$ فارمول دے۔

9. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \leftrightarrow B)$ فارمول دے۔

10. که A فارمول او x متغیر وي، نو $\forall x A$ فارمول دے۔

11. که A فارمول او x متغیر وي، نو $\exists x A$ فارمول دے۔

12. بل هېڅ څیز فارمول نه دے۔

د ترمونو د سټ او د فارمولونه د سټ تعریفونه استقرایي تعریفونه دي۔ په اصل کېنې موږ د فارمولونه سټ په نامتناهي ډېرو پړاوونو کېنې جوړوو۔ په لومړني پړاو کېنې ټول اتومي فارمولونه فارمولونه ګڼو؛ دا د تعریف له لومړنیو څو حالتونو سره سمون لري، یعنې د $\top$ ، $\perp$ ، $R(t_1, \dots, t_n)$ او (t_1, t_2) حالتونه۔ نو “اتومي فارمول” د همدې بڼو هر فارمول ته وايي۔

د تعریف نور حالتونه له هغو فارمولونه څخه چې لا جوړ شوي وي، د نویو فارمولونه د جوړولو قاعدې راګوي۔ په دویم پړاو کېنې د دغو قاعدو په کارولو له اتومي فارمولونه څخه فارمولونه جوړولې شو۔ په درېیم پړاو کېنې له اتومي فارمولونو او په دویم پړاو کېنې له ترلاسه شوو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، او همداسې مخکېنې۔ فارمول هر هغه څیز دے چې بالاخره په داسې یوه پړاو کېنې جوړ شي، او بل هېڅ څیز نه دے۔

د دود له مخې، $=$ د خپلو مدخلو تر منځ لیکو او قوسونه پرېږدو: $t_1 = t_2$ د (t_1, t_2) لنډون دے۔ همدارنګه $\neg(t_1, t_2)$ د $t_1 \neq t_2$ په بڼه لنډوو۔ کله چې د دوه ځایه نښلونکي $*$ په کارولو له B او C څخه جوړ شوی فارمول $(B * C)$ لیکو، ډېر ځله تر ټولو ډېرې جوړه قوسونه پرېږدو او یوازې $B * C$ لیکو۔

د منطق ځینې متنونه د دې دپاره چې $\exists x A$ او $\forall x A$ فارمولونه وګڼل شي، دا شرط لګوي چې متغیر x باید په A کېنې راشي۔ که دا شرط ونه لګوی، کومه ستونزه نه پېدا کېږي او کار اسانه کېږي۔

کله چې د یوې ځانګړې کارونې په ژبه کېنې کار کوو، ډېر ځله دوه ځایه پریدیکاتونه او تابعې د اړوندو ترمونو تر منځ لیکو، مثلاً د حساب په ژبه کېنې $t_2 < t_1$ او $(t_1 + t_2)$ ، او د سټ تیوري په ژبه کېنې $t_1 \in t_2$ لیکو۔ د حساب په ژبه کېنې د ناستي تابع د دود له مخې آن د خپل مدخل وروسته لیکل کېږي: t' ۔ خو په رسمي ډول دا په ترتیب سره یوازې د $A_0^2(t_1, t_2)$ ، $f_0^2(t_1, t_2)$ ، او $f_0^1(t)$ دودیز لنډونونه دي۔ د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-006) سرچینه د ناستي تابع په رسمي سمبول کېنې د څیز نښه پرېږدي، دلته هغه د همدې فهرست له سمبولیزم سره سمه ور زیاته شوې ده۔

تعریف 15.6 (نخوي يوشانواله). سمبول $\equiv$ د سمبولونو د تارونو تر منځ نخوي يوشانواله څرګندوي، يعنې $A \equiv B$! هله او يوازې هله چې A ! او B ! د يو شان اوږدوالي لرونکي د سمبولونو تارونه وي او په هر ځای کېنې يو شان سمبول ولري.

$\equiv$ د سمبول دواړو خواوو ته هغه تارونه هم ليکل کېدای شي چې په نښلولو ترلاسه شوي وي؛ مثلاً $(B \vee C) \equiv A$! دا معنا لري: د سمبولونو تار A ! له هغه تار سره يو شان دے چې په همدې ترتيب د پراښتې قوس، تار B !، سمبول $\vee$ ، تار C ! او ترلي قوس له نښلولو ترلاسه کېږي. که دا حالت وي، نو پوهېږو چې د A ! لومړۍ سمبول پراښتې قوس دے، A ! د دويم سمبول له ځايه B ! د يوه فرعي تار په توګه لري، له هغه فرعي تار وروسته $\vee$ راځي، او همداسې نور.

څرنګه چې ترمونه او فارمولونه د استقرايي تعريفونو له لارې له بنسټيزو اجزاوو څخه جوړېږي، د هغو په باب د څه ثابتولو دپاره لاندې استقرايي اصول کارول شوي.

لم 15.7 (په ترمونو د استقرا اصل). فرض کړئ L د لومړۍ درجې يوه ژبه ده. که يو خاصيت P داسې وي چې

1. د هر متغیر v دپاره صدق کوي؛

2. د L د هر ثابت سمبول a دپاره صدق کوي؛ او

3. که چېرې $t_1, \dots, t_n$ دپاره صدق کوي او f د L يو n -ځايه تابع وي، د $f(t_1, \dots, t_n)$ دپاره هم صدق کوي،

(په دې فرض چې $t_1, \dots, t_n$ د L ترمونه دي)، نو P د $\text{Trm}(L)$ د هر ترم دپاره صدق کوي.

تمرین 15.7، 15.8. ثابتہ کړئ.

لم 15.9 (په فارمولونو د استقرا اصل). فرض کړئ L د لومړۍ درجې يوه ژبه ده. که يو خاصيت P د ټولو اتومي فارمولونو دپاره صدق کوي او داسې وي چې

1. که چېرې A ! دپاره صدق کوي، د $\neg A$! دپاره هم صدق کوي؛

2. که چېرې A ! او B ! دپاره صدق کوي، د $(A \wedge B)$! دپاره هم صدق کوي؛

3. که چېرې A ! او B ! دپاره صدق کوي، د $(A \vee B)$! دپاره هم صدق کوي؛

4. که چېرې A ! او B ! دپاره صدق کوي، د $(A \rightarrow B)$! دپاره هم صدق کوي؛

5. که چېرې A ! او B ! دپاره صدق کوي، د $(A \leftrightarrow B)$! دپاره هم صدق کوي؛

6. که چېرې A ! دپاره صدق کوي، د $\exists x A$! دپاره هم صدق کوي؛

7. که چېرې A ! دپاره صدق کوي، د $\forall x A$! دپاره هم صدق کوي؛

(په دې فرض چې A ! او B ! د L فارمولونه دي)، نو P د $\text{Frm}(L)$ د ټولو فارمولونو دپاره صدق کوي.

15.4 يوازينه لوست

موږ چې فارمولونه په کومه طريقه تعريف کړي دي، هغه دا تضمینوي چې هر فارمول يو يوازينه لوست لري؛ يعنې د فارمولونو د جوړولو زموږ د قاعدو له مخې ئې د جوړولو په اصل کېنې يوازې يوه طريقه شته، او د «تفسیرولو» ئې هم يوازې يوه طريقه شته. که داسې نه وای، مبهم فارمولونه به مولل؛ يعنې داسې فارمولونه چې له يوه څخه زيات لوستونه يا تفسیرونه لري—او څرګنده ده چې موږ ترې ډډه کول غواړو. خو تر دې مهمه دا ده چې له دې خاصيت پرته به زموږ ډېری راتلونکي تعريفونه او ثبوتونه کار ورنه کړي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-014) سرچينه په همدې جمله کېنې د «تفسیر» د انګريزي کلې املا ناسمه ليکي، ژباړه ئې سمه معنا راوړي.

د دې خبرې د روښانولو ښايي غوره لار دا وي چې وګورو، که د فارمولونو د جوړولو داسې ناسمې قاعدې مو ورکړې وای چې يوازينه لوست نه تضمینوي، څه به پېښ شوي وو. مثلاً کېدای شي د نښلولو څخه د جوړولو په قاعدو کېنې مو قوسونه هېر کړي او دا مو روا ګڼي وای:

که A ! او B ! فارمولونه وي، نو $A \rightarrow B$! هم فارمول دے۔

له يوه اتومي فارمول D ! څخه په پيلولو به دې قاعدې د $D \rightarrow D$! جوړول را ته روا کړي وو۔ له دې او D ! څخه به مو $D \rightarrow D \rightarrow D$! ترلاسه کړے و۔ خو دا په دوو طريقو جوړېدے شي:

1. D ! د A ! په توګه، او $D \rightarrow D$! د B ! په توګه اخلو۔

2. A ! د $D \rightarrow D$! په توګه اخلو، او B ! پخپله D ! دے۔

په همدې ډول د فارمول $D \rightarrow D \rightarrow D$! د “لوستلو” دوه طريقې شته۔ دا د $B \rightarrow C$! بڼه لري چې B ! پکښې D ! او C ! پکښې $D \rightarrow D$! دے، خو همدارنګه د $B \rightarrow C$! بڼه لري چې B ! پکښې $D \rightarrow D$! او C ! پکښې D ! دے۔

که داسې وشي، زموږ تعريفونه به تل کار نه کوي۔ مثلاً که چې د يوه فارمول اصلي عملګر تعريفوو، وايو: د $B \rightarrow C$! بڼه لرونکي فارمول اصلي عملګر د $\rightarrow$ همدا ښودل شوے مورد دے۔ خو که فارمول $D \rightarrow D \rightarrow D$! له $B \rightarrow C$! سره په پورته يادو شوو دوو بېلو طريقو برابرول شو، نو په يوه حالت کېنې د $\rightarrow$ لومړے مورد او په بل حالت کېنې ئې دويم مورد د اصلي عملګر په توګه ترلاسه کوو۔ خو موږ غواړو چې اصلي عملګر د فارمول يوه تابع وي، يعنې هر فارمول بايد کټ مټ د اصلي عملګريو مورد ولري۔

لم 15.10. په فارمول A ! کېنې د کينو او ښيو قوسونو شمېر سره برابر دے۔

ثبوت. دا د A ! د جوړېدو پر طريقه په استقرا ثابتوو۔ دې ته دوه څيزونه پکار دي: (الف) لومړے بايد ثابته کړو چې ټول اتومي فارمولونه ياد خاصيت لري (د استقرا بنسټ)۔ (ب) بيا بايد ثابته کړو چې کله له راکړل شوو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، که زاره فارمولونه ياد خاصيت ولري، نو نوي ئې هم لري۔

$l(A)$ دې په A ! کېنې د کينو قوسونو شمېر وي او $r(A)$ دې د ښيو قوسونو شمېر وي؛ $l(t)$ او $r(t)$ دې په همدې ډول په يوه ترم t کېنې د کينو او ښيو قوسونو شمېرونه وي۔

تمرين 15.11. ثابته کړئ چې د هر ترم t دپاره $l(t) = r(t)$ ۔

1. $A \equiv \perp$! : A ! کېن 0 او ښي قوسونه لري۔

2. $A \equiv \top$! : A ! کېن 0 او ښي قوسونه لري۔

3. $A \equiv R(t_1, \dots, t_n)$! : A ! $l(A) = 1 + l(t_1) + \dots + l(t_n) = 1 + r(t_1) + \dots + r(t_n) = r(A)$ ۔ دلته هغه حقيقت کاروو چې د تمرين په توګه پرېښودل شوے دے: د هر ترم t دپاره $l(t) = r(t)$ ۔

4. $A \equiv t_1 = t_2$! : A ! $l(A) = l(t_1) + l(t_2) = r(t_1) + r(t_2) = r(A)$ ۔

5. $A \equiv \neg B$! : د استقرايي فرض له مخې $l(B) = r(B)$ نو $l(A) = l(B) = r(B) = r(A)$ ۔

6. $A \equiv (B * C)$! : د استقرايي فرض له مخې $l(B) = r(B)$ او $l(C) = r(C)$ نو $l(A) = 1 + l(B) + l(C) = 1 + r(B) + r(C) = r(A)$ ۔

7. $A \equiv \forall x B$! : د استقرايي فرض له مخې $l(B) = r(B)$ نو $l(A) = l(B) = r(B) = r(A)$ ۔

8. $A \equiv \exists x B$! : په همدې ډول۔

□

تعريف 15.12 (حقيقي مخکښ). د سمبولونو تار B ! د سمبولونو د تار A ! حقيقي مخکښ دے، که له B ! سره د سمبولونو د يوه نائش تار نښلول A ! ترلاسه کړي۔

لم 15.13. که A فارمول وي او B د A حقيقي مخکښ وي، نو B فارمول نه دے.

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 15.14، 15.13 ثابته کړئ.

قضيه 15.15. که A يو اتومي فارمول وي، نو له لاندې شرطونو څخه يو، او يوازې يو، پوره کوي.

$$1. A \equiv \perp$$

$$2. A \equiv \top$$

3. $A \equiv R(t_1, \dots, t_n)$ ، چې R يو n -ځايه پريديکات، $t_1, \dots, t_n$ ترمونه، او هر يو $R, t_1, \dots, t_n$ په يوازيني ډول ټاکل شوي دي.

$$4. A \equiv t_1 = t_2$$
، چې t_1 او t_2 په يوازيني ډول ټاکل شوي ترمونه دي.

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 15.16، 15.15 ثابته کړئ. (لارښوونه: د ترمونو دپاره د 15.13 يوه بڼه بيان او ثابته کړئ.)

قضيه 15.17 (يوازينه لوست). هر فارمول له لاندې شرطونو څخه يو، او يوازې يو، پوره کوي.

$$1. A \text{ اتومي دے.}$$

$$2. A \text{ د } \neg B \text{ بڼه لري.}$$

$$3. A \text{ د } (B \wedge C) \text{ بڼه لري.}$$

$$4. A \text{ د } (B \vee C) \text{ بڼه لري.}$$

$$5. A \text{ د } (B \rightarrow C) \text{ بڼه لري.}$$

$$6. A \text{ د } (B \leftrightarrow C) \text{ بڼه لري.}$$

$$7. A \text{ د } \forall x B \text{ بڼه لري.}$$

$$8. A \text{ د } \exists x B \text{ بڼه لري.}$$

سرېره پر دې، په هر حالت کې B ، يا B او C ، په يوازيني ډول ټاکل شوي دي. يعنې مثلاً د B ، C او B' ، C' داسې بېلې جوړې نشته چې A په يو وخت د دواړو بڼه ولري: $(B \rightarrow C)$ او $(B' \rightarrow C')$.

ثبوت. د جوړولو قاعدې غواړي چې که فارمول اتومي نه وي، بايد په پراښتې قوس ($\neg$)، يا په يوه سور پيل شي. بل خوا، هر فارمول چې له لاندې سمبولونو څخه په يوه پيلېږي، بايد اتومي وي: پريديکات، تابع، ثابت سمبول $\perp$ ، $\top$.

نو په اصل کې يوازې دا بنودل پکار دي چې که A د $(B * C)$ او هم د $(B' * C')$ بڼه لري، نو $B \equiv B'$ ، $C \equiv C'$ ، او $' = *$.

نو فرض کړئ چې هم $A \equiv (B * C)$ او هم $A \equiv (B' * C')$ او $B \equiv B'$ دے، يا نه دے. که وي، نو څرګنده ده چې $' = *$ او $C \equiv C'$ ، ځکه بيا دا د A هغه فرعي تارونه دي چې له يوه ځايه پيلېږي او يو شان اوږدواله لري. بل حالت $B \not\equiv B'$ دے. څرګنه چې B او B' دواړه د A هغه فرعي تارونه دي چې له يوه ځايه پيلېږي، يو بايد د بل حقيقي مخکښ وي. خو دا د 15.13 له مخې ناشوني ده.

□

15.5 د فارمول اصلي عملگر

ډېر ځله د هغه وروستي عملگر په باب خبرې کول کټور وي چې د فارمول A په جوړولو کې کارول شوي وي. دا عملگر د A اصلي عملگر بلل کېږي. په شهودي ډول دا د A “تر ټولو ډېرې” عملگر دے. مثلاً د $\neg A$ اصلي عملگر $\neg$ دے، د $(A \vee B)$ اصلي عملگر $\vee$ دے، او همداسې نور.

تعريف 15.18 (اصلي عملگر). د فارمول A اصلي عملگر په لاندې ډول تعريفېږي:

1. A atomic: is A هېڅ اصلي عملگر نه لري.
2. $A \equiv \neg B$: د A اصلي عملگر سمبول $\neg$ دے.
3. $A \equiv (B \wedge C)$: د A اصلي عملگر سمبول $\wedge$ دے.
4. $A \equiv (B \vee C)$: د A اصلي عملگر سمبول $\vee$ دے.
5. $A \equiv (B \rightarrow C)$: د A اصلي عملگر سمبول $\rightarrow$ دے.
6. $A \equiv (B \leftrightarrow C)$: د A اصلي عملگر سمبول $\leftrightarrow$ دے.
7. $A \equiv \forall x B$: د A اصلي عملگر سمبول $\forall$ دے.
8. $A \equiv \exists x B$: د A اصلي عملگر سمبول $\exists$ دے.

په هر حالت کېنې زموږ موخه په فارمول کېنې د اصلي عملگر همدا بنودل شوي ځانگړي مورد دے. مثلاً فارمول $((D \rightarrow E) \rightarrow (E \rightarrow D))$ د $(B \rightarrow C)$ بڼه لري، چې B پکېنې $(D \rightarrow E)$ او C پکېنې $(E \rightarrow D)$ دے؛ نو د $\rightarrow$ دويم مورد ئې اصلي عملگر دے.

دا د هغې تابع يو بازگشتي تعريف دے چې غير اټومي فارمولونه د هغو د اصلي عملگر موردونو ته لېږي. څرنکه چې فارمولونه په استقرائي ډول تعريف شوي دي، هر فارمول A په 15.18 کېنې له ورکړل شوو حالتونو څخه يو پوره کوي. دا تضمینوي چې د هر غير اټومي فارمول A دپاره اصلي عملگر موجود دے. څرنکه چې هر فارمول له دغو شرطونو څخه يوازې يو پوره کوي، او په هر حالت کېنې هغه کوچني فارمولونه په يوازيني ډول ټاکل شوي دي چې A ترې جوړ شوي، د A د اصلي عملگر مورد هم يوازينه دے؛ نو په رښتيا مو يوه تابع تعريف کړې ده.

موږ فارمولونه په 15.1 کېنې د هغو د اصلي عملگر د سمبول له مخې په ورکړل شوو نومونو يادوو.

اصلي عملگر	د فارمول ډول	بېلگه
هېڅ	اټومي (فارمول)	$t_1 = t_2, R(t_1, \dots, t_n), \top, \perp$
$\neg$	نفي	$\neg A$
$\wedge$	عطف	$(A \wedge B)$
$\vee$	فصل	$(A \vee B)$
$\rightarrow$	شرطي	$(A \rightarrow B)$
$\leftrightarrow$	دوه اړخيز شرطي	$(A \leftrightarrow B)$
$\forall$	عمومي (فارمول)	$\forall x A$
$\exists$	وجودي (فارمول)	$\exists x A$

جدول 15.1: اصلي عملگر او د فارمولونه نومونه

د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-007) سرچينه د عطف او فصل د بېلگو ترونيکي قوسونه د رياضي له چاپېريال څخه بهر ږدي؛ دلته دواړه قوسونه له خپلو فارمولونو سره يو ځای شوي دي.

15.6 فرعي فارمولونه

ډېر ځله د هغو فارمولونه په باب خبرې کول کټور وي چې یو راکړل شوی فارمول “جوړوي” — دې ته د هغه فرعي فارمولونه وایو. هر فارمول A د خپل ځان فرعي فارمول هم ګڼل کېږي، د A هر هغه فرعي فارمول چې پخپله A نه وي، حقیقي فرعي فارمول دے.

تعریف 15.19 (سمدستي فرعي فارمول). که A فارمول وي، د A سمدستي فرعي فارمولونه په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. اټومي فارمولونه سمدستي فرعي فارمولونه نه لري.
2. $A \equiv \neg B$: د A یوازینۍ سمدستي فرعي فارمول همدا B دے.
3. $A \equiv (B * C)$: د A سمدستي فرعي فارمولونه همدا B او C دي (* له دوه ځایه نښلونکو څخه هر یو کېدے شي).
4. $A \equiv \forall x B$: د A یوازینۍ سمدستي فرعي فارمول همدا B دے.
5. $A \equiv \exists x B$: د A یوازینۍ سمدستي فرعي فارمول همدا B دے.

تعریف 15.20 (حقیقي فرعي فارمول). که A فارمول وي، د A حقیقي فرعي فارمولونه په بازګشتي ډول داسې تعریفېږي:

1. اټومي فارمولونه حقیقي فرعي فارمولونه نه لري.
2. $A \equiv \neg B$: د A حقیقي فرعي فارمولونه همدا B او د B ټول حقیقي فرعي فارمولونه دي.
3. $A \equiv (B * C)$: د A حقیقي فرعي فارمولونه همدا B ، C ، د B ټول حقیقي فرعي فارمولونه او د C ټول حقیقي فرعي فارمولونه دي.
4. $A \equiv \forall x B$: د A حقیقي فرعي فارمولونه همدا B او د B ټول حقیقي فرعي فارمولونه دي.
5. $A \equiv \exists x B$: د A حقیقي فرعي فارمولونه همدا B او د B ټول حقیقي فرعي فارمولونه دي.

تعریف 15.21 (فرعي فارمول). د A فرعي فارمولونه پخپله A او د هغه ټول حقیقي فرعي فارمولونه دي.

پام وکړئ چې سمدستي فرعي فارمولونه او حقیقي فرعي فارمولونه مو په لږ توپیر تعریف کړي دي. په لومړي حالت کېنې مو د A د هرې ممکنې بڼې دپاره د هغه سمدستي فرعي فارمولونه نڅ په نڅه تعریف کړي دي. دا د حالتونو له مخې یو څرګند تعریف دے، او حالتونه ئې د فارمولونه د سټ له استقرایي تعریف سره سمون لري. په دویم حالت کېنې مو هم د ټولو فارمولونه د سټ د تعریف طریقه تعقیب کړې ده، خو په هر حالت کېنې مو د کوچنیو فارمولونه B او C د حقیقي فرعي فارمولونه تر څنګ، پخپله دا فارمولونه هم ور شامل کړي دي. په دې سره تعریف بازګشتي کېږي. په عمومي ډول، پر یوه استقرایي تعریف شوي سټ (زموږ په حالت کېنې فارمولونه) د تابع تعریف هله بازګشتي وي چې د تابع د تعریف حالتونه پخپله هماغه تابع وکاروي. خو د ښه تعریف دپاره باید ډاډه شو چې د تابع قیمتونه تل یوازې د هغو مدخلو دپاره کاروو چې تر تعریفېدونکې مدخل “څکښې” راځي — زموږ په حالت کېنې، د $(B * C)$ د “حقیقي فرعي فارمول” د تعریف پر وخت یوازې د “څکښو” فارمولونه B او C حقیقي فرعي فارمولونه کاروو.

قضیه 15.22. فرض کړئ B د A یو فرعي فارمول او C د B یو فرعي فارمول دے. بیا C د A یو فرعي فارمول دے. په بله وینا، د فرعي فارمول اړیکه انتقالی ده.

تمرین 15.22، 15.23. ثابته کړئ.

قضیه 15.24. فرض کړئ A داسې فارمول دے چې n نښلونکي او سورونه لري. بیا A تر ډېره $2n + 1$ فرعي فارمولونه لري.

تمرین 15.24، 15.25. ثابته کړئ.

15.7 جورېښتي لړۍ

په استقرایي تعریف سره د فارمولونه تعریفول، او د استقرا له لارې د فارمولونه د خاصیتونو د ثابتولو بشپړوونکې طریقه، ښکېلې او اغېزمنه لار ده. خو کله کله دا هم کټوره وي چې د فارمولونه جوړول له پخه پورته، کام په کام وڅېړو. دلته د جورېښتي لړۍ په مفهوم همدا کار کوو. د دې د ښودلو دپاره چې ترمونه او فارمولونه څنګه له خپلو استقرایي تعریفونو پرته په دې طریقه معرفي کېدای شي، لومړۍ د یوې ژبې $\mathcal{L}$ له سمبولونو څخه د جوړ شوي خپل سري تار مفهوم معرفي کوو.

تعریف 15.26 (تارونه). فرض کړئ $\mathcal{L}$ د لومړۍ درجې یوه ژبه ده. د $\mathcal{L}$ تار د $\mathcal{L}$ د سمبولونو یوه متناهي لړۍ ده. چې ژبه $\mathcal{L}$ له چاپېریال څخه په څرګند ډول ټاکلې وي، د $\mathcal{L}$ تار ته به ډېر ځله یوازې تار وایو.

بېلګه 15.27. د لومړۍ درجې د هرې ژبې $\mathcal{L}$ دپاره ټول $\mathcal{L}$ -فارمولونه د $\mathcal{L}$ تارونه دي، خو عکس ئې سم نه دے. مثلاً

$$(\exists v_0)(v_0 \rightarrow \exists)$$

د $\mathcal{L}$ یو تار دے، خو د $\mathcal{L}$ فارمول نه دے.

تعریف 15.28 (د ترمونو جورېښتي لړۍ). د $\mathcal{L}$ د تارونو متناهي لړۍ $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ د یوه ترم t جورېښتي لړۍ ده، که $t \equiv t_n$ وي او د هر $i \leq n$ دپاره یا t_i متغیر یا ثابت سمبول وي، او یا $\mathcal{L}$ یو k -ځایه تابع f ولري او داسې $i < m_1, \dots, m_k$ موجود وي چې $t_i \equiv f(t_{m_1}, \dots, t_{m_k})$. چې توپیر ئې اړین وي، د ترمونو جورېښتي لړۍ به د ترم جورېښتي لړۍ بولو. د ژباړې د نسخې سمون **(OLFOL-008)** سرچینه د ټاکلي ځاییز والي په پرتله په تېروتنه یو زیات شاخص او یو زیات مدخل شمېري، دلته دواړه لرونه د تابع له ټاکلي ځاییز والي سره برابر شوي دي.

بېلګه 15.29. لړۍ

$$\langle c_0, v_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle$$

د ترم $f_0^1(f_0^2(c_0, v_0))$ یوه جورېښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle v_0, c_0, f_0^2(c_0, v_0), f_0^1(f_0^2(c_0, v_0)) \rangle.$$

تعریف 15.30 (د فارمولونو جورېښتي لړۍ). د $\mathcal{L}$ د تارونو متناهي لړۍ $\langle !A_0, \dots, !A_n \rangle$ د $!A$ جورېښتي لړۍ ده، که $!A \equiv !A_n$ وي او د هر $i \leq n$ دپاره یا $!A_i$ یو اټومي فارمول وي، یا داسې $i < j, k$ او متغیر x موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

$$1. \quad !A_i \equiv \neg !A_j$$

$$2. \quad !A_i \equiv (!A_j \wedge !A_k)$$

$$3. \quad !A_i \equiv (!A_j \vee !A_k)$$

$$4. \quad !A_i \equiv (!A_j \rightarrow !A_k)$$

$$5. \quad !A_i \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$$

$$6. \quad !A_i \equiv \forall x !A_j$$

$$7. \quad !A_i \equiv \exists x !A_j$$

چې توپیر ئې اړین وي، د فارمولونو جورېښتي لړۍ به د فارمول جورېښتي لړۍ بولو.

بېلگه 15.31.

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle$$

د $\exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0))$ یوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle A_0^1(v_0), A_1^1(c_1), (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)), A_1^1(c_1),$$

$$\forall v_1 A_0^1(v_0), \exists v_0 (A_1^1(c_1) \wedge A_0^1(v_0)) \rangle.$$

لکه چې له دویمې بېلگې ښکاري، په جوړښتي لړیو کېنې “بې کټې توکي” هم راتلې شي: داسې فارمولونه چې زیاتي وي یا په جوړونه کېنې ونډه نه لري.

قضیه 15.32. په $\text{Frm}(\mathcal{L})$ کېنې هر فارمول A یوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. فرض کړئ A اتومي دے. نو لړۍ $\langle A \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده. اوس فرض کړئ چې B او C په ترتیب سره جوړښتي لړۍ $\langle B_0, \dots, B_n \rangle$ او $\langle C_0, \dots, C_m \rangle$ لري.

1. که $A \equiv \neg B$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, \neg B_n \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

2. که $A \equiv (B \wedge C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \wedge C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

3. که $A \equiv (B \vee C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \vee C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

4. که $A \equiv (B \rightarrow C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \rightarrow C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

5. که $A \equiv (B \leftrightarrow C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \leftrightarrow C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

6. که $A \equiv \forall x B$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, \forall x B_n \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

7. که $A \equiv \exists x B$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, \exists x B_n \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

□ پر فارمولونه د استقرا د اصل له مخې، هر فارمول یوه جوړښتي لړۍ لري.

د دې عکس هم ثابتولې شو. دا ځکه مهم دے چې ښيي د فارمولونو د تعریف زموږ دواړه لارې هم ارزښته دي: دواړه یو شان پایلې ورکوي. دا هم ترې معلومېږي چې د جوړښتي لړیو پر اوږدوالي عادي استقرا کارول او د فارمولونو په باب قضیې ثابتولې شو.

لم 15.33. فرض کړئ $\langle A_0, \dots, A_n \rangle$ د A_n جوړښتي لړۍ ده او $k \leq n$ دے. نو $\langle A_0, \dots, A_k \rangle$ د A_k جوړښتي لړۍ ده.

□ ثبوت. تمرین.

تمرین 15.34، 15.33 ثابته کړئ.

قضیه 15.35. $\text{Frm}(\mathcal{L})$ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو تارونو A سټ دے چې د A دواړه د فارمول جوړښتي لړۍ موجوده وي.

ثبوت. F دې د ژبې $\mathcal{L}$ د سمبولونو د ټولو هغو تارونو سټ وي چې جوړښتي لړۍ لري. په 15.32 کېنې مو ولیدل چې $\text{Frm}(\mathcal{L}) \subseteq F$ ؛ نو اوس بې عکس ثابتوو.

فرض کړئ A یوه جوړښتي لړۍ $\langle A_0, \dots, A_n \rangle$ لري. پر n د قوي استقرا له لارې ثابتوو چې $A \in \text{Frm}(\mathcal{L})$. زموږ استقرايي فرض دا دے چې د سمبولونو هر هغه تار چې د وروستي شاخص $m < n$ لرونکې جوړښتي لړۍ لري، په $\text{Frm}(\mathcal{L})$ کېنې دے. د جوړښتي لړۍ د تعریف له مخې، یا $A \equiv A_n$ وي او وروسته تار اتومي وي، یا باید داسې $j, k < n$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

$$1. !A \equiv \neg !A_j$$

$$2. !A \equiv (!A_j \wedge !A_k)$$

$$3. !A \equiv (!A_j \vee !A_k)$$

$$4. !A \equiv (!A_j \rightarrow !A_k)$$

$$5. !A \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$$

$$6. !A \equiv \forall x !A_j$$

$$7. !A \equiv \exists x !A_j$$

اوس حالت په حالت استدلال کوو. که A اتومي وي، نو $A_n \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ بل حالت کښې فرض کړئ چې $!A \equiv (!A_j \wedge !A_k)$ د 15.33 له مخې، $\langle !A_0, \dots, !A_j \rangle$ او $\langle !A_0, \dots, !A_k \rangle$ په ترتيب سره د A_j او A_k جوړښتي لري دي. څرنگه چې دا د A د جوړښتي لري حقيقي پيلنې فرعي لري دي، د دواړو وروسته شاخص له n څخه کم دے. نو د استقرايي فرض له مخې A_j او A_k په $\text{Frm}(\mathcal{L})$ کښې دي، او بيا د فارمول د تعريف له مخې $!A_j \wedge !A_k$ هم پکې دے. نور حالتونه په ورته استدلال ثابتېږي. د ژباړې د نسخې سمونونه: (OLFOL-009-011) سرچينه دلته د نحوي يوشانوالي پر ځاے د معنایي هم ارزښت نښه، د روانې ژبې پر ځاے د بياني ژبې شاخص، او د وروستي شاخص پر ځاے د لري اوږدوالې يادوي. دلته ثبوت د همدې برخې له تعريف او د قوي استقرا له متغير سره برابر شوی دے.

□

د ترمونو جوړښتي لري د فارمولونه د جوړښتي لريو په شان خاصيتونه لري.

قضيه 15.36. $\text{Trm}(\mathcal{L})$ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو تارونو t سټ دے چې د t دپاره د ترم جوړښتي لري موجوده وي.

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 15.37، 15.36. ثابته کړئ. لارښوونه: د 15.35 په ثبوت کښې کارول شوې طريقې ته ورته تگلاره وکاروئ.

په جوړښتي لريو کښې دوه ډوله "بې کچې توکي" راتلې شي: تکراري غړي، او هغه غړي چې د فارمول يا ترم په جوړولو کښې ونډه نه لري. دواړه د تر ټولو لنډو جوړښتي لريو په کلو لري کول شوي.

تعريف 15.38 (تر ټولو لنډې جوړښتي لري). د فارمول A جوړښتي لري $\langle !A_0, \dots, !A_n \rangle$ د A تر ټولو لنډه جوړښتي لري ده، که A د هره بله جوړښتي لري s داسې وي چې د s اوږدواله له $n+1$ سره برابر يا ترې زيات وي.

په همدې ډول، د ترم t جوړښتي لري $\langle t_0, \dots, t_n \rangle$ د t تر ټولو لنډه جوړښتي لري ده، که د t هره بله جوړښتي لري s داسې وي چې د s اوږدواله له $n+1$ سره برابر يا ترې زيات وي.

پام وکړئ چې يو فارمول يا ترم له يوې څخه زياتې تر ټولو لنډې جوړښتي لري لرلې شي، خو په ټولو کښې به کټ مټ يو شان تارونه وي.

قضيه 15.39. لاندې شرطونه هم ارزښته دي:

$$1. !B \text{ د } A \text{ يو فرعي-فارمول دے.}$$

$$2. !B \text{ د } A \text{ په هره جوړښتي لري کښې راځي.}$$

$$3. !B \text{ د } A \text{ په کومه تر ټولو لنډه جوړښتي لري کښې راځي.}$$

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 15.40، 15.39. ثابته کړئ.

تاریخي یادونه - جوړښتي لړۍ ریموند سمولین په خپل درسي کتاب *Logic First-Order* (Smullyan, 1968) کېني معرفي کړې. د جوړښتي لړیو نور خاصیتونه Zuckerman (1973) ثابت کړل.

15.8 آزاد متغیرونه او تړلي فارمولونه

تعریف 15.41 (د متغیر آزاد موردونه). په فارمول کېني د متغیر آزاد موردونه په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $atomic: is\ A$ په A کېني د متغیر ټول موردونه آزاد دي.
2. $A \equiv \neg !B$: د A د متغیر آزاد موردونه کېني B آزاد موردونه دي.
3. $A \equiv (!B * C)$: د A د متغیر آزاد موردونه په B کېني آزاد موردونه او ورسره په C کېني آزاد موردونه دي.
4. $A \equiv \forall x !B$: په A کېني د متغیر آزاد موردونه په B کېني ټول آزاد موردونه دي، د x له موردونو پرته.
5. $A \equiv \exists x !B$: په A کېني د متغیر آزاد موردونه په B کېني ټول آزاد موردونه دي، د x له موردونو پرته.

تعریف 15.42 (تړلي متغیرونه). په یوه فارمول A کېني د متغیر یو مورد هله تړلې دے چې آزاد نه وي.

تمرین 15.43. په 15.41 پسي د تړلو متغیرونو د موردونو یو استقرایي تعریف ورکړئ.

تعریف 15.44 (ساحه). که $\forall x !B$ په یوه فارمول A کېني د یوه فرعي فارمول مورد وي، نو په A کېني د B اړوند مورد $\forall x$ د اړوند مورد ساحه بلل کېږي. د $\exists x$ دپاره هم همدا شان.

که B په A کېني د سور د یوه مورد $\forall x$ یا $\exists x$ ساحه وي، نو په B کېني د x آزاد موردونه په $\forall x !B$ او $\exists x !B$ کېني تړلي دي. وایو چې دا موردونه د یاد شوي سور د مورد له خوا تړل شوي دي.

بېلگه 15.45. لاندې فارمول په پام کېني ونیسئ:

$$\exists v_0 \underbrace{A_0^2(v_0, v_1)}_{!B}$$

B د $\exists v_0$ ساحه ده. سور په B کېني د v_0 مورد تړي، خو د v_1 مورد نه تړي. نو په دې حالت کېني v_1 آزاد متغیر دے.

اوس وینو چې په یوه زیات پېچلي فارمول A کېني دا څنګه کار کوي:

$$\forall v_0 \underbrace{(A_0^1(v_0) \rightarrow A_0^2(v_0, v_1))}_{!B} \rightarrow \exists v_1 \underbrace{(A_1^2(v_0, v_1) \vee \forall v_0 \overbrace{\neg A_1^1(v_0)}^{!D})}_{!C}$$

B د لومړي $\forall v_0$ ساحه، C د $\exists v_1$ ساحه، او D د دویم $\forall v_0$ ساحه ده. لومړۍ $\forall v_0$ په B کېني د v_0 موردونه تړي، $\exists v_1$ په C کېني د v_1 مورد تړي، او دویم $\forall v_0$ په D کېني د v_0 مورد تړي. د v_1 لومړۍ مورد او د v_0 څلورم مورد په A کېني آزاد دي. د v_0 وروستۍ مورد په D کېني آزاد، خو په C او A کېني تړلې دے.

تعریف 15.46 (جمله). فارمول A هله او یوازې هله یوه تړلې فارمول ده چې د متغیرونه هېڅ آزاد مورد ونه لري.

15.9 ځایناستی

تعریف 15.47 (په ترم کښې ځایناستی). $s[t/x]$ ، یعنې په s کښې د x د هر مورد پر ځای د t د ځایناستی پایله، په بازکشتي ډول داسې تعریفوو:

$$1. s \equiv c : s[t/x] \text{ پخپله } s \text{ دے۔}$$

$$2. s \equiv y : \text{که } y \text{ یو متغیر او } x \neq y \text{ وي، نو } s[t/x] \text{ هم پخپله } s \text{ دے۔}$$

$$3. s \equiv x : s[t/x] \text{ همدا } t \text{ دے۔}$$

$$4. s \equiv f(t_1, \dots, t_n) : s[t/x] \text{ همدا } f(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x]) \text{ دے۔}$$

تعریف 15.48. یو ترم t په A کښې د x دپاره هله ازاد دے چې په A کښې د x هېڅ ازاد مورد د داسې سور په ساحه کښې نه راکشي چې په t کښې کوم متغیر تری.

پیلګه 15.49.

$$1. v_8 \text{ په } \exists v_3 A_4^2(v_3, v_1) \text{ کښې د } v_1 \text{ دپاره ازاد دے۔}$$

$$2. f_1^2(v_1, v_2) \text{ په } \forall v_2 A_4^2(v_0, v_2) \text{ کښې د } v_0 \text{ دپاره ازاد نه دے۔}$$

تعریف 15.50 (په فارمول کښې ځایناستی). که A فارمول، x متغیر، او t داسې ترم وي چې په A کښې د x دپاره ازاد وي، نو $A[t/x]$ په A کښې د x د ټولو ازادو موردونو پر ځای د t د ځایناستی پایله ده.

$$1. A \equiv \perp : A[t/x] \text{ همدا } \perp \text{ دے۔}$$

$$2. A \equiv \top : A[t/x] \text{ همدا } \top \text{ دے۔}$$

$$3. A \equiv P(t_1, \dots, t_n) : A[t/x] \text{ همدا } P(t_1[t/x], \dots, t_n[t/x]) \text{ دے۔}$$

$$4. A \equiv t_1 = t_2 : A[t/x] \text{ همدا } t_1[t/x] = t_2[t/x] \text{ دے۔}$$

$$5. A \equiv \neg B : A[t/x] \text{ همدا } \neg B[t/x] \text{ دے۔}$$

$$6. A \equiv (B \wedge C) : A[t/x] \text{ همدا } (B[t/x] \wedge C[t/x]) \text{ دے۔}$$

$$7. A \equiv (B \vee C) : A[t/x] \text{ همدا } (B[t/x] \vee C[t/x]) \text{ دے۔}$$

$$8. A \equiv (B \rightarrow C) : A[t/x] \text{ همدا } (B[t/x] \rightarrow C[t/x]) \text{ دے۔}$$

$$9. A \equiv (B \leftrightarrow C) : A[t/x] \text{ همدا } (B[t/x] \leftrightarrow C[t/x]) \text{ دے۔}$$

$$10. A \equiv \forall y B : \text{که } y \text{ له } x \text{ څخه بېل متغیر وي، نو } A[t/x] \text{ همدا } \forall y B[t/x] \text{ دے؛ که نه وي، نو } A[t/x] \text{ پخپله } A \text{ دے۔}$$

$$11. A \equiv \exists y B : \text{که } y \text{ له } x \text{ څخه بېل متغیر وي، نو } A[t/x] \text{ همدا } \exists y B[t/x] \text{ دے؛ که نه وي، نو } A[t/x] \text{ پخپله } A \text{ دے۔}$$

پام وکړئ چې ځایناستی کېدے شي بې اغېزې وي: که x په A کښې هېڅ نه وي راغلی، نو $A[t/x]$ پخپله A دے.

دا محدودیت چې t باید په A کښې د x دپاره ازاد وي، د لاندې حالتونو د مخنیوي دپاره اړین دے. که $A \equiv \exists y x < y$ او $t \equiv y$ وي، نو $A[t/x]$ به $y < y$ شي. په دې حالت کښې ازاد متغیر y د ځایناستی پر مهال د سور $\exists y$ له خوا «راکېږي»، او دا ناغوښتې پایله ده. مثلاً غواړو چې هر که $\forall x B$ صدق کوي، $B[t/x]$ هم صدق وکړي. خو $\forall x \exists y x < y$ په پام کښې ونیسئ (دلته B همدا $\exists y x < y$ دے). دا د بېلګې په توګه د طبیعي عددونو په باب رښتوني جمله ده: د هر عدد x دپاره تر هغه لویو عدد y شته.

که مو y د x د ممکنې ځایناستی په توګه روا کتلې وای، پایله به مو $y < y \equiv \exists y y$! $B[y/x]$ وه، چې دروغ ده. د دې مخنیوې په دې کوو چې په t کې هېڅ ازاد متغیر باید په A کې د کوم سور له خوا ترلې نه شي.

د پېچلې نښې د مخنیوي دپاره ډېر ځله لاندې دود کاروو: که A داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد راتلې شي، د دې د ښودلو دپاره $A(x)$ هم لیکو. چې موخه مو کوم A ! او x دي څرګنده وي، او t یو ترم وي (چې فرض کېږي په $A(x)$ کې د x دپاره ازاد دے)، نو $A(t)$ د $A[t/x]$ لنډون لیکو. مثلاً ویلې شو: « $A(t)$ د $A(x)$ یو مورد بولو.» له دې څخه موخه دا ده چې که A هر فارمول، x متغیر، او t داسې ترم وي چې په A کې د x دپاره ازاد وي، نو $A[t/x]$ د A یو مورد دے.

باب 16

د لومړۍ درجې منطق معنی پوهنه

16.1 پېژندنه

عبارتونو ته معنا ورکول د معنی پوهنې کار دے. د معنی پوهنې مرکزي مفهوم په جوړښت کېنې د صدق مفهوم دے. جوړښت د ژبې بنسټیزو اجزاوو ته معنا ورکوي: د تعریف ساحه د څیزونو یو نائش سټ دے. سورونه داسې تفسیرېږي چې پر همدې ساحه ګرځي، ثابت سمبولونه د ساحې له غړو سره ګومارل کېږي، تابعې له د تعریف ساحه څخه همدې ساحې ته له تابعو سره ګومارل کېږي، او پریدیکاتونه پر د تعریف ساحه له اړیکو سره ګومارل کېږي. د تعریف ساحه او د بنسټیز لغت ګومارنې په ګډه جوړښت جوړوي. متغیرونه په فارمولونه کېنې راتلې شي، او د معنی پوهنې د ورکولو دپاره باید هغو ته هم د د تعریف ساحه غړي وګومارو—دا د متغیر ګومارنه ده. په پای کېنې د صدق اړیکه دا ټول سره یوځای کوي. فارمول په جوړښت $\mathcal{M}$ کېنې د متغیر ګومارنې s په نسبت صدق کولې شي، چې $\mathcal{M}, s \models A$ لیکل کېږي. دا اړیکه هم د A پر جوړښت په استقرا تعریفېږي: د منطقي نښلونکو د رښتیاوالي جدولونه کاروو، خو مثلاً د $(A \wedge B)$ صدق د A او B د صدق یا نه صدق له مخې تعریف کړو. بیا څرګندېږي چې که فارمول A ترلې فارمول وي، یعنې ازاد متغیرونه ونه لري، د متغیر ګومارنه اړونده نه ده؛ نو ویلې شو چې ترلې فارمولونه په ساده ډول په جوړښتونه کېنې صدق کوي یا نه کوي.

د ترلې فارمولونه دپاره د صدق د اړیکې $\mathcal{M} \models A$ پر بنسټ بیا د اعتبار، معنایي استلزام، او د صدق وړتیا بنسټیز معنایي مفهومونه تعریفولې شو. ترلې فارمول هله معتبره ده، $\models A$ ، چې هر جوړښت پکېنې صدق وکړي. د ترلې فارمولونه یو سټ هله هغه لازمي، $\Gamma \models A$ ، چې هر هغه جوړښت چې د Γ په ټولو ترلې فارمولونه کېنې صدق کوي، په A کېنې هم صدق وکړي. او د ترلې فارمولونه یو سټ هله د صدق وړ دے چې کوم جوړښت په هغه کېنې په یو وخت په ټولو ترلې فارمولونه کېنې صدق وکړي. څرنګه چې فارمولونه په استقرايي ډول تعریف شوي، او صدق بیا د فارمولونه پر جوړښت په استقرا تعریفېږي، استقرا کارولې شو څو د خپلې معنی پوهنې خاصیتونه ثابت او تعریف شوي معنایي مفهومونه سره وتړو.

16.2 د لومړۍ درجې ژبو جوړښتونه

د لومړۍ درجې ژبې پخپله بې تفسیره دي: له ثابت سمبولونه، تابعې او پریدیکاتونه سره کومه ځانګړې معنا نه وي ترلې. معنا د جوړښت په ټاکلو ورکول کېږي. هغه د تعریف ساحه ټاکي؛ یعنې هغه څیزونه چې ثابت سمبولونه ئې ټاکي، تابعې پرې عمل کوي، او سورونه پرې ګرځي. سربېره پر دې، دا هم ټاکي چې کوم ثابت سمبولونه کوم څیزونه ټاکي، تابع څیزونه څنګه نورو څیزونو ته لېږي، او پریدیکاتونه پر کومو څیزونو صدق کوي. جوړښتونه په منطق کېنې د معنایي مفهومونو بنسټ دي، لکه لازمیت، اعتبار، او د صدق وړتیا. په لیکنو کېنې ورته په بېلابېل ډول «جوړښتونه»، «تفسیرونه» یا «مدلونه» ویل کېږي.

تعریف 16.1 (جوړښتونه). د لومړۍ درجې منطق د یوې ژبې $\mathcal{L}$ دپاره جوړښت $\mathcal{M}$ له لاندې اجزاوو جوړ دے:

1. د تعریف ساحه: یو نائش سټ، $|\mathcal{M}|$

2. د ثابت سمبولونه تفسیر: د $\mathcal{L}$ د هر ثابت سمبول c دپاره یو غړی $c^{\mathcal{M}} \in |\mathcal{M}|$

3. د پریدیکاتونه تفسیر: د $\mathcal{L}$ د هر n -ځایه پریدیکات R دپاره (له پرته) یوه n -ځایه اړیکه $R^M \subseteq |M|^n$

4. د تابعي تفسیر: د $\mathcal{L}$ د هر n -ځایه تابع f دپاره یوه n -ځایه تابع $f^M: |M|^n \rightarrow |M|$

بېلگه 16.2. د حساب د ژبې دپاره جوړښت M له یوه سټ؛ د $|M|$ له یوه غړي 0^M ، چې د ثابت سمبول 0 تفسیر دے؛ له یوې یو ځایه تابع $|M| \rightarrow |M|$ ؛ له دوو دوه ځایه تابعو $+^M$ او $\times^M$ ، چې دواړه $|M|^2 \rightarrow |M|$ دي؛ او له یوې دوه ځایه اړیکې $|M|^2 \subseteq <^M$ جوړ دے.

د داسې جوړښت یوه څرګنده بېلگه دا ده:

$$1. |M| = \mathbb{N}$$

$$2. 0^M = 0$$

$$3. I^M(n) = n + 1 \text{ دپاره } n \in \mathbb{N}$$

$$4. +^M(n, m) = n + m \text{ دپاره } n, m \in \mathbb{N}$$

$$5. \times^M(n, m) = n \cdot m \text{ دپاره } n, m \in \mathbb{N}$$

$$6. <^M = \{ \langle n, m \rangle : n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n < m \}$$

د $\mathcal{L}_A$ دپاره په دې ډول تعریف شوې جوړښت M د حساب معیاري مدل بلل کېږي، ځکه د $\mathcal{L}_A$ غیر منطقي ثابتونه کټ مټ هغسې تفسیروي چې تمه ئې کوی.

خو د $\mathcal{L}_A$ دپاره ډېر نور ممکن جوړښتونه هم شته. مثلاً د ساحې په توګه د $\mathbb{N}$ پر ځای د صحیح عددونو سټ $\mathbb{Z}$ اخیستلے، او د 0 ، 1 ، $+$ ، $\times$ او $<$ تفسیرونه ورسره سم تعریفولے شو. خو د $\mathcal{L}_A$ داسې جوړښتونه هم تعریفولے شو چې له عددونو سره هېڅ لرې اړیکه هم نه لري.

بېلگه 16.3. د سټ تیوري د ژبې $\mathcal{L}_Z$ یو جوړښت M یوازې یوه ساحه او یوه دوه ځایه اړیکه غواړي. نو په فني لحاظ مثلاً د خلکو سټ او اړیکه « x له y څخه مشر دے» هم د $\mathcal{L}_Z$ دپاره جوړښت کېدے شي، او هم $\mathbb{N}$ له $n \geq m$ سره د $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره. د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-012) سرچینه د اړیکې د ځاییز والي په عبارت کېنې ناسمه نښلوونکې کرښه ږدي؛ دلته مطلب «یوه دوه ځایه اړیکه» لوستل شوے دے.

د $\mathcal{L}_Z$ یو په ځانګړي ډول په زړه پورې جوړښت، چې د ساحې غړي ئې په رښتیا ستونه او د $\in$ تفسیر ئې په رښتیا اړیکه « x د y غړے دے» وي، د موروثي متناهي ستونو جوړښت ځنګ دے:

$$1. |\mathfrak{F}| = \emptyset \cup \wp(\emptyset) \cup \wp(\wp(\emptyset)) \cup \wp(\wp(\wp(\emptyset))) \cup \dots$$

$$2. \in^{\mathfrak{F}} = \{ \langle x, y \rangle : x, y \in |\mathfrak{F}|, x \in y \}$$

دا چې د څه شي د جوړښت ګڼو دپاره کوم شرطونه ږدو، زموږ پر منطق اغېز کوي. مثلاً د تشو ساحو نه منل، د سورو لرونکو جملو د صدق د معمول حساب له مخې، دا تضمینوي چې $\exists x (A(x) \vee \neg A(x))$ معتبر دے—یعني یو منطقي صدق دے. او دا شرط چې ټول ثابت سمبولونه باید د ساحې کوم څیز ته اشاره وکړي، تضمینوي چې وجودي تعمیم د استنتاج یوه سمه بڼه ده: $A(a)$ ، نو $\exists x A(x)$. که مو نومونو ته د ساحې بهر یا هېڅ څیز ته اشاره کول روا ګڼي وای، د ازاد منطق پر لور به تللي وو؛ په هغه کېنې وجودي تعمیم یوه اضافي مقدمې ته اړتیا لري: $A(a)$ او $\exists x x = a$ ، نو $\exists x A(x)$.

16.3 پوښل شوي جوړښتونه د لومړۍ درجې ژبو دپاره

په یاد ولرئ چې یو ترم هله ترلے دے چې هېڅ متغیرونه ونه لري.

تعریف 16.4 (د ترلو ترمونو قیمت). که t د ژبې $\mathcal{L}$ یو ترلے ترم او $\mathcal{M}$ د $\mathcal{L}$ یو جوړښت وي، قیمت $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$ ئې په لاندې ډول تعریفېږي:

$$1. \text{ که } t \text{ یوازې ثابت سمبول } c \text{ وي، نو } \text{Val}^{\mathcal{M}}(c) = c^{\mathcal{M}}.$$

$$2. \text{ که } t \text{ د } f(t_1, \dots, t_n) \text{ بڼه ولري، نو}$$

$$\text{Val}^{\mathcal{M}}(t) = f^{\mathcal{M}}(\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_n)).$$

تعریف 16.5 (پوښل شوي جوړښت). یو جوړښت هله پوښل شوی دے چې د ساحې هر غړی د کوم ترلي ترم قیمت وي.

بېلگه 16.6. فرض کړئ $\mathcal{L}$ هغه ژبه ده چې ثابت سمبولونه $zero$ ، one ، two ، ...، دوه ځایه پریدیکات $<$ ، او دوه ځایه تابعې $+$ او $\times$ لري. د $\mathcal{L}$ جوړښت $\mathcal{M}$ دې هغه وي چې ساحه ئې $|\mathcal{M}| = \{0, 1, 2, \dots\}$ او کومارنې ئې $zero^{\mathcal{M}} = 0$ ، $one^{\mathcal{M}} = 1$ ، $two^{\mathcal{M}} = 2$ ، او همداسې نورې دي. د دوه ځایه اړیکې د سمبول $<$ دپاره، سټ $<^{\mathcal{M}}$ د ټولو هغو جوړو $\langle c_1, c_2 \rangle \in |\mathcal{M}|^2$ سټ دے چې c_1 له c_2 څخه کوچنۍ وي: مثلاً $\langle 1, 3 \rangle \in <^{\mathcal{M}}$ ، خو $\langle 2, 2 \rangle \notin <^{\mathcal{M}}$. د دوه ځایه تابع $+$ دپاره $+^{\mathcal{M}}$ په معمول ډول تعریف کړئ—مثلاً $+(2, 3)^{\mathcal{M}}$ عدد 5 ته لېږي؛ د دوه ځایه تابع $\times$ دپاره هم همداسې وکړئ. نو د $four$ قیمت پخپله 4 دے، او د $(two, +(three, zero)) \times$ قیمت (یا په منځليکي نښه کښې، $(two \times (three + zero))$) دا دے:

$$\text{Val}^{\mathcal{M}}(\times(two, +(three, zero)))$$

$$\begin{aligned} &= \times^{\mathcal{M}}(\text{Val}^{\mathcal{M}}(two), \text{Val}^{\mathcal{M}}(+(three, zero))) \\ &= \times^{\mathcal{M}}(\text{Val}^{\mathcal{M}}(two), +^{\mathcal{M}}(\text{Val}^{\mathcal{M}}(three), \text{Val}^{\mathcal{M}}(zero))) \\ &= \times^{\mathcal{M}}(two^{\mathcal{M}}, +^{\mathcal{M}}(three^{\mathcal{M}}, zero^{\mathcal{M}})) \\ &= \times^{\mathcal{M}}(2, +^{\mathcal{M}}(3, 0)) \\ &= \times^{\mathcal{M}}(2, 3) \\ &= 6 \end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-013) د سرچینې د محاسبې په لومړۍ کرښه کښې د برابری نښه د بلي کرښې له پیل سره تکرار شوې؛ دلته لومړۍ تکراري نښه لرې شوې ده.

تمرین 16.7. ایا $\mathcal{M}$ ، یعنې د حساب معیاري مدل، پوښل شوی دے؟ څرگنده ئې کړئ.

16.4 په جوړښت کښې د فارمول صدق

هغه بنسټیز مفهومونه چې یوې خوا ته عبارتونه لکه ترمونه او فارمولونه، او بلي خوا ته جوړښتونه سره تړي، د یوه ترم قیمت او د فارمول صدق دي. په غیر رسمي ډول، د یوه ترم قیمت د جوړښت یو غړی دے—که ترم یوازې یو ثابت وي، قیمت ئې هغه څیز دے چې جوړښت له هغه ثابت سره کومارلے وي؛ او که د تابعې په کارولو جوړ شوی وي، د هغه قیمت د ثابتونو له قیمتونه او هغو تابعو څخه حسابېږي چې جوړښت په ترم کښې تابعو ته کومارلې وي. فارمول په یوه جوړښت کښې هله صدق کوي چې اړوندو ته ورکړل شوی تفسیر فارمول د جوړښت په ساحه کښې رښتونه کړي. د صدق دا مفهوم په استقرا ټاکل کېږي: د جوړښت مشخصات نېغ په نېغه وایي چې اتومي فارمولونه کله صدق کوي، او دا چې یو پېچلې فارمول کله صدق کوي، د هغه له اصلي نښلونکي یا سور او د هغه د سمدهستي فرعي فارمولونه له صدق یا نه صدق سره سم تعریفوو.

دلته د سورو حالت لږ نازک دے، ځکه د سور لرونکي فارمول سمدستي فرعي فارمول يو ازاد متغير لري، او جوړښتونه د متغیرونه قیمتونه نه ټاکي. د دې ستونزې د حل دپاره د متغير کومارنې هم معرفي کوو، او صدق يوازې د جوړښت په نسبت نه، بلکې د جوړښت او متغير کومارنې په نسبت تعريفوو.

تعريف 16.8 (د متغير کومارنه). د جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره د متغير کومارنه s هغه تابع ده چې هر متغير د $|\mathcal{M}|$ کوم غړي ته لېږي؛ يعنې

$$s: \text{Var} \rightarrow |\mathcal{M}|$$

جوړښت هر ثابت سمبول ته قيمت، او د متغير کومارنه هر متغير ته يو قيمت ورکوي. خو غواړو چې له دغو څخه جوړ شوي ترمونه هم د د تعريف ساحه غږي ونوموي. د دې دپاره د ترمونو قيمت په استقرا تعريفوو. د ثابت سمبولونه او متغیرونو قيمت هماغه دے چې جوړښت يا د متغير کومارنه ئې ټاکي، د زيات پچلو ترمونو قيمت د هغو تابعو په بازگشتي کارولو حسابېږي چې جوړښت له تابعې سره کومارلې وي.

تعريف 16.9 (د ترمونو قيمت). که t د ژبې $\mathcal{L}$ يو ترم، $\mathcal{M}$ د $\mathcal{L}$ يو جوړښت، او s د $\mathcal{M}$ دپاره متغير کومارنه وي، قيمت $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)$ ئې په لاندې ډول تعريفېږي:

$$1. \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t) = c^{\mathcal{M}} : t \equiv c$$

$$2. \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t) = s(x) : t \equiv x$$

$$3. t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$$

$$\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t) = f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n)).$$

تعريف 16.10 (د x بديله کومارنه). که s د جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره متغير کومارنه وي، د $\mathcal{M}$ هره هغه متغير کومارنه s' چې له s سره تر ډېره يوازې د x په کومارل شوي څيز کښې توپير لري، د s د x بديله کومارنه بلل کېږي. که s' د s د x بديله کومارنه وي، $s' \sim_x s$ ليکو.

پام وکړئ چې د يوې کومارنې s د x بديله کومارنه ار نه ده چې په رښتيا x ته بيل څيز وکوماري. په حقيقت کښې هره کومارنه د خپل ځان د x بديله کومارنه هم ګڼل کېږي.

تعريف 16.11. که s د جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره متغير کومارنه او $m \in |\mathcal{M}|$ وي، نو کومارنه $s[m/x]$ هغه د متغير کومارنه ده چې داسې تعريفېږي:

$$s[m/x](y) = \begin{cases} m & \text{که } y \equiv x \\ s(y) & \text{که نه وي} \end{cases}$$

په بله وينا، $s[m/x]$ د s د x هغه ځانګړې بديله کومارنه ده چې د ساحې غړي m له x سره کوماري، او له x پرته متغیرونه ته هماغه څيزونه کوماري چې s ئې کوماري.

تعريف 16.12 (صدق). په جوړښت $\mathcal{M}$ کښې د فارمول A ! صدق د متغير کومارنې s په نسبت، چې په سمبولونو کښې $\mathcal{M}, s \models A$ دے، په بازگشتي ډول داسې تعريفېږي. (موږ $\mathcal{M}, s \models A$ د $\mathcal{M}, s \models A$ نه دے» په معنا ليکو.)

$$1. \mathcal{M}, s \models A : A \equiv \perp$$

$$2. \mathcal{M}, s \models A : A \equiv \top$$

$$3. \mathcal{M}, s \models A : A \equiv R(t_1, \dots, t_n) : \langle \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n) \rangle \in R^{\mathcal{M}}$$

$$4. \mathcal{M}, s \models A : A \equiv t_1 = t_2 : \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_2)$$

$$5. \mathcal{M}, s \models A : A \equiv \neg B : \mathcal{M}, s \not\models B$$

$$6. \mathcal{M}, s \models A : A \equiv (B \wedge C) : \mathcal{M}, s \models B \text{ او } \mathcal{M}, s \models C$$

$$7. A \equiv (!B \vee !C) : \mathcal{M}, s \models A \text{ هله او يوازې هله چې } \mathcal{M}, s \models !B \text{ يا } \mathcal{M}, s \models !C \text{ (يا دواړه)۔}$$

$$8. A \equiv (!B \rightarrow !C) : \mathcal{M}, s \models A \text{ هله او يوازې هله چې } \mathcal{M}, s \models !C \text{ يا } \mathcal{M}, s \not\models !B \text{ (يا دواړه)۔}$$

$$9. A \equiv (!B \leftrightarrow !C) : \mathcal{M}, s \models A \text{ هله او يوازې هله چې يا دواړه } \mathcal{M}, s \models !B \text{ او } \mathcal{M}, s \models !C \text{ وي، يا نه } \mathcal{M}, s \models !B \text{ وي او نه } \mathcal{M}, s \models !C \text{۔}$$

$$10. A \equiv \forall x !B : \mathcal{M}, s \models A \text{ هله او يوازې هله چې د هر غړي } m \in |\mathcal{M}| \text{ دپاره } \mathcal{M}, s[m/x] \models !B \text{۔}$$

$$11. A \equiv \exists x !B : \mathcal{M}, s \models A \text{ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه غړي } m \in |\mathcal{M}| \text{ دپاره } \mathcal{M}, s[m/x] \models !B \text{۔}$$

د متغير کومارنې په وروستي دوو شرطونو کښې مهمې دي۔ د $\forall x !B(x)$ صدق داسې نه شو تعريفول: «د ټولو $m \in |\mathcal{M}|$ دپاره $\mathcal{M} \models !B(m)$ » لامل دا دے چې $\mathcal{M} \models !B(m)$ د $\exists x !B(x)$ صدق داسې نه شو تعريفول: «لږ تر لږه د يوه $m \in |\mathcal{M}|$ دپاره $\mathcal{M} \models !B(m)$ » لامل دا دے چې که $m \in |\mathcal{M}|$ وي، هغه د ژبې سمبول نه دے، نو $!B(m)$ فارمول نه دے (يعنې $!B[m/x]$ ناتعريف دے)۔ دا هم نه شو فرضول چې داسې ثابت سمبولونه يا ترمونه لرو چې د $\mathcal{M}$ هر غړي ونوموي، ځکه د جوړښتونه په تعريف کښې هېڅ شرط دا نه غواړي۔ په معياري ژبه کښې د ثابت سمبولونه سټ شمېرېدونکي لامتناهي دے، نو که $|\mathcal{M}|$ د شمېر ور نه وي، د هر څيز د نومولو دپاره کافي ثابت سمبولونه هم نشته۔

دا ستونزه د متغير کومارنو په معرفي کولو حلولو، په هغو سره متغيرونه نېغ په نېغه د ساحې له غړي سره تړلے شو۔ بيا د دې پر ځاي چې مثلاً دوايو $\exists x !B(x)$ په $\mathcal{M}$ کښې هله او يوازې هله صدق کوي چې لږ تر لږه د يوه $m \in |\mathcal{M}|$ دپاره $\mathcal{M} \models !B(m)$ وي، وايو چې دا په $\mathcal{M}$ کښې د s په نسبت هله او يوازې هله صدق کوي چې $!B(x)$ د $s[m/x]$ په نسبت لږ تر لږه د يوه $m \in |\mathcal{M}|$ دپاره صدق وکړي۔

بېلگه 16.13. فرض کړئ $\mathcal{L} = \{a, b, f, R\}$ ، چې a او b ثابت سمبولونه، f دوه ځايه تابع، او R دوه ځايه پريديکات دي۔ لاندې تعريف شوي جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کښې ونيسئ:

$$1. |\mathcal{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$2. a^{\mathcal{M}} = 1$$

$$3. b^{\mathcal{M}} = 2$$

$$4. \text{که } x + y \leq 3 \text{ وي، } f^{\mathcal{M}}(x, y) = x + y \text{، او که نه وي } 3 = \text{۔}$$

$$5. R^{\mathcal{M}} = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}$$

تابع $s(x) = 1$ ، چې هر متغير ته $1 \in |\mathcal{M}|$ کوماري، د $\mathcal{M}$ دپاره د متغير کومارنه ده۔
بيا

$$\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(a, b)) = f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(a), \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(b)).$$

څرنکه چې a او b ثابت سمبولونه دي، $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(a) = a^{\mathcal{M}} = 1$ او $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(b) = b^{\mathcal{M}} = 2$ نو

$$\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(a, b)) = f^{\mathcal{M}}(1, 2) = 1 + 2 = 3.$$

د $f(f(a, b), a)$ د قيمت د حسابولو دپاره بايد دا وگورو:

$$\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(f(a, b), a)) = f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(a)) = f^{\mathcal{M}}(3, 1) = 3,$$

ځکه $3 + 1 > 3$ ۔ څرنکه چې $s(x) = 1$ او $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(x) = s(x)$ ، دا هم لرو:

$$\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(f(a, b), x)) = f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(a, b)), \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(x)) = f^{\mathcal{M}}(3, 1) = 3,$$

يو اټومي فارمول $R(t_1, t_2)$ هله صدق کوي چې د مداخلو د قيمتونو جوړه، يعنې $\langle \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_1), \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t_2) \rangle$ د $R^{\mathfrak{M}}$ غړې وي. نو مثلاً $\mathfrak{M}, s \models R(b, f(a, b))$ لرو، ځکه $\langle \text{Val}^{\mathfrak{M}}(b), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(f(a, b)) \rangle = \langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ خو $\mathfrak{M}, s \not\models R(x, f(a, b))$ ، ځکه $\langle 1, 3 \rangle \notin R^{\mathfrak{M}}$.

د دې د معلومولو دپاره چې يو غير اټومي فارمول A صدق کوي که نه، د استقرايي تعريف هغه شرط کاروي چې پر اصلي نښلونکي عملي کېږي. مثلاً د $R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b))$ اصلي نښلونکې $\rightarrow$ دے، او

هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \models R(a, a) \rightarrow (R(b, x) \vee R(x, b))$

$\mathfrak{M}, s \models R(a, a)$ يا $\mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b)$

څرنگه چې $\mathfrak{M}, s \models R(a, a)$ (ځکه $\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$)، ځواب لا نه شو ټاکلی او لومړې بايد معلومه کړو چې $\mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b)$ دے که نه:

هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \models R(b, x) \vee R(x, b)$

$\mathfrak{M}, s \models R(b, x)$ يا $\mathfrak{M}, s \models R(x, b)$

او دا حالت سم دے، ځکه $\mathfrak{M}, s \models R(x, b)$ (ځکه $\langle 1, 2 \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$).

په ياد ولری چې د s د x بديله کومارنه هغه د متغير کومارنه ده چې له s سره تر ډېره يوازې د x په کومارنه کېږي توپير لري. د $|\mathfrak{M}|$ د هر غړي دپاره د s يوه د x بديله کومارنه شته:

$$s_1 = s[1/x],$$

$$s_2 = s[2/x],$$

$$s_3 = s[3/x],$$

$$s_4 = s[4/x].$$

نو مثلاً $s_2(x) = 2$ ، او له x پرته د هر متغير y دپاره $s_2(y) = s(y) = 1$. د جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره دا د s د x ټولې بديلې کومارنې دي، ځکه $|\mathfrak{M}| = \{1, 2, 3, 4\}$. په ځانگړي ډول پام وکړئ چې $s_1 = s$ (هره s تل د خپل ځان د بديله کومارنه هم وي).

د دې د معلومولو دپاره چې د وجودي سور لرونکې فارمول $\exists x!A(x)$ صدق کوي که نه، بايد معلومه کړو چې لږ تر لږه د يوه $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \models A(x)$ دے که نه. نو

$$\mathfrak{M}, s \models \exists x (R(b, x) \vee R(x, b)),$$

ځکه $\mathfrak{M}, s[1/x] \models R(b, x) \vee R(x, b)$ (هم شرط پوره کوي). خو

$$\mathfrak{M}, s \not\models \exists x (R(b, x) \wedge R(x, b))$$

ځکه هر $m \in |\mathfrak{M}|$ چې واخلو، $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(b, x) \wedge R(x, b)$.

د دې د معلومولو دپاره چې د عمومي سور لرونکې فارمول $\forall x!A(x)$ صدق کوي که نه، بايد معلومه کړو چې د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \models A(x)$ دے که نه. نو

$$\mathfrak{M}, s \models \forall x (R(x, a) \rightarrow R(a, x)),$$

ځکه د ټولو $m \in |\mathfrak{M}|$ دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \models R(x, a) \rightarrow R(a, x)$. د $m = 1$ دپاره $\mathfrak{M}, s[1/x] \models R(a, x)$ لرو، نو تالي رښتونه دے، او د $m = 2$ او 3 دپاره $\mathfrak{M}, s[m/x] \not\models R(x, a)$ ، نو مقدم دروغ دے. خو

$$\mathfrak{M}, s \not\models \forall x (R(a, x) \rightarrow R(x, a))$$

ځکه $\mathfrak{M}, s[2/x] \not\models R(a, x) \rightarrow R(x, a)$ (ځکه $\mathfrak{M}, s[2/x] \models R(a, x)$ او $\mathfrak{M}, s[2/x] \not\models R(x, a)$).

د یو زیات پېچلي حالت دپاره دا فارمول په پام کېښی:

$$\forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

څرنګه چې $\mathcal{M}, s[3/x] \not\models R(a, x)$ او $\mathcal{M}, s[4/x] \not\models R(a, x)$ ، هغه په زړه پورې حالتونه چې د شرطي د تالي په باب فکر پکښې پکار دے یوازې $m = 1$ او $m = 2$ دي. ایا $\mathcal{M}, s[1/x] \models \exists y R(x, y)$ ؟ دا هله صدق کوي چې لږ تر لږه یو $n \in |\mathcal{M}|$ داسې وي چې $\mathcal{M}, s[1/x][n/y] \models R(x, y)$. په حقیقت کې چې که $n = 1$ واخلو، نو $s[1/x][n/y] = s[1/y] = s$ ، څرنګه چې $s(x) = 1$ او $s(y) = 1$ ، $\langle 1, 1 \rangle \in R^{\mathcal{M}}$ ، ځواب هو دے.

د دې د معلومولو دپاره چې $\mathcal{M}, s[2/x] \models \exists y R(x, y)$ ، باید د متغیر کومارنې $s[2/x][n/y]$ وکورو. دلته د $n = 1$ دپاره دا کومارنه $s_2 = s[2/x]$ ده؛ او $R(x, y)$ پکښې صدق نه کوي ($s_2(x) = 2$ ، $s_2(y) = 1$ ، او $\langle 2, 1 \rangle \notin R^{\mathcal{M}}$). خو $s[2/x][3/y] = s_2[3/y]$ په پام کېښی ونیسئ. $\mathcal{M}, s_2[3/y] \models R(x, y)$ ، ځکه $\langle 2, 3 \rangle \in R^{\mathcal{M}}$ ، نو $\mathcal{M}, s_2 \models \exists y R(x, y)$.

نو د ټولو $m \in |\mathcal{M}|$ دپاره یا $\mathcal{M}, s[m/x] \not\models R(a, x)$ (که $m = 3$ یا 4 وي)، یا $\mathcal{M}, s[m/x] \models \exists y R(x, y)$ (که $m = 1$ یا 2 وي)، نو

$$\mathcal{M}, s \models \forall x (R(a, x) \rightarrow \exists y R(x, y)).$$

بل خوا،

$$\mathcal{M}, s \not\models \exists x (R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)).$$

$\mathcal{M}, s[m/x] \models R(a, x)$ یوازې د $m = 1$ او $m = 2$ دپاره لرو. خو د m د دواړو دغو قیمتونو دپاره داسې $n \in |\mathcal{M}|$ شته، یعنې $n = 4$ ، چې $\mathcal{M}, s[m/x][n/y] \not\models R(x, y)$ ؛ نو د $m = 1$ او $m = 2$ دپاره $\mathcal{M}, s[m/x] \not\models \forall y R(x, y)$. په ټوله کې داسې $m \in |\mathcal{M}|$ نشته چې $\mathcal{M}, s[m/x] \models R(a, x) \wedge \forall y R(x, y)$. د ژباړې د نسخې سمونونه: (OLFOL-015-020) سرچینه په بېلو ځایونو کې د وجودي شرط د صدق څرګندونه پرېږدي، د اړوند له تفسیر سره د متغیر کومارنه نښلوي، په فارمول کې زیاته کومه او زیات قوسونه ږدي، له یوه عددي مساوات څخه متغیر غورځوي، او د وروستي عمومي حالت متغیر بدلوي. دلته هر مورد د همدې تعریف او ټاکلي جوړښت له مخې سم شوی دے.

تمرین 16.14. فرض کړئ $\mathcal{L} = \{c, f, A\}$ ، چې یو ثابت سمبول، یوه یو ځایه تابع او یو دوه ځایه پریدیکات لري، او جوړښت $\mathcal{M}$ داسې ورکړل شوی دے:

$$1. |\mathcal{M}| = \{1, 2, 3\}$$

$$2. c^{\mathcal{M}} = 3$$

$$3. f^{\mathcal{M}}(1) = 2, f^{\mathcal{M}}(2) = 3, f^{\mathcal{M}}(3) = 2$$

$$4. A^{\mathcal{M}} = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

(الف) د ټولو متغیرونه v دپاره $s(v) = 1$ وټاکئ. معلومه کړئ چې آیا

$$\mathcal{M}, s \models \exists x (A(f(z), c) \rightarrow \forall y (A(y, x) \vee A(f(y), x)))$$

صدق کوي که نه، او لامل ئې څرګند کړئ.

(ب) یو بېل جوړښت او متغیر کومارنه ورکړئ چې فارمول پکښې صدق ونه کړي.

16.5 د متغیرونو کومارنې

د متغیر کومارنه s هر متغیر ته یو ارزښت ورکوي—او متغیرونه ئې شمېره دي. البته دا اړینه نه ده. موږ له متغیر کومارنو څخه یوازې د اسانتیا دپاره غواړو چې ټولو متغیرونه ته ارزښتونه وګوماري. د یوه ترم t ارزښت، او دا چې فارمول A ! د کومارنې s په نسبت په جوړښت کې صدق کوي که نه، یوازې په هغو ارزښتونو پورې تړلي دي چې s ئې د t متغیرونه او د A ! ازادو متغیرونه ته ګوماري. د لاندې

دوو قضیو منځپانګه همدا ده. د «پورې تړلي دي» مانا دقیقه کولو دپاره ښیو چې هرې دوې هغه متغیر کومارنې چې د t پر ټولو متغیرونو سره موافقې وي، هغه ته یو شان ارزښت ورکوي، او که دوې متغیر کومارنې د A پر ټولو ازادو متغیرونو سره موافقې وي، نو A د یوې په نسبت هله صدق کوي چې د بلې په نسبت هم صدق وکړي.

قضیه 16.15. که په ترم t کېنې متغیرونه د $x_1, \dots, x_n$ په منځ کېنې وي، او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1, \dots, n$ دپاره وي، نو

$$\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$$

ثبوت. د t پر پچلتیا د استقرا له لارې. په بنسټیز حالت کېنې t یا ثابت سمبول وي یا له $x_1, \dots, x_n$ متغیرونو څخه یو وي. که $t = c$ وي، نو $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = c^{\mathfrak{M}} = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$ که $t = x_i$ وي، د قضیې د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ نو $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) = s_1(x_i) = s_2(x_i) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t)$

د استقرايي کام دپاره فرض کړئ چې $t = f(t_1, \dots, t_k)$ او ادعا د $t_1, \dots, t_k$ دپاره صدق کوي. نو

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k)). \end{aligned}$$

د $j = 1, \dots, k$ دپاره، د t_j متغیرونه د $x_1, \dots, x_n$ په منځ کېنې دي. د استقرايي فرض له مخې $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_j) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_j)$ نو

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k)) \\ &= f^{\mathfrak{M}}(\text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_k)) \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(f(t_1, \dots, t_k)) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t). \end{aligned}$$

□

قضیه 16.16. که په A کېنې ازاد متغیرونه د $x_1, \dots, x_n$ په منځ کېنې وي، او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1, \dots, n$ دپاره وي، نو $\mathfrak{M}, s_1 \models A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s_2 \models A$.

ثبوت. د A پر پچلتیا استقرا کاروو. په بنسټیز حالت کېنې، چې A اتومي وي، A له لاندې څخه یو کېدای شي: $\perp$ ، $\top$ ، د یوه k -ځایه اړوند R او ترمونو $t_1, \dots, t_k$ دپاره $R(t_1, \dots, t_k)$ ، یا د ترمونو t_1 او t_2 دپاره $t_1 = t_2$. په وروستیو دوو حالتونو کېنې یوازې د دوه اړخیز شرطی مخامخ لور ثابتوو، ځکه د شاتني لور ثبوت ئې هم شکله دے.

1. $A \equiv \top$: دواړه $\mathfrak{M}, s_1 \models A$ او $\mathfrak{M}, s_2 \models A$ صدق کوي.

2. $A \equiv \perp$: دواړه $\mathfrak{M}, s_1 \not\models A$ او $\mathfrak{M}, s_2 \not\models A$.

3. $A \equiv R(t_1, \dots, t_k)$: فرض کړئ $\mathfrak{M}, s_1 \models A$ نو

$$\langle \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}.$$

د $i = 1, \dots, k$ دپاره، د 16.15 له مخې $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_i) = \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_i)$ نو دا هم لرو چې $\langle \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_k) \rangle \in R^{\mathfrak{M}}$ ځکه $\mathfrak{M}, s_2 \models A$.

4. $A \equiv t_1 = t_2$: فرض کړئ $\mathfrak{M}, s_1 \models A$ بیا $\text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_2)$ نو

$$\begin{aligned} \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_1) &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_1) && (\text{د 16.15 له مخې}) \\ &= \text{Val}_{s_1}^{\mathfrak{M}}(t_2) && (\mathfrak{M}, s_1 \models t_1 = t_2 \text{ ځکه چې}) \\ &= \text{Val}_{s_2}^{\mathfrak{M}}(t_2) && (\text{د 16.15 له مخې}) \end{aligned}$$

نو $\mathfrak{M}, s_2 \models t_1 = t_2$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-021) سرچینه د اتومي اړوند د حالت په وروستي ټولې کښې لومړي ترم ته په ناسمه توګه د عمومي شاخص نښه ورکوي؛ دلته هغه د ټولې له لومړي شاخص سره سم شوه دے۔

اوس فرض کړئ چې د A ! څخه د لږ پېچلیو ټولو فارمولونه B ! دپاره $\mathcal{M}, s_1 \models B$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}, s_2 \models B$ ۔ استقرایي ګام د A ! د اصلي چلوونکي له مخې په حالتونو وېشل کېږي۔ په هر حالت کې یوازې د دوه اړخیز شرطي مخامخ لور ثابتوو؛ د شاتني لور ثبوت ئې هم شکله دے۔ د سورو له حالتونو پرته، په ټولو حالتونو کې استقرایي فرض د A ! پر فرعي فارمولونه B ! کاروو۔ د B ! ازاد متغیرونه د A ! د ازادو متغیرونو په منځ کې دي۔ نو که s_1 او s_2 د A ! پر ازادو متغیرونو سره موافقې وي، د B ! پر هغو هم موافقې دي، او استقرایي فرض پر B ! کارول کېدے شي۔

1. $A \equiv \neg B$: که $\mathcal{M}, s_1 \models A$ وي، نو $\mathcal{M}, s_1 \not\models B$ ؛ د استقرایي فرض له مخې $\mathcal{M}, s_2 \not\models B$ ، ځکه $\mathcal{M}, s_2 \models A$ ۔

2. $A \equiv B \wedge C$: که $\mathcal{M}, s_1 \models A$ وي، نو $\mathcal{M}, s_1 \models B$ او $\mathcal{M}, s_1 \models C$ ؛ د استقرایي فرض له مخې $\mathcal{M}, s_2 \models B$ او $\mathcal{M}, s_2 \models C$ ځکه $\mathcal{M}, s_2 \models A$ ۔

3. $A \equiv B \vee C$: که $\mathcal{M}, s_1 \models A$ وي، نو $\mathcal{M}, s_1 \models B$ یا $\mathcal{M}, s_1 \models C$ ۔ د استقرایي فرض له مخې $\mathcal{M}, s_2 \models B$ یا $\mathcal{M}, s_2 \models C$ ؛ نو $\mathcal{M}, s_2 \models A$ ۔

4. $A \equiv B \rightarrow C$: که $\mathcal{M}, s_1 \models A$ وي، نو $\mathcal{M}, s_1 \not\models B$ یا $\mathcal{M}, s_1 \models C$ ۔ د استقرایي فرض له مخې $\mathcal{M}, s_2 \not\models B$ یا $\mathcal{M}, s_2 \models C$ ؛ نو $\mathcal{M}, s_2 \models A$ ۔

5. $A \equiv B \leftrightarrow C$: که $\mathcal{M}, s_1 \models A$ وي، نو یا $\mathcal{M}, s_1 \models B$ او $\mathcal{M}, s_1 \models C$ دواړه، یا $\mathcal{M}, s_1 \not\models B$ او $\mathcal{M}, s_1 \not\models C$ دواړه صدق نه کوي۔ د استقرایي فرض له مخې، یا $\mathcal{M}, s_2 \models B$ او $\mathcal{M}, s_2 \models C$ دواړه، یا $\mathcal{M}, s_2 \not\models B$ او $\mathcal{M}, s_2 \not\models C$ دواړه صدق نه کوي۔ په هر حالت کې $\mathcal{M}, s_2 \models A$ ۔

6. $A \equiv \exists x B$: که $\mathcal{M}, s_1 \models A$ وي، داسې $m \in |\mathcal{M}|$ شته چې $\mathcal{M}, s_1[m/x] \models B$ ۔ $s'_1 = s_1[m/x]$ او $s'_2 = s_2[m/x]$ ونیسئ۔ د B ! ازاد متغیرونه د $x_1, \dots, x_n$ او x په منځ کې دي۔ $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$ ځکه s'_1 او s'_2 په ترتیب سره د s_1 او s_2 x -ډولونه دي، او د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د s'_1 او s'_2 د تعریف له مخې $s'_1(x) = s'_2(x) = m$ ۔ نو استقرایي فرض پر B ! او s'_1, s'_2 کارول کېږي، او $\mathcal{M}, s'_2 \models B$ ۔ لرو۔ څرنګه چې $s'_2 = s_2[m/x]$ ، داسې $m \in |\mathcal{M}|$ شته چې $\mathcal{M}, s_2[m/x] \models B$ ، ځکه $\mathcal{M}, s_2 \models A$ ۔

7. $A \equiv \forall x B$: که $\mathcal{M}, s_1 \models A$ وي، نو د هر $m \in |\mathcal{M}|$ دپاره $\mathcal{M}, s_1[m/x] \models B$ ۔ غواړو ونیسو چې د هر $m \in |\mathcal{M}|$ دپاره $\mathcal{M}, s_2[m/x] \models B$ هم صدق کوي۔ یو خپل سري $m \in |\mathcal{M}|$ ونیسئ، او $s'_1 = s_1[m/x]$ او $s'_2 = s_2[m/x]$ په پام کې ونیسئ۔ $\mathcal{M}, s'_1 \models B$ لرو۔ د B ! ازاد متغیرونه د $x_1, \dots, x_n$ او x په منځ کې دي۔ $s'_1(x_i) = s'_2(x_i)$ ځکه s'_1 او s'_2 په ترتیب سره د s_1 او s_2 x -ډولونه دي، او د فرض له مخې $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د s'_1 او s'_2 د تعریف له مخې $s'_1(x) = s'_2(x) = m$ ۔ نو استقرایي فرض پر B ! او s'_1, s'_2 کارول کېږي، او $\mathcal{M}, s'_2 \models B$ لرو۔ دا د هر $m \in |\mathcal{M}|$ دپاره صدق کوي، یعنې د ټولو $m \in |\mathcal{M}|$ دپاره $\mathcal{M}, s_2[m/x] \models B$ ؛ نو $\mathcal{M}, s_2 \models A$ ۔

د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-022) سرچینه د عمومي سور په حالت کې دواړه بدلې شوې ګومارنې له بې شاخصه ګومارنې څخه جوړوي؛ دلته په ترتیب سره د لومړۍ او دویمې ګومارنې سم شاخصونه کارول شوي دي۔ د استقرا له مخې پایله اخلو چې هر کله د A ! ازاد متغیرونه د $x_1, \dots, x_n$ په منځ کې وي او $s_1(x_i) = s_2(x_i)$ د $i = 1, \dots, n$ دپاره وي، نو $\mathcal{M}, s_1 \models A$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}, s_2 \models A$ ۔ □

ترې فارمولونه ازاد متغیرونه نه لري؛ نو هرې دوې متغیر ګومارنې د هرې جملې ټولو (صفر) ازادو متغیرونو ته یو شان څیزونه ګوماري۔ له دې کبله اوس ثابته شوې قضیه وایي چې ترلے فارمول د متغیر ګومارنې په نسبت په جوړښت کې صدق کوي که نه، له هغې ګومارنې څخه په بشپړ ډول خپلواک دي۔ دا حقیقت ثبوتوو۔ همدا د لاندې تعریف بنسټ دے، چې د متغیر ګومارنې له یادولو پرته په جوړښت کې د ترلے فارمول صدق تعریفوي۔

نتیجه 16.17. که A ! ترلے فارمول او s یوه متغیر ګومارنه وي، نو $\mathcal{M}, s \models A$ هله او یوازې هله چې د هرې متغیر ګومارنې s' دپاره $\mathcal{M}, s' \models A$ ۔

ثبوت. s' هره متغیر کومارنه ونیسئ. څرنگه چې A ترلے فارمول ده، ازاد متغیرونه نه لري؛ ځکه هره متغیر کومارنه s' په څرکند ډول د A ټولو ازادو متغیرونو ته هماغه څیزونه کوماري چې s ئې کوماري. نو د 16.16 شرط پوره کېږي، او $\mathcal{M}, s \models A$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}, s' \models A$ ثبوت. $\square$

تعریف 16.18. که A ترلے فارمول وي، وایو چې جوړښت $\mathcal{M}$ په A کېږي صدق کوي، $\mathcal{M} \models A$ ، هله او یوازې هله چې د ټولو متغیر کومارنو s دپاره $\mathcal{M}, s \models A$.

که $\mathcal{M} \models A$ وي، په ساده ډول دا هم وایو چې A په $\mathcal{M}$ کېږي رښتیا ده. د صدق مفهوم په طبیعي ډول له انفرادي ترلي فارمولونه څخه د ترلي فارمولونه ستونو ته غځېږي.

تعریف 16.19. که Γ د ترلي فارمولونه یو سټ وي، وایو چې جوړښت $\mathcal{M}$ په Γ کېږي صدق کوي، $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، هله او یوازې هله چې د ټولو $A \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models A$.

د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-023) سرچینه د دې تعریف په پیل کېږي د جملو د سټ لښه بې ځایه دوه ځله راوړي؛ دلته تکرار لږې شوے دے.

قضیه 16.20. فرض کړئ $\mathcal{M}$ جوړښت، A ترلے فارمول، او s یوه متغیر کومارنه ده. $\mathcal{M} \models A$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}, s \models A$.

$\square$

ثبوت. تمرین.

تمرین 16.21، 16.20 ثابته کړئ.

قضیه 16.22. فرض کړئ $A(x)$ یوازې x ازاد لري، او $\mathcal{M}$ جوړښت دے. نو:

$$1. \mathcal{M} \models \exists x A(x) \text{ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوې متغیر کومارنې } s \text{ دپاره } \mathcal{M}, s \models A(x).$$

$$2. \mathcal{M} \models \forall x A(x) \text{ هله او یوازې هله چې د ټولو متغیر کومارنو } s \text{ دپاره } \mathcal{M}, s \models A(x).$$

$\square$

ثبوت. تمرین.

تمرین 16.23، 16.22 ثابته کړئ.

تمرین 16.24. فرض کړئ $\mathcal{L}$ له تابعې پرته ژبه ده. د جوړښت $\mathcal{M}$ ، ثابت سمبول c ، او $a \in |\mathcal{M}|$ په لرلو سره، $\mathcal{M}[a/c]$ هغه جوړښت تعریف کړئ چې کټ مټ د $\mathcal{M}$ په شان دے، خو $c^{M[a/c]} = a$. د ترلي فارمولونه A دپاره $\mathcal{M} \models A$ داسې تعریف کړئ:

$$1. A \equiv \perp : \mathcal{M} \models A \text{ نه.}$$

$$2. A \equiv \top : \mathcal{M} \models A.$$

$$3. A \equiv R(d_1, \dots, d_n) : \mathcal{M} \models A \text{ هله او یوازې هله چې } \langle d_1^M, \dots, d_n^M \rangle \in R^M.$$

$$4. A \equiv d_1 = d_2 : \mathcal{M} \models A \text{ هله او یوازې هله چې } d_1^M = d_2^M.$$

$$5. A \equiv \neg B : \mathcal{M} \models A \text{ هله او یوازې هله چې } \mathcal{M} \models B \text{ نه وي.}$$

$$6. A \equiv (B \wedge C) : \mathcal{M} \models A \text{ هله او یوازې هله چې } \mathcal{M} \models B \text{ او } \mathcal{M} \models C.$$

$$7. A \equiv (B \vee C) : \mathcal{M} \models A \text{ هله او یوازې هله چې } \mathcal{M} \models B \text{ یا } \mathcal{M} \models C \text{ (یا دواړه).}$$

$$8. A \equiv (B \rightarrow C) : \mathcal{M} \models A \text{ هله او یوازې هله چې } \mathcal{M} \models B \text{ نه وي یا } \mathcal{M} \models C \text{ (یا دواړه).}$$

9. $A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$: $A \models !B$ هله او یوازې هله چې یا $A \models !C$ او $A \models !B$ دواړه وي، یا نه $A \models !B$ وي او نه $A \models !C$.

10. $A \equiv \forall x !B$: $A \models !B$ هله او یوازې هله چې د ټولو $a \in \mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M}[a/c] \models !B[c/x]$ په دې شرط چې c په B کېنې نه وي راغله.

11. $A \equiv \exists x !B$: $A \models !B$ هله او یوازې هله چې داسې $a \in \mathcal{M}$ وي چې $\mathcal{M}[a/c] \models !B[c/x]$ په دې شرط چې c په B کېنې نه وي راغله.

فرض کړئ $x_1, \dots, x_n$ په A کېنې ټول ازاد متغیرونه، $c_1, \dots, c_n$ هغه ثابت سمبولونه دي چې په A کېنې نه دي، $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{M}$ او $s(x_i) = a_i$.

وښیئ چې $\mathcal{M}, s \models A$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}[a_1/c_1, \dots, a_n/c_n] \models A[c_1/x_1] \dots [c_n/x_n]$.

(دا مسئله ښیي چې د لومړۍ درجې منطق دپاره داسې معنی پوهنه ورکول ممکن دي چې له متغیر کومارنو پرته کار وکړي.)

تمرین 16.25. فرض کړئ f یو داسې تابعي سمبول دے چې په $A(x, y)$ کېنې نه وي. وښیئ چې داسې جوړښت $\mathcal{M}$ شته چې $\mathcal{M} \models \forall x \exists y !A(x, y)$ هله او یوازې هله چې داسې $\mathcal{M}'$ شته چې $\mathcal{M}' \models \forall x !A(x, f(x))$.

(دا مسئله د سکولم د قضیې په نامه د پېژندل شوې قضیې یو ځانګړی حالت دے؛ $\forall x !A(x, f(x))$ ته د $\forall x \exists y !A(x, y)$ د سکولم نورماله بڼه ویل کېږي.)

16.6 امتدادیتوب

امتدادیتوب، چې کله کله اړوندتیا هم بلل کېږي، په غیر رسمي ډول داسې څرګندولې شو: یوازیني عوامل چې د فارمول A پر صدق د جوړښت $\mathcal{M}$ او د متغیر کومارنې s په نسبت اغېز لري، د د تعریف ساحه کچه او هغه کومارنې دي چې $\mathcal{M}$ او s ې د ژبې هغو اجزاوو ته کوي چې په رښتیا په A کېنې راځي.

د امتدادیتوب یوه سمدستي پایله دا ده: که دوه جوړښتونه $\mathcal{M}$ او $\mathcal{M}'$ د ژبې پر ټولو هغو اجزاوو سره موافق وي چې په جمله A کېنې راځي، او یوه ساحه ولري، نو $\mathcal{M}$ او $\mathcal{M}'$ باید پر دې هم موافق وي چې پخپله A رښتیا ده که نه.

قضیه 16.26 (امتدادیتوب). فرض کړئ A فارمول، او $\mathcal{M}_1$ او $\mathcal{M}_2$ داسې جوړښتونه دي چې $|\mathcal{M}_1| = |\mathcal{M}_2|$ ، او s پر $|\mathcal{M}_1| = |\mathcal{M}_2|$ یوه متغیر کومارنه ده. که په A کېنې د راتلونکو هر ثابت سمبول c ، اړوند سمبول R ، او تابع f دپاره $c^{\mathcal{M}_1} = c^{\mathcal{M}_2}$ ، $R^{\mathcal{M}_1} = R^{\mathcal{M}_2}$ او $f^{\mathcal{M}_1} = f^{\mathcal{M}_2}$ وي، نو $\mathcal{M}_1, s \models A$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}_2, s \models A$.

ثبوت. لومړۍ (پر t د استقرا له لارې) ثابته کړئ چې د هر ترم دپاره $\text{Val}_s^{\mathcal{M}_1}(t) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}_2}(t)$. بیا قضیه پر A د استقرا له لارې ثابته کړئ، او د استقرا په بنسټ کېنې (چې A اتومي وي) له همدې ثابتې شوې ادعا څخه کار واخلئ. □

تمرین 16.27. د 16.26 ثبوت په تفصیل بشپړ کړئ.

نتیجه 16.28 (د تړلي فارمولونه دپاره امتدادیتوب). فرض کړئ A تړلۍ فارمول، او $\mathcal{M}_1$ ، $\mathcal{M}_2$ لکه په 16.26 کېنې وي. نو $\mathcal{M}_1 \models A$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}_2 \models A$.

ثبوت. له 16.26 او 16.17 څخه لاس ته راځي. □

پر دې سربېره، د یوه ترم ارزښت، او دا چې جوړښت په فارمول کېنې صدق کوي که نه، یوازې د هغه د فرعي ترمونو په ارزښتونو پورې تړلي دي.

قضيه 16.29. فرض کړئ $\mathcal{M}$ جوړښت، t او t' ترمونه، او s يوه متغير کومارنه ده. نو $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t[t'/x]) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t')/x]}^{\mathcal{M}}(t)$ ثبوت. پر t د استقرا له لارې.

1. که t يو ثابت وي، يعنې $t \equiv c$ نو $t[t'/x] = c$ او $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(c) = c^{\mathcal{M}} = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t')/x]}^{\mathcal{M}}(c)$

2. که t له x پرته بل متغير وي، يعنې $t \equiv y$ نو $t[t'/x] = y$ او $\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(y) = \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t')/x]}^{\mathcal{M}}(y)$ ځکه $s \sim_x$

3. که $t \equiv x$ وي، نو $t[t'/x] = t'$ خو د $s[\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t')/x]$ د تعريف له مخې $\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t')/x]}^{\mathcal{M}}(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t')$

4. که $t \equiv f(t_1, \dots, t_n)$ وي، نو:

$$\begin{aligned} \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t[t'/x]) &= \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(t_1[t'/x], \dots, t_n[t'/x])) \\ &\quad \text{د } t[t'/x] \text{ د تعريف له مخې} \\ &= f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1[t'/x]), \dots, \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n[t'/x])) \\ &\quad \text{د } \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(f(\dots)) \text{ د تعريف له مخې} \\ &= f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t')/x]}^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t')/x]}^{\mathcal{M}}(t_n)) \\ &\quad \text{د استقرايي فرض له مخې} \\ &= \text{Val}_{s[\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t')/x]}^{\mathcal{M}}(f(\dots)) \text{ د تعريف له مخې} \end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-024) سرچينه د دې محاسبې د لومړۍ کړنې په پای او د دويمې کړنې په پيل کښې د مساوات نښه دوه ځله راوړي؛ دلته زياته نښه لرې شوې ده.

□

قضيه 16.30. فرض کړئ $\mathcal{M}$ جوړښت، $A!$ فارمول، t' يو ترم، او s يوه متغير کومارنه ده. نو $\mathcal{M}, s \models A[t'/x]$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}, s[\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t')/x] \models A!$

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 16.31، 16.30 ثابته کړئ.

د **قضيه 16.29** او **16.30** مطلب دا دے. فرض کړئ يو ترم t يا فارمول $A!$ ، او بل ترم t' لرو، او غواړو د $t[t'/x]$ ارزښت، يا دا معلوم کړو چې $A[t'/x]!$ د متغير کومارنې s په نسبت په جوړښت $\mathcal{M}$ کښې صدق کوي که نه. يوې لارې کښې لومړۍ تعويض ترسره کول، او بيا د $\mathcal{M}$ او s په نسبت ارزښت يا صدق څېړل شو. بلې لارې کښې لومړۍ په $\mathcal{M}$ کښې د s په نسبت د t' ارزښت $m = \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t')$ معلومول، بيا د متغير کومارنه په $s[m/x]$ بدلول، او ورپسې په $\mathcal{M}$ کښې د $s[m/x]$ په نسبت د t ارزښت، يا $A! \models \mathcal{M}, s[m/x]$ څېړل شو. **قضيه 16.29** او **16.30** تضمينوي چې په دواړو لارو کښې ځواب يو شان وي.

16.7 معنایي مفهومونه

د لومړۍ درجې ژبو د جوړښتونه د تعریف په لرلو سره، د جملو ځینې بنسټیز معنایي خاصیتونه او د هغو تر منځ اړیکې تعریفول شوې. تر ټولو ساده ئې د جملې د اعتبار مفهوم دے. یوه جمله هله معتبره ده چې په هر جوړښت کېنې صدق وکړي. معتبرې جملې هغه دي چې د هغو د نامنطقي سمبولونو د تفسیر له څرنګوالي پرته صدق کوي. ځکه معتبرې جملې منطقي حقیقتونه هم بلل کېږي—هغوی په هر جوړښت کېنې رښتیا دي، یعنې صدق کوي؛ نو رښتینولي ئې یوازې په هغو کېنې پر راغلو منطقي سمبولونو او د هغو پر نحوي جوړښت پورې تړلې ده، پر نامنطقي سمبولونو یا د هغو پر تفسیر نه.

تعریف 16.32 (اعتبار). جمله A هله معتبره ده، $\models A$ ، چې د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \models A$.

تعریف 16.33 (استلزام). د جملو سټ Γ هله جمله A لازمي، $\Gamma \models A$ ، چې د هر هغه جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره چې $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، $\mathcal{M} \models A$ هم وي.

تعریف 16.34 (د صدق وړتیا). د جملو سټ Γ هله د صدق وړ دے چې د کوم جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي. که Γ د صدق وړ نه وي، د صدق نه وړ بلل کېږي.

قضیه 16.35. جمله A هله او یوازې هله معتبره ده چې د جملو د هر سټ Γ دپاره $\Gamma \models A$.

ثبوت. د مخامخ لور دپاره، فرض کړئ A معتبره ده، او Γ د جملو یو سټ دے. $\mathcal{M}$ داسې جوړښت ونیسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma$. څرنګه چې A معتبره ده، $\mathcal{M} \models A$ ؛ نو $\Gamma \models A$.

د شاتني لور د عکس نقیض دپاره، فرض کړئ A نامعتبره ده؛ نو داسې جوړښت $\mathcal{M}$ شته چې $\mathcal{M} \not\models A$. که چېرې $\Gamma = \{T\}$ وي، T د اعتبار له کبله $\mathcal{M} \models \Gamma$. ځکه داسې جوړښت $\mathcal{M}$ شته چې $\mathcal{M} \models \Gamma$ خو $\mathcal{M} \not\models A$ ؛ نو $\Gamma \not\models A$ ، نه لازمي. □

قضیه 16.36. $\Gamma \models A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg A\}$ د صدق نه وړ وي.

ثبوت. د مخامخ لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \models A$ ، او د عکس فرض وکړئ چې داسې جوړښت $\mathcal{M}$ شته چې $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{\neg A\}$. څرنګه چې $\mathcal{M} \models \Gamma$ او $\mathcal{M} \models A$ ، له بلې خوا، له $\mathcal{M} \models \neg A$ څخه $\mathcal{M} \not\models A$ ؛ نو هم $\mathcal{M} \models A$ او هم $\mathcal{M} \not\models A$ ، لرو، چې تناقض دے. ځکه داسې جوړښت $\mathcal{M}$ نه شي موجودېدے؛ نو $\Gamma \cup \{\neg A\}$ د صدق نه وړ دے.

د شاتني لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg A\}$ د صدق نه وړ دے. نو د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره یا $\mathcal{M} \models A$ ، یا $\mathcal{M} \not\models A$. ځکه د هر هغه جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره چې $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، $\mathcal{M} \models A$ ؛ نو $\Gamma \models A$. □

تمرین 16.37. 1. وښیئ چې $\Gamma \models \perp$ هله او یوازې هله چې Γ د صدق نه وړ وي.

2. وښیئ چې $\Gamma \cup \{A\} \models \perp$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \models \neg A$.

3. فرض کړئ c په A یا Γ کېنې نه راځي. وښیئ چې $\Gamma \models \forall x!A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \models A[c/x]$.

قضیه 16.38. که $\Gamma \subseteq \Gamma'$ او $\Gamma \models A$ وي، نو $\Gamma' \models A$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \subseteq \Gamma'$ او $\Gamma \models A$. $\mathcal{M}$ داسې جوړښت ونیسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma'$ ؛ نو $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، او له $\Gamma \models A$ څخه $\mathcal{M} \models A$ اخلو. ځکه هر کله چې $\mathcal{M} \models \Gamma'$ وي، $\mathcal{M} \models A$ ؛ نو $\Gamma' \models A$. □

قضیه 16.39 (د معنایي استنتاج قضیه). $\Gamma \cup \{A\} \models B$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \models A \rightarrow B$.

ثبوت. د مخامخ لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \cup \{!A\} \models !B$ ، او داسې جوړښت ونیسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، که $\mathcal{M} \models !A$ وي، نو $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{!A\}$ ؛ او څرنګه چې $\Gamma \cup \{!A\} \models !B$ ، لازمي، $\mathcal{M} \models !B$ ، ځکه $\mathcal{M} \models !A \rightarrow !B$ ، نو $\Gamma \models !A \rightarrow !B$.
د شاتني لور دپاره، فرض کړئ $\Gamma \models !A \rightarrow !B$ ، او داسې جوړښت ونیسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{!A\}$ ، بیا $\mathcal{M} \models \Gamma$ ؛ نو $\mathcal{M} \models !A \rightarrow !B$ ، او له $\mathcal{M} \models !A$ څخه $\mathcal{M} \models !B$ ، ځکه هر کله چې $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{!A\}$ وي، $\mathcal{M} \models !B$ ؛ نو $\Gamma \cup \{!A\} \models !B$.
□

قضیه 16.40. فرض کړئ $\mathcal{M}$ جوړښت، $A(x)$ داسې فارمول دے چې یو ازاد متغیر x لري، او t یو ترلے ترم دے. نو:

$$1. A(t) \models \exists x A(x)$$

$$2. \forall x A(x) \models A(t)$$

ثبوت. 1. فرض کړئ $\mathcal{M} \models A(t)$ ، داسې متغیر کومارنه ونیسئ چې $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$ ، څرنګه چې $A(t)$ ترلے فارمول ده، $\mathcal{M}, s \models A(t)$ ، د 16.30 له مخې $\mathcal{M}, s \models A(x)$ ، د 16.22 له مخې $\mathcal{M} \models \exists x A(x)$.
2. فرض کړئ $\mathcal{M} \models \forall x A(x)$ ، داسې متغیر کومارنه ونیسئ چې $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$ ، د 16.22 له مخې $\mathcal{M}, s \models A(x)$ ، د 16.30 له مخې $\mathcal{M}, s \models A(t)$ ، څرنګه چې $A(t)$ ترلے فارمول ده، د 16.20 له مخې $\mathcal{M} \models A(t)$.
□

باب 17

تیوری او د هغو مدلونه

17.1 پېژندنه

د بدیهی طریقې وده د ساینس په تاریخ کې یوه ستره لاسته راوړنه ده، او د ریاضۍ په تاریخ کې ځانګړې اهمیت لري. د یوه ډګر بدیهی وده ډېرې پوښتنې روښانوي: دا ډګر د څه په باب ده؟ تر ټولو بنسټیز مفاهیم یې کوم دي؟ هغوی له یو بل سره څنګه تړلي دي؟ ایا د ډګر ټول مفاهیم د دغو بنسټیزو مفاهیمو له مخې تعریفېدای شي؟ دا مفاهیم د کومو قوانینو پېروي کوي، او باید یې وکړي؟ بدیهی طریقه او منطق د یو بل دپاره جوړ شوي دي. صوري منطق د بدیهی تیوريو د جوړولو، د تیوري له بدیهی اصولو څخه په کره ټاکلې طریقه د قضیو د ثابتولو، او د بدیهی اصولو پوره کوونکو ټولو نظامونو د خاصیتونو د منظمې څېړنې وسیلې برابرې.

تعریف 17.1. د تړلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله بند دے چې هر کله $\Gamma \models A$ وي، نو $A \in \Gamma$ هم وي. د تړلي فارمولونه د یوه سټ Γ بندښت دا دے: $\{A : \Gamma \models A\}$.

وايو چې Γ د جملو د یوه سټ Δ له خوا په بدیهی اصولو ټاکل شوے دے، که Γ د Δ بندښت وي.

یوه بدیهی تیوري د هغو جملو سټ ګلے شو چې د هغې د بدیهی اصولو سټ Δ په بدیهی اصولو ټاکلے وي. په بل عبارت، کله چې د لومړۍ درجې ژبه د هغه ساینس د بنسټیزو مفاهیمو دپاره غیر منطقي سمبولونه ولري چې غواړو په بدیهی ډول یې وڅېړو، او ورسره د تړلي فارمولونه داسې سټ ولرو چې د ساینس بنسټیز قوانین بیانوي، نو تیوري په دې ژبه کې د ټولو هغو تړلي فارمولونه په توګه انځورولے شو چې له بدیهی اصولو څخه لازمېږي. دا لړۍ له هغو ساده بېلګو څخه، چې یوازې یو بنسټیز مفهوم او ساده بدیهی اصول لري، لکه د جزوي ترتیبونو تیوري، ترتیبي میخانیک غوندې پېچلو تیوريو پورې څېړي.

لاندې مهم منطقي حقیقتونه دي چې دغه صوري چلند د بدیهی طریقې دپاره دومره ارزښتمن کوي. فرض کړئ Γ د یوې تیوري بدیهی نظام، یعنې د جملو یو سټ دے.

1. په کره توګه ویلے شو چې یو بدیهی نظام د جوړښتونه مطلوبه ټولګه کله رانغاړي. یعنې که د جوړښتونه یوه ټاکلې ټولګه مو په پام کېنې وي، بدیهی نظام Γ هغه هله او یوازې هله په بریالیتوب رانغاړي چې مطلوب جوړښتونه کټ مټ هغه $\mathcal{M}$ وي چې $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي.

2. کېدے شي په دې کار کې ځکه پاتې راشو چې داسې $\mathcal{M}$ وي چې $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، خو $\mathcal{M}$ زموږ له مطلوبو جوړښتونه څخه نه وي. دا ښایي دې ته مو اړ کړي چې داسې بدیهی اصول ورزیات کړو چې په $\mathcal{M}$ کېنې رښتوني نه وي.

3. که لږ تر لږه په دې کېنې بریالي یو چې Γ په ټولو مطلوبو جوړښتونه کېنې رښتونه وي، نو هر کله چې $\Gamma \models A$ وي، جمله A هم په ټولو مطلوبو جوړښتونه کېنې رښتوني ده. نو د منطقي وسیلو (لکه د اشتقاق طریقو) په کارولو ښودلے شو چې جملې په ټولو مطلوبو جوړښتونه کېنې رښتوني دي: بس دا وښیو چې له بدیهی اصولو څخه لازمېږي.

4. کله کله مو کوم مطلوب جوړښتونه په پام کېنې نه وي، بلکې له خپلو بدیهی اصولو پیل کوو: ځینې بنسټیز مفاهیم اخلو چې غواړو ټاکلي قوانین پوره کړي، او دغه قوانین په یوه بدیهی نظام کېنې ثبتوو. سمدستي دا تصدیق کول غواړو چې بدیهی اصول یو بل نه

نقضوي، که ئې وکړي، هېڅ مفاهیم دغه قوانین نه شي پوره کولې او تیوري موناسازکاره جوړه کړې ده. د Γ د یوه مدل په موندلو تصدیق کولې شو چې داسې نه دي شوي. او که تیوري مو مدلوله ولري، په منطقي طریقو ئې څېړلې او مدلوله هم جوړولې شو.

5. د بدیهي اصولو استقلال هم یوه مهمه پوښتنه ده. کېدای شي یو بدیهي اصل په رښتیا د نورو پایله وي او له همدې امله زائد وي. ثابتولې شو چې په Γ کېنې بدیهي اصل A زائد دے، که $\Gamma \setminus \{A\} \models A$ ثابت کړو. دا هم ثابتولې شو چې بدیهي اصل زائد نه دے، که وښیو چې $\{\neg A\} \cup (\Gamma \setminus \{A\})$ د صدق وړ دے. د بېلګې په توګه، د هندسې د نورو بدیهي اصولو څخه د موازي کړنې د اصل استقلال همداسې ښودل شوی و.

6. بله مهمه پوښتنه په یوه تیوري کېنې د مفاهیمو د تعریفېدنې په باب ده: د ژبې ټاکنه دا ټاکنې چې د تیوري مدلوله له څه جوړ وي. خو د تیوري هر اړخ لازم نه دے چې په مدلولو کېنې جلا استازیتوب ولري. مثلاً هر ترتیب $\leq$ ورسره سم سخت ترتیب $<$ ټاکنې چې یو راکړل شي، بل ترې تعریفولې شو. نو د داسې ترتیب لرونکې تیوري په مدل کېنې د اړوند سخت ترتیب جلا شتون لازم نه دے. په عمومي ډول، یوه اړیکه د نورو له مخې کله تعریفېدای شي؟ یوه اړیکه د نورو له مخې کله نه شي تعریفېدای (او له همدې امله باید د ژبې په بنسټیزو سمبولونو کېنې ورزیاته شي)؟

17.2 د جوړښتونه د خاصیتونو بیانول

د تابعو او اړیکو شرطونه، یا په لا عمومي ډول دا خبره بیانول چې په یوه جوړښت کېنې تابعې او اړیکې دغه شرطونه پوره کوي، ډېر ځله کنټر او مهم وي. د بېلګې په توګه، غواړو د یوې ژبې هغه جوړښتونه چې پریدیکاتونه پکښې زموږ مطلوبه “معنی” لري، له هغو جوړښتونو څخه بېل کړو چې داسې نه دي. البته بشپړه ازادي لرو چې خپل “مطلوب” جوړښتونه وټاکو، مثلاً ویلې شو چې د پریدیکات $\leq$ تفسیر باید یو ترتیب وي، یا یوازې د L له هغو تفسیرونو سره دلچسپي لرو چې ساحه ئې له ستونو جوړه وي او $\in$ د “د غړې په توګه شتون” په اړیکه تفسیر شي. خو ایا دا د ژبې په ترلي فارمولونه کولې شو؟ په بل عبارت، پر جوړښت $\mathcal{M}$ کوم شرطونه د $\mathcal{M}$ د ژبې په یوه ترلې فارمول (یا ښايي د ترلي فارمولونه په یوه سټ) بیانولې شو؟ ځینې شرطونه نه شو بیانولې. مثلاً د L_A داسې هېڅ جمله نشته چې یوازې په هغه جوړښت $\mathcal{M}$ کېنې رښتوني وي چې $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ وي. “ساحه یوازې طبیعي عددونه لري” نه شو بیانولې. خو ښايي د جوړښتونه ځینې “جوړښتي خاصیتونه” بیانولې شو. د جوړښتونه کوم خاصیتونه په ترلي فارمولونه بیانولې شو؟ یا په بله وینا، د جوړښتونه کومې ټولګې د هغو جوړښتونو په توګه بیانولې شو چې یوه ترلې فارمول (یا د ترلي فارمولونه یو سټ) رښتوني کوي؟

تعریف 17.2 (د یوه سټ مدل). فرض کړئ Γ په ژبه L کېنې د ترلي فارمولونه یو سټ دے. وایو چې جوړښت $\mathcal{M}$ د Γ مدل دے، که د هر $A \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models A$ وي.

بېلګه 17.3. جمله $\forall x x \leq x$ په $\mathcal{M}$ کېنې هله او یوازې هله رښتوني ده چې $\leq^{\mathcal{M}}$ انعکاسي اړیکه وي. جمله $\forall x \forall y ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y)$ په $\mathcal{M}$ کېنې هله او یوازې هله رښتوني ده چې $\leq^{\mathcal{M}}$ ضد متناظره وي. جمله $\forall x \forall y \forall z ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z)$ په $\mathcal{M}$ کېنې هله او یوازې هله رښتوني ده چې $\leq^{\mathcal{M}}$ انتقالي وي. نو د لاندې سټ مدلوله

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall x x \leq x, \\ \forall x \forall y ((x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y), \\ \forall x \forall y \forall z ((x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z) \end{array} \right\}$$

کټ مټ هغه جوړښتونه دي چې $\leq^{\mathcal{M}}$ پکښې انعکاسي، ضد متناظره او انتقالي، یعنې جزوي ترتیب وي. له همدې امله، دا د جزوي ترتیبونو د لومړۍ درجې تیوري د بدیهي اصولو په توګه اخستلې شو.

17.3 د لومړۍ درجې تیوریو بېلګې

بېلګه 17.4. په ژبه $\mathcal{L}_<$ کېنې د سختو خطي ترتیبونو تیوري د لاندې سټ له خوا په بدیهي اصولو ټاکل کېږي:

$$\{ \begin{aligned} & \forall x \neg x < x, \\ & \forall x \forall y ((x < y \vee y < x) \vee x = y), \\ & \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z) \end{aligned} \}$$

دا مطلوب جوړښتونه په بشپړ ډول رانغاړي: هر سخت خطي ترتیب د دې بدیهي نظام مدل دے؛ او برعکس، که R پر یوه سټ X خطي ترتیب وي، نو هغه جوړښت $\mathfrak{M}$ چې $|\mathfrak{M}| = X$ او $\mathfrak{M} <^R$ لري، د دې تیورۍ مدل دے.

بېلګه 17.5. د کروېونو تیوري په هغه ژبه کېنې چې 1 (ثابت سمبول) او $\cdot$ (دوه ځاییزه تابع) لري، د لاندې فورمولونو له خوا په بدیهي اصولو ټاکل کېږي:

$$\begin{aligned} \forall x (x \cdot 1) &= x \\ \forall x \forall y \forall z (x \cdot (y \cdot z)) &= ((x \cdot y) \cdot z) \\ \forall x \exists y (x \cdot y) &= 1 \end{aligned}$$

بېلګه 17.6. د پيانو د حساب تیوري د حساب په ژبه $\mathcal{L}_A$ کېنې د لاندې جملو له خوا په بدیهي اصولو ټاکل کېږي-

$$\begin{aligned} \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \\ \forall x 0 \neq x' \\ \forall x (x + 0) &= x \\ \forall x \forall y (x + y') &= (x + y)' \\ \forall x (x \times 0) &= 0 \\ \forall x \forall y (x \times y') &= ((x \times y) + x) \\ \forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) &= y) \end{aligned}$$

او ورسره د لاندې ښې ټولې جملې

$$(!A(0) \wedge \forall x (!A(x) \rightarrow !A(x')))) \rightarrow \forall x !A(x)$$

ځکه چې د وروستۍ ښې نامتناهي ډېرې جملې شته، دا بدیهي نظام نامتناهي دے. وروستۍ بڼه د استقرا شېما بلل کېږي. (په اصل کېنې د استقرا شېما تر هغه لږه پېچلې ده چې دلته مو ښودلې ده.) وروستۍ بدیهي اصل د $<$ یو صریح تعریف دے.

بېلګه 17.7. د خالصو ستونو تیوري د ریاضۍ په بنسټونو (او فلسفه) کېنې مهمه ونډه لري. یو سټ هله خالص دے چې ټول غړي ئې هم خالص ستونه وي. نو تش سټ خالص کتل کېږي، خو هغه سټ چې کوم داسې څیز ئې غږے وي چې خپله سټ نه وي، خالص نه دے. په دې توګه خالص ستونه یوازې له تش سټ څخه، ئې له “غیرستي بنسټیزو عناصرو”، جوړ شوي ستونه دي؛ یعنې داسې څیزونه نه لري چې خپله ستونه نه وي.

لاندې فورمولونه د خالصو ستونو د یوې تیورۍ بدیهي نظام کتل کېدے شي:

$$\begin{aligned} \exists x \neg \exists y y \in x \\ \forall x \forall y (\forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \rightarrow x = y) \\ \forall x \forall y \exists z \forall u (u \in z \leftrightarrow (u = x \vee u = y)) \\ \forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow \exists u (z \in u \wedge u \in x)) \end{aligned}$$

او ورسره د لاندې بڼې ټولې جملې

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow A(y))$$

لومړۍ بډیه اصل وایي چې داسې یو سټ شته چې هېڅ غړي نه لري (یعنې $\emptyset$ شته)؛ دویم وایي چې ستونه امتدادي دي؛ درېم وایي چې د هر دوو ستونو X او Y دپاره سټ $\{X, Y\}$ شته؛ څلورم وایي چې د هر سټ X دپاره سټ UX شته، چېرته چې UX د X د ټولو عناصرو اتحاد ده.

وروستۍ یادې شوې ټرلي فارمولونه په ګډه د ساده ادراک شېما بلل کېږي. په اصل کېنې وایي چې د هر $A(x)$ دپاره سټ $\{x : A(x)\}$ شته—نو په لومړي نظر یو رښتونه، کټور او ښايي حتا ضروري بډیه اصل ښکاري. “ساده” ځکه بلل کېږي چې په پایله کېنې دا تیوري د صدق وړ نه پرېږدي: که $A(y)$ د $y \in y$ په توګه واخلئ، لاندې ټرلې فارمول لاس ته راځي:

$$\exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y)$$

او دا ټرلې فارمول په هېڅ جوړښت کېنې نه صدق کوي.

بېلګه 17.8. د مېرېلوژۍ یا جزیوې په ډګر کېنې د برخه والي اړیکه بنسټیزه اړیکه ده. لکه د ستونو د تیوريو په شان، د برخه والي داسې تیوري هم شته چې د دې اړیکې بېلابېل (او کله کله یو بل سره ټکر لرونکي) تصورات په بډیه اصولو ټاکي.

د مېرېلوژۍ ژبه یو دوه ځاییز اړوند سمبول P لري، او $P(x, y)$ دا “معنی” لري چې x د y یوه برخه ده. کله چې دا تفسیر په پام کېنې ولرو، د دې ژبې جوړښت د برخه والي جوړښت بلل کېږي. البته د یوه دوه ځاییز اړوند هر جوړښت په رښتیا د دې نوم وړ نه ده. د “برخه والي” د راغلارلو دپاره باید P^M ځینې شرطونه پوره کړي، او دا شرطونه د برخه والي د تیوري د بډیه اصولو په توګه ټاکل شوي. مثلاً برخه والې پر څیزونو جزوي ترتیب ده: هر څیز د خپل ځان (که څه هم غیر حقیقي) برخه ده؛ دوه بېل څیزونه د یو بل برخې نه شي کېدای؛ او د یوه څیز د برخې برخه خپله هم د هغه څیز برخه ده. پام وکړئ چې په دې معنی “د یوه څیز برخه ده” له “فرعي سټ ده” سره ورته ده، خو له “عنصر ده” سره نه ده ورته، ځکه عنصرول نه انعکاسي دي او نه انتقالی.

$$\forall x P(x, x)$$

$$\forall x \forall y ((P(x, y) \wedge P(y, x)) \rightarrow x = y)$$

$$\forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z))$$

سربېره پر دې، هر دوه څیزونه مېرېلوژیکي مجموعه لري (داسې څیز چې دغه دواړه څیزونه یې برخې وي او په دې لحاظ تر ټولو کوچنۍ وي).

$$\forall x \forall y \exists z \forall u (P(z, u) \leftrightarrow (P(x, u) \wedge P(y, u)))$$

دا یوازې د برخه والي ځینې هغه بنسټیز اصول دي چې مابعدالطبیعتپوهان یې خبرې. خو نور اصول ډېر ژر داسې پېچلي شي چې تر ځینو تعریف شویو اړیکو وړاندې یې جوړول یا لیکل ستونزمن وي. مثلاً په مېرېلوژۍ کېنې زیاتره دلچسپي لرونکي مابعدالطبیعتپوهان لاندې اصل هم معتبر ګڼي: هر کله چې څیز x حقیقي برخه y ولري، نو داسې برخه z هم لري چې له y سره هېڅ ګډه برخه ونه لري، او د y او z امتزاج x وي.

17.4 په جوړښت کېنې د اړیکو بیانول

د فارمولونه یوه اصلي ګټه دا ده چې په جوړښت $\mathcal{M}$ کېنې د $\mathcal{M}$ د ژبې $\mathcal{L}$ د بنسټیزو سمبولونو له مخې خاصیتونه او اړیکې بیانوي. مطلب مو دا ده: د $\mathcal{M}$ د تعریف ساحه د څیزونو یو سټ ده. ثابت سمبولونه، تابعې او پریدیکاتونه په $\mathcal{M}$ کېنې په ترتیب سره د $|\mathcal{M}|$ په ځینو څیزونو، پر $|\mathcal{M}|$ تابعو او پر $|\mathcal{M}|$ اړیکو تفسیرېږي. مثلاً که A_0^2 په $\mathcal{L}$ کېنې وي، نو $\mathcal{M}$ ورته اړیکه $R = A_0^{2\mathcal{M}}$ ګوماري. بیا فارمول $A_0^2(v_1, v_2)$ همدغه اړیکه په لاندې معنی بیانوي: که یوه متغیر-ګومارنه s ، v_1 له $|\mathcal{M}|$ او v_2 له $|\mathcal{M}|$ سره وتري، نو

$$Rab \quad \mathcal{M}, s \models A_0^2(v_1, v_2).$$

پام وکړئ چې دلته باید متغیر-کومارنې شاملې کړو: یوازې دا نه شو ویلې چې “ Rab ” هله او یوازې هله چې $\mathcal{M} \models A_0^2(a, b)$ ، ځکه a او b زموږ د ژبې سمبولونه نه، بلکې د $|\mathcal{M}|$ غړي دي.

موږ یوازې اتومي فارمولونه نه لرو، بلکې په منطقي نښلونکو او سورونو کې یوځای کول شوي، نو لا پېچلي فارمولونه نورې هغه اړیکې تعریفولې شي چې نېغ په نېغه په $\mathcal{M}$ کېنې نه دي شاملې. موږ دې ته گورو چې دا څنګه کېږي، او په ځانګړي ډول په جوړښت کېنې کومې اړیکې تعریفولې شو.

تعریف 17.9. فرض کړئ $A(v_1, \dots, v_n)$ د $\mathcal{L}$ داسې فارمول دے چې یوازې $v_1, \dots, v_n$ پکښې ازاد راځي، او $\mathcal{M}$ د $\mathcal{L}$ یو جوړښت دے. $A(v_1, \dots, v_n)$ هله او یوازې هله اړیکه $R \subseteq |\mathcal{M}|^n$ بیانوي چې

$$Ra_1 \dots a_n \quad \mathcal{M}, s \models A(v_1, \dots, v_n)$$

د هرې داسې متغیر-کومارنې s دپاره چې $s(v_i) = a_i$ ($i = 1, \dots, n$) وي.

بېلګه 17.10. د حساب په معیاري مدل $\mathcal{N}$ کېنې فارمول $v_1 < v_2 \vee v_1 = v_2$ پر $\mathbb{N}$ د $\leq$ اړیکه بیانوي. فارمول $v_2 = v_1'$ د ناستي اړیکه بیانوي، یعنې هغه $R \subseteq \mathbb{N}^2$ چې Rnm هله وي چې m د n ناسته وي. فارمول $v_1 = v_2'$ د مخکښ اړیکه بیانوي. دواړه فارمولونه $\exists v_3 (v_1 + v_3' = v_2) \vee \exists v_3 (v_3 \neq 0 \wedge v_2 = (v_1 + v_3))$ د $\leq$ اړیکه بیانوي. د دې معنی دا ده چې اړوند سمبول $<$ په رښتیا د حساب په ژبه کېنې ژاند دے؛ تعریفېدے شي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-025) سرچینې د دویم تعریفوونکي فارمول له وروستي متغیر څخه د څیز-ژبې بڼه غورځولې وه؛ دلته هغه بڼه د همدې فارمول له نورو متغیرونو سره یو شان بېرته راوستل شوې ده.

دا مفکوره یوازې په ځانګړو جوړښتونه کېنې په زړه پورې نه ده، بلکې هر کله مهمه ده چې یوه ژبه د یوه یا څو مطلوبو مدلونو د بیانولو دپاره کاروو، یعنې تیوري څېړو. دغه تیوري زیاتره یوازې څو پریدیکاتونه د بنسټیزو سمبولونو په توګه لري، خو په هغه ساحه کېنې چې بیانوي ئې، ډېرې نورې اړیکې مهمې ونډې لري. که دغه نورې اړیکې د ژبې د بنسټیزو پریدیکاتونه د تفسیروونکو اړیکو له مخې په منظمه توګه بیانېدے شي، وایو چې هغوی په ژبه کېنې تعریفولې شو.

تمرین 17.11. په $\mathcal{L}_A$ کېنې داسې فارمولونه ومومئ چې لاندې اړیکې تعریف کړي:

1. i او j تر منځ دے؛

2. m, n په پوره ډول وېشي (یعنې m د n مضرب دے)؛

3. n اول عدد دے (یعنې له 1 او n پرته بل هېڅ عدد n په پوره ډول نه وېشي).

تمرین 17.12. فرض کړئ فارمول $A(v_1, v_2)$ په جوړښت $\mathcal{M}$ کېنې اړیکه $R \subseteq |\mathcal{M}|^2$ بیانوي. داسې فارمولونه ومومئ چې لاندې اړیکې بیان کړي:

1. R د معکوسه اړیکه R^{-1} ؛

2. نسبي حاصل ضرب $R | R$ ؛

ایا د R د انتقالي بندښت R^+ د بیانولو کومه طریقه موندلے شي؟

تمرین 17.13. فرض کړئ $\mathcal{L}$ هغه ژبه ده چې یوازې دوه ځاییز اړوند سمبول $<$ لري (بل هېڅ ثابت سمبولونه، تابعې یا پریدیکاتونه نه لري) — البته له (پرتله) — فرض کړئ $\mathcal{N}$ داسې جوړښت دے چې $|\mathcal{N}| = \mathbb{N}$ ، او $\mathcal{N} = \{ \langle n, m \rangle : n < m \}$. لاندې ثابت کړئ:

1. $\{0\}$ په $\mathcal{N}$ کېنې تعریفېدے شي؛

2. $\{1\}$ په $\mathcal{N}$ کېنې تعریفېدے شي؛

3. $\{2\}$ په $\mathcal{N}$ کېنې تعریفېدے شي؛

4. د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره سټ $\{n\}$ په $\mathcal{M}$ کېنې تعریفېدې شي؛

5. د $|\mathcal{M}|$ هر متناهي فرعي سټ په $\mathcal{M}$ کېنې تعریفېدې شي؛

6. د $|\mathcal{M}|$ هر د متناهي متمم لرونکې فرعي سټ په $\mathcal{M}$ کېنې تعریفېدې شي (چېرته چې $X \subseteq \mathbb{N}$ هله او یوازې هله د متناهي متمم لرونکې دے چې $X \setminus \mathbb{N}$ متناهي وي).

17.5 د ستونو تیوري

د ریاضی کابو ټولې برخې د ستونو په تیوري کېنې جوړېدې شي. په دې تیوري کېنې د ریاضی جوړول څو کارونه غواړي. لومړی، $\in$ اړیکې دپاره د بدیهي اصولو یو سټ غواړي. بېلابېل بدیهي نظامونه جوړ شوي دي چې کله کله د $\in$ په باب یو بل سره ټکر لرونکي خاصیتونه لري. د ZFC په نوم بدیهي نظام، یعنې د انتخاب له بدیهي اصل سره د زرمو-فرېنکل سټ تیوري، ځانګړې مقام لري: دا تر بل هر بدیهي نظام ډېر کارول کېږي او څېړل کېږي، ځکه بدیهي اصول ئې د کابو ټولو هغو خبرو د ثبوت دپاره بس کېږي چې ریاضیپوهان ئې ثابتول غواړي. خو د دې له څرګندولو وړاندې باید لومړی روښانه کړو چې د ریاضیپوهانو مطلوبې خبرې اصلاً څنګه بیانولې شو. د پیل دپاره، ژبه هېڅ ثابت سمبولونه یا تابعې نه لري؛ نو په لومړي نظر دا روښانه نه ده چې د ځانګړو ستونو (لکه $\emptyset$ یا $\mathbb{N}$)، پر ستونو د عملونو (لکه $X \cup Y$ او $\wp(X)$)، یا لا د هغو جوړښتونو په باب څنګه خبرې وکړو چې له ستونو پرته نور څیزونه هم رانغاړي، لکه اړیکې او تابعې.

په پیل کېنې، “عنصر دے” یوازېنۍ مهمه اړیکه نه ده؛ “فرعي سټ دے” کابو همدومره مهمه ښکاري. خو “فرعي سټ دے” د “عنصر دے” له مخې تعریفولې شو. د دې دپاره باید د سټ تیوري په ژبه کېنې داسې فارمول $A(x, y)$ ومومو چې د ستونو یوه جوړه $\langle X, Y \rangle$ هله او یوازې هله پوره کړي چې $X \subseteq Y$ وي. خو X هله او یوازې هله د Y فرعي سټ دے چې د X ټول غړي د Y هم غړي وي. نو په لاندې فارمول تعریفولې شو:

$$\forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$$

اوس چې هر کله په یوه فارمول کېنې اړیکه $\subseteq$ کارول غواړو، د هغې پر ځای همدا فارمول کارولې شو (په دې شرط چې x او y په مناسب ډول بدل او ترلے متغیر z د اړتیا پر وخت بیا ونومول شي). مثلاً د ستونو امتدادیتوب وایي چې که هر دوه ستونه x او y په دوه اړخیزه توګه په یو بل کېنې شامل وي، نو x او y باید هماغه یو سټ وي. دا په $\forall x \forall y ((x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \rightarrow x = y)$ بیانېدې شي؛ یا که $\subseteq$ په پورته تعریف بدل کړو، په لاندې ډول:

$$\forall x \forall y ((\forall z (z \in x \rightarrow z \in y) \wedge \forall z (z \in y \rightarrow z \in x)) \rightarrow x = y).$$

دا په رښتیا د ZFC یو بدیهي اصل، یعنې “د امتدادیتوب بدیهي اصل” دے.

د $\emptyset$ دپاره هېڅ ثابت سمبول نشته، خو “ x تش دے” په $\neg \exists y y \in x$ بیانولې شو. بیا “ $\emptyset$ شته” په ترلے فارمول $\exists x \neg \exists y y \in x$ اوږي. دا د ZFC یو بل بدیهي اصل دے. (پام وکړئ چې د امتدادیتوب بدیهي اصل دا لازمي چې یوازې یو تش سټ وي.) هر کله چې د سټ تیوري په ژبه کېنې د $\emptyset$ په باب خبرې کول غواړو، داسې به لیکو: “داسې یو سټ شته چې تش دے او ...” د بېلګې په توګه، دا حقیقت چې $\emptyset$ د هر سټ فرعي سټ دے، په لاندې ډول بیانولې شو:

$$\exists x (\neg \exists y y \in x \wedge \forall z x \subseteq z)$$

چېرته چې، البته، $x \subseteq z$ به بیا په خپل تعریف بدلېږي.

د ستونو د عملونو، لکه $X \cup Y$ او $\wp(X)$ ، په باب د خبرو دپاره ورته چل کارول پکار دي. د سټ تیوري په ژبه کېنې د تابعې سمبولونه نشته، خو تابعوي اړیکې $X \cup Y = Z$ او $\wp(X) = Y$ په لاندې ډول بیانولې شو:

$$\forall u ((u \in x \vee u \in y) \leftrightarrow u \in z)$$

$$\forall u (u \subseteq x \leftrightarrow u \in y)$$

ځکه د $X \cup Y$ غړي کټ مټ هغه ستونه دي چې یا د X غړي وي یا د Y (یا د دواړو) غړي وي، او د $\wp(X)$ غړي کټ مټ د X فرعي ستونه دي. خو دا اجازه نه راکوي چې $x \cup y$ یا $\wp(x)$ د ترمونو په توګه وکاروو: یوازې ټول هغه فارمولونه کارولې شو چې

اړیکې $X \cup Y = Z$ او $\wp(X) = Y$ تعریفوي. په اصل کېنې لا دا هم نه پوهېږو چې دغه اړیکې کله هم پوره کېږي، یعنې نه پوهېږو چې اتحادونه او د فرعي ستونو ستونه تل شته. مثلاً ترلے فارمول $\forall x \exists y \wp(x) = y$ د ZFC یو بل بدیهي اصل دے (د فرعي ستونو د سټ بدیهي اصل).

اوس د مرتبو جوړو یا تابعو په باب خبرې څنگه کوو؟ دلته باید څرګنده کړو چې مرتبې جوړې او تابعې څنگه د ستونو ځانګړي ډولونه ګڼلے شو. د مرتبې جوړې $\langle x, y \rangle$ د تعریف یوه طریقه سټ $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ ده. خو لکه مخکېنې، داسې تابع نه شو معرفي کولے چې دغه سټ ونوموي؛ یوازې اړیکه $\langle x, y \rangle = z$ ، یعنې $\{\{x\}, \{x, y\}\} = z$ تعریفولے شو:

$$\forall u (u \in z \leftrightarrow (\forall v (v \in u \leftrightarrow v = x) \vee \forall v (v \in u \leftrightarrow (v = x \vee v = y))))$$

دا وایي چې د z غړي u کېت مټ هغه ستونه دي چې یا یوازې x ئې غړے وي، یا یوازې x او y ئې غړي وي (په بل عبارت، هغه ستونه چې یا له $\{x\}$ سره یو شان وي یا له $\{x, y\}$ سره). چې دا ولرو، نورې خبرې هم کولے شو؛ مثلاً $X \times Y = Z$:

$$\forall z (z \in Z \leftrightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = z))$$

تابعه $f: X \rightarrow Y$ د اړیکې $f(x) = y$ په توګه، یعنې د جوړو د سټ $\{\langle x, y \rangle : f(x) = y\}$ په توګه، ګڼلے شو. بیا ویلے شو چې سټ f له X څخه Y ته تابعه ده، که (الف) یوه اړیکه $\subseteq X \times Y$ وي؛ (ب) ټوله وي، یعنې د هر $x \in X$ دپاره داسې $y \in Y$ وي چې $\langle x, y \rangle \in f$ ؛ او (ج) تابعوي وي، یعنې هر کله چې $\langle x, y \rangle, \langle x, y' \rangle \in f$ وي، نو $y = y'$ وي (ځکه د تابعې قیمتونه باید یوازیني وي). نو " f " له X څخه Y ته تابعه ده" داسې لیکل کېدے شي:

$$\forall u (u \in f \rightarrow \exists x \exists y (x \in X \wedge y \in Y \wedge \langle x, y \rangle = u)) \wedge$$

$$\forall x (x \in X \rightarrow (\exists y (y \in Y \wedge \text{maps}(f, x, y))) \wedge$$

$$(\forall y \forall y' ((\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x, y')) \rightarrow y = y'))))$$

چېرته چې $\text{maps}(f, x, y)$ د $\exists v (v \in f \wedge \langle x, y \rangle = v)$ لندون دے (دا فارمول " $f(x) = y$ " بیانوي). د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-026) سرچینې په دواړو کلي شرطونو کېنې ساحوي قوسونه د شرط له پایلې وړاندې تړلي وو؛ دلته دواړه پایلې د خپلو کمیت ټاکونکو په ساحه کېنې راوستل شوې دي.

اوس دا هم ستونزمنه نه ده چې مثلاً بیان کړو چې $f: X \rightarrow Y$ یو پریو ده:

$$f: X \rightarrow Y \wedge \forall x \forall x' ((x \in X \wedge x' \in X \wedge$$

$$\exists y (\text{maps}(f, x, y) \wedge \text{maps}(f, x', y))) \rightarrow x = x')$$

تابعه $f: X \rightarrow Y$ هله او یوازې هله یو پریو ده چې هر کله f ، $x, x' \in X$ یوه y ته ولېږي، نو $x = x'$ وي. که دا فارمول په $\text{inj}(f, X, Y)$ لند کړو، لا له مخکېنې په داسې مقام کېنې یو چې د سټ تیورۍ په ژبه د کانتور د قضیې غوندې نه معمولي خبره بیان کړو: له $\wp(X)$ څخه X ته هېڅ یو پریو تابعه نشته:

$$\forall X \forall Y (\wp(X) = Y \rightarrow \neg \exists f \text{inj}(f, Y, X))$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-027) سرچینې دواړه کلي سوري د مشترک قیمت د شتون له شرط وړاندې تړلي وو؛ دلته د هماغو سورو تړونکي قوسونه د بشپړ شرطی فارمول تر پای وروسته راغلي دي.

کېدے شي څوک فکر وکړي چې سټ تیوري یو بل داسې بدیهي اصل غواړي چې د هر تعریفوونکي خاصیت دپاره د یوه سټ شتون تضمین کړي. که $A(x)$ د سټ تیورۍ داسې فارمول وي چې متغیر x پکېنې ازاد وي، لاندې ترلے فارمول په پام کېنې نیولے شو:

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow A(x)).$$

دا ترلے فارمول وایي چې داسې سټ y شته چې غړي ئې ټول او یوازې هغه x دي چې $A(x)$ پوره کوي. دا شېما "د ادراک اصل" بلل کېږي. ډېره ګټوره ښکاري؛ خو له بده مرغه ناسازګاره ده. $A(x) \equiv \neg x \in x$! واخلي؛ بیا د ادراک اصل وایي:

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x),$$

یعنې د ټولو هغو ستونو د سټ شتون وایي چې د خپل ځان غړې نه وي. داسې سټ نه شي موجودېده—دا د راسل تناقض ده. په اصل کېنې ZFC د دې اصل یوه محدوده—او سازگار—بڼه لري، یعنې د پلټون اصل:

$$\forall z \exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow (x \in z \wedge !A(x))).$$

تمرین 17.14. داسې اشتقاق ورکړئ چې لاندې ونښي، او په دې توګه ثابته کړئ چې د ادراک اصل ناسازگار ده:

$$\exists y \forall x (x \in y \leftrightarrow x \notin x) \vdash \perp.$$

ښایي لومړۍ د لاندې ثبوت کټور وي: $-(A \rightarrow \neg A) \wedge (\neg A \rightarrow A) \vdash \perp$.

17.6 د جوړښتونه د کچې بیانول

د جوړښتونو ځینې خاصیتونه د ژبې د غیرمنطقي سمبولونو له کارولو پرته هم بیانولې شو. مثلاً داسې ترې فارمولونه شته چې په جوړښت کېنې هله او یوازې هله رښتوني وي چې د تعریف ساحه، یعنې د جوړښت ساحه، لږ تر لږه، زیات نه زیات، یا کټ مټ یو ټاکلې شمېر n غړي ولري.

قضیه 17.15. ترلے فارمول

$$!A_{\geq n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n$$

$$\begin{aligned} & (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ & x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ & \vdots \\ & x_{n-1} \neq x_n) \end{aligned}$$

په جوړښت $\mathcal{M}$ کېنې هله او یوازې هله رښتوني ده چې $|\mathcal{M}|$ لږ تر لږه n غړي ولري. په پایله کېنې، $!A_{\geq n+1}$ په پایله کېنې، $\mathcal{M} \models \neg !A_{\geq n+1}$ هله او یوازې هله چې $|\mathcal{M}|$ زیات نه زیات n غړي ولري. د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-028) سرچینې د وجودي سور ټول ساحوي قوسونه د بېلولي له شرطونو وړاندې ترې وو او شرطونه ئې د سور له ساحې بهر پرېښي وو؛ دلته قوسونه د بشپړ شرط وروسته تړل شوي دي.

قضیه 17.16. ترلے فارمول

$$!A_{=n} \equiv \exists x_1 \exists x_2 \dots \exists x_n$$

$$\begin{aligned} & (x_1 \neq x_2 \wedge x_1 \neq x_3 \wedge x_1 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_1 \neq x_n \wedge \\ & x_2 \neq x_3 \wedge x_2 \neq x_4 \wedge \dots \wedge x_2 \neq x_n \wedge \\ & \vdots \\ & x_{n-1} \neq x_n \wedge \\ & \forall y (y = x_1 \vee \dots \vee y = x_n)) \end{aligned}$$

په جوړښت $\mathcal{M}$ کېنې هله او یوازې هله رښتوني ده چې $|\mathcal{M}|$ کټ مټ n غړي ولري. د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-029) سرچینې دلته هم وجودي سوري له خپل شرط وړاندې ترې وو؛ د وروستي کلي سور تړونکي قوسونه هم په سرچینه کېنې په نام ترتیب او یو زیات تړونکي قوس سره راغلي وو. دلته ټول شرط د وجودي سور په ساحه کېنې او د کلي سور قوسونه جوړې دي.

قضیه 17.17. یو جوړښت هله او یوازې هله نامتناهي ده چې د لاندې سټ مدل وي:

$$\{!A_{\geq 1}, !A_{\geq 2}, !A_{\geq 3}, \dots\}.$$

هېڅ يوه خالصه منطقي جمله نشته چې په M کېنې هله او يوازې هله رښتونې وي چې $|M|$ نامتناهي وي. خو له غير منطقي پريديکاتونه سره داسې ترلي فارمولونه ورکولې شو چې يوازې نامتناهي مدلونه لري (که څه هم هر نامتناهي جوړښت $\mathcal{U}$ مدل نه دے). د متناهي جوړښت خاصيت او د شمېر نه وړ جوړښت خاصيت حتا د ترلي فارمولونه په نامتناهي سټ هم نه شي بيانېدے. دا حقيقتونه د متناهي شاهد او لوڼهپايم-سکولم له قضيو څخه راځي.

باب 18

د لومړۍ درجې له منطق څخه وړاندې

اداري يادونه - دا څېړنې، چې د جبري اېوېگېد د منطق له يادښتونو څخه برابر شوي، د شته نورو منطقي نظامونو يوازې تر ټولو لنډه کتنه وړاندې کوي. موخه ئې دا ده چې په هغه کورس کې چې دا موضوعات نه رانغاړي، د نورو مطالعو موضوعات وروښيي. هيله ده چې دلته ياده شوې هره موضوع به بالاخره په پراخېدونکې منطق پروژه کې د يوې مستقلې برخې په کچه بشپړ بحث ومومي.

18.1 ټوليزه کتنه

د لومړۍ درجې منطق د پام وړ يوازينې منطقي نظام نه دے: د دې منطق ډېر غځېدلي او بدل ډولونه شته. يو منطق په عام ډول د يوې ژبې صوري مشخصات، اکثره، خو تل نه، د استنتاج يو نظام، او اکثره، خو تل نه، يوه ټاکل شوې معنې پوهنه لري. خو د دې ويې تخنيکي کارونه يوه څرگنده پوښتنه راپورته کوي: هغه منطقونه چې د لومړۍ درجې منطق نه دي، په وجداني يا فلسفي معنا د "منطق" له ويې سره څه اړيکه لري؟ لاندې ټول بيان شوي نظامونه د يوه يا بل ډول استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوي، آيا ويلې شو چې څه شي دوی منطقي کوي؟

اسانه ځوابونه نه تر سترگو کېږي. د "منطق" ويې په بېلابېلو لارو او بېلابېلو چاپيريالونو کې کارول کېږي، او دا مفهوم، لکه د "رښتيا" مفهوم، له ډېرو فلسفي دريځونو څېړل شوي دے. د بېلګې په توګه، څوک بنيادي د منطقي استدلال موخه دا وګڼي چې معلومه کړي کومې ويناوې په لازمي ډول رښتوني، له تجربې وړاندې رښتوني، د غيرمنطقي اصطلاحاتو له تفسير څخه خپلواکې رښتوني، د خپلې بڼې له مخې رښتوني، يا د ژبني تړون له مخې رښتوني دي، او له دغو مفکورو څخه هره يوه ډېر وضاحت غواړي. که پام يوازې په رياضياتو کې کارېدونکي منطق ته هم محدود کړو، د هغه د ساحې په هکله لږ توافق شته. د بېلګې په توګه، رسل او وايټ هېډ په پرېنسيپيا مېټماټيکا کې هڅه وکړه چې رياضيات د منطق پر بنسټ، د فرېګې له پېل کړې منطقپالې دود سره سم، جوړ کړي. د دوی منطقي نظام د لوړو ډولونو د منطق يوه بڼه وه چې لاندې بيان شوي نظام ته ورته وه. په پای کې اړ شول داسې بديهي اصول ورزيات کړي چې د ډېرو معيارونو له مخې سوچه منطقي نه ښکاري (په ځانګړي ډول د لامتناهي والي بديهي اصل او د راکمېدنې بديهي اصل)؛ خو بيا هم څوک دا دريځ لرلې شي چې د لوړې درجې استدلال ځينې بڼې بايد منطقي ومنل شي. د دې پر خلاف، کواين، چې هستپوهنه ئې "قضيه" د بحث د روا څېړنو په توګه نه مني، استدلال کوي چې د دويمې او لوړې درجې منطق په اصل کې د سټ تيوري ده چې د پسه پوست ئې اغوسته؛ په نورو ټکو، هغه نظامونه چې پر پرېديکاتونو کيټ ټاکنه لري سوچه منطقي نه دي.

اوس دپاره غوره ده چې دا ډول فلسفي مسئلې بل وخت ته پرېږدو او لاندې نظامونه يوازې د بېلابېلو ډولونو استدلال، که منطقي وي که بل څه، صوري ايډيالې بڼې وګڼو.

18.2 د ډېرو ډولونو منطق

د لومړۍ درجې په منطق کېنې متغیرونه او کمیت ټاکونکي پر یوه د تعریف ساحه ګرځي. خو ډېر ځله د څو (یو له بله بېلو) د تعریف ساحې درلودل کتور وي: د بېلګې په توګه، ښايي د عددونو د تعریف ساحه، د هندسي څیزونو د تعریف ساحه، له عددونو څخه عددونو ته د تابعو د تعریف ساحه، د ايلي ګروپونو د تعریف ساحه او داسې نور وغواړئ.

د ډېرو ډولونو منطق دا ډول چوکاټ برابروي. پیل د “ډولونو” له یوه لړ څخه کېږي—د یوه څیز “ډول” هغه “د تعریف ساحه” ښيي چې څیز باید پکې اوسېږي. بیا د هر ډول دپاره متغیرونه او کمیت ټاکونکي، او (په عام ډول) د هر ډول دپاره یو عینیت لرو. تابعې او اړیکې هم د هغو څیزونو د ډولونو له مخې “ټایپ” کېږي چې د ارګومېنټونو په توګه یې اخیستلې شي. له دې پرته د لومړۍ درجې د منطق عادي قاعدې ساتل کېږي، او د کمیت ټاکونکو د قاعدو یې د هر ډول دپاره تکرارېږي.

د بېلګې په توګه، د نړیوالو اړیکو د مطالعې دپاره ښايي داسې ژبه وټاکو چې دوه ډوله څیزونه، فرانسوي اتباع او جرمن اتباع، ولري. ښايي د لومړي ډول د څیزونو دپاره یوه یوځایزه اړیکه، “شراب څښي”، د دویم ډول د څیزونو دپاره بله یوځایزه اړیکه، “ورسټ خوري”، او یوه دوه ځایزه اړیکه، “څو ملتیزه واده شوې جوړه جوړوي”، ولرو. وروستۍ اړیکه دوه ارګومېنټونه اخلي: لومړۍ د لومړي ډول او دویم د دویم ډول وي. که a, b, c متغیرونه پر فرانسوي اتباعو او x, y, z متغیرونه پر جرمن اتباعو وګرځو، نو

$$\forall a \forall x (MarriedTo(a, x) \rightarrow (DrinksWine(a) \vee \neg EatsWurst(x)))$$

دا وایي چې که کوم فرانسو له یوه جرمن سره واده شوی وي، نو یا هغه فرانسو شراب څښي یا هغه جرمن ورسټ نه خوري. د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-030) سرچینې د دویم عمومي کمیت ټاکونکي د متغیر پراښتونکي ښه غورځولې وه؛ دلته هغه ښه بېرته ایښوول شوي ده.

د ډېرو ډولونو منطق په طبیعي ډول د لومړۍ درجې په منطق کېنې ځایدلې شي: د ډېرو ډولونو د د تعریف ساحې ټول څیزونه په یوه د لومړۍ درجې د تعریف ساحه کېنې یوځای کوي، د ډولونو د پېژندلو دپاره یوځایزه پریډیکاتونه کاروو او کمیت ټاکونکي نسبي کوي. د بېلګې په توګه، د پاسنۍ بېلګې اړونده د لومړۍ درجې ژبه به د نورو بیان شویو اړیکو تر څنګ “German” او “French” یوځایزه پریډیکاتونه ولري، او د ډول شرطونه به ترې لرې وي. یو ډول لرونکي کمیت ټاکونکي $\forall x!A$ ، چې x د جرمن ډول متغیر وي، داسې ژباړل کېږي:

$$\forall x (German(x) \rightarrow !A).$$

باید داسې بدیهي اصول هم ورزیات کړو چې ډولونه بېل تضمین کړي—لکه $\forall x \neg (German(x) \wedge French(x))$ —او هم داسې بدیهي اصول چې تضمین کړي “شراب څښي” یوازې د $French(x)$ پریډیکات پوره کونکو څیزونو دپاره صدق کوي، او داسې نور. له دې تړونونو او بدیهي اصولو سره دا ښودل ګران نه دي چې د ډېرو ډولونو ترې فارمولونه د لومړۍ درجې ترې فارمولونه ته، او د ډېرو ډولونو اشتقاقونه د لومړۍ درجې اشتقاقونه ته ژباړل کېږي. همدارنګه، د ډېرو ډولونو جوړښتونه د لومړۍ درجې اړوندو جوړښتونه ته او برعکس “ژباړل” کېږي؛ نو د ډېرو ډولونو د منطق دپاره هم د بشپړتیا قضیه لرو.

18.3 د دویمې درجې منطق

د دویمې درجې منطق ژبه یوازې د افرادو پر د تعریف ساحه کمیت ټاکنې ته اجازه نه ورکوي، بلکې د هغه د تعریف ساحه پر اړیکو هم کمیت ټاکل پرې کېدای شي. د لومړۍ درجې یوې ژبې $\mathcal{L}$ ته د هر k دپاره داسې متغیرونه R ورزیاتېږي چې پر k -ځایزو اړیکو ګرځي، او پر دغو متغیرونو کمیت ټاکنه هم روا کېږي. که R د یوې k -ځایزې اړیکې متغیر وي او $t_1, \dots, t_k$ عادي (د لومړۍ درجې) ترمونه وي، نو $R(t_1, \dots, t_k)$ یو اتومي فارمول دی. له دې پرته د فارمولونه سټ هماغسې تعریفېږي لکه د لومړۍ درجې په منطق کېنې، خو د دویمې درجې کمیت ټاکنې اضافي شرطونه لري. پام وکړئ چې عینیت یوازې د لومړۍ درجې د ترمونو دپاره لرو: که R او S د یوه شان ځایښت k اړیکیز متغیرونه وي، $R = S$ د لاندې عبارت د لنډون په توګه تعریفولې شو:

$$\forall x_1 \dots \forall x_k (R(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow S(x_1, \dots, x_k)).$$

د دویمې درجې منطق قاعدې یوازې د کمیت ټاکونکو قاعدې د دویمې درجې نویو متغیرونو ته غځوي. خو دلته باید لږ پام وشي چې دا متغیرونه د ژبې $\mathcal{L}$ له پریدیکاتونه، او په عام ډول د $\mathcal{L}$ له فارمولونه سره څنګه چلند کوي. لږ تر لږه، اړیکیز متغیرونه ترمونه ګڼل کېږي، نو د لاندې بڼې استنتاجونه لرو:

$$!A(R) \vdash \exists R !A(R)$$

خو که $\mathcal{L}$ د حساب ژبه وي او د ثابتې اړیکې نښه $<$ ولري، تمه کېږي چې لاندې استنتاج هم معتبر وي:

$$x < y \vdash \exists R R(x, y)$$

یا د یوه ورکړل شوي فارمول A دپاره:

$$!A(x_1, \dots, x_k) \vdash \exists R R(x_1, \dots, x_k)$$

په لا عام ډول، ښایي د لاندې بڼې استنتاجونه روا کول وغواړو:

$$!A[\lambda \vec{x}. !B(\vec{x})/R] \vdash \exists R !A$$

دلته $A[\lambda \vec{x}. !B(\vec{x})/R]$ هغه پایله ښيي چې په A کېنې د $R(t_1, \dots, t_k)$ بڼې هر اتومي فارمول په $!B(t_1, \dots, t_k)$ بدل شي. دا وروستی قاعده د ادراک شېما له شتون سره برابره ده، یعنې د لاندې بڼې یو بدیهي اصل:

$$\exists R \forall x_1, \dots, x_k (!A(x_1, \dots, x_k) \leftrightarrow R(x_1, \dots, x_k)),$$

د دویمې درجې په ژبه کېنې د هر فارمول A دپاره یوه داسې بېلګه چې R پکې ازاد متغیر نه وي. (تقریب: وښیئ چې که R ته اجازه ورکړل شي چې په A کېنې راشي، دا شېما ناسازګاره ده!) د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-031) د بدلولو په تشریح کېنې سرچینې د اړیکې اتومي نښه د څیز په نښه لیکلې وه؛ دلته د اتومي اړیکې سمه نښه پرته ایښوول شوې ده.

کله چې منطقپوهان د “دویمې درجې منطق بدیهي اصول” یادوي، په عام ډول د دویمې درجې د کمیت ټاکونکو پر قاعدو او د ادراک پر شېما د لومړۍ درجې منطق لږ تر لږه غځونه مرادوي. خو د دې بدیهي اصولو او قاعدو د کمزورو فرعي نظامونو مطالعه هم ډېر ځله په زړه پورې وي. د بېلګې په توګه، پام وکړئ چې د ادراک بدیهي شېما په خپل بشپړ عمومیت کېنې ناوړاندوینیزه ده: دا د داسې اړیکې $R(x_1, \dots, x_k)$ د شتون دعوه روا کوي چې په داسې فارمول “تعریف” شوې وي چې د دویمې درجې کمیت ټاکونکي لري؛ او دا کمیت ټاکونکي د ټولو داسې اړیکو پر سټ ګرځي—هغه سټ چې خپله R هم پکې ده! د شلې پېړۍ د پیل شاوخوا د راسل تناقض ته یو عام غبرګون دا و چې دا ډول تعریفونه ملامت وګڼل شي او د ریاضیاتو د بنسټونو په جوړولو کېنې ترې ډډه وشي. که په فارمول A کېنې د دویمې درجې کمیت ټاکونکو کارونه منع شي، د ادراک یوه وړاندوینیزه بڼه ترلاسه کېږي چې څه ناڅه کمزورې ده.

د معنایي نظر له مخې، د دویمې درجې یو جوړښت داسې کتلې شو چې د ژبې دپاره د لومړۍ درجې یو جوړښت او ورسره پر د تعریف ساحه د هغو اړیکو یو سټ لري چې د دویمې درجې کمیت ټاکونکي پرې ګرځي (په لا دقیق ډول، د هر k دپاره د ځایښت k اړیکو یو سټ شته). البته که ادراک په اشتقاق نظام کېنې شامل وي، دا اضافي شرط لرو چې د “دویمې درجې په برخه” کېنې د ادراک د بدیهي اصولو د پوره کولو دپاره کافي اړیکې وي—کېنې د اشتقاق نظام سم نه دے! د کافي اړیکو د تضمین یوه اسانه لار دا ده چې د دویمې درجې برخه د لومړۍ درجې پر برخه له ټولو اړیکو جوړه وګڼو. داسې جوړښت ته بشپړ ویل کېږي، او په یوه معنا په رښتیا د ژبې “ټاکل شوې جوړښت” دے. که خپل پام بشپړو جوړښتونه ته محدود کړو، هغه څه ترلاسه کوو چې د دویمې درجې بشپړه معنی پوهنه بلل کېږي. په دې حالت کېنې د یوه جوړښت مشخصول یوازې د لومړۍ درجې د برخې مشخصولو ته راګېږي، ځکه د دویمې درجې د برخې منځپانګه په ضمني ډول ترې معلومېږي.

په لنډیز کېنې، د دویمې درجې منطق په خبرو کېنې څه ابهام شته. د اشتقاق نظام له مخې ښایي له لاندې دواړو څخه یو مراد وي:

1. د دویمې درجې یو “لږ تر لږه” اشتقاق نظام، له ځینو ادراکي بدیهي اصولو سره.

2. د دویمې درجې “معیاري” اشتقاق نظام، له بشپړ ادراک سره.

د معنی پوهنې له مخې هم ښایي له لاندې دواړو څخه یوه د پام وړ وي:

1. “کمزورې” معنی پوهنه، چې جوړښت پکې د لومړۍ درجې یوه برخه او د ادراک د بدیهي اصولو د پوره کولو دپاره کافي لویه د دویمې درجې برخه لري.

2. د دویمې درجې “معیاري” معنی پوهنه، چې یوازې بشپړ جوړښتونه پکې خپرل کېږي.

کله چې منطقپوهان خپل مراد اشتقاق نظام یا معنی پوهنه نه مشخصوي، اکثره د هر لړ دویم توکي مرادوي. لکه چې وبه وینو، د دې معنی پوهنې کتنه دا ده چې د ډېرو طبیعي ریاضیکي جوړښتونو قطعي توصیفونه راکوي؛ په ورته وخت کې اشتقاق نظام ډېر پیاوړی او د دې معنی پوهنې دپاره سم دے. ټیکرټیا ئې دا ده چې اشتقاق نظام د دې معنی پوهنې دپاره بشپړ نه دے؛ په حقیقت کې د دویمې درجې د بشپړې معنی پوهنې دپاره هېڅ په اغېزمن ډول ورکړل شوی اشتقاق نظام بشپړ نه دے. له بلې خوا به وینو چې اشتقاق نظام د کمزورې معنی پوهنې دپاره بشپړ دے؛ نو که یوه جمله د اثبات وړ نه وي، یو داسې جوړښت شته، چې لازم نه دے بشپړ وي، او جمله پکې دروغ ده.

د دویمې درجې منطق ژبه ډېره بډایه ده. یوځایزې اړیکې د د تعریف ساحه له فرعي ستونو سره یو شان ځکله شو، نو په ځانګړي ډول پر دغو ستونو کیت ټاکل شو، د بېلګې په توګه، د طبیعي عددونو دپاره استقرا په یوه بدیهي اصل بیانول شو:

$$\forall R ((R(0) \wedge \forall x (R(x) \rightarrow R(x')))) \rightarrow \forall x R(x)).$$

که د حساب ژبه د $0, 1, +, \times$ او $<$ نښې ولري، د هغوی د چلند د بیانولو دپاره لاندې بدیهي اصول ورزیاتول شوي:

$$\forall x \neg x' = 0. \quad 1.$$

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y). \quad 2.$$

$$\forall x (x + 0) = x. \quad 3.$$

$$\forall x \forall y (x + y') = (x + y)'. \quad 4.$$

$$\forall x (x \times 0) = 0. \quad 5.$$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x). \quad 6.$$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z y = (x + z')). \quad 7.$$

دا ښودل ګران نه دي چې دغه بدیهي اصول د پاسني استقرا له بدیهي اصل سره، په دې شرط چې د دویمې درجې بشپړه معنی پوهنه کاروو، د حساب د معیاري جوړښت $\mathcal{M}$ ، د حساب د معیاري مدل، قطعي توصیف وړاندې کوي. که کوم جوړښت $\mathcal{M}$ دا بدیهي اصول رښتوني کوي، له $\mathbb{N}$ څخه د $\mathcal{M}$ د تعریف ساحه ته تابع f پر $\mathbb{N}$ د عادي بازګڼت په وسیله داسې تعریف کړئ چې $f(0) = 0^{\mathcal{M}}$ او $f(x+1) = f(x)^{\mathcal{M}}$ وي. پر $\mathbb{N}$ د عادي استقرا او په $\mathcal{M}$ کې د بدیهي اصولو (1) او (2) له صدق څخه وینو چې f یو پریو ده. د دې د ښودلو دپاره چې f پر هدف سټ بشپړه ده، P د $|\mathcal{M}|$ د هغو غړو سټ ونیسئ چې د f د قیمتونو په سټ کې دي. ځکه چې $\mathcal{M}$ بشپړ دے، P د دویمې درجې په د تعریف ساحه کې دے. د f له جوړونې پوهېږو چې $0^{\mathcal{M}}$ په P کې دے او P د $\mathcal{M}$ لاندې ترلے دے. دا چې د استقرا بدیهي اصل په $\mathcal{M}$ کې (په ځانګړي ډول د P دپاره) صدق کوي، تضمینوي چې P د $\mathcal{M}$ د لومړۍ درجې له ټول د تعریف ساحه سره برابر دے. نو f دوه اړخیزه یو پریو تابع ده. دا ښودل هم زیات ګران نه دي چې f هومومورفیزم دے، پر $\mathbb{N}$ عادي استقرا بیا بیا کاروو. د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-032) په دویم بدیهي اصل کې سرچینې د تابعې یوه بېله نښه کارولې وه، که څه هم ژبه او پاټې بحث د پریم نښه کاروي؛ دلته دویم اصل هماغې پریم نښې ته یو شان شوے دے.

د سټ تیورۍ په اصطلاحاتو کې تابع یوازې د اړیکې یو ځانګړی ډول دے؛ د بېلګې په توګه، یوځایزه تابع f له داسې دوه ځایزې اړیکې R سره یو شان ځکل کېدے شي چې $\forall x \exists! y R(x, y)$ پوره کوي. نو پر تابعو هم کیت ټاکل شو. بیا د بشپړې معنی پوهنې په کارولو د لامتناهي جوړښتونه ټولکي د هغو جوړښتونه $\mathcal{M}$ د ټولکي په توګه تعریفول شو چې د $\mathcal{M}$ له د تعریف ساحه څخه د هغه یو مناسب فرعي سټ ته یو پریو تابع لري:

$$\exists f (\forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \exists y \forall x f(x) \neq y).$$

بيا د دې جملې نفې د متناهي جوړښتونه ټولگه تعريفوي.

سربېره پر دې، د خطي ترتيب تعريف ته د لاندې شرط په زياتولو د بنو ترتيبونو ټولگه تعريفول شو:

$$\forall P (\exists x P(x) \rightarrow \exists x (P(x) \wedge \forall y (y < x \rightarrow \neg P(y))))).$$

دا وايي چې هر ناته سټ تر ټولو کوچنۍ غړې لري، که “سټ” له “يوځاييزې اړيکې” سره يو شان وگڼو. د بې بېلگې دپاره، د کرافونو ترليا داسې بيانول شو چې د څوکو هېڅ ناته بېلتون په ناتړلو برخو کښې نشته:

$$\neg \exists A (\exists x A(x) \wedge \exists y \neg A(y) \wedge \forall w \forall z ((A(w) \wedge \neg A(z)) \rightarrow \neg R(w, z))).$$

د يوې بې بېلگې په توگه، په تمرين کښې هڅه کول شې د هغو متناهي جوړښتونه ټولگه تعريف کړي چې د تعريف ساحه ئې جفته اندازه لري. تر دې هم په زړه پورې دا چې حقيقي عددونه د ناطقو عددونو لرونکي بشپړ مرتب ميدان په توگه په قطعي ډول توصيفول شو.

په لنډ ډول، د دويمې درجې منطق د لومړۍ درجې له منطق څخه ډېر زيات بيانونکې ده. دا ښه خبره؛ اوس بد خبره راځي. مخکې مو وويل چې د دويمې درجې د بشپړې معنې پوهنې دپاره هېڅ بشپړ اغېزمن اشتقاق نظام نشته. که ښه ئې وگڼو که بد، د لومړۍ درجې منطق ډېر خاصيتونه دلته نشته، چې د متناهي شاهد خاصيت او د لوېنهام-سکولم قضيه هم پکې دي.

له بې خوا، که څوک د دويمې درجې بشپړه معنې پوهنه پرېږدي او کمزورې بڼه ئې ومني، نو د دويمې درجې لږ تر لږه اشتقاق نظام د دې معنې پوهنې دپاره بشپړ ده. په نورو ټکو، که $\vdash$ داسې ولولو چې “په لږ تر لږه نظام کښې ثابتوي” او $\models$ داسې چې “په کمزورې معنې پوهنه کښې معنایي استلزام لري”، ښودل شو چې هر کله $\Gamma \models A$ وي نو $\Gamma \vdash A$ وي. که څوک په اشتقاق نظام کښې ځانگړي ادراکي بدبي اصول شاملول غواړي، بايد معنې پوهنه د دويمې درجې هغو جوړښتونو ته محدوده کړي چې دا اصول پوره کوي: د بېلگې په توگه، که Δ د ادراکي بدبي اصولو يو سټ وي (کېدې شي ټول وي)، نو که $\Gamma \cup \Delta \models A$ وي، $\Gamma \cup \Delta \vdash A$ هم وي. په ځانگړي ډول، که A د هغو ادراکي بدبي اصولو په کارولو د اثبات وړ نه وي چې موږ ئې څېړو، د $\neg A$ داسې يو مدل شته چې بيا هم دغه ادراکي بدبي اصول پوره کوي.

دا چې د بشپړتيا قضيه د کمزورې معنې پوهنې دپاره ولې صدق کوي، تر ټولو اسانه ئې دا ده چې د دويمې درجې منطق په لاندې ډول د ډېرو ډولونو منطق وگڼو. يو ډول د عادي “لومړۍ درجې” د تعريف ساحه په توگه تفسيرېږي، او بيا د هر k دپاره د “ځايښت k اړيکو” د تعريف ساحه لرو. ژبې ته جوړې دننه اړيکيزې ښې “ $true_k(R, x_1, \dots, x_k)$ ” ورکوو؛ مراد ئې دا ده چې R د $x_1, \dots, x_k$ دپاره صدق کوي، چرته چې R د “ k -ځاييزې اړيکې” د ډول متغير او $x_1, \dots, x_k$ د لومړۍ درجې د ډول څيزونه دي.

د دې يو شان کتلو له مخې، د دويمې درجې کمزورې معنې پوهنه په اصل کښې د ډېرو ډولونو د منطق عادي معنې پوهنه ده؛ او مخکې مو ليدلي چې د ډېرو ډولونو منطق د لومړۍ درجې په منطق کښې ځاييدل شي. نو د دواړو خواوو ژباړو ته په پام، د دويمې درجې منطق کمزور ته تصور په رښتيا د لومړۍ درجې منطق يوه پټه بڼه ده چې د تعريف ساحه ئې هم “څيزونه” او هم “اړيکې” لري او مناسب بدبي اصول پرې واکمن دي.

18.4 د لوړې درجې منطق

له لومړۍ درجې منطق څخه دويمې درجې منطق ته په تېرېدو مو وکړه شول چې په صوري ژبه کښې د لومړۍ درجې د تعريف ساحه د څيزونو د ستونو په هکله خبرې وکړو. ولې همدلته ودرېږو؟ د بېلگې په توگه، د درېيمې درجې منطق بايد موږ ته د څيزونو د ستونو د ستونو، يا ښايي آن د هغو ستونو، په هکله د خبرو وس را کړي چې هم څيزونه او هم د څيزونو ستونه لري. د څلورمې درجې منطق بيا د دې ډول څيزونو د ستونو په هکله خبرې راکوي. لکه چې اټکل مو کړی وي، دا مفکوره په خپله خوښه هر څومره تکرارول شو.

په عملي کار کښې د لوړې درجې منطق ډېر ځله د اړيکو پر ځای د تابعو په اصطلاحاتو کښې د فارمول په بڼه وړاندې کېږي. (له طبيعي يو شان کتلو سره دا توپير بنسټيز نه ده.) چې ځينې بنسټيز “ډولونه” A, B, C ، را کړل شي (چې اوس به ئې “ټاپونه” بولو)، د لاندې شرط په ورکولو نوي ټاپونه جوړول شو:

که σ او τ متناهي ټاپونه وي، $\sigma \rightarrow \tau$ هم متناهي ټاپ ده.

ټاپونه داسې نحوې “نښکې” وگڼئ چې هغه څیزونه ډلبندي کوي چې په خپل د تعریف ساحه کېنې ئې غواړو؛ $\sigma \rightarrow \tau$ هغه څیزونه بیانوي چې د ټایپ σ څیزونه د ټایپ τ څیزونو ته وړونکې تابعې دي. د بېلګې په توګه، ښايي د “رښتوني” او “دروغ” د رښتیاوالي قیمتونو یو ټایپ Ω او د طبیعي عددونو یو ټایپ $\mathbb{N}$ وغواړو. په دې حالت کېنې د ټایپ $\Omega \rightarrow \mathbb{N}$ څیزونه د یوځایزو اړیکو یا د $\mathbb{N}$ فرعي ستونو په توګه ګڼل شئ؛ د ټایپ $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ څیزونه له طبیعي عددونو څخه طبیعي عددونو ته تابعې دي؛ او د ټایپ $(\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$ څیزونه “فانکشنونه” دي، یعنې د لوړې درجې داسې تابعې چې تابعې اخلي او عددونه ورکوي.

لکه د دویمې درجې منطق، د لوړې درجې منطق هم د ډېرو ډولونو یو داسې منطق ګڼل شو چې د څیز د هر مطلوب ټایپ دپاره یو ډول لري. خو اکثره دا لا روښانه وي چې د لوړو ټاپونو نحو له بنسټه تعریف کړو. د بېلګې په توګه، د متناهي ټاپونو یو سټ په استقرایي ډول داسې تعریفول شوي:

1. $\mathbb{N}$ یو متناهي ټایپ ده.

2. که σ او τ متناهي ټاپونه وي، $\sigma \rightarrow \tau$ هم متناهي ټایپ ده.

3. که σ او τ متناهي ټاپونه وي، $\sigma \times \tau$ هم متناهي ټایپ ده.

په وجداني ډول، $\mathbb{N}$ د طبیعي عددونو ټایپ، $\sigma \rightarrow \tau$ له σ څخه τ ته د تابعو ټایپ، او $\sigma \times \tau$ د هغو جوړو ټایپ ښیي چې یو څیز ئې له σ او بل له τ څخه وي. بیا د ترمونو یو سټ په استقرایي ډول داسې تعریفول شوي:

1. د هر ټایپ σ دپاره $x, y, z, \dots$ په څېر د ټایپ σ متغیرونو یوه زېرمه شته.

2. 0 د ټایپ $\mathbb{N}$ یو ترم ده.

3. S (ناستي) د ټایپ $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ یو ترم ده.

4. که s د ټایپ σ ترم او t د ټایپ $(\sigma \rightarrow \sigma)$ ترم وي، R_{st} د ټایپ $\mathbb{N} \rightarrow \sigma$ یو ترم ده.

5. که s د ټایپ $\sigma \rightarrow \tau$ ترم او t د ټایپ τ ترم وي، $s(t)$ د ټایپ σ یو ترم ده.

6. که s د ټایپ σ ترم او x د ټایپ τ متغیر وي، $\lambda x. s$ د ټایپ $\tau \rightarrow \sigma$ یو ترم ده.

7. که s د ټایپ σ ترم او t د ټایپ τ ترم وي، $\langle s, t \rangle$ د ټایپ $\sigma \times \tau$ یو ترم ده.

8. که s د ټایپ $\sigma \times \tau$ یو ترم وي، $p_1(s)$ د ټایپ σ یو ترم او $p_2(s)$ د ټایپ τ یو ترم ده.

په وجداني ډول، R_{st} هغه تابع ښیي چې په بازګشتي ډول داسې تعریف شوې وي:

$$R_{st}(0) = s$$

$$R_{st}(x+1) = t(x, R_{st}(x)),$$

$\langle s, t \rangle$ هغه جوړه ښیي چې لومړۍ جز ئې s او دویم جز ئې t ده، او $p_1(s)$ او $p_2(s)$ د s لومړۍ او دویم غړي (“پروجیکشنونه”) ښیي. په پای کېنې، $\lambda x. s$ هغه تابع f ښیي چې داسې تعریف شوې وي:

$$f(x) = s$$

د ټایپ τ د هر x دپاره، نو توکې (6) د ادراک یوه ښه راکوي او د ترمونو په وسیله د تابعو تعریفول شوني کوي. فارمولونه د یوه شان ټایپ د ترمونو ترمنځ له عینیت ویناوو $s = t$ ، عادي بیاني تړونکو او د لوړو ټاپونو له کمیت ټاکنې څخه جوړېږي. بیا د نظام بدیهي اصول هغه بنسټیزې معادلې ګڼل شو چې پر پاس تعریف شويو ترمونو واکمني دي، او ورسره د کمیت ټاکنو او عینیت لرونکي منطق عادي قاعدې. د ژباړې د نسخې سمون: (OLFOL-033) په سرچینه کېنې د لامبدا ترم متغیر د پایلې ټایپ ته منسوب شوی و؛ دلته هغه د توکي (6) له تعریف سره سم د تابع د ورودي ټایپ ته منسوب شوی ده.

که د متناهي ټاپونو نظام ته د رښتیاوالي د قیمتونو ټایپ Ω ورزیات شي، باید د هغه پر کارونه واکمن بدیهي اصول هم شامل شي. په حقیقت کښې، که لږ ځیر واوسو، پچلي فارمولونه په بشپړ ډول لرې کول او د ټایپ Ω په ترمونو کې بدلولې شو! بیا د ثبوت نظام هم ورسره سم بدلېدې شي. پایله په اصل کښې د ټاپونو ساده تیوري ده چې الوزو چرچ په ۱۹۳۰ مو کلونو کښې وړاندې کړې وه.

لکه د دویمې درجې منطق، د لوړو ټاپونو د معنی پوهنې هم بېلابېلې بڼې شته چې ښايي کارول کې وخواړو. په بشپړه بڼه کښې د ټایپ $\tau \rightarrow \sigma$ متغیرونه د ټایپ σ له څیزونو څخه د ټایپ τ څیزونو ته د ټولو تابعو پر سټ کړځي. لکه چې تمه کېږي، دا معنی پوهنه دومره پیاوړې ده چې یو بشپړ او اغېزمن اشتقاق نظام نه مني. خو کزورې معنی پوهنه هم څېړلې شو چې جوړښت پکې د هر ټایپ τ دپاره د غړو ستونه T_τ او ورسره د تطبیق، پروجیکشن او داسې نورو مناسب عملونه لري. که جزئیات سم بشپړ شي، د پورته بیان شویو اشتقاق نظامونو د ډولونو دپاره د بشپړتیا قضیې ترلاسه کولې شو.

د لوړو ټاپونو منطق ځکه زړه راښکونکې ده چې یو داسې چوکاټ برابروي چې د ریاضیاتو لویه برخه پکې په طبیعي ډول ځایولې شو: له $\mathbb{N}$ څخه په پیل حقیقي عددونه، مسلسل تابعي او داسې نور تعریفولې شو. دا منطق د شهودي منطق په چاپېریال کښې په ځانګړي ډول زړه راښکونکې هم ده، ځکه ټاپونه روښانه “تعمیري” تفسیرونه لري. په حقیقت کښې د لوړو ټاپونو د معنی پوهنې تعمیری بڼې (چې د کلاسیک منطق پر ځای پر شهودي منطق ولاړې وي) جوړولې شو، دا بڼې دغه تعمیری تفسیرونه ډېر ښه روښانوي او په ډېرو لارو د خپلو کلاسیکو سیالانو په پرتله په زړه پورې دي.

18.5 شهودي منطق

د دویمې او لوړې درجې د منطق پر خلاف، د لومړۍ درجې شهودي منطق د کلاسیکې بڼې یو محدود شوی نظام ده چې د لا “تعمیري” ډول استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوی ده. لاندې بېلګې ښايي ځینې بنسټیزې انګېزې روښانه کړي.

فرض کړئ یوه ورځ یو څوک درته راشي او اعلان وکړي چې طبیعي عدد x ئې ټاکلې ده او دا خاصیت لري: که x اولي وي، د ریمان فرضیه رښتونی ده، او که x مرکب وي، د ریمان فرضیه دروغ ده. دا خو لوی زېر ده! د ریمان د فرضیې رښتیاوالی یا دروغوالی د ریاضیاتو له لویو ناهل شویو پوښتنو څخه ده، او داسې ښکاري چې دې کس مسئله محاسبې ته راکه کړې، یعنې یوازې باید معلومه شي چې یو ځانګړی عدد اولي ده که نه.

د x جادويي قیمت څو ده؟ هغه ئې داسې بیانوي: x هغه طبیعي عدد ده چې که د ریمان فرضیه رښتونی وي له 7 سره برابر ده، او که نه، له 9 سره.

تاسو په غوسه خپل پیسې بېرته غواړئ. له کلاسیک نظره پاسنه بیان په رښتیا د x یو یوازینی قیمت ټاکي، خو څه چې تاسو ئې په اصل کښې غواړئ د x داسې قیمت ده چې په څرګند ډول درکړل شوی وي.

د یوې بې، ښايي لږې مصنوعي، بېلګې دپاره لاندې پوښتنه وګورئ. پوهېږو چې یو غیر ناطق عدد ناطق توان ته پورته کېدې او ناطقه پایله ورکولې شي، د بېلګې په توګه، $2 = \sqrt{2}^2$. دومره څرګنده نه ده چې یو غیر ناطق عدد غیر ناطق توان ته پورته شي او بیا هم ناطقه پایله ورکړي که نه. لاندې قضیه مثبت ځواب ورکوي:

قضیه 18.1. داسې غیر ناطق عددونه a او b شته چې a^b ناطق وي.

ثبوت. $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ وګورئ. که دا ناطق وي، کار بشپړ ده. که نه وي، دا غیر ناطق ده. بیا لرو:

$$(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

□

چې خاڅا ناطق ده. نو په دې حالت کښې a له $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ سره او b له $\sqrt{2}$ سره برابر ونیسئ.

آیا دا یو معتبر ثبوت ده؟ زیاتره ریاضیپوهان ئې معتبر ګڼي. خو دلته بیا هم څه ناڅه نه قانع کوونکې خبره شته: د حقیقي عددونو د یوې جوړې شتون مو په یوه خاصیت سره ثابت کړی، بې له دې چې ویله شو دا کومه جوړه ده. همدا پایله داسې هم ثابتېدې شي چې

جوړه a ، b پخپله په ثبوت کېنې ورکړل شوې وي: $a = \sqrt{3}$ او $b = \log_3 4$ ونیسئ. بیا

$$a^b = \sqrt{3}^{\log_3 4} = 3^{1/2 \cdot \log_3 4} = (3^{\log_3 4})^{1/2} = 4^{1/2} = 2,$$

ځکه چې $3^{\log_3 x} = x$.

شهودي منطق د داسې استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوی چې د لومړي ثبوت په څېر ګامونه نه مني. د $A(x)$ پوره کوونکي x د شتون ثابتول په دې معنا دي چې یو ځانګړې x او د هغه له خوا د A د پوره کولو ثبوت ورکړی، لکه په دویم ثبوت کېنې. دا ثابتول چې A یا B ! صدق کوي، غواړي چې له دواړو څخه یو په رښتیا ثابت کړي.

په صوري ډول، د لومړۍ درجې شهودي منطق هغه وخت ترلاسه کېږي چې د لومړۍ درجې د منطق اشتقاق نظام په یوه ټاکلې طریقه محدود کړی. همداسې د دویمې یا لوړې درجې منطق شهودي بڼې هم شته. له ریاضیکي نظره دا یوازې صوري استنتاجي نظامونه دي، خو لکه مخکې چې وویل شول، موخه ئې د ریاضیکي استدلال یو ډول مدل کول دي. څوک دا هغه استدلال ګڼلې شي چې د ریاضیاتو یو ځانګړې فلسفي دریځ ئې روا بولي (لکه د بروور شهودیت)، څوک ئې د ریاضیکي استدلال یو لا “ملبوس” او قانع کوونکې ډول ګڼلې شي (د یدشپ د تعمیریت په دود)، او دا بحث هم کېدای شي چې صوري بیان غیر صوري انګېزه په رښتیا راغواړي که نه. خو هر فلسفي دریځ چې ولرو، شهودي منطق د یوه صوري وړاندې شوي منطق په توګه مطالعه کولای شو، او د هر دلیل له مخې، ډېر ریاضیکي منطقپوهان دا مطالعه په زړه پورې کوي.

د شهودي تړونکو یو غیر صوري تعمیری تفسیر شته چې په عام ډول د بیاچې تفسیر بلل کېږي (د بروور، هایټنګ او کولموګوروف په نومونو نومول شوی). دا داسې دے: د $A \wedge B$! ثبوت د A ! له یوه ثبوت او د B ! له یوه ثبوت څخه جوړه وي، د $A \vee B$! ثبوت یا د A ! ثبوت وي یا د B !، او څرګند معلومات لرو چې کوم یو دے، د $A \rightarrow B$! ثبوت یوه کړنلاره وي چې د A ! ثبوت د B ! په ثبوت بدلوي، د $\forall x A(x)$! ثبوت یوه کړنلاره وي چې د x د هر قیمت دپاره د $A(x)$! ثبوت پورته ورکوي، او د $\exists x A(x)$! ثبوت د x له یوه قیمت او دې ثبوت څخه جوړ وي چې هغه قیمت A ! پوره کوي. دا تفسیر په هغو محاسوبي اصطلاحاتو هم بیانېدای شي چې د “کړۍ-هاورد آیزومورفیزم” یا “د ټایپونو په توګه د فارمولونه بېلګه” بلل کېږي: فارمول د معلوماتو یو ټاکلې ټایپ مشخصوونکې وګڼی، او ثبوتونه د همدې معلوماتي ټایپونو محاسوبي څیزونه وګڼی چې رابڼي اړوند فارمول رښتونه دے.

شهودي منطق ډېر ځله کلاسیک منطق “د خارج وسط له اصل پرته” ګڼل کېږي. لاندې قضیه دا خبره لا دقیقه کوي.

قضیه 18.2. په شهودي ډول لاندې بدیهي شېبې یو له بل سره برابري دي:

$$1. (\neg A \rightarrow \perp) \rightarrow A.$$

$$2. A \vee \neg A.$$

$$3. \neg\neg A \rightarrow A.$$

له دوو نورو څخه د هرې شېبې بېلګې ترلاسه کول په شهودي منطق کېنې یو ښه تمرین دے.

د شهودي بیاني منطق لومړني استنتاجي نظامونه، چې د بروور د شهودیت د صوري بڼو په توګه وړاندې شوي وو، کولموګوروف، کلیوېنکو او هایټنګ په خپلواکه توګه جوړ کړل. د لومړۍ درجې شهودي منطق (او د شهودي ریاضیاتو د ځینو برخو) لومړۍ صوري بڼه هایټنګ وړاندې کړه. که څه هم یو شمېر په کلاسیک ډول معتبرې شېبې په شهودي ډول معتبرې نه دي، ډېرې نورې معتبرې دي.

دوه ګوښې نفي ژباړه د کلاسیک او شهودي منطق تر منځ یوه مهمه اړیکه بیانوي. دا په استقرایي ډول داسې تعریفېږي (A^N ! د کلاسیک فارمول A ! شهودي ژباړه وګڼئ):

$$A^N \equiv \neg\neg A \quad \text{د اټومي فارمولونه } A \text{ دپاره}$$

$$(!A \wedge !B)^N \equiv (!A^N \wedge !B^N)$$

$$(!A \vee !B)^N \equiv \neg\neg(!A^N \vee !B^N)$$

$$(!A \rightarrow !B)^N \equiv (!A^N \rightarrow !B^N)$$

$$(\forall x !A)^N \equiv \forall x !A^N$$

$$(\exists x !A)^N \equiv \neg\neg\exists x !A^N$$

کولموکوروف او کلیوېنکو د بیاني منطق دپاره د دې ژباړې ښې لرلې؛ د پریدیکاتي منطق دپاره کودل او کېنخن په خپلواکه توګه وړاندې کړه. لرو:

قضیه 18.3. 1. $A \leftrightarrow A^N$! په کلاسیک ډول د اثبات وړ ده.

2. که A ! په کلاسیک ډول د اثبات وړ وي، A^N ! په شهودي ډول د اثبات وړ ده.

اوس لاندې خبرې اترې تصورول شو. کلاسیک ریاضیپوه: “ما A ! ثابت کړه!” شهودي ریاضیپوه: “ستا ثبوت معتبر نه ده. تا په اصل کېنې A^N ! ثابت کړه ده.” کلاسیک ریاضیپوه: “ما ته سمه ده!” د کلاسیک ریاضیپوه له نظره شهودي ریاضیپوه یوازې په ورو توپرونو نښته، ځکه دواړه سره برابر دي. خو شهودي ریاضیپوه ټینګار کوي چې توپیر شته.

پام وکړئ چې پاسنۍ ژباړه یوازې له سوچه منطق سره کار لري، دا پوښتنه نه خبرې چې د کلاسیکو او شهودي ریاضیاتو دپاره مناسب غیرمنطقي بدیهي اصول کوم دي یا د دواړو ترمنځ څه اړیکه ده. خو د پاسنۍ قضیې لاندې لږ څڅونه څه ګټور معلومات راکوي:

قضیه 18.4. که Γ په کلاسیک ډول A ! ثابتوي، Γ^N په شهودي ډول A^N ! ثابتوي.

په نورو ټکو، که A ! له ځینو فرضیو څخه په کلاسیک ډول د اثبات وړ وي، A^N ! د هغو له دوه ګونې نفې ژباړو څخه د اثبات وړ ده.

د دې د ښودلو دپاره چې یوه جمله یا بیاني فارمول په شهودي ډول معتبر ده، یوازې یو ثبوت ورکول پکار دي. خو دا به ځنګه ښې چې معتبر نه ده؟ د دې دپاره داسې معنی پوهنې ته اړیو چې سمه، او غوره دا چې بشپړه وي. د کرپیکي معنی پوهنه دا اړتیا ښه پوره کوي.

هماغه کار کول شو چې د کلاسیک منطق دپاره مو وکړ: معنی پوهنه تعریف کړو او سمول او بشپړتیا ثابته کړو. خو لاندې توپیر ته پام ارزښت لري. د کلاسیک منطق معنی پوهنه په یوه معنا “څرګنده” وه او د تړونکو په معنا کېنې ضمني پرته وه. که څه هم د کرپیکي د معنی پوهنې دپاره څه وجداني انګېزه ورکول شو، دا د هماغه ډول حتمي والي احساس نه راکوي. سربېره پر دې، د یوه کلاسیک جوړښت مفهوم یو طبیعي ریاضیکي مفهوم ده؛ نو یا د جوړښت مفهوم د کلاسیک د لومړۍ درجې منطق د مطالعې وسیله ګلله شو، یا کلاسیک د لومړۍ درجې منطق د ریاضیکي جوړښتونه د مطالعې وسیله. د دې پر خلاف، د کرپیکي جوړښتونه یوازې منطقي جوړونې ګڼل کېدې شي، داسې نه ښکاري چې خپلواک ریاضیکي ارزښت ولري.

د بیاني ژبې دپاره د کرپیکي جوړښت $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$ د یوه سټ W ، پر W د یوه جزوي ترتیب R چې ترټولو کوچنۍ غړې ولري، او د بیاني متغیرونو له یوې “یکنواختې” ګومارنې څخه د W غړې ته جوړ ده. وجداني تصور دا ده چې د W غړې “ترۍ ګانې” یا “د پوهې حالتونه” ښیي، غړې u د $v \geq u$ یو “ممکن راتلونکې حالت” ښیي، او u ته ګومارل شوي بیاني متغیرونه هغه قضیې دي چې په حالت u کېنې رښتوني پېژندل شوې دي. بیا د تحلیل اړیکه $\mathcal{M}, w \Vdash A$ دا اړیکه د ژبې ټولو فارمولونه ته ځغوي، $\mathcal{M}, w \Vdash A$ داسې ولولئ چې “ A ! په حالت w کېنې رښتونه ده” — اړیکه په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\mathcal{M}, w \Vdash p_i$ هله او یوازې هله چې p_i یو له هغو بیاني متغیرونو څخه وي چې w ته ګومارل شوي.

2. $\mathcal{M}, w \nVdash \perp$.

3. $\mathcal{M}, w \Vdash (A \wedge B)$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}, w \Vdash A$ او $\mathcal{M}, w \Vdash B$ وي.

4. $\mathcal{M}, w \Vdash (A \vee B)$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}, w \Vdash A$ یا $\mathcal{M}, w \Vdash B$ وي.

5. $\mathcal{M}, w \Vdash (A \rightarrow B)$ هله او یوازې هله چې هر کله $w' \geq w$ او $\mathcal{M}, w' \Vdash A$ وي، نو $\mathcal{M}, w' \Vdash B$ هم وي.

دا ښودل یو ښه تمرین ده چې $(\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg p \vee \neg q))$ په شهودي ډول معتبر نه ده؛ د کرپیکي داسې جوړښت جوړ کړئ چې مقابله بېلګه ورکړي.

18.6 مودالي منطقونه

د یوې شرطې جملې دا بېلګه وګورئ:

که جبري په هغې کوټه کېنې یوازې وي، نو هغه مست او برېښه دے او پر څوکیو کېږي.

دا داسې شرطې وینا ده چې ښايي په مادي لحاظ رښتوني خو بیا هم غولونکې وي، ځکه عبارت داسې ښيي چې د مقدم او پایلې تر منځ تر دې پیاوړې اړیکه شته چې یوازې یا مقدم دروغ وي یا تالي رښتونه. یعنې، عبارت دا ښيي چې دعوه یوازې په دې ځانګړې نړۍ کېنې رښتوني نه ده (چرته چې ښايي ځکه په تش ډول رښتوني وي چې جبري په کوټه کېنې یوازې نه دے)، بلکې که مقدم رښتونه وے نو پایله به هم رښتوني وه. په نورو ټکو، دا وینا داسې اخیستل کېدے شي چې دعوه یوازې په دې نړۍ کېنې نه، بلکې په هره “ممکنه” نړۍ کېنې رښتوني ده؛ یا دا چې د دې ځانګړې نړۍ د محض رښتیاوالي پر خلاف، لازماً رښتوني ده.

مودالي منطق د دې ډول لزوم د معنا کولو دپاره جوړ شوے. مودالي بیاني منطق له عادي بیاني منطق څخه د بکس عملګر په زیاتولو ترلاسه کېږي؛ یعنې که $A!$ فارمول وي، نو $A!$ هم دے. په وجداني ډول $A!$ وایي چې $A!$ لازماً رښتونه، یا په هره ممکنه نړۍ کېنې رښتونه دے. $A!$ په عام ډول د $A! \rightarrow A$ لڼډون ګڼل کېږي او داسې لوستل کېږي چې $A!$ ممکن رښتونه دے. البته مودالیت په پریډیکاتي منطق کېنې هم ورزیاتېدله شي.

کرپيکي جوړښتونه مودالي منطق ته معنی پوهنه ورکولے شي؛ په حقیقت کېنې کرپيکي دا معنی پوهنه لومړے د مودالي منطق په پام کېنې نیولو سره جوړه کړې وه. دلته پر جزوي ترتیبونو د محدودېدو پر ځای په عام ډول د “ممکنو نړۍ ګانو” یو سټ P او د نړۍ ګانو تر منځ دوه ځاییزه “د لاسرسي” اړیکه $R(x, y)$ لرو. په وجداني ډول $R(p, q)$ وایي چې نړۍ q له p سره سازګاره ده؛ یعنې که موږ په نړۍ p کېنې “یو”، باید دا امکان ومنو چې نړۍ به د q په څېر وه.

مودالي منطق کله د “مفهومي” منطق په نامه یادېږي، د “مصادقي” منطق پر خلاف. د کلاسیک منطق په څېر د یوه مصادقي منطق ټاکل شوې معنی پوهنه یوازې یوې، “واقعي” نړۍ ته اشاره کوي؛ خو د یوه “مفهومي” منطق معنی پوهنه پر یوې پراخې هستپوهنې تکیه کوي. د لزوم د جوړښت کولو تر څنګ، مودالیت د نورو ژبنيو جوړښتونو د جوړښت کولو دپاره هم کارېدله شي، او $\square$ او $\Diamond$ د اړوند کارونې له مخې بیا تفسیرېږي. د بېلګې په توګه:

1. د اثبات وړتیا په منطق کېنې $A!$ داسې لوستل کېږي چې $A!$ د اثبات وړ دے “او $A!$ داسې چې $A!$ سازګار دے”.
2. په معرفتي منطق کېنې $A!$ داسې لوستل کېدے شي چې “زه په $A!$ پوهېږم” یا “زه پر $A!$ باور لرم”.
3. په زماني منطق کېنې $A!$ داسې لوستل کېدے شي چې $A!$ تل رښتونه وي “او $A!$ داسې چې $A!$ کله کله رښتونه وي”.

غواړو منطق په هغو قاعدو او بدیې اصولو پیاوړے کړو چې له مودالیت سره کار لري. د بېلګې په توګه، نظام $S4$ د بیاني منطق عادي بدیې اصول او قاعدې، او ورسره لاندې بدیې اصول لري:

$$\square(A \rightarrow B) \rightarrow (\square A \rightarrow \square B)$$

$$\square A \rightarrow A$$

$$\square A \rightarrow \square \square A$$

او دا قاعده هم: “له $A!$ څخه $\square A!$ پایله واخلي” - $S5$ لاندې بدیې اصل ورزیاتوي:

$$\Diamond A \rightarrow \square \Diamond A$$

د دې بدیې اصولو بدل ډولونه ښايي د بېلابېلو کارونو دپاره مناسب وي؛ د بېلګې په توګه، $S5$ په عام ډول د منطقي لزوم د مفهوم ځانګړونکې ګڼل کېږي. ښه خبره دا ده چې اکثره داسې معنی پوهنه موندلے شو چې د کرپيکي په جوړښتونه کېنې د لاسرسي اړیکه په طبیعي لارو محدودوي او د هغې په نسبت د اشتقاق نظام سم او بشپړ وي. د بېلګې په توګه، $S4$ د کرپيکي د هغو جوړښتونه له ټولګي سره سمون لري چې د لاسرسي اړیکه ئې انعکاسي او انتقالي وي. $S5$ د کرپيکي د هغو جوړښتونه له ټولګي سره سمون لري چې د لاسرسي اړیکه ئې عمومي وي، یعنې هره نړۍ له هرې بلې نړۍ څخه د لاسرسي وړ وي؛ نو $\square A!$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $A!$ په هره نړۍ کېنې صدق وکړي.

18.7 نور منطقونه

لکه چې ښايي تر اوسه مو معلومه کړې وي، د نوي منطق جوړول گران نه دي. تاسو هم خپله نحو جوړوله، د استنتاج يو نظام پنځوله، او ورته معنی پوهنه ترتیبولې شئ. که غواړئ د اشتقاق نظام مو د معنی پوهنې په نسبت بشپړ وي، ښايي لږ ځیرکتیا ته اړ شئ؛ او د نړۍ د قانع کولو دپاره هم څه څه پکار ده چې منطق مو په رښتیا په زړه پورې دے. خو په بدل کېنې ئې د خپل منطق د ریاضیکي او محاسبوي خاصیتونو په سپړلو ډېر ساعتونه پاکه او خوندوره بوختیا لرله شئ.

وروستیو لسیزو د صوري منطقونو رښتینې چاودنه لیدلې ده. فزي منطق د مبهمو خاصیتونو په هکله د استدلال د مدل کولو دپاره جوړ شوه. احتمالي منطق د ناڅرگندتیا په هکله استدلال مدل کوي. دیفالت منطقونه او نایکنواخته منطقونه د ماتېدونکو استدلالی بنو د مدل کولو دپاره جوړ شوي، یعنې داسې “معقول” استنتاجونه چې د نویو معلوماتو په راتلو وروسته ردېدلې شي. معرفتي منطقونه د پوهې په هکله استدلال، سببي منطقونه د سبب او مسبب د اړیکو په هکله استدلال، او آن “تکلیفي” منطقونه د اخلاقي مکلفیتونو په هکله استدلال مدل کوي. دا نظامونه چې د فلسفي، ریاضیکي یا محاسبوي انگېزې له مخې معرفي شوي وي، ښايي د ریاضیکي منطق، فلسفي منطق، مصنوعي ځیرکتیا، ادراکي پوهنې یا بېلې څانگې تر سرلیک لاندې مطالعه شي.

لږ همداسې اوږدېږي او امکانونه بې پایه ښکاري. ښايي هېڅکله د لایښځ دې خوب ته و نه رسېږو چې ټول انساني عقل محاسبې ته راکم کړو—خو دا موله هڅې څخه نه شي منع کولې.

برخه IV

مدل تيوري

ادارتي يادونه - د مدل تيوري مواد ښکاري او ازمېښتي دي. دا مهال دا يوازې د مدل تيوري په هکله د الېوانتونې له يادښتونو څخه اخيستل شوې بڼه ده، له هغو موضوعاتو پرته چې د لومړۍ درجې منطق په برخه کې راغلې دي (تيوري، بشپړتيا او د متناهي شاهد خاصيت). د درسي کتاب دپاره د کمپوتيا په موخه دا برخه لا ډېرې سريزې، انگېزې، سپړنې او تمرينونو ته اړتيا لري. اېلېي اړانا پلان لري چې په ځانگړي ډول پر دې برخه کار وکړي ([issue 65](#)) -

باب 19

د مدل تیوری بنسټونه

19.1 راکونی او غځونې

ډېر ځله د هغو ژبو، او د دغو ژبو د جوړښتونه پرتله کتوره یا اړینه وي چې ځینې ښې سره کچې لري. تر ټولو عام حالت دا دے چې د یوې ژبه $\mathcal{L}$ ټولې ښې د بلې ژبه $\mathcal{L}'$ برخه هم وي، یعنې $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$. بیا یو $\mathcal{L}$ -جوړښت $\mathcal{M}$ تل د اضافي ښو په تفسیرولو $\mathcal{L}'$ -جوړښت ته غځېدلی شي، په داسې حال کې چې د کډو ښو تفسیرونه هماغسې پاتې شي. له بلې خوا، له یوه $\mathcal{L}'$ -جوړښت $\mathcal{M}'$ څخه د هغو ښو د تفسیرونو په “هېرولو” یو $\mathcal{L}$ -جوړښت ترلاسه کول شو چې په $\mathcal{L}$ کېنې نۀ راځي.

تعریف 19.1. فرض کړئ $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$ ، $\mathcal{M}$ یو $\mathcal{L}$ -جوړښت او $\mathcal{M}'$ یو $\mathcal{L}'$ -جوړښت دے. $\mathcal{M}$ د $\mathcal{M}'$ تر $\mathcal{L}$ پورې راکونه، او $\mathcal{M}'$ د $\mathcal{M}$ تر $\mathcal{L}'$ پورې غځونه هله او یوازې هله ده چې

$$1. |\mathcal{M}| = |\mathcal{M}'|$$

$$2. \text{د هر داسې ثابت سمبول } c \in \mathcal{L} \text{ دپاره، } c^{\mathcal{M}} = c^{\mathcal{M}'} \text{ وي.}$$

$$3. \text{د هر داسې تابع } f \in \mathcal{L} \text{ دپاره، } f^{\mathcal{M}} = f^{\mathcal{M}'} \text{ وي.}$$

$$4. \text{د هر داسې پریدیکات } P \in \mathcal{L} \text{ دپاره، } P^{\mathcal{M}} = P^{\mathcal{M}'} \text{ وي.}$$

قضیه 19.2. که یو $\mathcal{L}$ -جوړښت $\mathcal{M}$ د یوه $\mathcal{L}'$ -جوړښت $\mathcal{M}'$ راکونه وي، نو د $\mathcal{L}$ د ټولو تړلي فارمولونه A دپاره

$$\mathcal{M} \models A \text{ چې هله او یوازې هله چې } \mathcal{M}' \models A.$$

□

ثبوت. تمرین.

تمرین 19.3، 19.2 ثابته کړئ.

تعریف 19.4. که یو $\mathcal{L}$ -جوړښت $\mathcal{M}$ ولرو، او $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{P\}$ د $\mathcal{L}$ هغه غځونه وي چې یوازینې n -ځاییز پریدیکات P ورزیاتوي، او $R \subseteq |\mathcal{M}|^n$ یوه n -ځاییزه اړیکه وي، نو د $\mathcal{M}$ هغه غځونه $\mathcal{M}'$ چې $P^{\mathcal{M}'} = R$ وي، په $(\mathcal{M}, R)$ لیکو.

19.2 فرعي جوړښتونه

د یوه جوړښت $\mathcal{M}$ د تعریف ساحه ښايي د بل جوړښت $\mathcal{M}'$ فرعي سټ وي. خو څرګنده ده چې $\mathcal{M}$ باید یوازې هغه وخت د $\mathcal{M}'$ یوه “برخه” وګڼو چې نه یوازې $|\mathcal{M}| \subseteq |\mathcal{M}'|$ وي، بلکې $\mathcal{M}$ او $\mathcal{M}'$ لږ تر لږه پر کډې برخې $|\mathcal{M}|$ د ژبې د ښو په تفسیرولو کې هم “سره سلا” وي.

تعریف 19.5. د یوې ژبې $\mathcal{L}$ جوړښتونه $\mathcal{M}$ او $\mathcal{M}'$ را کړل شي. وایو $\mathcal{M}$ د $\mathcal{M}'$ فرعي جوړښت، او $\mathcal{M}'$ د $\mathcal{M}$ غځونه ده، چې $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}'$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې

$$1. |\mathcal{M}| \subseteq |\mathcal{M}'| \text{ وي؛}$$

$$2. \text{ د هر داسې ثابت } c \in \mathcal{L} \text{ دپاره، } c^{\mathcal{M}} = c^{\mathcal{M}'} \text{ وي؛}$$

$$3. \text{ د هر داسې } n\text{-ځاییز تابع } f \in \mathcal{L} \text{ دپاره، د ټولو } a_1, \dots, a_n \in |\mathcal{M}| \text{ دپاره } f^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n) = f^{\mathcal{M}'}(a_1, \dots, a_n) \text{ وي؛}$$

$$4. \text{ د هر داسې } n\text{-ځاییز پریدیکات } R \in \mathcal{L} \text{ دپاره، د ټولو } a_1, \dots, a_n \in |\mathcal{M}| \text{ دپاره } \langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathcal{M}} \text{ هله او یوازې هله چې } \langle a_1, \dots, a_n \rangle \in R^{\mathcal{M}'}$$

یادونه 19.6. که ژبه ثابت یا تابعې ونه لري، نو هر $N \subseteq |\mathcal{M}|$ د $\mathcal{M}$ یو فرعي جوړښت $\mathcal{N}$ ټاکي چې د تعریف ساحه ئې $|\mathcal{N}| = N$ دے؛ د دې دپاره $R^{\mathcal{N}} = R^{\mathcal{M}} \cap N^n$ ږدو.

19.3 له بریده اوښتنه

قضیه 19.7. که د جملو یو سټ Γ د هرې کچې متناهي مدلوله ولري، نو یو نامتناهي مدل هم لري.

ثبوت. د Γ ژبه د شمېر وړ نویو ثابتونو $c_0, c_1, \dots$ په ورزیاتولو وغځوئ او سټ $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ وګورئ. دا ویل چې Γ د هرې کچې متناهي مدلوله لري، معنا ئې دا ده چې د هر $m > 0$ دپاره داسې $n \geq m$ شته چې Γ د شمېر n یو مدل لري. له دې پایله کېږي چې $\{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ په متناهي ډول د صدق وړ دے. د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \{c_i \neq c_j : i \neq j\}$ یو مدل $\mathcal{M}$ لري چې د تعریف ساحه ئې باید نامتناهي وي، ځکه ټولې نابرابرۍ $c_i \neq c_j$ پوره کوي. $\square$

قضیه 19.8. د لومړۍ درجې د هیڅ ژبې داسې جمله A نشته چې په یوه جوړښت $\mathcal{M}$ کېنې هله او یوازې هله رښتوني وي چې د دغه جوړښت د تعریف ساحه $|\mathcal{M}|$ نامتناهي وي.

ثبوت. که داسې A موجوده وے، نفي $\neg A$ به ئې په ټولو او یوازې په متناهي جوړښتونه کېنې رښتوني وے؛ نو د هرې کچې متناهي مدلوله به ئې لرل خو نامتناهي مدل به ئې نه درلود، چې دا له 19.7 سره په ټکر کېنې ده. $\square$

19.4 آیزومورف جوړښتونه

د لومړۍ درجې جوړښتونه په دوو لارو یو شان کېدے شي. یوه لار دا ده چې یو شان ترې فارمولونه رښتوني کړي. داسې جوړښتونه ابتدایي هم ارز بولو. خو جوړښتونه ډېر سره توپیر لرلے او بیا هم یو شان ترې فارمولونه رښتوني کولے شي—د بېلګې په توګه، یو ئې د شمېر وړ کېدے شي او بل نه. لامل دا دے چې د یوه جوړښت ډېر خاصیتونه د لومړۍ درجې په ژبو کېنې نه شي بیانېدے؛ یا ځکه چې ژبه پوره بډایه نه وي، یا د لومړۍ درجې منطق د بنسټیزو محدودیتونو، لکه د لوښایم—سکولم د قضیې، له امله. نو بله او لا سخته معنا چې جوړښتونه پکې یو شان کېدے شي دا ده چې له بنسټه هماغه وي: یوازې په هغو څیزونو کېنې توپیر ولري چې ترې جوړ دي، خو په جوړښتي خاصیتونو کېنې نه. د دې خبرې د دقیقولو یوه لار د آیزومورفیزم مفهوم دے.

تعریف 19.9. د یوې ژبه $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathcal{M}$ او $\mathcal{M}'$ را کړل شي. وایو $\mathcal{M}$ له $\mathcal{M}'$ سره ابتدایي هم ارز دے، چې $\mathcal{M} \equiv \mathcal{M}'$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې د $\mathcal{L}$ د هرې ترلے فارمول A دپاره $\mathcal{M} \models A$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}' \models A$ وي.

تعریف 19.10. د یوې ژبه $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathcal{M}$ او $\mathcal{M}'$ را کړل شي. وایو $\mathcal{M}$ له $\mathcal{M}'$ سره آیزومورف دے، چې $\mathcal{M} \simeq \mathcal{M}'$ ئې لیکو، هله او یوازې هله چې داسې تابع $h: |\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{M}'|$ شته چې:

$$1. \quad h \text{ یو پریو ده: که } h(x) = h(y) \text{ وي، نو } x = y;$$

$$2. \quad h \text{ پر هدف سټ بشپړه ده: د هر } y \in |\mathcal{M}'| \text{ دپاره داسې } x \in |\mathcal{M}| \text{ شته چې } h(x) = y;$$

$$3. \quad \text{د هر ثابت سمبول } c \text{ دپاره: } h(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{M}'};$$

$$4. \quad \text{د هر } n\text{-ځاییز پریډیکات } P \text{ دپاره:}$$

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathcal{M}} \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad \langle h(a_1), \dots, h(a_n) \rangle \in P^{\mathcal{M}'};$$

$$5. \quad \text{د هر } n\text{-ځاییز تابع } f \text{ دپاره:}$$

$$h(f^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{M}'}(h(a_1), \dots, h(a_n)).$$

قضیه 19.11. که $\mathcal{M} \simeq \mathcal{M}'$ وي، نو $\mathcal{M} \equiv \mathcal{M}'$.

ثبوت. فرض کړئ h له $\mathcal{M}$ څخه پر $\mathcal{M}'$ یو آیزومورفیزم دے. د هرې کومارنې s دپاره $h \circ s$ د h او s ترکیب، یعنې په $\mathcal{M}'$ کېنې هغه کومارنه ده چې $(h \circ s)(x) = h(s(x))$ وي. پر t او A په استقرا لاندې پیاوړې دعوې ثابتولے شو:

$$a. \quad h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t)$$

$$b. \quad \mathcal{M}, s \models A \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad \mathcal{M}', h \circ s \models A.$$

لومړۍ دعوه د t پر پچلتیا په استقرا ثابتېږي.

$$1. \quad \text{که } t \equiv c \text{ وي، نو } \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(c) = c^{\mathcal{M}} \text{ او } \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(c) = c^{\mathcal{M}'} \text{ نو } h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)) = h(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{M}'} = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t)$$

$$2. \quad \text{که } t \equiv x \text{ وي، نو } \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(x) = s(x) \text{ او } \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(x) = h(s(x)) \text{ نو } h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(x)) = h(s(x)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(x)$$

$$3. \quad \text{که } t \equiv f(t_1, \dots, t_n) \text{ وي، نو}$$

$$\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t) = f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n)) \quad \text{او}$$

$$\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t) = f^{\mathcal{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_n)).$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-001) سرچینې په دویمه کړنځه کېنې د دویم جوړښت د ترم قیمت د لومړي جوړښت د تابعې په تفسیر لیکلے و؛ دلته د هماغې کړنې د دویم جوړښت تفسیر بېرته ایښوول شوے دے. د استقرا فرض دا دے چې د هر i دپاره $h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_i)) = \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_i)$ نو

$$\begin{aligned} h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)) &= h(f^{\mathcal{M}}(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1), \dots, \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n))) \\ &= f^{\mathcal{M}'}(h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_1)), \dots, h(\text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t_n))) \end{aligned} \quad (19.1)$$

$$\begin{aligned} &= f^{\mathcal{M}'}(\text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_1), \dots, \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t_n)) \quad (19.2) \\ &= \text{Val}_{h \circ s}^{\mathcal{M}'}(t) \end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-002) سرچینې د لومړۍ کړنې د بهرنۍ تابعې ترونکې قوس غورځولې وه؛ دلته هغه قوس بېرته ایښوول شوے دے. دلته 19.1 د 19.10 له 5 او 19.2 د استقرا له فرض څخه پایله کېږي.

د (b) برخې ثبوت د تمرین دپاره پرېښودل شوے دے۔

□ که A جمله وي، کومارنې s او $h \circ s$ بې اغېزې دي، او $\mathcal{M} \models A$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}' \models A$ لرو۔

تمرین 19.12. د 19.11 د (b) برخې ثبوت په تفصیل بشپړ کړئ۔ پام وکړئ چې د 19.10 د آیزومورفیزم ځانګړونکي پنځه خاصیتونه هر یو چېرته کارول کېږي۔

تعریف 19.13. د یوه جوړښت $\mathcal{M}$ اتومورفیزم له $\mathcal{M}$ څخه پر خپل ځان یو آیزومورفیزم دے۔

تمرین 19.14. وښیئ چې د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره، که X د $\mathcal{M}$ یو تعریفېدونکی فرعي سټ او h د $\mathcal{M}$ یو اتومورفیزم وي، نو $X = \{h(x) : x \in X\}$ (یعنې X د h لاندې ثابت پاتې کېږي)۔

19.5 د یوه جوړښت تیوري

هر جوړښت $\mathcal{M}$ ځینې ترېلي فارمولونه رښتوني او ځینې دروغې کوي۔ د هغو ټولو ترېلي فارمولونه سټ چې دا جوړښت یې رښتوني کوي، د هغه تیوري بلل کېږي۔ دا سټ په رښتیا یوه تیوري ده، ځکه د هغې هر معنایي استلزام باید د هغې په ټولو مدلونو، او له دې ډلې په $\mathcal{M}$ کېنې، رښتونه وي۔

تعریف 19.15. یو جوړښت $\mathcal{M}$ را ګړ شي۔ د $\mathcal{M}$ تیوري د هغو ترېلي فارمولونه سټ $\text{Th}(\mathcal{M})$ دے چې په $\mathcal{M}$ کېنې رښتوني وي، یعنې $\text{Th}(\mathcal{M}) = \{A : \mathcal{M} \models A\}$ ۔

د “تیوري” اصطلاح په غیرصوري ډول د هغو ترېلي فارمولونه ستونو دپاره هم کاروو چې یو ټاکلې مطلوب تفسیر لري، که د استنتاج لاندې ترېلي وي او که نه۔

قضیه 19.16. د هر $\mathcal{M}$ دپاره $\text{Th}(\mathcal{M})$ بشپړه ده۔

□ ثبوت. د هرې ترلې فارمول A دپاره یا $\mathcal{M} \models A$ وي یا $\mathcal{M} \models \neg A$ ؛ نو یا $A \in \text{Th}(\mathcal{M})$ وي یا $\neg A \in \text{Th}(\mathcal{M})$ ۔

قضیه 19.17. که د هر $A \in \text{Th}(\mathcal{M})$ دپاره $\mathcal{N} \models A$ وي، نو $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$ ۔

□ ثبوت. دا چې د ټولو $A \in \text{Th}(\mathcal{M})$ دپاره $\mathcal{N} \models A$ دے، $\text{Th}(\mathcal{M}) \subseteq \text{Th}(\mathcal{N})$ ۔ که $\mathcal{N} \models A$ وي، نو $\neg A \notin \text{Th}(\mathcal{N})$ ؛ ځکه نو $\neg A \notin \text{Th}(\mathcal{M})$ ۔ دا چې $\text{Th}(\mathcal{M})$ بشپړه ده، $\neg A \in \text{Th}(\mathcal{M})$ ۔ نو $\text{Th}(\mathcal{N}) \subseteq \text{Th}(\mathcal{M})$ ، او له دې $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$ لرو۔

یادونه 19.18. $\mathfrak{R} = \langle \mathbb{R}, < \rangle$ وګورئ: دا هغه جوړښت دے چې د تعریف ساحه یې د حقیقي عددونو سټ $\mathbb{R}$ او ژبه یې یوازې یو دوه ځاییز پریدیکات لري چې پر حقیقي عددونو د $<$ اړیکې په توګه تفسیر شوے۔ څرګنده ده چې $\mathfrak{R}$ د شمېر نه وړ دے؛ خو دا چې $\text{Th}(\mathfrak{R})$ څرګنده سازګاره ده، د لوېنهایم-سکولم د قضیې له مخې د شمېر وړ مدل لري، مثلاً $\mathfrak{C}$ ، او د 19.17 له مخې $\mathfrak{R} \equiv \mathfrak{C}$ ۔ سربېره پر دې، دا چې $\mathfrak{R}$ او $\mathfrak{C}$ آیزومورف نه دي، ښیي چې د 19.11 معکوس په عام ډول نه صدق کوي۔

19.6 جزوي آيزومورفيزمونه

تعريف 19.19. دوه جوړښتونه $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ را کړل شي. له $\mathcal{M}$ څخه $\mathcal{N}$ ته جزوي آيزومورفيزم يوه متناهي جزوي تابع p ده چې ارگومېنټونه $\mathcal{M}$ کېني او قيمتونه $\mathcal{N}$ کېني وي، او د 19.10 د آيزومورفيزم شرطونه پر خپله د تعريف ساحه پوره کوي:

1. p يو پريو ده؛

2. د هر ثابت سمبول c دپاره: که $p(c^{\mathcal{M}}) = c^{\mathcal{N}}$ تعريف شوی وي، نو

3. د هر n -ځاييز پريديکات P دپاره: که $a_1, \dots, a_n$ د p د تعريف په ساحه کېني وي، نو $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \in P^{\mathcal{M}}$ هله او يوازې هله چې $\langle p(a_1), \dots, p(a_n) \rangle \in P^{\mathcal{N}}$

4. د هر n -ځاييز تابع f دپاره: که $a_1, \dots, a_n$ د p د تعريف په ساحه کېني وي، نو $p(f^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{N}}(p(a_1), \dots, p(a_n))$

د p متناهي والی په دې معنا دے چې $\text{dom}(p)$ متناهي ده.

پام وکړئ چې تشه تابع $\emptyset$ تل د هر دوو جوړښتونه تر منځ يو جزوي آيزومورفيزم وي.

تعريف 19.20. دوه جوړښتونه $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ په جزوي ډول آيزومورف دي، چې $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ ئې ليکو، هله او يوازې هله چې د $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ تر منځ د جزوي آيزومورفيزمونو يو ناتش سټ I وي چې د $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ شا خاصيت پوره کوي:

1. (خ) د هر $p \in I$ او $a \in |\mathcal{M}|$ دپاره داسې $q \in I$ شته چې $p \subseteq q$ او a د q د تعريف په ساحه کېني وي؛

2. (ش) د هر $p \in I$ او $b \in |\mathcal{N}|$ دپاره داسې $q \in I$ شته چې $p \subseteq q$ او b د q د قيمتونو په ساحه کېني وي.

قضيه 19.21. که $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ وي او $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ د شمېر وړ وي، نو $\mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$.

ثبوت. دا چې $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ د شمېر وړ دي، فرض کړئ $|\mathcal{M}| = \{a_0, a_1, \dots\}$ او $|\mathcal{N}| = \{b_0, b_1, \dots\}$. له يوه خپل سري $p_0 \in I$ څخه په پيل، د جزوي آيزومورفيزمونو زياتېدونکې لړۍ $p_0 \subseteq p_1 \subseteq p_2 \subseteq \dots$ داسې تعريفوو:

1. که $n+1$ طاق وي، يعنې $n = 2r$ ، نو د $\mathcal{M}$ خاصيت په کارولو داسې $p_{n+1} \in I$ ومومئ چې $p_n \subseteq p_{n+1}$ او a_r د p_{n+1} د تعريف په ساحه کېني وي؛

2. که $n+1$ جفت وي، يعنې $n+1 = 2r$ ، نو د $\mathcal{N}$ خاصيت په کارولو داسې $p_{n+1} \in I$ ومومئ چې $p_n \subseteq p_{n+1}$ او b_r د p_{n+1} د قيمتونو په ساحه کېني وي.

اوس که

$$p = \bigcup_{n \geq 0} p_n,$$

□

کېږدو، نو p د $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ تر منځ يو آيزومورفيزم دے.

تمرين 19.22. په تفصيل وښيئ چې په 19.21 کېني تعريف شوی p په رښتيا يو آيزومورفيزم دے.

قضيه 19.23. فرض کړئ $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ د يوې سوچه اريکيزې ژبه جوړښتونه دي (داسې ژبه چې يوازې پريديکاتونه لري او تابعي يا ثابتونه نه لري). بيا که $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ وي، نو $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$ هم وي.

ثبوت. پر فارمولونه په استقرا ښودل کېږي چې که $a_1, \dots, a_n$ او $b_1, \dots, b_n$ داسې وي چې یو جزوي آیزومورفیزم p هر a_i پر b_i وړي، او $s_1(x_i) = a_i$ او $s_2(x_i) = b_i$ وي (د $i = 1, \dots, n$ دپاره)، نو $\mathcal{M}, s_1 \models A$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}, s_2 \models A$ وي. د $n = 0$ حالت $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$ راکوي. □

یادونه 19.24. که تابعې موجودې وي، مخکینۍ پایله بیا هم رښتونی ده، خو د هغه آیزومورفیزم څېړل پکار دي چې p ئې د $a_1, \dots, a_n$ له خوا د $\mathcal{M}$ پر تولید شوي فرعي جوړښت او د $b_1, \dots, b_n$ له خوا د $\mathcal{N}$ پر تولید شوي فرعي جوړښت رامنځته کوي.

مخکینۍ پایله په پړاوونو هم “ماتېدۍ” شي: په یوه فارمول کښې د یو بل دننه کمیت ټاکونکو د شمېر او د اړوندو جزوي آیزومورفیزمونو د غځېدو د ځلونو تر منځ اړیکه ټینګوو.

تعریف 19.25. د هر فارمول A دپاره، د A د کمیت ټاکونکو رتبه، چې $qr(A) \in \mathbb{N}$ ئې لیکو، په بازګشتي ډول په A کښې د یو بل دننه کمیت ټاکونکو تر ټولو لوړه شمېره تعریفېږي. دوه جوړښتونه $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ هم ارز دي، چې $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$ ئې لیکو، که د کمیت ټاکونکو د مرتبې تر n پورې پر ټولو جملو سره سلا وي.

قضیه 19.26. فرض کړئ $\mathcal{L}$ یوه متناهي سوچه اړیکیزه ژبه ده، یعنې داسې ژبه چې متناهي شمېر پریدیکاتونه او ثابت سمبولونه لري او تابعې نه لري. بیا د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره، له منطقي هم ارزۍ پرته، د $\mathcal{L}$ په ژبه کښې یوازې متناهي ډېرې داسې د لومړۍ درجې ترې فارمولونه شته چې د کمیت ټاکونکو رتبه ئې تر n زیاته نه وي.

□

ثبوت. پر n په استقرا.

تعریف 19.27. یو جوړښت $\mathcal{M}$ راکړل شي. $|\mathcal{M}|^{<\omega}$ د $|\mathcal{M}|$ پر غړو د ټولو متناهي لړیو سټ ونیسۍ. په $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \dots$ د غړو متناهي لړۍ ښیو. که $\mathbf{a} \in |\mathcal{M}|^{<\omega}$ او $\mathbf{a} \in |\mathcal{M}|$ وي، نو $\mathbf{aa}$ له $\mathbf{a}$ سره د $\mathbf{a}$ نښلون ښیي.

تعریف 19.28. جوړښتونه $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ راکړل شي. د یو شان اوږدوالي لړیو تر منځ اړیکې $|\mathcal{M}|^{<\omega} \times |\mathcal{N}|^{<\omega}$ د I_n پر n په بازګڼت داسې تعریفوو:

1. $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ په $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ کښې یو شان اتومي فارمولونه پوره کړي، یعنې که د دواړو لړیو اوږدوالی k وي، $s_1(x_i) = a_i$ او $s_2(x_i) = b_i$ وي، او A داسې اتومي فارمول وي چې ټول متغیرونه ئې په $x_1, \dots, x_k$ کښې وي، نو $\mathcal{M}, s_1 \models A$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{N}, s_2 \models A$ وي.

2. $I_{n+1}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله چې د هر $\mathbf{a} \in |\mathcal{M}|$ دپاره داسې $\mathbf{b} \in |\mathcal{N}|$ وي چې $I_n(\mathbf{aa}, \mathbf{bb})$ ، او برعکس.

د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-003) سرچینې په لومړي شرط کښې د لړیو د اوږدوالي شاخص د اړیکو د بازګشتي شاخص سره یو شان نیولې و؛ دلته اوږدوالی په بېل k ښودل شوی، خو لومړنۍ اړیکه د هر اوږدوالي د لړیو اتومي فارمولونه پرتله کړي.

تعریف 19.29. $\mathcal{M} \approx_n \mathcal{N}$ لیکو که $I_n(\Lambda, \Lambda)$ د $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ دپاره صدق وکړي (دلته Λ تشه لړۍ ده).

قضیه 19.30. فرض کړئ $\mathcal{L}$ یوه سوچه اړیکیزه ژبه ده. بیا $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ دا لازمي چې د هر داسې A دپاره چې $qr(A) \leq n$ وي، $\mathcal{M}, \mathbf{a} \models A$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{N}, \mathbf{b} \models A$ وي (دلته هم، $\mathbf{a}$ هغه وخت A پوره کوي چې هره داسې s چې $s(x_i) = a_i$ وي، A پوره کړي). سر بېره پر دې، که $\mathcal{L}$ متناهي وي، معکوس هم صدق کوي.

ثبوت. دا چې $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ لازمي چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ د کمیت ټاکونکو تر n پورې یو شان فارمولونه پوره کوي، پر A په اسانه استقرا ثابتېږي. د معکوس دپاره پر n استقرا کوو او 19.26 کاروو، چې تضمینوي د هر n دپاره د هغې مرتبې تر ډېره متناهي ډېر یو له بله نه هم ارز فارمولونه شته.

د $n = 0$ دپاره، دا فرض چې $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ یو شان بې کمیت ټاکونکو فارمولونه پوره کوي، راکوي چې یو شان اتومي فارمولونه پوره کوي، نو $I_0(\mathbf{a}, \mathbf{b})$.

د $n + 1$ په حالت کېنې فرض کړئ a او b د کمیت ټاکونکو تر $n + 1$ پورې یو شان فارمولونه پوره کوي. د $I_{n+1}(a, b)$ د ښودلو دپاره کافي ده چې د هر $a \in |\mathcal{M}|$ دپاره داسې $b \in |\mathcal{N}|$ وښیو چې $I_n(aa, bb)$ ؛ او د استقرا له فرضه بیا کافي ده وښیو چې د هر $a \in |\mathcal{M}|$ دپاره داسې $b \in |\mathcal{N}|$ شته چې aa او bb د کمیت ټاکونکو تر n پورې یو شان فارمولونه پوره کوي.

یو $a \in |\mathcal{M}|$ راکړل شي. T_n^a ! د رتبې تر n پورې د هغو فارمولونه $B(x, y)$ سټ ونیسئ چې aa ئې په $\mathcal{M}$ کېنې پوره کوي، T_n^a ! له منطقي هم ارزۍ پرته متناهي دے، نو د غړو د تړون په اخیستو ئې یو د لومړۍ درجې فارمول ګڼلے شو. له دې پایله کېږي چې a $\exists x!T_n^a(x, y)$ پوره کوي، چې د کمیت ټاکونکو رتبه ئې تر $n + 1$ زیاته نه ده. د فرض له مخې b هماغه فارمول په $\mathcal{N}$ کېنې پوره کوي؛ نو داسې $b \in |\mathcal{N}|$ شته چې T_n^a, bb پوره کوي. په ځانګړي ډول، bb د کمیت ټاکونکو تر n پورې هماغه فارمولونه پوره کوي چې aa ئې پوره کوي. په ورته ډول ښودل کېږي چې د هر $b \in |\mathcal{N}|$ دپاره داسې $a \in |\mathcal{M}|$ شته چې aa او bb د کمیت ټاکونکو تر n پورې یو شان فارمولونه پوره کوي، په دې سره ثبوت بشپړېږي.

نتیجه 19.31. که $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ په یوه متناهي ژبه کېنې سوچه اړیکیز جوړښتونه وي، نو $\mathcal{M} \approx_n \mathcal{N}$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$ وي. په ځانګړي ډول، $\mathcal{M} \equiv \mathcal{N}$ هله او یوازې هله چې د هر n دپاره $\mathcal{M} \approx_n \mathcal{N}$ وي.

19.7 بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیبونه

تعریف 19.32. بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیب د هغې ژبه یو جوړښت $\mathcal{M}$ دے چې یوازینۍ دوه ځاییز پریډیکات $<$ لري او لاندې جملې پوره کوي:

$$1. \forall x \neg x < x$$

$$2. \forall x \forall y \forall z (x < y \rightarrow (y < z \rightarrow x < z))$$

$$3. \forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$$

$$4. \forall x \exists y x < y$$

$$5. \forall x \exists y y < x$$

$$6. \forall x \forall y (x < y \rightarrow \exists z (x < z \wedge z < y))$$

قضیه 19.33. هر دوه د شمېر وړ، بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیبونه آیزومورف دي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathcal{M}_1$ او $\mathcal{M}_2$ د شمېر وړ، بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیبونه دي، $<_1 = <^{\mathcal{M}_1}$ او $<_2 = <^{\mathcal{M}_2}$ ، او I د دوی تر منځ د ټولو جزوي آیزومورفیزمونو سټ دے. I تش نه دے، ځکه لږ تر لږه $\emptyset \in I$. ښیو چې I د مخ او شا خاصیت پوره کوي. بیا $\mathcal{M}_1 \simeq_p \mathcal{M}_2$ ، او قضیه له 19.21 څخه پایله کېږي.

د دې د ښودلو دپاره چې I د مخ خاصیت پوره کوي، فرض کړئ $p \in I$ او $i = 1, \dots, n$ دپاره $p(a_i) = b_i$ ، او د عمومیت له زیان پرته فرض کړئ $a_1 <_1 a_2 <_1 \dots <_1 a_n$. یو $a \in |\mathcal{M}_1|$ چې راکړل شي، $b \in |\mathcal{M}_2|$ داسې ومومئ:

$$1. \text{ که } a <_1 a_1 \text{ وي، } b \in |\mathcal{M}_2| \text{ داسې ونیسئ چې } b <_2 b_1$$

$$2. \text{ که } a_n <_1 a \text{ وي، } b \in |\mathcal{M}_2| \text{ داسې ونیسئ چې } b_n <_2 b$$

$$3. \text{ که د کوم } i \text{ دپاره } a_i <_1 a <_1 a_{i+1} \text{ وي، نو } b \in |\mathcal{M}_2| \text{ داسې ونیسئ چې } b_i <_2 b <_2 b_{i+1}$$

د مطلوب خاصیت لرونکې b تل موندل کېدے شي، ځکه $\mathcal{M}_2$ بې له سرحدي ټکو ګڼ خطي ترتیب دے. $q = p \cup \{ \langle a, b \rangle \}$ داسې تعریف کړئ چې $q \in I$ د p مطلوبه غځونه وي. په دې سره د مخ خاصیت ثابت شو. د شا خاصیت هم ورته دے. نو $\mathcal{M}_1 \simeq_p \mathcal{M}_2$ ؛ او د 19.21 له مخې $\mathcal{M}_1 \simeq \mathcal{M}_2$.

تمرین 19.34. د 19.33 ثبوت په دې بنودلو بشپړ کړئ چې I د شا خاصیت پوره کوي.

یادونه 19.35. $\mathcal{G}$ ، بې له سرحدي ټکو هر د شمېر ورکړنې خطي ترتیب، ونیسئ. بیا (د 19.33 له مخې) $\mathcal{G} \simeq \mathcal{Q}$ ، چې $\mathcal{Q} = (\mathbb{Q}, <)$ هغه د شمېر ورکړنې خطي ترتیب دے چې د تعریف ساحه یې د ناطقو عددونو سټ $\mathbb{Q}$ دے. اوس د 19.18 جوړښت $\mathcal{R} = (\mathbb{R}, <)$ بیا وگورئ. مو ولیدل چې داسې د شمېر ورکړنې جوړښت $\mathcal{G}$ شته چې $\mathcal{R} \equiv \mathcal{G}$ ، خو $\mathcal{G}$ ، بې له سرحدي ټکو یو د شمېر ورکړنې خطي ترتیب دے؛ نو له جوړښت $\mathcal{Q}$ سره ایزومورف (او ځکه ابتدایي هم ارز) جوړښت دے. د ابتدایي هم ارزۍ له انتقالیت څخه $\mathcal{R} \equiv \mathcal{Q}$ پایله کېږي. (دا مو په مستقیم ډول هم بنودلے شول: د هماغه مخ او شا دلیل په وسیله مو $\mathcal{Q} \simeq_p \mathcal{R}$ ټینګولے شو.)

باب 20

د حساب مدلونه

20.1 سریزه

د حساب معیاري مدل هغه جوړښت $\mathcal{M}$ دے چې $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ وي او 0 ، 1 ، $+$ ، $\times$ او $<$ هغسې تفسیر شوي وي لکه تمه چې ترې کېږي. یعنې 0 ، 1 د جانشین تابع ده، $+$ د جمع په توګه او $\times$ د ضرب په توګه د $\mathbb{N}$ د شمېرو تفسیر لري. په ځانګړي ډول:

$$\begin{aligned} 0^{\mathcal{M}} &= 0 \\ 1^{\mathcal{M}}(n) &= n + 1 \\ +^{\mathcal{M}}(n, m) &= n + m \\ \times^{\mathcal{M}}(n, m) &= nm \end{aligned}$$

البته د $\mathcal{L}_A$ داسې جوړښتونه هم شته چې تعریف ساحې $\mathbb{N}$ له څخه بېلې دي. د بېلګې په توګه، $\mathcal{M}$ داسې ونیسئ چې $|\mathcal{M}| = \{a\}^*$ وي (د یوازې نښې a متناهي لړۍ، یعنې $\emptyset$ ، a ، aa ، aaa ، ...)، او تفسیرونه یې داسې وي:

$$\begin{aligned} 0^{\mathcal{M}} &= \emptyset \\ 1^{\mathcal{M}}(s) &= s \frown a \\ +^{\mathcal{M}}(n, m) &= a^{n+m} \\ \times^{\mathcal{M}}(n, m) &= a^{nm} \end{aligned}$$

دا دوه جوړښتونه په دې معنا «په اصل کېنې یو شان» دي چې یوازینۍ توپیر یې د غړي او د تعریف ساحې په څیزونو کېنې دے، نه دا چې د تفسیر د تابعو له مخې د د تعریف ساحې غړي له یو بل سره څنګه تړاو لري. موږ وایو چې دا دوه جوړښتونه آیزومورف دي.

د متناهي شاهد له قضیه څخه په اسانۍ پایله کېږي چې هره تیوري چې په $\mathcal{M}$ کېنې رښتوې وي، داسې مدلونه هم لري چې له $\mathcal{M}$ سره آیزومورف نه وي. دا ډول جوړښتونه نامعیاري بلل کېږي. په معیاري مدل کېنې (یعنې په $\mathcal{M}$ او له هغې سره په ټولو آیزومورفو جوړښتونو کېنې) ټول غړي د معیاري عددنښو په ارزښتونو $\bar{n}$ کېنې راټولېږي، یعنې:

$$|\mathcal{M}| = \{\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

خو په نامعیاري مدلونو کېنې داسې نه ده: که $\mathcal{M}$ نامعیاري وي، نو لږ تر لږه یو $x \in |\mathcal{M}|$ شته چې د هېڅ n دپاره $x \neq \text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$ وي.

دا نامعیاري عناصر په زړه پورې دي: «نامتناهي طبیعی شمېرې» دي. خو د هغو شتون د ناکمیلۍ پدیدې هم په یوه معنا روښانوي. د بېلګې په توګه د پیاوړو حساب د سازګارۍ جمله، Con_{PA} ، یعنې $\neg \exists x \text{Prf}_{\text{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$ ، راواخلئ. څرنګه چې PA نه Con_{PA} ثابتوي او نه $\neg \text{Con}_{\text{PA}}$ ، نو هره یوه جمله په سازګار ډول له PA سره یوځای کېدای شي. څرنګه چې PA سازګاره ده، $\mathcal{M} \models \text{Con}_{\text{PA}}$ او په پایله کېنې $\mathcal{M} \models \neg \text{Con}_{\text{PA}}$ لرو. نو $\mathcal{M}$ د $\text{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\text{PA}}\}$ مدل نه دے، او ټول مدلونه یې باید نامعیاري وي. د $\text{PA} \cup \{\neg \text{Con}_{\text{PA}}\}$ مدلونه باید داسې یو غړی ولري چې د $\exists x \text{Prf}_{\text{PA}}(x, \ulcorner \perp \urcorner)$ د رښتینولۍ شاهد وي، یعنې له PA څخه د تناقض د اشتقاق کوډل عدد وي. داسې

غږے معیاري کېدے نه شي، ځکه د هر n دپاره $\text{PA} \vdash \neg \text{Prf}_{\text{PA}}(\bar{n}, \ulcorner \perp \urcorner)$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-004) سرچینې د وجودي جملې په دویم ځل لیکلو کېنې د ثبوت د کوډ ارکومېنټ x غورځولې و؛ دلته د ثبوت د نسبت دوه ارکومېنټه بڼه بېرته لیکل شوې، لکه د همدې فقرې په لومړي تعريف او په ورپسې معیاري عددنښه کېنې چې راغلې ده.

20.2 د حساب معیاري مدلوله

د حساب ژبه $\mathcal{L}_A$ په څرګند ډول د شمېرو، په ځانګړي ډول د طبیعي شمېرو، په هکله ده. نو «معیاري مدل» $\mathcal{M}$ ځانګړے دے: همدا هغه مدل دے چې موږ ئې په هکله خبرې کول غواړو. خو په منطق کېنې زموږ پام ډېر ځله یوازې جوړښتي ځانګړتیاوو ته وي، او هر دوه آیزومورف جوړښتونه دغه ځانګړتیاوې ګډې لري. نو لږ پراخ فکر کولے شو او هر هغه جوړښت چې له $\mathcal{M}$ سره آیزومورف وي «معیاري» وبلو.

تعريف 20.1. د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت معیاري دے، که له $\mathcal{M}$ سره آیزومورف وي.

قضیه 20.2. که جوړښت $\mathcal{M}$ معیاري وي، نو تعريف ساحه ئې د معیاري عددنښو د ارزښتونو سټ دے، یعنې:

$$|\mathcal{M}| = \{\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$$

ثبوت. څرګنده ده چې هر $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n}) \in |\mathcal{M}|$ دے. یوازې دا ښودل پاتې دي چې هر $x \in |\mathcal{M}|$ د کوم n دپاره $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$ دے. څرنګه چې $\mathcal{M}$ معیاري دے، له $\mathcal{M}$ سره آیزومورف دے. فرض کړئ $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathcal{M}|$ آیزومورفیزم وي. بیا $g(n) = g(\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n}))$ خو د هر $x \in |\mathcal{M}|$ دپاره داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې $g(n) = x$ وي، ځکه g پر هدف سټ بشپړه ده. $\square$

که د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت $\mathcal{M}$ معیاري وي، د د تعريف ساحه ټول غړي ئې د معیاري عددنښو $0, \bar{1}, \bar{2}, \dots$ په نوم یادېدے شي، یعنې د $0, 0', 0''$ او داسې نورو ترمونو په وسیله. البته دا معنا نه لري چې د $|\mathcal{M}|$ غړي پخپله شمېرې دي؛ یوازې دومره ده چې د هغو په نښه کولے شو، لکه څنګه چې په $|\mathcal{M}|$ کېنې شمېرې نښه کوو.

تمرین 20.3. وښیئ چې د 20.2 معکوس ناسم دے؛ یعنې داسې یو جوړښت $\mathcal{M}$ ورکړئ چې $|\mathcal{M}| = \{\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ وي، خو له $\mathcal{M}$ سره آیزومورف نه وي.

قضیه 20.4. که $\mathcal{M} \models \mathbf{Q}$ او $|\mathcal{M}| = \{\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n}) : n \in \mathbb{N}\}$ وي، نو $\mathcal{M}$ معیاري دے.

ثبوت. باید وښیو چې $\mathcal{M}$ له $\mathcal{M}$ سره آیزومورف دے. تابع $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathcal{M}|$ داسې وښیئ: $g(n) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$. د فرض له مخې g پر هدف سټ بشپړه ده. دا یو پر یو هم ده: هر کله چې $n \neq m$ وي، $\mathbf{Q} \vdash \bar{n} \neq \bar{m}$ نو له $\mathcal{M} \models \mathbf{Q}$ څخه $\mathcal{M} \models \bar{n} \neq \bar{m}$ ، هر کله چې $n \neq m$ په پایله کېنې $n \neq m$ وي، نو $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n}) \neq \text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{m})$ ، یعنې $g(n) \neq g(m)$. اوس باید دا هم وڅېړو چې g آیزومورفیزم دے.

1. $g(0) = g(o^{\mathcal{M}})$ ، ځکه $o^{\mathcal{M}} = 0$ د g له تعريفه $g(0) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{0})$ خو $\bar{0}$ هماغه 0 دے، او د داسې ترم ارزښت چې ثابت سمبول وي، هغه څه دے چې جوړښت ئې دغه ثابت سمبول ته ټاکي، یعنې $\text{Val}^{\mathcal{M}}(0) = o^{\mathcal{M}}$ نو $g(o^{\mathcal{M}}) = o^{\mathcal{M}}$ ، لکه اړین چې و.

2. $g(r^{\mathcal{M}}(n)) = g(n+1)$ ، ځکه په $\mathcal{M}$ کېنې $r^{\mathcal{M}}$ پر $\mathbb{N}$ د جانشین تابع ده. بیا د g له تعريفه $g(n+1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(\overline{n+1})$ خو $\overline{n+1}$ له $\overline{n'}$ سره یو ترم دے، نو $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\overline{n+1}) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(\overline{n'})$ د ارزښت د تابعي له تعريفه دا $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\overline{n'}) = r^{\mathcal{M}}(\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n}))$ دے. څرنګه چې $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n}) = g(n)$ نو $r^{\mathcal{M}}(g(n)) = g(r^{\mathcal{M}}(n))$.

3. $g(+^{\mathfrak{N}}(n, m)) = g(n + m)$ ځکه په $\mathfrak{N}$ کېنې د $\mathbb{N}$ د جمع تابع ده. بیا د g له تعریفه $g(n + m) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n + m})$ خو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n + m} = (\overline{n} + \overline{m})$ نو $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n + m}) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n} + \overline{m})$ د ارزښت د تابعې له تعریفه دا $(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m})) +^{\mathfrak{M}} =$ دے. څرنکه چې $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}) = g(n)$ او $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m}) = g(m)$ نو $-g(+^{\mathfrak{N}}(n, m)) = +^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$

4. $g(\times^{\mathfrak{N}}(n, m)) = \times^{\mathfrak{M}}(g(n), g(m))$ تمرین.

5. $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ هله او یوازې هله چې $n < m$ که وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \overline{n} < \overline{m}$ او $\mathfrak{M} \models \overline{n} < \overline{m}$ هم لرو. نو $\langle \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n}), \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{m}) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$ یعنې $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$ که $n \not< m$ وي، نو $\mathbf{Q} \vdash \neg \overline{n} < \overline{m}$ او په پایله کېنې $\mathfrak{M} \not\models \overline{n} < \overline{m}$ نو، لکه مخکې، $\langle g(n), g(m) \rangle \notin <^{\mathfrak{M}}$ په ګډه: $\langle n, m \rangle \in <^{\mathfrak{N}}$ هله او یوازې هله چې $\langle g(n), g(m) \rangle \in <^{\mathfrak{M}}$

□

تابع g د $\mathcal{L}_A$ د هر بل جوړښت $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحې ته له $\mathbb{N}$ څخه د نقشبې تر ټولو څرګنده لار ده، ځکه هر داسې $\mathfrak{M}$ هغه غړي لري چې $0, 1, 2$ او داسې نورو په نومونو یادېږي. نو د حیرانتیا خبره نه ده چې که $\mathfrak{M}$ د $\overline{n}$ په باب لږ تر لږه ځینې بنسټیزې ویناوې هماغسې رښتوني کړي لکه $\mathfrak{N}$ او g هم دوه اړخیزه یو په یو وي، نو g آیزومورفیزم ګرځي. په حقیقت کېنې که $|\mathfrak{M}|$ له هغو غړي پرته چې $\overline{n}$ ټي نوموي بل څه نه لري، نو همدا یوازینۍ آیزومورفیزم دے.

قضیه 20.5. که $\mathfrak{M}$ معیاري وي، نو د 20.4 له ثبوت څخه g له $\mathfrak{N}$ څخه $\mathfrak{M}$ ته یوازینۍ آیزومورفیزم دے.

ثبوت. فرض کړئ $h: \mathbb{N} \rightarrow |\mathfrak{M}|$ له $\mathfrak{N}$ څخه $\mathfrak{M}$ ته آیزومورفیزم وي. د n پر بنسټ استقرا ښیو چې $-g = h$ که $n = 0$ وي، نو د g له تعریفه $g(0) = 0^{\mathfrak{M}}$ خو څرنکه چې h آیزومورفیزم دے، $h(0) = h(0^{\mathfrak{N}}) = 0^{\mathfrak{M}}$ نو $-g(0) = h(0)$ اوس د $n + 1$ حالت راواخلئ:

$$\begin{aligned} g(n + 1) &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n + 1}) \text{ له تعریفه} \\ &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n'} \overline{n + 1} \equiv \overline{n'}) \text{ ځکه} \\ &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t') \text{ له تعریفه} \\ &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(\overline{n})) \text{ د} \\ &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(g(n)) \text{ له تعریفه} \\ &= \text{Val}^{\mathfrak{M}}(h(n)) \text{ د استقرايي فرض له مخې} \\ &= h(\text{Val}^{\mathfrak{M}}(n)) \text{ ځکه} \\ &= h(n + 1) \end{aligned}$$

□

د هر شمېرېدونکې لامتناهي سټ M د $\mathbb{N}$ او M تر منځ یوه دوه اړخیزه یو پر یو تابع شته، نو هر داسې M په بالقوه ډول د معیاري مدل $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحه کېدای شي. په حقیقت کېنې، که چېرې یو څیز $z \in M$ او مناسبه تابع s د $0^{\mathfrak{M}}$ او $1^{\mathfrak{M}}$ په توګه وټاکي، د $+$ ، $\times$ او $<$ تفسیرونه لا له مخکې ټاکل شوي وي. یوازې هغه تابعې $\{z\} \rightarrow M \rightarrow M$ په معیاري مدل کېنې د $1^{\mathfrak{M}}$ په توګه مناسبې دي چې یو پر یو او پر هدف سټ بشپړه دواړه وي. د s د قیمتونو ساحه z لرلې نه شي، ځکه که داسې وایو $\forall x \ 0 \neq x'$ به دروغ وایو. دا ترلې فارمول په $\mathfrak{N}$ کېنې رښتوني ده، نو $\mathfrak{M}$ ټي هم باید رښتوني کړي. تابع s باید یو پر یو وي، ځکه په $\mathfrak{N}$ کېنې د جانشین تابع $1^{\mathfrak{M}}$ همداسې ده، او د هغې $1^{\mathfrak{M}}$ یو پر یو توب په $\mathfrak{N}$ کېنې د ترلې فارمول له خوا بیانېږي. دا باید پر هدف سټ بشپړه هم وي، ځکه که نه نو داسې $\{z\} \rightarrow M \rightarrow M$ به وي چې د s د قیمتونو په ساحه کېنې نه وي، یعنې دا ترلې فارمول $\forall x (x = 0 \vee \exists y \ y' = x)$ به په $\mathfrak{M}$ کېنې دروغ وي، حال دا چې په $\mathfrak{N}$ کېنې رښتوني ده. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-005) سرچینې په وروستی جمله کېنې د تابعې د «قیمتونو ساحې» پر ځای د «تعریف ساحه» لیکلې وه، حال دا چې تابع s پر ټول M تعریف شوې ده. دلته د جملې له فورمول او د پرنسپالوالي له شرط سره سم د قیمتونو ساحه لیکل شوې ده.

20.3 نامعباري مدلونه

د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت هغه وخت معباري بولو چې له $\mathcal{M}$ سره آیزومورف وي. که یو جوړښت له $\mathcal{M}$ سره آیزومورف نه وي، نامعباري بلل کېږي.

تعریف 20.6. د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت $\mathcal{M}$ نامعباري دے، که له $\mathcal{M}$ سره آیزومورف نه وي. هغه غړي $x \in |\mathcal{M}|$ چې د کوم $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$ وي، د $\mathcal{M}$ معباري شمېرې بلل کېږي؛ او نورې نامعباري شمېرې بلل کېږي.

د 20.2 له مخې د $\mathcal{L}_A$ هر معباري جوړښت یوازې معباري غړي لري. نو یو نامعباري جوړښت باید لږ تر لږه یو نامعباري عنصر ولري. په حقیقت کېنې، د یوه نامعباري غړي شتون دا تضمینوي چې جوړښت نامعباري دے.

قضیه 20.7. که د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت $\mathcal{M}$ یوه نامعباري شمېره ولري، نو $\mathcal{M}$ نامعباري دے.

ثبوت. برعکس فرض کړئ، یعنې $\mathcal{M}$ معباري وي خو نامعباري شمېره x ولري. $g: \mathbb{N} \rightarrow |\mathcal{M}|$ یو آیزومورفیزم ونیسئ. په اسانه (په n په استقرا) لیدل کېږي چې $g(\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$. په بله وینا، g د $\mathcal{M}$ معباري شمېرې د $\mathcal{M}$ معباري شمېرو ته وړي. که $\mathcal{M}$ یوه نامعباري شمېره ولري، g پر هدف سټ بشپړه کېدے نه شي، چې له فرض سره ټکر دے. $\square$

تمرین 20.8. په یاد راوړئ چې $\mathbf{Q}$ لاندې بدیهي اصول لري:

$$\forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y) \quad)!Q_1($$

$$\forall x \ 0 \neq x' \quad)!Q_2($$

$$\forall x (x = 0 \vee \exists y x = y') \quad)!Q_3($$

داسې جوړښتونه $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2, \mathcal{M}_3$ ورکړئ چې:

$$1. \mathcal{M}_1 \models !Q_1, \mathcal{M}_1 \models !Q_2, \mathcal{M}_1 \not\models !Q_3$$

$$2. \mathcal{M}_2 \models !Q_1, \mathcal{M}_2 \models !Q_2, \mathcal{M}_2 \not\models !Q_3$$

$$3. \mathcal{M}_3 \models !Q_1, \mathcal{M}_3 \models !Q_2, \mathcal{M}_3 \not\models !Q_3$$

څرګنده ده چې د هر یوه دپاره یوازې $0^{\mathcal{M}_i}$ او $1^{\mathcal{M}_i}$ ټاکل پکار دي.

د $\mathcal{L}_A$ دپاره نامعباري جوړښتونه په اسانه ټاکل کېدے شي. د بېلګې په توګه، داسې جوړښت ونیسئ چې د تعریف ساحه $\mathbb{Z}$ وي او ټولې غیرمنطقي لښې په معمولي ډول تفسیر کړي. څرګه چې منفي شمېرې د هېڅ n دپاره د $\bar{n}$ ارزښتونه نه دي، دا جوړښت نامعباري دے. البته دا به د حساب مدل په دې معنا نه وي چې هماغه جملې رښتوني کړي چې $\mathcal{M}$ ې رښتوني کوي. مثلاً $\forall x x' \neq 0$ دروغ ده. خو د متناهي شاهد له قضیې څخه په اسانۍ ثابتول شو چې د حساب نامعباري مدلونه شته.

قضیه 20.9. فرض کړئ $\mathbf{TA} = \{!A : \mathcal{M} \models !A\}$ د $\mathcal{M}$ تیوري ده. $\mathbf{TA}$ یو د شمېر وړ نامعباري مدل لري.

ثبوت. ژبه $\mathcal{L}_A$ په یوه نوي ثابت سمبول c وغځوئ او د تړلي فارمولونه لاندې سټ ونیسئ:

$$\Gamma = \mathbf{TA} \cup \{c \neq \bar{0}, c \neq \bar{1}, c \neq \bar{2}, \dots\}$$

د Γ هر مدل $\mathcal{M}^c$ به داسې یو غړی $x = c^{\mathcal{M}}$ ولري چې نامعباري وي، ځکه د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $x \neq \text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$. دا هم څرګنده ده چې $\mathcal{M}^c \models \mathbf{TA}$ ، ځکه $\mathbf{TA} \subseteq \Gamma$. که له $\mathcal{M}^c$ څخه یوازې د c د تفسیر هېر کړو او هغه د $\mathcal{L}_A$ یو جوړښت $\mathcal{M}$ وګرځوو، تعریف ساحه ې لا هم نامعباري x لري او $\mathcal{M} \models \mathbf{TA}$ هم وي. وروستۍ خبره ځکه تضمینېږي چې c په $\mathbf{TA}$ کېنې نه راځي. نو کافي ده وښیو چې Γ مدل لري.

د متناهي شاهد قضيه کاروو. که د Γ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ وي، نو Γ هم د صدق وړ دے. يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ونیسئ. په Γ_0 کېنې د TA ځينې ترې فارمولونه او بنيادي د $c \neq \bar{n}$ د بڼې متناهي ډېرې جملې وي. که د دې بڼې کومه جمله وي، فرض کړئ k تر ټولو لوی عدد دے چې $\bar{k} \in \Gamma_0$ وي؛ او که هېڅ داسې جمله نه وي، د k ارزښت صفر ونیسئ. $\mathcal{N}_k$ د $\mathcal{N}$ داسې غځونه تعريف کړئ چې $c^{\mathcal{N}_k} = k + 1$ وي. بيا $\mathcal{N}_k \models \Gamma_0$ ؛ که $A \in \text{TA}$ وي، $\mathcal{N}_k \models !A$ ، ځکه $\mathcal{N}_k$ له c پرته په هر څه کېنې د $\mathcal{N}$ په شان دے او c په $!A$ کېنې نه راځي. او د دغې بڼې هرې راغلې جملې دپاره $\mathcal{N}_k \models c \neq \bar{n}$ ځکه $n \leq k$ او $\text{Val}^{\mathcal{N}_k}(c) = k + 1$. نو د Γ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ دے. د متناهي شاهد له قضیې Γ يو مدل لري؛ او څرنگه چې ژبه شمېرېدونکې او دغه مدل نامتناهي دے، د ښکته لوښايم-سکولم له قضیې يو شمېرېدونکې داسې مدل اخلو. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-006) سرچينې د متناهي فرعي سټ دپاره تر ټولو لوی شاخص يوازې هغه وخت ټاکلې و چې لږ تر لږه يوه د c او عددنې د نابرابرۍ جمله پکې وي؛ دلته د ټولو راغلو شاخصونو يو پاسنی حد نيول شوے، چې د هېڅ داسې جملې حالت هم رانغاړي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-007) د سرچينې ثبوت د متناهي شاهد له قضیې يوازې د يو مدل شتون راويست، خو قضيه شمېرېدونکې مدل غواړي؛ وروستۍ جمله د مخکې ثابتې شوې ښکته لوښايم-سکولم قضیې په کارولو دا اړين کام څرکندوي. $\square$

20.4 د Q مدلونه

موږ پوهېږو چې داسې نامعباري جوړښتونه شته چې هماغه ترې فارمولونه رښتوني کوي چې $\mathcal{N}$ ئې رښتوني کوي؛ يعنې د TA مدلونه دي. څرنگه چې $\mathcal{N} \models Q$ ، د TA هر مدل د Q هم مدل دے. له TA څخه ډېره کمزورې ده؛ مثلاً $Q \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$. کمزورې تيورۍ په اسانه پوره کېږي: ډېر مدلونه لري. مثلاً Q داسې مدلونه لري چې $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ دروغوي، خو هغه د TA يا حتا د PA مدلونه نه شي کېدے. د Q مدلونه نسبتاً ساده هم دي: په څرگند ډول ئې ټاکلے شو. بېلگه 20.10. هغه جوړښت $\mathcal{R}$ ونیسئ چې تعريف ساحه ئې $|\mathcal{R}| = \mathbb{N} \cup \{a\}$ او تفسیرونه ئې دا وي:

$$\begin{aligned} 0^{\mathcal{R}} &= 0 \\ r^{\mathcal{R}}(x) &= \begin{cases} x + 1 & \text{که } x \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{که } x = a \text{ وي} \end{cases} \\ +^{\mathcal{R}}(x, y) &= \begin{cases} x + y & \text{که } y \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کېنې} \end{cases} \\ \times^{\mathcal{R}}(x, y) &= \begin{cases} xy & \text{که } y \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ 0 & \text{که } x = 0 \text{ يا } y = 0 \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کېنې} \end{cases} \\ <^{\mathcal{R}} = \{ \langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ او } x < y \} \cup \{ \langle x, a \rangle : x \in |\mathcal{R}| \} \end{aligned}$$

د $\mathcal{R} \models Q$ ښودلو دپاره بايد ثابته کړو چې د Q ټول بديهي اصول په $\mathcal{R}$ کېنې رښتوني دي. د اسانتيا دپاره x^* د $r^{\mathcal{R}}(x)$ په ځای لیکو (په $\mathcal{R}$ کېنې د x «جانشين»)، $x \oplus y$ د $+^{\mathcal{R}}(x, y)$ په ځای (په $\mathcal{R}$ کېنې د x او y «مجموعه»)، $x \otimes y$ د $\times^{\mathcal{R}}(x, y)$ په ځای (په $\mathcal{R}$ کېنې د x او y «حاصل ضرب»)، او $x \otimes y$ د $<^{\mathcal{R}}$ په ځای لیکو. په دې لنډونو سره د $\mathcal{R}$ عمليات په لا څرگند ډول داسې ښودلے شو:

x	x^*	$x \oplus y$	0	m	a	$x \otimes y$	0	m	a
n	$n + 1$	0	0	m	a	0	0	0	0
a	a	n	n	$n + m$	a	n	0	nm	a
		a	a	a	a	a	0	a	a

$n \otimes m$ هله او يوازې هله چې $n < m$ ، د $n, m \in \mathbb{N}$ دپاره؛ او د هر $x \in |\mathcal{R}|$ دپاره $x \otimes a$.

$\mathcal{R} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$ ، ځکه $*$ يو پر يو ده. $\mathcal{R} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$ ، ځکه په $\mathcal{R}$ کېنې 0 د $*$ جانشين نه دے. $\mathcal{R} \models \forall x (x = 0 \vee \exists y x = y')$ ، ځکه د هر $n > 0$ دپاره $n = (n - 1)^*$ او $a = a^*$.

ځکه $\mathbb{R} \models \forall x (x + 0) = x$ ، ځکه $n \oplus 0 = n + 0 = n$ او د $\oplus$ له تعريفه $a \oplus 0 = a$ - $\mathbb{R} \models \forall x \forall y (x + y') = (x + y)'$ لږه پېچلې ده. که n او m دواړه معياري وي:

$$(n \oplus m^*) = (n + (m + 1)) = (n + m) + 1 = (n \oplus m)^*$$

ځکه $\oplus$ او $*$ پر معياري شمېرو له $+$ او $/$ سره سلا دي. اوس فرض کړئ $x \in |\mathbb{R}|$ بيا

$$(x \oplus a^*) = (x \oplus a) = a = a^* = (x \oplus a)^*$$

پاتې حالت دا دے چې $y \in |\mathbb{R}|$ وي خو $x = a$ - دلته هم بايد وڅېړو چې $y = n$ معياري دے يا $y = a$:

$$(a \oplus n^*) = (a \oplus (n + 1)) = a = a^* = (a \oplus n)^*$$

$$(a \oplus a^*) = (a \oplus a) = a = a^* = (a \oplus a)^*$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-008) سرچينې په دې وېش کښې د y وروسته حالت b ليکله و، خو د K د تعريف ساحه يوازې طبيعي شمېرې او a لري؛ دلته له ورپسې معادلې سره سم وروسته حالت a ليکل شوه دے. البته دا له اړتيا زيات تفصيل دے. مثلاً څرنګه چې د هر z دپاره $a \oplus z = a$ ، نو سمديتي $a \oplus a^* = a$ پایله کوله شو. پاتې بديهي اصول هم په همدې ډول ګڼ کېدے شي. نو $\mathbb{R}$ د Q يو مدل دے. «جمع» $\oplus$ ئې تبادلې هم ده. خو داسې نورې جملې شته چې په $\mathbb{N}$ کښې رښتوني او په $\mathbb{R}$ کښې دروغ دي، او برعکس. مثلاً $a \otimes a$ ، نو $\mathbb{R} \models \exists x x < x$ او $\mathbb{R} \not\models \forall x \neg x < x$ - له دې څرګندېږي چې $Q \not\models \forall x \neg x < x$.

تمرین 20.11. ثابته کړئ چې د 20.10 جوړښت $\mathbb{R}$ د Q پاتې بديهي اصول پوره کوي:

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad)!Q_6($$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad)!Q_7($$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad)!Q_8($$

داسې ترلے فارمول ومومئ چې يوازې $/$ ولري، په $\mathbb{N}$ کښې رښتوني او په $\mathbb{R}$ کښې دروغ وي.

بېلګه 20.12. هغه جوړښت $\mathbb{L}$ ونیسئ چې تعريف ساحه ئې $|\mathbb{L}| = \mathbb{N} \cup \{a, b\}$ او تفسیرونه $\iota^{\mathbb{L}} = *$ ، $\iota^{\mathbb{L}} = \oplus$ د لاندې جدولونو له مخې وي:

x	x^*	$x \oplus y$	m	a	b
n	$n + 1$	n	$n + m$	b	a
a	a	a	a	b	a
b	b	b	b	b	a

څرنګه چې $*$ يو پر يو ده، 0 ئې د قيمتونو په ساحه کښې نه دے، او له 0 پرته هر $x \in |\mathbb{L}|$ پکې دے، نو Q_1 - Q_3 په $\mathbb{L}$ کښې رښتوني دي. د هر x دپاره $x \oplus 0 = x$ ، نو Q_4 ! هم رښتونه دے. د Q_5 ! دپاره $x \oplus y^*$ او $(x \oplus y)^*$ پرتله کړئ. که x او y دواړه معياري وي، برابر دي، ځکه بيا $*$ او $\oplus$ له $+$ سره سلا دي. که x نامعياري او y معياري وي، $x \oplus y^* = x = x^* = (x \oplus y)^*$ ، که $x \oplus y^* = x = x^* = (x \oplus y)^*$ - که x او y دواړه نامعياري وي، څلور حالتونه لرو:

$$a \oplus a^* = b = b^* = (a \oplus a)^*$$

$$b \oplus b^* = a = a^* = (b \oplus b)^*$$

$$b \oplus a^* = b = b^* = (b \oplus a)^*$$

$$a \oplus b^* = a = a^* = (a \oplus b)^*$$

که x معياري خو y نامعياري وي، لرو:

$$n \oplus a^* = n \oplus a = b = b^* = (n \oplus a)^*$$

$$n \oplus b^* = n \oplus b = a = a^* = (n \oplus b)^*$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-009) سرچينې د درېيم نامعياري حالت په بني اړخ کښې ناتړلے y ليکله و، دلته د همدې کښې له چې اړخ او د جدول له مخې a بېرته اېښودل شوه دے. نو Q_5 ! $\mathbb{L} \models$ خو $a \oplus 0 \neq 0 \oplus a$ ، نو $\mathbb{L} \not\models \forall x \forall y (x + y) = (y + x)$.

تمرین 20.13، د 20.12 جوړښت له په $\otimes$ او $\ominus$ سره وغځوئ، خو د $\times$ او $<$ تفسیرونه وي. وښیئ چې جوړښت مو د Q پاتې بدیهي اصول پوره کوي:

$$\forall x (x \times 0) = 0 \quad)!Q_6($$

$$\forall x \forall y (x \times y') = ((x \times y) + x) \quad)!Q_7($$

$$\forall x \forall y (x < y \leftrightarrow \exists z (z' + x) = y) \quad)!Q_8($$

تمرین 20.14، د 20.12 په $\otimes$ کښې $a^* = a$ او $b^* = b$ دي. ایا د Q داسې مدل شته چې $a^* = b$ او $b^* = a$ وي؟

موږ د Q داسې مدلوله په څرګند ډول جوړ کړل چې نامعيارې غړي ئې د معيارې عناصرو «هاخوا» پراته دي. په حقیقت کښې، بدیهي اصول همدومره غواړي. یو نامعيارې غړی x د 0 $\ominus$ شرط پوره کول نه شي، ځکه $Q \vdash \forall x \neg x < 0$ (وګورئ د $OpenLogic$ اړونده سرچینیزه برخه [OLP]). همدارنګه د هر n دپاره $Q \vdash \forall x (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{1} \vee \dots \vee x = \bar{n}))$ (د $OpenLogic$ اړونده سرچینیزه برخه [OLP])، نو د هېڅ $n > 0$ دپاره $a \otimes n$ نه شو لرل.

20.5 د PA مدلوله

د TA هر نامعيارې مدل د PA هم نامعيارې مدل دے. موږ پوهېږو چې د TA، او په پایله کښې د PA، نامعيارې مدلوله شته. دا هم پوهېږو چې داسې نامعيارې مدلوله نامعيارې «شمېرې» لري، یعنې د تعریف ساحې داسې غړي چې له ټولو معيارې «شمېرو» هاخوا دي. خو دا ځنګه ترتیب شوي دي؟ څومره دي؟ ومو لیدل چې د کمزورې تیورۍ Q مدلوله حتا یوازې یوه نامعيارې شمېره لرل شي. خو دغه ساده جوړښتونه د PA یا TA مدلوله نه دي.

د PA یا TA د مدلولو د جوړښت د پوهېدو کلي دا ده چې وګورو په دغو تیوریو کښې کوم حقیقتونه د اشتقاق وړ دي. مثلاً PA لا له مخکې $\forall x x \neq x'$ او $\forall x \forall y (x + y) = (y + x)$ ثابتوي، نو هغه ساده جوړښتونه چې دا ترې فارمولونه دروغوي د PA د مدلولو په توګه ردوي.

فرض کړئ $\mathcal{M}$ د PA مدل دے. که $PA \vdash A$ وي، نو $\mathcal{M} \models A$. بیا د $0^{\mathcal{M}}$ دپاره z ، د $1^{\mathcal{M}}$ دپاره $*$ ، د $+$ دپاره $\oplus$ ، د $\times^{\mathcal{M}}$ دپاره $\otimes$ او د $<^{\mathcal{M}}$ دپاره $\ominus$ کاروو. هره ترلے فارمول A بیا د z ، $*$ ، $\oplus$ ، $\otimes$ او په هکله کوم شرط بیانوي، او که $\mathcal{M} \models A$ وي نو هغه شرط باید پوره شي. مثلاً که $\mathcal{M} \models Q_1$ ، یعنې $\mathcal{M} \models \forall x \forall y (x' = y' \rightarrow x = y)$ ، نو $*$ باید یو پریو وي.

قضیه 20.15. په $\mathcal{M}$ کښې $\ominus$ یو خطي سخت ترتیب دے، یعنې:

$$1. \text{ د هېڅ } x \in |\mathcal{M}| \text{ دپاره } x \otimes x \text{ نه وي.}$$

$$2. \text{ که } x \otimes y \text{ او } y \otimes z \text{ وي، نو } x \otimes z.$$

$$3. \text{ د هر } y \neq x \text{ دپاره یا } x \otimes y, \text{ یا } y \otimes x.$$

ثبوت. PA دا ثابتوي:

$$1. \forall x \neg x < x$$

$$2. \forall x \forall y \forall z ((x < y \wedge y < z) \rightarrow x < z)$$

$$3. \forall x \forall y ((x < y \vee y < x) \vee x = y)$$

□

قضیه 20.16. z د $\mathcal{M}$ تر ټولو کوچنۍ غړې د $\otimes$ په ترتیب کېنې دے. د هر x دپاره $x \otimes x^*$ ، او x^* تر ټولو کوچنۍ $\otimes$ -لوي غړې دے. له صفر څخه پرته د هر x دپاره داسې یوازینۍ y شته چې $y^* = x$ وي. (مور y په $\mathcal{M}$ کېنې د x «مخکېنې» بولو او په x^* کېنې بڼو.) د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-010) سرچینې د یوازینۍ مخکېنې دعوه د هر x دپاره کړې وه، چې صفر هم رانغاړي، حال دا چې د $Q2$ بدیهې اصل له مخې صفر د هېڅ څیز جانشین نه دے. دلته دعوه په سم ډول له صفر څخه پرته غړو ته محدوده شوې ده.

□

ثبوت. تمرین.

تمرین 20.17. په $\mathcal{L}_A$ کېنې داسې تړلي فارمولونه ومومئ چې په PA کېنې د اشتقاق وړ وي (او ځکه په $\mathcal{M}$ کېنې رښتوني وي) او په **20.16** کېنې د z ، $*$ او $\otimes$ ځانګړتیاوې تضمین کړي.

قضیه 20.18. د $\mathcal{M}$ ټول معیاري غړي د $\otimes$ له مخې له ټولو نامعیاري غړي څخه کوچني دي.

ثبوت. n د معیاري غړې $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$ د $\mathcal{M}$ غړي د لنډون په توګه کاروو. لا Q د هر $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\forall x (x < \bar{n}' \rightarrow (x = \bar{0} \vee x = \bar{n}))$ ثابتوي. د $\otimes z$ شرط پوره کوونکي غړي نشته. نو که n معیاري او x نامعیاري وي، $x \otimes n$ نه شو لرلے. د تعریف له مخې نامعیاري عنصر د هېڅ $n \in \mathbb{N}$ دپاره $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$ نه وي، نو $x \neq n$ هم دے. څرنګه چې $\otimes$ خطي ترتیب دے، باید $x \otimes n$ وي. □

قضیه 20.19. د $\mathcal{M}$ هر نامعیاري غړې x د لاندې فرعي سټ یو غړې دے:

$$\dots^{***} x \otimes^{**} x \otimes^* x \otimes x \otimes x^* \otimes x^{**} \otimes x^{***} \otimes \dots$$

مور دا فرعي سټ د x بلاک بولو او په $[x]$ کې لیکو. نه تر ټولو کوچنۍ او نه تر ټولو لوی غړې لري. دا د هغو $y \in \mathcal{M}$ د سټ په توګه ځانګړې کېدے شي چې د کوم معیاري n دپاره $x \oplus n = y$ یا $y \oplus n = x$ وي.

ثبوت. داسې سټ $[x]$ تل شته، ځکه د $\mathcal{M}$ هر غړې y یوازینۍ جانشین y^* لري او که دغه غړې نامعیاري وي، یوازینۍ مخکېنې y^* لري. د پرله پسې غړي y او y^* دپاره $y \otimes y^*$ ، او y^* د $\otimes$ له مخې د $\mathcal{M}$ تر ټولو کوچنۍ هغه غړې دے چې y ترې $\otimes$ وي. څرنګه چې تل $y \otimes y^*$ او $y^* \otimes y$ ، نو $[x]$ نه تر ټولو کوچنۍ او نه تر ټولو لوی غړې لري. که $y \in [x]$ وي، نو $x \in [y]$ ، ځکه بیا یا $x^{***} = y$ یا $x^{***} = y^*$ که $y^{***} = x$ وي (له n ځله $*$ سره)، نو $y \oplus n = x$ او برعکس، ځکه (که n د l ښو شمېر وي) $\text{PA} \vdash \forall x x' \dots' = (x + \bar{n})$. □

قضیه 20.20. که $[y] \neq [x]$ او $x \otimes y$ وي، نو د هر $u \in [x]$ او $v \in [y]$ دپاره $u \otimes v$.

ثبوت. پام وکړئ چې $\text{PA} \vdash \forall x \forall y (x < y \rightarrow (x' < y \vee x' = y))$ نو که $u \otimes v$ وي او $[u] \neq [v]$ ، د هر n دپاره $u \oplus n^* \otimes v$ هم لرو.

هر $u \in [x]$ د $y \otimes u$ شرط پوره کوي: د فرض له مخې $x \otimes y$ که $u \otimes x$ وي، د انتقال له مخې $u \otimes y$. او که $x \otimes u$ خو $u \in [x]$ وي، نو د کوم n دپاره $u = x \oplus n^*$ ؛ نو د هغه حقیقت له مخې چې اوس مو ثابت کړ $u \otimes y$.

اوس فرض کړئ $v \in [y]$ د $y \otimes v$ شرط پوره کوي، یعنې د کوم معیاري m دپاره $v \oplus m^* = y$. بیا $v \otimes x$ کېدے نه شي، کېنې $x \otimes v \oplus m^* = y$ به و. همدارنګه $x \neq v$ ، کېنې $x \oplus m^* = v \oplus m^* = y$ او $[x] = [y]$ به وو. نو $x \otimes v$ بیا د هر n دپاره $x \oplus n^* \otimes v$ هم. له دې امله که $x \otimes u$ او $u \in [x]$ وي، نو $u \otimes v$ که $u \otimes x$ وي، د انتقال له مخې $u \otimes v$.

□

په پای کېنې که $y \otimes v$ وي، نو $u \otimes v$ ، ځکه لکه چې ومو ښودل $u \otimes y$ او $y \otimes v$.

نتیجه 20.21. که $[x] \neq [y]$ وي، نو $[x] \cap [y] = \emptyset$.

ثبوت. فرض کړئ $x \in [x]$ او $x \otimes y$ بیا د هر $u \in [y]$ دپاره $u \otimes z$ که $z \in [y]$ هم وای، $z \otimes z$ به مو لرلے. د $y \otimes x$ حالت هم ورته دے.

□

دا معنا لري چې بلاکونه پخپله داسې ترتیبېدے شي چې د $\otimes$ درناوی وکړي: $[x] \otimes [y]$ هله او یوازې هله چې $x \otimes y$ ، یا په هم ارزه توګه، چې د هر $u \in [x]$ او $v \in [y]$ دپاره $u \otimes v$ وي. څرګنده ده چې معیاري بلاک $[0]$ تر ټولو کوچنۍ بلاک دے. له هېڅ نامعیاري بلاک سره تقاطع نه لري، او هېڅ دوه نامعیاري بلاکونه هم یو بل نه پرې کوي. په ځانګړي ډول، د پرله پسې جانشینونو یا مخکښینو په اخیستو بل بلاک ته نه شئ رسېدے.

قضیه 20.22. که x او y نامعیاري وي، نو $x \otimes x \oplus y$ او $x \oplus y \notin [x]$.

ثبوت. که y نامعیاري وي، نو $y \neq z$. $\text{PA} \vdash \forall x \forall y (y \neq 0 \rightarrow x < (x + y))$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-011) سرچینې د دې عمومي حقیقت په لیکلو کښې y ازاد پرېښے و، دلته پر y هم کلي سور ورزیات شوے، لکه دعوه او ورپسې استعمال چې غواړي. اوس فرض کړئ $x \oplus y \in [x]$. څرنګه چې $x \otimes x \oplus y$ ، د کوم معیاري عدد دپاره $x \oplus n^* = x \oplus y$ خو د جمع د اختصار قانون $\text{PA} \vdash \forall x \forall y \forall z ((x + y) = (x + z) \rightarrow y = z)$ دے. له دې به د کوم معیاري n دپاره $y = n^*$ پایله شي، خو y نامعیاري فرض شوې ده.

□

قضیه 20.23. تر ټولو کوچنۍ نامعیاري بلاک نشته.

ثبوت. $\text{PA} \vdash \forall x \exists y ((y + y) = x \vee (y + y)' = x)$ ، یعنې هر x پر 2 وېشل کېږي (ښايي پاتې شونې 1 ولري). که x نامعیاري وي، y هم نامعیاري دے. د مخکینۍ قضیې له مخې $y \otimes y \oplus y$ او $y \oplus y \notin [y]$ بیا $y \otimes (y \oplus y)^* \notin [y]$ او $(y \oplus y)^* \notin [y]$ هم. خو $x = y \oplus y$ یا $x = (y \oplus y)^*$ ، نو $y \otimes x$ او $y \notin [x]$.

□

قضیه 20.24. تر ټولو لوی بلاک نشته.

□

ثبوت. تمرین.

تمرین 20.25. وښیئ چې د PA په یوه نامعیاري مدل کښې تر ټولو لوی بلاک نشته.

قضیه 20.26. د بلاکونو ترتیب ګڼ دے. یعنې که $x \otimes y$ او $[x] \neq [y]$ وي، نو داسې بلاک $[z]$ شته چې له دواړو بېل او د هغو تر منځ وي.

ثبوت. فرض کړئ $x \otimes y$ لکه مخکې، $x \oplus y$ پر دوه وېشل کېږي (ښايي پاتې شونې ولري): داسې $z \in \mathbb{M}$ شته چې یا $x \oplus y = z \oplus z$ یا $x \oplus y = (z \oplus z)^*$. عنصر z د x او y «اوسط» دے، او $x \otimes z$ او $z \otimes y$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-012) سرچینې د دې ثبوت په دوو معادلو کښې ناتعریفه جمع کارولې وه؛ دلته د ټول څپرکي ټاکلي نامعیاري جمع بېرته ایښوول شوې ده.

□

تمرین 20.27. د 20.26 مفصل ثبوت ولیکئ. د z د شتون د تضمین دپاره PA باید کومه ترلے فارمول اشتقاق کړي؟ ولې $x \otimes z$ او $z \otimes y$ ، او ولې $[x] \neq [z]$ او $[y] \neq [z]$ دي؟

له دې امله، په هر شمېرېدونکي نامعیاري مدل کښې نامعیاري بلاکونه د ناطقو په شان ترتیب لري: یو شمېرېدونکې لامتناهي ګڼ خطي ترتیب بې له سرحدي ټکو جوړوي. ښودل کېدے شي چې هر دوه داسې شمېرېدونکې لامتناهي ترتیبونه آیزومورف دي. نو د رښتیني حساب د هر دوه د شمېر وړ نامعیاري مدلونو $\mathbb{M}_1$ او $\mathbb{M}_2$ هغه راکموني چې یوازې $<$ او $=$ لرونکې ژبې ته کېږي، آیزومورف دي. په رښتیا، آیزومورفیزم h داسې تعریفېدے شي: د $\mathbb{M}_1$ او $\mathbb{M}_2$ معیاري برخې د معیاري مدل $\mathbb{M}$ سره، او ځکه له یو بل سره، آیزومورف دي. د نامعیاري برخې بلاکونه پخپله د ناطقو په شان ترتیب شوي او ځکه آیزومورف دي؛ د بلاکونو یو آیزومورفیزم د هر بلاک دننه د خپل سرو عناصرو په سره برابرولو غځېدے شي، او بیا د $\mathbb{M}_1$ کښې د x د جانشین انځور د $\mathbb{M}_2$ کښې د x د انځور جانشین وټاکل شي. له دې دا نه

راځي چې $\mathcal{M}_1$ او $\mathcal{M}_2$ د حساب په بشپړه ژبه کېنې آيزومورف دي (آيزومورفزم تل د يوې ژبه په نسبت وي)، ځکه پر $|\mathcal{M}_1|$ او $|\mathcal{M}_2|$ د جمع او ضرب د تعريفولو نامتجانسي لارې شته. (دا د واک د يوې مشهورې قضیې څخه هم راځي چې د يوې بشپړې تيوري د شمېرېدونکو مدلونو شمېر 2 کېدې نه شي.) د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-013) سرچينې د بلاکونو شمېرېدنه له هر نامعياري مدل څخه بې له شرطه پایله کړې وه؛ دا يوازې د شمېرېدونکي مدل دپاره لازميږي. دلته دغه شرط څرګند شوی او د ورپسې جملې له شمېرېدونکو مدلونو سره برابر شوی دی.

20.6 د حساب محاسبه کېدونکي مدونه

معیاري مدل $\mathcal{M}$ دوه بڼې ځانګړتیاوې لري. تعريف ساحه $\mathbb{N}$ طبيعي شمېرې دي، يعنې عناصر $\mathbb{N}$ هماغه ډول څيزونه دي چې د حساب په ژبه $\mathbb{N}$ په هکله خبرې کول غواړو، او معیاري عددنښه $\bar{n}$ په رښتيا n په نښه کوي. بله نښه ځانګړتيا دا ده چې د $\mathcal{L}_A$ د غیرمنطقي نښو ټول تفسیرونه محاسبه کېدونکي دي. د جانشین، جمع او ضرب تابعې چې $\mathcal{M}$ ، $+$ او $\times$ دي، د شمېرو محاسبه کېدونکې تابعې دي (مثلاً د تيورینگ ماشینونو له خوا محاسبه کېدونکې، يا په ابتدایي بازګڼست تعريفېدونکې). او په $\mathcal{M}$ کېنې د کوچنیوالي اړیکه، يعنې $<^{\mathcal{M}}$ ، پرېکړه کېدونکې ده.

د $\mathcal{Q}$ او $\mathcal{PA}$ په شان د حسابي تيوريو نامعياري مدونه باید نامعياري عناصر ولري. نو تعريف ساحې $\mathbb{N}$ سره نور غړي هم لري. خو هر نامتاهي شمېرېدونکې جوړښت پر هر شمېرېدونکې لامتناهي سټ، د $\mathbb{N}$ په ګډون، جوړېدای شي. نو داسې نامعياري مدونه هم شته چې تعريف ساحه $\mathbb{N}$ وي. البته په داسې مدل $\mathcal{M}$ کېنې لږ تر لږه ځينې شمېرې خپل معمولي نقش نه شي لوبولې، ځکه داسې k باید وي چې د ټولو $n \in \mathbb{N}$ دپاره له $\text{Val}^{\mathcal{M}}(\bar{n})$ څخه بېل وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-023) سرچينې دلته هر شمېرېدونکې جوړښت یاد کړی و؛ خو د دې نسخې د شمېر وړتيا اصطلاح متناهي ستونه هم رانغاړي، او متناهي جوړښت د طبيعي شمېرو پر سټ نه شي جوړېدای. دلته د نامتاهي والي اړین شرط څرګند شوی؛ د بحث نامعياري حسابي مدونه له مخکې لا نامتاهي دي.

تعريف 20.28. $\mathcal{L}_A$ يو جوړښت $\mathcal{M}$ محاسبه کېدونکې دے هله او يوازې هله چې $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ ، $\mathcal{M}$ ، $+$ او $\times$ محاسبه کېدونکې تابعې، او $<^{\mathcal{M}}$ پرېکړه کېدونکې اړیکه وي.

بېلګه 20.29. د 20.10 جوړښت $\mathcal{R}$ په یاد راوړئ. تعريف ساحه $\mathbb{N} \cup \{a\}$ او تفسیرونه $\mathbb{N}$ دا وو:

$$\begin{aligned} 0^{\mathcal{R}} &= 0 \\ r^{\mathcal{R}}(x) &= \begin{cases} x+1 & \text{که } x \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{که } x = a \text{ وي} \end{cases} \\ +^{\mathcal{R}}(x, y) &= \begin{cases} x+y & \text{که } x, y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کېنې} \end{cases} \\ \times^{\mathcal{R}}(x, y) &= \begin{cases} xy & \text{که } x, y \in \mathbb{N} \text{ وي} \\ 0 & \text{که } x=0 \text{ يا } y=0 \text{ وي} \\ a & \text{په نورو حالاتو کېنې} \end{cases} \\ <^{\mathcal{R}} = \{ \langle x, y \rangle : x, y \in \mathbb{N} \text{ او } x < y \} \cup \{ \langle x, a \rangle : x \in |\mathcal{R}| \} \end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-014) سرچينې د وروستي سټ په شرط کېنې n ليکله و، حال دا چې په مرتبه جوړه کېنې x راغلې دے؛ دلته شرط د x د تعريف ساحې غړيتوب ته سم شوی، لکه د K په اصلي تعريف کېنې چې راغلې دے. خو $|\mathcal{R}|$ شمېرېدونکې لامتناهي او له $\mathbb{N}$ سره همشمېره دے. مثلاً $|\mathcal{R}| : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{R}$ چې $g(0) = a$ او د $n > 0$ دپاره $g(n) = n - 1$ وي، يوه دوه اړخيزه يو پړيو تابع ده. دا د $\mathcal{Q}$ د نوي مدل $\mathcal{R}'$ او $\mathcal{R}$ تر منځ پر آيزومورفزم بدلولې شو. په $\mathcal{R}'$ کېنې باید د $\mathcal{L}_A$ نښو ته بېلې تابعې او اړيکې وټاکو، ځکه د $\mathbb{N}$ بېل غړي د معیاري او نامعياري شمېرو نقشونه لوبوي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-015) سرچينې د مثبت n دپاره د n جمع يو نقشه ليکلې وه، چې صفر او يو د تابعې له قيمتونو بهر پرېږدي او دوه اړخيزه يو په يو نه ده. دلته د n منفي يو نقشه ليکل شوې؛ همدا نقشه د ورپسې ټولو لېږدول شويو تفسیرونو سره سلا ده.

په ځانګړي ډول، اوس 0 د a نقش لوبوي، نه د تر ټولو کوچنۍ معیاري شمېرې. تر ټولو کوچنۍ معیاري شمېره اوس 1 ده. نو $0^{\mathcal{R}'} = 1$ ټاکو. د جانشین تابع هم اوس بېله ده: یوه معیاري شمېره، یعنې $n > 0$ ، ورکړل شي، بیا هم $n + 1$ راګرځوي. خو 0 اوس د a نقش لوبوي، چې خپل جانشین دے. نو $1^{\mathcal{R}'}(0) = 0$ د جمع او ضرب دپاره هم لرو:

$$+^{\mathcal{R}'}(x, y) = \begin{cases} x + y - 1 & \text{که } y > 0, x \text{ وي} \\ 0 & \text{په نورو حالاتو کېنې} \end{cases}$$

$$\times^{\mathcal{R}'}(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{که } x = 1 \text{ یا } y = 1 \text{ وي} \\ xy - x - y + 2 & \text{که } y > 1, x \text{ وي} \\ 0 & \text{په نورو حالاتو کېنې} \end{cases}$$

او $\langle x, y \rangle \in <^{\mathcal{R}'}$ هله او یوازې هله چې $x < y$ ، $x > 0$ او $y > 0$ وي، یا $y = 0$ وي.

دا ټولې تابعې د طبیعي شمېرو محاسبه کېدونکې تابعې دي او $<^{\mathcal{R}'}$ پر $\mathbb{N}$ یوه پرېکړه کېدونکې اړیکه ده؛ خو دغه تابعې پر $\mathbb{N}$ د جانشین، جمع او ضرب له معمولي تابعو سره یو شان نه دي، او $<^{\mathcal{R}'}$ هم پر $\mathbb{N}$ له معمولي $<$ سره یو شان نه ده.

تمرین 20.30. داسې جوړښت $\mathcal{L}'$ ورکړئ چې $\mathbb{N} = |\mathcal{L}'|$ وي او د 20.12 له 2 سره آیزومورف وي.

20.29 بنیې چې $\mathbb{Q}$ پر $\mathbb{N}$ د تعریف ساحې محاسبه کېدونکې نامعیاري مدونه لري. خو لاندې پایله بنیې چې د $\mathbf{PA}$ د مدونو دپاره دا خبره رښتونی نه ده (او ځکه د $\mathbf{TA}$ د مدونو دپاره هم نه ده).

قضیه 20.31 (د ټېنباوم قضیه). $\mathfrak{N}$ تر آیزومورفیزم پورې د $\mathbf{PA}$ یوازینۍ محاسبه کېدونکې مدل دے. د ژباړې د نسخې سمون (OLMOD-016): سرچینې «یوازینۍ» په لفظي ډول ویلي وو، خو د طبیعي شمېرو پر بنسټ محاسبه کېدونکې او آیزومورف بیا-نومول شوي نقلونه شته؛ د ټېنباوم د قضیې دقیقه پایله دا ده چې هېڅ محاسبه کېدونکې نامعیاري مدل نشته. دلته «تر آیزومورفیزم پورې» دا دقیقوالی څرګندوي.

باب 21

د منځکړیتوب قضیه

21.1 سریزه

د منځکړیتوب قضیه لاندې پایله ده: فرض کړئ $\vdash A \rightarrow B$. بیا داسې ترلے فارمول C شته چې $\vdash A \rightarrow C$ او $\vdash C \rightarrow B$ وي. سربېره پر دې، په C کېنې هر ثابت سمبول، تابع او پریدیکات (له = پرته) په A او B دواړو کېنې راځي. ترلے فارمول C د A او B یو منځکړی بلل کېږي.


د منځکړیتوب قضیه په خپل ذات کېنې په زړه پورې ده، خو اصلي ارزښت ئې په دې کېنې دے چې د یوې تیورۍ دننه د تعریف وړتیا په هکله پایلې، او هغه شرطونه پرې ثابتولے شو چې لاندې ئې د دوو سازگارو تیوریو یوځای کول یو سازگار تیوري ورکوي. لومړۍ پایله د بېت د تعریف وړتیا قضیه، او دویمه د رابنسن د گډې سازکارۍ قضیه بلل کېږي.

21.2 د ترلي فارمولونه بېلول

د منځکړیتوب د قضیې ثبوت ته تر ټولو مخکې لږ بنسټیز کار پکار دے. د A او B منځکړی داسې ترلے فارمول C ده چې $A \models C$ او $C \models B$ وي. د نقیض عکس له مخې، وروستۍ خبره هله او یوازې هله رښتونی ده چې $\neg C \models \neg B$ وي. هغه ترلے فارمول C چې دا خاصیت ولري، ویل کېږي چې A او B بېلوي. نو د A او B د یو منځکړي موندل د داسې ترلے فارمول له موندلو سره برابر دي چې A او B بېل کړي. د معمول په څېر به د یوې عمومي شوې بڼې څېړل کتور وي: داسې جمله چې د ترلي فارمولونه دوه سټونه بېل کړي.

تعریف 21.1. یوه جمله C د جملو سټونه Γ او Δ هله او یوازې هله بېلوي چې $\Gamma \models C$ او $\Delta \models \neg C$ وي. که داسې هېڅ ترلے فارمول نه وي، نو Γ او Δ نه بېلېدونکي دي.

د Γ ، Δ او C د مدلونو د ټولگيو تر منځ د شاملېدو اړیکې لاندې ښودل شوې دي:



شکل 21.1: Γ او Δ بېلوي

لم 21.2. فرض کړئ $\mathcal{L}_0$ هغه ژبه ده چې هر هغه ثابت سمبول، تابع او پریدیکات (له = پرته) لري چې په Γ او Δ دواړو کېنې راځي؛ او $\mathcal{L}'_0$ د هر $n \geq 0$ دپاره د نامتناهي ډېرو نویو ثابت سمبولونه c_n په ورزیاتولو ترې ترلاسه شوې وي. بیا که Γ او Δ په $\mathcal{L}_0$ کېنې نه

بېلېدونکي وي، په L'_0 کېنې هم نه بېلېدونکي دي.

ثبوت. په غیرمستقیم ډول پرمخ ځو: د تناقض په موخه فرض کړئ چې Γ او Δ په L'_0 کېنې بېلېږي. بیا د کوم $C \in L_0$ دپاره $\Gamma \models C[c/x]$ او $\Delta \models \neg C[c/x]$ دي (دلته c یو نوی ثابت سمبول دے، هغه حالت چې C تر یوه زیات داسې نوي ثابت سمبول ولري، ورته دے). د متناهي شاهد له مخې د Γ یو متناهي فرعي سټ Γ_0 او د Δ یو متناهي فرعي سټ Δ_0 شته، داسې چې $\Gamma_0 \models C[c/x]$ او $\Delta_0 \models \neg C[c/x]$ وي. پرېږدئ G په Γ_0 کېنې د ټولو فارمولونه عطف، او H په Δ_0 کېنې د ټولو فارمولونه عطف وي. بیا

$$!G \models !C[c/x], \quad !H \models \neg !C[c/x].$$

له لومړۍ څخه د تعمیم په قاعده $!G \models \forall x !C$ لرو؛ او له دویمې څخه د نقیض عکس په قاعده $!C[c/x] \models \neg !H$ ، او له دې څخه هم $\forall x !C \models \neg !H$ ترلاسه کېږي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-017) سرچینې په وروستي استلزام کېنې ناکمالې نښه δ لیکلې وه؛ دلته H لیکل شوے، ځکه همدا د Δ_0 د جملو عطف دے او د مخکنۍ کرښې نقیض عکس همدا پایله ورکوي. د نقیض عکس بیا کارول $!H \models \neg \forall x !C$ راکوي. د یکنواختۍ له مخې

$$\Gamma \models \forall x !C, \quad \Delta \models \neg \forall x !C,$$

نو $\forall x !C$ په L_0 کېنې Γ او Δ بېلوي. $\square$

لم 21.3. فرض کړئ $\Gamma \cup \{\exists x !S\}$ او Δ نه بېلېدونکي دي، او c یو نوی ثابت سمبول دے چې په Γ ، Δ یا S کېنې نه راځي. بیا $\Gamma \cup \{\exists x !S, !S[c/x]\}$ او Δ هم نه بېلېدونکي دي.

ثبوت. د تناقض دپاره فرض کړئ چې C ، $\Gamma \cup \{\exists x !S, !S[c/x]\}$ او Δ بېلوي، خو په عین وخت کېنې $\Gamma \cup \{\exists x !S\}$ او Δ نه بېلېدونکي دي. دوه حالتونه بېلوو:

1. c په C کېنې نه راځي: په دې حالت کېنې $\Gamma \cup \{\exists x !S, \neg !C\}$ د صدق وړ دے (که داسې نه وے، C به $\Gamma \cup \{\exists x !S\}$ او Δ بېل کړي وو). که $S[c/x]$ ورزیات هم شي، سټ د صدق وړ پاتې کېږي؛ نو په پایله کېنې C بیا هم $\Gamma \cup \{\exists x !S, !S[c/x]\}$ او Δ نه بېلوي.

2. c په C کېنې راځي، نو C د $C[c/x]$ بڼه لري. بیا لرو چې

$$\Gamma \cup \{\exists x !S, !S[c/x]\} \models !C[c/x],$$

نو د استنتاج د قضیې او تعمیم له مخې $\Gamma, \exists x !S \models \forall x (!S \rightarrow !C)$ ، او په پای کېنې $\Gamma \cup \{\exists x !S\} \models \exists x !C$. له بلې خوا، $\Delta \models \neg !C[c/x]$ او ځکه د تعمیم له مخې $\Delta \models \neg \exists x !C$. نو $\Gamma \cup \{\exists x !S\}$ او Δ د بېلېدو وړ دي؛ دا تناقض دے.

$\square$

21.3 د کرېک د منځګړیتوب قضیه

قضیه 21.4 (د کرېک د منځګړیتوب قضیه). که $\models A \rightarrow !B$ وي، نو داسې ترلے فارمول C شته چې $\models A \rightarrow !C$ او $\models C \rightarrow !B$ وي، او په C کېنې هر ثابت سمبول، تابع او پریدیکات (له = پرته) په A او B دواړو کېنې راځي. ترلے فارمول C د A او B یو منځګړی بلل کېږي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathcal{L}_1$ د A ژبه او $\mathcal{L}_2$ د B ژبه ده. $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ پرېږدئ. د هر $i \in \{0, 1, 2\}$ دپاره $\mathcal{L}'_i$ له $\mathcal{L}_i$ څخه د نامتناهي دېرو نویو ثابت سمبولونه $c_0, c_1, c_2, \dots$ په ورزیاتولو ترلاسه شوې ژبه وي.

که A د صدق وړ نه وي، $\exists x x \neq x$ یو منځګړی دے. که $\neg!B$ د صدق وړ نه وي (او له همدې امله B معتبره وي)، $\exists x x = x$ یو منځګړی دے. نو دا هم فرض کولې شو چې A او $\neg!B$ دواړه د صدق وړ دي.

د منځګړیتوب د قضیې د نقیض عکس د ثابتولو دپاره فرض کړئ چې د A او B هېڅ منځګړی نشته. په بله وینا، فرض کړئ چې $\{A\}$ او $\{\neg!B\}$ په $\mathcal{L}_0$ کې نه بېلېدونکي دي.

موږ مو دا ده چې جوړه $(\{A\}, \{\neg!B\})$ یوې اعظمي نه بېلېدونکې جوړې (Γ^*, Δ^*) ته وغځوو. پرېږدئ $A_0, A_1, A_2, \dots$ د $\mathcal{L}'_1$ ترې فارمولونه، او $B_0, B_1, B_2, \dots$ د $\mathcal{L}'_2$ ترې فارمولونه په لړ کې راوړي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-018) سرچینې دلته د نا پراخو ژبو $\mathcal{L}_1$ او $\mathcal{L}_2$ جملې په لړ کې راوړې وې، حال دا چې ورپسې ادعا په نویو ثابتونو لرونکو ژبو $\mathcal{L}'_1$ او $\mathcal{L}'_2$ کې اعظمي سازګاري غواړي؛ دلته شمېرنه همدغو پراخو ژبو ته سمه شوې ده. د $n \geq 0$ دپاره د ترې فارمولونه د ستونو دوه زیاتېدونکې لړۍ (Γ_n, Δ_n) داسې تعریفوو. $\Gamma_0 = \{A\}$ او $\Delta_0 = \{\neg!B\}$ کېنېږدئ. که (Γ_n, Δ_n) لا تعریف شوي وي، Γ_{n+1} او Δ_{n+1} داسې تعریف کړئ:

1. که $\Gamma_n \cup \{A_n\}$ او Δ_n په $\mathcal{L}'_0$ کې نه بېلېدونکي وي، A_n په Γ_{n+1} کېنې واچوئ. سربېره پر دې، که A_n یو وجودي فارمول $\exists x!S$ وي، داسې نوی ثابت سمبول c وټاکئ چې په Γ_n ، Δ_n ، A_n یا B_n کېنې نه راځي، او $S[c/x]$ په Γ_{n+1} کېنې واچوئ.

2. که Γ_{n+1} او $\Delta_n \cup \{B_n\}$ په $\mathcal{L}'_0$ کې نه بېلېدونکي وي، B_n په Δ_{n+1} کېنې واچوئ. سربېره پر دې، که B_n یو وجودي فارمول $\exists x!S$ وي، داسې نوی ثابت سمبول c وټاکئ چې په Γ_{n+1} ، Δ_n ، A_n یا B_n کېنې نه راځي، او $S[c/x]$ په Δ_{n+1} کېنې واچوئ.

په پای کېنې داسې تعریف کړئ:

$$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n, \quad \Delta^* = \bigcup_{n \geq 0} \Delta_n.$$

اوس پر n په هممهاله استقرا ثابتولې شو چې:

1. Γ_n او Δ_n په $\mathcal{L}'_0$ کېنې نه بېلېدونکي دي؛

2. Γ_{n+1} او Δ_n په $\mathcal{L}'_0$ کېنې نه بېلېدونکي دي.

د 1 بنسټ له 21.2 څخه ترلاسه کېږي. د 2 دپاره باید درې حالتونه بېل کړو:

1. که $\Gamma_0 \cup \{A_0\}$ او Δ_0 بېلېدونکي وي، نو $\Gamma_1 = \Gamma_0$ او 2 یوازې هماغه 1 ده؛

2. که $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{A_0\}$ وي، نو Γ_1 او Δ_0 د جوړونې له مخې نه بېلېدونکي دي؛

3. هغه حالت پاتې کېږي چې A_0 وجودي وي، نو $\Gamma_1 = \Gamma_0 \cup \{\exists x!S, S[c/x]\}$ د جوړونې له مخې $\Gamma_0 \cup \{\exists x!S\}$ او Δ_0 نه بېلېدونکي دي، نو د 21.3 له مخې $\Gamma_0 \cup \{\exists x!S, S[c/x]\}$ او Δ_0 هم نه بېلېدونکي دي.

په دې سره د پورته 1 او 2 د استقرا بنسټ بشپړېږي. اوس استقرايي کام ته ورځو. د 1 دپاره، که $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{B_n\}$ وي، نو Γ_{n+1} او Δ_{n+1} د جوړونې له مخې نه بېلېدونکي دي (حتی چې B_n وجودي هم وي، د 21.3 له مخې)؛ او که $\Delta_{n+1} = \Delta_n$ وي (ځکه چې Γ_{n+1} او $\Delta_n \cup \{B_n\}$ بېلېدونکي دي)، د 2 استقرايي فرضیه کاروو. د 2 د استقرايي کام دپاره، که $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1} \cup \{A_{n+1}\}$ وي، نو Γ_{n+2} او Δ_{n+1} د جوړونې له مخې نه بېلېدونکي دي (حتی چې A_{n+1} وجودي هم وي، د 21.3 له مخې)؛ او که $\Gamma_{n+2} = \Gamma_{n+1}$ وي، د 1 هغه استقرايي حالت کاروو چې همدا اوس مو ثابت کړ. په دې سره پر 1 او 2 استقرا پای ته رسېږي.

له دې څخه پایله کېږي چې Γ^* او Δ^* نه بېلېدونکي دي؛ که داسې نه و، د متناهي شاهد له مخې به داسې $n \geq 0$ وای چې Γ_n او Δ_n بېلېدونکي وي، د 1 خلاف. په ځانګړي ډول، Γ^* او Δ^* سازګار دي: ځکه که لومړنۍ یا دویم سټ ناسازګار و، په ترتیب سره به $\forall x x = x$ یا $\exists x x \neq x$ بېل کړي وو.

اوس ښیو چې Γ^* په $\mathcal{L}'_1$ کېنې او په همدې ډول Δ^* په $\mathcal{L}'_2$ کېنې اعظمي سازګار دے. د لومړي سټ دپاره فرض کړئ چې د کوم $n \geq 0$ دپاره $A_n \notin \Gamma^*$ او $\neg A_n \in \Gamma^*$ وي. که $A_n \notin \Gamma^*$ وي، نو $\Gamma_n \cup \{A_n\}$ له Δ_n څخه بېلېدونکې دے، او ځکه داسې $C \in \mathcal{L}'_0$ شته چې دواړه لاندې خبرې سمې وي:

$$\Gamma^* \models A_n \rightarrow C, \quad \Delta^* \models \neg C.$$

همدا ډول، که $\neg A_n \in \Gamma^*$ وي، داسې $C' \in \mathcal{L}'_0$ شته چې دواړه لاندې خبرې سمې وي:

$$\Gamma^* \models \neg A_n \rightarrow C', \quad \Delta^* \models \neg C'.$$

د بیاني منطق له مخې $\Gamma^* \models C \vee C'$ او $\Delta^* \models \neg(C \vee C')$ ، نو Γ^* او Δ^* بېلوي. ورته استدلال ثابتوي چې Δ^* هم اعظمي دے.

په پای کېنې ښیو چې $\Gamma^* \cap \Delta^*$ په $\mathcal{L}'_0$ کېنې اعظمي سازګار دے. دا په څرګنده سازګار دے، ځکه د دوو سازګارو ستونو تقاطع ده. د اعظمیت د ښودلو دپاره $S \in \mathcal{L}'_0$ وینئ. اوس Γ^* په $\mathcal{L}'_1 \supseteq \mathcal{L}'_0$ کېنې اعظمي دے، او په همدې ډول Δ^* په $\mathcal{L}'_2 \supseteq \mathcal{L}'_0$ کېنې اعظمي دے. نو یا $S \in \Gamma^*$ یا $\neg S \in \Gamma^*$ ، او یا $S \in \Delta^*$ یا $\neg S \in \Delta^*$ وي. که $S \in \Gamma^*$ او $\neg S \in \Delta^*$ وي، نو S به Γ^* او Δ^* بېل کړي، او که $\neg S \in \Gamma^*$ او $S \in \Delta^*$ وي، نو S به Γ^* او Δ^* بېل کړي. له دې امله، یا $S \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ یا $\neg S \in \Gamma^* \cap \Delta^*$ وي، او $\Gamma^* \cap \Delta^*$ اعظمي دے.

څرنګه چې Γ^* اعظمي سازګار دے، داسې یو مدل $\mathcal{M}_1$ لري چې د تعریف ساحه $|\mathcal{M}_1|$ ئې په هغو او یوازې هغو عناصرو مشتمله ده چې ثابت سمبولونه تفسیروي، یعنې $c^{\mathcal{M}_1}$ ؛ کټ مټ لکه د بشپړتیا د قضیې په ثبوت کېنې (13.23) - په همدې ډول، Δ^* داسې یو مدل $\mathcal{M}_2$ لري چې د تعریف ساحه $|\mathcal{M}_2|$ ئې د ثابت سمبولونه په تفسیرونو $c^{\mathcal{M}_2}$ جوړه ده.

$\mathcal{M}_1$ له $\mathcal{M}'_1$ څخه داسې ترلاسه کړئ چې په $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_0$ کېنې د ثابت سمبولونه، تابعې او پریدیکاتونه تفسیرونه ترې وغورځوئ؛ او $\mathcal{M}_2$ هم په همدې ډول ترلاسه کړئ. بیا $h: \mathcal{M}_1 \rightarrow \mathcal{M}_2$ چې د $h(c^{\mathcal{M}_1}) = c^{\mathcal{M}_2}$ له مخې تعریف شوی، په $\mathcal{L}'_0$ کېنې یو آیزومورفیزم دے، ځکه لکه چې ومو ښودل $\Gamma^* \cap \Delta^*$ په $\mathcal{L}'_0$ کېنې اعظمي سازګار دے. دا ځکه پایله کېږي چې هره $\mathcal{L}'_0$ -ترله فارمول یا په Γ^* او Δ^* دواړو کېنې ده، یا په هېڅ یوه کېنې نه ده: نو $c^{\mathcal{M}_1} \in P^{\mathcal{M}_1}$ هله او یوازې هله چې $P(c) \in \Gamma^*$ ، هله او یوازې هله چې $P(c) \in \Delta^*$ ، او هله او یوازې هله چې $c^{\mathcal{M}_2} \in P^{\mathcal{M}_2}$ وي. د آیزومورفیزم نور شرطونه هم په ورته ډول ثابتېدې شي.

اوس به د ژبه $\mathcal{L}'_1 \cup \mathcal{L}'_2$ یو مدل $\mathcal{M}$ داسې تعریف کړو:

1. د تعریف ساحه $|\mathcal{M}|$ هماغه $|\mathcal{M}_2|$ دے، یعنې د ټولو $c^{\mathcal{M}_2}$ عناصرو سټ؛

2. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}'_2 \setminus \mathcal{L}'_1$ کېنې وي، نو $P^{\mathcal{M}} = P^{\mathcal{M}_2}$ ؛

3. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}'_1 \setminus \mathcal{L}'_2$ کېنې وي، نو $P^{\mathcal{M}} = h(P^{\mathcal{M}_1})$ ، یعنې $\langle c_1^{\mathcal{M}_2}, \dots, c_n^{\mathcal{M}_2} \rangle \in P^{\mathcal{M}}$ هله او یوازې هله چې

$\langle c_1^{\mathcal{M}_1}, \dots, c_n^{\mathcal{M}_1} \rangle \in P^{\mathcal{M}_1}$ وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-019) سرچینې په لومړۍ معادله کېنې د $\mathcal{L}'_1$ ځانګړي

پریدیکات تفسیر په نام $\mathcal{M}_2$ څخه لېږداده، چې هلته اصلاً نه تفسیرېږي؛ دلته د ورپسې «یعنې» شرط سره سم د $\mathcal{M}'_1$ تفسیر د h له لارې لېږدول شوی دے.

4. که یو پریدیکات P په $\mathcal{L}'_0$ کېنې وي، نو $P^{\mathcal{M}} = P^{\mathcal{M}_2} = h(P^{\mathcal{M}_1})$ ؛

5. د $\mathcal{L}'_1 \cup \mathcal{L}'_2$ تابعې، د ثابت سمبولونه په ګډون، په ورته ډول اداره کېږي.

د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-020) سرچینې وروسته ګډه مدل یوازې د نا پراخو ژبو $\mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2$ دپاره تعریف کړ، خو بیا ئې د نویو ثابتونو لرونکو ژبو $\mathcal{L}'_1$ او $\mathcal{L}'_2$ له مدلونو سره موافق او د $\Gamma^* \cup \Delta^*$ مدل وپاله. دلته ګډه ژبه او د ښو ټول حالتونه پراخو ژبو ته سم شوي، خو نوي ثابتونه هم تفسیر ولري او وروستی. د صدق ادعا تعریف شوې وي.

په پای کښې پر فارمولونه په استقرا ښودل کېږي چې $\mathcal{M}$ د $\mathcal{L}'_1$ پر ټولو فارمولونه له $\mathcal{M}'_1$ سره، او د $\mathcal{L}'_2$ پر ټولو فارمولونه له $\mathcal{M}'_2$ سره موافق دے. په ځانګړي ډول، $\mathcal{M} \models \Gamma^* \cup \Delta^*$ ؛ نو $\mathcal{M} \models A$ او $\mathcal{M} \models \neg B$ ، او $\mathcal{M} \models \neg B$ او $\mathcal{M} \models A \rightarrow B$ په دې سره د کرېک د منځګړیتوب د قضیې ثبوت پای ته رسېږي. □

21.4 د تعریف وړتیا قضیه

د منځګړیتوب د قضیې یو مهم استعمال د بېت د تعریف وړتیا قضیه ده. د یوې n -ځاییزې اړیکې R د تعریفولو دپاره داسې فارمول C ورکول شو چې n ازاد متغیرونه ولري او R پکې نه راځي. دا به د C له مخې د R یو څرګند تعریف وي. بیا دا هم ویل شو چې په داسې ژبه کښې یوه تیوري $\Sigma(P)$ چې n -ځاییز پریدیکات P لري، P په څرګنده توګه تعریفوي که یو صوري څرګند تعریف ولري (یا لږ تر لږه ترې لازم راشي)، یعنې

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow C(x_1, \dots, x_n)).$$

خو څرګند تعریف د یوې اړیکې د تعریفولو—یعنې په بشپړ ډول د هغې د ټاکلو—یوازې یوه لار ده. یوه تیوري داسې هم کېدای شي چې په هر مدل کښې د P تفسیر د پاتې ژبه په تفسیر سره ټاکل شوی وي. د تعریف وړتیا قضیه وایي چې هر کله یوه تیوري د P تفسیر په دې ډول ټاکي—یعنې P په ضمني توګه تعریفوي—نو هغه په څرګنده توګه هم تعریفوي.

تعریف 21.5. فرض کړئ $\mathcal{L}$ داسې ژبه ده چې پریدیکات P نه لري. د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د تړلي فارمولونه یو سټ $\Sigma(P)$ ، هله او یوازې هله په څرګنده توګه تعریفوي چې د $\mathcal{L}$ داسې فارمول $C(x_1, \dots, x_n)$ وي چې

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow C(x_1, \dots, x_n)).$$

تعریف 21.6. فرض کړئ $\mathcal{L}$ داسې ژبه ده چې پریدیکاتونه P او P' نه لري. د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د تړلي فارمولونه یو سټ $\Sigma(P)$ ، هله او یوازې هله په ضمني توګه تعریفوي چې

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow P'(x_1, \dots, x_n)),$$

چې $\Sigma(P')$ په $\Sigma(P)$ کښې د P پر ځای په یو شان ډول د P' له اېښودلو څخه ترلاسه کېږي.

په بله وینا، د هر مدل $\mathcal{M}$ او $\mathcal{M} \models R, R' \subseteq |\mathcal{M}|^n$ دپاره، که دواړه $(\mathcal{M}, R) \models \Sigma(P)$ او $(\mathcal{M}, R') \models \Sigma(P')$ وي، نو $R = R'$ ؛ دلته $(\mathcal{M}, R)$ هغه جوړښت $\mathcal{M}'$ دے چې $\mathcal{L} \cup \{P\}$ ته څڅوي او $R = P^{\mathcal{M}'}$ کوي، او د $(\mathcal{M}, R')$ دپاره هم همداسې ده.

قضیه 21.7 (د بېت د تعریف وړتیا قضیه). د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ د جملو یو سټ $\Sigma(P)$ ، هله او یوازې هله په ضمني توګه تعریفوي چې $\Sigma(P)$ ، P په څرګنده توګه تعریف کړي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-021) سرچینې د قضیې په بیان کښې $\Sigma(P)$ د فارمولونه سټ بللے و، سره له دې چې دواړه مخکني تعریفونه او ثبوت جملې کاروي؛ او د «هله او یوازې هله» دویم «هله» ترې پاتې و. دلته «جملې» او بشپړه دوه اړخیزه رابطه لیکل شوې ده.

ثبوت. که $\Sigma(P)$ ، P په څرګنده توګه تعریف کړي، نو دواړه

$$\begin{aligned} \Sigma(P) \models & \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow C(x_1, \dots, x_n)) \\ \Sigma(P') \models & \forall x_1 \dots \forall x_n (P'(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow C(x_1, \dots, x_n)) \end{aligned}$$

دي، او پایله ترې ترلاسه کېږي. د بل لوري دپاره فرض کړئ چې $\Sigma(P)$ ، P په ضمني توګه تعریفوي. لومړۍ ثابت سمبولونه $c_1, \dots, c_n$ په $\mathcal{L}$ کښې ورزیاتوو. بیا

$$\Sigma(P) \cup \Sigma(P') \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

د متناهي شاهد له مخې داسې متناهي ستونه $\Delta_0 \subseteq \Sigma(P)$ او $\Delta_1 \subseteq \Sigma(P')$ شته چې

$$\Delta_0 \cup \Delta_1 \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

پرېږدئ $D(P)$! د ټولو هغو ترې فارمولونه $A(P)$ عطف وي چې يا $A(P) \in \Delta_0$ يا $A(P) \in \Delta_1$ ؛ او $D(P')$! د ټولو هغو ترې فارمولونه $A(P')$ عطف وي چې يا $A(P) \in \Delta_0$ يا $A(P') \in \Delta_1$. بيا $D(P) \wedge D(P') \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n)$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-022) سرچينې په دې پايله کښې وروسته اتومي فارمول په خامه بڼه $P'c_1 \dots c_n$ ليکلې و؛ دلته د همدې ثبوت له ثابتې ښې سره سم $P'(c_1, \dots, c_n)$ ليکل شوې دے. دا داسې بيا ترتيبول شو چې هر پرديکات د $\models$ په يوه اړخ کښې راشي:

$$D(P) \wedge P(c_1, \dots, c_n) \models D(P') \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n).$$

د کرېک د منځگړيتوب له قضیې داسې ترلے فارمول $C(c_1, \dots, c_n)$ شته چې P يا P' نه لري او:

$$\begin{aligned} D(P) \wedge P(c_1, \dots, c_n) &\models C(c_1, \dots, c_n); \\ C(c_1, \dots, c_n) &\models D(P') \rightarrow P'(c_1, \dots, c_n). \end{aligned}$$

له دې دوو استلزامونو له لومړي څخه لرو چې $D(P) \models P(c_1, \dots, c_n) \rightarrow C(c_1, \dots, c_n)$. او له دويم څخه، ځکه چې د $\mathcal{L} \cup \{P\}$ يو مدل $(\mathcal{M}, R) \models A(P)$ هله او يوازې هله چې ورسره اړوند د $\mathcal{L} \cup \{P'\}$ مدل $(\mathcal{M}, R) \models A(P')$ وي، لرو چې $C(c_1, \dots, c_n) \models D(P) \rightarrow P(c_1, \dots, c_n)$ له دې څخه:

$$D(P) \models C(c_1, \dots, c_n) \rightarrow P(c_1, \dots, c_n).$$

دواړه سره يوځای کول راکوي چې $D(P) \models P(c_1, \dots, c_n) \leftrightarrow C(c_1, \dots, c_n)$ ؛ او د یکنواختی او تعمیم له مخې هم

$$\Sigma(P) \models \forall x_1 \dots \forall x_n (P(x_1, \dots, x_n) \leftrightarrow C(x_1, \dots, x_n)).$$

□

باب 22

د ليندستروم قضيه

22.1 پېژندګلو

په دې څپرکي کېنې موخه دا ده چې د لومړۍ درجې منطق په اړه د ليندستروم ځانګړنه ثابته کړو: د هغو منطقونو په ډله کېنې چې ځينې نور شرطونه هم پوره کوي، دا هغه اعظمي منطق دے چې د متناهي شاهد او د لوېنهام-سکولم بنکته قضیې پکښې صدق کوي (13.28 او 13.44). لومړۍ بايد د منطقونو هغه عمومي ټولګې لا په عمومي ډول ځانګړې کړو چې قضیه پرې عملي کېږي. بحث به مو تر اړيکيزو ژبو محدود وي، يعنې هغو ژبو ته چې يوازې پريديکاتونه او فردي ثابتونه لري، خو هېڅ تابعي نه لري.

22.2 انتزاعي منطقونه

تعريف 22.1. يو انتزاعي منطق جوړه $\langle L, \models_L \rangle$ ده، چې L داسې تابع ده چې هرې ژبه $\mathcal{L}$ ته د ترلي فارمولونه يو سټ $L(\mathcal{L})$ ورکوي، او $\models_L$ د $\mathcal{L}$ د جوړښتونه او د $L(\mathcal{L})$ د غړي تر منځ اړيکه ده. په ځانګړي ډول، $\langle F, \models \rangle$ عادي د لومړۍ درجې منطق دے؛ يعنې F هغه تابع ده چې ژبه $\mathcal{L}$ ته د $\mathcal{L}$ له ثابتونو څخه د جوړو شوو د لومړۍ درجې ترلي فارمولونه سټ ورکوي، او $\models$ د لومړۍ درجې منطق د پوره کولو اړيکه ده.

پام وکړئ چې د يوې ورکړې شوې ژبه د جوړښت هماغه مفهوم کاروو چې د لومړۍ درجې منطق دپاره ئې کاروو؛ خو دا له مخکښې نه فرضوو چې ترلي فارمولونه د $\mathcal{L}$ له بنسټيزو لښو څخه په معمولي ډول جوړې شوې دي، او نه دا چې $\models_L$ اړيکه د لومړۍ درجې منطق په شان په بازګشتي ډول تعريف شوې ده. نو دا بشپړ عمومي تعريف، د بېلګې په توګه، هغه حالت هم رانغاړي چې د $\langle L, \models_L \rangle$ ترلي فارمولونه نامتناهي اوږده تړونونه يا بېلتونونه ولري، له $\exists$ او $\forall$ پرته نور کميت ټاکونکي ولري (لکه «نامتناهي ډېر داسې x شته چې ...»)، يا بنيادي کميت ټاکونکو نامتناهي اوږده مخلری ولري. د دې د ټينګار دپاره چې په $L(\mathcal{L})$ کېنې «ترلي فارمولونه» اړينه نه ده د لومړۍ درجې منطق معمولي ترلي فارمولونه وي، په دې څپرکي کېنې پرې $E!$ ، $F!$ ، ... متغیرونه چلوو، او $A!$ ، $B!$ ، ... د لومړۍ درجې معمولي فارمولونه ته ساتو.

تعريف 22.2. $\text{Mod}_L(!E)$ دې ټولګې $\{\mathcal{M} : \mathcal{M} \models_L !E\}$ وښيي. که ژبه په څرګنده ښودل پکار وي، $\text{Mod}_L^C(!E)$ لیکو. د $\mathcal{L}$ دوه جوړښتونه $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ په $\langle L, \models_L \rangle$ کېنې ابتدايي هم ارز دي، چې $\mathcal{M} \equiv_L \mathcal{N}$ ئې لیکو، که د $L(\mathcal{L})$ هماغه ترلي فارمولونه په دواړو کېنې رښتوني وي.

تعريف 22.3. د ژبه $\mathcal{L}$ يو انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ نورمال دے که لاندې خاصيتونه پوره کړي:

1. $(L\text{-زياتېدنه})$ د ژبې $\mathcal{L}$ او $\mathcal{L}'$ دپاره، که $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$ وي، نو $L(\mathcal{L}) \subseteq L(\mathcal{L}')$.
2. (د غځونې خاصيت) د هر $E \in L(\mathcal{L})$ دپاره د $\mathcal{L}$ يو متناهي فرعي سټ $\mathcal{L}'$ شته، داسې چې اړيکه $\mathcal{M} \models_L !E$ يوازې د $\mathcal{L}'$ پر راګونې پورې اړه لري، يعنې که $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ پر $\mathcal{L}'$ يوه راګونه ولري، نو $\mathcal{M} \models_L !E$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{N} \models_L !E$ وي.

3. (د آیومورفیزم خاصیت) که $\mathcal{M} \models_L E$ او $\mathcal{M} \simeq \mathcal{N}$ وي، نو $\mathcal{N} \models_L E$ هم وي.

4. (د نوم اړونې خاصیت) اړیکه $\models_L$ د نوم اړونې له مخې ساتل کېږي: که ژبه $\mathcal{L}'$ له $\mathcal{L}$ څخه داسې لاس ته راشي چې هره نښه P د هماغې ځایزې کچې په نښه P' او هر ثابت c په بېل ثابت c' بدل شي، نو د هر جوړښت $\mathcal{M}$ او هرې ترلې فارمول E دپاره، $\mathcal{M} \models_L E$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}' \models_L E'$ وي؛ دلته $\mathcal{M}'$ د $\mathcal{M}$ اړوند $\mathcal{L}'$ -جوړښت او $E' \in L(\mathcal{L}')$ د E ! نوم اړول شوې جمله ده.

5. (بولي خاصیت) انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ د بولي رابطونو له مخې بند دے، په دې معنا چې د هر $E \in L(\mathcal{L})$ دپاره داسې $F \in L(\mathcal{L})$ شته چې $\mathcal{M} \models_L F$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M} \not\models_L E$ وي؛ او د هر E او F دپاره داسې G شته چې $\text{Mod}_L(!G) = \text{Mod}_L(!E) \cap \text{Mod}_L(!F)$ وي. د اتومي فارمولونه او نورو رابطونو دپاره هم همداسې ده.

6. (د کمیت ټاکونکي خاصیت) په $\mathcal{L}$ کښې د هر ثابت c او هر $E \in L(\mathcal{L})$ دپاره داسې $F \in L(\mathcal{L})$ شته چې

$$\text{Mod}_L^c(!F) = \{\mathcal{M} : (\mathcal{M}, a) \in \text{Mod}_L^c(!E) \text{ چې } a \in |\mathcal{M}|\},$$

چې دلته $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \setminus \{c\}$ او $(\mathcal{M}, a)$ د $\mathcal{M}$ هغه $\mathcal{L}$ -غځونه ده چې a ثابت c ته ورکوي.

7. (د نسبي کولو خاصیت) یوه ترلې فارمول $E \in L(\mathcal{L})$ ، یو نوے $(n+1)$ -ځایز محمول R ، او داسې نښې $c_1, \dots, c_n$ راکړل شي چې په $\mathcal{L}$ کښې نه وي؛ بیا یوه ترلې فارمول $F \in L(\mathcal{L} \cup \{R, c_1, \dots, c_n\})$ شته چې د E ! پر $R(x, c_1, \dots, c_n)$ نسبي کول بلل کېږي، او د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره:

$$(\mathcal{M}, X, b_1, \dots, b_n) \models_L F \text{ چې } \mathcal{M} \models_L E,$$

چې $\mathcal{M}$ د $\mathcal{M}$ هغه فرعي جوړښت دے چې د تعریف ساحه ئې $R^{\mathcal{M}}(a, b_1, \dots, b_n) = \{a \in |\mathcal{M}| : R^{\mathcal{M}}(a, b_1, \dots, b_n)\}$ دے (19.6 وگورئ)، او $(\mathcal{M}, X, b_1, \dots, b_n)$ د $\mathcal{M}$ هغه غځونه ده چې $R, c_1, \dots, c_n$ په ترتیب سره په $X, b_1, \dots, b_n$ تفسیروي (چې $X \subseteq M^{n+1}$).

د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-024) سرچینې د نوم اړونې په شرط کښې نوم اړول شوی جوړښت د اصلي ژبه اړوند بللے و؛ دلته هغه د اصلي جوړښت اړوند وبلل شو، او نوم اړول شوې جمله هم په څرگنده وپېژندل شوه. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-025) سرچینې د نسبي کولو په شرط کښې د نوي محمول ځایزه کچه نه وه ټاکلې؛ له ورپسې تعریف ساحې او غځونې سره سم دلته هغه یو زیات له ورکړو ثابتونو، یعنې $(n+1)$ -ځایز، ټاکل شوی دے.

تعریف 22.4. دوه انتزاعي منطقونه $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ او $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ راکړل شي. وایو چې دویم لږ تر لږه د لومړي هومره څرگندوونکي دے، چې $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ ئې لیکو، که د هرې ژبه $\mathcal{L}$ او هرې ترلې فارمول $E \in L_1(\mathcal{L})$ دپاره داسې ترلې فارمول $F \in L_2(\mathcal{L})$ شته چې $\text{Mod}_{L_1}^c(!E) = \text{Mod}_{L_2}^c(!F)$ وي. منطقونه $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle$ او $\langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ هم ارز دي که $\langle L_1, \models_{L_1} \rangle \leq \langle L_2, \models_{L_2} \rangle$ وي.

یادونه 22.5. د لومړۍ درجې منطق، یعنې انتزاعي منطق $\langle F, \models \rangle$ ، نورمال دے. په حقیقت کښې، پورته خاصیتونه تر ډېره د لومړۍ درجې منطق دپاره سملاسي دي. یوازې دومره یادوو چې د غځونې خاصیت له مصداقیت څخه راځي، او پر $R(x, c_1, \dots, c_n)$ د ترلې فارمول E ! نسبي کول د هرې فرعي فارمول F په $\forall x (R(x, c_1, \dots, c_n) \rightarrow !F)$ بدلولو سره تر لاسه کېږي. سربېره پر دې، که $\langle L, \models_L \rangle$ نورمال وي، نو $\langle F, \models \rangle \leq \langle L, \models_L \rangle$ ، لکه چې دا خبره د لومړۍ درجې پر فارمولونه په استقرا ښودل کېدے شي. نو له عمومیت څخه ئې له کوم زیان څخه فرض کولے شو چې د لومړۍ درجې هره ترلې فارمول د هر نورمال منطق غړې ده.

22.3 د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم خاصیتونه

اوس د متناهي شاهد او لوېنهایم-سکولم خاصیتونه د انتزاعي منطقونو حالت ته په څرگند ډول غځوو.

تعریف 22.6. یو انتزاعي منطق $\langle L, \models_L \rangle$ د متناهي شاهد خاصیت لري که د $L(\mathcal{L})$ -تري فارمولونه هر سټ Γ هغه وخت د صدق وړ وي چې هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ئې د صدق وړ وي.

تعریف 22.7. $\langle L, \models_L \rangle$ د لوښایم-سکولم بنکته خاصیت لري که هر د صدق وړ Γ یو د شمېر وړ مدل ولري.


د 19.20 د جزوي آیزومورفیزم مفهوم سوچه «الجبري» دے؛ یعنې د ژبې د تري فارمولونه له یادونې پرته او یوازې د جوړښتونه د ژبه $\mathcal{L}$ د ثابتونو له مخې ورکړل شوي دے. نو دا مفهوم پر انتزاعي منطقونو هم عملي کېږي. د لومړۍ درجې منطق په حالت کېنې له 19.23 څخه پوهېږو چې که دوه جوړښتونه په جزوي ډول آیزومورف وي، نو ابتدایي هم ارز دي. هغه ثبوت انتزاعي منطقونو ته نه غځېږي، ځکه پر فارمولونه استقرا د خپل سري $E \in L(\mathcal{L})$ دپاره ښايي موجوده نه وي؛ خو که د لوښایم-سکولم خاصیت صدق وکړي، قضیه بیا هم رښتوني ده.

قضیه 22.8. فرض کړئ $\langle L, \models_L \rangle$ یو نورمال منطق دے چې د لوښایم-سکولم خاصیت لري. بیا هر دوه په جزوي ډول آیزومورف جوړښتونه په $\langle L, \models_L \rangle$ کېنې ابتدایي هم ارز دي.

ثبوت. فرض کړئ $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ ، خو د کوم E دپاره $\mathcal{M} \models_L E$ او $\mathcal{N} \not\models_L E$ هم وي. د آیزومورفیزم د خاصیت له مخې فرض کول شو چې $E \in L(\mathcal{L})$ د یوې متناهي ژبه $\mathcal{L}$ دپاره وي. I دې د $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ تر منځ د جزوي آیزومورفیزمونو یو سټ وي؛ له عمومیت څخه ېې له زیان څخه دا هم فرض کړئ چې که $p \in I$ او $q \subseteq p$ وي، نو $q \in I$ هم وي.

$\mathcal{M}^{<\omega}$ د $\mathcal{M}$ د غړي د متناهي لړیو سټ دے. S دې پر $\mathcal{M}^{<\omega}$ هغه درې ځاییزه اړیکه وي چې نښلون ښيي؛ یعنې که $a, b, c \in \mathcal{M}^{<\omega}$ وي، نو $S(a, b, c)$ هله او یوازې هله صدق کوي چې c د a او b نښلون وي. همدارنګه، T دې هغه درې ځاییزه اړیکه وي چې د $b \in M$ او $a, c \in \mathcal{M}^{<\omega}$ دپاره $T(a, b, c)$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $a = a_1, \dots, a_n$ او $b = a_1, \dots, a_n$ وي. دوه نوي درې ځاییز پریدیکاتونه P او Q واخلئ، او جوړښت $\mathcal{M}^*$ داسې جوړ کړئ چې جهان ئې $\mathcal{M} \cup \mathcal{M}^{<\omega}$ وي، $\mathcal{M}$ د فرعي جوړښت په توګه ولري، او P او Q په نښلونکو اړیکو S او T تفسیر کړي؛ نو $\mathcal{M}^*$ د ژبه $\mathcal{L} \cup \{P, Q\}$ جوړښت دے. د اړتیا پر وخت د جهان د دوو برخو بېل نقلونه اخلو، خو دا اتحاد سره بېل کوډ شوي وي.

$\mathcal{M}^{<\omega}$ ، S' ، T' ، P' ، Q' او $\mathcal{N}^*$ په ورته ډول تعریف کړئ. ځکه چې د فرض له مخې $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ ، د $\mathcal{M}^{<\omega}$ او $\mathcal{N}^{<\omega}$ تر منځ داسې اړیکه I شته چې $I(a, b)$ هله او یوازې هله صدق کوي چې a او b آیزومورف وي او د 19.20 د مخ او شا شرط پوره کړي. اوس $\mathcal{R}$ هغه جوړښت ونیسئ چې د تعریف ساحه ئې د $\mathcal{M}^*$ او $\mathcal{N}^*$ د تعریف ساحې سره بېل کوډ شوي اتحاد وي، $\mathcal{M}^*$ او $\mathcal{N}^*$ د فرعي جوړښتونه په توګه ولري، او ژبه ئې یو اضافي دوه ځاییز پریدیکات R ولري چې په اړیکه I تفسیرېږي، او داسې پریدیکاتونه هم ولري چې د دواړو برخو د تعریف ساحې $\mathcal{M}^*$ او $\mathcal{N}^*$ ټاکي.



شکل 22.1: جوړښت $\mathcal{R}$ او د هغه دننه جزوي آیزومورفیزم.

مهمه کتنه دا ده چې د جوړښت $\mathcal{R}$ په ژبه کېنې یوه د انتزاعي منطق ترلے فارمول D_1 شته چې په $\mathcal{R}$ کېنې رښتوني ده او وايي $\mathcal{M} \models_L E$ او $\mathcal{N} \not\models_L E$ ؛ د دې دپاره د نسبي کولو خاصیت پکار دے. همدارنګه، یوه د لومړۍ درجې ترلے فارمول D_2 په $\mathcal{R}$ کېنې رښتوني ده او وايي چې $\mathcal{M} \simeq_p \mathcal{N}$ د جزوي آیزومورفیزم I له لارې. د لوښایم-سکولم د خاصیت له مخې، D_1 او D_2 په ګډه په یوه د شمېر وړ مدل $\mathcal{R}_0$ کېنې رښتوني دي؛ په دې مدل کېنې په جزوي ډول آیزومورف فرعي جوړښتونه $\mathcal{M}_0$ او $\mathcal{N}_0$ شته، داسې چې $\mathcal{M}_0 \models_L E$

او $\mathcal{M}_0 \not\models_L E$ خو د شمېر ور او په جزوي ډول آيزومورف جوړښتونه د 19.21 له مخې په حقيقت کېنې آيزومورف دي؛ دا د نورمالو انتزاعي منطقونو د آيزومورفېزم له خاصيت سره تناقض ده. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-026) سرچينې دواړه شاهدې جملې د لومړۍ درجې بللې وې، حال دا چې لومړۍ جمله د خپل سري انتزاعي جملې د نسبي کولو له لارې لاس ته راځي؛ دلته لومړۍ د انتزاعي منطق جمله او دويمه د لومړۍ درجې جمله وبلل شوه. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-027) سرچينې کې جوړښت ته د پخواني چپ جوړښت هماغه نوم، او بيا ښکته مدل او چپ فرعي جوړښت ته هم يو شان نوم ورکړی و؛ دلته کې جوړښت او د هغه شمېرېدونکي مدل په بېلو نښو ښودل شوي، او په انځور کېنې بهرنی نوم هم ورسره سم شوی دی. □

22.4 د ليندستروم قضيه

لم 22.9. فرض کړئ $E \in L(L)$ او L متناهي ده؛ دا هم فرض کړئ چې داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې د هر دوو جوړښتونه $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ دپاره، که $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$ او $\mathcal{M} \models_L E$ وي، نو $\mathcal{N} \models_L E$ هم وي. بيا $E!$ د لومړۍ درجې له يوې ترلې فارمول سره هم ارز ده؛ يعنې د لومړۍ درجې داسې $D!$ شته چې $\text{Mod}_L(E!) = \text{Mod}_L(D!)$ وي.

ثبوت. n داسې ونيسئ چې هر دوه n -هم ارز جوړښتونه $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ ، $E!$ ته د ورکړي ارزښت په اړه سره سلا وي. 19.26 راياد کړئ: په يوه متناهي ژبه کېنې، له منطقي هم ارزۍ پرته، د لومړۍ درجې يوازې متناهي ډېرې داسې ترلي فارمولونه شته چې د کيټ ټاکونکو رتبه ئې تر n زياته نه وي. اوس د هر ټاکلي جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $D_{\mathcal{M}}!$ د هغو د لومړۍ درجې ترلي فارمولونه $E!$ د هر منطقي هم ارزۍ له ټولگي څخه د يوه استازي ترون ونيسئ چې په $\mathcal{M}$ کېنې رښتوني وي او $\text{qr}(E!) \leq n$ ولري؛ دا ترون متناهي ده، او $\mathcal{N} \models D_{\mathcal{M}}!$ هله چې $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$ وي. بيا $D = \bigvee \{D_{\mathcal{M}}! : \mathcal{M} \models_L E\}$ کېږدئ؛ له هر منطقي هم ارزۍ ټولگي څخه د يوه استازي په ساتلو دا بېلتون هم متناهي ده. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-028) سرچينې د ټولو رښتونو ټيټې مرتبې جملو ترون «متناهي» بللې و، که څه هم په هر منطقي هم ارزۍ ټولگي کېنې بې شمېره نخوي بڼې راتللې شي؛ دلته په څرکنده له هر ټولگي څخه يو استازي اخيستل کېږي، او په وروستي بېلتون کېنې هم تکراري هم ارزې برخې لرې کېږي.

پايله $\text{Mod}_L(E!) = \text{Mod}_L(D!)$ تر لاسه کېږي. په حقيقت کېنې، که $\mathcal{N} \models_L D!$ وي، نو د کوم $\mathcal{M} \models_L E$ دپاره $\mathcal{M} \models D_{\mathcal{M}}!$ ؛ نو $\mathcal{N} \models D!$ هم. برعکس، که $\mathcal{N} \models_L E$ وي، نو $\mathcal{N} \models D!$ په کېنې يوه بېلېدونکې برخه ده، او دا چې $\mathcal{N} \models D_{\mathcal{N}}!$ ، نو $\mathcal{N} \models_L D!$ هم. □

قضيه 22.10 (د ليندستروم قضيه). فرض کړئ $\langle L, \models_L \rangle$ يو نورمال انتزاعي منطق ده چې د متناهي شاهد او لوېنهام-سکولم خاصيتونه لري. بيا $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$ ؛ نو $\langle L, \models_L \rangle$ د لومړۍ درجې له منطق سره هم ارز ده. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-029) سرچينې د قضیې په وينا کېنې د نورمالوالي شرط پرېښی و، حال دا چې ثبوت د غځونې، آيزومورفېزم، نسبي کولو او نورو نورمالو خاصيتونو کار اخلي، او معکوسه څرکندونکې اړيکه هم له همدې شرط څخه راځي.

ثبوت. د 22.9 له مخې، دومره ښودل کافي دي چې د هر $E \in L(L)$ دپاره، چې L متناهي وي، داسې $n \in \mathbb{N}$ شته چې د هر دوو جوړښتونه $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ دپاره: که $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$ وي، نو $\mathcal{M}$ او $\mathcal{N}$ پر $E!$ سره سلا وي. بيا $E!$ د لومړۍ درجې له يوې ترلې فارمول سره هم ارز ده، او له دې څخه $\langle L, \models_L \rangle \leq \langle F, \models \rangle$ پايله کېږي. ځکه چې په يوه متناهي او سوچه اړيکيزه ژبه کېنې کار کوو، د 19.30 له مخې دا وينا چې $\mathcal{M} \equiv_n \mathcal{N}$ ده، په اړوندې الجبري وينا $I_n(\emptyset, \emptyset)$ بدلولې شو.

يو $E!$ راکړل شي، او د تناقض دپاره فرض کړئ چې د هر n دپاره داسې جوړښتونه $\mathcal{M}_n$ او $\mathcal{N}_n$ شته چې $I_n(\emptyset, \emptyset)$ خو، د بېلگې په توگه، $\mathcal{M}_n \models_L E!$ او $\mathcal{N}_n \not\models_L E!$ وي. د آيزومورفېزم د خاصيت له مخې فرض کول شو چې ټول $\mathcal{M}_n$ د ژبه ثابتونه په هماغو څيزونو تفسيريوي؛ سربېره پر دې، ځکه په ژبه کېنې يوازې متناهي ډېرې اتومي ترلي فارمولونه شته، فرض کول شو چې هماغه اتومي ترلي فارمولونه پوره کوي؛ که داسې نه وي، د $\mathcal{M}$ کانونو يوه فرعي لړۍ اخيستلې شو. $\mathcal{M}$ د ټولو $\mathcal{M}_n$ کانو اتحاد ونيسئ؛ يعنې هغه يوازينی کوچنی جوړښت چې هر $\mathcal{M}_n$ د فرعي جوړښت په توگه لري. لکه د 22.8 په ثبوت کېنې، $\mathcal{M}^*$ د $\mathcal{M}$ هغه غځونه ونيسئ چې د تعريف ساحه ئې $|\mathcal{M}|^{<\omega} \cup |\mathcal{M}|$ وي، او په پراخه شوې ژبه کېنې د نښلون محمولونه P او Q ولري.

په ورته ډول $\mathfrak{M}_n$ ، $\mathfrak{M}$ او $\mathfrak{M}^*$ تعریف کړئ. اوس $\mathfrak{R}$ هغه جوړښت ونیسئ چې د تعریف ساحه $\mathfrak{M}^*$ او $\mathfrak{M}$ د د تعریف ساحې تر څنګ طبیعي عددونه $\mathbb{N}$ د خپل طبیعي ترتیب $\leq$ سره رانغاړي. ژبه $\mathfrak{L}$ داسې اضافي محمولونه لري چې د اړوندو د تعریف ساحې $|\mathfrak{M}|$ ، $|\mathfrak{M}|^<\omega$ او $|\mathfrak{M}|^<\omega$ ښيي، او داسې محمولونه هم لري چې د $\mathfrak{M}_n$ او $\mathfrak{M}$ د تعریف ساحې په لاندې معنا کوډوي:

$$\begin{aligned} |\mathfrak{M}_n| &= \{a \in |\mathfrak{M}| : R(a, n)\}; & |\mathfrak{M}_n| &= \{a \in |\mathfrak{M}| : S(a, n)\}; \\ |\mathfrak{M}_n|^{<\omega} &= \{a \in |\mathfrak{M}|^{<\omega} : R(a, n)\}; & |\mathfrak{M}_n|^{<\omega} &= \{a \in |\mathfrak{M}|^{<\omega} : S(a, n)\}. \end{aligned}$$

جوړښت $\mathfrak{R}$ یوه درې ځاییزه اړیکه J هم لري، داسې چې $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-030) سرچینې دلته ګډه کوډوونکي جوړښت د مخکیني اتحاد په هماغه نښه ښودلې، او وروسته $\mathfrak{L}$ د متناهي شاهد مدل هم د پخوانۍ غځونې په نښه ښودلې و؛ دلته ګډه جوړښت او د هغه نوی مدل په بېلو نښو ښودل کېږي.

اوس د $\mathcal{L}$ په هغه ژبه کېنې چې په R ، S ، J او نورو نښو پراخه شوې ده، داسې ترلې فارمول $D!$ شته چې وایي: $\leq$ یو منفصل خطي ترتیب دے چې لومړۍ خو وروستی غړۍ نه لري؛ د ترتیب د هر n دپاره $\mathfrak{M}_n \models_L E!$ او $\mathfrak{M}_n \not\models_L E!$ ؛ او $J(n, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ هله او یوازې هله چې $I_n(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ وي. د انتزاعي جملې اړوندې برخې د نسبي کولو او د کمیت ټاکونکي له خاصیتونو څخه تر لاسه کېږي.

ژبه په نویو ثابتونو c ، c_0 ، c_1 ، .. پراخه کړئ، او له $D!$ سره د لومړۍ درجې هغه جملې یوځایه کړئ چې c_0 د ترتیب لومړۍ غړۍ ټاکي، هر c_{k+1} د c_k سملاسي جانشین ټاکي، او د هر معیاري $k \in \mathbb{N}$ دپاره $c_k < c$ وایي. د دې تیورۍ هر متناهي فرعي سټ په $\mathfrak{R}$ کېنې داسې پوره کېدے شي چې c د هغو متناهي ډېرو یادو شوو جانشینانو څخه پورته یو طبیعي عدد وټاکي. د متناهي شاهد د خاصیت له مخې ټوله تیوري یو مدل $\mathfrak{R}^*$ لري. نو $n^* = c^{\mathfrak{R}^*}$ د هر معیاري k دپاره c_k له تفسیر څخه پورته دے، او د کوډ شوي منفصل ترتیب یو نامعیاري غړۍ دے. په ځانګړي ډول، $\mathfrak{R}^*$ داسې فرعي جوړښتونه $\mathfrak{M}_n^*$ او $\mathfrak{M}^*$ لري چې $\mathfrak{M}_n^* \models_L E!$ او $\mathfrak{M}_n^* \not\models_L E!$. اوس د $|\mathfrak{M}_n^*|$ او $|\mathfrak{M}^*|$ د k -توکیدو لړیو د جوړو یو سټ $\mathcal{I}$ داسې تعریفولے شو: $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \in \mathcal{I}$ هله او یوازې هله چې $J(n^* - k, \mathbf{a}, \mathbf{b})$ وي؛ دلته k د $\mathbf{a}$ او $\mathbf{b}$ اوږدوالی دے. ځکه n^* نامعیاري دے، د هر معیاري k دپاره $n^* - k > 0$ ؛ نو سټ $\mathcal{I}$ د دې خبرې شاهد دے چې $\mathfrak{M}_n^* \simeq_p \mathfrak{M}^*$. خو د 22.8 له مخې $\mathfrak{M}_n^*$ له $\mathfrak{M}^*$ سره L -هم ارز دے، او دا تناقض دے. د ژباړې د نسخې سمون: (OLMOD-031) سرچینې ادعا کړې وه چې د متناهي شاهد خاصیت د یوازینۍ جملې داسې مدل ورکوي چې نامعیاري پړاو ولري؛ هغه جمله پخپله داسې پړاو نه لازموي. دلته ژبه په یو پورني ثابت او د معیاري جانشینانو په نومونو غځول شوې، هر متناهي فرعي سټ په اصلي کوډوونکي جوړښت کېنې پوره کېږي، او متناهي شاهد ټولې تیورۍ ته له هر معیاري پړاو څخه پورته غړۍ ورکوي. د انتزاعي جملې د پوره کولو نښې هم له اړوند منطق سره څرګندې شوې دي.

□

برخه V

محاسبه كېدنه

ادارتي يادونه - دا برخه د محاسبه کېدنې د تيوري په اړه د جرېي اېوېگېد پر يادښتونو ولاړه ده. اوس مهال يوازې د بازگشتي تابعو څپرکي تمرينونه لري، او ټوله برخه لا د هڅونې، بېلگو، جزيياتو او تمرينونو په زياتولو سره پراخېدو ته اړتيا لري.

باب 23

بازگشتي تابعي

ادارتي يادونه- دا د بازگشتي تابعو په اړه د جرېمي اېوېگېد يادښتونه دي چې رېچرډ زاګ بيا کلي او پراخ کړي دي- دا څپرکي ځينې تمرينونه لري، او په خپلواکه توګه هم شاملېدے شي خو د نحو د حسابي کولو د بحث بنسټ برابر کړي-

23.1 پېژندګلو

د محاسبه کېدنې د يوې رياضي تيورۍ د جوړولو دپاره، تر هر څه وړاندې د محاسبه کېدنې يو مدل جوړول پکار دي- اوس موږ محاسبه کېدنه د هغه ډول کار په توګه ګڼو چې کمپيوټرونه ئې کوي، او کمپيوټرونه له نښو سره کار کوي- خو د محاسبه کېدنې د تيوريو د پرمختګ په پيل کېنې د محاسبې نمونه يي بېلګه عددي محاسبه وه- رياضيپوهانو تل د عددونو د تيورۍ له تابعو سره مينه لرلې، يعنې له داسې تابعو $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ سره چې محاسبه کېدے شي- نو دا د حيرانتيا خبره نه ده چې د محاسبه کېدنې د تيورۍ په پيل کېنې همدا تابعي څېړل کېدې- د محاسبه کېدونکو عددي تابعو تر ټولو پېژندل شوې بېلګې، لکه جمع، ضرب او توان (د طبيعي عددونو)، يو په زړه پورې خاصيت لري: دا په بازگشتي ډول تعريفېدے شي- ځکه نو دا ډېره طبيعي ده چې د بازگشتي تعريفونو پر بنسټ د محاسبه کېدونکې تابع يو عمومي تعريف جوړ کړو- د عددونو د تيورۍ د تابعو د بازگشتي تعريف له ډېرو ممکنو لارو څخه دلته يوه په ځانګړي ډول ساده نمونه مرکزي کېږي: تش په نامه بنسټيز بازگښت-

له محاسبه کېدونکو تابعو سره سره ښايي محاسبه کېدونکي ستونه او اړيکې هم راته د پام وړ وي- يو سټ هغه وخت محاسبه کېدونکي دے چې دا محاسبه کولے شو چې يو ورکړل شولے عدد د سټ غړے دے که نه؛ او يوه اړيکه هله او يوازې هله محاسبه کېدونکې ده چې دا محاسبه کولے شو چې لړۍ $\langle n_1, \dots, n_k \rangle$ د اړيکې غړے ده که نه- د يو سټ يا اړيکې د ځانګړونکې تابع په پام کېنې نيولو سره، د محاسبه کېدونکو ستونو او اړيکو بحث د محاسبه کېدونکو تابعو تر بحث لاندې راوستل کېدے شي- په دې توګه بنسټيزې بازگشتي اړيکې هم تعريفولے شو؛ د بېلګې په توګه، دا اړيکه چې « m, n » ېې له پاتې شوني وېشي» يوه بنسټيزه بازگشتي اړيکه ده-

خو بنسټيزې بازگشتي تابعي-يعنې هغه چې له بنسټيزو تابعو څخه د ترکيب او بنسټيز بازگښت په کارولو تعريفېدے شي-يوازينۍ محاسبه کېدونکې د عددونو د تيورۍ تابعي نه دي- د بنسټيز بازگښت ډېرې عمومي څېړل شوې دي، خو د تابعو د محاسبې تر ټولو پياوړې او په پراخه کچه منل شوې زياته لاره ېې پوله پلټنه ده- دا د جزوي بازگشتي تابعو تعريف ته، او له دې سره تړلي د عمومي بازگشتي تابعو تعريف ته لار هواروي- عمومي بازگشتي تابعي محاسبه کېدونکې او هرځای تعريف شوې دي، او دا تعريف په کره توګه هغه جزوي بازگشتي تابعي ځانګړې کوي چې هرځای تعريف شوې وي- بازگشتي تابعي د محاسبې د هر بل مدل (تيورينګ ماشينونو، لمبدا حساب، او داسې نورو) تقليد کولے شي، ځکه نو د محاسبې له ډېرو منل شوو مدلونو څخه يو مدل وړاندې کوي- د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-001) سرچينې بنسټيزې بازگشتي تابعي يوازې د بنسټيز بازگښت په کارولو تعريفېدونکې بللې وې؛ خو رسمي تعريف بنسټيزې تابعي او ترکيب هم غواړي- دلته لنډه ځانګړنه له رسمي تعريف سره سمه شوې ده-

23.2 بنسټیز بازگښت

د طبیعي عددونو یو خاصیت دا دے چې هر طبیعي عدد پر 0 د راتلونکي عمل $+1$ په متناهي خو ځله کارولو سره تر لاسه کېدے شي — هر طبیعي عدد یا 0 دے، یا د ... د 0 راتلونکي دے. د دې حقیقت په کارولو سره د یوې تابع $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ د ټاکلو یوه لاره داسې ده: (الف) وټاکئ چې د آرکومېنټ 0 دپاره د h ارزښت څه دے، او (ب) دا هم وټاکئ چې د $h(x)$ ارزښت له ورکړې وروسته د $h(x+1)$ ارزښت څنګه محاسبه شي. ځکه (الف) په نېغه راته وایي چې $h(0)$ څه دے، نو h د 0 دپاره تعریف شوه. اوس د $x = 0$ دپاره د (ب) لارښوونه په کارولو سره، له $h(0)$ څخه $h(1) = h(0+1)$ محاسبه کول شو. هماغه لارښوونه د $x = 1$ دپاره په کارولو سره، له $h(1)$ څخه $h(2) = h(1+1)$ محاسبه کوو، او همداسې مخکېنې څو. د هر طبیعي عدد x دپاره به بالاخره هغه پړاو ته ورسېږو چې $h(x+1)$ له $h(x)$ څخه تعریفوو، نو $h(x)$ د ټولو $x \in \mathbb{N}$ دپاره تعریف شوې ده. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-002) سرچینې د دې جملې د بازگښت لوری سرچپه لیکلې و او اوسنی ارزښت ئې له راتلونکي ارزښت څخه تعریفواوه؛ دلته د مخکېنې ورکړې لارښوونې له مخې راتلونکي ارزښت له اوسني ارزښت څخه تعریف شوی دے.

د بېلګې په توګه، فرض کړئ $h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ په لاندې دوو معادلو ټاکو:

$$\begin{aligned} h(0) &= 1 \\ h(x+1) &= 2 \cdot h(x) \end{aligned}$$

که د ضرب طریقه له مخکېنې را معلومه وي، نو دا معادلې د پورته (الف) او (ب) دپاره اړین معلومات راکوي. د دویمې معادلې پرله پسې په کارولو سره لاس ته راوړو چې

$$\begin{aligned} h(1) &= 2 \cdot h(0) = 2, \\ h(2) &= 2 \cdot h(1) = 2 \cdot 2, \\ h(3) &= 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 2, \\ &\vdots \end{aligned}$$

وینو چې هغه تابع h چې ټاکلې مو ده، $h(x) = 2^x$ ده.

د طبیعي عددونو ځانګړې خاصیت ضمانت کوي چې یوازې یوه تابع h شته چې دا دواړه معیارونه پوره کوي. د دې غوندې معادلو جوړې ته د تابع h په بنسټیز بازگښت تعریف وایي. دې ته ځکه «بازګشتي» وایي چې h په بازګشتي ډول تعریفوو، یعنې تعریف، او په ځانګړي ډول دویمه معادله، پخپله h په بني اړخ کېنې لري. دې ته ځکه «بنسټیز» وایي چې د $h(x+1)$ په تعریف کېنې یوازې د $h(x)$ ارزښت، یعنې سملاسي مخکیني ارزښت، کاروو. دا پر $\mathbb{N}$ د یوې تابع د بازګشتي تعریف تر ټولو ساده لاره ده.

د جمع او ضرب غوندې لا بنسټیزې تابعې هم په بنسټیز بازگښت تعریفول شوې. خو په دې حالتونو کېنې اړوندې تابعې 2-ځایزې دي. د آرکومېنټونو یو ځای ثابت نېسو او بل د بازگښت دپاره کاروو. د بېلګې په توګه، د $\text{add}(x, y)$ د تعریف دپاره x ثابت نیول شو، ارزښت لومړی د $y = 0$ دپاره تعریفول شو، او بیا د $y + 1$ دپاره ئې د y له مخې تعریفول شو. ځکه چې x ثابت دے، د تعریف معادلو په کېنې او بني اړخ دواړو کېنې به راځي.

$$\begin{aligned} \text{add}(x, 0) &= x \\ \text{add}(x, y+1) &= \text{add}(x, y) + 1 \end{aligned}$$

دا معادلې د ټولو x او y دپاره د add ارزښت ټاکي. د بېلګې په توګه، د $\text{add}(2, 3)$ د موندلو دپاره تعریف معادلې د $x = 2$ دپاره کاروو: لومړی معادله کاروو چې $\text{add}(2, 0) = 2$ ومومو، بیا دویمه معادله پرله پسې کاروو چې $\text{add}(2, 1) = 2 + 1 = 3$ ، $\text{add}(2, 2) = 3 + 1 = 4$ ، او $\text{add}(2, 3) = 4 + 1 = 5$ ومومو.

د add په تعریف کېنې مو د دویمې معادلې په بني اړخ کېنې $+$ وکاراوه، خو یوازې د 1 د زیاتولو دپاره. په بله وینا، د راتلونکي تابع $\text{succ}(z) = z + 1$ مو وکاروله او پر مخکیني ارزښت $\text{add}(x, y)$ مو عملي کړه، څو $\text{add}(x, y+1)$ تعریف کړو. نو بازګشتي تعریف داسې ګڼل شو چې د یوې تابع له مخې ورکړل شوی دے او موږ ئې پر مخکیني ارزښت عملي کوو. خو که تابع یوازې پر مخکیني ارزښت

نۀ، بلکې پر x او y هم تابع وگرځو، زیان نۀ لري—او کله ناکله اړینه وي—دا تعریف وگورئ:

$$\text{mult}(x, 0) = 0$$

$$\text{mult}(x, y + 1) = \text{add}(\text{mult}(x, y), x)$$

دا د تابع mult یو بنسټیز بازگشتي تعریف دے چې تابع add هم پر مخکیني ارزښت $\text{mult}(x, y)$ او هم پر لومړي آرگومېنټ x عملي کوي. دا هم تابع $\text{mult}(x, y)$ د ټولو آرگومېنټونو x او y دپاره تعریفوي. د بېلګې په توګه، $\text{mult}(2, 3)$ د $\text{mult}(2, 0)$ ، $\text{mult}(2, 1)$ ، $\text{mult}(2, 2)$ او $\text{mult}(2, 3)$ په پرله پسې محاسبې سره ټاکل کېږي:

$$\text{mult}(2, 0) = 0$$

$$\text{mult}(2, 1) = \text{mult}(2, 0 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 0), 2) = \text{add}(0, 2) = 2$$

$$\text{mult}(2, 2) = \text{mult}(2, 1 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 1), 2) = \text{add}(2, 2) = 4$$

$$\text{mult}(2, 3) = \text{mult}(2, 2 + 1) = \text{add}(\text{mult}(2, 2), 2) = \text{add}(4, 2) = 6$$

نو عمومي نمونه داسې ده: د یوې تابع $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ د بنسټیز بازگشتي تعریف دپاره دوه معادلې ورکوو. لومړۍ د $h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0)$ ارزښت h ته له اشارې پرته تعریفوي. دویمه د $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1)$ ارزښت د $h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)$ ، نورو آرگومېنټونو $x_0, \dots, x_{k-1}$ او y له مخې تعریفوي. په دې دویمه معادله کېنې یوازې د h سملاسي مخکیني ارزښت کارېدے شي. که د دې دوو معادلو د بڼې اړخونو ورکړي عملونه هم تابعې f او g وګڼو، نو په بنسټیز بازگښت د نوې تابع h د تعریف عمومي نمونه داسې ده:

$$h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) = f(x_0, \dots, x_{k-1})$$

$$h(x_0, \dots, x_{k-1}, y + 1) = g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y))$$

د add په حالت کېنې، $k = 1$ او $f(x_0) = x_0$ (عینیت تابع) دي، او $g(x_0, y, z) = z + 1$ (هغه 3-ځاییزه تابع چې د خپل دریم آرگومېنټ راتلونکي ورکوي) ده:

$$\text{add}(x_0, 0) = f(x_0) = x_0$$

$$\text{add}(x_0, y + 1) = g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y))$$

د mult په حالت کېنې، $f(x_0) = 0$ (هغه ثابت تابع چې تل 0 ورکوي) او $g(x_0, y, z) = \text{add}(z, x_0)$ (هغه 3-ځاییزه تابع چې د خپل وروستي او لومړي آرگومېنټ مجموعه ورکوي) دي:

$$\text{mult}(x_0, 0) = f(x_0) = 0$$

$$\text{mult}(x_0, y + 1) = g(x_0, y, \text{mult}(x_0, y)) = \text{add}(\text{mult}(x_0, y), x_0)$$

23.3 ترکیب

که f او g د طبیعي عددونو دوه یوځاییزې تابعې وي، نو ترکیب ټی کولے شو: $h(x) = f(g(x))$. په دې حالت کېنې نوې تابع $h(x)$ له تابعو f او g څخه په ترکیب تعریف شوې ده. غواړو دا د یو څخه د زیاتو آرگومېنټونو تابعو ته عمومي کړو.

د دې یوه لاره داسې ده: فرض کړئ f یوه k -ځاییزه تابع ده، او $g_0, \dots, g_{k-1}$ هغه k تابعې دي چې ټولې n -ځاییزې دي. بیا یوه نوې n -ځاییزه تابع h داسې تعریفولے شو:

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1}))$$

که f او ټولې g_i محاسبه کېدونکې وي، نو h هم محاسبه کېدونکې ده: د $h(x_0, \dots, x_{n-1})$ د محاسبې دپاره لومړۍ د هر $i = 0, \dots, k-1$ دپاره ارزښتونه $y_i = g_i(x_0, \dots, x_{n-1})$ محاسبه کړئ. بیا دا ارزښتونه f ته ورکړئ، خو $h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(y_0, \dots, y_{k-1})$ محاسبه کړئ. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-003) سرچینې په وروستۍ محاسبې کېنې د تابع د آرگومېنتونو لړۍ د تابعو د شمېر له مخې پای ته رسولې وه؛ دلته لړۍ د تابع د ځاییزې کچې له مخې بشپړه شوې ده.

ښايي دا د دې خبرې له حده زیات محدود بیان ښکاره شي چې له ځینو شته تابعو څخه د نوې تابع د محاسبې پر مهال څه پېښېږي. یوه خبره دا ده چې کله ناکله د یوې تابع ټول آرگومېنتونه نه کاروو؛ لکه هغه وخت چې د add په بنسټیز بازکشتي تعریف کېنې مو د کارولو دپاره $g(x, y, z) = \text{succ}(z)$ تعریف کړه. فرض کړئ د لاندې تابعو د کارولو اجازه لرو:

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i$$

تابعو P_i^n ته پروجکشن تابعې وایي: P_i^n یوه n -ځاییزه تابع ده. بیا g داسې تعریفېدې شي:

$$g(x, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x, y, z)).$$

دلته د f ونډه 1-ځاییزه تابع succ ترسره کوي، نو $k = 1$ دے. او یوه 3-ځاییزه تابع P_2^3 لرو چې د g_0 ونډه ترسره کوي. پایله یوه 3-ځاییزه تابع ده چې د درېم آرگومېنت راتلونکې ورکوي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-004) سرچینې د پروجکشن تابعو له تعریف سملاسي وروسته په نوم کېنې د تابعو شمېر د ځاییزې کچې پر ځای کارولی و؛ دلته نوم له هماغې تعریف شوې ځاییزې کچې سره سم شوی دے.

پروجکشن تابعې دا اجازه هم راکوي چې د آرگومېنتونو په بیا ترتیبولو یا سره یو کولو نوې تابعې تعریف کړو. د بېلګې په توګه، تابع $h(x) = \text{add}(x, x)$ داسې تعریفېدې شي:

$$h(x_0) = \text{add}(P_0^1(x_0), P_0^1(x_0)).$$

دلته $n = 1, k = 2$ ، د $f(y_0, y_1)$ ونډه add ترسره کوي، او د $g_0(x_0)$ او $g_1(x_0)$ دواړو ونډې $P_0^1(x_0)$ ، یعنې یوځاییزه پروجکشن تابع (یا عینیت تابع)، ترسره کوي.

که $f(y_0, y_1)$ هغه تابع وي چې له مخکېنې ئې لرو، نو تابع $h(x_0, x_1) = f(x_1, x_0)$ داسې تعریفولې شو:

$$h(x_0, x_1) = f(P_1^2(x_0, x_1), P_0^2(x_0, x_1)).$$

دلته $n = 2, k = 2$ ، او د g_0 او g_1 ونډې په ترتیب سره P_1^2 او P_0^2 ترسره کوي.

ښايي دا اندېښنه هم ولری چې د ټولو $g_0, \dots, g_{k-1}$ ځاییزه کچه باید یو شان n وي. (په یاد ولری چې د یوې تابع ځاییزه کچه د آرگومېنتونو شمېر دے؛ د n -ځاییزې تابع ځاییزه کچه n ده.) خو د پروجکشن تابعو زیاتول اړینه انعطاف‌پذیري برابروي. د بېلګې په توګه، فرض کړئ f او g ، 3-ځاییزې تابعې دي او h هغه 2-ځاییزه تابع ده چې داسې تعریف شوې ده:

$$h(x, y) = f(x, g(x, x, y), y).$$

د h تعریف له پروجکشن تابعو سره داسې بیا لیکل کېدای شي:

$$h(x, y) = f(P_0^2(x, y), g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)), P_1^2(x, y)).$$

بیا h له P_0^2 ، l او P_1^2 سره د f ترکیب دے، چې

$$l(x, y) = g(P_0^2(x, y), P_0^2(x, y), P_1^2(x, y)),$$

یعنې l له P_0^2 ، P_0^2 او P_1^2 سره د g ترکیب دے.

23.4 بنسټیزې بازگشتي تابعې

راځي یو ځل بیا ولیکو چې له شته تابعو څخه د بنسټیز بازگښت او ترکیب په کارولو نوې تابعې څنګه تعریفولې شو.

تعریف 23.1. فرض کړئ f یوه k -ځاییزه تابع ($k \geq 1$) او g یوه $(k+2)$ -ځاییزه تابع ده. هغه تابع چې له f او g څخه په بنسټیز بازگښت تعریفېږي، $(k+1)$ -ځاییزه تابع h ده چې لاندې معادلې ئې تعریفوي:

$$\begin{aligned} h(x_0, \dots, x_{k-1}, 0) &= f(x_0, \dots, x_{k-1}) \\ h(x_0, \dots, x_{k-1}, y+1) &= g(x_0, \dots, x_{k-1}, y, h(x_0, \dots, x_{k-1}, y)) \end{aligned}$$

تعریف 23.2. فرض کړئ f یوه k -ځاییزه تابع ده، او $g_0, \dots, g_{k-1}$ هغه k تابعې دي چې ټولې n -ځاییزې دي. هغه تابع چې له f او $g_0, \dots, g_{k-1}$ څخه په ترکیب تعریفېږي، n -ځاییزه تابع h ده چې داسې تعریفېږي:

$$h(x_0, \dots, x_{n-1}) = f(g_0(x_0, \dots, x_{n-1}), \dots, g_{k-1}(x_0, \dots, x_{n-1})).$$

له succ او پروجکشن تابعو

$$P_i^n(x_0, \dots, x_{n-1}) = x_i,$$

سره سره، د هر طبیعي عدد n او $i < n$ دپاره تابع $zero(x) = 0$ هم په بنسټیزو بازگشتي تابعو کېښي شاملوو.

تعریف 23.3. د بنسټیزو بازگشتي تابعو سټ له $\mathbb{N}^n$ څخه $\mathbb{N}$ ته د تابعو هغه سټ دے چې په لاندې مادو استقرارې ډول تعریفېږي:

1. zero بنسټیزه بازگشتي ده.

2. succ بنسټیزه بازگشتي ده.

3. هره پروجکشن تابع P_i^n بنسټیزه بازگشتي ده.

4. که f یوه k -ځاییزه بنسټیزه بازگشتي تابع وي او $g_0, \dots, g_{k-1}$ n -ځاییزې بنسټیزې بازگشتي تابعې وي، نو له $g_0, \dots, g_{k-1}$ سره د f ترکیب بنسټیزه بازگشتي دے.

5. که f یوه k -ځاییزه بنسټیزه بازگشتي تابع وي او g یوه $k+2$ -ځاییزه بنسټیزه بازگشتي تابع وي، نو له f او g څخه په بنسټیز بازگښت تعریف شوې تابع بنسټیزه بازگشتي ده.

په لنډه وینا، د بنسټیزو بازگشتي تابعو سټ هغه تر ټولو وړوکه سټ دے چې zero، succ او پروجکشن تابعې P_j^n لري، او د ترکیب او بنسټیز بازگښت له مخې بند دے.

د بنسټیزو بازگشتي تابعو سټ د «پراوونو» له مخې هم بیانولې شو. S_0 دې د پیلوونکو تابعو، یعنې zero، succ او پروجکشنونو، سټ وښيي. دا د 0 پراو بنسټیزې بازگشتي تابعې دي. کله چې یو پراو S_i تعریف شو، دې د پخپله S_{i+1} دې د تابعو او هغو ټولو تابعو سټ وي چې د همدې پراو پر تابعو د ترکیب یا بنسټیز بازگښت یوه بېلګه په کارولو لاس ته راځي. بیا

$$S = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} S_i$$

د ټولو بنسټیزو بازگشتي تابعو سټ دے. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-005) سرچینې راتلونکې پراو یوازې د مخکیني پراو پر تابعو د یو عمل له پایلو جوړاوه او پخپله ئې مخکینۍ تابعې نه ساتلې، دلته پراوونه په څرګنده تازیدي کړل شول، څو اتحاد د تعریف شوو تابعو له مخې بند وي.

راځي تصدیق کړو چې add بنسټیزه بازگشتي تابع ده.

قضیه 23.4. د جمع تابع $add(x, y) = x + y$ بنسټیزه بازگشتي ده.

ثبوت. د add یو بنسټیز بازگشتي تعريف مو لا له دوو تابعو f او g څخه لرو چې د 23.1 له شکل سره سمون خوري:

$$\text{add}(x_0, 0) = f(x_0) = x_0$$

$$\text{add}(x_0, y + 1) = g(x_0, y, \text{add}(x_0, y)) = \text{succ}(\text{add}(x_0, y))$$

نو add په دې شرط بنسټیزه بازگشتي ده چې f او g هم داسې وي. $f(x_0) = x_0 = P_0^1(x_0)$ ده، او پروجکشن تابعي بنسټیزې بازگشتي شمېرل کېږي، نو f بنسټیزه بازگشتي ده. تابع g هغه درې ځاییزه تابع $g(x_0, y, z)$ ده چې داسې تعريفېږي:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(z).$$

دا لا نه ښيي چې g بنسټیزه بازگشتي ده، ځکه g او succ په کره توګه یوه تابع نه دي: succ یو ځاییزه ده، خو g باید درې ځاییزه وي. مګر g په ترکیب په «رسمي» ډول داسې تعريفولې شو:

$$g(x_0, y, z) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$$

څرنګه چې succ او P_2^3 بنسټیزې بازگشتي تابعي شمېرل کېږي، نو g هم داسې ده، ځکه چې له بنسټیزو بازگشتي تابعو څخه په ترکیب تعريفېدې شي. □

قضیه 23.5. د ضرب تابع $\text{mult}(x, y) = x \cdot y$ بنسټیزه بازگشتي ده.

□

ثبوت. تمرین.

تمرین 23.6، 23.5 په دې ښودلو ثابته کړئ چې د mult بنسټیز بازگشتي تعريف د 23.1 غوښتل شوي شکل ته راوستل کېدای شي، او اړوندې تابعي f او g بنسټیزې بازگشتي دي.

بېلګه 23.7. دا مو د بنسټیز بازگشتي تعريف تر ټولو لومړۍ بېلګه ده:

$$h(0) = 1$$

$$h(y + 1) = 2 \cdot h(y).$$

دا تابع د 23.1 غوښتل شوي شکل ته نه شي راتلې، ځکه $k = 0$ دے. په تعريف کېنې ثابتونه 1 او 2 هم راځي. د لومړۍ ستونزې د هوارولو دپاره یو بې کاره آرګومېنټ ورزیاتوو او تابع h' تعريفوو:

$$h'(x_0, 0) = f(x_0) = 1$$

$$h'(x_0, y + 1) = g(x_0, y, h'(x_0, y)) = 2 \cdot h'(x_0, y).$$

تابع $f(x_0) = 1$ له succ او zero څخه په ترکیب تعريفېدای شي: $f(x_0) = \text{succ}(\text{zero}(x_0))$. تابع g له $g'(z) = 2 \cdot z$ او پروجکشنونو څخه په ترکیب تعريفېدای شي:

$$g(x_0, y, z) = g'(P_2^3(x_0, y, z))$$

او g' بیا پخپله په ترکیب داسې تعريفېدای شي:

$$g'(z) = \text{mult}(g''(z), P_0^1(z))$$

او

$$g''(z) = \text{succ}(f(z)),$$

چې f هماغه پورته تابع ده: $f(z) = \text{succ}(\text{zero}(z))$. اوس چې h' لرو، بیا ترکیب کارولې شو او $h(y) = h'(P_0^1(y), P_0^1(y))$ چې h له بنسټیزو تابعو څخه د ترکیبونو او بنسټیزو بازگشتونو د یوې لړۍ په کارولو تعريفېدای شي، نو h بنسټیزه بازگشتي ده.

23.5 د بنسټيز بازگښت ښې

د بنسټيزو بازگښتي تابعو د کره استقرائي بيان يوه گټه دا ده چې دا تابعې په منظم ډول بيانولې شو. د بېلگې په توگه، هرې داسې تابع ته لاندې يوه «ښه» ټاکلې شو. د صفر، راتلونکي او پروجکشنونو دپاره په ترتيب سره ښې zero ، succ او P_i^n وکاروئ. اوس فرض کړئ h له يوې k -ځاييزې تابع f او n -ځاييزو تابعو $g_0, \dots, g_{k-1}$ څخه په ترکيب تعريف شوې ده، او وروستيو تابعو ته مو ښې $G_0, F, \dots, G_{k-1}$ ټاکلې دي. بيا د يوې نوې ښې $\text{Comp}_{k,n}$ په کارولو سره، تابع h په $\text{Comp}_{k,n}[F, G_0, \dots, G_{k-1}]$ ښودلې شو.

په بنسټيز بازگښت د تعريف شوو تابعو دپاره ورته ښې کارولې شو. فرض کړئ $(k+1)$ -ځاييزه تابع h له k -ځاييزې تابع f او $(k+2)$ -ځاييزې تابع g څخه په بنسټيز بازگښت تعريف شوې ده، او f او g ته ټاکل شوې ښې په ترتيب سره F او G دي. بيا h ته ټاکل شوې ښه $\text{Rec}_k[F, G]$ ده.

په یاد ولرئ چې د جمع تابع په بنسټيز بازگښت داسې تعريف شوې ده:

$$\text{add}(x_0, 0) = P_0^1(x_0) = x_0$$

$$\text{add}(x_0, y + 1) = \text{succ}(P_2^3(x_0, y, \text{add}(x_0, y))) = \text{add}(x_0, y) + 1$$

دلته د f ونډه P_0^1 ترسره کوي، او د g ونډه $\text{succ}(P_2^3(x_0, y, z))$ ترسره کوي. وروستۍ تابع ته $\text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]$ ښه ټاکل شوې، ځکه دا له يوې 1 -ځاييزې تابع succ او 3 -ځاييزې تابع P_2^3 څخه په ترکيب د يوې تابع د تعريف پايله ده. په دې ترتيب، د جمع تابع په لاندې ښه ښودلې شو:

$$\text{Rec}_1[P_0^1, \text{Comp}_{1,3}[\text{succ}, P_2^3]].$$

د دې ښو لړل کله ناکله کټور وي، د بېلگې په توگه، د بنسټيزو بازگښتي تابعو د شمېرنې پر مهال.

تمرین 23.8. د mult بشپړه بنسټيزه بازگښتي ښه ورکړئ.

23.6 بنسټيزې بازگښتي تابعې محاسبه کېدونکې دي

فرض کړئ يوه تابع h په بنسټيز بازگښت تعريف شوې ده:

$$h(\vec{x}, 0) = f(\vec{x})$$

$$h(\vec{x}, y + 1) = g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, y))$$

او فرض کړئ تابعې f او g محاسبه کېدونکې دي. (موږ $\vec{x}$ د $x_0, \dots, x_{k-1}$ د لنډون دپاره کاروو.) بيا $h(\vec{x}, 0)$ په څرکند ډول محاسبه کېدای شي، ځکه دا يوازې $f(\vec{x})$ ده چې محاسبه کېدونکې مو فرض کړې ده. بيا $h(\vec{x}, 1)$ هم محاسبه کېدای شي، ځکه $1 = 0 + 1$ ده او په دې ډول $h(\vec{x}, 1)$ يوازې دا ده:

$$h(\vec{x}, 1) = g(\vec{x}, 0, h(\vec{x}, 0)) = g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})).$$

په همدې ډول مخکښې تللې شو او دا محاسبه کولې شو:

$$h(\vec{x}, 2) = g(\vec{x}, 1, h(\vec{x}, 1)) = g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x})))$$

$$h(\vec{x}, 3) = g(\vec{x}, 2, h(\vec{x}, 2)) = g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))))$$

$$h(\vec{x}, 4) = g(\vec{x}, 3, h(\vec{x}, 3)) = g(\vec{x}, 3, g(\vec{x}, 2, g(\vec{x}, 1, g(\vec{x}, 0, f(\vec{x}))))))$$

⋮

نو په عمومي ډول د $h(\vec{x}, y)$ د محاسبې دپاره په پرله پسې توگه $h(\vec{x}, 0), h(\vec{x}, 1), \dots$ محاسبه کوو، تر هغه چې $h(\vec{x}, y)$ ته ورسېږو.

نو که تابعې f او g محاسبه کېدونکې وي، يو بنسټيز بازگښتي تعريف يوه نوې محاسبه کېدونکې تابع ورکوي. همدارنګه، که تابعې f او g_i محاسبه کېدونکې وي، د تابعو ترکيب هم محاسبه کېدونکې تابع ورکوي.

څرنگه چې بنسټيزې تابعې zero ، succ او P_i^n محاسبه کېدونکې دي، او ترکيب او بنسټيز بازگښت له محاسبه کېدونکو تابعو څخه محاسبه کېدونکې تابعې ورکوي، نو هره بنسټيزه بازگښتي تابع محاسبه کېدونکې ده.

23.7 د بنسټیزو بازگشتي تابعو بېلگې

موږ لا د بنسټیزو بازگشتي تابعو ځینې بېلگې لرو: د جمع او ضرب تابعې add او mult- د عینیت تابع $\text{id}(x) = x$ بنسټیزه بازگشتي ده، ځکه دا یوازې P_0^1 ده- ثابتې تابعې $\text{const}_n(x) = n$ هم بنسټیزې بازگشتي دي، ځکه هغوی له zero او succ څخه په پرله پسې ترکیب تعریفېدې شي- دا هغه وخت کټور دي چې په بنسټیزو بازگشتي تعریفونو کې ثابتونه کارول غواړو- مثلاً، که تابع $f(x) = 2 \cdot x$ تعریفول غواړو، نو له $\text{const}_n(x)$ او ضرب څخه یې په ترکیب داسې ترلاسه کول شو: $f(x) = \text{mult}(\text{const}_2(x), P_0^1(x))$ له دې وروسته به دا چل کاروو-

قضیه 23.9. د توان تابع $\exp(x, y) = x^y$ بنسټیزه بازگشتي ده-

ثبوت. په بنسټیز بازگښت داسې تعریفول شو:

$$\exp(x, 0) = 1$$

$$\exp(x, y + 1) = \text{mult}(x, \exp(x, y)).$$

په کره توګه دا لا له بنسټیزو بازگشتي تابعو څخه یو بازگشتي تعریف نه دے- خو رسمي بڼه یې داسې ده:

$$\exp(x, 0) = f(x)$$

$$\exp(x, y + 1) = g(x, y, \exp(x, y)).$$

چې پکښې

$$f(x) = \text{succ}(\text{zero}(x)) = 1$$

$$g(x, y, z) = \text{mult}(P_0^3(x, y, z), P_2^3(x, y, z)) = x \cdot z$$

□

او په دې ډول f او g له بنسټیزو بازگشتي تابعو څخه په ترکیب تعریف شوې دي-

قضیه 23.10. مخکینۍ تابع $\text{pred}(y)$ چې داسې تعریف شوې ده،

$$\text{pred}(y) = \begin{cases} 0 & \text{که } y = 0 \text{ وي} \\ y - 1 & \text{که نه} \end{cases}$$

بنسټیزه بازگشتي ده-

ثبوت. پام وکړئ چې

$$\text{pred}(0) = 0 \text{ او}$$

$$\text{pred}(y + 1) = y.$$

دا نژدې یو بنسټیز بازگشتي تعریف دے- په کره توګه د بنسټیز بازگښت د تعریف له نمونې سره ځکه نه سمېږي چې هغه نمونه لږ تر لږه یو زیات آرګومېنټ x غواړي- دا په دې لحاظ هم نابنده ده چې د $\text{pred}(y + 1)$ په تعریف کې په رښتیا $\text{pred}(y)$ نه کاروي- خو لومړۍ $\text{pred}'(x, y)$ داسې تعریفول شو:

$$\text{pred}'(x, 0) = \text{zero}(x) = 0,$$

$$\text{pred}'(x, y + 1) = P_1^3(x, y, \text{pred}'(x, y)) = y.$$

□

او بیا pred ترې په ترکیب تعریفول شو، مثلاً داسې: $\text{pred}(x) = \text{pred}'(\text{zero}(x), P_0^1(x))$ -

قضیه 23.11. د فاکتوریل تابع $\text{fac}(x) = x! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot x$ بنسټیزه بازگشتي ده.

ثبوت. څرگند بنسټیز بازگشتي تعريف دا دے:

$$\begin{aligned}\text{fac}(0) &= 1 \\ \text{fac}(y+1) &= \text{fac}(y) \cdot (y+1).\end{aligned}$$

په رسمي ډول لومړۍ دوه ځاييزه تابع h داسې تعريفوو:

$$\begin{aligned}h(x, 0) &= \text{const}_1(x) \\ h(x, y+1) &= g(x, y, h(x, y))\end{aligned}$$

چې پکښې $g(x, y, z) = \text{mult}(P_2^3(x, y, z), \text{succ}(P_1^3(x, y, z)))$ ده؛ بيا ږدو چې

$$\text{fac}(y) = h(P_0^1(y), P_0^1(y)) = h(y, y).$$

له دې وروسته به لږ کم رسمي واوسو او هر ځل به د ترکیب او بنسټیز بازگښت بشپړ رسمي تعريفونه نه ورکوو. □

قضیه 23.12. پرې شوې تفریق $x \dot{-} y$ ، چې داسې تعريف شوې ده،

$$x \dot{-} y = \begin{cases} 0 & \text{که } x < y \text{ وي} \\ x - y & \text{که نه} \end{cases}$$

بنسټیزه بازگشتي ده.

ثبوت. لرو چې:

$$\begin{aligned}x \dot{-} 0 &= x \\ x \dot{-} (y+1) &= \text{pred}(x \dot{-} y)\end{aligned}$$

□

قضیه 23.13. د x او y تر منځ واټن $|x - y|$ بنسټیز بازگشتي دے.

ثبوت. لرو چې $|x - y| = (x \dot{-} y) + (y \dot{-} x)$ ، نو واټن له + او $\dot{-}$ څخه په ترکیب تعريفېدے شي، او دواړه بنسټیزې بازگشتي دي. □

قضیه 23.14. د x او y تر ټولو لوی ارزښت $\max(x, y)$ بنسټیز بازگشتي دے.

ثبوت. $\max(x, y)$ له + او $\dot{-}$ څخه په ترکیب داسې تعريفولے شو:

$$\max(x, y) = x + (y \dot{-} x).$$

که x تر ټولو لوی وي، يعنې $x \geq y$ ، نو $y \dot{-} x = 0$ ؛ ځکه $x + (y \dot{-} x) = x + 0 = x$. که y تر ټولو لوی وي، نو $y \dot{-} x = y - x$ ، او ځکه $-x + (y \dot{-} x) = x + (y - x) = y$. □

قضیه 23.15. د x او y تر ټولو وړوکه ارزښت $\min(x, y)$ بنسټیز بازگشتي دے.

□

ثبوت. تمرین.

تمرین 23.16، 23.15 ثابت کړئ.

تمرین 23.17، وښیئ چې

$$f(x, y) = 2^{(2^{\cdot^{2^x}})} y \quad \text{خه 2}$$

بنسټیزه بازگشتي ده.

تمرین 23.18، وښیئ چې صحیح وېش $d(x, y) = \lfloor x/y \rfloor$ (یعنې هغه وېش چې د اعشاري ټکي وروسته هر څه پکښې غورځوی) بنسټیز بازگشتي ده. کله چې $y = 0$ وي، شرط ږدو چې $d(x, y) = 0$ وي. د بنسټیز بازگښت او ترکیب په کارولو د d یو څرگند تعریف ورکړئ.

قضیه 23.19، د بنسټیزو بازگشتي تابعو سټ د لاندې دوو عملونو له مخې بند ده:

1. متناهي جمعې: که $f(\vec{x}, z)$ بنسټیزه بازگشتي وي، نو لاندې تابع هم داسې ده:

$$g(\vec{x}, y) = \sum_{z=0}^y f(\vec{x}, z).$$

2. متناهي حاصل ضربونه: که $f(\vec{x}, z)$ بنسټیزه بازگشتي وي، نو لاندې تابع هم داسې ده:

$$h(\vec{x}, y) = \prod_{z=0}^y f(\vec{x}, z).$$

ثبوت. د بېلګې په توګه، متناهي جمعې په لاندې معادلو بازگشتي تعریفېږي:

$$\begin{aligned} g(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}, 0) \\ g(\vec{x}, y+1) &= g(\vec{x}, y) + f(\vec{x}, y+1). \end{aligned}$$

□

23.8 بنسټیزې بازگشتي اړیکې

تعریف 23.20، اړیکه $R(\vec{x})$ هله بنسټیزه بازگشتي بلل کېږي چې ځانګړونکې تابع ئې

$$\chi_R(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{وي } R(\vec{x}) \\ 0 & \text{نه} \end{cases}$$

بنسټیزه بازگشتي وي.

په بله وینا، کله چې د بنسټیزې بازگشتي اړیکې $R(\vec{x})$ خبره کوو، مطلب مو د $\chi_R(\vec{x}) = 1$ په بڼه اړیکه وي، چې χ_R یوه بنسټیزه بازگشتي تابع ده او پر هر ننوت 1 یا 0 راکړځوي. د بېلګې په توګه، اړیکه $\text{IsZero}(x)$ هله او یوازې هله صدق کوي چې $x = 0$ وي، او له هغې سره سمون لرونکې تابع χ_{IsZero} په بنسټیز بازگښت داسې تعریفېږي:

$$\begin{aligned} \chi_{\text{IsZero}}(0) &= 1, \\ \chi_{\text{IsZero}}(x+1) &= 0. \end{aligned}$$

باید څرګنده وي چې اړیکې له نورو بنسټیزو بازگشتي تابعو سره ترکیبې شو. نو لاندې اړیکې هم بنسټیزې بازگشتي دي:

1. د برابری اړیکه $x = y$ ، چې په $\text{IsZero}(|x - y|)$ تعریفېږي؛

2. د کوچني-یا-برابر اړیکه $x \leq y$ ، چې په $\text{IsZero}(x - y)$ تعریفېږي-

د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-006) سرچینې دویمه اړیکه «کوچني» بللې وه، خو ورپسې نښه او ځانګړونکې تابع د کوچني-یا-برابر رسمي شرط ټاکي- دلته نوم له رسمي شرط سره برابر شوی دے-

قضیه 23.21. د بنسټیزو بازګشتي اړیکو سټ د بولي عملونو له مخې بند دے؛ یعنې که $P(\vec{x})$ او $Q(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي وي، نو لاندې اړیکې هم داسې دي:

$$1. \neg P(\vec{x})$$

$$2. P(\vec{x}) \wedge Q(\vec{x})$$

$$3. P(\vec{x}) \vee Q(\vec{x})$$

$$4. P(\vec{x}) \rightarrow Q(\vec{x})$$

ثبوت. فرض کړئ $P(\vec{x})$ او $Q(\vec{x})$ بنسټیزې بازګشتي دي، یعنې ځانګړونکې تابعې χ_P او χ_Q ئې بنسټیزې بازګشتي دي- باید وښیو چې $\neg P(\vec{x})$ او نورو ځانګړونکې تابعې هم بنسټیزې بازګشتي دي-

$$\chi_{\neg P}(\vec{x}) = \begin{cases} 0 & \text{که } \chi_P(\vec{x}) = 1 \text{ وي} \\ 1 & \text{که نه} \end{cases}$$

$\chi_{\neg P}(\vec{x})$ د $\chi_P(\vec{x})$ په توګه تعریفولے شو-

$$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x}) = \begin{cases} 1 & \text{که } \chi_P(\vec{x}) = \chi_Q(\vec{x}) = 1 \text{ وي} \\ 0 & \text{که نه} \end{cases}$$

$\chi_{P \wedge Q}(\vec{x})$ د $\chi_P(\vec{x}) \cdot \chi_Q(\vec{x})$ ، یا د $\min(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$ په توګه تعریفولے شو- په همدې ډول،

$$\chi_{P \vee Q}(\vec{x}) = \max(\chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x}))$$

$$\chi_{P \rightarrow Q}(\vec{x}) = \max(1 - \chi_P(\vec{x}), \chi_Q(\vec{x})).$$

□

قضیه 23.22. د بنسټیزو بازګشتي اړیکو سټ د محدودې کمیت ټاکنې له مخې بند دے؛ یعنې که $R(\vec{x}, z)$ بنسټیزه بازګشتي اړیکه وي، نو لاندې اړیکې هم داسې دي:

$$(\forall z < y) R(\vec{x}, z) \text{ او}$$

$$(\exists z < y) R(\vec{x}, z).$$

$(\forall z < y) R(\vec{x}, z)$ د $\vec{x}$ او y په باب هله او یوازې هله صدق کوي چې $R(\vec{x}, z)$ له y څخه د هر کوچني z دپاره صدق وکړي؛ د $(\exists z < y) R(\vec{x}, z)$ دپاره هم ورته تشرېح ده-

ثبوت. د دود له مخې $R(\vec{x}, z) (\forall z < 0)$ رښتونه نيسو (په ساده دليل چې له 0 څخه کوچنۍ z نشته)، او $R(\vec{x}, z) (\exists z < 0)$ دروغ نيسو. محدود کلي کيت ټاکونکي کټ مټ د متناهي حاصل ضرب يا تکراري کيڼي په شان کار کوي، يعنې که $P(\vec{x}, y) \Leftrightarrow R(\vec{x}, z) (y \text{ وي، نو } \chi_P(\vec{x}, y) \text{ داسې تعريفېدې شي:}$

$$\chi_P(\vec{x}, 0) = 1$$

$$\chi_P(\vec{x}, y + 1) = \min(\chi_P(\vec{x}, y), \chi_R(\vec{x}, y)).$$

محدوده وجودي کيت ټاکنه هم په ورته ډول د $\max$ په کارولو تعريفېدې شي. يا ئې له محدودې کلي کيت ټاکنې څخه د دې برابري په کارولو تعريفول شو: $R(\vec{x}, z) (\exists z < y) \leftrightarrow \neg(\forall z < y) \neg R(\vec{x}, z)$. پام وکړئ چې مثلاً د $\dots x \dots (\exists x \leq y)$ په بڼه محدود کيت ټاکونکي له $\dots x \dots (\exists x < y + 1)$ سره برابر دے. □

تمرین 23.23. وښئ چې درې ځایزه اړیکه $x \equiv y \pmod n$ (مودولو n تطابق) بنسټیزه بازگشتي ده.

یوه بله کتوره بنسټیزه بازگشتي تابع شرطي تابع $\text{cond}(x, y, z)$ ده، چې داسې تعريفېږي:

$$\text{cond}(x, y, z) = \begin{cases} y & \text{که } x = 0 \text{ وي} \\ z & \text{که نه} \end{cases}$$

دا په بازگشتي ډول داسې تعريفېږي:

$$\text{cond}(0, y, z) = y,$$

$$\text{cond}(x + 1, y, z) = z.$$

له دې څخه د بنسټيزو بازگشتي اړیکو پر بنسټ په حالتونو د بنسټيزو بازگشتي تابعو تعريفونه توجیه کول شو:

قضیه 23.24. که $g_0(\vec{x}), \dots, g_m(\vec{x})$ بنسټيزې بازگشتي تابعې وي، او $R_0(\vec{x}), \dots, R_{m-1}(\vec{x})$ بنسټيزې بازگشتي اړیکې وي، نو لاندې تعريف شوې تابع f هم بنسټیزه بازگشتي ده:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} g_0(\vec{x}) & \text{که } R_0(\vec{x}) \text{ وي} \\ g_1(\vec{x}) & \text{که } R_1(\vec{x}) \text{ وي او } R_0(\vec{x}) \text{ نه وي} \\ \vdots & \\ g_{m-1}(\vec{x}) & \text{که } R_{m-1}(\vec{x}) \text{ وي او مخکينې هېڅ یو نه وي} \\ g_m(\vec{x}) & \text{نه} \end{cases}$$

ثبوت. که چېرې $m = 1$ وي، دا یوازې لاندې تابع ده:

$$f(\vec{x}) = \text{cond}(\chi_{R_0}(\vec{x}), g_0(\vec{x}), g_1(\vec{x})).$$

□

که چېرې m له 1 څخه لوړ وي، یوازې د همدې بڼې تعريفونه سره ترکیبول شو.

23.9 محدوده کینه موندنه

ډېر وخت دا کتوره وي چې یوه تابع د هغه تر ټولو کوچني عدد په توګه تعريف کړو چې کوم خاصیت یا اړیکه P پوره کوي. که P پرېکړه کېدونکې وي، دا تابع یوازې په دې ډول محاسبه کول شو چې ټول ممکن عددونه 0، 1، 2، ... یو په بل پسې وازمېږو، تر هغه چې تر ټولو کوچنۍ عدد ومومو چې P پوره کوي. دا ډول بې‌پولې پلټنه مو د بنسټيزو بازگشتي تابعو له چوکاټه باندې - خو که یوازې په هغه تر

ټولو کوچني عدد کښې دلچسپي ولرو چې له کوم خپلوا که ورکړل شوي حد څخه کوچنۍ وي، نو بنسټيز بازگشتي پاتې کېږو. په بله او لږ عمومي وينا، فرض کړئ يوه بنسټيزه بازگشتي اړيکه $R(x, z)$ لرو. هغه تابع په پام کېښی ونيئ چې x او y هغه تر ټولو کوچني $z < y$ ته لږې چې $R(x, z)$ پوره کوي. دا تابع هم د $R(x, 0)$ ، $R(x, 1)$ ، ...، $R(x, y-1)$ په ازمويلو محاسبه کېدای شي. خو دا ولې بنسټيزه بازگشتي ده؟

قضيه 23.25. که $R(\vec{x}, z)$ بنسټيزه بازگشتي وي، نو تابع $m_R(\vec{x}, y)$ هم داسې ده؛ دا تابع، که داسې عدد وي، له y څخه تر ټولو کوچنۍ z راگرځوي چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کړي، او که داسې عدد نه وي نو y راگرځوي. تابع m_R به داسې ليکو:

$$(\min z < y) R(\vec{x}, z),$$

ثبوت. داسې هېڅ $z < 0$ نشته چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کړي، ځکه په اصل کې هېڅ $z < 0$ نشته. نو $m_R(\vec{x}, 0) = 0$. کله چې حد د $y + 1$ په بڼه وي، درې حالتونه لرو:

1. داسې $z < y$ شته چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کوي، په دې حالت کې $m_R(\vec{x}, y + 1) = m_R(\vec{x}, y)$.

2. داسې $z < y$ نشته، خو $R(\vec{x}, y)$ پوره کېږي، بيا $m_R(\vec{x}, y + 1) = y$.

3. داسې $z < y + 1$ نشته چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کړي، بيا $m_R(\vec{x}, y + 1) = y + 1$.

د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-007) سرچينې په درېيم حالت کې د تابع د پاراميترونو غلط وکتور ليکلی و، حال دا چې په ټول تعريف کې هماغه لومړنی وکتور ثابت پاتې کېږي. دلته آرگومېنټ بېرته هماغه ثابت وکتور ته سم شوې دے. نو د $m_R(\vec{x}, 0)$ پيلنی حالت په بنسټيز بازگښت د لاندې بشپړ تعريف په ترڅ کې ورکول شوی:

$$m_R(\vec{x}, 0) = 0$$

$$m_R(\vec{x}, y + 1) = \begin{cases} m_R(\vec{x}, y) & \text{که } m_R(\vec{x}, y) \neq y \text{ وي} \\ y & \text{که } m_R(\vec{x}, y) = y \text{ او } R(\vec{x}, y) \text{ وي} \\ y + 1 & \text{که نه} \end{cases}$$

پام وکړئ چې داسې $z < y$ شته چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کړي، هله او يوازې هله چې $m_R(\vec{x}, y) \neq y$ وي. □

تمرین 23.26. فرض کړئ $R(\vec{x}, z)$ بنسټيزه بازگشتي ده. تابع $m'_R(\vec{x}, y)$ چې، که داسې عدد وي، له y څخه تر ټولو کوچنۍ z راگرځوي چې $R(\vec{x}, z)$ پوره کړي، او که داسې عدد نه وي نو 0 راگرځوي، له χ_R څخه په بنسټيز بازگښت تعريف کړئ.

23.10 اوليه عددونه

محدوده کميت ټاکنه او محدوده کمينه موندنه د دې دپاره ډېر وسايل راکوي چې وښيو طبيعي تابعې او اړيکې بنسټيزې بازگشتي دي. د بېلګې په توګه اړيکه « y وېشي» په پام کېښی ونيئ، چې په $y \mid x$ ليکل کېږي. اړيکه $y \mid x$ هله صدق کوي چې y پر x بې له پاتې شوني ووېشل شي، يعنې y د x صحيح مضرب وي. که دا اړيکه صدق ونه کړي، يعنې کله چې د y پر x وېش د پاتې شوني په ژبه بيانېدای شي او پاتې شونی $0 >$ وي، نو $y \nmid x$ ليکو. په بله وينا، $y \mid x$ هله او يوازې هله چې د کوم z دپاره $x \cdot z = y$ وي. ښکاره ده چې هر داسې z ، که موجود وي، بايد $y \leq x$ وي. نو $y \mid x$ هله او يوازې هله چې د کوم $z \leq y$ دپاره $x \cdot z = y$ وي. له $=$ او ضرب څخه په محدودې وجودي کميت ټاکنې اړيکه $y \mid x$ داسې تعريفول شو:

$$x \mid y \Leftrightarrow (\exists z \leq y) (x \cdot z = y).$$

نو مو وښودله چې $y \mid x$ بنسټیزه بازگشتي ده. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-008) سرچینې د وېش د اړیکې د ناکامېدو په تشرېح کښې مقسوم او مقسوم علیه سرچېه کړي وو، او د صفر وېشونکي دپاره ئې هم د پاتې شوني ژبه کارولې وه. دلته لوری سم شوی او عمومي حالت ورپسې وجودي شرط ټاکي.

طبیعي عدد x هله اولیه ده چې نه 0 وي، نه 1، او یوازې پر 1 او پر خپل ځان وېشل کېږي. په بله وینا، اولیه عددونه داسې دي چې کله هم $y \mid x$ وي، نو یا $y = 1$ وي یا $y = x$. د دې د ازموینو دپاره چې x اولیه ده، یوازې د ټولو $y \leq x$ دپاره $y \mid x$ ازموینې پکار دي، ځکه که $y > x$ وي، نو په خپله $y \nmid x$ وي. نو اړیکه $\text{Prime}(x)$ ، چې هله او یوازې هله صدق کوي چې x اولیه وي، داسې تعریفېدای شي:

$$\text{Prime}(x) \Leftrightarrow x \geq 2 \wedge (\forall y \leq x) (y \mid x \rightarrow y = 1 \vee y = x)$$

او ځکه بنسټیزه بازگشتي ده.

اولیه عددونه 2، 3، 5، 7، 11، او داسې نور دي. تابع $p(x)$ په پام کېنې ونیسئ چې په دې لړۍ کېنې x م اولیه عدد راگرځوي؛ یعنې $p(0) = 2$ ، $p(1) = 3$ ، $p(2) = 5$ ، او داسې نور. (د اسانتیا دپاره به ډېر وخت $p(x)$ د p_x په توګه لیکو: $p_0 = 2$ ، $p_1 = 3$ ، او داسې نور).

که یوه تابع $\text{nextPrime}(x)$ مو لرله چې له x څخه لومړنۍ لویې اولیه عدد راگرځوي، نو p په بنسټیز بازگښت په اسانۍ تعریفېدای شي:

$$p(0) = 2$$

$$p(x+1) = \text{nextPrime}(p(x))$$

څرنګه چې $\text{nextPrime}(x)$ هغه تر ټولو کوچنۍ y ده چې $y > x$ وي او y اولیه وي، دا په بې‌پولې پلټنه په اسانۍ محاسبه کېدای شي. خو د اقلیدس د یوې پایلې له امله ئې په محدودې کمینه‌موندنې هم تعریفولې شو: تل داسې یو اولیه عدد شته چې له x څخه لوی او له $x! + 1$ څخه کوچنۍ یا برابر وي.

$$\text{nextPrime}(x) = (\min y \leq x! + 1) (y > x \wedge \text{Prime}(y)).$$

دا ښيي چې $\text{nextPrime}(x)$ او ځکه $p(x)$ ، یوازې محاسبه کېدونکې نه بلکې بنسټیزه بازگشتي ده. د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-009): سرچینې د راتلونکي اولیه عدد د تابع آرګومېنټ په دوو ځایونو کېنې د تابع د نوم دننه ایښی و، حال دا چې نورې کارونې نوم او آرګومېنټ جلا لیکي. دلته دواړه ځایونه له هماغې رسمي کارونې سره یو شان شول.

(که لېواله یئ، دا د اقلیدس د قضیې یو لنډ ثبوت ده. که ورکړل شوی عدد له دوو کوچنۍ وي، 2 نېغ په نېغه مطلوب اولیه عدد ده. په پاتې حالت کېنې فرض کړئ p_n تر ټولو لویې اولیه عدد ده چې $x \leq$ وي. د ټولو هغو اولیه عددونو حاصل ضرب $p = p_0 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_n$ په پام کېنې ونیسئ چې $x \leq$ دي. یا $p+1$ اولیه ده، یا x او $p+1$ تر منځ بل اولیه عدد شته. ولې؟ فرض کړئ $p+1$ اولیه نه ده. بیا کوم اولیه عدد $p+1 \mid q$ شته چې $q < p+1$ وي. اولیه عددونه $x \leq$ یو هم $p+1$ نه وېشي. (د p د تعریف له مخې هر اولیه $p_i \leq x$ وېشي، یعنې پاتې شونی 0 ورکوي. نو هر $p_i \leq x$ د $p+1$ په وېش کېنې پاتې شونی 1 ورکوي، او ځکه $p_i \nmid p+1$) نو q یو اولیه عدد ده چې $x >$ او $p+1 <$ ده. او $p \leq x!$ ، نو داسې اولیه عدد شته چې $x >$ او $x! + 1 <$ وي.) د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-010) د سرچینې لنډ ثبوت سمدستي تر ورکړل شوي عدد پورې تر ټولو لویې اولیه عدد ټاکه، خو دا څیز د لومړنیو دوو طبیعي عددونو دپاره نشته. دلته واړه حالتونه جلا وارزول شول او د حاصل ضرب استدلال پاتې حالتونو ته محدود شو؛ د قضیې حد او د راتلونکي اولیه عدد د تابع تعریف نه دي بدل شوي.

تمرین 23.27. صحیح وېش $d(x, y)$ د محدودې کمینه‌موندنې په کارولو تعریف کړئ.

23.11 لړۍ

د بنسټیزو بازگشتي تابعو سټ د پام وړ ټینګ ده. خو کله چې د لړیو د سمبالولو یوه مناسبه طریقه جوړه کړو، لا ډېر څه کولای شو. د طبیعي عددونو متناهي لړۍ به له طبیعي عددونو سره په لاندې ډول وپېژنو: لړۍ $\langle a_0, a_1, a_2, \dots, a_k \rangle$ له دې عدد سره سمون لري:

$$p_0^{a_0+1} \cdot p_1^{a_1+1} \cdot p_2^{a_2+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1}.$$

توانونو ته یو ځکه زیاتوو چې مثلاً لری $\langle 2, 7, 3 \rangle$ او $\langle 2, 7, 3, 0, 0 \rangle$ بېل عددي کودونه ولری. 0 او 1 دواړه د تشې لری کودونه نیولے شو؛ د کره والی دپاره دې Λ د 0 بنودنه وکړي.

د لریو دا کودول د حساب د تش په نامه بنسټیزې قضیې له امله کار کوي: هر طبیعي عدد $n \geq 2$ په پوره یوه طریقه په لاندې بڼه لیکل کېدے شي:

$$n = p_0^{a_0} \cdot p_1^{a_1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k}$$

چې $a_k \geq 1$ وي. دا ضمانت کوي چې نقشه $\langle a_0, \dots, a_k \rangle = \langle a_0, \dots, a_k \rangle$ یو په یو ده: بېلې لری بېلو عددونو ته لېږل کېږي، او له هر عدد سره تر ټولو زیاته یوه لری سمون لري.

اوس به وښیو چې د یوې لری د اوږدوالي موندل، د هغې د i م غړي موندل، د لری په پای کې د یوه غړي زیاتول، او د دوو لریو نښلول ټولې بنسټیزې بازگشتي چارې دي.

قضیه 23.28. تابع $\text{len}(s)$ ، چې د لری s اوږدوالی راگرځوي، بنسټیزه بازگشتي ده.

ثبوت. اړیکه $R(i, s)$ داسې تعریف کړئ:

$$R(i, s) \text{ هله او یوازې هله چې } p_i \mid s \wedge p_{i+1} \nmid s.$$

R په څرکند ډول بنسټیزه بازگشتي ده. کله چې s د یوې ناشنې لری کود وي، یعنې

$$s = p_0^{a_0+1} \cdot \dots \cdot p_k^{a_k+1},$$

$R(i, s)$ هله صدق کوي چې p_i تر ټولو لوی اولیه عدد وي چې $p_i \mid s$ ، یعنې $i = k$ وي. نو د s اوږدوالی هله او یوازې هله $i + 1$ دے چې p_i تر ټولو لوی اولیه عدد وي چې s وېشي؛ ځکه دا تعریف ورکولے شو:

$$\text{len}(s) = \begin{cases} 0 & \text{که } s = 0 \text{ یا } s = 1 \text{ وي} \\ 1 + (\min i < s) R(i, s) & \text{که نه} \end{cases}$$

دلته محدوده کینه موندنه کارولے شو، ځکه کله چې s د یوې لری کود وي، یوازې یو i اړیکه $R(i, s)$ پوره کوي، او که i موجود وي نو پخپله له s څخه کوچنۍ دے.

قضیه 23.29. تابع $\text{append}(s, a)$ ، چې د لری s په پای کې a د ورزیاتولو پایله راگرځوي، بنسټیزه بازگشتي ده.

ثبوت. append داسې تعریفېدے شي:

$$\text{append}(s, a) = \begin{cases} 2^{a+1} & \text{که } s = 0 \text{ یا } s = 1 \text{ وي} \\ s \cdot p_{\text{len}(s)}^{a+1} & \text{که نه} \end{cases}$$

□

قضیه 23.30. تابع $\text{element}(s, i)$ ، چې د s i م غړے راگرځوي (لومړني غړي ته 0م وايي)، او که i د s له اوږدوالي څخه لوی یا ورسره برابر وي نو 0 راگرځوي، بنسټیزه بازگشتي ده.

ثبوت. پام وکړئ چې a هله او یوازې هله د s i م غړے دے چې p_i^{a+1} د p_i تر ټولو لوی توان وي چې s وېشي؛ یعنې $p_i^{a+1} \mid s$ وي خو $p_i^{a+2} \nmid s$ نو:

$$\text{element}(s, i) = \begin{cases} 0 & \text{وي } i \geq \text{len}(s) \text{ که} \\ (\min a < s) (p_i^{a+2} \nmid s) & \text{که نه} \end{cases}$$

□

د پورته تعریف شوو تابعو د رسمي نومونو پر ځای لا لنډې نښې کاروو. د $\text{element}(s, i)$ پر ځای به $(s)_i$ کاروو، او $\langle s_0, \dots, s_k \rangle$ به د لنډې عبارت لنډون وي:

$$\text{append}(\text{append}(\dots \text{append}(\Lambda, s_0) \dots), s_k).$$

پام وکړئ که s د k اوږدوالی ولري، نو د s غړي $(s)_0, \dots, (s)_{k-1}$ دي.

قضیه 23.31. تابع $\text{concat}(s, t)$ چې دوه لړۍ سره نښلوي، بنسټیزه بازگشتي ده.

ثبوت. داسې تابع concat غواړو چې دا خاصیت ولري:

$$\text{concat}(\langle a_0, \dots, a_k \rangle, \langle b_0, \dots, b_l \rangle) = \langle a_0, \dots, a_k, b_0, \dots, b_l \rangle.$$

مرستندویه تابع $\text{hconcat}(s, t, n)$ کاروو چې د t لومړۍ n نښې له s سره نښلوي. دا تابع په بنسټیز بازگښت داسې تعریفېدای شي:

$$\text{hconcat}(s, t, 0) = s$$

$$\text{hconcat}(s, t, n+1) = \text{append}(\text{hconcat}(s, t, n), (t)_n)$$

بیا concat داسې تعریفولې شو:

$$\text{concat}(s, t) = \text{hconcat}(s, t, \text{len}(t)).$$

□

د $\text{concat}(s, t)$ پر ځای به $s \frown t$ لیکو.

دا به راته کتوره وي چې د یوې لړۍ عددي کوډ د هغې د اوږدوالي او تر ټولو لوی غړي له مخې محدود کړي شو. فرض کړئ s د k اوږدوالي یوه لړۍ ده او هر غړی یې له کوم عدد x څخه کوچنۍ یا ورسره برابر دے. که لړۍ ناشه وي، نو s تر ټولو زیات k اولیه عوامل لري، هر یو یې تر ټولو زیات p_{k-1} دے، او هر یو د s په اولیه تجزیه کېنې تر ټولو زیات د $x+1$ توان ته پورته شوی دے. نو داسې تعریف کوو:

$$\text{sequenceBound}(x, k) = \text{cond}(k, 1, p_{\text{pred}(k)}^{k \cdot (x+1)})$$

بیا د پورته بیان شوې لړۍ s عددي کوډ تر ټولو زیات $\text{sequenceBound}(x, k)$ دے. د ژباړې د نسخې سمون: **(OLCMP-011)** سرچینې د لړۍ په حد کېنې د تښتې لړۍ دپاره د منفي شاخص اولیه عدد کاراوه؛ ورپسې پلټنې هم نوماند له حد څخه سخت کوچنۍ غوښته او له حد سره برابر قانوني کوډ یې پرېښود. دلته شرطي تابع د تښتې لړۍ حد یو ټاکي او پلټنه تر حد پورې ټول شموله شوې ده.

پر لږیو د داسې حد په لرلو نوې تابعې په محدودې پلټنې تعریفولې شو. مثلاً concat په محدودې پلټنې تعریفولې شو. یوازې د هغه څیز (د نښلول شوې لړۍ د عدد) یو بنسټیز بازگشتي ځانګړتیايي شرط لیکل او د پلټنې حد ټاکل پکار دي. لنډې تعریف کار کوي:

$$\text{concat}(s, t) = (\min v \leq \text{sequenceBound}(s+t, \text{len}(s) + \text{len}(t)))$$

$$(\text{len}(v) = \text{len}(s) + \text{len}(t)) \wedge$$

$$(\forall i < \text{len}(s)) ((v)_i = (s)_i) \wedge$$

$$(\forall j < \text{len}(t)) ((v)_{\text{len}(s)+j} = (t)_j))$$

د ژباړې د نسخې سمون: **(OLCMP-012)** سرچینې د دویمې لړۍ د غړو شرط د لومړۍ لړۍ پر غړو د کلي کمیت ټاکونکي دننه ایښي و؛ نو د تښتې لومړۍ لړۍ په حالت کېنې هغه شرط تش صدقه کېده او د دویمې لړۍ هېڅ غړی یې نه ټاکه. دلته د دواړو لږیو شرطونه د اوږدوالي له شرط سره په خپلواکو عطفونو تړل شوي دي.

تمرین 23.32. وښیئ چې داسې بنسټیزه بازگشتي تابع $\text{sconcat}(s)$ شته چې دا خاصیت ولري:

$$\text{sconcat}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) = s_0 \frown \dots \frown s_k.$$

تمرین 23.33. وینئې چې داسې بنسټیزه بازګشتي تابع $\text{tail}(s)$ شته چې دا خاصیت ولري:

$$\text{tail}(\Lambda) = 0$$

$$\text{tail}(\langle s_0, \dots, s_k \rangle) = \langle s_1, \dots, s_k \rangle.$$

قضیه 23.34. تابع $\text{subseq}(s, i, n)$ چې د s له i م غړي څخه پیلېدونکې د n اوږدوالي فرعي لړۍ راګرځوي، بنسټیزه بازګشتي ده.

□

ثبوت. تمرین.

تمرین 23.35، 23.34 ثابت کړئ.

23.12 ونې

ځینې وخت د ونو ښودل د طبیعي عددونو په توګه کټور وي، کټ مټ لکه لړۍ چې په عددونو ښیو او د هغو خاصیتونه او عملونه د کودونو پر بنسټیزو بازګشتي اړیکو او تابعو ښیو. د دې دپاره لړۍ او د هغو کودونه کاروو. یوه ونه یا یوازې یوه غوټه (چې ښایي لېبل ولري) وي، یا یوه غوټه (چې ښایي لېبل ولري) وي چې له یو شمېر فرعي ونو سره تړلې وي. دې غوټې ته د ونې رېښه، او هغو فرعي ونو ته چې ورسره تړلې وي د هغې سمدستي فرعي ونې وایي.

ونې په بازګشتي ډول د $\langle k, d_1, \dots, d_k \rangle$ په لړۍ کودوو، چې k د سمدستي فرعي ونو شمېر او $d_1, \dots, d_k$ د سمدستي فرعي ونو کودونه دي. که غوټې لېبلونه ولري، له سمدستي فرعي ونو وروسته یې شاملول شوي. نو هغه ونه چې یوازې یوه د l لېبل لرونکې غوټه ولري، په $\langle 0, l \rangle$ کودېږي؛ او هغه ونه چې یوه د l_1 لېبل لرونکې رېښه او یوه د l_2 لېبل لرونکې غوټه سره تړلې وي، چې لېبلونه یې l_2 او l_3 دي، په $\langle 2, \langle 0, l_2 \rangle, \langle 0, l_3 \rangle, l_1 \rangle$ کودېږي.

قضیه 23.36. تابع $\text{SubtreeSeq}(t)$ ، چې د داسې لړۍ کود راګرځوي چې غړي یې د t کود لرونکې ونې د ټولو فرعي ونو کودونه دي، بنسټیزه بازګشتي ده.

ثبوت. لومړۍ پام وکړئ چې $\text{ISubtrees}(t) = \text{subseq}(t, 1, (t)_0)$ بنسټیزه بازګشتي ده او د ونې t د سمدستي فرعي ونو کودونه راګرځوي. اوس مرستندویه تابع $\text{hSubtreeSeq}(t, n)$ داسې تعریفوو چې د ټولو هغو فرعي ونو لړۍ محاسبه کړي چې رېښې یې د t له رېښې څخه تر ټولو زیات n څنډې لري وي. د t د هغو فرعي ونو لړۍ چې له رېښې څخه تر ټولو زیات 0 څنډې لري دي—یعنې پخپله د t په رېښه پیلېږي—یوازې له t څخه جوړه لري. ده. د $n + 1$ تر پکې د ټولو فرعي ونو د لړۍ د ترلاسه کولو دپاره، د n تر پکې شته فرعي ونې د هغو ټولو سمدستي فرعي ونو له لړۍ سره نښلوي چې د n تر پکې له فرعي ونو راځي. د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-013) سرچینې مرستندویه تابع له رېښې څخه په کټ مټ ټاکلي وائن د فرعي ونو لړۍ بلله، خولاندې بازګشتي کام مخکینی لري هم ساتي او تر ټاکلي وائن پورې ټولې پکې راټولوي. دلته تشریح د هماغې معادلې له مجموعي چلند سره برابره شوې ده. د ټولو د لست د ترلاسه کولو دپاره پام وکړئ: که $f(x)$ یوه بنسټیزه بازګشتي تابع وي چې د لړیو کودونه راګرځوي، نو د غړو د مثبت شمېر دپاره تابع $g_f(s, k) = f((s)_0) \frown \dots \frown f((s)_{k-1})$ هم بنسټیزه بازګشتي ده؛ د صفر غړو نښلون تښه لري نيسو:

$$g(s, 0) = \Lambda$$

$$g(s, k + 1) = g(s, k) \frown f((s)_k)$$

مثلاً، که s د ونو یوه لړۍ وي، نو $h(s) = g_{\text{ISubtrees}}(s, \text{len}(s))$ د s د غړو د ټولو سمدستي فرعي ونو لړۍ راګوي. د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-014) سرچینې مرستندویه نښلون د صفرم غړي په تابع پیل کاوه او بیا یې تر اوږدوالي پورې ټول شوله شاخص غځاوه؛ په دې سره یې د لړۍ له وروستي قانوني شاخص وروسته یو زیات غړی لوسته. دلته پارامیتر د لومړیو غړو شمېر دے: صفر تښ نښلون ورکوي او هر راتلونکی کام سملاسي ورپسې قانوني غړی زیاتوي. له دې څخه hSubtreeSeq داسې تعریفول شوي:

$$\text{hSubtreeSeq}(t, 0) = \langle t \rangle$$

$$\text{hSubtreeSeq}(t, n + 1) = \text{hSubtreeSeq}(t, n) \frown h(\text{hSubtreeSeq}(t, n)).$$

د t په کوډ شوې ونه کښې د فرعي ونو تر ټولو لوړه کچه، یعنې د ریښې او یوې پاڼه غونډې تر منځ تر ټولو لوی وخت، د کوډ t له مخې محدود ده. نو د t په کوډ شوې ونه کښې د ټولو فرعي ونو د کوډونو لړۍ $\text{hSubtreeSeq}(t, t)$ ورکوي. $\square$

تمرین 23.37. د 23.36 په ثبوت کښې د hSubtreeSeq تعریف په عمومي ډول تکرارونه راوړي. یو داسې بل تعریف ورکړئ چې ضمانت وکړي د یوې فرعي ونې کوډ په پایله لست کښې یوازې یو ځل راځي.

23.13 نور بازگڼستونه

د جوړو او لړیو په کارولو د بنسټیز بازگڼست لا نابلده (او ګټورې) بڼې توجیه کولې شو. مثلاً ډېر وخت دوه تابعې یوځای تعریفول ګټور وي، لکه په لاندې تعریف کښې:

$$\begin{aligned}h_0(\vec{x}, 0) &= f_0(\vec{x}) \\h_1(\vec{x}, 0) &= f_1(\vec{x}) \\h_0(\vec{x}, y + 1) &= g_0(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y)) \\h_1(\vec{x}, y + 1) &= g_1(\vec{x}, y, h_0(\vec{x}, y), h_1(\vec{x}, y))\end{aligned}$$

دا د هممهاله بازگڼست یوه بېلګه ده. د تابعو د تعریف بله ګټوره لار دا ده چې د $h(\vec{x}, y + 1)$ ارزښت د ټولو ارزښتونو $h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y)$ له مخې ورکړو، لکه په لاندې تعریف کښې:

$$\begin{aligned}h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y) \rangle).\end{aligned}$$

لاندې چوکاټ دا مفکوره لا لنډه بیانوي:

$$h(\vec{x}, y) = g(\vec{x}, y, \langle h(\vec{x}, 0), \dots, h(\vec{x}, y - 1) \rangle)$$

په دې پوهېدو سره چې کله $y, 0$ وي، د g وروسته آرګومېنټ یوازې تښه لری وي. په دواړو بڼو کښې مفکوره دا ده چې د «راتلونکي کام» د محاسبې پر مهال تابع h تر دې ځایه د محاسبه شوو ارزښتونو ټوله لړۍ کارولې شي. دې ته د ارزښتونو د بهیر بازگڼست وايي. د یوې ځانګړې بېلګې دپاره لاندې ډول تعریف توجیه کولې شي:

$$h(\vec{x}, y) = \begin{cases} g(\vec{x}, y, h(\vec{x}, k(\vec{x}, y))) & \text{که } k(\vec{x}, y) < y \text{ وي} \\ f(\vec{x}) & \text{که نه} \end{cases}$$

په بله وینا، په y د h ارزښت د h د هر مخکیني ارزښت له مخې محاسبه کېدای شي، او هغه مخکیني ارزښت k ورکوي.

تمرین 23.38. د پاتې شوني تابع $r(x, y)$ د ارزښتونو د بهیر په بازگڼست تعریف کړئ. (که x او y طبیعي عددونه او $y > 0$ وي، نو $r(x, y)$ له y څخه هغه کوچنۍ عدد دے چې د کوم z دپاره $x = z \times y + r(x, y)$ وي. د کره والي دپاره وایو که $y = 0$ وي، نو $r(x, 0) = 0$.)

باید په دې فکر وکړئ چې دا تابعې په عادي بنسټیز بازگڼست څنګه ترلاسه کېږي. د بنسټیز بازگڼست یوه وروستۍ بڼه په دې لحاظ لا انعطاف منونکې ده چې د لارې په اوږدو کښې د پارامیترونو (اړخیزو ارزښتونو) بدلولو اجازه ورکوي:

$$\begin{aligned}h(\vec{x}, 0) &= f(\vec{x}) \\h(\vec{x}, y + 1) &= g(\vec{x}, y, h(k(\vec{x}), y))\end{aligned}$$

دا هم په عادي بنسټیز بازگڼست تقلیدېدای شي. (دا کول ستونزمن دي. د یوې لارښوونې دپاره، محاسبه په لاس له پای څخه بېرته پرانیږي.)

23.14 نابنسټيزې بازگشتي تابعې

بنسټيزې بازگشتي تابعې ټولې هغه تابعې نه رانغاړي چې په شهودي ډول محاسبه کېدونکې دي. په شهودي ډول بايد څرگنده وي چې د ټولو يوځایيزو بنسټيزو بازگشتي تابعو يو لست $f_0, f_1, f_2, \dots$ جوړول شوی، داسې چې د y پر نوت د f_x ارزښت په اغېزمنه توګه محاسبه کېږي؛ په بله وينا، لاندې تعريف شوې تابع $g(x, y)$ محاسبه کېدونکې ده:

$$g(x, y) = f_x(y)$$

خو بيا لاندې تابع هم محاسبه کېدونکې ده:

$$\begin{aligned} h(x) &= g(x, x) + 1 \\ &= f_x(x) + 1. \end{aligned}$$

د هرې بنسټيزې بازگشتي تابع f_i دپاره د h او f_i ارزښتونه په i کېنې سره پېل دي. نو h محاسبه کېدونکې خو بنسټيزه بازگشتي نه ده؛ د g په باب هم همدا ويلی شو. دا د کانتور د قطري کولو د استدلال يوه «اغېزمنه» بڼه ده.

د هغو محاسبه کېدونکو تابعو لا څرګندې بېلګې هم ورکولې شو چې بنسټيزې بازگشتي نه دي. مثلاً نښه $g^n(x)$ دې $g(g(\dots g(x)))$ وښيي، چې ټولې n دانې g ګانې لري، او د تابعو لړۍ $g_0, g_1, \dots$ داسې تعريف کړئ:

$$\begin{aligned} g_0(x) &= x + 1 \\ g_{n+1}(x) &= g_n^x(x) \end{aligned}$$

تاسو ارزولې شئ چې هره تابع g_n بنسټيزه بازگشتي ده. هره ورپسې تابع له مخکينۍ څخه ډېره چټکه لوېږي؛ $g_1(x)$ له $2x$ سره برابره ده، $g_2(x)$ له $2^x \cdot x$ سره برابره ده، او $g_3(x)$ نژدې د x داتو 2 ګانو د تواني برج په شان لوېږي. د اکرمين-پيتر تابع په اصل کېنې همدا تابع $G(x) = g_x(x)$ ده، او ښودل کېدای شي چې دا له هرې بنسټيزې بازگشتي تابع څخه چټکه لوېږي. راځئ د بنسټيزو بازگشتي تابعو د شمېرنې مسئلې ته بېرته راشو. په یاد ولرئ چې هرې بنسټيزې بازگشتي تابع ته مو سمبولیکه نښه ټاکلې ده، نو د نښو شمېرل بس دي. هرې نښې F ته يو طبيعي عدد $\#(F)$ په بازگشتي ډول داسې ټاکلې شو:

$$\begin{aligned} \#(\text{zero}) &= \langle 0 \rangle \\ \#(\text{succ}) &= \langle 1 \rangle \\ \#(P_i^n) &= \langle 2, n, i \rangle \\ \#(\text{Comp}_{k,l}[H, G_0, \dots, G_{k-1}]) &= \langle 3, k, l, \#(H), \#(G_0), \dots, \#(G_{k-1}) \rangle \\ \#(\text{Rec}_l[G, H]) &= \langle 4, l, \#(G), \#(H) \rangle \end{aligned}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-015) سرچينې په دې کوډولو کېنې د پخوانۍ برخې ټاکلې صفر او راتلونکې نښې په ناڅاپي ډول په دوو نورو نښو بدلې کړې وې. دلته هماغه رسمي نښې بېرته کارول شوې دي؛ د هغو عددي ټاګونه هماغسې پاتې دي. دلته دا حقيقت کاروو چې د عددونو هره لړۍ د لړيو د مخکينۍ کوډ له لارې د يوه طبيعي عدد په توګه ګڼل کېدای شي. پایله دا ده چې هرې نښې ته يو طبيعي عددي کوډ ټاکل شوی دی. البته ځينې لړۍ (او ځکه ځينې عددونه) له هېڅ نښې سره سمون نه لري؛ خو که i د يوې يوځایيزې بنسټيزې بازگشتي تابع د نښې کوډ وي، f_i هماغه تابع نيسو، او که i داسې نښه نه کوډوي نو د ثابتې صفر تابع ئې نيسو. وروستۍ پایله دا ده چې د يوځایيزو بنسټيزو بازگشتي تابعو د شمېرلو يوه څرګنده طريقه لرو. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-016) سرچينې د کوډ ټاکنې پایله په سرچېه لوري بيان کړې وه، حال دا چې پورته بازگشتي معادلې هرې نښې ته د لړۍ يو عددي کوډ ټاکي. دلته د نقشې لوری او په ورپسې شمېرنه کېنې د يوځایيزې نښې شرط څرګند کړل شول.

(په حقيقت کېنې ځينې تابعې، لکه ثابته 0 تابع، په لست کېنې تر يو ځل زياتې راځي. دا يوازې زموږ د کوډولو مصنوعي پایله نه ده، بلکې د دې حقيقت پایله هم ده چې ثابته صفر تابع له يوې څخه زياتې نښې لري. وروسته به ووينو چې دا تکرارونه په محاسبه کېدونکې توګه نه شي مخنيوی کېدای، مثلاً هېڅ داسې محاسبه کېدونکې تابع نشته چې پرېکړه وکړي يوه ورکړل شوې نښه ثابته صفر تابع ښيي که نه.)

اوس تابع $g(x, y)$ د $f_x(y)$ په توګه اخلو، چې f_x هماغې شمېرنې ته اشاره کوي چې اوس مو بیان کړه. څنګه پوهېږو چې $g(x, y)$ محاسبه کېدونکې ده؟ په شهودي ډول خبره څرګنده ده: د $g(x, y)$ د محاسبې دپاره لومړۍ x «پرانیزې» او وګورئ چې ایا دا د یوې یوځاییزې تابع لښه ده که نه. که وي، پر ننوت y د هغې تابع ارزښت محاسبه کړئ.

کېدے شي لا مو منلې وي چې (په لږ کار سره!) داسې یو پروګرام، مثلاً په جاوا یا C++ کېنې، لیکلے شو چې دا کار وکړي، بیا د چرچ-تیورینګ اصل ته مراجعه کولے شو، چې وایي هر هغه څه چې په شهودي ډول محاسبه کېدونکې وي، په تیورینګ ماشین محاسبه کېدے شي.

البتہ د $g(x, y)$ د محاسبه کېدو د بنودلو لا نېغه لار دا ده چې هغه تیورینګ ماشین په څرګند ډول بیان کړو چې دا تابع محاسبه کوي. په ځانګړي ډول، دا به د چرچ-تیورینګ اصل او شهود ته د مراجعې مخه ونیسي. ډېر ژر به دومره وسایل جوړ کړي وي چې د $g(x, y)$ محاسبه کېدل د محاسبې د داسې مدل په کارولو وښیو چې پر تیورینګ ماشین تقلیدېدے شي: یعنې بازګشتي تابعې.

23.15 جزوي بازګشتي تابعې

د بازګشتي تابعو د تعریف د انګېزې دپاره پام وکړئ چې زموږ هغه ثبوت، چې محاسبه کېدونکې خو نابنسټیزې بازګشتي تابعې شته، په حقیقت کېنې تر دې ډېر څه ثابتوي. استدلال ساده و: موږ یوازې دا حقیقت وکاراوه چې تابعې $f_0, f_1, \dots$ په داسې ډول په لړ کېنې راوستل کېدے شي چې د x او y د تابع په توګه $f_x(y)$ محاسبه کېدونکې وي. نو دا استدلال د تابعو پر هر هغه ټولګي عملي کېږي چې په دې ډول په لړ کېنې راوستل کېدے شي. له دې سره له یوې ستونزې سره مخ کېږو: غواړو محاسبه کېدونکې تابعې په څرګند ډول بیان کړو، خو د محاسبه کېدونکو تابعو د یوې ټولګي هیڅ څرګند بیان بشپړ کېدے نه شي!

د وتلو لار دا ده چې جزوي تابعو ته هم ځای ورکړو. وبه وینو چې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په رښتیا په لړ کېنې راوستل کېدے شي. په حقیقت کېنې نږدې له وړاندې پوهېږو چې داسې ده، ځکه تیورینګ ماشینونه په منظم ډول په لړ کېنې راوستل کېدے شي. وروسته به خپل قطري استدلال ته راوګرځو او وبه خبرو چې ولې د جزوي تابعو په کېدون هغه استدلال مخ ته نه ځي. اوس پوښتنه دا ده: بنسټیزو بازګشتي تابعو ته څه ورزیات کړو چې ټولې جزوي بازګشتي تابعې تر لاسه کړو؟ دوه کارونه پکار دي:

1. د بنسټیزو بازګشتي تابعو خپل تعریف داسې بدل کړو چې جزوي تابعو ته هم ځای ورکړي.

2. تعریف ته یو څه ورزیات کړو، خو ځینې نوې جزوي تابعې هم پکې شاملې شي.

لومړۍ کار اسان دے. د پخوا په شان له صفر، جانشین او پروګرېشنونو څخه پیل کوو، او ټولګے د ترکیب او بنسټیز بازګڼت لاندې بندوو. یوازینۍ توپیر دا دے چې د ترکیب او بنسټیز بازګڼت تعریفونه باید د دې امکان دپاره بدل کړو چې په تعریف کېنې ځینې ترمونه تعریف شوي نه وي. که f او g جزوي تابعې وي، $f(x) \downarrow$ به په دې مانا لیکو چې f پر x تعریف شوې ده، یعنې x د f په تعریف ساحه کېنې دے؛ او $f(x) \uparrow$ به د دې مخالفې مانا، یعنې دا چې f پر x تعریف شوې نه ده، څرګندوي. $f(x) \simeq g(x)$ به په دې مانا کاروو چې یا $f(x)$ او $g(x)$ دواړه تعریف شوي نه دي، یا دواړه تعریف شوي او سره برابر دي. دا لښې به د لا پېچلو ترمونو دپاره هم کاروو. دا دود به منو چې که h او $g_0, \dots, g_k$ ټولې جزوي تابعې وي، نو

$$h(g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x}))$$

هله او یوازې هله تعریف شوے دے چې هر g_i پر $\vec{x}$ تعریف شوے وي، او h پر $g_0(\vec{x}), \dots, g_k(\vec{x})$ تعریف شوې وي. په دې پوهه د جزوي تابعو د ترکیب او بنسټیز بازګڼت تعریفونه هماغه پورته تعریفونه دي، خو “=” باید پر “ $\simeq$ ” بدل کړو.

بنسټیزو بازګشتي تابعو ته چې څه ورزیاتوو څو جزوي تابعې تر لاسه کړو، هغه د بې حده پلټنې عامل دے. که $f(x, \vec{z})$ پر طبیعي عددونو هره جزوي تابع وي، $\mu x f(x, \vec{z})$ داسې تعریف کړئ:

تر ټولو وړوګه x چې $f(0, \vec{z}), f(1, \vec{z}), \dots, f(x, \vec{z})$ ټول تعریف شوي وي، او $f(x, \vec{z}) = 0$ وي، که داسې x موجود وي؛

او که داسې نه وي، $\mu x f(x, \bar{z})$ تعريف شوی نه دے. دا $\mu x f(x, \bar{z})$ په یگا ډول تعريفوي.

پام وکړئ چې زموږ تعريف تيورينک ماشينونو، يا الگوريتمونو يا د محاسبې کوم ځانگړي مدل ته هېڅ اشاره نه کوي. خو د تركيب او بنسټيز بازگښت په شان، د بې حده پلټنې تر شا هم عملياتي، محاسبوي شهود شته. د يوې جزوي تابع د محاسبه کېدو په بحث کېنې هغه آرکومېنټونه، چې تابع پرې تعريف شوی نه وي، له هغو ننوتونو سره سمون خوري چې محاسبه پرې نه درېږي. د $\mu x f(x, \bar{z})$ د محاسبې کړنلار داسې ده: $f(0, \bar{z}), f(1, \bar{z}), f(2, \bar{z})$ او ورپسې قيمتونه محاسبه کړئ، ترڅو د صفر قيمت راوگرځي. خو که له منځنيو محاسبو څخه کومه يوه ونه درېږي، د $\mu x f(x, \bar{z})$ محاسبه هم نه درېږي.

که $R(x, \bar{z})$ هره اړيکه وي، $\mu x R(x, \bar{z})$ داسې تعريفېږي: $\mu x (1 - \chi_R(x, \bar{z}))$. په بله وينا، $\mu x R(x, \bar{z})$ د x تر ټولو وروکې قيمت راگرځوي چې $R(x, \bar{z})$ پوره کوي. نو که $f(x, \bar{z})$ هرځای تعريف شوې تابع وي، $\mu x f(x, \bar{z})$ له $\mu x (f(x, \bar{z}) = 0)$ سره يو شان دے. خو پام وکړئ چې زموږ لومړنی تعريف لا عمومي دے، ځکه دا امکان هم پرېږدي چې $f(x, \bar{z})$ په هر ځای کېنې تعريف شوې نه وي (خو د دې پر خلاف د يوې اړيکې ځانگړونکې تابع تل هرځای تعريف شوې وي).

تعريف 23.39. د جزوي بازگښتي تابعو سټ له طبيعي عددونو څخه طبيعي عددونو ته د بېلابېلو ځاييزو کچو د جزوي تابعو تر ټولو کوچنۍ سټ دے چې صفر، جانشين او پروجکشنونه لري، او د تركيب، بنسټيز بازگښت او بې حده پلټنې لاندې بند دے.

البته ځينې جزوي بازگښتي تابعي به په اتفاقي ډول هرځای تعريف شوې وي، يعنې د هر آرکومېنټ دپاره تعريف شوې وي.

تعريف 23.40. د بازگښتي تابعو سټ د هغو جزوي بازگښتي تابعو سټ دے چې هرځای تعريف شوې وي.

پر دې د ټينگار دپاره چې يوه بازگښتي تابع په هر ځای کېنې تعريف شوې ده، کله کله ورته “هرځای تعريف شوې بازگښتي” تابع هم ويل کېږي.

23.16 د نورمال شکل قضيه

قضيه 23.41 (د کليني د نورمال شکل قضيه). يوه بنسټيزه بازگښتي اړيکه $T(e, x, s)$ او يوه بنسټيزه بازگښتي تابع $U(s)$ شته چې دا خاصيت لري: که f هره جزوي بازگښتي تابع وي، نو د کوم e دپاره

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

د هر x دپاره پوره کېږي.

د نورمال شکل د قضیې ثبوت اوږد دے، خو بنسټيزه مفکوره ئې ساده ده. هره جزوي بازگښتي تابع يو شاخص e لري، په شهودي ډول دا هغه عدد دے چې د تابع پروگرام يا تعريف کوډوي. که $f(x) \downarrow$ وي، محاسبه په منظم ډول ثبتېدے او په کوم عدد s کوډېدے شي، او دا حقيقت، چې s پر ننوت x د f محاسبه کوډوي، يوازې د x او تعريف e په کارولو سره په بنسټيز بازگښتي ډول گل کېدے شي. نو اړيکه T ، يعنې “د شاخص e تابع د ننوت x دپاره يوه محاسبه لري، او s دا محاسبه کوډوي”، بنسټيزه بازگښتي ده. د محاسبې د بشپړ ريکارډ s په ورکړې سره د s “پاياله” د $f(x)$ قيمت دے، او هغه هم له s څخه په بنسټيز بازگښتي ډول تر لاسه کېدے شي.

د نورمال شکل قضیه بنې چې د هرې جزوي بازگښتي تابع د تعريف دپاره يوازې يوه بې حده پلټنه پکار ده. په بنسټيز ډول د ټولو عددونو له منځه پلټنه کوو ترڅو داسې عدد ومومو چې د شاخص e د تابع محاسبه پر ننوت x کوډوي. عددونه e د جزوي بازگښتي تابعو د “نومونو” په توگه کارولے شو، او د قضیې په معادله تعريف شوې تابع f ته φ_e ليکلے شو. پام وکړئ چې يوه جزوي بازگښتي تابع تر يوه ډېر شاخص لرلے شي — په حقيقت کېنې هره جزوي بازگښتي تابع بې شمېره ډېر شاخصونه لري.

23.17 د درېدنې مسئله

په عمومي ډول د درېدنې مسئله دا ده چې د يوې محاسبه کېدونکې تابع د مشخصې e (لکه پروگرام) او يو عدد n په ورکړې سره پرېکړه وشي چې د دې تابع محاسبه پر ننوت n درېږي، يعنې کومه پاياله ورکوي، که نه. اېلن تيورينگ په نوميالي ډول ثابته کړه چې دا مسئله

پخپله د یوې محاسبه کېدونکې تابع له لارې نه شي حل کېدے؛ یعنې تابع

$$h(e, n) = \begin{cases} 1 & \text{که محاسبه } e \text{ پر ننوت } n \text{ ودرېږي} \\ 0 & \text{که داسې نه وي،} \end{cases}$$

محاسبه کېدونکې نه ده.

د جزوي بازگشتي تابعو په چوکاټ کېنې د یو پروگرام د مشخصې رول د کلیني د نورمال شکل په قضیه کېنې ورکړل شوی شاخص e لوبولې شي. که f جزوي بازگشتي تابع وي، هر هغه e چې د نورمال شکل د قضیې معادله پوره کوي، د f یو شاخص دے. د عدد e په ورکړې سره د نورمال شکل قضیه وایي چې

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

جزوي بازگشتي ده، او د هرې جزوي بازگشتي $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ دپاره یو $e \in \mathbb{N}$ شته چې د ټولو $x \in \mathbb{N}$ دپاره $\varphi_e(x) \simeq f(x)$ وي. په حقیقت کېنې د هرې داسې f دپاره یوازې یو نه، بلکې بې شمېره ډېر داسې e شته. د درېدنې تابع h داسې تعریفېږي:

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{که } \varphi_e(x) \downarrow \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نه وي.} \end{cases}$$

نو $h(e, x) = 0$ هله او یوازې هله چې $\varphi_e(x) \uparrow$ وي؛ د نورمال شکل په ټاکلې شمېرنه کېنې هر طبیعي عدد e د کومې جزوي بازگشتي تابع شاخص دے، که هغه تابع په هر ننوت هم تعریف شوې نه وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-017) سرچینې د نورمال شکل د شمېرنې تر ټاکلو وروسته هم د داسې عدد بدیل ساتلې و چې کني د هېڅ جزوي بازگشتي تابع شاخص نه وي. خو پورته معادله هر طبیعي شاخص ته یوه جزوي بازگشتي تابع ټاکي. دلته هغه ناممکن بدیل له تشریح او قطري ثبوت څخه لرې کړے شوی دے؛ د درېدنې د تابع تعریف او د قضیې دعوه هماغسې دي.

قضیه 23.42. د درېدنې تابع h جزوي بازگشتي نه ده.

ثبوت. که h جزوي بازگشتي وای، دا تابع مو تعریفولے شوه:

$$d(y) = \begin{cases} 1 & \text{که } h(y, y) = 0 \text{ وي} \\ \mu x \ x \neq x & \text{که داسې نه وي.} \end{cases}$$

څرنکه چې هېڅ عدد x شرط $x \neq x$ نه پوره کوي، $\mu x \ x \neq x$ نشته؛ نو $d(y) \uparrow$ هله او یوازې هله چې $h(y, y) \neq 0$ وي. له دې تعریف څخه دا پایلې راځي:

1. د شاخص y دپاره، $d(y) \downarrow$ هله او یوازې هله چې $\varphi_y(y) \uparrow$ وي.

2. $d(y) \uparrow$ هله او یوازې هله چې $\varphi_y(y) \downarrow$ وي.

که h جزوي بازگشتي وای، d به هم جزوي بازگشتي وه. نو د کلیني د نورمال شکل د قضیې له مخې دا یو شاخص e_d لري. د $h(e_d, e_d)$ قیمت وکړئ. دوه ممکن حالتونه شته، 0 او 1.

1. که $h(e_d, e_d) = 1$ وي، نو $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$ دے. خو $\varphi_{e_d} \simeq d$ ، او $d(e_d)$ هله تعریف شوی دے چې $h(e_d, e_d) = 0$ وي. نو $h(e_d, e_d) \neq 1$.

2. که $h(e_d, e_d) = 0$ وي، نو د شاخص e_d تابع $\varphi_{e_d}(e_d) \uparrow$ ده. خو بیا هم $\varphi_{e_d} \simeq d$ ، حال دا چې $d(e_d)$ تعریف شوی دے؛ دغه مساوات به بیا $\varphi_{e_d}(e_d) \downarrow$ غوښتل.

د شاخص e_d په دواړو ممکنو حالتونو کېنې تناقض راځي. که h جزوي بازگشتي وای، d به هم جزوي بازگشتي وه او د هغې شاخص e_d به منل شوی وای؛ خو هېڅ ممکن قیمت د دغه شاخص له تعریف سره نه جورېږي. نو باید دې پایلې ته ورسېږو چې h جزوي بازگشتي کېدے نه شي. □

23.18 عمومي بازگشتي تابعې

د هرځای تعریف شویو تابعو د یو سټ د تر لاسه کولو بله لار هم شته. هرځای تعریف شوې تابع $f(x, \vec{z})$ هغه وخت منظمه وبولئ چې د طبیعي عددونو د هرې لړۍ $\vec{z}$ دپاره یو x موجود وي چې $f(x, \vec{z}) = 0$ وي. په بله وینا، منظمې تابعې کټ مټ هغه تابعې دي چې بې حده پلټنه پرې عملي کېدای شي او په پایله کې یوه هرځای تعریف شوې تابع تر لاسه کېږي. بې حده پلټنه په محتاط ډول یوازې منظمو تابعو ته محدودولې شو:

تعریف 23.43. د عمومي بازگشتي تابعو سټ له طبیعي عددونو څخه طبیعي عددونو ته د بېلابېلو ځاییزو کچو د تابعو تر ټولو کوچنۍ سټ ده چې صفر، جانشین او پروجکشنونه لري، او د ترکیب، بنسټیز بازگښت او پر منظمو تابعو د عملي شوې بې حده پلټنې لاندې بند ده.

په څرگند ډول هره عمومي بازگشتي تابع هرځای تعریف شوې ده. د 23.43 او 23.40 تر منځ توپیر دا ده چې په وروستي تعریف کې د جوړونې په منځ کې د جزوي بازگشتي تابعو کارول هم روا دي؛ یوازینۍ شرط دا ده چې په پای کې تر لاسه شوې تابع هرځای تعریف شوې وي. نو د “عمومي” ټکی، چې یو تاریخي پاتې شوني ده، سم نوم نه ده؛ په ظاهره 23.43 تر 23.40 لږ عمومي ده. خو له نېکه مرغه دا توپیر ظاهري ده؛ که څه هم تعریفونه بېل دي، د عمومي بازگشتي تابعو سټ او د بازگشتي تابعو سټ یو او هماغه سټ ده.

باب 24

د محاسبه کېدنې تیوري

اداري یادونه - د دې څپرکي مواد باید وکتل او پراخ کړل شي. په ځانګړې ډول تر اوسه هېڅ تمرین نه لري.

24.1 پېژندنه

د منطق هغه څانګه چې د محاسبه کېدنې تیوري بلل کېږي، د تابعو او ستونو د محاسبه کېدنې یا نسبي محاسبه کېدنې اړوندې مسئلې څېړي. دا د کليني د اغېز نښه ده چې دې مضمون ته پخوا د بازګڼت تیوري ویل کېدل، او نن دواړه نومونه په عام ډول کارېږي.

تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ هغه وخت جزوي محاسبه کېدونکې وېوې چې د محاسبې په کوم مدل کېنې محاسبه کېدای شي. که f هرځای تعریف شوې وي، په ساده ډول به وایو چې f محاسبه کېدونکې ده. هغه اړیکه R هم محاسبه کېدونکې بلل کېږي چې ځانګړونکې تابع χ_R ئې محاسبه کېدونکې وي. که f او g جزوي تابعې وي، $f(x) \downarrow$ به په دې مانا لیکو چې f پر x تعریف شوې ده، یعنې x د f په تعریف ساحه کېنې دے؛ او $f(x) \uparrow$ به د دې مخالفه مانا، یعنې دا چې f پر x تعریف شوې نه ده، څرګندوي. $f(x) \simeq g(x)$ به په دې مانا کاروو چې یا $f(x)$ او $g(x)$ دواړه تعریف شوي نه دي، یا دواړه تعریف شوي او سره برابر دي.

د محاسبه کېدنې تیوري د محاسبې کوم ځانګړي مدل ته له مراجعې پرته هم څېړل کېدای شي. د دې دپاره ښودل کېږي چې یوه نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $\text{Un}(k, x)$ شته. په دې سره جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په لړ کېنې راوستل کېدای شي. موږ به φ_k د k -مې یوځایزې جزوي محاسبه کېدونکې تابع دپاره وکاروو، چې د $\varphi_k(x) \simeq \text{Un}(k, x)$ له لارې تعریفېږي. (کليني د دې موخې دپاره $\{k\}$ کارولی و، خو په وروستیو کېنې دا نښه هومره نه ده کارول شوې.) لږ لا په عمومي ډول، د هرې ځایزې پکې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې په یو شان ډول په لړ کېنې راوستل کېدای شي، او φ_k^n به د k -مې n -ځایزې جزوي محاسبه کېدونکې تابع دپاره کاروو. د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-018) سرچینې په همدې پراګراف کېنې لومړۍ نړیواله شمېرنه د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره ټاکلې وه، خو په وروستۍ فقره کېنې ئې بې له کومې پېژندنې نوم جزوي بازګڼتې تابعو ته واړاوه. دلته نوم د پراګراف له ټاکلې، مدل-خپلواک ټولګي سره یو شان ساتل شوی دے؛ نښه او ځایزیزه کچه نه دي بدل شوي.

که $f(\vec{x}, y)$ هرځای تعریف شوې یا جزوي تابع وي، نو $\mu y f(\vec{x}, y)$ د $\vec{x}$ هغه تابع ده چې تر ټولو وړوکه y راګرځوي چې $f(\vec{x}, y) = 0$ وي، په دې شرط چې $f(\vec{x}, 0), \dots, f(\vec{x}, y-1)$ ټول تعریف شوي وي؛ که داسې y نه وي، $\mu y f(\vec{x}, y)$ تعریف شوی نه دے. که $R(\vec{x}, y)$ یوه اړیکه وي، $\mu y R(\vec{x}, y)$ تر ټولو وړوکه y تعریفېږي چې $R(\vec{x}, y)$ رښتیا وي؛ په بله وینا، تر ټولو وړوکه y چې $1 \dot{-} \chi_R(\vec{x}, y) = 0$ وي.

د دې د ښودلو دپاره چې یوه تابع محاسبه کېدونکې ده، دوه لارې شته:

1. په کلک ډول: یو تیورینګ ماشین یا جزوي بازګڼتې تابع په څرګند ډول بیان کړئ، او وښیئ چې همدا موخه شوې تابع محاسبه کوي؛

2. په غیر رسمي ډول: هغه الګوریتم بیان کړئ چې تابع محاسبه کوي، او د چرچ اصل ته مراجعه وکړئ.

د دواړو تر منځ تېره پوله نشته؛ د یو الګوریتم مفصل بیان باید دومره معلومات ورکړي چې په اصل کېنې د سم تیورینګ ماشین یا د جزوي بازګشتي تعریفونو د لړۍ طرحه نسبتاً څرګنده وي. بشپړ کلک تعریفونه ښایي معلوماتي نه وي، او هڅه به کوو چې د دغو دوو لارو تر منځ مناسب منځنۍ دریځ ومومو؛ په لنډ ډول، هڅه به کوو داسې شهودي خو کلک ثبوتونه ومومو چې ترې څرګنده وي کره تعریفونه تر لاسه کېدای شي.

24.2 د محاسبو کوډول

د محاسبې په هر مدل کېنې لاندې کارونه کېدای شي:

1. د محاسبه کېدونکو تابعو تعریفونه په منظم ډول بیانول. د بېلګې په توګه، د تیورینګ ماشین مشخصې، بازګشتي تعریفونه یا د پروګرام لیکلو په یوه ژبه کېنې پروګرامونه د دې تعریفونو ورکونکي ګڼل کېږي.

2. د یو ورکړل شوي ننوت دپاره، د کوم تعریف له مخې د یوې تابع د محاسبې بشپړ ریکارډ بیانول. د بېلګې په توګه، د تیورینګ ماشین محاسبه د محاسبې په هر ګام کېنې د ښو د لړۍ له لارې بیانېدای شي (د ماشین حالت او د تېپ منځپانګه).

3. دا ګڼل چې د یوې محاسبې یو اټکلي ریکارډ په رښتیا د دې ریکارډ دے که نه چې د ورکړل شوي تعریف محاسبه کېدونکې تابع به پر ورکړل شوي ننوت څنګه محاسبه شي (هغه ننوت چې تابع پرې تعریف شوې وي، یعنې محاسبه درېږي).

4. د یوې محاسبې د بشپړ ریکارډ له داسې بیان څخه د ورکړل شوي ننوت دپاره د تابع قیمت رالېستل. د بېلګې په توګه، د یوې درېدونکې تیورینګ ماشین محاسبې په وروستي ګام کېنې د تېپ منځپانګه قیمت دے.

د کوډولو په کارولو سره د محاسبه کېدونکې تابع هر بیان ته داسې عددي شاخص ټاکل کېدای شي چې لارښوونې په محاسبه کېدونکې ډول له شاخصه پرته تر لاسه شي. په ورته ډول د یوې محاسبې بشپړ ریکارډ هم په یوه عدد کوډېدای شي. په پایله کېنې پیدا شوې حسابي اړیکه، “ s د شاخص e د تابع د محاسبې ریکارډ پر ننوت x کوډوي”، او تابع، “د کوډ s لرونکې د محاسبې لړۍ وټ”، بیا محاسبه کېدونکې دي؛ په حقیقت کېنې دواړه بنسټیز بازګشتي دي.

دا بنسټیز حقیقت ډېر ځواکمن دے، او پرېږدي چې د محاسبه کېدنې په اړه ډېرې حیرانونکې او مهمې پایلې د محاسبې له غوره شوي مدل څخه په خپلواک ډول ثابتې کړو.

24.3 د نورمال شکل قضیه

فرض کړئ چې د محاسبه کېدونکو تابعو تعریفونه بیانول شوي، او ګڼل شو چې پر کوم ننوت د هغې تابع د محاسبې د بشپړ ریکارډ یو اټکلي بیان سم دے که نه. نو له دې سره سمه ښکاري چې د محاسبې له مدل څخه په خپلواک ډول د هرې محاسبه کېدونکې تابع f قیمت پر هر ننوت x داسې ټاکلای شو:

1. د محاسبې د ریکارډونو د ټولو ممکنه بیانونو له منځه پلټنه وکړئ.

2. وازموئ چې ورکړل شوی ریکارډ د $f(x)$ د محاسبې ریکارډ دے که نه.

3. که سم ریکارډ موندلې وي، د $f(x)$ قیمت ترې راوباسئ.

دا چې خبره په رښتیا همداسې ده، د کلیني د نورمال شکل د قضیې منځپانګه ده.

قضیه 24.1 (د کلیني د نورمال شکل قضیه). یوه بنسټیزه بازګشتي اړیکه $T(e, x, s)$ او یوه بنسټیزه بازګشتي تابع $U(s)$ شته چې دا خاصیت لري: که f هر جزوي محاسبه کېدونکې تابع وي، نو د کوم e دپاره

$$f(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

د هر x دپاره پوره کېږي.

د ثبوت څا که. د محاسبې د هر مدل دپاره د محاسبه کېدونکې تابع f یو بیان په کلک ډول تعریفېدې او داسې بیان په یوه طبیعي عدد e کوډېدې شي. د “محاسبې لړۍ” یو مفهوم هم په کلک ډول تعریفېدې شي چې د شاخص e تابع پر ننوت x د محاسبه کولو بهیر ثبتوي. دا ډول د محاسبې لړۍ هم په ورته ډول په یوه عدد s کوډېدې شي. دا هر څه په داسې ډول کېدې شي چې

1. اړیکه $T(e, x, s)$ ، چې هله او یوازې هله پوره کېږي چې عدد s د شاخص e د تابع د محاسبې لړۍ پر ننوت x کوډوي، او

2. تابع $U(s)$ ، چې په s کوډ شوې د محاسبې لړۍ د هغې محاسبې وروستی پایلې ته وړي،

دواړه محاسبه کېدونکي وي. په حقیقت کېنې اړیکه T او تابع U دواړه بنسټیز بازکشتي دي. □

د نورمال شکل د قضیې د کلک ثبوت دپاره باید د محاسبې یو مدل وټاکو، د محاسبه کېدونکو تابعو د بیانونو او د محاسبې د لړیو کوډول په تفصیل عملي کړو، او تصدیق کړو چې اړیکه T او تابع U بنسټیز بازکشتي دي. د ډېرو کارونو دپاره دومره بسنه کوي چې T او U محاسبه کېدونکي او هرځای تعریف شوې وي.

ښایي د نورمال شکل د قضیې ثبوت په لنډ شعار کېنې داسې ښه یاد پاتې شي: $\mu s T(e, x, s)$ پر ننوت x د شاخص e د تابع د محاسبې یوه لړۍ لټوي، او که داسې لړۍ وموندل شي، U ئې وت راگرځوي.

که د محاسبې مدل جزوي بازکشتي تابعي وي (چې کلیني په اصل کېنې همدا کارولې)، قضیه ښیي چې د هرې تابع په تعریف کېنې د بې حده پلټنې یوازې یوه کارونه، یعنې یوازې یو $\mu y f(\vec{x}, y)$ عامل، پکار دے. په دې مانا قضیه ښیي چې هره جزوي بازکشتي تابع یو نورمال شکل لري.

T او U د شمېرنې $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ د تعریف دپاره کارېدې شي. له دې وروسته به فرض کوو چې د T او U یو مناسب انتخاب مو ثابت کړې دے، او معادله

$$\varphi_e(x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$$

به د φ_e تعریف کڼو.

دا یو بل کټور حقیقت دے:

قضیه 24.2. هره جزوي محاسبه کېدونکې تابع بې شمېره ډېر شاخصونه لري.

دا خبره بیا هم په شهودي ډول څرګنده ده. د یوې محاسبه کېدونکې تابع له هر ورکړل شوي بیان څخه یو بل بیان جوړولې شو چې هماغه تابع (د ننوت او وت هماغه جوړه) محاسبه کوي، خو مثلاً لومړۍ داسې څه کوي چې پر محاسبه هېڅ اغېز نه لري (لکه دا ګڼل چې $0 = 0$ دے، یا تر 5 پورې شمېرل، او داسې نور). د بدل شوي بیان شاخص به تل له اصلي شاخصه بېل وي. دواړه د هماغې تابع شاخصونه دي، خو تابع په لږ بېل ډول محاسبه کوي.

24.4 د $n-m-s$ قضیه

راتلونکې قضیه د داسې دلیل له مخې د “ $n-m-s$ قضیې” په نوم پېژندل کېږي چې لږ وروسته به څرګند شي. ستونزمنه برخه دا پوهېدل دي چې قضیه په کره ډول څه وايي؛ کله چې ئې بیان درک کړئ، قضیه به ښیي څرګنده وېرېږي.

قضیه 24.3. د طبیعي عددونو د هرې جوړې n او m دپاره یوه بنسټیزه بازکشتي تابع s_n^m شته، داسې چې د هرې لړۍ $a_0, e, \dots$ ، $a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}$ دپاره لرو:

$$\varphi_{s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})}(y_0, \dots, y_{n-1}) \simeq \varphi_e^{m+n}(a_0, \dots, a_{m-1}, y_0, \dots, y_{n-1}).$$

کنټوره ده چې s_n^m پر پروګرامونو د عمل کوونکې تابع په توګه وګڼو. یعنې s_n^m د یوې $(m+n)$ -ځاییزې تابع پروګرام e او ثابت ننوتونه $a_0, \dots, a_{m-1}$ اخلي؛ بیا د پاتې دلیلونو د n -ځاییزې تابع پروګرام $s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ راګرځوي. که e د یوه تیورینګ ماشین تشریح وګڼئ، نو $s_n^m(e, a_0, \dots, a_{m-1})$ هغه تیورینګ ماشین دے چې د $y_0, \dots, y_{n-1}$ په ننوت کېنې $a_0, \dots, a_{m-1}$ د ننوت د لړۍ په سر کېنې ورزیاتوي، او e چلوي. نو هره s_n^m یوازې هغه بنسټیزه بازکشتي تابع ده چې د اړوند تیورینګ ماشین کوډ پېدا کوي. د ژباړې

د نسخې سمون: (OLCMP-019) سرچینې په همدې تشرېح کېنې لومړۍ یو پروګرامي شاخص ټاکلې و، خو د را ګرځېدونکي پروګرام په نښه کېنې ئې ناڅاپه بل متغیر لیکلې و، او ورپسې د تیورینگ ماشین تشرېح هم د هماغه بل متغیر په نوم پیلوله. دلته دواړه ځایونه د قضیې له ټاکلي شاخص سره یو شان ساتل شوي؛ د قضیې معادله نه ده بدله شوې.

24.5 نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع

قضیه 24.4. یوه نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $Un(e, x)$ شته. په بله وینا، داسې تابع $Un(e, x)$ شته چې:

1. $Un(e, x)$ جزوي محاسبه کېدونکې ده.

2. که $f(x)$ هره جزوي محاسبه کېدونکې تابع وي، نو یو طبیعي عدد e شته، داسې چې د هر x دپاره $f(x) \simeq Un(e, x)$ وي.

ثبوت. $Un(e, x) \simeq U(\mu s T(e, x, s))$ وټاکئ، چې U او T د کلیني د نورمال شکل په قضیه کېنې د (24.1) په شان دي. □

دا یوازې د دې خبرې کره بڼه ده چې موږ د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو اغېزمنه شمېرنه لرو. نظر دا دے چې که د هغې تابع دپاره f_e ولیکو چې $f_e(x) = Un(e, x)$ ئې تعریفوي، نو لړۍ $f_0, f_1, f_2, \dots$ ټولې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې رانغاړي، او $f_e(x)$ د e او x په نسبت “په یو شان” محاسبه کېدے شي. د ساده والي دپاره داسې دوه ځاییزه تابع کاروو چې د یوځاییزو تابعو دپاره نړیواله ده؛ خو د عددونو د لړیو په کوډولو سره دا خبره په اسانۍ دپرو دلیلونو ته عمومي کولے شو. د بېلګې په توګه، پام وکړئ چې که $f(x, y, z)$ یوه 3-ځاییزه جزوي بازګشتي تابع وي، نو تابع $g(x) \simeq f((x)_0, (x)_1, (x)_2)$ یوه یوځاییزه جزوي بازګشتي تابع ده. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-020) سرچینې په وروستۍ جمله کېنې له ممکنه جزوي درې ځاییزې تابع څخه جوړه شوې یوځاییزه تابع بې له “جزوي” قیده بازګشتي بللې وه، حال دا چې جوړه شوې تابع هماغه وخت ناتعریفه پاتې کېږي چې اړوند اصلي تابع ناتعریفه وي. دلته د تابع جزوي والی څرګند ساتل شوے دے؛ فورمول هماغه دے.

24.6 هېڅ نړیواله محاسبه کېدونکې تابع نشته

که څه هم داسې جزوي محاسبه کېدونکې تابع شته چې د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله ده، داسې هرځای تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع نشته چې د ټولو هرځای تعریف شویو محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-021) د سرچینې په لومړۍ جمله کېنې لومړۍ تابع د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره “هرځای تعریف شوې” بلل شوې وه، که څه هم ورپسې قضیه او تشرېح ئې په سمه توګه “نړیواله” بولي او څرګندوي چې دا تابع پخپله جزوي ده. دلته هماغه موخه شوې ځانګړنه، یعنې نړیوالتوب، لیکل شوې ده.

قضیه 24.5. هېڅ نړیواله محاسبه کېدونکې تابع نشته. په بله وینا، هره تابع $Un'(k, x)$ چې دا ځانګړنه ولري چې که $f(x)$ هرځای تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع وي، نو یو طبیعي عدد k شته، داسې چې د هر x دپاره $f(x) = Un'(k, x)$ وي، محاسبه کېدونکې نه ده.

ثبوت. ثبوت یو ساده قطري استدلال دے: که $Un'(k, x)$ هرځای تعریف شوې او محاسبه کېدونکې وای، نو

$$d(x) = Un'(x, x) + 1$$

به هم هرځای تعریف شوې او محاسبه کېدونکې وه. خو د تعریف له مخې $d(k)$ له $Un'(k, k)$ سره برابره نه ده. نو د هر k دپاره د $d(x)$ او $Un'(k, x)$ قیمتونه لږ تر لږه پر یوه x ، یعنې $x = k$ ، سره بېل دي. □

پورته 24.4 نېټې چې له دې قطري استدلاله وتلے شو، خو یوازې په دې بیه چې نړیواله تابع جزوي ومنو. یعنې Un د هرځای تعریف شویو محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله ده، خو پخپله هرځای تعریف شوې نه ده. قطري استدلال په جزوي حالت کېنې کار نه کوي.

تمرین 24.6. د دې د پوهېدو دپاره چې د 24.5 د ثبوت قطري استدلال ولې په جزوي حالت کېنې کار نه کوي، تابع $f(x) \simeq 1 + \text{Un}(x, x)$ وکړئ. ایا دا جزوي محاسبه کېدونکې ده؟ که وي، یو شاخص e لري، یعنې $f(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ د $f(e)$ په اړه څه ویلې شې؟

24.7 د درېدنې مسئله

د جوړښت له مخې نړیواله جزوي محاسبه کېدونکې تابع $\text{Un}(e, x)$ هله او یوازې هله تعریف شوې ده چې په e کوډ شوې د تابع محاسبه د ننوت x دپاره یو قیمت پیدا کړي. طبیعي پوښتنه دا ده چې ایا موږ پرېکړه کولې شو چې داسې ده که نه. په حقیقت کېنې دا پرېکړه نه شو کول. د محاسبې د تیورینګ ماشین په مدل کېنې دا په دې مانا ده چې ایا ورکړل شوی تیورینګ ماشین پر ورکړل شوي ننوت درېږي که نه، په محاسبوي ډول د پرېکړې وړ نه ده. له همدې کبله لاندې قضیه د “درېدنې د مسئلې د ناپرېکړتیا” په نوم پېژندل کېږي. لاندې به دوه ثبوتونه ورکړو. لومړی زموږ د مخکنۍ بحث لړۍ پسې غځوي، او دویم ډېر نېغ دے.

قضیه 24.7. فرض کړئ

$$h(e, x) = \begin{cases} 1 & \text{که } \text{Un}(e, x) \text{ تعریف شوې وي} \\ 0 & \text{که داسې نه وي.} \end{cases}$$

نو h محاسبه کېدونکې نه ده.

ثبوت. فرض کړئ h محاسبه کېدونکې ده. بنیو چې په دې سره یوه نړیواله محاسبه کېدونکې تابع تعریفولې شو. داسې تعریف کړئ:

$$\text{Un}'(e, x) = \begin{cases} \text{Un}(e, x) & \text{که } h(e, x) = 1 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نه وي.} \end{cases}$$

خو اوس $\text{Un}'(e, x)$ هرځای تعریف شوې تابع ده، او که h محاسبه کېدونکې وي نو دا هم محاسبه کېدونکې ده. د بېلګې په توګه، د بنسټیز بازګڼنت په کارولو سره g داسې تعریفولې شو:

$$\begin{aligned} g(0, e, x) &\simeq 0 \\ g(y + 1, e, x) &\simeq \text{Un}(e, x); \end{aligned}$$

بیا

$$\text{Un}'(e, x) \simeq g(h(e, x), e, x).$$

څرنګه چې $\text{Un}'(e, x)$ په هر هغه ځای کېنې له $\text{Un}(e, x)$ سره برابره ده چې وروستی تابع تعریف شوې وي، نو Un' د هغو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو دپاره نړیواله ده چې هرځای تعریف شوې وي. خو دا له 24.5 سره تناقض دے. □

ثبوت. فرض کړئ $h(e, x)$ محاسبه کېدونکې ده. تابع g داسې تعریف کړئ:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{که } h(x, x) = 0 \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نه وي.} \end{cases}$$

تابع g جزوي محاسبه کېدونکې ده. د بېلګې په توګه، دا د $\mu y \ h(x, x) = 0$ په توګه تعریفولې شو. نو د کوم e دپاره د هر x په نسبت $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ ده. ایا پر e تعریف شوې ده؟ که تعریف شوې وي، نو د g د تعریف له مخې $h(e, e) = 0$ دے (کله چې g تعریف شوې وي، یوازې د 0 قیمت اخلي). د h د تعریف له مخې دا په دې مانا ده چې $\text{Un}(e, e)$ تعریف شوې نه ده. زموږ د دې فرض له مخې چې د هر x دپاره $g(x) \simeq \text{Un}(e, x)$ ده، $g(e)$ هم تعریف شوې نه ده، چې تناقض دے. بل پلو، که $g(e)$ تعریف شوې نه وي، نو $h(e, e) \neq 0$ او ځکه $h(e, e) = 1$ دے. له دې څخه راځي چې $\text{Un}(e, e)$ تعریف شوې ده. خو څرنګه چې

دا استدلال د تیورینگ ماشینونو په ژبه هم بیانولې شو. فرض کړئ داسې تیورینگ ماشین H شته چې د یو تیورینگ ماشین E تشریح او یو ننوت x اخلي، او پرېکړه کوي چې E پر x درېږي که نه. بیا به یو بل تیورینگ ماشین G جوړولې شو چې یو ننوت x اخلي، H چلوي خو پرېکړه وکړي چې د شاخص x ماشین M_x پر ننوت x درېږي که نه، او بیا د هغې مخالف کار کوي. په بله وینا، که H ووايي چې M_x پر x درېږي، G په ناپایه کړی کښې ننوځي؛ او که H ووايي چې M_x پر x نه درېږي، نو G بس درېږي. ایا G د خپل شاخص په ننوت درېږي؟ پورته استدلال ښیي چې دا هله او یوازې هله درېږي چې نه درېږي—یو تناقض—نو زموږ دا فرض چې داسې تیورینگ ماشین H شته، باید ناسم وي.

24.8 د رسل له تناقض سره پرتله

کنټوره ده چې د دې برخې استدلالونه د رسل له تناقض سره پرتله او پیل کړو:

1. د رسل تناقض: فرض کړئ $S = \{x : x \notin x\}$. بیا $S \in S$ هله او یوازې هله چې $S \notin S$ وي، چې تناقض دے.

پایله: داسې سټ S نشته. د “ټولو ستونو د سټ” شتون منل د سټ تیورۍ له نورو بډیې اصولو سره ناسازگار دي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-023) د سرچینې د دوه اړخیز شرط په دویم اړخ کښې ناڅاپه یو بل لوستی توری راغلې و، که څه هم یوازې د سټ ټاکلې نوم تعریف شوی او د رسل شرط هم د هماغه سټ خپل غړیتوب ازمويني. دلته بل توری د ټاکلي سټ په نوم سم شوی دے.

2. د رسل د تناقض یوه بدله ښه: F له ټولو تابعو له سټ $\{0, 1\}$ نه هغه “تابع” وګڼئ چې داسې تعریفېږي:

$$F(f) = \begin{cases} 1 & \text{که } f \text{ د } f \text{ د تعریف ساحې غړی وي، او } f(f) = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

ورته استدلال ښیي چې $F(F) = 0$ هله او یوازې هله چې $F(F) = 1$ وي، چې تناقض دے.

پایله: F تابع نه ده. د “ټولو تابعو سټ” دومره لوستی دے چې د یوې تابع تعریف ساحه نه شي کېدے.

3. قطري استدلال: $f_0, f_1, \dots$ د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو شمېرنه وي، او $G: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$ داسې تعریف کړئ:

$$G(x) = \begin{cases} 1 & \text{که } f_x(x) \downarrow = 0 \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

که G محاسبه کېدونکې وي، نو د کوم k دپاره تابع f_k ده. خو بیا $G(k) = 1$ هله او یوازې هله چې $G(k) = 0$ وي، چې تناقض دے.

پایله: G محاسبه کېدونکې نه ده. پام وکړئ چې د سټ تیورۍ د بډیې اصولو له مخې G بیا هم تابع ده؛ دلته تناقض نشته، یوازې یوه څرګندونه ده.

د جزوي تابعو، محاسبه کېدونکو تابعو، جزوي محاسبه کېدونکو تابعو او داسې نورو یادونه کېدوونکې کېدے شي. له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته د ټولو جزوي تابعو سټ د څیزونو یوه لویه ټولګه ده. ځینې ئې هرځای تعریف شوې، ځینې ئې محاسبه کېدونکې، ځینې دواړه هرځای تعریف شوې او محاسبه کېدونکې، او ځینې یوه هم نه دي. په یاد ولرئ چې کله ئې له قیده “تابع” وایو، موخه مو هرځای تعریف شوې تابع وي. نو دا ډولونه لرو:

1. محاسبه کېدونکې تابعي

2. هغه جزوي محاسبه کېدونکې تابعې چې هرځای تعریف شوې نه دي

3. هغه تابعې چې محاسبه کېدونکې نه دي

4. هغه جزوي تابعې چې نه هرځای تعریف شوې او نه محاسبه کېدونکې دي

د دې د بېلولو دپاره ښايي داسې لوی مربع رسمول کتور وي چې له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته ټولې جزوي تابعې وښيي؛ بیا پکښې دوه یو پر بل ورغلي سیمې په نښه کړئ، چې یوه د هرځای تعریف شویو تابعو او بله د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو وي. ښه تمرین دے چې وکړئ د نقشبې په هره جوړه شوې سیمه کېنې یو څیز بیانولې شئ که نه.

24.9 محاسبه کېدونکي ستونه

د محاسبه کېدنې مفهوم له محاسبه کېدونکو تابعو څخه محاسبه کېدونکو ستونو ته غځولې شو:

تعریف 24.8. فرض کړئ S د طبیعي عددونو یو سټ دے. S هله او یوازې هله محاسبه کېدونکې دے چې ځانګړونکې تابع χ_S ئې محاسبه کېدونکې وي. په بله وینا، S هله او یوازې هله محاسبه کېدونکې دے چې تابع

$$\chi_S(x) = \begin{cases} 1 & \text{که } x \in S \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

محاسبه کېدونکې وي. همدارنګه، اړیکه $R(x_0, \dots, x_{k-1})$ هله او یوازې هله محاسبه کېدونکې ده چې ځانګړونکې تابع ئې محاسبه کېدونکې وي.

محاسبه کېدونکي ستونه او اړیکې د پرېکړې وړ هم بلل کېږي.

پام وکړئ چې اوس د محاسبه کېدنې څو مفهومونه لرو: د جزوي تابعو، تابعو او ستونو دپاره. دا سره ګډ نه کړئ! هغه تیورینګ ماشین چې جزوي تابع محاسبه کوي، د تابع په هغو نوتونو کېنې ئې وټ راګرځوي چې تابع پرې تعریف شوې وي؛ هغه تیورینګ ماشین چې یو سټ محاسبه کوي، تر دې پرېکړې وروسته چې ننوت په سټ کېنې دے که نه، یا 1 یا 0 راګرځوي.

24.10 په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه

تعریف 24.9. یو سټ هغه وخت په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے چې تش وي یا د یوې محاسبه کېدونکې تابع د قیمتونو سټ وي.

تاریخي یادونه. په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه د دې پرځای په بازګشتي ډول د شمېر وړ ستونه هم بلل کېږي. دا اصلي اصطلاح ده، او نن دواړه نومونه، او ورسره لنډونونه “c.e.” او “r.e.” په عام ډول کارېږي.

باید په دې فکر وکړئ چې تعریف څه مانا لري او اصطلاح ولې مناسبه ده. نظر دا دے چې که S د محاسبه کېدونکې تابع f د قیمتونو سټ وي، نو

$$S = \{f(0), f(1), f(2), \dots\},$$

او ځکه f د S د غړو د “شمېرلو” په توګه ځل کېدے شي. پام وکړئ چې د تعریف له مخې f لازمه نه ده زیاتېدونکې تابع وي، یعنې شمېر نه لازمه نه ده په زیاتېدونکې ترتیب وي. په حقیقت کېنې f لازمه نه ده یو په یو هم وي، یعنې د S په شمېر نه $f(0)$ ، $f(1)$ ، $f(2)$ ، ... کېنې تکرار منل شوے دے. د بېلګې په توګه، ثابته تابع $f(x) = 0$ سټ $\{0\}$ شمېري.

هر محاسبه کېدونکې سټ په محاسبوي ډول د شمېر ور دے. د دې د لیدلو دپاره فرض کړئ S محاسبه کېدونکې دے. که S تش وي، نو د تعریف له مخې په محاسبوي ډول د شمېر ور دے. که نه، a د S هر یو غړی وي. تابع f داسې تعریف کړئ:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{که } \chi_S(x) = 1 \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

بیا f محاسبه کېدونکې تابع ده، او S د f د قیمتونو سټ دے.

24.11 په محاسبوي ډول د شمېر ور ستونو معادل تعریفونه

د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-024) د سرچینې په اوږده سرلیک کېنې د تعریفونو د انگرېزي نوم املا دوه توري زیات لرل، او لاندې تشرېح کېنې د “هغه ننوتونه چې محاسبه پرې درېږي” پر ځای دوه سرپلونه سره لښتي وو. په پښتو متن کېنې دواړه څرګندې سمونیزې تېروتنې سمې شوې دي؛ هېڅ فني دعوه یا لښه نه ده بدله شوې.

لاندې قضیه د دې خبرې څو مهم معادل بیانونه راکوي چې یو سټ په محاسبوي ډول د شمېر ور وي.

قضیه 24.10. فرض کړئ S د طبیعي عددونو یو سټ دے. بیا لاندې خبرې سره معادلې دي:

1. S ، په محاسبوي ډول د شمېر ور دے.

2. S ، د یوې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د قیمتونو سټ دے.

3. S ، تش دے یا د یوې بنسټیزې بازګشتي تابع د قیمتونو سټ دے.

4. S ، د یوې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د تعریف ساحه ده.

لومړۍ درې فقرې وایي چې هر نانش په محاسبوي ډول د شمېر ور سټ په معادل ډول د یوې محاسبه کېدونکې تابع، جزوي محاسبه کېدونکې تابع، یا بنسټیزې بازګشتي تابع په وسیله شمېرل کېدای شي. څلورمه فقره وایي چې که S په محاسبوي ډول د شمېر ور وي، نو د کوم شاخص e دپاره

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

په بله وینا، S د هغو ننوتونو سټ دے چې د φ_e محاسبه پرې درېږي. له همدې کبله په محاسبوي ډول د شمېر ور ستونه کله ناکله نیمه د پرېکړې وړ بلل کېږي: که یو عدد په سټ کېنې وي، بالاخره “هو” تر لاسه کوي؛ خو که پکښې نه وي، هېڅکله “نه” نه تر لاسه کوي!

ثبوت. څرنګه چې هره بنسټیزه بازګشتي تابع محاسبه کېدونکې ده او هره محاسبه کېدونکې تابع جزوي محاسبه کېدونکې ده، 3 پر 1 دلالت کوي او 1 پر 2 دلالت کوي. (پام وکړئ چې که S تش وي، نو S د هغې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د قیمتونو سټ دے چې هېڅ ځای تعریف شوې نه ده.) که وښیو چې 2 پر 3 دلالت کوي، لومړۍ درې فقرې مو سره معادلې ښودلې دي.

نو فرض کړئ S د جزوي محاسبه کېدونکې تابع φ_e د قیمتونو سټ دے. که S تش وي، کار بشپړ دے. که نه، a د S هر یو غړی وي. د کليني د نورمال شکل د قضیې له مخې لیکلې شو:

$$\varphi_e(x) = U(\mu s T(e, x, s)).$$

په ځانګړي ډول، $\varphi_e(x) \downarrow$ او $y =$ هله او یوازې هله چې داسې s وي چې $T(e, x, s) = y$ او $U(s) = y$ وي. تابع $f(z)$ داسې تعریف کړئ:

$$f(z) = \begin{cases} U((z)_1) & \text{که } T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

بیا f بنسټیزه بازګشتي ده، ځکه T او U داسې دي. د تیورینګ ماشینونو په ژبه، که z داسې جوړه $\langle (z)_0, (z)_1 \rangle$ کودوي چې $(z)_1$ د ماشین M_e پر ننوت $(z)_0$ یوه درېدلې محاسبه وي، نو f د محاسبې وت راګرځوي، که نه، a راګرځوي.

باید وښیو چې S د f د قیمتونو سټ دے؛ یعنې د هر طبیعي عدد y دپاره، $y \in S$ هله او یوازې هله چې د f په قیمتونو کېنې وي. په مخکین لوري کېنې فرض کړئ $y \in S$ بیا y د φ_e په قیمتونو کېنې دے، نو د x ځینو s دپاره $T(e, x, s)$ پوره کېږي او $U(s) = y$ ده. خو بیا $y = f(\langle x, s \rangle)$ بل پلو، فرض کړئ y د f په قیمتونو کېنې دے. بیا یا $y = a$ ، یا د کوم z دپاره $U((z)_1) = y$ او $T(e, (z)_0, (z)_1)$ دي. څرنګه چې په وروستي حالت کېنې $y \downarrow = \varphi_e((z)_0)$ ده، په دواړو حالونو کېنې y په S کېنې دے. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-025) سرچینې په وروستي نتیجه کېنې یو نا تړلې متغیر کارولے و، که څه هم د شاهد کود لومړۍ برخه د محاسبې ننوت ټاکنې. دلته د نورمال شکل له مخکینې جملې سره سم د شاهد له کود څخه اخیستل شوی ننوت لیکل شوی دے.

(نښه $y \downarrow = \varphi_e(x)$ دا مانا لري چې “ $\varphi_e(x)$ تعریف شوې او له y سره برابره ده.” موږ په همدې اسانتیا $\varphi_e(x) = y$ هم کارولے شو؛ خو زیات غښته کله ناکله دا رایادوي چې له یوې جزوي تابع سره کار لرو.)

د 24.10 د ثبوت د بشپړولو دپاره دومره بسنه کوي چې وښیو 1 او 4 سره معادل دي. لومړۍ ښیو چې 1 پر 4 دلالت کوي. که ورکړل شوی سټ T وي، د هغې جزوي محاسبه کېدونکې تابع د تعریف ساحه ده چې هېڅ ځای تعریف شوې نه ده. اوس د ناټش حالت دپاره فرض کړئ S د یوې محاسبه کېدونکې تابع f د قیمتونو سټ دے، یعنې

$$S = \{y : f(x) = y \text{ د کوم } x \text{ دپاره،}\}$$

وټاکئ:

$$g(y) = \mu x (f(x) = y).$$

بیا g جزوي محاسبه کېدونکې تابع ده، او $g(y)$ هله او یوازې هله تعریف شوې ده چې د کوم x دپاره $f(x) = y$ وي. په بله وینا، د g د تعریف ساحه د f د قیمتونو سټ دے. د تیورینگ ماشینونو په ژبه: که تیورینگ ماشین F د S غړې شمېرې، نو تیورینگ ماشین G داسې وټاکئ چې په S کېنې د ورکړل شوي غړي د موندلو دپاره د F په وتونو کېنې پلټنه وکړي؛ که ئې ومومي ودرېږي، او که ئې نه مومي د تل دپاره پلټنې ته دوام ورکړي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-026) سرچینې په دې دلالت کېنې سمدستي فرض کړې وه چې ورکړل شوی سټ د یوې هرځای تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع د قیمتونو سټ دے؛ دا د T سټ دپاره ناشوني دي، که څه هم تعریف T سټ په څرګند ډول c.e. مني. دلته T حالت لومړۍ د هېڅ ځای تعریف شوې جزوي تابع په وسیله حل شوی، او د تابع د قیمتونو استدلال ناټش حالت ته کارول شوی دے.

په پای کېنې، د دې د ښودلو دپاره چې 4 پر 1 دلالت کوي، فرض کړئ S د جزوي محاسبه کېدونکې تابع φ_e د تعریف ساحه ده، یعنې

$$S = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

که S T وي، کار بشپړ دے؛ که نه، $a \in S$ هر یو غړی وي. تابع f داسې تعریف کړئ:

$$f(z) = \begin{cases} (z)_0 & \text{که } T(e, (z)_0, (z)_1) \text{ وي} \\ a & \text{که داسې نه وي.} \end{cases}$$

بیا، لکه پورته، عدد x هله او یوازې هله د f په قیمتونو کېنې دے چې $\varphi_e(x) \downarrow$ وي، یعنې هله او یوازې هله چې $x \in S$ وي. د تیورینگ ماشینونو په ژبه: که ماشین M_e د S نیمه پرېکړه کوي، د S غړي د تیورینگ ماشینونو د ټولو ممکنه محاسبو په ګډو او د درېدلو محاسبو د اړوندو ننوتونو په راګرځولو سره وشمېرئ. □

د 24.10 فقره 4 موږ ته په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو د شمېرلو یوه اسانه لار راکوي: د هر e دپاره W_e د φ_e د تعریف ساحه وټاکئ، یعنې

$$W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

بیا که A هر په محاسبوي ډول د شمېر وړ سټ وي، د کوم e دپاره $A = W_e$ وي.

لاندې قضیه په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو یوه بله ځانګړنه راکوي.

قضیه 24.11. سټ S هله او یوازې هله په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے چې داسې محاسبه کېدونکې اړیکه $R(x, y)$ وي چې

$$S = \{x : \exists y R(x, y)\}.$$

ثبوت. په مخکنی لوري کښې فرض کړئ S په محاسوبي ډول د شمېر وړ دے. نو د کوم e دپاره $S = W_e$ د e د همدې قیمت دپاره S داسې لیکلے شو:

$$S = \{x : \exists y T(e, x, y)\}.$$

په بېرته لوري کښې فرض کړئ $S = \{x : \exists y R(x, y)\}$ تابع f داسې تعريف کړئ:

$$f(x) \simeq \mu y R(x, y).$$

□

بيا f جزوي محاسبه کېدونکې ده، او S د f د تعريف ساحه ده.

24.12 محاسبه نه کېدونکي ستونزه شته

پورته مو وليدل چې هر محاسبه کېدونکې سټ په محاسوبي ډول د شمېر وړ دے. ايا د دې معکوس هم رښتيا دے؟ لاندې قضيه ښيي چې په عمومي ډول داسې نه ده.

قضيه 24.12. فرض کړئ K_0 سټ $\{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\}$ دے. بيا K_0 په محاسوبي ډول د شمېر وړ دے، خو محاسبه کېدونکې نه دے.

ثبوت. د دې د ليدلو دپاره چې K_0 په محاسوبي ډول د شمېر وړ دے، پام وکړئ چې دا د هغې تابع f د تعريف ساحه ده چې داسې تعريفېږي:

$$f(z) = \mu y (\text{len}(z) = 2 \wedge T((z)_0, (z)_1, y)).$$

ځکه که $\varphi_e(x)$ تعريف شوې وي، $f(\langle e, x \rangle)$ د درېدلې محاسبې يوه لړۍ مومي، که $\varphi_e(x)$ تعريف شوې نه وي، نو $f(\langle e, x \rangle)$ هم تعريف شوې نه ده، او که z ان يوه جوړه هم نه کوډوي، نو $f(z)$ بيا هم تعريف شوې نه ده.

□

دا حقيقت چې K_0 محاسبه کېدونکې نه دے، هماغه د درېدنې د مسئلې ناپېرېتيا ده، 24.7.

سټ K_0 د هغو جوړو $\langle e, x \rangle$ سټ دے چې $\varphi_e(x) \downarrow$ وي، يعنې $\langle e, x \rangle \in K_0$ هله او يوازې هله چې φ_e پر ننوت x تعريف شوې وي (ودرېږي)، نو دې ته “د درېدنې سټ” هم ويل کېږي. سټ $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ د “پر خپل ځان د درېدنې سټ” دے. دا ډېر ځله د يوې معياري ناپېرېتيا کېدونکې بېلګې په توګه کارول کېږي.

قضيه 24.13. پر خپل ځان د درېدنې سټ $K = \{e : \varphi_e(e) \downarrow\}$ د $c.e.$ دے خو د پرېکړې وړ نه دے.

ثبوت. فرض کړئ K د پرېکړې وړ دے، يعنې ځانګړونکې تابع χ_K ئې محاسبه کېدونکې ده. وټاکئ:

$$d(e) = \begin{cases} 1 & \text{که } \chi_K(e) = 0 \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

فرض کړئ k د d شاخص دے، يعنې $d \simeq \varphi_k$ بيا $d(k) \simeq \varphi_k(k)$ ده. دا له هغه حقيقت سره تناقض لري چې $d(k) \downarrow$ هله او يوازې هله چې $\varphi_k(k) \uparrow$ وي، او دا د d له تعريفه راځي.

□

K د تابع $f(x) = \mu y T(x, x, y)$ د تعريف ساحه ده او ځکه $c.e.$ دے.

24.13 په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونه د اتحاد او اشتراک لاندې تړلي دي

لاندې قضیه د محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو د ټولګي ځینې تړلتيایي خاصیتونه راکوي.

قضیه 24.14. فرض کړئ A او B په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي. بیا $A \cap B$ او $A \cup B$ هم په محاسبوي ډول د شمېر وړ دي.

ثبوت. 24.10 اجازه راکوي چې په محاسبوي ډول د شمېر وړ ستونو بېلابېلې ځانګړنې وکاروو. د روښانتیا دپاره به څو بېل ثبوتونه وړاندې کړو.

د لومړي ثبوت دپاره فرض کړئ A د محاسبه کېدونکې تابع f په وسیله شمېرل کېږي، او B د محاسبه کېدونکې تابع g په وسیله شمېرل کېږي. وټاکئ:

$$h(x) = \mu y (f(y) = x \vee g(y) = x) \text{ او } j(x) = \mu y (f((y)_0) = x \wedge g((y)_1) = x).$$

بیا $A \cup B$ د h د تعریف ساحه، او $A \cap B$ د j د تعریف ساحه ده.

په محاسبوي ژبه کېنې خبره داسې ده: که داسې کړنلارې راکړل شوې وي چې A او B شمېري، نو دا چې یو غږ x په $A \cup B$ کېنې دے که نه، په دواړو شمېرو کېنې د x په لټولو نیمه پرېکړه کولې شو، او دا چې x په $A \cap B$ کېنې دے که نه، په دواړو شمېرو کېنې په یو وخت د x په لټولو نیمه پرېکړه کولې شو.

د دویم ثبوت دپاره بیا فرض کړئ چې A د f او B د g په وسیله شمېرل کېږي. وټاکئ:

$$k(x) = \begin{cases} f(x/2) & \text{که } x \text{ جفت وي} \\ g((x-1)/2) & \text{که } x \text{ طاق وي} \end{cases}$$

بیا k ، $A \cup B$ شمېري؛ نظر دا دے چې k په نوبت د f او g شمېرنې کاروي. د $A \cap B$ شمېرل لږ ستونزمن دي. که $A \cap B$ تش وي، په څرګند ډول په محاسبوي ډول د شمېر وړ دے. که نه، c د $A \cap B$ هر یو غږ وي، او l داسې تعریف کړئ:

$$l(x) = \begin{cases} f((x)_0) & \text{که } f((x)_0) = g((x)_1) \text{ وي} \\ c & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

په محاسبوي ژبه کېنې l د f او g د شمېرو د غږو پر جوړو تېرېږي او هره برابره جوړه چې ومومي، وټاکئ راکړځوي؛ که جوړه برابره نه وي، ثابت غږ c راکړځوي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-027) سرچینې دې وروستي بدیل ته “د ثابت قیمت په راکړځولو تم کېدل” ویلي و، خو تابع په هر نوبت یو قیمت راکړځوي او محاسبه یې بې پایلې نه پاتې کېږي. دلته دا د سم ثابت شاتګ په توګه بیان شوی، په همدې برخه کېنې دوه څرګندې انګړېزې لیکدودیزې تېروتنې هم په طبیعي پښتو کېنې نه دي نقل شوې. فورمولونه نه دي بدل شوي.

د وروستي ثبوت دپاره فرض کړئ A د جزوي تابع $m(x)$ د تعریف ساحه او B د جزوي تابع $n(x)$ د تعریف ساحه ده. بیا $A \cap B$ د جزوي تابع $m(x) + n(x)$ د تعریف ساحه ده.

په محاسبوي ژبه کېنې، که A د هغو قیمتونو سټ وي چې m پرې درېږي او B د هغو قیمتونو سټ وي چې n پرې درېږي، نو $A \cap B$ د هغو قیمتونو سټ دے چې دواړه کړنلارې پرې درېږي.

د درېدنې د قیمتونو د سټ په توګه د $A \cup B$ څرګندول لږ ستونزمن دي، ځکه m او n باید په موازي ډول تقلید شي. د d او m یو شاخص او e د n یو شاخص وي، په بله وینا، $m = \varphi_d$ او $n = \varphi_e$. بیا $A \cup B$ د دې تابع د تعریف ساحه ده:

$$p(x) = \mu y (T(d, x, y) \vee T(e, x, y)).$$

په محاسبوي ژبه کېنې، پر نوبت x تابع p یا m یا n درېدلې محاسبه لټوي، او که یوه یې ومومي درېږي. □

24.14 په محاسبوي ډول د شمېر ور ستونه د متمم لاندې تړلي نه دي

فرض کړئ A په محاسبوي ډول د شمېر ور دے. ایا د A متمم، $\bar{A} = \mathbb{N} \setminus A$ ، همېشه په محاسبوي ډول د شمېر ور هم دے؟ لاندې قضیه او نتیجه ښيي چې ځواب “نه” دے.

قضیه 24.15. فرض کړئ A د طبيعي عددونو هر يو سټ دے. بیا A هله او یوازې هله محاسبه کېدونکې دے چې A او $\bar{A}$ دواړه په محاسبوي ډول د شمېر ور وي.

ثبوت. مخکښ لورے اسان دے: که A محاسبه کېدونکې وي، نو $\bar{A}$ هم محاسبه کېدونکې دے ($\chi_A = 1 - \chi_{\bar{A}}$)، او ځکه دواړه په محاسبوي ډول د شمېر ور دي.

په بل لوري کېنې فرض کړئ A او $\bar{A}$ دواړه په محاسبوي ډول د شمېر ور دي. A د φ_d د تعریف ساحه، او $\bar{A}$ د φ_e د تعریف ساحه وي. تابع h داسې تعریف کړئ:

$$h(x) = \mu s (T(d, x, s) \vee T(e, x, s)).$$

په بله وینا، پر ننوت x تابع h یا د φ_d یا د φ_e یوه درېدلې محاسبه لټوي. اوس که $x \in A$ وي، په لومړي حالت کېنې به بریالی شي، او که $x \in \bar{A}$ وي، په دویم حالت کېنې به بریالی شي. نو h هرځای تعریف شوې محاسبه کېدونکې تابع ده. خو اوس د هر x دپاره $x \in A$ هله او یوازې هله چې $T(d, x, h(x))$ وي، یعنې که φ_d پر همدې ننوت تعریف شوې وي. څرنګه چې $T(d, x, h(x))$ محاسبه کېدونکې اړیکه ده، نو A محاسبه کېدونکې دے. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-028) سرچینې په وروستی دوه اړخیزه نتیجه کېنې د متمم شاخص کارول، حال دا چې سمدي مخکښې ئې اصلي سټ د لومړي شاخص د تعریف ساحه ټاکلې ده. دلته هماغه لومړۍ شاخص کارول شو، خو ځانګړونکې ازموینه د اصلي سټ غړیتوب وښيي. □

په غیر رسمي محاسبوي ژبه کېنې خبره لا اسانه پوهېدل کېږي: د A د پرېکړې دپاره پر ننوت x د φ_d او φ_e درېدلې محاسبې ولټوئ. یوه به خاځا ودرېږي، که φ_d ودرېږي، نو x په A کېنې دے، او که نه، x په $\bar{A}$ کېنې دے. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-029) سرچینې په دې غیر رسمي لنډیز کېنې د لومړي ثبوت له شاخصونو سره نه سمون خورونکې نوی، ناتعریف شوی توری راوړے، او بیا ئې د متمم شاخص درېدنه د اصلي سټ له غړیتوب سره تړله. دلته د ثبوت هماغه دوه ټاکلي شاخصونه او سمه غړیتوبې ځانګه ساتل شوې ده.

نتیجه 24.16. $\bar{K}_0$ په محاسبوي ډول د شمېر ور نه دے.

ثبوت. موږ پوهېږو چې K_0 په محاسبوي ډول د شمېر ور دے، خو محاسبه کېدونکې نه دے. که $\bar{K}_0$ په محاسبوي ډول د شمېر ور وای، نو د 24.15 له مخې به K_0 محاسبه کېدونکې و، چې له 24.12 سره تناقض دے. □

24.15 راکېدنه

اوس پوهېږو چې لږ تر لږه یو سټ، K_0 ، شته چې په محاسبوي ډول د شمېر ور دے خو محاسبه کېدونکې نه دے. باید څرګنده وي چې نور هم شته. د راکېدنې طریقه یوه پیاوړې لار راکوي چې د نورو ستونو دا خاصیتونه، بې له دې چې هر ځل بنسټیزو اصولو ته ستانه شو، ثابت کړو.

په عمومي ډول، له سټ A څخه سټ B ته یوه “راکونه” داسې طریقه ده چې د دې پوښتنې ځوابونه چې غږي په B کېنې دي که نه، د دې پوښتنې په ځوابونو بدلوي چې غږي په A کېنې دي که نه. موږ به د “ډېر-پر-یو راکېدنې” په نوم مفهوم ته پام وکړو، خو د بېلابېلو خاصیتونو لرونکي د راکېدنې ډېر نور مفهومونه هم شته. د راکېدنې مفهومونه د محاسبوي پېچلتیا په څېړنه کېنې هم مرکزي دي، هلته د اغېزمنتیا مسئلې هم باید په پام کېنې ونيول شي. د بېلګې په توګه، یو سټ هغه وخت “اېن-پي-بشپړ” بلل کېږي چې په اېن-پي کېنې وي او د اېن-پي هره مسئله ورته راکول کېدے شي، دلته د لاندې مفهوم ته ورته راکونه کارېږي، خو دا زیات شرط لري چې راکونه په ځوحدي وخت کېنې محاسبه شي.

موږ د راګونې مفهوم لا له مخکې په ضمني ډول کارولې دے۔ سټ K داسې تعريف کړئ:

$$K = \{x : \varphi_x(x) \downarrow\},$$

يعني $K = \{x : x \in W_x\}$ ۔ زموږ هغه ثبوت چې د درېدې مسئله نه حل کېږي (24.7)، ترټولو ښه دا ښيي چې K محاسبه کېدونکې نه دے۔ راڼاد کړئ چې K_0 دا سټ دے:

$$K_0 = \{\langle e, x \rangle : \varphi_e(x) \downarrow\},$$

يعني $K_0 = \{\langle e, x \rangle : x \in W_e\}$ ۔ د K د نه محاسبه کېدنې هر ثبوت د K_0 نه محاسبه کېدنې ته غځول اسان دي: که K_0 محاسبه کېدونکې وای، نو دا موږ پرېکړه کولې شوه چې غږې x په K کېنې دے که نه، يوازې په دې پوښتنې سره چې جوړه $\langle x, x \rangle$ په K_0 کېنې ده که نه۔ هغه تابع f چې x په $\langle x, x \rangle$ بدلوي، له K څخه K_0 ته د راګونې يوه بېلګه ده۔ د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-030) سرچينې د دې بحث په پيل کېنې د “راګونې مفهوم” نوم دوه ځله پرله پسې ليکلې او د درېدې مسئله ټي د “نه حل کېدونکې” پر ځای د يوې ليکدوديزې تېروتنې له امله بله کلمه بللې وه۔ په پښتو کېنې دواړه څرګندې تحریرې تېروتنې نه دي نقل شوې۔ د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-031) د درېدې د جوړو دويم سټ-جوړونکي بيان په سرچينه کېنې د جوړې دوه مختصات اړولي وو، خو شرط ټي بيا هم دويم عدد د لومړي عدد د شاخص په توګه کاراوه۔ دلته جوړه د لومړي، کره تعريف په ترتيب ساتل شوې ده؛ ورپسې قطري راګونه هم همدغه ترتيب کاروي۔

تعريف 24.17. فرض کړئ A او B د طبيعي عددونو ستونه دي۔ محاسبه کېدونکې تابع $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ له A څخه B ته ډېر-پړيو راګونه ده، هله او يوازې هله چې د هر طبيعي عدد x دپاره

$$x \in A \quad f(x) \in B.$$

که داسې راګونه f شته، وايو A, B ته ډېر-پړيو راګېدونکې دے، چې $A \leq_m B$ ليکل کېږي۔ که A, B ته ډېر-پړيو راګېدونکې وي او برعکس هم، نو A او B ډېر-پړيو معادل بلل کېږي، چې $A \equiv_m B$ ليکل کېږي۔

که د پورته تعريف تابع f اتفاقاً يو په يو وي، نو A, B ته يو-پړيو راګېدونکې بلل کېږي۔ لاندې ډېرې راګونې دا پياوړې شرط پوره کوي، خو موږ به دا حقيقت نه کاروو۔

دا رښتيا ده، خو هېڅ څرګنده نه ده، چې يو-پړيو راګېدنه په رښتيا د ډېر-پړيو راګېدنې په پرتله پياوړې شرط دے۔ په بله وينا، داسې نامتناهي ستونه A او B شته چې A, B ته ډېر-پړيو راګېدونکې وي خو B ته يو-پړيو راګېدونکې نه وي۔

24.16 د راګېدنې خاصيتونه

که A, B ته راګېږي، $A \leq_m B$ ليکو۔ دا ښه وړاندیز کوي چې که $A \leq_m B$ وي، نو A له B څخه “زيات ستونزمن نه دے”، او $A \leq_m B$ “هومره يا ترې زيات ستونزمن دے”؛ او $A \leq_m B$ د عددونو د معمولي $\leq$ په شان ستونه (يا د پرېکړې مسئلې) د پېچلتيا له مخې مرتبوي۔ لاندې دوه قضیې د دې شهود ملاتړ کوي۔ لومړۍ وايي چې $A \leq_m B$ انتقالي ده۔ د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-032) د سرچينې د دې وروستۍ جملې په دوو کلمو کېنې څرګندې ليکدوديزې تېروتنې وې، په طبيعي پښتو کېنې سمه موخه شوې جمله ژباړل شوې ده۔

قضيه 24.18. که $A \leq_m B$ او $B \leq_m C$ وي، نو $A \leq_m C$ ۔

ثبوت. له A څخه B ته د راګونې او له B څخه C ته د راګونې ترکيب له A څخه C ته راګونه ورکوي۔ □

تمرین 24.19. په دې ښودلو ثابت کړئ چې که f او g په ترتيب سره له A څخه B او له B څخه C ته ډېر-پړيو راګونې وي، نو $f \circ g$ له A څخه C ته ډېر-پړيو راګونه ده۔

قضيه 24.20. فرض کړئ A او B هر ستونه دي، او $A \leq_m B$ ۔

1. که B په محاسوبي ډول د شمېر وړ وي، نو A هم داسې دے.

2. که B محاسبه کېدونکې وي، نو A هم داسې دے.

ثبوت. f له A څخه B ته ډېر-پړ-یو را کونه وي. د لومړۍ دعوې دپاره بس دا وازموئ چې که B د جزوي تابع g د تعريف ساحه وي، نو A د $g \circ f$ د تعريف ساحه ده:

$$x \in A \text{ هله او يوازې هله چې } f(x) \in B$$

$$. \downarrow g(f(x)) \text{ هله او يوازې هله چې}$$

د دويمې دعوې دپاره راياد کړئ چې که B محاسبه کېدونکې وي، نو B او $\bar{B}$ په محاسوبي ډول د شمېر وړ دي (24.15). دا ازمویل ستونزمن نه دي چې f له $\bar{A}$ څخه $\bar{B}$ ته هم ډېر-پړ-یو را کونه ده؛ نو د دې ثبوت د لومړۍ برخې له مخې A او $\bar{A}$ دواړه په محاسوبي ډول د شمېر وړ دي. ځکه A هم د 24.15 له مخې محاسبه کېدونکې دے. (په بدیل ډول، کله شئ چې $\chi_A = \chi_B \circ f$ ؛ نو که χ_B محاسبه کېدونکې وي، χ_A هم محاسبه کېدونکې ده.) $\square$

تمرین 24.21. فرض کړئ f له A څخه B ته ډېر-پړ-یو را کونه ده. وښئ چې f له $\bar{A}$ څخه $\bar{B}$ ته هم ډېر-پړ-یو را کونه ده.

تمرین 24.22. وښئ چې که $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ډېر-پړ-یو را کونه وي، نو $\chi_A = \chi_B \circ f$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-033) سرچينې دلته د را کونې تابع يوازې د لومړي سټ له غړو څخه دويم سټ ته تايپ کړې وه، حال دا چې تعريف ئې د ټولو طبيعي عددونو دپاره تابع غواړي او د سټ غړيتوب د دوه اړخيز شرط په وسيله ساتي. دلته د تعريف سمه طبيعي-عددونو تعريف ساحه او هم ساحه کارول شوې ده.

د تيورينګ را کېدنې په نوم د را کېدنې يو ډېر عمومي مفهوم په نورو سياقونو کېني کتور دے، په ځانګړي ډول د نا پېر کېتيا د پايلو په ثبوت کېني. پام وکړئ چې د 24.16 له مخې د K_0 متمم K_0 ته نه را کېږي، ځکه په محاسوبي ډول د شمېر وړ نه دے. خو په شهودي ډول، که د K_0 په اړه د پوښتنو ځوابونه مو پېژندل، د هغې د متمم په اړه د پوښتنو ځوابونه به مو هم پېژندل. سټ A هغه وخت B ته د تيورينګ له مخې را کېدونکې بلل کېږي چې په A کېني د پوښتنو ځوابونه د داسې محاسبه کېدونکې کړنلارې په وسيله وټاکل شي چې د B په اړه پوښتنې کولې شي. دا له ډېر-پړ-یو را کېدنې زيات ازاد دے، ځکه هلته (1) يوازې د B په اړه يوه پوښتنه کولې شئ، او (2) د “هو” ځواب بايد د A د پوښتنې په “هو” ځواب، او همداسې “نه” په “نه”، بدل شي. بيا هم که A ، B ته د تيورينګ له مخې را کېدونکې وي او B محاسبه کېدونکې وي، نو A هم محاسبه کېدونکې دے (که څه هم، لکه وليدل مو، ورته خبره د محاسوبي شمېر وړتيا دپاره نه پوره کېږي).

بايد د را کېدنې د هغو بېلابېلو مفهومونو په اړه فکر وکړئ چې بحث مو پرې وکړ، او توپيرونه ئې درک کړئ. خو په دې څپرکي کېني به يوازې له ډېر-پړ-یو را کېدنې سره کار کوو. په ضمني ډول، په تېر پراګراف کېني د را کېدنې دواړه ډولونه په محاسوبي پېچلتيا کېني ورته بڼې لري، خو دا زيات شرط ورسره وي چې تيورينګ ماشينونه په څوحدي وخت کېني وچلېږي: د ډېر-پړ-یو را کېدنې پېچلتيايي بڼه کارپ را کېدنه، او د تيورينګ را کېدنې پېچلتيايي بڼه کوک را کېدنه بلل کېږي.

24.17 بشپړ په محاسوبي ډول د شمېر وړ ستونه

تعريف 24.23. سټ A (د ډېر-پړ-یو را کېدنې لاندې) يو بشپړ په محاسوبي ډول د شمېر وړ سټ دے، که

1. A په محاسوبي ډول د شمېر وړ وي، او

2. د هر بل په محاسوبي ډول د شمېر وړ سټ B دپاره $B \leq_m A$ وي.

په بله وینا، بشپړ په محاسوبي ډول د شمېر وړ ستونزه د ټولو ممکنه په محاسوبي ډول د شمېر وړ ستونزو “تر ټولو ستونزمن” دي. دوي اجازه راکوي چې د هر په محاسوبي ډول د شمېر وړ ست په اړه پوښتنو ته ځواب ووايو.

قضيه 24.24. K, K_0 او K_1 ټول بشپړ په محاسوبي ډول د شمېر وړ ستونزه دي.

ثبوت. د دې د لیدلو دپاره چې K_0 بشپړ دے، B هر په محاسوبي ډول د شمېر وړ ست وي. نو د کوم شاخص e دپاره

$$B = W_e = \{x : \varphi_e(x) \downarrow\}.$$

f هغه تابع وي چې $f(x) = \langle e, x \rangle$ بيا د هر طبيعي عدد $x \in B$ دپاره x هله او يوازې هله چې $f(x) \in K_0$ وي. په بله وینا، f, B, K_0 ته راکوي.

د دې د لیدلو دپاره چې K_1 بشپړ دے، پام وکړئ چې د 24.26 په ثبوت کېنې مو K_0 ورته راکم کړے و. نو د 24.18 له مخې هر په محاسوبي ډول د شمېر وړ ست K_1 ته هم راکول کېدے شي.

K_0 هم په ډېره ورته طريقه K ته راکول کېدے شي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-034) د سرچينې وروستۍ جمله د راکونې لورے سرچپه لیکلے و: له قطري سب څخه د جوړو سب ته راکونه د لومړي سب بشپړتيا نه ثابتوي. دلته د جوړو بشپړ سب قطري سب ته راکېږي، خو د انتقال له مخې هر c.e. سب هم قطري سب ته راکم شي. □

تمرین 24.25. له K څخه K_0 ته يوه راکونه ورکړئ.

نو څرکنده شوه چې تر اوسه مو د په محاسوبي ډول د شمېر وړ ستونزو هره کلي بېلگه يا محاسبه کېدونکې ده، يا بشپړه. دا بايد عجيبه وېرېږي! ايا داسې په محاسوبي ډول د شمېر وړ ستونزه شته چې نه محاسبه کېدونکې او نه بشپړ وي؟ ځواب هو دے، خو دا تر هغه وخته نه وه ثابته شوې چې د ۱۹۵۰ مو کلونو په منځ کېنې فريډبرک او موچنيک په خپلواکه توگه ثابته کړه.

24.18 د راکېدنې يوه بېلگه

راځئ د 24.20 يوه کارونه وگورو.

قضيه 24.26. فرض کړئ

$$K_1 = \{e : \varphi_e(0) \downarrow\}.$$

بيا K_1 په محاسوبي ډول د شمېر وړ دے، خو محاسبه کېدونکې نه دے.

ثبوت. څرنکه چې $K_1 = \{e : \exists s T(e, 0, s)\}$ ، نو د 24.11 له مخې K_1 په محاسوبي ډول د شمېر وړ دے.

د دې د ښودلو دپاره چې K_1 محاسبه کېدونکې نه دے، راځئ وښيو چې K_0 ورته راکېدونکې دے.

دا لږ ستونزمن دے، ځکه د K_1 په کارولو سره يوازې د هغو محاسبو په اړه پوښتنې کولے شو چې له ځانگړي ننوت، 0، څخه پيلېږي. فرض کړئ يو هوښيار ملگرے لرئ چې د دې ډول پوښتنو ځوابونه درکولے شي (داسې ملگري د “اورا کلونو” په نوم پېژندل کېږي). بيا فرض کړئ څوک درته راشي او وپوښتي چې $\langle e, x \rangle$ په K_0 کېنې دے که نه، يعنې ماشين e پر ننوت x درېږي که نه. يو کار دا کولے شي چې بل ماشين e_x جوړ کړئ؛ دا ماشين د هر ننوت دپاره هغه ننوت له پامه غورځوي او پر ځاي يې e پر ننوت x چلوي. نو څرکنده ده چې د ماشين e پر ننوت x درېدل له دې پوښتنې سره معادل دي چې ماشين e_x پر ننوت 0 (يا هر بل ننوت) درېږي که نه. بيا له خپل ملگري وپوښتي چې دا نوی ماشين e_x پر ننوت 0 درېږي که نه؛ بدلې شوې پوښتنې ته د ملگري ځواب د اصلي پوښتنې ځواب درکوي. دا له K_0 څخه K_1 ته موخه شوې راکونه راکوي.

د نړيوالې جزوي محاسبه کېدونکې تابع په کارولو سره، f هغه درې ځاييزه تابع وي چې داسې تعريفېږي:

$$f(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

پام وکړئ چې f خپل درېیم ننوت یېځي له پامه غورځوي. داسې شاخص e وټاکئ چې $f = \varphi_e^3$ وي؛ نو لرو:

$$\varphi_e^3(x, y, z) \simeq \varphi_x(y).$$

د $n-m-s$ قضیې له مخې داسې تابع $s(e, x, y)$ شته چې د هر z دپاره

$$\begin{aligned}\varphi_{s(e, x, y)}(z) &\simeq \varphi_e^3(x, y, z) \\ &\simeq \varphi_x(y).\end{aligned}$$

د پورته غیر رسمي استدلال په ژبه، $s(e, x, y)$ د هغه ماشین شاخص دے چې د هر ننوت z دپاره هغه ننوت له پامه غورځوي او $\varphi_x(y)$ محاسبه کوي.

په ځانګړي ډول، لرو:

$$\varphi_{s(e, x, y)}(0) \downarrow \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad \varphi_x(y) \downarrow.$$

په بله وینا، $\langle x, y \rangle \in K_0$ هله او یوازې هله چې $s(e, x, y) \in K_1$ وي. نو هغه تابع g چې داسې تعریفېږي:

$$g(w) = s(e, (w)_0, (w)_1)$$

□

له K_0 څخه K_1 ته راکونه ده.

24.19 د هرځای تعریف کېدو مسئله ناپېرېکه کېدونکې ده

راځئ د $n-m-s$ قضیې د کارولو یوه بله بېلګه وګورو، خو وښیو چې یو څیز محاسبه کېدونکې نه دے. Tot د هرځای تعریف شویو محاسبه کېدونکو تابعو د شاخصونو سټ وي، یعنې

$$\text{Tot} = \{x : \varphi_x(y) \downarrow, \text{د هر } y \text{ دپاره}\}.$$

قضیه 24.27. Tot محاسبه کېدونکې نه دے.

ثبوت. د دې د لیدلو دپاره چې Tot محاسبه کېدونکې نه دے، دا ښودل بس دي چې K ورته راکېدونکې دے. $h(x, y)$ داسې تعریف کړئ:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } x \in K \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

پام وکړئ چې $h(x, y)$ یېځي پر y تکیه نه لري. دا لیدل باید ستونزمن نه وي چې h جزوي محاسبه کېدونکې ده: پر ننوتونو x, y دا h په دې ډول محاسبه کوو چې لومړۍ تابع φ_x پر ننوت x تقلیدوو؛ که دا محاسبه ودرېږي، $h(x, y)$ ، 0 راکځوي او درېږي. نو $h(x, y)$ یوازې $\text{zero}(\mu s T(x, x, s))$ ده، چېرته چې zero ثابت صفر تابع ده. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-035) سرچینې د دې محاسبې د بیان په پیل کېنې یو ناسمه زیاته کله لرله؛ طبیعي پښتو جمله د هغې له نقلولو پرته ژباړل شوې ده.

د $n-m-s$ قضیې په کارولو داسې بنسټیزه بارکشتي تابع $k(x)$ شته چې د هر x او y دپاره

$$\varphi_{k(x)}(y) = \begin{cases} 0 & \text{که } x \in K \text{ وي} \\ \uparrow & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

نو $\varphi_{k(x)}$ هله هرځای تعریف شوې ده چې $x \in K$ وي، او که نه نو تعریف شوې نه ده. په دې توګه k له K څخه Tot ته راکونه ده. □

په حقیقت کېنې Tot آن په محاسبوي ډول د شمېر وړ هم نه دے؛ پچلتیا ئې د “حسابي پوږیز نظام” په لا لوړه برخه کېنې پرته ده. خو دلته به د دې پیاوړتیا په اړه اندېښنه نه کوو.

24.20 د رایس قضیه

که لږ فکر وکړئ، وبه وینئ چې د Tot ځانګړي جزئیات د 24.27 په ثبوت کېنې هېڅ رول نه لري. موږ $h(x, y)$ داسې جوړ کړې و چې کټ مټ هغه وخت د ثابتې تابع $j(y) = 0$ په شان عمل وکړي چې x په K کېنې وي؛ خو په همدغو حالاتو کېنې مو د هرې بلې جزوي محاسبه کېدونکې تابع په شان هم عمل پرې کول شول. دا مشاهده موږ ته اجازه راکوي یوه لا عمومي قضیه بیان کړو چې، په لنډ ډول، وایي د محاسبه کېدونکو تابعو هېڅ غیرابتنالي خاصیت د پرېکړې وړ نه ده.

په یاد ولرئ چې $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ زموږ د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو معیاري شمېرنه ده.

قضیه 24.28 (د رایس قضیه). C د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو هر یو سټ وي، او $A = \{n : \varphi_n \in C\}$ وي. که A محاسبه کېدونکې وي، نو یا خو C تش ده، یا C د ټولو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو سټ ده.

شاخصي سټ داسې سټ A ده چې که n او m هغه شاخصونه وي چې یوه تابع “محاسبه کوي”، نو یا n او m دواړه په A کېنې دي، یا یو هم نه ده. دا لیدل ستونزمن نه دي چې په قضیه کېنې سټ A دا خاصیت لري. برعکس، که A شاخصي سټ وي او C د هغو تابعو سټ وي چې دا شاخصونه ئې محاسبه کوي، نو $A = \{n : \varphi_n \in C\}$.

په دې اصطلاح کېنې د رایس قضیه له دې وینا سره معادله ده چې هېڅ غیرابتنالي شاخصي سټ د پرېکړې وړ نه ده. د قضیې د مطلب د پوهېدو دپاره ګټوره ده چې د پروګرامونو (مثلاً ستاسو په خوښه پروګرامي ژبه کېنې) او د هغو د محاسبه کوونکو تابعو تر منځ توپیر روښانه کړو. د پروګرامونو (شاخصونو) په اړه، چې نخوي څیزونه دي، یقیناً داسې پوښتنې شته چې محاسبه کېدونکې دي: ایا دا پروګرام تر 150 زیاتې نښې لري؟ ایا تر 22 زیاتې کرښې لري؟ ایا د “ویل” جمله لري؟ ایا رشته “هېلو ورلډ” که هم د “پرنت” جملې د دلیل په توګه راځي؟ د رایس قضیه وایي چې د پروګرام د چلند په اړه هېڅ غیرابتنالي پوښتنه محاسبه کېدونکې نه ده. په دې کېنې دا پوښتنې هم راځي: ایا پروګرام پر ننوت 0 درېږي؟ ایا که هم درېږي؟ ایا که هم جفت عدد راګرځوي؟

د رایس د قضیې ثبوت. فرض کړئ C نه تش ده او نه د ټولو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو سټ، او A په C کېنې د تابعو د شاخصونو سټ وي. وبه ښیو چې که A محاسبه کېدونکې وای، د درېدنې مسئله مو حل کول شو؛ نو A محاسبه کېدونکې نه ده.

بې له دې چې عمومیت له لاسه ورکړو، فرض کول شو چې هغه تابع f چې هېچرته تعریف شوې نه ده، په C کېنې نه ده (که نه، په لاندې استدلال کېنې C او د هغې متمم سره بدل کړئ). g په C کېنې هره تابع وي. نظر دا ده چې که مو A پرېکړه کول شو، د هغو شاخصونو چې f محاسبه کوي او هغو چې g محاسبه کوي، توپیر مو کول شو؛ بیا مو همدغه وړتیا د درېدنې د مسئلې د حل دپاره کارول شو.

طریقه ئې دا ده. د نړیوالو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو په کارولو دا تابع تعریفول شو:

$$h(x, y) \simeq \begin{cases} \text{تعریف شوې نه ده} & \text{که } \varphi_x(x) \uparrow \text{ وي} \\ g(y) & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

د h د محاسبې دپاره لومړی د $\varphi_x(x)$ د محاسبې هڅه کوو؛ که دا محاسبه ودرېږي، بیا $g(y)$ محاسبه کوو؛ او که هغه محاسبه ودرېږي، وټ ئې راګرځوو. په لا صوري ډول لیکل شو:

$$h(x, y) \simeq P_0^2(g(y), \text{Un}(x, x)).$$

چېرته چې $P_0^2(z_0, z_1) = z_0$ هغه 2-ځاییزه پروجکشن تابع ده چې 0-م دلیل راګرځوي، او محاسبه کېدونکې ده.

بیا h د جزوي محاسبه کېدونکو تابعو ترکیب ده، او ښه اړخ کټ مټ هغه وخت تعریف شوی او له $g(y)$ سره برابر ده چې $\text{Un}(x, x)$ او $g(y)$ دواړه تعریف شوي وي.

پام وکړئ چې د هر ثابت x دپاره، که $\varphi_x(x)$ تعریف شوې نه وي، نو $h(x, y)$ د هر y دپاره تعریف شوې نه ده؛ او که $\varphi_x(x)$ تعریف شوې وي، نو $h(x, y) \simeq g(y)$. نو د x د هر ثابت قیمت دپاره $h(x, y)$ یا کټ مټ د f ، یا کټ مټ د g په شان عمل کوي، او دا پرېکړه چې $\varphi_x(x)$ تعریف شوې ده که نه، د دې پرېکړې سره برابره ده چې له دې دوو څخه کوم حالت ده. خو دا بیا د دې پرېکړې سره برابره ده چې $h_x(y) \simeq h(x, y)$ په C کېنې ده که نه، او که A محاسبه کېدونکې وای، همدا کار مو کول شو.

په لا صوري ډول، څرنگه چې h جزوي محاسبه کېدونکې ده، د کوم شاخص e دپاره له تابع φ_e سره برابره ده. د $n-m-s$ قضیې له مخې داسې بنسټیزه بازکشتي تابع s شته چې د هر x دپاره $\varphi_{s(e,x)}(y) \simeq h_x(y)$ وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-043) سرچینې دلته د ممکنه ناعریفو جزوي تابعو د ارزښتونو تر منځ د عادي برابری نښه کارولې وه؛ د پارامیټري کولو د قضیې له خپل بیان سره سم دلته د جزوي برابری نښه ساتل شوې ده. اوس د هر x دپاره لرو چې که $\downarrow \varphi_x(x)$ وي، نو $\varphi_{s(e,x)}$ هماغه تابع ده چې g ده، او ځکه $s(e,x)$ په A کېږي دے. له بلې خوا، که $\uparrow \varphi_x(x)$ وي، نو $\varphi_{s(e,x)}$ هماغه تابع ده چې f ده، او ځکه $s(e,x)$ په A کېږي نه دے. په بله وینا، د هر x دپاره $x \in K$ هله او یوازې هله چې $s(e,x) \in A$ وي. که A محاسبه کېدونکې وای، K هم محاسبه کېدونکې و، چې تناقض دے. نو A محاسبه کېدونکې نه دے. $\square$

د رایس قضیه ډېره پیاوړې ده. لاندې سمدستي نتیجه ئې د کارونې څو بېلګې ښيي.

نتیجه 24.29. لاندې ستونه د پرېکړې وړ نه دي.

$$1. \{17 \mid \varphi_x \text{ په قیمتونو کېږي دے} : x\}$$

$$2. \{\varphi_x \text{ ثابت ده} : x\}$$

$$3. \{\varphi_x \text{ هرځای تعریف شوې ده} : x\}$$

$$4. \{\text{هر کله چې } y' < y, \downarrow \varphi_x(y) \text{ او } \downarrow \varphi_x(y') \text{ نو } \varphi_x(y) < \varphi_x(y') : x\}$$

$\square$

ثبوت. دا ټول غیرایډیالي شاخصي ستونه دي.

24.21 د ثابت ټکي قضیه

راځئ یو ځل بیا د درېدنې مسئله وګورو. د لنډمهالې ښې په توګه $\neg \varphi_x(y)$ د $\langle x, y \rangle$ دپاره ولیکو؛ دا د $\varphi_x(y)$ د قیمت د یو “نوم” استازیتوب وکړی. په دې نښه د درېدنې د مسئلې د ناپرېکړتیا یو ثبوت بیا بیانولې شو.

پوښتنه: ایا داسې محاسبه کېدونکې تابع h شته چې لاندې خاصیت ولري؟ د هر x او y دپاره

$$h(\neg \varphi_x(y)) = \begin{cases} 1 & \text{که } \downarrow \varphi_x(y) \text{ وي} \\ 0 & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

ځواب: نه، که نه، دا جزوي تابع

$$g(x) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } h(\neg \varphi_x(x)) = 0 \text{ وي} \\ \text{تعریف شوې نه ده} & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

به محاسبه کېدونکې وه، او ځکه به ئې کوم شاخص e درلود. خو بیا لرو:

$$\varphi_e(e) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } h(\neg \varphi_e(e)) = 0 \text{ وي} \\ \text{تعریف شوې نه ده} & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

چې په دې صورت کېږي $\varphi_e(e)$ هله او یوازې هله تعریف شوې ده چې تعریف شوې نه وي، او دا تناقض دے.

اوس هغه معادله وګورئ چې φ_e لري. دلته په یوه معنا د ځان-مراجعي یوه بېلګه شته: موږ د $\varphi_e(e)$ قیمت داسې برابر کړی چې په یوه ځانګړې طریقه پر $\neg \varphi_e(e)$ تکیه وکړي. د ثابت ټکي قضیه وایي چې دا کار په عمومي ډول کولای شو—یوازې د تناقضونو د ثابتولو دپاره نه.

24.30 د ثابت ټکي د قضیې د بیانولو دوه معادل شکلونه راګوي. د منطقي نظره، د دې بیانونو معادلتوب له دې راځي چې دواړه رښتیا دي؛ خو زموږ اصلي موخه دا ده چې هر یو په نېغه توګه له بل څخه راځي، نو د همدې قضیې د بدیلو بیانونو په توګه اخیستل کېدای شي.

لم 24.30. لاندې بیانونه معادل دي:

1. د هرې جزوي محاسبه کېدونکې تابع $g(x, y)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

2. د هرې محاسبه کېدونکې تابع $f(x)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره

$$\varphi_e(y) \simeq \varphi_{f(e)}(y).$$

ثبوت. (1) $\Rightarrow$ (2): ورکړې f ته g داسې تعريف کړئ چې $g(x, y) \simeq \text{Un}(f(x), y)$ وي. (1) وکاروئ خو داسې شاخص e تر لاسه کړئ چې د هر y دپاره

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &\simeq \text{Un}(f(e), y) \\ &\simeq \varphi_{f(e)}(y).\end{aligned}$$

(1) $\Rightarrow$ (2): ورکړې g ته د $n-m-s$ قضيه وکاروئ خو داسې f تر لاسه کړئ چې د هر x او y دپاره $\varphi_{f(x)}(y) \simeq g(x, y)$ وي. (2) وکاروئ خو داسې شاخص e تر لاسه کړئ چې

$$\begin{aligned}\varphi_e(y) &\simeq \varphi_{f(e)}(y) \\ &\simeq g(e, y).\end{aligned}$$

په دې سره ثبوت بشپړېږي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-038) سرچينې په دې دوو استنتاجي لړيو کېنې د جزوي تابعو د قيمتونو تر منځ د عادي برابري نښه کارولې وه، سره له دې چې اړخونه تعريف شوي نه هم کېدلې شي. دلته د همدې څپرکي ټاکلې جزوي برابري نښه کارول شوې ده، خو دواړه تعريف شوي او ناتعريف حالتونه په کره ډول پوښل شي. $\square$

مخکښې له دې چې وښيو بيان (1) رښتيا دے (او ځکه (2) هم)، فکر وکړئ چې دا څومره عجيبه خبره ده. e يو کمپيوټري پروگرام وکښئ؛ بيان (1) وايي چې د هرې ورکړې جزوي محاسبه کېدونکې تابع $g(x, y)$ دپاره داسې کمپيوټري پروگرام e موندلے شئ چې $g_e(y) \simeq g(e, y)$ محاسبه کوي. په بله وينا، داسې کمپيوټري پروگرام موندلے شئ چې يوه پر خپل پروگرام مراجعه کوونکې تابع محاسبه کوي.

قضيه 24.31. په 24.30 کېنې دواړه بيانونه رښتيا دي. په ځانگړي ډول، د هرې جزوي محاسبه کېدونکې تابع $g(x, y)$ دپاره داسې شاخص e شته چې د هر y دپاره

$$\varphi_e(y) \simeq g(e, y).$$

ثبوت. اړين توکي لا د پورته درېدني مسئلې په بحث کېنې نغښتي دي. $\text{diag}(x)$ داسې محاسبه کېدونکې تابع وي چې د هر x دپاره د تابع $f_x(y) \simeq \varphi_x(x, y)$ يو شاخص راگرځوي، يعنې

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq \varphi_x(x, y).$$

diag داسې تابع وکښئ چې د يوې دوه ځاييزې تابع پروگرام د يوې يوځاييزې تابع په پروگرام بدلوي، او دا د اصلي پروگرام په لومړي دليل کېنې د هغه خپل شاخص په ثابتولو تر لاسه کېږي. تابع diag په صوري ډول داسې تعريفېدے شي: لومړے s داسې تعريف کړئ:

$$s(x, y) \simeq \text{Un}^2(x, x, y),$$

چېرته چې Un^2 يوه درې ځاييزه تابع ده چې د جزوي محاسبه کېدونکو دوه ځاييزو تابعو دپاره نړيواله ده. بيا د $n-m-s$ قضیې له مخې داسې بنسټيزه بازگشتي تابع diag موندلے شو چې دا پوره کړي:

$$\varphi_{\text{diag}(x)}(y) \simeq s(x, y).$$

اوس تابع l داسې تعريف کړئ:

$$l(x, y) \simeq g(\text{diag}(x), y).$$

او $l^\neg$ د l يو شاخص وي. په پای کېنې $e = \text{diag}(l^\neg)$ وټاکئ. بيا د هر y دپاره لرو:

$$\begin{aligned} \varphi_e(y) &\simeq \varphi_{\text{diag}(l^\neg)}(y) \\ &\simeq \varphi_{l^\neg}(l^\neg, y) \\ &\simeq l(l^\neg, y) \\ &\simeq g(\text{diag}(l^\neg), y) \\ &\simeq g(e, y), \end{aligned}$$

□

لکه چې غوښتل شوي وو.

دلته څه روان دي؟ فرض کړئ تاسو ته د داسې کمپيوټري پروگرام د لیکلو دنده درکړل شوې چې خپل متن چاپ کړي. بيا فرض کړئ چې په داسې پروگرامي ژبه کار کوئ چې د رشتو یو بډای او عجیب ګڼتون لري. په ځانګړې ډول، فرض کړئ ستاسو پروگرامي ژبه داسې تابع diag لري: تابع diag یوه ننوت رشته s اخلي، په s کېنې د 'x' نښې هره بېلګه مومي، او هغه د اصلي رشتې په اقتباس شوې بڼه بدلوي. د بېلګې په توګه، که دا رشته

world x hello

د ننوت په توګه ورکړل شي، تابع دا

world 'world x 'hello hello

د وټ په توګه راګرځوي. په دې صورت کېنې موخه شوه پروگرام لیکل اسان دي؛ ازمويلې شې چې

)'print(diag(x))print(diag(

کار سر ته رسوي. د C++ او جاوا په شان ډېرو عامو پروگرامي ژبو کېنې هم همدغه نظر (په یو څه پېچلې پلټنې سره) کار کوي.

موږ د ثابت ټکي د قضیې له ثبوت څخه یوازې څو کامه لرې یو. فرض کړئ د چاپ تابعې یوه بڼه $\text{print}(x, y)$ یوه رشته x او بل عددي دلیل y اخلي، او رشته x, y ځله چاپ کوي. بيا دا “پروگرام”

getinput(y);
y), 'y), print(diag(x) 'getinput(y); print(diag(

پر ننوت y خپل ځان y ځله چاپ کوي. که د $\text{diag} - \text{print} - \text{getinput}$ چوکاټ په هرې تابع $g(x, y)$ بدل کړو، دا تر لاسه کېږي:

y), 'y), 'g(diag(x)g(diag(

دا داسې پروگرام دے چې پر ننوت y ، تابع g پر خپل پروگرام او y چلوي. که “اقتباس کول” د “یو شاخص کارولو” په توګه وګڼو، پورته ثبوت تر لاسه کوو.

اوس دپاره که غواړئ ثبوت صوري چل، یا توره جادوګري، وکړئ پروا نه کوي. خو باید د پورته ورکړل شوي استدلال جزئیات بیا جوړ کړے شئ. کله چې د نابشپړتیا قضیې (او اړونده “د ثابت ټکي قضیه”) ثابتوو، د دې د کار کولو د علت د پوهېدو په نورو لارو به بحث وکړو.

همدغه نظر د “ثابت ټکي” یو ترکیبګر هم راکولے شي. فرض کړئ یو لامبدا ترم g لری، او داسې بل ترم k غواړئ چې k له gk سره β -معادل وي. زموږ د نښیزو دودونو په کارولو ترمونه داسې تعريف کړئ:

$$\text{diag}(x) = xx$$

او

$$l(x) = g(\text{diag}(x))$$

يعني l دا ترم دے: $\lambda x. g(xx)$ - k ترم ll وي- بيا لرو:

$$\begin{aligned} k &= (\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)) \\ &\rightarrow g((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx))) \\ &= gk. \end{aligned}$$

که

$$Y = \lambda g. ((\lambda x. g(xx))(\lambda x. g(xx)))$$

واخلو، نو Yg او $g(Yg)$ يو گډ ترم ته را کښي، ځکه $Yg \equiv_{\beta} g(Yg)$ دې ته “د کري ترکیبگر” ويل کېږي- که پر ځای ئې

$$Y = (\lambda xg. g(xgx))(\lambda xg. g(xgx))$$

واخلو، نو په حقيقت کېنې Yg ، $g(Yg)$ ته را کښي، چې لا پياوړې بيان دے- د Y دا وروستی بڼه “د تيورينگ ترکیبگر” بلل کېږي-

24.22 د ثابت ټکي د قضيي کارول

د ثابت ټکي قضيه په اصل کېنې اجازه را کوي چې جزوي محاسبه کېدونکې تابعې د هغو د شاخصونو په وسيله تعريف کړو- د بېلگې په توگه، داسې شاخص e موندل شو چې د هر y دپاره

$$\varphi_e(y) = e + y.$$

د بېلگې په توگه، د ثابت ټکي د قضيي ثبوت کارول شو خو په جاوا يا C++ کېنې داسې پروگرام جوړ کړو چې خپل متن چاپ کړي- راياډ کړئ چې که د هر e دپاره W_e د φ_e د تعريف ساحه وټاکو، نو لری $W_0, W_1, W_2, \dots$ په محاسبوي ډول د شمېر ور ستونه شمېري- ځينې دا ستونه محاسبه کېدونکي دي- پوښتلې شو چې ايا داسې الگوريتم شته چې قيمت x د ننوت په توگه واخلي، او که W_x محاسبه کېدونکې وي، د هغه د ځانگړونکې تابع يو شاخص را وگرځوي؟ ځواب “نه” دے، داسې الگوريتم نشته:

قضيه 24.32. داسې جزوي محاسبه کېدونکې تابع f نشته چې دا خاصيت ولري: هر که چې W_e محاسبه کېدونکې وي، نو $f(e)$ تعريف شوې وي او $\varphi_{f(e)}$ ئې ځانگړونکې تابع وي-

ثبوت. f هره جزوي محاسبه کېدونکې تابع وي؛ داسې e به جوړ کړو چې W_e محاسبه کېدونکې وي، خو $\varphi_{f(e)}$ ئې ځانگړونکې تابع نه وي- د ثابت ټکي د قضيي په کارولو داسې شاخص e موندل شو چې

$$\varphi_e(y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } y = 0 \text{ او } \varphi_{f(e)}(0) \downarrow = 0 \text{ وي} \\ \text{تعريف شوې نه ده} & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

يعني e د ثابت ټکي د قضيي په دې تابع له پلي کولو تر لاسه کېږي:

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} 0 & \text{که } y = 0 \text{ او } \varphi_{f(x)}(0) \downarrow = 0 \text{ وي} \\ \text{تعريف شوې نه ده} & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

په غير رسمي ډول داسې ليدل شو چې g جزوي محاسبه کېدونکې ده: پر ننوتونو x او y الگوريتم لومړی کوري چې y له 0 سره برابر دے که نه- که برابر وي، الگوريتم $f(x)$ محاسبه کوي، او بيا نړيوال ماشين کاروي خو $\varphi_{f(x)}(0)$ محاسبه کړي- که دا وروستی محاسبه ودرېږي او 0 را وگرځوي، الگوريتم 0 را گرځوي؛ که نه، الگوريتم نه درېږي- د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-036) سرچينې

د ثبوت په پیل کېنې خپل اختیاري سیال بشپړه محاسبه کېدونکې تابع بللې وه، حال دا چې د قضیې دعوې د ټولو جزوي محاسبه کېدونکو تابعو په اړه ده. دلته د قضیې هماغه جزوي ټولګې ساتل شوې؛ ورپسې جوړښت د ناتعریف حالت په ګډون هم کار کوي.

خو اوس پام وکړئ چې که $\varphi_{f(e)}(0)$ تعریف شوې او له 0 سره برابره وي، نو $\varphi_e(y)$ کېت مې هغه وخت تعریف شوې ده چې y له 0 سره برابر وي، نو $W_e = \{0\}$ - که $\varphi_{f(e)}(0)$ تعریف شوې نه وي، یا تعریف شوې خو له 0 سره برابره نه وي، نو $W_e = \emptyset$ - په دواړو حالاتو کېنې $\varphi_{f(e)}$ د W_e ځانګړونکې تابع نه ده، ځکه پر ننوت 0 ناسم ځواب ورکوي. □

24.23 د ځان-مراجعي په کارولو د تابعو تعریف

په عمومي ډول دا کتوره ده چې تابعې د هغو په خپلو اصطلاحاتو کېنې تعریف کړې شو. د بېلګې په توګه، ورکړو محاسبه کېدونکو تابعو k ، l او m ته د ثابت ټکي له وایي چې داسې جزوي محاسبه کېدونکې تابع f شته چې د هر y دپاره دا معادله پوره کوي:

$$f(y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{که } l(y) = 0 \text{ وي} \\ f(m(y)) & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

په لا ځانګړي ډول، f بیا داسې تر لاسه کېږي:

$$g(x, y) \simeq \begin{cases} k(y) & \text{که } l(y) = 0 \text{ وي} \\ \varphi_x(m(y)) & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

او بیا د ثابت ټکي له کارول کېږي څو داسې شاخص e وموندل شي چې $\varphi_e(y) \simeq g(e, y)$ وي. د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-044): سرچینې د ثابت ټکي په دې پلینه کېنې د دوو جزوي تابعو د ممکنه ناتعریفو ارزښتونو تر منځ عادي برابري کارولې وه؛ دلته د قضیې ټاکلې جزوي برابري ساتل شوې ده.

د یوې محسوسې بېلګې دپاره د “تر ټولو لوی ګډ مقسوم علیه” تابع $\gcd(u, v)$ داسې تعریفېدې شي:

$$\gcd(u, v) \simeq \begin{cases} v & \text{که } u = 0 \text{ وي} \\ \gcd(\text{mod}(v, u), u) & \text{که داسې نه وي} \end{cases}$$

چېرته چې $\text{mod}(v, u)$ پر u د v د وېش پاتې شوني څرګندوي. د ثابت ټکي له مخې ته مراجعه ښيي چې $\gcd$ جزوي محاسبه کېدونکې ده. (په حقیقت کېنې دا په پورته بڼه راوستل کېدې شي، چې y د جوړې $\langle u, v \rangle$ کوډ وګڼل شي.) بیا پر u استقرا ښيي چې په حقیقت کېنې $\gcd$ هرځای تعریف شوې ده.

البته داسې ځان-مراجع تعریفونه جوړول شوي چې له پورته بېلګو ډېر پېچلي وي. زیاتره پروګرامي ژبې په یوه یا بله طریقه د تابعو تعریف په خپلو اصطلاحاتو کېنې مني. پام وکړئ چې دا د هغې وړتیا په پرتله لږ حیرانونکې ده چې یوه تابع د هغه الګوریتم د شاخص په وسیله تعریف کړو چې هماغه تابع محاسبه کوي؛ او د ثابت ټکي قضیه په بشپړ عمومیت کېنې همدا اجازه راکوي. د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-037): سرچینې د دې وروستۍ جملې په پای کېنې د یو الګوریتم له خوا محاسبه کېدونکې یوه تابع په جمع نوم یاده کړې وه. دلته شمېر د هماغې ټاکلې تابع سره یو شان ساتل شوې ده.

برخه VI

تیورینگ ماشینونه

باب 25


د تیورینگ ماشین محاسبي

25.1 پېژندنه

دا څه معنا لري چې، مثلاً، له $\mathbb{N}$ څخه $\mathbb{N}$ ته یوه تابع محاسبه کېدونکې وي؟ د لومړنيو او تر ټولو نامتو ځوابونو څخه یو دا دے چې تابع هغه وخت محاسبه کېدونکې ده چې د تیورینگ ماشین په وسیله محاسبه کېدے شي. دا مفهوم الڼ تیورینگ په 1936 کې وړاندې کړ. د تیورینگ ماشینونه د محاسبي د یو مدل بېلگه ده—دوي د “محاسبي کړنلارې” نظر د تعریفولو یوه ریاضیاتي کره لار ده. د دې کره معنا تر بحث لاندې ده، خو په پراخه کچه منل شوې چې تیورینگ ماشینونه د محاسبي کړنلارو د ټاکلو یوه لار ده. که څه هم د “تیورینگ ماشین” اصطلاح د خوځنده پرزو لرونکي فزیکي ماشین انځور ذهن ته راوړي، په کره معنا تیورینگ ماشین یو سوچه ریاضیاتي جوړښت دے، او په همدې توګه د محاسبي کړنلارې نظر مثالي کوي. مثلاً، موږ د تیورینگ ماشین د وخت یا حافظې پر اړتیاوو هېڅ بندیز نه ږدو: تیورینگ ماشینونه یو ځیز ان هغه وخت محاسبه کولے شي چې محاسبه له هغو ټولو ذرو څخه زیاته زېرمه یا زیات کامونه وغواړي چې په کاینات کې شته.

ښايي غوره وي چې تیورینگ ماشین د یو ځانګړي ډول خیالي میکانیزم د پروګرام په توګه وګڼو. دا میکانیزم له یوې پټې او یو لوست-لیک سر څخه جوړ دے. زموږ د تیورینگ ماشینونو په بڼه کې پټه په یوه لوري (بني لوري ته) نامتناهي ده، او په مربعونو وېشل شوې، چې هر یو یې د یوې متناهي الفبا یوه لښه لرلے شي. دا ډول الفباوې هر شمېر بېلابېلې لښې لرلے شي، خو موږ به تر ډېره په درېو بسنه کوو: $\triangleright$ ، 0 او 1. کله چې میکانیزم پیل شي، پټه تشه وي (یعنې هر مربع د 0 لښه لري)، پرته له تر ټولو کین مربع څخه چې $\triangleright$ لري، او یو متناهي شمېر مربعونو څخه چې ننوت لري. په هر وخت کې میکانیزم له متناهي شمېر حالتونو څخه په یوه کې کېږي وي. په پیل کې سر د ننوت تر ټولو کین مربع، یعنې د پټې د پای لښې بني لوري ته مربع، لولي او په یو ټاکلي لومړني حالت کېږي وي. د میکانیزم د چلېدو په هر کام کېږي د اوس لوستل کېدونکي مربع منځپانګه، د میکانیزم حالت او د تیورینگ ماشین پروګرام په ګډه ټاکي چې ورپسې څه کېږي. د تیورینگ ماشین پروګرام د یوې جزوي تابع په توګه ورکول کېږي چې حالت q او لښه σ د ننوت په توګه اخلي، او درېز $\langle q', \sigma', D \rangle$ راګرځوي. هر کله چې میکانیزم په حالت q کېږي وي او لښه σ لولي، د اوسني مربع لښه په σ' بدلوي، سر د دې له مخې کین، بني لوري ته ځي یا پر ځای پاتې کېږي چې D په ترتیب سره L ، R یا N وي، او میکانیزم حالت q' ته ځي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-039) سرچینې د پټې تر ټولو کین مربع د پای لښې د ځای په توګه ټاکلے و، خو بیا یې سر هم په پیل کېږي پر هماغه مربع ایښے و. د همدې څپرکي صوري لومړنی ترتیب سر د پای لښې بني لوري ته، د ننوت پر لومړي مربع ږدي؛ دلته هماغه ټاکلے دود په څرګنده ساتل شوے دے.

د بېلګې په توګه، په 25.1 کېږي حالت وګورئ. د تیورینگ ماشین د پټې لیدونکې برخه په تر ټولو کین مربع کېږي د پټې د پای لښه $\triangleright$ لري، ورپسې درې 1 کانې، یو 0، او بیا څلور نورې 1 کانې دي. سر له کین لوري درېم مربع لولي، چې 1 لري، او په حالت q_1 کېږي دے—وايو “ماشین په حالت q_1 کېږي 1 لولي.” که د تیورینگ ماشین پروګرام د ننوت $\langle q_1, 1 \rangle$ دپاره درېز $\langle q_2, 0, N \rangle$ راګرځوي، ماشین به اوس په درېم مربع کېږي 1 په 0 بدل کړي، لوست-لیک سر به پر خپل ځایه پرېږدي، او حالت q_2 ته به واوړي. که بیا پروګرام د ننوت $\langle q_2, 0 \rangle$ دپاره $\langle q_3, 0, R \rangle$ راګرځوي، ماشین به 0 په 0 وليکي (یعنې په عمل کېږي به د لوست-لیک سر لاندې د پټې منځپانګه هماغسې پرېږدي)، یو مربع بني لوري ته به لار شي، او حالت q_3 ته به ننوځي. او همداسې نور.



شکل 25.1: یو تیورینگ ماشین چې خپل پروگرام عملي کوي.

وايو ماشین هغه وخت درېږي چې له داسې حالت q_n او نښې σ سره مخ شي چې د $\langle q_n, \sigma \rangle$ دپاره هېڅ لارښوونه نه وي، يعنې د ننوت $\langle q_n, \sigma \rangle$ دپاره د حالت بدلون تابع تعريف شوې نه وي. په بله وينا، ماشین د عملي کولو دپاره هېڅ لارښوونه نه لري، او په هماغه ځای کار بندوي. کله ناکله درېدل د ځانګړي درېدنې حالت h په وسيله څرګندېږي. دا به وروسته په زياتو جزئياتو وښودل شي.

د تیورینگ د مقالې، “د محاسبه کېدونکو عددونو په اړه،” ښکلا دا ده چې هغه نه یوازې یو صوري تعريف وړاندې کوي، بلکې دا استدلال هم کوي چې تعريف د محاسبه کېدنې شهودي مفهوم رانغاړي. له تعريفه بايد څرګنده وي چې هره تابع چې د تیورینگ ماشین په وسيله محاسبه کېږي، په شهودي معنا محاسبه کېدونکې ده. تیورینگ درې ډوله استدلالونه وړاندې کوي چې معکوسه خبره هم رښتیا ده، يعنې هره تابع چې موږ یې په طبيعي ډول محاسبه کېدونکې ګڼو، د داسې ماشین په وسيله محاسبه کېدونکې ده. د تیورینگ په خپلو ټکو، دا دي:

1. شهود ته نېغه مراجعه.

2. د دوو تعريفونو د معادلتوب ثبوت (په هغه صورت کې چې نوی تعريف زيات شهودي جاذبيت ولري).


3. د محاسبه کېدونکو عددونو د لویو ټولګيو بېلګې ورکول.

زموږ موخه دا ده چې د محاسبه کېدنې مفهوم “په اصل کې” تعريف کړو، يعنې د وخت او ځای عملي محدودیتونه په پام کې ونه ځلو. البته، کله چې د محاسبه کېدنې تر ټولو پراخ تعريف ولرو، بیا د محدودو سرچینو لرونکې محاسبه څېړل شو، دا د “محاسبوي پېچلتیا” په نوم مضمون زړه جوړوي.

تاريخي یادونه. الڼ تیورینگ په 1936 کېنې تیورینگ ماشینونه اختراع کړل. که څه هم په هغه وخت کېنې د هغه پاملرنه د لومړۍ درجې منطق پرېکړه کېدنې ته وه، دا مقاله د کمپیوټر د جوړښت د بنسټونو یوه پرېکنده مقاله بلل شوې ده. په مقاله کېنې تیورینگ پر محاسبه کېدونکو حقيقي عددونو، يعنې هغو حقيقي عددونو چې اعشاري څڼوې یې محاسبه کېدونکې دي، تمرکز کوي؛ خو یادونه کوي چې د هغه مفهومونه پر طبيعي عددونو محاسبه کېدونکو تابعو او نورو ته اړول ستونزمن نه دي. پام وکړئ چې دا په 1941 کېنې د لومړي کارکوونکي عمومي-موخې کمپیوټر له جوړېدو پوره پنځه کاله مخکې وو (الماني کونراد زوزه دا د خپلو والدینو د کور په ناسته کوټه کېنې جوړ کړ)، په بلېچلي پارک کېنې د تیورینگ او د هغه د ملګرو د کوډ ماتوونکي کولوسس له جوړېدو اووه کاله مخکې (1943)، د امریکايي اېنیاک څخه نهه کاله مخکې (1945)، په مانچسټر کېنې د لومړي برتانوي عمومي-موخې کمپیوټر—د مانچسټر د کوچنۍ کچې ازموینې ماشین—له جوړېدو دولس کاله مخکې (1948)، او د امریکایانو له خوا د بیناک له لومړۍ ازموینې دیارلس کاله مخکې (1949). د مانچسټر کوچنۍ کچې ازموینې ماشین د لومړي زېرمه-پروګرام کمپیوټر ویاړ لري—پخواني ماشینونه د هرې نوې دندې دپاره په لاس بیا سمبندې کېدل.


25.2 د تیورینگ ماشینونو څرگندونه

تیورینگ ماشینونه په لیدیز ډول د حالت ډیاگرامونو په وسیله ښودل کېدای شي. دا ډیاگرامونه د حالت له هغو خانو جوړ دي چې غښتي ئې سره نښلوي. لکه چې تمه کېږي، د حالت هره خانه د ماشین د یو حالت استازیتوب کوي. هر غښتی د هغې لارښوونې استازیتوب کوي چې له هماغه حالت څخه عملي کېدای شي، او د لارښوونې جزئیات د اړوند غښتي د پاسه یا لاندې لیکل شوي وي. لاندې ماشین وگورئ، چې یوازې دوه دننني حالتونه، q_0 او q_1 ، او یوه لارښوونه لري:



په یاد ولرئ چې تیورینگ ماشین یو لوست-لیک سر او یوه پټه لري چې ننوت پرې لیکل شوی وي. لارښوونه داسې لوستل کېږي: که په حالت q_0 کېږي 0 لولئ، یو 1 ولیکئ، ښي لوري ته لار شئ، او حالت q_1 ته واوړئ. دا له دې سره معادل ده چې د حالت بدلون تابع په $\langle q_0, 0 \rangle$ په $\langle q_1, 1, R \rangle$ واړوي.

بېلگه 25.1. جفت ماشین: لاندې تیورینگ ماشین هله او یوازې هله درېږي چې پر پټه د 1 کاناو شمېر جفت وي (په دې فرض چې د پټي ټول 1 کاناو له لومړي 0 څخه مخکېښي راځي).



د حالت ډیاگرام له لاندې حالت بدلون تابع سره سمون لري:

$$\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R \rangle,$$

$$\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R \rangle,$$

$$\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R \rangle$$

پورته ماشین یوازې هغه وخت درېږي چې ننوت د کرښو جفت شمېر وي. که نه، ماشین (په نظري ډول) تر نامعلومې مودې کار ته دوام ورکوي. د هر ماشین او ننوت دپاره د ماشین تشکیلونه پرله پسې څارل شوي، خو وټاکو. د تشکیلونو صوري تعریف به وروسته ورکړو. اوس د تشکیلونو په اړه په شهودي ډول د ډیاگرامونو د یوې لړۍ په توګه فکر کول شو، چې د کار په بهیر کېږي په هره شېبه د ماشین حالت ښيي. تشکیلونه د پټي منځپانګه، د ماشین حالت او د لوست-لیک سر ځای ښيي.

راځئ د جفت ماشین تشکیلونه هغه وخت پرله پسې وڅارو چې د څلورو 1 کاناو پر ننوت پیل شي. په دې صورت کېږي تمه لرو چې ماشین ودرېږي. بیا به ماشین د درېیو 1 کاناو پر ننوت وچلوو، چې هلته به ماشین تل روان وي.

ماشین په حالت q_0 کېږي، د تر ټولو کین 1 په لوستلو پیل کوي. د ماشین لومړنی حالت داسې ښودل شو:

$$\triangleright 1_0 1110 \dots$$

پورته تشکیل روښانه دے. لکه چې لیدل کېږي، ماشین په صفرم حالت کېږي د تر ټولو کین 1 په لوستلو پیل کوي. دا پر لومړي 1 د حالت د نوم په فرعي ښه ښودل کېږي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-040) سرچینې په دې ځای کېږي د ماشین حالت په نثر کېږي لومړی حالت بللې و، خو ډیاگرام او فرعي ښه دواړه صفرم حالت ټاکي، دلته هماغه سم حالت راورول شوی دے. په دې ځای کېږي د عملي کېدو وړ لارښوونه $\delta(q_0, 1) = \langle q_1, 1, R \rangle$ ده، نو ماشین پر پټه ښي لوري ته ځي او حالت q_1 ته اوړي.

$$\triangleright 11_1 110 \dots$$

څرنګه چې ماشین اوس په حالت q_1 کېږي یو 1 لولي، باید لارښوونه $\delta(q_1, 1) = \langle q_0, 1, R \rangle$ “تعقیب” کړو. په نتیجه کېږي دا تشکیل لاس ته راځي:

$\triangleright 111_0 10 \dots$

د ماشین د دوام سره قواعد یو ځل بیا په هماغه ترتیب عملي کېږي، او لاندې دوه تشکیلونه لاس ته راځي:

$\triangleright 1111_1 0 \dots$

$\triangleright 11110_0 \dots$

ماشین اوس په حالت q_0 کېږي یو 0 لولي. د حالت بدلون د ډیاګرام له مخې په اسانه وینو چې د عملي کولو هېڅ لارښوونه نشته، نو ماشین درېدلې ده. معنا دا چې ننوت منل شوی دے.

اوس فرض کړئ ماشین د درېیو 1 ګانو پر ننوت پیلوو. لومړني څو تشکیلونه ورته دي، ځکه هماغه لارښوونې عملي کېږي او یوازې د پټي په ننوت کېږي لږ توپیر شته:

$\triangleright 1_0 110 \dots$

$\triangleright 11_1 10 \dots$


$\triangleright 111_0 0 \dots$

$\triangleright 1110_1 \dots$

ماشین اوس له ټولو 1 ګانو څخه تېر شوی، او په حالت q_1 کېږي یو 0 لولي. لکه چې په ډیاګرام کېږي ښودل شوې، د $\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, R \rangle$ په بڼه یوه لارښوونه شته. څرنګه چې پټه ښي لوري ته تر نامعلومې مودې پورې له 0 څخه ډکه ده، ماشین به دا لارښوونه تل عملي کوي، په حالت q_1 کېږي به پاتې کېږي او لا پسې به ښي لوري ته ځي. ماشین به هېڅکله ونه درېږي، او ننوت نه مني.

دا خبره مهمه ده چې ټول ماشینونه نه درېږي. که درېدل په دې معنا وي چې د ماشین د عملي کولو لارښوونې خلاصې شي، نو داسې ماشین جوړول شوي چې هېڅکله نه درېږي: بس دا باوري کړو چې په هر حالت کېږي د هرې ښي دپاره یو وتونکې غښی شته. په حالت q_0 کېږي د 0 د لوستلو یوه لارښوونه په ور زیاتولو جفت ماشین داسې بدلول شوي چې تل روان وي.

بېلګه 25.2.




د ماشین جدولونه د تیورینګ ماشینونو د څرګندولو بله لار ده. د ماشین جدولونه د پټي الفبا پر x -محور، او د ماشین د حالتونو سټ پر y -محور ښيي. د جدول دننه، د هر حالت او ښي په ګډه ځای کېږي د لارښوونې پاتې برخه—نوې ښي، نوی حالت او د خوځښت لوري—لیکل کېږي. د ماشین جدولونه دا اسانه کوي چې ماشین په کوم حالت او د کومې ښي دپاره درېږي. په جدول کېږي هر تش ځای د ماشین د درېدو یو ممکن ټکی دے. د حالت د ډیاګرامونو او د لارښوونو د ستونزو پر خلاف، چې د ماشین د درېدو ځایونه پکښې تل سملاسي څرګند نه وي، د ماشین په جدول کېږي د تشو ځایونو په موندلو هر د درېدو ټکی ژر پېژندل کېږي. د ژباړې د نسخې سمون (OLCMP-041) سرچینې د جدول د حجرې توکي د نوي حالت او نوې ښي په سرچپه ترتیب یاد کړي وو، حال دا چې ښودل شوې حجرې لومړۍ نوې ښي او بیا نوی حالت لیکي؛ د هر تش ځای په اړه ورپسې جمله کېږي ورکه تړونکې کلمه هم ور زیاته شوه.

بېلګه 25.3. د جفت ماشین جدول دا دے:

$\triangleright$	1	0	
	$1, q_1, R$		q_0
	$1, q_0, R$	$0, q_1, R$	q_1

لکه چې وینو، ماشین هغه وخت درېږي چې په حالت q_0 کېږي یو 0 لولي.



شکل 25.2: یو دوه چنده کوونکے ماشین

تر اوسه مویوازې هغه ماشینونه کلي چې ننوت لولي او مني ئې. خو تیورینګ ماشینونه د لوستلو او لیکلو دواړو وړتیا لري. د داسې ماشین یوه بېلګه (که څه هم ډېرې، ډېرې بېلګې شته) دوه چنده کوونکے دے. دوه چنده کوونکے چې پر پټه د n شمېر 1 ګانو له یوې ډلې سره پیل شي، د $2n$ شمېر 1 ګانو یوه ډله د وت په توګه ورکوي.

بېلګه 25.4. مخکښې له دې چې دوه چنده کوونکے ماشین جوړ کړو، د مسئلې د حل دپاره یوه تګلاره جوړول مهم دي. څرنګه چې ماشین (لکه چې موږ تعریف کړے) دا نۀ شي یاد ساتلے چې څو 1 ګانې ئې لوستې دي، باید د پټې د ټولو 1 ګانو د شمېر ساتلو یوه لار پیدا کړو. یوه داسې لار دا ده چې وت له ننوت څخه په یو 0 جلا کړو. بیا ماشین له ننوت څخه لومړے 1 پاکولے، د ننوت پر پاتې برخې تېرېدلے، یو 0 پرېښودلے، او دوه نوي 1 ګانې لیکلے شي. بیا به ماشین بېرته لار شي، په ننوت کښې به دویم 1 پیدا کړي، او هغه به هم دوه چنده کړي. د ننوت د هر یو 1 په بدل کښې به د وت دوه 1 ګانې ولیکي. د ماشین د تګ په ترڅ کښې د ننوت په پاکولو باوري کولے شو چې هېڅ 1 پاتې نۀ شي او نۀ دوه ځله دوه چنده شي. کله چې ټول ننوت پاک شي، پر پټه به $2n$ شمېر 1 ګانې پاتې وي. د لاس ته راغلي تیورینګ ماشین د حالت دیاګرام په 25.2 کښې ښودل شوے دے.

تمرین 25.5. یو خپل سری ننوت وټاکئ او په 25.4 کښې د دوه چنده کوونکي ماشین تشکیلونه پرله پسې وڅارئ.

تمرین 25.6. د $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ الفبا لرونکے تیورینګ ماشین جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو هره هغه رشته مني، یعنې پرې ډېرې، چې د A ګانو شمېر ئې د B ګانو له شمېر سره برابر وي او ټول A ګانې له ټولو B ګانو مخکښې راشي، او هره هغه رشته ردوي، یعنې پرې نۀ ډېرې، چې د A ګانو شمېر د B ګانو له شمېر سره برابر نۀ وي یا ټولې A ګانې له ټولو B ګانو مخکښې رانه شي. (مثلاً، ماشین باید $AABB$ او $AAABBB$ ومنې، خو AAB او $AABBAABB$ دواړه رد کړي.)

تمرین 25.7. د $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ الفبا لرونکے تیورینګ ماشین جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو هره رشته α د ننوت په توګه واخلي او نقل ئې کړي، څو د $\alpha\alpha$ په بڼه وت پیدا کړي. (مثلاً، د $ABBA$ ننوت باید د $ABBAABBA$ وت ورکړي.)

تمرین 25.8. الفبایي؟: د $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ الفبا لرونکے تیورینګ ماشین جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو یوه متناهي لړۍ د ننوت په توګه ورکړل شي، نو وګوري چې ټولې A ګانې د ټولو B ګانو کین لوري ته راځي که نه. ماشین باید د ننوت رشته پر پټه پرېږدي، او که رشته “الفبایي” وي ودرېږي، او که نۀ وي تل په کړۍ کښې وچلېږي.

تمرین 25.9. الفبایي کوونکے: د $\{ \triangleright, 0, A, B \}$ الفبا لرونکے تیورینګ ماشین جوړ کړئ چې د A ګانو او B ګانو یوه متناهي لړۍ د ننوت په توګه واخلي او داسې ئې بیا ترتیب کړي چې ټولې A ګانې د ټولو B ګانو کین لوري ته راشي. (مثلاً، لړۍ $BABAA$ باید په $AAABB$ ، او لړۍ $ABBABB$ باید په $AAABBB$ بدله شي.) د ژباړې د نسخې سمون: (OLCMP-042) سرچینې د ننوت د اخیستلو او بیا ترتیبولو تر منځ د عطف کلمه پرېښي وه؛ دلته بشپړه جمله راوړل شوې ده.

سرچينې

- Paul Benacerraf. 1965. ``What Numbers Could Not Be." *The Philosophical Review* 74(1): 47--73.
- Gottlob Frege. 1884. *Die Grundlagen der Arithmetik*. Breslau: Wilhelm Koebner.
- Georg Cantor. 1892. ``Über eine elementare Frage der Mannigfaltigkeitslehre." *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* 1: 75--78.
- Michael Potter. 2004. *Set Theory and Its Philosophy*. Oxford University Press.
- John Conway. 2006. ``The Power of Mathematics." In *Power*, Cambridge University Press.
- John J. O'Connor and Edmund F. Robertson. 2005. ``The Real Numbers: Stevin to Hilbert."
- Karin Usadi Katz and Mikhail G. Katz. 2012. ``Stevin Numbers and Reality." *Foundations of Science* 17(2): 109--123.
- David Hilbert. 2013. *Lectures on the Foundations of Arithmetic and Logic 1917--1933*. Edited by William Bragg Ewald and Wilfried Sieg. Springer.
- Richard Dedekind. 1888. *Was sind und was sollen die Zahlen?* Braunschweig: Vieweg.
- P. D. Magnus et al. 2021. *forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic*. Open Logic Project.
- Raymond M. Smullyan. 1968. *First-Order Logic*. New York: Springer.
- Martin M. Zuckerman. 1973. ``Formation Sequences for Propositional Formulas." *Notre Dame Journal of Formal Logic* 14(1): 134--138.