

خلاص منطق

پښتو - پاکستان

ستونه

دا د ماشيني ژباړې د روان کار يوه برخه ده. په دې باب کښې شپږ برخې، بېلگې او تمرينونه شامل دي. بشپړه نسخه لا د جوړېدو په حال کښې ده. اصطلاحي پرېکړې او د کتنې حدود د سرچينو په شواهدو کښې ثبت دي.

Adapted from the Open Logic Project, revision 9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0. Original and adaptation: Creative Commons Attribution 4.0 International; component exceptions remain in the accompanying upstream source. [Open Logic Project](#). [Translation catalogue](#). This is an independently prepared machine translation, without upstream endorsement.

1 د غږولو له مخې برابري

سټ د څيزونو يوه ټولگه ده چې د يوه څيز په توگه ورته کتل کېږي. هغه څيزونه چې سټ ترې جوړ وي، د سټ عناصر يا غړي بللې شي. که x د يو سټ A غړی وي، $x \in A$ ليکو، که نه وي، $x \notin A$ ليکو. هغه سټ چې هېڅ غړي نه لري، تش سټ بللې شي او په “ $\emptyset$ ” ښودلې کېږي.

دا مهمه نه ده چې سټ څنگه ټاکو، د هغه غړي څنگه ترتيبوو، يا په رښتيا د هغه غړي څو ځله شمارو. يوازې دا مهم دي چې د هغه غړي کوم دي. دا خبره په لاندې اصل کېږي راتولوو.

تعريف 1.1 (د غږولو له مخې برابري). که A او B ستونه وي، نو $A = B$ هله او يوازې هله وي چې د A هر غړی هم B غړی وي، او برعکس.

د غږولو له مخې برابري د ځينو ښو د کارولو جواز راکوي. په عمومي توگه، چې کله ځينې څيزونه $a_1, \dots, a_n$ ولرو، نو $\{a_1, \dots, a_n\}$ هم هغه سټ دے چې غړي ئې $a_1, \dots, a_n$ دي. په “هم هغه” ټينگار کوو، ځکه چې د غږولو له مخې برابري راته وائي چې داسې سټ يوازې يو کېدے شي. په حقيقت کېږي، د غږولو له مخې برابري د لاندې خبرې جواز هم راکوي:

$$\{a, a, b\} = \{a, b\} = \{b, a\}.$$

دا هم هغه خبره څرگندوي چې د ستونو په پام کېږي نيولو پر وخت، د هغو د غږولو ترتيب يا دا چې څو ځله ښودل شوي دي، مهم نه دي.

بېلگه 1.2. چې کله د څيزونو يوه ډله ولری، هغه په يو سټ کېږي راتولو لے شي. د بېلگې په توگه، د رېچرډ د وروڼو او خويندو سټ يو داسې سټ دے چې يو کس لري، او هغه د $S = \{Ruth\}$ په بڼه ليکلے شو. له 4 څخه د کوچنيو مثبتو صحيح عددونو سټ $\{1, 2, 3\}$ دے، خو د $\{3, 2, 1\}$ يا آن د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$ په بڼه هم ليکل کېدے شي. د غږولو له مخې د برابري له مخې، دا ټول هم يو سټ دے. ځکه چې د $\{1, 2, 3\}$ هر غړی د $\{3, 2, 1\}$ (او د $\{1, 2, 1, 2, 3\}$) هم غړی دے، او برعکس.

ډېر ځله به يو سټ د يو داسې خاصيت په وسيله ټاکو چې د هغه غړي ئې په ګډه لري. د دې دپاره به دا لنډه نښه کاروو: $\{x : \phi(x)\}$ ، چې پکښې $\phi(x)$ د هغه خاصيت استازيتوب کوي چې x ئې بايد ولري، خو د سټ په غړو کښې وشمېرل شي.

بېلګه 1.3. زموږ په بېلګه کښې، S په دې بڼه هم ټاکل شو:

$$S = \{x : x \text{ د رېچرډ ورور يا خور دے}\}.$$

بېلګه 1.4. يو عدد هله او يوازې هله کامل بللے شي چې د خپلو حقيقي قاسمونو له مجموعې سره برابر وي (يعنې هغه عددونه چې دا عدد پرې پوره وېشل کېږي، خو پخپله له دې عدد سره برابر نه وي). د بېلګې په توګه، 6 کامل دے ځکه چې حقيقي قاسمونه ئې 1، 2 او 3 دي، او $6 = 1 + 2 + 3$. په حقيقت کښې، 6 له 10 څخه يوازېنې کوچنۍ مثبت صحيح عدد دے چې کامل دے. نو د غړو له مخې د برابرۍ په کارولو سره وئيلے شو:

$$\{6\} = \{x : x \text{ کامل دے او } 0 \leq x \leq 10\}$$

بني لاس ته نښه داسې لولو: “د هغو x ګانو سټ چې x کامل وي او $0 \leq x \leq 10$ وي” - دلته برابري دا خبره تائيدوي چې د ستونو په پام کښې نيولو پر وخت، د هغو د ټاکلو طريقه مهمه نه ده. او په لا عمومي توګه، د غړو له مخې برابري ډاډ راکوي چې تل د هغو x ګانو يوازې يو سټ وي چې $\phi(x)$ وي. نو د غړو له مخې برابري دا جواز راکوي چې $\{x : \phi(x)\}$ ته د هغو x ګانو هم هغه سټ ووايو چې $\phi(x)$ وي.

د غړو له مخې برابري راته د دې ښودلو يوه طريقه راکوي چې ستونه برابر دي: $A = B$ د ښودلو دپاره، وښايئ چې هر کله $x \in A$ وي نو $x \in B$ هم وي، او هر کله $y \in B$ وي نو $y \in A$ هم وي.

تمرین 1.5. ثابت کړئ چې له يو څخه زيات تش ستونه نه شي کېدے، يعنې وښايئ چې که A او B داسې ستونه وي چې هېڅ غړي نه لري، نو $A = B$.

2 فرعي ستونه او د فرعي ستونو ستونه

موږ به ډېر ځله ستونه سره پرتله کول غواړو. د پرتله کولو يو څرګند ډول داسې دے: هر هغه څيز چې په يو سټ کښې وي، په بل کښې هم وي. دا حالت دومره مهم دے چې د دې دپاره نوې نښې معرفي کړو.

تعريف 2.1 (فرعي سټ). که د يو سټ A هر غړے د B هم غړے وي، نو وايو چې A د B يو فرعي سټ دے، او $A \subseteq B$ ليکو. که A د B فرعي سټ نه وي، $A \not\subseteq B$ ليکو. که $A \subseteq B$ وي خو $A \neq B$ وي، $A \subset B$ ليکو او وايو چې A د B يو خاص فرعي سټ دے.

بېلګه 2.2. هر سټ د خپل ځان فرعي سټ دے، او $\emptyset$ د هر سټ فرعي سټ دے. د جفتو طبيعي عددونو سټ د طبيعي عددونو د سټ فرعي سټ دے. همدارنګه، $\{a, b\} \subseteq \{a, b, c\}$ خو $\{a, b, e\}$ د $\{a, b, c\}$ فرعي سټ نه دے.

بېلګه 2.3. عدد 2 د صحيح عددونو د سټ يو غړے دے، حال دا چې د جفتو عددونو سټ د صحيح عددونو د سټ فرعي سټ دے. خو يو سټ کېدے شي د بل سټ هم غړے وي او هم فرعي سټ، د بېلګې په توګه، $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ او هم $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$.

د غړوله مخې برابري د ستونو د برابري معيار راكوي: $A = B$ هله او يوازې هله وي چې د A هر غړه د B هم غړه وي، او برعكس. د "فرعي سټ" تعريف $A \subseteq B$ بالكل د دې معيار د لومړۍ نېټې په توگه تعريفوي: د A هر غړه د B هم غړه وي. البته، كه A او B سره بدل كړو، تعريف بيا هم عملي كېږي: يعنې $B \subseteq A$ هله او يوازې هله وي چې د B هر غړه د A هم غړه وي. او دا بيا بالكل د غړوله مخې د برابري "برعكس" برخه ده. په نورو ټكو، د غړوله مخې له برابري نه دا نتيجه راوځي چې ستونه هله او يوازې هله برابر وي چې د يو بل فرعي ستونه وي.

قضيه 2.4. $A = B$ هله او يوازې هله وي چې $A \subseteq B$ او $B \subseteq A$ دواړه وي.

اوس د ځينو نورو ګڼورو نښو د معرفي كولو دپاره هم ښه موقع ده. د دې په تعريف كې چې A كله د B فرعي سټ وي، مونږ ووييل چې "د A هر غړه ... دے"، او د "... ځاے مو په" د B غړه "ډك كړه. خو دا د عبارت دومره عامه ښه ده چې د دې دپاره د صوري نښو معرفي كول به ګټور وي.

تعريف 2.5. $(\forall x \in A)\phi$ د $\forall x(x \in A \rightarrow \phi)$ لنده ښه ده. همدارنګه، $(\exists x \in A)\phi$ د $\exists x(x \in A \wedge \phi)$ لنده ښه ده.

د دې نښو په كارولو سره ووييل شو چې $A \subseteq B$ هله او يوازې هله وي چې $(\forall x \in A)x \in B$ وي. اوس د يو ځانګړي ډول سټ څېړنې ته څو: د يو ټا کلي سټ د ټولو فرعي ستونو سټ.

تعريف 2.6. (د فرعي ستونو سټ). هغه سټ چې د يو سټ A ټول فرعي ستونه پکې وي، د A د فرعي ستونو سټ بللې شي، او $\wp(A)$ ليکل کېږي.

$$\wp(A) = \{B : B \subseteq A\}$$

بېلګه 2.7. د $\{a, b, c\}$ ټول ممکن فرعي ستونه کوم دي؟ دا دي: $\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$. د دې ټولو فرعي ستونو سټ $\wp(\{a, b, c\})$ دے:

$$\wp(\{a, b, c\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

تمرين 2.8. د $\{a, b, c, d\}$ ټول فرعي ستونه وليکئ.

تمرين 2.9. وښايئ چې که A د n په شمېر غړي ولري، نو $\wp(A)$ د 2^n په شمېر غړي لري.

3 ڇڻي مهم ستونه

بيلگه 3.1. مون به زياتره له هغو ستونو سره کار لرو چې غري ټي رياضيكي څيزونه وي. څلور داسي ستونه دومره مهم دي چې ځانگړي نومونه لري:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

د طبيعي عددونو سټ

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

د صحيح عددونو سټ

$$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z} \text{ او } n \neq 0\}$$

د ناطقو عددونو سټ

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

د حقيقي عددونو سټ (پيوستار)

دا ټول نامتناهي ستونه دي، يعني د هريوه غري په نامتناهي شمېر دي.

چې کله د دې ستونو له يوه نه بل ته څو، خپلې زېرمې ته نور عددونه ورزياتوو. په حقيقت کېنې، دا بايد څرگنده وي چې $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$: ځکه چې هر طبيعي عدد صحيح عدد دے، هر صحيح عدد ناطق عدد دے، او هر ناطق عدد حقيقي عدد دے. همدارنګه، دا هم بايد څرگنده وي چې $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q}$ ، ځکه چې -1 صحيح عدد دے خو طبيعي عدد نه دے، او $1/2$ ناطق عدد دے خو صحيح عدد نه دے. دا لږه ناڅرګنده خبره ده چې $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R}$ ، يعني داسې حقيقي عددونه شته چې ناطق نه دي.

کله ناکله به د مثبتو صحيح عددونو سټ $\mathbb{Z}^+ = \{1, 2, 3, \dots\}$ او هغه سټ هم کاروو چې يوازې لومړي دوه طبيعي عددونه لري، يعني $\mathbb{B} = \{0, 1\}$.


بيلگه 3.2 (توريږ تسلسلونه). يوه بله په زړه پورې بيلگه د يوې الفبا A د متناهي توريږو تسلسلونو سټ A^* دے: د A د عناصرو هره متناهي لړۍ د A يو توريږ تسلسل دے. د هرې الفبا A دپاره، تش توريږ تسلسل Λ هم د A په توريږو تسلسلونو کېنې شاملوو. د بيلگې په توګه،

$$\mathbb{B}^* = \{\Lambda, 0, 1, 00, 01, 10, 11,$$

$$000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111, 0000, \dots\}.$$

که $x = x_1 \dots x_n \in A^*$ يو داسې توريږ تسلسل وي چې د A له n "تورو" جوړ وي، نو وايو چې د دې تسلسل اوږدوالی n دے او $\text{len}(x) = n$ ليکو.

بيلگه 3.3 (نامتناهي لړۍ). د هر سټ A دپاره، د A د غړو د نامتناهي لړيو سټ A^ω هم په پام کېنې نيولے شو. يوه نامتناهي لړۍ $a_1 a_2 a_3 a_4 \dots$ د څيزونو له داسې لست نه جوړه وي چې په يو لوري نامتناهي غځېږي، او هر څيز ټي د A يو غړے وي.



شکل 1: د دوو سټونو اتحاد $A \cup B$ د A د غړو او د B د غړو ګډ سټ دے۔

4 اتحادونه او تقاطعې

په 1 کښې مو د تجرید په وسیله د سټونو تعریفونه معرفي کړل، یعنې د $\{x : \phi(x)\}$ په بڼه تعریفونه۔ دلته یو خاصیت ϕ په کار راوړو، او دا خاصیت د هغو سټونو یادونه کولې شي چې مخکې مو تعریف کړي دي۔ نو د بېلګې په توګه، که A او B سټونه وي، د $\{x : x \in A \vee x \in B\}$ سټ له هغو ټولو څیزونو جوړ دے چې د A یا B غړي وي، یعنې دا هغه سټ دے چې د A او B غړي سره یوځای کوي۔ دا لکه په 1 کښې انځورولې شو، چې رنگ شوې ساحه د دواړو سټونو A او B غړي په ګډه ښيي۔

په سټونو دا عمل، یعنې یوځای کول ئې، ډېر ګټور او عام دے؛ نو یو صوري نوم او نښه ورکوو۔

تعریف 4.1 (اتحاد). د دوو سټونو A او B اتحاد، چې $A \cup B$ لیکل کېږي، د ټولو هغو څیزونو سټ دے چې د A ، B ، یا د دواړو غړي وي۔

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}$$

بېلګه 4.2. څرنګه چې د غړو تکرار مهم نه دے، د هغو دوو سټونو اتحاد چې ګډ غړې ولري، هغه غړې یوازې یو ځل لري؛ د بېلګې په توګه، $\{a, b, c\} \cup \{a, 0, 1\} = \{a, b, c, 0, 1\}$ ۔

د یو سټ او د هغه د یو فرعي سټ اتحاد هم هغه لوی سټ دے: $\{a, b, c\} \cup \{a\} = \{a, b, c\}$ ۔

له تش سټ سره د یو سټ اتحاد له هم هغه سټ سره برابر دے: $\{a, b, c\} \cup \emptyset = \{a, b, c\}$ ۔


تمرین 4.3. ثابت کړئ چې که $A \subseteq B$ وي، نو $A \cup B = B$ ۔

د اتحاد یو “دوه ګون” عمل هم په پام کېښی نیولې شو۔ دا هغه عمل دے چې د هغو ټولو غړو سټ جوړوي چې د A غړي وي او د B هم غړي وي۔ دې عمل ته تقاطع وئیل کېږي، او لکه په 2 کښې ښودل کېدے شي۔

تعریف 4.4 (تقاطع). د دوو سټونو A او B تقاطع، چې $A \cap B$ لیکل کېږي، د ټولو هغو څیزونو سټ دے چې د A او B دواړو غړي وي۔

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}$$

دوه سټونه هله بېل بللے شي چې تقاطع ئې تشه وي۔ مطلب دا چې هېڅ ګډ غړي نه لري۔



شکل 2: د دوو سټونو تقاطع $A \cap B$ د هغو د ګډو غړو سټ دے۔

بېلګه 4.5. که دوه سټونه هېڅ ګډ غړي ونه لري، تقاطع ئې تشه ده: $\{a, b, c\} \cap \{0, 1\} = \emptyset$ ۔

که دوه سټونه ګډ غړي ولري، تقاطع ئې د هغو ټولو سټ دے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b, d\} = \{a, b\}$ ۔

د يو سټ او د هغه د يو فرعي سټ تقاطع هم هغه کوچنۍ سټ دے: $\{a, b, c\} \cap \{a, b\} = \{a, b\}$ ۔

له تش سټ سره د هر سټ تقاطع تشه ده: $\{a, b, c\} \cap \emptyset = \emptyset$ ۔

تمرین 4.6. په دقیقه توګه ثابت کړئ چې که $A \subseteq B$ وي، نو $A \cap B = A$ ۔

له دوو څخه د زیاتو سټونو اتحاد یا تقاطع هم جوړولې شو۔ په عمومي توګه د دې د بیانولو یوه ښکلې طریقه دا ده: فرض کړئ چې ټول هغه سټونه چې اتحاد (یا تقاطع) ئې جوړول غواړئ، په یو سټ کېنې راټول کړئ۔ بیا د ټولو اصلي سټونو اتحاد د هغو ټولو څیزونو د سټ په توګه تعریفولې شو چې لږ تر لږه د دې سټ د یو غړي غړي وي، او تقاطع د هغو ټولو څیزونو د سټ په توګه چې د دې سټ د هر غړي غړي وي۔

تعریف 4.7. که A د سټونو یو سټ وي، نو $A \cup A$ د A د غړو د غړو سټ دے:

$$\begin{aligned} \bigcup A &= \{x : x \text{ د دې سټ د یو غړي غړی دے} : x \in A\}, \text{ یعنې,} \\ &= \{x : x \text{ شته چې } B \in A \text{ داسې یو } x \in B\} \end{aligned}$$

تعریف 4.8. که A د سټونو یو سټ وي، نو $A \cap A$ د هغو څیزونو سټ دے چې د A ټول عناصر ئې په ګډه لري:


$$\begin{aligned} \bigcap A &= \{x : x \text{ د دې سټ د هر غړي غړی دے} : x \in A\}, \text{ یعنې,} \\ &= \{x : x \text{ د هر } B \in A, x \in B\} \end{aligned}$$

بېلګه 4.9. فرض کړئ چې $A = \{\{a, b\}, \{a, d, e\}, \{a, d\}\}$ ۔ بیا $\bigcup A = \{a, b, d, e\}$ او $\bigcap A = \{a\}$ ۔

تمرین 4.10. وښايئ چې که A یو سټ وي او $A \in B$ وي، نو $A \subseteq \bigcup B$ ۔

د سټونو د یوې لړۍ $A_1, A_2, \dots$ دپاره هم دا کار کولې شو:

$$\begin{aligned} \bigcup_i A_i &= \{x : x \text{ د دې سټونو څخه د یوه غړی دے} : x \in A_i\} \\ \bigcap_i A_i &= \{x : x \text{ د دې هر سټ غړی دے} : x \in A_i\}. \end{aligned}$$



شکل 3: د دوو سټونو تفاضل $A \setminus B$ د A د هغو غړو سټ دے چې د B غړي نه وي.

چې کله د سټونو یو انډکس ولرو، یعنې داسې یو سټ I چې د هر $i \in I$ دپاره A_i په پام کېنې نيسو، دا لنډې بڼې هم کارولې شو:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup \{A_i : i \in I\}$$

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \bigcap \{A_i : i \in I\}$$

په پای کېنې، کېدے شي د A د هغو ټولو غړو سټ په پام کېنې نیول وغواړو چې په B کېنې نه وي. دا لکه په 3 کېنې انځورولې شو.

تعریف 4.11 (تفاضل). د سټونو تفاضل $A \setminus B$ د A د هغو ټولو غړو سټ دے چې د B غړي نه وي، یعنې،

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ او } x \notin B\}.$$

تمرین 4.12. ثابت کړئ چې که $A \subsetneq B$ وي، نو $B \setminus A \neq \emptyset$.

5 جوړې، څوگونې او کارټيزي حاصل ضربونه

د غړو له مخې له برابری نه دا نتیجه راوځي چې د سټونو عناصر ترتیب نه لري. نو که د ترتیب استازیتوب کول غواړو، مرتبې جوړې $\langle x, y \rangle$ کاروو. په یوه نامرتبه جوړه $\{x, y\}$ کېنې ترتیب مهم نه دے: $\{x, y\} = \{y, x\}$. په مرتبه جوړه کېنې ترتیب مهم دے: که $x \neq y$ وي، نو $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

د سټونو په نظریه کېنې مرتبې جوړې څنګه په پام کېنې ونیسو؟ بنیادي خبره دا ده چې دا نظر وساتو: مرتبې جوړې هله او یوازې هله برابري وي چې لومړۍ عنصر یې هم یو وي او دویم عنصر یې هم یو وي، یعنې:

$$\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle \text{ هله او یوازې هله چې دواړه } a = c \text{ او } b = d.$$

د وینر-کوراتوسکي تعریف په کارولو سره د سټونو په نظریه کېنې مرتبې جوړې تعریفولې شو.

تعریف 5.1 (مرتبه جوړه). $\langle a, b \rangle = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

تمرین 5.2. د 5.1 په کارولو سره ثابت کړئ چې $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ هله او یوازې هله وي چې $a = c$ او $b = d$ دواړه وي.

چې د مرتبې جوړې تعریف مو وټاکلو، د نورو ستونو د تعریف دپاره ئې کارولې شو. د بېلګې په توګه، کله کله له دوو څخه د زیاتو څیزونو مرتبې لری هم غواړو، لکه درې ګونې $\langle x, y, z \rangle$ ، څلورګونې $\langle x, y, z, u \rangle$ ، او داسې نورې. درې ګونې د ځانګړو مرتبو جوړو په توګه ګڼلې شو، چې لومړۍ عنصر ئې پخپله یوه مرتبه جوړه وي: $\langle x, y, z \rangle$ هم $\langle \langle x, y \rangle, z \rangle$ دے. د څلورګونو دپاره هم همداسې ده: $\langle x, y, z, u \rangle$ هم $\langle \langle \langle x, y \rangle, z \rangle, u \rangle$ دے، او داسې نور. په عمومي توګه، د مرتبو n -ګونو $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ خبره کوو. د مرتبو جوړو، یا د نورو مرتبو n -ګونو، ځینې ستونه به ګټور وي.

تعریف 5.3 (کارتیزي حاصل ضرب). د ورکړل شوو ستونو A او B کارتيزي حاصل ضرب $A \times B$ داسې تعریفېږي:

$$A \times B = \{ \langle x, y \rangle : x \in A \text{ او } y \in B \}.$$

بېلګه 5.4. که $A = \{0, 1\}$ او $B = \{1, a, b\}$ وي، نو حاصل ضرب ئې دا دے:

$$A \times B = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle \}.$$

بېلګه 5.5. که A یو سټ وي، له خپل ځان سره د A حاصل ضرب، $A \times A$ ، د A^2 په بڼه هم لیکل کېږي. دا د هغو ټولو جوړو $\langle x, y \rangle$ سټ دے چې $x, y \in A$ وي. د ټولو درې ګونو $\langle x, y, z \rangle$ سټ A^3 دے، او داسې نور. یو بازګشتي تعریف ورکولے شو:

$$\begin{aligned} A^1 &= A \\ A^{k+1} &= A^k \times A \end{aligned}$$

تمرین 5.6. د $\{1, 2, 3\}^3$ ټول غړي وليکئ.

قضیه 5.7. که A د n په شمېر غړي او B د m په شمېر غړي ولري، نو $A \times B$ د $n \cdot m$ په شمېر عناصر لري.

ثبوت. په A کېنې د هر غړي x دپاره، د $\langle x, y \rangle \in A \times B$ په بڼه د m په شمېر غړي شته. فرض کړئ چې $B_x = \{ \langle x, y \rangle : y \in B \}$ څرنګه چې هر کله $x_1 \neq x_2$ وي، $\langle x_1, y \rangle \neq \langle x_2, y \rangle$ وي، نو $B_{x_1} \cap B_{x_2} = \emptyset$ خو که $A = \{x_1, \dots, x_n\}$ وي، نو $A \times B = B_{x_1} \cup \dots \cup B_{x_n}$ ، او ځکه د $n \cdot m$ په شمېر غړي لري.

د دې د انځورولو دپاره، د $A \times B$ غړي په یوه جالۍ کېنې ترتیب کړئ:

$$\begin{aligned} B_{x_1} &= \{ \langle x_1, y_1 \rangle \quad \langle x_1, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_1, y_m \rangle \} \\ B_{x_2} &= \{ \langle x_2, y_1 \rangle \quad \langle x_2, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_2, y_m \rangle \} \\ &\vdots \\ B_{x_n} &= \{ \langle x_n, y_1 \rangle \quad \langle x_n, y_2 \rangle \quad \dots \quad \langle x_n, y_m \rangle \} \end{aligned}$$

څرنګه چې ټول x_i یو له بله بېل دي، او ټول y_j یو له بله بېل دي، په دې جالۍ کېنې هېڅ دوه جوړې یو شان نه دي، او شمېر ئې $n \cdot m$ دے. □

تمرین 5.8. په k د استقرا په وسیله وښائی چې د هر $k \geq 1$ دپاره، که A د n په شمېر غړي ولري، نو A^k د n^k په شمېر غړي لري.

بېلگه 5.9. که A یو سټ وي، په A یوه کلمه د A د غړو هره لړۍ ده. یوه لړۍ د A د غړو د یوې n -گونې په توګه ګڼل کېدای شي. د بېلګې په توګه، که $A = \{a, b, c\}$ وي، نو لړۍ "bac" د درې گونې $\langle b, a, c \rangle$ په توګه ګڼل کېدای شي. کله، یعنې د لنډو لړۍ، په کمپیوټر ساینس کېنې بنیادي اهمیت لري. د منل شوي دود له مخې، د A د غړي د 1 اوږدوالي لرونکې لړۍ ګڼو، او $\emptyset$ د 0 اوږدوالي لرونکې لړۍ ګڼو. بیا په A د ټولو کلمو سټ دا ده:

$$A^* = \{\emptyset\} \cup A \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$$

6 د رسل پارادوکس

د غړو له مخې برابري د هغو x ګانو د هم هغه سټ دپاره د $\{x : \phi(x)\}$ نښې د کارولو جواز راکوي چې $\phi(x)$ وي. خو د غړو له مخې برابري په اصل کېنې یوازې د دې خبرې جواز راکوي: که داسې یو سټ وي چې غړي ئې ټول او یوازې هغه څیزونه وي چې ϕ وي، نو داسې سټ یوازې یو وي. په بل عبارت: د یو ϕ له ټاکلو وروسته، سټ $\{x : \phi(x)\}$ یوازینۍ ده، که موجود وي.

خو دا شرط مهم ده! بنیادي خبره دا ده چې له هر خاصیت څخه د سټ جوړول ممکن نه دي. یعنې ځینې خاصیتونه ستونزه نه تعریفوي. که ټولو تعریفو، نو له ښکاره تناقضونو سره به مخ شوو. د دې تر ټولو مشهوره بېلګه د رسل پارادوکس ده.

ستونه د نورو ستونو غړي کېدای شي؛ د بېلګې په توګه، د یو سټ A د فرعي ستونو سټ له ستونو جوړ وي. نو دا پوښتل یا څېړل معقول دي چې یو سټ د بل سټ غړی ده که نه. آیا یو سټ د خپل ځان غړی کېدای شي؟ د سټ په تصور کېنې ظاهراً هېڅ داسې خبره نشته چې دا ناممکنه کړي. د بېلګې په توګه، که ټول ستونه د څیزونو یوه ټولګه جوړوي، یو څوک ښايي فکر وکړي چې دا ټول په یو سټ کېنې راټولېدای شي، یعنې د ټولو ستونو په سټ کېنې. او دا چې پخپله یو سټ ده، نو د ټولو ستونو د سټ غړی به وي.

د رسل پارادوکس هغه وخت راولاړېږي چې دا خاصیت په پام کېنې ونیسو چې یو سټ خپل ځان د غړی په توګه ونه لري، یعنې د خپل ځان غړی نه وي. که فرض کړو چې د ټولو هغو ستونو یو سټ شته چې خپل ځان د غړی په توګه نه لري، نو څه به وشي؟ آیا

$$R = \{x : x \notin x\}$$

شته؟ څرګندېږي چې ثابتولې شو دا نشته.

قضیه 6.1 (د رسل پارادوکس). د $R = \{x : x \notin x\}$ په بڼه هېڅ سټ نشته.

ثبوت. که $R = \{x : x \notin x\}$ موجود وي، نو $R \in R$ هله او یوازې هله وي چې $R \notin R$ وي، او دا یو تناقض ده. □

راځئ دا ثبوت لږ ورو وګورو. که R موجود وي، دا پوښتنه معقوله ده چې $R \in R$ ده که نه. فرض کړئ چې په رښتیا $R \in R$ اوس، R د هغو ټولو ستونو د سټ په توګه تعریف شوی و چې د خپلو ځانونو غړي نه دي. نو که $R \in R$ وي، بیا R پخپله د R تعریفونکې خاصیت نه لري. خو یوازې هغه ستونه په R کېنې دي چې دا خاصیت لري؛ ځکه R د R غړی نه شي کېدای، یعنې $R \notin R$. خو R په یو وخت د R غړی هم نه شي کېدای او ناغړی هم، نو له تناقض سره مخ یو.

څرنگه چې د $R \in R$ فرض تناقض ته رسوي، نو $R \notin R$ لرو. خو دا هم تناقض ته رسوي! ځکه که $R \notin R$ وي، نو R پخپله د R تعريفونکې خاصيت لري، او ځکه R به د هغو ټولو نورو ستونو په شان د R غړې وي چې د خپل ځان غړي نه دي. او بيا هم، په يو وخت د R ناغړې او غړې دواړه نه شي کېدې.

د ستونو داسې نظريه څنگه جوړه کړو چې د رسل له پارادوکس څخه ځان وساتي، يعنې له دې متناقضې دعوي څخه ځان وساتي چې $R = \{x : x \notin x\}$ موجود دے؟ د دې دپاره داسې بديهي اصولونه ټاکل پکار دي چې دا بيان کړي چې ستونه کله موجود وي (او کله نه وي)، او ډېر دقيق شرطونه ورکړي.

د ستونو هغه نظريه چې په دې باب کېنې په لنډه توګه بيان شوې، دا کار نه کوي. دا په رښتيا ساده نظريه ده. دا يوازې درته وائي چې ستونه د غړو له مخې د برابرۍ پابند دي، او که ځينې ستونه ولري، د هغو اتحاد، تقاطع او داسې نور جوړولې شي. د ستونو نظريه له دې نه په زيات دقت هم جوړېدل ممکن دي.