

خلاص منطق

پښتو — پاکستان

د ثبوت نظامونه او بشپړتیا

د ماشینې ژباړې د روان کار پځمه لوستیزه نسخه

په دې لوستیزه نسخه کې د بیاني منطق د نحو او معناپوهنې بشپړ باب، د ثبوتي نظامونو ټولګټنه، د لومړۍ درجې منطق د سېکوېنټ حساب، فطري استنتاج، تابلو او بدیهي اشتقاق بشپړ بابونه، او د لومړۍ درجې منطق د بشپړتیا باب شامل دي. وروستی باب د نحوي وسیلو، لیندېناوم جوړونې، ترمي مودلونو، بشپړتیا، فشر دګۍ او ښکته لوڼه‌نایم-سکولم قضیه را اخلي. دا ټول 82 سرچینیز واحدونه دي؛ د ۷۲۲ واحدونو بشپړه ژباړه لا روانه ده او تراوسه 137 واحدونه په ژباړل شوي بډل کېږي شته.

په متن کې کېلې عنوانونه او ورپسې آبي [OLP] ښه د بشپړ OpenLogic هغو لومړۍ درجې منطق نحوي او معنایي برخو ته تړنې دي چې په دې جزوي لوستیزه نسخه کې نه دي شاملې. هره ښه اړوند تعریف، قضیه یا نتیجه په ثابته سرچینه کې پرانیزې.

Independent Pashto (Pakistan) translation of Open Logic Project revision 9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0. This reader contains 82 source units (OLP-0056 through OLP-0137). Pakistani usage is primary; Afghan Pashto sources are labelled regional comparators. Specialist terminology remains openly reviewable where exact native technical attestation is sparse. No native-reader review or upstream endorsement is claimed.

Original text and adaptation: Creative Commons Attribution 4.0 International, subject to the component notices preserved with the source snapshot. [Open Logic Project](#). [Translation catalogue](#). [Edition lineage](#).

فهرست

5	1 نحو او معنی پوهنه
5	1.1 پېژندنه
6	1.2 بياني فارمولونه
7	1.3 لومړنۍ پايلې
9	1.4 جوړښتي لړۍ
11	1.5 ارزښت ټاکنې او صدق
13	1.6 معنایي مفهومونه
15	2 د اشتقاق نظامونه
15	2.1 پېژندنه
16	2.2 د سپکوپنټ حساب
17	2.3 طبيعي استنتاج
18	2.4 تابلوګانې
19	2.5 بدیهي اشتقاقونه
21	3 د سپکوپنټ حساب
21	3.1 قاعدې او اشتقاقونه
22	3.2 بياني قاعدې
22	3.2.1 د $\neg$ دپاره قاعدې
22	3.2.2 د $\wedge$ دپاره قاعدې
22	3.2.3 د $\vee$ دپاره قاعدې
23	3.2.4 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې
23	3.3 د سورونو قاعدې
23	3.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې
23	3.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

24	جورښتي قاعدې	3.4
24	کمزوري کول	3.4.1
24	انقباض	3.4.2
24	تبادلہ	3.4.3
25	اشتقاقونه	3.5
26	د اشتقاقونه بېلګې	3.6
31	له سورونو سره اشتقاقونه	3.7
32	د ثبوت-تيوريکي مفاهيم	3.8
34	د اشتقاق وړتيا او سازګاري	3.9
36	د اشتقاق وړتيا او قضيز نښلونکي	3.10
37	د اشتقاق وړتيا او سورونه	3.11
38	سموالے	3.12
42	له عينيت سره اشتقاقونه	3.13
43	له عينيت سره سموالے	3.14
44	فطري استنتاج	4
44	قاعدې او اشتقاقونه	4.1
45	قضبي قاعدې	4.2
45	د $\wedge$ دپاره قاعدې	4.2.1
45	د $\vee$ دپاره قاعدې	4.2.2
45	د $\rightarrow$ دپاره قاعدې	4.2.3
45	د $\neg$ دپاره قاعدې	4.2.4
45	د $\perp$ دپاره قاعدې	4.2.5
46	د سورونو قاعدې	4.3
46	د $\forall$ دپاره قاعدې	4.3.1
46	د $\exists$ دپاره قاعدې	4.3.2
47	اشتقاقونه	4.4
48	د اشتقاقونه بېلګې	4.5
53	له سورونو سره اشتقاقونه	4.6
56	ثبوت-تيوريکي مفاهيم	4.7
58	د اشتقاق وړتيا او سازګاري	4.8
59	د اشتقاق وړتيا او قضبي رابطونه	4.9
61	د اشتقاق وړتيا او سورونه	4.10

61	4.11 سوالے
65	4.12 له عينيت سره اشتقاقونه
66	4.13 له عينيت سره سوالے

5 تابلوگانې

68	5.1 قاعدې او تابلوگانې
69	5.2 قضیوي قاعدې
69	5.2.1 د $\neg$ قاعدې
69	5.2.2 د $\wedge$ قاعدې
69	5.2.3 د $\vee$ قاعدې
69	5.2.4 د $\rightarrow$ قاعدې
69	5.2.5 د پرېکون قاعده
70	5.3 د سورونو قاعدې
70	5.3.1 د $\forall$ قاعدې
70	5.3.2 د $\exists$ قاعدې
71	5.4 تابلوگانې
72	5.5 د تابلوگانې بېلگې
77	5.6 له سورونو سره تابلوگانې
81	5.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم
83	5.8 د اشتقاق وړتيا او سازگاري
85	5.9 د اشتقاق وړتيا او قضیوي رابطونه
87	5.10 د اشتقاق وړتيا او سورونه
89	5.11 سوالے
91	5.12 له عينيت سره تابلوگانې
92	5.13 له عينيت سره سوالے

6 بدیې اشتقاقونه

94	6.1 قاعدې او اشتقاقونه
96	6.2 د قضیې نښلونکو دپاره بدیې اصول او قاعدې
96	6.3 د کمیت ټاکونکو دپاره بدیې اصول او قاعدې
97	6.4 د اشتقاقونه بېلگې
98	6.5 له کمیت ټاکونکو سره اشتقاقونه
99	6.6 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

100	6.7 د استنتاج قضيه
102	6.8 له كميت ټاكونكو سره د استنتاج قضيه
103	6.9 د اشتقاق وړتيا او سازگاري
104	6.10 د اشتقاق وړتيا او د قضبي نښلوونكي
105	6.11 د اشتقاق وړتيا او كميت ټاكونكي
105	6.12 سمواله
107	6.13 له عينيت سره اشتقاقونه
108	7 د بشپرتيا قضيه
108	7.1 سريزه
109	7.2 د ثبوت لنډيز
111	7.3 د ترلي فارمولونه بشپړ سازگار ستونه
112	7.4 د هنكين غځونه
114	7.5 د لينډنباوم له
115	7.6 د يو مدل جوړونه
117	7.7 عينيت
120	7.8 د بشپرتيا قضيه
121	7.9 د متناهي شاهد قضيه
123	7.10 د متناهي شاهد قضبي نېغ ثبوت
124	7.11 د لوښايم-سكولم قضيه

باب 1

نحو او معنی پوهنه

ادارتي یادونه - دا یوازې د تعریفونو ډېره لنډه لنډیزه ده - باید پراخه شي، خو د فارمولونو پر جوړښت د استقرا د ثبوتونو اسانه پېژندنه او ډېرې نورې بېلګې پکې راشي -

1.1 پېژندنه

بیاني منطق له هغو فارمولونه سره کار لري چې له بیاني متغیرونه څخه د $\neg$ ، $\wedge$ ، $\vee$ ، $\rightarrow$ او $\leftrightarrow$ بیاني نښلونکو په کارولو جوړېږي. د تصور له مخې، بیاني متغیر p د داسې یوې جملې یا بیان ځای نیسي چې رښتونه یا دروغ ژن وي. هر کله چې په فارمول کې د بیاني متغیر "د رښتیاوالي قیمت" وټاکل شي، نو د بیاني نښلونکو په کارولو ترې د جوړو شویو ټولو فارمولونه د رښتیاوالي قیمت هم ټاکل کېږي. وایو چې بیاني منطق د رښتیاوالي تابعي دے، ځکه چې معنی پوهنه یې د رښتیاوالي د قیمتونو د تابعو له مخې ورکول کېږي. په تېره بیا، په بیاني منطق کې دا نه څېړو چې رښتیاوالی او دروغوالی نور څنګه ټاکل کېږي؛ مثلاً دا چې یو څه د یوازې اتفاقي رښتیاوالي پر ځای بالضروره رښتیا دي، یا څوک پرې پوهېږي چې رښتیا دي، یا اوس رښتیا دي نه دا چې پخوا رښتیا وو یا وروسته به رښتیا وي. موږ یوازې د رښتیا ($\mathbb{T}$) او دروغو ($\mathbb{F}$) دوه قیمتونه په پام کې نیسو، نو دا امکان له بحثه وباسو چې یو بیان دې نه رښتونه وي نه دروغ ژن، یا دې نیم رښتونه وي. موږ یوازې هغو نښلونکو ته هم پام کوو چې ترې د جوړ شوي فارمول د رښتیاوالي قیمت د هغې د برخو د رښتیاوالي په قیمتونو پوره ټاکل کېږي، نه مثلاً د هغې په معنی. په تېره بیا، دا لاندې ده چې په انګرېزي کې د شرطیو رښتیاوالي قیمت په دې معنی تابعي دے که نه. مادي شرطی $\rightarrow$ تابعي دے؛ نور منطقونه له هغو شرطیو سره کار کوي چې د رښتیاوالي تابعي نه وي.

د رښتیاوالي د تابعي بیاني منطق د نظريې او مابعد منطق د ودې دپاره باید لومړۍ د هغه د عبارتونو نحو او معنی پوهنه تعریف کړو. موږ به له بیاني متغیرونه څخه د نښلونکو په کارولو د فارمولونه د جوړولو یوه لار بیان کړو. نور تعریفونه هم ممکن دي. نور نظامونه به بېلې نښې غوره کړي، د بنسټیزو نښلونکو بېل ستونه به وټاکي او قوسونه به په بېله توګه وکاروي، یا به یې هېڅ ونه کاروي، لکه په تش په نامه پولنډۍ نښه اېښودنه کېږي. خو په ټولو لارو کې یو ګډ شے دا دے چې د جوړېدو قاعدې د فارمولونه سټ په استقرایي ډول تعریفوي. که کار په سمه توګه وشي، هر عبارت د جوړېدو د قاعدو له مخې په اصل کې یوازې په یوه لار ترلاسه کېدے شي. هغه استقرایي تعریف چې په یګا ډول لوستل کېدونکي عبارتونه ورکوي، موږ ته اجازه راکوي چې په هماغه طریقه، یعنې په استقرایي تعریف، دغو عبارتونو ته معنی ورکړو.

عبارتونو ته معنی ورکول د معنی پوهنې ډگر ده. د بياني منطق په معنی پوهنه کېنې مرکزي مفهوم په ارزښت ټاکنه کېنې صدق ده. ارزښت ټاکنه v بياني متغیرونه ته د رښتياوالي $\mathbb{T}$ او $\mathbb{F}$ قيمتونه ورکوي. هر ارزښت ټاکنه د هر فارمول A دپاره د رښتياوالي قيمت $v(A)$ ټاکي. فارمول په ارزښت ټاکنه v کېنې هله او يوازې هله صادق ده چې $v(A) = \mathbb{T}$ وي؛ دا په $v \models A$ لیکو. دا اړیکه د A پر جوړښت د استقرا له مخې هم تعريفېدای شي: د منطقي ښلولونکو د رښتياوالي تابعي کاروو، خو مثلاً د $A \wedge B$! صدق د A ! او B ! د صدق يا نه صدق له مخې تعريف کړو.

د جملو د صدق د اړیکې $v \models A$ پر بنسټ بيا د تاوتولوژۍ، استلزام او د صدق وړتيا بنسټيز معنایي مفهومونه تعريفول شول. فارمول هله تاوتولوژي، $v \models A$ ، ده چې هر ارزښت ټاکنه ئې صادق کړي، يعنې د هر v دپاره $v(A) = \mathbb{T}$ وي. د فارمولونه يو سټ هله هغې ته استلزام ورکوي، $\Gamma \models A$ ، چې هر هغه ارزښت ټاکنه چې د Γ ټول فارمولونه صادق کړي، A هم صادق کړي. او د فارمولونه يو سټ هله د صدق وړ ده چې کوم ارزښت ټاکنه ئې ټول فارمولونه په يو وخت صادق کړي. ځکه چې فارمولونه په استقرايي ډول تعريف شوي او صدق بيا د فارمولونه پر جوړښت د استقرا له مخې تعريف شوی، موږ استقرا کارول شو چې د خپلې معنی پوهنې خاصيتونه ثابت او تعريف شوي معنایي مفهومونه يو له بل سره وتړو.

1.2 بياني فارمولونه

د بياني منطق فارمولونه له بياني متغیرونه، د دروغوالي له بياني ثابت $\perp$ او د رښتياوالي له بياني ثابت $\top$ څخه د منطقي ښلولونکو په کارولو جوړېږي.

1. د بياني متغیرونه $p_0, p_1, \dots$ يو شمېرېدونکې لامتناهي سټ At_0
2. د دروغوالی بياني ثابت $\perp$.
3. د رښتياوالی بياني ثابت $\top$.
4. منطقي ښلولونکي: $\neg$ (نفي)، $\wedge$ (عطف)، $\vee$ (فصل)، $\rightarrow$ (شرطي)، $\leftrightarrow$ (دوه اړخيز شرطي)
5. د وقف ښې: $()$ او کامه.

د بياني منطق دا ژبه په $\mathcal{L}_0$ ښیو.

کېدای شي تاسو له هغو اصطلاحاتو او ښو سره بلد یئ چې زموږ له پورته کارولو سره توپیر لري. د منطق متنونه، او ښوونکي، عموماً د “نفي” دپاره $\neg$ ، او $\wedge$ ، او $\vee$ ، او $\rightarrow$ ، او $\leftrightarrow$ ، او $\equiv$ دي. د “شرطي” يا “استلزام” عامې ښې $\rightarrow$ ، او $\equiv$ دي. د “دوه اړخيز شرطي”، “دوه اړخيز استلزام” يا “مادي” هم ارزښت ټاکنې $\leftrightarrow$ ، او $\equiv$ دي. د $\perp$ ښې ته په بېلو ځایونو کېنې “دروغوالی”، “فالسوم”، “محال” يا “ښکته” ويل کېږي. د $\top$ ښې ته په بېلو ځایونو کېنې “رښتياوالی”، “وېروم” يا “پورته” ويل کېږي.

تعريف 1.1 (فارمول). د بياني منطق د فارمولونه سټ $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ په استقرايي ډول داسې تعريفېږي:

1. $\perp$ يو اټومي فارمول ده.
2. $\top$ يو اټومي فارمول ده.

3. هر بياني متغير p_i يو اتومي فارمول دے۔

4. که A يو فارمول وي، نو $\neg A$ هم يو فارمول دے۔

5. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \wedge B)$ يو فارمول دے۔

6. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \vee B)$ يو فارمول دے۔

7. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \rightarrow B)$ يو فارمول دے۔

8. که A او B فارمولونه وي، نو $(A \leftrightarrow B)$ يو فارمول دے۔

9. بل هېڅ شے فارمول نه دے۔

د فارمولونه تعريف يو استقرائي تعريف دے۔ په اصل کښې موږ د فارمولونه سټ په نامتناهي ډېرو پړاوونو کښې جوړوو۔ په لومړني پړاو کښې ټول اتومي فارمولونه فارمولونه گڼو؛ دا د تعريف له لومړنيو څو حالتونو سره سمون لري، يعنې د $\perp$ ، $\top$ ، p_i حالتونه۔ په دې توگه “اتومي فارمول” د همدې بڼې هر فارمول ته وايي۔

د تعريف نور حالتونه له هغو فارمولونه څخه د نويو فارمولونه د جوړولو قاعدې راكوي چې له مخکښې جوړ شوي وي۔ په دويم پړاو کښې له دغو قاعدو څخه په کار اخيستو له اتومي فارمولونه څخه فارمولونه جوړول شوي۔ په درېيم پړاو کښې له اتومي فارمولونو او په دويم پړاو کښې له ترلاسه شويو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، او همداسې مخکښې ځو۔ فارمول هر هغه شے دے چې بالاخره په داسې کوم پړاو کښې جوړ شي، او بل هېڅ شے نه دے۔

کله چې د دوه ځايه نښلوونکي $*$ په کارولو له B او C څخه جوړ شوي فارمول $(B * C)$ لیکو، ډېر ځله د قوسونو تر ټولو بهرنی جوړ پرېږدو او يوازې $B * C$ لیکو۔

تعريف 1.2 (نځوي يوشانوالی). د $\equiv$ نښه د نښو د توريږو لريو ترمنځ نځوي يوشانوالی څرگندوي؛ يعنې $A \equiv B$ هله او يوازې هله چې A او B د نښو د يو شان اوږدوالي توريږې لري وي او په هر ځاي کښې يوه نښه ولري۔

د $\equiv$ نښې دواړو خواوو ته د يو ځاي کولو له لارې ترلاسه شوې توريږې لري هم راتلې شي۔ مثلاً $A \equiv (B \vee C)$ دا معنی لري: د نښو توريږه لري A هماغه توريږه لري ده چې په همدې ترتيب د پرانيستي قوس، د B توريږې لري، د $\vee$ نښې، د C توريږې لري او د ترلي قوس په يو ځاي کولو ترلاسه کېږي۔ که داسې وي، نو پوهېږو چې د A لومړۍ نښه پرانيسته قوس دے، A د B توريږه لري د فرعي توريږې لري په توگه لري چې له دويمې نښې پيلېږي، ورپسې $\vee$ راځي، او داسې نور۔

1.3 لومړنۍ پايلې

قضيه 1.3 (د فارمولونه دپاره د استقرا اصل). که کوم خاصيت P د ټولو اتومي فارمولونه دپاره صدق کوي او داسې وي چې

1. هر کله چې د A دپاره صدق کوي، د $\neg A$ دپاره هم صدق کوي؛

2. هر کله چې د A او B دپاره صدق کوي، د $(A \wedge B)$ دپاره هم صدق کوي؛

3. هر کله چې د A او B دپاره صدق کوي، د $(A \vee B)$ دپاره هم صدق کوي؛

4. هر کله چې د A او B دپاره صدق کوي، د $(A \rightarrow B)$ دپاره هم صدق کوي؛

5. هر کله چې د A او B دپاره صدق کوي، د $(A \leftrightarrow B)$ دپاره هم صدق کوي؛

نو P د ټولو فارمولونه دپاره صدق کوي.

ثبوت. S دې د هغو ټولو فارمولونه مجموعه وي چې خاصيت P لري. په شرکنده $S \subseteq \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د 1.1 ټول شرطونه پوره کوي: ټول اتومي فارمولونه لري او د منطقي عملګرونه له مخې بند دے. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د دې ډول تر ټولو وړوکه ټولګه دے، نو $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq S$ له دې امله $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) = S$ او هر فارمول خاصيت P لري. $\square$

قضيه 1.4. په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کېنې هر فارمول متوازن دے؛ يعنې د کېنو قوسونو شمېر ئې د بڼيو قوسونو له شمېر سره برابر دے.

تمرين 1.5. د 1.4 ثبوت ورکړئ.

قضيه 1.6. د فارمول هېڅ خاصه پيلنې برخه فارمول نه ده.

تمرين 1.7. د 1.6 ثبوت ورکړئ.

قضيه 1.8 (يگا لوستنوتيا). په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کېنې هر فارمول A په لاندې بڼو کېنې د يوې په توګه پوره يوه تجزيه لري:

1. $\perp$.

2. $\top$.

3. د کوم $p_n \in \text{At}_0$ دپاره p_n .

4. د کوم فارمول B دپاره $\neg B$.

5. د کومو فارمولونه B او C دپاره $(B \wedge C)$.

6. د کومو فارمولونه B او C دپاره $(B \vee C)$.

7. د کومو فارمولونه B او C دپاره $(B \rightarrow C)$.

8. د کومو فارمولونه B او C دپاره $(B \leftrightarrow C)$.

سرېره پر دې، دا تجزيه يگا ده.

ثبوت. پر A استقرا کوو. مثلاً فرض کړئ چې A د $(B \rightarrow C)$ او $(B' \rightarrow C')$ په توګه دوه بېلې لوستنې لري. نو B او B' بايد يو شان وي، کېنې يو به د بل خاصه پيلنې برخه وي؛ نو که د A دواړه لوستنې بېلې وي، علت ئې خامخا دا دے چې C او C' د نښو د هماغې يوې لړۍ بېلې لوستنې دي، چې د استقرايي فرض له مخې ناشونې ده. $\square$

تعريف 1.9 (يو شان ځايناستي). که A او B فارمولونه وي او p_i يو بياني متغير وي، نو $A[B/p_i]$ هغه پايله بڼې چې په A کېنې د p_i هر راتګ د B په يوه راتګ بدل شي؛ همدارنګه، د $p_1, \dots, p_n$ پر ځاۍ په يو وخت د فارمولونه $B_1, \dots, B_n$ ځايناستي په $A[B_1/p_1, \dots, B_n/p_n]$ ښودل کېږي.

تمرین 1.10. د لاندې پنځو فارمولونه په هر یوه کښې وټاکئ چې آیا فارمول د $A[B/p_i]$ د ځایناستي په توګه څرګندېدې شي، چې A ! په دې کښې یو وي: (الف) p_0 ؛ (ب) $(\neg p_0 \wedge p_1)$ ؛ او (ج) $((\neg p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$. په هر حالت کښې اړونده ځایناستي په ګوته کړئ.

$$1. p_1$$

$$2. (\neg p_0 \wedge p_0)$$

$$3. ((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$$

$$4. \neg((p_0 \rightarrow p_1) \wedge p_2)$$

$$5. ((\neg(p_0 \rightarrow p_1) \rightarrow (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$$

تمرین 1.11. د $A[B/p]$! یو له ریاضي پلوه کره تعریف د استقرا له مخې ورکړئ.

1.4 جوړښتي لړۍ

په استقرایي تعریف سره د فارمولونه تعریفول، او د استقرا له لارې د فارمولونه د خاصیتونو د ثابتولو بشپړوونکې طریقه، ښکې او اغېزمنه لار ده. خو کله کله دا هم کتوره وي چې د فارمولونه جوړول له پنځه پورته، کام په کام وڅېړو. دلته د جوړښتي لړۍ په مفهوم همدا کار کوو.

تعریف 1.12 (د فارمولونو جوړښتي لړۍ). د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ښو د توزیزو لړیو یوه متناهي لړۍ $\langle A_0, \dots, A_n \rangle$ د A ! دپاره جوړښتي لړۍ ده که $A \equiv A_n$! وي او د هر $i \leq n$ دپاره یا A_i ! اتومي فارمول وي، یا داسې $j, k < i$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

$$1. A_i \equiv \neg A_j$$

$$2. A_i \equiv (A_j \wedge A_k)$$

$$3. A_i \equiv (A_j \vee A_k)$$

$$4. A_i \equiv (A_j \rightarrow A_k)$$

$$5. A_i \equiv (A_j \leftrightarrow A_k)$$

بېلګه 1.13

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle$$

د $\neg(p_1 \wedge p_0)$ یوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \rightarrow p_1), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle.$$

لکه چې له دویمې بېلګې ښکاري، په جوړښتي لړیو کښې “بې ګټې توکي” هم راتلې شي: داسې فارمولونه چې زیاتي وي یا په جوړونه کښې ونډه نه لري.

قضيه 1.14. په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول A يوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. فرض کړئ A اتومي ده. نو لړۍ $\langle A \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده. اوس فرض کړئ چې B او C په ترتيب سره جوړښتي لړۍ $\langle B_0, \dots, B_n \rangle$ او $\langle C_0, \dots, C_m \rangle$ لري.

1. که $A \equiv \neg B$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, \neg B_n \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

2. که $A \equiv (B \wedge C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \wedge C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

3. که $A \equiv (B \vee C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \vee C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

4. که $A \equiv (B \rightarrow C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \rightarrow C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

5. که $A \equiv (B \leftrightarrow C)$ وي، نو $\langle B_0, \dots, B_n, C_0, \dots, C_m, (B_n \leftrightarrow C_m) \rangle$ د A جوړښتي لړۍ ده.

د فارمولونه دپاره د استقرا د اصل له مخې، هر فارمول يوه جوړښتي لړۍ لري.

د دې عکس هم ثابتولې شو. دا ځکه مهم ده چې ښيي د فارمولونو د تعريف زموږ دواړه لارې همارښته دي: دواړه يو شان پايلې ورکوي. دا هم ترې معلومېږي چې د جوړښتي لړيو پر اوږدوالي عادي استقرا کارولې شو او د فارمولونو په اړه قضيه ثابتولې شو.

لم 1.15. فرض کړئ $\langle A_0, \dots, A_n \rangle$ د A_n جوړښتي لړۍ ده او $k \leq n$ ده. نو $\langle A_0, \dots, A_k \rangle$ د A_k جوړښتي لړۍ ده.

ثبوت. تمرين.

قضيه 1.16. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ښو د ټولو هغو توريږو لړيو سټ ده چې يوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. F دې د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ښو د هغو ټولو توريږو لړيو سټ وي چې جوړښتي لړۍ لري. په 1.14 کښې مو وليدل چې $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$ ؛ اوس ئې عکس ثابتوو.

فرض کړئ A يوه جوړښتي لړۍ $\langle A_0, \dots, A_n \rangle$ لري. پر n د قوي استقرا له لارې ثابتوو چې $A \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. زموږ استقرايي فرض دا ده چې د ښو هره هغه توريږه لړۍ چې د $m < n$ اوږدوالي جوړښتي لړۍ لري، په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې ده. د جوړښتي لړۍ د تعريف له مخې، يا بايد داسې $j, k < n$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه يو صدق وکړي:

$$1. \neg A_n \equiv \neg A_j$$

$$2. \neg A_n \equiv (A_j \wedge A_k)$$

$$3. \neg A_n \equiv (A_j \vee A_k)$$

$$4. \neg A_n \equiv (A_j \rightarrow A_k)$$

$$5. \neg A_n \equiv (A_j \leftrightarrow A_k)$$

اوس حالت په حالت استدلال کوو. که A_n اتومي وي، نو $A_n \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ بل حالت کښې فرض کړئ چې $A \equiv (!A_j \wedge !A_k)$ د 1.15 له مخې، $\langle !A_0, \dots, !A_j \rangle$ او $\langle !A_0, \dots, !A_k \rangle$ په ترتيب سره د A_j او A_k جوړښتي لري دي. ځکه چې دا د A د جوړښتي لري خاصې پيلنې فرعي لري دي، د دواړو اوږدوالی له n څخه لږ دے. نو د استقرايي فرض له مخې A_j او A_k په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې دي، او بيا د فارمول د تعريف له مخې $(!A_j \wedge !A_k)$ هم پکې دے. نور حالتونه په ورته استدلال ثابتېږي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLPL-002) سرچينه په دې يوه کرښه کښې د نحوي يوشانوالي د نښې پر ځای د معنایي هم ارزښت نښه کاروي، حال دا چې تعريف، ټول نور حالتونه او ثبوت د توريو لريو يوشانوالی غواړي. دلته د هماغه تعريف نښه بېرته کارول شوې ده. $\square$

1.5 ارزښت ټاکنې او صدق

تعريف 1.17 (ارزښت ټاکنې). $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ دې د رښتياوالي د دوو قيمتونو، “رښتيا” او “دروغ”، سټ وي. د $\mathcal{L}_0$ دپاره ارزښت ټاکنه يوه تابع v ده چې د ژبې بياني متغيرونه ته يا $\mathbb{T}$ ورکوي يا $\mathbb{F}$ ، يعنې $v: \text{At}_0 \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

تعريف 1.18. چې ارزښت ټاکنه v را کړل شوی وي، د ارزونې تابع $\bar{v}: \text{Frm}(\mathcal{L}_0) \rightarrow \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ په استقرايي ډول داسې تعريف کړئ:

$$\begin{aligned} \bar{v}(\perp) &= \mathbb{F}; \\ \bar{v}(\top) &= \mathbb{T}; \\ \bar{v}(p_n) &= v(p_n); \\ \bar{v}(\neg !A) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{که داسې نه وي.} \end{cases} \\ \bar{v}(!A \wedge !B) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{T} \text{ او } \bar{v}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{F} \text{ يا } \bar{v}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases} \\ \bar{v}(!A \vee !B) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{T} \text{ يا } \bar{v}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{F} \text{ او } \bar{v}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases} \\ \bar{v}(!A \rightarrow !B) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{F} \text{ يا } \bar{v}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \bar{v}(!A) = \mathbb{T} \text{ او } \bar{v}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases} \\ \bar{v}(!A \leftrightarrow !B) &= \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \bar{v}(!A) = \bar{v}(!B) \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \bar{v}(!A) \neq \bar{v}(!B) \text{ وي.} \end{cases} \end{aligned}$$

دا مادې د رښتياوالي له لاندې جدولونو سره سمون لري:

$\neg !A$	$!A$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$

$\neg A \wedge \neg B$	$\neg B$	$\neg A$
T	T	T
F	F	T
F	T	F
F	F	F

$\neg A \vee \neg B$	$\neg B$	$\neg A$
T	T	T
T	F	T
T	T	F
F	F	F

$\neg A \rightarrow \neg B$	$\neg B$	$\neg A$
T	T	T
F	F	T
T	T	F
T	F	F

$\neg A \leftrightarrow \neg B$	$\neg B$	$\neg A$
T	T	T
F	F	T
F	T	F
T	F	F

تمرین 1.19. فرض کړئ چې $\mathcal{L}_0$ ته یو درې ځایه نښلونکې $\diamond$ ورزیاتوو چې ارزونه یې داسې ورکول شوې ده:

$$\bar{v}(\diamond(\neg A, \neg B, \neg C)) = \begin{cases} \bar{v}(\neg B) & \text{که } \bar{v}(\neg A) = \text{T وي،} \\ \bar{v}(\neg C) & \text{که } \bar{v}(\neg A) = \text{F وي} \end{cases}$$

د دې نښلونکې د رښتیاوالي جدول ولیکئ.

قضیه 1.20 (ځایي ټاکنه). فرض کړئ v_1 او v_2 داسې ارزښت ټاکنې دي چې په $\neg A$ کېنې په راتلونکو بیاني متغیرونه یو له بل سره موافق دي؛ یعنې هر کله چې p_n په فارمول $\neg A$ کېنې راشي، $v_1(p_n) = v_2(p_n)$ وي. نو $\bar{v}_1$ او $\bar{v}_2$ هم پر $\neg A$ موافق دي؛ یعنې $\bar{v}_1(\neg A) = \bar{v}_2(\neg A)$.

د ژباړې د نسخې سمون: (OLPL-003) سرچینه د فرض په دویمه وینا کېنې “په کوم فارمول کېنې” لیکي، خو قضیه هماغه له مخکېنې ټاکلې شوې فارمول ارزوي. ژباړه د لومړۍ وینا سره سم د هماغه فارمول متغیرونه اخلي؛ په دې سره د قضیې مقصود شرط څرګند پاتې کېږي.

□

ثبوت. پر $\neg A$ استقرا کوو.

تعریف 1.21 (صدق). د فارمول $\neg A$ صدق په ارزښت ټاکنه v کېنې، یعنې $v \models \neg A$ ، په استقرایي ډول داسې تعریفول شو. (د “ $v \models \neg A$ نه دے” د څرګندولو دپاره $v \not\models \neg A$ لیکو.)

$$1. \quad A \equiv \perp :!A \not\models A$$

$$2. \quad A \equiv \top :!A \models A$$

$$3. \quad A \equiv p_i :!A \models A \text{ هله او يوازې هله چې } v(p_i) = \top \text{ وي.}$$

$$4. \quad A \equiv \neg!B :!A \models A \text{ هله او يوازې هله چې } v \not\models B \text{ وي.}$$

$$5. \quad A \equiv (!B \wedge !C) :!A \models A \text{ هله او يوازې هله چې } v \models !B \text{ او } v \models !C \text{ دواړه وي.}$$

$$6. \quad A \equiv (!B \vee !C) :!A \models A \text{ هله او يوازې هله چې } v \models !B \text{ يا } v \models !C \text{، يا دواړه، وي.}$$

$$7. \quad A \equiv (!B \rightarrow !C) :!A \models A \text{ هله او يوازې هله چې } v \not\models !B \text{ يا } v \models !C \text{، يا دواړه، وي.}$$

$$8. \quad A \equiv (!B \leftrightarrow !C) :!A \models A \text{ هله او يوازې هله چې } v \models !B \text{ او } v \models !C \text{ دواړه وي، يا نه } v \models !B \text{ وي او نه } v \models !C$$

که Γ د فارمولونه يو سټ وي، نو $v \models \Gamma$ هله او يوازې هله چې د هر $A \in \Gamma$ دپاره $v \models A$ وي.

قضيه 1.22. $v \models A$ هله او يوازې هله چې $\bar{v}(!A) = \top$ وي.

□

ثبوت. پر A ! استقرا کوو.

تمرین 1.23. د 1.22 ثبوت ورکړئ.

1.6 معنایي مفهومونه

لاندې معنایي مفهومونه تعریفوو:

تعریف 1.24. 1. فارمول A هله د صدق وړ دے چې د کوم v دپاره $v \models A$ وي؛ او هله د صدق نه وړ دے چې د هېڅ v دپاره $v \models A$ نه وي؛

2. فارمول A هله تاوتولوژي ده چې د ټولو ارزښت ټاکنې v دپاره $v \models A$ وي؛

3. فارمول A هله اتفاقي دے چې د صدق وړ وي خو تاوتولوژي نه وي؛

4. که Γ د فارمولونه يو سټ وي، نو $\Gamma \models A$ (" Γ ، A ته استلزام ورکوي ") هله او يوازې هله چې د هر هغه ارزښت ټاکنه v دپاره $v \models A$ وي چې $v \models \Gamma$ وي.

5. که Γ د فارمولونه يو سټ وي، نو Γ هله د صدق وړ دے چې داسې ارزښت ټاکنه v موجود وي چې $v \models \Gamma$ وي؛ او که داسې نه وي، Γ د صدق نه وړ دے.

تمرین 1.25. د لاندې څلورو فارمولونه په هر يوه کښې وټاکئ چې آیا هغه (الف) د صدق وړ، (ب) تاوتولوژي او (ج) اتفاقي دے.

$$1. (p_0 \rightarrow (\neg p_1 \rightarrow \neg p_0))$$

$$2. ((p_0 \wedge \neg p_1) \rightarrow (\neg p_0 \wedge p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \rightarrow p_0) \rightarrow (p_0 \rightarrow p_1))$$

$$3. (p_0 \leftrightarrow p_1) \rightarrow (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$$

$$4. ((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \wedge p_2)) \vee (p_2 \rightarrow (p_0 \leftrightarrow p_1)))$$

قضيه 1.26. 1. A هله او يوازې هله تاوتولوژي ده چې $\emptyset \models A$ وي،

2. که $\Gamma \models A$ او $\Gamma \models A \rightarrow B$ وي، نو $\Gamma \models B$ ؛

3. که Γ د صدق وړ وي، نو د Γ هر متناهي فرعي سټ هم د صدق وړ ده؛

4. يو اړخيز زياتوالی: که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \models A$ وي، نو $\Delta \models A$ هم؛

5. تعدي: که $\Gamma \models A$ او $\Delta \cup \{A\} \models B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \models B$.

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 1.27. د 1.26 ثبوت ورکړئ.

قضيه 1.28. $\Gamma \models A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg A\}$ د صدق نه وړ وي.

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 1.29. د 1.28 ثبوت ورکړئ.

قضيه 1.30 (د معنایي استنتاج قضيه). $\Gamma \models A \rightarrow B$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{A\} \models B$ وي.

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 1.31. د 1.30 ثبوت ورکړئ.

باب 2

د اشتقاق نظامونه

ادارتي يادونه - دا څپرک د اشتقاق د نظامونو عمومي مواد راغونډوي. کوم درسي کتاب چې يو ځانگړی نظام کاروي، د هغه نظام د معرفي کوونکي څپرکي په پيل کېنې د پېژندنې برخه او د اړوندې ټولگنې برخه ورکېدوې شي.

2.1 پېژندنه

منطقونه عموماً معنی پوهنه او اشتقاق نظام دواړه لري. معنی پوهنه د رښتياوالي، د صدق وړتيا، اعتبار او استلزام په څېر مفهومونو سره کار لري. د اشتقاق د نظامونو موخه دا ده چې د استلزام او اعتبار د ثابتولو يوه بشپړه نحوي طريقه ورکړي. دا نظامونه په دې معنی بشپړه نحوي دي چې په داسې يوه نظام کېنې اشتقاق يو متناهي نحوي څيز وي، چې عموماً د ترلي فارمولونه يا فارمولونه يوه لړۍ يا بل متناهي ترتيب وي. د اشتقاق بڼه نظامونه دا خاصيت لري چې د ترلي فارمولونه يا فارمولونه د هرې ورکړل شوې لړۍ يا ترتيب “سمواله” په ميخانيکي توگه کتل کېدای شي.

د لومړۍ درجې منطق تر ټولو ساده، او له تاريخي پلوه لومړنی، اشتقاق نظامونه بديهي وو. په داسې يوه نظام کېنې د فارمولونه يوه لړۍ هله اشتقاق کتل کېږي چې په هغې کېنې هر فارمول يا د “بديهي اصولو” په يوه ټاکلي سټ کېنې وي، يا د ټاکلو “استنتاجي قاعدو” له يوې څخه په کار اخيستو په لړۍ کېنې له مخکېنيو فارمولونه څخه ترې راووتی، او په ميخانيکي توگه کتل کېدای شي چې آيا فارمول بديهي اصل دے او آيا د استنتاج له کومې قاعدې سره سم له نورو فارمولونه څخه راوتلی دے. د اشتقاق بديهي نظامونه تشرېح کول اسانه دي، او له مابعدمنطقي پلوه پرې کار کول هم اسانه دي، خو په هغو کېنې اشتقاقونه لوستل او پوهېدل گران دي او جوړول ئې هم گران دي.

د اشتقاق نور نظامونه د دې موخې دپاره جوړ شوي چې د اشتقاقونه جوړول يا له بشپړېدو وروسته پر اشتقاقونه پوهېدل اسانه کړي. بېلگې ئې طبيعي استنتاج، د رښتياوالي ونې چې د تابلو شونتونو په نامه هم پېژندل کېږي، او د سېکونې حساب دي. د اشتقاق ځينې نظامونه په ځانگړې توگه د ميخانيکي کولو دپاره طرح شوي دي؛ مثلاً د حل طريقه په سافټویر کېنې په اسانۍ پلي کېږي، خو پر اشتقاقونه ئې پوهېدل تقريباً ناشوني دي. د اشتقاق دا نور نظامونه زياتره اشتقاقونه د لړيو پر ځای د فارمولونه د ونو په توگه بڼي. په دې سره په اسانۍ ليدل کېږي چې د اشتقاق کومې برخې پر کومو نورو برخو تکیه لري.

نو د يوه ورکړل شوي منطق، لکه د لومړۍ درجې منطق، د اشتقاق بېل نظامونه به دا په بېلو ډولونو روښانه کړي چې ترلې فارمول کله قضيه ده او د نورو له ځينو څخه د ترلې فارمول د د اشتقاق ور کېدو معنی څه ده. دا که په بديهي اشتقاقونه، طبيعي استنتاجونو، سېکونې اشتقاقونه، د رښتياوالي په ونو يا د حل په ابطالونو ترسره شي، غواړو چې دا اړيکې د اعتبار او

استلزام له معنایي مفهومونو سره سمون ولري. د “ A ! قضیه ده” دپاره “ $A \vdash$ او د “ A ! له Γ څخه د اشتقاق وړ دے” دپاره “ $A \vdash \Gamma$ ” لیکو. $\vdash$ چې هر ډول تعریف شي، غواړو له $\models$ سره سمون ولري؛ یعنې:

$$1. A \vdash A \text{ هله او یوازې هله چې } A \models$$

$$2. \Gamma \vdash A \text{ هله او یوازې هله چې } \Gamma \models A$$

د پورته دواړو د “یوازې هله” لوري ته سمولې ویل کېږي. اشتقاق نظام هله سم دے چې د اشتقاق وړتیا استلزام یا اعتبار تضمین کړي. د اشتقاق هر د کار وړ نظام باید سم وي؛ د اشتقاق ناسم نظامونه هېڅ ګټه نه لري. په اصل کېنې د اشتقاق ټوله موخه دا ده چې د اعتبار یا استلزام نحوي تضمین ورکړي. موږ به د وړاندې شویو اشتقاق نظامونو سمولې ثابت کړو.

د دې عکس، یعنې “هله” لورے، هم مهم دے: دې ته بشپرتیا ویل کېږي. د اشتقاق بشپړ نظام دومره ځواکمن وي چې هر کله A ! معتبر وي، ویني چې A ! قضیه ده؛ او هر کله چې $\Gamma \models A$ وي، ویني چې $\Gamma \vdash A$. بشپرتیا ثابتول ګران دي، او ځینې منطقونه د اشتقاق هېڅ بشپړ نظام نه لري. د لومړۍ درجې منطق ئې لري. کورت ګوډل لومړۍ کس و چې د لومړۍ درجې منطق د اشتقاق د یوه نظام بشپرتیا ئې په خپله ۱۹۲۹ز کال څېړنیزه رساله کېنې ثابته کړه.

له اشتقاق نظامونو سره یو بل ترلې مفهوم سازګاري ده. د ترلي فارمولونه یو سټ هله ناسازګار بلل کېږي چې هر څه ترې اشتقاق کېدے شي؛ او که داسې نه وي، سازګار دے. ناسازګاري د صدق د نه وړتیا نحوي سیاله ده: لکه د صدق نه وړ ستونو غوندې، د ترلي فارمولونه ناسازګار ستونه ښې نظریې نه جوړوي او په بنسټیز ډول نیکګري وي. د ترلي فارمولونه سازګار ستونه کېدے شي رښتوني یا ګټور نه وي، خو لږ تر لږه د منطقي ګټورتیا له دې تر ټولو ټیټ برید څخه تېرېږي. د اشتقاق په بېلو نظامونو کېنې د ترلي فارمولونه د ستونو د سازګارۍ ځانګړې تعریف توپیر کولے شي؛ خو لکه $\vdash$ ، غواړو سازګاري د خپل معنایي سیال، د صدق وړتیا، سره سمه وي. غواړو تل داسې وي چې Γ هله او یوازې هله سازګار وي چې د صدق وړ وي. دلته د “یوازې هله” لورے له بشپرتیا سره برابر دے، ځکه سازګاري د صدق وړتیا تضمینوي؛ او “هله” لورے له سموالي سره برابر دے، ځکه د صدق وړتیا سازګاري تضمینوي. په حقیقت کېنې د کلاسیکي لومړۍ درجې منطق دپاره د سموالي او بشپرتیا دواړه ښې همارزښته دي.

2.2 د سپکوېنټ حساب

د اشتقاق ډېر نظامونه د ترلي فارمولونه له ترتیبونو سره کار کوي، خو د سپکوېنټ حساب له سپکوېنټونو سره کار کوي. سپکوېنټ د دې ښې یو عبارت دے:

$$A_1, \dots, A_m \Rightarrow B_1, \dots, B_n,$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLPF-001) سرچینه د سپکوېنټ دواړو خواوو ته یو شان وروستۍ اندېکس کاروي، چې دواړه لړۍ په ناپامۍ یو شان اوږدوي؛ خو ورپسې څرګندوي چې هره لړۍ په خپلواکه توګه تشه کېدے شي. دلته د ښۍ لړۍ وروستۍ اندېکس بېل شوے، څو دواړه متناهي لړۍ خپلواکه اوږدوالی ولري. یعنې دا د ترلي فارمولونه د لړیو یوه جوړه ده چې د سپکوېنټ په نښه $\Rightarrow$ بېله شوې ده. له دواړو لړیو هره یوه تشه کېدے شي. د سپکوېنټ په حساب کېنې اشتقاق د سپکوېنټونو یوه ونه ده. تر ټولو پاسني سپکوېنټونه ځانګړې ښه لري، او “لومړني سپکوېنټونه” یا “بديهي اصول” بلل کېږي؛ هر بل سپکوېنټ د استنتاج د کومې قاعدې له لارې سم له پاسه سپکوېنټونو څخه راځي. د استنتاج قاعدې یا په سپکوېنټونو کېنې ترلي فارمولونه سمبالوي، یعنې کېنې یا ښۍ خوا ته ئې ورزیاتوي، ترې لري کوي یا ئې بیا ترتیبوي؛ او یا د قاعدې په پایله کېنې یو مرکب فارمول معرفي کوي. مثلاً $\wedge L$ قاعده اجازه راکوي چې له $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ څخه $A \wedge B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ استنتاج کړو، او $\rightarrow R$ اجازه راکوي چې د هر $A, \Delta, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ، او B دپاره له $A, \Gamma \Rightarrow \Delta, B \rightarrow A$ څخه $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ استنتاج کړو. (په تېره بیا، Γ او Δ تش کېدے شي.)

د سېکونېټ پر حساب ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعريفېږي: $\Gamma \vdash A$ هله او يوازې هله چې داسې کومه لړۍ Γ_0 موجوده وي چې په Γ_0 کېنې هر A په Γ کېنې وي، او داسې اشتقاق موجود وي چې سېکونېټ $A \Rightarrow \Gamma_0$ ئې په جرړه کېنې وي. A هله د سېکونېټ په حساب کېنې قضيه ده چې سېکونېټ $A \Rightarrow$ کوم اشتقاق ولري. مثلاً دا اشتقاق ښي چې $\vdash (A \wedge B) \rightarrow A$:

$$\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{!A \wedge !B \Rightarrow !A} \wedge L}{\Rightarrow (A \wedge B) \rightarrow A} \rightarrow R$$

يو سټ Γ د سېکونېټ په حساب کېنې هله ناسازگار دے چې د $\Gamma_0 \Rightarrow$ کوم اشتقاق موجود وي، چې په کېنې هر $A \in \Gamma_0$ په Γ کېنې وي او د سېکونېټ ښي خوا تشه وي. د WR قاعدې په کارولو له ناسازگار سټ څخه هر ترلے فارمول اشتقاق کېدے شي.

د سېکونېټ حساب په ۱۹۳۰ مو کلونو کېنې گيرهارډ کېنټنن جوړ کړ. د منظمې او متناظرې طرحې له امله دا د اشتقاقونه د نظريې د ودې دپاره ډېر کتور صوري نظام دے. د سېکونېټ په حساب کېنې د اشتقاقونه موندل نسبتاً اسانه دي، خو دا اشتقاقونه ډېر ځله په سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تړاو کله کله په اسانۍ نه ښکاري. بيا هم، دا د اشتقاق نظامونو ډېره ښکلې لار ثابته شوې، او ډېر منطقونه د سېکونېټ حساب نظامونه لري.

2.3 طبيعي استنتاج

طبيعي استنتاج د اشتقاق داسې نظام دے چې موخه ئې د رښتيني استدلال، په تېره بيا د رياضي پوهانو د منظم استدلال، انځورول دي. رښتيني استدلال د يو شمېر “طبيعي” ښو له مخې مخکېنې ځي. مثلاً د حالتونو ثبوت موږ ته اجازه راکوي چې د يوه فصلي فرض پر بنسټ پايله ثابته کړو، په دې چې وښيو پايله د فصل له هرې برخې څخه راځي. نامستقيم ثبوت اجازه راکوي چې پايله په دې سره ثابته کړو چې نفي ئې تناقض ته رسېږي. شرطي ثبوت د “که... نو...” شرطي ادعا په دې سره ثابتي چې تالي له مقدم څخه راځي. طبيعي استنتاج د دغو طبيعي استنتاجونو د ځينو صوري کول دي. هر منطقي ښلولونکي او هر سور دوه قاعدې لري، يوه د معرفي کولو او بله د لرې کولو قاعده، او هره يوه ئې د داسې طبيعي استنتاج له يوې ښې سره سمه ده. مثلاً $\rightarrow$ Intro له شرطي ثبوت سره او $\vee$ Elim د حالتونو له ثبوت سره سمون لري. يوه په تېره ساده قاعده $\wedge$ Elim ده، چې اجازه راکوي له $A \wedge B$ څخه A يا B استنتاج کړو.

يو خاصيت چې طبيعي استنتاج د اشتقاق له نورو نظامونو څخه بېلوي، د فرضونو کارول دي. په طبيعي استنتاج کېنې اشتقاق د فارمولونه يوه ونه ده. يو فارمول د فارمولونه د ونې په جرړه کېنې وي، او د ونې “پانې” هغه فارمولونه وي چې پايله ترې رايستل کېږي. په طبيعي استنتاج کېنې ځينې پاڼه-فارمولونه د اشتقاق دننه ونډه لري، خو تر هغې “کارول شوي وي” چې اشتقاق پايلې ته رسېږي. دا په رښتيني استدلال کېنې د هغو فرضيو د معرفي کولو له دود سره سمون لري چې يوازې لږ وخت نافذې پاتې کېږي. مثلاً د حالتونو په ثبوت کېنې د فصل د هرې برخې رښتياوالے فرضوو، په شرطي ثبوت کېنې د مقدم رښتياوالے فرضوو، او په نامستقيم ثبوت کېنې د پايلې د نفي رښتياوالے فرضوو. د فرضي فرضونو د معرفي کولو او بيا د يوه منځني کلام د ثبوتولو دپاره د هغو ختمولو دا طريقه د طبيعي استنتاج څرکنده ښه ده. د طبيعي استنتاج د يوه اشتقاق په پاڼو کېنې فارمولونه فرضونه بلل کېږي، او د استنتاج ځينې قاعدې کېدے شي هغه “ايستل” کړي. مثلاً که مو له ځينو فرضونو څخه د B کوم اشتقاق درلود چې A هم پکې شامل و، نو د $\rightarrow$ Intro قاعده اجازه راکوي چې $A \rightarrow B$ استنتاج کړو او د A ښي هر فرض ختم کړو. (د دې ثبوتولو دپاره چې کوم فرضونه په کومو استنتاجونو کېنې ختمېږي، استنتاج او هغه فرضونه چې ختموي ئې په يوه شمېره ښه کوو.) هغه فرضونه چې د اشتقاق په پاڼو کېنې نه ايسل شوي

پاتې کېږي، په کچه د پایلي د رښتیاوالي دپاره بس دي؛ نو اشتقاق ثابتوي چې د هغه نه ایستل شوي فرضونه پایلي ته استلزام ورکوي.

د طبیعي استنتاج پر بنسټ اړیکه $\Gamma \vdash A$ هله صدق کوي چې داسې اشتقاق موجود وي چې A ! د ونې وروستی ترله فارمول وي، او هره نه ایستل شوې پاڼه په Γ کېنې وي. A ! په طبیعي استنتاج کېنې هله قضیه ده چې داسې اشتقاق موجود وي چې A ! وروستی ترله فارمول وي او ټول فرضونه ایستل شوي وي. مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $A \rightarrow (A \wedge B) \vdash A$:

$$\frac{\frac{[A \wedge B]^1}{A} \wedge \text{Elim}}{(\frac{A}{(A \wedge B) \rightarrow A} \rightarrow \text{Intro})} \text{Intro}$$

نښه 1 څرګندوي چې فرض $A \wedge B$! د $\rightarrow$ Intro په استنتاج کېنې ایستل کېږي.

یو سټ Γ هله ناسازگار دے چې په طبیعي استنتاج کېنې $\Gamma \vdash \perp$ وي. د $\perp$ قاعده دا یقیني کوي چې له ناسازگار سټ څخه هر ترله فارمول اشتقاق کېدے شي.

د طبیعي استنتاج نظامونه کیرهارډ کېنټخن او ستاینسواف یاشکوفسکي په ۱۹۳۰ مو کلونو کېنې جوړ کړل، او وروسته ډاک پراوېخ او فریدرېک فیچ لا پراخ کړل. ځکه چې استنتاجونه ئې د ثبوت طبیعي لارې انځوروي، فلسفيان ئې خوښوي. د فیچ جوړې شوې ښې زیاتره د منطق په پېژندنیزو درسي کتابونو کېنې کارول کېږي. د منطق په فلسفه کېنې کله کله د طبیعي استنتاج قاعدې د منطقي عملګرو معنی ورکوي، چې دې ته “ثبوت-نظري معنایي پوهنه” ویل کېږي.

2.4 تابلوګانې

د اشتقاق ډېر نظامونه د تړلي فارمولونه له ترتیبونو سره کار کوي، خو تابلوګانې له نښه لرونکي فارمولونه سره کار کوي. نښه لرونکي فارمول یوه جوړه ده چې د رښتیاوالي له یوې نښې ($\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$) او ترله فارمول څخه جوړه ده:

$$\mathbb{T}!A \text{ یا } \mathbb{F}!A.$$

تابلو له هغو نښه لرونکي فارمولونه څخه جوړ وي چې د لاندې خوا ته ځانګېدونکې ونه کېنې ترتیب شوي وي. دا له یو شمېر فرضونو پیلېږي او په هغو نښه لرونکي فارمولونه دوام کوي چې د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو تر ځان له پاسه له یوه نښه لرونکي فارمولونه څخه راوتلي وي. هره قاعده اجازه راکوي چې د یوې ځانګې په پای کېنې یو یا څو نښه لرونکي فارمولونه ورزیات کړو، یا دوه نښه لرونکي فارمولونه یو د بل تر څنګ ورزیات کړو؛ په وروستي حالت کېنې ځانګه په دوو وېشل کېږي او دوه ورزیات شوي نښه لرونکي فارمولونه د دواړو ځانګو سروڼه جوړوي.

پریوه مرکب نښه لرونکي فارمول د قاعدې له پلي کولو څخه داسې نښه لرونکي فارمولونه ورزیاتېږي چې سمدستي فرعي-فارمولونه وي. د هرې قاعدې یوه جوړه راځي، د دواړو نښو هرې یوې دپاره یوه قاعده. مثلاً د $\mathbb{T} \wedge$ قاعده پر $\mathbb{T}!A \wedge \mathbb{T}!B$ پلي کېږي او اجازه راکوي چې د هرې هغې ځانګې په پای کېنې دواړه نښه لرونکي فارمولونه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{T}!B$ ورزیات کړو چې $\mathbb{T}!A \wedge \mathbb{T}!B$ لري؛ او د $\mathbb{F} \wedge$ قاعده اجازه راکوي چې یوه ځانګه د $\mathbb{F}!A$ او $\mathbb{F}!B$ یو د بل تر څنګ په ورزیاتولو وېشو. د ژباړې د نسخې سمون (OLPF-002) په سرچینه کېنې د دروغې عطف قاعدې دویم ارګومېنټ ټول مرکب فارمول دے، خو د رښتوني عطف موازي قاعده او د لاندې بېلګې ټولې قاعدې هلته یوازې نښلرونکي اخلي. دلته هماغه د عطف نښلرونکي کارول شوے، څو د قاعدې نښه په یو شان بڼه جوړه شي. تابلو هله ترله دے چې د هغه هره ځانګه د نښه لرونکي فارمولونه سره برابره جوړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ ولري.

پر تابلوگانې ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې داسې کوم متاهي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \dots, !B_n\} \subseteq \Gamma$ موجود وي چې د لاندې فرضونو دپاره یو ترلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

مثلاً دا ترلے تابلو ښيي چې $\vdash (A \wedge !B) \rightarrow !A$:

1.	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
3.	$\mathbb{F}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
5.	$\mathbb{T}\psi$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

یو سټ Γ د تابلو په حساب کښې هله ناسازگار دے چې د لاندې فرضونو دپاره یو ترلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

د کوم $B_i \in \Gamma$ دپاره.

تابلوگانې په ۱۹۵۰ مو کلونو کښې اېورټ بېټ او یا کو هېنتیکا هر یوه په خپلواکه توګه جوړ کړل، او رېموند سمولیان ساده او عام کړل. دا کارول ډېر اسانه دي، ځکه چې د تابلو جوړول ډېره منظمه طریقه ده. د تابلوگانې د منظم طبیعت له امله په کمپیوټر کښې هم په اسانۍ پلي کېږي. خو تابلو زیاتره په سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تړاو کله کله په اسانۍ نه ښکاري. دا تګلاره هم ډېره عامه ده، او ډېر پېل منطقونه د تابلو نظامونه لري. تابلوگانې له موږ سره د هغو جوړښتونه په موندلو کښې هم مرسته کوي چې ورکړل شوي تړلي فارمولونه، یا د هغو ستونه، صادقوي: که سټ د صدق وړ وي، ترلے تابلو به و نه لري؛ یعنې هر تابلو به یوه پړانېستې څانګه ولري. په دې شرط چې پر هغې څانګه هره ممکنه قاعده پلي شوې وي، صادقوونکې جوړښت له یوې پړانېستې څانګې څخه “لوستل کېدے” شي. له سپکوېنټ حساب سره هم ډېر نږدې تړاو شته: په اصل کښې یو ترلے تابلو د سپکوېنټ په حساب کښې یو لنډ شوے اشتقاق دے چې سرچپه لیکل شوے وي.

2.5 بدیهي اشتقاقونه

بدیهي اشتقاقونه د اشتقاق تړولو زاړه او ساده منطقي نظامونه دي. د هغو اشتقاقونه یوازې د تړلي فارمولونه لري. د تړلي فارمولونه یوه لړۍ هله سم اشتقاق ګڼل کېږي چې په هغې کښې هره ترلے فارمول A له لاندې شرطونو څخه یو پوره کړي:

1. A بدیهي اصل وي؛ یا

2. A د تړلي فارمولونه د ورکړل شوي سټ Γ یو غړے وي؛ یا

3. A د استنتاج په کومه قاعده توجیه شوے وي.

د بدیهي اصل کېدو دپاره A باید د یو شمېر ټاکلو ترلے فارمول شېماوو له یوې سره ښه ولري. د بدیهي اصولونو د شېماوو ډېر داسې ستونه شته چې د لومړۍ درجې منطق دپاره د اشتقاق د قناعت وړ، سم او بشپړ نظام ورکوي. ځینې د هغو ښلویونکو

له مخې ترتيب شوي وي چې واک پرې چلوي؛ مثلاً دا شېماوې

$$!A \rightarrow (!B \rightarrow !A) \quad !B \rightarrow (!B \vee !C) \quad (!B \wedge !C) \rightarrow !B$$

هغه عام بديهي اصول دي چې پر $\rightarrow$ ، $\vee$ او $\wedge$ واک چلوي. د بديهي اصولو ځينې نظامونه غواړي د اصولو شمېر تر ټولو لږ وي. دا چې کوم نښلويونکي بنسټيز وټاکل شي، ان داسې نظامونه هم موندل کېدای شي چې يوازې له يوه بديهي اصل څخه جوړ وي.

د استنتاج قاعده يوه شرطې وينا ده چې په اشتقاق کېنې د ترلې فارمول د توجیه کېدو دپاره بس شرط ورکوي. مودوس پوننس يوه ډېره عامه داسې قاعده ده: وايي که A او $A \rightarrow B$ له مخکېنې توجیه شوي وي، نو B توجیه شوی دے. دا معنی لري چې په اشتقاق کېنې هغه کرښه چې ترلې فارمول B لري، په دې شرط توجیه شوې ده چې A او $A \rightarrow B$ دواړه، د کوم ترلې فارمول A دپاره، په اشتقاق کېنې له B څخه مخکېنې راغلي وي.

پر بديهي اشتقاقونه ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعريفېږي: $\Gamma \vdash A$ هله او يوازې هله چې داسې اشتقاق موجود وي چې ترلې فارمول A ئې وروسته فارمول وي، او Γ په هغه اشتقاق کېنې د هغو ترلې فارمولونه سټ ونيول شي چې د پورته (۲) له مخې توجیه شوي وي. A هله قضیه ده چې A داسې اشتقاق ولري چې Γ پکې تش وي؛ يعنې په اشتقاق کېنې هره ترلې فارمول يا د (۱) له مخې توجیه شوې وي يا د (۳) له مخې. مثلاً دا اشتقاق ښيي چې $\vdash !A \rightarrow (!B \rightarrow (!B \vee !A))$:

1. $!B \rightarrow (!B \vee !A)$
2. $(!B \rightarrow (!B \vee !A)) \rightarrow (!A \rightarrow (!B \rightarrow (!B \vee !A)))$
3. $!A \rightarrow (!B \rightarrow (!B \vee !A))$

په ۱ مه کرښه ترلې فارمول د بديهي اصل $A \rightarrow (!A \vee !B)$ بڼه لري، چې د A او B ونډې پکې بدلې شوې دي. په ۲ مه کرښه جمله د بديهي اصل $A \rightarrow (!B \rightarrow !A)$ بڼه لري. نو دواړه کرښې توجیه شوې دي. ۳ مه کرښه د مودوس پوننس له مخې توجیه شوې ده: که په لنډه ئې D وليکو، نو ۲ مه کرښه د $C \rightarrow !D$ بڼه لري، چې C هم $!B \rightarrow (!B \vee !A)$ ، يعنې ۱ مه کرښه، ده.

يو سټ Γ هله ناسازگار دے چې $\Gamma \vdash \perp$. د بديهي اصولو يو بشپړ نظام به دا هم ثابتوي چې د هر A دپاره $\vdash !A$ ؛ نو که Γ ناسازگار وي، د هر A دپاره $\Gamma \vdash !A$.

د منطق د بديهي اشتقاقونه نظامونه لومړۍ ګوټلوب فرېګه په خپل ۱۸۷۹ز اثر پېګريفسريفت کېنې وړاندې کړل، چې له همدې امله زياتره د معاصر منطق لومړۍ اثر ګڼل کېږي. بيا الفرېډ نارت وايټ هېډ او برټرېنډ رسل په پرېنسيپيا ماتيماتيکا کېنې، او ډيوېډ هيلبرټ او شاګردانو ئې په ۱۹۲۰ مو کلونو کېنې بشپړ کړل. ځکه ورته زياتره “د فرېګه نظامونه” يا “د هيلبرټ نظامونه” ويل کېږي. دا ډېر انعطاف منونکي دي، ځکه چې د يو منطق دپاره بديهي نظام زياتره په اسانۍ موندل کېږي. دا چې اشتقاقونه ډېر ساده جوړښت او يوازې يوه يا دوه استنتاجي قاعدې لري، د هغو په اړه د څيزونو ثبوتول هم نسبتاً اسانه دي. خو په عمل کېنې ئې کارول ډېر ګران دي؛ يعنې ثبوتونه موندل او ليکل ګران دي.

باب 3

د سپکوپنټ حساب

ادارتي يادونه. دا څپرک د کلاسيک د لومړۍ درجې منطق دپاره د کپنټن معياري سپکوپنټ حساب LK وړاندې کوي. دې ته نور مثالونه او تمرينونه هم پکار دي. د ثبوت د نظام په توګه د سپکوپنټ له حساب سره د اړوندو موادو د شاملولو يا اېستلو دپاره د prfLK ټېګ وکاروئ.

3.1 قاعدې او اشتقاقونه

د راتلونکو خبرو دپاره، پرېږدئ چې $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ د ترلي فارمولونه متناهي لری وښيي.

تعريف 3.1 (سپکوپنټ). سپکوپنټ د لاندې څرګندنه ده:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

دلته Γ او Δ د ژبې $\mathcal{L}$ د ترلي فارمولونه متناهي (او کېدې شي تشې) لری دي. Γ ته مقدم او Δ ته تالي ويل کېږي.

د يوه سپکوپنټ تر شا شهودي مفکوره دا ده: که د مقدم ټولې ترلي فارمولونه صدق کوي، نو د تالي لږ تر لږه يوه ترلي فارمولونه صدق کوي. يعنې که $\Gamma = \langle !A_1, \dots, !A_m \rangle$ او $\Delta = \langle !B_1, \dots, !B_n \rangle$ وي، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې

$$(!A_1 \wedge \dots \wedge !A_m) \rightarrow (!B_1 \vee \dots \vee !B_n)$$

صدق کوي. دوه خاص حالتونه شته: يو هغه چې Γ تش وي، او بل هغه چې Δ تش وي. کله چې Γ تش وي، يعنې $m = 0$ ، نو $\Delta \Rightarrow$ هله صدق کوي چې $!B_1 \vee \dots \vee !B_n$ صدق کوي. کله چې Δ تش وي، يعنې $n = 0$ ، نو $\Gamma \Rightarrow$ هله صدق کوي چې $\neg(!A_1 \wedge \dots \wedge !A_m)$ صدق کوي. موږ يو سپکوپنټ هله معتبر بولو چې ورسره سمون لرونکې ترلې فارمول معتبره وي.

که Γ د ترلي فارمولونه يوه لری وي، نو $\Gamma, !A$ د هغې پايلې دپاره لیکو چې $!A$ د Γ ښي پاڼې ته ورزيات شي (او A, Γ د هغې پايلې دپاره چې A د Γ کيڼ پاڼې ته ورزيات شي). که Δ هم د ترلي فارمولونه يوه لری وي، نو Γ, Δ د دواړو لړيو نښلول دي.

تعريف 3.2 (لومړنۍ سپکوپنټ). لومړنۍ سپکوپنټ داسې سپکوپنټ دے چې له لاندې ښو څخه يوه لري:

$$1. A \Rightarrow A$$

$$2. \Rightarrow \top$$

$$3. \perp \Rightarrow$$

، او A ! د ژبې هره ترلے فارمول کېدے شي.

په سپکوېنټ حساب کېنې اشتقاقونه د سپکوېنټونو داسې ټاکلې وې چې تر ټولو بره سپکوېنټونه ئې لومړني سپکوېنټونه وي؛ او که يو سپکوېنټ د يوه يا دوو نورو سپکوېنټونو لاندې راشي، بايد د استنتاج د يوې قاعدې له مخې ترې په سمه توګه راووتې. د LK قاعدې پر دوو اصلي ډولونو وېشل کېږي: منطقي قاعدې او جوړښتي قاعدې. منطقي قاعدې د لاندې سپکوېنټ د هغې ترلے فارمول د اصلي عملګر په نوم نومول کېږي چې A ! او/يا B ! لري. هره قاعده دوه بڼې لري: يوه د داسې سپکوېنټ د استنتاج دپاره چې د منطقي عملګر لرونکې ترلے فارمول ئې کين لوري ته وي، او بله د هغه سپکوېنټ دپاره چې دا ترلے فارمول ئې ښي لوري ته وي.

3.2 بياني قاعدې

3.2.1 د $\neg$ دپاره قاعدې

$$\neg R \frac{\Delta!A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg!A\Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg L \frac{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta \neg!A, \Gamma \Rightarrow}$$

3.2.2 د $\wedge$ دپاره قاعدې

$$\wedge R \frac{\Delta, !B\Gamma \Rightarrow \quad \Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\wedge!B\Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge L \frac{\Delta!A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta!A\wedge!B, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge L \frac{\Delta!B, \Gamma \Rightarrow}{\Delta!A\wedge!B, \Gamma \Rightarrow}$$

3.2.3 د $\vee$ دپاره قاعدې

$$\vee R \frac{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\vee!B\Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee R \frac{\Delta, !B\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\vee!B\Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee L \frac{\Delta!B, \Gamma \Rightarrow \quad \Delta!A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta!A\vee!B, \Gamma \Rightarrow}$$

3.2.4 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې

$$\rightarrow R \frac{\Delta, !B!A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A \rightarrow !B, \Gamma \Rightarrow} \quad \rightarrow L \frac{\Lambda !B, \Pi \Rightarrow \quad \Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \Lambda !A \rightarrow !B, \Gamma, \Pi \Rightarrow}$$

3.3 د سورونو قاعدې

3.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې

$$\forall R \frac{\Delta, !A(a)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \forall x !A(x)\Gamma \Rightarrow} \quad \forall L \frac{\Delta !A(t), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \forall x !A(x), \Gamma \Rightarrow}$$

په $\forall L$ کېنې t یوه تړلې اصطلاح ده (یعنې داسې اصطلاح چې متغیرونه نه لري). په $\forall R$ کېنې a ثابت سمبول دے چې باید د $\forall R$ قاعدې په لاندې سېکونې کېنې هېڅ ځای نه وي راغلے. موږ د a د $\forall R$ استنتاج ځانگړے متغیر بولو-¹

3.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$$\exists R \frac{\Delta, !A(t)\Gamma \Rightarrow}{\Delta, \exists x !A(x)\Gamma \Rightarrow} \quad \exists L \frac{\Delta !A(a), \Gamma \Rightarrow}{\Delta \exists x !A(x), \Gamma \Rightarrow}$$

بیا هم، t یوه تړلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists L$ قاعدې په لاندې سېکونې کېنې نه راځي. موږ د a د $\exists L$ استنتاج ځانگړے متغیر بولو.

دا شرط چې ځانگړے متغیر د $\forall R$ یا $\exists L$ استنتاج په لاندې سېکونې کېنې نه راځي، د ځانگړي متغیر شرط بلل کېږي. هغه دود ریاډ کړئ چې کله $!A$ داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، نو دا په $!A(x)$ لیکلو ښیو. په همدې چوکاټ کېنې بیا $!A(t)$ د $!A[t/x]$ لندون دے. نو د $\exists R$ قاعده داسې هم لیکلے شو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A[t/x]}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x !A} \exists R$$

پام وکړئ چې t کېدے شي له مخکېنې په $!A$ کېنې راغلے وي؛ مثلاً $!A$ کېدے شي $P(t, x)$ وي. له دې امله، له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x P(t, x)$ استنتاجول د $\exists R$ سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t یوه یا زیاتې پېښې په تړلي متغیر x بدلولے “شي”، او اړینه نه ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ. خو د $\forall R$ او $\exists L$ د ځانگړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په $!A$ کېنې نه راځي. نو د $\forall R$ په کارولو سره له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x P(a, x)$ چې ثابت سمبول a په $!A$ کېنې نه راځي. نو د $\forall R$ په کارولو سره له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x P(a, x)$ چې ثابت سمبول a په $!A$ کېنې نه راځي. نو د $\forall R$ په کارولو سره له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x P(a, x)$ سمه توگه نه شي استنتاجولے.

¹موږ د “ځانگړي متغیر” اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتني قاعده کېنې a ثابت سمبول دے. دا نوم تاریخي لاملونه لري.

په $\exists R$ او $\forall L$ کېنې پر اصطلاح t هېڅ بندیز نشته. بل لوري ته، د $\exists L$ او $\forall R$ په قاعدو کېنې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پورتي سېکونې کېنې د $A(a)$ څخه بهر هېڅ ځای نه راځي. دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے؛ یعنې نظام یوازې معتبر سېکونېونه اشتقاق کړي. له دې شرط پرته لاندې استنتاجونه روا کېدل:

$$\frac{\frac{!A(a) \Rightarrow !A(a)}{\exists x !A(x) \Rightarrow !A(a)} * \exists L}{\exists x !A(x) \Rightarrow \forall x !A(x)} \forall R \quad \frac{\frac{!A(a) \Rightarrow !A(a)}{!A(a) \Rightarrow \forall x !A(x)} * \forall R}{\exists x !A(x) \Rightarrow \forall x !A(x)} \exists L$$

خو $\exists x !A(x) \Rightarrow \forall x !A(x)$ معتبر نه دے.

3.4 جورښتي قاعدې

موږ څو داسې قاعدو ته هم اړتیا لرو چې د یوه سېکونې په کېنې او ښي لوري کېنې د ترلي فارمولونه د بیا ترتیبولو اجازه راکړي. ځکه چې منطقي قاعدې غواړي هغه ترلي فارمولونه چې قاعده پرې کار کوي، یا په بشپړ کېنې او یا په بشپړ ښي پای کېنې وي، نو د “تبادلي” داسې قاعدې ته اړتیا لرو چې ترلي فارمولونه سم ځای ته یوسي. کله کله دا هم مهمه وي چې دوه یو شان ترلي فارمولونه سره یو کړو او هر لوري ته ترلې فارمول ورزیاته کړو.

3.4.1 کمزوري کول

$$\text{WR} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A \Gamma \Rightarrow} \quad \text{WL} \frac{\Delta \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}$$

3.4.2 انقباض

$$\text{CR} \frac{\Delta, !A, !A \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A \Gamma \Rightarrow} \quad \text{CL} \frac{\Delta !A, !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta !A, \Gamma \Rightarrow}$$

3.4.3 تبادلې

$$\text{XR} \frac{\Delta, !A, !B, \Lambda \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !B, !A, \Lambda \Gamma \Rightarrow} \quad \text{XL} \frac{\Delta \Gamma, !A, !B, \Pi \Rightarrow}{\Delta \Gamma, !B, !A, \Pi \Rightarrow}$$

د کمزوري کولو، انقباض او تبادلې د استنتاجونو یوه لړۍ به زیاتره د استنتاج په دوو کرښو ښوول کېږي. لاندې قاعده چې “پرېکون” بلل کېږي، په کره توګه اړینه نه ده، خو د اشتقاقونه بیا کارول او یو ځای کول ډېر اسانوي.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \quad !A, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

3.5 اشتقاقونه

موږ وويل چې لومړنۍ سپکونېت څنگه وي او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. په سپکونېت حساب کېنې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرايي توګه جوړېږي: هر اشتقاق يا په يوازې ځان يو لومړنۍ سپکونېت وي، او يا له يوه يا دوو اشتقاقونه او ورپسې يوه استنتاج څخه جوړ وي.

تعريف 3.3 (LK اشتقاق). د يوه سپکونېت S LK-اشتقاق د سپکونېتونو داسې متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو بره سپکونېتونه لومړني سپکونېتونه دي.
 2. د ونې تر ټولو لاندې سپکونېت S دے.
 3. له S پرته د ونې هر سپکونېت د استنتاج د يوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه ده، او د هغې کارونې پايله په ونه کېنې د هماغه سپکونېت مخامخ لاندې ولاړه وي.
- بيا وایو چې S د اشتقاق وروستۍ سپکونېت دے او S په LK کېنې د اشتقاق وړ دے (يا LK-د اشتقاق وړ دے).
- بېلګه 3.4. هر لومړنۍ سپکونېت، مثلاً $C \Rightarrow !C$ ، اشتقاق دے. له دې څخه د يوې پلي قاعدې، مثلاً د WL قاعدې، په کارولو نوې اشتقاق ترلاسه کول شو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{!A, \Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL}$$

خو قاعده عمومي مراد لري: په قاعده کېنې A ! د هرې ترلې فارمول، مثلاً د D !، په ځای راوستلې شو. که مقدمه زموږ له لومړني سپکونېت $C \Rightarrow !C$ سره سمون خوري، نو Γ او Δ دواړه يوازې C ! دي، او پايله به بيا $C \Rightarrow !C, D$! وي. نو لاندې اشتقاق دے:

$$\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C} \text{WL}$$

اوس يوه بله قاعده، مثلاً XL، کارولې شو چې په کېنې لوري کېنې د دوو ترلي فارمولونه د ځای بدلولو اجازه راکوي. نو لاندې هم سم اشتقاق دے:

$$\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C} \text{WL} \quad \frac{!D, !C \Rightarrow !C}{!C, !D \Rightarrow !C} \text{XL}$$

د دې قاعدې په دې کارونه کېنې، چې داسې ورکړل شوې وه:

$$\frac{\Gamma, !A, !B, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, !B, !A, \Pi \Rightarrow \Delta} \text{XL}$$

Γ او Π دواړه تش وو، Δ هم C دے، او د A او B ونډې په همدې ترتيب D او C لوبوي. نژدې په همدې طريقه وینو چې

$$\frac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D} \text{WL}$$

هم اشتقاق دے. اوس دا دواړه اشتقاقونه اخلو او د $\wedge R$ په کارولو ئې يو ځای کوو. هغه قاعده داسې وه:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \quad \Gamma \Rightarrow \Delta, !B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B} \wedge R$$

زموږ په حالت کېنې مقدمې بايد د هغو اشتقاقونه له وروستيو سپکونونو سره سمون وځوري چې په مقدمو پای ته رسېږي. يعنې Γ د $C, !D$ ، Δ تشه، A د C او B د D سره برابره ده. نو که استنتاج سم وي، پایله $C, !D \Rightarrow !C \wedge !D$ ده.

$$\frac{\frac{\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C} \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C} \text{XL} \quad \frac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D} \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C \wedge !D} \wedge R$$

البتہ مقدمې سرچپه کولې هم شو؛ بيا A به D او B به C وي.

$$\frac{\frac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D} \text{WL} \quad \frac{\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C} \text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C} \text{XL}}{!C, !D \Rightarrow !D \wedge !C} \wedge R$$

3.6 د اشتقاقونه بيلگې

بيلگه 3.5. د سپکونې $A \wedge !B \Rightarrow !A$ يو LK-اشتقاق ورکړئ.

د اشتقاق په لاندې برخه کېنې د غوښتل شوي وروستي سپکونې په لیکلو پيل کوو.

$$\overline{!A \wedge !B \Rightarrow !A}$$

بيا بايد معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج لاندې سپکونې دا بڼه لرل شي. دا يوه جوړښتي قاعده کېدې شي، خو غوره ده چې لومړې کومه منطقي قاعده ولټوو. په لاندې سپکونې کېنې يوازېنې منطقي نښلونکې $\wedge$ دے، نو د $\wedge$ قاعده لټوو، او ځکه چې د $\wedge$ نښه په مقدم کېنې راځي، د $\wedge L$ قاعده گورو.

$$\overline{!A \wedge !B \Rightarrow !A} \wedge L$$

د $\wedge L$ استنتاج د پورتنۍ سپکونېت دپاره دوه امکانونه شته: يا $A \Rightarrow A$ او يا $A \Rightarrow B$. څرګنده ده چې $A \Rightarrow A$ يو لومړنۍ سپکونېت دے، او دا ښه خبره ده، خو $A \Rightarrow B$ په عمومي توګه د اشتقاق وړ نه دے. پورتنۍ سپکونېت ورپکړو:

$$\frac{A \Rightarrow A}{A \wedge B \Rightarrow A} \wedge L$$

اوس د سپکونېت $A \wedge B \Rightarrow A$ سم LK -اشتقاق لرو.

بېلګه 3.6. د سپکونېت $\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B$ يو LK -اشتقاق ورکړئ. د اشتقاق په لاندې برخه کېنې د غوښتل شوي وروستي سپکونېت په لیکلو پیل وکړئ.

$$\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B$$

د داسې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا وروستۍ سپکونېت را کړي، د وروستي سپکونېت منطقي ښلولونکي کورو: $\neg$ ، $\vee$ او $\rightarrow$. اوس مهال یوازې $\vee$ او $\rightarrow$ مهم دي، ځکه چې د وروستي سپکونېت د ترلي فارمولونه اصلي عملګروونه دي؛ خو $\neg$ د بل ښلولونکي د چاپېریال دننه دے، نو وروسته به ئې وڅېړو. له دې امله د وروستي استنتاج د منطقي قاعدې امکانونه $\vee L$ او $\rightarrow R$ دي. په رښتیا هره یوه غوره کول شو، خو $\rightarrow R$ غوره کوو، یوازې د دې دپاره چې په دوو ځانګړو وېشل لږ وروسته کړو. د هغو $\rightarrow$ استنتاجونو د ښې له مخې چې دا لاندې سپکونېت ورکول شي، ښه باید داسې وي:

$$\frac{A, \neg A \vee B \Rightarrow B}{\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B} \rightarrow R$$

که $\neg A \vee B$ د مقدم بهرني پای ته یوسو، د $\vee L$ قاعده کارول شو. د شېما له مخې دا باید په لاندې ډول پر دوو پورتنیو سپکونېتونو وېشل شي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-001) د سرچینې په هغو څلورو قاعدوي ونو کېنې چې د مقدم دوه فارمولونه سره بدلوي، د ښې لوري د تبادلې ښه راغلي ده؛ دلته د قاعدې له واقعي لوري سره سمه د کین لوري د تبادلې ښه کارول کېږي.

$$\frac{\frac{\neg A, A \Rightarrow B}{\neg A \vee B, A \Rightarrow B} \vee L \quad \frac{B, A \Rightarrow B}{A, \neg A \vee B \Rightarrow B} XL}{\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B} \rightarrow R$$

رایاد کړئ چې موږ هڅه کوو تر لومړنیو سپکونېتونو پورې په پورته لوري لار پیدا کړو؛ داسې ښکاري چې ډېر ورنژدې یو! ښی ځانګه له لومړني سپکونېت څخه یوازې یو کمزوري کول او یوه تبادله لرې ده، او بیا بشپړېږي:

$$\frac{\frac{\frac{B \Rightarrow B}{A, B \Rightarrow B} WL \quad \frac{B, A \Rightarrow B}{A, \neg A \vee B \Rightarrow B} XL}{\neg A \vee B, A \Rightarrow B} \vee L \quad \frac{A, \neg A \vee B \Rightarrow B}{\neg A \vee B \Rightarrow A \rightarrow B} \rightarrow R$$

اوس کینه ځانګه کورو. په هره ترلې فارمول کېنې یوازینۍ منطقي ښلولونکې د مقدم د ترلي فارمولونه د $\neg$ ښه ده، نو د $\neg L$ قاعدې یوه کارونه کورو.

$$\frac{\frac{\frac{}{!A \Rightarrow !B, !A} \neg L}{\neg !A, !A \Rightarrow !B} \neg L \quad \frac{\frac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B} WL}{!B, !A \Rightarrow !B} XL}{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B} \vee L$$

$$\frac{\frac{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \rightarrow !B} \rightarrow R}{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B} XL$$

لکه ښی ځانګه چې مو بشپړه کړه، له دې کښې ځانګې څخه هم یوازې یو کمزوري کول او یوه تبادله لرې یو.

$$\frac{\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{!A \Rightarrow !A, !B} WR}{!A \Rightarrow !B, !A} XR \quad \frac{\frac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B} WL}{!B, !A \Rightarrow !B} XL}{\neg !A, !A \Rightarrow !B} \neg L \quad \frac{\frac{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B}{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B} XL}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \rightarrow !B} \rightarrow R$$

بېلګه 3.7. د سپکوښت $\neg(!A \wedge !B) \Rightarrow \neg !A \vee \neg !B$ یو LK-اشتقاق ورکړئ. د پورته طریقو په کارولو، غوښتل شوی وروستنی سپکوښت په لاندې برخه کښې لیکو.

$$\frac{}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}$$

په وروستي سپکوښت کښې د ترلي فارمولونه شته اصلي ښلولونکي د $\vee$ او $\neg$ ښې دي. دلته هم $\vee L$ او هم $\neg R$ کار ورکوي، خو په $\neg R$ پیل کوو، ځکه چې د یوې شېې دپاره پر دوو ځانګو وېشل ځنډوي:

$$\frac{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)} \neg R$$

اوس د $\wedge L$ او $\vee L$ تر منځ ټاکنه لرو. ګورو چې د $\wedge L$ قاعدې په کارولو څه کېږي: یا په سپکوښت $!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow$ او یا په سپکوښت $!B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow$ پیل کول شو. ځکه چې اشتقاق د $!A$ او $!B$ له پلوه متناظر دے، لومړنۍ غوره کوو. د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-002) د سرچینې په دغو دوو امکانی پورتنیو سپکوښتونو کښې له دویمې جملې څخه نفې پاتې شوې وه؛ دلته د وروستي سپکوښت او ورپسې قاعدوي ونې له مخې په دواړو جملو کښې نفې ساتل کېږي.

$$\frac{\frac{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow} \wedge L}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)} \neg R$$

د اشتقاق د ډکولو په دوام وینو چې له یوې ستونزې سره مخ کېږو:

$$\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow} \neg L \quad \frac{\frac{}{!A \Rightarrow !B} ?}{\neg !B, !A \Rightarrow} \neg L}{\neg !A \vee \neg !B, !A \Rightarrow} \vee L$$

$$\frac{\frac{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow} \wedge L}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)} \neg R$$

د ښې څانگې پورته برخه نوره نه شي را کېدلې او د جوړښتي استنتاجونو له لارې لومړني سپکوپنټ ته نه شي رسول کېدې؛ نو دا سمه لار نه ده. له دې امله پورته د $\wedge L$ قاعدې کارول تېروتنه وه. بېرته مخکيني حالت ته څو او پر ځاي ئې $\vee L$ قاعده پلي کوو، نو ترلاسه کوو:

$$\frac{\frac{\frac{\neg!A, !A \wedge !B \Rightarrow}{\neg!A \vee \neg!B, !A \wedge !B \Rightarrow} \vee L \quad \frac{\neg!B, !A \wedge !B \Rightarrow}{!A \wedge !B, \neg!A \vee \neg!B \Rightarrow} XL}{\neg!A \vee \neg!B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)} \neg R$$

هره څانگه د مخکيني په شان بشپړه کړو، نو ترلاسه کوو:

$$\frac{\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{!A \wedge !B \Rightarrow !A} \wedge L \quad \frac{\neg!A, !A \wedge !B \Rightarrow}{\neg!A \vee \neg!B, !A \wedge !B \Rightarrow} \vee L \quad \frac{\frac{!B \Rightarrow !B}{!A \wedge !B \Rightarrow !B} \wedge L \quad \frac{\neg!B, !A \wedge !B \Rightarrow}{!A \wedge !B, \neg!A \vee \neg!B \Rightarrow} XL}{\neg!A \vee \neg!B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)} \neg R$$

(په دغو کامونو کېنې د $\wedge$ قاعدې د $\neg$ له قاعدو څخه لاندې هم پلي کېدې شوې او بيا به هم سم اشتقاق ترلاسه شوې و-)

بېلگه 3.8. تر اوسه مو د انقباض قاعده نه ده کارولې، خو کله کله اړينه وي. دا ئې يوه بېلگه ده. فرض کړئ غواړو $\Rightarrow A \vee \neg!A$ ثابت کړو. د $\vee R$ سرچپه پلي کول به له دغو دوو اشتقاقونه څخه يو را کړي:

$$\frac{\frac{\Rightarrow !A}{\Rightarrow !A \vee \neg!A} \vee R \quad \frac{\frac{!A \Rightarrow}{\Rightarrow \neg!A} \neg R}{\Rightarrow !A \vee \neg!A} \vee R$$

البته له دغو څخه هېڅ يو په لومړني سپکوپنټ نه پاي ته رسېږي. چل دا دې چې پوه شو د انقباض قاعده د ترلې فارمول دوه نقلونه سره يو کول شي—او کله چې د ثبوت لټون کوو، يعنې له لاندې څخه پورته څو، د $A \vee \neg!A$ يوه کاپي په مقدمه کېنې ساتلې شو، مثلاً:

$$\frac{\frac{\Rightarrow !A \vee \neg!A, !A}{\Rightarrow !A \vee \neg!A, !A \vee \neg!A} \vee R \quad \frac{\Rightarrow !A \vee \neg!A}{\Rightarrow !A \vee \neg!A} CR$$

اوس $\vee R$ دويم ځل کارولې شو او $\neg!A$ هم ترلاسه کوو، چې بشپړ اشتقاق ته رسېږي.

$$\frac{\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{\Rightarrow !A, \neg!A} \neg R \quad \frac{\Rightarrow !A, !A \vee \neg!A}{\Rightarrow !A \vee \neg!A, !A} \vee R \quad \frac{\Rightarrow !A \vee \neg!A, !A}{\Rightarrow !A \vee \neg!A, !A \vee \neg!A} \vee R}{\Rightarrow !A \vee \neg!A} CR$$

تمرین 3.9. د لاندې سپکونونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. !A \wedge (!B \wedge !C) \Rightarrow (!A \wedge !B) \wedge !C$$

$$2. !A \vee (!B \vee !C) \Rightarrow (!A \vee !B) \vee !C$$

$$3. !A \rightarrow (!B \rightarrow !C) \Rightarrow !B \rightarrow (!A \rightarrow !C)$$

$$4. !A \Rightarrow \neg \neg !A$$

تمرین 3.10. د لاندې سپکونونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. (!A \vee !B) \rightarrow !C \Rightarrow !A \rightarrow !C$$

$$2. (!A \rightarrow !C) \wedge (!B \rightarrow !C) \Rightarrow (!A \vee !B) \rightarrow !C$$

$$3. \Rightarrow \neg (!A \wedge \neg !A)$$

$$4. !B \rightarrow !A \Rightarrow \neg !A \rightarrow \neg !B$$

$$5. \Rightarrow (!A \rightarrow \neg !A) \rightarrow \neg !A$$

$$6. \Rightarrow \neg (!A \rightarrow !B) \rightarrow \neg !B$$

$$7. !A \rightarrow !C \Rightarrow \neg (!A \wedge \neg !C)$$

$$8. !A \wedge \neg !C \Rightarrow \neg (!A \rightarrow !C)$$

$$9. !A \vee !B, \neg !B \Rightarrow !A$$

$$10. \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg (!A \wedge !B)$$

$$11. \Rightarrow (\neg !A \wedge \neg !B) \rightarrow \neg (!A \vee !B)$$

$$12. \Rightarrow \neg (!A \vee !B) \rightarrow (\neg !A \wedge \neg !B)$$

تمرین 3.11. د لاندې سپکونونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. \neg (!A \rightarrow !B) \Rightarrow !A$$

$$2. \neg (!A \wedge !B) \Rightarrow \neg !A \vee \neg !B$$

$$3. !A \rightarrow !B \Rightarrow \neg !A \vee !B$$

$$4. \Rightarrow \neg \neg !A \rightarrow !A$$

$$5. !A \rightarrow !B, \neg !A \rightarrow !B \Rightarrow !B$$

$$6. (!A \wedge !B) \rightarrow !C \Rightarrow (!A \rightarrow !C) \vee (!B \rightarrow !C)$$

$$7. (!A \rightarrow !B) \rightarrow !A \Rightarrow !A$$

$$8. \Rightarrow (!A \rightarrow !B) \vee (!B \rightarrow !C)$$

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري-)

3.7 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلگه 3.12. د سپکوبنټ $\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)$ يو LK-اشتقاق ورکړئ.

کله چې له سورونو سره کار کوو، بايد ډاډمن شو چې د ځانگړي متغير شرط نه ماتوو، او کله کله د دې دپاره اړيو چې د ځينو استنتاجونو د پلي کولو ترتيب بدل کړو. په عمومي توگه دا گټوره ده چې لومړۍ هغه قاعدې وڅېړو چې د ځانگړي متغير د شرط تابع دي (په بشپړ شوي ثبوت کښې به لاندې وي). همدارنگه، غوره ده لږ وړاندې وگورو او اټکل وکړو چې لومړنۍ سپکوبنټ به څنگه وي. زموږ په حالت کښې بايد د $A(a) \Rightarrow A(a)$ په شان وي. يعنې کله چې د سورونو قاعدې “سرچپه” کوو، بايد د $\forall$ او $\exists$ دواړو قاعدو دپاره هماغه اصطلاح—چې a به ئې وېولو—غوره کړو. که د هرې قاعدې دپاره بېله اصطلاح غوره کړو، د $A(a) \Rightarrow A(b)$ په شان څه ته رسېږو، چې البته د اشتقاق وړ نه دے.

د معمول په شان په دې ليکلو پيل کوو:

$$\overline{\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)}$$

يا د $\exists L$ قاعده پلي کول شو او يا د $\neg R$ قاعده. ځکه چې $\exists L$ د ځانگړي متغير د شرط تابع ده، بڼه ده چې دا ژر تر ژره وڅېړو، نو لومړۍ همدا پلي کوو.

$$\frac{\overline{\neg A(a) \Rightarrow \neg \forall x A(x)}}{\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)} \exists L$$

د $\neg L$ او $\neg R$ قاعدو په سرچپه پلي کولو ترلاسه کوو:

$$\frac{\frac{\overline{\forall x A(x) \Rightarrow A(a)}}{\neg A(a), \forall x A(x) \Rightarrow} \neg L}{\forall x A(x), \neg A(a) \Rightarrow} XL}{\neg A(a) \Rightarrow \neg \forall x A(x)} \neg R}{\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)} \exists L$$

په دې ځاي کښې يوازېن امکان د $\forall L$ قاعدې پلي کول دي. ځکه چې دا قاعده د ځانگړي متغير د بنديز تابع نه ده، نو کومه ستونزه نشته. راياډ کړئ چې غواړو يو لومړنۍ سپکوبنټ، يعنې د $A(a) \Rightarrow A(a)$ په بڼه، ترلاسه کړو، نو د قاعدې د کارولو پر مهال بايد a د A د ارکومېنټ په توگه غوره کړو.

$$\frac{\frac{\overline{A(a) \Rightarrow A(a)}}{\forall x A(x) \Rightarrow A(a)} \forall L}{\neg A(a), \forall x A(x) \Rightarrow} \neg L}{\forall x A(x), \neg A(a) \Rightarrow} XL}{\neg A(a) \Rightarrow \neg \forall x A(x)} \neg R}{\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x)} \exists L$$

په تېره بيا له سورونو سره د کار پر مهال مهمه ده چې په دې ځاي کښې بيا وگورو چې د ځانگړي متغير شرط خو نه دے مات شوے. ځکه چې زموږ له کارول شوو قاعدو څخه يوازې $\exists L$ د ځانگړي متغير د شرط تابع وه، او ځانگړۍ متغير a د هغې په لاندې سپکوبنټ (وروستي سپکوبنټ) کښې نه راځي، نو دا سم اشتقاق دے.

تمرین 3.13. د لاندې سپکو پښتونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. \Rightarrow (\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall z (!A(z) \wedge !B(z))$$

$$2. \Rightarrow (\exists x !A(x) \vee \exists y !B(y)) \rightarrow \exists z (!A(z) \vee !B(z))$$

$$3. \forall x (!A(x) \rightarrow !B) \Rightarrow \exists y !A(y) \rightarrow !B$$

$$4. \forall x \neg !A(x) \Rightarrow \neg \exists x !A(x)$$

$$5. \Rightarrow \neg \exists x !A(x) \rightarrow \forall x \neg !A(x)$$

$$6. \Rightarrow \neg \exists x \forall y ((!A(x, y) \rightarrow \neg !A(y, y)) \wedge (\neg !A(y, y) \rightarrow !A(x, y)))$$

تمرین 3.14. د لاندې سپکو پښتونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. \Rightarrow \neg \forall x !A(x) \rightarrow \exists x \neg !A(x)$$

$$2. (\forall x !A(x) \rightarrow !B) \Rightarrow \exists y (!A(y) \rightarrow !B)$$

$$3. \Rightarrow \exists x (!A(x) \rightarrow \forall y !A(y))$$

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري.)

اداري یادونه. دا برخه د سپکو پښت حساب د اشتقاق وړتیا او سازګارۍ تعریفونه راغونډوي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-003) په سرچینه کېنې د طبیعي استنتاج نوم راغلی و؛ دلته د څپرکي او ورپسې تعریفونو له مخې د سپکو پښت حساب نوم کارول کېږي.

3.8 د ثبوت-تیوريکي مفاهیم

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنایي مفاهیم (اعتبار، معنایي استلزام او د صدق وړتیا) تعریف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تیوريکي مفاهیم تعریفوو. دا مفاهیم په جوړښتونه کېنې د ترلي فارمولونه د صدق پر بنسټ نه، بلکې د ځینو سپکو پښتونو د اشتقاق وړتیا یا د اشتقاق نه وړتیا پر بنسټ تعریفېږي. دا یوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالی او بشپړتیا قضیه ده.

تعریف 3.15 (قضیې). ترلې فارمول A هله قضیه ده چې په LK کېنې د سپکو پښت A $\Rightarrow$ اشتقاق موجود وي. که A قضیه وي، $A \vdash$ لیکو؛ او که نه وي، $A \not\vdash$ لیکو.

تعریف 3.16 (د اشتقاق وړتیا). ترلې فارمول A ! د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه د اشتقاق وړ ده، یعنې $\Gamma \vdash A$ ، هله او یوازې هله چې یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او په Γ_0 کېنې د ترلي فارمولونه یو لړ Γ'_0 موجود وي، داسې چې LK د $A \Rightarrow \Gamma'_0$ سپکو پښت اشتقاق کړي. که A ! له Γ څخه د اشتقاق وړ نه وي، $\Gamma \not\vdash A$ لیکو.

د انقباض، کمزوري کولو او تبادلې د قاعدو له امله، په Γ'_0 کېنې د ترلي فارمولونه ترتیب او شمېر اهمیت نه لري: که سېکوېنټ $\Gamma'_0 \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ وي، نو د هر داسې Γ''_0 دپاره $\Gamma'_0 \Rightarrow !A$ هم د اشتقاق وړ دے چې د Γ'_0 هماغه ترلي فارمولونه لري. مثلاً که $\Gamma_0 = \{!B, !C\}$ وي، نو هم $\Gamma'_0 = \{!B, !B, !C\}$ او هم $\Gamma''_0 = \{!C, !C, !B\}$ داسې لرونه دي چې یوازې د Γ_0 ترلي فارمولونه لري. که د یوه لرونکې سېکوېنټ د اشتقاق وړ وي، د بل لرونکې هم دے، مثلاً:

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \frac{!B, !B, !C \Rightarrow !A}{!B, !C \Rightarrow !A} \text{CL} \\ \frac{!B, !C \Rightarrow !A}{!C, !B \Rightarrow !A} \text{XL} \\ \frac{!C, !B \Rightarrow !A}{!C, !C, !B \Rightarrow !A} \text{WL} \end{array}$$

له دې وروسته به وایو چې که Γ_0 د ترلي فارمولونه یو متناهي سټ وي، نو $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ هر هغه سېکوېنټ دے چې مقدم ئې په Γ_0 کېنې د ترلي فارمولونه یو لرونکي وي، او د اړتیا په وخت کېنې انقباضونه، تبادلې او کمزوري کول په ناوېلې توګه ورګډوو.

تعریف 3.17 (سازګاري). د جملو سټ Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ موجود وي، داسې چې $\Gamma_0 \Rightarrow \text{LK}$ د سېکوېنټ اشتقاق کړي. که Γ ناسازګار نه وي، یعنې که د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\Gamma_0 \Rightarrow \text{LK}$ د سېکوېنټ اشتقاق نه کړي، نو هغه سازګار بولو.

قضیه 3.18 (انعکاسیت). که $A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash A$.

ثبوت. لومړنۍ سېکوېنټ $A \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ دے، او $\{!A\} \subseteq \Gamma$.

قضیه 3.19 (یکنواختي). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Delta \vdash A$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash A$ ، یعنې یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ دے. ځکه چې $\Gamma \subseteq \Delta$ ، نو $\Gamma_0 \subseteq \Delta$ هم یو متناهي فرعي سټ دے. له دې امله د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق هم $\Delta \vdash A$ ښیي.

قضیه 3.20 (انتقالیت). که $\Gamma \vdash A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash B$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash A$ وي، یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق π_0 شته. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash B$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Delta_0 \subseteq \Delta$ دپاره د $!A, \Delta_0 \Rightarrow !B$ اشتقاق π_1 شته. لاندې اشتقاق وګورئ:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow !A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \pi_1 \\ !A, \Delta_0 \Rightarrow !B \end{array}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow !B} \text{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma \cup \Delta \vdash B$ ، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash B$ ښیي.

پام وکړئ، په ځانګړې توګه د دې معنی دا ده چې که $\Gamma \vdash A$ او $A \vdash B$ وي، نو $\Gamma \vdash B$ همدارنګه ترې دا هم راځي چې که $A_1, \dots, A_n \vdash B$ وي او د هر i دپاره $\Gamma \vdash A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash B$.
قضيه 3.21. Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې د هرې جملې A دپاره $\Gamma \vdash A$ وي.

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 3.22. 3.21 ثابت کړئ.

قضيه 3.23. (متناهي شاهد). 1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash A$.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې د $\Gamma_0 \Rightarrow A$ سپکوبنټ اشتقاق لري. له دې امله $\Gamma_0 \vdash A$.

2. که Γ ناسازګار وي، نو يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سپکوبنټ اشتقاق کړي. خو بيا Γ_0 د Γ يو ناسازګار متناهي فرعي سټ دے.

□

3.9 د اشتقاق وړتيا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق وړتيا اړيکې يو شمېر خاصيتونه ثابت کړو. دا خاصيتونه په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر يو به د بشپرتيا د قضیې په ثبوت کې ونډه ولري.

قضيه 3.24. که $\Gamma \vdash A$ وي او $\Gamma \cup \{A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي Γ_0 او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ شته چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow A$ او $A, \Gamma_1 \Rightarrow$ سپکوبنټونه اشتقاق کړي. د $\Gamma_0 \Rightarrow A$ د **LK**-اشتقاق نوم π_0 او د $A, \Gamma_1 \Rightarrow$ د **LK**-اشتقاق نوم π_1 کېږدو. بيا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \pi_1 \\ A, \Gamma_1 \Rightarrow \end{array}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}$$

□

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ؛ له دې امله Γ ناسازګار دے.

قضيه 3.25. $\Gamma \vdash A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړۍ فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ ، يعنې د $\Gamma \Rightarrow !A$ اشتقاق π_0 شته. د $\neg L$ قاعدې په ورزياتولو د $\neg !A, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق ترلاسه کوو، يعنې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار دے. که $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار وي، نو د $\neg !A, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق π_1 شته. لاندې د $\Gamma \Rightarrow !A$ اشتقاق دے:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_1}{\neg !A, \Gamma \Rightarrow} \text{Cut} \quad \frac{!A \Rightarrow !A}{\Rightarrow !A, \neg !A} \neg R}{\Gamma \Rightarrow !A} \text{Cut}}$$

□

تمرین 3.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي.

قضيه 3.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$. بيا د کوم سپکونېټ $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق π شته. سپکونېټ $\neg !A, \Gamma_0 \Rightarrow$ هم د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi}{\Gamma_0 \Rightarrow !A} \text{Cut} \quad \frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow} \neg L \quad \frac{!A, \neg !A \Rightarrow}{!A, \neg !A \Rightarrow} \text{XL}}{\Gamma_0, \neg !A \Rightarrow} \text{Cut}}$$

□

ځکه چې $\neg !A \in \Gamma$ او $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، نو دا ښيي چې Γ ناسازگار دے.

قضيه 3.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. داسې متناهي ستونه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ او داسې **LK**-اشتقاقونه π_0 او π_1 شته چې په همدې ترتيب د $\neg !A, \Gamma_1 \Rightarrow$ او $!A, \Gamma_0 \Rightarrow$ اشتقاقونه دي. بيا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{\frac{\frac{\vdots \pi_0}{!A, \Gamma_0 \Rightarrow} \neg R \quad \frac{\frac{\vdots \pi_1}{\neg !A, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow} \text{Cut}}$$

□

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. له دې امله Γ ناسازگار دے.

3.10 د اشتقاق وړتيا او قضيز نښلوونکي

موږ ثابتوو چې د سپکوښت حساب د د اشتقاق وړتيا اړيکه $\vdash$ دومره پياوړې ده چې د قضيزو نښلوونکو په اړه ځينې بنسټيز حقيقتونه ثابت کړي، لکه $A \wedge B \vdash A$ او $A \wedge B \vdash B$ (مودوس پونېس) - دغه حقيقتونه د بشپرتيا د قضیې د ثبوت دپاره اړين دي.

قضيه 3.29. 1. هم $A \wedge B \vdash A$ او هم $A \wedge B \vdash B$.

2. $A, B \vdash A \wedge B$.

ثبوت. 1. دواړه سپکوښتونه $A \wedge B \Rightarrow A$ او $A \wedge B \Rightarrow B$ د اشتقاق وړ دي:

$$\frac{A \Rightarrow A}{A \wedge B \Rightarrow A} \wedge L \quad \frac{B \Rightarrow B}{A \wedge B \Rightarrow B} \wedge L$$

2. دا د سپکوښت $A, B \Rightarrow A \wedge B$ يو اشتقاق دے - د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-004) د سرچينې په ونه کېنې د عطف-بنې قاعدې دواړو مقدمو يو شان مقدم نه درلود؛ دلته د جوړښتي استنتاجونو دوه گونې کرښې دواړه مقدمې له پایلې سره سموي.

$$\frac{\frac{A \Rightarrow A}{A, B \Rightarrow A} \quad \frac{B \Rightarrow B}{A, B \Rightarrow B}}{A, B \Rightarrow A \wedge B} \wedge R$$

□

قضيه 3.30. 1. $A \vee B, \neg A, \neg B$ ناسازگار دے -

2. هم $A \vdash A \vee B$ او هم $B \vdash A \vee B$.

ثبوت. 1. موږ د سپکوښت $A \vee B, \neg A, \neg B \Rightarrow$ يو اشتقاق ورکوو:

$$\frac{\frac{A \Rightarrow A}{\neg A, A \Rightarrow} \neg L \quad \frac{B \Rightarrow B}{\neg B, B \Rightarrow} \neg L}{\frac{A, \neg A, \neg B \Rightarrow \quad B, \neg A, \neg B \Rightarrow}{A \vee B, \neg A, \neg B \Rightarrow} \vee L}$$

(راياد کړئ چې د استنتاج دوه گونې کرښې خو کمزوري کول، انقباضونه او تبادلي ښيي -)

2. دواړه سپکوښتونه $A \Rightarrow A \vee B$ او $B \Rightarrow A \vee B$ اشتقاقونه لري:

$$\frac{A \Rightarrow A}{A \Rightarrow A \vee B} \vee R \quad \frac{B \Rightarrow B}{B \Rightarrow A \vee B} \vee R$$

□

قضيه 3.31. 1. $\neg A, A \rightarrow B \vdash B$.

2. هم $\neg!A \vdash !A \rightarrow !B$ او هم $!B \vdash !A \rightarrow !B$.

ثبوت. 1. سپکونېټ $!A \Rightarrow !B, !A \Rightarrow !B$ د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{!A \Rightarrow !A \quad !B \Rightarrow !B}{!A \rightarrow !B, !A \Rightarrow !B} \rightarrow L$$

2. دواړه سپکونېټونه $!B \Rightarrow !A \rightarrow !B$ او $\neg!A \Rightarrow !A \rightarrow !B$ د اشتقاق وړ دي:

$$\frac{\frac{\frac{!A \Rightarrow !A}{\neg!A, !A \Rightarrow} \neg L}{!A, \neg!A \Rightarrow} XL}{!A, \neg!A \Rightarrow !B} WR \quad \frac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B} WL}{\neg!A \Rightarrow !A \rightarrow !B} \rightarrow R \quad \frac{!B \Rightarrow !B}{!B \Rightarrow !A \rightarrow !B} \rightarrow R$$

□

3.11 د اشتقاق وړتيا او سورونه

د بشپړتيا قضيه دا هم غواړي چې د سپکونېټ حساب قاعدې په دې برخه کېنې د $\vdash$ په اړه ثابت شوي حقيقتونه را کړي.

قضيه 3.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ يا $!A(x)$ کېنې نه راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x !A(x)$.

ثبوت. د کوم متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\Gamma_0 \Rightarrow !A(c)$ د LK -اشتقاق نوم π_0 کېږدئ. د $\forall R$ استنتاج په ورزياتولو د $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x !A(x)$ اشتقاق ترلاسه کوو؛ ځکه c په Γ يا $!A(x)$ کېنې نه راځي، نو د ځانگړي متغير شرط پوره کېږي.

□

قضيه 3.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x !A(x)$.

2. $\forall x !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. سپکونېټ $!A(t) \Rightarrow \exists x !A(x)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{!A(t) \Rightarrow !A(t)}{!A(t) \Rightarrow \exists x !A(x)} \exists R$$

2. سپکونېټ $\forall x !A(x) \Rightarrow !A(t)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\frac{!A(t) \Rightarrow !A(t)}{\forall x !A(x) \Rightarrow !A(t)} \forall L$$

□

3.12 سموله

د سپکوپنټ حساب په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نه کړي چې په حقيقت کېنې نه وي. نو سموله د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خونديتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوريکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ A ! معتبر ده؛

2. که ترې فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛

3. که د ترې فارمولونه یو سټ ناسازگار وي، د صدق وړ نه دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نه وي، اشتقاق نظام نیکرے دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموله ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

ځکه دغه ټول ثبوت-تیوريکي خاصیتونه په سپکوپنټ حساب کېنې د ځینو سپکوپنټونو د د اشتقاق وړتیا له لارې تعریف شوي دي، د پورته (۱)–(۳) ثابتول غواړي چې د د اشتقاق وړ سپکوپنټونو د معنایي خاصیتونو په اړه یو څه ثابت کړو. لومړۍ به تعریف کړو چې د سپکوپنټ معتبر کېدل څه معنی لري، او بیا به وښیو چې هر د اشتقاق وړ سپکوپنټ معتبر دے. وروسته (۱)–(۳) د دې پایلې د لازمو نتیجه په توګه راځي.

تعریف 3.34. جوړښت $\mathcal{M}$ یو سپکوپنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله او یوازې هله پوره کوي چې یا د کوم $A \in \Gamma$! دپاره $A \notin \mathcal{M}$ وي، یا د کوم $A \in \Delta$! دپاره $A \models \mathcal{M}$ وي. یو سپکوپنټ هله او یوازې هله معتبر دے چې هر جوړښت $\mathcal{M}$ هغه پوره کړي.

قضیه 3.35 (سموله). که LK د $\Theta \Rightarrow \Xi$ سپکوپنټ اشتقاق کړي، نو $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے.

ثبوت. فرض کړئ π د $\Theta \Rightarrow \Xi$ اشتقاق دے. موږ په π کېنې د استنتاجونو پر شمېر n استقرا کوو.

که د استنتاجونو شمېر 0 وي، نو π یوازې له یوه لومړني سپکوپنټ څخه جوړ دے. هر لومړنۍ سپکوپنټ $A \Rightarrow A$! په څرګند ډول معتبر دے؛ ځکه د هر $\mathcal{M}$ دپاره یا $A \notin \mathcal{M}$ وي یا $A \models \mathcal{M}$.

که د استنتاجونو شمېر له 0 څخه زیات وي، د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو. د استقرا د فرضیې له مخې منلے شو چې د دغه استنتاج مقدمې معتبرې دي؛ ځکه د هرې مقدمې په اشتقاق کېنې د استنتاجونو شمېر له n څخه کم دے.

لومړۍ هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې یوازې یوه مقدمه لري.

1. وروستۍ استنتاج کمزوري کول دي. بیا $\Theta \Rightarrow \Xi$ یا $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دے (که وروستۍ استنتاج WL وي) یا $A, \Gamma \Rightarrow \Delta$! دے (که WR وي)، او اشتقاق له لاندې دواړو بنو څخه په یوه پای ته رسېږي:

$$\frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow \Delta} \text{WL} \quad \frac{\vdots}{\Gamma \Rightarrow \Delta, A} \text{WR}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے؛ يعنې د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره يا کوم $C \in \Gamma$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ وي، يا کوم $C \in \Delta$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ وي.

که د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ وي، نو $C \in \Theta$ هم دے؛ ځکه $\Theta = !A, \Gamma$ ، نو د کوم $C \in \Theta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ دے. همدارنګه، که د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ وي، ځکه $C \in \Xi$ ، نو د کوم $C \in \Xi$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ دے. له دې امله $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے.

2. وروستنه استنتاج $\neg L$ دے: بيا د وروستي استنتاج مقدمه $\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ او پایله $\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ده، يعنې اشتقاق داسې پاڼے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A \end{array}}{\neg A, \Gamma \Rightarrow \Delta} \neg L$$

او $\Theta = \neg A, \Gamma$ ، په داسې حال کې چې $\Xi = \Delta$.

د استقرا فرضيه وايي چې $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے؛ يعنې د هر $\mathcal{M}$ دپاره يا (الف) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (ب) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (ج) $\mathcal{M} \models A$ وي. غواړو وښيو چې $\Theta \Rightarrow \Xi$ هم معتبر دے. فرض کړئ $\mathcal{M}$ جوړښت دے. که (الف) سم وي، نو داسې $C \in \Gamma$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ ، خو $C \in \Theta$ هم دے. که (ب) سم وي، نو داسې $C \in \Delta$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ ، خو $C \in \Xi$ هم دے. په پای کې، که $\mathcal{M} \models A$ وي، نو $\mathcal{M} \models \neg A$ دے. ځکه $\neg A \in \Theta$ ، نو داسې $C \in \Theta$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ وي. له دې امله $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے.

3. وروستنه استنتاج $\neg R$ دے: تمرين.

4. وروستنه استنتاج $\wedge L$ دے: دوه ښي شته؛ $A \wedge B$ په کيڼ لوري کې د مقدمې له A يا B څخه استنتاج کېدے شي. په لومړي حالت کې π داسې پاڼے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ !A, \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{!A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta} \wedge L$$

او $\Theta = !A \wedge !B, \Gamma$ ، په داسې حال کې چې $\Xi = \Delta$. يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کې ونيسئ. ځکه د استقرا د فرضيې له مخې $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، يا (الف) $\mathcal{M} \models A$ ، يا (ب) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (ج) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ وي. په (الف) حالت کې $!A \wedge !B$ ، نو داسې $C \in \Theta$ (يعنې $!A \wedge !B$) شته چې $\mathcal{M} \models C$ وي. په (ب) حالت کې داسې $C \in \Gamma$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ ، او $C \in \Theta$ هم دے. په (ج) حالت کې داسې $C \in \Delta$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ ، او ځکه $\Xi = \Delta$ ، $C \in \Xi$ هم دے. نو په هر حالت کې $\mathcal{M} \models !A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ سېکونېټ پوره کوي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-005) د سرچينې په ورپسې پایله کې عطف لرونکې مقدمه پاتې شوې وه؛ دلته د همدغه ثابت شوي بشپړ سېکونېټ اعتبار ليکل کېږي. ځکه $\mathcal{M} \models !A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے. هغه حالت چې $!A \wedge !B$ له B څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د A پر ځای د B په راورلو، حل کېږي.

5. وروستنه استنتاج $\vee R$ دے: دوه ښي شته؛ $A \vee B$ په ښي لوري کې د مقدمې له A يا B څخه استنتاج کېدے شي. په لومړي حالت کې π داسې پاڼے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \vee B} \vee R$$

اوس $\Theta = \Gamma$ او $\Xi = \Delta, !A \vee B$ دي. يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کېنې ونیسئ. ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، يا (الف) $\mathcal{M} \models !A$ ، يا (ب) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (ج) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ وي. په (الف) حالت کېنې $\mathcal{M} \models !A \vee B$ په (ب) حالت کېنې داسې $C \in \Gamma$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ په (ج) حالت کېنې داسې $C \in \Delta$ شته چې $\mathcal{M} \models C$. نو په هر حالت کېنې $\mathcal{M} \models \Delta, !A \vee B$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \vee B$ ، يعنې $\Theta \Rightarrow \Xi$ پوره کوي. ځکه $\mathcal{M}$ اختياري و، $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے. هغه حالت چې $!A \vee B$ له B څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د $!A$ پر ځای د B په راوړلو، حل کېږي.

6. وروستۍ استنتاج $\rightarrow R$ دے: بيا داسې پای ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ !A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \rightarrow B} \rightarrow R$$

بيا هم د استقرا فرضيه وايي چې مقدمه معتبر ده؛ غواړو وښيو چې پایله هم معتبره ده. يو اختياري $\mathcal{M}$ ونیسئ. ځکه $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ معتبر دے، لږ تر لږه يو له دغو حالتونو څخه سم دے: (الف) $\mathcal{M} \models !A$ ، (ب) $\mathcal{M} \models B$ ، (ج) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (د) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$. په (الف) او (ب) حالتونو کېنې $\mathcal{M} \models !A \rightarrow B$ ، نو داسې $C \in \Delta, !A \rightarrow B$ شته چې $\mathcal{M} \models C$ وي. په (ج) حالت کېنې د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ دے. په (د) حالت کېنې د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ دے. په هر حالت کېنې $\mathcal{M} \models \Delta, !A \rightarrow B$ ځکه $\mathcal{M}$ اختياري و، $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \rightarrow B$ معتبر دے.

7. وروستۍ استنتاج $\forall L$ دے: بيا داسې فارمول $A(x)$ او تړلې اصطلاح t شته چې π داسې پای ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ !A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta \end{array}}{\forall x !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall L$$

غواړو وښيو چې پایله $\forall x !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده. يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کېنې ونیسئ. ځکه چې مقدمه $!A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده، يا (الف) $\mathcal{M} \models !A(t)$ ، (ب) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (ج) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ دے. په (الف) حالت کېنې، د کيټ ټاکونکو او تړلو ترمونو قضيه [OLP] له مخې، که $\mathcal{M} \models \forall x !A(x)$ وي، نو $\mathcal{M} \models !A(t)$ دے. ځکه $\mathcal{M} \models !A(t)$ ، نو $\mathcal{M} \models \forall x !A(x)$ په (ب) او (ج) حالتونو کېنې $\mathcal{M}$ هم $\forall x !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کوي. ځکه $\mathcal{M}$ اختياري و، $\forall x !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے.

8. وروستۍ استنتاج $\exists R$ دے: تمرین.

9. وروستۍ استنتاج $\forall R$ دے: بيا داسې فارمول $A(x)$ او ثابت سمبول a شته چې π داسې پای ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A(a) \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x !A(x)} \forall R$$

دلته د ځانگړي متغير شرط پوره کېږي؛ يعنې a په $A(x)$ ، Γ يا Δ کېنې نه راځي. د استقرا د فرضي له مخې د وروستي استنتاج مقدمه معتبره ده. بايد وښيو چې پايله هم معتبره ده؛ يعنې د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره يا (الف) $\mathcal{M} \models \forall x A(x)$ ، يا (ب) د کوم $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (ج) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ وي.

فرض کړئ $\mathcal{M}$ يو اختياري جوړښت دے. که (ب) يا (ج) سم وي، کار بشپړ دے؛ نو فرض کړئ يو هم سم نه دے: د هر $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، او د هر $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \not\models C$. بايد وښيو چې (الف) سم دے، يعنې $\mathcal{M} \models \forall x A(x)$. د کيت ټاکونکو د صدق قضيه [OLP] له مخې کافي ده وښيو چې د ټولو متغير-ټاکنو s دپاره $\mathcal{M}, s \models A(x)$. نو يو اختياري متغير-ټاکنه s ونيسئ. داسې جوړښت $\mathcal{M}'$ په پام کېنې ونيسئ چې د $\mathcal{M}$ په شان دے، پرته له دې چې $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$. د جملو د امتدادي والي نتيجه [OLP] له مخې، د هر $C \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M}' \models C$ ؛ ځکه a په Γ کېنې نه راځي، او د هر $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M}' \not\models C$. خو مقدمه معتبره ده، نو $\mathcal{M}' \models A(a)$. د جملې د صدق او متغير-گومارنې قضيه [OLP] له مخې $\mathcal{M}', s \models A(a)$ ، ځکه $A(a)$ يوه جمله ده. اوس $s \sim_x s$ او $s(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}'}(a)$ ، ځکه $\mathcal{M}' \models A(x)$ مو همداسې تعريف کړے دے. نو فورمول د بدلولو قضيه [OLP] پلي کېږي او $\mathcal{M}', s \models A(x)$ ترلاسه کوو. ځکه a په $A(x)$ کېنې نه راځي، د امتدادي والي قضيه [OLP] له مخې $\mathcal{M}, s \models A(x)$. ځکه s اختياري و، دا مو ثابت کړل چې د ټولو متغير-ټاکنو دپاره $\mathcal{M}, s \models A(x)$.

10. وروستۍ استنتاج $\exists L$ دے: تمرين.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې دوه مقدمې لري.

1. وروستۍ استنتاج پرېکون دے: بيا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ !A, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \text{Cut}$$

فرض کړئ $\mathcal{M}$ جوړښت دے. د استقرا د فرضي له مخې دواړه مقدمې معتبرې دي، نو $\mathcal{M}$ دواړه پوره کوي. دوه حالتونه بېلوو: (الف) $\mathcal{M} \not\models A$ او (ب) $\mathcal{M} \models A$. په (الف) حالت کېنې، د دې دپاره چې $\mathcal{M}$ کينه مقدمه پوره کړي، بايد $\Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کړي. بيا پايله هم پوره کوي. په (ب) حالت کېنې، د دې دپاره چې $\mathcal{M}$ ښۍ مقدمه پوره کړي، د ژباړې د نسخې سمون: (OLSQ-006) سرچينې دلته د سپکوښت د ښې پر ځاے د سټ-توپير ښه لرله؛ د قاعدې له مقدمو سره سمه ښه راوستل کېږي. بايد $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کړي. بيا هم $\mathcal{M}$ پايله پوره کوي.

2. وروستۍ استنتاج $\wedge R$ دے. بيا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !B \end{array}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B} \wedge R$$

يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کېنې ونيسئ. که $\mathcal{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ سپکوښت پوره کوي، کار بشپړ دے. نو فرض کړئ نه ئې پوره کوي. ځکه د استقرا د فرضي له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، $\mathcal{M} \models A$. همدارنګه، ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ معتبر دے، $\mathcal{M} \models B$. نو $\mathcal{M} \models A \wedge B$.

3. وروستۍ استنتاج $\forall L$ دے: تمرين.

4. وروستنه استنتاج $\rightarrow L$ دے۔ بيا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\frac{\begin{array}{c} \vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A \end{array} \quad \begin{array}{c} \vdots \\ !B, \Pi \Rightarrow \Lambda \end{array}}{!A \rightarrow !B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \rightarrow L$$

بيا هم يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کېنې ونيسئ او فرض کړئ چې $\mathcal{M}$ د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سپکوښت نه پوره کوي۔ بايد وښيو چې $\mathcal{M} \not\models A \rightarrow !B$ ۔ که $\mathcal{M}$ د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سپکوښت نه پوره کوي، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta$ او نه $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کوي۔ ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، $\mathcal{M} \models !A$ ؛ او ځکه $!B, \Pi \Rightarrow \Lambda$ معتبر دے، $\mathcal{M} \models !B$ ۔ خو بيا $\mathcal{M} \not\models A \rightarrow !B$ ، او همدا مو غوښتل۔

□

تمرین 3.36. د 3.35 ثبوت بشپړ کړئ۔

نتیجه 3.37. که $\vdash A$ وي، نو $!A$ معتبر ده۔

نتیجه 3.38. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Gamma \models !A$ ۔

ثبوت. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق شته۔ د 3.35 له مخې، هر جوړښت $\mathcal{M}$ يا کوم $B \in \Gamma_0$ ناسموي يا $!A$ رښتيا کوي۔ نو که $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، بيا $\mathcal{M} \models !A$ هم دے۔

□

نتیجه 3.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازگار دے۔

ثبوت. موږ مقابل عکس ثابتوو۔ فرض کړئ Γ سازگار نه دے۔ بيا يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow$ اشتقاق شته۔ د 3.35 له مخې $\Gamma_0 \Rightarrow$ معتبر دے۔ په بله وينا، د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره داسې $C \in \Gamma_0$ شته چې $\mathcal{M} \not\models C$ ، او ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ ، دغه C په Γ کېنې هم دے۔ نو هېڅ $\mathcal{M}$ د Γ سټ نه پوره کوي، او Γ د صدق وړ نه دے۔

□

3.13 له عينيت سره اشتقاقونه

له عينيت سره اشتقاقونه اضافي لومړنيو سپکوښتونو او استنتاجي قاعدو ته اړتيا لري۔

تعريف 3.40 (د دپاره لومړني سپکوښتونه). که t تړلې اصطلاح وي، نو $t = t \Rightarrow$ يو لومړنی سپکوښت دے۔

د = قاعدې دا دي (t_1 او t_2 تړلې اصطلاحگانې دي):

$$\frac{\Delta, !A(t_2)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A(t_1)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} = \frac{\Delta, !A(t_1)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A(t_2)t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}$$

بېلگه 3.41. که s او t ترې اصطلاحکاني وي، نو $s = t, !A(s) \vdash !A(t)$:

$$\frac{\frac{!A(s) \Rightarrow !A(s)}{s = t, !A(s) \Rightarrow !A(s)} \text{WL}}{s = t, !A(s) \Rightarrow !A(t)} =$$

دا به د يو شان څيزونو د تعويض د اصل يا د لايښخ د قانون په نامه اشنا وي. LK ثابتوي چې = متناظره او انتقالي ده:

$$\frac{\frac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1} \text{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1} = \frac{\frac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2} \text{WL}}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3} \text{XL}$$

په کين اشتقاق کښې فارمول $x = t_1$ زموږ $!A(x)$ دے. په بني اړخ کښې $!A(x)$ د $t_1 = x$ په توگه اخلو.

تمرین 3.42. د لاندې سپکوبښتونو اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. \Rightarrow \forall x \forall y ((x = y \wedge !A(x)) \rightarrow !A(y))$$

$$2. \exists x !A(x) \wedge \forall y \forall z ((!A(y) \wedge !A(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x (!A(x) \wedge \forall y (!A(y) \rightarrow y = x))$$

3.14 له عينيت سره سموالے

قضيه 3.43. LK د عينيت له لومړنيو سپکوبښتونو او قاعدو سره سم دے.

ثبوت. د $t = t \Rightarrow$ په بڼه لومړني سپکوبښتونه معتبر دي؛ ځکه د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \models t = t$ (پام وکړئ، فرض کوو چې اصطلاح t ترې ده، يعنې هېڅ متغير نه لري؛ نو متغير-ټاکنې اهميت نه لري.)

فرض کړئ په اشتقاق کښې وروستنه استنتاج = دے. بيا مقدمه $!A(t_1)$ او پایله $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow$ $!A(t_2)$ ده. يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کښې ونیسئ. بايد وښيو چې پایله معتبره ده؛ يعنې که $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ او $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، نو يا د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا $\mathcal{M} \models !A(t_2)$ دے.

د استقرا د فرضيې له مخې مقدمه معتبره ده. د دې معنی دا ده چې که $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ او $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، نو يا (الف) د کوم $C \in \Delta$ دپاره $\mathcal{M} \models C$ ، يا (ب) $\mathcal{M} \models !A(t_1)$ دے. په (الف) حالت کښې کار بشپړ دے. (ب) حالت وگورئ. داسې متغير-ټاکنه s ونیسئ چې $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$ د جملې د صدق او متغير-گومارنې قضيه [OLP] له مخې $\mathcal{M}, s \models !A(t_1)$ ځکه $s \sim_x s$ ، د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] له مخې $\mathcal{M}, s \models !A(x)$ ځکه $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ ، نو $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ ، او له دې امله $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] په بيا پلي کولو $\mathcal{M}, s \models !A(t_2)$ هم لرو. د جملې د صدق او متغير-گومارنې قضيه [OLP] له مخې $\mathcal{M} \models !A(t_2)$. $\square$

باب 4

فطري استنتاج

ادارقي يادونه. دا څپرک د کښتنې/پراوېچ په طريقه د فطري استنتاج يو نظام وړاندې کوي. د ثبوت د يوه نظام په توګه له فطري استنتاج سره اړوند مواد د شاملولو يا ايستلو دپاره د prfND ټګ وکاروئ.

4.1 قاعدې او اشتقاقونه

د فطري استنتاج له نظامونو څخه موخه دا ده چې په رياضيکي ثبوت کې له کارېدونکي غير رسمي استدلال سره نژدې موازي وي (همدا وجه ده چې تر يوه حده "فطري" دے). د فطري استنتاج ثبوتونه له فرضيو پېلېږي. بيا د استنتاج قاعدې ورباندې کارول کېږي. فرضيې د Intro ، Intro ، Elim او Elim د استنتاج د قاعدو په وسيله "ايستل" کېږي، او د روښانتيا دپاره د ايستل شوې فرضيې لښان د استنتاج تر څنګ ليکل کېږي.

تعريف 4.1 (فرضيه). يوه فرضيه هره هغه ترلې فارمول ده چې د هرې ځانګې په ترټولو پورتي ځاي کېږي وي.

په فطري استنتاج کېښې اشتقاقونه د ترلي فارمولونه ځانګړې ونې دي؛ ترټولو پورتي ترلي فارمولونه فرضيې وي، او که يوه ترلې فارمول تريوې، دوو يا دريو نورو جملو لاندې وي، بايد په سمه توګه د استنتاج له يوې قاعدې څخه پايله شي. د استنتاج په سر کېښې ترلي فارمولونه د هغې مقدمې او لاندې ترلې فارمول د استنتاج پايله بلل کېږي. قاعدې په جوړو کېښې راځي: د هر منطقي عملګر دپاره يوه د داخلولو او يوه د ايستلو قاعده. دوی په پايله کېښې منطقي عملګر داخلوي يا منطقي عملګر د قاعدې له يوې مقدمې څخه باسي. ځينې قاعدې اجازه ورکوي چې د يوه ټاکلي ډول فرضيه ايستل شي. د دې د ښودلو دپاره چې کومه فرضيه د کوم استنتاج په وسيله ايستل کېږي، فرضيې او استنتاج دواړو ته لښانونه ورکوي. دا د فرضيې په $[A]^n$ ليکلو ښودل کېږي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLND-001) سرچينه په دې ونه کېښې لاندې ولاړتوګي "سېکونټونه" بولي؛ دلته "جملې" راوړل شوې، ځکه خپله سرچينه ونه د جملو ونه تعريفوي او قاعدې پر جملو لګېږي.

دا دود دے چې د ټولو منطقي عملګرونه $\wedge$ ، $\vee$ ، $\rightarrow$ ، $\neg$ او $\perp$ دپاره قاعدې په پام کېښې ونيول شي، که څه هم ځينې ئې تعريف شوي وي.

4.2 قضيي قاعدې

4.2.1 د $\wedge$ دپاره قاعدې

$$\begin{array}{l} \wedge\text{Elim} \frac{!A \wedge !B}{!A} \\ \wedge\text{Elim} \frac{!A \wedge !B}{!B} \end{array} \qquad \wedge\text{Intro} \frac{!B \quad !A}{!A \wedge !B}$$

4.2.2 د $\vee$ دپاره قاعدې

$$\begin{array}{l} [!B]^n \quad [!A]^n \\ \vdots \quad \vdots \\ \vee\text{Elim} \frac{!C \quad !C}{!C} \quad !A \vee !B \quad n \end{array} \qquad \begin{array}{l} \vee\text{Intro} \frac{!A}{!A \vee !B} \\ \vee\text{Intro} \frac{!B}{!A \vee !B} \end{array}$$

4.2.3 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې

$$\rightarrow\text{Elim} \frac{!A \quad !A \rightarrow !B}{!B} \qquad \begin{array}{l} [!A]^n \\ \vdots \\ \rightarrow\text{Intro} \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \quad n \end{array}$$

4.2.4 د $\neg$ دپاره قاعدې

$$\neg\text{Elim} \frac{!A \quad \neg !A}{\perp} \qquad \begin{array}{l} [!A]^n \\ \vdots \\ \neg\text{Intro} \frac{\perp}{\neg !A} \quad n \end{array}$$

4.2.5 د $\perp$ دپاره قاعدې

$$\begin{array}{l} [\neg !A]^n \\ \vdots \\ \perp_C \frac{\perp}{!A} \quad n \end{array} \qquad \perp_I \frac{\perp}{!A}$$

پام وکړئ چې $\neg$ Intro او $\perp_C$ ډېر سره ورته دي: توپیر دا دے چې $\neg$ Intro یوه نفي شوې ترلے فارمول A ! راوباسي، خو $\perp_C$ یوه مثبت ترلے فارمول A ! راوباسي.

کله چې یوه قاعده ښيي چې کومه فرضیه ایستل کېدے شي، موږ دا اجازه بولو، شرط ئې نۀ بولو. مثلاً د $\rightarrow$ Intro په قاعده کېنې د مقدمې B ! په اشتقاق کېنې د A ! په ښه هر شمېر فرضيې ایستلے شو، چې صفر هم پکې شامل دے.

4.3 د سورونو قاعدې

4.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې

$$\forall\text{Intro} \frac{!A(a)}{\forall x !A(x)} \quad \forall\text{Elim} \frac{\forall x !A(x)}{!A(t)}$$

د $\forall$ په قاعدو کېنې t یوه تړلې اصطلاح ده (یعنې داسې اصطلاح چې هېڅ متغیر نۀ لري)، او a داسې ثابت سمبول دے چې په پایله $\forall x !A(x)$ یا په هرې هغې فرضيې کېنې نۀ راځي چې د مقدمې $A(a)$! په پای ته رسېدونکي اشتقاق کېنې نۀ ایستل شوې پاتې وي. موږ a د $\forall$ Intro استنتاج ځانګړے متغیر بولو.¹

4.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$$\exists\text{Intro} \frac{!A(t)}{\exists x !A(x)} \quad \exists\text{Elim} \frac{\begin{array}{c} n[!A(a)] \\ \vdots \\ !C \end{array} \quad \exists x !A(x)}{!C} n$$

بیا هم، t یوه تړلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې په مقدمه $\exists x !A(x)$ ، پایله C !، یا په هرې هغې فرضيې کېنې نۀ راځي چې د دواړو مقدمو په پای ته رسېدونکو اشتقاقونه کېنې نۀ ایستل شوې پاتې وي (د $A(a)$! فرضیو پرته). موږ a د $\exists$ Elim استنتاج ځانګړے متغیر بولو.

هغه شرط چې په $\forall$ Intro یا $\exists$ Elim استنتاج کېنې ځانګړے متغیر په پایله یا په هرې هغې فرضيې کېنې نۀ راځي چې مقدمو ته په رسېدونکو اشتقاقونه کېنې نۀ ایستل شوې وي، او د په وجودي مقدمه کېنې هم نۀ راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLND-002) سرچینه په دې عمومي جمله کېنې وایي چې ځانګړے متغیر په “مقدمو” کېنې نۀ راځي، خو د دواړو قاعدو مرستندویه مقدمه همدا ځانګړے ثابت لري؛ دلته د سرچینې له مخکېنې کره شرطونو سره سم پایله، نۀ ایستل شوې فرضيې او د وجود ایستلو وجودي مقدمه ټاکل شوې دي.

هغه دود رایاد کړی چې کله A ! داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، نو دا په $A(x)$! لیکلو ښیو. په همدې چوکاټ کېنې بیا $A(t)$! د $A[t/x]$! لنډون دے. نو د $\exists$ Intro قاعده داسې هم لیکلے شو:

¹موږ د “ځانګړي متغیر” اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کېنې a یو ثابت دے. دا نوم تاریخي لاملونه لري.

$$\frac{!A[t/x]}{\exists x !A} \exists \text{Intro}$$

پام وکړئ چې t کېدای شي له مخکېنې په A کېنې راغلې وي؛ مثلاً $!A$ کېدای شي $P(t, x)$ وي. له دې امله، له $P(t, x)$ څخه $\exists x P(t, x)$ استنتاجول د $\exists \text{Intro}$ سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t یوه یا زیاتې پېښې په ترلي متغیر x “بدلوله” شئ، او اړینه نه ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ. خو د $\forall \text{Intro}$ او $\exists \text{Elim}$ د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په A کېنې نه راځي. نو د $\forall \text{Intro}$ په کارولو سره له $P(a, a)$ څخه $\forall x P(a, x)$ په سمه توګه نه شئ استنتاجول.

په $\exists \text{Intro}$ او $\forall \text{Elim}$ کېنې له ترلټیا پرته بل بندیز نشته، او اصطلاح t هره ترلې اصطلاح کېدای شي؛ نو د بل شرط اندېښنه نه شته. بل لوري ته، د $\exists \text{Elim}$ او $\forall \text{Intro}$ په قاعدو کېنې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پایله یا کومې نه ایستل شوې فرضيې کېنې هېڅ ځای نه راځي. دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے، یعنې نظام له هغو نه ایستل شوې فرضیو څخه یوازې هغه ترلي فارمولونه اشتقاق کړي چې ترې معنایي پایله کېږي. له دې شرط پرته لاندې به روا و:

$$\frac{\frac{\exists x !A(x) \quad \frac{[!A(a)]^1}{\forall x !A(x)} * \forall \text{Intro}}{\forall x !A(x)} \exists \text{Elim}}$$

خو $\exists x !A(x) \not\equiv \forall x !A(x)$.

ځکه چې د سورونو د ایستلو قاعدې د متغیرونه پر ځای یوازې د ترلو اصطلاحاتو اېښوولو اجازه ورکوي، نو هره هغه فارمول چې د ترلي فارمولونه له یوه سټ څخه وایستل شي، پخپله ترلے فارمول ده.

4.4 اشتقاقونه

موږ وویل چې فرضیه څه ده او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. په فطري استنتاج کېنې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرایي ډول جوړېږي: هر اشتقاق یا یوازې یوه فرضیه وي، یا له یو، دوو یا دریو اشتقاقونه او ورپسې له یوه سم استنتاج څخه جوړ وي.

تعریف 4.2 (اشتقاق). له فرضیو Γ څخه د ترلے فارمول A یو اشتقاق د ترلي فارمولونه یوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو پورتنۍ ترلي فارمولونه یا په Γ کېنې وي یا په ونه کېنې د یوه استنتاج په وسیله ایستل شوې وي.
2. د ونې تر ټولو لاندې ترلے فارمول A ده.
3. په ونه کېنې هره ترلے فارمول، پرته له لاندېنۍ جملې A څخه، د استنتاج د یوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه وي چې پایله ئې په ونه کېنې نېغ د هغې ترلے فارمول لاندې ولاړه وي.

بیا وایو چې A د اشتقاق پایله او Γ ئې نه ایستل شوې فرضيې دي.

که له Γ څخه د A کوم اشتقاق وي، وایو چې A له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، یا په ښو کېنې: $\Gamma \vdash A$. که د A داسې اشتقاق وي چې هره فرضیه پکې ایستل شوې وي، نو $\vdash A$ لیکو.

بېلگه 4.3. هره فرضيه په يوازې ځان اشتقاق ده. نو مثلاً A ! په يوازې ځان اشتقاق دے او B ! هم په يوازې ځان همداسې دے. له دغو څخه د، مثلاً، $\wedge$ Intro قاعدې په کارولو يو نوے اشتقاق اخستلے شو:

$$\frac{A! \quad B!}{A \wedge B!} \wedge \text{Intro}$$

دا قاعدې عامې دي: پکې A ! او B ! په هر ډول ترلي فارمولونه، مثلاً په C ! او D ! بدلولے شو. بيا به پایله $C \wedge D$! وي؛ نو

$$\frac{C! \quad D!}{C \wedge D!} \wedge \text{Intro}$$

يو سم اشتقاق دے. البته فرضيې سره اړولے هم شو، خو D ! د A ! او C ! د B ! ونډه واخلي. له دې امله

$$\frac{D! \quad C!}{D \wedge C!} \wedge \text{Intro}$$

هم يو سم اشتقاق دے.

اوس بله قاعده، مثلاً $\rightarrow$ Intro، کارولے شو. دا اجازه راکوي چې يو شرطي قضيه پایله کړو او هره هغه فرضيه ايستل کړو چې له دغه شرطي قضيې له مقدم سره يو شان وي. نو لاندې دواړه سم اشتقاقونه دي:

$$1 \frac{[C]^1 \quad D!}{C \wedge D!} \wedge \text{Intro} \rightarrow \text{Intro} \quad 1 \frac{C! \quad [D]^1}{C \wedge D!} \wedge \text{Intro} \rightarrow \text{Intro}$$

دوئ په ترتيب سره نښي چې $D \vdash C \rightarrow (C \wedge D)$ او $C \vdash D \rightarrow (C \wedge D)$.

راياد کړئ چې د فرضيو ايستل اجازه ده، شرط نه دے: لازم نه ده چې فرضيې وباسو. په ځانگړي ډول، يوه قاعده هله هم کارولے شو چې فرضيې په اشتقاق کښې موجودې نه وي. مثلاً لاندې اشتقاق روا دے، که څه هم د ايستل کېدو دپاره هېڅ فرضيه A نه شته:

$$1 \frac{B!}{A \rightarrow B!} \rightarrow \text{Intro}$$

4.5 د اشتقاقونه بېلگې

بېلگه 4.4. رايي چې د ترلے فارمول $A \rightarrow (A \wedge B)$ يو اشتقاق ورکړو.

په پيل کښې مطلوبه پایله د اشتقاق په لاندې برخه کښې ليکو.

$$\overline{(A \wedge B) \rightarrow A}$$

اوس بايد معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج پایله د دې بڼې ترلے فارمول کېدے شي. د پایلې اصلي عملگر $\rightarrow$ دے، نو څه کوو چې د $\rightarrow$ Intro قاعدې په کارولو پایلې ته ورسېږو. غوره ده چې اړوندې فرضيې وليکو او د پرمختگ پر مهال د استنتاج قاعدو ته نښانونه ورکړو، خو د ثبوت په پای کښې په اسانۍ ووينو چې ټولې فرضيې ايستل شوې دي که نه.

$$\begin{array}{c} [!A \wedge !B]^1 \\ \vdots \\ !A \\ 1 \frac{(!A \wedge !B) \rightarrow !A}{!A} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

اوس بايد له فرضيې $!A \wedge !B$ څخه تر $!A$ پورې پړاوونه ډک کړو. ځکه چې يوازې له يوه رابط $\wedge$ سره کار لرو، بايد د $\wedge$ د اېستلو قاعده وکاروو. له دې څخه لاندې ثبوت لاس ته راځي:

$$\begin{array}{c} [!A \wedge !B]^1 \\ \vdots \\ !A \\ 1 \frac{(!A \wedge !B) \rightarrow !A}{!A} \rightarrow \text{Intro} \end{array} \wedge \text{Elim}$$

اوس د $!A \rightarrow (!A \wedge !B)$ يو سم اشتقاق لرو.

بېلگه 4.5. اوس راځئ چې د $(!A \rightarrow !B) \rightarrow (!A \vee !B)$ يو اشتقاق ورکړو. په پيل کېنې مطلوبه پايله د اشتقاق په لاندې برخه کېنې لیکو.

$$\overline{(\neg !A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)}$$

د هغې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا پايله راکولې شي، په پايله کېنې منطقي رابطونو $\neg$ ، $\vee$ او $\rightarrow$ ته گورو. اوس يوازې د $\rightarrow$ لومړۍ پېښه راته مهمه ده، ځکه همدا د وروستۍ پايلې د ترلې فارمول اصلي عملگر دے، $\neg$ ، $\vee$ او د $\rightarrow$ دويمه پېښه د بل رابط په ساحه کېنې دي، نو وروسته به ئې وڅېړو. له دې امله د $\rightarrow$ Intro له قاعدې پيل کوو. سمه کارونه ئې بايد داسې وي: د ژباړې د نسخې سمون: (OLND-004) سرچينه دلته د فطري استنتاج وروستۍ جمله “په وروستي سېکونېنې کېنې” بولي، دلته “وروستۍ پايله” راولړ شوې، ځکه دا ونه د جملو ثبوت دے او سېکونېنې نه لري.

$$\begin{array}{c} [\neg !A \vee !B]^1 \\ \vdots \\ !A \rightarrow !B \\ 1 \frac{!A \rightarrow !B}{(\neg !A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

له دې وروسته د دوام دوه لارې لرو. يا له لاندې څخه پورته کار روان ساتلے او د $\rightarrow$ Intro بله کارونه لټولے شو، يا له پاسه لاندې کار کولے او د $\vee$ Elim قاعده کارولے شو. دويمه لار اخلو. فرضيه $\neg !A \vee !B$ د $\vee$ Elim د تر ټولو کېنې مقدمې په توگه کاروو. د $\vee$ Elim د سمې کارونې دپاره نورې دوه مقدمې بايد له پايلې $!A \rightarrow !B$ سره يو شان وي، خو هره يوه په خپل وار له بلې فرضيې، يعنې د $\neg !A \vee !B$ له دوو بېلندونو څخه له يوه، رايستل کېدے شي. نو اشتقاق به داسې وي:

$$\begin{array}{c} [\neg !A]^2 \quad [!B]^2 \\ \vdots \quad \vdots \\ \vdots \quad !A \rightarrow !B \quad !A \rightarrow !B \\ 2 \frac{[\neg !A \vee !B]^1 \quad !A \rightarrow !B \quad !A \rightarrow !B}{!A \rightarrow !B} \vee \text{Elim} \\ 1 \frac{!A \rightarrow !B}{(\neg !A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

په بني لوري دواړو ځانگو کېنې غواړو $!A \rightarrow !B$ اشتقاق کړو، غوره لار ئې د $\rightarrow$ Intro کارول دي.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\neg!A]^2, [!A]^3 \\ \vdots \\ \frac{2 \frac{[\neg!A \vee !B]^1}{\vdots} \quad 3 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \quad 4 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \\ \vdots \\ 1 \frac{(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \end{array} \\
 \vdots \\
 \frac{2 \frac{[\neg!A \vee !B]^1}{\vdots} \quad 3 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \quad 4 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \\
 \vdots \\
 1 \frac{(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}
 \end{array}$$

د اشتقاق په دوو تشو برخو کښې له $\neg!A$ او $!A$ څخه، او له $!A$ او $!B$ څخه، د $!B$ اشتقاقونه غواړو. لومړۍ برخه اخلو. $\neg!A$ او $!A$ د $\neg\text{Elim}$ دوه مقدمې دي:

$$\begin{array}{c}
 \frac{[\neg!A]^2 \quad [!A]^3}{\perp} \neg\text{Elim} \\
 \vdots \\
 !B
 \end{array}$$

د $\perp_I$ په کارولو $!B$ د پایلې په توګه اخستلې او ځانګه بشپړولې شو.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\neg!A]^2 \quad [!A]^3 \\ \vdots \\ \frac{2 \frac{[\neg!A \vee !B]^1}{\vdots} \quad 3 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \quad 4 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \\ \vdots \\ 1 \frac{(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \end{array} \\
 \vdots \\
 \frac{[\neg!A]^2 \quad [!A]^3}{\perp} \neg\text{Elim} \\
 \vdots \\
 \frac{2 \frac{[\neg!A \vee !B]^1}{\vdots} \quad 3 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \quad 4 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \\
 \vdots \\
 1 \frac{(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}
 \end{array}$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLND-003) سرچینه په دې بشپړه ونه کښې له نفي شوې مقدمې او مثبتې مقدمې څخه کاږي. ته استنتاج د کاږي د داخلولو په نښان ښيي، د مخکښې جزوي ونې او ټاکلې قاعدې سره سم دلته د نفي ایستلو نښان راوړل شوی دے.

اوس تر ټولو ښی ځانګې ته ګورو. دلته باید پوه شو چې د اشتقاق تعریف د فرضیو ایستل روا بولي خو لازمي ئې نه بولي. په بله وینا، که له فرضیو $!A$ او $!B$ څخه د یوې په کارولو $!B$ راوباسو او بله ونه کاروو، دا روا ده. له $!B$ څخه د $!B$ اشتقاق کول څرګند دي: $!B$ په یوازې ځان داسې اشتقاق دے او هېڅ استنتاج نه غواړي. نو فرضیه $!A$ ساده ښکولې شو.

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} [\neg!A]^2 \quad [!A]^3 \\ \vdots \\ \frac{2 \frac{[\neg!A \vee !B]^1}{\vdots} \quad 3 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \quad 4 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \\ \vdots \\ 1 \frac{(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \end{array} \\
 \vdots \\
 \frac{[\neg!A]^2 \quad [!A]^3}{\perp} \neg\text{Elim} \\
 \vdots \\
 \frac{2 \frac{[\neg!A \vee !B]^1}{\vdots} \quad 3 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \quad 4 \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro} \\
 \vdots \\
 1 \frac{(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)}{!A \rightarrow !B} \rightarrow \text{Intro}
 \end{array}$$

پام وکړئ چې په بشپړ اشتقاق کښې د تر ټولو ښي اړخ $\rightarrow\text{Intro}$ استنتاج په حقیقت کښې هېڅ فرضیه نه باسي.

بېلګه 4.6. تر اوسه مو د $\perp_C$ قاعدې ته اړتیا نه ده پېښه شوې. دا ځکه ځانګړې ده چې داسې فرضیه ایستل راکوي چې د قاعدې د پایلې فرعي فارمول نه وي. دا له $\perp_I$ قاعدې سره نژدې تړلې ده. په حقیقت کښې $\perp_I$ د $\perp_C$ قاعدې ځانګړې حالت دے — د “شهودي منطق” په نامه یو منطق شته چې یوازې $\perp_I$ پکې روا دے. کله چې بله هېڅ لار کار نه کوي،

$\perp_C$ وروستی وسیله ده. مثلاً فرض کړئ غواړو $\neg A \vee \neg A$! اشتقاق کړو. زموږ عادي تګلاره به دا وي چې د $\neg A \vee \neg A$! د $\vee$ Intro په کارولو اشتقاق کړو. خو دا غواړي چې له هېڅ فرضيې پرته يا A يا $\neg A$! اشتقاق کړو، او دا نه کېږي. $\perp_C$ موږ غوري!

$$\begin{array}{c} [\neg(A \vee \neg A)]^1 \\ \vdots \\ \perp \\ \hline 1 \quad \neg A \vee \neg A \quad \perp_C \end{array}$$

اوس له $\neg(A \vee \neg A)$ څخه د $\perp$ يو اشتقاق لټوو. ځکه $\perp$ د $\neg$ Elim پایله ده، نو کېدای شي دا هڅه وکړو:

$$\begin{array}{c} [\neg(A \vee \neg A)]^1 \quad [\neg(A \vee \neg A)]^1 \\ \vdots \quad \vdots \\ \neg A \quad A \\ \hline \perp \\ \hline 1 \quad \neg A \vee \neg A \quad \perp_C \end{array} \neg\text{Elim}$$

د $\neg A$ د اشتقاق موندلو تګلاره د $\neg$ Intro کارونه غواړي:

$$\begin{array}{c} [\neg(A \vee \neg A)]^1, [A]^2 \quad [\neg(A \vee \neg A)]^1 \\ \vdots \quad \vdots \\ \perp \quad A \\ \hline \neg A \quad \neg\text{Intro} \\ \hline \perp \\ \hline 1 \quad \neg A \vee \neg A \quad \perp_C \end{array} \neg\text{Elim}$$

دلته $\perp$ په اسانۍ اخستلی شو: $\neg$ Elim پر $\neg(A \vee \neg A)$ او A کاروو؛ دویمه جمله زموږ له نوې فرضيې A څخه د $\vee$ Intro په وسیله راځي:

$$\begin{array}{c} [A]^2 \quad [\neg(A \vee \neg A)]^1 \\ \neg A \vee \neg A \quad \vee\text{Intro} \\ \hline \neg(A \vee \neg A) \quad \neg\text{Elim} \\ \hline \perp \\ \hline 2 \quad \neg A \quad \neg\text{Intro} \\ \hline \perp \\ \hline 1 \quad \neg A \vee \neg A \quad \perp_C \end{array} \neg\text{Elim}$$

په بني لوري کېنې همدا تګلاره کاروو، خو A د $\perp_C$ په وسیله اخلو:

$$\begin{array}{c} [A]^2 \quad [\neg(A \vee \neg A)]^1 \quad [\neg A]^3 \\ \neg A \vee \neg A \quad \vee\text{Intro} \quad \neg A \vee \neg A \quad \vee\text{Intro} \\ \hline \neg(A \vee \neg A) \quad \neg\text{Elim} \quad \neg(A \vee \neg A) \quad \neg\text{Elim} \\ \hline \perp \quad \perp \\ \hline 2 \quad \neg A \quad \neg\text{Intro} \quad 3 \quad \neg A \quad \perp_C \\ \hline \perp \\ \hline 1 \quad \neg A \vee \neg A \quad \perp_C \end{array}$$

تمرین 4.7. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې ونښي:

$$1. !A \wedge (!B \wedge !C) \vdash (!A \wedge !B) \wedge !C$$

$$2. !A \vee (!B \vee !C) \vdash (!A \vee !B) \vee !C$$

$$3. !A \rightarrow (!B \rightarrow !C) \vdash !B \rightarrow (!A \rightarrow !C)$$

$$4. !A \vdash \neg \neg !A$$

تمرین 4.8. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې ونښي:

$$1. (!A \vee !B) \rightarrow !C \vdash !A \rightarrow !C$$

$$2. (!A \rightarrow !C) \wedge (!B \rightarrow !C) \vdash (!A \vee !B) \rightarrow !C$$

$$3. \vdash \neg (!A \wedge \neg !A)$$

$$4. !B \rightarrow !A \vdash \neg !A \rightarrow \neg !B$$

$$5. \vdash (!A \rightarrow \neg !A) \rightarrow \neg !A$$

$$6. \vdash \neg (!A \rightarrow !B) \rightarrow \neg !B$$

$$7. !A \rightarrow !C \vdash \neg (!A \wedge \neg !C)$$

$$8. !A \wedge \neg !C \vdash \neg (!A \rightarrow !C)$$

$$9. !A \vee !B, \neg !B \vdash !A$$

$$10. \neg !A \vee \neg !B \vdash \neg (!A \wedge !B)$$

$$11. \vdash (\neg !A \wedge \neg !B) \rightarrow \neg (!A \vee !B)$$

$$12. \vdash \neg (!A \vee !B) \rightarrow (\neg !A \wedge \neg !B)$$

تمرین 4.9. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې ونښي:

$$1. \neg (!A \rightarrow !B) \vdash !A$$

$$2. \neg (!A \wedge !B) \vdash \neg !A \vee \neg !B$$

$$3. !A \rightarrow !B \vdash \neg !A \vee !B$$

$$4. \vdash \neg \neg !A \rightarrow !A$$

$$5. !A \rightarrow !B, \neg !A \rightarrow !B \vdash !B$$

$$6. (!A \wedge !B) \rightarrow !C \vdash (!A \rightarrow !C) \vee (!B \rightarrow !C)$$

$$7. (!A \rightarrow !B) \rightarrow !A \vdash !A$$

$$8. \vdash (!A \rightarrow !B) \vee (!B \rightarrow !C)$$

(دا ټول د $\perp_C$ قاعده غواړي-)

4.6 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلگه 4.10. له سورونو سره د کار پر مهال بايد ډاډ واخلو چې د ځانگړي متغير شرط نه ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځينو استنتاجونو د عملي کولو ترتيب بدلول را بدلول غواړي. په عمومي توگه گټه کوي چې لومړۍ د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانگړي متغير شرط ورباندې لگېږي (په بشپړ ثبوت کښې به دوی لاندې راځي).

راځئ وگورو چې د فارمول $\exists x \neg A(x) \rightarrow \neg \forall x A(x)$ يو اشتقاق څنگه ورکوو. د معمول په شان داسې پيل کوو:

$$\overline{\exists x \neg A(x) \rightarrow \neg \forall x A(x)}$$

لومړۍ لیکو چې د $\rightarrow$ Intro د قاعدې په وسيله د وروستي پړاو د توجيه کولو دپاره څه پکار دي.

$$\begin{array}{c} [\exists x \neg A(x)]^1 \\ \vdots \\ \neg \forall x A(x) \\ 1 \frac{}{\exists x \neg A(x) \rightarrow \neg \forall x A(x)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

ځکه پر $\neg \forall x A(x)$ د کارولو دپاره څرگنده قاعده نه شته، اشتقاق داسې برابر و چې د $\exists$ Elim قاعده وکارولې شو. دلته بايد د ځانگړي متغير شرط ته پام وکړو او داسې ثابت وټاکو چې په $\exists x A(x)$ يا د هغې په هرې اړوندې فرضيې کښې نه راځي. (خو ځکه چې هېڅ ثابت سمبولونه نه دي راغلي، هر انتخاب سم ده).

$$\begin{array}{c} [\neg A(a)]^2 \\ \vdots \\ 2 \frac{[\exists x \neg A(x)]^1 \quad \neg \forall x A(x)}{\neg \forall x A(x)} \exists \text{Elim} \\ 1 \frac{}{\exists x \neg A(x) \rightarrow \neg \forall x A(x)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

د $\neg \forall x A(x)$ د راليستلو دپاره د $\neg$ Intro قاعده کارول غواړو: دا غواړي چې يو تناقض راوباسو، او کېدای شي $\forall x A(x)$ د يوې اضافي فرضيې په توگه وکاروو. البته په دې تناقض کښې هغه فرضيه $\neg A(a)$ هم راتلې شي چې د $\exists$ Elim استنتاج به ئې وباسي. داسې ئې برابر و:

$$\begin{array}{c} [\neg A(a)]^2, [\forall x A(x)]^3 \\ \vdots \\ 3 \frac{}{\neg \forall x A(x)} \neg \text{Intro} \\ 2 \frac{[\exists x \neg A(x)]^1 \quad \neg \forall x A(x)}{\neg \forall x A(x)} \exists \text{Elim} \\ 1 \frac{}{\exists x \neg A(x) \rightarrow \neg \forall x A(x)} \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

داسې ښکاري چې تناقض ته نژدې يو. تر ټولو اسانه قاعده $\forall$ Elim ده چې د ځانگړي متغير هېڅ شرط نه لري. ځکه د عمومي سور لرونکي x پر ځای هره تېرې اصطلاح کارولې شو، ښه ده چې هماغه a وکاروو خو تناقض ته ورسېږو.

$$\frac{\frac{\frac{[\neg!A(a)]^2}{\frac{[\forall x!A(x)]^3}{!A(a)} \forall\text{Elim}}{\neg!A(a)} \neg\text{Elim}}{\frac{\perp}{\neg\forall x!A(x)} \neg\text{Intro}} \frac{[\exists x\neg!A(x)]^1}{\neg\forall x!A(x)} \exists\text{Elim}}{\frac{\exists x\neg!A(x) \rightarrow \neg\forall x!A(x)}{\rightarrow\text{Intro}} \rightarrow\text{Intro}}$$

په ځانګړي ډول له سورونو سره د کار پر مهال اوس دا بيا کتل مهم دي چې د ځانګړي متغير شرط نه دے مات شوے۔ دلته دغه شرط يوازې پر $\exists\text{Elim}$ لګېدے، او ځانګړے متغير a په هغو فرضيو کښې نه راځي چې استنتاج ورپورې ترلے دے؛ نو دا سم اشتقاق دے۔

بېلګه 4.11. کله کله له نورو فارمولونه څخه فارمول رايستلے شو۔ په دغو حالتونو کښې کېدے شي نه ايستل شوې فرضيې ولرو۔ د خپلې وروستۍ موخې تر څنګ د فرضيو حساب ساتل هم مهم دي۔ راځئ وګورو چې له فرضيو $\exists x (!A(x) \wedge !B(x))$ او $\forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b))$ څخه د فارمول $\exists x !C(x, b)$ يو اشتقاق څنګه ورکوو۔ د معمول په شان پايله لاندې ليکو۔

$$\overline{\exists x !C(x, b)}$$

د کار دپاره دوه مقدمې لرو۔ د لومړۍ د کارولو، يعنې له $\exists x (!A(x) \wedge !B(x))$ څخه د $\exists x !C(x, b)$ د اشتقاق موندلو دپاره به د $\exists\text{Elim}$ قاعده کاروو۔ ځکه د ځانګړي متغير شرط لري، دا قاعده لومړۍ کاروو۔ لاندې لاس ته راځي:

$$\frac{\frac{[!A(a) \wedge !B(a)]^1}{\vdots} \frac{\exists x (!A(x) \wedge !B(x))}{\exists x !C(x, b)} \exists\text{Elim}}{\exists x !C(x, b)} \exists\text{Elim}$$

هغه دوه فرضيې چې ورسره کار کوو، $!B$ شريکوي۔ بنياني اوس د $\wedge\text{Elim}$ په کارولو د $!B(a)$ بېلول ګټور وي۔

$$\frac{\frac{[!A(a) \wedge !B(a)]^1}{!B(a)} \wedge\text{Elim}}{\frac{\exists x (!A(x) \wedge !B(x))}{\exists x !C(x, b)} \exists\text{Elim}} \exists\text{Elim}$$

د کار دپاره دويمه فرضيه $\forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b))$ ده۔ ځکه د ځانګړي متغير شرط نه لري، د $\forall\text{Elim}$ په کارولو د ثابت سمبول a په وسيله x بېلګه کولے او $!B(a) \rightarrow !C(a, b)$ اخستلے شو۔ اوس $!B(a) \rightarrow !C(a, b)$ او $!B(a)$ دواړه لرو۔ بل ګام بايد د $\rightarrow\text{Elim}$ نېغه کارونه وي۔

$$\frac{\frac{\frac{\forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b))}{!B(a) \rightarrow !C(a, b)} \forall\text{Elim}}{!C(a, b)} \rightarrow\text{Elim}}{\frac{\exists x (!A(x) \wedge !B(x))}{\exists x !C(x, b)} \exists\text{Elim}} \exists\text{Elim}$$

موخې ته ډېر نژدې یو! د $\exists$ Intro یوه کارونه موخې ته مو رسوي.

$$\frac{\frac{\frac{\forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b))}{!B(a) \rightarrow !C(a, b)} \forall \text{Elim} \quad \frac{[!A(a) \wedge !B(a)]^1}{!B(a)} \wedge \text{Elim}}{!C(a, b)} \rightarrow \text{Elim} \quad \frac{\frac{\exists x (!A(x) \wedge !B(x))}{\exists x !C(x, b)} \exists \text{Intro}}{\exists x !C(x, b)} \exists \text{Elim}$$

ځکه په هر پړاو کېنې مو ډاډ اخیستې چې د ځانګړي متغیر شرطونه نه دي مات شوي، باور کولې شو چې دا سم اشتقاق دے.

بېلګه 4.12. له فرضیو $\forall x !A(x) \rightarrow \exists y !B(y)$ او $\neg \exists y !B(y)$ څخه د فارمول $\neg \forall x !A(x)$ یو اشتقاق ورکړئ. د معمول په شان موخې فارمول لاندې لیکو.

$$\overline{\neg \forall x !A(x)}$$

د اشتقاق وروستی کړننه نفی ده، نو $\neg$ Intro کارول غواړو. دا غواړي چې معلومه کړو تناقض څنګه اشتقاق کړو.

$$\frac{[\forall x !A(x)]^1 \quad \vdots \quad \perp}{\neg \forall x !A(x)} \neg \text{Intro}$$

تر دې ځایه ښه یو. $\forall$ Elim کارولې شو، خو څرګنده نه ده چې موخې ته به مو ورسوي. پر ځایې ټي خپله یوه فرضیه کاروو. $\forall x !A(x) \rightarrow \exists y !B(y)$ له $\forall x !A(x)$ سره د $\rightarrow$ Elim قاعدې کارول راکوي.

$$\frac{\frac{\forall x !A(x) \rightarrow \exists y !B(y) \quad [\forall x !A(x)]^1}{\exists y !B(y)} \rightarrow \text{Elim} \quad \vdots \quad \perp}{\neg \forall x !A(x)} \neg \text{Intro}$$

اوس د کار دپاره یوه وروستی فرضیه لرو، او ښکاري چې د $\neg$ Elim په کارولو تناقض ته مو رسولې شي.

$$\frac{\frac{\frac{\forall x !A(x) \rightarrow \exists y !B(y) \quad [\forall x !A(x)]^1}{\exists y !B(y)} \rightarrow \text{Elim} \quad \neg \exists y !B(y)}{\perp} \neg \text{Elim} \quad \vdots \quad \perp}{\neg \forall x !A(x)} \neg \text{Intro}$$

تمرین 4.13. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

$$1. \vdash (\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall z (!A(z) \wedge !B(z))$$

$$2. \vdash (\exists x !A(x) \vee \exists y !B(y)) \rightarrow \exists z (!A(z) \vee !B(z))$$

$$3. \forall x (!A(x) \rightarrow !B) \vdash \exists y !A(y) \rightarrow !B$$

$$4. \forall x \neg !A(x) \vdash \neg \exists x !A(x)$$

$$5. \vdash \neg \exists x !A(x) \rightarrow \forall x \neg !A(x)$$

$$6. \vdash \neg \exists x \forall y ((!A(x, y) \rightarrow \neg !A(y, y)) \wedge (\neg !A(y, y) \rightarrow !A(x, y)))$$

تمرین 4.14. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

$$1. \vdash \neg \forall x !A(x) \rightarrow \exists x \neg !A(x)$$

$$2. (\forall x !A(x) \rightarrow !B) \vdash \exists y (!A(y) \rightarrow !B)$$

$$3. \vdash \exists x (!A(x) \rightarrow \forall y !A(y))$$

(دا ټول د $\perp_C$ قاعده غواړي-)

4.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

اداري يادونه- دا برخه د فطري استنتاج د اثبات پذيرۍ اړيکې او سازگاري تعريفونه راټولوي-

لکه څنګه چې مويو شمېر مهم معنایي مفاهيم (اعتبار، معنایي استلزام، د صدق وړتيا) تعريف کړل، اوس ورسره سم ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو- دا مفاهيم په جوړښتونه کېنې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له لارې نه، بلکې له نورو څخه د ځينو ترلي فارمولونه د د اشتقاق وړتيا يا د اشتقاق نه وړتيا له لارې تعريفېږي- دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم سره سمون خوري- د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتيا قضیې دي-

تعريف 4.15 (قضیې). يوه ترلې فارمول A هله قضیه ده چې په فطري استنتاج کېنې د A داسې اشتقاق وي چې ټولې فرضيې پکې ایستل شوې وي- که A قضیه وي، $\vdash A$ لیکو، او که نه وي $\nvdash A$ لیکو-

تعريف 4.16 (د اشتقاق وړتيا). ترلې فارمول A ! د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash A$ ، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې اشتقاق وي چې پایله یې A وي او هره فرضیه پکې يا ایستل شوې وي يا په Γ کېنې وي- که A له Γ څخه د اشتقاق وړ نه وي، $\Gamma \nvdash A$ لیکو-

تعريف 4.17 (سازگاري). د ترلي فارمولونه يو سټ Γ هله او يوازې هله ناسازگار دے چې $\Gamma \vdash \perp$ وي- که Γ ناسازگار نه وي، يعني $\Gamma \nvdash \perp$ وي، نو سازگار یې بولو-

قضیه 4.18 (انعکاسیت). که $A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash A$ -

ثبوت. فرضیه A ! په يوازې ځان د A داسې اشتقاق دے چې هره نه ایستل شوې فرضیه یې (يعنې A) په Γ کېنې ده-
□

قضيه 4.19 (يکخواختي). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Delta \vdash A$.

□

ثبوت. له Γ څخه د A هر اشتقاق له Δ څخه هم د A اشتقاق دے.

قضيه 4.20 (انتقاليت). که $\Gamma \vdash A$ او $\Gamma \cup \Delta \vdash B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash B$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash A$ وي، د A داسې اشتقاق δ_0 شته چې ټولې نۀ ايسټل شوې فرضيې ئې په Γ کښې دي. که $\{A\} \cup \Delta \vdash B$ وي، د B داسې اشتقاق δ_1 شته چې ټولې نۀ ايسټل شوې فرضيې ئې په $\{A\} \cup \Delta$ کښې دي. اوس لاندې وگورئ:

$$\frac{\begin{array}{c} \Delta, [A]^1 \\ \vdots \delta_1 \\ !B \\ \hline !A \rightarrow !B \end{array} \xrightarrow{\text{Intro}} \begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \delta_0 \\ !A \\ \hline \end{array} \xrightarrow{\text{Elim}} !B}{!B}$$

□

اوس ټولې نۀ ايسټل شوې فرضيې په $\Gamma \cup \Delta$ کښې دي؛ نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash B$ ښيي.

کله چې $\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ يو متناهي سټ وي، د $\Gamma \vdash B$ دپاره لنډه نښه $A_1, A_2, \dots, A_k \vdash B$ کارولے شو؛ په ځانگړي ډول $A \vdash B$ دا معنی لري چې $\{A\} \vdash B$.

پام وکړئ که $\Gamma \vdash A$ او $A \vdash B$ وي، نو $\Gamma \vdash B$. همدارنگه، که $A_1, \dots, A_n \vdash B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash B$.

قضيه 4.21. لاندې شرطونه معادل دي.

1. Γ ناسازگار دے.

2. د هرې ترلے فارمول A دپاره $\Gamma \vdash A$.

3. د کومې ترلے فارمول A دپاره $\Gamma \vdash A$ او $\Gamma \vdash \neg A$.

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 4.22. 4.21 ثابت کړئ.

قضيه 4.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash A$ وي.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازگار وي، نو Γ سازگار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو له Γ څخه د A کوم اشتقاق δ شته. Γ_0 د δ د نۀ ايسټل شوې فرضيو سټ ونيئ. ځکه هر اشتقاق متناهي دے، Γ_0 يوازې متناهي ډېرې ترلي فارمولونه لرلے شي. نو δ له متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ څخه د A اشتقاق دے.

2. دا د (1) د هغه ځانگړي حالت نقیض عکس دے چې $A \equiv \perp$ وي.

□

4.8 د اشتقاق وړتيا او سازگاري

اوس به د د اشتقاق وړتيا اړيکې يو شمېر خاصيتونه ثابت کړو. دوی په خپلواکه توګه په زړه پورې دي، خو هر يو به د بشپرتيا قضیې په ثبوت کېږي ونډه ولري.

قضیه 4.24. که $\Gamma \vdash !A$ وي او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ اشتقاق δ_1 او له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $\perp$ اشتقاق δ_2 ونوموئ. بيا داسې اشتقاق کولای شو:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [!A]^1 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \perp \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ !A \end{array}}{\begin{array}{c} \perp \\ \neg\text{Intro} \\ \neg !A \end{array}} \neg\text{Elim}$$

□

په نوي اشتقاق کېږي فرضیه $!A$ ایستل شوې ده، نو دا له Γ څخه اشتقاق دے.

قضیه 4.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار وي.

ثبوت. لومړۍ فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ ؛ یعنې د $!A$ داسې اشتقاق δ_0 شته چې نه ایستل شوې فرضیې Γ دي. له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ څخه د $\perp$ یو اشتقاق داسې اخلو:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_0 \\ !A \end{array} \quad \neg !A}{\perp} \neg\text{Elim}$$

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار دے، او δ_1 له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ کېږي له نه ایستل شوې فرضیو څخه د $\perp$ اړوند اشتقاق دے. یوازې له Γ څخه د $!A$ یو اشتقاق د $\perp_C$ په کارولو اخلو:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg !A]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \perp \end{array}}{!A} \perp_C$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLND-005) سرچینه په دې ونه کېږي له ایستلو نښان سره د همدې قاعدې یو دویم ښان نښان هم پردي؛ زیات نښان لرې شوی او د فرضیې ایستل او د قاعدې نوم په ټاکلي ګډ نښان کېږي ساتل شوي دي.

□

تمرین 4.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي.

قضیه 4.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash A$ او $\neg!A \in \Gamma$. بيا له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق δ شته. د $\neg$ Elim قاعدې دا ساده کارونه وگورئ:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta \\ \neg!A \quad !A \end{array}}{\perp} \neg\text{Elim}$$

□ ځکه $\neg!A \in \Gamma$ او ټولې نۀ ایستل شوې فرضيې په Γ کېنې دي، دا $\Gamma \vdash \perp$ ښيي.

قضيه 4.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg!A\}$ دواړه ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. په ترتيب سره له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $\perp$ او له $\Gamma \cup \{\neg!A\}$ څخه د $\perp$ اشتقاقونه δ_1 او δ_2 شته. بيا داسې اشتقاق کول شو:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma, [\neg!A]^2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \perp \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma, [!A]^1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \perp \end{array}}{\begin{array}{c} 2 \quad \neg\neg!A \quad \neg\text{Intro} \quad 1 \quad \neg!A \quad \neg\text{Intro} \\ \neg\neg!A \quad \neg!A \\ \perp \end{array}} \neg\text{Elim}$$

□ ځکه فرضيې $!A$ او $\neg!A$ ایستل شوې دي، دا يوازې له Γ څخه د $\perp$ يو اشتقاق دے. نو Γ ناسازگار دے.

4.9 د اشتقاق وړتيا او قضیې رابطونه

موږ ثابتوو چې د فطري استنتاج د د اشتقاق وړتيا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضیې رابطونو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه، لکه $!A \wedge !B \vdash !A$ او $!A, !A \rightarrow !B \vdash !B$ (قیاسي استنتاج)، ثابت کړي. دا حقیقتونه د بشپړتیا قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضيه 4.29. 1. دواړه $!A \wedge !B \vdash !A$ او $!A \wedge !B \vdash !B$.

2. $!A, !B \vdash !A \wedge !B$.

ثبوت. 1. دواړه داسې اشتقاق کول شو:

$$\frac{!A \wedge !B}{!A} \wedge\text{Elim} \quad \frac{!A \wedge !B}{!B} \wedge\text{Elim}$$

2. داسې ئې اشتقاق کول شو:

$$\frac{!A \quad !B}{!A \wedge !B} \wedge\text{Intro}$$

□

قضيه 4.30. 1. $!A \vee !B, \neg !A, \neg !B$ ناسازگار دے۔

2. دواړه $!A \vdash !A \vee !B$ او $!B \vdash !A \vee !B$ ۔

ثبوت. 1. لاندې اشتقاق وگورئ:

$$\frac{1 \quad !A \vee !B \quad \frac{\neg !A \quad [!A]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{\neg !B \quad [!B]^1}{\perp} \neg\text{Elim}}{\perp} \vee\text{Elim}$$

دا له نۀ ایستل شوې فرضیو $!A \vee !B$ ، $\neg !A$ او $\neg !B$ څخه د $\perp$ یو اشتقاق دے۔

2. دواړه داسې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{!A}{!A \vee !B} \vee\text{Intro} \quad \frac{!B}{!A \vee !B} \vee\text{Intro}$$

□

قضيه 4.31. 1. $\neg !A, !A \rightarrow !B \vdash !B$ ۔

2. دواړه $\neg !A \vdash !A \rightarrow !B$ او $!B \vdash !A \rightarrow !B$ ۔

ثبوت. 1. داسې ئې اشتقاق کولے شو:

$$\frac{!A \rightarrow !B \quad !A}{!B} \rightarrow\text{Elim}$$

2. دا د لاندې دوو اشتقاقونه په وسیله ښودل کېږي:

$$\frac{\neg !A \quad [!A]^1}{\perp} \neg\text{Elim} \quad \frac{!B}{!A \rightarrow !B} \rightarrow\text{Intro} \quad \frac{1 \quad \frac{\perp}{!B} \perp_I}{!A \rightarrow !B} \rightarrow\text{Intro}$$

پام وکړئ چې $\rightarrow\text{Intro}$ د فرضیې $!A$ ایستل کولے شي، خو لازمه نۀ ده چې و ئې باسي۔

□

4.10 د اشتقاق وړتيا او سورونه

د بشپرتيا قضيه دا هم غواړي چې د فطري استنتاج قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقيقتونه ورکړي چې په دې برخه کې ثابتېږي.

قضيه 4.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ يا $A(x)$ کېنې نه راځي، او $\Gamma \vdash A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x A(x)$.

ثبوت. δ له Γ څخه د $A(c)$ يو اشتقاق ونیسئ. د $\forall$ Intro استنتاج په زياتولو د $\forall x A(x)$ يو اشتقاق اخلو. ځکه c په Γ يا $A(x)$ کېنې نه راځي، د ځانگړي متغير شرط پوره کېږي. $\square$

قضيه 4.33. 1. $\vdash A(t) \vdash \exists x A(x)$.

2. $\vdash \forall x A(x) \vdash A(t)$.

ثبوت. 1. لاندې له $A(t)$ څخه د $\exists x A(x)$ يو اشتقاق دے:

$$\frac{A(t)}{\exists x A(x)} \exists \text{Intro}$$

2. لاندې له $\forall x A(x)$ څخه د $A(t)$ يو اشتقاق دے:

$$\frac{\forall x A(x)}{A(t)} \forall \text{Elim}$$

$\square$

4.11 سمواله

د فطري استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څيزونه اشتقاق نه کړي چې په حقيقت کېنې ترې نه لازميږي. نو سمواله د اشتقاق نظامونو د تضمين شوې خونديتوب يو ډول خاصيت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکي خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هره د اشتقاق وړ ترې فارمول معتبره ده؛

2. که ترې فارمول له ځينو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنايي پايله هم ده؛

3. که د ترې فارمولونه يو سې ناسازگار وي، د صدق وړ نه دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي. که له دغو څخه کوم يو سم نه وي، اشتقاق نظام نيمگړے دے—له حده زيات څيزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سمواله ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري.

قضيه 4.34 (سمواله). که A له نه ایستل شوې فرضيو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، نو $\Gamma \models A$.

ثبوت. فرض کړئ δ د A ! يو اشتقاق دے. موږ په δ کېنې د استنتاجونو پر شمېر استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره هغه حالت ثابتوو چې د استنتاجونو شمېر 0 وي. په دې حالت کېنې δ يوازې له يوې ترلې فارمول A ! څخه جوړ دے، يعنې يوه فرضيه ده. دغه فرضيه نۀ ايسټل شوې ده؛ ځکه فرضيې يوازې د استنتاجونو په وسيله ايسټل کېدے شي، او دلته هېڅ استنتاج نشته. نو هر جوړښت $\mathcal{M}$ چې د ثبوت ټولې نۀ ايسټل شوې فرضيې پوره کوي، A ! هم پوره کوي.

اوس د استقرا پړاو اخلو. فرض کړئ δ ، n استنتاجونه لري. د تر ټولو لاندې استنتاج مقدمه يا مقدمې د فرعي-اشتقاقونه په وسيله اشتقاق شوې دي، او په هر يوه کېنې تر n کم استنتاجونه دي. د استقرا فرضيه منو: د تر ټولو لاندې استنتاج مقدمې د هغو فرعي-اشتقاقونه له نۀ ايسټل شوې فرضيو څخه لازميږي چې په دغو مقدمو پاے ته رسېږي. بايد وښيو چې پایله A ! د ټول ثبوت له نۀ ايسټل شوې فرضيو څخه لازميږي.

د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو. لومړۍ هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې يوازې يوه مقدمه لري.

1. فرض کړئ وروستۍ استنتاج Intro- دے: اشتقاق دا ښه لري:

$$\frac{\Gamma, [A]^n \vdots \delta_1}{n \vdash \neg A} \neg\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\perp$ د δ_1 له نۀ ايسټل شوې فرضيو $\Gamma \cup \{A\}$ څخه لازميږي. يو جوړښت $\mathcal{M}$ ونيسئ. بايد وښيو چې که $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، نو $\mathcal{M} \models \neg A$ دے. د خلف په توګه فرض کړئ $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، خو $\mathcal{M} \not\models \neg A$ ، يعنې $\mathcal{M} \models A$. له دې به $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{A\}$ لازم شي. دا زموږ د استقرا د فرضيې خلاف دے. نو $\mathcal{M} \models \neg A$.

2. وروستۍ استنتاج $\wedge\text{Elim}$ دے: دوه ښې لري؛ له مقدمې $A \wedge B$! څخه يا A ! يا B ! رايستل کېدے شي. لومړۍ حالت ونيسئ. اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\frac{\Gamma \vdots \delta_1 \vdash A \wedge B}{\vdash A} \wedge\text{Elim}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $A \wedge B$! د δ_1 له نۀ ايسټل شوې فرضيو Γ څخه لازميږي. يو جوړښت $\mathcal{M}$ ونيسئ. بايد وښيو چې که $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي، نو $\mathcal{M} \models A \wedge B$ دے. فرض کړئ $\mathcal{M} \models \Gamma$ زموږ د استقرا د فرضيې ($\Gamma \models A \wedge B$) له مخې پوهېږو چې $\mathcal{M} \models A \wedge B$. د تعريف له مخې $\mathcal{M} \models A \wedge B$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M} \models A$ او $\mathcal{M} \models B$ دواړه وي. (هغه حالت چې له $A \wedge B$! څخه B ! رايستل کېږي، په ورته ډول څېړل کېږي.)

3. وروستۍ استنتاج $\vee\text{Intro}$ دے: دوه ښې لري؛ $A \vee B$! يا له مقدمې A ! يا له مقدمې B ! څخه رايستل کېدے شي. لومړۍ حالت ونيسئ. اشتقاق دا ښه لري:

$$\frac{\Gamma \vdots \delta_1 \vdash A}{\vdash A \vee B} \vee\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې A د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ څخه لازمېږي. یو جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ. باید ونښو چې که $\Gamma \models \Gamma$ وي، نو $\mathcal{M} \models !A \vee !B$ دے. فرض کړئ $\mathcal{M} \models \Gamma$ ؛ بیا $\mathcal{M} \models !A$ ، ځکه $\Gamma \models !A$ (د استقرا فرضیه). نو $\mathcal{M} \models !A \vee !B$ هم باید وي. (هغه حالت چې $!A \vee !B$ له $!B$ څخه رالیستل کېږي، په ورته ډول خپرل کېږي.)

4. وروستۍ استنتاج $\rightarrow$ Intro دے: $A \rightarrow !B$ له داسې فرعي ثبوت څخه رالیستل کېږي چې فرضیه ئې A او پایله ئې $!B$ ده، یعنې:

$$\begin{array}{c} \Gamma, [!A]^n \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ !B \\ \hline n \quad !A \rightarrow !B \rightarrow \text{Intro} \end{array}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $!B$ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه لازمېږي، یعنې $\Gamma \cup \{!A\} \models !B$. یو جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ. د δ له نۀ ایستل شوې فرضيې یوازې Γ دي؛ ځکه A په وروستۍ استنتاج کېږي ایستل شوې ده. نو باید ونښو چې $\Gamma \models !A \rightarrow !B$. د خلف په توګه فرض کړئ چې د کوم جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، خو $\mathcal{M} \not\models !A \rightarrow !B$ وي. نو $\mathcal{M} \models !A$ او $\mathcal{M} \not\models !B$. خو د فرضيې له مخې $!B$ د $\Gamma \cup \{!A\}$ معنایي پایله ده، یعنې $\mathcal{M} \models !B$ ، او دا تناقض دے. نو $\Gamma \models !A \rightarrow !B$.

5. وروستۍ استنتاج $\perp_I$ دے: دلته δ داسې پای ته رسېږي:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ \perp \\ \hline !A \quad \perp_I \end{array}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\perp$ باید ونښو چې $\Gamma \models !A$. فرض کړئ داسې نۀ وي؛ بیا د کوم $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \models \Gamma$ او $\mathcal{M} \not\models !A$ دي. خو کاذبي هېڅ جوړښت یا ارزونه نۀ پوره کوي؛ یعنې تل $\mathcal{M} \models \perp$ وي؛ نو له دې به $\Gamma \models \perp$ لازم شي، چې د استقرا د فرضيې خلاف دے.

6. وروستۍ استنتاج $\perp_C$ دے: تمرین.

7. وروستۍ استنتاج $\forall$ Intro دے: بیا δ دا بڼه لري:

$$\begin{array}{c} \Gamma \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ !A(a) \\ \hline \forall x !A(x) \quad \forall \text{Intro} \end{array}$$

د استقرا د فرضيې له مخې مقدمه $!A(a)$ د نۀ ایستل شوې فرضیو Γ معنایي پایله ده. داسې جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma$ وي. باید ونښو چې $\mathcal{M} \models \forall x !A(x)$. ځکه $\forall x !A(x)$ یوه ترلے فارمول ده، د دې معنی دا ده چې د هرې متغیر-کومارنې s دپاره باید $\mathcal{M}, s \models !A(x)$ ونښو (کیت ټاکونکو د صدق قضیه [OLP]). ځکه Γ ټول له جملو جوړ دے، د هر $B \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M}, s \models B$ د صدق تعریف [OLP] له مخې دے. $\mathcal{M}'$ داسې جوړښت ونیسئ

چې د $\mathcal{M}$ په شان وي، خو $a^{\mathcal{M}'} = s(x)$ وي. ځکه a په Γ کېنې نه راځي، د جملو د امتدادي والي نتيجه [OLP] له مخې $\mathcal{M}' \models \Gamma$ ځکه $\mathcal{M}' \models A(a)$ ، $\Gamma \models A(a)$ ځکه $A(a)$ يوه ترلې فارمول ده، د جملې د صدق او متغير-کومارنې قضيه [OLP] له مخې $\mathcal{M}', s \models A(a)$ د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] له مخې $\mathcal{M}', s \models A(x)$ له مخې a او يوازې هله چې $\mathcal{M}' \models A(a)$ (ياد ولرئ $A(a)$ هماغه $A(x)[a/x]$ دے). نو $\mathcal{M}', s \models A(x)$ ځکه a په $A(x)$ کېنې نه راځي، د امتدادي والي قضيه [OLP] له مخې $\mathcal{M}, s \models A(x)$ خو s خپل سري متغير-کومارنه وه؛ نو $\mathcal{M} \models \forall x A(x)$.

8. وروستنه استنتاج $\exists$ Intro دے: تمرين.

9. وروستنه استنتاج $\forall$ Elim دے: تمرين.

اوس هغه ممکن استنتاجونه خپرو چې خو مقدمې لري: $\exists$ Elim، $\rightarrow$ Elim، $\neg$ Elim، $\wedge$ Intro، $\vee$ Elim. نسخې سمون: (OLND-006) سرچينې د خو-مقدمې قاعدو له دې بشپړ لړ څخه د نفي ايستلو قاعده غورځولې ده، سره له دې چې لاندې تمرين ئې هم راوړي؛ دلته بېرته شامله شوه.

1. وروستنه استنتاج $\wedge$ Intro دے. $A \wedge B$ له مقدمو A او B څخه رايستل کېږي او δ دا بڼه لري:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \hline A \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \hline B \end{array}}{A \wedge B} \wedge \text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې A د δ_1 له نۀ ايستل شوې فرضيې Γ_1 څخه، او B د δ_2 له نۀ ايستل شوې فرضيې Γ_2 څخه لازمېږي. د δ له نۀ ايستل شوې فرضيې $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ دي؛ نو بايد $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \models A \wedge B$ وښيو. داسې جوړښت $\mathcal{M}$ ونيسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي. ځکه $\mathcal{M} \models \Gamma_1$ او $\mathcal{M} \models A$ ، نو $\mathcal{M} \models A$ همدارنګه، ځکه $\mathcal{M} \models \Gamma_2$ او $\mathcal{M} \models B$ نو $\mathcal{M} \models B$ دواړه يو ځای $\mathcal{M} \models A \wedge B$ راکوي.

2. وروستنه استنتاج $\vee$ Elim دے: تمرين.

3. وروستنه استنتاج $\rightarrow$ Elim دے. B له مقدمو $A \rightarrow B$ او A څخه رايستل کېږي. اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \hline A \rightarrow B \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \hline A \end{array}}{B} \rightarrow \text{Elim}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $A \rightarrow B$ د δ_1 له نۀ ايستل شوې فرضيې Γ_1 څخه، او A د δ_2 له نۀ ايستل شوې فرضيې Γ_2 څخه لازمېږي. يو جوړښت $\mathcal{M}$ ونيسئ. بايد وښيو چې که $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي، نو $\mathcal{M} \models B$ دے. فرض کړئ $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ځکه $\mathcal{M} \models A \rightarrow B$ ، نو $\mathcal{M} \models A \rightarrow B$ ځکه $\mathcal{M} \models A$ ، نو $\mathcal{M} \models B$ له دې څخه $\mathcal{M} \models B$ لازمېږي (ځکه که $\mathcal{M} \models B$ وے، نو له $\mathcal{M} \models A$ سره به $\mathcal{M} \models A \rightarrow B$ وے، چې د $\mathcal{M} \models A \rightarrow B$ خلاف دے).

4. وروستنه استنتاج $\neg$ Elim دے: تمرين.

5. وروستنه استنتاج $\exists$ Elim دے: تمرين.

□

تمرین 4.35. د 4.34 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 4.36. که $\vdash A$ وي، نو $!A$ معتبره ده.

نتیجه 4.37. که Γ د صدق وړ وي، نو سازگار دے.

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازگار نه دے. بیا $\Gamma \vdash \perp$ ، یعنې له Γ څخه د نه ایستل شوې فرضیو پر بنسټ د $\perp$ یو اشتقاق شته. د 4.34 له مخې هر جوړښت $\mathcal{M}$ چې Γ پوره کوي، باید $\perp$ هم پوره کړي. ځکه د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\perp \notin \mathcal{M}$ ، نو هېڅ $\mathcal{M}$ ، Γ نه شي پوره کولې؛ یعنې Γ د صدق وړ نه دے.

□

4.12 له عینیت سره اشتقاقونه

له عینیت سره اشتقاقونه اضافي استنتاجي قاعدو ته اړتیا لري.

$$\begin{array}{l} =\text{Elim} \frac{!A(t_1) \quad t_1 = t_2}{!A(t_2)} \qquad \qquad \qquad =\text{Intro} \frac{}{t = t} \\ =\text{Elim} \frac{!A(t_2) \quad t_1 = t_2}{!A(t_1)} \end{array}$$

په پورته قاعدو کېنې t ، t_1 او t_2 تړلې اصطلاحگانې دي. د $=\text{Intro}$ قاعده راکوي چې د $t = t$ په بڼه هره د یووالي جمله نېغ په نېغه، له هېڅ فرضي پرته، اشتقاق کړو.

بېلګه 4.38. که s او t تړلې اصطلاحگانې وي، نو $!A(t), s = t \vdash !A(s)$:

$$\frac{s = t \quad !A(s)}{!A(t)} = \text{Elim}$$

دا به د «یو شان څیزونو د تعویض د اصل» یا د لاینېڅ د قانون په نامه اشنا وي.

تمرین 4.39. ثابت کړئ چې $=$ متناظره او انتقالي دواړه ده؛ یعنې د $\forall x \forall y (x = y \rightarrow y = x)$ او $\forall x \forall y \forall z ((x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z)$ اشتقاقونه ورکړئ.

بېلګه 4.40. موږ دا تړلې فارمول اشتقاق کوو:

$$\forall x \forall y ((!A(x) \wedge !A(y)) \rightarrow x = y)$$

له دې تړلې فارمول څخه:

$$\exists x \forall y (!A(y) \rightarrow y = x)$$

اشتقاق له لاندې څخه پورته جوړوو:

$$\begin{array}{c}
 \exists x \forall y (!A(y) \rightarrow y = x) \quad [!A(a) \wedge !A(b)]^1 \\
 \vdots \\
 \frac{1 \quad \frac{a = b}{(!A(a) \wedge !A(b)) \rightarrow a = b} \rightarrow \text{Intro}}{\forall y ((!A(a) \wedge !A(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro} \\
 \frac{\forall y ((!A(a) \wedge !A(y)) \rightarrow a = y)}{\forall x \forall y ((!A(x) \wedge !A(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro}
 \end{array}$$

اوس بايد اصلي فرضيه وکاروو: ځکه دا وجودي فارمول ده، د منځنۍ پایلې $a = b$ د اشتقاق کولو دپاره $\exists \text{Elim}$ کاروو.

$$\begin{array}{c}
 [\forall y (!A(y) \rightarrow y = c)]^2 \\
 [!A(a) \wedge !A(b)]^1 \\
 \vdots \\
 \frac{2 \quad \frac{\exists x \forall y (!A(y) \rightarrow y = x)}{a = b} \exists \text{Elim}}{1 \quad \frac{a = b}{(!A(a) \wedge !A(b)) \rightarrow a = b} \rightarrow \text{Intro}} \rightarrow \text{Intro} \\
 \frac{\frac{1 \quad \frac{a = b}{(!A(a) \wedge !A(b)) \rightarrow a = b} \rightarrow \text{Intro}}{\forall y ((!A(a) \wedge !A(y)) \rightarrow a = y)} \forall \text{Intro}}{\forall x \forall y ((!A(x) \wedge !A(y)) \rightarrow x = y)} \forall \text{Intro}
 \end{array}$$

د پاس په بني لوري کښې فرعي-اشتقاق د خپلو فرضيو په کارولو بشپړېږي، خو $a = c$ او $b = c$ ونښي. دا دوه جلا اشتقاقونه غواړي. د $a = c$ اشتقاق داسې دے:

$$\frac{\frac{[\forall y (!A(y) \rightarrow y = c)]^2}{!A(a) \rightarrow a = c} \forall \text{Elim} \quad \frac{[!A(a) \wedge !A(b)]^1}{!A(a)} \wedge \text{Elim}}{a = c} \rightarrow \text{Elim}$$

له $a = c$ او $b = c$ څخه $a = b$ د $=\text{Elim}$ په وسيله اشتقاق کوو.

تمرین 4.41. د لاندې فارمولونه اشتقاقونه ورکړئ:

$$1. \quad \forall x \forall y ((x = y \wedge !A(x)) \rightarrow !A(y))$$

$$2. \quad \exists x !A(x) \wedge \forall y \forall z ((!A(y) \wedge !A(z)) \rightarrow y = z) \rightarrow \exists x (!A(x) \wedge \forall y (!A(y) \rightarrow y = x))$$

4.13 له عينيت سره سموالے

قضيه 4.42. د $=$ له قاعدو سره فطري استنتاج سم دے.

ثبوت. د $t = t$ په بڼه هره فارمول معتبره ده؛ ځکه د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \models t = t$ (پام وکړئ چې اصطلاح t تړلې فرضوو، يعنې هېڅ متغير نه لري؛ نو متغير-کومارنې اغېز نه لري.)

فرض کړئ په کوم اشتقاق کښې وروستۍ استنتاج $=\text{Elim}$ دے، يعنې اشتقاق لاندې بڼه لري:

$$\frac{\begin{array}{c} \Gamma_1 \\ \vdots \\ \delta_1 \\ \vdots \\ t_1 = t_2 \end{array} \quad \begin{array}{c} \Gamma_2 \\ \vdots \\ \delta_2 \\ \vdots \\ !A(t_1) \end{array}}{!A(t_2)} = \text{Elim}$$

مقدمې $t_1 = t_2$ او $!A(t_1)$ په خپل وار له نۀ اېستل شوې فرضيو Γ_1 او Γ_2 څخه اشتقاق شوې دي. غواړو وښيو چې $!A(t_2)$ له $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ څخه لازمېږي. داسې جوړښت $\mathcal{M}$ ونیسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي. د استقرا د فرضيې له مخې $\mathcal{M} \models !A(t_1)$ او $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ نو $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ او هره متغیر-کومارنه ونیسئ، او $m = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] له مخې $\mathcal{M}, s \models !A(t_1)$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}, s[m/x] \models !A(x)$ ، او دا هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}, s \models !A(t_2)$. ځکه $\mathcal{M} \models !A(t_1)$ ، نو $\mathcal{M} \models !A(t_2)$. $\square$

باب 5

تابلوګانې

اداري يادونه - دا څپرک يونه لرونکې تحليلي تابلو نظام وړاندې کوي -
د ثبوت د يوه نظام په توګه له تابلو سره اړوند مواد د شاملولو يا ايستلو دپاره د prfTab ټک وکاروئ - د ژباړې
د نسخې سمون: (OLTAB-001) سرچينه دلته په تېروتنه فطري استنتاج يادوي؛ د څپرکي، ټک او ټول وارد شوي
موادو له مخې مطلب تابلو نظام دے، نو نوم ئې دلته سم شوے دے -

5.1 قاعدې او تابلوګانې

تابلو په جوړښت کېنې د ترلے فارمول د رښتيا يا دروغ کېدو د ممکنو لارو منظمه پلټنه ده - د تابلو بنسټيز توکي نښه لرونکي
فارمولونه دي: ترلي فارمولونه له يوه رښتياوالي ارزښت «نښې» سره، چې يا $\mathbb{T}$ وي يا $\mathbb{F}$ - دا نښه لرونکي فارمولونه په داسې
ونه کېنې ترتيبېږي چې لاندې خوا ته غځېږي -

تعريف 5.1. نښه لرونکې فارمول له يوه رښتياوالي ارزښت او ترلے فارمول څخه جوړه ده، يعنې له دې دواړو څخه يوه:

$$\mathbb{T}!A \text{ يا } \mathbb{F}!A.$$

په شهودي ډول $\mathbb{T}!A$ داسې لوستلے شو چې «کېدے شي A رښتيا وي»، او $\mathbb{F}!A$ داسې چې «کېدے شي A ! دروغ وي» (په کوم جوړښت کېنې) -

په وټه کېنې هر نښه لرونکې فارمول يا فرض دے (چې د وټې په ترټولو پاسنۍ برخه کېنې ليکل کېږي)، يا تر ځان له پاسه
له کوم نښه لرونکې فارمول څخه د يوې استنتاجي قاعدې په وسيله اخستل شوے دے - د مخکېنې فارمول د هر ممکن اصلي
عملکر دپاره دوه قاعدې شته: يوه د هغه حالت دپاره چې نښه $\mathbb{T}$ وي، او بله د هغه حالت دپاره چې نښه $\mathbb{F}$ وي - ځينې
قاعدې وټې ته ځانګې ورکوي او ځينې يوازې ځانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزياتوي - يوه قاعده کېدے شي (او ډېر ځله
بايد) سمدستي پر مخکېنې نښه لرونکې فارمول نة، بلکې له رېښې څخه د قاعدې د پلي کېدو تر ځاي پورې په ځانګه کېنې پر
هر نښه لرونکې فارمول پلي شي -

يوه ځانګه هله ترلې ده چې $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ دواړه ولري - ترلے تابلو هغه دے چې هره ځانګه ئې ترلې وي - د شهودي تعبير
له مخې هره ځانګه يو ګډ امکان بيانوي، خو $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ يو ځاي ممکن نة دي - په بله وينا، که يوه ځانګه ترلې وي،

هغه امکان رد شوی دے چې څانګه ئې بيانوي. په ځانګړي ډول، د دې معنی دا ده چې ترلے تابلو هغه ټول امکانات دروي چې د $T!A$ په بڼه هر فرض په يو وخت رښتيا او د $F!A$ په بڼه هر فرض دروغ کړي. د $A!$ دپاره ترلے تابلو داسې ترلے تابلو دے چې رښه ئې $F!A$ وي. که داسې ترلے تابلو موجود وي، د $A!$ د دروغ کېدو ټول امکانات رد شوي؛ يعنې $A!$ بايد په هر جوړښت کېنې رښتيا وي.

5.2 قضیوي قاعدې

5.2.1 د $\neg$ قاعدې

$$\neg F \frac{F \neg!A}{T!A} \qquad \neg T \frac{T \neg!A}{F!A}$$

5.2.2 د $\wedge$ قاعدې

$$\wedge F \frac{F!A \wedge!B}{F!A \mid F!B} \qquad \wedge T \frac{T!A \wedge!B}{T!A \mid T!B}$$

5.2.3 د $\vee$ قاعدې

$$\vee F \frac{F!A \vee!B}{F!A \mid F!B} \qquad \vee T \frac{T!A \vee!B}{T!A \mid T!B}$$

5.2.4 د $\rightarrow$ قاعدې

$$\rightarrow F \frac{F!A \rightarrow!B}{T!A \mid F!B} \qquad \rightarrow T \frac{T!A \rightarrow!B}{F!A \mid T!B}$$

5.2.5 د پرېکون قاعده

$$\text{Cut} \frac{}{T!A \mid F!A}$$

د Cut قاعده پر مخکښ لښه لرونکي فارمول نۀ «پلي کېږي»؛ بلکې راکوي چې په تابلو کېنې هره څانګه په دوو ووېشو: يوه څانګه $T!A$ او بله $F!A$ لري. دا اړينه نۀ ده—د لښه لرونکي فارمولونه هر هغه سټ چې ترلے تابلو ولري، له Cut پرته هم يو ترلے تابلو لري—خو راکوي چې تابلوګانې په اسانه طريقه سره يو ځای کړو.

5.3 د سورونو قاعدې

5.3.1 د $\forall$ قاعدې

$\forall F \frac{F \forall x !A(x)}{F !A(a)}$	$\forall T \frac{T \forall x !A(x)}{T !A(t)}$
---	---

په $\forall T$ کېنې t تړلې اصطلاح ده (يعنې متغیرونه نه لري) - په $\forall F$ کېنې a داسې ثابت سمبول دے چې بايد د $\forall F$ تر قاعدې پاس په ځانګه کېنې هېڅ ځای نه وي راغلے - a د $\forall F$ استنتاج ځانګړے متغیر بولو-¹

5.3.2 د $\exists$ قاعدې

$\exists F \frac{F \exists x !A(x)}{F !A(t)}$	$\exists T \frac{T \exists x !A(x)}{T !A(a)}$
---	---

بيا هم t تړلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists T$ تر قاعدې پاس په ځانګه کېنې نه راځي - a د $\exists T$ استنتاج ځانګړے متغیر بولو -

هغه شرط چې ځانګړے متغیر د $\forall F$ يا $\exists T$ استنتاج تر پاسه په ځانګه کېنې نه راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي -
هغه قرارداد را یاد کړئ چې کله A داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، دا د $A(x)$ په لیکلو ښیو - په همدې سیاق کېنې $A(t)$ د $A[t/x]$ لنډه بڼه ده - نو د $\exists F$ قاعده داسې هم لیکلے شو:

$$\frac{F \exists x !A}{F !A[t/x]} \exists F$$

پام وکړئ چې t له مخکېنې په A کېنې راتلے شي؛ مثلاً A کېدے شي $P(t, x)$ وي - نو له $F \exists x P(t, x)$ څخه $F P(t, t)$ استنتاجول د $\exists F$ سمه کارونه ده - خو په $\forall F$ او $\exists T$ کېنې د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په A کېنې نه راځي - نو له $F \forall x P(a, x)$ څخه د $\forall F$ په کارولو $F P(a, a)$ په سمه توګه نه شی استنتاجولے -

په $\forall T$ او $\exists F$ کېنې د تړلې اصطلاح t پر انتخاب نور بندیز نشته - بل لوري ته، د $\exists T$ او $\forall F$ په قاعدو کېنې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a د اړوند استنتاج تر پاسه په ځانګو کېنې هېڅ ځای نه راځي - دا شرط د نظام د سموالي د يقيني کولو دپاره اړین دے - له دې شرط پرته لاندې به د $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ دپاره یو تړلے تابلو و:

1	$F \exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$	Assumption
2	$T \exists x \varphi(x)$	$\rightarrow F 1$
3	$F \forall x \varphi(x)$	$\rightarrow F 1$
4	$T \varphi(a)$	$\exists T 2$
5	$F \varphi(a)$	$\forall F 3$

⊗

¹ د «ځانګړي متغیر» اصطلاح کاروو، سره له دې چې په پورته قاعده کېنې a یو ثابت سمبول دے - دا تاریخي لاملونه لري -

خو $\exists x \varphi(x) \rightarrow \forall x \varphi(x)$ معتبر نه دے۔

5.4 تابلوګانې

و مو ويل چې فرض څه دے، او د استنتاج قاعدې مو ورکړې۔ له دغو څخه تابلوګانې په استقرايي ډول جوړېږي: هر تابلو يا يوه يوازېنۍ څانګه ده چې له يوه يا زياتو فرضونو جوړه وي، يا پر يوه څانګه د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو له بل تابلو څخه اخستل کېږي۔

تعريف 5.2 (تابلو). د فرضونو $S_1!A_1, \dots, S_n!A_n$ دپاره (چې هر S_i يا $\mathbb{T}$ وي يا $\mathbb{F}$) تابلو د نښه لرونکي فارمولونه يوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د وني تر ټولو پاسني n نښه لرونکي فارمولونه $S_i!A_i$ دي، يو تر بل لاندې۔
2. په ونه کېنې هر نښه لرونکې فارمول چې له فرضونو څخه نه وي، تر ځان پاس په څانګه کېنې پر نښه لرونکې فارمول د يوې استنتاجي قاعدې له سمې کارونې څخه راوتلې وي۔

د تابلو يوه څانګه هله او يوازې هله تړلې ده چې $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ دواړه ولري؛ که نه وي پرانيستې ده۔ هغه تابلو چې هره څانګه ئې تړلې وي، د خپلو فرضونو د سټ تړلې تابلو دے۔ که تابلو تړلې نه وي، يعنې لږ تر لږه يوه پرانيستې څانګه ولري، نو پرانيسته دے۔

بېلګه 5.3. د فرضونو هر سټ په يوازې ځان تابلو دے، خو په عام ډول به تړلې نه وي۔ (په څرګند ډول يوازې هله تړلې دے چې فرضونه له مخکېنې د نښه لرونکي فارمولونه يوه جوړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ ولري۔)

له يوه تابلو (پرانيستې يا تړلې) څخه د کومې استنتاجي قاعدې په پلي کولو يو نوے، لوی تابلو اخستلې شو۔ قاعده په هغه کېنې پر نښه لرونکې فارمول $A!$ پلي کوو۔ دا قاعده به د هرې هغې څانګې په پای کېنې يو يا زيات نښه لرونکي فارمولونه ورزيات کړي چې د $A!$ هغه پېښه لري چې قاعده مو پرې پلي کړې ده۔

مثلاً فرض $\mathbb{T}!A \wedge \neg!A$ ونیسئ۔ لاندې هغه (پرانيستې) تابلو دے چې يوازې له همدې فرض څخه جوړ دے:

$$.1 \quad \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi \quad \text{Assumption}$$

د $\mathbb{T}!A \wedge \neg!A$ قاعده پر فرض پلي کوو او ترې نوے تابلو اخلو۔ دا قاعده راکوي چې تابلو ته دوه نوې کېنې، $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{T}\neg!A$ ، ورزياتي کړو:

$$\begin{array}{lll} .1 & \mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi & \text{Assumption} \\ .2 & \mathbb{T} \varphi & \wedge \mathbb{T} 1 \\ .3 & \mathbb{T} \neg \varphi & \wedge \mathbb{T} 1 \end{array}$$

کله چې تابلوګانې لیکو، پلي شوې قاعدې په بني لوري کېنې ثبتوو (مثلاً $\wedge \mathbb{T} 1$ دا معنی لري چې پر دې کرښه نښه لرونکې فارمول د $\mathbb{T}!A$ قاعدې د هغې کارونې پایله ده چې د 1 پر کرښه نښه لرونکې فارمول ته شوې ده)۔ دا نوے تابلو اوس نور نښه لرونکي فارمولونه لري، خو يوازې پر يوه ($\mathbb{T}\neg!A$) قاعده پلي کولې شو (په دې حالت کېنې $\mathbb{T}\neg!A$ قاعده)۔ له دې څخه لاندې تړلې تابلو راځي:

.1	$\mathbb{T} \varphi \wedge \neg \varphi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 1$
.3	$\mathbb{T} \neg \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 1$
.4	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 3$
	$\otimes$	

5.5 د تابلوگانې بیلګې

بیلګه 5.4. رايي د ترلے فارمول $\neg(A \wedge B) \rightarrow \neg A$ دپاره يو ترلے تابلو ومومو.

لومړۍ اړوند فرض د تابلو په سر کښې لیکو.

.1	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
----	---	------------

یوازې یو فرض شته، نو یوازې یو نښه لرونکې فارمول دے چې قاعده پرې پلي کولے شو. (د هر نښه لرونکې فارمول دپاره تل تر ټولو زیاته یوه قاعده پلي کېدے شي: دا د ترلے فارمول د اړوندې نښې او اصلي عملگر قاعده ده.) په دې حالت کېدې باید $\mathbb{F} \rightarrow$ پلي کړو.

.1	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.3	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$

د دې حساب ساتلو دپاره چې پر کومو نښه لرونکي فارمولونه مو اړوندې قاعدې پلي کړې دي، د جملې تر څنګ د سم نښان لیکو. خو د سم نښان یوازې هله ولیکئ چې قاعده پر ټولو پرانیستو ځانګو پلي شوې وي. کله چې پر کوم نښه لرونکې فارمول په هره پرانیستې ځانګه کېدې اړونده قاعده پلي شي، بیا ورته د بېرته ورګرځېدو او د قاعدې د بیا پلي کولو اړتیا نه لرو. په دې حالت کېدې یوازې یوه ځانګه ده، نو قاعده یوازې یو ځل پلي کول غواړي. (پام وکړئ چې د سم نښانونه یوازې د تابلوګانو د جوړولو اسانتیا ده او په رسمي ډول د تابلوګانو د نحوې برخه نه ده.)

یو نوې نښه لرونکې فارمول شته چې قاعده پرې پلي کولے شو: پر 2 کرښه $\neg(A \wedge B) \rightarrow \neg A$ د $\mathbb{T}$ قاعدې له پلي کولو څخه دا رايي:

.1	$\mathbb{F}(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.3	$\mathbb{F} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

ځکه اوس ځانګه $\mathbb{T} \neg(A \wedge B)$ (پر 4 کرښه) او $\mathbb{F} A$ (پر 3 کرښه) دواړه لري، ځانګه ترې ده. ځکه همدا یوازې ځانګه ده، تابلو ترلے دے. د $\neg(A \wedge B) \rightarrow \neg A$ دپاره مو یو ترلے تابلو وموند.

بېلگه 5.5. اوس رايي د $(\neg!A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)$ دپاره يو ترلے تابلو ومومو-
له اړوند فرض څخه پيل کوو:

$$.1 \quad \mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad \text{Assumption}$$

په دې تابلو کښې د يوازېني نښه لرونکې فارمول اصلي عملگر $\rightarrow$ او نښه $\mathbb{F}$ ده، نو د $\mathbb{F} \rightarrow$ قاعده پرې پلي کوو او دا اخلو:

$$\begin{array}{ll} .1 & \mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad \checkmark \quad \text{Assumption} \\ .2 & \mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ .3 & \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \end{array}$$

اوس دا ټاکنه لرو چې پر 2 کرښه $\vee \mathbb{T}$ پلي کړو که پر 3 کرښه $\mathbb{F} \rightarrow$ په حقيقت کښې د ترتيب ټاکنه توپير نه کوي، تر هغې چې د هر نښه لرونکې فارمول اړونده قاعده په هره څانگه کښې پلي شي- نو لومړۍ اخلو- د $\vee \mathbb{T}$ قاعده تابلو ته څانگې ورکوي، او د قاعدې دوه پایلې به هغه نوي نښه لرونکي فارمولونه وي چې دوو نويو څانگو ته ورزياتېږي- له دې څخه دا رايي:

$$\begin{array}{ll} .1 & \mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad \checkmark \quad \text{Assumption} \\ .2 & \mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \quad \checkmark \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ .3 & \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ & \swarrow \quad \searrow \\ .4 & \mathbb{T} \neg\varphi \quad \mathbb{T} \psi \quad \vee \mathbb{T} 2 \end{array}$$

لا مو پر 3 کرښه د $\mathbb{F} \rightarrow$ قاعده نه ده پلي کړې؛ اوس ئې کوو- د وخت د سپما دپاره ئې پر دواړو څانگو پلي کوو- را ياد کړئ چې د کوم نښه لرونکې فارمول تر څنګ يوازې هله د سم نښان لیکو چې اړونده قاعده مو په هره پرانيستې څانگه کښې پلي کړې وي- نو غوره ده چې قاعده د هرې هغې څانگې په پای کې پلي کړو چې اړوند نښه لرونکې فارمول لري- په دې توګه به په بېلابېلو څانگو کښې لاندې هماغه نښه لرونکې فارمول ته بېرته نه ورګرځو-

$$\begin{array}{ll} .1 & \mathbb{F} (\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \quad \checkmark \quad \text{Assumption} \\ .2 & \mathbb{T} \neg\varphi \vee \psi \quad \checkmark \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ .3 & \mathbb{F} (\varphi \rightarrow \psi) \quad \checkmark \quad \rightarrow \mathbb{F} 1 \\ & \swarrow \quad \searrow \\ .4 & \mathbb{T} \neg\varphi \quad \mathbb{T} \psi \quad \vee \mathbb{T} 2 \\ .5 & \mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \varphi \quad \rightarrow \mathbb{F} 3 \\ .6 & \mathbb{F} \psi \quad \mathbb{F} \psi \quad \rightarrow \mathbb{F} 3 \\ & \quad \quad \quad \otimes \end{array}$$

اوس ښۍ څانگه ترلې ده- په کيڼه څانگه کښې لا هم پر 4 کرښه د $\mathbb{T} \neg$ قاعده پلي کولے شو- له دې څخه $\mathbb{F} !A$ رايي او کيڼه څانگه ترل کېږي:

.1	$\mathbb{F}(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\neg\varphi \vee \psi \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.3	$\mathbb{F}(\varphi \rightarrow \psi) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\swarrow \quad \searrow$	
.4	$\mathbb{T}\neg\varphi \quad \mathbb{T}\psi$	$\vee \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
.6	$\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 3$
.7	$\mathbb{F}\varphi \quad \otimes$	$\neg \mathbb{T} 4$
	$\otimes$	

بېلگه 5.6. د فرضونو په توګه د هر شمېر لږنې فارمولونه دپاره تابلوکاني ورکولې شو. ډېر ځله له يوې زياتې داسې قاعدې پلي کول هم اړين وي چې ځانګړې ورکوي؛ او په عام ډول تابلو هر شمېر ځانګړې لرلې شي. مثلاً د $\{\mathbb{T}!A \vee \mathbb{T}!B \wedge !C, \mathbb{F}!A \vee !B \wedge !C\}$ لومړۍ پر لومړي فرض د $\vee \mathbb{T}$ قاعده پلي کوو:

.1	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$	Assumption
	$\swarrow \quad \searrow$	
.3	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$

اوس پر 2 کرښه د $\wedge \mathbb{F}$ قاعده پلي کولې شو. دا په دواړو ځانګړو کښې په يو وخت کوو، نو پر 2 کرښه د سم نښان وهلې شو:

.1	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
	$\swarrow \quad \searrow$	
.3	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
	$\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$	
.4	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \quad \mathbb{F}\varphi \vee \chi \quad \mathbb{F}\varphi \vee \psi \quad \mathbb{F}\varphi \vee \chi$	$\wedge \mathbb{F} 2$

اوس $\vee \mathbb{F}$ پر ټولو هغو ځانګړو پلي کولې شو چې $!A \vee !B$ لري:

.1	$\mathbb{T}\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{F}(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
	$\swarrow \quad \searrow$	
.3	$\mathbb{T}\varphi \quad \mathbb{T}\psi \wedge \chi$	$\vee \mathbb{T} 1$
	$\swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow$	
.4	$\mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark \quad \mathbb{F}\varphi \vee \chi \quad \mathbb{F}\varphi \vee \psi \checkmark \quad \mathbb{F}\varphi \vee \chi$	$\wedge \mathbb{F} 2$
.5	$\mathbb{F}\varphi \quad \mathbb{F}\varphi$	$\vee \mathbb{F} 4$
.6	$\mathbb{F}\psi \quad \mathbb{F}\psi$	$\vee \mathbb{F} 4$
	$\otimes$	

اوس تر ټولو کينه څانګه ترې ده. راځئ $\vee F$ پر $AV!C$ پلي کړو:



.1	$T\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$F(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
.3	$ \begin{array}{cc} T\varphi & T\psi \wedge \chi \\ \swarrow \quad \searrow & \swarrow \quad \searrow \\ F\varphi \vee \psi \checkmark & F\varphi \vee \chi \checkmark & F\varphi \vee \psi \checkmark & F\varphi \vee \chi \checkmark \end{array} $	$\vee T 1$
.4	$F\varphi \vee \psi \checkmark$	$\wedge F 2$
.5	$F\varphi$	$\vee F 4$
.6	$F\psi$	$\vee F 4$
.7	$\otimes$	$\vee F 4$
.8	$F\chi$	$\vee F 4$
	$\otimes$	

پام وکړئ چې د روښانتيا دپاره مو د $\vee F$ د دويم ځل کارونې پايله لاندې يوره. په دې حالت کېنې دې ته اړتيا نه وه؛ ځکه توجهونه به يو شان وو.

دوه څانګې پرانيستې پاتې دي، او پر 3 کرښه $T!B \wedge C$ لا بې د سم نښانه ده. پر هغې $\wedge T$ پلي کوو او ترېله تابلو اخلو:

.1	$T\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$F(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
.3	$ \begin{array}{cc} T\varphi & T\psi \wedge \chi \checkmark \\ \swarrow \quad \searrow & \swarrow \quad \searrow \\ F\varphi \vee \psi \checkmark & F\varphi \vee \chi \checkmark & F\varphi \vee \psi \checkmark & F\varphi \vee \chi \checkmark \end{array} $	$\vee T 1$
.4	$F\varphi \vee \psi \checkmark$	$\wedge F 2$
.5	$F\varphi$	$\vee F 4$
.6	$F\psi$	$\vee F 4$
.7	$\otimes$	$\wedge T 3$
.8	$T\chi$	$\wedge T 3$
	$\otimes$	

د پرتلې دپاره، لاندې د فرضونو د همدې سټ يو ترېله تابلو ده چې قاعدې پکې په بل ترتيب پلي شوې دي:

.1	$\mathbb{T} \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{F} (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \checkmark$	Assumption
		
.3	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi \checkmark$	$\wedge \mathbb{F} 2$
.4	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 3$
.5	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 3$
		
.6	$\mathbb{T} \varphi$	$\vee \mathbb{T} 1$
.7	$\mathbb{T} \psi \wedge \chi \checkmark$	$\wedge \mathbb{T} 6$
.8	$\mathbb{T} \chi$	$\wedge \mathbb{T} 6$

تمرین 5.7. د لاندې دپاره ترلي تابلوکاني ورکړئ:

1. $\mathbb{T} !A \wedge (!B \wedge !C), \mathbb{F} (!A \wedge !B) \wedge !C$

2. $\mathbb{T} !A \vee (!B \vee !C), \mathbb{F} (!A \vee !B) \vee !C$

3. $\mathbb{T} !A \rightarrow (!B \rightarrow !C), \mathbb{F} !B \rightarrow (!A \rightarrow !C)$

4. $\mathbb{T} !A, \mathbb{F} \neg \neg !A$

تمرین 5.8. د لاندې دپاره ترلي تابلوکاني ورکړئ:

1. $\mathbb{T} (!A \vee !B) \rightarrow !C, \mathbb{F} !A \rightarrow !C$

2. $\mathbb{T} (!A \rightarrow !C) \wedge (!B \rightarrow !C), \mathbb{F} (!A \vee !B) \rightarrow !C$

3. $\mathbb{F} \neg (!A \wedge \neg !A)$

4. $\mathbb{T} !B \rightarrow !A, \mathbb{F} \neg !A \rightarrow \neg !B$

5. $\mathbb{F} (!A \rightarrow \neg !A) \rightarrow \neg !A$

6. $\mathbb{F} \neg (!A \rightarrow !B) \rightarrow \neg !B$

7. $\mathbb{T} !A \rightarrow !C, \mathbb{F} \neg (!A \wedge \neg !C)$

8. $\mathbb{T} !A \wedge \neg !C, \mathbb{F} \neg (!A \rightarrow !C)$

9. $\mathbb{T} !A \vee !B, \mathbb{T} \neg !B, \mathbb{F} !A$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-002) سرچينې دوه رښتوني فرضونه د يو نښه لرونکي فارمول په دننه کښې سره يو ځای کړي وو؛ دلته هر فرض خپله رښتيا نښه لري، لکه د مسئلې په اړوند استلزام کښې.

10. $\mathbb{T} \neg !A \vee \neg !B, \mathbb{F} \neg (!A \wedge !B)$

11. $\mathbb{F} (\neg !A \wedge \neg !B) \rightarrow \neg (!A \vee !B)$

$$.12 \quad \mathbb{F} \neg(!A \vee !B) \rightarrow (\neg!A \wedge \neg!B)$$

تمرین 5.9. د لاندې دپاره ترلي تابلوکاني ورکړئ:

$$.1 \quad \mathbb{T} \neg(!A \rightarrow !B), \mathbb{F} !A$$

$$.2 \quad \mathbb{T} \neg(!A \wedge !B), \mathbb{F} \neg!A \vee \neg!B$$

$$.3 \quad \mathbb{T} !A \rightarrow !B, \mathbb{F} \neg!A \vee !B$$

$$.4 \quad \mathbb{F} \neg \neg!A \rightarrow !A$$

$$.5 \quad \mathbb{T} !A \rightarrow !B, \mathbb{T} \neg!A \rightarrow !B, \mathbb{F} !B$$

$$.6 \quad \mathbb{T} (!A \wedge !B) \rightarrow !C, \mathbb{F} (!A \rightarrow !C) \vee (!B \rightarrow !C)$$

$$.7 \quad \mathbb{T} (!A \rightarrow !B) \rightarrow !A, \mathbb{F} !A$$

$$.8 \quad \mathbb{F} (!A \rightarrow !B) \vee (!B \rightarrow !C)$$

5.6 له سورونو سره تابلوکاني

بېلگه 5.10. له سورونو سره د کار پر مهال بايد ډاډ واخلو چې د ځانگړي متغير شرط نه ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځينو استنتاجونو د پلي کولو ترتيب بدلول را بدلول غواړي. په عام ډول گټه کوي چې لومړۍ د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانگړي متغير شرط ورباندې لگېږي (په بشپړ تابلو کښې به دوی پاس راځي).

راځئ وگورو چې د ترلې فارمول $\exists x \neg!A(x) \rightarrow \neg \forall x !A(x)$ دپاره تابلو څنگه ورکوو. د معمول په شان د فرض له ثبوتولو پيل کوو:

$$.1 \quad \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \quad \text{Assumption}$$

ځکه اصلي عملگر $\rightarrow$ دے، نو $\mathbb{F} \rightarrow$ پلي کوو:

$$.1 \quad \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \quad \checkmark \quad \text{Assumption}$$

$$.2 \quad \mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1$$

$$.3 \quad \mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1$$

راتلونکې د کار کرښه 2 ده. $\exists \mathbb{T}$ کاروو. دا يو نوے ثابت سمبول غواړي؛ ځکه لا هېڅ ثابت سمبولونه نه دي راځلي، هريو ټاکلې شو، مثلاً a .

$$.1 \quad \mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \quad \checkmark \quad \text{Assumption}$$

$$.2 \quad \mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \quad \checkmark \quad \rightarrow \mathbb{F} 1$$

$$.3 \quad \mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \quad \rightarrow \mathbb{F} 1$$

$$.4 \quad \mathbb{T} \neg \varphi(a) \quad \exists \mathbb{T} 2$$

اوس پر 3 کرښه $\neg \mathbb{F}$ پلي کوو:

.1	$\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.3	$\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{T} \neg \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	$\neg \mathbb{F} 3$

پر 4 کرښه د $\neg \mathbb{T}$ او ورپسې پر 5 کرښه د $\forall \mathbb{T}$ په پلي کولو ترلے تابلو اخلو.

.1	$\mathbb{F} \exists x \neg \varphi(x) \rightarrow \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x \neg \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.3	$\mathbb{F} \neg \forall x \varphi(x) \checkmark$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{T} \neg \varphi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	$\neg \mathbb{F} 3$
.6	$\mathbb{F} \varphi(a)$	$\neg \mathbb{T} 4$
.7	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\forall \mathbb{T} 5$
	$\otimes$	

بېلگه 5.11. رائج وکورو چې د لاندې سټ دپاره تابلو څنګه ورکوو:

$$\mathbb{F} \exists x !C(x, b), \mathbb{T} \exists x (!A(x) \wedge !B(x)), \mathbb{T} \forall x (!B(x) \rightarrow !C(x, b)).$$

د معمول په شان له فرضونو پیل کوو:

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x))$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption

تل باید لومړۍ هغه قاعده پلي کړو چې د ځانګړي متغیر شرط لري؛ په دې حالت کېنې هغه پر 2 کرښه $\exists \mathbb{T}$ ده. ځکه فرضونه ثابت سمبول b لري، باید بل یو وکاروو؛ بیا a اخلو.

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$

که اوس پر 1 کرښه $\exists \mathbb{F}$ یا پر 3 کرښه $\forall \mathbb{T}$ پلي کړو، باید وټاکو چې د x پر ځای کومه اصطلاح t کېښودو. ځکه دا قاعدې د ځانګړي متغیر شرط نه لري، هره خوښه اصطلاح ټاکلې شو. په ځینو حالتونو کېنې ښايي قاعده څو ځله له بېلابېلو st سره پلي کول هم لازم شي. خو د عمومي قاعدې په توګه ګټه کوي چې له هغو اصطلاحګانو څخه یوه واخلو چې له مخکېنې په تابلو کېنې راغلې وي — دلته a او b — او په دې حالت کېنې اټکل کولې شو چې له a سره د ترې ځانګې لاس ته راتلل ډېر ممکن دي.

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a)$	$\exists \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
.6	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall \mathbb{T} 3$

پر 1 او 3 کرښو نښه لرونکي فارمولونه ته د سم نښان نه ورکړو؛ ځکه ښايي بيا ئې وکاروو. اوس پر 4 کرښه $\wedge \mathbb{T}$ پلي کړئ:

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
.6	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b)$	$\forall \mathbb{T} 3$
.7	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
.8	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$

که اوس پر 6 کرښه $\rightarrow \mathbb{T}$ پلي کړو، تابلو ترل کېږي:

.1	$\mathbb{F} \exists x \chi(x, b)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \exists x (\varphi(x) \wedge \psi(x)) \checkmark$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \forall x (\psi(x) \rightarrow \chi(x, b))$	Assumption
.4	$\mathbb{T} \varphi(a) \wedge \psi(a) \checkmark$	$\exists \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{F} \chi(a, b)$	$\exists \mathbb{F} 1$
.6	$\mathbb{T} \psi(a) \rightarrow \chi(a, b) \checkmark$	$\forall \mathbb{T} 3$
.7	$\mathbb{T} \varphi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
.8	$\mathbb{T} \psi(a)$	$\wedge \mathbb{T} 4$
.9	$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \psi(a) \quad \mathbb{T} \chi(a, b) \\ \otimes \quad \quad \otimes \end{array}$	$\rightarrow \mathbb{T} 6$

بېلگه 5.12. د لاندې سټ دپاره تابلو جوړوو:

$$\mathbb{T} \forall x !A(x), \mathbb{T} \forall x !A(x) \rightarrow \exists y !B(y), \mathbb{T} \neg \exists y !B(y).$$

د معمول په شان فرضونه لیکو:

.1	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \neg \exists y \psi(y)$	Assumption

لومړۍ پر 3 کرښه د $\neg T$ قاعده پلي کوو. د «تل لومړۍ د ځانگړي متغیر شرط لرونکې قاعدې پلي کړئ» قاعدې یوه پایله دا ده: «بې د ځانگړي متغیر شرطه د سورونو قاعدې تر اړتیا پورې وځنډوئ.» همدارنګه هغه قاعدې هم وځنډوئ چې وېش رامنځته کوي.

.1	$T \forall x \varphi(x)$	Assumption
.2	$T \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y)$	Assumption
.3	$T \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.4	$F \exists y \psi(y)$	$\neg T 3$

نوی 4 کرښه $\exists F$ غواړي، چې د ځانگړي متغیر له شرط پرته د سور قاعده ده. نو دا ځنډوو او پر 2 کرښه $\rightarrow T$ کاروو.

.1	$T \forall x \varphi(x)$	Assumption
.2	$T \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.3	$T \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.4	$F \exists y \psi(y)$	$\neg T 3$
$\swarrow \quad \searrow$		
.5	$F \forall x \varphi(x) \quad T \exists y \psi(y)$	$\rightarrow T 2$

دواړه نوي ښه لرونکي فارمولونه د ځانگړي متغیر د شرط لرونکې قاعدې غواړي، نو راتلونکې کام باید همدا وي:

.1	$T \forall x \varphi(x)$	Assumption
.2	$T \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.3	$T \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.4	$F \exists y \psi(y)$	$\neg T 3$
$\swarrow \quad \searrow$		
.5	$F \forall x \varphi(x) \checkmark \quad T \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow T 2$
.6	$F \varphi(b) \quad T \psi(c)$	$\forall F 5; \exists T 5$

د ځانگو د تړلو دپاره باید پر 1 او 4 کرښو ښه لرونکي فارمولونه وکاروو. د هغو اړوندې قاعدې ($\exists F$ او $\forall T$) د ځانگړي متغیر شرط نه لري، نو هرې مناسبې اصطلاحگانې ټاکلې شو. په دې حالت کېنې په خپل وار همدا b او c دي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-003) سرچینه دلته د دروغ-وجودي ښه لرونکي فارمول د کرښې شمېر درې ښيي، خو دریمه کرښه د نفی مقدمه ده؛ اړونده دروغ-وجودي قاعده او وروستی ونه دواړه څلورمه کرښه کاروي، نو اشاره سمه شوه.

.1	$T \forall x \varphi(x)$	Assumption
.2	$T \forall x \varphi(x) \rightarrow \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.3	$T \neg \exists y \psi(y) \checkmark$	Assumption
.4	$F \exists y \psi(y)$	$\neg T 3$
$\swarrow \quad \searrow$		
.5	$F \forall x \varphi(x) \checkmark \quad T \exists y \psi(y) \checkmark$	$\rightarrow T 2$
.6	$F \varphi(b) \quad T \psi(c)$	$\forall F 5; \exists T 5$
.7	$T \varphi(b) \quad F \psi(c)$	$\forall T 1; \exists F 4$
$\otimes \quad \otimes$		

تمرین 5.13. د لاندې دپاره ترلي تابلوگانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F} (\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall z (!A(z) \wedge !B(z))$
2. $\mathbb{F} (\exists x !A(x) \vee \exists y !B(y)) \rightarrow \exists z (!A(z) \vee !B(z))$
3. $\mathbb{T} \forall x (!A(x) \rightarrow !B), \mathbb{F} \exists y !A(y) \rightarrow !B$
4. $\mathbb{T} \forall x \neg !A(x), \mathbb{F} \neg \exists x !A(x)$
5. $\mathbb{F} \neg \exists x !A(x) \rightarrow \forall x \neg !A(x)$
6. $\mathbb{F} \neg \exists x \forall y ((!A(x, y) \rightarrow \neg !A(y, y)) \wedge (\neg !A(y, y) \rightarrow !A(x, y)))$

تمرین 5.14. د لاندې دپاره ترلي تابلوگانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F} \neg \forall x !A(x) \rightarrow \exists x \neg !A(x)$
2. $\mathbb{T} (\forall x !A(x) \rightarrow !B), \mathbb{F} \exists y (!A(y) \rightarrow !B)$
3. $\mathbb{F} \exists x (!A(x) \rightarrow \forall y !A(y))$

5.7 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

ادارتي يادونه - دا برخه د تابلوگانو د اثبات پذيرۍ اړيکې او سازگاري تعريفونه راټولوي.

لکه څنګه چې مو يو شمېر مهم معنایي مفاهيم (اعتبار، استلزام او د صدق وړتيا) تعريف کړل، اوس ورته ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو. دا مفاهيم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له مخې نه، بلکې د ځينو ترلي تابلوگانې د موجوديت له مخې تعريفېږي. دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتيا قضيې دي.

تعريف 5.15 (قضیې). يوه ترلې فارمول A هله قضیه ده چې د $\mathbb{F} !A$ دپاره ترلې تابلو موجود وي. که A قضیه وي، $\vdash A$ لیکو، او که نه وي $\nvdash A$ لیکو.

تعريف 5.16 (د اشتقاق وړتيا). ترلې فارمول A د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash A$ ، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې متناهي سټ $\{B_1, \dots, B_n\} \subseteq \Gamma$ او د لاندې سټ دپاره ترلې تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F} !A, \mathbb{T} !B_1, \dots, \mathbb{T} !B_n\}.$$

که A له Γ څخه د اشتقاق وړ نه وي، $\Gamma \nvdash A$ لیکو.

تعريف 5.17 (سازگاري). د ترلي فارمولونه يو سټ Γ هله او يوازې هله ناسازگار دے چې داسې متناهي سټ $\{!B_1, \dots, !B_n\} \subseteq \Gamma$ او د لاندې سټ دپاره ترلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}.$$

که Γ ناسازگار نه وي، سازگار ئې بولو.

قضيه 5.18 (انعكاسيت). که $A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash A$.

ثبوت. که $A \in \Gamma$ وي، نو $\{!A\}$ د Γ يو متناهي فرعي سټ دے، او لاندې تابلو ترلے دے:

- | | | |
|----|----------------------|------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi$ | Assumption |
| | $\otimes$ | |

□

قضيه 5.19 (يكنواختي). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Delta \vdash A$.

□

ثبوت. د Γ هر متناهي فرعي سټ د Δ هم متناهي فرعي سټ دے.

قضيه 5.20 (انتقاليت). که $\Gamma \vdash A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash B$.

ثبوت. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash B$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Delta_0 = \{!C_1, \dots, !C_n\} \subseteq \Delta$ شته چې

$$\{\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \dots, \mathbb{T}!C_n\}$$

ترلے تابلو لري. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو داسې $D_1, \dots, D_m \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!D_1, \dots, \mathbb{T}!D_m\}$$

ترلے تابلو لري. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-004) سرچينه په منځنۍ جمله کښې د ډي-لړ يوازې وروستۍ جمله د گاما فرعي سټ بولي، دلته د لړ ټولې جملې د گاما غړي ښودل شوې، لکه د انتقاليت تعريف چې غواړي- اوس د لاندې فرضونو تابلو ونيسئ:

$$\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!C_1, \dots, \mathbb{T}!C_n, \mathbb{T}!D_1, \dots, \mathbb{T}!D_m.$$

پر A د Cut قاعده پلي کړئ. دا دوه څانگې جوړوي: يوه پکې $\mathbb{T}!A$ ، او بله پکې $\mathbb{F}!A$ لري. نو په يوه څانگه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \dots, \mathbb{T}!C_n\}$$

ځکه د دغو فرضونو دپاره ترلے تابلو شته، هغه له دې څانگې سره نښلولے شو؛ هره هغه څانگه ترل کښې چې له $\mathbb{T}!A$ څخه تېرېږي. په بله څانگه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!D_1, \dots, \mathbb{T}!D_m\}$$

□

نو بل لورے هم بشپړولے او ترلے تابلو اخستلے شو. دا $\Gamma \cup \Delta \vdash B$ ښيي.

پام وکړئ د دې يوه ځانگړې پايله دا ده: که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$ له دې څخه دا هم لازمېږي چې که $!A_1, \dots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضيه 5.21. Γ هله او يوازې هله ناسازگار دے چې د هرې ترلے فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 5.22. 5.21 ثابت کړئ.

قضيه 5.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$ وي.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازگار وي، نو Γ سازگار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \dots, !B_n\}$ او د لاندې دپاره ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

همدا تابلو، $\Gamma_0 \vdash !A$ هم ښيي.

2. که Γ ناسازگار وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \dots, !B_n\}$ دپاره د لاندې يو ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

دا ترلے تابلو ښيي چې Γ_0 ناسازگار دے.

□

5.8 د اشتقاق وړتيا او سازگاري

اوس د د اشتقاق وړتيا اړيکې يو شمېر خاصيتونه ثابتوو. دوی په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر يو به د بشپړتيا قضیې په ثبوت کې ونډه ولري.

قضيه 5.24. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. داسې متناهي $\Gamma_0 = \{!B_1, \dots, !B_n\}$ او $\Gamma_1 = \{!C_1, \dots, !C_m\} \subseteq \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \dots, \mathbb{T}!B_n\}$$

$$\{\mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \dots, \mathbb{T}!C_m\}$$

ترلي تابلوگانې لري. پر $!A$ د Cut قاعدې په کارولو دا په يوه ترلي تابلو کېږي يو ځای کول شو چې د $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ ناسازگاري ښيي. ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$ ؛ له دې امله Γ ناسازگار دے. د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-005) سرچينه د دويم متناهي سټ په تعريف کېږي لږ په اېن شاخص پای ته رسوي، خو په تابلو کېږي ئې وروسته غږے د اېم شاخص لري؛ دلته د لږ وروسته شاخص يو شان شوے دے.

□

قضيه 5.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار وي.

ثبوت. لومړۍ فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ ، يعنې د لاندې دپاره ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F} !A, \mathbb{T} !B_1, \dots, \mathbb{T} !B_n\}$$

د $\neg \mathbb{T}$ قاعدې په کارولو دا د لاندې دپاره په ترلي تابلو اړولے شو:

$$\{\mathbb{T} \neg !A, \mathbb{T} !B_1, \dots, \mathbb{T} !B_n\}.$$

بل لوري ته، که د وروستي سټ دپاره ترلے تابلو وي، د لومړي سټ په ترلي تابلو ئې اړولے شو: هغه هر فارمول رڼگوو چې پر لومړي فرض $\mathbb{T} \neg !A$ د $\neg \mathbb{T}$ له کارونې راوتلے وي، خپله دغه فرض هم رڼگوو، او فرض $\mathbb{F} !A$ ورزياتوو. ځکه که کومه ځانگه مخکېنې د $\neg \mathbb{T}$ د هغې پايلې له امله ترلې وه چې پر $\mathbb{T} \neg !A$ پلې شوې، يعنې $\mathbb{F} !A$ ، نو په نوي تابلو کېنې اړونده ځانگه هم ترلې ده. که په زور تابلو کېنې کومه ځانگه د فرض $\mathbb{T} \neg !A$ او $\mathbb{F} \neg !A$ دواړو له امله ترلې وه، پر $\mathbb{F} \neg !A$ د $\neg \mathbb{F}$ په پلي کولو او د $\mathbb{T} !A$ په اخستلو ئې په ترلې ځانگه اړولے شو. دا ځانگه ځکه ترلې کېږي چې $\mathbb{F} !A$ مو د فرض په توگه ورزيات کړے دے.

□

تمرين 5.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي.

قضيه 5.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$. بيا داسې $B_1, \dots, B_n \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F} !A, \mathbb{T} !B_1, \dots, \mathbb{T} !B_n\}$$

ترلے تابلو لري. فرض $\mathbb{F} !A$ په $\mathbb{T} \neg !A$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته هغه $\mathbb{F} !A$ پايله ورننباسئ چې پر $\mathbb{T} \neg !A$ د $\neg \mathbb{T}$ له کارونې راځي. په زور تابلو کېنې هره ترلے فارمول چې د 1 کېنې په حواله توجيه شوې وه، اوس د $n + 1$ کېنې په حواله توجيه کېږي. نو که زور تابلو ترلے و، نوے تابلو هم ترلے دے. دا د Γ ناسازگاري ښيي؛ ځکه ټول فرضونه په Γ کېنې دي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-006) سرچينه د «داسې چې» وروسته يو بې دليله تېک شاتګې ږدي؛ دلته لرې شوے دے. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-007) سرچينه وايي د رښتوني نفي قاعده پر دروغې جملې پلې کېږي؛ قاعده په حقيقت کېنې پر رښتوني نفي شوې جملې پلې کېږي او دروغ مثبت فارمول راوباسي، لکه د همدې ثبوت په راتلونکې جمله کېنې.

□

قضيه 5.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. که داسې $B_1, \dots, B_n \in \Gamma$ او $C_1, \dots, C_m \in \Gamma$ وي چې

$$\{\mathbb{T} !A, \mathbb{T} !B_1, \dots, \mathbb{T} !B_n\}$$

$$\{\mathbb{T} \neg !A, \mathbb{T} !C_1, \dots, \mathbb{T} !C_m\}$$

دواړه ترلي تابلوکانې ولري، يو داسې کچه تابلو جوړولې شو چې د Γ ناسازگاري ښيي. د فرضونو په توگه $\mathbb{T}!B_n, \dots, \mathbb{T}!B_1$ له $\mathbb{T}!C_1, \dots, \mathbb{T}!C_m$ سره يو ځای کاروو، او بيا د Cut قاعده پلي کوو. دا دوه څانگې ورکوي: يوه په $\mathbb{T}!A$ او بله په $\mathbb{F}!A$ پيلېږي.

په کيڼ لوري کښې د لومړي تابلو د فرضونو لاندې برخه ورزياته کړئ. دلته د قاعدې هره کارونه لا هم سمه ده؛ ځکه د لومړي تابلو هر فرض، د $\mathbb{T}!A$ په شمول، موجود دے. نو د $\mathbb{T}!A$ لاندې هره څانگه ترل کېږي.

په ښي لوري کښې د دويم تابلو د فرض لاندې برخه ورزياته کړئ، خو د $\mathbb{T}!A$ پر فرض د $\neg\mathbb{T}$ د هرې کارونې پايلې ترې لرې کړئ. پر $\mathbb{T}!A$ د $\neg\mathbb{T}$ پايله $\mathbb{F}!A$ ده، چې بيا هم موجوده ده؛ ځکه د کچه تابلو په ښي لوري کښې د Cut قاعدې پايله ده.

که په دويم تابلو کښې کومه څانگه د فرض $\mathbb{T}!A$ (چې په کچه تابلو کښې نور فرض نه دے) او $\mathbb{F}!A$ دواړو له امله ترلې وه، پر $\mathbb{F}!A$ د $\neg\mathbb{F}$ په پلي کولو $\mathbb{T}!A$ اخستلې شو. اوس په کچه تابلو کښې اړونده څانگه هم ترل کېږي؛ ځکه د Cut قاعدې ښي پايله، $\mathbb{F}!A$ ، پکې ده. که په دويم تابلو کښې يوه څانگه د بل کوم لامل له امله ترلې وه، په کچه تابلو کښې اړونده څانگه هم ترلې ده؛ ځکه په زور، دويم تابلو کښې پر څانگه له $\mathbb{T}!A$ پرته هر بل نښه لرونکي فارمولونه د کچه تابلو پر اړوندې څانگې هم راځي. $\square$

5.9 د اشتقاق وړتيا او قضیوي رابطونه

ثابتو چې د تابلوکانو د اشتقاق وړتيا اړیکه $\vdash$ دومره پياوړې ده چې د قضیوي رابطونو په اړه ځينې بنسټيز حقیقتونه ثابت کړي؛ لکه $A \wedge B \vdash A$ او $A \rightarrow B \vdash B \vdash A$ (مودوس پوننس). دا حقیقتونه د بشپرتيا قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 5.29. 1. دواړه $A \wedge B \vdash A$ او $A \wedge B \vdash B$.

2. $\neg A, B \vdash A \wedge B$.

ثبوت. 1. د $\{A, \mathbb{T}!A \wedge B\}$ او $\{B, \mathbb{T}!A \wedge B\}$ دواړو دپاره ترلي تابلوکانې شته:

1.	$\mathbb{F} \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \wedge \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
4.	$\mathbb{T} \psi$	$\wedge\mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

2. د $\{A, \mathbb{T}!A, \mathbb{T}!B, \mathbb{F}!A \wedge B\}$ دپاره لاندې ترلې تابلو دے:

.1	$\mathbb{F} \varphi \wedge \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{F} \varphi \quad \mathbb{F} \psi \end{array}$		
.4	$\otimes \quad \otimes$	$\wedge \mathbb{F} 1$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-008) سرچينه په لومړيو څلورو تابلوگانو کېنې د اتو نښه لرونکو فارمولونو د نښې او فارمول تر منځ جلا کونکې قوس غورځوي؛ دلته د تعريف شوې دوه-ارگومېنټه د $\backslash \text{SFmla}$ دوه-ارگومېنټه بڼه بېرته راوړل شوې ده. $\square$

قضيه 5.30. 1. $\{!A \vee !B, \neg !A, \neg !B\}$ ناسازگار دے.

2. دواړه $!A \vdash !A \vee !B$ او $!B \vdash !A \vee !B$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{T} !A \vee !B, \mathbb{T} \neg !A, \mathbb{T} \neg !B\}$ تر لے تابلو ورکړو:

.1	$\mathbb{T} \varphi \vee \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
.3	$\mathbb{T} \neg \psi$	Assumption
.4	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
.5	$\mathbb{F} \psi$	$\neg \mathbb{T} 3$
$\begin{array}{c} \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{T} \varphi \quad \mathbb{T} \psi \end{array}$		
.6	$\otimes \quad \otimes$	$\vee \mathbb{T} 1$

2. د $\{\mathbb{F} !A \vee !B, \mathbb{T} !B\}$ او $\{\mathbb{F} !A \vee !B, \mathbb{T} !A\}$ دواړو دپاره ترې تابلوگانې شته:

.1	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
.3	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

.1	$\mathbb{F} \varphi \vee \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
.3	$\mathbb{F} \varphi$	$\vee \mathbb{F} 1$
.4	$\mathbb{F} \psi$	$\vee \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

$\square$

قضيه 5.31. 1. $\neg!A, !A \rightarrow !B \vdash !B$

2. دواړه $\neg!B \vdash !A \rightarrow !B$ او $\neg!A \vdash !A \rightarrow !B$

ثبوت. 1. د $\{!B, !A \rightarrow !B, !A\}$ يو ترله تابلو شته:

1.	$\mathbb{F} \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	Assumption
4.	$\begin{array}{cc} & \swarrow \searrow \\ \mathbb{F} \varphi & \mathbb{T} \psi \\ \otimes & \otimes \end{array}$	$\rightarrow \mathbb{T} 2$

2. د $\{!A \rightarrow !B, !B\}$ او $\{!A \rightarrow !B, !\neg A\}$ دواړو دپاره ترلي تابلوگانې شته:

1.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \neg \varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
5.	$\mathbb{F} \varphi$	$\neg \mathbb{T} 2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F} \varphi \rightarrow \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T} \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T} \varphi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
4.	$\mathbb{F} \psi$	$\rightarrow \mathbb{F} 1$
	$\otimes$	

□

5.10 د اشتقاق وړتيا او سورونه

د بشپرتيا قضيه دا هم غواړي چې د تابلو قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقيقتونه ورکړي چې په دې برخه کې ثابتېږي.

قضيه 5.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ يا $A(x)$ کې نه راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x !A(x)$.


ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A(c)$ ، يعنې داسې $!B_1, \dots, !B_n \in \Gamma$ او د لاندې دپاره ترله تابلو شته:

$$\{\mathbb{F} !A(c), \mathbb{T} !B_1, \dots, \mathbb{T} !B_n\}.$$

بايد وښيو چې د لاندې دپاره هم ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F} \forall x !A(x), \mathbb{T} !B_1, \dots, \mathbb{T} !B_n\}.$$

ترلے تابلو واخلي، لومړے فرض ئې په $\mathbb{F} \forall x !A(x)$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته $\mathbb{F} !A(c)$ ورننباښئ.



تابلو لا هم ترلے دے؛ ځکه ټولې هغه ترلي فارمولونه چې مخکښې د فرضونو په توګه موجودې وې، اوس هم د تابلو په سر کښې موجودې دي. نوښتل شوې کرښه د $\forall \mathbb{F}$ قاعدې د سې کارونې پایله ده؛ ځکه ثابت سمبول c په $!B_1, \dots, !B_n$ يا $\forall x !A(x)$ کښې نه راځي، يعنې په نوي تابلو کښې د نوښتل شوې کرښې پاس نه راځي. $\square$

قضيه 5.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x !A(x)$.

2. $\forall x !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. د $\mathbb{F} \exists x !A(x), \mathbb{T} !A(t)$ دپاره ترلے تابلو دا دے:

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \exists x \varphi(x)$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \varphi(t)$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{F} \varphi(t)$ | $\exists \mathbb{F} 1$ |
| | $\otimes$ | |

2. د $\mathbb{F} \varphi(t), \mathbb{T} \forall x !A(x)$ دپاره ترلے تابلو دا دے:

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------------------|
| 1. | $\mathbb{F} \varphi(t)$ | Assumption |
| 2. | $\mathbb{T} \forall x \varphi(x)$ | Assumption |
| 3. | $\mathbb{T} \varphi(t)$ | $\forall \mathbb{T} 2$ |
| | $\otimes$ | |

$\square$

5.11 سموله

د تابلوگانو په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څيزونه اشتقاق نه کړي چې په حقيقت کېنې نه وي. نو سموله د اشتقاق نظامونو د تضمين شوې خونديتوب يو ډول خاصيت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکي خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ A ! معتبر دے؛

2. که ترې فارمول له ځينو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛

3. که د ترې فارمولونه يو سټ ناسازگار وي، د صدق وړ نه دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي. که له دغو څخه کوم يو سم نه وي، اشتقاق نظام نېکمره دے—له حده زيات څيزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموله ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري.

ځکه دغه ټول ثبوت-تيوريکي خاصيتونه د يو يا بل ډول د ترې تابلوگانې له لارې تعريف شوي دي، د پورته (۱)–(۳) ثابتول غواړي چې د ترې تابلوگانې د معنایي خاصيتونو په اړه يو څه ثابت کړو. لومړۍ به تعريف کړو چې د يو نښه لرونکې فارمول پوره کېدل په يو جوړښت کېنې څه معنی لري؛ بيا به وښيو چې که يو تابلو ترې وي، هېڅ جوړښت ئې ټول فرضونه نه پوره کوي. وروسته (۱)–(۳) د دې پایلې د لازمو نتيجو په توګه راځي.

تعريف 5.34. جوړښت $\mathcal{M}$ يو نښه لرونکې فارمول $T!A$ هله او يوازې هله پوره کوي چې $\mathcal{M} \models A$ ، او $F!A$ هله او يوازې هله پوره کوي چې $\mathcal{M} \not\models A$. د نښه لرونکي فارمولونه يو سټ Γ هله او يوازې هله پوره کوي چې هر $S!A \in \Gamma$ پوره کړي. Γ هله د صدق وړ دے چې کوم جوړښت ئې پوره کړي، او که داسې نه وي د صدق وړ نه دے.

قضيه 5.35 (سموله). که Γ يو ترې تابلو ولري، نو Γ د صدق وړ نه دے.

ثبوت. د يو تابلو څانګه هله او يوازې هله د صدق وړ بولو چې پر هغې د نښه لرونکي فارمولونه سټ د صدق وړ وي؛ او تابلو هله د صدق وړ بولو چې لږ تر لږه يوه د صدق وړ څانګه ولري.

دا خبره ښيو: د استنتاج د کومې قاعدې په وسيله د يو د صدق وړ تابلو پراخول تل يو د صدق وړ تابلو ورکوي. دا به قضيه ثابته کړي: هر ترې تابلو د Γ يوازې له فرضونو څخه جوړ تابلو ته د استنتاج د قاعدو په پلي کولو تر لاسه کېږي. نو که Γ د صدق وړ وای، د هغې هر تابلو به د صدق وړ و. خو ترې تابلو په څرګند ډول د صدق وړ نه دے: هر څانګه دواړه $T!A$ او $F!A$ لري، او هېڅ جوړښت نه شي کولې چې A ! هم پوره او هم نه پوره کړي.

فرض کړئ يو د صدق وړ تابلو لرو، يعنې داسې تابلو چې لږ تر لږه يوه د صدق وړ څانګه لري. د استنتاج قاعده يا يوې څانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزياتوي يا يوه څانګه په دوو وېشي. که په تابلو کېنې کومه د صدق وړ څانګه وي چې اړوند قاعدوي تطبيق ئې نه پراخوي، هغه په پراخ شوي تابلو کېنې هم د صدق وړ پاتې کېږي؛ نو پراخ شوي تابلو د صدق وړ دے. ځکه يوازې هغه حالت څېړل پکار دي چې قاعده پر يوې د صدق وړ څانګې پلي کېږي.

Γ پر هغې څانګې د نښه لرونکي فارمولونه سټ وېشل، او $S!A \in \Gamma$ هغه نښه لرونکې فارمول وېشل چې قاعده پرې پلي کېږي. که قاعده څانګه نه وېشي، بايد وښيو چې پراخه شوې څانګه، يعنې Γ له قاعدوي پایلو سره، لا هم د صدق وړ ده. که قاعده څانګه وېشي، بايد وښيو چې له دوو تر لاسه شوو څانګو لږ تر لږه يوه د صدق وړ ده. لومړۍ هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څانګه نه وېشي.

1. څانگه پر $\Gamma \vdash \neg!B \in \Gamma$ د $\neg!B$ په پلي کولو پراخېږي. بيا پراخه شوې څانگه د $\Gamma \cup \{\mathbb{F}!B\}$ نښه لرونکي فارمولونه لري. فرض کړئ $\mathbb{M} \models \Gamma$. په ځانگړي ډول $\mathbb{M} \models \neg!B$ نو $\mathbb{M} \models \mathbb{F}!B$ ، يعنې پوره کوي.

2. څانگه پر $\Gamma \vdash \mathbb{F}!B \in \Gamma$ د $\mathbb{F}!B$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين.

3. څانگه پر $\Gamma \vdash \mathbb{T}!B \wedge \mathbb{T}!C \in \Gamma$ د $\mathbb{T}!B \wedge \mathbb{T}!C$ په پلي کولو پراخېږي؛ له دې څخه پر څانگه دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{T}!C$. فرض کړئ $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانگړي ډول $\mathbb{M} \models \mathbb{T}!B \wedge \mathbb{T}!C$. بيا $\mathbb{M} \models \mathbb{T}!B$ او $\mathbb{M} \models \mathbb{T}!C$ پوره کوي. يعنې $\mathbb{M}$ دواړه $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{T}!C$ پوره کوي.

4. څانگه پر $\Gamma \vdash \mathbb{F}!B \vee \mathbb{F}!C \in \Gamma$ د $\mathbb{F}!B \vee \mathbb{F}!C$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين.

5. څانگه پر $\Gamma \vdash \mathbb{F}!B \rightarrow \mathbb{F}!C \in \Gamma$ د $\mathbb{F}!B \rightarrow \mathbb{F}!C$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر څانگه دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{F}!C$. فرض کړئ $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانگړي ډول $\mathbb{M} \models \mathbb{F}!B \rightarrow \mathbb{F}!C$. بيا $\mathbb{M} \models \mathbb{T}!B$ او $\mathbb{M} \models \mathbb{F}!C$ پوره کوي. يعنې $\mathbb{M}$ دواړه $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{F}!C$ پوره کوي.

د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-009) سرچينې په دواړو کلي-کميت ټاکونکو قاعدوي حالتونو کېنې د قاعدې په مقدمه کېنې د بي مېتا-فارمول ليکله و، خو پايله او ټول ورپسې معنایي استدلال د اې مېتا-فارمول کاروي. دلته اې په هر حالت کېنې يو شان ساتل کېږي.

6. څانگه پر $\Gamma \vdash \mathbb{T} \forall x!A(x) \in \Gamma$ د $\mathbb{T} \forall x!A(x)$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر څانگه يو نوې نښه لرونکې فارمول $\mathbb{T}!A(t)$ ترلاسه کېږي. فرض کړئ $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانگړي ډول $\mathbb{M} \models \mathbb{T} \forall x!A(x)$. د کميت ټاکونکو او تړلو ترمونو قضيه [OLP] له مخې $\mathbb{M} \models \mathbb{T}!A(t)$ نو $\mathbb{M}$ ، پوره کوي.

7. څانگه پر $\Gamma \vdash \mathbb{F} \forall x!A(x) \in \Gamma$ د $\mathbb{F} \forall x!A(x)$ په پلي کولو پراخېږي. له دې څخه پر څانگه يو نوې نښه لرونکې فارمول $\mathbb{F}!A(a)$ ترلاسه کېږي، چې a داسې ثابت سمبول دے چې په Γ کېنې نه راځي. ځکه Γ د صدق وړ دے، داسې $\mathbb{M}$ شته چې $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانگړي ډول $\mathbb{M} \models \mathbb{F} \forall x!A(x)$. بايد وښيو چې $\Gamma \cup \{\mathbb{F}!A(a)\}$ د صدق وړ دے. د دې دپاره مناسب $\mathbb{M}'$ داسې تعريفوو.

د کميت ټاکونکو د صدق قضيه [OLP] له مخې $\mathbb{M} \models \mathbb{F} \forall x!A(x)$ هله او يوازې هله چې د کوم s دپاره $\mathbb{M}, s \models A(x)$ نه شي. اوس $\mathbb{M}'$ د $\mathbb{M}$ په شان وټولئ، خو $a^{\mathbb{M}'} = s(x)$ د جملو د امتدادي والي نتيجه [OLP] له مخې، د هر $\mathbb{T}!C \in \Gamma$ دپاره $\mathbb{M}' \models C$ ، او د هر $\mathbb{F}!C \in \Gamma$ دپاره $\mathbb{M}' \models C$ ؛ ځکه a په Γ کېنې نه راځي.

د امتدادي والي قضيه [OLP] له مخې

$\mathbb{M}', s \models A(x)$ د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] له مخې $\mathbb{M}', s \models A(a)$ ځکه $A(a)$ يوه تړلې فارمول ده، د جملې د صدق او متغير-کومارنې قضيه [OLP] له مخې $\mathbb{M}' \models A(a)$ ؛ يعنې $\mathbb{M}'$ ، پوره کوي.

8. څانگه پر $\Gamma \vdash \mathbb{T} \exists x!B(x) \in \Gamma$ د $\mathbb{T} \exists x!B(x)$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين.

9. څانگه پر $\Gamma \vdash \mathbb{F} \exists x!B(x) \in \Gamma$ د $\mathbb{F} \exists x!B(x)$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين.

اوس هغه ممکن استنتاجونه خپرو چې څانگه وېشي.

1. څانگه پر $\Gamma \vdash \mathbb{F}!B \wedge \mathbb{F}!C \in \Gamma$ د $\mathbb{F}!B \wedge \mathbb{F}!C$ په پلي کولو پراخېږي؛ له دې څخه دوه ځانگړي ترلاسه کېږي: کينه څانگه د $\mathbb{F}!B$ له لارې او بڼې څانگه د $\mathbb{F}!C$ له لارې دوام کوي. فرض کړئ $\mathbb{M} \models \Gamma$ ، او په ځانگړي ډول $\mathbb{M} \models \mathbb{F}!B \wedge \mathbb{F}!C$. بيا يا $\mathbb{M} \models \mathbb{F}!B$ يا $\mathbb{M} \models \mathbb{F}!C$ په لومړي حالت کېنې $\mathbb{M}$ ، پوره کوي؛ يعنې $\mathbb{M}$ د کينې څانگې فارمولونه پوره کوي. په دويم حالت کېنې $\mathbb{M}$ ، پوره کوي؛ يعنې $\mathbb{M}$ د بڼې څانگې فارمولونه پوره کوي.

2. څانگه پر $\forall T \mid BV!C \in \Gamma$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين -

3. څانگه پر $\rightarrow T \mid B \rightarrow!C \in \Gamma$ په پلي کولو پراخېږي: تمرين -

4. څانگه د Cut په وسيله پراخېږي. له دې څخه دوه څانگې ترلاسه کېږي: يوه $T!B$ او بله $F!B$ لري. ځکه $M \models \Gamma$ او يا $M \models B$ يا $M \not\models B$ ، M يا کينه يا بنی څانگه پوره کوي.

□

تمرين 5.36. د 5.35 ثبوت بشپړ کړئ.

نتيجه 5.37. که $\vdash A$ وي، نو A معتبر دے.

نتيجه 5.38. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Gamma \models A$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو د ځينو $B_1, \dots, B_n \in \Gamma$ دپاره $\{F!A, T!B_1, \dots, T!B_n\}$ يو ترلے تابلو لري. د 5.35 له مخې، هر جوړښت M يا کوم B_i ناسموي يا A رښتيا کوي. نو که $M \models \Gamma$ وي، بيا $M \models A$ هم دے. □

نتيجه 5.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازگار دے.

ثبوت. مقابل عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازگار نه دے. بيا $B_1, \dots, B_n \in \Gamma$ شته او د $\{T!B_1, \dots, T!B_n\}$ دپاره يو ترلے تابلو شته. د 5.35 له مخې، داسې M نشته چې د ټولو $i = 1, \dots, n$ دپاره $M \models B_i$ وي. خو بيا Γ د صدق وړ نه دے. □

5.12 له عينيت سره تابلوگاني

له عينيت سره تابلوگاني د استنتاج اضافي قاعدې غواړي. د $=$ قاعدې دا دي $(t, t_1$ او t_2 ترلي ترمونه دي):

$$\begin{array}{ccc} \frac{\mathbb{T} t_1 = t_2}{=F \frac{F!A(t_1)}{F!A(t_2)}} & =T \frac{\mathbb{T} t_1 = t_2}{\mathbb{T} \frac{F!A(t_1)}{F!A(t_2)}} & = \frac{}{\mathbb{T} t = t} \end{array}$$

پام وکړئ چې له نورو ټولو قاعدو سره په توپير کښې، $=T$ او $=F$ غواړي چې دوه نښه لرونکي فارمولونه له وړاندې پر څانگه وي؛ يعنې دواړه $\mathbb{T} t_1 = t_2$ او $S!A(t_1)$.

بېلگه 5.40. که s او t ترلي ترمونه وي، نو $s = t, !A(s) \vdash !A(t)$:

- | | | |
|----|----------------|------------|
| 1. | $F \varphi(t)$ | Assumption |
| 2. | $T s = t$ | Assumption |
| 3. | $T \varphi(s)$ | Assumption |
| 4. | $T \varphi(t)$ | $=T 2, 3$ |
| | ⊗ | |

کېدے شي دا د يو شان څيزونو د تعويض د اصل يا د لايښځ د قانون په نوم درته اشنا وي.
 تابلوکاني ثابتوي چې = متناظره ده، يعني $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

- | | | |
|----|------------------------|------------|
| .1 | $\mathbb{F} s_2 = s_1$ | Assumption |
| .2 | $\mathbb{T} s_1 = s_2$ | Assumption |
| .3 | $\mathbb{T} s_1 = s_1$ | = |
| .4 | $\mathbb{T} s_2 = s_1$ | =T 2, 3 |
- ⊗

دلته کرښه 2 د $\mathbb{T} =$ لومړنۍ اړين فارمول $s_1 = s_2$ دے. کرښه 3 دويم اړين فارمول دے، چې د $\mathbb{T}!A(s_1)$ بڼه لري. $A(x)$ د $x = s_1$ په توگه وگڼئ؛ بيا $A(s_1)$ ، $s_1 = s_1$ او $A(s_2)$ ، $s_2 = s_1$ کېږي. د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-010): سرچينې کرښه درې د اې د دويم ترم بڼه بللې وه، خو د قاعدې په دې تطبيق کېښې هغه د اې د لومړي ترم بڼه ده، لکه ورپسې تشرېح چې هم ښيي.

تابلوکان دا هم ثابتوي چې = انتقالي ده، يعني $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

- | | | |
|----|------------------------|------------|
| .1 | $\mathbb{F} s_1 = s_3$ | Assumption |
| .2 | $\mathbb{T} s_1 = s_2$ | Assumption |
| .3 | $\mathbb{T} s_2 = s_3$ | Assumption |
| .4 | $\mathbb{T} s_1 = s_3$ | =T 3, 2 |
- ⊗

په دې تابلو کېښې د $\mathbb{T} =$ لومړنۍ اړين فارمول کرښه 3، $s_2 = s_3$ ده (s_2 د t_1 او s_3 د t_2 ونډه لري). دويم اړين فارمول چې د $\mathbb{T}!A(s_2)$ بڼه لري، کرښه 2 ده. دلته $A(x)$ د $s_1 = x$ په توگه وگڼئ؛ په دې سره $A(s_2)$ ، $s_1 = s_2$ (يعني کرښه 2) او $A(s_3)$ په پايله کېښې فارمول $s_1 = s_3$ کېږي. د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-011): سرچينې د اې د دويم ترم د بڼې د پراخولو پر ځای د قاعدې عمومي برابري ليکلې وه؛ خو د همدلته ټاکل شوي اې له مخې اړوند فارمول د لومړي او دويم ترم برابري ده.

تمرین 5.41. د لاندې دپاره ترلي تابلوکاني ورکړئ:

$$1. \mathbb{F} \forall x \forall y ((x = y \wedge !A(x)) \rightarrow !A(y))$$

$$2. \mathbb{F} \exists x (!A(x) \wedge \forall y (!A(y) \rightarrow y = x))$$

$$\mathbb{T} \exists x !A(x) \wedge \forall y \forall z ((!A(y) \wedge !A(z)) \rightarrow y = z)$$

5.13 له عينيت سره سمواله

قضيه 5.42. د عينيت له قاعدو سره تابلوکاني سم دي: هېڅ ترلې تابلو د صدق وړ نه دے.

ثبوت. يوازې بايد د پخوا په شان وښيو چې که يو تابلو د صدق وړ څانګه ولري، نو د $=$ له قاعدو څخه د يوې په پلي کولو ترلاسه شوې څانګه هم د صدق وړ ده. Γ پر څانګه د نښه لرونکو فارمولونه سټ وېوئ، او $\mathcal{M}$ داسې جوړښت وېوئ چې Γ پوره کوي.

فرض کړئ څانګه د $=$ په کارولو، يعنې د نښه لرونکي فارمول $\mathbb{T} t = t$ په زياتولو پراخېږي. په څرګند ډول $\mathcal{M} \models t = t$ ؛ نو $\mathcal{M}$ ، $\Gamma \cup \{\mathbb{T} t = t\}$ هم پوره کوي.

که څانګه د $\mathbb{T} =$ په کارولو پراخېږي، موږ يو نښه لرونکي فارمول $\mathbb{T}!A(t_2)$ ورزياتوو، خو Γ دواړه $\mathbb{T} t_1 = t_2$ او $\mathbb{T}!A(t_1)$ لري. د ژباړې د نسخې سمون: (OLTAB-012) سرچينې د رښتوني-عينيت قاعدې پايلې ته عمومي S نښه ورکړې وه؛ د قاعدې، دواړو مقدمو او لاندې معنایي ثبوت له مخې دا رښتوني نښه ده. نو $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ او $\mathcal{M} \models !A(t_1)$ لرو. داسې متغیر-ټاکنه s واخلي چې $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1)$ د جملې د صدق او متغیر-ګومارنې قضيه [OLP] له مخې $\mathcal{M}, s \models !A(t_1)$. ځکه $s \sim_x s$ ، د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] له مخې $\mathcal{M}, s \models !A(x)$. ځکه $\mathcal{M} \models t_1 = t_2$ ، نو $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ ، او ځکه $s(x) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t_2)$ د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] په بيا پلي کولو $\mathcal{M}, s \models !A(t_2)$ هم لرو. د جملې د صدق او متغیر-ګومارنې قضيه [OLP] له مخې $\mathcal{M} \models !A(t_2)$ د $\mathbb{F} =$ حالت هم په همدې ډول حل کېږي. $\square$

باب 6

بدیهي اشتقاقونه

ادارتي يادونه- لا تر اوسه دا هڅه نه ده شوې چې ډاډ ترلاسه شي چې د دې څپرکي مواد د هغو بېلابېلو ټاکنو درناوې کوي چې بڼې کوم نښلونکي او کمیت ټاکنو کې بنسټيز يا تعريف شوي دي: له $\leftrightarrow$ پرته، چې تعريف شوي ځنګل کېږي، ټول بنسټيز ځنګل شوي دي- که د لومړۍ درجې منطق ټاک رښتوښت وي، له کمیت ټاکنو سره بڼه جوړوو، که نه وي، بې له هغو بڼه جوړوو-

6.1 قاعدې او اشتقاقونه

بدیهي اشتقاقونه بڼايي د منطق د اشتقاق تر ټولو ساده نظام وي- اشتقاق یوازې د فارمولونه یوه لړۍ ده- د اشتقاق ځنګل کېدو دپاره، په لړۍ کېنې هر فارمول باید یا د کوم بدیهي اصل یوه بېلګه وي، یا د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له یوه یا زیاتو هغو فارمولونه څخه راشي چې په لړۍ کېنې ترې وړاندې دي- اشتقاق خپل وروسته فارمول، اشتقاق کوي-

تعريف 6.1 (د اشتقاق وړتیا). که Γ د $\mathcal{L}$ د فارمولونه یو سټ وي، نو له Γ څخه یو اشتقاق د فارمولونه یوه متناهي لړۍ $A_1, \dots, A_n$! ده، چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه یو شرط پوره کېږي:

1. $A_i \in \Gamma$ ؛ یا

2. A_i یو بدیهي اصل ده؛ یا

3. A_i د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له کوم A_j ! (او A_k !) څخه راځي، چې $j < i$ (او $k < i$) -

دا چې سم اشتقاق څه ځنګل کېږي، په دې پورې اړه لري چې موږ کومې استنتاجي قاعدې منو (او البته کوم څیزونه بدیهي اصول ګڼو)- استنتاجي قاعده یوه که-نو وینا ده چې راته وايي د ځینو شرطونو لاندې په اشتقاق کېنې یو ګام A_i ! سم استنتاجي ګام ده- د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-001) سرچینې په دې یو ځای کېنې د ای-آی د میتا-فارمول نښه پرېښې وه؛ تعريف او د همدې پاراګراف نورې ټولې کارونې هغه د فارمول په توګه لیکي، نو نښه دلته بېرته راوستل شوه-

تعريف 6.2 (د استنتاج قاعده). د استنتاج قاعده یو بس شرط ورکوي چې له Γ څخه په اشتقاق کېنې څه شی سم استنتاجي ګام ځنګل کېږي-

د بېلګې په توګه، ځکه چې هره یو-غریزه لری A چې $A \in \Gamma$ وي، په څرګند ډول اشتقاق کتل کېږي، لاندې ډېره ساده استنتاجي قاعده کېدے شي:

که $A \in \Gamma$ وي، نو A له Γ څخه په هر اشتقاق کېنې تل سم استنتاجي کام دے۔

همدارنګه که A له بدیهي اصولو څخه یو وي، نو یوازې A هم اشتقاق دے؛ ځکه دا هم یوه استنتاجي قاعده ده:

که A بدیهي اصل وي، نو A سم استنتاجي کام دے۔

خبره هغه وخت لا په زړه پورې شي چې استنتاجي قاعده هغو فارمولونه ته رجوع کوي چې تر څېړل شوي کام وړاندې راغلي وي۔ لاندې قاعده مودوس پوننس بلل کېږي:

که $A \rightarrow B$ او B په اشتقاق کېنې وړاندې راغلي وي، نو A سم استنتاجي کام دے۔

که همدا یوازینی استنتاجي قاعده وي، نو د اشتقاق پورته تعریف مو داسې کېږي: $A_1, \dots, A_n$ هله او یوازې هله اشتقاق دے چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه یو شرط پوره کېږي:

1. $A_i \in \Gamma$ ؛ یا

2. A_i یو بدیهي اصل دے؛ یا

3. د کوم $j < i$ دپاره A_j ، $A \rightarrow B$ وي، او د کوم $k < i$ دپاره A_k ، B وي۔

وروسته بند وایي چې A_i له A_j ، $A \rightarrow B$ او A_k (B) څخه د مودوس پوننس په وسیله راځي۔ که له 1 څخه تر n پورې تېرېدے شو، او هر ځل داسې فارمول A_i ومومو چې یا په Γ کېنې وي، یا بدیهي اصل وي، یا استنتاجي قاعده راته وایي چې سم استنتاجي کام دے، نو ټوله لری سم اشتقاق کتل کېږي۔

تعریف 6.3 (د اشتقاق وړتیا). یو فارمول A هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash A$ لیکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په A پای ته رسېږي۔

تعریف 6.4 (قضیې). فارمول A هله قضیه ده چې له تش سب څخه د A یو اشتقاق وي۔ که A قضیه وي $\vdash A$ ، او که نه وي $\nvdash A$ لیکو۔

6.2 د قضیې نښلوونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 6.5 (بدیهي اصول). د قضیې نښلوونکو د بدیهي اصولو سټ Ax_0 د لاندې ټولو بنو فارمولونه لري:

$$(!A \wedge !B) \rightarrow !A \quad (6.1)$$

$$(!A \wedge !B) \rightarrow !B \quad (6.2)$$

$$!A \rightarrow (!B \rightarrow (!A \wedge !B)) \quad (6.3)$$

$$!A \rightarrow (!A \vee !B) \quad (6.4)$$

$$!A \rightarrow (!B \vee !A) \quad (6.5)$$

$$(!A \rightarrow !C) \rightarrow ((!B \rightarrow !C) \rightarrow ((!A \vee !B) \rightarrow !C)) \quad (6.6)$$

$$!A \rightarrow (!B \rightarrow !A) \quad (6.7)$$

$$(!A \rightarrow (!B \rightarrow !C)) \rightarrow ((!A \rightarrow !B) \rightarrow (!A \rightarrow !C)) \quad (6.8)$$

$$(!A \rightarrow !B) \rightarrow ((!A \rightarrow \neg !B) \rightarrow \neg !A) \quad (6.9)$$

$$\neg !A \rightarrow (!A \rightarrow !B) \quad (6.10)$$

$$\top \quad (6.11)$$

$$\perp \rightarrow !A \quad (6.12)$$

$$(!A \rightarrow \perp) \rightarrow \neg !A \quad (6.13)$$

$$\neg \neg !A \rightarrow !A \quad (6.14)$$

تعریف 6.6 (مودوس پوننس). که B او $B \rightarrow !A$ له وړاندې په اشتقاق کېنې راغلي وي، نو A سم استنتاجي گام دے.

د مودوس پوننس قاعده به په “MP” لنډوو.

6.3 د کمیت ټاکونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 6.7 (د کمیت ټاکونکو بدیهي اصول). پر کمیت ټاکونکو واکمن بدیهي اصول د لاندې ټولو بنو بېلگې دي:

$$\forall x !B \rightarrow !B(t), \quad (6.15)$$

$$!B(t) \rightarrow \exists x !B. \quad (6.16)$$

د هر تړلي ترم t دپاره.

تعریف 6.8 (د کمیت ټاکونکو قاعدې).

که $B \rightarrow !A(a)$ له وړاندې په اشتقاق کېنې راغلي وي او a په Γ یا B کېنې نه راځي، نو $B \rightarrow \forall x !A(x)$ سم استنتاجي گام دے.

که $A(a) \rightarrow !B$ له وړاندې په اشتقاق کېنې راغلي وي او a په Γ یا B کېنې نه راځي، نو $\exists x !A(x) \rightarrow !B$ سم استنتاجي گام دے.

له دغو دواړو هره یوه به په “QR” لنډوو.

6.4 د اشتقاقونه بېلگې

بېلگه 6.9. فرض کړئ غواړو $(\neg!D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ ثابت کړو. دا په څرگند ډول زموږ د هېڅ بديهي اصل بېلگه نه ده، نو د هغې د اشتقاق کولو دپاره د MP قاعده کارول پکار دي. زموږ يوازېنۍ قاعده مودوس پوننس ده، چې $A!$ او $A \rightarrow !B$ راکړل شي، د $B!$ توجیه راکوي. يوه تگلاره دا ده چې 6.6 داسې وکاروو چې $A!$ ، $\neg!D$ ؛ $B!$ ، $E!$ ؛ او $C!$ ، $D \rightarrow !E$ وي؛ يعنې دا بېلگه:

$$(\neg!D \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow ((!E \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow ((\neg!D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E))).$$

ولې؟ د مودوس پوننس دوه تطبيقونه وروستۍ برخه راکوي، او همدا مو غوښتي ده. په اسانۍ وينو چې $\neg!D \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ د 6.10، او $E \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ د 6.7 بېلگه ده. نو زموږ اشتقاق دا دے:

1. $\neg!D \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ 6.10
2. $(\neg!D \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow$
 $((!E \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow ((\neg!D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E)))$ 6.6
3. $(!E \rightarrow (!D \rightarrow !E)) \rightarrow ((\neg!D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E))$, 1, 2 MP
4. $!E \rightarrow (!D \rightarrow !E)$ 6.7
5. $(\neg!D \vee !E) \rightarrow (!D \rightarrow !E)$, 3, 4 MP

بېلگه 6.10. رائج د $D \rightarrow !D$ يو اشتقاق ولټوو. دا د بديهي اصل بېلگه نه ده، نو په MP ئې اشتقاق کول پکار دي. 6.7 د $A \rightarrow !B$ په بڼه يو بديهي اصل دے چې MP پرې پلي کېدے شي. د کټي دپاره، البته، هغه $B!$ چې MP ئې په دې حالت کېنې د سم کام په توگه توجیه کوي بايد $D \rightarrow !D$ وي؛ ځکه همدا مو غوښتل چې اشتقاق ئې کړو. په دې سره $A!$ هم بايد $D!$ وي؛ يعنې د 6.7 دې بېلگې ته کتلے شو:

$$!D \rightarrow (!D \rightarrow !D)$$

د MP د پلي کولو دپاره به د دويمې اړوندې مقدمې، يعنې $A!$ ، توجیه هم پکار وي. خو زموږ په حالت کېنې هغه $D!$ دے، او $D!$ په يوازې ځان اشتقاق کولے نه شو. نو بله تگلاره پکار ده. بل بديهي اصل چې يوازې $\rightarrow$ لري 6.8 دے، يعنې

$$(!A \rightarrow (!B \rightarrow !C)) \rightarrow ((!A \rightarrow !B) \rightarrow (!A \rightarrow !C))$$

د MP په دوه ځله پلي کولو وروستۍ دننې شرطې ته رسېدے شو. بيا دا معنی لري چې د 6.8 داسې بېلگه غواړو چې $A \rightarrow !C$ پکې $D \rightarrow !D$ ، يعنې زموږ موخه فارمول وي. نو $A!$ او $C!$ دواړه $D!$ دي. $B!$ څنگه وټاکو چې دواړه $(!B \rightarrow !C)$ او $A \rightarrow !B$ ، يعنې زموږ په حالت کېنې $(!B \rightarrow !D)$ او $D \rightarrow !B$ ، هم د اشتقاق وړ وي؟ له دغو لومړنۍ، هر $B!$ چې وټاکو، لا د 6.7 بېلگه ده. او که $B!$ ، $(D \rightarrow !D)$ وي، نو $D \rightarrow !B$ به هم د 6.7 بله بېلگه وي. نو زموږ اشتقاق دا دے:

1. $!D \rightarrow ((!D \rightarrow !D) \rightarrow !D)$ 6.7
2. $(!D \rightarrow ((!D \rightarrow !D) \rightarrow !D)) \rightarrow$
 $((!D \rightarrow (!D \rightarrow !D)) \rightarrow (!D \rightarrow !D))$ 6.8
3. $(!D \rightarrow (!D \rightarrow !D)) \rightarrow (!D \rightarrow !D)$, 1, 2 MP
4. $!D \rightarrow (!D \rightarrow !D)$ 6.7
5. $!D \rightarrow !D$, 3, 4 MP

بېلگه 6.11. کله کله غواړو وښيو چې له ځينو نورو فارمولونه Γ څخه د کوم فارمول يو اشتقاق شته. مثلاً رائجي وښيو چې له $\Gamma = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$ څخه $A \rightarrow C$ ، اشتقاق کول شو.

1. $A \rightarrow B$ Hyp
2. $B \rightarrow C$ Hyp
3. $(B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))$ 6.7
4. $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ 2, 3 MP
5. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$ 6.8
6. $((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$ 4, 5 MP
7. $A \rightarrow C$ 1, 6 MP

هغه کرښې چې “Hyp” (د “فرضيې” دپاره) پرې ليکل شوي دي، ښيي چې په هغې کرښه فارمول د Γ يو غړی دے.

قضيه 6.12. که $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ او $\Gamma \vdash B \rightarrow C$ وي، نو $\Gamma \vdash A \rightarrow C$

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ او $\Gamma \vdash B \rightarrow C$. بيا له Γ څخه د $A \rightarrow B$ يو اشتقاق شته؛ او له Γ څخه د $B \rightarrow C$ يو اشتقاق هم شته. د هغو په يو بل پسې لښلولو ئې په يو اشتقاق کېږي يو ځای کړئ. اوس د مخکېنې بېلگې د اشتقاق 3-7 کرښې ورزياتي کړئ. دا له Γ څخه د $A \rightarrow C$ يو اشتقاق دے—او همدا د نوي اشتقاق وروستۍ کرښه ده. پام وکړئ چې د 4مې او 7مې کرښې توجیه لا هم سمه پاتې کېږي که د 1مې کرښې حواله د $A \rightarrow B$ د اشتقاق د وروستۍ کرښې په حواله، او د 2مې کرښې حواله د $B \rightarrow C$ د اشتقاق د وروستۍ کرښې په حواله بدله شي. □

تمرین 6.13. له بديهي اصولو څخه د اشتقاقونه په وړاندې کولو وښيي چې لاندې خبرې سمې دي:

$$1. (A \wedge B) \rightarrow (B \wedge A)$$

$$2. ((A \wedge B) \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))$$

$$3. \neg(A \vee B) \rightarrow \neg A$$

6.5 له کيت ټاکونکو سره اشتقاقونه

بېلگه 6.14. رائجي د $(\forall x A(x) \wedge \forall y B(y)) \rightarrow \forall x (A(x) \wedge B(x))$ يو اشتقاق ورکړو. لومړی پام وکړئ چې

$$(\forall x A(x) \wedge \forall y B(y)) \rightarrow \forall x A(x)$$

د 6.1 يوه بېلگه ده، او

$$\forall x A(x) \rightarrow A(a)$$

د 6.15 بېلگه ده. نو د 6.12 له مخې پوهېږو چې

$$(\forall x A(x) \wedge \forall y B(y)) \rightarrow A(a)$$

د اشتقاق وړ دے۔ همدارنگه، ځکه

$$(\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall y !B(y) \quad \text{او}$$

$$\forall y !B(y) \rightarrow !B(a)$$

په ترتيب د 6.2 او 6.15 بېلگې دي،

$$(\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow !B(a)$$

د 6.12 په وسيله د ثبوت وړ دے۔ د 6.3 د يوې مناسبې بېلگې او د MP د دوو تطبيقونو په کارولو وینو چې

$$(\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow (!A(a) \wedge !B(a))$$

د ثبوت وړ دے۔ اوس QR پلي کولے شو او دا ترلاسه کوو:

$$(\forall x !A(x) \wedge \forall y !B(y)) \rightarrow \forall x (!A(x) \wedge !B(x)).$$

6.6 ثبوت-تيوريکي مفاهيم

لکه څنگه چې مو يو شمېر مهم معنایي مفاهيم (اعتبار، معنایي لازميت او د صدق وړتيا) تعريف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تيوريکي مفاهيم تعريفوو۔ دا د جوړښتونه په دننه کښې د ترلي فارمولونه پوره کېدو ته په رجوع نۀ، بلکې د ځينو فارمولونو د اشتقاق وړتيا يا د اشتقاق نۀ وړتيا ته په رجوع تعريفېږي۔ دا يوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهيم يو شان راځي۔ د هغويو شان راتلل د سموالي او بشپړوالي د قضيو منځپانگه ده۔

تعريف 6.15 (د اشتقاق وړتيا). فارمول A هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash A$ لیکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په A پای ته رسېږي۔

تعريف 6.16 (قضيه). فارمول A هله قضيه ده چې له تش سب څخه د A يو اشتقاق وي۔ که A قضيه وي $\vdash A$ ، او که نۀ وي $\nvdash A$ لیکو۔

تعريف 6.17 (سازگاري). د فارمولونه يو سب Γ هله او يوازې هله سازگار دے چې $\Gamma \not\vdash \perp$ ؛ که داسې نۀ وي ناسازگار دے۔

قضيه 6.18 (انعکاس). که $A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash A$ ۔

□

ثبوت. يوازې فارمول A له Γ څخه د A يو اشتقاق دے۔

قضيه 6.19 (زياتېدنه). که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Delta \vdash A$ ۔

□

ثبوت. له Γ څخه د A هر اشتقاق له Δ څخه هم د A يو اشتقاق دے۔

قضيه 6.20 (انتقال). که $\Gamma \vdash A$ او $\Gamma \cup \Delta \vdash B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash B$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \cup \Delta \vdash B$. بيا له $\{A\} \cup \Delta$ څخه يو اشتقاق $B_1 = A, \dots, B_l = B$ شته. په دې اشتقاق کېنې ځينې کامونه به د هغې قاعدې له مخې سم وي چې کومې مخکېنې کېنې $B_i = A$ ته رجوع کوي. د فرض له مخې له Γ څخه د A يو اشتقاق شته؛ يعنې داسې اشتقاق $A_1, \dots, A_k = A$ چې هر A_i يا بديهي اصل وي، يا د Γ يو غړی وي، يا د استنتاج د قاعدې له مخې سم وي. اوس دا لړۍ په پام کېنې ونیسئ:

$$A_1, \dots, A_k = A, B_1, \dots, B_l = B.$$

دا له $\Gamma \cup \Delta$ څخه د B سم اشتقاق دے، ځکه هر $B_i = A$ اوس د هماغې قاعدې له مخې توجیه کېږي چې $A_k = A$ توجیه کوي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-002) سرچينې په وروستۍ جمله کېنې يوازې له بي-آی څخه د ميتا-فارمول نښه پرېښي وه؛ هماغه کرښه پورته او په نښلول شوې لړۍ کېنې په نښه لرلې بڼه تعريف شوې ده. □

پام وکړئ چې په ځانگړي ډول دا معنی لري: که $\Gamma \vdash A$ او $A \vdash B$ وي، نو $\Gamma \vdash B$. له دې څخه دا هم رايي چې که $A_1, \dots, A_n \vdash B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash B$.

قضيه 6.21. هله Γ او يوازې هله ناسازگار دے چې د هر A دپاره $\Gamma \vdash A$ وي.

□

ثبوت. تمرين.

تمرين 6.22. 6.21 ثابت کړئ.

قضيه 6.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash A$.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازگار وي، نو Γ سازگار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو د فارمولونه داسې متناهي لړۍ $A_1, \dots, A_n$ شته چې $A_n \equiv A$ ؛ او هر A_i يا منطقي بديهي اصل وي، يا د Γ يو غړی وي، يا د مودوس پونس له مخې له مخکېنو فارمولونه څخه رايي. Γ_0 د هغو A_i سټ ونیسئ چې په Γ کېنې دي. بيا همدا اشتقاق له Γ_0 څخه هم يو اشتقاق دے، نو $\Gamma_0 \vdash A$.

2. دا د ځانگړي حالت $A \equiv \perp$ دپاره د (1) مقابل عکس دے.

□

6.7 د استنتاج قضيه

لکه چې مو وليدل، په بديهي نظام کېنې اشتقاقونه ورکول ستونزمن دي، او اشتقاقونه موندل هم گرانېږي. د فارمولونه اوږدې لړۍ په رښتيا لیکلو پر ځای، زياتره دا استدلال اسانه وي چې داسې اشتقاقونه شته؛ د دې دپاره څو ساده پايلې کاروو. درې داسې پايلې مو لا ثابتي کړې دي: 6.18 وايي که چې $A \in \Gamma$ پوهېږو، تل $\Gamma \vdash A$ ویلے شو. 6.19 وايي که $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Gamma \cup \{B\} \vdash A$ هم دے. او 6.20 بڼي که $\Gamma \vdash A$ او $A \vdash B$ وي، نو $\Gamma \vdash B$. دا د مودوس پونس يوه بله ساده، “ميتا” بڼه ده:

قضيه 6.24. که $\Gamma \vdash A$ او $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ وي، نو $\Gamma \vdash B$.

ثبوت. موږ $\{A, A \rightarrow B\} \vdash B$ لرو:

1. A فرض
2. $A \rightarrow B$ فرض
3. B پوننس مودوس 1, 2

□

د 6.20 له مخې $\Gamma \vdash B$.

په دې برخه کې تر ټولو مهمه پايله چې کارووې د استنتاج قضيه ده:

قضيه 6.25 (د استنتاج قضيه). $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vdash A \rightarrow B$.

ثبوت. د “که” لوري سمديستي دے. که $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ وي، د 6.19 له مخې $\Gamma \cup \{A\} \vdash A \rightarrow B$ هم دے. همدارنگه د 6.18 له مخې $\Gamma \cup \{A\} \vdash A$ نو د 6.24 له مخې $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$.

د “يوازې” لوري دپاره له $\Gamma \cup \{A\}$ څخه د B د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره دوه د اوږدوالي 1 د هر اشتقاق دپاره ثابتوو. له $\Gamma \cup \{A\}$ څخه د B د اوږدوالي 1 اشتقاق يوازې له B څخه جوړ وي؛ او که سم وي، يا $B \in \Gamma \cup \{A\}$ وي يا B بديهي اصل وي. د ژباړې د نسخې سمون (OLAX-003) سرچينې په دې غږيتوب کې له اې-مټا فارمول څخه مخکېني يوازې د غږيتوب لښه ليکلې وه؛ د جملې فاعل دلته د بشپړ فارمول په دننه کې راوستل شو. که $B \in \Gamma$ وي يا بديهي اصل وي، نو $\Gamma \vdash B$ همدارنگه د 6.7 له مخې $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$ ، او 6.24 موږ ته $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ راکوي. که $B \in \{A\}$ وي، نو $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ ؛ ځکه وروستۍ ترلې فارمول $A \rightarrow B$ د $A \rightarrow A$ هماغه جمله ده، او په 6.10 کې مو هغه اشتقاق کړې ده.

د استقرا په پړاو کې فرض کړئ له $\Gamma \cup \{A\}$ څخه د B يو اشتقاق په داسې ګام B پای ته رسېږي چې په مودوس پوننس توجیه شوی دے. (که په مودوس پوننس توجیه شوی نه وي، نو $B \in \Gamma$ ، يا $B \equiv A$ ، يا B بديهي اصل دے، او د استقرا د بنسټ هماغه استدلال پرې پلي کېږي.) بيا د کوم فارمول C دپاره په اشتقاق کې ځينې مخکېني ګامونه $C \rightarrow B$ او C دي؛ يعنې $\Gamma \cup \{A\} \vdash C \rightarrow B$ او $\Gamma \cup \{A\} \vdash C$ ، او اړوند اشتقاقونه لاند دي، نو د استقرا فرضيه پرې پلي کېږي. ځکه دواړه دا لرو:

$$\Gamma \vdash A \rightarrow (C \rightarrow B);$$

$$\Gamma \vdash A \rightarrow C.$$

خو د 6.8 له مخې دا هم لرو:

$$\Gamma \vdash (A \rightarrow (C \rightarrow B)) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B)),$$

□

او د 6.24 دوه تطبيقونه، لکه چې پکار ده، $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ راکوي.

پام وکړئ چې 6.7 او 6.8 په عين دې موخه ټاکل شوي وو چې د استنتاج قضيه سمه وي. لاندې د د اشتقاق وړتيا په اړه ځينې ګټور حقيقتونه دي چې د تمرینونو په توګه ئې پرېږدو.

قضيه 6.26. 1. $\vdash (!A \rightarrow !B) \rightarrow ((!B \rightarrow !C) \rightarrow (!A \rightarrow !C))$ ؛ د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-004) سرچينې د لومړۍ دعوې د بهرني وروستي قوس د ټولو نښه پرېښي وه؛ دلته د پرايښتو قوسونو سره سمه يوه تړونکې نښه پرته راوستل شوې ده.

2. که $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \neg !B$ وي، نو $\Gamma \cup \{!B\} \vdash !A$ (مقابل عکس)؛

3. $\{!A, \neg !A\} \vdash !B$ (له کاذبۍ هر څه، انفجار)؛

4. $\{\neg \neg !A\} \vdash !A$ (دوه ګوښې نفي حذف)؛

5. که $\Gamma \vdash \neg \neg !A$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$ ؛

تمرین 6.27. 6.26 ثابت کړئ.

6.8 له کټ ټاکونکو سره د استنتاج قضيه

قضيه 6.28 (د استنتاج قضيه). که $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$.

ثبوت. يو ځل بيا له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ ثبوت د 6.25 په ثبوت کېنې له بنسټ سره يو شان دے.

د استقرا په پړاو کېنې بيا فرض کړئ له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ اشتقاق په داسې ګام $!B$ پای ته رسېږي چې په استنتاجي قاعده توجیه شوی دے. که استنتاجي قاعده مودوس پونښ وي، د 6.25 د ثبوت په شان مخکېنې ځو. که قاعده QR وي، پوهېږو چې $B \equiv C \rightarrow \forall x !D(x)$ او د $C \rightarrow !D(a)$ ښې فارمول په اشتقاق کېنې له مخکېنې راغلي دے، چې a په C ، A يا Γ کېنې نه راځي. نو دا لرو:

$$\Gamma \cup \{!A\} \vdash !C \rightarrow !D(a),$$

او د استقرا فرضیه پلي کېږي؛ یعنې دا لرو:

$$\Gamma \vdash !A \rightarrow (!C \rightarrow !D(a)).$$

له دې څخه

$$\vdash (!A \rightarrow (!C \rightarrow !D(a))) \rightarrow ((!A \wedge !C) \rightarrow !D(a))$$

او مودوس پونښ سره ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (!A \wedge !C) \rightarrow !D(a).$$

ځکه د ځانګړي متغیر شرط لا هم پلي کېږي، دې اشتقاق ته په QR توجیه شوی ګام ورزیاتولې شو، او ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (!A \wedge !C) \rightarrow \forall x !D(x).$$

دا هم لرو:

$$\vdash ((!A \wedge !C) \rightarrow \forall x !D(x)) \rightarrow (!A \rightarrow (!C \rightarrow \forall x !D(x))),$$

نو د مودوس پوننس له مخې،

$$\Gamma \vdash !A \rightarrow (!C \rightarrow \forall x !D(x)),$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-005) سرچينې د پورته ماقبل وروستۍ بديهي بېلگه کښې د بهرني شرطي يو تړونکې قوس پرېښه و؛ هغه قوس دلته د بشپړې شېما دپاره پرته راوستل شو. يعنې $\Gamma \vdash !A \rightarrow !B$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-006) سرچينې وروستۍ پايله يوازې د بي د ثبوت په توگه ليکلې وه؛ خو د قضيې موخه او سمدستي مخکښې کرښه د اې-که-بي ثبوت ورکوي، نو هماغه بشپړه پايله راوستل شوې ده.

هغه حالت د تمرين په توگه پرېږدو چې $B!$ د QR قاعدې په وسيله توجیه کېږي، خو د $\exists x !D(x) \rightarrow !C$ بڼه لري. □

تمرين 6.29. د 6.28 ثبوت بشپړ کړئ.

6.9 د اشتقاق وړتيا او سازگاري

اوس به د د اشتقاق وړتيا اړيکې يو شمېر خاصيتونه ثابت کړو. دا په خپلواکه توگه په زړه پورې دي، خو هر يو به د بشپړوالي د قضيې په ثبوت کېښې ونډه ولري.

قضيه 6.30. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. که $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي، نو $\Gamma \cup \{!A\} \vdash \perp$ د 6.18 له مخې د هر $B \in \Gamma$ دپاره $\Gamma \vdash !B$ د فرض له مخې $\Gamma \vdash !A$ هم دے، نو د هر $B \in \Gamma \cup \{!A\}$ دپاره $\Gamma \vdash !B$ د 6.20 له مخې $\Gamma \vdash \perp$ يعنې Γ ناسازگار دے. □

قضيه 6.31. $\Gamma \vdash !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار وي.

ثبوت. لومړۍ فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ د 6.19 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash !A$ د 6.18 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \neg !A$ د 6.10 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash !A \rightarrow (\neg !A \rightarrow \perp)$ هم لرو. نو د 6.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \perp$ لرو.

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازگار دے؛ يعنې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \perp$ د استنتاج د قضيې له مخې $\Gamma \vdash \neg !A \rightarrow \perp$ د 6.13 له مخې $\Gamma \vdash (\neg !A \rightarrow \perp) \rightarrow \neg \neg !A$ ، نو د 6.24 له مخې $\Gamma \vdash \neg \neg !A \rightarrow !A$ ځکه $\Gamma \vdash \neg \neg !A \rightarrow !A$ (6.14)، د 6.24 په بيا پلي کولو $\Gamma \vdash !A$ لرو. □

تمرين 6.32. ثابته کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازگار وي.

قضيه 6.33. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ ناسازگار دے.

ثبوت. د 6.10 له مخې $\Gamma \vdash \neg!A \rightarrow (!A \rightarrow \perp)$ د 6.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \vdash \perp$ ثبوت.

قضيه 6.34. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg!A\}$ دواړه ناسازگار وي، نو Γ ناسازگار دے.

ثبوت. تمرين.

تمرين 6.35، 6.34 ثابت کړئ.

6.10 د اشتقاق وړتيا او د قضیې نښلوونکي

ثابتو چې د بدیهي استنتاج د $\vdash$ د اشتقاق وړتيا اړیکه دومره پیاوړې ده چې د قضیې د نښلوونکو ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي؛ لکه $!A \wedge !B \vdash !A$ او $!A, !A \rightarrow !B \vdash !B$ (مودوس پوننس). دغه حقیقتونه د بشپړوالي د قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضيه 6.36. 1. دواړه $!A \wedge !B \vdash !A$ او $!A \wedge !B \vdash !B$

2. $!A, !B \vdash !A \wedge !B$

ثبوت. 1. د 6.1 او 6.2 څخه په مودوس پوننس. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-007) سرچینې د دواړو جلا عطف-ایستو دپاره لومړني بدیهي اصل ته دوه ځله حواله کړې وه؛ دویمه دعوه د دویم عطف-ایستې بدیهي اصل کاروي.

2. د 6.3 څخه د مودوس پوننس په دوه تطبیقونو.

□

قضيه 6.37. 1. $!A \vee !B, \neg!A, \neg!B$ ناسازگار دے.

2. دواړه $!A \vdash !A \vee !B$ او $!B \vdash !A \vee !B$

ثبوت. 1. له 6.10 څخه $\neg!A \rightarrow (!A \rightarrow \perp)$ او $\neg!B \rightarrow (!B \rightarrow \perp)$ ترلاسه کوو. نو د استنتاج د قضیې له مخې $\neg!A \rightarrow \perp$ او $\neg!B \rightarrow \perp$ لرو. له 6.6 څخه $(!A \vee !B) \rightarrow \perp$ او $\{\neg!A, \neg!B\} \vdash (!A \vee !B) \rightarrow \perp$ ترلاسه کوو. د استنتاج د قضیې له مخې $\{\neg!A, \neg!B\} \vdash \perp$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-008) سرچینې دلته د نفي لومړني بدیهي اصل ته حواله کړې وه؛ ښودل شوې انفجاري شېماوې د نفي دویم بدیهي اصل بېلګې دي.

2. له 6.4 او 6.5 څخه په مودوس پوننس.

□

قضيه 6.38. 1. $!A, !A \rightarrow !B \vdash !B$

2. دواړه $\neg!A \vdash !A \rightarrow !B$ او $!B \vdash !A \rightarrow !B$

ثبوت. 1. دا اشتقاق کولے شو:

- 1. $!A$ Hyp
- 2. $!A \rightarrow !B$ Hyp
- 3. $!B$,1, 2 MP

2. په ترتيب د 6.10 او 6.7، او د استنتاج د قضيې له مخې -

□

6.11 د اشتقاق وړتيا او کيت ټاکونکي

د بشپړوالي قضيې دا هم غواړي چې بديهي استنتاجونه د $\vdash$ په اړه په دې برخه کې ثابت شوي حقيقتونه ورکړي -

قضيه 6.39. که c داسې ثابت سمبول وي چې په Γ يا $!A(x)$ کې نه راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x !A(x)$.

ثبوت. د استنتاج د قضيې له مخې $\Gamma \vdash \top \rightarrow !A(c)$ ځکه c په Γ يا $\top$ کې نه راځي، ترلاسه کوو چې $\Gamma \vdash \top \rightarrow \forall x !A(x)$ ځکه رښتيا يو بديهي اصل دے، د ميتا-مودوس پونس له مخې $\Gamma \vdash \forall x !A(x)$ د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-009) سرچينې وروسته ګام د استنتاج قضيې ته يو ځل بيا منسوب کړے و؛ هغه قضيې يوازې د رښتيا فرض ورزياتوي، حال دا چې دلته رښتيا بديهي اصل او مودوس پونس فرض بېرته لرې کوي -

□

قضيه 6.40. 1. $!A(t) \vdash \exists x !A(x)$.

2. $\forall x !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. د 6.16 او د استنتاج د قضيې له مخې -

2. د 6.15 او د استنتاج د قضيې له مخې -

□

6.12 سموالے

د بديهي استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څيزونه اشتقاق نه کړي چې په حقيقت کې نه صدق کېږي - نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمين شوې خونديتوب يو ډول خاصيت دے - د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکي خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ $!A$ معتبر دے؛

2. که $!A$ له ځينو نورو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛

3. که د فارمولونه يو سټ Γ ناسازګار وي، د صدق وړ نه دے -

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي. که له دغو څخه کوم يو سم نه وي، اشتقاق نظام نېکگرې دے—له حده زيات څيزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري.

قضيه 6.41. که A يو بدیهي اصل وي، نو د هر جوړښت $\mathcal{M}$ او متغیر-کومارنې s دپاره $\mathcal{M}, s \models A$.

ثبوت. بايد تصديق کړو چې ټول بدیهي اصول معتبر دي. د بېلګې په توګه د 6.15 حالت دا دے: فرض کړئ t په A کېنې د x دپاره ازاد وي، او $\mathcal{M}, s \models \forall x!A$ ومنئ. بيا د پوره کېدو د تعريف له مخې، د هرې $s' \sim_x s$ دپاره $\mathcal{M}, s' \models A$ هم دے، او په ځانګړې ډول دا هله سم دے چې $s'(x) = \text{Val}_s^{\mathcal{M}}(t)$ وي. د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] له مخې $\mathcal{M}, s \models A[t/x]$ دا ښيي چې $\mathcal{M}, s \models (\forall x!A \rightarrow A[t/x])$.

قضيه 6.42 (سموالے). که $\Gamma \vdash A$ وي، نو $\Gamma \models A$.

ثبوت. له Γ څخه د A د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو. که داسې هېڅ کام نه وي چې په استنتاج توجیه شوه وي، نو په اشتقاق کېنې ټول فارمولونه يا د بدیهي اصولو بېلګې دي يا په Γ کېنې دي. د مخکېنې قضیې له مخې ټول بدیهي اصول معتبر دي؛ نو که A بدیهي اصل وي، $\Gamma \models A$ که $A \in \Gamma$ وي، نو په څرګنده $\Gamma \models A$.

که د A د اشتقاق وروستۍ کام په مودوس پونس توجیه شوه وي، نو په اشتقاق کېنې فارمولونه B او $A \rightarrow B$ شته، او د استقرا فرضیه د اشتقاق پر هغو برخو پلي کېږي چې په دغو فارمولونه پاي ته رسېږي (ځکه په هره برخه کېنې لږ تر لږه يو په استنتاج توجیه شوه کام کم دے). نو د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \models B$ او $\Gamma \models B \rightarrow A$ بيا د معنایي استنتاج قضیه [OLP] له مخې $\Gamma \models A$.

اوس فرض کړئ وروستۍ کام په QR توجیه شوه دے. بيا هغه کام د $C \rightarrow \forall x B(x)$ بڼه لري، او ترې مخکېنې کام $C \rightarrow B(c)$ دے، چې c په Γ ، يا C يا $\forall x B(x)$ کېنې نه راځي. د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \models C \rightarrow B(c)$ د معنایي استنتاج قضیه [OLP] له مخې $\Gamma \cup \{C\} \models B(c)$.

داسې يو جوړښت $\mathcal{M}$ په پام کېنې ونیسئ چې $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \{C\}$ وي. بايد وښیو چې $\mathcal{M} \models \forall x!B(x)$ ځکه $\forall x!B(x)$ یوه ترلے فارمول ده، د دې معنی دا ده چې د هرې متغیر-کومارنې s دپاره بايد $\mathcal{M}, s \models B(x)$ وښیو (کمیت ټاکونکو د صدق قضیه [OLP]). ځکه $\Gamma \cup \{C\}$ ټول له جملو جوړ دے، د هر $D \in \Gamma \cup \{C\}$ دپاره $\mathcal{M}, s \models D$ د صدق تعريف [OLP] له مخې دے. $\mathcal{M}'$ داسې جوړښت ونیسئ چې د $\mathcal{M}$ په شان وي، خو $c^{\mathcal{M}'} = s(x)$ وي. ځکه c په Γ يا C کېنې نه راځي، د جملو د امتدادي والي نتیجه [OLP] له مخې $\mathcal{M}' \models \Gamma \cup \{C\}$ ځکه $\Gamma \cup \{C\} \models B(c)$ ، نو $\mathcal{M}' \models B(c)$. د ژباړې د نسخې سمون (OLAX-010) سرچینې په دې پوره کېدو ادعا کېنې د بي-سي د میتا-فارمول ښه پربنې وه؛ په مخکېنې لازمیت او ورپسې ټولو استعمالونو کېنې همدا ښه موجوده ده، نو دلته بېرته راوستل شوه. ځکه $B(c)$ یوه ترلے فارمول ده، د جملې د صدق او متغیر-کومارنې قضیه [OLP] له مخې $\mathcal{M}', s \models B(c)$ د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] له مخې $\mathcal{M}', s \models B(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}', s \models B(c)$ (یاد ولرئ چې $B(c)$ هماغه $B(x)[c/x]$ دے). نو $\mathcal{M}', s \models B(x)$ ځکه c په $B(x)$ کېنې نه راځي، د امتدادي والي قضیه [OLP] له مخې $\mathcal{M}, s \models B(x)$ خو s اختیاري متغیر-کومارنه وه، نو $\mathcal{M} \models \forall x!B(x)$. له دې امله $\Gamma \cup \{C\} \models \forall x!B(x)$ د معنایي استنتاج قضیه [OLP] له مخې $\Gamma \models C \rightarrow \forall x!B(x)$.

هغه حالت د تمرین په توګه پرېږدو چې A په QR توجیه کېږي، خو د $\exists x!B(x) \rightarrow C$ بڼه لري.

تمرین 6.43. د 6.42 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 6.44. که $\Gamma \vdash A$ وي، نو A معتبر دے.

نتیجه 6.45. که Γ د صدق وړ وي، نو سازگار دے.

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازگار نه دے. بیا $\Gamma \vdash \perp$ ؛ یعنې له Γ څخه د $\perp$ یو اشتقاق شته. د 6.42 له مخې هر جوړښت $\mathcal{M}$ چې Γ پوره کوي، باید $\perp$ هم پوره کړي. ځکه د هر جوړښت $\mathcal{M}$ دپاره $\mathcal{M} \not\models \perp$ ، نو هېڅ $\mathcal{M}$ ، Γ نه شي پوره کولې؛ یعنې Γ د صدق وړ نه دے. $\square$

6.13 له عینیت سره اشتقاقونه

په اشتقاقونه کېنې د $=$ د شاملولو دپاره یوازې نوې بدیهې شېماوې ورزیاتوو. د اشتقاق او $\vdash$ تعریف هماغسې پاتې کېږي؛ یوازې نوي بدیهې اصول هم منو.

تعریف 6.46 (د عینیت بدیهې اصول).

$$t = t, \quad (6.17)$$

$$t_1 = t_2 \rightarrow (!B(t_1) \rightarrow !B(t_2)), \quad (6.18)$$

د هر تړلي ترم t ، t_1 او t_2 دپاره.

قضیه 6.47. بدیهې اصول 6.17 او 6.18 معتبر دي.

$\square$

ثبوت. تمرین.

تمرین 6.48. 6.47 ثابت کړئ.

قضیه 6.49. د هر تړلي ترم t او سټ Γ دپاره $\Gamma \vdash t = t$. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-011) سرچینې دلته «هر ترم» ویلي وو، خو د یووالي لومړۍ بدیهې اصل یوازې پر تړلو ترمونو شېما ده؛ هماغه لازم قید بېرته څرکند شو.

قضیه 6.50. که $\Gamma \vdash !A(t_1)$ او $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ وي، نو $\Gamma \vdash !A(t_2)$ ، په دې شرط چې دواړه بنودل شوي ترمونه تړلي وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-012) سرچینې په دې قضیه کېنې د تړلو ترمونو شرط نه و بیان کړی، سره له دې چې ثبوت یې نېغ په نېغه د یووالي دویم بدیهې اصل کاروي او هغه شېما یوازې تړلي ترمونه مني.

ثبوت. دا فارمول

$$(t_1 = t_2 \rightarrow (!A(t_1) \rightarrow !A(t_2)))$$

$\square$

د 6.18 یوه بېلګه ده. پایله د MP په دوه پلي کولو سره ترلاسه کېږي.

باب 7

د بشپړتيا قضيه

7.1 سريزه

د بشپړتيا قضيه د منطق په اړه له تر ټولو بنسټيزو پايلو څخه يوه ده. دا په دوو بڼو وړاندې کېږي، او موږ به د دواړو همارزښت ثابت کړو. په لومړۍ بڼه کېږي دا زموږ د معنی پوهنې د پايلې او د اشتقاق نظام ترمنځ د اړيکې په اړه يو بنسټيز حقيقت وايي: که ترلې فارمول A د ځينو ترلي فارمولونه Γ معنایي پايله وي، نو داسې اشتقاق هم شته چې $\Gamma \vdash A$ ثابتوي. په دې توګه، د اشتقاق نظام هغومره پياوړې دے څومره چې د هغو خبرو له ثابتولو پرته کېدے شي چې په رښتيا نه لازمېږي.

په دويمه بڼه کېږي دا د مدل د شتون د پايلې په توګه ويل کېدے شي: د ترلي فارمولونه هر سازګار سټ د صدق وړ دے. سازګاري يو ثبوت-تيوريکي مفهوم دے: دا وايي چې زموږ د اشتقاق نظام د يو ټاکلي ډول اشتقاقونه نه شي جوړولے. خو دا څوک تضمینوي چې يوازې ځکه چې له Γ څخه د يو ټاکلي ډول هېڅ اشتقاقونه نشته، خامخا داسې جوړښت M ؟ د بشپړتيا د قضیې تر لومړي ثبوت وړاندې—بلکې د هغو اشتقاق نظامونو تر رامنځته کېدو هم وړاندې چې اوس ئې لرو—ستر جرمن رياضي پوه ډېوېډ هيلبرټ دا نظر درلود چې د رياضي نظريو سازګاري د هغو څيزونو شتون تضمینوي چې نظريې ئې په اړه دي. هغه ګوتلوب فرېګه ته په يو ليک کېږي داسې وويل:

که په خپل سري ډول ورکړل شوي بديهي اصول له خپلو ټولو پايلو سره يو بل نه نقضوي، نو رښتوني دي او هغه څيزونه چې بديهي اصول ئې تعريفوي شتون لري. زما دپاره همدا د رښتياوالي او شتون معيار دے.

فرېګه سخت مخالفت وکړ. د بشپړتيا د قضیې دويمه بڼه ښيي چې هيلبرټ لږ تر لږه په دې معنی سم و چې که بديهي اصول سازګار وي، نو داسې کوم جوړښت شته چې ټول رښتوني کوي.

دا يوازېښي لاملونه نه دي چې د بشپړتيا قضيه—يا لا کړه، د هغې ثبوت—مهمه ده. دا يو شمېر مهمې پايلې لري چې ځينې به ئې جلا وڅېړو. د بېلګې په توګه، ځکه هر اشتقاق چې $\Gamma \vdash A$ ښيي متناهي دے، نو له Γ څخه يوازې متناهي ډېر ترلي فارمولونه کارولے شي. له دې امله د بشپړتيا له قضیې څخه لازمېږي چې که A د Γ معنایي پايله وي، نو لا له وړاندې د Γ د کوم متناهي فرعي سټ معنایي پايله ده. دې ته د متناهي شاهد خاصيت ويل کېږي. په همارز ډول، که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو په خپله Γ هم سازګار دے.

که څه هم د متناهي شاهد قضيه د بشپړتيا له قضیې څخه د اشتقاقونه د منځنۍ لارې په تېرېدو لازمېږي، د بشپړتيا د قضیې خپله ثبوت هم نېغ په نېغه د هغې د ثابتولو دپاره کارول کېدے شي. ځکه ثبوت د ترلي فارمولونه داسې سټ اخلي چې يو ټاکلے خاصيت—سازګاري—لري، او له دې سټه داسې جوړښت جوړوي چې ټاکلي خاصيتونه لري (په دې حالت کېږي،

سټ پوره کوي) - کابو همدا جوړونه د متناهي شاهد خاصيت د نېغ ثبوت دپاره کارېږي، که د سازگارو ستونو پر ځای د ترلي فارمولونه له «په متناهي ډول د صدق وړ» ستونو څخه پيل وکړو. دا جوړونه نورې پايلې هم ورکوي؛ د بېلګې په توګه، د ترلي فارمولونه هر د صدق وړ سټ يو متناهي يا شمېرېدونکې لامتناهي مدل لري. (دې پايلې ته د لوېنهام-سکولم قضيه ويل کېږي.) په عمومي ډول، د ترلي فارمولونه له ستونو څخه د جوړښتونه جوړول په منطق کېنې ډېر ځله، او کله کله حتی په فلسفه کېنې هم، کارول کېږي.

7.2 د ثبوت لنډيز

د بشپرتيا د قضیې ثبوت يو څه پېچلې دے، او په لومړي لوست کېنې ترې لار ورکېدل اسانه دي. نو رائج د ثبوت لنډيز وړاندې کړو. لومړۍ کام د نظر د زاويې داسې بدلون دے چې د ثبوت لاره راښيي. که بشپرتيا داسې وګڼو چې «هر کله $\Gamma \models A$ وي، نو $\Gamma \models A$ وي»، ښايي د کومې مفکورې موندل هم ګران وي: ځکه د $\Gamma \vdash A$ د ښودلو دپاره بايد اشتقاق ومومو، او داسې نه ښکاري چې فرضيه $\Gamma \models A$ په دې کېنې څه مرسته راسره کوي. د ځينو ثبوتي نظامونو دپاره اشتقاق نېغ جوړېدے شي، خو موږ لږه بله لار نيسو. د نظر اړين بدلون دا دے: بشپرتيا داسې هم ويل کېدے شي چې «که Γ سازگار وي، نو د صدق وړ دے». ښايي د Γ معلومات له دې فرضيې سره يو ځای وکاروو چې هغه سازگار دے، او داسې جوړښت جوړ کړو چې په Γ کېنې هر ترلے فارمول پوره کړي. بالاخره موږ پوهېږو چې د کوم ډول جوړښت په لټه کېنې يو: هغه چې هماغسې وي لکه Γ چې ئې بيانوي!

که Γ يوازې اتومي ترلي فارمولونه ولري، نو د هغې دپاره مدل جوړول اسانه دي. فرض کړئ ټولې اتومي ترلي فارمولونه د $P(a_1, \dots, a_n)$ بڼه لري، چې a_i ګانې ثابت سمبولونه دي. يوازې دومره پکار دي چې د تعريف ساحه $|\mathcal{M}|$ او د P دپاره داسې ګومارنه پيدا کړو چې $\mathcal{M} \models P(a_1, \dots, a_n)$ وي. دا ډېره ګرانه نه ده: $|\mathcal{M}| = \mathbb{N}$ ، $c_i^{\mathcal{M}} = i$ وټاکئ، او د هر $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$ دپاره جوړه $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ په $P^{\mathcal{M}}$ کېنې واچوئ، چې k_i د ثابت سمبول a_i شمېر دے (يعني $a_i \equiv c_{k_i}$).

اوس فرض کړئ Γ کوم داسې فارمول $\neg B$ لري چې B اتومي دے. ښايي اندېښنه وکړو چې د $\mathcal{M}$ جوړونه د $\neg B$ د رښتوني کولو له امکان سره ټکر کوي. خو دلته د Γ سازګاري کار رائج: که $\neg B \in \Gamma$ وي، نو $B \notin \Gamma$ ، کنه Γ به ناسازگار و. او که $B \notin \Gamma$ وي، نو زموږ د $\mathcal{M}$ د جوړونې له مخې $\mathcal{M} \models B$ ؛ نو $\mathcal{M} \models \neg B$ تر دې ځايه هر څه سم دي.

که Γ پېچلي، نااتومي فارمولونه ولري نو څه؟ فرض کړئ $A \wedge B$ لري. د دې د رښتوني کولو دپاره بايد داسې پرمخ لاړ شو لکه دواړه A او B چې په Γ کېنې وي. او که $A \vee B \in \Gamma$ وي، بايد لږ تر لږه يو ئې رښتونه کړو؛ يعنې داسې پرمخ لاړ شو لکه يو ئې چې په Γ کېنې وي.

دا لاندې مفکوره راښيي: په Γ کېنې نور فارمولونه داسې ورزياتوو چې (الف) ترې جوړېدونکې سټ سازگار وساتو، (ب) ډاډ ترلاسه کړو چې د هرې ممکنې ترلے فارمول A دپاره يا A په جوړ شوي سټ کېنې وي يا $\neg A$ ، او (ج) که هر کله $A \wedge B$ په سټ کېنې وي، دواړه A او B هم پکېنې وي؛ که $A \vee B$ په سټ کېنې وي، لږ تر لږه يو له A او B څخه هم پکېنې وي؛ او داسې نور. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-001) سرچينې په شرط (ب) کېنې «اتومي جمله» ليکلې وه، خو همدا پاراګراف دا شرط د بشپړ سټ تعريف بولي او ورپسې رسمي تعريف ئې د هرې جملې دپاره ټاکي؛ نو ناسمه «اتومي» ځانګړنه لرې شوه. موږ دې کار ته (که اړينه وي، تر ابده) دوام ورکوو. د ټولو داسې زياتو شوو فارمولونه سټ Γ^* وبلل. بيا به پورته جوړونه داسې جوړښت $\mathcal{M}$ را کړي چې په استقرا سره ثابتولے شو په Γ^* کېنې ټولې جملې پوره کوي، او ځکه چې $\Gamma \subseteq \Gamma^*$ ، په Γ کېنې ټولې جملې هم پوره کوي. څرګندېږي چې د (الف) او (ب) تضمين بس دے. د جملو هغه سټ چې (ب) پوره کوي بشپړ بلل کېږي. نو زموږ کار به دا وي چې سازگار سټ Γ يو سازگار

او بشپړ سټ Γ^* ته وغځوو.

په دې پلان کېنې يوه ستونزه شته: که $\exists x!A(x) \in \Gamma$ وي، غواړو په دې بهير کېنې کوم ثابت سمبول c وټاکو او $A(c)!$ ورزيات کړو. خو څنگه پوهېږو چې دا کار تل کېدای شي؟ بنياني زموږ په ژبه کېنې يوازې څو ثابت سمبولونه وي، او د هر يوه دپاره $\neg!A(c) \in \Gamma$ ولرو. ورسره $A(c)!$ هم نه شو زياتوله، ځکه سټ به ناسازگار کړي؛ بيا به نه پوهېدو چې $\mathcal{M}$ بايد $A(c)!$ رښتونه کړي که $\neg!A(c)$ لا دا هم کېدای شي چې Γ يوازې د داسې ژبې جملې ولري چې هېڅ ثابت سمبول نه لري (د بېلګې په توګه، د ستونو د تيوري ژبه).

د دې ستونزې حل دا دے چې په پيل کېنې پخې نامتناهي ډېر ثابتونه، او ورسره داسې جملې، زياتې کړو چې په سم ډول ئې له کميت ټاکونکو سره وتړي. (البته بايد تصديق کړو چې دا کار ناسازگاري نه شي رامنځته کولے).

زموږ لومړنۍ جوړونه هغه وخت ښه کار کوي چې په اتومي جملو کېنې يوازې ثابت سمبولونه ولرو. خو ژبه بنياني تابعې هم ولري. په هغه حالت کېنې بنياني پر $\mathbb{N}$ د سمې تابعې موندل، چې دغو تابعې ته ئې وګومارو او هر څه سم شي، ستونزمن وي. نو بله چاره دا ده: د c_i د تفسير دپاره د i د کارولو پر ځاے، د ثابت سمبولونه خپله سټ د تعريف ساحه وټاکئ. بيا $\mathcal{M}$ هر ثابت سمبول خپل ځان ته ګومارلے شي: $c_i^{\mathcal{M}} = c_i$. خو ولې دا کار تر پايه نه رسوو: د ژبې ټول ترمونه $|\mathcal{M}|$ وټاکئ! په دې صورت کېنې تابعې ته د تابعو څرګنده ګومارنه شته (دغه تابعې ترمونه د ارګومېنټونو په توګه اخلي او ترمونه د قيمتونو په توګه لري): تابع f_i^n ته هغه تابع ګومارو چې n ترمونه $t_1, \dots, t_n$ د نوت په توګه اخلي او ترم $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$ د قيمت په توګه ورکړي.

د معما وروستۍ ټوټه دا ده چې له $=$ سره څه وکړو. پريديکات $=$ ثابت تفسير لري: $\mathcal{M} \models t = t'$ هله او يوازې هله چې $\text{Val}^{\mathcal{M}}(t) = \text{Val}^{\mathcal{M}}(t')$ وي. اوس که هر څه داسې وټاکو چې د ترم t قيمت په خپله t وي، نو دا جوړښت به د $t = t'$ په ښه هېڅ جملې رښتوني نه کړي، مګر دا چې t او t' يو او هماغه ترم وي. څرګنده ده چې دا ستونزه ده، ځکه د تابعې لرونکې ژبې کابو هره په زړه پورې تيوري به داسې جملې $t = t'$ د قضيو په توګه ولري چې t او t' يو ترم نه وي (د بېلګې په توګه، د حساب په تيوريو کېنې: $(0 + 0) = 0$). د دې ستونزې د هوارولو دپاره د $\mathcal{M}$ تعريف ساحه بدلوو: په $|\mathcal{M}|$ کېنې د څيزونو په توګه د ترمونو پر ځاے د ترمونو ستونه کاروو، او هر سټ ټول هغه ترمونه لري چې د Γ جملې ئې برابر ګڼل غواړي. نو د بېلګې په توګه، که Γ د حساب تيوري وي، له دغو ستونو څخه يو به 0 ، $(0 + 0)$ ، (0×0) ، او داسې نور ولري. همدا سټ به 0 ته ګومارو، او څرګنده به شي چې همدا سټ په دې کېنې د ټولو ترمونو قيمت هم دے، لکه د $(0 + 0)$ قيمت. نو په دې بدله شوې جوړښت کېنې به جمله $(0 + 0) = 0$ رښتوني وي.

نو دا کارونه به کوو. لومړے د بشپړ سازگارو ستونو خاصيتونه څېړو؛ په ځانګړي ډول ثابتو چې بشپړ سازگار سټ $A \wedge B!$ هله او يوازې هله لري چې دواړه $A!$ او $B!$ ولري، او $A \vee B!$ هله او يوازې هله لري چې لږ تر لږه يو ئې ولري؛ او داسې نور (7.2). بيا د جملو «مشبوع» ستونه تعريفوو او څېړو. مشبوع سټ داسې شرطي فارمولونه لري چې هره کميت ټاکونکې ترلے فارمول د هغې له بېلګو سره تړي (7.6). ښيو چې هر سازگار سټ Γ تل مشبوع سټ Γ' ته غځېدے شي (7.7). که يو سټ سازگار، مشبوع او بشپړ وي، دا خاصيت هم لري چې $\exists x!A(x)$ هله او يوازې هله لري چې د کوم تړلي ترم t دپاره $A(t)!$ ولري او $\forall x!A(x)$ هله او يوازې هله لري چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $A(t)!$ ولري (7.8). بيا مشبوع سازگار سټ Γ' اخلو، او ښيو چې داسې مشبوع، سازگار او بشپړ سټ Γ^* ته غځېدے شي (7.9). همدا سټ Γ^* د خپل ترمي مدل $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ د تعريف دپاره کاروو. د ترمي مدل تعريف ساحه د تړلو ترمونو سټ دے، او د هغه د پريديکاتونه تفسير د هغو اتومي تړلي فارمولونه له مخې ټاکل کېږي چې په Γ^* کېنې دي (7.10). د مشبوع، بشپړو سازگارو ستونو خاصيتونه کاروو، څو وښيو چې په رښتيا $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A!$ هله او يوازې هله چې $A \in \Gamma^*$ (7.13)؛ نو په ځانګړي ډول $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \Gamma$ په پای کېنې دا هم څېړو چې که Γ ، $=$ هم ولري، ترمي مدل څنگه تعريف کړو (7.18)، او ښيو چې هغه Γ^* پوره کوي (7.22).

7.3 د ترلي فارمولونه بشپړ سازگار ستونه

تعريف 7.1 (بشپړ ست). د ترلي فارمولونه يو ست Γ هله او يوازې هله بشپړ دے چې د هرې ترلې فارمول A دپاره يا $A \in \Gamma$ وي يا $\neg A \in \Gamma$.

د جملو بشپړ ستونه هېڅ پوښتنه بې ځوابه نه پرېږدي. د هرې ترلې فارمول A دپاره Γ «وايي» چې A رښتونه دے که کاذب. د بشپړ ستونو ارزښت د بشپړتيا د قضیې له ثبوت څخه هم اوړي. د بېلګې په توګه، هغه تيوري چې بشپړ او د بدیهي اصولو له لارې څرګندېدونکې وي، تل د پرېکړې وړ وي.

بشپړ سازگار ستونه د بشپړتيا په ثبوت کېنې مهم دي، ځکه تضمینونه شو چې د ترلي فارمولونه هر سازگار ست Γ په بشپړ سازگار ست Γ^* کېنې شامل دے. بشپړ سازگار ست د هرې ترلې فارمول A دپاره يا A لري يا د هغې نفې $\neg A$ ، خو دواړه نه لري. دا په ځانګړي ډول د اتومي ترلي فارمولونه دپاره هم سم دي؛ نو له بشپړ سازگار ست څخه په داسې ژبه کېنې چې ثابت سمبولونه په مناسبه توګه ورزيات شوي وي، داسې جوړښت جوړولے شو چې پکېنې د پريديکاتونه تفسير د هغو اتومي ترلي فارمولونه له مخې تعريفېږي چې په Γ^* کېنې دي. بيا ښودل کېدے شي چې دا جوړښت په Γ^* کېنې ټولې ترلي فارمولونه (او ځکه په Γ کېنې ټولې) رښتوني کوي. د دې وروستي حقيقت ثبوت دا غواړي چې $\neg A \in \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې $A \notin \Gamma^*$ ، او $(A \vee B) \in \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې $A \in \Gamma^*$ يا $B \in \Gamma^*$ ؛ او داسې نور.

په لاندې بحث کېنې به ډېر ځله د $\vdash$ د انعکاسيت، یکنواختۍ او انتقاليت خاصيتونه په ناڅرګند ډول کاروو (وګورئ برخې 3.8، 4.7، 5.7 او 6.6).

قضيه 7.2. فرض کړئ Γ بشپړ او سازگار دے. بيا:

1. که $A \vdash A$ وي، نو $A \in \Gamma$.
2. $A \wedge B \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې دواړه $A \in \Gamma$ او $B \in \Gamma$ وي.
3. $A \vee B \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې يا $A \in \Gamma$ وي يا $B \in \Gamma$.
4. $A \rightarrow B \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې يا $A \notin \Gamma$ وي يا $B \in \Gamma$.

ثبوت. په لاندې ټولو برخو کېنې فرض کوو چې Γ بشپړ او سازگار دے.

1. که $A \vdash A$ وي، نو $A \in \Gamma$.

فرض کړئ $A \vdash A$. د نقیض په توګه فرض کړئ چې $A \notin \Gamma$. ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg A \in \Gamma$. د **قضیې 3.27، 4.27، 5.27 او 6.33** له مخې Γ ناسازگار دے. دا له دې فرضيې سره تناقض دے چې Γ سازگار دے. نو $A \notin \Gamma$ نه شي کېدے، او ځکه $A \in \Gamma$.

2. $A \wedge B \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې دواړه $A \in \Gamma$ او $B \in \Gamma$ وي:

د مخامخ لوري دپاره، فرض کړئ $A \wedge B \in \Gamma$. بيا د **قضیې 3.29، 4.29، 5.29 او 6.36**، د توکي (۱) له مخې $A \vdash A$ او $B \vdash B$. د 1 له مخې $A \in \Gamma$ او $B \in \Gamma$ ، لکه څنګه چې پکار وو.

د عکس لوري دپاره، $A \in \Gamma$ او $B \in \Gamma$ ونیسئ. د **قضیې 3.29، 4.29، 5.29 او 6.36**، د توکي (۲) له مخې $A \wedge B \vdash A$ او $A \wedge B \vdash B$. د 1 له مخې $A \wedge B \in \Gamma$.

3. لومړۍ ښیو چې که $AV!B \in \Gamma$ وي، نو یا $A \in \Gamma$ وي یا $B \in \Gamma$! فرض کړئ $AV!B \in \Gamma$ ، خو $A \notin \Gamma$ او $B \notin \Gamma$! ځکه Γ بشپړ دے، نو $A \in \Gamma$ او $B \in \Gamma$! د قضیې 3.30، 4.30، 5.30 او 6.37، د توکي (1) له مخې Γ ناسازگار دے؛ دا تناقض دے. نو یا $A \in \Gamma$ وي یا $B \in \Gamma$!

د عکس لوري دپاره، فرض کړئ یا $A \in \Gamma$ وي یا $B \in \Gamma$! د قضیې 3.30، 4.30، 5.30 او 6.37، د توکي (2) له مخې $\Gamma \vdash AV!B$ د 1 له مخې $AV!B \in \Gamma$ ، لکه څنګه چې پکار وو.

4. د مخامخ لوري دپاره، فرض کړئ $A \rightarrow B \in \Gamma$ ، او د نقیض په توګه فرض کړئ چې $A \in \Gamma$ او $B \notin \Gamma$! د دغو فرضونو له مخې $A \rightarrow B \in \Gamma$ او $A \in \Gamma$! د قضیې 3.31، 4.31، 5.31 او 6.38، د توکي (1) له مخې $\Gamma \vdash B$ خو بیا د 1 له مخې $B \in \Gamma$ ؛ دا له $B \notin \Gamma$ سره تناقض دے.

د عکس لوري دپاره، لومړۍ هغه حالت وڅېړئ چې $A \notin \Gamma$ وي. ځکه Γ بشپړ دے، نو $A \in \Gamma$! د قضیې 3.31، 4.31، 5.31 او 6.38، د توکي (2) له مخې $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ بیا د 1 له مخې $A \rightarrow B \in \Gamma$ ، لکه څنګه چې پکار وو.

اوس هغه حالت وڅېړئ چې $B \in \Gamma$ وي. بیا د قضیې 3.31، 4.31، 5.31 او 6.38، یو ځل بیا د توکي (2) له مخې $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ د 1 له مخې $A \rightarrow B \in \Gamma$!

□

تمرین 7.3. د 7.2 ثبوت بشپړ کړئ.

7.4 د هنکین غځونه

د بشپرتيا د قضیې د ثابتولو د ستونزې یوه برخه دا ده چې هغه مدل چې له بشپړ سازگار سټ Γ څخه ئې جوړوو باید په Γ کېنې ټول کمیت ټاکونکي لرونکي فارمولونه رښتوني کړي. د دې د تضمین دپاره د لیون هنکین یو چل کاروو. په اصل کېنې دا چل د ژبې په لامتناهي ډېرو ثابت سمبولونه غځول او د هر داسې فارمول $A(x)$ دپاره چې یو ازاد متغیر لري، د لاندې ښې یو فارمول ورزیاتول دي: $\exists x!A(x) \rightarrow A(c)$ چې c یو له نوو ثابت سمبولونه څخه دے. کله چې هغه جوړښت جوړوو چې Γ پوره کوي، دا به تضمین کړي چې د نوو ثابت سمبولونو په منځ کېنې هره رښتوني وجودي جمله یو شاهد ولري.

قضیه 7.4. که Γ په $\mathcal{L}$ کېنې سازگار وي او $\mathcal{L}'$ له $\mathcal{L}$ څخه د نوو ثابت سمبولونه د شمېرېدونکې لامتناهي سټ $d_0, d_1, \dots$ په ورزیاتولو ترلاسه شي، نو Γ په $\mathcal{L}'$ کېنې سازگار دے.

تعریف 7.5 (مشیوع سټ). د ژبې $\mathcal{L}$ د فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله مشیوع دے چې د هر داسې فارمول $A(x) \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ دپاره چې یو ازاد متغیر x لري، داسې ثابت سمبول $c \in \mathcal{L}$ موجود وي چې $\exists x!A(x) \rightarrow A(c) \in \Gamma$.

لاندې تعریف به د ورپسې قضیې په ثبوت کېنې وکارول شي.

تعریف 7.6. فرض کړئ $\mathcal{L}'$ هماغسې وي لکه په 7.4 کېنې. د $\mathcal{L}'$ د ټولو هغو فارمولونه $A_i(x_i)$ یوه شمېرېنه $A_0(x_0)$ ، $A_1(x_1)$ ، ... وټاکئ چې یو متغیر (x_i) پکېنې ازاد راځي. ترې فارمولونه D_n پر n د استقرا له لارې تعریفوو.

c_0 دې د هغو d_i په منځ کېنې لومړنۍ ثابت سمبول وي چې مونږ $\mathcal{L}$ ته ورزیات کړي دي او په $A_0(x_0)$ کېنې نه راځي. په دې فرض چې D_0 ، ...، D_{n-1} له مخکېنې تعریف شوي دي، c_n دې د نوو ثابت سمبولونه d_i په منځ کېنې لومړنۍ هغه وي چې نه په D_0 ، ...، D_{n-1} کېنې راځي او نه په $A_n(x_n)$ کېنې.

اوس D_n دا فارمول وټاکئ: $\exists x_n!A_n(x_n) \rightarrow A_n(c_n)$.

لم 7.7. هر سازگار سټ Γ يوه مشبوع سازگار سټ Γ' ته څښتنه شي.

ثبوت. د ژبې $\mathcal{L}$ د جملويو سازگار سټ Γ راکړل شوي دي؛ ژبه د نوو ثابت سمبولونه د شمېرېدونکي لامتناهي سټ په ورزياتولو وځي، خو $\mathcal{L}'$ جوړ شي. د 7.4 له مخې Γ لا هم په بدياه ژبه کښې سازگار دے. همدارنګه، D_i دې هماغسې وي لکه په 7.6 کښې. وټاکي:

$$\begin{aligned}\Gamma_0 &= \Gamma \\ \Gamma_{n+1} &= \Gamma_n \cup \{!D_n\}\end{aligned}$$

يعني $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{!D_0, \dots, !D_n\}$ او $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$ وټاکي. په څرګند ډول مشبوع دے.

که Γ' ناسازگار وے، نو د کوم n دپاره به Γ_n ناسازگار وے (تمرین: څرګنده کړئ چې ولې). نو د Γ' د سازګاري د ښودلو دپاره دا بسنه کوي چې پر n د استقرا له لارې وښیو چې هر سټ Γ_n سازگار دے.

د استقرا بنسټ يوازې دا ادعا ده چې $\Gamma_0 = \Gamma$ سازگار دے، او دا د قضیې فرضیه ده. د استقرا د ګام دپاره، فرض کړئ چې Γ_n سازگار دے، خو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!D_n\}$ ناسازگار دے. در په یاد کړئ چې D_n دا دے: $\exists x_n !A_n(x_n) \rightarrow !A_n(c_n)$ چې $A_n(x_n)$ د $\mathcal{L}'$ داسې فارمول دے چې يوازې متغیر x_n ئې ازاد دے. د c_n د غوره کولو د طريقې له مخې (وکورئ 7.6)، c_n نه په $A_n(x_n)$ کښې راځي او نه په Γ_n کښې.

که $\Gamma_n \cup \{!D_n\}$ ناسازگار وي، نو $\Gamma_n \vdash \neg !D_n$ ، او ځکه لاندې دواړه سم دي:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n !A_n(x_n) \quad \Gamma_n \vdash \neg !A_n(c_n)$$

ځکه چې c_n نه په Γ_n کښې راځي او نه په $A_n(x_n)$ کښې، د قوي تعميم قضیه قضیې 3.32، 4.32، 5.32 او 6.39 پلي کېږي. له $\Gamma_n \vdash \neg !A_n(c_n)$ څخه دا ترلاسه کوو: $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg !A_n(x_n)$. نو دواړه دا لرو: $\Gamma_n \vdash \exists x_n !A_n(x_n)$ او $\Gamma_n \vdash \forall x_n \neg !A_n(x_n)$ ؛ نو Γ_n پخپله ناسازگار دے. (پام وکړئ چې $\neg \exists x_n !A_n(x_n) \vdash \forall x_n \neg !A_n(x_n)$ تناقض: فرض دا و چې Γ_n سازگار دے. نو $\Gamma_n \cup \{!D_n\}$ سازگار دے. □

اوس به وښیو چې مشبوع، سازگار او بشپړ ستونه دا خاصیت لري چې يوه عمومي کيټ ټاکونکې ترلې فارمول هله او يوازې هله لري چې د هغې ټولې بېلګې ولري او يوه وجودي کيټ ټاکونکې ترلې فارمول هله او يوازې هله لري چې لږ تر لږه د هغې يوه بېلګه ولري. له دې څخه به د دې ښودلو دپاره کار واخلو چې هغه جوړښت چې له مشبوع، سازگار او بشپړ سټ څخه ئې جوړوو، د هغه ټولې کيټ ټاکونکې جملې رښتوني کوي.

قضیه 7.8. فرض کړئ Γ بشپړ، سازگار او مشبوع دے.

1. $\exists x !A(x) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه تړلي ترم t دپاره $A(t) \in \Gamma$ وي.

2. $\forall x !A(x) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $A(t) \in \Gamma$ وي.

ثبوت. 1. لومړۍ فرض کړئ چې $\exists x !A(x) \in \Gamma$. ځکه Γ مشبوع دے، نو د کوم ثابت سمبول c دپاره $(\exists x !A(x) \rightarrow !A(c)) \in \Gamma$. د قضیې 3.31، 4.31، 5.31 او 6.38، د توکي (1)، او 17.2 له مخې $A(c) \in \Gamma$.

د بل لوري دپاره مشبوع والی لازم نه دے: فرض کړئ $A(t) \in \Gamma$. بيا د قضیې 3.33، 4.33، 5.33 او 6.40، د توکي (1) له مخې $\Gamma \vdash \exists x !A(x)$. د 17.2 له مخې $\exists x !A(x) \in \Gamma$.

2. فرض کړئ چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\neg A(t) \in \Gamma$ د نقيض په توګه فرض کړئ چې $\forall x \neg A(x) \notin \Gamma$ ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg \forall x \neg A(x) \in \Gamma$ د مشبوع والي له مخې، د کوم ثابت سمبول c دپاره $(\exists x \neg A(x) \rightarrow \neg A(c)) \in \Gamma$ د فرض له مخې، ځکه چې c يو ترله ترم دے، نو $\neg A(c) \in \Gamma$ خو له دې څخه به Γ ناسازګار شي. (تمرین: هغه اشتقاق ورکړئ چې ښيي

$$\neg \forall x \neg A(x), \exists x \neg A(x) \rightarrow \neg A(c), \neg A(c)$$

ناسازګار دے.)

د عکس لوري دپاره مشبوع والي لازم نه دے: فرض کړئ $\forall x \neg A(x) \in \Gamma$ بيا د قضیې 3.33، 4.33، 5.33 او 6.40، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash \neg A(t)$ د 7.2 له مخې $\neg A(t) \in \Gamma$.

□

7.5 د لینډنباوم لړه

اوس یوه مرستندویه قضیه ثابتوو چې ښيي د ترلي فارمولونه هر سازګار سټ د جملو په داسې سټ کېښي شامل دے چې یوازې سازګار نه، بلکې بشپړ هم وي. ثبوت په هر ځل د یوې ترلې فارمول په زیاتولو کار کوي، او په هر پړاو کېښي تضمینوي چې سټ سازګار پاتې شي. دا ځکه کوو چې د هر A دپاره یا A یا $\neg A$ په کوم پړاو کېښي ورزیات شي. بيا د دې جوړونې د ټولو پړاوونو اتحاد یا A لري یا ئې نفي $\neg A$ ، او په دې توګه بشپړ دے. دا سازګار هم دے، ځکه په هر پړاو کېښي پام کوو چې ناسازګاري رامنځته نه کړو.

لم 7.9 (د لینډنباوم لړه). په ژبه $\mathcal{L}$ کېښي هر سازګار سټ Γ داسې غځېدے شي چې یو بشپړ او سازګار سټ Γ^* شي.

ثبوت. فرض کړئ Γ سازګار دے. د $\mathcal{L}$ د ټولو ترلي فارمولونه یوه شمېرته $A_0, A_1, \dots$ وي. $\Gamma_0 = \Gamma$ تعریف کړئ، او

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{A_n\} & \text{وي، سازګار } \Gamma_n \cup \{A_n\} \text{ که} \\ \Gamma_n \cup \{\neg A_n\} & \text{کېښي. صورت بل په} \end{cases}$$

$$\Gamma^* = \bigcup_{n \geq 0} \Gamma_n \text{ وټاکئ.}$$

هر Γ_n سازګار دے: Γ_0 د تعریف او فرض له مخې سازګار دے. که $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{A_n\}$ وي، لامل ئې دا دے چې وروستۍ سټ سازګار دے. که دا سازګار نه وي، نو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$ باید تصدیق کړو چې $\Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$ سازګار دے. فرض کړئ چې سازګار نه دے. بيا دواړه $\Gamma_n \cup \{A_n\}$ او $\Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$ ناسازګار دي. دا په دې معنا ده چې Γ_n به د قضیې 3.28، 4.28، 5.28 او 6.34 له مخې ناسازګار وے، چې دا د استقرا له فرضيې سره تناقض دے.

د هر n او هر $i < n$ دپاره، $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. دا پر n د ساده استقرا له لارې ترلاسه کېږي. د $n = 0$ دپاره هېڅ $i < 0$ نشته، نو ادعا په خپله سمه ده. د استقرا د کام دپاره فرض کړئ چې ادعا د n دپاره سمه ده. ښیو چې که $i < n + 1$ وي، نو $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ له مخې یا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{A_n\}$ ده یا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$. نو $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. که $i < n + 1$ وي، نو د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ (که $i < n$ وي)، یا دا ساده حقیقت لرو چې $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (که $i = n$ وي). د $\subseteq$ د انتقالیت له مخې $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ ترلاسه کوو.

له دې څخه څرګندېږي چې Γ^* سازګار دے۔ لامل دا دے: فرض کړئ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ متناهي دے۔ د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-002) سرچينې د تش متناهي فرعي سټ حالت نه و بيل کړے، حال دا چې «تر ټولو لوے» پړاو يوازې د نا تش سټ دپاره ټاکل کېدے شي؛ د تش حالت څرګنده سازګاري ورزياته شوه۔ نو فرض کړئ چې دا فرعي سټ نا تش دے۔ هر $B \in \Gamma'$! د کوم i دپاره په Γ_i کېږي هم دے۔ n دې د دغو شاخصونو تر ټولو لوے وي۔ ځکه که $i \leq n$ وي نو $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ ، هر $B \in \Gamma'$! هم $B \in \Gamma_n$ دے؛ يعنې $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$ او سازګار دے۔ نو هر متناهي فرعي سټ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ سازګار دے۔ د قضيې 3.23، 4.23، 5.23 او 6.23 له مخې، Γ^* سازګار دے۔

د $\text{Frm}(\mathcal{L})$ هره ترلے فارمول په هغه لړ کېږي راځي چې د Γ^* د تعريف دپاره کارول شوے دے۔ که $A_n \notin \Gamma^*$ وي، لامل ئې دا دے چې $\{A_n\} \cup \Gamma_n$ ناسازګار و۔ خو بيا $\neg A_n \in \Gamma^*$ ، نو بشپړ دے۔ □

7.6 د يو مدل جوړونه

اوس مهال مو له = سره کار نسته؛ يعنې يوازې دا ښودل غواړو چې د ترلي فارمولونه يو سازګار سټ Γ چې = نه لري، د صدق وړ دے۔ لومړے Γ يوه سازګار، بشپړ او مشبوع سټ Γ^* ته غځو۔ په دې حالت کېږي د مدل $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ تعريف ساده دے: د $\mathcal{L}'$ د ترلو ترمونو سټ د تعريف ساحه ګرځو۔ هر ثابت سمبول پخپله ځان ته ورګومارو، او په عمومي ډول دا باوري کوو چې د هر ترلي ترم t دپاره $\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ پريډيکاتونه داسې تفسيروو چې يوه اتومي ترلے فارمول په $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ کېږي هله او يوازې هله رښتوني وي چې په Γ^* کېږي وي۔ دا به څرګنده توګه په Γ^* کېږي ټولې اتومي ترلي فارمولونه په $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ کېږي رښتوني کړي۔ نورې جملې هم رښتوني دي، په دې شرط چې هغه Γ^* چې ترې پيل کوو، سازګار، بشپړ او مشبوع وي۔

تعريف 7.10 (ترمي مدل). فرض کړئ Γ^* په ژبه $\mathcal{L}$ کېږي د ترلي فارمولونه يو بشپړ، سازګار او مشبوع سټ دے۔ د Γ^* ترمي مدل $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ هغه جوړښت ده چې په لاندې ډول تعريفېږي:

1. د تعريف ساحه $|\mathcal{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ د ټولو ترلو ترمونو سټ دے۔

2. د ثابت سمبول c تفسير پخپله c دے: $c^{\mathcal{M}(\Gamma^*)} = c$ ۔

3. تابع f ته هغه تابع ګومارل کېږي چې ترلي ترمونه $t_1, \dots, t_n$ د ارګومېنتونو په توګه واخلي او ترلے ترم $f(t_1, \dots, t_n)$ د قيمت په توګه ولري:

$$f^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$$

4. که R يو n -مقامي پريډيکات وي، نو

$$\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathcal{M}(\Gamma^*)} \text{ چې هله او يوازې هله چې } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

اوس به وګورو چې په رښتيا $\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ لرو۔

لم 7.11. فرض کړئ $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ د 7.10 ترمي مدل دے؛ بيا د هر ترلي ترم دپاره $\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ ۔

ثبوت. ثبوت پر t د استقرا له لارې دے۔ د بنسټ حالت، چې t يو ثابت سمبول وي، ښځه په ښځه د ترمي مدل له تعريف څخه ترلاسه کېږي۔ د استقرا د ګام دپاره فرض کړئ $t_1, \dots, t_n$ داسې ترلي ترمونه دي چې $\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$ او f

يوه n -مقامي تابع ده. بيا

$$\begin{aligned}\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(f(t_1, \dots, t_n)) &= f^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(\text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t_1), \dots, \text{Val}^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t_n)) \\ &= f^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) \\ &= f(t_1, \dots, t_n),\end{aligned}$$

□

او نو د استقرا له مخې دا د هر ترلي ترم t دپاره سم دي.

د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-008) په سرچينه کښې د دې ټاکنيز شرط درېيم (د لومړۍ درجې منطق د نه ټاکل کېدو) تش ارکومېنټ پاتې شوی و؛ دلته په څرګنده توګه ورزيات شو، خو راتلونکې شرط د هغه پر ځای وانه خيستل شي.

جوړښت $\mathcal{M}$ ښايي يوه په وجودي ډول کميت ټاکونکې ترلې فارمول $\exists x!A(x)$ رښتوني کړي، بې له دې چې کومه بېلګه $A(t)$ رښتوني کړې وي. جوړښت $\mathcal{M}$ ښايي د يوې په عمومي ډول کميت ټاکونکې ترلې فارمول $\forall x!A(x)$ ټولې بېلګې $A(t)$ رښتوني کړي، خو پخپله $\forall x!A(x)$ رښتوني نه کړي. لامل دا دے چې په عمومي ډول د $|\mathcal{M}|$ هر غړی د کوم ترلي ترم قيمت نه وي ($\mathcal{M}$ ښايي پوښلې نه وي). همدا لامل دے چې د صدق اړيکه د متغير-ګومارنو له لارې تعريفېږي. خو زموږ د ترمي مدل $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ دپاره دا اړينه نه ده، ځکه هغه پوښلې دے. راتلونکې نتيجه همدا وايي.

قضيه 7.12. فرض کړئ $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ د 7.10 ترمي مدل دے.

1. $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \exists x!A(x)$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه ترلي ترم t دپاره $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A(t)$ وي.

2. $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \forall x!A(x)$ هله او يوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A(t)$ وي.

ثبوت. 1. د کميت ټاکونکو د صدق قضيه [OLP] له مخې، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \exists x!A(x)$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوې متغير-ګومارنې s دپاره $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(x)$ وي. ځکه $|\mathcal{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ له ترلو ترمونو جوړ دے، دا هله او يوازې هله کېږي چې لږ تر لږه يو ترلې ترم t وي، داسې چې $s(x) = t$ او $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(x)$ د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] له مخې، چې $s(x) = t$ وي، $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(t)$ وي. د جملې د صدق او متغير-ګومارنې قضيه [OLP] له مخې، $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(t)$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A(t)$ وي، ځکه $A(t)$ يوه جمله ده.

2. د کميت ټاکونکو د صدق قضيه [OLP] له مخې، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models \forall x!A(x)$ هله او يوازې هله چې د هرې متغير-ګومارنې s دپاره $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(x)$ وي. راياد کړئ چې $|\mathcal{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ له ترلو ترمونو جوړ دے، نو د هر ترلي ترم t دپاره $s(x) = t$ داسې يوه متغير-ګومارنه ده، او د هرې متغير-ګومارنې دپاره $s(x)$ کوم ترلې ترم t دے. د فورمول د بدلولو قضيه [OLP] له مخې، چې $s(x) = t$ وي، $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(x)$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(t)$ وي. د جملې د صدق او متغير-ګومارنې قضيه [OLP] له مخې، $\mathcal{M}(\Gamma^*), s \models A(t)$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A(t)$ وي، ځکه $A(t)$ يوه جمله ده.

□

لم 7.13 (د صدق لږه). فرض کړئ $A!$ ، $=$ نه لري. بيا $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models A!$ هله او يوازې هله چې $A \in \Gamma^*$ وي.

ثبوت. دواړه لوري په يو وخت، او پر $A!$ د استقرا له لارې ثابتوو.

1. $A \equiv \perp : \mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models A$ د صدق د تعريف له مخې. له بېلې خوا، ځکه Γ^* سازگار دے، نو $\perp \notin \Gamma^*$.
2. $A \equiv \top : \mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ د صدق د تعريف له مخې. له بېلې خوا، ځکه Γ^* سازگار او بشپړ دے، او $\top \in \Gamma^*$.
3. $A \equiv R(t_1, \dots, t_n) : \mathcal{M}(\Gamma^*) \models R(t_1, \dots, t_n)$ هله او يوازې هله چې $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathcal{M}(\Gamma^*)}$ وي (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ وي (د $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ د جوړونې له مخې).
4. $A \equiv \neg !B : \mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models !B$ وي (د صدق د تعريف له مخې). د استقرا د فرضيې له مخې، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models !B$ هله او يوازې هله چې $B \notin \Gamma^*$ وي. ځکه Γ^* سازگار او بشپړ دے، نو $B \notin \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې $\neg !B \in \Gamma^*$ وي.
5. $A \equiv !B \wedge !C : \mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ هله او يوازې هله چې دواړه $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models !B$ او $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models !C$ ولرو (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې دواړه $B \in \Gamma^*$ او $C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې). د 27.2 له مخې، دا هله او يوازې هله کېږي چې $(!B \wedge !C) \in \Gamma^*$.
6. $A \equiv !B \vee !C : \mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models !B$ يا $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models !C$ وي (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې $B \in \Gamma^*$ يا $C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې). دا هله او يوازې هله کېږي چې $(!B \vee !C) \in \Gamma^*$ وي (د 37.2 له مخې).
7. $A \equiv !B \rightarrow !C : \mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*) \not\models !B$ يا $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models !C$ وي (د صدق د تعريف له مخې)، او دا هله او يوازې هله چې $B \notin \Gamma^*$ يا $C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضيې له مخې). دا هله او يوازې هله کېږي چې $(!B \rightarrow !C) \in \Gamma^*$ وي (د 47.2 له مخې).
8. $A \equiv \forall x !B(x) : \mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ هله او يوازې هله چې د ټولو تر ټولو ترمونو t دپاره $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models !B(t)$ وي (7.12). د استقرا د فرضيې له مخې، دا هله او يوازې هله چې د ټولو تر ټولو ترمونو t دپاره $B(t) \in \Gamma^*$ وي؛ د 7.8 له مخې بيا دا هله او يوازې هله چې $\forall x !B(x) \in \Gamma^*$ وي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-003) د سرچينې په وروستۍ فورمول کښې د استقرا له اوسني حالت سره ناسمه فورمول-لنډه راغلې؛ دلته د همدې حالت لنډه کارول شوې.
9. $A \equiv \exists x !B(x) : \mathcal{M}(\Gamma^*) \models A$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه ترمي t دپاره $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models !B(t)$ وي (7.12). د استقرا د فرضيې له مخې، دا هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه ترمي t دپاره $B(t) \in \Gamma^*$ وي. د 7.8 له مخې بيا دا هله او يوازې هله چې $\exists x !B(x) \in \Gamma^*$ وي.

□

7.7 عينيت

په مخکښې برخه کېنې د ترمي مدل ورکړل شوې جوړونه د هغو ستونو Γ دپاره د اول مرتبې د منطق د بشپړوالي ثابتولو ته بس ده چې $=$ نه لري. ترمي مدل هر داسې $A \in \Gamma^*$ رښتونه کوي چې $=$ نه لري (او په دې توگه ټول $A \in \Gamma^*$ هم). خو که $=$ موجود وي، دا کار نه کوي. لامل دا دے چې بيا بنائې Γ^* داسې يوه تړلۍ فارمول $t = t'$ ولري، خو په ترمي مدل کېنې د هر ترمي قيمت پخپله هماغه ترم دے. نو که t او t' بېل ترمونه وي، په ترمي مدل کېنې ئې قيمتونه، يعنې

په ترتيب سره t او t' ، هم بېل دي؛ ځکه $t = t'$ ناسم دے۔ خو دا ستونزه د هغې جوړونې په کارولو هوارولې شو چې «خارج قسمت جوړونه» بللې شي۔

تعريف 7.14. فرض کړئ Γ^* په $\mathcal{L}$ کښې د جملويو سازکار او بشپړ سټ دے۔ د $\mathcal{L}$ د تړلو ترمونو پر سټ اړیکه $\approx$ داسې تعريفوو:

$$t \approx t' \quad \text{هله او يوازې هله چې} \quad t = t' \in \Gamma^*$$

قضيه 7.15. اړیکه $\approx$ لاندې خاصيتونه لري:

1. $\approx$ انعکاسي ده۔

2. $\approx$ متناظره ده۔

3. $\approx$ انتقالي ده۔

4. که $t \approx t'$ وي، f يوه تابع وي، او $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ تړلي ترمونه وي، نو

$$f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \approx f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n).$$

5. که $t \approx t'$ وي، R يو پريديکات وي، او $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ تړلي ترمونه وي، نو

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^* \quad \text{هله او يوازې هله چې}$$

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

ثبوت. ځکه Γ^* سازکار او بشپړ دے، نو $t = t' \in \Gamma^*$ هله او يوازې هله چې $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي۔ نو د لاندې خبرو ښودل کافي دي:

1. د هر تړلي ترم t دپاره $\Gamma^* \vdash t = t$ ۔

2. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي، نو $\Gamma^* \vdash t' = t$ ۔

3. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ او $\Gamma^* \vdash t' = t''$ وي، نو $\Gamma^* \vdash t = t''$ ۔

4. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي، نو

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$$

د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-004) د سرچينې په لومړي تابعي ترم کښې يوه تکراري کامه وه؛ دلته لري شوې ده۔ دا د هرې n -مقامي تابع f او تړلو ترمونو $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ دپاره سم دي۔

5. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ او $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n)$ وي، نو $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$ د هر n -مقامي پريديکات R او تړلو ترمونو $t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_n$ دپاره۔

□

تمرین 7.16. د 7.15 ثبوت بشپړ کړئ۔

تعريف 7.17. فرض کړئ Γ^* په يوه ژبه $\mathcal{L}$ کېنې يو سازگار او بشپړ سټ دے، t يو ترلے ترم دے، او $\approx$ د مخکېنې تعريف اړیکه ده. بيا:

$$[t]_{\approx} = \{t' : t' \in \text{Trm}(\mathcal{L}), t \approx t'\}$$

$$\text{Trm}(\mathcal{L})/\approx = \{[t]_{\approx} : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\}$$

تعريف 7.18. فرض کړئ $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\Gamma^*)$ د Γ^* هغه ترمي مدل دے چې په 7.10 کېنې راغلے. بيا $\mathcal{M}/\approx$ لاندې جوړښت ده:

$$1. |\mathcal{M}/\approx| = \text{Trm}(\mathcal{L})/\approx$$

$$2. c^{\mathcal{M}/\approx} = [c]_{\approx}$$

$$3. f^{\mathcal{M}/\approx}([t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx}) = [f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx}$$

$$4. \langle [t_1]_{\approx}, \dots, [t_n]_{\approx} \rangle \in R^{\mathcal{M}/\approx} \text{ هله او يوازې هله چې } \mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n) \text{ وي؛ يعنې هله او يوازې هله چې } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ وي.}$$

پام وکړئ چې $f^{\mathcal{M}/\approx}$ او $R^{\mathcal{M}/\approx}$ مو د $\text{Trm}(\mathcal{L})/\approx$ پر عناصرو داسې تعريف کړي چې هغوی مو د $[t]_{\approx}$ په ښه ياد کړي؛ يعنې د استازو $t \in [t]_{\approx}$ له لارې. بايد باوري کړو چې دا تعريفونه د دې استازو پر انتخاب پورې تړلي نه دي؛ يعنې د نورو داسې انتخابونو t' دپاره چې هماغه د هم ارزښتي ټولگي ټاکي ($[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$)، تعريفونه هماغه پايله ورکړي. د بېلگې په توگه، که R يو يو-مقامي پريديکات وي، د تعريف وروستۍ فقره وايي چې $[t]_{\approx} \in R^{\mathcal{M}/\approx}$ هله او يوازې هله چې $\mathcal{M} \models R(t)$ وي. که د کوم بل ترم t' دپاره چې $t \approx t'$ وي، $\mathcal{M} \not\models R(t')$ ، نو تعريف به وغواړي چې $[t']_{\approx} \notin R^{\mathcal{M}/\approx}$. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-005) د سرچينې په منفي صدق فورمول کېنې د لومړي استازي ښه راغلې وه؛ د جملې د «بل ترم» او ورپسې ټولگي له مخې دلته د بل استازي ښه کارول شوې ده. که $t \approx t'$ وي، نو $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ ؛ خو نه شو کولې چې هم $[t]_{\approx} \in R^{\mathcal{M}/\approx}$ او هم $[t]_{\approx} \notin R^{\mathcal{M}/\approx}$ ولرو. خو 7.15 تضمينوي چې دا نه شي پېښېدلے.

قضيه 7.19. $\mathcal{M}/\approx$ په ښه ډول تعريف شولے دے؛ يعنې که $t_1, \dots, t_n, t'_1, \dots, t'_n$ تړلي ترمونه وي، او د هرې اړوندې جوړې دپاره $t_i \approx t'_i$ وي، نو

$$1. [f(t_1, \dots, t_n)]_{\approx} = [f(t'_1, \dots, t'_n)]_{\approx} \text{ يعنې}$$

$$f(t_1, \dots, t_n) \approx f(t'_1, \dots, t'_n)$$

او

$$2. \mathcal{M} \models R(t_1, \dots, t_n) \text{ هله او يوازې هله چې } \mathcal{M} \models R(t'_1, \dots, t'_n) \text{ وي؛ يعنې}$$

$$R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ هله او يوازې هله چې } R(t'_1, \dots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

□

ثبوت. له 7.15 څخه پر n د استقرا له لارې ترلاسه کېږي.

د ترمي مدل د حالت په څېر، د صدق لمې تر ثبوت مخکېنې لاندې لمې ته اړتيا لرو.

لم 7.20. فرض کړئ $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\Gamma^*)$ ؛ بيا $\text{Val}^{\mathcal{M}/\approx}(t) = [t]_{\approx}$.

□

ثبوت. ثبوت د 7.11 له ثبوت سره ورته دے۔

تمرین 7.21. د 7.20 ثبوت بشپړ کړئ۔

لم 7.22. د ټولو جملو A دپاره $\mathcal{M}/\approx \models A$ هله او یوازې هله چې $A \in \Gamma^*$ وي۔

ثبوت. پر A د استقرا له لارې، کټ مټ د 7.13 د ثبوت په څېر۔ یوازې هغه حالت زیات پام غواړي چې $A \equiv t = t'$ وي۔

وي (د $\mathcal{M}/\approx$ د تعریف له مخې) $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ هله او یوازې هله چې $\mathcal{M}/\approx \models t = t'$

وي (د $[t]_{\approx}$ د تعریف له مخې) $t \approx t'$ هله او یوازې هله چې

وي (د $\approx$ د تعریف له مخې)۔ $t = t' \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې

□

پام وکړئ: سره له دې چې $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ تل د شمېر وړ او نامتناهي دے، $\mathcal{M}/\approx$ ښايي متناهي وي، ځکه کېدلې شي چې د $[t]_{\approx}$ ټولګي یوازې متناهي شمېر وي۔ دا تمه کېدونکې ده، ځکه ښايي Γ داسې ترلي فارمولونه ولري چې هره هغه جوړښت چې دوی پکښې رښتوني وي، باید متناهي وي۔ د بېلګې په توګه، $\forall x \forall y x = y$ یوه سازګاره ترلے فارمول ده، خو یوازې په هغو جوړښتونه کېنې رښتوني کېږي چې د تعریف ساحه ئې کټ مټ یو غړے لري۔

7.8 د بشپړتيا قضيه

رائی خپلې پایلې سره یوځای کړو: د بشپړتيا قضیې ته رسېږو۔

قضیه 7.23 (د بشپړتيا قضیه). فرض کړئ Γ د ترلي فارمولونه یو سټ دے۔ که Γ سازګار وي، نو د صدق وړ دے۔

ثبوت. فرض کړئ Γ سازګار دے۔ د 7.7 له مخې، یو مشبوع سازګار سټ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ شته۔ د 7.9 له مخې، داسې $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ شته چې سازګار او بشپړ دے۔

ځکه $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ ، نو د هرې فارمول $A(x)$ دپاره Γ^* په لاندې بڼه یوه ترلے فارمول لري: $\exists x !A(x) \rightarrow !A(c)$ او په دې توګه Γ^* مشبوع دے۔ که $\Gamma = \Gamma^*$ ، نو د 7.13 له مخې، $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models !A$ هله او یوازې هله چې $A \in \Gamma^*$ وي۔ له دې څخه په تېره بیا دا ترلاسه کېږي چې د ټولو $A \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M}(\Gamma^*) \models !A$ ؛ نو Γ د صدق وړ دے۔ که $\Gamma \neq \Gamma^*$ ، ولري، نو د 7.22 له مخې د ټولو ترلي فارمولونه A دپاره $\mathcal{M}/\approx \models !A$ هله او یوازې هله چې $A \in \Gamma^*$ وي۔ په تېره بیا، د ټولو $A \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M}/\approx \models !A$ ؛ نو Γ د صدق وړ دے۔

□

نتیجه 7.24 (د بشپړتيا قضیه، دویمه بڼه). د ټولو Γ او ترلي فارمولونه A دپاره: که $\Gamma \models !A$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$ ۔

ثبوت. پام وکړئ چې په 7.24 او 7.23 کېنې Γ گاڼې په کلي ډول کيټ ټاکل شوې دي. د دې دپاره چې ځان کېږدئ نه کړو، 7.23 د يوه بېل متغير په کارولو بيا بيانوو: د ترلي فارمولونه د هر سټ Δ دپاره، که Δ سازگار وي، نو د صدق وړ دے. د نقيض عکس له مخې، که Δ د صدق وړ نه وي، نو Δ ناسازگار دے. دا به د لازمي نتيجه په ثبوت کېنې وکاروو.

فرض کړئ $\Gamma \models A$. بيا د معنایي استلزام او د صدق نه وړتيا قضيه [OLP] له مخې $\Gamma \cup \{\neg A\}$ د صدق وړ نه دے. که $\Gamma \cup \{\neg A\}$ خپل Δ ونيسو، د 7.23 مخکېنې بڼه راکوي چې $\Gamma \cup \{\neg A\}$ ناسازگار دے. د قضیې 3.25، 4.25، 5.25 او 6.31 له مخې $\Gamma \vdash A$. $\square$

تمرین 7.25، 7.24 وکاروئ چې 7.23 ثابت کړئ، او په دې توګه وښیئ چې د بشپرتيا قضیې دواړه بيانونه هم ارزښته دي. تمرین 7.26. د دې دپاره چې د اشتقاق نظام بشپړ وي، قاعدې ئې بايد دومره پیاوړې وي چې هر د صدق وړ نه سټ ناسازگار ثابت کړي. د بشپرتيا د ثبوت دپاره د اشتقاق کومې قاعدې اړينې وې؟ آيا له دې قاعدو څخه کومه يوه د ثبوت په هېڅ ځای کېنې نه ده کارول شوې؟ د دې پوښتنو د ځواب دپاره داسې يو لړيا شکل جوړ کړئ چې وښيي د اشتقاق کومې قاعدې په هغو کومو پایلو کېنې کارول شوې چې د 7.23 ثبوت ته رسېږي. په دې ثبوتونو کېنې د قاعدو هر ضمني استعمال هم خاځا ياد کړئ.

7.9 د متناهي شاهد قضيه

د بشپرتيا قضیې يوه مهمه پايله د متناهي شاهد قضيه ده. د متناهي شاهد قضيه وايي چې که د ترلي فارمولونه د يوه سټ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ وي، نو ټول سټ د صدق وړ دے، حتی که سټ پخپله نامتناهي وي. دا هېڅ څرګنده خبره نه ده. لږ تر لږه په لومړي نظر داسې هېڅ څه نه ښکاري چې د ترلي فارمولونه د داسې نامتناهي سټونو امکان رد کړي چې متناقض وي، خو تناقض ئې، په اصطلاح، يوازې له نامتناهي شمېر څخه راوړلایږي. د متناهي شاهد قضيه وايي چې داسې حالت رډېدل شي: د ترلي فارمولونه داسې د صدق وړ نه نامتناهي سټونه نشته چې هر متناهي فرعي سټ ئې د صدق وړ وي. د بشپرتيا قضیې په څېر، د دې يوه بڼه هم له استلزام سره تړاو لري: که د ترلي فارمولونه يو نامتناهي سټ کوم څه لازمي، نو لا له وړاندې ئې يو متناهي فرعي سټ لازمي.

تعريف 7.27. د فارمولونه يو سټ Γ هله او يوازې هله په متناهي ډول د صدق وړ دے چې هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د صدق وړ وي.

قضيه 7.28 (د متناهي شاهد قضيه). د هرې د جملو ټولګې Γ او هرې جملې A دپاره لاندې خبرې سمې دي:

1. $\Gamma \models A$ هله او يوازې هله چې يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وي، داسې چې $\Gamma_0 \models A$.

2. Γ هله او يوازې هله د صدق وړ دے چې په متناهي ډول د صدق وړ وي.

ثبوت. موږ (2) ثابتوو. که Γ د صدق وړ وي، نو داسې جوړښت $\mathcal{M}$ شته چې د ټولو $A \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models A$. څرګنده ده چې همدا $\mathcal{M}$ د Γ هر متناهي فرعي سټ هم پوره کوي؛ نو Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے.

اوس فرض کړئ Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے. بيا هر متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د صدق وړ دے. د سموالي له مخې (قضیې 3.39، 4.37، 5.39 او 6.45)، هر متناهي فرعي سټ سازگار دے. بيا د لاندې پایلې له مخې Γ پخپله هم بايد سازگار وي: قضیې 3.23، 4.23، 5.23 او 6.23. د بشپرتيا له مخې (7.23)، ځکه Γ سازگار دے، نو د صدق وړ دے. $\square$

تمرین 7.29. د 7.28 برخه (1) ثابته کړئ.

بېلگه 7.30. د یوې تیورۍ Γ په هر مدل $\mathcal{M}$ کېنې، هر ترم t خاځا د $|\mathcal{M}|$ یو غړې ټاکي. آیا دا هم تضمینولې شو چې د $|\mathcal{M}|$ هر غړې کوم ترم ټاکلې وي؟ په بله وینا، آیا داسې تیورۍ Γ شته چې ټول مدلونه ئې پوښلي وي؟ د متناهي شاهد قضیه ښیي چې که Γ نامتناهي مدلونه ولري، داسې نه ده. دا داسې لیدل شو: فرض کړئ $\mathcal{M}$ د Γ یو نامتناهي مدل دے، او c داسې یو ثابت سمبول دے چې د Γ په ژبه کېنې نشته. فرض کړئ Δ د ټولو هغو جملو $c \neq t$ سټ دے چې t د Γ په ژبه $\mathcal{L}$ کېنې یو ترلے ترم وي، یعنې

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\}.$$

د $\Gamma \cup \Delta$ یو متناهي فرعي سټ د $\Gamma' \cup \Delta'$ په بڼه لیکل کېدے شي، چې $\Gamma' \subseteq \Gamma$ او $\Delta' \subseteq \Delta$ وي. ځکه Δ' متناهي دے، یوازې متناهي ډېر ترمونه لرلے شي. داسې $a \in |\mathcal{M}|$ واخلي چې د $|\mathcal{M}|$ یو غړې وي او له هغوی څخه ئې هېڅ یو نه ټاکي؛ او $\mathcal{M}'$ داسې جوړښت واخلي چې کټ مټ د $\mathcal{M}$ په څېر وي، خو $c^{\mathcal{M}'} = a$ هم ولري. ځکه په Δ' کېنې د راغلو ټولو t دپاره $a \neq \text{Val}^{\mathcal{M}'}(t)$ ، نو $\mathcal{M}' \models \Delta'$. ځکه $\mathcal{M} \models \Gamma$ ، $\Gamma' \subseteq \Gamma$ ، او c په Γ کېنې نه راځي، نو $\mathcal{M}' \models \Gamma'$ هم. دواړه سره یوځای راګوري چې د $\Gamma \cup \Delta$ د هر متناهي فرعي سټ $\Gamma' \cup \Delta'$ دپاره $\mathcal{M}' \models \Gamma' \cup \Delta'$. نو د $\Gamma \cup \Delta$ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ دے. د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \Delta$ پخپله د صدق وړ دے. نو داسې مدلونه شته چې $\mathcal{M} \models \Gamma \cup \Delta$. هر داسې $\mathcal{M}$ د Γ مدل دے، خو پوښلے نه دے، ځکه د $\mathcal{L}$ د ټولو ترمونو t دپاره $\text{Val}^{\mathcal{M}}(c) \neq \text{Val}^{\mathcal{M}}(t)$.

بېلگه 7.31. داسې یوه ژبه $\mathcal{L}$ په پام کېنې ونیسئ چې پریدیکات $<$ ، ثابت سمبولونه 0 او 1 ، او تابعې $+$ ، $\times$ او $-$ ولري. فرض کړئ Γ په دې ژبه کېنې د ټولو هغو ترلي فارمولونه سټ دے چې په جوړښت $\mathcal{Q}$ کېنې رښتوني دي، چې د تعریف ساحه ئې $\mathbb{Q}$ او تفسیرونه ئې څرګند دي. Γ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو ترلي فارمولونه سټ دے چې د ناطقو عددونو په اړه رښتوني دي. څرګنده ده چې په $\mathbb{Q}$ (او حتی په $\mathbb{R}$) کېنې داسې عددونه r نشته چې له 0 څخه لوی، خو د ټولو $k \in \mathbb{Z}^+$ دپاره له $1/k$ څخه کوچني وي. که داسې عدد موجود وای، یو ډېر کوچنۍ عدد به و: له صفره بېل، خو ډېر حده کوچنۍ. د متناهي شاهد قضیه د دې ښودلو دپاره کارېدلے شي چې د Γ داسې مدلونه شته چې ډېر کوچنۍ عددونه پکېنې موجود دي. زموږ په ژبه کېنې د تقسیم تابع نشته (پر صفر تقسیم ناتعریف دے، او تابعې باید په بشپړو تابعو تفسیر شي). خو بیا هم څرګندولے شو چې $r < 1/k$ ، ځکه دا هله او یوازې هله سم دي چې $r \cdot k < 1$ او s یو نوے ثابت سمبول ونیسئ او Δ داسې وټاکئ:

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \bar{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(چې $\bar{k} = (1 + (1 + \dots + (1 + 1) \dots))$ کېنې k ځله 1 راغلے). د Δ د هر متناهي فرعي سټ Δ_0 دپاره داسې K شته چې په Δ_0 کېنې د ټولو ترلي فارمولونه $c \times \bar{k} < 1$ دپاره $k < K$ وي. که $\mathcal{Q}$ داسې $\mathcal{Q}'$ ته پراخه کړو چې $c^{\mathcal{Q}'} = 1/K$ ولري، نو د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\mathcal{Q}' \models \Gamma_0 \cup \Delta_0$ ؛ نو $\Gamma \cup \Delta$ په متناهي ډول د صدق وړ دے (تمرین: دا په تفصیل ثابت کړئ). د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \Delta$ د صدق وړ دے. د $\Gamma \cup \Delta$ هر مدل $\mathcal{Q}$ یو ډېر حده کوچنۍ عدد لري؛ یعنې $c^{\mathcal{Q}}$.

تمرین 7.32. د حساب په معیاري مدل $\mathcal{M}$ کېنې داسې هېڅ غړې $k \in |\mathcal{M}|$ نشته چې هره صیغه $\bar{n} < x$ پوره کړي (چې $\bar{n}$ هغه $0' \dots'$ دے چې n دانې لري). د متناهي شاهد قضیه وکاروئ او وښئ چې د حساب په ژبه کېنې هغه ترلي فارمولونه چې د حساب په معیاري مدل $\mathcal{M}$ کېنې رښتوني دي، په داسې جوړښت $\mathcal{M}'$ کېنې هم رښتوني دي چې یو داسې غړې لري چې په رښتیا هره صیغه $\bar{n} < x$ پوره کوي.

بېلگه 7.33. پوهېږو چې له عينيت سره د اول مرتبې منطق دا څرگندولې شي چې د د تعريف ساحه كچه بايد لږ تر لږه ټاكلي اندازه ولري: جمله $A_{\geq n}$! (چې وايي «لږ تر لږه n بېل څيزونه شته») يوازې په هغو جوړښتونو كښې رښتوني ده چې $|M|$ لږ تر لږه n څيزونه ولري. نو كه داسې وټاكو:

$$\Delta = \{A_{\geq n} : n \geq 1\}$$

بيا د Δ هر مدل بايد نامتناهي وي. په دې توگه يوې تيورۍ ته د Δ په ورزياتولو تضمينولې شو چې يوازې نامتناهي مدلوله ولري: د $\Gamma \cup \Delta$ مدلوله كټ مټ د Γ نامتناهي مدلوله دي.

نو د اول مرتبې منطق نامتناهي والې څرگندولې شي. خو د متناهي شاهد قضيه ښيي چې متناهي والې نه شي څرگندولې. ځكه فرض كړئ د جملو كوم سټ Λ په ټولو او يوازې متناهي جوړښتونه كښې رښتوني وي. بيا $\Delta \cup \Lambda$ په متناهي ډول د صدق وړ دے. ولې؟ فرض كړئ $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ متناهي دے، چې $\Delta' \subseteq \Delta$ او $\Lambda' \subseteq \Lambda$ وي. كه لومړۍ فرعي سټ خالي وي، د اندېكس ارزښت يو ټاكو، او كه خالي نه وي، n دې تر ټولو لوی هغه عدد وي چې $A_{\geq n} \in \Delta'$! د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-006) سرچينه سمدستي تر ټولو لوی اندېكس ټاكي، خو خالي متناهي فرعي سټ داسې اندېكس نه لري؛ دلته خالي حالت جلا ونيول شو. ځكه Λ په ټولو متناهي جوړښتونو كښې رښتوني دے، داسې مدل M لري چې متناهي ډېر، خو $n \geq$ ، غري ولري. خو بيا $M \models \Delta' \cup \Lambda'$ د متناهي شاهد قضيه له مخې، $\Delta \cup \Lambda$ يو نامتناهي مدل لري، او دا له هغې فرضيې سره تناقض لري چې Λ يوازې په متناهي جوړښتونه كښې رښتوني دے.

7.10 د متناهي شاهد قضيه نېغ ثبوت

د بشپرتيا قضيه له كارولو پرته، د بشپرتيا قضيه د ثبوت د هماغو نظرونو په كارولو، د متناهي شاهد قضيه نېغ په نېغه ثابتولې شو. د بشپرتيا قضيه په ثبوت كښې مو د ترلي فارمولونه له يوه سازگار سټ Γ څخه پيل وكړ، هغه مو د ترلي فارمولونه يوه سازگار، مشبوع او بشپړ سټ Γ^* ته پراخ كړ، او بيا مو وښودله چې له Γ^* څخه په جوړ شوي ترمي مدل $M(\Gamma^*)$ كښې د Γ ټولې ترلي فارمولونه رښتوني دي؛ نو Γ د صدق وړ دے.

همدا طريقه د دې ښودلو دپاره كارولې شو چې د جملو يو په متناهي ډول د صدق وړ سټ، د صدق وړ دے. يوازې د هغو پايلو اړوندې ښې ثابتول پكار دي چې د صدق لمې ته رسېږي، او پكښې «سازگار» په «په متناهي ډول د صدق وړ» بدلولو.

قضيه 7.34. فرض كړئ Γ ، بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ دے. بيا:

$$1. (A \wedge !B) \in \Gamma \text{ هله او يوازې هله چې دواړه } A \in \Gamma \text{ او } B \in \Gamma \text{ وي.}$$

$$2. (A \vee !B) \in \Gamma \text{ هله او يوازې هله چې يا } A \in \Gamma \text{ يا } B \in \Gamma \text{ وي.}$$

$$3. (A \rightarrow !B) \in \Gamma \text{ هله او يوازې هله چې يا } A \notin \Gamma \text{ يا } B \in \Gamma \text{ وي.}$$

تمرين 7.35، 7.34 ثابت كړئ. $\vdash$ مه كاروئ.

لم 7.36. هر په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ يو مشبوع، په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ' ته غځېدلی شي.

تمرين 7.37، 7.36 ثابت كړئ. (اشاره: مهم كام دا ښودل دي چې كه Γ_n په متناهي ډول د صدق وړ وي، نو $\{D_n\} \cup \Gamma_n$ هم همداسې دے؛ بې له دې چې اشتقاقونه يا سازگاري ته مراجعه وشي.)

قضيه 7.38. فرض کړئ Γ بشپړ، په متناهي ډول د صدق وړ، او مشبوع دے.

1. $\exists x!A(x) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې لږ تر لږه د يوه تړلي ترم t دپاره $A(t) \in \Gamma$ وي.

2. $\forall x!A(x) \in \Gamma$ هله او يوازې هله چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $A(t) \in \Gamma$ وي.

تمرین 7.39. 7.38 ثابت کړئ.

لم 7.40. هر په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ يو بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ^* ته غځېدلی شي.

تمرین 7.41. 7.40 ثابت کړئ. (اشاره: مهم گام دا ښودل دي چې که Γ_n په متناهي ډول د صدق وړ وي، نو يا $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ يا $\Gamma_n \cup \{\neg!A_n\}$ په متناهي ډول د صدق وړ دے.)

قضيه 7.42. (د متناهي شاهد خاصيت) Γ هله او يوازې هله د صدق وړ دے چې په متناهي ډول د صدق وړ وي.

ثبوت. که Γ د صدق وړ وي، نو داسې جوړښت $\mathcal{M}$ شته چې د ټولو $A \in \Gamma$ دپاره $\mathcal{M} \models A$ وي. څرگنده ده چې همدا $\mathcal{M}$ د Γ هر متناهي فرعي سټ هم پوره کوي، نو Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے.

اوس فرض کړئ Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے. د 7.36 له مخې، داسې په متناهي ډول د صدق وړ مشبوع سټ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ شته. د 7.40 له مخې، Γ' يو بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ^* ته غځېدلی شي، او Γ^* لا هم مشبوع دے. که عينيت موجود نه وي، د ترمي مدل $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ ؛ او که عينيت موجود وي، د مخکېني برخې خارج قسمت شوې ترمي مدل د 7.10 د جوړونې پر بنسټ جوړ کړئ. پام وکړئ چې 7.12 د Γ^* پر سازگاري (يا، په دې حساب، پر بشپړ والي يا مشبوع والي) تکیه نه کوله؛ يوازې پر دې ئې تکیه کوله چې $\mathcal{M}(\Gamma^*)$ پوښلې دے. د عينيت په حالت کېني د هم ارزښتي او سازگارتيا شرطونه هم نېغ له متناهي صدق وړتيا څخه ترلاسه کېږي: د هر شرط ناکامي به يو د صدق وړ نه متناهي فرعي سټ ورکړي. د صدق لمې ثبوت (7.13) هغه وخت هم سم پر مخ ئې چې 7.2 او 7.8 ته مراجعه په ترتيب سره 7.34 او 7.38 ته په مراجعه بدلې کړو. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-009) په سرچينه کېني د دې ټاکنيز شرط درېم تش ارکومېنټ پاتې شوی و؛ دلته په څرگنده توگه ورزيات شو، خو ورپسې متن د هغه پر ځای وانه خيستل شي. د عينيت په حالت کېني د برابري استقرائي حالت د خارج قسمت له تعريف څخه نېغ ترلاسه کېږي. د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-007) د سرچينې د اول مرتبې نېغ ثبوت يوازې عادي ترمي مدل يادوي، چې د عينيت لرونکې جملې نه پوښي؛ دلته د عينيت دپاره اړينه خارج قسمت جوړونه او د هغې متناهي صدق-وړتيايي دليل څرگند شو. □

تمرین 7.43. د صدق لمې (7.13) بشپړ ثبوت په هغه بڼه وليکئ چې د 7.42 د ثبوت دپاره اړينه ده.

7.11 د لوېنهام-سکولم قضيه

د لوېنهام-سکولم قضيه وايي چې که يوه تيوري نامتناهي مدل ولري، نو داسې يو مدل هم لري چې تر ډېره شمېرېدونکې لامتناهي وي. د دې خبرې يوه سملاسي پايله دا ده چې د اول مرتبې منطق دا نه شي څرگندولې چې د جوړښت کچه د شمېر نه وړ ده: هره تړلې فارمول يا د تړلي فارمولونه هر سټ چې په ټولو د شمېر نه وړ جوړښتونه کېني رښتونه وي، په کوم د شمېر وړ جوړښت کېني هم رښتونه دے.

قضيه 7.44. که Γ سازگار وي، نو يو د شمېر وړ مدل لري، يعنې په داسې جوړښت کېنې د صدق وړ دے چې د تعريف ساحه ئې يا متناهي يا شمېرېدونکې لامتناهي وي.

ثبوت. که Γ سازگار وي، د بشپرتيا قضیې ثبوت چې کوم جوړښت $\mathcal{M}$ ورکوي، د هغه د تعريف ساحه $|\mathcal{M}|$ د ژبې $\mathcal{L}$ د ترمونو له سب څخه لويه نه ده. نو $\mathcal{M}$ تر ډېره شمېرېدونکې لامتناهي دے. □

قضيه 7.45. که Γ د عينيت پرته د اول مرتبې د منطق په ژبه کېنې د تړلي فارمولونه يو سازگار سب وي، نو يو شمېرېدونکې لامتناهي مدل لري، يعنې په داسې جوړښت کېنې د صدق وړ دے چې د تعريف ساحه ئې نامتناهي او د شمېر وړ وي.

ثبوت. که Γ سازگار وي او داسې هېڅ جمله نه لري چې عينيت پکېنې راغله وي، نو د بشپرتيا قضیې ثبوت چې کوم جوړښت $\mathcal{M}$ ورکوي، د هغه د تعريف ساحه $|\mathcal{M}|$ کټ مټ د ژبې $\mathcal{L}'$ د ترمونو سب دے. نو $\mathcal{M}$ شمېرېدونکې لامتناهي دے، ځکه $\text{Trm}(\mathcal{L}')$ هم داسې دے. □

بېلگه 7.46 (د سکولم پارادوکس). د زرمولو-فرېنکل سب تيوري ZFC يو ډېر پياوړے چوکاټ دے چې کابو ټولې رياضيکي خبرې پکېنې څرگندېدلې شي، د ستونو د کچو په اړه حقيقتونه هم. نو د بېلگې په توګه، ZFC ثابتولې شي چې د حقيقي عددونو سب $\mathbb{R}$ ، د شمېر نه وړ دے؛ د کانتور قضيه ثابتولې شي چې د هر سب تواني سب پخپله له هغه سب څخه لوی دے، او داسې نور. که ZFC سازگار وي، ټول مدلونه ئې نامتناهي دي؛ او سربېره پر دې، ټول داسې غړي لري چې تيوري ئې په اړه وايي چې د شمېر نه وړ دي، لکه هغه عنصر چې د ZFC دا قضيه رښتوني کوي چې د طبيعي عددونو تواني سب موجود دے. د لوېنېم-سکولم قضیې له مخې، ZFC، د شمېر وړ مدلونه هم لري: داسې مدلونه چې «د شمېر نه وړ» ستونه لري، خو پخپله د شمېر وړ دي.