Contrôle des règles lexicales

Fragments exacts des groupes corrigés. Les termes définis et les occurrences indiquées de resp. restent sans règle ; les unités mathématiques restent littérales.

Folio 616; groupe 246

Soit $m \in \mathbb{Z}$. Un faisceau cohérent F sur X est dit m-régulier si, en chaque point du support de F, $O_X(1)$ est engendré par ses sections globales et si, pour tout $q \geq 1$, on a

Folio 639; groupe 321

Soient k un corps algébriquement clos, Y un k-schéma normal, projectif muni d'un faisceau ample $O_Y(1)$, et X le schéma des zéros d'une section φ de $O_Y(1)$. On suppose que Y soit de dimension ≥ 3 (resp. ≥ 2). Alors le morphisme $\mathrm{Pic}_{Y/k} \longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/k}$ (resp. le morphisme $\mathrm{Pic}^{\tau}_{Y/k} \to \mathrm{Pic}^{\tau}_{X/k}$ (voir 4.1)) est de type fini et a un noyau N qui est un groupe fini (non-réduit en général).

Folio 644; groupe 329

Soient X, Y propres sur un schéma S et $f : X \to Y$ un morphisme surjectif (resp. le morphisme d'inclusion du schéma des zéros d'une section φ d'un faisceau ample $O_Y(1)$, sous les hypothèses de 3.8). Alors

Folio 658; groupe 369

Soit k un corps. On appelle k-cycle positif spécial de dimension r tout k-schéma projectif X, muni d'un faisceau $O_X(1)$ très ample, qui est réunion de sous-schémas fermés X_j de dimension r, X_j étant obtenu par un changement de base $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k_j)$ comme image inverse d'un k_j-schéma intègre X'_j (muni de $O_{X'_j}(1)$). On appelle degré de X le coefficient a_r dans le polynôme de Hilbert $\chi(O_X(n)) = \sum a_i \binom{n+i}{i}$.

Folio 658; groupe 370

Soient k un corps algébriquement clos et X un k-cycle positif spécial de dimension r et degré d. Alors O_X est un $(0, \ldots, 0, d)$-faisceau.

Folio 567; deux occurrences effectivement réglées

resp resp

Folio 605; numéro de paragraphe ordinaire

3.2. échantillon du seul style du numéro