

选择题（8+2）4' 6'

常用策略和备考重点：

1. 平时要努力做出所有选项，考试善用排除法，优选对判断类问题下手，计算可能不用做
2. 寻找矛盾点，有时A对的话B就错，利用关性或冲突解决问题
3. 回归教材，如物理学史，原子物理，波动光学，电磁波，单位制等问题不要出错
4. 基本公式，普通二级结论该了解的不能丢，比如，碰撞公式，电磁感应方向判断，Q的计算
5. 单位法计算与判断，如求F，表达式中所有单位计算应为 $N=kg\cdot m/s^2$
6. 针对运动合成与分解，动态受力分析，带电粒子在磁场中的偏转等问题，能作图就别计算，注意正负及应理
7. 图象问题 ⇒适用于实验题

(I) 观察图象原点是否为(0,0)，单位是否标准化（mA，$\times 10^{-3}$）

(II) 分析图象横纵坐标；多图象关联注意交点是否有含义（可能不对应同一坐标系

确定横纵坐标是否为常规关系，确定表达式

(III) 若为非常规关系，优先分析题意中的基本关系，再利用物理表达式对之进行代换

(IV) 分析交点，k（导数），面积含义

PS：k切与k割

k切（某点导数）
k割（平均斜率）
⇒反应到二阶关系

S：(1) 有正负，仅为代数关系，大小与绝对值相关 ⇒计算关系

(2) 注意，S含义很容易是横纵坐标之积；ΔS可能另有作用，反应差值关系

实验题（10+12+14+16）（力争电较多） 力求满分

优先注意课本上已有的实验（我印象中有的）

测量小车速度与加速度；力的合成与分解；验证牛二定律；运动合成与分解；平抛运动的关系；圆周运动求向心力与向心加速度；地一月验证万有引力扭秤实验测G与k（静电力常量）；验证机械能守恒；电容器的充放电；测电阻率；万用表使用；测电源电动势与内阻；探究替代曲线法制黑箱实验；变压器规律；自感现象；验证动量守恒；利用单摆测定g；油膜法测分子直径；理想气体状态方程的验证；光电效应

难点：(1) 计算：{计算量 / 公式表达 / 单位（数量级，有效数字）} ⇒一切以实验目的的基本公式出发，进行数学代换与变形 } 统一

(2) 误差分析：{读数、测量、计算误差：只能减少，不能避免。⇒严谨操作，图象计算
系统误差：分析误差来源 ⇒可计算的代入公式判断}

(3) 创新实验（不会脱离基本实验）

实验器材：

打点计时器：(1) 计时点与计数点的区别 (2) $f=50Hz$，$T=\frac{1}{f}=0.02s$（中国用，防止故意要心你改f，本质为$T=\frac{1}{f}$）

(2) 逐差法计算，相邻相同时间内 $\Delta x=aT^2$（减小误差）(4) A B C $v_B=\frac{S_{AB}+S_{BC}}{2T}$

游标卡尺：(1) 不估读 (2) 对于10，和50分度值的游标卡尺，计算后尾数为0保留

螺旋测微器 (2) 要估读 精确到0.01 (1) 大格0.5mm，小格0.01mm，计算得结果

内外接法；电表改装 ⇒电学实验常见

欧姆表：



(1) 电流红入黑出（包括万用表时电流电压表）

(2) 欧姆表盘刻度分布不均 左侧为∞，右侧为0

(3) $R_中=R_内$，读数时尽量以$R_中$左右为基准读数 可以不估读，别忘记乘以倍率

(4) 常态下指向无穷，偏转过大即靠近0，要调小倍率

(5) 改变倍率就要欧姆调零，（注意机械调零与欧姆调零的区别）

$Q=\bar{I}\cdot t$，以及油膜实验数格时注意边界格便记，少于半格不计数

计算题（10+14+16）

一：热学；功率（动态电路）；远距离输电；几何光学；核反应方程式

(1) 立足基础公式，热学中$PV=nRT$；光电$E_k=$之类

(2) 训练题型与计算能力，力求满分

二，三（基本上是一力，一电，均有极强综合性）

力学：{牛二定律 / 功能关系 / 动量} ⇒{图象法判断路程 / 利用动能定理 结合初末状态直接分析 / 变力过程：$F\cdot t=mv_2-mv_1$ / 寻找动量守恒（碰撞；只有内力（外力动为0）；人船…）}

电学：{复合场（理解难，题相易）⇒利用抵消，分解化为多种常规关系 ⇒平面几何
电磁感应（理解易，题时难）⇒{动量，能量观点 / 动态电路分析}}

高考物理重物理思维，不能死做题，要有总结和反思

数学

选择题（8+3）

单选（7题 时代，难度明显下降，需重视高正确率，尤其是5-8要能做，万一时间富余，单选力求满分）

A不能失分：1）集合 有关问题：注意子集、真子集，非空子集等描述；区分包含、属包含的关系

（2）复数有关问题及计算：注意计算到最后是原复数还是共轭复数

（3）正弦定理，余弦定理基本应用（注意 余弦的正负，到底能否确定角的范围

（4）普通不等式的使用；基本不等式；简单大小比较（作差/商），构造函数，利用单调性）

（5）古典概型；排列 组合（注意阶乘和 组合数，排列数的计算）

（6）等差，等比数列求和；一般数列通项的求解（$a_n=S_n-S_{n-1}$）

（7）指数，对数相关式子及计算；指数、对数函数 的定义及其特定性质

（8）平面向量及其相关使用；投影向量 的应用及其性质

B中档（加强训练）：（1）较复杂大小比较（极值点偏移形；中间值代换；极根思想）

（2）指对同构；对数均值不等式；导数型同构（给定导后 的关系，发现求导前形式）

（3）内接球，外接球类问题；立体几何相关体积、面积的计算

（4）三角函数的图像分析；四取值范围问题（23新考填空是最后一题）

（5）立方体中角度问题（大计算量，注意方法，慎用建系法）

（6）立体几何中关面问题（作出关面图）

（7）特定方法的排列 组合（插空法，捆绑法）

（8）容斥原理（集合、古典概型）

（9）普通圆锥曲线几何法 ☆

（10）数列 方向 ⇒ 抽象数列

多选题（9-11，3选项选出一个得2分，2选项选出不得三分 ⇒ 整体要尽力做，做出来便高分）

9 ⇒ 优先向全对满分，不要出错 ⇒ 注意 课本基本概念不要出错

10 ⇒ 可以花时间做，有时间要做出来 ⇒ 来自课后题 概率不小

11 ⇒ 新定义，回归基础，能多少是多少 ⇒ 如 24年特殊曲线

填空题：与上面题型在一起 知识点一般较全且不重复，三类小题一起可以有较长时间的限时训练

大题（改革后为5题，根是 原22题中大大题型的整合，复习思路仍可以如此

（1）解三角形 ⇒ 正/余弦定理的综合使用与变形；基本不等式的综合运用；向量方法的使用

（2）数列 ⇒ 基本等比/等差数列 公式；奇偶项 数列；特征根 ⇒ 错位相减；裂项 相消；转化 替代

（3）概率 统计 ⇒ 古典概型；二项式定理 的巧用；二项分布/超几何分布/正态分布；全概率公式/贝叶斯公式 ⇒ 数感；数列 综合；概率学基本理解

（4）立体几何 ⇒ 角度计算；入计算 ⇒ 建系；空间向量法 ☆；几何法 ☆ ⇒ 有时比建系好用

（5）导数：类型多同学，最基本的几类 ⇒ 对数均值不等式；含参讨论（对数单集构）；零点存在性定理；洛必达（必要性探路）

（6）圆锥曲线 ⇒ 三大定义；光学性质（切线）；弦长公式：$\frac{\Delta}{|a|}$；坐标系转换；未达求解；极点-极线 ⇒ 计算能力!!!

B5: B-9:

1. 三类定义

(1) $|PF_1|\pm|PF_2|=2a$, $|F_1F_2|=2c$

(2) 动点到定点与定直线距离之比为定值 e

(3) 动点与定点、斜率之积为定值 $\pm\frac{b^2}{a^2}$

} 直线作图，标明边长，普通几何计算

2. 焦点弦与焦半径



$|PF|=\frac{p}{1-\cos\theta}$

$|AB|=\frac{2p}{\sin^2\alpha}$

3. 定比分点

(1)



$\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$

$e\cos\theta=\left|\frac{\lambda-1}{\lambda+1}\right|$ } 双曲线也适用 ⇒ 常见

(2)



$|AF|=m$

$|BF|=n$ ⇒ $\cos\theta=\left|\frac{m-n}{m+n}\right|=\left|\frac{\lambda-1}{\lambda+1}\right|$

$\frac{|AF|}{|BF|}=\lambda$ 也是向量关系

4. 求 e：{ 构造 含 a,b,c（齐次）方程；求 a,b,c 中两个

5. 抛物线特定结论（设点即可证明）



(1) $y_1y_2=-p^2$, $x_1x_2=\frac{p^2}{4}$

(2) $|AB|=x_1+x_2+p$

(3) $|AB|=\frac{2p}{\sin^2\theta}$

(4) $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BF}=0$

(5) 以AB为直径的圆与准线相切

(6) $A_1F\perp B_1F$

(7) 若M为A_1B_1中点 $AM\perp BM$, $MF\perp AB$

(8) $\overrightarrow{AO}=\lambda\overrightarrow{OB}$ $\overrightarrow{BO}=\mu\overrightarrow{OA_1}$（共线）

(9) $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$

6. 切线类问题（切点 (x_0,y_0)）

对原方程 ⇒ $x^2\to x_0x$ $x\to\frac{x_0x}{2}$

$y^2\to y_0y$ $y\to\frac{y_0y}{2}$



利用 $\theta_1=\theta_2$ 切线方程

可证明抛物线（圆锥曲线）光学性质

7. 曲线轨迹

(1) 定义法

(2) 设 $Q(x,y)$ 相关点 (x_0,y_0) 代入 P，得 Q 的轨迹

(3) 设某一参数 t，利用 t 寻找 x,y 关系

(4) 交轨消参：两动曲线消去相同参数，求出动曲线交点轨迹

8. 丹德林双球模型

B-8: 容斥原理 Card 势、集合中元素个数（必修一课后拓展）



S_1: card(1∩2)

S_2: card(1∩3)

S_3: card(2∩3)

S_0: card(1∩2∩3)

$\text{card}(1)+\text{card}(2)+\text{card}(3)-\text{Card}(1\cap2)-\text{Card}(1\cap3)-\text{card}(2\cap3)+\text{card}(1\cap2\cap3)=S_{总}$

⇒ 某区域重叠部分为 $(1,3,5,7\cdots 2n+1)$ 处重叠，card为正

为 $(2,4,6,8\cdots 2n)$ 处重叠，card为负

B-10.: 抽象数列

(1) 重点利用 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 或 $S_n = S_{n-1} + a_n$ 代入后进行代换

(2) 特征方程求数列通项

eg. $a_n = ca_{n-1} + d$ 型

$a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 3$ ⇒ 特征方程 $x = 2x + 3$ ⇒ 特征根 $x = -3$ ⇒ 不要在试卷上写

$a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$ ⇒ $\{a_n + 3\}$ 是等比数列, 公比为2

(3) 2023· 新高考I卷T21 1.乙两人投篮,每次由其中一人投篮,规则如下:若命中则此人继续投籃,若未命中则换为对方投 篮.无论之前投篮情况如何,甲每次投篮的命中率均为0.6,乙每次投篮的命中率均为0.8.由抽 签确定第1次投篮的人选,第1次投篮的人是甲、乙的概率各为0.5. (1)求第2次投篮的人是乙的概率; (2)求第i次投篮的人是甲的概率: (3)已知:若随机交量,服从两点分布,且 $P(X=1)=1-P(X=0)=4i=1,2,n$,则 记前〃次(即从第1次到第#次投篮)中甲投篮的次数为Y,求(Y).

(2) 假设 第 $i-1$ 次 ($i \geq 1$) 在甲手中概率 P_{i-1}, 则在乙中概率 $1-P_{i-1}$

$P_i = 0.5P_{i-1} + 0.5(1-P_{i-1})$ ⟺ ⇒ 代入特征方程即可

同曲同构思想: 从P出发的两条直线, 经过某曲线停在另一曲线上, 曲线上坐标. 斜率此值或起点位同步, 同构

eg $\begin{cases} Ax_1 + By_1 + C = 0 \\ Ax_2 + By_2 + C = 0 \end{cases}$ $M(x_1, y_1)$ $N(x_2, y_2)$

直线 MN: $Ax + By + C = 0$ ⇒ A, B, C 为该直线特征

(x_1, y_1) (x_2, y_2) 为原曲线特征

阿基米德三角形　$y^2=2px$　$A(x_1,y_1)$ $B(x_2,y_2)$ $M(\frac{x_1+x_2}{2},\frac{y_1+y_2}{2})$



点：$\begin{cases} l_{PA}: yy_1=p(x+x_1) \\ l_{PB}: yy_2=p(x+x_2) \end{cases} \Rightarrow x_P=\frac{y_1y_2}{2p},\ y_P=\frac{y_1+y_2}{2}$

$\Rightarrow$ 直线 $PM \parallel x$ 轴

引入 $N(x_3,y_3)$ 切线 C 过 N　出现 $\triangle BDN$，$\triangle ACD$（也为阿基米德三角形）

同上：$\begin{cases} x_C=\frac{y_1y_3}{2p},\ y_C=\frac{y_1+y_3}{2} \\ x_D=\frac{y_2y_3}{2p},\ y_D=\frac{y_2+y_3}{2} \end{cases}$

特别地，若 $\overrightarrow{PN}=\lambda\overrightarrow{PM}$（$N\notin PM$上）则 N 为 PM 中点、过 N 的切线 $\parallel AB$（代入坐标，可利用向量，易证）

线 $\begin{cases} \frac{|AC|}{|CP|}=\frac{|x_A-x_C|}{|x_C-x_P|}=\frac{|y_1-y_3|}{|y_3-y_2|} \\ \text{同理 } \frac{|PD|}{|DB|}=\frac{|CN|}{|ND|}=\frac{|y_1-y_3|}{|y_3-y_2|} \end{cases} \Rightarrow \underline{\frac{|AC|}{|CP|}=\frac{|PD|}{|DB|}=\frac{|CN|}{|DN|}}$ ☆（坐标得证）

$\begin{cases} |PF|^2=(\frac{y_1y_2}{2p}-\frac{p}{2})^2+(\frac{y_1+y_2}{2})^2=\frac{y_1^2y_2^2}{4p^2}+\frac{y_1^2+y_2^2}{4}+\frac{p^2}{4} \\ |AF||BF|=|x_1+\frac{p}{2}||x_2+\frac{p}{2}|=\frac{y_1^2y_2^2}{4p^2}+\frac{y_1^2+y_2^2}{4}+\frac{p^2}{4} \end{cases} \Rightarrow \underline{|PF|^2=|AF||BF|}$ ☆

导数：

1. 含参函数单调性讨论 ⇒ 恒成立/存在性问题
   - 求导后分离变量，对函数最值讨论
   - 指数单身狗，指数找朋友 ⇒ 转化为函数上的切线或特定值的关系
2. 单变量不等式证明
   - 直接求导证明
   - 移项构造函数
   - 分拆函数 $g(x)_{min} \geq f(x)_{max}$
   - 放缩法 ⇒ 放缩 $e^x \geq 1+x$　$e^{x-1} \geq x$　$\ln x \geq x-1$　…
     $\ln x \leq \frac{x-1}{x}$　$\sin x \leq x \leq \tan x$
3. 双变量不等式证明
   - 对数均值不等式法
   - 极值点偏移
4. 零点相关问题
   - 讨论零点个数
   - 参数范围求解
   - 多零点问题和、差、积、商可能关系
   - 隐零点问题
5. 同构问题


x
1
sin x
tanx