

# Mathematik: Diskrete Strukturen

## Lösungsblatt

Anton Bubnov, Eugen Kuzmenko

April 20, 2015

### Vertiefung:

- (a) Bestimmen Sie  $\text{mod}(5^{31} \cdot 2^{789} - 23^{23}, 10)$ .

Bemerkung: die höhere Potenzen werden in Potenzen von 2 aufgeteilt. Für Modulus Rechenregeln wird Theorem 1.2 (BM) benutzt.

$$\text{mod}(5^{31}, 10) = 5 \quad \text{da } \text{mod}(5^n, 10) = 5, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$$

$$\begin{aligned} \text{mod}(2^{789}, 10) &= \text{mod}(2^{512} \cdot 2^{256} \cdot 2^{16} \cdot 2^4 \cdot 2^1, 10) \\ &= \text{mod}(\text{mod}(2^{512}, 10) \cdot \text{mod}(2^{256}, 10) \cdot \text{mod}(2^{16}, 10) \cdot \text{mod}(2^4, 10) \cdot \text{mod}(2^1, 10), 10) \\ &= \text{mod}(6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 2, 10) \quad \text{da } \text{mod}(2^4, 10) = 6 \\ &= \text{mod}(6 \cdot 2, 10) \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{mod}(-23^{23}, 10) &= \text{mod}(23^{16} \cdot 23^4 \cdot 23^2 \cdot (-23)^1, 10) \\ &= \text{mod}(9 \cdot 7, 10) \quad \text{da } \text{mod}(23^2, 10) = 9 \text{ und } \text{mod}(23^4, 10) = 1 \\ &= \text{mod}(63, 10) \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{mod}(5^{31} \cdot 2^{789} - 23^{23}, 10) &= \text{mod}(5 \cdot 2 + 3, 10) \\ &= \text{mod}(13, 10) \\ &= 3 \end{aligned}$$

- (b) Bestimmen Sie  $\text{mod}(5^{31} \cdot 2^{789} - 23^{23}, 11)$ .

Bemerkung: Rechenweg ist gleich wie in Punkt a.

$$\begin{aligned} \text{mod}(5^{31}, 11) &= \text{mod}(5^{30} \cdot 5, 11) \\ &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{mod}(2^{789}, 11) &= \text{mod}(2^{512} \cdot 2^{256} \cdot 2^{16} \cdot 2^4 \cdot 2^1, 11) \\ &= \text{mod}(9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 2, 11) \\ &= \text{mod}(432, 11) \\ &= 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{mod}(-23^{23}, 11) &= \text{mod}(23^{16} \cdot 23^4 \cdot 23^2 \cdot (-23)^1, 11) \\ &= \text{mod}(4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7, 11) \\ &= \text{mod}(420, 11) \\ &= 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{mod}(5^{31} \cdot 2^{789} - 23^{23}, 11) &= \text{mod}(5 \cdot 6 + 9, 11) \\ &= \text{mod}(39, 11) \\ &= 6\end{aligned}$$

(c) Bestimmen Sie  $\text{mod}(7^{31} \cdot 2^{789}, 10)$ .

Bemerkung: Rechenweg ist gleich wie in Punkt a.

$$\begin{aligned}\text{mod}(7^{31}, 10) &= \text{mod}(7^{16} \cdot 7^8 \cdot 7^4 \cdot 7^2 \cdot 7^1, 10) \\ &= \text{mod}(1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 9 \cdot 7, 10) \\ &= \text{mod}(63, 10) \\ &= 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{mod}(2^{789}, 10) &= \text{mod}(2^{512} \cdot 2^{256} \cdot 2^{16} \cdot 2^4 \cdot 2^1, 10) \\ &= \text{mod}(6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 2, 10) \\ &= \text{mod}(12, 10) \\ &= 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{mod}(7^{31} \cdot 2^{789}, 10) &= \text{mod}(3 \cdot 2, 10) \\ &= \text{mod}(6, 10) \\ &= 6\end{aligned}$$

(d) Bestimmen Sie  $\text{kgV}(178, 144)$ .

$$178 = 2 \cdot 89$$

$$144 = 2^4 \cdot 3^2$$

$$\text{kgV}(178, 144) = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 89 = 12816 \quad (\text{nach Lemma 1.5 (BM)})$$

(e) Bestimmen Sie  $\text{ggT}(12877480, 24145275)$ .

$$\begin{aligned}\text{ggT}(12877480, 24145275) &= \text{ggT}(24145275 - 12877480, 12877480) \\ &= \text{ggT}(12877480 - 11267795, 11267795) \\ &= \text{ggT}(11267795 - 1609685, 1609685) \\ &= 1609685\end{aligned} \quad (\text{nach Lemma 1.8 (BM)})$$

(f) Wie sieht der  $\frac{12877480}{24145275}$  zu äquivalente teilerfremde Bruch aus?

(g) Wie viele Funktionen  $f : \{0, 1, 2, 3\}^n \rightarrow \{0, 1, 2\}$  gibt es, die genau einmal den Funktionswert 0 annehmen?

(h) Wie viele Funktionen  $f : \{0, 1, 2, 3\}^n \rightarrow \{0, 1, 2\}$  gibt es, die genau zweimal den Funktionswert 0 annehmen?

## Transfer:

(a) 8 Symbole

**Schritt 1:** Wir wählen beliebig zwei Sätze. Um Länge 8 zu bekommen müssen wir insgesamt 4 Wörtern haben, weil andere 4 Symbolen zusätzliche Zeichen sind.

**Schritt 2:** Da es in Alphabet 26 Buchstaben gibt, können wir von 4 kleine Buchstaben so viel Kombinationen machen:

$$26^4 = 456976$$

**Schritt 3:** Wenn jede kleine Buchstabe eventuell auch grösser sein kann, können wir von 4 kleine und grosse Buchstaben so viel Kombinationen machen:

$$(26 \cdot 2)^4 = 7311616$$

**Schritt 4:** In Reihe von 4 Buchstaben können wir Ziffern in 7 Varianten stellen:

$$\begin{aligned} X &\in 0, 1, \dots, 9 \\ \{a|bcd\} &\rightarrow \{Xa|Xbcd\}, \{aX|bcdX\} \\ \{ab|cd\} &\rightarrow \{Xab|Xcd\}, \{aXb|cXd\}, \{abX|cdX\} \\ \{abc|d\} &\rightarrow \{Xabc|Xd\}, \{abcX|dX\} \end{aligned}$$

Erster Zahl kann 10 Ziffer sein und zweite 9 Ziffern. Also haben wir so viele Varianten für 2 Verschiedene Ziffern und 7 Satz Kombinationen:

$$\begin{aligned} 10 \cdot 9 \cdot 7 &= 630 \\ 7311616 \cdot 630 &= 4606318080 \end{aligned}$$

**Schritt 5:** Nächstens haben wir 3 Möglichkeiten 6 Symbolen zu stellen:

$$\begin{aligned} 3 \cdot 6 &= 18 \\ 4606318080 \cdot 18 &= 82913725440 \end{aligned}$$

**Schritt 6:** Dann haben wir 22 Symbole am Anfang oder am Ende:

$$\begin{aligned} 22 \cdot 2 &= 44 \\ 82913725440 \cdot 44 &= 3648203919360 \end{aligned}$$

---

Da in diese Aufgabe ändert sich nur der Zahl der Symbole, kann man dazu ein Formel verwenden. Anzahl der Kombinationen in Schritt 4 kann man so berechnen:

$$k = \left(\frac{n}{2}\right)^2 + n - 1, \text{ wo } n \text{ ist Anzahl der Symbole in Passwort minus 4.}$$

Dann gemäs der Informaton aus Schritten in (a) 1-6 bauen wir solche Funktion:

$$f(n) = 52^n \cdot 10 \cdot 9 \cdot \left(\left(\frac{n}{2}\right)^2 + n - 1\right) \cdot 18 \cdot 44$$


---

- (b) 10 Symbole:  $f(6) = 19729486795898880$
- (c) 12 Symbole:  $f(8) = 87644017343610224640$
- (d) 14 Symbole:  $f(10) = 350332190369658678804480$
- (e) 16 Symbole:  $f(12) = 1309500512049975946232463360$