


Fachbereich Informatik und  
Informationswissenschaft

Universität  
Konstanz



**Skriptum**  
**zur Vorlesung**  
**Mathematik: Diskrete Strukturen**

*gehalten im Sommersemester 2015*

*von*

*Sven Kosub*

**23. April 2015**

*Version v4.2*

---



---

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>1</b>	<b>Kombinatorik</b>	<b>1</b>
1.1	Grundregeln des Abzählens . . . . .	1
1.2	Einfache Urnenmodelle . . . . .	3
1.3	Binomialkoeffizienten . . . . .	5
1.4	Permutationen . . . . .	10
	<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>12</b>



Der Schwerpunkt in diesem einführenden Kapitel über Kombinatorik liegt auf dem Abzählen endlicher Mengen.

## 1.1 Grundregeln des Abzählens

**Lemma 1.1** *Es seien  $A$  und  $B$  endliche Mengen. Es gibt genau dann eine Bijektion  $f : A \rightarrow B$ , wenn  $\|A\| = \|B\|$  gilt.*

**Beweis:** Siehe Satz 3.19 (aus dem Kapitel über Funktionen und Abbildungen im Skriptum *Mathematische Grundlagen der Informatik*). ■

**Lemma 1.2 (Summenregel)** *Es seien  $A_1, \dots, A_n$  endliche, paarweise disjunkte Mengen. Dann gilt:*

$$\|A_1 \cup \dots \cup A_n\| = \sum_{j=1}^n \|A_j\|$$

**Beweis:** Wegen der paarweisen Disjunktheit der Mengen kommt jedes Element aus  $A_1 \cup \dots \cup A_n$  in genau einer Menge  $A_j$  vor. ■

**Lemma 1.3 (Produktregel)** *Es seien  $A_1, \dots, A_n$  endliche Mengen. Dann gilt:*

$$\|A_1 \times \dots \times A_n\| = \prod_{j=1}^n \|A_j\|$$

**Beweis:** Wir beweisen die Aussage mittels Induktion über die Anzahl  $n$  der Mengen.

- *Induktionsanfang:* Für  $n = 1$  ist die Aussage offensichtlich.
- *Induktionsschritt:* Es sei  $n > 1$ . Weiterhin seien  $A_1, \dots, A_n$  endliche Mengen. Wir setzen

$$\begin{aligned} A^* &=_{\text{def}} A_1 \times \dots \times A_{n-1} \\ B_y &=_{\text{def}} \{ (x_1, \dots, x_{n-1}, y) \mid (x_1, \dots, x_{n-1}) \in A^* \} \quad \text{für } y \in A_n \end{aligned}$$

Für die so definierten Mengen gelten folgende Eigenschaften:

- (i) Die Mengenfamilie  $\{ B_y \mid y \in A_n \}$  ist eine Partition von  $A_1 \times \cdots \times A_n$ .
- (ii) Für jedes  $y \in A_n$  ist die Funktion

$$f_y : B_y \rightarrow A^* : (x_1, \dots, x_{n-1}, y) \mapsto (x_1, \dots, x_{n-1})$$

eine Bijektion, d.h.  $\|B_y\| = \|A^*\|$  für alle  $y \in A_n$  (nach Lemma 1.1).

Damit erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 \|A_1 \times \cdots \times A_n\| &= \left\| \bigcup_{y \in A_n} B_y \right\| && \text{(nach Eigenschaft (i))} \\
 &= \sum_{y \in A_n} \|B_y\| && \text{(nach Lemma 1.2 und Eigenschaft (i))} \\
 &= \sum_{y \in A_n} \|A^*\| && \text{(nach Lemma 1.1 und Eigenschaft (ii))} \\
 &= \|A^*\| \cdot \|A_n\| \\
 &= \left( \prod_{j=1}^{n-1} \|A_j\| \right) \cdot \|A_n\| && \text{(nach Induktionsvoraussetzung)} \\
 &= \prod_{j=1}^n \|A_j\|
 \end{aligned}$$

Damit ist das Lemma bewiesen. ■

**Lemma 1.4 (Potenzregel)** *Es seien  $A$  und  $B$  endliche Mengen mit  $\|A\| = m$  und  $\|B\| = n$ . Dann existieren genau  $n^m$  Funktionen  $f : A \rightarrow B$ .*

**Beweis:** Nach Lemma 1.1 dürfen wir  $A = \{1, \dots, m\}$  ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit annehmen. Jeder Funktion  $f : A \rightarrow B$  kann nun eineindeutig (injektiv) ein Tupel  $(f(1), \dots, f(m)) \in B^m$  zugeordnet werden. Außerdem entspricht jedes Tupel (die Wertetabelle)  $(y_1, \dots, y_m) \in B^m$  einer Funktion  $f : A \rightarrow B : j \mapsto y_j$ . Damit ist die Zuordnung sowohl injektiv als auch surjektiv, also eine Bijektion. Aus Lemma 1.1 und Produktregel (Lemma 1.3) folgt somit

$$\|\{ f \mid f : A \rightarrow B \}\| = \|B^m\| = \|B\|^m = n^m.$$

Damit ist das Lemma bewiesen. ■

**Beispiel:** Wie viele boolesche Funktionen mit  $n$  Variablen gibt es? Die Antwort lautet  $\|\{ f \mid f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\} \}\| = 2^{2^n}$ .

**Korollar 1.5** Für endliche Mengen  $A$  mit  $\|A\| = n$  gilt  $\|\mathcal{P}(A)\| = 2^n$ .

**Beweis:** Wir konstruieren eine Bijektion zwischen  $\mathcal{P}(A)$  und der Menge der Funktionen  $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ . Dazu definieren wir für eine Menge  $B \in \mathcal{P}(A)$  die Funktion:

$$c_B : A \rightarrow \{0, 1\} : x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{falls } x \in B \\ 0 & \text{falls } x \notin B \end{cases}$$

Diese Zuordnung ist offensichtlich eine Bijektion zwischen  $\mathcal{P}(A)$  und der Menge der Funktionen  $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ . Nach der Potenzregel (Lemma 1.4) und Lemma 1.1 gilt folglich

$$\|\mathcal{P}(A)\| = \|\{ f \mid f : A \rightarrow \{0, 1\} \}\| = 2^n.$$

Damit ist das Korollar bewiesen. ■

Die im Beweis von Korollar 1.5 angegebenen Funktionen haben einen Namen: Für eine Menge  $B \subseteq A$  heißt  $c_B$  die *charakteristische Funktion* von  $B$ .

## 1.2 Einfache Urnenmodelle

Urnenmodelle stellen ein typisches Szenario für kombinatorische Problemstellungen dar. Die einfachste Situation ist die folgende: In einer Urne liegen  $n$  unterscheidbare Kugeln, von den  $k$  Kugel gezogen werden dürfen. Die zu beantwortende Frage ist dann: Wie viele Möglichkeiten gibt es diese  $k$  Kugeln zu ziehen? Zur Präzisierung des Szenarios werden Unterschiede danach gemacht, ob

- die Reihenfolge, in der die Kugeln gezogen werden, eine Rolle spielt,
- gezogene Kugeln wieder zurückgelegt werden oder nicht.

Damit ergeben sich vier verschiedene Szenarios.

**Theorem 1.6** Die Anzahl der Möglichkeiten, aus einer Urne mit  $n$  Kugeln  $k$  Kugeln auszuwählen, ist durch folgende Tabelle gegeben:

	mit Zurücklegen	ohne Zurücklegen
mit Reihenfolge	$n^k$	$n^{\underline{k}} =_{\text{def}} \frac{n!}{(n-k)!}$
ohne Reihenfolge	$\binom{n+k-1}{k}$	$\binom{n}{k} =_{\text{def}} \frac{n!}{k!(n-k)!}$

Die im Theorem mitdefinierten Größen  $n^k$  und  $\binom{n}{k}$  heißen *fallende Faktorielle von  $n$  der Länge  $k$*  sowie *Binomialkoeffizient* („ $n$  über  $k$ “).

**Beispiel:** Wir geben für jedes der vier Szenarien Beispiele an:

	mit Zurücklegen	ohne Zurücklegen
mit Reihenfolge (geordnet)	PIN-Codes: • $n = 10$ Ziffern • $k = 4$ Stellen • 10.000 Codes	Wettkämpfe: • $n = 10$ Starter • $k = 3$ Medaillen • 720 Siegerehrungen
ohne Reihenfolge (ungeordnet)	Wahlen: • $n = 3$ Kandidaten • $k = 100$ Wähler • 5.151 Wahlausgänge	Lotto: • $n = 49$ Kugeln • $k = 6$ Kugeln • 13.983.816 Ziehungen

**Beweis:** Wir beweisen alle Fälle einzeln, aber aufeinander aufbauend:

- *Ziehen mit Zurücklegen, mit Reihenfolge:* Jede Auswahlmöglichkeit entspricht einer Funktion  $f : \{1, \dots, k\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ , wobei  $f(i)$  genau der Kugel entspricht, die als  $i$ -te Kugel gezogen wurde. Nach der Potenzregel (Lemma 1.4) gibt es somit  $n^k$  Möglichkeiten.
- *Ziehen ohne Zurücklegen, mit Reihenfolge:* Für die erste gezogene Kugel gibt es  $n$  Möglichkeiten, für die zweite gezogene Kugel gibt es  $n - 1$  Möglichkeiten. Für die  $k$ -te gezogene Kugel ( $k \leq n$ ) gibt es mithin noch  $n - k + 1$  Möglichkeiten. Insgesamt gibt es damit

$$n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot (n - k + 1) = \frac{n!}{(n - k)!} = n^{\underline{k}}$$

Möglichkeiten.

- *Ziehen ohne Zurücklegen, ohne Reihenfolge:* Mit Berücksichtigung der Reihenfolge gibt es  $\frac{n!}{(n - k)!}$  Auswahlmöglichkeiten. Wenn die Reihenfolge keine Rolle mehr spielt, zählen alle Auswahlfolgen, bei denen die gleichen  $k$  Kugeln gezogen wurden, nur noch als eine Auswahlmöglichkeit. Dies sind gerade  $k!$  viele. Damit gibt es insgesamt

$$\frac{n!}{(n - k)!} \cdot \frac{1}{k!} = \frac{n!}{k!(n - k)!} = \binom{n}{k}$$

Möglichkeiten.

- *Ziehen mit Zurücklegen, ohne Reihenfolge:* Da jede Kugel mehrmals gezogen werden kann, die Reihenfolge jedoch keine Rolle spielt, ist nur wichtig, wie oft eine Kugel gezogen wird. Es sei also  $(a_1, \dots, a_n)$  ein Tupel mit den entsprechenden Anzahlen, wobei  $a_j$  gerade angibt, wie oft die Kugel  $j$  gezogen wird. Für ein Anzahl tupel  $(a_1, \dots, a_n)$  muss nun gelten:

$$(i) \ a_j \in \{0, \dots, k\} \text{ für alle } j \in \{1, \dots, n\}$$



$$(ii) \ a_1 + \dots + a_n = k$$

Wir müssen nun zählen, wie viele derartige Tupel es geben kann. Dazu repräsentieren wir die Tupel in einer anderen Weise, die es uns ermöglicht, das Szenario zu wechseln. Wir verwenden  $k$ -mal das Symbol  $*$  und  $(n-1)$ -mal das Symbol  $|$ . Ein Anzahltupel  $(a_1, \dots, a_n)$  wird nun (injektiv) durch die Symbolfolge

$$\underbrace{**\dots*}_{a_1} | \underbrace{**\dots*}_{a_2} | \dots | \underbrace{**\dots*}_{a_n}$$

repräsentiert. Umgekehrt entspricht auch jede Symbolfolge, die  $k$ -mal das Symbol  $*$  und  $(n-1)$ -mal das Symbol  $|$  enthält, einem Anzahltupel mit obigen Eigenschaften. Demzufolge ist die Repräsentierung eine Bijektion zwischen der Menge der Anzahltupel und der Menge der Symbolfolgen. Die Anzahl möglicher Symbolfolgen zu bestimmen, entspricht aber gerade dem Ziehen von  $k$  Positionen für das Symbol  $*$  aus  $n+k-1$  möglichen Positionen ohne Zurücklegen und ohne Reihenfolge. Mithin gibt es insgesamt

$$\binom{n+k-1}{k}$$

Möglichkeiten.

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

## 1.3 Binomialkoeffizienten

Aus dem letzten Abschnitt (Theorem 1.6) wissen wir, dass die Anzahl der Möglichkeiten aus  $n$  Kugeln  $k$  Kugeln ungeordnet ohne Zurücklegen zu ziehen gerade dem Binomialkoeffizienten  $\binom{n}{k}$  entspricht. Da Binomialkoeffizienten auch über die reine Kombinatorik hinaus wichtig sind, wollen in diesem Abschnitt die wichtigsten Eigenschaften von Binomialkoeffizienten festhalten. Dazu definieren wir den Binomialkoeffizienten noch einmal explizit: Für  $n, k \in \mathbb{N}$  definieren wir

$$\binom{n}{k} \stackrel{\text{def}}{=} \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad \text{mit } \binom{n}{k} = 0 \quad \text{für } k > n.$$

Ein einfache, sofort einsichtige Beobachtung ist:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Damit lässt sich der Binomialkoeffizient konsistent auch für negative Werte für  $k$  definieren:

$$\binom{n}{k} \stackrel{\text{def}}{=} 0 \quad \text{für } k \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}.$$

**Theorem 1.7 (PASCALSches Dreieck)** Für  $n \in \mathbb{N}_+$  und  $k \in \mathbb{N}$  gilt

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Wir geben zwei Beweise für das Theorem an.

**Beweis:** (*rechnerisch*) Wir führen eine Fallunterscheidung bezüglich der Werte von  $k$  durch:

- Für  $k = 0$  und  $n > 1$  gilt  $\binom{n}{0} = 1 = \binom{n-1}{-1} + \binom{n-1}{0}$ .

- Für  $0 < k < n$  rechnen wir aus:

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} \\ &= \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} \cdot \frac{k}{k} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!} \cdot \frac{n-k}{n-k} \\ &= \frac{(n-1)! \cdot k}{k!(n-k)!} + \frac{(n-1)!(n-k)}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{(n-1)!(k+n-k)}{k!(n-k)!} \\ &= \frac{(n-1)! \cdot n}{k!(n-k)!} \\ &= \binom{n}{k} \end{aligned}$$

- Für  $k = n$  und  $n > 1$  gilt  $\binom{n}{n} = 1 = \binom{n-1}{n-1} + \binom{n-1}{n}$ .

- Für  $k > n > 1$  gilt  $\binom{n}{k} = 0 = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ .

Damit ist das Theorem durch Nachrechnen bewiesen. ■

**Beweis:** (*kombinatorisch*) Wir interpretieren die Gleichung als Bestimmung der Kardinalität von Mengen auf zwei verschiedene Weisen. Es seien  $n \in \mathbb{N}_+$  und  $k \in \mathbb{N}$ . Wir definieren folgende Mengenfamilien:

$$\begin{aligned} \mathcal{F} &=_{\text{def}} \{ \{a_1, \dots, a_k\} \mid a_i \in \{1, \dots, n\} \text{ und } a_i \neq a_j \text{ für } i \neq j \} \\ \mathcal{F}_+ &=_{\text{def}} \{ A \mid A \in \mathcal{F} \text{ und } 1 \in A \} \\ \mathcal{F}_- &=_{\text{def}} \{ A \mid A \in \mathcal{F} \text{ und } 1 \notin A \} \end{aligned}$$

Die einzelnen Mengenfamilien stehen für folgende Urnenmodelle:

- $\mathcal{F}$  entspricht dem ungeordneten Ziehen von  $k$  Kugeln aus  $n$  Kugeln ohne Zurücklegen.
- $\mathcal{F}_+$  entspricht dem ungeordneten Ziehen von  $k$  Kugeln aus  $n$  Kugeln ohne Zurücklegen, wobei Kugel 1 *immer* gezogen wird.
- $\mathcal{F}_-$  entspricht dem ungeordneten Ziehen von  $k$  Kugeln aus  $n$  Kugeln ohne Zurücklegen, wobei Kugel 1 *nie* gezogen wird.

Nun gilt offensichtlich  $\mathcal{F} = \mathcal{F}_+ \cup \mathcal{F}_-$  sowie  $\mathcal{F}_+ \cap \mathcal{F}_- = \emptyset$ , also  $\|\mathcal{F}\| = \|\mathcal{F}_+\| + \|\mathcal{F}_-\|$  nach der Summenregel (Lemma 1.2). Nach Theorem 1.6 gilt:

$$\|\mathcal{F}\| = \binom{n}{k}, \quad \|\mathcal{F}_+\| = \binom{n-1}{k-1}, \quad \|\mathcal{F}_-\| = \binom{n-1}{k}$$

Mithin erhalten wir:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Damit ist das Theorem kombinatorisch bewiesen. ■

**Beispiel:** Der Dreiecksaufbau des rekursiven Zusammenhangs in Theorem 1.7 lässt sich leicht veranschaulichen und ist schon aus der Schule bekannt:

					$\binom{0}{0}$																								
										1																			
					$\binom{1}{0}$					$\binom{1}{1}$																			
					$\binom{2}{0}$					$\binom{2}{1}$					$\binom{2}{2}$														
					$\binom{3}{0}$					$\binom{3}{1}$					$\binom{3}{2}$					$\binom{3}{3}$									
					$\binom{4}{0}$					$\binom{4}{1}$					$\binom{4}{2}$					$\binom{4}{3}$					$\binom{4}{4}$				
					$\vdots$					$\vdots$					$\vdots$					$\vdots$					$\vdots$				

**Theorem 1.8 (Binomialtheorem)** Für alle  $x, y \in \mathbb{R}$  und  $n \in \mathbb{N}$  gilt

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

Das Binomialtheorem kann durch vollständige Induktion über  $n$  bewiesen werden. Dies ist eine gute Übung zu Anwendung des PASCALSchen Dreiecks. Wir geben einen anderen Beweis.

**Beweis:** (*kombinatorisch*) Es seien  $x, y \in \mathbb{R}$  und  $n \in \mathbb{N}$  beliebig. Durch Ausmultiplizieren von  $(x + y)^n$  erhalten wir:

$$\begin{aligned}
 (x + y)^n &= \underbrace{x \cdot \dots \cdot x \cdot x}_{n \text{ Faktoren}} + \\
 &+ x \cdot \dots \cdot x \cdot y + \\
 &+ x \cdot \dots \cdot y \cdot x + \\
 &+ x \cdot \dots \cdot y \cdot y + \\
 &\vdots \\
 &+ \underbrace{y \cdot \dots \cdot y \cdot y}_{n \text{ Faktoren}}
 \end{aligned}$$

Die Summanden können zusammengefasst werden zu Produkten von jeweils  $n$  Faktoren, von denen  $k$  Faktoren gerade  $y$  und  $n - k$  Faktoren gerade  $x$  sind. Die Summanden sind also von der Form  $x^{n-k}y^k$ , da die Reihenfolge bei der Multiplikation keine Rolle spielt. Die Anzahl der Produkte  $x^{n-k}y^k$  entspricht somit gerade dem Ziehen von  $k$  Kugeln (die Positionen für  $y$  im Produkt) aus  $n$  Kugeln (die Gesamtheit aller Positionen für Faktoren), d.h.  $\binom{n}{k}$ . Folglich gilt insgesamt:

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

**Korollar 1.9** Für alle  $n \in \mathbb{N}_+$  gilt

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0.$$

**Beweis:** Nach dem Binomialtheorem gilt

$$0 = (1 - 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} (-1)^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}.$$

Damit ist das Korollar bewiesen. ■

**Korollar 1.10** Für alle  $n \in \mathbb{N}$  gilt

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

**Beweis:** Nach dem Binomialtheorem gilt

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Damit ist das Korollar bewiesen. ■

**Theorem 1.11 (VANDERMONDESche Identität)** Für  $k, m, n \in \mathbb{N}$  gilt

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j}.$$

**Beweis:** (*kombinatorisch*) Es seien  $A$  und  $B$  disjunkte Mengen mit  $\|A\| = n$  und  $\|B\| = m$ . Für jedes  $j \in \{0, \dots, k\}$  definieren wir die Mengenfamilie

$$\mathcal{X}_j =_{\text{def}} \{ X \mid X \subseteq A \cup B, \|X \cap A\| = j \text{ und } \|X \cap B\| = k - j \}$$

Es gibt  $\binom{n}{j}$  viele  $j$ -elementige Teilmengen von  $A$  und  $\binom{m}{k-j}$  viele  $(k-j)$ -elementige Teilmengen von  $B$ . Damit gilt

$$\|\mathcal{X}_j\| = \binom{n}{j} \binom{m}{k-j}.$$

Wegen  $\mathcal{X}_i \cap \mathcal{X}_j = \emptyset$  für  $i \neq j$  folgt nun

$$\binom{n+m}{k} = \sum_{j=0}^k \|\mathcal{X}_j\| = \sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j}.$$

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

**Beispiel:** Die Beweistechnik für Theorem 1.11 heißt *Doppeltes Abzählen*. Wenn zum Beispiel in einer Vorlesung  $n + m$  Studenten sitzen,  $n$  weibliche und  $m$  männliche, wie viele verschiedene Gruppen mit genau  $k$  Studenten gibt es dann? Dies lässt sich auf zwei Arten bestimmen:

- Ohne Berücksichtigung des Geschlechts erhalten wir  $\binom{n+m}{k}$  Gruppen.
- Mit Berücksichtigung des Geschlechts zählen wir für jedes  $j \in \{0, 1, \dots, k\}$  alle Gruppen mit jeweils genau  $j$  weiblichen und genau  $k - j$  männlichen Studenten, damit also insgesamt  $\sum_{j=0}^k \binom{n}{j} \binom{m}{k-j}$  Gruppen.

Da wir über dieselbe Menge von Studenten argumentieren, sind beide Anzahlen gleich.

## 1.4 Permutationen

Es sei  $A$  eine endliche Menge mit  $\|A\| = n$ . Eine *Permutation* von  $A$  ist eine bijektive Funktion  $\pi : A \rightarrow A$ . Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit setzen wir stets  $A = \{1, \dots, n\}$  voraus. Die Menge  $\{1, \dots, n\}$  notieren wir auch als  $[n]$ . Weiterhin definieren wir die Menge

$$\mathcal{S}_n =_{\text{def}} \{ \pi \mid \pi : [n] \rightarrow [n] \text{ ist eine Permutation} \},$$

die sogenannte *symmetrische Gruppe* von  $n$  Elementen.

**Theorem 1.12** Für alle  $n \in \mathbb{N}_+$  gilt  $\|\mathcal{S}_n\| = n!$ .

**Beweis:**  $\|\mathcal{S}_n\|$  entspricht dem Ziehen von  $n$  Kugeln aus einer Urne mit  $n$  Kugeln ohne Zurücklegen mit Berücksichtigung der Reihenfolge. Nach Theorem 1.6 gilt

$$\|\mathcal{S}_n\| = \frac{n!}{(n-n)!} = n!.$$

Damit ist das Theorem bewiesen. ■

Ohne Beweis geben wir folgendes Resultat über das Verhalten der Fakultätsfunktion an:

**Theorem 1.13 (STIRLINGSche Formel)** Für alle  $n \in \mathbb{N}_+$  gilt

$$\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n < n! < \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n e^{\frac{1}{12n}},$$

wobei  $e = e^1 = 2,718281828459 \dots$  die EULERSche Konstante ist.

Permutationen können auf verschiedene Arten geschrieben werden. Im Folgenden behandeln wir drei Schreibweisen:

**Matrixschreibweise:** Dazu schreiben wir die Permutation  $\pi : [n] \rightarrow [n]$  als  $2 \times n$ -Matrix der Form

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \pi(3) & \dots & \pi(n) \end{pmatrix}$$

Da  $\pi$  bijektiv ist, kommen alle Werte  $1, \dots, n$  in der zweiten Zeile vor.

**Beispiel:** Folgende Permutation ist in Matrixschreibweise gegeben:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 6 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

**Tupelschreibweise:** Im Prinzip genügt es, von der Matrixschreibweise lediglich die zweite Zeile zu übernehmen, d.h. Permutationen können angegeben werden in der Form

$$\pi = (\pi(1), \pi(2), \pi(3), \dots, \pi(n)).$$

**Beispiel:**  $\pi = (4, 1, 6, 2, 5, 3)$  ist obige Permutation in Tupelschreibweise.

**Zyklenschreibweise:** Die Zyklenschreibweise entsteht, wenn wir für  $x \in [n]$  die iterierte Hintereinanderausführung von  $\pi$  auf  $x$  betrachten. Dadurch entsteht eine Folge:

$$\begin{aligned} \pi^0(x) &=_{\text{def}} x, \\ \pi^1(x) &=_{\text{def}} \pi(x), \\ \pi^2(x) &=_{\text{def}} \pi(\pi(x)), \\ &\vdots \\ \pi^k(x) &=_{\text{def}} \pi(\pi^{k-1}(x)), \\ &\vdots \end{aligned}$$

Für jedes  $x \in [n]$  gibt es dann ein minimales  $0 < k < n$  mit  $\pi^k(x) = x$ .

**Beispiel:** Für die Permutation  $\pi = (4, 1, 6, 2, 5, 3)$  gilt

$$\begin{aligned} \pi^0(1) &= 1, & \pi^1(1) &= 4, & \pi^2(1) &= 2, & \pi^3(1) &= 1; \\ \pi^0(2) &= 2, & \pi^1(2) &= 1, & \pi^2(2) &= 4, & \pi^3(2) &= 2; \\ \pi^0(3) &= 3, & \pi^1(3) &= 6, & \pi^2(3) &= 3; \\ \pi^0(4) &= 4, & \pi^1(4) &= 2, & \pi^2(4) &= 1, & \pi^3(4) &= 4; \\ \pi^0(5) &= 5, & \pi^1(5) &= 5; \\ \pi^0(6) &= 6, & \pi^1(6) &= 3, & \pi^2(6) &= 6. \end{aligned}$$

Eine Folge  $x, \pi(x), \pi^2(x), \dots, \pi^{k-1}(x)$  mit minimalem  $k > 0$ , so dass  $\pi^k(x) = x$ , heißt *Zyklus* der Länge  $k$  und wird als  $(x \ \pi(x) \ \pi^2(x) \ \dots \ \pi^{k-1}(x))$  geschrieben.

**Beispiel:**  $\pi = (4, 1, 6, 2, 5, 3)$  enthält die Zyklen  $(1 \ 4 \ 2)$ ,  $(3 \ 6)$  und  $(5)$ .

Jede Permutation kann als *Produkt von Zyklen* geschrieben werden, indem die Zyklen einfach hintereinander gesetzt werden. Die Schreibweise ist jedoch nicht eindeutig. Insbesondere kann jeder Zyklus der Länge  $k$  auf genau  $k$  Arten geschrieben werden.

**Beispiel:** Die Permutation  $\pi = (4, 1, 6, 2, 5, 3)$  können wir als Produkt von Zyklen wie folgt schreiben:

$$(4, 1, 6, 2, 5, 3) = (1 \ 4 \ 2)(3 \ 6)(5)$$

$$\begin{aligned} &= (4\ 2\ 1)(6\ 3)(5) \\ &= (5)(2\ 1\ 4)(6\ 3) \end{aligned}$$

Insbesondere gilt  $(1\ 4\ 2) = (4\ 2\ 1) = (2\ 1\ 4)$ .



---

# Literaturverzeichnis

---

- [GKP94] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth und Oren Patashnik. *Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science*. 2. Auflage. Addison-Wesley Longman, Amsterdam, 1994.
- [KP09] Bernd Kreußler und Gerhard Pfister. *Mathematik für Informatiker*. Springer-Verlag, Berlin, 2009.
- [MM06] Christoph Meinel und Martin Mundhenk. *Mathematische Grundlagen der Informatik. Mathematisches Denken und Beweisen. Eine Einführung*. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden, 2006.
- [Ste07] Angelika Steger. *Diskrete Strukturen. Band 1: Kombinatorik-Graphentheorie-Algebra*. 2. Auflage. Springer-Verlag, Berlin, 2007.
- [SS02] Thomas Schickinger und Angelika Steger. *Diskrete Strukturen. Band 2: Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik*. Springer-Verlag, Berlin, 2002.
- [Wag03] Klaus W. Wagner. *Theoretische Informatik. Eine kompakte Einführung*. 2. überarbeitete Auflage. Springer-Verlag, Berlin, 2003.
- [WHK04] Manfred Wolff, Peter Hauck und Wolfgang Küchlin. *Mathematik für Informatik und Bioinformatik*. Springer-Verlag, Berlin, 2004.
- [Wil03] Herbert S. Wilf. *generatingfunctionology*. 3. Auflage. CRC Press, Boca Raton, FL, 2005.

