

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Расчётно-графическая работа. Математический анализ №1
по теме «Множества»

Вариант №6

Выполнила группа №6, Поток 15.1:

Студенты: Эминов Расим,

Бободжонов Комронджон,

Носов Георгий,

Солиев Илхом

Преподаватель:

Беспалов Владимир Владимирович

Санкт-Петербург, 2023

Дата сдачи: 25.11.2023

Задание 1.1

Перечислите элементы множества:

$$K = \{x : x < 12, x - \text{натуральное число}\}$$

Решение:

$$K = \{x : x < 12, x - \text{натуральное число}\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}.$$

Задание 1.2

Опишите множество при помощи характеристического свойства:

$$M = \{ \text{Множество неотрицательных нечетных чисел } 1, 3, 5, 7, \dots \}$$

Решение:

$$M = \{x \mid x \in N \text{ и } x = 2n + 1 \text{ для некоторого } n \in N_0\}$$

$$M = \{x \mid x \in N \text{ и } x = 2n + 1 \text{ для некоторого } n \in N_0\}$$

Здесь N обозначает множество натуральных чисел, а N_0 — множество натуральных чисел включая ноль. Выражение $x = 2n + 1$ указывает на то, что ' x ' является нечетным числом, так как оно представляет собой удвоенное натуральное число (включая ноль) плюс один.

Задание 1.3

Эквивалентны ли следующие множества: $A = \{x \mid x^3 - 8 = 0\}$ и $B = \{x \mid x^2 - 4x + 4 = 0\}$

Решение:

Рассмотрим множество $A = \{x \mid x^3 - 8 = 0\}$.

Решим уравнение $x^3 - 8 = 0$.

$$x = 2$$

Рассмотрим множество $B = \{x \mid x^2 - 4x + 4 = 0\}$.

Решим квадратное уравнение $x^2 - 4x + 4 = 0$.

$$D = B^2 - 4AC = 16 - 16 = 0$$

Исходя из 0-го значения дискриминанта, мы имеем один корень.

$$x = \frac{-B \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{4}{2} = 2$$

Таким образом у нас получилось так $A = \{2\}$ и $B = \{2\}$.

Исходи из того, что $\{2\} = \{2\}$, множества $A = \{2\}$ и $B = \{2\}$ являются эквивалентными.

Задание 1.4

Даны множества:

- $U = \{p, q, r, s, t, u, v, w\}$
- $A = \{p, q, r, s, t\}$
- $B = \{p, r, t, v\}$
- $C = \{p, s, t, u, v\}$

Требуется найти:

- 1) $A \setminus C$
- 2) $A \setminus \overline{B}$
- 3) $B \setminus C$
- 4) $\overline{A \cup B}$
- 5) $\overline{C} \cup A$
- 6) $\overline{A} \cup B$
- 7) $B \cap \overline{A}$
- 8) $A \cup B \cup C$
- 9) $(A \cup B) \cap C$
- 10) $(A \setminus B) \cup C$
- 11) $(\overline{A} \setminus B) \cup C$
- 12) $(\overline{A} \cup B) \cap \overline{C}$
- 13) $(A \cup B) \setminus (\overline{A} \cap C)$
- 14) $(A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
- 15) $(C \cup A) \setminus (C \cap A)$
- 16) $(A \cup B) \cap (A \cap C)$
- 17) $\overline{A \cup B \cup C}$
- 18) $\overline{C} \cup (B \setminus A)$
- 19) $A \oplus C$
- 20) $(A \setminus B) \oplus (A \setminus C)$

$$21) (\bar{A} \setminus B) \oplus (B \setminus A)$$

Определения:

- Объединение: $A \cup B = \{x: (x \in A) \vee (x \in B)\}$
- Пересечение: $A \cap B = \{x: (x \in A) \wedge (x \in B)\}$
- Вычитание: $A \setminus B = \{x: (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$
- Симметрическое вычитание: $A \oplus B = \{x: (x \in A) \vee (x \in B)) \wedge \overline{((x \in A) \wedge (x \in B))}\}$
- Дополнение: $\bar{A} = \{x: (x \in U) \wedge (x \notin A)\}$

Решение:

- 1) $A \setminus C = \{p, q, r, s, t\} \setminus \{p, s, t, u, v\} = \{q, r\}$
- 2) $A \setminus \bar{B} = A \setminus (U \setminus B) = \{p, q, r, s, t\} \setminus (\{p, q, r, s, t, u, v, w\} \setminus \{p, r, t, v\}) = \{p, q, r, s, t\} \setminus \{q, s, u, w\} = \{p, r, t\}$
- 3) $B \setminus C = \{p, r, t, v\} \setminus \{p, s, t, u, v\} = \{r\}$
- 4) $\overline{A \cup B} = U \setminus (A \cup B) = \{p, q, r, s, t, u, v, w\} \setminus (\{p, q, r, s, t\} \cup \{p, r, t, v\}) = \{p, q, r, s, t, u, v, w\} \setminus \{p, q, r, s, t, v\} = \{u, w\}$
- 5) $\bar{C} \cup A = (U \setminus C) \cup A = (\{p, q, r, s, t, u, v, w\} \setminus \{p, s, t, u, v\}) \cup \{p, q, r, s, t\} = \{q, r, w\} \cup \{p, q, r, s, t\} = \{p, q, r, s, t, w\}$
- 6) $\bar{A} \cup B = (U \setminus A) \cup B = (\{p, q, r, s, t, u, v, w\} \setminus \{p, q, r, s, t\}) \cup \{p, r, t, v\} = \{u, v, w\} \cup \{p, r, t, v\} = \{p, r, t, u, v, w\}$
- 7) $B \cap \bar{A} = B \cap (U \setminus A) = \{p, r, t, v\} \cap (\{p, q, r, s, t, u, v, w\} \setminus \{p, q, r, s, t\}) = \{p, r, t, v\} \cap \{u, v, w\} = \{v\}$
- 8) $A \cup B \cup C = \{p, q, r, s, t\} \cup \{p, r, t, v\} \cup \{p, s, t, u, v\} = \{p, q, r, s, t, u, v\}$
- 9) $(A \cup B) \cap C = (\{p, q, r, s, t\} \cup \{p, r, t, v\}) \cap \{p, s, t, u, v\} = \{p, q, r, s, t, v\} \cap \{p, s, t, u, v\} = \{p, s, t, v\}$
- 10) $(A \setminus B) \cup C = (\{p, q, r, s, t\} \setminus \{p, r, t, v\}) \cup \{p, s, t, u, v\} = \{q, s\} \cup \{p, s, t, u, v\} = \{p, q, s, t, u, v\}$
- 11) $(\bar{A} \setminus B) \cup C = ((U \setminus A) \setminus B) \cup C = ((\{p, q, r, s, t, u, v, w\} \setminus \{p, q, r, s, t\}) \setminus \{p, r, t, v\}) \cup \{p, s, t, u, v\} = (\{u, v, w\} \setminus \{p, r, t, v\}) \cup \{p, s, t, u, v\} = \{u, w\} \cup \{p, s, t, u, v\} = \{p, s, t, u, v, w\}$
- 12) $(\bar{A} \cup B) \cap \bar{C} = ((U \setminus A) \cup B) \cap (U \setminus C) = ((\{p, q, r, s, t, u, v, w\} \setminus \{p, q, r, s, t\}) \cup \{p, r, t, v\}) \cap (\{p, q, r, s, t, u, v, w\} \setminus \{p, s, t, u, v\}) = (\{u, v, w\} \cup \{p, r, t, v\}) \cap \{q, r, w\} = \{p, r, t, u, v, w\} \cap \{q, r, w\} = \{r, w\}$
- 13) $(A \cup B) \setminus (\bar{A} \cap C) = (A \cup B) \setminus ((U \setminus A) \cap C) = (\{p, q, r, s, t\} \cup \{p, r, t, v\}) \setminus ((\{p, q, r, s, t, u, v, w\} \setminus \{p, q, r, s, t\}) \cap \{p, s, t, u, v\}) =$


- $$\{p, q, r, s, t, v\} \setminus (\{u, v, w\} \cap \{p, s, t, u, v\}) = \{p, q, r, s, t, v\} \setminus \{u, v\} = \{p, q, r, s, t\}$$
- 14) $(A \setminus B) \cup (A \setminus C) = (\{p, q, r, s, t\} \setminus \{p, r, t, v\}) \cup (\{p, q, r, s, t\} \setminus \{p, s, t, u, v\}) = \{q, s\} \cup \{q, r\} = \{q, r, s\}$
- 15) $(C \cup A) \setminus (C \cap A) = (\{p, s, t, u, v\} \cup \{p, q, r, s, t\}) \setminus (\{p, s, t, u, v\} \cap \{p, q, r, s, t\}) = \{p, q, r, s, t, u, v\} \setminus \{p, s, t\} = \{q, r, u, v\}$
- 16) $(A \cup B) \cap (A \cap C) = (\{p, q, r, s, t\} \cup \{p, r, t, v\}) \cap (\{p, q, r, s, t\} \cap \{p, s, t, u, v\}) = \{p, q, r, s, t, v\} \cap \{p, s, t\} = \{p, s, t\}$
- 17) $\overline{A \cup B \cup C} = U \setminus (A \cup B \cup C) = \{p, q, r, s, t, u, v, w\} \setminus (\{p, q, r, s, t\} \cup \{p, r, t, v\} \cup \{p, s, t, u, v\}) = \{p, q, r, s, t, u, v, w\} \setminus \{p, q, r, s, t, u, v\} = \{w\}$
- 18) $\overline{C} \cup (B \setminus A) = (U \setminus C) \cup (B \setminus A) = (\{p, q, r, s, t, u, v, w\} \setminus \{p, s, t, u, v\}) \cup (\{p, r, t, v\} \setminus \{p, q, r, s, t\}) = \{q, r, w\} \cup \{v\} = \{q, r, v, w\}$
- 19) $A \oplus C = \{p, q, r, s, t\} \oplus \{p, s, t, u, v\} = \{q, r, u, v\}$
- 20) $(A \setminus B) \oplus (A \setminus C) = (\{p, q, r, s, t\} \setminus \{p, r, t, v\}) \oplus (\{p, q, r, s, t\} \setminus \{p, s, t, u, v\}) = \{q, s\} \oplus \{q, r\} = \{r, s\}$
- 21) $(\overline{A} \setminus B) \oplus (B \setminus A) = ((U \setminus A) \setminus B) \oplus (B \setminus A) = ((\{p, q, r, s, t, u, v, w\} \setminus \{p, q, r, s, t\}) \setminus \{p, r, t, v\}) \oplus (\{p, r, t, v\} \setminus \{p, q, r, s, t\}) = (\{u, v, w\} \setminus \{p, r, t, v\}) \oplus \{v\} = \{u, w\} \oplus \{v\} = \{u, v, w\}$

Задание 1.5

Опишите множество, соответствующее закрашенной части диаграммы Венна:

Решение:

$$(A \cap B \cap C) \cup (A \setminus (B \cup C)) \cup (B \setminus (A \cup C))$$





Задание 1.6

Для каждого из приведенных ниже множеств используйте диаграммы Венна и заштрихуйте те ее части, которые изображают заданные множества:

$$\overline{A \cup B}, B \setminus (A \cup C)$$

Решение:

$$\overline{A \cup B}$$





a)

$$\overline{A \cup B}$$

$$B \setminus (A \cup C)$$

$$A \cup B$$

b)




Задание 1.7

С помощью диаграммы Венна проверьте справедливость соотношения
 $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$

Решение:

$$A \cup C$$



$$B \setminus (A \cup C)$$




$$(A \cup B)$$

С помощью диаграммы Венна
построим множество $(A \cup B) \setminus C$


С помощью диаграммы Венна
построим множество $(A \setminus C) \cup (B \setminus C)$



$$(A \setminus C)$$



$$(B \setminus C)$$



$$(A \setminus C) \cup (B \setminus C)$$

Таким образом $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$.

Задание 1.8

Доказать тождество $\overline{A \cup B} \cap C = C \setminus (C \cap (A \cup B))$, используя свойства операций.

Решение: п. ч. $C \setminus (C \cap (A \cup B)) \stackrel{\text{дистрибутивность пересечения}}{=} C \setminus ((C \cap A) \cup (C \cap B)) \stackrel{\text{закон де Моргана для вычитания}}{=} (C \setminus (C \cap A)) \cap (C \setminus (C \cap B)) \stackrel{\text{закон де Моргана для вычитания}}{=} ((C \setminus C) \cup (C \setminus A)) \cap ((C \setminus C) \cup (C \setminus B)) = (\emptyset \cup (C \setminus A)) \cap (\emptyset \cup (C \setminus B)) \stackrel{\text{свойства пустого множества}}{=} (C \setminus A) \cap (C \setminus B) \stackrel{\text{закон де Моргана для вычитания}}{=} C \setminus (A \cup B) \stackrel{\text{выражение для вычитания } A \setminus B = A \cap \overline{B}}{=} \overline{A \cup B} \cap C \text{ л. ч}$

Задание 1.9

Опрос группы студентов показал, что 70 % из них любят ходить в кино, 60 % – в театр, 30% – в музей. В кино и театр ходят 40 % студентов, в кино и в музей – 20 %, в театр и в музей – 10 %. Сколько студентов (в %) ходят в кино, театр и в музей?

Решение:

$$|A| = 70\% \text{ (кино)}$$

$$|B| = 60\% \text{ (театр)}$$

$$|C| = 30\% \text{ (музей)}$$

$$|A \cap B| = 40\% \text{ (кино и театр)}$$

$$|A \cap C| = 20\% \text{ (кино и музей)}$$

$$|B \cap C| = 10\% \text{ (театр и музей)}$$

Чтобы найти $|A \cap B \cap C|$, нам нужно из суммы процентов групп, посещающих по два места, вычесть сумму процентов каждой группы по отдельности и добавить неизвестный нам процент студентов, посещающих все три места.

$$|A \cap B \cap C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| - |A \cup B \cup C|$$

Заметим, что $|A \cup B \cup C|$ не может быть больше 100%, так что максимальное значение для $|A \cup B \cup C|$ - это 100%.

Процент студентов, которые любят ходить и в кино, и в театр, и в музей $|A \cap B \cap C|$, можно рассчитать, вычтя из суммы процентов студентов, которые любят ходить и в кино, и в театр $|A \cap B|$, и в кино, и в музей $|A \cap C|$, и в театр, и в музей $|B \cap C|$, сумму процентов студентов, которые любят ходить в каждое место отдельно $|A| + |B| + |C|$, и добавим общий процент студентов, чтобы скорректировать пересечения.

$$\begin{aligned} |A \cap B \cap C| &= (|A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C|) - (|A| + |B| + |C|) + 100\% = \\ &= (40\% + 20\% + 10\%) - (70\% + 60\% + 30\%) + 100\% = 10\% \end{aligned}$$

Ответ: 10% студентов любят ходить и в кино, и в театр, и в музей.

Задание 1.10

Используя формулу включений-исключений, решите задачу. Сколько натуральных чисел от 1 до 10000 не делится ни на a , ни на b , ни на c , ни на d ?

$$a = 3, b = 8, c = 16, d = 7;$$

Решение:

Если число делится на 16, то оно делится и на 8. Поэтому число 16 можно в условии задачи опустить.

Пусть A, B, C – множества целых положительных чисел, не превосходящих 1000, делящихся нацело на 3, 8, и 7 соответственно.

Тогда:

$$A \cap B, A \cap C, B \cap C, A \cap B \cap C$$

– множества целых положительных чисел, не превосходящих 10000 и делящихся нацело на $24 = 3 \cdot 8$, $21 = 3 \cdot 7$, $56 = 8 \cdot 7$ и $168 = 3 \cdot 8 \cdot 7$ соответственно.

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| =$$

Тогда, используя формулу включения и исключения имеем:

$$= (10000/3) + (10000/8) + (10000/7) - (10000/24) - (10000/21) - (10000/56) + (10000/168) = 5000$$

Следовательно, количество целых положительных чисел, не превосходящих 10000 и не делящихся нацело ни на одно из чисел 3, 8, 16 и 7, равно $10000 - 5000 = 5000$.

Ответ: 5000 целых положительных чисел, не превосходящих 10000 и не делящихся нацело ни на одно из чисел 3, 8, 16 и 7.

Задание 1.11

Методом математической индукции доказать, что при $n \in \mathbb{N}$: $7^n + 12n + 17$ кратно 18.

Решение:

Для доказательства по методу математической индукции, мы будем выполнять два шага: базовый шаг и шаг индукции.

Базовый шаг:

1. При $n = 1$: Подставим $n = 1$ в выражение $7^n + 12n + 17$:

$$7^1 + 12 \cdot 1 + 17 = 7 + 12 + 17 = 36.$$

Это число кратно 18, так как 36 делится на 18 без остатка.

Шаг индукции:

2. Предположим, что для некоторого положительного натурального числа k , формула $7^k + 12k + 17$ кратна 18.

3. Доказательство для $k + 1$: Теперь докажем, что при условии, что $7^k + 12k + 17$ кратно 18, также и $7^{k+1} + 12(k + 1) + 17$ кратно 18.

$$7^{k+1} + 12(k + 1) + 17 = 7 \cdot 7^k + 12k + 17 + 12$$

Мы знаем, что $7^k + 12k + 17$ кратно 18 (по предположению индукции). Таким образом, можно выделить $7^k + 12k + 17$ в выражении $7 \cdot 7^k + 12k + 17 + 12$.

$$\begin{aligned} 7 \cdot (7^k + 12k + 17) - 6(12k) - 6(17) + 12 &= 7 \cdot (7^k + 12k + 17) - (6 \cdot 12k + 90) = \\ &= 7 \cdot (7^k + 12k + 17) - 18(4k + 5) \end{aligned}$$

Таким образом, мы представили выражение $7^{k+1} + 12(k + 1) + 17$ в виде разности двух слагаемых, каждое из которых кратно 18, следовательно и самовыражения будет кратно 18.

Задание 1.12

Доказать, что при любом натуральном n выполняется равенство:
 $1 + 6 + 20 + \dots + (2n - 1) * 2^{n-1} = 3 + 2^n * (2n - 3)$.

Решение:

1. Пусть $k = 1$, тогда:

$$\text{л. ч } 1 + 6 + 20 + \dots + (2k - 1) * 2^{k-1} = (2 - 1) * 2^{1-1} = 1$$

$$\text{п. ч } 3 + 2^k * (2k - 3) = 3 + 2^1 * (2 - 3) = 3 - 2 = 1$$

$$1 = 1 \text{ — верно}$$

2. Считая, что для $k = n$ равенство верно, рассмотрим $k = n + 1$:

$$\text{л. ч } 1 + 6 + 20 + \dots + (2k - 1) * 2^{k-1}$$

$$= 1 + 6 + 20 + \dots + (2n - 1) * 2^{n-1} + (2n + 2 - 1)$$

$$* 2^{n+1-1} = 3 + 2^n * (2n - 3) + (2n + 1) * 2^n$$

$$= 3 + 2^n * (4n - 2)$$

$$\text{п. ч } 3 + 2^k * (2k - 3) = 3 + 2 * 2^n * (2n + 2 - 3)$$

$$= 3 + 2^n * (4n - 2)$$

$$3 + 2^n * (4n - 2) = 3 + 2^n * (4n - 2) \text{ — верно}$$