


Anthracnose Fruit Spot

अँथ्रॅकनोज (करपा रोग)

Causal Pathogen / रोगकारक घटक (English): *Colletotrichum gloeosporioides*

रोगकारक जैविक/बुरशीजन्य घटक (मराठी): कोलेटोट्रिचम ग्लोओस्पोरिओइड्स

FIELD IDENTIFICATION & DIAGNOSTIC IMAGE / क्षेत्र ओळख आणि रोग लक्षणे चित्र



RIND SYMPTOM GUIDE / साल लक्षण मार्गदर्शक

English Case Definition

Anthracnose is recognized by small, circular, dark brown to black lesions that quickly become severely sunken or depressed into the rind. In humid, warm, or rainy weather, the centers of these lesions exude distinctive sticky, gelatinous salmon-pink or orange masses of fungal spores. Leaves display corresponding dark brown spots with bright yellow halos, causing heavy premature defoliation.

मराठी लक्षणे सविस्तर माहिती

अँथ्रॅकनोज हा बुरशीजन्य रोग फळांच्या पृष्ठभागावर खोलगट, गोलाकार आणि गडद तपकिरी ते काळ्या रंगाचे चट्टे निर्माण करतो. हवेत दमटपणा किंवा सतत पाऊस असल्यास या डागांच्या मध्यभागातून संत्रा-गुलाबी किंवा नारिंगी रंगाचे चिकट बुरशीचे बिजाणू बाहेर पडतात. पानांवर पिवळे कडे असलेले डाग पडून झाडाची पाने गळतात.

ACTIONABLE CONTROL STEPS / सविस्तर नियंत्रण पायऱ्या

Biological & Organic Measures / जैविक आणि सेंद्रिय व्यवस्थापन पद्धत

English Protocol Steps

- Canopy Training:** Prune crisscrossing inner branches to open the canopy layout. This ensures prompt evaporation of morning dew and rainwater, cutting the moisture window required for spore germination.
- Protective Colonization:** Spray certified *Bacillus subtilis* formulations (5 g/liter) on a regular preventive regime to coat the fruit rind with helpful microbial blockades.

मराठी सेंद्रिय कृती पायऱ्या

- झाडांची छाटणी:** सूर्यप्रकाश आणि हवा थेट आत जाण्यासाठी झाडाच्या आतील दाट आणि एकमेकांवर येणाऱ्या फांद्या छाटून टाका. यामुळे फळांवरील ओलावा लवकर सुकतो आणि बुरशी वाढत नाही.
- जैविक कवच:** फळांची साल मजबूत करण्यासाठी आणि बुरशीला अटकाव करण्यासाठी *बॅसिलस सबटिलिस* (५ ग्रॅम) प्रति लिटर पाण्यात मिसळून नियमित अंतराने फवारणी करा.

English Treatment Details

- **Proactive Contact:** Spray **Copper Oxychloride (3 g/liter)** or **Mancozeb (2.5 g/liter)** ahead of seasonal rainfall to neutralize spores.
- **Curative Traze Therapy:** Upon spotting sunken lesions, immediately spray systemic single-site inhibitors: **Azoxystrobin (1 ml/liter)**, **Propiconazole (1 ml/liter)**, or **Carbendazim (1 g/liter)** in rotation.

मराठी रासायनिक औषधोपचार पायऱ्या

- **प्रतिबंधात्मक उपाय:** पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी बिजाणू नष्ट करण्यासाठी **कॉपर ऑक्झिक्लोराईड (३ ग्रॅम)** किंवा **मॅन्कोझेब (२.५ ग्रॅम)** प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा.
- **रोगनाशक फवारणी:** फळांवर खोलगट चट्टे दिसताच **अझॉक्सीस्ट्रोबिन (१ मिली)**, **प्रोपिकोनाझोल (१ मिली)** किंवा **कार्बेन्डाझिम (१ ग्रॅम)** प्रति लिटर पाण्यात मिसळून आलटून-पालटून फवारा.