


Bacterial Blight (Oily Spot)

तेलकट डाग (बॅक्टेरियल ब्लाइट)

Causal Pathogen / रोगकारक घटक (English): *Xanthomonas axonopodis* pv. *punicae*

रोगकारक जैविक/बुरशीजन्य घटक (मराठी): झॅथोमोनास अॅक्सोनोपोडिस पीव्ही. पुनिकी

FIELD IDENTIFICATION & DIAGNOSTIC IMAGE / क्षेत्र ओळख आणि रोग लक्षणे चित्र



RIND SYMPTOM GUIDE / साल लक्षण मार्गदर्शक

English Case Definition

Bacterial blight manifests as dark brown to black, water-soaked, circular lesions on the pomegranate rind which rapidly take on an oily, shiny sheen. As the pathogen multiplies, the rigid rind develops deep, severe cracks splitting along characteristic 'L' or 'Y' axes. This leads to complete inner pulp rotting, structural drop, and up to 80-100% crop loss if left uncontrolled.

मराठी लक्षणे सविस्तर माहिती

तेलकट डाग हा डाळिंबावरील अत्यंत विनाशकारी जिवानूजन्य रोग आहे. यामध्ये फळांच्या पृष्ठभागावर सुरुवातीला पाण्याचे अंश असलेले गोल डाग पडतात जे नंतर काळे आणि तेलकट चमकदार बनतात. रोगाची तीव्रता वाढल्यास फळांची साल 'L' किंवा 'Y' आकारात मधोमध तडकते, ज्यामुळे आतील संपूर्ण गर सडतो व फळे गळून पडतात.

ACTIONABLE CONTROL STEPS / सविस्तर नियंत्रण पायऱ्या

Biological & Organic Measures / जैविक आणि सेंद्रिय व्यवस्थापन पद्धत

English Protocol Steps

- **Sanitation Protocol:**** Prune infected twigs 2 inches below the visible dry lesion during clean windows. Collect all fallen leaves and diseased fruits, carry them away from the orchard perimeter, and bury or incinerate them.
- **Wound Sealing:**** Immediately paint pruned cut ends with a freshly prepared ****10% Bordeaux Paste**** slurry to create an airtight chemical shield against bacterial entry.
- **Biocontrol Inoculation:**** Spray ****Pseudomonas fluorescens**** or ****Bacillus subtilis**** formulations @ 5

मराठी सेंद्रिय कृती पायऱ्या

- **स्वच्छता मोहीम:**** छाटणी करताना संसर्गित फांद्या डागाच्या २ इंच खालून कापून घ्या. बागेतील पडलेली पाने आणि रोगट फळे गोळा करून बागेबाहेर नेऊन जमिनीत खोल गाडा किंवा पूर्णपणे जाळून टाका.
- **जखम भरणे:**** छाटणी पूर्ण झाल्यावर कापलेल्या भागांवर जिवानूंचा प्रवेश रोखण्यासाठी त्वरित ****१०% बोर्डो पेस्ट**** किंवा कॉप ऑक्झिक्लोराईडची घट्ट पेस्ट लावा.
- **जैविक नियंत्रण फवारणी:**** हवेत दमटपणा किंवा ढगाळ हवामान असताना ****स्यूडोमोनास फ्लुरोसेन्स**** किंवा ****बॅसिलस सबटिलिस****

grams per liter of water at 12-day intervals during high-humidity or overcast weather to colonize and outcompete the pathogen.

५ ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यात मिसळून दर १२ दिवसांनी संपूर्ण झाडावर फवारणी करा.

Chemical Spray Treatment / रासायनिक फवारणी वेळापत्रक

English Treatment Details

- **First Protective Shield:** Spray **Streptocycline** (0.05 g/liter) mixed with **Copper Oxychloride** (2.5 g/liter) at the onset of monsoon or immediately post-pruning to disinfect the canopy.
- **Secondary Eradication:** If active oily lesions persist, apply **Bronopol** (0.5 g/liter) combined with **Captan** (2 g/liter). Repeat after 14 days depending on rainfall volume.
- **Advanced Containment:** Spray **Kasugamycin** (0.2%) + **Copper Hydroxide** (2 g/liter) during prolonged wet spells to halt rapid horizontal tissue transfer.

मराठी रासायनिक औषधोपचार पायन्या

- **पहिली प्रतिबंधात्मक फवारणी:** मान्सून सुरू होताना किंवा छाटणीनंतर लगेच जिवाणू नष्ट करण्यासाठी **स्ट्रेप्टोसायक्लीन** (०.०५ ग्रॅम) अधिक **कॉपर ऑक्झिक्लोराईड** (२.५ ग्रॅम) प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारा.
- **दुसरी फवारणी:** सक्रिय तेलकट डाग दिसल्यास **ब्रोनोपोल** (०.५ ग्रॅम) अधिक **कॅप्टन** (२ ग्रॅम) प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा. तीव्रतेनुसार १४ दिवसांनी पुन्हा फवारा.
- **प्रगत नियंत्रण:** सतत पाऊस पडत असल्यास जिवाणूंचा प्रसार रोखण्यासाठी **कासुगामायसिन** (०.२%) अधिक **कॉपर हायड्रॉक्साईड** (२ ग्रॅम) प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा.