


Cercospora Fruit Spot

सर्कोस्पोरा फळ डाग

Causal Pathogen / रोगकारक घटक (English): *Cercospora punicae*

रोगकारक जैविक/बुरशीजन्य घटक (मराठी): सर्कोस्पोरा पुनिकी

FIELD IDENTIFICATION & DIAGNOSTIC IMAGE / क्षेत्र ओळख आणि रोग लक्षणे चित्र



RIND SYMPTOM GUIDE / साल लक्षण मार्गदर्शक

English Case Definition

Cercospora manifests as small, highly discrete, intensely dark blackish-brown circular spots across the pomegranate rind. Unlike bacterial blight, these lesions remain completely dry, separate, and non-slimy, without deep crack patterns. However, severe infestations cause the outer shell to turn leathery, dry, and crack irregularly due to moisture stress, lowering commercial market grade.

मराठी लक्षणे सविस्तर माहिती

सर्कोस्पोरा रोगामध्ये फळांच्या सालीवर लहान, स्पष्ट आणि सुटे गडद काळे-तपकिरी गोलाकार डाग पडतात. तेलकट डागाच्या तुलनेत हे डाग कोरडे व तेलकटपणा नसलेले असतात. संसर्ग तीव्र झाल्यास फळांची साल कडक व चामड्यासारखी बनते आणि फळे अनियमितपणे तडकतात, ज्यामुळे बाजारातील किंमत कमी होते.

ACTIONABLE CONTROL STEPS / सविस्तर नियंत्रण पायऱ्या

Biological & Organic Measures / जैविक आणि सेंद्रिय व्यवस्थापन पद्धत

English Protocol Steps

- **Sanitary Disposal:**** Collect all fallen spotted leaves and affected fruits from the orchard basin and bury them in 2-foot deep trenches mixed with lime to prevent spore escape.
- **Root Zone Inoculation:**** Apply well-rotted Farm Yard Manure or Vermicompost enriched with ****Trichoderma harzianum culture**** around the root zone to suppress soil-borne fungal propagation.

मराठी सेंद्रिय कृती पायऱ्या

- **कचऱ्याची विल्हेवाट:**** बागेतील पडलेली डागाळलेली पाने आणि बाधित फळे गोळा करून बागेबाहेर २ फूट खोल खड्ड्यात चुना टाकून गाडून टाका.
- **मुळांचे सक्षमीकरण:**** जमिनीतील बुरशीचा प्रादुर्भाव दाबण्यासाठी झाडाच्या मुळांभोवती ****ट्रायकोडर्मा विरजणयुक्त**** चांगलेले कुजलेले शेणखत किंवा गांडूळ खत मोठ्या प्रमाणात द्या.



English Treatment Details

- **Early Canopy Shield:** Spray **Chlorothalonil (2 g/liter)** or **Zineb (2 g/liter)** during early fruit-setting stages when the rind tissue is growing rapidly.
- **Targeted Knockdown:** If spots multiply rapidly across the block, spray systemic compounds like **Thiophanate Methyl (1 g/liter)** or **Difenoconazole (1 ml/liter)**.

मराठी रासायनिक औषधोपचार पायऱ्या

- **सुरुवातीचे संरक्षण:** फळे धरण्याच्या सुरुवातीच्या नाजूक टप्प्यात **क्लोरोथॅलोनिल (२ ग्रॅम)** किंवा **झिनेब (२ ग्रॅम)** प्रति लिटर पाण्यात मिसळून संरक्षणात्मक फवारणी करा.
- **वेगवान नियंत्रण:** डाग वेगाने वाढत असल्यास **थायोफेनेट मिथाईल (१ ग्रॅम)** किंवा **डिफेनोकोनाझोल (१ मिली)** प्रति लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करा.