

## CB N°1 - COMPLÉMENTS D'ALGÈBRE LINÉAIRE - SUJET 1

1. On considère les matrices  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ , et  $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ -2 & 3 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$ .

Déterminer la nature des endomorphismes de  $\mathbb{R}^3$  canoniquement associés à  $A$  et  $B$ , ainsi que leurs éléments caractéristiques.

$A^2 = A$  donc  $A$  est la matrice de la projection  $p$  sur  $\text{Im}(p) = \text{Vect}\{(0, 1, 1), (1, 1, 0)\}$  parallèlement à  $\text{Ker}(p) = \text{Vect}\{(1, 1, 1)\}$ .

$B^2 = I_3$  donc  $B$  est la matrice de la symétrie  $s$  par rapport à  $\text{Ker}(s - \text{Id}_{\mathbb{R}^3}) = \text{Vect}\{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$  parallèlement à  $\text{Ker}(s + \text{Id}_{\mathbb{R}^3}) = \text{Vect}\{(1, 1, -1)\}$ .

2. On considère les sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^3$  suivants :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + z = 0\}, G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - y = 0 \text{ et } x + y + z = 0\}$$

- a. Déterminer des bases de  $F$  et de  $G$ .

$$F = \text{Vect}\{(1, 0, -1), (0, 1, 0)\}, \text{ et } G = \text{Vect}\{(1, 1, -2)\}.$$

- b. Montrer que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $\mathbb{R}^3$ .

On note  $f_1 = (1, 0, -1)$ ,  $f_2 = (0, 1, 0)$  et  $g = (1, 1, -2)$ .

La matrice  $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$  est inversible, d'inverse  $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ .

On en déduit que la famille  $(f_1, f_2, g)$  est libre, de cardinal 3, c'est donc une base de  $\mathbb{R}^3$  ;  $F$  et  $G$  sont supplémentaires.

- c. Donner la matrice dans la base canonique de la projection sur  $F$  parallèlement à  $G$ .

$$A = P \text{Mat}_{(f_1, f_2, g)}(p) P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

## CB N°1 - COMPLÉMENTS D'ALGÈBRE LINÉAIRE - SUJET 2

1. On considère la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ , et  $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ .

Déterminer la nature des endomorphismes de  $\mathbb{R}^3$  canoniquement associés à  $A$  et  $B$ , ainsi que leurs éléments caractéristiques.

$A^2 = I_3$  donc  $A$  est la matrice de la symétrie  $s$  par rapport à  $\text{Ker}(s - \text{Id}_{\mathbb{R}^3}) = \text{Vect}\{(1, 1, -1)\}$  parallèlement à  $\text{Ker}(s + \text{Id}_{\mathbb{R}^3}) = \text{Vect}\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}$ .

$B^2 = B$  donc  $B$  est la matrice de la projection  $p$  sur  $\text{Im}(p) = \text{Vect}\{(1, 0, 2), (1, 1, 1)\}$  parallèlement à  $\text{Ker}(p) = \text{Vect}\{(1, 0, 1)\}$ .

2. On considère les sous-espaces vectoriels de  $\mathbb{R}^3$  suivants :

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x + z = 0\}, G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, y + z = 0 \text{ et } x + y + z = 0\}.$$

- a. Déterminer des bases de  $F$  et de  $G$ .

$$F = \text{Vect}\{(1, 0, -1), (0, 1, 0)\}, \text{ et } G = \text{Vect}\{(0, 1, -1)\}.$$

- b. Montrer que  $F$  et  $G$  sont supplémentaires dans  $\mathbb{R}^3$ .

On note  $f_1 = (1, 0, -1)$ ,  $f_2 = (0, 1, 0)$  et  $g = (0, 1, -1)$ .

La matrice  $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$  est inversible, d'inverse  $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ .

On en déduit que la famille  $(f_1, f_2, g)$  est libre, de cardinal 3, c'est donc une base de  $\mathbb{R}^3$  ;  $F$  et  $G$  sont supplémentaires.

- c. Donner la matrice dans la base canonique de la symétrie par rapport à  $F$ , parallèlement à  $G$ .

$$A = P \text{Mat}_{(f_1, f_2, g)}(p) P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$