



СМ-Клиника
многопрофильный медицинский холдинг



ООО "СМ-Медика"

Адрес 117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом № 65, корпус 1

Телефон +7 (495) 777-48-49

Факс

E-mail

Лицензия № ЛО41-01137-77/00351219

Амбулаторная карта № АМ6217403

Протокол компьютерной томографии

Дата приема 28.11.2025 Время 22:49

ФИО пациента Микова Чиана Сергеевна

Дата рождения 24.01.1977 Возраст на момент осмотра 48 ИДС получено.

Врач Глазунова Ольга Игоревна

Жалобы перед исследованием со слов пациента

Область исследования: органы брюшной полости и забрюшинного пространства

Положение пациента во время исследования: лежа на спине

Исследование выполнено на аппарате: 128-ми срезовый компьютерный томограф Siemens Perspective

Контрастное усиление: -омнипак 350 mgI/ml — 100 мл

Эффективная (индивидуальная) доза облучения пациента: 20,4 мЗв

Описание исследования

Проведено четырехфазное исследование в высокоразрешающем режиме с дополнительной сложной обработкой изображения (анализ с построением MIP, MPR реконструкций).

ПЕЧЕНЬ обычной формы и расположения, размеры увеличены (ККР 19,4 см); контуры ровные, четкие, структура паренхимы однородная, без очаговых изменений, плотность паренхимы в пределах +57 ед.Н. Зон патологического накопления контрастного вещества не выявляется. Воротная вена 10 мм.

ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ обычных размеров, просвет с однородным содержимым; рентгенопозитивных конкрементов в проекции желчного пузыря не определяется. Внутри- и внепеченочные желчные протоки не расширены.

СЕЛЕЗЁНКА в размерах не увеличена, без очаговых изменений плотности, с характерным «мраморным» типом контрастирования в аортальную фазу.

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА обычной формы и размеров. Контуры её чёткие, ровные, структура паренхимы однородная, без очаговых изменений плотности, без признаков патологического накопления КВ. Парапанкреатическая клетчатка не изменена.

НАДПОЧЕЧНИКИ обычной структуры, дополнительных образований, зон патологического накопления контрастного вещества в проекции надпочечников не выявлено.

ПОЧКИ имеют обычную форму и размеры, контуры чёткие, ровные. Паренхима правой и левой почек контрастируется симметрично. Рентгенопозитивных конкрементов, зон патологического накопления КВ в проекции почек не определяется. Правой почке определяется простая киста размером 12 мм, в левой размером 3 мм. В отсроченную фазу контрастирования ЧЛС достаточное, симметричное.

МОЧЕТОЧНИКИ не расширены, без конкрементов.

МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ тугого наполнения, стенки не утолщены в просвете дополнительных образований не выявлено.

Жидкости в брюшной полости и малом тазу не выявлено.

Дополнительных объемных образований и достоверного выраженного утолщения стенки желудка, петель тонкой и сегментов толстой кишки на уровнях сканирования не отмечено.

Прямой кишки определяется участок гиперваскуляризации стенки кишки с наличием крупной питающей ветки диаметром до 3,6 мм.

Пупочное кольцо расширено до 7 мм.

Убедительных КТ-признаков увеличения забрюшинных лимфоузлов не определяется.

В режиме визуализации костной ткани деструктивные изменения на исследованном уровне не выявляются.

Заключение

Гепатомегалия. Мелкая пупочная грыжа. Мелкие кисты печени. Кисты почек Bosniak I.

Признаки гиперваскуляризации стенки прямой кишки.

Рекомендовано ФКС.

Подпись врача рентгенолога

