

№ заказа	149820616	Фамилия пациента	Микова Чиана Сергеевна
Дата регистрации заказа	15.12.2025	Имя пациента	JOP5Au
Пол пациента	женский	Дата рождения пациента	24.01.1977
Адрес пациента	№ страхового полиса		
Номер истории болезни пациента	Направляющий врач		
Адрес	127549, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Бибирево, ул Пришвина, д. 8, к. 1	Отделение	-
1135	1135. ООО "Лабораторно-диагностический центр"	Палата	
Диагноз			

Исследование

Значение

Ед. изм.

Нормальные значения

АУТОИММУННАЯ ДИАГНОСТИКА

Антинейрональные антитела (Анти-Yo1, Hu, Ri, PNMA2 (Ma2/Ta), CV2, Амфифизин), диагностика паранеопластических энцефалитов

Дата исследования: 18.12.2025;

Коммен.Антинейрональные АТ

Отрицательный результат выявления антинейрональных антител в сыворотке крови в значительной степени исключает наличие таких неврологических нарушений, как паранеопластический энцефаломиелит, паранеопластическая сенсорная нейропатия, паранеопластическая мозжечковая дегенерация, паранеопластическая атаксия опсоклонус миоклонус, синдром «ригидного человека» (stiff person syndrome). Антинейрональные антитела – это широкая группа органоспецифических аутоантител, которые циркулируют в крови и цереброспинальной жидкости пациентов с неврологической симптоматикой, развившейся на фоне паранеопластического процесса. Описано более 32 редких антигенных мишеней антинейрональных антител, которые включают антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), антитела к амфифизину, клеткам Пуркинье, антитела к вольтаж-зависимым калиевым каналам и др.. Метод иммуноблота позволяет определить 6 наиболее частых антинейрональных антител: анти-Yo, Hu, Ri, PNMA2 (Ma2/Ta), CV2, Амфифизину. Тест может быть отрицательным у отдельных пациентов с неврологическими нарушениями на фоне паранеопластического процесса, находящихся в глубокой иммуносупрессии, связанной с гуморальным дефицитом, тяжелыми соматическими заболеваниями или под действием медикаментозной терапии. Отсутствие антинейрональных антител не исключает наличие паранеопластического процесса у больных с неврологической патологией, однако значительно снижает вероятность этих заболеваний. При отрицательном результате исследования может быть рекомендовано определение антинейрональных антител методом непрямой иммунофлюоресценции, определение антител к GAD 65, определение антител к вольтаж-зависимым калиевым каналам.

Антитела к амфифизину

не обнаружены

Антитела к CV 2.1

не обнаружены

Антитела к Hu (антитела к ядрам нейронов 1)

не обнаружены

Антитела к PNMA2 (Ta/Ma2)

не обнаружены

Антитела к Ri (антитела к ядрам нейронов 2)

не обнаружены

Антитела к Yo-1 антигену (АТ к клеткам Пуркинье)

не обнаружены

Результат лабораторных исследований не является единственным параметром для постановки диагноза.

Получая данный результат анализов, пациент подтверждает, что давал согласие на обработку своих ПДн 15.12.2025