

# NOTE DI MECCANICA QUANTISTICA

MANUEL DEODATO



## INDICE

<b>1</b>	<b>Struttura matematica della meccanica quantistica</b>	<b>5</b>
1.1	Introduzione	5
1.1.1	Notazione bra-ket	5
1.1.2	Operatori	6
1.1.3	Operatori autoaggiunti	7
1.1.4	Commutatori	8
1.2	Prodotto esterno	8
1.2.1	Proiettori	8
1.2.2	Completezza di una base e valore di aspettazione di un osservabile	8
1.2.3	Cambiamento di base	9
1.3	Applicazioni per la meccanica quantistica	9
1.3.1	Rappresentazione delle coordinate	9
1.3.2	Rappresentazione degli impulsi	10
1.3.3	Misura di un osservabile	10
1.3.4	Principi della meccanica quantistica	11
1.3.5	Spazio di Hilbert proiettivo, sistemi puri e misti	11
1.3.6	Proiettore per sistemi puri	12
1.3.7	Flusso di probabilità ed equazione di continuità	13
<b>2</b>	<b>Introduzione alla meccanica quantistica</b>	<b>15</b>
2.1	Evoluzione temporale	15
2.1.1	Equazione di Shrödinger per gli stati	15
2.1.2	Soluzione dell'equazione	15
2.1.3	Equazione di Shrödinger per la funzione d'onda	16
2.1.4	Equazione di Shrödinger per il proiettore	17
2.2	Evoluzione temporale per gli operatori	17
2.2.1	Il quadro di Shrödinger	17
2.2.2	Il quadro di Heisenberg	17
2.2.3	Evoluzione delle misure	18
2.3	Simmetrie e operatore impulso	18
2.3.1	Traslazioni	18
2.3.2	L'operatore impulso	19
2.3.3	Funzione d'onda degli impulsi	20
2.3.4	Simmetrie per stati che evolvono temporalmente	21
2.3.5	Commutatore di $\hat{p}$ e $\hat{X}$	21

2.4	Il principio di indeterminazione	22
2.4.1	Introduzione	22
2.4.2	Algebra degli operatori sottratti	23
2.4.3	Il principio di indeterminazione	23
2.5	Alcuni esempi di $\hat{H}$ per sistemi quantistici	24
2.5.1	Sistema di due corpi	24
2.5.2	Particella in campo esterno	25
2.6	L'oscillatore armonico	25
2.6.1	Operatori di creazione e distruzione	25
2.6.2	Funzione d'onda per l'oscillatore armonico	27
2.7	Operatore parità e sistemi unidimensionali	28
2.7.1	Operatore parità	28
2.7.2	Alcuni teoremi per sistemi unidimensionali	29
2.7.3	Moto di una particella sotto potenziale	30
2.7.4	Particella contro barriera di potenziale	31
2.8	Meccanica quantistica dei sistemi interagenti	32
2.8.1	Operatori per sistemi non-interagenti	32
2.8.2	La matrice densità	33
2.8.3	Caratterizzazione degli stati misti	33
2.8.4	Valore di aspettazione per miscele statistiche	34
2.8.5	Evoluzione temporale della matrice densità	34
2.9	L'operatore momento angolare	35
2.9.1	Rotazioni in 3D	35
2.9.2	Rotazione su funzione d'onda	35
2.9.3	Momento angolare	35
2.9.4	Momento angolare orbitale	36
2.9.5	Spettro del momento angolare	37
2.9.6	Introduzione allo spin	37
2.9.7	Spettro del momento angolare orbitale	38
2.10	Atomo di idrogeno	40
2.10.1	Particelle in campo centrale	40
2.10.2	Funzione d'onda per l'atomo di idrogeno	41
2.10.3	Lo stato fondamentale, medie e varianze di posizione e momento	42
2.10.4	Principio di indeterminazione	44
2.10.5	Oscillatore armonico 3D	44
2.11	Lo spin	45
2.11.1	Esempio – Sistema di spin 1/2 (parte 1)	45

2.11.2	Esempio – Sistema di spin $1/2$ (parte 2)	46
2.11.3	Gli angoli di Eulero e le matrici di Wigner	48
2.11.4	Regole di superselezione	49
2.11.5	Coefficienti di Clebsch-Gordan	50
2.11.6	Esempio – Coefficienti di Clebsch-Gordan per due spin $1/2$	52
2.11.7	Operatori tensoriali irriducibili	53
2.11.8	Teorema di Wigner-Eckart	54
<b>3</b>	<b>Teoria delle perturbazioni</b>	<b>56</b>
<b>4</b>	<b>Esercitazioni (23-24)</b>	<b>57</b>
4.1	Sistemi a due livelli	57
4.1.1	Descrizione generale	57
4.1.2	Matrici di Pauli	57
4.1.3	Studio di un sistema a due livelli	58
4.1.4	Risonanza di spin	59
4.2	Dinamica degli operatori	61
4.2.1	Dinamica di un sistema a due livelli	61
4.2.2	Dinamica di un sistema a due livelli tramite rappresentazione di Heisenberg	62
4.2.3	Metodo di soluzione alternativo	62
4.3	Sistema composto da due sottosistemi a due livelli	63
4.3.1	Spettro dell'Hamiltoniano	64
4.3.2	Matrice densità	65
4.4	Buca di potenziale $V_0$	65
4.4.1	Buca di potenziale con parità	68
4.4.2	Spettro energetico	69
4.4.3	Buca di potenziale infinita	70
4.5	Positronio (prova d'esame)	70
<b>5</b>	<b>Esercitazioni 21-22</b>	<b>76</b>
5.1	Generalità sui sistemi a due livelli	76
5.2	Sistema di qubit	80
5.3	Teoria generica sui sistemi composti	81
5.4	Sistemi di due qubit interagenti	83
5.5	Complementi di teoria	87
5.5.1	Entropia di entanglement	87
5.5.2	Funzione di una matrice	87
5.5.3	Evoluzione temporale di stati impuri	88

# 1 STRUTTURA MATEMATICA DELLA MECCANICA QUANTISTICA

## 1.1 Introduzione

### DEFINIZIONE 1.1 — PRODOTTO SCALARE.

Per  $V$  spazio vettoriale su  $\mathbb{C}$  e  $\psi, \phi \in V$ , si definisce  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$  come:

- $\langle \psi, \phi \rangle \in \mathbb{C}$ ;
- $\langle \psi, \phi \rangle = \langle \phi, \psi \rangle^*$ ;
- $\langle \psi, c_1\phi_1 + c_2\phi_2 \rangle = c_1 \langle \psi, \phi_1 \rangle + c_2 \langle \psi, \phi_2 \rangle$ , con  $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$ ;
- $\langle \phi, \phi \rangle \geq 0$  e  $\langle \phi, \phi \rangle = 0 \iff \phi = 0$ .

Dato  $\phi \in V$ , questo induce la **norma**:

$$\|\phi\| \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt{\langle \phi, \phi \rangle} \quad (1.1.1)$$

Si ricordano le seguenti disuguaglianze:

$$\begin{aligned} \textbf{Schwarz: } & |\langle \phi, \psi \rangle|^2 \leq \langle \phi, \phi \rangle \langle \psi, \psi \rangle \\ \textbf{Triangolare: } & \|\phi + \psi\| \leq \|\psi\| + \|\phi\| \end{aligned} \quad (1.1.2)$$

### TEOREMA 1.1 — TEOREMA DI RIESZ.

Dato  $T$  operatore lineare limitato agente su spazio di Hilbert  $\mathcal{H}$ , allora  $\exists f \in \mathcal{H} : \forall \phi \in \mathcal{H} \Rightarrow T(\phi) \equiv \langle f, \phi \rangle$ . Inoltre,  $\|T\| = \|f\|$ .

**OSSERVAZIONE 1.1 — FUNZIONALI E OPERATORI.** Un funzionale lineare è un operatore lineare  $F$  che agisce su uno spazio vettoriale  $V$  su  $\mathbb{K}$  e restituisce un valore nel campo; formalmente:  $F : V \rightarrow \mathbb{K}$ . In generale, gli operatori non restituiscono valori in  $\mathbb{K}$ , mentre i funzionali sì.

Gli operatori rappresentano gli osservabili, mentre i funzionali sono usati per calcolare aspettazione e probabilità.

#### 1.1.1 Notazione bra-ket

Sia  $V$  uno spazio vettoriale e  $V'$  il suo duale; si definiscono:

- per  $\phi \in V \longrightarrow |\phi\rangle \in V$ ;
- per  $F \in V' \longrightarrow \langle F| \in V'$ .

Per Riesz, per qualche  $f \in V$ :

$$\langle F|\phi \rangle \stackrel{\text{def}}{=} F(\phi) = \langle f, \phi \rangle \Rightarrow F(\phi) \leftrightarrow \langle f|\phi \rangle \quad (1.1.3)$$

Visto che  $\langle \phi|\psi \rangle = \langle \phi, \psi \rangle$ , allora:

$$\langle c\phi| = c^* \langle \phi| \longleftrightarrow |c\phi \rangle = c |\phi \rangle \quad (1.1.4)$$

### 1.1.2 Operatori

Si considerano vettori, o **stati**, in uno spazio di Hilbert  $\mathcal{H}$ . Un operatore che agisce su tale spazio è definito come  $\hat{A} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ , quindi  $\hat{A}|\phi \rangle \in \mathcal{H}$ . Gli operatori di interesse saranno **lineari**.

Se  $\hat{A}$  è limitato (quindi continuo), dato  $|\psi \rangle \in \mathcal{H}$ , con  $\{\phi_i\}$  base ortonormale:

$$\begin{cases} \hat{A}|\psi \rangle = |\phi \rangle = \sum_{i=1}^{+\infty} c_i |\phi_i \rangle \\ \hat{A}|\psi \rangle = \sum_{i=1}^{+\infty} b_i \hat{A}|\phi_i \rangle \end{cases}$$

si nota che

$$\langle \phi_j|\hat{A}\psi \rangle = \langle \phi_j| \left( \sum_{i=1}^{+\infty} b_i \hat{A}|\phi_i \rangle \right) = \sum_{i=1}^{+\infty} b_i \underbrace{\langle \phi_j|\hat{A}|\phi_i \rangle}_{\equiv A_{ji}} \quad (1.1.5)$$

dove  $A_{ji}$  è un elemento di matrice; infatti

$$\langle \phi_j|\phi \rangle = \langle \phi_j|\hat{A}\psi \rangle = \sum_{i=1}^{+\infty} c_i \langle \phi_j|\phi_i \rangle = c_j$$

da cui, unendo le uguaglianze:

$$\sum_{i=1}^{+\infty} A_{ji} b_i = c_j$$

Sia  $\hat{A}$  lineare; l'aggiunto è  $\hat{A}^\dagger$  e tale che  $\langle \phi, \hat{A}\psi \rangle = \langle \hat{A}^\dagger \phi, \psi \rangle$ . Allora, in notazione bra-ket:

$$\langle w| = \langle \phi| \hat{A}^\dagger \longleftrightarrow |w \rangle = \hat{A} |\phi \rangle \quad (1.1.6)$$

Inoltre

$$\begin{aligned}\langle \psi, \phi \rangle^* &= \langle \phi, \psi \rangle \implies \langle \psi | \phi \rangle^* = \langle \phi | \psi \rangle \\ \implies \langle \psi | \hat{A}^\dagger | \phi \rangle^* &= \langle \phi | \hat{A} | \psi \rangle\end{aligned}\quad (1.1.7)$$

Infine, se  $\{\phi_i\}$  base ortonormale:

$$A_{ij}^\dagger = \langle \phi_i | \hat{A}^\dagger | \phi_j \rangle = \langle \phi_j | \hat{A} | \phi_i \rangle^* = A_{ji}^* \implies A^\dagger = (A^\top)^* \quad (1.1.8)$$

Da questo, segue:

$$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger; (cA)^\dagger = c^* A^\dagger \quad (1.1.9)$$

### 1.1.3 Operatori autoaggiunti

**DEFINIZIONE 1.2 — OPERATORE AUTOAGGIUNTO.**

Sia  $\mathcal{H}$  uno spazio di Hilbert complesso e sia  $A$  un operatore lineare definito su un dominio  $\text{Dom}(A) \subseteq \mathcal{H}$ . L'operatore  $A$  si dice **autoaggiunto** se soddisfa le seguenti condizioni:

- (1). **Densità del dominio:** il dominio  $\text{Dom}(A)$  è denso nello spazio di Hilbert  $\mathcal{H}$ , ovvero:

$$\overline{\text{Dom}(A)} = \mathcal{H}.$$

- (2). **Simmetria:** per ogni  $\psi, \phi \in \text{Dom}(A)$ ,

$$\langle \psi, A\phi \rangle = \langle A\psi, \phi \rangle.$$

- (3). **Uguaglianza con l'aggiunto:** il dominio di  $A$  coincide con quello del suo aggiunto  $A^\dagger$ , e i due operatori coincidono, ovvero:

$$\text{Dom}(A) = \text{Dom}(A^\dagger) \quad \text{e} \quad A = A^\dagger.$$

Essendo  $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$ , si ha  $A_{ij} = (A_{ij}^*)^\top$ . Questi sono sempre diagonalizzabili, quindi hanno base ortonormale di autovettori. Visto che  $\langle \phi_1 | \hat{A} | \phi_2 \rangle = \langle \phi_2 | \hat{A} | \phi_1 \rangle^*$ , allora  $\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \in \mathbb{R}$  ed è il **valore di aspettazione**.

Sia  $|\psi\rangle$  autostato di  $\hat{A}$  autoaggiunto; allora  $\hat{A}|\psi\rangle = a|\psi\rangle \implies \langle \psi | \hat{A} = \langle \psi | a^*$ . Si nota, però, che:

$$a \langle \psi | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A}^\dagger | \psi \rangle = a^* \langle \psi | \psi \rangle \iff a = a^* \implies a \in \mathbb{R} \quad (1.1.10)$$

Siano  $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$  tali che  $\hat{A}|\psi_1\rangle = a_1|\psi_1\rangle$  e  $\hat{A}|\psi_2\rangle = a_2|\psi_2\rangle$ , con  $a_1 \neq a_2$ ; allora:

$$\begin{aligned} a_2 \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle &= \langle \psi_1 | \hat{A} | \psi_2 \rangle = \langle \psi_1 | \hat{A}^\dagger | \psi_2 \rangle = a_1^* \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = a_1 \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle \\ &\Rightarrow (a_2 - a_1) \langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = 0 \iff |\psi_1\rangle \perp |\psi_2\rangle \end{aligned} \quad (1.1.11)$$

#### 1.1.4 Commutatori

**DEFINIZIONE 1.3 — COMMUTATORE.**

Siano  $\hat{A}, \hat{B}$  due operatori; il commutatore è:  $[\hat{A}, \hat{B}] \stackrel{\text{def}}{=} \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$ . Quindi se  $\hat{A}, \hat{B}$  commutano, si ha  $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ .

**TEOREMA 1.2 — SPETTRO COMUNE.**

Se  $\hat{A}, \hat{B}$  sono autoaggiunti e commutano, allora condividono una base di autovettori.

## 1.2 Prodotto esterno

Applicazione  $\rho : V \times V \rightarrow \mathcal{O}$ , con  $\mathcal{O}$  spazio degli operatori lineari. Un esempio di prodotto esterno è l'operatore lineare

$$\hat{O} = |\psi\rangle \langle \phi| : V \rightarrow V \quad (1.2.1)$$

Si nota che:

$$\langle v | \hat{O} w \rangle = \langle v | (|\psi\rangle \langle \phi|) w \rangle = \langle v | \psi \rangle \langle \phi | w \rangle = \langle \hat{O}^\dagger v | w \rangle \iff O^\dagger = |\phi\rangle \langle \psi|$$

### 1.2.1 Proiettori

Operatore  $\hat{P}$  tale che  $\hat{P}^2 = \hat{P}$ . Un esempio è  $\hat{P} = |\psi\rangle \langle \psi|$ , con  $\|\psi\| = 1$  perché:

$$\hat{P}^2 = |\psi\rangle \langle \psi | \psi \rangle \langle \psi| = |\psi\rangle \langle \psi| \equiv \hat{P}$$

### 1.2.2 Completezza di una base e valore di aspettazione di un osservabile

Un insieme ortonormale  $\{|\phi_i\rangle\}$  si dice completo se:



$$\sum_{i=1}^{+\infty} |\phi_i\rangle \langle \phi_i| = \text{Id} \quad (1.2.2)$$

Un insieme ortonormale completo è una base ortonormale di  $\mathcal{H}$ , quindi permette di scomporre ogni stato in una combinazione lineare.

### 1.2.3 Cambiamento di base

Siano  $\{|\phi_i\rangle\}_i$ ,  $\{|\psi_i\rangle\}_i$  basi ortonormali. Si esprime una in funzione dell'altra:

$$|\psi_i\rangle = \left( \sum_{j=1}^{+\infty} |\phi_j\rangle \langle \phi_j| \right) |\psi_i\rangle = \sum_{j=1}^{+\infty} \langle \phi_j | \psi_i \rangle |\phi_j\rangle \equiv \sum_{j=1}^{+\infty} S_{ij}^* |\phi_j\rangle \quad (1.2.3)$$

Per  $\varphi$  generico stato:  $|\varphi\rangle = \sum_{i=1}^{+\infty} a_i |\phi_i\rangle = \sum_{i=1}^{+\infty} b_i |\psi_i\rangle$ ; allora:

$$\begin{cases} b_i = \langle \psi_i | \varphi \rangle = \sum_{j=1}^{+\infty} a_j \langle \psi_i | \phi_j \rangle \equiv \sum_{j=1}^{+\infty} S_{ij} a_j \\ a_i = \langle \phi_i | \varphi \rangle = \sum_{j=1}^{+\infty} b_j \langle \phi_i | \psi_j \rangle \equiv \sum_{j=1}^{+\infty} S_{ji}^* b_j \end{cases} \quad (1.2.4)$$

Ora, essendo le due basi ortonormali:

$$\delta_{ij} = \left\langle \phi_i \left| \left( \sum_{k=1}^{+\infty} |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \right) \phi_j \right\rangle = \sum_{k=1}^{+\infty} \langle \phi_i | \psi_k \rangle \langle \psi_k | \phi_j \rangle = \sum_{k=1}^{+\infty} S_{ki}^* S_{kj} \quad (1.2.5)$$

da cui  $S^\dagger S = \text{Id}$ .

## 1.3 Applicazioni per la meccanica quantistica

### 1.3.1 Rappresentazione delle coordinate

Uno stato si decompone in maniera diversa a seconda della base; ogni decomposizione è una sua diversa **rappresentazione**.

Sia  $\hat{Q} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$  operatore autoaggiunto **posizione**<sup>1</sup>, con  $\hat{Q} |x\rangle = x |x\rangle$ <sup>2</sup>. Il suo spettro è continuo, quindi la decomposizione spettrale avviene tramite integrale:

<sup>1</sup>Indicato anche con  $\hat{X}$ .

<sup>2</sup>Gli autostati sono le  $x$ , mentre  $|x\rangle$  rappresenta gli autovettori.

dato uno stato  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$

$$|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \langle x|\psi\rangle |x\rangle dx \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) |x\rangle dx \quad (1.3.1)$$

con  $\psi(x)$  **funzione d'onda** dello stato  $|\psi\rangle$  e ne indica i coefficienti nella rappresentazione delle coordinate.

### 1.3.2 Rappresentazione degli impulsi

Sia  $\hat{p}|p\rangle = p|p\rangle$  operatore impulso (autoaggiunto); per  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ :

$$|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dp c(p) |p\rangle \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} dp \tilde{\psi}(p) |p\rangle \quad (1.3.2)$$

dove  $\tilde{\psi}(p)$  è la funzione d'onda nel dominio degli impulsi e si ottiene trasformando con Fourier  $\psi(x)$ .

### 1.3.3 Misura di un osservabile

Sia  $\hat{A}$  operatore lineare autoaggiunto<sup>1</sup> con autovalori  $a_i$  e autovettori  $|\lambda_i\rangle$ . Assumendo che  $\langle \lambda_i|\lambda_j\rangle = \delta_{ij}$  formino una base ortonormale<sup>2</sup> e dato un generico  $|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{+\infty} b_i |\lambda_i\rangle$ , si nota che :

$$\langle \psi|\hat{A}|\psi\rangle = \left[ \sum_{i=1}^{+\infty} b_i^* \langle \lambda_i| \right] \left[ \sum_{j=1}^{+\infty} b_j \hat{A} |\lambda_j\rangle \right] = \sum_{i=1}^{+\infty} |b_i|^2 a_i \quad (1.3.3)$$

dove si può vedere  $|b_i|^2$  come probabilità di ottenere misura  $a_i$  da osservabile  $\hat{A}$ . In questo senso, deve valere:

$$\sum_{i=1}^{+\infty} |b_i|^2 \stackrel{!}{=} 1$$

---

<sup>1</sup>In generale, ogni operatore in meccanica quantistica, almeno quelli associati ad osservabili, sono operatori lineari autoaggiunti.

<sup>2</sup>Possono essere sempre costruiti in modo che siano ortonormali.

Questa condizione è verificata dalla normalizzazione di ciascuno stato:

$$\langle \psi | \psi \rangle = \left[ \sum_{i=1}^{+\infty} b_i^* \langle \lambda_i | \right] \left[ \sum_{j=1}^{+\infty} b_j | \lambda_j \rangle \right] = \sum_{i,j=1}^{+\infty} b_i^* b_j \langle \lambda_i | \lambda_j \rangle = \sum_{i=1}^{+\infty} |b_i|^2 \stackrel{!}{=} 1 \quad (1.3.4)$$

Per un operatore a spettro continuo  $\hat{F}$ , con autovettori  $|z\rangle$  relativi ad autovalori  $z$  e  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ ,  $|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z) |z\rangle dz$ ,  $f(z) = \langle z | \psi \rangle$ :

$$\begin{aligned} \langle \psi | \hat{F} | \psi \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} f^*(y) \langle y | dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(z) \hat{F} |z\rangle dz \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} dy dz f^*(y) f(z) z \langle y | z \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} z |f(z)|^2 dz \quad (1.3.5) \\ \langle \psi | \psi \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} |f(z)|^2 dz \stackrel{!}{=} 1 \text{ (normalizzazione)} \end{aligned}$$

### 1.3.4 Principi della meccanica quantistica

- (a). Uno stato fisico  $|\psi\rangle$  è un vettore in uno spazio di Hilbert  $\mathcal{H}$ ,  $\ell^2$  o  $L^2$ . Lo stesso stato può essere equivalentemente moltiplicato per una fase:  $e^{i\alpha} |\psi\rangle$ .
- (b). Per ogni sistema, ogni stato deve essere tale che  $\langle \psi | \psi \rangle = 1$ .
- (c). Gli osservabili sono operatori lineari autoaggiunti che agiscono su  $\mathcal{H}$ .
- (d). Il valore di aspettazione di un osservabile  $\hat{A}$  relativo ad uno stato  $|\psi\rangle$  è  $\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$ . Se  $a_i$  sono autovalori, con  $|a_i\rangle$  relativi autovettori, di  $\hat{A}$ , la probabilità di ottenere la misura  $a_i$  (data dal fatto che il sistema è nello stato  $|a_i\rangle$ ) è  $|a_i|^2$ .

Nel caso di operatori con spettri continui, si costruisce la densità di probabilità  $P(x)dx = |\psi(x)|^2 dx$  (come esempio per operatore posizione  $\hat{Q}$ ) ed è probabilità di trovare la particella nell'intervallo spaziale  $dx$ .

### 1.3.5 Spazio di Hilbert proiettivo, sistemi puri e misti

Ogni stato  $|\psi\rangle$  è definito a meno di una fase; per eliminare fase globale, si usa lo spazio proiettivo  $\mathcal{P}(\mathcal{H}) = \mathcal{H}/\sim$ , con  $|\psi\rangle \sim e^{i\alpha} |\psi\rangle$ .

Con gli elementi di  $\mathcal{P}(\mathcal{H})$  si può introdurre un **isomorfismo naturale**<sup>1</sup> con lo spazio generato dagli operatori  $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ , nel caso di sistemi **puri**.

Un sistema quantistico puro, è univocamente descritto da un singolo stato  $|\psi\rangle$  (quello in cui si trova in un certo istante temporale), quindi il proiettore  $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$  contiene tutte le informazioni necessarie per una sua descrizione. Un sistema **misto**, invece, non può essere descritto tramite un singolo stato perché appartiene a più stati puri contemporaneamente in una certa proporzione; in questo caso, il proiettore diventa una **matrice di densità** con

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \quad (1.3.6)$$

### 1.3.6 Proiettore per sistemi puri

La condizione di normalizzazione è:

$$\text{Tr } \rho = 1 \quad (1.3.7)$$

*Dimostrazione.* Se  $|\psi\rangle = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n |\phi_n\rangle$ :

$$\begin{aligned} \text{Tr } \rho &\stackrel{\text{def}}{=} \sum_{m=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \langle\phi_m|\rho|\phi_n\rangle \delta_{mn} = \sum_{n=1}^{+\infty} \langle\phi_n|\rho|\phi_n\rangle = \sum_{n=1}^{+\infty} \langle\phi_n|\psi\rangle \langle\psi|\phi_n\rangle \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} |\langle\phi_n|\psi\rangle|^2 = \langle\psi|\psi\rangle \end{aligned} \quad (1.3.8)$$

dove l'ultima uguaglianza deriva dalla completezza di  $\{|\phi_n\rangle\}_n$ . ■

Un generico elemento di matrice di  $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$  è  $\rho_{ij} = c_i c_j^*$ , dove  $|\psi\rangle = \sum_i c_i |\phi_i\rangle$ .

*Dimostrazione.* Per conto diretto:

$$\begin{aligned} \rho_{ij} &= \langle\phi_i|\rho|\phi_j\rangle = \langle\phi_i|\psi\rangle \langle\psi|\phi_j\rangle = \sum_{m=1}^{+\infty} c_m \langle\phi_i|\phi_m\rangle \sum_{n=1}^{+\infty} c_n^* \langle\phi_n|\phi_j\rangle \\ &= \sum_{m,n=1}^{+\infty} c_m c_n^* \delta_{im} \delta_{jn} = c_i c_j^* \end{aligned} \quad (1.3.9)$$

■

<sup>1</sup>Isomorfismo che non dipende dalla scelta del rappresentante della classe di equivalenza.

Dato  $\hat{A}$  osservabile con base di autostati  $\{|a_i\rangle\}_i$ :

$$\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \text{Tr } \rho \hat{A} \quad (1.3.10)$$

*Dimostrazione.* Si prende  $\psi = \sum_i c_i |a_i\rangle$  e  $\rho = |\psi\rangle \langle \psi|$ ; allora:

$$\text{Tr}(\rho \hat{A}) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_i \langle a_i | \rho \hat{A} | a_i \rangle = \sum_i a_i \langle a_i | \rho | a_i \rangle = \sum_i |c_i|^2 a_i \equiv \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \quad (1.3.11)$$

■

### 1.3.7 Flusso di probabilità ed equazione di continuità

Sistema composto da particella in 3D sotto potenziale  $V(x)$ . Sia  $\psi(\mathbf{x}, t)$  funzione d'onda per stato  $|\psi(t)\rangle$ . La probabilità di trovare particella in una regione  $\Gamma$  dello spazio è<sup>1</sup>:

$$P_\Gamma(t) \equiv \int_\Gamma d^3x |\psi(\mathbf{x}, t)|^2 \quad (1.3.12)$$

Per quanto detto in §2.5.2:  $i\hbar \partial_t \psi(\mathbf{x}, t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{x})\right) \psi(\mathbf{x}, t)$ ; evoluzione temporale di  $P_\Gamma(t)$  è:

$$\begin{aligned} \partial_t P_\Gamma(t) &= \partial_t \int_\Gamma d^3x \psi(\mathbf{x}, t) \psi^*(\mathbf{x}, t) = \int_\Gamma \left[ \psi^*(\mathbf{x}, t) \partial_t \psi(\mathbf{x}, t) + \psi(\mathbf{x}, t) \partial_t \psi^*(\mathbf{x}, t) \right] d^3x \\ &= \int_\Gamma \left[ \psi^*(\mathbf{x}, t) \frac{1}{i\hbar} \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x) \right) \psi(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{i\hbar} \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x) \right) \psi^*(\mathbf{x}, t) \right] d^3x \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \int_\Gamma \left[ \psi^*(\mathbf{x}, t) \nabla^2 \psi(\mathbf{x}, t) - \psi(\mathbf{x}, t) \nabla^2 \psi^*(\mathbf{x}, t) \right] d^3x = \frac{i\hbar}{2m} \int_\Gamma \nabla \cdot (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) d^3x \end{aligned}$$

Definendo **flusso di probabilità**:

$$\mathbf{J} = -\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*) \quad (1.3.13)$$

si ha:

$$\partial_t P_\Gamma(t) = - \int_\Gamma \nabla \cdot \mathbf{J} d^3x \quad (1.3.14)$$

da cui si ottiene equazione di continuità:

<sup>1</sup>I termini con il potenziale si cancellano perché simmetrici, mentre quelli con  $\nabla^2$  no perché in uno sarà derivato  $\psi$ , nell'altro  $\psi^*$ .

$$\partial_t |\psi|^2 + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0 \quad (1.3.15)$$

## 2 INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA

### 2.1 Evoluzione temporale

#### 2.1.1 Equazione di Shrödinger per gli stati

Variazione temporale dello stato di un sistema:  $|\psi(t)\rangle$  o  $|\psi, t\rangle$ . Per la funzione d'onda:  $\psi(x, t) = \langle x | \psi(t) \rangle$ . Per trovare evoluzione temporale di uno stato, si richiede che:

- (a). l'evoluzione sia univocamente determinata da uno stato iniziale  $\Rightarrow$  si richiede che nell'equazione compaia al massimo il primo ordine di derivazione  $\partial_t |\psi(t)\rangle$ ;
- (b). sperimentalmente, si verifica il principio di sovrapposizione, quindi l'equazione differenziale deve essere lineare.

L'equazione risultante è:

$$i\hbar \partial_t |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (2.1.1)$$

$\hat{H}$  è un generico operatore che definisce l'evoluzione temporale del sistema. Deve risultare autoaggiunto.

*Dimostrazione.* Da  $\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle \stackrel{!}{=} 1, \forall t$ :

$$\begin{aligned} 0 &\stackrel{!}{=} \partial_t \langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = (\partial_t \langle \psi(t) |) |\psi(t)\rangle + \langle \psi(t) | (\partial_t |\psi(t)\rangle) \\ &\Rightarrow \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{H}^\dagger | \psi(t) \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{H} | \psi(t) \rangle \Rightarrow \hat{H}^\dagger = \hat{H} \end{aligned} \quad (2.1.2)$$

■

Questo candida  $\hat{H}$  come osservabile

#### 2.1.2 Soluzione dell'equazione

La soluzione è:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t-t_0)} |\psi(t_0)\rangle \quad (2.1.3)$$

dove

$$e^{\hat{A}} \stackrel{\text{def}}{=} 1 + \hat{A} + \frac{1}{2} \hat{A}^2 + \dots$$

Visto che  $\hat{H}$  è autoaggiunto, l'esponenziale è unitario:

$$e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)} = \text{Id} \quad (2.1.4)$$

Definendo l'**evolutore** come l'operatore  $\hat{U}(t, t_0)$  tale che  $|\psi(t)\rangle = \hat{U}(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle$ , risulta  $\hat{U}(t, t_0)\hat{U}^\dagger(t, t_0) = \text{Id}$ . Se  $\hat{H}$  **indipendente dal tempo**, allora  $\hat{U}(t, t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)}$ .

### 2.1.3 Equazione di Shrödinger per la funzione d'onda

Per  $\{|x\rangle\}$  base ortonormale  $\Rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} dx \langle \psi(t)|x\rangle \langle x|\psi(t)\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx |\psi(x, t)|^2 \stackrel{!}{=} 1$  per normalizzazione. Nell'eq. di Shrödinger:

$$i\hbar\partial_t |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \Rightarrow i\hbar\partial_t \langle x|\psi(t)\rangle = \langle x|\hat{H}|\psi(t)\rangle \Rightarrow i\hbar\partial_t \psi(x, t) = \hat{H}\psi(x, t) \quad (2.1.5)$$

Il passaggio  $\langle x|\hat{H}|\psi(t)\rangle \stackrel{*}{=} \hat{H}\psi(x, t)$  è giustificato con l'accorgimento che gli  $\hat{H}$  non sono gli stessi: uno agisce su ket, l'altro su scalare; la definizione di  $\hat{H}$  agente su  $\psi(x, t)$  è:

$$\langle x|\hat{H}|\psi(t)\rangle \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} dy \langle x|\hat{H}|y\rangle \langle y|\psi(t)\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \hat{H}\psi(x, t)$$

con  $\langle x|\hat{H}|y\rangle$  è l'elemento di matrice dell'Hamiltoniano originale nella rappresentazione delle coordinate.

Per la soluzione dell'equazione:

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= \hat{U}(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle \Rightarrow \langle x|\psi(t)\rangle = \psi(x, t) = \langle x|\hat{U}(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle \\ \Rightarrow \psi(x, t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} dy \langle x|\hat{U}(t, t_0)|y\rangle \langle y|\psi(t_0)\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dy \hat{U}(x, y, t, t_0)\psi(y, t_0) \\ \Rightarrow \psi(x, t) &= \hat{U}(t, t_0)\psi(x, t_0) \end{aligned}$$

dove, come prima, i due  $\hat{U}$  non sono gli stessi.



### 2.1.4 Equazione di Shrödinger per il proiettore

Partendo da  $\hat{\rho}(t) = |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)|$ , si trova:

$$\begin{aligned}\partial_t \hat{\rho}(t) &= [\partial_t |\psi(t)\rangle] \langle \psi(t)| + |\psi(t)\rangle [\partial_t \langle \psi(t)|] \\ &= -\frac{i}{\hbar} \hat{H} |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)| + \frac{i}{\hbar} |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)| \hat{H}^\dagger = -\frac{i}{\hbar} \hat{H} \hat{\rho}(t) + \frac{i}{\hbar} \hat{\rho}(t) \hat{H} \\ &= -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{\rho}(t)]\end{aligned}\quad (2.1.6)$$

## 2.2 Evoluzione temporale per gli operatori

Ci sono tre quadri per vedere il problema:

- (a). **quadro di Shrödinger:** solo gli stati dipendono dal tempo, mentre gli operatori no;
- (b). **quadro di Heisenberg:** solo gli operatori dipendono dal tempo;
- (c). **quadro misto (o di interazione):** l'Hamiltoniano si divide in  $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_I$ , dove il primo evolve gli operatori e il secondo evolve gli stati.

### 2.2.1 Il quadro di Shrödinger

Evoluzione temporale di  $\hat{O}$ , con  $\partial_t \hat{O} = 0$ , è:

$$\begin{aligned}\partial_t \langle \psi(t) | \hat{O} | \psi(t) \rangle &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{H} \hat{O} | \psi(t) \rangle - \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | \hat{O} \hat{H} | \psi(t) \rangle \\ &= \left\langle \psi(t) \left| \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{O}] \right| \psi(t) \right\rangle\end{aligned}\quad (2.2.1)$$

Operatore **velocità** definito come  $\hat{v} = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{Q}]$ .

### 2.2.2 Il quadro di Heisenberg

Gli stati evolvono tramite operatore, quindi si definisce  $\hat{O}_H(t)$  come:

$$\left\langle \psi(t_0) \left| e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} \hat{O} e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} \right| \psi(t_0) \right\rangle \equiv \langle \psi(t_0) | \hat{O}_H(t) | \psi(t_0) \rangle \quad (2.2.2)$$

dove si nota che ancora  $\hat{O}$  non dipende dal tempo.

### 2.2.3 Evoluzione delle misure

Modello della mq prevede che operatore  $\hat{O}$  autoaggiunto applicato ad uno stato  $|\psi\rangle$  restituisca valore rappresentato da  $\hat{O}$  in tale stato. In questo senso, potendo espandere  $|\psi\rangle$  in autostati di  $\hat{O}$ , le misure sono gli autovalori dell'operatore e, a seconda del tipo di spettro, sono continui, discreti o entrambi.

Per l'energia (quindi se  $\hat{O} \equiv \hat{H}$ ), se  $|\psi_n\rangle$  autostato dell'autovalore  $E_n$ :  $\hat{H}|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle$ , dove  $E_n$  è energia dello stato  $|\psi_n\rangle$ .

Sia  $|\phi(t)\rangle = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)\right)|\phi(t_0)\rangle$  un generico stato, con  $|\phi(t_0)\rangle = \sum_n c_n |\psi_n(t_0)\rangle$ . Allora:

$$|\phi(t)\rangle = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}(t-t_0)} |\psi_n(t_0)\rangle = \sum_{n=1}^{+\infty} c_n e^{-\frac{i}{\hbar}E_n(t-t_0)} |\psi_n(t_0)\rangle \quad (2.2.3)$$

L'esponenziale è una fase, quindi  $|\phi(t)\rangle$  è **stazionario**. Per questo, se  $\hat{O}$  operatore:  $\langle\psi_n(t)|\hat{O}|\psi_n(t)\rangle = \langle\psi_n(t_0)|\hat{O}|\psi_n(t_0)\rangle$ , da cui  $E_n(t) = E_n(0)$  per  $\hat{O} \equiv \hat{H}$ .

## 2.3 Simmetrie e operatore impulso

### 2.3.1 Traslazioni

Sia trasla  $|\psi\rangle \rightarrow |\psi'\rangle$ ,  $\hat{A} \rightarrow \hat{A}'$ , e, assumendo simmetria per traslazioni spaziali, si richiede che per  $\hat{A}|\phi_n\rangle = a_n|\phi_n\rangle \rightarrow \hat{A}'|\phi_n\rangle = a'_n|\phi'_n\rangle$  si abbia  $a'_n = a_n$ . Se  $|\psi\rangle = \sum_n c_n |\phi_n\rangle$  e  $|\psi'\rangle = \sum_n c'_n |\phi'_n\rangle$ , deve valere  $|c_n|^2 = |c'_n|^2$  perché sono le probabilità di ottenere una certa misura. L'invarianza per traslazione è assicurata quando:

$$\begin{cases} a'_n = a_n \\ |c'_n|^2 = |c_n|^2 \end{cases} \quad (2.3.1)$$

Si cerca  $\hat{U}$  operatore delle traslazioni. Si assume che questo soddisfi:

$$\begin{cases} |\psi'\rangle = \hat{U}|\psi\rangle, \forall |\psi\rangle \in \mathcal{H} \\ \langle\phi'|\psi'\rangle = \langle\phi|\psi\rangle, \forall |\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathcal{H} \end{cases} \quad (2.3.2)$$

Unendo le due, si trova  $\hat{U}$  unitario:

$$\langle\phi'|\psi'\rangle = \langle\phi|\hat{U}^\dagger\hat{U}|\psi\rangle \Rightarrow \hat{U}^\dagger\hat{U} = \text{Id} \quad (2.3.3)$$

Su generico operatore  $\hat{A}$  come sopra:

$$\begin{aligned}\hat{A}'\hat{U}|\phi_n\rangle &= a_n\hat{U}|\phi_n\rangle = \hat{U}a_n|\phi_n\rangle = \hat{U}\hat{A}|\phi_n\rangle \Rightarrow \hat{A}'\hat{U}|\phi_n\rangle = \hat{U}\hat{A}|\phi_n\rangle \\ \Rightarrow \hat{A}' &= \hat{U}\hat{A}\hat{U}^\dagger\end{aligned}\quad (2.3.4)$$

Si definisce azione di  $\hat{U}$  su una funzione d'onda:

$$\psi'(x) = \langle x|\psi'\rangle = \langle x|\hat{U}|\psi\rangle \stackrel{\text{def}}{=} \hat{U}\psi(x) \Rightarrow \psi'(x) = \hat{U}\psi(x) \quad (2.3.5)$$

### 2.3.2 L'operatore impulso

Visto  $\hat{U}$  unitario, si prende  $\hat{U}(s) = e^{is\hat{K}}$  per parametrizzare la traslazione con parametro continuo  $s$ . Si mostra che  $\hat{K}$  è autoaggiunto<sup>1</sup>. Sviluppando attorno a  $s = 0$ :

$$\hat{U}(s) \simeq \hat{U}(0) + s \left. \frac{d}{ds} \hat{U}(s) \right|_{s=0} + O(s^2) = \text{Id} + is\hat{K} + O(s^2) \quad (2.3.6)$$

Dovendo essere  $\hat{U}(s)\hat{U}^\dagger(s) = \text{Id}$ , trascurando  $O(s^2)$ :

$$\left( \text{Id} + s \frac{d}{ds} \hat{U}^\dagger(s) \right) \left( \text{Id} + s \frac{d}{ds} \hat{U}(s) \right) = \left( \text{Id} - is\hat{K}^\dagger \right) \left( \text{Id} + is\hat{K} \right) \simeq \text{Id} + is(\hat{K} - \hat{K}^\dagger) \quad (2.3.7)$$

da cui  $\hat{K} = \hat{K}^\dagger$ .

Si introduce operatore **impulso**<sup>2</sup> come  $\hat{K} = -\frac{1}{\hbar}\hat{p}$ , da cui  $\hat{U}(s) = \exp(-\frac{i}{\hbar}s\hat{p})$ . Si ricava la sua rappresentazione nello spazio delle posizioni. Sviluppando<sup>3</sup>:

$$\begin{aligned}\hat{U}\psi(x) &\simeq \left( 1 - \frac{i}{\hbar}s\hat{p} \right) \psi(x) \\ \psi'(x) &\equiv \psi(x-s) \simeq \psi(x) + s \left. \frac{d}{ds} \psi(x-s) \right|_{s=0} = \psi(x) - s\partial_x\psi(x) \\ \Rightarrow \left( 1 - \frac{i}{\hbar}s\hat{p} \right) \psi(x) &= \psi(x) - s\partial_x\psi(x)\end{aligned}\quad (2.3.8)$$

Da cui  $\hat{p} = -i\hbar\partial_x$ .

<sup>1</sup>Quindi sarà un possibile osservabile.

<sup>2</sup>Questa introduzione è giustificata dal fatto che, per il teorema di Nöther, l'impulso è il generatore delle traslazioni spaziali.

<sup>3</sup>Si ottiene l'espressione di  $\hat{p}$  nella rappresentazione delle coordinate sotto l'assunzione che una traslazione abbia il seguente effetto su una funzione d'onda:  $\psi'(x) \equiv \hat{U}\psi(x) = \psi(x-s)$ .

### 2.3.3 Funzione d'onda degli impulsi

Visto che  $\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar\partial_x|\psi\rangle$ , vale  $\langle x|\hat{p}|p\rangle = \hat{p}\langle x|p\rangle \equiv \hat{p}\psi_p(x) \Rightarrow -i\hbar\partial_x\psi_p(x) = p\psi_p(x)$ , quindi  $\psi_p(x) = \langle x|p\rangle = C \exp\left(\frac{i}{\hbar}px\right)$ . Per  $C$ , si usa normalizzazione:

$$\delta(p'-p) = \langle p'|p\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \langle p'|x\rangle \langle x|p\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx |C|^2 \exp\left(-\frac{i}{\hbar}x(p'-p)\right) = 2\pi |C|^2 \hbar \delta(p-p')$$

quindi  $C = 1/\sqrt{2\pi\hbar}$  e

$$\psi_p(x) = \langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp\left(\frac{i}{\hbar}px\right) \quad (2.3.9)$$

Dato generico  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$  rappresentato dalle posizioni, usando  $\langle p|x\rangle^* = \psi_p(x)$ :

$$\tilde{\psi}(p) \equiv \langle p|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \langle p|x\rangle \langle x|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{i}{\hbar}px\right) \psi(x) dx \quad (2.3.10)$$

Quindi spazi di posizioni e momenti sono legati da una trasformata di Fourier<sup>1</sup>:

$$\begin{cases} \psi(x) \equiv \langle x|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{\psi}(p) e^{ipx/\hbar} dp \\ \tilde{\psi}(p) \equiv \langle p|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx \end{cases} \quad (2.3.11)$$

L'azione di  $\hat{X}$  su  $\tilde{\psi}(p)$  è:

$$\hat{X}\tilde{\psi}(p) = i\hbar\partial_p\tilde{\psi}(p) \quad (2.3.12)$$

<sup>1</sup>Essendo  $\lambda = h/p$  e  $k = 2\pi/\lambda = 2\pi p/h = p/\hbar$ .

cioè la rappresentazione di  $\hat{X}$  nello spazio dei momenti è  $\hat{X} = i\hbar\partial_p$ . Infatti:

$$\begin{aligned}\langle p|\hat{X}|\psi\rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \langle p|\hat{X}|x\rangle \langle x|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \frac{x}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar} \psi(x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-ipx/\hbar} \psi(x) dx = \left(-\frac{\hbar}{i}\right) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \partial_p e^{-ipx/\hbar} \psi(x) dx \\ &= (i\hbar\partial_p) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) e^{-ipx/\hbar} dx = i\hbar\partial_p \tilde{\psi}(p)\end{aligned}$$

### 2.3.4 Simmetrie per stati che evolvono temporalmente

$\hat{O}(t, t_0)$  operatore di evoluzione temporale:  $|\psi'(t)\rangle = \hat{O}(t, t_0)|\psi'(t_0)\rangle$  e  $|\psi(t)\rangle = \hat{O}(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle$ . Simmetria per traslazioni temporali implica:  $|\psi'(t)\rangle = \hat{U}(s)|\psi(t)\rangle$ ,  $\forall t$ . Unendo le due:

$$\begin{aligned}|\psi'(t)\rangle &= \hat{U}(s)\hat{O}(t, t_0)|\psi(t_0)\rangle = \hat{U}(s)\hat{O}(t, t_0)\hat{U}^{-1}(s)\hat{U}(s)|\psi(t_0)\rangle \\ &= \hat{U}(s)\hat{O}(t, t_0)\hat{U}^{-1}(s)|\psi'(t_0)\rangle\end{aligned}\quad (2.3.13)$$

Dall'imposizione dell'invarianza per traslazioni, risulta  $\hat{U}(s)\hat{O}(t, t_0)\hat{U}^{-1}(s) = \hat{O}(t, t_0)$ . Vista la struttura dell'operatore di evoluzione temporale<sup>1</sup>, si ricava  $[\hat{H}, \hat{U}(s)] = 0$ .

Per  $s$  piccoli,  $\hat{U}(s)$  è rappresentato da  $\hat{p}$ , quindi vale  $[\hat{H}, \hat{p}] = 0$ .

### 2.3.5 Commutatore di $\hat{p}$ e $\hat{X}$

Sia  $\hat{T}(s)$  operatore di traslazione spaziale; se  $|x'\rangle = \hat{T}(s)|x\rangle \equiv |x+s\rangle = \exp(-\frac{i}{\hbar}s\hat{p})|x\rangle$ :

$$\begin{aligned}\hat{X}|x'\rangle &= x'|x'\rangle = (x+s)|x+s\rangle \\ \hat{X}'|x'\rangle &= \hat{T}(s)\hat{X}\hat{T}^\dagger(s)|x'\rangle = x|x+s\rangle\end{aligned}\quad (2.3.14)$$

con  $\hat{X}'$  operatore traslato. Per  $s$  piccoli:

$$\hat{X}' = e^{-\frac{i}{\hbar}s\hat{p}}\hat{X}e^{\frac{i}{\hbar}s\hat{p}} \simeq \hat{X} + \frac{i}{\hbar}s[\hat{X}, \hat{p}]$$

<sup>1</sup>Nel caso in questione, si può scrivere come esponenziale dell'operatore  $\hat{H}$ , che, sviluppato in serie, permette di ricavare l'espressione del commutatore.

Visto che  $(\hat{X} - s \text{Id})|x + s\rangle = x|x + s\rangle$ , da cui  $\hat{X}' = \hat{X} - s \text{Id}$ :

$$\hat{X}' = \begin{cases} \hat{X} + \frac{i}{\hbar}s[\hat{X}, \hat{p}] \\ \hat{X} - s \text{Id} \end{cases} \Rightarrow [\hat{X}, \hat{p}] = i\hbar \text{Id} \quad (2.3.15)$$

Alternativamente, si sarebbe potuto notare che

$$\begin{cases} \hat{X}\psi(x) = x\psi(x) \\ \hat{p}\psi(x) = -i\hbar\partial_x\psi(x) \end{cases}$$

implica:

$$\begin{aligned} [\hat{X}, \hat{p}]\psi(x) &= x(-i\hbar\partial_x)\psi(x) - (-i\hbar\partial_x)x\psi(x) \\ &= -x(i\hbar\partial_x\psi(x)) + x(i\hbar\partial_x\psi(x)) + \psi(x)(i\hbar\partial_x x) = i\hbar\psi(x), \quad \forall \psi(x) \end{aligned} \quad (2.3.16)$$

## 2.4 Il principio di indeterminazione

### 2.4.1 Introduzione

Si usa funzione d'onda<sup>1</sup> tridimensionale<sup>2</sup>  $\psi(\mathbf{r}) = \langle \mathbf{r} | \psi \rangle$ , dove  $|\mathbf{r}\rangle = |\mathbf{r}(x_1, x_2, x_3)\rangle = |x_1\rangle \otimes |x_2\rangle \otimes |x_3\rangle$ . Questa definizione è necessaria per far sì che l'azione di un operatore posizione legato alla singola coordinata restituisca  $\hat{X}_1 |\mathbf{r}\rangle = x_1 |\mathbf{r}\rangle$  per esempio<sup>3</sup>. Allora  $|\psi(\mathbf{r})|^2 = |\langle \mathbf{r} | \psi \rangle|^2$  è densità di probabilità di trovare la particella in un certo intervallo  $d\mathbf{r}$ . Il valore di aspettazione si esprime come:

$$\mathbf{E}[\mathbf{r}] = \langle \psi | \hat{\mathbf{R}} | \psi \rangle \equiv \bar{\mathbf{R}} = \iiint dx dy dz \mathbf{r} |\psi(\mathbf{r})|^2 = \begin{pmatrix} \bar{R}_{x_1} \\ \bar{R}_{x_2} \\ \bar{R}_{x_3} \end{pmatrix} \quad (2.4.1)$$

La varianza è data da  $\mathbf{E}[(\mathbf{r} - \bar{\mathbf{R}})^2] = \iiint dx dy dz (\mathbf{r} - \bar{\mathbf{R}})^2 |\psi(x, y, z)|^2$ , quindi si definisce:

$$\Delta_r^2 \stackrel{\text{def}}{=} \langle \psi | \hat{\mathbf{R}}_S^2 | \psi \rangle = \iiint dx dy dz (\mathbf{r} - \bar{\mathbf{R}})^2 |\psi(\mathbf{r})|^2 \equiv \mathbf{E}[(\mathbf{r} - \bar{\mathbf{R}})^2] \quad (2.4.2)$$

<sup>1</sup>Con il pedice 0, indica che è relativa allo stato fondamentale  $\psi_0$ .

<sup>2</sup>Essa è definita, sotto l'assunzione di poter separare le variabili nell'integrale, come  $\psi(\mathbf{r}) = \psi(x_1)\psi(x_2)\psi(x_3)$ . Essendo che  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \mathcal{H}_3$  e che ogni bra agisce sul ket del suo spazio di Hilbert, si ottiene  $\psi(\mathbf{r}) = \langle x_1 \otimes x_2 \otimes x_3 | \psi_{x_1} \otimes \psi_{x_2} \otimes \psi_{x_3} \rangle = \langle x_1 | \psi_{x_1} \rangle \langle x_2 | \psi_{x_2} \rangle \langle x_3 | \psi_{x_3} \rangle$ .

<sup>3</sup>In questo caso  $|\mathbf{r}\rangle \in \mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \mathcal{H}_3$ , dove gli operatori  $\hat{X}_1, \hat{X}_2, \hat{X}_3$  agiscono rispettivamente su  $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2, \mathcal{H}_3$ .

con  $\hat{\mathbf{R}}_S = \hat{\mathbf{R}} - \hat{\bar{\mathbf{R}}}$  è l'operatore posizione **sottratto** e  $\hat{\bar{\mathbf{R}}} = \bar{\mathbf{R}} \text{Id}$ . Analogamente:

$$\begin{aligned}\bar{p} &= \langle \psi | \hat{\mathbf{P}} | \psi \rangle \\ \Delta_p^2 &= \langle \psi | \hat{\mathbf{P}}_S^2 | \psi \rangle\end{aligned}\tag{2.4.3}$$

#### 2.4.2 Algebra degli operatori sottratti

Siano  $\hat{A}, \hat{B}$  autoaggiunti tali che  $[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}$ , con  $\hat{C}$  autoaggiunto<sup>1</sup>; se  $\hat{A}_S, \hat{B}_S$  sono i sottratti, allora è ancora  $[\hat{A}_S, \hat{B}_S] = i\hat{C}$ :

$$\begin{aligned}[\hat{A}_S, \hat{B}_S] &= (\hat{A} - \hat{\bar{A}})(\hat{B} - \hat{\bar{B}}) - (\hat{B} - \hat{\bar{B}})(\hat{A} - \hat{\bar{A}}) = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) - \cancel{\hat{A}\hat{\bar{B}}} + \cancel{\hat{\bar{A}}\hat{B}} + \cancel{\hat{\bar{B}}\hat{A}} - \cancel{\hat{B}\hat{\bar{A}}} \\ &= [\hat{A}, \hat{B}]\end{aligned}$$

dove si è usato che l'identità commuta con ogni operatore. Sia  $\hat{T} \stackrel{\text{def}}{=} \hat{A}_S + i\omega\hat{B}_S$  non autoaggiunto:  $\hat{T}^\dagger = \hat{A}_S - i\omega\hat{B}_S$ . Si nota che  $\hat{T}^\dagger\hat{T}$  è autoaggiunto:  $(\hat{T}^\dagger\hat{T})^\dagger = \hat{T}^\dagger\hat{T}$ .

Per generico  $|\psi\rangle$  vale  $\langle \psi | \hat{T}^\dagger\hat{T} | \psi \rangle \geq 0$ :

$$|w\rangle = \hat{T}|\psi\rangle, \langle w| = \langle \psi | \hat{T}^\dagger \Rightarrow \langle w | w \rangle = \langle \psi | \hat{T}^\dagger\hat{T} | \psi \rangle \geq 0$$

quindi:

$$\begin{aligned}0 \leq \langle \psi | \hat{T}^\dagger\hat{T} | \psi \rangle &= \langle \psi | (\hat{A}_S - i\omega\hat{B}_S)(\hat{A}_S + i\omega\hat{B}_S) | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A}_S^2 | \psi \rangle + \omega^2 \langle \psi | \hat{B}_S^2 | \psi \rangle + i\omega \langle \psi | [\hat{A}_S, \hat{B}_S] | \psi \rangle \\ &\Rightarrow \langle \psi | \hat{A}_S^2 | \psi \rangle + \omega^2 \langle \psi | \hat{B}_S^2 | \psi \rangle + i\omega \langle \psi | i\hat{C} | \psi \rangle \geq 0, \forall \omega\end{aligned}$$

Vale  $\forall \omega \Rightarrow$  si cerca  $\omega_0$  che la rende più piccola possibile<sup>2</sup>; si ottiene, per  $\omega = \omega_0$ :

$$\Delta_A^2 \Delta_B^2 \geq \frac{\langle \psi | \hat{C} | \psi \rangle^2}{4} \Rightarrow \Delta_A \Delta_B \geq \frac{|\langle \psi | \hat{C} | \psi \rangle|}{2}\tag{2.4.4}$$

#### 2.4.3 Il principio di indeterminazione

Usando  $\hat{A}, \hat{B}$  come  $\hat{X}_i, \hat{p}_i$ ; visto che  $[\hat{R}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}$ , allora:

$$\Delta_{x_i} \Delta_{p_i} \geq \frac{\hbar}{2}\tag{2.4.5}$$

<sup>1</sup>La  $i$  fuori serve per assicurare che  $\hat{C}$  sia autoaggiunto.

<sup>2</sup>La procedura si basa sul derivare rispetto a  $\omega$  e imporre derivata a 0.

## 2.5 Alcuni esempi di $\hat{H}$ per sistemi quantistici

### 2.5.1 Sistema di due corpi

Il sistema è rappresentato dallo spazio di Hilbert totale dato da  $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$  delle singole particelle in 3D. Per due corpi 1, 2 in 3D, si ha un Hamiltoniano:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}_1^2}{2m_1} + \frac{\hat{\mathbf{p}}_2^2}{2m_2} + U(|\hat{\mathbf{r}}_1 - \hat{\mathbf{r}}_2|) \quad (2.5.1)$$

con<sup>1</sup>  $[\hat{r}_{ij}, \hat{p}_{kl}] = i\hbar\delta_{ik}\delta_{jl}$ . Si definiscono:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{X}} &= \frac{m_1\hat{\mathbf{r}}_1 + m_2\hat{\mathbf{r}}_2}{m_1 + m_2}; \quad \hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{r}}_2 - \hat{\mathbf{r}}_1 \\ \hat{\mathbf{P}} &= \hat{\mathbf{p}}_1 + \hat{\mathbf{p}}_2; \quad \hat{\mathbf{p}} = \frac{m_1\hat{\mathbf{p}}_2 - m_2\hat{\mathbf{p}}_1}{m_1 + m_2} \end{aligned} \quad (2.5.2)$$

con  $[\hat{X}_i, \hat{P}_j] = i\hbar\delta_{ij}$  e  $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}$ . In questo modo<sup>2</sup>:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{P}}^2}{2M} + \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2\mu} + U(|\hat{\mathbf{x}}|), \quad M = m_1 + m_2 \quad \text{e} \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \quad (2.5.3)$$

che agisce su una nuova separazione dello spazio di Hilbert in termini di  $\mathbf{X}$  (coordinata del centro di massa) e  $\mathbf{x}$  (coordinata relativa):  $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{CM}} \otimes \mathcal{H}_{\text{rel}}$ .

Da eq. 2.5.1, passando in rappresentazione delle coordinate:

$$\begin{aligned} \hat{H} &= -\frac{\hbar^2}{2m_1}\vec{\nabla}_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_2}\vec{\nabla}_2^2 + U(|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2M}\vec{\nabla}_X^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu}\vec{\nabla}_x^2 + U(|\mathbf{x}|) \end{aligned} \quad (2.5.4)$$

Si è separato  $\hat{H}$  in parte dipendente da  $\hat{\mathbf{X}}$  e parte dipendente solo da  $\hat{\mathbf{x}}$ . Per risolvere l'equazione di Schrödinger<sup>3</sup> si usa la separazione delle variabili:  $\psi(\mathbf{x}, \mathbf{X}) =$

<sup>1</sup>Il primo indice rappresenta a quale delle due particelle fa riferimento la grandezza, mentre il secondo indice indica la componente del vettore.

<sup>2</sup>Si sostituisce  $\hat{\mathbf{p}}_1 = -\hat{\mathbf{p}} + m_1\hat{\mathbf{P}}/(m_1 + m_2)$  e  $\hat{\mathbf{p}}_2 = \hat{\mathbf{p}} + m_2\hat{\mathbf{P}}/(m_1 + m_2)$ .

<sup>3</sup>Data da  $\hat{H}\psi = E\psi$ , con  $E$  energia dello stato.



$A(\mathbf{X})B(\mathbf{x})$ :

$$\begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2M} \vec{\nabla}_X^2 A(\mathbf{X}) = E A(\mathbf{X}) \\ \left( -\frac{\hbar^2}{2\mu} \vec{\nabla}_x^2 + U(|\mathbf{x}|) \right) B(\mathbf{x}) = E' B(\mathbf{x}) \end{cases} \quad (2.5.5)$$

$$\Rightarrow \left( -\frac{\hbar^2}{2M} \vec{\nabla}_X^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu} \vec{\nabla}_x^2 + U(|\mathbf{x}|) \right) \psi(\mathbf{x}, \mathbf{X}) = (E + E') \psi(\mathbf{x}, \mathbf{X})$$

### 2.5.2 Particella in campo esterno

In 1D, particella soggetta a  $F = -\partial_x V(x)$  con  $V(x)$  potenziale. In questo caso, varrà:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x}) \quad (2.5.6)$$

L'equazione di Shrödinger è:

$$i\hbar \partial_t |\psi(x, t)\rangle = \hat{H} |\psi(x, t)\rangle \quad (2.5.7)$$

In rappresentazione delle coordinate, visto che  $\hat{H}$  si rappresenta come  $-\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2 + V(x)$ :

$$i\hbar \partial_t \psi(x, t) = \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \partial_x^2 + V(x) \right) \psi(x, t) \quad (2.5.8)$$

In rappresentazione degli impulsi, invece:

$$i\hbar \partial_t \tilde{\psi}(p, t) = \left( \frac{p^2}{2m} + V(i\hbar \partial_p) \right) \tilde{\psi}(p, t) \quad (2.5.9)$$

## 2.6 L'oscillatore armonico

### 2.6.1 Operatori di creazione e distruzione

Si prende un Hamiltoniano analogo al caso classico:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 \hat{x}^2 \quad (2.6.1)$$

Tramite costanti del sistema come  $m, \omega, \hbar$ , si costruiscono altre costanti caratteristiche del sistema in questione:  $\ell_\omega = \sqrt{\hbar/(m\omega)}$  lunghezza caratteristica e

$p_\omega = m\omega\ell_\omega$  impulso caratteristico. Da queste, si definisco gli operatori:

$$\begin{cases} \hat{p} = \hat{P}/p_\omega \\ \hat{q} = \hat{x}/\ell_\omega \end{cases} \Rightarrow \hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2} [\hat{p}^2 + \hat{q}^2] \quad (2.6.2)$$

Si definisce anche  $\hat{a} = (\hat{q} + i\hat{p})/\sqrt{2}$ , che soddisfa  $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$  e  $\hat{H} = \frac{\hbar\omega}{2} (\hat{a}\hat{a}^\dagger + \hat{a}^\dagger\hat{a})$ . Per  $\hat{N} = \hat{a}^\dagger\hat{a} \Rightarrow \hat{H} = \hbar\omega(\hat{N} + 1/2)^1$ ; inoltre:

$$\begin{aligned} [\hat{N}, \hat{a}] &= [\hat{a}^\dagger\hat{a}, \hat{a}] = \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a} - \hat{a}\hat{a}^\dagger\hat{a} = [\hat{a}^\dagger, \hat{a}]\hat{a} = -\hat{a} \\ [\hat{N}, \hat{a}^\dagger] &= \hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{a}^\dagger - \hat{a}^\dagger\hat{a}^\dagger\hat{a} = \hat{a}^\dagger[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger \end{aligned}$$

Prendendo base di autostati di  $\hat{N}$  tali che  $\hat{N}|\nu\rangle = \nu|\nu\rangle$  e definendo  $\hat{a}|\nu\rangle = |w\rangle$ , si ha<sup>2</sup>:

$$\hat{N}|w\rangle = \hat{N}\hat{a}|\nu\rangle = (\hat{a}\hat{N} - \hat{a})|\nu\rangle = \hat{a}(\nu - 1)|\nu\rangle = (\nu - 1)\hat{a}|\nu\rangle = (\nu - 1)|w\rangle \quad (2.6.3)$$

Questo significa che  $|w\rangle$  è autostato con autovalore diminuito di 1 rispetto a quello di partenza, che si traduce nel fatto che  $\hat{a}$  mappa gli autostati di  $\hat{N}$  in autostati con autovalore diminuito di 1.

Si osserva, poi, che gli autovalori di  $\hat{N}$  non sono mai negativi:

$$0 \leq \langle w|w\rangle = \langle \nu|\hat{a}^\dagger\hat{a}|\nu\rangle = \langle \nu|\hat{N}|\nu\rangle = \nu \langle \nu|\nu\rangle = \nu$$

che assicura che  $\hat{a}|0\rangle = |0\rangle$ . In maniera del tutto analoga si vede che  $\hat{N}\hat{a}^\dagger|\nu\rangle = (\nu + 1)\hat{a}^\dagger|\nu\rangle$ , quindi  $\hat{a}^\dagger$  aumenta autovalore. Si nota che **non vi è limite superiore** agli autovalori, mentre limite inferiore è dato da  $\langle \nu|\nu\rangle \geq 0$ . Ciò significa che autovalori di  $\hat{N}$  vanno da 0 a  $+\infty$ .

Si nota, infine, che, vale  $\hat{a}^\dagger|n\rangle = c_n|n + 1\rangle^3$ ; per trovare  $c_n$ , facendo uso della relazione di commutazione  $\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{N} + 1$ :

$$\begin{cases} \langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle = \langle n|(\hat{N} + 1)|n\rangle = (n + 1)\langle n|n\rangle = n + 1 \\ \langle n|\hat{a}\hat{a}^\dagger|n\rangle = |c_n|^2 \langle n + 1|n + 1\rangle = |c_n|^2 \end{cases} \Rightarrow |c_n|^2 = n + 1$$

Dovendo avere autostati normalizzati:

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(\hat{a}^\dagger)^n|0\rangle \quad (2.6.4)$$

<sup>1</sup>Questo si ottiene aggiungendo e sottraendo  $\hat{a}^\dagger\hat{a}$  all'interno della parentesi in  $\hat{H}$ .

<sup>2</sup>La seconda uguaglianza è assicurata dal commutatore  $[\hat{N}, \hat{a}] = -\hat{a}$ .

<sup>3</sup>Visto che  $\hat{a}^\dagger$  deve mappare autostato di  $\hat{N}$  in quello che ha autovalore aumentato di 1, allora  $\hat{a}^\dagger|n\rangle \propto |n + 1\rangle$  con costante di proporzionalità  $c_n$ . Lo stesso vale per  $\hat{a}$ .

Dagli autovalori di  $\hat{N}$ , si ricavano quelli dell'energia  $\hat{H} = \hbar\omega(\hat{N} + 1/2) \Rightarrow E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$ .

### 2.6.2 Funzione d'onda per l'oscillatore armonico

In rappresentazione delle coordinate, l'equazione di Shrödinger è  $\hat{H}\psi(x, t) = i\hbar\partial_t\psi(x, t)$ , cioè:

$$\left[ -\frac{\hbar^2\partial_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2 \right] \psi(x, t) = i\hbar\partial_t\psi(x, t) \quad (2.6.5)$$

Per gli autovalori, invece si ha  $\hat{H}\psi_E(x) = E\psi_E(x)$ <sup>1</sup>:

$$\left[ -\frac{\hbar^2\partial_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2x^2 \right] \psi_E(x) = E\psi_E(x) \quad (2.6.6)$$

Si definisce  $\lambda = E/E_\omega$ , dove si è preso  $E_\omega = \hbar\omega/2$ . In rappresentazione delle coordinate,  $q = x/\ell_\omega$ , quindi  $\psi(x) = \psi(\ell_\omega q) \equiv u(q)$ . Quindi:

$$\frac{d^2u}{dq^2} + (\lambda - q^2)u = 0 \quad (2.6.7)$$

*Dimostrazione.* Essendo  $q = x/\ell_\omega \Rightarrow \frac{d}{dx} = \frac{dq}{dx} \frac{d}{dq} = \frac{1}{\ell_\omega} \frac{d}{dq}$ . Sostituendo nell'equazione agli autovalori:

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\ell_\omega^2} \frac{d^2}{dq^2} + \frac{1}{2}m\omega^2\ell_\omega^2q^2 \right] \psi_E(x) = \left[ -\frac{\hbar\omega}{2} \frac{d^2}{dq^2} + \frac{\hbar\omega}{2}q^2 \right] \psi_E(x) = E\psi_E(x)$$

Usando  $E = \lambda E_\omega = \lambda \frac{\hbar\omega}{2}$  e dividendo tutto per  $\frac{\hbar\omega}{2}$ , si ottiene il risultato cercato dopo aver sostituito  $u(q) = \psi(\ell_\omega q)$ . ■

Questo si dice *risrittura in unità naturali*, cioè si è espresso tutto tramite valori adimensionali.

Si impone condizione di moto limitato, quindi  $\lim_{q \rightarrow \pm\infty} u(q) = 0$ ; sotto questo limite, l'equazione diventa

$$\frac{d^2u}{dq^2} + q^2u = 0 \Rightarrow u(q) \propto e^{q^2/2}, e^{-q^2/2}$$

---

<sup>1</sup>Visto che l'evoluzione temporale degli autostati dell'Hamiltoniano è banale, cioè consiste nel prodotto per una fase, si trascura evoluzione temporale nell'equazione agli autovalori.

da cui chiaramente si deve scartare  $e^{q^2/2}$  perché non rispetta il limite. Si assume soluzione generale della forma:

$$u(q) = \mathcal{H}(q)e^{-q^2/2} \quad (2.6.8)$$

Per trovare  $\mathcal{H}(q)$  si sostituisce in equazione originale  $\Rightarrow \mathcal{H}'' - 2q\mathcal{H}' + (\lambda - 1)\mathcal{H} = 0$ ; matematicamente si dimostra che vi è soluzione che non modifica l'andamento di  $e^{-q^2/2}$  solo se  $(\lambda_n - 1) = 2n$  e questa soluzione sono i **polinomi di Hermite**, della forma

$$\mathcal{H}_n = (-1)^n e^{q^2} \frac{d^n e^{-q^2}}{dq^n} \quad (2.6.9)$$

Allora avere una soluzione fisicamente accettabile, cioè che rispetti  $\lim_{q \rightarrow \pm\infty} u(q) = 0$  implica quantizzazione dell'energia perché, dovendo richiedere  $\lambda_n = 2n + 1$ , si ha  $E_n = \lambda_n E_\omega = \hbar\omega(n + 1/2)$ .

Ora si torna a  $\psi_n(x)$  e si cerca la costante di normalizzazione  $C_n$ :

$$\psi_n(x) = C_n \mathcal{H}_n \left( \frac{x}{\ell_\omega} \right) e^{-x^2/(2\ell_\omega^2)} \quad (2.6.10)$$

Per la costante di normalizzazione, si fa uso di  $\int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{H}_n^2(q) e^{-q^2} dq = 2^n (n!) \sqrt{\pi}$ :

$$1 \stackrel{!}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_n(x)|^2 dx = |C_n|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{H}_n^2 \left( \frac{x}{\ell_\omega} \right) e^{x^2/\ell_\omega^2} dx = |C_n|^2 \ell_\omega \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{H}_n^2(q) e^{-q^2} dq$$

dove  $q = x/\ell_\omega$ . Allora si ha  $C_n = 1/\sqrt{2^n \ell_\omega \sqrt{\pi} (n!)}$ , da cui:

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n \ell_\omega \sqrt{\pi} (n!)}} \mathcal{H}_n \left( \frac{x}{\ell_\omega} \right) e^{-x^2/(2\ell_\omega^2)} \quad (2.6.11)$$

## 2.7 Operatore parità e sistemi unidimensionali

### 2.7.1 Operatore parità

Operatore  $\hat{P}_a$  definito in modo tale da soddisfare

$$\begin{aligned} \hat{P}_a \hat{x} \hat{P}_a^{-1} &= -\hat{x}; \quad \hat{P}_a \hat{p} \hat{P}_a = -\hat{p} \\ \hat{P}_a^2 &= \text{Id} \Rightarrow \hat{P}_a = \hat{P}_a^{-1} \end{aligned} \quad (2.7.1)$$

Da questo deriva che  $[\hat{P}_a \hat{x} \hat{P}_a, \hat{P}_a \hat{p} \hat{P}_a] = i\hbar$ . Dato un generico stato  $|\psi\rangle$ , si ha:

$$\hat{P}_a \hat{x} \psi(x) = \hat{P}_a x \psi(x) = x \hat{P}_a \psi(x) \Rightarrow \hat{P}_a \hat{x} \hat{P}_a \hat{P}_a \psi(x) = -\hat{x} \hat{P}_a \psi(x) = x \hat{P}_a \psi(x)$$

cambiando segno ad entrambi i membri, si vede che  $\hat{P}_a \psi(x) = \psi(-x)$ . L'operatore parità può commutare con  $\hat{H}$  quando questo è, per esempio, quadratico in  $\hat{x}, \hat{p}$ , infatti:

$$[\hat{P}_a, \hat{p}^2] = \hat{P}_a \hat{p}^2 - \hat{p} \hat{P}_a \hat{p} = \hat{P}_a \hat{p}^2 + \hat{p} \hat{P}_a \hat{p} = \hat{P}_a \hat{p}^2 - \hat{P}_a \hat{p}^2 = 0$$

dove si è sfruttato solo che  $\hat{P}_a \hat{P}_a = \text{Id}$ . Quando  $\hat{P}_a$  commuta con  $\hat{H}$ , oltre a valere invarianza temporale, significa anche che hanno stessi autostati. Visto che  $\hat{P}_a^2 = \text{Id}$ , i suoi autovalori sono  $\pm 1$ , quindi nei casi in cui  $[\hat{H}, \hat{P}_a] = 0$ , si possono ordinare gli autostati  $|n\rangle$  di  $\hat{H}$  t.c.  $\hat{P}_a |n\rangle = (-1)^n |n\rangle$ . Questo implica che:

$$\begin{aligned} \langle n | \hat{x} | n \rangle &= -\langle n | -\hat{x} | n \rangle = -\langle n | \hat{P}_a \hat{x} \hat{P}_a | n \rangle = -(-1)^n (-1)^n \langle n | \hat{x} | n \rangle = -\langle n | \hat{x} | n \rangle \\ \Rightarrow \langle n | \hat{x} | n \rangle &= 0 \end{aligned}$$

Analogamente si vede che  $\langle n | \hat{p} | n \rangle = 0$ .

### 2.7.2 Alcuni teoremi per sistemi unidimensionali

Si considera Hamiltoniano della forma  $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})$ .

#### TEOREMA 2.1.

In 1D,  $\hat{H}$  ha spettro non-degenere.

#### TEOREMA 2.2.

Gli stati fondamentali dello spettro non hanno zeri.

#### TEOREMA 2.3.

Gli stati non-fondamentali dello spettro hanno degli zeri e l' $n$ -esimo ne ha  $n$ .

#### TEOREMA 2.4.

Uno spettro discreto di  $\hat{H}$  corrisponde ad un moto limitato nello spazio.

### 2.7.3 Moto di una particella sotto potenziale

Si considera sistema 1D composto da particella soggetta a

$$U(x) = \begin{cases} V_0 & , x > 0 \\ 0 & , x < 0 \end{cases}$$

Conseguentemente, l'Hamiltoniano è  $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + U(\hat{x})$  e l'equazione agli autovallori è data da  $\hat{H}\psi_E(x) = E\psi_E(x)$ .

Quando una particella arriva da  $x < 0$  e incontra potenziale  $V_0$  si distinguono i casi in cui  $E > V_0$  e  $E < V_0$ .

L'equazione di Shrödinger è data da:

$$\partial_x^2 \psi + \frac{2m}{\hbar^2} [E - U(x)] \psi = 0$$

- **Caso**  $E > V_0$ .

Se  $x < 0$ , si ha  $\partial_x^2 \psi + k^2 \psi = 0$  con  $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$ <sup>1</sup>, quindi:

$$\psi_-(x) = A_1 e^{ikx} + A_2 e^{-ikx} \quad (2.7.2)$$

Se  $x > 0$ , invece, si ha, per  $q = \sqrt{\frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}}$ ,  $\partial_x^2 \psi + q^2 \psi = 0$ , da cui:

$$\psi_+(x) = B_1 e^{iqx} + B_2 e^{-ikx} \quad (2.7.3)$$

Si impone raccordo in  $x = 0$  tra le soluzioni:

$$\begin{cases} A_1 + A_2 = B_1 + B_2 & \text{continuità di } \psi \\ ik(A_1 - A_2) = iq(B_1 - B_2) & \text{continuità di } \psi' \end{cases}$$

Per altre condizioni, si usa flusso di probabilità  $J = -\frac{i\hbar}{2m} (\psi^* \partial_x \psi - \psi \partial_x \psi^*)$ ; andando a inserire  $\psi_-$  nella definizione di  $J$ , si ha  $J = \frac{\hbar k}{m} (|A_1|^2 - |A_2|^2) \equiv J_{\text{inc}} + J_{\text{rif}}$ . Si assume assenza di onda riflessa, per cui  $B_2 = 0$ <sup>2</sup>; similmente, si prende anche  $A_2 = 0$  perché non si è interessati ad un'onda che si propaga via dalla barriera.

Per normalizzazione di  $\psi_-$ <sup>3</sup>, si prende  $|J| = 1$ ; avendo interpretato  $A_1 e^{ikx}$

<sup>1</sup>Essendo che in  $x < 0$   $U(x) = 0$ .

<sup>2</sup>Si richiede questo perché è il coefficiente dell'onda che da  $x > 0$  va verso  $x < 0$ .

<sup>3</sup>È comune utilizzare un tipo di normalizzazione alternativa quando si ha a che fare con particelle non confinate in una regione spaziale.

come onda incidente e  $A_2 e^{-ikx}$  come onda riflessa, si deve normalizzare a  $1 J_{\text{inc}}$ , quindi  $A_1 = 1/\sqrt{\hbar k/m} \equiv 1/\sqrt{v}^1$ .

Se  $J_{\text{tr}} = \frac{\hbar q}{m} |B_1|^2$  come flusso trasmesso, si possono definire anche

$$T \stackrel{\text{def}}{=} \frac{J_{\text{tr}}}{J_{\text{inc}}} = \frac{q}{k} \frac{|B_1|^2}{|A_1|^2}; \quad R \stackrel{\text{def}}{=} \frac{J_{\text{rif}}}{J_{\text{inc}}} = \frac{|A_2|^2}{|A_1|^2} \quad (2.7.4)$$

da cui deve risultare anche  $T + R = 1$ . Risolvendo le condizioni imposte, si trova:

$$\begin{cases} R = 1 - \frac{4kq}{(k+q)^2} \\ T = \frac{4kq}{(k+q)^2} \end{cases}$$

Per  $E/V_0 \rightarrow \infty$ , deve risultare  $T \rightarrow 1$ , quindi  $k \sim q$ .

- **Caso  $E < V_0$ .**

In  $x < 0$ ,  $\partial_x^2 \psi + k^2 \psi = 0$  con  $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$  e si ha stessa soluzione di prima. In  $x > 0$  vale  $\partial_x^2 \psi - \beta^2 \psi = 0$  con  $\beta = \sqrt{2m(V_0 - E)/\hbar^2}$ , quindi

$$\psi_+(x) = B_1 e^{-\beta x} + B_2 e^{\beta x} \quad (2.7.5)$$

Per il resto, si richiede ancora  $B_2 = 0$  e si impongono le stesse condizioni di raccordo.

## 2.7.4 Particella contro barriera di potenziale

Si considera  $V(x) \neq 0$  per  $x \in [0, a]$ ; si cerca di capire se nel caso di  $V_0 > E$ , si trova qualcosa per  $x > a$ .

Se  $x < 0$  si ha  $\partial_x^2 \psi + k^2 \psi = 0$ ,  $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$  e  $\psi_- = A_1 e^{ikx} + A_2 e^{-ikx}$ . Per  $0 < x < a$ , si ha  $\psi_a(x) = B_1 e^{-\beta x} + B_2 e^{\beta x}$ . Se  $x > a$ , si ha  $\psi_+ = C_1 e^{ikx} + C_2 e^{-ikx}$ .

Le condizioni di raccordo sono da scrivere sia in  $x = 0$  che in  $x = a$ ; rispettivamente:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ ik & -ik \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -\beta & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}, \quad x = 0$$

$$\begin{pmatrix} e^{-\beta a} & e^{\beta a} \\ -\beta e^{-\beta a} & \beta e^{\beta a} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{ika} & e^{-ika} \\ ike^{ika} & -ike^{-ika} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

---

<sup>1</sup>Si identifica  $\hbar k/m$  come la velocità di propagazione dell'onda.

Si richiede  $C_2 = 0$  perché si è interessati solo all'effetto tunnel e (forse) si prende  $B_2 = 0$  come al solito. Risolvendo il sistema e imponendo  $R + T = 1$ , si trova

$$T = \frac{4E(V_0 - E)}{4E(V_0 - E) + V_0^2 \sinh^2 \left( \sqrt{\frac{V_0 - E}{\hbar^2/(2ma^2)}} \right)} \equiv \frac{|C_1|^2}{|A_1|^2} \simeq \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\sqrt{\frac{V_0 - E}{\hbar^2/(2ma^2)}}} \quad (2.7.6)$$

con approssimazione per  $V_0 - E \gg \hbar^2/(2ma^2)$ .

## 2.8 Meccanica quantistica dei sistemi interagenti

Si considerano sistemi 1, 2. Se questi non interagiscono  $\Rightarrow \mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ ; se  $\{|a_n\rangle\}_n, \{|b_m\rangle\}_n$  basi di  $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$  rispettivamente, si avrebbe base di  $\mathcal{H}$  data da  $|a_n, b_m\rangle = |a_n\rangle \otimes |b_m\rangle$ , quindi  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$  significa che:

$$|\psi\rangle = \sum_{n,m} c_{n,m} |a_n\rangle \otimes |b_m\rangle \equiv \left[ \sum_n c_n |a_n\rangle \right] \otimes \left[ \sum_m d_m |b_m\rangle \right]$$

dove  $c_{n,m} = c_n b_m$ .

### 2.8.1 Operatori per sistemi non-interagenti

Se  $\hat{A}, \hat{B}$  operatori di 1, 2 rispettivamente, allora per  $\{|a_n\rangle\}$  base di autostati di  $\hat{A}$  e  $\{|b_m\rangle\}$  base di autostati di  $\hat{B}$ :

$$\begin{aligned} \hat{A} |a_n\rangle \otimes |b_m\rangle &= a_n |a_n\rangle \otimes |b_m\rangle \\ \hat{B} |a_n\rangle \otimes |b_m\rangle &= b_m |a_n\rangle \otimes |b_m\rangle \end{aligned}$$

Da questo, risulta

$$(\hat{A} \otimes \hat{B}) |a_n\rangle \otimes |b_m\rangle = a_n b_m |a_n\rangle \otimes |b_m\rangle$$

Per questa caratterizzazione, deve risultare  $[\hat{A}, \hat{B}] = 0^1$ . Infine, se  $|\psi\rangle = \sum_{n,m} c_{n,m} |a_n\rangle \otimes |b_m\rangle$ :

$$\begin{aligned} \hat{A} |\psi\rangle &= \sum_{n,m} c_{n,m} (\hat{A} |a_n\rangle) \otimes |b_m\rangle = a_n |\psi\rangle \\ (\hat{A} \otimes \hat{B}) |\psi\rangle &= \sum_{n,m} c_{n,m} (\hat{A} |a_n\rangle) \otimes (\hat{B} |b_m\rangle) = a_n b_m |\psi\rangle \end{aligned}$$

---

<sup>1</sup>Questo, in realtà, vale anche quando i sistemi sono interagenti.



### 2.8.2 La matrice densità

Se  $\mathcal{H}$  spazio del sistema complessivo, con base  $|a_n b_m\rangle$ , e  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ , si scrive matrice densità o come  $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ , o con elementi di matrice  $\langle a_n b_m | \rho | a_j b_k \rangle$  della **matrice densità**.

Se  $\hat{R}$  operatore in  $\mathcal{H}$ , inserendo base completa tra  $\rho$  e  $\hat{R}$ :

$$\langle\psi|\hat{R}|\psi\rangle = \text{tr}(\rho\hat{R}) = \sum_{n,m} \langle a_n b_m | \rho \hat{R} | a_n b_m \rangle = \sum_{n,m,j,k} \langle a_n b_m | \rho | a_j b_k \rangle \langle a_j b_k | \hat{R} | a_n b_m \rangle$$

Si considera caso particolare  $\hat{R} = \hat{R}^{(1)} \otimes \text{Id}^{(2)}$  (cioè  $\hat{R}$  agisce solo su  $\mathcal{H}_1$ ) e si ha:

$$\begin{aligned} \text{tr}(\rho\hat{R}) &= \sum_{n,m,j,k} \langle a_n b_m | \rho | a_j b_k \rangle \langle a_j b_k | \hat{R} | a_n b_m \rangle = \sum_{n,m,j,k} \langle a_n b_m | \rho | a_j b_k \rangle \langle a_j | \hat{R}^{(1)} | a_n \rangle \overbrace{\langle b_k | \text{Id}^{(2)} | b_m \rangle}^{=\delta mk} \\ &= \sum_{n,m,j} \langle a_n b_m | \rho | a_j b_m \rangle \langle a_j | \hat{R}^{(1)} | a_n \rangle \equiv \text{tr}(\rho^{(1)} \hat{R}^{(1)}) \end{aligned}$$

dove  $\rho^{(1)} = \text{tr}^{(2)} \rho \stackrel{\text{def}}{=} \sum_m \langle a_n b_m | \rho | a_j b_m \rangle$ . Tutte le proprietà del proiettore valgono anche per  $\rho^{(1)}$ <sup>1</sup>, cioè  $\text{tr}^{(1)} \rho^{(1)} = 1$ ,  $\rho^{(1)\dagger} = \rho^{(1)}$ , ma **non è vero** che  $\text{tr}^{(1)} (\rho^{(1)})^2 = 1$ . In generale:

$$\text{tr}^{(1)} (\rho^{(1)})^2 \leq 1 \quad (2.8.1)$$

e l'uguaglianza vale quando lo stato che descrive è puro.

### 2.8.3 Caratterizzazione degli stati misti

Si considerano due sistemi 1,2 interagenti e si studia il sistema complessivo, rappresentato da  $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ , con Hamiltoniano  $\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{H}_I$ . L'evoluzione temporale di un  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$  è data da:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} |\psi(0)\rangle$$

Gli stati che non si possono scrivere come miscela di altri stati sono detti **puri** e si parla di **sovrapposizione coerente**. Un esempio è  $|\psi\rangle = (|0\rangle^{(1)} + |1\rangle^{(1)}) \otimes |0\rangle^{(2)}$  che si separa come prodotto tensore di stati del sistema 1 e del 2.

Quando questo non è possibile, si parla di **miscela statistica**, come per lo stato  $|\psi\rangle = |0\rangle^{(1)} \otimes |0\rangle^{(2)} + |1\rangle^{(1)} \otimes |1\rangle^{(2)}$ .

<sup>1</sup>Qui si tratterà  $\rho^{(1)}$  in particolare, ma il discorso è analogo per gli altri.

#### 2.8.4 Valore di aspettazione per miscele statistiche

Per  $\hat{O}$  osservabile, valore di aspettazione per stati puri è  $\langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle$ . Se  $|\phi\rangle$  stato misto, non si calcola allo stesso modo perché il sistema si distribuisce su più stati con una certa probabilità. Si calcola come:

$$\langle \hat{O} \rangle = \sum_n \omega_n \langle \phi_n | \hat{O} | \phi_n \rangle \quad (2.8.2)$$

dove i  $|\phi_n\rangle$  sono stati di una base di  $\mathcal{H}$  e  $\omega_n$  è la relativa probabilità, quindi  $0 \leq \omega_n \leq 1$  e  $\sum_n \omega_n = 1$ .

Introducendo base ortonormale  $\{|i\rangle\}$ :

$$\langle \hat{O} \rangle = \sum_{n,i,j} \omega_n \langle \phi_n | i \rangle \langle i | \hat{O} | j \rangle \langle j | \phi_n \rangle \equiv \sum_{n,i,j} \omega_n O_{ij} \langle \phi_n | i \rangle \langle j | \phi_n \rangle \equiv \sum_{i,j} \rho_{ji} O_{ij} \equiv \text{tr } \rho \hat{O} \quad (2.8.3)$$

dove si è definita la matrice densità

$$\rho_{ij} = \sum_n \omega_n \langle j | \phi_n \rangle \langle \phi_n | i \rangle \Rightarrow \hat{\rho} = \sum_n \omega_n |\phi_n\rangle \langle \phi_n| \quad (2.8.4)$$

Con questa definizione, la **matrice di densità** permette descrizione del sistema. Per questa definizione, continuano a valere  $\hat{\rho} = \hat{\rho}^\dagger$  e  $\text{tr } \rho = 1$ , ma

$$\text{tr } \rho^2 = \sum_n \omega_n^2 \leq \sum_n \omega_n = 1$$

#### 2.8.5 Evoluzione temporale della matrice densità

Per proiettore classico (che si ha per  $\omega_n = 1$  per generico  $n$ )  $\hat{\rho} = |\psi\rangle \langle \psi|$  l'evoluzione temporale è data da:

$$\hat{\rho}(t) = |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)| = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} |\psi(0)\rangle \langle \psi(0)| e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H} t}$$

Per stato misto, in generale:

$$\hat{\rho}(t) = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} \hat{\rho}(0) e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H} t}$$

Per  $\{|\phi\rangle_n\}_n$  base:

$$\rho(t) = \sum_n \omega_n e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} |\phi_n(0)\rangle \langle \phi_n(0)| e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} \equiv \sum_n \omega_n |\phi_n(t)\rangle \langle \phi_n(t)| \quad (2.8.5)$$

## 2.9 L'operatore momento angolare

### 2.9.1 Rotazioni in 3D

Una generica rotazione si scrive come composizione di tre matrici di rotazione

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \cos \phi & 0 & \sin \phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \phi & 0 & \cos \phi \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Per rotazione infinitesima, sviluppando attorno a 0 le matrici sopra, si ottiene la forma generica  $R_k(\varepsilon) = \text{Id} - i\varepsilon \Omega_k$ , dove  $k$  rappresenta l'asse attorno a cui si ruota e:

$$\Omega_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}; \Omega_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix}; \Omega_3 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vale  $(\Omega_k)_{ij} = -i\varepsilon_{kij}$  e  $[\Omega_i, \Omega_j] = i\varepsilon_{ijk}\Omega_k$ . Componendo le tre matrici, la rotazione infinitesima più generale, attorno a generico asse  $\mathbf{n}$ , è scritta come  $R_{\mathbf{n}} = \text{Id} - i\varepsilon_k \Omega_k$ <sup>1</sup> (eliminando infinitesimi di ordine superiore al primo). Applicandola a vettore  $\mathbf{x}$ , si trova  $\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \delta\theta \mathbf{n} \times \mathbf{x}$ , prendendo  $\vec{\varepsilon} = \delta\theta \mathbf{n}$ .

### 2.9.2 Rotazione su funzione d'onda

Dovendo rimanere la probabilità invariata sotto rotazione, la funzione d'onda non deve cambiare valore dopo rotazione dello spazio.

Dato operatore  $\hat{U}_R : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ , con  $R$  matrice di rotazione 3D, si richiede che:

$$\psi'(\mathbf{x}) = \hat{U}_R \psi(\mathbf{x}) = \psi(R^{-1}\mathbf{x}) \quad (2.9.1)$$

dove  $\hat{U}_R$  in equazione sopra è definito in  $L^2$ .

### 2.9.3 Momento angolare

Una trasformazione finita da quella infinitesima è data da

---

<sup>1</sup>Si sta assumendo somma su  $k$ .

$$\hat{U}_R(\theta) = e^{-\frac{i}{\hbar}\theta \mathbf{n} \cdot \mathbf{J}} \quad (2.9.2)$$

con  $\mathbf{n}$  asse di rotazione,  $\theta$  angolo di rotazione e  $\mathbf{J}$  vettore **momento angolare** degli operatori Hermitiani dei momenti angolari lungo ciascun asse.

Valgono le relazioni di commutazione e si mostra solo la prima:

$$\begin{aligned} [\hat{J}_a, \hat{J}_b] &= i\hbar \varepsilon_{abc} \hat{J}_c \\ [\hat{X}_a, \hat{J}_b] &= i\hbar \varepsilon_{abc} \hat{X}_c \\ [\hat{p}_a, \hat{J}_b] &= i\hbar \varepsilon_{abc} \hat{p}_c \end{aligned} \quad (2.9.3)$$

*Dimostrazione.* Si considerano due rotazioni infinitesime attorno a due assi distinti:  $R_1(\varepsilon) = \text{Id} - i\varepsilon \Omega_1$  e  $R_2 = \text{Id} - i\varepsilon \Omega_2$ . Si approssima al secondo ordine (primo ordine non-banale):

$$R_G = R_2(-\varepsilon)R_1(-\varepsilon)R_2(\varepsilon)R_1(\varepsilon) \simeq (\text{Id} + \varepsilon^2[\Omega_1, \Omega_2]) = (\text{Id} + i\varepsilon^2\Omega_3) = R_3(-\varepsilon^2)$$

dove si sono usate relazioni di commutazione delle  $\Omega_k$ . Applicandole a funzione d'onda, si ha contemporaneamente:

$$\begin{cases} \psi'(\mathbf{x}) = \hat{U}_{R_G}\psi(\mathbf{x}) \simeq \left(\text{Id} + \frac{i}{\hbar}\varepsilon^2\hat{J}_3\right)\psi(\mathbf{x}) \\ \psi'(\mathbf{x}) \simeq \left(\text{Id} + \frac{\varepsilon^2}{\hbar^2}[\hat{J}_1, \hat{J}_2]\right)\psi(\mathbf{x}) \end{cases}$$

Confrontando le due, si ottiene la tesi generalizzando relazione. (Forse) alternativamente, si sarebbe potuto procedere direttamente da analisi delle relazioni di commutazione delle  $\Omega_k$ , considerando che  $\hat{J}_k = \Omega_k/\hbar$ . ■

## 2.9.4 Momento angolare orbitale

Si definisce  $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{X}} \times \hat{\mathbf{p}}$  parte orbitale di  $\hat{\mathbf{J}}$ . Si mostra che, in rappresentazione delle coordinate:

$$\hat{\mathbf{L}}\psi(\mathbf{x}) = -i\hbar \mathbf{x} \times \nabla \psi(\mathbf{x}) \quad (2.9.4)$$

*Dimostrazione.* Per rotazione  $\delta\theta$  della funzione d'onda, da  $\hat{U}_R\psi(\mathbf{x}) = \psi(R^{-1}\mathbf{x})$ , si ha:

$$e^{-\frac{i}{\hbar}\delta\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{L}}}\psi(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x} - \delta\theta \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{x})$$

Sviluppando fino al primo ordine entrambi i membri:

$$\left[ \text{Id} - \frac{i}{\hbar} \delta\theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{L}} \right] \psi(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x}) - \delta\theta (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{x}) \cdot \nabla \psi(\mathbf{x})$$

Utilizzando  $(\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{x}) \cdot \nabla = \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{x} \times \nabla)$  e dovendo valere per generica scelta di  $\hat{\mathbf{n}}$ , si ritrova la tesi. ■

### 2.9.5 Spettro del momento angolare

$\hat{J}_a$  e  $\hat{H}$  non commutano, quindi non hanno base comune. Si definisce  $\hat{J}^2 = \sum_a \hat{J}_a^2$  e si può mostrare che  $[\hat{J}^2, \hat{J}_a] = 0$ . Si cerca base comune a  $\hat{J}^2$  e  $\hat{J}_z$  per convenzione; in particolare, si richiede:

$$\hat{J}^2 |\beta m\rangle = \hbar^2 \beta |\beta m\rangle; \quad \hat{J}_z |\beta m\rangle = \hbar m |\beta m\rangle$$

con  $|\beta m\rangle$  autostati normalizzabili<sup>1</sup>. Si nota che:

- (a). visto che  $\hat{J}^2 = \hat{J}_x^2 + \hat{J}_y^2 + \hat{J}_z^2$ , vale  $\beta = \langle \beta m | \hat{J}^2 | \beta m \rangle \geq \langle \beta m | \hat{J}_z^2 | \beta m \rangle = m^2$ ;  
 (b). definendo  $\hat{J}_\pm = \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y$ , con  $[\hat{J}_z, \hat{J}_\pm] = \pm \hbar \hat{J}_\pm$  e  $[\hat{J}_+, \hat{J}_-] = 2\hbar \hat{J}_z^2$ , e dovendo valere  $\beta \geq m^2 \Rightarrow \exists m_{\max}, m_{\min}$  tali che:

$$\begin{aligned} \hat{J}_z \hat{J}_+ |\beta m\rangle &= (\hat{J}_+ \hat{J}_z + \hbar \hat{J}_+) |\beta m\rangle = \hbar(m+1) \hat{J}_+ |\beta m\rangle \Rightarrow \hat{J}_+ |\beta m_{\max}\rangle = 0 \\ \hat{J}_z \hat{J}_- |\beta m\rangle &= (\hat{J}_- \hat{J}_z - \hbar \hat{J}_-) |\beta m\rangle = \hbar(m-1) \hat{J}_- |\beta m\rangle \Rightarrow \hat{J}_- |\beta m_{\min}\rangle = 0 \end{aligned}$$

- (c). visto che  $\hat{J}_- \hat{J}_+ = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 - \hbar \hat{J}_z$ , si ha:

$$0 = \hat{J}_- \hat{J}_+ |\beta j\rangle = (\hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 - \hbar \hat{J}_z) |\beta j\rangle \Rightarrow \hbar^2(\beta - j^2 - j) = 0 \Rightarrow \beta = j(j+1)$$

con  $j = m_{\max}$ . Analogamente  $m_{\min} = -j$ . Visto che  $\beta = j(j+1)$ , si usa  $j$  al posto di  $\beta$ , per cui vale  $-j \leq m \leq j$ .

### 2.9.6 Introduzione allo spin

Si usa solo parte orbitale  $\hat{\mathbf{L}}$  per sistemi la cui descrizione avviene tramite singola funzione d'onda.

Si considera sistema descritto da più funzioni d'onda  $\psi_1(\mathbf{x}), \psi_2(\mathbf{x})$ ; sotto rotazione, il sistema deve mantenere intatte le sue simmetrie e si deve anche

<sup>1</sup>Si usa notazione con due variabili  $\beta, m$  perché corrisponderanno ai due numeri quantici che permettono una più dettagliata descrizione dello stato che rappresentano.

<sup>2</sup>Si mostrano a partire da  $[\hat{J}_a, \hat{J}_b] = i\hbar \varepsilon_{abc} \hat{J}_c$ .

considerare lo spin, che è una proprietà intrinseca della particella. Per questo motivo, una generica rotazione è data da:

$$\hat{U}_R \begin{pmatrix} \psi_1(\mathbf{x}) \\ \psi_2(\mathbf{x}) \end{pmatrix} = e^{-\frac{i}{\hbar} \theta \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\mathbf{S}}} \begin{pmatrix} \psi_1(R^{-1}\mathbf{x}) \\ \psi_2(R^{-1}\mathbf{x}) \end{pmatrix} \quad (2.9.5)$$

con  $\hat{\mathbf{S}}$  operatore momento angolare di spin. Questo si occupa della rotazione intrinseca della particella per mantenere intatta la simmetria di partenza, mentre  $\hat{\mathbf{L}}$  si occupa della rotazione spaziale. Si assume che:

$$[\hat{\mathbf{L}}, \hat{\mathbf{S}}] = 0 \quad (2.9.6)$$

e si ha  $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$ . Inoltre, visto che  $[\hat{J}_a, \hat{J}_b] = i\hbar \varepsilon_{abc} \hat{J}_c$ , deve valere:

$$[\hat{S}_a, \hat{S}_b] = i\hbar \varepsilon_{abc} \hat{S}_c \quad (2.9.7)$$

### 2.9.7 Spettro del momento angolare orbitale

Analogamente a quanto fatto per  $\hat{J}$ , si usano  $\hat{L}^2, \hat{L}_z$  con autostati  $|\ell m\rangle$  tali che:

$$\hat{L}^2 |\ell m\rangle = \ell(\ell + 1) |\ell m\rangle, \quad \hat{L}_z |\ell m\rangle = m |\ell m\rangle$$

Usando coordinate sferiche,  $\hat{\mathbf{L}}$  nello spazio delle coordinate diventa:

$$\hat{\mathbf{L}} = r \hat{\mathbf{r}} \times (-i\hbar) \left[ \hat{r} \partial_r + \frac{1}{r} \hat{\theta} \partial_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \partial_\varphi \right] = -i\hbar \left[ \hat{\phi} \partial_\theta - \frac{1}{\sin \theta} \hat{\theta} \partial_\varphi \right]$$

Si definiscono<sup>1</sup>:

$$\begin{aligned} \hat{\ell}^2 &= \hat{L}^2 / \hbar = - \left[ \frac{1}{\sin^2 \theta} \partial_\varphi^2 + \frac{1}{\sin \theta} \partial_\theta (\sin \theta \partial_\theta) \right] \\ \hat{\ell}_z &= \hat{L}_z / \hbar = -i \partial_\varphi \end{aligned} \quad (2.9.8)$$

Si cerca soluzione con la separazione delle variabili:  $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$ . Inserendola in una delle due, visto che non hanno parte che agisce su  $R(r)$ , questa si semplifica e riduce il problema al calcolo di  $Y(\theta, \varphi)$ ,

<sup>1</sup>In  $\hat{\ell}_z$  si ha solo componente  $\varphi$  perché è l'unica che contribuisce alla componente  $z$  di  $\hat{\mathbf{L}}$ , infatti  $\hat{z} = \hat{r} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta$ .

quindi a risolvere:

$$\begin{cases} \hat{\ell}^2 Y(\theta, \varphi) = \ell(\ell + 1) Y(\theta, \varphi) \\ \hat{\ell}_z Y(\theta, \varphi) = m Y(\theta, \varphi) \end{cases} \quad (2.9.9)$$

- **Soluzione della seconda equazione.**

Si risolve

$$-i \frac{\partial}{\partial \varphi} [\Theta(\theta) \Phi(\varphi)] = m \Theta(\theta) \Phi(\varphi) \implies \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} = im \Phi(\varphi)$$

Questo significa che  $\Phi(\varphi) \propto e^{-im\varphi}$  con costante di normalizzazione data da  $\int_0^{2\pi} \Phi_m^*(\varphi) \Phi_{m'}(\varphi) d\varphi = \delta_{mm'}$  dove si è esplicitata dipendenza dal parametro  $-\ell < m < \ell$ . La soluzione completa è:

$$\Phi_m(\varphi) = \frac{e^{im\varphi}}{\sqrt{2\pi}} \quad (2.9.10)$$

Infine, dovendo risultare  $\varphi + 2\pi = \varphi$ , si richiede che  $\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \implies e^{im(2\pi+\varphi)} = e^{im\varphi} \iff e^{i2\pi m} = 1 \iff m \in \mathbb{Z}$ . Allora  $\hat{L}_z$  può avere solo autovalori del tipo  $0, \pm\hbar, \pm 2\hbar, \dots$

- **Soluzione della prima equazione.**

Si inserisce  $\Phi_m(\varphi)$  e si usa  $\partial_\varphi^2 \Phi_m(\varphi) = -m^2 \Phi_m(\varphi)$ , ottenendo:

$$-\left[ -\frac{m^2}{\sin^2 \theta} + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \right] \Theta(\theta) = \ell(\ell + 1) \Theta(\theta)$$

La soluzione di questa sono i **polinomi di Legendre**  $\Theta_{\ell m}(\theta) \propto P_\ell^m(\cos \theta)$ .

Complessivamente, si ha:

$$Y_\ell^m(\theta, \varphi) = C_{\ell m} e^{im\varphi} P_\ell^m(\cos \theta), \quad C_{\ell m} = \sqrt{\frac{(2\ell + 1)}{4\pi} \frac{(\ell - m)!}{(\ell + m)!}} \quad (2.9.11)$$

In questo modo:

$$\int (Y_{\ell'}^{m'})^* Y_\ell^m d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

e formano base ortonormale per lo spazio di Hilbert  $L^2$ .

## 2.10 Atomo di idrogeno

### 2.10.1 Particelle in campo centrale

Si studia problema generale di particelle in campo centrale  $U(|\hat{x}_1 - \hat{x}_2|)$ ; volendo applicare, poi, il discorso all'atomo di idrogeno, si assume un moto limitato. Si riprende trattazione affrontata in §2.5.1, con  $\psi(X, x) = \phi(X)\kappa(x)$  per assunzione, che deve soddisfare:

$$\begin{cases} -\frac{\hbar^2}{2M} \nabla_X^2 \phi(X) = E_{\text{CM}} \phi(X) \\ \left( -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla_x^2 + U(x) \right) \kappa(x) = E \kappa(x) \end{cases} \quad (2.10.1)$$

Dalla prima, si trova  $\phi(\vec{X}) = C e^{i\vec{k} \cdot \vec{X}}$ , essendo  $E_{\text{CM}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2M}$ . Poi ci si mette nel CM, per cui  $E_{\text{CM}} = 0$ , e si risolve la seconda usando le coordinate sferiche:

$$\hat{H} \psi(r, \theta, \varphi) = E \psi(r, \theta, \varphi) \Rightarrow \left[ \frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r) + \frac{1}{r^2} \hat{\ell}^2 \right] \psi + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U(r)) \psi = 0 \quad (2.10.2)$$

con  $\hat{\ell}^2$  dato da eq. 2.9.8. Allora si assume  $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$ , per cui:

$$\frac{1}{r^2} \partial_r (r^2 \partial_r) R + \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} R + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U(r)) R = 0$$

Usando  $\chi(r) = rR(r)$ , tale che  $\chi(r) \rightarrow 0$  per  $r \rightarrow 0$ , e definendo  $U_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\ell(\ell+1)}{r^2}$ , si ha:

$$\frac{d^2}{dr^2} \chi(r) + \frac{2m}{\hbar^2} (E - U_{\text{eff}}(r)) \chi(r) = 0 \quad (2.10.3)$$

Vista l'equazione differenziale, la soluzione dipenderà dai parametri  $E, \ell$ , quindi un autostato si esprime, in generale, come  $|E, \ell, m\rangle$  e costituiscono un sistema ortonormale. Questo sistema è anche non-degenere perché il problema per  $R(r)$  è unidimensionale e relativo a moto limitato, quindi la coppia di autovalori  $E, \ell$ , relativi rispettivamente a  $\hat{H}, \hat{\ell}^2$ , è non-degenere. Visto che le autofunzioni dipendono da  $m$ , lo si include per la descrizione degli stati.

Si assume  $R(r) \propto r^a$ , con  $a$  da determinare; per farlo, si sostituisce nell'equazione differenziale e si manda  $r \rightarrow 0$ , facendo rimanere l'equazione nel limite



asintotico di  $r$  piccoli:

$$\frac{d}{dr} \left( r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \ell(\ell + 1)R = 0 \Rightarrow a = \ell \quad (2.10.4)$$

quindi  $R(r) \propto r^\ell$ .

### 2.10.2 Funzione d'onda per l'atomo di idrogeno

È il caso particolare della trattazione precedente con  $U(\hat{r}) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hat{r}}$ . A partire dalle grandezze  $m_e c^2 \simeq 0.5 \text{ MeV}$  e  $\alpha = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}$  costante di struttura fine, si definisco le grandezze caratteristiche del sistema:

$$\begin{aligned} \ell_B &= \frac{\hbar}{m_e c \alpha} \approx 0.5 \cdot 10^{-10} \text{ m} & (\text{raggio di Bohr}) \\ E_B &= \frac{1}{2} m_e c^2 \alpha^2 & (\text{costante di Rydberg}) \end{aligned} \quad (2.10.5)$$

Nel caso di atomo di idrogeno, si approssima  $\mu \simeq m_e \equiv m$ , e l'equazione agli autovalori relativa è:

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \psi(\mathbf{x}) = E \psi(\mathbf{x}) \quad (2.10.6)$$

Conviene passare in coordinate sferiche e sfruttare invarianza sotto rotazioni, per cui  $[\hat{H}, \hat{L}] = 0$ . Usando separazione delle variabili:  $\psi_{E\ell m}(\mathbf{x}) \equiv \langle \mathbf{x} | E \ell m \rangle = R_{E\ell}(r) Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$ .

Si sostituiscono in eq. differenziale per  $R$  le grandezze  $\bar{r} = r/\ell_B$  e  $\bar{E} = E/E_B$ . Per semplicità, si ometteranno le barre, ma si intendono grandezze riscalate. Definendo, inoltre,  $n = 1/\sqrt{-2\bar{E}}$ <sup>1</sup> e  $\rho = 2r/n$ :

$$R'' + \frac{2}{\rho} R' + \left[ \frac{n}{\rho} - \frac{1}{4} - \frac{\ell(\ell + 1)}{\rho^2} \right] R = 0 \quad (2.10.7)$$

con  $R = R(\rho)$ . Si è visto che  $R(\rho) \propto \rho^\ell$  per  $\rho \rightarrow 0^+$ , mentre per  $\rho \rightarrow +\infty$  si ha  $R'' - \frac{1}{4}R = 0 \Rightarrow R(\rho) \propto e^{\pm\rho/2}$ . Volendo descrivere moto limitato, si elimina soluzione con  $+$ . Complessivamente, si ha:

$$R(\rho) = \rho^\ell e^{-\rho/2} L(\rho) \quad (2.10.8)$$

---

<sup>1</sup>Qui  $n$  non è immaginario perché le energie relative al sistema limitato che si sta studiando sono assunte negative.

che, sostituita nell'equazione differenziale, restituisce forma di  $L$ , che deve essere una **ipergeometrica confluyente**. Imponendo che queste funzioni rispettino la condizione energetica  $n \in \mathbb{N}$  e  $n \geq \ell + 1$ , le soluzioni sono i **polinomi generalizzati di Laguerre**:

$$L_k^{(s)}(\rho) = \frac{d^s}{d\rho^s} L_k(\rho), \text{ con } L_k(\rho) = e^\rho \frac{d^k}{d\rho^k} (\rho^k e^{-\rho}) \quad (2.10.9)$$

Mettendo tutto insieme e aggiungendo la costante di normalizzazione, si trova:

$$\psi_{n\ell m}(r, \theta, \varphi) = -\sqrt{\frac{4(n-\ell-1)!}{(n\ell_B)^3 n [(n+\ell)!]^3}} \rho^\ell e^{-\rho/2} L_{n+\ell}^{(2\ell+1)}(\rho) Y_{\ell m}(\theta, \varphi) \quad (2.10.10)$$

dove si è sostituito  $E$  con  $n$  come pedice in quanto sono in corrispondenza per la relazione  $E_n = -\frac{m_e \alpha^2 c^2}{2n^2}$ .

### 2.10.3 Lo stato fondamentale, medie e varianze di posizione e momento

L'energia minima del sistema è  $E_1 = -m_e \alpha^2 c^2 / 2$  e, visto che si deve rispettare  $n \geq \ell + 1$  e  $|m| \leq \ell$ , associata a:

$$\psi_{100}(r, \theta, \varphi) = R_{10}(r) Y_{00}(\theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi \ell_B^3}} e^{-r/\ell_B} \quad (2.10.11)$$

Essendo il sistema nello stato fondamentale invariante per rotazioni, deve anche valere  $\langle 0 | \hat{\mathbf{X}} | 0 \rangle = 0$ ; si distinguerebbero direzione e verso del vettore. Per lo stesso motivo:  $\langle 0 | \hat{\mathbf{p}} | 0 \rangle = 0^1$ .

Si può riscrivere  $\psi_{100}$  in termini di  $\bar{r} = r/\ell_B$ , con normalizzazione  $(\sqrt{\pi})^{-1} \Rightarrow \psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\bar{r}}$ .

Si cerca probabilità di ottenere un certo impulso  $\mathbf{p}$  (relativo allo stato fondamentale):  $\mathcal{P}(p) = |\tilde{\psi}_{100}(p)|^2$ . Si ottiene trasformando con Fourier  $\psi_{100}$ :

$$\tilde{\psi}_{100} = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3x e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} \psi(\mathbf{x}) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \frac{1}{(1+p^2)^2}$$

<sup>1</sup>È ragionevole che sia 0 perché lo stato è legato, nel senso che l'elettrone è vincolato a un moto limitato ad una certa regione dello spazio. Se non fosse nullo, il sistema andrebbe all'infinito lungo quella particolare direzione.

**OSSERVAZIONE 2.1.** Sistema invariante per rotazione  $\Rightarrow \tilde{\psi}(p)$  dipende solo da  $|\mathbf{p}|$ .

Si calcola varianza della posizione<sup>1</sup>:

$$\begin{aligned}
 \langle 0|\hat{\mathbf{X}}^2|0\rangle &= \int d^3x \langle 0|x\rangle \langle x|\hat{\mathbf{X}}^2|0\rangle = \int d^3x \psi_{100}^*(x) \hat{\mathbf{X}}^2 \psi_{100}(x) \\
 &= \int r^2 dr \sin \theta d\theta d\varphi |\mathbf{x}|^2 |\psi_{100}(x)|^2 \\
 &= \frac{1}{\pi \ell_B^3} \int_0^{+\infty} dr r^4 e^{-2r/\ell_B} \int_0^\pi d\theta \sin \theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\
 &= \frac{4}{\ell_B^3} \int_0^{+\infty} dr r^4 e^{-2r/\ell_B} = \frac{4}{\ell_B^3} \cdot \frac{3\ell_B^5}{4} = 3\ell_B^2
 \end{aligned} \tag{2.10.12}$$

dove si è usato  $\int_0^{+\infty} r^n e^{-\alpha r} dr = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$ . Ora si fa il calcolo per  $\langle \hat{\mathbf{p}}^2 \rangle$ . Si ha  $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$  nelle coordinate, quindi:

$$\langle \hat{\mathbf{p}}^2 \rangle = -\hbar^2 \int_{\mathbb{R}^3} \psi_{100}^*(\mathbf{x}) \nabla^2 \psi_{100}(\mathbf{x}) d^3x = -\hbar^2 \cdot 4\pi \int_0^\infty \psi_{100}(r) \nabla^2 \psi_{100}(r) r^2 dr$$

Per una funzione radiale  $\nabla^2 \psi(r) = \psi''(r) + \frac{2}{r} \psi'(r)$ , dove  $\psi'(r) = -\frac{1}{l_B} \psi_{100}(r)$  e  $\psi''(r) = \frac{1}{l_B^2} \psi_{100}(r)$ , perciò  $\nabla^2 \psi_{100}(r) = \frac{1}{l_B^2} \psi_{100}(r) - \frac{2}{l_B r} \psi_{100}(r)$ . Allora:

$$\begin{aligned}
 \langle \hat{\mathbf{p}}^2 \rangle &= -\hbar^2 \cdot 4\pi \int_0^\infty \frac{1}{\pi l_B^3} e^{-2r/l_B} \left( \frac{1}{l_B^2} - \frac{2}{l_B r} \right) r^2 dr \\
 &= -\frac{4\hbar^2}{l_B^3} \left[ \frac{1}{l_B^2} \int_0^\infty r^2 e^{-2r/l_B} dr - \frac{2}{l_B} \int_0^\infty r e^{-2r/l_B} dr \right] \\
 &= -\frac{4\hbar^2}{l_B^3} \left[ \frac{1}{l_B^2} \cdot \frac{l_B^3}{4} - \frac{2}{l_B} \cdot \frac{l_B^2}{4} \right] = \frac{\hbar^2}{l_B^2}
 \end{aligned} \tag{2.10.13}$$

Riassumendo:

$$\langle 0|\hat{\mathbf{X}}|0\rangle = \langle 0|\hat{\mathbf{p}}|0\rangle = 0 ; \quad \langle 0|\hat{\mathbf{X}}^2|0\rangle = 3\ell_B^2 ; \quad \langle 0|\hat{\mathbf{p}}^2|0\rangle = \frac{\hbar^2}{\ell_B^2} \tag{2.10.14}$$

<sup>1</sup>Invarianza per rotazioni  $\Rightarrow \psi(\mathbf{x}) \equiv \psi(x)$ , inoltre  $|\mathbf{x}| \equiv x \equiv r$ .

#### 2.10.4 Principio di indeterminazione

Si è visto che, essendo  $[\hat{X}_a, \hat{p}_b] = i\hbar\delta_{ab}$ , si ricava:

$$\left\langle (\hat{X}_a - \langle \hat{X}_a \rangle)^2 \right\rangle \left\langle (\hat{p}_b - \langle \hat{p}_b \rangle)^2 \right\rangle \geq \delta_{ab} \frac{\hbar^2}{4} \quad (2.10.15)$$

Applicandolo allo stato fondamentale, per quanto detto sopra,  $\langle \hat{X}_a \rangle = \langle \hat{p}_b \rangle = 0, \forall a, b$ ; inoltre, valendo invarianza per rotazioni, sommando su  $a, b$ , si ha:

$$\langle \hat{\mathbf{X}}^2 \rangle \langle \hat{\mathbf{p}}^2 \rangle \geq \frac{3\hbar^2}{4} \quad (2.10.16)$$

D'altra parte  $\langle 0 | \hat{X}_a^2 | 0 \rangle = \frac{1}{3} \langle 0 | \hat{\mathbf{X}}^2 | 0 \rangle$  e  $\langle 0 | \hat{p}_a^2 | 0 \rangle = \frac{1}{3} \langle 0 | \hat{\mathbf{p}}^2 | 0 \rangle$  vista l'invarianza per rotazioni, quindi:

$$\frac{\hbar^2}{4} \leq \langle 0 | \hat{X}_a^2 | 0 \rangle \langle 0 | \hat{p}_a^2 | 0 \rangle = \frac{1}{9} \langle 0 | \hat{\mathbf{X}}^2 | 0 \rangle \langle 0 | \hat{\mathbf{p}}^2 | 0 \rangle \Rightarrow \langle \hat{\mathbf{X}}^2 \rangle \langle \hat{\mathbf{p}}^2 \rangle \geq \frac{9}{4} \hbar^2 \quad (2.10.17)$$

per cui si ottiene un limite inferiore più preciso. Tuttavia si possono usare i risultati in eq. 2.10.14, per concludere che  $\langle \hat{\mathbf{X}}^2 \rangle \langle \hat{\mathbf{p}}^2 \rangle = 3\hbar^2$ , conforme con le stime di sopra.

#### 2.10.5 Oscillatore armonico 3D

Si studia sistema con Hamiltoniano  $\hat{H} = \sum_{i=1}^3 \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{x}_i^2$ . Questo si può scomporre come  $\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{H}_3$ , ciascuno relativo a una coordinata spaziale.

Gli Hamiltoniani si diagonalizzano separatamente, con  $\hat{H}_1 |n_1\rangle = E_{n_1} |n_1\rangle$ , con  $E_{n_1} = \hbar\omega(n_1 + 1/2)$ . Per operatore di creazione:  $|n_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{n_1!}} (\hat{a}_1^+)^{n_1} |0\rangle$ , con  $|0\rangle = \frac{1}{\pi^{1/4} \ell_\omega^{1/2}} e^{-x^2/(2\ell_\omega^2)}$ .

Chiaramente  $[\hat{H}_i, \hat{H}_j] = 0$ , quindi uno stato di  $\hat{H}$ , individuabile tramite  $|n_1 n_2 n_3\rangle$ , si può rappresentare con  $|n_1\rangle |n_2\rangle |n_3\rangle$ ; ne segue che  $E_{n_1 n_2 n_3} = \hbar\omega(n_1 + n_2 + n_3 + 3/2) \equiv \hbar\omega(n + 3/2)$ , visto che  $\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{H}_3$ .

Potendo scomporre  $|n_1 n_2 n_3\rangle$ , questo si scrive come:

$$|n_1 n_2 n_3\rangle = C (\hat{a}_1^+)^{n_1} (\hat{a}_2^+)^{n_2} (\hat{a}_3^+)^{n_3} |000\rangle$$

dove  $C$  è un fattore di normalizzazione e gli  $\hat{a}_i^+$  sono operatori di creazione relativi alla variabile  $i$ -esima.

In 3D, la funzione d'onda è:

$$\varphi_0 = \left( \frac{1}{\pi^{1/4} \ell_\omega^{1/2}} \right)^3 e^{-r^2/(2\ell_\omega^2)} \quad (2.10.18)$$

Il valore medio della distanza è dato, usando  $\hat{r}^2 = \hat{x}_1^2 + \hat{x}_2^2 + \hat{x}_3^2$ , da:

$$\langle 0|^{(1)} \langle 0|^{(2)} \langle 0|^{(3)} (\hat{x}_1^2 + \hat{x}_2^2 + \hat{x}_3^2) |0\rangle^{(1)} |0\rangle^{(2)} |0\rangle^{(3)} = \langle 0|\hat{x}_1^2|0\rangle \langle 0|\hat{x}_2^2|0\rangle \langle 0|\hat{x}_3^2|0\rangle = \frac{3}{2} \ell_\omega^2$$

## 2.11 Lo spin

Si ricorda che per sistemi descritti da più funzioni d'onda, una rotazione  $\hat{R}$  agisce come:

$$\hat{R} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \vdots \\ \psi_n \end{pmatrix} = \hat{M} \begin{pmatrix} \psi_1(R^{-1}\mathbf{x}) \\ \vdots \\ \psi_n(R^{-1}\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

con  $\hat{R}(\hat{n}, \theta) = e^{-\frac{i}{\hbar} \theta \hat{n} \cdot \hat{\mathbf{L}}} \hat{M}(\hat{n}, \theta)$ , dove  $\hat{M}$  agisce sulle componenti (rotazione passiva), mentre l'esponenziale agisce sulle coordinate (rotazione attiva).

Visto che  $\hat{R}$  deve essere unitario e che l'esponenziale già lo è, anche  $\hat{M}$  deve esserlo; allora  $\hat{M}(\hat{n}, \theta) = e^{-\frac{i}{\hbar} \theta \hat{n} \cdot \hat{\mathbf{S}}}$ , con  $\hat{\mathbf{S}}$  Hermitiano.  $[\hat{\mathbf{L}}, \hat{\mathbf{S}}] = 0$  visto che agiscono indipendentemente, quindi  $\hat{R}(\hat{n}, \theta) = e^{-\frac{i}{\hbar} \theta \hat{n} \cdot (\hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}})} \equiv e^{-\frac{i}{\hbar} \theta \hat{n} \cdot \hat{\mathbf{J}}}$ . Valendo  $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k$  e  $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{L}_k$ , deve risultare  $[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{S}_k$ . Si ha anche:

$$\begin{aligned} [\hat{S}^2, \hat{S}_a] &= 0 \\ \begin{cases} \hat{S}^2 |s, s_z\rangle = \hbar^2 s(s+1) |s, s_z\rangle, & s = \frac{n}{2} \text{ e } n = 0, 1, 2, \dots \\ \hat{S}_z |s, s_z\rangle = \hbar s_z |s, s_z\rangle, & -s \leq s_z \leq s \end{cases} \end{aligned} \quad (2.11.1)$$

### 2.11.1 Esempio – Sistema di spin 1/2 (parte 1)

Si considera per esempio un sistema (una particella tipo elettrone) di spin 1/2. Lo studio di un sistema del genere consiste nel trascurare qualunque altro aspetto del sistema se non il suo spin. In altre parole, gli stati del sistema in esame saranno unicamente stati di spin e non coinvolgeranno energia o altri valori.

Per  $s = 1/2$ , si ha  $m = 1/2$ ,  $m = -1/2$  perché  $m$  si muove a passi di 1 tramite gli operatori di salita e discesa, quindi il sistema ha un totale di due gradi di libertà. Questo significa che gli stati prendono valori in uno spazio vettoriale

bidimensionale, pertanto gli operatori di spin saranno matrici hermitiane  $2 \times 2$ . In questo caso, la forma matriciale degli operatori di spin è ottenuta tramite le matrici di Pauli:

$$\hat{S}_x = \frac{1}{2}\hbar\sigma_1 \quad \hat{S}_y = \frac{1}{2}\hbar\sigma_2 \quad \hat{S}_z = \frac{1}{2}\hbar\sigma_3 \quad (2.11.2)$$

dove i coefficienti  $\hbar/2$  servono a rendere esatte le relazioni dell'algebra di tali operatori.

Da §5.1 e §5.2, si sa che  $\sigma_3$ , quindi  $\hat{S}_z$ , fornisce una base completa per il sistema ed è data da

$$\left\{ |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Si vede che  $|\uparrow\rangle = |s = \frac{1}{2}, m = \frac{1}{2}\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ , mentre  $|\downarrow\rangle = |s = \frac{1}{2}, m = -\frac{1}{2}\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$ <sup>1</sup>:

$$\hat{S}_z |\uparrow\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

quindi  $m = 1/2$  effettivamente perché è l'autovalore di  $\hat{S}_z$ . Questo dimostra che lo spin up coincide con  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$  e, quindi, il down coincide con  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

Sia  $|\psi\rangle = \alpha |\uparrow\rangle + \beta |\downarrow\rangle$  un generico stato; la probabilità di trovare il sistema nello stato  $|\uparrow\rangle$  in questo sistema è, per definizione,  $|\langle\uparrow|\psi\rangle|^2 = |\alpha|^2$ ; analogamente, la probabilità di trovarlo in  $|\downarrow\rangle$  è  $|\langle\downarrow|\psi\rangle|^2 = |\beta|^2$ . Per normalizzazione dello stato, la somma di queste fa 1, coerentemente con quanto ci si sarebbe aspettato.

### 2.11.2 Esempio – Sistema di spin 1/2 (parte 2)

Si considera ancora  $s = 1/2$ , per cui l'autovalore di  $\hat{S}_z$  è:  $m = s_z = -1/2, 1/2$ . L'autovalore di  $\hat{S}^2$ , invece, ha valore  $3/4$ . In unità naturali, si considera  $\hat{S}_a = \sigma_a/2$ ,  $a = 1, 2, 3$ . Gli elementi della base completa si indicano con  $|s, m\rangle$  e si prende, come base completa, gli autostati di  $\hat{S}_z$ .

Ora si studia l'effetto di una rotazione, attorno all'asse  $\hat{n}$  e di angolo  $\theta$ , su un generico stato  $|\psi\rangle = a |\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle + b |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$ . Tale rotazione sarà data da  $\hat{R}(\hat{n}, \theta) = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{n}\cdot\hat{S}\theta}$ ; se ne cercherà rappresentazione matriciale per ottenere autovalori e autovettori. Il versore in coordinate polari è  $\hat{n} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$ , quindi:

$$\hat{n} \cdot \hat{S} = \frac{1}{2}\hbar\hat{n} \cdot \hat{\sigma} = \frac{1}{2}\hbar \begin{pmatrix} \cos \theta & e^{-i\varphi} \sin \theta \\ e^{i\varphi} \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \equiv \frac{1}{2}\hbar M$$

<sup>1</sup>Si sottintende  $\hbar = 1$ .

**ESERCIZIO 2.1.**

Si cercano autovalori e autovettori di  $M$ .

*Svolgimento.* Per gli autovalori:

$$\begin{vmatrix} \cos \theta - \lambda & e^{-i\varphi} \sin \theta \\ e^{i\varphi} \sin \theta & -\cos \theta - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \lambda^2 - 1 \stackrel{!}{=} 0$$

quindi  $\lambda_{\pm} = \pm 1$ . Quindi gli autovettori sono:

$$\begin{pmatrix} \cos \theta \mp 1 & e^{-i\varphi} \sin \theta \\ e^{i\varphi} \sin \theta & -\cos \theta \mp 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} 0 \iff a(\cos \theta \mp 1) + be^{-i\varphi} \sin \theta = 0$$

$$\Rightarrow b = e^{i\varphi} \frac{\pm 1 - \cos \theta}{\sin \theta} a$$

dove il segno superiore è relativo a  $\lambda = 1$ , mentre quello inferiore a  $\lambda = -1$ . Queste possono essere riscritte meglio usando le identità trigonometriche  $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$ ,  $1 + \cos \theta = 2 \cos^2(\theta/2)$  e  $1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2)$ :

$$b_+ = e^{i\varphi} \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} a_+ = e^{i\varphi} \frac{2 \sin^2 \theta/2}{2 \cos \theta/2 \sin \theta/2} a_+ = e^{i\varphi} \frac{\sin \theta/2}{\cos \theta/2} a_+$$

$$b_- = -e^{i\varphi} \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} a_- = -e^{i\varphi} \frac{2 \cos^2 \theta/2}{2 \sin \theta/2 \cos \theta/2} a_- = -e^{i\varphi} \frac{\cos \theta/2}{\sin \theta/2} a_-$$

Così facendo, si possono ottenere degli autovettori scritti in maniera simmetrica prendendo  $a_+ = e^{-i\varphi/2} \cos \theta/2$  e  $a_- = -e^{-\varphi/2} \sin \theta/2$ :

$$|v_+\rangle = \begin{pmatrix} e^{-\varphi/2} \cos \theta/2 \\ e^{i\varphi/2} \sin \theta/2 \end{pmatrix} \quad |v_-\rangle = \begin{pmatrix} -e^{-i\varphi/2} \sin \theta/2 \\ e^{-i\varphi/2} \cos \theta/2 \end{pmatrix}$$

♠

**OSSERVAZIONE 2.2.** Si nota che gli autovalori si sarebbero potuti determinare in principio senza calcoli: il sistema è invariante per rotazioni per assunzione, quindi, visto che ruotando  $\hat{S}_z$  lungo un altro asse, il sistema deve rimanere uguale, anche i suoi autovalori devono rimanere invariati.

A questo punto, gli autostati di  $\hat{R} = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{n} \cdot \hat{S} \theta}$  sono gli stessi di  $\hat{n} \cdot \hat{S}$ , che, a loro volta, sono gli stessi di  $M$ .

### 2.11.3 Gli angoli di Eulero e le matrici di Wigner

Permettono di esprimere la rotazione più generica. Si indicherà rotazione con  $\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma)$ . Usando base completa  $|jm\rangle$ , si verifica che  $\langle j'm'|\hat{R}|jm\rangle \equiv \langle \hat{R} \rangle = M\delta_{j'j}$ , con  $M$  matrice generica; per farlo, si usa  $[\hat{J}^2, \hat{R}] = 0$ :

$$\begin{cases} \langle j'm'|\hat{J}^2\hat{R}|jm\rangle = j'(j'+1)\langle \hat{R} \rangle \\ \langle j'm'|\hat{J}^2\hat{R}|jm\rangle = j(j+1)\langle \hat{R} \rangle \end{cases} \iff j = j'$$

Si indica  $\langle \hat{R} \rangle \equiv D_{m,m'}^j(\alpha, \beta, \gamma)$ , con  $\alpha, \beta, \gamma$  una delle possibili parametrizzazioni. Usando base  $|jm\rangle$ :

$$\hat{R}|jm\rangle = \sum_{j'm'} |j'm'\rangle \langle j'm'|\hat{R}|jm\rangle = \sum_{m'} |jm'\rangle D_{m,m'}^j(\alpha, \beta, \gamma)$$

Significa che per ogni rotazione,  $j$  è fissato.

Si calcolano elementi di  $D_{m,m'}^j$ . Per farlo, si considera che una generica rotazione si può spezzare nella composizione delle rotazioni per ciascun angolo di Eulero:

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) = \hat{R}(\hat{z}', \gamma)\hat{R}(\hat{u}, \beta)\hat{R}(\hat{z}, \alpha) = e^{-\frac{i}{\hbar}\gamma\hat{z}'\cdot\mathbf{J}}e^{-\frac{i}{\hbar}\beta\hat{u}\cdot\mathbf{J}}e^{-\frac{i}{\hbar}\alpha\hat{z}\cdot\mathbf{J}}$$

con  $\hat{u}$  versore  $\hat{y}$  dopo rotazione attorno all'asse  $\hat{z}$ , di angolo  $\alpha$  e  $\hat{z}'$  versore  $\hat{z}$  che si ottiene dopo rotazione attorno a  $\hat{u}$  di angolo  $\beta$ . Si può dimostrare che:

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) = e^{-\frac{i}{\hbar}\alpha J_z}e^{-\frac{i}{\hbar}\beta J_y}e^{-\frac{i}{\hbar}\gamma J_z}$$

Ne segue che:

$$\begin{aligned} D_{m,m'}^j(\alpha, \beta, \gamma) &= \langle jm' | e^{-\frac{i}{\hbar}\alpha J_z} e^{-\frac{i}{\hbar}\beta J_y} e^{-\frac{i}{\hbar}\gamma J_z} | jm \rangle = e^{i(\alpha m' - \gamma m)} \langle jm' | e^{-\frac{i}{\hbar}\beta J_y} | jm \rangle \\ &\equiv e^{-i(\alpha m' + \gamma m)} d_{m,m'}^j(\beta) \end{aligned} \quad (2.11.3)$$

Le matrici  $D, d$  sono note come **matrici di Wigner**.

**ESEMPIO 2.1 — MATRICE DI WIGNER PER SPIN 1/2.**

Si vuole calcolare  $d_{m,m'}^j(\beta)$  nel caso di  $s = 1/2$ . In questo caso, in unità naturali,  $J_y = \sigma_y/2$ , quindi si deve calcolare  $e^{-\frac{i}{2}\beta\sigma_y}$ . Si ha:

$$e^{-i\frac{\beta\sigma_y}{2}} = \cos \frac{\beta}{2} - i\sigma_y \sin \frac{\beta}{2}$$



Allora:

$$d_{m,m'}^{1/2}(\beta) = \begin{pmatrix} \cos \beta/2 & -\sin \beta/2 \\ \sin \beta/2 & \cos \beta/2 \end{pmatrix} \quad (2.11.4)$$

Da questa, si ricava

$$D_{m,m'}^{1/2}(\alpha, \beta, \gamma) = e^{-i(\alpha m' + \gamma m)} \begin{pmatrix} \cos \beta/2 & -\sin \beta/2 \\ \sin \beta/2 & \cos \beta/2 \end{pmatrix} \quad (2.11.5)$$

Facendo agire questa rotazione sulle armoniche sferiche, che sono gli autostati del momento angolare orbitale, si deve ottenere lo stesso effetto che su  $|jm\rangle$ , quindi:

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) Y_{lm}(\theta, \varphi) = Y_{lm}(\theta', \varphi') = \sum_{m'} Y_{lm'}(\theta, \varphi) D_{m',m}^\ell(\alpha, \beta, \gamma) \quad (2.11.6)$$

#### 2.11.4 Regole di superselezione

Si considera una rotazione di  $\theta = 2\pi$  attorno all'asse  $\hat{z}$ ; questa agisce su un autostato nel seguente modo:

$$\hat{R}_{2\pi} |jm\rangle = e^{-i2\pi \hat{J}_z} |jm\rangle = e^{-i2\pi m} |jm\rangle = (e^{-i\pi})^{2m} |jm\rangle = (-1)^{2m} |jm\rangle$$

Si nota che  $m$  dipende direttamente da  $j$ : se  $j \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \mathbb{Z} \Rightarrow (-1)^{2m} = 1$ ; al contrario, se fosse  $j$  semintero<sup>1</sup>, visto che ogni valore di  $m$  si trova a passi di 1 da  $j$ , significa che  $m$  rimane semintero<sup>2</sup>. Allora si può più semplicemente scrivere che

$$\hat{R}_{2\pi} |jm\rangle = (-1)^{2j} |jm\rangle \quad (2.11.7)$$

**OSSERVAZIONE 2.3.** Nel caso di spin semintero (quindi per fermioni) si osserva che una rotazione di  $2\pi$  non è sufficiente a far tornare il sistema allo stesso punto di partenza.

Dal punto di vista fisico, nonostante gli stati possono subire variazioni a seguito di rotazioni di  $2\pi$ , si deve comunque verificare un'invarianza degli operatori: le misure che si compiono ruotando il sistema di  $2\pi$  devono essere le stesse. Per imporre questa condizione su un osservabile  $\hat{O}$  generico, si richiede

<sup>1</sup>Cioè della forma  $n/2$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

<sup>2</sup>Infatti se 2 non divide  $n \Rightarrow n = 2q + r$ ,  $q \in \mathbb{N}$  e  $0 \leq r < 2$ , pertanto sommando un  $k \in \mathbb{N}$ , si trova  $(n + 2k)/2$ . Si deve mostrare che questo non è divisibile per 2 ed è immediato, visto che  $n + 2k = 2(q + k) + r \equiv 2n' + r$ .

$[\hat{O}, \hat{R}_{2\pi}] = 0$ . D'ora in poi, ogni osservabile che sia *un buon osservabile*, soddisfa automaticamente  $[\hat{O}, \hat{U}] = 0$ .

Usare operatori che soddisfano questa richiesta non è sufficiente a rendere indifferente il risultato in eq. 2.11.7. Sia  $\hat{U} \equiv \hat{R}_{2\pi}$  e sia  $|\psi'\rangle = \hat{U}|\psi\rangle \neq |\psi\rangle$ ; per osservabile  $\hat{A}$  tale che  $[\hat{A}, \hat{U}] = 0$ :

$$\langle\psi'|\hat{A}|\psi'\rangle = \langle\psi|\hat{U}^\dagger\hat{A}\hat{U}|\psi\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$$

visto che  $[\hat{A}, \hat{U}] = 0 \Rightarrow \hat{A}\hat{U} = \hat{U}\hat{A} \Rightarrow \hat{U}^\dagger\hat{A}\hat{U} = \hat{U}^\dagger\hat{U}\hat{A} = \hat{A}$ , essendo  $\hat{U}$  unitario. Questo significa che se anche gli stati non rimangono invariati sotto rotazione di  $2\pi$ , nel caso in cui l'osservabile commuti con tale rotazione, il suo valore medio sullo stato rimane invariato.

Visto che  $\hat{R}_{2\pi}|jm\rangle = (-1)^{2j}|jm\rangle$ , alcuni stati prenderanno un segno negativo, altri no:

$$\hat{R}_{2\pi}|+\rangle = |+\rangle \quad \hat{R}_{2\pi}|-\rangle = -|-\rangle$$

Se  $[\hat{A}, \hat{R}_{2\pi}] = 0$ , usando sempre che  $\hat{R}_{2\pi}$  è unitario, si trova che:

$$\langle+|\hat{R}_{2\pi}\hat{A}|-\rangle = \langle+|\hat{A}\hat{R}_{2\pi}|-\rangle \Rightarrow \langle+|\hat{A}|-\rangle = -\langle+|\hat{A}|-\rangle \iff \langle+|\hat{A}|-\rangle = 0$$

dove si è applicato prima  $\hat{R}_{2\pi}$  su  $|+\rangle$  e poi su  $|-\rangle$ .

Le implicazioni di questo sono che gli stati a  $j$  intero e quelli a  $j$  semintero non interferiscono tra di loro. A questo punto, il valor medio di un operatore  $\hat{A}$  su uno stato composto dalla mistura di questi due, tipo  $|\psi_\omega\rangle = |+\rangle + e^{i\omega}|-\rangle$ , dipende singolarmente dal valor medio di  $\hat{A}$  su  $|+\rangle$  e su  $|-\rangle$ :

$$\langle\psi_\omega|\hat{A}|\psi_\omega\rangle = \langle+|\hat{A}|+\rangle + \langle-|\hat{A}|-\rangle$$

Questa è chiamata **regola di superselezione**.

### 2.11.5 Coefficienti di Clebsch-Gordan

Si considerano due sistemi a due livelli, 1 e 2, con momenti angolari fissati  $j_1, j_2$  rispettivamente. Hanno basi, rispettivamente,  $|j_1 m_1\rangle$  e  $|j_2 m_2\rangle$  di  $2j_1 + 1$  e  $2j_2 + 1$  elementi, mentre la base della composizione<sup>1</sup> è data da  $|j_1 j_2 m_1 m_2\rangle = |j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle$  e ha  $(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)$  elementi.

Si cerca un cambio di base da  $|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle$  a  $|j_1, j_2, J, M\rangle$ , con  $J$  riferito a  $\hat{J}^2 = \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2$  e  $M$  a  $\hat{J}_z = \hat{J}_{1,z} + \hat{J}_{2,z}$ , per sistema complessivo invariante rispetto

<sup>1</sup>La base della composizione di due sistemi è sempre il prodotto tensore delle basi, però quando vi è interazione, vi può essere la formazione di stati entangled che non sono esprimibili tramite stati di  $\mathcal{H}$ .

a rotazioni globali. È possibile usare gli autovalori di  $\hat{J}^2$  e  $\hat{J}_z$  come numeri quantici perché formano un set completo; questo si dimostra facendo vedere che  $\hat{J}_1^2, \hat{J}_2^2, \hat{J}^2, \hat{J}_z$  commutano, cosa che deriva direttamente dal fatto che  $[\hat{J}_1^2, \hat{J}_2^2] = 0$  e dal fatto che commutano anche  $\hat{J}^2, \hat{J}_z$ .

Sia  $N(J)$  numero di set indipendenti associati a  $J^1$  e  $n(M)$  numero di stati con autovalore  $M$ . Si ha:

$$n(M) = \sum_{J \geq |M|} N(J) \quad (2.11.8)$$

Questa implica che  $N(J) = n(J) - n(J + 1)$ . Inoltre, si ha che:

$$n(M) = \begin{cases} 0 & , |M| > j_1 + j_2 \\ j_1 + j_2 + 1 - |M| & , j_1 + j_2 \geq |M| \geq |j_1 - j_2| \\ 2 \min \{j_1, j_2\} + 1 & , |j_1 - j_2| \geq |M| \geq 0 \end{cases} \quad (2.11.9)$$

Allora

$$N(J) = n(J) - n(J + 1) \implies N(J) = \begin{cases} 1 & , |j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2 \\ 0 & , \text{altrimenti} \end{cases} \quad (2.11.10)$$

**ESEMPIO 2.2 — CASO  $j_1 = j_2 = 1$ .**

Si considera il caso  $j_1 = j_2 = 1$ , quindi  $m_1, m_2 = 1, 0, -1$ . Si calcola  $n(M)$ , che sarebbe il numero di stati con  $m_1, m_2$  tali che  $m_1 + m_2 = M$ . In questo caso  $-2 \leq M \leq 2$ , quindi si calcolano i seguenti.

- $n(2) = 1$ , perché l'unica combinazione che restituisce  $M = 2$  è  $m_1 = m_2 = 1$ .
- $n(1) = 2$  perché si può ottenere da  $(m_1, m_2) = (1, 0)$  o  $(0, 1)$ .
- $n(0) = 3$  perché si può ottenere da  $(0, 0)$ ,  $(1, -1)$  o  $(-1, 1)$ .

Conseguentemente si ha:

- $N(2) = n(2) - n(3) = 1 - 0 = 1$ ;
- $N(1) = n(1) - n(2) = 2 - 1 = 1$ ;
- $N(0) = n(0) - n(1) = 3 - 2 = 1$ .

Questo è servito a dimostrare che nella base  $|j_1 j_2 J M\rangle$ , ad ogni valore fissato di  $J$ , si ha un singolo set di  $M$  perché  $N(J)$  è al massimo 1 e i valori di  $J$  sono tali per cui  $|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$ .

---

<sup>1</sup>Con set si intende l'insieme degli stati che, a fissato  $J$ , hanno  $-J \leq M \leq J$  diverso.

Pertanto è possibile passare dalla base  $|j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle = |j_1 j_2 m_1 m_2\rangle$  alla base  $|j_1 j_2 JM\rangle$  perché quest'ultima è ben definita. La relazione tra le due basi è data dai **coefficienti di Clebsch-Gordan**:

$$\begin{aligned} |j_1 j_2 JM\rangle &= \sum_{m_1, m_2} |j_1 j_2 m_1 m_2\rangle \langle j_1 j_2 m_1 m_2 | j_1 j_2 JM\rangle \\ &\equiv \sum_{m_1, m_2} C_{j_1 j_2 m_1 m_2}^{JM} |j_1 j_2 m_1 m_2\rangle \end{aligned} \quad (2.11.11)$$

Questi coefficienti possono essere scelti reali tramite fasi per gli stati. La relazione si può invertire per scrivere  $|j_1 j_2 m_1 m_2\rangle$  tramite il complesso coniugato di  $C_{j_1 j_2 m_1 m_2}^{JM}$ . Per il seguito, **si assumeranno reali**.

Questi coefficienti, essendo trasformazioni unitarie, soddisfano le seguenti relazioni<sup>1</sup>:

$$\begin{aligned} \sum_{m_1, m_2} C_{j_1 j_2 m_1 m_2}^{JM} C_{j_1 j_2 m_1' m_2'}^{J'M'} &= \delta_{JJ'} \delta_{MM'} \\ \sum_{J, M} C_{j_1 j_2 m_1 m_2}^{JM} C_{j_1 j_2 m_1' m_2'}^{JM} &= \delta_{m_1 m_1'} \delta_{m_2 m_2'} \end{aligned} \quad (2.11.12)$$

### 2.11.6 Esempio – Coefficienti di Clebsch-Gordan per due spin 1/2

Si considera la composizione di due spin 1/2, cioè  $j_1 = j_2 = 1/2$ . In questo caso, la base data dal prodotto tensore è della forma

$$\left| \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \right\rangle \otimes \left| \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \right\rangle = \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \right\rangle$$

Si vogliono calcolare i coefficienti di Clebsch-Gordan per passare da  $\left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \right\rangle$  a  $\left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} JM \right\rangle$ .

Per iniziare, si considerano  $|j_1 j_2 JM\rangle = \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} 11 \right\rangle$  e  $\left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} 1 -1 \right\rangle$ ; dovendo avere  $M = 1, -1$ , l'unica possibilità è, rispettivamente,  $m_1 = m_2 = 1/2$  e  $m_1 = m_2 = -1/2$ , quindi, in entrambi i casi, i coefficienti di Clebsch-Gordan sono pari a 1:

$$\left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} 11 \right\rangle = C_{\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}}^{11} \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle = \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle \quad \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} 1 -1 \right\rangle = \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} -\frac{1}{2} -\frac{1}{2} \right\rangle$$

Si riprende l'operatore discesa  $\hat{J}_- = \hat{J}_x - i\hat{J}_y = \hat{J}_{1,-} + \hat{J}_{2,-}$ , che è tale per cui  $\hat{J}_- |JM\rangle = [(J-M+1)(J+M)]^{1/2} |J, M-1\rangle$ . Tramite questo, si possono calcolare

<sup>1</sup>Si ottengono sostituendo i coefficienti di una delle due equazioni (quelle per  $|j_1 j_2 m_1 m_2\rangle$  e  $|j_1 j_2 JM\rangle$  per il cambio di base) e imponendo che valga l'uguaglianza.

gli altri coefficienti:

$$\hat{J}_- \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} 11 \right\rangle = \sqrt{2} \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} 10 \right\rangle = (\hat{J}_{1,-} + \hat{J}_{2,-}) \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle^{(1)} \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle^{(2)} = \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right\rangle^{(1)} \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle + \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle^{(1)} \left| \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right\rangle^{(2)}$$

da cui

$$\left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} 10 \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle + \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right\rangle \right)$$

L'ultimo si trova per ortogonalità con gli altri ed è:

$$\left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} 00 \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right\rangle - \left| \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} \right\rangle \right)$$

Ricapitolando, i coefficienti di Clebsch-Gordan sono:

$$C_{\frac{1}{2} \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}}^{11} = 1 \quad C_{\frac{1}{2} \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \mp \frac{1}{2}}^{10} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad C_{\frac{1}{2} \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2} \mp \frac{1}{2}}^{00} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

e gli altri sono nulli.

### 2.11.7 Operatori tensoriali irriducibili

Si ricorda che

$$\langle j' m' | \hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) | j m \rangle = \delta_{jj'} D_{m' m}^j(\alpha, \beta, \gamma)$$

che è equivalente a

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) | j m \rangle = \sum_{m'} | j m' \rangle D_{m' m}^j(\alpha, \beta, \gamma)$$

**DEFINIZIONE 2.1 — OPERATORI TENSORIALI IRRIDUCIBILI.**

Si parla di **operatori tensoriali irriducibili** (ITO, *irreducible tensor operators*) riferendosi all'insieme di operatori  $\hat{T}_q^{(k)}$ ,  $-k \leq q \leq k$  (quindi sono  $2k + 1$  elementi) che soddisfano:

$$\hat{R}(\alpha, \beta, \gamma) \hat{T}_q^k \hat{R}^{-1}(\alpha, \beta, \gamma) = \sum_{q'} \hat{T}_{q'}^k D_{q' q}^k(\alpha, \beta, \gamma) \quad (2.11.13)$$

**ESEMPIO 2.3 — ITO SCALARI.**

Si considera  $\hat{T}_0^0$ ; allora:

$$\hat{R} \hat{T}_0^0 \hat{R}^{-1} = \hat{T}_0^0 D_{00}^0(\alpha, \beta, \gamma) = \hat{T}_0^0$$

cioè  $\hat{T}_0^0$  è un operatore scalare.

Sia  $\hat{V}$  un generico operatore vettoriale (tipo la posizione o il momento); se ne costruiscono gli ITO come segue:

$$\hat{T}_1^1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{V}_x + i\hat{V}_y) \quad \hat{T}_0^1 = \hat{V}_z \quad \hat{T}_{-1}^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\hat{V}_x - i\hat{V}_y) \quad (2.11.14)$$

Per definizione, si ha<sup>1</sup>:

$$\hat{R}\hat{T}_q^k\hat{R}^{-1} = \sum_{q'} \hat{T}_{q'}^k D_{q'q}^k = \sum_{q'} \hat{T}_{q'}^k \langle kq' | \hat{R} | kq \rangle$$

Si esprime  $\hat{R} = 1 - i\epsilon \hat{n} \cdot \hat{J}$  come rotazione infinitesima e, sostituendo, si trova:

$$\hat{T}_q^k - i\epsilon [\hat{n} \cdot \hat{J}, \hat{T}_q^k] = \hat{T}_q^k - i\epsilon \sum_{q'} \hat{T}_{q'}^k \langle kq' | \hat{n} \cdot \hat{J} | kq \rangle$$

da cui

$$[\hat{n} \cdot \hat{J}, \hat{T}_q^k] = \sum_{q'} \hat{T}_{q'}^k \langle kq' | \hat{n} \cdot \hat{J} | kq \rangle \quad (2.11.15)$$

Da questa relazione, si possono calcolare le regole di commutazione coi vari operatori di momento angolare definiti; ricordando la definizione di operatore di salita, per esempio

$$\begin{aligned} \hat{J}_+ |jm\rangle &= [j+m+1)(j-m)]^{1/2} |j, m+1\rangle \\ \Rightarrow [\hat{J}_+, \hat{T}_q^k] &= [(k-q)(k+q+1)]^{1/2} \hat{T}_{q+1}^k \end{aligned}$$

oppure

$$[\hat{J}_z, \hat{T}_q^k] = q\hat{T}_q^k$$

### 2.11.8 Teorema di Wigner-Eckart

Siano gli stati di un sistema generico della forma  $|\alpha JM\rangle$ ; volendo calcolare

$$\langle \alpha' J' M' | T_q^k | \alpha JM \rangle = C_{JkMq}^{J'M'} \langle \alpha' J' || T_q^k || \alpha J \rangle$$

dove  $C$  sono i coefficienti di Clebsch-Gordan. L'importanza del teorema sta nel fatto che tutta la dipendenza da  $M, M', q$  sta in  $C_{JkMq}^{J'M'}$  e risulta utile nel calcolare rapporti fra elementi di matrice.

<sup>1</sup>Si nota che qui  $k, q, q', \dots$  sono autostati della forma  $|jm\rangle$  del momento angolare.

**ESEMPIO 2.4.**

Si usa il teorema nel caso di un operatore scalare  $\hat{S}$  che è della forma  $T_0^0$ :

$$\langle \alpha' J' M' | \hat{S} | \alpha J M \rangle = C_{J0M0}^{J'M'} \langle \alpha' J' || \hat{S} || \alpha J \rangle$$

Visto che  $C_{J0M0}^{J'M'} = \langle J0M0 | J_1 J_2 | J M \rangle = \delta_{JJ'} \delta_{MM'}$ , si ha:

$$\langle \alpha' J' M' | \hat{S} | \alpha J M \rangle = \delta_{JJ'} \delta_{MM'} \langle \alpha' J' || \hat{S} || \alpha J \rangle$$

### 3 TEORIA DELLE PERTURBAZIONI



## 4 ESERCITAZIONI (23-24)

### 4.1 Sistemi a due livelli

#### 4.1.1 Descrizione generale

Sono sistemi i cui stati appartengono ad  $\mathcal{H}$ , con  $\dim \mathcal{H} = 2$ . Possibile base<sup>1</sup> è

$$\{|0\rangle, |1\rangle\} \equiv \{|\downarrow\rangle, |\uparrow\rangle\}, \text{ dove } |0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \equiv |\downarrow\rangle \text{ e } |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \equiv |\uparrow\rangle.$$

Dato  $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ , allora  $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$  e tali che  $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$  per normalizzazione  $\langle\psi|\psi\rangle \stackrel{!}{=} 1$ .

#### 4.1.2 Matrici di Pauli

Dovendo essere autoaggiunto, l'Hamiltoniano per sistemi simili è della forma

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} a & b \\ b^* & c \end{pmatrix}, \quad a, c \in \mathbb{R}, \quad b \in \mathbb{C} \quad (4.1.1)$$

Una base per i possibili Hamiltoniani è  $\mathcal{B} = \{\text{Id}, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}$ , dove  $\sigma_i$  sono **matrici di Pauli**:

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.1.2)$$

Autovalori e autovettori di, rispettivamente,  $\sigma_z, \sigma_x, \sigma_y$  sono:

- $v_{z,-} \equiv |0\rangle$  relativo a  $\lambda = -1$  e  $v_{z,+} \equiv |1\rangle$  relativo a  $\lambda = 1$ ;
- $v_{x,-} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  relativo a  $\lambda = -1$  e  $v_{x,+} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  relativo a  $\lambda = 1$ ;
- $v_{y,-} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$  relativo a  $\lambda = -1$  e  $v_{y,+} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$  relativo a  $\lambda = 1$ .

---

<sup>1</sup>Qui si sottintende una base sul campo complesso  $\mathbb{C}$ .

Le matrici di Pauli soddisfano le seguenti proprietà:

$$\sigma_\alpha \sigma_\beta = \delta_{\alpha\beta} + i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \sigma_\gamma \Rightarrow \begin{cases} [\sigma_\alpha, \sigma_\beta] \stackrel{\text{def}}{=} \sigma_\alpha \sigma_\beta - \sigma_\beta \sigma_\alpha = 2i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \sigma_\gamma \\ \{\sigma_\alpha, \sigma_\beta\} \stackrel{\text{def}}{=} \sigma_\alpha \sigma_\beta + \sigma_\beta \sigma_\alpha = 2\delta_{\alpha\beta} \text{Id} \end{cases} \quad (4.1.3)$$

$$\text{tr } \sigma_\alpha = 0$$

#### 4.1.3 Studio di un sistema a due livelli

Si considera  $\hat{H} = a\sigma_z + b\sigma_x$ , con  $a, b \in \mathbb{R}$ . Lo spettro è dato da:

$$0 \stackrel{!}{=} \det(\hat{H} - \lambda \text{Id}) = \begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ b & -a - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - a^2 - b^2$$

da cui  $\lambda_\pm = \pm\sqrt{a^2 + b^2}$ . Gli autostati normalizzati sono:

$$|v_\pm\rangle = \frac{1}{\left[2(1 + r^2 \mp r\sqrt{1 + r^2})\right]^{1/2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -r \pm \sqrt{1 + r^2} \end{pmatrix} \equiv A_\pm \begin{pmatrix} 1 \\ R_\pm \end{pmatrix}, \quad r = \frac{a}{b}$$

##### ESERCIZIO 4.1.

Si assume che il sistema si trovi in  $|v_+\rangle = A_+(|\uparrow\rangle + R_+|\downarrow\rangle)$ ; calcolare probabilità che stia in  $|\uparrow\rangle$ .

*Svolgimento.* La probabilità è data da  $|\langle\uparrow|v_+\rangle|^2 = A^2 \equiv P_\uparrow$ . ♠

##### ESERCIZIO 4.2.

Il sistema è ancora in  $|v_+\rangle$ ; indicando con  $|\rightarrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  e  $|\leftarrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$  gli autostati di  $\sigma_x$ , calcolare la probabilità di trovare il sistema in  $|\leftarrow\rangle$ .

*Svolgimento.* Si riscrive  $|v_+\rangle$  in termini di  $|\leftarrow\rangle, |\rightarrow\rangle$ :

$$|v_+\rangle = A_+ \left( \frac{1 + R_+}{\sqrt{2}} |\rightarrow\rangle + \frac{1 - R_+}{\sqrt{2}} |\leftarrow\rangle \right)$$

$$\text{quindi } P_\leftarrow = \left( A_+ \frac{1 - R_+}{\sqrt{2}} \right)^2. \quad \text{♠}$$

##### ESERCIZIO 4.3.

Calcolare valore di aspettazione di  $\sigma_z$  in  $|v_+\rangle$ .

*Svolgimento.* Essendo  $|v_+\rangle = A_+ (|\uparrow\rangle + R_+ |\downarrow\rangle) \Rightarrow \sigma_z |v_+\rangle = A_+ (|\uparrow\rangle - R_+ |\downarrow\rangle)$ . Inoltre  $\langle v_+| = A_+^* (\langle\uparrow| + R_+^* \langle\downarrow|) = A (\langle\uparrow| + R_+ \langle\downarrow|)$  visto che  $A_+, R_+ \in \mathbb{R}$ . Allora:

$$\langle v_+ | \sigma_z | v_+ \rangle = A^2 - A^2 R_+^2 = A^2 (1 - R_+^2)$$

♠

#### 4.1.4 Risonanza di spin

Nota: da vedere dopo aver visto dinamica degli operatori.

Si prende  $\mathbf{B} = B_0 \hat{z} + \mathbf{B}_1(t)$ , con  $\mathbf{B}_1(t) = \hat{x} B_1 \cos \omega t + \hat{y} B_1 \sin \omega t$ . Scegliendo come Hamiltoniano  $\hat{H} = -\gamma \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ , si ha:

$$\begin{aligned} \hat{H} &= -\gamma B_0 \hat{S}_z - \gamma B_1 \hat{\mathbf{S}} \cdot (\hat{x} B_1 \cos \omega t + \hat{y} B_1 \sin \omega t) \\ &= -\gamma B_0 \hat{S}_z - \gamma B_1 e^{-\frac{i}{\hbar} \omega t \hat{S}_z} \hat{S}_x e^{\frac{i}{\hbar} \omega t \hat{S}_z} \end{aligned} \quad (4.1.4)$$

L'ultima uguaglianza si può dimostrare per calcolo diretto, ma non si fa. Per risolvere  $i\hbar \partial_t |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(0)\rangle$ , si moltiplica per una fase  $e^{\frac{i}{\hbar} \omega t \hat{S}_z}$ :

$$\Rightarrow i\hbar e^{\frac{i}{\hbar} \omega t \hat{S}_z} \partial_t |\psi(t)\rangle = \left[ -\gamma B_0 \hat{S}_z e^{\frac{i}{\hbar} \omega t \hat{S}_z} - \hat{S}_x e^{\frac{i}{\hbar} \omega t \hat{S}_z} \right] |\psi(0)\rangle$$

Si prende  $|\phi\rangle = e^{\frac{i}{\hbar} \omega t \hat{S}_z} |\psi(t)\rangle$ , che equivale a mettersi in SR rotante; allora:

$$\begin{aligned} i\hbar \partial_t |\phi\rangle &= \underbrace{[-(\gamma B_0 + \omega) \hat{S}_z - \gamma B_1 \hat{S}_x]}_{\equiv \hat{H}_{\text{eff}}} |\phi\rangle \\ \Rightarrow |\phi\rangle &= e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}_{\text{eff}} t} |\phi\rangle \end{aligned} \quad (4.1.5)$$

con  $\hat{H}_{\text{eff}}$  indipendente dal tempo. Si riscrive

$$\hat{H}_{\text{eff}} = -\frac{1}{2} \hbar [(\omega_0 + \omega) \hat{\sigma}_z + \omega \hat{\sigma}_x], \quad \omega_0 = \gamma B_0 \text{ e } \omega_1 = \gamma B_1 \quad (4.1.6)$$

e si assume  $|\phi(0)\rangle = |\uparrow\rangle \Rightarrow |\psi(T)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} \omega T \hat{S}_z} e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}_{\text{eff}} T} |\uparrow\rangle$ . Ora si deve calcolare  $e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}_{\text{eff}} T}$ ; per farlo, si prende  $\hat{H}_{\text{eff}} = -\frac{1}{2} \hbar \alpha \hat{n} \cdot \hat{\sigma}$ , con  $\hat{n} = \frac{1}{\alpha} (\omega_1, 0, \omega_0 + \omega)$  e  $\alpha =$

$(\omega_1^2 + (\omega_0 + \omega)^2)^{1/2}$ . Allora:

$$e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_{\text{eff}}t} = e^{\frac{i}{2}\alpha t \hat{n} \cdot \hat{\sigma}} = \cos\left(\frac{\alpha t}{2}\right) \text{Id} + i(\hat{n} \cdot \hat{\sigma}) \sin\left(\frac{\alpha t}{2}\right)$$

$$= \begin{pmatrix} \cos \frac{\alpha t}{2} + i \frac{\omega_0 + \omega}{\alpha} \sin \frac{\alpha t}{2} & i \omega_1 \sin \frac{\alpha t}{2} \\ i \frac{\omega_1}{\alpha} \sin \frac{\alpha t}{2} & \cos \frac{\alpha t}{2} - i \frac{\omega_0 + \omega}{\alpha} \sin \frac{\alpha t}{2} \end{pmatrix} \equiv A \quad (4.1.7)$$

Da questa, si ottiene:

$$|\phi(t)\rangle = A |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} \cos \frac{\alpha t}{2} + i \frac{\omega_0 + \omega}{\alpha} \sin \frac{\alpha t}{2} \\ i \frac{\omega_1}{\alpha} \sin \frac{\alpha t}{2} \end{pmatrix} = A_{11} |\uparrow\rangle + A_{21} |\downarrow\rangle \quad (4.1.8)$$

quindi l'espressione per  $|\psi\rangle$  è:

$$|\psi(T)\rangle = e^{-\frac{i}{2}\omega T} A_{11} |\uparrow\rangle + e^{-\frac{i}{2}\omega T} |\downarrow\rangle \quad (4.1.9)$$

Se al tempo  $T$ , il campo magnetico rotante cessa:

$$|\psi(t)\rangle = e^{\frac{i}{2}\omega_0(t-T)} e^{-\frac{i}{2}\omega T} A_{11}(T) |\uparrow\rangle + e^{-\frac{i}{2}\omega_0(t-T)} e^{\frac{i}{2}\omega T} A_{12}(T) |\downarrow\rangle \quad (4.1.10)$$

**ESERCIZIO 4.4 — PROBABILITÀ CHE PER  $t > T$ , LA PARTICELLA SIA IN  $|\downarrow\rangle$ .**

Si ha:

$$P_{\downarrow} = |\langle \downarrow | \psi(t > T) \rangle|^2 = |A_{21}|^2 = \left| \omega_1 \frac{\sin(\alpha T/2)}{\alpha} \right|^2 \quad (4.1.11)$$

La dipendenza da  $T$  è data dal fatto che per  $t > T$ , il campo magnetico rotante che permette il passaggio da  $|\uparrow\rangle$  a  $|\downarrow\rangle$  cessa di agire. Inoltre, la probabilità ha massimo per  $T = \pi/\alpha$ , con

$$\frac{\omega_1^2}{(\omega_0 + \omega)^2 + \omega_1^2} \leq 1 \quad (4.1.12)$$

L'uguaglianza vale nel caso di risonanza, cioè per  $\omega = \omega_0$ .

## 4.2 Dinamica degli operatori

### 4.2.1 Dinamica di un sistema a due livelli

Si considera  $\hat{H} = -\hat{\boldsymbol{\mu}} \cdot \mathbf{B}$ , dove  $\mathbf{B} = (0, 0, B_0)$  e  $\hat{\boldsymbol{\mu}} = \gamma \hat{\mathbf{S}}$  e  $\hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar}{2} \hat{\boldsymbol{\sigma}}$  e  $\hat{\boldsymbol{\sigma}}$  vettore delle tre matrici di Pauli, quindi:

$$\hat{H} = -\gamma \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_z B_0 \quad (4.2.1)$$

Vista la forma di  $\hat{\sigma}_z$ ,  $\hat{H}$  ha autostati  $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ , con autovalori, rispettivamente,  $-\gamma \frac{\hbar}{2} B_0$  e  $\gamma \frac{\hbar}{2} B_0$ . Conseguentemente, se  $\gamma, B_0 > 0$ , lo stato fondamentale è  $|\uparrow\rangle$  (in quanto autostato dell'Hamiltoniano con autovalore più basso).

Si considera generico stato  $|\psi\rangle$  e si vuole scrivere evoluzione temporale a partire da  $|\psi_0\rangle = a_1 |\uparrow\rangle + a_2 |\downarrow\rangle$ , con  $|a_1|^2 + |a_2|^2 = 1$ ,  $a_1, a_2 \in \mathbb{C}$ . L'evoluzione è data da:

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= a_1 e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\uparrow} t} |\uparrow\rangle + a_2 e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\downarrow} t} |\downarrow\rangle \rightarrow \left[ a_1 e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\uparrow} t} |\uparrow\rangle + a_2 e^{-\frac{i}{\hbar} E_{\downarrow} t} |\downarrow\rangle \right] e^{\frac{i}{2\hbar} (E_{\uparrow} + E_{\downarrow}) t} \\ \Rightarrow |\psi(t)\rangle &= a_1 e^{i\omega_0 t/2} |\uparrow\rangle + a_2 e^{-i\omega_0 t/2} |\downarrow\rangle, \quad \omega_0 = \frac{E_{\downarrow} - E_{\uparrow}}{\hbar} \end{aligned} \quad (4.2.2)$$

dove freccia  $\rightarrow$  è per indicare la moltiplicazione per una fase.

Si calcolano valori medi delle componenti di  $\hat{\boldsymbol{\mu}}$ . Si nota che:

$$\langle \hat{\mu}_x \rangle = \gamma \frac{\hbar}{2} (a_1^* a_2 e^{-i\omega_0 t} + a_2^* a_1 e^{i\omega_0 t}) = \gamma \hbar \Re \{ a_2 a_1^* e^{-i\omega_0 t} \} \quad (4.2.3)$$

dove si è usato che  $\hat{\mu}_x = \gamma \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_x$  e come agisce  $\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  su  $|\uparrow\rangle$  e  $|\downarrow\rangle$  (eq. 4.3.4).

Prendendo, poi,  $a_1 = a_2 = 1/\sqrt{2}$ , si trova  $\hat{\mu}_x$  e analogamente anche gli altri:

$$\langle \hat{\mu}_x \rangle = \gamma \frac{\hbar}{2} \cos(\omega_0 t), \quad \langle \hat{\mu}_y \rangle = -\gamma \frac{\hbar}{2} \sin(\omega_0 t), \quad \langle \hat{\mu}_z \rangle = 0 \quad (4.2.4)$$

Infine:

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{\boldsymbol{\mu}} \rangle = -\frac{\omega_0 \hbar}{2} \gamma \begin{pmatrix} \sin \omega_0 t \\ \cos \omega_0 t \\ 0 \end{pmatrix} = \langle \hat{\boldsymbol{\mu}} \rangle \times \omega_0 \hat{\mathbf{z}} \quad (4.2.5)$$

#### 4.2.2 Dinamica di un sistema a due livelli tramite rappresentazione di Heisenberg

In questa:  $\hat{H} \rightarrow \hat{H}(t)$ . Dato operatore in rappresentazione di Shrödinger  $\hat{O}_S$ , in rappresentazione di Heisenberg diventa:

$$\langle \psi(t) | \hat{O}_S | \psi(t) \rangle = \left\langle \psi_0 \left| e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} \hat{O}_S e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} \right| \psi_0 \right\rangle \equiv \langle \psi_0 | \hat{O}_H | \psi_0 \rangle \Rightarrow \hat{O}_H = e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} \hat{O}_S e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t}$$

Conseguentemente:

$$\frac{d}{dt} \hat{O}_H = \frac{i}{\hbar} \hat{H} e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} \hat{O}_S e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} - \frac{i}{\hbar} \hat{H} e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} \hat{O}_S e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} \equiv \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{O}_H] \quad (4.2.6)$$

Per gli operatori di seguito, si sottintende che sono in rappresentazione di Heisenberg. Per calcolare  $\frac{d}{dt} \hat{u}_x$ , bisogna calcolare  $\frac{d}{dt} \hat{S}_x = \frac{i}{\hbar} [\hat{H}, \hat{S}_x]$  per la formula sopra. Essendo  $\hat{H} \propto \hat{S}_z$  e  $[\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar \hat{S}_y$ , si ottiene facilmente il risultato.

Considerando  $\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$ , invece, si ottiene il risultato più generale per cui  $[\hat{H}, \hat{S}_x] = B_y [\hat{S}_y, \hat{S}_x] + B_z [\hat{S}_z, \hat{S}_x] = i\hbar (B_z \hat{S}_y - B_y \hat{S}_z)$ . Questa si generalizza a:

$$\frac{d}{dt} \hat{\mathbf{S}} = \hat{\mathbf{S}} \times \gamma \mathbf{B} \quad (4.2.7)$$

#### 4.2.3 Metodo di soluzione alternativo

Si considera solito  $\hat{H} = -\gamma \mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{S}}$  e generico stato  $|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} |\psi(0)\rangle$ , con  $|\psi(0)\rangle$  dato. Si riscrive  $e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H} t} = e^{\frac{i}{2} \mathbf{B} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}} t} = e^{i\alpha \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}}$ , con  $\hat{\mathbf{n}} = \frac{1}{|\mathbf{B}|} (B_x, B_y, B_z)$  e  $\alpha = \frac{|\mathbf{B}| t}{2}$ . Usando questa espressione:

$$e^{i\alpha \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}}} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(i\alpha \hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}})^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(i\alpha)^k}{k!} (\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}})^k$$

Si svolge calcolo per  $k = 2$  ad esempio:  $(\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}})^2 = \sum_{i,j} n_i n_j \sigma_i \sigma_j$ . Essendo che  $[\sigma_\alpha, \sigma_\beta] = 2i\epsilon_{\alpha\beta\gamma} \sigma_\gamma$  e  $\{\sigma_\alpha, \sigma_\beta\} = 2\delta_{\alpha\beta} \text{Id}$ , allora:

$$\sigma_\alpha \sigma_\beta = \text{Id} \delta_{\alpha\beta} + i \sum_{\gamma} \epsilon_{\alpha\beta\gamma} \sigma_\gamma \Rightarrow (\hat{\mathbf{n}} \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}})^2 = \sum_{\alpha,\beta} n_\alpha n_\beta (\text{Id} \delta_{\alpha\beta} + i\epsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{\sigma}_\gamma) \quad (4.2.8)$$

Si nota che  $\sum_{\alpha,\beta} n_\alpha n_\beta (i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{\sigma}_\gamma) = 0$  perché  $n_\alpha n_\beta$  è simmetrico per scambio di indici, mentre  $\varepsilon_{\alpha\beta\gamma}$  è antisimmetrico, perciò la somma è nulla. Allora:

$$(\hat{n} \cdot \hat{\sigma})^2 = \sum_{\alpha,\beta} n_\alpha n_\beta \text{Id } \delta_{\alpha\beta} = (\hat{n} \cdot \hat{n}) \text{Id} = \text{Id} \quad (4.2.9)$$

Quindi:

$$(\hat{n} \cdot \hat{\sigma})^k = \begin{cases} \hat{n} \cdot \hat{\sigma} & , k \text{ pari} \\ \text{Id} & , k \text{ dispari} \end{cases} \quad (4.2.10)$$

Allora:

$$e^{i\alpha \hat{n} \cdot \hat{\sigma}} = \text{Id} \cos \alpha + i \hat{n} \cdot \hat{\sigma} \sin \alpha \quad (4.2.11)$$

Ritornando all'evoluzione temporale, questa si scrive come:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}t} |\psi(0)\rangle = \left[ \cos\left(\frac{|\mathbf{B}|t}{2}\right) \text{Id} + i \sin\left(\frac{|\mathbf{B}|t}{2}\right) \hat{n} \cdot \hat{\sigma} \right] |\psi(0)\rangle \quad (4.2.12)$$

Quindi per operatore di spin in rappresentazione di Heisenberg:

$$\begin{aligned} \hat{S}_x(t) &= e^{\frac{i}{\hbar} \hat{H}t} S_x(0) e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}t} \\ &= \left[ \cos\left(\frac{|\mathbf{B}|t}{2}\right) \text{Id} - i \sin\left(\frac{|\mathbf{B}|t}{2}\right) \hat{n} \cdot \hat{\sigma} \right] S_x(0) \left[ \cos\left(\frac{|\mathbf{B}|t}{2}\right) \text{Id} + i \sin\left(\frac{|\mathbf{B}|t}{2}\right) \hat{n} \cdot \hat{\sigma} \right] \end{aligned} \quad (4.2.13)$$

### 4.3 Sistema composto da due sottosistemi a due livelli

I due sottosistemi si indicano con 1 e 2, quindi  $|\psi_1\rangle$  sarà stato del primo e  $|\psi_2\rangle$  sarà stato del secondo.

Si considera sistema con Hamiltoniano  $\hat{H} = J \sigma_1 \cdot \sigma_2$ , con  $J \in \mathbb{R}$  e  $\sigma_i = (\sigma_{i,x}, \sigma_{i,y}, \sigma_{i,z})$ , mentre il prodotto, invece, è definito da:

$$\sigma_1 \cdot \sigma_2 \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=\{x,y,z\}} \sigma_{1,i} \otimes \sigma_{2,i} \quad (4.3.1)$$

**DEFINIZIONE 4.1 — PRODOTTO TENSORE TRA MATRICI.**

Il prodotto tensore tra due matrici, rispettivamente di dimensioni  $m \times n$  e  $p \times q$ , restituisce una matrice di dimensioni  $pm \times qn$  definita come:

$$A \otimes B \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix} \quad (4.3.2)$$

dove ogni prodotto  $a_{ij}B$  è blocco dato dal prodotto della matrice  $B$  per lo scalare  $a_{ij}$ .

Si assume che i due sottosistemi non interagiscono fra loro, quindi ogni operatore agisce sul proprio stato e la base di  $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$  è semplicemente  $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \otimes \mathcal{B}_2$ , ossia:

$$\mathcal{B} = \{|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle\} \quad (4.3.3)$$

Si vuole rappresentare  $\mathcal{H}$  in forma matriciale. Usando:

$$\begin{aligned} \sigma_x |\uparrow\rangle &= |\downarrow\rangle, \quad \sigma_x |\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle \\ \sigma_y |\uparrow\rangle &= i |\downarrow\rangle, \quad \sigma_y |\downarrow\rangle = -i |\uparrow\rangle \\ \sigma_z |\uparrow\rangle &= |\uparrow\rangle, \quad \sigma_z |\downarrow\rangle = -|\downarrow\rangle \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \hat{H} |\uparrow\uparrow\rangle &= J |\uparrow\uparrow\rangle, \quad \hat{H} |\downarrow\downarrow\rangle = J (2 |\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \\ \hat{H} |\uparrow\downarrow\rangle &= J (2 |\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\downarrow\rangle), \quad \hat{H} |\downarrow\uparrow\rangle = J |\downarrow\downarrow\rangle \end{aligned} \quad (4.3.4)$$

si ha:

$$H = J \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4.3.5)$$

#### 4.3.1 Spettro dell'Hamiltoniano

Ci si restringe al blocco centrale:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -J & 2J \\ 2J & -J \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} -J - \lambda & 2J \\ 2J & -J - \lambda \end{pmatrix} \Rightarrow (J + \lambda - 2J)(J + \lambda + 2J) \stackrel{!}{=} 0 \\ &\Rightarrow \lambda_1 = J, \quad \lambda_2 = -3J \end{aligned} \quad (4.3.6)$$

Quindi gli autovalori sono  $E = J, J, J, -3J$ . Da questi, si ottengono gli autostati che, normalizzati, sono:

$$\left\{ |\uparrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle, \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} \right\} \quad (4.3.7)$$

dove i primi 3 sono *stati di tripletto*, mentre l'ultimo è di *singoletto*. Questi, in ordine, hanno autovalori  $J, J, J, -3J$ .



#### 4.3.2 Matrice densità

Si vuole scrivere  $\rho_\psi$  per l'autostato  $\psi \equiv \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}$ :

$$\begin{aligned}\rho_\psi &= |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle)(\langle\uparrow\downarrow| - \langle\downarrow\uparrow|) \\ &= \frac{1}{2}(|\uparrow\downarrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| - |\uparrow\downarrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| - |\downarrow\uparrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| + |\downarrow\uparrow\rangle\langle\downarrow\uparrow|) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}\quad (4.3.8)$$

da cui si nota che  $\rho = \rho^\dagger$  e  $\text{tr } \rho = 1$ . Per vedere se lo stato è puro, si calcola:

$$\text{tr } \rho^2 = \frac{1}{4} \text{tr} \left[ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \right] = \frac{1}{4} \text{tr} \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = 1 \equiv \text{tr } \rho \quad (4.3.9)$$

quindi lo stato è puro.

Si restringe  $\rho_\psi$  a  $\rho_\psi^{(1)} = \text{tr}^{(2)} \rho_\psi$ :

$$\begin{aligned}\rho_\psi^{(1)} &= \sum_j \langle j | \rho_\psi | j \rangle = \langle \uparrow |^{(2)} \rho | \uparrow \rangle^{(2)} + \langle \downarrow |^{(2)} \rho | \downarrow \rangle^{(2)} \\ &= \frac{1}{2} \langle \uparrow |^{(2)} (|\uparrow\downarrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| - |\uparrow\downarrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| - |\downarrow\uparrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| + |\downarrow\uparrow\rangle\langle\downarrow\uparrow|) | \uparrow \rangle^{(2)} + \\ &\quad + \frac{1}{2} \langle \downarrow |^{(2)} (|\uparrow\downarrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| - |\uparrow\downarrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| - |\downarrow\uparrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| + |\downarrow\uparrow\rangle\langle\downarrow\uparrow|) | \downarrow \rangle^{(2)} \\ &= \frac{1}{2} |\uparrow\rangle\langle\uparrow| + \frac{1}{2} |\downarrow\rangle\langle\downarrow| = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\end{aligned}\quad (4.3.10)$$

dove si è usato il fatto che  $|\uparrow\rangle$  e  $|\downarrow\rangle$  sono ortonormali. Si nota che i sistemi 1, 2 sono entangled perché:

$$(\rho^{(1)})^2 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{tr } (\rho^{(1)})^2 = \frac{1}{2} \neq 1$$

Conoscendo  $\rho^{(1)}$ , ogni operatore  $\sigma_{1,i}$  che agisce su 1 è t.c.  $\langle \sigma_{1,i} \rangle = \text{tr}(\rho^{(1)}) \sigma_{1,i}$ .

#### 4.4 Buca di potenziale $V_0$

Si considera

$$V(x) = \begin{cases} 0 & , |x| > \frac{a}{2} \\ -V_0 & , |x| \leq \frac{a}{2} \end{cases}, \quad a \in \mathbb{R}^{>0}$$

L'Hamiltoniano è  $\hat{H} = \hat{p}^2/2m + V(\hat{x})$  e si risolve  $\hat{H}\psi(x) = E\psi(x)$ , ossia

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\partial_x^2\psi(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \quad (4.4.1)$$

*Svolgimento.* Si assume  $E > 0$ . Fuori dalla buca ( $|x| > a/2$ ) vale  $V(x) = 0$ , quindi:

$$\psi_{\text{out}}(x) = A \exp\left(i\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}x\right) + B \exp\left(-i\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}x\right) \quad (4.4.2)$$

Se  $|x| = a/2$ , invece, si ha:

$$\psi_{\text{bound}}(x) = A' \exp\left(i\frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}x\right) + B' \exp\left(-i\frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}x\right) \quad (4.4.3)$$

Si rigetta, allora, la possibilità  $E > 0$  perché si è interessati al caso di **stati legati**.

D'ora in avanti, si considererà  $E < 0$ . Si nota, inoltre, che  $E \geq -V_0$  perché:

$$\begin{aligned} \frac{\hat{p}^2}{2m}|\psi\rangle + V(\hat{x})|\psi\rangle &= E|\psi\rangle \implies \left\langle\psi\left|\frac{\hat{p}^2}{2m}\right|\psi\right\rangle + \langle\psi|V(\hat{x})|\psi\rangle = E \\ \implies \left\langle\psi\left|\frac{\hat{p}^2}{2m}\right|\psi\right\rangle + \int_{-\infty}^{+\infty} dx \psi^*(x)V(x)\psi(x) &\geq \left\langle\psi\left|\frac{\hat{p}^2}{2m}\right|\psi\right\rangle + \min_x V(x) \int_{-\infty}^{+\infty} dx |\psi(x)|^2 \end{aligned}$$

Per condizione di normalizzazione, si trova che:

$$E \geq \left\langle\frac{\hat{p}^2}{2m}\right\rangle + \min_x V(x) \implies E \geq \min_x V(x) \equiv -V_0 \quad (4.4.4)$$

Si è interessati al caso di una particella all'interno della buca di potenziale, la cui posizione decresce esponenzialmente al di fuori, pertanto il range di interesse è  $-V_0 \leq E < 0$ .

- Soluzione fuori dalla buca.

Qui  $V(x) = 0$ , quindi la funzione d'onda è della forma  $\psi(x) = Ae^{\lambda x} + Be^{-\lambda x}$ , con  $\lambda = \frac{1}{\hbar}\sqrt{2m(-E)}$ <sup>1</sup>. Si indicherà la soluzione per  $|x| < a/2$  con 1 e con 3 quella per  $|x| > a/2$ .

- Soluzione nella buca.

Qui  $V(x) = -V_0$ , quindi per  $\eta = \frac{\sqrt{2m(E+V_0)}}{\hbar}$ , si ha  $\psi(x) = A_2e^{i\eta x} + B_2e^{-i\eta x}$ . Visto che  $E > -V_0 \implies \eta > 0$ .

---

<sup>1</sup>Si nota che  $-E > 0$ , quindi  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

Si devono raccordare le soluzioni. Intanto si eliminano i termini non fisicamente pertinenti, come  $B_1 e^{-\lambda x}$  e  $A_3 e^{\lambda x}$  perché fanno divergere le soluzioni. Le condizioni di raccordo sono:

$$\begin{aligned}\psi_1\left(-\frac{a}{2}\right) &= \psi_2\left(-\frac{a}{2}\right) ; \quad \psi_1'\left(-\frac{a}{2}\right) = \psi_2'\left(-\frac{a}{2}\right) \\ \psi_2\left(\frac{a}{2}\right) &= \psi_3\left(\frac{a}{2}\right) ; \quad \psi_2'\left(\frac{a}{2}\right) = \psi_3'\left(\frac{a}{2}\right)\end{aligned}$$

Da quelle nella prima riga, si ha  $A_1 e^{-\lambda \frac{a}{2}} = A_2 e^{i\eta \frac{a}{2}} + B_2 e^{-i\eta \frac{a}{2}}$  e  $\lambda A_1 e^{\lambda \frac{a}{2}} = i\eta A_2 e^{i\eta} - i\eta B_2 e^{-i\eta \frac{a}{2}}$ . Risolvendo per  $A_2, B_2$ :

$$A_2 = \frac{i\eta + \lambda}{2i\eta} A_1 e^{-(\lambda - i\eta)\frac{a}{2}} ; \quad B_2 = \frac{i\eta - \lambda}{2i\eta} A_1 e^{-(\lambda + i\eta)\frac{a}{2}}$$

In modo analogo, dalle altre si ottengono due espressioni per  $B_3$ :

$$B_3 = \begin{cases} \left( e^{i\eta a} \frac{\lambda + i\eta}{2i\eta} - e^{-i\eta a} \frac{\lambda - i\eta}{2i\eta} \right) A_1 \\ \left( -e^{i\eta a} \frac{\lambda + i\eta}{2\lambda} - e^{-i\eta a} \frac{\lambda - i\eta}{2\lambda} \right) A_1 \end{cases} \Rightarrow e^{i\eta a} \frac{\lambda^2 + 2i\lambda\eta - \eta^2}{2i\lambda\eta} = e^{-i\eta a} \frac{\lambda^2 - 2i\lambda\eta - \eta^2}{2i\lambda\eta}$$

da cui

$$e^{2i\eta a} \frac{(\lambda + i\eta)^2}{(\lambda - i\eta)^2} = 1 \Rightarrow \frac{\lambda - i\eta}{\lambda + i\eta} = \pm e^{i\eta a} \quad (4.4.5)$$

Si distinguono i casi negativo (caso a) e positivo (caso b).

- Caso a.

La condizione si riscrive come:

$$\begin{aligned}\frac{\lambda/\eta - i}{\lambda/\eta + i} &= -e^{i\eta a} \Rightarrow \frac{\lambda}{\eta}(1 + e^{i\eta}) = i(1 - e^{i\eta a}) \\ \Rightarrow \frac{\lambda}{\eta} &= \tan\left(\frac{\eta a}{2}\right)\end{aligned} \quad (4.4.6)$$

In questo caso, i coefficienti verificano

$$\frac{A_1}{B_3} = -e^{i\eta a} \frac{\lambda + i\eta}{\lambda - i\eta} = 1 ; \quad \frac{A_2}{B_2} = e^{i\eta a} \frac{\lambda + i\eta}{2i\eta} = 1$$

cioè le autofunzioni sono simmetriche rispetto allo zero, quindi sono pari:

$\psi_a(x) = \psi_a(-x)$ . In definitiva:

$$\psi_a(x) = \begin{cases} A_1 e^{\lambda x} & , x < -a/2 \\ B_2(e^{i\eta x} + e^{-i\eta x}) = 2B_2 \cos(\eta x) & , |x| < a/2 \\ A_1 e^{-\lambda x} & , x > a/2 \end{cases} \quad (4.4.7)$$

- Caso b.

Analogamente, al caso precedente, si ottiene:

$$\frac{\lambda}{\eta} = -\frac{1}{\tan\left(\frac{\eta a}{2}\right)} \quad (4.4.8)$$

Questa volta si ha  $\frac{A_1}{B_3} = -1$  e  $\frac{A_2}{B_2} = -1$ , quindi  $\psi_b(x) = -\psi_b(-x)$ . In definitiva:

$$\psi_b(x) = \begin{cases} A_1 e^{\lambda x} & , x < -a/2 \\ B_2(e^{i\eta x} - e^{-i\eta x}) = 2iB_2 \sin(\eta x) & , |x| < a/2 \\ -A_1 e^{-\lambda x} & , x > a/2 \end{cases} \quad (4.4.9)$$

♠

#### 4.4.1 Buca di potenziale con parità

Si risolve problema della sezione precedente usando l'operatore parità.

*Svolgimento.* Invece di verificare alla fine le proprietà di parità delle autofunzioni, si poteva osservare fin da subito che, dato  $\hat{\mathcal{P}}$  operatore di parità rispetto allo zero, si ha  $[\hat{\mathcal{P}}, V(\hat{x})] = 0$ , il che è sufficiente per dire che:

$$[\hat{\mathcal{P}}, \hat{H}] = 0 \quad (4.4.10)$$

Questo implica che esiste una base comune di autovettori di  $\hat{\mathcal{P}}, \hat{H}$ , quindi le autofunzioni cercate devono avere parità definita<sup>1</sup>, quindi, rispetto a  $\hat{\mathcal{P}}$ , avere autovalore +1 o -1 a seconda se sono pari o dispari rispettivamente.

Questo si traduce in  $A_1 = B_3$  e  $A_2 = B_2$  per parità positiva e  $A_1 = -B_3$  e  $A_2 = -B_2$  per parità negativa. In questo modo, si trovano subito le equazioni 4.4.7 e 4.4.9, dalle quali si ricavano le equazioni 4.4.6 e 4.4.8. ♠

---

<sup>1</sup>Con questo, si intende che devono essere o pari o dispari rispetto a 0.

#### 4.4.2 Spettro energetico

Si cercano i livelli energetici. Per autofunzioni pari, bisogna imporre contemporaneamente:

$$\begin{aligned} \lambda &= \eta \tan\left(\eta \frac{a}{2}\right) \\ k_0 &\equiv \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} = \sqrt{\lambda^2 + \eta^2} \Rightarrow \eta \tan\left(\eta \frac{a}{2}\right) = \sqrt{k_0^2 - \eta^2} \end{aligned} \quad (4.4.11)$$

Nel caso dispari, analogamente si ha:

$$\begin{aligned} \lambda &= \frac{-\eta}{\tan\left(\eta \frac{a}{2}\right)} \Rightarrow \frac{-\eta}{\tan\left(\eta \frac{a}{2}\right)} = \sqrt{k_0^2 - \eta^2} \\ k_0 &= \sqrt{\lambda^2 + \eta^2} \end{aligned} \quad (4.4.12)$$

Queste non sono facilmente risolubili analiticamente e si usa metodo grafico come mostrato di seguito: Si nota che a prescindere dai parametri del sistema,




Figura 1: Rappresentazione grafica dell'intersezione delle condizioni. Soluzioni pari in linea continua, mentre soluzioni dispari in linea tratteggiata.

esisterà sempre un'energia fondamentale relativa al primo stato pari. Detti  $P, D$  numeri delle soluzioni, rispettivamente, pari e dispari, si ha  $N = P + D$  numero complessivo di autofunzioni, dalla figura si nota che:

$$\begin{aligned} P &= \left\lceil \frac{k_0 a}{2\pi} \right\rceil = 1 + \max_{n \in \mathbb{N}} \left\{ n : \frac{2\pi}{a} n \leq k_0 \right\} \\ D &= \left\lfloor \frac{1}{2} \left( \frac{k_0 a}{\pi} - 1 \right) \right\rfloor = \max_{n \in \mathbb{N}} \left\{ n : \frac{(2n+1)\pi}{a} \leq k_0 \right\} \\ N &= \left\lceil \frac{k_0 a}{\pi} \right\rceil = 1 + \max_{n \in \mathbb{N}} \left\{ n : \frac{\pi}{a} n \leq k_0 \right\} \end{aligned} \quad (4.4.13)$$

#### 4.4.3 Buca di potenziale infinita

Si manda  $V_0 \rightarrow \infty$ , per cui  $k_0 = \sqrt{2mV_0/\hbar^2} \rightarrow +\infty$ . Per questo motivo, le soluzioni (sia pari che dispari) coincidono con gli asintoti:

$$\lambda'_n = \begin{cases} \frac{2n+1}{a}\pi & , \text{ caso pari} \\ \frac{2n}{a}\pi & , \text{ caso dispari} \end{cases} \quad (4.4.14)$$

A queste, corrispondono i livelli energetici  $E_n = \frac{\hbar^2 \lambda'^2}{2m} - V_0$ , quindi si deve risolvere il problema di  $V_0 \rightarrow \infty$  in questa espressione.

Per correggere espressione, si considera il problema speculare in cui:

$$V(x) = \begin{cases} +\infty & , |x| > a/2 \\ 0 & , |x| \leq a/2 \end{cases}$$

La soluzione è data da

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = E\psi(x), |x| \leq \frac{a}{2} \Rightarrow \psi(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx) \quad (4.4.15)$$

e  $k = \sqrt{2mE/\hbar^2}$ ; dall'imposizione che  $\psi(x) = 0, |x| > a/2$ , si deve imporre  $\psi(\pm a/2) = 0$ . Così facendo, si trovano due famiglie di soluzioni:

- soluzioni pari date da  $\cos(k_n x)$  con  $k_n = 2n\pi/a$ ;
- soluzioni dispari date da  $\sin(k_n x)$  con  $k_n = (2n+1)\pi/a$ .

Si unificano scrivendo  $k_n = n\pi/a$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Allora  $E_n = \frac{\hbar^2 k_n^2}{2m} = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}$ . La normalizzazione impone che i coefficienti delle soluzioni siano  $\sqrt{2/a}$ .

#### 4.5 Positronio (prova d'esame)

Il sistema consiste di un elettrone e un positrone legati insieme da potenziale di Coulomb  $U(r) = -k/r$ , con  $k = e^2$ .

(1). **Scrivere l'Hamiltoniano del sistema ed elencare le quantità conservate.**

Si ha  $\hat{H} = \frac{\hat{p}_1^2}{2m} + \frac{\hat{p}_2^2}{2m} - \frac{k}{\hat{r}}$ . Visto che  $\hat{H}$  non dipende dal tempo, si conserva. L'Hamiltoniano è anche invariante sotto traslazioni globali  $\Rightarrow$  si conserva l'impulso del CM ed è invariante per rotazioni, quindi si conserva il momento angolare.

- (2). **Scrivere l'Hamiltoniano in coordinate del CM e relativa, poi trovare le energie degli stati legati del sistema.**

Nel CM, l'Hamiltoniano diventa:  $\hat{H} = \frac{\hat{p}_{\text{CM}}^2}{2M} + \frac{\hat{p}_r^2}{2\mu} - \frac{k}{\hat{r}}$ , con  $M = 2m$  e  $\mu = m/2$ . Allora il CM compie un moto libero, essendo che il potenziale dipende solo dalla coordinata relativa; si osserva meglio notando che l'Hamiltoniano si può disaccoppiare:

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_{\text{CM}}^2}{2M} + \left( \frac{\hat{p}_r^2}{2\mu} - \frac{k}{\hat{r}} \right) \Rightarrow \hat{H} = \hat{H}_{\text{CM}} + \hat{H}_r$$

dove  $\hat{H}_{\text{CM}}$  non contiene alcun potenziale, quindi il centro di massa compie moto libero. Essendo  $\hat{H}$  separabile nelle due coordinate, la funzione d'onda si può scrivere come  $\psi = \psi_{\text{CM}}\psi_r$ , con  $\psi_{\text{CM}} = e^{i\mathbf{k}_{\text{CM}} \cdot \mathbf{x}_{\text{CM}}}$  e  $\mathbf{k}_{\text{CM}} = \frac{\mathbf{p}_{\text{CM}}}{\hbar}$ . Per il seguito, quindi, si studia solamente  $\psi_r$ .

Quanto ad  $\hat{H}_r$ , questo è lo stesso Hamiltoniano studiato nel caso dell'atomo di idrogeno, quindi, con l'accortezza di sostituire  $m_e \rightarrow \mu$ , si ha:

$$E_n = -\frac{\mu k^2}{2(\hbar n)^2} \quad (4.5.1)$$

- (3). **Ricavare funzione d'onda dello stato fondamentale e calcolare il raggio quadratico medio.**

Riprendendo trattazione dell'atomo di idrogeno, ogni autostato è della forma  $|n, \ell, m\rangle$ , con  $\ell$  associato a  $\hat{L}^2$  e  $m$  associato a  $\hat{L}_z$ , ossia  $\hat{L}^2 |n, \ell, m\rangle = \ell(\ell+1) |n, \ell, m\rangle$  e  $\hat{L}_z |n, \ell, m\rangle = m |n, \ell, m\rangle$ . Si ricorda che  $-\ell \leq m \leq +\ell$ , quindi lo stato fondamentale sarà non-degenere, mentre gli altri sì e con degenerazione pari a  $n^2$ , visto che, fissato  $n$ , si ha  $\ell = 0, \dots, n-1$  e  $m \in [-\ell, \ell]$ :

$$\text{deg}(|n, \ell, m\rangle) = \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell+1) = n^2$$

dove  $2\ell+1$  sono i valori di  $m$ . In generale, nella rappresentazione delle coordinate,  $\psi_{n,\ell,m}(r, \theta, \varphi) = R_{n\ell}(r)Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$ ; si è interessati a  $|1, 0, 0\rangle$ , associato a  $R_{10}(r)Y_{00}(\theta, \varphi)$ , dove:

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad R_{10} = \frac{2}{r_B^{3/2}} e^{-r/r_B}$$

in cui  $r_B = \hbar/(\mu\alpha c)$  è il raggio di Bohr.

Per il raggio quadratico medio

$$r_p = \sqrt{\langle |\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|^2 \rangle}$$

con  $|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2| \equiv r$ , si ha:

$$\begin{aligned} \langle r^2 \rangle &= \langle 100 | r^2 | 100 \rangle = \int d^3x \psi_{100}^*(\mathbf{x}) r^2 \psi_{100}(\mathbf{x}) = \int_0^{+\infty} dr r^4 \int_0^\pi d\theta \sin \theta \int_0^{2\pi} d\varphi |Y_{00}|^2 |R_{10}|^2 \\ &= \int_0^{+\infty} dr r^4 \int_{-1}^{+1} d(\cos \theta) \int_0^{2\pi} d\varphi |Y_{00}|^2 \frac{4}{r_B^3} e^{-2r/r_B} = \frac{4}{r_B^3} \int_0^{+\infty} r^4 e^{-2r/r_B} dr \end{aligned}$$

dove si è usato che  $Y_{\ell m}(\theta, \varphi)$  è correttamente normalizzata. L'integrale rimanente si può risolvere per parti, oppure notando che per  $\alpha = r/r_B$  si ha  $\frac{d^4}{d\alpha^4} e^{-\alpha r} = r^4 e^{-\alpha r}$ , quindi:

$$\langle r^2 \rangle = 3r_B^2 \Rightarrow r_p = \sqrt{3}r_B \quad (4.5.2)$$

- (4). **Ripetere il punto (3) per i primi stati eccitati con  $n = 2$ , corrispondenti a  $\ell = 1$  e  $\ell = 0$ .** Si ha:

$$R_{20} = \frac{1}{\sqrt{2}r_B^{3/2}} \left( 1 - \frac{r}{2r_B} \right) e^{-r/(2r_B)}; \quad R_{21} = \frac{1}{\sqrt{24}r_B^{3/2}} \frac{r}{r_B} e^{-r/(2r_B)}$$

Le armoniche sferiche non sono date perché tanto sono normalizzate, quindi non rientrano nel calcolo, esattamente come nel punto precedente. Come prima:

$$\begin{aligned} \langle r^2 \rangle_{200} &= \int r^2 |\psi_{200}|^2 d^3x = \int_0^{+\infty} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} r^2 |\psi_{200}|^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= \int_0^{+\infty} r^4 R_{20}^2 dr = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{r^4}{r_B^3} \left( 1 - \frac{r}{2r_B} \right)^2 e^{-r/r_B} dr = \frac{r_B^2}{2} \int_0^{+\infty} u^4 \left( 1 - \frac{u}{2} \right)^2 e^{-u} du \\ &= \frac{r_B^2}{2} \int_0^{+\infty} \left( u^4 - u^5 + \frac{u^6}{4} \right) e^{-u} du = \frac{r_B^2}{2} \left( 4! - 5! + \frac{6!}{4} \right) = 42r_B^2 \end{aligned}$$

dove si è preso  $u = \alpha r$ .

Per gli stati  $|2, 1, m\rangle$ , invece, per il fatto che l'integrale del raggio quadratico medio coinvolge una grandezza indipendente da  $m$ , il risultato è analogo



per tutti gli stati al variare di  $m = -1, 0, 1$ . Ripetendo un calcolo analogo, si trova  $\langle r^2 \rangle_{21} = 30r_B^2$ .

- (5). **Scrivere funzione d'onda in SR in moto con velocità  $V = v\hat{x}$  costante rispetto al CM.**

Occorre compiere una traslazione sull'impulso del centro di massa. L'operatore unitario che compie tale traslazione è  $\hat{U} = e^{\frac{i}{\hbar}p\hat{X}_{\text{CM}}} = e^{\frac{i}{\hbar}MV\hat{X}_{\text{CM}}}$ , quindi:

$$\psi \rightarrow e^{\frac{i}{\hbar}MV\hat{X}_{\text{CM}}}\psi \quad (4.5.3)$$

- (6). **Il positronio può decadere in due fotoni. Si assume che questo possa avvenire quando la distanza tra le due particelle è minore della lunghezza d'onda Compton  $\lambda = \alpha r_B$ . Valutare la probabilità dell'evento nello stato fondamentale, secondo la stima  $P_{\text{decay}} \sim P(r < \lambda)$ , usando  $\lambda \ll r_B$ .**

Si cambia variabile in  $x = r/\lambda$ . Allora:

$$\begin{aligned} P(r \leq \lambda) &= \int_0^\lambda dr \int d\Omega r^2 |\psi_{100}|^2 = \int_0^\lambda r^2 R_{10}^2 dr = \int_0^\lambda \frac{4r^2}{r_B^3} e^{-2r/r_B} dr = 4 \frac{\lambda^3}{r_B^3} \int_0^1 x^2 e^{-2\lambda x/r_B} dx \\ &\simeq 4 \frac{\lambda^3}{r_B^3} \int_0^1 x^2 \left(1 - 2x \frac{\lambda}{r_B}\right) dx = 4 \frac{\lambda^3}{r_B^3} \left(\frac{1}{3} - \frac{\lambda}{2r_B}\right) \simeq \frac{4}{3} \frac{\lambda^3}{r_B^3} = \frac{4}{3} \alpha^3 \end{aligned}$$

dove si è sviluppato l'esponenziale per  $\lambda \ll r_B$ .

- (7). **Si aggiunge all'Hamiltoniano del sistema una componente di spin  $\hat{H}_{\text{spin}} = \beta \hat{S}_1 \cdot \hat{S}_2$ , con 1 relativo a  $e^-$  e 2 a  $e^+$ . Descrivere come cambiano le funzioni d'onda.**

L'aggiunta di spin comporta il passaggio ad uno spazio di Hilbert prodotto  $\mathcal{H} = \mathcal{H}_{\text{orb}} \otimes \mathcal{H}_{\text{spin}}$ , dove  $\mathcal{H}_{\text{spin}}$  è lo spazio di Hilbert per gli spin di entrambe le particelle, che essendo di spin 1/2, ha dimensione 4, e  $\mathcal{H}_{\text{orb}}$  è lo spazio di Hilbert usato finora. Quindi  $|\psi\rangle \in \mathcal{H} \Rightarrow |\psi\rangle = |\psi_{\text{orb}}\rangle \otimes |\psi\rangle_{\text{spin}}$ .

Si potrebbe pensare di usare una base del tipo  $\{|\uparrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\downarrow\downarrow\rangle\}$  per gli stati di  $\mathcal{H}_{\text{spin}}$ , ma questa non diagonalizza l'Hamiltoniano complessivo  $\hat{H} = \hat{H}_{\text{orb}} + \hat{H}_{\text{spin}}$ ; infatti si è visto che in questa base

$$\hat{H}_{\text{spin}} \propto \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ottenibile applicando  $\hat{H}_{\text{spin}}$  ai 4 vettori di base. Il modo più semplice per trovare altra base è utilizzare che  $\hat{S}^2 = (\hat{\mathbf{S}}_1 + \hat{\mathbf{S}}_2)^2 = \hat{S}_1^2 + \hat{S}_2^2 + 2\hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2$ , da cui:

$$\hat{H}_{\text{spin}} = \frac{\beta}{2}(\hat{S}^2 - \hat{S}_1^2 - \hat{S}_2^2) \quad (4.5.4)$$

Gli autostati di  $\hat{S}^2$  diagonalizzano  $\hat{H}_{\text{spin}}$  perché per le proprietà delle matrici di Pauli  $\hat{S}_1^2, \hat{S}_2^2$  sono banali:  $\hat{S}_j^2 = \text{Id}$ , quindi

$$\hat{S}_i^2 = \left(\frac{\hbar}{2}\right)^2 (\hat{\sigma}_x^2 + \hat{\sigma}_y^2 + \hat{\sigma}_z^2) = \frac{3}{4}\hbar^2 \text{Id}, \quad i = 1, 2$$

Sia  $|S\rangle$  autostato di  $\hat{S}^2$ , quindi (per  $\hbar = 1$ )  $\hat{S}^2 |S\rangle = s(s+1) |S\rangle$ ; allora:

$$\hat{H}_{\text{spin}} |S\rangle = \frac{\beta}{2}(\hat{S}^2 - \hat{S}_1^2 - \hat{S}_2^2) |S\rangle = \frac{\beta}{2} \left[ s(s+1) - \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \right] |S\rangle$$

Nota: visto che  $[\hat{S}^2, \hat{S}_z] = 0$ , si può trovare base di autostati comune.

Ora si studia lo spettro di  $\hat{S}^2$ . Per regola di addizione dei momenti angolari, ricordando che  $s_1 = s_2 = 1/2$ :

$$|s_1 - s_2| \leq s \leq s_1 + s_2 \quad (4.5.5)$$

Quindi  $s = 0$  oppure  $s = 1$ . L'autovalore  $s = 1$  ha degenerazione 3 perché ad esso possono corrispondere le proiezioni lungo  $z$  con valori  $s_z = 0, 1, -1$ , cioè si distinguono tre stati diversi  $|s = 1, s_z = 1\rangle, |s = 1, s_z = 0\rangle, |s = 1, s_z = -1\rangle$ . Per  $s = 0$ , si può avere solo  $s_z = 0$ , quindi è un singoletto.

Si dimostra che una scelta di base completa che diagonalizza  $\hat{H}_{\text{spin}}$  è:

$$\begin{aligned} |s = 1, s_z = 1\rangle &= |\uparrow\uparrow\rangle; |s = 1, s_z = -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle \\ |s = 1, s_z = 0\rangle &= \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}; |s = 0, s_z = 0\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (4.5.6)$$

Per i primi due è semplice: per due particelle di spin 1/2, le uniche combinazioni per cui  $s_z = \pm 1$  si hanno quando entrambe hanno spin concordi.

Nel seguito i ket con numeri tipo  $|01\rangle$  si riferiscono a spin totale, mentre quelli con le frecce tipo  $|\uparrow\downarrow\rangle$  agli spin distinti. Si studiano, quindi,  $|00\rangle, |10\rangle$ , per i quali  $\hat{S}^2 |00\rangle = 0$  e  $\hat{S}^2 |10\rangle = 2 |10\rangle$ .

Si cercano i coefficienti  $\alpha, \beta$  tali che

$$\hat{S}^2(\alpha|\uparrow\downarrow\rangle + \beta|\downarrow\uparrow\rangle) = (\hat{S}_1^2 + \hat{S}_2^2 + 2\hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2)(\alpha|\uparrow\downarrow\rangle + \beta|\downarrow\uparrow\rangle) = \gamma(\alpha|\uparrow\downarrow\rangle + \beta|\downarrow\uparrow\rangle) \equiv \gamma|\psi\rangle$$

con  $\gamma = 0, 2$ . Si nota che per spin  $1/2$ , l'operatore  $\hat{S}_i^2$  agisce come  $\hat{S}_i^2\alpha|\uparrow\downarrow\rangle = \frac{3}{4}\alpha|\uparrow\downarrow\rangle$  e  $\hat{S}_i^2\beta|\downarrow\uparrow\rangle = \frac{3}{4}\beta|\downarrow\uparrow\rangle$ ,  $i = 1, 2$ , visto che moltiplicano il ket per  $s(s+1) = 3/4$ .

Per spin  $1/2$ , come già accennato,  $\hat{S}_i = \hat{\sigma}_i/2$ , quindi:

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2|\uparrow\downarrow\rangle &= \frac{1}{4} \left[ \hat{\sigma}_{1x}\hat{\sigma}_{2x}|\uparrow\downarrow\rangle + \hat{\sigma}_{1y}\hat{\sigma}_{2y}|\uparrow\downarrow\rangle + \hat{\sigma}_{1z}\hat{\sigma}_{2z}|\uparrow\downarrow\rangle \right] = \frac{1}{4} \left[ |\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\downarrow\rangle \right] \\ &= \frac{1}{2}|\downarrow\uparrow\rangle - \frac{1}{4}|\uparrow\downarrow\rangle\end{aligned}$$

Analogamente:  $\hat{\mathbf{S}}_1 \cdot \hat{\mathbf{S}}_2|\downarrow\uparrow\rangle = \frac{1}{2}|\uparrow\downarrow\rangle - \frac{1}{4}|\downarrow\uparrow\rangle$ . Mettendo tutto insieme:

$$\hat{S}^2|\psi\rangle = \frac{3}{2}\alpha|\uparrow\downarrow\rangle + \frac{3}{2}\beta|\downarrow\uparrow\rangle + \alpha\left(|\downarrow\uparrow\rangle - \frac{1}{2}|\uparrow\downarrow\rangle\right) + \beta\left(|\uparrow\downarrow\rangle - \frac{1}{2}|\downarrow\uparrow\rangle\right) = (\alpha + \beta)|\uparrow\downarrow\rangle + (\alpha + \beta)|\downarrow\uparrow\rangle$$

Si dividono i due casi, a seconda del valore di  $\gamma$ :

- se  $\gamma = 0$ , le componenti della combinazione sopra devono annullarsi, quindi  $\alpha = -\beta$ , quindi

$$|00\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} \quad (4.5.7)$$

comprensivo di normalizzazione;

- se  $\gamma = 2$ , deve risultare  $\alpha = \beta$ , quindi

$$|10\rangle = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} \quad (4.5.8)$$

anche questo comprensivo di normalizzazione.

## 5 ESERCITAZIONI 21-22

### 5.1 Generalità sui sistemi a due livelli

Le matrici di Pauli sono:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (5.1.1)$$

Queste soddisfano le seguenti proprietà:

$$\begin{aligned} \sigma_i &= \sigma_i^\dagger & \sigma_i^2 &= \text{Id} & [\sigma_i, \sigma_j] &= 2i\varepsilon_{ijk}\sigma_k \\ \sigma_i\sigma_j &= \delta_{ij}\text{Id} + i\varepsilon_{ijk}\sigma_k & \text{tr } \sigma_i &= 0 \end{aligned} \quad (5.1.2)$$

Le matrici Hermitiane  $2 \times 2$  formano uno spazio vettoriale quadridimensionale sui reali e la forma più generale di una matrice Hermitiana si può scrivere tramite le matrici di Pauli:

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} a & c + id \\ c - id & b \end{pmatrix}, \quad a, c, b, d \in \mathbb{R} \\ A &= a_0 \text{Id} + \sum_{i=1}^3 a_i \sigma_i, \quad a_j \in \mathbb{R}, \quad j = 0, 1, 2, 3 \end{aligned} \quad (5.1.3)$$

Un sistema a due livelli prende stati in uno spazio di Hilbert bidimensionale a coefficienti su  $\mathbb{C}$ . Una possibile base completa è:

$$\mathcal{B} = \left\{ |+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad (5.1.4)$$

Lo stato più generale del sistema si scrive, tramite la base scelta, come

$$|\psi\rangle = a_+ |+\rangle + a_- |-\rangle$$

dove  $|a_+|^2 + |a_-|^2 \stackrel{!}{=} 1$  per la condizione di normalizzazione.

La matrice densità associata allo stato  $|\psi\rangle$  è scritta, in forma operatoriale, come  $\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$ . La matrice densità soddisfa le seguenti proprietà:

$$\rho = \rho^\dagger \quad \text{tr } \rho = 1 \quad \rho^2 = \rho \quad (5.1.5)$$

dove l'ultima ( $\rho^2 = \rho$ ) è verificata unicamente per stati puri. Se  $|i\rangle, |j\rangle$  sono elementi di base, la matrice densità si può rappresentare anche in forma matriciale come

$$\rho_{ij} = \langle i | \rho_\psi | j \rangle \implies \rho_\psi = |i\rangle \rho_{ij} \langle j| \quad (5.1.6)$$

Si nota che l'operatore  $\hat{M} = \sigma_3$  è tale per cui

$$M_{ij} = \langle i | \hat{M} | j \rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \sigma_3$$

come si è scelta la base.

È possibile calcolare il valore di aspettazione di un osservabile  $\hat{O}$  su uno stato generico (anche non puro) usando la matrice densità tramite la relazione  $\langle \hat{O} \rangle = \text{tr } \rho \hat{O}$ .

#### ESERCIZIO 5.1.

Scrivere il più generale Hamiltoniano per un sistema a due livelli.

*Svolgimento.* Un Hamiltoniano deve essere un operatore Hermitiano, quindi si usa l'espressione della più generale matrice Hermitiana  $2 \times 2$  riportata in eq. 5.1.3. ♠

#### ESERCIZIO 5.2.

Scrivere il più generale Hamiltoniano che ha  $|+\rangle, |-\rangle$  come autostati.

*Svolgimento.* Partendo dall'espressione di  $\hat{H}$  in eq. 5.1.3, si impone che  $|+\rangle$  e  $|-\rangle$  siano autostati:

$$\begin{pmatrix} a & c + id \\ c - id & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ c - id \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \lambda_+ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \iff c - id = 0$$

$$\begin{pmatrix} a & c + id \\ c - id & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c + id \\ b \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \lambda_- \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \iff c + id = 0$$

Quindi si richiede  $c = d = 0$ . Questo significa che la più generale espressione di  $\hat{H}$  che abbia  $|+\rangle, |-\rangle$  come autostati è:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} = a_0 \text{Id} + a_3 \sigma_3 \quad (5.1.7)$$

dove  $a_0$  e  $a_3$  scelti in modo tale che sulla diagonale escano  $a, b$ . ♠

**ESERCIZIO 5.3.**

Calcolare la matrice densità  $\rho_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$  per gli stati

- $|\psi\rangle = |+\rangle$ ;
- $|\psi\rangle = |-\rangle$ ;
- $|\psi\rangle = a|+\rangle + b|-\rangle$ .

*Svolgimento.* Se  $|\psi\rangle = |+\rangle$ , allora  $\rho_+ = |+\rangle\langle+|$ , il che significa che, per l'ortonormalità degli elementi di base, vale

$$\rho_+ = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Analogamente si trova  $\rho_-$ . Se  $|\psi\rangle = a|+\rangle + b|-\rangle$ , invece, si ha

$$\begin{aligned} \langle+|(a|+\rangle + b|-\rangle)(\langle+|a^* + \langle-|b^*)|+\rangle &= |a|^2 & \langle+|\rho_\psi|-\rangle &= ab^* \\ \langle-|(a|+\rangle + b|-\rangle)(\langle+|a^* + \langle-|b^*)|-\rangle &= |b|^2 & \langle-|\rho_\psi|+\rangle &= a^*b \\ \Rightarrow \rho_{ij} &= \begin{pmatrix} |a|^2 & ab^* \\ a^*b & |b|^2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

In quest'ultimo caso, si nota che  $|\psi\rangle$  è normalizzato  $\Rightarrow |a|^2 + |b|^2 = 1 \Rightarrow \text{tr } \rho = 1$ .

Inoltre  $\rho = \rho^+$  e

$$\rho^2 = \begin{pmatrix} |a|^2 & ab^* \\ a^*b & |b|^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |a|^2 & ab^* \\ a^*b & |b|^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |a|^4 + |a|^2|b|^2 & |a|^2ab^* + ab^*|b|^2 \\ a^*b(|a|^2 + |b|^2) & |a|^2|b|^2 + |b|^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |a|^2 & ab^* \\ a^*b & |b|^2 \end{pmatrix} = \rho$$

♠

**ESERCIZIO 5.4.**

Scrivere la più generale matrice densità. NOTA: le proprietà più generali sono quelle per stati qualsiasi, non necessariamente puri, quindi  $\text{tr } \rho = 1$ ,  $\rho = \rho^+$  e  $\text{tr } \rho^2 \leq 1$ .

*Svolgimento.* Facendo uso della più generale espressione di una matrice Hermitiana riportata in eq. 5.1.3, si ha il punto di partenza

$$\rho_{ij} = a_0 \text{Id} + \sum_{i=1}^3 a_i \sigma_i$$

Visto che deve risultare  $\text{tr } \rho = 1$ , si deve avere  $a_0 + a_3 + a_0 - a_3 = 2a_0 \stackrel{!}{=} 1$ , quindi  $a_0 = 1/2$ .

Infine, si calcola  $\rho^2$  per imporre  $\text{tr } \rho^2 \leq 1$ , ricordando che  $\sigma_i^2 = 1$ . Per farlo, si nota che, ridefinendo  $a_i$ ,  $i = 1, 2, 3$  in modo che  $\rho = \frac{1}{2} (\text{Id} + \vec{a} \cdot \vec{\sigma})$ , si trova<sup>1</sup>:

$$\rho^2 = \frac{1}{4} (\text{Id} + \vec{a} \cdot \vec{\sigma})(\text{Id} + \vec{a} \cdot \vec{\sigma}) = \frac{1+a^2}{4} \text{Id} + \frac{1}{2} \vec{a} \cdot \vec{\sigma}$$

Si nota che  $\rho$  descrive uno stato puro  $\iff a^2 = 1$ , per cui si verifica  $\rho = \rho^2$ . In generale, visto che  $\text{tr } \sigma_i = 0$ , si ha  $\text{tr } \rho^2 = \frac{1+a^2}{2} \leq 1 \iff a^2 \leq 1$ . L'espressione più generica per la matrice densità è:

$$\rho = \frac{1}{2} (\text{Id} + \vec{a} \cdot \vec{\sigma})$$

con  $a^2 \leq 1$ . ♠

#### ESERCIZIO 5.5.

Calcolare il valore di aspettazione  $\hat{M} = \sigma_3$  su uno stato generico individuato da  $\rho = \frac{1}{2} (\text{Id} + \vec{a} \cdot \vec{\sigma})$ .

*Svolgimento.* Per conto diretto:

$$\text{Tr } \rho \hat{O} = \sum_i \rho_{ii} M_{ii} = \frac{1}{2} (1 + a_3) M_{11} + \frac{1}{2} (1 - a_3) M_{22} = \frac{1}{2} (1 + a_3) - \frac{1}{2} (1 + a_3) = a_3$$

Più efficientemente, si sarebbe potuto notare che, visto che  $\text{Tr } \sigma_i = 0$ :

$$\text{Tr} \left[ \frac{1}{2} (\text{Id} + \vec{a} \cdot \vec{\sigma}) \sigma_3 \right] = \text{Tr} \frac{1}{2} a_3 \sigma_3^2 = \text{Tr} \frac{1}{2} a_3 \text{Id} = a_3$$
♠

#### ESERCIZIO 5.6.

Scrivere la più generale  $\rho$  tale per cui  $\langle \hat{M} \rangle = 0$ .

*Svolgimento.* Dall'esercizio precedente, si ricava la condizione  $a_3 = 0$ ; allora la  $\rho$  più generica è:

$$\rho = \frac{1}{2} (\text{Id} + a_1 \sigma_1 + a_2 \sigma_2)$$
♠

---

<sup>1</sup>La seconda uguaglianza è da dimostrare.

**ESERCIZIO 5.7.**

Trovare il più generico stato puro  $|\psi\rangle$  tale per cui  $\langle\psi|\hat{M}|\psi\rangle = 0$ .

*Svolgimento.* Prendendo  $|\psi\rangle = a|+\rangle + b|-\rangle$ , con  $|a|^2 + |b|^2 = 1$ , si ha

$$\langle\psi|\hat{M}|\psi\rangle = \langle\psi|\sigma_3|\psi\rangle = |a|^2 - |b|^2$$

Quindi si deve imporre  $|a|^2 = |b|^2$ . Dalla condizione di normalizzazione, si ottiene che deve essere  $|a|^2 = 1/2$ , quindi, in generale:

$$|\psi\rangle = e^{i\theta} \left( \frac{|+\rangle + e^{i\varphi} |-\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

ha  $\langle\hat{M}\rangle = 0$ . ♠

**5.2 Sistema di qubit**

Si considera un singolo sistema di due qubit. Come base si usano autovettori di  $\sigma_3$ , ossia

$$\left\{ |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Si considera l'Hamiltoniano

$$\hat{H} = \text{Id} + \sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Gli autovalori di questa sono  $\epsilon_1 = 0$  e  $\epsilon_2 = 2$  perché ha determinante 0 ( $\Rightarrow \epsilon_1 = 0$ ) e la traccia è conservata, quindi l'altro autovalore deve essere 2. I relativi autovettori normalizzati sono:

$$|\epsilon_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle - |2\rangle) \quad |\epsilon_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle + |2\rangle)$$

A questo punto, un generico stato si può scrivere come:

$$|\psi\rangle = a|\epsilon_1\rangle + b|\epsilon_2\rangle = \bar{a}|1\rangle + \bar{b}|2\rangle$$

Volendo studiare sua evoluzione temporale, conviene usare la base delle autoenergie perché gli autovettori di  $\hat{H}$  sono stazionari; di fatto:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} |\psi(0)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}t} \left[ a|\epsilon_1\rangle + b|\epsilon_2\rangle \right] = a e^{-\frac{i}{\hbar}\epsilon_1 t} |\epsilon_1\rangle + b e^{-\frac{i}{\hbar}\epsilon_2 t} |\epsilon_2\rangle \quad (5.2.1)$$



**OSSERVAZIONE 5.1.** Risulta più comodo usare la base degli autostati di  $\hat{H}$  perché  $[\hat{H}, \sigma_3] \neq 0$  perché  $[\sigma_1, \sigma_3] = -2i\sigma_2$ , il che vuol dire che  $\sigma_3$  e  $\hat{H}$  non hanno base comune.

Ora si assume che  $|\psi(0)\rangle = |1\rangle$ . Volendo scrivere evoluzione temporale in termini delle autoenergie, si scrive  $|1\rangle$  in termini di  $|\epsilon_1\rangle$  e  $|\epsilon_2\rangle$ :

$$\frac{1}{2}|\epsilon_1\rangle + \frac{1}{2}|\epsilon_2\rangle = \frac{1}{2}(|1\rangle - |2\rangle) + \frac{1}{2}(|1\rangle + |2\rangle) = |1\rangle \equiv |\psi(t=0)\rangle$$

cioè  $a = b = 1/\sqrt{2}$ . Sostituendo questi in eq. 5.2.1, si ottiene l'evoluzione temporale per  $|\psi(t)\rangle$ . Considerando  $\sigma_3$  come osservabile, si vuole vedere il suo valore medio a  $t = 0$  nello stato  $|\psi\rangle$ , quindi si calcola

$$\langle\psi(0)|\sigma_3|\psi(0)\rangle \equiv \langle 1|\sigma_3|1\rangle = 1$$

Ora, più in generale, si calcola  $\langle\psi(t)|\sigma_3|\psi(t)\rangle$ . Per farlo, conviene esprimere  $|\psi(t)\rangle$  in termini di  $|1\rangle, |2\rangle$ :

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left( e^{-\frac{i}{\hbar}\epsilon_1 t} |\epsilon_1\rangle + e^{-\frac{i}{\hbar}\epsilon_2 t} |\epsilon_2\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[ e^{-\frac{i}{\hbar}\epsilon_1 t} \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle - |2\rangle) + e^{-\frac{i}{\hbar}\epsilon_2 t} \frac{1}{\sqrt{2}} (|1\rangle + |2\rangle) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[ \left( e^{-\frac{i}{\hbar}\epsilon_1 t} + e^{-\frac{i}{\hbar}\epsilon_2 t} \right) |1\rangle + \left( e^{-\frac{i}{\hbar}\epsilon_2 t} - e^{-\frac{i}{\hbar}\epsilon_1 t} \right) |2\rangle \right] \equiv a(t)|1\rangle + b(t)|2\rangle \end{aligned}$$

Visto che  $\sigma_3|1\rangle = |1\rangle$ , mentre  $\sigma_3|2\rangle = -|2\rangle$ , si ha  $\langle\psi(t)|\sigma_3|\psi(t)\rangle = |a(t)|^2 - |b(t)|^2$ , dove

$$\begin{aligned} |a(t)|^2 &= \frac{1}{4} \left[ 2 + e^{\frac{i}{\hbar}(\epsilon_1 - \epsilon_2)t} + e^{\frac{i}{\hbar}(\epsilon_2 - \epsilon_1)t} \right] = \frac{1}{2} \left[ 1 + \cos \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\hbar} t \right] \\ |b(t)|^2 &= \frac{1}{2} \left[ 1 - \cos \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\hbar} t \right] \\ \Rightarrow \langle\psi(t)|\sigma_3|\psi(t)\rangle &= |a(t)|^2 - |b(t)|^2 = \cos \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\hbar} t \end{aligned}$$

### 5.3 Teoria generica sui sistemi composti

Si considerano due sistemi 1, 2 e si cerca di caratterizzare gli stati del sistema globale 1 + 2. Si indicano con  $\hat{A}^{(1)}$  gli operatori hermitiani del sistema 1 e con  $\hat{B}^{(2)}$  quelli del 2, cioè, tali che  $\hat{A}^{(1)}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle$ , con  $a_n$  autostati di  $\hat{A}^{(1)}$  e che  $\hat{B}^{(2)}|b_m\rangle = b_m|b_m\rangle$ <sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Si assume base di autovettori discreta per semplicità e si assume, inoltre, assenza di degenerazione.

Lo spazio di Hilbert di  $1+2$ , a partire dalle basi fornite dagli operatori  $\hat{A}^{(1)}, \hat{B}^{(2)}$  per 1 e 2 rispettivamente, è ottenuto tramite prodotto vettore:

$$|a_n b_m\rangle = |a_n\rangle^{(1)} \otimes |b_m\rangle^{(2)} \quad (5.3.1)$$

L'azione di un operatore di uno dei due spazi su un elemento di base dello spazio completo agisce solo sulla componente proveniente dallo stesso spazio; ad esempio

$$\hat{A}^{(1)} |a_n b_m\rangle = \hat{A}^{(1)} |a_n\rangle^{(1)} \otimes |b_m\rangle^{(2)} = \left( \hat{A}^{(1)} |a_n\rangle \right) \otimes |b_m\rangle^{(2)}$$

Di fatto, si ha  $[\hat{A}^{(1)}, \hat{B}^{(2)}] = 0$ .

Il generico stato ottenuto da questa base sarà:

$$|\psi\rangle = \sum_{n,m} c_{nm} |a_n\rangle^{(1)} \otimes |b_m\rangle^{(2)}$$

Dato  $\hat{R}$  generico operatore, si vuole calcolare  $\langle\psi|\hat{R}|\psi\rangle \equiv \text{tr } \rho \hat{R}$ , con  $\rho = |\psi\rangle \langle\psi|$ . Rinominando con  $|nm\rangle = |n\rangle \otimes |m\rangle$  un elemento di base dello spazio completo, si può scrivere  $\rho$  in forma matriciale come

$$\rho_{nm,n'm'} = \langle nm|\psi\rangle \langle\psi|n'm'\rangle \implies \rho = \sum_{n,m,n',m'} |nm\rangle \rho_{n,m,n',m'} \langle n'm'| = |\psi\rangle \langle\psi|$$

Allo stesso modo, si rappresenta in forma matriciale l'operatore  $\hat{R}$ :

$$R_{nm,n'm'} = \langle nm|\hat{R}|n'm'\rangle$$

A questo punto

$$\langle\psi|\hat{R}|\psi\rangle = \text{tr } \rho \hat{R} = \sum_{n,m,n',m'} \langle nm|\rho|n'm'\rangle \langle n'm'|\hat{R}|nm\rangle = \sum_{n,m,n',m'} \rho_{nm,n'm'} R_{nm,n'm'}$$

Limitando l'azione dell'operatore  $\hat{R}$  solamente allo stato 1, cioè  $\hat{R} \rightarrow \hat{R}^{(1)}$ , l'espressione sopra si modifica come segue:

$$\begin{aligned} \text{tr } \rho \hat{R}^{(1)} &= \sum_{n,m,n',m'} \langle nm|\rho|n'm'\rangle \langle n'm'|\hat{R}^{(1)}|nm\rangle = \sum_{n,m,n',m'} \langle nm|\rho|n'm'\rangle \langle n'|\hat{R}^{(1)}|n\rangle \overbrace{\langle m'|m\rangle}^{=\delta_{mm'}} \\ &= \sum_{n,n'} \sum_m \underbrace{\langle nm|\rho|n'm\rangle}_{\equiv \rho^{(1)}} \langle n'|\hat{R}^{(1)}|n\rangle \end{aligned}$$

visto che  $\hat{R}^{(1)}$  agisce solo su 1, con  $\rho^{(1)}$  matrice densità limitata allo spazio 1. Si capisce se il sistema 1 è isolato se  $\text{tr} [\rho^{(1)}]^2 = 1$ .

**OSSERVAZIONE 5.2.** Nel passaggio da  $\rho$  a  $\rho^{(1)}$  o  $\rho^{(2)}$  si perdono informazioni sul sistema globale:  $\rho^{(i)}$  permette di studiare i sottosistemi singolarmente, ma non contiene l'informazione riguardante la comunicazione tra i vari sottosistemi contenuta, invece, in  $\rho$ .

Si immagina, ora, di mantenere attiva l'interazione fra due sistemi 1, 2 per  $t < t_0$ ; in questa frazione di tempo, l'Hamiltoniano complessivo è dato da  $\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \hat{H}_{12}$ . Immaginando, a  $t = t_0$ , di rimuovere l'interazione e di continuare a studiare unicamente l'interazione del sistema 1, il nuovo Hamiltoniano è semplicemente  $\hat{H}_1$ , quindi l'evoluzione temporale è ottenuta tramite  $e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_1(t-t_0)}$ ,  $t > t_0$ :

$$\rho^{(1)}(t) = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_1(t-t_0)}\rho^{(1)}(t=t_0)e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_1(t-t_0)} \quad (5.3.2)$$

dove si usa la condizione iniziale di  $\rho^{(1)}(t=t_0) = \text{tr}_2 \rho(t_0)^1$ , cioè la condizione del sistema 1 poco prima della fine dell'interazione.

## 5.4 Sistemi di due qubit interagenti

Per  $a = 1, 2$  (a seconda di quale sistema di qubit si considera), si individua l'operatore

$$\hat{M}_a = \sigma_3^{(a)}, \quad \text{con } \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Questo fornisce base per il sistema  $a$  data da  $|1\rangle^{(a)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $|2\rangle^{(a)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ . Si indica con  $|k\rangle$ ,  $k = 1, 2, 3, 4$  la base completa dello spazio di Hilbert dei due sistemi di qubit, cioè:

$$\begin{aligned} |1\rangle &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}^{(1)} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}^{(2)} ; |2\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}^{(1)} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}^{(2)} \\ |3\rangle &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}^{(1)} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}^{(2)} ; |4\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}^{(1)} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}^{(2)} \end{aligned} \quad (5.4.1)$$

---

<sup>1</sup>Si traccia via 2 dalla matrice densità completa.

Si studia il sistema sotto l'Hamiltoniano

$$\hat{H} = \frac{1}{4} \left( \vec{\sigma}^{(1)} + \vec{\sigma}^{(2)} \right)^2 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \vec{\sigma}^{(1)} \cdot \vec{\sigma}^{(2)}$$

con  $\vec{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ , dove la seconda uguaglianza è ottenuta dal fatto che, per una generica matrice di Pauli, vale  $\sigma_i^2 = \text{Id} \Rightarrow \vec{\sigma}^2 = 3 \text{Id}^1$ .

Il prossimo passo è scrivere  $\hat{H}$  in forma matriciale in modo da poterne calcolare gli autovalori. Quindi se  $|q\rangle, |k\rangle$  sono elementi della base dello spazio completo, si calcola  $H_{qk} = \langle q | \hat{H} | k \rangle$ , che sarà una matrice  $4 \times 4$ . Si ha:

$$H_{qk} = \frac{3}{2} \overbrace{\langle q | \text{Id}^{(1)} \otimes \text{Id}^{(2)} | k \rangle}^{\equiv \langle q | k \rangle = \delta_{qk}} + \frac{1}{2} \langle q | \vec{\sigma}^{(1)} \cdot \vec{\sigma}^{(2)} | k \rangle = \frac{3}{2} \delta_{qk} + \frac{1}{2} \langle q | \vec{\sigma}^{(1)} \cdot \vec{\sigma}^{(2)} | k \rangle$$

Si nota che

$$\langle q | \vec{\sigma}^{(1)} \cdot \vec{\sigma}^{(2)} | k \rangle = \langle i |^{(1)} \langle j |^{(2)} \vec{\sigma}^{(1)} \cdot \vec{\sigma}^{(2)} | i' \rangle^{(1)} | j' \rangle^{(2)} = \langle i | \vec{\sigma}^{(1)} | i' \rangle \cdot \langle j | \vec{\sigma}^{(2)} | j' \rangle$$

dove si è sottinteso il prodotto tensore, con  $i, i', j, j' = 1, 2$ . Svolgendo il calcolo, si trova

$$H_{qk} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Da questa rappresentazione, si vede che gli elementi di base  $|1\rangle, |4\rangle$  sono autostati con autovalore 2; considerando il blocco centrale e ricordando autovalori e autovettori trovati in §5.2, si ha:

$$\begin{aligned} \lambda = 2 : & \left\{ |\epsilon_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |\epsilon_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, |\epsilon_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] \right\} \\ \lambda = 0 : & |\epsilon_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] \end{aligned} \quad (5.4.2)$$

---

<sup>1</sup>Il risultato  $3/2$  in  $\hat{H}$  deriva dal fatto che, nonostante  $[\vec{\sigma}^{(1)}]^2 = 3 \text{Id}^{(1)}$ , in realtà un generico operatore  $\hat{A}^{(1)}$ , cioè agente solo su 1, equivale a  $\hat{A}^{(1)} \otimes \text{Id}^{(2)}$ . Nelle parentesi tonde di  $\hat{H}$ , si avrebbe

$$\hat{H} = \frac{1}{4} \left( 3 \text{Id}^{(1)} \otimes \text{Id}^{(2)} + 3 \text{Id}^{(1)} \otimes \text{Id}^{(2)} + 2 \vec{\sigma}^{(1)} \cdot \vec{\sigma}^{(2)} \right)$$

da cui il  $3/2$ , che è sarebbe più correttamente da moltiplicare per  $\text{Id}^{(1)} \otimes \text{Id}^{(2)}$ , ma si sottintende per non appesantire la notazione.

**OSSERVAZIONE 5.3.** In questo caso, si ha una degenerazione pari a 3; la presenza di degenerazione non permette di distinguere, dal punto di vista energetico, i vari stati perché una misura di energia restituisce lo stesso valore (autoenergia) per tre stati.

È necessario trovare un'altra base che permetta di avere autovalori dell'energia diversi, quindi bisogna trovare un altro operatore, che commuta con l'Hamiltoniano, e che non abbia degenerazione nello spettro.

Si studia l'operatore

$$\hat{S}_3 = \frac{1}{2} (\sigma_3^{(1)} + \sigma_3^{(2)}) \quad (5.4.3)$$

e si vede se riesce a distinguere gli autostati. Intanto si verifica che commuta con  $\hat{H}$ ; per farlo, si osserva che, definendo  $\hat{S}_i = \frac{1}{2} (\sigma_i^{(1)} + \sigma_i^{(2)})$ , si ha  $\hat{H} = \sum_{i=1}^3 \hat{S}_i^2$ . Visto che  $[\hat{S}_i, \hat{S}_3] = i\epsilon_{i3k}\hat{S}_k$ <sup>1</sup>, allora<sup>2</sup>  $[\hat{S}_i^2, \hat{S}_3] = i\epsilon_{i3k}(\hat{S}_i\hat{S}_k + \hat{S}_k\hat{S}_i)$ . Quindi:

$$\begin{aligned} [\hat{H}, \hat{S}_3] &= i \sum_{i,k} \epsilon_{i3k} (\hat{S}_i\hat{S}_k + \hat{S}_k\hat{S}_i) \\ &= i \sum_{i,k} \epsilon_{k3i} (\hat{S}_i\hat{S}_k + \hat{S}_k\hat{S}_i) \implies [\hat{H}, \hat{S}_3] = 0 \\ &= -i \sum_{i,k} \epsilon_{i3k} (\hat{S}_i\hat{S}_k + \hat{S}_k\hat{S}_i) \end{aligned}$$

Andando a calcolare  $\langle \epsilon_i | \hat{S}_3 | \epsilon_i \rangle$  con gli  $|\epsilon_i\rangle$  definiti in eq. 5.4.2, si trova  $\epsilon_0 = 0$ ,  $\epsilon_1 = 1$ ,  $\epsilon_2 = -1$  e  $\epsilon_3 = 0$ , quindi ha risolto la degenerazione osservata prima.

Ora si considera in particolare lo stato fondamentale  $|\epsilon_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|12\rangle - |21\rangle)$ <sup>3</sup>. Si vuole guardare lo stato fondamentale del solo sistema 1; allora si definisce  $\rho = |\epsilon_0\rangle\langle\epsilon_0|$  e si calcola  $\rho^{(1)} = \text{Tr}^{(2)} \rho$  (cioè si traccia sul secondo sottosistema).

<sup>1</sup>Qui è sufficiente usare le regole di commutazione delle matrici di Pauli che definiscono gli  $\hat{S}_i$ , ricordando che in questi è presente un fattore 1/2.

<sup>2</sup>Qui si è usata la proprietà del commutatore  $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$ .

<sup>3</sup>Riprendendo la notazione per gli elementi di base per singolo sistema di due qubit, si ha  $|12\rangle = |1\rangle \otimes |2\rangle$ .

**ESERCIZIO 5.8 — (FACOLTATIVO).**

Per esercizio (non sarà utile nel seguito), si calcola la forma matriciale di  $\rho$ , indicata con  $\rho_{qk} = \langle q|\rho|k\rangle$ .

*Svolgimento.* Questa matrice avrà evidentemente tutti 0 nei posti in cui  $|k\rangle$  o  $|q\rangle$  sono diversi da  $|12\rangle$  o  $|21\rangle$ ; allora la matrice sarà composta da tutti zeri tranne un blocco quadrato  $2 \times 2$ .

Sfruttando le proprietà  $\text{Tr } \rho = 1$  e  $\rho = \rho^\dagger$ , è sufficiente calcolare gli elementi  $\langle 12|\rho|12\rangle$  e  $\langle 12|\rho|21\rangle$  per dedurre conseguentemente gli altri. I vari elementi di matrice si calcolano facilmente ad occhio: i braket  $\langle 12|12\rangle = \langle 21|21\rangle = 1$ , mentre  $\langle 12|21\rangle = \langle 21|12\rangle = -1$  perché il coefficiente di  $|21\rangle$  in  $|\epsilon_0\rangle$  è  $-1$ . Ne segue che gli elementi fuori diagonale nel blocco  $2 \times 2$  hanno un segno negativo, mentre quelli sulla diagonale hanno segno positivo. Tutti questi sono moltiplicati per  $1/2$  derivante dal prodotto dei due  $1/\sqrt{2}$  in  $\rho = |\epsilon_0\rangle\langle\epsilon_0|$ . Complessivamente:

$$\rho_{qk} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (5.4.4)$$

Ad occhio si vede che soddisfa anche le proprietà  $\rho = \rho^\dagger$ ,  $\text{Tr } \rho = 1$ . Ora si calcola  $\rho^2$  per vedere se soddisfa  $\text{Tr } \rho^2 = 1$ .

$$\rho^2 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

da cui si vede subito che  $\text{Tr } \rho^2 = 1$ . ♠

Ora si calcola  $\rho^{(1)}$ :

$$\begin{aligned} \rho^{(1)} &= \sum_j \langle j|^{(2)} (|\epsilon_0\rangle\langle\epsilon_0|) |j\rangle^{(2)} = \frac{1}{2} \sum_j \langle j| \left( |1\rangle|2\rangle - |2\rangle|1\rangle \right) \left( \langle 1|\langle 2| - \langle 2|\langle 1| \right) |j\rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle 1| \left( |1\rangle|2\rangle - |2\rangle|1\rangle \right) \left( \langle 1|\langle 2| - \langle 2|\langle 1| \right) |1\rangle + \frac{1}{2} \langle 2| \left( |1\rangle|2\rangle - |2\rangle|1\rangle \right) \left( \langle 1|\langle 2| - \langle 2|\langle 1| \right) |2\rangle \\ &= \frac{1}{2} [ |2\rangle\langle 2| + |1\rangle\langle 1| ] \end{aligned}$$

**OSSERVAZIONE 5.4.** Nel calcolo precedente, prestare attenzione a far agire  $|j\rangle$  e

$\langle j|$  solamente sugli stati del sottosistema 2.

In forma matriciale, evidentemente:

$$\rho_{ij}^{(1)} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \text{Id}$$

Si vede facilmente che soddisfa  $\text{Tr } \rho^{(1)} = 1$  e  $\rho^{(1)} = (\rho^{(1)})^\dagger$ , mentre

$$(\rho^{(1)})^2 = \frac{1}{4} \text{Id} \implies \text{Tr } (\rho^{(1)})^2 = \frac{1}{2} < 1$$

quindi lo stato che rappresenta non è puro.

Volendo calcolare il valore di aspettazione dell'operatore  $\hat{M}$  sul sottosistema 1, si nota ad occhio che  $\langle M \rangle^{(1)} = \text{Tr } \rho^{(1)} \hat{M} = 0$ .

## 5.5 Complementi di teoria

### 5.5.1 Entropia di entanglement

È possibile quantificare la purezza di uno stato a seconda di quando  $\text{Tr } \rho^2$  è vicina a 1. Questo viene fatto tramite **entropia di entanglement**:

$$S = -\ln \left[ \text{Tr } (\rho^{(1)})^2 \right] \quad (5.5.1)$$

Più in generale, si definisce

$$S_\alpha = \frac{1}{1-\alpha} \ln \left[ \text{Tr } (\rho^{(1)})^\alpha \right] \quad (5.5.2)$$

Si può anche definire l'entropia di von Neumann:

$$S_{\text{VN}} = -\text{Tr } (\rho^{(1)} \ln \rho^{(1)}) \quad (5.5.3)$$

### 5.5.2 Funzione di una matrice

Si è appena usato  $\ln \rho$ , con  $\rho$  matrice. Per capire cosa significa, si prende una matrice  $M$  hermitiana e una sua funzione  $F(M)$  è definita come:

$$F(M) = U F(\lambda_i) U^{-1} \quad (5.5.4)$$

dove  $U$  è la matrice che diagonalizza  $M$ , i  $\lambda_i$  sono i suoi autovalori e  $F(\lambda_i)$  è la matrice in cui la funzione  $F$  agisce sugli autovalori della matrice.

Praticamente, se  $F(M) = M^3$  per esempio, si ha:

$$F(M) = U \begin{pmatrix} \lambda_1^3 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & \lambda_2^3 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{pmatrix} U^{-1}$$

Questo significa che si applica  $F$  su una matrice diagonale dove l'operazione è ben definita e poi si ritorna alla rappresentazione originaria della matrice tramite la matrice  $U$  che è quella che diagonalizza  $M$ , cioè che la porta nella rappresentazione in cui è diagonale.

### 5.5.3 Evoluzione temporale di stati impuri

Stati impuri che si formano dall'interazione di più sistemi mantengono la loro impurità anche quando si blocca l'interazione. Per dimostrarlo, sia  $\rho^{(1)}(0)$  la matrice densità di uno stato entangled, cioè tale che  $\text{Tr}(\rho^{(1)}(0))^2 < 1$ . Se a  $t = 0$  si blocca l'interazione,  $\forall t > 0$ ,  $\text{Tr}(\rho^{(1)}(t))^2 < 1$ :

$$\text{Tr}(\rho^{(1)}(t))^2 = \text{Tr}\left(e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_1 t} \rho^{(1)}(0) e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_1 t}\right)^2 = \text{Tr}\left(\rho^{(1)}(0) e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_1 t} e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_1 t}\right)^2 = \text{Tr}(\rho^{(1)}(0))^2 < 1$$

dove si è usata la proprietà della traccia per cui  $\text{Tr} AB = \text{Tr} BA$ .