

NOTE DI FISICA STATISTICA

INDICE

1	Introduzione alla meccanica statistica	4
1.1	Principi della meccanica statistica	4
1.2	Ensemble canonico	5
2	Meccanica statistica classica dei sistemi interagenti	7
2.1	Sistemi interagenti	7
2.1.1	Interazione a due corpi	8
2.1.2	Equazione di van der Waals	9
2.1.3	Costruzione di Maxwell	11
2.2	Espansioni in clusters	12
2.2.1	Espansione in cumulanti	13
2.2.2	Equazione di stato ed espansione del viriale	15
2.2.3	Espansione del viriale per sfere rigide	17
2.2.4	Sfere rigide in 1D	18
2.3	Densità, funzioni di correlazione ed equazione di stato	19
2.3.1	Densità	19
2.3.2	Equazione di stato	20
2.3.3	Equazione di Born-Green	21
3	Transizioni di fase	23
3.1	Teoria di Lee-Yang	24
3.2	Esponenti critici in van der Waals	28
3.3	Modello di Ising in campo medio	31
3.3.1	Soluzione del modello di Ising	32
3.3.2	Rottura di simmetria	35
3.3.3	Esponenti critici	36
3.3.4	Problemi del modello	37
3.4	Teorie di campo e campo medio	38
3.4.1	Teoria di Ginzburg-Landau	41
3.4.2	Esponenti critici	44
3.4.3	Validità del campo medio: argomento di Ginzburg	46
3.5	Modello di Ising oltre il campo medio	47
3.5.1	Argomento di Peierls per Ising 1D	47
3.5.2	Soluzione esatta del modello di Ising 1D	49
3.5.3	Argomento di Peierls per Ising 2D	53
3.6	Omogeneità e gruppo di rinormalizzazione	55
3.6.1	Leggi di scala	55
3.6.2	Argomento di Widom	57
3.6.3	Omogeneità	58

3.6.4	Introduzione al gruppo di rinormalizzazione	60
3.6.5	Punti fissi nella teoria RG	62
3.6.6	Applicazione al modello di Ising 1D	64
A	Appendice	66
A.1	Nozioni termodinamiche di base	66
A.1.1	Potenziali termodinamici	66
A.2	Test di consistenza	67
A.3	Integrale nell'argomento di Peierls 1D	68

1 INTRODUZIONE ALLA MECCANICA STATISTICA

1.1 Principi della meccanica statistica

Per $\mathcal{N}$ copie dello stesso sistema, se il microstato i -esimo si estrae $\mathcal{N}_i$ volte, la probabilità che venga estratto è data da

$$p_i = \frac{\mathcal{N}_i}{\mathcal{N}}$$

Il fatto che i microstati si contino con indice discreto è dato dal fatto che occupano una porzione di un certo volume nello spazio delle fasi. I principi sono i seguenti.

- (a). **Principio di equiprobabilità.** Cellette di uguale volume nello spazio delle fasi hanno, a priori, la stessa probabilità di essere estratte.
- (b). **Ammissibilità delle estrazioni.** Gli stati in cui il sistema si può trovare devono rispettare certe condizioni legate a variabili macroscopiche, che definiscono l'ensemble con cui si descrive il sistema.
 - *Ensemble microcanonico:* sono costanti N , V e E (energia totale), quindi sono accessibili solo i microstati con energia fissa pari a E .
 - *Ensemble canonico:* sono costanti N , V e T (sistema a contatto con bagno termico) ed è nota l'energia interna del sistema:

$$U = \langle E \rangle = \frac{1}{\mathcal{N}} \sum_i \mathcal{N}_i E_i = \sum_i p_i E_i$$

- *Ensemble gran canonico:* sono costanti T , V e μ , in quanto il sistema scambia energia e particelle con l'ambiente, a temperatura e potenziale chimico costanti.
- (c). Per $\mathcal{N} \rightarrow +\infty$, si considera solo la distribuzione più probabile, mentre le altre sono trascurabili.

Ora si stabilisce come si calcola la probabilità di una distribuzione. Si indica con la successione $\{i_k\}_{k=1}^{\mathcal{N}}$ una successione di indici, dove i_k rappresenta il microstato in cui si trova la copia k -esima del sistema. Visto che ogni sequenza è equiprobabile, la probabilità di una deve essere proporzionale alla sua molteplicità $\mathcal{M}$, cioè al numero di sequenze distinte di estrazioni che portano ad una identica distribuzione¹. Allora, la distribuzione più probabile sarà quella con $\mathcal{M}$ più alto.

¹Per esempio, se $\mathcal{N} = 3$, con due uscite nel microstato 1 e una uscita nel microstato 2 (cioè $N_1 = 2$ e $N_2 = 1$), si ha le sequenze i_k che portano alla stessa distribuzione sono $(1, 1, 2)$, $(1, 2, 1)$, $(2, 1, 1)$.

Per determinare la molteplicità, si considera che permutare due indici relativi allo stesso microstato lascia invariata la successione¹, quindi

$$\mathcal{M}(\mathcal{N}_1, \mathcal{N}_2, \dots) = \frac{\mathcal{N}!}{\mathcal{N}_1! \mathcal{N}_2! \dots} = \frac{\mathcal{N}!}{\prod_i \mathcal{N}_i!}$$

Per $\mathcal{N} \rightarrow +\infty$, si può usare la formula di Stirling:

$$\log \mathcal{N}! \simeq \mathcal{N}(\log \mathcal{N} - 1)$$

da cui

$$\begin{aligned} \log \mathcal{M} &\simeq \mathcal{N}(\log \mathcal{N} - 1) - \sum_i \mathcal{N}_i(\log \mathcal{N}_i - 1) = \mathcal{N} \log \mathcal{N} - \sum_i \mathcal{N}_i \log \mathcal{N}_i \\ &= \mathcal{N} \log \mathcal{N} - \mathcal{N} \sum_i p_i (\log p_i + \log \mathcal{N}) = -\mathcal{N} \sum_i p_i \log p_i \end{aligned}$$

dove si è usato che $\sum_i \mathcal{N}_i = \mathcal{N}$, $\mathcal{N}_i = \mathcal{N} p_i$ e $\sum_i p_i = 1$. Visto che si deve massimizzare $\mathcal{M}$, la costante $\mathcal{N}$ è ininfluente, quindi si considera

$$\log \mathcal{M} \simeq - \sum_i p_i \log p_i \quad (1.1.1)$$

L'entropia, in meccanica statistica, si definisce come

$$S = -\kappa_B \sum_i p_i \log p_i \quad (1.1.2)$$

Il logaritmo serve a renderla estensiva, mentre $\mathcal{M}$, in un certo senso, misura l'ignoranza sul sistema. Questo motiva $S \propto \log \mathcal{M}$; la costante di proporzionalità si può dimostrare essere proprio κ_B .

1.2 Ensemble canonico

Si ammette la possibilità che il sistema scambi energia con l'ambiente, il quale funge da bagno termico e mantiene T costante. Si assume, inoltre, che $N_B \gg N_S$ (il bagno ha molte più particelle del sistema), ma comunque entrambi rilevanti a livello macroscopico.

Si tratta l'universo con il formalismo microcanonico, visto che la sua energia è costante; allora

$$E < E_S + E_B < E + \Delta E$$

con E energia universo e ΔE incertezza associata. Per avere una buona definizione di bagno termico, deve anche valere $E_B \gg E_S$. Visto che E_B ed E_S sono vincolate

¹Ad esempio $(1, 1, 2) = (1, 1, 2)$.

dall'energia E dell'universo, si può assumere che la distribuzione del sistema sia

$$\rho_S(\{\vec{q}_S\}, \{\vec{p}_S\}) \sim \Gamma_B(E_B)$$

con $\Gamma(E_B)$ numero di microstati del bagno a energia E_B . Per il terzo principio della meccanica statistica, ci si limita a considerare il valore $\bar{E}_B$ che massimizza Γ_B , con altri trascurabili; allora

$$S_B(E_B) = \kappa_B \log \Gamma_B(E_B) \simeq S_B(E) - E_S \left. \frac{\partial S_B}{\partial E_B} \right|_{E_B=E} + \dots$$

ottenuto sviluppando ad E . Usando che $\frac{1}{T} = \left. \frac{\partial S}{\partial E} \right|_V$, si ha $S_B(E_B) \simeq S_B(E) - E_S/T$, da cui

$$\Gamma_B(E_B) = \Gamma_B(E - E_S) \simeq e^{\frac{1}{\kappa_B} S_B(E)} e^{-\frac{E_S}{\kappa_B T}}$$

da cui $\rho_S \sim e^{-E_S/(\kappa_B T)}$.

2 MECCANICA STATISTICA CLASSICA DEI SISTEMI INTERAGENTI

2.1 Sistemi interagenti

Si considera un gas di N particelle descritto da un'hamiltoniana

$$H = \sum_{j=1}^N \frac{p_j^2}{2m} + \mathcal{V}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)$$

dove $\mathcal{V}$ è il termine di interazione, che si assume indipendente dai momenti. Si descrive tale sistema con il formalismo canonico; allora

$$Z = \frac{1}{N!h^{3N}} \int d^N \vec{q} d^N \vec{p} e^{-\beta H}$$

L'integrale nei momenti è facile perché risulta essere un integrale gaussiano¹:

$$\frac{1}{h^{3N}} \int d^N \vec{p} e^{-\beta \sum_j \frac{p_j^2}{2m}} = \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3N/2}$$

La parte complicata è relativa a quella sulle posizioni. Si indica con Z_N la parte della funzione di partizione relativa all'integrale della parte interagente dell'hamiltoniana:

$$Z_N := \int d^N \vec{x} e^{-\beta \mathcal{V}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)}$$

Conoscendo Z_N , si ricava tutta la fisica del sistema. Infatti:

$$\begin{aligned} F &= -\frac{1}{\beta} \log \left[\frac{1}{N!} \left(\frac{2\pi m}{h^2 \beta} \right)^{3N/2} \right] - \frac{1}{\beta} \log Z_N \\ U &= -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = \frac{3}{2} N \kappa_B T + \kappa_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \log Z_N \Big|_T \\ p &= -\frac{\partial F}{\partial V} \Big|_T = \kappa_B T \frac{\partial}{\partial V} \log Z_N \Big|_T \end{aligned}$$

da cui si ricava l'equazione di stato

$$\frac{pV}{N\kappa_B T} = \frac{V}{N} \frac{\partial}{\partial V} \log Z_N \Big|_T \quad (2.1.1)$$

Osservazione 2.1. Nel limite non interagente in cui $\mathcal{V} \equiv 0$, si vede che $Z_N = V^N$ (volume nel quale è confinato il gas), per cui

$$\frac{pV}{N\kappa_B T} = \frac{V}{N} N \frac{1}{V} = 1 \implies pV = N\kappa_B T$$

¹Si ricorda che $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\pi/\alpha}$.

che è l'equazione di stato del gas perfetto.

2.1.1 Interazione a due corpi

Si studia il caso in cui il potenziale sia della forma

$$\mathcal{V}(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N) = \sum_{i < j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)$$

La tecnica per calcolare Z_N è procedere iterativamente: si cerca di trovare Z_{N+1} in termini di Z_N , assumendo quest'ultima nota. Di seguito, si svolgono passaggi per esplicitare Z_N nel caso in cui si abbiano $N + 1$ particelle.

$$\begin{aligned} Z_{N+1} &= \int d^N \vec{x} \int d\vec{x}' e^{-\beta \sum_{i < j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} e^{-\beta \sum_{j=1}^N v(\vec{x}' - \vec{x}_j)} \\ &= \frac{\int d^N \vec{x} \int d\vec{x}' e^{-\beta \sum_{i < j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} e^{-\beta \sum_j v(\vec{x}' - \vec{x}_j)}}{\int d^N \vec{x} e^{-\beta \sum_{i < j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)}} \int d^N \vec{x} e^{-\beta \sum_{i < j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} \\ &= \left\langle \int d\vec{x}' e^{-\beta \sum_j v(\vec{x}' - \vec{x}_j)} \right\rangle_N Z_N \end{aligned}$$

dove il pedice N alla media si riferisce al fatto che è pesata con la funzione di distribuzione per il sistema di N particelle.

Per proseguire nello studio del sistema, si fa la seguente assunzione: *l'interazione tra le particelle del sistema avviene esclusivamente a coppie*. Questo significa che, qualora due particelle si trovino vicine a tal punto da interagire, è estremamente improbabile che ve ne siano altre che interagiscono. Se le particelle i e j sono vicine, si scrive che $\vec{x}_i \sim \vec{x}_j$.

Osservazione 2.2. Se $\vec{x}' \not\sim \vec{x}_i$, $\forall i = 1, \dots, N$, allora $e^{-\beta \sum_j v(\vec{x}' - \vec{x}_j)} \simeq 1$, per cui $Z_{N+1} \simeq V Z_N$.

Trascurando il caso banale nell'osservazione, rimane da studiare il caso $\vec{x}' \sim \vec{x}_i$, per qualche $i = 1, \dots, N$. In questo caso, si può considerare $e^{-\beta \sum_{i < j} v(\vec{x}_i - \vec{x}_j)} \simeq 1$, da cui

$$Z_{N+1} \simeq \frac{\int d\vec{x}' \int d^N \vec{x} e^{-\beta \sum_i v(\vec{x}' - \vec{x}_i)}}{V^N} Z_N$$

Visto che le particelle sono indistinguibili

$$Z_{N+1} \simeq \int d\vec{x}' \left(\int d\vec{y} e^{-\beta v(\vec{x}' - \vec{y})} \right)^N \frac{1}{V^N} Z_N$$

Aggiungendo e sottraendo 1, l'integrale tra parentesi è

$$\left[V - \int d\vec{y} \left(1 - e^{-\beta v(\vec{x}' - \vec{y})} \right) \right]^N$$

Ora si assume che il potenziale sia uniforme e, quindi, che $v(\vec{x}_i - \vec{x}_j) \equiv v(|\vec{x}_i - \vec{x}_j|)$; tramite un cambio di coordinate, allora:

$$\begin{aligned} a &:= \int dr \, 4\pi r^2 \left(1 - e^{-\beta v(r)} \right) \\ \Rightarrow Z_{N+1} &\simeq \frac{1}{V^N} \left(\int d\vec{x}' (V - a)^N \right) Z_N = \frac{V(V - a)^N}{V^N} Z_N = V \left(1 - \frac{a}{V} \right)^N Z_N \end{aligned}$$

visto che $(V - a)^N$ non dipende da $\vec{x}'$. Allora, si vede che $Z_1 = V$, $Z_2 = V(1 - a/V)Z_1$, e così via, per cui

$$Z_N = V^N \left(1 - \frac{a}{V} \right)^{1+2+\dots+(N-1)} = V^N \left(1 - \frac{a}{V} \right)^{\frac{N(N-1)}{2}}$$

Infine, si osserva che, nel limite termodinamico, cioè per grandi N , V e N/V costante, si ha

$$\left(1 - \frac{a}{V} \right)^{\frac{N(N-1)}{2}} = \exp \left[\frac{N(N-1)}{2} \log \left(1 - \frac{a}{V} \right) \right] \simeq \exp \left[\frac{N^2}{2} \log \left(1 - \frac{a}{V} \right) \right] \simeq \exp \left(\frac{-aN^2}{2V} \right)$$

da cui

$$Z_N \simeq V^N e^{-aN^2/(2V)}$$

Questa è l'espressione di *campo medio*.

2.1.2 Equazione di van der Waals

Ora si riprende l'equazione di stato in 2.1.1. Inserendo quanto appena ottenuto, si trova

$$\frac{pV}{N\kappa_B T} = 1 + \frac{Na}{2V}$$

Per capire meglio l'espressione, si esplicita a :

$$\begin{aligned} a &= 4\pi \int_0^{+\infty} dr \, r^2 \left(1 - e^{-\beta v(r)} \right) \\ &\simeq 4\pi \int_0^b dr \, r^2 (1 - 0) + 4\pi \int_b^{+\infty} dr \, r^2 \left(1 - e^{-\beta v} \right) \\ &\simeq \frac{4}{3}\pi b^3 - \frac{1}{\kappa_B T} 4\pi \int_b^{+\infty} dr \, r^2 (-v(r)) \\ &= V_b - \frac{D}{T} \end{aligned}$$

dove $V_b = \frac{4}{3}\pi b^3$ (volume sfera di raggio b) e $D = -\frac{1}{\kappa_B} \int_b^{+\infty} dr \, 4\pi r^2 v(r)$. Nella prima approssimazione sopra, si è scelto $v(r)$ simile a Lennard-Jones, approssimandolo come¹

$$v(r) = \begin{cases} +\infty & r \in [0, b] \\ v(r) < 0 & r \in (b, +\infty) \end{cases}$$

Nella seconda approssimazione, invece, si è assunto il caso di **alte temperature**, corrispondente a $\beta \ll 1$, per sviluppare l'esponenziale al primo ordine. In questo modo, l'equazione di stato diventa

$$\frac{pV}{N\kappa_B T} \simeq 1 + \frac{N}{2} \frac{V_b}{V} - \frac{ND}{2VT}$$

Questo può essere riscritto in una forma più nota:

$$\left(p + \frac{a_w}{V^2}\right)(V - b_w) = N\kappa_B T \quad (2.1.2)$$


dove $b_w = \frac{N}{2}V_b$ e $a_w = \frac{1}{2}N^2\kappa_B D$. Questa è l'*equazione di stato di van der Waals* (da cui i pedici w in a_w e b_w). Questa equazione permette di dire che, sotto le ipotesi trattate, in particolare quella di gas diluito, il gas si può descrivere tramite l'equazione di stato del gas perfetto, a patto di correggere pressione e volume opportunamente:

- il volume deve essere corretto perché le particelle non sono puntiformi, ma occupano un volume (sono circa sfere), quindi non possono sovrapporsi (viene diminuito tramite b_w);
- la pressione viene aumentata per via del potenziale considerato, il quale include una coda attrattiva che tende a non far allontanare liberamente le particelle tra loro.

Ora se ne studiano le isoterme nel piano (V, p) . Si vede che, al variare del valore fisso di temperatura, se ne trova uno in particolare che definisce la curva risultante; questo si chiama *temperatura critica*, T_c . Per $T > T_c$, la curva risultante assegna sempre una pressione ad un volume; nel caso di $T < T_c$, invece, la curva non è più iniettiva: si trovano dei valori di pressione raggiunti da volumi diversi. Mentre nel caso $T > T_c$, la relazione $\left.\frac{\partial p}{\partial V}\right|_T < 0$ è sempre verificata, si vede che per $T < T_c$, la variazione di pressione al variare del volume può diventare positiva, il che rappresenta un problema fisico perché indica instabilità nel gas. Quando $T = T_c$, invece, l'equazione diventa $(V - V_c)^3 = 0$ e presenta un punto di flesso in (T_c, p_c, V_c) , dove

$$T_c = \frac{8}{27} \frac{a}{b} \frac{1}{N\kappa_B} \quad p_c = \frac{a}{27b^2} \quad V_c = 3b \quad (2.1.3)$$

¹Cioè a meno di un tratto di discesa, diventa subito negativo dopo b e, dopo un minimo, si attesta sullo zero.



Si vedrà che questo punto, chiamato *punto critico*, è relativo ad una transizione di fase del secondo ordine; i tre punti di volume corrispondenti ad un certo valore di pressione nel caso di $T < T_c$, una volta corretti, si vedranno corrispondere ad una transizione di fase del primo ordine.

Osservazione 2.3. Definendo $\bar{p} = p/p_c$, $\bar{V} = V/V_c$ e $\bar{T} = T/T_c$, attorno al punto critico, l'equazione di van der Waals si può scrivere come


$$\left(\bar{p} + \frac{3}{\bar{V}^2}\right) \left(\bar{V} - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}\bar{T}$$

nota come *legge degli stati corrispondenti*. Si nota che questa non contiene alcuna informazione sulla natura del gas in esame, ossia sulla sostanza di cui è composto, visto che si riescono a eliminare le variabili a e b da cui tale dipendenza deriva.

2.1.3 Costruzione di Maxwell

Per risolvere il problema della zona instabile nel caso $T < T_c$, Maxwell ha proposto il seguente argomento. Il problema risiede nel fatto che, passando al grafico (V, F) tramite $F = \int p dV$ a T fissata, si vede che la curva prevista da van der Waals non minimizza l'energia libera di Helmholtz, causa dell'instabilità.

Allora si deve sostituire la parte prevista da van der Waals con una retta orizzontale a pressione $p_1 = p_2$ che, nel grafico (V, F) , sia la tangente alla curva nei punti V_1 e V_2 .



Questo permette di identificare i punti 1 e 2. Le condizioni imposte da questo ragionamento sono:

$$p_1 = p_2 \implies \left. \frac{\partial F}{\partial V_1} \right|_T = \left. \frac{\partial F}{\partial V_2} \right|_T$$

$$\frac{F_2 - F_1}{V_2 - V_1} = \left. \frac{\partial F}{\partial V_1} \right|_T$$

da cui

$$-\left. \frac{\partial F}{\partial V_1} \right|_T (V_2 - V_1) = -(F_2 - F_1) \implies p_1(V_2 - V_1) = \int_{V_1}^{V_2} p \, dV$$

Questo permette di concludere anche che la retta orizzontale $p_1 = p_2$ nel grafico (V, p) è tale per cui le aree A e B sono uguali. Infine, si nota che, durante l'intera retta rossa individuata da Maxwell, la sostanza che compone il sistema coesiste allo stato liquido e gassoso: per $V \leq V_1$, la sostanza è allo stato liquido; per $V \geq V_2$, la sostanza è allo stato gassoso; per $V \in (V_1, V_2)$, i due stati coesistono e la pressione è costante.

2.2 Espansioni in clusters

Si tratta di sviluppi di natura perturbativa, fondati sull'assunzione di gas con densità *piccola*. Permette una descrizione più accurata e generale di un sistema composto da un gas reale; si ritroverà il caso di van der Waals come sviluppo al primo ordine non-banale.

Osservazione 2.4. Questi sviluppi sono adeguati quando il sistema non si trova vicino a transizioni di fase, le quali sono caratterizzate da non-analiticità delle variabili termodinamiche del sistema.

Si utilizza il formalismo gran canonico per studiare un gas descritto dall'hamiltoniana

$$H = \sum_i \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i < j} v(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)$$

introdotta nelle sezioni precedenti. Si ricorda che la funzione di gran partizione è data da¹

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(T, V, \mu) &= \sum_{N=0}^{+\infty} e^{\beta\mu N} Z(T, V, N) \\ &= \sum_{N=0}^{+\infty} \frac{1}{N!} \frac{1}{\lambda_T^{3N}} e^{\beta\mu N} \int d^N \vec{r} \exp \left[-\beta \sum_{i < j} v(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|) \right] \\ &= \sum_{N=0}^{+\infty} \frac{e^{\beta\mu N}}{N! \lambda_T^{3N}} Z_N(T, V) \end{aligned}$$

¹Dalle sezioni precedenti, si ricorda che la parte dei momenti coinvolge integrali gaussiani già visti e rimane la parte difficile da trattare nelle coordinate.

dove $\lambda_T^2 = h^2/(2\pi m \kappa_B T)$, nota col nome di *lunghezza d'onda termica* e

$$v(r) \simeq \begin{cases} 0 & , r \rightarrow +\infty \\ +\infty & , r \rightarrow 0 \end{cases}$$

un potenziale del tipo Lennard-Jones. Per studiare Z_N , si definiscono le *funzioni di Mayer* $f_{ij} := e^{-\beta v(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)} - 1$, per cui

$$Z_N(T, V) = \int d^N \vec{r} \prod_{i < j} (1 + f_{ij})$$

Inoltre, si introduce la quantità $W_N(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \prod_{i < j} (1 + f_{ij})$, la cui giustificazione arriverà più avanti, tale per cui

$$\mathcal{Z}(T, V, \mu) = \sum_{N=0}^{+\infty} \frac{e^{\beta \mu N}}{N! \lambda_T^{3N}} \int d^N \vec{r} W_N(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) \quad (2.2.1)$$

2.2.1 Espansione in cumulanti

Per comodità, essendo che si dovrà valutare $\log \mathcal{Z}$, si scrive

$$\mathcal{Z}(T, V, \mu) = \exp \left[\sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{e^{\beta \mu \ell}}{\ell! \lambda_T^{3\ell}} \int d^\ell \vec{r} \mathcal{U}_\ell(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_\ell) \right] \quad (2.2.2)$$

nota come *espansione in cumulanti*. Si studia la relazione tra le espressioni in 2.2.1 e 2.2.2, esplicitando i primi termini della serie nella prima e i primi termini dello sviluppo in serie dell'esponenziale nella seconda, in quanto questi dovranno coincidere, termine a termine, per ciascun ordine dello sviluppo.

$$\begin{aligned} \mathcal{Z} &= 1 + \frac{e^{\beta \mu}}{\lambda_T^3} \int d\vec{r}_1 W_1(\vec{r}_1) + \frac{e^{2\beta \mu}}{2! \lambda_T^6} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 W_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) + \dots \\ \mathcal{Z} &= 1 + \left\{ \sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{e^{\beta \mu \ell}}{\ell! \lambda_T^{3\ell}} \int d^\ell \vec{r} \mathcal{U}_\ell \right\} + \frac{1}{2} \{ \dots \}^2 + \dots \\ &\simeq 1 + \frac{e^{\beta \mu}}{\lambda_T^3} \int d\vec{r}_1 \mathcal{U}_1(\vec{r}_1) + \frac{e^{2\beta \mu}}{2 \lambda_T^6} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \mathcal{U}_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) + \frac{1}{3!} \dots + \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(\frac{e^{2\beta \mu}}{\lambda_T^6} \int d\vec{r}_1 \int d\vec{r}_2 \mathcal{U}_1(\vec{r}_1) \mathcal{U}_1(\vec{r}_2) + \frac{e^{3\beta \mu}}{\lambda_T^9} \int d\vec{r}_1 \int d\vec{r}_2 \int d\vec{r}_3 \mathcal{U}_1(\vec{r}_1) \mathcal{U}_2(\vec{r}_2, \vec{r}_3) + \dots \right) \end{aligned}$$

dove l'ultima riga deriva dal termine al quadrato tra parentesi graffe nella forma esponenziale di $\mathcal{Z}$. In questo modo, eguagliando ciascun coefficiente per ogni potenza di

$\alpha = e^{\beta\mu}/\lambda_T^3$, si vede che, perché le due espressioni coincidano, deve valere

$$\begin{aligned} W_1(\vec{r}_1) &= \mathcal{U}_1(\vec{r}_1) & W_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= \mathcal{U}_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) + \mathcal{U}_1(\vec{r}_1)\mathcal{U}_1(\vec{r}_2) \\ W_3(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3) &= \mathcal{U}_3(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3) + \mathcal{U}_1(\vec{r}_1)\mathcal{U}_2(\vec{r}_2, \vec{r}_3) \\ &\quad + \mathcal{U}_1(\vec{r}_2)\mathcal{U}_2(\vec{r}_1, \vec{r}_3) + \mathcal{U}_1(\vec{r}_3)\mathcal{U}_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) + \mathcal{U}_1(\vec{r}_1)\mathcal{U}_1(\vec{r}_2)\mathcal{U}_1(\vec{r}_3) \end{aligned}$$

In generale, si vede che

$$\begin{aligned} W_N(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) &= \mathcal{U}_N(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) \\ &\quad + \sum_{\alpha=2}^N \frac{1}{\alpha!} \sum_{p_1=1}^{N-\alpha+1} \dots \sum_{p_{\alpha}=1}^{N-\alpha+1} \frac{N!}{p_1!p_2! \dots p_{\alpha}!} \mathcal{U}_{p_1} \dots \mathcal{U}_{p_{\alpha}} \delta \left(N - \sum_{\gamma=1}^{\alpha} p_{\gamma} \right) \end{aligned}$$

In questa formula, il termine $\frac{1}{\alpha!}$ tiene conto delle possibili permutazioni delle $\mathcal{U}_i$ in un termine che ne coinvolge il prodotto, come $\mathcal{U}_1\mathcal{U}_2 = \mathcal{U}_2\mathcal{U}_1$; il termine $\frac{N!}{p_1! \dots p_{\alpha}!}$, invece, tiene conto della possibilità di permutare le posizioni delle particelle che compaiono negli argomenti di una data $\mathcal{U}_k$, come $\mathcal{U}_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \mathcal{U}_2(\vec{r}_2, \vec{r}_1)$. Quest'ultimo è dovuto al fatto che le particelle sono identiche e si dovrà integrare su tutto lo spazio, pertanto i contributi saranno equivalenti sia che si chiami $\vec{r}_1$, che $\vec{r}_2$.

Osservazione 2.5. Si può far corrispondere ogni funzione di Mayer f_{ij} che compare in una W_N ad un grafo di N vertici, dove il vertice i e il vertice j sono connessi. Similmente, il prodotto di $f_{12}f_{23}$ in W_3 , per esempio, è assimilabile ad un grafo di 3 vertici, dove le connessioni sono tra 1 e 2 e tra 2 e 3. In questo senso, si vede che

$$W_3 = 1 + f_{12} + f_{13} + f_{23} + f_{12}f_{23} + f_{13}f_{23} + f_{13}f_{12} + f_{12}f_{13}f_{23}$$

è somma di grafi connessi (non separabili in sottografi), cioè le $f_{12}f_{23}$, $f_{13}f_{23}$, $f_{13}f_{12}$ e $f_{12}f_{13}f_{23}$, e grafi non connessi, dati dai termini rimanenti. In generale, ogni W_N segue la stessa logica: è somma di tutti i possibili grafi con N vertici. Si può vedere, invece, che le $\mathcal{U}_\ell$, invece, sono esclusivamente legate a grafi connessi perché, in W_N , la $\mathcal{U}_N$ è l'unica indecomponibile, per cui deve corrispondere al grafo completamente connesso con N vertici. Allora, l'espansione in cumulanti permette di considerare esclusivamente i termini corrispondenti a grafi connessi.

Per continuare lo studio di $\mathcal{Z}$, si definisce

$$b_\ell := \frac{1}{\ell!} \frac{1}{V} \int d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_\ell \mathcal{U}_\ell(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_\ell)$$

dove il fattore $1/V$ serve a rendere b_ℓ intensivo, visto che, come si vedrà, l'integrale porta un fattore pari a V . Con questa definizione, si ha:

$$\mathcal{Z} = \exp \left[V \sum_{\ell=1}^{+\infty} \frac{e^{\beta\mu\ell}}{\lambda_T^{3\ell}} b_\ell \right]$$

2.2.2 Equazione di stato ed espansione del viriale

Grazie all'espansione in cumulanti, si può calcolare direttamente il gran potenziale:

$$\Omega = -\kappa_B T \log \mathcal{Z} = -V \kappa_B T \sum_{\ell=1}^{+\infty} \alpha^\ell b_\ell$$

$$\Omega = -pV \implies p = \kappa_B T \sum_{\ell=1}^{+\infty} \alpha^\ell b_\ell$$

Però $\alpha = e^{\beta\mu}/\lambda_T^3$ coinvolge il potenziale chimico; per eliminarlo si considera che

$$\langle N \rangle = -\frac{\partial \Omega}{\partial \mu} \Big|_{T,V} \implies \frac{\langle N \rangle}{V} = \sum_{\ell=1}^{+\infty} \ell \alpha^\ell b_\ell$$

Per invertire la relazione ed esprimere μ in termini di $\langle N \rangle$, si espande la somma e si cerca una relazione ricorrente. Unendo le espressioni per p e $\langle N \rangle/V$ trovate, si ha:

$$\frac{pV}{\langle N \rangle \kappa_B T} = \frac{\sum_{\ell=1}^{+\infty} \alpha^\ell b_\ell}{\sum_{\ell=1}^{+\infty} \ell \alpha^\ell b_\ell} \stackrel{!}{=} \sum_{\ell=1}^{+\infty} \left(\frac{\langle N \rangle}{V} \right)^{\ell-1} B_\ell$$

L'ultima uguaglianza è nota come *espansione del viriale* ed è ottenuta imponendo che il rapporto tra le due serie restituisca una singola serie, i cui coefficienti B_ℓ sono noti come *coefficienti del viriale*.

Al solito, per trovare i coefficienti, si sviluppano le due somme, con l'ipotesi di $\alpha \ll 1$ (corrispondente a bassa densità) e si eguagliano i coefficienti dei termini con stesso ordine di sviluppo:

$$\frac{\sum_{\ell=1}^{+\infty} \alpha^\ell b_\ell}{\sum_{\ell=1}^{+\infty} \ell \alpha^\ell b_\ell} = \sum_{\ell} B_\ell \left(\sum_j j \alpha^j b_j \right)^{\ell-1}$$

$$\frac{b_1 \alpha + b_2 \alpha^2 + b_3 \alpha^3 + \dots}{b_1 \alpha + 2b_2 \alpha^2 + 3b_3 \alpha^3 + \dots} = B_1 + B_2 (b_1 \alpha + 2b_2 \alpha^2 + \dots) + B_3 (b_1^2 \alpha^2 + 4b_1 b_2 \alpha^3 + \dots)$$

Intanto si semplifica un α nel rapporto a sinistra; l'idea è di sviluppare il denominatore, portandolo al numeratore. Prima di farlo, si osserva che $b_1 = 1$; infatti, $\mathcal{U}_1 = W_1 = 1$, da cui

$$b_1 = \frac{1}{V} \int d\vec{r}_1 \mathcal{U}_1(\vec{r}_1) = \frac{V}{V} = 1$$

Allora

$$\frac{b_1}{b_1 + 2b_2 \alpha + 3b_3 \alpha^2 + \dots} = \frac{1}{1 + 2b_2 \alpha + 3b_3 \alpha^2 + \dots}$$

$$\simeq 1 - 2b_2 \alpha - 3b_3 \alpha^2 + \dots + 4b_2^2 \alpha^2 + 9b_2 b_3 \alpha^3 + \dots$$

In questo modo, si vede che il termine senza α è $B_1 = 1$; per i termini in α , invece, si ha $B_2 = b_2 - 2b_2 = -b_2$. La regola generale è

$$B_n = -\frac{1}{(n-2)!V^n} \sum \left\{ \begin{array}{l} \text{grafi con n vertici che rimangono connessi} \\ \text{se si toglie un vertice e le sue connessioni con gli altri} \end{array} \right\}$$

Quelli descritti nella somma sono detti *grafi completamente connessi*. Riprendendo l'espansione del viriale, si vede che

$$\frac{pV}{\langle N \rangle \kappa_B T} = B_1 + B_2 \frac{\langle N \rangle}{V} + \dots = 1 - b_2 \frac{\langle N \rangle}{V} + \dots$$

A meno di un segno meno derivante dalla definizione di funzione di Mayer data in questa trattazione, l'equazione di stato

$$\frac{pV}{\langle N \rangle \kappa_B T} = 1 - b_2 \frac{\langle N \rangle}{V}$$

è esattamente quella che permette di ritrovare l'equazione di van der Waals.

Si può calcolare il fattore correttivo successivo a van der Waals; svolgendo il calcolo, si trova

$$B_3 = 4b_2^2 - 2b_3 = 4 \left(-\frac{1}{2} \int d\vec{r} f(\vec{r}) \right)^2 - 2 \frac{1}{6V} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3 (3f_{12}f_{23} + f_{12}f_{13}f_{23})$$

Tramite il cambio di variabili

$$\begin{cases} \vec{R}_1 = \vec{r}_1 - \vec{r}_2 \\ \vec{R}_2 = \vec{r}_3 - \vec{r}_2 \\ \vec{R}_3 = 2\vec{r}_3 - \vec{r}_1 \end{cases} \quad (2.2.3)$$

si può dimostrare che¹

$$-\frac{1}{V} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3 f_{12}f_{23} = -\frac{1}{V} \int d\vec{R}_1 d\vec{R}_2 d\vec{R}_3 f(|\vec{R}_1|) f(|\vec{R}_2|)$$

per cui l'integrale in $d\vec{R}_3$ porta un volume, che si semplifica con il $1/V$ davanti e, quindi, questo si semplifica con $4 \left(-\frac{1}{2} \int d\vec{r} f(\vec{r}) \right)^2$. Ne segue che

$$B_3 = -\frac{1}{3V} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3 f_{12}f_{23}f_{13}$$

in accordo con la formula generale per B_n , visto che si dimostra che l'unico grafo completamente connesso con 3 vertici è quello in cui tutti e tre i punti sono connessi.

¹Nell'ultima uguaglianza, si sta sottintendendo che gli integrali di $f_{12}f_{23}$, $f_{12}f_{13}$ e $f_{13}f_{23}$ sono uguali.

2.2.3 Espansione del viriale per sfere rigide

Si considera il caso in cui le particelle del gas sono delle sfere rigide (hard spheres) ed interagiscono, quindi, solo a contatto. Questo viene formalizzato nel potenziale

$$v_{HS}(r) = \begin{cases} +\infty & , r < \sigma \\ 0 & , r > \sigma \end{cases}$$

dove σ rappresenta il diametro delle sfere¹. Tramite la sostituzione $\vec{R} = \frac{\vec{r}_1 + \vec{r}_2}{2}$ e $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$, si può calcolare

$$B_2 = -\frac{1}{2V} \int d\vec{R} \int d\vec{r} \left(e^{-\beta v(|\vec{r}|)} - 1 \right) = -2\pi \int dr r^2 \left(e^{-\beta v(r)} - 1 \right) = \frac{2\pi}{3} \sigma^3$$

dove, nell'ultimo integrale, si è passati in coordinate polari. Per B_3 , invece, utilizzando il cambio di variabili in 2.2.3, si ha:

$$\begin{aligned} B_3 &= -\frac{1}{3V} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 d\vec{r}_3 f_{12} f_{23} f_{13} \\ &= -\frac{1}{3V} \int d\vec{R}_1 d\vec{R}_2 d\vec{R}_3 \left(e^{-\beta v(|\vec{R}_1|)} - 1 \right) \left(e^{-\beta v(|\vec{R}_2|)} - 1 \right) \left(e^{-\beta v(|\vec{R}_1 - \vec{R}_2|)} - 1 \right) \end{aligned}$$

Per come è costruito v_{HS} , se $r < \sigma$, allora $f = -1$; se $r > \sigma$, allora $f = 0$. Utilizzando questo comportamento del potenziale, si possono calcolare gli integrali individuando il dominio di integrazione corretto.

Nel caso 1D, ad esempio, per avere un integrando non-banale, si devono verificare le condizioni

$$\begin{cases} |R_1| < \sigma \\ |R_2| < \sigma \\ |R_1 - R_2| < \sigma \end{cases}$$

da cui si ottiene il dominio di integrazione. L'area di questo dominio di integrazione è $D = \frac{6}{8}(2\sigma)^2$, per cui si ottiene

$$B_3 = \frac{1}{3} \int_D dR_1 dR_2 = \frac{1}{3} \frac{6}{8} (2\sigma)^2 = \sigma^2$$

Nel caso 3D, invece, individuare il dominio di integrazione è più complicato. Si utilizza il cambio di variabili

$$\begin{cases} \vec{q} = \vec{R}_1 - \vec{R}_2 \\ \vec{Q} = \frac{1}{2} (\vec{R}_1 + \vec{R}_2) \end{cases}$$

¹Se $r < \sigma$, con $\sigma = 2R$ e R raggio della singola sfera, allora significa che due sfere si stanno compenetrando, per cui il potenziale deve valere infinito in accordo con l'assunzione di sfere rigide.

da cui si ottiene

$$B_3 = -\frac{1}{3} \int_D d\vec{q} d\vec{Q} \left(e^{-\beta v(|\vec{Q} + \vec{q}/2|)} - 1 \right) \left(e^{-\beta v(|\vec{Q} - \vec{q}/2|)} - 1 \right) \left(e^{-\beta v(|\vec{q}|)} - 1 \right)$$

Ne segue che i vincoli per ottenere il dominio di integrazione D sono:

$$\begin{cases} |\vec{Q} + \vec{q}/2| < \sigma \\ |\vec{Q} - \vec{q}/2| < \sigma \\ |\vec{q}| < \sigma \end{cases}$$

Questi permettono di descrivere D come la regione di intersezione tra due sfere di raggio σ ; sapendo che il volume di una calotta sferica di altezza h di una sfera di raggio R è $V_{\text{cap}} = \frac{\pi}{3} h^2 (3R - h)$, si conclude che

$$B_3 = \frac{1}{3} \iint_D d\vec{q} d\vec{Q} = \frac{1}{3} \int_D d\vec{q} 2V_{\text{cap}} = \frac{5}{18} \pi^2 \sigma^6$$

dove $R = \sigma$, visto che le sfere in considerazione hanno raggio σ .

2.2.4 Sfere rigide in 1D

In realtà, in 1D, il problema delle sfere rigide si può risolvere esattamente. Le particelle vivono in uno spazio 1D (segmento), che si assume essere $[0, L]$. Si indica con a il diametro della singola sfera. La posizione di ogni sfera, relativa all'estremità destra di tale sfera¹, è indicata con x_i , $i = 1, \dots, N$, con la convenzione per cui più piccolo è il pedice, più la particella si trova vicina a 0; in questo modo, sono ordinate lungo il segmento $[0, L]$, con x_N quella più vicina ad L .

Si fissa il numero di particelle a N e si usa il formalismo canonico. Si nota che la posizione delle particelle, visto l'ordinamento dato, non può essere arbitraria; la particella x_i è sempre compresa tra la particella x_{i-1} e x_{i+1} e non possono compenetrarsi. Il possibile spazio in cui si può trovare è tra $x_{i-1} + a$ e $L - (N - i)a$ perché più a sinistra di $x_{i-1} + a$ non può andare altrimenti compenetrerebbe la particella $i - 1$ -esima e il potenziale varrebbe $+\infty$, portando integrando nullo; allo stesso tempo, non può trovarsi più a destra dello spazio occupato se tutte le sfere dalla $i + 1$ -esima alla N -esima fossero tutte attaccate a partire dall'estremità L , altrimenti, di nuovo, si avrebbe integrando nullo. Questo significa che la funzione di partizione canonica si esprime come

$$Z = \frac{1}{h^N} \int d^N p e^{-\beta p^2/2m} \int_a^{L-(N-1)a} dx_1 \cdots \int_{x_{N-2}+a}^{L-a} dx_{N-1} \int_{x_{N-1}+a}^L dx_N$$

¹Cioè x_i rappresenta il bordo destro della sfera i -esima.

Gli integrali relativi al potenziale si possono calcolare iterativamente. Si nota che

$$\begin{aligned}
I_N &= \int_{x_{N-1}+a}^L dx_N = L - (x_{N-1} + a) & I_{N-1} &= \frac{1}{2} (L - (x_{N-2} + 2a))^2 \\
&\vdots \\
I_{N-k} &= \frac{1}{(k+1)!} [L - (x_{N-k+1} + (k+1)a)]^{k+1} \\
&\vdots \\
I_1 &= \frac{1}{N!} [L - (x_0 + Na)]^N
\end{aligned}$$

con $x_0 = 0$, visto che si è preso, come bordo sinistro, 0. In questo modo, si conclude che

$$Z = \frac{1}{N! \lambda_T^N} (L - Na)^N$$

Per trovare l'equazione di stato, a questo punto, essendo nel formalismo canonico, si calcola l'energia libera di Helmholtz $F = -\kappa_B T \log Z$, visto che Z è nota, e, poi, si ottiene la *pressione*

$$f = - \left. \frac{\partial F}{\partial L} \right|_T$$

dove si è indicata con f perché, essendo in 1D, non si deriva rispetto al volume, ma rispetto alla lunghezza, trovando a tutti gli effetti una forza. Svolgendo il conto, si trova che

$$f = \kappa_B T \frac{N}{L - Na}$$

Sviluppando questo in approssimazione di bassa densità $\rho = N/L \ll 1$, si trova l'espansione del viriale vista precedentemente:

$$\frac{fL}{N\kappa_B T} = \frac{L}{L - Na} \simeq 1 + a\rho + a^2\rho^2 + \dots$$

che è consistente con i coefficienti trovati nella sezione precedente.

2.3 Densità, funzioni di correlazione ed equazione di stato

2.3.1 Densità

L'idea è arrivare a ottenere una equazione di stato espressa in termini di funzioni di correlazione a due punti densità-densità, invece che tramite espansione del viriale.

Per farlo, si deve intanto dare una definizione di densità, associata alla probabilità di trovare una particella in una posizione. La probabilità che le N -particelle del sistema si

trovino nelle posizioni $\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N$ rispettivamente è data da

$$p(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N) = \frac{1}{Z_N} e^{-\beta \sum_{i < j} v_{ij}(\vec{r}_i - \vec{r}_j)}$$

dove si sta tralasciando la parte relativa agli impulsi, visto che quella dipendente dalle coordinate è quella più complicata da integrare. La densità di particelle in un punto si può definire, allora, come la probabilità di trovare una particella in tale punto $\vec{r}$ e tutte le altre altrove:

$$n_1(\vec{r}) := \left\langle \sum_{k=1}^N \delta(\vec{r} - \vec{r}_k) \right\rangle = \frac{1}{Z_N} \sum_{k=1}^N \int d^N \vec{r} \delta(\vec{r} - \vec{r}_k) e^{-\beta \sum_{i < j} v_{ij}}$$

dove la media è intesa come media di ensemble. In condizioni di simmetria del sistema, cioè gas omogeneo, isotropo, con particelle identiche eccetera, ogni integrale è uguale e, semplificando la δ con l'integrale rispetto a $d\vec{r}_1$, si ottiene

$$n_1(\vec{r}) = N \int d\vec{r}_2 \dots d\vec{r}_N p(\vec{r}, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) \quad (2.3.1)$$

Questo si può generalizzare a più particelle; per esempio, si può definire la funzione di correlazione densità-densità

$$n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) := \left\langle \sum_{i=1}^N \delta(\vec{r}_1 - \vec{r}_i) \sum_{j \neq i}^N \delta(\vec{r}_2 - \vec{r}_j) \right\rangle$$

corrispondente a trovare la prima particella in $\vec{r}_1$ e un'altra, diversa, particella in $\vec{r}_2$. In condizioni di simmetria come nel caso precedente, essendo indifferente quali coppie di particelle si considerano, si conclude che

$$n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = N(N-1) \int d\vec{r}_3 \dots d\vec{r}_N p(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3, \dots, \vec{r}_N) \quad (2.3.2)$$

con $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ fissati, mentre le altre coordinate sono integrate su tutto lo spazio. Il fattore $N(N-1)$ corrisponde all'argomento combinatorio di poter assegnare N particelle in $\vec{r}_1$ e, avendone già assegnata una, quelle disponibili per $\vec{r}_2$ sono $N-1$. Più in generale, si può definire

$$n_k(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_k) = \frac{N!}{(N-k)!} \int d\vec{r}_{k+1} \dots d\vec{r}_N p(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$$

2.3.2 Equazione di stato

Quella più importante rimane la n_2 perché si può dimostrare che entra direttamente nell'equazione di stato. Per vederlo, si procede per conto diretto. Si considera che,

indicando con K l'energia cinetica e U quella potenziale, si ottiene¹:

$$\begin{aligned}\langle E \rangle &= \langle K \rangle + \langle U \rangle = \frac{3}{2} N \kappa_B T - \frac{1}{Z_N} \frac{\partial Z_N}{\partial \beta} \\ &= \frac{3}{2} N \kappa_B T + \frac{1}{Z_N} \sum_{i < j} \int d\vec{r}_1 \dots d\vec{r}_N v(\vec{r}_{ij}) e^{-\beta \sum_{i < j} v(\vec{r}_{ij})} \\ &= \frac{3}{2} N \kappa_B T + \frac{1}{2} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 v(\vec{r}_{12}) n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2)\end{aligned}$$

questo sempre sotto le opportune ipotesi di omogeneità, isotropia, particelle identiche eccetera, da cui il fattore $\frac{N(N-1)}{2}$ perché tutti quegli integrali sono uguali e il fattore conta le combinazioni di i, j , per $i \neq j$.

Per arrivare alla funzione di stato, si calcola $p = - \frac{\partial F}{\partial V} \Big|_T = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial V} \log Z_N$, immaginando il caso più semplice per svolgere i calcoli in cui il sistema sia confinato in un volume $V = L^3$. In questo modo

$$\frac{\partial}{\partial V} \log Z_N = \frac{L}{3V} \frac{1}{Z_N} \frac{\partial Z_N}{\partial L}$$

Per terminare il calcolo, si definisce il cambio di variabili $\vec{s}_i = \vec{r}_i/L$ (si divide ogni componente di $\vec{r}_i$ per L); in questo modo, svolgendo i calcoli, si trova

$$p = \frac{N \kappa_B T}{V} - \frac{1}{6V} \int d\vec{r}_1 d\vec{r}_2 \left[\vec{r}_{12} \cdot \frac{\partial v(\vec{r}_{12})}{\partial \vec{r}_{12}} \right] n(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$$

Da questa espressione, si conclude che la $n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$ determina la termodinamica del sistema. Questo vuol dire che, per studiare un sistema, o si calcola l'espansione in clusters, oppure si cerca un modo per calcolare la n_2 .

2.3.3 Equazione di Born-Green

Questa è un'equazione differenziale che permette di determinare $n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$; inoltre, rappresenta un esempio particolare di *gerarchia BBGKY* (Bogoljubov-Born-Green-Kirkwood-Yvon), che sono equazioni differenziali per trovare la funzione di correlazione k -esima.

Per ricavare l'equazione di Born-Green, si considera il seguente passaggio:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \vec{r}_1} n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) &= \frac{N(N-1)}{Z_N} \int d\vec{r}_3 \dots d\vec{r}_N \frac{\partial}{\partial \vec{r}_1} \left(e^{-\beta \sum_{i < j} v(\vec{r}_i - \vec{r}_j)} \right) \\ &= \frac{N(N-1)}{Z_N} \int d\vec{r}_3 \dots d\vec{r}_N (-\beta) \left[\frac{\partial}{\partial \vec{r}_1} v(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) + \frac{\partial}{\partial \vec{r}_1} \sum_{j \geq 3} v(\vec{r}_1 - \vec{r}_j) \right] e^{-\beta \sum_{i < j} v_{ij}} \\ &= -\beta \left[\frac{\partial}{\partial \vec{r}_1} v(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \right] - \beta \frac{N(N-1)}{Z_N} \int d\vec{r}_3 \dots d\vec{r}_N \left(\sum_{j \geq 3} \frac{\partial}{\partial \vec{r}_j} v_{1j} \right) e^{-\beta \sum_{i < j} v_{ij}}\end{aligned}$$

¹Il risultato della parte cinetica è giustificato dal fatto che è relativa ad un gas perfetto, avendola separata da quella potenziale.

Ora si può usare il fatto che si considerano sistemi omogenei, isotropi, con particelle indistinguibili, per cui la somma su $j \geq 3$ restituisce termini tutti uguali tra loro, il che fa comparire un fattore $N - 2$. A questo punto, nel secondo termine, si ritrova proprio la n_3 , per cui si ricava proprio l'equazione di Born-Green cercata:

$$\vec{\nabla}_1 n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = -\beta \left(\vec{\nabla}_1 v(\vec{r}_{12}) \right) n_2(\vec{r}_1, \vec{r}_2) - \beta \int d\vec{r}_3 \left(\vec{\nabla}_1 v(\vec{r}_{13}) \right) n_3(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3) \quad (2.3.3)$$

Osservazione 2.6. Da questa equazione, per ottenere la n_2 , è necessario conoscere preliminarmente la n_3 ; applicando lo stesso discorso alla n_3 , si arriva a trovare una catena di equazioni differenziali che non si chiudono, similmente a quanto succede per la gerarchia BBGKY.

Per proseguire il calcolo, si utilizza l'approssimazione di Kirkwood:

$$n_3(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3) \simeq \frac{n_2(\vec{r}_{12})n_2(\vec{r}_{13})n_2(\vec{r}_{23})}{n_1^3} \quad (2.3.4)$$

Un argomento di natura probabilistica permette di validare questa approssimazione, qualora le particelle del gas siano sufficientemente diluite; questo è in accordo col fatto che tale approssimazione deve, in qualche modo, ricondurre l'equazione di stato a quanto trovato tramite lo sviluppo in clusters. In particolare, l'assunzione che si fa è dire che le tre particelle in $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$ e $\vec{r}_3$ non sono tutte e tre vicine, ossia che solo due tra queste interagiscono, ossia si compenetrano, visto il potenziale in considerazione.

Ora si giustifica tale approssimazione in questo caso appena descritto tramite un'interpretazione probabilistica. Per la formula di Bayes, si ha che

$$p(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3) = p(\vec{r}_3 \mid \vec{r}_1, \vec{r}_2)p(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$$

Assumendo che trovare la particella 3 in $\vec{r}_3$ non influenzi il trovare la particella 1 in $\vec{r}_1$, si può approssimare $p(\vec{r}_3 \mid \vec{r}_1, \vec{r}_2) \simeq p(\vec{r}_3 \mid \vec{r}_2)$. Per la stessa motivazione, essendo i due eventi indipendenti, si può anche approssimare $p(\vec{r}_1, \vec{r}_3) \simeq p(\vec{r}_1)p(\vec{r}_3)$. Mettendo tutto insieme, si ottiene:

$$p(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3) = \underbrace{\frac{p(\vec{r}_3, \vec{r}_2)}{p(\vec{r}_2)}}_{=p(\vec{r}_3|\vec{r}_2)} p(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \underbrace{\frac{p(\vec{r}_1, \vec{r}_3)}{p(\vec{r}_1)p(\vec{r}_3)}}_{=1} = \frac{p(\vec{r}_1, \vec{r}_2)p(\vec{r}_2, \vec{r}_3)p(\vec{r}_1, \vec{r}_3)}{p(\vec{r}_1)p(\vec{r}_2)p(\vec{r}_3)}$$

in completa consistenza con l'approssimazione di Kirkwood.

3 TRANSIZIONI DI FASE

Si manifestano come discontinuità nelle proprietà termodinamiche di un sistema. Queste possono tradursi in:

- (a). cambiamento dello stato del sistema, ossia passaggio da liquido a solido, per esempio;
- (b). cambiamento della *simmetria del sistema*, come per esempio l'arrangiamento dei dipoli magnetici in un ferromagnete e in un paramagnete¹;
- (c). cambiamenti nella topologia del sistema, cioè una modifica nelle proprietà globali del sistema, non individuabili localmente.

Definizione 3.1 (Ordine di una transizione di fase). Secondo Ehrenfest, l'ordine di una transizione di fase è l'ordine della prima derivata discontinua dei potenziali termodinamici.

Esempio 3.1. Si possono verificare discontinuità nella densità o nell'entropia; entrambi questi casi sono spesso legati a cambiamenti di stato:

$$V = \left. \frac{\partial G}{\partial p} \right|_T \quad S = - \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_p$$

Visto che la discontinuità è presente nel primo ordine di derivazione del potenziale di Gibbs, questi cambiamenti di stato sono transizioni di fase del primo ordine, secondo Ehrenfest.

Esempio 3.2. Si può avere una magnetizzazione

$$m = - \left. \frac{\partial F}{\partial H} \right|_{T,V}$$

continua, ma si potrebbero avere discontinuità, o divergenze, della suscettività magnetica

$$\chi := \frac{\partial m}{\partial H}$$


Questo, quindi, corrisponde ad una transizione di fase del secondo ordine e un esempio concreto in cui si verifica è il passaggio da ferromagnete a paramagnete e viceversa.

Osservazione 3.1. In realtà, non vi sono differenze sostanziali tra le transizioni di fase del secondo e ordini superiori; inoltre, spesso capita che il problema non sia una discontinuità, ma divergenze, come per la suscettività magnetica. Per questo motivo, la classificazione secondo Ehrenfest non è utilizzata.

¹Con questo si intende, per esempio, il passaggio da ferromagnete a paramagnete. Questo cambiamento porta i dipoli, tutti allineati lungo una direzione, ad arrangersi casualmente, cioè si passa da un arrangiamento simmetrico ad uno non-simmetrico

Si parla, ad oggi, di transizioni del primo ordine e di transizioni *continue*, cioè tutte quelle che non hanno discontinuità nella derivata prima.

Le transizioni di fase del primo ordine nei diagrammi di fase corrispondono alle linee rosse continue; le transizioni di fase del secondo ordine, invece, si verificano nelle regioni attorno al punto in cui una di queste linee rosse si blocca, cioè attorno al punto critico.



L'equazione di stato di van der Waals permette di descrivere proprio quello che succede attorno a questi punti critici; in realtà, permette di individuare proprio quel valore di temperatura, la temperatura critica, per cui, in un diagramma (ρ, T) si distinguono regioni in cui il sistema è gassoso (tipicamente a densità basse), liquido (tipicamente a densità alte) e in cui i due stati coesistono.

In prossimità dei punti critici, si vedrà che sarà possibile individuare la divergenza di alcune quantità. Per esempio, nelle vicinanze di punti critici, si possono osservare degli andamenti divergenti di alcune quantità, come

$$k_T \sim |T - T_C|^{-\gamma}$$

$$C_V \sim |T - T_C|^{-\alpha}$$

con γ e α noti come *esponenti critici*.

3.1 Teoria di Lee-Yang

Permette di individuare le transizioni di fase come singolarità nella funzione di partizione. Si parte dalla funzione di gran partizione, in quanto si intende studiare il sistema tramite il formalismo gran canonico; si ha

$$\mathcal{Z}(z, T, V) = \sum_{N=0}^M z^N Z(N, T, V)$$

con z fugacità, Z la funzione di partizione canonica, e si deve avere $M < +\infty$ qualora il sistema sia finito, ossia nel caso in cui V sia limitato¹.

¹Questo perché le particelle non possono sovrapporsi, quindi in un volume finito, se ne possono avere un numero finito.

Nel caso in cui la somma sia finita, non ci si aspettano comportamenti strani:

$$\mathcal{Z} = 1 + zZ(1, T, V) + z^2 Z(2, T, V) + \dots + z^M Z(M, T, V) > 1$$

dove il > 1 è dato dal fatto che $z = e^{\beta\mu}$ e le funzioni di partizione canoniche sono sempre positive. Ne segue che $\mathcal{Z}$ è un polinomio di grado M in z , per cui ammette esattamente M radici nel campo complesso. Indicando con $\xi_1, \dots, \xi_M$ le sue radici, assumendo che siano tutte distinte, si può scrivere

$$\mathcal{Z}(z) = \prod_{N=1}^M \left(1 - \frac{z}{\xi_N}\right)$$

Visto che $\mathcal{Z}(0) = 1$ e le Z sono tutte positive, con $z > 1$, si vede che le ξ_k non possono appartenere alla retta reale positiva. In realtà, quello che si può far vedere è che le radici sono a coppie di complessi coniugati, cioè se ξ_j è radice, allora ξ_j^* anche lo è. Questo è dato dal fatto che la funzione di gran partizione deve essere una funzione reale, ossia invariante sotto coniugio complesso. Per il formalismo gran canonico, si ha

$$\begin{cases} \frac{p}{\kappa_B T} = \frac{1}{V} \log \mathcal{Z}(z, T, V) \\ \frac{1}{v} = \frac{\langle N \rangle}{V} = \frac{1}{V} z \frac{\partial}{\partial z} \log \mathcal{Z}(z, T, V) \end{cases}$$

Ora, se V è finito, quindi $N < +\infty$, non ci si aspettano singolarità; anzi, il sistema è stabile: si ha $p > 0$ e, essendo

$$v = \frac{V}{z \partial_z \log \mathcal{Z}} \implies \left. \frac{\partial v}{\partial z} \right|_T = -V \frac{\partial_z \log \mathcal{Z} + z \partial_z^2 \log \mathcal{Z}}{(z \partial_z \log \mathcal{Z})^2}$$

vale

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial p}{\partial v} \right|_T &= \left. \frac{\partial p}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v} \right|_T = \left(\frac{\kappa_B T}{V} \frac{\partial}{\partial z} \log \mathcal{Z} \right) \frac{1}{\left. \frac{\partial v}{\partial z} \right|_T} \\ &= -\frac{\kappa_B T}{V^2} \frac{z^2 (\partial_z \log \mathcal{Z})^3}{\partial_z \log \mathcal{Z} + z \partial_z^2 \log \mathcal{Z}} < 0 \end{aligned}$$

Quest'ultima entra nella compresibilità isoterma $k_T^{-1} = -v \left. \frac{\partial p}{\partial v} \right|_T$, che risulta, quindi, positiva, senza risultare in instabilità.

Se, al contrario, nel limite termodinamico, le equazioni riportate sopra diventano:

$$\begin{cases} \frac{p}{\kappa_B T} = \lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} \log \mathcal{Z} \\ \frac{1}{v} = \lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} z \frac{\partial}{\partial z} \log \mathcal{Z} \end{cases}$$

In questo caso, il limite può causare problemi, anche perché non è chiaro in principio se si possa scambiare con la derivata parziale, visto che la $\mathcal{Z}$, essendo ora una somma infinita di termini, può presentare punti di non analiticità. La teoria di Lee-Yang prevede i seguenti teoremi, che permettono di capire quando nascono singolarità.

Teorema 3.1. Il limite

$$\mathcal{F}(z) = \lim_{V \rightarrow +\infty} \frac{1}{V} \log \mathcal{Z}$$

esiste per ogni valore di $z > 0$. Inoltre, il risultato di tale limite è una funzione continua e non decrescente in z . In generale, poi, $\mathcal{F}(z)$ non dipende da V , a patto che la sua superficie non aumenti più velocemente di $V^{2/3}$ (a meno di frattali, quindi).

Teorema 3.2. Se R è una regione del piano complesso in cui non sono presenti zeri di $\mathcal{Z}$, allora $\mathcal{F}_V(z)$ converge uniformemente sui compatti di R , per $V \rightarrow +\infty$.

Come conseguenza di questo secondo teorema, la teoria matematica afferma che è possibile scambiare il limite con la derivata e questo corrisponde ai casi in cui non si verificano singolarità. Ne segue che, nella regione R , il sistema è termodinamicamente stabile, con

$$\frac{p}{\kappa_B T} = \mathcal{F}(z) \quad v^{-1}(z) = z \frac{\partial}{\partial z} \mathcal{F}(z)$$

e si può dimostrare che $p > 0$ e $\frac{\partial p}{\partial v} < 0$.

Per evidenziare la stabilità termodinamica in R , si nota che, il primo teorema assicura $\frac{\partial p}{\partial z} \geq 0$, cioè $p(z)$ è una funzione crescente; inoltre, si può vedere che v^{-1} non decresce in funzione di z perché

$$z \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{v} = z \frac{\partial}{\partial z} \left(z \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{V} \log \mathcal{Z} \right) \propto \text{Var } N$$

per quanto visto nella trattazione del formalismo gran canonico. Visto che le fluttuazioni di N devono essere positive, allora v^{-1} deve essere crescente in z (cioè $\partial_z v^{-1} \geq 0$). Combinando questi due risultati, eliminando la fugacità, si ottiene $\frac{\partial p}{\partial v} \leq 0$, cioè la pressione decresce con l'aumentare del volume, il che individua una regione di stabilità termodinamica per il sistema.

Quello che la teoria di Lee-Yang permette di comprendere è che, se $V < +\infty$, la funzione di gran partizione è analitica in z , quindi neanche p e v . Nel caso in cui $V \rightarrow +\infty$, invece, gli zeri di $\mathcal{Z}(z)$ possono accumularsi e tendere arbitrariamente vicino all'asse reale; questo significa che esisterà un punto di tale asse reale attorno al quale non si riesce a trovare una regione libera da zeri. Questo punto reale è proprio il punto critico ed è dove si verificano le transizioni di fase.

Teorema 3.3 (Teorema del cerchio). Per un sistema con particelle disposte a reticolo

(cioè senza sovrapporsi) e soggette a potenziale della forma

$$v_{ij} = \begin{cases} +\infty & , i = j \\ < 0 & , i \neq j \end{cases}$$

allora $\mathcal{Z}(z, T, V) = 0 \iff |z| = 1$.

Osservazione 3.2. Questo teorema permette di concludere che un'eventuale transizione di fase, per un sistema del tipo previsto dal teorema, può verificarsi esclusivamente per $z = 1$, visto che gli zeri di $\mathcal{Z}(z)$ sono sulla circonferenza unitaria in $\mathbb{C}$.

Se θ_k sono le fasi delle radici di $\mathcal{Z}$, allora, nel caso del potenziale considerato sopra, si può scrivere, imponendo anche $\mathcal{Z}(0) = 1$, che

$$\mathcal{Z} = \prod_k \frac{z - e^{i\theta_k}}{-e^{-i\theta_k}}$$

Essendo interessati al limite termodinamico, però, la produttoria non va più bene perché è su indice discreto. L'idea è di definire una funzione di distribuzione $g(\theta)$, con $\theta \in [0, 2\pi)$, che indica come sono distribuiti gli zeri nel limite termodinamico. Inoltre, essendo le radici di $\mathcal{Z}(z)$ coppie di complessi coniugati, deve valere anche

$$g(\theta) = g(-\theta)$$

In questo modo, nel limite termodinamico, si ha:

$$\log \mathcal{Z} = \sum_k \log \left(\frac{z - e^{-i\theta_k}}{-e^{-i\theta_k}} \right) \longrightarrow V \int_0^{2\pi} d\theta g(\theta) \log \left(\frac{z - e^{-i\theta}}{-e^{-i\theta}} \right)$$

Visto che $g(\theta) = g(-\theta)$, l'integrale tra 0 e π sarà uguale a quello tra π e 2π . Ne segue che

$$\begin{aligned} \log \mathcal{Z} &= V \int_0^\pi d\theta g(\theta) \log \left(\frac{z - e^{-i\theta}}{-e^{-i\theta}} \right) + V \int_\pi^{2\pi} d\theta g(\theta) \log \left(\frac{z - e^{-i\theta}}{-e^{-i\theta}} \right) \\ &= V \int_0^\pi d\theta g(\theta) \log \left(\frac{z - e^{-i\theta}}{-e^{-i\theta}} \right) + V \int_0^\pi d\theta g(-\theta) \log \left(\frac{z - e^{i\theta}}{-e^{i\theta}} \right) \\ &= V \int_0^\pi d\theta g(\theta) \log \left[\frac{z - e^{-i\theta}}{-e^{-i\theta}} \frac{z - e^{i\theta}}{-e^{i\theta}} \right] \\ &= V \int_0^\pi d\theta g(\theta) \log (z^2 + 1 - 2z \cos \theta) \end{aligned}$$

In questo modo, si ottiene che

$$\begin{cases} \frac{p}{\kappa_B T} = \int_0^\pi d\theta g(\theta) \log(z^2 + 1 - 2z \cos \theta) \\ \frac{1}{v} = \frac{1}{V} z \frac{\partial}{\partial z} \log \mathcal{Z} = 2z \int_0^\pi d\theta g(\theta) \frac{z - \cos \theta}{z^2 + 1 - 2z \cos \theta} \end{cases}$$

Da queste formule, si deduce che la singolarità può avvenire solamente nel punto $(\theta, z) = (0, 1)$, quando $g(\theta = 0) \neq 0$. Inoltre, tutte le informazioni sul sistema si ottengono a partire dalla conoscenza di $g(\theta)$.

3.2 Esponenti critici in van der Waals

Si considera il caso di van der Waals con tutte le assunzioni del caso. In prossimità del punto critico, vale la legge degli stati corrispondenti:

$$\left(\bar{P} + \frac{3}{\bar{V}^2}\right) \left(\bar{V} - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}\bar{T}$$

con $\bar{P} = P/P_c$, $\bar{V} = V/V_c$ e $\bar{T} = T/T_c$. Si definiscono le variabili ridotte

$$p = \frac{P - P_c}{P_c} \quad v = \frac{V - V_c}{V_c} \quad t = \frac{T - T_c}{T_c}$$

e si assume di essere arbitrariamente vicini al punto critico (T_c, V_c, P_c) . In fisica, sono attualmente noti 6 *esponenti critici*; nella seguente trattazione, se ne evidenzieranno 4 che caratterizzano la classe delle transizioni di fase di cui fa parte van der Waals (cioè che è descritto da van der Waals).

(1). Se $t = 0$, allora

$$\frac{\partial P}{\partial V} = \frac{\partial^2 P}{\partial V^2} = 0$$

perché, nel punto critico, si ha un punto di flesso nel diagramma (V, P) a $T = T_c$ (cioè $t = 0$). Ne segue che

$$p \sim v^\delta$$

con $\delta = 3$. Per verificarlo, basta imporre $T = T_c$ nella legge degli stati corrispondenti e studiare l'andamento di $p(v)$. Infatti, essendo $T = T_c$, vale $\bar{T} = 1$ e

$$\bar{P} = \frac{8}{2\bar{V} - 1} - \frac{3}{\bar{V}^2}$$

Visto che $\bar{V} = 1 + v$, si ha $3\bar{V} - 1 = 2 + 3v$, per cui

$$\frac{8}{3\bar{V} - 1} = 4 \left(1 + \frac{3}{2}v\right)^{-1} \quad \frac{3}{\bar{V}^2} = 3(1 + v)^{-2}$$

Essendo arbitrariamente vicini al punto critico, si usano gli sviluppi $(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$ e $(1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots$:

$$\frac{8}{3\bar{V}-1} \simeq 4 - 6v + 9v^2 - \frac{27}{2}v^3 \quad \frac{3}{\bar{V}^2} \simeq 3 - 6v + 9v^2 - 12v^3$$

Allora

$$\bar{P} \simeq \left(4 - 6v + 9v^2 - \frac{27}{2}v^3\right) - (3 - 6v + 9v^2 - 12v^3) = 1 - \frac{3}{2}v^3$$

Visto che $p = \bar{P} - 1$, si ha $p \simeq -\frac{3}{2}v^3$, per cui $p \sim v^3$ ¹.

(2). Si ricorda che

$$C_V = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_V = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V$$

Nel caso di van der Waals, si ricorda che l'energia interna è pari a

$$U = \frac{3}{2}N\kappa_B T - \frac{\partial}{\partial \beta} \log Z_N = \frac{3}{2}N\kappa_B T - \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{N^2}{2} \frac{a}{V} \right)$$

con

$$a = 4\pi \int dr r^2 (1 - e^{-\beta v(r)}) \propto \beta$$

se $\beta \ll 1$. Quindi

$$U \simeq \frac{3}{2}N\kappa_B T + \frac{N^2}{V} 2\pi \int dr r^2 v(r)$$

e, allora

$$C_V = \frac{3}{2}N\kappa_B \implies C_V \sim t^{-\alpha}$$

con $\alpha = 0$ in questo caso perché risulta costante.

(3). La compressibilità isoterma è pari a

$$k_T = - \frac{1}{V} \left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T$$

con

$$\left. \frac{\partial p}{\partial V} \right|_T = - \frac{N\kappa_B T}{(V-b)^2} + \frac{2a}{V^3} = \frac{N\kappa_B}{4b^2} (T_c - T)$$

utilizzando il valore $T_c = \frac{8}{27} \frac{a}{b} \frac{1}{N\kappa_B}$ e il fatto che $V = V_c = 3b$, essendo interessati al comportamento di k_T nei pressi del punto critico. Questo implica che


$$k_T \sim |t|^{-\gamma}$$

¹Tecnicamente sarebbe $|p| \sim |v|^\delta$, con $\delta = 3$, ma il modulo è implicito in $p \sim v^3$.

con $\gamma = 1$. Questo significa che k_T diverge in prossimità del punto critico, comportando forti fluttuazioni nel numero di particelle e invalidando, allora, l'equivalenza del gran canonico con gli altri ensemble.

- (4). Si va a studiare il caso in cui gas e liquido coesistono secondo il diagramma (ρ, T) .

Si è interessati a capire qual è l'andamento della densità del liquido ρ_{liq} e del gas ρ_{gas} nel tendere al punto critico, percorrendo la cupola della parabola. In particolare, si stimerà la differenza $\rho_{\text{liq}} - \rho_{\text{gas}}$ in funzione della temperatura. Per farlo, si considera $T < T_c$, visto che, sopra questo valore, il sistema è nello stato gassoso e, quindi, non c'è coesistenza.



Invertendo la legge degli stati corrispondenti, si vede che

$$\frac{p}{p_c} = \frac{8T/T_c}{3\bar{V} - 1} - \frac{3}{\bar{V}^2}$$

Da van der Waals e a seguito della costruzione di Maxwell, si sa che ci sono una serie di volumi che corrispondono tutti alla stessa pressione, i cui estremi corrispondono ad uno stato gassoso (a sinistra) e uno stato liquido (a destra). Per questa ragione, tale equazione sarà soddisfatta da entrambi questi volumi, ottenendo che


$$\begin{aligned} \frac{p}{p_c} &= \frac{8T/T_c}{3\bar{V}_{\text{liq}} - 1} - \frac{3}{\bar{V}_{\text{liq}}^2} = \frac{8T/T_c}{3\bar{V}_{\text{gas}} - 1} - \frac{3}{\bar{V}_{\text{gas}}^2} \\ \Rightarrow \frac{T}{T_c} &= \frac{(3\bar{V}_{\text{liq}} - 1)(3\bar{V}_{\text{gas}} - 1)(\bar{V}_{\text{liq}} + \bar{V}_{\text{gas}})}{8\bar{V}_{\text{gas}}^2 \bar{V}_{\text{liq}}^2} \end{aligned}$$

Si suppone, ora, che $\bar{V}_{\text{gas}} = \frac{V_c + \varepsilon}{V_c}$ e $\bar{V}_{\text{liq}} = \frac{V_c - \varepsilon}{V_c}$, ossia che questi due valori si discostino di un arbitrario $\varepsilon > 0$ rimanendo sulla parabola, cioè lungo la retta per cui restituiscono uguale pressione in regime di coesistenza. In questo caso, si può approssimare

$$\frac{T}{T_c} = 1 - \frac{\varepsilon^2}{4V_c^2} + O(\varepsilon^4)$$

Da questa, si ricava che

$$\varepsilon \sim -t^\beta$$



con $\beta = 1/2$. Questa, in particolare, è valida per $t < 0$, ossia per valori $T < T_c$; si vede che, per $t > 0$, si ha $\varepsilon = 0$.

Si farà vedere, nel seguito, un altro sistema i cui esponenti $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ sono gli stessi di questo, anche se il sistema in questione si studia sotto tutt'altro punto di vista, ossia transizioni di fase che riguardano le sue proprietà magnetiche. Questo è dovuto al fatto che i due sistemi fanno parte della stessa *classe di universalità*, il che ha a che fare con le assunzioni sul sistema, più che l'aspetto che se ne intende studiare. Di fatto, si riutilizzeranno le assunzioni di gas rarefatto, approssimato al primo ordine dell'espansione in clusters, eccetera.

3.3 Modello di Ising in campo medio

Per schematizzare in modo elementare un sistema magnetico in meccanica statistica classica, si introducono delle variabili S_i che possono assumere valori esclusivamente pari a ± 1 . L'idea è di assegnare queste variabili ad ogni particella all'interno di un reticolo e determinerà il comportamento della particella ad allinearsi con il campo magnetico esterno. Il modello di Ising è caratterizzato da un hamiltoniana

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i$$

dove J è la costante di accoppiamento, $\langle i, j \rangle$ somma, dato i , sui prossimi vicini alla particella i -esima nel reticolo (cioè sulle particelle *connesse* alla i -esima direttamente), e h è il campo magnetico. Se $J > 0$, il sistema sarà ferromagnetico perché H assume valore minimo quando la particella i -esima è allineata con i suoi vicini, altrimenti, per $J < 0$, si ha un comportamento anti-ferromagnetico.

Prendendo $h = 0$ e $J > 0$, si può osservare una transizione da paramagnete (ordinamento casuale degli S_i) a ferromagnete passando da alte temperature ($\beta \sim 0$) a basse temperature ($\beta \rightarrow +\infty$). Questo individua una transizione di fase per cui la magnetizzazione m , che si troverà essere $\langle S_i \rangle$ (valor medio), ha un punto di discontinuità ad una certa T_c , sopra cui è costante e pari a zero.




Figura 1: Magnetizzazione in funzione della temperatura.

In realtà, non è sistematico che si verifichi questo andamento, ma dipende dal tipo di reticolo considerato.

3.3.1 Soluzione del modello di Ising

Per risolvere il modello di Ising, ossia calcolare tutte le quantità termodinamiche necessarie, è necessario determinare

$$Z = \sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H(\{S_i\})}$$

Osservazione 3.3. Si usa il formalismo canonico perché il numero di particelle è fissato dal numero di reticoli del sistema.

Si definisce la magnetizzazione del sito i -esimo come $m_i = \langle S_i \rangle$; in questo modo, si può esprimere ogni variabile S_i in termini del suo valor medio e delle sue fluttuazioni come

$$S_i = m_i + \delta S_i$$

Calcolare la somma per ottenere Z è molto difficile, per cui si fa uso dell'approssimazione di Weiss (o di campo medio), per cui si assume che le δS_i siano molto piccole. Si ha

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - h \sum_{i=1}^N S_i = -J \sum_{\langle i,j \rangle} (m_i + \delta S_i)(m_j + \delta S_j) - h \sum_{i=1}^N (m_i + \delta S_i)$$

Assumendo anche invarianza per traslazioni, si può scrivere che $m_i = m, \forall i$. Sviluppando il prodotto e semplificando il secondo ordine delle fluttuazioni per l'approssimazione di campo medio, si trova:

$$\begin{aligned} m_i m_j + m_i \delta S_j + m_j \delta S_i + \delta S_i \delta S_j &= m^2 + m(\delta S_i + \delta S_j) \\ &= m^2 + m[(S_i - m) + (S_j - m)] \\ &= -m^2 + m(S_i + S_j) \\ &= -m^2 + 2m S_i \end{aligned}$$

In questo modo, si ha

$$\begin{aligned} H &\simeq -J \sum_{i=1}^N \sum_{j_{p.v.}} (-m^2 + 2m S_i) - h \sum_{i=1}^N S_i \\ &= -J y \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (-m^2 + 2m S_i) - h \sum_{i=1}^N S_i \\ &= \frac{1}{2} J y m^2 N - (h + m J y) \sum_{i=1}^N S_i \end{aligned}$$

dove $j_{p.v.}$ indica le particelle j -esime prime vicine con la i -esima e y è il numero di primi vicini di un sito nel reticolo. Il fattore $\frac{1}{2}$ serve per evitare di contare due volte le stesse


coppie di particelle. Il fattore $h + mJy$ si dice *campo magnetico efficace* ed è importante notare che dipende dalla magnetizzazione m del sistema. Allora

$$\begin{aligned} Z &= C \sum_{\{S_i\}} e^{\beta(h+mJy) \sum_i S_i} = C \prod_i \sum_{S_i=\pm 1} e^{\beta(h+mJy) S_i} \\ &= C \prod_i \left[e^{\beta(h+mJy)} + e^{-\beta(h+mJy)} \right] = 2^N C \cosh(\beta h + \beta mJy)^N \end{aligned} \quad (3.3.1)$$

dove C è una costante moltiplicativa legata alla presenza del termine costante (rispetto alle quantità termodinamiche di interesse) $\frac{1}{2}Jym^2N$ nell'hamiltoniana. Dalla termodinamica, la magnetizzazione del sistema è pari a

$$m = \frac{1}{N} \left(\frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial h} \log Z \right)_{h=0} = \tanh(\beta h + \beta mJy)_{h=0} = \tanh(\beta mJy) \quad (3.3.2)$$

e si vede che la magnetizzazione compare sia a destra che a sinistra.



Questi due grafici individuano i due casi possibili, a seconda del coefficiente angolare della retta $f(m) = m$. Il caso a sinistra è associato a

$$\left. \frac{\partial \tanh(\beta mJy)}{\partial m} \right|_{m=0} < 1 \iff \beta Jy < 1$$

mentre il secondo caso è individuato dalla condizione

$$\left. \frac{\partial \tanh(\beta mJy)}{\partial m} \right|_{m=0} > 1 \iff \beta Jy > 1$$

Questa differenza tra i valori possibili della magnetizzazione permette di individuare una temperatura critica:

$$\beta_c Jy = 1 \iff \frac{1}{\kappa_B T_c} Jy = 1 \iff T_c = \frac{Jy}{\kappa_B}$$

che coincide proprio con la temperatura critica a cui avviene la transizione di fase introdotta alla fine della scorsa sezione.

Osservazione 3.4. I valori m^* e $-m^*$ sono simmetrici e sono legati al fatto che il grafico di $m(T)$ a fine della scorsa lezione può avere un ramo rosso nella parte superiore del piano, o uno perfettamente specchiato nella parte inferiore.

In particolare, il caso $T > T_c \Rightarrow m = 0$ corrisponde al caso paramagnetico, mentre il caso $T < T_c$, che permette $m = 0, +m^*, -m^*$, corrisponde al caso ferromagnetico. Per capire quali di queste soluzioni sono fisicamente ammissibili (nel caso $T < T_c$), si studia l'energia libera e si vede a quali di queste corrisponde un suo minimo. L'energia libera è data da

$$F = -\kappa_B T \log Z = \frac{1}{2} J y N m^2 - \kappa_B T N \log [2 \cosh (\beta h + \beta m J y)]$$

$$= F_0 + \frac{a}{2} m^2 + \frac{b}{4!} m^4 - \lambda h m + \dots$$

dove si è usato lo sviluppo per $h, m \ll 1$ e che $\log(\cosh \epsilon) = \frac{\epsilon^2}{2} - \frac{\epsilon^4}{12} + \dots$ per $\epsilon \ll 1$. In questa espressione, si ha


$$F_0 = -N \kappa_B T \log 2 \quad a = N \frac{J y}{\kappa_B T} (\kappa_B T - J y) \quad b = 2 N \kappa_B T \left(\frac{J y}{\kappa_B T} \right)^4 \quad \lambda = 2 N \frac{J y}{\kappa_B T}$$

con $a \sim T - T_c$, visto che $T_c = J y / \kappa_B$. Si nota che l'equazione $m = \tanh(\beta m J y)$ equivale alla condizione


$$\left. \frac{\partial F}{\partial m} \right|_{h=0} = 0 \iff J y N m - \kappa_B T N \frac{[\sinh(\beta m J y)] \beta J y}{\cosh(\beta m J y)} = 0 \iff m - \tanh(\beta m J y) = 0$$

quindi i valori $m = 0, m^*, -m^*$ sono già punti stazionari. Dallo sviluppo di F , si vede che, essendo $b, \lambda > 0$ e $F_0 < 0$, si possono avere due casi distinti:

- se $T > T_c$, ossia $a > 0$, F è una quartica con concavità verso l'alto e un unico minimo:



- se $T < T_c$, ossia $a < 0$, F ha due punti di minimo, $\pm m^*$ e $m = 0$ è un massimo locale, con la particolarità che, quando $h \neq 0$, uno di questi due punti di minimo viene favorito dal sistema, a seconda della sua tendenza ad allinearsi o meno col campo magnetico esterno:



In assenza di campo magnetico, il valore $m^* \rightarrow 0$ con continuità per $T \rightarrow T_c^-$ e si ottiene proprio un grafico simile a quello in figura 1. In realtà, quando $h = 0$, come già accennato, si potrebbe creare un andamento speculare (specchiato) per $m < 0$, corrispondente all'andamento di $-m^*$, visto che l'energia libera è simmetrica per scambio di segno in m . Quando si prende $h \neq 0$, però, si ha una rottura della simmetria del sistema: la comparsa del termine lineare in F evidenzia una preferenza per un valore di m , che sia positivo o negativo. Questo implica che, nel grafico $m(T)$, comparirà solo una delle due branche, a seconda del segno del minimo preferito dal sistema. Se $T > T_c$, invece, l'azione del campo magnetico causa al più uno shift, ma la fisica del sistema non cambia.

Questo andamento di $m(T)$, per $T < T_c$, corrisponde proprio ad una transizione di fase continua nel punto critico $T = T_c$.

3.3.2 Rottura di simmetria

In questo caso, si parla di simmetria $\mathbb{Z}_2$, corrispondente all'inversione di segno degli S_i . Per capire cosa si intende per rottura di simmetria, si riprende la funzione di partizione

$$Z = \sum_{\{S_i\}} \exp \left[-\beta \left(H(h=0) - h \sum_{i=1}^N S_i \right) \right]$$

dove si è evidenziata la componente asimmetrica per scambio di segno negli S_i , ossia $h \sum_i S_i$, scrivendo $H(h=0) = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j$, che invece è simmetrica. La rottura di simmetria emerge dal fatto che i limiti

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \lim_{h \rightarrow 0} \langle m \rangle \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow +\infty} \langle m \rangle$$

non coincidono. Nel primo caso si annulla il campo prima di prendere il limite termodinamico, e quindi il sistema rimane simmetrico. Nel secondo caso, invece, si prende prima il limite $N \rightarrow +\infty$: sotto la temperatura critica il sistema presenta due stati degeneri con magnetizzazione $\pm m^*$, e un campo infinitesimo seleziona uno dei due rami;

mandando, poi, $h \rightarrow 0^\pm$, la magnetizzazione resta non nulla, segnalando la rottura spontanea di simmetria.

3.3.3 Esponenti critici

Essendo interessati agli esponenti critici, cioè all'andamento di certe quantità in un intorno del punto critico, si può utilizzare l'approssimazione

$$F \simeq F_0 + \frac{a}{2}m^2 + \frac{b}{4!}m^4 - \lambda hm$$

fatta per $m \ll 1$ perché, attorno al punto critico, $m \simeq 0$. Inoltre, si assumerà, per la validità dell'approssimazione sopra, anche h sufficientemente piccolo. Utilizzando questa espressione, si può ricavare il valore di m^* , che ora si indicherà con m_0 :

$$\left. \frac{\partial F}{\partial m} \right|_{m_0} = 0 \implies am_0 + \frac{b}{6}m_0^3 - \lambda h = 0 \quad (3.3.3)$$

- (1). Considerando $h = 0$, si ha $m_0 = 0$, oppure $m_0 = \pm \sqrt{-6a/b}$, che ha senso se $T < T_c$, per cui $a < 0$. Ricordando che $a \sim T - T_c$, si conclude che $m_0 \sim |T - T_c|^\beta$, con $\beta = 1/2$, proprio come nel caso di van der Waals.
- (2). Ora si considera la suscettività magnetica $\chi = \left. \frac{\partial m_0}{\partial h} \right|_{m_0=0}$. Per $T > T_c$ e h piccolo, si ha $m_0 \sim h/a$ per l'equazione 3.3.3, da cui

$$\chi \sim \frac{1}{a} \sim |T - T_0|^{-\gamma}$$

con $\gamma = 1$. Se $T < T_c$, derivando rispetto ad h l'equazione 3.3.3, si trova

$$a\chi + \frac{b}{2}m_0^2\chi = \lambda$$

Utilizzando che $m_0 \simeq 0$ attorno al punto critico, si può trascurare il termine quadratico e, di nuovo, si trova $\chi \sim 1/a$.

- (3). Si considera $T = T_c$, per cui $a = 0$ e $\frac{b}{6}m_0^3 = \lambda h$, per l'equazione 3.3.3. Allora si trova che

$$m_0 \sim h^{1/\delta}$$

con $\delta = 3$.

- (4). Si considera la capacità termica

$$C = T \left. \frac{\partial S}{\partial T} \right|_{h=0, T=T_c} = -T_c \left. \frac{\partial^2 F(m_0)}{\partial T^2} \right|_{h=0, T=T_c}$$

Considerando la solita espressione approssimata per F , si trova che

$$F(m_0) = \begin{cases} F_0 & , T \geq T_c \\ F_0 - \frac{3}{4} N \kappa_B T \frac{(T_c - T)^2}{T_c^2} & , T < T_c \end{cases}$$

Si vede allora che F e la sua derivata prima rispetto a T sono continue, ma la sua derivata seconda no:

$$C = \begin{cases} -T_c \frac{\partial^2 F_0}{\partial T^2} = 0 & , T \geq T_c \\ \frac{3}{2} N \kappa_B & , T < T_c \end{cases} \implies C \sim |T - T_c|^{-\alpha}$$

con $\alpha = 0$.

Si vede, allora, che il modello di Ising in campo medio fa parte della stessa classe di universalità di van der Waals, in quanto gli esponenti critici sono uguali.

3.3.4 Problemi del modello

Dalla sezione precedente, si è evidenziato che χ tende a divergere. Però, $\chi \propto \text{Var } M$, con M magnetizzazione del sistema; questo è un problema perché l'approssimazione di campo medio è basata proprio sul considerare piccole tali fluttuazioni.

Si vede che

$$M := \sum_i \langle S_i \rangle = \frac{\sum_i \sum_{\{S_j\}} S_i e^{-\beta H}}{\sum_{\{S_j\}} e^{-\beta H}} = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial h} \log Z$$

Ora, se

$$H = H_0(\{S_j\}) - \sum_j h S_j$$

si ha

$$\begin{aligned} M &= \sum_i \frac{\sum_{\{S_j\}} S_i e^{-\beta(H_0 - \sum_j S_j h)}}{\sum_{\{S_j\}} e^{-\beta(H_0 - \sum_j S_j h)}} \\ &\simeq \frac{\sum_i \langle S_i \rangle_0 + \beta h \sum_{i,j} \langle S_i S_j \rangle_0}{1 + \beta h \sum_i \langle S_i \rangle_0} \\ &\simeq \beta h \left[\sum_{i,j} \langle S_i S_j \rangle_0 - \sum_i \langle S_i \rangle_0 \sum_j \langle S_j \rangle_0 \right] + \sum_i \langle S_i \rangle_0 \end{aligned}$$

da cui $\chi \propto \frac{1}{n} (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2) \propto \text{Var } M$. Però si è anche visto che $\chi \sim t^{-\gamma}$, con $\gamma = 1$, che diverge. Questo è dato dal fatto che il campo medio non tratta bene le interazioni spin-spin, da cui segue $\text{Var } M = 0$. Si deve cercare un modo alternativo per studiare questo caso.

3.4 Teorie di campo e campo medio

Riprendendo l'espressione della funzione di partizione canonica per il modello di Ising, con $h = 0$ momentaneamente, questa si può generalizzare, tramite una *matrice di connettività*, come

$$Z = \sum_{\{S_i\}} \exp \left[\frac{1}{2} \sum_{i,j} S_i J_{ij} S_j \right]$$

con β incluso in J_{ij} , somma su i, j generici la cui connessione è verificata da J_{ij} e $\frac{1}{2}$ fattore combinatorio per evitare di contare, al solito, le coppie (i, j) e (j, i) che danno risultati uguali.

Per continuare, è necessario utilizzare il seguente risultato per integrali gaussiani:

$$\int d^N x \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{i,j} x_i A_{ij} x_j + \sum_i B_i x_i \right] = \sqrt{\frac{(2\pi)^N}{\det A}} e^{\frac{1}{2} \sum_{i,j} B_i (A^{-1})_{ij} B_j}$$

dove A è una matrice definita positiva. Questo generalizza l'espressione

$$\int dx e^{-ax^2+bx} = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/4a}$$

Dimostrazione. Si nota che

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} \sum_{i,j} x_i A_{ij} x_j + \sum_i B_i x_i &= -\frac{1}{2} \vec{x}^\top A \vec{x} + \frac{1}{2} (\vec{B}^\top \vec{x} + \vec{x}^\top \vec{B}) \\ &= -\frac{1}{2} (\vec{x}^\top - \vec{B}^\top A^{-1}) A (\vec{x} - A^{-1} \vec{B}) + \frac{1}{2} \vec{B}^\top A^{-1} \vec{B} \\ &\quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{=\vec{y}} \\ &= -\frac{1}{2} \vec{y}^\top A \vec{y} + \frac{1}{2} \vec{B}^\top A^{-1} \vec{B} \end{aligned}$$

Visto che A è definita positiva, si può diagonalizzare, per cui esiste una matrice O tale che $\Lambda = O^\top A O$ è diagonale. Allora la dimostrazione si può concludere prendendo $\vec{z}$ tale che $\vec{y} = O \vec{z}$, da cui $\vec{y}^\top A \vec{y} = \vec{z}^\top \Lambda \vec{z}$; infatti, si ha

$$\int d^N y e^{-\frac{1}{2} \vec{y}^\top A \vec{y}} = \det O \int d^N z e^{-\frac{1}{2} \vec{z}^\top \Lambda \vec{z}} = \int d^N z e^{-\frac{1}{2} \sum_j z_j^2 \lambda_j} = \prod_{j=1}^N \sqrt{\frac{2\pi}{\lambda_j}}$$

dove i λ_j sono gli autovalori di A , corrispondenti, quindi, alla diagonale di Λ . L'altro termine è costante e compare come fattore all'esponenziale, proprio come previsto dalla formula. $\square$

Per utilizzare questo risultato, si prendono $B_i = S_i$, $A = J^{-1}$ e $x_i = \psi_i$, per cui

$$Z = Z_0 \frac{1}{2^N} \int_{-\infty}^{+\infty} d\psi_1 \int_{-\infty}^{+\infty} d\psi_2 \dots \int_{-\infty}^{+\infty} d\psi_N \sum_{\{S_i\}} e^{-\frac{1}{2} \sum_{i,j} \psi_i (J^{-1})_{ij} \psi_j + \sum_i S_i \psi_i}$$

con $Z_0 = 2^N \sqrt{\frac{\det(J^{-1})}{(2\pi)^N}}$. La comodità è che la somma sugli $\{S_i\}$ agisce solo sul secondo addendo dell'esponenziale, mentre l'altro va fuori. Si ha

$$\sum_{\{S_i\}} e^{\sum_i S_i \psi_i} = \prod_i \left(\sum_{S_i = \pm 1} e^{S_i \psi_i} \right) = 2^N e^{\sum_i \log(\cosh \psi_i)}$$

per lo stesso conto fatto in 3.3.1. Allora¹

$$Z = Z_0 \int d^N \psi e^{-f[\psi]}, \quad \text{con} \quad f[\psi] = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \psi_i J_{ij}^{-1} \psi_j - \sum_i \log(\cosh \psi_i)$$

Aggiungere il campo magnetico, ora, è facile²:

$$f[\psi] = \frac{1}{2} \sum_{i,j} \psi_i (J^{-1})_{ij} \psi_j - \sum_i \log[\cosh(\psi_i + \bar{h}_i)]$$

dove il termine $\bar{h}_i$ include β . Un'altra operazione comoda è riscaldare le variabili ψ_i in modo che

$$f[\psi] = \frac{1}{2} \sum_{i,j} (\psi_i - \bar{h}_i) (J^{-1})_{ij} (\psi_j - \bar{h}_j) - \sum_i \log[\cosh \psi_i]$$

Per svolgere l'integrale di Z , si usa l'approssimazione di punto sella: si immagina di sviluppare l'integrando attorno al punto stazionario $\bar{\psi}$:

$$Z \simeq Z_0 e^{-f[\bar{\psi}]}$$

valida nel limite in cui le fluttuazioni dell'integrando attorno a questo punto sono molto piccole. Per determinare il vettore $\bar{\psi}$, si impone $\left. \frac{\partial f}{\partial \psi_i} \right|_{\psi_i = \bar{\psi}_i} = 0$, da cui

$$\sum_j (J^{-1})_{ij} \bar{\psi}_j = \tanh \bar{\psi}_i$$

Per ritrovare il caso di Weiss, si assume invarianza per traslazioni (quindi anche campo magnetico uniforme, condizioni al contorno invarianti per traslazioni); in questo modo,

¹Le parentesi quadre stanno ad indicare che f è un funzionale.

²Inglobando β nel campo magnetico, nella via più generale questo dipende dal sito, pertanto la funzione di partizione sarà

$$Z = \sum_{\{S_i\}} \exp \left[\frac{1}{2} \sum_{i,j} S_i J_{ij} S_j + \sum_i \bar{h}_i S_i \right]$$

dove la barra su $\bar{h}_i$ indica che include anche β .

$\psi_i = \psi$, $\forall i = 1, \dots, N$ e, dalla scelta

$$\begin{cases} \beta m J y = \psi \\ m = \sum_j (J^{-1})_{ij} \psi \end{cases}$$

si nota l'equivalenza con l'equazione 3.3.2, cioè $\psi \sim m$. Infine, si può definire

$$\sum_j (J^{-1})_{ij} = \frac{1}{\beta k}$$

per esplicitare la dipendenza dalla temperatura¹, dove k contiene le informazioni sulla connettività del sistema, che, in analogia con la trattazione secondo Weiss, coincide con Jy . Così facendo, si conclude che

$$\frac{1}{\beta k} \psi = \tanh \psi \quad (3.4.1)$$

Le soluzioni sono già note dalla trattazione precedente: visto che la tangente iperbolica ha pendenza 1 in 0, si ha che:

- se $1/\beta k > 1$, allora si ha un'unica soluzione $\psi = 0$;
- se $1/\beta k < 1$, allora si hanno le soluzioni $\psi = 0, \pm \psi^*$.

Inoltre, la condizione $1/\beta_c k = 1$ permette di individuare la temperatura critica tramite $\beta_c = 1/k$.

Osservazione 3.5. La differenza rispetto alla precedente trattazione è che, ora, ψ è un campo, cioè è una variabile della posizione. Precedentemente, la magnetizzazione si assumeva costante; in questo caso, invece, si vedrà che si può inserire l'informazione che $\psi = \psi(x)$ e studiare le fluttuazioni.

Sotto approssimazione di ψ_i piccoli, si può scrivere la $f(\psi)$ sviluppando con Taylor il termine con $\log(\cosh \psi)$, da cui si ricava

$$f(\psi) \simeq \frac{1}{2} \sum_{i,j} \psi_i J^{-1} \psi_j - \frac{1}{2} \sum_i \psi_i^2 + \frac{1}{12} \sum_i \psi_i^4$$

Per trattare l'altro termine, si usa la trasformata di Fourier; questo perché il sistema è invariante sotto traslazioni e la trasformata di Fourier permette di renderlo più semplice. Tramite questa, si scrive una generica funzione $g(\vec{r}_i)$, con $\vec{r}_i$ posizione dei siti del reticolo, come

$$g(\vec{r}_i) = \frac{1}{N} \sum_{\vec{q}} \tilde{g}(\vec{q}) e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}_i}$$

¹Questo è dovuto al fatto che, inizialmente, si era inclusa β nella matrice di connettività; in questo modo, la si esplicita nuovamente

dove, con condizioni al bordo periodiche, si ha $\vec{q} = \frac{2\pi}{N}(n_x, n_y, n_z)$, per $n_\alpha = 0, 1, \dots, N_\alpha - 1$ e $N = N_x N_y N_z$. Applicandola alla f , si ottiene

$$\begin{aligned} f(\psi) &= \frac{1}{2N^2} \sum_{\vec{q}, \vec{q}'} \psi_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}'} \sum_{i,j} J_{ij}^{-1} e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}_i + i\vec{q}' \cdot \vec{r}_j} \\ &= \frac{1}{2N^2} \sum_{\vec{q}, \vec{q}'} \psi_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}'} \sum_{i,j} J_{ij}^{-1} e^{i\vec{q} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_j)} e^{i(\vec{q} + \vec{q}') \cdot \vec{r}_j} \end{aligned}$$

dove, nell'ultima uguaglianza, si è moltiplicato e diviso per $e^{-i\vec{q}' \cdot \vec{r}_j}$. Usando l'invarianza per traslazioni, il termine $J_{ij}^{-1} e^{i\vec{q} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_j)}$ dipende solamente dalla distanza $d = |i - j|$ tra i vari siti, quindi si può eliminare un grado di libertà e far variare un solo indice, scrivendo

$$\begin{aligned} f(\psi) &= \frac{1}{2N^2} \sum_{\vec{q}, \vec{q}'} \psi_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}'} \sum_i J_{ij_0}^{-1} e^{i\vec{q} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_{j_0})} \overbrace{\sum_j e^{i(\vec{q} + \vec{q}') \cdot \vec{r}_j}}^{= N \delta_{\vec{q}, -\vec{q}'}} \\ &= \frac{1}{2N} \sum_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}} \psi_{-\vec{q}} J^{-1}(\vec{q}) \end{aligned}$$

con

$$J^{-1}(\vec{q}) := \sum_i J_{ij_0}^{-1} e^{i\vec{q} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_{j_0})}$$

Per comprendere il significato di $J^{-1}(\vec{q})$, si guarda la trasformata di Fourier di J :

$$\begin{aligned} J(\vec{q}, \vec{q}') &= \sum_{i,j} J_{ij} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}_i} e^{-i\vec{q}' \cdot \vec{r}_j} = \sum_{i,j} J_{ij} e^{-i\vec{q} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_j)} e^{-i(\vec{q} + \vec{q}') \cdot \vec{r}_j} \\ &= \sum_i J_{ij_0} e^{-i\vec{q} \cdot (\vec{r}_i - \vec{r}_{j_0})} \delta_{\vec{q}, \vec{q}'} = J(\vec{q}) \end{aligned}$$

dove si sono utilizzate le stesse argomentazioni del calcolo precedente. Quindi, si vede che $J(\vec{q})$ coincide proprio con la trasformata di Fourier di J .

3.4.1 Teoria di Ginzburg-Landau

La J trattata finora è del tutto generica, quindi la si deve definire in maniera opportuna per poter rivedere il modello di Ising. Data la relazione

$$\beta J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j = \frac{1}{2} \sum_{i,j} S_i J_{ij} S_j$$

la matrice J , nel caso 3D e per un reticolo quadrato di passo a , deve essere della forma

$$J_{ij} = \beta J [\delta_{i,i\pm\hat{x}} + \delta_{i,i\pm\hat{y}} + \delta_{i,i\pm\hat{z}}]$$

da cui si ottiene

$$J(\vec{q}) = \beta J \sum_{\hat{k}=\hat{x},\hat{y},\hat{z}} (e^{iq_k a} + e^{-iq_k a}) = 2\beta J \sum_{\hat{k}} \cos(q_k a)$$

Vista la sua definizione, è facile convincersi che $J^{-1}(\vec{q}) = 1/J(\vec{q})$. Osservando che

$$\frac{1}{\sum_k \cos(q_k a)} = \frac{1}{d} \frac{1}{\left[1 - \left(1 - \frac{1}{d} \sum_k \cos(q_k a)\right)\right]} \simeq \frac{1}{d} \left(1 + 1 - \frac{1}{d} \sum_k \cos(q_k a)\right)$$

dove si è espanso in serie, sotto l'assunzione di passo reticolare $a \ll 1$, si può scrivere

$$\begin{aligned} \frac{1}{2N} \sum_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}} \psi_{-\vec{q}} J^{-1}(\vec{q}) &= \frac{1}{2N(2\beta J)} \sum_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}} \frac{1}{\sum_k \cos(q_k a)} \psi_{-\vec{q}} \\ &\simeq \frac{1}{2} \frac{1}{2d\beta JN} \sum_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}} \left[1 + \frac{1}{d} \left(d - \sum_k \cos(q_k a)\right)\right] \psi_{-\vec{q}} \end{aligned}$$

Il termine nuovo ottenuto con questa trattazione è quello relativo a

$$\sum_{\vec{q}} \psi_{\vec{q}} \left(d - \sum_k \cos(q_k a)\right) \psi_{-\vec{q}}$$

Anti-trasformando per tornare nello spazio reale, questo termine diventa

$$\begin{aligned} \sum_{\vec{q}} \sum_{i,j} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}_i} \psi_i \left[d - \sum_k \frac{1}{2} \overbrace{(e^{iq_k a} + e^{-iq_k a})}^{=\cos(q_k a)} \right] e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}_j} \psi_j &= \\ = \frac{N}{2} \left(2d \sum_i \psi_i^2 - \sum_{i,\hat{k}} \psi_i \psi_{i \pm a\hat{k}} \right) &\propto \frac{N}{2} \sum_{\langle i,j \rangle} (\psi_i - \psi_j)^2 \end{aligned}$$

Mettendo tutto insieme, si conclude che, per $\psi \ll 1$, si ha

$$f(\psi) \simeq \frac{1}{2} \sum_i \left(\frac{1}{y\beta J} - 1 \right) \psi_i^2 + \frac{\tilde{c}}{\beta J} \sum_{\langle i,j \rangle} (\psi_i - \psi_j)^2 + \frac{1}{12} \sum_i \psi_i^4$$

con $y = 2d$ numero di coordinazione, cioè conta quanti primi vicini ci sono, data la dimensione d del reticolo (assumendolo quadrato), dove $\tilde{c}$ incorpora tutti i fattori non inclusi. Inoltre, $\tilde{c}/\beta J > 0$, così come $\frac{1}{12} > 0$; al contrario

$$\frac{1}{y\beta J} - 1 \begin{cases} < 0 & , \text{ se } \beta > \beta_c \\ > 0 & , \text{ se } \beta < \beta_c \end{cases}$$

Il termine colorato è quello che, nella trattazione con Weiss, non compariva e che permette di descrivere correttamente le fluttuazioni. D'altra parte, si vede anche che, nel caso in cui $\psi_i = \psi$, $\forall i$, cioè il campo è omogeneo su tutto il reticolo, tale termine si annulla e si trova il caso ottenuto con Weiss.

Nel passaggio al continuo, cioè per passo reticolare estremamente piccolo, si può scrivere $\psi_i \rightarrow \psi(\vec{x})$. Utilizzando l'approssimazione di punto sella, per cui l'energia libera risulta pari a $F = F_0 + \kappa_B T f(\psi)$, si ottiene che

$$F[\psi(\vec{x})] = F_0 + \int d^d \vec{x} \left\{ \frac{1}{2} a \psi^2(\vec{x}) + \frac{1}{2} c |\vec{\nabla} \psi(\vec{x})|^2 + u \psi^4(\vec{x}) - \lambda \psi(\vec{x}) \right\}$$

dove

- $a \sim (T - T_c)$;
- $c > 0$, altrimenti le fluttuazioni potrebbero essere arbitrariamente grandi¹ e si avrebbe instabilità nel sistema;
- $u > 0$, altrimenti F non sarebbe limitata inferiormente²;
- λ è il campo esterno.

Questa espressione è nota come *energia libera di Ginzburg-Landau*.

Osservazione 3.6. (1). In assenza di campo esterno ($\lambda = 0$), il funzionale $F[\psi]$ è pari rispetto al campo $\psi(\vec{x})$, cioè si osserva invarianza rispetto alla simmetria di $\mathbb{Z}_2$ nella funzione di partizione. Gli unici termini che possono rompere tale simmetria sono quelli di campo magnetico, in quanto sono gli unici termini dispari, anche se in questo sviluppo si è arrivati solo fino al primo ordine, in assunzione di $\psi \ll 1$.

(2). L'approssimazione di punto sella garantisce che ψ sia proporzionale alla magnetizzazione, caratterizzando, dunque, il *parametro d'ordine* della transizione paramagnete/ferromagnete; si vedrà che, in generale, i termini che si trascurano in questa approssimazione e che garantiscono tale proporzionalità portano a esponenti critici che non sempre sono quelli attesi.

(3). Se $\psi(\vec{x})$ non è uniforme, l'energia libera aumenta, visto che $|\vec{\nabla} \psi(\vec{x})| > 0$; questo permette di concludere che l'ipotesi di omogeneità di Weiss è ragionevole, in quanto tende a minimizzare l'energia.

(4). Il termine ψ^4 , con $u > 0$, è necessario a garantire la stabilità del sistema; infatti, senza di questo, nel caso di $a < 0$, l'energia libera non avrebbe un punto di minimo, visto che non sarebbe limitata inferiormente e, quindi, il sistema sarebbe instabile.

¹Il funzionale tenderebbe a minimizzarsi, quindi a massimizzare $|\vec{\nabla} \psi|^2$, per cui le fluttuazioni aumenterebbero (da controllare).

²Infatti, aumentando ψ , il termine $-|u|\psi^4$, in assunzione $u < 0$, dominerebbe e non si avrebbe un limite inferiore, rendendo necessario arrivare ad un termine di potenza superiore, proporzionale a ψ^6 .

- (5). L'assunzione $\psi \rightarrow 0$ è fatta perché interessati al comportamento del sistema vicino al punto critico. Inoltre, l'espressione ottenuta per $F[\psi(\vec{x})]$, basata su punto sella e $\psi \ll 1$, in realtà è un'assunzione di partenza del modello di Ginzburg-Landau, non il punto di arrivo. Cioè tale teoria si prefigge di avere uno sviluppo di F in potenze pari in ψ , incluse quelle relative alle fluttuazioni (tipo $|\vec{\nabla}\psi(\vec{x})|^2$), mentre le potenze dispari sono solo quelle proporzionali al campo.
- (6). Nella teoria di Ginzburg-Landau, le fluttuazioni di $\psi(\vec{x})$ rispetto al suo valore di punto sella (cosa che garantisce l'essere il parametro d'ordine in $\vec{x}$) si trascurano completamente. Per tale ragione, gli esponenti critici risulteranno identici a quelli trovati con Weiss, quantomeno α, β, γ e δ .

3.4.2 Esponenti critici

Si definisce la funzione di correlazione del parametro d'ordine

$$\Gamma(\vec{x} - \vec{x}') = \langle \psi(\vec{x})\psi(\vec{x}') \rangle - \langle \psi(\vec{x}) \rangle \langle \psi(\vec{x}') \rangle$$

In questo modo, si può scrivere che

$$\psi(\vec{x}) = \int d^d \vec{x}' \Gamma(\vec{x} - \vec{x}') \lambda(\vec{x}')$$

Assumendo che il campo esterno λ sia uniforme, dato che la suscettività è espressa come

$$\chi(\vec{x}) = \int d^d \vec{x}' \Gamma(\vec{x} - \vec{x}')$$

si ha che

$$\psi(\vec{x}) \sim \lambda \chi$$

Si usa ancora la trasformata di Fourier:

$$\psi(\vec{q}) = \int d^d \vec{x} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{x}} \psi(\vec{x}) \quad \psi(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d \vec{q} e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}}$$

Tramite la trasformata, si può scrivere che

$$\vec{\nabla}\psi(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d \vec{q} (i\vec{q}) e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}} \psi(\vec{q})$$

Si ricorda il risultato

$$\delta(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d \vec{q} e^{i\vec{q}\cdot\vec{x}}$$

L'energia libera di Ginzburg-Landau trasformata con Fourier diventa:

$$F[\psi(\vec{q})] \simeq F_0 + c \int d^d \vec{q} \left\{ \frac{1}{2} a \psi^2(\vec{q}) + \frac{1}{2} c |\vec{q}|^2 \psi^2(\vec{q}) - \lambda \psi(\vec{q}) \right\}$$

dove si è trascurato il termine in ψ^4 perché, per semplicità, si è assunto $T > T_c$, per cui $a > 0$. Si nota che, per l'espressione approssimata ottenuta sopra per F , i modi a impulso $\vec{q}$ differente siano indipendenti tra loro, cioè in F non si intrecciano $\psi(\vec{q})$ a impulsi $\vec{q}$ differenti; per questo motivo si può studiare la condizione di minimizzazione dell'energia libera semplicemente imponendo

$$\frac{\partial F}{\partial \psi(\vec{q})} = 0$$

da cui si ricava la condizione

$$(a + cq^2)\psi(\vec{q}) = \lambda \implies \psi(\vec{q}) = \frac{\lambda}{a + cq^2}$$

In questa approssimazione, allora, $\Gamma(\vec{q}) \sim 1/(a + cq^2)$; tramite trasformata di Fourier inversa, si ha:

$$\Gamma(|\vec{x}|) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int d^d \vec{q} \frac{e^{i\vec{q} \cdot \vec{x}}}{a + cq^2} \propto \frac{e^{-r/\xi}}{r^{d-2}}$$

L'idea per risolvere questo integrale è trasformarlo in un integrale gaussiano negli impulsi come

$$\int_0^{+\infty} du \int d^d \vec{q} e^{-u(a+cq^2)+i\vec{q} \cdot \vec{x}}$$

Chiamando $|\vec{x}| = r$ e prendendo $\xi^2 = c/a$, si ha la forma generale

$$\Gamma(r) \propto \frac{e^{-r/\xi}}{r^{d-2+\eta}}$$

nota come *forma di Ornstein-Zernike*. In questa forma generale, si ha $\xi \sim |T - T_c|^{-\nu}$; nel caso in questione, si vede che $\eta = 0$ e $\nu = 1/2$.

Questa formula è importante per osservare che:

- se $r \gg \xi$, allora $\Gamma \sim e^{-r/\xi}$;
- se $r \ll \xi$, allora $\Gamma \sim r^{2-d+\eta}$.

Sostanzialmente, ξ funge da lunghezza scala del sistema: al punto critico, ξ diverge, per cui le correlazioni decadono a legge di potenza in r , il che vuol dire che punti molto distanti tra loro sentiranno comunque interazioni potenzialmente non trascurabili; lontano dal punto critico, ξ è finita e, quindi, le correlazioni decadono esponenzialmente in r , il che vuol dire che le correlazioni tra punti sufficientemente distanti sono trascurabili.

L'importanza degli esponenti critici è che questi permettono di descrivere univocamente il comportamento macroscopico del sistema, in quanto quello microscopico, nei pressi di una transizione di fase, non è significativo. Si è visto che questi esponenti non dipendono dal sistema che si sta considerando, quanto più dalle assunzioni che si applicano al sistema stesso, per cui permettono di dividere i sistemi in *classi di universalità*:

due sistemi sono nella stessa classe se, nei pressi di una transizione di fase, hanno gli stessi esponenti critici, cioè si comportano allo stesso modo.

3.4.3 Validità del campo medio: argomento di Ginzburg

Per la validità dell'approssimazione di campo medio, si richiede

$$\frac{\langle \delta S_i \delta S_j \rangle}{m^2} \ll 1$$

quando $r \sim \xi$, condizione che corrisponde a chiedere $\text{Var } A / \langle A \rangle^2 \ll 1$, per una certa quantità A . Utilizzando il fatto che

$$\langle \delta S_i \delta S_j \rangle \sim \Gamma(r = |i - j|) \sim \frac{e^{-r/\xi}}{r^{d-2+\eta}}$$

e che $m^2 \sim |t|^{2\beta}$, $\xi \sim |t|^{-\nu}$, ponendo $r = \xi$, si trova che $\Gamma(r = \xi) \sim \xi^{2-d-\eta} \sim |t|^{-\nu(2-d-\eta)}$. Allora, si conclude che

$$\frac{\Gamma(r = \xi)}{m^2} \sim \frac{|t|^{-\nu(2-d-\eta)}}{|t|^{2\beta}} = |t|^{-\nu(2-d-\eta)=2\beta} \ll 1$$

Questo, nel limite $t = (T - T_c)/T_c \rightarrow 0$, si verifica se l'esponente è positivo, ossia

$$-\nu(e - d - \eta) - 2\beta > 0 \iff d > 2 - \eta + \frac{2\beta}{\nu}$$

Prendendo il caso del campo medio, per cui si ha $\eta = 0$, $\beta = \nu = 1/2$, si ottiene che deve valere $d > 4$. Risolvendo il modello di Ising dalla funzione di partizione, infatti, si trova che:

- nel caso 1D, non c'è alcuna transizione di fase;
- nel caso 2D, c'è transizione, ma gli esponenti critici sono diversi dal campo medio;
- nel caso 3D, c'è transizione, ma gli esponenti critici sono diversi dal campo medio;
- nel caso 4D, si hanno gli stessi esponenti critici, anche se la condizione $d > 4$ non è soddisfatta.

3.5 Modello di Ising oltre il campo medio

3.5.1 Argomento di Peierls per Ising 1D

Si considera un modello di Ising in 1D a range variabile, ossia descritto dall'hamiltoniana

$$H = -J \sum_{i,j=1}^N \frac{1}{|i-j|^\gamma} S_i S_j$$

con γ range delle interazioni. Si osserva che, per $\gamma \rightarrow +\infty$, si ritrova il modello di Ising standard, che collega solamente due spin immediatamente vicini; nel caso di $\gamma < +\infty$, invece, le interazioni con spin più lontani decadono come una legge di potenza.

Per iniziare, si considera l'hamiltoniana di Ising standard

$$H_\infty = -J \sum_i S_i S_{i+1}$$

essendo relativa a $\gamma \rightarrow +\infty$. Si vogliono studiare le due seguenti configurazioni del sistema:

- (1). configurazione ferromagnetica, data esclusivamente da spin up $\dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots$;
- (2). configurazione a due domini ferromagnetici, data da tutti spin up fino a un certo sito e tutti spin down da lì in poi $\dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \dots$.

Nella configurazione a due domini, la coppia di spin $\uparrow \downarrow$ è detta *muro del dominio* ed è responsabile per un'energia più alta rispetto alla configurazione completamente ferromagnetica. Infatti, nella configurazione ferromagnetica, si ha un'energia pari a $-JN$, assumendo un reticolo 1D con N siti; al contrario, per la configurazione a due domini, si hanno tutti +1 per i prodotti $S_i S_{i+1}$ (un sito è accoppiato esclusivamente con il successivo), tranne che per il muro, per cui si ha un -1 . Per questo motivo, nella configurazione a due domini, l'energia del sistema è $-J(N-1) + J$, quindi

$$\Delta E = E_2 - E_1 = -J(N-1) + J + JN = 2J$$

Per capire qual è, tra i due, il sistema termodinamicamente più stabile, è necessario minimizzare il potenziale termodinamico opportuno: a temperatura $T = 0$, la configurazione termodinamicamente più stabile è quella con E minore; se $T > 0$, invece, è necessario considerare il contributo entropico e, quindi, è necessario minimizzare l'energia libera F . Per stimare questo contributo, si ricorda che l'entropia è definita come $\kappa_B \log(\text{n. microstati accessibili})$; visto che la configurazione con tutti spin allineati è una sola, mentre la seconda consente di spostare il muro in una qualunque delle posizioni

(nel limite termodinamico), si può dire che

$$\Delta S = S_2 - S_1 \simeq \kappa_B \log N \implies \Delta F = \Delta E - T\Delta S = 2J - \kappa_B T \log N$$

Ad una certa $T > 0$ fissata, allora, nel limite termodinamico, si ha $\Delta F < 0$, ossia $F_1 > F_2$, per cui si conclude che la configurazione (2) è quella termodinamicamente più stabile.

Questo argomento si può ripetere, confrontando la configurazione (2) con una configurazione in cui si sono due muri; iterando il discorso, si conclude che il sistema tende a generare più muri possibili, concludendo che, per ogni temperatura positiva, la configurazione scelta dal sistema non potrà mai essere ferromagnetica, ma si tenderà sempre ad una configurazione paramagnetica. Se ne conclude che, per H_∞ a temperatura $T > 0$, non ci si aspettano transizioni di fase.

Il discorso si può estendere anche a $\gamma < +\infty$. Per calcolare il ΔE , si considera la configurazione (2) come composta da $N/2$ spin up e $N/2$ spin down, con muro posto in $n = 0$; cioè, facendo variare n da $-N/2$ a $+N/2$, si percorrono tutti gli N siti, incontrando il muro in $n = 0$. Secondo questo ragionamento, si può scrivere

$$\Delta E = 2J \sum_{n=-N/2}^0 \sum_{n'=1}^{N/2} \frac{1}{|n - n'|^\gamma}$$

Nel limite termodinamico, per $N \rightarrow +\infty$, si può passare al continuo:

$$\Delta E \simeq 2J \int_{-\infty}^0 dn \int_0^{+\infty} dn' \frac{1}{(n' - n)^\gamma}$$

dove si è rimosso il modulo perché $n' > n$ sempre. Questi integrali si possono risolvere e si trova che diversi valori di γ portano a comportamenti diversi del sistema¹.

- Se $\gamma < 1$, allora $\Delta E \sim N^\alpha$, per qualche $\alpha > 0$, quindi diverge come un polinomio; ne segue che $\Delta F = \Delta E - T\Delta S > 0$ perché $T\Delta S \sim \log N$, quindi $F_2 > F_1$.
- Se $\gamma < 2$, allora $\Delta E \sim N^{2-\gamma}$, quindi ci si trova nel caso precedente e, di nuovo, $F_2 > F_1$.
- Se $\gamma = 2$, $\Delta E \sim \log N$ e questa trattazione è troppo rozza per predire un comportamento definito, visto che si ha la differenza di due termini con uguale andamento nel limite termodinamico.
- Se $\gamma > 2$, invece, si trova che $\Delta E \rightarrow -\infty$, per cui $F_2 < F_1$.

L'argomento di Peierls, dunque, ammette transizioni di fase paramagnete-ferromagnete a temperatura finita esclusivamente se $\gamma < 2$.

¹Soluzione dell'integrale e motivazione dei risultati in appendice (A.3).

Osservazione 3.7. La precedente trattazione assume $h = 0$, cioè assenza di campo esterno.

3.5.2 Soluzione esatta del modello di Ising 1D

Si considera il modello di Ising 1D standard, cioè con $H = -J \sum_{j=1}^N S_j S_{j+1} - h \sum_{j=1}^N S_j$, e lo si risolve esattamente. La funzione di partizione è data da

$$Z = \sum_{\{S_i\}} \exp \left[\beta \sum_j S_j S_{j+1} + \beta h \sum_j S_j \right] = \sum_{\{S_i\}} \exp \left[\beta \sum_j \left(S_j S_{j+1} + \frac{1}{2} h (S_j + S_{j+1}) \right) \right]$$

dove l'ultima uguaglianza è giustificata dalle assunzioni di condizioni al contorno periodiche (così da avere l'espressione ben definita per $j = N$ e $j+1 = 1$ di conseguenza) e invarianza per traslazioni, per cui si distribuisce il campo esterno uniformemente su ciascuna coppia di spin, da cui il fattore $1/2$.

Per risolverlo, si introduce la tecnica della matrice di trasferimento, definita come

$$T_{SS'} = \exp \left[\beta \left(JS S' + \frac{h}{2} (S + S') \right) \right]$$

che, nel formalismo della meccanica quantistica, si può esprimere anche come $T_{SS'} = \langle S|T|S' \rangle$. Per capire meglio come è fatta tale matrice, si parte dal fatto che S e S' possono essere pari solamente a ± 1 , quindi sono ben definite le mappe

$$S = +1 \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad S = -1 \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Di conseguenza, si può rappresentare T in termini della base spin up, spin down:

$$T = \begin{pmatrix} T_{+1,+1} & T_{+1,-1} \\ T_{-1,+1} & T_{-1,-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\beta(J+h)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J-h)} \end{pmatrix}$$

Allora è chiaro che

$$Z = \sum_{\{S_i\}} \langle S_1|T|S_2 \rangle \langle S_2|T|S_3 \rangle \cdots \langle S_N|T|S_1 \rangle$$

Visto che $\sum_{\{S_i\}} = \sum_{S_1=\pm 1} \sum_{S_2=\pm 1} \dots$, allora

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{S_1} \langle S_1 | T \overbrace{\left\{ \sum_{S_2} |S_2\rangle \langle S_2| \right\}}^{=\text{Id}} T \overbrace{\left\{ \sum_{S_3} |S_3\rangle \langle S_3| \right\}}^{=\text{Id}} \dots \overbrace{\left\{ \sum_{S_N} |S_N\rangle \langle S_N| \right\}}^{=\text{Id}} |S_1\rangle \\ &= \sum_{S_1} \langle S_1 | T^N | S_1 \rangle = \text{Tr } T^N \end{aligned}$$

Visto che T è reale e simmetrica, si diagonalizza: $T = O D O^\top$, per cui

$$T^N = (O D O^{-1})(O D O^{-1}) \dots (O D O^{-1}) = O D^N O^{-1}$$

Usando il fatto che la traccia, si ha che $\text{Tr } T^N = \text{Tr}(O D^N O^{-1}) = \text{Tr}(O O^{-1} D^N) = \text{Tr } D^N$; se λ_+ , λ_- sono gli autovalori di T , si ha

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_+ & 0 \\ 0 & \lambda_- \end{pmatrix} \implies Z = \lambda_+^N + \lambda_-^N$$

Calcolando il determinante di T , si ottiene che

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta J} \left[\cosh(\beta h) \pm \sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}} \right]$$

con $\lambda_+ > \lambda_-$, per cui $Z \sim \lambda_+^N$ nel limite termodinamico. Da questo, si ricava che

$$F = -\kappa_B T \log Z = -\kappa_B T N \log \lambda_+$$


da cui la magnetizzazione è pari a

$$M = -\frac{\partial F}{\partial h} = \frac{N \sinh(\beta h)}{\sqrt{\sinh^2(\beta h) + e^{-4\beta J}}}$$

Si nota che, essendo la magnetizzazione per sito pari a M/N ed essendo

$$\lim_{h \rightarrow 0} \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{M}{N} = 0$$

non vi è magnetizzazione nel sistema in assenza di campo esterno e, quindi, non vi è alcuna transizione di fase, per ogni $T > 0$.



Con un ragionamento analogo, si possono trovare anche le funzioni di correlazione.

Definendo

$$(S | S') := \exp \left[\beta J S S' + \frac{\beta h}{2} (S + S') \right]$$

si può scrivere

$$\begin{aligned} \langle S_n S_{n+r} \rangle &= \frac{1}{Z} \sum_{\{S_i\}} (S_1 | S_2) (S_2 | S_3) \cdots (S_{n-1} | S_n) S_n (S_n | S_{n+1}) \cdots \\ &= \frac{1}{Z} \text{Tr} \left(T_1 T_2 \cdots T_{n-1} O_n T_n T_{n+1} \cdots T_{n+r-1} O_{n+r} T_{n+r} \cdots T_N \right) \end{aligned}$$

dove O_n è una matrice relativa al fattore S_n nell'espressione alla prima riga, che conta gli stati dello spin n -esimo; questa si può scrivere come

$$O = O_n = O_{n+r} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Quindi

$$\langle S_n S_{n+r} \rangle = \frac{1}{Z} \text{Tr} \left(T^{n-1} O T^r O T^{N-(n-1+r)} \right) = \frac{1}{Z} \text{Tr} \left(O T^r O T^{N-r} \right)$$

Ora si assume $h = 0$; in questo caso

$$T = \begin{pmatrix} e^{\beta J} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J} \end{pmatrix}$$

Essendo simmetrica e reale, si diagonalizza con $T = U D U^{-1}$, dove

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Gli autovalori di T , quindi la diagonale di D , si trovano essere

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta J} \left(1 \pm e^{-2\beta J} \right)$$

Sostituendo, dunque, si vede che

$$\begin{aligned}\langle S_n S_{n+r} \rangle &= \frac{1}{Z} \text{Tr} \left[O (U D^r U^{-1}) O (U D^{N-r} U^{-1}) \right] \\ &= \frac{1}{Z} \text{Tr} \left[\underbrace{(U^{-1} O U)}_{=\sigma} D^r \underbrace{(U^{-1} O U)}_{=\sigma} D^{N-r} \right]\end{aligned}$$

con


$$\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

matrice che inverte le componenti di un vettore. Si conclude che

$$\begin{aligned}\langle S_n S_{n+r} \rangle &= \frac{1}{Z} \text{Tr} \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_+^r & 0 \\ 0 & \lambda_-^r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_+^{N-r} & 0 \\ 0 & \lambda_-^{N-r} \end{pmatrix} \right] \\ &\sim \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^r = \left(\frac{1 - e^{-2\beta J}}{1 + e^{-2\beta J}} \right)^r = [\tanh(\beta J)]^r\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \langle S_n S_{n+r} \rangle \sim e^{-ar/\xi}, \quad \text{con } \xi = -\frac{a}{\log [\tanh(\beta J)]}$$


Questa espressione permette di concludere che le funzioni di correlazione decadono esponenzialmente, con lunghezza caratteristica ξ . Si vede, dunque, che per $T \rightarrow \infty$, si ha $\xi \rightarrow +\infty$; in questo caso, il sistema è completamente disordinato perché la correlazione è assente e gli spin si orientano in modo del tutto casuale. Se, invece, $T \rightarrow 0$, allora $\xi \rightarrow 0$ e si ha il caso banale del ferromagnete perfetto in cui tutti gli spin si polarizzano, ma è un caso poco interessante perché si stanno assumendo nulle fluttuazioni termiche.



Questo significa che, a temperatura finita, le funzioni di correlazione decadono esponenzialmente, con una lunghezza caratteristica dipendente dalla temperatura in questione, ma sempre, indipendentemente, con andamento esponenziale. Questo scenario è tipico per tutti i sistemi 1D a corto raggio, per i quali, quindi, si ha assenza di fenomeni critici.

3.5.3 Argomento di Peierls per Ising 2D

Si considera un reticolo quadrato di spin, con un campo esterno tale che quelli posti sul bordo siano tutti up. Questo si considera irrilevante nel limite $N \rightarrow +\infty$. All'interno, gli spin $\downarrow$ si racchiudono in un circuito direzionato in senso orario, che è univocamente individuato da una lunghezza $b \geq 4$ e un indice $i = i(b) \in \mathbb{N}$. La lunghezza b è determinata contando uno spessore di una unità per ogni spin down adiacente al lato considerato.



Questo argomento consiste nel dare una stima del numero medio di spin down, $\langle N_- \rangle$, presenti all'interno del reticolo, a partire dal fatto che¹

$$N_- = \sum_{b,i} A(b,i) \chi(b,i)$$

dove $A(b,i)$ rappresenta l'area del circuito individuato da b e i , mentre $\chi(b,i)$ è una funzione caratteristica che scarta i circuiti da non considerare: vale 1 se il circuito (b,i) racchiude tutti gli spin down, ossia se confina unicamente con spin up, e vale 0 altrimenti. Si ha $A(b,i) \leq b^2/16$ perché il circuito più grande costruibile è quello quadrato che occupa tutto il reticolo², mentre il numero dei possibili circuiti di lunghezza b , n , soddisfa

$$n(b) \leq N \times 3 \times 3 \times \dots \times 3 = 3^{b-1} N$$

perché si hanno N siti possibili da cui partire e, una volta tracciato il primo segmento, per non percorrerlo di nuovo (essendo il reticolo quadrato), si hanno solamente 3 possibili vie e, lo stesso, si ripete per ogni step fino all'ultimo. Per stimare

$$\langle N_- \rangle = \sum_{b,i} A(b,i) \langle \chi(b,i) \rangle$$

si considera che

$$\langle \chi(b,i) \rangle = \frac{\sum_S^* e^{-\beta E(S)}}{\sum_S e^{-\beta E(S)}}$$


dove l'apice $*$ indica che si considerano solo delle configurazioni ammissibili. Il termine al numeratore rappresenta la somma su tutte le configurazioni ammissibili, mentre

¹Questa relazione è assicurata dal fatto che ogni spin adiacente a un lato porta un conteggio di una unità per quello stesso lato, quindi il numero di spin down presenti in (b,i) è proprio $A(b,i)$.

²Si nota che $(b/4)^2$ è l'area di un quadrato di perimetro b .

quello al denominatore rappresenta la somma su tutte le configurazioni possibili.

Sia C una configurazione ammessa in $*$,
cioè contenente solo spin down e tutti
spin up all'esterno.



Si definisce C^* come la configurazione C con spin up all'interno, al posto degli spin down, mentre quelli fuori rimangono invariati in up. Allora si può scrivere che

$$E_C = E_{C^*} + 2Jb$$

visto che b rappresenta il numero di spin down lungo i bordi, che quindi creano una differenza di energia pari a $+2J$ con una configurazione di tutti spin up. In questo modo, si può stimare che

$$\langle \chi(b, i) \rangle \leq \frac{\sum_S^* e^{-\beta E(S)}}{\sum_S^* (e^{-\beta E(S)} + e^{-\beta E(S^*)})} \leq e^{-2Jb\beta}$$

La prima disuguaglianza è data dal fatto che $\sum_S^* (e^{-\beta E(S)} + e^{-\beta E(S^*)})$ è più piccolo della somma su tutte le configurazioni possibili, cioè il denominatore è più piccolo di quello in $\langle \chi(b, i) \rangle$; la seconda, invece, si ottiene usando che $E(S) = E(S^*) + 2Jb$:

$$\frac{\sum_S^* e^{-\beta E(S)}}{\sum_S^* (e^{-\beta E(S)} + e^{-\beta E(S^*)})} = \frac{\sum_S^* e^{-\beta E(S)}}{\sum_S^* (e^{-\beta E(S)} + e^{2Jb\beta} e^{-\beta E(S)})} \leq \frac{\sum_S^* e^{-\beta E(S)}}{e^{2Jb\beta} \sum_S^* e^{-\beta E(S)}} = e^{-2Jb\beta}$$

Allora

$$\langle N_- \rangle \leq \sum_b \frac{b^2}{16} \sum_i e^{-2Jb\beta}$$

Visto che $b = 4, 6, 8, \dots$, mentre $i = 1, 2, \dots, n(b)$ e $n(b) \leq 3^{b-1}N$, si ottiene che

$$\frac{\langle N_- \rangle}{N} \leq \frac{1}{16} \sum_{b=4,6,8,\dots} b^2 e^{-2Jb\beta} 3^{b-1} = \frac{1}{48} \sum_b b^2 3^b e^{-2Jb\beta}$$

Ora si prende $x = 3e^{-2J\beta}$ e si pone $i = b/2$; così facendo:

$$\frac{\langle N_- \rangle}{N} \leq \frac{1}{48} \sum_{i=2,3,4,\dots} (2i)^2 x^{2i} = \frac{1}{12} \left[\sum_{i=1}^{+\infty} (i^2 x^{2i}) - x^2 \right]$$

Infine, si prende $y = x^2 = 9e^{-4J\beta}$ e si osserva che

$$\sum_{i=1}^{+\infty} i^2 y^i = \frac{y^2 + y}{(1-y)^3}$$

risultato ottenuto valutando il seguente risultato per la serie geometria

$$\left(y \frac{d}{dy}\right)^2 \sum_{i=0}^{+\infty} y^i = (1-y)^{-1}$$

Mettendo tutto insieme, si trova che

$$\frac{\langle N_- \rangle}{N} \leq \frac{4y^2}{12(1-y)^3} \left(1 - \frac{3}{4}y + \frac{1}{4}y^2\right)$$

Per $T \ll 1 \Rightarrow \beta \gg 1$, allora, $y \ll 1$, per cui $\langle N_- \rangle < \frac{N}{2}$. Questo dimostra che, sotto una certa temperatura, il sistema acquisisce una magnetizzazione non-nulla.

Osservazione 3.8. Queste argomentazioni di Peierls sono qualitative e servono unicamente per mostrare che, in 2D (e in 1D con $\gamma < 2$), ci si aspetta la comparsa di una fase ferromagnetica sotto una certa temperatura T_c , ma non permette di stimare questo valore quantitativamente, né gli esponenti critici.

3.6 Omogeneità e gruppo di rinormalizzazione

3.6.1 Leggi di scala

Gli esponenti trovati, per $t = (T - T_c)/T_c$, nel caso di sistemi magnetici, sono

$$\begin{array}{lll} C_v \sim |t|^{-\alpha} & \psi \sim |t|^\beta \ (t < 0) & \chi \sim |t|^{-\gamma} \\ \psi \sim h^{1/\delta} \ (t = 0) & \Gamma(r) \sim \frac{e^{-r/\xi}}{r^{d-2+\eta}} & \xi \sim |t|^{-\nu} \end{array}$$

con ψ parametro d'ordine, χ suscettività, ξ lunghezza di scala, h campo magnetico, d dimensione fisica dello spazio in cui si trova il sistema. Questi non sono tutti indipendenti tra loro; infatti, si hanno le seguenti quattro relazioni, note col nome di *leggi di scala*, che permettono di determinare gli altri, a partire dalla conoscenza di due soli esponenti critici.

$$\left\{ \begin{array}{ll} \alpha + 2\beta + \gamma = 2 & \text{(Rushbrooke)} \\ \beta\delta = \beta + \gamma & \text{(Widom)} \\ \gamma = \nu(2 - \eta) & \text{(Fisher)} \\ 2 - \alpha = \nu d & \text{(Josephson)} \end{array} \right.$$

Il fatto che solo due esponenti critici siano indipendenti dà origine al concetto di *universalità*, alla base di cui vi è la teoria del gruppo di rinormalizzazione.

Osservazione 3.9. Se ξ diverge nel punto critico, allora il sistema diventa *auto-similare*: indipendente dalla scala considerata del sistema, questo presenta sempre le stesse caratteristiche, analogamente ai frattali.

L'assunzione alla base di questa teoria è l'**ipotesi di scala**: vicino al punto critico, una quantità le cui dimensioni sono di L^{-D} (L lunghezza) è proporzionale a ξ^{-D} .

Si osservano i seguenti risultati derivanti dall'ipotesi di scala.

- (1). $F/\kappa_B T = \log Z$ è una quantità adimensionale per definizione; allora

$$\frac{1}{V} \frac{F}{\kappa_B T} \sim \xi^{-d}$$

visto che $[F/(\kappa_B T V)] = L^{-d}$.

- (2). Per le relazioni degli esponenti critici $[\Gamma] = L^{2-d-\eta}$; visto che $\Gamma(r) := \langle \psi(0)\psi(r) \rangle - \langle \psi(0) \rangle \langle \psi(r) \rangle$, si ha che $[\psi] = [\Gamma]^{1/2}$, quindi

$$\psi \sim \xi^{\frac{2-d-\eta}{2}}$$

- (3). Per definizione

$$\chi(\vec{r}) := \int d^d \vec{r}' \Gamma(\vec{r})$$

Allora $[\chi] = [\Gamma \cdot V] = L^{2-d-\eta} L^d$, visto l'integrale sul volume, quindi

$$\chi \sim \xi^{2-\eta}$$

- (4). La magnetizzazione totale è data da $M = -\frac{\partial F}{\partial h}$, per cui $[h] = \left[\frac{F}{M}\right] = \left[\frac{F}{m \cdot V}\right]$, dove m è la magnetizzazione per singolo sito del reticolo. Vista la definizione di parametro d'ordine e visto che $F/\kappa_B T$ è adimensionale, si conclude che

$$[h] = \left[\frac{1}{\psi \cdot V}\right] = \frac{1}{L^{\frac{2-d-\eta}{2}}} \frac{1}{L^d} = L^{-\frac{2+d-\eta}{2}} \implies h \sim \xi^{-\frac{2+d-\eta}{2}}$$

Si possono combinare queste quattro osservazioni con il fatto che $\xi \sim |t|^{-\nu}$ e con le definizioni delle quantità termodinamiche.

- (1). *Relazione di Josephson*. Chiamando $f = F/V$, si ha

$$c_V = -T \left. \frac{\partial^2 f}{\partial T^2} \right|_V \sim |t|^{-\alpha}$$

dove $c_V = C_V/m$ è il calore specifico a volume costante (con m massa). Allora

$$f \sim |t|^{2-\alpha}$$

vicino al punto critico. Essendo, per l'osservazione (1) precedente, $f \sim \xi^{-d}$ e $\xi \sim |t|^{-\nu}$, si ha $|t|^{\nu d} \sim |t|^{2-\alpha}$, da cui si ottiene la relazione $2 - \alpha = \nu d$.

(2). *Relazione di Fisher.* Si ha $\chi \sim |t|^{-\gamma}$, quindi $|t|^{-\gamma} \sim \xi^{2-\eta} \sim |t|^{\nu(\eta-2)}$, da cui $\gamma = \nu(2 - \eta)$.

(3). *Relazioni di Rushbrook e Widom.* Si considera, intanto, che $\psi \sim |t|^\beta \Rightarrow |t|^\beta \sim \xi^{\frac{2-\eta-d}{2}} \sim |t|^{\nu(\eta+d-2)/2}$ e, quindi

$$\beta = \frac{1}{2}\nu(\eta + d - 2) \quad (a)$$

Inoltre, $\psi \sim h^{1/\delta}$ e $\psi \sim |t|^\beta$, quindi $|t|^\beta \sim h^{1/\delta} \Rightarrow h \sim |t|^{\beta\delta}$. Visto che $h \sim \xi^{-(2+d-\eta)/2}$, allora $|t|^{\beta\delta} \sim |t|^{\nu(2+d-\eta)/2}$, da cui

$$\beta\delta = \frac{\nu}{2}(2 + d - \eta) \quad (b)$$

Da (b) – (a), si trova, usando Fisher, la relazione di Widom:

$$\beta\delta - \beta = \nu(2 - \eta) = \gamma \implies \beta\delta = \beta + \gamma$$

Da (b) + (a), invece, e dall'utilizzo delle relazioni di Fisher prima e Widom dopo, si ottiene la relazione di Rushbrooke:

$$\beta + \beta\delta = \nu d = 2 - \alpha \implies 2 - \alpha - \beta = \beta\delta = \beta + \gamma$$

da cui $\alpha + 2\beta + \gamma = 2$.

3.6.2 Argomento di Widom

Da osservazioni sperimentali, si hanno i due seguenti punti:

(I). vicino al punto critico, il parametro d'ordine è

$$\psi \sim \begin{cases} 0 & , t > 0 \\ |t|^\beta & , t < 0 \end{cases}$$

nel caso $h = 0$;

(II). per $T = T_c$ (cioè $t = 0$), allora $\psi \sim h^{1/\delta}$;

(III). vicino al punto critico, la suscettività magnetica è $\chi \sim |t|^{-\gamma}$.

L'argomento di Widom si basa sul combinare queste due osservazioni sperimentali per determinare una forma del parametro d'ordine. Si ipotizza che

$$\psi = |t|^\beta F_\psi^\pm \left(\frac{h}{t^\Delta} \right) \quad (3.6.1)$$

dove $F^\pm = F_+$, per $t > 0$, mentre $F^\pm = F_-$, per $t < 0$. Per il punto (I), si deve avere

$$F_\psi^+ = 0 \quad F_\psi^-(h = 0) = \text{cost.}$$

Supponendo $h \neq 0$, ci si aspetta che le quantità che descrivono il sistema si comportino in modo liscio, ad eccezione, eventualmente, della magnetizzazione, nel tendere al punto critico. Si impone, allora, che¹

$$\lim_{h \rightarrow 0} F^-(x) \sim x^\lambda$$

Sotto questa ipotesi, si ha $\psi \sim |t|^\beta (h/t^\Delta)^\lambda$. Per il punto (II), si ha:

$$\begin{cases} 1/\delta = \lambda \\ \beta - \lambda\Delta = 0 \end{cases}$$

Dall'ipotesi di Widom (3.6.1), la suscettività magnetica è

$$\chi = \left. \frac{\partial \psi}{\partial h} \right|_{h=0} \implies \chi \sim |t|^{\beta-\Delta} F'_\psi(h=0)$$

Per il punto (III), allora $\gamma = \Delta - \beta$. Mettendo tutto insieme, si trova

$$\beta = \lambda\Delta = \frac{\Delta}{\delta} \implies \beta\delta = \Delta = \gamma + \beta$$

che è proprio la relazione di Widom nelle leggi di scala.

3.6.3 Omogeneità

Imponendo una relazione analoga a 3.6.1 per le altre funzioni termodinamiche, come l'energia libera, si possono ritrovare tutte le leggi di scala; una funzione che soddisfa una tale relazione si dice *omogenea*. L'omogeneità permette di codificare l'invarianza di scala che si verifica nei pressi del punto critico dovuta alla divergenza del parametro di scala.

Per descrivere l'ipotesi, si considera una generica funzione $f(q)$, nella generica variabile q . La richiesta che la f sia omogenea in q equivale a dire che, riscalandolo $q' = b^{D_q} q$, allora

$$f(q') = b^{D_f} f(q)$$

dove D_f è la dimensione di f , mentre D_q è quella di q . Per esempio, nel caso della funzione di correlazione $\Gamma(x) \sim x^{-p}$ (con $p = d + \eta - 2$), prendendo $x' = x/b$, allora $\Gamma(x') = b^p \Gamma(x)$.

Si vuole applicare questa ipotesi di omogeneità alla funzione $f = F/V$ (energia per unità di volume), con $f = f(h, t)$. L'ipotesi di omogeneità consiste nella validità delle due seguenti relazioni

$$\begin{cases} h' = b^{D_h} h \\ t' = b^{D_t} t \end{cases} \quad f(h', t') = b^d f(h, t)$$

¹Si considera solo la F^- perché $F^+ = 0$.

con h campo magnetico e $t = T - T_c$. Ora si determinano D_t e D_h .

- Sapendo che $\xi \sim |t|^{-\nu}$, allora $|t| \sim \xi^{-1/\nu}$. Se $\xi' = \xi/b$, allora

$$t' = b^{D_t} t \sim b^{D_t} \xi^{-1/\nu} = b^{D_t} b^{-1/\nu} (\xi')^{-1/\nu}$$

Perché si continui ad avere $t' \sim (\xi')^{-1/\nu}$, allora, è necessario avere $D_t = 1/\nu$.

- Si ha $h \sim \xi^{(\eta-d-2)/2}$. Per $\xi' = \xi/b$, si ha

$$h' = b^{D_h} h \sim b^{D_h} \xi^{(\eta-d-2)/2} \sim b^{D_h} b^{\frac{\eta-d-2}{2}} (\xi')^{\frac{\eta-d-2}{2}}$$

Dalla richiesta $h' \sim (\xi')^{\frac{\eta-d-2}{2}}$, si ottiene $D_h = \frac{2+d-\eta}{2}$.

Si fissa il riscaldamento in modo che $|t'| = 1$, cioè $b = |t|^{-1/D_t}$. Così facendo, essendo $f(h, t) = b^{-d} f(h', t')$, si trova che

$$f(h, t) = \left(|t|^{-1/D_t}\right)^{-d} f(h', 1) \implies f(h, t) = |t|^{d/D_t} \tilde{f}\left(\frac{h}{|t|^{D_h/D_t}}\right)$$

dove si è usato che $h' = b^{D_h} h = \left(|t|^{-1/D_t}\right)^{D_h} h$ e la $\tilde{f}$ è ottenuta eliminando la dipendenza da t' (fissato a 1) nella $f(h', t')$.

Dalle relazioni degli esponenti critici, si ottengono delle relazioni che, opportunamente combinate in modo algebrico, unitamente con i valori trovati per D_h e D_t , permettono di ritrovare le leggi di scala.

(1). $f \sim |t|^{2-\alpha} \implies 2 - \alpha = d/D_t$.

(2). $\psi \sim |t|^\beta$ e $\psi = -\left.\frac{\partial f}{\partial h}\right|_{h=0}$ permette di concludere che

$$\beta = \frac{d}{D_t} - \frac{D_h}{D_t} = \frac{d - D_h}{D_t}$$

(3). $\chi \sim |t|^{-\gamma}$ e $\chi = \left.\frac{\partial \psi}{\partial h}\right|_{h=0}$ implica che

$$\gamma = -\left(\frac{d}{D_t} - 2\frac{D_h}{D_t}\right) = \frac{2D_h - d}{D_t}$$

(4). $\psi \sim h^{1/\delta}$ implica che

$$\psi = -\frac{\partial f}{\partial h} = -|t|^{\frac{d-D_h}{D_t}} \tilde{f}\left(\frac{h}{|t|^{D_h/D_t}}\right) \sim h^{1/\delta} \sim h^{1/\delta}$$

Questo andamento è vero se


$$\tilde{f}\left(\frac{h}{|t|^{D_h/D_t}}\right) \sim \left(\frac{h}{|t|^{D_h/D_t}}\right)^{1/\delta} \implies |t|^{\frac{d-D_h}{D_t} - \frac{D_h}{\delta D_t}} h^{1/\delta} \sim h^{1/\delta} \iff \delta = \frac{D_h}{d - D_h}$$

Per esempio, secondo queste relazioni, si ritrova la legge di scala di Rushbrooke:

$$\begin{aligned}\alpha + 2\beta + \gamma &= \left(2 - \frac{d}{D_t}\right) + \left(2\frac{d - D_h}{D_t}\right) + \left(\frac{2D_h - d}{D_t}\right) \\ &= 2 + \frac{-d + 2d - 2D_h + 2D_h - d}{D_t} = 2\end{aligned}$$

3.6.4 Introduzione al gruppo di rinormalizzazione

L'idea alla base del gruppo di rinormalizzazione è, a partire da un reticolo, raggruppare i siti in modo da creare un nuovo reticolo con meno siti e una scala di lunghezze diverse, rinormalizzando i gradi di libertà del reticolo. Per esempio, a destra, per un reticolo quadrato, si crea un nuovo reticolo ottenuto dal raggruppamento di un *blocco* di quattro siti del reticolo originario.



Continuando l'esempio del reticolo quadrato, se nel reticolo di partenza (nero) si avevano N^2 siti, nel reticolo finale (rosso) se ne dovranno avere $(N/2)^2$ perché si raggruppano due siti per ogni dimensione. Tenendo a mente gli spin, si passa da $\{S_i\}_{i=1}^{N^2} \longrightarrow \{S'_i\}_{i'=1}^{(N/2)^2}$, dove

$$S'_i = \begin{cases} 1 & , \sum_{i \in \text{blocco}} S_i > 0 \\ -1 & , \sum_{i \in \text{blocco}} S_i < 0 \\ S_1 & , \sum_{i \in \text{blocco}} S_i = 0 \end{cases}$$

per la regola di maggioranza. Considerando il caso del modello di Ising, l'obiettivo è partire da

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - h \sum_i S_i \quad Z = \sum_{\{S_i\}} e^{-\beta H(\{S_i\})} := e^{-Nf(h,t)}$$

con $f = -\frac{1}{N} \log Z = \frac{F}{N\kappa_B T}$ e ottenere, nel reticolo finale

$$H'(\{S'_i\}) = -J' \sum_{\langle i,j \rangle} S'_i S'_j - h' \sum_i S'_i \quad Z' = \sum_{\{S'_i\}} e^{-\beta H'(\{S'_i\})} = e^{-N'f(h',t')} \stackrel{(*)}{=} e^{-Nf(h,t)}$$

con $J' \neq J$ e $h' \neq h$ in generale. Cioè si vogliono modificare le scale di lunghezza, ma avere una fisica del sistema che è analoga prima e dopo la trasformazione, cosa assicurata da $(\star)$. Nel caso del reticolo quadrato, la scala di lunghezza cambia con $b = 2$. In generale, il numero di siti è $N' = b^{-d}N^1$; in un reticolo quadrato (piano) come questo, si ha $b = d = 2$, infatti $N' = N/4$. Affinché la relazione $(\star)$ sia vera, si deve avere che la f è omogenea:

$$f(h, t) = \frac{N'}{N} f(h', t') = b^{-d} f(h', t')$$

con $t' = b^A t$ e $h' = b^B h$. Questa assunzione, quindi, implica la *relazione di omogeneità*.

In generale (non necessariamente Ising, ma spin interagenti in modo arbitrario), si considera

$$H(\{S_i\}) = \sum_{\alpha} K_{\alpha} S_{\alpha} \quad S_{\alpha} = \prod_{i \in I_{\alpha}} S_i$$

Per esempio, si può avere

$$H = K_1 \sum_i S_i + K_2 \sum_{\langle i, j \rangle} S_i S_j + \tilde{K}_2 \sum_{\langle\langle i, j \rangle\rangle} S_i S_j + \dots + K_3 \sum_{\langle i, j, k \rangle} S_i S_j S_k + \dots$$

In ogni caso, vale

$$\sum_{\{S_i\}} H(\{S_i\}) = 0$$

perché si sommano sia le componenti up, che quelle down, quindi si annullano a vicenda. Nel raggruppamento dei siti, le nuove variabili di spin del blocco $S'_B = g(S_B)$, dove g è una relazione che, nel caso trattato precedentemente, potrebbe essere la regola di maggioranza. Poi si introduce una probabilità

$$P_B(\{S_B\}) := \delta(S'_B, g(S_B)) = \begin{cases} 1 & , \text{ se } \{S_B\} \text{ restituisce } S'_B \\ 0 & , \text{ se } \{S_B\} \text{ non restituisce } S'_B \end{cases}$$

cioè è pari a 1 se lo spin risultante dal blocco $\{S_B\}$ coincide con S'_B . Più in generale, si definisce

$$P(\{S'\}, \{S\}) = \prod_B P_B(\{S_B\})$$

che è pari a 1 se $\{S\}$ raggruppati restituiscono $\{S'\}$ e 0 altrimenti. Allora devono valere le due seguenti relazioni:

$$P(\{S'\}, \{S\}) \geq 0 \quad \sum_{\{S'\}} P(\{S'\}, \{S\}) = 1$$

¹Diverso dall' N riportato sopra, che indica il numero di siti per ciascuna dimensione, mentre questo rappresenta il numero di siti totali.

Questo permette di scrivere che

$$Z = \sum_{\{S\}} e^{-H(\{S\})} = \sum_{\{S'\}} \sum_{\{S\}} P(\{S'\}, \{S\}) e^{-H(\{S\})} \stackrel{\text{def}}{=} e^{-N\mu} \sum_{\{S'\}} e^{-H'(\{S'\})}$$

dove si è inglobato β nelle costanti J, h , o K_α più in generale, e si è definito

$$e^{-H'(\{S'\})} := e^{N\mu} \sum_{\{S\}} P(\{S'\}, \{S\}) e^{-H(\{S\})}$$

con μ determinato dal fatto che $\sum_{\{S'\}} H(\{S'\}) = 0$. Si richiede, ora, che H' abbia la stessa forma di H :

$$H'(\{S'\}) = \sum_{\alpha} K'_\alpha S'_\alpha$$

Di fatto, la teoria del gruppo di rinormalizzazione consiste nello studiare come cambiano le costanti di accoppiamento $K_\alpha \rightarrow K'_\alpha$. Allora si è partiti da $e^{-Nf(K)} = \sum_{\{S\}} e^{-H(\{S\})}$ e si è arrivati a

$$e^{-Nf(K')} = \sum_{\{S'\}} e^{-H'(\{S'\})} = e^{N\mu} \sum_S \overbrace{\sum_{S'} P(\{S'\}, \{S\})}^{=1} e^{-H(\{S\})} = e^{N\mu} \sum_{\{S\}} e^{-H(\{S\})}$$

da cui

$$f(K) = \mu(K) + b^{-d} f(K')$$

con $\mu(K)$ costante¹.

Il gruppo di rinormalizzazione consiste, quindi, in una trasformazione, detta *trasformazione RG*, $K \rightarrow K' = R(K)$ legate al cambio di scala del sistema al *passo successivo*: ogni trasformazione RG raggruppa un sito in un blocco di *passo successivo* (per esempio, nel reticolo quadrato, si incorpora un altro sito per dimensione); iterando, si può arrivare al riscaldamento del sistema desiderato. Questo si può ripetere infinite volte perché, nel limite termodinamico, si hanno infiniti siti.

3.6.5 Punti fissi nella teoria RG

Considerando un vettore K^* di costanti di accoppiamenti tale che $K^* = R(K^*)$, cioè invariante sotto trasformazione RG, questo descrive un sistema la cui fisica risulta indipendente dalla scala utilizzata per studiarlo. La lunghezza di correlazione, in questi casi, può valere:

- $\xi = 0$, corrispondente a sistemi a temperatura infinita che, quindi, risultano disordinati a qualunque scala, senza distinzioni (caso banale);

¹Qui K è il vettore di componenti K_α .

- $\xi = +\infty$, corrispondente a punti critici.

Si definisce $K^{(n+1)} := R(K^{(n)})$ per indicare le costanti ottenute passando dall'applicazione n -esima della trasformazione a quella $n+1$ -esima. Visto che $K^* = R(K^*)$, si può scrivere banalmente

$$K^{(n+1)} - K^* = R(K^{(n)}) - K^*$$

L'utilità di questa scrittura è linearizzare R attorno a K^* :

$$R(K^{(n)}) \simeq R(K^*) + W(K^{(n)} - K^*)$$

dove la matrice W è data da

$$W_{\alpha\beta} = \left. \frac{\partial R_\alpha(K)}{\partial K_\beta} \right|_{K=K^*}$$

Si diagonalizza W per trovarne gli autovalori che determinano il riscaldamento del sistema lungo l'autovettore ad esso relativo, il che permette di capire come agisce R . In particolare, si cercano gli *autovettori sinistri*

$$\phi W = \lambda \phi$$

e gli autovalori associati. Tramite tali autovettori, si definisco i *campi di scala*:

$$v^{(n)} := \sum_{\alpha} \phi_{\alpha} (K^{(n)} - K^*)_{\alpha}$$

dove ϕ_{α} è la componente α -esima del vettore ϕ . I campi di scala sono interessanti perché

$$\begin{aligned} v^{(n+1)} &= \sum_{\alpha} \phi_{\alpha} (K^{(n+1)} - K^*)_{\alpha} = \sum_{\alpha} \phi_{\alpha} W_{\alpha\beta} (K^{(n)} - K^*)_{\beta} \\ &= \sum_{\beta} \lambda \phi_{\beta} (K^{(n)} - K^*)_{\beta} = \lambda v^{(n)} \end{aligned}$$

Cioè i campi di scala sono tali per cui, sotto la trasformazione R , vengono riscaldati dell'autovalore associato all'autovettore ϕ che li definisce. Scrivendo $\lambda = b^y$, con b scala di lunghezza del sistema (nel reticolo quadrato, $b = 2$), si può individuare y come la dimensione di v . L'introduzione dei campi di scaling è l'esser passati da un set $\{K_1, K_2, \dots\}$ al set $\{v_1, v_2, \dots\}$ ¹ tramite cui

$$f(v) = \mu(v) + b^{-d} f(v')$$

dove $v'_j = \lambda_j v_j$. Questi campi assumono una rilevanza a seconda dell'autovalore λ_j ; infatti, a seconda che questo sia minore o maggiore di 1, iterando infinite volte la

¹Le K_{α} e v_i sono, rispettivamente, le componenti dei vettori K e v .


trasformazione, tendono o meno a zero. Per tale ragione, se $\lambda_j < 1$, v_j si dice *campo irrilevante*; se $\lambda_j > 1$, si dice *campo rilevante*; se $\lambda_j = 1$, si dice *campo marginale* nel senso che la trattazione non permette di comprenderne il comportamento.

3.6.6 Applicazione al modello di Ising 1D

Si considera $H = -J \sum_j S_j S_{j+1} - h \sum_j S_j$, la cui soluzione esatta si è visto essere legata alla matrice di trasferimento

$$T = \begin{pmatrix} e^{\beta(J+h)} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta(J-h)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/uv & u \\ u & v/u \end{pmatrix}$$

dove si sono definite le variabili $u = e^{-\beta J}$ e $v = e^{-\beta h}$. Si sceglie di raggruppare gli spin della catena 1D di Ising a coppie, quindi si prende $b = 2$.



Visto che si stanno raggruppando i siti a coppie, la soluzione del reticolo con i siti **blu** è ottenuta tramite la matrice

$$T^2 = T \cdot T = \begin{pmatrix} u^2 + 1/u^2 v^2 & v + 1/v \\ v + 1/v & u^2 + v^2/u^2 \end{pmatrix}$$

Si vogliono trovare delle nuove variabili u', v' tali che

$$T' = C \begin{pmatrix} 1/u'v' & u' \\ u' & v'/u' \end{pmatrix}$$

coincide con T^2 , cioè risolve il problema, ma ha la stessa forma di T^2 . Inoltre, la costante C è influente perché non compare nei potenziali termodinamici. Dal confronto delle due matrici, si trova che


$$\begin{cases} C/u'v' = u^2 + 1/u^2 v^2 \\ Cu'v + 1/v \\ Cv'/u' = u^2 + v^2/u^2 \end{cases} \implies \begin{cases} u' = \frac{(v + 1/v)^{1/2}}{(u^4 + 1/u^4 + v^2 + 1/v^2)^{1/4}} \\ v' = \frac{(u^4 + v^2)^{1/2}}{(u^4 + 1/v^2)^{1/2}} \\ C = (v + 1/v)^{1/2} (u^4 + 1/u^4 + v^2 + 1/v^2)^{1/4} \end{cases}$$

Per semplificare le espressioni, si prendono $x = u^4 = e^{-4\beta J}$ e $y = v^2 = e^{-2\beta h}$, per cui

$$\begin{cases} x' = x \frac{(1+y)^2}{(x+y)(1+xy)} \\ y' = y \frac{x+y}{1+xy} \end{cases}$$

Supponendo $J, h > 0$, allora $x, y \in [0, 1]$.

Si vuole studiare il comportamento di un punto (x, y) iterando la trasformazione più volte. In questo modo, si può costruire il grafico a destra. I punti fissi della trasformazione, evidenziati in rosso nel grafico, si trovano essere $(x^*, y^*) = (1, y^*)$, $\forall y^* \in [0, 1]$, $(x^*, y^*) = (0, 1)$ e $(x^*, y^*) = (0, 0)$. Le frecce, invece, indicano la direzione di un punto che si trova lungo quella curva nel caso in cui si iteri la trasformazione più volte, per cui questo grafico è detto *flusso di normalizzazione*.



In questo senso, il punto $(0, 1)$ è *repulsivo*: spostandosi leggermente da esso, si finisce da un'altra parte del grafico; al contrario, la retta rossa definisce punti *attrattivi* perché, spostandosi da essi, ci si ritorna. Il punto $(0, 0)$, invece, è sia attrattivo, che repulsivo, a seconda di dove ci si sposta.

Dalle definizioni, si vede che $x = 1 \iff -4\beta J = 0$, che corrisponde a $\beta \rightarrow 0$, o $T \rightarrow +\infty$, il che equivale a spin non correlati ($\xi = 0$), quindi senza una fisica interessante alla base. Al contrario, i punti della linea attrattiva corrispondono, a meno di casi limite $J, h \rightarrow +\infty$, a temperatura nulla, cioè $\beta \rightarrow +\infty$.

A APPENDICE

A.1 Nozioni termodinamiche di base

- Per il primo principio, si ha $\Delta E = Q - W$, con ΔE variazione di energia interna. Per un sistema generale che coinvolge lavoro meccanico, magnetico, elettrico e scambio di particelle di natura diversa, si ha

$$\delta W = PdV - HdM - EdP - (\mu_1 dN_1 + \mu_2 dN_2 + \dots)$$

In generale, $\delta W = \sum_i F_i dx_i$, con F_i forza generalizzata (intensiva) e x_i spostamento generalizzato (estensivo).

- Per trasformazione reversibile, l'entropia è data da

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} \quad (\text{A.1.1})$$

Per trasformazioni generiche, vale $dS \geq \frac{\delta Q}{T}$ e l'uguaglianza vale solo per trasformazioni reversibili.

- Per trasformazioni generiche

$$dE + \delta W \leq TdS \quad (\text{A.1.2})$$

A.1.1 Potenziali termodinamici

Combinando primo e secondo principio, nel caso di processi che coinvolgono solo lavoro meccanico, si ha

$$dE \leq TdS - \delta W = TdS - PdV + \mu dN \quad (\text{A.1.3})$$

ammettendo scambio di particelle di un solo costituente. Se il processo avviene ad entropia, volume e numero di particelle costanti, $dE \leq 0$, cioè l'energia rimane invariata, o tende verso il minimo. Altrimenti, si considerano i seguenti potenziali termodinamici:

- **Energia libera di Helmholtz:** $F = E - TS$, da cui

$$dF \leq -PdV - SdT + \mu dN \quad (\text{A.1.4})$$

- **Energia libera di Gibbs:** $G = F + PV = E - TS + PV$, da cui

$$dG \leq VdP - SdT + \mu dN \quad (\text{A.1.5})$$

- **Entalpia:** $H = E + PV$, da cui

$$dH \leq TdS + VdP + \mu dN \quad (\text{A.1.6})$$

- **Gran potenziale:** $\Omega = E - TS - \mu dN$, da cui

$$d\Omega \leq -SdT - PdV - Nd\mu \quad (\text{A.1.7})$$

A.2 Test di consistenza

Si assume che $\mathcal{U}_\ell$ rappresenti un grafo connesso di dimensione ℓ ; si fa vedere che l'espansione in cumulanti è una somma su grafi connessi. Per farlo, si considera l'espressione

$$W_N = \sum_{\{m_\ell\}}^* \prod_{\ell} \mathcal{U}_\ell$$

giustificata dall'associazione delle f_{ij} con una connessione tra i vertici i e j . Il significato è scomporre ogni grafo di N vertici in termini delle sue componenti connesse. L'indice m_ℓ indica il numero di componenti connesse in un grafo di N vertici e soddisfa $\sum_{\ell} m_\ell \cdot \ell = N$: dovendo il grafo complessivo essere di N vertici, visto che nella m_ℓ -esima componente connessa, ci sono ℓ vertici, la somma su ℓ restituisce il numero totale di vertici, cioè N .

L'apice $*$ indica che si dovrebbe includere un fattore combinatorio correttivo perché grafi diversi restituiscono lo stesso integrale, ma, per il momento, lo si sottintende, anche se questo è pari a

$$\frac{N!}{\prod_{\ell} m_\ell! (\ell!)^{m_\ell}}$$

dove

- $N!$ tiene conto di tutte le permutazioni delle particelle;
- $1/\ell!$ poiché $\mathcal{U}_\ell$ è una somma di grafi su ℓ vertici, l'integrale su $d^\ell r$ non deve contare come distinte le permutazioni interne al cluster se le particelle sono identiche;
- $1/m_\ell!$ evita di contare più volte la stessa configurazione scambiando tra loro m_ℓ cluster identici di dimensione ℓ .

visto che le particelle sono indistinguibili. Allora si ha, introducendo alla fine il fattore di conteggio e il vincolo $\sum_{\ell} m_\ell \cdot \ell = N$, che

$$\begin{aligned} Z_N &= \sum_{\{m_\ell\}}^* \prod_{\ell} \int d^N \vec{r} \mathcal{U}_\ell = \sum_{\{m_\ell\}}^* \int d^N \vec{r} \prod_{\ell} \mathcal{U}_\ell \\ &= \sum_{\{m_\ell\}} \prod_{\ell} \frac{N!}{m_\ell! (\ell!)^{m_\ell}} (\ell! V b_\ell)^{m_\ell} \delta \left(N - \sum_{\ell} \ell \cdot m_\ell \right) \end{aligned}$$

Questo fattore correttivo si vuole rimuovere, per cui risulta utile il formalismo gran canonico che introduce una somma su N per farlo sparire. Prendendo $\alpha = e^{\beta\mu}/\lambda_T^3$, si ha:

$$\begin{aligned}\mathcal{Z} &= \sum_{N=0}^{+\infty} \frac{\alpha^N}{N!} \sum_{\{m_\ell\}} \prod_{\ell} \frac{N!}{m_\ell! (\ell!)^{m_\ell}} V^{m_\ell} \frac{(\ell!)^{m_\ell}}{m_\ell!} b_\ell^{m_\ell} \\ &= \sum_{m_1, m_2, \dots = 0}^{+\infty} \prod_{\ell} \frac{1}{m_\ell!} (V b_\ell \alpha^\ell)^{m_\ell}\end{aligned}$$

dove le due somme si sono sostituite con delle multi-somme sulle componenti connesse di qualunque lunghezza¹, avendo sommato su N da 0 a infinito, e si è scritto $\alpha^N = \alpha^{\sum_\ell \ell \cdot m_\ell}$. Per finire, si osserva che:

$$\mathcal{Z} = \prod_{\ell=1}^{+\infty} \sum_{m_\ell=0}^{+\infty} \frac{1}{m_\ell!} (V b_\ell \alpha^\ell)^{m_\ell} = \exp \left(V \sum_{\ell=1}^{+\infty} b_\ell \alpha^\ell \right)$$

che è proprio l'espansione in cumulanti trovata, concludendo che questa coinvolge somme solo su grafi connessi.

A.3 Integrale nell'argomento di Peierls 1D

Si studia l'integrale

$$I(\gamma) := \int_{-\infty}^0 dn \int_0^{+\infty} dn' \frac{1}{(n' - n)^\gamma}$$

Intanto, si manda $n \rightarrow -n$, così da ottenere

$$I(\gamma) = \int_0^{+\infty} dn \int_0^{+\infty} dn' \frac{1}{(n' + n)^\gamma}$$

Poi si considera il cambio di variabili $u = n' + n$ e $v = n'$; queste relazioni sono ovviamente invertibili e lo jacobiano è

$$J = \det \begin{pmatrix} \partial_u n' & \partial_v n' \\ \partial_u n & \partial_v n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -1$$

Allora $|J| = 1 \implies dn dn' = du dv$. Quanto agli estremi di integrazione, si hanno $n, n' \geq 0$, con $n' = v$ e $n = u - v$, per cui $v \geq 0$ e $u - v \geq 0$, per cui $u \geq v$. Se ne conclude, dunque, che

$$I(\gamma) = \int_0^{+\infty} du \int_0^u dv \frac{1}{u^\gamma} = \int_0^{+\infty} u^{1-\gamma} du$$

¹Si avrà m_1 di lunghezza 1, m_2 di lunghezza 2 e così via. Queste arrivano fino a $+\infty$ perché si considerano somme di componenti connesse con sempre più vertici, per cui si dovrà considerare, per esempio, anche il grafo di infiniti vertici senza connessioni, associato a $m_1 \rightarrow +\infty$.

Per risolverlo e capirne l'andamento, si introducono i cutoff α e L per cui

$$I_{\alpha,L}(\gamma) = \int_{\alpha}^L u^{1-\gamma} du = \begin{cases} \frac{L^{2-\gamma} - \alpha^{2-\gamma}}{2-\gamma} & , \text{ se } \gamma \neq 2 \\ \log \frac{L}{\alpha} & , \text{ se } \gamma = 2 \end{cases}$$

Si distinguono i seguenti casi:

- se $\gamma = 2$, si ha divergenza logaritmica sia per $\alpha \rightarrow 0$, sia per $L \rightarrow +\infty$;
- se $\gamma < 2$, allora $2 - \gamma > 0$ e, quindi, il termine $L^{2-\gamma} \rightarrow +\infty$, mentre $\alpha^{2-\gamma}$ resta finito, quindi $I(\gamma) \sim L^{2-\gamma}$;
- se $\gamma > 2$, allora $2 - \gamma < 0$, per cui, nel limite $\alpha \rightarrow 0$, $L \rightarrow +\infty$, si ha $I(\gamma) \sim \alpha^{2-\gamma}$.