

# NOTE DI ASTROFISICA

MANUEL DEODATO

# INDICE

|          |                                                                     |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Teoria del trasporto radiativo</b>                               | <b>3</b>  |
| 1.1      | Grandezze fondamentali                                              | 3         |
| 1.2      | Propagazione nel vuoto                                              | 5         |
| 1.3      | Propagazione in un mezzo                                            | 5         |
| <b>2</b> | <b>Classificazioni delle stelle</b>                                 | <b>6</b>  |
| 2.1      | Sistemi fotometrici                                                 | 6         |
| 2.2      | Spettro del Sole                                                    | 7         |
| 2.3      | Serie dell'idrogeno                                                 | 8         |
| 2.4      | Classificazione spettrale di Harvard                                | 9         |
| 2.5      | Popolazione di idrogeno                                             | 10        |
| 2.6      | Popolazione del calcio                                              | 12        |
| 2.7      | Classificazione MKK                                                 | 13        |
| <b>3</b> | <b>Struttura ed evoluzione stellare</b>                             | <b>14</b> |
| 3.1      | Equilibrio idrostatico                                              | 14        |
| 3.2      | Validità della condizione di equilibrio idrostatico                 | 15        |
| 3.3      | Pressione e temperatura centrali                                    | 16        |
| 3.4      | Teorema del viriale                                                 | 16        |
| 3.4.1    | Gas perfetto                                                        | 17        |
| 3.4.2    | Gas monoatomico                                                     | 18        |
| 3.5      | Tempo scala di evoluzione stellare                                  | 19        |
| 3.6      | Equazione di conservazione dell'energia                             | 20        |
| 3.7      | Trasporto di energia nelle stelle                                   | 21        |
| 3.7.1    | Trasporto conduttivo                                                | 21        |
| 3.7.2    | Trasporto convettivo                                                | 22        |
| 3.7.3    | Criterio di stabilità                                               | 23        |
| 3.7.4    | Trasporto di energia tramite convezione                             | 24        |
| 3.7.5    | Teoria della lunghezza di rimescolamento                            | 25        |
| 3.7.6    | Validità dell'equilibrio idrostatico in presenza di moti convettivi | 27        |
| 3.8      | Equazioni di struttura – recap                                      | 28        |
| 3.9      | Termodinamica per gli interni stellari                              | 28        |
| <b>A</b> | <b>Grandezze fondamentali</b>                                       | <b>29</b> |

# 1 TEORIA DEL TRASPORTO RADIATIVO

## 1.1 Grandezze fondamentali


Si studia la propagazione delle radiazioni elettromagnetiche dalla sorgente che si desidera osservare fino all'osservatore stesso, trascurando le interazioni microscopiche di tale radiazione con il mezzo che separa sorgente e osservatore, bensì concentrandosi sulle sue interazioni a livello macroscopico. L'assunzione alla base della trattazione è che le scale dimensionali dei



mezzi attraversati dalla radiazione siano molto maggiori rispetto alla lunghezza d'onda della radiazione stessa. In questo limite, la propagazione della radiazione può essere assunta rettilinea.

Le variabili tramite cui si descrive il campo di radiazione sono  $\vec{r}$ ,  $t$  e  $\hat{k}$ , rispettivamente posizione, tempo e versore d'onda. L'oggetto che permetterà di descrivere il campo della radiazione è l'*intensità specifica monocromatica*  $I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k})$ .

Si definisce studiando l'energia trasferita dalla radiazione su una superficie infinitesima  $dA$ , con versore normale  $\hat{n}$ . La quantità di energia trasferita a questa superficie da una radiazione che si muove lungo  $\hat{k}$ , con frequenza compresa tra  $\nu$  e  $\nu + d\nu$ , entro un angolo solido  $d\Omega$  e che si trova in  $\vec{r}$  al tempo  $t$ , è data da



$$dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n} dA dt d\Omega d\nu$$

Indicando, poi, con  $\theta$  l'angolo tra  $\hat{k}$  e  $\hat{n}$ , si può scrivere

$$dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \cos \theta dA dt d\Omega d\nu \quad (1.1.1)$$

Si osserva, quindi, che  $I_\nu$  ha le dimensioni di

$$\frac{\text{energia}}{\text{superficie tempo angolo solido frequenza}}$$

In CGS, allora, le sue unità di misura sono  $[I_\nu] = \text{erg cm}^{-2} \text{s}^{-1} \text{sr}^{-1} \text{Hz}^{-1}$ <sup>1</sup>. L'intensità specifica permette di determinare il campo di radiazione, per cui l'intera teoria del trasporto radiativo

<sup>1</sup>Nell'espressione, erg è l'unità di misura dell'energia e sr è lo steradiano, per la misura adimensionale degli angoli solidi.

si basa sul trovare questa quantità. Tramite l'intensità specifica, si possono esprimere il flusso *Flusso* monocromatico  $F_\nu$  e il flusso  $F$  come

$$F_\nu = \int I_\nu \cos \theta \, d\Omega \quad F = \int F_\nu \, d\nu \quad (1.1.2)$$

Si nota che, per una radiazione isotropa,  $I_\nu$  non dipende da  $\hat{k}$ , quindi  $F_\nu \propto \int \cos \theta \, d\Omega = 0$ . L'impulso trasportato dalla radiazione è  $dE/c$ , direzionato lungo  $\hat{k}$ ; la pressione di radiazione *Pressione di radiazione* è ottenuta come il flusso dell'impulso ortogonale alla superficie su cui incide la radiazione, per cui

$$P_\nu = \int \frac{dE/c}{dA \, dt \, d\nu} \hat{k} \cdot \hat{n} \, d\Omega = \int \frac{I_\nu}{c} \cos^2 \theta \, d\Omega \quad (1.1.3)$$

Se la radiazione è isotropa, allora

$$P_\nu = \frac{I_\nu}{c} \int \cos^2 \theta \, d\Omega = \frac{I_\nu}{c} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta \, d\theta = \frac{4\pi}{3} \frac{I_\nu}{c}$$

La densità di energia trasmessa dalla radiazione è l'energia per unità di volume *Densità di energia*

$$dV = dA \, ds \cos \theta = dA \, c \, dt \cos \theta$$

con  $ds = c \, dt$  tratto percorso in tempo  $dt$ , quindi

$$u_\nu = \int \frac{I_\nu}{c} \, d\Omega \quad u = \int u_\nu \, d\nu \quad (1.1.4)$$

Per radiazione isotropa, si ha

$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} I_\nu \implies P_\nu = \frac{u_\nu}{3}$$

L'intensità specifica media è definita come media rispetto all'angolo solido:

$$J_\nu = \frac{\int I_\nu \, d\Omega}{\int d\Omega} = \frac{1}{4\pi} \int I_\nu \, d\Omega \quad (1.1.5)$$

*Intensità specifica media*


In questo modo, si trova che

$$u_\nu = \frac{4\pi}{c} J_\nu$$

**Osservazione 1.1.** Se la radiazione è isotropa, allora  $J_\nu = \frac{I_\nu}{4\pi} \int d\Omega = I_\nu$ .

**Esempio 1.1 (Sfera uniformemente brillante).**

Si vuole calcolare il flusso della radiazione emessa dalla sfera nel punto  $P$ , a distanza  $r$  dal suo centro. L'ipotesi di sfera uniformemente brillante corrisponde a una radiazione elettromagnetica emessa di intensità  $I = B$  costante, in un qualunque punto interno alla sfera, mentre è 0 altrimenti.




Il flusso è, allora, determinato da se il segmento che parte da  $P$  e lungo  $r$  interseca o meno la sfera:

$$F = \int I \cos \theta \, d\Omega = 2\pi B \int_0^{\theta_c} \cos \theta \sin \theta \, d\theta = 2\pi B \frac{1 - \cos^2 \theta_c}{2} = \pi B \sin^2 \theta_c$$

Però si sa che  $\sin \theta_c = R/r$ , quindi  $F = \pi B (R/r)^2$ . Sulla superficie,  $r = R$ , quindi  $F(R) = \pi B$ .

## 1.2 Propagazione nel vuoto

Si studia, ora, cosa succede all'intensità di una radiazione che si propaga nel vuoto tra un punto  $\vec{r}$  e un punto  $\vec{r}'$  posti lungo  $\hat{k}$ . L'energia trasportata è quella che attraversa sia  $dA$  che  $dA'$ .



Quella che attraversa  $dA$  è  $dE = I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n} \, dA \, dt \, d\Omega \, d\nu$ , dove  $d\Omega$  è l'angolo solido tale per cui la radiazione, nel punto  $\vec{r}$ , vede esattamente  $dA'$ , quindi è  $d\Omega = \hat{k} \cdot \hat{n}' \frac{dA'}{R^2}$ . Quella che attraversa  $dA'$  è, invece, data da  $dE' = I_\nu(\vec{r}', t', \hat{k}) \hat{k} \cdot \hat{n}' \, dA' \, dt \, d\Omega' \, d\nu$ , con  $d\Omega' = \hat{k} \cdot \hat{n} \frac{dA}{R^2}$ . Visto che la propagazione avviene nel vuoto,  $dE = dE'$ , da cui, esplicitando  $d\Omega$  e  $d\Omega'$ , si trova che  $I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) = I_\nu(\vec{r}', t', \hat{k})$ ; questo significa che l'intensità di una radiazione che si propaga nel vuoto lungo una stessa direzione rimane invariata.

Utilizzando questa relazione per uno spostamento infinitesimo da  $dA$ , cioè usando il ragionamento per  $\vec{r}$  e  $\vec{r} + d\vec{r}$ , si ha che

$$\begin{aligned} \Delta E &= \left[ I_\nu(\vec{r} + d\vec{r}, t + dt, \hat{k}) - I_\nu(\vec{r}, t, \hat{k}) \right] dA \, dt \, d\Omega \, d\nu \\ &= \left[ \frac{1}{c} \frac{\partial I_\nu}{\partial t} + \hat{k} \cdot \vec{\nabla} I_\nu \right] ds \, dA \, dt \, d\Omega \, d\nu \end{aligned}$$

con  $dt = ds/c$ , da cui si ottiene

$$\frac{1}{c} \frac{\partial I_\nu}{\partial t} + \hat{k} \cdot \vec{\nabla} I_\nu = 0 \quad (1.2.1)$$

nel vuoto.

**Osservazione 1.2.** Il fatto che  $I_\nu$  rimanga costante nel vuoto è legato al fatto che è un flusso per unità di angolo solido: indipendentemente dalla distanza dalla sorgente, la si vedrà brillare allo stesso modo, tuttavia al distanza fa variare l'angolo solido, per cui il flusso che raggiunge l'osservatore varierà di conseguenza tramite la legge  $F \propto 1/r^2$  trovata sopra.

## 1.3 Propagazione in un mezzo

Da completare...

## 2 CLASSIFICAZIONI DELLE STELLE

### 2.1 Sistemi fotometrici

La prima classificazione stellare fu in termini di *luminosità* decrescente. Questa prevedeva sei classi, dove la prima differiva per un fattore 100 rispetto alla sesta. Pertanto, la definizione di *magnitudine apparente* di una stella è

$$m_1 - m_2 = -2.5 \log_{10} \left( \frac{\ell_1}{\ell_2} \right) \quad (2.1.1)$$

La luminosità registrata è ottenuta come

$$\ell \propto \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} f(\lambda) T(\lambda) d\lambda$$

in quanto non è possibile registrare il flusso su tutte le frequenze contemporaneamente, dove  $T(\lambda) = R(\lambda)K(\lambda)Q(\lambda)A(\lambda)$  tiene conto, rispettivamente, delle proprietà di riflessività delle ottiche, delle proprietà del filtro, dell'efficienza quantica del rivelatore e dell'atmosfera.

**Osservazione 2.1.** Ogni misurazione di magnitudine è relativa: il riferimento più comune, pertanto chiamato *riferimento fotometrico*, è Vega. Tale magnitudine di riferimento si indica con  $m_0$ . Quando si usa questo come riferimento fotometrico, si parla di *Vegamag* (cioè magnitudine nel riferimento di Vega).

Nel pedice della magnitudine, si specifica anche il filtro utilizzato, come *U*, *V*, *B* eccetera (ultravioletto, visibile, blu). In figura 1, è riportato un andamento approssimativo della  $K(\lambda)$  per filtri a banda larga.




Figura 1:  $K(\lambda)$  per i vari tipi di filtri.

Ad una magnitudine misurata con un certo filtro  $i$ ,  $m_i$ , si può aggiungere una correzione, detta correzione bolometrica BC per ottenere la magnitudine bolometrica, cioè la magnitudine

*Magnitudine  
bolometrica*

misurata se fosse possibile misurare tutto il flusso, per cui

$$m_{\text{bol}} = m_i + \text{BC}$$

La magnitudine apparente vista finora dipende dalla distanza dalla stella; si definisce la magnitudine assoluta  $M$  come la magnitudine apparente della stessa stella ad una distanza di 10 pc. Il flusso prodotto a distanza  $d$  è  $f_d = (R/d)^2 \pi I$ , mentre quello prodotto a 10 pc è  $f_{10} = (R/10)^2 \pi I$ ; allora

$$m - M = -2.5 \log_{10} \left( \frac{100}{d^2} \right) = -5 \log_{10} \left( \frac{10}{d} \right) = -5 + 5 \log d$$

Si può tenere conto dell'assorbimento, nel caso in cui la radiazione non si propaghi nel vuoto, aggiungendo un termine  $A_v$ .

La differenza di magnitudini della stessa stella  $m_{*,i} - m_{*,j}$  ottenute con filtri diversi  $i, j$  è chiamata indice di colore. Questo permette di ottenere importanti informazioni riguardanti la temperatura della stella: per una stella molto calda, ad esempio, il flusso tenderebbe ad essere più concentrato nel blu, che nel rosso ad esempio.

*Magnitudine assoluta*

*Indice di colore*




Figura 2: Effetto della temperatura sul flusso ottenuto con diversi filtri: stelle più fredde avranno un indice di colore B-V più piccolo, mentre stelle più calde lo avranno maggiore.

## 2.2 Spettro del Sole

La formazione di righe spettrali nelle stelle è strettamente legato ad un gradiente di temperatura presente tra la sorgente della radiazione e l'ultimo punto da cui questa viene riemessa prima di giungere al rivelatore. Lo studio dello spettro del Sole ha portato la scoperta dell'elio,

elemento chimico che mostra la sua riga tipica di assorbimento nel giallo attorno ai 560 nm ed è stato osservato in condizioni di eclissi solare, in quanto normalmente oscurato da altre righe.




Figura 3: Spettro visibile del Sole.

Tra le righe più importanti, si osservano le seguenti.

- Il doppietto del sodio neutro a 589 nm e 589.6 nm: il sodio tende a ionizzarsi con l'aumentare della temperatura, pertanto è facile trovarlo nelle zone più esterne dell'atmosfera stellare. Inoltre, una gravità maggiore favorirà una pressione maggiore, quindi un numero maggiore di urti tra le particelle. Il verificarsi di urti perturba i livelli energetici e allarga le righe, per cui valutare la larghezza delle righe del sodio può dare indicazioni sulle condizioni dell'atmosfera stellare.
- La serie di Balmer, che corrisponde a transizioni orbitali nell'idrogeno neutro verso il livello  $n = 2$ . L'intensità di queste righe è strettamente vincolata ad avere una popolazione sufficiente di atomi di idrogeno non-ionizzati e con elettroni nel livello  $n = 2$ , per cui si possono ottenere informazioni sulla temperatura superficiale della stella. Inoltre, l'idrogeno è particolarmente suscettibile all'effetto Stark: la presenza di una densità elettronica elevata (legata ad altrettanto elevata gravità superficiale) porta la formazione di campi elettrici che, per effetto Stark, modificano i livelli energetici dell'idrogeno, provocando un allargamento di riga. Anche questo, quindi, è un ottimo indicatore circa le dimensioni e la gravità della stella.
- Righe CaII H e K, relative a lunghezze d'onda, rispettivamente, di 396.85 nm e 393.37 nm. Il calcio è molto poco presente, però si ionizza facilmente nella fotosfera solare. Inoltre, questo è un ottimo indicatore dell'attività magnetica della stella, in quanto queste righe si formano nella cromosfera, regione stellare situata tra la corona e la fotosfera, che è particolarmente sensibile agli effetti termici provocati dai campi magnetici.

## 2.3 Serie dell'idrogeno

La prima ad essere stata registrata è stata la serie di Balmer, individuata dalla formula

$$\lambda = (364.6 \text{ nm}) \frac{n^2}{n^2 - 4}$$



il cui primo valore individua la riga  $H_\alpha$  a circa 656 nm e si sposta nel blu e verso l'ultravioletto dai valori successivi. Questa termina ad una lunghezza d'onda di circa 364 nm, valore in corrispondenza del quale si può osservare il *salto di Balmer* in stelle “non troppo calde”, come si vedrà. Successivamente, si individuarono altre righe, come quelle di Lyman, o Paschen; tutte queste si uniscono tramite la *legge di Rydberg-Ritz*

$$\frac{1}{\lambda} = R \left( \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

con  $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ . La serie di Balmer si ha a seguito di transizioni al livello  $n = 2$ ; quella di Lyman, a  $n = 1$ ; quella di Paschen, a  $n = 3$ .

La natura di queste è esclusivamente quantistica e legata al fatto che l'energia del livello  $n$ -esimo è

$$E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{2\pi^2 m e^4}{h^2}$$

da cui la frequenza della radiazione emessa è

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{E_2 - E_1}{h} = \frac{2\pi^2 m e^4}{h^3} \left( \frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad T = \frac{2\pi^2 m e^4}{h^3 c}$$

## 2.4 Classificazione spettrale di Harvard

Basata sul classificare le stelle in base al loro spettro: O, B, A, F, G, K, M. Si introdussero, poi, delle sottoclassi indicate da lettera di riferimento, seguita da un numero arabo, e altre due classi, la T e la Y, dopo la M. In seguito, si concluse che questo ordinamento segue un andamento decrescente con la temperatura effettiva; infatti, non si osservano solo differenze nelle righe di assorbimento, ma anche nella parte continua dello spettro. Si può vedere che il massimo

| Classe   | Temperatura effettiva               | Colore relativo a Vega | Massa in sequenza principale ( $M_\odot$ ) | Raggio in sequenza principale ( $R_\odot$ ) | Luminosità in sequenza principale ( $L_\odot$ , bolometrica) | Righe dell'idrogeno |
|----------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>O</b> | $\geq 33\,000 \text{ K}$            | blu                    | $\geq 16$                                  | $\geq 6.6$                                  | $\geq 30\,000$                                               | Deboli              |
| <b>B</b> | $10\,000\text{--}33\,000 \text{ K}$ | bianco-azzurro         | 2.1–16                                     | 1.8–6.6                                     | 25–30\,000                                                   | Medie               |
| <b>A</b> | $7\,300\text{--}10\,000 \text{ K}$  | bianco                 | 1.4–2.1                                    | 1.4–1.8                                     | 5–25                                                         | Forti               |
| <b>F</b> | $6\,000\text{--}7\,300 \text{ K}$   | bianco-giallastro      | 1.04–1.4                                   | 1.15–1.4                                    | 1.5–5                                                        | Medie               |
| <b>G</b> | $5\,300\text{--}6\,000 \text{ K}$   | giallo                 | 0.8–1.04                                   | 0.96–1.15                                   | 0.6–1.5                                                      | Deboli              |
| <b>K</b> | $3\,900\text{--}5\,300 \text{ K}$   | arancione chiaro       | 0.45–0.8                                   | 0.7–0.96                                    | 0.08–0.6                                                     | Molto deboli        |
| <b>M</b> | $2\,300\text{--}3\,900 \text{ K}$   | rosso-arancione chiaro | 0.08–0.45                                  | $\leq 0.7$                                  | $\leq 0.08$                                                  | Molto deboli        |

dell'intensità delle righe della serie di Balmer è raggiunto in corrispondenza delle stelle di classe A0; analogamente la riga del sodio è più intensa, tanto più la stella è fredda, quindi aumenta

di intensità con il diminuire della temperatura. Le B2, ad una temperatura  $T_{\text{eff}} = 22000$  K, raggiungono il massimo delle righe di He I, mentre le K0 raggiungono il massimo delle righe di Ca II. Lo spettro delle stelle più fredde è molto più complesso di quello delle stelle più calde.

## 2.5 Popolazione di idrogeno


Si intende motivare la presenza di righe di Balmer più intense per le stelle di classe A, da cui si conclude anche il perché della presenza marcata del salto di Balmer, relativo ad una depressione, rispetto ad un andamento tipico del corpo nero, dell'intensità in prossimità dei 364 nm, per stelle di classe B ed A in particolare e la sua assenza in quelle di classe O.

Tutto questo è strettamente legato alla popolazione di idrogeno predisposta a emettere radiazioni della serie di Balmer, quindi idrogeno non-ionizzato e eccitato allo stato  $n = 2$ . Per stimare questo, sarà necessario, da una parte valutare la popolazione di idrogeno eccitato, rispetto a quello nello stato fondamentale; dall'altra, studiare l'andamento della presenza di idrogeno ionizzato con la temperatura. Combinando questi due andamenti, si osserverà un picco nella popolazione di idrogeno eccitato a  $n = 2$  per temperature di circa 10000 K, quindi esattamente in corrispondenza della temperatura delle stelle di classe A0.

Assumendo di essere in LTE, si può usare la distribuzione di Boltzmann per stimare la popolazione di idrogeno in  $n = 2$ ,  $N_2$ , rispetto a quella nel fondamentale,  $N_1$ :

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T}\right)$$

dove  $E_2 - E_1 = 10.2$  eV e  $g_n = 2n^2$ , quindi  $g_2/g_1 = 4$ .



Si mostra il procedimento per ricavare  $N_2/N_1$ . La funzione di partizione di un atomo di idrogeno è  $Z = \sum_i g_i e^{-E_i/\kappa_B T}$ , dove  $g_i$  è la degenerazione di ciascun livello energetico. Allora la probabilità che l'elettrone occupi il livello energetico  $i$ -esimo è

$$P_i = \frac{1}{Z} g_i e^{-E_i/\kappa_B T}$$

Questo significa che, per un gas di  $N$  atomi di idrogeno, il numero di atomi nel livello  $i$ -esimo è  $N_i = NP_i$ , quindi

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{P_2}{P_1} = \frac{g_2}{g_1} \exp\left(-\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T}\right)$$

Cercando il valore di  $T$  per cui  $N_2/N_1 = 1$ , si trova

$$4 \exp\left(-\frac{10.2 \text{ eV}}{\kappa_B T}\right) \Rightarrow T \approx 85000 \text{ K}$$

Questo evidenzia come, in realtà, sarebbe presente più idrogeno in  $n = 2$  per stelle di temperature ben superiori a quelle delle stelle di classe A; il problema è che sopra un certo valore di temperatura, l'idrogeno si ionizza. Per tenerne conto, si utilizza l'*equazione di Saha*<sup>1</sup>:

$$\frac{N_{i+1}}{N_i} = \frac{2\kappa_B T Z_{i+1}}{P_e Z_i} \left(\frac{2\pi m_e \kappa_B T}{h^2}\right)^{3/2} e^{-\chi_i/\kappa_B T}$$

dove  $N_i$  è la popolazione dell'atomo ionizzato  $i$ -volte,  $Z_i$  è la funzione di partizione,  $\chi_i$  è il potenziale di ionizzazione dell'atomo ionizzato  $i$ -volte e  $P_e$  è la temperatura del gas di elettroni.

**Osservazione 2.2.** Aumentando  $P_e$ , a  $T$  costante, aumenta la densità di elettroni nel sistema, quindi aumenta la probabilità di ricombinazione e, quindi, diminuisce la popolazione di specie ionizzate.

Considerando un valore tipico di  $P_e \sim 20 \text{ N/m}^2$ , l'equazione di Saha permette di concludere che: a  $T = 8300 \text{ K}$ , il 5% dell'idrogeno è ionizzato; a  $T = 9600 \text{ K}$ , il 50% è ionizzato; a  $T = 11300 \text{ K}$ , il 95% è ionizzato. Pesando la curva di Boltzmann con l'equazione di Saha, si ottiene l'andamento corretto, dato da

$$\frac{N_2}{N_{\text{tot}}} = \frac{N_2}{N_1 + N_2} \frac{N_I}{N_{\text{tot}}} = \frac{N_2/N_1}{1 + N_2/N_1} \frac{1}{1 + N_{II}/N_I}$$

dove  $N_1 + N_2$  è idrogeno neutro, quindi  $N_I$ .




Figura 4: A sinistra, grafico dell'equazione di Saha; a destra, popolazione di idrogeno in  $n = 2$  pesato con Saha.

**Osservazione 2.3.** Il risultato è ovviamente approssimativo, in quanto si è assunta una atmosfera stellare composta esclusivamente da idrogeno e in LTE, da cui la differenza dal reale valore di 9520 K.

<sup>1</sup>La sua validità è sempre ristretta all'LTE, ma anche a densità non troppo elevate; per esempio, non vale nei nuclei delle stelle. Di fatto, per densità molto alte, è presente un'altra causa di ionizzazione: la ionizzazione per pressione. Questa è dovuta al fatto che gli urti fra le particelle diminuiscono l'energia necessaria per ionizzare un atomo.

## 2.6 Popolazione del calcio

Si vuole mostrare perché le righe del calcio sono più profonde di quelle della serie di Balmer nel sole. Questo ha strettamente a che fare con la popolazione di specie chimica utile a produrre tali righe; di fatto, si vedrà che ci sono sensibilmente molti più atomi di calcio II, più che atomi di idrogeno nel primo livello eccitato. Per fare i conti, si utilizzeranno i seguenti valori di




Figura 5: Spettro solare che evidenzia la profondità delle righe del calcio II rispetto a quelle della serie di Balmer.

$T_{\text{eff}} = 5777 \text{ K}$  e  $P_e = 1.5 \text{ N m}^{-2}$ . Inoltre, tali profondità sembrano assurde perché il numero di atomi di calcio presenti nel Sole, rapportati con quelli di idrogeno, è di  $1/500,000$ .

Per capire l'abbondanza di idrogeno propenso a produrre tali righe, si considera  $\chi_i = 13.6 \text{ eV}$ , per cui

$$\begin{aligned} \left[ \frac{N_2}{N_1} \right]_{\text{HI}} &= \frac{g_2}{g_1} \exp \left( -\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T} \right) = 5.06 \times 10^{-9} \approx \frac{1}{200,000,000} \\ \left[ \frac{N_{II}}{N_I} \right]_{\text{H}} &= \frac{2\kappa_B T Z_{i+1}}{P_e Z_i} \left( \frac{2\pi m_e \kappa_B T}{h^2} \right)^{3/2} e^{-\chi_i / \kappa_B T} = 7.70 \times 10^{-5} \approx \frac{1}{13,000} \\ \Rightarrow \frac{N_2}{N_{\text{tot}}} &= \frac{N_2}{N_1 + N_2} \frac{N_I}{N_{\text{tot}}} = 5.06 \times 10^{-9} \end{aligned}$$

per cui solo un atomo di idrogeno ogni  $2 \times 10^8$  è nel primo livello eccitato e, quindi, in grado di produrre righe di Balmer.

Per il calcio, invece, si ha  $\chi_i = 6.11 \text{ eV}$ , mentre le funzioni di partizione si possono trovare tabulate e pari a  $Z_I = 1.32$  e  $Z_{II} = 2.30$ ; allora:

$$\left[ \frac{N_{II}}{N_I} \right]_{\text{Ca}} = 918$$

Questo evidenzia come il calcio sia, in gran parte ionizzato: si trova solo un atomo di calcio I ogni 918 atomi di calcio II. Le righe H (396.8 nm) e K (393.3 nm) sono prodotte da transizioni dallo stato fondamentale del calcio; facendo come esempio solo il calcolo per la riga K, usando

che  $E_2 - E_1 = 3.12 \text{ eV}$ ,  $g_1 = 2$  e  $g_2 = 4$ , si trova che

$$\left[ \frac{N_2}{N_1} \right]_{\text{CaII}} = \frac{g_2}{g_1} \exp \left( -\frac{E_2 - E_1}{\kappa_B T} \right) = 3.79 \times 10^{-3} = \frac{1}{264}$$

Per cui molti atomi di calcio II sono nel fondamentale, quindi in grado di produrre la riga K. Mettendo insieme le due informazioni, si vede che

$$\begin{aligned} \left[ \frac{N_1}{N_{\text{tot}}} \right]_{\text{CaII}} &\simeq \left[ \frac{N_1}{N_1 + N_2} \right]_{\text{CaII}} \left[ \frac{N_{II}}{N_{\text{tot}}} \right]_{\text{Ca}} = \frac{1}{1 + [N_2/N_1]_{\text{CaII}}} \frac{[N_{II}/N_I]_{\text{Ca}}}{1 + [N_{II}/N_I]_{\text{Ca}}} \\ &= \frac{1}{1 + 3.79 \times 10^{-3}} \frac{918}{1 + 918} = 0.995 \end{aligned}$$

cioè il 99.5% di calcio è ionizzato e nello stato fondamentale. Allora, per rapportare la quantità di atomi di idrogeno in grado di produrre righe di Balmer e atomi di calcio in grado di produrre righe H e K si usa il rapporto 1 : 500,000:

$$500,000 \times 5.06 \times 10^{-9} \approx \frac{1}{395}$$

da cui per ogni atomo di idrogeno nel primo eccitato, ci sono 395 atomi di calcio II nel fondamentale.

## 2.7 Classificazione MKK

È un perfezionamento della scala di Harvard: ad ogni classe della forma  $X0^1$  si fa seguire un numero romano da 0 a VII che ne indica la luminosità.

| 0           | I            | II                | III     | IV         | V    | VI      | VII          |
|-------------|--------------|-------------------|---------|------------|------|---------|--------------|
| Ipergiganti | Supergiganti | Giganti brillanti | Giganti | Subgiganti | Nane | Subnane | Nane bianche |

Visto che  $F = \sigma T_{\text{eff}}^4$  ed essendo la luminosità della stella (se questa ha raggio  $R$ ) pari  $L = 4\pi R^2 F$ , si trova che

$$L = 4\pi R^2 \sigma T_{\text{eff}}^4$$

Allora, fissata la temperatura effettiva, la luminosità può variare al variare del raggio e, quindi, a parità di massa (legata alla temperatura), si ha la densità.

---

<sup>1</sup>Lettere tra O, B, A, F, G, K, M, L, T, Y e numeri da 0 a 9. Storicamente quelle di classe O partivano da 5; con moderni avanzamenti, è tipico partire da 2, mentre O0 e O1 non sono comunemente utilizzati.

### 3 STRUTTURA ED EVOLUZIONE STELLARE

#### 3.1 Equilibrio idrostatico

L'atmosfera stellare compone solo una minima frazione dell'intera massa della stella; la rimanente parte, è contenuta nel nucleo. La massa di una stella è molto importante: una stella è un ammasso gassoso autogravitante, ossia la forza di gravità e le forze di pressione interne devono essere in equilibrio. Visto che la forza di gravità è estremamente debole, è necessaria una grande massa perché il gas non tenda a disperdersi.

Si indica con  $R$  il raggio della stella e con  $r$  la coordinata radiale. Assumendo simmetria sferica, le variabili della stella dipendono solo da  $r$  e dal tempo, per cui  $P = P(r, t)$ ,  $\rho = \rho(r, t)$ ,  $T = T(r, t)$  e  $m = m(r, t)$ ; riguardo quest'ultima, visto che rappresenta la massa contenuta in una sfera di raggio  $r$  al tempo  $t$ , la massa della stella si può indicare con  $M(t) = m(R, t)$ .

La massa contenuta nel guscio è

$$dm(r, t) = \frac{\partial m}{\partial r} dr + \frac{\partial m}{\partial t} dt$$

Visto che, in generale

$$m(r, t) = \int_0^r 4\pi r'^2 \rho(r', t) dr'$$

si ha


$$\frac{\partial m}{\partial r} = 4\pi r^2 \rho \quad \frac{\partial m}{\partial t} = -4\pi r^2 \rho v$$

dove  $\partial_t m$  è ottenuta dal fatto che la variazione di massa corrisponde ad un flusso che abbandona il guscio con velocità  $v$ . Dall'uguaglianza delle derivate seconde, si ricava l'equazione di continuità (per un sistema a simmetria sferica):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \rho v) = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \quad (3.1.1)$$

Per studiare la condizione di equilibrio della stella, si richiede che la forza risultante delle forze che agiscono su un guscio infinitesimo, di massa  $dm$  e raggio  $dr$ , sia nulla. Questa risultante è data dalla pressione dello strato interno verso l'esterno, dalla pressione dello strato esterno verso l'interno e dalla forza di gravità.

Si indica il campo gravitazionale con  $\vec{g}(r, t) = -g(r, t)\hat{r}$ , dove  $g(r, t) = \frac{Gm(r, t)}{r^2}$ . Per semplicità, si fissa un istante  $t$  e si trascura la dipendenza dal tempo; allora, la condizione di equilibrio è



*Equazione di  
continuità*

*Equilibrio  
idrostatico*

data da

$$[P(r) - P(r + dr)]4\pi r^2 - g(r)4\pi r^2 \rho dr = 0$$

dove  $P(r)$  è la pressione interna che spinge verso l'esterno il guscio,  $P(r + dr)$  è la pressione esterna che spinge il guscio verso l'interno e l'ultimo termine è legato alla forza di gravità, con  $4\pi r^2 \rho dr$  massa del guscio. Questa è verificata quando

$$\frac{\partial P}{\partial r} = -g(r)\rho = -\frac{Gm\rho}{r^2} \quad (3.1.2)$$

dove  $P$  è la *pressione totale*, quindi dovuta sia alla radiazione, sia dovuta a nuclei atomici ed elettroni.

### 3.2 Validità della condizione di equilibrio idrostatico

Si vuole stabilire se è valida la condizione di equilibrio idrostatico nelle stelle. In assenza di equilibrio, si ha l'equazione del moto

$$\rho \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial r} - \frac{Gm\rho}{r^2} \quad (3.2.1)$$

Si distinguono i casi in cui il corpo sia in caduta libera (free fall), relativo a  $\frac{\partial P}{\partial r} = 0$  e il caso in cui sia nullo il termine gravitazionale.

- (a). Per  $\frac{\partial P}{\partial r} = 0$ , l'equazione del moto è  $\rho \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{Gm\rho}{r^2}$ . Il tempo scala di questa caduta libera,  $\tau_{\text{ff}}$ , si definisce come

$$\left| \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \right| = \frac{R}{\tau_{\text{ff}}^2} \Rightarrow \frac{Gm}{r^2} \sim \frac{GM}{R^2} = \frac{R}{\tau_{\text{ff}}^2} \Rightarrow \tau_{\text{ff}} = \sqrt{\frac{R^3}{GM}} \sim \frac{1}{\sqrt{G\bar{\rho}}}$$

con  $\bar{\rho}$  densità media della stella.

- (b). Per termine gravitazionale nullo, si ha  $\rho \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial r}$ . Visto che  $\frac{\partial P}{\partial r} < 0$ , l'accelerazione è diretta verso l'esterno della stella, quindi questo caso corrisponde ad un'esplosione. Il tempo scala di esplosione  $\tau_{\text{exp}}$  è definito come

$$\left| \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \right| = \frac{R}{\tau_{\text{exp}}^2} \Rightarrow \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial r} \sim \frac{1}{\rho} \frac{P}{R} = \frac{R}{\tau_{\text{exp}}^2} \Rightarrow \tau_{\text{exp}} \sim R \sqrt{\frac{\rho}{P}} \sim \frac{R}{c_s}$$

dove  $\sqrt{\rho/P}$  ha la forma della velocità del suono  $c_s$ .

All'equilibrio idrostatico, i due termini devono essere dello stesso ordine di grandezza:  $\tau_{\text{ff}} \sim \tau_{\text{exp}}$ . In questo caso, si parla di *tempo scala idrodinamico*  $\tau_{\text{idr}}$ .

Per stabilire la validità dell'approssimazione nel caso delle stelle, si considera un tempo scala evolutivo  $\tau_{\text{ev}}$ , riferito al tempo su cui si osservano variazioni nelle grandezze caratteristiche della stella in questione, e lo si confronta con il tempo scala idrodinamico: se  $\tau_{\text{ev}} \gg \tau_{\text{idr}}$ , allora,

con buona approssimazione, vale l'assunzione di equilibrio idrodinamico. Nel caso del sole, si ha  $\bar{\rho}_{\odot} = 1.4 \text{ g/cm}^3$ , quindi  $\tau_{\text{ff},\odot} \sim 30 \text{ min}$ , per cui si può concludere che l'approssimazione di equilibrio idrostatico è valida, visto che  $\tau_{\text{ev}} \sim 10^{10} \text{ yr}$ .

### 3.3 Pressione e temperatura centrali

Avendo appurato la validità dell'approssimazione di equilibrio idrostatico, si ha  $\frac{\partial P}{\partial r} = -\frac{Gm\rho}{r^2} < 0$ , quindi la pressione diminuisce con l'aumentare di  $r$ . Si stima, nel caso del Sole, la pressione centrale. Scrivendo l'equazione di equilibrio come rapporto incrementale e indicando con  $P_{\text{sup}}$  la pressione sulla superficie e con  $P_c$  quella centrale, si ha

$$\frac{P_{\text{sup}} - P_c}{R} = -G \frac{M}{2} \frac{\bar{\rho}}{R^2}$$

con  $P_{\text{sup}} \approx 0$ , da cui  $P_c \sim 5 \times 10^{18} \text{ dyne/cm}^2$ . Con metodi più raffinati, si trova che  $P_{c,\odot} = 2.6 \times 10^{17} \text{ dyne/cm}^2$ .

Quanto alla temperatura centrale, è necessaria un'equazione di stato  $P(\rho, T)$ . Assumendo valida l'equazione del gas perfetto, si può scrivere

$$P = n\kappa_B T = \frac{\rho}{\mu m_H} \kappa_B T$$

con  $\mu = \bar{m}/m_H$  peso molecolare medio. In prima approssimazione, questo modello è veritiero nel senso che la temperatura del Sole, come di moltissime altre stelle, è elevata:  $T_{c,\odot} \approx 1.6 \times 10^7 \text{ K}$ . Nonostante questo, si dovrebbe far uso di un'equazione di stato che tenga anche conto delle interazioni nel gas.

**Osservazione 3.1.** L'implicazione pressione grande  $\Rightarrow$  temperatura grande è estremamente dipendente dall'equazione di stato che modella il nucleo. Si possono trovare dei casi, come nelle nane bianche, in cui la pressione non è legata alla temperatura tramite l'equazione di stato, ma  $P \sim \rho^n$ .

Durante la loro evoluzione, le stelle tendono a perdere energia per via della dispersione di calore prodotto tramite reazioni termonucleari nel nucleo; questo calore tende a disperdersi in quanto fondamentalmente isolate: la stella più vicina al Sole è Proxima Centauri, ad una distanza di  $\sim 1.4 \text{ pc} \sim 4 \times 10^{18} \text{ cm}$ , per cui  $\frac{d}{R_{\odot}} \sim 0.6 \times 10^8$ , quindi  $V/V_{\odot} \sim 10^{23}$ , con  $V$  volume vuoto attorno al Sole. Tuttavia, visto che la relazione tra pressione e temperatura è legata dall'equazione di stato, le stelle degeneri, come le nane bianche, non diminuiscono il loro raggio durante la loro vita, ma si raffreddano solamente.

### 3.4 Teorema del viriale

Mette in relazione energia gravitazionale ed energia cinetica. Si considera una stella all'equilibrio idrostatico; moltiplicando ambo i membri l'equazione di equilibrio per  $V(r) dr = \frac{4}{3}\pi r^3 dr$ ,



si ottiene

$$V(r) dP = -\frac{1}{3} \frac{Gm}{r} dm$$

con  $dm = 4\pi r^2 \rho dr$ . Integrando:

$$\int V(r) dP = \int_0^R P dV - \int P dV$$

dove si è usato che  $P(R) = 0$  e  $V(0) = 0$ . Per l'altro termine, si ha

$$-\int \frac{Gm}{r} dm = \Omega$$

con  $\Omega$  energia potenziale gravitazionale. Allora:

$$\Omega = -3 \int P dV \quad (3.4.1)$$

**Osservazione 3.2.** Questa ha validità del tutto generale riguardo le proprietà termodinamiche del gas; si è ricavata soltanto sull'assunzione di equilibrio idrostatico.

In assunzione di gas non-relativistico, si ha  $P = \frac{2}{3} \frac{K}{V}$ , per cui

$$\Omega + 2K = 0 \quad (3.4.2)$$

### 3.4.1 Gas perfetto

In questo caso,  $dK = \frac{3}{2} \kappa_B T dN$  e  $dm = \mu m_H dN$ , per cui

$$dK = \frac{3}{2} \frac{\mathcal{R}}{\mu} T dm$$

con  $\mathcal{R}$  costante del gas perfetto. Si ricorda che  $dU = c_V T dm$  e calore specifico a volume e pressione costante sono in relazione tramite  $c_P - c_V = \mathcal{R}/\mu$  e  $\gamma = c_P/c_V$ , per cui  $dU = \frac{\mathcal{R}}{\mu} \frac{T}{\gamma-1} dm$ , da cui  $dK = \frac{3}{2} (\gamma - 1) dU$ . Assumendo che  $\gamma$  sia costante, si può integrare per ottenere

$$K = \frac{3}{2} (\gamma - 1) U \quad (3.4.3)$$

L'energia della stella si può scrivere come  $E = \Omega + U$ , assumendo che non vi siano reazioni nucleari, per cui  $U$  rappresenta solo l'energia interna legata all'agitazione termica; in questo modo, si possono scrivere due equazioni, una in termini dell'energia potenziale gravitazionale, l'altra in termini dell'energia interna:

$$E = \frac{3\gamma - 4}{3(\gamma - 1)} \Omega \quad E = -(3\gamma - 4)U \quad (3.4.4)$$

Dalla richiesta che la stella sia all'equilibrio, cioè sia autogravitante, visto che  $\Omega < 0$ , si deve avere  $E < 0$ , per cui  $\gamma \geq \frac{4}{3}$ . Da uno studio approfondito della stabilità del sistema, si evidenzia che  $\gamma < \frac{4}{3}$  definisce un sistema instabile che non è all'equilibrio idrostatico e tende a disperdersi.

Ora, se la perdita di energia della stella è esclusivamente legata all'irraggiamento, la luminosità è  $L = -\dot{E} > 0$ <sup>1</sup>, si ha  $\dot{E} < 0$ ; dalle relazioni sopra, segue che  $\dot{\Omega} < 0 \Rightarrow \dot{R} < 0$  e  $\dot{U} > 0 \Rightarrow \dot{K} > 0 \Rightarrow \dot{T} > 0$ .

$$L = -\dot{E} > 0 \Rightarrow \dot{E} < 0 \Rightarrow \begin{cases} \dot{\Omega} < 0 \Rightarrow \dot{R} < 0 \Rightarrow \dot{\rho} > 0 \\ \dot{U} > 0 \Rightarrow \dot{K} > 0 \Rightarrow \dot{T} > 0 \end{cases} \quad (3.4.5)$$

**Osservazione 3.3.** Questa catena di implicazioni, nel caso di assenza di reazioni nucleari attive, la perdita di energia nella stella ne comporta una contrazione e, allo stesso tempo, un aumento della temperatura. Questo risultato dipende dall'assunzione di gas perfetto; un modello più preciso, per stelle regolate da un'equazione di stato dipendente *significativamente* dalla temperatura, in assenza di reazioni termonucleari, porta ad un risultato analogo. Stelle di questo tipo sono a capacità termica negativa: perdendo energia si scaldano. Lo stesso non accade nelle nane bianche, per esempio, le quali sono a capacità termica positiva.

Ci sono due casi che possono interrompere la catena in 3.4.5:

- (a). la temperatura aumenta fino a che non iniziano le reazioni termonucleari, che portano un termine aggiuntivo nell'energia e interrompono il processo di restringimento;
- (b). è possibile che  $\rho$  aumenti in modo da far degenerare gli elettroni prima che la temperatura possa essere tale da innescare le reazioni termonucleari, per cui le proprietà del nucleo stellare si disaccoppiano dalla temperatura.

Nella fase di nascita della stella, si verifica esattamente una di queste due situazioni: nel caso in cui la stella non arrivi proprio ad innescare le reazioni, e si formano le *nane brune*, stelle di massa molto piccola, vicino a quella di Giove. Questo dilemma, si ripropone ogni qualvolta la stella esaurisce il combustibile alla base delle reazioni: se riesce a raggiungere una temperatura tale da innescarne altre, continua, altrimenti degenera. Più grande è la massa della stella, più in futuro si arriverà alla degenerazione.

### 3.4.2 Gas monoatomico

Gran parte del gas che costituisce le stelle è monoatomico; in questo caso,  $\gamma = \frac{5}{3}$ , quindi

$$\begin{cases} E = \Omega/2 = -U \\ K = U \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} L = -\dot{\Omega}/2 \\ L = \dot{U} \end{cases}$$

---

<sup>1</sup>Se ci fossero altri fenomeni che dissipano energia, come la produzione di neutrini, si dovrebbero aggiungere a  $L$ .

per cui  $\dot{K} = -\dot{\Omega}/2$ . In questo caso, si vede che metà energia gravitazionale finisce in luminosità, quindi viene dispersa, mentre l'altra metà finisce in energia cinetica, cioè in agitazione termica.

### 3.5 Tempo scala di evoluzione stellare

Riprendendo la catena 3.4.5, si vuole stimare il tempo scala su cui avvengono l'aumento della temperatura e la contrazione. Questo sarà dato dal rapporto tra l'energia a disposizione e la velocità con cui questa viene dispersa.

**Osservazione 3.4.** Questa valutazione si farà nel caso di assenza di reazioni termonucleari e in approssimazione di gas perfetto monoatomico.

L'energia potenziale è

$$\Omega = - \int \frac{Gm \, dm}{r}$$

Non conoscendo  $m(r, t)$  e  $\rho(r, t)$ , si svolge il calcolo assumendo  $\rho = \text{cost.}$ , per cui

$$\Omega = -\frac{3}{5}G\frac{M^2}{R}$$

Visto che  $M_{\odot} = 2 \times 10^{33} \text{ g}$  e  $R_{\odot} = 7 \times 10^{10} \text{ cm}$ , allora  $|\Omega|/2 \approx 1.1 \times 10^{48} \text{ erg}$ . Tramite un calcolo più preciso, dovuto alla conoscenza di  $\rho(r, t)$ , si ottiene  $\Omega_{\odot} \approx 4 \times 10^{48} \text{ erg}$ . Allora, sapendo che  $L_{\odot} \approx 3.8 \times 10^{33} \text{ erg s}^{-1}$ , si ha<sup>1</sup>

$$\tau_{\text{KH}} = \frac{|\Omega/2|}{L} = \frac{3}{10} \frac{GM^2}{RL} \approx 9 \times 10^6 \text{ yr}$$

Dal calcolo più preciso, invece, si trova  $\tau_{\text{KH}} \approx 20 \times 10^6 \text{ yr}$ .

Inizialmente, si pensò che l'energia prodotta dal Sole fosse legata a reazioni chimiche, come quelle di combustione; con queste, però, l'energia rilasciata per quantità di massa è  $\sim 4 \times 10^{12} \text{ erg g}^{-1}$ , quindi, essendo  $M_{\odot} \approx 2 \times 10^{33} \text{ g}$ , si esaurirebbe l'energia in un tempo scala

$$\tau_{\text{chem}} = \frac{4 \times 10^{12} \text{ erg g}^{-1} \times 2 \times 10^{33} \text{ g}}{4 \times 10^{33} \text{ erg s}^{-1}} \sim 10^5 \text{ yr}$$

che è molto più piccolo dell'attuale età del Sole di  $\tau_{\odot} = 4.57 \text{ Gyr}$ <sup>2</sup>.

Successivamente, si pensò a reazioni di fissione nucleare. Il problema con queste è che la sorgente di energia aggiuntiva deve dipendere dalla temperatura perché le stelle come il Sole sono a capacità termica negativa: questi due fattori, combinati, originano il meccanismo che permette alle stelle di rimanere in equilibrio stazionario. Infatti:

- se l'energia prodotta non bilancia quella persa per luminosità, la stella, per il viriale, si contrae, quindi aumenta la densità e si scalda, per cui l'energia prodotta aumenta fino a bilanciare la contrazione;

<sup>1</sup>Il pedice *KH* indica "Kelvin-Helmholtz".

<sup>2</sup>Questa viene ricavata con estrema precisione tramite radio-datazione.

- viceversa, se l'energia prodotta è maggiore di quella persa, la stella si espande, per cui si riduce la temperatura e, allora, l'energia prodotta.

Questo sistema è fondamentalmente un termostato che regola la temperatura interna della stella per far sì che le reazioni producano esattamente l'energia necessaria per l'equilibrio. Tuttavia, la radioattività non soddisfa questo meccanismo, per cui le reazioni di fissione non possono essere alla base della produzione energetica nelle stelle.

Si associa, quindi, questa produzione energetica a reazioni termonucleari. L'energia a riposo del sole è  $E = M_{\odot}c^2 = 2 \times 10^{54}$  erg. Considerando la reazione di produzione di elio a partire da 4 atomi di idrogeno ( $m_{\text{H}}c^2 = 931$  MeV), si origina un difetto di massa di  $(4m_{\text{H}} - m_{\text{He}})c^2 = 26.73$  MeV, pari al 0.7% dell'energia a riposo iniziale; assumendo che la stella sia composta unicamente da idrogeno, il prodotto di questa reazione termonucleare produce, complessivamente,  $0.7\% \times M_{\odot}c^2 \approx 2 \times 10^{52}$  erg, da cui si ottiene un tempo scala

$$\frac{M_{\odot}c^2 \times 0.007}{L_{\odot}} \approx 10^{11} \text{ yr}$$

Da un calcolo più esatto, specie legato al fatto che non tutto l'idrogeno viene trasformato in elio, si trova il *tempo scala nucleare*  $\tau_{N,\odot} \sim 10^{10}$  yr per la conversione di idrogeno in elio. Si osserva, che  $\tau_{\text{ff}} \ll \tau_{\text{KH}} \ll \tau_N$ .

**Osservazione 3.5.** Quando la stella raggiunge la condizione di equilibrio termico, cioè l'energia prodotta dalle reazioni termonucleari è uguale all'energia persa per luminosità (o luminosità più neutrini), entra in una fase di *stop nucleare*; questo, però, non blocca l'evoluzione della stella: il processo di fusione nucleare porta ad una diminuzione del numero di nuclei atomici per unità di volume, quindi  $n$  diminuisce in  $P = n\kappa_B T$ , quindi, a parità di temperatura, diminuisce la pressione. A bilanciare la forza di gravità, tuttavia, è proprio il gradiente di pressione, per cui la stella finisce per contrarsi e, quindi, per aumentare la propria temperatura. Il tempo scala su cui avviene questo processo, però, è quello su cui avvengono le reazioni termonucleari nel nucleo, cioè  $\tau_N$ .

### 3.6 Equazione di conservazione dell'energia

Si indica con  $L(r, t)$  la quantità di energia per unità di tempo che attraversa la superficie sferica di raggio  $r$ . La differenza tra la quantità di energia che entra nella superficie sferica di raggio  $r$  e quella che esce dalla superficie di raggio  $r + dr$  deve essere pari all'energia che viene prodotta o distrutta all'interno del guscio di spessore  $dr$ , per la conservazione dell'energia. Allora

$$\frac{\partial L}{\partial r} = 4\pi r^2 \rho \varepsilon$$

con  $[\varepsilon] = \text{erg g}^{-1} \text{ s}^{-1}$ . Questo rappresenta il coefficiente di energia nucleare (prodotta o assorbita) all'interno di un guscio infinitesimo ed è ottenuto come somma di tre contributi:  $\varepsilon = \varepsilon_N + \varepsilon_g - \varepsilon_{\nu}$ . In questa espressione,  $\varepsilon_N$  è il coefficiente di produzione di energia nucleare;

$\varepsilon_g$  è il coefficiente di energia gravitazionale, anche se è definito come

$$\varepsilon_g = -\frac{dQ}{dt} = -T \frac{dS}{dt}$$

quindi tiene conto della quantità di calore scambiato dalle trasformazioni termodinamiche all'interno del guscio infinitesimo. Questo diventa importante quando la stella è governata dal viriale ed evolve con tempi scala  $\tau_{KH}$ , altrimenti è trascurabile, visto che  $\tau_{KH} \ll \tau_N$ . Infine,  $\varepsilon_\nu$  è relativo all'energia dei neutrini, i quali escono dalla stella senza interagire in alcun modo, quindi sottraendo l'energia che si portano dietro alla struttura, da cui il segno negativo<sup>1</sup>.

### 3.7 Trasporto di energia nelle stelle

Dal trasporto radiativo negli interni stellari, si è trovato che

$$\frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{3}{4ac} \frac{\kappa_R \rho}{T^3} F_{\text{rad}}$$

cioè la presenza di un gradiente di temperatura deve necessariamente essere associato ad un trasporto energetico dovuto alle radiazioni. Oltre al trasporto energetico dovuto alla radiazione, sono presenti anche gli effetti di conduzione e di convezione.

Negli interni stellari, il gradiente di temperatura si può stimare (nel caso del sole), come

$$\frac{\Delta T}{\Delta r} \approx \frac{T_{c,\odot} - T_{\text{eff},\odot}}{R_\odot} \sim 1.4 \times 10^{-4} \text{ K cm}^{-1}$$

Il cammino libero medio di un fotone nel sole è di  $\bar{\ell} \sim 2 \text{ cm}$ , quindi la variazione di temperatura sulla distanza media percorsa da un fotone è di  $\Delta T \sim 3 \times 10^{-4} \text{ K}$ , per cui

$$\frac{\Delta T}{T} \sim 10^{-10} \div 10^{-11}$$

per cui l'approssimazione di LTE relativa ad ogni processo di emissione/assorbimento fotonico è ben giustificata e il processo di trasporto dell'energia tramite fotoni è un processo diffusivo.

#### 3.7.1 Trasporto conduttivo

L'equazione della conduzione del calore è della forma  $F_{\text{cond}} = -D_{\text{cond}} \frac{dT}{dr}$ ; essendo molto simile, in forma, all'equazione del trasporto radiativo, si introduce un'*opacità conduttiva*  $\kappa_{\text{cond}}$  in modo che si possa scrivere

*Opacità conduttiva*

$$D_{\text{cond}} = \frac{4ac}{3} \frac{T^3}{\kappa_{\text{cond}} \rho} \implies F_{\text{cond}} = -\frac{4ac}{3} \frac{T^3}{\kappa_{\text{cond}} \rho} \frac{dT}{dr}$$

<sup>1</sup>Il cammino libero medio di un neutrino nel piombo, alla stessa energia che possiederebbe dopo esser stato prodotto nel sole, è di qualche anno luce, per cui la stella gli risulta fondamentalmente trasparente.

e unirla all'equazione del trasporto radiativo come

$$F = F_{\text{rad}} + F_{\text{cond}} = -\frac{4ac}{3} \frac{T^3}{\bar{\kappa}\rho} \frac{\partial T}{\partial r} \quad \frac{1}{\bar{\kappa}} = \frac{1}{\kappa_R} + \frac{1}{\kappa_{\text{cond}}}$$

In assenza di convezione, allora, il flusso totale coincide con quello per radiazione e conduzione; in questo caso, si parla di *equilibrio radiativo* e, quindi

*Equilibrio radiativo*

$$\frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa}\rho}{T^3} \frac{L(r,t)}{4\pi r^2} \quad (3.7.1)$$

visto che  $F = F_{\text{tot}} = L(r,t)/(4\pi r^2)$ .

*Rilevanza di  $\kappa_{\text{cond}}$*

Nel nucleo di stelle come il Sole, il cammino libero medio dei fotoni è molto più grande di quello degli elettroni<sup>1</sup>, per cui  $\kappa_R \ll \kappa_{\text{cond}} \implies \bar{\kappa} \simeq \kappa_R$  e, quindi, il trasporto è quasi esclusivamente radiativo.

**Osservazione 3.6.** La conduzione, invece, diventa dominante a densità molto elevate; in questi casi, infatti, dovendo ricorrere a statistiche quantistiche per l'elevata degenerazione elettronica, il principio di esclusione di Pauli fa sì che molti degli urti degli elettroni con le particelle circostanti vengano soppressi, in quanto molti stati in cui l'elettrone coinvolto nell'urto potrebbe finire sono già occupati. Questo riduce il numero di urti possibili e, quindi, aumenta il cammino libero medio.


### 3.7.2 Trasporto convettivo

Si è visto che  $F \propto \frac{1}{\bar{\kappa}} \frac{\partial T}{\partial r}$  e ci si chiede se questo ha un limite superiore. Quando il gradiente nel corpo diventa sufficientemente alto, si formano dei *moti convettivi*<sup>2</sup>.

Dalla formazione di una *bolla*, si cerca di capire se il sistema è stabile o instabile rispetto ai moti convettivi tramite perturbazione del sistema, cioè si sposta la bolla dalla posizione  $r$  a  $r + dr$  e si vede cosa succede.

Si indicano con  $P_1, \rho_1$  e  $P_1^*, \rho_1^*$  rispettivamente le variabili del sistema e della bolla nel punto 1; analogamente, si usano le variabili  $P_2, \rho_2, P_2^*, \rho_2^*$ .

Si assume che, nello spostare la bolla, i tempi scala con cui la pressione della bolla e dell'ambiente vanno all'equilibrio sono molto minori del tempo scala con cui si hanno scambi di calore.



<sup>1</sup>Gli elettroni, vista la loro massa, sono i mediatori più efficienti del trasporto conduttivo, cioè hanno più possibilità di spostarsi da zone più calde a zone più fredde, rispetto ad un intero atomo.

<sup>2</sup>È lo stesso fenomeno che accade quando si mette sul fuoco una pentola piena d'acqua: inizialmente, il calore si diffonde per conduzione; quando il gradiente di temperatura diventa sufficientemente grande tra base e superficie, si innescano dei moti convettivi.

Secondo quest'approssimazione,  $P^* = P$  in ogni punto del tragitto. Lo stesso non succede per la densità: andando dall'interno verso l'esterno, si va da zone più dense a zone meno dense, la bolla si espande. Inoltre, vale  $T_2 < T_1$ . L'altra approssimazione che si fa è che la trasformazione termodinamica sia adiabatica, cioè non vi è scambio di calore tra l'interno e l'esterno della bolla.

### 3.7.3 Criterio di stabilità

Il comportamento del sistema in risposta allo spostamento della bolla si distingue in due casi:

- $\rho_2^* > \rho_2$ , l'attrazione gravitazionale prevale sulla spinta di Archimede  $\vec{A}$ , per cui la bolla viene riportata verso il basso;
- se  $\rho_2^* < \rho_2$ , prevale la spinta di Archimede e la bolla viene portata verso l'alto.

Si vede, quindi, che la condizione di stabilità corrisponde al caso  $\rho_2^* > \rho_2$ , in quanto i moti convettivi vengono soppressi.

Immaginando che nel punto  $r$ , la bolla sia in equilibrio con l'esterno, le grandezze della bolla e dell'esterno coincidono. Nel punto  $r + dr$ , invece, si ha

$$P_2^* = P_2 = P(r + dr) \simeq P(r) + \frac{dP}{dr} dr \quad \rho_2 = \rho(r + dr) \simeq \rho(r) + \frac{d\rho}{dr} dr$$

con  $\rho_2^* \neq \rho_2$ . Visto che la trasformazione è adiabatica, si ha che e viste le relazioni tra le altre grandezze, si può scrivere che<sup>1</sup>

$$\rho_2^* = \rho_1^* \left( \frac{P_2^*}{P_1^*} \right)^{1/\gamma} = \rho(r) \left( \frac{P(r + dr)}{P(r)} \right)^{1/\gamma} \simeq \rho(r) \left( 1 + \frac{1}{P} \frac{dP}{dr} dr \right)^{1/\gamma} \simeq \rho \left( 1 + \frac{1}{\gamma P} \frac{dP}{dr} dr \right)$$

con  $\gamma = c_P/c_V$ . Imponendo la condizione di stabilità, si ha

$$\rho \left( 1 + \frac{1}{\gamma P} \frac{dP}{dr} dr \right) > \rho + \frac{d\rho}{dr} dr \iff \frac{1}{\gamma P} \frac{dP}{dr} > \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr}$$

da cui si ottiene il **criterio di stabilità di Schwarzschild**:

$$\frac{1}{\gamma} \frac{d \log P}{dr} > \frac{d \log \rho}{dr} \quad (3.7.2)$$

Per ottenere il criterio in una forma più semplice, si usano le due seguenti approssimazioni, spesso verificate:

*Semplificazione del criterio*

(a). il gas che costituisce il plasma nel nucleo sia un gas perfetto, per cui  $P = n\kappa_B T = \frac{\rho}{\mu m_H} \kappa_B T$ ;

(b).  $\mu = \text{cost.}$ , cioè la composizione chimica del gas è omogenea.

In questo modo, usando l'equazione del gas perfetto con  $\mu$  costante, si ha

$$\frac{dP}{P} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dT}{T} \implies \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = \frac{1}{P} \frac{dP}{dr} - \frac{1}{T} \frac{dT}{dr}$$

<sup>1</sup>Nell'ultimo passaggio, si sviluppa la radice, in quanto il termine aggiuntivo è molto piccolo.

Inserendo questa relazione nell'equazione di stabilità, si ha

$$\frac{1}{\gamma P} \frac{dP}{dr} > \frac{1}{\rho} \frac{d\rho}{dr} = \frac{1}{P} \frac{dP}{dr} - \frac{1}{T} \frac{dT}{dr} \implies \frac{1}{T} \frac{dT}{dr} > \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{1}{P} \frac{dP}{dr} \implies \frac{P}{T} \frac{dT}{dP} \frac{dP}{dr} > \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{dP}{dr}$$

In astrofisica, si definisce  $\nabla := \frac{d \log T}{d \log P}$ . Inizialmente, si è in condizioni di equilibrio radiativo, per cui il gradiente sopra è  $\nabla_{\text{rad}}$ . Inoltre, il termine  $1 - 1/\gamma = \nabla_{\text{ad}}$  è il gradiente adiabatico, per cui la condizione di stabilità si riduce a

$$\nabla_{\text{rad}} < \nabla_{\text{ad}} \quad (3.7.3)$$

**Osservazione 3.7.** Mentre  $\nabla$  collega pressione e temperatura in punti diversi, quindi esprime effettivamente una variazione spaziale,  $\nabla_{\text{ad}}$ , invece, esprime più precisamente la variazione di temperatura a seguito di una trasformazione adiabatica.

Assumendo di essere in equilibrio radiativo, per cui  $\nabla_{\text{rad}} < \nabla_{\text{ad}}$

$$\nabla_{\text{rad}} = \frac{d \log T}{d \log P} = \frac{P}{T} \frac{dT}{dP} = \frac{P}{T} \frac{dT}{dr} \frac{dr}{dP} \propto \frac{dT}{dr} = -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa} \rho}{T^3} \frac{L(r)}{4\pi r^2} \quad (\dagger)$$

Allora si vede che l'aumento del gradiente radiativo, collegato ad un aumento del gradiente di temperatura, si può verificare per due motivazioni: o aumenta  $\bar{\kappa}$ , o aumenta il flusso.

*Cause dei moti convettivi*

Lo sviluppo di moti convettivi a causa di un flusso troppo grande che rende  $\nabla_{\text{rad}} > \nabla_{\text{ad}}$  si osserva nei nuclei di alcune stelle (con inviluppo in equilibrio) ed è legato al tipo di reazioni termonucleari che avvengono; lo sviluppo di moti convettivi negli inviluppi (con nucleo in equilibrio), invece, è legato all'opacità, che è  $\bar{\kappa} \simeq \kappa_R$ , visto che si è fuori dal nucleo.

*Stabilità sulla luminosità*

Ricordando che  $\frac{dP}{dr} = -\frac{Gm\rho}{r^2}$ , sostituendolo nella relazione ( $\dagger$ ), si ottiene una relazione che impone il vincolo di stabilità sulla luminosità in un punto:

$$L(r) < \frac{16\pi acG}{3\bar{\kappa}} \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T^4}{P} m \quad (3.7.4)$$

**Osservazione 3.8.** Intuitivamente, la formazione di convezione è legata al fatto che, superata una certa soglia, il gradiente di temperatura non si riesce a *smaltire* solo tramite trasporto radiativo e conduttivo.

### 3.7.4 Trasporto di energia tramite convezione

Assumendo la presenza di convezione, pertanto la bolla viene trasportata e non soppressa, questa viaggerà per una certa distanza e, ad un certo punto si dissolverà. Essendo in presenza di convezione, il criterio di Schwarzschild impone che  $\nabla > \nabla_{\text{ad}}$ <sup>1</sup>; visto che la temperatura ambientale varia con  $\nabla$ , mentre la temperatura della bolla con  $\nabla_{\text{ad}}$ , il fatto che si abbia una maggiore variazione della temperatura ambientale, quindi una sua maggior diminuzione, im-

<sup>1</sup>Si scrive  $\nabla$  perché, in presenza di convezione, il gradiente ambientale non è più solo quello radiativo.



plica che  $T_2^* > T_2$ . Analogamente, le bolle che viaggiano verso il basso avranno temperatura minore di quella esterna. Questo processo, quindi, sta globalmente riducendo il gradiente di temperatura della stella. Quando si innesta la convezione, quindi, si ha la seguente catena di disuguaglianze:

$$\nabla_{\text{ad}} < \nabla < \nabla_{\text{rad}} \quad (3.7.5)$$

La prima ( $\nabla_{\text{ad}} < \nabla$ ) si verifica perché, se fosse  $\nabla_{\text{ad}} = \nabla$ , si avrebbe uno spostamento di materia, ma non uno di energia; la seconda, invece, vale perché la convezione diminuisce il gradiente ambientale rispetto alla sola presenza di diffusione radiativa.

Il flusso totale, in presenza di convezione, è  $F_{\text{tot}} = \frac{L(r)}{4\pi r^2} = F_{\text{rad}} + F_{\text{cond}} + F_{\text{conv}}$ : quando si innesca la convezione, si può vedere che il termine  $F_{\text{conv}}$  diventa rapidamente dominante; più è efficiente il trasporto convettivo, più  $\nabla$  si allontana da  $\nabla_{\text{rad}}$  e tende ad essere dell'ordine di  $\nabla_{\text{ad}}$ .

*Superadiabaticità*

Nel caso dei nuclei convettivi, nonostante si parli di **supereadiabaticità** in riferimento alla differenza  $\nabla - \nabla_{\text{ad}} > 0$ , si può osservare che tale differenza è molto piccola, quantomeno dal punto di vista numerico, e può essere approssimato a quello adiabatico. Negli involucri convettivi, invece, la convezione è meno efficiente, per cui  $\nabla - \nabla_{\text{ad}}$  è più grande.

### 3.7.5 Teoria della lunghezza di rimescolamento

Si vuole trovare un'equazione che leghi  $F_{\text{tot}}$  e il gradiente di temperatura anche nelle regioni in cui vi è convezione. La variazione di temperatura interna alla bolla ed esterna nel punto di arrivo della bolla in questione è data da

$$\delta T = T_2^* - T_2 = \left( \left| \frac{dT}{dr} \right| - \left| \frac{dT}{dr} \right|_{\text{ad}} \right) dr := \Delta \nabla T \, dr$$

dove  $\Delta \nabla T$  è chiamata *superadiabaticità*. Conoscendo il gradiente adiabatico, questa si scrive come

$$\nabla_{\text{ad}} = 1 - \frac{1}{\gamma} = \frac{d \log T}{d \log P} \Big|_{\text{ad}} \implies \Delta \nabla T = \frac{dT}{dr} - \left( 1 - \frac{1}{\gamma} \right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr}$$

Visto che la trasformazione avviene a pressione costante (perché si è assunto che bolla ed ambiente abbiano sempre stessa pressione), il calore scambiato dalla bolla è

$$c_p \rho \delta T = c_p \rho \Delta \nabla T \, dr$$

Essendo interessati al flusso di questa quantità, supponendo che la velocità media delle bolle sia  $v$ , si trova che

$$F_{\text{conv}} = c_p \rho v \Delta \nabla T \, dr$$

La variazione di densità tra ambiente e bolla, tramite lo stesso ragionamento di prima, utilizzando di avere a che fare con gas perfetto e che  $\mu$  è costante, si può scrivere che

$$\delta\rho = \left( \left| \frac{d\rho}{dr} \right| - \left| \frac{d\rho}{dr} \right|_{\text{ad}} \right) = -\frac{\rho}{T} \delta T = -\frac{\rho}{T} \Delta \nabla T \, dr$$

La teoria della *mixing length*, si prende  $dr = \ell$ , detta, appunto, lunghezza di rimescolamento, che corrisponde ad una sorta di cammino libero medio. La forza responsabile del trasporto della bolla è la spinta di Archimede; visto che si sta facendo una trattazione approssimativa, generalmente si prende una sorta di valor medio aggiungendo un fattore  $1/2$ , per cui  $\bar{F} = \frac{1}{2} g \delta \rho$ ; per il teorema delle forze vive, si può ottenere la velocità:  $\frac{1}{2} \rho v^2 = \bar{F} \ell$ , da cui

$$v = \ell^{1/2} \sqrt{\frac{g}{\rho} \delta \rho} \implies \bar{v} = \frac{\ell^{1/2}}{2} \sqrt{\frac{g}{\rho} \delta \rho} \quad (3.7.6)$$

dove  $\bar{v}$  è una sorta di media ottenuta sempre tramite l'aggiunta del fattore  $1/2$ . A questo punto, si può ottenere l'espressione per il flusso convettivo:

$$F_{\text{conv}} = c_P \rho \left( \frac{Gm}{T \ell^2} \right)^{1/2} \Delta \nabla T^{3/2} \frac{\ell^2}{2} \quad (3.7.7)$$

Si osservano le grandezze da cui dipende questo flusso:

$$F_{\text{conv}} \propto \ell^2 \quad F_{\text{conv}} \propto \Delta \nabla T^{3/2} \quad F_{\text{conv}} \propto c_P \rho$$

In particolare, l'ultima proporzionalità implica che, a parità di superadiabaticità e mixing length, la convezione genera un flusso maggiore nelle zone a maggiore densità e calore specifico, motivo per cui è molto più rilevante nei nuclei stellari, che negli inviluppi. Inoltre, la presenza del termine  $\Delta \nabla T$  in  $F_{\text{conv}}$  evidenzia la possibilità di trovare tra relazione gradiente di temperatura e flusso in presenza di convezione.

La lunghezza di rimescolamento si può esprimere come

$$\ell = \alpha H_P = -\alpha \frac{dr}{d \log P}$$

con  $H_P$  altezza di scala di pressione e  $\alpha$  parametro empirico, da calibrare tramite esperimenti e si può considerare  $\alpha \approx 2$ .

Considerando punti della stella in cui  $r = R_\odot/2$ ,  $T \sim 10^6$  K, si ottiene  $\ell \sim R_\odot/10$ , motivo per cui l'innesco di moti convettivi porta un contributo non trascurabile di flusso  $F_{\text{conv}}$ , cioè  $\ell \gg 1$  porta  $F_{\text{conv}} \gg 1$ . Assumendo, molto grossolanamente che  $F_{\text{tot}} \simeq F_{\text{conv}}$ , la superadiabaticità necessaria per trasportare tale flusso è  $\Delta \nabla T \sim 2 \times 10^{-10}$  K cm<sup>-1</sup>; ricordando che, nel caso del Sole,  $\left| \frac{dT}{dr} \right| \sim 2 \times 10^{-4}$  K cm<sup>-1</sup>, si vede che  $\Delta \nabla T / \left| \frac{dT}{dr} \right| \sim 10^{-6}$ . Quindi, nei nuclei convettivi, la superadiabaticità relativa al gradiente termico è molto piccolo, quindi  $\nabla \gtrsim \nabla_{\text{ad}}$ .

Negli inviluppi convettivi, invece,  $\ell$  diminuisce e  $c_P \rho$  diminuisce, quindi, a parità di  $\Delta \nabla T$ , il flusso di energia dovuto alla convezione diminuisce; volendo trasportare lo stesso flusso, allora,

è necessario aumentare la superadiabaticità, per cui aumenta la differenza  $\nabla - \nabla_{\text{ad}}$ .

**Osservazione 3.9.** Nelle stelle con involucri convettivi, il gradiente di temperatura nella regione è  $\nabla$ , che dipende direttamente da  $F_{\text{conv}}$ , a sua volta dipendente da  $\ell$ . Ne segue che il valore della temperatura effettiva dipende da  $\ell$ , il quale non è determinabile tramite principi primi, e, quindi, non si può predire teoricamente tale valore di temperatura. Al contrario, per nuclei convettivi con involucro all'equilibrio, la temperatura effettiva non è legata ad alcun parametro libero in quanto il gradiente di temperatura è descritto da  $\nabla_{\text{rad}}$ , che si sa calcolare.

### 3.7.6 Validità dell'equilibrio idrostatico in presenza di moti convettivi

I moti convettivi sono moti macroscopici di materia; si vuole valutare se possono alterare l'equilibrio idrostatico della stella.

Utilizzando la relazione in 3.7.6 e calcolandola in una zona intermedia della regione convettiva del Sole (tanto per dare una stima), si ottiene una velocità delle bolle

$$v_b \sim \sqrt{g\ell \frac{\delta\rho}{\rho}} \sim 0.03 \text{ km/s}$$

dove si è usato  $g \sim 300 \text{ m/s}^2$ ,  $\ell \sim 10^7 \text{ m}$  e  $\delta\rho/\rho \sim 10^{-7}$ . Questa si può confrontare con la velocità media delle particelle, la quale dipende dalla temperatura; per  $T \sim 10^6 \div 10^7 \text{ K}$ , si ha

$$v_p \sim \sqrt{\frac{3\kappa_B T}{\mu m_H}} \sim 100 \text{ km/s}$$

Visto che  $v_b/v_p \sim 10^{-4}$  e che  $P \propto v^2$ , allora  $P_{\text{conv}} \sim 10^{-8} P_{\text{gas}}$ , quindi il contributo della convezione risulta trascurabile.

Un'altra argomentazione, invece, si basa sul valutare i tempi scala. Si definisce il *tempo scala di rimescolamento* come il tempo che le bolle impiegano a fare il loro percorso; utilizzando nuovamente  $\ell \sim R_{\odot}/10$ , si ottiene

$$\tau_{\text{mix}} = \frac{\ell}{v_b} \sim 20 \text{ giorni} \gg \tau_{\text{ff}}$$

quindi la struttura riesce a mantenersi all'equilibrio idrostatico, in quanto ha il tempo di riassestarsi a seguito di moti convettivi.

**Osservazione 3.10.** Anche se irrilevante per valutare la validità dell'equilibrio idrostatico, si osserva che  $\tau_{\text{mix}} \ll \tau_{\text{KH}} \ll \tau_N$ , i quali si ricordano essere dell'ordine dei milioni e dei miliardi di anni rispettivamente. Dal punto di vista dei tempi scala evolutivi, quindi, la convezione si può considerare istantanea. Questo consente, nel caso di nuclei convettivi, di considerare la distribuzione chimica omogenea all'interno del nucleo stesso, visto che la convezione è un processo di rimescolamento della materia. Lo stesso non si può dire di nuclei non convettivi, in cui le reazioni termonucleari modificano la materia solamente nelle regioni in cui sono attive.

### 3.8 Equazioni di struttura – recap

Finora, si sono trovate le seguenti equazioni fondamentali per la descrizione della struttura stellare:

$$\begin{aligned} \frac{\partial m}{\partial r} &= 4\pi r^2 \rho & \frac{\partial P}{\partial r} &= -\frac{Gm\rho}{r^2} \\ \frac{\partial L}{\partial r} &= 4\pi r^2 \rho \varepsilon & \frac{\partial T}{\partial r} &= \begin{cases} -\frac{3}{4ac} \frac{\bar{\kappa}\rho}{T^3} \frac{L}{4\pi r^2} & , \text{ eq. radiativo} \\ \left| \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{\text{conv}} & , \text{ eq. convettivo} \end{cases} \end{aligned}$$

Nonostante quelle della riga di sopra coinvolgano la struttura della stella, queste si vedono figurare in quelle che, invece, descrivono il profilo energetico, visto che compare la densità. Risolvere le equazioni di struttura stellare equivale a risolvere queste equazioni simultaneamente per ottenere il comportamento della stella al variare di  $r$ , ad un istante fissato, e poi vedere come evolve nel tempo. Per fare ciò, però, è necessaria la conoscenza di una grande quantità di *input fisici*, come i termini che compongono  $\varepsilon$ , per esempio.

### 3.9 Termodinamica per gli interni stellari

35:00

## A GRANDEZZE FONDAMENTALI


In astrofisica, si usa il sistema CGS per le unità di misura, ma grammi e centimetri sono scomodi per le misurazioni degli oggetti di interesse, quindi si utilizzano unità derivate.

- Massa solare:  $1 M_{\odot} \approx 2 \times 10^{33} \text{ g}$ .

Le masse delle stelle si aggirano nell'intervallo  $0.08 \div 300 M_{\odot}$ . Per le masse delle galassie, invece, si è sull'ordine di  $10^{11} M_{\odot}$ . Si stima che siano presenti, nell'universo visibile, un totale di  $10^{11}$  galassie.

- Distanze.

Per le distanze, si fa riferimento alla distanza Terra-Sole e si individua  $1 \text{ AU} = 1.5 \times 10^{13} \text{ cm}$ . Si utilizza il raggio Terra-Sole per calcolare la distanza delle stelle tramite triangolazione. In particolare, si definisce la parallasse annua come l'angolo che sottende una unità astronomica percorso dalla stella nel corso di mezza rivoluzione della Terra attorno al sole e si indica con  $\pi$ <sup>1</sup>.



In questo modo, si ha che

$$\tan \pi = \frac{1 \text{ AU}}{d}$$

con  $d$  distanza tra sole e stella in questione. Essendo le stelle molto distanti, si considera l'approssimazione  $\pi \ll 1$ , per cui  $\tan \pi \simeq \pi$  e, quindi,  $\pi = 1 \text{ AU}/d$ .

Visto che gli angoli sono estremamente piccoli, invece di usare i radianti, si fa uso degli arcosecondi. In questo senso, si definisce una unità di misura per la distanza, il parsec, corrispondente ad una distanza tale che  $\pi = 1 \text{ arcsec}$ . Allora  $d[\text{pc}] = 1[\text{AU}]/\pi[\text{arcsec}]$ .

- Quanto alle scale temporali, il sole ha 4.57 miliardi di anni, mentre l'universo ha 13.8 miliardi di anni.

<sup>1</sup>Si ricrea l'ellisse descritta dalla stella legata all'orbita della terra attorno al Sole durante un anno solare; di questa ellisse, la parallasse rappresenta il semi-asse maggiore, relativo alle due posizioni della Terra poste su una retta ortogonale alla retta che unisce il Sole con la stella in questione. In questo modo, si ottiene la situazione in figura.