

# Matematika - Cheatsheet

Kosta Čolović

Poslednja izmena: 3. jul 2026.

# Sadržaj

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Logika</b>                                         | <b>4</b>  |
| 1.1      | Relacije . . . . .                                    | 4         |
| 1.1.1    | Relacije ekvivalencije i poretka . . . . .            | 4         |
| 1.1.2    | 1-1 i <i>na</i> funkcije . . . . .                    | 4         |
| 1.2      | Operacije . . . . .                                   | 4         |
| <b>2</b> | <b>Algebra</b>                                        | <b>5</b>  |
| 2.1      | Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike . . . . . | 5         |
| 2.2      | Nejednakosti . . . . .                                | 5         |
| 2.2.1    | Sredine ( $H_n$ , $G_n$ , $A_n$ , $K_n$ ) . . . . .   | 5         |
| 2.2.2    | Bernulijeva nejednakost . . . . .                     | 5         |
| 2.2.3    | Koši-Švarcova nejednakost . . . . .                   | 5         |
| 2.3      | Korenovanje . . . . .                                 | 5         |
| 2.4      | Nizovi . . . . .                                      | 6         |
| 2.4.1    | Poznate sume . . . . .                                | 6         |
| 2.4.2    | Aritmetički niz . . . . .                             | 6         |
| 2.4.3    | Geometrijski niz . . . . .                            | 6         |
| 2.5      | Polinomi . . . . .                                    | 7         |
| <b>3</b> | <b>Geometrija</b>                                     | <b>8</b>  |
| 3.1      | Trigonometrija . . . . .                              | 8         |
| 3.1.1    | Sinusna teorema . . . . .                             | 8         |
| 3.1.2    | Kosinusna teorema . . . . .                           | 8         |
| 3.1.3    | Teorema o projekcijama . . . . .                      | 8         |
| 3.1.4    | Adicione formule . . . . .                            | 8         |
| 3.1.5    | Formule za polovinu ugla . . . . .                    | 9         |
| 3.1.6    | Transformacije proizvoda u zbir . . . . .             | 9         |
| 3.1.7    | Transformacije zbira u proizvod . . . . .             | 9         |
| 3.1.8    | Molvajdove formule . . . . .                          | 10        |
| 3.1.9    | Tangensna teorema . . . . .                           | 10        |
| 3.1.10   | Inverzne trigonometrijske funkcije . . . . .          | 10        |
| 3.1.11   | Formule višestrukog ugla . . . . .                    | 10        |
| 3.1.12   | Ostalo . . . . .                                      | 10        |
| <b>4</b> | <b>Teorija brojeva</b>                                | <b>11</b> |
| 4.1      | Kongruencija . . . . .                                | 11        |
| 4.1.1    | Mala Fermaova teorema . . . . .                       | 11        |
| 4.1.2    | Broj delilaca . . . . .                               | 11        |

|          |                                                     |           |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 4.2      | Kompleksni brojevi . . . . .                        | 11        |
| 4.2.1    | Muavrova formula . . . . .                          | 11        |
| 4.2.2    | Koren kompleksnog broja . . . . .                   | 11        |
| 4.2.3    | Zbir $n$ -tih korena kompleksog broja . . . . .     | 11        |
| <b>5</b> | <b>Kombinatorika</b>                                | <b>12</b> |
| 5.1      | Prebrojavanja . . . . .                             | 12        |
| 5.2      | Binomni koeficijenti . . . . .                      | 12        |
| 5.2.1    | Binomni identiteti . . . . .                        | 12        |
| 5.2.2    | Formula uključenja-isključenja . . . . .            | 13        |
| 5.3      | Izbori elemenata . . . . .                          | 14        |
| 5.4      | Generisanje permutacija i kombinacija . . . . .     | 14        |
| 5.5      | Funkcije generatriše . . . . .                      | 14        |
| 5.5.1    | Definicija funkcije generatriše . . . . .           | 14        |
| 5.5.2    | Operacije sa funkcijama generatrisama . . . . .     | 14        |
| 5.6      | Particije brojeva . . . . .                         | 14        |
| 5.7      | Rekurentne jednačine . . . . .                      | 15        |
| 5.7.1    | Linearne rekurentne jednačine . . . . .             | 15        |
| 5.7.2    | Nelinearne rekurentne jednačine . . . . .           | 16        |
| 5.8      | Fibonačijevi brojevi . . . . .                      | 16        |
| 5.8.1    | Lukasovi brojevi . . . . .                          | 16        |
| 5.9      | Katalanovi brojevi . . . . .                        | 16        |
| 5.10     | Bernulijevi brojevi . . . . .                       | 16        |
| <b>6</b> | <b>Teorija grafova</b>                              | <b>17</b> |
| 6.1      | Osnovni pojmovi i teoreme . . . . .                 | 17        |
| 6.1.1    | Tipovi grafova . . . . .                            | 17        |
| 6.1.2    | Izomorfizmi grafova i teoreme . . . . .             | 17        |
| 6.1.3    | Šetnje, staze i putevi . . . . .                    | 18        |
| 6.1.4    | Neki grafovi . . . . .                              | 18        |
| 6.1.5    | Matrične reprezentacije grafova . . . . .           | 19        |
| 6.2      | Stabla . . . . .                                    | 19        |
| 6.2.1    | Definicija i osnovna svojstva . . . . .             | 19        |
| 6.2.2    | Korenska i razapinjuća stabla . . . . .             | 20        |
| 6.2.3    | Pretrage grafova . . . . .                          | 20        |
| 6.3      | Označena stabla . . . . .                           | 21        |
| 6.3.1    | Prebrojavanje označenih stabala . . . . .           | 21        |
| 6.3.2    | Kodiranje i dekodiranje označenih stabala . . . . . | 21        |
| 6.4      | Minimalna razapinjuća stabla . . . . .              | 22        |
| 6.4.1    | Težinski grafovi . . . . .                          | 22        |
| 6.4.2    | Kruskalov algoritam . . . . .                       | 22        |
| 6.4.3    | Primov algoritam . . . . .                          | 23        |
| 6.5      | Ojlerovi multigrafovi . . . . .                     | 24        |
| 6.5.1    | Problem kineskog poštara . . . . .                  | 24        |
| 6.6      | Hamiltonovi grafovi . . . . .                       | 25        |
| 6.6.1    | Problem trgovačkog putnika . . . . .                | 25        |
| 6.7      | Planarni grafovi . . . . .                          | 27        |
| 6.8      | Sparivanja u grafovima . . . . .                    | 27        |

|           |                                                      |           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 6.9       | Bojenje grafova . . . . .                            | 28        |
| 6.9.1     | Bojenje mapa . . . . .                               | 29        |
| 6.10      | Rastojanja u usmerenim težinskim grafovima . . . . . | 29        |
| 6.10.1    | Dajkstrin algoritam . . . . .                        | 29        |
| 6.10.2    | Floyd-Varšalov algoritam . . . . .                   | 30        |
| <b>7</b>  | <b>Linearna algebra</b>                              | <b>32</b> |
| <b>8</b>  | <b>Analitička geometrija</b>                         | <b>33</b> |
| 8.1       | Ugao između dve prave . . . . .                      | 33        |
| <b>9</b>  | <b>Analiza</b>                                       | <b>34</b> |
| 9.1       | Limesi . . . . .                                     | 34        |
| 9.1.1     | Poznati limesi . . . . .                             | 34        |
| 9.1.2     | Upoređivanje beskonačnosti . . . . .                 | 34        |
| 9.1.3     | Teoreme . . . . .                                    | 35        |
| 9.2       | Asimptote . . . . .                                  | 35        |
| 9.2.1     | Kosa asimptota . . . . .                             | 35        |
| 9.3       | Izvodi . . . . .                                     | 36        |
| 9.3.1     | Poznati izvodi . . . . .                             | 36        |
| 9.3.2     | Lajbnicova formula . . . . .                         | 36        |
| 9.3.3     | Fermaova, Rolova i Lagranžova teorema . . . . .      | 37        |
| 9.4       | Tejlorov razvoj . . . . .                            | 38        |
| 9.4.1     | Opšta formula Tejlorovog razvoja . . . . .           | 38        |
| 9.4.2     | Razvoji elementarnih funkcija . . . . .              | 38        |
| 9.5       | Integrali . . . . .                                  | 39        |
| 9.5.1     | Poznati integrali . . . . .                          | 39        |
| 9.5.2     | Izvedeni integrali . . . . .                         | 39        |
| <b>10</b> | <b>Verovatnoća</b>                                   | <b>40</b> |
| <b>11</b> | <b>Statistika</b>                                    | <b>41</b> |
| <b>12</b> | <b>Numerička analiza</b>                             | <b>42</b> |

# Logika

## 1.1 Relacije

Neka je  $\rho$  binarna relacija skupa  $A$ . Tada, ona može imati sledeće osobine:

- **Refleksivnost:**  $x \rho x, \forall x \in A$
- **Simetričnost:**  $x \rho y \implies y \rho x, \forall x, y \in A$
- **Antisimetričnost:**  $x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y, \forall x, y \in A$
- **Tranzitivnost:**  $x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z, \forall x, y, z \in A$

### 1.1.1 Relacije ekvivalencije i poretka

- **Ekvivalencija:** refleksivnost + simetričnost + tranzitivnost
- **Poredak:** refleksivnost + antisimetričnost + tranzitivnost

### 1.1.2 1-1 i na funkcije

- **1-1:**  $x_1 = x_2 \implies f(x_1) = f(x_2)$
- **na:**  $f : A \rightarrow B, (\forall y \in B)(\exists x \in A)(y = f(x))$

## 1.2 Operacije

- **Komutativnost:**  $x + y = y + x$
- **Asocijativnost:**  $x + (y + z) = (x + y) + z$
- **Distributivnost (· prema + sa desne strane):**  $(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$
- **Distributivnost (· prema + sa leve strane):**  $z \cdot (x + y) = (z \cdot x) + (z \cdot y)$

# Algebra

## 2.1 Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$
$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm b^3 + 3ab(b \pm a) = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

## 2.2 Nejednakosti

### 2.2.1 Sredine ( $H_n$ , $G_n$ , $A_n$ , $K_n$ )

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq G_n = \sqrt[n]{|x_1 \cdot \dots \cdot x_n|} \leq A_n = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq K_n = \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

### 2.2.2 Bernulijeva nejednakost

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad x > -1, \quad n \in \mathbb{N}$$

### 2.2.3 Koši-Švarcova nejednakost

$$(a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + \dots + a_nb_n)^2, \quad \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}$$

## 2.3 Korenovanje

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$

## 2.4 Nizovi

### 2.4.1 Poznate sume

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = 1 + 8 + 27 + 64 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left[ \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right] = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} = +\infty$$

### 2.4.2 Aritmetički niz

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

### 2.4.3 Geometrijski niz

$$S_n = b_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

## 2.5 Polinomi

Za  $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ ,  $a_i \in \mathbb{Z}$  važi:

- $P(\alpha) = 0 \wedge \alpha \in \mathbb{Z} \implies \alpha \mid a_0$
- $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \wedge NZD(p, q) = 1 \wedge P(\frac{p}{q}) = 0 \implies p \mid a_0 \wedge q \mid a_n$



# Geometrija

## 3.1 Trigonometrija

### 3.1.1 Sinusna teorema

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

### 3.1.2 Kosinusna teorema

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha, \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta, \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma\end{aligned}$$

### 3.1.3 Teorema o projekcijama

$$\begin{aligned}a &= b \cos \gamma + c \cos \beta, \\b &= a \cos \gamma + c \cos \alpha, \\c &= a \cos \beta + b \cos \alpha\end{aligned}$$

### 3.1.4 Adicione formule

$$\begin{aligned}\sin(x \pm y) &= \sin(x) \cos(y) \pm \cos(x) \sin(y) \\ \cos(x \pm y) &= \cos(x) \cos(y) \mp \sin(x) \sin(y) \\ \tan(x \pm y) &= \frac{\tan(x) \pm \tan(y)}{1 \mp \tan(x) \tan(y)} \\ \cot(x \pm y) &= \frac{\cot(x) \cot(y) \mp 1}{\cot(y) \pm \cot(x)}\end{aligned}$$

### 3.1.5 Formule za polovinu ugla

$$\begin{aligned}\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 - \cos(x)}{2} \\ \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 + \cos(x)}{2} \\ \sin(x) &= \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \cos(x) &= \frac{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \tan(x) &= \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \cot(x) &= \frac{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

### 3.1.6 Transformacije proizvoda u zbir

$$\begin{aligned}\sin(x) \sin(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)] \\ \cos(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) + \cos(x + y)] \\ \sin(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\sin(x - y) + \sin(x + y)]\end{aligned}$$

### 3.1.7 Transformacije zbira u proizvod

$$\begin{aligned}\cos(x) + \cos(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \cos(x) - \cos(y) &= -2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) + \sin(y) &= 2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) - \sin(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ C_n = \cos(\alpha) + \cos(\alpha + x) + \cos(\alpha + 2x) + \dots + \cos(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \cos\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\ S_n = \sin(\alpha + x) + \sin(\alpha + 2x) + \dots + \sin(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \sin\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

### 3.1.8 Molvajdove formule

$$\frac{a+b}{c} = \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \sec\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

$$\frac{a-b}{c} = \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \csc\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

### 3.1.9 Tangensna teorema

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}$$

### 3.1.10 Inverzne trigonometrijske funkcije

$$\sin(\arccos(x)) = \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\arccos(x) + \arccos(y) = \begin{cases} \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y < 0 \end{cases}$$

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right), & xy < 1 \\ \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + \pi, & x > 0, y > 0 \\ \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) - \pi, & x < 0, y < 0 \end{cases}$$

### 3.1.11 Formule višestrukog ugla

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$\sin(3x) = 3 \sin(x) - 4 \sin^3(x)$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$$

$$\tan(3x) = \tan(x) \tan\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \tan\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$$

$$\sin(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n-1}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \cos^{n-2k-1}(x) \sin^{2k+1}(x)$$

$$\cos(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos^{n-2k}(x) \sin^{2k}(x)$$

### 3.1.12 Ostalo

$$\sum_{i=0}^{\frac{1}{2}(n-3)} \cos\left(\frac{(2i+1)\pi}{n}\right) = \frac{1}{2}, \quad n = 2k+1 \geq 3, k \in \mathbb{N}_0$$

# Teorija brojeva

## 4.1 Kongruencija

### 4.1.1 Mala Fermaova teorema

$$a^{p-1} \equiv_p 1, \text{ za svaki prost broj } p \in \mathbb{Z}$$

### 4.1.2 Broj delilaca

$$\tau(a) = (\alpha_1 + 1) \dots (\alpha_n + 1), \quad a = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}$$

## 4.2 Kompleksni brojevi

### 4.2.1 Muavrova formula

$$z^n = r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

### 4.2.2 Koren kompleksnog broja

$$z_k = \sqrt[n]{|a|} \left[ \cos \left( \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left( \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \right]$$

### 4.2.3 Zbir $n$ -tih korena kompleksog broja

$$x^n = z, \quad z, x \in \mathbb{C} \implies \sum_{k=1}^n x_k = 0 \quad (x_1, x_2, \dots, x_n \text{ se ponašaju kao težišne duži } n\text{-tougla.})$$

# Kombinatorika

## 5.1 Prebrojavanja

- **Prebrojati skup** - odrediti njegovu kardinalnost
- **Princip jednakosti**: postoji bijekcija  $f : A \rightarrow B \implies |A| = |B|$
- **Princip zbira**:  $\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset \implies |\bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum_{i=1}^n |A_i|$
- **Princip proizvoda**:  $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
- **Uopšteni Dirihletov princip**:  $|A| = k > n \cdot c \implies (\exists i)(|A \cap A_i| \geq c + 1)$
- **Ramzijeve broj**  $R(k, n)$  - najmanji skup osoba koji sadrži ili  $k$  osoba koje se međusobno poznaju ili  $n$  osoba koje se međusobno ne poznaju.

## 5.2 Binomni koeficijenti

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{R}, k \leq n, \quad \binom{n}{0} = 1$$

### 5.2.1 Binomni identiteti

- **Uslov simetričnosti**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n$$

- **Negacija gornjeg indeksa**:

$$\binom{-n}{k} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k}, \quad k \in \mathbb{N}$$

- **Adiciona formula**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}, \quad 0 < k < n$$

- **Paskalov trougao**: elementi  $n$ -te vrste oblika  $\binom{n}{k}$  za  $1 \leq k \leq n$

- **Binomna formula:**

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

- **Polinomna formula:**

$$(a_1 + \dots + a_m)^n = \sum_{\substack{k_1+k_2+\dots+k_m=n \\ k_1, k_2, \dots, k_m \geq 0}} \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} a_1^{k_1} a_2^{k_2} \dots a_m^{k_m}$$

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!}$$

- **Izvlačenje ispred zagrade**

$$\begin{aligned} 1. \quad \binom{n}{k} &= \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}, \quad 0 < k \leq n \\ 2. \quad \binom{n}{k} &= \frac{n-k+1}{k} \binom{n}{k-1}, \quad 0 < k < n \end{aligned}$$

- **Pojednostavlјivanje proizvoda:**

$$\binom{n}{k+r} \binom{k+r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r}, \quad k, n, r \geq 0$$

- **Sumacione formule:**

$$\begin{aligned} 1. \quad \sum_{k=0}^n \binom{r+k}{k} &= \binom{n+r+1}{n}, \quad r, n \geq 0 \\ 2. \quad \sum_{k=0}^n \binom{k}{r} &= \binom{n+1}{r+1}, \quad r, n \geq 0 \end{aligned}$$

(Dokaz indukcijom po  $n$ )

- **Suma kvadrata:**

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}, \quad n \geq 0$$

### 5.2.2 Formula uključenja-isključenja

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subset \mathbb{N}_n} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

## 5.3 Izbori elemenata

- Vandermondov identitet:

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$$

$$\sum_{k=0}^r \binom{r}{k} \binom{s}{n+k} = \binom{r+s}{r+n}$$

## 5.4 Generisanje permutacija i kombinacija

## 5.5 Funkcije generatriše

### 5.5.1 Definicija funkcije generatriše

$$a = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots) \implies a(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i x^i, \quad a_k = \frac{a^{(k)}(0)}{k!}$$

### 5.5.2 Operacije sa funkcijama generatrisama

$$\frac{\alpha}{1 - cx^b} \rightarrow (\alpha, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \underbrace{\alpha c, 0, \dots, 0}_{b-1}, \underbrace{\alpha c^2, 0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c^3, \dots), \quad a_n = \begin{cases} \alpha c^{\frac{n}{b}}, & n \equiv_b 0 \\ 0, & n \not\equiv_b 0 \end{cases}$$

$$a(x) + b(x) \rightarrow (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots)$$

$$\frac{d}{dx} a(x) \rightarrow (a_1, 2a_2, 3a_3, 4a_4, 5a_5, 6a_6, \dots), \quad b_n = (n+1)a_{n+1}$$

$$x^n a(x) \rightarrow (\underbrace{0, \dots, 0}_n, a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)$$

$$\frac{a(x) - (a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1})}{x^n} \rightarrow (a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, a_{n+3}, \dots)$$

$$\int_0^x a(t) dt \rightarrow (0, a_0, \frac{a_1}{2}, \frac{a_2}{3}, \dots, \frac{a_{n-1}}{n}, \dots)$$

$$a(x) \cdot b(x) \rightarrow (a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \dots, \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}, \dots)$$

## 5.6 Particije brojeva

- Broj kompozicija (uređena  $k$ -torka  $(a_1, \dots, a_k)$  td.  $\sum_{i=1}^k a_i = n$ ) broja  $n$  na  $k$  sabiraka je

$$\binom{n-1}{k-1}$$

- Broj kompozicija prirodnog broja  $n$  jednak je

$$\sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} = 2^{n-1}$$

- Formula za broj particija ne postoji.
- Za particije broja  $n$  važi

$$p_k(n) = p_k(n-k) + p_{k-1}(n-k) + \cdots + p_1(n-k)$$

## 5.7 Rekurentne jednačine

### 5.7.1 Linearne rekurentne jednačine

- Linearna rekurentna jednačina  $k$ -tog reda:

$$f_0(n)a_n + f_1(n)a_{n+1} + \cdots + f_k(n)a_{n+k} = f(n)$$

- Opšte rešenje nehomogene linearne rekurentne jednačine je oblika

$$a_n = h_n + p_n,$$

gde je  $h_n$  opšte rešenje odgovarajuće homogene jednačine, a  $p_n$  partikularno rešenje date nehomogene jednačine.

#### Linearne rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima

- Linearna rekurentna jednačina  $k$ -tog reda sa konstantnim koeficijentima:

$$f_0a_n + f_1a_{n+1} + \cdots + f_ka_{n+k} = f(n)$$

- Karakteristična jednačina rekurentne jednačine sa konstantnim koeficijentima je jednačina

$$f_kx^k + \cdots + f_1x + f_0 = 0 \quad (5.1)$$

- Određivanje **opšteg rešenja** linearne rek. jednačine sa konst. koeficijentima:

1. Ako su nule  $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{C}$  karakteristične jednačine 5.1 jednostruke, onda je to opšte rešenje dato sa

$$a_n = c_1x_1^n + c_2x_2^n + \cdots + c_kx_k^n$$

2. Ako postoji nula multipliciteta  $m$ , onda ona daje član

$$c_ix_i^n + c_{i+1}nx_i^n + \cdots + c_{i+m-1}n^{m-1}x_i^n$$

u opštem rešenju homogene jednačine.

- Određivanje **partikularnog rešenja** lin. rek. jednačine sa konst. koeficijentima:

- Ako važi  $f(n) = P_d(n)b^n$ , gde je  $P_d$  polinom stepena  $d$  i  $b \in \mathbb{R}$ , važi sledeće:

1. ako  $x = b$  nije nula kar. jednačine 5.1, onda se partikularno rešenje traži u obliku

$$p_n = (A_0 + A_1n + \cdots + A_dn^d)b^n$$

2. ako  $x = b$  jeste nula multipliciteta  $m$ , onda se partikularno rešenje traži u obliku

$$p_n = n^m(A_0 + A_1n + \cdots + A_dn^d)b^n$$

- Mogu se rešavati i pomoću funkcija generatrisa.



### Linearne rekurentne jednačine sa funkcionalnim koeficijentima

- Ne postoji opšti metod za rešavanje jednačina sa funkcionalnim koeficijentima, niti se sve mogu rešiti. Može se izračunati prvih nekoliko članova i potom induktivno dokazati naslućeno rešenje. Primenjuje se i metod smene, kojim se jednačina uprošćava.

### 5.7.2 Nelinearne rekurentne jednačine

- Rešavaju se slično kao linearne rekurentne jednačine sa funkcionalnim koeficijentima.

## 5.8 Fibonaćijevi brojevi

- Rekurentna formula:

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \quad F_0 = 0, F_1 = 1$$

- Opšti član niza (Bineova formula):

$$F_n = \frac{\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n}{\sqrt{5}}$$

### 5.8.1 Lukasovi brojevi

## 5.9 Katalanovi brojevi

## 5.10 Bernulijevi brojevi

# Teorija grafova

## 6.1 Osnovni pojmovi i teoreme

### 6.1.1 Tipovi grafova

- **Prost graf:**  $G = (V, E)$ ,  $V$  - skup čvorova,  $E$  - skup grana.
- Čvorovi su *susedni* ako ih grana spaja. Grana je *incidentna* sa ova dva čvora. Ti čvorovi su *krajevi* grane. Grane incidentne sa susednim čvorom su *susedne*.
- **Stepen čvora  $u$  ( $d_u$ )** - broj grana incidentnih sa njim.
- **Okolina čvora  $u$  ( $N(u)$ )** - skup svih čvorova njemu susednih.
- $\delta$  - *minimalni stepen* čvora u grafu;  $\Delta$  - *maksimalni stepen* čvora u grafu.
- **Graf sa petljama** - dopuštene grane čija su oba kraja isti čvor.
- **Multigraf** - dopušteno više grana između dva ista čvora.
- **Težinski graf** - svakoj grani pridružena numerička vrednost.
- **Usmereni (orijentisani) graf (digraf)** - svaka grana može imati usmerenje.

**Teorema 6.1.1.** *Suma stepena čvorova grafa jednaka je dvostrukom broju grana:*

$$\sum_{i=1}^n d_{u_i} = 2m$$

**Teorema 6.1.2.** *Broj čvorova neparnog stepena grafa nije neparan.*

### 6.1.2 Izomorfizmi grafova i teoreme

- **Izomorfni grafovi** - postoji *bijekcija* skupa čvorova jednog na skup čvorova drugog koja čuva susedstva. U prevodu, izomorfni su ako se razlikuju samo oznake čvorova.
- **$k$ -dimenziona kocka** - graf čiji se skup čvorova sastoji od svih uređenih binarnih  $k$ -torki i čiji su čvorovi susedni akko se odgovarajuće  $k$ -torke razlikuju tačno u jednoj koordinati.
- **Invarijanta grafa** - funkcija definisana na skupu grafova koja ima istu vrednost za sve izomorfne grafove.

- **Podgraf**  $G' = (V', E')$  grafa  $G = (V, E)$  - važi  $V' \subseteq V$ ,  $E' \subseteq E$ .
- **Indukovani podgraf** - dobija se uklanjanjem proizvoljnog skupa čvorova grafa (zadržavaju se sve grane iz originalnog grafa koje povezuju preostale čvorove).
- **Komplement**  $\overline{G} = (V, \overline{E})$  grafa  $G = (V, E)$  - čvorovi su susedni u  $\overline{G}$  akko nisu susedni u  $G$ . Graf je *samokomplementaran* ako je izomorfan svom komplementu.

### 6.1.3 Šetnje, staze i putevi

- **Šetnja** - niz čvorova i grana  $(v_1, e_1, v_2, e_2, \dots, e_{n-1}, v_n)$  grafa  $G$  u kojem se svaka grana pojavljuje između dva sa njom incidentna čvora. *Dužina šetnje* je broj grana koje se pojavljuju u njoj. Šetnja je *zatvorena* akko počinje i završava u istom čvoru.
- **Staza** - šetnja u kojoj se svaka grana pojavljuje najviše jednom.
- **Put** - šetnja u kojoj se svaki čvor (pa i svaka grana) pojavljuje najviše jednom.
- Dva čvora  $u$  i  $v$  su *povezana* akko postoji šetnja koja počinje u  $u$  i završava u  $v$ . Graf je *povezan* akko su svi njegovi čvorovi međusobno povezani.
- Povezanost čvorova u grafu je relacija ekvivalencije. *Komponente povezanosti* grafa su klase ekvivalencije te relacije.
- **Vezivni čvor** - čvor čije uklanjanje povećava broj komponenti povezanosti grafa.
- **Most** (ili vezivna grana) - grana čije uklanjanje povećava broj komponenti povezanosti grafa (za 1).
- **Rastojanje**  $\text{dist}(u, v)$  između dva čvora  $u$  i  $v$  - dužina najkraćeg puta koji ih povezuje. Ako ne postoji takva šetnja, rastojanje je beskonačno.
- **Ekscentricitet** čvora  $u$  -  $\text{ecc}(u) = \max\{\text{dist}(u, v) \mid v \in V\}$ .
- **Radijus** grafa  $G$  -  $\text{rad}(G) = \min\{\text{ecc}(u) \mid u \in V\}$ .
- **Centar** grafa  $G$  - skup svih čvorova  $u$  za koje važi  $\text{ecc}(u) = \text{rad}(G)$ .
- **Dijametar** grafa  $G$  -  $\text{diam}(G) = \max\{\text{ecc}(u) \mid u \in V\}$ .

### 6.1.4 Neki grafovi

- **Prazan graf** - graf bez grana. Takav graf sa sa jednim čvorom se naziva *trivijalni graf*.
- **Potpun (kompletan) graf**  $K_n$  - graf sa  $n$  čvorova od kojih su svaka dva povezana granom.
- **Regularni graf** - graf u kojem su svi čvorovi istog stepena. Ako je stepen  $k$ , graf se naziva *k-regularnim*.

- **Bipartitni graf** - trivijalni graf ili graf čiji se skup čvorova može podeliti na dva disjunktne podskupa tako da svaka grana povezuje čvor iz jednog podskupa sa čvorom iz drugog.
- **Potpun (kompletan) bipartitni graf**  $K_{m,n}$  - bipartitni graf sa  $m$  čvorova u jednom i  $n$  čvorova u drugom podskupu, pri čemu je svaki čvor iz jednog podskupa povezan sa svakim čvorom iz drugog podskupa. Stepenn svakog čvora iz prvog podskupa je  $n$ , a stepenn svakog čvora iz drugog podskupa je  $m$ .
  - **Zvezda**  $S_n$  - kompletan bipartitni graf  $K_{1,n}$ .
- **Ciklus**  $C_n$  - Povezan graf kod kojeg je stepenn svakog čvora jednak 2. Ciklus sa  $n$  čvorova se naziva *n-ciklus*.
- **Put** je:
  - za  $n \leq 2$ , jedini povezan graf sa  $n$  čvorova;
  - za  $n \geq 3$ , graf koji se dobija uklanjanjem jedne grane ciklusa  $C_n$ .

Put koji ima  $n$  čvorova označava se sa  $P_n$ .

- **Dužina ciklusa i dužina puta** - broj grana koje sadrže.

**Teorema 6.1.3.** *Graf je bipartitan.  $\iff$  Graf ne sadrži cikluse neparne dužine.*

## 6.1.5 Matrične reprezentacije grafova

- **Matrica susedstva**  $A(G)$  grafa  $G$  sa  $n$  čvorova - kvadratna matrica reda  $n$  čiji element  $a_{ij}$  je jednak broju grana koje povezuju čvorove  $v_i$  i  $v_j$ . Za prost graf,  $a_{ij} = 1$  ako su čvorovi susedni, a  $a_{ij} = 0$  inače.
- **Matrica incidencije**  $R(G)$  grafa  $G$  sa  $n$  čvorova i  $m$  grana - matrica reda  $n \times m$  čiji element  $a_{ij}$  je jednak 1 ako je čvor  $v_i$  incidentan sa granom  $e_j$ , a  $a_{ij} = 0$  inače.

## 6.2 Stabla

### 6.2.1 Definicija i osnovna svojstva

- **Stablo** - Povezan graf koji ne sadrži podgraf izomorfan ciklusu. U prevodu, povezan graf bez ciklusa.
- **Šuma** - Graf čije su komponente povezanosti stabla.

**Teorema 6.2.1.** *Sledeće tvrdnje su ekvivalentne:*

1.  $T$  je stablo.
2.  $T$  je povezan graf kod kojeg je broj grana za 1 manji od broja čvorova, tj. važi  $m = n - 1$ .
3.  $T$  je maksimalni graf bez ciklusa, tj. dodavanje bilo koje grane u  $T$  stvara ciklus.
4.  $T$  je minimalni povezan graf, tj. uklanjanje bilo koje grane iz  $T$  ga čini nepovezanim.
5. Za svaka dva grafa  $T$  postoji tačno jedan put koji ih povezuje.

## 6.2.2 Korenska i razapinjuća stabla

- **Korensko stablo** - stablo u čiji je jedan čvor izdvojen od ostalih. Taj čvor se naziva *koren*.
- Ako je  $r$  koren stabla i ako važi  $\text{dist}(u, r) = i$ , kažemo da čvor  $u$  pripada  $i$ -tom nivou stabla. Ako  $u$  pripada  $i$ -tom nivou, a  $v$   $(i + 1)$ -om nivou, i ako su susedni, kažemo da je  $u$  *prethodnik* čvora  $v$ , a  $v$  *sledbenik* čvora  $u$ . Čvor koji nema naslednika nazivamo *list*. Čvor koji nije ni koren ni list nazivamo *unutrašnji čvor*.
- **Korensko  $k$ -arno stablo** - korensko stablo kod kojeg svaki čvor ima najviše  $k$  sledbenika.
- **Potpuno korensko  $k$ -arno stablo** - korensko  $k$ -arno stablo kod kojeg svaki čvor koji nije list ima tačno  $k$  sledbenika.
- **Razapinjući graf** grafa  $G$  - graf koji ima isti skup čvorova kao i  $G$  i čiji je skup grana podskup skupa grana grafa  $G$ .
- **Razapinjuće stablo** povezanog grafa  $G$  - razapinjući graf koji je stablo.
- **Razapinjuća šuma** grafa  $G$  - razapinjući podgraf koji se sastoji od razapinjućih stabala komponenta povezanosti grafa  $G$ .
- Ako je  $T$  razapinjuće stablo povezanog grafa  $G$ , onda se dodavanjem proizvoljne grane stablu  $T$ , pri čemu ona pripada grafu  $G$ , dobija tačno jedan ciklus u novonastalom grafu. Taj ciklus se naziva **elementarni ciklus** grafa  $G$  u odnosu na razapinjuće stablo  $T$ .
- Broj elementarnih ciklusa povezanog grafa ne zavisi od izbora razapinjućeg stabla. Broj grana svakog razapinjućeg stabla jednak je  $n - 1$ , a po definiciji svaka grana koja pripada grafu, a ne pripada fiksiranom razapinjućem stablu, određuje jedan elementarni ciklus. Dakle, broj elementarnih ciklusa povezanog grafa  $G$  jednak je  $m - n + 1$ .

**Teorema 6.2.2.** *Broj elementarnih ciklusa grafa jednak je  $m - n + p$ , gde je  $m$  broj grana grafa,  $n$  je broj čvorova grafa, a  $p$  je broj komponenti povezanosti grafa.*

- **Ciklomatički broj**  $v$  grafa - broj elementarnih ciklusa grafa.

## 6.2.3 Pretrage grafova

Pretraga grafa je postupak sistematskog obilaska svakog čvora grafa tačno jednom. Rezultat pretrage je **stablo pretrage** (razapinjuće usmereno stablo).

- **Pretraga po dubini** (DFS - Depth First Search) - „najdublji” mogući put: iz trenutnog čvora se ide ka neobrađenom susedu dokle god je moguće, a zatim se vrši povratak (bektrek) na prethodni čvor.
- **Pretraga po širini** (BFS - Breadth First Search) - „nivo po nivo”: prvo se obilaze svi neobrađeni susedi početnog čvora, zatim svi neobrađeni susedi tih suseda, i tako redom.

## 6.3 Označena stabla

### 6.3.1 Prebrojavanje označenih stabala

**Teorema 6.3.1** (Kejljeva teorema). *Broj označenih stabala sa  $n$  čvorova jednak je  $n^{n-2}$ .*

- **Kontrakcija  $G \cdot e$**  - dobija se od multigrafa  $G - e$  identifikovanjem (spajanjem) krajnjih čvorova grane  $e$  u jedan čvor.
- **Rekurentna formula** za broj razapinjućih stabala  $t(G)$ :

$$t(G) = t(G - e) + t(G \cdot e)$$

### 6.3.2 Kodiranje i dekodiranje označenih stabala

Svako označeno stablo sa  $n$  ( $n \geq 2$ ) čvorova može se jednoznačno predstaviti **Priferovim nizom** dužine  $n - 2$ .

---

#### Algoritam 6.3.1 Priferovo kodiranje

---

1. **INPUT**: Stablo  $T$  sa  $n$  čvorova.
  2. **WHILE** broj čvorova  $> 2$ :
    - $u$  = list sa najmanjom oznakom;
    - $v$  = sused čvora  $u$ ;
    - $s := s + v$ ; // dodaj  $v$  u niz
    - $T := T - u$ ; // ukloni  $u$  iz stabla
  3. **RETURN**  $s$
-

---

**Algoritam 6.3.2** Priferovo dekodiranje
 

---

1. **INPUT:** Priferov niz  $s = (s_1, s_2, \dots, s_{n-2})$ .
  2. **Inicijalizacija:**
    - $T = (V, \emptyset)$  gde je  $V = \{1, 2, \dots, n\}$ .
    - $l = (1, 2, \dots, n)$  // lista čvorova koji mogu biti listovi.
  3. **WHILE**  $s \neq ()$ :
    - $v =$  najmanji čvor iz  $l$  koji se ne nalazi u  $s$ ;
    - $w = s_1$ ;
    - $T := T + \{v, w\}$  // dodaj granu između  $v$  i  $w$ ;
    - $l := l \setminus \{v\}$ ;
    - $s := s \setminus \{s_1\}$ ;
  4. **Završni korak:** Poveži granom poslednja dva čvora preostala u listi  $l$ .
  5. **RETURN**  $T$
- 

## 6.4 Minimalna razapinjuća stabla

### 6.4.1 Težinski grafovi

Kod težinskih grafova, svakoj grani  $e$  dodeljena je vrednost (težina)  $w(e)$ , koja predstavlja trošak, udaljenost ili kapacitet veze.

- **Težina grafa**  $w(G)$  - suma težina svih grana u grafu:

$$w(G) = \sum_{e \in E(G)} w(e)$$

- **Minimalno razapinjuće stablo** (MST) - razapinjuće stablo  $T$  grafa  $G$  za koje je suma težina grana  $w(T)$  minimalna.

### 6.4.2 Kruskalov algoritam

Strategija Kruskalovog algoritma je „najpre grana najmanje težine”. Reč je o **polnornom algoritmu** koji u svakom koraku bira lokalno optimalno rešenje.

---

**Algoritam 6.4.1** Kruskalov algoritam
 

---

1. **INPUT:** Povezan težinski graf  $G = (V, E)$ .
  2.  $T = (V, \emptyset)$  // inicijalizacija praznog stabla.
  3. Sortiraj sve grane  $e \in E$  u neopadajući niz po težinama.
  4. **FOR** svaku granu  $e = (u, v)$  iz sortiranog niza:
    - **IF**  $T + e$  ne sadrži ciklus:
    - $T := T + e$  // dodaj granu u stablo.
  5. **RETURN**  $T$
- 

**Teorema 6.4.1** (3.4.1). *Kruskalov algoritam rezultuje minimalnim razapinjućim stablom (MST) povezanog težinskog grafa.*

- **Napomena:** Algoritam se može optimizovati uvođenjem brojača dodatih grana. Kada broj grana dostigne  $n - 1$ , algoritam se može završiti, jer je stablo kompletirano.

### 6.4.3 Primov algoritam

Strategija Primovog algoritma zasniva se na principu „najpre najbliži sused”. Za razliku od Kruskalovog algoritma koji grane bira globalno, Primov algoritam gradi stablo postepeno, proširujući trenutni podgraf.

**Teorema 6.4.2** (3.4.3). *Neka je  $G = (V, E)$  povezan težinski graf,  $U \subset V$  i  $e$  grana minimalne težine koja spaja čvor iz skupa  $U$  sa čvorom iz skupa  $V \setminus U$ . Tada postoji minimalno razapinjuće stablo grafa  $G$  koje sadrži granu  $e$ .*

---

**Algoritam 6.4.2** Primov algoritam
 

---

1. **INPUT:** Težinski graf  $G = (V, E)$ .
  2.  $T = (\emptyset, \emptyset)$  // inicijalizacija praznog stabla.
  3. Izaberi proizvoljan čvor  $v \in V$  i dodaj ga u  $T$ .
  4. **WHILE** broj čvorova u  $T < |V|$ :
    - Nađi granu  $e = (u, w)$  minimalne težine takvu da  $u \in T$ , a  $w \notin T$ .
    - Dodaj granu  $e$  i čvor  $w$  u  $T$ .
  5. **RETURN**  $T$
-



## 6.5 Ojlerovi multigrafovi

Multigraf je **Ojlerov** ako sadrži zatvorenu stazu koja svaku granu obilazi tačno jednom. **Poluojlerov** graf sadrži stazu (ne nužno zatvorenu) koja svaku granu obilazi tačno jednom.

**Teorema 6.5.1** (Ojlerova teorema). *Netrivijalan povezan multigraf je Ojlerov akko svi njegovi čvorovi imaju paran stepen.*

**Teorema 6.5.2.** *Netrivijalan povezan multigraf je poluojlerov akko sadrži tačno 0 ili 2 čvora neparnog stepena.*

Flerijev algoritam se koristi za pronalaženje Ojlerove staze u grafu. Ključno pravilo pri izboru grane je izbegavanje „mostova” osim ako ne postoji druga mogućnost.

---

### Algoritam 6.5.1 Flerijev algoritam

---

1. **INPUT:** Ojlerov multigraf  $G$ .
  2. Izaberi proizvoljan čvor  $v_0$ . Neka je  $s = (v_0)$  trenutna staza.
  3.  $H = G$  // radna kopija grafa.
  4. **WHILE** broj grana u  $H > 0$ :
    - Izaberi granu  $e = (u, v)$  iz  $H$  takvu da:
      - (a)  $u$  je poslednji čvor staze  $s$ .
      - (b)  $e$  nije most u  $H$  (osim ako ne postoji drugi izbor).
    - $s := s + e + v$ ;
    - $H := H - e$ ; // ukloni granu iz pomoćnog grafa.
  5. **RETURN**  $s$
- 

U slučaju kada graf nije poluojlerov, problem se može modifikovati dodavanjem novih grana ili dozvoljavanjem višestrukih prolazaka kroz iste grane.

### 6.5.1 Problem kineskog poštara

Problem kineskog poštara (engl. *Route Inspection Problem*) odnosi se na pronalaženje zatvorene šetnje u povezanom težinskom multigrafu koja sadrži sve grane grafa i ima minimalnu ukupnu težinu.

- **Cilj:** Optimizovati rutu tako da se obiđu sve ulice (grane) uz minimalan utrošak vremena (dužine puta).
- **Ojlerov slučaj:** Ako je multigraf Ojlerov, svaka Ojlerova staza predstavlja optimalno rešenje jer se svakom granom prolazi tačno jednom.
- **Opšti slučaj:** Ako graf nije Ojlerov (postoje čvorovi neparnog stepena), neke grane se moraju obići više puta. Problem se tada svodi na „uparivanje” čvorova neparnog stepena i dodavanje puteva minimalne težine između njih kako bi svi čvorovi postali parnog stepena.

---

**Algoritam 6.5.2** Rešavanje problema kineskog poštara (za neojlerov graf)
 

---

1. Identifikuj sve čvorove neparnog stepena u multigrafu.
  2. Odredi sve moguće puteve između parova čvorova neparnog stepena i pronadi onaj skup uparivanja koji daje minimalnu ukupnu težinu.
  3. Dodaj „virtuelne” grane (duplikate postojećih grana) duž najkraćih puteva između odabranih parova, čineći graf Ojlerovim.
  4. Primenom Flerijevo algoritma na tako modifikovan graf pronadi Ojlerovu stazu.
- 

## 6.6 Hamiltonovi grafovi

Graf je **Hamiltonov** ako sadrži ciklus koji prolazi kroz svaki čvor grafa tačno jednom (**Hamiltonov ciklus**). Graf je **polu-Hamiltonov** ako sadrži put koji prolazi kroz svaki čvor grafa tačno jednom (**Hamiltonov put**).

**Teorema 6.6.1** (Dirakova teorema). *Ako graf  $G$  ima  $n \geq 3$  čvorova i minimalni stepen čvora  $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$ , tada je  $G$  Hamiltonov.*

### Problem konjičkog skoka

Problem konjičkog skoka zahteva obilazak svakog polja šahovske table (ili table formata  $m \times n$ ) skakačem, tako da se na svakom polju stane tačno jedanput.

- **Grafovski interpretacija:** Čvorovi grafa su polja table, a grane predstavljaju dozvoljene poteze skakača.
- **Veza sa teorijom:** Postojanje rešenja ekvivalentno je postojanju Hamiltonovog puta (ili ciklusa) u tako konstruisanom grafu.
- **Napomena:** Za table formata  $m \times n$  (gde je  $m, n \geq 3$ ), rešenje postoji osim za tabele formata  $3 \times 3$ ,  $3 \times 5$ ,  $3 \times 6$  i  $4 \times 4$ .
- **Metoda:** Problemi većih dimenzija (npr.  $8 \times 8$ ) često se rešavaju metodom „podela i vladaj” — deljenjem table na manje segmente koji se pojedinačno rešavaju i povezuju.

Za razliku od Ojlerovih grafova, ne postoji jednostavna i efikasna teorema (nužan i dovoljan uslov) za proveru postojanja Hamiltonovog ciklusa u opštem grafu, zbog čega je ovaj problem računski složen (NP-kompletno).

#### 6.6.1 Problem trgovačkog putnika

Problem trgovačkog putnika (engl. *Traveling Salesperson Problem - TSP*) zahteva pronalaženje Hamiltonovog ciklusa minimalne težine u potpunom težinskom grafu.

- **Cilj:** Obići svaki grad (čvor) tačno jednom i vratiti se u početni, uz minimalnu ukupnu dužinu puta.

- **Kompleksnost:** Problem je **NP-težak**, što znači da ne postoji poznat algoritam koji bi ga rešio u polinomijalnom vremenu za sve ulaze.
- **Pristupi:**
  - *Egzaktni algoritmi:* Pretraga svih mogućih Hamiltonovih ciklusa (neefikasno za veliki broj gradova).
  - *Heuristički algoritmi:* Traže **suboptimalna** rešenja (rešenja "bliska" optimalnom) u razumnom vremenu.

### 3-heuristika

Ova heuristika poboljšava početni Hamiltonov ciklus kroz iterativne promene (lokalna pretraga).

---

#### Algoritam 6.6.1 3-heuristika za TSP

---

1. **INPUT:** Hamiltonov ciklus  $s_1$  potpunog težinskog grafa.
  2. **WHILE** kriterijum zaustavljanja nije ispunjen:
    - Ukloni 3 nesusedne grane iz trenutnog ciklusa  $s_i$ , čime se dobijaju 3 zasebna puta.
    - Ponovo poveži krajeve tih puteva na sve moguće načine da se formira novi Hamiltonov ciklus.
    - Izaberi ciklus  $s_{i+1}$  sa minimalnom težinom među svim novonastalim ciklusima.
    - **IF**  $w(s_{i+1}) < w(s_i)$ , prihvati  $s_{i+1}$  kao trenutni ciklus.
  3. **RETURN**  $s_i$  (suboptimalni ciklus)
- 

- **Napomena:** Strategija „uvek idi do najbližeg suseda” (Greedy) je najjednostavnija heuristika, ali često ne daje optimalno rešenje. 3-heuristika daje znatno bolje rezultate jer omogućava „preslaganje” ciklusa.

## 6.7 Planarni grafovi

Graf je **planaran** ako se može nacrtati u ravni tako da se njegove grane nigde ne seku (osim u čvorovima). Svaki takav crtež deli ravan na jednu ili više **oblasti** (jedna od njih je uvek beskonačna).

**Teorema 6.7.1** (Ojlerova teorema za planarne grafove). *Za svaki povezan planaran graf  $G$  važi:*

$$n - m + f = 2$$

*gde su  $n$  broj čvorova,  $m$  broj grana, a  $f$  broj oblasti na koje graf deli ravan.*

**Posledice Ojlerove teoreme:**

- Za svaki prost planaran graf sa  $n \geq 3$  važi:

$$m \leq 3n - 6$$

- Ako prost planaran graf ne sadrži cikluse dužine 3 (npr. bipartitan je), onda važi stroža nejednakost:

$$m \leq 2n - 4$$

## Kuratovskijeva teorema

Da bismo definisali karakterizaciju planarnih grafova, koristimo pojam **potpodele** (subdivision), koja nastaje umetanjem novih čvorova na postojeće grane.

**Teorema 6.7.2** (Kuratovskijeva teorema). *Graf je planaran ako i samo ako ne sadrži podgraf koji je izomorfan nekoj potpodi grafa  $K_5$  (kompletnan graf sa 5 čvorova) ili  $K_{3,3}$  (kompletnan bipartitan graf sa 3+3 čvora).*

- **Značaj:** Ovo je fundamentalni rezultat koji nam omogućava da testiramo planarnost bilo kog grafa identifikacijom tzv. zabranjenih struktura (Kuratovski grafovi).

## 6.8 Sparivanja u grafovima

**Sparivanje** (matching) u grafu  $G$  je podskup skupa grana takav da nijedne dve grane nemaju zajednički čvor (nisu susedne).

- **Maksimalno sparivanje** - sparivanje kojem se ne može dodati nova grana, a da ostane sparivanje.
- **Najveće sparivanje** - sparivanje sa najvećim mogućim brojem grana.
- **Savršeno sparivanje** - sparivanje u kojem je svaki čvor grafa incidentan sa tačno jednom granom sparivanja.

## Beržova teorema i proširenje

- **M-alternirajući put** - put kod kojeg grane naizmenično pripadaju i ne pripadaju sparivanju  $M$ .
- **M-uvećani put** - M-alternirajući put čiji su krajnji čvorovi slobodni (nisu pokriveni sparivanjem  $M$ ).

**Teorema 6.8.1** (Beržova teorema). *Sparivanje  $M$  u grafu  $G$  je najveće ako i samo ako  $G$  ne sadrži M-uvećani put.*

## Problem rasporeda poslova (Assignacija)

Problem se modeluje pomoću bipartitnog grafa gde jedna particija čvorova predstavlja radnike, a druga poslove.

- **Jednostavan slučaj:** Ako su svi radnici jednako efikasni, problem se svodi na pronalaženje **najvećeg sparivanja** u bipartitnom grafu. Za to se koristi **Mađarski algoritam**.
- **Složeniji slučaj:** Ako radnici imaju različitu efikasnost, koriste se težinski bipartitni grafovi gde težina grane predstavlja cenu ili vreme obavljanja posla. Ovde se primenjuje **Kun-Mankresov algoritam**.

## 6.9 Bojenje grafova

Bojenje grafova podrazumeva dodeljivanje boja elementima grafa (čvorovima ili granama) uz određene uslove.

- **Pravilno bojenje čvorova** - funkcija kojom se susednim čvorovima dodeljuju različite boje.
- **Hromatski broj**  $\chi(G)$  - minimalan broj boja potrebnih za pravilno bojenje čvorova. To je invarijanta grafa.
- **Linijski graf**  $L(G)$  - graf čiji čvorovi odgovaraju granama grafa  $G$ , a susedni su ako su odgovarajuće grane u  $G$  susedne. Bojenje grana grafa  $G$  ekvivalentno je bojenju čvorova grafa  $L(G)$ .

### Teoreme i svojstva

- **Kompletni grafovi:**  $\chi(K_n) = n$ .
- **Bipartitni grafovi:** Za graf sa bar jednom granom,  $\chi(G) = 2$  (bihromatski grafovi).
- **Ciklus  $C_n$ :**  $\chi(C_n) = 2$  za  $n = 2k$ , odnosno  $\chi(C_n) = 3$  za  $n = 2k - 1$ .
- **Gornja granica:**  $\chi(G) \leq \Delta + 1$ .
- **Bruks teorema:** Jednakost  $\chi(G) = \Delta + 1$  važi akko je graf kompletan ili ciklus neparne dužine.

### 6.9.1 Bojenje mapa

Problem bojenja mapa datira iz XIX veka i odnosi se na bojenje teritorija tako da susedne teritorije (one koje dele granicu dužine veće od nule) imaju različite boje.

- **Modelovanje:** Svaka mapa se može predstaviti kao planaran graf gde čvorovi odgovaraju teritorijama, a grane granicama. Problem se svodi na određivanje hromatskog broja tog planarnog grafa.
- **Teorema o četiri boje:** Svaki planaran graf je 4-obojev ( $\chi(G) \leq 4$ ).
- **Istorijat:** Hipotezu je 1890. godine podržao Hejvud (dokazao 5-obojevitost), dok su Epl i Haken tek 1976. godine dokazali teoremu o 4 boje uz pomoć računara.

### Primene i algoritmi

- **Pohlepna heuristika:** Čvorovi se boje redom  $(v_1, \dots, v_n)$ , a svakom se dodeljuje prva boja koja nije iskorišćena za njegove susede. Iako efikasan, ovaj algoritam ne garantuje minimalan broj boja ( $\chi$ ).
- **Raspored ispita:** Ispiti su čvorovi, a grane povezuju one koje student polaže istovremeno. Potreban broj termina =  $\chi(G)$ .
- **Skladištenje materijala:** Materije su čvorovi, a grane povezuju nekompatibilne supstance. Minimalan broj skladišnih prostora =  $\chi(G)$ .

## 6.10 Rastojanja u usmerenim težinskim grafovima

### 6.10.1 Dajkstrin algoritam

- **Napomena:** U prvom delu, algoritam određuje prethodnika svakog čvora i izračunava najkraća rastojanja. Drugi deo algoritma služi za rekonstrukciju samih putanja koristeći informacije o prethodnicima. Moguća je modifikacija algoritma kojom se direktno pamte nizovi čvorova koji čine najkraći put.

**Teorema 6.10.1** (Teorema 3.10.3). *Dajkstrin algoritam daje najkraće puteve od jednog čvora usmerenog težinskog grafa do svih čvorova tog grafa.*

---

**Algoritam 6.10.1** Dajkstrin algoritam
 

---

1. **INPUT:** Usmeren težinski graf  $G$  i početni čvor  $r$ .
  2. **Inicijalizacija:**
    - $prethodnik(u) = undefined$  za sve  $u \in V$ .
    - $rastojanje(r) = 0$ , a  $rastojanje(u) = \infty$  za sve  $u \in V \setminus \{r\}$ .
    - $S = \emptyset$  (skup razmotrenih čvorova).
  3. **WHILE**  $S \neq V$ :
    - Nađi  $u \in V \setminus S$  takav da je  $rastojanje(u)$  minimalno.
    - $S := S \cup \{u\}$ .
    - **FOR** svaka grana  $(u, v)$  gde  $v \in V \setminus S$ :
      - **IF**  $rastojanje(u) + w(u, v) < rastojanje(v)$ :
        - \*  $prethodnik(v) = u$
        - \*  $rastojanje(v) = rastojanje(u) + w(u, v)$
  4. **Rekonstrukcija puteva** (za svaki  $u \in S$ ):
    - $v = u$ ,  $put = (u)$ .
    - **WHILE**  $prethodnik(v) \neq undefined$ :
      - $v = prethodnik(v)$ ,  $put = v + put$ .
  5. **RETURN**  $put, rastojanje(u)$
- 

**6.10.2 Floyd-Varšalov algoritam**

- **Napomena:** Za svaka dva čvora grafa, algoritam pronalazi najkraći put koji potencijalno prolazi kroz sve ostale čvorove.
- **Modifikacije:** Algoritam se može unaprediti za rekonstrukciju samih putanja (pamćenjem prethodnika) ili za utvrđivanje dostupnosti čvorova (tada se težine grana tretiraju kao 1, a algoritam proverava samo postojanje puta).

---

**Algoritam 6.10.2** Floyd-Varšalov algoritam

---

1. **INPUT:** Inicijalna matrica rastojanja  $D$  usmerenog težinskog grafa.
  2.  $n = \text{size}(D)$ .
  3. **FOR**  $i = 1$  **TO**  $n$ :
    - **FOR**  $j = 1$  **TO**  $n$ :
      - **FOR**  $k = 1$  **TO**  $n$ :
        - \* **IF**  $D(j, k) > D(j, i) + D(i, k)$ :
          - $D(j, k) := D(j, i) + D(i, k)$
  4. **RETURN**  $D$  (matrica najkraćih rastojanja)
-



# Linearna algebra

# Analitička geometrija

## 8.1 Ugao između dve prave

$$\tan(\theta) = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|, \quad \text{gde je } \theta \text{ ugao pod kojim se seku prave } k_1 x + b_1 \text{ i } k_2 x + b_2.$$

# Analiza

## 9.1 Limesi

### 9.1.1 Poznati limesi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x}\right) = \ln a \quad \left[ \implies \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x}\right) = 1 \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0 \quad \left[ \implies \lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1 \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\sin \sin \dots \sin(x_0)}_n = 0, \quad x_0 \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\cos \cos \dots \cos(x_0)}_n = d, \quad x_0 \in \mathbb{R}, \quad d - \text{Dottie number}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log(n) \right) = \gamma \approx 0.5772 \text{ (Ojlerova konstanta)}$$

### 9.1.2 Upoređivanje beskonačnosti

$$(n!)^2 \gg n^n \gg n! \gg \alpha^n \gg n^\alpha \gg \log_\alpha(n)$$

### 9.1.3 Teoreme

#### 3 limesa:

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x) \text{ na } \dot{U}_a \wedge \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\text{Štolc: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} \quad (b_n \text{ strogo rastući i } \lim_{x \rightarrow +\infty} b_n = +\infty)$$

$$\text{Koši } (A_n): \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a$$

$$\text{G}_n: \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \wedge a_n > 0, n \in \mathbb{N} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = a$$

$$\text{H}_n: \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} = a$$

$$\sqrt[n]{a_n}: a_n > 0, n \in \mathbb{N} \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$$

$$\text{L'Hôpitalovo pravilo: } \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}, \quad c \in \overline{\mathbb{R}}, \quad \text{za oblike } \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \text{ i } \frac{0}{0}$$

## 9.2 Asimptote

### 9.2.1 Kosa asimptota

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] = b$$

## 9.3 Izvodi

### 9.3.1 Poznati izvodi

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1, x > 0)$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} \quad (x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z})$$

$$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z})$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1)$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1)$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

### 9.3.2 Lajbnicova formula

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(n-k)} v^{(k)}$$

### 9.3.3 Fermaova, Rolova i Lagranžova teorema

**Fermaova teorema:** Neka je  $U_\delta = (c - \delta, c + \delta)$   $\delta$ -okolina tačke  $c \in \mathbb{R}$  i funkcija  $f : U_\delta \rightarrow \mathbb{R}$  diferencijabilna u tački  $c$ . Ako funkcija  $f$  u tački  $c$  ima lokalni ekstremum, onda je  $f'(c) = 0$ .

**Rolova teorema:** Neka je funkcija  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ :

- neprekidna u svim tačkama segmenta  $[a, b]$ ,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala  $(a, b)$ ,
- ima jednake vrednosti na krajevima tog segmenta:  $f(a) = f(b)$ .

Tada postoji tačka  $c \in (a, b)$  td.  $f'(c) = 0$ .

**Lagranžova teorema:** Neka je funkcija  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ :

- neprekidna u svim tačkama segmenta  $[a, b]$ ,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala  $(a, b)$ .

Tada postoji tačka  $c \in (a, b)$  td.  $f'(c)(b - a) = f(b) - f(a)$ .

## 9.4 Tejlorov razvoj

### 9.4.1 Opšta formula Tejlorovog razvoja

$$T_{n,a}(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n, \quad a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

### 9.4.2 Razvoji elementarnih funkcija

$$(1+x)^\alpha = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}x^2 + \binom{\alpha}{3}x^3 + \dots, \quad \alpha \in \mathbb{R}, |x| < 1$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, \quad |x| < 1$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arcsin(x) = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \frac{35}{1152}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{40}x^5 - \frac{5}{112}x^7 - \frac{35}{1152}x^9 - \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\tan(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \dots, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$$

$$\arctan(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\cot(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} + \frac{x^7}{4725} - \frac{2x^9}{93555} + \dots, \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{arccot}(x) = \frac{\pi}{2} - x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{7}x^7 - \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

## 9.5 Integrali

### 9.5.1 Poznati integrali

$$\begin{aligned}
\int x^a dx &= \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C, \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, x > 0 \\
\int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C, \quad x \neq 0 \\
\int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln(a)} + C, \quad a > 0, a \neq 1 \\
\int e^x dx &= e^x + C \\
\int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\
\int \cos(x) dx &= \sin(x) + C \\
\int \frac{1}{\sin^2(x)} dx &= -\cot(x) + C, \quad x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \\
\int \frac{1}{\cos^2(x)} dx &= \tan(x) + C, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \\
\int \frac{1}{1+x^2} dx &= \arctan(x) + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin(x) + C, \quad |x| < 1 \\
\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2+1}| + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C, \quad |x| > 1
\end{aligned}$$

### 9.5.2 Izvedeni integrali

$$\begin{aligned}
\int \ln|x| dx &= x \ln|x| - x + C \\
\int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C, \quad a \in \mathbb{R}, |x| \leq a \\
\int \frac{1}{\sin(x)} dx &= \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right| + C \\
\int \frac{1}{\cos(x)} dx &= \ln \left| \cot\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \right| + C
\end{aligned}$$



# Verovatnoća

# Statistika

# Numerička analiza