

Практика по геометрии

(преподаватель Амрани И. М.)

Записал Костин П.А.

Данный документ неидеальный, прошу сообщать о найденных недочетах в [вконтакте](#)

Содержание

0.1	(03.09.2019) Кривые и поверхности	2
0.2	(10.09.2019) Задачи на кривые	3
0.3	(17.09.2019) Поверхности	6
0.4	(24.10.2019) Первая фундаментальная форма	7
0.5	(01.10.2019) Ещё задача на $I(F)$	8
0.6	(01.10.2019) Вторая фундаментальная форма	9
0.7	(08.10.2019) Практика совместно с 242	14
0.8	(15.10.2019) Практика совместно с 242 x2	16

0.1 (03.09.2019) Кривые и поверхности

Пример

$$\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \gamma \in C^2, \quad \text{т.ч.} \quad |\gamma(t)| = 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\text{Д-ть, что } \gamma'(t) \perp \gamma''(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Док-во

$$|\gamma'| = 1 \Leftrightarrow \sqrt{\langle \dot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle} = 1 \Leftrightarrow \langle \dot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle = 1$$

$$(\langle \dot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle)' = (1)' \Rightarrow 2 \langle \dot{\gamma}, \ddot{\gamma} \rangle = 0$$

Вообще очевидно, но если нет, то:

$$(\langle \dot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle)' = \left(\sum_{i=1}^3 \dot{\gamma}_i^2 \right)' = \sum_{i=1}^3 2\dot{\gamma}_i \ddot{\gamma}_i = 2 \langle \dot{\gamma}, \ddot{\gamma} \rangle$$

Пример

$$\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \gamma \in C^3, \quad |\gamma'| = 1, \quad \gamma'' \neq 0$$

$$T(t) = \gamma'(t), \quad B(t) = T(t) \times N(t), \quad N(t) = \frac{\gamma''(t)}{|\gamma''(t)|}$$

1. Д-ть, что $\{T(t), N(t), B(t)\}$ - ОНБ
2. Найти координаты $\frac{dT}{dt}, \frac{dN}{dt}, \frac{dB}{dt}$ в базисе $\{T, N, B\}$

Решение

1. Очевидно, $B(t) = \underset{=1}{T} \cdot \underset{=1}{N} \sin \angle(T, N)$

$$T \perp N \text{ (по пред. задаче), } B \perp N, \quad B \perp T \text{ (по опр. вект. произв.)}$$

2. По определению "взятием производной" получаем:

$$\frac{dT}{dt} = 0T + |\ddot{\gamma}|N + 0B$$

$$\langle N, T \rangle = 0 \Rightarrow \langle \frac{dN}{dt}, T \rangle + \langle N, \frac{dT}{dt} \rangle = 0$$

$$\text{Аналогично } 0 = \langle \frac{dT}{dt}, B \rangle = - \langle \frac{dB}{dt}, T \rangle$$

$$|\ddot{\gamma}| = \langle \frac{dN}{dt}, T \rangle = - \langle N, \frac{dT}{dt} \rangle$$

$$\frac{dN}{dt} = -|\ddot{\gamma}|T + 0N + \tau(t)B$$

$$\frac{dB}{dt} = 0T - \tau(t)N + 0B$$


0.2 (10.09.2019) Задачи на кривые

Мы хотим найти τ через $\dot{\gamma}$, $\ddot{\gamma}$, $\dddot{\gamma}$

Замечание

На плоскости в каждой точке гладкой кривой есть окружность, которая наилучшим образом приближает кривую

$$R = \frac{1}{|\ddot{\gamma}|}, \quad |\ddot{\gamma}| := \kappa - \text{кривизна}$$



Решение (продолжение)

$$\tau = \langle \frac{dN}{dt}, B \rangle$$

$$\frac{dN}{dt} = \left(\frac{\ddot{\gamma}}{|\ddot{\gamma}|} \right)' = \frac{\dddot{\gamma}|\ddot{\gamma}| - |\ddot{\gamma}|'\ddot{\gamma}}{|\ddot{\gamma}|^2}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \langle \frac{dN}{dt}, B \rangle &= \langle \frac{\ddot{\gamma}|\ddot{\gamma}| - |\ddot{\gamma}|'\ddot{\gamma}}{|\ddot{\gamma}|^2}, \frac{\dot{\gamma} \times \ddot{\gamma}}{|\ddot{\gamma}|} \rangle = \\ &= \frac{1}{|\ddot{\gamma}|^3} \langle \ddot{\gamma}|\ddot{\gamma}| - |\ddot{\gamma}|'\ddot{\gamma}, \dot{\gamma} \times \ddot{\gamma} \rangle \underset{\text{см. на N}}{=} \\ &= \frac{1}{|\ddot{\gamma}|^3} \langle \ddot{\gamma}|\ddot{\gamma}|, \dot{\gamma} \times \ddot{\gamma} \rangle = \frac{1}{|\ddot{\gamma}|^2} \langle \ddot{\gamma}, \dot{\gamma} \times \ddot{\gamma} \rangle = \frac{(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}, \dddot{\gamma})}{|\ddot{\gamma}|^2} \end{aligned}$$

Пример

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad t \mapsto (4 \cos(t), 5 - 5 \sin(t), -3 \cos(t))$$

1. Найти κ и τ
2. Понять, что из себя представляет линия

Решение

1. Предыдущую задачу мы не можем просто так применить, потому что $|\dot{\gamma}| = 5 \neq 1$, но мы можем перепараметризовать:

$$\tilde{\gamma} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad t \mapsto (4 \cos(\frac{t}{5}), 5 - 5 \sin(\frac{t}{5}), -3 \cos(\frac{t}{5}))$$

$$\dot{\tilde{\gamma}} = (-\frac{4}{5} \sin(\frac{t}{5}), -\cos(\frac{t}{5}), \frac{3}{5} \sin(\frac{t}{5}))$$

$$\Rightarrow |\dot{\tilde{\gamma}}| = 1$$

$$\ddot{\tilde{\gamma}} = (-\frac{4}{25} \cos(\frac{t}{5}), \frac{1}{5} \sin(\frac{t}{5}), \frac{3}{25} \cos(\frac{t}{5}))$$

$$\Rightarrow \kappa = |\ddot{\tilde{\gamma}}| = \frac{1}{25}$$

$$\ddot{\tilde{\gamma}} = (\frac{4}{125} \sin(\frac{t}{5}), \frac{1}{25} \cos(\frac{t}{5}), -\frac{3}{125} \sin(\frac{t}{5}))$$

$$\Rightarrow \tau = \frac{(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}, \ddot{\gamma})}{|\ddot{\gamma}|^2} = 25(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}, \ddot{\gamma}) = 0$$


2. Наша линия находится на плоскости:

$$3x + 0y + 4z$$

И лежит на сфере:

$$x^2 + (y - 5)^2 + z^2 = 25$$


Значит она представляет из себя окружность, потому что есть разные точки



Пример

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad t \mapsto (\cos(t), \sin(t), t)$$

1. Построить график



2. Найти κ и τ

Решение

Аналогично $t \rightarrow \frac{t}{\sqrt{2}}$

$$\tilde{\gamma} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad t \mapsto \left(\cos\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right), \sin\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right), \frac{t}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\tilde{\dot{\gamma}} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right), \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right), \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\Rightarrow |\tilde{\dot{\gamma}}| = 1$$

$$\tilde{\ddot{\gamma}} = \left(-\frac{1}{2} \cos\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right), -\frac{1}{2} \sin\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right), 0 \right)$$

$$\Rightarrow \kappa = |\tilde{\ddot{\gamma}}| = \frac{1}{2}$$

$$\tilde{\ddot{\gamma}} = \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} \sin\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right), -\frac{1}{2\sqrt{2}} \cos\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right), 0 \right)$$

$$\tau = \frac{(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}, \ddot{\gamma})}{|\ddot{\gamma}|^2}$$

$$(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}, \ddot{\gamma}) = \det \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \sin(\frac{t}{\sqrt{2}}) & \frac{1}{\sqrt{2}} \cos(\frac{t}{\sqrt{2}}) & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{2} \cos(\frac{t}{\sqrt{2}}) & -\frac{1}{2} \sin(\frac{t}{\sqrt{2}}) & 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{2}} \sin(\frac{t}{\sqrt{2}}) & -\frac{1}{2\sqrt{2}} \cos(\frac{t}{\sqrt{2}}) & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{8}$$

0.3 (17.09.2019) Поверхности

Пример

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad t \mapsto (r(t), 0, z(t)), \text{ где } r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, z : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Найти параметризацию поверхности вращения вокруг OZ

Док-во

Из геометрических соображений: $(r(t) \cos \varphi, r(t) \sin \varphi, z(t))$, $\varphi \in [0, 2\pi]$

Более строго:

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r(t) \\ 0 \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r(t) \cos \alpha \\ r(t) \sin \alpha \\ z(t) \end{pmatrix}$$

Опр

Гладкая двухмерная поверхность:

$$F : \overset{\text{откр}}{U}_{t, s} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

т.ч. $\frac{\partial F}{\partial S}, \frac{\partial F}{\partial t}$ - непрерывные функции


Опр

Гладкая регулярная поверхность:

$$F : \overset{\text{откр}}{U}_{t, s} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

т.ч. $\frac{\partial F}{\partial S}, \frac{\partial F}{\partial t}$ - линейно независимы

"регулярная = скорость не обнуляется"



0.4 (24.10.2019) Первая фундаментальная форма

Пример

$$F : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} \left\langle \frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle & \left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle \\ \left\langle \frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial s} \right\rangle & \left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial s} \right\rangle \end{pmatrix} = \\ = \left\langle \frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle \left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial s} \right\rangle - \left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle \left\langle \frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial s} \right\rangle = \\ = \left| \frac{\partial F}{\partial t} \right|^2 \left| \frac{\partial F}{\partial s} \right|^2 - \left| \frac{\partial F}{\partial s} \right|^2 \left| \frac{\partial F}{\partial t} \right|^2 \cos^2 t = \left| \frac{\partial F}{\partial t} \right|^2 \left| \frac{\partial F}{\partial s} \right|^2 = \left| \frac{\partial F}{\partial t} \times \frac{\partial F}{\partial s} \right|^2 \end{aligned}$$

Замечание

$$A(S) = \sum A(\square)$$

$$A(\square) \approx \left| \frac{\partial F}{\partial t} \times \frac{\partial F}{\partial s} \right| \Delta t \Delta s$$

$$I(F) = \begin{pmatrix} \left\langle \frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle & \left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle \\ \left\langle \frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial s} \right\rangle & \left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial s} \right\rangle \end{pmatrix}$$

$$A(S) = \iint \left| \frac{\partial F}{\partial t} \times \frac{\partial F}{\partial s} \right| dt ds = \iint \sqrt{\det I(F)} dt ds$$

Пример

$$F : (0, 2\pi) \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(\theta, \varphi) \rightarrow (\cos \theta \sin \varphi, \cos \theta \cos \varphi, \sin \theta)$$

1. Доказать, что образ F находится на сфере радиуса 1
2. Найти S сферы через $I(F)$

Док-во

1. Видно из параметрического уравнения сферы что это сфера, а также понятен радиус и её центр

$$\begin{cases} x = x_0 + R \cdot \sin \theta \cdot \cos \phi, \\ y = y_0 + R \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi, \\ z = z_0 + R \cdot \cos \theta, \end{cases}$$

где $\theta \in [0, \pi]$ и $\phi \in [0, 2\pi]$ (у нас будет сдвиг на угол)

2. Найдем переменные для $I(F)$:

$$\left\langle \frac{\partial F}{\partial \theta}, \frac{\partial F}{\partial \theta} \right\rangle = \sin^2 \theta \sin^2 \varphi + \sin^2 \theta \cos^2 \varphi + \cos^2 \theta = 1$$

$$\left\langle \frac{\partial F}{\partial \theta}, \frac{\partial F}{\partial \varphi} \right\rangle = 0, \quad \left\langle \frac{\partial F}{\partial \varphi}, \frac{\partial F}{\partial \theta} \right\rangle = 0, \quad \left\langle \frac{\partial F}{\partial \varphi}, \frac{\partial F}{\partial \varphi} \right\rangle = \cos^2 \theta$$


$$\Rightarrow I(F) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \cos^2 \theta \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A(S) = \iint \sqrt{\det I(F)} d\theta d\varphi = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |\cos \theta| d\theta d\varphi = \int_0^\pi 4 d\varphi = 4\pi$$

0.5 (01.10.2019) Ещё задача на $I(F)$

Пример

$$F : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad C^1 \text{ регулярная}$$



Найти длину $\tilde{\gamma} = F \circ \gamma$ через γ и $I(F)$

Решение

$$\begin{aligned}
 l(F \circ \gamma) &:= \int_0^1 |F \circ \gamma(t)'| dt \\
 \frac{d(F \circ \gamma(t))}{dt} &= \underbrace{\frac{\partial F}{\partial x}}_{\text{вектор}} \overbrace{\dot{\gamma}_1(t)}^{\text{скаляр}} + \frac{\partial F}{\partial y} \dot{\gamma}_2(t) = \\
 &= \left\langle \frac{\partial F}{\partial x} \dot{\gamma}_1(t) + \frac{\partial F}{\partial y} \dot{\gamma}_2(t), \frac{\partial F}{\partial x} \dot{\gamma}_1(t) + \frac{\partial F}{\partial y} \dot{\gamma}_2(t) \right\rangle = \\
 &= \left\langle \frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial x} \right\rangle \dot{\gamma}_1^2(t) + 2 \left\langle \frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y} \right\rangle \dot{\gamma}_1(t) \dot{\gamma}_2(t) + \left\langle \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial y} \right\rangle \dot{\gamma}_2^2(t) = \\
 &= (\dot{\gamma}_1, \dot{\gamma}_2) I(F) \begin{pmatrix} \dot{\gamma}_1 \\ \dot{\gamma}_2 \end{pmatrix} \\
 \Rightarrow l(F \circ \gamma) &= \int_0^1 \sqrt{(\dot{\gamma}_1, \dot{\gamma}_2) I(F) \begin{pmatrix} \dot{\gamma}_1 \\ \dot{\gamma}_2 \end{pmatrix}} dt
 \end{aligned}$$

0.6 (01.10.2019) Вторая фундаментальная форма

Опр

$F: U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ C^2 регулярная

$$\left| \frac{\partial F}{\partial x} \times \frac{\partial F}{\partial y} \right| \neq 0$$

$$n := \frac{\frac{\partial F}{\partial x} \times \frac{\partial F}{\partial y}}{\left| \frac{\partial F}{\partial x} \times \frac{\partial F}{\partial y} \right|} - \text{перп. обоим и по модулю 1}$$

$$L = \left\langle \frac{\partial^2 F}{\partial x^2}, n \right\rangle, \quad M = \left\langle \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}, n \right\rangle, \quad N = \left\langle \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}, n \right\rangle$$

$$\Pi(F) = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix}$$

Замечание

$\Pi(F)$ говорит, какая ПВП лучше всего приближает в данной точке

Пример

Пусть есть сфера радиуса r :

$$\begin{cases} x = x_0 + R \cdot \sin \theta \cdot \cos \phi, \\ y = y_0 + R \cdot \sin \theta \cdot \sin \phi, \\ z = z_0 + R \cdot \cos \theta, \end{cases}$$

где $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ и $\phi \in [0, 2\pi)$

Найти $\Pi(F)$, $I(F)$ и $\frac{\det(\Pi)}{\det(I)}$

Решение

Посчитаем $I(F)$:

$$\frac{\partial F}{\partial \theta} = (-r \sin \theta \cos \varphi, -r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \varphi} = (-r \cos \theta \sin \varphi, r \cos \theta \cos \varphi, 0)$$

$$\left\langle \frac{\partial F}{\partial \theta}, \frac{\partial F}{\partial \theta} \right\rangle = r^2, \quad \left\langle \frac{\partial F}{\partial \theta}, \frac{\partial F}{\partial \varphi} \right\rangle = 0$$

$$\left\langle \frac{\partial F}{\partial \varphi}, \frac{\partial F}{\partial \theta} \right\rangle = 0, \quad \left\langle \frac{\partial F}{\partial \varphi}, \frac{\partial F}{\partial \varphi} \right\rangle = r^2 \cos^2 \theta$$

$$\Rightarrow I(F) = \begin{pmatrix} r^2 & 0 \\ 0 & r^2 \cos^2 \theta \end{pmatrix}$$

Посчитаем $\Pi(F)$:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} = (-r \cos \varphi \cos \theta, -r \cos \theta \sin \varphi, -r \sin \theta)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial \theta \partial \varphi} = (r \sin \theta \sin \varphi, -r \sin \theta \cos \varphi, 0)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial \varphi^2} = (-r \cos \theta \cos \varphi, -r \cos \theta \sin \varphi, 0)$$

Напоминание В правом ортонормированном базисе:

Если два вектора \vec{a} и \vec{b} представлены координатами

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z), \quad \vec{b} = (b_x, b_y, b_z),$$

то их векторное произведение имеет координаты

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y, a_z b_x - a_x b_z, a_x b_y - a_y b_x)$$

Для запоминания этой формулы удобно использовать мнемонический определитель:

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix},$$

где $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{j} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$

$$\frac{\partial F}{\partial \theta} \times \frac{\partial F}{\partial \varphi} = (-r^2 \cos^2 \theta \cos \varphi, -r^2 \cos^2 \theta \sin \varphi, -r^2 \sin \theta \cos \theta)$$

$$n = \frac{\frac{\partial F}{\partial \theta} \times \frac{\partial F}{\partial \varphi}}{\left| \frac{\partial F}{\partial \theta} \times \frac{\partial F}{\partial \varphi} \right|} = (-\cos \theta \cos \varphi, -\cos \theta \sin \varphi, -\sin \theta)$$

$$L = \left\langle \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}, \bar{n} \right\rangle = r$$

$$M = \left\langle \frac{\partial^2 F}{\partial \theta \partial \varphi}, \bar{n} \right\rangle = 0$$

$$N = \left\langle \frac{\partial^2 F}{\partial \varphi^2}, \bar{n} \right\rangle = r \cos^2 \theta$$

$$\Rightarrow \Pi(F) = \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & r \cos^2 \theta \end{pmatrix}$$

$$K = \frac{\det \Pi(F)}{\det I(F)} = \frac{1}{r^2} - \text{кривизна Гаусса}$$

Пример

Пусть $\gamma : t \rightarrow (t - \operatorname{th}(t), 0, \frac{1}{\operatorname{ch}(t)})$, $t > 0$

1. Найти S поверхности, полученной вращением γ вокруг OZ

2. Найти $\Pi(F)$, $I(F)$ и $K = \frac{\det(\Pi)}{\det(I)}$

Решение

Была задача $(r(t), 0, z(t)) \Rightarrow (r(t) \cos \varphi, r(t) \sin \varphi, z(t)), \varphi \in [0, 2\pi]$

$$\Rightarrow \left((t - \operatorname{th}(t)) \cos \varphi, (t - \operatorname{th}(t)) \sin \varphi, \frac{1}{\operatorname{ch}(t)} \right), \varphi \in [0, 2\pi]$$

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \left(\left(1 - \frac{1}{\operatorname{ch}^2(t)} \right) \cos \varphi, \left(1 - \frac{1}{\operatorname{ch}^2(t)} \right) \sin \varphi, \frac{\operatorname{sh}(t)}{\operatorname{ch}^2(t)} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial t} = \left(\operatorname{th}^2(t) \cos \varphi, \operatorname{th}^2(t) \sin \varphi, \frac{\operatorname{sh}(t)}{\operatorname{ch}^2(t)} \right)$$

$$\frac{\partial F}{\partial \varphi} = (-(t - \operatorname{th}(t)) \sin \varphi, (t - \operatorname{th}(t)) \cos \varphi, 0)$$

$$< \frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial t} > = \operatorname{th}^4(t) + \frac{\operatorname{sh}^2(t)}{\operatorname{ch}^4(t)} = \operatorname{th}^4 \left(1 + \frac{1}{\operatorname{sh}^2} \right) = \operatorname{th}^2(t), \quad < \frac{\partial F}{\partial t}, \frac{\partial F}{\partial \varphi} > = 0$$

$$< \frac{\partial F}{\partial \varphi}, \frac{\partial F}{\partial t} > = 0, \quad < \frac{\partial F}{\partial \varphi}, \frac{\partial F}{\partial \varphi} > = (t - \operatorname{th}(t))^2$$

$$\Rightarrow I(F) = \begin{pmatrix} \operatorname{th}^2(t) & 0 \\ 0 & (t - \operatorname{th}(t))^2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A(S) &= \iint \sqrt{\det I(F)} dt d\varphi = \iint \sqrt{(t - \operatorname{th}(t))^2 \operatorname{th}^2(t)} dt d\varphi = \\ &= \iint |(t - \operatorname{th}(t)) \operatorname{th}(t)| dt d\varphi = \iint (t - \operatorname{th}(t)) \operatorname{th}(t) dt d\varphi \end{aligned}$$

- ???

$$\frac{\partial F}{\partial t} \times \frac{\partial F}{\partial \varphi} =$$

$$\left((\operatorname{th}^2(t) \sin \varphi) (0) - \left(\frac{\operatorname{sh}(t)}{\operatorname{ch}^2(t)} \right) ((t - \operatorname{th}(t)) \cos \varphi), \right.$$

$$\left. \left(\frac{\operatorname{sh}(t)}{\operatorname{ch}^2(t)} \right) ((\operatorname{th}(t) - t) \sin \varphi) - (\operatorname{th}^2(t) \cos \varphi) (0), \right.$$

$$\left. (\operatorname{th}^2(t) \cos \varphi) ((t - \operatorname{th}(t)) \cos \varphi) - (\operatorname{th}^2(t) \sin \varphi) ((\operatorname{th}(t) - t) \sin \varphi) \right) =$$

$$= \left(- \left(\frac{\operatorname{sh}(t)}{\operatorname{ch}^2(t)} \right) (t - \operatorname{th}(t)) \cos \varphi, \right.$$

$$\left. \left(\frac{\operatorname{sh}(t)}{\operatorname{ch}^2(t)} \right) (\operatorname{th}(t) - t) \sin \varphi, (t - \operatorname{th}(t)) \operatorname{th}^2(t) \right) =$$

$$\begin{aligned}
& \left| \frac{\partial F}{\partial t} \times \frac{\partial F}{\partial \varphi} \right| = \sqrt{\left(\frac{\text{sh}(t)}{\text{ch}^2(t)} \right) ((t - \text{th}(t)))^2 + ((t - \text{th}(t)) \text{th}^2(t))^2} = \\
& = |t - \text{th}(t)| \text{th}^2(t) \sqrt{\frac{1}{\text{sh}^2(t)} + 1} = |(t - \text{th}(t)) \text{th}(t)| \text{th}^2(t) = \text{th}^3(t)(t - \text{th}(t)) \\
& n = \frac{\frac{\partial F}{\partial \theta} \times \frac{\partial F}{\partial \varphi}}{\left| \frac{\partial F}{\partial \theta} \times \frac{\partial F}{\partial \varphi} \right|} = \left(- \left(\frac{1}{\text{ch}(t)} \right) \frac{1}{\text{th}^2(t)} \cos \varphi, - \left(\frac{1}{\text{ch}(t)} \right) \frac{1}{\text{th}^2(t)} \sin \varphi, \frac{1}{\text{th}(t)} \right) \\
& \frac{\partial F}{\partial t} = \left(\text{th}^2(t) \cos \varphi, \text{th}^2(t) \sin \varphi, \frac{\text{sh}(t)}{\text{ch}^2(t)} \right) \\
& \Rightarrow \frac{\partial^2 F}{\partial t^2} = \left(2 \frac{1}{\text{ch}^2(t)} \text{th}(t) \cos \varphi, 2 \frac{1}{\text{ch}^2(t)} \text{th}(t) \sin \varphi, \frac{\text{ch}^3(t) - 2 \text{sh}^2(t) \text{ch}(t)}{\text{ch}^4(t)} \right) \\
& \Rightarrow L = \langle \frac{\partial^2 F}{\partial t^2}, \bar{n} \rangle = ? \\
& \Rightarrow \frac{\partial^2 F}{\partial t \partial \varphi} = (?, ?, ?) \\
& \Rightarrow M = \langle \frac{\partial^2 F}{\partial t \partial \varphi}, \bar{n} \rangle = ? \\
& \frac{\partial F}{\partial \varphi} = (-(t - \text{th}(t)) \sin \varphi, (t - \text{th}(t)) \cos \varphi, 0) \\
& \Rightarrow \frac{\partial^2 F}{\partial \varphi^2} = (?, ?, ?) \\
& \Rightarrow N = \langle \frac{\partial^2 F}{\partial \varphi^2}, \bar{n} \rangle = ? \\
& \Rightarrow \Pi(F) = \begin{pmatrix} ? & ? \\ ? & ? \end{pmatrix} \\
& K = \frac{\det \Pi(F)}{\det I(F)} = ? - \text{кривизна Гаусса}
\end{aligned}$$

0.7 (08.10.2019) Практика совместно с 242

Пример (стереографическая проекция)

$$f : S^2 - \{(0, 0, 1)\} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad (x, y, z) \mapsto \left(\frac{x}{1-z}, \frac{y}{1-z} \right)$$


$$\text{где } S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

1. Найдите $f^{-1} = g : \mathbb{R}^2 \rightarrow S^2 - \{N\}$ (полюс)
2. Доказать, что g сохраняет углы
3. Найдите $I(F)$ (п.ф.ф.) g

здесь должен быть рисунок, но его нет, как и смысла

Решение

«««< HEAD



=====

»»»> 83670251f6bc46fc8cdf944582027862cf7cb0c2

1. Надо найти g : $f \circ g = \text{id}$ и $g \circ f = \text{id}$

$$a = \frac{x}{1-z}, \quad b = \frac{y}{1-z}, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

Найдем из уравнений x, y, z :

$$z = \frac{a^2 + b^2 - 1}{a^2 + b^2 + 1}, \quad x = \frac{2a}{a^2 + b^2 + 1}, \quad y = \frac{2b}{a^2 + b^2 + 1}$$

2. Вспомним, что

$$\cos(\alpha) = \frac{\langle \dot{\gamma}, \dot{\beta} \rangle}{|\dot{\gamma}| |\dot{\beta}|}, \quad \cos(\theta) = \frac{\langle \tilde{\gamma}, \tilde{\beta} \rangle}{|\tilde{\gamma}| |\tilde{\beta}|}$$

$$\tilde{\gamma} = g \circ \gamma \quad \tilde{\beta} = g \circ \beta$$

$$\tilde{\gamma} = \left(\frac{2\gamma_1}{\gamma_1^2 + \gamma_2^2 + 1}, \frac{2\gamma_2}{\gamma_1^2 + \gamma_2^2 + 1}, \frac{\gamma_1^2 + \gamma_2^2 - 1}{\gamma_1^2 + \gamma_2^2 + 1} \right)$$

Аналогично другие. Можно было бы посчитать всё и подставить

$$\frac{d}{dt}\tilde{\gamma} = \frac{\partial g}{\partial a}\dot{\gamma}_1 + \frac{\partial g}{\partial b}\dot{\gamma}_2$$

Обозначим $\star = a^2 + b^2 + 1$

$$\frac{\partial g}{\partial a} = \left(\frac{2\star - 4a^2}{\star^2}, \frac{2\star - 4b^2}{\star^2}, \frac{4b}{\star^2} \right)$$

$$I(F) = \begin{pmatrix} \left\langle \frac{\partial g}{\partial a}, \frac{\partial g}{\partial a} \right\rangle^{\rho} & \left\langle \frac{\partial g}{\partial b}, \frac{\partial g}{\partial a} \right\rangle^{=0} \\ \left\langle \frac{\partial g}{\partial a}, \frac{\partial g}{\partial b} \right\rangle^{=0} & \left\langle \frac{\partial g}{\partial b}, \frac{\partial g}{\partial b} \right\rangle^{\rho} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho & 0 \\ 0 & \rho \end{pmatrix}$$

То есть на самом деле:

$$\cos(\theta) = \frac{\langle \dot{\tilde{\gamma}}, \dot{\tilde{\beta}} \rangle}{|\dot{\tilde{\gamma}}||\dot{\tilde{\beta}}|} = \frac{\langle \dot{\gamma}, I\dot{\beta} \rangle}{\sqrt{\langle \dot{\gamma}, I\dot{\gamma} \rangle} \sqrt{\langle \dot{\beta}, I\dot{\beta} \rangle}}$$

$$\begin{aligned} \tilde{\gamma} &= \left\langle \frac{\partial g}{\partial a}\dot{\gamma}_1 + \frac{\partial g}{\partial b}\dot{\gamma}_2, \frac{\partial g}{\partial a}\dot{\gamma}_1 + \frac{\partial g}{\partial b}\dot{\gamma}_2 \right\rangle \\ \langle \tilde{\gamma}, \tilde{\gamma} \rangle &= \left\langle \frac{\partial g}{\partial a}, \frac{\partial g}{\partial a} \right\rangle \dot{\gamma}_1^2 + 2 \left\langle \frac{\partial g}{\partial a}, \frac{\partial g}{\partial b} \right\rangle \dot{\gamma}_1 \dot{\gamma}_2 + \left\langle \frac{\partial g}{\partial b}, \frac{\partial g}{\partial b} \right\rangle \dot{\gamma}_2^2 \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} \dot{\gamma}_1 \\ \dot{\gamma}_2 \end{pmatrix}, I \begin{pmatrix} \dot{\gamma}_1 \\ \dot{\gamma}_2 \end{pmatrix} \right\rangle \\ \frac{\rho \langle \dot{\gamma}, \dot{\beta} \rangle}{\sqrt{\rho}|\dot{\gamma}|\sqrt{\rho}|\dot{\beta}|} &= \frac{\rho \langle \dot{\gamma}, \dot{\beta} \rangle}{\rho|\dot{\gamma}||\dot{\beta}|} = \frac{\langle \dot{\gamma}, \dot{\beta} \rangle}{|\dot{\gamma}||\dot{\beta}|} = \cos \alpha \end{aligned}$$

3. см. выше

0.8 (15.10.2019) Практика совместно с 242 х2

Пример

$$f : \mathbb{R}_+^* \times (0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$u, v \mapsto \left(\frac{\cos v}{\operatorname{ch} u}, \frac{\sin v}{\operatorname{ch} u}, u - \operatorname{th} u \right)$$

1. Найдите $I(F)$
2. Найдите $\Pi(F)$
3. Найдите кривизну Гаусса
4. Найдите площадь поверхности

Решение

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \left(-\frac{\cos v \operatorname{sh} u}{\operatorname{ch}^2 u}, -\frac{\sin v \operatorname{sh} u}{\operatorname{ch}^2 u}, \overbrace{1 - \frac{1}{\operatorname{ch}^2 u}}^{\operatorname{th}^2 u} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial v} = \left(-\frac{\sin v}{\operatorname{ch} u}, \frac{\cos v}{\operatorname{ch} u}, 0 \right)$$

$$\left\langle \frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial u} \right\rangle = \operatorname{th}^2$$

$$\left\langle \frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial v} \right\rangle = 0$$

$$\left\langle \frac{\partial f}{\partial v}, \frac{\partial f}{\partial v} \right\rangle = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 u}$$

$$\Rightarrow I(F) = \begin{pmatrix} \operatorname{th}^2 u & 0 \\ 0 & \frac{1}{\operatorname{ch}^2 u} \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial F}{\partial v} \times \frac{\partial F}{\partial u} = \left(-\cos v \frac{\operatorname{th}^2 u}{\operatorname{ch} u}, \sin v \frac{\operatorname{th}^2 u}{\operatorname{ch} u}, -\frac{\operatorname{sh} u}{\operatorname{ch}^3 u} \right)$$

$$\left| \frac{\partial F}{\partial v} \times \frac{\partial F}{\partial u} \right| = \frac{\operatorname{th} u}{\operatorname{ch} u}$$

$$n = \frac{\frac{\partial F}{\partial v} \times \frac{\partial F}{\partial u}}{\left| \frac{\partial F}{\partial v} \times \frac{\partial F}{\partial u} \right|} = \left(-\operatorname{th} u \cos v, -\operatorname{th} u \sin v, -\frac{1}{\operatorname{ch} u} \right)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial v^2} = \left(-\frac{\cos v}{\operatorname{ch} u}, -\frac{\sin v}{\operatorname{ch} u}, 0 \right)$$

$$L = \left\langle \frac{\partial^2 F}{\partial v^2}, \bar{n} \right\rangle = -\frac{\operatorname{sh} u}{\operatorname{ch}^2 u}$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial v \partial u} = \left(, , 0 \right)$$

$$\begin{aligned}
M &= \left\langle \frac{\partial^2 F}{\partial v \partial u}, \bar{n} \right\rangle = 0 \\
\frac{\partial^2 F}{\partial u^2} &= \left(-\cos v \frac{1 - \operatorname{sh}^2 u}{\operatorname{ch}^3 u}, -\sin v \right) \\
N &= \left\langle \frac{\partial^2 F}{\partial u^2}, \bar{n} \right\rangle = \frac{\operatorname{sh} u}{\operatorname{ch}^2 u} \\
\Rightarrow \Pi(F) &= \begin{pmatrix} -\frac{\operatorname{sh} u}{\operatorname{ch}^2 u} u & 0 \\ 0 & \frac{\operatorname{sh} u}{\operatorname{ch}^2 u} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$A(S) = 2 \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \frac{\operatorname{sh} u}{\operatorname{ch}^2 u} du dv = 2 \cdot 2\pi \int_0^\infty \frac{\operatorname{sh} u}{\operatorname{ch}^2 u} du = 4\pi$$

Пример

$$\begin{aligned}
F: \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\
(u, v) &\mapsto (F_1(u, v), F_2(u, v), F_3(u, v))
\end{aligned}$$

При каких условиях на $I(F)$ F "сохраняет расстояние" (доказать)

Решение

$$l(\gamma) \stackrel{?}{=} l(F \circ \gamma) = \int_0^1 \|(F \circ \gamma)\| dt$$

$$\Rightarrow \int_0^1 \langle \dot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle^{\frac{1}{2}} dt \stackrel{\forall \gamma}{=} \int_0^1 \langle \dot{\gamma}, I(F) \dot{\gamma} \rangle dt$$

$$\text{т.к. } \langle \dot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle = \langle \dot{\gamma}, I(F) \dot{\gamma} \rangle \quad \forall \gamma$$

$$I(F) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \text{ортогональная}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c = b \\ a^2 + c^2 = 1 \\ b^2 + d^2 = 1 \\ ab + cd = 0 \\ ad - cb = \pm 1 \end{cases}$$

$$\text{т.к. } a, d > 0 \Rightarrow I(F) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Пример

Сделаем цилиндр из плоскости с сохранением расстояния

$$u, v \xrightarrow{F} (\cos v, \sin v, u)$$

$$I(F) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$