
2019-10-25

Задача (1)

Изоморфны ли $C_8 \times C_3$ и $C_4 \times C_6$?

В $C_8 \times C_3$ есть эл-ты порядка 24

В $C_4 \times C_6$ макс порядок 12

$f: G \rightarrow H$ изоморфизм

$g \rightarrow h$ и у g и h разные порядки?

$$(f(g))^{12} = f(g^{12}) = e$$

h - порядка 24 $h \in C_8 \times C_3$

$$f: C_4 \times C_6 \rightarrow C_8 \times C_3$$

$$g \rightarrow h$$

$$g = f^{-1}(h)$$

$$f(g^{12}) = e = (f(g))^{12}$$

$$f: G \rightarrow H$$

$$g \rightarrow h \quad \square \text{ порядок } g = n \quad \text{порядок } h = m$$

$$h^n = (f(g))^n = f(g^n) = f(e_1) = e_2 \quad m : n \quad m \geq n$$

$$e_2 = h^m = (f(g))^m = f(g^m) \Rightarrow e_1 = g^m \Rightarrow n : m \quad n \geq m \Rightarrow n = m$$

Задача (2)

Для каких G следующие отображения $f: G \rightarrow G$
гомоморфизмы

$$1. f(x) = x^2$$

$$2. f(x) = x^{-1}$$

Если взять $(Z, +)$

$$f(x) = 2x$$

$$f(x + y) = 2(x + y)$$

Нужно проверить, выполняется ли такое соотношение:

$$f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y)$$

$$f(x \cdot y) = x \cdot y \cdot x \cdot y = x \cdot x \cdot y \cdot y$$

Для этого нужна комм. группа

$$f(x \cdot y) = (x \cdot y)^2 = (x \cdot y)(x \cdot y)$$

$$f(x) \cdot f(y) = x^2 \cdot y^2 = x \cdot x \cdot y \cdot y$$

$$x \cdot (y \cdot x) = x \cdot (x \cdot y) \Leftrightarrow x \cdot y \cdot x = x \cdot x \cdot y \Leftrightarrow y \cdot x = x \cdot y$$

Ответ для 1. Необходима комм. группа

$$f(x) = x^{-1}$$

$$f(x \cdot y) = f(x)f(y) = x^{-1} \cdot y^{-1}$$

$$f(x \cdot y) = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$$

$$(xy)(y^{-1}x^{-1}) = e$$

$$y^{-1}x^{-1} = x^{-1}y^{-1} \quad \Bigg| \cdot x$$

$$xy^{-1}x^{-1} = y^{-1} \quad \Bigg| \cdot y$$

$$yxy^{-1}x^{-1} = e$$

$$yx = xy$$

Задача (3)

Найти нормальные подгруппы S_3

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

3 подгруппы, (1 элемент остается на месте)

Рассмотрим циклы длины 3

Если возвести цикл в квадрат, то мы получим обратную перестановку

2 подгруппы (2 цикла)

1 группа из id

$$\{e, (1\ 2)\}$$

$$\{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} - \text{нормальная?}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

порядок $(1\ 2\ 3) = 3$

В S_3 3 элемента

$g(1\ 2\ 3)g^{-1} =$ цикл длины 3

$\{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}$ - действительно нормальная

Проверим $\{e, (1\ 2)\}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Элемент не остался на месте

$\{e, (1\ 2)\}$ не нормальная

$$S_{3/H} \simeq C_2$$

УТВ

Если есть цикл длины n , то порядок $= n$

Напоминание

$$Q_8 \quad \pm 1 \quad \pm i \quad \pm j \quad \pm k$$

-1 коммутирует со всеми

$$i \cdot j = k$$

$$j \cdot i = -k$$

$$j \cdot k = i$$

$$i \cdot k = -j$$

$$i^2 = -1$$

	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	-j
j	j	-k	-1	i
k	k	j	-i	-1

Задача (4)

(!) Q_8 изоморфна группе матриц по умножению

$$E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \pm I = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$J = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \quad \pm K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\pm 1 \rightarrow \pm E$$

$$\pm i \rightarrow \pm I$$

$$\pm j \rightarrow \pm J$$

$$\pm k \rightarrow \pm K$$

$$K^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E$$

Надо все проверить

Упр

Досчитать 4 дома

Задача (5)

Найти все гомоморфизмы $Z_6 \rightarrow Z_{18}$

$$(\mathbb{Z}/_6\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Z}/_{18}\mathbb{Z}, +)$$

$$(\mathbb{Z}/_6\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}/_{18}\mathbb{Z}, +)$$

Вариант от Сережи

Слева порядок, а справа элемент из $\mathbb{Z}/_6\mathbb{Z}$

$$1 \quad 0 \rightarrow 0$$

$$6 \quad 1 \rightarrow 3$$

$$3 \quad 2 \rightarrow 6$$

$$2 \quad 3 \rightarrow 9$$

$$3 \quad 4 \rightarrow 12$$

$$6 \quad 5 \rightarrow 15$$

$$f(x) = 3kx, \quad k \in N$$

$$f(x) = 3x$$

$$f(x) = 3kx \pmod{18}$$

$$f(x+y) = 3k(x+y) = 3kx + 3ky = f(x) + f(y)$$

Почему нельзя взять любое k ?

$$0 = f(0) = f(1_1^6) = f(1_1)^6 = 6(1_2) \neq 0$$

$$f(1_1) \rightarrow$$

$$f(2_1) = f(1_1 + 1_1) = f(1_1) + f(1_1)$$

$$f(k_1) = kf(1_1)$$

1_1 - имеет порядок 6, значит она не может отобразиться в элементы с порядком не делителем 6, а иначе противоречие

$$f(1_1) \rightarrow 9_2$$

$$f(1_1) \rightarrow 12_2$$