

1. Метрические пространства. Примеры.

Опр

X - мн-во ($X \neq \emptyset$)

$\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ (метрика)

Пара (X, ρ) назыв. метр. пр-вом, если:

1. $\rho(x, y) \geq 0$ и $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$

2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$

3. нер-во \triangle

$$\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$$

Примеры

1. $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ со станд. ρ

2. На \mathbb{R}^2

$$\rho_1((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

$$\rho_\infty = \max \{|x_1 - x_2|, |y_1 - y_2|\}$$

$$\rho_p = (|x_1 - x_2|^p + |y_1 - y_2|^p)^{\frac{1}{p}} \quad \rho_2 - \text{Евклидова метрика}$$

3. X - мн-во

$$\rho(a, b) = \begin{cases} 0, & a = b \\ 1, & a \neq b \end{cases} - \text{Дискретная метрика}$$

2. Открытые и замкнутые множества. Свойства

Опр

$$B(x_0, \epsilon) = \{x \in X \mid \rho(x, x_0) < \epsilon\}$$

Открытый шар с центром в x_0 и радиусом ϵ

ϵ - откр. в x_0

Опр

$$U \subset X \quad U - \text{откр.}, \text{ если}$$

$$\forall x \in U \quad \exists \epsilon : B(x, \epsilon) \subset U$$

Опр

$$Z \subset X \quad Z - \text{замкн.}, \text{ если } X \setminus Z - \text{откр. мн-во}$$

Теор (св-ва откp. мн-в)

1. $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ - семейство откp. мн-в

$$\Rightarrow \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha - \text{откр.}$$

2. $U_1 \dots U_n$ - откp. (конеч. число)

$$\Rightarrow \bigcap_{i=1}^n U_i - \text{откр.}$$

3. \emptyset, X - откp.

Док-во

1.

$$\forall x \in \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \Rightarrow \exists \alpha_0 : x \in U_{\alpha_0}$$

$$U_{\alpha_0} - \text{откр.} \Rightarrow \exists \epsilon : B(x, \epsilon) \subset U_{\alpha_0}$$

$$B(x, \epsilon) \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \Rightarrow \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha - \text{откр.}$$

2.

$$\forall x \in \bigcap_{i=1}^n U_i \Rightarrow \forall i \ x \in U_i$$

$$\exists \mathcal{E}_i : B(x, \mathcal{E}_i) \subset U_i$$

$$\mathcal{E} = \min_{i=1, \dots, n} \{\mathcal{E}_i\} \quad B(x, \mathcal{E}) \subset B(x, \mathcal{E}_i) \subset U_i$$

$$B(x, \mathcal{E}) \subset \bigcap_{i=1}^n U_i \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n U_i - \text{откр}$$

Лемма

$B(x_0, r)$ – *откр.*

\forall метр. пр-ва $X \quad \forall x_0 \ \forall r > 0$

Док-во

$x \in B(x_0, r)$

$\rho(x_0, x) = d < r$

$\mathcal{E} = \frac{r-d}{2}$

$B(x, \mathcal{E}) \subset B(x_0, r)$?

$\square \exists x_1 \in B(x, \mathcal{E}) \setminus B(x_0, r)$

$\rho(x_1, x) < \mathcal{E} = r - d$

$\rho(x_0, x) = d$


$\rho(x_1, x_0) \geq r$

$\rho(x_1, x_0) \geq \rho(x_1, x) + \rho(x, x_0)$


$\rho(x_1, x_0) \geq r \quad \text{и} \quad \rho(x_1, x) + \rho(x, x_0) < r$

противореч. нер-ву \triangle

1)



2)



Теор (св-ва замк. мн-в)

1. $\{F_i\}_{i \in A}$ – *замкн.*

$$\Rightarrow \bigcap_{i \in A} F_i - \text{замк.}$$

2. F_1, \dots, F_n — замк.

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^n F_i \text{ — замк.}$$

3. \emptyset и X замк.

$$F_i = X \setminus U_i, \quad U_i \text{ — откр.}$$

$$\bigcap F_i = \bigcap (X \setminus U_i) = X \setminus \bigcup U_i$$

3. Внутренность и внешность множества.

Опр

X - м. пространство $A \subset X \quad x_0 \in X$

x_0 - назыв. внутр. относительно A (в X), если $\exists \mathcal{E} > 0 :$
 $B(x_0, \mathcal{E}) \subset A$

Опр

x_0 - назыв. внешней, если x_0 - внутр. для $\bar{A} = X \setminus A$
 $\exists \mathcal{E} > 0 : B(x_0, \mathcal{E}) \cap A = \emptyset$

Опр

Остальные точки - граничные

x_0 - гранич., если $\forall \mathcal{E} > 0 B(x_0, \mathcal{E}) \cap A \neq \emptyset$ и
 $B(x_0, \mathcal{E}) \not\subset A$

$Int A$ - внутренность A - мн-во внутр. т.

$Ex A$ - внешность A - мн-во внешних т.

$\partial A = Fr A$ - граница A - мн-во гр.т.

Теор

След. описания Int эквив.

1. $Int A$ - мн-во внутр. т.
2. Наибольшее (по включению) откр. мн-во, содерж. в A
3. max (по включению) откр. мн-во, содерж. в A
4. $Int A = \bigcup U_i, \quad U_i - \text{откр.} \quad U_i \subset A$
5. $Int A = (X \setminus Ex A) \setminus \partial A$

Док-во

$(2) \Leftrightarrow (4) \Leftrightarrow (3)$ т.к. объедин. откр. - откр.

$(1) \Leftrightarrow (4) :$

\Rightarrow

$x_0 \in \text{мн-во внутр. т.} \subset \bigcup U_i, \quad U_i - \text{откр.} \quad U_i \subset A$

$\exists \mathcal{E} > 0 : B(x_0, \mathcal{E}) - \text{откр.} \subset A$ (по определению $Int A$)

\Leftarrow

$\exists i : x_0 \in U_i \subset A \quad x_0 \in \bigcup U_i$

$\exists \mathcal{E} : B(x_0, \mathcal{E}) \subset U_i \subset A \Rightarrow x_0 - \text{внутр. т.} A$

Теор (равносильные определения внешности)

1. $Ex A$ - мн-во внеш. т.

$$2. \text{ } Ex A = Int (X \setminus A)$$

3. $Ex A$ - *max* (по вкл.) *откр. мн-во*, не пересекается с A

$$4. \text{ } Ex A = \bigcup U_i, \quad U_i - \text{откр.} \quad U_i \cap A = \emptyset$$

Относительно внутр.

$A \subset X \Rightarrow (A, \rho)$ — метр. пр-во

$$B \subset A \quad Int_A B \neq Int_X B$$

Пример

$X = \mathbb{R}, \quad \rho - \text{станд.}$

$$A = [0, 1] \quad B = [0, \tfrac{1}{2})$$

$$Int_X B = (0, \tfrac{1}{2}) \quad Int_A B = [0, \tfrac{1}{2})$$

4. Замыкание множества.

Опр

Замыкание A $ClA = \{x \in X \mid \forall \mathcal{E} > 0 \quad B(x, \mathcal{E}) \cap A \neq \emptyset\}$

Теор

1. $ClA = \{x \in X \mid \forall \mathcal{E} > 0 \quad B(x, \mathcal{E}) \cap A \neq \emptyset\}$
2. $ClA = IntA \cup \partial A$
3. $ClA = \cap F_i, \quad F_i - \text{замк} \quad F_i \supset A$
4. $ClA = \min(\text{по вкл.}) \text{ замк. } \supset A$

Док-во

(3) \Leftrightarrow (4) - пересеч. замк. - замк.

(1) \Leftrightarrow (2) - очев.

(1) \Rightarrow (3) :

$$\forall \mathcal{E} > 0 \quad x : B(x, \mathcal{E}) \cap A \neq \emptyset$$

$$\sqsupset x \notin F - \text{замк.} \quad F \supset A \quad x \in X \setminus F - \text{откр.}$$

$$\exists \mathcal{E} > 0 : B(x, \mathcal{E}) \subset X \setminus F \subset X \setminus A$$

$$\Rightarrow x - \text{внеш.} \quad \text{противореч.}$$

(3) \Leftarrow (1) :

$$x \in \cap F_i$$

$$\sqsupset \exists \mathcal{E} > 0 : B(x, \mathcal{E}) \cap A = \emptyset$$

$$B(x, \mathcal{E}) - \text{откр. (по л.)} \quad \text{замк} - F = X \setminus B(x, \mathcal{E}) \quad F \supset A$$

$$x \notin F - \text{противореч.}$$

Замеч

1. $A - \text{откр.} \Leftrightarrow A = IntA$
2. $A - \text{замк.} \Leftrightarrow A = ClA$
3. $IntA \subset A \subset ClA$
 $\partial A = ClA \setminus IntA$


Пример

$$X = \mathbb{R}; \quad A = \emptyset$$

$$IntA = \emptyset \quad ExA = \emptyset \quad \partial A = \mathbb{R}$$

Пример

Кантор. мн-во - замк.



5. Топологические пространства. Примеры.

Опр

X - *мн-во*

$\Omega \subset 2^X = \{A \subset X\}$ - *мн-во подмн. X*

(X, Ω) - *назыв. тополог. пр-вом, если*

1.

$$\forall \{U_i\}_{i \in I} \in \Omega \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \Omega$$

2. $U_1, U_2, \dots, U_n \Rightarrow U_1 \cap U_2 \cap \dots \cap U_n \in \Omega$

3. $\emptyset; X \in \Omega$

Ω - *тополог. на X*

$U \in \Omega$ - *назыв. открытым мн-вом*

Опр

(X, Ω) - *топ. пр-во; $F \subset X$*

F - *назыв. замк., если $X \setminus F \in \Omega$*

Теор

1.

$$\bigcap_{i \in I} F_i - \text{замк, если } F_i - \text{замк}$$

2. $F_1 \cup F_2$ - *замк (F_1, F_2 - замк.)*

3. \emptyset, X - *замк.*

Примеры

1. (X, ρ) - *топ. пр-во*

2. *дискр. пр-во: $\Omega = 2^X$*

3. *антидискр. пр-во: $\Omega = \{\emptyset, X\}$*

Опр

(X, Ω) - *метризуемо, если \exists метрика $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_X$*

$\Omega =$ *мн-во откр. подмн. в ρ*

Антидискр. - не метризуемо, если $|X| > 1$

4. *Стрелка*

$$X = \mathbb{R} \text{ или } \mathbb{R}_+ = \{x \geq 0\}$$

$$\Omega = \{(a, +\infty)\} \cup \{\emptyset\} \cup \{X\}$$

5. *Связное двосточие*

$$X = \{a, b\}$$

$$\Omega = \{\emptyset, X, \{a\}\}$$

6. *Топология конечных дополнений (Зариского)*

X - беск. мн-во

Замкнутые конечные мн-ва и X

$$\Omega = \{A \mid X \setminus A \text{ конечно}\}$$

6. База топологии. Критерий базы.

Опр

X - топ. пр-во; $A \subset X$
 $Int A = \cup U, \quad U \in \Omega \quad U \subset A$
 $Cl A = \cap F, \quad F - \text{ замк. } F \supset A$
 $\partial A = Cl A \setminus Int A$

Опр

$x_0 \in X$
окр. x_0 назыв. $\forall U \in \Omega : x_0 \in U$

Опр

x_0 назыв. внутр. т. A , если $\exists U_{x_0} \subset A$
 x_0 назыв. внеш. т. A , если $\exists U_{x_0} \cap A = \emptyset$
 x_0 назыв. граничной, если $\forall U_{x_0} \quad (U_{x_0} \not\subset A) \text{ и } (U_{x_0} \cap A \neq \emptyset)$

Опр

(X, Ω) - топ. пр-во
 $\mathcal{B} \subset \Omega \quad \mathcal{B}$ назыв. базой топологии, если

$$\forall U \in \Omega \quad \exists \{V_i\} \in \mathcal{B} : \quad U = \bigcup_{i \in I} V_i$$

Пример

$X = \mathbb{R}^n$ или другое метр. пр-во
 $\mathcal{B} = \{B(x_0, \mathcal{E}) \mid x_0 \in X, \mathcal{E} > 0\}$ - база топологии
 $\forall U$ - откp. $\forall x_0 \in U \quad \exists \mathcal{E} : B(x_0, \mathcal{E}) \subset U$

$$\bigcup_{x_0 \in U} B(x_0, \mathcal{E}) = U$$

Теор (Критерий базы)

X - мн-во \mathcal{B} - нек. совокупность подмн-в X
 \mathcal{B} - база $\Omega \Leftrightarrow$

1.

$$\bigcup_{U_i \in \mathcal{B}} U_i = X$$

2. $\forall U, V \in \mathcal{B} \quad \forall x \in U \cap V \quad \exists W \in \mathcal{B} : x \in W; W \subset U \cap V$

Док-во

\Rightarrow очев

$$\Leftarrow \Omega = \left\{ \bigcup_{i \in I} U_i \mid U_i \in \mathcal{B} \right\}$$

1.

$$\bigcup_{j \in J} \left(\bigcup_{i \in I_j} U_i \right) = \bigcup_{i,j} U_i$$

2.

$$\left(\bigcup_j U_j \right) \cap \left(\bigcup_i U_i \right) = \bigcup_{i,j} (U_i \cap U_j) = \bigcup_{i,j} \left(\bigcup_{x \in U_i \cap U_j} W_x \right)$$

$$x \in W_x \subset U_i \cap U_j$$

$$\bigcup_{x \in U_i \cap U_j} W_x = U_i \cap U_j \quad W_x \in \mathcal{B}$$

3.

$$\emptyset = \bigcup_{i \in \emptyset} U_i \quad X = \bigcup_{U_i \in \mathcal{B}} U_i$$

Теор (База окр. точки)

X - мн-во $\forall x \in X \quad \exists \mathcal{B}_x \subset 2^x$

$$1. x \in U \quad \forall U \in \mathcal{B}_x$$

$$2. U, V \in \mathcal{B}_x \Rightarrow \exists W \in \mathcal{B}_x : W \subset U \cap V$$

$$3. y \in U \quad (U \in \mathcal{B}_x) \Rightarrow \exists V \in \mathcal{B}_y : V \subset U$$

0.

$$\mathcal{B}_x \neq \emptyset \Rightarrow \bigcup_{x \in X} \mathcal{B}_x - \text{база нек. топологии}$$

7. Топология произведения пространств.

Пример (- конструкция)

X, Y - топ. пр-ва

$(X, \Omega_X); \quad (Y, \Omega_Y)$

Введем базу топ. на $X \times Y$

$$\mathcal{B} = \{U \times V \mid U \in \Omega_X; \quad V \in \Omega_Y\}$$

$$\Omega_{X \times Y} = \left\{ \bigcup_{i \in I} U_i \times V_i \mid U_i \in \Omega_X; \quad V_i \in \Omega_Y \right\}$$

$$\left(\bigcup_{i \in I} U_i \times V_i \right) \cap \left(\bigcup_{j \in J} S_j \times T_j \right) = \bigcup_{i \in I, j \in J} ((U_i \cap S_j) \times (V_i \cap T_j))$$

$$(U_i \cap S_j) \in \Omega_X \quad (V_i \cap T_j) \in \Omega_Y$$

8. Равносильные определения непрерывности.

Опр

$(X, \rho); (Y, d)$ - метр. пр-ва $f : X \rightarrow Y$

f - назыв. непр. в т. x_0 , если

$\forall \mathcal{E} > 0 \quad \exists \delta > 0 :$

Если $\rho(x, x_0) < \delta \Rightarrow d(f(x), f(x_0)) < \mathcal{E}$

f - непр, если она непр. в каждой точке

Теор

f - непр в $x_0 \Leftrightarrow \forall U - \text{откр.} \subset Y : U \ni f(x_0)$

$\exists V - \text{откр.} \subset X \quad x_0 \in V \text{ и } f(V) \subset U$

Док-во

f - непр. в $x_0 \Leftrightarrow \forall \mathcal{E} > 0 \quad \exists \delta > 0$

$f(B(x_0, \delta)) \subset B(f(x_0), \mathcal{E})$

$\Rightarrow \forall U - \text{откр.} \subset Y : f(x_0) \in U \Rightarrow \exists \mathcal{E} > 0 :$

$f(x_0) \in B(f(x_0), \mathcal{E}) \subset U \Rightarrow \exists \delta > 0$

$f(B(x_0, \delta)) \subset B(f(x_0), \mathcal{E}) \subset U \quad B(x_0, \delta) = V$

$\Leftarrow \forall$ обрывается

9. Прообраз топологии. Индуцированная топология.

Опр

$f : X \Rightarrow Y$ - отображ. мн-в

(Y, Ω_Y) - топ. пр-во

Ω_X - самая слабая топ.

f - непр.

$\forall U \in \Omega_Y \quad f^{-1}(U)$ должен быть открытым в X

Теор

$\{f^{-1}(U)\}$ - топология на X и она назыв. прообразом Ω_Y

Док-во

1.

$$f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} U_i\right) = \bigcup_{i \in I} f^{-1}(U_i) \quad (*)$$

2. $f^{-1}(U_1 \cap U_2) = f^{-1}(U_1) \cap f^{-1}(U_2)$

3. $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset \quad f^{-1}(Y) = X$

$$(*) : \quad f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} U_i\right) = \{x \mid f(x) \in \bigcup_{i \in I} U_i\} = \{x \mid \exists i \in I : f(x) \in U_i\}$$

Опр

(X, Ω_X) - топ. пр-во

$A \subset X$

$\Omega_A = \{U \cap A \mid U \in \Omega_X\}$ - индуцированная топология на A

10. Инициальная топология. Топология произведения как инициальная.

Опр

$$\forall i \in I \quad f_i : X \rightarrow Y_i$$

(Y_i, Ω_i) - топ. пр-во

$\{f_{i1}^{-1}(U_1) \cap f_{i2}^{-1}(U_2) \cap \dots \cap f_{ik}^{-1}(U_k) \mid U_j \in \Omega_{ij}; \quad j = 1, \dots, k; \quad k \in \mathbb{N}\}$ - база нек. топологии

Ω_X - соотв. топология (инициальная топология)

Опр

$\{f_i^{-1}(U)\}$ - предбаза топологии

Теор

Топология произведения совпадает с инициальной

Опр

$$\prod_{i \in I} x_i = \{f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} x_i \mid f(i) \in x_i\}$$

$$p_k : \prod_{i \in I} x_i \rightarrow X_k \quad k \in I$$

$$p_k(f) = f(k) \Rightarrow \text{если } x_i - \text{мон.} \Rightarrow \prod_{i \in I} x_i - \text{мон.}$$

11. Финальная топология. Фактортопология. Приклеивание.

Опр

$\forall i \in I \quad f_i : X_i \rightarrow Y$ - отображ.

(X_i, Ω_i)

Хотим завести на Y топологию:

$\forall f_i$ - непрер. Топ на Y самая сильная

$U \subset Y \quad \forall i \in I \quad f_i^{-1}(U) \in \Omega_i$

$\Omega_Y = \{U \mid \forall i \quad f_i^{-1}(U) \in \Omega_i\}$

$\emptyset, Y \in \Omega_Y$

$f_i^{-1}(U_1 \cap U_2) = f_i^{-1}(U_1) \cap f_i^{-1}(U_2)$

$$f_i^{-1}\left(\bigcup_{k \in K} U_k\right) = \bigcup_{k \in K} f_i^{-1}(U_k)$$

Пример

Приклеивание

X, Y - пр-ва

$A \subset X \quad f : A \rightarrow Y$ - отображ.

Хотим получить $X \cup_f Y$ - приклеивание

$X \cup_f Y = X \cup Y / \sim \quad \forall a \quad a \sim f(a)$

Y - Топ



X - Топ $\longrightarrow X \cup_f Y$

U - откp. в $X \cup_f Y$, если $U \cap X$ - откp. в X и

$U \cap Y$ - откp. в Y (если f - инъект.)

12. Гомеоморфизм.

Опр

$f : X \rightarrow Y$ - гомеоморфизм, если

1. f - непр.
2. f - биекция
3. f^{-1} - непр.

Предп

\simeq - отношение эквив.

Теор

Если $(X, \Omega_X) \simeq (Y, \Omega_Y)$, то

$f_* : \Omega_X \rightarrow \Omega_Y$ - биекция

$f_*(U) = f(U)$

13. Связность топологического пространства и множества.

14. Связность отрезка.

15. Связность замыкания. Связность объединения.

Теор

(X, Ω) - топ. пр-во

$A \subseteq X$ - связно

$A \subseteq B \subseteq ClA$

$\Rightarrow B$ - связно

Теор

Если A - связ., то ClA - связ.

Теор

(X, Ω) - топ. пр-во

$A, B \subseteq X$ - связны

$A \cap B \neq \emptyset$

$\Rightarrow A \cup B$ - связно

16. Связность и непрерывные отображения.

Теор

$(X, \Omega_X), (Y, \Omega_Y)$ - топ. пр-ва

$f : X \rightarrow Y$ - непр.

X - связно $\Rightarrow f(X)$ - связно

17. Связность произведения пространств

Теор

X, Y - топ. пр-ва

$X \times Y$ - связн. $\Leftrightarrow X, Y$ - связн.

Замеч

Любое конечное произведение связных топ. пр-в связно

Теор

$\prod_{i \in I} X_i$ - связно $\Leftrightarrow \forall i \in I \quad X_i$ - связно

18. Компоненты Связности.

Опр

X - топ. пр-во

Компонентой связности т. $x_0 \in X$ назыв. наиб. по включению связное множество, ее содержащее.

$$K_{x_0} = \cup \{M \in 2^X \mid x_0 \in M - \text{связ.}\}$$

Теор

1. $\forall x, y \in X \quad K_x = K_y \text{ или } K_x \cap K_y = \emptyset$

2. компоненты связности - замк.

3. Для любого связ. мн-ва \exists компонента связности, в которой оно целиком содержится

$$\forall M \subseteq X (M - \text{связ.} \Rightarrow \exists x \in X : M \subseteq K_x)$$

4. $\forall x, y, z \in X \quad (x, y \in K_z \Leftrightarrow \exists M - \text{связ.} : x, y \in M \text{ и } z \in M)$

Опр

X - топ. пр-во назыв. вполне несвязным, если $\forall x \in X : K_x = \{x\}$

19. Линейная связность

Опр

Линейно связное пр-во - топ. пр-во, в котором любые две точки можно соединить непр. кривой

(X, Ω) - лин. св., если $\exists f :$

$f : [0, 1] \rightarrow X$ (путь в X) $| f(0) = x$ (нач. пути); $f(1) = y$ (кон. пути),
 $\forall x, y \in X$

Теор

X - топ. пр-во

X - лин. св. $\Rightarrow X$ - св.

Теор

A, B - лин. св. $A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow A \cup B$ - лин. св.

Теор

X, Y - топ. пр-во; $f : X \rightarrow Y$ - непр.

X - лин. св. $\Rightarrow f(x)$ - лин. св.

20. Компактность. Примеры.

Опр

(X, Ω) - топ. пр-во

X - компакт, если из любого открытого покрытия X можно выбрать конечное подпокрытие

$$\forall \{U_i\}_{i \in I}, \quad U_i \in \Omega$$

$$\left(\bigcup_{i \in I} U_i = X \Rightarrow \exists n \in \mathbb{N} \quad \exists \{i_1, \dots, i_n\}_{ij \in I} : \bigcup_{k=1}^n U_{i_k} = X \right)$$

Опр

(X, Ω) - топ. пр-во

$A \subseteq X$ - комп., если оно комп. в индуц. топ.

Теор

1. конечное топ. пр-во всегда компактно
2. дискретное бесконечное множ. не комп.
3. антидискр. множ. комп.
4. $[0, 1]$ - компакт.

Теор

X - комп. $A \subseteq X$ - замк. $\Rightarrow A$ - комп.

Теор

X - комп. $f : X \rightarrow Y \Rightarrow f(x)$ - комп.

След

Комп. - топ. св-во

21. Простейшие свойства компактности.

22. Компактность произведения пространств.

Теор

X, Y - *комп.* $\Leftrightarrow X \times Y$ - *комп.*

Теор

$$\{X_i\}_{i \in I} \text{ - комп. } \Leftrightarrow \prod_{i \in I} X_i \text{ - комп.}$$

23. Компактность и хаусдорфовость

Опр

X назыв хаусдорфф., если

$$\forall x_1 \neq x_2 \in X \quad \exists U_{x_1}, U_{x_2} : \quad U_{x_1} \cap U_{x_2} = \emptyset$$

Теор (1)

X - хаусдорфф. A - комп $\in X \Rightarrow A$ - замк.

Теор

$f : X \rightarrow Y$ непр., биекция

X - комп.

Y - хаусдорфф.

$\Rightarrow f$ - гомеоморфф.

Док-во (1)

$X \setminus A$ - откp?

$x_0 \in X \setminus A$

$\forall x_1 \in A \Rightarrow \exists U_{x_0} \ni x_0; \quad V_{x_1} \ni x_1$

$U_{x_0} \cap V_{x_1} = \emptyset$

$$\bigcup_{x_1 \in A} V_{x_1} \subset A \Rightarrow x_1, x_2, \dots, x_k : \quad \bigcup_{i=1}^k V_{x_i} \supset A$$

$$U_{x_0} = \bigcap_{i=1}^k U_{x_i} \text{ - искомая окр. } U_{x_0} \cap A = \emptyset$$

(Иначе $U_{x_0} \cap V_{x_i} \neq \emptyset, \quad U_{x_i} \cap V_{x_i} \neq \emptyset$)

24. Лемма Лебега. Компактность отрезка.

Теор (Лемма Лебега)

$$X = [0, 1] \subset \bigcup_{i \in I} U_i \quad \{U_i\}_{i \in I} - \text{откр. покр. } X$$

$$\Rightarrow \exists \mathcal{E} > 0 : \forall x_0 \exists i \in I : B(x_0, \mathcal{E}) \subseteq U_i$$

(\mathcal{E} зависит от покр. \mathcal{E} - число Лебега)

След

Отрезок - комп.

25. Критерий компактности подмножеств евклидова пространства.

Теор

$$A \subset \mathbb{R}^n$$

A - комп. $\Leftrightarrow A$ - замк и огр.

Опр

A - огр., если $\exists N : A \subset B(0, N)$

Док-во

$\Rightarrow A$ - замк. т.к. \mathbb{R}^n - хаусдорф.

A - огр. $\{B(0, n)\}_{n \in \mathbb{N}}$

$\Leftarrow A \subset [-N, N] \times [-N, N] \times \dots \times [-N, N] = K$ т.к. огр.

K - комп.

A - замк. в $K \Rightarrow A$ - комп.

26. Теорема Вейерштрасса. Примеры.

Теор (Вейерштрасса)

K - компакт.

$f : K \rightarrow \mathbb{R}$ - непр. $\Rightarrow \exists x_0 \in K :$

$\forall x \in K \quad f(x) \leq f(x_0) \quad (x_0 - \max)$

Док-во

$f(K)$ - комп. $\subset \mathbb{R} \Rightarrow f(K)$ - замк. и огр \Rightarrow

$\sup f(K) \in f(K)$ (замк.)

$\sup f(K) \neq \infty$ (огр.)

$\sup f(K) = f(x_0)$

27. Вторая аксиома счётности и сепарабельность.

Опр

X - обл. II A.C., если в X \exists счетная база

Опр

X - назыв сепараб., если $\exists A \subset X$
 $|A| \leq \aleph_0$ и $ClA = X$

Опр

A - всюду плотно, если $ClA = X$

Теор

X - II A.C. $\Rightarrow X$ - сепараб.

28. Теорема Линделёфа.

Теор

X - II A.C. \Rightarrow из \forall откр. покр. X можно извлечь не более чем счетное подпокрытие

29. Первая аксиома счётности.

Опр

База окр-тей точки

$\forall x \quad \exists \{U_{x_i}\}_{i \in I_x}$

1. $U_{x_i} \in \Omega; \quad x \in U_{x_i}$

2. $\forall U \in \Omega : x \in U \quad \exists U_{x_i} : x \in U_{x_i} \subset U$

Опр

Если \exists база окр-тей:

$\forall x \quad \{U_{x_i}\}_{i \in I_x}$ не более чем счетное $\Rightarrow X$ удовл. I A.C.

30. Из компактности следует секвенциальная компактность (с первой АС).

31. Из секвенциальной компактности следует компактность (со второй АС).

32. Полнота и вполне ограниченность метрических пространств.

Опр

Фунд. послед.

$\{X_n\}$ - *фунд.*, если $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N : \forall n, m > N : \rho(X_n, X_m) < \varepsilon$

Опр

X *назыв. полным*, если \forall *фунд. послед. сходится*

Опр

$\{X_i\}_{i \in I}$ - \mathcal{E} -*сеть*, если $\forall x \quad \exists x_i : \rho(x, x_i) < \varepsilon$

Опр

X *назыв. вполне огранич.*, если $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists$ *конечная \mathcal{E} -сеть*

33. Из полноты и вполне ограниченности следует компактность

Теор (равносильные)

1. X - компактно
2. X - секвенц. комп.
3. X - полн. и вполне огр.

34. Аксиомы отделимости.

Теор (Колмогорова)

$$\forall x, y \in X : x \neq y \Rightarrow \exists U \in \Omega$$

Теор (Тихонова)

$$\forall x, y \in X : x \neq y \Rightarrow \exists U \in \Omega$$

Теор (Хаусдорфа)

$$\forall x, y \in X \quad \exists U_x, U_y : U_x \cap U_y = \emptyset$$

Теор (3)

$$\begin{aligned} &\forall x \in X \text{ и замкнуто } F \subseteq X, \quad x \notin F \\ &\exists U_x \text{ и } U_F : U_x \cap U_F = \emptyset \end{aligned}$$

Теор (4)

$$\begin{aligned} &F_1, F_2 - \text{ замк. } : F_1 \cap F_2 = \emptyset \\ &\exists U_{F_1} \text{ и } U_{F_2} : U_{F_1} \cap U_{F_2} = \emptyset \\ &T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0 \end{aligned}$$

35. Нормальность матрического пространства.

Опр

(X, Ω) - хаусдорф.

X - нормально $\Leftrightarrow \forall F$ - замк., $\forall G \in \Omega \quad F \subseteq G \Rightarrow \exists G' \in \Omega :$

$F \subseteq G' \subseteq ClG' \subseteq G$